

**Ways in which the HIV virus is transmitted representing one of a series of posters in an advertising campaign about AIDS by the Agence Française Lutte Contre le SIDA. Colour lithograph.**

**Publication/Creation**

[France] : L'Agence Française de Lutte Contre le SIDA, [between 1990 and 1999]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/cvgenfax>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

# Le VIH se transmet comme ça :

AGENCE FRANÇAISE DE  
*... lutte contre le sida ...*

Par le sperme et les sécrétions vaginales, par le sang, par transmission materno-foetale

**Par le sperme et les sécrétions vaginales**  
donc par les relations sexuelles sans préservatif avec pénétration anale ou vaginale, qui sont le mode majeur de transmission du virus, autant pour les hommes que pour les femmes. Le risque d'infection par le VIH augmente statistiquement avec le nombre de partenaires, mais un seul rapport non protégé avec une personne atteinte peut suffire pour être contaminé. Quant aux contacts de la bouche avec le sexe ou l'anus, les quelques cas de contamination de ce type sont extrêmement rares. Cependant, il convient d'éviter de recevoir du sperme dans la bouche.

**Par le sang**  
donc par le partage des seringues chez les toxicomanes qui doivent aussi se protéger de la contamination par voie sexuelle en utilisant des préservatifs.

**Par transmission materno-foetale**  
Il existe un risque de transmission de la mère séropositive à son enfant, durant la grossesse ou pendant l'accouchement. L'allaitement peut être une cause de contamination de l'enfant, il est contre-indiqué.