

**An enlarged view of the HIV virus with a list of ten points about how the virus is transmitted. Colour lithograph, 1990.**

**Publication/Creation**

[Lebanon] : World Health Organisation, 1990.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/smax5p2e>

**License and attribution**

You have permission to make copies of this work under a Creative Commons, Attribution, Non-commercial license.

Non-commercial use includes private study, academic research, teaching, and other activities that are not primarily intended for, or directed towards, commercial advantage or private monetary compensation. See the Legal Code for further information.

Image source should be attributed as specified in the full catalogue record. If no source is given the image should be attributed to Wellcome Collection.

# الاحتياطات العامة الواجب اتباعها لمنع انتشار عدوى الأمراض المعدية في موقع الرعاية الصحية

يجب التعامل مع الدم وسوائل الجسم الأخرى كما لو كانت دائمًا مصدر عدوى للأمراض الجرثومية

١. أغسل يديك بالماء والصابون قبل وبعد التعامل مع المريض.

٢. إمتنع عن الملامسة المباشرة للدم وسوائل الجسم الأخرى :

- استعمل دائمًا قفازات نظيفة، وإذا تعذر ذلك استخدم الملاقطة.
- ارتد مريول واقٍ.

٣. أثناء الإجراءات التي تحدث فيها انسكابات أو تاثير الدم (جراحة، توليد...):

استخدم غطاء وجهي أو قناع ونظارة خمامة الوجه

ارتد مريول خاص غير مسرب للسوائل

غطّ جميع جروحك المفتوحة بضمادة غير مسربة للماء

٤. استخدم أدوات جراحية وإبر ومحاقن معقمة ذات استعمال واحد:

بعد استخدامها، القها في وعاء مقاوم للنقب موضوعاً في أقرب مكان لك  
إمتنع عن نزع الإبر أو ثنيها أو كسرها أو إعادة تغطيتها بعد الاستعمال

٥. تأكد من تعقيم الأدوات الجراحية بطريقة سليمة قبل وبعد استعمالها.

٦. ضع العينات المخبرية في أوعية محكمة الغطاء وغير قابلة للكسر لمنع التسرب أثناء النقل.

٧. تخلص من النفايات السائلة بحذف في المكان المخصص لها (كالرحاض أو المغسلة) و النفايات الصلبة (ضمادات و مفرغات...) بوضعها في أكياس عازلة قبل نقلها للتخلص منها.

٨. في حال الانعاش فم لفم . استخدم قطع فموية (mouth piece) أو أكياس انعاش (embo-bags) ونظفها جيداً وطهرها قبل استخدامها مجدداً.

٩. ضع الغسيل وبياضات المريض المتتسخة في أكياس مانعة للتسرب في نفس المكان الذي استخدمت فيه قبل نقلها إلى المكان المخصص لغسلها. إذا تعذر ذلك ، أطوها مع مراعات أن تكون الإجراء المتتسخ في الداخل.

١٠. في حال توفي المريض بالسيدا في مركز عملك . اتبع الاحتياطات الموجزة أعلاه عند القيام بالإجراءات اللازمة

**ملاحظة:** إذا تعرضت لوخز إبرة مستعملة أو سوائل جسم مريض أبلغ في الحال المسؤولين عنك  
لإتخاذ التدابير اللازمة

