

**Ankylostomes, ascaris, trichostrongylines : une dose de 'Alcopar' les expulse / Burroughs Wellcome & Co. (the Wellcome Foundation Ltd.).**

**Contributors**

Burroughs Wellcome and Company.  
Wellcome Foundation Ltd.

**Publication/Creation**

London : Burroughs Wellcome and Co., [1963?]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/ncz57nww>

**License and attribution**

You have permission to make copies of this work under a Creative Commons, Attribution license.

This licence permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See the Legal Code for further information.

Image source should be attributed as specified in the full catalogue record. If no source is given the image should be attributed to Wellcome Collection.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

*une dose d'Alcopar' les expulse*

**ankylostomes  
ascaris  
trichostrongylés**

## Chaque fois que vous aurez à traiter une helminthiase intestinale... pensez d'abord à l'Alcopar'

Le traitement par l'Alcopar' est:

**Simple** une dose unique de 5 grammes suffit dans la plupart des cas.

**Sûr** il ne produit ni réaction toxique ni effet secondaire pénible.

**Efficace** des taux de guérison de 90% et même plus sont fréquemment obtenus.

**Économique** l'Alcopar' est actif aussi bien contre les infestations mixtes que contre les infestations simples.

**Suffisant à lui seul** il ne nécessite ni jeûne, ni purgation, ni autre traitement adjuvant.

### Vous pouvez employer l'Alcopar'

- Pour le traitement individuel, quel que soit l'âge du malade.
- Pour le traitement collectif dans les écoles, cliniques, etc.
- Pour le traitement de masse.

### Ankylostomose et ascariidiose

Non traitée, l'ankylostomose peut persister pendant de longues années (jusqu'à 8 ans) chez les sujets qui ont quitté les régions où cette parasitose est fréquente.

De nombreux auteurs ont souligné la haute valeur de l'Alcopar'. van Oye (1961) écrit: "... l'Alcopar' possède trois qualités que l'on est en droit d'attendre d'un médicament destiné au traitement de masse: il est efficace, non toxique et facile à administrer".

Jusqu'à 50 pour cent des malades atteints d'ankylostomose hébergent aussi des ascaris.

L'Alcopar' expulse de l'intestin l'ankylostome et l'ascaris. Seaton (1962) déclare: "... il est avantageux de faire d'une pierre deux coups en employant le biphénium qui agit contre les deux parasites".

L'expérience clinique ne cesse de montrer que l'Alcopar<sup>®</sup> est l'anthelminthique de choix contre les infestations par l'ankylostome, l'ascaris et *Trichostrongylus* sp.

### Trichostrongylose

Dans les pays du Moyen et de l'Extrême-Orient, la trichostrongylose est souvent associée à l'ankylostomose.

En Egypte, Nagaty et Rifaat (1959) ont employé l'Alcopar<sup>®</sup> contre diverses helminthiases. Les examens pour la recherche des oeufs de parasites dans les selles de sujets atteints de trichostrongylose étaient négatifs dans 82% des cas, 3 semaines après le traitement par l'Alcopar<sup>®</sup>. Dans les cas où l'ankylostomose était associée à la trichostrongylose, 95% des malades étaient aussi débarrassés de leurs ankylostomes. Une dose unique de 5 grammes d'Alcopar<sup>®</sup> était administrée. L'Alcopar<sup>®</sup> fut parfaitement toléré par tous les malades dont l'âge allait de 4 ans à 60 ans.

Plusieurs auteurs font aussi mention de l'activité de l'Alcopar<sup>®</sup> contre les oxyures.

### Posologie

Adultes et enfants de plus de 2 ans: contenu d'un sachet dose, dans de l'eau, à jeun et au moins une heure avant un repas afin d'assurer un contact aussi étroit que possible entre l'Alcopar<sup>®</sup> et les parasites. En cas de diarrhée tenace, trois doses de 5 grammes (3 sachets) sont parfois nécessaires; elles seront prises le même jour, en 3 fois, entre les repas.

Enfants de moins de 2 ans ou pesant moins de 10 kg: moitié de la dose pour adultes. Cette dose réduite peut être divisée en deux parties égales administrées l'une le matin l'autre le soir ou le lendemain. Pour éviter les nausées que pourrait causer l'amertume de l'Alcopar<sup>®</sup>, il est conseillé de donner le médicament aux enfants dans une boisson sucrée.

En cas de vomissements graves ou de déshydratation avancée, quel que soit l'âge du malade, on rétablira



# Granulé 'Alcopar'

trade mark

*Sachets-dose de 5 grammes contenant une quantité d'hydroxynaphtoate de bépénium équivalente à 2,5 grammes de bépénium base. Paquets de 25 sachets.*

l'équilibre hydrique avant d'administrer le traitement par l'Alcopar'.

Dans les régions où les helminthiases sont très répandues le danger de réinfestation est constant. L'administration systématique d'Alcopar' est le moyen décisif de mettre fin à ce danger.

## Bibliographie

- Nagaty, H. F., et Rifaat, M. A. (1959) *J. trop. Med. Hyg.*, **62**, 255.  
Seaton, D. R. (1962) *Practitioner*, **188**, 58.  
van Oye, E. (1961) *Trans. R. Soc. trop. Med. Hyg.*, **55**, 117.



**Burroughs Wellcome & Co., Londres**

*(The Wellcome Foundation Ltd.)*