

A woman making a solution to cure her child's diarrhoea: child health in Kenya. Colour lithograph by Department of Child Health, ca. 2000.

Publication/Creation

Nairobi (S.L.P. 43319) : Idara ya afya ya watoto, [2000?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/m8tm74c7>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Jinsi ya kutengeneza dawa ya kurudisha MAJI NA NGUVU katika mwili wa mtoto anayehara



Mtoto
anayehara
anahitaji
kulindwa
vyema

1 Nawa mikono yako



2 Safisha mkebe wa Kimbo
wa nusu kilo ama kipimo
kingine chochote cha 500ml.



3 Jaza kufikia kipimo cha
500ml. Kama ni mkebe wa
Kimboujaze kufikia
msatari mwekundu. Kata
pembe ya pakiti ya dawa hiyo.



4 Mwaga dawa YOTE
ndani ya hayo maji



7



6



Mpe mtoto anywe
pole pole, nusu ya
kikombe kila baada
ya kuhaba. Mpe
mtoto kiasi
atakachotaka
kunywa.
Hakikisha ya kwamba
mtoto amemaliza
mkebe mmoja wa
dawa mchana na
mkebe mwininge
usiku.
Ukoroga dawa ya
kutumia mchana,
koroga nyigine
mpya kutumia usiku

5 Koroga mpaka dawa
yote iyeyuke



Muhimu

1. Endelea kumpa mtoto chakula wakati Wote
anapoendelea kuhaba. Mpe chakula kingi
zaidi ya kawaida kwa wiki moja baada ya
kuhaba kuisha.
2. LINI UMUONE AFISA WA AFYA
Ikiwa mtoto wako hajapata nafuu katika
muda wa siku tatu au akionyesha
mojawapo ya dalili zifuatazo:-
 - Kushidwa kunyonya au kunywa
 - Kutapika kila kitu
 - Kunywa kwa shida
 - Akipata homa (joto jingi)
 - Damu kwenye kinyezi(choo)
 - Ugonjwa ukizidi
3. Mtoto akiwa ana nyonya, endelea
kumnyonyesha
4. Mpeleke mtoto kituo cha afya apatiwe
madini ya zinc