

Pharmacopoea norvegica : regia auctoritate edita.

Publication/Creation

Christianiæ : Cammermeyer, 1879.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/cesg98tt>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>





22500292386





Digitized by the Internet Archive
in 2014

<https://archive.org/details/b20407099>

36 E 34751

PHARMACOPOEA NORVEGICA.

EDITIO ALTERA

ITERUM TYPIS DESCRIPTA.


REGIA AUCTORITATE EDITA.



CHRISTIANIÆ.

IMPENSIS ALB. CAMMERMEYER.

1879.



34751

PHARMACOPOEA NORVEGICA.

EDITIO ALTERA

ITERUM TYPIS DESCRIPTA.

REGIA AUCTORITATE EDITA.

CHRISTIANIÆ.

IMPENSIS ALB. CAMMERMEYER.

1879.

8872 446
15024

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY	
Coll.	WellMOrac
Coll.	
No.	QV 740
	. ENG
	1879
	P 53

M15768

Typis officinae Mallingianae.

Index.

	Pag.
Præfatio alteræ Pharmacopoeæ Norvegicæ editionis nunc iterum typis descriptæ	V
Præfatio alteræ Pharmacopoeæ Norvegicæ editionis . . .	VII
Prolegomena et canones	X
Abbreviata & signorum explicatio	XIV
Materia medica	1
Apparatus, qvi in omnibus pharmacopoliis præsto esse debent	279
Reagentia	280
Solutiones exploratoriæ	283
Tabula rationem inter pondus medicum hucusqve usitatum et pondus metricum exhibens	284
Tabula rationem inter pondus metricum et pondus medi- cum hucusqve usitatum exhibens	285
Index medicaminum, qvæ rubris litteris et nota veneni signata in armariis obseratis servanda sunt	286
Index medicaminum, qvæ rubris litteris signata in vasis vel in cistulis scriniisve stannatis servanda sunt .	287
Tabula qvantitatem maximam medicamentorum vehemen- tium adultis interne pro dosi dispensandam exhibens	290
Tabula exhibens rationem inter pondus specificum Alco- holis cum aqua destillata mixti et partes centesimas Alcoholis anhydri, ratione habita voluminis et pon- deris	292

IV

	Page
Tabula exhibens rationem inter pondus specificum et co- piam acidi anhydri, quæ in partibus centum (100)	
Acidi acetici cum aqua diluti continetur (+ 15° C.)	295
— " " Acidi hydrochlorati "	296
— " " Acidi nitrici "	297
— " " Acidi sulphurici "	298
— " " Ammoniaci (+ 14° C.) . . .	299
Tabula, quæ approximate indicat, quot partes Aquæ fri- gidæ ad singulas partes medicaminum quorundam solvendæ requirantur	300
Tabula pondus atomorum demonstrans	302
Index medicaminum, quorum fortitudo vel compositio in Pharmacopoeæ Ed. II commutata est	303
Index medicaminum et quæ in alteram Pharmacopoeæ editionem nunc iterum typis descriptam nova recepta sunt et de quibus aliquid mutatum est	306
Index	308
Addenda & corrigenda	319

Omnibus alteræ Pharmacopoeæ Norvegicæ editionis exemplaribus divenditis nova exemplaria typis describerentur necesse erat. Nonnulla nova medicamenta, quæ nunc frequenter adhibentur et quæ partim in formulam medicamenta vendendi jam recepta sunt, item nonnulla composita præparata ad plebis necessitatem præcipue accommodata digna, quæ hac occasione data adderentur, editoribus visa sunt. Item synonyma ad pharmacopoeas, quæ postquam altera nostræ pharmacopoeæ editio primum typis descripta erat editæ sunt, Svecicam, Germanicam, Britannicam et pharmacopoeam Americæ septentrionalis, accommodarentur necesse erat.

Additamenta et graviores mutationes in tabula singillatim enumerata sunt. Quæ additamenta et mutationes iisdem, qui hanc editionem olim componebant, debentur, excepto tamen Dr. F. P. Möller, qui nunc quidem peregre profectus est. Chirurgus autem centurialis H. Lindboe editores adjuvit.

Præfatio.

Quum omnia exemplaria Pharmacopoeæ Norvegicæ vendita essent, novamque et emendatam editionem ipsum tempus postulare videretur, edicto regio 2 Februarii 1867 cura nobis mandata est, ut novam editionem Pharmacopoeæ Norvegicæ conscriberemus, in qua systema ponderis Gallicum, quod metricum vocant, usurpandum esset, iisque ut fundamento nitendum, quæ inter delectos viros, e Dania, Svecia, Norvegia ad emendandam Pharmacopoeam missos, a. 1865 Stockholmiae convenerunt. Hoc opere nunc in lucem prodeunte, pauca nobis præfari licebit.

Medicaminum 687, quæ priore editione continentur, circiter 250, composita plerumque et quidem pharmaceutica, in hac omisimus; quæ in priore editione non erant, circiter 60 recepimus.

In compositione et fortitudine medicaminum propter ea, quæ de hac re convenerant, non pauca mutanda fuerunt; ex his satis erit hoc loco tincturas efficaciores nominare, quarum fortitudinem a 20% ad 10% minui-
mus; omnes majoris momenti mutationes, quæ in eo genere factæ sunt, in tabula singillatim enumeravimus.

Pro pondere medicinali editionis prioris systema metricum secundum edictum, quod supra diximus, in hanc editionem induximus. Ratio inter pondus grammatum et pondus adhuc usitatum medicinale in tabula et accurate et, ut ad usum aptior esset, approximate indicata est.

VIII

Ut systema metricum induximus, ita latius quam in priore editione systema, quod decimale dicunt, usurpavimus, ubicunque ita fieri potuit, ut fractis numeris non uteremur nec proportionem singularum partium eorum medicaminum, quæ ex priore editione retinuimus, multum mutaremus.

Ad majorem numerum præparatorum chemicorum præcepta parandi adjecimus.

Ne præter necessitatem cariora fierent hæc medicamina, quæ plerumque in officinis technicis parantur, neve pharmacopola, præceptum Pharmacopoeæ seqvi coactus, novas et emendatas rationes, quas monstrarent litteræ et artes excultiores, adhibere impediretur, majore numero horum præceptorum pharmacopolæ svadere, non impedire volumus.

De synonymis has spectavimus Pharmacopoeas: Pharmacopoeam Norvegicam 1854, Ph. Svecicam 1869, Ph. Danicam 1868, Ph. Borussicam 1862, Ph. Germaniæ 1867, Ph. Austriacam 1869, British Pharmacopoeia 1867, Pharmacopoeia of the United States 1864, Pharmacopée Française 1866.

In addendis synonymis majores compositionis fortitudinisve mutationes plerumque notavimus, id quod summa cura in synonymis e Pharmacopoeis Svec. et Dan. receptis observatum est.

Ubi præparata hujus editionis a priore multum discrepant, id propria annotatione significavimus.

Præter indices et tabulas, quas supra diximus, hæc quoque adjecta sunt: Index reagentium et apparatus quorundam, qui in omnibus pharmacopoliis præsto esse debent, tabulæ Alcoholis, Ammoniaci, acidorum quorundam, tabula ponderis atomorum, tabula, qua ostenditur solubilitas in aqua medicaminum quorundam officinalium.

Hoc opus in publicum edentes maximas gratias agimus auctoribus novarum Pharmacopoeiarum, Svecicæ et Danicæ, quæ, dum ultimam operi nostro manum imponi-

mus, summo nobis usui fuerunt. Et inter eos singularibus verbis laudandus est N. J. Berlin, præses regii collegii sanitatis Svecici, qui, ut consilio et opera nobis adesset, nec tempori nec viribus pepercerit.

Pharmacopolis quoque medicisque haud paucis Norvegicis gratia debetur maxima, quod plurima et quidem utilissima prompto animo nobis impertiverunt.

Labores nostri cum Danis et Svecis conjuncti non plenam illi quidem similitudinem efficere potuerunt, id quod in primo hujus generis conatu non expectandum erat, præsertim quum priores Pharmacopoeæ, quibus ut fundamento hoc commune opus niti debuit, tot et tantis rebus inter se discreparent; summam tamen propositi partem, communem medicaminum ejusdem nominis compositionem, assecuti sumus; quod quanto sit usui, facillime æstimabitur, si incommoda prioris dissimilitudinis in hoc genere haud infrequentia spectaveris, quæ incommoda, commeatu inter gentes regionum septentrionalium in dies augescente, etiam majoris momenti fore apparet.

Ideo gravissimas horum incommodorum causas novis Pharmacopoeis Scandinavicis summotas crediderimus. Quod in hac re reliquum est, id nunc quidem, primo gradu et difficillimo facto, post tempus non nimis longum eo facilius perfici posse speramus.

Die 31 Maji 1870.

E. F. Lochmann,
Medicinæ Professor.

O. M. N. Lund,
Medicus.

F. P. Møller,
Dr. philos., Pharmacopola.

H. H. Hvoslef,
Dr. philos., Pharmacopola.

Prolegomena et canones.

Mensuræ et pondera, quibus medici in medicamentis præscribendis et pharmacopolæ in medicamentis ad usum medicum dispensandis uti debent, hæc sunt:

Principium mensuræ longitudinis est **metrum Gallicum**, quod pedibus Norvegicis 3,187 respondet.

1 **metrum** continet . . . 10 decimetra.

1 decimetrum „ . . . 10 centimetra.

1 **centimetrum** „ . . . 10 millimetra.

Principium ponderis est **gramma Gallicum**. Libra mercatoria Norvegica („Skaalpund“) grammata 498,1137, libra medica Norvegica grammata 357,8452 exæquat.

1 **kilogramma** continet 10 hectogrammata.

1 hectogramma „ 10 decagrammata.

1 decagramma „ 10 grammata.

1 **gramma** „ 10 decigrammata.

1 decigramma „ 10 centigrammata.

1 **centigramma** „ 10 milligrammata.

Mensura, quæ **litrum** vocatur, kilogramma unum vel mille centimetra cubica aquæ destillatæ sub temperatura 4^o exæquat. Litrum unum respondet mensuræ, quam „Pot“ vocamus, 1,036.

1 kilolitrum continet . . . 10 hectolitra.

1 hectolitrum „ . . . 10 decalitra.

1 decalitrum „ . . . 10 litra.

1 **litrum** „ . . . 10 decilitra.

1 decilitrum „ . . . 10 centilitra.

1 centilitrum „ . . . 10 millilitra.

XI

Thermometrum centum graduum sive Celsiusum ad gradum caloris constituendum in hac Pharmacopoea Norvegica editione adhibetur.

Pondera specifica calore graduum quindecim (+ 15°) definita sunt.

Medicamina, quibus continentur substantiae volatiles, ita asservanda sunt, ut nihil volatile deperdatur.

Plantarum partes omnes, quantum fieri potest, e plantis in nostra patria sua sponte nascentibus potius quam e cultis colligendae et diligenter siccandae sunt. In receptaculis ligneis vel vitreis vel porcellaneis vel metallicis ita servandae sunt, ut quum insecta tum lux, humor partesque pulverulentae, quae in aëre insunt, ab iis arceantur. Ne sint mucidae neve cariosae; prospiciendum est, ne colorem, odorem, saporem proprium amittant.

Pulveres. Substantiae in pulverem redigendae primum ab omnibus partibus alienis adhaerentibus vel immixtis purgentur et adhibito calore 60°—65° non excedente caute siccantur, prius, si opus est, concisae vel alia ratione comminutae. Deinde substantiis in mortario vel alia ratione contritis et in cribrum supra infraque obtectum immissis, pulvis quassatione secernatur. Pulvis secretus probe commisceatur et, si opus est, iterum caute siccetur, tum in vasis probe siccatis, bene obturatis, a luce remotis servetur. Partes remanentes substantiarum vegetabilium abjiciendae sunt. Parvam tantum copiam pulverum ex substantiis organicis paratorum servare licet. Pulveres vegetabiles paratos emere pharmacopoeae non licet.

Pulverum tria exstant in pharmacopoliis genera.

1. **Pulvis crassus**, qui per cribra trajiciendus est confecta ex ferro laminato stannoque obducto, quorum fundus foramina habeat rotunda diametro circiter 1,5 millimetri.
2. **Pulvis communis**, qui per cribrum bombycinum tra-

jiciendus est ita contextum, ut singula centimetra fila circiter triginta (30) capiant vel ut singula centimetra quadrata foramina habeant circiter 1000.

3. **Pulvis subtilissimus**, qui per cribrum bombycinum trajiciendus est ita contextum, ut singula centimetra fila circiter quinquaginta (50) capiant vel ut singula centimetra quadrata foramina habeant circiter 2500.

Si de subtilitate pulveris in formula medica nihil præscriptum est, pulvis communis dispensetur. Cribrum setaceum adhibere licet, si pulverem ejusdem subtilitatis præbet.

Concisio ita instituatur, ut omnes partes eadem fere sint magnitudine; partes pulverulentæ cribro secernantur.

Parvam tantum copiam partium vegetabilium concisarum servare licet.

Species. Ad species parandas cribra adhibeantur confecta ex ferro laminato stannoque obducto, quorum sit fundus foraminibus rotundis diametro circiter 4,5 millimetri trajectus, exceptis iis, de quibus in formulis aliter præscriptum est.

Nisi aliud diserte præscriptum est:

Maceratio fiat calore 15° — 25° inter agitationem vel quassationem sæpius repetitam;

Digestio fiat calore 35° — 40° inter agitationem vel quassationem sæpius repetitam.

Emplastra semper linteo, nisi aliud medicus præscripsit, illinenda sunt. Nisi in formula medica alia illitura expresse postulatur, centum (100) centimetris quadratis lintei vel alutæ vel serici grammata duodecim (12) cujusvis emplastri generis illinantur, excepto Emplastro adhæsivo, cujus grammata duo (2) adhibenda sunt, Emplastro gummoso, cujus grammata sex (6), et Emplastro Cantharidum colato, cujus grammata decem (10) requiruntur.

Pilulæ. In pilulis parandis hæ regulæ observandæ sunt. Si præceptum medicum ejusmodi est, ut massa

XIII

pilularis ex substantiis præscriptis confici non possit, pharmacopolæ vel aqvam vel Syrupum Sacchari vel Spiritum vel Glycerinum vel Radicem Althææ pulveratam addere licet et pilulas ita formare, ut, etiamsi pondus earum paullo majus fiat, numerus tamen idem sit, quem medicus aut diserte præscripsit aut præscribere voluisse videtur. Si pondus pilularum in formula medica non definitum est, statuere licet, eum voluisse, ut singulæ pilulæ decem centigrammata (0,10 gram.) substantiarum omnium nominatim præscriptarum continerent. Nisi medicus aliud præscripserit, pilulæ Lycopodio conspergendæ sunt. Pharmacopolam substantiam ejusque copiam, quam sua sponte addiderit, in formula medica significare oportet.

Signa medicamentorum dispensatorum in charta alba notanda sunt, si medicamenta usui interno inserviunt, in charta rubra vel cærulea vel aliter colorata, si externo usui inserviunt.

Medicamina composita, si ratio parandi in Pharmacopoea indicata est, secundum formulas præscriptas accurate in pharmacopoliis paranda sunt; sin formulæ signo V notatæ sunt, iis non teneri debet pharmacopola, sed licebit etiam alias parandi rationes sequi.

Vasa ceteraque receptacula, quibus medicamina in pharmacopoliis servantur, nominibus officinalibus hujus editionis Pharmacopoeæ et, exceptis iis, quæ in adjectis tabulis tali modo signavimus: †† vel: †, nigris litteris notanda sunt.

Abbreviata & signorum explicatio.

Ph. N. Ed. I.	significat	Pharmacopoeam Norvegicam 1854.
Ph. Svec.	„	Pharmacopoeam Svecicam 1869 & 1871.
Ph. Dan.	„	Pharmacopoeam Danicam 1868 & 1869.
Ph. Germ.	„	Pharmacopoeam Germanicam 1872.
Ph. Austr.	„	Pharmacopoeam Austriacam 1869.
Ph. Brit.	„	British Pharmacopoeia 1867. Second reprint, with additions, 1874.
Ph. U. St.	„	Pharmacopoeia of the United States of America. Fifth decennial revision 1876.
Ph. Fr.	„	Pharmacopée Française 1866.
Cfr.	„	Confer.
Gram.	„	Gramma.
CC.	„	Centimetrum cubicum.
V.	„	Vide.

† indicat medicamina, quæ rubris litteris signata in vasis vel in cistulis scriniisve stannatis servanda sunt.

†† indicat medicamina, quæ rubris litteris et nota veneni signata in armariis obseratis servanda sunt.

MATERIA MEDICA.

WATKINS MEDICAL

Acetas kalicus.

$K.C_2H_3O_2$.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

*Ph. Germ.: Kali aceticum. Ph. Brit.: Potassæ acet-
tas. Ph. U. St.: Potassii acetat. Ph. Fr.: Acétate
de potasse.*

Edikesurt Kali.

Pulvis candidus, squamosus, crystallinus, in aëre cito deliquescens, in aquæ partibus duabus (2), in spiritus concentrati partibus quatuor (4) plane solubilis.

Solutio acidulata ne solutione sulphidi hydrici, alkalina ne solutione sulpho-hydratis ammoniaci præbeat præcipitatum (metalla). Solutio acido nitrico acidulata ne chloreto baryco (sulphates), nitrato argenteo aut nullam aut exiguum certe turbationem exhibeat (chloreta).

In vitro bene clauso servetur.

†† Acetas morphicus.

$C_{17}H_{19}NO_3. HC_2H_3O_2$.

Ph. N. Ed. I.: Acetas morphinicus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

*Ph. Germ.: Morphinum aceticum. Ph. Brit. & Ph. U. St.:
Morphiæ acetat.*

Edikesurt Morphin.

Pulvis albidus, sapore amaro, odore ex acido acetico, in aqua additis guttis nonnullis acidi acetici facile solu-

bilis, difficilior in spiritu; acido nitrico frigido affuso colore e rubro flavo tingitur.

Solutio addita solutione hydratis natrici præbeat sedimentum album, quod in eadem solutione hydratis natrici abunde addita facile solvatur, (si præcipitatum non plane solvitur, adesse putandum est narcotinum); ne spargat inter hæc odorem ammoniaci (salia ammoniacalia). Ignitus nullo residuo relicto deflagret.

In vase bene clauso cautissime servetur.

Dosis maxima: *Centigrammata tria* . . . 0,03 gram.

† Acetas plumbicus.

$\text{Pb}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Plumbum aceticum. Ph. Brit. & Ph. U. St.:

Plumbi acetas. Ph. Fr.: Acétate de plomb.

Edikesurt Blyoxyd.

Crystalli coloris expertes in aquæ frigidæ partibus duabus (2), fervidæ parte dimidia, spiritus concentrati partibus octo (8) solubiles. Aëri expositæ crystalli aquam paulatim perdunt et acido carbonico recepto turbide in aqua solvuntur. Solutæ solutione ammoniaci abunde addita colorem cæruleum ne induant (Cu). Si plumbum e solutione aquosa, solutione sulphidi hydrici abunde addita, eliminaveris, liquor filtratus, si calefeceris, omnino aufugiat (Fe, Ca).

In vase bene clauso caute servetur.

Præparata:

Solutio subacetatis plumbici.

„ „ „ diluta.

Ungventum acetatis plumbici.

„ „ „ compositum.

Acetum aromaticum.

Ph. Svec.

Cfr. Ph. Germ. & Ph. Austr.: Acetum aromaticum. Cfr.

Ph. Fr.: Vinaigre aromatique des hôpitaux.

Aromatisk Edike.

Rp.	Ætherolei Citri	1
	„ Juniperi	1
	„ Lavandulæ	1
	„ Menthæ piperitæ	1
	„ Rosmarini	1
	<i>singulorum partem unam.</i>	
	„ Caryophylli partes tres	3
	Spiritus concentrati partes centum	100
	Acidi acetici partes trecentas	300
	Aqvæ partes octingentas	800.
	Misce conqvassando.	
	Limpidum dispensetur.	
	Servetur in vase bene clauso.	

Acetum Scillæ

loco Aceti Scillæ Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Austr.: Acetum Scillæ. Cfr. Ph. Germ. & Ph. Brit.: Acetum Scillæ. Ph. U. St.: Acetum Scillæ (10 % Bulb. Scillæ). Ph. Fr.: Vinaigre scillitique (circit. 8 % Bulb. Scillæ).

Strandløg-Edike.

Rp.	Bulbi Scillæ siccati et concisi partes decem . . .	10
	Acidi acetici partes viginti	20
	Aqvæ partes octoginta	80.
	In vase clauso per triduum macerata colentur et exprimantur.	

Sit limpidum. Servetur in vase vitreo bene clauso.

Præparatum:

Oxymel Scillæ 1 ad 3.

Acidum aceticum

(Partes 100 continent acidi anhydri partes 25.)

loco Ph. N. Ed. I.: Acid. acetic. conc. (65 %) & Acid. acetic. dilut. (10 %).

Ph. Svec. & Ph. Dan. (25 %).

Ph. Germ.: Acid. acet. dilut. (30 %). Ph. Austr.: Acid. acetic. dilut. (20,4 %). Ph. Brit.: Acidum aceticum (28 %). Ph. U. St.: Acid. aceticum (30 %). Cfr. Ph. Fr.: Acide acétique cristallisable.

Edikesyre.

Liquor limpidus, coloris expers, volatilis, odore pungenti et acido, pondere specifico 1,040. Acidum cum aqua dilutum ne solutione sulphidi hydrici (metalla) neve nitrate argentario (acid. hydrochlorat.) neve chloreto baryeo (acid. sulphuric.) neve chloreto baryeo et solutione chlori (acid. sulphuros.) præbeat præcipitatum; carbonate natrico saturatum ne spargat odorem empyreumaticum (substantiæ empyreumaticæ).

Gramma unum (1) acidi 49 CC. solutionis carbonatis natrici exploratoriæ vel carbonatis natrici anhydri 0,26 gram. saturat.

In vase bene clauso servetur.

Præparata:

Acetum aromaticum.

„ Scillæ.

Mixtura camphorata acida.

†† Acidum arsenicosum.

As_2O_3 .

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Dan.

*Ph. Germ. & Ph. Austr.: Acidum arsenicosum. Ph. Brit.
& Ph. U. St.: Acidum arseniosum. Ph. Fr.: Acide
arsénieux.*

Arsensyrling. Hvid Arsenik.

Massa aut pellucida, vitrea, amorpha aut alba, porcellanica, crystallina, in aqvæ partibus circiter sexaginta (60) solubilis; in carbone candenti posita prorsus avolat odorem alliaceum spargens. Solutionibus alkalium causticorum vel carbonicorum plane solvitur. Acido hydrochlorato abunde addito sedimentum flavum ne oriatur (As_2S_3).

Dosis maxima: *Milligrammata quinque* 0,005 gram.

Præparatum:

Liquor arseniitis kalici 1 in 100.

Acidum benzoicum.

$\text{H.C}_7\text{H}_5\text{O}_2$.

Ph. N. Ed. I.: Acidum benzoicum sublimatum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

*Ph. Germ., Ph. Brit. & Ph. U. St.: Acidum benzoicum
(sublimatum). Ph. Fr.: Acide benzoïque par subli-
mation.*

Flores Benzoës.

Benzoësyre.

E Resina Benzoë sublimatione paretur.

Crystalli albidæ vel subflavescentes, semipellucidæ, serici instar nitentes, odore benzoino, in aqvæ frigidæ

partibus ducentis (200), fervidæ partibus viginti quatuor (24), in spiritu facile solubiles. Ignitæ ad caloris gradum 120 liqvescunt et demum calore aucto prorsus avolant; carbonem ne secerant (ex acido hippurico, saccharo etc.); cum solutione non nimis diluta hypermanganatis kalici digestæ odorem ætherolei amygdalarum amararum ne spargant (acidum cinnamomicum).

V. **Resina Benzoë** crassiuscule pulverata in sartaginem ferream planam margine circiter centimetra quinque alto instructam ita immittatur, ut stratum fere centimetrum crassum habeas. Supra aperturam sartaginis expandatur charta bibula laxioris texturæ, cujus margines ad externam sartaginis oram glutine amylaceo affigantur; supra sartaginem et chartam expansam conus vel cylindrus clausus e charta satis densa paratus vel tubus geniculatus construatur et funiculi ope ad parietes sartaginis fortiter alligetur. Apparatus ita constructus in laminam ferream imponatur, quo facto ignis lenis sub lamina accendatur. Calefactione interrupta conus interdum elevetur et crystalli ibi et in charta bibula adhærentes removeantur, quod usque eo repetendum est, dum omnis acidi copia avolaverit.

Præparatum:

Tinctura Opii benzoica 1 : 200.

Acidum citricum.

$H_3. C_6H_5O_7. H_2O.$

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Acide citrique. Ceteræ: Acidum citricum.

Citronsyre.

Crystalli coloris expertes, in aqua et spiritu facile solubiles, ignitæ nullo residuo relicto conflagrantes. Solutio aqyosa ne solutione sulphidi hydrici (metalla)

neve oxalate ammonico (Ca) neve chloreto baryco (acid. sulphuric.) neve acetate kalico (T) neve chloreto calcico (Ox.) præbeat præcipitatum.

Præparatum :

Liquor citratis kalici 4 ad 100.

Acidum gallotannicum. Tanninum.

$C_{14}H_{10}O_9$.

Ph. N. Ed. I.: Acidum tannicum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Acide tannique. Ceteræ: Acidum tannicum.

Tannin.

Pulvis e flavescenti albidus, saporis fortiter adstringentis, facile in aqua, difficilior in spiritu solubilis.

Cum aqua solutionem prorsus limpidam præbeat (substantiæ resinaceæ), ignitus nullo fere residuo relicto conflagret.

Acidum hydrochloratum.

(Partes 100 continent acidi anhydri partes 25.)

Ph. N. Ed. I.: Acidum hydrochloricum concentratum
(circiter 20 %).

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Acid. hydrochloricum (25 %). Ph. Austr.: Acid. hydrochloric. concentrat. purum (24,24 %). Ph. Brit.: Acid. hydrochloricum (31,8 %). Ph. U. St.: Acid. muriaticum (32,2 %). Ph. Fr.: Acide chlorhydrique dissous (circ. 34 %).

Chlorvandstofsyre. Saltsyre.

Liquor limpidus, coloris expers, volatilis, odoris pungentis, pondere specifico 1,124.

Si acidum aqua diluitur, ne solutione sulphidi hydrici addita præbeat præcipitatum, etiamsi in vase clauso digestum per aliquod tempus sepositum sit (metalla, As); si acidum solutione ammoniaci supersaturetur, solutione sulpho-hydratis ammoniaci addita ne turbetur (Fe). Acidum aqua dilutum ne chloreto baryco (acid. sulphuric.) neve chloreto baryco et solutione chlori (acid. sulphuros.) turbetur, neve iodeto kalico et amylo cocto addito colorem cæruleum exhibeat (Cl).

Gramma unum (1) acidi solutionis carbonatis natrici exploratoriæ 68,5 CC. vel 0,36 gram. carbonatis natrici anhydri saturat.

Servetur in vitro epistomio vitreo clauso.

Adhibetur ad præparationem:

Ætheris chlorati spirituos.

Acidi nitrici hydrochlorati 2 in 3.

Tincturæ Chinoidini 5 - 100.

Acidum hydrochloratum dilutum.

(Partes 100 continent acidi anhydri partes 10.)

Ph. N. Ed. I.: Acidum hydrochloricum dilutum (10 %).

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Acidum hydrochloricum dilutum (12,5 %).

Ph. Austr.: Acid. hydrochloric. dilut. purum (12,4 %).

Ph. Brit.: Acidum hydrochloricum dilutum (10,58 %).

Ph. U. St.: Acidum muriaticum dilutum (circit. 8 %).

Fortyndet Chlorvandstofsye.

Rp. **Acidi hydrochlorati partes duas** 2

Aqvæ destillatæ partes tres 3

vel tantam copiam, ut liqvores commixti sint pondere specifico 1,049.

Gramma unum (1 gram.) acidi solutionis carbo-

natis natrici exploratoriæ 27,4 CC. vel carbonatis natrici anhydri 0,145 gram. saturat.

Servetur in vitro epistomio vitreo clauso.

Dosis maxima: *Guttæ viginti* (20).

†† Acidum hydrocyanatum.

(Partes 100 continent acidi anhydri partes 2.)

Ph. N. Ed. I.: Acidum hydrocyanicum (2 %).

Ph. Brit. & Ph. U. St.: Acidum hydrocyanicum dilutum (2 %). *Ph. Fr.: Acide prussique médicinal (10 %).*

Blaasyre.

Liquor limpidus, coloris expers, volatilis, odoris peculiaris. Solutione hydratis kalici abundantis affusa et additis guttis nonnullis solutionis sulphatis ferrosi parvam sulphatis ferri copiam continentis, liquor acido hydrochlorato acidulatus præcipitatum cæruleum præbet.

Partibus mille (1000) acidi pars una (1) acidi sulphurici concentrati addenda est.

In vitris parvis atque bene clausis loco frigidulo cautissime servetur.

Dosis maxima: *Guttæ tres* (3).

V. Rp. Cyaneti ferroso-kalici puri pulverati

partes duodecim 12;

in retortam tubulatam vel cucurbitam immissis addatur mixtio ante parata et refrigerata

Acidi sulphurici concentrati *partium sex* . 6

et **Aqvæ** *partium duodecim* 12.

Retorta, quæ triplicem certe copiam mixtionis affusæ capere debet, accurate cum apparatu refrigeratorio vitreo jungatur, cujus orificium conjunctum est cum excipulo bene refrigerato, in quo insunt aquæ destillatæ partes duodecim (12). In balneo arenæ calefiat, donec residuum

pæne siccum in retorta remanserit vel partes circiter triginta (30) in excipulo contineantur. Destillatum partibus septuaginta (70) vel tanta copia aqvæ destillatæ diluatur, ut partes centum (100) partes duas (2) acidi hydrocyanati anhydri contineant.

Hoc ita dignosci potest, si gramma unum (1) acidi cum triplice sui pondere aqvæ destillatæ commixtum, solutione nitratis argenticæ abundanti affusa, decimam grammatis partem (0,1 gram.) cyaneti argenticæ bene abluti et siccati præbeat, vel si acidi grammati uni (gram. 1) cum aqvæ destillatæ triplice sui copia et solutione hydratis kalici abundanti commixti 3,7 CC. solutionis nitratis argenticæ exploratoriæ instillari possint, priusquam turbatio, conqvassatione iterum non solubilis, oriatur; si vero copiam solutionis nitratis argenticæ exploratoriæ ante dictam gutta una addita superaveris, præcipitatum stabile exhibeatur.

Præparatum:

Aqva amygdalarum amararum 50 in 720.

Acidum nitrico-nitrosum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Acidum nitricum fumans.

Rygende Salpetersyre.

Liquor coloris aurantiaci in aëre fumos rubros exhalans, pondere specifico 1,49—1,50.

Aqva valde dilutum nitrate argentico (Cl) et chloro baryco (acid. sulphuric.) paullulum modo turbetur.

Servetur in vasis epistomiis vitreis clausis loco obscuro et frigidulo.

Acidum nitricum

(Partes 100 continent acidi anhydri partes 25.)

loco Ph. N. Ed. I.: Acid. nitric. conc. (60 %) & Acid. nitric. dilut. (10 %).

Ph. Svec. & Dan.

Ph. Germ.: Acid. nitricum (circ. 25 %). Ph. Austr.: Acid. nitricum concentrat. purum (48 %). Ph. Brit. & Ph. U. St.: Acid. nitricum (60 %). Ph. Fr.: Acide nitrique officinal (60 %).

Salpetersyre.

Liquor limpidus, coloris expers, prorsus volatilis, ponderis specifici 1,180.

Acidum aqua dilutum ne nitrate argentario (Cl) neve chloreto baryco (acid. sulphuric.) turbetur; cum guttis nonnullis chloroformii conqvassatum colorem e violaceo rubrum ne induat (J) neve, si huic mixtioni solutionis sulphidi hydrici guttas nonnullas addideris (acid. iodicum). Gramma unum (1) acidi solutionis carbonatis natrici exploratoriæ 46,3 CC. vel carbonatis natrici anhydri 0,245 gram. saturat.

Servetur in vitro epistomio vitreo clauso.

Dosis maxima: *Guttæ quindecim* (15).

Præparatum:

Acidum nitricum hydrochloratum 1 in 3.

Acidum nitricum hydrochloratum.

Cfr. Ph. Germ.: Acidum chloro-nitrosum. Ph. Brit.: Acidum nitro-hydrochloricum dilutum. Ph. U. St.: Acid. nitromuriaticum & Acid. nitromuriaticum dilutum. Ph. Fr.: Eau régale.

Aqua regia.

Kongevand.

Rp. **Acidi nitrici partem unam** 1
 „ **hydrochlorati partes duas** 2.

Misceantur.

Ex tempore paretur.

Dosis maxima: *Guttæ quindécim* (15).

† Acidum phenylicum. A. carbolicum.

C_6H_6O .

Ph. Svec.: Acidum phenylicum. Ph. Dan.: Acid. phenylicum s. Acid. carbolicum.

Ph. Germ.: Acidum carbolicum crystallisatum. Ph. Austr.: Acidum carbolicum, Ph. Brit. & Ph. U. St.: Acid. carbolicum. Ph. Fr.: Acide phénique, Phénol, Acide carbolique.

Phenylsyre. Carbolisyre.

Massa crystallina vel, si aqvæ paucillum continet, liqvor gravis et qvasi oleosus, coloris expers vel rube-scens, temperatura + 35°—42° in liqvore limpidum et olei similem liqvescens, calore circiter 180° ebulli-ens, odore pyrolei lithanthracis, in aqvæ partibus circiter viginti quinque (25), facile in spiritu concentrato, glycerino, æthere et oleo pingvi solubilis.

Servetur caute in vase epistomio vitreo clauso.

Dosis maxima: *Guttæ tres* (3).

Acidum phosphoricum dilutum.

(Partes 100 continent acidi anhydri partes 10.)

Ph. N. Ed. I.: Acidum phosphoricum (10 %).

Ph. Svec. & Dan. (10 %).

Ph. Germ.: Acid. phosphoricum (20 %). Ph. Austr.: Acid. phosphoricum (16,6 %). Ph. Brit.: Acid. phosphoricum dilutum (10 %). Ph. U. St.: Acidum phosphoricum dilutum (7,5 %). Ph. Fr.: Acide phosphorique officinal (circiter 45 %).

Fortyndet Phosphorsyre.

Liqvor limpidus, coloris expers, ponderis specifici 1,08. Solutione sulphidi hydrici addita, ne subito neve

interjecto tempore, si mixtio in vase clauso seposita fuerit, oriatur præcipitatum (acid. arsenicos. — acid. arsenic.). Acidum solutione ammoniaci supersaturatum aut nullum aut paucillum modo præcipitati albi vel cani præbeat (Fe. Ca. Mg.). Solutione chloreti hydrargyrici, nitrate argentico, chloreto baryeo ne turbetur (acid. phosphoros., acid. hydrochlorat., acid. sulphuric.). Si acidum cum æquali copia acidi sulphurici concentrati commiscetur et solutio sulphatis ferrosi caute superinfunditur, zona fusca inter ambos liqvores ne oriatur (acid. nitric.).

Gramma unum (1) acidi carbonatis natrici anhydri 0,15 gram. saturat.

Dosis maxima: *Guttæ viginti* (20).

Acidum salicylicum.

$C_7 H_6 O_3$.

Salicylsyre.

Crystalli coloris expertes, prismaticæ, in aqvæ fervidæ partibus viginti (20), frigidæ partibus circiter duabus millibus (2000), in spiritu et æthere facile solubiles.

Solutio parva copia solutionis chloreti ferri addita colore violaceo tingitur. Solutio spirituosâ ne solutione sulphidi hydrici præbeat præcipitatum (metalla). Acidum cum acido sulphurico concentrato superfusum solutionem limpida, coloris expertem aut paucillum subflavam præbeat.

Ignitæ ad caloris gradum 156 liquescunt et deum calore aucto prorsus conflaurant.

Acidum succinicum subflavum.

Ph. N. Ed. I.: Acidum succinicum crystallisatum.

Ph. Svec.: Acidum succinicum depuratum. Ph. Dan.: Acidum succinicum.

Ph. Germ.: Acidum succinicum. Ph. Fr.: Acide succinique impur, Sel volatile de Succin.

Ravsyre.

Crystalli vel crustæ cohærentes, pallide flavescentes, odore pyrolei succini, ignitæ primum liqvescunt, tum prorsus avolant. In aqvæ frigidæ partibus viginti qvatuor (24), ebullientis partibus duabus et dimidia ($2\frac{1}{2}$), in spiritu facile solvuntur.

Solutio acidi aqvosa solutione hydratis calcici ne turbetur ($\overline{Ox.}, \overline{T.}$), cum solutione hydratis natrici calefacta odorem ammoniaci ne spargat (salia ammoniacalia).

Præparata:

Liquor antispasticus	5 in 100.
„ succinatis ammonici pyroleosi.	10 - 100.

Acidum sulphuricum concentratum.

H_2SO_4 .

(Partes 100 continent acidi anhydri partes 80.)

Ph. N. Ed. I.: (81,63 %).

Ph. Svec.: (80 %). *Ph. Dan.:* Acidum sulphuricum (80 %).

Ph. Germ.: Acidum sulfuricum (80 %). *Ph. Austr.:*

Acid. sulphuric. concentrat. purum (circ. 80 %). *Ph.*

Brit. & Ph. U. St.: Acid. sulphuricum (circ. 80 %).

Ph. Fr.: Acide sulfurique purifié (circ. 80 %).

Concentreret Svovelsyre.

Liquor limpidus, qvasi oleosus, coloris expers, ponderis specifici 1,84.

In lamina platinea ignitus ne residuum relinqvat; cum triplice sui aqvæ copia dilutus præcipitatum album ($Pb. SO_4$) ne præbeat. Si acidum in apparatu Marshii tractaveris, maculæ arsenici ne oriantur; si acido æqvalem copiam solutionis sulphatis ferrosi caute affuderis, zona fusca inter ambos liqvores ne oriatur (acid. nitric.). Acidum aqva satis dilutum nitrate argentario addito ne præbeat præcipitatum (acid. hydrochlorat.).

Gramma unum (1 gram.) solutionis carbonatis na-

trici exploratoriæ 200 CC. vel carbonatis natrici anhydri
1,06 gram. saturat.

Servetur in vase vitreo epistomio vitreo clauso.

Præparata:

Acidum hydrocyanatum	1 in 1000.
Liquor acidus Halleri	50 - 100.
Tinctura aromatica acida	5 - 100.

Acidum sulphuricum dilutum.

(Partes 100 continent acidi anhydri partes 10.)

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Dan. (10 %).

*Ph. Germ.: (circ. 13 %). Ph. Austr.: Acid. sulphuric.
dilut. purum (circ. 13 %). Ph. Brit.: (circ. 10 %).
Ph. U. St.: Acid. sulphuricum dilutum (10 %). Ph.
Fr.: Acide sulfurique diluë (8 %).*

Fortyndet Svovelsyre.

Liquor limpidus, coloris expers, pondere specifico 1,081
—1,085. Ad reagentia uti acidum sulphuricum concen-
tratum sese habeat.

Gramma unum (1 gram.) acidi solutionis carbonatis
natrici exploratoriæ 25 CC. vel carbonatis natrici anhydri
0,132 gram. saturat.

Servetur in vitro epistomio vitreo clauso.

Dosis maxima: *Guttæ viginti (20).*

V. Rp. **Aqvæ destillatæ partes septem 7.**

Caute affundatur inter agitationem baculi vitrei ope

Acidi sulphurici concentrati pars una 1.

Præparata:

Decoctum Chinæ acidum	1 in 100.
Mixtura acida	2 - 100.

Acidum tartaricum.H₂. C₄ H₄ O₆.*Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Fr.: Acide tartrique. Ceteræ: Acidum tartaricum.***Vinsyre.**

Crystalli coloris expertes, aëri expositæ immutabiles, in aqvæ frigidæ parte una et dimidia (1¹/₂), facile in spiritu solubiles. Ignitæ nullo residuo relicto conflaurant.

Solutio acidi aqvosa ne solutione sulphidi hydrici (metalla, Pb. Cu.) neve oxalate ammonico (Ca) neve chloreto baryeo (acid. sulphuric.) turbetur.

Præparata:

Pulvis effervescens.	Dosis una continet	1,50 gram.
„ „ compositus.	„	1,50 „

Æther.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Dan.**Ph. Fr.: Éther sulfurique. Ceteræ: Æther.*

Liquor limpidus, coloris expers, volatilis, facile inflammabilis, in aqvæ partibus decem (10), in qvavis proportionem spiritus concentrati solubilis. Pondus specificum 0,725 ne excedat.

Sit ad chartam exploratoriam indifferens et prorsus volatilis, ita ut pannus linteus æthere imbutus exhalatione sua sponte peracta odorem non spargat.

Servetur in lagenis non plane repletis et bene clausis loco frigidulo.

Præparata:

Æther spirituosus	25 in 100.
Collodium cantharidatum.	
Extractum Filicis.	

Æther aceticus.*Ph. N. Ed. I.: Acetas æthylicus.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ., Ph. Austr. & Ph. Brit.: Æther aceticus. Ph.**Fr.: Éther acétique.*

Edike-Æther.

Liquor limpidus, coloris expers, prorsus volatilis, pondere specifico 0,900—0,904, in aquæ partibus decem (10), in quavis proportionem spiritus solubilis. Aëri expositus acidam reactionem mox præbet.

Sit ad chartam exploratoriam, quantum fieri potest, indifferens.

Servetur in lagenis bene clausis loco frigidulo.

Æther chloratus spirituosus.*Ph. N. Ed. I.: Spiritus muriatico-æthereus.**Ph. Dan.**Ph. Germ.: Spiritus Ætheris chlorati.*

Spiritus salis dulcis.

Rp. **Superoxydi manganici** in frustis parvis vel grosse pulveratis *partes triginta duas* 32.

Immittatur in cucurbitam satis amplam; tum affundatur mixtio parata ex

Acidi hydrochlorati *partibus octo* 8

et **Spiritus concentrati** *partibus viginti quatuor*. 24.

Cucurbita in balneo arenæ collocata et cum apparatu refrigeratorio, cui excipulum adaptatum sit, conjuncta, stet per horas duas vel tres; tunc destillatio leni calore fiat, donec partes viginti quinque (25) transierint. Destillatum, si acidam præbet reactionem, cum bicarbonate natrico abundanti conquassetur, deinde in balneo aquæ calefactum rectificetur. Sit limpidus, coloris expers, plane volatilis, reactionis neutralis, ponderis specifici 0,838—0,842.

Servetur in vitris parvis bene clausis loco obscuro et frigidulo.

Æther spirituosus.*Ph. N. Ed. I.: Æther alcoholicus.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Spiritus æthereus. Ph. Fr.: Éther sulfurique alcoolisé (Éther & Alcool (90%), partes æquales). Ceteræ: Spiritus Ætheris.***Liquor anodynus Hoffmanni.****Hoffmanns Draaber.**

Rp. **Ætheris** partes viginti quinque 25.
Spiritus concentrati partes septuaginta quinque. 75.
 Misceantur.

Sit pondere specifico 0,806—0,810. Cum aqua mixtus liquorem limpidum præbet. Servetur in lagena probe clausa loco frigidus.

Præparata:

*Æther spirituosus camphoratus.**Liquor antispasticus.**Solutio chloreti ferri spirituosæ-æthereæ.**Tinctura Castorei æthereæ.*,, *Valerianæ æthereæ.***Æther spirituosus-camphoratus.***Ph. N. Ed. I.: Æther alcoholicus camphoratus.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Fr.: Teinture étherée de camphre (Camphre 10. Éther alcoolisé 90).***Liquor nervinus.****Campher-Draaber.**

Rp. **Camphoræ** partem unam 1;
 solve in

Ætheris spirituosus partibus sex 6.

Servetur in lagena probe obturata loco frigidus.

Ætherolea.

Ætheriske Olier.

Sint prorsus volatilia et iis proprietatibus prædita, quæ in singulis indicabuntur, earumque substantiarum, e quibus parata sunt, odorem excitatissimum spargant. Ne sint spiritu, oleis vel ætheroleis vilioribus adulterata.

Si cum aqua convassantur, volumina pro copia spiritus additi minuuntur.

Admixtio oleorum agnoscitur ex macula diaphana post exhalationem in charta bibula relicta et, nisi oleum Ricini admixtum est, ex majore spiritus copia, quæ ad solutionem efficiendam requiritur.

Viliora ætherolea intermixta ex odore, qui inter exhalationem oritur, sæpe agnoscuntur. Ætheroleo Terebinthinæ addito ætheroleum plerumque difficiliter in spiritu solvitur.

Servanda sunt a luce remota in lagenis parvis probe obturatis et, quantum fieri potest, semper repletis.

Ætheroleum Absinthii.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan.

Ph. Germ.: *Oleum absinthii.* Ph. Fr.: *Huile volatile d'absinthe.*

Malurtolie.

Ex **Herba Absinthii** destillatione paratum. Tenue, e fusco viride, in omni proportionem spiritus concentrati limpide solubile.

Ætheroleum Amygdalarum amararum.

(Ab acido hydrocyanato liberum.)

Ph. U. St.: Oleum amygdalæ amaræ. Ph. Fr.: Huile volatile d'amandes amères (impur).

Bittermandelolie (blaasyrefri).

Liquor limpidus, coloris expers vel pallide subflavus, odoris peculiaris, ad chartam exploratoriam indifferens, in aquæ partibus triginta (30), in spiritus omni proportionem solubilis.

Solutio spirituosa cum hydrate kalico et solutione sulphatis ferrico-ferrosi conqvassata et acido hydrochlorato supersaturata præcipitatum cæruleum ne præbeat (acid. hydrocyanat.). Solutio spirituosa, in qua gas hydrogenii zinci et acidi hydrochlorati ope evolvitur, ne, solutione calcis chloratæ addita, colorem cæruleum neve rubicundum induat (nitrobenzinum).

Servetur in vitris bene clausis semperqve repletis.

Præparatum:

Aqua Amygdalarum amararum.

Ætheroleum Anisi.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Huile volatile d'anis. Ceteræ: Oleum anisi.

Anisolie.

E Fructibus Anisi destillando paratum. Coloris expers vel subflavum, saporis mitis, dulciusculi, frigore admisso concreescens, in spiritus partibus quatuor vel quinque (4—5) solubile.

Liquidum semper dispensetur.

Præparata:

Liquor pectoralis.

Spiritus ammoniacatus anisatus.

Tinctura Opii benzoica.

Ætheroleum Bergamiæ.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Dan.: Ætheroleum bergamo.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Oleum bergamottæ. Ph. U. St.:**Oleum bergamii. Ph. Fr.: Huile volatile de bergamote.*

Bergamotolie.

Citrus Bergamia *Risso. Aurantiaceæ.* Arbor Indiæ orientalis indigena, in Europa meridionali frequenter culta.

E cortice fructuum recentium in Italia expressione paratur.

Pallide flavum vel e subviridi flavum, odoris svavis, saporis amari, in omni proportionem spiritus concentrati solubile.

Ætheroleum Cajeputi.*Ph. N. Ed. I.: Ætheroleum Melaleucarum crudum.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Oleum Cajeputi. Ph. Brit. & Ph. U. St.:**Oleum cajuputi. Ph. Fr.: Huile volatile de Cajeput.*

Cajeputolie.

Melaleuca Cajeputi *Roxb.* et aliæ **Melaleucæ** species. **Myrtaceæ.** Arbores in Moluccis indigenæ.

E foliis recentibus destillatione paratum. Tenue, viride aut e subflavo viride, odoris penetrantis Rosmarini

similis vel camphoracei, in omni proportione spiritus concentrati solubile.

Ne adhibeatur ætheroleum, quod solutione cyaneti ferroso-kalici addita colorem rubrum induat (Cu).

Ætheroleum Carvi.

Ph. N. Ed. I.: Ætheroleum Cari.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. U. St.: Oleum cari. Ph. Fr.: Huile volatile de carvi.

Ceteræ: Oleum Carvi.

Karveolie.

E Fructibus Carvi destillatione paratum. Coloris expers vel subflavum, tenue, sapore urenti, in spiritu concentrato facile solubile.

Præparatum:

Oleum carminativum.

Ætheroleum Caryophylli.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Oleum Caryophyllorum. Ph.

Brit. & Ph. U. St.: Oleum caryophylli. Ph. Fr.: Huile volatile de girofle.

Nellikolie.

E Floribus Caryophylli destillatione paratum. Coloris expers aut subflavum, tempore interjecto subrubicundum, spissiusculum, sapore urenti, aqua gravius, in omni proportione spiritus concentrati solubile.

Præparata:

Acetum aromaticum.

Massa pilularum Colocynthidum compositarum.

Tinctura balsamica aromatica.

Ætheroleum Cassiæ.

Ph. N. Ed. I.: Ætheroleum Corticis Cinnamomi.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Oleum Cinnamomi Cassiæ.

Kanelolie.

Cinnamomum Cassia *Fr. Nees* (**C. aromaticum** *Chr. Nees*). **Laurineæ.** Arbor Chinæ et Cochinchinæ.

E cortice destillando paratum.

Coloris aurei vel subflavi, tempore interjecto obscurius crystallosque acidi cinnamomici demittens, saporis initio subdulcis deinde aeris, aqua gravius, in omni portione spiritus concentrati solubile.

Præparata:

Aqua Cinnamomi spiritiosa.

Tinctura balsamica aromatica.

Ætheroleum Citri.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Ætheroleum Cedro.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Oleum Citri.

Citronolie.

Citrus Limonum *Risso.* (**C. medica** *L.* var. **Limonum.**) **Aurantiaceæ.** Arbor in Asia orientali indigena, in Europa meridionali culta.

E cortice fructuum recentium destillando vel exprimendo paratum.

Recens subturbidum, deinde limpidius, subflavum, tenue; in spiritus partibus decem ad viginti (10—20) solubile.

Præparatum:

Acetum aromaticum.

Pulvis refrigerans.

Ætheroleum Cumini.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Fr.: Huile volatile de cumin.*

Romersk Karveolie.

Cuminum Cyminum L. Umbelliferæ. Planta annua orientalis, in Europa culta.

E fructibus destillando paratum. Subflavum, tempore interjecto in colorem obscuriorem vergens, saporis urentis, in spiritu concentrato solubile.

Præparatum:

Oleum carminativum.

Ætheroleum Foeniculi.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Fr.: Huile volatile de fenouil. Ceteræ: Oleum Foeniculi.*

Fennikelolie.

E Fructibus Foeniculi destillatione paratum.

Coloris expers aut subflavum, tenue, frigore rigescens, saporis subdulcis, in partibus duabus spiritus concentrati solubile.

Præparata:

Liquor pectoralis.

Oleum carminativum.

Pulvis Magnesiae cum Rheo.

Tinctura Digitalis rubra.

Ætheroleum Juniperi.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ., Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph. U. St.: Oleum Juniperi. Ph. Fr.: Huile volatile de genévrier.*

Enebærolie.

E **Fructibus Juniperi** submaturis et ramulis junioribus destillando paratum.

Tenue, coloris expers aut subflavum, in partibus decem (10) spiritus concentrati solubile.

Oleum e ligno adhibere non licet.

Præparata:

Acetum aromaticum.

Spiritus antiparalyticus.

Ungventum aromaticum.

Ætheroleum Lavandulæ.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Fr.: Huile volatile de lavande. Ceteræ: Oleum Lavandulæ.*

Lavendelolie.

E **Floribus Lavandulæ** destillando obtentum.

Tenue, subflavum aut e subviridi subflavum, in omni proportionem spiritus concentrati solubile.

Præparata:

Acetum aromaticum.

Spiritus Lavandulæ.

Tinctura balsamica aromatica.

„ Lavandulæ composita.

Ungventum aromaticum.

Ætheroleum Macidis.*Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Oleum Macidis. Ph. U. St.:
Oleum Myristicæ.*

Muskatblommeolie.

Myristica fragrans *Houttuyn. (M. moschata Thunberg).***Myristicææ.** Arbor insularum Moluccensium.

Ex arillis seminum destillatione paratum.

Tenue, coloris expers aut subflavum, paullatim e
flavo subrubrum, in spiritus concentrati partibus sex (6)
solubile.

Præparatum:

Tinctura balsamica aromatica.

Ætheroleum Menthæ crispæ.*Ph. N. Ed. I.: Ætheroleum Menthæ.**Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Oleum Menthæ crispæ. Ph. Fr.:
Huile volatile de menthe crépue.*

Krusemynteolie.

Mentha crispa *L. Labiatæ.* Planta perennis Eu-
ropæ australis.

Ex herba destillando obtentum.

Subflavum vel e subviridi flavidum, tempore inter-
jecto obscurius et spissescens, sapore aromatico, in lingua
frigoris sensum relinqvens, in omni proportionem spiritus
concentrati limpide solubile.

Præparata:

Oleum carminativum.

Unguentum aromaticum.

Ætheroleum Menthæ piperitæ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Huile volatile de menthe poivrée. Ceteræ: Oleum Menthæ piperitæ.

Pebermynteolie.

Ex **Herba Menthæ piperitæ** destillatione obtentum.

Tenue, tempore interjecto spissescens, coloris expers aut subflavum, interdum viridescens, in lingua frigoris sensum relinqvens; cum æquali pondere spiritus concentrati mixtum limpide solvitur, majore copia spiritus addita plerumqve limpidum manet, interdum tamen turbatur.

Adhibeatur, qvod in mercatu optimum prostat, Gallicum vel Anglicum vel Germanicum.

Præparatum:

Acetum aromaticum.

Ætheroleum Origani Cretici.

Ph. N. Ed. I.: Ætheroleum Origani.

Ph. Dan.

Spansk Humleolie.

Origanum Creticum *L.* **Labiatae.** Suffrutex Europæ meridionalis, inprimis insularum Archipelagi, indigenus.

Ex herba destillando paratum.

Tenue, flavum, tempore interjecto e rubro fuscum.

Præparatum:

Spiritus saponis camphoratus.

Ætheroleum Petroselini.

Petersilleolie.

Petroselinum sativum *Hoffm.* (**Apium Petroselinum** *L.*). **Umbelliferæ.** Herba radice bienni in regione mediterranea orientali indigena, apud nos in hortis culta.

E fructibus destillando paratum.

Subflavum vel e subfusco flavum, spissiusculum, sapore initio miti, demum os paulum urenti, in omni portione spiritus solubile.

Ætheroleum Rosæ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Germ. & Ph. U. St.: Oleum Rosæ. Ph. Austr.: Oleum Rosarum. Ph. Fr.: Huile volatile de rose.

Rosenolie.

E **Petalis Rosæ** destillando paratum.

Coloris expers aut pallide subflavum, spissum, in temperatura consveta crystallinum, in spiritus concentrati nonaginta (90) partibus in temperatura + 17° solubile.

Admixtio Cetacei ita dignosci potest, si paucis guttis in balneo vaporis calefactis residuum relinqvitur.

Præparatum:

Mixtura Ferri composita.

Ætheroleum Rosmarini.

Ph. N. Ed. I.: Ætheroleum Rosmarini.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Huile volatile de romarin. Ceteræ: Oleum Rosmarini.

Rosmarinolie.

Rosmarinus officinalis L. Labiatæ. Frutex Europæ meridionalis.

Ex herba florenti destillatione paratum.

Tenue, coloris expers aut e subviridi flavum, in partibus duabus (2) spiritus concentrati solubile.

Præparata:

Acetum aromaticum.

Linimentum Opodeldoc.

Spiritus Rosmarini.

„ saponis camphoratus.

Tinctura Lavandulæ composita.

Ungventum aromaticum.

† *Ætheroleum Sabinæ.**Ph. Svec.**Ceteræ: Oleum Sabinæ.*

Sabinaolie.

E Ramulis Sabinæ destillando paratum.

Tenue, coloris expers aut pallide subflavum, in partibus duabus (2) spiritus concentrati solubile.

Caute servetur.

Dosis maxima: *Gutta una* (1).† *Ætheroleum Sinapis.**Ph. N. Ed. I.: Ætheroleum Brassicæ.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Austr.: Oleum Sinapis æthereum. Ceteræ: Oleum Sinapis.*

Sennepsolie.

E Seminibus Sinapis nigræ destillando paratum.

Tenue, coloris expers aut subflavum, odoris penetrantissimi, aqua gravius, in omni proportionem spiritus concentrati solubile; cuti inspersum ruborem et pustulas excitat.

Caute servetur.

Ætheroleum Terebinthinæ crudum.*Ph. N. Ed. I.: Ætheroleum Pinorum crudum.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Fr.: Essence de térébenthine. Ceteræ: Oleum Terebinthinæ.***Raa Terpentiniolie.****E Balsamo Terebinthina communi destillando paratum.**

Tenue, coloris expers aut subflavum, calore avolans residuo sæpe relicto. Ne sit odore empyreumatico.

Hoc ætheroleum in lagenis majoribus servare licet.

Præparata:

Ungventum aromaticum.

„ terebinthinatum.

Ætheroleum Terebinthinæ rectificatum.*Ph. N. Ed. I.: Ætheroleum Pinorum rectificatum.**Ph. Svec.: Ætherol. Terebinthinæ depuratum. Ph. Dan.: Ætherol. Terebinthinæ.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Oleum Terebinthinæ rectificatum.***Renset Terpentiniolie.****Rp. Ætherolei Terebinthinæ crudi partem unam . . . 1****Aqvæ partes sex 6.**

Fiat destillatio, quamdiu destillatum coloris expers sit. Ætheroleum destillatum ab aqua, quæ simul transierit, separetur.

Sit limpidum, coloris expers, calefactum sine residuo avolans, ad chartam exploratoriam indifferens, in spiritus concentrati partibus circiter duodecim (12) solubile.

Ætheroleum Thymi.*Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. U. St.: Oleum Thymi. Ph. Fr.: Huile volatile de thym.*

Timianolie.

Thymus vulgaris *L. Labiatæ.* Suffrutex Europæ meridionalis, apud nos in hortis cultus.

Ex herba florenti destillando paratum.

Tenue, coloris expers, subflavum vel e subfusco flavum, tempore interjecto e subfusco rubrum, sapore urenti, cum æqvo pondere spiritus concentrati solutionem limpidam præbens.

Præparatum:

Linimentum Opodeldoc.

Agaricus chirurgorum.*Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Fungus igniarius præparatus. Ph. Austr.:**Agaricus chirurgorum.**Ph. Fr.: Agaric de chène.*

Knusk.

Polyporus fomentarius *Fries. Fungi, Hymenomycetes.*

Fungus præparatus.

Sit omnino mollissimus, accensus tranquille et æqualiter sine ullo crepitu ardeat.

† Aloë.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Brit.: Aloë soccotrina (& Aloë barbadensis).**Ph. Fr.: Aloës du Cap. Ceteræ: Aloë.*

Aloë Capensis.

Aloe.

Aloës variæ species. **Liliaceæ.** Plantæ Africæ australis.

Massæ non pellucidæ, e subviridi obscure fuscæ, in marginibus colore clariore diaphanæ, fractura conchata vitri instar nitenti, odoris afflatæ massæ subnauseosi, proprii, saporis valde amari, pulverem coloris e viridi flavi præbentes. In aqua frigida ex parte resinam mollem relinqvens solvitur, in aqua fervida turbidam, in spiritu concentrato pæne limpida præbet solutionem.

Caute servetur.

Præparata:

Extractum Aloës.

Massa pilularum Colocynthidum compositarum . . 24 : 100.

Amylum Arrow.

Ph. N. Ed. I.: Amylum Marantarum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Amylum Marantæ. Ph. Austr.: Arrow-root.

Ph. U. St.: Maranta. Ph. Fr.: Arrow-root.

Arrow-Mel.

Maranta arundinacea L. et forsân aliæ **Marantæ** species. **Marantaceæ.** Planta Indiæ occidentalis indigena, in orientali India culta.

Amylum e rhizomate tuberoso separatum. Cave ne amylo Solani tuberosi adulteratum sit, neve adhibeatur amyllum aliarum plantarum sub eodem nomine in mercatura occurrens.

Amylum Tritici.

Ph. N. Ed. I.: Amylum Triticorum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Amylum Tritici. Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph.

U. St.: Amylum. Ph. Fr.: Amidon de blé.

Hvedestivelse.

Triticum vulgare Villars. **Gramineæ.** Planta in zonis temperatis culta.

Amylum e fructibus separatum.

Præparatum:

Ungventum Glycerini.

† Aqva Amygdalarum amararum

loco Aqvæ amygdalarum amararum destillatæ Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Aqva amygdalarum amararum concentrata. (Paratur destillando. Partes 1000 continent acidi hydrocyanati anhydri 1,3—1,4).

Ph. Germ. (destillata. Contin. acidi hydrocyanati anhydri 1,0 in 1000 partibus). Ph. Austr.: Aqva amygdalarum amararum concentrata (destillata. 0,6 in 1000). Ph. U. St.: Aqva amygdalæ amaræ.

Bittermandelvand.

Rp. **Acidi hydrocyanati** (2 %) *partes quinquaginta* 50
Ætherolei Amygdalarum amararum

partes quatuor 4

Spiritus diluti *partes centum quadraginta sex* 146

Aqvæ destillatæ *partes quingentas viginti* . . 520.

Misceantur.

Sit limpida colorisque expers.

Partes centum (100) continent partes 0,139 acidi hydrocyanati anhydri. Hoc ita dignosci potest, si grammatibus decem (10 gram.) aqvæ amygdalarum amararum

cum solutione hydratis kalici abundanti mixtis 2,57 CC. solutionis nitratis argentici exploratoriæ adstillari possunt, priusquam præcipitatum stabile, conqvassando non solubile, oriatur; si vero copiam solutionis nitratis argentici supra dictam gutta una superaveris, præcipitatum conqvassando non solubile efficitur.

In lagenis bene clausis et a luce remotis caute servetur.

Dosis maxima: *Guttæ quingvaginta* (50).

Aqva Cinnamomi spirituosa.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Aqva Cinnamomi spirituosa (destillata).

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Aqva Cinnamomi spirituosa (destillata).

Rp. *Ætherolei Cassiæ partes duas* 2
Spiritus diluti 500
Aqvæ 500
singulorum partes quingentas.

Misceantur.

Præparata:

Infusum Rhei alkalinum.

Mixtura alba.

Tinctura extracti pomorum ferrati.

Aqva destillata.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Austr.: Aqva destillata simplex. Ceteræ: Aqva destillata.

Destilleret Vand.

Sit limpida, odoris, saporis, coloris expers, plane volatilis. Solutione chloreti hydrargyrici corrosivi vel solutione hydratis calcici ne turbetur (carbon. ammon.).

V. Rp. **Aqvæ** partes mille et quingentas 1500
in quibus soluta est

Sulphatis aluminico-kalici pars una 1.

Fiat destillatio. Partes quinquaginta primo destillatæ
reijciantur, partes mille dein transgressæ servantur.

Aqua pyrolei Pini. Aqua picea.

Ph. N. Ed. I.: Aqua picea.

Ph. Svec.: Infusum Pyrolei Pini.

Ph. Germ.: Aqua Picis. Ph. U. St.: Infusum picis liquidæ
(1—4). Ph. Fr.: Eau de goudron.

Tjære vand.

Rp. **Pyrolei Pini** partes decem 10

Aqvæ fervidæ partes centum 100.

Mixtæ in lagena clausa convassentur, donec refluxerint; dein filtrentur.

Recens parata dispensetur.

Aqvæ destillatæ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Destillerede Vande.

Substantiæ præscriptæ grosse contusæ vel concisæ
cum sufficienti aquæ copia, aquæ destillatæ parandæ
quantitatem circiter parte dimidia superante, misceantur.

Ad partes centum aquæ destillatæ cujuslibet obti-
nendas requiruntur:

Seminum vel Fructuum siccatorum partes quinque 5

Foliorum vel Herbarum vel Corticum siccatorum

partes decem 10.

Observe: Ad partes centum aqvæ Rosæ parandas requiruntur:

Petalorum Rosæ recentium *partes viginti* . . . 20

Chloreti natrici *partes triginta* 30.

Nota: Ante dispensationem ætheroleum innatans separandum est.

Aqvæ extemporaneæ.

Ph. N. Ed. I.

Rp. **Ætherolei** *partem unam* 1

Aqvæ *partes mille* 1000.

Conqvassentur, donec solutæ sint.

Limpidæ dispensentur.

Dispensentur, nisi aqvæ destillatæ expresse præscriptæ sunt.

Axungia.

Ph. N. Ed. I.: Axungia suis.

Ph. Svec.: Axungia curata. Ph. Dan.: Axungia Porci lota.

Ph. Germ.: Adeps suillus. Ph. Austr.: Axungia Porci.

Ph. Brit.: Adeps præparatus. Ph. U. St.: Adeps.

Ph. Fr.: Axonge ou Graisse de porc.

Fedt.

Sus Scropha domesticus L. Mammalia, Pachydermata. Adeps abdominalis recens ablatis membranis, minutim concisus, aqua elotus, leni calore liqvatus, aqua adherenti liberatus, per linteum colatus.

Sit saporis rancidi vel empyreumatici expers, calore adhibito plane liqvescens.

Præparata:

Axungia benzoata.	Ungventum oxydi zincici.
Ungventum aromaticum.	„ stibiatum.
„ Hydrargyri.	„ Sulphuris compositum.
„ hydratocarbonatis plumbici.	

Axungia benzoata.
*Ph. Svec.**Ph. Brit.: Adeps benzoatus. Ph. Fr.: Axonge benzoïnée.*

Rp. **Resinæ Benzoës** contusæ partes duas 2
Axungiæ partes centum 100.

Per horas duas liqvatae et interdum agitatae colentur et inter agitationem refrigerentur.

Præparatum:

Ungventum iodeti kalici.

Balsamum Copaiva.
*Ph. N. Ed. I.: Balsamum Copaiferarum.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Balsamum Copaivæ. Ph. Brit.:**Copaiva. Ph. U. St.: Copaiba. Ph. Fr.: Copahu.***Copaivabalsam.**

Copaifera multijuga Hayne et aliæ **Copaiferæ** species.
Cæsalpinieæ. Arbores Brasilie.

Balsamum e truncis vulneratis effluens, limpidum, subflavum, odoris peculiaris, spissitudinis olei pingvis, in spiritu et æthere solubile. Vetustum, obscurius, spissum

vel quod calefactum odorem terebinthinum emittit, rejiciendum est.

Servetur in vase bene clauso.

Balsamum Peruvianum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Baume du Pérou noir. Ceteræ: Balsamum Peruvianum.

Perubalsam.

Myroxylon Pereiræ *Klotzsch* et **Myroxyli** forsitan aliæ species. **Papilionaceæ.** Arbores Americæ centralis indigenæ.

Balsamum ex arbore sauciata caloris ope elicatum.

Fluidum e nigro fuscum, consistentiæ syrupi, in stratis tenuioribus colore ex purpureo fusco diaphanum, aëri expositum non siccescens, reactionis acidæ, odoris grate vanillacei, saporis subamari, os diu urentis, in spiritus concentrati partibus sex fere plane solubile, cum aqua destillatum oleum æthereum non præbens.

Præparatum:

Tinctura balsamica aromatica.

Balsamum Styrax liquidus.

Ph. Svec.

Ph. Germ.: Styrax liquidus. Ph. Brit.: Styrax præparatus. Ph. U. St.: Styrax. Ph. Fr.: Styrax liquide.

Styrax liquidus.

Styraxbalsam.

Liquidambar orientale *Miller.* **Balsamifluæ.** Arbor Asiæ minoris indigena.

Balsamum expressione corticis paratum.

Massa consistentiæ spissioris balsami Terebinthinæ, opaca, coloris plus minusve grisei, interdum cum aliquanto aquæ permixta, odoris peculiaris, grati, in spiritu concentrato fere plane solubilis.

Præparatum:

Massa pilularum de Cynoglosso.

Balsamum Terebinthina communis.

Ph. N. Ed. I.: Balsamum Pinorum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Térébenthine commune. Ceteræ: Terebinthina.

Terpentin.

Pini variæ species. **Coniferæ.** Arbores Europæ et Americæ borealis.

Balsamum e truncis vulneratis effluens.

Massa e subflavo alba, turbida, lenta, mellis consistentiæ, subgranulosa; per aliquod tempus seposita crustam limpidiorem et diaphanam in superficie exhibet.

Præparata:

Emplastrum Cantharidum colatum.

„ „ cum Euphorbio.

„ „ ordinarium.

„ gummi-resinosum.

Unguentum basilicum flavum.

„ „ nigrum.

„ terebinthinatum.

Balsamum Terebinthina Veneta.*Ph. N. Ed. I.: Balsamum Laricis.**Ph. Svec. Ph. Dan.: Balsamum Terebinthina laricina seu Veneta.**Ph. Germ.: Terebinthina laricina. Ph. Fr.: Térébenthine du Mélèze.***Venetiansk Terpentin.****Larix decidua** *Miller.* **Coniferæ.** Arbor Europæ australis.

Balsamum e trunco vulnerato effluens. Plerumque limpidum, interdum subturbidum, æqvabile, coloris subflavi aut e subviridi flavi.

Præparata:

Emplastrum adhæsivum.

„ Meliloti.


Balsamum Tolutanum.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Fr.: Baume de Tolu. Ceteræ: Balsamum Tolutanum.***Tolubalsam.**

Myroxylon toluiferum *Humboldt, Bonpland, Kunth* et aliæ forsā **Myroxyli** species. **Papilionaceæ.** Arbores Novæ Granadæ.

Balsamum e cortice vulnerato effluens.

Massa resinosa, interdum mollis Terebinthinæque similis, sæpius solida et fragilis, sed calore mollescens et lentescens, e rubro vel flavo fusca, diaphana, odore subvanillaceo, in spiritu concentrato facile solubilis.

Adhibetur ad præparationem pilularum iodeti ferrosi.


Biboras natricus. Borax.*Ph. N. Ed. I.: Biboras natricus.**Ph. Svec. & Ph. Dan.: Biboras natricus.**Ph. Germ.: Borax (s. Natrium biboricum). Ph. Austr.: Natrium boracicum. Ph. Brit.: Borax. Ph. U. St.: Sodii Boras. Ph. Fr.: Borate de soude, Borax.***Borax.**

Crystalli coloris expertes, pellucidæ vel superficialiter subfatiscentes; ignitæ aqvam perdunt et demum in massam pellucidam et vitri similem liqvescunt. In aqvæ frigidæ circiter partibus qvindicim (15), fervidæ partibus duabus (2) solvuntur, solutiones reactionis alkalinæ præbentes. Solutio salis acidulata ne solutione sulphidi hydrici, alkalina ne solutione sulpho-hydratis ammonici vel carbonatis ammonici præbeat præcipitatum (metalla, terræ alkalinæ). Acidis ne effervescat (carbonates), neve nitrato argenteo neve chloreto baryeo præcipitatum acido nitrico non solubile præbeat (chloreta, sulphates).

Præparata:

Linetus boracinus 10 : 100.

Tartarus boraxatus.


Bicarbonas kalicus.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Kali bicarbonicum. Ph. Brit.: Potassæ bicarbonas. Ph. U. St.: Potassii Bicarbonas. Ph. Fr.: Bicarbonate de potasse.***Surt kulsurt Kali.**

Crystalli coloris expertes, pellucidæ, aëri expositæ non mutabiles, in aqvæ frigidæ partibus qvatuor (4) so-

lubiles, solutiones reactionis alkalinae exhibentes. Et sal siccum et solutio salis, si calefeceris, partem acidi carbonici amittunt. Solutio aqvosa solutione chlorethi hydrargyrici corrosivi addita leviter modo turbetur, ne praebeat praecipitatum flavum vel rubicundum (carbonates). Solutio acido nitrico acidulata chloreto baryeo ne praecipitatum exhibeat (sulphates), nitrate argentario leviter modo turbetur (chlorethi).

Adhibetur ad praeparationem liquoris citratis kalici.

Bicarbonas natrius.



Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Natrum bicarbonicum. Ph. Austr.: Natrium hydrocarbonicum. Ph. Brit.: Sodae bicarbonas. Ph. U. St.: Sodii Bicarbonas. Ph. Fr.: Bicarbonate de soude.

Surt kulsurt Natron.


Pulvis vel crusta crystallinae, albissimae, in aere persistentes, in aqvae frigidae partibus tredecim (13) reactione alkalina debili solubiles; pulvis et siccus et in aqua solutus, si calefeceris, partem acidi carbonici amittit.

Solutio aqvosa solutione chlorethi hydrargyrici addita leviter modo turbetur, ne praebeat praecipitatum flavum vel rubicundum (carbonates), neve acido nitrico acidulata solutione sulphidi hydrici praecipitatum exhibeat (metalla), nitrate argentario vel chloreto baryeo levissimam modo turbationem praebeat (chlorethi, sulphates).

Præparata:

Infusum Rhei alkalinum	3 ad 200.
Pulvis effervescens. Doses singulæ continent .	2,00 gram.
" " compositus. Doses singulæ	
continent	2,00 —
Trochisci bicarbonatis natrici. Trochisci singuli	
continent	0,05 —

Bitartras kalicus. Cremor Tartari.



Ph. N. Ed. I.: Tartras hydrico-kalicus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Bitartras kalicus.

Ph. Germ.: Tartarus depuratus s. Kali bitartaricum purum. Ph. Austr.: Kalium hydro-tartaricum. Ph. Brit.: Potassæ Tartras acida. Ph. U. St.: Potassii Bitartras. Ph. Fr.: Tartrate acide de potasse. Crème de tartre.

Surt vinsurt Kali. Renset Vinsten.

Crystalli albæ vel pulvis albus crystallinus, saporis aciduli, in aqvæ frigidæ partibus circiter centum et septuaginta (170) solubilis.

Solutio acidulata ne solutione sulphidi hydrici, alkalina ne solutione sulpho-hydratis ammonici præbeat præcipitatum (metalla, Fe, Cu). Pulvis cum solutione concentrata carbonatis natrici coctus solutionem plane limpidam præbeat (Ca).

Solutio acido nitrico acidulata ne nitrate argentario neve chloreto baryco turbetur (chloreto, sulphates).

Præparata:

Pulvis refrigerans	6 : 8
Species laxantes St. Germain	10 : 100.
Tartarus boraxatus.	

Brometum kalicum.

KBr.

*Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Kalium bromatum. Ph. Brit.:**Potassæ bromidum. Ph. U. St.: Potassii Bromidum.**Ph. Fr.: Bromure de potassium.*

Bromkalium.

Crystalli coloris expertes, cubicæ, in aëre immutabiles, in aqvæ parte una et dimidia ($1\frac{1}{2}$), in spiritus partibus circiter ducentis (200) solubiles.

Solutio concentrata aqvosa acido hydrochlorato addito ne effervescat (carbonates), neve chloreto baryeo turbetur (sulphates). Solutio aqvosa ne amyllum coctum colore cæruleo tingat, guttis nonnullis solutionis chlori caute additis (iodeta). Si crystallorum subtiliter tritarum pars una (1) cum parte una et dimidia ($1\frac{1}{2}$) bichromatis kalici subtiliter triti et acidi sulphurici concentrati partibus quatuor (4) accurate commiscetur et destillatio e retorta parva dein instituitur, destillatum ita obtentum, solutione ammoniaci abundanti admixta, aut decoloretur aut colorem pallide flavum induat (chloreta).

† Bulbus Scillæ.

Ph. N. Ed. I.: Bulbi Scillæ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph. U. St.: Scilla.

Ph. Fr.: Scille.

Strandløg.

Urginea Scilla Steinheil (Scilla maritima L.). Liliaceæ.

Herba bulbosa regionis mediterraneæ.

Squamæ bulbi intermediæ, diaphanæ, albidæ, corneæ, sapore mucilagineo, nauseoso, amaro.

Bene siccatae in vase bene clauso caute servantur.

Dosis maxima: *Centigrammata viginti quinque* (0,25 gram.).

Præparata:

Acetum Scillæ	1 : 10
Oxymel Scillæ	1 : 30.

Calx chlorata.

Ph. N. Ed. I.: Calcaria chlorata.

Ph. Svec. (Chlori efficacis minimum 10 %). *Ph. Dan.:* (20 %).

Ph. Germ.: *Calcaria chlorata* (25 %). *Ph. Austr.:*

Calcium hypochlorosum. *Ph. Brit.:* *Calx chlorata*

(30 %). *Ph. U. St.:* *Calx chlorinata* (25 %). *Ph.*

Fr.: *Chlorure de chaux sec. Hypochlorite de chaux impur.*

Chlorkalk.

Pulvis albus vel e cano albidus, pæne siccus, grumosus, chlorum redolens, in aqua ex parte turbide solubilis; aëri expositus cito humescit et pastæ consistentiam assumens chloro aufugiente decomponitur.

Partes centum (100) contineant chlori efficacis minimum partes viginti (20). Hoc ita dignosci potest, si calcis chloratæ pulveratæ partes centum (100) in vitrum epistomio vitreo clausum impositas conqvassando cum sulphatis ferrosi partibus centum qvinqvaginta sex (156) in aqua acido hydrochlorato acidulata solutis liqvorem efficias, qvi acidam reactionem præbens guttas nonnullas solutionis hypermanganatis kalici additas non decoloret.

Servetur in vasis bene clausis et a lucis accessu remotis.

Præparatum;

Solutio Calcis chloratæ 2 : 100.

Camphora.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Camphre du Japon. Ceteræ: Camphora.

Campher.

Camphora officinarum *Nees.* (*Laurus Camphora L.*).
Laurineæ. Arbor Japoniæ et Chinæ.

Destillatione cum aqua ligni et foliorum in Japonia et China obtinetur, in Europa sublimatione repurgatur.

Massa diaphana colorisqve expers, aqua levior, lamellata, nitida, tenax, odoris penetrantis et peculiaris, aëri exposita temperatura ordinaria sensim, calefacta citius sine residuo avolans, in aqua minima ex parte, in spiritu, æthere, chloroformio, acido acetico, oleis pingvibus et æthereis facile solubilis.

In vase bene clauso servetur.

Præparata:

Æther spirituosus camphoratus 1 : 7

Linimentum ammoniacato-camphoratum 4 : 100

„ Opodeldoc 2 : 100

Mixtura camphorata	1 : 100
„ „ acida	1 : 100
Oleum camphoratum	20 : 100
Spiritus antiparalyticus	6 : 100
„ camphoratus	10 : 100
„ saponis camphoratus	3 : 100
Tinctura Opii benzoica	3 : 1000
Ungventum acetatis plumbici compositum	8 : 100.

† Cantharides.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Cantharides. Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph. U.
St.: Cantharis. Ph. Fr.: Cantharide.

Spanske Fluor.

Lytta vesicatoria Fabr. Insecta, Coleoptera. Europæ mediæ et australis indigena.

Insecta, quantum fieri potest, integra, vermiculis non corrosa. Ad gradum coloris 30—40 plane exsiccata in vase bene clauso servantur.

Præparata:

Collodium cantharidatum	4 : 5
Emplastrum Cantharidum colatum	1 : 3
„ „ cum Euphorbio	2 : 15
„ „ ordinarium	6 : 22
Ungventum Cantharidum	1 : 5
Tinctura Cantharidum	1 : 30.

Caragheen.

Ph. N. Ed. I.: Sphærococcus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Carrageen. Ph. Austr.: Caragaheen. Ph. U. St.: Chondrus. Ph. Fr.: Carragaheen.

Caragheen.

Sphærococcus crispus et **S. mamillosus** *Agardh.*
Algæ, Florideæ. Algæ polymorphæ ad litora Angliæ et Hiberniæ frequentes, ad Norvegiæ occidentalis litora passim inventæ.

Thallus planus vel canaliculatus, dichotomus, margine undulatus et serrulatus, siccatus cartilagineus, colore subflavo, cum aqua coctus gelatinam refrigeratione rigescentem præbens.

Præparatum:

Gelatina Caragheen 6 : 100.

Carbo ligni præparatus.

Ph. N. Ed. I.: Carbo ligni.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Carbo pulveratus. Ph. Austr.: Carbo ligni depuratus. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Carbo ligni. Ph. Fr.: Charbon végétal.

Præpareret Trækul.

Juniores **Tiliæ** vel **Populi** vel **Alni** ramuli in crucibulo leviter clauso vel alio idoneo vase comburantur, donec omnes volatiles partes extricatæ sint. Carbones exinde orti in subtilissimum pulverem redigantur et aquæ sufficienti quantitate excoquantur; tum pulvis filtro collectus et aqua ablutus fortiore calore exsicceetur.

Pulvis ita paratus sit subtilissimus, levissimus, niger, saporis atque odoris expers; in aëre candefactus flammam ne concipiat neve aquam, quacum coquitur, colore tingat.

Carbonas calcicus cretaceus.

Ph. N. Ed. I.: Carbonas calcicus.

Ph. Svec.

Cfr. Ph. Germ.: Calcaria carbonica præcipitata. Ph.

Austr.: Calcium carbonicum nativum. Ph. Brit. & Ph.

U. St.: Creta. Ph. Fr.: Carbonate de chaux (craie).

Creta alba.

Kridt.

Frusta vel pulvis albus, amorphus, tingens, non in aqua, in acido hydrochlorato fere plane sub effervescencia acidi carbonici solubilis.

Præparatum:

Ungventum Sulphuris compositum.

Carbonas kalicus depuratus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Kali carbonicum depuratum. Ph. Brit.: Potassæ carbonas. Ph. U. St.: Potassii Carbonas.

Renset Potaske.

Sit pulvis albus, siccus, in aëre deliquescens, cum aquæ copia æquali solutionem pæne limpidam præbens.

Ph. Norv. Ed. II.

Solutio acido nitrico acidulata ne solutione sulphidi hydrici turbetur (metalla).

Servetur in vase bene clauso.

Carbonas kalicus purus.

K_2CO_3 .

Ph. N. Ed. I.: Carbonas kalicus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Carbonas kalicus.

Ph. Germ.: Kali carbonicum purum. Ph. Austr.: Kalium carbonicum depuratum. Ph. U. St.: Potassii Carbonas pura. Ph. Fr.: Carbonate de Potasse, Sel de Tartre.

Kulsurt Kali.

Pulvis albissimus, siccus, in aëre deliquescens, cum aqvæ æquali copia solutionem prorsus limpidam præbens.


Solutio acidulata ne solutione sulphidi hydrici, alkalina ne solutione sulpho-hydratis ammonici præbeat præcipitatum (metalla). Solutio acido nitrico acidulata ne chloreto baryco (sulphates), neve aut leviter modo nitrate argentario turbetur (chloreto).

Servetur in vase bene clauso.

V. **Bicarbonatis kalici** quantum vis in patina ferrea polita candefiat, donec aqvæ et acidi carbonici evolutio desierit.

Præparata:

Liquor arseniitis kalici	1 : 100
Mixtura Ferri composita	2 : 300
Solutio carbonatis kalici	20 : 100.

Carbonas natricus.

Ph. N. Ed. I.: Carbonas natricus crystallisatus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Natrum carbonicum purum. Ph. Austr.: Natrum carbonicum crystallisatum. Ph. Brit.: Sodæ carbonas. Ph. U. St.: Sodii Carbonas. Ph. Fr.: Carbonate de soude cristallisé.

Kulsurt Natron. Soda.

Crystalli pellucidæ, coloris expertes, in aquæ partibus duabus (2) solubiles. Aëri expositæ fatiscunt, avolante maxima ex parte aqua crystallina (parte fere dimidia ponderis salis). Solutio acidulata ne solutione sulphidi hydrici, alkalina ne solutione sulpho-hydratis ammonici præbeat præcipitatum (metalla). Solutio acido nitrico acidulata, addito nitrate argenteo vel chloreto baryeo, ne præcipitatum, vix turbationem levem exhibeat (chloreto & sulphates).

Servetur in vase bene clauso.

Castoreum Canadense.

Ph. N. Ed. I.: Castoreum a) Canadense.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Castoreum Canadense. Ceteræ: Castoreum.

Kanadisk Bævergjæl.

Castor Americanus Cuvier. Mammalia, Glires. Animal Americam borealem habitans.

Folliculi inter anum et genitalia utriusque sexus positi, membranis exterioribus arcte adnatis et difficulter

separabilibus instructi, massa subresinosa duriore in fractura nitenti vel massa interdum molliore repleti.

Ne sint folliculi parvi, vieti aut nimis fibrosi. Cave ne confundantur cum folliculis factitiis e resina membranis modo involuta confectis.

Servetur caute siccatum, ne mucorem contrahat.

Præparata:

Massa pilularum de Cynoglosso	1 : 15
Tinctura Castorei	20 : 100
“ “ ætherea	20 : 100.

Cera.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Cire blanche & Cire jaune. Ceteræ: Cera alba & C. flava.

Vox.

Apis mellifica L. Insecta, Hymenoptera.

Cera flava e favis apum liqvata.

Cera alba e cera flava aplicatione parata.

Cave, ne sit pingvedinibus vel materiis similibus adulterata. Cera flava dispensetur, nisi alba expresse præscripta est.

Præparata:

Ceratum rubrum.	Ungventum acetatis plumbici com-
Charta antirheumatica.	“ aromaticum. [positum.
Emplastrum adhæsivum.	“ basilicum flavum.
“ Cantharidum colatum.	“ “ nigrum.
“ Cantharidum ordinarium.	“ Cantharidum.
“ gummi-resinosum.	“ Cerae.
“ Meliloti.	“ Cetacei.
Spongia cerata.	“ oxydi hydrargyrici.
Ungventum acetatis plumbici.	“ terebinthinatum.

Ceratum rubrum*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. Ph. Dan.: Ceratum ad labia* (cum ætheroleo Lavandulæ paratum).*Ph. Germ.: Ceratum cetacei rubrum* (cum oleo Bergamottæ & oleo Citri paratum). *Ph. Fr.: Cérat à la rose.***Læbe-Pomade.**

Rp. Ceræ flavæ partes viginti	20
Cetacei partes triginta	30
Olei Amygdalarum partes quinquaginta	50.
Colliquefactis addantur	
Radicis Alkannæ concisæ partes decem	10
Ætherolei Bergamæ pars una	1.
Per aliquod tempus calefacta colentur.	

Cetaceum.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Fr.: Blanc de baleine ou Céline. Ceteræ: Cetaceum.***Hvalrav. Spermacet.****Physeter macrocephalus L. Mammalia, Cetacea.**

Sit albissimum, grosse lamelloso-crystallinum, nitens. Flavescens vel rancidum rejiciatur.

Præparata:

Ceratum rubrum.

Ungventum cetacei.

Charta antirheumatica

loco Massæ chartæ antirheumaticæ Ph. N. Ed. I.

Gigtpapir.

Rp. Resinæ Colophonii	40
Picis Pini	40
<i>singulorum partes quadraginta.</i>	
Pyrolei Pini	10
Ceræ flavæ	10
<i>singulorum partes decem.</i>	

Massa liqvando commixta coletur et chartæ tenuiter illinatur.

Chinoidinum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Chinoidina.

Ph. Germ.: Chinoidinum.

Chinoidin.

Massa fusca, resinæ similis, saporis amari, in aqua fere insolubilis, in spiritu, æthere, acidis dilutis facile solubilis.

Aqua, qvacum conqvassatur, colore ne tingatur, evaporata pauxillum modo residui relinqvat. Ignita massa prorsus conflagret.

Præparatum:

Tinctura Chinoidini 10 : 100.

Chloras kalicus.K.ClO₃.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Kali chloricum. Ph. Austr.: Kalium chloricum. Ph. Brit.: Potassæ chloras. Ph. U. St.: Potassii Chloras. Ph. Fr.: Chlorate de potasse.***Chlorsurt Kali.**

Crystalli pellucidæ, coloris expertes, lamellares, in aëre immutabiles, in aquæ frigidæ partibus septendecim (17), fervidæ partibus tribus (3) solubiles. Si solutio cum acido hydrochlorato coquitur, gas chlori avolat. Eadem solutio, gase chlori leni calefactione fugato, ne solutione sulphidi hydrici præcipitatum præbeat, etiamsi cum ea per aliquod tempus seposita fuerit (metalla: As.). Solutio aquosa ne oxalate ammonico præcipitatum exhibeat (Ca), nitrate argentario leviter modo turbetur (chloreta). Candefactæ crystalli residuum ad chartam exploratoriam aut indifferens aut reactionis leviter modo alkalinae relinquant (KNO₃).

†† Chloreto-amidetum hydrargyricum.NH₂HgCl.*Ph. N. Ed. I.: Amideto-chloretum hydrargyricum.**Ph. Svec. Ph. Dan.: Chloretum amido-hydrargyricum.**Ph. Germ.: Hydrargyrum præcipitatum album. Ph. Austr.: Hydrargyrum bichloratum ammoniatum. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Hydrargyrum ammoniatum.***Mercurius præcipitatus albus.****Hvidt Kviksølv-Præcipitat.**

Sit pulvis albissimus, in aqua frigida insolubilis. Si cum aqua per aliquod temporis spatium coquitur, ex parte

decomponitur; ignitus deletur et sine liqvatione avolat. Cum solutione hydratis natrici calefactus colorem flavum sensim assumit, odorem ammoniaci spargens. Sit in acido hydrochlorato diluto prorsus solubilis.

In vitro bene clauso et a luce remoto cautissime servetur.

V. Rp. **Chloreti hydrargyrici corrosivi partes duas 2**
Aqvæ destillatæ partes quadraginta . . . 40.

Solvantur. Solutio limpida et ad temperaturam ordinariam refrigerata inter agitandum infundatur in

Solutionis Ammoniaci partes tres . . . 3.

Præcipitatum inde effectum filtro colligatur, aqvæ destillatæ partibus viginti (20) abluatur et inter plagulas chartæ bibulæ quam citissime in loco obscuro siccetur.

Chloretum ammonicum.

NH_4Cl .

Ph. N. Ed. I.


Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Ammonium chloratum. Ph. Brit.: Ammonii chloridum. Ph. U. St.: Ammonii Chloridum purificatum. Ph. Fr.: Chlorhydrate d'ammoniaque. Sel ammoniac.

Salmiak.

Frusta vel pulvis, coloris atqve odoris expers, in aqvæ frigidæ partibus tribus (3), fervidæ æquo pondere solubilis, ignitus plane avolans.

Solutio acidulata ne solutione sulphidi hydrici, alkalina ne solutione sulpho-hydratis ammonici turbetur (metalla: Cu, Pb, Sn, Fe).

Chloretum chinicum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Chininum hydrochloricum. Ph. Austr.: Chininum hydro-chloricum.

Chlorvandstofsurt Chinin.

Crystalli parvæ, subtiles, sericeo-nitentes, in aqvæ partibus viginti qvatuor (24), in spiritus partibus tribus (3) solubiles; ignitæ nullo residuo relicto conflagent.

Solutio aqvosa acido sulphurico diluto præcipitatum ne exhibeat (Ba), chloreto baryco addito aut ne aut leviter modo turbetur (acid. sulphuric.).

Servetur in vase bene clauso.


V. Rp. **Chloreti baryci partes septem** 7

Aqvæ fervidæ partes ducentas 200.

In cucurbita solutis addantur

Sulphatis chinici partes viginti quinque 25.

Mixtio inter qvassationem sæpius repetitam per horam dimidiam calore circiter 100° calefiat, tum filtretur, et remanentia eluantur. Filtratam in balneo aqvæ ad crystallisationem evaporetur, tum, liqvore per aliquod tempus seposito, crystalli exortæ separentur et, nullo calore adhibito, inter plagulas chartæ bibulæ siccentur. Lixivia remanens denuo evaporetur, qvæ operatio repetatur, qvamdiu crystalli e liqvore seposito exoriuntur.

Chloretum ferricum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Ferrum sesquichloratum. Ph. Austr.: Ferrum sesquichloratum solutum. Ph. U. St.: Ferri Chloridum.

Chlorjern.

Massæ crystallinæ, ex aurantiaco flavæ, in aëre deliquescentes, in aqua et spiritu solubiles. Solutio aqvosa

guttis nonnullis acidi sulphurici additis portiunculam solutionis hypermanganatis kalici affusam ne decoloret (Fe O). Si solutio aqvosa solutione ammoniaci supersaturatur, liquor a præcipitato inde effecto filtratus colorem cæruleum ne exhibeat (Cu) neve solutione sulpho-hydratis ammonici præbeat præcipitatum (metalla: Zn). Solutio aqvosa chloreto baryco ne turbetur (acid. sulphuric.). Æquali copia acidi sulphurici concentrati addita et solutione sulphatis ferrosi caute superinfusa, zona fusca inter ambos liquores ne oriatur (acid. nitric.).

Servetur in vase bene clauso.

V. **Acidi hydrochlorati** copiae cuilibet in cucurbita capaciore tamdiu addatur

Ferrum in filis, qvamdiu hoc solvitur.

Solutio inde effecta cum Ferro abunde addito per aliquod tempus digeratur, tum filtretur, qvo facto liquor limpidus in patina porcellanea capaciore calore aquæ bullientis calefiat. Deinde mixtio ex

Acidi hydrochlorati *partibus tribus* 3

Acidi nitrici *parte una* 1

parata tamdiu inter agitationem affundatur, donec portiuncula liquoris exempta et aqua satis diluta solutionem hypermanganatis kalici non jam decoloret. Tum liquor in balneo vaporis evaporetur, donec pondus ejus fere quinque partibus (5) majus sit qvam copia Ferri adhibiti, dein in patina bene tecta in loco frigido seponatur, ut in massam crystallinam concreseat.

Præparata:

Solutio chlorete ferrici	50 : 100
„ „ „ spirituosa	10 : 100
„ „ „ spirituoso-æthereo	10 : 100.

†† Chloretum hydrargyricum corrosivum.

Hg Cl₂.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Hydrargyrum bichloratum corrosivum. Ph. Brit.: Hydrargyri perchloridum. Ph. U. St.: Hydrargyri Chloridum corrosivum. Ph. Fr.: Deutochlorure de Mercure sublimé.

Kviksølv-Sublimat.

Massæ albæ, ponderosæ, diaphanæ, crystallinæ, in aqvæ frigidæ partibus sedecim (16), fervidæ partibus tribus (3), spiritus partibus tribus (3), ætheris partibus quatuor (4) solubiles. Ignitæ liqvescunt et plane avolant. Solutio aqvosa solutione iodeti kalici addita præcipitatum rubrum exhibeat et in eadem solutione iodeti kalici et in solutione chloreti hydrargyrici abundanti solubile.

Cautissime servetur.

Dosis maxima: Centigrammata tria . . 0,03 gram.

† Chloretum hydrargyrosus mite. Calomel.

Hg₂Cl₂.

Ph. N. Ed. I.: Chloretum hydrargyrosus mite sublimatum.

Cfr. Ph. Svec.: Chloretum hydrargyrosus præcipitatum.

Ph. Dan.: Chloretum hydrargyrosus sublimatum.

Ph. Germ.: Hydrargyrum chloratum mite (sublimatione paratum) & Hydrarg. chlorat. mite vapore paratum.

Ph. Austr.: Hydrargyrum chloratum mite. Ph. Brit.: Hydrargyri subchloridum. Ph. U. St.: Hydrargyri Chloridum mite. Ph. Fr.: Protochlorure de Mercure par sublimation.

Calomel.

Sublimatione paratum.

Sit pulvis ponderosus, e flavescenti albus, in aqua,

spiritu, æthere insolubilis, ignitus sine liqvatione plane volatilis. Sublimatione pluries repetita, vel si cum aqua aut acido hydrochlorato concentrato aut chloretis quibusdam coctus, vel si luci per aliquod temporis spatium expositus fuit, in chloretum hydrargyricum corrosivum et hydrargyrum ex parte decompōnitur.

Si pulvis cum aqua conqvassatus erit, liqvor inde filtratus solutione sulphidi hydrici ne turbetur (HgCl_2).

A luce remotum caute servetur.

†† Chloretum morphicum.

$\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{NO}_3\text{HCl} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Morphinum hydrochloricum. Ph. Austr.:

Morphinum hydrochloricum. Ph. Brit.: Morphicæ

hydrochloras. Ph. U. St.: Morphicæ Murias. Ph.

Fr.: Chlorhydrate de Morphine.

Chlorvandstofsurt Morphin.

Crystalli albæ, nitentes, sæpius fasciculatim cohærentes, saporis amari, in aquæ partibus viginti (20) et in spiritus partibus sexaginta (60) solubiles. Acido nitrico frigido affusæ colore e luteo rubro tinguntur, ignitæ nullo residuo relicto conflaurant. Solutiones, affusa solutione hydratis natrii, præcipitatum album in copia abundanti ejusdem hydratis natrii solutionis plane solubile præbeant (præcipitatum, quod non plane solvitur, præsentiam narcotini indicat); ne illa ratione tractatæ odorem ammoniacalem spargant (salia ammoniacalia).

Cautissime servetur.

Dosis maxima: Centigrammata tria . . . 0,03 gram.

† **Chloretum zincicum.**

ZnCl2.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Zincum chloratum. Ph. Brit. &

Ph. U. St.: Zinci chloridum. Ph. Fr.: Chlorure de zinc.

Chlorzink.

Pulvis albus, aëri expositus deliquescens, ignitus in liqvore qvasi oleaceum liqvescens, in aqua et spiritu concentrato turbide, additis autem guttis nonnullis acidi hydrochlorati limpide solubilis. Solutio acidulata solutione sulphidi hydrici ne turbetur (metalla: Pb, Cu, Cd). Solutione ammoniaci addita præcipitatum album, in liqvore præcipitanti abunde affuso solubile, oriatur.

Servetur caute in vitro bene clauso.

V. **Zincum** vel **Oxydum zincicum venale** in **Acidi hydrochlorati** *sufficienti copia* solvatur.

Solutio inde effecta cum zinco abundanti per aliquod tempus digeratur et per vitrum grosse contusum vel per asbestum filtretur. Liqvor filtratus dein leni calore adhibito in patina porcellanea evaporetur, donec portiuncula exempta refrigerando obrigescat. Massa liqvefacta et paullum refrigerata in frustula comminuatur et in vas prorsus siccum imponatur.

† **Chloroformium.**

CHCl3.

Ph. N. Ed. I.: Trichloretum formylicum.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Chloriformium purum (Pond. specif. 1,490—1,494).

Ph. Germ.: Chloroformium (1,492—1,496). *Ph. Austr.: Chloroformium* (1,49—1,50). *Ph. Brit.: Chloroformium* (1,49). *Ph. U. St.: Chloroformum purificatum* (1,480). *Chloroformum venale* (1,45—1,49). *Ph. Fr.: Chloroforme* (1,48).

Chloroform.

Sit liqvor limpidus, volatilis, odoris peculiaris, saporis

dulcis et urentis, in aqua minima ex parte, in spiritu, æthere, oleis pingvibus facile solubilis. Ebulliat caloris gradu 60—63. Pondus specificum = 1,485—1,493. Aqua, quæcumque convassatur, chartam exploratoriam ne permutet neve nitrate argéntico turbetur (acid. hydrochlorat.). Chloroformium instillatum in solutione iodeti kalici ne rubescat (Cl). Cum æquali pondere acidi sulphurici concentrati convassatus et per aliquod tempus sepositus hoc ne tingat.

Servetur caute in vitro bene obturato.

Nota: Ad usum externum Chloroformium, quod dicitur Germanicum, pondere specifico circiter 1,50 dispensetur.

Præparatum:

Tinctura odontalgica 23 : 100.

Citras ferrico-ammonicus.

Cfr. Ph. Germ.: *Ferrum citricum ammoniatum*. Cfr. Ph. Brit.: *Ferri et ammoniæ citras*. Cfr. Ph. U. St.: *Ferri et Ammonii Citras*. Cfr. Ph. Fr.: *Citrate de fer ammoniacale*.

Citronsurt Jernoxyd-Ammoniak.

Rp. **Acidi citrici partes tres** 3,
solve in

Aqvæ destillatæ partibus viginti 20.

Deinde sensim addatur hydratis ferrici recens præcipitati et adhuc humidi ea quantitas, ut post digestionem longiorem et inter agitationem sæpe repetitam paulum non solutum supersit. Tum liquorem filtra filtrum paullo aquæ eluendo. Liquori filtrato addatur

Acidi citrici pars una 1

(in aqua destillata soluta et cum solutione ammoniaci saturata).

Tum liquor in patinam porcellaneam immissus ad syrupi spissitudinem evaporetur et super vasa plana porcellanea vel vitrea extensus exsicceetur.

Sit sal siccum, amorphum, in aëre humescens, plerumque lamellas tenues, diaphanas referens, coloris e viridi flavi, saporis acidulati, pungentis, salini, postea mitis, ferruginei, in aqua frigida colore subflavido facile et plane solubile, quæ solutio cum solutione ammoniaci mixta colore e rubro fusco fiat, sed præcipitatum ne demittat.

Præparatum:

Vinum Chinæ ferratum.

Collodium.

Ph. N. Ed. I.

Pharmacopœarum: Collodium.

Collodium.

Sit limpidum, consistentiæ syrupi, ad chartam exploratoriam indifferens. Cuti impositum membranam cohærentem et splendentem relinquat.

Servetur in vitro bene clauso loco frigido.

V. Rp. **Nitratis kalici** *partes viginti* 20

Acidi sulphurici crudi *partes triginta* 30.

In vase vitreo capaciore misceantur. Mixtioni ad temperaturam 30° refrigeratæ addatur

Gossypii depurati *pars una* 1,
quod ita immergatur, ut mixtione totum imbuatur; quo facto per horas 12—24 seponatur. Dein massa solida eximatur, aqua destillata eluatur, donec chartam exploratoriam non amplius permutet, tum exprimatur et calore lenissimo siccetur.

Gossypium fulminans hac ratione paratum cum tanta copia mixtionis ex

Ætheris *partibus sex* 6

Spiritus concentrati *parte una* 1

paratæ conqvassetur, quanta ad solutionem syrupi consistentiæ parandam requiratur.

Solutio dein seponatur, ut partes non solutæ subsidant, tum limpide defundatur.

Præparatum:

Collodium elasticum.

Collodium cantharidatum.

Ph. Dan.

Ph. Germ.: Collodium cantharidatum.

Ph. U. St.: Collodium cum Cantharide.

Rp. **Cantharidum** nuper grosse pulveratarum

partes octoginta 80.

In apparatu apto cum

Ætheris *partibus centum viginti octo 128*

extrahantur, ut extracti pæne limpidi

partes octoginta octo 88

compareantur, cui extracto inter qvassationem admisceantur

Spiritus concentrati *partes octo 8*

Gossypii fulminantis *partes quatuor 4,*

quod illa ratione parari potest, quæ in Collodio commemorando exposita est.

Sit consistentiæ syrupi, colore e subfusco viridi. Servetur in vitro bene clauso loco frigido.

Collodium elasticum.

Ph. Svec. (Collod. 200, Glycerin. 1). *Ph. Dan.* (Collod. 99, Ol. Ricini 1).

Ph. Germ. (Collod. 50, Ol. Ricini 1). *Ph. Brit.: Collodium flexile.* *Cfr. Ph. U. St.: Collodium flexile* (Collod. 50, Terebinth. Canadense 2, Ol. Ricini 1). *Ph. Fr.: Collodion* (Collod. 100, Ol. Ricini 7).

Rp. **Glycerini** *partem unam 1*

Collodii *partes centum 100.*

Misceantur.

Servetur in vitro bene obturato loco frigido.

Cortex Cascarillæ.*Ph. N. Ed. I.: Cortex Eluteriæ.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Austr. & Ph. U. St.: Cascarilla. Ph. Fr.: Cascarille officinale. Ceteræ: Cortex Cascarillæ.***Cascarillebark.**

Croton Sloanei, Cr. Eluteria, Cr. Cascarilla Bennet & Cr. lineare Jacquin. Euphorbiaceæ. Arbores fruticescentes insularum Indiæ occidentalis, præsertim Bahamensium.

Cortex durus, canaliculatus vel convolutus, extus cinereus, intus e cinereo fuscus, fractura cornea, manducatus os urens, sapore amaro, odore aromatico.

Ramuli sæpe intermixti rejiciantur.

Præparatum:

Tinctura Cascarillæ 20 : 100.

Cortex Chinæ Calisayæ.*Ph. N. Ed. I.: Cortex Cinchonæ regius.**Ph. Svec. & Ph. Dan.*

Ph. Germ.: Cortex Chinæ Calisayæ. Ph. Austr.: China (Cortex Chinæ Calisayæ). Ph. Brit.: Cinchonæ flavæ cortex. Ph. U. St.: Cinchona flava. Ph. Fr.: Quinquina Calisaya ou Quinquina jaune royal.

Konge-Chinabark.

Cinchona Calisaya Weddell. Rubiaceæ. Arbor in regionibus altioribus Andium Boliviae et Peruviae australis spontanea, in insula Java et India orientali culta.

Cortex interior trunci, planiusculus, unum ad duo centimetra crassus, e rufo flavus, extus impressionibus

foveatis, superficialibus, argute marginatis instructus, fractura æqualiter, brevissime rigideqve fibrata.

Cortex basium, quas dicunt, Chinæ partes minimum duas (2) in centum partibus (100) continere debet. Cave, ne confundas cum corticibus flavis vilioribus, quales sunt cortices Chinæ Carthagenæ, rubiginosus, Pitoyensis.

Præparata:

Decoctum Chinæ	10 : 100
„ „ acidum	10 : 100
Tinctura Chinæ	20 : 100
„ „ composita	8 : 70.

Cortex Cinnamomi Ceylanici.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Cortex Cinnamomi Zeylanici. Ofr. Ph. Austr.: Cinnamomum. Ph. Brit.: Cinnamomi cortex. Ph. U. St.: Cinnamomum. Ph. Fr.: Cannelle de Ceylan.

Ægte Kanel.

Cinnamomum Ceylanicum Breyn. Laurineæ. Arbor insulæ Ceylon indigena, in zonis calidis culta.

Cortex interior ramulorum, pluries convolutus, tenuissimus, fragilis, coloris pallide ex flavo fusci, odoris grate aromatici, saporis dulcis, manducatus os urens.

Præparata:

Massa pilularum de Cynoglosso.

Tinctura aromatica.

„ „ acida.

„ Cinnamomi.

„ Lavandulæ composita.

Cortex Frangulæ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Cortex Frangulæ.

Frangulabark.

Rhamnus Frangula L. Rhamneæ. Frutex Norvegiæ indigenus.

Cortex ramorum sæpius convolutus, extus canus vel e cano fuscus, verrucis parvis, albis, transverse sæpe porrectis, obsitus, vetustior subrimosus, strato suberoso, tenuissimo, intus purpureo obtectus, fractura fibrata, fibris citrinis.

Ne dispensetur cortex nisi per annum saltem servatus.

Cortex fructuum Aurantii. Flavedo Aurantii.

Ph. N. Ed. I.: Cortex fructuum Aurantii.

Ph. Svec.: Flavedo aurantii. Ph. Dan.: Cortex fructus Aurantii.

Ph. Germ.: Cortex fructus Aurantii. Ph. Austr.: Aurantium (Flavedo corticis Aurantii). Ph. Brit.: Aurantii cortex. Ph. U. St.: Aurantii amari cortex. Ph. Fr.: Écorce d'Orange amère.

Pommerantsskal.

Citrus vulgaris Risso (C. Aurantium L. var. amara). **Aurantiaceæ.** Arbor Asiæ orientalis et meridionalis indigena, in Europa meridionali frequenter culta.

Cortex fructus maturi a strato interiore albo liberetur.

Præparata:

Tinctura Aurantii.

„ Chinæ composita.

„ Lavandulæ composita.

Cortex Qvercus.

*Ph. N. Ed. I.: Cortex Qvercuum.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Cortex Qvercus. Ph. Brit.: Qvercus cortex. Ph. U. St.: Qvercus alba. Ph. Fr.: Écorce de chêne rouvre.*

Egebark.

Qvercus pedunculata Ehrhardt (**Q. Robur L.**) et **Q. sessiliflora** Smith (**Q. Robur β . L.**). Cupuliferæ. Arbores Norvegiæ australis.

Colligendus est tempore vernali cortex truncorum juniorum vel ramorum non nimis vetustorum.

Decocta,

qvibus nulla formula nominatim præscripta est, eodem modo parentur ac decoctum Chinæ.

Decoctum Chinæ.

*Ph. N. Ed. I.: Decoctum Cinchonæ simplex.**Ph. Brit. & Ph. U. St.: Decoctum Cinchonæ flavæ (1 ad 20).*

China-Decoct.

Rp. **Corticis Chinæ Calisayæ** contusi *partes decem* 10.

Per dimidiam horam coquantur cum

Aqvæ tanta copia, qvanta sufficiat ad colaturam calide expressam *partium centum* . . . 100.

Refrigeratum sit turbidum.

Ex tempore paretur.

Decoctum Chinæ acidum.*Ph. N. Ed. I.: Decoctum Cinchonæ acidum.***Surt China-Decoct.**

- Rp. **Corticis Chinæ Calisayæ** contusi *partes decem* 10
Acidi sulphurici diluti *partem unam* 1.
 Coquantur per horam dimidiam in patina
 porcellanea cum
Aqvæ tanta copia, qvanta sufficiat ad colatu-
 ram expressam *partium centum* 100.
 Refrigeratum sit turbidum.
 Paretur ex tempore.

Elæosacchara.*Ph. N. Ed. I.: (1:100).**Ph. Svec. & Ph. Dan.: (2:100).**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Elæosacchara. Ph. Fr.: Oléo-*
*saccharures.***Oliesukker.**

- Rp. **Ætherolei** cujusvis *guttas quinque* 5
Sacchari albi *grammata decem* 10.
 Conterendo misceantur.
 Parentur ex tempore.

Electuarium aperiens.*Ph. N. Ed. I.*

Cfr. Ph. Svec.: Electuarium Sennæ (Fruct. Coriandri 1,
 Folior. Sennæ 10, Pulpæ Tamarind. depurat. 15, Syrupi
 Sacchari 25). *Cfr. Ph. Dan.: Electuarium e Senna*

mannatum (Tartrat. kalic. 3, Fol. Sennæ 6, Pulp. Tamarind. 12, Syrup. Sennæ 24. Evaporentur ad partes 40).
Cfr. Ph. Germ.: Electuarium e Senna. Ph. Austr.: Electuarium lenitivum. Ph. Brit.: Confectio Sennæ. Ph. Fr.: Électuaire lénitif.

Afførende Latvæрге.

Rp. Tartratis kalici pulverati *partem unam* . . . 1
 Foliorum Sennæ pulveratorum *partes duas* . . . 2
 Pulpæ Tamarindorum depuratæ *partes quatuor* . . . 4
 Syrupi Sennæ mannati *partes octo* 8.
 Terendo commisceantur. Ne dispensetur nisi per aliquot dies sepositum.

Emplastrum adhæsivum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Emplastrum resinæ. Cfr. Ph. Fr.: Emplâtre agglutinatif (Emplâtre d'André de la croix).

Heftplaster.

Rp. Emplastri oxydi plumbici *partes octigentas* . . . 800
 Ceræ flavæ 75
 Resinæ Pini flavæ 75
singulorum partes septuaginta quinque,
 Sebi *partes viginti quinque* 25.
 Modico calore colliqvefactis addantur
 Balsami Terebinthinæ Venetæ
partes viginti quinque 25.
 Bene commixta massa in magdalides formetur.

Emplastrum adhæsivum cum Resina Mastiche.

Heftplaster.

Rp. Emplastri oxydi plumbici	<i>partes octingentas</i>	800
Ceræ flavæ	<i>partes septuaginta quinque</i>	75
Sebi	<i>partes viginti quinque</i>	25
Resinæ Mastichis	<i>partes centum</i>	100.
Mixta modico calore liqvefiant; deinde massa in magdalides formetur.		

Emplastrum Cantharidum colatum.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec.*

Rp. Cantharidum pulveratarum		40
Resinæ Colophonii		40
<i>singularum partes quadraginta,</i>		
Ceræ flavæ	<i>partes viginti quinque</i>	25
Sebi	<i>partes decem</i>	10.
Commixtis et inter frequentem agitationem balnei aquæ ope per horas tres liqvefactis addantur		
Balsami Terebinthinæ communis	<i>partes quinque</i>	5.
Massa dein per pannum linteum prelo calefacto exprimatur et in papyraceas capsulas effundatur.		

Emplastrum Cantharidum cum Euphorbio.*Ph. N. Ed. I.: Emplastrum Cantharidum perpetuum.**Ph. Svec.:* (Balsam. Terebinth. Venet. loco Balsami Tereb. comm.).*Ph. Dan.**Cfr. Ph. Germ.:* *Emplastrum Cantharidum perpetuum.**Ph. Austr.:* *Empl. Cantharidum perpetuum* (Cantharid. circit. 18⁰/₀).

Trækplaster.

Rp. Balsami Terebinthinæ communis		6
Resinæ Mastichis		6
<i>singulorum partes sex.</i>		

Leni calore colliqvefactis inter perpetuam agitationem admisceantur

Cantharidum nuper pulveratarum *partes duæ* . 2
Euphorbii pulverati *pars una* 1.
 Massa in papyraceas capsulas effundatur.

Emplastrum Cantharidum ordinarium.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan.: Emplastrum cantharidum.

Ph. Germ.: Empl. Cantharidum ordinarium (Cantharid. 25%). *Ph. Austr.: Emplastrum Cantharidum* (33%).

Ph. Brit.: Empl. Cantharidis (33%). *Cfr. Ph. U. St.: Ceratum Cantharidis* (33%). *Ph. Fr.: Emplâtre vésicatoire* (33%).

Spanskflue-Plaster.

Rp. Cerae flavæ *partes decem* 10

Balsami Terebinthinæ communis *partes tres* . 3.

Modico calore colliqvefactis paullatim inter agitationem continuam addatur mixtio per horas sex antea digesta e

Cantharidum nuper pulveratarum et siccatarum
partibus sex 6

Olei Olivarum *partibus tribus* 3
 parata.

Massa inter agitationem sæpius repetitam refrigerata in magdalides formetur.

Super oxydum calcicum potissimum servetur.

Emplastrum gummi-resinosum.

Ph. N. Ed. I.

Cfr. Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Empl. Lithargyri compositum. Cfr. Ph. Austr.: Emplastrum diachylon compositum.

Ph. Brit.: Empl. Galbani. Ph. Fr.: Emplâtre diachylon gommé.

Gummi-Plaster.

Rp. Emplastri oxydi plumbici	<i>partes septuaginta</i>	70
Ceræ flavæ	<i>partes duodecim</i>	12.
Colliquifactis addantur		
Gummi resinæ Ammoniaci		6
" " Galbani		6
<i>singulorum partes sex</i>		
antea calore balnei aquæ solutæ in		
Balsami Terebinthinæ communis	<i>partibus sex</i>	6
Spiritus diluti	<i>partibus tribus</i>	3.
Refrigerata massa in magdalides formetur.		

Emplastrum Meliloti

loco Emplastri Melilotorum Ph. N. Ed. I.

Cfr. Ph. Svec. & Ph. Dan.

Cfr. Ph. Germ.: Empl. Meliloti. Ph. Austr.: Empl. de Meliloto.

Meloten-Plaster.

Rp. Olei Olivarum	20
Resinæ Colophonii	20
<i>singulorum partes viginti,</i>	
Ceræ flavæ partes quadraginta	40.
Liqventur et per horam dimidiam inter perpetuam agitationem in balneo aquæ seponantur. Dein refrigeratis addatur mixtio liqvefacta	
Gummi-resinæ Ammoniacy	2
Balsami Terebinthinæ Venetæ	2
<i>singulorum partium duarum.</i>	

Adde demum:

Herbæ Meliloti pulveratæ et siccatae

partes duodecim 12

11 Absinthii pulveratæ et siccatae

partes quatuor 4.

Exacte commixta massa in magdalides formetur.

Emplastrum oxydi plumbici.

Ph. N. Ed. I.: Emplastrum plumbicum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Empl. Lithargyri simplex. Ph. Austr.: Empl. diachylon simplex. Ph. Brit.: Empl. Plumbi. Ph. Fr.: Emplâtre simple.

Bly-Plaster.

Rp. **Oxydi plumbici** subtilissime pulverati *partem unam* 1
Olei Olivarum *partes duas* 2.
 Concoquantur assidue agitando et aqvam calidam subinde instillando, donec emplastrum confectum sit. Magdalides formentur.

Præparata:

Emplastrum adhæsivum.

„ gummi-resinosum.

Emulsio Amygdalarum

loco Emulsionis Amygdalarum Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec.: Emulsio amygdalina. Ph. Dan.

Ph. Austr.: Emulsio amygdalina. Ph. Brit.: Mixtura Amygdalæ. Ph. Fr.: Émulsion simple.

Mandel-Emulsion.

Rp. **Seminum Amygdali dulcium** decorticatorum
partes decem 10

In mortario contusis et aqvæ portiuncula sensim affusa in massam pultaceam redactis addatur

Aqvæ tanta copia,

qvanta requiratur ad obtinendas colaturæ lenissime expressæ *partes nonaginta* 90.

Admisceantur dein:

Syrupi Sacchari *partes decem* 10.

Ex tempore paretur.

Emulsio oleosa*loco Emulsionis oleosæ Ph. N. Ed. I.**Cfr. Ph. Austr.: Emulsio oleosa.***Olie-Emulsion.**

Rp. Olei Olivarum partes decem	10
Gummi Arabici pulverati partes quinque	5
Aqvæ partes octo	8.
Emulsioni conterendo effectæ addantur	
Syrupi Sacchari partes quindecim	15
Aqvæ partes sexaginta duæ	62.
Misceantur.	
Ex tempore paretur.	

† Euphorbium.*Ph. N. Ed. I.: Resina Euphorbiarum.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Euphorbium. Ph. Fr.: Euphorbe des Canaries.*

Euphorbia resinifera Berg. Euphorbiaceæ. Frutex in Atlante Africæ indigenus.

Succus lacteus e frutice vulnerato effluens, in aëre induratus.

Frustula plerumque pisi magnitudine, multiformia, sæpe perforata, sordide subflava, opaca, frigore friabilia, magnæ acritudinis, in aqua, spiritu et æthere ex parte solubilia; pulverata sternutationem vehementissimam excitant.

A ramulorum partibus sæpe admixtis liberetur.

Caute servetur.

Præparatum:

Emplastrum Cantharidum cum Euphorbio 1 : 15.

Extracta.

In extractis parandis hæc observanda sunt, nisi alia parandi ratio præscripta est.

Maceratio fiat calore 15° — 25° adhibito, digestio calore 35° — 40° , inter agitationem vel qvassationem sæpius repetitam.

Evaporatio in balneo aqvæ vel vaporum ita instructo, ut calor aqvæ bullientis non superetur, inter continuam agitationem et sine ulla intermissione perficienda est. Majorem partem spiritus ad extrahendum adhibiti ante evaporationem leni calore destillando detrahare licet; hæc tamen spiritus copia postea ad idem solummodo extractum comparandum adhibenda est.

In extractis exsiccandis temperatura calorem 50° ne excedat.

In extractis spissis parandis tamdiu fiat evaporatio, donec tanta spissitudo effecta sit, ut in temperatura media extractum in fila deduci, non vero e vase effundi possit.

Serventur extracta loco sicco non nimis calido in vasis porcellaneis vel vitreis antea bene siccatis.

Tabula Extractorum.

Extracta sicca.

Extractum Aconiti.	} Extracta } spirituosa.	{ Continent partem quadran- tem ($\frac{1}{4}$) sacchari lactis.
„ Belladonnæ.		
„ Hyoseyami.		
„ Nucis vomicæ.		
„ Aloës.	} Extracta aqvosa.	
„ Cardui benedicti.		
„ Gentianæ.		
„ Glycyrrhizæ depuratum.		
„ Rhei.		
„ Glycyrrhizæ crudum. (Extractum venale.)		
„ Rhei compositum.		

Extracta spissa.

- Extractum Cannabis. (Extractum venale.)
 „ Filicis (Extractum æthereum.)
 „ Pomorum ferratum
 „ Secalis cornuti. (Extractum aqvosum.)
 „ Taraxaci.

† Extractum Aconiti.

Ph. N. Ed. I.: Extractum Aconitorum.

Ph. Svec.: Extr. Aconiti tuberum. Ph. Dan.: Extr. Aconiti (herbæ).

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Extr. Aconiti (tuber.). Ph. Brit. & Ph. U. St.: Extr. Aconiti (folior.). Ph. Fr.: Extrait alcoolique d'aconit (feuilles).

Aconit-Extract.

Rp. **Herbæ Aconiti** minutim concisæ *partem unam* . 1

Spiritus diluti *partes quatuor* 4.

Per dies quinque macerentur et exprimantur. Residuis affundantur

Spiritus diluti *partes tres* 3.

Iterum macerata exprimantur. E liquoribus commixtis et filtratis partes quinque destillantur. Quod remanserit, balneo aquæ ad siccum evaporetur. Extractum ita exsiccatum dein cum tertia ponderis sui parte ($\frac{1}{3}$) sacchari lactis bene misceatur.

Servetur caute in vase bene clauso et in loco sicco, si velis, supra oxydum vel chloretum calcicum.

Dosis maxima: *Centigrammata quindecim* 0,15 gram.

Eadem ratione parentur et servantur:

Extractum Belladonnæ.

„ Hyoscyami.

Nota: Pars una (1) extractorum narcoticorum nostrorum respondet partibus duabus (2) extractorum narcoticorum exsiccatorum Pharmacopoeæ Svec. Ed. VII. 2.

† Extractum Aloës.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Extractum Aloës. Ph. Brit.: Extractum Aloës Socotrinæ. Cfr. Ph. U. St.: Aloë purificata.

Aloe-Extract.

Rp. Aloës pulveratæ partem unam 1
Aqvæ partes quatuor 4.

Inter perpetuam agitationem ebulliant.

Mixtio per viginti quatuor horas seposita et colando a sedimento liberata evaporetur, ut fiat extractum siccum.

Caute servetur.

Præparatum:

Extractum Rhei compositum 20 : 100.

† Extractum Belladonnæ.

Ph. N. Ed. I.: Extractum Atropæ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. U. St.: Extr. Belladonnæ alcoholicum. Ph. Fr.: Extrait alcoolique de belladonne. Ceteræ: Extractum Belladonnæ.

Belladonna-Extract.

E Foliis Belladonnæ minutim concisis uti extractum Aconiti paretur.

Dosis maxima: Centigrammata quinque 0,05 gram.

† Extractum Cannabis Indicæ.

Ph. Svec.

Ph. Germ., Ph. Austr. & Ph. U. St.: Extract. Cannabis.

Ph. Brit. & Ph. U. St.: Extr. Cannabis Indicæ. Ph.

Fr.: Hachisch.

Indisk Hamp-Extract.

Cannabis sativa L. var. **Indica**. **Cannabineæ**. Planta annua Indiæ orientalis.

Extractum venale ex herba spiritu extrahendo paratum, spissum, e nigro viride vel e nigro fuscum, in spiritu concentrato, non in aqua solubile.

Caute servetur.

Dosis maxima: *Centigrammata decem* . 0,10 gram.

Extractum Cardui benedicti.

Ph. N. Ed. I.: Extractum Cnici.

Ph. Svec.

Ph. Germ.: Extract. Cardui benedicti. Ph. Fr.: Extrait de chardon bénit.

Rp. **Foliorum Cardui benedicti** siccatorum et minutim concisorum quantum vis.

Affunde

Aqvæ fervidæ tantum,

quantum ad pultariam massam formandam requiratur. Per duodecim horas macerata prelo exprimantur. Residuis partibus iterum affundatur

Aqvæ fervidæ tantum,

quantum ad pultariam massam formandam requiratur. Per horas sex seposita iterum exprimantur. Liqvores commixti et ad dimidium sui evaporati seponantur, ut

partes turbantes subsident; dein liquor a sedimento limpide defusus aquæ balneo ad siccum evaporetur.

Præparatum:

Massa pilularum tonico-nervinarum 1 : 3.

Extractum Filicis.

Ph. N. Ed. I.: Extractum Aspidii.

Ph. Svec.

Ph. Germ.: Extract. Filicis. Ph. Austr.: Extract. Filicis maris. Ph. Fr.: Extrait éthéré de Fougère mâle.

Bregnerod-Extract.

Rp. **Rhizomatis Filicis pulverati partem unam** . . . 1.

Affundantur

Ætheris partes tres 3.

Per triduum macerata filtrentur et exprimantur. Partibus residuis affundantur

Ætheris partes duæ 2.

Iterum macerentur et exprimantur. Liquores commixti atque filtrati dein destillentur, donec quarta pars ($\frac{1}{4}$) remanserit, quæ balneo aquæ ad syrupi spissitudinem evaporetur. In maceratione tali modo effecta apparatus Mohri vel Hageri adhibere licet.

Extractum Gentianæ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Extrait de Gentiane. Ceteræ: Extractum Gentianæ.

Gentiana-Extract.

E Radice Gentianæ minutim concisa uti extractum

Cardui benedicti paretur, nisi quod aqua frigida abdi-
beat.

Extractum Glycyrrhizæ crudum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Succus Liqviritiæ crudus.

Lakrits.

Extractum venale e Radice Glycyrrhizæ paratum.

Compactum, durum, in baculos subcylindricos re-
ductum, nigrum, fractura nitenti, saporis peculiaris, dul-
cis, in aqua relictis heterogeneis solubile.

Cave, ne contineat cuprum.

Præparatum:

• Extractum Glycyrrhizæ depuratum.

Extractum Glycyrrhizæ depuratum

loco Extracti radicis Glycyrrhizarum Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Extract. Glycyrrhizæ.

Ph. Germ.: Succus Liqviritiæ depuratus (spissus). Ph.

Austr.: Extr. Liqviritiæ (e radice). Ph. Brit. & Ph.

U. St.: Extr. Glycyrrhizæ (e radice). Ph. & Fr.: Ex-

trait de suc de réglisse. Suc de réglisse purifié.

Lakrits-Extract.

Extractum Glycyrrhizæ crudum in vase idoneo de-
ponatur interjectis stratis stramineis aut virgis bene elotis
salicis vel betulæ, tantaque aquæ copia affundatur, ut
obtegatur. Maceratione per tres vel quatuor dies per-
fecta, liquor detrahatur, atque recens copia aquæ parti

residuæ affundatur, quod simul cum ceteris, quæ supra indicatæ sunt, operationibus toties iteretur, donec aqua omnia, quæ solvi possunt, extraxerit. Liqvores limpidi effecti ad siccum evaporentur.

Præparatum:

Liqvor pectoralis 20 : 100.

† Extractum Hyoscyami.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Brit.: Extractum Hyoscyami. Ph. Austr.: Extr. Hyoscyami foliorum. Ph. U. St.: Extr. Hyoscyami alcoholicum. Ph. Fr.: Extrait alcoolique de Jusquiame.

Bulmeurt-Extract.

E Foliis Hyoscyami uti extractum Aconiti paretur.

Dosis maxima: *Centigrammata viginti* . 0,20 gram.

† Extractum Nucis vomicæ.

Ph. N. Ed. I.: Extractum Strychni.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Extract. Strychni spirituosum. Ph. Austr. & Ph. Brit.: Extract. Nucis vomicæ. Ph. U. St.: Extr. Nucis vomicæ alcoholicum. Ph. Fr.: Extrait alcoolique de noix vomique.

Rævekage-Extract.

E Seminibus Nucis vomicæ grosse pulveratis uti extractum Aconiti paretur, nisi quod digestio calore gra-

duum 50—60 macerationis loco adhibeatur, et extractum ad siccum, saccharo lactis non addito, evaporetur.

Dosis maxima: *Centigrammata decem* . 0,10 gram.

Extractum Pomorum ferratum

loco Extracti Pomorum ferrati Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Extractum Pomi ferratum.

Ph. Germ.: Extract. ferri pomatum. Ph. Austr.: Extract. malatis ferri.

Fructus Pyri Mali aciduli, recentes, decorticati in pulvem contendantur.

Rp. **Succi** inde recens expressi *partes decem* . . . 10

Ferri pulverati *partem unam* 1.

Massa sæpius agitata loco tepido, aquam exhalatam restituendo, tamdiu seponatur, donec ferrum non jam solvi videatur; deinde per horas quinque calore graduum 60—70 digestus liquor filtretur et ad communem extracti spissi consistentiam evaporetur.

Præparatum:

Tinctura extracti Pomorum ferrati.

Extractum Rhei.

Ph. N. Ed. I.: Extractum Rheorum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Brit.: Extr. Rhei. Ph. Fr.: Extrait de rhubarbe. Cfr. Ph. U. St.: Extr. Rhei (alcoholicum).

Rhabarber-Extract.

Rp. **Radiciis Rhei** concisæ et a pulvere liberatæ
partem unam 1

Aqvæ partes quinque 5.
 Per horas viginti quatuor macerata leniter exprimantur.
 Residuis affundantur

Aqvæ partes tres 3.
 Iterum per horas duodecim macerentur et exprimantur. Liqvores commixti et, ut partes turbantes subsident, sepositi limpide defundantur et ad siccum evaporentur.

Præparatum:

Extractum Rhei compositum 50 : 100.

Extractum Rhei compositum

loco Massæ pilularum Rheorum compositarum Ph. N. Ed. I.

Cfr. Ph. Dan.: Extractum Rhei jalapinum.

Cfr. Ph. Germ.: Extractum Rhei compositum.

Rp. **Extracti Aloës partes viginti** 20
Extracti Rhei partes quingvagenta 50
Massæ pilularum Resinæ Jalapæ partes triginta 30.
 Pulverata commisceantur.

† Extractum Secalis cornuti. Ergotinum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Extractum Secalis cornuti.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Extr. Secalis cornuti. Cfr. Ph.

Brit.: Extr. Ergotæ liquidum. Ph. Fr.: Ergotinum Bonjean.

Ergotin.

Rp. **Secalis cornuti nuper pulverati partem unam** . . . 1
Aqvæ partes tres 3.

Per horas duodecim loco frigidulo macerentur, dein liquor coletur. Expressis residuis affunde

Aqvæ partes duas 2.

Iterum maceretur et exprimatur. Liqvores limpidi commixti ad syrupi spissitudinem evaporentur.

Refrigeratis addatur

Spiritus concentrati pars una 1.

Per horas viginti quatuor sæpius agitando macerentur. Solutio inde effecta spiritiosa dein filtretur et ad communem extracti spissi consistentiam evaporetur.

Caute servetur.

Dosis maxima: *Centigrammata triginta* . 0,30 gram.

Extractum Taraxaci.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Extrait de pissenlit. Ceteræ: Extr. Taraxaci.

Løvetand-Extract.

Radix Taraxaci recens cum herba juniore concisa et ad pultariam massam contusa exprimatur. Partes residuæ, idonea aquæ quantitate affusa, in pultem redactæ iterum exprimantur. Liqvores, donec coagulati sint, calefiant, dein colati ad communem extracti spissi consistentiam evaporentur.

Ferrum pulveratum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.

Pulveriseret Jern.

Sit pulvis cinereus, ponderosus; in acido hydrochlorato diluto, nullo gasis sulphidi hydrici odore orto,

pæne solvatur, pauxillum tantummodo residui carbonacei relinqvens (Fe S). Si ferrum hujus solutionis, acido nitrico ad perfectam ferri oxydationem addito, solutione ammoniaci abundanti secreveris, liquor filtratus colorem cæruleum ne exhibeat neve solutione sulpho-hydratis ammoniaci addita præcipitatum præbeat (Cu, Zn).

Servetur loco sicco in vase bene clauso.

Præparata:

Extractum Pomorum ferratum.

Pilulæ iodeti ferrosi.

Syrupus iodeti ferrosi.

Ferrum reductum.

Ph. Dan.

Ph. Germ.: Ferrum reductum. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Ferrum redactum. Ph. Fr.: Fer réduit par l'Hydrogène.

Reduceret Jern.

Pulvis subtilissimus, e cinereo niger; in mortario porcellaneo tritus splendorem metallicum exhibet. In acido hydrochlorato sub evolutione gasis hydrogenii fere plane solvatur.

Si pulveris partem unam (1) cum partibus viginti (20) solutionis chloreti ferrici in lagena obturata conqvasaveris, summum dimidia pars non soluta remaneat (oxydum ferrico-ferrosum).

Servetur loco sicco in vase bene clauso.

Flores Arnicae.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Flores Arnicae.] Ph. Austr.: Arnica (Flores, Folia, Rhizoma). Ph. U. St. & Ph. Fr.: Arnica.

Arnica-Blomster.

Arnica montana L. Synanthereæ. Planta radice perenni in Norvegia frequens.

Flosculi vitellini, pappo piloso, scabro, fragili instructi, germine tuboque pubescentes; flores radiales sunt feminei et ligulati, quatuor fere millimetra lati, tridentati; flores disci hermaphroditi, tubulosi et quinque-
dentati.

Flores recens evoluti colligendi. Ne sint a larvis et vermiculis corrosi. Dispensentur a peranthodiis liberati.

Præparatum:

Tinctura Arnicæ 10 : 100.

Flores Caryophylli.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Caryophylli. Ph. Austr.: Caryophyllus. Ph. Brit.: Caryophyllum. Ph. U. St.: Caryophyllus. Ph. Fr.: Girofle.

Kryddernelliker.

Caryophyllus aromaticus L. Myrtaceæ. Arbor insularum Moluccensium indigena, in regionibus calidis culta.

Flores nondum explicati, colore fusco, cylindrati vel subangulati, calyce quadripartito, corollam globosam caducam includente. Sint odore fragrantissimo, manducati os urant.

Præparata:

Massa pilularum de Cynoglosso.

Tinctura Lavandulæ composita.

Flores Chamomillæ.

*Ph. N. Ed. I.: Flores Matricariæ.**Ph. Svec. Ph. Dan.: Flores Chamomillæ vulgaris.**Ph. Germ.: Flores Chamomillæ vulgaris. Ph. Austr.: Chamomilla vulgaris. Ph. U. St.: Matricaria. Ph. Fr.: Chamomille commune.*

Kamille-Blomster.

Matricaria Chamomilla L. Synanthereæ. Planta annua in nonnullis Norvegiæ locis frequens.

Calathia radiata, periclinio imbricato, receptaculo conico, nudo, cavo, flosculis disci flavis et tubulosis, radii albis et ligulatis, pappo nullo. Ne confundantur cum floribus plantarum affinium uti Pyrethri inodori *Smith*, Anthemis arvensis *L.*

Præparata:

Oleum Chamomillæ infusum.

Species emollientes.

„ resolventes.

Unguentum aromaticum.

Flores Cinæ.

*Ph. N. Ed. I.: Flores Artemisiæ.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Flores Cinæ. Ph. Austr.: Cina. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Santonica. Ph. Fr.: Semen contra.*

Ormefrø.

Artemisiæ species e sectione Seriphidii huc usque ignota. **Synanthereæ.**

Calathia nondum explicata, pauciflora, oblongo-prismatica, glabra, colore subviridi vel subflavo, circiter duo

millimetra longa; periclinii squamæ sunt imbricatæ, carinatæ, membranaceo marginatæ, glandulis minutis et aureis dorso inspersis; exteriores squamæ sunt ovoideæ, minores quam interiores oblongæ; sapore et odore sunt peculiari et ingrato. Adhibeantur solummodo flores Cinæ, qui dicuntur Levantici.

Flores Kusso.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Flores Kosso. Ph. Austr.: Kousso. Ph. Brit.: Cusso. Ph. U. St.: Brayera. Ph. Fr.: Cousso.

Kusso.

Hagenia Abyssinica Willdenow. (Brayera anthelmintica Kunth.) Rosaceæ. Arbor in montibus Abyssiniæ indigena.

Paniculæ femineæ, coarctatæ, ramosissimæ, villosæ, multifloræ, floribus perigynis, plus minusve defloratis, bibracteolatis, bracteolis subrotundis sepalisque quinque vel quatuor exterioribus oblongis, circiter centimetrum longis, membranaceis, reticulato-venosis, subrubris vel subviridibus, sapore nauseoso et amaro.

Serventur in vasis diligenter clausis et a luce remotis. Ante dispensationem a ramis crassioribus liberentur.

Flores Lavandulæ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Flores Lavandulæ. Ph. Austr. & Ph. U. St.: Lavandula. Ph. Fr.: Lavande officinale et Lavande commune ou Spic.

Lavendel-Blomster.

Lavandula officinalis Chaix. (L. spica α angusti-

folia L.) Labiatæ. Suffrutex Europæ australis apud nos in hortis interdum cultus.

Flores nondum plane explicati, calyce cylindrico, striato, quinque-
dentato, corolla bilabiata, cærulea, odore fragranti et aromatico.

Præparatum:

Species resolventes. 8 : 100.

Flores Sambuci.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Flores Sambuci. Ph. Austr.: Sambucus
(Flores & Fructus recentes). *Ph. Brit.: Sambuci flores.*

Ph. U. St.: Sambucus. Ph. Fr.: Sureau.

Hylde-Blomster.

Sambucus nigra L. Caprifoliaceæ. Frutex in Norvegia sponte nascens rarior, frequenter in hortis cultus.

Cymæ florentes quinqueradiatæ, multifloræ, corollis rotatis e flavo albidis. Flores nigrescentes rejiciantur.

Præparata:

Species emollientes.

„ laxantes St. Germain.

„ pectorales.

„ resolventes.

Flores Tanaceti.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. U. St.: Tanacetum. Ph. Fr.: Tanaise.

Regnfang-Blomster.

Tanacetum vulgare L. Synanthereæ. Planta perennis Norvegiæ.

Calathia ad corymbum disposita, aureo-flava, discoidea, periclinio imbricato, receptaculo convexo, nudo, flosculis tubulosis copiose obsito, odore gravi et peculiari.

Flores Verbasci.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Flores Verbasci. *Ph. Austr.:* Verbascum.

Ph. Fr.: Bouillon blanc.

Kongelys-Blomster.

Verbascum Thapsus L. **V. thapsiforme** Schrader et **V. phlomoides** L. **Personatæ.** Plantæ biennes Europæ mediæ, prima in Norvegia etiam satis frequens.

Corollæ satis magnæ, rotatæ, subregulares, aureo-flavæ, staminibus superioribus tribus brevioribus et albo lanatis, inferioribus duobus longioribus et glabris, sapore mucilaginoso, odore peculiari.

Corollæ a calycibus liberatæ et optime siccatae in vasis diligenter clausis servantur.

Præparatum:

Species pectorales.

† Folia Belladonnæ.

Ph. N. Ed. I.: Folia Atropæ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Folia Belladonnæ. *Ph. Austr.:* Belladonna (Folia, Radix). *Ph. Brit. & Ph. U. St.:* Belladonnæ folia. *Ph. Fr.:* Feuilles de belladonne.

Belladonna-Blade.

Atropa Belladonna L. **Solanaceæ.** Planta rediviva Europæ mediæ et australis.

Folia ovato-lanceolata in petiolum attenuata, integerrima, supra saturate viridia, juniora pubescentia, adultiora nervis solummodo subpubescentia, odoris narcotici, saporis subamari, ingrati.

Folia e planta florescenti colligenda et caute servanda sunt.

Dosis maxima: *Centigrammata triginta* . 0,30 gram.

Præparatum:

Extractum Belladonnæ.

Folia Bucco.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Brit.: Buchu folia. Ph. U. St.: Buchu.

Barosma crenata Kunze, **B. crenulata** Hooker, **B. betulina** Bartling, **B. serratifolia** Willdenow et **Empleurum serrulatum** Aiton. **Diosmeæ**. Frutices in promontorio Bonæ Spei indigeni.

Folia crassa, glandulosa, tri- vel quinquenervia, glabra, formæ variæ. Odore sunt gravi et aromatico, sapore aromatico et subcamphoraceo.

Folia Cardui benedicti.

Ph. N. Ed. I.: Herba Cnici.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Chardon bénit.

Cnicus benedictus Gærtner (**Centaurea benedicta** L.). **Synanthereæ**. Herba annua in regionibus mediterraneis, præsertim in Græcia, spontanea, in Germania culta.

Folia oblongo-lanceolata, in petiolum attenuata, si-

nuato-pinnatifida, echinato-dentata, villosa, sapore per-
amaro et salso.

Præparata:

Extractum Cardui benedicti.

Tinctura amara.

† Folia digitalis.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Folia Digitalis. Ph. Austr.: Digitalis. Ph.

*Brit.: Digitalis folia. Ph. U. St.: Digitalis. Ph. Fr.:
Digitale.*

Digitalis-Blade.

Digitalis purpurea L. Personatæ. Planta biennis
in Norvegia occidentali et in montosis Europæ mediæ
spontanea.

Folia ovato-lanceolata, in petiolum attenuata, rugosa,
crenata, inprimis subtus plus minusve villosa, saporis
amari et nauseosi.

Folia e planta florescenti in Norvegia sponte cre-
scenti colligenda sunt; servantur caute a luce remota
neve ultra annum.

Dosis maxima: *Centigrammata viginti* . 0,20 gram.

Præparata:

Tinctura Digitalis 10 : 100

„ „ rubra 10 : 100.

Folia Farfaræ.

Ph. N. Ed. I.: Folia Tussilaginis.

Ph. Dan.

Ph. Germ. Cfr. Ph. Fr.: Tussilage ou Pas d'anc (Flores).

Hestehov-Blade.

Tussilago Farfara L. Synanthereæ. Herba radice perenni in Norvegia frequens.

Folia subrotundo-cordata, sinuato-angulata, dentata, subtus albido-tomentosa, supra glabra et subviridia, saporis peculiaris, amari.

Juniora plantæ folia mensibus Junii vel Julii colligenda sunt.

Præparatum:

Species pectorales.

† Folia Hyoscyami.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Folia Hyoscyami. Ph. Austr.: Hyoscyamus.

Ph. Brit. & Ph. U. St.: Hyoscyami folia. Ph. Fr.:

Jusquame noire.

Bulmeurt-Blade.

Hyoscyamus niger L. Solanaceæ. Planta biennis in Norvegia spontanea.

Folia ovato-oblonga, sinuato-dentata, villosa, recentia viscosa, odoris foetidi, narcotici.

E planta florecenti colligenda, caute nec ultra annum servanda.

Dosis maxima: *Centigrammata quadraginta* 0,40 gram.

Præparata:

Extractum Hyoscyami.

Oleum Hyoscyami infusum.

Folia Menyanthis.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Folia Trifolii fibrini. Ph. Austr.: Trifolium fibrinum. Ph. Fr.: Ményanthe ou Trèfle d'eau.*

Bukkeblade.

Menyanthes trifoliata L. Gentianeæ. Herba radice perenni apud nos in locis palustribus frequens.

Folia petiolata, ternata, foliolis subsessilibus, ovalibus vel oblongis, leviter repando crenatis, glabris, læte viridibus, sapore peramaro.

Folia, priusquam planta florere coepit, colligenda.

Præparatum :

Species amaræ.

Folia Nicotianæ.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Folia Nicotianæ. Ph. Brit.: Tabaci Folia.**Ph. U. St.: Tabacum. Ph. Fr.: Nicotiane ou Tabac.*

Tobaks-Blade.

Nicotiana Tabacum L. Solanaceæ. Herba annua in America calidiore indigena.

Folia magna, oblongo-lanceolata, acuta, basi attenuata, glanduloso-villosa, siccata fusca.

Folia, quæ Virginiana appellantur, sola adhibere licet.

Folia Salviæ.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Folia Salviæ. Ph. Austr. & Ph. U. St.:
Salvia. Ph. Fr.: Sauge officinal.*

Salvie-Blade.

Salvia officinalis L. Labiatæ. Suffrutex Europæ meridionalis, apud nos interdum hortensis.

Folia petiolata, oblonga, rugosa, crenulata, tenuiter tomentosa; manducata adstringentia, sapore amaro, odore aromatico.

Colligantur, antequam flores explicantur.

Folia Sennæ.*Ph. N. Ed. I.: Folia Cassiarum.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Folia Sennæ. Ph. Austr.: Senna. Ph. Brit.:
Senna Alexandrina. Ph. U. St.: Senna. Ph. Fr.:
Séné d'Égypte.*

Sennes-Blade.

Cassia lenitiva Bischoff. Cæsalpinieæ. Suffrutex Ægypti et Nubiæ.

Foliola subcoriacea, ovalia vel oblonga, integerrima, acuta, basi obliqua, pallide subglauca. Sint a foliis Solenostemmatis Argel Hayne (lanceolatis, basi æqualibus) et a stipitibus leguminibusque, quantum fieri potest, libera.

Præparata:

Folia Sennæ spiritu extracta.

Electuarium aperiens 2 : 15

Infusum Sennæ 10 : 100

„ „ compositum 10 : 100

Species amaræ 25 : 100

„ laxantes Hamburgenses 62 : 100

Syrupus Sennæ mannatus 10 : 100.

Folia Sennæ spiritu extracta.

Ph. Dan.

Ph. Germ.: *Folia Sennæ spiritu extracta.* Ph. Austr.:
Senna sine resina.

Rp. **Foliorum Sennæ** *partem unam* 1

Spiritus concentrati *partes quatuor* 4.

Folia per biduum macerata exprimantur et siccentur.

Præparatum:

Species laxantes St. Germain 40 : 100.

† Folia Stramonii.

Ph. N. Ed. I.: *Folia Daturæ.*

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: *Folia Stramonii.* Ph. Austr.: *Stramonium.*

Ph. Brit. & Ph. U. St.: *Stramonii folia.* Ph. Fr.:
Stramoine ou Pomme-épineuse.

Pigæble-Blade.

Datura Stramonium L. Solanaceæ. Herba annua
Orientis, in Norvegia australi interdum quasi spontanea,
sed rara.

Folia petiolata, acuta, sinuato-dentata, juniora pube-
scentia, adultiora nervis raris pilis obsitis, supra saturate
viridia, infra pallidiora, odore peculiari, sapore nauseoso
et amaro.

E planta florecenti colligenda, caute nec ultra an-
num servanda.

Dosis maxima: *Centigrammata triginta* . 0,30 gram.

Folia Uvæ Ursi.*Ph. N. Ed. I.: Folia Arctostaphyli.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Folia Uvæ Ursi. Ph. Brit.: Uvæ ursi folia.**Ph. Austr. & Ph. U. St.: Uva ursi. Ph. Fr.: Busserole ou Uva ursi.*

Mjælbær-Blade.

Arctostaphylos Uva Ursi Sprengel (Arbutus Uva Ursi L.). Ericineæ. Fruticulus in Norvegia frequens.

Folia obovata, coriacea, integerrima, glabra, nitida, reticulato-venosa. Ne confundantur cum foliis Vaccinii vitis Idææ L., margine reflexis, subtus opacis et fusco punctatis.

Folia æstate colligenda.

Fructus Anisi.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Fructus Anisi vulgaris. Ph. Austr.: Anisum vulgare. Ph. U. St.: Anisum. Ph. Fr.: Anis vert ou Anis.*

Anis.

Pimpinella Anisum L. Umbelliferæ. Herba annua in regione mediterranea orientali spontanea, in Europa culta.

Diachenia plane matura, late ovata, a latere parum compressa, dense pubescentia, e cinereo subviridia; constant ex duobus schizocarpiis plerumque cohærentibus, quorum utrumque quinque costis angustis instructum est; odore sunt aromatico, sapore subdulci. Cave, ne fructus Conii maculati (non pubescentes, costis undulatis et crenatis) intermixti sint.

Præparata:

Species Juniperi.

„ laxantes St. Germain.

„ pectorales.

Tinctura amara.

„ Colocynthidum composita.

Fructus Aurantii immaturi.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Fructus Aurantii immaturus.

Ph. Germ. Ph. Brit.: Aurantii fructus. Ph. Fr.: Orangette ou Petit grain.

Umodne Pommerantser.

Citrus vulgaris *Risso. (C. Aurantium L. var. amara.)*

Aurantiaceæ. Arbor Asiæ orientalis in zonis calidioribus ubique culta.

Baccæ immaturæ, globosæ, ad magnitudinem cerasorum electæ, glandulosæ, duræ, colore e viridi subnigro, sapore amaro.

Præparatum:

Tinctura amara.

Fructus Cannabis.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.

Hampefrø.

Cannabis sativa *L. Cannabineæ.* Herba annua Indiæ orientalis, apud nos culta.

Nuculæ ovatæ, bivalvares, monospermæ, pericarpio fragili, semine oleoso, sapore subdulci.

Præparatum:

Species demulcentes.

Fructus Cardamomi.*Ph. N. Ed. I.: Semina Elettariæ.**Ph. Svec.: Semina Cardamomi. Ph. Dan.: Fructus Cardamomi.**Ph. Germ.: Fructus Cardamomi minores s. Cardamomum minus. Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph. U. St.: Cardamomum. Ph. Fr.: Cardamome du Malabar.***Cardamome.****Elettaria Cardamomum** *White & Matoni. Scitamineæ.*

Planta perennis Indiæ orientalis, præsertim Malabariæ.

Capsulæ chartaceæ, multispermæ, seminibus parvis, duriusculis, fuscis, rugosis, in altera parte sulcatis, odore aromatico, manducatis os urentibus.

Præparata:

Tinctura aromatica.

„ „ acida.

„ Rhei amara.

Fructus Carvi.*Ph. N. Ed. I.: Fructus Cari.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Fructus Carvi. Ph. Austr.: Carvum. Ph. Brit.: Carvi fructus. Ph. U. St.: Carum. Ph. Fr.: Fruit de Carvi.***Karve.****Carum Carvi** *L. Umbelliferæ.* Herba radice perenni in Norvegia frequentissima.

Diachenia matura, oblonga, a latere valde compressa; constant ex duobus schizocarpiis, facile separa-

bilibus, quorum utrumque quinque costis angustis et sulcatis, fuscis, univittatis instructum est; manducata os leviter urunt.

Fructus Coriandri.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Fructus Coriandri. Ph. Brit.: Coriandri fructus. Ph. Austr. & Ph. U. St.: Coriandrum. Ph. Fr.: Coriandre.

Coriander.

Coriandrum sativum L. Umbelliferae. Herba annua regionis mediterraneae.

Diachenia matura, globosa, intus cava, colore e fusco flavo; constant ex duobus schizocarpiis plerumque cohaerentibus, dorso multistriatis. Manducata os urunt; sapore sunt subdulci, odore aromatico.

Præparatum:

Infusum Sennae compositum.

Species laxantes Hamburgenses.

Fructus Cubebæ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Cubebæ. Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph. U. St.: Cubeba. Ph. Fr.: Cubebe.

Cubeber.

Cubeba officinalis Miquel. (Piper Cubeba L.). Piperaceæ. Frutex scandens insulae Javæ spontaneus et cultus.

Drupæ submaturæ, duriusculæ, subglobosæ, basi attenuata stipitiforini, reticulatim rugosæ, colore e cinereo

obscurè fusco, fructus Piperis magnitudine, odore fragranti; manducatæ os urunt.

Præparatum:

Tinctura Lavandulæ composita.

Fructus Foeniculi.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Fructus Foeniculi. Ph. Brit.: Foeniculi fructus. Ph. Austr. & Ph. U. St.: Foeniculum. Ph. Fr.: Fenouil doux.

Fennikelfrø.

Foeniculum officinale Allioni. (Anethum Foeniculum L.). Umbelliferæ. Herba radice perenni, in Europa meridionali indigena, apud nos interdum hortensis.

Diachenia matura, oblonga, teretiuscula, subfusca vel subviridia, schizocarpiis duobus plerumque discretis, quinquecostatis, costis carinatis pallidioribus, sulcis latis obscurioribus, odore peculiari, sapore subdulci; manducata os leviter urunt.

Præparata:

Species decocti lignorum.

„ laxantes St. Germain.

Syrupus Sennæ mannatus.

Fructus Juniperi.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Fructus Juniperi. Ph. Austr. & Ph. U. St.: Juniperus. Ph. Fr.: Baie de Genièvre.

Enerbær.

Juniperus communis L. Coniferæ. Frutex vel arbuscula Norvegiæ.

Galbuli maturi, globosi, pisi magnitudine, carnosi, extus e nigro fuscis, subcærulei, carne e subviridi fusca, sapore subdulci, postremo subamaro.

Præparata :

Species amaræ.

„ Juniperi.

Fructus Lupuli.

Ph. N. Ed. I.: Fructus Humuli.

Ph. Svec.

Ph. Brit.: Lupulus. Ph. U. St.: Humulus. Ph. Fr.: Houblon.

Humle.

Humulus Lupulus L. Cannabineæ. Herba rediviva, indigena et culta.

Strobuli maturi, ovati, levissimi, bracteis laxè imbricatis, membranaceis, venoso-reticulatis, ex viridi luteis vel ex viridi fuscis. Ultra annum ne servantur.

Gelatina alba.

Ph. Svec.

Ph. Germ.: Gelatina. Ph. Fr.: Gélatine animale.

Gelatine.

Paratur ex ossibus in officinis technicis.

Sit pellucida, coloris et odoris pæne expers.

Gelatina Caragheen

*loco Gelatinæ Sphærococci Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec.**Ph. Germ.: Gelatina Carrageen. Ph. Austr.: Gelatina Caragheen. Ph. Fr.: Gelée de carragaheen.*Rp. Caragheen concisi partes sex 6
Aqvæ tantum,

ut coqvendo per horæ quadrantem fiat colatura, qvæ, solutis in ea

Sacchari albi partibus octo 8,
pondus habeat partium centum 100.

Ex tempore paretur.

Gelatina Lichenis Islandici

*loco Gelatinæ Cetrariæ elotæ Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Gelatina Lichenis Islandici. Ph. Fr.: Gelée de lichen d'Islande.*Rp. Lichenis Islandici eloti concisi partes sedecim 16
Aqvæ partes ducentas 200.Coqvantur tamdiu, ut habeas colaturæ expressæ
partes centum 100.

Ex tempore paretur.

Glacies.

Ph. Svec.

Is.

Glandulæ Lupuli. Lupulinum.*Ph. Svec.: Glandulæ Lupuli. Ph. Dan.: Glandula Lupuli.**Ph. Germ.: Glandulæ Lupuli. Ph. Austr.: Lupulus.**Ph. U. St.: Lupulina. Ph. Fr.: Lupulin.***Lupulin.**

Glandulæ a **Fructibus Lupuli** recens siccatis ope cribri setacei separatæ.

Pulvis subresinosus, aureus, deinde e luteo fuscus, e glandulis minutis balsamiferis constans, odoris peculiaris, saporis amari.

Serventur in vase bene obturato et a luce remoto neve ultra annum.

Glycerinum.*Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. U. St.: Glycerina. Ph. Fr.: Glycérine. Ceteræ: Glycerinum.***Glycerin.**

Liquor limpidus, syrupi consistentiæ, coloris atque odoris expers, ad chartam exploratoriam indifferens, in omni proportionem aquæ et spiritus, non in æthere et oleis pingvibus solubilis, ponderis specifici 1,23—1,25.

Ignitus exiguo tantummodo residuo relicto conflagret; ne solutione sulphidi hydrici neve oxalate ammonico præbeat præcipitatum (Cu, Pb, Ca); cum solutione hydratis kalici calefactum ne fuscescat, quæ mixtura addito sulphate cuprico ne rubescat (saccharum).

Præparata:

Collodium elasticum.

Linctus boracinus.

Massa pilularum Colocynthidum compositarum.

„ „ de Cynoglosso.

Ungventum Glycerini.

Gummi Arabicum.*Ph. N. Ed. I.: Gummi Acaciarum.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Gummi Arabicum. Ph. Brit.:
Acaciæ gummi. Ph. U. St.: Acacia. Ph. Fr.: Gomme
arabique vraie.***Arabisk Gummi.**

Plures **Acaciæ** species ut **A. Seyal Delile**, **A. Ehrenbergiana & tortilis Hayne**. **Mimoseæ**. Arbores vel frutices Arabiæ, Nubiæ, terrarum adjacentium.

Succus e rimis corticis exsudans in aëre induratus.

Frusta magis minusve globosa, coloris expertia vel subflavescentia, semipellucida, odoris et saporis nullius.

Præparata:

Emulsio oleosa.

Mixtura alba.

„ camphorata.

„ camphorata acida.

Mucilago gummi Arabici.

Gummi-resina Ammoniacum. Ammoniacum.*Ph. N. Ed. I.: Gummi-resina Doremæ.**Ph. Svec. & Ph. Dan.: Gummi-resina Ammoniacum.**Ph. Germ.: Ammoniacum (s. Gummi-resina Ammoniacum).**Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph. U. St.: Ammoniacum.**Ph. Fr.: Gomme Ammoniaque.***Ammoniak-Gummi.**

Dorema Ammoniacum Don. Umbelliferæ. Planta perennis in Persia et in desertis circa lacum Aral indigena.

Succus lacteus e planta florente sponte prodiens, in aëre induratus.

Grana seu lacrymæ vel distinctæ vel leviter inter se conglutinatæ, extus flavæ vel e flavo fuscæ, fractura leviter conchata, lactea, pingviter nitida, frigore duriusculæ, calore mollescentes, saporis amari, nauseosi, odoris gravis.

Rejiciendæ sunt massæ compactæ, fuscæ, quisquiliis intermixtæ.

Præparata:

Emplastrum gummi-resinosum	6 : 100
„ Meliloti	2 : 100.

Gummi-resina Asa foetida. Asa foetida.

Ph. N. Ed. I.: Gummi-resina Ferulæ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Gummi-resina Asa foetida.

Ph. Germ.: Asa foetida (seu Gummi-resina Asa foetida).

Ph. Brit. & Ph. U. St.: Assa foetida. Ph. Austr. &

Ph. Fr.: Asa foetida.

Dyvelsdræk.

Scorodosma foetidum *Bunge* et **Narthex Asa foetida** *Falconer*. **Umbelliferæ**. Plantæ perennes, illa in Bucharica et parte septentrionali Persiæ, hæc in Persia orientali indigena.

Succus lacteus e radicibus sauciatis effluens, in aëre induratus.

Grana libera vel plus minusve inter se conglutinata, vel massæ irregulares, fractura leviter conchata, pingviter nitida, recenti albida, mox purpurascente, postremum fuscescente, frigore duriusculæ, calore mollescentes, odoris alliacei, saporis subamari.

Rejiciantur massæ subnigræ vel lapidibus aliisque sordibus mixtæ.

Præparata:

Massa pilularum tonico-nervinarum 1 : 3

Tinctura Asæ foetidæ 20 : 100.

Gummi-resina Galbanum. Galbanum.

Ph. N. Ed. I.: Gummi-resina Galbani.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Gummi-resina Galbanum.

Ph. Germ.: Galbanum (seu Gummi-resina Galbanum).

Ceteræ: Galbanum.

Galbanum.

Ferula erubescens Boissier. Umbelliferæ. Planta perennis in montosis Persiæ indigena.

Succus lacteus e planta sponte prodiens, in aëre induratus.

Massæ e subviridi vel e subfusco flavidæ, frigore fragiles, calore manus molliores, paullum splendentes, granis vel frustulis albidis vel luteolis sæpe intermixtis; sapore sunt amaro et acri, odore gravi.

Præparatum:

Emplastrum gummi-resinosum.

Gummi-resina Myrrha. Myrrha.

Ph. N. Ed. I.: Gummi-resina Balsamodendri.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Gummi-resina Myrrha.

Ph. Germ.: Myrrha (seu Gummi-resina Myrrha). Ceteræ: Myrrha.

Myrrha.

Balsamodendron Ehrenbergianum *Berg*, fortasse etiam **B. Myrrha** *N. v. Esenb.* **Burseraceæ.** Arbores Arabiæ & Africæ orientalis mediæ.

Succus e cortice exsudatus, in aëre induratus.

Frustula irregularia extus pulverulenta, variæ magnitudinis, interdum subglobosa, colore subflavo aut ex rubenti fusco, fractura ceræ instar nitenti. Myrrha majore ex parte in aqua solutione turbida, e flavo fusca, minore ex parte in spiritu solutione ex rubenti flava solvitur, addito acido nitrico violacea. Adhibeatur Myrrha, quæ dicitur electa, rejectis frustis coloris obscurioris vel alienæ originis.

Præparata:

Massa pilularum de Cynoglosso	1 : 15
Mixtura Ferri composita	4 : 300
Tinctura Myrrhæ	20 : 100.

Gummi-resina Olibanum. Olibanum.

Ph. N. Ed. I.: Gummi-resina Boswelliæ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Gummi resina Olibanum.

Ph. Germ.: Olibanum (s. Gummi-resina Olibanum). Ph.

Austr.: Olibanum. Ph. Fr.: Oliban.

Virak.

Boswelliæ species nondum satis cognita. Arbor regionum littoralium Africæ orientalis et Arabiæ australis.

Succus e rimis corticis stillans, in aëre induratus.

Grana subglobosa, lacrymæformia, variæ magnitudinis, extus opaca quasi pulvere inspersa, coloris ex albido luteoli vel subrufi, serius obscurioris, fragilia, fractura ceracea.

Præparatum:

Massa pilularum de Cynoglosso	2 : 15.
---	---------

Hepar sulphuris.

Ph. N. Ed. I.: Persulphuretum kalicum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Kalium sulfuratum. Ph. Austr.: Kalium sulphuratum pro balneo. Ph. Brit.: Potassa sulphurata.

Ph. U. St.: Potassii sulphuretum. Ph. Fr.: Foie de soufre.

Svovellever.

Sit colore e flavo fusco, postea subviridi, in aquæ partibus duabus (2) maxima ex parte solubile. Acidis additis gas sulphidi hydrici evolvit et sulphur copiose secernit.

V. Rp. **Sulphuris sublimati** *partem unam* 1
Carbonatis kalici depurati *partes duas* 2.

Commixta in olla ferrea operculo prædita et ad trientem solummodo repleta leni igne calefiant, usque dum massa liqvata tranquille fluat. Tum paullum refrigerata in mortarium ferreum oleo illitum et mox obtegendum effundatur, ut plane refrigescat; quo facto in frusta contundatur et in vitris optime clausis servetur.

Herba Absinthii.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Herba Absinthii. Ph. Austr. & Ph. U. St.: Absinthium. Ph. Fr.: Absinthe grande ou Aluyne.

Malurt.

Artemisia Absinthium L. Synanthereæ. Planta perennis indigena.

Herba florens paniculata, inferioribus foliis cano-sericeis bi- vel tripinnatifidis, laciniis ultimis spathulatis,

superioribus indivisis, calathiis subglobosis, nutantibus, receptaculo villosio flosculisque subluteis, parvis instructis, saporis peramari, odoris aromatici, gravis.

A caulibus crassioribus liberata dispensetur.

Præparata:

Emplastrum Meliloti	4 : 100
Species resolventes	20 : 100
Tinctura Absinthii	20 : 100
„ amara	10 : 100.

† Herba Aconiti.

Ph. N. Ed. I.: Folia Aconitorum.

Ph. Dan.

Ph. Brit. & Ph. U. St.: Aconiti folia. Ph. Fr.: Feuilles d'Aconit Napel.

Cfr. Ph. Svec. & Ph. Germ.: Tubera Aconiti. Ph. Austr.: Aconitum (tuber).

Aconit.

Aconitum Napellus L. Ranunculaceæ. Planta perennis in regionibus montosis Europæ mediæ indigena, apud nos in hortis frequenter culta.

Herba florens, ante florum perfectam evolutionem colligenda.

Folia supra saturate viridia, infra pallidiora, digitato-palmatisecta, inferiora in quinque, superiora vulgo in tria bi- vel trilaciniata segmenta divisa, saporis subamari et acris; manducata sensum peculiarem et formicatorium post tempus excitant. Flores sunt irregulares, cærulei, ad inflorescentiam racemosam dispositi.

Caute servetur.

Dosis maxima: *Centigrammata viginti quinque* 0,25 gram.

Præparata:

Extractum Aconiti.

Tinctura „ 10 : 100.

† **Herba Conii.***Ph. N. Ed. I.: Folia Conii.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Herba Conii. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Conii folia. Ph. Austr.: Conium. Ph. Fr.: Ciguë officinale ou grande Ciguë.*

Skarntyde.

Conium maculatum L. Umbelliferae. Planta biennis Europæ, etiam Norvegiæ meridionalis.

Herba ubiqve glabra, caule recenti pruinoso et fusco vel sangvineo-maculato, foliis supra saturate viridibus, infra pallidioribus, tri- vel quadripinnatifidis, inferioribus fistuloso-petiolatis, laciniis ultimis oblongis, serratis, mucronulatis.

Herba paullo anteqvam florere coepit colligenda et a caulibus validioribus liberanda est.

Servetur caute neve ultra annum.

Dosis maxima: *Centigrammata triginta* . 0,30 gram.† **Herba Lobeliæ.***Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Herba Lobeliæ. Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph. U. St.: Lobelia. Ph. Fr.: Lobélie enflée.*

Lobelia.

Lobelia inflata L. Lobeliaceæ. Planta annua in America boreali indigena.

Herba florens; in placentis quadrangulis ad nos advehitur.

Caute servetur.

Præparatum:

Tinctura Lobeliæ 10 : 100.

Herba Malvæ.

Ph. N. Ed. I.: Folia Malvarum.

Ph. Dan.

Ph. Germ.: Folia Malvæ. Ph. Austr.: Malva. Ph. Fr.: Mauve.

Malva.

Malva sylvestris L. M. rotundifolia L. M. vulgaris Fr. Malvaceæ. Plantæ perennes Europæ.

Folia longe petiolata, subrenata vel rotundo-cordata, utraqve superficie pubescentia, quinque- vel septemlobata, sapore mucilagineo. Flores sunt regulares, calyce duplice, exteriori trisepalo et villosa, interiore quinquefido; corolla pentapetala, rosea vel alba.

Præparata:

Species demulcentes.

„ emollientes.

Herba Meliloti.

Ph. N. Ed. I.: Herba Melilotorum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Herba Meliloti. Ph. Austr.: Melilotus. Ph. Fr.: Mélilot officinal.

Melotenurt.

Melilotus officinalis Willdenow. Papilionaceæ. Planta biennis in regionibus littoralibus Norvegiæ australis passim indigena.

Rami floriferi, foliis ternatis, foliolis obovato-lanceolatis, in apice subserratis, inflorescentia spicata, corolla papilionacea, parva, lutea, odore peculiari et fragranti.

Præparata:

Emplastrum Meliloti.

Species emollientes.

Ungventum aromaticum.

Herba Melissæ.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. Ph. Dan.: Folia Melissæ.**Ph. Germ.: Folia Melissæ. Ph. Austr. & Ph. U. St.: Melissa. Ph. Fr.: Mélisse officinal.***Melissa officinalis** L. var. **citrata** Bisch. **Labiatae.**

Planta perennis Europæ meridionalis.

Herba florens, foliis petiolatis, ovoideis vel subcordatis, serratis, nervis pilosis, corollis labiatis; odore grato et citrino, sapore subamaro.

Præparatum:

Species resolventes.

Herba Menthæ piperitæ.*Ph. Svec. Ph. Dan.: Folia Menthæ piperitæ.**Ph. Germ.: Folia Menthæ piperitæ. Ph. Austr.: Mentha.**Ph. U. St.: Mentha piperita. Ph. Fr.: Menthe poivrée.*

Pebermynte.

Mentha piperita L. **Labiatae.** Planta perennis Angliæ, in Europa media frequenter culta.

Herba florens, foliis oppositis, petiolatis, oblongis, acutis, argute serratis, subglabris, glandulosis, corollis subregulariter infundibuliformibus, margine quadripartito; odore fragranti, sapore peculiari et camphoraceo, primum os urente, deinde frigoris sensum relinvente.

Præparatum:

Species resolventes.

Herba Origani.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Dan.**Ph. Austr. & Ph. U. St.: Origanum. Ph. Fr.: Origane vulgaire.*

Vild Merian.

Origanum vulgare L. Labiatæ. Planta perennis Norvegiæ.

Herba florens, foliis oppositis, ovatis, pilosis, pellucido-punctatis; spicis in corymbum terminalem dispositis, densis; bracteis adpressis quadrifariam imbricatis, ovatis, in apice violaceis; corollis labiatis, violaceis, odoris fragrantis, saporis subamari.

A caulibus crassioribus liberata dispensetur.

Præparata:

Species resolventes.

Unguentum aromaticum.

Hydrargyrum crudum.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Hydrargyrum venale.

Ph. Germ. & Ph. U. St.: Hydrargyrum. Ph. Fr.: Mercure.

Kviksølv.

Metallum liquidum, mobilissimum, partem quam minimam metallorum alienorum continens.

Servetur in vase obturato.

Præparata:

Hydrargyrum depuratum.

Unguentum Hydrargyri.

Hydrargyrum depuratum.

Ph. N. Ed. I.: Hydrargyrum.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Hydrargyrum.

Ph. Germ.: Hydrargyrum depuratum. Ph. Austr. & Ph.

Brit.: Hydrargyrum. Ph. Fr.: Mercure purifié.

Renset Kviksølv.

Metallum liquidum, mobilissimum, splendens, in acido nitrico plane solubile. Si solutio acidi nitrici ope effecta ad siccum evaporetur et candefiat, vestigium residui vix remaneat.

Servetur in vase obturato.

V. Rp. **Hydrargyri crudi** partes centum 100.

Affunde mixtionem antea paratam

Acidi nitrici 3

Aqvæ 3

singulorum partium trium.

In lagenam immissæ inter quassationem sæpius repetitam per aliquot dies seponantur. Hydrargyrum a liqore innatanti separetur, deinde aqua destillata abluatur et charta bibula prorsus siccetur.

† Hydras chloralicus.

C_2HCl_3O . H_2O .

Ph. Svec.

Ph. Germ.: Chloralum hydratum crystallisatum. Ph. Brit.:

Chloral hydras. Ph. U. St.: Chloral.

Crystalli coloris expertes, aciculares, vel massæ crystallinæ laxè cohærentes, odoris melonacei et paullum pungentis, saporis acris atqve fauces radentis, in aquæ vel spiritus fere æqvis partibus solubiles; solutiones ad chartam exploratoriam indifferentes præbent. Leni calore liquefiunt, ebulliunt caloris gradu 95. Solutione hydratis kalici digestæ decomponuntur et chloroformium secernunt.

Solutio aqvosa nitrate argentario ne præcipitatum exhiheat, calefacta nullo residuo relicto conflagret.

Servetur in vasis bene clausis loco obscuro.

Dosis maxima: *Grammata tria*. 3 gram.

Hydras ferricus.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec.*

Ph. Germ.: Ferrum oxydatum fuscum. Ph. Brit.: Ferri peroxidum hydratum. Ph. U. St.: Ferri oxidum hydratum. Ph. Fr.: Peroxyde de fer hydraté.

Jernoxydhydrat.

Pulvis e rubro fuscus, non in aqua, facile in acido hydrochlorato solubilis.

Solutio guttas nonnullas solutionis hypermanganatis kalici additas ne decoloret (Fe O); si solutione ammoniaci supersaturatur, liquor a præcipitato inde effecto filtratus ne solutione sulpho-hydratis ammonici turbetur (Cu, Zn) neve evaporatione perfecta residuum relinqvat (salia alkalina), chloreto baryco addito aut ne aut modo exigue turbetur (sulphates). Solutio acidi nitrici ope effecta nitrate argentario ne turbetur (chloreto).

In vase bene clauso servetur.

V. Rp. **Sulphatis ferrosi partes decem** 10.

Solvantur in mixtione antea parata

Acidi sulphurici concentrati partium duarum 2

Aqvæ partium decem 10.

In patina porcellanea capaci calore aquæ bullientis temperaturam haud superante, usque dum soluta sint, calefiant; tum sensim et inter agitandum addantur

Acidi nitrici partes tres 3

vel tanta copia, ut portiuncula exempta et aqua diluta guttas nonnullas solutionis hypermanganatis kalici additas non jam decoloret. Liquor ita paratus, refrigeratus et cum aquæ quadruplicè ponderis sui copia dilutus, sensim in mixtionem

Solutionis Ammoniaci 30

Aqvæ 30

singularum partium triginta

antea paratam inter agitandum infundatur. Si liquor reactionem acidam præbet, tanta copia solutionis ammoniaci addatur, ut alkaline reagat. Præcipitatum hinc effectum aqua destillata frigida bene abluatur, in colatorium linteum imponatur, tum exprimatur et temperatura ordinaria siccetur.

Hydras kalicus.

KHO.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Kali causticum fusum. Ph. Austr.: Kalium hydro-oxydatum. Ph. Brit.: Potassa caustica. Ph. U. St.: Potassa. Ph. Fr.: Potasse pure (Potasse à l'alcool).

Ætskali.

Frusta vel bacilli, albi, caustici, fractura crystallina; aëri expositi aquam et acidum carbonicum ex aëre attrahunt et deliquescunt; facile in aqua vel spiritu solvuntur. Acidis affusis leviter modo effervescent (carbonates). Solutio acido nitrico supersaturata ne solutione ammoniaci abunde addita præbeat præcipitatum (oxyd. alumin. & ferric.), nitrate argentario vel chloreto baryco addito exiguum modo præcipitatum exhibeat (chloreto, sulphates).

Servetur in vase probe clauso.

Hydratocarbonas magneticus.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Magnesia carbonica. Ph. Austr.: Magnesium carbonicum hydro-oxydatum. Ph. Brit.: Magnesia carbonas. Ph. U. St.: Magnesii carbonas. Ph. Fr.: Carbonate de Magnésie. Hydro-carbonate de Magnésie. Magnésie blanche.

Magnesia alba.**Kulsur Magnesia.**

Massa facile friabilis vel pulvis albus, levissimus, in aqua fere nequaquam, in acidis dilutis sub effervescencia acidi carbonici facile solubilis. Aqua, si cum pulvere coquitur, ne reactionem valde alkalinam præbeat (carbonates alcalini). Solutio acidi nitrici ope effecta ne solutione sulphidi hydrici turbetur neve oxalate ammonico, si, chloreto ammonico prius addito, solutione ammoniaci supersaturetur (Ca). Solutio acido nitrico acidulata nitrate argenteo vel chloreto baryeo leviter modo turbetur (chloreto & sulphates).

Præparatum:

Pulvis Magnesiæ cum Rheo 1 : 3.

Hydratocarbonas plumbicus.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Cerussa seu Plumbum carbonicum. Ph. Austr.: Plumbum carbonicum. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Plumbi carbonas. Ph. Fr.: Carbonate de plomb, Céruse.

Blyhvidt.

Pulvis albus, ponderosus vel massa grumosa, haud in aqua, plane in acido acetico et acido nitrico, avolante acido carbonico, solubilis. Solutio, e qua plumbum solutione sulphidi hydrici plane eliminatum est, ne carbonate natrico præcipitatum præbeat (Ba, Ca).

Præparatum:

Ungventum hydratocarbonatis plumbici 1 : 3.

† **Hypermanganas kalicus.**KMnO₄.*Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Kali hypermanganicum crystallisatum. Ph.**Austr.: Kalium hypermanganicum crystallisatum.**Ph. Brit.: Potassæ permanganas. Ph. U. St.: Potassii permanganas. Ph. Fr.: Permanganate de potasse.***Overmangansurt Kali.**

Crystalli prismaticæ, ex atropurpureo nigræ, metallice splendentes, in aqvæ partibus sedecim (16) solubiles. Solutio aqvosa est colore purpureo substantiisqve reducentibus decoloratur.

Servetur caute in vitris epistomiis vitreis clausis.

I n f u s a.

Ph. Germ.: Infusa (1:10), Inf. concentrata (1,5—10) & Inf. concentratissima (2:10).

Infusa, quibus nulla formula nominatim præscripta est, eodem modo parentur quo infusum Sennæ.

Infusum Rhei alkalinum*loco Infusi Rheorum Ph. N. Ed. I.*

Ph. Dan. Cfr. Ph. Svec. (Rp. Rad. Rhei partes 10 et Carbonat. natric. p. 2, ex quibus parantur infusi p. 100).

Cfr. Ph. Germ. & Ph. Austr.: Tinctura Rhei aqvosa.

Rhabarber-Draaber.

Rp. **Radicis Rhei** in talos minutos concisæ et a pulvere

liberatæ *partes viginti quinque* 25

Bicarbonatis natrici *partes tres* 3

Aqvæ *partes ducentas* 200.

Per duodecim horas macerentur.

Liquor, qvi, expressione levi colatus, erit
partium centum septuaginta 170,
 ebulliat; liquori refrigerato admisceantur

Aqvæ Cinnamomi spirituosæ partes triginta . 30.

Filtretur. Servetur in vitris obturatis loco frigido.
 Limpidum dispensetur.

Præparatum:

Mixtura aperiens 1 : 2.

Infusum Sennæ.

Ph. N. Ed. I.: Infusum Cassiarum.

Ph. Brit.: Infus. Sennæ (1 : 10, cum rhizomate Zingiberis).

Ph. U. St.: Infus. Sennæ (1 : 16, cum fruct. Coriandri).

Sennesblade-Infus.

Rp. **Foliorum Sennæ** concisorum *partes decem* . . 10.

Affunde

Aqvæ fervidæ tantam copiam,
 qvanta, digestionem per dimidiam horam peracta, ad ex-
 pressam colaturam *partium centum* 100
 sufficiat.

Ex tempore paretur.

Infusum Sennæ compositum

loco Decocti Cassiarum compositi Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan. Cfr. Ph. Svec.: Infus. Sennæ compositum (Tar-
 tras natrico-kalicus loco Tartratis kalici).

Cfr. Ph. Germ.: Infusum Sennæ compositum (Folior. Sennæ
 2 ad infusi partes 15). *Cfr. Ph. Austr.: Infusum*
laxativum (circ. 10 : 100).

Rp. **Fructuum Coriandri** contusorum *partes duas* . 2

„ **Vitis viniferæ apyrenæ partes quinque** 5

Foliorum Sennæ concisorum *partes decem* . . 10.

Affunde

Aqvæ fervidæ tantam copiam,
qvanta, digestionem per horam peracta, ad colaturæ ex-
pressæ *partes septuaginta duas* 72
efficiendas sufficiat. Solvantur in his

Mannæ *partes viginti quinque* 25

Tartratis kalici *partes tres* 3.

Liqvori iterum colato addatur

Aqvæ tantum,

ut fiat infusum *partium centum* 100.

Dispensetur limpidum.

Iodetum kalicum.

KI.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

*Ph. Germ. & Ph. Austr.: Kalium iodatum. Ph. Brit. &
Ph. U. St.: Potassii Iodidum. Ph. Fr.: Iodure de
Potassium.*

Jodkalium.

Crystalli albæ, cubicæ, subdiaphanæ, in aquæ par-
tibus tribus qvartis ($\frac{3}{4}$), in spiritus partibus sex vel
septem (6—7) solubiles. Solutiones sunt reactione paul-
lulum alkalina.

Solutio aqvosa solutione sulpho-hydratis ammonici
ne turbetur (Zn, Fe), acido sulphurico diluto addito ne
effervescat (carbonates) neve amyllum coctum cærulefaciat
(acid. iodic.). Solutio acido nitrico leviter acidulata ne
chlreto baryco præcipitatum præbeat (acid. sulphuric.).
Nitræs argenticus solutioni salis aqvosæ abunde additus
præcipitatum pallide flavum, solutione ammoniaci aut
insolubile aut minima ex parte solubile, præbeat, ita ut
liqvor ammoniacalis a sedimento filtratus acidi nitrici

abundanti copia addita leviter modo turbetur, non exhibeat præcipitatum (chloreta, brometa).

Servetur in vitro bene obturato.

Præparata:

Solutio superiodeti kalici	2 : 100
Ungventum iodeti kalici	10 : 100.

† Iodum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. U. St.: Iodinium. Ph. Fr.: Iode. Ceteræ: Iodum.

J o d.

Tabulæ vel squamæ ponderosæ, e griseo nigræ, metallice splendentes, crystallinæ, molles, odore peculiari, in spiritus concentrati partibus decem (10), in aqua minima ex parte solubiles. Æthere, chloroformio, sulphido carbonico facile solvuntur. Ignitæ nullo residuo relicto prorsus avolant.

Servetur caute in vase epistomio vitreo clauso.

Dosis maxima: *Centigrammata quinque* . 0,05 gram.

Adhibetur ad præparationem:

Pilularum iodeti ferrosi (iodi gram. 4 ad pilulas 100).	
Solutionis iodi spirituosæ	5 : 100
„ superiodeti kalici	1 : 100
Syrupi iodeti ferrosi	82 : 1000.

† Kermes mineralis

loco Pulveris stibici Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Kermes mineralis (e sulphureto stibico et carbonate natrico concoquendo paratus).

Ph. Germ.: Stibium sulfuratum rubeum. Ph. U. St.: Antimonii Oxysulphuretum. Ph. Fr.: Kermès minéral.

Kermes.

Rp. Oxydi stibici partes decem 10

Sulphureti stibici amorphi partes nonaginta . 90.


Pulverata exactissime commisceantur.

Sit pulvis subtilis, e fusco rufus, in aqua frigida insolubilis. Acido hydrochlorato facile solvatur gase sulphidi hydrici avolante. Solutio acidi tartarici aqvisa decimam ponderis ejus partem (0,1) solvat.

Servetur caute in vase probe clauso.

Nota: Partes duæ (2) continent eandem copiam oxydi stibici ac pars una (1) pulveris stibici Ph. N. Ed. I.

Lactas ferrosus.



Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Ferrum lacticum. Ph. U. St.:

Ferri Lactas. Ph. Fr.: Lactate de fer.

Melkesurt Jernoxydul.

Crustæ crystallinæ aut pulvis, vel albidus vel e flavescenti viridis, in aqvæ partibus circiter quinquaginta (50) solubilis.

Solutio aqvisa, solutione acetatis plumbici addita, ne præcipitatum, vix turbationem levissimam præbeat (acid. sulphuric., hydrochlorat., malic. et tartaric.). Postquam oxydum ferrosus, addita solutione hydratis natrici, prorsus secretum est, liquor limpide filtratus; guttis nonnullis solutionis sulphatis cuprici additis, inter bulliendum præcipitatum rubicundum ne exhibeat (saccharum).

Servetur in vase bene clauso.

Lichen Islandicus.*Ph. N. Ed. I.: Cetraria.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Lichen Islandicus. Ph. Brit. &**Ph. U. St.: Cetraria. Ph. Fr.: Lichen d'Islande.*

Islandsk Lav.

Cetraria Islandica *Achar.* (**Lichen Islandicus** *L.*)
Lichenes. In regionibus montosis et silvestribus Norvegiæ indigena.

Thallus erectus, foliaceus, varie laciniatus, margine fimbriatus, canaliculatus, altera superficie fuscus, altera pallidior, siccatus rigidus et fragilis, humectatus mollis, cartilagineo-subcoriaceus, sapore amaro, cum aqua coctus et refrigeratus gelatinam præbens.

Præparatum:

Lichen Islandicus elotus.

Lichen Islandicus elotus.*Ph. N. Ed. I.: Cetraria elota.**Ph. Svec.**Ph. Germ.: Lichen Islandicus ab amaritie liberatus.*

Præpareret islandsk Lav.

Rp. Lichenis Islandici quantum vis.

Maceretur per duodecim horas aqua ducentesimam sui partem ($\frac{1}{200}$) **Carbonatis kalici depurati** continente; liqvore dein defuso lichen aqua frigida bene abluatur et siccetur.

Præparatum:

Gelatina lichenis Islandici 16 : 100.

Lignum Guajaci.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Fr.: Gayac. Ceteræ: Lignum Guajaci.*

Guajactræ.

Guajacum officinale L. Zygophylleæ. Arbor insularum Indiæ occidentalis.

Duramen trunci, alburno et cortice remoto, ponderosum, resinosum, e subviridi flavum. Calefactum odorem benzoinum spargit.

Præparata:

Species amaræ	25 : 100
„ decocti lignorum	42 : 100.

Lignum Qvassiae.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Lignum Qvassiae. Ph. Austr. & Ph. U. St.: Qvassia. Ph. Brit.: Qvassiae lignum (e Picræna excelsa Lindl.). Ph. Fr.: Quassi amer.*

Qvassia.

Qvassia amara L. Simarubeæ. Frutex arborescens Guyanensis.

Lignum trunci et ramorum crassiorum, albidum, leve, sapore peramaro. Rasuram, qvæ in mercatura prostat, adhibere non licet.

Linctus boracinus*loco Mellis boracini Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec.: Linctus Biboratis natrici (Biborat. natrici 1 & Mell. depur. 9).**Cfr. Ph. Brit.: Mel boracis & Glycerinum boracis. Ph. U. St.: Glyceritum sodii boratis & Mel sodii boratis.*

Trøskesaft.

Rp. Biboratis natrici pulverati	10
Glycerini	10
<i>singulorum partes decem.</i>	
Solutis addantur	
Mellis depurati <i>partes octoginta</i>	80.

Linimentum ammoniacato-camphoratum

loco Linimenti ammoniaci camphorati Ph. N. Ed. I.

- Ph. Svec.* (Solut. ammoniaci 1. Olei camphorati 3). *Ph. Dan.:*
Lin. ammoniacatum camphoratum (Olei camphorati 1.
 Olei Olivar. 2. Solut. ammoniaci 1).
Ph. Germ.: *Lin. ammoniato-camphoratum.* *Ph. Fr.:* *Liniment ammoniacal camphré.*

Hvid Campherolie.

Rp. Olei camphorati <i>partes viginti</i>	20
„ Olivarum	40
Solutionis Ammoniaci	40
<i>singulorum partes quadraginta.</i>	
Misceantur.	

Linimentum calcicum.

Ph. N. Ed. I.: *Linimentum calcis.*

Ph. Svec.

Ph. U. St.: *Linimentum calcis.* *Ph. Fr.:* *Liniment calcaire.*

Kalk-Liniment.

Rp. Olei Lini	50
Solutionis hydratis calcici	50
<i>singulorum partes quingvagina.</i>	
Agitando misceantur.	

Linimentum Opodeldoc

loco Linimenti saponati Ph. N. Ed. I.

Cfr. Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Linim. saponato-camphoratum.

Ph. Fr.: Baume Opodeldoc.

Opodeldok.

Rp. **Saponis butyracei** siccati et rasi *partes octo* . . . 8

Camphoræ contusæ *partes duas* 2.

In cucurbitam immissis affundantur

Spiritus concentrati *partes octoginta quatuor* . . . 84.

Balneo aqvæ calefiant, donec soluta sint. Solutis addantur

Solutionis Ammoniaci *partes quatuor* 4

Ætherolei Rosmarini 1

„ **Thymi** 1

singulorum pars una.

In cucurbita apte clausa loco tepido seponantur, ut partes turbantes subsidant. Liqvor limpidus defundatur, residuum turbidum filtretur. In vasis idoneis refrigeretur. Servetur loco frigido.

Sit album, subpellucidum, opalescens; calore manus in liqvorem limpidum liqvescat.

Linteum carptum Anglicum.

Ph. Dan.

Ph. Svec.: Filamenta lintei triti & Linteum carptum Anglicum.

Engelsk Charpi.

† **Liquor acidus Halleri**

loco Elixir acidi Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Cfr. Ph. Germ.: Mixtura sulphurica acida (Acid. sulphurici conc. 25 0/0). *Cfr. Ph. Austr.: Liquor acidus Halleri* (Acid. sulphurici conc. 25 0/0). *Cfr. Ph. Fr.: Acide sulfurique alcoolisé* (Acid. sulphurici conc. 25 0/0).

Hallers sure Draaber.

Rp. **Spiritus concentrati** 50
Acidi sulphurici concentrati 50
singulorum partes quinquaginta.

Acidum inter qvassationem instilletur, ita ut mixtura non nimis calefiat.

Sit limpidus, coloris expers vel subflavidus; per aliquod tempus sepositus odorem ætheri similem spargit.

Servetur in vitro epistomio vitreo clauso.

Dosis maxima: *Guttæ decem* (10).

Nota: Partes duæ (2) respondent partibus qvinque (5)
 Elixir acidi Ph. N. Ed. I. et partibus qvatuor (4)
 aliarum pharmacopoeiarum.

Liquor antispasticus.

Ph. N. Ed. I.

K r a m p e - D r a a b e r.

Rp. **Liquoris succinatis ammonici pyroleosi** 50
Ætheris spirituosus 50
singulorum partes quinquaginta.

Misceantur.

†† **Liquor arseniitis kalici.**
Solutio arsenicalis Fowleri.

Ph. N. Ed. I.: Solutio arseniitis kalici (sine spiritu Lavandulæ).

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Liquor arseniitis kalici.

Ph. Austr.: Solutio arsenicalis Fowleri (1 : 90). Ph. Germ.: Liquor Kali arsenicosi (1 : 90). Ph. Brit.: Liquor arsenicalis (1 : 120). Ph. U. St.: Liquor Potassii arsenitis (circ. 1 : 150). Ph. Fr.: Solution d'Arsénite de potasse (1 : 100).

Fowlers Arsenik-Draaber.

Rp. **Acidi arsenicosi pulverati** 1
Carbonatis kalici puri 1
singulorum partem unam
Aqvæ partes qvinque 5.
 Coquantur, donec omnino solutæ sint.
 Solutis addantur
Spiritus Lavandulæ partes qvinque 5
Aqvæ tantum,
 quantum ad liquoris pondus *partium centum* . . . 100
 obtinendum sufficiat.
 Cautissime servetur.
 Dosis maxima: *Guttæ decem* (10).

Liquor citratis kalici. Julapium salinum.

Ph. N. Ed. I.: Solutio citratis kalici saccharata.

Ph. Svec.: Liquor citratis kalici. Ph. Dan.: Julapium salinum.

Cfr. Ph. U. St.: Liquor potassii citratis.

J u l a p i u m.

Rp. **Solutionis acidi citrici partes viginti** 20

[ex acidi citrici partibus viginti (20) et aqvæ partibus octoginta (80) paratæ]

Solutionis bicarbonatis kalici *partes quadraginta* 40

[ex bicarbonatis kalici partibus viginti quinque (25) et aqvæ partibus centum et septuaginta quinque (175) paratæ].

Leniter conqvassando mixtis addantur

Syrupi Sacchari *partes decem* 10

Aqvæ tanta copia,

qvanta ad liqvoris pondus *partium centum* 100
reqviratur.

Ex tempore paretur.

Partes centum (100) continent partes circiter quinque (5) citratis kalici anhydri.

Liqvor ophthalmicus

loco Liqvoris ophthalmici albi Ph. N. Ed. I.

Ø i e n v a n d.

Rp. **Sulphatis zincici** *partes qvatuor* 4

Aqvæ Rosæ *partes mille* 1000.

Solutis addantur

Vini Opii crocati *partes decem* 10.

Liqvor pectoralis

loco Elixir pectoralis Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Cfr. Ph. Germ.: Elixir e Succo Liqviritiæ.

B r y s t - D r a a b e r.

Rp. **Extracti Glycyrrhizæ depurati** *partes viginti* . 20

Aqvæ Foeniculi *partes sexaginta* 60.

Solutis addantur

Spiritus ammoniacati anisati *partes viginti* . 20.
Limpidus dispensetur.

Liquor succinatis ammonici pyroleosi.

Ph. N. Ed. I.: Solutio succinatis ammonici pyro-oleosi.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Liquor Ammonii succinici. Ph. Fr.: Liqueur de corne de cerf succinée.

Liquor cornu Cervi succinatus.

Hjortetak-Draaber.

Rp. **Acidi succinici subflavi** *partes decem* 10

Aqvæ calidæ *partes octoginta* 80.

Solutis addatur

Supercarbonatis ammonici pyroleosi tantum,
ut acidum saturetur. Liquor dein per horas viginti quatuor in loco temperato seponatur atque filtretur.

Sit limpidus, recens paratus colore flavo, postea colore paullo obscuriore, odore empyreumatico.

Præparatum:

Liquor antispasticus 1 : 2.

Liquor supercarbonatis ammonici pyroleosi

loco Solutionis sesquicarbonatis ammonici pyro-oleosi

Ph. N. Ed. I. (1 : 10).

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Liquor Ammonii carbonici pyro-oleosi. Ph. Fr.:

Esprit volatile de corne de cerf.

Liquor cornu Cervi.

Rp. **Supercarbonatis ammonici pyroleosi** *partem unam* 1
Aqvæ *partes sex* 6.

Solvantur. Per viginti qvatuor horas loco temperato seposita et sæpius agitata filtrentur.

Sit primo limpidus colorisque expers vel subflavus, postea subfuscus et subturbidus, pondere specifico 1,060 usque ad 1,065.

Præparatum:

Spiritus antiparalyticus 16 : 100.

Lycopodium.

Ph. N. Ed. I.: Semina Lycopodiorum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Lycopode. Ceteræ: Lycopodium.

Lycopodium.

Lycopodium clavatum L. **L. annotinum** L. & L. **complanatum** L. **Lycopodiaceæ.** Plantæ perennes in silvis Norvegiæ frequentes.

Sporidia.

Sit prorsus siccum, pallide flavum, non adulteratum quisquiliis vel polline saturate flavo Pinorum aliarumve plantarum, qvi pulvis facilius conglomeratur.

Manna.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Manne. Ceteræ: Manna.

Fraxinus Ornus L. **Oleineæ.** Arbor in Europa meridionali indigena et culta.

Succus e truncis vulneratis effluens et aëre induratus.

- 1) Frusta plana vel canaliculata, in fractura strata concentrica exhibentia, colore e subflavo albido, sapore dulci, non acri. Dispensetur, si medicus **Mannam canellatam** vel **electam** præscripserit.
- 2) Massæ irregulares albidæ vel subflavæ, glebulis subfuscis et subviscidis mixtæ, sapore dulci et subacri, quæ **Manna vulgaris** vel „Gerace“ vocantur. Quæ vocatur Manna pingvis (de Puglia) rejicienda est.

Præparata:

Infusum Sennæ compositum	25 : 100.
Species laxantes Hamburgenses	23 : 100.
Syrupus Sennæ mannatus	15 : 100.

† Massa pilularum Colocynthidum compositarum.

Ph. N. Ed. I.: Massa pilularum Colocynthidis compositarum.

Ph. Svec.: Pilulæ Colocynthidum compositæ (Rp. Flor. Caryophylli gram. 1, Resin. Jalapæ gram. 2, Extract. Colocynthid. composit. gram. 7, Extract. Absinthii q. s. M. f. pilul. 100).

Cfr. Ph. Germ.: Extractum Colocynthidis compositum.

Ph. Brit.: Pilula Colocynthidis composita. Cfr. Ph.

U. St.: Extractum colocynthidis compositum. Ph. Fr.: Pilules de Coloquinte composées.

Rp. **Pulpæ Colocynthidum** pulveratæ partes duodecim 12

Aloës pulveratæ 24

Scamonii pulverati 24

singulorum partes viginti quatuor,

Ætherolei Caryophylli partes quatuor 4

Sebi 18

Glycerini 18

singulorum partes duodeviginti.

Triturando bene commisceantur.

Massa pilularum de Cynoglosso.

Ph. N. Ed. I.: Massa pilularum sedantium cum Cynoglosso
(Balsamum Styrax liquidus loco Resinæ Styracis).

Ph. Dan. (Rp. Opii pulv., Radic. Cynogloss., Semin. Hyoscyami, singulor. partes 4, Gummi-resinæ Myrrhæ p. 6, Gummi-resinæ Olibani p. 5, Flor. Caryophyll., Cortic. Cinnamomi Cassiæ, Radic. Althææ, singulor. p. 2).

Ph. Fr.: Pilules de cynoglosse (Pilul. singul. contin. 0,02 gram. Extracti Opii).

Hostepulver.

Rp. **Radicis Cynoglossi pulveratæ partes quindecim** 15.
Commisceantur cum

Balsami Styracis liquidi partibus tribus . . . 3
solutis in

Spiritus concentrati partibus tribus . . . 3.
Nullo calore adhibito siccatis admisceantur

Opii pulverati 12

Gummi-resinæ Olibani pulverati 12

singulorum partes duodecim,

Gummi-resinæ Myrrhæ pulveratæ partes duode-
viginti 18

Seminum Hyoscyami 6

Florum Caryophylli 6

Corticis Cinnamomi Ceylanici 6

Stigmatum Croci 6

Castorei Canadensis 6

singulorum pulveratorum partes sex.

• Pilulæ formantur ope glycerini.

Partes quindecim (15) continent Opii partes duas (2)
et seminum Hyoscyami partem unam (1).

† Massa pilularum resinæ Jalapæ.

Ph. N. Ed. I.: Massa pilularum resinæ Ipomæarum.

Ph. Dan.

Ph. Germ.: Sapo jalapinus.

- Rp. **Resinæ Jalapæ** 50
Saponis albi oleacei 50
singulorum partes quingvaginta.
Pulverata exactissime misceantur.
Dosis maxima: *Centigrammata sexaginta* 0,60 gram.
Præparatum:
Extractum Rhei compositum 30 : 100.
-

Massa pilularum tonico-nervinarum.

Ph. N. Ed. I.

- Rp. **Sulphatis ferrosi** 1
Gummi-resinæ Asæ foetidæ 1
Extracti Cardui benedicti 1
singulorum partem unam.
Pulverata misceantur.
-

Mel.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Mel album.
Ph. Austr.: Mel crudum. Ph. Fr.: Miel. Ceteræ: Mel.

H o n n i n g.

Apis mellifica L. Insecta, Hymenoptera. Materia saccharina e nectariis florum ab apibus collecta et parata.

Adhibeatur optimum, quod e favis sponte stillat. Videas ne sit acidum, farina aliisve heterogeneis adulteratum.

Præparatum:

Mel depuratum.

Mel depuratum.*Ph. N. Ed. I.: Mel despumatum.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ., Ph. Austr. & Ph. Brit.: Mel depuratum.**Ph. U. St.: Mel despumatum. Ph. Fr.: Mellite simple.***Renset Honning.**

Rp. **Mellis partes centum** 100
Aqvæ partes ducentas 200.

Mixta et ad caloris gradum fere 90 per horam calefacta per noctem seponantur. Additis dein chartæ bibulæ partibus duabus liqvor bene agitetur, coletur et in balneo aqvæ, ebullitione tamen evitata, evaporetur, ut sit pondere specifico 1,33—1,34.

Præparata:

Linctus boracinus.

Oxymel Scillæ.

Mixtura acida*loco Mixturæ acidæ Ph. N. Ed. I.*

(Acid. sulphur. dilut. partes 2 ad mixturæ partes 114.)

Cfr. Ph. Dan.: Mixtura acida sulphurica (Acid. sulph. dil. 3, Syrup. Rubi 22, Aqv. dest. 100).

Sur Mixtur.

Rp. **Acidi sulphurici diluti partes duas** 2
Aqvæ partes octoginta 80
Syrupi Rubi Idæi partes duodeviginti 18.
 Misceantur.

Mixtura alba.*loco Mixturæ albæ Ph. N. Ed. I.**Ph. Dan.**Ph. Brit.: Mixtura cretæ. Ph. U. St.: Mistura cretæ. Ph. Fr.: Décoction blanche de Sydenham.***Hvid Mixtur.**

Rp.	Testarum ostrearum præparatarum	3
	Gummi Arabici pulverati	3
	<i>singulorum partes tres.</i>	
	Conterantur cum	
	Aqvæ partibus octoginta octo	88.
	Admisceantur deinde	
	Syrupi sacchari	3
	Aqvæ Cinnamomi spirituosæ	3
	<i>singulorum partes tres.</i>	
	Paretur ex tempore.	

Mixtura aperiens.*Ph. N. Ed. I.*

Rp.	Infusi Rhei alkalini partes tres	3
	Tartratis kalici partem unam	1
	Aqvæ partes duas	2.
	Misceantur.	
	Ex tempore paretur.	

Mixtura camphorata*loco Mixturæ camphoratæ Ph. N. Ed. I.**(Camphoræ pars 1 ad mixturæ partes 125.)**Ph. Dan. (Camphor. 1, Mucilag. Gummi arabici 4, Syrup. Rhoead. 15, Aqv. Sambuci 105).*

C a m p h e r - M i x t u r.

Rp.	Camphoræ pulveratæ <i>partem unam</i>	1.
	Contere cum	
	Mucilaginis Gummi Arabici <i>partibus novem</i>	9.
	Adde	
	Syrupi Rubi Idæi <i>partes decem</i>	10
	Aqvæ <i>partes octoginta</i>	80.
	Recens parata dispensetur.	
	Præparatum:	
	Mixtura camphorata acida	99 : 100.

Mixtura camphorata acida.

Ph. N. Ed. I.

S u r C a m p h e r - M i x t u r.

Rp.	Acidi acetici <i>partem unam</i>	1
	Mixturæ camphoratæ <i>partes nonaginta novem</i>	99.
	Misceantur.	
	Ex tempore paretur.	

Mixtura Ferri composita.

*Ph. N. Ed. I.: Mixtura Balsamodendri ferrata.**Ph. Dan. Cfr. Ph. Svec.: Emulsio Myrrhæ ferrata (Aqua Menthæ piperitæ & Tinctura Lavandulæ aromatica parata).**Ph. Brit.: Mixtura Ferri composita. Ph. U. St.: Mistura Ferri composita.*

G r i f f i t h s M i x t u r.

Rp.	Carbonatis kalici puri <i>partes duas</i>	2
	Gummi-resinæ Myrrhæ in frustulis non siccatis	
	<i>partes quatuor</i>	4.
	Bene contritis sensim affundantur	
	Aqvæ <i>partes centum et quadraginta quatuor</i>	144.

Emulsioni inde effectæ admisceantur

Sulphatis ferrosi partes duæ 2
antea solutæ in mixtura

Aqvæ Rosæ partium centum viginti octo 128

Syrupi sacchari partium viginti 20.

Paretur ex tempore.

Moschus.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Musc. Ceteræ: Moschus.

M o s k u s.

Moschus moschiferus *L.* **Mammalia, Ruminantia.**
Habitat montes Asiæ mediæ.

Massa primum unguinosa, mox grumosa, ex granis variæ magnitudinis constans, pingviter nitens, colore obscure fusco, secreta et inclusa in folliculo proprio intus membrana tenui et fusca vestito; e folliculo exempta et a membranis pilisque purgata adhibeatur.

Cave a folliculis adulteratis, qui, parte Moschi exempta, alia massa repleti sunt. Omnino rejiciatur Moschus Russicus vel Kabardinicus in folliculo massam continens clariorem, odoris multo debilioris et urinæ similis.

In vase bene clauso servetur.

Mucilago Cydoniæ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Mucilago Cydoniæ. Ph. Austr.: Mucilago Cydoniorum seminum. Ph. Fr.: Mucilage de coing.

Kvæde-Slim.

- Rp. **Seminum Cydoniæ** partes duas 2
Aqvæ Rosæ partes centum 100.
 Conqvassentur, donec mucilago effecta sit; tum coletur.
 Ex tempore paretur.

Mucilago Gummi Arabici.

- Ph. N. Ed. I.: Mucilago gummi Acaciarum.*
Ph. Svec. & Ph. Dan.
Ph. Germ. & Ph. Austr.: Mucilago gummi Arabici. Ph.
Brit. & Ph. U. St.: Mucilago Acaciæ. Ph. Fr.: Mucilage de gomme arabique.

Gummi-Slim.

- Rp. **Gummi Arabici** partem unam 1
Aqvæ partes duas 2.
 Fiat solutio, dein coletur.
 Sit limpida, coloris fere expers.
 Præparata:
 Mixtura camphorata.
 " " acida.

Mucilago Salep.

- Ph. N. Ed. I.: Mucilago Orchidum.*
Ph. Svec. loco Mixturæ Saleb (Tuber. Saleb 1, Aqv. 92, Syrup. Papaveris 8). Ph. Dan.
Ph. Germ.: Mucilago Salep.

Salep.

- Rp. **Tuberum Salep** pulveratorum partem unam . . . 1
Aqvæ partes decem 10.

Conqvassando bene commixtis addatur

Aqvæ fervidæ tantum,

quantum sufficiat ad *partes centum* 100
efficiendas.

Conqvassetur, donec refrixerit.

Recens parata dispensetur.

† Nitras argenticus.

Ag NO₃.

Ph. N. Ed. I.: Nitras argenticus fusus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Argentum nitricum fusum. Ph.

Brit.: Argenti nitras. Ph. U. St.: Argenti nitras

fusa. Ph. Fr.: Nitrate d'argent fondu.

Lapis infernalis.

Salpetersurt Sølvoxyd. Helvedessten.

Bacilli albidi vel subcinerei, in fractura radiati, in aqvæ pondere æquali, in spiritus partibus decem (10) solubiles, solutiones reactionis neutralis exhibentes. Solutiones solutione ammoniaci abundanti ne præbeant præcipitatum (Pb) neve colore cæruleo tingantur (Cu). Argento acidi hydrochlorati ope secreto, liqvor filtratus evaporatione peracta ne relinqvat residuum (salia alkalina).

Servetur caute in vase clauso et a luce remoto.

Dosis maxima: *Centigrammata tria* . . . 0,03 gram.

Præparatum:

Nitras argenticus mitigatus 50 : 100.

Nitras argenticus mitigatus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Cfr. Ph. Svec.: Nitras argenticus bis mitigatus (Nitrat. argentic. 1, Nitrat. kalic. 2).

Cfr. Ph. Germ. & Ph. Austr.: Argentum nitricum cum Kalio nitrico (1 : 2).

Rp. Nitrat ^{is} argentici	50
„ kalici	50

singulorum partes quingvaginta.

Colliqvefactæ in formam bacillorum effundantur.

Servetur in vase clauso et a luce remoto.

Nitras kalicus.

K NO₃.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Kali nitricum. Ph. Austr.: Kalium nitricum.

Ph. Brit.: Potassæ nitras. Ph. U. St.: Potassii nitras.

Ph. Fr.: Nitrate de Potasse, Nitre, Salpêtre.

Nitrum.

Salpeter. (Kali-Salpeter.)

Crystalli coloris expertes, prismaticæ, in aëre persistentes, vel pulvis albus crystallinus, in aquæ frigidæ partibus tribus (3), fervidæ parte dimidia ($\frac{1}{2}$) solubiles, solutiones reactionis neutralis exhibentes. Solutio acidulata ne solutione sulphidi hydrici, alkalina ne solutionibus sulpho-hydratis ammonici, carbonatis ammonici, phosphatis natrici præbeat præcipitatum (metalla, terræ alkalinæ). Solutio acido nitrico acidulata chloreto barycone turbetur (acid. sulphuric.), nitrate argentario turbationem vix levissimam exhibeat (acid. hydrochlorat.).

Præparata :

Nitras argenticus mitigatus	1 : 2.
Pulvis refrigerans	1 : 8.

Nitras natricus.

Na NO₃.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec.**Ph. Germ.: Natrum nitricum. Ph. Brit.: Sodæ Nitras.**Ph. U. St.: Sodii nitras.*

Natron-Salpeter.

Crystalli coloris expertes, pellucidæ, rhomboideæ, in aqvæ frigidæ partibus duabus (2), fervidæ parte una (1) solubiles, solutiones reactionis neutralis exhibentes. Solutio acidulata ne solutione sulphidi hydrici, alkalina ne solutione sulpho-hydratis ammonici neve carbonate ammonico neve phosphate natrico turbetur (metalla, terræ alkalinæ). Acidis additis ne effervescat (carbonates). Solutio acido sulphurico diluto acidulata amyllum coctum, additis guttis nonnullis solutionis chlori, ne cærulefaciat (iodeta, acid. iodic.). Solutio acido nitrico acidulata ne chloreto baryco exhibeat præcipitatum (sulphates), nitrate argentario vix opalescat (chloreto).

†† Nitras strychnicus.

C₂₁ H₂₂ N₂ O₂. H NO₃.*Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Strychninum nitricum.*

Salpetersurt Strychnin.

Crystalli albæ, flexibiles, sericeo nitentes, in aqvæ frigidæ partibus sexaginta (60), bullientis partibus tribus (3), in spiritu difficulter, in æthere non solubiles. Chromate kalico et acido sulphurico affusæ colorem e cæruleo violaceum induunt. Acido nitrico superinfuso co-

lore rubro ne tingantur (brucinum); ignitæ nullo residuo relicto conflagrent.

In vitro bene obturato cautissime servetur.

Dosis maxima: *Milligrammata quinque* 0,005 gram.

Oleum Amygdalarum.

Ph. N. Ed. I.: Pingvoleon Amygdalarum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Oleum Amygdalarum dulcium.

Ph. Brit.: Oleum Amygdalæ. Ph. U. St.: Oleum Amygdalæ expressum. Ph. Fr.: Huile d'amandes douces.

Mandel-Olie.

E Seminibus Amygdali dulcibus vel amaris expressum.

Sit limpidum, frigore vix spissescens, coloris pallide flavi, odoris expers, saporis mitis, non rancidi.

Præparata:

Ceratum rubrum.

Ungventum cetacei.

Oleum Cacao.

Ph. N. Ed. I.: Pingvoleon Theobromatum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Oleum Theobromæ. Ph. Fr.: Beurre de Cacao.

Butyrum Cacao.

Cacao-Smør.

E Seminibus Cacao decorticatis et leniter tostis expressione vel coctione paratum.

Ph. Norv. Ed. II.

Recens paratum coloris e subflavo albi, postea al-
bidi, saporis mitis, odoris grati, non rancidi, in tempe-
ratura consveta consistentiæ sebaceæ, calore 29°—30° ca-
lefactum limpide liqvescens, in æthere facile solubile.

Oleum camphoratum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

*Ph. Germ. & Ph. Austr.: Oleum camphoratum. Ph. U. St.:
Linimentum camphoræ. Ph. Fr.: Huile camphrée.*

C a m p h e r - O l i e.

Rp. **Camphoræ** contusæ *partes viginti* 20
Olei Olivarum *partes octoginta* 80.
 Digerendo fiat solutio.

Præparatum :

Linimentum ammoniacato-camphoratum 20 : 100.

Oleum carminativum.

Ph. N. Ed. I.

G r ø n O l i e.

Rp. **Olei Chamomillæ infusi** *partes nonaginta* 90
Ætherolei Menthæ crispæ *partes quatuor* 4
 „ „ **Carvi** 2
 „ „ **Cumini** 2
 „ „ **Foeniculi** 2
singulorum partes duas.

Conqvassando misceantur.

Oleum Chamomillæ infusum.*Ph. N. Ed. I.: Oleum Matricariæ infusum.**Ph. Germ. Ph. Fr.: Huile de Chamomille.***K a m i l l e - O l i e.**Rp. **Florum Chamomillæ** concisorum *partes viginti* 20**Spiritus concentrati** *partes quadraginta* . . . 40.

Maceratis per horas duodecim affundantur

Olei Olivarum *partes centum* 100.

Massa in balneo aquæ, donec spiritus evaporatus sit, calefiat; dein oleum exprimatur et, ut partes turbantes subsidant, sepositum defundatur et filtretur.

Præparatum:

Oleum carminativum 90 : 100

† Oleum Crotonis.*Ph. N. Ed. I.: Pingvroleum Crotonum.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Austr.: Oleum Crotonis Tiglii. Ph. U. St.: Oleum Tiglii. Ph. Fr.: Huile de Croton Tiglium. Ceteræ: Oleum Crotonis.***C r o t o n - O l i e.****Tiglium officinale** *Klotzsch. Euphorbiaceæ.* Arbuscula Indiæ orientalis.

Oleum e seminibus expressum, spissiusculum, flavum vel e fusco flavum, primum mite, demum linguam acerrime urens et pustulas excitans, odore ingrato, in spiritu concentrati partibus circiter quadraginta (40), facile in æthere solubile.

Caute servetur.

Dosis maxima: *Gutta una* (1).

Oleum Hyoscyami infusum.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. Ph. Austr.: Oleum Hyoscyami foliorum infusum. Ph. Fr.: Huile de Jusquiame.***Bulmeurt-Olie.****E Foliis Hyoscyami uti oleum Chamomillæ infusum paretur.**

Præparatum:

Ungventum acetatis plumbici compositum . . . 10 : 100.

Oleum jecoris Aselli.*Ph. N. Ed. I.: Pingvoleon Gadorum.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Oleum jecoris Aselli. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Oleum Morrhuæ. Ph. Fr.: Huile de foie de morue.***T r a n.****Gadus Morrhua L., G. Callarias et Gadi aliæ species. Pisces, Malacopterygii.** In mari septentrionali frequentissimi.

Oleum ex hepate piscium recenti paratum.

Sit omnino limpidum, flavidum, non rancidum.

Oleum Lauri.*Ph. N. Ed. I.: Pingvoleon Lauri.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr. Ph. Fr.: Huile de fruits de Laurier.*

L a u r b æ r - O l i e.

Laurus nobilis L. Laurineæ. Arbor regionis mediterraneæ.

Expressione fructuum obtentum.

Ungvinosum, granulosum, viride, odore laurino et aromatico.

Præparatum:

Ungventum aromaticum.

Oleum Lini.

Ph. N. Ed. I.: Pingvoleon Lini.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Huile de Lin. Ceteræ: Oleum Lini.

L i n - O l i e.

E Seminibus Lini expressione paratum.

Oleum spissiusculum, limpidum, flavum vel e subfusco flavum, siccescens, in ætheris parte una et dimidia ($1\frac{1}{2}$), in spiritus partibus quinque (5) solubile.

Præparatum:

Linimentum calcis 1 : 2.

Oleum Myristicæ.

Ph. N. Ed. I.: Pingvoleon Myristicæ.

Ph. Svec.

Ph. Germ. & Ph. U. St.: Oleum Myristicæ. Ph. Austr.: Oleum Nucis moschatæ. Ph. Brit.: Oleum Myristicæ expressum. Ph. Fr.: Beurre de muscade.

Balsamum Nucistæ.

M u s k a t b a l s a m.

Myristica fragrans Houttuyn (**M. moschata** Thunberg).

Myristiceæ. Arbor insularum Moluccensium, quæ etiam in India orientali colitur.

E seminibus a testa externa liberatis cum ætheroleo mixtum expressione obtinetur.

Solidum, colore aurantiaco, e flavescenti albido aut rubicundo variegato, odore et sapore nucis moschatæ.

Oleum Olivarum.

Ph. N. Ed. I.: Pingvoleon Oleæ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. Ph. Fr.: Huile d'Olivier. Ceteræ: Oleum Olivæ.

Olive n-Olie.

Olea Europæa L. Oleineæ. Arbor Europæ meridionalis indigena et culta.

E fructu expressione obtentum.

Sit limpidum, pallide flavum, odoris et saporis fere expers.

Præparata:

Emplastrum Cantharidum ordi-	Oleum camphoratum.
narium.	„ Chamomillæ infusum.
„ Meliloti.	„ Hyoscyami „
„ Oxydi plumbici.	Ungventum acetatis plumbici.
Emulsio oleosa.	„ basilicum flavum.
Linimentum ammoniacato-cam-	„ „ nigrum.
phoratum.	„ ceræ.

Oleum Palmæ.

Ph. N. Ed. I.: Pingvoleon Elaid.

Ph. Svec.

Ph. Fr.: Huile de palme.

P a l m e - O l i e.

Elais Guineensis *Jacquin.* **Palmæ.** Arbor Guineæ indigena, in regionibus calidis Americæ culta.

E fructibus vel coctione cum aqua vel expressione paratum.

Sit unguinosum, coloris aurantiaci, odoris violacei, non rancidi.

Servetur in vase bene clauso et ab lucis accessu remoto loco frigido.

Oleum Ricini.

Ph. N. Ed. I.: Pingvoleon Ricini.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Huile de Ricins. Ceteræ: Oleum Ricini.

A m e r i k a n s k O l i e.

Ricinus communis *L.* **Euphorbiaceæ.** Planta fruticosa Indiæ utriusque et Africæ meridionalis indigena, in Europa meridionali culta.

E seminibus expressione obtentum.

Sit limpidum, coloris expers aut subflavum, saporis mitis, in æquali portione spiritus concentrati calore 50° plane solubile. Quod rancidum est, rejiciatur; frigore ex parte concretum ne dispensetur nisi antea liqvefactum.

† Opium.

Ph. N. Ed. I.

Pharmacopœarum: Opium.

Papaver somniferum *L.* **Papaveraceæ.** Planta annua Orientis indigena et culta.

Succus lacteus e capsulis immaturis vulneratis exsudans, in aëre concreescens.

Placentæ variæ magnitudinis, plerumque paullum compressæ vel subglobosæ, Papaveris foliis involutæ et Rumicis ejusdam fructibus conspersæ. Recentes sunt molliores, intus pallide fuscæ, e granis vel lacrimis parvis constantes in discissione placentarum conspicuis; exsiccatae sunt obscuriores, fractura e rubro fusca, odore nauseoso, sapore amaro. In spiritu et in aqua ex parte solvuntur; cum aqua digestæ ne præbeant liquorem mucilagineum (amylum etc.).

Eligatur Opium, quod Levanticum vel Turcicum vocatur, neve dispensetur nisi bene siccatum et pulveratum, quod Morphini partes circiter decem (10) in partibus centum (100) continet.

Hoc ita dignosci potest:

Opii calore graduum 100 siccati et pulverati grammata decem (10) cum mixtione aquæ grammatum centum et quinquaginta (150) et acidi hydrochlorati grammatum decem (10) per horas duodecim macerentur. Quæ non soluta sint, in filtrum siccatum et ponderatum ingerantur, aqua destillata eluantur, calore graduum 100 siccantur. Pondus residui insoluti grammata quatuor et dimidium (4,5) ne excedat. Solutioni acidi hydrochlorati ope effectæ addantur grammata viginti (20) chloretri natrici, quibus solutis per horas viginti quatuor seponatur. Tum liquor filtretur, et præcipitatum inde effectum solutione saturata chloretri natrici in filtro eluatur. Liquori filtrato addatur tanta solutionis ammoniaci copia, ut odorem leviter ammoniacalem spargat, dein per horas viginti quatuor loco frigido seponatur. Crystalli, quæ secretæ erunt, colligantur et acido acetico diluto solvantur. Solutio filtretur, filtrum aqua destillata eluatur. Liquor filtratus, si pondus grammata octoginta (80) excedit, ad hoc pondus evaporetur, quo facto solutione ammoniaci supersaturetur et per horas viginti quatuor seponatur. Dein crystalli Morphini, quæ secretæ erunt, in filtrum siccatum et ponderatum imponantur, quam minima

copia aqvæ destillatæ eluantur, calore graduum 100 siccantur. Ne sit pondus earum minus quam unum gramma (1 gram.).

Caute servetur.

Dosis maxima: *Centigrammata quindecim* 0,15 gram.

Præparata:

Opium depuratum.

Liquor ophthalmicus circiter 1 : 1000.

Massa pilularum de Cynoglosso 2 : 15.

Pulvis Ipecacuanhæ opiatu 10 : 100.

Syrupus opiatu 1 : 1000.

Tinctura Opii 10 : 100.

„ „ benzoica 5 : 1000.

Vinum Opii 10 : 100.

„ „ crocatu 10 : 100.

† Opium depuratum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec.

Ph. Fr.: Extrait d'opium. Ceteræ: Extractum Opii.

Rp. Opii pulverati *partem unam* 1

Aqvæ *partes decem* 10.

Per viginti quatuor horas sæpius agitando macerata prelo exprimantur. Residuis partibus affundantur

Aqvæ *partes quinque* 5.

Per horas viginti quatuor iterum macerata exprimantur. Liqvores commixti et, ut partes turbantes subsidant, sepositi a sedimento defundantur, filtrentur, balneo aqvæ exsiccantur.

In aqua turbide solvatur.

Caute servetur.

Dosis maxima: *Centigrammata decem* . 0,10 gram.

Oxydum calcicum.

*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Calcaria usta. Ph. Austr.: Calcium oxydatum.**Ph. Brit. & Ph. U. St.: Calx. Ph. Fr.: Chaux vive.*

Calx viva.

Brændt Kalk.

Massæ albæ vel e cano albæ; dimidia fere ponderis sui parte aqvæ inspersæ incalescunt et in pulverem siccum dilabuntur; aëri expositæ aqvam et acidum carbonicum assumunt.

Servetur in vase bene clauso.

Præparatum:

Solutio hydratis calcici.

†† Oxydum hydrargyricum.

Hg O.

*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec.: Oxydum hydrargyricum & Oxyd. hydrarg. præcipitatum. Ph. Dan.*

Ph. Germ.: Hydrargyrum oxydatum rubrum & Hydrarg. oxydat. via humida paratum. Ph. Austr.: Hydrargyrum oxydatum flavum. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Hydrargyri oxidum flavum & Hydrarg. oxid. rubrum. Ph. Fr.: Oxyde rouge de Mercure.

Kviksølvoxyd.

1. Via sicca paratum.

Sit pulvis subtilissimus, ponderosus, e flavescenti ruber, in aqua vix, in acido hydrochlorato vel acido nitrico plane solubilis. Ignitus prorsus avolet nullo re-

siduo relicto; vapores rubros ne evolvat (acid. nitric.). Solutione acidi oxalici ne mutetur (oxydum hydrargyricum præcipitatum).

2. Via humida paratum.

Sit pulvis subtilissimus, ponderosus, pallide flavus, in acido hydrochlorato vel acido nitrico plane solubilis. Solutione acidi oxalici addita in oxalatem hydrargyricum transfertur album colorem assumens. Ignitus plane avolat nullo residuo relicto.

Servetur caute et a luce remotum.

Oxydum hydrargyricum via sicca paratum dispensetur, nisi oxydum hydrargyricum via humida paratum (præcipitatum) expresse præscriptum est.

Præparatum:

Ungventum oxydi hydrargyrici 5 : 100.

Oxydum magnesium leve.

Mg O.

Ph. N. Ed. I.: Oxydum magnesium.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Magnesia usta. Ph. Austr.: Magnesium oxydatum. Ph. Brit.: Magnesia levis. Ph. U. St.: Magnesia. Ph. Fr.: Magnésie calcinée.

Magnesia usta.

Let, brændt Magnesia.

Pulvis albus, levissimus, haud in aqua, facile in acidis solubilis. Acidis dilutis aut ne aut leviter modo effervescat (carbonates). Solutio acidulata solutione sulphidi hydrici ne turbetur (metalla). Solutio acido nitrico acidulata nitrate argentario vel chloreto baryeo aut nullam aut levem modo turbationem exhibeat (chloreta, sulphates).

V. **Hydratocarbonas magneticus** in crucibulo capaciore non vitreato, qvōd leviter modo obtegendum est, calefiat, donec acidum carbonicum et aqua omnino fugata sint. Hoc ita dignoscitur, si portiuncula massæ mediæ exempta et aqua superinfusa acido sulphurico diluto addito sine effervescētia solvitur.

Dispensetur, nisi Oxydum magneticum ponderosum expresse præscriptum est.

Oxydum magneticum ponderosum.

Mg O.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Brit.: Magnesia.

Tung, brændt Magnesia.

Pulvis albus ponderosior, haud in aqua, facile in acidis solubilis. Ad reagentia uti oxydum magneticum leve sese habeat.

Servetur in vase probe clauso.

V. Rp. **Sulphatis magnetrici** partes sex 6

Aqvæ destillatæ frigidæ partes duodeviginti 18.

Solutis addatur mixtio e

Carbonatis natrici partibus septem 7

et **Aqvæ destillatæ** frigidæ partibus viginti una 21

parata. Mixtio per dies aliquot loco frigidulo seponatur, donec præcipitatum primo ortum gelatinosum in pulverem crystallinum conversum sit, qvōd, liqvore defuso, aqua destillata frigida bene eluatur, in pannum linteum expansum imponatur, tum exprimatur et temperatura ordinaria siccetur.

Carbonas magneticus ita paratus in crucibulo non vitreato et leviter modo obtegendo tamdiu calefiat, donec portiuncula exempta acidis dilutis non effervescat.

† Oxydum plumbicum.

Pb O.

*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.*

Ph. Austr.: Plumbum oxydatum. Ph. Germ.: Lithargyrum (seu Plumbum oxydatum). Ph. Brit. & Ph. U. St.: Plumbi oxidum. Ph. Fr.: Oxyde de plomb fondu, Litharge.

Lithargyrum.

B l y o x y d.

Squamæ e rubro flavæ, crystallinæ, vel pulvis e rubro flavus, ponderosus. In acido nitrico aqua diluto aut nullo aut exiguo modo residuo relicto solvatur (minium), paululum modo effervesceat (carbonates). Si solutio acido nitrico acidulata solutione ammoniaci supersaturatur, liquor, qui præcipitato inde effecto albo innatat, colorem aut nullum aut leviter tantummodo cærulescentem induat (Cu).

In vase clauso caute servetur.

Præparata:

Emplastrum oxydi plumbici.

Solutio subacetatis plumbici.

„ „ „ diluta.

† Oxydum stibicum.

Sb₂ O₃.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Dan.*

Ph. Brit. & Ph. U. St.: Antimonii oxidum. Ph. Fr.: Oxyde d'antimoine par précipitation.

A n t i m o n o x y d.

Pulvis albus vel e flavescenti albidus, haud in

aqva, in solutione hydratis kalici vel acido hydrochlorato vel solutione acidi tartarici facile solubilis.

Si cum carbonate natrico sicco et cyaneto kalico sicco in tubo vitreo angusto igniveris, speculum metallicum volatile in tubi parte refrigerata ne oriatur (As). Solutio acido hydrochlorato acidulata solutione sulphidi hydrici abunde addita præcipitatum aurantiacum in solutione sulpho-hydratis ammonici prorsus solubile exhibeat (præcipitatum insolubile præsentiam plumbi vel cupri indicat). Si oxydum stibicum cum solutione carbonatis natrici digeritur, liqvor inde filtratus et acido nitrico abundanti acidulatus ne nitrate argentario neve chloreto baryeo turbetur (chloreto, sulphates).

Caute servetur.

- V. **Sulphuretum stibicum crystallisatum** et subtiliter pulvetatum cum **Acido hydrochlorato crudo** in patina porcellanea capaci concoqvatur, donec sulphidum hydricum prorsus fugatum sit. Solutio ita effecta et per aliquod tempus seposita filtretur et in patina porcellanea aut sub divo aut sub fumariolo vapores avidè attrahente evaporetur, donec portiuncula exempta refrigeratione obrigescat. Crystalli chloreto plumbici evaporatione forte exortæ removeantur. Massæ ita effectæ limpidæ pars una (1) in aqvæ calidæ partes quadraginta (40) inter agitandum infundatur. Sedimentum inde ortum decanthando elutum et aqvæ destillatæ sufficienti copia addita in pultem tenuem conversum tanta **Carbonatis natrici** copia digeratur, ut liqvor sit reactionis leviter alkalinae neque amplius evolvatur acidum carbonicum. Præcipitatum dein primum decanthando, tum impositum in linteum expansum exprimendo prorsus eluatur et leni calore adhibito siccetur.

Præparatum:

Kermes mineralis 10 : 100.

Oxydum zincicum.

Zn O.

*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Zincum oxydatum purum. Ph. Austr.: Zincum oxydatum. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Zinci oxidum.**Ph. Fr.: Oxide de Zinc par voie humide.***Z i n k o x y d.**

Ex hydratocarbonate zincico calefactione paratum.

Pulvis albus, ignitus flavescens, refrigeratus rursus albescens, haud in aqua, in acidis dilutis facile solubilis.

Ne effervescat acidis affusis (carbonates). Solutio acido hydrochlorato acidulata solutione sulphidi hydrici ne turbetur (Cu), alkalina præcipitatum album non coloratum præbeat (Mn, Fe). Si solutionem acidi hydrochlorati ope effectam solutione carbonatis ammonici supersaturaveris, præcipitatum inde ortum liqore præcipitanti abunde superinfuso solvatur (Ca).

Si cum aqua digeratur, liqor filtratus et acido nitrico acidulatus ne nitrate argentico neve chloreto baryeo præcipitatum exhibeat (chloreta, sulphates) neve evaporatus residuum relinquat (salia alkalina).

Servetur in vitro bene clauso.

V. Rp. **Carbonatis natrici** *partes undecim* 11**Aqvæ destillatæ** *partes centum* 100.

Solutis et ad ebullitionem calefactis inter agitandum addantur

Sulphatis zincici *partes decem* 10in **Aqvæ destillatæ** *partibus centum* 100

solutæ. Quum mixtio per aliquod tempus seposita fuerit, præcipitatum inde ortum primum decanthando quam optime eluatur, tum in sacculum linteum impositum aqua destillata plane eluatur et siccet. Hydratocarbonas zincicus ita

paratus in crucibulo leviter tecto igne non nimis forti calefiat, donec portiuncula exempta acidis dilutis additis non jam effervescat.

Præparatum:

Ungventum oxydi zincici 1 : 10.

Oxymel Scillæ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr. Ph. Fr.: Oxymel scillitique.

Strandløg-Honning.

Rp. **Aceti Scillæ** *partem unam* 1

Mellis depurati *partes tres* 3.

In balneo aquæ evaporentur, donec remaneant
partes tres 3.

Loco frigido servetur.

Petala Rosæ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec.: Petala Rosæ centifoliæ & Petala Rosæ Gallicæ.

Ph. Dan.: Flores Rosæ centifoliæ & Flores Rosæ Gallicæ.

Ph. Germ.: Flores Rosæ. Ph. Austr.: Rosa. Ph. Brit.: Rosæ centifoliæ petala & Rosæ Gallicæ petala. Ph. U. St.: Rosa centifolia & Rosa Gallica. Ph. Fr.: Rose à cent feuilles (Rose pâle), Rose rouge ou de Provins.

Rosenblade.

Rosa centifolia L. **Rosaceæ.** Frutex Orientis in Europa hortensis.

Petala pallide rubentia, odore gratissimo, sapore

subadstringenti. Colligantur plane evoluta; recentia cum æqvo pondere chloreti natrici condiantur.

† Phosphorus.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Phosphore. Ceteræ: Phosphorus.

P h o s p h o r.

Bacilli vel massæ, coloris expertes vel subflavidæ, diaphanæ, sub aqua per aliquod tempus servatæ superficie albescenti; aëri expositæ fumos odore alliaceo spargunt et facile accenduntur. Sub aqua ad caloris gradum quadragesimum quartum (44°) calefactæ in liqvore qvasi oleaceum liqvescunt; in aqua non solvuntur, in spiritu vel æthere parva ex parte, paullo magis in oleis vel ætheroleis, facilius in sulphido carbonico. Continent plerumqve sulphuris vel arsenii vestigia.

Servetur sub aqua in vitro bene clauso et capsula e ferro laminato parata incluso.

Dosis maxima: *Centigramma unum* . . 0,01 gram.

Pilulæ iodeti ferrosi.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Brit. & Ph. U. St.: Pilulæ Ferri iodidi. Ph. Fr.: Pilules de protoiodure de fer.

Pilulæ Blancardi.

J o d j e r n - P i l l e r.

Rp. Iodi grammata qvatuor	gram. 4,00
Ferri pulverati grammata duo	„ 2,00
Aqvæ grammata qvatuor	„ 4,00.

Ph. Norv. Ed II.

Ingestis in mortarium porcellaneum et, donec color fuscus evanuerit, agitatis admisceantur

Sacchari albi pulverati *grammata quatuor* gram. 4,00

Radicis Althææ pulveratæ *grammata duo* „ 2,00

„ **Glycyrrhizæ** pulveratæ *quantitas sufficiens.*

Formentur hinc pilulæ centum (100).

Ferro reducto conspergantur et solutione concentrata et ætherea balsami Tolutani irrorentur. Siccentur loco tepido.

Continent singulæ pilulæ iodeti ferrosi quinque centigrammata (0,05 gram.)

Pix Pini.

Ph. N. Ed. I.: Pix Pinorum solida.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Pix navalis. Ph. Fr.: Poix noire.

B e g.

Resina empyreumatica evaporatione **Pyrolei Pini** residua.

Nigra, opaca, in frigore fragilis, in calore lenta, in spiritu solubilis, odore pyroleo Pini simili.

Præparatum:

Charta antirheumatica.

Unguentum basilicum nigrum.

Pulpa Colocynthidum.

Ph. N. Ed. I.: Pulpa Colocynthidis.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Fructus Colocynthidis.

Ph. Germ.: Fructus Colocynthidis. Ph. Brit.: Colocynthidis pulpa. Ph. Austr. & Ph. U. St.: Colocynthis.

Ph. Fr.: Coloquinte.

Colokvinter.

Citrullus Colocynthis *Schrader* (**Cucumis Colocynthis** *L.*). **Cucurbitaceæ.** Planta annua regionis mediterraneæ orientalis.

Baccæ decorticatæ, globosæ, pomi fere magnitudine, carne levissima, spongiosa, albida, plurimis seminibus parietalibus.

Adhibeatur pulpa a seminibus liberata.

Dosis maxima: *Centigrammata viginti* . 0,20 gram.

Præparata:

Massa pilularum Colocynthidum compositarum . 12 : 100.

Tinctura Colocynthidum composita . 10 : 100.

Pulpa Tamarindorum cruda.

Ph. N. Ed. I.: Fructus Tamarindi.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Fructus Tamarindi crudus.

Ph. Germ.: Pulpa Tamarindorum cruda. Ph. Austr.,

Ph. Brit. & Ph. U. St.: Tamarindus. Ph. Fr.: Tamarins.

Tamarinder.

Tamarindus Indica *L.* **Cæsalpinieæ.** Arbor Indiæ orientalis et Ægypti indigena.

Pulpa e lomentis deprompta, seminibus fibrisque sæpius intermixta. Adhibeatur pulpa e fusco nigra, tenax, orientalis; rejiciantur et nigra, dura, quæ dicitur Ægyptiaca, et occidentalis, mollis, fusca, sæpe fermentata.

Præparatum:

Pulpa Tamarindorum depurata.

Pulpa Tamarindorum depurata.*Ph. N. Ed. I.: Pulpa Tamarindi.**Ph. Svec. Ph. Dan.: Pulpa Tamarindi.**Ph. Germ.: Pulpa Tamarindorum depurata. Ph. Austr. & Ph. Brit.: Tamarindus. Ph. Fr.: Pulpe de Tamarins.*

R e n s e d e T a m a r i n d e r.

Pulpæ Tamarindorum crudæ tanta affundatur aqvæ fervidæ copia, qvanta sæpius agitando ad massam æqvabilem et mollem formandam requiratur. Spathulæ ope per cribrum setaceum trajecta in vase porcellaneo vel alio vase idoneo ad syrupi spissioris consistentiam evaporetur.

Hujus massæ *partibus tribus* 3**Sacchari albi** pulverati *pars una* 1

admisceatur, qvo facto mixtio evaporetur, donec massa consistentiæ pultacæ parata sit.

Servetur in vase vitreo vel porcellaneo loco frigido et sicco.

Ferrum politum in massam immissum cupro ne inducatur

Præparatum:

Electuarium aperiens 4 : 15.

Pulvis ad fumigationes Chlorig.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec.: Species pro vaporibus Chlorig. Ph. Dan.: Pulvis pro vaporibus Chlorig.**Ph. Germ.: Fumigatio Chlorig. Ph. Fr.: Fumigation Guytonienne. Fumigation de Chlore.*

P u l v e r t i l C h l o r r ø g n i n g.

Rp. **Superoxydi manganici** nativi pulverati*partes quinque* 5**Chloreti natrici** venalis *partes decem* 10

Bene misceantur.

Grammata qvindecim (15 gram.), affusa æquali copia mixtionis ex acidi sulphurici crudi et aqvæ partibus æqualibus paratæ, ad spatium circiter 30 metrorum cubicorum fumigandum sufficiunt.

Pulvis effervescens.

Ph. N. Ed. I.: Pulvis ærophorus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Pulvis ærophorus Anglicus. Ph. Austr.: Pulvis ærophorus.

Ph. U. St.: Pulveres effervescentes.

Ph. Fr.: Poudre gazogène alcaline.

Bruse-Pulver.

Rp. **Bicarbonatis natrici pulverati**

grammata duo 2,00 gram.

Dentur in charta cærulea.

Rp. **Acidi tartarici pulverati**

gramma unum et dimidium 1,50 gram.

Detur in charta alba.

Ambo simul dispensanda sunt et dosin unam efficiunt.

Pulvis effervescens compositus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Pulvis ærophorus laxans. Ph. Austr.: Pulvis ærophorus Seidlitzensis.

Cfr. Ph. U. St.: Pulveres effervescentes aperientes.

Ph. Fr.: Poudre gazogène laxative.

Afførende Bruse-Pulver.

Rp. **Tartratis natrico-kalici pulverati**

grammata octo 8,00 gram.

Bicarbonatis natrici pulverati

grammata duo 2,00 gram.

Mixta in charta cærulea dentur.

Rp. **Acidi tartarici** pulverati

gramma unum et dimidium 1,50 gram.

Detur in charta alba.

Ambo simul dispensanda sunt et dosin unam efficiunt.

Pulvis Ipecacuanhæ opiatuſ vel Thebaicuſ.

Ph. N. Ed. I.: Pulvis Cephaëlidiſ opiatuſ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Pulvis Ipecacuanhæ Thebaicuſ.

Ph. Germ.: Pulv. Ipecacuanhæ opiatuſ (Opīi 10 0/0). Ph.

Auſtr.: Pulvis Doveri (Opīi 10 0/0). Ph. Brit. &

Ph. U. St.: Pulv. Ipecacuanhæ compoſituſ (Opīi 10 0/0).

Ph. Fr.: Poudre d'ipécacuanha opiacée (Poudre de Dower) (Extract. Opīi 9 0/0).

Pulvis Doveri.

D o v e r s P u l v e r .

Rp. **Radiciſ Ipecacuanhæ** 10

Opīi 10

ſingulorum parteſ decem,

Sulphatiſ kaliſi parteſ octoginta 80.

Seorſum pulverata miſceantur.

Pulvis Magnesiæ cum Rheo.

Ph. N. Ed. I.: Pulvis Magnesiæ compoſituſ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Pulvis Magnesiæ cum Rheo. Ph. Brit. & Ph.

U. St.: Pulvis Rheī compoſituſ.

B a r n e p u l v e r .

Rp. **Hydratocarbonatiſ magnesiſi** 1

Elæosacchari Foeniculi	1
Radiciſ Rhei	1
singulorum pulveratorum <i>partem unam.</i>	
Misceantur.	

Pulvis refrigerans.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan.

Cfr. Ph. Germ.: Pulvis temperans.

Kjø l e n d e P u l v e r.

Rp. Elæosacchari Citri	1
Nitratiſ kalici	1
<i>singulorum partem unam,</i>	
Bitartratiſ kalici partes sex	6.
Pulverata misceantur.	

Pyroleum animale rectificatum.

Ph. N. Ed. I.: Oleum animale rectificatum.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Pyroleum animale.

Ph. Germ.: Oleum animale æthereum. Ph. Fr.: Huile volatile de corne de cerf.

Ex **Pyroleo animali** crudo ad similem normam atqve ætheroleum Terebinthinæ rectificatum destillando paratum.

Sit limpidum, coloris expers vel subflavum, reactionis alkalinæ.

Loco obscuro servetur.

Præparatum :

Supercarbonas ammonicus pyroleosus.

Pyroleum Oxycedri. Oleum cadinum.

Ph. Svec.: Pyroleum Oxycedri. Ph. Dan.: Pyroleum Juniperi.
Ph. Germ.: Oleum Juniperi empyreumaticum. Ph. Austr.: Oleum cadinum. Ph. Fr.: Huile de Cade.

Em py re u ma t i s k E n e b æ r o l i e.

Juniperus Oxycedrus L. Coniferæ. Frutex Europæ meridionalis.

E ligno destillatione sicca paratum.

Sit spissiusculum, obscure fuscum, odoris simul juniperini et empyreumatici.

Pyroleum Petræ.

Ph. N. Ed. I.: Petroleum album.

Ph. Svec.: Pyroleum petræum. Ph. Dan.: Pyroleum Petræ.
Ph. Germ.: Oleum Petræ Italicum. Ph. Austr.: Petroleum rectificatum.

S t e n o l i e.

Liquor tenuis, limpidus, iridescens, coloris expers vel subflavus aut subruber, odoris proprii bituminosi, ponderis specifici 0,75—0,85, ex Asia et Italia advectus.

Cum æqvo volumine acidi sulphurici concentrati conqvassatus ne incalescat neve post quietem colore obscuriore imbutus appareat.

Cave, ne cum petroleo Americano vel ejus destillatis aut residuis confundas.

In lagenis bene clausis loco frigido servetur.

Pyroleum Pini. Pix liquida.

Ph. N. Ed. I.: Pix Pinorum liquida.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Pyroleum Pini.

Ph. Germ.: Pix liquida (seu Resina empyreumatica liquida).
Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph. U. St.: Pix liquida. Ph. Fr.: Goudron végétal.

T j æ r e.

E ligno **Pini** specierum sicca per descensum destillatione paratum.

Spissum, obscure fuscum, odoris empyreumatici, reactionis acidæ.

Præparata:

Aqua pyrolei Pini.

Charta antirheumatica.

Ungventum Sulphuris compositum.

Pyroleum Succini rectificatum.

Ph. N. Ed. I.: Oleum Succini rectificatum.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Pyroleum Succini.

Ph. Fr.: Huile volatile de Succin. Ceteræ: Oleum Succini rectificatum.

R e n s e t R a v o l i e.

E **Pyroleo Succini** crudo eadem ratione atqve ætheroleum Terebinthinæ rectificatum destillando parari potest.

Sit limpidum, coloris expers vel subflavum, reactionis neutrius vel subacidæ; in spiritus partibus duodecim (12) solubile. Quod spissum et fuscum factum est, rejiciatur.

Servetur loco obscuro.

Præparata:

Spiritus antiparalyticus.

Tinctura balsamica aromatica.

Radix Alkannæ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. Ph. Fr.: Orcanette.

Alkanna-Rod.

Alkanna tinctoria *Tausch.* (**Anchusa tinctoria** *L.*).

Asperifoliæ. Planta perennis Europæ australis et Asiæ minoris.

Radix cortice lamelloso, atropurpureo tecta; quæ cortice denudata est, rejiciatur.

Adhibetur ad præparationem:

Cerati rubri,

Tincturæ balsamicæ aromaticæ,

„ Digitalis rubræ.

Radix Althææ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Radix Althææ. Ph. Austr. & Ph. U. St.:

Althæa. Ph. Fr.: Guimauve.

Althæa-Rod.

Althæa officinalis *L. Malvaceæ.* Planta radice perenni Europæ mediæ et australis indigena et culta.

Radices secundariæ a cortice exteriori liberatæ, albæ vel subalbæ, structura fibrosa, sapore subdulci et mucilaginoso.

Præparata:

Pilulæ iodeti ferrosi.

Species demulcentes.

„ emollientes.

„ pectorales.

Syrupus Althææ.

Radix Angelicæ.*Ph. N. Ed. I.: Radix Archangelicæ.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. Ph. Austr.: Angelica. Ph. Fr.: Angélique officinale.*

Angelika-Rod. Kvanne-Rod.

Archangelica officinalis Hoffm. Umbelliferæ. Planta biennis vel perennis, in regionibus montosis Germaniæ mediæ spontanea et plerumque culta.

Radices longæ, molles, sulcatæ, e capite crasso subspongioso supra dense orientes, cortice crassiusculo, extus e cano fusco, intus albo et frequentibus receptaculis balsamiferis flavis instructo, ligno subflavo et radiato. Radix manducata os urit, odore est acri, sapore initio subdulci, deinde amaro et forti.

Radicem **Archangelicæ officinalis Fries**, plantæ in alpibus Norvegiæ frequentis, etiam adhibere licet.

Servetur in vase bene clauso.

Radix Artemisiæ.*Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Radix Artemisiæ. Ph. Fr.: Racine d'Armoise.*

Artemisia-Rod.

Artemisia vulgaris L. Synanthereæ. Herba radice perenni in Norvegia frequens.

Fibrillæ radicis, longiusculæ, flexibiles, ramosæ, sulcatæ, extus pallide fuscæ, intus albæ, e rhizomate cylindrico lignoso undiqve orientes.

Vere vel autumno colligendæ, sine lotionē mundatæ

celeriter siccandæ, in vase probe clauso nec ultra annum servandæ. In pulvere parando lignum centrale rejiciatur.

Radix Bardanæ.

Ph. N. Ed. I.: Radix Lapparum.

Ph. Dan.

Ph. Germ.: Radix Bardanæ. Ph. U. St.: Lappa. Ph. Fr.: Bardane.

Borre-Rod.

Lappa major *Gærtn.*, **L. minor** *De Cand.*, **L. tomentosa** *Lamarck.* (**Arctium Lappa** *L.* cum varietatibus). **Syn-anthereæ.** Plantæ biennes Europæ.

Radix longa, digitum fere crassa, extus rugosa, e cano fusca, intus pallidior, cortice crassiusculo, intus foraminibus quasi albo-tomentosis sæpe trajecto, ligno radiato, medulla tenui et nivea, saporis mucilaginosi, initio subdulcis, mox subamari. Prostat plerumque per longitudinem dissecta.

Præparatum:

Species decocti lignorum 20 : 100.

Radix Columbo.

Ph. N. Ed. I.: Radix Cocculi.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. Ph. Brit.: Calumbæ radix. Ph. Austr. &

Ph. U. St.: Calumba. Ph. Fr.: Colombo.

Columbo-Rod.

Cocculus palmatus *Wallich.* **Menispermaceæ.** Herba

scandens, radice perenni, in Africa meridionali spontanea, in India orientali culta.

Radix mucilaginosa, saporis amari, coloris e subviridi vel e subfusco flavi, in segmenta transversa suborbicularia dissecta.

Radix Cynoglossi.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan.

Ph. Fr.: Cynoglosse.

C y n o g l o s - R o d.

Cynoglossum officinale L. Asperifoliæ. Planta biennis Norvegiæ.

Radix longa, cylindrica, carnosæ, extus fusca, intus alba, ligno stellato, supra medulla spongiosa. Prostat sæpius dissecta, segmento sordido et e flavo fusco. Recens est odoris narcotici, siccata pæne nullius, saporis mucilaginosi et subdulcis.

Præparatum:

Massa pilularum de Cynoglosso 1 : 6.

Radix Gentianæ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Radix Gentianæ. Ph. Brit.: Gentianæ radix.

Ph. Austr. & Ph. U. St.: Gentiana. Ph. Fr.: Gentiane.

G e n t i a n a - R o d.

Gentiana purpurea L. Gentianæ. Herba radice

perenni in alpihus Norvegiæ meridionalis et occidentalis frequens.

Radix integra, prælonga et paullum ramosa, extus e cano fusca et longitudinaliter sulcata, intus subrufa, recens carnosa, siccata fragilis, saporis peramari.

Præparata:

Extractum Gentianæ.

Tinctura amara	3 : 100.
„ Chinae composita	3 : 70.
„ Gentianæ	20 : 100.
„ Rhei amara	4 : 100.

Radix Glycyrrhizæ.

Ph. N. Ed. I.: Radix Glycyrrhizarum.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Radix Glycyrrhizæ echinatæ & Radix Glycyrrhizæ glabræ.

Ph. Germ.: Radix Liqviritiæ glabræ & Radix Liqviritiæ mundata. Ph. Austr.: Liqviritia. Ph. Brit.: Glycyrrhizæ radix. Ph. U. St.: Glycyrrhiza. Ph. Fr.: Réglisse.

L a k r i t s - R o d.

Glycyrrhiza echinata L. et G. glabra L. Papilionaceæ. Suffrutices Europæ meridionalis, ille in Russia, Hungaria, Dalmatia, hic in Hispani, Italia, Sicilia spontaneus.

Radix a cortice liberata, coloris flavi, saporis dulcis.

Præparata:

Pilulæ iodeti ferrosi.

Species decocti lignorum.

„ demulcentes.

„ Juniperi.

Species pectorales.

Syrupus Althææ.

Tinctura Digitalis rubra.

Radix Ipecacuanhæ.

Ph. N. Ed. I.: Radix Cephaëlidis.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph. U. St.: Ipecacuanha. Ph. Fr.: Ipécacuanha annelé ou officinal.

B r æ k r o d.

Cephaëlis Ipecacuanha Willdenow. Rubiaceæ. Suffrutex repens Americæ meridionalis, præsertim in silvis humidis Brasilie frequens.

Radix flexuosa, annulis densis, incompletis, torosis verrucosa, cortice crasso, corneo, extus obscurius vel pallidius fusco, intus e flavo cinereo, facile a ligno tenui et albido separabili.

In pulvere parando lignum, quod circiter quartam ponderis partem ($\frac{1}{4}$) efficit, rejiciatur.

Præparata :

Pulvis Ipecacuanhæ opiatu 10 : 100.

Vinum Ipecacuanhæ 10 : 100.

Radix Pimpinellæ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. Ph. Fr.: Saxifrage.

P i m p i n e l l e - R o d.

Pimpinella saxifraga L. Umbelliferæ. Planta radice perenni Norvegiæ.

Radix plerumque simplex et recta, longitudinaliter sulcata, verrucosa, supra transverse rugosa, colore e subflavo fusco, ligno citrino, annulo obscuro a cortice duro separato, intus ductibus resinosis parvis et e fusco rubris instructo. Radix manducata os urit, sapore est subamaro, odore peculiari.

Præparatum :

Tinctura Pimpinellæ 20 : 100.

Radix Ratanhiæ.

Ph. N. Ed. I.: Radix Kramericæ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Radix Ratanhæ. Ph. Austr.: Ratanha. Ph. Brit.: Kramericæ radix. Ph. U. St.: Krameria. Ph. Fr.: Ratanhia.

R a t a n h i a - R o d.

Krameria triandra Ruiz & Pavon et **Kr. ixina** L. var. **Granatensis**. **Polygaleæ**. Fruticuli Americæ meridionalis, inprimis Peruviae et Boliviae.

Radix lignosa, infra ramosa, ramis longis cylindricis, cortice coloris cinnamomei vel e rubro violacei, sapore valde amaro et adstringenti.

Rejicienda est radix plus minusve decorticata.

Præparatum :

Tinctura Ratanhiæ 20 : 100.

Radix Rhei.

Ph. N. Ed. I.: Radix Rheorum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. Ph. Austr.: Rheum. Ph. Brit.: Rhei radix. Ph. U. St.: Rheum. Ph. Fr.: Rhubarbe de Chine.

R h a b a r b e r - R o d.

Rhei species ignotæ. **Polygonææ.** Plantæ perennes in partibus borealibus et mediis imperii Chinensis et in regno Thibetano sponte crescentes.

Segmenta radiceis multiformia, dura, ponderosa, omnino deglupta, extus lutea et plerumque pulvere conspersa, intus radiis alternatim rubris et albis multifariam contortis et intricatis variegata.

Frusta spongiosa colore viridiusculo vel e cano flavo rejicienda sunt.

Præparata:

Extractum Rhei.

Infusum Rhei alkalinum 25 : 200.

Pulvis Magnesiae cum Rheo 1 : 3.

Tinctura Rhei amara 10 : 100.

Radix Sarsaparillæ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. Ph. Brit.: Sarsæ radix. Ph. Austr. & Ph.

U. St.: Sarsaparilla. Ph. Fr.: Salsepareille du Mexique & S. du Honduras.

S a r s a p a r i l l e - R o d.

Smilacis species complures non satis determinatæ. **Smilacææ.** Suffrutices flexuosi, volubiles, in regionibus calidis Americæ spontanei.

Radices secundariæ cormo remotæ. Adhibenda est radix teres, medulla alba, farinosa et cortice crassiore instructa; radix e terra Mexicana advecta, profunde sulcata, medulla tenui, haud farinosa et cortice delabente prædita, nec minus quæ macilenta est, rejiciatur.

Radix Sassafras.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.*

Ph. Germ.: Lignum Sassafras. Ph. Brit.: Sassafras radix. Cfr. Ph. U. St.: Sassafras (cortex radice). Ph. Fr.: Racine de Sassafras.

Sassafras-Rod.

Sassafras officinalis *Nees v. Esenb. (Laurus Sassafras L.). Laurineæ.* Arbor in silvis regionum calidiorum Americæ borealis indigena.

Radicis frusta non nimis crassa, cortice adhærenti.

Præparatum:

Species decocti lignorum 20 : 100.

Radix Senegæ.*Ph. N. Ed. I.: Radix Polygalæ.**Ph. Svec. & Ph. Dan.*

Ph. Germ. Ph. Brit.: Senegæ radix. Ph. Austr. & Ph. U. St.: Senega. Ph. Fr.: Polygala de Virginie.

Senega-Rod.

Polygala Senega L. Polygalææ. Herba radice perenni regionum orientalium Americæ borealis.

Radix subcylindrica, basi tuberosa, ad apicem versus sensim attenuata, subramosa, incurvata, in interiore curvaturæ latere carina corticali arguta notata, in altero latere torosa, colore subflavo vel e cano fusco, cortice crassiusculo intus subflavo, ligno pallide flavo, odore debili; manducata fauces radit.

Præparatum:

Syrupus Senegæ 4 : 100.

Radix Serpentariæ.*Ph. N. Ed. I.: Radix Aristolochiæ.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Radix Serpentariæ. Ph. Brit.: Serpentariæ radix. Ph. U. St.: Serpentaria. Ph. Fr.: Aristoloche Serpentinaire.***Serpentaria-Rod.**

Aristolochia Serpentaria L. Aristolochiææ. Herba perennis in provinciis australibus Americæ borealis indigena.

Rhizoma horizontale flexuosum, supra reliquiis caulibus, infra radicibus frequentibus, tenuissimis, fragilibus, pallide fuscis instructum. Radix est sapore amaro, fricata odore camphoraceo.

Radix Taraxaci.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Radix Taraxaci (siccata) & Radix Taraxaci cum herba (recens). Ph. Brit.: Taraxaci radix. Ph. Austr. & Ph. U. St.: Taraxacum. Ph. Fr.: Racine de Pissenlit ou Dent de lion.***Løvetand-Rod.**

Taraxacum officinale Weber (Leontodon Taraxacum L.). Synanthereæ. Herba radice perenni totius Europæ vulgatissima.

Radix recens cum foliis primo vere colligenda; adhibetur ad extractum Taraxaci parandum.

Radix siccata colligatur autumnus.

Radix Valerianæ.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. Ph. Brit.: Valerianæ radix. Ph. Austr. &**Ph. U. St.: Valeriana. Ph. Fr.: Valériane sauvage.***Valeriana Rod.**

Valeriana officinalis L. Valerianæ. Planta perennis per totam fere Europam, etiam in Norvegia satis frequens.

Rhizoma usque ad duo centimetra crassum, interdum stoloniferum, radices undique emittens frequentes, longas, teretes, recentes albas, siccitas e cinereo fuscas, striatas, cortice intus subfusco, ligno tenui pallidiore, saporis amari et os urentis, odoris gravis, peculiaris.

Rhizoma una cum fibrillis radicalibus autumnò colligendum, sine lotionè humo liberandum et loco umbroso celeriter siccandum.

Servetur in vase bene clauso.

Præparata:

Tinctura Valerianæ 20 : 100.

„ „ ætherea 20 : 100.

† Ramuli Sabinæ.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Summitates Sabinæ. Ph. Brit.: Sabinæ ca-**cumina. Ph. Austr. & Ph. U. St.: Sabina. Ph. Fr.:**Sabine.*

Juniperus Sabina L. Coniferæ. Frutex Europæ meridionalis, apud nos interdum hortensis.

Ramuli novelli arcte condensati, foliis brevissimis, rigidis, rhombicis, in dorso glandula oleosa instructis, in

seriem quadruplicem imbricatim dispositis, ætate procedente longius inter se distantibus et acuminatis, odore gravi, sapore nauseoso, resinoso, amaro.

Colligantur tempore vernali, servantur caute in vase bene clauso et a luce remoto, nec ultra annum.

Dosis maxima: *Gramma unum*. 1 gram.

Resina Benzoë. Benzoë.

Ph. N. Ed. I.: Resina Benzoin.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Resina Benzoë.

Ph. Germ.: Benzoë (s. Resina Benzoë). Ph. Austr.: Benzoë. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Benzoinum.

Benzoë-Harpix.

Styrax Benzoin *Dryand. (Benzoin officinale Hayne).*

Styracææ. Arbor Indiæ orientalis et insularum Moluccensium.

Massa resinosa e trunco vulnerato prodiens, in aëre concreta.

Aut grana conglutinata, extus e flavo fusca vel e rubicundo flava, intus lactea et nitida, aut massæ compactæ, colore e rubro fusco, granis pallidioribus inspersis; odore sunt pergrato et vanillaceo.

Resina Benzoë, quæ dicitur de Sumatra vel de Penang, rejicienda est.

Præparata:

Axungia benzoata 2 : 100.

Tinctura Benzoës 20 : 100.

„ „ composita 12,5 : 100.

Resina Colophonium. Colophonium.*Ph. N. Ed. I.: Colophonium.**Ph. Svec. & Ph. Dan.: Resina Colophonium.**Ph. Germ.: Colophonium (s. Resina Colophonium). Ph. Austr.: Colophonium. Ph. Fr.: Colophone ou Arcanson.***Colophonium.****Pinus sylvestris** L. et aliæ **Pini** species. **Coniferæ.**
Arbores Europæ et Americæ borealis.

E balsamo arborum usque ad perfectam extricationem ætherolei et aquæ calefacto parata.

Sit ex albido flava vel e flavo fusca, diaphana, fragilis, saporis et odoris fere expers.

Præparata:

Charta antirheumatica.

Emplastrum Cantharidum colatum.

„ Meliloti.

Ungventum basilicum flavum.

„ „ nigrum.

Resina Guajaci.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. Ph. Austr.: Guajacum. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Guajaci resina. Ph. Fr.: Résine de Gayac.***Guajac-Harpix.****Guajacum officinale** L. **Zygophyllæ.** Arbor Indiæ occidentalis, præsertim insularum Jamaicæ et St. Domingo.

Resina e trunco arboris vel sponte stillans vel coqvendo cum aqua elicitæ.

Frusta extus subviridi pulvere conspersa, fragilia, fractura e flavo viridi, vitri splendore nitenti, in spiritu vel solutione hydratis kalici solubilia.

Præparatum:

Tinctura Guajaci ammoniacata 3 : 18.

† Resina Jalapæ.

Ph. N. Ed. I.: Resina Ipomæarum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Résine de Jalap. Ceteræ: Resina Jalapæ.

Jalapa-Harpix.

Resina e **Tuberibus Jalapæ** parata, sicca, fragilis, extus e flavo fusca, fractura nitenti et obscuriore, in spiritu plane, in æthere exigua ex parte solubilis.

Caute servetur.

Dosis maxima: *Centigrammata triginta* . 0,30 gram.

V. Rp. **Tuberum Jalapæ** in pulverem crassum contusorum
partem unam 1

Spiritus concentrati *partes duas* 2.

Macerentur in vase clauso per dies quinque. Liqore deinde per expressionem remoto, residuum cum

Spiritus concentrati *partibus duabus* 2

iterum maceretur et fortiter exprimatur; quo facto liqores spirituosi commixti et filtrati, addita aqvæ quarta eorum parte ($\frac{1}{4}$), destillando minuantur, ut subsidat resina, quæ aqua calida, donec hæc coloris expers defluat, eluatur, deinde in balneo aqvæ calefiat, usque dum portiuncula exempta refrigerando facile friabilis fiat. In bacillos formata vase bene clauso servetur.

Præparata:

Extractum Rhei compositum 15 : 100.

Massa pilularum resinæ Jalapæ 50 : 100.

Resina Mastix. Mastix.*Ph. N. Ed. I.: Resina Pistaciæ.**Ph. Svec. & Ph. Dan.: Resina Mastix.**Ph. Germ.: Mastix. Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph. U. St.: Mastiche. Ph. Fr.: Mastic.***M a s t i x.**

Pistacia Lentiscus *L. var. Chia De Cand. Terebinthaceæ Kunth. Anacardiaceæ Endl.* Arbor nana in insula Chio culta.

Succus e truncis ramisque sauciatis exsudatus et aëre induratus.

Grana subrotunda, pisi plerumque magnitudine, subflava, superficie pulverulenta, fractura vitri instar nitenti, pellucida, manducata mollescentia, in spiritu maxima ex parte solubilia.

Præparatum:

Emplastrum adhæsivum cum resina Mastiche.

Emplastrum Cantharidum cum Euphorbio.

Resina Pini flava.*Ph. N. Ed. I.: Resina Pinorum.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Resina Pini. Cfr. Ph. U. St.: Resina. Ph. Fr.: Poix-résine ou Résine jaune.***H a r p i x.**

Pinus sylvestris *L. et aliæ Pini species. Coniferæ.* Arbores Europæ et Americæ borealis.

Resina balsami arborum ad extricationem ætherolei cum aqua cocti residua.

Flava vel e fusco flava, opaca vel hic illic tantum diaphana, odore et sapore balsami Terebinthinæ.

Præparatum :
Emplastrum adhæsivum.

† Resina Podophylli. Podophyllum.

Ph. Brit. & Ph. U. St.: Podophylli resina.

P o d o p h y l l i n.

Podophyllum peltatum L. Podophylleæ. Planta perennnis Americæ borealis.

E rhizomate parata.

Pulvis pallide e subviridi vel e subfusco flavidus, odore et sapore peculiari, ingrato, non in aqua, facile in spiritu et æthere solubilis. Solutione ammoniaci addita colore viridiusculo tingitur.

Caute servetur.

Dosis maxima: *Centigrammata decem* . 0,10 gram.

Rhizoma Calami.

Ph. N. Ed. I.: Radix Acori.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. Ph. Austr. & Ph. U. St.: Calamus. Ph. Fr.: Acore vrai.

K a l m u s - R o d.

Acorus Calamus L. Aroideæ. Planta perennis Orientis, in paludibus Europæ quasi indigena.

Rhizoma subcylindricum, compressum, digitum fere crassum, extus subviride, subrubrum vel subfuseum, annulatum et inferne radicibus abscissis cicatricatum, intus albidum et propter canales aëriferos numerosos spongiosum, saporis amari et aromatici, odoris gravis et peculiaris.

Sero autumnno colligatur.

Rhizoma Filicis.

Ph. N. Ed. I.: Stipites Aspidii.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph. U. St.: Filix mas. Ph. Fr.: Fougère mâle.

B r e g n e - R o d.

Polystichum Filix mas Roth (Polypodium Filix mas L.). Polypodiaceæ. Filix in Norvegia frequens.

Rhizoma varia longitudine, ad centimetra duo et dimidium crassum, recens carnosum, siccatum spongiosum, intus colore viridi, paulatim cinnamomeo, instructum fasciculis vasorum majusculis ad annulum interruptum dispositis, tota superficie reliquiis petiolorum adscendentibus, angulatis, carnosius, extus e nigro fuscis, intus subviridibus obsitum, squamis paleaceis, fuscis dense tectum; sapor est dulcis et subamarus, odor peculiaris et nauseosus.

Rhizomata, quæ fracturam colore vel cinnamomeo vel fusco præbent, rejicienda sunt.

Colligatur autumno neve ultra annum servetur.

Præparatum:

Extractum Filicis.

Rhizoma Galangæ.

Ph. N. Ed. I.: Radix Alpinia.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.

G a l a n g a - R o d.

Alpinia species nondum cognita Chinensis. Scitamineæ.

Rhizoma digiti fere crassitudine, cylindricum, sæpe geniculatim inflexum, extus e rubro fuscum, intus colore cinnamomeo, sapore urenti et subamaro, odore peculiari.

Præparata :

Tinctura aromatica.

„ „ acida.

Rhizoma Iridis.

Ph. N. Ed. I.: Radix Iridis.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Rhizoma Iridis. Ph. Austr.: Iris. Ph. U.

St.: Iris Florentina & Iris versicolor.

Violrod.

Iris Florentina *L.* et **Iris pallida** *Lamarck.* **Irideæ.**
Plantæ perennes Europæ meridionalis indigenæ et cultæ.

Rhizoma decorticatum, articulosum, solidum, durum, colore subalbo, odore violaceo.

Rhizoma Zingiberis.

Ph. N. Ed. I.: Radix Zingiberis.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Rhizoma Zingiberis. Ph. Austr., Ph. Brit.

& Ph. U. St.: Zingiber. Ph. Fr.: Gingembre.

Ingefær.

Zingiber officinale *Roscoe* (**Amomum Zingiber** *L.*).
Scitamineæ. Planta perennis Indiæ orientalis indigena et culta.

Rhizoma decorticatum. Rejiciatur quod oxydo calcico vel chloro albissimum factum est.

Præparata:

Syrupus Sennæ mannatus.

Tinctura aromatica.

„ „ acida.

Saccharum lactis.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Sucre de lait. Ceteræ: Saccharum lactis.

Melkesukker.

Frusta vel crustæ, albæ, duræ, crystallinæ, interdum in cylindros coalitæ, saporis subdulcis, in aqvæ frigidæ partibus septem (7), haud in spiritu solubiles.

Adhibetur ad præparationem:

Extracti Aconiti,

„ Belladonnæ,

„ Hyoscyami.

Salicylas natrius.

Na C₇ H₅ O₃.

Salicylsurt Natron.

Pulvis albus crystallinus, saporis dulcis, dein acrioris, cum aqvæ æquali copia solutionem limpidam syrupi consistentiæ præbens, in spiritus partibus circiter octo solubilis.

Solutio aqvosa acido hydrochlorato addito præcipitatum album exhibeat (acidum salicylicum). Solutio spirituosa acido nitrico acidulata ne solutione sulphidi hydrici, neve chloreto barico, neve nitrate argentario præbeat præcipitatum (metalla, sulphates, chloreta).

† **Santoninum.***Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Fr.: Santonine. Ceteræ: Santoninum.***S a n t o n i n .**

Crystalli subtiles, coloris expertes, luci diutius expositæ flavescentes, in aqua vix, in spiritus concentrati partibus circiter quadraginta quatuor (44), in chloroformii partibus tribus (3) et in oleo Ricini solubiles. Cum hydrate kalico in spiritu soluto præbet liqvore coccineum, postea sensim in liquorem decolorem transeuntem. Ignitæ primum liqvescunt, tum nullo residuo relicto conflagrant.

Servetur caute in vitro a luce remoto.

Dosis maxima: *Centigrammata quindecim* 0,15 gram.

Præparatum:

Trochisci Santonini; singuli continent Santonini 0,03 gram.

Sapo albus oleaceus.*Ph. N. Ed. I.: Sapo Alicantinus.*

Ph. Svec.: Sapo albus Hispanicus. Ph. Dan.: Sapo albus oleaceus.

Ph. Germ.: Sapo medicatus & oleaceus. Ph. Austr.: Sapo medicinalis. Ph. Brit.: Sapo durus. Ph. U. St.: Sapo. Ph. Fr.: Savon amygdalin.

H v i d s p a n s k S æ b e .

Sapo natricus ex oleo Olivarum paratus.

Sit peralbus et durus, in aëre ne humescat neve efflorescat; ne sit odore rancido. In aqua et spiritu plane solvatur.

Præparata:

Massa pilularum resinæ Jalapæ.

Spiritus saponis camphoratus.

Sapo butyraceus.

Ph. Svec.: Sapo butyrinus. Ph. Dan.: Sapo butyraceus.

S m ø r s æ b e.

Sapo natricus e butyro paratus.

Sit albidus, odoris haud rancidi, in aqua et spiritu, residuo tantummodo exiguo relicto, solubilis.

Præparatum :

Linimentum Opodeldoc.

† Scammonium.

Ph. N. Ed. I.: Gummi-resina Convolvuli.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Resina Scammoniae. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Scammonium. Ph. Fr.: Scammonée d'Alep.

Convolvulus Scammonia L. Convolvulaceæ. Planta perennis, in Asia minore et Syria spontanea.

Succus lacteus e radice abscissa exsudans, in aëre induratus.

Frusta levia; sicca, colore e subviridi cinereo, fractura opaca, foraminibus parvis instructa, cum aqua trita emulsionem subviridem præbentia. Partes centum (100) contineant resinæ æthere solubilis partes minimum septuaginta quinque (75).

Dosis maxima: Centigrammata quinquaginta 0,50 gram.

Præparatum :

Massa pilularum Colocyntidum compositarum . 24 : 100.

Sebum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan.: Sebum ovillum.

Ph. Germ.: Sebum. Ph. Austr.: Sebum ovile. Ph. Brit.: Sebum præparatum. Ph. U. St.: Sebum.

T a l g.

Bos Taurus L. Capra Hircus L. Ovis Aries L.
Ruminantia.

Pingvedo horum animalium abdominalis, inprimis omenti, capsularum renalium et lumborum, minutim concisa, aqua elota, liqvata, dein colata.

Sit ad chartam exploratoriam indifferens.

Præparata:

Emplastrum adhæsivum.	Ungventum basilicum flavum.
„ Cantharidum colatum.	„ „ nigrum.
„ Meliloti.	„ Cantharidum.
Ungventum aromaticum.	„ Hydrargyri.

† **Secale cornutum.**

Ph. N. Ed. I.: Spermœdia.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Ergota.

Ph. Fr.: Ergot de Seigle.

M e l d r ø i e.

Claviceps purpureus Tulasne. Pyrenomyces. Fungus in floribus gramineis, præsertim Secalis cerealis, parasiticus.

Mycelia fungi (**Spermœdia clavus Fries**) obtuse trigona, plerumque subcurva, in utramque partem aut in superiorem tantum attenuata, trisulca, colore extus e nigro violaceo, interdum pruinosa et appendice sordide alba et molli ab apice instructa, intus colore e flavo albo, odore peculiari, sapore nauseoso. Adhibeantur ea sola, quæ in spicis Secalis cerealis nascuntur. Colligantur ante perfectam maturitatem Secalis cerealis, leni calore siccantur, in vase bene clauso neve ultra annum servantur.

Rejicienda sunt insectis corrosa, mucida vel quæ odorem ammoniacalem spargunt. Parvam modo copiam pulveris nec nisi nuper paratam habere licet.

Præparatum:
Extractum Secalis cornuti.

Semina Amygdali amara.

Ph. N. Ed. I.: Amygdalæ amaræ.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Semen Amygdali amarum.

Ph. Germ.: Amygdalæ amaræ. Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph. U. St.: Amygdala amara. Ph. Fr.: Amandes amères.

B i t r e M a n d l e r.

Amygdalus communis *L. var. amara De Cand.*
Amygdalæ. Arbor in regione mediterranea indigena et culta.

Semina a testa externa liberata. Cave, ne semina Amygdali dulcia immixta contineant.

Semina Amygdali dulcia.

Ph. N. Ed. I.: Amygdalæ dulces.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Semen Amygdali dulce.

Ph. Germ.: Amygdalæ dulces. Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph. U. St.: Amygdala dulcis. Ph. Fr.: Amandes douces.

S ø d e M a n d l e r.

Amygdalus communis *L. var. dulcis De Cand.*
Amygdalæ. Arbor in regione mediterranea indigena et culta.

Semina a testa externa liberata. Cave, ne semina Amygdali amara immixta contineant.

Præparatum:
Emulsio Amygdalarum.

Semina Cacao.

Ph. N. Ed. I.: Semina Theobromatum.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Semen Cacao.

Ph. Germ.: Semen Cacao. Ph. Fr.: Cacao.

C a c a o - B ø n n e r.

Theobroma Cacao L. et aliæ **Theobromatis** species.
Büttneriaceæ. Arbores in America calida spontaneæ et cultæ.

Semina majora, pingviora, fermentatione mitigata adhibenda sunt.

† Semina Colchici.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Semen Colchici.

Ph. Germ.: Semen Colchici. Ph. Austr.: Colchicum. Ph.

Brit.: Colchici semina. Ph. U. St.: Colchici semen.

Ph. Fr.: Semence de Colchique.

C o l c h i c u m - F r ö.

Colchicum autumnale L. **Colchicaceæ.** Planta bulbosa in Europa media et australi indigena.

Semina plane matura, subglobosa, cornea, extus obscure fusca, foveolato-punctata, nisi vetusta sunt subviscida, intus pallide grisea, saporis nauseosi et amari.

Caute servantur.

Præparatum :

Vinum Colchici 10 : 100.

Semina Cydoniæ.

*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. Ph. Dan.: Semen Cydoniæ.**Ph. Germ.: Semen Cydoniæ. Ph. Austr.: Cydonia. Ph.**U. St.: Cydonium. Ph. Fr.: Semence de Cognassier.*

K v æ d e k j e r n e r.

Cydonia vulgaris Persoon (Pyrus Cydonia L.). Pomaceæ. Arbor nana Orientis atqve Europæ meridionalis indigena, in Europa media culta.

Semina cuneata, angulata vel compressa, e rubro fusca. In aqua turgescunt et mucilagine emollita lubrica fiunt.

Præparatum:

Mucilago Cydoniæ.

† Semina Hyoscyami.

*Ph. N. Ed. I.**Ph. Dan.: Semen Hyoscyami.**Ph. Germ.: Semen Hyoscyami. Ph. U. St.: Hyoscyami semen.*

B u l m e u r t - F r ø.

Hyoscyamus niger L. Solanaceæ. Herba biennis Norvegiæ.

Semina plane matura, minima, compressa, subreniformia, foveolato-punctata, extus e cinereo subfusca, intus albida, saporis oleosi, amari.

Caute servantur.

Dosis maxima: *Centigrammata viginti* . 0,20 gram.

Præparatum:

Massa pilularum de Cynoglosso 1 : 15.

Semina Lini.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. Ph. Dan.: Semen Lini.**Ph. Germ.: Semen Lini. Ph. Brit.: Lini semina. Ph. Austr. & Ph. U. St.: Linum. Ph. Fr.: Semence de Lin.***Lin - Frø.****Linum usitatissimum L. Lineæ.** Planta annua apud nos frequenter culta.

Semina ovata, compressa, levia, nitida, fusca, saporis mucilaginei et oleosi. In aqua turgescunt et lubrica fiunt.

Præparatum:

Species emollientes 50 : 100.

† Semina Nucis vomicæ.*Ph. N. Ed. I.: Semina Strychni.**Ph. Svec. Ph. Dan.: Semen Nucis vomicæ.**Ph. Germ.: Semen Strychni. Ph. Austr., Ph. Brit.: & Ph. U. St.: Nux vomica. Ph. Fr.: Noix vomique.***Rævekager.****Strychnos Nux vomica L. Strychneæ.** Arbor Indiæ orientalis.

Semina discoidea, orbicularia, centro umbilicata, indumento sericeo e subflavo griseo pilorum adpressorum dense vestita.

Caute servantur.

Rasuram venalem adhibere non licet.

Dosis maxima: *Centigrammata viginti* . 0,20 gram.

Præparata:

Extractum Nucis vomicæ.

Tinctura " " 10 : 100.

Semina Qvercus.

Ph. N. Ed. I.: Semina Qvercuum.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Semen Qvercus.

Ph. Austr.: Qvercus. Ph. Fr.: Gland de chêne.

E g e n ø d d e r.

Qvercus pedunculata Ehrh. (Q. Robur L.). Q. sessiliflora Smith (Q. Robur β L.). Cupuliferæ. Arbores Norvegiæ meridionalis.

Semina plane matura; constant e cotyledonibus binis, oblongis, subplano-convexis, facile fissilibus, duris, extus reticulatis et fuscis, intus albis vel pallide flavis. Sapore sunt amaro et adstringenti.

Præparatum:

Semina Qvercus tosta.

Semina Qvercus tosta.

Ph. Dan.: Semen Qvercus tostum.

Ph. Germ.: Semen Qvercus tostum. Ph. Austr.: Qvercus (Semina Qvercus tosta).

E g e n ø d k a f f e.

Semina Qvercus probe siccata in vase ferreo apto inter continuam agitationem torreantur, donec fragilia facta sint et colorem fuscum induerint. Refrigerata et a pulvere subtili nigroque adhærenti liberata in pulverem grossiusculum redigantur. Pulvis ita paratus sit colore fusco, sapore subadstringenti.

Servetur in vase bene clauso.

Semina Sinapis nigræ.

Ph. N. Ed. I.: Semina Brassicæ.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Semen Sinapis nigræ.

Ph. Germ.: Semen Sinapis. Ph. Austr. & Ph. Brit.: Sinapis. Ph. U. St.: Sinapis nigra. Ph. Fr.: Moutarde noire.

Sort Sennep.

Sinapis nigra L. (Brassica nigra Koch, Brassica sinapioides Roth.). Cruciferæ. Planta annua per totam fere Europam indigena et frequenter culta.

Semina subglobosa, foveolato-punctata, extus e rubro fusca, intus flava, pulverem e flavo viridem præbentia, qvi aqua humectatus odorem acerrimum spargit; manducata primum sunt sapore oleoso, tum os vehementer urunt.

Sericum adhæsivum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Emplastrum adhæsivum Anglicum. Ph. Austr.: Emplastrum adhæsivum. Ph. Fr.: Sparadrap de colle de poisson. Taffetas d'Angleterre.

Engelsk Heftplaster.

Sit flexibile, madefactum cuti tenaciter adhærescat.

V. Rp. **Collæ piscium partes decem** 10

Aqvæ fervidæ partes centum et viginti. 120.

Fiat solutio, cujus, dum calida est, altera parte dimidia sericum expansum iterum atqve iterum illinatur, cura adhibita, ne solutio in aversam serici partem permeet, et ut singula strata siccata sint, priusquam iterum illinantur.

Alteri parti solutionis calefactæ addantur

Spiritus concentrati *partes quadraginta* . . . 40

Glycerini *pars una* 1,

qva mixtione sericum ratione jam supra exposita iterum
illinatur. Aversum serici latus tinctura Benzoës illinatur.

Serum lactis aluminatum

loco Seri lactis aluminati Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Serum lactis aluminatum (1 : 100).

A l u n - V a l l e.

Rp. **Lactis vaccini** recentis et cremore privati

partes ducentas 200

Sulphatis aluminico-kalici *partem unam* . . . 1.

Commixta et ad ebullitionem fere calefacta agitentur,
usque dum coagulatio perfecta sit; dein liquor coletur.

Ex tempore paretur.

Nota: Partes duæ (2) eandem quantitatem sulphatis alu-
minico-kalici continent ac partes tres (3) seri lactis
aluminati Ed. I.

Solutio acetatis Ammonici

loco Solutionis acetatis ammonici Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Liquor ammonii acetici (15 %). *Ph. Austr.:*

Ammonium aceticum solutum (15 %). *Ph. Brit.:*

Liquor Ammoniacæ acetatis (7 %). *Ph. U. St.: Liquor*

Ammonii acetatis (7 %). *Ph. Fr.: Acétate d'ammo-
maque liquide (17 %).*

Spiritus Mindereri.

Edikesur Ammoniak-Opløsning.

Rp. **Acidi acetici** *partes quinquaginta quatuor* . . . 54.
 Adde

Solutionis Ammoniaci *partes quadraginta sex* . . . 46
 aut tantum, ut acidum neutralisetur.

Partes centum (100) continent partes circiter viginti (20) acetatis ammoniaci.

Nota: Pars una (1) respondet partibus duabus (2) solutionis acetatis ammoniaci Ed. I.

Solutio acidi carbolici.

Carbolvand.

Rp. **Acidi carbolici** *partes duas* 2
Aqvæ destillatæ *partes centum* 100.
 Fiat solutio.

Solutio Ammoniaci.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: *Liquor Ammonii caustici (10 %)*. Ph. Austr.
Ammonia (10 %). Ph. Brit.: *Liquor Ammoniacæ (10 %)*.
 Ph. U. St.: *Aqua Ammoniacæ (10 %)*. Ph. Fr.: *Ammoniaque liquide (21 %)*.

Ammoniak. Salmiakspiritus.

Partes centum (100) contineant ammoniaci partes decem (10).

Liquor limpidus, coloris expers, plane volatilis, ponderis specifici 0,960. Solutio addita solutione sulphidi

hydrici ne turbetur neve tingatur (metalla: Pb, Cu), oxalate ammonico addito ne præbeat præcipitatum (Ca); in lagena clausa cum solutione hydratis calcici conqvasata aut neqvaqvam aut leviter modo turbetur (CO_2), acido nitrico abundanti acidulata ne nitrate argentario neve chloreto baryco turbetur (chloreto, sulphates). Solutio acido saturata odorem empyreumaticum ne spargat.

Solutionis gramma unum (1) solutionis acidi sulphurici exploratoriæ 59 CC. saturat.

Servetur in vitro epistomio vitreo clauso.

Adhibetur ad præparationem:

Linimenti ammoniacato-camphorati	40 : 100.
„ Opodeldoc	4 : 100.
Solutionis Acetatis ammonici	46 : 100.
„ Ammoniaci spirituosæ	50 : 100.
Spiritus ammoniacati anisati	175 : 1000.
„ antiparalytici	16 : 100.
Tincturæ Guajaci ammoniacatæ	5 : 18.

Solutio Ammoniaci spirituosa

loco Solutionis ammoniaci alcoholicæ Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Liquor ammonii caustici spirituosus (NH_3 10 %).

Rp. Solutionis Ammoniaci	50
Spiritus concentrati	50
<i>singulorum partes quinquaginta.</i>	

Misceantur.

Partes centum (100) continent partes quinque (5) ammoniaci anhydri.

Nota: Partes duæ (2) respondent parti uni (1) solutionis Ammoniaci alcoholicæ Ed. I.

Solutio Calcis chloratæ

loco Solutionis Calcarie chloratæ dilutæ Ph. N. Ed. I.

Cfr. Ph. Svec.: Liquor Calcis chloratæ (Calx chlorata 1, Aqva 20).

Ph. Brit.: Liquor Calcis chloratæ (Calx chlorata 1, Aqva 10).

Chloralk-Opløsning.

Rp. **Calcis chloratæ partes duas** 2.
Immitte in mortarium lapideum vel porcellaneum et pistillo assidue trituras sensim affunde

Aqvæ partes viginti 20.

Deinde filtratis adde

Aqvæ tantum,

quantum sufficiat ad obtinendam solutionem

partium centum 100.

Servetur in vase bene clauso.

Nota: Pars una (1) respondet partibus duabus (2) solutionis Calcarie chloratæ dilutæ Ed. I.

Solutio carbonatis kalici

loco Solutionis carbonatis kalici Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Liquor Kali carbonici (33,3 %). *Ph. Austr.:*

Kalium carbonicum solutum (33,3 %).

Kulsurt Kali-Opløsning.

Rp. **Carbonatis kalici puri partes viginti** 20

Aqvæ destillatæ partes triginta 30.

Solutis et filtratis addatur

Aqvæ destillatæ tanta copia,

quanta requiratur ad obtinendam solutionem

partium centum 100.

Nota: Pars una (1) respondet partibus duabus (2) solutionis carbonatis kalici Ed. I.

Præparatum:

Tinctura digestiva 1:3.

Solutio chloreth ferri

loco Solutionis chloreth ferri Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Liquor ferri sesquichlorati (Fe₂ Cl₆ 43,5 %).

Ph. Austr.: Ferrum sesquichloratum solutum. Ph.

Brit.: Liquor ferri perchloridi fortior (circit. 34 %).

Ph. U. St.: Liquor ferri chloridi (50 %). Ph. Fr.:

Solution officinale de perchlorure de fer (26 %).

Chlorjern-Opløsning.

Rp. Chloreth ferri 50

Aqvæ destillatæ 50

singulorum partes quinquaginta.

Fiat solutio.

Sit limpida, ponderis specifici 1,298—1,302.

Partes centum (100) continent chloreth ferri anhydri circiter partes triginta (30).

Nota: Pars una (1) respondet partibus tribus (3) solutionis chloreth ferri Ed. I.

Solutio chloreth ferri spiritiosa.

Ph. Svec. Cfr. Ph. Dan. (Fe₂ Cl₆ circit. 12 %).

Ph. Brit.: Tinctura Ferri perchloridi (Fe₂ Cl₆ circit. 8 %).

Cfr. Ph. U. St.: Tinctura ferri chloridi (Fe₂ Cl₆ circit. 12 %).

Tinctura ferri muriatici.

Chlorjern-Draaber.

Rp. Chloreth ferri partes decem 10

Spiritus diluti nonaginta 90.

Solvantur.

Servetur in vase non pellucido.

Partes centum (100) continent chloreth ferri anhydri circiter partes sex (6).

Solutio chloreti ferrici spirituosæ-æthereæ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: *Tinctura ferri chlorati æthereæ* ($\text{Fe}_2 \text{Cl}_6$ circit. 3 0/0).

Liquor anodynus martialis.

Rp. **Chloreti ferrici partes decem** 10
Ætheris spirituosæ partes nonaginta 90.

Mixtio in lagenis vitreis bene obturatis solis radiis exponatur, donec color e fusco flavus plane evanuerit et limpida fiat.

In vase epistomio vitreo bene clauso servetur.

Partes centum (100) continent chloreti ferrici anhydri circiter partes sex (6).

Solutio Chlorig.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: *Aqua chlorata.* *Ph. Austr.:* *Aqua chlorig.*

Ph. Brit.: *Liquor Chlorig.* *Ph. U. St.:* *Aqua chlorinii.*

Ph. Fr.: *Chlore dissous, Solution aqueuse de chlore.*

Liquor limpideus, e flavo viridis, plane volatilis, odoris pungentis, chartam exploratoriam statim decolorans colore rubro non ante exorto (acida).

Partes centum (100) contineant chlorig minimum partes 0,32, quod ita dignoscitur, si partes centum (100) solutionis commixtæ cum partibus duabus et dimidia ($2\frac{1}{2}$) sulphatis ferrosi in aqua et parva copia acidi sulphurici solutis præbent liquorem, qui guttas nonnullas solutionis hypermanganatis kalici additas non decoloret.

Servetur in lagenis parvis semperque repletis et epistomiis vitreis clausis loco obscuro et frigidulo.

V. Cucurbita vel retorta **Superoxydi manganici** frustis magnitudinem nucis Avellanæ fere adæquantibus repleatur,

quo facto tanta copia **Acidi hydrochlorati crudi** sed ab arsenico liberi affundatur, quanta ad dimidiam cucurbitæ partem replendam requiratur. Cucurbita ope epistomii suberini vel melius obturamento e resina elastica parato claudatur, per quod trajectus sit tubus vitreus curvatus, cujus altera extremitas in lagenam fere ad dimidiam partem aqua destillata caloris graduum decem (10^0) repletam porrigatur. Cucurbita calore balnei aquæ lente calefiat; quum superior pars lagenæ gase e flavo viridi repleta est, hæc lagena removenda et altera lagena item ad dimidiam partem aqua destillata repleta in ejus locum substituenda est. Lagena remota epistomio vitreo statim obturetur, deinde vehementer et assidue convassetur. Quum alterius lagenæ superior pars gase chlori repleta est, hæc lagena removeatur, prior substituatur et operationes supra expositæ reiterentur, quæ omnia tamdiu repetantur, donec aqua plus chlori recipere non possit.

Solutio hydratis calcici.

Ph. N. Ed. I.: Solutio oxydi calcici.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Aqua calcaria. Ph. Austr.: Aqua calcis. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Liquor calcis. Ph. Fr.: Eau de chaux.

Aqua calcis.

K a l k v a n d.

Rp. Oxydi calcici partem unam 1
Aqvæ partes centum 100.

Bene misceantur. Liquor subtrubidus in vas diligenter claudendum imponatur et inter agitationem pluries repetitam seponatur, ut partes turbantes subsidant. Priusquam dispensetur, solutio limpida defundatur vel cito et quantum fieri potest absque aëris accessu per chartam filtretur.

Sit liquor limpidus, coloris expers, reactionis alkalinae; calefactus vel per aliquod tempus aëri expositus turbetur.

Præparatum :

Linimentum calcicum 50 : 100.

† Solutio Iodi spirituosa. Tinctura Iodi

loco Solutionis Iodi alcoholicæ Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Solutio Iodi spirituosa.

Ph. Germ.: Tinctura Iodi (Iodi 10 0/0). Ph. Austr.: Tinctura Iodi (circit. 6 0/0). Ph. Brit.: Tinctura Iodi (Iodi circit. 2,5 0/0 & Iodeti kalici circit. 1 0/0). Ph. U. St.: Tinctura Iodini (circit. 6 0/0). Ph. Fr.: Teinture d'iode (circit. 8 0/0).

J o d t i n c t u r.

Rp. Iodi partes quinque 5
 Spiritus concentrati partes nonaginta quinque . 95.
 Fiat solutio.

Aut ex tempore aut exigua tantum copia paretur.

Caute servetur in vitro epistomio vitreo clauso.

Dosis maxima: *Guttæ viginti* (20).

Nota: Partes duæ (2) respondent parti uni (1) solutionis Iodi alcoholicæ Ed. I.

Solutio subacetatis plumbici.

Ph. N. Ed. I.: Solutio acetatis sesquiplumbici concentrata.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Liquor plumbi subacetici. Ph. Austr.: Plumbum aceticum basicum solutum. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Liquor plumbi subacetatis. Ph. Fr.: Sous-acétate de plomb liquide.

Acetum saturninum.

Blyedike.

Rp. Acetatis plumbici partes decem 10

Aqvæ destillatæ partes quadraginta sex 46.

Solvantur. Solutioni in lagenam immissæ admisceantur

Oxydi plumbici partes tres 3.

Mixtio inter agitationem sæpius repetitam in lagena obturata digeratur, donec oxydum plumbicum fere prorsus solutum sit, tum liqvor filtretur et in vitris bene clausis servetur.

Sit limpida, coloris expers, reactionis alkalinæ; aëri exposita acidum carbonicum attrahit, præcipitato albo exoriente. Solutione ammoniaci abunde addita liqvor, qui præcipitato inde effecto albo innatet, colore cæruleo ne tingatur (Cu).

Partes centum (100) continent subacetatis plumbici partes viginti (20).

Præparatum:

Solutio subacetatis plumbici diluta 2 : 100.

Solutio subacetatis plumbici diluta

loco Solutionis acetatis sesquiplumbici dilutæ Ph. N. Ed. I.

Ph. Germ.: Aqva plumbi Goulardi. Ph. Brit. & Ph. U.

St.: Liqvor plumbi subacetatis dilutus. Cfr. Ph. Fr.:

Lotion avec l'acétate de plomb.

Aqva Saturnina.

Blyvand.

Rp. Solutionis subacetatis plumbici partes duas 2

Spiritus diluti partes octo 8

Aqvæ partes nonaginta 90.

Misceantur.

†† Solutio sulphatis atropici.

Atropindraaber.

Rp. Sulphatis atropici partem unam 1
 Aquæ destillatæ partes ducentas 200.
 Fiat solutio.

† Solutio superiodeti kalici

loco Solutionis superiodeti kalici Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec.

Ph. Brit.: *Liquor Iodi* (Iodi 4 0/0, Iodeti kalici 6 0/0). Ph.

U. St.: *Liquor Iodini compositus* (Iodi circit. 4 0/0,
 Iodeti kalici circit. 8 0/0).

Rp. Iodi partem unam 1
 Iodeti kalici partes duas 2
 Aquæ partes nonaginta septem 97.
 Solvantur.

Caute servetur.

Nota: Partes decem (10) partem unam (1) solutionis
 superiodeti kalici Ed. I. fere adæquant.

Species amaræ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec.: *Species ad infusum amarum* (Fruct. Anisi stel-
 lati 1, Lign. Qvassiæ 1, Fol. Cardui benedicti 2).

Ph. Dan.: *Species pro thea amara* (sine ligno Guajaci).

Bitter The.

Rp. Ligni Guajaci rasi 25
 Fructuum Juniperi concisorum 25
 Foliorum Menyanthis concisorum 25
 " Sennæ " 25
 singulorum partes viginti quinque.

Misceantur.

Species decocti lignorum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec.: Species ad decoctum lignorum (Rad. Glycyrrhizæ 1, Rad. Saponariæ 2, Lign. Juniperi 4, Lign. Guajaci 6).

Ph. Dan.: Species pro decocto lignorum.

Cfr. Ph. Germ.: Species ad decoctum lignorum.

Rp. Fructuum Foeniculi contusorum partes duas . . .	2
Radicis Glycyrrhizæ concisæ partes sex . . .	6
Stipitum Dulcamaræ concisorum partes decem . . .	10
Radicis Bardanæ concisæ	20
„ Sassafras „	20
singularum partes viginti,	
Ligni Guajaci rasi partes quadraginta duas . . .	42.
Misceantur.	

Species demulcentes.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan.: Species pro thea demulcenti (Fruct. Foeniculi 1, Radic. Glycyrrhizæ 1, Radic. Althææ 4, Semin. Lini 4).

Cfr. Ph. Austr.: Species Althææ.

S l i m t h e.

Rp. Fructuum Cannabis contusorum	30
Herbæ Malvæ concisæ	30
Radicis Althææ „	30
singulorum partes triginta,	
Radicis Glycyrrhizæ concisæ partes decem . . .	10.
Misceantur.	

Species emollientes.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan.: Species pro cataplasmate emollienti (Herb. Malvæ 2, Herb. Meliloti 2, Flor. Chamomillæ vulgaris 2, Flor. Sambuci 2, Radic. Althææ 3, Semin. Lini 9).

Cfr. Ph. Germ. & Ph. Austr.: Species emollientes.

Blødgjørende Urter.

Rp. Florum Chamomillæ	10
„ Sambuci	10
Herbæ Malvæ	10
„ Meliloti	10
Radicis Althææ	10
singulorum concisorum <i>partes decem,</i>	
Seminum Lini contusorum <i>partes quinquaginta</i>	50.
Misceantur.	

Species Juniperi.

Ph. N. Ed. I.

Ene bærthe.

Rp. Fructuum Anisi concisorum	10
Radicis Glycyrrhizæ concisæ	10
singulorum <i>partes decem,</i>	
Fructuum Juniperi contusorum <i>partes octoginta</i>	80.
Misceantur.	

Species laxantes Hamburgenses.

Hamburgerthe.

Rp. Foliorum Sennæ concisorum <i>partes octo</i> . . .	8
Mannæ concisæ <i>partes tres</i>	3
Fructuum Coriandri contusorum	1
Bitartratis kalici pulverati	1
singulorum <i>partem unam.</i>	
Misceantur.	

Species laxantes St. Germain.

Ph. Dan.: Species pro thea St. Germain (Fruct. Anisi 5, Fruct. Foeniculi 5, Flor. Sambuci 10, Folior. Sennæ spiritu extractor. 16, Bitartrat. kalici depurati 4).

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Species laxantes St. Germain.

Ph. Fr.: Espèces purgatives ou Thé de Saint Germain.

St. Germain-The.

Rp. Fructuum Anisi	10
„ Foeniculi	10
singulorum contusorum partes decem,	
Florum Sambuci concisorum partes triginta .	30
Foliorum Sennæ Spiritu extractorum partes	
quadraginta	40
Misceantur. Adde in dispensando	
Bitartratis kalici pulverati partes decem . . .	10.

Species pectorales.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec.: Species ad infusum pectorale (Fruct. Anisi stellati 2, Flor. Verbasci 5, Radic. Althææ 10, Herb. Hyssopi 10, Herb. Cerefolii 20).

Ph. Dan.: Species pro thea pectorali (Fruct. Anisi stellati 2, Flor. Verbasci 3, Folior. Tussilaginis 3, Herb. Veronicæ 3, Radic. Glycyrrhizæ 3, Flor. Sambuci 4, Radic. Althææ 7).

Cfr. Ph. Germ. & Ph. Austr.: Species pectorales. Ph. Fr.: Espèces pectorales.

B r y s t t h e.

Rp. Fructuum Anisi partes decem	10
Florum Sambuci	15
„ Verbasci	15
Foliorum Farfaræ	15

Radicis Glycyrrhizæ	15
<i>singulorum partes quindecim,</i>	
Radicis Althææ partes triginta	30.
Concisa et contusa misceantur.	

Species resolventes

loco Ph. N. Ed. I. (Herba Menthæ crispæ loco Herbæ Menthæ piperitæ).

Ph. Svec.: Species ad fomentum resolvens (Fruct. Lupuli 1, Herb. Absinthii 1, Flor. Chamomillæ 1, Herb. Menthæ crisp. 2).

Ph. Dan.: (Herb. Absinthii 8, Herb. Origani 8, Herb. Menthæ piperit. 8, Herb. Melissæ 8, Flor. Chamomillæ 3, Flor. Lavandulæ 3, Flor. Sambuci 2).

F o r d e l e n d e U r t e r.

Rp. Herbæ Absinthii	20
„ Melissæ	20
Herbæ Menthæ piperitæ	20
„ Origani	20.
<i>singularum partes viginti,</i>	
Florum Chamomillæ	8
„ Lavandulæ	8
<i>singulorum partes octo,</i>	
Florum Sambuci partes quatuor	4.
Concisa misceantur.	

Spiritus ammoniacatus anisatus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Liquor ammonii anisatus.

Rp. <i>Ætherolei Anisi partes viginti quinque</i>	25
<i>Spiritus concentrati partes octingentas</i>	800
<i>Solutionis Ammoniaci partes centum septuaginta quinque</i>	175.

Misceantur.

Præparatum:

Liquor pectoralis	20 : 100.
-------------------	-----------

Spiritus antiparalyticus.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan.: (Ætherol. Terebinth. crudi 1, Pyrol. Succini rectificat. 1, Spirit. camphorat. 16, Liquor. Supercarbon. ammonic. pyroleos. 3, Solution. Ammoniaci 4).

Rp. <i>Ætherolei Juniperi</i>	4
<i>Pyrolei Succini rectificati</i>	4
<i>singulorum partes quatuor,</i>	
<i>Spiritus camphorati partes sexaginta</i>	60
<i>Solutionis Ammoniaci</i>	16
<i>Liquoris Supercarbonatis ammonici pyroleosi</i>	16
<i>singulorum partes sedecim.</i>	

Misceantur.

Sit turbidus, e fusco flavus, postea obscurior.

Spiritus camphoratus.

Ph. N. Ed. I.: Solutio camphoræ alcoholica.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Spiritus camphoratus (1 : 9). *Ph. Austr.:* Spiritus camphoratus (1 : 10). *Ph. Brit. & Ph. U St.:* Spiritus camphoræ (1 : 10). *Ph. Fr.:* Alcool camphré.

Campherspiritus.

Rp. **Camphoræ** contusæ *partes decem* 10
Spiritus diluti *partes nonaginta* 90.
 Solvantur.

Præparatum :

Spiritus antiparalyticus 60 : 100.

Spiritus concentratus.

Ph. N. Ed. I.: Alcohol rectificatissimum.

Ph. Svec. & Ph. Dan. Cfr. Ph. Dan.: Spiritus alcoholisatus (95—96 ‰).

Ph. Germ.: Spiritus (90—91 ‰). Ph. Austr.: Spiritus vini concentratus (90 ‰). Ph. Brit.: Spiritus rectificatus (84 ‰). Ph. U. St.: Alcohol (90 ‰).

Spiritus.

Sit limpidus, coloris expers, plane volatilis, reactionis neutralis, ponderis specifici 0,8311—0,8344, id quod indicat 91—90 alcoholis anhydri partes mensura dimensas in 100 partibus contineri.

Sit a fermentoleo plane liber.

Præparata, in quibus comparandis Spiritus concentratus adhibetur:

Acetum aromaticum,	Oleum Chamomillæ infusum,
Æther chloratus spirituusus,	„ Hyoseyami infusum,
„ spirituusus,	Solutio Ammoniaci spirituosa,
Collodium cantharidatum,	„ Iodi spirituosa,
Extractum Secalis cornuti,	Spiritus ammoniacatus anisatus,
Folia Sennæ Spiritu extracta,	„ Lavandulæ,
Linimentum Opodeldoc,	„ Rosmarini,
Liquor acidus Halleri,	Tinctura Asæ foetidæ.
Massa pilularum de Cynoglosso,	„ balsamica aromatica,

Spiritus tenuis.*Ph. N. Ed. I.: Alcohol tenue.**Ph. Svec. & Ph. Dan.: Spiritus tenuis (45—46 ‰).**Ph. Brit.: Spiritus tenuior. Ph. U. St.: Spiritus Frumenti „Whisky“ (48—56 ‰) & Spiritus Vini Gallici „Brandy“ (48—56 ‰).*

Sit limpidus, coloris expers, a fermentoleo liber, ponderis specifici 0,9348, id quod respondet alcoholis anhydri partibus mensura dimensis fere 50 in 100 partibus.

Spiritus Lavandulæ.*Ph. Svec. & Ph. Dan.: (destillatione paratus).**Ph. Fr.: Esprit de Lavande. Ceteræ: Spiritus Lavandulæ.***Lavendelspiritus.**

Rp. **Ætherolei Lavandulæ** partes duas 2
Spiritus concentrati partes nonaginta octo . . . 98.
 Solvantur.

Præparata :

Liquor Arseniitis kalici 5 : 100.
 Tinctura Lavandulæ composita 70 : 100.

Spiritus Rosmarini.*Ph. Svec. (destill.).**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Spiritus Rosmarini (destill.). Ph. Brit.: (mixt.). Ph. Fr.: Esprit de Romarin (destill.).***Rosmarinspiritus.**

Rp. **Ætherolei Rosmarini** partes duas 2
Spiritus concentrati partes nonaginta octo . . . 98.
 Solvantur.

Præparatum:

Tinctura Lavandulæ composita 30 : 100.

Spiritus Saponis camphoratus.

Ph. N. Ed. I.: Solutio Saponis alcoholica.

Ph. Svec.: (sine ætheroleo Origani Cretici paratus).

Ph. Dan.: (Ætheroleum Thymi loco ætherolei Origani Cretici).

Cfr. Ph. Germ.: Spiritus saponatus. Cfr. Ph. Austr.: Spiritus saponatus.

Cfr. Ph. U. St.: Linimentum saponis.

Spiritus saponatus.**S æ b e s p i r i t u s.**

Rp. **Saponis albi oleacei rasi partes sedecim 16**
Camphoræ contusæ partes tres 3
Spiritus diluti partes octoginta 80.

Solutis addantur

Ætherolei Origani Cretici 1

„ Rosmarini 1

singulorum pars una.

Solutio filtrata in vase probe clauso servetur.

Dispensetur limpidus.

Spongia cerata.

Ph. N. Ed. I.: Spongiæ ceratæ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Spongiæ ceratæ. Ph. Austr.: Spongia pressa.

Ph. Fr.: Éponges préparées à la cire.

P r e s s v a m p.

Spongiæ marinæ purgatæ et siccatae in frusta dissecantur, in ceram flavam liqvatam immergantur, prelo calefacto fortiter exprimantur, donec refrixerint, a cera superflua liberentur.

Spongia marina.*Ph. N. Ed. I.: Spongia.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Spongiæ marinæ. Ph. Fr.: Éponge fine.*

S v a m p.

Spongia officinalis L. Zoophytum maris mediterranei.

Ad usum medicum non dispensanda est nisi mundata, mollior, minoribus poris et lucidiore colore prædita.

Præparatum:

Spongia cerata.

Stigmata Croci.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Fr.: Safran. Ceteræ: Crocus.*

S a f r a n.

Crocus sativus L. Irideæ. Herba bulbosa orientalis, in Europa meridionali frequenter culta.

Stigmata siccata, subcaniculato-complanata, sensim dilatata, crispa, aurantiaca, plerumque stylo luteo brevissimo insidentia, odoris fragrantis, peculiaris, saporis subdulcis.

Præferenda sunt Gallica, quæ Gatinais vocantur; servantur a luce remota.

Præparata:

Massa pilularum de Cynoglosso.

Ungventum acetatis plumbici compositum.

Vinum Opii crocatum.

Stipites Dulcamaræ.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.: Stipites Dulcamaræ. Ph. Austr., Ph. Brit.
& Ph. U. St.: Dulcamara. Ph. Fr.: Douce-amère.***Solanum Dulcamara L. Solanaceæ.** Suffrutex sarmentosus Norvegiæ.

Caules et rami flexuosi, foliorum cicatricibus alternis notati, longitudinaliter striati vel sulcati, peridermate subviridi vel e subfusco flavo, a cortice tenui primo viridi, postea albo facile separabili, ligno primo viridi, postea subflavo, valde poroso, sapore primo amaro, dein dulci.

Colligendi sunt stipites autumnno post foliorum lapsum vel primo vere ante tempus florescendi.

Præparatum:

Species decocti lignorum 10 : 100.

Subnitras bismuthicus.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.*

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Bismuthum subnitricum. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Bismuthi subnitras. Ph. Fr.: Sous-nitrate de Bismuth.

Magisterium Bismuthi.

Pulvis albus crystallinus, in acido hydrochlorato vel acido nitrico plane et sine effervescentia solubilis. Si solutioni acidulatæ pulveris solutio sulphidi hydrici abunde affundatur et præcipitatum inde effectum filtroque collectum solutione sulpho-hydratis ammonici digeratur, liquor inde filtratus acido hydrochlorato abunde addito

præcipitatum flavum ne exhibeat (As, Sb). Liqvor a præcipitato solutione sulphidi hydrici effecto filtratus et evaporatus residuum in igne persistens ne relinqvat (metalla, Ca, Mg, K, Na). Solutio acido nitrico acidulata ne acido sulphurico diluto (Pb), neve nitrate argentario (chloreta) neve chloreto baryeo (acid. sulphuric.) turbetur. Pulvis acidis ne effervesceat (carbonates).

V. Rp. **Bismuthi** venalis *partes viginti* 20.

Nitratis kalici *partem unam* 1.

Seorsum subtilissime pulverata commisceantur et in crucibulum immittantur. Massa per horam inter assiduam agitationem liqvefacta, metallum liqvidum effundatur, a scoriis liberetur et vicesima sui parte ($\frac{1}{20}$) nitratis kalici addita eodem modo iterum tractetur.

Bismuthi hac ratione depurati et grosse pulverati

partes duæ 2

in cucurbitam, in qva insunt

Acidi nitrici *partes novem* 9,

sensim ingerantur. In metallo addendo prospiciendum erit, ne qva pars ante addatur, quam pars prius addita pæne soluta sit. Sub finem operationis vis acidi ope caloris balnei aqvæ augenda est.

Solutio seponatur, ut subsidat, tum limpide defundatur et ad crystallisationem evaporetur. **Crystallorum** ita paratarum *pars una* (1) cum **Aqvæ destillatæ** *partibus quatuor* (4) misceatur, qvæ mixtio in vas, in qvo insunt **Aqvæ destillatæ** ad caloris gradum 50 calefactæ *partes viginti una* (21), inter agitandum infundatur. Quum præcipitatum inde effectum subsederit, liqvor supernatans, ut primum refrigeratus est, defundatur, qvo facto præcipitatum in filtrum imponatur, aqvæ destillatæ parva copia eluatur, tum inter plagulas chartæ bibulæ, quamdiu hæ madefiunt, exprimatur et ad calorem gradus 40 non superantem siccetur.

Sulphas aluminico-kalicus. Alumen.K. $\text{Al}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$.

Ph. N. Ed. I.: Sulphas aluminico-kalicus crystallisatus.
Ph. Svec. & Ph. Dan.: Sulphas aluminico-kalicus.
Ph. U. St.: Aluminii et Potassii sulphas. Ph. Fr.: Sulfate d'Alumine et de Potasse, Alun. Ceteræ: Alumen.

A l u m e n.

Crystalli coloris expertes, subfatiscentes, sapore subdulci et adstringenti, in aquæ frigidæ partibus circiter sedecim (16), fervidæ partibus æqualibus ad solutiones reactionis acidæ solubiles. Solutio aquosa solutione sulphidi hydrici ne turbetur. Solutio ammoniaci abunde addita præcipitatum album et gelatinosum exhibet, quod solutione sulpho-hydratis ammoniaci addita aut ne aut leviter modo coloretur (Fe). Si sal vel solutionem ejus aquosam cum solutione hydratis natrici calefeceris, odor ammoniaci ne spargatur.

Præparata:

Serum lactis aluminatum 1 : 200.
 Sulphas aluminico-kalicus ustus.

Sulphas aluminico-kalicus ustus. Alumen ustum.

Ph. N. Ed. I.: Sulphas aluminico-kalicus siccus.
Ph. Svec.: Sulphas aluminico-kalicus ustus. Ph. Dan.: Sulphas aluminico-kalicus siccatus.
Ph. Germ. & Ph. Austr.: Alumen ustum. Ph. Brit.: Alumen exsiccatum. Cfr. Ph. U. St.: Alumen exsiccatum. Ph. Fr.: Sulfate d'Alumine et de Potasse desséché, Alun calciné.

B r æ n d t A l u m e n.


Massæ albæ, leves, spongiosæ, in aqua plane, sed

lente solubiles. Solutæ uti solutiones sulphatis aluminico-kalici se gerant.

Servetur in vase bene clauso.

- V. **Sulphatis aluminico-kalici** grosse contusi quantum vis in olla fictili capaciore non vitreata igne non nimis forti calefiat, donec aqua aufugerit, et massa spongiosa residua sit.

†† Sulphas atropicus.



Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Atropinum sulphuricum. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Atropiæ Sulphas. Ph. Fr.: Sulfate d'Atropine.

S v o v e l s u r t A t r o p i n.

Crystalli subtiles, tenues, nitentes aut pulvis albus, in aqua vel spiritu facile solubilis, solutiones reactionis neutrius exhibens. Solutio salis aquosa et concentrata solutionibus hydratis aut carbonatis kalici vel natriei præcipitatum album in liqvore præcipitante abunde affuso plane solubile exhibeat. Solutio unius partis (1) crystallo-
rum in aquæ partibus ducentis (200) alkaliis ne mutetur. Crystalli ignitæ nullo residuo relicto conflagrent.


Cautissime servetur.

Dosis maxima: *Milligramma unum* . 0,001 gram.

Præparatum:

Solutio sulphatis atropici 1 : 200.

Sulphas calcicus ustus.



Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Calcaria sulfurica usta.

B r æ n d t G i p s.

Pulvis albus, qvi aqva addita in pulvem redactus brevi tempore in massam duram obrigescit.

Servetur in vase bene clauso.

Sulphas chinicus.

$(C_{20} H_{24} N_2 O_2)_2 H_2 SO_4 \cdot 7 H_2 O.$

Ph. N. Ed. I.: Sulphas chininicus crystallisatus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Chininum sulphuricum. Ph.

Brit.: Quiniæ Sulphas. Ph. U. St.: Quiniæ Sulphas.

Ph. Fr.: Sulfate de Quinin.

S v o v e l s u r t C h i n i n .

Crystalli subtiles, graciles, flexibiles, qvæ in aëre sicco et calido sepositæ circiter 11,7 % ponderis sui perdunt, avolante maxima ex parte aqva crystallina. In aqvæ frigidæ partibus octingentis (800), fervidæ partibus triginta (30), spiritus partibus sexaginta (60), in æthere vix solvuntur. In aqva acido sulphurico acidulata facillime solvuntur. Solutiones sunt sapore peramaro, colore cærulescente; solutione ammoniaci addita præcipitatum album in æthere solubile exhibent (præcipitatum in æthere non solubile Cinchoninum indicat). Crystalli acido sulphurico concentrato et frigido affuso colorem rubrum ne induant (salicinum). Ignitæ nullo residuo relicto conflagrent.

Servetur in vase bene clauso.

Observe: Si copia aqvæ a medico præscripta ad solutionem efficiendam non sufficit, gutta una (1) acidi sulphurici diluti pro qvinis centigrammatibus (0,05 gram.) sulphatis chinici a pharmacopola addenda est.

† Sulphas cupricus.

Cu SO₄. 5 H₂ O.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Cuprum sulfuricum purum. Ph. Austr.:
Cuprum sulphuricum. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Cupri
Sulphas. Ph. Fr.: Sulfate de cuivre, Couperose bleue,
Vitriol bleue.

Svovelsurt Kobberoxyd. Kobbervitriol.

Crystalli cyaneæ, diaphanæ, in aqvæ frigidæ parti-
bus tribus et dimidia (3¹/₂), ebullientis partibus æqualibus
solubiles. Solutio cum solutione ammoniaci abundanti
commixta liqvoem prorsus limpidum et saturate cæru-
leum præbeat. Solutio, e qua cuprum solutionis sul-
phidi hydrici ope plane eliminatum est, evaporando re-
siduum in igne persistens ne relinquat.

Servetur caute.

Dosis maxima emetica: Centigrammata sexaginta

0,60 gram.

Sulphas ferrosus.

Fe SO₄. 7 H₂ O.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Ferrum sulfuricum purum. Ph. Austr.:
Ferrum sulphuricum. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Ferri
sulphas. Ph. Fr.: Sulfate de fer, Couperose verte,
Vitriol vert.

Svovelsurt Jernoxydul. Jernvitriol.

Crystalli pellucidæ, pallide viridiusculæ, prorsus
siccæ, in aqvæ frigidæ circiter partibus duabus (2), fer-

vidæ parte æquali, haud in spiritu solubiles. Solutio acidulata solutione sulphidi hydrici ne turbetur (Cu).

Servetur in vase probe clauso.

V. Rp. **Acidi sulphurici concentrati** *partes centum* 100
Aqvæ destillatæ *partes quadringentas* . . . 400.

In patina porcellanea caute mixtis sensim adjiciantur

Ferri in filis *partes sexaginta* 60

vel tanta copia, qvanta leni calefactione solvi potest.

Quum evolutio gasis desierit, liquor cum ferro abundanti per horas aliquot digeratur. Solutioni filtratæ **Acidi sulphurici concentrati** *pars una* (1) admisceatur, qvo facto ad crystallisationem evaporetur.

Crystalli exortæ et infundibulo collectæ primum parva copia aqvæ, dein spiritu diluto abluantur et inter chartæ bibulæ plagulas ad temperaturam aëris ordinariam qvam celerrime siccentur.

Præparata:

Massa pilularum tonico-nervinarum 1 : 3.

Mixtura Ferri composita circiter 2 : 300.

Sulphas kalicus.

$K_2 SO_4$.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Kali sulfuricum. Ph. Austr.: Kalium sulphuricum. Ph. Brit.: Potassæ Sulphas. Ph. U. St.: Potassii Sulphas.

Svovelsurt Kali.

Crystalli vel crustæ crystallinæ, coloris expertes, duræ, in aëre immutabiles, in aqvæ frigidæ partibus novem (9), fervidæ partibus qvatuor (4) solubiles. Solutiones ne solutione sulphidi hydrici neve carbonate ne

trico turbentur (metalla, Mg). Solutio acido nitrico acidulata nitrate argentario addito ne præbeat præcipitatum (chloreta).

Præparatum:

Pulvis Ipecacuanhæ opiatæ 80 : 100.

Sulphas magnesicus.

Mg SO₄. 7 H₂ O.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: *Magnesia sulfurica*. Ph. Austr.: *Magnesium sulphuricum*. Ph. Brit.: *Magnesiæ Sulphas*. Ph. U. St.: *Magnesiæ Sulphas*. Ph. Fr.: *Sulfate de magnésie*, *Sel de Sedlitz*, *Sel d'Epsom*.

S v o e l s u r M a g n e s i a. E n g e l s k S a l t.

Crystalli parvæ, coloris expertes, sapore amaro, in aquæ frigidæ partibus tribus (3), ebullientis parte una (1) solubiles. Solutio acidulata solutione sulphidi hydrici ne turbetur, solutio aqvosa, cui abundans copia solutionis ammoniaci et chlorethi ammoniaci addita est, solutione sulpho-hydratis ammoniaci ne præbeat præcipitatum (metalla). Solutio diluta aqvosa et acido nitrico acidulata nitrate argentario ne turbetur (chloreta).

†† Sulphas morphicus.

(C₃₄ H₁₉ N O₆)₂ H₂ SO₄. 5 H₂ O.

Ph. N. Ed. I.: *Sulphas morphinicus*.

Ph. Germ.: *Morfinum sulfuricum*. Ph. U. St.: *Morphiæ Sulphas*.

S v o e l s u r t M o r p h i n.

Crystalli albæ, sericeo-nitentes, fasciculatim coalitæ, in aqua et spiritu facile solubiles; acido nitrico frigido

Ph. Norv. Ed. II.

affusæ colorem e flavo rubrum induunt. Solutio aqvosa solutione hydratis natriei addita præcipitatum album præbeat, qvòd in solutione præcipitante abunde affusa plane solvatur (si præcipitatum non plane solvitur, narcotinum adesse putandum est), odorem ammoniaci ne spargat (salia ammoniacalia). Crystalli ignitæ nullo residuo relicto conflagrent.

Cautissime servetur.

Dosis maxima: *Centigrammata tria* . . 0,03 gram.

Sulphas natrieus.

$\text{Na}_2 \text{SO}_4. 10 \text{H}_2\text{O}.$

Ph. N. Ed. I.: Sulphas natrieus crystallisatus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Natrum sulfuricum. Ph. Austr.: Natrum sulphuricum crystallisatum. Ph. Brit.: Sodæ Sulphas.

Ph. U. St.: Sodii Sulphas. Ph. Fr.: Sulfate de Soude, Sel de Glauber.

Svovelsurt Natron. Glaubersalt.

Crystalli coloris expertes; in aëre sicco aqvam perdunt et fatiscunt; in aqvæ frigidæ partibus tribus (3), in aqvæ ad 33° calefactæ parte tertia ($\frac{1}{3}$), ebullientis partibus duabus qvintis ($\frac{2}{5}$) solubiles. Solutio acidulata solutione sulphidi hydrici ne turbetur, alkalina ne solutione sulpho-hydratis ammonici neve phosphate natrico præbeat præcipitatum (metalla, Mg). Solutio aqvosa diluta et acido nitrico acidulata nitrate argentario ne præcipitatum, vix turbationem levem exhibeat (chloreta).

Servetur in vase bene clauso.

† Sulphas zincicus.

 $\text{Zn SO}_4 \cdot 7 \text{ H}_2 \text{ O}.$ *Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Zincum sulphuricum. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Zinci Sulphas. Ph. Fr.: Sulfate de zinc, Couperose blanche, Vitriol blanc.*

S v o v e l s u r t Z i n k o x y d.

Crystalli coloris expertes, in aëre sicco fatiscentes aufugiente ex parte aqua crystallisationis, in aquæ parte æquali solubiles. Solutio acido hydrochlorato acidulata solutione sulphidi hydrici ne turbetur; solutio aqvosa solutione ammoniaci et sulpho-hydratis ammoniaci addita præcipitatum album, ne coloratum (Fe, Mn) exhibeat. Liquor a præcipitato inde effecto filtratus evaporatione residuum in igne persistens ne relinqvat (terræ alkalinae, alkalia). Solutio diluta aqvosa et acido nitrico acidulata nitrate argenteo præcipitatum ne præbeat (chloreta).

Servetur caute in vitro bene clauso.

Dosis maxima emetica: *Centigrammata sexaginta*

0,60 gram

- V. **Zincum** vel **Oxydum zincicum** venale in sufficienti copia **Acidi sulphurici diluti** leni calore adhibito solvatur. Solutio inde effecta cum zinco abundantiori per aliquot horas digeratur, tum filtretur et ad crystallisationem evaporetur. Crystalli exortæ calore gradus 30 non superante inter plagulas chartæ bibulæ siccentur.

Præparatum:

Liquor ophthalmicus circiter 4 : 1000.

Sulphidum stibicum.

Sb₂ S₃.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Stibium sulphuratum aurantiacum. Ph. Fr.: Soufre doré d'antimoine.

Sulphur auratum Antimonii.

G u l d s v o v e l.

Pulvis aurantiacus, odoris expers, in aqua et spiritu insolubilis. In solutione hydratis kalici plane solvatur. Si cum solutione bicarbonatis natrici conqvassetur, liquor filtratus, addito acido hydrochlorato abundanti, præcipitatum flavum ne exhibeat (As₂ S₃). Si cum solutione acidi tartarici frigida et diluta conqvasatum sit, liquor filtratus, addita solutione sulphidi hydrici, aut nullum aut levissimum modo præcipitatum coloris aurantiaci præbeat (Sb₂ O₃). Aqua, quacum digeratur et filtretur, sit ad chartam exploratoriam indifferens neve nitrate argentario neve chloreto baryco turbetur (chloreta, sulphates).

Servetur in vitro bene clauso et a luce remoto.

V. Rp. **Carbonatis natrici crudi** partes centum . . . 100
Aqvæ partes quadringentas . . . 400.

In cacabo ferreo solutis et ad ebullitionem calefactis addantur **Oxydi calcici** partes triginta (30) cum quadruplice sui copia aquæ in massam pultariam antea conversæ. Mixtio per dimidiam horam coqvatur, tum addantur **Sulphuris sublimati** partes decem (10). Omni sulphuri soluto admisceantur **Sulphureti stibici crystallisati** subtiliter pulverati partes viginti (20). Tum inter agitationem assiduam et aquam evaporatione dissipatam restituendo coqvatur, donec color cinereus mixtionis evanuerit. Quo

facto per aliquod tempus seponatur, liquor limpidus defundatur et pars residua cum aquæ partibus ducentis (200) iterum decoquatur atque filtretur. Liqvores ita obtenti commisceantur et ad crystallisationem evaporentur. Crystalli inde ortæ in infundibulum imponantur et aqua destillata, cui additum est pauxillum solutionis hydratis natrici, abluantur.

Harum crystallorum partes viginti quinque (25) in Aquæ destillatæ partibus centum et quinquaginta (150) solvantur. Solutio, si turbida sit, filtrata **Aquæ destillatæ partibus ducentis (200)** diluatur et in mixtionem refrigeratam ex **Acidi sulphurici concentrati partes octo (8)** et **Aquæ destillatæ partibus centum et quinquaginta (150)** paratam inter assiduam agitationem infundatur. Præcipitatum inde effectum aqua destillata abluatur, donec liquor defluens reactionem acidam non præbeat; tum in solutionem frigidam paratam e **Bicarbonatis natrici partibus duabus (2)** et **Aquæ destillatæ partibus quadraginta (40)** immissum per biduum maceretur. Deinde præcipitatum in filtro collectum aquæ destillatæ ope prorsus eluatur, tum inter plagulas chartæ bibulæ expressum loco tepido quam citissime siccetur.

Sulphur præcipitatum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Fr.: Soufre précipité. Ceteræ: Sulphur præcipitatum.

Lac sulphuris.

S v o v e l m e l k.

Sit pulvis subtilissimus, pallide flavus, odoris pæne expers, ignitus nullo residuo relicto conflagrans. Si grammata quinque (5) pulveris cum solutionis ammoniaci

grammatibus decem (10) digesseris, liqvor inde filtratus et, acido hydrochlorato abunde addito, per aliquod tempus sepositus præcipitatum ne exhibeat (As). Si pulvis cum aqua conqvassatur, liqvor inde filtratus chartam exploratoriam ne permutet, neve oxalate ammonico (Ca) neve nitrate argentario (acid. hydrochlorat.) neve chloreto baryeo (acid. sulphuric.) præcipitatum exhibeat.

Servetur in vase bene clauso.

V. Rp. **Oxydi calcici** *partem unam* 1
Aqvæ *partes quinque* 5.

In lebetem ferreum capaciorem ingestis et in massam pultaceum conversis addantur

Sulphuris sublimati *partes duæ* 2
 et **Aqvæ** *partes viginti quinque* 25.

Tum mixtio parata inter agitationem perpetuam per horam coqvatur, dum aqua evaporata subinde substituatur. Liqvor dein per aliquod tempus sepositus limpide defundatur, partes, qvæ residuæ sint, cum aquæ partibus quindecim (15) per dimidiam hōram coqvantur, quo facto liqvor item limpide defundatur vel filtretur. Liqvoribus limpidis in vase capaciore commixtis tanta copia mixtionis ex **Acidi hydrochlorati** et **Aqvæ** *partibus æqualibus* inter agitandum affundatur, ut liqvor reactionem leviter modo alkalinam præbeat. Tum præcipitatum quiete subsidens a liqvore supernatante defundendo celeriter separetur, aqua destillata affusa et iterum defusa lavetur, dein in sacculum linteum ingestum prorsus eluatur, tum exprimatur et calore gradus 35 non superante qvam citissime siccetur. Si præcipitatum elotum colorem obscuriorem præbet, quod portiunculam sulphureti ferrosi immixtam indicat, præcipitatum istud, anteqvam siccetur, cum acido hydrochlorato diluto terendum et denuo prorsus eluendum est.

Sulphur sublimatum.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. Ph. Dan.: Sulphur sublimatum venale.**Ph. Germ.: Sulfur sublimatum. Ph. Brit., Ph. U. St. & Ph. Austr.: Sulphur sublimatum. Ph. Fr.: Fleur de soufre.***Flores sulphuris.****S v o v e l b l o m m e.**

Pulvis citrinus, in aqua insolubilis; ignitus nullo fere residuo conflagret. Aqua, quacum digesseris, reactionem plerumque acidam præbet.

Præparata:

Sulphur sublimatum elotum.

Ungventum sulphuris compositum 15 : 100.

Sulphur sublimatum elotum.*Ph. Svec. Ph. Dan.: Sulphur sublimatum.**Ph. Germ.: Sulfur depuratum. Ph. U. St.: Sulphur lotum. Ph. Fr.: Fleurs de soufre lavées.***R e n s e t S v o v e l b l o m m e.**

Pulvis subtilis, citrinus, siccus, in aqua insolubilis; ignitus residuo fere nullo relicto conflagret. Aqua, quacum digesseris, reactionem acidam ne præbeat. Si pulveris grammata quinque (5) cum grammatibus decem (10) solutionis ammoniaci digesseris, liquor filtratus, acido hydrochlorato et solutione sulphidi hydrici abunde additis, ne exhibeat præcipitatum (As).

Servetur in vase bene clauso.

V. **Sulphur sublimatum** cum aqua destillata, cui admixta est duodecima pars ($\frac{1}{12}$) **Solutionis Ammoniaci**, teratur et

in massam pultariam conversum per biduum digeratur; dein massa aqua destillata prorsus eluatur et siccata per cribrum trajiciatur.

Sulphuretum stibicum amorphum.

$Sb_2 S_3$.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Brit. & Ph. U. St.: Antimonium sulphuratum.

Pulvis subtilissimus, e rubro fuscus, non in aqua, facile in acido hydrochlorato sub evolutione gasis sulphidi hydrici solubilis. Sit in solutione hydratis natriaci prorsus solubile. Si pulverem cum solutione acidi tartarici diluta digesseris, liqvor inde filtratus solutione sulphidi hydrici addita turbationem tantummodo levissimam e flavo rubram præbeat ($Sb_2 O_3$). Si mixtionem e pulveris parte una (1) et nitratis natriaci partibus quatuor (4) in crucibulo porcellaneo combusseris, massa residua cum aqua digesta et filtrata et acido nitrico accurate saturata, nitrato argentario addito, ne præcipitatum e fusco rubrum exhibeat (As). Aqua, quæcum pulvis conqvassetur, sit ad chartam exploratoriam indifferens neve nitrato argentario neve chloreto baryeo turbetur (chloreta, sulphates).

Servetur in vitro bene clauso.

V. Rp. **Sulphureti stibici crystallisati** subtilissime pulverati
partem unam 1,

Solutionis hydratis kalici (continentis hydratis kalici circiter 20 0/0, quod ponderi specifico 1,25 respondet)

partes quatuor 4,
Aqvæ partes quindecim 15.

In lebetes ferreo vel patina porcellanea per dimidiam horam inter agitationem assiduam concoquantur; tunc addantur

Aqvæ bullientis partes quinquaginta 50,

quo facto filtretur et residuum aqua calida eluatur. Liquor ita obtentus in mixtionem antea paratam

Acidi hydrochlorati crudi (pondere specifico 1,165)
partium duarum 2

et **Aqvæ partium viginti** 20
 inter agitandum infundatur. Inter hoc providendum est, ut liquor, præcipitatione peracta, acide reagat. Præcipitatum inde effectum aqua destillata eluatur, dein cum solutione frigida ex

Bicarbonatis natrici parte una 1

et **Aqvæ destillatæ partibus viginti** 20
 parata per biduum maceratum in colatorium linteum imponatur et aqua destillata prorsus eluatur, tum exprimatur et loco tepido et obscuro siccetur.

Præparatum:

Kermes mineralis 90 : 100.

Sulphuretum stibicum crystallisatum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec.: Sulphuretum stibicum crudum. Ph. Dan.: Sulphuretum stibicum.

Ph. Germ.: Stibium sulfuratum crudum. Ph. Austr.: Stibium sulphuratum nigrum. Ph. Brit.: Antimonium nigrum (lævigat.). Ph. U. St.: Antimonii Sulphuretum (lævigat.). Ph. Fr.: Sulfure d'antimoine.

Antimonium crudum.

Crystalliseret Svovelantimon.

Frusta ponderosa, e nigro grisea, fractura radiatim crystallina, in aqua insolubilia; subtiliter pulverata in acido hydrochlorato maxima ex parte sub effervescencia gasis sulphidi hydrici solvantur. Solutio acidi hydro-

chlorati ope effecta evaporando vel spiritum addendo aut nullas aut perpaucas modo crystallos demittat (Pb), cum solutione ammoniaci supersaturata et filtrata colorem aut nullum aut leviter modo cærulescentem præbeat (Cu). Sit ab arsenio, quantum fieri potest, liberum, quod eadem ratione agnosci potest, quæ in sulphureto stibico amorpho commemorando exposita est.

Supercarbonas ammonicus.

Ph. N. Ed. I.: Sesquicarbonas ammonicus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Ammonium carbonicum. Ph. Brit.: Ammoniac carbonas. Ph. U. St.: Ammonii carbonas.

Kulsur Ammoniak. Hjortetaksalt.

Massæ albæ, subdiaphanæ, duræ, crystallinæ, in superficie sæpius pulvere albo tectæ, odoris fortis ammoniacalis, in aquæ partibus quatuor (4) solubiles; ignitæ plane avolent. Solutio acido nitrico acidulata ne solutione sulphidi hydrici (metalla, Pb) neve chloreto baryco præcipitur; nitrato argentario addito aut nullam aut exiguum modo turbationem præbeat (chloreta).

Servetur in vase bene clauso.

Præparatum:

Supercarbonas ammonicus pyroleosus.

Supercarbonas ammonicus pyroleosus.

Ph. N. Ed. I.: Sesquicarbonas ammonicus pyro-oleosus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Ammonium carbonicum pyro-oleosum. Ph. Fr. Carbonate d'ammoniaque empyreumatique.

Rp. **Supercarbonatis ammonici pulverati**
partes nonaginta septem 97.

Terendo sensim admisceantur

Pyrolei animalis rectificati *partes tres* 3.

Præparata:

Liquor succinatis ammonici pyroleosi.

„ supercarbonatis ammonici pyroleosi 1 : 7.

Superoxydum manganicum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Manganum hyperoxydatum. Ph. Austr.: Manganum hyperoxydatum nativum. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Manganesii Oxidum nigrum. Ph. Fr.: Oxyde de Manganèse ou Peroxyde de Manganèse.

M a n g a n h y p e r o x y d. B r u n s t e n.

Pulvis vel massæ crystallinæ, ponderosæ, e cano atræ, cum acido hydrochlorato ignitæ chlorum copiose evolventes.

Adhibetur ad præparationem:

Ætheris chlorati spirituosus,

Pulveris ad fumigationes chlori.

Syrupus Althææ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr. Ph. Fr.: Sirop de Guimauve.

A l t h æ a - S y r u p.

Rp. Radicis Althææ concisæ	2
„ Glycyrrhizæ concisæ	2
<i>singularum partes duas.</i>	
Per hor m macerentur cum	
Aqvæ tanta copia, qvanta ad colaturam	
<i>partium quadraginta</i>	40
expressione omissa obtinendam requiratur.	
Liquori in balneo aqvæ calefacto addantur	
Sacchari albi <i>partes sexaginta</i>	60.

Syrupus Aurantii.

Ph. Svec. & Ph. Dan. (sine spiritu).
Ph. Germ.: Syrupus Aurantii corticis. Ph. Austr.: Sy-
rupus Aurantiorum corticum. Ph. Brit.: Syrupus
Aurantii. Cfr. Ph. U. St.: Syrupus Aurantii corticis.
Ph. Fr.: Sirop d'Orange.

Pommerants-Syrup.

Rp. Tincturæ Aurantii <i>partes decem</i>	10
Syrupi sacchari <i>partes nonaginta</i>	90.
Misceantur.	

Syrupus iodeti ferrosi.

Ph. N. Ed. I.: Solutio iodeti ferrosi saccharata.
Ph. Svec. & Ph. Dan.
Ph. Germ.: Syrupus ferri iodati (iodeti ferrosi circiter 5 %).
Ph. Austr.: Syrupus ferri iodati (12 %). Ph. Brit.: Sy-
rupus ferri iodidi (circit. 7 %). Ph. U. St.: Syrupus
ferri iodidi (circit. 12 %). Ph. Fr.: Sirop d'iodure
de fer (0,5 %).

Rp. **Iodi** *partes octoginta duas* 82

Ferri pulverati *partes triginta* 30.

Conterantur in mortario ferreo cum idonea aquæ quantitate. Iodo soluto et colore fusco primum orto in colorem viridem converso totum in filtrum parvum collocetur et aqua plane eluatur. Solutioni filtratæ addatur

Aquæ tantum,

quantum ad *partes quadringentas* 400
obtinendas requiratur.

Adde demum

Syrupi sacchari *partes sexcentas* 600.

Misceantur.

Sit coloris expers. Servetur in vitris pellucidis.

Partes centum (100) continent iodeti ferrosi circiter partes decem (10).

Syrupus Myrtilli.

Ph. N. Ed. I.

Blaabær-Syrup.

Fructus **Vaccinii Myrtilli** recentes contundantur et, ut fermententur, in temperatura graduum 20—25 seponantur. Fermentatione peracta succus exprimatur, coqvatur, per aliquot dies seponatur. Liqvor a sedimento limpide defusus filtretur.

Succi ita parati *partibus quadraginta* 40
addantur

Sacchari albi *parte sexaginta* 60.

Balnei vaporis ope solutæ colentur. Syrupus plane refrigeratus in lagenas bene siccatas immittatur.

Syrupus opiatatus vel Thebaicus*loco Syrupi opiati Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.: Syrupus Thebaicus.**Cfr. Ph. Germ.: Syrupus opiatatus (Extract. Opii 0,1 %).**Ph. Brit.: Syrupus Papaveris. Ph. Austr.: Syrupus**Diacodii. Ph. Fr.: Sirop d'Opium (Extract. Opii**0,2 %) & Sirop Diacode (Extract. Opii 0,05 %).***O p i u m - S y r u p.****Rp. Tincturæ Opii partem unam 1****Syrupi sacchari partes nonaginta novem . . . 99.**

Misceantur.

Nota: Partes duæ (2) respondent parti uni (1) syrupi
opii Ed. I.**Syrupus Rubi Idæi.***Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr. Ph. Fr.: Sirop de framboises.***B r i n g e b æ r - S y r u p.**E fructibus Rubi Idæi recentibus uti syrupus Myrtilli
paretur.

Præparata:

Mixture acida.

,, camphorata.

,, ,, acida.

Syrupus sacchari.*Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ. & Ph. Austr.: Syrupus simplex. Ph. Brit. &**Ph. U. St.: Syrupus. Ph. Fr.: Sirop de sucre incolore.*

Sukker-Syrup.

Rp. **Sacchari albi** partes sexaginta 60

Aqvæ partes quadraginta 40.

In balneo aqvæ solvantur. Syrupus coletur et plane refrigeratus in lagenas siceas immittatur.

Præparata:

Emulsio Amygdalarum.

Mixtura Ferri composita.

„ oleosa.

Syrupus Aurantii.

Liquor citratis kalici.

„ iodeti ferrosi.

Mixtura alba.

„ opiatum.

Syrupus Senegæ.

Ph. N. Ed. I.: Syrupus Polygalæ.

Cfr. Ph. Svec. (Rad. Senegæ 1 ad syrupi partes 28). Ph.

Dan.

Ph. Germ. Ph. U. St.

Senega-Syrup.

Rp. **Radiciis Senegæ** concisæ partes quatuor 4.

Coque per dimidiam horam cum

Aqvæ tanta copia,

qvanta, liqvore colato et filtrato, ad partes quadraginta 40
obtinendas requiratur.

In balneo aqvæ calefactis addantur

Sacchari albi partes sexaginta 60.

Syrupus Sennæ mannatus.

Ph. N. Ed. I.: Syrupus Cassiarum mannatus.

Ph. Svec. (sine rhizomate Zingiberis). Ph. Dan.

Cfr. Ph. Germ.: Syrupus Sennæ cum Manna. Ph. Austr.:

Syrupus mannatus. Ph. Brit.: Syrupus Sennæ.

Manna-Syrup.

Rp. Fructuum Foeniculi contusorum	1
Rhizomatis Zingiberis contusi	1
<i>singulorum partem unam,</i>	
Foliorum Sennæ concisorum partes decem . . .	10
Mannæ partes quindecim	15
Aqvæ fervidæ tanta copia,	
qvanta, mixtione per horas duas seposita, ad colaturæ	
partes quingvaginta	50
obtinendas requiratur.	
Adde demum	
Sacchari albi pulverati partes quingvaginta . .	50.
Præparatum:	
Electuarius aperiens	8 : 15.

Tartarus boraxatus.

Ph. N. Ed. I.: Tartras boraxato-kalicus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Tartarus boraxatus (seu Kali tartaricum boraxatum). Ph. Fr.: Tartrate borico-potassique.

Borax-Vinsten.

Rp. Biboratis natrici partem unam	1
Aqvæ destillatæ fervidæ partes decem	10.

In patina porcellanea calefiant; solutis addantur

Bitartratis kalici partes duæ	2,
---	----

qvibus solutis liquor filtretur, deinde evaporetur, donec massa tenax remaneat, qvæ, dum calida est, in laminas tennes extrahatur et leni calore siccetur; qvo facto massa pulveretur et in vitrum siccum et calefactum imponatur.

Sit pulvis albus, facile humescens, sapore acido, in aquæ parte æquali solubilis. Solutio acidulata solutione sulphidi hydrici addita ne turbetur, solutio alkalina ne

solutione sulpho-hydratis ammonici neve carbonate ammonico exhibeat præcipitatum (metalla, Ca).

Servetur in vitro bene clauso.

Tartras kalicus.

$K_2 C_4 H_4 O_6$.

Ph. N. Ed. I.: Tartras bikalicus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Kali tartaricum. Ph. Austr.: Kalium tartaricum. Ph. Brit.: Potassæ Tartras. Ph. U. St.: Potassii Tartras. Ph. Fr.: Tartrate neutre de Potasse.

Vinsurt Kali.

Crystalli diaphanæ, coloris expertes, in aqvæ frigidæ partibus tribus qvartis ($\frac{3}{4}$), ebullientis parte dimidia ($\frac{1}{2}$) solubiles, solutiones neutrales vel subalkalinæ reactionis præbentes. Solutio acidulata ne solutione sulphidi hydrici, alkalina ne solutione sulpho-hydratis ammonici neve oxalatis ammonici præbeat præcipitatum (Cu, Sn, Fe, Ca). Solutio acido nitrico acidulata ne chloreto baryco (acid. sulphuric.), ne aut leviter tantummodo nitrate argenco turbetur (chloreta).


V. Rp. **Bicarbonatis kalici partes quinque** 5
Aqvæ destillatæ partes duodecim 12.

In patina porcellanea, donec ebulliant, calefiant. Sensim et inter agitandum addantur

Bitartratis kalici partes novem 9
 vel tanta copia, ut solutio reactionem leviter alkalinam præbeat. Tum liquor filtretur et ad crystallisationem evaporetur. Crystalli inde ortæ siccentur.

Præparata:

Electuarius aperiens 1 : 15.
 Infusum Sennæ compositum 3 : 100.
 Mixtura aperiens 1 : 6.

Tartras natrico-kalicus. Tartarus natronatus.

Ph. N. Ed. I.: Tartras natrico-kalicus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Tartras natrico-kalicus.

Ph. Germ.: Tartarus natronatus (seu Natro-Kali tartaricum). Ph. Austr.: Kalium natrio-tartaricum. Ph. Brit.: Soda tartarata. Ph. U. St.: Potassii et Sodii tartras. Ph. Fr.: Tartrate de Potasse et de Soude (Sel de Seignette de la Rochelle).

Seignette-Salt.

Crystalli pellucidæ, coloris expertes, leni calore liqvescentes, in aqvæ frigidæ partibus duabus (2) solubiles. Solutio aqvosa ne solutione sulphidi hydrici neve solutione sulpho-hydratis ammonici neve oxalate ammonico turbetur (metalla, Ca). Solutio acido nitrico acidulata nitrate argentario vel chloreto baryco leviter modo turbetur (chloreto, sulphates).


V. Rp. **Carbonatis natrici partes quatuor** 4
Aqvæ destillatæ partes viginti 20.

In patina porcellanea usque ad ebullitionem calefactis sensim et inter agitandum addantur

Bitartratis kalici partes quinque 5
 vel tanta copia, ut solutio leviter alkaline reagat; tunc liquor per aliquod tempus sepositus filtretur et ad crystallisationem evaporetur. Crystalli exortæ parva copia aqvæ destillatæ frigidæ abluantur et siccentur.

Præparatum :

Pulvis effervescens compositus.

† **Tartras stibico-kalicus. Tartarus stibiatus.**

Ph. N. Ed. I.: Tartras stibico-kalicus.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Tartras stibico-kalicus.

Ph. Germ.: Tartarus stibiatus (s. Stibio-Kali tartaricum).

Ph. Austr.: Kalium stibio-tartaricum. Ph. Brit.:

Antimonium tartaratum. Ph. U. St.: Antimonii et

Potassii Tartras. Ph. Fr.: Tartrate de Potasse et

d'Antimoine.

Bræk - V i n s t e n.

Crystalli pellucidæ, nitentes, aut porcellanicæ albæ, octaëdricæ vel tetraëdricæ, in aqvæ frigidæ partibus quindecim usque ad viginti (15—20), ebullientis partibus duabus (2), haud in spiritu solubiles, solutiones reactionis subacidæ exhibentes. Qvum in cochlea ferrea igniveris et, donec acidum tartaricum prorsus deletum sit, calorem sensim auxeris, massa inde effecta cande-facta et adhalata odorem alliaceum ne spargat (As). So-lutio aqvosa et parva copia acidi tartarici acidulata ne nitrate argentario neve chloreto baryco turbetur (chloreta, sulphates).

Servetur caute in vase bene clauso.

Dosis maxima: *Centigrammata quindecim* 0,15 gram.

V. Rp.	Oxydi stibici	<i>partes quatuor</i>	4
	Bitartratis kalici	<i>partes quinque</i>	5
	Aqvæ destillatæ	<i>partes quinquaginta</i>	50.

Commixtæ in patina porcellanea per horam inter sæpius agitandum coquantur, dum aqua evaporatione dissipata re-stituatur. Liqvor, dum calidus est, filtretur et evaporetur, donec residuæ sint partes triginta (30); dein seponatur, ut crystallos efficiat. Crystalli ortæ et e liqvore exemptæ aqua destillata frigida abluantur et inter plagulas chartæ bibulæ siccentur.

E lixivio remanenti plures crystalli evaporando comparari possunt.

Præparata:

Ungventum stibiatum	20 : 100.
Vinum stibiatum	4 : 1000.

Testæ Ostrearum præparatæ.

Ph. N. Ed. I.: Conchæ Ostreæ.

Ph. Dan.

Ph. Germ.: Conchæ præparatæ. Ph. U. St.: Testa præparata.

Præparerede Østersskaller.

Ostrea edulis L. Mollusca. Acephala. Ad litora Norvegiæ frequens.

Testæ Ostrearum a sordibus bene purgatæ cum aqua coquantur, scopulæ ope a quisquiliis mudentur, deinde abluantur, siccantur, in pulverem subtilissimum terantur, aqua lævigentur et iterum siccantur.

Præparatum:

Mixtura alba.

Tincturæ.

Ph. N. Ed. I.: Essentiæ.

Ph. Fr.: Teintures. Ceteræ: Tincturæ.

Tincturæ, nisi alia parandi ratio expresse præscripta est, hac ratione parandæ sunt.

Species aut minutim concisæ aut grosse pulveratæ cum menstruo extrahenti in cucurbita vel alio idoneo vase commisceantur. Cucurbitæ excipulum ita instructum adaptetur, ut nihil vaporum transgredientium deperdatur. Tum liquor, qui in cucurbita inest, in balneo aquæ per dimidiam horam leniter coqvatur, in quo ob-

servandum est, ut, coctione non abrupta, quam minima pars liqvoris destillet. Liqvore omnino refrigerato, quæ pars transgressa sit, in cucurbitam refundatur, quo facto coletur et exprimatur.

Si maceratio aut digestio præscripta est, hæc fiat calore graduum 35—40, illa calore graduum 15—25. Vasa inter macerationem claudantur, inter digestionem vesica humida, quæ acu perforanda est, obtegantur.

Serventur tincturæ in lagenis bene obturatis.

Tinctura Absinthii.

Ph. N. Ed. I.: Essentia Absynthii.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. Ph. Fr.: Teinture d'Absinthe.

Malurt-Tinctur.

Rp. **Herbæ Absinthii** partes viginti 20
Spiritus diluti partes centum 100.
 Fiat tinctura.

† Tinctura Aconiti

loco Essentiæ Aconitorum Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan.

Ph. Germ.: Tinctura Aconiti (Tuber. 10 : 100). *Ph. Austr.: Tinctura Aconiti* (Tuber. 20 : 100). *Ph. Brit.: Tinctura Aconiti* (Tuber. circit. 12 : 100). *Ph. U. St.: Tinctura Aconiti radicis* (12 : 40). *Cfr. Ph. Fr.: Alcoolature d'Aconite* (Fol. recent. Aconiti & Spiritus (90 %) partes æquales, per decem dies maceratæ).

Aconit-Tinctur.

Rp. **Herbæ Aconiti** concisæ partes decem 10
Spiritus diluti partes centum 100.

Per dies quinque macerata exprimantur.

Caute servetur.

Dosis maxima: *Guttæ triginta* (30).

Nota: Partes duæ (2) respondent parti uni (1) essentiæ
Aconitorum Ph. N. Ed. I.

Tinctura amara.

Ph. N. Ed. I.: Essentia amara.

Ph. Dan. Cfr. Ph. Svec.: Tinctura Absinthii composita
(sine fruct. Anisi. Rhizoma Galangæ loco radicis Gen-
tianæ).

Cfr. Ph. Germ.: Tinctura amara. Ph. Austr.: Tinctura
Absinthii composita.

Bitter Tinctur.

Rp. Fructuum Anisi <i>partem unam</i>	1
„ Aurantii immaturorum	3
Foliorum Cardui benedicti.	3
Radicis Gentianæ	3
<i>singulorum partes tres,</i>	
Herbæ Absinthii <i>partes decem</i>	10
Spiritus diluti <i>partes centum</i>	100.
Fiat tinctura.	

Tinctura antihysterica.

M o d e r d r a a b e r.

Rp. Tincturæ Asæ fœtidæ <i>partes decem</i>	10
„ Castorei	1
Ætheris spirituosus camphorati	1
<i>singulorum partem unam.</i>	
Fiat tinctura.	

Tinctura Arnicæ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. Ph. Austr.: (20 : 100, e rhizomate, foliis, floribus parata). *Ph. Brit.:* (5 : 100, e rhizomate Arnicæ).

Ph. U. St.: (circit. 15 : 100). *Ph. Fr.:* *Teinture d'Arnica* (20 : 100).

Arnica-Tinctur.

Rp. **Florum Arnicæ partes decem** 10
Spiritus diluti partes centum 100.
 Fiat tinctura.

Tinctura aromatica.

Ph. N. Ed. I.: *Essentia aromatica.*

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.

Aromatisk Tinctur.

Rp. **Fructuum Cardamomi** 25
Florum Caryophylli 25
Rhizomatis Galangæ 25
 „ **Zingiberis** 25
singulorum partes viginti quinque,
Corticis Cinnamomi Ceylanici partes centum . 100
Spiritus diluti partes mille 1000.
 Fiat tinctura.

Præparatum:

Tinctura aromatica acida 95 : 100.

Tinctura aromatica acida.

Ph. N. Ed. I.: *Essentia aromatica acida.*

Ph. Svec. Ph. Dan.: (Species tincturæ aromatic. 5, Acid. sulphur. conc. 1, Spiritus dilut. 24).

Ph. Germ.

Rp. **Acidi sulphurici concentrati partes quinque . . 5**
Tincturæ aromaticæ partes nonaginta quinque 95.
 Caute misceantur; refrigerata filtrentur.
 Sit limpida.

Tinctura Asæ fœtidæ.

Ph. N. Ed. I.: Essentia Ferulæ.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Tinct. Assafoetidæ.

Ph. Fr.: Teinture d'Asa foetida.

D y v e l s d r æ k - D r a a b e r.

Rp. **Gummi-resinæ Asæ fœtidæ partes viginti . . 20**
Spiritus concentrati partes centum . . . 100.
 Fiat tinctura.

Præparatum:

Tinctura antihysterica 10 : 12.

Tinctura Aurantii.

Ph. N. Ed. I.: Essentia Aurantii.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Tinctura Aurantii corticis. Ph. Austr.: Tinct. Aurantiorum corticis. Ph. Brit.: Tinctura Aurantii recentis. Ph. U. St.: Tinctura Aurantii. Ph. Fr.: Teinture d'écorce d'oranges amères.

P o m m e r a n t s - T i n c t u r.

Rp. **Corticis fructuum Aurantii partes viginti . . 20**
Spiritus diluti partes centum 100.
 Fiat tinctura.

Præparatum:

Syrupus Aurantii 10 : 100.

Tinctura balsamica aromatica.*Ph. N. Ed. I.: Essentia ætherea balsamica.**Ph. Dan.**Cfr. Ph. Germ.: Mixtura oleoso-balsamica. Ph. Austr.:**Balsamum vitæ Hoffmanni.***Balsamum vitæ Hoffmanni.***Røde Hoffmannsdraaber.*

- Rp. **Pyrolei Succini rectificati** *partes duas* 2
Ætherolei Caryophylli 4
 „ **Cassiae** 4
 „ **Lavandulæ** 4
 „ **Macidis** 4
singulorum partes quatuor,
Balsami Peruviani 6
Radiciis Alkannæ 6
singulorum partes sex,
Spiritus concentrati *partes nongentas septuaginta* 970.
 Mixtio inter agitationem sæpius repetitam per unum
 diem macerata filtretur.

Tinctura Benzoës.*Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. U. St.: Tinctura Benzoini. Ph. Fr.: Teinture de Benjoin. Ceteræ: Tinctura Benzoës.***Benzoë-Tinctur.**

- Rp. **Resinæ Benzoës** *partes viginti* 20
Spiritus concentrati *partes centum* 100.
 Fiat tinctura.

Tinctura Benzoës composita.

Ph. Dan.

Saardraaber.

Rp.	Aloës partem unam	1
	Balsami Peruviani partes duas	2
	Resinæ Benzoës pulveratæ partes novem	9
	Spiritus concentrati partes sexaginta	60.
Digerantur.		

† Tinctura Cantharidum.

*Ph. N. Ed. I.: Essentia Cantharidum.**Ph. Svec. & Ph. Dan.*

Ph. Germ.: (1 : 10). *Ph. Austr.:* (1 : 5). *Ph. Brit.:* Tinctura Cantharidis (circ. 1 : 80). *Ph. U. St.:* Tinctura Cantharidis (1 : 30). *Ph. Fr.:* Teinture de Cantharides (1 : 10).

Spanskflue-Tinctur.

Rp.	Cantharidum nuper pulveratarum partem unam	1
	Spiritus diluti partes triginta	30.
Fiat tinctura.		
Caute servetur.		
Dosis maxima: Guttæ triginta (30).		

Tinctura Cascarillæ.

*Ph. N. Ed. I.: Essentia Eluteriæ.**Ph. Svec. & Ph. Dan.*

Ph. Fr.: Teinture de Cascarille. *Ceteræ:* Tinctura Cascarillæ.

C a s c a r i l l e - T i n c t u r.

- Rp. **Corticis Cascarillæ** partes viginti 20
Spiritus diluti partes centum 100.
 Fiat tinctura.

Tinctura Castorei.

Ph. N. Ed. I.: Essentia Castorei.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Tinctura Castorei Canadensis.

Ph. Germ.: Tinct. Castorei Canadensis & Sibirici. Ph.

Brit. & Ph. U. St.: Tinct. Castorei (circit. 5 : 100).

Ph. Fr.: Teinture de Castoréum (10 : 100).

B æ v e r g j æ l - T i n c t u r.

- Rp. **Castorei** partes viginti 20
Spiritus concentrati partes centum 100.
 Fiat tinctura.

Præparatum :

Tinctura antihysterica 1 : 12.

Tinctura Castorei ætherea.

Ph. N. Ed. I.: Essentia Castorei ætherea.

Ph. Fr.: Teinture éthérée de Castoréum (10 : 100).

- Rp. **Castorei** crasse pulverati partes viginti 20.
Ætheris spirituosus partes centum 100.
 Per quatuordecim dies macerata filtrentur.

Tinctura Chinæ.

Ph. N. Ed. I.: Essentia Cinchonæ.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Tinct. Chinæ Calisayæ.

Ph. Germ.: Tinct. Chinæ simplex. Ph. Brit.: Tinct.

Cinchonæ flavæ. Ph. U. St.: Tinct. Cinchonæ. Ph.

Fr.: Teinture de Quinquina.

China-Tinctur.

- Rp. **Corticis Chinæ Calisayæ partes viginti** . . . 20
Spiritus diluti partes centum . . . 100.
 Fiat tinctura.

Tinctura Chinæ composita.

Ph. N. Ed. I.: Essentia Cinchonæ composita.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Cfr. Ph. Germ. Cfr. Ph. Brit. & Ph. U. St.: Tinct. Cinchonæ composita.

- Rp. **Radicis Gentianæ** . . . 3
Corticis fructuum Aurantii . . . 3
singulorum partes tres,
Corticis Chinæ Calisayæ partes octo . . . 8
Spiritus diluti partes septuaginta . . . 70.
 Fiat tinctura.

Tinctura Chinoidini.

Ph. Svec.: Tinctura Chinoidinæ. Ph. Dan.: Tinct. Chinoidinæ.

Ph. Germ.: Tinct. Chinoidini.

Chinoidin-Tinctur.

- Rp. **Chinoidini partes decem** . . . 10
Acidi hydrochlorati partes quinque . . . 5
Spiritus concentrati partes octoginta quinque . 85.
 Soluta filtrentur.

Tinctura Cinnamomi.*Ph. N. Ed. I.: Essentia Cinnamomi.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Fr.: Teinture de Cannelle. Ceteræ: Tinctura Cinnamomi.***K a n e l - D r a a b e r.**

Rp. **Corticis Cinnamomi Ceylanici** *partes viginti* . . . 20
Spiritus diluti *partes centum* 100.
 Fiat tinctura.

† Tinctura Colocynthidum composita*loco Essentiæ Colocynthidis Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec.: (Fruct. Anisi stellati loco fructuum Anisi). Ph.**Dan.: Tinct. Colocynthidis composita.**Ofr. Ph. Germ.: Tinct. Colocynthidis.***C o l o k v i n t - T i n c t u r.**

Rp. **Fructuum Anisi** *partem unam* 1
Pulpæ Colocynthidum *partes decem* 10
Spiritus concentrati *partes centum* 100.
 Fiat tinctura.

Caute servetur.

Dosis maxima: *Guttæ triginta* (30).

Nota: Partes duæ (2) respondent parti uni (1) essentiæ
 Colocynthidis Ph. N. Ed. I.

Tinctura digestiva.**M a v e d r a a b e r.**

Rp. **Solutionis carbonatis kalici** 10
Tincturæ Rhei amaræ 10
Ætheris spirituosus camphorati 10
singulorum partes decem.
 Limpide dispensetur.

† Tinctura Digitalis

*loco Essentiæ Digitalis Ph. N. Ed. I.**Ph. Svec. & Ph. Dan.*

Ph. Germ.: a) *Tinctura Digitalis* (e foliis recentibus 5 & Spiritus 6 parata). b) *Cfr. Tinct. Digitalis ætherea* (1 : 10). *Ph. Austr.:* *Tinctura Digitalis* (20 : 100). *Ph. Brit.:* *Tinctura Digitalis* (circ. 15 : 100). *Ph. U. St.:* *Tinctura Digitalis* (circ. 1 : 8). *Ph. Fr.:* *Teinture de Digitale* (20 : 100). *Cfr. Alcoolature de Digitale* (Fol. Digitalis recent. & Spiritus 90 % singulorum partes æquales. Macerentur et filtrentur).

Digitalis-Tinctur.

Rp. Foliorum Digitalis concisorum partes decem . . . 10.
 Spiritus diluti partes centum 100.

Per dies quinque macerata exprimantur.

Caute servetur.

Dosis maxima: Guttæ triginta (30).

Nota: Partes duæ (2) respondent parti uni (1) essentiæ Digitalis Ph. N. Ed. I.

† Tinctura Digitalis rubra

*loco Essentiæ Digitalis compositæ Ph. N. Ed. I.**Ph. Dan.:* (Paratur ligno Santali rubro loco radicis Alkannæ).

Elixir antasthmaticum Aaskovi.

Rp. Radicis Alkannæ concisæ partes quinque . . . 5
 Foliorum Digitalis concisorum partes decem . . . 10
 Radicis Glycyrrhizæ concisæ partes viginti . . . 20
 Aquæ Foeniculi 50
 Spiritus diluti 50
singulorum partes quinquaginta.

Per dies quinque macerata exprimantur.

Caute servetur.

Dosis maxima: *Guttæ triginta* (30).

Nota: Partes duæ (2) respondent parti uni (1) essentiæ
Digitalis compositæ Ph. N. Ed. I.

Tinctura extracti Pomorum ferrati

loco Solutionis extracti Pomorum ferrati Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. Ph. Dan.: Tinctura Pomi ferrata.

*Ph. Germ.: Tinctura Ferri pomata. Ph. Austr.: Tinctura
Malatis Ferri.*

Rp. **Extracti Pomorum ferrati** *partes viginti* . . . 20

Aqvæ Cinnamomi spirituosæ *partes centum* . . . 100.

Soluta filtrentur.

Nota: Pars una (1) respondet partibus circiter duabus (2)
solutionis extracti Pomorum ferrati Ph. N. Ed. I.

Tinctura Gentianæ.

Ph. N. Ed. I.: Essentia Gentianæ.

Ph. Dan.

*Ph. Germ.: Tinct. Gentianæ. Cfr. Ph. U. St.: Tinctura
Gentianæ composita. Ph. Fr.: Teinture de Gentiane.*

Gentiana-Tinctur.

Rp. **Radiciis Gentianæ** *partes viginti* 20

Spiritus diluti *partes centum* 100.

Fiat tinctura.

Tinctura Guajaci ammoniacata

loco Essentiæ Guajaci ammoniatæ Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ., Ph. Brit. & Ph. U. St.: Tinctura Guajaci ammoniata. Cfr. Ph. Austr.: Tinctura Guajaci. Cfr. Ph. Fr.: Teinture de Gayac.

Rp. Resinæ Guajaci partes tres 3
 Solutionis Ammoniaci partes quinque 5
 Spiritus concentrati partes decem 10.
 Maceratione solvantur.

Nota: Partes tres (3) æqualem Ammoniaci quantitatem continent ac pars una (1) essentiæ Guajaci ammoniatæ Ed. I.

Tinctura Lavandulæ composita

loco Essentiæ Lavandulæ Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec.: Tinctura Lavandulæ aromatica (Rp. Ligni Santali rubri 3, Cortic. Cinnamomi Ceylanici 4, Semin. Myristicæ 4, Spirit. Rosmarini 100, Spirit. Lavandulæ 300). *Ph. Dan.: Tinct. Lavandulæ rubra* (Rp. Corticis recentis fruct. Citri 3, Flor. Lavand. 36. Macerentur cum Spirit. dilut. 150 & aqv. 150. Destilla partes 150. Adde liqtori destillato cortic. Cinnamomi Cassiæ 4, Fruct. Cubebæ 1, Flor. Caryophylli 1, Lign. Santal. rubr. q. s.).

Rp. Corticis fructuum Aurantii 1
 Florum Caryophylli 1
 Fructuum Cubebæ 1
singulorum partem unam,
 Corticis Cinnamomi Ceylanici partes duas . . . 2
 Spiritus Rosmarini partes triginta 30
 „ Lavandulæ partes septuaginta 70.
 Fiat tinctura.

† *Tinctura Lobeliæ.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.:* (10 : 100). *Ph. Austr.:* (20 : 100). *Ph. Brit.*
& *Ph. U. St.:* (circ. 15 : 100). *Ph. Fr.:* *Teinture de*
Lobélie (20 : 100).*Lobelia-Tinctur.*Rp. *Herbæ Lobeliæ partes decem* 10
Spiritus diluti partes centum 100.*Fiat tinctura.**Caute servetur.**Dosis maxima: Guttæ quingvaginta (50).**Tinctura Myrrhæ.**Ph. N. Ed. I.:* *Essentia Balsamodendri.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Fr.:* *Teinture de Myrrhe. Ceteræ: Tinctura Myrrhæ.**Myrrha-Tinctur.*Rp. *Gummi-resinæ Myrrhæ partes viginti* 20
Spiritus concentrati partes centum 100.*Fiat tinctura.*† *Tinctura Nucis vomicæ.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.:* *Tinct. Strychni* (10 : 100). *Ph. Austr.:* *Tinct.*
nucis vomicæ (20 : 100). *Ph. Brit.:* *Tinct. Nucis vo-*
micæ (circ. 12 : 100). *Ph. U. St.:* *Tinct. Nucis vo-*
micæ (circ. 1 : 4). *Ph. Fr.:* *Teinture de Noix vomique*
(20 : 100).*Ph. Norv. Ed. II.*

Rævekage-Tinctur.

- Rp. **Seminum Nucis vomicæ** partes decem . . . 10
Spiritus diluti partes centum 100.
 Fiat tinctura.
 Caute servetur.
 Dosis maxima: *Guttæ quadraginta* (40).

Tinctura odontalgica.

Eau de chérubin.

Tanddraaber.

- Rp. **Ætherolei Caryophylli** partes septendecim . . 17
 — **Cassiae** partem unam 1
Ætheris acetic 23
Chloroformii 23
singulorum partes viginti tres,
Spiritus concentrati partes triginta sex . . . 36.
 Misceantur.

† Tinctura Opii vel Thebaica

loco Essentiæ Opii simplicis Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan.: Tinctura thebaica. Cfr. Ph. Svec.: Tinctura thebaica (Opii 1, Aqvæ Cinnamomi spirituosæ 4, Spirit. dilut. 6).

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Tinctura Opii simplex (Opii 10 : 100). *Ph. Brit.: Tinctura Opii* (circ. 8 : 100).

Ph. U. St.: Tinctura Opii (circ. 1 : 12). *Ph. Fr.: Teinture d'extrait d'opium* (Extr. Opii 1 : 12).

Opiums-Tinctur.

- Rp. **Opii bene siccati et grosse pulverati** partes decem 10
Spiritus diluti partes centum 100.

Fiat tinctura.

Caute servetur.

Dosis maxima: *Guttæ triginta* (30).

Nota: Partes duæ (2) respondent parti uni (1) *essentiæ*
Opii simplicis Ph. N. Ed. I.

Præparatum:

Syrupus opiatus 1 : 100.

Tinctura *Opii benzoica*. Tinctura *Thebaica benzoica*.

Ph. N. Ed. I.: *Essentia Opii benzoica* (Acid. benzoic.
 præcipitat. loco acid. benzoici sublimati).

Ph. Svec. & Ph. Dan.: *Tinctura thebaica benzoica*.

Ph. Germ.: *Tinctura Opii benzoica* (*Opii* 1 : 200). *Ph.*

Brit.: *Tinctura Camphoræ composita* (circ. 1 : 200).

Ph. U. St.: *Tinctura Opii camphorata* (circ. 1 : 200).

Ph. Fr.: *Teinture d'opium camphrée* (*Extr. Opii*
 1 : 200).

Elixir paregoricum.

Anis-Draaber.

Rp. *Ætherolei Anisi partes duas* 2
Camphoræ partes tres 3
Acidi benzoici 5
Opii bene siccati et grosse pulverati 5
singulorum partes quinque,
Spiritus diluti partes mille. 1000.
 Fiat tinctura.

Tinctura Pimpinellæ.*Ph. N. Ed. I.: Essentia Pimpinellæ.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Germ.***Pimpinelle-Tinctur.**

Rp. Radicis Pimpinellæ partes viginti 20.
 Spiritus diluti partes centum 100.
 Fiat tinctura.

Tinctura Ratanhiæ.*Ph. N. Ed. I.: Essentia Kramerie.**Ph. Svec. & Ph. Dan.*

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Tinct. Ratanhæ. Ph. Brit. &
Ph. U. St.: Tinct. Kramerie. Ph. Fr.: Teinture de
ratanhia.

Ratanhia-Tinctur.

Rp. Radicis Ratanhiæ partes viginti 20
 Spiritus diluti partes centum 100.
 Fiat tinctura.

Tinctura Rhei amara*loco Essentiæ Rheorum Ph. N. Ed. I.*

Cfr. Ph. Svec.: Tinctura Rhei amara (Cortic. Canellæ albæ
 1, Radic. Gentianæ 2, Radic. Rhei 10, Spirit. dilut. 100.
 Macerentur). *Cfr. Ph. Dan.: Vinum Rhei* (Fruct. Car-
 damomi 2, Radic. Gentianæ 3, Radic. Rhei 8, Vini Xeres
 80) *& Tinctura Rhei amara* (Radic. Serpentariæ 3,
 Radic. Gentianæ 8, Radic. Rhei 32, Spirit. dilut. 320.
 Digerantur).

*Cfr. Ph. Germ.: Tinctura Rhei vinosa. Cfr. Ph. Austr.:
Tinctura Rhei vinosa Darelli. Cfr. Ph. U. St.:
Tinctura Rhei.*

Bitre Rhabarber-Draaber.

Rp. **Fructuum Cardamomi** *partem unam* 1
Radicis Gentianæ *partes quatuor* 4
 „ **Rhei** *partes decem* 10
Spiritus diluti *partes centum* 100.
 Fiat tinctura.

Præparatum:

Tinctura digestiva 10 : 30.

Tinctura Valerianæ.

Ph. N. Ed. I.: Essentia Valerianæ.

Ph. Dan.

*Ph. Fr.: Teinture de valériane. Ceteræ: Tinctura Va-
lerianæ.*

Valeriana-Tinctur.

Rp. **Radicis Valerianæ** *contusæ partes viginti* . . . 20
Spiritus diluti *partes centum* 100.
 Per dies quinque macerata exprimantur.

Tinctura Valerianæ ætherea.

*Ph. Svec.: Tinctura Valerianæ. Ph. Dan.: Tinctura Va-
lerianæ ætherea.*

Ph. Germ. Ph. Fr.: Teinture éthérée de valériane.

Rp. **Radicis Valerianæ** *contusæ partes viginti* . . . 20
Ætheris spirituosus *partes centum* 100.
 Per dies quinque macerata exprimantur.

Tragacantha.*Ph. N. Ed. I.: Gummi Astragalorum.**Ph. Svec. & Ph. Dan.**Ph. Fr.: Gomme Adragante. Ceteræ: Tragacantha.***Tragacanth-Gummi.**

Astragalus verus *Olivier*, **A. Creticus** *Lamarck*, **A. gummifer** *Labill.* et aliæ **Astragali** species. **Papilionaceæ.**
Frutices Græciæ et Asiæ minoris.

Succus e trunco exsudatus et induratus.

Laminæ planæ, tenues, subrotundæ vel spiraliter tortæ, falcatæ, aut frusta tenuia, filiformia. Substantia est cornea, subdiaphana, tenax, ita ut difficulter pulveretur, coloris albi aut e subflavo albidus, in aqua intumescit, cum aqua fervida mucilaginem spissam præbet.

Præparata:

Trochisci bicarbonatis natrici.

„ Santonini.

Trochisci bicarbonatis natrici.*Ph. Svec.*

Ph. Germ.: Trochisci Natri bicarbonici (Bicarb. natric. 0,10 gram.). *Ph. U. St.: Trochisci Sodii Bicarbonatis* (Bicarb. natric. 0,18 gram.). *Ph. Fr.: Tablettes de bicarbonate de soude. Pastilles de Vichy ou de d'Arcet* (Bicarb. natric. 0,025 gram.).

Vichy-Pastiller.**Rp. Bicarbonatis natrici pulverati**

grammata quinque 5,00 gram.

Sacchari albi pulverati

grammata nonaginta quinque 95,00 gram.

Misceantur et ope sufficientis copiae

Tragacanthæ in mucilaginem tenuem conversæ fiat massa, e qua formentur trochisci æquales numero centum (100).

Continent igitur trochisci singuli bicarbonatis natrici centigrammata quinque (0,05 gram.).

Trochisci Santonini.

Ph. Svec.: (Pigmento Carmini Coccionellæ tincti). *Ph. Dan.*

Ph. Germ.: *Trochisci Santonini* (Santonini a) 0,05 gram., b) 0,25 gram.). *Ph. Austr.:* *Trochisci Santonini* (0,05 gram.). *Ph. U. St.:* *Trochisci Santonini* (Santonini circit. 0,03 gram.). *Ph. Fr.:* *Tablettes de Santonine* (0,01 gram.).

Orme-Kager.

Rp. **Santonini subtilissime pulverati**

grammata tria 3,00 gram.

Sacchari albi pulverati

grammata quadraginta septem 47,00 gram.

Tragacanthæ in mucilaginem tenuem redactæ quantum satis,

ut fiat massa bene mixta, e qua formentur trochisci æquales numero centum (100).

Continent igitur trochisci singuli Santonini centigrammata tria (0,03 gram.).

A luce remoti servantur.

Tubera Jalapæ.

Ph. N. Ed. I.: *Radix Ipomæarum.*

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: *Tubera Jalapæ.* *Ph. Austr., Ph. Brit. & Ph. U. St.:* *Jalapa.* *Ph. Fr.:* *Jalap tubéreux ou officinal.*

Jalaparod.

Ipomœa Purga *Hayne, Wenderoth.* **Convolvulaceæ.**
 Planta perennis volubilis Americæ meridionalis, in primis regni Mexicani.

Tubera globosa vel oblonga, variæ magnitudinis, integra vel dissecta, solida, ponderosa, extus fusca, rugosa, intus e flavo fusca, zonis frequentibus, obscurioribus, resinosis instructa. Contineant resinæ partes minimum decem (10) in centum (100) pulveris partibus.

Tubera Salep.

Ph. N. Ed. I.: *Radix Orchidum.*

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: *Tubera Salep.* *Ph. Austr. & Ph. Fr.:* *Salep.*

Saleprod.

Species variæ generum **Orchidearum, Orchis, Ophryos, Platantheræ** cet. Plantæ pratenses Asiæ et Europæ, etiam Norvegiæ.

Tubera irregularia, ovata vel oblonga, rarius palmata, cornea, subdiaphana, colore sordide albo vel e subfusco albo; pulverata cum aqua mucilaginem præbent.

Præparatum:

Mucilago Salep.

Ungventa.

In unguentis parandis prospiciendum est, ne major calor adhibeatur, quam qui necessario requiratur. Sub-

stantiæ volatiles non ante addendæ sunt, quam massa ad circiter 60° vel 70° refrigerata est. Ungventum ne sint grumosa neve odorem rancidum spargant.

Serventur ab humore, luce, calore quam optime remota.

Ungventum acetatis plumbici

loco Ungventi plumbici Ph. N. Ed. I. (Acetatis plumbici 4%).

Ph. Svec.: Ungventum plumbicum (Axungiae 5, Butyri 5, Sebi 5, Ceræ flavæ 5, Ol. Olivar. 10, Oxyd. plumbic. 5, Picis Pini 1) & *Ungventum subacetatis plumbici* (Ceræ flavæ 5, Ol. Olivar. 12. Colliqvefactis & semirefrigeratis addantur solutionis subacetatis plumbici 3).

Ph. Dan.: Ungventum universale (Ceræ flavæ 6, Ol. Raparum 17, Acetat. plumb. 1. Commixtis addatur Ol. Rapar. 1).

Ph. Germ.: Ungventum Plumbi. Ph. Brit.: Ungventum Plumbi acetatis. Ph. Austr.: Ungventum Plumbi acetici.

Bly-Salve.

Rp. Ceræ flavæ partes viginti quinque 25
 Olei Olivarum partes quinquaginta 50.
 Leni calore liqvatis assidue agitando addantur
 Acetatis plumbici partes quinque 5
 Olei Olivarum partes viginti 20
 antea bene contritæ. Agitetur massa, donec refrixerit.

Præparatum:

Ungventum acetatis plumbici compositum.

Ungventum acetatis plumbici compositum.

Ph. N. Ed. I.: Ungventum plumbicum compositum.

Ph. Dan.

Ungventum hæmorrhoidale.

Rp. Stigmatum Croci pulveratorum partes quatuor	4
Camphoræ pulveratæ partes octo	8
Olei Hyoscyami infusi partes sedecim	16.
Bene contritis sensim addantur	
Ungventi acetatis plumbici partes septuaginta duæ	72.

Ungventum aromaticum.

Ph. N. Ed. I.

Cfr. Ph. Dan.: Ungventum nervinum.

Cfr. Ph. Germ.: Ungventum Rosmarini compositum.

Cfr. Ph. Austr.: Ungventum aromaticum.

Sene-Salve.

Rp. Herbæ Meliloti	8
„ Origani	8
Florum Chamomillæ	8
singulorum partes octo.	

In mortario cum

Spiritus concentrati partibus sedecim	16
contusa per duodecim horas macerentur. Addantur	
Axungię partes nonaginta sex	96
Sebi partes quadraginta octo	48
Ceræ flavæ partes sedecim	16.

Balneo aqvæ calefacta, donec evaporatus sit spiritus, per linteum pannum filtrentur et prelo calefacto exprimantur. Massæ ad caloris gradum 35—40 refrigeratæ addantur

Olei Lauri	1
Ætherolei Lavandulæ	1
„ Menthæ crispæ	1
singulorum pars una,	

Ætherolei Juniperi	2
„ Rosmarini	2
„ Terebinthinæ crudi	2
<i>singulorum partes duæ.</i>	

Massa, donec refrikerit, bene agitetur.

Ungventum basilicum flavum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec.: Ungventum Terebinthinæ resinosum (Rp. Resinæ Pini flavæ 1, Sebi 1, Balsami Terebinth. commun. 1, Ceræ flavæ 1, Ol. olivar. 4). *Ph. Dan.: Ungventum basilicum flavum* (Rp. Resin. Pini flavæ 2, Ceræ flavæ 2, Sebi 2, Balsami Terebinth. commun. 1, Ol. olivar. 6). *Ph. Germ.: Ungventum basilicum.* *Ph. Brit.: Ungventum resinæ.* *Cfr. Ph. U. St.: Ceratum resinæ compositum.*

Gul Kongesalve.

Rp. Balsami Terebinthinæ communis	15
Ceræ flavæ	15
Resinæ Colophonii	15
Sebi	15

singulorum partes quindecim,

Olei Olivarum partes quadraginta 40.

Colliquefacta colentur et sæpe agitentur, donec ungventum obriguerit.

Præparatum:

Ungventum Cantharidum.

Ungventum basilicum nigrum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan.

Ph. Fr.: Onguent basilicum.

Sort Kongesalve.

Rp. Balsami Terebinthinæ communis	12
Ceræ flavæ	12
Picis Pini	12
Resinæ Colophonii	12
Sebi	12

singulorum partes duodecim,

Olei Olivarum partes quadraginta 40.

Colliquefacta colentur et sæpe agitentur, donec un-
gventum obriguerit.

Ungventum Cantharidum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec.: Ungventum Cantharidum (Ungventum Terebinthinæ resinosum loco ungv. basilici flavi). *Ph. Dan.: Ungventum Cantharidum simplex* (Cantharid. 2, Olei Olivarum 9 in balneo aqvæ digestæ colentur. Hujus filtrati partes 7 cum Ceræ flavæ partibus 3 liqvefiant, ut fiat ungv.). *Ungventum Cantharidum viride* (Cantharid. 27, Olei Olivar. 36, Resin. Colophonii 9, Ceræ flavæ 9, Sebi 9, Balsam. Terebinth. communis 9. Mixtioni liqvatae et colatae addatur Æruginis 1).

Cfr. Ph. Germ.: Ungvent. Cantharidum (Cantharid. circ. 17 %). *Ph. Brit.: Ungventum Cantharidis* (circ. 12 %). *Cfr. Ph. U. St.: Ungventum Cantharidis* (circit. 11 %). & *Ceratum extracti Cantharidis* (circit. 33 %). *Ph. Fr.: Pommade épispastique jaune* (6 %) & *Pommade épispastique verte* (3 %).

Spanskflue-Salve.

Rp. Cantharidum pulveratarum partes viginti . . .	20
Ungventi basilici flavi partes octoginta . . .	80.

Calore balnei aquæ in vase clauso per tres horas digesta colentur preloque aqua fervida calefacto exprimantur.

Ungventum Ceræ.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec.: Ceratum flavum (Ceræ flavæ 1, Olei Olivarum 2).

Ph. Dan.

Ph. Germ.: Ungventum cereum. Ph. Austr.: Ungventum simplex (Ceræ albæ 1, Axungiae 4). *Ph. Brit.: Ungventum simplex. Cfr. Ph. U. St.: Ceratum & Ungventum. Ph. Fr.: Cérat simple.*

Vox-Salve.

Rp. Ceræ flavæ partes viginti quinque 25.

Olei Olivarum partes septuaginta quinque . . . 75.

Liqvata colentur et assidue agitando refrigerentur.

Præparatum:

Ungventum oxydi hydrargyrici.

Ungventum Cetacei.

Ph. N. Ed. I.: Ungventum cetacei rosaceum.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Ungventum leniens. Ph. Austr.: Ungventum emolliens (Crème céleste). *Cfr. Ph. U. St.: Ceratum Cetacei. Ph. Fr.: Cold cream.*

Spermacet-Salve. Cold Cream.

Rp. Cetacei 5

Ceræ albæ 5

singulorum partes quinque,

Olei Amygdalarum partes quingvagenta . . . 50.
 Liqvātis addantur
Aqvæ Rosæ partes qvadragenta . . . 40.
 Assidue agitentur, donec e seposita massa aqua non
 amplius separetur.

Ungventum Glycerini.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

*Ph. Germ. & Ph. Austr.: Ungventum glycerini. Ph. Brit.:
 Glycerinum amyli. Ph. Fr.: Glycéré d'amidon.*

Glycerin-Salve.

Rp. **Amyli Triticici** subtilissime pulverati partem unam 1
Glycerini partes qvindecim . . . 15.
 Calefiant inter agitationem sæpius repetitam, donec
 ungventum pellucidum factum sit.

† Ungventum hydrargyri.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

*Ph. Germ.: Ungventum Hydrargyri cinereum (Hydrargyri
 33 0/0). Ph. Austr.: Ungventum Hydrargyri (33 0/0).
 Ph. U. St.: Ungv. Hydrargyri (50 0/0). Ph. Fr.:
 Pommade mercurielle faible, Onguent gris (circ. 12 0/0).
 Cfr. Pommade mercurielle à parties égales, Onguent
 Napolitain (50 0/0).*

Ungventum Neapolitanum.

Graa Kviksølv-Salve.

Rp. **Hydrargyri crudi** partes viginti . . . 20
Sebi . . . 5

Axungiaë 5

singulorum partes quinque.

In vase ferreo vel porcellaneo conterantur, donec globuli hydrargyri armato oculo cerni nequeant. Deinde paullatim et assidua trituratione addantur

Sebi partes quindecim 15

Axungiaë partes quingvaginta quinque 55
antea liqvatae et refrigeratae.

Caute servetur.

Ungventum hydratocarbonatis plumbici.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Ungventum Cerussæ. Ph. Brit.

& Ph. U. St.: Ungventum Plumbi Carbonatis. Ph.

Fr.: Pommade de carbonate de plomb.

Bly hvidt-Salve.

Rp. **Hydratocarbonatis plumbici partem unam.** . . . 1

Axungiaë partes duas 2.

Misceantur.

Ungventum iodeti kalici

loco Ungventi iodati Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: (Paratur Ungvento Glycerini loco Axungiaë benzoatae).

Ph. Germ.: Ungventum Kalii iodati (Iodeti kalici 10 0/0).

Ph. Brit. & Ph. U. St.: Ungventum Potassii Iodidi

(circ. 12 0/0). Ph. Fr.: Pommade d'iodure de potas-

sium (circ. 10 0/0) & Glycéré d'iodure de potassium

(circ. 10 0/0).

J o d k a l i u m - S a l v e.

Rp. Iodeti kalici partes decem 10
 Aquæ partes quinque 5.
 Contritis admisceantur inter terendum
 Axungia benzoatæ partes octoginta quinque . 85.
 Ex tempore paretur.

Nota: Partes nonaginta duæ (92) ungventi iodati Ph. N.
 Ed. I. continent iodi partem unam (1) et iodeti
 kalici partes decem (10).

† Ungventum oxydi hydrargyrici

loco Ungventi oxydi hydrargyrici Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan.

Ph. Germ.: Ungvent. hydrargyri rubrum (10 0/0). Ph.
 Brit. & Ph. U. St.: Ungvent. Hydrargyri oxidi rubri
 (circ. 12 0/0). Ph. Fr.: Pommade d'oxyde rouge de
 mercure (circ. 6 0/0).

Ungventum ophthalmicum rubrum.

Rød Kviksølvsalve. Rød Øiensalve.

Rp. Oxydi hydrargyrici subtilissime pulverati
 partes quinque 5
 Ungventi Ceræ liqvati et semirefrigerati
 partes nonaginta quinque 95.

Exactissime commisceantur.

Caute servetur.

Nota: Partes duæ (2) respondent parti circiter uni (1)
 ungventi oxydi hydrargyrici Ed. I.

Ungventum oxydi zincici.

Ph. Dan.

Ph. Germ.: Ungventum zinci (1 : 9). *Ph. Brit. & Ph.*

U. St.: Ungventum zinci oxidi (1 : 6)

Z i n k - S a l v e.

Rp. **Oxydi zincici partes decem** 10

Axungiae liqvefactae et semirefrigeratae
partes nonaginta 90.

Misceantur.

Ex tempore paretur.

† Ungventum stibiatum

loco Ungventi stibiati Ph. N. Ed. I.

Ph. Germ.: Ungventum Tartari stibiati (20 0/0). *Ph.*

Austr.: Ungventum Autenriethi (20 0/0). *Ph. Brit.:*

Ungventum Antimonii tartarati (20 0/0). *Ph. U. St.:*

Ungventum Antimonii (25 0/0). *Ph. Fr.: Pommade*
stibiée (25 0/0).

K o p p e - S a l v e.

Rp. **Tartratis stibico-kalici subtilissime pulverati**
partes viginti 20

Axungiae partes octoginta 80.

Bene misceantur.

Caute servetur.

Nota: Partes quinqve (5) respondent partibus tribus (3)
ungventi stibiati Ph. N. Ed. I.

Ungventum Sulphuris compositum.

Ph. Svec.

Ph. Austr.: Ungventum sulfuratum.

Ph. Norv. Ed. II.

Ungventum ad scabiem Viennense.

Wiener-Salve.

Rp. Carbonatis calcici cretacei partes decem . . .	10
Pyrolei Pini	15
Sulphuris sublimati	15
singulorum partes quindecim,	
Axungiae	30
Saponis viridis	30
singulorum partes triginta.	
Misceantur.	

Ungventum terebinthinatum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan.

Ph. Germ. & Ph. Brit.: Ungventum Terebinthinæ. Cfr.

Ph. U. St.: Linimentum Terebinthinæ.

Terpentin-Salve.

Rp. Ceræ flavæ partes triginta	30.
Leni calore liqvatis addantur	
Balsami Terebinthinæ communis	35
Ætherolei Terebinthinæ crudi	35
singulorum partes triginta quinque.	
Agitetur massa, donec refrixerit.	

Valerianas zincicus.

 $\text{Zn} (\text{C}_5 \text{H}_9 \text{O}_2)_2$.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec.

Ph. Germ.: Zincum valerianicum. Ph. Brit. & Ph. U.

St.: Zinci valerianas. Ph. Fr.: Valérianate de zinc.

Valerianasurt Zinkoxyd.

Squamæ albæ, crystallinæ, pingviter nitentes, tactu pingviusculæ, acidum valerianicum redolentes, in aquæ frigidæ partibus nonaginta (90), difficiliter in aqua ebullienti, facile in spiritu solubiles.

Sit in solutione ammoniaci abundanti prorsus solubilis. Solutio ita effecta solutione sulphidi hydrici addita præcipitatum albissimum præbeat. Liqvor a præcipitato inde effecto filtratus phosphate natrico addito ne turbetur (metalla, Mg). Partes centum (100) in acido nitrico solutæ, si candefeceris, partes viginti quinque usque ad triginta (25—30) oxydi zincici relinquant.

In vitro probe clauso servetur.

†† Veratrinum.

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Veratrina.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Veratrinum. Ph. Brit. & Ph.

U. St.: Veratria. Ph. Fr.: Vératrine.

Veratrin.

Pulvis albus vel e subflavo albidus, calore liqvescens, ignitus sine residuo conflagrans, in aqua vix, facile in spiritu, difficulter in æthere solubilis; acidis dilutis facile solvitur.

Cautissime servetur.

Dosis maxima: *Centigramma unum* . . 0,01 gram.

Vinum Chinæ.

Cfr. Ph. Germ. Cfr. Ph. Brit.: Vinum Quiniæ. Cfr.

Ph. Fr.: Vin de quinquina.

China-Vin.

Rp. Corticis Chinæ Calisayæ grosse pulverati	
	<i>partes quinquaginta</i> 50
Spiritus concentrati	<i>partes viginti</i> 20
Acidi citrici	<i>partem unam</i> 1
Vini de Malaga	<i>partes mille</i> 1000.

Mixtio per dies decem macerata exprimatur, residuis vini de Malaga affundatur tantum, quantum iis expressis ad mille (1000) vini Chinæ partes obtinendas requiratur.

Sit limpidum.

Vinum Chinæ ferratum.

Cfr. Ph. Dan.

Cfr. Ph. Fr.: Vin de quinquina ferrugineux.

Jern-China-Vin.

Rp. Citratis ferrico-ammonici	<i>partem unam</i> 1;
solve in	
Vini Chinæ	<i>partibus centum</i> 100.
Sit limpidum.	

† Vinum Colchici

loco Essentiæ Colchici Ph. N. Ed. I.

Ph. Dan. Cfr. Ph. Svec.: Tinctura Colchici (1 : 10).

Ph. Germ.: Vinum Colchici (10 : 100). Ph. Austr.: Vinum Colchici (20 : 100). Ph. Brit.: Vinum Colchici (Bulb. Colchici 20, Vini Xeres 100). Ph. U. St.: Vinum Colchici seminis (circ. 1 : 8). Ph. Fr.: Teinture de semences de Colchique (10 : 100). Vin de semences de Colchique (6 : 100).

partes decem 10

Nota: Partes duæ (2) respondent parti uni (1) essentiæ
Colchici Ph. N. Ed. I.

B r æ k r o d - V i n.

Dosis maxima: *Guttæ triginta* (30).

† Vinum Opii crocatum. Vinum Thebaicum crocatum

loco Essentiæ Opii crocatæ Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.: Vinum thebaicum crocatum.

Ph. Germ. & Ph. Austr.: Tinctura Opii crocata (Opii 10 : 100). Ph. Brit.: Vinum Opii (Opii depurat. circ. 1 : 20). Ph. U. St.: Vinum Opii (circ. 1 : 8). Ph. Fr.: Laudanum de Sydenham (circ. 12 9/10).

L a u d a n u m.

Rp. Opii bene siccati et grosse pulverati

partes quindecim 15

Corticis Cinnamomi Ceylanici 1

Florum Caryophylli 1

singulorum grosse pulveratorum partem unam,

Stigmatum Croci nuper siccatorum *partes quinque 5*

Vini de Malaga *partes centum et quinquaginta 150.*

Mixtio per dies quinque macerata exprimatur et filtretur.

Caute servetur.

Dosis maxima: *Guttæ triginta (30).*

Nota: Partes duæ (2) respondent parti uni (1) essentiæ Opii crocatæ Ph. N. Ed. I.

Præparatum:

Liquor ophthalmicus circ. 10 : 1000.

† Vinum stibiatum

loco Solutionis Tartratis stibico-kalici alcoholicæ

Ph. N. Ed. I.

Ph. Svec. & Ph. Dan.

Ph. Germ.: Vinum stibiatum (1 : 250). Ph. Austr.:

Vinum stibiato-tartaricum (1 : 250). Ph. Brit.: Vi-

num antimoniale (1 : 200). Ph. U. St.: Vinum anti-

monii (1 : 225). Ph. Fr.: Vin émétique (1 : 300).

B r æ k - V i n .

Rp. **Tartratis stibico-kalici** *partem unam* 1
Vini Xeres *partes ducentas quingvagenta* 250.
 Soluta filtrentur.
 Caute servetur.

Nota: Partes quinque (5) respondent partibus quatuor (4)
 solutionis tartratis stibico-kalici alcoholicæ Ph.
 N. Ed. I.

In omnibus pharmacopoliis præsto esse debent:

- 1) Apparatus, qui ad præparata chemica exploranda requiruntur.
- 2) Apparatus, quibus ad explorationes volumetricas opus est.
- 3) Apparatus, qui ad pondus specificum definiendum requiruntur.

Reagentia,

qvæ ad medicamina exploranda in pharmacopoliis præsto esse debent.

Si præparata, qvæ in hac tabula enumeravimus, etiam in materia medica Pharmacopoeæ exstant, hujus præparata adhibeantur, nisi aliter expresse præscriptum est.

Acetas kalicus.

Acetas plumbicus in *Aqvæ destillatæ partibus novem* (9) solutus.

Acidum aceticum.

Acidum hydrochloratum.

Acidum nitricum.

Acidum oxalicum in *Aqvæ destillatæ partibus undeviginti* (19) solutum.

Ignitum nullo residuo relicto avolet (alkalia).

Acidum sulphuricum concentratum.

Acidum sulphuricum dilutum.

Acidum tartaricum in *Aqvæ destillatæ partibus quatuor* (4) solutum.

Æther.

Amylum.

Biboras natricus.

Bichromas kalicus.

Solutio acido nitrico acidulata nitrato argentario ne præcipitetur (chloreto).

Carbonas natricus in *Aqvæ destillatæ partibus novem* (9) solutus.

Carbonas natricus anhydrus.

Charta exploratoria cærulea.

Charta exploratoria rubra.

Chloretum ammonicum in **Aqvæ destillatæ** *partibus novem* (9) solutum.

Chloretum barycum in **Aqvæ destillatæ** *partibus novem* (9) solutum.

Solutio solutione sulphidi hydrici ne turbetur (metalla). Solutio, unde baryum acido sulphurico abunde addito plane eliminatum est, evaporata residuum in igne persistens ne relinquat (alkalia).

Chloretum ferricum in **Aqvæ destillatæ** *partibus undeviginti* (19) solutum.

Chloretum hydrargyricum corrosivum in **Aqvæ destillatæ** *partibus undeviginti* (19) solutum.

Chloroformium.

Cyanetum ferroso-kalicum in **Aqvæ destillatæ** *partibus novem* (9) solutum.

Solutio valde diluta chloreto baryco ne turbetur (acid. sulphuric.).

Cyanetum kalicum.

Ad reagendum etiam minus purum, quod parvam copiam carbonatis vel cyanatis kalici continet, adhibere licet.

Hydras kalicus vel **Hydras natricus** in **Aqvæ destillatæ** *partibus quatuor* (4) solutus.

Hypermanganas kalicus in **Aqvæ destillatæ** *partium quinque millibus* (5000) solutus.

Iodetum kalicum in **Aqvæ destillatæ** *partibus undeviginti* (19) solutum.

Nitras argenticus in **Aqvæ destillatæ** *partibus undeviginti* (19) solutus.

Nitras kalicus vel **Nitras natricus.**

Solutio acido nitrico acidulata nitrate argentario ne turbetur (chloreta).

Oxalas ammonicus in **Aqvæ destillatæ** *partibus undeviginti* (19) solutus.

Ignitus nullo residuo relicto avolet.

Phosphas natricus in *Aqvæ destillatæ partibus novem* (9) solutus.

Solutio acido nitrico acidulata ne solutione sulphidi hydrici neve nitrate argentario neve chloreto baryeo turbetur (metalla, chloreta, sulphates).

Solutio Ammoniaci.

Solutio exploratoria cærulea.

Sit quantum fieri potest reactionis neutrius. Servetur potissimum in lagena ad dimidiam modo partem replenda et gossypio laxè obturata.

Solutio sulphidi hydrici.

Gas sulphidi hydrici in aquam destillatam, coqvendo ab aëre liberatam, inducatur, donec portiuncula exempta solutione chlorethi ferri addita lactescat.

Solutio sulphohydratis ammoniaci.

In solutionem ammoniaci cum duplici sui copia aquæ destillatæ dilutam tamdiu inducatur gas sulphidi hydrici lotum, donec portiuncula exempta solutione sulphatis magnæsici addita non amplius turbetur. Solutio recens parata coloris fere expers est, interjecto tempore flavescit.

Spiritus concentratus.

Sulphas cupricus in *Aqvæ destillatæ partibus undeviginti* (19) solutus.

Sulphas ferrosus.

Supercarbonas ammonicus in *Aqvæ destillatæ partibus quatuor* (4) solutus.

Zincum purum granulatum.

Si zincum in apparatu Marshii cum acido sulphurico diluto aut acido hydrochlorato diluto tractaveris, gas inde ortum, quod chlorethi calcici ope siccatum aliquamdiu lente per tubum vitreum duxeris, qui apto ab orificio spatio usque ad candorem calefaciendus est, speculum metallicum in tubi parte frigida ne relinquat (As, Sb).

Solutiones exploratoriæ,

qvæ in pharmacopoliis præsto esse debent.

Serventur in lagenis epistomiis vitreis bene clausis. Solutio nitratis argentici exploratoria servetur a luce remota.

1) Solutio carbonatis natrici exploratoria.

1 CC. solutionis 0,0053 gram. carbonatis natrici anhydri continere debet.

Carbonas vel bicarbonas natricus chemice purus tamdiu candefiat, donec nihil jam ponderis amittat. Massæ omnino siccæ grammata quinque et tres decimæ (5,3 gram.) in lagenam litri unius capacem et aqua destillata semirepletam ingerantur. Sale omni soluto tanta copia aqvæ destillatæ addatur, ut calore graduum quindecim (+ 15°) solutio litrum unum accurate adæqvæt.

2) Solutio acidi sulphurici exploratoria.

1 CC. solutionis 0,004 gram. acidi sulphurici anhydri continere debet, qvæ copia 1 CC. solutionis carbonatis natrici exploratoriæ accurate saturat.

Ut hæc solutio paretur, grammata quatuor et novem decimæ (4,9 gram.) acidi sulphurici concentrati officialis tanta copia aqvæ destillatæ diluantur, ut litrum unum solutionis approximate habeas.

3) Solutio nitratis argentici exploratoria.

1 CC. solutionis 0,017 gram. nitratis argentici continere debet.

Grammata septendecim (17,00 gram.) nitratis argentici chemice puri in lagenam litri unius capacem et aqua destillata semirepletam ingerantur. Sale omni soluto, tanta copia aqvæ destillatæ addatur, ut calore graduum quindecim (+ 15°) solutio litrum unum accurate adæqvæt.

Tabula

rationem inter pondus medicum hucusque usitatum et
pondus metricum exhibens.

		Approximate:	Accurate:
		Grammata	Grammata
Libra medica	1		
vel			
Unciæ	12	360,00 . .	pro 357,8452
"	10	300,00 . .	298,2043
"	8	240,00 . .	238,5634
"	6	180,00 . .	178,9226
"	4	120,00 . .	119,2817
"	2	60,00 . .	59,6408
Uncia	1	30,00 . .	29,8204
Drachmæ	7	26,25 . .	26,0928
"	6	22,50 . .	22,3653
"	5	18,75 . .	18,6377
"	4	15,00 . .	14,9102
"	3	11,25 . .	11,1826
"	2	7,50 . .	7,4551
Drachma	1	3,75 . .	3,7275
Scrupuli	2	2,50 . .	2,4850
Scrupulus	1	1,25 . .	1,2425
Grana	19	1,18 . .	1,1802
"	18	1,12 . .	1,1181
"	17	1,06 . .	1,0560
"	16	1,00 . .	0,9939
"	15	0,93 . .	0,9318
"	14	0,87 . .	0,8696
"	13	0,81 . .	0,8075
"	12	0,75 . .	0,7454
"	11	0,68 . .	0,6833
"	10	0,62 . .	0,6212
"	9	0,56 . .	0,5590
"	8	0,50 . .	0,4969

		Approximate :	Accurate :
		Grammata	Graminata
Grana	7	. . 0,43 . .	. . . 0,4348
"	6	. . 0,37 . .	. . . 0,3727
"	5	. . 0,31 . .	. . . 0,3106
"	4	. . 0,25 . .	. . . 0,2484
"	3	. . 0,19 . .	. . . 0,1863
"	2	. . 0,12 . .	. . . 0,1242
Granum	1	. . 0,06 . .	. . . 0,0621
"	$\frac{1}{2}$	. . 0,03 . .	. . . 0,0310
"	$\frac{1}{3}$	. . 0,02 . .	. . . 0,0207
"	$\frac{1}{4}$	. . 0,015 . .	. . . 0,0155
"	$\frac{1}{6}$	. . 0,010 . .	. . . 0,0103

Tabula

rationem inter pondus metricum et pondus medicum
hucusque usitatum exhibens.

Pondus metricum.	Pondus medicum pristinum.	
	Approximate :	Accurate :
Kilogramma .	$33 \frac{1}{3} \ 4\frac{1}{3} \ 3$. . .	16103,0000 gr.
Hectogramma	$3 \frac{1}{3} \ 2\frac{5}{6} \ 3$. . .	1610,3000 gr.
Decagramma .	. . . $2\frac{2}{3} \ 3$. . .	161,0300 gr.
Gramma . . .	 16 gr.	16,1030 gr.
Decigramma .	 $1\frac{3}{5}$ gr.	1,6103 gr.
Centigramma	 $\frac{1}{6}$ gr.	0,1610 gr.
Milligramma .	 $\frac{1}{60}$ gr.	0,0161 gr.

Index

medicaminum, quæ rubris litteris et nota veneni signata
in armariis obseratis servanda sunt.

Acetas morphicus.

Acidum arsenicosum.

„ **hydrocyanatum.**

Chloreto-amidetum hydrargyricum.

Chloretum hydrargyricum corrosivum.

„ **morphicum.**

Liquor arseniitis kalici.

Nitras strychnicus.

Oxydum hydrargyricum.

Solutio sulphatis atropici.

Sulphas atropicus.

„ **morphicus.**

Veratrinum.

Obs. Aliæ quoque materiæ, quæ in officinis pharmaceuticis habentur et eandem fere vim perniciosam possident quam medicamenta supra enumerata, eodem modo servandæ sunt.

Quantitates exiguas salium morphicorum, quæ ad usum quotidianum requiruntur, extra armarium venenorum servare licet.

Index

medicaminum, quæ rubris litteris signata in vasis vel in
cistulis scriniisve stannatis servanda sunt.

Acetas plumbicus.

Acidum phenylicum.

Ætheroleum Sabinæ.

„ Sinapis.

Aloë.

Aqua Amygdalarum amararum.

Bulbus Scillæ.

Cantharides.

Chloretum hydrargyrosus mite.

„ zincicum.

Chloroformium.

Euphorbium.

Extractum Aconiti.

„ Aloës.

„ Belladonnæ.

„ Cannabis Indicæ.

„ Hyoscyami.

„ Nucis vomicæ.

„ Secalis cornuti.

Folia Belladonnæ.

„ Digitalis.

„ Hyoscyami.

„ Stramonii.

Herba Aconiti.

„ Conii.

„ Lobeliæ.

Hydras chloralicus.

Hypermanganas kalicus.

Iodum.
 Kermes mineralis.
 Liqvor acidus Halleri.
 Massa pilularum Colocynthidum compositarum.
 " " resinæ Jalapæ.
 Nitras argenticus.
 Oleum Crotonis.
 Opium.
 Opium depuratum.
 Oxydum plumbicum.
 " stibicum.
 Phosphorus.
 Pulpa Colocynthidum.
 Ramuli Sabinæ.
 Resina Jalapæ.
 " Podophylli.
 Santoninum.
 Scammonium.
 Secale cornutum.
 Semina Colchici.
 " Hyoscyami.
 " Nucis vomicæ.
 Solutio Iodi spirituosa.
 " superiodeti kalici.
 Sulphas cupricus.
 " zincicus.
 Tartras stibico-kalicus.
 Tinctura Aconiti.
 " Cantharidum.
 " Colocynthidum composita.
 " Digitalis.
 " Digitalis rubra.
 " Lobeliæ.
 " Nucis vomicæ.
 " Opii.

Ungventum Hydrargyri.
" oxydi hydrargyrici.
" stibiatum.

Vinum Colchici.

" Opii.
" Opii crocatum.
" stibiatum.

Obs. Etiam aliæ materiæ, quæ eandem fere fortitudinem
et vim habent quam medicamina supra enumerata,
eodem modo signandæ atque servandæ sunt.

T a b u l a

quantitatem maximam medicamentorum vehementium
adultis interne pro dosi dispensandam exhibens.

Acetas morphi ^c us	centigrammata tria = 0,03 gram.
Acidum arsenicosum	milligrammata qvinque = 0,005 gram.
« hydrochloratum dilutum	guttæ viginti (20).
« hydrocyanatum	guttæ tres (3).
« nitricum	guttæ qvindecim (15).
« nitricum hydrochloratum	guttæ qvindecim (15).
« phenylicum	guttæ tres (3).
« phosphoricum dilutum	guttæ viginti (20).
« sulphuricum dilutum	guttæ viginti (20).
Aconiti Extractum	centigrammata qvindecim = 0,15 gram.
« Herba	centigrammata viginti qvinque = 0,25 gram.
« Tinctura	guttæ triginta (30).
Aqua amygdalarum amararum	guttæ qvinqvaginta (50).
Belladonnæ Extractum	centigrammata qvinque = 0,05 gram.
« Folia	centigrammata triginta = 0,30 gram.
Cannabis Indicæ Extractum	centigrammata decem = 0,10 gram.
Cantharidum Tinctura	guttæ triginta (30).
Chloretum hydrargyricum corrosivum	
.	centigrammata tria = 0,03 gram.
« morphi ^c um	centigrammata tria = 0,03 gram.
Colchici Vinum	guttæ qvinqvaginta (50).
Colocynthis Pulpa	centigrammata viginti = 0,20 gram.
« Tinctura composita	guttæ triginta (30).
Conii Herba	centigrammata triginta = 0,30 gram.
Crotonis Oleum	gutta una (1).
Digitalis Folia	centigrammata viginti = 0,20 gram.
« Tinctura	guttæ triginta (30).
« « rubra	guttæ triginta (30).
Hydras chloralicus	grammata tria = 3,00 gram.
Hyoscyami Extractum	centigrammata viginti = 0,20 gram.
« Folia	centigrammata qvadraginta = 0,40 gram.
« Semina	centigrammata viginti = 0,20 gram.

Iodum	centigrammata qvinque = 0,05 gram.
Iodi, Solutio spirituosa	guttæ viginti (20).
Jalapæ Resina	centigrammata triginta = 0,30 gram.
Liqvor acidus Halleri	guttæ decem (10).
« arseniitis kalici	guttæ decem (10).
Lobeliæ Herba	centigrammata triginta = 0,30 gram.
« Tinctura	guttæ qvinqvaginta (50).
Nitras argenticus	centigrammata tria = 0,03 gram.
« strychnicus	milligrammata qvinque = 0,005 gram.
Nucis vomicæ Extractum	centigrammata decem = 0,10 gram.
« « Semina	centigrammata viginti = 0,20 gram.
« « Tinctura	guttæ qvadraginta (40).
Opium	centigrammata qvindecim = 0,15 gram.
« depuratum	centigrammata decem = 0,10 gram.
Opii Tinctura	guttæ triginta (30).
« Vinum	guttæ triginta (30).
« Vinum crocatum	guttæ triginta (30).
Phosphorus	centigramma unum = 0,01 gram.
Podophylli Resina	centigrammata decem = 0,10 gram.
Sabinæ Ætheroleum	gutta una (1).
« Ramuli	gramma unum = 1,00 gram.
Santoninum	centigrammata qvindecim = 0,15 gram.
Scammonium	centigrammata qvinqvaginta = 0,50 gram.
Scillæ Bulbus	centigrammata viginti qvinque = 0,25 gr.
Secalis cornuti Extractum	centigrammata triginta = 0,30 gram.
Stramonii Folia	centigrammata triginta = 0,30 gram.
Sulphas atropicus	milligramma unum = 0,001 gram.
« cupricus . Dosis emetica centigrammata sexaginta = 0,60 gram.	
« morphicus	centigrammata tria = 0,03 gram.
« zincicus . Dosis emetica centigrammata sexaginta = 0,60 gram.	
Tartras stibico-kalicus.	
	Dosis emetica centigrammata qvindecim = 0,15 gram.
Veratrinum	centigramma unum = 0,01 gram.

Nota. Si medicus dosin majorem, quam quæ in hac tabula indicata est, præscribit, præter solitos numeros litteris quoque dosin significare debet. Alioquin pharmacopola dispensationem differre debet, donec per litteras vel per colloquium de præscripto medici certior factus est.

T a b u l a

rationem inter pondus specificum **Alcoholis** cum aqua
hydri, ratione habita

Pondus specificum ad caloris gradum 1° (secundum Gay- Lussac).	Partes centesimae voluminis Alcoholis anhydri (secundum Tralles).	Partes centesimae ponderis Alcoholis anhydri.	Pondus specificum ad caloris gradum 1° (secundum Gay- Lussac).	Partes centesimae voluminis Alcoholis anhydri (secundum Tralles).	Partes centesimae ponderis Alcoholis anhydri.
0,7947	100	100,00	0,8799	74	66,83
0,7995	99	98,39	0,8824	73	65,74
0,8041	98	96,84	0,8850	72	64,66
0,8084	97	95,34	0,8875	71	63,58
0,8125	96	93,89	0,8907	70	62,50
0,8168	95	92,46	0,8925	69	61,42
0,8201	94	91,07	0,8949	68	60,38
0,8237	93	89,71	0,8973	67	59,32
0,8272	92	88,37	0,8997	66	58,27
0,8306	91	87,09	0,9027	65	57,24
0,8346	90	85,75	0,9044	64	56,22
0,8373	89	84,46	0,9067	63	55,21
0,8405	88	83,19	0,9090	62	54,21
0,8436	87	81,94	0,9112	61	53,20
0,8466	86	80,71	0,9141	60	52,20
0,8502	85	79,50	0,9156	59	51,20
0,8526	84	78,29	0,9178	58	50,21
0,8555	83	77,09	0,9200	57	49,23
0,8583	82	75,91	0,9221	56	48,26
0,8611	81	74,74	0,9248	55	47,29
0,8645	80	73,59	0,9262	54	46,32
0,8664	79	72,45	0,9283	53	45,36
0,8693	78	71,31	0,9303	52	44,42
0,8720	77	70,18	0,9323	51	43,47
0,8747	76	69,05	0,9348	50	42,52
0,8773	75	67,93	0,9362	49	41,59

exhibens

destillata mixti et partes centesimas Alcoholis an-
voluminis et ponderis.

Pondus specificum ad caloris gradum 15 (secundum Gay- Lussac).	Partes centesimæ voluminis Alcoholis anhydri (secundum Tralles).	Partes centesimæ ponderis Alcoholis anhydri.	Pondus specificum ad caloris gradum 15 (secundum Gay- Lussac).	Partes centesimæ voluminis Alcoholis anhydri (secundum Tralles).	Partes centesimæ ponderis Alcoholis anhydri.
0,9381	48	40,66	0,9740	22	17,95
0,9399	47	39,74	0,9750	21	17,11
0,9417	46	38,82	0,9760	20	16,28
0,9440	45	37,90	0,9770	19	15,46
0,9452	44	36,99	0,9780	18	14,63
0,9470	43	36,08	0,9790	17	13,80
0,9487	42	35,18	0,9800	16	12,98
0,9503	41	34,28	0,9811	15	12,15
0,9523	40	33,39	0,9821	14	11,33
0,9535	39	32,50	0,9832	13	10,51
0,9550	38	31,62	0,9844	12	9,69
0,9565	37	30,74	0,9854	11	8,87
0,9579	36	29,86	0,9866	10	8,05
0,9595	35	28,99	0,9878	9	7,24
0,9605	34	28,13	0,9890	8	6,43
0,9618	33	27,27	0,9902	7	5,62
0,9631	32	26,41	0,9915	6	4,81
0,9643	31	25,55	0,9928	5	4,00
0,9656	30	24,69	0,9942	4	3,20
0,9666	29	23,84	0,9956	3	2,40
0,9677	28	22,99	0,9970	2	1,60
0,9688	27	22,14	0,9985	1	0,80
0,9698	26	21,30	1,0000	0	0
0,9709	25	20,46			
0,9719	24	19,62			
0,9729	23	18,78			

Pondus specificum spiritus, qvi ad usum pharmaceuticum adhibetur, temperatura majore minuitur, minore augetur, pro $1,25^{\circ}$ C. circiter 0,001.

Spiritus fortior ad debiliorem reduci potest secundum formulam $x = p \frac{b}{a}$.

E. g. Si grammata p spiritus b ‰ paranda sunt, hic spiritus grammata $p \frac{b}{100}$ alcoholis anhydri continebit. Si spiritus, qvem in promptu habemus, a ‰ continet, tanta copia hujus spiritus sumenda est, ut eandem copiam $\left(p \frac{b}{100}\right)$ alcoholis anhydri habeas. Si illam copiam littera x significes, alcoholis anhydri igitur partes $x \frac{a}{100}$ habemus, unde sequitur ut

$$x \frac{a}{100} = p \frac{b}{100}$$

$$x = p \frac{b}{a}.$$

Est igitur $p - x$ ea copia aqvæ destillatæ, qva, ut habeas copiam p spiritus b ‰, diluendæ sunt partes x spiritus a ‰, qvem primo in promptu habuimus.

T a b u l a

exhibens rationem inter pondus specificum et copiam
acidi anhydri, quæ in partibus centum (100) **Acidi**
acetici cum aqua diluti continetur (+ 15° C.).

(Secundum van der Toorn.)

Pondus specificum.	Partes centesimæ acidi acetici an- hydri.	Pondus specificum.	Partes centesimæ acidi acetici an- hydri.	Pondus specificum.	Partes centesimæ acidi acetici an- hydri.
1,0574	85	1,0729	56	1,0447	27
1,0603	84	1,0723	55	1,0433	26
1,0626	83	1,0717	54	1,0419	25
1,0646	82	1,0711	53	1,0404	24
1,0664	81	1,0705	52	1,0389	23
1,0681	80	1,0698	51	1,0373	22
1,0696	79	1,0691	50	1,0358	21
1,0710	78	1,0685	49	1,0342	20
1,0722	77	1,0675	48	1,0326	19
1,0732	76	1,0667	47	1,0310	18
1,0741	75	1,0658	46	1,0293	17
1,0748	74	1,0649	45	1,0277	16
1,0754	73	1,0640	44	1,0261	15
1,0759	72	1,0631	43	1,0245	14
1,0763	71	1,0621	42	1,0228	13
1,0765	70	1,0611	41	1,0211	12
1,0766	69	1,0601	40	1,0194	11
1,0766	68	1,0591	39	1,0177	10
1,0766	67	1,0580	38	1,0159	9
1,0765	66	1,0569	37	1,0141	8
1,0764	65	1,0558	36	1,0124	7
1,0762	64	1,0546	35	1,0107	6
1,0759	63	1,0537	34	1,0089	5
1,0756	62	1,0522	33	1,0072	4
1,0753	61	1,0510	32	1,0055	3
1,0749	60	1,0498	31	1,0037	2
1,0745	59	1,0485	30	1,0019	1
1,0740	58	1,0472	29		
1,0735	57	1,0460	28		

T a b u l a

exhibens rationem inter pondus specificum et copiam acidi anhydri, quæ in partibus centum (100) **Acidi hydrochlorati** cum aqua diluti continetur (+ 15° C.).

(Secundum Ure.)

Pondus specificum.	Partes centesimæ acidi an- hydri.	Pondus specificum.	Partes centesimæ acidi an- hydri.	Pondus specificum.	Partes centesimæ acidi an- hydri.	Pondus specificum.	Partes centesimæ acidi an- hydri.
1,2000	40,777	1,1515	30,582	1,1000	20,388	1,0497	10,194
1,1982	40,369	1,1494	30,174	1,0980	19,980	1,0477	9,786
1,1964	39,961	1,1473	29,767	1,0960	19,572	1,0457	9,379
1,1946	39,554	1,1452	29,359	1,0939	19,165	1,0437	8,971
1,1928	39,146	1,1431	28,951	1,0919	18,757	1,0417	8,563
1,1910	38,738	1,1410	28,544	1,0899	18,349	1,0397	8,155
1,1893	38,330	1,1389	28,136	1,0879	17,941	1,0377	7,747
1,1875	37,923	1,1369	27,728	1,0859	17,534	1,0357	7,340
1,1857	37,516	1,1349	27,321	1,0838	17,126	1,0337	6,932
1,1846	37,108	1,1328	26,913	1,0818	16,718	1,0318	6,524
1,1822	36,700	1,1308	26,505	1,0798	16,310	1,0298	6,116
1,1802	36,292	1,1287	26,098	1,0778	15,902	1,0279	5,709
1,1782	35,884	1,1267	25,690	1,0758	15,494	1,0259	5,301
1,1762	35,476	1,1247	25,282	1,0738	15,087	1,0239	4,893
1,1741	35,068	1,1226	24,874	1,0718	14,679	1,0220	4,486
1,1721	34,660	1,1206	24,466	1,0697	14,271	1,0200	4,078
1,1701	34,252	1,1185	24,058	1,0677	13,863	1,0180	3,670
1,1681	33,845	1,1164	23,650	1,0657	13,456	1,0160	3,262
1,1661	33,437	1,1143	23,242	1,0637	13,049	1,0140	2,854
1,1641	33,029	1,1123	22,834	1,0617	12,641	1,0120	2,447
1,1620	32,621	1,1102	22,426	1,0597	12,233	1,0100	2,039
1,1599	32,213	1,1082	22,019	1,0577	11,825	1,0080	1,631
1,1578	31,805	1,1061	21,611	1,0557	11,418	1,0060	1,124
1,1557	31,398	1,1041	21,203	1,0537	11,010	1,0040	0,816
1,1537	30,990	1,1020	20,796	1,0517	10,602	1,0020	0,408

T a b u l a

exhibens rationem inter pondus specificum et copiam
acidi anhydri, qvæ in partibus centum (100) **Acidi**
nitrici cum aqua diluti continetur (+ 15° C.).

(Secundum Kolb.)

Pondus specifi- cum.	Partes centesimæ acidi an- hydri.	Pondus specifi- cum.	Partes centesimæ acidi an- hydri.	Pondus specifi- cum.	Partes centesimæ acidi an- hydri.
1,530	85,71	1,435	62,57	1,298	40,44
1,530	85,57	1,432	61,85	1,295	39,97
1,530	85,47	1,429	61,06	1,289	38,57
1,529	85,30	1,423	60,00	1,274	37,31
1,523	83,90	1,419	59,31	1,264	36,00
1,520	83,14	1,414	58,29	1,257	35,14
1,516	82,28	1,410	57,43	1,251	34,28
1,514	81,66	1,405	56,57	1,244	33,43
1,509	80,57	1,400	55,77	1,237	32,53
1,506	79,72	1,395	54,85	1,225	30,86
1,503	78,85	1,393	54,50	1,218	29,29
1,499	78,00	1,386	53,14	1,211	29,02
1,495	77,15	1,381	52,46	1,198	27,43
1,494	76,77	1,374	51,43	1,192	26,57
1,488	75,43	1,372	51,08	1,185	25,71
1,486	74,95	1,368	50,47	1,179	24,85
1,482	73,86	1,363	49,71	1,172	24,00
1,478	72,86	1,358	48,86	1,166	23,14
1,474	72,00	1,353	48,08	1,157	22,04
1,470	71,14	1,346	47,14	1,138	19,71
1,467	70,28	1,341	46,29	1,120	17,14
1,463	69,39	1,339	46,12	1,105	14,97
1,460	68,57	1,335	45,40	1,089	12,85
1,456	67,71	1,331	44,85	1,077	11,14
1,451	66,56	1,323	43,70	1,067	9,77
1,445	65,14	1,317	42,83	1,045	6,62
1,442	64,28	1,312	42,00	1,022	3,42
1,438	63,44	1,304	41,14	1,010	1,71

T a b u l a

exhibens rationem inter pondus specificum et copiam
acidi anhydri, quæ in partibus centum (100) **Acidi**
sulphurici cum aqua diluti continetur (+ 15° C.).

(Secundum Bineau.)

Pondus specificum.	Partes centesimæ acidi an- hydri.	Pondus specificum.	Partes centesimæ acidi an- hydri.	Pondus specificum.	Partes centesimæ acidi an- hydri.	Pondus specificum.	Partes centesimæ acidi an- hydri.
1,843	81,63	1,675	61,22	1,398	40,81	1,182	20,40
1,842	80,81	1,663	60,40	1,388	40,00	1,174	19,58
1,840	80,00	1,651	59,59	1,379	39,18	1,167	18,77
1,840	79,18	1,639	58,77	1,370	38,36	1,159	17,95
1,838	78,36	1,637	57,95	1,361	37,55	1,151	17,14
1,837	77,55	1,615	57,14	1,351	36,73	1,144	16,32
1,835	76,73	1,604	56,32	1,342	35,82	1,136	15,51
1,834	75,91	1,592	55,59	1,333	35,10	1,129	14,69
1,831	75,10	1,580	54,69	1,324	34,28	1,121	13,87
1,827	74,28	1,568	53,87	1,315	33,47	1,113	13,06
1,822	73,47	1,557	53,05	1,306	32,65	1,106	12,24
1,816	72,65	1,545	52,24	1,297	31,83	1,098	11,42
1,809	71,83	1,534	51,42	1,289	31,02	1,091	10,61
1,802	71,02	1,523	50,61	1,281	30,20	1,083	9,79
1,794	70,10	1,512	49,79	1,272	29,38	1,075	8,98
1,786	69,38	1,501	48,98	1,264	28,57	1,068	8,16
1,777	68,57	1,490	48,16	1,256	27,75	1,061	7,34
1,767	67,75	1,480	47,34	1,247	26,94	1,053	6,53
1,756	66,94	1,469	46,53	1,239	26,12	1,046	5,71
1,745	66,12	1,458	45,71	1,231	25,30	1,039	4,89
1,734	65,30	1,448	44,89	1,223	25,49	1,032	4,08
1,722	64,48	1,438	44,07	1,215	23,67	1,025	3,26
1,710	63,67	1,428	43,26	1,206	22,85	1,019	2,44
1,698	62,85	1,418	42,45	1,198	22,03	1,013	1,63
1,686	62,04	1,408	41,63	1,190	21,22	1,006	0,81

T a b u l a

exhibens rationem inter pondus specificum et copiam
Ammoniaci anhydri, quæ in partibus centum (100) **Am-**
moniaci cum aqua diluti continetur (+ 14° C.).

(Secundum Carium.)

Pondus specificum.	Partes centesimæ Ammoniaci anhydri.	Pondus specificum.	Partes centesimæ Ammoniaci anhydri.
0,8844	36,0	0,9314	18,0
0,8864	35,0	0,9347	17,0
0,8885	34,0	0,9380	16,0
0,8907	33,0	0,9414	15,0
0,8929	32,0	0,9449	14,0
0,8953	31,0	0,9484	13,0
0,8976	30,0	0,9520	12,0
0,9001	29,0	0,9556	11,0
0,9026	28,0	0,9593	10,0
0,9052	27,0	0,9631	9,0
0,9078	26,0	0,9670	8,0
0,9106	25,0	0,9709	7,0
0,9133	24,0	0,9749	6,0
0,9166	23,0	0,9790	5,0
0,9191	22,0	0,9831	4,0
0,9221	21,0	0,9873	3,0
0,9251	20,0	0,9915	2,0
0,9283	19,0	0,9959	1,0

Tabula

qvæ approximate indicat, qvot partes **Aqvæ frigidæ** ad
singulas partes medicaminum qvorundam
solvendas requirantur.

Acetas kalicus	pars una, 1, solvitur in p. 2.
„ plumbicus	— 1 — — 2.
Acidum arsenicosum	— 1 — — 60.
„ benzoicum	— 1 — — 200.
„ phenylicum	— 1 — — 70.
„ salicylicum	— 1 — — ca. 500.
„ succinicum subflavum	— 1 — — 24.
„ tartaricum	— 1 — — 1,5.
Æther	— 1 — — 10.
Æther aceticus	— 1 — — 10.
Biboras natricus	— 1 — — 15.
Bicarbonas kalicus	— 1 — — 4.
„ natricus	— 1 — — 13.
Bitartras kalicus	— 1 — — 170.
Brometum kalicum	— 1 — — 1,5.
Carbonas kalicus depuratus	— 1 — — 1.
„ „ purus	— 1 — — 1.
„ natricus	— 1 — — 2.
Chloras kalicus	— 1 — — 17.
Chloretum ammonicum	— 1 — — 3.
„ chinicum	— 1 — — 24.
„ hydrargyricum corrosivum	— 1 — — 16.
„ morphicum	— 1 — — 20.
Iodetum kalicum	— 1 — — 1.
Lactas ferrosus	— 1 — — 50.

Nitras	argenticus	pars una, 1, solvitur in p. 1.			
„	kalicus	—	1	—	3.
„	natricus	—	1	—	2.
„	strychnicus	—	1	—	60.
Saccharum	lactis	—	1	—	7.
Sulphas	aluminico-kalicus	—	1	—	16.
„	atropicus	—	1	—	2.
„	chinicus	—	1	—	800.
„	cupricus	—	1	—	4.
„	ferrosus	—	1	—	2.
„	kalicus	—	1	—	9.
„	magneticus	—	1	—	2.
„	natricus	—	1	—	3.
„	zincicus	—	1	—	1.
Supercarbonas	ammonicus	—	1	—	4.
Tartarus	boraxatus	—	1	—	1.
Tartras	kalicus	—	1	—	1.
„	natrico-kalicus	—	1	—	2.
„	stibico-kalicus	—	1	—	20.
Valerianas	zincicus	—	1	—	90.

T a b u l a
pondus atomorum demonstrans.

Aluminium	Al.	27,4.
Argentum	Ag.	108.
Arsenium	As.	75.
Aurum	Au.	196,5.
Barium	Ba.	137.
Bismuthum	Bi.	210.
Boron	Bo.	11.
Bromum	Br.	80.
Calcium	Ca.	40.
Carbonium	C.	12.
Chlorum	Cl.	35,5.
Cuprum	Cu.	63,5.
Ferrum	Fe.	56.
Hydrargyrum	Hg.	200.
Hydrogenium	H.	1.
Iodum	I.	127.
Kalium	K.	39.
Magnesium	Mg.	24.
Manganum	Mn.	55.
Natrium	Na.	23.
Nitrogenium	N.	14.
Oxygenium	O.	16.
Phosphorus	P.	31.
Platinum	Pt.	198.
Plumbum	Pb.	207.
Stibium	Sb.	122.
Sulphur	S.	32.
Zincum	Zn.	65.

Index

medicaminum, quorum fortitudo vel compositio in hac editione Pharmacopoeæ commutata est.

Commutationes graviores typis distensis notatæ sunt.

Editio altera.

Acidum aceticum (Acidi anhydri 25 %).

Acidum hydrochloratum (25 %).

Acidum nitricum (25 %).

Aqua Amygdalarum amararum.

Decoctum Chinæ acidum.

Elæosacchara.

Emulsio Amygdalarum.

Emulsio oleosa.

Extractum Rhei compositum.

Gelatina Caragheen.

Gelatina lichenis Islandici.

Infusum Rhei alkalinum.

Infusum Sennæ compositum.

Kermes mineralis (Oxydi stibici 1 & Sulphureti stibici amorphi 9).

Linctus boracinus.

Linimentum ammoniacato-camphoratum.

Linimentum Opodeldoc.

Liquor acidus Halleri (Spiritus concentrati & Acidi sulphurici concentrati partes æquales).

Liquor arseniitis kalici.

Liquor citratis kalici.

Liquor ophthalmicus.

Liquor pectoralis.

Editio prior.

Acidum aceticum concentratum (65 %).

Acidum aceticum dilutum (10 %).

Acidum hydrochloricum concentratum (circiter 20 %).

Acidum nitricum concentratum (60 %).

Acidum nitricum dilutum (10 %).

Gelatina Sphærococci.

Gelatina Cetrariæ elotæ.

Decoctum Cassiarum compositum.

Pulvis stibicus (Oxydi stibici 1 & Sulphureti stibici crystallis. 4).

Elixir acidum (Spiritus concentrati 4 & Acidi sulphurici concentrati 1).

Editio altera.

Liquor supercarbonatis ammonici
pyroleosi (1—6).
Massa pilularum de Cynoglossio.
Mixture acida.
Mixture alba.
Mixture camphorata.
Mixture camphorata acida.
Mixture Ferri composita.
Mucilago Cydoniæ.
Mucilago Salep.
Serum lactis aluminatum (1 : 200).
Solutio acetatis ammonici
(Acetatis ammonici 20 %).
Solutio Ammoniaci spirituosus
(Ammoniaci 5 %).
Solutio Calcis chloratæ (2 : 100).

Solutio carbonatis kalici (Car-
bonatis kalici 20 %).
Solutio chloreti ferri (Chlo-
reti ferri crystallisati & Aquæ
partes æquales).
Solutio Iodis spirituosus (Iodi 5 %).
Solutio subacetatis plumbici diluta.
Solutio superiodeti kalici
(Iodi 1 % & Iodeti kalici 2 %).
Species resolventes.
Syrupus opiatus (Opii 0,1 %).
Tinctura Aconiti (10 : 100).
Tinctura Colocynthis com-
posita (10 : 100).
Tinctura Digitalis (10 : 100).
Tinctura Digitalis rubra
(10 : 100).
Tinctura extracti Pomorum
ferrati (20 : 100).
Tinctura Guajacii ammoniacata
(Ammoniaci circiter 3 %).
Tinctura Lavandulæ composita.
Tinctura Opii (Opii 10 %).
Tinctura Rhei amara.

Editio prior.

Solutio sesquicarbonatis ammo-
nici pyro-oleosi (1—9).

Serum lactis aluminatum (1 : 300).
Solutio acetatis ammonici (Ace-
tatis ammonici 10 %).
Solutio Ammoniaci alcoholica
(Ammoniaci 10 %).
Solutio Calcis chloratæ diluta
(circiter 1 : 100).
Solutio carbonatis kalici (Carbo-
natis kalici 10 %).
Solutio chloreti ferri (Chloreti
ferri crystallisati 1 & Aquæ 5).

Solutio Iodis alcoholica (Iodi 10 %).
Solutio superiodeti kalici (Iodi
10 % & Iodeti kalici 13 %).

Syrupus opiatus (Opii 0,2 %).
Essentia Aconitorum (20 : 100).
Essentia Colocynthis (20 : 100).

Essentia Digitalis (20 : 100).
Essentia Digitalis composita
(20 : 100).
Solutio extracti Pomorum ferrati
(10 : 100).
Essentia Guajacii ammoniacata (Am-
moniaci circiter 9 %).
Essentia Lavandulæ.
Essentia Opii simplex (Opii 20 %).

Editio altera.

Ungventum basilicum flavum.
 Ungventum basilicum nigrum.
 Ungventum ceræ.
 Ungventum iodeti kalici (Iodeti kalici 10 %).
 Ungventum oxydi hydrargyrici (Oxydi hydrargyrici 5 %).
 Ungventum stibiati (Tartari stibiati 20 %).
 Vinum Colchici (Seminum Colchici 1 & Vini Xeres 10).
 Vinum Opii crocatum (Opii 10 %).
 Vinum stibiati (Tartari stibiati 1 & Vini Xeres 250).

Editio prior.

Ungventum iodatum (Iodeti kalici circiter 11 % & Iodi circiter 1 %).
 Ungventum oxydi hydrargyrici (Oxydi hydrargyrici circ. 11 %).
 Ungventum stibiati (Tartari stibiati circiter 33 %).
 Essentia Colchici (Seminum Colchici 1 & Spiritus (45 %) 5).
 Essentia Opii crocata (Opii 20 %).
 Solutio tartratis stibico-kalici alcoholica (Tartari stibiati 1 & Spiritus tenuis 199).

Index

medicamentorum et quæ in alteram pharmacopoeæ editionem nunc iterum typis descriptam nova recepta sunt et de quibus aliquid mutatum est.

A. Medicamenta, quæ in alteram pharmacopoeæ editionem nunc iterum typis descriptam nova recepta sunt:

Acidum salicylicum.
 Citras ferrico-ammonicus.
 Emplastrum adhæsivum cum resina Mastiche.
 Salicylas natrius.
 Solutio acidi carbolicæ.
 Solutio sulphatis atropici.
 Species laxantes Hamburgenses.
 Tinctura antihysterica.
 Tinctura Benzoës composita.
 Tinctura digestiva.
 Tinctura odontalgica.
 Vinum Chinæ.
 Vinum Chinæ ferratum.

B. Medicamenta, jam antea recepta, de quibus aliquid mutatum est.

1. Medicamenta, quorum compositio mutata est:

Æther chloratus spirituosus.
 Ceratum rubrum.
 Elæosacchara.
 Sericum adhæsivum.
 Solutio chloreti ferrici spirituosæ-æthereæ.
 Unguentum Glycerini.
 Vinum Opii crocatum.

2. Medicamenta, de quibus aliis in rebus graviores mutationes statutæ sunt:

Ætheroleum Juniperi.

Chloroformium.

Cortex Chinæ Calisayæ.

Glycerinum.

Hydras chloralicus.

Moschus.

Semina nucis vomicæ.

INDEX.

A.			
	Pag.		Pag.
Absinthii, Ætheroleum.....	19.	Acidum tannicum	7.
« Herba.....	110.	« tartaricum.....	16.
« Tinctura.....	245.	Aconiti, Extractum.....	77.
Acetas æthylicus.....	17.	« Herba.....	111.
« kalicus.....	1.	« Tinctura	245.
« morpheus.....	1.	Æther	16.
« morphinicus.....	1.	« aceticus	17.
« plumbicus.....	2.	« alcoholicus	18.
Acetatis ammoniaci, Solutio... 198.		« « camphoratus.....	18.
Acetum aromaticum	3.	« chloratus spirituosus... 17.	
« saturninum.....	206.	« spirituosus	18.
« Scillæ.....	3.	« « camphoratus.....	18.
Acidum aceticum	4.	Ætherolea	19.
« « concentratum	4.	Ætheroleum Absinthii.....	19.
« « dilutum.....	4.	« Amygdalarum amara-	
« arsenicosum	5.	rum	20.
« benzoicum.....	5.	« Anisi	20.
« benzoicum sublimatum..	5.	« Bergamiæ	21.
« carbolicum	12.	« Brassicæ.....	29.
« citricum	6.	« Cajeput	21.
« gallotannicum.....	7.	« Cari.....	22.
« hydrochloratum.....	7.	« Carvi	22.
« « dilutum.....	8.	« Caryophylli	22.
« hydrochloricum concen-		« Cassiæ.....	23.
tratum.....	7.	« Citri	23.
« hydrochloricum dilutum	8.	« Corticis Cinnamomi... 23.	
« hydrocyanatum	9.	« Cumini	24.
« hydrocyanicum.....	9.	« Foeniculi	24.
« nitrico-nitrosus.....	10.	« Juniperi	25.
« nitricum	11.	« Lavandulæ.....	25.
« « concentratum.....	11.	« Macidis	26.
« « dilutum	11.	« Melaleucarum crudum	21.
« « hydrochloratum	11.	« Menthæ.....	26.
« phenylicum	12.	« « crispæ.....	26.
« phosphoricum.....	12.	« « piperitæ	27.
« phosphoricum dilutum... 12.		« Origani	27.
« salicylicum.....	13.	« « Cretici	27.
« succinicum crystallisa-		« Petroselini	27.
tum.....	13.	« Pinorum crudum	30.
« succinicum subflavum... 13.		« « rectificatum	30.
« sulphuricum concentra-		« Rorismarini.....	28.
tum.....	14.	« Rosæ.....	28.
« sulphuricum dilutum ... 15.		« Rosmarini.....	28.

	Pag.		Pag.
Ætheroleum Sabinæ.....	29.	Aurantii, Flavedo	67.
« Sinapis	29.	« Fructus immaturi	99.
« Terebinthinæ crudum...	30.	« Syrupus.....	236.
« « rectificatum.....	30.	« Tinctura	248.
« Thymi	31.	Axungia.....	36.
Agaricus chirurgorum.....	31.	« benzoata.....	37.
Alcohol rectificatissimum....	213.	« suis	36.
« rectificatum.....	214.		
« tenue.....	215.	B.	
Alkannæ, Radix.....	169.	Balsamum Copaiferarum... 37.	
Aloë.....	31.	« Copaiva.....	37.
Aloë Capensis.....	31.	« Laricis.....	40.
Aloës, Extractum	78.	« Nucistæ.....	133.
Althææ, Radix.....	170.	« Peruvianum.....	38.
« Syrupus.....	235.	« Pinorum	39.
Alumen.....	220.	« Styrax liquidus.....	38.
« ustum.....	220.	« Terebinthina communis	39.
Amideto-chloretum hydrargy- ricum.....	55.	« « Veneta	40.
Ammoniacum	106.	« Tolutanum.....	40.
Amygdalarum, Emulsio.....	74.	« vitæ Hoffmanni.....	249.
« Oleum	145.	Bardanæ, Radix.....	172.
Amygdalæ amaræ.....	192.	Belladonnæ, Extractum	78.
« dulces.....	192.	« Folia.....	91.
Amygdali, Semina amara....	192.	Benzoë.....	181.
« « dulcia.....	192.	« Resina.....	181.
Amylum Arrow.....	32.	Benzoës, Tinctura	249.
« Marantæ.....	32.	« « composita... 250.	
« Tritici	33.	Bergamiæ, Ætheroleum.....	21.
« Triticorum.....	33.	Biboras natricus.....	41.
Angelicæ, Radix.....	171.	Bicarbonas kalicus	41.
Anisi, Ætheroleum	20.	« natricus.....	42.
« Fructus.....	98.	Bitartras kalicus.....	43.
Antimonium crudum.....	33.	Borax.....	41.
Aqua amygdalarum amararum	33.	Brometum kalicum	44.
« amygdalarum amara- rum destillata.....	33.	Bucco, Folia.....	92.
« calcis.....	204.	Bulbi Scillæ.....	45.
« Cinnamomi spiritiosa... 34.		Bulbus Scillæ.....	45.
« destillata	34.	Butyrum Cacao.....	145.
« picea	35.		
« pyrolei Pini	35.	C.	
« regia	11.	Cacao, Oleum.....	145.
« saturnina.....	206.	« Semina.....	193.
Aquæ destillatæ	35.	Cajeput, Ætheroleum.....	21.
« extemporaneæ	36.	Calami, Rhizoma.....	185.
Arnica, Flores.....	86.	Calcaria chlorata	45.
« Tinctura.....	247.	Calomel	59.
Arrow, Amylum.....	32.	Calx chlorata.....	45.
Artemisiæ, Radix.....	171.	« viva.....	154.
Asa foetida.....	107.	Camphora.....	46.
Asæ foetidæ, Tinctura.....	248.	Cannabis Indicæ, Extractum	79.
Aurantii, Cortex fructuum... 67.		Cannabis, Fructus	99.
		Cantharides	47.

	Pag.		Pag.
Cantharidum, Emplastrum co-		Chloreto-amidetum hydrar-	
latum...	71.	gyricum	55.
« cum Eu-		Chloretum ammonicum.....	56.
phorbio	71.	« chinicum.....	57.
« ordinarium	72.	« ferricum	57.
« Tinctura.....	250.	« hydrargyricum corrosi-	
« Ungventum	268.	vum	59.
Caragheen	48.	« hydrargyrosus mite...	59.
« Gelatina.....	104.	« « mite sublimatum	59.
Carbo ligni	48.	« morphecum.....	60.
« « præparatus.....	48.	« zincicum.....	61.
Carbonas calcicus.....	49.	Chloroformium.....	61.
« « cretaceus.....	49.	Cinæ, Flores.....	88.
« kalicus	50.	Cinnamomi Ceylanici, Cortex	66.
« « depuratus.....	49.	« Tinctura.....	253.
« « purus	50.	Citras ferrico-ammonicus.....	62.
« natricus	51.	Citri, Ætheroleum.....	23.
« « crystallisatus	51.	Colchici, Semina.....	193.
Cardamomi, Fructus.....	100.	« Vinum	276.
Cardui benedicti, Extractum	79.	Cold Cream	269.
« « Folia.....	92.	Collodium	63.
Carvi, Ætheroleum.....	22.	« cantharidatum	64.
« Fructus	100.	« elasticum	64.
Caryophylli, Ætheroleum.....	22.	Colocynthis, Massa pilu-	
« Flores.....	87.	larum compositarum... 134.	
Cascarillæ, Cortex.....	65.	Colocynthis, Pulpa.....	162.
« Tinctura.....	250.	« Tinctura composita.....	253.
Cassia, Ætheroleum.....	23.	Colophonium.....	182.
Castorei, Tinctura.....	251.	« Resina	182.
« « ætherea.....	251.	Columbo, Radix.....	172.
Castoreum Canadense	51.	Conii, Herba.....	112.
Cera alba.....	52.	Conchæ Ostrea.....	244.
« flava.....	52.	Coriandri, Fructus	101.
Ceræ, Ungventum.....	269.	Cortex Cascarillæ.....	65.
Ceratum labiale.....	53.	« Chinæ Calisayæ.....	65.
« rubrum	53.	« Cinchonæ regius.....	65.
Cetacei, Ungventum	269.	« Cinnamomi Ceylanici..	66.
Cetaceum.....	53.	« Eluteriæ	65.
Cetraria	125.	Cortex Frangulæ.....	67.
« elota.....	125.	« fructuum Aurantii.....	67.
Chamomillæ, Flores	88.	Cortex Quercus.....	68.
« Oleum infusum.....	147.	« Quercum.....	68.
Charta antirheumatica.....	54.	Cremor Tartari	43.
Chinæ Calisayæ, Cortex.....	65.	Creta alba.....	49.
« Decoctum	68.	Croci, Stigmata.....	217.
« « acidum	69.	Crotonis, Oleum	147.
« Tinctura.....	251.	Cubebæ, Fructus.....	101.
« « composita.....	252.	Cumini, Ætheroleum.....	24.
« Vinum	275.	Cydoniæ, Mucilago.....	140.
« « ferratum	276.	« Semina.....	194.
Chinoidinum.....	54.	Cynoglossi, Radix.....	173.
Chinoidini, Tinctura.....	252.	Cynoglossi, Massa pilula-	
Chloras kalicus.....	55.	rum de.....	135.

	Pag.		Pag.
D.		<i>Essentia Digitalis composita</i>	254.
Decocta.....	68.	<i>Eluteriæ</i>	250.
<i>Decoctum Cassiarum compo-</i>		<i>Ferulæ</i>	248.
<i>situm</i>	121.	<i>Gentianæ</i>	255.
<i>Chinæ</i>	68.	<i>Guajaci ammoniata</i> ...	256.
<i>acidum</i>	69.	<i>Krameria</i>	260.
<i>Cinchonæ acidum</i>	69.	<i>Lavandulæ</i>	256.
<i>simplex</i>	68.	<i>Opii benzoica</i>	259.
<i>Digitalis, Folia</i>	93.	<i>crocata</i>	278.
<i>Tinctura</i>	254.	<i>simplex</i>	258.
<i>rubra</i>	254.	<i>Pimpinellæ</i>	260.
<i>Dulcamaræ, Stipites</i>	218.	<i>Rheorum</i>	260.
		<i>Valerianæ</i>	261.
E.		<i>Essentiæ</i>	244.
<i>Eau de chérubin</i>	258.	<i>Euphorbium</i>	75.
<i>Elæosacchara</i>	69.	<i>Extracta</i>	76.
<i>Electuarium aperiens</i>	69.	<i>Extracti Pomorum ferrati,</i>	
<i>Elixir acidum</i>	129.	<i>Tinctura</i>	255.
<i>antasthmaticum Aaskovi</i>	254.	<i>Extractum Aconiti</i>	77.
<i>paregoricum</i>	259.	<i>Aconitorum</i>	77.
<i>pectorale</i>	131.	<i>Aloës</i>	78.
<i>Emplastrum adhæsivum</i>	70.	<i>Aspidii</i>	80.
<i>cum resina</i>		<i>Atropæ</i>	78.
<i>Mastiche</i> ..	71.	<i>Belladonnæ</i>	78.
<i>Cantharidum colatum</i> ...	71.	<i>Cannabis Indicæ</i>	79.
<i>cum Euphorbio</i>	71.	<i>Cardui benedicti</i>	79.
<i>ordinarium</i>	72.	<i>Cnici</i>	79.
<i>perpetuum</i>	71.	<i>Filicis</i>	80.
<i>gummi-resinosum</i>	72.	<i>Gentianæ</i>	80.
<i>Meliloti</i>	73.	<i>Glycyrrhizæ crudum</i> ...	81.
<i>Melilotorum</i>	73.	<i>depuratum</i>	81.
<i>oxydi plumbici</i>	74.	<i>Hyoscyami</i>	82.
<i>plumbicum</i>	74.	<i>Nucis vomicæ</i>	82.
<i>Emulsio Amygdalarum</i>	74.	<i>Pomorum ferratum</i>	83.
<i>oleosa</i>	75.	<i>Rhei</i>	83.
<i>Ergotinum</i>	84.	<i>radicis Glycyrrhizarum</i>	81.
<i>Essentia Absynthii</i>	245.	<i>Rhei compositum</i>	84.
<i>Aconitorum</i>	245.	<i>Rheorum</i>	83.
<i>ætherea balsamica</i>	249.	<i>Secalis cornuti</i>	84.
<i>amara</i>	246.	<i>Strychni</i>	82.
<i>aromatica</i>	247.	<i>Taraxaci</i>	85.
<i>acida</i>	247.		
<i>Aurantii</i>	248.	F.	
<i>Balsamodendri</i>	257.	<i>Farfaræ, Folia</i>	93.
<i>Cantharidum</i>	250.	<i>Ferrum pulveratum</i>	85.
<i>Castorei</i>	251.	<i>reductum</i>	86.
<i>ætherea</i>	251.	<i>Filicis, Extractum</i>	80.
<i>Cinchonæ</i>	251.	<i>Rhizoma</i>	86.
<i>composita</i>	252.	<i>Flavedo Aurantii</i>	67.
<i>Cinnamomi</i>	253.	<i>Flores Arnicæ</i>	86.
<i>Colchici</i>	276.	<i>Artemisiæ</i>	88.
<i>Colocynthis</i>	253.	<i>Benzoës</i>	5.
<i>Digitalis</i>	254.	<i>Caryophylli</i>	87.

	Pag.		Pag.
Flores Chamomillæ	88.	Gelatina lichenis Islandici..	104.
« Cinæ	88.	« <i>Sphærococci</i>	104.
« Kusso.....	89.	Gentianæ, Extractum	80.
« Lavandulæ	89.	« Radix	173.
« <i>Matriacriæ</i>	88.	« Tinctura	255.
« Sambuci.....	90.	<i>Gerace</i>	134.
« <i>Sulphuris</i>	231.	Glacies	104.
« Tanaceti.....	90.	Glandulæ Lupuli.....	105.
« Verbasci	91.	Glycerini, Unguentum.....	270.
Foeniculi, Ætheroleum	24.	Glycerinum	105.
« Fructus	102.	Glycyrrhizæ, Extractum cru-	
<i>Folia Aconitorum</i>	111.	dum	81.
« <i>Arctostaphyli</i>	98.	« Extractum depuratum ..	81.
« <i>Atropæ</i>	91.	« Radix	174.
« Belladonnæ	91.	Guajaci, Lignum.....	126.
« Bucco.....	92.	« Resina	182.
« Cardui benedicti	92.	« Tinctura ammoniacata ..	256.
« <i>Cassiarum</i>	96.	<i>Gummi Acaciarum</i>	106.
« <i>Conii</i>	112.	« Arabici, Mucilago.....	141.
« <i>Daturæ</i>	97.	« Arabicum.....	106.
« Digitalis	93.	« <i>Astragalorum</i>	262.
« Farfaræ	93.	Gummi-resina Ammoniacum ..	106.
« Hyoscyami.....	94.	« « <i>Asa foetida</i>	107.
« <i>Malvarum</i>	113.	« « <i>Balsamodendri</i> ..	108.
« Menyanthis	95.	« « <i>Boscellia</i>	109.
« Nicotianæ	95.	« « <i>Convolvuli</i>	190.
« Salviæ	96.	« « <i>Dorema</i>	106.
« Sennæ	96.	« « <i>Ferula</i>	107.
« « spiritu extracta ...	97.	« « <i>Galbani</i>	108.
« Stramonii	97.	« « Galbanum	108.
« <i>Tussilaginis</i>	93.	« « Myrrha.....	108.
« Uvæ ursi	98.	« « Olibanum.....	109.
Frangulæ, Cortex	67.		
Fructus Anisi.....	98.	H.	
« Aurantii immaturi	99.	Hepar sulphuris	110.
« Cannabis	99.	Herba Absinthii	110.
« Cardamomi	100.	« Aconiti.....	111.
« <i>Cari</i>	100.	« <i>Cnici</i>	92.
« Carvi.....	100.	« <i>Conii</i>	112.
« Coriandri.....	101.	« Lobeliæ	112.
« Cubebæ	101.	« Malvæ	113.
« Foeniculi	102.	« Meliloti	113.
« <i>Humuli</i>	103.	« <i>Melilotorum</i>	113.
« Juniperi.....	102.	« Melissæ	114.
« Lupuli	103.	« Menthæ piperitæ	114.
« <i>Tamarindi</i>	163.	« Origani	114.
		Hydrargyri, Unguentum	270.
G.		<i>Hydrargyrum</i>	115.
Galangæ, Rhizoma	186.	Hydrargyrum crudum.....	115.
Galbanum	108.	« depuratum	115.
Gelatina alba.....	103.	Hydras chloralicus	116.
« Caragheen.....	104.	« ferricus.....	117.
« <i>Cetrariæ elotæ</i>	104.	« kalicus	118.

	Pag.		Pag.
Hydrato-carbonas magnescicus	118.	Lignum Qvassiae	126.
" " plumbicus...	119.	Linctus boracicus	126.
Hyoscyami, Extractum	82.	Lini, Oleum	149.
" Folia	94.	" Semina	195.
" Oleum infusum	148.	Linimentum ammoniacato-	
" Semina	194.	camphoratum	127.
Hypermanganas kalicus	120.	" Ammoniaci camphora-	
		tum	127.
I.		" calcicum	127.
Infusa	120.	" Calcis	127.
Infusum Cassiarum	121.	" Opodeldoc	128.
" Rhei alkalinum	120.	" saponatum	128.
" Rheorum	120.	Linteum carptum Anglicum	128.
" Sennae	121.	Liquor acidus Halleri	129.
" " compositum	121.	" anodynus Hoffmanni	18.
Iodeti ferrosi, Syrupus	236.	" " martialis	203.
Iodetum kalicum	122.	" antispasticus	129.
Iodi, Solutio spirituosæ	205.	" arseniitis kalici	130.
" Tinctura	205.	" citratæ kalici	130.
Iodum	123.	" cornu Cervi	133.
Ipecacuanhæ, Pulvis opiatæ	166.	" " succinatus	132.
" Pulvis Thebaicus	166.	" " nervinus	18.
" Radix	175.	" ophthalmicus	131.
" Vinum	277.	" " albus	131.
Iridis, Rhizoma	187.	" pectoralis	131.
		" succinatis ammonici	
J.		pyroleosi	132.
Jalapæ, Resina	183.	" supercarbonatis ammo-	
" resinæ, Massa pilularum	135.	nici pyroleosi	132.
" Tubera	263.	Lithargyrum	157.
Julapium salinum	130.	Lobeliæ, Herba	112.
Juniperi, Ætheroleum	25.	" Tinctura	257.
" Fructus	102.	Lupuli, Fructus	103.
" Species	209.	" Glandulæ	105.
		Lupulinum	105.
K.		Lycopodium	133.
Kermes mineralis	123.		
Kusso, Flores	89.	M.	
		Magisterium Bismuthi	218.
L.		Magnesia alba	119.
Lac Sulphuris	229.	" usta	155.
Lactas ferrosus	124.	Magnesiae, Pulvis cum Rheo	166.
Lapis infernalis	142.	Malvæ, Herba	113.
Laudanum	278.	Manna	133.
Lauri, Oleum	148.	Manna canellata	134.
Lavandulæ, Ætheroleum	25.	" electa	134.
" Flores	89.	" vulgaris	134.
" Spiritus	215.	Massachartæ antirheumaticæ	54.
" Tinctura composita	256.	" pilularum Colocynthi-	
Lichen Islandicus	125.	dum compositarum	134.
" " elotus	125.	" pilularum Colocynthi-	
Lichenis Islandici, Gelatina	104.	dis compositarum	134.
Lignum Guajaci	126.	" pilularum de Cynoglosso	135.

	Pag.		Pag.
<i>Massa pilularum resinæ Ipo-</i>		O.	
<i>macarum</i>	135.	<i>Oleum Amygdalarum</i>	145.
“ “ <i>resinæ Jalapæ</i>	135.	“ <i>animale rectificatum</i> ..	167.
“ “ <i>Rheorum compo-</i>		“ <i>Cacao</i>	145.
<i>sitarum</i>	84.	“ <i>Cadinum</i>	168.
“ “ <i>sedantium cum</i>		“ <i>camphoratum</i>	146.
<i>Cynoglosso</i>	135.	“ <i>carminativum</i>	146.
“ “ <i>tonico-nervinarum</i>	136.	“ <i>Chamomillæ infusum</i> ..	147.
<i>Mastix</i>	184.	“ <i>Crotonis</i>	147.
<i>Mastix, Resina</i>	184.	“ <i>Hyoscyami infusum</i> ..	148.
<i>Mel</i>	136.	“ <i>Jecoris Aselli</i>	148.
“ <i>boracinum</i>	126.	“ <i>Lauri</i>	148.
“ <i>depuratum</i>	137.	“ <i>Lini</i>	149.
“ <i>despumatum</i>	137.	“ <i>Matricariæ infusum</i> ..	147.
<i>Meliloti, Emplastrum</i>	73.	“ <i>Myristicæ</i>	149.
“ <i>Herba</i>	113.	“ <i>Olivarum</i>	150.
<i>Melissæ, Herba</i>	114.	“ <i>Palmae</i>	150.
<i>Menthæ crispæ, Ætheroleum</i>	26.	“ <i>Ricini</i>	151.
“ <i>piperitæ, Ætheroleum</i> ..	27.	“ <i>Succini rectificatum</i> ..	169.
“ “ <i>Herba</i>	114.	<i>Olivarum, Oleum</i>	150.
<i>Menyanthis, Folia</i>	95.	<i>Olibanum</i>	109.
<i>Mercurius præcipitatus albus</i>	55.	<i>Opii, Tinctura</i>	258.
<i>Mixtura acida</i>	137.	“ “ <i>benzoica</i>	259.
“ <i>alba</i>	138.	“ <i>Vinum</i>	277.
“ <i>aperiens</i>	138.	“ “ <i>crocaturum</i>	278.
“ <i>Balsamodendri ferrata</i>	139.	<i>Opium</i>	151.
“ <i>camphorata</i>	138.	“ <i>depuratum</i>	153.
“ “ <i>acida</i>	139.	<i>Origani, Herba</i>	114.
“ <i>Ferri composita</i>	139.	“ <i>Cretici, Ætheroleum</i> ..	27.
<i>Moschus</i>	140.	<i>Oxycedri, Pyroleum</i>	168.
<i>Mucilago Cydoniæ</i>	140.	<i>Oxydum calcicum</i>	154.
“ <i>gummi Acaciarum</i>	141.	“ <i>hydrargyricum</i>	154.
“ “ <i>Arabici</i>	141.	“ <i>magnesium</i>	155.
“ <i>Orchidum</i>	141.	“ “ <i>leve</i>	155.
“ <i>Salep</i>	141.	“ “ <i>ponderosum</i>	156.
<i>Myristicæ, Oleum</i>	149.	“ <i>plumbicum</i>	157.
<i>Myrrha</i>	108.	“ <i>stibicum</i>	157.
<i>Myrrhæ, Tinctura</i>	257.	“ <i>zincicum</i>	159.
<i>Myrtilli, Syrupus</i>	237.	<i>Oxymel Scillæ</i>	160.
		P.	
N.		<i>Palmae, Oleum</i>	150.
<i>Nicotianæ, Folia</i>	95.	<i>Persulphuretum kalicum</i> ..	110.
<i>Nitras argenticus</i>	142.	<i>Petala Rosæ</i>	160.
“ “ <i>fusus</i>	142.	<i>Petroleum album</i>	168.
“ “ <i>mitigatus</i>	142.	<i>Petroselini, Ætheroleum</i> ..	27.
“ <i>kalicus</i>	143.	<i>Phosphorus</i>	161.
<i>Nitras natrius</i>	144.	<i>Pilulæ Blancardi</i>	161.
“ <i>strychnicus</i>	144.	<i>Pilulæ iodeti ferrosi</i>	161.
<i>Nitrum</i>	143.	<i>Pimpinellæ, Radix</i>	175.
<i>Nucis vomicæ, Extractum</i> ..	82.	“ <i>Tinctura</i>	260.
“ “ <i>Semina</i>	195.	<i>Pingvroleum Amygdalarum</i>	145.
“ “ <i>Tinctura</i>	257.	“ <i>Crotonum</i>	147.

	Pag.		Pag.
<i>Pingvroleum Elaidis</i>	150.	<i>Radix Aristolochiæ</i>	179.
« <i>Gadurum</i>	148.	« <i>Artemisiæ</i>	171.
« <i>Lauri</i>	148.	« <i>Bardanæ</i>	172.
« <i>Lini</i>	149.	« <i>Cephaëlidis</i>	175.
« <i>Myristicæ</i>	149.	« <i>Cocculi</i>	172.
« <i>Oleæ</i>	150.	« <i>Columbo</i>	172.
« <i>Ricini</i>	151.	« <i>Cynoglossi</i>	173.
« <i>Theobromatum</i>	145.	« <i>Gentianæ</i>	173.
Pini, Pix.....	162.	« <i>Glycyrrhizarum</i>	174.
« <i>Pyroleum</i>	168.	« <i>Glycyrrhizæ</i>	174.
« <i>Resina flava</i>	184.	« <i>Ipecacuanhæ</i>	175.
Pix liquida.....	168.	« <i>Ipomæarum</i>	263.
« <i>Pini</i>	162.	« <i>Iridis</i>	187.
« <i>Pinorum liquida</i>	168.	« <i>Krameriæ</i>	176.
« « <i>solida</i>	162.	« <i>Lapparum</i>	172.
Podophylli, Resina.....	185.	« <i>Orchidum</i>	264.
Podophyllum.....	185.	« <i>Pimpinellæ</i>	175.
<i>Pulpa Colocynthis</i>	162.	« <i>Polygalæ</i>	178.
« <i>Colocynthis</i>	162.	« <i>Ratanhiæ</i>	176.
« <i>Tamarindi</i>	164.	« <i>Rhei</i>	176.
« <i>Tamarindorum cruda</i>	163.	« <i>Rheorum</i>	176.
« « <i>depurata</i>	164.	« <i>Sarsaparillæ</i>	177.
Pulvis ad fumigationes Chlorig.....	164.	« <i>Sassafras</i>	178.
« <i>aërophorus</i>	165.	« <i>Senegæ</i>	178.
« <i>Cephaëlidis opiatum</i>	166.	« <i>Serpentariæ</i>	179.
« <i>Doveri</i>	166.	« <i>Taraxaci</i>	179.
« <i>effervescens</i>	165.	« <i>Valerianæ</i>	180.
« « <i>compositus</i>	165.	« <i>Zingiberis</i>	187.
« <i>Ipecacuanhæ opiatum</i>	166.	Ramuli Sabinæ.....	180.
« « <i>Thebaicus</i>	166.	Ratanhiæ, Radix.....	176.
« <i>Magnesicæ compositus</i>	166.	« <i>Tinctura</i>	260.
« « <i>cum Rheo</i>	166.	Resina Benzoë.....	181.
« <i>refrigerans</i>	167.	« <i>Benzoin</i>	181.
« <i>stibicus</i>	123.	« <i>Colophonium</i>	182.
Pyroleum animale rectificatum.....	167.	« <i>Euphorbiarum</i>	75.
« <i>Oxycedri</i>	168.	« <i>Gnajak</i>	182.
« <i>Petræ</i>	168.	« <i>Ipomæarum</i>	183.
« <i>Pini</i>	168.	« <i>Jalapæ</i>	183.
« <i>Succini rectificatum</i>	169.	« <i>Mastix</i>	184.
		« <i>Pini flava</i>	184.
		« <i>Pinorum</i>	184.
		« <i>Pistaciæ</i>	184.
		« <i>Podophylli</i>	185.
		Rhei, Extractum.....	83.
		« « <i>compositum</i>	84.
		« <i>Infusum alkalinum</i>	120.
		« <i>Radix</i>	176.
		« <i>Tinctura amara</i>	260.
		Rheo, Pulvis Magnesicæ cum.....	166.
		Rhizoma Calami.....	185.
		« <i>Filicis</i>	186.
		« <i>Galangæ</i>	186.
		« <i>Iridis</i>	187.

Q.

Qvassicæ, Lignum.....	126.
Qvercus, Cortex.....	68.
« <i>Semina</i>	196.
« « <i>tosta</i>	196.

R.

<i>Radix Acori</i>	185.
« <i>Alkanæ</i>	169.
« <i>Alpinæ</i>	186.
« <i>Althææ</i>	170.
« <i>Angelicæ</i>	171.
« <i>Archangelicæ</i>	171.

	Pag.		Pag.
Rhizoma Zingiberis.....	187.	Sennæ, Syrupus mannatus..	239.
Ricini, Oleum.....	151.	Sericum adhævisum.....	197.
Rosæ, Ætheroleum.....	28.	Serpentariæ, Radix.....	179.
" Petala.....	160.	Serum lactis aluminatum....	198.
Rosmarini, Ætheroleum.....	28.	Sesqvicarbonas ammonicus..	234.
" Spiritus.....	215.	" " pyro-	
Rubi Idæi, Syrupus.....	238.	oleosus.....	234.
S.			
Sabinæ, Ætheroleum.....	29.	Sinapis, Ætheroleum.....	29.
" Ramuli.....	180.	" nigræ, Semina.....	197.
Sacchari, Syrupus.....	238.	Solutio acetatis ammonici..	198.
Saccharum lactis.....	188.	" " sesquiplumbici	
Salep, Macilago.....	141.	concentrata.....	205.
" Tubera.....	264.	" Acetatis sesquiplumbici	
Salicylas natricus.....	188.	diluta.....	206.
Salviæ, Folia.....	96.	" acidi carbolici.....	199.
Sambuci, Flores.....	90.	" Ammoniaci.....	199.
Santonini, Trochisci.....	263.	" " alcoholica.....	200.
Santoninum.....	189.	" " spirituosa.....	200.
Sapo albus oleaceus.....	189.	" Arsenitis kalici.....	130.
" Alicantinus.....	189.	" arsenicalis Fowleri....	130.
" butyraceus.....	190.	" Calcariae chloratæ di-	
Saponis, Spiritus camphoratus	216.	luta.....	201.
Sarsaparillæ, Radix.....	177.	" Calcis chloratæ.....	201.
Sassafras, Radix.....	178.	" Camphoræ alcoholica..	212.
Scammonium.....	190.	" carbonatis kalici.....	201.
Sebum.....	190.	" chloreti ferri.....	202.
Secale cornutum.....	191.	" " " spirituosa.....	202.
Secalis cornuti, Extractum...	84.	" " " spirituoso-	
Semina Amygdali amara.....	192.	" " " " ætherea.....	203.
" " dulcia.....	192.	" Chlori.....	203.
" Brassicæ.....	197.	" Citratæ kalici saccha-	
" Cacao.....	193.	rata.....	130.
" Colchici.....	193.	" extracti Pomorum fer-	
" Cydoniæ.....	194.	rati.....	255.
" Elettariæ.....	100.	" hydratis calcici.....	204.
" Hyoscyami.....	194.	" Iodeti ferrosi saccha-	
" Lini.....	195.	rata.....	236.
" Lycopodiorum.....	133.	" Iodæ alcoholica.....	205.
" Nucis vomicæ.....	195.	" " spirituosa.....	205.
" Qvercus.....	196.	" Oxydi calcici.....	204.
" " tosta.....	196.	" Saponis alcoholica.....	216.
" Qvercuum.....	196.	" Sesqvicarbonatis am-	
" Sinapis nigræ.....	197.	monici pyro-oleosi....	132.
" Strychni.....	195.	" subacetatis plumbici...	205.
" Theobromatum.....	193.	" " " diluta.....	206.
Senegæ, Radix.....	178.	" Succinatis ammonici	
" Syrupus.....	239.	pyro-oleosi.....	132.
Sennæ, Folia.....	96.	" sulphatis atropici.....	207.
" " spiritu extracta	97.	" superiodeti kalici.....	207.
" Infusum.....	121.	" Tartratis stibico-kalici	
" " compositum.....	121.	alcoholica.....	278.
		Species amaræ.....	207.
		" decocti lignorum.....	208.

	Pag.		Pag.
Tinctura Arnicae.....	247.	Unguentum acetatis plumbici	265.
" aromatica.....	247.	" acetatis plumbici com-	
" " acida.....	247.	positum.....	265.
" Asae foetidae.....	248.	" ad scabiem Viennense	274.
" Aurantii.....	248.	" aromaticum.....	266.
" balsamica aromatica.....	249.	" basilicum flavum.....	267.
" Benzoës.....	249.	" basilicum nigrum.....	267.
" " composita.....	250.	" Cantharidum.....	268.
" Cantharidum.....	250.	" Cerae.....	269.
" Cascarillae.....	250.	" Cetacei.....	269.
" Castorei.....	251.	" " rosaceum.....	269.
" " aetherea.....	251.	" Glycerini.....	270.
" Chinae.....	251.	" Hydrargyri.....	270.
" " composita.....	252.	" hydrato-carbonatis plum-	
" Chinoidini.....	252.	bici.....	271.
" Cinnamomi.....	253.	" haemorrhoidale.....	266.
" Colocynthis composita	253.	" iodatum.....	271.
" digestiva.....	253.	" iodeti kalici.....	271.
" Digitalis.....	254.	" Neapolitanum.....	270.
" Digitalis rubra.....	254.	" ophthalmicum rubrum	272.
" extracti Pomorum ferrati	255.	" oxydi hydrargyrici.....	272.
" Ferri muriatici.....	202.	" " zincici.....	273.
" Gentianae.....	255.	" plumbicum.....	265.
" Guajaci ammoniacata...	256.	" " compositum.....	265.
" Iodi.....	205.	" stibiatum.....	273.
" Lavandulae composita...	256.	" Sulphuris compositum	273.
" Lobeliae.....	257.	" terebinthinatum.....	274.
" Myrrhae.....	257.	Uvae ursi, Folia.....	98.
" Nucis vomicae.....	257.		
" odontalgica.....	258.		
" Opii.....	258.		
" " benzoica.....	259.		
" Pimpinellae.....	260.		
" Ratanhiae.....	260.		
" Rhei amara.....	260.		
" Thebaica.....	258.		
" " benzoica.....	259.		
" Valerianae.....	261.		
" " aetherea.....	261.		
Tincturae.....	244.		
Tragacantha.....	262.		
Trichloretum formylicum.....	61.		
Trochisci bicarbonatis natrici	262.		
" Santonini.....	263.		
Tubera Jalapae.....	263.		
" Salep.....	264.		

	U.		Z.
Unguenta.....	264.	Zingiberis, Rhizoma.....	188.

Addenda & corrigenda.

Post medicamina infra enumerata hæc præparata addenda fuerunt:

Pag.			
7.	Acidum citricum . . .	} Præparatum: Vinum Chinæ.	
66.	Cortex Chinæ Calisayæ		
12.	Acidum carbolicum .	—	Solutio acidi carbolici.
17.	Æther aceticus . . .	} —	Tinctura odontalgica.
22.	Ætheroleum Caryophylli		
23.	— Cassiæ .		
18.	Æther spirituosus cam-	—	— antihysterica.
	phoratus	—	— digestiva.
32.	Aloë	} —	— Benzoës composita.
38.	Balsamum Peruvianum		
44.	Bitartras kalicus .	Præparatum:	Species laxantes Hamburgenses.
276.	Vinum Chinæ . . .	—	Vinum Chinæ ferratum.

13. Lin. 19 & 20. Pro „circiter duabus millibus (2000)“ lege „circiter quingentis (500)“.
73. - 4. Post „Colliqvefactis“ adjiciatur „et semirefrigeratis“.
118. - 9. Adjiciatur: „Ph. N. Ed. I.: Hydras kalicus & Hydras kalicus fusus“.
131. - 25. Pro „Elixir pectoralis“ lege „Elixir pectorale“.
252. Pro paginæ numero 253 lege 252.
-

