

Handbuch der Knochenlehre des Menschen / von J. Henle.

Contributors

Henle, Jacob, 1809-1885.

Publication/Creation

Braunschweig : Freidrich Vieweg, 1855.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/e5pwrbf9>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>






22101345362



Digitized by the Internet Archive
in 2014

<https://archive.org/details/b20421540>



HANDBUCH
DER
SYSTEMATISCHEN
ANATOMIE DES MENSCHEN.

VON
DR. J. HENLE.



IN DREI BÄNDEN.

MIT ZAHLREICHEN MEHRFARBIGEN IN DEN TEXT EINGEDRUCKTEN HOLZSTICHEN.

ERSTER BAND. ERSTE ABTHEILUNG.

KNOCHENLEHRE.

BRAUNSCHWEIG.

DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.

1855.

Ankündigung.

Professor Henle's Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen erscheint in drei Bänden.

Die Bände und deren Abtheilungen enthalten und werden enthalten:

Ersten Bandes erste Abtheilung: **Die Knochenlehre.**

Ersten Bandes zweite Abtheilung: **Die Bänderlehre.**

Ersten Bandes dritte Abtheilung: **Die Muskellehre.**

Zweiter Band, in drei Lieferungen: **Die Eingeweidelehre.**

Dritten Bandes erste Abtheilung: **Die Gefässlehre.**

Dritten Bandes zweite Abtheilung: **Die Nervenlehre.**

Es ist die Einrichtung getroffen, dass jede Abtheilung besonders paginirt und einzeln käuflich ist, während alle Bände und Abtheilungen zusammen das Ganze, das Handbuch der systematischen Anatomie des Menschen, bilden. Jede Abtheilung wird zu dem Ende auch mit doppelten Titeln, dem Gesamt- und Special-Titel, versehen sein.

Des ersten Bandes erste Abtheilung, die Knochenlehre, ist zum Preise von $1\frac{1}{2}$ Thlr. erschienen.

Des ersten Bandes zweite Abtheilung, die Bänderlehre, ist zum Preise von $1\frac{1}{3}$ Thlr. erschienen.

Des ersten Bandes dritte Abtheilung, die Muskellehre, ist zum Preise von $2\frac{1}{3}$ Thlr. erschienen.

Der zweite Band erscheint in drei Lieferungen, von denen bis jetzt die erste zum Preise von $2\frac{1}{3}$ Thlr. ausgegeben ist; die zweite und dritte Lieferung sowie der dritte Band folgen sich so rasch, als es die auf die Ausstattung zu verwendende Sorgfalt irgend erlaubt.

Auf diese Sorgfalt in der Ausstattung, namentlich in den zahlreichen Abbildungen, dürfen Studirende und Aerzte besonders aufmerksam gemacht werden und zwar mit Hinweisung auf den ausserordentlich billigen Preis. Mit dem Texte erwerben die Käufer zugleich einen anatomischen Atlas, der, wie schon die vorliegenden Abtheilungen der Knochen-, Bänder-, Muskel- und Eingeweidelehre zeigen, reichhaltiger ist, als irgend eins der den Studirenden für diesen Zweck zugängigen Kupferwerke. Das Henle'sche Handbuch macht für sie die Anschaffung eines besondern anatomischen Atlases entbehrlich. Fast sämtliche Abbildungen sind Originale, mit grösster Sorgfalt nach Präparaten neu gezeichnet und gestochen.

Jede Buchhandlung ist in den Stand gesetzt, auf sechs auf einmal bezogene Exemplare ein Frei-Exemplar bewilligen zu können.

Friedrich Vieweg und Sohn.

Die Herausgabe einer Uebersetzung in französischer und englischer Sprache
sowie in sonstige Sprachen wird von uns vorbehalten.

Friedrich Vieweg und Sohn.

IN DREI BÄNDEN.

ERSTER BAND. ERSTE ABTHEILUNG.

KNOCHENLEHRE.

MIT EINEM ANHANG VON ERNÄHRUNG UND VERDAUUNG.

BRUNNEN.

DRUCK UND VERLAG VON ERNST VON SEIDEL UND SOHN.

1852.

H A N D B U C H
DER
SYSTEMATISCHEN
A N A T O M I E
DES
M E N S C H E N.

VON
DR. J. HENLE,
Professor der Anatomie in Göttingen.

IN DREI BÄNDEN.

ERSTER BAND. ERSTE ABTHEILUNG.

KNOCHENLEHRE.

MIT ZAHLREICHEN IN DEN TEXT EINGEDRUCKTEN HOLZSCHNITTEN.

BRAUNSCHWEIG,
DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.

1 8 5 5.

Ch. Nelson Tage M.
HANDBUCH *Vienna. 188.*

DER

KNOCHENLEHRE

DES

MENSCHEN.

VON

DR. J. HENLE,

Professor der Anatomie in Göttingen.

MIT 290 IN DEN TEXT EINGEDRUCKTEN HOLZSCHNITTEN.

BRAUNSCHWEIG,

DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.

1 8 5 5.

Holzsnitte
aus dem xylographischen Atelier
von Friedrich Vieweg und Sohn
in Braunschweig.

Papier
aus der mechanischen Papier-Fabrik
der Gebrüder Vieweg zu Wendhausen
bei Braunschweig.



M15097

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY	
Coll.	weIMOmec
Call	
No.	Q54
	1855-
	H51h

V o r r e d e.

Wenn zu der grossen Zahl anerkannter anatomischer Handbücher ein neues sich gesellt, so muss es darauf gefasst sein, mehr verwunderten und fragenden Blicken, als solchen, aus welchen die Befriedigung eines „tief gefühlten Bedürfnisses“ leuchtet, zu begegnen. Ist es nun auch des Buches eigene Sache, sich über seine Existenz zu rechtfertigen, so mag es doch dem Verfasser gestattet sein, die Motive und die aus denselben hervorgegangene Einrichtung des Unternehmens mit einigen Worten anzudeuten.

Dass nicht das thatsächlich Neue zur Mittheilung drängte, wird man gern glauben. Obgleich die Meinung, dass die specielle Anatomie eine abgeschlossene Wissenschaft sei, Jahr für Jahr durch mehr oder minder bedeutende Entdeckungen widerlegt wird; obgleich selbst auf der viel begangenen Heerstrasse der Osteologie noch hier und da ein Fund den aufmerksamen Wanderer lohnt: so ist doch das, was wir hinzufügen, verschwindend klein gegen die Masse des von lange her Ueberlieferten. Wenn der Verfasser die Gunst, nach welcher er strebt, sich erwirbt, so muss er sie der Methode der Darstellung verdanken.

Die Tendenz des Buches ist eine praktische. Ich verstehe aber unter einer praktischen Behandlung der Anatomie weder die Bevorzugung der für den Arzt wichtigeren Körpertheile, noch eine gelegentliche Hinweisung auf Operationsregeln und Aehnliches, sondern eine Weise des Vortrags, welche für alle praktischen Fälle ein Bild des Geschehenen in der Phantasie des Beschauers und Lesers zurücklässt. Auf dieser Tendenz beruht die Verwebung des Textes und der Figuren, die deshalb eine unerlässliche war, weil der Text das Auge des Lesers zu den abgebildeten Formen leiten will und die Abbildungen

die im Text gegebene Anregung, beschriebene Formen sich vorzustellen, unterstützen sollen. Der Text konnte deshalb weder so kurz, noch so an sich fasslich eingerichtet werden, als man es von Hilfsmitteln des ersten Unterrichts erwartet; ich habe aber die Hoffnung, dass die Beschreibung in dem Maasse, wie sie das Verständniss der Figuren fördert, sich selbst überflüssig machen werde.

Die Abbildungen sind um ein gutes Theil eleganter, aber nicht viel complicirter, als diejenigen, welche der Verfasser seit Jahren bei anatomischen Demonstrationen an die Tafel zeichnet und seinen Zuhörern nachzuzeichnen zumuthet. Abgesehen davon, dass diese Einfachheit der Figuren eine Bedingung war, um in der Zahl derselben unbeschränkt zu sein, so glaube ich dadurch auch die Auffassung des Wesentlichen erleichtert zu haben. Die Abbildungen der Knochen wollen nicht mit denen von Albin oder d'Alton verglichen werden; sie bescheiden sich, in malerischer Wirkung selbst hinter den Holzschnitten der englischen und französischen Taschen-Anatomien zurückzustehen. Als Muster schwebte mir der Charakter architektonischer Zeichnungen vor, welche von Licht und Schatten nur so weit, als zur Andeutung der Form nothwendig ist, Gebrauch machen, die Verschiedenheiten des Materials durch conventionelle Strichweisen ausdrücken, von allen Zufälligkeiten der Wirklichkeit absehen und so freilich gerade auf Alles verzichten, was ein Architekturbild pittoresk machen kann. Ebenfalls nach dem Vorbilde des Architekten habe ich mein Object mit Hülfe von Durchschnitten zu erläutern gesucht. Es ist zur Orientirung in diesen Durchschnitten nicht unwesentlich, dass sie sich mühelos auf einander und auf die Façade beziehen lassen; deshalb wurde immer von Horizontalschnitten die obere, von Schnitten, welche den Körper in vordere und hintere Hälfte trennen (Frontalschnitten), die hintere Schnittfläche abgebildet.

Bei der Verbindung, in welcher Text und Abbildungen zu einander stehen, wird man, wie ich hoffe, eine besondere Erklärung der letzteren nicht vermissen. Sie ist einigermaassen dadurch ersetzt, dass die Einzelheiten mit den charakteristischen Anfangsbuchstaben ihrer Namen bezeichnet und die Namen der Einzelheiten, welche man auf den Abbildungen zu suchen hat, im Texte durch den Druck ausgezeichnet sind.

Was nun die anatomische Terminologie betrifft, so bin ich mit dem Versuche einer Vereinfachung derselben vorangegangen, den ich der wohlwollenden Prüfung der Fachgenossen empfehle. Dass die üblichen Benennungen anatomischer Gegenstände nicht immer treffend, nicht immer wohlklingend, öfters geschmacklos und im Allgemeinen

principlos sind, ist eine von allen Seiten eingeräumte Thatsache. Doch ist dies ein Uebelstand, den die Anatomie mit vielen Natur- und technischen Wissenschaften theilt und den, bei der Ausbildung, welche sie einmal erlangt hat, auch die consequentesten Neuerungen nicht mehr beseitigen werden. Ein Uebelstand aber, der die Anatomie auszeichnet, ist die Häufung gleichbedeutender Namen für dieselbe Sache. In den übrigen Naturwissenschaften gilt die Synonymie als eine Last, deren man sich gern entledigte; sind durch Missgriffe einem Körper mehrere Namen zu Theil geworden, so verschwinden doch, sobald der berechtigte festgestellt ist, die übrigen aus dem Gebrauche. In anatomischen Werken aber, und zwar nicht bloss in gelehrten, zieht man obsolete Namen ans Tageslicht; zwei Benennungen durch ein *seu* zu verbinden, ist das Wenigste, was der anatomische Anstand erfordert, und dies geht so weit, dass die Entdecker selbst ihre Neuigkeiten, wie vornehme Eltern ihre Kinder, mit einer Anzahl Namen ausstatten. Ich habe mich für jeden Körpertheil immer nur einer und derselben Bezeichnung bedient; gebräuchliche Synonyme sind in Noten unter dem Text angegeben; dass ungebräuchliche in Vergessenheit gerathen, wollte ich, so viel an mir liegt, nicht verhindern.

Unter diesen Umständen aber musste die Wahl des beizubehaltenden Namens ein Gegenstand ernster Erwägung sein. Dass nicht das historische Princip, wie in den Naturwissenschaften, maassgebend sein konnte, liegt auf der Hand: die meisten ersten Namen der Dinge würden wie ganz neue klingen. Oft gab die Rücksicht auf die Kürze oder die Sinnigkeit der Namen den Ausschlag; Benennungen nach Gelehrten, wie *Antrum Highmori*, *Canalis Fallopii* und viele andere, suchte ich zu vermeiden, schon aus dem Grunde, weil, wie bereits Sömmerring rügt, diese Art anatomischer Ehrenzeichen nur sehr selten den trafen, der sie verdient hatte.

Einer Rechtfertigung bedarf vielleicht die Unbeständigkeit im Gebrauche lateinischer und deutscher Kunstausrücke. Ich bekenne, dass es keine unabsichtliche ist. Am wünschenswerthesten wäre mir die Durchführung einer neutralen und den Nationen, die sich mit unserer Wissenschaft beschäftigen, gemeinsamen, lateinischen Terminologie gewesen; denn ich vermag nicht, eine Bethätigung des Patriotismus darin zu erkennen, dass man fremden Völkern den Zugang zu dem wissenschaftlichen Erwerb des eigenen erschwert. Aber von dem *Hepate* oder den *Oculis* zu reden, ist selbst unter Fachmännern schon längst nicht mehr möglich; so wird im Allgemeinen, wie das Interesse an einer Sache sich verbreitet, der Trivialname unvermeid-

licher, und so sind auch in diesem Buche die vielfach wiederkehrenden Dinge deutsch benannt. Die wahrhaften Vortheile an Präcision und Kürze, welche in vielen Fällen lateinische Ausdrücke gewähren, sollte man sich aber nicht entgehen lassen. Wo unsere Sprache schleppende zusammengesetzte Wörter bildet, während die lateinische den wesentlichen Theil der Bezeichnung als Beiwort zu einem Hauptwort fügt, welches allenfalls abgekürzt oder weggelassen werden darf, da verdient die lateinische unbedingt den Vorzug. Es giebt andere Mittel, die Liebe zum Vaterlande und zur Muttersprache zu beweisen, als die Opfer an Zeit und Zunge, die man bringt, wenn man z. B. statt der oder die *Cruralis* und statt *N., A. oder V. cruralis* Schenkelnerv, Schenkelpulsader und Schenkelblutader spricht und schreibt.

Schliesslich habe ich noch zwei Schriften zu erwähnen, die mir zu spät zukamen, um die in denselben enthaltene Belehrung an geeigneter Stelle zu benutzen. Horner spricht sich in einer unter H. Meyer's Leitung ausgearbeiteten Dissertation (Ueber die Krümmung der Wirbelsäule im aufrechten Stehen. Zürich 1854) ebenso wie Vrolik (siehe unten S. 24) gegen die Richtigkeit der Weber'schen Durchschnittszeichnung der Wirbelsäule aus; nach Horner liegen das Atlasgelenk, der Körper des neunten Brustwirbels und des dritten Kreuzwirbels in einer Verticalen; in der Form der Wirbelkörper (siehe unten S. 32) fand Horner nirgends eine Regelmässigkeit, als an den unteren Lendenwirbeln. Während sonst überall bald hinten, bald vorn eine um Weniges verschiedene Höhe sich zeigte, ergab sich hier beständig eine stärkere Höhe vorn, eine geringere hinten.

Aus Huschke's Werk „Schädel, Hirn und Seele des Menschen und der Thiere, Jena 1854“ ist nachzutragen (zu S. 188), dass die *Alae vomeris* sich während des Wachsthums nach hinten ausdehnen: noch beim jährigen Kinde bedecken sie nur den vordersten Theil der unteren Fläche des Wespenbeinkörpers; im zwanzigsten Jahre erreichen sie die Synchondrose des Hinterhaupts- und Wespenbeins (a. a. O. S. 7). Auf die wichtigen Beiträge zur Kenntniss der Alters-, Geschlechts- und Racenunterschiede des Schädels im Ganzen, welche Huschke's Werk enthält, kann ich hier nur verweisen.

Göttingen, Februar 1855.

Der Verfasser.

I n h a l t.

	Seite
Einleitung	X
Plan des Körpers der Wirbelthiere, insbesondere des Menschen	1
Die organischen Systeme	5
I. Knochenlehre	18
A. Knochen des Stammes	23
1. Wirbelsäule, <i>Columna vertebralis</i>	26
a. Wahre Wirbel	28
α. Beugewirbel	—
β. Drehwirbel	41
b. Falsche Wirbel	44
α. Kreuzbein, <i>Os sacrum</i>	—
β. Steissbein, <i>Os coccygis</i>	48
2. Brustbein, <i>Sternum</i>	50
3. Rippen, <i>Costae</i>	53
4. Zungenbein, <i>Os hyoides</i>	64
5. Schädel	65
1. Hinterhauptsbein, <i>Os occipitis</i>	91
2. Wespenbein, <i>Os sphenoides</i>	97
3. Siebbein, <i>Os ethmoides</i>	113
4. Stirnbein, <i>Os frontis</i>	119
5. Schläfenbein, <i>Os temporum</i>	126
6. Scheitelbein, <i>Os parietale</i>	153
7. Oberkieferbein, <i>Os maxillae</i>	156
8. Gaumenbein, <i>Os palatinum</i>	169
9. Thränenbein, <i>Os lacrymale</i>	175
10. Muschelbein, <i>Concha inferior</i>	177
11. Nasenbein, <i>Os nasi</i>	180
12. Jochbein, <i>Os zygomaticum</i>	182
13. Pflugscharbein, <i>Vomer</i>	186
14. Unterkiefer, <i>Mandibula</i>	188
B. Knochen der Extremitäten	200
I. Knochen der oberen Extremität	209
a. Knochen des Gürtels der oberen Extremität	—
1. Schulterblatt, <i>Scapula</i>	—
2. Schlüsselbein, <i>Clavicula</i>	214
b. Oberarmknochen	216
Armbein, <i>Humerus</i>	—

	Seite
c. Unterarmknochen	221
1. <i>Ulna</i> , Ellenbogenbein	222
2. <i>Radius</i> , Speiche	224
d. Knochen der Hand	227
α. Handwurzelknochen, <i>Ossa carpi</i>	—
1. Kahnbein, <i>Os scaphoideum</i>	229
2. Mondbein, <i>Os lunatum</i>	230
3. Pyramidenbein, <i>Os pyramidale</i>	231
4. Erbsenbein, <i>Os pisiforme</i>	—
5. Trapezbein, <i>Os trapezium</i>	—
6. Trapezoidbein, <i>Os trapezoides</i>	232
7. Kopfbein, <i>Os capitatum</i>	—
8. Hakenbein, <i>Os hamatum</i>	233
β. Mittelhandknochen, <i>Ossa metacarpi</i>	235
γ. Phalangen	238
II. Knochen der unteren Extremität	240
a. Knochen des Gürtels der unteren Extremität	—
Hüftbein, <i>Os coxae</i>	—
b. Knochen des Oberschenkels	253
Schenkelbein, <i>Femur</i>	—
c. Unterschenkelknochen	258
1. <i>Patella</i> , Kniescheibe	260
2. <i>Tibia</i> , Schienbein	—
3. <i>Fibula</i> , Wadenbein	263
d. Knochen des Fusses	265
α. Fusswurzelknochen, <i>Ossa tarsi</i>	268
1. Fersenbein, <i>Calcaneus</i>	269
2. Sprungbein, <i>Talus</i>	271
3. Schiffbein, <i>Os naviculare</i>	274
4. Erstes Keilbein, <i>Os cuneiforme primum</i>	275
5. Zweites Keilbein, <i>Os cuneiforme secundum</i>	276
6. Drittes Keilbein, <i>Os cuneiforme tertium</i>	—
7. Würfelbein, <i>Os cuboideum</i>	277
β. Mittelfussknochen, <i>Ossa metatarsi</i>	279
γ. Phalangen	282

E i n l e i t u n g.

Die menschliche Anatomie ist ein Theil der beschreibenden Naturwissenschaften, ihr Object ist die Erforschung und Darstellung des Baues menschlicher Körper.

Zerschneiden (*ἀνατέμνειν*) oder zergliedern müssen wir den Leib, um zur Anschauung der in der Tiefe verborgenen Theile zu gelangen. Doch ist dieser zunächst liegende Grund nicht der einzige, der uns bei anatomischen Operationen leitet und die Methode der Operationen bestimmt. Unser Geist bedient sich jenes Mittels, um in seiner Weise sich die Aussenwelt anzueignen: er löst den natürlichen Verband, um das an verschiedenen Orten zerstreute Gleichartige zusammenzufassen, und zerlegt nach den ihm angeborenen Kategorien das in Wirklichkeit Unzertrennliche.

Unzertrennlich ist in der wirklichen Natur die Verbindung der Form und der Materie; aber man schildert Formen und verhält sich dabei gleichgültig gegen die Materie, aus welcher die Form gebildet ist, und auf der anderen Seite beschäftigt man sich mit den Eigenschaften der Materie, unbekümmert um die Formen, welche die Natur ihr ertheilt hat.

Ein-
theilung.

Aus dieser Abstraction gehen die beiden Hauptzweige der anatomischen Wissenschaft hervor, die allgemeine und specielle Anatomie. Man behandelt organische Körper, wie Werke der Technik oder Architektur, zu deren Verständniss eine Einsicht erforderlich ist einerseits in die Form der Baustücke, andererseits in die Qualitäten der verwendbaren Materialien, der Holzarten, Metalle, Steine u. s. f., Kenntnisse, welche ebenfalls in besonderen Fächern der betreffenden Wissenschaften überliefert werden. Die oberflächlichste Besichtigung lehrt, dass an verschiedenen Orten oder in verschiedenen Theilen des thierischen Organismus Stoffe von gleichen Eigenschaften, wie Knochen, Muskeln, Sehnen, Nerven u. s. f. wiederkehren, deren gleichförmige Bruchstücke wir nicht von einander unterscheiden würden und die entweder nur durch ihre relative Lage oder durch die äussere Begrenzung, die ihnen vermöge ihrer Lage zukommt, von einander abweichen. Die allgemeine Anatomie vergleicht und ordnet diese Stoffe; sie lehrt die Qualitäten derselben kennen, durch welche sie die

Gestalt des Organismus bestimmen helfen; sie schliesst aber in der Regel die Erörterung derjenigen Qualitäten nicht aus, vermittelt welcher sie in die Bewegungserscheinungen eingreifen, deren Quelle der Organismus ist.

Die allgemeine Anatomie verdient diesen Namen in doppeltem Sinne. Nicht nur umfassen in der Regel die Gruppen der allgemeinen Anatomie, die Stoffe, eine Mehrheit von verschiedenen geformten Organen desselben Körpers, sondern es besteht auch zwischen Organismen verschiedener Gattung in Beziehung auf die der Untersuchung zugänglichen Eigenschaften der Stoffe eine grössere Uebereinstimmung als in Beziehung auf die Formen, so dass man bei Erforschung der Stoffe statt des menschlichen Körpers, mit wenigen Ausnahmen, thierische benutzen kann, eine Kenntniss der Form aber, wie sie das praktische Bedürfniss fordert, nur aus der Anschauung des menschlichen Körpers gewonnen wird.

Die allgemeine und specielle Anatomie zerfallen jede in zwei Disciplinen, jene wegen der Natur des Objects, diese durch die Methode der Darstellung.

Die allgemeine Anatomie trennt an den Stoffen, welche die specielle Anatomie gleichsam als das einfache, rohe Baumaterial ihr zu weiterer Untersuchung überweist, in zweiter Linie Form und Materie; diese Stoffe interessieren, wie die Baustoffe des Technikers, ausser durch ihre elementare Zusammensetzung, auch durch ihr Gefüge, durch die sogenannte Textur, deren augenfällige Unterschiede wir mit den Namen des Compacten, Porösen, Faserigen, Körnigen u. s. f. bezeichnen. Aus jenen, auf dem Standpunkte der speciellen Anatomie einfachen Stoffen gewinnt die chemische Zerlegung Mischungsbestandtheile, die mechanische Zerklüftung Formbestandtheile. Die Mischungsbestandtheile fallen der organischen Chemie, insbesondere der Zoochemie, Histochemie, zu; der Formbestandtheile bemächtigt sich die Histologie oder Gewebelehre. Insofern sie in feinere und wenigstens zum Theil gleichartige Formbestandtheile, in Kügelchen, Fasern und dergl. zerlegt werden können, erhalten die Stoffe, die den Organismus zusammensetzen, den Namen Gewebe; insofern die Gewebe sich in eine bestimmte Form gebracht finden, machen sie die Organe aus. Es kann nicht fehlen, dass diese beiden Begriffe vielfach in einander spielen und dass, je nach der Fassung derselben, die Grenzen der allgemeinen und speciellen Anatomie willkürlich weiter und enger gezogen werden. Ein Körpertheil, welcher isolirt betrachtet, nach Form und Zusammensetzung als specifisches Organ erscheint, kann in einem Organ höherer Ordnung die Rolle eines Gewebtheils übernehmen, wie dies z. B. bei den Drüsen der Fall ist, die in der Dicke einer Schleimhaut eingeschlossen sind. Da ferner die Untersuchung der Form und Oberfläche der Organe, je genauer sie ist, um so tiefer in den feineren Bau derselben einführt, während andererseits die Darstellung der Formbestandtheile erst dadurch vollendet wird, dass man die Art ihrer Zusammenfügung zu Organen nachweist: so ist begreiflich, dass sich specielle Anatomen und Histologen häufig auf demselben Gebiete begegnen und dass sie nur durch die Richtung, nach welcher sie es durchmessen, von einander verschieden sind. Nur in dem Falle wird es beiden Theilen leicht, sich zu bescheiden, wenn ein Gewebe entweder in einer Zahl ver-

schiedenartig gestalteter Organe, wie Knochen und Muskeln, oder in wechselnden Verhältnissen der Lagerung, wie Gefässe und Nerven, im Organismus verbreitet ist. Hier findet der Anatom reichliche Arbeit, um die ihn der Histologe in der Regel nicht zu beneiden pflegt. Gewebe, deren Verbreitungsbezirk gering oder deren Verhalten an verschiedenen Stellen gleichförmig ist, wie das Gewebe vieler Drüsen, der Linse, Hornhaut oder der Zähne, Nägel, Haare, Cutis u. s. f., werden von beiden Theilen mit gleicher Berechtigung für sich in Anspruch genommen.

Die zwei Disciplinen, in welche die specielle Anatomie sich spaltet, sind die systematische (specielle Anatomie im engeren Sinne des Wortes) und die topographische Anatomie. In der systematischen Anatomie bilden die Gewebe, in der topographischen die Körpergegenden das Eintheilungsprincip. Jene verfolgt die Organe in die verschiedenen Regionen des Körpers, diese verfolgt von den Regionen aus die verschiedenen Organe. Jene verweilt mehr bei der absoluten Form, diese bei der relativen Lage der Körpertheile. Es ist klar, dass die Form nicht ohne Rücksicht auf die Lage beschrieben, die Lage nicht ohne Rücksicht auf die Form verstanden werden kann. Die Verschiedenheit und doch so nahe Verwandtschaft, welche zwischen diesen beiden Methoden besteht, lässt sich nicht wohl anschaulicher machen als durch Vergleichung mit den Methoden einer allgemein zugänglichen, beschreibenden Wissenschaft, der Geographie. Auch hier verfährt man topographisch, d. h. man schildert irgend einen Fleck der Erde, indem man die Gebirge bezeichnet, die ihn einschliessen, die Gewässer, die ihn bespülen, u. s. f. Aber die Namen dieser Gebirge und Gewässer bleiben leere Klänge, wenn nicht die systematische Beschreibung des Zuges und Zusammenhanges der Gebirge, der Ströme und Meere vorausgegangen ist, und wieder benutzt man ausgezeichnete und namhafte Localitäten, um in Kürze den Verlauf der Berge und Flüsse anzugeben.

Das Studium der systematischen Anatomie muss dem Studium der topographischen vorangehen; die systematische Anatomie setzt ihrerseits wieder eine Kenntniss der Regionen voraus, die wir glücklicherweise zum grossen Theil schon aus dem gewöhnlichen Leben mitbringen. Die topographische Anatomie, wie sie in der Reihe der anatomischen Fächer das letzte ist, so steht sie zugleich der praktischen Medicin am nächsten. Diagnostische Forschungen sowohl, wie chirurgische Eingriffe gehen von der Oberfläche aus, und die Fragen, welche der Praktiker an die Anatomie richtet, haben vor Allem den Zweck, die Oberfläche gleichsam durchsichtig zu machen. Aus diesem Grunde wird synonym mit topographischer Anatomie auch der Name chirurgische Anatomie gebraucht, ein Name, der nur den Fehler hat, zu eng zu sein, da jene Localkenntniss, die den Chirurgen bei der Führung des Messers und bei der Beurtheilung von Verletzungen leitet, auch bei der Deutung der Symptome innerer Krankheiten nicht zu entbehren ist.

Wenn es aber der topographischen Anatomie vorbehalten bleibt, die Methode. Stücke, in welche der Systematiker den Körper zertheilt, wieder zu einem Gesamtbilde zu vereinen, so darf doch auch die systematische Methode niemals vergessen, dass das gemeinsame Ziel aller anatomischen Studien

die Orientirung in dem menschlichen Körper ist, und sie muss sich der Mittel bewusst sein, welche zu diesem Ziele führen.

Die Erfahrung lehrt, dass die wiederholte Anschauung sinnlicher Objecte, auch ohne das ausdrückliche Bestreben, sich dieselben einzuprägen, die Phantasie mit Bildern füllt, welche zur willkürlichen Reproduction solcher Objecte genügen. Finden wir uns in einem bekannten Hause im Dunkel zurecht, messen wir ohne Aufmerksamkeit auf einer gewohnten Treppe die Höhe und Zahl der Schritte richtig ab, beschreiben wir aus der Erinnerung die Einrichtung unseres Zimmers oder die Gestalt unserer Freunde: so zeigen wir, dass es möglich ist, auf dem einfachen Wege durch das Auge in den Besitz sinnlicher Vorstellungen zu gelangen, welche dauerhaft und bestimmt genug sind, um die objective Wahrnehmung zu ersetzen. Die Erfahrung lehrt aber ferner, dass der Besitz an Vorstellungen, den wir auf diesem Wege erworben zu haben glauben, in vielen Fällen nur ein scheinbarer ist; dass das innere Bild in dem Augenblicke, in welchem wir es ans Licht zu bringen suchen, zerrinnt; dass an die Stelle concreter Eigenschaften ein verschwommenes Etwas getreten ist, das sich eben wegen seiner Verschwommenheit nicht beschreiben, sondern nur fühlen lässt. Jean Paul sagt (Ergänzungsbl. zur *Levana*, Vorrede): „Leserin liest gar dickste Romane durch, ohne die Namen der Helden und Nebenhelden anders im Kopfe zu haben, als wie einen verworrenen Namenszug, und sie wüsste ihn nicht auszusprechen, wenn man darauf dränge.“ Vielleicht haben sich auch Leser bereits auf ähnlichen Nachlässigkeiten erlappt. Dass man über die Farbe der Augen, über die Form der Nase nahestehender Persönlichkeiten im Unklaren sein kann, werden die Meisten schon erfahren haben. Man werfe die Frage auf, wie viel Füße der Krebs, wie viel Zehen die Katze habe, und man wird bemerken, dass über diese und ähnliche Punkte in gebildeten Kreisen Meinungsverschiedenheiten bestehen. In den Gesichtern einer fremden Bevölkerung erkennt man eine gewisse Uebereinstimmung des Typus, die man an den eigenen Landsleuten vermisst; Glieder Einer Familie findet man einander bis zur Verwechslung ähnlich und wundert sich bei näherer Bekanntschaft, wie dies möglich gewesen sei. Alles dies rührt daher, dass die Bilder, die man aus dem unbefangenen Verkehr mit der Aussenwelt gewinnt, nur in gröberen Umrissen entworfen sind und manches feinere Detail unausgefüllt lassen. Es giebt bevorzugte Geister, oder, richtiger gesagt, Sinne, in welchen die Abbilder vorübergehender objectiver Empfindungen mit der Ausführung der Form und mit der Intensität der Farbe haften, wie sie die grosse Mehrzahl der Menschen nur an Traumbildern kennt. Nur so kann ich mir das Talent des Malers erklären, der aus der Erinnerung copirt, dem also das Erinnerungsbild zum Analysiren Stand halten muss, wie es die Wirklichkeit thut. Offenbar wäre es eigentlich auch dieses Talent, die Bilder sinnlicher Objecte ohne Weiteres in ihrer concretesten Gestalt aufzufassen und aufzubewahren, welches den Naturforscher und insonderheit den Anatomen macht. Da aber die von der Natur in solcher Weise Gesegneten ihre Bestimmung eher durch Beschäftigung mit der Kunst als mit der Anatomie zu erfüllen glauben, so müssen wir minder günstig organisirten Köpfe auf Umwege bedacht sein, auf welchen wir zu Vorstellungen von gleicher Präcision gelangen.

Das Mittel hierzu ist die Verbindung der sinnlichen Empfindungen mit Begriffen, einer Art von subjectiven Thätigkeiten, welche hier nicht und vielleicht nirgends näher definirt werden können und von welchen ich nur die Eigenthümlichkeit hervorhebe, dass sie jede sinnliche Empfindung, zu welcher sie sich gesellen, zu einer entschieden selbstbewussten machen und dass sie, ohne jemals den specifischen Charakter der sinnlichen Empfindung, der Farbe, des Tons, Geschmacks u. s. f. anzunehmen, sich doch in gleichsam immer engeren Kreisen um die specifische Empfindung zusammenziehen, bis sie zuletzt zur blossen Copula werden, d. h. zu einem Bande, welches eine Anzahl sinnlicher Empfindungen unter sich verknüpft und auf ein Einfaches, von welchem sie angeregt werden, zurückbezieht. Die Begriffe Körper, Thier, Säugethier, Fleischfresser, Hund, Pudel geben ein Beispiel jener Art von Zusammenziehung um die sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit; wenn ich aber an jene Reihe von Worten noch die Bezeichnung „dieser Hund“ oder den Eigennamen eines bestimmten und bekannten Hundes anfüge, so nenne ich bloss Laute, Schallempfindungen, die unser Geist für identisch zu halten befiehlt mit der Summe sinnlicher Eindrücke, zu welchen der besondere Hund Anlass giebt, Laute, die wir benutzen, um mit einem Schlage die Erinnerung an so viele sinnliche Eindrücke wach zu rufen. Man kann sich das Behalten einer Melodie erleichtern dadurch, dass man sich einprägt, sie gehe im Dreivierteltact, sie beginne im Auftact, mit ganzen oder halben Noten, Alles Begriffe, deren Kenntniss dem naturwüchsigen musikalischen Gedächtniss entbehrlich ist. Die Ausdehnung und Begrenzung sichtbarer Objecte kann als blosser Ausfüllung eines Theiles des Gesichtsfeldes aufbewahrt und reproducirt werden, oder man übersetzt die Ausdehnung in Begriffe, wie Gross und Klein oder in Einheiten bestimmter Maassstäbe und die Begrenzung in mathematische Ausdrücke. Wenn also, mit einem Worte, die Künstlerphantasie das Bild in seiner Totalität auffasst, so löst die Gelehrtenphantasie dasselbe in seine Bestandtheile auf, macht diese Bestandtheile einzeln, indem sie sie benennt und ordnet und unter Verstandesbegriffe subsumirt, zum Gegenstande des Denkens und führt sie dergestalt, förmlich und feierlich, ins Bewusstsein ein, um sie endlich wieder zum Gesamtbilde zusammenzufügen. Dieser Gang ist mühsam, aber gewährt eine gewisse Sicherheit, dass das Object in all seinen Theilen verstanden und erfasst werde; freilich führt er auch zu einem Abwege, vor welchem zu warnen um so weniger unterlassen werden darf, als im Allgemeinen eine gewisse Disposition zur Verirrung durch die Art unserer gelehrten Schulbildung begründet wird.

Die Verirrung aber besteht darin, dass man unterlässt, die Begriffe, welche nur die Vehikel sinnlicher Anschauungen sein sollten, wieder in solche Anschauungen zurückzuübersetzen, dass man dem Gedächtniss, statt organischer Formen, schematische Tabellen und, statt Bilder, Namen und Ziffern überliefert. Es giebt unter den Lernenden Viele, welche, ohne eine bestimmte Vorstellung von dem mikroskopischen Ansehen menschlichen Blutes, danach trachten, den Begriff „Blutkörperchen“ mit dem Schall „Null Komma Null Null Drei“ zu associiren. Aber auch von den Lehrenden wird öfters darin gefehlt, dass sie das Bemerkenswerthe mehr aufzählen und gruppiren, als beschreiben. Die Beschreibung, darüber sind wir Alle

einig, kann niemals die Betrachtung der Naturkörper ersetzen; sie soll aber nicht zu einem blossen Verzeichniss der Sehenswürdigkeiten herabsinken, sondern den Beschauer zu den einzelnen Objecten begleiten und ihn nöthigen, Auge, Finger und Gedanken an den Formen hinzuführen. Sie soll das räumlich fertig neben einander Bestehende zeitlich nach einander entstehen lassen, weil sie erstens gar nicht anders kann und weil zweitens an einem historischen Faden die Thatsachen leichter den Eingang in eine Phantasie finden, die nicht speciell für Formen organisirt ist. Aber nur um dieser Vermittelung willen haben die Worte und Zeichen der Beschreibung eine Bedeutung. Wem das Metall der sinnlichen Vorstellungen zum Transport zu schwer dünkt, mag es in das Papiergeld der Begriffe umsetzen; aber das Papier ist nicht des Aufhebens werth, wenn es sich nicht zu seiner Zeit wieder in Metall verwandeln lässt. Anfängern erlaube ich mir zur Selbstprüfung, ob ihre anatomischen Kenntnisse diese Bedingung erfüllen, ein Mittel vorzuschlagen: sie mögen versuchen, die Gegenstände aus dem Gedächtniss zu zeichnen. Was in Worten richtig gedacht ist, muss sich in Strichen wiedergeben lassen. Sind wir doch auch im gemeinen Leben jeden Augenblick bereit, wenn wir um die Lage eines Ortes befragt werden, unsere Auseinandersetzung mit Illustrationen, wenn auch allenfalls nur mit einem Spazierstock in Sand gravirt, zu begleiten!

Plan des Körpers der Wirbelthiere,

insbesondere

des Menschen.

Der Körper des Menschen, wie der Wirbelthiere überhaupt, besteht, auf seine Grundform zurückgeführt, aus zwei parallelen, einander in ihrer ganzen Länge berührenden, im Allgemeinen cylindrischen Röhren. Die eine dieser Röhren umschliesst die Centralorgane des Nervensystems, Organe, an welche vorzugsweise die Functionen des Denkens, Empfindens und Wollens, die das Thier vor der Pflanze voraus hat, gebunden sind; die andere Röhre schliesst die Organe für die Functionen der Ernährung und Fortpflanzung ein, die dem Thiere und der Pflanze gemein sind. Man kann deshalb jene Röhre die animalische, diese die vegetative nennen.

Animalische und vegetative Röhre.

Bei der dem Menschen natürlichen Haltung sind die Längenaxen beider Röhren senkrecht gegen die Erdoberfläche gestellt; dadurch bestimmt sich das Oben und Unten; die Längenaxe wird zur verticalen (oder perpendicularen); Ebenen und Durchschnitte, welche parallel der Längenaxe durch den Körper gelegt oder gedacht werden, nennen wir verticale. Ein Durchschnitt, welcher, der Grundfläche parallel und senkrecht gegen die verticale Axe, den Körper in einen oberen und unteren Theil scheidet, heisst Horizontal- oder Querschnitt, die in dieser Ebene gelegenen Axen heissen horizontale oder Queraxen. Die Ebene, welche gleichzeitig beide Röhren senkrecht in gleiche Hälften theilt und also durch die Linie, in der beide Röhren einander berühren, gelegt sein muss, wird die Medianebene des Körpers genannt; sie trennt rechts und links. Einen in dieser Ebene geführten Schnitt nennt man Medianschnitt. Durch die Lage der Sinnesorgane und durch die Gewöhnung, nach der von ihnen beherrschten Richtung zu greifen und zu schreiten, eine Gewöhnung, die allerdings auch durch die Mechanik der Bewegungswerkzeuge begünstigt wird, gelangen wir zur Unterscheidung von vorn und hinten: die animalische Röhre ist die hintere, die vegetative die vordere. Ich nenne eine Ebene, welche, senkrecht auf die Median- oder Verticalebene gedacht, den hinteren Theil des Körpers von dem vorderen trennt, Frontalschnitt oder senkrechten Querdurchschnitt. Von den horizontalen Axen soll die in der Ebene des Frontalschnittes gelegene den Namen trans-

Axen und Ebenen.


versale, die in der Ebene des Medianschnittes und der dem Medianschnitt parallelen Schnitte gelegene den Namen *sagittale* erhalten¹⁾; die von der verticalen und sagittalen Axe begrenzten, der Medianebene parallelen Ebenen und Schnitte werde ich als *sagittale* bezeichnen.

Von den populären, zur Bezeichnung der Dimensionen des Raums verwendbaren Ausdrücken hat nur der Begriff der Höhe einen unzweideutigen Sinn. Was man unter Länge, Breite, Dicke zu verstehen habe, ist willkürlich und besonders wegen der relativen Bedeutung, die diesen Wörtern anklebt, schwankend. Wir bedürfen derselben aber, wo wir Organe ohne Rücksicht auf ihre Lage zu den Axen des aufrecht gestellten Körpers zu beschreiben haben, und wir bedienen uns derselben alsdann gerade in dem relativen Sinne, wo Länge dem grössten und Dicke dem kleinsten Durchmesser entspricht.

Haupt-
theilung.

Am oberen Ende sind die beiden mit einander verbundenen Röhren, die animalische und vegetative, unter einem Winkel, der sich einem

Fig. 1.



rechten nähert, nach vorn umgebogen, so dass die Endflächen der Cylinder, welche die oberen sein sollten, an die Vorderfläche zu liegen kommen, Fig. 1. Indem sich die hintere Röhre zugleich, entsprechend der Anschwellung des Rückenmarks zum Gehirn, halbkugelförmig erweitert, bildet sie den Schädel²⁾, *Cranium*; das obere Ende der vegetativen Röhre, welches bei der erwähnten Umbeugung an die untere Fläche der animalischen gelangt, wird Gesicht, *Facies*, genannt; beide, Schädel und Gesicht, in Verbindung mit einander erhalten den Namen Kopf (*Caput*). Vom Schädel abwärts behält die animalische Röhre so ziemlich den gleichen Durchmesser und nur gegen das untere Ende verjüngt sie sich etwas; die vegetative Röhre, überall umfangreicher, ist unmittelbar unter dem Kopf am schmalsten und bildet mit dem entsprechenden Theile der hinteren Röhre den Hals, *Collum*, erweitert sich aber bald wieder zu einem Körper von abgeplattet cylindrischer, oben und unten verjüngter Gestalt, der in Verbindung mit dem entsprechenden Theil der hinteren Röhre und im Gegensatz zu Kopf und Hals, Rumpf, *Truncus*, genannt wird.

Kopf, Hals und Rumpf werden unter der Benennung *Stamm* zusammengefasst, im Gegensatz zu den Extremitä-

¹⁾ Die französischen Schriftsteller haben für die Axe, die ich *sagittale* nenne, die Bezeichnung *antéro-postérieure*. Der von mir gewählte Ausdruck ist den Anatomen von einer in der Richtung von vorn nach hinten verlaufenden Schädelnaht bereits geläufig und ich glaube, dass einer Verallgemeinerung desselben nichts entgegensteht. Deutsch liesse sich die *sagittale* Axe nach der Analogie von senkrecht und wagerecht die *pfeilrechte* nennen.

²⁾ Hirnschädel.

ten, welche, zwei obere und zwei untere, aus den Seitentheilen des Rumpfes an dessen oberer und unterer Spitze hervorwachsen, bei den niedersten Wirbelthieren und, in den ersten Stadien ihrer Entwicklung, auch bei den höheren in Form conischer oder abgeplatteter Zapfen, im ausgebildeten Zustande als vielfach gegliederte und gegen die Spitze hin getheilte Anhänge.

Die äusseren Theile des Stammes und die Extremitäten sind mit Bezug auf die Medianebene des Körpers symmetrisch gebildet, d. h. die Eine seitliche Körperhälfte wiederholt die andere in der Weise, wie das Spiegelbild einer Landschaft im Flusse das Urbild der Landschaft wiederholt: die in gleicher Entfernung von der Medianebene diesseits und jenseits gelegenen Theile gleichen einander. Alle neben der Medianebene befindlichen äusseren Organe sind demnach doppelt vorhanden oder paarig; auch die Organe, welche die Mitte der vorderen oder hinteren Körperwand einnehmen und nach populären Begriffen einfach oder unpaarig genannt werden, wie Nase, Mund, Brustbein, Harnröhre und dergl., bestehen aus zwei gleichen seitlichen Hälften, und sogar an den unpaaren, fibrösen oder knöchernen Scheidewänden, welche je zwei in der Medianebene an einander grenzende Höhlen trennen, wie z. B. an der Falx cerebri, dem Pflugscharbein, finden sich Spuren einer Zusammensetzung aus je zwei, mit den einander zugewandten Flächen verschmolzenen Blättern.

Unter den in den Körperhöhlen gelegenen Organen sind die meisten von ebenso regelmässig symmetrischem Bau, wie die Körperwände, doch treten bei den symmetrischen Eingeweiden der vegetativen Röhre, wie bei den Lungen und Nieren, schon Störungen der Symmetrie bezüglich des Umfangs und der Lage ein, veranlasst durch die unsymmetrische Bildung anderer, in der gleichen Höhle eingeschlossener Eingeweide. Zu den letzteren gehören das Herz nebst den grossen Gefässstämmen und der in der Bauchhöhle gelegene Theil des Verdauungsapparates. In der ersten Anlage sind aber selbst diese Organe symmetrisch und es geht die Symmetrie erst im Laufe der Entwicklung verloren, bei dem unpaaren Darmrohr durch Lageveränderungen, welche Folge der Verlängerung desselben sind, bei den paarigen Gefässstämmen durch theilweise und einseitige Obliteration. Und wo nach vollendeter Reife an symmetrischen Stellen der Körperhöhlen ungleichnamige Organe liegen, stellt sich doch ein Gleichgewicht durch eine gewisse Aehnlichkeit des Umfangs und der Form her, wie zwischen Leber und Milz, zwischen Blinddarm und Flexura iliaca coli, zwischen dem Bogen der Aorta linker- und der Vena azygos rechterseits.

Die wirklich symmetrischen Organe entsprechen einander in der Regel vollkommener, als mit Rücksicht auf die grosse Zahl der Störungen, welchen der organische Entwicklungsprocess ausgesetzt ist, erwartet werden sollte. Es ist meistens nicht schwer, aus einer grossen Zahl von Knochen verschiedener Skelette die gleichnamigen, je einem Individuum zugehörigen, herauszufinden. Mathematisch genau aber ist in der That die Symmetrie nirgends: bekanntlich sind fast alle Nasen merklich schief gestellt und nicht nur die Scheidewand der Nase, sondern auch die der Stirnbein- und Wespenbeinhöhlen weicht nach der einen oder anderen Seite aus; es giebt kaum ein Individuum, dessen Augen mit ganz gleichen bre-

chenden Kräften begabt wären; die Rippenknorpel haften nur selten regelmässig einander gegenüber am Brustbein; die Lage der Brustwarzen des Mannes ist öfters, sowohl was die Höhe als die Entfernung von der Medianebene betrifft, auf beiden Seiten verschieden. Ziemlich beständig überwiegen die Dimensionen der Organe der rechten Körperhälfte einigermaassen die der linken¹⁾. Die vorzugsweise Uebung der rechten Seite mag hieran Antheil haben; aber dass man allgemein gewöhnt ist, die rechte Seite vorzugsweise zu üben, scheint aus einem angeborenem Uebergewicht der rechten Körperhälfte erklärt werden zu müssen.

Eine Verschiedenheit beider Körperhälften stellt sich bei den Embryonen der Wirbelthiere schon in den ersten Tagen der Entwicklung dadurch heraus, dass sie dem Dotter oder der Nabelblase die linke Körperseite zuwenden, womit die rechte von Anfang an freier wird. Mit dieser Lage hängt, wie v. Baer annimmt (Entwicklungsgeschichte, Bd. I, S. 51), die asymmetrische Ausbildung der Kreislaufs- und Verdauungsorgane so genau zusammen, dass eine Ursache, welche jenes Verhältniss der Lagerung umkehrte, auch zu einer Umkehrung der genannten Eingeweide (*Situs inversus*) Anlass geben müsste. Im weiteren Verlaufe ist sodann die rechte Seite im Verhältniss zur linken insofern bevorzugt, als die Venenstämme, welche das Blut aus der rechten Körperhälfte sammeln, gerades Weges zur rechten Vorkammer des Herzens verlaufen, während das Venenblut der linken Hälfte diesen Stämmen auf einem Umweg, durch quer verlaufende Aeste, zugeführt wird. Ueber den Einfluss dieser anatomischen Thatsache auf die relative Häufigkeit gewisser Krankheiten in der Einen oder anderen Körperseite siehe meine rat. Path. Bd. II, Abthl. 2, S. 136.

Bei der Beschreibung der symmetrisch gebildeten Körpertheile macht sich das Bedürfniss von Ortsbezeichnungen fühlbar, wodurch das Verhältniss zur Medianebene und die Entfernung von derselben für beide Körperhälften zugleich ausgedrückt wird. Die hergebrachte Weise, die von der Medianebene nach der Einen oder anderen Seite entfernten Punkte äussere, und die ihr sich nähernden innere zu nennen, kann Missverständnisse herbeiführen, weil die Begriffe innen und aussen auch mit Beziehung auf die Axe des Stammes und der Glieder und auf einzelne Körperhöhlen, ohne Rücksicht auf das Verhältniss zur Medianebene, gebräuchlich sind. Man vermeidet diese Zweideutigkeit, wenn man die einander entgegengesetzten Seitenränder der paarigen Organe mit besonderen, den Regionen entsprechenden Namen belegt. So ist an jeder Kopfhälfte die Schläfen- und Nasenseite, an der oberen Extremität die Ulnar- und Radialseite, an der unteren Extremität die Tibial- und Fibularseite zu unterscheiden. Im Allgemeinen werde ich mich der Ausdrücke lateralwärts und medianwärts für die von der Medianebene abgewandte und die derselben zugewandte Richtung bedienen; die lateral- und medianwärts gewandten Flächen oder Ränder sollen laterale und mediale²⁾ heissen.

¹⁾ Hildebrandt-Weber, Handbuch der Anatomie des Menschen. Braunschweig, 1830. Bd. I, S. 122. — F. Arnold, Handbuch der Anatomie des Menschen. Freiburg, 1844. Bd. I, S. 28.

²⁾ Die übliche Adjectivform, median und mittlere bezeichnet eine absolute Stellung im Raum. Man bedarf eines Wortes, welches die Annäherung zur Mittellinie in derselben relativen Weise ausdrückt, die auch unsere übrigen Ortsbezeichnungen (vorn, hinten, seitlich u. s. f.) besitzen, und ich wähle dazu eine in Vergessenheit gerathene Form, welche bei Solinus vorkommt und wahrscheinlich aus einer Stelle von Plinius her stammt (*Salmas. exercit. Plin. p. 166 D.*).

Bei dem physiologischen Gegensatz, in welchem die vordere und hintere Röhre zu einander stehen, ist eine Analogie ihrer Formen nicht zu erwarten. Eine solche besteht dennoch, bezüglich der Wände, an dem Schwanzende vieler Wirbelthiere, wo der Inhalt der vorderen Röhre auf einen einfachen Blutgefäßstamm reducirt ist und eine durch die Mitte des Körpers gelegte Frontalebene den letzteren ebenso in zwei gleiche Hälften theilt, wie die Medianebene.


Die Vergleichung des menschlichen Stammes mit einem cylindrischen Doppelrohr könnte die Frage hervorrufen, ob nicht auch die einander im Längsdurchmesser entgegengesetzten Pole mit Beziehung auf die Queraxe symmetrische Bildung entdecken lassen? Schon ein Blick auf den senkrechten Durchschnitt widerlegt dies und zeigt, dass die animalische Röhre in fast continuirlichem Gange von Einem Ende zum anderen abnimmt und dass auch die Verengungen und Erweiterungen der vegetativen Röhre, entsprechend der Reihenfolge physiologisch differenter Eingeweide, eine einfache Reihe bilden. Statt einer symmetrischen Stellung zeigt sich in der Längsaxe des Körpers vielmehr eine Wiederholung gleichartiger und, wie die Plattenpaare einer galvanischen Säule, gleichsinnig geschichteter Theile. Bei den Gliederthieren ist diese Anordnung schon äusserlich, an der Abtheilung des Körpers in Ringe, kenntlich; bei den Wirbelthieren zeigt sie sich äusserlich nur in den Extremitäten, von welchen die hinteren eine mehr oder minder genaue Wiederholung der vorderen sind. Sie entzieht sich dem Auge an dem von der Haut überkleideten Stamme, tritt aber wieder an den tieferen Schichten seiner Wände, insbesondere an den Knochen und Muskeln hervor. Das cylindrische Rohr zerfällt durch Verknöcherung in eine Anzahl auf einander geschichteter Ringe, das cylindrische Doppelrohr in eine Anzahl von Doppelringen. Das Verständniss des organischen Gebäudes ist wesentlich dadurch gefördert worden, dass wir die einfachen Elemente, in welche der Körper gleich wie in Scheiben zerlegt werden kann, aufsuchen lernten und dass wir die Metamorphosen verfolgten, welche diese Elemente je nach dem physiologischen Bedürfniss der einzelnen Regionen erfahren.

Wiederholung in der Längsaxe.

Die organischen Systeme.

An jeder der beiden an einander gelötheten Röhren, deren äussere Schichten. Form und Lage im Vorigen beschrieben wurde, ist Wand und Lumen


Fig. 2.



oder Höhle zu unterscheiden. Die Höhlen sind gesondert; die Wände bestehen aus verschiedenen Schichten, deren man, wenn man vorerst nur den Verlauf und nicht das Gewebe in Betracht zieht, drei anzunehmen hat, eine innere, mittlere und äussere. Der Horizontaldurchschnitt, Fig. 2, zeigt, dass die inneren Schichten der Wände beider Röhren (durch die punktirten Linien angegeben) je einen selbstständigen, die Höhle zunächst begrenzenden Köcher dar-

stellen; sie werden als fibröse und seröse Hüllen der in den Höhlen eingeschlossenen Eingeweide mit diesen Eingeweiden beschrieben. Die Mittelschichten fließen an der Berührungsstelle beider Röhren zusammen, gehören also theilweise beiden gemeinschaftlich an, lassen sich aber noch in Gedanken in zwei selbstständige Köcher trennen. Diese Schichten sind es, welche sich durch ihre Härte und Unverweslichkeit auszeichnen und das Skelett des Stammes bilden. Die äussere Schicht erscheint, indem sie sich in der ganzen Länge des Körpers, über die Berührungsstelle beider Röhren von einer zur anderen hinüberschlägt, als ein einfacher, beiden überall gemeinschaftlicher Ueberzug, welcher durch nichts mehr den complicirten Bau der von ihm bekleideten Gebilde verräth. Dieser Ueberzug, an die tieferen Theile locker und einigermaassen verschiebbar angeheftet, an der freien Oberfläche von einer trocknen und festen Substanz bedeckt und durch sie gegen die Aussenwelt geschützt, ist die äussere Haut (Cutis).

Fig. 3.



Die Schicht, welche am Stamm die mittlere ist, setzt sich als solide Axe in die Extremitäten fort, auf die auch die äussere Haut übergeht. Zwischen beiden verlaufen in den Extremitäten die Massen contractiler Fasern, welche, als Muskeln oder Fleisch, den Gliedern ihre Rundung verleihen und durch ihre Zusammenziehung die verschiebbaren Theile gegen einander bewegen. Auch am Stamm füllen die Muskeln hauptsächlich die Räume zwischen der äusseren und mittleren Schicht.


Die Eintheilung des Stoffes, welche beim Vortrage der systematischen Anatomie ganz allgemein und mit gutem Recht eingeführt ist, gründet sich theils auf die Continuität der erwähnten Schichten, theils auf die zweifellose Gleichartigkeit der Textur und Function der unter einem Begriff zusammenzufassenden Körpertheile.

1. Knochen. Das feste, zum Theil knorpelige, grösstentheils aber knöcherne Gerüste, welches die Wände des Stammes stützt und die Axe der Extremitäten bildet, beschreibt die Knochenlehre (Osteologie).

2. Bänder. Das Skelett besteht aus einzelnen Stücken, welche durch weichere Substanz, Knorpel oder Bindegewebe, mehr oder minder beweglich unter einander verbunden sind. In dem Einen Falle geht das verbindende Gewebe von allen Punkten der einander zugekehrten Flächen je zweier Knochen aus; so entsteht die Naht im weitesten Sinne des Wortes (*Synarthrosis*), in welcher die Knochen um so beweglicher sind, je mächtiger die Lage der Zwischensubstanz. Im anderen Falle sind die einander zugekehrten Knochenflächen ganz oder grösstentheils frei und glatt, daher über einander verschiebbar. Das weiche Gewebe, welches die Knochen verbindet, geht von den Rändern der auf einander gleitenden Flächen oder von einzelnen Gruben oder Vorsprüngen der letzteren aus. Eine solche Verbindung heisst Gelenk (*Diarthrosis*). In früheren Lebensaltern sind manche Knochen durch Naht getrennt, welche später, durch Verknöcherung der Naht, zu

einem einzigen Stück verschmelzen; man kann sich ebenfalls aus der Naht, durch eine in entgegengesetzter Richtung fortschreitende Metamorphose die bewegliche Gelenkverbindung hervorgegangen denken, wenn nämlich

Fig. 4.



das Gewebe der ersteren sich vom Centrum aus bis auf die periphere Schicht erweicht und endlich verflüssigt (Fig. 4). Die Wirbel- und Beckenfugen mit ihrem gallertartigen, halbflüssigen Kerne stellen eine Zwischenstufe zwischen den Nähten und Gelenken dar. Eine andere Art des Ueberganges findet sich in den Verbindungen der Gelenkfortsätze der Wirbel, von welchen die oberen zu Gelenken, die des Kreuzbeins zu Nähten

werden, die endlich noch vor vollendetem Wachsthum verknöchern. Mit Rücksicht auf die Bestimmung, welche im Allgemeinen die Gelenkfortsätze der Wirbel haben, könnte man die Verschmelzung derselben am Kreuzbein eine physiologische Anchylose nennen.

Die weichen, lediglich zur Verbindung der Knochen bestimmten Gebilde heissen Bänder; der Theil der systematischen Anatomie, welcher dieselben beschreibt, ist die Bänderlehre (Syndesmologie).

Sind die Knochen durch Nähte und Gelenke gegen einander beweglich, 3. Muskeln. so müssen sie, damit die Bewegungen wirklich werden, mit Geweben in Verbindung stehen, welche einer Aenderung ihres Volumen und in gewissen Richtungen einer Verlängerung oder Verkürzung fähig sind. In dem Organismus sind zwei Arten von Geweben verbreitet, welche dieser Anforderung entsprechen. Die Gewebe der ersten Art haben vermöge einer Anordnung der Moleküle, die sich auch im Tode erhält, die Eigenschaft, nach der Ausdehnung, wenn die ausdehnende Gewalt nachlässt, freiwillig in den Zustand der Verkürzung zurückzukehren, der also für sie als Zustand der Ruhe anzusehen ist. Die Kraft, welche sich auf diese Weise äussert, heisst Elasticität; sie inhärrt, in gewissem Maasse, allen Bestandtheilen des thierischen Körpers; die Gewebe aber, deren Elasticität bei Bewegungen der Körpertheile in Betracht kommt, sind das Knorpel- und Bindegewebe und das eigentlich sogenannte elastische Gewebe. Eine zweite Art verkürzungsfähiger Gewebe ist im Zustande der Ruhe ausgedehnt, bedarf besonderer Anregung, um sich zusammenzuziehen, und verliert mit dem Tode das Vermögen, der Anregung zu folgen. Gewebe dieser Art nennt man contractile oder irritable oder schlechthin Muskeln. Sie bestehen aus parallel geordneten feinen Fasern; ihre Zusammenziehung geschieht, wahrscheinlich durch Kräuselung der Fasern, in der Richtung der letzteren, wobei der Umfang des Muskels in den übrigen Dimensionen zunimmt. Die Muskeln erscheinen in zweierlei Formen, welche bei gleicher chemischer Beschaffenheit sich sowohl durch die Gestalt der Elemente, als auch durch deren Anordnung unterscheiden und sich auch bezüglich ihrer Vertheilung im Organismus in zwei, allerdings nicht ganz scharf begrenzte Gruppen trennen lassen. Die Eine Art der Muskeln, die vegetativen (organischen, glatten), aus langgestreckten Zellen gebildet, von blasser Farbe, durch dünne Lagen von elastischem und Bindegewebe auf eine dem unbewaffneten Auge kaum wahrnehmbare Art in Bündel geschieden, ge-

hört der Haut, den röhren- und blasenförmigen Eingeweiden und den nahrungssaftführenden Canälen an und erscheint in den Wänden jener Röhren und Blasen als hautartig ausgebreitete Schicht. Die Fasern der anderen Art des Muskelgewebes, die animalischen (gestreiften oder varikösen) haben in Masse eine rothe Farbe; sie sind zu feinen Bündeln, die feinen Bündel zu stärkeren und diese wieder zu stärkeren zusammengefasst u. s. f. und jedes Bündel, die primitiven von einer einfachen Membran, die secundären, tertiären u. s. f. von successiv stärkeren Bindegewebshüllen umgeben, so dass der faserige Bau, wenn nicht durch die feinsten, so doch durch die gröberen Bündel sogleich in die Augen fällt. Sie sind vorzugsweise zur Bewegung der Skeletttheile gegen einander bestimmt, mit welchen sie durch Bindegewebsstränge, Sehnen, in Verbindung stehen, erstrecken sich aber auch vom Skelett in die äussere Haut, von den Körperöffnungen aus an den röhrenförmigen Eingeweiden streckenweit nach innen und kommen ausserdem, wovon später, an einem Theil des Blutgefässsystemes vor. Die Muskellehre (Myologie) im systematisch-anatomischen Sinne beschreibt die Form der animalischen Muskeln, welche mit dem Skelett unmittelbar zusammenhängen, sammt ihren Sehnen und den, die grösseren Muskelmassen umhüllenden Bindegewebsschichten (Fascien); die Muskeln, vegetative sowohl, als animalische, welche als Schichten in den Wänden der Eingeweide und Gefässe vorkommen, werden in Verbindung mit diesen abgehandelt.


4. Eingeweide.

Für das, was man unter Eingeweide versteht, eine einfache Definition zu geben, ist nicht möglich. Der Begriff umfasst Organe von sehr verschiedenartiger Function und Structur, ebensowohl im Inneren, als an der Körperoberfläche gelegene. So ist auch der Inhalt der Eingeweidelehre (Splanchnologie) ein sehr gemischter, welchen wir in folgende drei Unterabtheilungen einigermaassen zu ordnen suchen:

a. Cutis und deren Fortsetzungen.

1. Die Haut mit ihren Fortsetzungen. Die Haut, wie sie einen gemeinsamen Ueberzug über die animalische und vegetative Röhre bildet, so dient sie auch gleichmässig beiderlei Zwecken, dem sinnlichen und dem chemischen Verkehr mit der Aussenwelt. Ihre Bedeutung für die vegetativen Functionen gewinnt aber dadurch das Uebergewicht, dass sie sich an den Körperöffnungen nach innen schlägt, um sich zu den Apparaten der Ernährung und Fortpflanzung zu entfalten.

Die vegetative Röhre steht in der ersten Zeit des embryonalen Lebens mit dem Dotter, *Vitellus*, aus dessen Hülle sie sich abschnürt, durch




Mediandurchschnitt.

einen Gang in offener Verbindung, welcher etwa von der Mitte ihrer vorderen Fläche seinen Ursprung nimmt und in dem Maasse, als der Embryo sich vergrössert, länger und relativ enger wird. Die Oeffnung des vegetativen Rohres, von welcher der Gang ausgeht, ist der Nabel, *Umbilicus*, der Gang heisst *Ductus vitello-intestinalis*.

Durch den Nabel und den D. vitello-intestinalis nimmt der Embryo die erste Nahrung, die ihm aus dem Dotter zukommt, in sich auf. Später, wenn der Gang zwischen Nabel und Dotter unwegsam wird und der Nabel sich schliesst, bricht die vegetative Röhre an der oberen und unteren Spitze durch und es bilden sich die bleibenden Oeffnungen, von welchen jede durch eine Brücke, die obere durch den Gaumen, die untere durch das Perinäum (Damm) getheilt wird (Fig. 7). An diesen Oeffnungen aber ist die Cutis

Fig. 7.



nicht durchbohrt; sie schlägt sich über die von ihr bedeckte Wand der vegetativen Röhre nach innen, hier an die innere Fläche der Röhrenwand, dieselbe austapezirend, befestigt, dort frei innerhalb der Höhle in Form von Schläuchen oder Blasen aufgehangen, welche nach mannigfachen Verengungen und Erweiterungen, Faltungen und Verzweigungen theils blindsackig enden (Athem-, Harn- und Geschlechtsorgane), theils an dem der Eingangsöffnung gegenüberliegenden Körperende wieder in die Cutis übergehen, den Körper also von einem Pol zum anderen durchziehen (Verdauungsorgane). Dabei erfahren die Schichten der Cutis mannigfache Modificationen, wodurch sich dieselbe, in mehr oder minder raschem Uebergang, zur Schleimhaut umgestaltet, die im Allgemeinen durch die rothe Farbe und feuchte Beschaffenheit ihrer Oberfläche ausgezeichnet und um so feiner ist, je enger das Lumen der Canäle, die sie begrenzt. Die letzten, feinsten und reichlich verzweigten Enden der Canäle, durch Bindegewebe zusammengehalten, erscheinen als drüsige Gebilde (*Glandulae*); die Gänge, welche die Drüsen mit dem Hauptschleimhautcanal verbinden, als Ausführungsgänge (*Ductus excretorü*).

Kleinere Einstülpungen der Cutis, welche zwischen ihr und der Muskelschicht in der Körperwand liegen, werden mit der Cutis beschrieben, die Brustdrüse ausgenommen, die man ihrer Function wegen zu den Geschlechtsorganen stellt.

Wenn man die Schleimhaut als Fortsetzung der Cutis, die Ausführungsgänge und Drüsenröhrchen als Fortsetzungen oder Ausstülpungen der Schleimhäute beschreibt, so ist dies, was hier ein- für allemal bemerkt werden möge, niemals wörtlich so zu nehmen, als ob bei der ersten Entwicklung ein Vorschreiten und Fortwachsen in der Richtung stattgefunden habe, in welcher etwa der Beschreibende von einem Theile zum anderen übergeht. Die Anatomie bedient sich dieser Ausdrücke, wie auch der Worte Ursprung, Verlauf, Theilung, in bloss räumlichem Sinne und ohne Rücksicht auf die zeitliche Beziehung, die ihnen eigentlich zu Grunde liegt. Die zeitliche Reihenfolge, in welcher die Organe wirklich auftreten, welche wir in der Beschreibung nach einander auftreten lassen, kommt für unseren Zweck nicht in Betracht; doch darf man sagen, dass sie schwerlich irgendwo mit den Vorstellungen übereinstimmt, die wir uns zum Behufe der Auffassung der

räumlichen An- und Unterordnung geschaffen haben. Die Körpertheile sind früher in ihrer äusseren Form vollendet, als in ihre verschiedenen Schichten oder Gewebe gesondert. Zieht sich nun, wenn diese Sonderung vollzogen ist, ein Strang oder Canal streckenweit hin, so kann man sich die Entstehung desselben nicht anders denken, als dass in jedem Querschnitt der anfänglich gleichartigen Substanzen sich ein entsprechendes scheiben- oder ringförmiges Stück zur Substanz jenes Stranges oder Canals metamorphosirt habe. Scheint ein Strang, wie dies z. B. von den Nerven behauptet wird, aus den Centralorganen in peripherischer Richtung fortzuwachsen, so ist es in der That nur die Metamorphose des bereits abgelagerten Blastems, welche in der Richtung vom Centrum zur Peripherie fortschreitet. Oft wachsen in dieser Art Canäle von zwei Seiten einander entgegen, um sich dann schliesslich in einander zu öffnen, und namentlich findet sich dies Verhältniss zwischen Drüsen und ihren Ausführungsgängen. Daher rechtfertigt es sich auch, das Ovarium den absondernden Drüsen beizuzählen und den Oviduct als dessen Ausführungsgang zu betrachten, wenngleich die Hohlräume dieser Drüse geschlossen sind und sich mit dem Lumen des Oviducts nur vorübergehend in Verbindung setzen.

b. Blut-
gefäss-
drüsen.

2. Die Blutgefässdrüsen. Eine beschränkte Anzahl von Organen ist im äusseren Ansehen den absondernden Drüsen ähnlich, unterscheidet sich aber von diesen in dem wesentlichen Punkte, dass sie, abgesehen von den Blutgefässen, entweder keine oder doch nur völlig geschlossene Hohlräume enthalten. Ob die Organe, welche man unter diesen Gesichtspunkten und unter dem gemeinsamen Namen der Blutgefässdrüsen zusammenstellt (Schilddrüse, Milz, Nebennieren, Thymus), noch wichtigere, als jene äusseren und zum Theil negativen Eigenschaften mit einander gemein haben, lässt sich mittelst unseres gegenwärtigen Wissens von ihrem Bau und ihrer Function nicht entscheiden. Jedenfalls aber ist ihre Verwandtschaft unter einander grösser, als die Verwandtschaft einzelner derselben zu den Organen der Verdauung, Harnbereitung oder Athmung, welchen man sie, je nach ihrer Lage in der Nähe der einen oder anderen, bisher anzureihen pflegte.

c. Sinnes-
apparate.

3. Die Sinnesapparate. In dem Worte Sinnesorgan liegt ein Doppelsinn. Wir bedienen uns desselben, um die Substanz zu bezeichnen, an welche die eigenthümliche Thätigkeit des Empfindens gebunden ist, die Substanz, deren Reizung Veränderung der Empfindung nach sich zieht und deren Zerstörung die Fähigkeit, in der specifischen Weise zu empfinden, aufhebt. Der Reiz, welcher die Empfindung veranlasst, kann unseren Körper an seiner Oberfläche treffen; damit es aber dann wirklich zur Empfindung komme, muss zwischen dem Gehirn und dem gereizten Punkt der Oberfläche eine ununterbrochene Verbindung durch Nervenfasern bestehen. Diese Thatsache ist auf zweierlei Art ausgelegt worden: entweder man betrachtet die Nerven als eine Art Conductoren, die den örtlichen Erfolg der Reizung zum Gehirne fortzupflanzen bestimmt seien, und schreibt einzelnen Gehirnthellen die Fähigkeit zu, ihre durch die Nerven vermittelte Erregung in der specifischen Form einer sinnlichen Empfindung wahrzunehmen. Oder man erkennt die Nervenfasern in ihrem ganzen Verlaufe bis zu ihrer Einpflanzung ins Gehirn als Träger der Kräfte, die sich in Sinnesempfindungen aussprechen, und man sieht in der Verbindung dieser Nerven und insbesondere ihrer centralen Enden mit anderen Hirnthellen die Bedingung, an welche das Bewusstwerden des Zustandes der Sinnesnerven ge-

knüpft ist. Je nachdem man die eine oder andere dieser Ansichten adoptirt, fasst man als Substanz des Sinnes oder als eigentliches Organ der Sinesthätigkeit entweder ausschliesslich den Gehirntheil, von welchem man annimmt, dass er die Empfindungen erzeuge, oder den Nerven von seinem Ursprung an der Körperoberfläche bis zu seiner Endigung im Gehirn. Gewöhnlicher ist es, Sinnesorgane die mehr oder weniger zusammengesetzten Gebilde zu nennen, welche an der Körperoberfläche zunächst zur Aufnahme gewisser Arten von Sinnesreizen bestimmt sind, das Auge und Ohr, die Nase, Zunge und Haut. Für diese werde ich den Namen Sinnesapparate gebrauchen. Der Sinn kann thätig sein nach Ausrottung oder mit Umgehung derselben, wie die sogenannten Hallucinationen und Träume von sichtbaren Gegenständen bei völlig Erblindeten, wie die in Folge von Hirncongestion eintretenden Sinnesphantasmen und viele ähnliche Erscheinungen beweisen. Der Sinnesapparat aber hat die doppelte Bedeutung: 1) dem Sinnesnerven Flächen zur peripherischen Ausbreitung darzubieten, und 2) eine für jeden Nerven besondere Art von Reizen, für welche der Nerv eine specifische Empfänglichkeit besitzt, zu leiten, zu concentriren oder nach Umständen zu mässigen. Der letztgenannte Zweck erforderte sehr verschiedene Einrichtungen, je nachdem Lichtstrahlen, Schallwellen, chemischen oder mechanischen Einflüssen der Weg zu dem Nerven gebahnt werden sollte. Diese Einrichtungen nebst der Endausbreitung der Sinnesnerven, so weit sie eigenthümlich und von dem Apparat unzertrennlich ist, beschreiben wir in der Eingeweidelehre und weisen der Nervenlehre die Beschreibung des Laufes der Sinnesnerven und ihrer Ursprünge zu.

Die Nervenlehre (Neurologie) stellt die in der animalischen Röhre enthaltenen Organe nebst deren Ausläufern in die Wände beider Röhren und in die Höhlen der vegetativen Röhre dar. Jene Organe, zusammengesetzt theils aus den mikroskopischen Nervenfasern, welche in Masse weiss sind, theils aus kugelförmigen Elementen, welche in Masse eine grauröthliche Substanz bilden, sind, wie früher erwähnt, Träger der Seelenthätigkeiten und der sinnlichen Empfindungen und Erreger der Muskelcontractionen. Alle diese verschiedenen Lebensäusserungen, ebenso wie die verschiedenen Formen der sinnlichen Empfindung haften dergestalt an bestimmten Gruppen von Nerven, dass die Reizung jeder Faser an jeder Stelle ihres Verlaufs die gleichen Reactionen hervorruft und keine jemals ihre Rolle mit einer anderen vertauscht. Die Gruppe von Nervenfasern, deren Thätigkeit den psychischen Functionen zu Grunde liegt, macht einen Theil des Gehirnes aus und erstreckt sich nicht über die Schädelhöhle hinaus. Die empfindenden und bewegenden Nerven aber, wenn sie auch im Gehirn und Rückenmark mit enthalten sind und in diesen Organen (vielleicht in der grauen Substanz derselben) die Quelle ihrer Kraft haben, müssen sich doch hinausbegeben zu den Oberflächen, auf welchen sie die Eindrücke der Aussenwelt empfangen sollen, und zu den Muskeln, welchen sie die Impulse zur Zusammenziehung überbringen. Auf den richtigen Zusammenhang dieser Nerven mit den, den psychischen Functionen dienenden Hirnthteilen kommt es sodann an, wenn eine peripherische Erregung der Sinnesnerven eine bewusste Empfindung, wenn ein Gedanke, der Wille, eine Muskelzusammenziehung veranlassen soll. Der Austritt der Nerven

5. Nerven.

aus der animalischen Röhre geschieht durch symmetrische seitliche Oeffnungen in Form von symmetrischen Stämmen, mächtigen, meist aus mehreren Wurzeln zusammentretenden Faserbündeln, welche sich peripherisch verästeln, d. h. wiederholt in feinere, eine geringere Faserzahl umfassende Bündel spalten. Stämme und Zweige schicken einander häufig gegenseitig kleinere Abtheilungen von Fasern, sogenannte Anastomosen, zu und schwellen an bestimmten Stellen, zumal auf dem Wege zu den Eingeweiden, durch Einlagerung grauer Substanz knotenartig (zu Ganglien) an. Alles dies, die Form der Centralorgane, die Vertheilung der grauen und weissen Substanz und die Faserung der letzteren, die Verzweigung und der Verlauf der Nerven, und die Lage und Form der Ganglien gehört in das Gebiet der Nervenlehre; doch verfolgt diese die Verästelungen der Nerven in der Regel nur bis zum Eintritt in die Organe, welchen sie Beweglichkeit oder eine bestimmte Art der Empfindlichkeit verleihen, und begnügt sich im Uebrigen mit dem allgemeinen Resultate, dass die Verästelung und die Verfeinerung der Aeste, sowie der Austausch ihrer Fasern noch innerhalb der Muskeln und Häute fort dauert, bis aus der fortgesetzten Theilung die letzten und feinsten, nur mikroskopisch erkennbaren und nur aus wenigen Fasern bestehenden Zweige hervorgehen, deren Endigungsweise nur an wenigen Stellen zuverlässig ermittelt ist.

6. Gefässe.

Ich erwähne zuletzt das organische System, welches alle übrigen durchdringt und in wesentlich gleicher Anordnung in allen Körpertheilen wiederkehrt, welches deshalb auch wenigstens oberflächlich gekannt sein muss, wenn die Beschreibung der übrigen nicht in vielen Punkten unverständlich bleiben soll: ich meine das System der nahrungssaftführenden Gefässe. Der Theil der Anatomie, welcher einlässlich von demselben handelt, ist die Gefässlehre (Angiologie).

Die Existenz der organischen Körper beruht auf einem beständigen Stoffaustausch mit der Aussenwelt, so dass die Materie, die eben noch Bestandtheil eines lebenden Wesens war, zersetzt abgegeben und, wenn das Leben fortbestehen soll, neue gleichartige Materie von aussen aufgenommen werden muss. Dieser Austausch erfolgt auf die leichteste Weise bei den niedersten Thieren und Pflanzen, die entweder aus einem einfachen Bläschen oder, wie die Gährungspilze, aus reihenweise über einander geordneten Bläschen bestehen. Jedes dieser Bläschen ist an jeder Stelle gleich fähig, die geeigneten Stoffe aus dem Medium, in welchem es sich befindet, anzuziehen, die abgenutzten auszuschcheiden. Bei den complicirteren Organismen war, abgesehen von der etwa nöthigen Vorbereitung der Nahrungsmittel, der Zerkleinerung und Auflösung derselben, eine Veranstellung nöthig, damit jedes organische Element mit den frischen Nahrungssäften in Berührung komme. Ganz allgemein gelangen diese daher bei den complicirteren Thieren in eine innere Höhle, den Verdauungscanal, und werden, so weit sie brauchbar sind, von da aus durch den Körper verbreitet. Dies könnte nun in unmittelbarer Weise dadurch bewerkstelligt werden, dass der Verdauungscanal selbst Verzweigungen durch die Substanz des Körpers sendete, in welchen der verflüssigte Nahrungsstoff weiter geführt würde. Enden diese Verzweigungen blind, so wird der unbrauchbare Theil der Nahrung nebst dem verbrauchten Material des Organismus

durch eine rückgängige Bewegung und durch die Aufnahmsöffnung (den Mund) wieder ausgeworfen. Der nächste Fortschritt in der Organisation erfolgte sodann dadurch, dass die Canäle, welche sich durch den Körper ziehen, sich entweder einzeln oder wieder zu einem Canal gesammelt, durch mehrere Aftermündungen oder durch eine einzige nach aussen öffneten, wodurch die Bewegung der Nahrungsstoffe zu einer continuirlichen, den Körper von einem Pol zum anderen durchwandernden, werden würde. In der Classe der Polypen, Medusen und Helminthen kommen Arten mit einem durch den Körper verzweigten Verdauungscanal mit und ohne After vor, in welchen man die eine und andere der eben angedeuteten Formen eines nahrungssaftführenden Systems verwirklicht zu sehen glaubte. Ob mit Recht, mag dahingestellt bleiben. Manche Entdeckungen der neueren Zeit lassen vermuthen, dass wir unsere Kenntnisse von dem Bau jener Thiere zu früh für abgeschlossen gehalten haben. Jedenfalls ist bei den höheren Thieren der Darm, mag er einfach oder verzweigt sein, nur ein Behälter für die aufgenommene und verflüssigte Nahrung, aus welchem die zum Wiederersatz der organischen Substanz bestimmten Säfte erst in ein neues Röhrensystem übergeleitet werden. Dies erfolgt durch Aufsaugung (Endosmose). Der Darminhalt ist für die Thiere, was der Boden für die Pflanze. In den Boden sind die Wurzeln der Pflanze gesenkt und in den Spitzen der Wurzeln beginnen die Saftcanäle, geschlossen, so dass nur flüssigen und gelösten Stoffen der Eintritt in dieselben gestattet ist. Ebenso ist in den Darmwänden des Thieres ein Netz geschlossener Röhren ausgebreitet, dessen Membranen nur der gelöste Theil des Darminhaltes zu durchdringen vermag. Die unlöslichen Bestandtheile der Nahrung, welche in der Darmhöhle zurückbleiben, werden als Excremente ausgeleert; die gelösten, in jenes Röhrennetz aufgenommenen, bilden die allgemeine Ernährungsflüssigkeit des Körpers, das Blut. Und gleich dem Eintritt in dies Gefäßsystem ist auch der Austritt der Stoffe aus demselben, zum Behuf der Ausscheidung aus dem Körper, überall ein Process der Durchschwitzung gelöster Materien auf Häute oder in die Höhlen drüsiger Organe, welche zum Theil vermöge der chemischen Eigenthümlichkeit der Gewebe, die in ihre Zusammensetzung eingehen, gerade die zum Auswerfen reifen Materien aus dem Blute an sich ziehen.

Mit dieser vervollkommenen Einrichtung der Stoffeinnahme und Abgabe hängt noch ein anderer Fortschritt zusammen, der sich kurz und gleichnissweise so ausdrücken lässt, dass die Erneuerung der Nahrungssäfte bei niederen Organismen, wenn sie durch unmittelbare Verästelungen des Darms im Körper verbreitet werden, eine integrale ist, bei höheren, mit einem geschlossenen Gefäßsystem versehenen Organismen dagegen eine partiale. Für einen bestimmten Bruchtheil neu eintretender, jüngerer Stoffe scheidet hier immer ein entsprechender Bruchtheil der ältesten aus und während dieser allmäligen Regeneration wird die Masse des Blutes in einer kreisförmigen Bahn umhergetrieben, so dass dasselbe Partikelchen wiederholt zu der Stelle zurückkehren kann, von der es ausging.

Um eine kreisförmige Bahn, wie die, in welcher das Blut sich bewegt, zu beschreiben, muss man willkürlich an irgend eine Stelle den Anfang setzen. Beim Blutgefäßsystem hat sich der Ausgangspunkt ganz unge-

sucht dadurch ergeben, dass alle die feinsten Röhren, die sich in den Geweben verbreiten, Zweige eines oder weniger Stämme sind und sich wieder zu einem oder wenigen Stämmen vereinigen. Dem Stoffumsatz dienen unmittelbar nur die feinsten Röhren von 0,002 — 0,008''' Durchmesser, deren Wände zugleich dünn genug sind, um die Blutflüssigkeit durchsickern zu lassen; man nennt sie Capillargefässe oder, weil sie überall netzförmig unter einander zusammenhängen, Capillarnetze. Die Inseln fester Substanz in den Lücken dieser Netze, das sogenannte Parenchym, sind in manchen Geweben nicht breiter, als die Capillargefässe selbst, erreichen aber in anderen eine viel bedeutendere Ausdehnung, so dass in jedem Durchschnitt der Zwischenraum zwischen je zwei Röhren das Zehnfache des Durchmessers der Röhren betragen kann. Die Gewebe werden danach in blutreiche und blutarme unterschieden. Die Stämme und Zweige, in welchen das Blut den Capillarnetzen zuströmt, werden Arterien (Pulsadern), die Zweige und Stämme, in welchen es aus den Capillarnetzen abfließt, werden Venen (Blutadern) genannt. Die Häute sämtlicher Gefässe, mit Ausnahme der feinsten Capillarien, sind elastisch und contractil und demnach einer Veränderung ihres Kalibers fähig; an den einfachen Stämmen aber, die sich in die Arterien- und Venenzweige auflösen, sind die Vorrichtungen angebracht, welche die Strömung des Blutes und die Richtung dieser Strömung regeln. Ich komme auf dieselben zurück.

Vermittelst der Capillarnetze stehen nicht nur die Arterien mit entsprechenden Venen, sondern auch die arteriellen Gefässe, so wie die venösen, je unter sich in Verbindung. Es giebt ausserdem Verbindungen der einander benachbarten Arterienzweige diesseits und ebenso der Venenzweige jenseits ihrer capillaren Verästelung durch Gefässe, deren Kaliber dem Kaliber der Zweige, zwischen welchen sie die Communication herstellen, entspricht. Solche Verbindungen heissen Anastomosen und, wenn sie reichlich und netzförmig sind, Geflechte (Plexus).

Die venösen Gefässe sind nicht die einzigen, durch welche der Nahrungssaft aus den Organen zurückgeleitet wird. Bei den Wirbelthieren besteht in dem Parenchym der meisten Organe neben dem Capillarnetz der Blutgefässe ein gröberes und wahrscheinlich ebenfalls geschlossenes Netz von Röhren, deren wesentliche Bestimmung ist, sich mit dem Saft zu füllen, der die Blutgefässcapillarien verlassen und sich in das Parenchym ergossen hat.


In dieselben Röhren, die man mit dem Namen Saugadern, (Lymphgefässe) bezeichnet, finden dann noch andere, zufällig von aussen zugeführte Flüssigkeiten, womit die Gewebe sich tränken, ihren Weg, und so sind sie es auch, welche in den Darmwänden, in Berührung mit den neu eingeführten und verdauten Nahrungsmitteln, die Zuleitung der Ersatzstoffe des Blutes übernehmen. Aus den Saugadernetzen gehen verhältnissmässig feine und vielfach unter einander anastomosirende Gefässe hervor, die in der Richtung der Venen und meistens in Begleitung derselben aus den Organen aus- und zusammentreten und endlich, in einige Hauptstämme gesammelt, ihren Inhalt in die Hauptstämme der Venen ergiessen.

Die Nahrungssäfte haben, wenn sie aus dem Parenchym zurückkehren,

durch Abgabe einzelner Bestandtheile und durch Aufnahme anderer, die theils im Organismus erzeugt, theils von aussen zugeführt sind, mancherlei Veränderungen erfahren. Je nach der Function und dem Nahrungsbedürfniss der Organe sind diese Veränderungen verschieden. Bei Vergleichung des Inhaltes der Arterien und Venen verrathen sie sich allgemein, mit einer einzigen, später zu erwähnenden Ausnahme, schon dadurch, dass das Blut, nachdem es die Capillarien passirt hat, dunkler geworden ist. Das Blut verdankt die hellrothe Farbe seinem Gehalt an Sauerstoff; die dunkle Färbung des Venenblutes rührt davon her, dass bei dem Stoffwechsel der Sauerstoff theilweise verloren geht, wogegen sich das Blut mit Kohlensäure, einem der Zersetzungsproducte der organischen Materie, schwängert. Der Farbstoff des Blutes aber, welcher durch die Einwirkung und Entziehung des Sauerstoffs in der angegebenen Weise verändert wird, ist in mikroskopischen Bläschen, den Blutkörperchen, enthalten, denen die Capillargefässe den Austritt nicht gestatten. So ist die Flüssigkeit farblos, welche zum Behuf der Ernährung aus den Capillarnetzen der Blutgefässe ausschwitzt, und ebenso farblos ist die durch den Austausch mit dem Parenchym veränderte Flüssigkeit, welche in die Netze und Stämme der Saugadern gelangt. Diese Flüssigkeit ist die Lymphe; in den Saugadern des Darms ist sie zur Zeit der Verdauung durch beigemischtes Fett milchig-weiss und wird dann Chylus (Milchsaft) genannt. Die Saugadern oder Lymphgefässe des Darms führen deshalb auch den Namen Chylusgefässe.

Unter den Organen, deren Geschäft es ist, die verbrauchten Stoffe an die Aussenwelt zurückzugeben, ist eines vorzugsweise darauf eingerichtet, das Blut von seiner Kohlensäure zu befreien. Es ist ein bei den in der Luft lebenden Thieren drüsenartiges Gebilde, die Lunge, auf deren Wänden das Blut in den zahlreichsten und feinsten Capillarien fliesst, nur durch eine äusserst dünne Substanzlage von der atmosphärischen Luft geschieden, welche in die Höhle des Organs vermittelt der Athembewegungen abwechselnd einge- und wieder aus derselben ausgestossen wird. Bei dieser Berührung des Blutes mit der Luft wird Sauerstoff aus der letzteren gegen Kohlensäure aus dem ersteren eingetauscht. In diesem Falle, dessen ich soeben als einer Ausnahme gedachte, geht das Blut heller roth aus den Capillargefässen hervor, als es in dieselben einströmte. Es giebt Thiere (Amphibien), in welchen sich der Lungenkreislauf zu dem allgemeinen nicht anders verhält, als der Kreislauf jedes anderen absondernden Organs:


Fig. 8.



ein Ast des gemeinsamen arteriellen Stammes geht zur Lunge; das hellrothe Blut kehrt aus der Lunge zu dem allgemeinen Venenstamm zurück, der sich sodann geradezu in den Arterienstamm fortsetzt. Die Grenze zwischen beiden, das Ende des venösen und der Anfang des arteriellen Stammes, ist daran zu erkennen, dass zwischen beiden, mit beiden zusammenhängend, der muskulöse Schlauch, das Herz, *Cor*, Fig. 8, eingeschoben ist, welcher das Blut in Bewegung setzt, welcher also von Einer Seite her den Venenstamm aufnimmt, nach der anderen Seite hin den Arte-


rienstamm abgiebt. Ein solches Kreislaufsystem ist ein einfaches. Das Blut wird allmählig von Kohlensäure gereinigt, dadurch, dass in dem Venenstamm immer das von allen Körpertheilen rückkehrende Blut gemischt und immer wieder ein neuer Theil dieses gemischten Blutes in der Lunge dem Einfluss der Luft ausgesetzt wird; gerade so wie das Blut in den Nieren von den Bestandtheilen, die als Urin ausgeschieden werden, dadurch befreit wird, dass die Nierenarterien beständig einen Theil des Blutes zur Läuterung durch die Nieren abseits führen. In den meisten Wirbelthieren und dem Menschen gewinnt die Lunge oder, was ihr bei Wasserthieren entspricht, die Kieme, eine hervorragendere Stellung. Hier ist es nicht mehr eine Abtheilung des Blutes, welche dem Gasaustausch in dem Athemorgan ausgesetzt wird, sondern die ganze Masse des Blutes macht, bevor sie wieder zu den anderen Körpertheilen verbreitet wird, den Weg durch die Lunge; der Stamm der Körpervene setzt sich statt in die Körperarterie, in eine Lungenarterie fort; erst die aus den Lungen austretenden Gefässe vereinigen sich wieder zur Körperarterie. Dem Körperkreislauf, als dem grossen, steht der Lungenkreislauf, als sogenannter kleiner Kreislauf, gegenüber. Auch dieses doppelte Gefässsystem lässt sich unter dem Bilde eines einfachen Kreises denken, Fig. 9, und kommt mit einfachem Herzen, z. B. bei den Fischen, vor. Bei den höheren Wirbelthieren verdoppelt sich auch der bewegende Apparat. Der eine liegt zwischen Körpervene und Lungenarterie, der andere zwischen Lungenvene und Körperarterie; dadurch aber, dass die beiden Herzen, Fig. 10, obgleich vollkommen gegen einander abgeschlossen, Wand an Wand gelagert sind, wird man dahin geführt, sich als Schema dieses Blutgefässsystem zwei aneinanderstossende Kreise oder die Touren einer 8 vorzustellen.

Fig. 9.



Ap arteria pulmonalis,
P Respirationsorgan, *Vp*
vena pulmonalis, die un-
mittelbar Körperarterie
wird. *Vc* Körpervene.
C Herz.

Fig. 10.



Ac Körperarterie.
Cc Körperherz. *Cp* Lungenherz.

genannter kleiner Kreislauf, gegenüber. Auch dieses doppelte Gefässsystem lässt sich unter dem Bilde eines einfachen Kreises denken, Fig. 9, und kommt mit einfachem Herzen, z. B. bei den Fischen, vor. Bei den höheren Wirbelthieren verdoppelt sich auch der bewegende Apparat. Der eine liegt zwischen Körpervene und Lungenarterie, der andere zwischen Lungenvene und Körperarterie; dadurch aber, dass die beiden Herzen, Fig. 10, obgleich vollkommen gegen einander abgeschlossen, Wand an Wand gelagert sind, wird man dahin geführt, sich als Schema dieses Blut-

gefässsystem zwei aneinanderstossende Kreise oder die Touren einer 8 vorzustellen.


Was den Bau der genannten Bewegungsapparate betrifft, so zeichnen sie sich gegen die aus ihnen hervorgehenden Arterienstämme sowohl durch grössere Weite, als durch beträchtlichere Stärke der Wandungen aus; diese bestehen aus zahlreichen Schichten animalischer Muskelfasern, welche durch rhythmisch abwechselnde Zusammenziehungen und Erschlaffungen die Höhle, die sie umschliessen, abwechselnd enger und weiter machen. Mit jeder

Verengung wird der flüssige Inhalt ausgetrieben. Damit er nicht nach beiden Mündungen entweiche und nicht bei jeder nachfolgenden Erweiterung von beiden Seiten wieder zurückströme, ist nichts weiter erforderlich, als dass die Mündungen mit Klappen versehen seien, Fig. 11, welche hier



A. Arterie. V. Vene.

dem Austritt, dort dem Rücktritt wehren, die sich also nach der gleichen Richtung öffnen und schliessen. Solche Klappen sind an beiden sogenannten Kammern oder *Ventrikeln* des Herzens angebracht. Ausser an den Ventrikeln kommen bei verschiedenen Thieren noch an den zunächst gelegenen Theilen der venösen oder arteriellen Stämme animalische, rhythmisch bewegliche Muskeln vor; bei den höheren Wirbelthieren sind es namentlich die venösen Gefässe, die sich jederseits vor dem Aorten- und vor dem Lungenventrikel, zu rhythmisch-contractilen Säcken erweitern, Fig. 12. Dies sind die Vorhöfe (*Atria*); indem sie sich gleichzeitig mit einander und alternirend mit den Ventrikeln zusammenziehen, nehmen sie im Moment ihrer Erweiterung das Blut aus den hinter ihnen liegenden Venenstämmen auf, um dasselbe im Moment der Verengung in die Herzkammern zu treiben.



Die Gefässlehre befasst sich, gleich der Nervenlehre, mit der Beschreibung des Centralorgans, welches hier das Herz ist, und der Stämme, Aeste und Zweige nur bis zu dem Eintritt der letzteren in die einzelnen Organe. Die Verschiedenheiten, welche die Gewebe

in Bezug auf das Verhalten der Gefässe im Parenchym derselben zeigen, schildert die Gewebelehre; Eigenthümlichkeiten des Gefässverlaufs in besonderen Organen kommen bei der Beschreibung der letzteren zur Sprache.

hro 1844

Zahl der
Knochen.

I. Knochenlehre.


Die Theile des Skelettes sind nach Form und Zahl in den verschiedenen Lebensaltern verschieden. In eine gewisse Anzahl von Stücken, die durch Gelenke untereinander zusammenhängen, ist schon die knorpelige Anlage des Skeletts beim Fötus geschieden. Mit der Umwandlung des Knorpels und gewisser, an den Knorpel angrenzender fibröser Gebilde¹⁾ in Knochen mehrt sich die Zahl jener Theile. Die Verknöcherung geht nämlich von mehreren gesonderten Punkten eines und desselben Knorpels, den sogenannten Verknöcherungspunkten, aus; es entstehen innerhalb der verknöchern- den Gewebe Knochenkerne, die einander entgegenwachsen, bis sie nur noch eine verhältnissmässig schmale Brücke unverknöchelter Substanz zwischen sich haben. So ist der ursprünglich einfache Knorpel in mehrere Knochen zerfallen, die sich bei der Maceration wirklich von einander lösen (Fig. 13). Der zwischen ihnen unverknöchert gebliebene Theil der Grundlage erscheint nun als Naht- oder Bandmasse, *Synchondrosis*, während sich die unverknöchert gebliebenen Knorpelschichten an den freien Enden als knorpelige Ueberzüge oder Gelenkknorpel, *Cartilagines articulares*, darstellen. Viele dieser Nähte und Nahtknorpel oder Nahtbänder²⁾ haben eine vorübergehende Existenz; sie erhalten sich nur so lange, als der Knochen im Wachsen begriffen ist, werden aber, wenn derselbe seine Ausbildung erreicht hat,

¹⁾ Die Untersuchungen über die Natur der Gewebe, aus deren Verknöcherung das Skelett hervorgeht, haben zu dem Resultat geführt, dass sowohl ächter Knorpel, als auch Faserknorpel und Bindegewebe zur Knochenbildung verwandt werden. Man darf nur das Kreuzbein eines Erwachsenen betrachten, um die Ueberzeugung zu gewinnen, dass hier ausser den ursprünglich knorpeligen Wirbeln auch die faserknorpeligen Zwischenwirbelscheiben und selbst die fibrösen Bänder (Lig. longitudinale anticum, Lig. interspinalia) u. s. f. knöchern geworden sind. Die Bedeutung des ächten Knorpels beruht nicht in seiner Verwandtschaft zur Knochenerde, denn ächte Knorpel können sich unverknöchert erhalten und Faserknorpel und Bindegewebe können ebensowohl typisch verknöchern, wie ächter Knorpel. Der letztere findet sich als Grundlage des Skeletts, wo äusserer Druck oder der Zug der Muskeln eine provisorisch feste Unterstützung nöthig macht und die Grundlage der Knochen ist faserknorpelig oder fibrös in den Verdickungsschichten der Extremitätenknochen, in der Schädeldecke u. s. f., wo ein knorpelig-knöcherner Kern oder die Spannung der Theile von innen aus hinreichenden Halt gewährt.

²⁾ Je nachdem die Grundlage des Knochens knorpelig oder häutig ist, nähert sich auch die Nahtmasse, abgesehen von späteren Veränderungen, mehr dem Knorpel- oder fibrösen Gewebe.

nachträglich in die Verknöcherung mit hineingezogen, und mit Vollendung der Verknöcherung stellt sich die Einheit wieder her, die vor Beginn derselben

Fig. 13.



bestanden hatte. Ganz allgemein sind an den langen Knochen der Extremitäten jugendlicher Körper die Gelenk-Enden, öfters auch noch einzelne, dem Ansätze von Muskeln dienende Hervorragungen in der Nähe der Gelenk-Enden von dem cylindrischen Mittelstück durch eine Naht getrennt, welche später verknöchert. Die Hüftbeine zerfallen durch die Verknöcherung in drei Theile, welche zur Zeit der Geschlechtsreife wieder zu Einem Stück verschmelzen. Im Hirnschädel, der bei den Embryonen der höheren Thiere, wie bei den Knorpelfischen, eine einfache knorpelig-häutige Kapsel ist, lagert sich die Knochenmasse an

der Basis in Form von Kernen, an der Decke in Schuppen ab, die noch zur Zeit der Geburt weit aus einander stehen, aber schon nach dem ersten Lebensjahr zusammengedrückt sind und zum Theil (wie die Stirnbeinhälften) schon in früher Jugend völlig in einander fließen.

Viele Nähte aber erhalten sich noch an dem reifen Körper und, mit seltenen Ausnahmen, welche man deshalb in das Gebiet der Pathologie verweist, während des ganzen Lebens. Diese Nähte verdienen, im Gegensatz zu den eben erwähnten vorübergehenden oder transitorischen, den Namen der bleibenden oder permanenten.

Die Beschreibungen der systematischen Anatomie halten sich in der Regel an die Formen, welche der Körper unmittelbar nach Vollendung des Wachstums darbietet; die Besonderheiten früherer Lebensalter werden als Entwicklungsstufen aufgefasst; die Veränderungen, die sich in reiferen Jahren einstellen, betrachtet man schon als Anfänge der Involution, d. h. der Entartung, welcher der Organismus nach seiner Blüthezeit allmähig bis zum Verwelken anheimfällt. Da aber jener Zeitpunkt, der uns die Normen liefert, nicht scharf begrenzt ist, so kann es mitunter schwierig werden, zu entscheiden, welche Bildung die definitive sei. Dies begegnet schon bei Bestimmung der Zahl der Knochen. Das Wespenein wird oft, die Schläfenbeine werden allgemein als selbstständige Knochen gerechnet, während doch das Wespenein, wie die Schläfenbeine an jugendlichen Schädeln bereits mit dem Hinterhauptsbein knöchern verschmolzen sind. Das Brustbein zählt als Ein Knochen, obgleich die drei Theile, aus welchen es besteht, sich spät oder gar nicht vereinigen. Mitunter lässt man sich, und zwar mit vollem Recht, bei der Aufzählung der Theile des Skeletts durch die Rücksicht auf die Bequemlichkeit der Darstellung leiten. So geht man bei der Beschreibung der Hüftknochen auf die drei Stücke zurück, die schon zur Zeit der Pubertät zu Einem verwachsen sind.

Die Synarthrosen, und zwar sowohl die vorübergehenden als die bleibenden, erscheinen unter zwei Hauptformen: 1) als Synchondrose (Symphyse) oder Syndesmose (am Schädel als Fontanelle), wenn die

Nähte.

knorpelige oder häutige Zwischensubstanz mächtig oder ausgedehnt genug ist, um für sich dargestellt zu werden. 2) Als Naht im engeren Sinne, *Sutura*, wenn die Nahtsubstanz zwischen den einander zugewandten Knochenrändern nur wie ein Kitt oder Leim in unmerklich dünner Schicht liegt. Die Naht kommt nur an platten Knochen vor, sie ist a) eine einfache (*Harmonia*), z. B. die Verbindung der Nasenbeine unter einander; b) eine gezahnte (*S. dentata s. serrata*), wenn die Knochenränder, wie an der Schädeldecke, mit Zacken in einander greifen; c) eine Schuppennaht (*S. squamosa*), wenn ein Knochen mit zugeschärftem Rand über den Rand des anderen greift, wie z. B. der obere Rand des Schläfenbeins über das Scheitelbein. Die gezahnte Naht ist die festeste. Indem die Zacken gleich den Fingern der verschränkten Hände in einander greifen, machen sie die Verschiebung der Knochen in der der Naht parallelen Richtung unmöglich. Dem Auseinanderweichen der in der Naht verbundenen Knochen ist dadurch vorgebeugt, dass entweder die Zacken gegen die Spitze an Breite zunehmen, oder dass sie mit seitlichen Zähnelungen versehen sind. In der Richtung der Dicke an einander auf- und abwärts zu gleiten werden die Knochen dadurch verhindert, dass die Zacken und die entsprechenden Vertiefungen nicht von der ganzen Dicke des Randes ausgehen. Von der vollkommenst gezahnten bis zur einfachen Naht kommen übrigens die mannigfaltigsten Abstufungen vor und auch die Schuppennaht kann sich der gezahnten durch Zähnelung des übergreifenden Randes nähern.

Verbindet eine transitorische Naht Knochenstücke von so ungleichen Dimensionen, dass Ein Stück hauptsächlich die Form des Knochens bestimmt und die anderen sich zu diesem wie Anhänge, Fortsätze oder Säume verhalten, so erhält jenes Hauptstück den Namen *Diaphyse*, die anderen werden *Epiphysen* genannt. Unter *Apophyse* verstehen die Einen die Epiphyse nach ihrer Verschmelzung mit dem Hauptstück, Andere die Vorsprünge, welchen keine besonderen Kerne zu Grunde liegen, welche also gleichsam aus dem Körper hervorgewachsen sind. Der beschreibenden Anatomie genügen die Bezeichnungen Mittelstück oder Körper (*Corpus*) einerseits und Enden (*Extremitates*) und Fortsätze (*Processus*) andererseits, und sie sind schon deshalb vorzuziehen, weil die Entwicklungsweise der Knochenvorsprünge nicht für alle unwidersprechlich festgestellt und vielleicht nicht einmal für alle Individuen genau die nämliche ist.

Altersver-
schieden-
heiten.

Was die Formverschiedenheiten der Knochen je nach den Altersstufen betrifft, so soll hier im Allgemeinen nur erwähnt werden die mit der Entwicklung der Muskelkräfte zunehmende Auswirkung der dem Muskelansatz dienenden Rauigkeiten, Leisten und Zacken, wie denn diese auch, bei verschiedenen Individuen verglichen, der Entwicklung des Muskelsystems proportional sind; ferner die Bildung und fortschreitende Ausdehnung von Hohlräumen in den Knochen. Die knorpelige und häutige Grundlage der Knochen ist massiv; zugleich mit der Verknöcherung beginnt, durch theilweise Wiederaufsaugung der Knochenmasse, die Bildung der feinen, anastomosirenden Markcanälchen; indem mit dem Wachsen des Knochens die Aufsaugung fortschreitet, entstehen ansehnlichere Zellen und Höhlen, welche sich zum Theil mit Fett (Knochenmark), zum Theil, wenn sie sich in einen Schleimhauttractus öffnen und selber von Fortsetzungen der Schleimhaut ausgekleidet werden, mit Luft erfüllen. Höhlen der letzteren Art kommen bei dem Menschen und den Säugethieren nur in Schädelknochen (bei

Vögeln auch in Extremitätenknochen) vor. Die Markhöhlen sind je nach der äusseren Form der Knochen eigenthümlich gestaltet. In den cylindrischen Mittelstücken der Extremitätenknochen stellt sich, von einer mächtigen Schicht compacter Substanz begrenzt, eine einfache, cylindrische Höhle her; die platten, das Nerven- und Eingeweiderohr umgebenden Knochen haben zwischen zwei mehr oder minder mächtigen Tafeln compacter Substanz eine Lage schwammigen Knochengewebes, mit rundlichen, unter einander zusammenhängenden markerfüllten Hohlräumen (Diploë); die Gelenkenden der cylindrischen Knochen und die kurzen Knochen des Stammes und der Extremitäten sind durchaus grosszellig, schwammig, mit einer Rinde versehen, die kaum mächtiger ist, als die an deren innere Fläche anstossenden Blätter der schwammigen Substanz. An Uebergängen zwischen diesen Formen fehlt es freilich nicht; in den kleinsten Finger- und Zehenknochen ist die Markhöhle durch eine Art Diploë ersetzt; unter den platten Knochen sind es besonders die der Schädeldecke, dann die Rippen, an welchen die erwähnten Eigenthümlichkeiten hervortreten, indess der Bau der Hüftbeine sich mehr dem der rundlichen Knochen anschliesst.

Die Vergrösserung der Markräume auf Kosten des Knochengewebes macht auch noch in den späteren Lebensperioden Fortschritte. Daraus, und nicht aus der Vermehrung der Kalkerde gegen den Knorpel, ist die Brüchigkeit der Knochen bei Greisen zu erklären. In platten Knochen kann die Diploë schwinden, so dass dann die beiden Tafeln, welche durch die Diploë getrennt waren, in eine einzige zusammenfallen,

Die Anordnung der Markräume bedingt gewisse Eigenthümlichkeiten der Oberfläche der Knochen. In den Röhrenknochen findet sich neben zahllosen, dem blossen Auge nicht oder kaum wahrnehmbaren Poren, welche in die Markcanälchen führen, in der Regel Eine grössere Oeffnung, das Ernährungsloch, *Foramen nutritium*; es ist die äussere Mündung eines Canals, der die compacte Substanz schief nach oben oder nach unten durchsetzt, um Blutgefässe zur Markhöhle zu leiten. Die Oberfläche schwammiger Knochen ist zu demselben Zwecke von einer Menge grösserer und kleinerer Löcher durchbohrt. Die platten Knochen sind mit zerstreuten und um so zahlreicheren und grösseren Ernährungslöchern versehen, je mächtiger im Verhältniss zu den Tafeln compacter Substanz die Diploë wird.

Ernährungs-
löcher.

Die Eintheilung der Knochen nach ihrer äusseren Gestalt ist schon im Vorigen gegeben. Man unterscheidet 1) cylindrische, lange oder Röhrenknochen, 2) platte oder breite, und 3) kurze Knochen. Die letzteren haben nur das mit einander gemein, dass keiner ihrer Durchmesser den anderen bedeutend überwiegt; im Uebrigen sind sie sehr mannigfaltig, bald mehr der Kugel-, bald der Würfelform, bald einer cylindrischen Scheibe sich nähernd. Cylindrisch sind, mit wenigen Ausnahmen, die in der Axe der Glieder gelegenen Knochen; platt sind, wie erwähnt, die Knochen, die an der Bildung der Körperwände Antheil nehmen; sie sind, die eine Fläche nach aussen, die andere nach innen gewandt, sämmtlich entsprechend der Form der Höhlen nach der Fläche gebogen. Die kurzen Knochen sind an der Stelle, wo sich die Hand an den Arm, der Fuss an

Eintheilung.

das Bein schliesst, ferner in der Längsaxe des Stammes, in der ganzen Berührungslinie der vegetativen und animalischen Röhre, zur Herstellung einer Gliederung verwandt, welche durch Summirung einer Anzahl von geringfügigen Verschiebungen der einzelnen Theile eine ausgiebige Bewegung des Ganzen gestattet.


Aus der Verschmelzung verschiedenartiger Knochen, wie sie zwischen den in der Axe des Stammes gelegenen kurzen Knochen und einzelnen, die vordere oder hintere Röhre umschliessenden platten Knochen stattfindet, gehen Gestalten hervor, welche in keine der oben genannten Abtheilungen passen. Man hat sie unter dem Namen gemischte Knochen zusammengestellt.

Die natürliche Haupteintheilung der Knochen des Skeletts nach ihrer Lage ist die in die Knochen des Stammes und der Extremitäten. Fraglich bleibt dabei nur die Stellung einiger Knochen, durch welche die Extremitäten mit dem Skelett des Stammes in Verbindung stehen, die einerseits zur knöchernen Umschliessung der Körperhöhlen, in deren Wand sie auch vollkommen versteckt sind, mehr oder weniger beitragen, andererseits die Flächen zur Einlenkung der eigentlichen Extremitätenknochen bieten. Ich werde sie unter der Benennung Extremitätengürtel in Verbindung mit den Knochen der Extremitäten abhandeln. Die Form des Gürtels und die Art seines Zusammenhanges mit dem Stamm ist je nach der auf dem Gürtel ruhenden Last und nach dem Mechanismus der Extremitäten sehr mannigfaltig und so auch schon für die oberen und unteren Extremitäten des menschlichen Körpers verschieden.

Fig. 14.



Fig. 15.



Nebensiehende Querschnitte, von welchen Fig. 14 in der Gegend des oberen Randes der Brust, Fig. 15 in der Beckengegend angenommen ist, in welchen die Knochen des Stammes schwarz, die des Extremitätengürtels roth bezeichnet

sind, mögen eine vorläufige Anschauung von der Verbindung der Rumpf- und Extremitätenknochen geben. Es erhellt daraus, dass der Schulter- wie der Beckengürtel mit den Bogen des vegetativen Rohrs zusammenstossen, der Schultergürtel an einem vorderen, unpaaren Mittelstück dieser Bogen ein-

gelenkt, der Beckengürtel selber die Stelle eines Theils der Bogen vertretend.

Das vollständige trockne Skelett eines Mannes wiegt etwa 150 — 200 Unzen, das weibliche Skelett 100 — 150 Unzen. Wegen der Dimensionen des Skeletts und der Proportion seiner einzelnen Theile verweise ich auf die Handbücher von Hildebrandt-Weber (Bd. II, S. 39), Krause (2te Aufl. Bd. I. Theil 2, S. 224)


und Arnold (Bd. I, S. 71). Vergl. Seiler, Anatomie des Menschen, für Künstler und Turnlehrer. Leipzig 1850. Schmidt, Proportionsschlüssel, Stuttgart 1849. G. Schadow, Polyklet. Berlin 1834 (Ausführliche Darstellung der Verschiedenheiten der Proportionen nach Lebensalter und Geschlecht).

A. Knochen des Stammes.

In der Berührungslinie der animalischen und vegetativen Röhre liegt, als feste Stütze und Axe des Stammes, eine halbcylindrische Säule, welche

A. Knochen
des
Stammes.

Fig. 16.




mit ihrer convexen Fläche in die Eingeweidehöhle vorragt und die plane, meist sogar rinnenförmig ausgehöhlte Fläche der Hirn- und Rückenmarkshöhle zukehrt (Fig. 16). Die Stärke der Säule ist am beträchtlichsten in der Gegend, wo sich der Beckengürtel an die Knochen des Stammes anfügt; von da aus verjüngt sie sich nach unten hin rasch, nach oben hin allmählig und mit einigen Schwankungen, die jedoch nur den Breitendurch-

messer betreffen. Im Profil oder Mediandurchschnitt betrachtet, zeigt sie Schlangenkrümmungen, welche später genauer bezeichnet werden sollen und von welchen es hier genüge, zu bemerken, dass in der Becken- und Brustgegend, wo die vegetative Röhre allseitig knöchern umschlossen ist, die Convexität des Bogens sich nach hinten wendet, während in der Bauch- und Halsgegend, wo die Wände der vegetativen Röhre grösstentheils von Weichtheilen gebildet werden, die Convexität des Bogens nach vorn sieht, bis bei der letzten, raschen Krümmung in der Schädelbasis die hintere Fläche der Säule zur oberen, die vordere zur unteren wird.

Mit dem Beginn der Verknöcherung wird diese Säule in eine bestimmte Anzahl über einander geschichteter, cylindrischer Scheiben geschieden, deren Höhe in den verschiedenen Gegenden der Säule ziemlich genau der Dicke der letzteren proportional ist (Fig. 17 a. f. S.). Diese Scheiben sind die Wirbelkörper. Sie alterniren mit niedrigeren Scheiben unverknöcherter Substanz, den Zwischenwirbelknorpeln, *Ligg. s. Cartilaginee intervertebrales*, welche als relativ weiche Bänder die je einander zugekehrten Flächen zweier Wirbelkörper an einander heften. Die grosse Mehrzahl dieser Synchondrosen ist permanent, nur in der Schädelbasis und in der Nähe des unteren Endes der Wirbelsäule verknöchern sie regelmässig und zwischen den zwei oberen Rumpfwirbeln und dem Schädel werden sie durch eine Gelenkverbindung eigenthümlicher Art ersetzt.


In der untersten Spitze des Rumpfes sind die Wirbelkörper die einzig knöchernen Theile. Im Uebrigen schliesst sich an dieselben, ihnen an Zahl entsprechend, je ein hinterer und vorderer, mehr oder minder vollständiger knöcherner Bogen oder Reif, jener die Wand der animalischen, dieser die Wand der vegetativen Röhre stützend. So weit die Wirbelkörper durch Synchondrosen oder (wie die beiden oberen Rumpfwirbel und der Rand des Schädels) durch Gelenke zusammenhängen, lassen jene Bogen

Lücken zwischen einander, welche durch Bänder und Muskeln ausgefüllt werden; so weit sind auch die Wirbelkörper mittelst Dehnung der Zwischenwirbelknorpel gegen einander verschiebbar. Wo aber die Synchondrosen der Wirbelkörper zur Zeit der Reife verknöchert gefunden werden, breiten sich auch die Bogenstücke sämmtlich oder theilweise bis zu gegenseitiger Berührung, ja bis zur Verschmelzung aus und bilden so sammt den Körpern dort den Schädel, hier das Kreuzbein. Wir beschränken uns zunächst auf die Betrachtung der Körpergegenden, deren Wirbel vereinzelt bestehen. Allgemein sind hier, und zwar schon in den ersten Lebensjahren, die hinteren Bogen, sowohl die vollständigen als die unvollständigen, mit den Wirbelkörpern knöchern verbunden; von den vorderen Bogen sind die vollständigen an den Wirbelkörpern eingelenkt, die unvollständigen theils an denselben eingelenkt, theils mit ihnen verschmolzen. Den Körper sammt allen continuirlich mit ihm zusammenhängenden Bogentheilen nennt man Wirbel, *Vertebra*.



Mediandurchschnitt der Knochen des Stammes.

Fig. 18.




Die eingelenkten vorderen Bogen zerfallen, wo sie vollständig sind, in drei Stücke (Fig. 18); zwei sind symmetrisch, gleich den Hälften eines Reifs; ihre vorderen Spitzen, die eine Strecke weit knorpelig sind verbindet das dritte, unpaare, den Wirbeln gegenüberliegende Mittelstück. Die symmetrischen seitlichen Bogentheile sind die wahren Rippen, *Costae verae*; die zugehörigen Mittelstücke fließen, indem sie sich der Länge nach an einander reihen, zu einem platten, einfachen Kno-

¹⁾ Die Wirbelsäule nach der von W. Weber u. E. Weber (Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge. Göttingen 1836. Taf. VIII.) gegebenen Abbildung, die der Abdruck eines in Gyps eingeschlossenen und so der Länge nach durchsägten Rumpfes ist. Die Abbildung, welche Vrolik (Tidschr. voor de wis-en natuurkundige Wetenschappen. Deel III. Amsterdam 1850. Taf. I.) von der Wirbelsäule eines Rumpfes liefert, welcher im gefrorenen Zustande durchsägt wurde, weicht in einigen Punkten und besonders darin von der Weber'schen ab, dass die Spitze des Steissbeines etwas höher steht, als der untere Rand der Synchondrose der Schambeine.

chen, dem Brustbein, *Sternum*, zusammen. Wahre Rippen erstrecken sich, sieben an der Zahl, vom achten bis vierzehnten Wirbel; ihnen folgen nach unten noch fünf ähnliche, ebenso an den Wirbeln eingelenkte

Fig. 19.




Bogen (Fig. 19), zwischen welchen aber das Verbindungsstück ausgefallen ist und die sich entweder an die nächste obere Rippe anlegen oder (die beiden untersten) frei im Fleische enden. Sie sind um so kürzer, je weiter abwärts am Stamme sie liegen, und werden von jenen am Brustbein anstossenden Rippen unter dem Namen falsche Rippen

pen, *Costae spuriae*, unterschieden. Die sämtlichen Rippen, wahre und falsche, nebst den Wirbeln, an welchen sie befestigt sind, und dem Brustbein setzen das zusammen, was man den knöchernen Brustkasten oder Brustkorb, *Thorax*, nennt.

Ich habe schon erwähnt, dass keiner der vorderen Bogen, welche mit den Wirbelkörpern knöchern verbunden sind, vollständig ist; sie stellen also, vor ihrer Verschmelzung mit den übrigen Theilen der Wirbel, falsche Rippen dar, von welchen auch die längste, beiläufig gesagt, die Länge der letzten beweglichen Rippe nicht erreicht. Solche mit den Wirbeln verschmolzene falsche Rippen kommen, wie sich später zeigen wird, in der Hals- und Lendengegend vor; an dem oberen Theil des Halses aber findet

Fig. 20.




sich, ausser Zusammenhang mit den Wirbeln, noch ein anderartiges Rudiment von vorderen Bogen: eine unpaare, in der Mitte der vorderen Wand der vegetativen Röhre gelegene Knochenplatte, mit einigen kurzen, paarigen, seitlichen Anhängen, welche sich wie ein vereinzelt Stück Brustbein mit den vorderen Enden einiger Rippen ausnimmt, deren weiter rückwärts gelegene Theile verkümmert oder unentwickelt geblieben wären. Dies ist das Zungenbein, *Os hyoides*.

Was nun die aus knöchern verbundenen Wirbeln zusammengefügte Theile des Stammskelettes betrifft, so wird es sich als wahrscheinlich erweisen, dass das Kreuzbein ausser den Körpern und hinteren Bogen auch noch Anfänge von vorderen Bogen enthalte und dass diese es sind, an welche zunächst der Beckengürtel durch Synchondrose sich anschliesst. Viel weiter von dem Typus der bisher beschriebenen Knochen weichen die Knochen des Schädels ab, welche durch die Entfaltung des Rückenmarks zum Gehirn, durch die Einrichtungen zur Aufnahme der am Kopfe vereinigten Sinnesorgane, durch den Abschluss der animalischen Röhre und endlich durch die Bereitung eines Zuganges zur vegetativen sehr mannigfaltige Umgestaltungen erfahren. Dennoch ist es, den Schädel im Grossen und Ganzen aufgefasst, sowohl bei Betrachtung des Längsschnittes (Fig. 17) als des umstehenden Frontalschnittes (Fig. 21 auf folg. Seite) (der dem Horizontalschnitt eines Rücken-

wirbels entspricht) nicht schwer zu erkennen, dass die Knochen der Schä-

Fig. 21.



deldecke abgeplattete und gleichsam breitgeschlagene hintere Bogen sind, und dass die Knochen des Gesichts und insbesondere der Kiefer die vorderen Bogen des Rumpfes wiederholen. Die Stücke, welche die Nasenhöhle, *Cavum narium*, seitlich begrenzen und den Oberkiefer und Gaumen zusammensetzen, sind von den vordern Bogen der Rumpfwand darin unterschieden, dass sie, obgleich der Ring, den sie bilden, vollständig ist, dennoch unarticulirt mit der Basis des Schädels zusammenhängen. Auch erfolgt die Vereinigung der Seitenhälften unter sich beim Erwachsenen ohne Dazwischenkunft eines unpaaren, dem Brustbein und Zungenbeinkörper vergleichbaren Mittelstücks. Dagegen erstreckt sich von der Naht, in welcher die beiden genannten Bogenhälften vorn und unten zusammentreten, eine unpaare, mediane, grossentheils knöcherne Scheidewand, *Septum narium*, vertical zur Schädelbasis, das obere Ende der vegetativen Röhre in zwei neben einander gelegene Canäle theilend. Einen mehr rippenähnlichen Bogen stellt, abgesehen davon, dass auch hier die beiden Seitenhälften ohne Mittelstück und sogar ohne Naht in einander übergehen, der Unterkiefer, *Mandibula*, dar, den ich, weil er nicht in der Durchschnittsebene liegt, in Fig. 21 punktirt angedeutet habe; seine Form ist der Form eines Rippenpaares mehr verwandt und seine Einlenkung an den Schädel erinnert an das Gelenk der Rippe mit dem Wirbel. Indessen wird eine genauere Betrachtung des Schädels ergeben, dass auch das Kiefergelenk einem Wirbelrippengelenk nicht geradezu gleich zu setzen ist.

Zum Behuf einer mehr ins Einzelne gehenden Beschreibung theilen wir die Knochen des Stammes folgendermaassen ein: 1) Wirbelsäule; 2) Brustbein; 3) Rippen; 4) Zungenbein; 5) Schädel.

1) Wirbelsäule, *Columna vertebralis* ¹⁾.

1. Wirbelsäule.

Sämmtliche Wirbel, die unter einander verschmolzenen des Kreuzbeins mit eingeschlossen, in ihrer natürlichen oder in einer nach Art der natürlichen künstlich hergestellten Verbindung machen die Wirbelsäule aus.

Die durch Synchondrose verbundenen, durch Maceration trennbaren Wirbel zwischen Kreuzbein und Schädel nennt man wahre Wirbel (*Vv. verae*); die Wirbel, welche zum Kreuzbein verschmelzen und die, im Vergleich mit den übrigen, unvollständigen Wirbel unterhalb des Kreuzbeins fasst man unter der Benennung falsche Wirbel zusammen. Die unvollständigen, unterhalb des Kreuzbeins gelegenen Wirbel pflegt man, obwohl sie gleich den wahren Wirbeln durch Synchondrosen getrennt sind, als Ab-


¹⁾ Rückgrat, *Columna spinalis*, *Spina dors.*

theilungen eines einzigen Knochens zu betrachten, der den Namen Steissbein, *Os coccygis*, führt.

Die Zahl der wahren Wirbel beträgt 24; davon stehen 12 mit Rippen in Verbindung und tragen zur Bildung des Brustkorbes bei; dies sind die Brustwirbel, *Vertebrae thoracicae*¹⁾; zwischen dem obersten Brustwirbel und dem Schädel liegen 7, zwischen dem untersten Brustwirbel und dem Kreuzbein 5 Wirbel; jene werden Halswirbel, *Vertebrae colli*²⁾, diese werden Bauchwirbel, *Vertebrae abdominales*³⁾, genannt. Falsche Wirbel enthält das Kreuzbein 5, das Steissbein 4.

Diese Zahlen sind sehr beständig; Ueberszahl oder Mangel eines Wirbels gehört, besonders in der Hals- und Brustgegend, zu den Seltenheiten; häufiger findet sich die Zahl der Bauchwirbel, am häufigsten die der Kreuzwirbel um Einen vermehrt. Nicht selten nimmt die Zahl der Wirbel in einer Abtheilung der Wirbelsäule auf Kosten der anstossenden Abtheilung um Einen zu, wenn z. B. der letzte Bauchwirbel oder der erste Steisswirbel mit dem Kreuzbein verwächst oder der erste Kreuzwirbel einem Bauchwirbel ähnlich wird und von dem folgenden getrennt bleibt, oder wenn der erste Bauchwirbel eine lose Rippe trägt, u. s. f.

Fig. 22.



vermehrt. Nicht selten nimmt die Zahl der Wirbel in einer Abtheilung der Wirbelsäule auf Kosten der anstossenden Abtheilung um Einen zu, wenn z. B. der letzte Bauchwirbel oder der erste Steisswirbel mit dem Kreuzbein verwächst oder der erste Kreuzwirbel einem Bauchwirbel ähnlich wird und von dem folgenden getrennt bleibt, oder wenn der erste Bauchwirbel eine lose Rippe trägt, u. s. f.

Aus dem, was oben über die Krümmungen der Axe des Stammes angegeben wurde, ist zu entnehmen, dass die am meisten nach vorn vorspringenden Gegenden der Wirbelsäule (Fig. 22) von Hals- und Bauchwirbeln eingenommen werden, die am meisten nach hinten vorspringenden von Rücken- und Kreuzwirbeln. Der Uebergang der Einen Krümmung in die andere erfolgt ganz allmähig, die Grenze zwischen dem letzten Bauchwirbel und dem Kreuzbein allein ausgenommen, an welcher die bereits begonnene Ausbeugung nach hinten plötzlich unter einem Winkel (dem Promontorium) steiler wird.

Bei ruhiger Haltung des Rumpfes in aufrechter Stellung springt nach hinten die Synchondrose zwischen dem 6ten und dem 7ten Brustwirbel, nach vorn die Synchondrose zwischen dem 4ten und 5ten Bauchwirbel am meisten vor; der Gipfel der Convexität, welche das Kreuz- mit dem Steissbein nach hinten bildet, gehört dem 3ten bis 4ten Kreuzwirbel an. Fällt man eine Verticallinie vom oberen Rande des ersten Halswirbels auf eine die Steissbeinspitze be-

¹⁾ Rückenwirbel, *Vv. dorsales*.

²⁾ Nackenwirbel, *Vv. cervicales*.

³⁾ Lendenwirbel, *Vv. lumbales*.

rührende Horizontalebene, so liegt der Mitte jener Verticalen der 11te Brustwirbel gegenüber; eine von der Mitte ihrer oberen Hälfte gegen die Wirbelsäule gerichtete Horizontale trifft auf den unteren Rand des 3ten Brustwirbels, eine ebenso von der Mitte der unteren Hälfte der Verticalen gezogene Linie trifft den unteren Rand des 4ten Bauchwirbels und also ziemlich genau den höchsten Punkt der nach vorn gerichteten Convexität der Bauchwirbelgegend.

Ausser den normalen Krümmungen in der Medianebene zeigt die Wirbelsäule der meisten Menschen noch geringe seitliche Biegungen, und zwar ist die nach hinten gerichtete Convexität der Rückenwirbel meistens zugleich etwas nach rechts gewandt, eine Folge des Uebergewichts der Muskeln der rechten Ober-Extremität.

a. Wahre Wirbel.

a. Wahre
Wirbel.

Die wahren Wirbel sind einander ähnlich genug, um nach einem gemeinsamen Schema beschrieben werden zu können. Die Verschiedenheiten, welche sie zeigen, beziehen sich auf die Dimensionen und auf die Form. Die Formverschiedenheiten sind entweder wesentliche oder unwesentliche: vermittelt der ersteren sind die drei Abtheilungen der wahren Wirbel streng von einander geschieden; an ihnen ist sicher zu erkennen, welcher Abtheilung ein Wirbel angehört. Die unwesentlichen Verschiedenheiten der Form entwickeln sich in der Reihe der Wirbel allmähig; sie sind zwar, wenn man die mittleren Glieder aus zwei Abtheilungen mit einander vergleicht, hinreichend charakteristisch, verwischen sich aber an den Grenzen der Abtheilungen. Wesentlich und charakteristisch sind nur die Bildungen, die sich auf das Verhältniss der Wirbel zu den vorderen Bogen beziehen.

Wir sehen dabei ab von den seltenen Fällen, wo das Rudiment des vorderen Bogens am siebenten Hals- oder ersten Bauchwirbel auf Einer Seite oder auf beiden durch Synchondrose an dem Wirbel befestigt ist und also einen Uebergang zur articulirten Rippe darstellt.

Wir haben uns indess bei der folgenden Darstellung zunächst auf die Reihe der Wirbel vom dritten abwärts zu beschränken. Der erste und der zweite Halswirbel, wenngleich in den Beziehungen, welche soeben als charakteristische bezeichnet wurden, den übrigen Halswirbeln gleich, sind doch durch andere Eigenthümlichkeiten von den übrigen Hals- und den beiden anderen Arten von Wirbeln weit mehr verschieden, als diese unter sich. Der Grund liegt hauptsächlich in der Einrichtung der Gelenke, die zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel auf die Drehung um die Längsaxe, zwischen dem zweiten und dritten und so zwischen allen folgenden hauptsächlich auf die Beugung berechnet sind. Es mögen deshalb die beiden ersten Halswirbel unter dem Namen Drehwirbel, die übrigen alle unter dem Namen Beugewirbel zusammengefasst werden.


α. Beugewirbel.

α. Beuge-
wirbel.

Der Beugewirbel, welchen ich in diesem Abschnitt schlechthin Wirbel nenne, besteht aus dem Körper, *Corpus* (Fig. 23), dessen Form im Allgemeinen schon oben geschildert wurde, und dem hinteren Bogen, den man schlechthin Bogen, *Arcus*, nennt. Von der hinteren Wand des Körpers


und der vorderen Wand des Bogens wird das Wirbelloch, *Foramen vertebrale* ¹⁾ umgrenzt. Die Reihe der Wirbellöcher bildet den Wirbelcanal, *Canalis vertebralis* ²⁾. Der Bogen ist durchgängig an seinem Ursprung aus dem Körper niedriger als der Körper; dieser Ursprung liegt am oberen Rande des Körpers (Fig. 24); es bleibt daher unter dem Ursprung des Bogens ein Theil des Seitenrandes des Körpers frei, in welchen der untere Rand des Bogens in einer nach unten concaven Krümmung übergeht. Eine ähnliche, meist viel seichtere, nach oben concave Krümmung findet sich oben an dem Uebergange des Körpers zum Bogen, wenn der Ansatz des letzteren etwas unterhalb des oberen Randes des Körpers herabgerückt oder wenn dieser Rand an den Seiten aufgeworfen ist.

Fig. 23.



Der vierte Brustwirbel, von unten.

Fig. 24.



Zwei Brustwirbel, im Profil.

Wie die Wirbelkörper durch Synchondrosen, so sind die Wirbelbogen durch Gelenke mit einander verbunden. Jeder Wirbelbogen hat an jeder Seite zwei Gelenkflächen, eine obere und eine untere, zur Articulation je mit dem nächst höheren und dem nächst tieferen Wirbel. Sie werden von Vorsprüngen getragen; welche man die oberen und unteren Gelenkfortsätze, *Processus articulares sup. et inf.* ³⁾, nennt. Diese Fortsätze müssen, wenn die Gelenke der Bogen den Synchondrosen der Körper gegenüber liegen sollen, sich beiderseits um so mehr über die Ränder des Bogens und selbst des Wirbelkörpers erheben, je geringer die Höhe des Bogens im Vergleich zur Höhe des Körpers und je mächtiger die Lage des Zwischenwirbelknorpels ist.

Der vordere Rand des Gelenkfortsatzes, indem er nach vorn in den Rand des Bogens umbiegt, der seinerseits wieder, wie erwähnt, in den hinteren Rand des Körpers übergeht, vervollständigt einen Ausschnitt, die *Incisura vertebralis sup.* ⁴⁾ et *inf.* ⁵⁾, der am oberen Wirbelrande nach oben, am unteren Rande nach unten ausgehöhlt und am oberen Rande flacher als am unteren ist. Beide Ausschnitte vereinigen sich, wenn die Wirbel an

¹⁾ Rückenmarksloch, *For. medullae spinalis*, *Apertura spinalis*.

²⁾ Rückenmarkscanal, *Can. medullae spinalis*.

³⁾ Schiefe Fortsätze, *Pr. obliqui*.


⁴⁾ *I. v. minor.* ⁵⁾ *I. v. major.*

einander gefügt und durch den Zwischenwirbelknorpel verbunden sind, zu einem kurzen Canal oder Loch, Zwischenwirbelloch, *Foramen intervertebrale* (Fig. 24), welches in das Innere des Wirbelcanals führt. Diese Löcher sind es, durch welche längs der ganzen Wirbelsäule die Nervenstämmen und Blutgefäße aus- und eintreten.

Von der Seitenfläche der Wirbelbogen und zum Theil der Körper erstreckt sich seitwärts ein kürzerer oder längerer, in den verschiedenen Arten der Wirbel verschieden gestalteter Fortsatz, der Querfortsatz, *Processus transversus*. Er ist Stütze der Rippe (an den Brustwirbeln) oder diese Stütze in Verbindung mit dem Rudiment des vorderen Bogens (an den Hals- und Bauchwirbeln).

Eine Rauigkeit, *Tuberositas vertebralis m.*, welche hauptsächlich den Streckmuskeln des Rückgrats zum Ansätze dient, nimmt an den Brustwirbeln (Fig. 26. Vt. 10) die hintere Fläche der Spitze des Querfortsatzes ein, geht an den Halswirbeln (Fig. 25) auf den unteren Gelenkfortsatz über und dehnt sich an den Bauchwirbeln von der Wurzel des Querfortsatzes zum hinteren Rand des oberen Gelenkfortsatzes aus. Sie wird zuweilen schon an den unteren Brustwirbeln durch eine schief auf- und seitwärts laufende Furche getheilt; regelmässig scheidet sie sich an den Bauchwirbeln in zwei Fortsätze, von welchen man den oberen, eine Art Leiste am Aussenrande des oberen Gelenkfortsatzes, als *Processus mamillaris*, den unteren, eine scharfe Linie oder kurze Spitze an der Wurzel des Querfortsatzes, als *Processus accessorius* beschreibt, Fig. 26.


Fig. 25



Fünfter bis siebenter Halswirbel und erster Brustwirbel von hinten.

Eine von der Mitte der hinteren Fläche des Bogens gerade nach hinten oder nach hinten und abwärts ragende Spitze, der Wirbeldorn, *Proc. spinosus* (Dornfortsatz), ist ebenfalls zur Befestigung von Muskeln und Bändern bestimmt.

Fig. 26.




Zehnter bis zwölfter Brustwirbel und erster Bauchwirbel von hinten.

Betrachten wir nach dieser Aufzählung der einzelnen Theile des Wirbels die Modificationen, welchen ihre Gestalt je nach der Stelle, die der Wirbel einnimmt, unterworfen ist.

Der Körper nimmt vom dritten Hals- bis zum letzten Bauchwirbel im verticalen und sagittalen Durchmesser ebenso beständig als langsam zu (im verticalen von 14 zu 29mm, im sagittalen von 14 zu 35mm); auch der transversale Durchmesser wächst vom dritten Halswirbel (21mm) bis zum letzten Bauchwirbel (55mm), bleibt sich aber in den mittleren Brustwirbeln, vom zweiten bis achten, ziemlich gleich oder nimmt selbst vom zweiten bis fünften etwas ab. Die Endflächen (obere und untere) sind daher im Allgemeinen mit dem längsten Durchmesser transversal gestellt; nur in den nächst oberen Brustwirbeln wird der transversale von dem sagittalen


Körper.

Fig. 27.




Fünfter Halswirbel von unten.

Fig. 28.



Vierter Brustwirbel von unten.


Fig. 29.



Bauchwirbel von unten.


Durchmesser erreicht und selbst überholt. Die Form der Endflächen gleicht an den Halswirbeln, Fig. 27, einem Oblongum mit abgerundeten Ecken, nähert sich an den oberen Brustwirbeln, Fig. 28, einem Dreieck mit concaver, der Wirbelhöhle zugekehrter Basis und mit abgestumpfter, nach vorn gerichteter Spitze und wird in den unteren Brust- und den Bauchwirbeln, Fig. 29, bohnenförmig, die Convexität des vorderen der Concavität des hinteren Randes nahezu parallel. Die Endflächen sind an mace- rirten Wirbelkörpern ringsum von einem wulstigen, schwach vorspringenden Rand umsäumt; starke leistenartige Vorsprünge finden sich an den Halswirbeln, und zwar vom oberen Rande an jeder Seite aufwärts, Fig. 30, vom unteren Rande vorn und hinten abwärts gerichtet, Fig. 31, so dass dadurch die obere Endfläche jedes Wirbels von Einer Seite zur andern, die untere Endfläche von hinten nach vorn ausgehöhlt erscheint, und die gegen einander gerichteten Flächen je zweier Wirbelkörper einan-

Fig. 30.



Frontalschnitt der Körper des 4ten und 5ten Halswirbels.

Fig. 31.



Medianschnitt der Körper des 4ten u. 5ten Halswirbels.

v. fig 31

der wie zwei zum Handschlag in einander gefügte Hände umfassen. Mit ihrer Aussenfläche vergrössert die obere seitliche Leiste der Halswirbelkörper die Tiefe des oberen Wirbelausschnitts und indem sie sich an den unteren Theil der Seitenfläche des nächst oberen Wirbels anlegt, trägt sie statt der letzteren zur Bildung des Zwischenwirbellochs bei und bewirkt, dass dieses Loch in der Halsgegend ausnahmsweise zum grösseren Theil von dem unteren, zum kleineren Theil vom oberen Wirbelausschnitt begrenzt wird. Die obere und untere Fläche je eines Wirbels sind in der Hals- und Bauchgegend einander parallel, sie haben am letzten Bauchwirbel eine auffallende, an den Brustwirbeln eine sehr geringe Neigung gegen einander, und zwar an dem Bauchwirbel nach hinten, an den Brustwirbeln nach vorn. Demnach ist nur an dem nach vorn concaven Theile der Wirbelsäule, welcher zugleich der minder bewegliche ist, die Krümmung in der Gestalt der Wirbelknochen begründet; die nach vorn convexe Krümmung in der Gegend der Hals- und Bauchwirbel muss durch Keilform der Knorpelscheiben vermittelt sein.


Dies ist das übereinstimmende Resultat der Messungen von W. und E. Weber (a. a. O. S. 91) und Nuhn (Untersuchungen aus dem Gebiete der Anatomie, Physiologie und praktischen Medicin, Heft I. Heidelberg, 1849. S. 12). Hirschfeld (*Gaz. méd. de Paris*. 1849. p. 490) hält indess die keilförmige Gestalt der Zwischenwirbelknorpel der Hals- und Bauchgegend und die Krümmung der Wirbelsäule an diesen Strecken nur für Folge der Zusammenziehung der zwischen den Wirbelbogen gelegenen elastischen Bänder. Nach der Trennung der Wirbelsäule durch einen Frontalschnitt in Körper und Bogen richte sich an den Körpern die Hals- und Lendengegend gerade, während die Reihe der Bogen sich um $\frac{1}{7}$ der ganzen Länge der Wirbelsäule verkürze. Das Letztere ist richtig, und es unterliegt keinem Zweifel, dass die elastischen Bänder der Wirbelbogen die nach vorn gerichtete Convexität der Hals- und Bauchwirbel vermitteln helfen. Die Entfernung der Bogen aber genügt nicht, um diese Convexität zu ebenen, da auch das Lig. longitudinale posterius sich der Streckung der Wirbelsäule widersetzt.

Die Form der Seitenflächen der Wirbelkörper, das Wort im Gegensatz zu den Endflächen gebraucht, ergiebt sich aus der Anschauung der letzteren von selbst. Die Körper sind vorn und hinten abgeplattet an den Halswirbeln, dreiseitig prismatisch mit concaver hinterer Fläche an den nächst oberen Brustwirbeln, mit convexer Vorderfläche und concaver hinterer Fläche versehen an den unteren Brust- und den Bauchwirbeln. Die Höhe der hinteren Fläche übertrifft die der vorderen unmerklich an den Brustwirbeln; die Vorderfläche ist merklich höher als die hintere an dem letzten Bauchwirbel. Dabei ist die der vegetativen Höhle zugekehrte Fläche jedes Wirbelkörpers ringsum in verticaler Richtung leicht ausgehöhlt und die gleiche Fläche der Halswirbel durch zwei von oben nach unten divergirende Linien in drei Felder, ein mittleres, mehr vortretendes und rauheres und zwei seitliche, tiefer liegende und glatte geschieden. Allgemein ist die in die Wirbelhöhle schauende Fläche poröser, mit grösseren Ernährungslöchern versehen als die vordere.

Als charakteristisches Merkmal tragen die Körper der Brustwirbel an ihrem Seitenrande die zur Verbindung mit den Rippenköpfchen bestimmten

Gelenkflächen, Rippenpfannen, *Fossae costales*¹⁾, die sich indess, je weiter nach unten, um so mehr rückwärts auf die Wurzel der Bogen ausdehnen. Den zwölf Rippen entsprechen im Ganzen zwölf Gelenkflächen; diese sind aber an der Brustwirbelsäule dergestalt vertheilt, dass nur die erste, elfte und zwölfte ununterbrochen je Einem Wirbel angehören, zu der Bildung der zweiten bis zehnten dagegen immer je zwei Wirbel nebst der zwischen ihnen befindlichen Knorpelscheibe beitragen (Fig. 32).

Fig. 32.




Seitenansicht der Brust-
wirbelsäule.

Demnach findet sich auf dem ersten Brustwirbel eine ganze Rippenpfanne am oberen, eine halbe am unteren Rande, auf dem zehnten eine halbe Rippenpfanne am oberen Rande, auf dem elften und zwölften je eine ganze und auf jedem der übrigen Wirbel eine halbe Rippenpfanne am oberen, eine halbe am unteren Rande (*Fossa cost. sup. et inf.*, Fig. 24).

Die Gelenkfläche für die erste Rippe erstreckt sich nicht selten mit auf den siebenten Halswirbel.

Doch ist der Ausdruck halb hier nicht im streng mathematischen Sinne zu nehmen; denn erstens tritt, wie erwähnt, zwischen den oberen und unteren Theil jeder zusammengesetzten Rippenpfanne der Zwischenwirbelknorpel ein, und zweitens ist schon am dritten Brustwirbel der obere Theil der Gelenkfläche grösser als der untere desselben Wirbels, und dies Missverhältniss wächst an jedem folgenden Wirbel, den endlichen Uebergang der ganzen Gelenkfläche auf Einen Wirbel vorbereitend. Die ungetheilte Gelenkfläche ist kreisförmig oder oval (mit dem längsten Durchmesser der sagittalen Axe des Wirbels parallel) mit mehr oder minder, besonders am oberen Umfang, vorspringendem Rande; die Theile einer solchen Fläche entsprechen also einem grösseren oder kleineren Kreisabschnitt. Die kleinen, dem unteren Rande der tieferen Brustwirbel zuge-

Fig. 33.



Frontalschnitt des fünften u. sechsten
Brustwirbels mit den Köpfchen
der Rippen.

theilten Abschnitte der Rippenpfanne sind abwärts geneigt und, zumal wenn der obere Vorsprung des Randes der Rippenpfanne sich stark ausprägt, schärfer gegen die Seitenfläche als gegen die untere Fläche des Wirbelkörpers abgesetzt (Fig. 33).

Die zusammengesetzten Rippenpfannen bilden mit ihrem hinteren Rand einen Theil des vorderen Randes der Zwischenwirbellöcher; die in diesen Pfannen eingelenkten Rippen müssen daher die Zwischenwirbellöcher verengen und die Bewegungen der ersteren können nicht ohne Einfluss auf die in den letzteren enthaltenen Gefässe und Nerven sein. So mag man es für zweckmässig halten, dass die Pfanne

¹⁾ *Superficies articulares laterales.*

der beiden untersten, vorzugsweise frei beweglichen Rippen von den Zwischenwirbellochern weg auf die Seitenfläche der betreffenden Wirbelkörper gerückt ist.

An den Körpern der Halswirbel wird die Stelle, welche der Rippenpfanne der Brustwirbel entspricht, von der Wurzel der Querfortsätze eingenommen. Deswegen scheinen, wenn man die Wirbelsäule nach Entfernung der Rippen von vorn betrachtet, die Körper der Halswirbel einen kleineren Cylinderabschnitt darzustellen als die Körper der Rückenwirbel. Ein Theil der Seitenfläche der ersteren wird durch die Querfortsätze verdeckt.

Bogen.


Die Wirbelbogen haben eine im Allgemeinen den Körpern entsprechende, aber ungleichmässige Höhe. Man kann unterscheiden: die seitlichen Massen, von welchen jederseits die beiden Gelenkfortsätze und der Querfortsatz ausgehen, den Hals, welcher diese Massen jederseits mit dem Körper verbindet, und den hinteren Bogenabschnitt, welcher sie unter sich verbindet. Die Seitenmassen mit den Gelenkfortsätzen sind, wie erwähnt, überall die nach oben und unten am meisten hervorragenden Theile; die Höhe des Halses beträgt etwa $\frac{2}{3}$ der Höhe der Wirbelkörper; die hinteren Bogenabschnitte sind in der Hals- und Brustgegend den Körpern an Höhe ziemlich gleich und nur an den Bauchwirbeln ansehnlich niedriger, woraus folgt, dass bei gerader Haltung die Zwischenräume der Bogen am Hals- und Brusttheil der Wirbelsäule ungefähr eben so hoch sind, als die Zwischenwirbelknorpel, am Bauchtheil aber höher. Was den Hals der Wirbelbogen betrifft, so ist der früher gegebenen allgemeinen Beschreibung nur wenig hinzuzufügen. Sein oberer Rand liegt an den Hals- und Brustwirbeln fast in gleicher Flucht mit dem oberen Rand des Körpers, an den mittleren Brustwirbeln sogar über demselben, indem er von dem nach oben vorspringenden Rande der Rippenpfanne ausgeht (Fig. 24), an den Bauchwirbeln dagegen etwas tiefer als der obere Rand des Körpers. An den Halswirbeln ist der Hals des Bogens schief seit- und rückwärts, an den Brust- und Bauchwirbeln ist er gerade rückwärts gerichtet; dadurch ist an den Halswirbeln, trotz der geringeren Breite des Wirbelkörpers, der Querdurchmesser des Wirbellochs absolut grösser als an den Brust- und Bauchwirbeln. Mit der Länge des Bogenhalses nimmt von oben nach unten sehr allmähig und nur mit geringen Schwankungen die Entfernung der Bogen-gelenke vom Körper und der sagittale Durchmesser der Zwischenwirbellöcher zu.

Die seitlichen Massen der Wirbelbogen werden in Verbindung mit den Fortsätzen beschrieben, von welchen ihre äussere Fläche grösstentheils verdeckt wird.

Die hinteren Abschnitte der Wirbelbogen sind, von Einem Gelenkfortsatz zum anderen gemessen, am ausgedehntesten an den Halswirbeln, am kürzesten an den Brustwirbeln; sie sind nach der Fläche und ausserdem nach der Kante so gekrümmt, dass die Concavität des Bogens nach oben sieht und die Lücken zwischen den einzelnen Bogen halbmondförmig nach oben gebogene Querspalt darstellen, die aber an den Brustwirbeln grösstentheils durch den abwärts gerichteten Dorn verschlossen werden. Eine Ausnahme machen, nebst den letzten Brustwirbeln, die Bauchwirbel, bei

welchen durch die gegenseitige Annäherung der unteren Gelenkfortsätze der untere Bogenrand in einen nach unten offenen, spitzen Winkel verwandelt wird, die Lücke zwischen den Bogen also die Form eines Dreiecks mit nach oben gerichteter Spitze und mitunter, wenn zugleich der obere Rand tief eingeschnitten ist, eine Rautenform erhält (Fig. 34).

Fig. 34.



Dritter u. vierter Bauchwirbel von hinten.

So weit die Ränder der Bogen frei liegen, sind sie an den Halswirbeln scharf, an den Brust- und Lendenwirbeln zur Aufnahme der Zwischenbogenbänder rauh, selbst zackig; diese Rauigkeit geht an den Brustwirbeln vom oberen Rande auf die hintere Fläche, vom unteren Rande auf die vordere Fläche des Bogens über; sie erstreckt sich am

oberen Rand der Bauchwirbel auf den oberen Rand des Dornfortsatzes, am unteren Rande der Bauchwirbel auf die Vorderfläche der Gelenkfortsätze. Am Halse sind die Wirbelbogen mit der Vorderfläche abwärts sanft geneigt; dadurch, indem zugleich jeder Bogen gegen den nächst oberen etwas zurücktritt, wird der sagittale Durchmesser des Wirbelcanals nach abwärts allmähig vergrößert. In den Brust- und Bauchwirbeln stehen die Bogenflächen der Rückenfläche des Wirbelkörpers parallel, vertical. Die Vorderfläche des Bogens, die den Wirbelcanal bilden hilft, ist in den Brust- und Bauchwirbeln, abgesehen von den eben erwähnten Rauigkeiten am unteren Rande, völlig glatt; an den Halswirbeln ist sie durch eine unter der Mitte und dem Rande parallel verlaufende Linie in ein oberes grösseres und ein unteres kleineres Feld getheilt; das letztere, etwas vertiefte, ist von den Zwischenbogenbändern bedeckt, die sich von unten her an jene Linie anheften. Die Rückenfläche des Bogens ist der Länge nach durch den Dorn getheilt, in dessen Seitenflächen sie übergeht.

Die Wirbeldornen sind durchgängig mehr oder weniger abwärts geneigt; die längeren mitunter auch etwas abwärts gekrümmt. Jene Neigung nimmt von den oberen Halswirbeln bis zum siebenten Brustwirbel in dem Maasse zu, dass die Dornen in der Mitte der Brustwirbelsäule einander dachziegelförmig decken (Fig. 24. 35); vom achten Brustwirbel an abwärts richten sie sich rasch wieder auf; so dass schon der Dorn des elften Brustwirbels ziemlich gerade nach hinten steht. Die Dornen des dritten bis sechsten Halswirbels sind fast gleich lang (14^{mm}), der Dorn des siebenten Halswirbels überragt aber den des sechsten um etwa die Hälfte der Länge des letzteren; von da an bis zum siebenten Brustwirbel nimmt die Länge der Dornen allmähig um so viel zu, dass sie, trotz der grösseren Neigung abwärts, gleich weit nach hinten ragen; die folgenden verkürzen sich wieder bis zum elften Brustwirbel, von wo an bis zum Kreuzbein sie um Weniges anfangs zu- und schliesslich wieder abnehmen.

Dornen.

Bei natürlich aufgerichteter Wirbelsäule trifft eine vom untersten Theil der Spitze des siebenten Brustwirbeldorns nach vorn gezogene Horizontale unter den oberen Rand des neunten Brustwirbelkörpers; eine ebenso von einem Bauchwirbeldorn gezogene Linie fällt unter den oberen Rand des nächstfolgenden Wirbelkörpers und, von den Halswirbeldornen, etwa auf die Mitte des nächstfolgenden Wirbelkörpers.

Vom siebenten Halswirbel an sind die Spitzen der Dornen durch die Haut zu fühlen; der siebente Halswirbeldorn fühlt sich aber am leichtesten heraus, weil er nicht nur mit der Spitze, sondern auch mit einem Theil des oberen Randes fre unter der Haut liegt.

Die Dornen des dritten bis sechsten Halswirbels sind platt, deprimirt; die obere, von Einer Seite zur anderen gewölbte, oder durch eine Längsfirste getheilte Fläche geht aus der hinteren Fläche des Bogens, die untere in gleichem Sinne ausgehöhlte Fläche aus der vorderen Fläche des Bogens hervor; die Spitze ist in zwei platte, divergirende, öfters nicht ganz symmetrische Zacken getheilt (Fig. 25). Die folgenden Dornen bis zu dem des neunten oder zehnten Brustwirbels sind sämmtlich an der Basis dreiseitig prismatisch, mit zwei gewölbten oder ausgehöhlten Seitenflächen, welche oben in einer, an der Mitte des oberen Randes des Bogens beginnenden Firste zusammenstossen, und einer unteren, schwach ausgehöhlten Fläche, in welche die vordere Fläche des Bogens besonders an den stark abwärts geneigten Dornen, fast ohne Unterbrechung, übergeht (Fig. 35. 36). Indem sich die untere Fläche

Fig. 35.





Fig. 36.




Brustwirbelbogen von vorn.
+ Durchschnitt des Bogenhalses.
Ft s. S. 39.

A. Brustwirbel von hinten. B. Frontalschnitt des Wirbeldorns.

gegen die Spitze hin zu einer Kante verschmälert, werden die Seitenflächen einander parallel und gewinnt der Dorn eine comprimirtre Gestalt mit oberem und unterem scharfen Rande und senkrecht abgeschnittener, wulstiger, an einigen Wirbeln beilförmig nach unten vorspringender Spitze. Der siebente Halswirbeldorn, obgleich hinsichtlich seiner Länge, seiner prismatisch gestalteten Wurzel und ungetheilten Spitze den Brustwirbeldornen ähnlich, schliesst sich doch den Dornen der höheren Halswirbel dadurch an, dass er an der Spitze breiter ist als hoch (Fig. 25), und der erste Brustwirbel bildet den Uebergang zu den folgenden durch eine, wenngleich

noch ansehnlich breite, doch schon im senkrechten Durchmesser verlängerte



Bauchwirbel im Profil.

Endfläche der Spitze. Die Dornen vom zehnten oder elften Brustwirbel an abwärts sind sogleich vom Ursprung an platt und comprimirt, mit zwei seitlichen Flächen, die rechts und links in die hintere Fläche des Bogens umbiegen, mit zwei scharfen Rändern, einem oberen und unteren, von welchen der letztere oft nach unten concav ist, und einem verdickten, wulstigen, zuweilen durch eine seichte Längsfurche getheilten hinteren Rande (Fig. 37).

Häufig tragen die Dornen der Bauchwirbel an ihrer Spitze oben eine Gelenkfläche, unten einen convexen Gelenkknopf, einfach oder in zwei getheilt, wodurch sie unter einander articuliren, *Diarthrosis interspinosa* Mayer (Tiedemann und Treviranus, Zeitschrift für Physiologie. Bd. II. p. 29. Taf. V. Fig. 1. 2.).

Die Gelenkfortsätze ragen an allen Wirbeln über den oberen Rand der Wirbelbogen mehr hervor als über den unteren, weil der abwärts gekrümmte Bogen seine untere Gelenkfläche der oberen Gelenkfläche des nächsten Bogens gleichsam entgegenträgt; sie ragen nach oben und unten am stärksten hervor an den Bauchwirbeln theils wegen der Höhe der Zwischenwirbelbänder, theils wegen der im Vergleich zum Körper geringen Höhe der Bogen dieser Wirbelabtheilung. Die Form der Gelenkfortsätze wird hauptsächlich durch die Richtung der Gelenkflächen bestimmt, welche sich von oben nach unten in folgender Weise umändert. Der Schädel articulirt auf dem ersten Halswirbel, der erste Halswirbel auf dem zweiten mit fast horizontalen Flächen; vom Gelenk des zweiten, mit dem dritten Halswirbel an drehen sich die Gelenkflächen so um die Queraxe, dass die dem oberen Wirbel angehörigen nach vorn und unten, die dem unteren angehörigen nach hinten und oben schauen (Fig. 31), bis sie, am fünften oder sechsten Brustwirbel, der Frontalebene parallel zu liegen kommen, die dem oberen Wirbel angehörigen nach vorn, die dem unteren angehörigen nach hinten gerichtet (Fig. 24. 35). So erhalten sie sich bis zum Gelenk des zwölften Brustwirbels mit dem ersten Lendenwirbel, dessen Flächen, mit den vorhergehenden verglichen, um die Längsaxe rückwärts gedreht erscheinen, so dass die Gelenkflächen des Brustwirbels sich lateralwärts, die des Bauchwirbels medianwärts kehren, und fortan, da diese Richtung in den folgenden Gelenken beibehalten wird, jedesmal die unteren Gelenkfortsätze eines Wirbels von den oberen des folgenden umfasst werden (Fig. 34). Die meisten dieser Gelenkflächen liegen der Medianebene fast genau parallel; nur an dem Gelenk des letzten Bauchwirbels mit dem Kreuzbein ist die obere Gelenkfläche mehr nach vorn, die untere entsprechend nach hinten gerichtet.

Gelenkfortsätze.

Die Gelenkflächen der Hals- und Brustwirbel sind von nicht ganz regelmässigen, jedoch nahezu kreisrunden Contouren begrenzt und flach oder

leicht gekrümmt. Die Ebene der Halswirbelgelenke ist nach unten resp. vorn convex, die Ebene der Brustwirbelgelenke nach vorn concav; an jedem Halswirbel sind demnach die oberen Gelenkflächen vertieft, die unteren gewölbt, an dem Brustwirbel sind, umgekehrt, die oberen Gelenkflächen gewölbt, die unteren vertieft. An den Bauchwirbeln findet man die lateralwärts gewandten Flächen von vorn nach hinten mehr oder minder gewölbt, die medianwärts gewandten Flächen in derselben Richtung ausgehöhlt und beide meist im verticalen Durchmesser verlängert. — Was nun die Form der Fortsätze betrifft, welche einen Theil dieser Gelenkflächen tragen, so sind die oberen an den Hals- und Brustwirbeln von vorn nach hinten comprimirt, mit vorderer convexer, hinterer platter und überknorpelter Fläche, beide Flächen nach oben und den Seiten in einen halbkreisförmigen, scharfen Rand zusammenstossend, so zwar, dass an den Halswirbeln die hintere (Gelenk-)Fläche, vorwärts geneigt, der vertical gestellten Vorderfläche entgegenkommt, an den Brustwirbeln, umgekehrt, die Vorderfläche, rückwärts geneigt, sich an der vertical gestellten hinteren (Gelenk-) Fläche heraufzieht. Der untere Gelenkfortsatz springt an den Halswirbeln nur wenig nach abwärts, hauptsächlich aber nach hinten und seitlich vor; mit dem oberen zusammen stellt er an jedem Wirbel eine kurze, schief abgestutzte, an die Seitenfläche des Bogens angewachsene Säule dar; längs dem hinteren Theil des unteren Randes verläuft die oben erwähnte Muskelrauhigkeit (Fig. 25). Noch weniger zeichnet sich der untere Gelenkfortsatz an den zehn oberen Brustwirbeln aus, an welchen fast die ganze Gelenkfläche auf die Vorderseite des Bogens zu liegen kommt (Fig. 36). An den Bauchwirbeln ist die Gelenkfläche ganz auf die Gelenkfortsätze übergegangen; von diesen sind die oberen seitlich zusammengedrückt, aussen rauh, innen glatt, die unteren dreiseitigen Pyramiden ähnlich mit nach unten gerichteter Spitze, die Seitenfläche glatt, die vordere und hintere Fläche rauh. Die unteren stehen dicht zusammen, die oberen so weit auseinander, dass ihre innere Fläche noch etwas weiter von der Medianebene entfernt ist als die Aussenfläche des unteren Fortsatzes der gleichen Seite. Die oberen Gelenkfortsätze der Bauchwirbel werden noch durch die an ihrem hinteren Rande gelegenen Pr. mamillares und accessorii verlängert (Fig. 37).

Die oberen Gelenkfortsätze des zwölften Brustwirbels gleichen denen der übrigen Brustwirbel, seine unteren Gelenkfortsätze den gleichnamigen Gelenkfortsätzen der Bauchwirbel. Der elfte Brustwirbel zeichnet sich hinsichtlich der Stellung der Gelenkflächen nicht vor den übrigen aus, macht aber den Anfang mit der Bildung deutlich vorspringender unterer Gelenkfortsätze.


Unter dem Namen *Diarthrosis obliqua accessoria* beschreibt Mayer (a. a. O. Fig. 3 — 5) zwei Gelenke, welche sich zuweilen an unteren Brust- und oberen Bauchwirbeln finden, die Gelenkköpfe (*proc. obliqui accessorii*) unten, die Gelenkgruben oben jederseits an der Wurzel des Dornfortsatzes medianwärts von den eigentlichen Gelenkfortsätzen.

Querfortsätze.

Die Querfortsätze stehen an den Hals- und Bauchwirbeln weiter nach vorn als an den Brustwirbeln; indem sie die Schlangenbiegung der Wirbelsäule mitmachen, übertreiben sie dieselbe noch in der Art, dass eine längs ihrer Spitzen gezogene Linie am Brustkorb nach hinten, am

Hals- und Bauchtheil nach vorn steiler gekrümmt ist, als die Axe des Wirbelcanals. Dies ist der Erfolg einer Verschiedenheit theils des Ursprungs, theils der Richtung und Länge der Querfortsätze an den verschiedenen Gegenden der Wirbelsäule. Sie entspringen an den Brustwirbeln jederseits zwischen dem unteren Rande der oberen und dem oberen Rande der unteren Gelenkfläche mit einer cylindrischen Wurzel, welche unten über dem Wirbelausschnitt rinnenförmig vertieft ist und mit ihrer vorderen, abgeplatteten Fläche in den Hals des Wirbelbogens übergeht. Der Querfortsatz des ersten Brustwirbels ist gerade seitwärts gerichtet (18^{mm} lang); vom zweiten Brustwirbel an weichen die Spitzen der Querfortsätze immer mehr rückwärts; sie nähern sich deshalb der Mittellinie und nehmen in der vorderen oder hinteren Ansicht der Wirbelsäule abwärts scheinbar an Länge ab (Fig. 38).

Fig. 38.



Wirbelsäule von hinten.


Wirklich und rasch kürzer wird der Querfortsatz vom neunten Brustwirbel an, und am zwölften, zuweilen auch schon am elften, ist er nur noch ein kurzer, in zwei bis drei stumpfe Zacken getheilter Höcker. Die Spitzen der Querfortsätze des ersten bis zehnten Brustwirbels sind kolbig verdickt; sie tragen (Fig. 24. 39) an der Vorderseite eine kreisrunde schwach vertiefte, an den oberen Wirbeln abwärts, an den unteren aufwärts gerichtete Gelenkfläche zur Articulation mit den Rippenhöckern (Querfortsatzpfanne, *Fossa transversalis*), an der Rückseite die zum Muskelansatz dienende Rauigkeit, welche sich, wie erwähnt, an den tieferen Wirbeln quer theilt und öfters so von der Spitze des Querfortsatzes abrückt, dass in der Ansicht des Wirbels von hinten der Rand der Pfanne für den Rippenhöcker seitlich unten vorspringt (Fig. 26). An den beiden unteren Brustwirbeln hat sich die Muskelrauigkeit, in den *Pr. mamillaris* und *accessorius* zerfallen, an die Wurzel des kurzen Querfortsatzes zurückgezogen; dieser ist kolbig oder spitz und steht mit dem Rippenhöcker nur durch ein Ligament in Verbindung.

Variet. Man findet ihn auf ein unscheinbares Knötchen reducirt; der *Pr. accessorius* fehlt am elften oder zwölften Brustwirbel. Die Gelenkfläche wird schon am Querfortsatz des zehnten Brustwirbels vermisst.

Um die Querfortsätze der Hals- und Bauchwirbel richtig zu verstehen, ist es nöthig, einen Blick auf die Verbindung der Brustwirbel mit den Rippen zu werfen. Sie wird vermittelt durch die Köpfchen und Höcker der Rippen (Fig. 39), von welchen sich jene an die Körper, diese an die Querfortsätze der Wirbel anlegen. Der zwischen Kopf und Höcker gelegene


Hals der Rippe (*Cc*) begrenzt von vorn, wie der Querfortsatz von hinten, eine Oeffnung, welche *Foramen costo-transversarium* genannt werden soll.

Fig. 39.



Brustwirbel und Rippe von unten.


Fig. 40.



Fünfter Halswirbel von unten.

Sie wird durch Bandmasse ausgefüllt. Verschmilzt das Köpfchen einer kurzen Rippe mit dem Körper, der Höcker derselben mit dem Querfortsatz des Wirbels, so entsteht die Art durchlöcherter Querfortsätze, wie sie an sämtlichen Halswirbeln, die beiden oberen mit eingeschlossen, vorkommen (Fig. 40). Das *Foramen costo-transversarium*, hier schlechthin *For. transversarium* genannt, wird vom sechsten Halswirbel an aufwärts durch die zum Schädel aufsteigende A. und V. vertebralis ausgefüllt. Die Leiste, die dasselbe nach vorn begrenzt, entspringt vom Körper, die dem Querfortsatz entsprechende hintere Leiste entspringt am siebenten Halswirbel von der Seite des Bogens zwischen den Gelenkfortsätzen und rückt in den höheren Wirbeln immer weiter nach vorn, so dass in der Ansicht von hinten die Querfortsätze von den Gelenkfortsätzen fast oder völlig verdeckt werden, zumal auch die Grösse der ersteren in allen Dimensionen vom siebenten Halswirbel aufwärts geringer wird. Gleich das *For. costo-transversarium* an den Brustwirbeln einer länglichen Spalte, so verwandelt es sich an den Halswirbeln in eine kreisrunde Oeffnung, an deren Begrenzung medianwärts der Körper und Bogenhals des Wirbels und seitlich eine Brücke Antheil nimmt, in welche die Berührungsstelle zwischen dem Rippenhöcker und eigentlichen Querfortsatz sich auszieht. Die vordere und hintere Leiste des Querfortsatzes der Halswirbel sind platt, mit den Flächen in der Frontalebene; ihre unteren Ränder verbindet die erwähnte, ebenfalls platte, aber mit den Flächen horizontal gestellte und nach oben ausgehöhlte Brücke. So wird der Querfortsatz jenseits des *For. transversarium* zu einer Rinne, in welcher der aus dem Zwischenwirbelloch ausgetretene Nerve ruht, und der Rand dieser Rinne endet vorn und hinten in eine auf- oder seitwärts gerichtete Zacke, welche zur Anheftung von Muskeln benutzt wird (Fig. 41).

Fig. 41.




Halswirbel, schief von oben und seitlich.

Oefters ist das *For. transversarium* durch eine feine Knochenbrücke in eine hintere kleinere und vordere grössere Oeffnung getheilt.


Verfolgt man den Querfortsatz von den Brustwirbeln abwärts, so sieht man ihn am ersten Bauchwirbel plötzlich wieder eben so weit und weiter seitwärts reichen, als am ersten Brustwirbel; seine Länge pflegt an den folgenden Wirbeln wenig zu- oder abzunehmen; seine Höhe gleicht ebenfalls der Höhe der Brustwirbelquerfortsätze und ist nur am fünften Bauchwirbel etwas beträchtlicher; er ist platt mit scharfem oberen und unteren Rande und grade oder schief abgestutzter, wenig verdickter Spitze, welche kaum rückwärts und wenig aufwärts gerichtet ist. Dieser Querfortsatz der Bauchwirbel ¹⁾ aber entspricht dem höckerförmigen Querfortsatz der letzten Brustwirbel sammt einer kurzen Rippe, deren Verbindungen mit dem Wirbel in Einer Knochenmasse untergegangen sind. Dies ergibt sich, ohne die Beihülfe der Entwicklungsgeschichte, schon aus der Form der Querfortsätze. Ihre dicke Wurzel entspringt von der Seitenfläche nicht nur des Bogens, sondern auch des Körpers der Wirbel; sie geht mit ihrer Vorderfläche in die Vorderfläche des Körpers über, und eine Vertiefung auf ihrer oberen und unteren Fläche nimmt sich wie ein durch Knochenmasse ausgefülltes *Foramen costo-transversarium* aus (Fig. 42. 43). Der *Processus mamillaris* ist an den hinteren Rand des oberen Gelenkfortsatzes hinaufgerückt (Fig. 43);

Fig. 42.



Zwölfter Brustwirbel mit der Rippe von unten.

Fig. 43.



Bauchwirbel von unten.

der *Processus accessorius* dagegen zieht sich, namentlich an den tieferen Bauchwirbeln, als eine scharfe Leiste bis zum unteren Rande der Wurzel des Querfortsatzes herab.


An den unteren Lendenwirbeln eines Skelettes finde ich die Spitzen des *Pr. mamillaris* und *accessorius* durch eine Knochenbrücke verbunden, so dass beide mit einander nur einen breiten, von einer runden Oeffnung durchbohrten Fortsatz darstellen. An einer Wirbelsäule unserer Sammlung articulirt der überknorpelte untere Rand der Spitze des Querfortsatzes des letzten Bauchwirbels in einer überknorpelten flachen Grube auf der oberen Fläche des Seitentheiles des Kreuzbeines.

β. Drehwirbel.

Man denke sich den Körper eines gewöhnlichen Wirbels in die Breite ^{β. Dreh-} stark ausgedehnt und durch zwei von vorn nach hinten gezogene Linien ^{wirbel.}


¹⁾ *Processus costarius*, Krause.

in drei ungefähr gleich grosse Abtheilungen geschieden, die beiden seitlichen Theile (*M*, Fig. 44) oben und unten überknorpelt und, statt durch Synchondrosen, durch Gelenke mit entsprechenden Flächen der angrenzenden Wirbel oder wirbelähnlicher Stücke verbunden; den mittleren Theil zer-



Atlas und Epistr. von oben.

zweiten Halswirbel geschieht der Uebergang vom Dreh- zum Beugewirbel: die obere Fläche seines Körpers ist mit zwei Gelenkflächen versehen, zwi-



Epistr. von oben.

fallen in eine vordere knöcherne, eine hintere sehnige Leiste (*Aa* und *L*) und einen cylindrischen, knöchernen, ringsum freien Kern (*D*) und diesen Kern mit seiner unteren Fläche an die obere des nächst unteren Wirbelkörpers angewachsen: so hat man ein Bild der Eigenthümlichkeiten, die den ersten und zweiten Halswirbel vor den übrigen auszeichnen. In dem ersten Halswirbel ist der Körper vertreten durch den vorderen Bogen und die beiden, die Gelenkflächen tragenden Seitenmassen; im zweiten Halswirbel geschieht der Uebergang vom Dreh- zum Beugewirbel: die obere Fläche seines Körpers ist mit zwei Gelenkflächen versehen, zwischen welchen der zapfenförmige Zahn, *Dens*¹⁾ (Fig. 45), sich erhebt; nach unten hin aber verjüngt sich der Körper zu dem Umfange, welcher den gewöhnlichen Halswirbelkörpern zukommt, und die untere Fläche desselben ist von der unteren Fläche der folgenden Halswirbel nicht verschieden. Hinter beiden Gelenkflächen des ersten und hinter der oberen Gelenkfläche des zweiten Halswirbels folgt jederseits, wie hinter den Körpern der Beugewirbel, ein Ausschnitt, der dem vorderen Rande des

Wirbelausschnittes der übrigen wahren Wirbel entspricht; die hintere knöcherne Begrenzung dieses Ausschnittes fehlt aber am ersten Halswirbel und am oberen Rande des zweiten, zugleich mit den Gelenkfortsätzen, die erst am unteren Rande des zweiten Halswirbels in der den Beugewirbeln des Halses eigenen Gestalt auftreten. Der Mangel der Gelenkfortsätze an den einander zugewandten Rändern der Bogen des ersten und zweiten Halswirbels bedingt, dass die Lücke zwischen diesen Bogen (wie zwischen dem Bogen des ersten Halswirbels und dem Hinterhaupt) breiter wird, als zwischen irgend welchen anderen Wirbeln; sie wird zugleich höher und der Zugang zur Wirbelhöhle an dieser Stelle in jeder Beziehung geräumiger durch die geringe Höhe des hinteren Bogens des ersten Halswirbels und durch die Abwesenheit eines Dornes.

Aus dieser Beschreibung erhellt, dass auf die Seitenmassen des ersten Halswirbels und die Theile des zweiten, welchen die oberen Gelenkflächen angehören,

¹⁾ Zahnfortsatz, *processus odontoideus*.

der Name Gelenkfortsätze nicht passt, und damit hört der Widerspruch auf, welcher bezüglich der Austrittsstelle der Rückenmarksnerven zwischen den beiden oberen Wirbeln und den folgenden zu bestehen schien, wenn man angab, dass sie hier vor und dort hinter den Gelenkfortsätzen austreten.

Am ersten Halswirbel, *Atlas*, ist der vordere Bogen, *Arcus anterior*, etwas niedriger, die Seitenmassen, *Massae laterales*, sind wenig höher als die Körper der regelmässigen Halswirbel; eine vom Seitenrande der Seitentheile abwärts gezogene Linie fällt etwa in die Mitte des Querfortsatzes des dritten Halswirbels. Der vordere Bogen hat an seiner Vorderfläche zwischen zwei seichten Eindrücken einen besonders nach unten vorspringenden Muskelhöcker, *Tuberculum anterius*, diesem gegenüber an der hinteren Fläche eine kreisrunde, schwach vertiefte Gelenkfläche, *Fossa art. post.*, welche einer ähnlichen, kaum gewölbten, an der Vorderseite des Zahnes des zweiten Halswirbels entspricht. Die oberen Gelenkflächen der Seitenmassen, die Hinterhauptspfannen, *Fossae art. supp.*, sind von vorn nach hinten stark, von einer Seite zur anderen schwach ausgehöhlt, ohrförmig mit gegen die Medianebene concaven Rändern und gegen diese Ebene abfallend. Die unteren Gelenkflächen der Seitenmassen sind sehr wenig vertieft, fast kreisrund und steigen gegen die Medianebene sanft an; die Innenflächen der Seitenmassen springen gewölbt und uneben gegen die Wirbelhöhle vor und zeigen nahe dem oberen Rande hinter einem warzenförmigen Höckerchen eine mehr oder minder tiefe Grube, in welcher das hinter dem Zahn verlaufende quere Band sich befestigt.


Der hintere Bogen, *Arcus posterior*, nimmt aus der hinteren Fläche der Seitenmassen etwa in der Mitte ihrer Höhe seinen Ursprung, anfangs deprimirt, die Flächen nach oben und unten, die scharfen Kanten nach innen und aussen gewandt; im weiteren Verlauf nach hinten, indem die Flächen sich verjüngen und die Kanten sich verbreitern, werden die Flächen, wie an den folgenden Bogen, vor- und rückwärts, die Ränder aufwärts gekehrt. Der deprimirte, nach oben zugleich etwas ausgehöhlte Theil bildet für Nerven und Gefässe eine Rinne, *Sinus atlantis*, welche von oben her durch die nach hinten ausgezogene Spitze des überknorpelten Theiles des Körpers überragt wird. Mitten auf der hinteren Fläche des hinteren Bogens, an der der Basis des Dornes in den folgenden Wirbeln entsprechenden Stelle, findet sich ein kurzer Höcker oder eine verticale Leiste oder auch ein Grübchen mit wulstigen Rändern, das *Tuberculum posterius atlantis*. Der hintere Bogen des Atlas setzt sich hinter dem Körper weg in die hintere Leiste des Querfortsatzes fort, dessen vordere Leiste aus der Vorderfläche der Seitenmassen hervor- und gerade lateralwärts geht. Der Querfortsatz ist an sich stärker als an den tieferen Halswirbeln; dies, in Verbindung mit seiner geraden Richtung und der verhältnissmässig bedeutenden Breite des Körpers, bewirkt, dass die Spitze desselben weiter zur Seite reicht, als die Spitze des Querfortsatzes der folgenden Halswirbel und mitunter selbst des ersten Brustwirbels. Das Wirbelloch des Atlas erstreckt sich, zur Aufnahme des Zahnes, zwischen den Seitenmassen nach vorn in Form einer von seitlichen convexen und einem vorderen concaven Rande begrenzten Bucht; der zur Aufnahme des Rückenmarkes bestimmte hintere

Theil ist breiter, aber im sagittalen Durchmesser kürzer, als in den nächstfolgenden Wirbeln.

Variet. Die Hinterhauptspfanne ist durch eine quer verlaufende raue Rinne getheilt. Die eine oder andere Leiste des Querfortsatzes ist schwach oder fehlt. Vom hinteren Theil des Randes der Hinterhauptspfanne wölbt sich eine Brücke zur hinteren Leiste des Querfortsatzes oder zur Wurzel des hinteren Bogens und verwandelt den hinter dem Querfortsatzloch gelegenen Theil des Sinus atlantis in einen Knochencanal, durch welchen die Vertebralgefäße laufen.

Epistropheus.

Der zweite Halswirbel, *Epistropheus* (Fig. 46), ist am Körper,



Epistropheus im Profil.

auch abgesehen vom Zahn, wie am Bogen höher, als die folgenden Halswirbel. Der Körper ist an seiner nach oben sich verbreiternden Vorderfläche mit denselben seitlichen Eindrücken und demselben dreiseitigen Mittelfelde versehen, wie die Beugewirbel des Halses; die obere Fläche setzt sich von ihrer Mitte aus, allmählig ansteigend, in den Zahn fort und trägt zu den Seiten desselben die schwach gewölbten, seitwärts geneigten, nach vorn überhängenden Gelenkflächen, *Fossae art. supp.*, auf welchen der Atlas articulirt. Der Zahn ist cylindrisch, mit kurzer, kegelförmiger Spitze, die nach vorn steiler abfällt als nach hinten; an der hinteren Fläche unter der Spitze breit ringförmig eingeschnürt, an der Vorderseite mit der bereits erwähnten Gelenkfläche, *Fossa art. ant.*, versehen. Der Bogen liegt mit seinem oberen Rande in gleicher Höhe mit dem oberen Rande des Körpers und zeigt statt des oberen Ausschnittes nur eine ganz seichte Vertiefung hinter der Gelenkfläche des Körpers; der untere Wirbelausschnitt ist tief und zur Seite, wie an den folgenden Wirbeln, durch den Gelenkfortsatz, *Proc. art. inf.*, begrenzt. Der Querfortsatz entspringt mit einer Leiste dicht unter dem oberen Rande des Körpers, mit der anderen, schwächeren, vom Bogen über dem unteren Gelenkfortsatz. Er ist kürzer, mehr abwärts geneigt und minder rinnenförmig als an den folgenden Wirbeln. Wegen der nach oben zunehmenden Breite des Körpers stellt das *For. transversarium* einen auf- und seitwärts gekrümmten kurzen Canal dar. Der Dorn ist hoch, in zwei starke Zacken getheilt und reicht weiter rückwärts als an den nächstfolgenden Wirbeln.

Die hintere Leiste des Querfortsatzes fehlt zuweilen.

b. Falsche Wirbel.

α. Kreuzbein, *Os sacrum*.¹⁾

b. Falsche
Wirbel.
α. Kreuz-
bein.

Den Namen Kreuzbein tragen die fünf, im reifen Körper unter einander verschmolzenen Wirbel, welche dem letzten Bauchwirbel folgen. Diese Verschmelzung, die knöcherne Verwachsung der Synchronosen der

¹⁾ Heiligbein.

Körper und der Gelenke der Bogen, sowie die Verknöcherung der Bandmassen, welche an anderen Wirbeln die Lücken zwischen den Bogen ausfüllen, ist indess nicht das einzige, für die Kreuzwirbel charakteristische Merkmal. Gleich den verschiedenen Arten der wahren Wirbel zeichnen sich auch die Kreuzwirbel durch eine eigenthümliche Anordnung der Querfortsätze aus. Hier sind sie in die Breite ausgezogen, zugleich verdickt und mit den Flächen, die sie einander zukehren, einander dergestalt entgegengewachsen, dass sie jenseits der Zwischenwirbellöcher in derselben Ebene, wie die Wirbelkörper, und gleich diesen anfangs durch Synchrondrosen, später durch Knochenmasse an einander haften. Die Synchrondrosen der Körper der Kreuzwirbel sind noch nach der Verknöcherung durch Querleisten auf der Vorderfläche des Kreuzbeins angedeutet, Fig. 47; von den Synchrondrosen der Querfortsätze aber bleibt selten eine Spur und so bilden

Fig. 47.



Kreuzbein mit dem letzten Bauchwirbel
von vorn.


Fig. 48.

Kreuzbein mit dem letzten Bauchwirbel
von hinten.

die letzteren, unter einander zusammenhängend, die sogenannten Seitentheile, *Partes laterales*, des Kreuzbeins, deren Grenze gegen den mittleren Theil oder Körper die vorderen und internen Kreuzbeinlöcher, *Foramen sacralia antt.* und *postt.*, Fig. 47, 48 und 49, bezeichnen. Die Kreuzbeinlöcher sind die Mündungen eines den Knochen gerade von vorn nach hinten durchsetzenden Canals, dessen Wände seitlich, oben und unten von den Querfortsätzen, medianwärts von den Körpern und Gelenkfortsätzen gebildet werden. Die Zwischenwirbellöcher, *Foramina inter-*

vertebralia (Fig. 49), wie überall von den Körpern und Gelenkfortsätzen

Fig. 49.



Erster Kreuzwirbel, von unten.

je zweier Wirbel umschlossen, liegen am hinteren Theil der medianen Wand jener Canäle; die Axe der ersteren trifft unter einem fast rechten Winkel auf die Axe der letzteren; die vorderen und hinteren Kreuzbeinöffnungen entsprechen also den Lücken zwischen je zwei Rippen an der Vorderseite und je zwei Querfortsätzen an der Rückseite, durch welche in der Brustgegend der Wirbelsäule

die intercostalen Aeste der Spinalnerven nach vorn, die dorsalen Aeste dieser Nerven nach hinten treten.

Die Kreuzwirbel nehmen von oben nach unten an Höhe, jedoch selten gleichmässig, ab; meist sind die beiden oberen ziemlich gleich hoch (28 — 33^{mm}), die drei folgenden, einander ebenfalls ziemlich gleich, beträchtlich niedriger (20^{mm}); die Breite, zwischen den vorderen Kreuzbeinlöchern gemessen, bleibt sich bei allen gleich (32^{mm}). Die Kreuzbeinlöcher liegen daher vorn und hinten in parallelen Reihen, die beiden oberen einer jeden Seite von grösserem Durchmesser und weiter auseinander als die beiden unteren; die vorderen durchgängig weiter als die entsprechenden hinteren; sie sind rund oder oval, die ovalen mit dem längsten Durchmesser in der Breite oder Höhe des Kreuzbeines; an der Bildung der oberen haben je zwei Kreuzwirbel gleichen Antheil, das dritte rückt gegen den oberen Wirbel auf, das vierte liegt ganz über der verknöcherten Synchondrose der zwei letzten Kreuzwirbel. Die Seitentheile verschmälern sich abwärts und enden höher oder tiefer am Seitenrande des letzten Kreuzwirbels in einem geraden, oder nach unten convexen oder nach unten ausgeschnittenen Rande. In derselben Richtung verjüngt sich das Kreuzbein auch im Dickendurchmesser, indem die Wirbelkörper an Dicke (von 30 auf 7^{mm}), der Wirbelcanal an Tiefe und die Dornen an Länge verlieren. Die Breite des Wirbelcanals wird von oben nach unten allmählig dadurch eingeschränkt, dass die Wurzeln der Wirbelbogen sich der Medianebene nähern. Wie sich nun der ganze Knochen nach den Seiten und nach unten schaufelförmig zuschärft und zuspitzt, ist er zugleich nach Art einer Schaufel doppelt in der Fläche gekrümmt, die Concavität des Breiten- und Höhendurchmessers nach vorn oder, mit Bezug auf die Lage des Kreuzbeines im aufrechten Körper, im oberen Theil ab-, im unteren vorwärts gerichtet.


Die obere, bei aufrechter Körperhaltung vorwärts geneigte Fläche des Kreuzbeins gleicht in ihrem mittleren Theile der oberen Fläche eines Bauchwirbels und entspricht der unteren Fläche des letzten dieser Wirbel; die Seitentheile aber kehren eine Fläche nach oben, welche, je weiter sie sich von der Medianebene entfernt, um so mehr im sagittalen Durchmesser sich ausdehnt; welche ferner, vom Gelenkfortsatz durch eine tiefe Furche geschieden, vor diesem Fortsatz in einer Ebene mit der Fläche des Bogen-

halses und Körpers liegt und noch weiter vorn bald sanfter, bald steiler in die Vorderfläche abfällt. Die Grenze der oberen und vorderen Fläche nimmt mit dem Promontorium Theil an der Begrenzung des kleinen Beckens gegen das grosse. Die untere Spitze des Kreuzbeines wird allein von der quer elliptischen unteren Fläche des letzten Kreuzwirbels gebildet, da weder, wie erwähnt, die Seitentheile, noch die Bogen diese Spitze erreichen.

Die Rückenfläche des Kreuzbeines ist, so weit der Wirbelcanal geschlossen ist, mit einer medianen Längsfurche versehen, die sich, je weiter abwärts, um so weniger über das Niveau erhebt und am freien Rande abwechselnd verdickte Vorsprünge und scharfe Einbiegungen zeigt; die Vorsprünge entsprechen den Spitzen der comprimierten, abwärts geneigten Dornen, *Processus spinosi spurii* (Fig. 48. 50), die Einkerbungen dem Rande der verknöcherten, dünneren Bandlagen zwischen den einander zugekehrten Rändern der Dornen. Auch in der Fläche zwischen der Basis der Dornen und der hinteren Kreuzbeinlöcher wechseln mächtigere und glatte mit dünneren und unebenen Querstreifen, jene die Bogen, diese die verknöcherten, die Räume zwischen den Bogen ausfüllenden Bänder. Dicht am medialen Rande der Kreuzbeinlöcher sitzt in Form von kurzen Zacken oder von platten, mitunter noch durch eine quere Naht unterbrochenen Längsleisten die Reihe der knöchern verbundenen Gelenkfortsätze, *Procc. articulares spurii*. Alle diese Bildungen sind je nach den Fortschritten, welche die Verknöcherung in verschiedenen Individuen macht, sehr veränderlich; so ist auch der Bogen des unteren oder mehrerer unteren, selten sämtlicher Kreuzwirbel unvollständig, bis auf die Gelenkfortsätze geschwunden, von denen die untersten, die Kreuzbeinhörner, *Cornua sacralia* griffelförmig mit planer, überknorpelter Endfläche nach unten ragen, um mit Steissbeinfortsätzen von gleicher Form und Bedeutung durch Synchondrose verbunden zu werden. Unter der Wurzel dieser Hörner liegt der letzte Kreuzbein-

ausschnitt, der durch den entsprechenden Ausschnitt über der Wurzel der Steissbeinhörner zum Zwischenwirbelloch ergänzt wird. Besonders rauh und unregelmässig sind die seitlichen Partien der hinteren Fläche durch die Anheftung der starken, das Kreuzbein mit den Beckenknochen verbindenden Bänder. Es finden sich umfangreiche stumpfe Hervorragungen besonders in der Nähe des oberen Randes, tiefe, durch scharfe oder stumpfe Querleisten geschiedene Gruben, die ihre Flächen theilweise seitlich wenden, oder es ist ein Theil der Fläche gegen die Seitenränder abgedacht und mitunter von der eigentlichen Rückenfläche durch mehr oder minder vorspringende longitudinale Kämme geschieden, welche entsprechend der Stelle der ursprüngli-

Fig. 50



Kreuzbein, im Profil.

chen Synchrondrosen, erhaben und dazwischen vertieft sind, *Processus transversi spurii*, Fig. 49.

Der Seitenrand des Kreuzbeins, Fig. 50, ist S förmig geschweift, im oberen, nach vorn convexen Theil der Krümmung eine überknorpelte, nach dem Dickendurchmesser des Knochens (20^{mm}) concave Fläche, im unteren, nach vorn concav gekrümmten Theil oben wulstig und gegen die Spitze hin zugeshärft. Durch die überknorpelte Fläche, *Facies auricularis*, ist das Kreuzbein an die Beckenknochen befestigt.

β. Steissbein, *Os coccygis* ¹⁾.

β. Steiss-
bein.

Das Steissbein (Fig. 51) besteht aus vier durch Synchrondrose mit einander verbundenen, nicht selten mit einander knöchern verwachsenen Wirbeln, von welchen die beiden untersten nicht einmal Spuren von Bogen oder Fortsätzen an sich tragen. Der oberste Steisswirbel ist ein im Dickendurchmesser abgeplatteter, gegen die untere Fläche verjüngter Wirbelkörper mit zwei aufwärts gerichteten, kurzen, cylindrischen Zacken, den Steissbeinhörnern, *Cornua coccygea*, welche den Kreuzbeinhörnern in der bereits beschriebenen Weise entgegenkommen. Sie stellen jeder den Hals und oberen Gelenkfortsatz eines Wirbelbogens dar. Jenseits derselben setzen

Fig. 51.



Steissbein, von hinten.

sich die Ränder und Flächen des Körpers in die dreiseitigen Seitentheile fort, deren seitwärts gerichtete Spitze den untersten Rand des Kreuzbeins überragt, deren oberer, leicht vertiefter Rand mit dem unteren Theil des äusseren Randes des Kreuzbeins einen Ausschnitt begrenzt, welcher einem seitlich unvollständig geschlossenen vorderen Kreuzbeinloch entspricht. Die untere Fläche des ersten Steisswirbels (12^{mm} breit) wird abermals seitlich von der oberen Fläche des zweiten überragt, an welchem noch Hörner und Seitentheile wie verkleinerte Nachbildungen der gleichnamigen Theile des ersten Steisswirbels angedeutet sind. Der dritte Steisswirbel ist ein abgeplattetes, keilförmiges Knochenstück, kleiner als der zweite, der vierte von gleicher Form, kleiner, als der dritte, immer jedoch so, dass jeder untere Wirbel mit seiner oberen breiteren Fläche jederseits über die schmale untere Endfläche des nächst oberen hervorsieht. Die untere Endfläche des vierten Steisswirbels ist uneben, abgerundet.

Wirbel-
canal.

Der Canal, welchen die auf einander geschichteten Wirbel umschliessen, macht die Krümmungen der Wirbelsäule mit. Die vordere Wand desselben bilden längs der Säule der wahren Wirbel abwechselnd die hohen Knochenscheiben der Wirbelkörper und die niederen Knorpelscheiben der Zwischenwirbelbänder, längs dem Kreuzbein die knöchern zusammengefügt Körper; die seitliche und hintere Wand bilden die Wirbelbogen und die

¹⁾ Schwanzbein, Kuckuksbein.

zwischen ihnen ausgespannten Bänder; oben setzt sich der Wirbelcanal durch das Hinterhauptsloch in die Schädelhöhle fort; unten endet er zugescharft dadurch, dass sich die Membran, welche die Stelle der Bogen der unteren Wirbel vertritt (Lig. sacrococcygeum), an die hintere Fläche des ersten Steisswirbels befestigt. Zwischen den Bogen der beiden obersten Halswirbel besteht, wie zwischen dem Bogen des obersten Halswirbels und dem Schädel, eine einfache Querspalte; vom unteren Rande des zweiten Halswirbels an bis zum oberen Rande des ersten Kreuzwirbels wird diese Querspalte vermittelst der Gelenkfortsätze in je drei Oeffnungen getheilt, die paarigen Zwischenwirbellöcher jederseits vor den Gelenkfortsätzen und die unpaare Zwischenwirbelspalte (*Fissura intervertebralis* ¹⁾) zwischen den Gelenkfortsätzen. Am Kreuzbein ist die letztere durch Knochenmasse verschlossen; wenn aber, wie das an den unteren Kreuzwirbeln häufig und am ersten Steisswirbel regelmässig der Fall ist, die Bogen unvollständig werden, so fliessen die Zwischenwirbelspalten zu Einer Längsspalte zusammen, und wenn die Cornua sacralia und coccygea einander nicht erreichen, so vereinigen sich auch noch die letzten Zwischenwirbellöcher mit dieser Längsspalte zu einer gemeinsamen Lücke.

Der Wirbelcanal hat in den verschiedenen Gegenden der Wirbelsäule eine verschiedene Gestalt und Weite; er ist enger in den minder beweglichen Regionen, Brust- und Kreuztheil, weiter im Hals- und Bauchtheil. Im Brusttheil ist der Querschnitt desselben fast kreisrund (17^{mm} im Durchmesser); in den Hals- und Bauchwirbeln nimmt besonders die Breite des Canals zu und der Querschnitt wird stumpfwinklig dreiseitig, die stumpfe mehr oder minder abgerundete Spitze nach hinten gerichtet; im Kreuzbein verjüngt sich der Querschnitt des Canals im transversalen und sagittalen Durchmesser rasch zu einer halbmondförmigen, mit der Concavität vorwärts gerichteten Spalte.

Die Zwischenwirbellöcher und die durch dieselben verlaufenden Nerven und Gefässe werden in der Regel nach dem oberen der beiden Wirbel, von welchen sie umschlossen werden, gezählt und benannt; eine Ausnahme machen die Zwischenwirbellöcher am Halse, zu welchen die beiden oberen Fissurae intervertebrales und zwar die Fiss. interv. zwischen Schädel und Atlas als erste eingerechnet werden, so dass hier jede Oeffnung nach dem unterhalb derselben belegenen Wirbel, die Oeffnung zwischen dem siebenten Hals- und ersten Brustwirbel aber als achttes Zwischenwirbelloch des Halses bezeichnet wird. Wegen der besonderen Form der Zwischenwirbellöcher des Kreuzbeines verweise ich auf die Beschreibung dieses Knochens. Das fünfte For. interv. sacrale liegt zwischen dem Kreuz- und Steissbein, ein For. interv. coccygeum unter dem ersten Steisswirbel innerhalb des Lig. sacrococcygeum. Die eigentlichen Zwischenwirbellöcher nehmen von den Hals- zu den Bauchwirbeln continuirlich an Umfang zu; ihre Lage, am Halse über den Querfortsätzen, an Brust und Bauch vor denselben, ist bei der Beschreibung der Wirbel erörtert worden.

Zwischen-
wirbel-
löcher.

Von den Zwischenwirbelspalten sind die beiden obersten breiter und höher, als die übrigen, wegen des Mangels der Gelenkfortsätze und wegen

Zwischen-
wirbel-
spalten.

¹⁾ Foramen intervertebrale posterius. M. J. Weber.

der geringen Höhe des Bogens des Atlas; sie sind zugänglicher, als die folgenden, über welche die bis zum elften Brustwirbel mehr und mehr abwärts geneigten Dornen ragen. An den unteren Halswirbeln (Fig. 25) sind sie noch als niedrige halbmondförmige, mit der Concavität aufwärts gerichtete Lücken sichtbar; an den Brustwirbeln (Fig. 35) sind sie von hinten her vollkommen verdeckt; vom untersten Brustwirbel an (Fig. 26. 34) werden die Zwischenwirbelspalten durch die Aufrichtung der Dornen wieder freier und gewinnen vermöge der Divergenz der unteren Gelenkfortsätze die Form eines aufrechtstehenden Dreiecks mit abwärts convexer Basis.

Zwischen der männlichen und weiblichen Wirbelsäule besteht bezüglich der Dimensionen ein geringerer Unterschied, als man nach der Grössenverschiedenheit beider Geschlechter erwarten würde. Die männliche Wirbelsäule ist durchschnittlich etwa 1 Zoll länger (Krause, Arnold). Die Querfortsätze der Brustwirbel sind beim Weibe etwas mehr rückwärts geneigt, als beim Manne; der Bauchtheil der weiblichen Wirbelsäule ist verhältnissmässig länger; das weibliche Kreuzbein ist breiter und kürzer und liegt geneigter.

Beim Neugeborenen enthält die Mehrzahl der Wirbel drei Knochenstücke, eins im Körper, an beiden Endflächen von Knorpel bedeckt, zwei im Bogen, welche an der Wurzel des Wirbeldorns zusammenstossen. Im Atlas finden sich nur diese beiden Bogenstücke; sein vorderer Bogen ist noch ganz knorpelig, ebenso die drei letzten Steisswirbel und zuweilen alle vier. Der Epistropheus besitzt ausser dem Knochenlenkern des Körpers einen oder zwei dicht zusammenliegende Knochenkerne im Zahn; die drei oberen Kreuzwirbel haben jederseits neben dem vorderen Theil des Bogenstücks je einen besonderen Knochenkern. Der Kern im vorderen Bogen des Atlas entsteht innerhalb des ersten Lebensjahres; die Steisswirbel verknöchern, zuweilen aus zwei Stücken, der Reihe nach von oben nach unten, im siebenten bis zwölften Jahr und zuweilen noch später. Die knöcherne Vereinigung der Bogenstücke unter sich erfolgt im ersten bis dritten Jahr, zuerst an den Brust- und unteren Hals-, dann an den Bauchwirbeln und zuletzt am Atlas. Später als unter sich verschmelzen die Bogentheile mit dem Körper; doch ist auch diese Verschmelzung im sechsten Jahr vollendet. Die Verschmelzung der Knochenkerne der Kreuzwirbel erfolgt früher in den unteren, als in den oberen Wirbeln und die Bogentheile verschmelzen früher mit dem Körper, als unter sich; am obersten Kreuzwirbel etwa im sechsten Jahre.

Unbeständige Knochenkerne kommen hinzu am Tuberculum post. des Atlas und in den vorderen Wurzeln der Querfortsätze der Halswirbel, besonders des siebenten. Um die Zeit der Pubertät finden sich unbeständige kleine Knochenkerne an den Spitzen der Dorn- und Querfortsätze sämmtlicher Wirbel, auch in den Procc. accessorii und mamillares der Bauchwirbel; beständig erhält jeder Wirbelkörper zur Pubertätszeit an der oberen und unteren Fläche eine scheibentörmige Epiphyse, die nach Vollendung des Wachstums mit dem Körper verschmilzt. Am Kreuzbein verknöchern vom achtzehnten Jahre an und von unten herauf auch die Zwischenwirbelknorpel, der zwischen den beiden obersten Kreuzwirbeln im 25sten bis 30sten Jahre.

Um dieselbe Zeit verwachsen gewöhnlich die beiden unteren Steisswirbel mit einander, später auch die höheren unter sich und mit dem Kreuzbein, häufiger bei Männern, als bei Frauen.

2. Brustbein, Sternum.

2. Brust-
bein.


Das Brustbein ist ein platter, im Verhältniss zur Höhe (220^{mm}) schmaler Knochen, der Länge nach (Fig. 17), abgesehen von der unteren Spitze,

schwach nach vorn gewölbt; von einer Seite zur anderen auf der Innenfläche schwach ausgehöhlt, auf der Aussenfläche bald gewölbt, bald und besonders im unteren Theile durch Auftreibung der Seitenränder ebenfalls ausgehöhlt, so dass der Querschnitt einem Meniscus gleicht (Fig. 52). Der obere Rand des Brustbeines liegt in gleicher Höhe mit dem unteren Rande des zweiten Brustwirbels, sein unteres Ende etwa dem zehnten Brustwirbel gegenüber. Das untere Ende entfernt sich weiter von der Wirbelsäule nach vorn, als das obere; die äussere Fläche des Knochens sieht daher nach oben, die innere nach unten. Die Dicke des Brustbeins ist am beträchtlichsten am oberen Rande, von da an abwärts

Fig. 52.

Querschnitt
des Brust-
beins.

Fig. 53.



Brustbein, von vorn.

bis zur Anheftung der letzten Rippe ziemlich gleich, und nimmt unter dieser Stelle schnell bis zu völliger Zuschärfung der unteren Spitze ab. Der obere Rand (Fig. 53) ist drei Mal halbmondförmig ausgeschnitten: der mittlere halbmondförmige Ausschnitt, *Incisura semilunaris*, lässt sich frei unter der Haut fühlen, die beiden seitlichen und zur Seite geneigten Ausschnitte, Schlüsselbeinausschnitte, *Incisurae claviculares*, sind überknorpelt und articuliren mit den vorderen Enden der Schlüsselbeine. Sie nehmen in der Regel einen längeren Theil des Brustbeinrandes ein, als der halbmondförmige Ausschnitt. An dem Seitenrande des Brustbeins sind die sieben wahren Rippen, die oberste durch Synchondrose, die folgenden durch Gelenke befestigt. Die Fläche zur Aufnahme der obersten Rippe, *Incisura cost. 1*, schliesst sich, schräg aufwärts geneigt, unmittelbar an den äusseren Rand des Schlüsselbeinausschnitts an; die Gelenkflächen für die zweite bis sechste Rippe, ebenfalls halbmondförmige überknorpelte

Ausschnitte, aber immer kleiner und flacher, je weiter abwärts sie liegen, wechseln mit scharfen, eingebogenen freien Stellen des Seitenrandes, welche zwischen den oberen Gelenkflächen ungefähr ebenso hoch sind, als diese, zwischen den Gelenkflächen der unteren Rippen aber niedriger werden, so dass diese Gelenkflächen einander näher rücken, bis zuletzt die Gelenkfläche der siebenten Rippe die der sechsten fast berührt oder wirklich mit derselben zusammenfliesst. Von den Synchondrosen, welche ursprünglich das Brustbein, der Zahl der Rippen entsprechend, quer abtheilen, erhalten sich im Erwachsenen zwei, die obere zwischen den Gelenkflächen der zweiten Rippen und zwar von der Mitte der einen zur Mitte der anderen, die untere ebenso zwischen den Gelenkflächen der siebenten Rippen. Das Brustbein zerfällt dadurch in drei ungleich lange Stücke, den Griff, *Manubrium*, den Körper, *Corpus*, und den Schwertfortsatz, *Processus ensiformis*¹⁾. Am Griff findet sich nebst den Schlüsselbeinausschnitten die

¹⁾ *Pr. xiphoideus. Cartilago ensij. s. xiphoidea.*

Grube zur Anheftung der ersten Rippe und die halbe Gelenkfläche für die zweite, am Körper ist die untere Hälfte der zweiten Rippe, die dritte bis sechste ganz und die siebente zur Hälfte eingelenkt; der Schwertfortsatz trägt am oberen Theil des Seitenrandes die untere Hälfte der Gelenkfläche der siebenten Rippe. Er bildet die kurz abgerundete oder spitz ausgezogene oder in zwei ungleiche Zacken getheilte, bald aus- bald einwärts gebogene freie untere Spitze des ganzen Knochens und ist häufiger und schon in früherem Alter mit dem Körper knöchern verwachsen, als der Griff, erhält sich aber, besonders im unteren Theile, lange und oft bis in das hohe Alter knorpelig.

An beiden Nähten ist das Brustbein schmäler, als ober- und unterhalb derselben; die Seitenränder des Griffes convergiren also nach unten und der Griff im Ganzen hat die Gestalt eines Dreiecks mit nach unten gewandter quer abgestutzter Spitze; genauer genommen müsste man ihn einem von mehr oder minder einwärts gebogenen Seiten begrenzten Zehneck vergleichen. Der Körper ist langgestreckt eiförmig, mit gezackten Seitenrändern, quer abgestutzter oberer und unterer Spitze, die grösste Breite (46^{mm}) nahe der unteren Spitze, in der Gegend der Insertion der fünften Rippe. Die Breite nimmt hier, und zwar auf Kosten der Länge des Brustbeines, so zu, dass der Theil des Randes, welcher die Gelenkflächen für die sechste und siebente Rippe trägt, fast abwärts gerichtet ist und die Insertionen dieser Rippe neben die Naht des Körpers und Schwertfortsatzes zu liegen kommen. Der Schwertfortsatz hat die grösste Breite bald näher dem oberen, bald dem unteren Rande.

Die Flächen des Brustbeines sind beide von vielen feinen Furchen und kleinen Löchern rauh; oft finden sich Querwülste nicht bloss an der Stelle der Nähte, sondern auch auf dem Körper zwischen je zwei einander gegenübergelegenen Rippengelenkflächen. Statt continuirlich gewölbt, ist das Brustbein zuweilen an dem einen oder anderen jener Querwülste unter einem stumpfen Winkel geknickt.

Die Verbindung des Handgriffes mit dem Körper des Brustbeines geschieht in der Regel durch Knorpel, selten durch Fasergewebe, noch seltener durch ein, von einer Synovialkapsel ausgekleidetes Gelenk (beschrieben von Maisonneuve, *Arch. gén.* 1842. *Juill.* p. 253). Der Brustbeinkörper behält zuweilen mehrere Nähte. Die Nähte können unregelmässig, einzelne Stücke auch der Länge nach getheilt sein; solche Nähte hinterlassen zuweilen nach der Verknöcherung Längsspalten oder (häufiger) rundliche Löcher, durch welche Gefässe der Aussen- und Innenfläche des Thorax mit einander in Verbindung stehen. Aehnliche Löcher kommen am Schwertfortsatz vor. An einem Brustbein der hiesigen Sammlung ist der Schwertfortsatz ein schmaler und dünner kreisrunder Knorpelring. Die Gelenkflächen der beiden untersten Rippen nähern sich nicht selten einander dergestalt, dass sie den Schwertfortsatz vom Körper des Brustbeines abdrängen, der dann mit seiner oberen Spitze an die unteren Ränder der Rippenknorpel anstösst.

Unter dem Namen *Ossa suprasternalia* beschrieb zuerst Breschet (*Ann. des sc. nat.* 2e sér. T. X. p. 91. Tab. VIII.) zwei an dem oberen Rand des Brustbeins durch Synchondrose befestigte Knöchelchen. Nach Luschka (*Zeitschr. für wissenschaftl. Zool.* Bd. IV. S. 36. Taf. II.) liegen sie, in Gestalt dem Erbsenbein der Handwurzel ähnlich, auf dem oberen halbmondförmigen Ausschnitt des Brustbeingriffs, näher dem hinteren als dem vorderen Rande, an der inneren Seite des Sterno-Claviculargelenkes. Der Theil des Brustbeins, auf welchem die Knöchelchen mit planer Fläche ruhen, pflegt über das Niveau der Nachbarschaft erhoben zu sein

und es können solche Erhebungen am hinteren Rande des oberen Brustbeinausschnittes als Merkmale benutzt werden, dass die Ossa suprasternalia vorhanden waren. Zwei starke Bänder, ein vorderes und ein hinteres, befestigen die Suprasternalknochen am Brustbein. Der Zwischengelenkknorpel des Sternoclaviculargelenkes steht durch eine feste Bandmasse mit dem äusseren Umfang derselben in Verbindung. Das Lig. interclaviculare geht, durch ein straffes Bindegewebe von ihnen geschieden, über sie hinweg. Die Anwesenheit der Ossa suprasternalia gehört zu den seltenen Varietäten. Analoge, regelmässige Bildungen fand Luschka bei verschiedenen Arten von Dasypus.

Der Körper des Brustbeines hat beim Manne mindestens die doppelte Länge des Griffes; beim Weibe übertrifft der Griff an Länge die Hälfte des Körpers (Hyrtl, top. Anat. Bd. I. S. 348).

Der Griff des Brustbeines enthält beim Neugeborenen meist einen Knochenkern. Die Zahl der Knochenkerne im Körper ist verschieden und vermehrt sich noch innerhalb des ersten Jahres; sie liegen in der Regel in einfacher Längsreihe, und die Nähte zwischen denselben verlaufen zwischen je zwei einander gegenüberliegenden Gelenkflächen; häufig ist das eine oder andere dieser Stücke durch eine Längsnaht getheilt. Zuweilen verschieben sich diese Stücke unregelmässig gegeneinander (Breschet, a. a. O. pl. VIII. Fig. 2. Otto, *Comment. de rarioribus quibusdam sceleti humani cum animalium sceleto analogiis*. Wratisl. 1839. p. 19. Taf. II. M. J. Weber, *Commentatio anatomico-physiol.* Bonn. 1848. Fig. 3 und 4., Baumgärtner, *Physiol. Atlas*. Taf. XXXIX. Fig. 5.). Im oberen Theil des Schwertfortsatzes erscheinen die Ossificationspunkte (einer oder mehrere) selten vor dem vierten Jahr, oft viel später oder gar nicht. Die Knochenkerne vereinigen sich, zuerst die paarigen mit ihren verticalen Rändern, dann die einfach gewordenen mit ihren horizontalen Rändern und zwar von unten aufwärts; die letzte Quernaht des Körpers verschwindet erst gegen das 20ste bis 25ste Jahr. Im höheren Alter können Körper und Schwertfortsatz, seltener noch Körper und Griff mit einander knöchern verwachsen. Die Verwachsung der letzteren kann äusserlich vollendet scheinen, indess unter einer dünnen Knochenrinde die Synchronrose sich erhält.

3. Rippen, *Costae*.


Wir haben die Rippen eingetheilt in wahre (I — VII) und falsche 3. Rippen. (VIII — XII). Die falschen lassen sich weiter in zwei Abtheilungen scheiden: die oberen (VIII — X) hängen noch dadurch, dass sie sich jede an den unteren Rand der nächst oberen Rippe anlegen, mit dem Brustbein mittelbar zusammen, während die untersten (XI und XII) mit ihren vorderen Spitzen frei enden und deshalb freie Rippen genannt werden mögen.

Im ausgebildeten Zustande besteht jede Rippe aus zwei Stücken, welche durch die Textur und einigermaassen auch durch die Richtung verschieden und gegen einander abgegrenzt sind. Der hintere und grössere Theil jeder Rippe nämlich ist knöchern; der vordere knorpelig; der knorpelige Theil der Rippe heisst Rippenknorpel, *Cartilago costalis*, wir müssen den knöchernen Theil, wenn von ihm allein die Rede sein soll, mit dem Namen Rippenknochen, *Os costale*, bezeichnen. Beide ergänzen sich, abgesehen von der ersten und den beiden untersten Rippen, zu einem mit der Concavität aufwärts gekehrten Bogen, welcher an jeder folgenden Rippe steiler, ja an den unteren oftmals einer gebrochenen Linie ähnlich wird.

Der Gipfel dieses Bogens fällt an den oberen Rippen ziemlich genau mit der Grenze des knöchernen und knorpeligen Theils zusammen, an den tieferen Rippen, von der fünften an, fällt er in den knorpeligen Theil, so dass also der abwärts laufende Schenkel des Bogens von dem Knochen und einem Theil des Knorpels, der aufwärts laufende Schenkel aber nur vom Knorpel gebildet wird (Fig. 54). Der Knorpel der ersten Rippe gehört ebensowohl dem Brustbein, als der Rippe an und kann als ein in die Länge gezogener Nahtknorpel betrachtet werden. Für die übrigen Rippenknorpel gilt dies nicht, weil sie nur dem Rippenknochen mit der ganzen Berührungsfläche adhären, mit dem Brustbein aber und die tieferen mit einander durch eigentliche Gelenke in Verbindung stehen.


Die Rippenknochen nehmen von dem ersten bis achten an Länge zu, von da an wieder ab. Die Höhe schwankt an verschiedenen Stellen einer Rippe um ebenso viel (zwischen 10 und 18^{mm}), als an den verschiedenen

Fig. 54.



Brustkorb, von vorn.

Fig. 55.




Frontaldurchschnitt des Brustkorbs.

Rippen einer Seite, doch ist im Allgemeinen die erste am höchsten, die zwölfte in jeder Dimension schwächlicher als die übrigen und die sechste bis zehnte höher, als die nächst oberen.

Jeder Rippenknochen ist in dreifachem Sinn gekrümmt, nach der Fläche, nach der Kante und um seine Längsaxe; doch herrscht bei den verschiedenen Rippen derselben Seite bald die eine, bald die andere dieser Krümmungen vor. Dieselben werden verständlicher werden, wenn wir zuvor einen Blick auf die Gestaltung des Brustkorbes im Ganzen werfen und die Rippen im Zusammenhange als Theile einer continuirlichen Wand betrachten, welche nur durch streifenweis abwechselnde Entwicklung von Knochen- und Muskelsubstanz in Rippen und in die Muskeln zerfallen erscheint, welche die Räume zwischen den Rippen, die Intercostalräume, ausfüllen.

Der Brustkorb gleicht in seinem unteren Theil äusserlich einem in der Richtung von vorn nach hinten abgeplatteten Cylinder; nach oben wölbt er sich kuppelförmig zu, doch behält auch hierbei und bis an den oberen Rand die Vorderfläche ihre abgeplattete Form bei und wenn die Ränder eines Frontalschnittes (Fig. 55) symmetrische Curven beschreiben, so stellt sich auf dem Medianschnitt (Fig. 16) und dem oberen Theil des sagittalen Durchschnitts (Fig. 56) der vordere Rand kaum gewölbt, dagegen stark


Fig. 56 ¹⁾.

Sagittaler Durchschnitt des Brustkorbes, 3 Z. seitwärts vom Sternoclaviculargelenk.
Cc Cartilago costalis.

¹⁾ Nach Pirogoff, *Anatome topographica Fasc. 2 A. Taf. II. Fig. 1.*

rückwärts geneigt dar. Die Stelle der eigentlichen Kuppel oder einer oberen Endfläche des Brustkorbes vertritt eine Oeffnung, welche hinten vom unteren Rand des ersten Brustwirbelkörpers, vorn vom Brustbeingriff und jederseits von der ersten Rippe begrenzt und durch die Eingeweide und Gefäße ausgefüllt wird, die vom Hals zur Brusthöhle und umgekehrt verlaufen. Die von den besagten Rändern (Fig. 57) umschlossene imaginäre Ebene ist fast in gleicher Flucht mit dem Brustbein gegen den Horizont

Fig. 57.



Profilansicht des Brustkorbes.


geneigt; sie hat die Form eines breitgezogenen Kartenherzens mit nach unten und vorn gerichteter, transversal abgestutzter Spitze (Fig. 54). Die der Spitze gegenüber gelegene Einbiegung des hinteren (oberen) Randes ist breit und seicht; sie rührt von dem Vorsprung des Wirbelkörpers her.

Weiter abwärts, wie sich die Brusthöhle nach vorn und den Seiten und vermöge der Krümmung der Brustwirbelsäule anfänglich selbst nach hinten erweitert, bildet sich zu jeder Seite der Wirbelsäule eine tiefe Rinne oder, mit anderen Worten, läuft die Seitenwand der Brust zuerst rückwärts, bevor sie sich im Bogen wieder nach vorn und endlich medianwärts wendet. Ein Horizontal-


taldurchschnitt der Brusthöhle (Fig. 58. 59) stellt deshalb eine bohnen- oder nierenförmige Fläche dar, deren Einbiegung dem Vorsprung der Wirbelkörper entspricht, wegen der Ausbeugung der Wirbelsäule aber oft von der Symmetrie merklich abweicht¹⁾. Die tiefe Furche, welche jederseits

¹⁾ Zahlreiche Horizontaldurchschnitte des Brustkastens nebst Angaben ihrer Maasse finden sich bei Hutchinson, Von der Capacität der Lungen und von den Athmungsfunktionen. Aus dem Englischen von Samosch. Braunschweig 1849. S. 42 ff.

neben dem Vorsprung der Wirbelsäule herabläuft, heisst Lungenfurche, *Sulcus pulmonalis*.

Fig. 58 ¹⁾.

Horizontalschnitt durch die Mitte des vierten Brustwirbels. Vt 5 die oberen Gelenkfortsätze des 5ten Brustw. Cc 2 Knorpel der 2ten Rippe.

Fig. 59 ²⁾.

Horizontalschnitt durch den siebenten Brustwirbel, nahe dem unteren Rande. Vt 8 die oberen Gelenkfortsätze des achten Brustwirbels.

Die untere Grenze des Brustkorbes zieht sich von dem zwölften Brustwirbel jederseits längs dem unteren Rande der letzten freien Rippe hin, springt von der Spitze dieser Rippe aufwärts auf den unteren Rand und die Spitze der elften Rippe, von dieser auf die zehnte Rippe über und steigt

¹⁾ Nach Pirogoff, Taf. III. Fig. 3.

²⁾ Nach Pirogoff, Taf. VIII. Fig. 3.

dann continuirlich in einer steilen und nach unten schwach convexen Linie zur Naht des Brustbeinkörpers mit dem Schwertfortsatze auf, um längs dem Seitenrande des letzteren wieder bis zur Spitze desselben abwärts zu verlaufen.

Die eigentliche Grenze der Brusthöhle geht übrigens, wenn man dieselbe nach dem Ursprung des Zwerchfelles bestimmt, quer über den oberen Theil der hinteren Fläche des Schwertfortsatzes. Der grössere Theil dieses Knorpels und insbesondere seine Spitze ist zwischen den Muskelschichten der Bauchwand eingeschlossen.

Die von der Spitze zur Basis zunehmende Erweiterung des Brustkorbes bedingt, dass die wahren Rippen von der ersten an, wie erwähnt, länger werden, und mit der eigenthümlichen Form jener Erweiterung hängt es zusammen, dass die Längenzunahme von der ersten bis zur dritten Rippe auffallender ist als an den folgenden. Die seitliche Wölbung des Brustkorbes spricht sich in den meisten Rippen und insbesondere in allen denjenigen, welche den unteren, mehr gleichförmig cylindrischen Theil der Brust umgeben, als Flächenkrümmung aus; der hintere Theil der Krümmung, mittelst welcher die Rippe zur Bildung der Lungenfurche beiträgt, gehört einem kleineren Halbmesser an, als der vordere. In der ersten Rippe aber und in dem hinteren Theil der zweiten, die in dem oberen kuppelförmigen Theile des Brustkorbes liegen und demgemäss die innere Fläche abwärts, die äussere aufwärts kehren, sind es die Kanten, deren Krümmung der Curve des Querschnittes des Brustkorbes entspricht, während die Flächen plan oder nur in der Richtung vom oberen zum unteren Rand so viel ausgehöhlt sind, als es die vom Frontalschnitt der Brustwand gebildete Curve verlangt. Krümmungen um die eigene Axe oder Torsionskrümmungen kommen, je nach der Stelle, welche die Rippe einnimmt, in verschiedenen Graden und in dreierlei Formen vor. An der ersten und zweiten Rippe ist eine Torsion in der Art bemerklich, dass, da die Brust vorn steiler abfällt als an den Seiten, die Flächen, welche am hinteren Theile der Brust je nach oben und unten gerichtet sind, am vorderen Theile derselben sich allmählig schief je nach vorn und hinten wenden. Eine Torsion entgegengesetzter Art findet an den folgenden Rippen bis zur siebenten oder achten Statt: die Flächen, welche im hinteren und Seitentheile der Brust vertical stehen, legen sich, wie die Rippe an die Vorderseite des Thorax gelangt, in Uebereinstimmung mit der geneigten Lage des Brustbeins schräg mit dem oberen Rande nach hinten. Eine dritte Art von Torsionskrümmung findet sich in den untersten Rippen, deren Flächen im hinteren Theile der Brustwand, die innere nach oben, die äussere nach unten geneigt sind und sich im Verlauf nach vorn allmählig vertical richten.

Die erste Rippe liegt mit den Flächen, die zweite theils mit den Flächen, theils mit den Kanten, die folgenden Rippen liegen mit den Kanten in schiefen Ebenen, welche im Allgemeinen der schiefen Ebene der oberen Apertur des Brustkorbes parallel, jedoch an jeder folgenden Rippe etwas mehr abwärts geneigt sind; daher die Zwischenrippenräume von hinten nach vorn an Höhe gewinnen und eine senkrechte Linie, welche von der vorderen Spitze der ersten Rippe zu einer durch die Spitzen der zwölften Rippen gelegten Horizontalebene gefällt wird, reichlich um 2 Zoll länger ist, als der verticale Abstand der hinteren Enden der ersten und zwölften

Rippe. Diese Abwärtsneigung und Divergenz der Rippen beruht auf mehreren Ursachen: erstens sind schon die Wirbelkörper, an welchen die oberen Rippen angeheftet sind, mit den Vorderflächen nach unten gerichtet; der an dem Wirbel befestigte Theil der Rippe braucht aber nur eine geringe Drehung mit der Vorderfläche abwärts zu machen, so verräth sich dies durch eine ansehnliche Senkung der vorderen Spitze. Zweitens liegt, zumal an den unteren Wirbeln, die Querfortsatzpfanne tiefer als die entsprechende Rippenpfanne; der Rippe wird dadurch von Anfang an mit der Richtung seitwärts auch die Richtung der Spitze nach abwärts mitgetheilt. Drittens hat bei allen Rippen mit vertical gestellten Flächen, also bei der dritten bis zwölften, auf die Lage der vorderen Spitze eine Krümmung der Kanten Einfluss. Die Kanten sind an der dritten und vierten Rippe seicht nach oben concav, an den folgenden bis zur zehnten immer zunehmend und dann wieder abnehmend gegen das Vorderende der Rippe abwärts gebogen.

Man erkennt und vergleicht diese Krümmungen am besten, wenn man die Rippen neben einander, den oberen Rand gegen die Unterlage gewandt, auf eine plane Fläche legt: die dritte und vierte Rippe berühren die Ebene mit den beiden Enden, während der mittlere Theil des Randes sich wenig von derselben erhebt; ihr Rand beschreibt also, abgesehen von der Flächenkrümmung, einen nach oben seicht concaven Bogen und steigt fast um ebenso viel, als er am Wirbelende abwärts läuft, am vorderen Ende wieder gegen das Brustbein auf. Von der fünften Rippe an erheben alle, wenn man sie mit dem hinteren Theile des oberen Randes fest auflegt, den vorderen Theil dieses Randes von der Unterlage. Die fünfte verlässt die Unterlage erst in der Nähe der Spitze, die sechste schon von der Hälfte ihrer Länge an und jede folgende bis zur zehnten um etwas früher, und so erhebt sich auch die vordere Spitze um so höher, je früher der Rand die Horizontalebene verlässt. Von der zehnten bis zur letzten Rippe nimmt diese Krümmung wieder ab.

Die Abstände der Rippen von einander müssen wegen der von oben nach unten zunehmenden Höhe der Brustwirbel von oben nach unten um so gewisser an Höhe zunehmen, als auch die Rippenpfanne selbst an den Wirbelkörpern allmählig abwärts rückt. Eine Ausnahme findet an den drei ersten Rippen Statt, zwischen welchen die Abstände seitlich und vorn dadurch erweitert werden, dass je die untere Rippe auch lateralwärts abrückt. Ist jene Vergrößerung der Abstände nicht durchgängig an den Intercostalräumen zu erkennen, so ist dies durch Schwankungen theils der Krümmung, theils der Breite der Rippen veranlasst. Das Auseinanderweichen der Spitzen der Rippen kommt aber jedenfalls mehr auf Rechnung der eben beschriebenen Krümmungen, als des Auseinanderrückens ihrer hinteren Anheftungen.


Eine Linie, welche die vorderen Spitzen sämtlicher Rippenknochen verbindet, zieht sich vom ersten zum zweiten medianwärts; sie weicht von dem zweiten zum zehnten ebenso stätig, als allmählig lateralwärts und bis zum siebenten zugleich vor-, von da an aber rückwärts, endlich von der Spitze des zehnten zur Spitze des zwölften Rippenknochens rasch zugleich rück- und medianwärts.

Die Knorpel der wahren Rippen (Fig. 54) müssen, um an dem verhältnissmässig kurzen Seitenrand des Brustbeines ihre Anheftung zu finden, bedeutend gegen das letztere convergiren. Von der ersten Rippe an geht der Knorpel

abwärts, von der zweiten fast horizontal, von der dritten zur siebenten immer steiler aufwärts, wobei der Knorpel jeder Rippe gegen den vorhergehenden an Länge zunimmt und jeder vom Ursprung am Rippenknochen zur Insertion am Brustbeine hin sich verschmälert. Durchgängig sind die Rippenknorpel platt, mit schwach gewölbten Flächen, von welchen die eine nach vorn, die andere nach hinten sieht, und mit abgerundetem oberen und unteren Rande. An der sechsten und zuweilen schon an der fünften Rippe geht nahe an der Verbindungsnaht des Knorpels mit dem Knochen vom unteren Rande des ersteren ein kurzer, anfangs breiter und nach unten sich verschmälender Vorsprung abwärts, welchem vom oberen Rande des folgenden Rippenknorpels ein ähnlich gestalteter, nur noch niedrigerer Vorsprung entgegenkommt. Die elliptischen Endflächen, womit diese beiden Vorsprünge einander berühren, sind an dem abwärts verlaufenden convex, an dem aufwärts verlaufenden concav und durch eine fibröse Kapsel zu einem Gelenk verbunden. Dies Gelenk kann Rippenknorpelgelenk, *Articulatio cartilaginum costalium*, die Fortsätze, welche die Gelenkflächen tragen, können oberer und unterer Gelenkfortsatz, *Processus articularis sup. et inf.*, des Rippenknorpels genannt werden. Gelenke derselben Art auf ähnlichen Vorsprüngen finden sich, immer mehr nach den Seiten zurückweichend, zwischen den Knorpeln der siebenten und achten, der achten und neunten Rippe; jenseits der Gelenkverbindung gegen das Brustbein hin laufen der achte und neunte Rippenknorpel jeder in eine feine Spitze aus, die etwa zur Mitte der Länge des nächst oberen Rippenknorpels reicht und nur durch straffes Bindegewebe an denselben befestigt ist. Der Knorpel der zehnten Rippe legt sich mit einer ähnlichen Spitze, ohne Articulation, an den neunten Rippenknorpel an. Die Knorpel der freien Rippen sind kurz, ebenfalls zugespitzt und in gleicher Flucht mit den Rippenknochen gelegen.

An jeder Rippe unterscheidet man von dem Mittelstück oder Körper, *Corpus*, das hintere oder Wirbel-Ende, *Extremitas posterior* und das vordere Ende oder die Spitze, *Extremitas anterior*.

Fig. 60.



Vierte Rippe von vorn.

Fig. 61.



Dieselbe von hinten.

Das hintere Ende reicht von dem Köpfchen, welches an den Wirbelkörper anstösst, bis zum Höcker, der an den Querfortsatz befestigt ist. Es ist von cylindrischer oder prismatischer Gestalt, hat an den zehn oberen Rippen fast die gleiche, der Länge des Wirbelquerfortsatzes entsprechende Länge und wird erst an den beiden freien Rippen kürzer. Köpfchen, *Capitulum*, heisst der äusserste, etwas angeschwollene Theil (Fig. 60), welcher die senkrecht abgestutzte und überknorpelte, an der zweiten bis zehnten Rippe von


recht abgestutzte und überknorpelte, an der zweiten bis zehnten Rippe von

einer Querleiste, der *Crista capituli*, durchzogene Endfläche trägt. Diese Endfläche articulirt in der Rippenpfanne und wird durch die Querleiste in zwei Felder, ein oberes, aufwärts geneigtes, und ein unteres, abwärts geneigtes, geschieden, welche den beiden, zu einer Rippenpfanne zusammen tretenden Gelenkflächen je zweier Wirbel entsprechen. Der Höcker, *Tuberculum*, ist an der ersten und zweiten Rippe ein vorspringender Winkel des hinteren Randes, an den übrigen Rippen eine platte Hervorragung der hinteren Fläche oder, an den mittleren Rippen, des unteren Theils der hinteren Fläche. Er besteht an den zehn oberen Rippen aus zwei durch eine ab- und seitwärts laufende Furche getrennten Erhabenheiten (Fig. 61). Die den Köpfchen näher und nach unten gelegene, den unteren Rand der Rippe überragende Erhabenheit trägt eine rundliche, bei der natürlichen Lage der Rippe schräg aufwärts gerichtete, schwach gewölbte Gelenkfläche von etwas geringerem Umfange als die Querfortsatzpfanne des Wirbels, an welchem sie eingelenkt ist. Die andere, seitlich und oben gelegene und besonders an den fünf bis sechs oberen Rippen stark ausgeprägte Erhabenheit, *Tub. s. s.*, ist kegelförmig oder abgeplattet, bald glatt, bald rauh und ragt neben der Spitze des Querfortsatzes, mehr oder minder genau an diese sich anschliessend, nach hinten (vergl. S. 40. Fig. 39). An der elften und zwölften und zuweilen schon an der zehnten Rippe ist der Höcker eine niedere Rauhhigkeit oder auch nur eine schiefe Leiste, dem Köpfchen näher gerückt.

Der zwischen Köpfchen und Höcker befindliche Theil des Wirbel-Endes der Rippe ist der Rippenhals, *Collum costae*. Er ist an der ersten Rippe in demselben Sinne, wie der Körper dieser Rippe abgeplattet, mit rauhem hinteren Rande; indem an der zweiten Rippe dieser rauhe hintere Rand höher wird, erhält der Hals derselben eine dreiseitig prismatische Gestalt. Der Sagittalschnitt zeigt ein mit der Spitze nach vorn gerichtetes, spitzwinkliges Dreieck. Einem dreiseitigen Prisma ähnlich ist der Hals auch an den folgenden Rippen, nur dass die längeren Seiten nach vorn und hinten schauen und, auf dem Sagittalschnitt, die Spitze des Dreiecks nach oben gerichtet ist. Häufig erhebt sich, besonders an den mittleren Rippen, der obere Rand des Halses und des anstossenden Theiles des Körpers zu einem breiten, platten, nach oben convexen Kamme, *Crista colli sup.*, welcher zur seitlichen Begrenzung des Zwischenwirbelloches beiträgt und den aus dieser Oeffnung austretenden Theilen eine Art Rück-

lehne bietet. Dadurch, dass die Vorderfläche des Kammes gegen die des Rippenhalses mehr oder minder rasch zurückweicht, bildet sich am oberen Rippenrande eine seichte Furche, *Sulcus costalis sup.*, welche sich jenseits des Höckers bald in den oberen Rand des Rippenkörpers verliert. Im Uebrigen ist die vordere Fläche des Rippenhalses glatt, die hintere rauh und um so tiefer von oben nach unten ausgehöhlt, je mehr der Kamm des Halses entwickelt ist. Die untere Fläche des Halses ist eine, besonders am vorderen Rande scharfkantige Hohlkehle, welche sich an dem Körper geradezu fortsetzt, aber dadurch als Furche, *Sulcus cost. inf.*, auf die Vorderfläche des Körpers gelangt, dass sich der hintere Rand der Hohlkehle


Fig. 62.



Verticaler Durch-
schnitt einer rechten
Rippe, A. des Halses,
B. des Körpers.


ähnlich wie der obere Rand des Rippenhalses, in einen glatten, aber nach unten convexen Kamm verlängert (*Crista colli inf.*), der sich erst gegen das vordere Drittel des Rippenkörpers in den unteren Rand verliert (Fig. 63). Dieser Kamm ist Ursache, dass die Rippe in ihrem mittleren

Fig. 63.



Verticaler Durchschnitt einer rechten Rippe, A. des Halses, B. des Körpers.

Fig. 64.



Querschnitt der vierten Rippe.


Theile höher erscheint, als in der Nähe des vorderen und hinteren Endes; der Gipfel seiner nach unten gerichteten Convexität, der oft statt eines Bogens einen stumpfen Winkel darstellt oder selbst in ein Knötchen ausgezogen ist, rückt an jeder Rippe, von der zweiten an, allmähig weiter seitwärts; an ihm endet eine über die hintere Fläche der Rippe schräg ab- und seitwärts laufende rauhe Linie, welche, aber nur auf der Aussenfläche der Rippe, die bogenförmige Krümmung derselben in der Art unterbricht, dass der hintere Theil gegen den seitlichen durch einen stumpfen Winkel, *Angulus costae*, abgesetzt erscheint (Fig. 64). Die Reihe der Rippenwinkel (Fig. 65) bildet die seitliche Begrenzung einer Längs-Furche, welche in der Medianebene durch die Wirbeldornen geschlossen wird und zur Aufnahme der Streckmuskeln des Rückgrates dient.

Der Winkel fehlt an der ersten und zweiten Rippe oder fällt, wie man sich ausdrückt, mit dem Höcker zusammen. An der ersten Rippe (Fig. 66) findet sich dagegen meistens ein eigenthümliches Höckerchen, am oberen Rande unweit der vorderen Spitze, *Tuberc. scaleni*, welches das seitliche Ende der Insertion des M. scalenus ant. bezeichnet, und dahinter eine geglättete und etwas vertiefte Stelle, *Sulcus subclaviae*, auf welcher, bei ihrem Austritt aus dem Brustkorbe, die Art. subclavia ruht. Die zweite Rippe (Fig. 67) ist ausgezeichnet durch eine vom Höcker aus über den nach oben gekehrten hinteren Theil der äusseren Fläche sich erstreckende, den Rändern parallel verlaufende scharfe Linie, welche diese Fläche in eine lateral- und eine medianwärts gewandte Abdachung scheidet und etwa in der Mitte der Länge der Rippe sich gegen eine ansehnliche Rauigkeit (für den Ursprung des M. serratus ant.) am unteren Rande dieser Rippe hinzieht.

Am vorderen Ende sind die meisten Rippen sowohl im senkrechten, als im Dickendurchmesser etwas aufgetrieben, was um so mehr auffällt, wenn sie, wie dies häufig der Fall ist, eine kurze Strecke vor dem Ende eingeschnürt erscheinen. Die Endfläche, die den Rippenknorpel aufnimmt


ist rauh, vertieft, elliptisch, nähert sich aber an der zweiten und an den untersten Rippen zuweilen mehr der Kreisform.

Fig. 65.




Brustkorb von hinten.

Fig. 66.



Erste Rippe von oben.

Fig. 67.



Zweite Rippe von oben.

Von der Vermehrung der Zahl der Brustwirbel und Rippen, die auf Kosten der nächsten Hals- und Bauchwirbel dadurch erfolgt, dass der sonst mit dem Wirbel verschmolzene Querfortsatz als ein selbstständiger Knochen erscheint, war schon bei der Beschreibung der Wirbelsäule die Rede. Ueberzählige Rippen dieser Art kommen nach Gruber (*Neue Anomalien*. Berl. 1849. S. 7) bei Individuen zwischen 10 und 16 Jahren in jedem dritten bis vierten Falle vor, häufiger unten als oben. Selten trägt ausser dem ersten auch der zweite Bauchwirbel statt des Querfortsatzes eine falsche Rippe. Einmal (Cruveilhier) war der Querfortsatz des ersten Bauchwirbels normal und die Querfortsätze des zweiten bis vierten Bauchwirbels waren Rippen ähnlich. Die Varietät findet sich häufiger symmetrisch, als einseitig. Trägt der siebente Halswirbel die überzählige Rippe, so endet dieselbe entweder frei oder sie articulirt mit der ersten Brustrippe (Meckel's Archiv. Bd. I. S. 642. Taf. VI. Fig. 36. Knox, *Lond. med. gaz* 1843. Novbr. p. 136) oder hängt durch Knorpel oder Band mit dem Brustbein zusammen (Sömmerring). Selten ist eine wirkliche Vermehrung der rippentragenden Wirbel, noch seltener eine Verminderung auf

elf. Einmal sah Gruber eine überzählige freie Rippe auf Einer Seite am unteren Rande der Spitze des Querfortsatzes des zweiten Brustwirbels eingelenkt.

Eine Articulation je zweier Rippen an ihrem hinteren Ende findet sich an einem Präparat unserer Sammlung. Vom vorderen Rande des Halses geht, dem Höcker gegenüber, von der fünften Rippe schräg abwärts ein platter Fortsatz, 4 Linien breit, am freien Rande verdickt und quer abgestutzt. Derselbe articulirt in einem Kapselgelenk mit einem ähnlich gestalteten, von der sechsten Rippe vor- und aufwärts entgegenkommenden Fortsatz. Eine unvollkommen gebildete erste Rippe, die nur im hinteren Theil knöchern, im vorderen grösseren Theile ligamentös ist, beschreibt Struthers (*Monthly Journ.* 1853. Oct. S. 292). Oft ist die zwölfte Rippe ungewöhnlich klein.

Der Knorpel der ersten Rippe kann mit dem Brustbeingriff mittelst einer Kapselmembran articuliren (Gruber); der Knorpel der achten Rippe kann das Brustbein erreichen. Das vordere Ende des Rippenknochen ist zuweilen gabelförmig getheilt und geht in zwei Knorpel über, die sich entweder wieder vereinigen oder gesondert ans Brustbein befestigen. Umgekehrt setzen sich mitunter zwei Rippen mittelst eines gemeinschaftlichen Knorpels ans Brustbein.


Am weiblichen Thorax ist die Flächenkrümmung des hinteren Theils der Rippe stärker, dagegen die Kantenkrümmung (nach unten) schwächer, als beim Mann; die erste und zweite Rippe sind absolut länger (Meckel).

Zur Pubertätszeit entstehen an Köpfchen und Höcker der Rippe besondere Knochenkerne, welche bald mit dem Körper verschmelzen. Die Epiphysen der Höcker fehlen den zwei unteren Rippen. Im höheren Alter verknöchern häufig die Rippenknorpel, zuerst an der Oberfläche und vom Brustbeinende aus.

4. Zungenbein, *Os hyoides*.

4. Zungen-
bein.

Das Zungenbein (Fig. 68. 69) liegt, bei rückwärts gebeugtem Kopf leicht durch die Haut fühlbar, an der Grenze zwischen der verticalen Vorderwand des Halses und dem horizontalen Boden der Mundhöhle. Das unpaare Mittelstück desselben, der Körper, *Basis*, ist platt, 12^{mm} hoch und etwas



Zungenbein von vorn.

mehr als doppelt so breit, von einer Seite zur anderen und von oben nach unten gewölbt. Die letztere Wölbung ist die stärkere und so beträchtlich, dass die obere Hälfte der Vorderfläche, welche durch eine quere Firste von der unteren Hälfte geschieden ist, mehr auf- als vorwärts sieht und die Concavität der hinteren Fläche die Fingerspitze aufnimmt. Der obere Rand ist eben, der untere, in der Mitte dem oberen parallel, steigt an den Seiten schräg zum Seitenrande des Körpers auf, der ihm, etwas aufwärts geneigt, unter einem stumpfen Winkel entgegenkommt.


Die Vorderfläche des Körpers wird ausser durch die erwähnte Querfirste noch durch eine mehr oder minder deutliche mediane Firste getheilt, wodurch vier Felder oder Gruben entstehen, in welchen Muskeln sich befestigen.

Mit dem Seitenrande des Körpers sind jederseits zwei Bogenstücke verbunden, das Eine, längere, durch Synchondrose, das andere, kürzere, durch ein Gelenk; das erstere verwächst häufig, das letztere nur ausnahmsweise knöchern mit dem Körper.

Die grösseren Bogenstücke oder Hörner, *Cornua majora*, schliessen sich so an den Körper an, dass sie die von demselben begonnene Krümmung nach hinten, nur steiler, fortsetzen. Mit ihrem vorderen Rande entsprechen sie dem Seitenrande des Körpers, ihr oberer und unterer Rand geht continuirlich oder nur durch eine geringe Einschnürung abgesetzt aus dem gleichnamigen Rand des Körpers hervor, die Flächen des Körpers gehen in die der Hörner über, doch drehen sich die letzteren alsbald so um ihre Längsaxe, dass die äussere Fläche aufwärts, die innere abwärts gerichtet wird, und gegen die hintere Spitze verjüngen sie sich, nähern sich der cylindrischen Form und enden je in ein cylindrisches Knöpfchen.

Die kleinen Hörner, *Cornua minora*, sitzen mit kreisförmigen Gelenkflächen (3^{mm} im Durchmesser) auf der Vorderfläche der Naht der grossen Hörner und des Zungenbeinkörpers, näher dem oberen Rande, als dem unteren. Sie sind weizenkorn- oder birnförmig, meistens nur wenig höher, als dick, zuweilen aber in schlanke, zugespitzte Säulchen bis zur halben Länge der grossen Hörner und mehr verlängert, schief seit- und rückwärts gerichtet.

Fig. 69.



Zungenbein, Profil.

Das grosse Horn des Zungenbeins kann ebenfalls mit dem Körper durch Gelenk verbunden sein. Manche halten dies für die Regel.

Von der Spitze der kleinen Hörner erstreckt sich das Lig. stylo-hyoid. zum Griffelfortsatz des Schädels. Indem die Verknöcherung dieses Bandes vom Zungenbein aufwärts fortschreitet, verlängern sich die kleinen Hörner des letzteren; vom Schädel aus gewinnt öfters auf Kosten des Lig. stylo-hyoid. der Griffelfortsatz eine ungewöhnliche Länge. Seltener enthält das Band ein von dem kleinen Horn und dem Griffelfortsatz gesondertes, rundliches Knorpel- oder Knochenstück. Noch seltener ist das ganze Band vom Schädel bis zum Zungenbein knöchern, so dass der Griffelfortsatz und das kleine Horn in Eine Knochenstange zusammenfliessen, die das Zungenbein mit dem Schädel verbindet.

Beim Neugeborenen ist das Zungenbein noch grösstentheils knorplich, auf dieselbe Art, wie beim Erwachsenen, abgetheilt, mit Knochenkernen im Körper und den grossen Hörnern. Die kleinen Hörner bleiben am längsten knorplich und sind es oft noch im Erwachsenen.

5. S c h ä d e l.

Der Schädel besteht aus der eiförmigen Kapsel, welche das Gehirn enthält und welche, ausgenommen die Communicationsöffnung mit der Wirbelhöhle und die Lücken zum Durchtritt von Gefässen und Nerven, nach allen Seiten vollkommen geschlossen ist, und aus den Bogen, die den obersten Theil der Eingeweideröhre umgeben. Gemeinschaftlich tragen diese Bogen und jene Kapsel an der Grenze, wo sie einander berühren, zur Bildung von Gruben und Canälen für die Apparate der höheren Sinne bei.

Eine Anzahl theils paariger, theils unpaarer Knochen setzen dies complicirte Gerüste zusammen. Sie stehen mit einander grösstentheils durch sehr feste, zackige, schuppige oder einfache Nähte in Verbindung, von welchen manche schon zur Zeit der Reife, manche erst im höheren Alter, die

einen gewöhnlich, die anderen selten durch Verknöcherung der Zwischen-
substanz verwischt werden. Nur an Einer Stelle jederseits am Boden des
Hirnschädels (zwischen dem Felsentheil des Schläfenbeins und dem Hinter-
haupts- und Wespenbein) ist eine etwas ansehnlichere, unregelmässige Kno-
chenlücke durch Knorpel ausgefüllt; nur Ein Knochen, der Unterkiefer, ist
durch Gelenke mit den übrigen verbunden.

An dem Rande einiger der Oeffnungen, wodurch Canäle, die im Schä-
del verlaufen, nach aussen münden, sind zur Verlängerung dieser Canäle
(Nase, Ohr, Tuba) Knorpelröhren angefügt, welche, streng genommen, wie
die Rippen und Gelenkknorpel, den Theilen des Skeletts zugezählt werden
müssten, gewöhnlich aber bei den betreffenden Sinnesorganen abgehandelt
werden. Es lässt sich dies einigermaassen damit rechtfertigen, dass man ge-
wöhnt ist, den knöchernen Schädel, nach der Maceration, ohne jene knor-
plichen Anhänge zu sehen und daher auch die letzteren bei allen Messun-
gen und Vergleichen der Schädel ausser Acht zu lassen. Für die Auf-
fassung des Zusammenhanges der Schädelknochen unter sich ist die nähere
Kenntniss der knorplichen Anhänge, wegen ihrer Lage an den äussersten
Grenzen des Schädels, erlässlich.

Man theilt die Kopfknochen ein in die Knochen des eigentlichen Schä-
dels und des Gesichts. Zu jenen rechnet man alle, welche zum Verschluss
der Schädelkapsel beitragen; die meisten derselben, namentlich die an der
Basis gelegenen, gehen zugleich in die Bildung des Gesichtsschädels ein.
Die Gesichtsknochen aber nehmen an der Zusammensetzung des Hirnschä-
dels nicht Theil und sind von der Schädelhöhle aus nicht sichtbar.

Zu den eigentlichen Schädelknochen gehören:

a. Unpaare.

1. Hinterhauptsbein, *Os occipitis*, **O**.
2. Wespenbein, *Os sphenoides*, **S**. ¹⁾.
3. Siebbein, *Os ethmoides*, **E**. ²⁾.
4. Stirnbein, *Os frontis*, **F**.

b. Paarige.

5. Schläfenbeine, *Ossa temporum*, **T**.
6. Scheitelbeine, *Ossa parietalia*, **Pr**. ³⁾.

Zu den Gesichtsknochen zählt man:

a. Paarige.

7. Oberkieferbeine, *Ossa maxillae*, **Max**. ⁴⁾.
8. Gaumenbeine, *Ossa palatina*, **Pl**.
9. Thränenbeine, *Ossa lacrymalia*, **L**. ⁵⁾.
10. Muschelbeine, *Conchae inferiores*, **C**. ⁶⁾.

¹⁾ Keilbein, Flügelbein, *Os sphenoideum*, *vespiforme*, *cuneiforme*, *alare*. Ich unterdrücke den gebräuchlicheren Namen Keilbein, weil derselbe an Fusswurzelknochen vergeben ist.

²⁾ Riechbein, *Os cribriforme*.

³⁾ Seitenwandbeine, *Ossa bregmatica*, *Ossa verticis*.

⁴⁾ *Maxilla superior*, *Os maxillare superius*.

⁵⁾ Nagelbeine, *Ossa unguis*.

⁶⁾ Untere Muscheln, *Ossa turbinata*, *spongiosa*.


11. Nasenbeine, *Ossa nasi*, **N.** ¹⁾.
12. Jochbeine, *Ossa zygomatica*, **Z.** ²⁾.
- b. Unpaare:
13. Pflugscharbein, *Vomer*, **V.**
14. Unterkieferbein, *Mandibula*, **Md.** ³⁾.

Hinterhaupts- und Wespenbein werden, da sie nach der Pubertät mit einander verschmelzen, von Manchen als Ein Knochen unter dem Namen Grundbein, *Os basilare*, beschrieben.


Zuweilen findet sich die Zahl der Knochen des Schädels durch abnorme Nähte oder durch längeres Bestehen von Nähten, welche in früher Jugend normal sind, vermehrt. Ich werde diese Varietäten nach der Beschreibung der regelmässigen Zusammensetzung des Schädels anführen.

Ueber die Stellung der genannten Knochen und den Antheil, welchen die einzelnen an der Zusammensetzung des Ganzen haben, wird es leichter sein, sich zu orientiren, wenn wir der speciellen Beschreibung derselben eine Totalansicht des Schädels und seiner Höhlen vorausschicken.

Nennt man den Hirnschädel eiförmig, so ist zuerst hinzuzufügen, dass **Hirnschädel** er mit dem spitzeren Ende nach vorn, mit dem breiteren nach hinten gekehrt ist, so zwar, dass der grösste Breitendurchmr. y (140mm im Lichten) den längsten, vom unteren Rande der Stirn zum vorragendsten Theil des Hinterhauptes gerichteten oder sagittalen Durchmesser x (170 mm) an der Grenze des hinteren und mittleren Drittels schneidet (Fig. 70 und 71).



Mediandurchschnitt des Hirnschädels.



Horizontaldurchschnitt des Hirnschädels.

Wenig weiter nach vorn fällt auch die grösste Höhe des Hirnschädels, wenn man nämlich die Höhe durch senkrecht auf die Längsaxe gezogene Linien bestimmt. Bei natürlich aufrechter Haltung des Kopfes ist der

¹⁾ *Ossa nasalia*.

²⁾ Wangenbeine, *Ossa jugalia, malarialia*.


³⁾ Unterkinnlade, *Maxilla inferior, Os maxillare inf.*

längste Durchmesser des Schädels unter einem Winkel von etwa 20 Grad gegen den Horizont geneigt.

Sodann wird die Regelmässigkeit der Eiform vielfach gestört, theils durch begrenzte Vorsprünge und Vertiefungen, theils durch Kanten, welche, gerade oder gebogen, über längere Strecken der Oberfläche hinziehen und, in Verbindung mit einer mehr oder minder beträchtlichen Abplattung der Oberfläche, stellenweise den Schädel einem von planen Wänden umschlossenen Körper ähnlich machen. An diesen Vorsprüngen und Kanten betheiligen sich entweder beide Flächen in gleichem Sinne, so dass einem Vorsprung der äusseren Fläche eine Vertiefung der inneren und umgekehrt entspricht; sie nehmen sich alsdann wie getrieben aus; oder die Vorsprünge und Kanten sind nur gleichsam auf die eine Fläche aufgesetzt, die Vertiefungen in die eine Fläche eingegraben und die Schädelwand wird durch jene verdickt, durch diese verdünnt. Wird sie verdickt und weichen die äussere und innere Tafel auseinander, so nimmt entweder die diploëtische Substanz an Mächtigkeit zu oder sie schwindet völlig und es treten an ihre Stelle die früher erwähnten, einfachen oder von dünnen Knochenplättchen durchsetzten Höhlen, welche sich von der animalischen Röhre aus mit Luft füllen (Stirn- und Wespenbeinhöhlen, Zellen des Warzenfortsatzes u. s. f.).

Die Mächtigkeit der Schädelwand beträgt an den Stellen von mittlerer Stärke 3 — 4 mm; an Stellen, wo die äussere oder innere Wand Vorsprünge bildet, erreicht sie das Doppelte, an Stellen, wo sich lufthaltige Räume zwischen beiden Platten befinden, das 6 — 7fache jener Stärke und mehr.

Eine fast continuirliche Kante zieht sich, im Allgemeinen horizontal verlaufend, äusserlich um den unteren Theil des Hirnschädels und scheidet die grösstentheils plane untere Fläche, Basis, von der mehr gewölbten Schädeldecke. Der Verlauf dieser Kante ist folgender: Von einem hinten



Profilansicht des Hirnschädels ohne Jochbogen.


in der Mittellinie gelegenen, platten oder stachelförmigen Vorsprung des Hinterhauptbeins, *Protuberantia occipitalis ext.*, geht sie nach jeder Seite in abwärts gekrümmtem Bogen, als *Linea nuchae superior*¹⁾, auf den Rand eines stark nach unten vorspringenden Muskelfortsatzes, des *Processus mastoideus*, über. Vor diesem Fortsatz, über der äusseren Ohröffnung, *Porus acust. ext.*, und dem Unterkiefergelenk, setzt sie sich in die Wurzel des Jochbogens, *Arcus zygomaticus*, fort,

¹⁾ *L. semicircularis sup. ossis occipitis.*

welcher deprimirt, mit der oberen Fläche aus der Seitenfläche, mit der unteren Fläche aus der Grundfläche des Schädels entspringt und erst im weiteren Verlauf eine Torsion erfährt, wodurch die eine Fläche lateral-, die andere medianwärts gewandt wird. Vor der Wurzel des Jochbogens erscheint die Grenze zwischen der Seiten- und Bodenfläche des Schädels wieder als scharfe Kante, und zwar in ziemlich gleicher Flucht mit der Wurzel des Jochbogens. Wir nennen sie hier *Crista infratemporalis* und werden sie bei der Beschreibung des Wespen- und Schläfenbeins wieder zur Sprache bringen. Durch die hohe vordere Insertion des Jochbogens unterbrochen, tritt die Fortsetzung jener Kante als scharfer oberer Rand der Augenhöhle, *Margo supraorbitalis*, auf das Gesicht über und kommt mit der gleichnamigen Kante der anderen Schädelhälfte in der Nasenwurzel, *Radix nasi*, zusammen.

An der Schädeldecke sind die Seitenflächen abgeplattet und gegen die gewölbte obere Fläche

abgegrenzt durch eine der Curve, welche der obere Rand des Mediandurchschnittes des Schädels beschreibt, fast parallel verlaufende Linie, *Linea temporalis* ¹⁾ (Fig. 72 u. 73). Unterhalb dieser Linie liegt die Schläfenfläche, *Planum temporale*; den in der Mitte zwischen beiden Schläfenlinien gelegenen gewölbten Theil kann man im weiteren Sinne



Frontaldurchschnitt des Hirnschädels.

des Worts Scheitel, *Vertex* ²⁾, nennen; im engeren Sinne bedeutet Scheitel die mittlere und höchste Region dieses Gewölbes, während der nach vorn gegen die Nasenwurzel abfallende Theil als Stirn, *Frons*, der hintere Abhang als Hinterhaupt, *Occiput*, unterschieden wird. Stirn und Scheitel gehen an dem knöchernen Schädel ohne deutliche Grenze in einander über (in der äusseren Haut macht die Behaarung die Grenze); zwischen Hinterhaupt und Scheitel ist die Grenze nicht selten durch eine Vertiefung bezeichnet, welche einer Knochennaht entspricht und durch die Vorragung des Hinterhauptsbeins über die Scheitelbeine erzeugt wird. Die Zusammensetzung des Schädels aus zwei symmetrischen Hälften ist äusserlich längs der Stirn und dem Scheitel öfters durch eine schwache Kante oder eine leichte Vertiefung angedeutet.


Von diesen Flächen und ihren Kanten ist an der Innenseite des Schädels nichts zu sehen, ausser der Andeutung einer medianen Scheidewand an dem vorderen und hinteren Ende der Basis und an der Decke der Schä-

¹⁾ *L. semicircularis oss. parietalis.*

²⁾ *Sinciput.*

delhöhle (Fig. 74 und 75) und ausser einer Querfurche, *Sulcus transversus*, längs dem hinteren Theil der Grenze zwischen Basis und Decke.

Fig. 74.




Ansicht der Schädelhöhle von innen. Basis.

Von dem vordersten Theil der Basis erhebt sich jene Scheidewand in Gestalt eines niedrigen, comprimierten, dreiseitigen Vorsprunges, der *Crista galli* des Siebbeins; an der Decke erscheint sie von dem vorderen Rande derselben ansteigend und durch eine Grube gegen die Crista galli abgesetzt, als niedrige Firste, die sich aber schon auf der Mitte der Stirn in zwei Lippen spaltet und so in eine Rinne, *Sulcus sagittalis*, verwandelt, welche längs der Mittellinie des Scheitels weiter zieht, hinten in jene Querfurche einmündet und unterhalb der Querfurche wieder als Firste, *Crista occipitalis interna*, bis zum Rande des Hinterhauptslochs herabläuft. Von der Crista galli und dieser Längsfirste und Furche ragt senkrecht, von der Querfurche wagerecht eine fibröse Scheidewand in die Schädelhöhle vor, jene zwischen die beiden Seitenhälften des Gross- und des Kleinhirns, diese zwischen das Grosshirn und das Kleinhirn. In den Furchen, zwischen dem Knochen und der Anheftungsstelle jener fibrösen Scheidewände,

ruhen die wichtigsten Blutleiter (*Sinus membranae durae*), häutige Canäle, in welchen das Venenblut aus dem Gehirn und den Schädelknochen sich sammelt. Der scharfe Winkel, unter welchem am oberen Rande der Augenhöhle die Stirn äusserlich in die Schädelbasis umbiegt, ist durch

Fig. 75.



Ansicht der Schädelhöhle von innen. Decke.

Auseinanderweichen der beiden Platten des Stirnbeins inwendig ausgeglichen und abgerundet; ebenso geht, wie der Frontaldurchschnitt, Fig. 73, zeigt, an der Innenseite der Schläfenfläche, die Aushöhlung der Seitenwand ununterbrochen in die des Bodens und der Decke über.


Dagegen finden sich auch auf der, im Allgemeinen glatten und glänzenden inneren Tafel (*Lamina vitrea*) des Schädels Unebenheiten und Kanten, welche nach innen vorspringen, ohne äusserlich angedeutet zu sein. Ueberall, mit Ausnahme des mittleren Theils der Grundfläche, verlaufen krummlinige Vorsprünge, *Juga cerebralia*, welche in die Furchen der Gehirnwindungen passen, zwischen den diese Windungen aufnehmenden Vertiefungen, den *Impressiones digitatae*. Zahlreiche, tiefere und seichtere verzweigte Furchen (Fig. 75) bezeichnen den Verlauf der Gefässe an der Aussenseite der fibrösen Haut, welche dem Schädel als Periost und zugleich dem Gehirn als Umhüllung dient. Im Grunde dieser Furchen liegen Reihen feiner Poren für die in die Substanz des Knochens tretenden Gefäss-

ästchen; die Furchen selbst gehen von Canälen der Schädelwand aus, durch welche die Gefässstämme von aussen in die Schädelhöhle geführt werden. Häufig kommen bei Erwachsenen an der Schädeldecke neben der Längsfurche unregelmässige Gruben vor, in welchen Auswüchse von der äusseren Fläche der fibrösen Hirnhaut, die sogenannten *pacchionischen Drüsen*, liegen.

Schädel-
gruben.

Die Grundfläche des Schädels, von innen betrachtet (Fig. 76), zeigt zwei quer verlaufende Kanten, welche in der Mitte am stärksten hervorragen und gegen die Seitenwände sich verlieren, welche ferner in der Mitte

Fig. 76.



Ansicht der Schädelbasis von innen.

einander näher liegen als seitwärts, wo die vordere nach vorn, die hintere nach hinten ausweicht. Sie theilen die Schädelbasis in drei Gruben, die man als hintere, mittlere und vordere Schädelgrube, *Fossa cranii ant., med. und post.*, unterscheidet. In der hinteren Schädelgrube liegt die grosse Oeffnung, welche aus der Wirbelhöhle in die Schädelhöhle führt, *Foram. occipitale*. Die Wölbung hinter dieser Oeffnung lässt sich, wie erwähnt, einem

ausgedehnten und abgeplatteten Wirbelbogen vergleichen. In dem vor dem Hinterhauptsloch gelegenen Theil der hinteren und in den beiden vorderen Schädelgruben wird die Mitte von einer Längsreihe wirbelkörperartiger, aber schon zur Zeit der Reife untrennbar verbundener Knochenstücke, den Körpern des Hinterhaupts- und Wespenbeins, eingenommen; ihnen zur Seite liegt in der hinteren und mittleren Schädelgrube rechts und links in ebenfalls longitudinaler, jedoch unregelmässiger Reihenfolge eine Anzahl von Oeffnungen für Gefässe und Nerven; sie sind den Zwischenwirbellöchern der Wirbelsäule analog, doch ist diese Aehnlichkeit nur oberflächlich, weil die Löcher den Zwischenräumen weder von Körpern noch von Bogen genau entsprechen. Die vordere Schädelgrube wird von der mittleren geschieden in der Mitte durch einen dem Wespenbeinkörper angehörigen, platt aufliegenden Saum, *Limbus sphenoidalis*; daneben durch die rückwärts ragenden *Procc. clinoid. anter.*, in welche jener Saum übergeht, und weiter seitwärts durch den ausgeschweiften Rand der Orbitalflügel des Wespenbeins, *Alae orbitales*, welcher von der Spitze des *Procc. clinoid. ant.* ausgeht, um sich in der Seitenfläche des Schädels zu verlieren. Die vordere Schädelgrube ist flach; die Durchtrittsstellen des ersten Nervenpaares, *Foramina cribrosa*, nehmen in derselben einen schmalen Längsstreif jederseits neben der Crista galli ein.

Die mittlere Schädelgrube, von vorn her durch den eben beschriebenen hinteren Rand der vorderen Schädelgrube überragt, grenzt sich gegen die hintere ab mittelst einer Firste, welche in der Mitte als querer, vorwärts geneigter Kamm, Sattellehne, *Dorsum sellae*, des Wespenbeins, stark vorragt und von der Wurzel dieses Kammes seit- und rückwärts auf eine Kante, *Angulus superior*, der Schläfenpyramide und schliesslich von dieser auf den oberen Rand der Querfurche übergeht, die, wie erwähnt, Basis und Decke der Schädelhöhle von einander scheidet. Zur Seite des Fusses der Sattellehne ist eine Aushöhlung, durch welche die mittlere mit der hinteren Schädelgrube communicirt, durch welche namentlich die Nervenstämme nach vorn verlaufen, die in der hinteren Schädelgrube aus den Centralorganen hervortreten und erst in der mittleren die Schädelhöhle verlassen.

Nicht selten wird diese Aushöhlung theilweise gedeckt durch Zacken, welche von der Spitze der Schläfenpyramide aufwärts, von der Spitze des *Dorsum ehippii* rück- und abwärts ragen. Sie sind als Verknöcherungen des Tentorium cerebelli zu betrachten, welches von der Sattellehne zur oberen Kante des Schläfenbeins hinübergespannt ist (s. Wespenbein).

Die Reihe der Löcher, welche aus der mittleren Schädelgrube nach aussen führen, beginnt neben dem *Limbus sphenoidalis* mit dem *Canalis opticus* (für die *Art. ophthalmica* und den zweiten Hirnnerven); nur durch ein dünnes Stäbchen von ihm getrennt, in der Ansicht von oben durch den hinteren Rand des Orbitalflügels verdeckt, folgt die *Fissura orbitalis sup.*, eine am medianen Ende abgerundete, nach der Seite hin sich verschmälernde und zuspitzende Querspalte, durch die am medialen Theil (der seitliche, spaltförmige ist durch eine Verbindung der harten Hirnhaut mit der Beinhaut der Augenhöhle verschlossen) die *V. ophthalmica cerebralis*,

¹⁾ *Can. condyloideus post.*

der *N. III.*, *IV.*, *VI.* und der erste Ast des *N. V.* treten. Hinter dieser Spalte, allmählig von der Mittellinie seitwärts weichend, folgen hintereinander: der *Can. rotundus* (für den zweiten Ast des *N. V.*), das *Foramen ovale* (für den dritten Ast desselben), das *Foramen spinosum* für die *Vasa meningeae* und medianwärts neben den beiden letzteren das *Foramen lacerum*, von einem Faserknorpel ausgefüllt, den nur wenige feine Gefäß- und Nervenästchen durchsetzen. Gerade über diesem Faserknorpel liegt die Hauptarterie des Gehirns, *Carotis int.*, nachdem sie an der Spitze der Pyramide des Schläfenbeins aus dem *Can. caroticus* hervorgetreten und bevor sie an der Seitenfläche des Wespenbeins aufwärts geht.

In der hinteren Schädelgrube liegen die Austrittsöffnungen in einer der Queraxe fast parallelen, nur wenig rück- und medianwärts geneigten Reihe neben oder vielmehr über einander in der medianwärts geneigten Ebene, welche von der oberen Kante der Schläfenpyramide gegen das Hinterhauptsloch abfällt: zu oberst der *Porus acust. int.* (für die *Vasa auditiva* und den *N. VII.* u. *VIII.*), darunter das *Foramen jugulare*, durch Vorsprünge des einen oder anderen der dasselbe begrenzenden Knochen in einen seit- und rückwärts gelegenen geräumigen Theil (für die *V. jugularis*) und einen median- und vorwärts gelegenen engeren Theil (für die *N. IX.*, *X* und *XI* und den *Sinus petros. inf.*) geschieden; endlich, dem Rande des Hinterhauptslochs zunächst und etwa über der Mitte des Gelenkhöckers des Schädels, der *Canalis hypoglossi* (*N. XII.*) ¹⁾.

Einige andere, minder beständige Oeffnungen, welche Communications-ästen zwischen äusseren und inneren Venen (*Emissaria*) den Durchtritt gestatten, kommen an der Basis, den Seitenwänden und an der Decke des Hirnschädels vor. Zu diesen gehört der *Can. condyloideus* ²⁾, dessen innere Mündung in der hinteren Schädelgrube medianwärts vom *Foramen jugulare* sichtbar ist.


Aussenfläche
der Schä-
delbasis.

Die Aussenseite der Grundfläche des Schädels (Fig. 77) ist zunächst in zwei Regionen, eine hintere und eine vordere, zu scheiden, von welchen, wenn man sie auf die Gegenden der Wirbelsäule zurückführt, jene der Wirbelfurche, diese der Vorderfläche der Wirbelkörper entspricht. Weil einerseits die Wirbelhöhle, wo sie sich zur Schädelhöhle erweitert, nach hinten vorspringt und andererseits die Vorderfläche der animalischen Röhre sich an der Uebergangsstelle zum Schädel unter einem rechten Winkel nach vorn umbeugt, kommen beide Regionen in Eine und zwar in eine abwärts gerichtete Ebene zu liegen. Die Grenze zwischen beiden bildet eine schwach nach vorn convexe Linie, welche vom vorderen Rande des *Foramen occipitale* jederseits vor dem Gelenkhöcker, mittelst dessen der Schädel auf dem Atlas articulirt, *Proc. condyloideus*, vorüberführt und von da auf einem Querwalle (*Proc. jugularis* des Hinterhauptsbeins) seit- und rückwärts zu dem Warzenfortsatze (*Proc. mastoideus*) läuft. Auf der Fläche, welche hinter dieser Linie, zwischen ihr, der oberen Nackenlinie des Hinterhauptsbeins und den Warzenfortsätzen eingeschlossen ist — wir wollen sie die Nackenfläche des Schädels nennen —, finden alle von Rippen, Dornen und Querfortsätzen aufwärts zum Schädel verlaufenden

¹⁾ *Can. condyloideus ant.* ²⁾ *Can. condyloideus post.*

Muskeln ihre Anheftung. Der Theil der Schädelbasis, welcher vor der beschriebenen Linie liegt, ist zunächst wieder in zwei Felder, ein hinteres

Fig. 77.



Basis des Schädels von aussen; Gaumenflügel des Wespenbeins (*Ppt*) an der Basis quer abgesägt. *Cr.* äussere Mündung des *Can. rotundus*. *Pae.* Aeussere Mündung des Gehörgangs. *Cca.* Eingang des *Can. caroticus*.

und ein vorderes, einzutheilen. Das hintere Feld stellt einen queren, in der Mitte schmalen, nach den Seiten sich vor- und rückwärts ausbreitenden Gürtel dar, welcher dem Umfang der mittleren Schädelgrube ungefähr gleichkommt. Der mittlere Theil desselben, vor dem Rande des Hinterhauptslochs, dient Muskeln zur Insertion, welche an der Vorderfläche der Hals- und oberen Brustwirbel entspringen. Zur Seite liegt der Knochen, welcher das Gehörorgan einschliesst — die Pyramide, *Pyramis*, des Schläfenbeins —, die Gelenkfläche für den Unterkiefer, *Fossa mandibularis*, und vor beiden eine Ebene, die sich seitlich bis an die *Crista infratemporalis* erstreckt und das Dach einer nach unten offenen Grube bildet, welche von den den Unterkiefer bewegendenden Muskeln grösstentheils ausgefüllt wird. Ich nenne diese Grube Unterschläfengrube, *Fossa infratemporalis*, das ganze Feld mag mit dem Namen „Mittlerer Gürtel

der Schädelbasis“ bezeichnet werden. Das vordere Feld ist in seinem mittleren Theil Decke der vegetativen Röhre, an den Seiten theils Decke, theils Seitenwand der Augenhöhlen. Zwischen der horizontalen Platte, welche die Decke der Augenhöhle bildet, und der vertical gestellten, vor- und medianwärts schauenden Wand, welche die Augenhöhle seitlich begrenzen hilft, liegt die obere Augenhöhlenspalte, *Fissura orbitalis sup.* Gegen den mittleren Gürtel der Basis grenzt sich das vordere Feld ab: in der Mitte durch das *Tuberculum pharyngeum*, einen etwa 12^{mm} vor dem Rande des Hinterhauptslochs auf dem wirbelkörperartigen Knochen der Schädelbasis vorspringenden Höcker, an welchen die Mitte des oberen Randes der hinteren Wand des Schlundkopfes befestigt ist. An den Seiten ist die Grenze zwischen dem mittleren Gürtel der Schädelbasis und der Seitenwand der Augenhöhlen bezeichnet durch einen dem Temporalflügel des Wespenbeins angehörigen scharfen Kamm, *Crista orbitalis*, dem wir als oberem Rand der unteren Augenhöhlenspalte bei Beschreibung der Augenhöhle wieder begegnen werden. Zwischen dem *Tuberculum pharyngeum* und diesem Kamme läuft die Grenze längs dem medianen und vorderen Rande der Wurzel der Gaumenflügel, *Processus pterygoidei*, des Wespenbeins hin.

Gesichts-
schädel.

Gehen wir zum Gesichtsschädel über, so erkennen wir als dessen

Fig. 78.





Fig. 79.




Frontaldurchschnitt des Schädels durch den dritten Backzahn.

1 Schädelhöhle. 2 Augenhöhlen. 3 Nasenhöhlen. 4 Kieferhöhlen. 5 Mundhöhle.

Grundlage die in den Wänden des horizontalen Endstücks des vegetativen Rohres eingeschlossenen Knochenplatten (Fig. 79). Indem der vordere Theil dieses Rohres durch eine horizontale Scheidewand quer abgetheilt und die obere Abtheilung wieder durch eine mediane Scheidewand der Länge nach halbt wird, entstehen drei Canäle, zwei obere, symmetrisch und Wand an Wand an der Basis des Schädels in sagittaler Richtung verlaufend, und ein dritter unpaarer, in gleicher Richtung unterhalb der beiden oberen. Der untere, unpaare Canal ist die Mundhöhle; die beiden oberen, paarigen sind die Nasenhöhlen; die Wand, welche die Nasenhöhlen von einander trennt, heisst Nasenscheidewand, *Septum narium*; sie wird (Fig. 80) von einer perpendicularen Platte des Sieb-

Fig. 80.




Mediandurchschnitt des Schädels links neben der Nasenscheidewand.

* Knorpel der Nasenscheidewand.

beins, vom Pflugscharbein und nach vorn von einer Knorpelplatte gebildet. Die zwischen den Nasenhöhlen und der Mundhöhle verlaufende horizontale Wand heisst Gaumen, *Palatum*; zu ihrer Bildung tragen Oberkiefer und Gaumenbein bei. Nach aussen (vorn) öffnet sich die Mundhöhle durch den Mund und am Schädel durch die Kieferspalte; die Eingänge der Nasenhöhlen, die Nasenöffnungen oder Naslöcher, erscheinen am skelettirten Schädel als einfache Oeffnung, weil der knorpelige Theil der Nasenscheidewand fehlt und die knöcherne nicht bis an die Oberfläche reicht. Die Oeffnung (Fig. 81 a. f. S.) wird *Apertura pyriformis* genannt. Nach innen (hinten) münden die Nasenhöhlen oberhalb des Gaumens und die Mundhöhle unterhalb desselben in die Vorderwand des oberen

Theiles des Schlundes oder des Schlundkopfes. Die hinteren Mündungen der Nasenhöhle werden *Choanen* genannt; sie werden medianwärts

Fig. 81.



Ansicht des Schädels von vorn.


durch den scharfen hinteren Rand der Nasenscheidewand, unten durch den scharfen hinteren Rand des Gaumens begrenzt. Die Stelle des lateralen Randes nimmt eine Grube, *Fossa pterygoidea* (Fig. 80.82), ein, welche, nach hinten offen, von zwei rückwärts divergirenden verticalen Platten umfasst wird. Die Platten sind Theile des Gaumenflügels des Wespenbeins, zwischen die sich nur am unteren Ende ein kleiner Fortsatz des Gaumenbeins eindrängt. Die Grube wird ausgefüllt von einem Muskel (*M. pterygoid. int.*), der sich von da zum Unterkiefer begiebt. Die Einmündung der Mundhöhle in den Schlund erfolgt durch eine kreisförmige Oeffnung, eine Art von Engpass, *Isthmus faucium*, welchen aber nebst dem Gaumen nur Weichtheile, die Zunge am Boden der Mundhöhle und die an den Seitenwänden der letzteren vorspringenden Gaumenbogen, umgrenzen.

Zwischen Mund- und Nasenhöhlen besteht eine Communication durch den *Can. incisivus*, welcher in der Nasenhöhle doppelt, dicht dies- und jenseits der Scheidewand beginnt und mit einer unpaarigen Oeffnung, *Aper-tura inf. can. incis.* (Fig. 82), hinter den vordersten Zähnen ausmündet.

Die Nasenhöhlen sind von den vorderen bis zu den hinteren Oeffnun-

gen ringsum von festen, im vorderen Theile knorplichen, im hinteren Theile knöchernen Wänden umschlossen. Der knöcherne Apparat der

Fig. 82.



Ansicht des Schädels von hinten bei auf die Brust geneigtem Kinn.


Mundhöhle besteht aus zwei nach vorn convexen, einander nahezu parallelen, platten Bogen, deren einander zugekehrte Ränder die Zähne tragen. Der obere Bogen ist mit dem vorderen und Seitenrande des Bodens der Nasenhöhlen verwachsen und seine innere Fläche geht continuirlich in die untere Fläche des Gaumens über. Der untere Bogen ist gegen den oberen und somit gegen den ganzen Schädel beweglich und articulirt an dem letzteren mittelst eines jederseits senkrecht aufsteigenden Fortsatzes, des Unterkieferastes, *Ramus mandibulae*, welcher da die Gelenkgrube an der Grenze zwischen der Schläfen- und Grundfläche des Schädels angebracht ist, mit der Aussenfläche in der Fortsetzung der Schläfenfläche

liegt, mit der Innenfläche eine unvollständige äussere Begrenzung der Unterschläfengrube bildet.

Nasenhöhle.

Jede Nasenhöhle stellt in dem grössten Theile ihrer Länge einen vierseitigen Canal mit abgerundeten Ecken dar (Fig. 84), dessen Höhe die Breite bedeutend übertrifft. Von den vier Wänden, welche den Canal umgeben, stehen die Median- und Seitenwand vertical und einander parallel, wenn man von einigen Vorsprüngen der Seitenwand nach innen und von den häufigen Unregelmässigkeiten in der Stellung der Nasenscheidewand absieht, welche bald nach der rechten, bald nach der linken Nasenhöhle ausgebogen ist. Die Breite der Nasenhöhle ist demnach überall ziemlich die gleiche (15^{mm}), die Höhe aber ist in verschiedenen Regionen verschieden und dies rührt, da die unterste Wand oder der Boden eben und fast horizontal ist, von Ungleichheiten der oberen Wand oder der Decke her. Die grösste Höhe (45^{mm}) besitzt die Nasenhöhle im mitt-

Fig. 83.




Seitenwand der Nasenhöhle.

leren Theile ihrer Länge, wo sie durch eine dünne, vorn von den Aesten des Riechnerven durchbohrte Knochenplatte, *Lamina cribrosa* des Siebbeins, von der Schädelhöhle geschieden ist und auch von diesem Theile der Decke ist nur ein schmaler Streifen (2 bis 3^{mm}) zunächst der medianen Wand frei, während seitlich eine zellige Knochenmasse, das Labyrinth des Siebbeins, *Labyrinthus*, von der Decke herabragt und den oberen Theil der Nasenhöhle bis zur Seitenwand ausfüllt (Fig. 83. 84). Weiter rückwärts, so weit die Nasenhöhle unter der mittleren Schädelgrube liegt, wird die Höhe der ersteren um die Höhe des wirbelkörperartigen Knochens dieses Theils der Schädelbasis — des Wespenbeinkörpers — beeinträchtigt. Indess kommt diese Raumbeschränkung dadurch wieder der Nasenhöhle zu Gute, dass sich im Wespenbeinkörper zwei geräumige, durch eine mediane Scheidewand getrennte Höhlen bilden, welche durch eine Oeffnung in der vorderen Wand dieses Knochens jede mit Einer Nasenhöhle in Ver-

bindung stehen. Dies sind die Wespenbeinhöhlen, *Sinus sphenoidales*. Durch eine ähnliche Oeffnung in der Gegend der Nasenwurzel hängt jede Nasenhöhle mit der Stirnhöhle, *Sinus frontalis*, zusammen, einer Höhle, welche sich zwischen den aus einander weichenden Platten der vorderen Wand des Schädels befindet und mehr oder minder weit in der Decke der Augenhöhle nach hinten erstreckt. Jenseits dieser Stelle nach vorn, von der Nasenwurzel an, hört die Decke der Nasenhöhle auf, Boden der Schädelhöhle zu sein; sie geht selbständig, mit freier, oberer Fläche als sogenannter Rücken der Nase weiter, neigt sich aber zugleich stark abwärts und diese Richtung verfolgen die am Rande der knöchernen Nasenöffnung anhaftenden Nasenknorpel so weit, dass das Dach bis zur Ebene des Bodens der Nase niedersteigt und die Eingänge der Nasenhöhlen in den Boden derselben, vor dem knöchernen Gaumen, zu liegen kommen. An der Seitenwand der Nase sind in ziemlich gleichen Entfernungen über einander drei

Fig. 84.



Frontaldurchschnitt des Schädels durch den dritten Backzahn.

1. Schädelhöhle. 2. Augenhöhlen. 3. Nasenhöhlen.
4. Kieferhöhlen. 5. Mundhöhle.


nungen über einander drei knöcherne Klappen, die Nasenmuscheln, *Conchae*, befestigt, welche pultdachförmig schräg abwärts in die Höhle vorspringen und sich mit dem freien Rande wieder lateralwärts umrollen. Die unterste dieser Muscheln, *Concha inf.*, Fig. 82, ist ein selbstständiger Knochen; die oberen, *Concha superior* und *media*, sind Theile des Labyrinths des Siebbeins. Der angeheftete Rand sämtlicher Muscheln verläuft ziemlich genau sagittal, der freie gebogen, so dass jede in der Mitte ihrer Länge die grösste Höhe hat; an Länge übertrifft jede untere die nächst obere. Jede Muschel bildet mit ihrer concaven Fläche die Decke, mit ihrer convexen Fläche den Boden eines Ganges, der den grössten Theil der Nasenhöhle in sagittaler Richtung durchsetzt. Man zählt solcher Gänge (Nasengänge) drei, den untersten, *Meatus narium*

inf., zwischen dem Boden der Nasenhöhle und der unteren Muschel, den mittleren, *M. n. med.*, zwischen der unteren und mittleren, den obersten, *M. n. sup.*, Fig. 83, zwischen der mittleren und oberen Muschel. Bedeckt von den Muscheln, in der Seitenwand der Nasenhöhle, liegen die

Oeffnungen, durch welche die Zellen des Labyrinths, die Stirnhöhle und einige andere noch zu erwähnende Höhlen und Canäle der Gesichtsknochen mit der Nasenhöhle communiciren. Medianwärts öffnen sich die Nasengänge durch weite Spalten in den Theil der Nasenhöhle, der ununterbrochen von der Decke bis zum Boden reicht und den man den gemeinschaftlichen Nasengang nennen könnte. Ein Loch in der lateralen Wand der Nase, *Foramen sphenopalatinum* (Fig. 83), setzt die Nasenhöhle mit der Fossa sphenomaxillaris und weiter mit der Fossa infratemporalis in Verbindung (s. unten).

Augen-
höhle.

An die Nasenhöhlen schliessen sich jederseits die Augenhöhlen an, und der obere Theil der Seitenwand der Nase, an welchen von innen das Labyrinth sich lehnt, ist zugleich mediale Wand der Augenhöhle. Sie stösst mit der Decke der Augenhöhle unter einem stumpfen Winkel zusammen, in welchem im Hintergrunde der Augenhöhle der Ausgang des *Canalis opticus* und weiter nach vorn und vor einander die *Foramina ethmoidalia* liegen, jenes zum Eintritt des Sehnerven, diese zum Austritt von Gefässen und Nerven aus der Augenhöhle bestimmt. Der untere Theil der Seitenwand der Nase dagegen wird, mit Ausnahme des in das Gesicht ragenden, knorplichen Theils, durch einen Anbau, den Oberkieferkörper, verdeckt, welcher fast so weit als die Decke der Augenhöhle seitwärts vorspringt und mit seiner oberen, etwas abwärts geneigten Wand den Boden der Augenhöhle bildet. Dieser Anbau ist hohl, im Frontalschnitt dreiseitig mit nach unten gerichteter, stumpfer Spitze; seine obere Wand, in sagittaler Richtung vom *Canalis infraorbitalis* durchzogen, ist dreiseitig, ebenso der Querschnitt oben dreiseitig, unten halbkreisförmig



Frontaldurchschnitt des Gesichtsschädels vor dem ersten Backzahn.

1. Stirnhöhle. 2. Augenhöhle.
3. Kieferhöhle. 4. Nasenhöhle.

mit seitwärts gerichteter Spitze oder Convexität. Die Höhle heisst Kieferhöhle, *Sinus maxillaris* ¹⁾; sie steht mit der Nasenhöhle und zwar mit dem mittleren Nasengange durch eine weite Oeffnung der Wand, welche beiden gemeinschaftlich ist, in Verbindung. Der verschmälerte Boden der Kieferhöhle liegt mit dem Gaumen in gleicher Höhe und über dem Seitentheile des Zahnrandes, *Processus dentalis*, des Oberkiefers (Fig. 84).

Der Winkel, unter welchem die obere in die vordere Wand der Kieferhöhle umbiegt, macht einen Theil des unteren vorderen Randes der Augenhöhle aus (vergleiche Fig. 81). Von ihm steigt eine Kante gegen die Nasenwurzel auf, die vordere Grenze einer perpendicularen Rinne bildend, welche abwärts in einen cylindrischen Canal übergeht. Die Rinne ist die Thränengrube, *Fossa lacrymalis*


¹⁾ *Antrum Highmori*.

(Fig. 85, 86); der Canal heisst Thränen canal, *Canalis lacrymalis*; er läuft zwischen Kiefer- und Nasenhöhle herab, um sich in die letztere unterhalb der unteren Muschel zu öffnen; durch die Schleimhaut, womit er ausgekleidet ist, hängt der Schleimhautüberzug der Nasenhöhle mit der Schleimhaut der Augenlider zusammen.

Der Eingang in den Thränen canal unterbricht auf eine kurze Strecke den Zusammenhang der medialen Wand und des Bodens der Augenhöhle. Uebrigens, wenn man den Körper des Oberkiefers als einen Anbau an der Seitenwand der Nase bezeichnet, versteht es sich schon, dass die der Augenhöhle zugekehrte Seitenwand der Nase continuirlich auf die der Augenhöhle zugekehrte obere Wand der Kieferhöhle übergeht. Dieser Uebergang erfolgt so allmähig, dass die mediale und untere Wand der Augenhöhle nur Eine schiefe oder schwach ausgehöhlte Ebene bilden. Dem Unteraugenhöhlenrande gegenüber, im Hintergrunde der Augenhöhle, erfolgt der Uebergang der oberen Fläche des Oberkieferkörpers in die hintere Fläche desselben mittelst einer scharfen oder etwas abgerundeten vor- und seitwärts verlaufenden Kante; diese Kante macht den unteren Rand der *Fissura orbitalis inf.* aus, deren oberen Rand ich als Grenze des mittleren Gürtels der Schädelbasis und der Decke der Augenhöhle bereits erwähnte. Die Spalte führt aus der Augenhöhle zur Basis des Schädels und insbesondere zur Unterschläfengrube.


So weit die Augenhöhle von den Wänden der Schädel-, Nasen- und Kieferhöhle begrenzt wird (Fig. 86), kann man ihre Form einem Trichter

Fig. 86.



Ansicht des Gesichtsschädels, ohne Jochbein, von vorn, das Gesicht um Weniges nach links gestellt.

Fig. 87.



Die Gesichtsknochen mit dem Jochbein, in gleicher Stellung.

oder einer vierseitigen hohlen, mit der Spitze rückwärts gerichteten Pyramide vergleichen, aus welcher am unteren Theile der lateralen Wand ein schmaler, nach hinten zugespitzter Längsstreifen ausgeschnitten worden. Die dadurch entstandene Spalte würde am vorderen breiteren Ende offen sein, wenn sie nicht durch den vorüberziehenden Rand einer Knochenplatte

abgeschlossen würde, die sich ober- und unterhalb der Unteraugenhöhlenspalte an die Wand der Augenhöhle anlegt und diese Höhle seitlich vergrößern hilft. Diese Knochenplatte ist das Jochbein oder vielmehr der Orbitaltheil, *Pars orbitalis*, des Jochbeins. Der Augenhöhle mit der Einen Fläche zugewandt, geht sie mit der anderen in die Schläfenfläche des Schädels über, welche dadurch nach vorn über den Hirnschädel hinaus vergrößert, zugleich aber rinnenartig nach der Seite umgebogen wird, Fig. 88, eine Beugung, an welcher auch die anstossenden, die Schädel- und Augenhöhle seitlich begrenzenden Knochenwände (Stirnbein, Wespenbeinflügel und Oberkiefer) Antheil nehmen.


Ich nehme als Regel den Fall an, wo das Jochbein an der Bildung der Fiss. orb. inf. Theil nimmt. Diese Regel ist nicht ohne häufige Ausnahmen (s. Jochbein).

Die auf die eben beschriebene Weise entstandene flache Rinne wird vertieft und erhält eine Seitenwand durch die Anfügung des vorderen Endes des Jochbogens oder der Wangenplatte, *Pars malaris*, des Jochbeins.

Jochbogen.

Der Jochbogen geht aus der Verbindung dieser Platte mit einem Fortsatz des Schläfenbeins, *Processus zygomaticus*, hervor. Er entspringt,

Fig. 88.



Horizontaldurchschnitt des Gesichtsschädels, durch den vorderen Theil des Jochbogens.


† Schnittfläche der Gaumenflügel. Tsp Tuberc. spinosum. Sa Spina angularis. Frl For. lacerum.

wie bereits erwähnt, platt (deprimirt) aus dem hinteren Theile der unteren Kante der Schläfenfläche über der Oeffnung des knöchernen Gehörganges, läuft anfänglich, an der unteren Fläche zur Aufnahme des Gelenkkopfes des Unterkiefers ausgehöhlt, seitwärts, wendet sich weiterhin, zugleich mit einer Drehung um die eigene Axe, wodurch die obere Fläche zur medialen wird, nach vorn und erreicht in einer seitwärts convexen Krümmung wieder die Seitenwand des Gehirn- und Gesichtsschädels. In der Nähe des hinteren Ursprungs ist der Jochbogen niedrig (7^{mm}); allmählig wächst, im Verlauf nach vorn, seine Höhe auf etwa das Doppelte; dann, während der untere Rand in gleicher Flucht bis zum Oberkiefer fortschreitet, biegt der obere

Rand im rechten Winkel aufwärts um und wird zum hinteren Rande einer Platte, welche hoch genug ist, um sich längs des ganzen Seitenrandes der Augenhöhle anzulegen, Fig. 89. Die Vereinigung des Jochbogens mit der Seitenwand der Augenhöhle erfolgt unter einem spitzen Winkel, dessen nach vorn gelegener Scheitel scharf, dessen rückwärts schauende Oeffnung dagegen abgerundet ist. Oberhalb des seitlichen Augenhöhlenrandes geht die Aussenfläche des Jochbogens in die Stirn, unterhalb dieses Randes

geht sie in die Gesichtsfläche des Oberkiefers über; oben, wo der Jochbogen sich mit dem Hirnschädel verbindet, setzt sich sein vorderer Rand

Fig. 89.




Schädel im Profil.

in den oberen Rand der Augenhöhle, sein hinterer Rand in den Anfang der Schläfenlinie fort; unten, wo der Jochbogen sich an den Gesichtschädel anschliesst, unterbricht die Insertion desselben die halbkreisförmige Krümmung der Oberkieferfläche und theilt diese jederseits in ein vorderes und ein hinteres Feld. Das hintere Feld bildet die vordere Wand der Unterschläfengrube, deren anderweite Begrenzungen sogleich aufgezählt werden sollen. Eine Hervorragung des unteren Randes des Jochbogens nahe vor seinem Anschluss an den Oberkiefer wird Wangenhöcker, *Tuber zygomaticum*, genannt.

Die Unterschläfengrube liegt unter dem Seitentheile des mittleren Gürtels der Schädelbasis, vor- und medianwärts vom Unterkiefergelenk. Von der Schläfengrube ist sie durch die Wurzel des Jochbogens und weiter vorwärts durch die Unterschläfenfirste, *Crista infratemporalis*, geschieden (Fig. 88, 90). Indem diese Firste, von der Gegend der Wurzel des Jochbogens schräg median- und vorwärts auf dem Schläfen- und Wespen-

Unterschläfengrube.

bein zur *Fissura orbit. inf.* läuft, macht sie die laterale, dann die



Profilansicht des Gesichtsschädels mit geringer Drehung um die verticale Axe nach rechts und um die sagittale Axe mit der linken Hälfte aufwärts. Der Jochbogen und Unterkiefer entfernt. † † Schnittflächen des Jochbogens.

vordere Grenze der knöchernen Decke der Unterschläfengrube aus; an ihrem vorderen Ende, dicht hinter der *Fissura orbit. inf.*, findet sich ein wulst- oder zacken- oder kammförmiger Vorsprung, *Tuberculum spinosum*; von ihm aus geht ein Muskel quer zum *Proc. condyloideus* des Unterkiefers herüber. Der vorderen Grenze der Decke der Unterschläfengrube parallel wird die hintere durch die *Fissura sphenopetrosa*, eine Spalte zwischen dem Wespenbein und der Pyramide des Schläfenbeins, bezeichnet, an welcher die später, S. 90, zu erwähnende knorpliche Tuba verläuft. Hart vor dieser Spalte, mit dem längsten Durchmesser parallel derselben, liegt das


Foramen ovale, dahinter das *Foramen spinosum* und hinter diesem ragt mehr oder minder weit eine Zacke, der Wespenbeinstachel, *Spina angularis*, herab. Medianwärts verschmälert sich die obere Wand der Unterschläfengrube und biegt sanft in die mediale Wand dieser Grube um, welche durch die laterale Platte des *Proc. pterygoideus* gebildet wird. Von der vorderen Begrenzung der Unterschläfengrube, durch den Oberkieferkörper, war soeben die Rede. Ueber demselben communicirt sowohl die Schläfengrube als die Unterschläfengrube durch die *Fissura orb. inf.* mit der Augenhöhle; seitlich an dem Oberkiefer und unter dem Wangenhöcker vorbei gelangt man aus der Unterschläfengrube auf die Vorderfläche des Gesichts. Als laterale Wand der Unterschläfengrube dient vorn der Jochbogen, weiter rückwärts der Unterkieferast; nach unten und hinten ist die genannte Grube am knöchernen Schädel offen (vgl. Fig. 82), sie wird aber bis auf einige schmale Spalten durch die Muskeln verschlossen, welche vom Gaumenflügel des Wespenbeins zum hinteren Rande des Unterkieferastes treten.

Spheno-
maxillar-
grube.

Indem der Gaumenflügel des Wespenbeins, schräg ab- und vorwärts gerichtet, sich mit dem vorderen Rande allmähig dem Oberkiefer nähert und endlich mit dem unteren Theile des vorderen Randes fest an denselben anlegt, entsteht zwischen ihm und dem Oberkiefer, an der Grenze der medialen und vorderen Wand der Unterschläfengrube, eine dreiseitige, mit dem längsten Durchmesser vertical und mit der Spitze abwärts gerichtete

Spalte, die *Fissura sphenomaxillaris*, Fig. 90; sie führt in eine enge, medianwärts von der Unterschläfengrube gelegene Höhle, die Fossa

Fig. 91.



Seitenansicht des Schädels, insbesondere der die Fossa sphenomaxillaris umgrenzenden Theile. X Schnittfläche der Decke der Augenhöhle. †† Schnittflächen, wodurch der Temporalflügel des Wespenbeins von dem Körper dieses Knochens getrennt wurde. 1. Can. opticus. 2. Mediale Begrenzung der Fissura orbitalis sup. 3. 4. Foramina ethmoidalia ant. und post. 5. Eingänge der Cann. alveolares posteriores.

sphenomaxillaris, von welcher aus durch verschiedene Oeffnungen und Canäle der zweite Ast des Trigeminus und die Art. und V. maxillaris int. ihre Zweige verbreiten. Eine dünne, dem Gaumenbeine angehörige Knochenplatte schliesst, dem Eingange gegenüber, die Fossa sphenomaxillaris gegen die Nasenhöhle ab, in der Nähe des oberen Randes von dem bereits erwähnten *Foramen sphenopalatinum* durchbrochen, welches Gefässe und Nerven zur Nasenhöhle durchtreten lässt. Am oberen, schwach abwärts geneigten Theile der hinteren Wand der Sphenomaxillargrube liegt der Ausgang des Canals, *Canalis rotundus*, durch welchen der zweite Ast des Trigeminus aus dem Schädel hervordringt; es repräsentirt dieser Theil der hinteren Wand, insofern er die Schädelhöhle von der Sphenomaxillargrube scheidet, gewissermaassen die obere Wand oder Decke der letzteren. Etwas


ab- und medianwärts findet man die vordere Apertur des *Can. Vidianus*, welcher die Wurzel des Gaumenflügels sagittal durchsetzt und der Spitze der Schläfenpyramide gegenüber an der Schädelbasis ausmündet. An der Vorderseite, wo der Oberkiefer die Sphenomaxillargrube begrenzt, bietet sich über dem Rande dieses Knochens ein Ausgang durch die Fissura orbitalis inf. in die Augenhöhle dar. Am unteren Ende setzt sich von der Stelle, wo der Gaumenflügel an den Oberkiefer sich anlehnt, zwischen Gaumenflügel, Oberkiefer und Gaumenbein ein weiterhin mehrfach getheilter Canal, *Canalis pterygopalatinus*, abwärts fort, um sich an der hinteren seitlichen Ecke der unteren Gaumenfläche zu öffnen.

Gehör-
apparat.

Gleich der Augenhöhle wird auch die zur Aufnahme des Gehörorgans bestimmte Höhle zum Theil unmittelbar von der Basis des Hirnschädels, zum Theil von Knochenplatten, die dem vegetativen Rohre angehören, gebildet, so dass die Schädelbasis zugleich die Decke, die dem vegetativen Rohre angehörigen Knochen den Boden dieser Höhle darstellen und in den Seitenwänden der letzteren die Knochen der animalischen und vegetativen Röhre einander begegnen. Die den Gehörapparat umschliessenden Knochen setzen, mit einigen Zuthaten, welche später einzeln namhaft gemacht werden sollen, die Pyramide des Schläfenbeins zusammen. Wir versuchen, um die Gestalt dieses Skeletttheils verständlicher zu machen, zuerst die Grundform des Gehörapparates zu construiren. Derselbe besteht aus zwei Haupttheilen, dem Labyrinth (Fig. 92, 1) und dem Zuleitungsrohr (2, 2', 2''). Das Labyrinth ist mit Wasser, das Zuleitungsrohr mit Luft erfüllt. Von dem Labyrinth genüge es, zu bemerken, dass es eine in der Dicke der Wand der Schädelbasis eingeschlossene Höhlung ist, gemodelt nach der Form häutiger, gleichfalls wasserhaltiger Bläschen und Röhrchen, die in dem Wasser desselben aufgehängt sind und die Endausbreitung des Hörnerven tragen. Von der Schädelhöhle her führt zum Labyrinth ein Canal, *Meatus acust. int.*, welcher vom Stamme des Hörnerven ausgefüllt wird; in der äusseren Wand des Labyrinths sind zwei rundliche Knochenlücken, über welche Membranen hingespant sind, sogenannte Fenster, die in das Lumen des Zuleitungsrohres schauen. Das Zuleitungsrohr lässt sich als eine Ausstülpung des Schlundkopfes (3) betrachten, welche aus dem obersten Theile der lateralen Wand hervor- und dann dicht unter der Schädelbasis und an der äusseren Wand des Labyrinths vorüber rück- und seitwärts geht, um sich zwischen dem Warzenfortsatz und dem Unterkiefergelenk an der Seitenfläche des Schädels zu öffnen. Die Schleimhaut des Schlundes würde sich auf diese Weise bis in die äussere Haut des Ohres und so weiter fortsetzen, schlosse nicht in der Nähe der äusseren Oeffnung eine häutige Scheidewand, Paukenfell (*), den äusseren oder lateralen Theil dieses Rohres gegen den inneren oder medialen Theil hermetisch ab. Der laterale Theil, von einer blinden Einstülpung der äusseren Haut ausgekleidet, ist der äussere Gehörgang (2); er ist, vom äusseren Ohre an gerechnet, eine Strecke knorplich, dann knöchern und verläuft im Allgemeinen in einer transversalen Richtung. Der mediale Theil, in welchen ein gleichfalls blinder Fortsatz der Schleimhaut des Schlundes sich hineinzieht, biegt allmähig in eine Richtung um, welche zwischen der transversalen und sagittalen ungefähr die Mitte hält. Er zerfällt in zwei

nicht scharf gegen einander abgegrenzte Abtheilungen, Paukenhöhle (2') und Tuba (2''). Die dem Paukenfell zunächst gelegene, geräumigere Ab-

Fig. 92.




Transversaler Durchschnitt des Gehörapparates. 1. Gehörlabyrinth. 2. Äusserer Gehörgang. 2' Paukenhöhle. 2'' Tuba. 3. Schlundkopf. * Paukenfell; von demselben aus geht eine punktirte Linie zu einem der Fenster des Labyrinths, die Lage der Gehörknöchelchen bezeichnend. 4. 4. Knorpel des äusseren Ohrs und Gehörganges 5. 5. Knorpel der Tuba. Fmd. Gelenkgrube des Unterkiefers. Cca. Canalis caroticus. † Durchschnitt des Proc. pterygoid. des Wespenbeins. †† Durchschnitt des Warzenfortsatzes.

theilung ist die Paukenhöhle; ihre laterale Wand ist das Paukenfell; dem Paukenfell gegenüber, am medialen, wegen der Krümmung des Canals zugleich nach vorn gerichteten Ende verjüngt sie sich zur Tuba. In die hintere Wand der Paukenhöhle, welche aber wegen der erwähnten Krümmung mehr lateral- als vorwärts gewandt ist, öffnen sich die Fenster des Labyrinths. Von dem Mittelpunkt des Paukenfells zu dem obersten dieser Fenster verläuft (durch eine punktirte Linie angedeutet) eine Kette kleiner, unter einander articulirender Knöchelchen (*Ossicula auditus*), deren Beschreibung ich für die Splanchnologie verspare. Durch eine seitwärts von den Fenstern befindliche weite Oeffnung der hinteren Wand tritt die Paukenhöhle mit einer Höhle des Warzenfortsatzes, *Antrum mastoideum*, und den leeren Zellen desselben in der nämlichen Weise in Verbindung, wie die Nasenhöhle mit den Aushöhlungen des Stirnbeins und Wespenbeinkörpers. Die mediale, resp. vordere engere und röhrenförmige Abtheilung, die Tuba, ist wie der äussere Gehörgang halb knorplich, halb knöchern; knöchern an der der Paukenhöhle zugekehrten Seite, knorplich am unteren, dem Schlunde zunächst gelegenen Theile.

Die knorplich-knöcherne Wandung des eben beschriebenen Zuleitungsrohres gleicht in ihrer ganzen Länge einer Dachrinne oder einer cylindri-

Fig. 93.



Pyramide des rechten Schläfenbeins mit den knorplichen Anhängen, von unten, die mediale Wand der knorplichen Tuba mit dem unteren Rande medianwärts umgebogen. † Durchschnitt des Pr. pterygoid. †† Durchschnitt des Pr. styloideus. 1. Knorplicher Gehörgang. 2. Knorpel der Tuba. Pc. Gelenkfortsatz des Hinterhauptes. Prm. Proc. mastoideus. Fmd. Gelenkgrube des Unterkiefers. Fov. For. ovale. Fs. Foramen spinosum. Sa. Spina angularis des Wespenbeins.

schen Röhre, aus deren Wand ein schmaler oder breiter Längsstreifen ausgeschnitten ist. An dem knorplichen Theile der Tuba fehlt die vordere und untere Wand, an dem Knorpel des äusseren Gehörganges ein Streif der oberen Wand. So weit die Rinne knöchern ist, ist sie von unten her theilweise bis zu völliger Verschmelzung an die Schädelbasis angelöthet, doch wird auch hier am vorderen und hinteren Rande die Anfügungsstelle durch schmale, spaltförmige Vertiefungen bezeichnet.

Schläfen-
pyramide.

Ich habe von einigen Zuthaten gesprochen, welche, indem sie sich an die eben beschriebenen Knochentheile anlehnen und mit denselben verwachsen, die Pyramide des Schläfenbeins vervollständigen. Dahin gehören: 1) Die knöchernen Wände, welche den Canal der Carotis, *Can. caroticus*, umschliessen. Dieser Canal beginnt medianwärts neben dem vorderen Ende der knöchernen Tuba und läuft erst aufwärts, dann mit einer Biegung, der knorplichen Tuba parallel, vor- und medianwärts, so dass der Eingang in der Flucht der Schädelbasis horizontal, der Ausgang an der Spitze der Pyramide vertical gerichtet ist. Der Ausgang sieht demnach gegen die Seitenwand des Körpers des Hinterhauptbeins. Zwischen der Spitze der Pyramide, dem Körper des Hinterhauptbeins und dem hinteren Rande des Temporalflügels des Wespenbeins bleibt eine grosse, unregelmässige, von Faserknorpel ausgefüllte Lücke, *Foramen lacerum*, in welcher sich die beiden Spalten begegnen, welche vor und hinter der Spitze der Pyramide verlaufen, die *Fissura sphenopetrosa*, in welcher die Tuba ruht, zwischen der Spitze der Pyramide und dem Temporalflügel, und die *Fissura petrobasis* zwischen der Spitze der Pyramide und

dem Hinterhauptsbeine. Die letztere verbindet das *For. lacerum* mit dem *For. jugulare*. 2) Der Griffelfortsatz, *Proc. styloideus* (††); dies ist der mehr oder minder weit abwärts verknöcherte obere Theil des Aufhängebandes des Zungenbeins, welcher mit der unteren Wand der Paukenhöhle, an die er befestigt ist, verschmilzt. Der Stelle, von welcher aussen der Griffelfortsatz abgeht, entspricht innen ungefähr der Knochenfalz, in welchen das Paukenfell eingefügt ist.

Ein Ausschnitt am lateralen Theile des hinteren Randes der Pyramide umgrenzt mit einem entsprechenden Ausschnitt am Hinterhauptsbeine das *For. jugulare*, und ein Vorsprung in jedem dieser beiden Ausschnitte trennt das Foramen jugulare unvollkommen in zwei Oeffnungen, die hintere für die V. jugularis, die vordere für die Nerven (s. oben). Von dem *For. jugulare* ist die äussere Mündung des *Canalis hypoglossi* nur durch eine schmale Knochenbrücke geschieden. Dicht am hinteren Rande des Foramen jugulare, in der Pyramide des Schläfenbeins und unmittelbar hinter der Basis des Griffelfortsatzes, liegt das *Foramen stylomastoideum*, aus welchem der siebente Hirnnerv hervortritt.

1. Hinterhauptsbein, *Os occipitis*.

Das Hinterhauptsbein nimmt den hinteren Theil der Grundfläche und die hintere Wand des Schädels ein, das Hinterhauptsloch, *Foramen occipitale* ¹⁾ allseitig umschliessend. Ein schwammiges, wirbelkörperartiges Stück (Fig. 94), welches von vornher das Hinterhauptsloch begrenzt, wird Körper, *Corpus* ²⁾, genannt; eine vom hinteren Rande des Hinterhauptsloches sich rück- und aufwärts erstreckende, nach aussen gewölbte, nach oben zugespitzte Platte heisst Schuppe, *Squama* ³⁾. Zwischen Körper und Schuppe liegt jederseits, in beide ohne scharfe Begrenzung übergehend, der Seitentheil, *Pars lateralis* ⁴⁾, welcher den auf der Gelenkfläche des Atlas articulirenden Gelenkhöcker trägt.

1. Hinterhauptsbein.

Der Körper des Hinterhauptsbeins ist es, in welchem hauptsächlich die mehrerwähnte Umbeugung der Axe der Wirbelsäule aus der verticalen in die horizontale Richtung geschieht. Dieses Knochenstück würde demnach, wenn es im Uebrigen die Gestalt eines regulären Wirbelkörpers hätte, von einem solchen doch darin abweichen, dass die Endflächen nicht parallel, sondern fast rechtwinklig gegen einander geneigt, d. h. die untere horizontal, die obere und nunmehr vordere nahezu vertical ständen. Statt der unteren Endfläche aber besitzt der Körper des Hinterhauptsbeines einen scharfen Rand, der, ebenso wie der obere Rand des vorderen Bogens des Atlas, gekrümmt und an diesen durch ein Band befestigt ist. Von jenem Rande aus gehen die innere und äussere oder die der Hirn- und der Eingeweidehöhle zugewandten Flächen beide schräg aufwärts, aber die

Körper.

¹⁾ *F. occip. magnum*.


²⁾ Zapfentheil, *Basis*, *Pars basilaris*.

³⁾ *Pars occipitalis*.

⁴⁾ *Pars condyloidea*, *jugularis*.

innere Fläche steiler als die äussere, wobei also der Knochen an Höhe zunimmt und eine vordere Endfläche gewinnt, welche, so lange sie überhaupt

Fig. 94.




Mediandurchschnitt des Hinterhauptsbeins.

noch von der entsprechenden des Wespenbeins geschieden werden kann, fast vierseitig (Fig. 95 u. 96) und etwa um die Hälfte breiter als hoch ist (21 : 13^{mm}). Gleich der Durchschnitsfläche werden auch die Seitenflächen nach vorn allmählig höher, doch ist nur die vordere Hälfte derselben frei (an die

hintere fügt sich der Seitenteil); sie geht in die untere Fläche des Körpers mit einem abgerundeten Rande über; die Kante, in welcher sie mit der oberen Fläche des Körpers jederseits zusammenstösst, ist ein scharfer, vorspringender Saum, an den eine ähnliche Kante der Schläfenpyramide sich anlehnt. Die obere und untere Fläche verschmälern sich nach vorn; die obere ist glatt, die untere rauh; die obere ist von Einer Seite zur anderen ausgehöhlt, die untere schwach gewölbt. Nur dicht am Seitenrande fällt die obere Fläche (Fig. 95) wieder seitwärts ab, eine Furche, *Semisulcus petrosus inf.*, bildend, die sich noch nach hinten auf den Seitenrand der Pars lateralis verfolgen lässt und durch das anstossende Schläfenbein zu einer tiefen Rinne vervollständigt wird; die Rinne nimmt einen Blutleiter, den Sinus petr. inf., auf. Die untere Fläche (Fig. 96) ist ausgezeichnet durch ein medianes Knötchen, *Tuberculum pharyngeum* ¹⁾, welches einige Linien vor dem Hinterhauptsloche liegt und sich

Fig. 95.




Hinterhauptsbein, von vorn.

geum ¹⁾, welches einige Linien vor dem Hinterhauptsloche liegt und sich

¹⁾ *Spina s. Crista pharyngea s. basilaris.*

gegen dasselbe oder gegen den vorderen Rand des Knochens oder nach beiden Richtungen öfters in eine schwache Firste fortsetzt. An das Knötchen

Fig. 96.



Hinterhauptsbein, von unten.

heftet sich die Spitze eines in der Mitte der hinteren Wand des Schlundes gelegenen Sehnenstreifens, der *Linea alba pharyngis*. Es dient demnach, die Grenze zu bezeichnen, von welcher aus nach vorn die Schädelbasis Decke der Rachenhöhle wird. Eine Querleiste, welche sich jederseits, in einiger Entfernung seitlich vom *Tub. phar.* beginnend, auf den Seitentheil erstreckt, dient einem Muskel (*Rect. cap. ant. min.*) zum Ansatz.

Die Schuppe kehrt Schuppe.

den mittleren, tief ausgeschnittenen und wulstigen Theil ihres vorderen Randes dem Hinterhauptsloche zu; die Seitenränder gehen von der oberen Spitze erst divergirend ab- und lateralwärts, wenden sich dann unter einem sehr stumpfen Winkel (*Seitenwinkel*) medianwärts, bis sie wieder unter einem stumpfen, nach aussen offenen Winkel in den Seitenrand der *Pars lateralis* übergehen. Der oberhalb des Seitenwinkels gelegene Theil des Seitenrandes verbindet sich in einer scharfgezackten Naht mit dem Scheitelbein; unter dem Winkel ist der Rand mit schwächeren Zacken versehen und mit dem hinteren Rande des Warzentheils des Schläfenbeins zusammengefügt. In der Naht zwischen dem Hinterhaupts- und Schläfenbeine oder in dem Warzentheile des Schläfenbeins liegt das *Foramen mastoideum* (siehe Schläfenbein).

Die Grenze der Hinterhaupts- und Nackengegend ist auf der äusseren Fläche der Schuppe (Fig. 97) durch eine von dem Einen Seitenwinkel zum anderen oder etwas unterhalb derselben sich erstreckende, aufwärts convexe Bogenlinie, die obere Nackenlinie, *Linea nuchae sup.* ¹⁾, bezeichnet, welche in der Regel durch eine mediane Einkerbung mehr oder weniger tief getheilt ist. Ueber oder in der Einkerbung ist die Hinterhauptschuppe verdickt, auch wohl in einen Höcker oder eine platte abwärts gerichtete Spitze ausgezogen, *Protuberantia* ²⁾ *occip. ext.*; von da aus bis herab zum Rande des Hinterhauptsloches erstreckt sich eine mediane Firste, *Lin. nuchae mediana* ³⁾. Etwa in der Mitte zwischen der oberen Nackenlinie und dem Rande des Hinterhauptsloches verläuft die untere Nackenlinie, *Lin. nuchae infer.* ⁴⁾, an manchen Schädeln ziemlich

¹⁾ *L. semicircularis sup. a u t.*


²⁾ *Spina.*

³⁾ *Crista occipitalis.*

⁴⁾ *L. semicircularis inf.*

regelmässig der oberen parallel, an anderen winklig oder unterbrochen. An die mediane Nackenlinie setzt sich das Nackenband, an die gebogenen

Fig. 97.



Hinterhauptsbein, von hinten.

Nackenlinien und die Fläche zwischen denselben setzen sich die Muskeln des Nackens fest.

Die innere Oberfläche der Schuppe (Fig. 95 und 96) ist durch zwei parallele, eine Furche einschliessende Firsten, welche in der Höhe des Seitenwinkels oder dicht über demselben fast horizontal gehen, in ein oberes und unteres Feld getheilt, von denen jenes dem Schädeldach, dieses der hinteren Schädelgrube angehört. Senkrecht auf

diese Querfurche, *Sulc. transversus*, steht im oberen Felde eine seichtere Furche, *Sulc. sagittalis*, im unteren ein einfacher Kamm, *Crista occipit. int.*, der aber bald in zwei, das Hinterhauptsloch umfassende und längs dem Rande desselben sich verlierende Schenkel aus einander weicht. Wo die obere verticale Furche auf die Querfurche trifft, biegt sie sich meistens in die rechte Hälfte der letzteren um. Die Kreuzungsstelle der Furchen und Firsten ragt, der äusseren Protuberanz gegenüber oder etwas tiefer als diese, in Form eines platten oder theilweise scharfen Wulstes, *Protuberantia occ. int.*, nach innen vor ¹⁾.

In den Feldern oder Gruben über der Querfurche liegen die hinteren Spitzen der Hemisphären des Grosshirns, in den unteren Feldern das Kleinhirn. Hier, zu beiden Seiten der *Crista occ. int.*, ist die Mächtigkeit des Knochens am geringsten. In der Längsfurche selbst ruht der *Sinus sagittalis sup.*, in der Querfurche jederseits ein *Sinus transversus*, von denen gewöhnlich der rechte stärker ist und den *Sinus sagittalis* aufnimmt. Abweichungen von diesem Verlaufe der Blutleiter bedingen Varietäten der Gestalt der inneren Oberfläche der Schuppe. Die Furchen sind tiefer oder seichter oder fehlen theilweise. Auch die untere Firste kann furchenartig werden und am Hinterhauptsloche in eine Furche (*Sulcus marginalis for. magni*) übergehen, die den hinteren Rand dieses Loches halbkreisförmig umgiebt (Barkow, anatom. Abhandlungen. Breslau 1851. S. 1. Taf. I. Fig. 1). Die Schuppe ist in seltenen Fällen der Länge nach, häufiger transversal getheilt (Meckel. Otto, *De rarioribus quibusdam sceleti humani cum animalium sceleto*

¹⁾ Die von der Protub. int. ausgehenden kreuzförmigen Furchen werden die *Eminentia cruciata* des Hinterhauptsbeins genannt.

analogis. Wratisl. 1839. p. 11); in einem von Otto (a. a. O. Fig. 1) beobachteten Falle trug ihre Spitze einen zungenförmigen, zwischen die Scheitelbeine eingeschobenen Fortsatz.

Die Seitentheile des Hinterhauptsbeines gehen platt und breit aus Seitentheile. der Schuppe hervor und fügen sich, hoch und schmal, an den Körper an. Die Abnahme der Breite erfolgt rasch durch einen tiefen, abgerundeten Ausschnitt des Seitenrandes, Drosselausschnitt, *Incisura jugularis* (Fig. 95), welcher den hinteren und medialen Rand des Foramen jugulare ¹⁾ ausmacht. Bis zu diesem Ausschnitt ist der laterale Rand des Seitentheiles mit dem Schläfenbeine zusammengefügt, und zwar hinten mit dem Warzenthelle durch eine schwachzackige Naht, eine unmittelbare Fortsetzung der Naht, welche zwischen der Schuppe des Hinterhauptsbeins und dem Warzenthell besteht; vorn mit der Pyramide des Schläfenbeins durch eine bald nach der Pubertät verknöchernde Synchronrose, *Synchondrosis petro-occipitalis* (Fig. 95 und 96), deren Berührungsflächen spitzwinklig dreiseitig, mit aufwärts gerichteter Spitze, am Hinterhauptsbeine schwach convex, am Schläfenbeine schwach concav, dort auf-, hier abwärts geneigt sind. An der *Incisura jugularis* selbst ist der Rand scharf. Das zunächst hinter dem querverlaufenden Theile des Jugularausschnittes gelegene Stück des Hinterhauptsbeins heisst Drosselfortsatz, *Processus jugularis*. Die äussere Fläche desselben ist ein transversaler Wulst, der dem M. rect. cap. lateralis zum Ansatz dient (Fig. 97 *); die innere glatte Fläche wird durch eine quere Firste (Fig. 95 und 96 **), die gegen den Seitenrand hin zur oberen Spitze der *Synchondrosis petro-occipitalis* ansteigt, in zwei Felder geschieden. Das hintere Feld, indem es sich auch nach hinten gegen die Schuppe durch eine stumpfe, schräg median- und vorwärts laufende Kante absetzt, erscheint als breite Furche, zur Aufnahme des vorderen Endes des Sin. transversus; das vordere Feld, steil abwärts zum Rande des Foramen jugulare abfallend, stützt die hintere Wand des Anfanges der V. jugularis. Am medialen Ende der Firste, welche diese beiden Flächen trennt, oder in der einen oder anderen dieser Flächen findet sich die innere Mündung eines Canals, *Canalis condyloid.* ²⁾ (Fig. 95), welcher in schräger Richtung rück- und abwärts den Knochen durchsetzt und sich in einer Grube hinter dem Gelenkhöcker, *Fossa condyloidea* (Fig. 97), nach aussen öffnet.

Er fehlt nicht selten. In demselben liegt ein Communicationsast des Sin. transv. mit den äusseren Venen des Schädels (Emissarium). In einem Präparate unserer Sammlung geht der Canal von der inneren Mündung an vor- und medianwärts in den sogleich zu beschreibenden Canal des Hypoglossus.

Die Verbindung zwischen der Schuppe und dem seitlich an dieselbe sich anschliessenden Proc. jugularis einerseits und dem Hinterhauptskörper andererseits bewerkstelligen zwei Knochenleisten, von denen die eine in aufwärts, die andere in abwärts convexem Bogen verläuft (Fig. 96). Sie fassen einen Canal zwischen sich, den *Can. hypoglossi* ³⁾, welcher in schräger Rich-

¹⁾ *F. lacerum posterius.*

²⁾ *Foramen condyl. post. a u t.*

³⁾ *Foramen condyl. ant. a u t.*

tung seit- und vorwärts den N. hypoglossus aus der Schädelhöhle führt. Die Divergenz beider Leisten ist, neben ihrer nach vorn hin wachsenden Mächtigkeit, Ursache der Höhenzunahme, welche die Seitentheile in ihrem Anschluss an den Körper erfahren. Von diesen Leisten entspricht die untere, zugleich der Mittellinie nähere dem seitlichen, gelenktragenden Theile des Körpers eines Drehwirbels. Ihre untere Fläche vermittelt die Articulation mit dem Atlas. Die Gelenkflächen sind, gleich denen des Atlas, länger als breit und mit den vorderen Spitzen gegen einander geneigt; sie sind aber zugleich mit den Flächen etwas von einander ab- und seitwärts gekehrt, indem der mediale Rand tiefer steht als der laterale. Im Frontalschnitt sind sie schwach convex, dergestalt, dass die Convexitäten beider Flächen in Einem flachen Kreisbogen zu liegen scheinen; eine stärkere Wölbung besitzen sie in der Richtung von vorn nach hinten. Indem die hintere Spitze in eine Grube, die Fossa condyloidea, eingelassen, die vordere dagegen durch einen abwärts gerichteten Vorsprung, den Gelenkfortsatz, *Proc. condyloideus* (Fig. 96 und 97), abwärts geschoben ist, kommen beide, die vordere und hintere Spitze, bei ruhiger aufrechter Haltung des Schädels in eine horizontale Ebene zu liegen, indess eine durch das Hinterhauptsloch und den Körper des Hinterhauptes gelegte Ebene schräg ansteigt. Medianwärts gehen die Gelenkfortsätze in den vorderen Rand des Hinterhauptsloches über und bilden mit demselben einen continuirlichen Bogen, welcher die Lücke zwischen Hinterhaupt und Atlas von oben her begrenzt.

Ueber die eben beschriebene untere Leiste ist die obere und zugleich mehr seitlich gelegene gleich einem Brückenbogen hinübergespannt, in derselben Weise, wie zuweilen am oberen Rande des Atlas eine Knochenbrücke von der Seitenmasse zum hinteren Bogen verläuft. Von der Aussenfläche der Schädelbasis gesehen, scheidet jene Brücke die äussere Mündung des Can. hypoglossi (Fig. 96) von dem Foramen jugulare. An der Seite, welche sie dieser Oeffnung zuwendet, zieht sich von hinten her in Form einer Firste der Rand des Foramen jugulare, von vorn her die Spitze der rauhen Seitenfläche des Körpers herauf. In der Regel springt diese Spitze (Fig. 96 ***) seitlich vor in Form eines Fortsatzes ¹⁾, welcher sich genau an die Schläfenpyramide anlegt und das For. jugulare von vornher begrenzt. Die Firste, welche den Rand des Foramen jugulare bildet, trägt dicht hinter dem vorderen Ende ein Knötchen, zuweilen auch einen kurzen Stachel, *Processus intrajugularis ossis occipitis* ²⁾, wodurch sie das Foramen jugulare in einen hinteren grösseren Abschnitt (für die V. jugularis) und einen vorderen kleineren für die Nerven quertheilen hilft. Die Furche des Sinus petrosus inferior geht vor diesem Knötchen oder Stachel abwärts und das Ende des Sinus petrosus liegt demnach mit den Nerven in der vorderen Abtheilung des For. jugulare. Die untere Fläche des Brückenbogens, welche sich dem Canal des Hypoglossus zuwendet, ist glatt, ausgehöhlt, der Eingang in diesen Canal öfters durch ein feines Knochenstäbchen der Länge nach getheilt. Die obere Fläche ist aus-

¹⁾ *Proc. jugularis accessorius* M. J. Weber, *Proc. j. anterior* Gruber.

²⁾ *Proc. jugularis medius* Gruber.

gezeichnet durch eine seichte Querfurche, welche den Verlauf der Nerven andeutet und durch eine verdickte und rauhe Stelle, *Tuberc. jugulare* ¹⁾ vor dieser Querfurche, welche den auf dem Hinterhauptskörper ruhenden Hirntheilen zur seitlichen Stütze dient.

Var. Die Gelenkflächen des Hinterhauptsbeins sind, gleich denen des Atlas, durch eine Rinne quergetheilt. — Zwischen dem Gelenkfortsatz und der Jugularöffnung verläuft ein vom scharfen Rand der letzteren mehr oder minder gedeckter Gefässcanal. Schultz, Bem. über den Bau der Menschenschädel. Petersb. 1852. S. 15. Taf. II. Fig. 5. An drei Schädeln beobachtete Dieterich (Beschreibung einiger Abnormitäten des Menschenschädels. Basel 1842. S. 8. Fig. 1) am vorderen Rande des For. occipitale eine Gelenkgrube zur Aufnahme des Zahnes des zweiten Halswirbels. Gruber (Neue Anomalien. Berl. 1849. S. 4) sah eine Gelenkfläche am hinteren Rande des Hinterhauptsloches und den vorderen Rand rinnenförmig vertieft zur Aufnahme des vorderen Bogens des ersten Halswirbels. Ein cylindrischer medianer Fortsatz oder zwei Fortsätze neben einander mit überknorpelter unterer Fläche kommen am vorderen Rande des Hinterhauptsloches vor zur Articulation mit dem Atlas (Meckel, dessen Archiv Bd. I. S. 644. Taf. VI. Fig. 37. Dieterich, a. a. O. Gruber, a. a. O. S. 3). Neben dem Proc. jugularis findet sich ein überknorpelter Fortsatz, *Processus paramastoideus*, der mit dem Querfortsatze des ersten Halswirbels articulirt (Dieterich, a. a. O. Fig. 5. Mayer, N. Untersuchungen aus d. Gebiete der Anatomie und Physiol. Bonn 1842. S. 19. Patruban, Prager Vierteljahrsschr. 1848. Bd. I. S. 36. Taf. I. Fig. 5. 6. Gruber, a. a. O. S. 4).

Von der lateralen Spitze der Firste, welche den Sulcus transversus von vornher begrenzt, geht ein Knochenplättchen rückwärts, um diese Furche zu überwölben (Gruber, a. a. O. S. 5). Der Processus jugularis ist von einem Emissarium durchbohrt (ebendas.).

In der Form gleicht das Hinterhauptsloch dem For. vertebrale des ersten Halswirbels. Es ist elliptisch, mit dem längsten Durchmesser (30^{mm}) sagittal gestellt, die vordere Abtheilung von beiden Seiten her aussen durch die Gelenkfortsätze, innen durch die Tubercula jugularia eingengt.

Beim Neugeborenen besteht das Hinterhauptsbein aus vier, durch Synchondrose zusammengefügteten Stücken, dem Körper, der Schuppe und den beiden Seitentheilen. Die paarigen Seitenstücke entsprechen aber nicht dem Theile des Knochens, der beim Erwachsenen Seitentheil genannt wird, indem einerseits die Naht zwischen den Seitenstücken und dem Körper beim Neugeborenen durch die Gelenkhöcker geht und der Körper die vordere Spitze der letzteren trägt, andererseits die Naht zwischen Seitenstücken und Schuppe fast in gleicher Flucht mit dem hinteren Rande des Hinterhauptsloches liegt, das letztere also beim Neugeborenen seitlich fast allein durch die Seitenstücke begrenzt wird. Die Schuppe ist von der Spitze aus senkrecht und von der Mitte des Seitenrandes aus transversal mehr oder minder tief eingeschnitten, Einschnitte, welche sich mitunter in Form feiner Fissuren ziemlich lange erhalten. Im zweiten bis vierten Jahre verbinden sich die Seitentheile mit der Schuppe, ein bis zwei Jahre später mit dem Körper. — Bevor das Hinterhauptsbein mit dem Wespenbeine verschmilzt, bilden sich an beiden Flächen der Synchondrose platte Knochenscheiben, ähnlich denjenigen auf den Endflächen der Wirbelkörper.

2. Wespenbein, *Os sphenoides*.

Es besteht aus einem unpaaren, würfelförmigen Mittelstück, dem Körper, dessen hintere Fläche an die Vorderfläche des gleichnamigen Stückes des Hinterhauptsbeins stösst und im Erwachsenen mit demselben verschmilzt, 2. Wespenbein.


¹⁾ *Proc. anonymus*.

und aus den symmetrischen Seitentheilen. Der Körper zeigt in den ersten Lebensjahren und zuweilen noch später die Spuren der Zusammensetzung aus zwei hinter einander gelegenen und durch Synchronrose verbundenen Stücken von fast gleicher Grösse; er stellt also zwei an den Berührungsflächen verschmolzene Wirbelkörper dar. Die Seitentheile sind jederseits drei platte, flügelartige Fortsätze, zwei horizontal, der dritte vertical mit geringer Neigung des unteren Endes nach vorn gestellt. Die horizontalen verhalten sich zum Körper wie Anfänge von Wirbelbogen; sie gehören, so lange der Wespenbeinkörper sich in zwei zerlegen lässt, der eine dem vorderen, der andere dem hinteren Körper an; der horizontale Fortsatz des vorderen Körpers, in allen Dimensionen der kleinere, wird Orbitalflügel, *Ala orbitalis* ¹⁾, der von dem hinteren Wespenbeinkörper ausgehende horizontale Fortsatz wird Temporalflügel, *Ala temporalis* ²⁾, genannt. Die Spalte zwischen beiden ist die obere Augenhöhle, *Fissura orbitalis sup.* ³⁾. Der verticale Fortsatz lässt sich einem Rippenrudiment vergleichen, welches, an dem Körper und dem Temporalflügel entspringend, in der Seitenwand der Choane abwärts zum Gaumen geht. Er führt den Namen Gaumenflügel, *Proc. pterygoideus* ⁴⁾.

a. Körper

Der Wespenbeinkörper wendet die obere Fläche der Schädelhöhle, die untere der Nasenhöhle zu; in


Fig. 98.



Medianschnitt des Wespenbeins.
Crs Crista sphenoid. Rs Rostr. sphenoid.

die letztgenannte Höhle schaut auch die vordere Fläche, während die hintere, wie erwähnt, an den Körper des Hinterhauptbeins stösst. Die lateralen Flächen sind fast ganz durch die Wurzeln der horizontalen Fortsätze eingenommen und verdeckt. Die hintere Fläche ist stark abwärts geneigt (Fig. 98), die vordere ist es ebenfalls in geringerem Grade, wenn man absieht von einem medianen vorspringenden Kamm, der diese

Fig. 99.



obere Fläche

Wespenbein von oben. Pea Proc. clinoid. ant.

Fläche theilt. Durch die Convergenz der hinteren und vorderen Fläche nach unten erhält der Körper die Keilform, derentwegen man ihn mit dem Schlussstein eines Gewölbes vergleichen hat.

Die obere Fläche des Wespenbeins wird durch zwei quer verlaufende Vorragungen in drei Felder abgetheilt, von welchen das mittlere die Art von Isthmus darstellt, welcher die

¹⁾ *Ala parva, Proc. ensiformis.*

²⁾ *Fissuras sphenoidalis.*

³⁾ *Ala magna, Ala lateralis.*

⁴⁾ *Ala descendens s. palatina.*

beiden Seitenhälften der mittleren Schädelgrube verbindet, das vordere und hintere Feld demnach je der vorderen und hinteren Schädelgrube angehören. Das mittlere Feld nimmt etwa die Hälfte, das vordere und hintere Feld je ein Viertel des sagittalen Durchmessers der ganzen Fläche (34^{mm}) ein. Die vordere Vorrangung, *Limbus sphen. m.*, ist in ihrem mittleren Theile einem feinen, platt aufliegenden Saume ähnlich, der sich zuweilen kaum merklich gegen die Fläche absetzt; um so auffallender wird sie nach den Seiten, wo der hintere Rand des Saumes sich aus dem transversalen Verlauf im Bogen rückwärts wendet, um in die hintere Spitze des Orbitalflügels überzugehen. Die Fläche vor dem Limbus ¹⁾ ist glatt, mit einer leise angedeuteten medianen Firste, einer Art Vorläufer der Crista galli; nach den Seiten setzt sich diese Fläche ununterbrochen in die obere Fläche der Orbitalflügel fort; ihr vorderer Rand, welcher ebenfalls continuirlich in den vorderen Rand der Orbitalflügel übergeht, ist mit dem hinteren Rand des Stirnbeins und der Siebbeinplatte in mehr oder minder zackiger Naht verbunden, selten einfach transversal, meistens in eine einfache oder getheilte mediane Spitze vorspringend.

Das mittlere Feld der oberen Wespenbeinfläche in Verbindung mit der Hervorragung, durch welche es von dem hinteren Felde geschieden wird, gewährt das Bild eines Sattels mit Knopf und Lehne ²⁾, in dessen Vertiefung oder Sitz ein drüsenartiger Anhang der Hirnbasis, die Hypophyse, ruht. Der Sattelknopf, *Tuberculum sellae* ³⁾, ist ein Querswulst dicht hinter und unter dem Limbus; wie dieser zieht er sich seitlich in einen platten Fortsatz, *Radix inf. alae orbitalis*, aus, der, an die untere Fläche des Orbitalflügels stossend, die Austrittsöffnung des N. opticus und der Art. ophthalmica, *Can. opticus* ⁴⁾, umschliessen hilft. Je nach der Entfernung des Sattelwulstes von dem Limbus, je nachdem der letztere nach hinten vorspringt und der erstere sich erhebt, entsteht zwischen beiden eine flachere oder tiefere, schmalere oder breitere Quersfurche, *Sulcus opticus*, welche seitwärts zu dem Can. opticus führt und dem Chiasma der Nn. optici zur Anlehnung dient.

Var. Nicht selten folgt hinter dem Sattelknopf eine zweite seichtere und schmalere Quersfurche, die den vorderen Theil eines kreisförmigen, die Hypophyse umgebenden venösen Sinus aufnimmt. Der niedere Wulst, welcher diese Furche von der dahinter befindlichen Grube trennt und der Synchondrose der beiden ursprünglichen Wespenbeinkörper entspricht, steigt zuweilen an jeder Seite zu einem stumpfen oder spitzen Knötchen, dem *Proc. clinoides med.*, auf. Der Proc. clin. med. kann sich zu einem Stäbchen verlängern, das sich, gleich der unteren Wurzel des Orbitalflügels, an die untere Fläche der hinteren Spitze dieses Flügels anlegt. Es entsteht dadurch, von dem Can. opticus durch die untere Wurzel des Orbitalflügels geschieden, ein ähnlicher, kürzerer Canal, *Foramen carotico-clinoides*, an welchem die Carotis int. auf- und dann rückwärts läuft.

Mitten zwischen beiden Procc. clinoid. med. liegt eine feine Oeffnung (oder mehrere), wodurch Gefässe ins Innere des Knochens treten.

¹⁾ *Jugum sphenoidale.*

²⁾ *Sella turcica, ephippium.*

³⁾ Sattelwulst, *Tub. ephippii.*


⁴⁾ *Foramen opt.*

Die tiefste Stelle des Sattels, Hypophysengrube, *Fossa hypophyseos*, ist in sagittaler wie in transversaler Richtung concav, gegen die Seitenfläche des Wespenbeinkörpers jederseits durch eine sagittale, sehr stumpfe, selten rinnenförmige Kante undeutlich abgesetzt. Die Sattellehne, *Dorsum sellae* ¹⁾, von welcher sie nach hinten begrenzt wird, ist ein starker, von der ganzen Breite des Körpers sich erhebender und vorwärts geneigter, im sagittalen Durchmesser comprimierter Kamm mit parallelen oder aufwärts convergirenden Seitenrändern und wulstigem, horizontalem oder leicht concavem oberen Rand. Auf seine glatte Vorderfläche setzt sich die Aushöhlung des Sattelsitzes fort; seine hintere Fläche ²⁾, eben oder leicht von einer Seite zur anderen ausgehöhlt und rauh, liegt in Einer Flucht mit der oberen Fläche des Körpers des Hinterhauptsbeins. Die Naht zwischen beiden ist oft noch im Erwachsenen durch eine Rauhhigkeit angedeutet. Die oberen Ecken der Sattellehne sind jede in einen kurzen, platten, kolbigen oder knopfförmigen Fortsatz, oder auch in eine ab- und rückwärts ragende Spitze verlängert, *Proc. clinoides post.*

Die Form der *Procc. clinoides post.* ist verschiedenartig und öfters sehr unregelmässig, was seinen Grund ohne Zweifel darin hat, dass sich Verknöcherungen der harten Hirnhaut auf dieselben auflagern und mit ihnen verschmelzen. Die Verschmelzung ist mitunter unvollkommen und man findet Knochenspitzen und Plättchen durch eine mehr oder minder deutliche Naht an den *Proc. clinoid. post.* angefügt. Ein solches Plättchen von ungewöhnlicher Grösse ($\frac{1}{2}$ Zoll lang, 3 — 4''' breit) hat Gruber (Abhandl. aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie. Petersburg 1852. S. 1. Fig. 1 — 3) aus dem Schädel eines 30 — 40jährigen Mannes beschrieben. Vergl. Schultz, a. a. O. S. 18.

Am Fuss der Sattellehne ragt jederseits ein schmales, rückwärts gebogenes Plättchen (Fig. 99*) vor, welches mit der Spitze der Schläfenbeinpyramide zusammenstösst ³⁾; es bildet die laterale Wand einer Rinne, durch welche die in der Naht zwischen dem Körper des Hinterhauptsbeins und der Schläfenpyramide befindliche Furche (des Sinus petrosus inf.) mit der Hypophysengrube in Verbindung steht. In anderen Fällen ist der Fuss der Sattellehne verschmälert und unter ihm zieht eine breite Furche, Fortsetzung des Sulc. petr. inf., zur Seitenfläche des Wespenbeinkörpers.

Seiten-
flächen.



Seitenansicht des Wespenbeinkörpers, Orbital- und Temporalflügel an den Wurzeln abgesägt.

Ra, Rm, Rp, Wurzeln des Temporalflügels. Cr, Can. rotundus.

Wenden wir uns zur Betrachtung dieser Seitenfläche (Fig. 100), so finden wir einen grossen Theil derselben, wie erwähnt, durch die Wurzeln der Orbital- und Temporalflügel eingenommen. Indem die ersteren an der vorderen oberen Ecke, die letzteren weiter hinten in der Nähe des unteren Randes ihren Ursprung nehmen, bleibt vorn der untere, hinten der obere Theil der Seitenfläche frei. Der unterhalb der Orbitalflügel gelegene Theil der Seitenfläche fällt fast perpendicular ab; er bildet den medialen Rand der Fissura orbitalis sup. und inferior, und ist eine kurze Strecke weit im Hintergrunde

¹⁾ *D. ephippii.*

²⁾ *Clivus; Cl. Blumenbachii.*

³⁾ *Proc. basilaris Sue. Proc. occipitalis Loder.*


der Augenhöhle an deren medialer Wand sichtbar; der hinter den Orbitalflügeln und oberhalb der Temporalflügel befindliche Theil der Seitenfläche des Wespenbeinkörpers ist sanft geneigt, näher der horizontalen als der verticalen Stellung; er zeigt vorn, neben dem Sattelknopf, einen mehr oder minder tiefen Eindruck, *Impressio carotica*, welcher die letzte, nach vorn convexe Krümmung der Carotis aufnimmt und hinten (Fig. 99), neben der Sattellehne, eine breite Furche, *Sulcus caroticus*, in welcher dieselbe Arterie gleich nach ihrem Eintritt in die Schädelhöhle ruht. Diese Furche zu vertiefen und gegen den Temporalflügel abzugrenzen, erhebt sich längs dem lateralen Rande derselben ein saum- oder zungenförmiges, nach innen umgerolltes Plättchen, *Lingula sphenoidalis*.

Sömmerring fand bisweilen statt der Lingula ein völlig abgesondertes, in der harten Hirnhaut liegendes Knochenstückchen.

An der unteren Fläche des Wespenbeinkörpers (Fig. 101) unterschei-

untere
Fläche.

Fig. 101.



Wespenbein von unten. Die Proc. pterygoidei an der Wurzel abgesägt.

† Schnittfläche derselben.

det man ein unpaares mittleres Feld von den paarigen Seitenfeldern, welche letztere wieder durch eine vom lateralen zum medialen Rande schräg rückwärts verlaufende Furche in eine vordere und hintere Abtheilung geschieden werden. Das Mittelfeld gleicht der Vorderfläche eines schmalen Wirbelkörpers; es ist von einer Seite zur anderen convex, glatt, nach vorn verschmälert und meist ausgezeichnet durch eine tiefere oder seichtere Querspalte oder eine rundliche Grube in der Nähe des vorderen Randes, Ueberbleibsel einer Synchondrose der beiden Wespenbeinkörper des Fötus. Die hintere Abtheilung des Seitenfeldes, *Processus vaginalis*, ist von dem Mittelfeld, dem sie ihre schmalste Seite zuwendet, durch eine tiefe Furche abgesetzt. Sie wird in Verbindung mit dem Gaumenflügel näher beschrieben werden, von welchem aus sie sich über die untere Fläche des Körpers herüberzulegen scheint; die vordere Abtheilung des Seitenfeldes


gehört der Wespenbeinmuschel, *Concha sphenoidalis* ¹⁾, an, einem dünnen, blasig aufgetriebenen Knochenplättchen, von etwa dreieckiger Form, dessen nach hinten gekehrte Spitze sich zwischen das Mittelfeld und den Pr. vaginalis einschiebt, dessen Basis nach vorn gerichtet und an der Vorderfläche des Wespenbeinkörpers aufwärts gebogen ist. Wenn der Wespenbeinkörper, der in den ersten Lebensjahren noch aus schwammiger Substanz besteht, hohl geworden ist, bildet die Wespenbeinmuschel den Boden und den untersten Theil der vorderen Wand dieser Höhle; noch zur Pubertätszeit ist sie von den übrigen Theilen des Wespenbeinkörpers durch eine Naht geschieden. Später tritt an die Stelle dieser Naht eine lineare Furche, die sich nur selten ganz verwischt.

Die vordere mediale Ecke jeder Wespenbeinmuschel biegt in einen platten, beilförmigen Fortsatz um, dessen Flächen sich in eine der Medianebene parallele Lage begeben; die entsprechenden Fortsätze beider Seiten stoßen mittelst einer verticalen Naht vor dem vorderen verschmälerten Ende des Mittelfeldes in der Medianebene zusammen. Auch diese Naht schwindet zur Zeit der Reife, indessen die zusammenstossenden Kanten sich in einen platten Kamm mit scharfem und unebenem Rande verlängern, der, einem comprimierten Schnabel ähnlich, nach unten und vorn vorspringt, *Rostrum sphenoidale*, und sich niedriger in der Mitte der vorderen Fläche heraufzieht, *Crista sphenoidalis* (Fig. 102). Das Mittelfeld der unteren Fläche wird fast ganz (nur ein schmaler Streifen längs dem hinteren Rande bleibt frei) durch die Anheftung der knöchernen Nasenscheidewand, insbesondere des oberen, breiten Randes des Vomer, verdeckt. In eine Furche dieses Randes passt das *Rostrum sphenoidale*. Ueber den Seitenrand der Wespenbeinmuscheln erstreckt sich mehr oder minder weit medianwärts die Platte des Gaumenbeins, welche die mediale Wand der Fossa sphenomaxillaris ausmacht.

vordere
Fläche.

Die vordere Wand des Wespenbeinkörpers (Fig. 102) ist, wie er-

Fig. 102.



Wespenbeinkörper von vorn. Vergl. S. 110.

wähnt, abwärts geneigt, so dass sie mit der unteren Wand in einer stumpfen, meist abgerundeten Kante zusammenstösst. Mit den seitlichen Wänden und mit der oberen Wand vereinigt sie sich in zackigen, mehr oder minder vorspringenden Kanten, an welche das Stirnbein, Siebbein und die Gaumenbeine sich anfügen. Ist sie vollständig und regelmässig,

¹⁾ *Ossiculum Bertini*, *Cornu sphenoidale*, Wespenbeinhorn oder Tute. Der Name *Cornu* ist unpassend und verdankt seinen Ursprung einem Missverständniss. Bertin

so zeigt sie an jeder Seite der *Crista sphenoidalis* eine grosse, kreisrunde oder ovale, scharfrandige Oeffnung (von 6^{mm} Durchm.), die sich in der Nasenhöhle hinter den oberen Zellen des Labyrinths verbirgt. Diese Oeffnung, *Foramen sphenoidale*, entsteht dadurch, dass vom vorderen Rande der oberen Wand des Wespenbeinkörpers eine Platte mit ausgeschnittenem Rand dem vorderen, aufwärts gerichteten Rande der Wespenbeinmuscheln entgegenwächst. Häufig ist die vordere Wand unvollständig und demgemäss das Foramen sphenoidale unregelmässig, weit und gerissen. Vor den lateralen Theil desselben legen sich alsdann, als Stellvertreter der vorderen Wand, oben die hinteren Siebbeinzellen, unten ein Fortsatz des Gaumenbeins. Häufiger verwachsen die Ränder der eben genannten Knochentheile mit der vorderen Wand des Wespenbeinkörpers, so dass beim Zerlegen der Schädelknochen die letztere zerbricht und theilweise den ersteren folgt.

Die hintere Fläche des Wespenbeinkörpers (Fig. 110) ist vierseitig, mit abgerundeten Ecken, rauh und von tiefen Furchen durchzogen. Neben der unteren Ecke und über der Wurzel der Gaumenflügel ist jederseits der *Sulcus caroticus* und am Seitenrande der letzteren die *Lingula* sichtbar.

hintere
Fläche.

Die Höhlen des Wespenbeinkörpers, *Sinus sphenoidales*, entwickeln sich durch Aufsaugung der ursprünglich spongiösen Substanz des Knochens in der Richtung von vorn nach hinten; sie haben daher eine je nach dem Lebensalter der Individuen verschiedene Tiefe. Eine perpendiculäre, nicht immer genau mediane und nicht immer ebene Scheidewand, die sich ebenfalls mit den Jahren verdünnt, *Septum sphenoidale*, grenzt in Einer Flucht mit der Nasenscheidewand den rechten und linken Sinus sph. gegen einander ab. Oft ragen von dieser Scheidewand, wie von den übrigen Wänden, kurze Zacken oder Plättchen in das Innere der Höhle und theilen sie in Zellen ab.

Wespen-
beinhöhlen.

Var. Sehr selten fehlt das *Septum sph.* Häufiger weicht es so weit aus der Medianebene, dass die Eine Höhle sich auf Kosten der anderen bedeutend verkleinert. — Das *Foramen sph.* ist auf eine schmale, seitwärts gerückte Spalte reducirt, die von dem Labyrinth des Siebbeins überragt wird. — Die Wespenbeinhöhle dehnt sich abwärts in die Wurzeln der Gaumenflügel aus.


Die Orbitalflügel sind platte und horizontale Auswüchse des vorderen Theils der oberen Seitenkante des Wespenbeinkörpers (Fig. 103). Ich habe schon erwähnt, dass die obere Fläche und der vordere Rand des Körpers ununterbrochen in die entsprechenden Theile des Orbitalflügels übergehen und dass der hintere Rand dieses Flügels mit dem *Limbus sphenoidalis* zusammenhängt. Man kann das zunächst an den Körper anstossende, von parallel verlaufenden Rändern eingeschlossene Stück des Orbitalflügels als eine, und zwar als obere Wurzel des Flügels betrachten; als zweite, untere Wurzel tritt das ebenfalls bereits erwähnte Plättchen, *Rad. inf.*, hinzu, welches, neben dem Sattelwulst, von der Seitenwand des Körpers seitwärts und im Bogen aufwärts abgeht, die eine Fläche nach oben und etwas nach vorn, die andere nach unten und hinten gerichtet, mit scharfem Hinter- und

b. Orbital-
flügel.

(*Hist. de l'academie royale d. sciences de l'année 1744. Paris 1748. p. 298*) wählte für die von ihm beschriebenen Knöchelchen die Benennung *Cornets* wegen ihrer Aehnlichkeit mit den Muscheln (*Cornets*) des Siebbeins.

wulstigem Vorderrande. Beide Wurzeln schliessen mit der Seitenwand des Körpers den vor- und lateralwärts verlaufenden, cylindrischen und nach

Fig. 103.



Wespenbein von oben.

vorn trichterförmig sich erweiternden *Can. opticus* ein; die untere Wurzel des Orbitalflügels scheidet den Canal von der Fissura orbitalis sup.

Von der Vereinigungsstelle beider Wurzeln oder vom Seitentheil des hinteren Randes des *Can. opt.* ragt frei nach hinten in die Schädelhöhle ein platter, dreiseitiger Fortsatz mit abgerundeter und etwas verdickter Spitze, der

Processus clinoid. ant., dessen medialer Rand gerade von vorn nach hinten, dessen lateraler Rand von der Spitze an schräg vor- und seitwärts läuft, um in den ausgeschweiften hinteren Rand des Orbitalflügels überzugehen. Der mediale Rand des *Proc. clinoid. ant.* ist zuweilen der Länge nach gefurcht zur Aufnahme der *Art. ophthalmica*, die sich an denselben anlehnt.

Seitwärts läuft der Orbitalflügel in eine mehr oder minder fein ausgezogene, nach der Kante rückwärts gekrümmte Spitze aus, die sich hinter den oberen Rand des Temporalflügels zurückzieht. Entweder legt sie sich dicht an diesen an oder sie bleibt von ihm durch einen schmalen Zwischenraum getrennt und diesen Zwischenraum füllt der hintere Rand des Augenhöhlentheils des Stirnbeins aus, mit dem sich sowohl der Orbital- als der Temporalflügel verbinden. Von den Flächen des Orbitalflügels ist die obere in der Schädelhöhle als hinterer Theil des Bodens der vorderen Schädelgrube sichtbar; die untere, in welche die Seitenfläche des Wespenbeinkörpers umbiegt, gehört theils der Decke der Augenhöhle, theils der Schädelhöhle an. Von der Insertion der unteren Wurzel an läuft nämlich über diese Fläche in lateraler Richtung eine sehr stumpfe Kante, welche die eigentliche obere Begrenzung der Fissura orbitalis sup. ausmacht (Fig. 107 ***); was vor dieser Kante liegt, sieht in die Augenhöhle; der hinter der Kante befindliche Theil der unteren Fläche des Orbitalflügels liegt in der Schädelhöhle und stellt mit der seitlichen Spitze des Flügels einen saumartigen Vorsprung des Bodens der vorderen Schädelgrube über die mittlere dar.


Var. Der Orbitalflügel erhält eine dritte Wurzel durch Verschmelzung des *Pr. clinoid. med.* mit der Spitze des *Pr. clinoid. ant.*, wovon bereits die Rede war. Selten erreicht diese Spitze den *Pr. clinoid. post.* und verschmilzt auch mit diesem. Ein Präparat unserer Sammlung zeigt in dem Orbitalflügel einen geräumigen Sinus, der sich vor der vorderen Wand des Körpers direct in die Nasenhöhle öffnet.

c. Temporalflügel.

Die Temporalflügel des Wespenbeins nehmen ihren Ursprung vom hinteren und unteren Theil der Seitenfläche des Körpers mit einer Haupt- und zwei Nebenwurzeln (Fig. 104, 105). Die Hauptwurzel, **Radix me-**

dia alae temp., ist platt, deprimirt, — mit dem längsten Durchmesser sagittal; ihre Mächtigkeit nimmt von vorn nach hinten etwas zu, ist aber

Fig. 104.




Seitenansicht des Wespenbeinkörpers, Orbital- und Temporalflügel an den Wurzeln abgesägt.

nicht genau bestimmbar, weil an ihre untere Fläche ein Theil des Gaumenflügels anstösst. Mit dem vorderen Rande schräg vorwärts, mit dem hinteren Rande schräg rückwärts verlaufend, entfaltet sie sich fächerförmig zu einer Platte, welche, aufwärts gekrümmt, ihre concave (innere) Fläche der Schädelhöhle zuwendet und mit ihrer convexen Fläche aussen an der Basis und Seitenwand des Schädels sichtbar wird.

Von den Nebenwurzeln muss die eine vordere, *Rad. ant. alae temp.*, die andere hintere, *Rad. post. alae temp.*, genannt werden. Die vordere entspringt platt und gleichfalls deprimirt, mit scharfem Hinter-

Fig. 105.



Wespenbein von oben. Orbitalflügel abgesägt.

und abgerundetem Vorderende über dem vorderen Viertel der Hauptwurzel. Indem sie sich brückenförmig auf die Innenfläche der Hauptwurzel herüberschlägt, um sich in diese Fläche zu verlieren, verwandelt sie eine über der Hauptwurzel von hinten nach vorn verlaufende Rinne in einem Canal mit hinterer und vorderer runder Oeffnung. Dies ist der *Can. rotundus* ¹⁾, wel-

chen der zweite Ast des Trigeminus benutzt, um die Schädelhöhle zu verlassen. Wie der *Can. opticus* durch die untere Wurzel des Orbitalflügels, so wird der *Can. rotundus* durch die vordere Wurzel des Temporalflügels von der *Fiss. orbitalis sup.* geschieden. Die hintere Nebenwurzel ist ein comprimirtes, dickeres oder dünneres Plättchen, welches an der Seitenfläche des Körpers zwischen der Hauptwurzel des Temporalflügels und der Lingula entspringt und, parallel dem hinteren Rande der aus der Hauptwurzel hervorgehenden Platte, hinter dieser und in geringer Entfernung von ihr (3^{mm}) seit- und rückwärts verläuft. Ihre in allen Dimensionen verjüngte Spitze verschmilzt mit der hinteren Spitze der erwähnten Platte; vorher zieht sich ein plattes Stäbchen mit nahezu vertical gestellten Flächen von der Vorderfläche der hinteren Wurzel an den hinteren Rand der Platte herüber. Durch das Stäbchen von einander getrennt, entstehen zwei Oeffnungen: die Eine, der Mittellinie nähere, grösser, oval, mit dem längsten Durchmesser parallel dem hinteren Rande des Temporalflügels, die andere, weiter seit-

¹⁾ *For. rotundum*, *Can. maxillar. sup.*

und rückwärts gelegene, kleiner und kreisrund. Jene ist das *Foramen ovale*, durch welches der dritte Ast des Trigeminus aus der Schädelhöhle austritt, diese das *Foramen spinosum*, durch welches die Vasa meningeae media verlaufen. Medianwärts vom Foramen spinosum schickt die hintere Wurzel häufig ein dünnes horizontales Plättchen (*Lamina sphenopetrosa*) nach hinten ab, welches mit seinem hinteren Rande an den oberen Rand der vorderen Mündung des Can. musculo-tubarius des Schläfenbeins stösst und so in die knöcherne Decke dieses Canals übergeht.

Ziemlich beständig findet sich die hintere Wurzel an ihrer Abgangsstelle vom Körper in verticaler Richtung von einem oder einigen Canälchen, *Canaliculi sphenoidales*, oder einer Längsspalte durchsetzt, wodurch sie den Anschein gewinnt, als ob sie selbst wieder aus der Verschmelzung von zwei hinter einander gelegenen Wurzeln hervorgegangen wäre.

Häufig ist die hintere Wurzel unvollkommen; sie erscheint in Gestalt eines kurzen, zungenförmigen Plättchens; dann ist das Foramen ovale am hinteren Rande offen. Oder das Foramen ovale ist vollständig, aber das Foramen spinosum medialerwärts nicht geschlossen. Doch kommt seitwärts neben dem unvollständigen oder auch vollständigen Foramen spinosum öfters noch ein vollständiges innerhalb der hinteren Spitze des Temporalflügels vor.

Medianwärts neben dem Foramen ovale und spinosum ist der Temporalflügel zuweilen in schräger Richtung von einem engen auf- und rückwärts verlaufenden Canälchen durchzogen, dem Can. innominatus Arnold, in welchem der N. petr. superf. min. liegt, wenn er nicht, was häufiger vorkommt, durch die Fissura sphenopetrosa geht.

In einiger Entfernung seitwärts von der lateralen Spitze der Fissura orbitalis sup. findet sich mitunter ein Canälchen, welches den Temporalflügel von der Schädel- zur Orbitalfläche durchsetzt und Zweige der Vasa meningeae aus der Schädelhöhle zur Augenhöhle treten lässt (Albin, Tabb. ossium. Taf. V. Fig. 6. 7. U.).


Wir haben an dem Temporalflügel zunächst eine innere, concave und eine äussere, convexe Fläche unterschieden. Der Rand, in welchem diese beiden Flächen sich vereinigen, geht mit mehreren benachbarten Knochen Verbindungen ein und ändert, abgesehen von der Flächenkrümmung des Flügels, in seinem Verlaufe zu wiederholten Malen theils in Winkeln, theils in Bogen seine Richtung. Berücksichtigt man nur die schroffen, winkligen Umbeugungen des Randes, so erkennt man an demselben fünf Abtheilungen, von welchen zwei vorwärts, zwei rückwärts gewandt sind und Eine, die schmalste, seitwärts oder, wegen der Flächenkrümmung des Flügels, aufwärts sieht. Von den beiden nach vorn und nach hinten gerichteten Abtheilungen des Randes ist je die dem Körper zunächst gelegene scharf und frei; die weiter seitlich gelegenen verbinden sich, die vordere, *Margo frontalis* (Fig. 106), mit dem Stirnbein und, wenn er so weit vorwärts reicht, mit dem vorderen Rand des Orbitalflügels, die hintere, *Margo temporalis* ¹⁾, mit der Schläfenschuppe; der schmale Seitenrand des Temporalflügels, *M. parietalis*, stösst an das Scheitelbein.

Der freie Theil des vorderen Randes (Fig. 106 **) begrenzt von unten die Fissura orbitalis sup. So weit er, dem Körper zunächst, von der vorderen Wurzel des Temporalflügels gebildet wird, läuft er gerade seitwärts, dann wendet er sich in einer geraden oder convexen Linie nach oben und

¹⁾ *Incisura temp. Margo semilunaris.*

zugleich nach vorn, um in einem stumpfen Winkel in den frontalen Rand überzugehen. Dieser verläuft im Bogen erst seit-, dann rückwärts; er ist

Fig. 106.



Wespenbein von oben. Orbitalflügel abgesägt.

breit, eine horizontale, rauhe, dreiseitig stumpfwinkelige Fläche. Der stumpfe Winkel ist nach vorn gerichtet und entspricht dem oberen Ende einer Firste, welche die Aussenfläche des Flügels senkrecht theilt. Der parietale Rand geht, wenn er deutlich ausgeprägt ist (oft reducirt er sich auf eine Einkerbung zwischen dem vorhergehenden und dem folgenden Rand), unter einem

stumpfen Winkel vom frontalen Rande ab und gerade oder wenig abwärts geneigt von vorn nach hinten; er ist von der äusseren gegen die innere Fläche des Knochens abgeschrägt und legt sich schuppenförmig über den unteren Theil der äusseren Fläche des Scheitelbeins, oft auch des Stirnbeins. Der temporale Rand, unter einem rechten oder spitzen Winkel gegen den parietalen abgesetzt, läuft in einem Viertelskreis erst median-, dann rückwärts und zugleich, mit der Flächenkrümmung des Flügels, von der Seitenwand des Schädels zur Basis desselben. Er ist breit, von der parietalen Ecke an zunehmend zackig und in der Art schuppenförmig, dass an dem in der Seitenwand des Schädels gelegenen Theile die innere Fläche über die äussere, an dem in der Basis gelegenen Theile die äussere Fläche über die innere hervorragt. So muss die Schläfenschuppe, welche sich, entsprechend zugeschärft, mit diesem Rande des Temporalflügels verbindet, an der Seitenwand des Schädels ihn decken, an der Schädelbasis aber von ihm getragen werden.

Der Uebergang des temporalen Randes in den freien und glatten, median- und vorwärts gerichteten Theil des hinteren Randes erfolgt unter einem spitzen Winkel, welcher zwischen die Schuppe und Pyramide des Schläfenbeins einspringt. Von diesem Winkel ragt abwärts die *Spina angularis*¹⁾ (Vergl. Fig. 77. 88. 93), eine stumpfe oder spitze Zacke oder auch eine scharfkantige, mit der scharfen Kante parallel dem hinteren freien Rande des Flügels verlaufende Gräte. Sie scheidet an der Schädelbasis die Unterkieferpfanne von der Rinne, in welcher die knorpliche Tuba liegt, und hat das For. spinosum vor- und medianwärts neben sich.

Var. Vor der grätenförmigen *Spina angularis* und in gleicher Flucht mit ihr liegt an der unteren Fläche der zwischen For. spinosum und ovale befindlichen Brücke eine zweite, ähnlich gestaltete Gräte; beide schicken sich von ihren einander zugewandten unteren Ecken spitze Fortsätze entgegen, die einander erreichen

¹⁾ *Sp. sphenoidalis*. — *Ala parva Ingrassiae* wird die grätenartige *Spina angularis* genannt, die sich einem schmalen, abwärts gerichteten Flügel vergleichen lässt.


oder nicht und ein vollständig oder unvollständig geschlossenes rundes Loch von der Weite des Foramen spinosum umgeben, welches in einer verticalen Ebene gerade unter dem Eingange des F. spinosum gelegen ist und wahrscheinlich von der Art. meningea media durchsetzt wird an der Stelle, wo sich diese Arterie nach oben krümmt, um in die Schädelhöhle einzutreten.

Seitlich von der eben erwähnten vorderen Gräte und parallel derselben, gerade hinter dem lateralen Rande des For. ovale, findet sich zuweilen noch eine Spitze oder Gräte, die in Verbindung mit jener eine gegen das For. ovale verlaufende 3mm breite Furche begrenzt.

Der freie hintere Rand des Temporalflügels wird ganz oder doch zum grössten Theil von der hinteren Wurzel desselben gebildet. Er begrenzt von vorn mit dem dem Körper zunächst gelegenen Theile das Foramen lacernum, weiter nach der Seite hin die enge Fissura spheno-petrosa und macht die vordere Wand der zur Aufnahme der Tuba bestimmten Rinne aus, deren hintere Wand von der Schläfenpyramide gebildet wird.

Die innere Fläche des Temporalflügels ist einfach, glatt oder mit leichten, den Gehirnwindungen entsprechenden Eindrücken, zuweilen auch mit einer vom C. rotundus zum For. ovale verlaufenden Furche versehen.

Fig. 107.



Temporalflügel von aussen. Cv Can. vidianus. *** vgl. S. 104.

Die äussere Fläche ist in vier Felder getheilt durch zwei über die Mitte der Fläche hinziehende Firsten, eine von horizontalem, die andere von verticalem Verlauf, welche einander demnach fast rechtwinkelig kreuzen und mittelst der Durchkreuzung theilen, so dass die verticale Firste in eine obere und untere, die horizontale in eine laterale und mediale Abtheilung zerfällt. Ich werde die obere Abtheilung der verticalen Firste *Crista zygomatica* nennen, die untere Abtheilung dieser Firste *Crista spheno-maxillaris*; die laterale Abtheilung der horizontalen Firste ist schon als *Crista infratemporalis* ¹⁾ hervorgehoben worden; die mediale Abtheilung der horizontalen Firste soll *Crista orbitalis* genannt werden. Am stärksten springt, besonders im unteren Theil, die Crista zygomatica vor. In ihrem Laufe nach unten, parallel dem unteren Rande der Fissura orbit. sup., schräg rück- und medianwärts gerichtet, scheidet sie die Aussenfläche des Temporalflügels, bis zur Kreuzungsstelle mit den horizontalen Firsten, in eine median- oder vorwärts ge-

¹⁾ *Crista alae magnae a. u. t.*

wandte Fläche, die in der Seitenwand der Augenhöhle liegt, *Facies orbitalis*, und eine lateralwärts gewandte Fläche, die der Schläfengrube ange- gehört, *Facies temporalis*. Die Crista zygomatica




Fig. 108.
Horizontaldurchschnitt
des Temporalflügels.

trägt zur Vergrösserung sowohl der Orbital- als der Temporalfläche bei; die Orbitalfläche aber setzt sich in gleicher Flucht auf die Crista fort, während die Temporalfläche beim Uebergang auf die letztere rinnenförmig vor- und dann seitwärts umbiegt. Der freie Rand der Crista zygomatica ist zackig und verbindet sich mit dem Rande des Jochbeins, auf welches jene beiden Flächen, die eine in fortgesetzt gerader, die andere in fortgesetzt concaver Richtung, weiter sich erstrecken (s. Fig. 108).

Zu der unteren Spitze der Crista zygomatica geht als unterer Rand der Temporalfläche die Crista infratemporalis gerade oder in einem aufwärts convexen Bogen, die Crista orbitalis, welche den unteren Rand der Orbitalfläche und den oberen Rand der Fissura orbit. inf. bildet, in einer fast ganz geraden Linie, jene ziemlich genau sagittal, diese nur wenig von dem oberen (Stirnbein-) Rande der Orbitalfläche divergirend. Die Crista infratemporalis erreicht indess in der Regel nicht genau die Ecke, in welcher die Crista zygomatica und orbitalis sich verbinden; dicht hinter dieser Ecke endet sie in einer kurzen, stumpfen oder spitzen, abwärts ragenden Zacke, *Tuberculum spinosum*, von welcher sich eine Kante entweder medianwärts zur Crista orbitalis oder abwärts zur Crista speno-maxillaris fortsetzt.


Die Crista speno-maxillaris ist eine stumpfe Kante, welche im Bogen erst median-, dann abwärts und schliesslich auf den Gaumenflügel übergeht und den hinteren Rand der Fissura speno-maxillaris bildet. Die zur Seite neben und hinter ihr und unterhalb der Crista infratemporalis gelegene Fläche des Temporalflügels, *Facies infratemporalis*, ist, als Decke der Unterschläfengrube, ein Theil der Grundfläche des Schädels. Die medianwärts von der Crista speno-maxillaris und unterhalb der Crista orbitalis befindliche Fläche, *Facies spenomaxillaris*, liegt in der Frontalebene, gegen die Orbitalfläche etwas zurückweichend; sie ist schmal und verschmälert sich noch nach unten, wo sie auf die Vorderfläche des Gaumenflügels übergeht. Von der Augenhöhle aus ist sie als hintere Wand der Fossa speno-maxillaris sichtbar; mitten in derselben befindet sich die äussere (vordere) Mündung des Can. rotundus.

Der Gaumenflügel entspringt mit zwei Wurzeln, einer lateralen, d. Gaumenflügel. perpendicularen und einer medialen, schräg abwärts an die laterale herantretenden, mit der medialen längs der unteren Fläche des Seitentheils des Körpers, mit der lateralen längs der unteren Fläche der Hauptwurzel des Temporalflügels. Indem beide Wurzeln dicht neben einander liegen und alsbald zusammenfliessen, schliessen sie in Gemeinschaft mit dem Körper einen engen, cylindrischen, sagittal verlaufenden Gang ein, den *Can. vidianus*¹⁾, der mit der vorderen Mündung (Fig. 109 a. f. S.) in die Fossa

¹⁾ *Can. pterygoideus, recurrens.*


spheno-maxillaris, mit der hinteren Mündung gerade unterhalb der Lingula in das Foramen lacerum sieht (Fig. 110). Vergleicht man den

Fig. 109.



Wespenbein von vorn.

Fig. 110.



Wespenbein von hinten.

Gaumenflügel einer Rippe, so entspricht seine mediale Wurzel dem Kopf und Hals, seine laterale Wurzel dem mit einem kurzen Querfortsatz verschmolzenen Höcker der Rippe, und der Can. vidianus einem Foramen costo-transversarium.

Die laterale Wurzel ist die stärkere; sie hat eine vordere Fläche, welche ohne Unterbrechung aus der Fac. spheno-maxillaris des Temporalflügels hervorgeht, und eine Seitenfläche, in welche ebenso die Facies infratemporalis dieses Flügels umbiegt. Die mediale Wurzel ist dünn, am vorderen Rande sogar scharf; hinten ist sie, neben dem Ausgang des Can. vidianus, in eine stumpf-kegelförmige Spitze ausgezogen; von ihrer der Nasenhöhle zugekehrten Fläche geht ein Plättchen, *Processus vaginalis* ¹⁾, aus, welches dicht unter dem Körper,

mit seinen Flächen der unteren Fläche des Körpers parallel, mehr oder minder weit medianwärts vorspringt und von unten her den Falz begrenzt, in welchen der obere Seitenrand des Vomer eingefügt ist. Die untere Fläche dieses Plättchens hat dicht am Ursprung eine seichte Grube ²⁾, in welcher einer der Gaumenmuskeln befestigt ist.

Var. Der Proc. vaginalis hat an seiner unteren Fläche eine Längsrinne, dem Can. vidianus parallel, zuweilen durch ein feines Plättchen, welches unterhalb des Proc. vaginalis von der medialen Wurzel entspringt, zum Canal geschlossen.


Der vierseitige Knochentheil, welcher aus der Vereinigung beider Wurzeln hervorgeht, zeigt schon am Ursprung die hintere Fläche rinnenförmig ausgehöhlt. Indem nun diese Aushöhlung nach abwärts sich rasch oder allmähig weiter vertieft, gewinnt der Gaumenflügel das Ansehen einer

¹⁾ Proc. ad vomerem.

²⁾ Fossa navicularis Cruveilhier.

Zusammensetzung aus zwei perpendicularen, nach vorn convergirenden und an den vorderen Rändern mit einander verbundenen Platten. Auch diese Verbindung hört ungefähr in der Mitte der Höhe des Gaumenflügels auf: beide Platten trennen sich und weichen auseinander, mit ihren vorderen, rauhen Rändern eine dreiseitige Spalte, *Fissura pterygoidea* ¹⁾, begrenzend, in die ein Fortsatz des Gaumenbeins passt. Im Verein mit der nach hinten gerichteten Concavität dieses Fortsatzes schliessen die einander zugewandten Flächen der Platten des Gaumenflügels, die *Fossa pterygoidea* ein.

Ihrer Stellung nach müssen die Platten des Gaumenflügels mit dem Namen der medialen und lateralen, *Lamina medialis* und *lateralis*, bezeichnet werden (Fig. 111). Die mediale Platte liegt mit ihren Flächen pa-



Horizontalschnitt der Gaumenflügel.
Pl. Gaumenbein. Mx. Oberkiefer-
bein. V. Pflugscharbein.

parallel der Medianebene, die laterale ist unter einem spitzen Winkel gegen die mediale geneigt. Die laterale macht den hinteren Theil der medialen Wand der Unterschläfengrube aus; die mediale liegt im hinteren Theile der Seitenwand der Nasenhöhle. Die laterale Platte übertrifft die mediale im sagittalen Durchmesser, ragt dagegen minder weit abwärts als diese; der hintere Rand beider Platten ist frei, einfach concav oder durch mehr oder minder vorspringende Spitzen unterbrochen, deren sich Eine, auf welcher der untere Rand der knorplichen Tuba ruht, regelmässig in der Mitte der Höhe des medialen Flügels, eine oder zwei unbeständig am lateralen Flügel finden. Mit ihren Vorderrändern fassen beide Platten bis zu ihrer Trennung die Vorderfläche des Gaumenflügels ein. Ausserdem begrenzt der vordere Rand der lateralen Platte, eine Fortsetzung der Crista sphenomaxillaris des Temporalflügels, bis zu seiner Verbindung mit dem Gaumenbein von hinten her den Eingang in die Fossa sphenomaxillaris, der vordere Rand der medialen Platte fügt sich an die in der Seitenwand der Nase gelegene Platte des Gaumenbeins und wird von der letzteren zum Theil nach der Nasenhöhle hin bedeckt.

Von der Vorderfläche des Gaumenflügels wurde bereits erwähnt, dass sie, so weit sie der lateralen Wurzel angehört, eine Fortsetzung der Sphenomaxillarfläche des Temporalflügels ist, in welcher die vordere Mündung des Can. rotundus liegt. Median- und etwas abwärts vom Can. rotundus öffnet sich in der Vorderfläche des Gaumenflügels der vidische Canal. Weiter nach unten verschmälert sich diese Fläche und endet spitz über dem Anfang der Fissura pterygoidea oder geht in eine schmale Rinne über, welche sich noch eine Strecke weit auf dem rauhen Vorderrand der einen oder anderen Platte hinzieht und von den Rinnen des Gaumen- und Oberkieferbeins zum Canal ergänzt wird. Dies ist der Canalis pterygo-palatinus; die Rinne, *Sulcus pterygopalatinus* ²⁾, beginnt zuweilen schon unter der Ausmündung des Can. vidianus, seitlich begrenzt von einer verticalen

¹⁾ *F. pterygo-palatina. Incisura pt.*

²⁾ *S. pterygoideus M. J. Weber.*

Kante, welche von der vorderen unteren Ecke des Wespenbeinkörpers herabsteigt (Fig. 109).

Vom unteren Rand der medialen Platte des Gaumenflügels geht nach unten der *Hamulus pterygoideus* aus, ein cylindrischer oder von den Seiten comprimierter, hakenförmig rück- und seitwärts gekrümmter Fortsatz, der an der lateralen Seite durch eine tiefe, von vorn nach hinten verlaufende Rinne, *Sulcus hamuli pt.* (Fig. 109), gegen den die Fossa pterygoidea begrenzenden Theil der Platte abgesetzt ist. Die Rinne liegt nur wenig tiefer als der untere Rand der lateralen Platte; der Hamulus springt um 4 bis 9^{mm} über dieselbe abwärts vor und kann selbst den Zahnrand des Oberkiefers überragen.

Var. Die Fossa pterygoidea ist durch unregelmässige Leisten abgetheilt; zuweilen im oberen Theile flach, mit einer seichten Rinne versehen, *Sulcus tubae*, welche die Tuba aufnimmt. Die laterale Fläche der lateralen Platte ist ebenfalls durch Leisten und Vertiefungen uneben.

Der vordere Rand der lateralen Lamelle trägt kurze, stumpfe oder spitze, zuweilen hakenförmig aufwärts gekrümmte Zacken, auf welchen die Gefässe ruhen, welche von der Seite her in die Fossa spheno-maxillaris eintreten. Die Zacken am hinteren Rande der lateralen Platte gewinnen eine ungewöhnliche Ausdehnung. Eine derselben, welche etwa von der Mitte dieses Randes ausgeht, reicht zuweilen (nach Gruber unter 13 — 14 Schädeln Einmal) bis an die Spina angularis, mit welcher sie sich verbindet (Dieterich, a. a. O. Fig. 1, a). Es geschieht dies durch Verknöcherung eines Bandes, *Lig. pterygo-petrosum Civinini* (Schmidt's Jahrb. Bd. XXIII. S. 277), welches von jener Zacke zur Spina angularis hinübergespannt ist. Selten entspringt höher oben noch ein kleinerer Fortsatz, der sich mit der Brücke zwischen jenem unteren Fortsatz und der Spina angularis oder auch nur mit dem einen dieser beiden Knochentheile verbinden kann (Theile-Sömmerring, Muskellehre, S. 68. Gruber, *Bulletin de la classe physico-mathemat. de l'académie des sciences de St. Petersbourg.* T. VIII. Nr. 24).

An Negerschädeln sind die Gaumenflügel stärker, weiter von einander entfernt und mit dem unteren Ende mehr nach vorn geneigt, als an kaukasischen. Der Winkel, welchen sie mit der Basis des Hinterhauptsbeins bilden, beträgt nach Betz (Zeitschr. für rat. Med. N. F. Bd. II. S. 54) bei wohlgeformten kaukasischen Schädeln 70 bis 80°; bei einem Negerschädel betrug er 93°; an den Schädeln von Malaien, Kalmucken und Peruanern schwankte er zwischen 85 und 90°.

Das Wespenbein des Neugeborenen besteht aus drei oder vier durch Synchondrose verbundenen Stücken. Ein Stück bildet der vordere Wespenbeinkörper mit den Orbitalflügeln, ein zweites der hintere Körper, der aber oft mit dem vorderen bereits verschmolzen ist; die beiden Temporalflügel sind immer gesondert und wachsen erst im Verlauf des ersten Lebensjahrs an den Körper an. Die Naht zwischen Körper und Temporalflügel verläuft sagittal, seitlich neben der anfänglich noch sehr stumpfen Lingula sph. Der Gaumenflügel hängt durch seine laterale Wurzel mit dem Temporalflügel zusammen; die mediale Wurzel desselben steht anfangs mit ihrem ganzen oberen Rande frei; dann legt sie sich mit dem vorderen Theil dieses Randes an die laterale Wurzel an und ist mit dieser verschmolzen, bevor der Temporalflügel mit dem Körper verschmilzt. Die hintere Wurzel des Temporalflügels ist zur Zeit der Geburt noch kurz, das For. ovale am hinteren Rande offen.

Die Wespenbeinmuscheln entstehen im Laufe des ersten bis zweiten Lebensjahres als dünne, etwa kreisförmige Plättchen auf der abwärts geneigten Vorderfläche des Wespenbeinkörpers, platt auf der dünnen Decke aufliegend, welche die spongiöse Substanz dieses Knochentheils nach aussen begrenzt. Allmählig gewinnen sie in den nächsten Jahren die Form, die sie am reifen Knochen zeigen, sie entwickeln die quere Kante, welche die untere Fläche des Wespenbeinkörpers von der vorderen


scheidet, und schicken einander die Fortsätze entgegen, die sich in Gestalt des Rostr. sphen. in der Mittellinie vereinigen, indess unter ihnen nicht bloss die Decke des ursprünglichen Körpers, sondern auch dessen spongiöse Substanz schwindet. Der Anfang einer Höhlenbildung im Wespenbein ist schon im dritten Lebensjahre gemacht. Der obere Theil der vorderen Wand des Körpers entwickelt sich gleichzeitig mit der Wespenbeinmuschel aus einem ähnlichen Knochenplättchen, dessen Ränder aber früh mit den Rändern der oberen und Seitenflächen des Körpers verwachsen. Die Verwachsung der Wespenbeinmuscheln mit dem Körper erfolgt erst zwischen dem zehnten bis fünfzehnten Jahre. Nach dem zwanzigsten obliterirt die Naht zwischen Wespen- und Hinterhauptsbein (s. oben).

Der Winkel, welchen die Gaumenflügel mit dem Körper bilden, beträgt beim Neugeborenen $110 - 115^\circ$, beim Greise, nach dem Ausfallen der Zähne, $90 - 100^\circ$ (Betz).

3. Siebbein, *Os ethmoideum*.

Die Grundlage des Siebbeins ist eine horizontale, in der Mitte der 3. Siebbein vorderen Schädelgrube vor dem Wespenbeinkörper gelegene Platte, Siebplatte, *Lamina cribrosa*, welche zugleich Boden der Schädelhöhle und Decke der Nasenhöhle ist. Sie wird in zwei gleiche Seitenhälften getheilt

Fig. 112.



Frontaldurchschnitt des Siebbeins. Clf Cellulae front. Cns Concha sup. Cnm Concha media. Pu Proc. uncinatus.

durch eine der Regel nach verticale, häufig aber etwas schräg gestellte Platte, die zum kleineren Theil aufwärts in die Schädelhöhle, zum grösseren Theil abwärts in die Nasenhöhle ragt und mit ihrem oberen Theile, Hahnenkamm, *Crista galli*, in der unvollkommenen medianen Scheidewand der Schädelhöhle, mit dem unteren Theile, der perpendicularen Platte, *Lamina perpendicularis*, in der Nasenscheidewand liegt. Am Seitenrande der Siebplatte hängt jederseits das Labyrinth, *Labyrinthus*, ein


mengesetzter, etwa vierseitig prismatischer Körper, welcher den oberen Seitentheil der Nasenhöhle einnimmt und mittelst seiner perpendicularen Seitenwand, Papierplatte, *Lamina papyracea* ¹⁾, den grösseren hinteren Theil der medialen Wand der Augenhöhle ausmacht.

Die Siebplatte (Fig. 113 a. f. S.) ist länglich vierseitig, gegen den vorderen Rand verschmälert, im sagittalen Durchmesser etwa doppelt so lang als im transversalen am hinteren Rande. Dieser Rand ist mit dem vorderen Rande des Wespenbeinkörpers in einer einfachen Naht zusammengefügt, oft auch von dem letzteren etwas überragt und demselben entsprechend ausgeschnitten. Mit den vorderen und den seitlichen Rändern passt die Siebplatte in einen Ausschnitt des Stirnbeins; gegen die seitlichen Ränder krümmt sie sich aufwärts, um in die Wölbung überzugehen, womit die Seitentheile der vorderen Schädelgrube über die Augenhöhle hingepannt sind. Die

Siebplatte.

¹⁾ *Os planum*.

Fläche der Siebplatte ist ausgezeichnet durch eine Menge feinerer und weiterer Poren, *Foramina cribrosa*, welche ordnungslos zu beiden Seiten der Crista galli zerstreut liegen, meist zahlreicher im vorderen als im hinteren



S


Siebbein von oben. Clf Cell. front.

Alle diese Oeffnungen werden von Aestchen des N. olfactorius durchsetzt, mit Ausnahme der vordersten jederseits (Fig. 113 *), welche häufig von dem Sieb- und Stirnbein gemeinschaftlich gebildet wird und dem N. ethmoidalis den Durchtritt aus der Schädel- in die Nasenhöhle gestattet. Oft grenzt ein feiner und niedriger Kamm, dicht am Seitenrande der Siebplatte und diesem parallel verlaufend, eine Rinne für den N. ethmoidalis von der eigentlichen Siebplatte ab.

Crista galli.

Die Crista galli, von der Seite betrachtet, ähnelt einem rechtwinkligen, ungleichseitigen Dreieck, welches mit der längeren Kathete auf der Siebplatte aufgewachsen, mit der kürzeren nach vorn gerichtet ist. Die längste

Fig. 114.



Siebbein, Profilsansicht, das linke Labyrinth entfernt.
Cns, Cnm Concha sup. und media.

Theile der Platte. Dicht an der Crista galli und am Seitenrande der Siebplatte führen sie in kurze, enge Canälchen, welche sich längs der Lamina perpendicularis und der medialen Wand des Labyrinthes hinziehen; längs der Mitte jeder Seitenhälfte der Siebplatte sind sie einfache Löcher, durch breite oder schmale Brücken von einander geschieden, oft zu mehreren im Boden seichter Grübchen vereinigt, oft, und namentlich in der Nähe des vorderen Randes, zu schmalen Längsspalten zusammengeflossen.

Seite steigt entweder continuirlich vom hinteren Rande der Siebplatte an oder erhebt sich von der Fläche der letzteren aus einer anfänglich niederen und stumpfen medianen Kante. Die längste Seite und der oberste Theil der vorderen, sowie der Winkel, in welchem diese beiden zusammenstossen, bilden den freien Rand der Crista galli; hier ist sie dünn und scharf; nach unten und besonders gegen den unteren Theil des vorderen Randes,

der sich an das Stirnbein anlegt, nimmt sie an Mächtigkeit zu. Die Seitenflächen werden gewölbt und schliessen spongiöse Substanz oder eine Höhle ein; der vordere Rand ist breit und rauh. Seine Breite wird zunächst unter der Spitze noch vergrößert durch einen jederseits vor- und aufwärts abgehenden, kurzen, platten Fortsatz, *Processus ala-*

ris¹⁾, der sich an das Stirnbein anlegt (Fig. 113 und 114). Die Rinne zwischen diesen beiden Fortsätzen umschliesst, in Verbindung mit einer medianen Furche des Stirnbeins, einen cylindrischen, nach unten verjüngt und blind zulaufenden Canal, *Foramen coecum*; häufig ist das Foramen coecum in dem Stirnbeine allein enthalten; der vordere Rand der Crista galli zeigt alsdann statt einer medianen Furche eine schwache Firste, mit welcher es in einer Rinne des Stirnbeins befestigt ist.

Das Foramen coecum wird in der Regel von einem Bindegewebestrang, welcher sich in die Falx cerebri fortsetzt, ganz ausgefüllt. Zuweilen jedoch findet man im Grunde desselben noch eine feine Oeffnung (nach M. J. Weber in der Regel zwei), die zu Gefässcanälen des Proc. nasalis des Stirnbeins führt.


Unterhalb des Abganges der Procc. alares setzt sich der vordere Rand der Crista galli, allmählig wieder verschmälert, in den vorderen Rand der Lamina perpendicularis fort. Die Grenze beider wird, ausser durch die Kreuzung mit der Siebplatte, auch durch die veränderte Richtung des Randes angezeigt, der sich, wo er auf die perpendiculäre Platte übergeht, unter einem stumpfen Winkel vorwärts wendet, entsprechend der Neigung des Nasenrückens, an dessen Mitte er sich von innen, längs der Naht der Nasenbeine, anlegt. Im Ganzen dem vorderen Rande parallel, jedoch oft unregelmässig ausgeschnitten, oder in einer gebrochenen Linie mit nach vorn offenem, stumpfem Winkel verläuft der hintere scharfe Rand der Lamina perpendicularis, der sich mit dem oberen, kürzeren Theile an die Crista sphenoidalis, mit dem unteren, längeren Theile auf den Vorderrand des Pflugscharbeins fügt. Der untere Rand der L. perpend. geht entweder dem oberen, an die L. cribrosa angehefteten parallel oder convergirt nach vorn mit demselben. Er ist dick, wulstig und rauh und begrenzt von oben den Knorpel der Nasenscheidewand. Die Form der von diesen vier Rändern umschlossenen Lam. perpendicularis ist die eines mehr oder minder regelmässigen verschobenen Rechtecks. Im Allgemeinen dünn, verdickt sich die Platte in der Nähe des oberen, des vorderen und des unteren Randes. Nahe am oberen Rande ist sie in senkrechter Richtung von Furchen und feinen Canälchen durchzogen, in welchen, wie erwähnt, die Zweige des N. olfactorius herablaufen.

Lamina
perpendi-
cularis.

Die Labyrinth des Siebbeins ragen zuweilen über den unteren Labyrinth. Rand der Lamina perpendicularis vor und verstecken denselben; häufiger erreichen sie ihn nicht. Ihre Höhe beträgt 23^{mm} (etwas mehr als die Hälfte der grössten Höhe der Nasenhöhle), ihr sagittaler Durchmesser 32^{mm}, die Breite eines Labyrinths 16^{mm}. Ein Gang von etwa 4^{mm} Breite trennt die mediale Wand jedes Labyrinths von der Lam. perpendicularis (Fig. 112). Die Form, Grösse und Zahl der Zellen des Labyrinths unterliegt vielen individuellen Verschiedenheiten, ebenso die Art ihrer Verbindung; es giebt Zellen, welche die halbe Höhe und Breite des Labyrinths einnehmen, und andere von einigen Millimetern Durchmesser; die Communication findet bald durch weite Oeffnungen, bald durch schmale Spalten Statt; häufig zeigt sich die eine oder andere Zelle blasig aufgetrieben auf Kosten der benachbarten, deren Wände dann nach innen gewölbt erscheinen.

¹⁾ *Hamulus frontalis*.

Alle Siebbeinzellen öffnen sich unmittel- oder mittelbar auf der medialen Fläche oder am medialen Rande der unteren Fläche des Labyrinths. Nach allen übrigen Seiten sind sie an dem vollständigen Schädel geschlossen. Integrierender Bestandtheil des Siebbeins und mit den Wänden der Zellen untrennbar verschmolzen ist aber nur die erwähnte *Lam. papyracea*, welche gegen die Augenhöhle den grössten Theil der Zellen abschliesst. Vor ihr an der lateralen Fläche des Labyrinths, dann an der oberen, hinteren und unteren Fläche desselben sieht man Zellen, von welchen einzelne in allen, andere in vielen Siebbeinen offen stehen und ihren



Verschluss durch die benachbarten Kopfknochen, wie durch Deckel, erhalten. Das Verhältniss zu diesen Deckknochen ist verschieden, indem die Zelle zum grösseren Theil bald in dem Siebbein, bald im Deckknochen enthalten ist. Manche Zellen erhalten eine doppelte Aussenwand, indem sie mit ihrer dem Siebbein eigenthümlichen Lamelle sich unmittelbar an benachbarte Knochenplatten anlegen; zuweilen ersetzen auch die Aussenwände von Siebbeinzellen zum Theil die Lamellen ander-

rer, anstossender Knochen, z. B. die vordere Wand des Wespenbeinkörpers.

Die Zellen, welche die Lamina pap. schliesst, heissen eigentliche Siebbeinzellen, *Cell. ethmoidales*; die übrigen werden je nach den Deckknochen benannt, durch welche sie vervollständigt werden. Vor den *Cell. ethmoidales* liegen die *Cell. lacrymales*¹⁾, welche, in gleicher Flucht mit der Lamina papyracea, das Thränenbein und von vorn her der Stirnfortsatz des Oberkieferbeins zudeckt. Zeigen sich an der hinteren Fläche des Labyrinths offene Zellen, so erhalten sie ihre hintere Wand und einen Theil ihrer Seitenwände durch das Gaumenbein, *Cell. palatinae*, und, über demselben, durch den Wespenbeinkörper, *Cell. sphenoidales*. Ueber die an der oberen Fläche des Labyrinths sich öffnenden Zellen, *Cellulae frontales*, legt sich das Stirnbein, von dessen längs der Incisura ethmoidalis gelegenen Zellen die vorderste in die Stirnhöhle führt. Endlich kommen am lateralen Theile der unteren Fläche des Labyrinths zuweilen unvollständige Zellen vor, *Cellulae maxillares*, die von dem Oberkieferbeine ergänzt werden. Häufiger ruht das Labyrinth mit einem glatten, schräg lateralwärts gerichteten Seitentheile seiner unteren Fläche auf einer entsprechend geneigten Fläche am medialen Rande der Orbitalfläche des Oberkieferbeins.

Die Lamina papyracea ist in der Regel länglich vierseitig, die längste

¹⁾ *Cell. orbitariae*.

Seite sagittal, häufig aber mit abgerundeten Winkeln und mannigfach gezackten und gebogenen Rändern versehen. Mit diesen Rändern stösst sie an die aufgezählten Deckknochen der Siebbeinzellen, vorn an das Thränenbein, oben an das Stirnbein, hinten an den Körper des Wespenbeins, unten an den Körper des Oberkiefers. An ihre hintere, untere Ecke, bald mehr dem unteren, bald mehr dem hinteren Rande entlang, fügt sich, zwischen Wespen- und Oberkieferbein, der Proc. orbitalis des Gaumenbeins.


Var. Die Lamina papyracea ist durch eine perpendiculäre Naht in zwei Platten getrennt, von welchen die vordere, kleinere, dem hinteren Thränenbeine mancher Säugethiere verglichen werden kann.

In der Naht zwischen der Lamina papyracea und dem Stirnbein finden sich die beiden *Foramina ethmoidalia* ($1\frac{1}{2}$ mm Durchm.), das eine (F. e. ant.) in der Nähe der vorderen, das andere (F. e. post.) dicht an der hinteren Ecke der L. papyracea. Sie werden durch Ausschnitte der beiden zusammenstossenden Knochen gebildet oder gehören Einem derselben, am häufigsten dem Stirnbein allein an. Von der Incisura ethmoidalis der Lam. papyracea, wenn eine solche vorhanden ist, geht eine mehr oder minder tiefe Furche (Fig. 116 **) mehr oder minder weit medianwärts über die obere Fläche des Labyrinths, welche vom Stirnbein so zum Can. ethmoidalis ergänzt wird, dass das mediale Ende dieses Canals zuweilen ganz im Stirnbein verläuft.

Der Can. ethmoidalis ant., welcher nebst den gleichnamigen Gefässen den N. ethmoidalis zur Schädelhöhle führt, ist sehr beständig. Dagegen fehlt nicht selten der Can. ethm. post., in welchem Vasa ethm. post. zu den Siebbeinzellen und zur Schädelhöhle verlaufen. Statt des hinteren For. ethm. oder neben demselben kommt zuweilen ein mittleres vor, welches ebenfalls den Eingang eines in die Schädelhöhle einmündenden Canals darstellt.

Die Platte, welche die mediale Wand des Labyrinths bildet ¹⁾, ist eigenthümlich rauh durch zahlreiche, meist schief ab- und rückwärts verlaufende gerade und gebogene Furchen, durch Grübchen und feinere und gröbere Poren, worunter hier und da ein grösseres, scharfrandiges Loch, und durch die zwischen den Furchen und Oeffnungen vorspringenden Spitzen und

Fig 116.



Siebbein von der Seite, das linke Labyrinth und die Lam. perpend. entfernt.

zwei Theile von fast gleicher Höhe scheidet. Der obere Rand dieser Spalte

Leistchen. Ihr vorderer Rand ist scharf und in seiner oberen Hälfte mit dem Proc. nasalis des Oberkieferbeins und der medialen Fläche des Thränenbeins verbunden, in der unteren Hälfte dagegen frei und concav oder gerade und dann schräg ab- und rückwärts gerichtet. Ihr hinterer Rand ist tief eingeschnitten durch eine Spalte, welche von der medialen Fläche des Labyrinths aus horizontal bis fast an die laterale Oberfläche desselben vordringt und die hintere Hälfte des Labyrinths quer in

¹⁾ *Lamina concharum.*

ist nicht nur scharf, sondern meist auch in einen abwärts ragenden Saum verlängert, der den Zugang zur Spalte verengt. Die Spalte (Fig. 116) ist der obere Nasengang, *Meat. nar. sup.*, der überhängende Rand derselben ist die obere Muschel, *Concha sup.* ¹⁾. In den oberen Nasengang, versteckt durch die obere Muschel, münden mit einer oder mehreren runden oder querspaltförmigen Oeffnungen die Zellen des hinteren oberen Viertels des Labyrinths, namentlich die *Cellulae palatinae* und *sphenoidales*.

Der untere Rand der medialen Wand des Labyrinths stösst mit dem vorderen in einem rechten oder stumpfen Winkel zusammen und verläuft von vorn nach hinten gerade oder wenig abwärts geneigt und zugleich mit einer schwachen Convexität. Dieser Rand ist ausserdem seitwärts umgerollt oder auch in eine scharfe Kante seitwärts umgebogen. Die Fläche zunächst über demselben ist gegen die Nasenscheidewand hin gewölbt und geht mittelst dieser Wölbung in den horizontalen Boden des oberen Nasenganges über. Die Platte, die diesen Boden bildet und sich dann abwärts und endlich wieder seitwärts umrollt, wird mittlere Muschel, *Concha media*, genannt. Sie überwölbt den mittleren Nasengang, welchem zum Boden die obere Fläche der unteren Muschel dient, eines selbständigen und mit dem Oberkieferbeine durch Naht verbundenen, im Uebrigen aber ganz nach Art der mittleren Muschel gefalteten Knochens. Unter der letzteren finden sich vorn die Mündungen zunächst der vorderen Siebbeinzellen, mit welchen die Stirnhöhlen und die in der unteren Hälfte des hinteren Theiles des Labyrinths gelegenen Zellen in Verbindung stehen. Nach hinten ist die mittlere Muschel über die übrigen Theile des Labyrinths hinaus in eine Spitze verlängert, deren lateraler Rand sich an eine Firste des Gaumenbeins anlegt. Längs dem freien Rande ist sie in der Regel verdickt und in einer dem Rande parallelen Richtung von weiten Canälen durchzogen, welche von Bindegewebe und Gefässen erfüllt werden.

Var. Der lateralwärts umgerollte Rand der mittleren Muschel geht weit aufwärts und die Muschel scheint in eine knöcherne Blase oder Tasche umgewandelt, zu welcher nur ein enger Zugang von oben an der dem Labyrinth zugewandten Seite bleibt.

Gedeckt von der mittleren Muschel, findet sich im mittleren Nasengange ein kleinerer, muschelartig umgerollter Fortsatz, den Eingang der Kieferhöhle von oben überwölbt. Die Siebbeinzellen öffnen sich oberhalb dieses Fortsatzes; der *Proc. uncinatus* (s. unten) liegt unterhalb desselben.

An einem Siebbein unserer Sammlung fehlt die obere Muschel; die mediale Platte des Labyrinths ist eine perpendiculäre, am unteren Rande umgerollte Platte, an deren hinterem Rande nur ein abwärts geneigter, spitzer Fortsatz die Stelle der oberen Muschel bezeichnet.

Häufig findet sich über der oberen Muschel eine vierte, von ähnlicher Form, aber kleinere, *Concha Santoriniana*.


Wo der vordere Rand der medialen Wand des Labyrinths in die mittlere Muschel übergeht, entwickelt sich von jenem Rande und den Wänden der vorderen Siebbeinzellen ein platter und sehr dünner Fortsatz, *Proc. uncinatus* ²⁾ (Fig. 112. 115—117), welcher weiter lateralwärts liegt als die

¹⁾ *Os turbinatum s. spongiosum sup.* — *Concha Morgagniana*.

²⁾ *Proc. hamatus*; *Proc. unc.* oder *ham. major*.

Muschel, übrigens in gleicher Höhe mit der letzteren oder um Weniges tiefer

Fig. 117.



Siebbein von unten.

und dem unteren Rande derselben ziemlich parallel ab- und etwa bis unter die Mitte des Labyrinths rückwärts läuft. Seine beiden Flächen liegen sagittal, seine Ränder sind einfach oder zackig, das freie, etwas angeschwollene hintere Ende läuft in kurze Spitzen, zuweilen in eingerollte Plättchen aus. Der Proc. uncinatus legt sich vor die weite Lücke der Nasenwand des Oberkieferbeins, die in die Kieferhöhle führt, und begrenzt mit seinem oberen Rande die Communicationsöffnung der Kiefer- und Nasenhöhle. Das untere Ende desselben stösst mit dem Proc. ethmoid. der unteren Muschel zusammen.

Als *Proc. uncinatus minor* wird bei Albin, Sömmerring, Meckel und M. J. Weber ein breites und kurzes, seitwärts umgebogenes Plättchen beschrieben, welches von der vorderen, unteren Ecke der Lam. papyracea ausgeht. Es hängt zuweilen mit der Wurzel des Proc. uncinatus maj. zusammen, wird von dem Thränenbein bedeckt oder stösst an den oberen Rand des Oberkieferbeins und wird nicht leicht völlig vermisst. Doch lässt es sich immer als ein unvollständiges Deckstück der untersten Cellulae lacrymales oder der vordersten Cellulae maxillares betrachten und scheint mir deshalb einen besonderen Namen nicht zu verdienen.

Beim reifen Fötus sind nur die beiden Labyrinthe des Siebbeins knöchern, aber von sehr geringem transversalen Durchmesser; bis zum vierten oder fünften Jahre vergrössern sie sich durch Ausdehnung der Zellen und zwar hauptsächlich in medialer Richtung. Die Verknöcherung des unpaaren Theils des Siebbeins beginnt erst im sechsten Lebensmonat oder noch später, und zwar von der Crista galli an abwärts. Im zweiten bis dritten Jahre sind die Labyrinthe mit dem mittleren Theile verwachsen. Unentschieden ist noch, ob die Siebplatte, bevor die Verschmelzung der einzelnen Stücke zu einem Knochen vollendet ist, mit den Labyrinth oder mit der Crista galli und der Lamina perpendicularis verbunden ist. Gegen die letztere, allgemein angenommene Ansicht hat M. J. Weber sich erklärt.


4. Stirnbein, *Os frontis*.

Das Stirnbein stellt, von innen betrachtet, einen Hohlkugelabschnitt dar und schliesst von vornher die Schädelkapsel allseitig, einen schmalen Ausschnitt in der Mitte des Bodens, *Incisura ethmoidalis*, ausgenommen, welchen die Siebplatte ausfüllt. Es reicht indess an der Schädeldecke weiter rückwärts als an der Basis, so dass eine durch den hinteren Rand desselben gelegte Ebene in einem Winkel von 60° gegen den Horizont geneigt ist. In Verbindung mit der Siebplatte gleicht der hintere Rand des Stirnbeins einem Kreisbogen oder einer mit dem längsten Durchmesser quer gestellten Ellipse, die in ihrem unteren Theile abgeflacht und zu beiden Seiten neben dem hinteren Rande der Siebplatte sogar etwas aufwärts gebogen ist, entsprechend der Wölbung des Daches der Augenhöhle. Oben

4. Stirnbein.

und seitlich steht der hintere Rand des Stirnbeins mit den Scheitelbeinen,

Fig. 118.



Stirnbein von innen.

unten von der Stelle an, wo er sich abzuflachen beginnt, mit dem Wespenbein in Verbindung. Oben ist er stark und zackig und nimmt nach unten hin an Mächtigkeit allmählig ab.

Die innere Oberfläche des Stirnbeins zeigt die gewöhnlichen Gehirn- und Gefäss-eindrücke; die Gehirneindrücke und die dieselben trennenden Leisten am stärksten ausgeprägt am Boden, die Gefäss-eindrücke an der Seitenfläche. Der schmale Rand, welcher die Incisura ethmoid. von vorn

begrenzt, ist, wenn er gemeinschaftlich mit dem vorderen Rande der Crista galli das Foramen coecum bildet, in senkrechter Richtung tief gefurcht; schliesst er aber das Foramen coecum ganz ein, so ist er unterhalb des Eingangs in diesen Canal glatt oder mit einer nur linearen senkrechten Rinne versehen. An eine kleine, plane, kaum rauhe Fläche (Fig. 118*) zu jeder Seite jener Furche (oder der hinteren Wand des For. coecum) lehnen sich die Procc. alares der Crista galli. Ueber dem Rande des For. coecum beginnt, senkrecht ansteigend, die *Crista frontalis*, ein scharfer, selten auf der Schneide gefurchter Kamm, welcher mehr oder minder weit (bis zu 8mm) in die Schädelhöhle vorspringt und nach längerem oder kürzerem Verlaufe in zwei Lippen aus einander weicht, die, sich allmählig abflachend, den *Sulcus sagittalis*¹⁾ (4mm breit) begrenzen. Längs dem letzteren finden sich die unbeständigen Eindrücke pacchionischer Drüsen.

Äussere Fläche.


An der äusseren Fläche des Stirnbeins (Fig. 119) ist, wie schon bei der allgemeinen Beschreibung des Schädels angegeben wurde, Decke und Boden bestimmter von einander geschieden, als an der inneren Fläche. Die Grenze ist durch drei nach oben convexe Bogen, zwei seitliche symmetrische und einen mittleren, unpaaren, bezeichnet. Die seitlichen Bogen sind die Oberaugenhöhlenränder, *Margines supraorbitales*, Kanten, mit welchen die perpendiculäre, die Stirngegend einnehmende Platte in die horizontale obere Wand der Augenhöhlen umbiegt. Der mittlere Bogen, *Margo nasalis*, ist der vordere Rand einer rauhen Fläche, welche an der Bildung des Daches der Nase Antheil nimmt und am unversehrten Schädel durch die Anfügung der Nasenbeine und der Stirnfortsätze der Oberkieferbeine verdeckt ist.

Die Supraorbitalränder sind nach oben und zugleich nach vorn convex; sie sind, je näher den Schläfen, um so schärfer und um so mehr überhängend; in der Nähe der Nase runden sie sich ab, so dass der Ueber-

¹⁾ *Sulcus frontalis*.

gang aus der Augenhöhle in die Stirn und in die Wölbung, womit meistens die letztere über die Nasenwurzel vorragt, sanfter wird. Meist steht das nasale Ende merklich tiefer als das temporale. Ein flacher Ausschnitt, *Incisura supraorbitalis*, welchen der Supraorbitalrand in der Nähe seines nasalen Endes (25 mm von der Medianebene) zeigt, geht in der Regel an seinem lateralen Rande scharf aus dem Supraorbitalrande hervor und an dem medialen Rande abgerundet in den letzteren über; doch

Fig. 119.



Stirnbein von vorn.

ist öfters auch der mediale Rand der Incisura supraorb. durch eine spitze, quer vorspringende Zacke bezeichnet, und nicht selten verbindet sich diese Zacke mit einer ähnlichen an der lateralen Ecke der Incisura supraorb. zu einer Knochenbrücke, die den Einschnitt zu einem Canal (*Can. supraorb.*) umwandelt, dessen Eingang in der Decke der Augenhöhle hinter dem Supraorbitalrande, dessen Ausgang (*For. supraorb.*) an der Stirn über dem Supraorbitalrande sich findet.

Durch die Incisura oder das Foramen supraorbitale kommen die Vasa supraorbit. und der N. frontalis und supraorbit. aus der Augenhöhle zur Stirn. Oft ist der Canal von Anfang an oder am Ausgange durch eine schmale oder breite Brücke in zwei neben oder über einander liegende Canäle getheilt. Vom Grunde der Incisur oder von der oberen Wand des Canals führt zuweilen ein *For. nutritium* in das Stirnbein.

Zuweilen besteht ausser dem *Can. resp. der Incisura supraorbitalis* und seitwärts von derselben ein Canal vom Verlauf und Durchmesser des *Can. supraorbitalis*, dessen Mündungen aber sowohl an der Stirn wie in der Decke der Augenhöhle weiter vom Rande des Knochens entfernt liegen.

Der Nasenrand ist steiler vorwärts und etwas steiler aufwärts gebogen als der Supraorbitalrand. Er ist aber kürzer als dieser (die Länge der Sehne des *Mg. nas.* verhält sich zur Länge der Sehne des *Mg. supraorbit.* etwa wie 2 : 3) und reicht nicht so weit aufwärts.

Der perpendiculäre, oberhalb der *Mgg. supraorbit.* und der Incisura nasalis gelegene Theil des Stirnbeins, Stirnplatte, *Pars perpendicularis* ¹⁾, zerfällt durch zwei nahe am Seitenrande aufwärts verlaufende Kanten in drei Felder, ein grosses, unpaares, mittleres, *Facies frontalis*, und zwei kleine, seitliche, *Facies temporales*. Jenes umfasst die ganze Breite der Stirn und reicht in den vorderen Theil des Scheitels hinauf;

Perpendiculärer Theil.

¹⁾ *P. ascendens*, *P. frontalis s. s.*

diese gehören jederseits dem vorderen Theile der Schläfenfläche an. Die Kante, welche Stirn- und Schläfenfläche trennt, ist das vordere Ende der Schläfenlinie ¹⁾. Sie geht nach unten in seitwärts concavem Bogen auf den oberen Rand des Jochfortsatzes, *Proc. zygomaticus* ²⁾ (Fig. 119, 120), über, eines seit- und abwärts vorragenden Fortsatzes von dreiseitig prismatischer Gestalt, auf welchen ich zurückkomme.

Die Stirnfläche (Fig. 119) zeigt zunächst über jedem Supraorbitalrande eine Wölbung, *Arcus superciliaris*, welche von der Nasenwurzel aus seitwärts und aufwärts, sich allmählig über den Mg. s. o. erhebend, verläuft und gegen die Schläfenlinie hin verflacht. Durch diese Wölbung erhält das Stirnbein über den Augenhöhlenrändern eine bedeutende Mächtigkeit; doch ist der Superciliarbogen oft nur die dünne äussere Wand einer Höhle, der Stirnhöhle, *Sinus frontalis* (Fig. 122), welche sich von der Nasenhöhle aus zwischen die äussere und innere Knochentafel des Stirnbeins erstreckt. Die beiden Superciliarbogen stossen über der Nasenwurzel zusammen oder werden, was häufiger der Fall ist, durch ein flaches Feld von der Breite des Nasenrückens, die *Glabella*, von einander geschieden. Ueber dem Arcus superciliaris und ungefähr an der Stelle des Uebergangs der eigentlichen Stirn- in die Scheitelgegend, gleich weit entfernt von der Mittellinie und der Schläfenlinie, findet sich eine zweite, einer flachen Beule ähnliche Wölbung, welche man Stirnhöcker, *Tuber frontale*, nennt. Die Mittellinie der Aussenfläche des verticalen Theiles des Stirnbeins ist oft, jedoch nur in wenig auffallender Weise bezeichnet durch eine Furche auf der Glabella und weiter hinauf durch eine Kante, welche zwischen den Stirnhöckern am stärksten ist.

Die Furche und die Kante sind Ueberbleibsel einer Naht, *Sutura frontalis*, welche sich beim Erwachsenen zuweilen vollständig, zuweilen nur im untersten Theile der Stirnplatte erhält.

Horizontaler Theil.

Der horizontale Theil der Aussenfläche des Stirnbeins zerfällt in den Nasentheil (*Pars nasalis*) und die Augenhöhlentheile oder Flächen (*Plana orbitalia*) ³⁾. Der Nasentheil liegt, wie sich von selbst versteht, unpaar zwischen den paarigen Augenhöhlentheilen; seine Grenze gegen die Augenhöhlenfläche ist jederseits eine scharf vorspringende Linie, *Margo naso-orbitalis* (Fig. 120), welche, sagittal und gerade oder mit geringen Excursionen auf- und abwärts gebogen, von dem Winkel, in welchem der Supraorbital- und Nasenrand der Stirnplatte zusammenstossen, bis an den hinteren Rand des Knochens verläuft. Wenn sich der vordere Endpunkt dieser Linie an dem isolirten Stirnbein wegen der Abrundung des nasalen Endes des Supraorbitalrandes nicht mit völliger Schärfe bestimmen lässt, so ist er dagegen, so lange das Stirnbein mit den Nachbarknochen in Verbindung steht, durch das obere Ende des vorderen Randes der Thränengrube hinlänglich genau bezeichnet (vgl. Fig. 81, 89).

Der Naso-Orbitalrand ist an der inneren Wand der Augenhöhle sichtbar, wo er in einer Naht mit dem oberen Rande zuvorderst des Stirnfort-


¹⁾ *Linea semicircularis.*

²⁾ *Proc. malaris s. jugalis.*

³⁾ Die *Pars orbitalis aut.* entspricht dem von mir sogenannten *Planum orbitale* nebst dem anstossenden zelligen Theile der *Pars nasalis*. Der letztere wird jener Auffassung zufolge als innerer Rand der Orbitalplatte beschrieben.

satzes des Oberkiefers, dann des Thränenbeins und dahinter der Papier-

Fig. 120.



Stirnbein von unten. Ft Fossa trochlearis.

platte des Siebbeins zusammenstösst. In dem mit der Papierplatte verbundenen Theile des Randes kommen die Ausschnitte, die zur Bildung der Foramina ethmoidalia beitragen, oder über dem Rande die *Foramina ethmoidalia ant. und post.* vor, von welchen bei der Beschreibung des Siebbeins (S. 117) die Rede war.


Der Nasentheil des Stirnbeins hat die Form eines mit der Convexität nach vorn gerichteten und nach hinten lang ausgezogenen Hufeisens. Von den zwei Rändern, innerhalb welcher die hufeisenförmige Fläche beschlossenen ist, ist der innere identisch mit der schon erwähnten Incisura ethmoidalis, welche die Siebplatte einfasst; der äussere wurde ebenfalls als Nasenrand mit seinen Fortsetzungen, den Naso-Orbitalrändern, bereits beschrieben. Der innere Rand bildet vorn einen etwas flacheren Bogen als der äussere, oder, mit anderen Worten, die Ränder stehen vorn weiter von einander ab als an den Seiten, und in einzelnen Fällen rücken sie einander, je weiter nach hinten, um so näher.

Die beiden seitlichen, gerade verlaufenden Partien des Nasentheils haben ein, von dem mittleren, bogenförmigen Stücke wesentlich verschiedenes Ansehen. Jene sind die schon bei Gelegenheit des Siebbeins besprochenen Deckel der Stirnbeinzellen des Labyrinths. Sie stellen eine von dünnen Platten begrenzte, hinten flache und nach vorn allmählig sich vertiefende longitudinale Rinne dar, die durch perpendiculäre, der Frontalebene parallele Scheidewände mehr oder minder regelmässig in eine Reihe vierseitiger Zellen abgetheilt wird. Von der vordersten dieser Zellen aus erstreckt sich zwischen die Tafeln der Stirn- und der Augenhöhlenplatte die Stirnhöhle; die Aushöhlung schreitet mit den Jahren bis zu einer individuell variirenden Grenze auf-, seit- und medianwärts fort; medianwärts erstreckt sie sich von beiden Seiten her auch über der mittleren Partie des Nasentheils der Norm gemäss bis zur Medianebene und lässt nur eine dünne Scheidewand, *Septum frontale*, zwischen beiden Sinus übrig, die indess häufig nicht ganz median gestellt ist.

Von den Forr. ethmoidalia aus gehen Rinnen oder Canäle für den N. und die Vasa ethm. schräg median- und vorwärts, die Rinnen in der Decke, die Canäle innerhalb des angewachsenen Randes der Scheidewände der Cellulae frontales.

Die mittlere, gebogene Partie des Nasentheils ist eine sehr rauhe, schräg nach unten und hinten abfallende Fläche, deren hinterer Rand in einen, der Wurzel des Nasenrückens entsprechend gewölbten Fortsatz, den Nasenfortsatz, *Processus nasalis o. fr.*, ausläuft. Form und Dimensionen dieses Fortsatzes, den man als den wesentlichen Theil der


über den Boden der Hirnhöhle hinaus verlängerten Decke des vegetativen Rohrs betrachten muss, sind sehr veränderlich. Wo er am vollkommensten entwickelt ist, nimmt er mit seinem Ursprunge den ganzen vorderen Rand der Incisura ethmoid. ein; er ist von da in einem zur Stirnplatte stumpfen Winkel ab- und vorwärts gerichtet, an der gewölbten Aussenfläche rau, an der concaven Innenfläche glatt, am vorderen (unteren) freien Rande scharf, längs der Mitte der oberen Fläche mit einer stumpfen, längs der Mitte der unteren Fläche mit einer scharfen perpendiculären Kante ver-



Querschnitt des Pr. nasalis des Stirnbeins.

sehen. Mittelst eines senkrecht gegen den Nasenrücken geführten Querschnittes getheilt, giebt er das Bild eines Kreuzes mit rückwärts gekrümmten Seitenschenkeln. Die rauhe Fläche des Nasentheils und die Aussenfläche des Nasenfortsatzes dienen in der Mitte den Nasenbeinen (*N*), seitlich den Stirnfortsätzen des Oberkieferbeins (*Mx*) zur Befestigung, in der Art, dass diese platten Knochentheile mit ihren zackigen hinteren und wegen der Neigung des Nasenrückens aufwärts gerichteten Rändern in die rauhe Fläche des Nasentheils eingreifen und mit ihren unteren, rückwärts schauenden Flächen anfänglich auf der gewölbten Aussenfläche des Nasenfortsatzes ruhen. Die stumpfe mediane Kante dieser Fläche springt in die Naht der Nasenbeine vor. Die Innenfläche des Nasenfortsatzes begrenzt oben von vornher das *For. coecum* (wenn an der Bildung desselben das Siebbein Theil nimmt), dient mit ihrer medianen Längsfurche dem oberen Theile des vorderen Randes der Lamina perpendicularis des Siebbeins (*E*) zur Anheftung und deckt zu den Seiten der Nasenscheidewand die Nasenhöhle und zuweilen auch noch, wenn sie breit genug ist, die vorderen Zellen des Labyrinths. Die Varietäten der Form des Nasenfortsatzes beruhen nun auf einem Uebergewicht der Entwicklung bald des platten Theiles, bald der medianen Kanten, insbesondere der unteren. Im ersten Fall stellt er eine plane und dünne, von einer Seite zur anderen gewölbte, scharfrandige Lamelle, im anderen einen seitlich comprimierten, spitzen Stachel dar ¹⁾. Die Uebergänge zwischen diesen Extremen ergeben sich von selbst.

Fig. 122.



Mediandurchschnitt des Stirnbeins mit dem Nasenbein und Siebbein.


Die Augenhöhlenfläche des Stirnbeins (Fig. 123) ist concav von Einer Seite zur anderen und, in schwächerem Maasse, von vorn nach hinten;

Augenhöhlen-
lentheile.

¹⁾ *Spina nasalis aut.* Die *Alae spinae nasalis* M. J. Weber entsprechen dem platten Theil des Nasenfortsatzes bei stark vorspringenden medianen Kanten.

hinter dem, wie erwähnt, stark überhängenden lateralen Theil des Supraorbitalrandes hat sie eine meistens kaum merkliche, seichte Grube, *Fossa lacrymalis*, welche die Thränendrüse aufnimmt, und in gleicher Höhe hinter

Fig. 123.



Stirnbein von unten. Ft Fossa trochlearis.

dem nasalen Ende des Supraorbitalrandes einen tieferen, aber minder umfangreichen Eindruck, *Fossa trochlearis*, in welchem die Schlinge befestigt ist, durch die die Sehne des M. obliq. oculi sup. läuft. An der Stelle der Fossa trochlearis findet sich zuweilen, zur Anheftung der genannten Schlinge, ein kurzer, spitzer Stachel, *Spina trochlearis*. Im Uebrigen ist

die Augenhöhlenfläche glatt und eben, unregelmässig vierseitig. Von ihren Rändern ist der vordere, der sie gegen die Stirnplatte, und der mediale, der sie gegen den Nasentheil absetzt, bereits beschrieben; der hintere Rand ist dem Supraorbitalrande fast parallel und mit dem vorderen Rande des Orbitalflügels des Wespenbeins durch die Naht verbunden, die in der Augen-, wie in der Schädelhöhle sichtbar ist; er ist aber schmaler, als der Supraorbitalrand, da der laterale Rand der Orbitalfläche sich auf dem Weg von vorn nach hinten der Medianebene nähert. An den lateralen Rand schliessen sich die Knochen an, welche mit ihren medianwärts gewandten verticalen Flächen die Augenhöhle seitlich begrenzen und dieselbe von der Schläfengrube abschliessen, zuvorderst die Orbitalplatte des Jochbeins, dahinter der Temporalflügel des Wespenbeins. Seitlich von diesem Rand finden sich die rauhen, theilweise zackigen Flächen, mit welchen entsprechende Flächen der beiden genannten Knochen sich verbinden: dem hinteren Rande des Stirnbeins zunächst eine stumpfwinkelig dreiseitige, mit dem stumpfen Winkel vorwärts gerichtete Fläche, mittelst welcher das Stirnbein auf dem oberen Rande (Mg. frontalis) des Temporalflügels ruht; vorn eine schmalere, rauhere, ebenfalls dreiseitige, aber spitzwinkelige und mit der Spitze rückwärts gerichtete Fläche, mit welcher sich das Stirnbein auf den oberen Rand des Jochbeins stützt; zwischen den einander zugekehrten Spitzen dieser beiden Flächen ein scharfer Rand, der etwa dem mittleren Drittel des lateralen Randes der Orbitalfläche entspricht, und von dem oberen Rande der Crista zygomatica des Temporalflügels und der Augenhöhlenplatte des Jochbeins eingenommen wird, mehr von der einen oder anderen, je nachdem die Seitenwand der Augenhöhle zum grösseren Theil vom Joch- oder Wespenbein gebildet wird.

Die rauhe Fläche, welche zur Verbindung mit dem Jochbein dient, ist etwas lateralwärts gerichtet; sie ist die Endfläche eines dreiseitig prismatischen Vorsprungs, dessen schon oben gedacht wurde und welcher als *Proc. zygomat.* beschrieben wird. Auf die Vorderfläche dieses Fortsatzes setzt sich die Vorderfläche des Stirnthteils, auf seine untere Fläche die Or-

Jochfortsatz.

Orbitalfläche ohne Unterbrechung fort; seine obere Fläche geht in einem sanften Bogen aus der Schläfenfläche, sein oberer Rand ebenso aus der Schläfenlinie des perpendicularen Theils des Stirnbeins hervor.

Zwischen dem hinteren und dem lateralen Rande der Orbitalfläche, mit anderen Worten, zwischen der Insertion des Orbital- und Temporalflügels an das Stirnbein bleibt mitunter eine kleine Strecke des Randes der Orbitalfläche frei, welche ebenso oft in gleicher Flucht mit dem hinteren, als mit dem lateralen Rande erscheint und an der Begrenzung der Fissura orb. sup. Antheil nimmt. Durch eine unbeständige Oeffnung im Orbitaltheil tritt eine Vene aus der Schädel- in die Augenhöhle, welche durch die Naht zwischen Stirn- und Wespenbein wieder in die Schädelhöhle zurückkehrt. Schultz, a. a. O. S. 27.


Das Stirnbein besteht beim Neugeborenen noch aus zwei symmetrischen Hälften. Die mediane Naht, in welcher diese beiden Hälften aneinandergesetzt sind, ist anfangs einfach, wird später zackig und verschwindet gewöhnlich gegen Ende des zweiten Lebensjahres. Die Stirnhöhlen entwickeln sich nicht vor dem zweiten Jahre, nehmen von da an langsam an Ausdehnung zu und scheinen sich auch nach vollendeter Reife noch zu vergrößern.

5. Schläfenbein, *Os temporum*.

5. Schläfen-
bein.

Das Schläfenbein füllt jederseits an der Seitenwand und Basis des Schädels die Lücke zwischen dem Hinterhaupts- und Wespenbein aus. So weit es an der Seitenwand des Schädels erscheint, ist es, abgesehen von den aus der äusseren Fläche hervorgehenden Fortsätzen, platt mit schwach convexer Aussen- und concaver Innenfläche. Das an der Basis gelegene Stück ist einem Prisma oder einer liegenden Pyramide ähnlich, welche mit der Grundfläche seit- und etwas rückwärts, mit der Spitze median- und vorwärts gerichtet, im medialen (vorderen) Theile massiv, im lateralen (hinteren) Theile von einer weiten Höhle quer durchzogen ist, deren Eingang, der *Porus acusticus ext.* ¹⁾, sich in der Grundfläche der Pyramide, an der Seitenwand des Schädels findet.

Fig. 124.



Linkes Schläfenbein, von der Seite, bei einer geringen Drehung des Schädels um die sagittale Axe mit der linken Fläche aufwärts.

An dem platten Theil des Knochens unterscheidet man zwei Abtheilungen, eine vordere, Schuppen- theil oder Schuppe, *Pars squamosa* s. *Squama*, von welcher in der Nähe des unteren Randes der Jochfortsatz, *Processus zygomaticus*, seinen Ursprung nimmt, und eine hintere und kleinere, den Warzen- theil, *Pars mastoidea* ²⁾, dessen äussere Fläche fast ganz durch den Warzenfortsatz, *Proc. mastoideus* ³⁾, eingenommen wird (Fig. 124). Beide Abtheilungen sind am oberen Rand des Knochens durch eine Einbiegung, in welcher ihre convexen

¹⁾ *P. auditorius ext.*

²⁾ Zitzen- theil, *Pars mamillaris*.

³⁾ Zitzenfortsatz, *Proc. mamillaris*.

oberen Ränder einander begegnen, *Incisura parietalis*, gegen einander abgegrenzt; am unteren Rande geht der Warzen- in den Schuppentheil mittelst einer bogenförmig aufwärts gewölbten Platte über, welche den oberen Theil des Eingangs in den äusseren Gehörgang und die obere Wand des letzteren bildet. Diese Platte, wiewohl sie an dem vollendeten Schläfenbein mit demselben Rechte dem Warzen-, wie dem Schuppentheil zugerechnet werden kann, erweist sich doch bei ihrem ersten Auftreten als ein Bestandtheil der Schuppe und soll deshalb in Verbindung mit dieser beschrieben werden. Im Uebrigen scheiden sich Schuppen- und Warzentheil auf der Aussenfläche des Schläfenbeins durch eine bald nur schwache, bald wulstige Firste, die sich von der *Incisura parietalis* schräg vorwärts gegen den Jochfortsatz erstreckt und das hintere Ende der Schläfenlinie darstellt. Auf der Innenfläche des Knochens setzt sich häufig eine Spalte (Fig. 135), welche den Schuppentheil von der Pyramide trennt, zwischen dem ersteren und dem Warzentheil bis zur *Incisura parietalis* fort, entweder als Spalte oder in Form einer seichten, linearen Furche oder einer Reihe punktförmiger Oeffnungen.

Der an der Basis gelegene, pyramidenförmige Theil, Pyramide, besteht aus zwei, ganz unabhängig von einander sich entwickelnden Stücken, dem Felsentheil, *Pars petrosa*, und dem Paukentheil, *Pars tympanica* ¹⁾.

Am Felsentheil unterscheiden wir zunächst den massiven, aus besonders fester Substanz gebildeten Körper von dem dünnen, plattenartigen Fortsatz, Paukendecke, *Tegmen tympani* ²⁾, der von der Einen Kante desselben ausgeht. Der Körper ist ein vierseitiges, mit der Einen, schräg abgestutzten Endfläche auf dem vorderen unteren Theil der inneren Fläche des Warzentheils aufgewachsenes Prisma, dessen Längsaxe, wie bereits von der Pyramide im Ganzen angegeben wurde, vor- und medianwärts und zwar so verläuft, dass die Fortsetzungen der Längsaxen beider Felsentheile einander unter einem stumpfen Winkel in der Gegend des hinteren Randes der Nasenscheidewand schneiden würden. Von den vier Kanten des prismatischen Körpers liegen je zwei und zwei einander gegenüberstehende die einen in der verticalen, die anderen in der horizontalen Ebene, sie sind demnach als obere (*s*), untere (*i*), vordere (*a*) und hintere (*p*) zu bezeichnen (Fig. 125, 126, 127 a. f. S.). Von den vier Seitenflächen schauen zwei, die in der oberen Kante zusammenstossen, in die Schädelhöhle; die Eine, die von der oberen Kante schräg vorwärts abfällt, nennen wir innere vordere (*ia*), die andere, die von der oberen Kante schräg rückwärts abfällt, innere hintere (*ip*) Fläche. Zwei Flächen liegen an der Aussenseite der Grundfläche des Schädels; eine äussere hintere (*ep*), der inneren vorderen parallel, liegt frei, eine äussere vordere (*ea*), der inneren hinteren parallel, ist theils durch den Schuppen-, theils durch den

¹⁾ Ich gebrauche den Namen Felsentheil in einem engeren, als dem üblichen Sinne. Die Meisten nehmen Felsentheil und Pyramide synonym und begreifen unter beiden Bezeichnungen den Paukentheil mit; Arnold aber, welcher den Paukentheil vom Felsentheil trennt, rechnet zu dem letzteren auch den Warzentheil.

²⁾ *Processus tympani* s. *Tegmentum tympani*. M. J. Weber.

den Paukentheil verdeckt und macht die hintere Wand der Pauken-

Fig. 125.




Fig. 126.





Fig. 127.



Parallele Durchschnitte des Schläfenbeins in einer auf die Längsaxe der Pyramide senkrechten Richtung. Fig. 125 vor dem vorderen Rand des äusseren Gehörgangs. Fig. 126 vor dem Griffelfortsatz. Fig. 127 vor dem Eingang des Can. carot. Pst Proc. styloideus. Crp Crista petrosa. Mtγ Margo tympanicus squamæ. Ama Antr. mastoideum. Caf Can. facialis. Cvt Cavum tympani. Cca Can. carot. Cm Canalis musculotubarius. Stu Septum tubæ.


höhle aus. Durch die Convergenz der Längsaxen der Felsentheile nach vorn sind aber die vorderen Flächen an der Innen- und Aussenseite des Felsentheils zugleich lateralwärts, die hinteren Flächen an der Innen- und Aussenseite zugleich medianwärts gewandt.

Keine dieser Flächen ist gegen die Flächen des Warzentheils, an welche sie stossen, bestimmt abgegrenzt; höchstens könnte man den vorderen Rand des Sulcus sinus transversi, wovon später, als laterale Grenze zwischen der inneren hinteren Fläche des Felsentheils und der Innenfläche des Warzentheils betrachten. Mit dem Schuppentheil steht der eigentliche prismatische Körper des Felsenbeins in gar keiner Berührung, vielmehr bleibt, da der letztere sich von seinem Ursprung am Warzenthail an immer mehr von der Schuppe medianwärts entfernt, zwischen dem Felsenthail und der Schuppe eine Lücke, die nur durch eine dünne und durchscheinende Platte von oben her zugedeckt wird. Diese Platte — das bereits erwähnte *Tegmen tympani* — ist ein Fortsatz des Felsentheils, von dessen vorderer Kante

sie ausgeht, so dass ihre obere Fläche mit der inneren vorderen Fläche des Felsentheils in einer Flucht liegt, ihre untere Fläche dagegen rechtwinkelig gegen die Paukenhöhlenfläche des Felsentheils geneigt ist. Der vordere Rand dieser Platte legt sich an den Schuppentheil an, anfangs, d. h. mit dem lateralen Theil (Fig. 125) an die innere Fläche der Schuppe, weiter medianwärts (Fig. 126) an den unteren Rand derselben. Die Stelle der Verbindung wird erkannt an einer Fissur, der *Fissura petro-squamosa*, welche sich von dem lateralen Ende aus häufig eine Strecke weit verwischt, am medialen Ende aber immer deutlich und wenn auch eng, doch durchgängig ist. Sie hat einen im Ganzen bogenförmigen und nach vorn convexen, dabei fein gezackten oder wellenförmigen Verlauf.


Der Paukentheil gleicht einer kurzen und weiten, mit der

Fig. 128.



Theil des linken Schläfenbeins, wie Fig. 124. Mty Mg. tympan.

Fig. 129.



Dasselbe, ohne den Paukentheil. † Schnittfläche, wodurch der Paukentheil entfernt wurde.

Längsaxe transversal gestellten und oben offenen Röhre, welche mit den etwas eingerollten oberen Rändern an den Warzen- und Schuppentheil so angefügt ist, dass der Ausschnitt zwischen diesen beiden zur elliptischen Oeffnung, *Porus acusticus ext.*, und die concave Platte der Schuppe, die ich als obere Wand des Gehörgangs bezeichnete, zum elliptischen Canal ergänzt wird. Der Ein-

gang der Röhre ist wulstig und zur Anheftung des knorpeligen Gehörgangs rau, die Ausmündung gegen die Paukenhöhle hin so schräg abgestutzt, dass die vordere Wand fast doppelt so lang ist, als die hintere (vgl. Fig. 148). Die hintere Wand der Röhre lehnt sich an den Warzenfortsatz und ist äusserlich von demselben durch eine Spalte, *Fissura tympanico-mastoidea* ¹⁾ geschieden, in welcher sich die feinen Mündungen des Can. mastoideus finden. Die vordere Wand ist frei, begrenzt von vorn und unten den äusseren Gehörgang und weiter


¹⁾ *Fissura petroso-mastoidea*.

medianwärts die Paukenhöhle und den Can. musculo-tubarius ¹⁾ und endet, allmählig verjüngt, mit gerade abgestutztem Rande unter dem medialen Ende der Paukendecke. Von dem Boden der Röhre, in welchem die Innenflächen der vorderen und hinteren Wand in einander umbiegen, ragt aussen eine scharfe Kante, die *Crista petrosa*, abwärts, die mit der unteren Kante des Felsentheils untrennbar verwächst; der obere Rand der vorderen Wand ist vom Porus acust. ext. an eine kurze Strecke mit dem Schuppentheil verschmolzen, dann weiter medianwärts an die untere Fläche der Paukendecke gefügt und vom vorderen Rande der letzteren so überragt, dass zwischen beiden eine Spalte bleibt, die *Fissura petro-tympa-nica* ²⁾, welche an dem medialen Ende häufig verwächst, am lateralen Ende aber weit und wegsam bleibt und von der Schädelbasis ins Innere der Paukenhöhle führt. Mit der äusseren vorderen Wand des Felsentheils umschliessen die lateralen Ränder der Paukendecke und des Paukentheils die dreiseitige Mündung des *Can. musculo-tubarius* (Fig. 127). Von den Canälen, welche die massive Substanz des eigentlichen Felsentheils durchziehen, liegt der ansehnlichste (5 bis 6^{mm} im Durchmesser) an der Vorderseite des medialen, über die Schuppe hinaus sich erstreckenden Theils desselben; dies ist der *Can. caroticus*. Der Eingang in denselben ist auf der hinteren unteren Fläche des Felsentheils hinter dem medialen Ende der Vorderwand des Paukentheils. In einem Viertelkreis aufsteigend, würde er an der Spitze der Pyramide münden, wenn nicht meistens die vordere und obere Wand des Canals, wie durch Abnutzung, defect wären und die eigentliche Mündung desselben mit der Lücke dieser Wand zu einer langen und breiten Spalte zusammenflösse. Da die vordere Wand des Felsentheils zugleich hintere Wand der Paukenhöhle ist und da der Eingang in den carotischen Canal sich hinter der medialen Mündung des Can. musculo-tubarius befindet, so folgt, dass die Paukenhöhle und der Can. musc.-tub. einerseits und der Can. carot. andererseits eine Strecke weit Wand an Wand liegen. Namentlich ist es nur eine dünne Platte, welche den aufsteigenden und den Anfang des liegenden Theils des Can. carot. von der Paukenhöhle und dem Can. musculo-tubarius scheidet (Fig. 127).

a. Schuppentheil.

Der Schuppentheil, für sich betrachtet, hat ungefähr die

Fig. 130.



Form einer kreisförmigen Scheibe, aus deren unterem Rande mittelst zweier in einem stumpfen oder abgerundeten Winkel convergirender Linien ein Stück ausgeschnitten ist. Er wird demnach eingefasst von einem Bogen, welcher mehr als drei Vierteln eines Kreises entspricht, und von


¹⁾ Ich wähle diesen Namen, um nicht von einer knöchernen Tuba im engeren und weiteren Sinne reden zu müssen. Die Tuba im weiteren Sinne dieses Wortes ist durch eine quere Scheidewand in den Canal des M. tensor tympani und die eigentliche Tuba getheilt.

²⁾ *Fissura Glaseri*.

Linkes Schläfenbein, von der Seite, bei einer geringen Drehung des Schädels um die sagittale Axe mit der linken Fläche aufwärts.

den geraden oder schwach nach oben convexen, den Ausschnitt begrenzenden Linien. Die vordere dieser Linien ist auf der Aussenfläche des Schläfenbeins als oberer Rand der *Fissura petro-squamosa* (Fig. 131) sichtbar und

Fig. 131.



Theil des linken Schläfenbeins, wie Fig. 130.

weiter aufwärts durch die Verwachsung der Schuppe mit dem oberen Rand der vorderen Platte des Paukentheils verdeckt. Die den Ausschnitt von der hinteren Seite begrenzende Linie ist im Grunde des äusseren Gehörgangs als medialer Rand der oberen Wand des genannten Ganges sichtbar. Dieser Rand (ich werde ihn den *Margo tympanicus* des Schuppentheils nennen) ist in der Regel etwas uneben und vorn und hinten

durch die Anlagerung des rinnenförmigen Paukentheils überragt; er dient dem Paukenfell zur Anheftung. Der bogenförmige Theil des Randes des Schuppentheils (Fig. 130) zieht aus der Tiefe des äusseren Gehörgangs nach hinten längs der Grenze zwischen Schuppen- und Warzenthail zur *Incisura parietalis*, an welcher er frei wird; er ist zunächst der *Incisura parietalis* eine kurze Strecke zackig, dann im grössten Theil seiner Länge auf Kosten der inneren Fläche zugespitzt, am vorderen unteren Theil wieder dick und zackig und hier auf Kosten der äusseren Fläche schräg abgeschnitten. Mit dem hinteren und oberen Theil dieses Bogens setzt sich das Scheitelbein in Verbindung und der zugespitzte Rand des letzteren wird vom Rand der Schläfenschuppe äusserlich überdeckt. Der vordere und untere Theil des bogenförmigen Randes der Schläfenschuppe fügt sich an den entsprechend gebogenen Rand des Temporalflügels des Wespenbeins so an, dass oben die Schläfenschuppe, unten der Temporalflügel an der Aussenfläche des Schädels weiter vorragt.

Die Flächen der Schuppe sind sowohl von oben nach unten, als von vorn nach hinten gekrümmt, die äussere convex, die innere concav; in beiden Richtungen entspricht die Krümmung der inneren Fläche einem kleineren Radius, als die der äusseren, wodurch es geschieht, dass der Knochen in der Mitte am dünnsten ist und gegen die Ränder an Mächtigkeit zunimmt. Die Krümmung von vorn nach hinten ist im Ganzen schwächer als die von oben nach unten; die letztere nimmt abwärts dergestalt zu, dass der untere Theil der Platte an der Schädelbasis und an der Decke des äusseren Gehörgangs fast horizontal zu liegen kommt. Wie bei allen Knochen, welche zugleich an der Bildung der Schädeldecke und Basis Antheil nehmen, erfolgt auch an der Schuppe des Schläfenbeins der Uebergang der Seiten- in die Grundfläche innen sanft und im Bogen, aussen

schröff und mittelst einer vorspringenden Kante. Der oberhalb der Kante gelegene Theil ist so geneigt, dass die Schuppen beider Schläfenbeine sowohl mit den vorderen, als mit den unteren Rändern convergiren.

Innere
Fläche.

Die innere Oberfläche der Schuppe (Fig. 132) ist durch die Anheftung




Fig. 132.


Schuppentheil von innen. † Schnittfläche, wodurch der Warzentheil abgetrennt ist.

der Paukdecke (*Fps*) in ein oberes und ein unteres Feld getheilt; das obere bei Weitem grössere, gehört der Seitenwand der mittleren Schädelgrube an; das untere sieht in die Paukenhöhle und bildet in Verbindung mit dem Paukenfell deren vordere Wand. Der der Schädelhöhle angehörige Theil der inneren Oberfläche der Schuppe zeigt ausser den Eindrücken der Hirnwindungen und den scharfen Vorsprüngen zwischen denselben eine tiefe Gefässrinne (**) für die *Vasa meningeae media*, welche an der vorderen unteren Ecke entsteht, in der Nähe des vorderen Randes heraufzieht und meist höher oder tiefer eine horizontal

rückwärts ziehende Zweigfurche abgibt.

Äussere
Fläche.

Die Kante, welche an der äusseren Fläche des Schuppentheils die Seiten- und Grundfläche von einander scheidet, beginnt über dem *Porus acust. ext.* und läuft von da an fast horizontal nach vorn; aus ihr, und zwar aus ihrem mittleren Theil geht der Jochfortsatz hervor, anfänglich platt, deprimirt, seitwärts gerichtet und dann, mit einer Torsion um seine Axe, wodurch er eine comprimirtte Gestalt annimmt, im Bogen nach vorn sich wendend (Fig. 133 und 134). Der der Schuppe zunächst gelegene deprimirtte



Rechtes Schläfenbein von unten ohne den Paukenthail. † Schnittfläche, wodurch der Paukenthail entfernt wurde. †† Schnittfläche des Griffelfortsatzes.




Fig. 134.

Dasselbe mit dem Paukenthail. *Tt* Tegmen tympani. *Sao* Sulcus art. occip. *Im* Incisura mastoidea.

Theil, den man als Wurzel des Jochfortsatzes betrachten kann, ist dreiseitig mit seitwärts gerichteter Spitze. Sein hinterer Rand geht, aus der *Linea temporalis* hervor, schräg seit- und vorwärts in den oberen Rand

des comprimirten Theils des Jochfortsatzes über; sein vorderer Rand ist concav, wird einerseits zum unteren Rand des comprimirt Theils des Jochbogens und setzt sich andererseits auf der Schläfenschuppe nach vorn als eine stumpfe Firste fort, welche, wenn das Schläfenbein mit dem Wespenbein verbunden ist, auf die *Crista infratemporalis* des Temporalflügels stösst und als *Crista infratemporalis* des Schläfenbeins bezeichnet werden mag. Die Seitenfläche der Schuppe über dem Ursprung des Jochbogens und über dieser *Crista infratemporalis* gehört der Schläfenfläche des Schädels an und geht mittelst einer Aushöhlung in die obere und etwas vorwärts geneigte Fläche der Wurzel des Jochfortsatzes über; sie ist besonders im vorderen unteren Theil mit seichten Eindrücken versehen, die den gröberen Abtheilungen der Bündel des *M. temporalis* entsprechen, und durch eine Gefässfurche ausgezeichnet, welche die *Art. temporalis media* aufnimmt, hinter der Wurzel des Jochfortsatzes über dem Rande des *Porus acust. ext.* beginnt und meist einfach, selten nach vorn verzweigt gerade oder leicht geschlängelt aufwärts zieht (Fig. 130).

Der unter dem Ursprung des Jochbogens und unter der *Crista infratemporalis* an der Grundfläche des Schädels gelegene Theil der Schläfenschuppe befindet sich mit der unteren Fläche der Wurzel des Jochbogens in gleicher Flucht und ist durch einen queren Kamm (Fig. 133 *k*), an den sich der obere Rand der vorderen Platte des Paukentheils anlegt, in eine hintere Region, die Decke des äusseren Gehörganges, und eine vordere Region, welche hauptsächlich der Articulation mit dem Unterkiefer dient, geschieden. Der eigentliche Rand des *Porus acust. ext.* ist öfters noch bezeichnet durch ein mehr oder minder scharfes und horizontales oder nach dem Umfang des Gehörganges gekrümmtes Leistchen (Fig. 134 *l*) und darüber durch einen seichten Eindruck oder ein spaltförmiges von einem Fortsatz der Beinhaut ausgefülltes Grübchen. Die vordere Abtheilung der Basalfläche der Schuppe gewinnt in Verbindung mit der Wurzel des Jochbogens die Form eines verschobenen Rechtecks, wovon die Eine, meist längere Diagonale sagittal liegt, die andere kürzere von der Queraxe des Schädels nur wenig, und zwar mit dem medialen Ende nach hinten abweicht. Es kann in drei Felder eingetheilt werden, welche in der Richtung von hinten nach vorn sich folgendermaassen an einander schliessen: 1) das hintere Feld, dreiseitig mit nach hinten gerichteter und meist quer abgestutzter Spitze, ist eine seicht von hinten nach vorn ausgehöhlte und mit einem dünnen Knorpelüberzug bekleidete Gelenkfläche, die *Fossa mandibularis*¹⁾, die sich seitwärts bis an den Rand der Wurzel des Jochbogens erstreckt, medianwärts von der *Fissura petro-squamosa* begrenzt wird. Vor der *Fossa mandib.* liegt 2) ein querer oder schwach nach vorn gebogener Wulst, dessen Dimensionen denen der *Fossa mandibularis* ungefähr gleichen, dessen transversaler Durchmesser aber nach vorn abnimmt; es ist das *Tuberculum articulare*, auf welches beim Oeffnen des Mundes der Gelenkkopf des Unterkiefers zu stehen kommt. Die hintere Wand dieses *Tuberculum* fällt, wenn man den Schädel von unten her betrachtet, mehr oder minder steil gegen die *Fossa mandibularis* ab; vorn reicht es bis zum vorderen Rande

¹⁾ *Fossa articularis maxillae inferioris.*

der Wurzel des Jochbogens und nach beiden Seiten grenzt es sich durch convergirend vorwärts verlaufende rauhe Linien ab, welche von der Anheftung der Gelenkkapsel des Unterkiefers herrühren. Vor dem Tuberculum articulare liegt 3) eine mit der Spitze vorwärts gerichtete dreiseitige Fläche, *Facies infratemporalis*, welche mit der Facies infratemporalis des Temporalflügels des Wespenbeins das Dach der Unterschläfengrube ausmacht. Sie ist von wechselndem Umfang, fliesst häufig mit dem Tuberculum articulare zusammen, ist aber meistens von demselben durch eine vom vorderen Rande der Wurzel des Jochfortsatzes quer herüberziehende Kante deutlich geschieden.

An dem Jochfortsatz haben wir die Wurzel von dem eigentlichen Bogen theil unterschieden. Die Wurzel biegt in den Bogen um, indem sich ihre Flächen verschmälern und zugleich die obere medianwärts, die untere lateralwärts richten. Der Uebergang der oberen Fläche der Wurzel in die innere des Bogens erfolgt allmähig; der Uebergang der unteren Fläche der Wurzel in die äussere des Bogens ist schroffer und durch die rauhe, nach unten gekrümmte Linie bezeichnet, die das Tuberculum articulare lateralwärts begrenzt. In der Regel stellt sich auch die laterale Fläche des Bogens früher perpendicular als die mediale, und der Bogen erscheint eine Strecke weit dreiseitig prismatisch, indem sich am vorderen Rande des Tuberculum articulare zwischen die laterale und mediale Fläche eine untere Fläche einschiebt, welche bald in den unteren Rand des Bogens aufgeht. Die Länge des Jochfortsatzes ist verschieden, doch überragt sein vorderes Ende meistens den vorderen Rand der Schuppe. Seine Höhe und Mächtigkeit nimmt gegen das vordere Ende etwas zu. Der vordere Rand verläuft schräg von oben und vorn nach hinten und unten und ist stark zackig, zur Verbindung mit dem hinteren Rande des Pr. temporalis des Jochbeins.

Var. Von dem vorderen Rand der Schuppe geht ein platter Fortsatz zwischen dem Wespenbein und dem Scheitelbein zum hinteren Rande des Stirnbeins, das Scheitelbein von der Berührung mit dem Wespenbein ausschliessend (Chizeau s. Meckel, Path. Anat. Bd. I, S. 341. Dieterich, a. a. O. S. 9. — Einmal auf 50 bis 60: Gruber, Abh. aus der menschl. und vergleichenden Anatomie. Petersburg 1852. S. 6. 114. Fig. 4). Ein Fall beidseitig in der hiesigen Sammlung. Diese Anomalie entsteht dadurch, dass ein an der vorderen unteren Spitze des Scheitelbeins gelegener Nahtknochen, welcher ziemlich häufig vorkommt, statt mit der unteren Spitze des Scheitelbeins oder mit dem oberen Rande des Temporalflügels vielmehr mit der Schläfenschuppe verschmilzt.

Der Schuppentheil ist durch eine quere Naht getheilt (Meckel, Path. Anat. Bd. I, S. 339. Gruber, a. a. O. S. 114).

Die Schuppe ist von einer Oeffnung durchbohrt, durch welche ein Zweig der Art. mening. media aus der Schädelhöhle in die Schläfengrube tritt (Gruber, a. a. O. S. 126). Ein Fall in der hiesigen Sammlung. Dicht über dem hinteren Rande der Wurzel des Jochbogens liegt in einem Schläfenbein der hiesigen Sammlung die Oeffnung (1mm Durchm.) eines Canals, welcher schräg vorwärts durch die Schuppe in die Schädelhöhle führt.

Die gewöhnlich sehr geringe Neigung der Queraxe des Tuberculum articulare mit dem medialen Ende rückwärts kann so stark werden, dass die Queraxen der Tubercula beider Seiten einander unter einem Winkel von weniger als 90 Grad schneiden.

Der Warzentheil ist eine aussen convexe, innen concave Platte, mächtiger als die Schuppe, aber kleiner und von sehr unbeständiger Form. im Allgemeinen kreisförmig oder oval, mit mancherlei Einkerbungen und winkeligen Ausbiegungen des Randes. Unten greift er fast ebenso weit als die Schuppe an die Basis des Schädels herum, reicht aber in der Seitenwand des Schädels minder hoch hinauf. Vorn fliesst er mit dem Schuppen- und Felsentheil zusammen; der obere und hintere Theil des Randes ist an dem isolirten Schläfenbein frei.

b. Warzen-
theil.

Wie sich der Warzentheil gegen den Schuppentheil abgrenzt, wurde bereits angegeben. Der freie Rand des Warzentheils geht von der Incisura parietalis an erst etwas aufwärts und dann gerade oder im Bogen nach hinten, biegt aus dieser Richtung abgerundet oder im Winkel nach unten und endlich, ebenfalls abgerundet oder im Winkel, nach vorn um. An der Incisura parietalis und einer kleineren oder grösseren Strecke hinter derselben steht er, auf Kosten der äusseren Fläche schräg abgeschnitten, mit dem Scheitelbein, von da an bis zum Anschluss an den Felsentheil mit dem Hinterhauptsbein in Verbindung durch Nähte, welche grösstentheils starkgezackt und nur gegen das untere Ende einfach sind, an welchem sie auch nicht selten verwachsen.


An der Aussenfläche des Warzentheils (Fig. 133. 134) geht nach unten der Fortsatz ab, von welchem er den Namen trägt. Der Warzenfortsatz ist im Allgemeinen kegelförmig mit abwärts gerichteter Spitze. Doch ist die Spitze abgerundet, die laterale Fläche stärker gewölbt als die mediale, so dass der Kegel von den Seiten zusammengedrückt, ja an der medialen Fläche mitunter eingedrückt erscheint und einen schneidenden Rand erhält, welcher nur hinten eine schräge, vorn dagegen eine fast perpendiculäre Richtung hat. Die Höhe des Warzenfortsatzes wird etwas vergrössert dadurch, dass sich längs der Wurzel desselben an der medialen Fläche eine tiefe Rinne, die *Incisura mastoidea*, hinzieht; medianwärts ist diese Rinne durch einen dem Warzenfortsatz parallelen, aber niedrigen scharfen oder stumpfen Kamm eingefasst. In ihr ist der hintere Bauch des M. digastricus befestigt. Längs der medialen Seite des Kamms verläuft eine von der Art. occipitalis herrührende Furche, *Sulcus arteriae occipitalis*. Im Uebrigen ist sowohl die Höhe, als das Ansehen der Oberfläche des Warzenfortsatzes sehr verschieden. Er ist rauh, mit Muskeleindrücken, Gefässöffnungen, unregelmässigen Furchen und selbst kurzen zackigen Vorsprüngen versehen oder glatt, blasenartig aufgetrieben und durchscheinend, und verräth im letzteren Falle schon äusserlich die grosszellige Beschaffenheit seiner Diploë, deren Hohlräume sich in die Paukenhöhle öffnen. Oft ist der Warzentheil in der Nähe des oberen oder hinteren Randes von einem engeren oder weiteren Canal oder von mehreren Canälen durchbohrt, oder es wird ein solcher Canal durch die Vereinigung entsprechender Ausschnitte im Warzentheil des Schläfenbeins und Hinterhauptsbein gebildet, ein Canal, welcher den Knochen schräg ein-, vor- und abwärts durchsetzt und innen am hinteren Rande des sogleich zu erwähnenden Sulcus sinus transversus ausmündet. Es sind dies die *Foramina mastoidea*, durch welche Arterienzweige zur Dura mater treten und der Sinus transversus mit äusseren Schädelvenen anastomosirt.

Äussere
Fläche.

innere
Fläche.

Durch eine scharf vorspringende Kante, die von der oberen Kante des

Fig. 135.



Rechtes Schläfenbein von innen. † Schnittfläche,
durch welche die Pyramide abgetrennt ist.
*Grenze des Schuppen- u. Warzentheils.

Felsentheils fast horizontal und mit gegen die Schädelhöhle gerichteter Concavität auf den Warzenthail sich fortsetzt, ist die innere Oberfläche des letzteren in ein kleineres oberes und ein grösseres, unteres Feld abgetheilt (Fig. 135). Das obere Feld bildet die hintere laterale Ecke der mittleren Schädelgrube; es liegt fast horizontal und in einer Ebene mit der oberen Fläche des Felsentheils, in die es ohne Unterbrechung übergeht, während es von der inneren Fläche der Schuppe häufig, wenn gleich nicht beständig, durch die Spuren der oben erwähnten

Spalte (*) getrennt ist. Das untere Feld liegt vertical, am unteren und hinteren Rande medianwärts umgebogen, und nimmt die vordere laterale Ecke der hinteren Schädelgrube ein. Es ist ausgezeichnet durch eine breite Furche, *Sulcus sinus transversi* ¹⁾, welche am oberen Rande des Knochens genau unter der die beiden Felder scheidenden Kante beginnt, eine kurze Strecke weit dieser Kante parallel läuft, dann aber von derselben im Bogen ab- und medianwärts zum unteren Ende des freien Knochenrandes ablenkt. Die Furche beherbergt einen Theil des Sinus transversus, der von der Querfurche der Hinterhauptsschuppe auf den Warzenthail übergeht, um von diesem wieder auf den Proc. jugularis des Hinterhauptbeins zurückzukehren.

Var. Das For. mastoideum kann eine bedeutende Weite erreichen und für das Foramen jugulare vicariiren.

Die Aussenfläche des Warzenfortsatzes ist durch eine unregelmässige, zackige, im Ganzen perpendiculäre Furche getheilt, welche einer ehemaligen Spalte zwischen Schuppen- und Warzenthail entspricht.

Hyrtl gedenkt eines Schläfenbeins, an welchem hinter und über dem äusseren Gehörgang eine kreisrunde, 3 Linien weite Oeffnung in die Trommelhöhle führt.

c. Pyramide.

An der Pyramide haben wir vier Kanten und vier Flächen zu unterscheiden, welche den oben näher bezeichneten Kanten und Flächen des Körpers des Felsentheils entsprechen und zum Theil identisch sind. So sind (Fig. 136 u. 137) die hintere innere und die hintere äussere Fläche der Pyramide, sowie die obere und die hintere Kante derselben, Theile des Körpers des Felsentheils, welcher auch allein die Spitze der Pyramide darstellt. Dagegen ist die vordere innere Fläche der Pyramide nur in ihrer hinteren Hälfte vom Körper des Felsentheils, in der vorderen Hälfte von der Paukendecke gebildet und die vordere äussere Fläche der Pyramide ist identisch mit der vorderen Wand des Paukentheils bis zu der

¹⁾ *Fossa sigmoidea* aut.

Stelle, wo Pyramide und Schuppe in einem Winkel auseinanderweichen, der die hintere, die Spina angularis tragende Ecke des Temporalflügels aufnimmt. Die Richtung dieser vorderen äusseren Fläche der Pyramide ist im Allgemeinen die nämliche, wie die der entsprechenden, hinter ihr versteckten Wand des Felsentheils, doch ist sie überall mehr gegen den Horizont geneigt und entfernt sich, je näher dem lateralen Rand (dem Porus acust. ext.) um so mehr auch nach vorn von dem Felsentheil. Die untere Kante der Pyramide geht aus der Verschmelzung einer Firste, die der unteren Fläche des Paukentheils angehört, mit der eigentlichen unteren Kante des Felsentheils hervor. Die vordere Kante der Pyramide endlich ist, so weit dieselbe mit der Schuppe in Verbindung steht, aus dem vorderen Rande der Paukendecke und dem oberen Rande der Vorderwand des Paukentheils so zusammengesetzt, dass längs der medialen Hälfte des Paukentheils (Fig. 137) die beiden genannten Ränder unter sich und der überragende derselben mit dem Rande der Schuppe zusammenstossen, wei-

Fig. 136





Fig. 137



Parallele Durchschnitte des Schläfenbeins in einer auf die Längsaxe der Pyramide senkrechten Richtung. Fig. 136 vor dem vorderen Rand des äusseren Gehörgangs.

Fig. 137 vor dem Griffelfortsatz. Vergl. S. 128.


ter lateralwärts hingegen (Fig. 136) der Rand der Paukendecke und des Paukentheils auseinanderweichen, jener aufwärts, dieser abwärts und beide zugleich vorwärts auf die Fläche der Schuppe, die sich auf diese Weise gewissermaassen zwischen die beiden genannten Knochenränder einzudrängen scheint.

Ich gehe zu einer näheren Betrachtung zuvörderst der Kanten und Flächen der Pyramide über, um sodann auf die Wände der Höhle, welche von dem Pauken- und Felsentheil umschlossen wird, zurückzukommen. Die im Körper des Felsentheils enthaltenen Höhlungen des Labyrinths erwähne ich nur soweit, als sie die Gestalt der Oberfläche des Knochens bestimmen.

Kanten.

Die obere Kante der Pyramide (Fig. 140. s) von sanft wellenförmigem Verlauf, ragt frei in die Schädelhöhle; sie setzt sich, wie oben erwähnt wurde, nach hinten auf den Warzenthail und von da weiter auf den oberen Rand der Querfurche der Hinterhauptschuppe fort, trägt zur Abgrenzung der hinteren gegen die mittlere Schädelgrube bei und ist in ihrer ganzen Länge zur Aufnahme des Sinus petrosus sup. gefurcht. Die untere Kante, *Crista petrosa* (Fig. 138), ist ein scharfer, mehrmals ausgerandeter, zuweilen auch in Zacken und Spitzen verlängerter Kamm, der von der *Fissura tympanico-mastoidea* an, sich an der vorderen Fläche des Proc. styloideus

Fig. 138.




Rechtes Schläfenbein von unten, der Schädel um seine sagittale Axe mit der linken Seite aufwärts gedreht. Vgl. S. 141.

dicht vorüberzieht und nach vorn hin verliert. Die vordere Kante der Pyramide ist mit dem unteren Rande des Schuppentheils in der eben angegebenen Weise verbunden. Die *Fissura petro-squamosa* und *petro-tympanica* verlaufen dicht neben einander und medianwärts nur wenig divergirend, durch ein schmales, unregelmässiges Knochenplättchen getrennt, welches sich wie die Schneide eines von oben her zwischen den Rand der Schuppe und des Paukentheils herabgesenkten Keils ausnimmt. Dies Knochenplättchen ist der längs dem Rande des Schuppentheils abwärts verlängerte, vordere Rand des *Tegmen tympani*.

Ueber die Fissuren hinaus setzt sich der obere Rand der vorderen Wand des Paukentheils medianwärts noch eine kleine Strecke weit in Form einer rauhen Fläche fort, an welche sich die Basis der Spina angularis mit einer entsprechenden Fläche anlehnt. Sodann fällt der obere Rand des Paukentheils gegen die untere Kante in einem perpendicularen und rauhen, nicht selten abwärts in eine platte Zacke verlängerten Rande ab, hinter welchem die vordere untere Fläche des eigentlichen Felsentheils, als Spitze der Pyramide, zum Vorschein kommt. An dieser Spitze ist die untere Kante, wie erwähnt, nur schwach angedeutet, die vordere Kante aber, die vom Ende des angewachsenen Randes der Paukendecke sich medianwärts fortsetzen sollte, ist in der Regel ganz unscheinbar, so dass die vordere innere und vordere äussere Fläche des Felsentheils zu Einer convexen Fläche zusammenfliessen und die Pyramide gegen die Spitze einem dreiseitigen Prisma ähnlich wird. Die hintere Kante der Pyramide (Fig. 139 und Fig. 142 p) beginnt am unteren Ende des freien Randes des Warzentheils als hinterer Rand der dreiseitigen Fläche, durch welche das Schläfenbein an die Seitenfläche des Processus jugularis des Hinterhauptsbeins angefügt ist; sie geht dann anfangs scharf und allmähig stumpfer mehrfach ausgebogen oder ausgezackt vorwärts und steigt zuletzt schräg zur oberen Kante (Fig. 142) auf, um sich mit ihr an der Spitze des Felsentheils unter einem spitzen Winkel zu verbinden. Der laterale scharfe Theil der hinteren Kante ist in der Schädelhöhle als vorderer Rand des Foramen jugulare sichtbar. Durch einen Vorsprung

oder Stachel, *Processus infrajugularis partis petrosae*, wird er, gleich der

Fig. 139.



Rechtes Schläfenbein von unten, der Schädel um seine sagittale Axe mit der rechten Seite aufwärts gedreht.


Incisura jug. des Hinterhauptsbeins, in zwei Concavitäten, *Incisura jugul. lateralis* u. *medialis* (ant. und post.), geschieden. Der mediale, stumpfere Theil der Kante geht entlang der lateralen Kante des Hinterhaupts- und des hinteren Theils des Wespenbeinkörpers. Zwischen diesen Knochen einer- und der Pyramide andererseits bleibt eine enge und unregelmässige, von Faserknorpel oder von einer Reihe platter Knöchelchen ausgefüllte Spalte, Fissura petrobasis (Fig. 93); sie verläuft, von der Schädelhöhle aus betrachtet, im Grunde einer Rinne, welche in der Regel zum grösseren Theile vom Hinterhaupts- und Wespenbein, zum kleineren vom Felsentheil gebildet wird und den Sinus petrosus inf. enthält.

Var. In der Fissura petrobasis kommt vor dem Foramen jugulare ein rundes Loch vor, von Ausschnitten des Schläfen- und Hinterhauptsbeins begrenzt, in welchem abgesondert der Sinus petr. inf. verläuft.

An der vorderen inneren Fläche der Pyramide ist der massive Theil von dem unterhöhlten und über die Paukenhöhle zur Schuppe herübergespannten *Tegmen tympani* schon dem äusseren Ansehen nach,

Flächen,
vordere
innere

Fig. 140.



Linkes Schläfenbein von oben, der obere Theil der Pars squamosa u. mastoidea durch einen horizontalen Schnitt entfernt.

vermöge der Durchsichtigkeit des letzteren, leicht zu unterscheiden. Im medialen Theil dieser Fläche (Fig. 140), wo die *Fissura petro-squamosa* deutlich zu werden beginnt, setzt sich die Paukendecke gewöhnlich auch gegen die Oberfläche des Felsenbeinkörpers durch eine Längsfurche, oder eine unregelmässige Längsspalte, oder auch nur durch eine veränderte Neigung der Oberfläche (Fig. 137) ab. Dem Felsentheil allein gehört eine Wölbung, *Eminentia arcuata*¹⁾, an, die sich an der Grenze des lateralen und mittleren Drittels desselben rechtwinklig auf dessen Längsaxe von der oberen Kante gegen die vordere erstreckt; sie rührt her von dem vorderen perpendiculären Bogengang des Labyrinths, welcher hier bis nahe unter die Oberfläche des Knochens tritt. Etwas näher der Spitze der Pyramide und dicht neben der Paukendecke findet sich, von einem unebenen Rande überragt, eine

¹⁾ *Jugum petrosum*.

spaltförmige Oeffnung, *Hiatus Canalis facialis* ¹⁾, zu welcher von der Spitze der Pyramide her und parallel der Längsaxe derselben eine seichte gerade Furche führt. In der Furche liegt der N. petrosus superf. maj.; durch die Oeffnung tritt er in einen Canal, der ebenfalls ganz innerhalb des Felsentheils eingeschlossen ist und nach kurzem geraden Verlauf mit dem Canalis facialis, wovon später, zusammenmündet. Die der Spitze der Pyramide zunächst gelegene Partie der vorderen inneren Fläche ist dicht unter der oberen Kante eingedrückt, zur Aufnahme des Stammes des N. trigeminus (*Impressio trigemini*); nach unten, über dem carotischen Canal, ist sie vom Rande der medialen Oeffnung dieses Canals aus mehr oder minder tief ausgebuchtet. Die Paukendecke hat, für sich betrachtet, ungefähr die Gestalt eines mit der Basis an den Felsentheil gefügten stumpfwinkeligen Dreiecks mit abgestutzten Winkeln; sie ist über der eigentlichen Paukenhöhle am breitesten und verschmälert sich lateral- und medianwärts über den Zellen des Warzenfortsatzes und über dem Can. musculo-tubarius. Der mediale schmalere Theil ist meistens vom Körper des Felsentheils durch eine der Längsaxe des letzteren parallele Spalte geschieden, welche sich zuweilen bis an den Hiatus Can. facialis erstreckt; er ist vom freien Rande aus mehrfach eingekerbt, wie gesplittert; der Eine dieser Splitter tritt durch seinen freien Rand mit einem platten Fortsatz der hinteren Wurzel des Temporalflügels in Verbindung. Zwischen den Splintern oder in dem Winkel zwischen der unteren Fläche der Paukendecke und der vorderen unteren Fläche des Felsentheilkörpers, mittelst eines longitudinalen Leistchens von dem Lumen des Can. musculo-tubarius geschieden, verläuft parallel dem Sulcus n. petr. superf. maj. ein feines Canälchen, der obere Theil des Can. tympanicus, dessen Eingang (*Apertura sup. Can. tympanici*) sich nahe an dem Hiatus Can. fac. und gewöhnlich in gerader Richtung vor demselben befindet. Auch zum Eingang in dieses Canälchen führt öfters eine feine, dem Sulcus n. petr. superf. maj. parallele Furche; in dieser Furche und durch das Canälchen verläuft der N. petr. superf. min.

Ausser den benannten Erhabenheiten, Furchen und Löchern zeigt die vordere innere Fläche der Pyramide noch unbeständige Gehirneindrücke, Gefässrinnen und Foramina nutritia. Der Can. n. petr. sup. maj. bietet zahlreiche Abweichungen dar: häufig ist die obere Wand desselben unvollständig oder fehlt und die entsprechende Furche ist im letzteren Fall offen bis an den Can. facialis. Oft ist der Hiatus Can. fac. durch eine Knochenbrücke perpendicular getheilt. Nach der Ap. sup. Can. tympanici sucht man an manchen Schläfenbeinen vergeblich, der entsprechende Nerv muss hier entweder durch den Hiatus C. fac. oder durch die Tuba eintreten. In anderen Schläfenbeinen kommen um die Ap. sup. Can. tympanici feine Oeffnungen vor, welche Arterienzweige in die Gehörhöhle und zunächst in den Can. tens. tymp. (s. unten) oder in den Can. n. petr. superf. maj. führen. Der Sulcus sin. petr. sup. verläuft, statt in der oberen Kante, neben derselben über die vordere innere Fläche der Pyramide.

Ueber die Impressio trigemini ragt von deren medialem Rande ein stachelförmiger, kurzer Fortsatz seit- und rückwärts.


Die vordere äussere Wand der Pyramide ist, so weit sie dem Pau-

Vordere
äussere
Fläche.

¹⁾ *Hiatus canalis Fallopieae. Apertura spuria C. F.*

kentheil angehört, im oberen Theil nach vorn gewölbt, unten nach vorn concav; sie ist glatt oder von feinen Gefässrinnen und Ernährungslöchern rauh, mächtig oder dünn und stellenweise durchscheinend (Fig. 141). Vor

Fig. 141.



Rechtes Schläfenbein von unten, der Schädel um seine sagittale Axe mit der linken Seite aufwärts gedreht.

dem medialen Rande des Paukentheils mündet der Can. musculo-tubarius. Wo neben diesem Rande die entsprechende Fläche des Felsentheils zu Tage kommt, hat die letztere noch eine ansehnliche Höhe, verjüngt sich aber gegen die Spitze der Pyramide. Sie liegt, an der Aussenfläche der Schädelbasis sichtbar, dicht hinter dem freien hinteren Rande des Temporalflügels, demselben parallel und gegen ihn geneigt und begrenzt so von hinten her die Fissura spheno-petrosa, eine schmale und gerade, von Faserknorpel ausgefüllte Spalte, welche, von aussen betrachtet, den tiefsten Theil der Rinne ausmacht, in welcher die knorpliche Tuba eingebettet ist. Der

von dem Tegmen tympani überdeckte laterale Theil der vorderen äusseren Wand des Felsentheils trägt etwa in der halben Höhe des Can. musculo-tubarius ein horizontales, aufwärts concaves Plättchen, *Septum tubae*, welches in selteneren Fällen die gegenüberstehende Wand erreicht, gewöhnlich aber durch einen fibrösen Streifen ergänzt wird und auf die eine oder andere Art den Can. musculo-tubarius in zwei übereinander gelegene Canäle scheidet. Der untere dieser Canäle, dessen Wände von Schleimhaut ausgekleidet werden, ist die knöcherne *Tuba*, der obere, *Can. tensoris tympani* ¹⁾, wird vom M. tensor tympani ausgefüllt. Das Septum tubae verliert sich medianwärts auf der vorderen Wand des carotischen Canals; von dem lateralen Ende in der Paukenhöhle wird später die Rede sein. Die Wand, die den Can. tensoris tympani vom carotischen Canal scheidet, besteht nicht selten aus zwei Lamellen, welche eine sehr dünne Lage diploëtischer Substanz zwischen sich schliessen. Zwischen beiden Lamellen oder in der Dicke der Wand, wenn sie massiv ist, läuft ein feines Canälchen in einer dem Can. tensoris tympani parallelen Richtung; wir nennen es nach dem Nerven, der in demselben eingeschlossen ist und welcher aus der Paukenhöhle vorwärts zu dem die Carotis umspannenden Nervenplexus geht, Can. n. petr. prof. minoris. Die laterale Mündung dieses Canals liegt in der medialen oberen Ecke der Paukenhöhle oder in der Tuba dicht unterhalb des Septum derselben; die mediale Mündung findet sich in der vorderen Wand des Can. caroticus, entweder gerade auf dem Rande derselben, oder an ihrer inneren oder äusseren Fläche; im letzteren Fall läuft der aus dem Canal hervorgetretene Nervenzweig in einer Furche der Aussenfläche dieser Wand bis zur medialen Oeffnung des Can. caroticus weiter. (Vergl. Fig. 146 A*.)


¹⁾ *Semicanalis T. t.* — *Sulcus musculosus.*

Var. Oft ist die vordere Wand des äusseren Gehörorganes in einer kleineren oder grösseren Ausdehnung durchbrochen. Cassebohm, Tract. de aure humana. Hal. 1734. p. 28. Taf. I, Fig. 2 r'. Dieterich a. a. O. S. 10, Fig. 1 bb.

Hintere, innere Fläche.

Auf der hinteren inneren Fläche der Pyramide (Fig. 142) zeichnet sich etwa in der Mitte ihrer Länge und etwas näher der oberen Kante,

Fig. 142.



Linkes Schläfenbein von hinten. Der Kopf um die verticale Axe mit dem Gesicht stark nach rechts und zugleich abwärts. Pij. Proc. intrajugularis. Jjl. Jjm. Incisura jug. later. und med.

als der unteren eine weite, rundliche oder quer-elliptische Oeffnung mit überhängendem und abgerundetem oberen Rande aus, der **Porus acust. int.**, von welcher aus ein Canal, 6 mm lang, in fast genau transversaler Richtung ins Innere des Knochens führt; der Canal ist der innere Gehörgang, *Meat. acust. int.*¹⁾, zur Aufnahme des N. facialis und acusticus und der Art. auditiva int. bestimmt. Der auf den ersten Blick anscheinend blinde Grund desselben²⁾ ist durch einen queren Vorsprung in eine obere und untere Grube, jede dieser Gruben wieder durch einen niedrigen Wulst perpendicular in eine mediale und laterale getheilt. Die beiden unteren Gruben und die laterale obere sind nur von sehr feinen Löchern siebförmig durchbohrt, durch welche die

Nerven- und Gefässzweige zum Labyrinth treten; die mediale und zugleich mehr nach vorn gelegene obere Grube setzt sich in den Can. n. facialis fort.

Seitwärts vom Porus acust. int. und näher der oberen Kante des Felsentheils findet sich eine blinde, einer eingezogenen Narbe ähnliche, von der Spitze der Pyramide her zugängliche Vertiefung (***), eine unvollständig ausgefüllte Grube unter dem oberen perpendicularen Bogengang. Noch weiter seitwärts, etwa in der Mitte zwischen dem Porus acust. int. und dem Rande des *Sulcus sinus transv.* und in gleicher Höhe mit dem ersteren verläuft in verticaler oder schräger Richtung eine von einem scharfen Rand verdeckte und von der Grundfläche der Pyramide her zugängliche Spalte, die *Apertura externa aquaed. vestibuli*, durch welche die harte Hirnhaut gefässhaltige Fortsätze zur Beinhaut des Labyrinths schickt. So weit der untere Rand dieser Fläche die Fissura petrobasilaris begrenzen hilft, streicht dem Rande entlang eine Furche, deren obere Kante so sehr vorragt, dass die Höhlung der Furche medianwärts und theilweise sogar abwärts sieht. Wir nennen sie *Semisulcus petr. inf.* Mit der gleichbenannten Furche des Hinterhauptsbeins setzt sie die bei der Beschreibung des Hinterhauptsbeins erwähnte tiefe Rinne zusammen, welche den Sinus petr. inf. trägt.

Var. Der überhängende obere Rand des Porus acust. int. ist medianwärts, seltener rückwärts in eine stumpfe oder scharfe Zacke verlängert (*Crista tentorii*



¹⁾ *Canalis communis nervorum auditus.*
Septum meat. acust.

M. J. Weber), welche in das Tentorium vorspringt und dem Sinus petrosus sup. zur Unterlage dient.

Die hintere äussere Fläche der Pyramide ist unregelmässig, durch Gruben, Oeffnungen und Fortsätze ausgezeichnet (Fig. 143). Wir thei-

Hintere
äussere
Fläche.

Fig. 143.



Rechtes Schläfenbein von unten, der Schädel um seine sagittale Axe mit der rechten Seite aufwärts gedr.

len dieselbe, der leichteren Uebersicht wegen, durch drei senkrecht auf die Längsaxe der Pyramide geführte parallele Linien in vier Zonen, von welchen jede folgende medianwärts und zugleich etwas nach vorn von der vorhergehenden liegt. Die Dimensionen dieser Zonen sind an manchen Schläfenbeinen einander ziemlich gleich, doch kann sich jede auf Kosten der angrenzenden vergrössern. Die in derselben Zone hinter einander gelegenen Theile kommen, wegen der Neigung der ganzen Fläche, je weiter nach hinten um so höher und um so näher der Medianebene zu liegen.

Die erste Zone, vom Proc. mastoid. an gerechnet, wird in ihrer hinteren Hälfte von der etwas vertieften und überknorpelten Fläche, *Synchondr. petro-occipit.* eingenommen, durch welche das Schläfenbein mit dem Hinterhauptsbein zusammengefügt ist und später verschmilzt. Aus der vorderen Hälfte dieser Zone ragt der Griffelfortsatz, *Proc. styloideus*, hervor, ein cylindrischer, stellenweise comprimierter, gerader oder schwach gekrümmter Stift von sehr veränderlicher Länge, mit der Spitze ab-, vor- und wenig medianwärts gerichtet. Seine Basis ist vorn und seitlich von der Crista petrosa, wie von einer Scheide umsäumt und meistens auch nach den anderen Seiten von einem Graben, in welchem sich feine Ernährungslöcher befinden, und einem niedrigen Wall¹⁾ umgeben. Seitlich von der Basis des


Griffels, in einer Vertiefung, die sich rück- und seitwärts in die Incisura mastoidea fortsetzt, liegt das *For. stylo-mastoideum*, die äussere Oeffnung des Can. facialis und Eintrittsstelle der Art. stylomastoidea.

Die zweite Zone ist in ihrem ganzen Umfange oder doch bis in die Nähe des vorderen Randes glatt und vertieft, eine weite Grube, *Fossa jugularis*, mit scharfen Rändern oder, in der natürlichen Lage des Schläfenbeins, eine Kuppel, die sich über den oberen und vorderen Theil des Ursprungs der V. jugularis an der Schädelbasis wölbt. Ueber die Mitte dieser Grube

¹⁾ *Vagina proc. styloidei.*

zieht, parallel der Längsaxe der Pyramide, eine seichte Furche, *Sulcus r. auricul. vagi*, und am seitlichen Ende dieser Furche, dicht am Rande der

Fig. 144.



Fossa jugularis, liegt eine feine Oeffnung, die in den Can. mastoideus führt. Dieser Canal, zur Aufnahme des genannten R. aur. vagi bestimmt, verläuft durch die Dicke des Felsentheils, dann an der Grenze des Felsen- und Warzentheils in transversaler und etwas aufwärts convexer Richtung und in zwei Abtheilungen, von welchen die erste (mediale) von der Fossa jugularis bis in den Can. facialis, die zweite (laterale) vom Can. facialis bis zur Fissura tympanico-mastoidea reicht, in welcher er, gegen das Ende meistens gabelig getheilt, mit zwei feinen Oeffnungen mündet.

In der dritten Zone ist die vordere Hälfte eine grosse, kreisrunde Oeffnung, der Eingang des *Can. caroticus*; die hintere Hälfte nimmt eine trichterförmige, dem Abdruck einer flachen, dreiseitigen Pyramide ähnliche Grube ein, aus deren Spitze eine rundliche Oeffnung zum Aquaeductus cochleae führt (*Ap. ext. Aq. c.*), der, gleich dem Aquaeductus vestibuli, die Verbindung der äusseren Beinhaut mit der Beinhaut des Labyrinthes vermittelt. Ein scharfer Kamm scheidet die Fossa jugular. von dem Eingange des Can. caroticus, ein stumpferer Kamm, der sie von der Apertura ext. aquaeductus cochleae scheidet, stösst mit seinem hinteren Ende auf den *Proc. intrajugularis* (Fig 143) des hinteren Randes der Pyramide. Dicht vor der Mitte dieses Kamms und genau am hinteren Rande des For. caroticum liegt flach oder in einem seichten Grübchen ¹⁾ die feine *Apert. inf. Can. tympanici*, die den gleichnamigen Nervenast (vom N. glossopharyngeus) auf- und seitwärts in die Paukenhöhle führt. Eine noch etwas feinere Oeffnung findet sich, von dem Eingange des Can. caroticus aus sichtbar, in der hinteren Wand des aufsteigenden Theils des letzteren; von ihr geht ein Canälchen aus, welches in ziemlich gleicher Richtung mit dem Can. tympanicus die dünnere oder dickere Knochenwand zwischen Paukenhöhle und Can. caroticus durchsetzt. Die Oeffnung und das Canälchen heissen nach dem Nervenzweig, den sie einschliessen *For. und Can. caroticotympanicus*.

Die vierte Zone entspricht in ihrer vorderen (lateralen) Hälfte, die sich gegen den medialen, gewöhnlich etwas ausgeschnittenen Rand hin zuschärft, dem Boden des carotischen Canals, in der hinteren (medialen) Hälfte der massiven Spitze der Pyramide; sie ist unregelmässig, rauh, von einer Masse feiner Ernährungslöcher durchbohrt; der massive Theil, der sich übrigens auch bezüglich seiner inneren Textur der spongiösen Knochensubstanz nähert, ist öfters von tiefen Furchen oder Gruben durchzogen, die von Fortsetzungen des Faserknorpels, welcher das For. lacerum schliesst, ausgefüllt werden. Gegen den vorderen Rand glättet sich dieser Theil der vorderen unteren Fläche allmähig und biegt ebenso allmähig in die vordere innere Flä-

¹⁾ *Fossula petrosa.*


che des Felsentheils um, die die Furche zur Aufnahme der knorplichen Tuba von hinten her begrenzt.

Var. Der Proc. styloideus besteht aus zwei oder selbst mehreren, durch Synchondrose verbundenen Abtheilungen.

Neben den feinen Mündungen des Can. mastoideus in der Fissura tympanico-mastoidea, neben der Apertura inf. can. tympanici und dem Aquaeductus cochleae kommen Ernährungslöcher vor, von welchen die betreffenden Oeffnungen manchmal schwer zu unterscheiden sind. Von dem einen oder anderen der in der Fissura tympanico-mastoidea befindlichen Löcher geht zuweilen ein feines Canälchen aus, das in der Tiefe des knöchernen Gehörganges ausmündet. Statt eines N. und Can. carotico-tympanicus finden sich nicht selten zwei feinere. Auch aus der Fossa jugularis führen mitunter feine Löcher gerade aufwärts in die Paukenhöhle.

Die Höhle des Gehörapparats, welche das Schläfenbein von einer ^{Gehörhöhle} Seite zur anderen durchzieht, hat, im Grossen und Ganzen betrachtet, die Form eines liegenden Y; der Theil der Höhle, welcher dem Fuss des Y entspricht, ist parallel der Längsaxe des Felsentheils median- und vorwärts, die beiden divergirenden Schenkel sind neben einander, jedoch nicht in ganz gleicher Höhe, seit- und rückwärts gerichtet (Fig. 145).

Fig. 145.



Rechtes Schläfenbein, Horizontaldurchschnitt der Pyramide. † Horizontaldurchschnitt der vorderen Wand des Paukentheils. La. Gehörlabyrinth. Tt. Untere Fläche des Tegmen tympani. Stt. Septum tubae. Cca. Untere Fläche der oberen Wand des Can. carot.

Der Vorsprung, an welchem sich der einfache Canal in zwei Arme bricht, wird vom *Margo tympanicus* des Schuppentheils und von der convexen Aussenfläche des Warzenfortsatzes mit der daran lehnenen Wand des Paukentheils gebildet. Der Schenkel, welcher unter dem Paukenrand des Schuppentheils und längs der Aussenfläche des Warzenfortsatzes entschiedener transversal verläuft, ist der äussere Gehörgang, *Meatus acust. ext.*, der einfache Canal in Verbindung mit dem anderen medialen und mehr in der Flucht des einfachen Canals gelegenen Schenkel stellt die Höhle des mittleren Ohrs dar.

Die Höhle des mittleren Ohrs zerfällt, wie schon bei der allgemeinen

Beschreibung des Schädels angegeben wurde, in drei nur unvollkommen gegen einander abgegrenzte, neben oder hinter einander gelegene Abtheilungen. Die mittlere Abtheilung, welche sich der Einmündung des äusseren Gehörgangs gerade gegenüber befindet, ist die Paukenhöhle, *Cavum tympani*; aus ihr geht vor- und medianwärts der *Can. musculotubarius*, rück- und lateralwärts das *Antrum mastoideum* hervor. Die Paukenhöhle und der Can. musculo-tubarius haben im Wesentlichen die gleiche Form und Begrenzung. Die Grundform beider Höhlen ist die eines dreiseitigen Prisma, mit einer hinteren Wand, einer dachförmig geneigten oberen und

einer schräg aufsteigenden vorderen oder unteren Wand (vgl. Fig. 125 — 127). Die hintere Wand ist identisch mit derjenigen Fläche des Felsenheils, die ich die äussere vordere genannt habe: sie ist also etwas abwärts und stark lateralwärts gerichtet. Die obere Wand haben wir als Paukendecke beschrieben, sie scheidet das mittlere Ohr von der Schädelhöhle. Die vordere Wand, ebenfalls stark zur Seite gekehrt, ist zum Theil identisch mit der vorderen äusseren Wand der Pyramide und gehört, so weit sie den Can. musculo-tubarius begrenzt, dem Paukentheil des Schläfenbeins an. Wo nun aber die vordere Wand dieses Knochentheils auf ihrem Weg von der Mündung der Tuba zum Porus acust. ext. aus der diagonalen Richtung in die eigentlich laterale übergeht und vordere Wand des äusseren Gehörgangs wird, da wird die Stelle einer vorderen Wand der Paukenhöhle durch eine Membran, das Paukenfell, vertreten, die in gleicher Flucht mit dem Paukenrand der Schuppe und mit der medialen Wand des Paukentheils von jenem zu diesem herübergespannt ist. Eine schmale und seichte Furche, *Sulcus tympanicus* (Fig. 146 B), zwischen zwei parallelen, feinen

Fig. 146 A.






Fig. 146 B.



Pyramide des linken Schläfenbeins, in den Felsen- und Paukentheil zerlegt; der Felsenheil von der vorderen äusseren Fläche, der Paukentheil, umgelegt, von der angewachsenen Fläche. † correspondirende Schnittflächen des Felsen- und Paukentheils. †† Schnittfläche, durch welche die Schuppe abgetrennt ist. *Tt.* Tegmen tympani. * Mündung des Can. n. petr. prof. min. vgl. S. 141.

Leistchen, bezeichnet auf der inneren Fläche der vorderen Wand des Paukentheils die Einfügungsstelle des Paukenfells. Sie steigt auf der vorde-

ren Platte des Paukentheils ziemlich in der Mitte zwischen dem lateralen und medialen Rande derselben senkrecht herab und auf der hinteren Platte des Paukentheils unmittelbar am lateralen Rande derselben wieder hinauf.

In mancherlei Weisen wird die eben dargestellte Grundform gestört. Die Decke der Paukenhöhle ist von sehr verschiedener Mächtigkeit und öfters an ihrer unteren Fläche mit einer Lage zelliger Knochensubstanz bekleidet. Der Uebergang der hinteren Wand zur vorderen geschieht in der Paukenhöhle und selbst im Anfang der Tuba mittelst einer Aushöhlung, die man als untere Wand oder Boden der Paukenhöhle unterscheiden könnte. Auch diese Wand ist meistens mit zahlreichen feinen Zellen¹⁾ besetzt. Besonders reich an Unebenheiten von verschiedener Bedeutung ist aber die hintere Wand der Paukenhöhle und des Can. musculo-tubarius.

Was an dieser Wand zuerst in die Augen fällt, ist etwas über der Mitte ihrer Höhe das Vorhofsfenster, *Fenestra vestibuli*²⁾, eine glattrandige, halb-ovale oder nierenförmige, mit dem längsten Durchmesser (3^{mm}) parallel der Längsaxe der Pyramide und mit dem convexen Rande nach oben gestellte Oeffnung, welche, wie das sogleich zu beschreibende Schneckfenster, in die Höhle des knöchernen Labyrinthes führt. Das Vorhofsfenster liegt im Grunde einer mehr oder minder tiefen, trichterförmigen Grube, nach verschiedenen Seiten von verschiedenen Wülsten überragt. Quer über den oberen Rand desselben zieht ein halbcylindrischer Wulst, von einer dünnen Knochenplatte gebildet, welcher sich gegen die laterale Grenze der Paukenhöhle etwas abwärts senkt und in der Basis des Felsentheils verliert. Es ist die Vorderwand des queren Theils des *Can. facialis*.

Fast beständig findet sich in dieser Wand, zunächst der lateralen Grenze der Paukenhöhle, eine ovale, mit dem längsten Durchmesser parallel der Längsaxe des Canals gestellte Oeffnung, die aber nur in macerirten Knochen wegsam und am frischen Präparate vollständig von fibröser Haut geschlossen ist.

Die Stelle des Knies des Can. facialis liegt etwa um die Länge des Vorhofsfensters medianwärts von der medialen Spitze des letzteren; über dieser Spitze aber ist der Wulst des Can. facialis durch das laterale Ende des *Can. tensoris tympani* verdeckt. Das Septum tubae setzt sich nämlich von der hinteren Wand des Can. musculo-tubarius in gerader Richtung oder kaum ansteigend auf die hintere Wand der Paukenhöhle fort. Schliesst es den Can. tensoris tympani vollständig, so geht sein vorderer Rand von der Vorderwand des Can. musculo-tubarius allmähig an die Decke desselben und endlich nach oben umgerollt an die hintere Wand der Paukenhöhle über und lässt an der Spitze des Canals nur eine kleine Lücke zum Austritt der Sehne des M. tens. tymp. übrig. Ist aber der vordere Rand des Septum tubae, wie dies die Regel ist, frei, so biegt er an der bezeichneten Stelle über dem ovalen Fenster in einem kurzen Bogen um in ein ähnliches, nur schmaleres und mit dem freien Rande abwärts geneigtes Plättchen, welches oberhalb des Septum tubae und parallel demselben eine kurze Strecke gegen die mediale Mündung des Can. musculo-tubarius zurückläuft. Der umgebogene Theil des Plättchens, welches den Can. tensoris tympani

¹⁾ *Cellulae tympanicae.*

²⁾ *Fen. ovalis. F. semiovalis.* M. J. Weber.

N. petrosus sup. min. und der N. tympanicus glossopharyngei in einander übergehen). Der Can. tympanicus läuft von der oberen Oeffnung auf der vorderen inneren Wand der Pyramide (S. 140) an lateralwärts, erst eine kurze Strecke der Längsaxe der Pyramide parallel, dann hinter dem Can. tensoris tympani, oder in einer Furche der hinteren Wand des letzteren steiler abwärts und gelangt unter dem Proc. cochleariformis, nahe an der medialen Spitze des Vorhofsfensters, in die Paukenhöhle. Weiter geht er als Canal oder Rinne in einer geraden oder gebrochenen und mit dem Scheitel medianwärts gerichteten Linie auf dem Promontorium nach unten und verlässt die Paukenhöhle wieder durch ein Canälchen des Bodens derselben, welches unterhalb des Schneckenfensters beginnt und medianwärts absteigend mit der Ap. inf. can. tympanici (S. 144) mündet.

Etwa von der Mitte des Paukenhöhlentheils des Can. tympanicus, bald von einem Punkte, bald gesondert, gehen zwei oder drei Furchen in medialer Richtung ab, Nervenzweige zu oder von dem N. tympanicus führend. Die obere Furche (*Sulcus n. petr. prof. min.*) setzt sich sanft ansteigend bis in die Tuba fort und geht an dem medialen Ende der letzteren in den gleichnamigen Canal (S. 141) über. Die untere Furche oder die beiden unteren, *Sulci carotico-tympanici*, gehen gerade oder leicht gebogen abwärts und stossen auf die Foramina carotico-tympanica in der Wand des Can. caroticus.

Noch sind zwei Oeffnungen in der Paukenhöhle zu erwähnen, die Ein- und Austrittsstelle der Chorda tympani, welche beide dicht hinter dem Anheftungsrande des Paukenfalls liegen. Die Eintrittsstelle oder die *Apertura tympanica Can. chordae* (Fig. 148) findet sich am seitlichen unteren Rande des Paukenfells und am Boden der Paukenhöhle in der Ecke, welche die hintere Wand der Paukenhöhle mit der vorderen bildet; die Austrittsstelle ist die Fissura petro-tympanica, hinter dem medialen oberen Rande des Paukenfells, in der Ecke, in welcher die hintere und die obere Wand der Paukenhöhle zusammenstossen.

Die Paukenhöhle verjüngt sich nach vorn zum Can. musculo-tubarius durch Verschmälerung und gegenseitige Annäherung ihrer drei Wände. Indem die Decke an Breite abnimmt, rücken die hintere und vordere Wand näher zusammen; indem die obere Wand sich zugleich mit dem vorderen Rande etwas abwärts neigt, dagegen die Neigung der vorderen Wand geringer wird, und endlich die hintere Wand entsprechend der Wölbung des Can. caroticus gewölbt vorspringt, wird der sagittale Durchmesser des Can. musculo-tubarius noch mehr beeinträchtigt. Die Höhe desselben aber mindert sich theils durch eine geringe Senkung der Decke, theils und in bedeutenderem Grade durch Aufsteigen des Bodens von der Stelle an, wo der Boden des mittleren Ohrs zugleich laterale Wand und Decke des Can. caroticus ist.


Die dritte am meisten seit- und rückwärts gelegene Abtheilung des mittleren Ohrs, das *Antrum mastoideum* (Fig. 148), ist eine unregelmässig geformte Höhle mit zelligen Wänden, deren Decke eine unmittelbare Fortsetzung der Decke der Paukenhöhle ist, deren seitwärts gerichtete hintere Wand, gleich der entsprechenden Wand der Paukenhöhle, von dem Felsentheil gebildet wird, deren vordere medial gerichtete sehr unregelmässige Wand aber dem

Zitzentheil angehört. Es ist eine Höhle, welche die an den Warzentheil angewachsene Basis der Pyramide und den Warzentheil selbst unterminirt und nach unten mit den Zellen des Warzenfortsatzes in Verbindung tritt. Mit der Paukenhöhle communicirt sie durch eine weite Oeffnung, deren unterer Rand etwa in gleicher Höhe mit dem Vorhofsfenster liegt. Der Boden der Paukenhöhle steigt also ebenso, wie medianwärts gegen den Eingang der Tuba, so lateralwärts gegen den Eingang des Antrum mastoideum auf.

Can. facialis.

Hinter der Paukenhöhle verläuft der Can. facialis (Fig. 148). Aus dem Grunde des Meat. acust. int. geht er, von der Richtung dieses Canals etwas nach vorn abweichend, eine kurze Strecke weit fort und biegt dann rasch und fast rechtwinkelig nach hinten um. Die Umbeugungsstelle, *Genu Can. facialis* ist es, wo sich der *Can. nervipetr. superf. maj.* mit dem Can. facialis vereinigt. Nach der Vereinigung läuft der letztere anfangs in der Flucht des ersteren und über dem Vorhofsfenster lateralwärts; allmählig aber wendet er sich im Bogen nach unten, um an der äusseren hinteren Fläche des Felsentheils, am *Foramen stylomastoideum* auszumünden. Dicht hinter dem Knie communicirt der N. facialis durch ein enges und kurzes Canälchen mit dem Can. tympanicus. In der vorderen, der Paukenhöhle

Fig. 148.



Pyramide wie Fig. 146. Das Tegmen tympani entfernt, † Schnittfläche desselben. Durch einen weiter nach hinten geführten Schnitt ist ein Theil der Pars mastoidea entfernt, der Can. facialis und das Antr. mastoideum (Ama) geöffnet.

zugekehrten Wand des Can. facialis ist unweit der äusseren Mündung ein enges Loch sichtbar, der Eingang des eben so engen *Can. chordae*, der sich unter spitzem Winkel vom Can. facialis abzweigt und vor- und aufwärts durch die Dicke des Felsentheils zur Paukenhöhle verläuft, in deren laterale untere Ecke er sich an der eben angegebenen Stelle öffnet. 5—6mm über dem Foramen stylomastoideum liegen einander gegenüber in der Wand des Can. facialis die feinen Löcher, durch welche der N. auricularis vagi aus der ersten Abtheilung des *Can. mastoideus* in die zweite übertritt (S. 144).

Var. Das Foramen stylomastoideum ist von unbeständigen, feinen Ernährungslöchern umgeben. Eine grössere Oeffnung finde ich an zwei Schläfenbeinen unserer Sammlung, 3mm lateralwärts neben dem F. stylomastoideum, Eingang eines Canälchen, welches in der Paukenhöhle an der Stelle des Can. chordae mündet. Es

scheint demnach, dass der Ursprung der Chorda tympani vom N. facialis ausserhalb des Can. facialis fallen kann.

Einige Monate vor der Geburt besteht das Schläfenbein noch aus drei gesonderten, theils häutig, theils knorplich mit einander verbundenen Theilen, der Schuppe, dem Paukentheil und der Pyramide, welche ohne Unterbrechung in den Warzentheil übergeht. Zur Zeit der Geburt hängen diese drei Stücke in der Regel schon knöchern, jedoch theilweise noch leicht trennbar zusammen. Am festesten ist die Verbindung des Paukentheils mit der Schuppe; die Nähte zwischen dem Schuppen- und Paukentheil einerseits und der Pyramide andererseits sind aber überall noch sichtbar und meist sind es nur vereinzelte schmale Knochenbrücken, mittelst welcher beide Theile an einander haften und zwar die Schuppe an dem dem späteren Warzentheil entsprechenden Stück und der Paukentheil an dem Rande des Felsentheils, der später zur Crista petrosa wird. Die Verknöcherung macht ohne Regel bald in der ersten, bald in der zweiten der genannten Nähte raschere Fortschritte. Mit dem ersten Lebensjahre pflegt sie vollendet zu sein, doch kann sich ausnahmsweise die Naht zwischen Schuppen- und Warzentheil länger erhalten, und zwischen dem vorderen Theile des unteren Randes der Schuppe und der Paukendecke besteht sie, wie erwähnt, während des ganzen Lebens.

Der Schuppentheil ist beim Neugeborenen platter, als beim Erwachsenen, gegen den unteren Rand nur wenig medianwärts umgebogen; der Jochfortsatz geht unter einem spitzen Winkel fast gerade nach vorn ab; seine bogenförmige Gestalt gewinnt er erst mit der Entwicklung des Musc. temporalis.

Der Paukentheil des Neugeborenen ist ein platter, an seiner inneren Fläche zur Aufnahme des Paukenfells gefalzter, fast zum vollständigen Ring nach oben umgebogener Knochenstreif, mit dem hinteren Ende an einen Fortsatz der Schuppe und an den Warzentheil befestigt, darunter, wo er auf den Felsentheil übergeht, über eine Grube hingespant, aus welcher der noch völlig knorpliche Griffelfortsatz hervorragt. Der vordere Theil des Rings steigt von der unteren Kante des Felsentheils schräg auf zur Schuppe und wächst mittelst des oberen Endes ebenfalls an derselben fest. Da der abwärts ragende Theil der Paukendecke, der sich im Erwachsenen zwischen den unteren Rand der Schuppe und den oberen Rand des Paukentheils einschiebt, den letzteren beim Neugeborenen noch nicht erreicht, so fliesst die Fissura petroso-tympanica mit dem Can. musculo-tubarius zusammen. (Zur späteren Trennung beider trägt auch der lange Fortsatz des Hammers bei, welcher in der Fissura petroso-tympanica liegt und mit den Wänden derselben verschmilzt.) — Zur Zeit der Geburt ist der Porus acust. extern. noch identisch mit dem Paukenfellsalz; ein knöcherner Gehörgang ist nicht vorhanden. Derselbe bildet sich in den ersten Lebensjahren durch Ansatz neuer Knochenmaterie am seitlichen (hinteren) Rande, besonders des vorderen Theils des Paukenringes; doch erfolgt dieser Ansatz oft unregelmässig, in Gestalt platter Vorsprünge von einzelnen Gegenden des Randes, und es entstehen so die Lücken in der vorderen Wand des knöchernen Gehörgangs, von welchen oben S. 142 die Rede war.

Der Unterkiefer articulirt beim Neugeborenen in einem sehr seichten, kreisförmigen Grübchen an der Wurzel des Jochfortsatzes. Wie sich der Schuppentheil nach unten und der Jochfortsatz bogenförmig lateralwärts wölbt, wächst die Grube im transversalen Durchmesser. Sie vertieft sich zugleich durch die Ausbildung der vorderen Wand des Gehörgangs und des Tuberculum articulare.

Der Felsentheil ist anfangs genauer nach der Form des Labyrinths und insbesondere der Bogengänge modellirt; eine tiefe, nur von Knorpel ausgefüllte Grube, die freilich auch im Erwachsenen nicht ganz ausgeglichen wird, findet sich, mit medianwärts gerichteter Oeffnung, unter dem oberen vorderen Bogengang.

An dem Warzentheil entsteht erst einige Zeit nach der Geburt die Andeutung eines Warzenfortsatzes, doch hat im zweiten und dritten Jahre der Proc. und die

Incisura mastoidea die dem reifen Zustand entsprechende Grösse. Zellig und luft-haltig wird der Warzenfortsatz aber erst gegen die Zeit der Pubertät oder noch später.

Der Griffelfortsatz verknöchert zum Theil von der Basis aus, zum Theil von der Spitze aufwärts. Bevor beide Verknöcherungen einander begegnen, steht also die verknöcherte Spitze durch Synchondrose mit dem Schläfenbein in Verbindung.

In der Fissura petro-basilaris findet sich ein oder eine Reihe platter Knochen, welche längs dem Rande des Felsentheils vom For. jugulare bis zur Spitze des Felsentheils reichen. Sie füllen am knöchernen Schädel die Spalte nicht aus, sondern liegen beweglich in derselben und gehen daher bei der Maceration gewöhnlich verloren. Am festesten haftet der der Spitze des Felsentheils zunächst gelegene Theil, ein meist selbstständiges, platt linsenförmiges mit den Flächen horizontal gelegenes Knöchelchen, welches mit einer rauen Fläche in einem Grübchen des Felsenbeins ruht und von dem vorspringenden Rande dieses Grübchens festgehalten wird¹⁾. Die weiter hinten in der Fissura petro-basilaris gelegenen Knochenscheiben sind mit den rauen Flächen nach der Krümmung dieser Spalte gebogen, am oberen Rande scharf, am unteren gleich der unteren Fläche der Pyramide warzig und porös. Dieterich, welcher sie unter dem Namen *Os raphogeminans ossis petrosi* beschreibt, Gruber (*Bulletin de la classe physico-math. de l'acad. des sciences de Petersb.* T. XI. S. 557) u. Schultz (a. a. O. S. 29) stellen sie mit den Nahtknochen zusammen, gleich welchen sie zuweilen frei bleiben, zuweilen verwachsen, und zwar entweder mit der Pyramide oder mit dem Wespenbein. Mir scheinen sie eher die Bedeutung von Epiphysen zu haben. Sie entstehen erst zur Zeit der Pubertät, das Knöchelchen der Felsenbeinspitze ausgenommen, welches Meckel und Zinn schon an Kinderschädeln fanden, und sie verwachsen, allerdings zuweilen erst im späten Alter, mit dem Felsenbein. So ist es wenigstens in der grossen Mehrzahl der Fälle; nur einmal fand ich den hinteren Theil des Knochens der Fissura petro-basilaris mit dem Körper des Hinterhauptsbeins und an demselben Schädel, auf der anderen Seite, zugleich mit dem Hinterhauptsbein und der Pyramide verschmolzen.


¹⁾ Dieses Knöchelchen ist deshalb auch von mehreren Beobachtern erwähnt und unter dem Namen des *Cortesischen* oder *Riolanischen* Knöchelchen in den Handbüchern eingeführt worden. Den ersten dieser Namen trägt es mit Unrecht. Cortese (*Miscellaneorum medicinalium decades denae. Messanae* 1625. p. 17) spricht von kleinen, sesamartigen Knochen im Sinus cavernosus, und zwar innerhalb der Arterien. Er sagt: *Revolutio arteriarum, in quarum cavitate ossicula duo reperuntur*, und weiter: *Non solum in hac parte arteriae ossicula in se continent, verum etiam in aliis, naturae providentia*, um nämlich die Arterien offen zu erhalten. Es ist unmöglich, diesen Worten eine andere Deutung zu geben, als ihnen bereits Morgagni (*De sed. et caus. morb. epist. III. §. 22*) gegeben hat, dass sie sich nämlich auf Verknöcherungen der Hirnarterien beziehen. Besser passt die kurze Beschreibung von Riolan (*Osteologia. Paris* 1613. p. 462), wo von einem Knöchelchen die Rede ist, *forma seminis citrulli, in cavitate magni illius foraminis exterioris, quod subit penetratque carotis*. Auch Winslow (*Exposition anatomique de la structure du corps humain. Paris* 1732. T. I. p. 33), Meckel (*De quinto pare nervorum. Gotting.* 1748. p. 21) und Zinn (*Observationes quaedam botanicae et anatomicae. Gotting.* 1753. p. 40) scheinen die vordere Spitze der erwähnten Knochenreihe vor sich gehabt zu haben; Winslow's sesamartiges Knöchelchen liegt nämlich zwischen der Spitze des Felsenbeins und der oberen Oeffnung des carotischen Canals, das von Meckel und Zinn erwähnte Knöchelchen in dem Theile der harten Hirnhaut, welcher die obere Spitze des Felsenbeins bekleidet, zwischen dem Stamm des Trigeminus und dem Sinus cavernosus. Caldani, dessen Beobachtungen (*Opusc. anatomica. Patav.* 1803. p. 44. Taf. III. Fig. 1. 2) man mit denen von Cortese, Riolan u. s. w. zusammenzustellen pflegt, handelt von einem platten Knöchelchen an der Aussen- (lateralen) Seite der Arterie, welches durch feine Fäden der harten Hirnhaut mit den darunter gelegenen Knochen verbunden sei, zuweilen sich bis zum Process. clinoid. post. erstrecke und ihm unter 10 Schädeln 6 Mal begegnet sei. Es mögen ihm demnach Fälle wie die oben nach Sömmerring erwähnten vorgelegen haben, wo die Lingula sphenoidalis als selbstständiger Knochen bestand, und andere, wo mit dem Proc. clinoid. ein rück- und abwärts gerichteter Fortsatz verbunden oder verwachsen war (S. 100).

6. Scheitelbein, *Os parietale*.

Die Scheitelbeine, platt, vierseitig, nach dem verticalen und sagittalen Durchmesser des Schädels gewölbt, nehmen die hinteren $\frac{2}{3}$ der Scheitelgegend und des oberen Theils der Seitenwände des Schädels ein, mit der hinteren unteren Ecke bis nahe an die Schädelbasis herabreichend (Fig. 89).

6. Scheitelbein.

Fig. 149.



Linkes Scheitelbein von aussen.

Sie verbinden sich mit einander in einer medianen zackigen Naht, Scheitlnaht, *Sutura parietalis*¹⁾, welche von der Mitte des hinteren Randes der Stirnbeinschuppe zur Mitte des oberen Randes der Hinterhauptsschuppe reicht. Der Rand, an welchem beide Scheitelbeine zusammenstossen, wird Scheitelrand, *Margo parietalis*²⁾, genannt. Von dem vorderen und hinteren Ende des Scheitelrandes gehen unter nahezu


rechten Winkeln und einander ziemlich parallel die Ränder ab, mittelst deren sich das Scheitelbein vorn an das Stirnbein, hinten an das Hinterhauptbein anschliesst. Beide weichen in ihrem Verlaufe abwärts etwas nach vorn ab, und zwar der hintere Rand stärker als der vordere, wodurch der untere Rand, der seinerseits wieder dem oberen parallel geht, gegen den letzteren um Weniges verkürzt erscheint. Der vordere Rand, *Mg. frontalis*³⁾, ist mit dem hinteren Rande des Stirnbeins bis zur Begegnung mit dem Temporalflügel des Wespenbeins in einer Naht, Kronennaht, *Sutura coronalis*, verbunden, welche, so weit sie quer über die eigentliche Decke des Schädels verläuft, stark zackig, unterhalb der Schläfenlinie aber mehr schuppenförmig ist, so zwar, dass der von innen zugeschärfte Rand

¹⁾ Pfeilnaht, *Sut. sagittalis*.

²⁾ *Mg. superior, sagittalis*

³⁾ *Mg. coronalis*

des Scheitelbeins den Rand des Stirnbeins deckt. Der hintere und wegen der Flächenkrümmung des Scheitelbeins abwärts gerichtete Rand dieses



Rechtes Scheitelbein von innen.

Knochens, *Mg. occipitalis*¹⁾, kommt mit dem oberen Rand der Hinterhauptsschuppe in einer sehr tief gezackten und mit zahlreichen Nebenzacken versehenen Naht, der Hinterhauptsnaht *Sutura occipitalis*¹⁾, zusammen. Am Seitenwinkel der Hinterhauptsschuppe setzt sich das untere Ende dieser Naht in fast gerader Richtung in die Naht zwischen der Hinterhauptsschuppe und dem hintern

Rande des Warzentheils des Schläfenbeins fort, indess der

hintere Rand des Scheitelbeins abgerundet oder in einem stumpfen Winkel in den unteren Rand dieses Knochens umbiegt.

Der untere Rand, *Mg. sphenotemporalis*²⁾, besteht aus drei, im Verlauf und theilweise auch in der Form verschiedenen Abtheilungen. Die vorderste Abtheilung, *Mg. sphenoidalis*³⁾, die in horizontalem oder schräg nach hinten absteigendem Verlauf nur eine kurze Strecke einnimmt, ist auf Kosten der äusseren Fläche schräg abgeschnitten und verbirgt sich hinter dem oberen Rande des Temporalflügels des Wespenbeins. Die mittlere Abtheilung, *Mg. squamosus*, welche sich über mehr als die Hälfte der Länge des ganzen Randes erstreckt, ist in gleicher Weise und nur noch schräger zugespitzt, zugleich aber concav ausgeschnitten und durch radial gegen den Ausschnitt gestellte Längswülste ausgezeichnet. Sie ist von dem oberen Rande der Schläfenschuppe bedeckt und mit demselben in einer Schuppennaht (*Sutura squamosa s. s.*) vereinigt. Die hinterste Abtheilung des unteren Scheitelbeinrandes (*Mg. mastoideus*⁴⁾) ist dick, grobzackig, gerade oder leicht auf- oder abwärts gebogen und ruht auf dem oberen Rand des Warzentheils des Schläfenbeins. Die stumpfe Ecke, an welcher der *Mg. squamosus* des Scheitelbeins in den *Mg. mastoideus* desselben Knochens übergeht, springt in die *Ineisura parietalis* des Schläfenbeins ein.

¹⁾ *S. lambdoidea*.

²⁾ *Mg. temporalis aut.*

³⁾ Sie wird als quer abgestutzter vorderer unterer Winkel des Scheitelbeins unter dem Namen *Ang. sphenoid.* beschrieben.

⁴⁾ *Ang. mastoideus aut.*

Die vier Winkel des Scheitelbeins können als oberer vorderer ¹⁾ und oberer hinterer ²⁾, unterer vorderer und unterer hinterer Winkel unterschieden werden.

Die innere, concave Fläche des Scheitelbeins (Fig. 150) ist mit denselben Eindrücken der Hirnwindungen und der pacchionischen Drüsen versehen, wie die innere Fläche des Stirnbeins. Vom vorderen unteren Winkel aus verästelt sich die tiefe, zuweilen im Anfange zu einem Canal geschlossene Furche, in welcher die Vasa meningeae media liegen. Meistens geht weiter nach hinten eine zweite, feinere, ebenso verästelte Furche von der Schläfenschuppe auf das Scheitelbein über. Längs dem Margo parietalis zieht sich eine hier und da unterbrochene Furche, *Semisulcus sagittalis*, hin, welche erst durch die Verbindung beider Scheitelbeine vollständig wird; sie setzt sich nach vorn in den Sulcus sagittalis des Stirnbeins, nach hinten in den Sulcus sagittalis des Hinterhauptbeins fort und dient, wie diese, zur Aufnahme des gleichnamigen Blutleiters. Eine kleine geneigte Fläche ³⁾ an der hinteren unteren Ecke (Fig. 150 *) vervollständigt von oben her den Sulcus sin. transversus an der Stelle, wo er von der Hinterhauptsschuppe auf die Innenfläche des Warzentheils übergeht.

Ueber die Aussenfläche des Scheitelbeins (Fig. 149) verläuft die Schläfenlinie in einem Bogen vom vorderen Rande an (etwa am oberen Ende des unteren Viertels desselben beginnend) zum Winkel zwischen dem Mg. squamosus und mastoideus. Sie erhebt sich mehr oder weniger gegen den Scheitel aufwärts, ist bald nur leise angedeutet, bald scharf und selbst wulstig; die Fläche unter ihr, *Planum temporale* ⁴⁾, flach oder gewölbt, sticht öfters durch Glätte und Glanz gegen die Scheitelfläche des Scheitelbeins ab, die durch eine Masse feinsten Gefäßlöcher ein mattes Ansehen gewinnt. Hinter der Mitte des Mg. squamosus steigt die rinnenförmige Spur der Art. tempor. media aufwärts. Ueber der Schläfenlinie, in der Mitte zwischen dem vorderen und hinteren Rande des Scheitelbeins, aber dem unteren näher als dem oberen, liegt der Scheitelhöcker, *Tuber parietale*, eine platt kegelförmige Hervorragung. Dicht am Mg. parietalis und in geringer Entfernung (20^{mm}) vom hinteren oberen Winkel findet sich öfters eine runde, die Dicke des Scheitelbeins durchsetzende Oeffnung, *Foramen parietale*, in welcher ein Emissarium liegt.

Das Scheitelbein ist zuweilen durch eine Naht in eine obere und untere Hälfte getheilt (Sömmerring in Tiedemann und Treviranus' Zeitschr. Bd. I. S. 1. Taf. I. Gruber, Abhandl. aus der menschl. und vergl. Anat. S. 113).

Die Verknöcherung des Scheitelbeins, welche strahlenförmig von einem Punkte, dem Scheitelhöcker, ausgeht, lässt zur Zeit der Reife noch an allen vier Ecken Lücken zwischen dem Scheitelbein und den angrenzenden Knochen übrig, die sogenannten Fontanellen, *Fonticuli*, auf welche ich später zurückkomme.

Verlaufen die Vasa meningeae media in einem Canal des Scheitelbeins, so kann im höheren Alter die äussere Wand dieses Canals durch Abnutzung schwinden (Hyrtl, Topogr. Anat. Bd. I. S. 16).

¹⁾ A. frontalis.


²⁾ A. occipitalis.

³⁾ Sulcus transversus.

⁴⁾ Pl. semicircularis.

7. Oberkieferbein, *Os maxillae*.

7. Oberkieferbein.




Rechtes Oberkieferbein von vorn.

Das Oberkieferbein, Fig. 151, der ansehnlichste Theil des Gesichts und die eigentliche Grundlage desselben, besteht aus dem Körper und vier Fortsätzen. Der Körper ist ein kurzer, aufrecht gestellter, hohler Halbcylinder, die obere Endfläche im Boden der Augenhöhle, die untere Endfläche in der Höhe des Gaumens gelegen, die convexe Seitenwand nach aussen gerichtet, die plane nach innen gegen die Nasenhöhle und mit der unregelmässigen Oeffnung versehen, durch welche die eigene Höhle des Oberkieferbeins (Kieferhöhle, *Sinus maxillaris*¹⁾ mit der Nasenhöhle communicirt. Von den Fortsätzen ragt der eine, Stirnfortsatz, *Processus frontalis*²⁾, längs dem medialen Rande der Augenhöhle und als Seitenwand des Nasengewölbes zum Stirnbein empor. Der zweite, Jochfortsatz, *Processus zygomatico-orbitalis*³⁾, erhebt sich seitlich von der Seitenwand des Körpers, indem er diese in eine vordere, dem Gesichte, und eine hintere, der Unterschläfengrube angehörige Hälfte scheidet, und legt sich mit einem medialen Vorsprung seines oberen Randes wieder über den Körper herüber, so dass er den Seitentheil des Bodens der Augenhöhle und die Decke eines Canals darstellt, der als Can. infraorbitalis beschrieben werden wird. Der dritte Fortsatz, Zahnfortsatz, *Processus dentalis*⁴⁾, ist ein niedriger, verhältnissmässig dicker Bogen, mit einer äusseren und einer inneren Fläche, die aus den entsprechenden Flächen des Körpers geradezu hervorgehen, und einem unteren freien Rande, in welchem die Wurzeln der Zähne stecken. Medianwärts ragt dieser Fortsatz über den Körper des Oberkiefers bis zur Mittellinie und bis zur Begegnung mit dem gleichnamigen Knochentheil der anderen Seite vor, mit dem er sich in einer medianen, sagittalen Naht verbindet. Er bildet auf diese Weise den vorderen Theil des Gaumengewölbes und den unteren Rand des Eingangs der Nasenhöhle (vergl. Fig. 81). Der vierte Fortsatz, Gaumenfortsatz, *Processus palatinus* (Fig. 152), ist eine horizontale Platte, welche von dem vorderen Theile der Nasenfläche des Körpers an der Grenze zwischen dem Körper und dem Alveolarfortsatz medianwärts abgeht. Er erreicht mit seinem medialen Rande die Mittellinie, mit

¹⁾ *Antrum Highmori*.²⁾ *Pr. nasalis*.³⁾ *Pr. malaris s. jugalis s. zygomaticus aut.* Der Orbitaltheil des von mir sogenannten *Pr. zygomatico-orbitalis* wird als ein Theil des Körpers beschrieben.⁴⁾ *Pr. alveolaris*.

seinem vorderen Rande den hinteren Rand des freien Theiles des Alveolarfortsatzes, mit dem er in der Regel bis auf einige leise Spuren einer Naht verschmilzt; sein hinterer Rand stösst an den Vorderrand der horizontalen Platte des Gaumenbeins, welche, in gleicher Flucht mit dem Gaumenfortsatz des Oberkiefers, das Gaumengewölbe nach hinten abschliesst.



Linkes Oberkieferbein
von hinten.

Die Grenzbestimmungen zwischen Körper und Fortsätzen sind meistens willkürlich; die Flächen gehen von dem einen zu dem anderen ohne Unterbrechung über und nur an wenigen Stellen führt eine Naht oder die Spur einer solchen zu einer schärferen Scheidung.

Den Körper begrenzen dünne Wände, an welchen zunächst mit Rücksicht auf ihr Verhältniss zur Kieferhöhle eine äussere und innere Fläche unterschieden werden muss. Wir beginnen mit der Betrachtung der äusseren Flächen dieser Wände. Die äussere Fläche der vorderen Wand oder die Gesichtsfläche des Oberkiefers (Fig. 151) ist zur Seite gerichtet und glatt, erscheint aber von oben nach unten und von einer Seite zur anderen etwas ausgehöhlt, weil der Zahnfortsatz, in welchen sie sich nach unten fortsetzt, sowie der Stirnfortsatz, in welchen sie auf- und medianwärts, und der Processus zygomatico-orbitalis, in welchen sie auf- und lateralwärts übergeht, sämmtlich nach vorn vortreten. Die tiefste Aushöhlung, *Fossa maxillaris* ¹⁾, liegt ziemlich in der Mitte der Vorderwand des Oberkieferbeins, gleich weit vom Orbital- und Alveolarrande entfernt. Gerade über dieser Grube, 8^{mm} unterhalb des Infraorbitalrandes, findet sich das *Foramen infraorbitale*, die vordere Mündung des gleichnamigen Canals, der am hinteren Rande des Bodens der Augenhöhle seinen Anfang nimmt. Das Foramen infraorbitale ist am oberen Rande scharf; von dem medialen Theile seiner Peripherie geht mehr oder minder schräg medianwärts, seltener schräg lateralwärts hinauf zum Infraorbitalrande eine feinzackige oder einfache Naht, welche häufig bis auf eine sehr feine Linie oder Furche geschwunden, zuweilen auch ganz verwischt ist. Was lateralwärts von dieser Naht liegt, ist Processus zygomatico-orbitalis; medianwärts stellt die vordere Wand des Oberkieferbeins, indem sie mit der oberen Wand in einer scharfen Kante fast rechtwinklich zusammenstösst, auf der kurzen Strecke bis zur Wurzel des Stirnfortsatzes den Infraorbitalrand dar; an ihrem medialen Rande verbindet sich die vordere mit der medialen Wand in einer stumpfen oder scharfen Kante, welche an der Begrenzung der Nasenöffnung Antheil nimmt.


Var. Der Infraorbitalcanal ist an seiner Ausmündung durch eine verticale Brücke getheilt oder öffnet sich mit mehreren gesonderten Mündungen ins Gesicht. Als Spur der ehemaligen Trennung des Os incisivum vom Oberkieferkörper will Arnold, in höchst seltenen Fällen, eine Linie vom zweiten Schneidezahn bis über den Rand der Nasenöffnung gesehn haben.

¹⁾ *F. canina*.

Infratemporalfläche.

Die Aussenfläche der hinteren Wand des Oberkieferkörpers oder die Infratemporalfläche ist weniger seitwärts gewandt als die vordere; sie ist von einer Seite zur anderen gewölbt und geht mittelst dieser Wölbung

Fig. 153.



Linkes Oberkieferbein von hinten. Sz Spina zygomatica.

continuirlich in die Nasenfläche über; nach unten, gegen den Alveolarfortsatz, nimmt sie um Weniges an Breite ab. Die obere mediale Ecke, in welcher die hintere, die mediale und die obere Wand zusammenstossen, ist schräg abgestutzt mittelst einer dreiseitigen, die Spitze abwärts kehrenden, etwas rauhen und scharfkantigen Fläche, an welche sich der Orbitalfortsatz des Gaumenbeins lehnt; ich werde sie *Trigonum palatinum* nennen. Unten ist die zunächst an die Nasenfläche stossende Region der Infratemporalfläche durch eine vertiefte oder vorspringende, auf die Nasenfläche sich fortsetzende rauhe Stelle ¹⁾ ausgezeichnet, die sich mit dem Proc. pyramidalis des Gaumenbeins in Verbindung setzt. Mit dem glatteren Theile zwischen dieser Rauhgkeit und dem Trigonum palatinum bildet der abgerundete mediale Rand der hinteren Wand die vordere Grenze der Fissura speno-maxillaris, indess der scharfe und nach der Schläfe abhängige obere Rand dieser Wand zwischen dem Trigonum palatinum und dem Proc. zygomatico-orbit. von unten her die Fissura orbit. inf. begrenzt. Seitwärts ist die Grenze der Infratemporalfläche gegen den Proc. zygomatico-orbitalis häufig durch eine perpendiculäre Furche bestimmt, welche oben die grösste Tiefe hat und nach abwärts sich verliert. Was nun die Infratemporalfläche selbst betrifft, so ist sie meistens in der oberen Hälfte glatt, nur von einer mehr oder minder schräg aufsteigenden Depression durchzogen, welche sich vom freien Theile des medialen Randes zu einer halbkreisförmigen Einkerbung in der Mitte des oberen Randes biegt. Diese Einkerbung ist der Eingang des *Sulcus infraorbitalis* der Orbitalfläche, welcher den N. und die Vasa infraorbitalia aufnimmt; in der genannten Depression ruht der aus der Sphenomaxillargrube hervorgehende Nerv. In der unteren Hälfte pflegt die Infratemporalfläche rauher zu sein von feinen Poren und Gefässrinnen, und in der Mitte ihrer Höhe zeigt sie eine oder mehrere, den Knochen schief ab- und seitwärts durchbohrende Oeffnungen oder Canäle, *Canales alveolares postt.*, zu welchen und an welchen vorüber in der nämlichen Richtung ab- und seitwärts flachere oder tiefere Furchen führen, N. und Vasa alveolaria supp. postt. enthaltend.


Zuweilen findet sich noch ein Canalis alveolaris höher oben, seitlich neben dem Eingang in den Sulcus infraorbitalis.

Orbitalfläche.

Die Aussenfläche der oberen Wand oder die Orbitalfläche des Oberkieferkörpers ist vorwärts und in noch stärkerem Maasse lateralwärts geneigt; ihre mediale Hälfte liegt im Boden der Augenhöhle frei; der laterale, abhängigere Theil verbirgt sich, um den Boden des Infraorbitalcanals

¹⁾ Unter *Tuber* s. *Tuberositas maxillae* wird von Manchen diese Rauhgkeit, von den Meisten die ganze untere Hälfte der Infratemporalfläche verstanden.

zu bilden, unter dem Proc. zygomatico-orbitalis, und kann erst in Verbindung mit diesem beschrieben werden. Der mediale Rand der Infraorbitalfurche im Hintergrunde der Augenhöhle und weiter vorn eine Naht, welche nur selten gänzlich schwindet, *Sutura infraorbitalis*, scheiden die freie und völlig glatte Fläche, *Planum orbitale*, von der ganz oder theilweise



Linkes Oberkieferbein, Seitenansicht.


Sl Sutura longit. imperf. *Cla* Crista lacr. ant.
Sl Sulcus lacrymalis. *Ml* Margo lacrymalis.

bedeckten, die ich das *Planum infra-orbitale* nennen werde. Der vordere Rand des Planum orbitale, welcher demselben mit der Gesichtsfläche gemeinsam ist, der hintere Rand, wodurch es mit der Infratemporalfläche zusammenstösst, die hintere mediale Ecke, welche durch das Trigonum palatinum schräg abgeschnitten ist, sind schon im Vorhergehenden beschrieben. So bleibt nur der mediale Rand zu betrachten übrig. Derselbe besteht aus zwei ziemlich gleich langen Abtheilungen, welche, je von der hinteren und vorderen Ecke an einander entgegen und dabei sanft auf- und medianwärts verlaufend, in einem stumpfen Winkel oder in einer platten Zacke, *Angulus ethmolacrymalis*, zusammenreffen. Die hintere Abtheilung ist mit der Papierplatte des Siebbeins verbunden; sie ist uneben, fein gezackt oder mehr oder minder tief gekerbt; die vordere Abtheilung hat mitunter eine kurze Strecke weit vom Angulus ethmolacrymalis an die nämliche Beschaffenheit; gewöhnlich ist sie ganz glatt. Ein schwacher Vorsprung theilt sie in zwei Concavitäten, von welchen die hintere in der Regel den längeren Theil des Randes einnimmt, die vordere tiefer ausgeschnitten ist. Auf den hinteren Theil stützt sich der untere Rand des Thränenbeins; der vordere Theil, welchen man *Incisura lacrymalis* nennen kann, trägt den unteren Rand des Hamulus lacrymalis (s. Thränenbein) oder begrenzt frei von der Seite her den oberen Eingang des Thränencanals. Das Verhältniss des Oberkiefers zu diesem Canal wird später dargestellt werden.

Var. Eine Zacke steigt von diesem Rande hinter dem hinteren Rande der Papierplatte des Siebbeins zum Stirnbein auf (Gruber, Abh. aus der menschl. und vergleichenden Anatomie. S. 51). An einem Botokudenschädel, in der Sammlung des hiesigen physiolog. Instituts, findet sich in der Naht zwischen Sieb- und Oberkieferbein, gerade unter dem For. ethmoidale ant., eine grosse Oeffnung (3mm), welche aus der Augenhöhle direct in die Nasenhöhle führt.

Die äussere Fläche der medialen Wand oder die Nasenfläche des Nasenfläche Oberkiefers hat den oberen Rand mit der Orbitalfläche, den hinteren Rand mit der Infratemporalfläche, den vorderen Rand mit der Gesichtsfläche gemein; nach unten geht sie zuvorderst sanft ausgehöhlt auf die obere Fläche des Zahnfortsatzes, weiter hinten ebenso auf die obere Fläche des Gaumenfortsatzes, und mit dem hintersten Drittel gerade abwärts auf die innere Fläche des Zahnfortsatzes über. Sie ist von einer Lücke, dem

Hiatus maxillaris ¹⁾, durchbrochen, welche über ein Viertel und manchmal fast die Hälfte der ganzen Wand einnimmt und einen halbkreis- oder ei-



Rechtes Oberkieferbein von innen.

Ce Crista ethmoid. Ct Crista turbinalis.

Il Incisura lac. Il Margo lacrym.

oder bohnenförmigen Umfang hat. Mit dem oberen und hinteren Theile ihres Randes beschreibt diese Lücke einen im Allgemeinen dem oberen und hinteren Rande der ganzen Nasenfläche parallelen, jedoch steileren und auf dem Wege von vorn nach hinten und unten sich allmähig von diesem Rande entfernenden Bogen. Der vordere Rand der Lücke geht in gerader oder in vor- oder rückwärts gebogener Linie von der Mitte der vorderen, mit dem Thränenbein verbundenen Abtheilung des oberen Randes schräg ab- und rückwärts.

Im ganzen Umkreise der Oeffnung ist

die Wand dünn und scharf abgeschnitten mit Ausnahme einer kurzen Strecke am oberen Ende des vorderen Randes, wo sie mitunter gleichsam nach vorn umgeklappt erscheint oder mit dem concaven hinteren Rande eines schmalen, halbmondförmigen Plättchens verwächst, welches zur Bildung der medialen Wand des Thränencanals beiträgt und *Lunula lacrymalis* genannt werden soll.

Der vor dem Hiatus maxill. gelegene Theil der Nasenfläche ist gegen die Nasenhöhle frei, nur von der Schleimhaut überzogen, glatt und eben; der über, hinter und unter dem Hiatus maxill. gelegene Theil dieser Fläche ist von den benachbarten Knochen bedeckt, uneben und stellenweise rauh.

Die Grenze beider Theile ist zuweilen vom Rande der Kieferhöhle abwärts schroff durch einen Absatz bezeichnet, welcher dadurch entsteht, dass der hintere, von der perpendicularen Platte des Gaumenbeins bedeckte Theil um die ganze Mächtigkeit dieser Platte unter das Niveau des vorderen freien Theils zurückweicht.

Ueber dem Hiatus maxill. ist die Fläche aufwärts geneigt und besonders gegen den hinteren Rand hin in flache oder tiefe Zellen abgetheilt, welche, wie bei der Beschreibung des Siebbeins angegeben wurde, die unteren Zellen des Labyrinths dieses Knochens schliessen. Die Fläche hinter dem Hiatus maxill. ist von längeren Gefässfurchen durchzogen und mit feinen Grübchen und Vorragungen versehen; sie dient der dünnen verticalen Platte des Gaumenbeins zur Unterlage. Weiter abwärts, unterhalb des Hiatus maxillaris und hinter dem hinteren Rande des Gaumenfortsatzes findet sich ein auffallend rauhes Feld, gewöhnlich von einer flachen, schräg ab- und vorwärts laufenden Furche, *Sulcus pterygopalatinus*, getheilt; in die Rauhgkeit greift eine rauhe Fläche des Gaumenbeins ein; die Furche schliesst sich durch eine Rinne des Gaumenbeins zum Canal (Can. pterygopalatinus).

¹⁾ *Apertura sinus max. ant.* Unter diesem Namen verstehe ich den Eingang, wie er sich an dem ungetrennten Schädel darstellt.

Die untere Wand des Körpers des Oberkieferbeins ist nach unten durch den Ansatz des Zahnfortsatzes gedeckt.


Die Kieferhöhle entspricht in ihrer Form ziemlich genau der äusseren Form des Knochens; doch erstreckt sie sich mitunter in die Basis des Proc. zygomatico-orbitalis und frontalis. Auch gehen, von der Kieferhöhle aus betrachtet, die Wände des Oberkieferkörpers sämtlich abgerundet in einander über. Der Boden ist durch einige niedere Querleisten unvollkommen in Fächer abgetheilt. Von der Mitte der Decke an zieht sich zur Gegend des Foram. infraorbitale in der vorderen Wand ein halbeylindrischer, nach vorn, wie er sich tiefer herabsenkt, auch an Breite zunehmender Wulst, die untere Wand des Canalis infraorbitalis. An der inneren Fläche der hinteren Wand verlaufen, von der inneren Mündung der Canales oder Foramina alveolaria aus, schmale, zuweilen verzweigte Furchen schräg absteigend oder sanft abwärts gebogen nach vorn. Oft sind sie undeutlich, und zwar aus zweierlei Ursachen; dort werden sie zu seicht, hier ziehen sie sich ganz oder stellenweise als Canäle in die Dicke der Knochenwand zurück. Oft sieht man von denselben feine, lineare Gefässrinnen abwärts gehen und sich verästeln. Die eine oder andere jener Furchen setzt sich in der Regel, als Furche oder Canal, *Sulcus s. Can. alveolar. ant.*, auf die Innenfläche der vorderen Wand bis an den Boden des Can. infraorbitalis fort und steht mit dem Lumen des letzteren durch eine spaltförmige Oeffnung in Verbindung. Zweige der im Infraorbitalcanal enthaltenen Nerven und Gefässe gehen durch diese Oeffnung herab in die Wand oder auf die Innenfläche der Kieferhöhle und kommen schlingenförmig mit den durch die For. alveol. postt. eintretenden Nerven und Gefässen zusammen.

Der Stirnfortsatz, von der vorderen oberen Ecke des Körpers platt und etwas nach hinten gekrümmt emporsteigend, hat eine äussere, Gesichts-, und eine innere, der Nasenhöhle zugekehrte Fläche; die äussere Fläche geht aus der vorderen Fläche des Körpers unmittelbar hervor, neigt sich aber unter einem spitzen Winkel gegen die Medianebene; die innere Fläche ist eine Fortsetzung der medialen Fläche des Körpers. Die Flächen des Fortsatzes verjüngen sich nach oben; an Dicke aber nimmt er zu gegen den oberen Rand, welcher quer abgestutzt und zackig mit dem rauhen Theil der Pars nasalis des Stirnbeins in der früher (S. 124) beschriebenen Weise zusammenstösst. Von dem oberen Rande an geht der vordere zuerst ab- und etwas vorwärts, und ist, so weit er diese Richtung einhält, mit dem lateralen Rande des Nasenbeins verbunden; sodann, etwa in der Höhe des tiefsten Theils des Augenhöhlenrandes, wendet er sich scharf und frei unter einem stumpfen, gewöhnlich abgerundeten oder abgestutzten Winkel rück- und etwas seitwärts, um sich in den Rand des Oberkieferkörpers fortzusetzen, welcher die knöcherne Nasenöffnung begrenzt. Der hintere Rand des Nasenfortsatzes (Fig. 155) beginnt oben abgerundet, weicht aber bald in zwei scharfe Kanten auseinander, welche eine Hohlkehle zwischen sich schliessen, die, je weiter abwärts, um so mehr an Tiefe und Breite zunimmt. Diese Hohlkehle, Thränenfurche, *Sulc. lacrym.*, ist die vordere Hälfte der Thränengrube, *Fossa lacrymal.*; sie schaut nach hinten, jedoch so, dass ihre mediale Kante etwas weiter rückwärts vorspringt als die laterale. Die letztere, *Crista lacrymal. ant.*, ist als vorderer Rand des Sulcus lacry-

Stirn-
fortsatz.

malis frei ¹⁾ und geht, einfach ausgeschweift oder in eine niedrige, platte Zacke erhoben, nach unten in die obere vordere mediale Ecke des Oberkieferkörpers, einerseits also in den Infraorbitalrand, andererseits in die *Incisura lacrymalis* über. Die mediale Kante der Hohlkehle, *Mg. lacrymalis*, setzt sich weiter nach unten auf der Nasenfläche des Oberkieferkörpers fort; oben, so weit sie über den Körper des Oberkiefers hervorragt, stösst sie im Grunde der Thränengrube mit dem vorderen Rande des Thränenbeins zusammen; unten, wo sie, den Schädel im Profil betrachtet, hinter dem medialen Rande der Orbitalfläche des Oberkiefers verschwindet,

Fig. 156.



Transversaldurchschnitt des rechten Oberkieferbeins, dicht unter der oberen Wand. 1. Thränengrube. 2. Kieferhöhle. 3. Can. infraorbitalis.

krümmt sie sich von vornher der Lunula lacrymalis entgegen (Fig. 156) und verbindet sich mit dem vorderen Rande der letzteren entweder direct oder durch Vermittlung eines zwischen beiden emporsteigenden platten Fortsatzes (*Proc. lacrymalis*) der unteren Muschel. Schliesslich läuft sie zum Theil abwärts in die Nasenfläche des Körpers aus, zum Theil biegt sie etwa in der halben Höhe der Apertura pyriformis fast rechtwinklig nach vorn um in eine vor- und wenig abwärts bis

zum vorderen Naseneingange verlaufende Rauigkeit, *Crista turbinalis* ²⁾, an die der vordere Theil des oberen Randes der unteren Muschel sich anheftet (Fig. 155). Auf der äusseren Fläche des Stirnfortsatzes bemerkt man zwischen unbeständigen feinen Gefässfurchen eine bogenförmig vor der *Crista lacrymalis* vom oberen zum unteren Ende derselben verlaufende lineare Rinne, *Sutura longitudinalis imperfecta* Weber, die Spur einer Naht, welche die frühere Abgrenzung eines zweiten vorderen Thränenbeins bezeichnet (Fig. 154).

In dieser Naht kommen mitunter tiefe Gruben und Ernährungslöcher, auch Oeffnungen vor, welche in die Nasenhöhle führen (Schultz, a. a. O. p. 39. Taf. XI. Fig. 1). Rosenmüller (*Partium externarum oculi humani descr. Lips. 1797. p. 17*) sah zweimal den Theil des Stirnfortsatzes, der an der Bildung der Thränengrube Theil hat, abgetrennt, nur durch Harmonie mit dem Oberkieferbein verbunden.

Ziemlich beständig findet sich im unteren, breiteren Theil der Gesichtsfäche des Stirnfortsatzes ein weites Foramen nutritium, welches in einen mehrere Linien langen, in der Dicke des Knochens abwärts verlaufenden Canal führt.

Die innere Fläche des Stirnfortsatzes ist mit zahlreichen, feinen, meist aufwärts verzweigten Gefässfurchen und etwa in der Mitte zwischen der

¹⁾ Der Name *Crista lacrymalis* wird von Manchen der medialen Kante der Hohlkehle oder auch dem ganzen, nach hinten abstehenden Plättchen ertheilt.


²⁾ *Cr. turb. inf. aut.*

Crista turbinalis und dem oberen Rande mit einer stumpfen, der Crista turbinalis parallel verlaufenden Erhabenheit versehen. An diese, die *Crista ethmoidalis* ¹⁾ (Fig. 155), fügt sich der untere Rand der vorderen Spitze des Geruchs-Labyrinths, welcher weiter hinten sich in die mittlere Muschel und den Proc. uncinatus theilt. Von der Fläche über der Crista ethmoidalis trägt der vordere Theil mit den Nasenbeinen zur Bildung der Decke des Nasengewölbes bei; der hintere Theil ist mehr rückwärts gewandt, zuweilen von schwach vorspringenden Leisten in Zellen getheilt, und schliesst mit dem Thränenbein die vorderen Siebbeinzellen.

* Der Processus zygomatico-orbitalis entspringt dreiseitig prismatisch aus der Aussenfläche des Körpers; von den drei Seitenflächen dieses Prisma ist die eine, auf- und medianwärts gerichtet, laterale Wand des Can. infraorbitalis; sie geht in der ganzen Länge dieses Canals aufwärts gerollt aus dem Boden desselben hervor und wölbt sich sogleich wieder medianwärts als Decke über denselben (Fig. 156). Die beiden anderen Flächen convergiren nach unten zu einer stumpfen, concaven, seitwärts stark vorspringenden Kante; sie sind Fortsetzungen, die eine der vorderen, die andere der hinteren Fläche des Oberkieferkörpers, jene vor- und abwärts, diese rück- und abwärts über die Flächen, mit welchen sie zusammenhängen, herübergebogen; die hintere Fläche zugleich auffallend glatt, die vordere öfters mit einer Muskelrauhigkeit gerade über dem For. infraorb. versehen. Die freie Endfläche des kurzen Prisma liegt wegen des starken Vorsprungs der unteren Spitze mehr gegen den Horizont geneigt, als die Fläche des Körpers, welche den Fortsatz trägt; jene ist nach jeder Dimension grösser, als die an dem Oberkieferkörper angewachsene Grundfläche, besonders aber überragt sie die letztere im Querdurchmesser mittelst ihrer lateralen Spitze und mittelst einer Platte, in welche die, dieser Spitze gegenüberliegende Kante sich medianwärts verlängert (Fig. 157). Diese Platte, die ich die *Lamina orbitalis* des Proc. zygomatico-orbitalis nennen werde, ist die

Proc. zygo-
matico-or-
bitalis.

Fig. 157.



Linkes Oberkieferbein; der Proc. zygomatico-orbitalis mittelst eines schrägen, vom Can. infraorbitalis aus seit- und abwärts geführten Schnittes abgetrennt. Po Planum orbitale. Pi Planum infraorbitale. Sna Spina nasalis ant.

Decke des Can. infraorbitalis, erstreckt sich aber, je näher der vorderen Oeffnung desselben, um so weiter medianwärts über ihn hinaus, und nimmt, während sie am hintern Rande papierdünn ist, nach vorn wie an Breite, so auch allmählig an Mächtigkeit zu. Ihre obere Fläche ist in gleichem Ni-

¹⁾ *Crista turbin. sup. Crista transversa.*

veau mit dem Planum orbitale des Oberkieferkörpers; demnach geht der Canal. infraorbitalis, je weiter nach vorn, um so weiter unter dieses Niveau herab und die Distanz zwischen dem Mg. infraorbitalis und dem Foramen infraorbitale wird durch die Dicke des vorderen Randes der Lamina orbitalis bestimmt.

Mit der oben erwähnten Endfläche des Proc. zygomatico-orbitalis hängt die obere Fläche der Lamina orbitalis ununterbrochen zusammen. Zwar ist die obere Fläche des Proc. zygomatico-orbitalis, die Lamina orbitalis mit eingerechnet, deutlich in zwei Felder geschieden, ein seitliches, dreiseitiges, sehr rauhes und zur Seite geneigtes Feld, *Tuberositas zygomatica*, auf welchem das Jochbein ruht, und ein mediales, vierseitiges und glattes, mehr horizontal im Boden der Augenhöhle gelegenes Feld. Allein die Grenze beider Felder, eine in sagittaler Richtung gerade oder lateralwärts convex verlaufende Linie, liegt ganz oder grösstentheils seitwärts vom Canalis infraorbitalis, fällt also noch in das Gebiet des eigentlichen Processus zygomaticus, und zieht sich nur am vorderen Rande zuweilen über das Foramen infraorbitale weg und selbst bis zum medialen Rande der Lamina orbitalis medianwärts hin, in welchem Falle die Lamina orbitalis durch das Jochbein von dem Antheil an der Bildung des Mg. infraorbitalis völlig ausgeschlossen wird.

Wegen der mannigfaltigen Varietäten in der Bildung dieses Randes verweise ich auf die Beschreibung des Jochbeins.


An der hinteren oberen Ecke endet die *Tuberositas zygomatica* mit einer platten, aufwärts ragenden Zacke, *Spina zygomatica*, welche mit ihrem stumpfen, etwas concaven, medialen Rande den unteren Theil der lateralen Begrenzung der Fissura orbitalis inferior abgiebt. An die vordere, rauhe Fläche dieser Zacke legt sich das Jochbein in der Regel so an, dass es über ihr und bis zur Crista zygomatica des Wespenbeins mit einem kleinen Theil seines Randes die Begrenzung der Fissura orbitalis infer. übernimmt; die hintere Fläche der Spina zygomatica (Fig. 154) ist platt und geht in die glatte hintere Fläche des Processus zygomatico-orbitalis und des Oberkieferkörpers über, von welchem letzteren sie indess meistens noch eine Strecke weit durch eine perpendiculäre Furche oder eine Art Einschnitt geschieden ist. Zuweilen läuft der Can. infraorbitalis dicht neben und sogar unter dem Ursprung der Spina zygomat., und die Platte, die den Canal deckt, schliesst sich unmittelbar an diese Spina an; häufiger ist der Boden der Augenhöhle von der Wurzel der Spina zygomatica bis zum Eingang des Can. infraorbitalis eine einfache Platte, und es bleibt sogar der hinterste Theil des Can. infraorbit. ungedeckt, eine offene, oder nur unvollständig vom lateralen Rande her überwölbte Rinne. Erst in einiger Entfernung vom Eingang, zuweilen erst in der Hälfte seiner Länge erhält er eine vollständige Decke durch die Lamina orbitalis, welche oben glatt, unten, entsprechend der Furche der oberen Fläche des Oberkieferkörpers rinnenförmig ausgehöhlt und gegen den Oberkieferkörper durch eine unregelmässig wellenförmige oder zackige Spalte, die obenerwähnte *Sutura infraorbitalis*, abgesetzt ist, die früh obliteriren, sich aber auch noch in hohem Alter ganz oder theilweise wegsam erhalten kann. Bleibt sie wegsam, so geht die im Boden der Augenhöhle befindliche Naht in die S. 157 beschrie-

bene, vom Foramen infraorbitale zum Mg. infraorbitalis aufsteigende Naht über. Der Abstand des Foramen infraorb. vom unteren Augenhöhlenrande längs dieser Naht giebt ein Maass der Höhe oder Mächtigkeit, welche die Lamina orbitalis des Proc. zygomatico-orbitalis am vorderen Rande erreicht, jedoch kein vollständiges. Denn es ragt von diesem Rande medianwärts neben dem Foram. infraorbitale ein platter, mitunter spitzer und bis 3mm langer Zahn (Fig. 157*) nach unten, der zwischen zwei Lamellen der Vorderwand des Oberkieferkörpers wie in einer Tasche aufgenommen und demnach von der einen dieser Lamellen von vornher bedeckt wird ¹⁾.

Var. Vom medialen Rande der Spina zygomatica geht abwärts zum Rande des Oberkieferkörpers eine platte Brücke. Es entsteht dadurch ein Loch nach vorn und unten von dem lateralen Ende der Fissura orbitalis inferior, durch welches eine erst innerhalb der Augenhöhle von der A. infraorbitalis abgehende Alveolaris oder Buccinatoria wieder aus der Augenhöhle austritt. Die untere Spitze des Pr. zygomatico-orbital. ragt zuweilen lateralwärts weit über den Wangenhöcker hinaus und vertritt demnach einen Theil des unteren Randes des Jochbeins. In einem von Dietrich (a. a. O. S. 10. Fig. 4) beschriebenen Falle setzte sich diese Spitze längs dem ganzen unteren Rand des Jochbeins bis an den Jochfortsatz des Schläfenbeins fort.

Der Zahnfortsatz zeigt auf der unteren freien Fläche, welche man auch den Zahnrand, *Margo dentalis* ²⁾, nennt, die weiten Mündungen von acht tiefen, sich trichterförmig verjüngenden, von dünnen Rändern eingefassten und durch dünne Scheidewände von einander getrennten Gruben (Fig. 158). Diese Gruben, *Alveoli*, dienen zur Aufnahme der Zahn-

Zahn-
fortsatz.



Oberkieferbeine von unten.

wurzeln; gleich den Zähnen nehmen sie im Allgemeinen von vorn nach hinten an Umfang zu; die fünf hinteren, für die Backzähne, sind in der Tiefe mehrfächerig und häufig im Grunde, gegen die Kieferhöhle hin, durchbrochen; in den übrigen enthält der Grund je eine feine Oeffnung oder mehrere, dicht neben einander, durch welche die Zahnerven und Gefässe zur Spitze der Zahnwurzel treten. Von den Scheidewänden steht die

vorderste der Medianebene fast parallel; die hintersten stehen parallel der Frontalebene und die zweite und dritte oder nur die zweite haben eine schräge, den Uebergang vermittelnde Stellung. Auf der äusseren oder Gesichtsfläche des Zahnfortsatzes erkennt man perpendiculäre, den Zahnfächern entsprechende Erhabenheiten ³⁾; seine innere Fläche ist rau, po-

¹⁾ Um diese eigenthümliche Anordnung zu sehen, muss man an einem Oberkieferbein, an welchem die Sutura infraorbitalis wegsam ist, ein feines Uhrfedersägeblatt in den Infraorbitalcanal einführen und den Proc. zygomatico-orbit. durch einen schräg ab- und seitwärts geführten Schnitt vom Körper trennen. Der beschriebene zahnartige Fortsatz lässt sich alsdann mit Leichtigkeit aus seiner Tasche herausheben.

²⁾ *Mg. alveolaris.* ³⁾ *Juga alveolaria.*

rös; hinten, wo sie direct in die Nasenfläche des Körpers sich fortsetzt und an der Bildung der rauhen Fläche, an die das Gaumenbein sich anlegt, Theil nimmt, steht sie perpendiculär; sie erhält aber, je weiter nach vorn, um so mehr die Neigung nach unten, um sanft in die untere Fläche des Gaumenfortsatzes überzugehen. Als Grenzmarke zwischen beiden Fortsätzen findet sich regelmässig am medialen Rande der unteren Fläche und in geringer Entfernung (8^{mm}) vom Zahnrande ein halbkreisförmiger Ausschnitt, *Incisura incisiva*, der sich mit dem entsprechenden Ausschnitt des Knochens der anderen Seite zu einer in der mediansagittalen Naht der beiden Oberkieferbeine gelegenen, unpaaren Oeffnung, *Foramen incisivum* ¹⁾, verbindet; sodann, an jüngeren Schädeln beständig, aber auch an älteren häufig, vom hinteren Rande dieser Oeffnung ausgehend, eine feine Naht oder Furche, *Sutura incisiva*, welche dem Zahnrande parallel seit- und rückwärts läuft und etwa der Scheidewand der Alveolen des dritten und vierten Zahns gegenüber endet. Seltener erhält sich im Erwachsenen die Spur eines noch beim Neugeborenen normalen Theils dieser Naht, welcher von dem eben bezeichneten Ende vorwärts zur Scheidewand der Alveolen des zweiten und dritten Zahns geht.

Die obere Fläche des Zahnfortsatzes, so weit sie am Boden der Nasenhöhle frei liegt, ist glatt, etwas nach hinten abhängig und von einer Seite zur anderen ausgehöhlt, indem sie am lateralen Rande ausgerundet in die Nasenfläche des Körpers, und am medialen Rande ebenso auf einen aufwärts vorspringenden und mitunter selbst seitwärts übergebogenen Kamm, *Semicrista incisiva* ²⁾, sich fortsetzt. Auf dieser Fläche liegt an der Grenze zwischen dem Zahn- und Gaumenfortsatz dicht an der *Semicrista incisiva* eine runde Oeffnung, *Apertura sup. Can. incisivi*, und auch von dieser sieht man, wiewohl seltener als an der unteren Fläche, die *Sutura incisiva* in Form einer Rinne oder eines feinen Spalts quer herüber und zuweilen noch an der medialen Wand des Körpers eine Strecke weit hinaufgehen (Fig. 155). An der lateralen Wand des *Can. incisivus*, auf welchen ich sogleich zurückkomme, verläuft eine perpendiculäre Rinne, welche die medialen Enden der *Sutura incisiva* der unteren und oberen Fläche des knöchernen Gaumens mit einander verbindet, zuweilen auch bis zu einer geringen Tiefe als verticaler Spalt in den Knochen eindringt.


Die mediale Fläche des Zahnfortsatzes, welche sich in einer Flucht vom unteren Rande dieses Fortsatzes bis zum oberen Rande der *Semicrista nasalis* erstreckt, ist rauh, von dünnen Blättern der Höhe nach durchzogen, mittelst welcher die Fortsätze von beiden Seiten in einander greifen. Dicht unter dieser Fläche verläuft der *Can. incisivus*, von der oberen Mündung an ab- und etwas vorwärts, nur von einem dünnen Plättchen medianwärts gedeckt, welches den unteren Rand der Fläche nicht erreicht und meistens an dem einen Oberkieferbein höher oben endet als an dem anderen. An dem einzelnen Oberkiefer ist der *Can. incisivus* von der Stelle an, wo dieses Plättchen endet, eine medianwärts offene Furche; liegen die

¹⁾ *F. palatinum anterius*.

²⁾ So nenne ich die jedem Knochen zugehörige Hälfte der durch Vereinigung beider Knochen entstehenden *Crista incisiva* (*nasalis* aut.).

Oberkieferbeine in ihrer natürlichen Verbindung an einander, so vereinigen sich diese beiden Furchen zu dem unteren, einfachen Theil des Can.

Fig. 159.



Frontaldurchschnitt des Gaumens zwischen den Eckzähnen. Sm. Sinus maxillaris.

incisivus und die Plättchen zu der medianen Scheidewand, welche den Canal nach oben in einen rechten und linken Arm trennt (Fig. 159). Die Semicristae beider Oberkiefer bilden, zusammenstehend, die mediane *Crista incisiva*; ihre divergirenden oberen Ränder tragen den unteren Rand des Knorpels der Nasenscheidewand. An den hinteren steil abfallenden Rand der *Crista incisiva* stösst die vordere, untere Ecke des Pflugscharbeins; vorn, gegen den Naseneingang, senkt sich die Semicrista sanft zum Boden der Nasenhöhle herab und ragt über denselben vor in Form einer spitzen dreikantigen Zacke, auf welche die mediale und die obere Fläche des Proc. alveolaris gerade und die Gesichtsfläche seit- und abwärts umgebogen übergehen. Beide Zacken, mit den medialen Flächen zusammengefügt, bilden den vorderen Nasenstachel, *Spina nasalis ant.* (Fig. 157).

Der hintere Rand des Zalinfortsatzes ist eine Wölbung, mittelst welcher die äussere und innere Fläche dieses Fortsatzes abgerundet in einander übergehen. Auf diese Wölbung setzt sich die Rauigkeit des Oberkieferkörpers, welche zur Befestigung des Gaumenbeins bestimmt ist, mehr oder minder weit abwärts fort und es bleibt demnach unterhalb der Anheftung des Gaumenbeins ein höherer oder niedrigerer Theil des hinteren Randes frei; derselbe ist durch Muskelansätze uneben.

Rosenmüller (*Diss. de singularibus et nativis ossium c. h. varietatibus*, Lips. 1804, p. 14) giebt die Beschreibung und Abbildung eines Falls, wo die *Sutura incisiva* sich an der medialen Wand des Oberkieferkörpers und weiter an dem Stirnfortsatz hinaufzieht, an dem letzteren als eine, auch auf der Gesichtsfläche desselben sichtbare Spalte. So weit die Spalte auf der Gesichtsfläche des Stirnfortsatzes verläuft, hat sie die nämliche Richtung, wie die oben erwähnte Spur der Abtrennung eines vorderen Thränenbeins.

Der Can. incisivus ist von sehr wechselnder Weite; die mediale Scheidewand desselben endet bald hoch oben, bald reicht sie bis zur unteren Mündung; die Zahl der Mündungen kann sich auf mehrfache Weise vervielfältigen. Scarpa (*Anatom. annotat. Lib. II. p. 75*) schildert als normale Form diejenige, wo vor und hinter der Scheidewand der eigentlichen Cann. incisivi und in der sagittalen Gaumennaht je ein unpaares Canälchen liege, beide feiner, als die Cann. incisivi, das vordere noch feiner als das hintere. Sie seien insbesondere zur Aufnahme der Nn. nasopalatini bestimmt, und zwar in der Regel das vordere Canälchen zur Aufnahme des linken, das hintere des rechten Nerven. Unter 46 ohne Wahl untersuchten Fällen habe ich 16 Mal den Can. incisivus so getroffen, wie er oben beschrieben wurde, unten einfach und oben durch eine mediane Scheidewand getheilt, häufig jedoch die linke und rechte Abtheilung von verschiedener Weite. Einmal war der obere Theil des Canals unwegsam, von den Eingängen am Boden der Nasenhöhle war nichts zu sehen; am Gaumen fand sich eine, in zwei blinde Löcher führende Grube. In den übrigen Fällen war die Gaumenmündung des Can. incisivus in drei oder vier, einmal in fünf Oeffnungen getheilt. Am häufigsten (17 Mal) bestand in der Mitte vor

den beiden regelmässigen Canälen ein unpaarer, medianer, auf die Nasenscheidewand stossender und demnach blinder Gang, der einem Ernährungsgefäss diene. Seltener (3 Mal) kam ein solcher Gang hinter den Mündungen des Can. incisivus vor. In anderen Fällen verdreifachte sich die Gaumenmündung durch eine frontal oder sagittal gestellte Scheidewand des einen der beiden regelmässigen Canäle und zwar bald des rechten, bald des linken. Vier Gaumenöffnungen entstehen entweder durch eine derartige Theilung beider Canäle oder durch Theilung des einen bei gleichzeitiger Anwesenheit eines blinden Ernährungsloches. Oft stehen die Gaumenmündungen symmetrisch im Dreieck oder im Kreuz, indess die Canäle unsymmetrisch, zwei in die eine, einer in die andere Nasenhöhle führen.

Gaumen-
fortsatz.

Der Gaumenfortsatz (Fig. 158) ist am vorderen Rande auf die angegebene Weise vom Zahnfortsatz geschieden, am hinteren, quer oder unregelmässig wellenförmig verlaufenden Rande auf Kosten der oberen Fläche schräg zugespitzt und mit der horizontalen Platte des Gaumenbeins in einer Art Schuppennaht, *Sutura palatina transversa*, verbunden. Seine obere Fläche ist glatt und gleich der oberen Fläche des Zahnfortsatzes, deren Fortsetzung sie ist, von einer Seite zur anderen ausgehöhlt; doch ist der mediale Rand der oberen Fläche des Gaumenfortsatzes nur wenig aufgeworfen und die mediale Fläche dieses Fortsatzes fast um die Höhe der Crista incisiva niedriger als die mediale Fläche des Zahnfortsatzes, mit welcher sie den blätterigen Bau gemein hat. Die Plattenform des Processus palatinus erlaubt, diese mediale Fläche auch als verdickten, medialen Rand zu betrachten. Die Naht, in welcher die medialen Flächen oder Ränder von beiden Seiten zusammenkommen, ein Theil der *Sutura palatina sagittalis*, bildet gegen die Nasenhöhle einen höheren oder niederen, öfters zweilippigen Vorsprung, *Crista nasalis*, auf welchem der vordere Theil des unteren Randes der Pflugschar ruht. Die untere Fläche des Gaumenfortsatzes ist rauh, von vielen Ernährungslöchern durchbohrt, und öfters mit einer in sagittaler Richtung etwas geschlängelt und näher dem lateralen als dem medialen Rande verlaufenden, nach vorn sich verlierenden seichten Furche versehen, an welcher, besonders im hinteren Theil, bald median-, bald lateralwärts niedere Kämme oder Spitzen vorragen. In dieser Furche liegen die Vasa und N. pterygo-palatina.

Das Oberkieferbein des Neugeborenen fällt durch seine verhältnissmässig geringe Höhe auf, bedingt durch die mangelhafte Entwicklung des Zahnfortsatzes, der um diese Zeit nur die Kronen der Zähne, später die viel längeren Wurzeln derselben einschliesst. Die Kieferhöhle ist besonders im verticalen und transversalen Durchmesser sehr seicht; ihr Boden liegt in gleicher Höhe mit dem unteren Rande des Hiatus maxillaris; ihre Decke reicht lateralwärts noch nicht bis zum Boden des Can. infraorbitalis. Von den Vorragungen an der Vorderfläche des Kiefers, welche den Alveolen entsprechen, ist besonders die des dritten Zahns deutlich und stark gewölbt. Die *Sutura infraorbitalis* ist zur Zeit der Geburt eine wegsame Spalte; dem Fortsatz, welcher sich vom Proc. zygomatico-orbitalis über den Sulcus infraorbitalis des Oberkieferkörpers medianwärts herüberlegt, um mit seinem unteren Rande den oberen Rand des Foramen infraorbitale zu bilden, begegnet ein lateralwärts vorragender, schräg abgestutzter Fortsatz des Körpers anfänglich in einer einfachen, ab- und medianwärts verlaufenden Naht, bald aber wächst an der Vorderfläche vom Rande des letzteren Fortsatzes eine dünne Platte über den Rand des ersteren lateralwärts hinaus. Die Spur der Verbindung beider Fortsätze ist auf der Gesichtsfläche des Kiefers nicht selten schon im ersten Lebensjahre verwischt; auf der Orbitalfläche erhält sie sich länger.

Die Sutura incisiva ist beim Neugeborenen sowohl an der Gaumen- wie an der Nasenfläche sehr deutlich; der Can. incisivus ist medianwärts offen; die Wand, die später den oberen Theil desselben nach dieser Seite schliesst, entsteht aus dünnen und niedrigen Plättchen, welche vom vorderen Rande der Furche rückwärts, vom hinteren Rande vorwärts wachsen.

In der Incisura lacrymalis des Oberkieferbeins und auf dem unterhalb derselben gelegenen Theil der medialen Fläche, welche die seitliche Wand des Thränencanals ausmacht, bildet sich häufig ein besonderes Knöchelchen, zuerst von Rousseau (*Ann. des sc. natur.* T. XVII. 1829. p. 86. pl. 5 A) unter dem Namen *Os lacrymale ext.* oder *unguis minor*, dann von Gruber (*Bulletin physico-mathématique de l'académie des sciences de Petersbourg.* T. VIII. 1850. Nro. 13) unter dem Namen eines *Os canalis naso-lacrymalis* beschrieben. Es besteht im vollkommensten Zustand aus zwei, unter einem rechten Winkel verbundenen, dünnen Plättchen, von welchen das eine horizontal am Boden der Augenhöhle, an der Grenze zwischen dem Körper und dem Stirnfortsatz des Oberkieferbeins liegt; das andere, verticale, in den Thränencanal mehr oder minder weit hinabragt, mit quer abgestutztem oder lancettförmig zugespitztem Ende. Die Mächtigkeit beider Plättchen ist verschieden; meistens liegen sie papierdünn und flach auf den Wänden des Oberkieferbeins, öfters sind sie mit convexen und rauhen, selbst zackigen Flächen in Vertiefungen des Oberkiefers eingesenkt; nur ein Mal sah ich das *Os lacrymale ext.* in eine entsprechende Lücke des Oberkiefers eingelassen, so dass die Naht nicht nur auf der Orbital- und Nasenfläche, sondern auch von der Kieferhöhle aus sichtbar war. Die horizontale Platte, mehr oder minder weit lateralwärts und zuweilen auch über den Infraorbitalrand ins Gesicht vorragend mit zackigem oder abgerundetem Rande, verhält sich zur verticalen wie der einseitige und platt geschlagene Kopf eines Nagels. Die Kante, in welcher das horizontale und verticale Plättchen zusammenstossen, kann, gleich der Incisura lacrymalis selbst, einen Theil des oberen Randes des Thränencanals bilden, oder sie wird von diesem Rande abgedrängt durch den Hamulus lacrymalis, der sich mit seinem unteren Rande an jene Kante anlegt, oder durch einen dem Hamulus lacrymalis entgegenkommenden Fortsatz des Stirnfortsatzes des Oberkiefers oder durch beide. Im letzteren Fall (dem von Rousseau abgebildeten) liegt die horizontale Platte wie ein Nahtknochen im Boden der Augenhöhle lateralwärts vom Eingang des Thränencanals. Die horizontale Platte kann fehlen oder auf einen schmalen Saum reducirt sein, mit welchem das verticale Plättchen gleichsam am Rande des Thränencanals aufgehängt ist.

Das äussere Thränenbein verwächst im reiferen Alter mit dem Oberkiefer, seltener mit dem eigentlichen Thränenbein. Es scheint sich erst längere Zeit nach der Geburt zu entwickeln. In Kinderschädeln geht vom Rande der Incisura lacrymalis eine sagittale Spalte tief abwärts zwischen die Knochenlamellen, welche die mediale Wand des Oberkiefers bilden, eine Spalte, wodurch die innere, die Lunula lacrymalis tragende Lamelle eine Strecke weit vom übrigen Knochen abgelöst erscheint. Vielleicht hat Gruber diese Lamelle mit dem äusseren Thränenbein verwechselt, wenn er behauptet, das letztere schon bei 6- und 7monatlichen Embryonen gesehen zu haben.

Fallen im höheren Alter die Zähne aus, so schwinden die Alveolen theils durch Ausfüllung mit Knochensubstanz, theils durch Abnutzung.

8. Gaumenbein, *Os palatinum*.


Das Gaumenbein besteht aus zwei dünnen, vierseitigen, im rechten Winkel zusammengefüigten Platten, von welchen die eine, horizontale, *Pars horizontalis* ¹⁾, den hinteren Theil des Gaumengewölbes bildet, die andere, verticale, *Pars perpendicularis* ²⁾, vom lateralen Rande der

8. Gaumen-
bein,

¹⁾ *P. palatina.* ²⁾ *P. nasalis.* *P. ascendens.*

horizontalen an, längs der Nasenfläche der medialen Wand des Oberkiefers aufsteigt. Von der hinteren Ecke der Kante, in welcher die horizontale

Fig. 160.




und verticale Platte zusammenstossen, geht rückwärts der *Proc. pyramidalis* ab und legt sich in die Incisura pterygoidea (des Gaumenflügels des Wespenbeins). Nach oben, etwas unter dem Niveau des Bodens der Augenhöhle, theilt sich die perpendiculäre Platte des Gaumenbeins mittelst eines tiefen, fast kreisförmigen Ausschnittes, *Incisura palatina*, in einen vorderen und einen hinteren Fortsatz. Jener, der *Processus orbitalis*, liegt auf dem Trigonum palatinum des Oberkiefers; dieser, *Processus sphenoidalis*, setzt sich mit dem Körper des Wespenbeins in Verbindung.

Die beiden Flächen der horizontalen Platte des Gaumenbeins sind Fortsetzungen der Flächen des Gaumenfortsatzes des Oberkieferbeins: die obere gehört dem Boden der Nasenhöhle an und ist wie die Fläche des Gaumenfortsatzes, als deren Verlängerung sie erscheint, glatt und von einer Seite zur anderen ausgehöhlt; die untere oder Gaumenfläche ist ebener

und glatter als die Gaumenfläche des Gaumenfortsatzes und nur längs dem Seitenrande vertieft von einer an der hinteren lateralen Ecke befindlichen ovalen und mit dem längsten Durchmesser in sagittaler Richtung gestellten, seitwärts nicht immer ganz geschlossenen Oeffnung an, dem *Foramen pterygopalatinum* (Fig. 161), auf welches ich zurückkomme. Die Vertiefung ist der Anfang der Furche für die Vasa und N. pterygo-palatina, deren bei Beschreibung des Gaumenfortsatzes des Oberkiefers gedacht wurde. Der vordere Rand der horizontalen Platte ist mit dem hinteren Rande des Gaumenfortsatzes des Oberkiefers in der schon bei diesem Knochen beschriebenen queren Gaumennaht vereinigt; der hintere Rand der horizontalen Platte ist concav, am medialen Theile scharf, am lateralen Theile in einen abwärts ragenden Kamm umgebogen, welcher quer hinter dem erwähnten For.

Fig. 161.



Rechtes Gaumenbein von unten.

pterygo-palatinum auf den Proc. pyramidalis übergeht und die hintere Wand einer niederen trichterförmigen Höhle bildet, in deren Spitze jene Oeffnung sich befindet. Mit dem verdickten und besonders nach oben aufgeworfenen medialen Rande liegt die Pars horizont. in der sagittalen Gaumennaht, setzt in der Nasenhöhle die Crista nasalis der Gaumenfortsätze des Oberkieferbeins fort und stützt so den hinteren Theil des unteren Randes der Pflugschar; mit dem lateralen Rande biegt sie in den perpendiculären Theil und zunächst in die mediale Wand des Canalis pterygo-palatinus um. Die Spitze, in welcher der concave hintere Rand mit dem lateralen zusammenstösst, setzt sich in den Proc. pyramidalis fort; die Spitze an der vom medialen und hinteren Rande gebildeten Ecke tritt

übergeht und die hintere Wand einer niederen trichterförmigen Höhle bildet, in deren Spitze jene Oeffnung sich befindet. Mit dem verdickten und besonders nach oben aufgeworfenen medialen Rande liegt die Pars horizont. in der sagittalen Gaumennaht, setzt in der Nasenhöhle die Crista nasalis der Gaumenfortsätze des Oberkieferbeins fort und stützt so den hinteren Theil des unteren Randes der Pflugschar; mit dem lateralen Rande biegt sie in den perpendiculären Theil und zunächst in die mediale Wand des Canalis pterygo-palatinus um. Die Spitze, in welcher der concave hintere Rand mit dem lateralen zusammenstösst, setzt sich in den Proc. pyramidalis fort; die Spitze an der vom medialen und hinteren Rande gebildeten Ecke tritt


mit der entsprechenden des gleichnamigen Knochens der anderen Seite zu der platten und meist abgerundeten *Spina nasalis post.* zusammen.

Die perpendiculäre, mit dem oberen Ende rückwärts geneigte Platte des Gaumenbeins deckt den hinteren Theil der medialen Wand des Oberkiefers dergestalt, dass sie nach hinten diesen Knochen in sagittaler

Perpendi-
culäre
Platte.

Richtung, je näher dem oberen Rande, um so weiter überragt und sich in der Regel auch nach vorn über den Hiatus maxillaris hinaus erstreckt. Ihr hinterer Rand legt sich an den vorderen Rand des Gaumenflügels des Wespenbeins und deckt ihn von der Nasenseite her; ihr vorderer Rand ist sehr dünn und uneben; nicht selten sendet er etwa von der Mitte seiner Höhe einen platten, ebenfalls sehr dünnen Fortsatz, Nasenfortsatz, *Proc. nasalis*, nach vorn, der sich mit dem unteren Rande an den unteren Rand des Hiatus maxillaris fügt, mit der vorderen abgerundeten Spitze den vorderen Rand dieser Lücke erreicht und so, von unten auf, einen Theil derselben schliesst.

Fig. 162.



Rechtes Gaumenbein, mediale Fläche.

Die Verbindung des Fortsatzes mit der betreffenden Wand des Oberkiefers geschieht entweder in einfacher oder schuppenförmiger Naht und im letzteren Fall häufig so, dass die Spitze des Fortsatzes auf die laterale Fläche der Oberkieferwand tritt, dieselbe also nach der Kieferhöhlenseite eine Strecke weit bedeckt. Vergl. Schultz, a. a. O. p. 51.

Die mediale Fläche der perpendiculären Platte des Gaumenbeins (Fig. 162) hat zwei parallele, sagittale, mit der hinteren Spitze wenig abwärts geneigte Firsten, die Eine etwa in der Mitte ihrer Höhe, die andere am oberen Ende unmittelbar unter oder etwas über dem Ausschnitt, welcher den *Proc. orbitalis* und *sphenoidalis* trennt. Die untere Firste, *Crista turbinalis*¹⁾, dient, wie die gleichnamige Firste des Oberkieferbeins, der unteren Muschel zur Befestigung; mit der oberen Firste, *Crista ethmoidalis*²⁾, welche meist nur im vorderen Theil des Knochens deutlich ist, verbindet sich der laterale Rand der Siebbeinplatte, welche die hinteren Zellen des Labyrinths von unten schliesst und sich medianwärts in die mittlere Muschel fortsetzt.


Die laterale Fläche der perpendiculären Platte (Fig. 163) ist in vier perpendiculäre Felder oder Streifen getheilt. Das hinterste Feld ist von unbeständiger Breite, nicht selten auf einen schmalen Saum reducirt, mässig rauh, an die mediale Fläche der Gaumenflügel gefügt. Das zweite Feld, von hinten an gerechnet, ist glatt, und im oberen Theile, wo es die mediale Wand der Fossa sphenomaxillaris darstellt, flach; abwärts wandelt es sich in eine Furche, *Sulcus pterygopalatinus* um, welche seicht beginnt und

¹⁾ *Cr. turbin. inf. aut.*

²⁾ *Cr. turbin. sup. aut.*

nach unten dadurch an Tiefe zunimmt, dass sich vom vorderen und hinteren Rande Kämme ¹⁾ erheben, und je weiter nach unten, um so weiter einander entgegen über die Furche herüberbiegen, zuweilen bis zur wirklichen Vereinigung, ja bis zur Verschmelzung über derselben. Beide Kämme sind an ihrer medialen, dem Sulcus pterygo-palatinus zugekehrten Fläche glatt, an ihrer lateralen Fläche rau, und es setzt sich die Rauigkeit des hinteren

Fig. 163.



Linkes Gaumenbein, laterale Fläche.

ren Kammes auf die laterale Fläche des Processus pyramidalis, die Rauigkeit des vorderen Kammes auf das dritte Feld der perpendicularen Platte fort. Indem sich sodann diese rauhe Fläche, sowie die rauhe Fläche des Processus pyramidalis an die entsprechenden Rauigkeiten des Oberkieferkörpers anlegen, fügen sich die zwischen den Rauigkeiten befindlichen Rinnen, der Sulcus pterygo-palatinus des Oberkiefers und des Gaumenbeins, zum *Canalis pterygo-palatinus* an einander. Je näher der unteren Oeffnung, um so grösser wird der Antheil, welchen das Gaumenbein an der Bildung des Canals nimmt; die untere sagittal-ovale Oeffnung selbst, das For. pterygo-palatinum, ist zu seinem grössten Theil und, wenn die

perpendicularen Kämme unten zusammentreten, ringsum vom Gaumenbein eingefasst; eine feine Naht, Fortsetzung der queren Gaumen-naht, läuft im letzteren Falle an der lateralen Seite desselben hin. Höher oder tiefer im Sulcus pterygo-palatinus findet man zwei Löcher (selten drei oder vier, noch seltener nur ein einziges), welche in Zweigcanäle des Can. pterygo-palatinus, die unter spitzen Winkeln abwärts abgehenden *Canales palatini posteriores* führen.

Var. Zuweilen öffnet sich in den Can. pterygo-palatinus ein Canälchen, welches die perpendicularen Platte in schräg von der medialen zur lateralen Fläche absteigender Richtung durchsetzt. Auch gerade nach vorn in die horizontale Platte des Gaumenbeins tritt ein Canälchen aus dem Can. pterygo-palatinus ein.

Das vorderste Feld der perpendicularen Platte, von sehr wechselnder Form und Ausdehnung, ist glatt, schaut in die Kieferhöhle und setzt sich in die laterale Fläche des Nasenfortsatzes, wenn ein solcher vorhanden ist, ohne Unterbrechung fort.


Proc. pyramidalis.

Der *Pr. pyramidalis* sitzt in Form eines Steuerruders am hinteren Rande der perpendicularen Platte, ein rechtwinkeliges Dreieck, die Eine Kathete mit diesem Rand verwachsen, die andere in der Flucht des unteren Randes der perpendicularen Platte, die schwach ausgehöhlte Hypothense rück- und aufwärts gerichtet. Der Fortsatz entspringt dünn von der perpendicularen Platte, verdickt sich aber gegen die freien Ränder und zwar vorzugsweise nach der lateralen Fläche hin, so dass diese Fläche von der lateralen Fläche der perpendicularen Platte unter einem stumpfen Winkel

¹⁾ *Crista longitudinalis ant. und post.*

lateralwärts abweicht (Fig. 160. 161). Die Verdickung beginnt mit dem den

Fig. 164.



Gaumen nebst den die Choanen begrenzenden Knochen von unten. Ppt. Processus pterygoidei.

von einer tiefen und rauhen Rinne (Fig. 160—162*) eingenommen, welche den vorderen Rand der medialen Platte des Gaumenflügels des Wespenbeins umfasst. An diese Rinne stösst, schon dem hinteren Rande des Proc. pyramidalis angehörig, die glatte, ausgehöhlte, dreiseitig spitzwinkelige und mit der Spitze nach oben gerichtete Fläche, welche in der Fissura pterygoidea zwischen den auseinanderweichenden Platten des Gaumenflügels im Grunde der Fossa pterygoidea zum Vorschein kommt (ebend. **). Weiter seitwärts folgt die rauhe Rinne, in welche der vordere Rand der lateralen Platte des Wespenbeinflügels eingefügt ist (160. 161. 163. ***). Die oben erwähnten Canales palatini post., welche, vom Sulcus pterygo-palatinus aus, in der Dicke des Proc. pyramidalis abwärts laufen, münden in der Regel mit zwei Oeffnungen, *Foramina palatina posteriora*, neben einander auf dem unteren, wulstigen Rand dieses Fortsatzes, auf und hinter dem Kamme, der in transversaler Richtung hinter dem Foramen pterygo-palatinum verläuft.

Grösse, Zahl und Form dieser Canäle und Löcher sind veränderlich. Zuweilen wird der am meisten seitlich gelegene Can. palatinus post. gleich dem Can. pterygo-palatinus von Rinnen des Gaumen- und Oberkieferbeins zusammengesetzt.

Von den beiden vom oberen Ende der perpendicularen Platte ausgehenden Fortsätzen ist der vordere seitwärts gekrümmt, um auf dem Körper des Oberkiefers zu ruhen, der hintere im Bogen medianwärts gerichtet, um längs der medialen Wurzel des Gaumenflügels sich an die untere Fläche des Wespenbeinkörpers anzulegen (Fig. 160. 164).


Der Proc. orbitalis ist eine dreiseitige hohle Pyramide, die Spitze seit- und vorwärts, die der Grundfläche entsprechende Seite median- und etwas rückwärts gewandt; die Stelle der Grundfläche nimmt ganz oder grösstentheils eine weite Oeffnung ein, die in die trichterförmige Höhlung

Sulcus pterygo-palatinus von hinten her begrenzenden Kamme; mit der bereits erwähnten, vom Rande dieses Kammes auf die laterale Fläche des Proc. pyramidalis sich erstreckenden Rauhhigkeit legt sie sich an die rauhen Stellen der medialen Wand und des hinteren Randes des Körpers und des Zahnfortsatzes des Oberkiefers an; weiter rückwärts ragt ein kleiner glatter Theil dieser Fläche (Fig. 163. 164 p) frei über den hinteren Rand des Oberkiefers nach hinten. Die mediale Fläche des Proc. pyramidalis ist fast ganz

Proc.
orbitalis.

der Pyramide führt (Fig. 162); der Rand der Oeffnung liegt in gleicher

Fig. 165.



Linkes Gaumenbein von der Seite, im Zusammenhang mit dem Sieb- und Wespenbein. † Schnittfläche der Augenhöhlenplatte des Stirnbeins. †† Durchschnittenen Wurzeln des Temporalflügels. Lpa. Lamina papyracea. Pu. Proc. uncinatus des Siebbeins.

Flucht mit dem hinteren oberen zelligen Theil der Nasenfläche des Oberkiefers und verbindet sich mit dem Rande der Siebbeinzelle, welche der Proc. orbitalis von der Seite her zu schliessen bestimmt ist. Was von der Grundfläche des Proc. orbitalis hinter dieser Oeffnung übrig bleibt, legt sich vor die laterale untere Ecke der vorderen Wand des Wespenbeinkörpers und trägt, wenn diese Wand unvollständig ist, zur Schliessung der Wespenbeinhöhle bei. Von den drei in der Spitze der Pyramide zusammenstossenden, dreiseitigen Seitenflächen ist die Eine, vor- und abwärts geneigt, mit dem Trigonum palatinum des Oberkieferkörpers verbunden; die zweite, horizontale, nimmt in der Höhe der Orbitalfläche des Oberkiefers die hintere mediale Ecke des Bodens der Augenhöhle ein; sie stösst an ihrem medialen Rande in einer Naht zusammen mit dem hinteren

Theil des unteren Randes der Papierplatte des Siebbeins und reicht eine kurze (zuweilen eine längere) Strecke weit zwischen dem hinteren Rande der Papierplatte und dem vorderen Rande des Wespenbeinkörpers an der medialen Wand der Augenhöhle empor. Die dritte Fläche steht, an die Infratemporalfläche des Oberkiefers sich anschliessend, perpendicular und macht den oberen Theil der vorderen Wand der Fossa sphenomaxillaris aus. Diese Fläche ist von oben nach unten ausgehöhlt und bildet so den Anfang der Rinne, die auf der Infratemporalfläche des Oberkiefers weiter zum Can. infraorbitalis führt; sie ist ferner von einer Seite zur andern concav und wendet sich mit dem medialen Rande rückwärts, um sich an die laterale Fläche des Wespenbeinkörpers anzuschliessen. Die Kante zwischen den beiden letztgenannten Flächen (Fig. 165 k) ist der hinterste Theil des unteren Randes der Fissura orbitalis inf.

Der Orbitalfortsatz des Gaumenbeins ersetzt demnach genau die Ecke, welche an der Vereinigungsstelle der Orbital-, Nasal- und Infratemporalfläche dem Oberkiefer fehlt und verliert in dem Maasse an Umfang, als der Oberkiefer nach dieser Seite hin vollständiger wird. Andererseits wechselt die Ausdehnung des Orbitalfortsatzes gegen das Siebbein, indem die von beiden Knochentheilen gemeinschaftlich gebildeten Zellen zum grösseren Theile bald dem einen, bald dem anderen angehören. So findet sich der Orbitalfortsatz bald auf ein flaches, gegen das Siebbein nur leicht ausgehöhlt Plättchen reducirt, bald zu einem tiefen Trichter mit einem von flachen Zellen umgebenen Eingang verlängert.

Var. Der Orbitalfortsatz des Gaumenbeins reicht dem hinteren Rande der Papierplatte des Siebbeins entlang und vor dem vorderen Rande des Wespenbeinkörpers bis zum Stirnbein hinauf (Gruber, Abb. S. 4). Die Zelle des Orbitalfortsatzes ist gegen das Siebbein geschlossen und öffnet sich dagegen in die Kieferhöhle (M. J. Weber).

Der Proc. sphenoidalis ist ein kleines, medianwärts gebogenes und zugleich rückwärts gelehntes Plättchen, mit sagittal abgestutztem Rande. Dieser Rand ist breit und abgeplattet, oder scharf, und unter der unteren Wand des Wespenbeinkörpers so herübergebogen (Fig. 164), dass er den vorderen seitlichen Theil dieser Wand verstärkt oder, vor dem Processus vaginalis der medialen Wurzel des Gaumenflügels, den vordersten Theil des Falzes zur Aufnahme des oberen Randes der Pflugschar bilden hilft.

Proc.
sphenoida-
lis.

Der Ausschnitt zwischen den beiden obenbeschriebenen Fortsätzen begrenzt mit der unteren Fläche des Wespenbeinkörpers, an welche die beiden Fortsätze sich anlegen, eine runde, zuweilen unregelmässige Oeffnung, *For. sphenopalatinum*, die Communicationsöffnung zwischen der Fossa sphenomaxill. und der Nasenhöhle (Fig. 165). Der Antheil des Wespenbeins wird um so geringer, je mehr sich die gegen einander gekehrten Ränder des Gaumenbeins einander zuneigen, und nicht selten wird das Wespenbein ganz ausgeschlossen durch einen verschiedentlich gestalteten leisten- oder blattförmigen oder schnörkelartig geschwungenen Fortsatz, welchen der Proc. orbitalis von der hinteren oberen Ecke an zum Vorderrande des Processus sphenoidalis rückwärts sendet.


Var. Das Foramen sphenopalat. ist durch ein feines Knochenplättchen getheilt, welches zwischen den Wurzeln des Proc. orbit. und sphenoid. horizontal hingepannt ist. — Das Gaumenbein des Neugeborenen ist von dem des Erwachsenen besonders durch die verhältnissmässig geringe Höhe der verticalen Platte und durch die mangelhafte Entwicklung des Orbitalfortsatzes, der ein solides dünnes Plättchen darstellt, unterschieden.

9. Thränenbein, *Os lacrymale*.

Das Thränenbein ist ein im Wesentlichen vierseitiges Knochenplättchen, seitliche Decke der vorderen Siebbeinzellen, in die Lücke gefügt, welche vorn von der medialen Kante der Thränenfurche des Stirnfortsatzes des Oberkiefers, hinten vom vorderen Rande der Papierplatte des Sieb-

9. Thrä-
nenbein.

Fig. 166.




Rechtes Thränenbein,
laterale Fläche.

beins, oben und unten von den medialen Rändern der Orbitalplatten des Stirnbeins und des Oberkieferkörpers eingefasst wird. Die Ränder verlaufen gerade oder fein gezackt (Fig. 166); mitunter wird die vierseitige Form durch grössere und unregelmässige Biegungen besonders des hinteren Randes alterirt; der untere Rand ist in der Regel länger als der obere und convex. Der obere, vordere und hintere Rand sind mit den Knochen, an welche sie angrenzen, durch einfache Nähte verbunden; nur der untere Rand

ruht, so weit er mit dem Oberkiefer in Verbindung steht, meistens mittelst einer breiteren, schräg ab- und medianwärts gerichteten Lippe auf der im entsprechenden Sinne abgeschrägten Kante des genannten Knochens.

Auf der äusseren Fläche des Thränenbeins verläuft in verticaler Richtung, mit dem oberen Ende ein wenig nach vorwärts geneigt, eine scharfe Kante, *Crista lacrym. post.*, die sich von oben nach unten allmählig mehr über die Fläche erhebt und am unteren Ende in eine dünne, hakenförmig nach vorn gekrümmte Spitze, *Hamulus lacrymalis*, ausgeht. Durch diese Kante wird die Fläche getheilt in ein hinteres, breiteres und ein vorderes, schmaleres Feld. Das hintere Feld ist flach und bildet den vordersten Theil der medialen Wand der Augenhöhle; das vordere Feld, *Sulcus lacrymalis* (Fig. 166), ist in einem stumpfen Winkel gegen das hintere vorwärts gerichtet, von einer Seite zur anderen ausgehöhlt, und legt sich mit seinem vorderen Rande an den hinteren Rand der gleichnamigen Rinne des Stirnfortsatzes des Oberkiefers, um in Verbindung mit dieser die Thränengrube, *Fossa lacrymalis* zu bilden (Fig. 167). Unten trifft die Crista

Fig. 167.




Das linke Thränenbein, in Verbindung mit dem Siebbein und Oberkieferbein. Der Schädel um seine sagittale Axe mit der linken Gesichtshälfte abwärts gedreht. *Lpa.* Lamina papyracea des Siebbeins. *Prl.* Proc. lacrymalis des Muschelbeins. *Pf.* Proc. frontalis. *Cla.* Crista lacrymalis ant. des Oberkieferbeins.

lacrymalis post. auf die hintere Ecke der Incisura lacrym. (des Oberkiefers); der Hamulus lacr. verläuft mit seinem unteren Rande auf dieser Incisur, je nach seiner Länge, mehr oder minder weit vorwärts. Der untere Rand der Thränenfurche des Thränenbeins dagegen ist von der hinteren Ecke der Incisura lacrymalis in einem medianwärts convexen Bogen zum medialen Rande der Thränenfurche des Oberkieferbeins hinübergespannt. Indem die parallel ab- und seitwärts verlaufenden Cristae lacrymales des Oberkieferbeins und des Thränenbeins an ihrem unteren Ende durch Vermittelung des oberen Randes des Hamulus und

allenfalls der Incisura lacrymalis in einander umbiegen, stellen sie eine langgestreckte Ellipse und den oberen Rand eines cylindrischen Canals dar, zu welchem der Zugang durch einen spitzwinkelig gegen die Axe und von der medialen abwärts zur lateralen Wand geführten Schnitt gewonnen scheint. Die Thränengrube ist die mediale Wand dieses Canals, so weit sie durch den besagten Schnitt sichtbar geworden. Die mediale

Fig. 168.



Rechtes Thränenbein in Verbindung mit dem Oberkieferbein, mediale Fläche.
Lu. Lunula lacrymalis. Ct. Crista turbinalis des Oberkiefers.

Wand des eigentlichen Thränencanals ist demnach die gerade Fortsetzung der Thränengrube, nur dass für den Sulcus lacr. des Thränenbeins, vom unteren Rande des letzteren an, die Lunula lacrym. des Oberkieferbeins und ein Fortsatz des Muschelbeins (*Prl*, Fig. 167) eintreten, dessen Beschreibung im nächsten Abschnitte folgt ¹⁾.

Die dem Labyrinth zugekehrte Fläche des Thränenbeins (Fig. 168) hat in der Regel eine der Crista und öfters auch dem Hamulus lacrymalis der Aussenseite entsprechende verticale Vertiefung, und ist durch horizontale oder schräge Leisten in flache Zellen abgetheilt.

Das Thränenbein bietet zahlreiche Varietäten dar. Es ist von feinen Canälen durchzogen (Schultz a. a. O. p. 42. Taf. IV. Fig. 1 — 4), häufig von grösseren oder kleineren Oeffnungen durchbrochen, und die Zahl der Löcher kann so gross werden, dass nur eine Art Netz zarter Knochenleistchen übrig bleibt. Es kann der Quere und der Länge nach durch Nähte getheilt oder mit der Papierplatte des Siebbeins verwachsen, endlich durch Ausdehnung des Oberkiefer- oder des Siebbeins oder beider theilweise oder völlig verdrängt sein. An einem Schädel (Italiener) des hiesigen physiol. Instituts findet sich ein Thränenbein von nur 4 mm im sagittalen, 8 mm im verticalen Durchmesser hinter der Thränengrube, welche allein dem Stirnfortsatz des Oberkiefers angehört. In einem von Gruber beschriebenen Falle (Müll. Arch. 1848. S. 412. T. XIV) wird das Thränenbein ersetzt durch Fortsätze des Stirnbeins und Oberkieferkörpers, welche zwischen dem Stirnfortsatz des Oberkiefers und der Papierplatte des Siebbeins einander in der medialen Wand der Augenhöhle begegnen.

10. Muschelbein, *Concha inferior*.

Die Muschelbeine bestehen aus dem Körper und drei Fortsätzen. Körper und Fortsätze sind dünn und platt. Der Körper ist uneben, einer Muschel oder einem mit den Seitenrändern eingerollten Myrtenblatt vergleichbar. Mit dem längsten Durchmesser (40 mm) parallel der sagittalen Axe des Schädels, liegt er in der Seitenwand der Nasenhöhle, die convexe Fläche auf-, die concave abwärts gekehrt, eine Spitze nach vorn, die andere nach


10. Muschelbein.

Körper.

¹⁾ Der unterste Theil des Sulcus lacr. des Thränenbeins, welcher sich mitunter dem Muschelbein entgegen abwärts verlängert, wird als *Proc. nasalis s. lacrymalis* des Thränenbeins aufgeführt.

hinten gerichtet (Fig. 169). Die vordere Spitze ist in der Regel abgerundet oder abgestutzt, die hintere ¹⁾

Fig. 169.



Rechtes Muschelbein, in Verbindung mit dem Oberkiefer- und Gaumenbein, mediale Fläche. *Hm* Hiatus maxillaris. *Lu* Lunula lacrymalis.

länger ausgezogen. Von den Rändern des Muschelbeinkörpers ist der Eine an die Knochen der lateralen Wand der Nasenhöhle befestigt, der andere weiter median- und abwärts gelegene springt frei in die Nasenhöhle vor. Der befestigte Rand ist scharf, der freie wulstig. Die Flächen gleichen denen der Siebbeinmuscheln: die convexe ist, besonders in der Nähe des unteren Randes, mit mehreren, unterbrochenen, theilweise von dünnen Plättchen überbrückten, der Länge nach verlaufenden Furchen versehen, welche durch niedere Kämme und Spitzen

von einander geschieden sind; die concave Fläche ist in der Regel glatter; beide sind, gleich dem wulstigen Rande, siebförmig von einer Masse feiner Poren durchlöchert. Je nachdem die Wölbung des Muschelbeinkörpers schwächer oder stärker ist, ragt er entweder, wie ein Dach schräg medianwärts abfallend, über den Boden der Nasenhöhle, oder er geht aus der horizontalen Lage des lateralen Theils medianwärts im Bogen in die verticale über, rollt sich auch wohl mit dem freien Rande wieder lateralwärts um und macht so mit seiner convexen Fläche den Boden des mittleren, mit der concaven die Decke des unteren Nasengangs aus.

Der angewachsene oder laterale Rand des Muschelbeins ist in drei Abtheilungen geschieden. Die vordere, von vorn nach hinten schräg aufsteigende Abtheilung ist mit der Crista turbinalis des Oberkieferbeins, die hintere, von vorn nach hinten schräg absteigende mit der gleichnamigen Crista des Gaumenbeins verbunden; die mittlere Abtheilung ist zwischen beiden Kämmen frei an der medialen Wand des Oberkieferbeins, welche hier theils zurückweicht, theils durchbrochen ist, hingepannt. Von dieser Abtheilung gehen die Fortsätze aus. Wir haben an derselben wieder zwei Abtheilungen zu unterscheiden: die vordere, kürzere, reicht vom hinteren Ende der Crista turbinalis des Oberkiefers bis an den vorderen Rand des Hiatus maxillaris; sie setzt sich aufwärts in ein quer abgestutztes Plättchen, den *Proc. lacrymalis* ²⁾, fort, welcher, zwischen das untere Ende des medialen Randes des Sulcus lacrymalis und die Lunula lacrymalis des Oberkieferbeins eingeschoben, oder auch, von der Nasenseite her den einen oder anderen dieser Knochentheile deckend, dem unteren Rand des Thränenbeins begegnet und demnach, je weiter das Thränenbein herabragt, um so niedriger und unscheinbarer wird. Der *Proc. lacrymalis* des Muschelbeins wendet die mediale, etwas rauhe Fläche der Nasenhöhle, die laterale, schwach concave und glatte Fläche der Thränengrube zu; die


Proc. lacrymalis.

¹⁾ *Hamulus palatinus.* ²⁾ *Processus nasalis.*

quere Naht, in welcher er mit dem Thränenbein zusammenstösst, liegt in der medialen Wand des Thränencanals (Fig. 167); die stumpfwinkliche Kante, an welcher die laterale Fläche des Proc. lacrym. in die concave Fläche des Muschelbeinkörpers ausbiegt, begrenzt den Ausgang des genannten Canals (vgl. Fig. 85). Die hintere, längere Abtheilung des freien Theiles des lateralen Randes des Muschelbeinkörpers läuft horizontal über den unteren Theil des Hiatus maxill. vom vorderen zum hinteren Rande desselben und schickt auf- und abwärts platte Fortsätze, welche sich vor diese Oeffnung legen, um sie gegen die Nasenhöhle hin zu verengen oder abzuschliessen. Der abwärts gerichtete Fortsatz, *Pr. maxillaris*, ein Theil der lateralen Wand des unteren Nasenganges, schliesst den unterhalb des Muschelbeins befindlichen Theil des Hiatus maxill. vollständig; es ist ein halbmondförmiges oder vierseitiges Plättchen, welches sich mit seinem freien Rande entweder auf den Rand der genannten Oeffnung stützt oder den letzteren bald an der medialen, bald an der lateralen Fläche etwas überragt (Fig. 170, 171). Deckt

Proc.
maxillaris.

Fig. 170.




Linkes Muschelbein, laterale Fläche.

die perpendiculäre Platte des Gaumenbeins oder ein Proc. nasalis derselben einen Theil des Hiatus maxill., so tritt der Proc. maxill. des Muschelbeins auch mit diesen Theilen des Gaumenbeins in Verbindung, und wird um so kleiner, je enger der Hiatus maxillaris an sich ist und je mehr er durch das Gaumenbein verengt wird. Der Fortsatz, der von dem oberen Rande des Muschelbeinkörpers aufsteigt, um zur Schliessung des über dem lateralen

Rande des Muschelbeins in den mittleren Nasengang sich öffnenden Theils des Hiatus maxillaris beizutragen, *Pr. ethmoidalis*, ist von sehr wechselnder Grösse und Gestalt. Er entsteht in einiger Entfernung hinter dem Thränenfortsatz, geht schräg oder im Winkel gebogen nach vorn und vereinigt sich mittelst eines abgestutzten Randes mit dem ab- und rückwärts gekehrten unteren Rande des *Pr. uncinatus* des Siebbeins (Fig. 171). Er ist meistens schmal, oft aber auch breit genug, um mit dem hinteren

Proc.
ethmoidalis.

Fig. 171.



Linkes Oberkieferbein mit dem Sieb-, Gaumen- und Muschelbein; die Seitenwand der Kieferhöhle weggenommen.


Rande sich an den hinteren Rand der Kieferhöhle anzulegen. Häufig sieht man ihn von rundlichen Oeffnungen durchbrochen, in feine Zacken ausgezogen. Zwischen ihm und dem Thränenfortsatz kommen manchmal noch mehrere kleinere, spitze oder blattförmige Nebensätze vor, welche alle unter sich und mit dem Processus uncinatus durch eine fibröse Membran verbunden sind, so dass der Zugang von der Nasen- zur Kieferhöhle nur oberhalb des Proc. ethmoidalis der Muschel und hinter dem Proc. uncinatus des Siebbeins offen bleibt.

Das Muschelbein des Neugeborenen ist in keinem wesentlichen Punkt von dem des Erwachsenen verschieden. Nicht selten verwächst es im reiferen Alter mit dem Oberkieferbein.

11. Nasenbein, *Os nasi*.11. Nasen-
bein.

Die Nasenbeine füllen, in einer medianen Naht an einander gefügt, die Lücke aus, welche in der Decke der Nasenhöhle zwischen den medialen Rändern der Stirnfortsätze des Oberkieferbeins und dem Nasentheile des Stirnbeins übrig bleibt (Fig. 172). Mit ihren Flächen jederseits in die

Fig. 172.



Rechtes Nasenbein in Verbindung mit dem Sieb-, Stirn- und Oberkieferbein, von vorn. *Lpe.* Lamina perpendicularis des Siebbeins. *Pn.* Processus nasalis des Stirnbeins.


Flächen des genannten Fortsatzes übergehend, bilden sie den Rücken und einen Theil der Seitenwand der knöchernen Nase. Ihr hinterer oder, bei der geneigten Lage der Nasendecke, oberer Rand setzt sich gegen das überhängende Stirnbein, als Nasenwurzel, ab; ihr vorderer, breiterer Rand ist am knöchernen Schädel frei, leicht gekerbt, scharf, ein Theil der Apertura pyriformis und in Einer Flucht mit dem freien Rande des Stirnfortsatzes des Oberkieferbeins.

An ihn ist die knorpliche

Stütze des vorderen (unteren) Theils des Nasenrückens befestigt.

Jedes Nasenbein ist eine vierseitige Platte, mit geradem medialen und gegen das vordere Ende schräg lateralwärts abweichendem und auf Kosten der vorderen Fläche schräg zugespitztem lateralen Rande. Die Flächen nehmen somit gegen den freien Rand an Breite zu. Sie sind von Einer Seite zur anderen die äusseren convex, die inneren concav, und zwar entspricht die Concavität der inneren einem kleineren Radius, als die Convexität der äusseren, weil der mediale Rand nach innen aufgeworfen ist und einen Vorsprung in die Nasenhöhle bildet, welcher, zusammen mit dem entsprechenden Vorsprung des anderen Nasenbeins, einen einfachen oder

Fig. 173.



Rechtes Nasenbein vom medialen Rand.

zweilippigen medianen Kamm darstellt. Dieser Kamm ruht auf dem oberen (vorderen) Rand der knöchernen Scheidewand der Nase, und zwar auf dem medianen oberen Kamm des Nasenfortsatzes des Stirnbeins und weiter vorn auf der perpendicularen Platte des Siebbeins. In der Richtung von der Wurzel zum vorderen Rand ist die innere Fläche des Nasenbeins gerade oder leicht concav, der Wurzel zunächst, wo sie den Nasenfortsatz des Stirnbeins deckt, eine grössere oder geringere Strecke weit rauh, im Uebrigen glatt und von einigen longitudinalen Furchen durchzogen, von welchen die tiefste und dem lateralen Rande zunächst gelegene, *Sulcus ethmoidalis*, Fig. 173, zur Aufnahme des N. ethmoid. dient. Die äussere Fläche des Nasenbeins ist, abgesehen von einigen Ernährungslöchern und sehr feinen Gefässrinnen,

glatt, und von der Wurzel zum vorderen Rande erst concav, dann convex. Indem sich gegen die Nasenwurzel hin die äussere Fläche des Knochens von der inneren allmähig entfernt, nimmt er in dieser Richtung an Mächtigkeit und besonders sein medialer Rand an Höhe zu. Dieser Rand ist, zur Verbindung der Nasenbeine unter sich, feinblättrig, oft an dem einen Nasenbeine gewölbt, am anderen entsprechend vertieft. Der hintere Rand ist eine rauhe, zackige Fläche, auf die oben (S. 124) beschriebene Weise mit dem Nasentheile des Stirnbeins verbunden.

Die Form der Nasenbeine ist sehr grossen individuellen Schwankungen unterworfen. Ihre Breite wechselt um das Vierfache; die breiten liegen mit dem grössten Theile ihrer Fläche bald vor-, bald seitwärts gewandt, wodurch der Nasenrücken platt oder scharf wird. Wie sehr der Winkel, den ihre Gesichtsfläche mit der Stirn bildet, variiren kann, lehrt schon die Betrachtung lebender Köpfe.

Oft sind die Nasenbeine ungleich, das Eine auf Kosten des anderen vergrössert. Einen Fall, wo das linke Nasenbein sich mit einem queren Fortsatz zwischen das Stirnbein und das rechte Nasenbein eindrängt, bildet d'Alton ab (Handb. der menschl. Anat. Bd. I. S. 40). Aehnliche Fortsätze kommen an der oberen lateralen Ecke der Nasenbeine vor, wo sie sich zwischen das Stirnbein und den Stirnfortsatz des Oberkieferbeins erstrecken. Der hintere (obere) Theil der Naht beider Nasenbeine kann zackig sein oder obliteriren. Verwachsung dieser Naht in der ganzen Länge ist selten. Diese Verwachsung, die an Affenschädelbildungen erinnert, ist kein Racenkennzeichen; denn es kommen kaukasische Schädel mit verschmolzenen Nasenbeinen und äthiopische mit sehr schön ausgebildeten und gesonderten Nasenbeinen vor. Merkwürdig aber ist es, dass Mangel und die auffallendste Verkümmern der Nasenbeine verhältnissmässig häufig an Schädeln fremder Racen beobachtet worden ist. Das hiesige physiologische Institut besitzt aus der Blumenbach'schen Sammlung den Schädel eines Negerkindes, an welchem jede Spur einer Abtrennung der Nasenbeine von den Stirnfortsätzen der Oberkieferbeine fehlt, die letzteren also die Stelle der ersteren mit vertreten. Dieselbe Anomalie, an europäischen Kinderschädeln, ist von Köhler (Beschreibung der physiol. und pathol. Präp. in der Sammlung des Hrn. Loder, Leipzig 1795, S. 124) und einseitig von J. F. Meckel (Beitr. zur vergl. Anatomie, Bd. I. Hft. 2. Leipz. 1809. S. 54) notirt. An dem Schädel eines Kindes und eines Weibes beobachtete sie Sandifort (*Observationes anatomico-path. Lib. III. p. 130; IV. p. 136*). An einem Javaneschädel der Blumenbach'schen Sammlung reichen die Stirnfortsätze des Oberkiefers medianwärts so weit vor, dass sie zwischen den oberen Theilen ihrer medialen Ränder nur eine schmale Spalte lassen, die sich abwärts erweitert; in der Spalte liegt ein plattes Knochenstück von verschoben rhombischer Form, unzertrennlich mit der vorderen Kante der Lamina perpendicularis des Siebbeins verwachsen, höher als breit, einen spitzen Winkel aufwärts gegen den Rand des Stirnbeins, den anderen, minder spitzen Winkel jenem gegenüber frei nach unten, die beiden stumpfen Winkel seitwärts gerichtet. Die Breite der transversalen Diagonale dieses Knochenstücks zwischen den stumpfen Winkeln beträgt 6mm. — An einem Kafferschädel derselben Sammlung wird ein noch engerer Raum zwischen beiden Stirnfortsätzen des Oberkiefers durch ein noch schmaleres, längliches und plattes, aber selbständiges Knochenstück und durch einen vom Stirnbein herabragenden und abwärts zugespitzten Fortsatz ausgefüllt, der sich zwischen den rechten Rand des eben erwähnten Knochenstücks und den Stirnfortsatz des Oberkiefers eine Strecke weit eindrängt. Die Blutgefässe des Gesichts stehen mitunter mit denen der Nasenhöhle durch Löcher der Nasenbeine in Verbindung.

Unter dem Namen *Ossa internasalia* beschreibt Mayer (Archiv für physiol. Heilk. 1849. S. 235) Knochen, welche, ganz oder theilweise mit einander ver-


wachsen, in dem dreieckigen Ausschnitt des Randes der Nasenbeine, im oberen Winkel der Apertura pyriformis, auf der vorderen Spitze der Lamina perpendicularis des Siebbeins liegen; sie haben die Grösse etwa eines halben Silbergroschens und kommen unter hundert Schädeln zwei bis drei Mal wohl entwickelt vor. In der Regel verwachsen sie im späteren Alter, vom vierzigsten Jahre an; an dem Schädel eines Neugeborenen erscheinen sie bereits in dem Knorpel der Lamina perpendicularis hinter der Nasenspitze. (Mayer betrachtet diese Knochen als Analoga der Rüsselknochen mancher Säugethiergattungen.)

12. Jochbein, *Os zygomaticum*.

12. Joch-
bein.

Das Jochbein muss man sich zusammengesetzt denken aus zwei, unter einem spitzen Winkel ($60 - 70^\circ$) und mit halbmondförmig ausgeschnittenen Rändern zusammengefügt Platten. Die scharfe Kante, welche durch die Zusammenfügung beider Platten gebildet wird, ist die untere Hälfte des lateralen und die laterale Hälfte des unteren Randes der Augenhöhle, verläuft demnach im Bogen erst ab-, dann median- und zugleich vorwärts. Von den Platten macht die eine, Orbitalplatte, *Pars orbitalis*, den vorderen Theil der lateralen Wand und des Bodens der Augenhöhle aus; die andere, Wangenplatte, *Pars malaris*, deckt von der Seite her den vorderen Theil der Schläfengrube. Die

Fig. 174.



Gesichtsschädel von vorn. Foi Fissura orbit. inf. Pz Proc. zygomat. des Schläfenbeins.

Orbitalplatte zeigt sich demnach, wenn man den Schädel von vorn betrachtet, von oben nach unten ausgehöhlt, die Wangenplatte von hinten nach vorn schwach gewölbt. Die Orbitalplatte wendet ihre vordere Fläche der Augenhöhle zu; die vordere Fläche der Wangenplatte gehört dem Gesichte an; die hinteren Flächen beider Theile sehen in die Schläfengrube und stellen, indem sie ausgerundet in einander übergehen, eine einzige verticale und gerade nach hinten gerichtete Hohlkehle dar, welche die Schläfengrube von vorn abschliesst und sich aufwärts auf die hintere Fläche des Jochfortsatzes des Stirnbeins, abwärts auf die hintere Aushöhlung des Proc. zygomatico-orbitalis des Oberkieferbeins fortsetzt.

Orbital-
platte.

Ich habe die Orbitalplatte des Jochbeins einem spitzwinklichen Dreieck verglichen. Die schmale, dem spitzen Winkel gegenüberliegende

Orbitalplatte ist spitzwinklich dreiseitig mit abwärts gerichteter Spitze, die Wangenplatte unregelmässig vierseitig. Beide Platten stehen mit dem grössten Theile ihrer Flächen vertical, und zwar in einer diagonalen, die Mitte zwischen der frontalen und sagittalen haltenden Richtung, die Orbitalplatte von der gemeinschaftlichen vorderen Kante median-, die Wangenplatte lateralwärts verlaufend. Nur die untere Spitze der Orbitalplatte biegt in die horizontale, die obere vordere Ecke der Wangenplatte in eine mehr der frontalen sich nähernde


Seite ist ein horizontaler, zackiger Rand ¹⁾, am medialen Ende scharf, gegen das laterale an Mächtigkeit (im sagittalen Durchmesser) zunehmend, in gleicher Flucht oder etwas tiefer als der Stirnrand des Temporalflügels des Wespenbeins gelegen. Auf ihn stützt sich der Jochfortsatz des Stirnbeins. Von den beiden langen, den spitzen Winkel einschliessenden Seiten ist die laterale der Augenhöhlenrand, die mediale ein grösstentheils oder in der ganzen Länge zackiger Rand. Der hintere, verticale Theil dieses Randes (Fig. 175 *) ist an die *Crista zygomatica* des Temporalflügels des Wespenbeins dergestalt angefügt, dass die beiden Flächen dieses Flügels, welche die Crista zygomatica scheidet, durch die Orbital- und Temporalfläche des Jochbeins geradezu verlängert werden (Fig. 176). Der vordere, horizontal verlaufende Theil desselben Randes (Fig. 175 ***) stösst am Boden der Augenhöhle in einer Naht mit der Lamina orbitalis des Proc. zygomatico-orbitalis des Oberkieferbeins zusammen. Zwischen jenem, mit dem Wespenbein, und diesem, mit dem Oberkieferbein verbundenen Theil ist der Rand (**) in der Regel eine kurze Strecke frei und scharf, vertical vom oberen zum unteren Rande der Fissura orbit. inf. hinübergespannt. Häufig kommen aber das Wespen- und Oberkieferbein einander am Seitenrande der Fiss. orbit. inf. so entgegen, dass sie das Jochbein vom Antheil an der Bildung dieser Oeffnung ausschliessen.

Fig. 175.



Rechtes Jochbein von vorn, der Schädel um die verticale Axe nach rechts gedreht.

Fig. 176.



Horizontalschnitt des Jochbeins in Verbindung mit dem Temporalflügel des Wespenbeins. *Fco* Facies orbit. *Fct* Facies temporalis.

Nach Gruber's Untersuchungen an 120 Schädeln (Abhandl. aus der menschl. u. vergleichenden Anatomie, Petersburg 1854, S. 116) ist das Jochbein ebenso oft von der Fissura orbit. inf. ausgeschlossen, als es an derselben Antheil nimmt. Die Ausschliessung geschieht nicht nur durch Fortsätze, welche Oberkiefer und Temporalflügel einander entgegenschicken, sondern auch durch Nahtknochen, einen oder mehrere, welche am lateralen Ende dieser Fissur zwischen den genannten Knochen und dem Jochbein liegen. Froment (*Rech. sur plusieurs points d'anatomie*, Paris 1854, p. 55) sah die Theilnahme des Jochbeins an der Fissur unter 375 Schädeln 105 Mal auf beiden Seiten und 87 Mal auf Einer Seite. Von den Fällen, in welchen das Jochbein ausgeschlossen war, war 28 Mal auf beiden Seiten und 31 Mal auf Einer Seite die Verbindung des Wespen- und Oberkieferbeins durch einen Nahtknochen bewerkstelligt. Ausserdem constatirte Froment, dass die Häufigkeit der Verbindung des Wespen- und Oberkieferbeins mit dem Alter zunimmt.

Nicht selten legt sich das Jochbein von vorn her so über die Spina zygomatica des Oberkieferbeins, dass beide mit einander, das Jochbein vorn, das Oberkieferbein hinten, den lateralen Rand der Fissur bilden.


An der unregelmässig vierseitigen Wangenplatte ist die dem Orbitalrande gegenüberliegende untere Kante frei und wulstig und verläuft gerade oder schwach nach unten gekrümmt mit mässiger Steigung rück- und lateralwärts. Sie geht hinten in den unteren Rand des Jochfortsatzes des Schläfenbeins, vorn in die untere Kante des prismatischen Proc. zygomatico-

Wangenplatte.

¹⁾ Proc. frontalis aut.

orbitalis des Oberkieferbeins über, in die letztere mit einer stumpfwinklichen Knickung, Wangenhöcker, *Tuberositas malaris*, Fig. 177, deren Scheitel abwärts gerichtet ist und entweder genau dem Ende der Naht beider Knochen entspricht oder auf den einen oder anderen derselben rückt. Die

Fig. 177.



Linkes Jochbein, fast Profil.

ganze Kante ist von Muskelansätzen rau und diese Rauigkeit greift als schmaler oder breiter Saum auf die äussere Fläche der Wangenplatte über.

Der vordere und hintere Rand der Wangenplatte haben eine einigermaassen parallele, schräg von oben und vorn nach hinten und unten geneigte Richtung, doch ist in der Regel der vordere Rand noch etwas mehr gegen den Horizont geneigt als der hintere, um so mehr, je länger die vordere Spitze ausgezogen ist, in welcher dieser Rand mit dem medialen Rande der Pars orbitalis zusammenstösst. Er ist gerade oder unregelmässig wellenförmig gebogen, schwach

zackig und in seiner ganzen Länge mit dem vorderen Rande des Proc. zygomatico-orbitalis des Oberkiefers verbunden.

Die Länge der vorderen oberen Spitze des Jochbeins ¹⁾ und damit der Antheil, welchen das Jochbein an der Bildung des Infraorbitalrandes nimmt, ist grossen individuellen Schwankungen unterworfen. Als Regel kann gelten, dass die Spitze des Jochbeins gerade oder etwas medianwärts über dem For. infraorbitale endet. Steigt sodann, wie dies ebenfalls Regel ist, die Naht vom Foramen zum Mg. infraorbitalis ebenso schräg medianwärts auf, so folgen in dem letztgenannten Rande von der Schläfen- zur Nasenseite einander Jochbein, Proc. zygomatico-orbitalis, Oberkieferkörper, endlich Crista lacrymalis des Stirnfortsatzes des Oberkiefers. Hat die Spitze des Jochbeins die gewöhnliche Länge, steigt aber die Naht vom For. zum Mg. infraorbitalis lateralwärts auf, so wird der Proc. zygomatico-orbitalis von der Bildung des Mg. infraorbitalis ausgeschlossen und die Spitze des Jochbeins reicht auf den oberen Rand des Oberkieferkörpers hinüber. Nun kann die Naht vom For. zum Mg. infraorbitalis so sehr lateralwärts vordringen, dass der Körper des Oberkiefers vom Mg. infraorbitalis ausgeschlossen wird. Die Spitze des Jochbeins kann dabei die gewöhnliche Länge behalten. Endlich kann sich auch diese Spitze so verlängern, dass sie über den Proc. zygomatico-orbitalis und den Körper des Oberkiefers weg die Crista lacrymalis erreicht.

Die Zahl der Varietäten wird noch vermehrt durch die Existenz von Schaltknochen in der Naht des Proc. zygomatico-orbitalis und des Körpers des Oberkiefers.

Zuweilen springt die Gesichtsfläche der vorderen Spitze des Jochbeins wulstig über die Gesichtsfläche des Oberkieferbeins vor und in der Naht finden sich tiefe Gruben und Ernährungslöcher.


Der hintere Rand der Wangenplatte hat zwei Abtheilungen. Der obere, längere, S- oder zickzackförmig gekrümmte Theil ist frei, oben wulstig, abwärts, je mehr die Schläfengrube sich neben ihm vertieft, um so schärfer. Die untere rückwärts verlaufende Krümmung der Sförmigen

¹ Proc. maxillaris aut.

Linie geht unter einem stumpfen Winkel über in den unteren, schräg ab- und rückwärts gerichteten und stark gezähnelten Theil des hinteren Randes, welcher sich mit dem Jochfortsatz des Schläfenbeins in Verbindung setzt. Die durch die Einbiegung des hinteren Randes abgesetzte rückwärts vorragende Platte, welche in dem erwähnten zackigen Rande endet, wird Schläfenfortsatz, *Proc. temporalis*, des Jochbeins genannt.

Die laterale Fläche der Wangenplatte ist glatt, in verschiedenem Grade gewölbt. Von der medialen Fläche (Fig. 178) ist der grössere,

Fig. 178.



Rechtes Jochbein von innen.

hinterer Theil ebenfalls glatt und tritt mit dem verticalen Theile der hinteren Fläche der Orbitalplatte in der beschriebenen Weise zu einer Concavität zusammen. Der vordere Theil ist rau in einer dreiseitigen Fläche, deren Basis sich längs dem horizontalen Theile der Orbitalplatte hinzieht, deren Spitze mit der vorderen unteren Ecke der Wangenplatte zusammenfällt. Diese Rauigkeit, welche sich auf die untere Fläche der Orbitalplatte fortsetzt, entspricht in ihrer Form genau der Form der rauhen End-

fläche des *Proc. zygomatico-orbitalis*, auf welcher sie ruht.

Das Jochbein wird von zwei Canälen durchzogen, welche die Bestimmung haben, Nerven- und Gefässäste aus der Augenhöhle einerseits auf die Wange, andererseits in die Schläfengrube zu leiten. Die Nervenäste sind, wie überall, die beständigeren, ein *N. zygomatico-facialis* und ein *N. zygomatico-temporalis* vom *N. zygomaticus*¹⁾ des zweiten Astes des Trigemini. Die betreffenden und gleichbenannten Canäle, *Can. zygomatico-facialis* und *Can. zygomatico-temporalis*, gehen von der Orbitalfläche aus, der eine in transversaler Richtung, etwas nach vorn und wenig nach unten abweichend zur Gesichtsfläche, der andere rück- und auf- oder abwärts zur Schläfenfläche. Die Eingänge²⁾ liegen auf der Orbitalfläche ungefähr im Niveau der *Fissura orbit. inferior*, der Ausgang des *Can. zygomatico-facialis*³⁾ findet sich auf der Gesichtsfläche nahe (5—8 mm) unter dem Orbitalrande, in gerader Linie über dem Wangenhöcker; der Ausgang des *Can. zygomatico-temporalis*⁴⁾ liegt in der oberen Hälfte der Schläfenfläche, bald dem unteren, bald dem oberen Rande näher. Nicht selten erfolgt die Theilung des *N. zygomaticus* in seine beiden Aeste erst innerhalb des Jochbeins. Dann ist Eine orbitale Mündung beiden Canälen gemein, der *Can. zygomatico-facialis* liegt in der Flucht des gemeinsamen Anfanges, und der *Can. zygomatico-temporalis* geht unter einem spitzen Winkel rück- und medianwärts von demselben ab.

Can.
zygom.-fac.
u. zygom.-
tempor.

Es giebt noch andere zahlreiche Varietäten der beschriebenen Canäle. Die Ausgangsöffnungen beider können sich vervielfältigen, die des *Can. zygomatico-temporalis* stehen alsdann über einander, die des *Can. zygom.-fac.*, 2—4, in einem

¹⁾ *N. subcutaneus malae aut.*

²⁾ *Foramen zygom. orbitale* Krause, *F. z. sup.* Weber, *F. z. int.* Arnold.

³⁾ *Foramen zygom. faciale* Krause, *F. z. ant.* Weber, *F. z. ext.* Arnold.

⁴⁾ *For. zygom. int.* Meckel, *F. z. temp.* Krause, *F. z. post.* Weber und Arnold.

dem Orbitalrande concentrischen Bogen. In einem Falle sah ich zwei Can. zygomatico-facial. sich gegen die Mündung zu einem einfachen Canal vereinigen. Beide Canäle kommen doppelt, der Can. zygomatico-temporalis auch dreifach vor, oder es bestehen neben dem vom Can. zygomatico-fac. sich abzweigenden Can. zygomatico-temp. noch zwei besondere. Der Eingang des Can. zygomatico-temporalis rückt medianwärts in die Naht zwischen der Pars orbitalis des Jochbeins und der Crista zygomatica des Temporalflügels; sehr selten versetzt er sich auf die letztgenannte Crista. Hier erscheint der Can. zygomatico-temp. als einfaches Loch der Orbitalplatte, dort durchzieht er den verticalen Theil dieser Platte von unten nach oben. Zuweilen geht ein Canal, der in dieser Richtung aufsteigt, an der oberen Ecke des Jochbeins statt auf die Schläfenfläche, auf die Gesichtsfläche über. Auch findet man die Pars malaris am oberen Theile des hinteren Randes in transversaler Richtung von einem Canälchen durchsetzt. Zuweilen führen auf der Orbital- und Schläfenfläche längere Furchen zu den Oeffnungen oder von ihnen weg. Variabel und in keinem bestimmten Verhältniss zu einander sind auch die Durchmesser der Oeffnungen (bis zu 3 mm). Selten fehlt der Can. zygomatico-temporalis, noch seltener der Can. zygomatico-facialis.


Jochbeine, durch eine horizontale Naht getheilt, bilden Sandifort (a. a. O. Lib. III. p. 113. Taf. VIII. Fig. 7) und Schultz (a. a. O. p. 57. Taf. II. Fig. 3) ab. Der dem Oberkiefer zunächst gelegene Theil des Jochbeins kann eine Höhlung (bis zu Bohnengrösse) enthalten, die sich mit der Kieferhöhle in Verbindung setzt Mayer in Schmidt's Jahrb. Bd XXXI. S. 12).

13. Pflugscharbein, *Vomer*.

13. Pflug-
scharbein.

Das Pflugscharbein ist der hintere Theil der Nasenscheidewand, eine aufrecht in der Medianebene stehende, aber meistens nach der einen oder anderen Seite ausweichende, vierseitige Platte. Sie verbindet sich (Fig. 179) durch den oberen Rand mit der Schädelbasis und insbesondere mit der

Fig. 179.




Knöchernen Scheidewand der Nase von der linken Seite. *Lp* Lamina perpendicularis des Siebbeins. *Ci* Crista incisiva.

unteren Fläche des Wespenbeinkörpers, durch den unteren Rand mit der Crista nasalis der Oberkiefer- und Gaumenbeine, durch den vorderen Rand mit der perpendicularen Platte des Siebbeins (*Lp*) und weiter abwärts mit dem Knorpel der Nasenscheidewand; der hintere Rand steht frei zwischen beiden Choanen. Der obere und der hintere Rand einerseits und der vordere und untere andererseits sind von fast gleicher Länge; die letzteren beiden länger als die ersteren; der obere steigt von hinten nach vorn schräg auf, der hintere, meistens schwach concav, schräg ab, der untere Rand, ebenfalls schwach concav, liegt horizontal oder mit dem hinteren Ende kaum merklich höher als mit dem vorderen; der

vordere Rand ist dem hinteren parallel oder etwas mehr gegen den Horizont geneigt. Der obere und hintere Rand verbinden sich in einem spitzen

Fig. 180.



Knöchernen Nasenscheidewand von hinten.

† Schnittfläche des Körpers, †† des Temporalflügels des Wespenbeins.

Fov Foramen ovale.

Fig. 181.




Pflugscharbein von vorn und oben.

Winkel, der obere und vordere, sowie der hintere und untere unter stumpfen Winkeln; die Spitze, in welcher der vordere und untere Rand zusammenstossen sollten, ist vertical abgestutzt oder durch einen Aus-

schnitt auf die hintere Ecke der Crista incisiva aufgepasst. Das Pflugscharbein ist am hinteren Rande und am hinteren Theile des unteren Randes

am dünnsten; vor- und aufwärts nimmt es an Dicke zu und am oberen Rande legt es sich in zwei Blätter, *Alae vomeris* (Fig. 180—182), aus einander, die, unter stumpfem Winkel gegen einander geneigt, eine Rinne¹⁾ einschliessen, welche zur Aufnahme des Wespenbeinschnabels bestimmt ist. Die Vförmig divergirenden hinteren Ränder dieser Rinne sind wulstig und abgerundet, die lateralen Ränder scharf, zwischen die untere Fläche des Wespenbeinkörpers und die Procc. vaginales des Gaumenflügels wie ein-

Fig. 182.



Decke der Nasenhöhle von unten.

† Horizontalschnitt des Vomer.

†† Schnittfläche der Gaumenflügel.

Pv Proc. vaginalis des Gaumenflügels.

Ps Proc. sphenoidalis des Gaumenbeins.

gefalzt, weiter vorn an den Rand des Wespenbeinfortsatzes des Gaumenbeins gelehnt oder von ihm getragen (Fig. 182). Die Rinne vertieft sich nach vorn in dem Maasse, als die Spitze des Wespenbeinschnabels vorspringt und schliesst sich entweder über dem letzteren zu einer Art von Tasche, oder sie läuft offen, schmal und tief, von zwei sehr zarten Blättern eingefasst, längs dem ganzen vorderen Rande oder längs dem grössten Theile desselben herab. Sie wird dann von dem Scheidewandknorpel ausgefüllt; die perpendiculäre Platte des Siebbeins stützt sich asymmetrisch auf eins der Blätter (gewöhnlich auf das rechte) und drängt dasselbe aus dem Loth lateralwärts, so dass die Naht sich in Form einer stumpfwinkligen Kante nach der

einen (meist der linken) Nasenhöhle ausbiegt. Das andere Blatt ragt an dem macerirten Schädel frei empor, ist aber oft unvollständig.

¹⁾ *Incisura vomeris.*

An der unteren Fläche des Wespen- und über der Rinne des Pflugscharbeins verläuft ein medianer Canal (Fig. 180, 182 *), welcher Blutgefäße zwischen die Platten des Pflugscharbeins und weiter nach vorn zum Knorpel der Nasenscheidewand führt. Neben demselben und in gleicher Richtung kommt häufig jederseits ein Canal vor, zwischen dem Wespenbeinkörper, der Wurzel des Proc. vaginalis und dem lateralen Rande der Ala vomeris, ein Canal, durch welchen Blutgefäße von der Basis des Schädels vorwärts in die spongiöse Substanz des Wespenbeinkörpers oder in die Wespenbeinhöhlen oder, in selteneren Fällen, in die Nasenhöhle treten (Fig. 182 **). Ein zweiter paariger und ebenfalls sagittaler Canal ¹⁾ liegt unterhalb des vorigen, um Weniges lateralwärts und mit der hinteren Mündung (Fig. 182 ***) weiter vorn; die obere Wand desselben wird vom Keilbeinkörper, die untere vom medialen Rande des Proc. sphenoid. des Gaumenbeins in Verbindung mit dem lateralen Rande der Ala vomeris gebildet. Durch ihn gelangen Gefäß- und Nervenästchen aus der Nasenhöhle und zwar von der Gegend des For. sphenopalatinum zur oberen Wand des Schlundkopfs. Man kann diese Canäle *C. vomerobasillares* nennen und nach ihrer Lage als medianen, lateralen oberen und lateralen unteren unterscheiden.

Jeder dieser Canäle kann fehlen; der mediane Canal fehlt im höheren Alter gewöhnlich oder ist obliterirt (Tourtual, Rhein.-westfäl. Correspondenzbl. Bd. IV. Nr. 10, 11.) Der laterale untere Canal verläuft häufig zwischen Gaumen- und Wespenbein allein. Er kann mit dem Can. vidianus communiciren.

Die Flächen des Pflugscharbeins sind in der Regel glatt. Eine seichte, meistens kaum bemerkbare Furche zieht auf beiden Flächen von der Gegend der hinteren oberen zur vorderen unteren Spitze. Sie rührt vom N. nasopalatinus her.

Das Pflugscharbein besteht beim Neugeborenen aus zwei dünnen Blättern, welche nur am unteren und hinteren Rande mit einander verwachsen sind oder in einander umbiegen und einen platten, in die knorpelige Scheidewand der Nase sich fortsetzenden Knorpel umgeben. Völlig verwachsen diese Platten erst gegen die Zeit der Pubertät. Im reifen Alter verschmilzt das Pflugscharbein mit der perpendicularen Platte des Siebbeins.

14. Unterkiefer, *Mandibula*.


14. Unterkiefer.

Der Unterkiefer ist ein halbelliptischgebogener, platter Knochen, welcher den unteren Theil der Vorderfläche und den hinteren Theil der Seitenflächen des Gesichtes einnimmt. Seine Flächen haben eine von der verticalen nur wenig und zwar in der Art abweichende Stellung, dass die äussere Fläche etwas aufwärts, die innere abwärts gewandt ist. Von den Rändern ist der untere abgerundet, wulstig, überall durch die Haut zu fühlen; er bezeichnet die Grenze der Unterkiefer- und Unterkinngegend. Der obere Rand trägt in seinem mittleren Theile die Zähne; hinter dem letzten Zahn jederseits erhebt sich etwa von dem hinteren Drittel jeder Seitenhälfte ein platter Fortsatz, dessen fast sagittal gestellte, nur wenig mit dem hinteren Rande lateralwärts ausweichende Flächen aus der inne-

¹⁾ *Canaliculus pharyngeus* Arnold.

ren und äusseren Fläche des zahntragenden Bogens unmittelbar hervor-
gehen. Diese Fortsätze heissen *Aeste*, *Rami* ¹⁾; im Gegensatz zu den-

Fig. 183.



Unterkiefer im Profil.

selben nennt man den mitt-
leren bogenförmigen Theil des
Unterkiefers den Körper ²⁾.
Der der hinteren unteren Ecke
zunächst gelegene Theil des
Knochens, welcher durch eine
in Gedanken vom vorderen
Rande des Astes abwärts und
vom oberen Rande des Kör-
pers rückwärts gezogene Linie
begrenzt wird, kann ebenso-
wohl zum Körper wie zum
Aste gerechnet werden. Ihn
dem Aste zuzurechnen, scheint
aber deshalb natürlicher, weil
sich vom vorderen Rande des
Astes eine Kante auf die Vor-
derfläche des Körpers eine

Strecke weit schräg abwärts fortsetzt, die den Ast gegen den Körper ab-
grenzt. Der untere Rand des Astes liegt nach dieser Vorstellung in der
Flucht des unteren Randes des Körpers. Die abgerundete Ecke, mit wel-
cher der untere Rand in den hinteren Rand des Astes unter einem stumpfen
Winkel übergeht, heisst Unterkieferwinkel, *Angulus mandibulae*.
Am oberen Rande ist der Ast durch einen bogenförmigen Ausschnitt,
Incisura mandibulae ³⁾, in zwei Fortsätze getheilt; der hintere Fort-
satz, Gelenkfortsatz, *Proc. condyloideus* (**Pc**) articulirt mit der Pfanne des
Schläfenbeins; der vordere, *Proc. coronoideus* (**Pco**) ⁴⁾, ist ein Muskel-
fortsatz, welchen die Sehne des *M. temporalis* umfasst.

An dem Körper des Unterkiefers ist der obere oder Zahnrand, *Limbus alveolaris*, mit Fächern zur Aufnahme der Zahnwurzeln in gleicher
Zahl und Form, wie die beiden Oberkieferbeine, versehen, nur dass die
Alveolen der Schneidezähne, wie diese Zähne selbst, im Unterkiefer klei-
ner sind als im Oberkiefer. Damit hängt zusammen, dass der Rand des
Unterkiefers, so weit er die Schneidezähne trägt, einen flacheren Bogen
bildet als der entsprechende Rand des Oberkiefers, und hinter den letzte-
ren zurückweicht; ja dass, wenn die Eckzähne und deren Fächer vortreten,
der Zahnrand des Unterkiefers statt eines Bogens eine gebrochene Linie
darstellt, transversal im mittleren Theile und unter einem stumpfen Winkel
in die Seitentheile übergehend. Der untere Rand ⁵⁾, wegen der erwähnten
Neigungen der Flächen vor den oberen vortretend, ist demselben im

¹⁾ *Rami perpendiculares seu adscendentes.*

²⁾ *Ramus horizontalis.*


³⁾ *I. semilunaris s. sigmoidea.*

⁴⁾ Von *κορώνη*, Krähe, nicht von *corona*, daher unrichtig mit Kronenfortsatz
übersetzt.

⁵⁾ Basis.

Uebrigen parallel, zwischen den Eckzähnen transversal, dann im Bo-

Fig. 184.




Unterkiefer von unten.

noch mehr markirt. Dem Zahnrande zunächst zeigt die äussere und in schwächerem Maasse die innere Fläche am deutlichsten an den Schneide- und Eckzähnen die den Zahnfächern entsprechenden Wölbungen, *Juga alveolaria*. Diese Wölbungen bewirken, dass, so weit die Schneidezähne

reichen, der obere Theil der äusseren Fläche sich im Vergleich zur unteren mehr gerade stellt und selbst nach vorn überhängt. Dadurch wird die Vorderfläche von oben nach unten concav und die Concavität wird mitunter noch tiefer durch ein wulstartiges Vortreten des unteren Randes. Sie wird aber in der Mitte des Unterkiefers unterbrochen und in zwei Gruben, Kinngruben, *Fossae mentales*, ge-

Fig. 185.



Unterkiefer von vorn.


schieden durch die *Protuberantia mentalis* ¹⁾, einen dreiseitigen Vor-

¹⁾ *Crista mentalis ext.*, *Spina m. e.*, *Tuberculum m. e.*

sprung, dessen Basis mit dem transversalen Theile des unteren Randes zusammenfällt, dessen stumpfe oder lang ausgezogene Spitze sich in der Mittellinie mehr oder minder weit zwischen die Jugalveolen der Schneidezähne erhebt. Ausserdem ist die Mittellinie durch eine sehr feine lineare Furche, eine Spur der Zusammensetzung des Unterkiefers aus zwei seitlichen Hälften bezeichnet, welche sich vom Zahnrande abwärts, selbst bis auf die Protuberantia mentalis erstreckt. Unter dem zweiten Backzahn und in der Mitte der Höhe des Unterkiefers liegt das *Foramen mentale* ¹⁾, der Ausgang eines Canals, der sich von dem, den Unterkiefer der Länge nach durchsetzenden Can. alveolaris abzweigt und Nerven und Gefässe ins Gesicht führt. In der Gegend des vierten Backzahns erhebt sich die schiefe Linie, *Linea obliqua* ²⁾, welche, wie erwähnt, rück- und aufwärts in den vorderen Rand des Astes übergeht.

Die innere Fläche des Unterkiefers (Fig. 186) steht im Allgemeinen der äusseren parallel. Durch eine Kante aber, welche dem M. mylohyoideus zum Ansatz dient und mehr oder minder vorspringend vom hintersten Backzahn bis zur Mittellinie verläuft, erhält der obere Theil der inneren Fläche eine

mehr verticale oder gar eine aufwärts schauende Richtung, wogegen der unter der Kante befindliche Theil sich stärker abwärts neigt. Da ferner jene Kante, die *Linea mylohyoidea*, auf ihrem Wege nach vorn jederseits schräg vom oberen zum unteren Rande des Kiefers herabsteigt, so ist der mit der Aussenfläche convergirende, abwärts geneigte Theil der inneren Fläche um so niedriger, je näher der Mittellinie, und am Kinn fällt er fast mit dem unteren Rande zu-



Rechte Hälfte des Unterkiefers von innen.

sammen. Die Fläche unter der *Linea mylohyoidea* ist noch durch eine Furche, *Sulcus mylohyoideus*, unterbrochen, welche vom Aste auf den Körper übergeht, sich in der Gegend der Eckzähne verliert und den N. und die Vasa mylohyoidea beherbergt. Auf dem Ast beginnt sie zuweilen als Canal, auf dem Körper wird sie bald sehr seicht; in der Gegend des letzten Backzahns ist sie gleich weit vom unteren Kiefferrand und der *Linea mylohyoidea* entfernt; nach vorn nähert sie sich, wie die *Lin. mylohyoidea*, aber in minder schrägem Verlauf, dem unteren Rande des Unterkiefers. Unter der *Linea mylohyoidea* liegen am transversalen Theile des Randes unmittelbar neben einander zwei, die Fingerspitze aufnehmende Eindrücke,

¹⁾ *F. maxillare ant.*

²⁾ *L. o. externa.*

Fossae digastricae, in welchen die vorderen Bäuche der Mm. digastrici sich befestigen; darüber eine mediane Zacke oder Firste, welche, aufwärts zuweilen in zwei getheilt, unter der Mitte der Fläche endet. Es ist die *Spina mentalis* ¹⁾, die Anheftungsstelle der Mm. geniohyoidei und darüber der Mm. genioglossi; neben derselben findet sich jederseits eine flache Grube (Fig. 186 *), in welcher der Vorderrand der Gland. sublingualis ruht ²⁾. Vom oberen Ende der Spina mentalis geht zuweilen eine sehr feine mediane Furche, wie auf der Aussenfläche, zur Scheidewand der beiden mittelsten Schneidezähne.

Aeste.

Der Ast des Unterkiefers ist auf der äusseren Fläche mit schräg ab- und rückwärts verlaufenden Streifen und breiten Furchen, den Abdrücken der Bündel des Masseter, versehen, gegen den Winkel rauh, über demselben und dem zunächst liegenden Theile des hinteren und unteren Randes etwas vertieft, so dass der Rand nach aussen umgebogen erscheint. Aehnliche schräge, nur meistens stärkere Leisten und Eindrücke finden sich, von der Insertion des M. pterygoideus int. herrührend, an der inneren Fläche des Unterkieferwinkels. In der Höhe des Zahnrandes und ziemlich in der Mitte zwischen ihrem hinteren und vorderen Rande besitzt diese Fläche eine (3 mm) weite Oeffnung, *Foramen mandibulare* ³⁾, durch welche die Nerven und Gefässe der Zähne in den *Can. mandibularis* ⁴⁾ eintreten. Den medialen Rand dieser Oeffnung bildet ein scharfes, aufwärts in eine abgerundete Spitze verlängertes Plättchen, *Lingula mandibulae*; dasselbe wird von dem Lig. laterale internum umfasst und setzt sich abwärts in den vorderen Rand des Sulcus mylohyoideus fort; beginnt aber der Sulcus myloh. als Canal, so bedeckt die Lingula den Ursprung desselben aus dem Can. mandibularis.

Proc. coronoides.

Der Proc. coronoides, in welchen der vordere Rand des Astes aufsteigt, ist von sehr verschiedener Form; er ist bald etwas höher, bald etwas niedriger als der Gelenkfortsatz, meistens aber mit diesem von gleicher Höhe; er ist, wie der ganze Ast, mehr oder minder rückwärts geneigt, in verschiedenem Grade sichelförmig rückwärts gebogen, das obere Ende spitz oder abgerundet, vertical oder zur Seite geneigt, die Höhe des Fortsatzes kürzer oder länger als der sagittale Durchmesser seiner Basis. Er ist an der Spitze ganz platt oder schon von der Spitze an auf der inneren Fläche gewölbt. Regelmässig entwickelt sich weiter abwärts auf der Innenfläche neben dem vorderen Rande eine Kante, welche im Bogen erst ab-, dann vorwärts verläuft, sich dabei allmähig von dem vorderen Rande zurückzieht und auf der Innenfläche des Körpers am letzten Backzahn endet (Fig. 186). Der Raum zwischen dem vorderen Rande des Proc. coronoides und dessen Fortsetzung, der Linea obliqua einerseits und der eben beschriebenen Kante andererseits, ist eine nach unten und vorn sich verbreiternde und vertiefende, schliesslich den Zahnrand umfassende Hohlkehle. Sie ist durch eine schwache Firste getheilt, welche von ihrem hinteren Rande zum äusseren Rande der Alveole des letzten Backzahns und oft noch eine kurze Strecke

¹⁾ *Sp. m. interna*.

²⁾ *Fossa mylohyoidea* M. J. Weber.

³⁾ *F. alveolare inf.*, *F. maxillare post.*

⁴⁾ *C. maxillaris inf.*, *C. alveolaris inf.*


vor diesem her verläuft. Die Firste kann *Crista buccinatoria* genannt werden, da ein Theil der Fasern des *M. buccinator* von ihr entspringt.

Der Gelenkfortsatz endet in einen elliptischen, flach gewölbten, von einer sehr dünnen Knorpellage bekleideten Kopf, dessen grösster Durchmesser (16^{mm}) fast transversal, mit dem medialen Ende wenig rückwärts abweichend, gestellt ist. Die hintere Fläche des Fortsatzes, dreiseitig mit aufwärts gerichteter Basis, geht aus dem hinteren Rande des Astes hervor, der sich fächerförmig, jedoch mehr median- als lateralwärts ausbreitet; an seine Vorderfläche zieht sich, gegen den lateralen Rand der Gelenkfläche, der scharfe Rand der Incisura mandib. herauf. Medianwärts von dieser Kante ist die Vorderfläche etwas ausgehöhlt, zuweilen rauh, von der Anheftung des *M. pterygoideus* ext. Die Gelenkfläche greift auf der vorderen Seite weiter herab als auf der hinteren und ist gegen jene schärfer abgesetzt als gegen diese.

Unter den mannigfaltigen Formverschiedenheiten des Gelenkfortsatzes ist wohl die seltenste die, dass die Gelenkflächen mit den transversalen Axen nach vorn convergiren. Oft verjüngt sich der sagittale Durchmesser gegen den lateralen oder medialen Rand. Zuweilen ist die Gelenkfläche auffallend nach Einer Seite abhängig oder halbmondförmig, die Concavität nach vorn, oder Sförmig gebogen.

Der Unterkiefer enthält eine feinzellige Diploe zwischen compacten Tafeln, die an der äusseren Seite mächtiger sind als an der inneren und die verhältnissmässig grösste Mächtigkeit an den Rändern und den Aesten

Fig. 187.



Verticale Durchschnitte der rechten Unterkieferhälfte, A hinter dem letzten Backzahn, B vor dem dritten Backzahn, C vor dem ersten Backzahn. Lim Linea mylohyoidea.

tale öffnet, verringert sich sein Lumen plötzlich um mehr als die Hälfte (vergl. Fig. 187 B C). Seine obere Wand ist sehr porös, regelmässiger Zweigcanälchen sind aber nur im mittleren Theile des Unterkiefers zu finden, wo sie im rechten Winkel abgehen und zwischen den Alveolen gegen den freien Rand der Septa der Schneidezähne aufsteigen.

Beim Neugeborenen besteht der Unterkiefer aus zwei seitlichen, durch eine mediane Synchronrose verbundenen Hälften. Die Verknöcherung der Synchronrose beginnt selten vor der Geburt, meistens bald nach derselben und zwar von mehreren Punkten aus. Ein linsenförmiges plattes Knochenscheibchen entsteht dicht

haben. Der *Can. mandibul.* durchzieht den Knochen ziemlich genau in der Richtung des *Sulc. mylohyoideus*, am Körper also viel näher dem unteren Rand als dem oberen; er liegt der inneren Oberfläche näher als der äusseren. Jenseits des Abgangs des Seitenzweiges, der sich am For. men-

vor der Endfläche jeder Unterkieferhälfte, mit den Flächen parallel dieser Endfläche und gleich dem Knochenkern einer Epiphyse in der Tiefe des Knorpels; ein unpaariger oder zwei dicht zusammenstossende paarige Knochenstreifen finden sich oberflächlich am unteren Rande des Knochens und dem diesem Rande zunächst liegenden Theile der vorderen Fläche in der Gegend der nachmaligen Protuberantia mentalis. Die zwei tiefen, linsenförmigen Epiphysen verbinden sich unter einander zu einem unpaaren, eiförmigen Stück, dann verwachsen sie mit den Unterkieferhälften und mit der oberflächlichen Epiphyse des Kinns; im dritten bis vierten Monat ist diese Verwachsung meistens schon so weit vollendet, dass keine Spur der Nähte mehr sichtbar ist, indess die Naht am Zahnrande des Kiefers sich, wie erwähnt, oft bis ins reife Alter erhält ¹⁾).

Im Uebrigen zeichnet sich der Unterkiefer des Säuglings vor dem des Erwachsenen aus durch die geringe Höhe der Aeste und durch den stumpfen Winkel, in welchem Körper und Aeste zusammenstossen. Statt des Foramen mandibulare finden sich zwei (selten drei) Oeffnungen, von welchen die eine zu einer Furche am Boden der hinteren Backzähne, die andere in den eigentlichen Can. mandibularis führt. Die weiteren Formveränderungen stehen mit dem Durchbruch und Wechsel der Zähne in zu genauem Verband, als dass hier darauf eingegangen werden könnte. Im hohen Alter schleifen sich, wenn die Zähne verloren gegangen sind, die Alveolarränder ab, die Aeste erhalten wieder eine mehr geneigte Stellung und der Körper, einem rippenartigen Bogen ähnlich, tritt bei geschlossenem Munde mit seinem mittleren Theile über den Rand des Oberkiefers hinauf.

Nähte.

Wir schliessen die Beschreibung des Schädels mit der Darstellung der Nähte, in welchen die denselben zusammensetzenden Knochen an seiner Oberfläche zusammenstossen.

An der Schädeldecke verlaufen zwei Nähte hinter einander und einander einigermassen parallel, die vordere zwischen dem hinteren Rande des Stirnbeins und dem vorderen der Scheitelbeine, die hintere zwischen dem hinteren Rande der Scheitelbeine und der Hinterhauptsschuppe (vgl. Fig. 74, 75). Jene wird Kronennaht, *Sutura coronalis* ²⁾, diese wird Lambdanaht, *Sutura lambdoidea* ³⁾, genannt. Die Kronennaht hat auf dem Scheitel eine genau transversale Richtung, weicht aber, indem sie sich an der Seitenwand des Schädels und in der Schläfengrube herabzieht, nach vorn ab; die Lambdanaht ist eine gebrochene Linie, deren Schenkel in einer Ebene liegen, welche zwischen der frontalen und horizontalen ziemlich die Mitte hält. Den Scheitel dieser gebrochenen Linie und die Mitte der Kronennaht verbindet die mediane Scheitelsnaht, *Sutura parietalis* ⁴⁾.

Die Kronen- und Lambdanaht treffen je mit ihrem unteren Ende in der Seitenwand des Schädels auf eine Naht, welche im Allgemeinen der Scheitelsnaht parallel, jedoch in schlangenförmigen Krümmungen auf- und abgeht (Fig. 72). An derselben nimmt von oben her das Stirn- und Scheitelbein, von unten her das Jochbein, der Temporalflügel des Wespenbeins und die Schläfenschuppe Theil. Sie beginnt, in der Höhe der Nasenwurzel, am

¹⁾ Die oberflächlichen Epiphysen wurden zuerst von Meckel beobachtet und von M. J. Weber für eine constante Durchgangsbildung erklärt. Den Zahnrand erreichen diese Zwischenknochen nicht, haben an der Bildung der Alveolen der Schneidezähne keinen Antheil und es ist deshalb nicht statthaft, sie, wie Dieterich (a. a. O. S. 18) und Arnold (Lehrb. der Physiologie Bd. II. S. 1261) gethan, den Zwischenkieferbeinen des Oberkiefers an die Seite zu stellen.

²⁾ *S. fronto-parietalis.* ³⁾ *S. occipito-parietalis, occipitalis.* ⁴⁾ *S. sagittalis.*

äusseren Rande der Augenhöhle mit der Naht zwischen Stirn- und Jochbein (*Sutura zygomatico-frontalis*), setzt sich in aufwärts convexem Bogen längs dem oberen Rande des Temporalflügels, zwischen diesem und zuerst dem Stirnbein, dann dem Scheitelbein fort, geht dann in einem zweiten längeren und stärker aufwärts gekrümmten Bogen zwischen dem Scheitelbein und der Schläfenschuppe (*Sutura squamosa*), endlich wieder in kurzem niedrigen Bogen zwischen Scheitelbein und Warzentheil nach hinten. Das Ende der Kronennaht fällt demnach etwa auf die Mitte des oberen Randes des Temporalflügels; das Ende der Lambdanaht fällt auf die hintere obere Ecke des Warzentheils des Schläfenbeins und theilt sich in zwei Schenkel, von welchen der eine (*S. parieto-mastoidea*) nach vorn in die eben beschriebene sagittale Naht der Seitenwand des Schädels umbiegt, indess der andere (*S. occipito-mastoidea*) fast in der Flucht der Hinterhauptsnaht und nur wenig rückwärts abweichend zwischen Hinterhauptsbein und Warzentheil seinen Weg zur Schädelbasis fortsetzt.

Die Nähte der Schädeldecke sind sämmtlich gezahnt, mit groben Zacken an der Aussenfläche, fein wellenförmig an der Innenfläche des Schädels. Die grössten Zacken mit zahlreichen Nebenzacken hat die Hinterhauptsnaht. Die sagittale Naht der Seitenwand ist, so weit das Wespenbein und die Schläfenschuppe betheiligt sind, Schuppennaht, dergestalt, dass die Knochen der Seitenwand die der Decke umfassen. Nur in der *Sutura parieto-mastoidea* tritt das umgekehrte Verhältniss ein und wird das Schläfenbein von der Ecke des Scheitelbeins äusserlich überragt.

Indess die sagittale Naht der Seitenwand von oben her die Kronen- und Lambdanaht aufnimmt, sendet sie nach der entgegengesetzten Richtung abwärts zur Schädelbasis drei Nähte ab, zwei im vorderen Theil der Schläfenfläche, eine hinter dem Warzenfortsatz. Die vorderste dieser Nähte, *Sutura spheno-zygomatica*, verläuft zwischen der Orbitalplatte des Jochbeins und dem Wespenbeinflügel fast vertical und stösst auf die abgerundete laterale Spitze der Fissura orbitalis inf. Indem diese Fissur median- und abwärts in die Fissura spheno-maxillaris umbeugt und von der unteren Spitze der letzteren die Naht zwischen dem Gaumenflügel des Wespenbeins und dem Proc. pyramidalis des Gaumenbeins ihren Ursprung nimmt, entsteht ein Bild (Fig. 90), wie wenn auf der Landkarte ein Fluss in einen See über- und wieder aus demselben hervorgeht, und lässt sich die untere Naht als eine mittelbare Fortsetzung der oberen betrachten. Die zweite von der sagittalen Seitennaht abwärts laufende Naht, *Sutura spheno-temporalis*, geht im Bogen zwischen Temporalflügel und Schläfenschuppe abwärts und über die Infratemporalfirste rückwärts, um an der Schädelbasis zwischen dem Unterkiefergelenk und der Spina angularis auf einer transversalen Naht, auf welche ich zurückkomme, zu enden. Die dritte Naht ist die bereits erwähnte *Sutura occipito-mastoidea*; sie zieht sich an der Schädelbasis medianwärts vom Proc. mastoideus und styloideus fast gerade nach vorn zum For. jugulare; der vorderste Theil derselben ist die *Synchondrosis petrobasilaris*.

Ausser den Nähten, welche von der Seitenwand des Schädels auf die Basis übergehen und abgesehen von den frühzeitig verknöchernden queren Synchondrosen zwischen den Körpern des Hinterhaupts- und Wespenbeins,

besitzt die Schädelbasis (Fig. 77) zwei parallele, in der Richtung der Axe der Schläfenpyramide schräg median- und vorwärts laufende Nähte, welche man freilich nicht als Nähte, sondern als Spalten aufzuführen gewöhnt ist, mit Unrecht, da sie an dem frischen Schädel ganz und gar von Knorpelmasse ausgefüllt sind. Die Hauptmasse dieses Knorpels liegt im For. lacerum; von da aus erstreckt sich die eine hintere Naht, *Sutura* (Fissura) *petrobasis*, zwischen Schläfenpyramide und Hinterhauptsbein zur lateralen Spitze des For. jugulare; die andere, vordere, *Sutura* (Fissura) *sphenopetrosa*, verläuft zwischen Schläfenpyramide und Temporalflügel und setzt sich über der medialen Mündung der knöchernen Tuba noch eine Strecke weit in der Decke derselben fort, während an der Schädelbasis in der gleichen Flucht die Fissura petrosquamosa und petrotympanica auftreten.

Wegen der Nähte am Gaumen verweise ich auf S. 170.

Im Gesicht (Fig. 81) findet sich die transversale Naht der Nasenwurzel, die sich jederseits in die Augenhöhle fortsetzt, zwischen Stirnbein einerseits und Nasenbeinen und Stirnfortsätzen des Oberkiefers andererseits; von der Mitte derselben abwärts eine mediane Naht zwischen den Nasenbeinen und zwischen den Zahnfortsätzen der Oberkieferbeine, der medianen Naht der Nasenbeine fast parallel die Naht zwischen Nasenbein und Stirnfortsatz des Oberkiefers jeder Seite, endlich etwa von der Mitte des unteren Randes der Augenhöhle schräg seit- und abwärts zum Wangenhöcker die Naht zwischen Joch- und Oberkieferbein, *Sutura zygomatico-maxillaris*. Häufig geht von der letzteren oder medianwärts neben ihr vom Augenhöhlenrande zum For. infraorbitale die dem Oberkiefer angehörige *Sutura infraorbitalis* herab.

Die Art, wie die Knochen, welche die Augenhöhle begrenzen, zusammengefügt sind (Fig. 81, 86, 87), lässt eine gewisse Symmetrie nicht erkennen. Vier Nähte laufen sagittal, ungefähr je an der Grenze der oberen, unteren, medialen und lateralen Wand. Die obere und untere Wand sind durch ziemlich entsprechende quere Nähte, die mediale und laterale Wand ebenso durch verticale Nähte abgetheilt. Die transversale Naht der Decke der Augenhöhle befindet sich zwischen Stirnbein und Orbitalflügel des Wespenbeins und grenzt von der Decke ein kleines dreiseitiges Feld im Hintergrunde der Augenhöhle ab; die transversale Naht des Bodens verläuft zwischen Oberkiefer und Proc. orbitalis des Gaumenbeins, ein ebenfalls dreiseitiges, nur noch kleineres Feld im Hintergrunde der Augenhöhle abgrenzend. Gegen die mediale Wand setzt sich die vom Stirnbein gebildete Decke durch eine Naht ab, welche längs dem Stirnfortsatz des Oberkiefers, dann dem Thränenbein, dann der Papierplatte des Siebbeins hinzieht; die Grenze gegen die laterale Wand bildet eine Naht, welche zwischen Stirn- und Jochbein beginnt, sich dann zwischen Stirnbein und Temporalflügel fortsetzt und in der Spitze der Fissura orbitalis sup. endet. An der Naht, welche die untere und mediale Wand scheidet, betheiligen sich von unten her Oberkiefer- und Gaumenbein, von oben her Thränen- und Siebbein; zwischen der unteren und lateralen Wand erstreckt sich, vom lateralen Ende der Fissura orbitalis inf. beginnend, die *Sutura zygomatico-maxillaris*. Die laterale Wand wird an der Grenze des vorderen und mittleren Drittels perpendicular getheilt durch die Naht zwischen Orbitalflügel und Jochbein;

die mediale Wand wird an der entsprechenden Stelle ebenfalls perpendicular getheilt durch die Naht zwischen Thränen- und Siebbein, ferner, dicht am vorderen Rande der Augenhöhle, durch die im Grunde der Thränengrube verlaufende Naht zwischen Stirnfortsatz des Oberkiefers und Thränenbein, und im Hintergrunde der Augenhöhle durch die Naht zwischen Siebbein und Wespenbeinkörper. Den Boden der Augenhöhle theilt in zwei seitliche Hälften die Sutura infraorbitalis zwischen dem Körper und dem Proc. zygomatico-orbitalis des Oberkieferbeins.

Im Inneren der Schädelhöhle sind an der Decke und in den beiden hinteren Abtheilungen des Bodens dieselben Nähte wie an der Aussenfläche sichtbar; in der vorderen Schädelgrube kommen die Nähte zwischen der Siebplatte des Siebbeins, dem Stirn- und Wespenbein hinzu (Fig. 74).

Die mannigfaltigen Varietäten der Schädelknochen haben, wie sich von selbst versteht, Varietäten der Nähte im Gefolge. Doch giebt es eine Art von Varietäten, bei welchen die abweichende Form der Naht als das Wesentliche sich aufdrängt und die damit verbundene Abweichung in der Form der Knochen als etwas Secundäres aufgefasst wird. Es kann — am häufigsten geschieht dies in der Lambda-naht — eine einzelne Zacke oder eine Anzahl von Zacken von einem der mit einander verbundenen Knochen sich ablösen, ringsum abgrenzen und so gleichsam eine Insel in der Naht bilden. Die von einer abnorm getheilten Naht inselartig umschlossenen Knochen werden *Nahtknochen*, *Ossa suturarum* ¹⁾, genannt.

Naht-
knochen.

Der Begriff der Nahtknochen ist übrigens in doppelter Beziehung schwankend. Erstens ist es willkürlich, ob wir einen Knochen, z. B. den oberen Theil einer durch quere Naht in zwei Stücke zerfallenen Hinterhauptsschuppe, als selbstständigen Nahtknochen oder als Theil des Knochens, von welchem er abgelöst ist, betrachten wollen. Zweitens haben die Nahtknochen mitunter nur eine vorübergehende Existenz, verschmelzen später mit dem einen oder anderen der Knochen, zwischen welche sie eingefügt sind, und gehören also eigentlich in das Gebiet der Epiphysen, wie der Knochen der Fissura petrobasilaris (S. 152), das äussere Thränenbein (S. 169) u. a. Unzweideutig sind die Nahtknochen, welche in den Bereich der beiden die Naht begrenzenden Knochen eingreifen, als ob jeder der letzteren seinen Beitrag zu dem einfachen, eingeschalteten Stück abgegeben hätte.

Eine besondere und seltene Art abnormer Nähte umschreibt Knochenstücke, welche eher den Namen *Schalt-* als *Nahtknochen*, nach der oben gegebenen Definition, verdienen würden. Es sind meist nur kleine, in der Continuität eines Knochens eingesprengte, also von einem und demselben Knochen ringsum umgebene Stücke. Am häufigsten finden sich dergleichen im Warzentheil des Schläfenbeins, sie kommen innerhalb der Zacken des Randes eines Schädelknochens und sogar innerhalb eines Nahtknochens vor.

Mit Rücksicht auf ihre Mächtigkeit lassen sich zwei Arten von Nahtknochen unterscheiden. Es giebt 1) oberflächliche, in Vertiefungen der eigentlichen Schädelknochen gleichsam nur eingelegte, und zwar ebensowohl an der äusseren Oberfläche, welche nicht bis an die Glastafel reichen, wie an der inneren Oberfläche, welche von aussen nicht wahrnehmbar sind. 2) Durchgreifende, durch deren Entfernung die Schädelwand eine Lücke bekommt. Die letzteren sind fast immer keilförmig, gegen die innere Oberfläche verjüngt. Der Anschein von Nahtknochen der ersteren Art entsteht zuweilen dadurch, dass an schuppenförmigen Nähten neben dem Naht-
rande Stifte des tieferen Knochens in Löchern des oberflächlichen aufgenommen werden (Schultz, a. a. O. S. 9).

Nahtknochen kommen symmetrisch vor, doch ist dies nicht die Regel. Die Form ihrer Ränder richtet sich nach der Form der Knochen, welche sie vertreten;

¹⁾ Schaltknochen, Zwickelbeine, Nahtdoppler, *Ossa intercalaria*, *epactalia*, *triquetra*, *Wormiana*, *raphogeminantia*.

in den zackigen Nähten des Schädels sind sie aussen zackig, innen fein wellenförmig, zwischen den Gesichtsknochen sind sie glattrandig. Ihre Grösse wie ihre Zahl ist sehr veränderlich, die Grösse vom Punktförmigen bis zu einem Durchmesser von mehreren Zollen. Die grösste Zahl kleiner Nahtknochen findet man mitunter in der Lambdanaht.

In den meisten Nähten des Schädels und Gesichts hat man Nahtknochen beobachtet, am häufigsten, wie erwähnt, in der Lambdanaht, wo bald ein unpaariger, medianer, eckiger Knochen die Spitze des Hinterhauptsbeins vertritt, bald zackige Knöchelchen in den Schenkeln der Naht reihenweise geordnet sind. Seltener sind die Nahtknochen in der Kronen-, noch seltener in der Scheitlnaht. Sehr oft findet sich ein länglicher, mit dem längsten Durchmesser sagittal gestellter Nahtknochen am unteren vorderen Winkel des Scheitelbeins; indem derselbe mit der Schläfenschuppe verwächst, bildet er die oben (S. 134) erwähnte Zacke derselben, die sich zwischen Scheitelbein und Temporalflügel einschiebt. Eben so gewöhnlich ist an der Stelle, wo der hintere untere Winkel des Scheitelbeins mit dem Hinterhauptsbein und dem Warzentheil des Schläfenbeins zusammentrifft, ein Nahtknochen oder eine Anzahl derselben, die sich auf Kosten bald des einen, bald des anderen der genannten Knochen entwickeln. Zwischen Scheitelbein und Schläfenschuppe, dem ganzen oberen Rande der letzteren entlang, wurde zuweilen ein mehrere Linien hoher Nahtknochen beobachtet, so dass die Schuppennaht doppelt vorhanden schien. In der Grube, welche in der Schädelhöhle hinter dem Jochfortsatz des Stirnbeins oberhalb der Verbindung des letzteren mit dem Temporalflügel liegt, vor oder hinter der queren Naht zwischen Siebbein, Stirnbein und Wespenbein, sowie neben der sagittalen Naht zwischen Stirn- und Siebbein kommen bei jungen Subjecten zahlreiche kleine, durch verschiedenartig angeordnete Linien umschriebene Plättchen vor (Gruber, Abh. S. 114). Statt der Knochenspitzen, welche vom Hinterhaupts- oder Schläfenbeine aus das Foramen jugulare quertheilen, findet sich ein besonderes Knöchelchen, *Ossiculum jugulare* Gruber (*Bulletin de l'academie de St. Petersburg*, T. XI. p. 93).

Unter den Nähten des Gesichts bieten die der Augenhöhle am häufigsten Nahtknochen dar und hier wieder vorzugsweise die Naht, in welcher Orbitalflügel, Oberkiefer und Jochbein einander vor dem lateralen Rande der Fissura orbit. inf. begegnen. Einen Nahtknochen in der Decke der Augenhöhle zwischen dem Wespenbein, Sieb- und Stirnbein hat Czermak (*Zeitschr. für wissensch. Zool.* Bd. III. S. 27. Taf. II) unter einigen hundert Schädeln fünf Mal angetroffen. Erwähnung verdient noch wegen der häufigen Anwesenheit feiner Nahtknochen die *Sutura incisiva*. Vergl. Sandifort, *Observat. anatomico-pathol. Lib. III. p. 103. Lib. IV. p. 134.* Rosenmüller, *De singularibus et nativis ossium c. h. varietatibus.* Lips. 1804. p. 11. Jung, *Animadv. de ossibus generatim et in specie de ossibus rhaphogeminantibus.* Basil. 1827.

Unter-
schie-
de der
Racen,

Man hat vielfach nach Charakteren an dem Schädel gesucht, mittelst welcher die Racen des Menschengeschlechts gesondert und unterschieden werden sollten. Solche Charaktere sind nicht in eigentlichen Varietäten der Form der Kopfknochen zu finden; wenigstens ist bis jetzt noch jede Varietät, welche als Eigenthümlichkeit einer fremden Race angesehen worden war, bei einheimischen Schädeln wieder-gesehen worden, und es könnte sich höchstens fragen, ob Varietäten, wie Verschmelzung der Nasenbeine, gewisse Nahtknochen und dergl., bei einer Race relativ vorwiegen. Die Racenkennzeichen bestehen nur in Verschiedenheiten der Proportion, der Neigung und Krümmung der einzelnen Elemente des Schädels. Man hat dieselben auf einen mathematischen Ausdruck zu bringen gesucht durch Vergleichung der Winkel, welchen die Stirnebene mit der Schädelbasis oder dem Gaumen oder einer durch beliebige Punkte des Schädels gelegten Ebene bildet, oder durch Vergleichung gewisser Axen des Schädels oder des Flächenraumes, welchen am Mediandurchschnitt des Schädels die Hauptabtheilungen einnehmen. Solche Proportionen können, ihrer Natur nach, keine scharfen Grenzen zwischen den einzelnen Typen bilden. Auch hat die Erfahrung gelehrt, dass kein einfaches Verhältniss zur Bezeich-

nung dessen hinreicht, was für die verschiedenen Typen charakteristisch ist. Zu dem Ende schlägt Retzius (Müll. Arch. 1845, S. 84) die Combination zweier Momente vor, der Schädelform und der Stellung der Kiefer. Er unterscheidet langköpfige Formen (mit vorwiegendem sagittalen Durchmesser) und kurzköpfige, Dolichocephali und Brachycephali, und unter diesen wieder Formen mit geraden und mit vorstehenden Kiefern, Orthognathi und Prognathi.

Bei Vergleichung der menschlichen und thierischen Schädel fällt das relative Uebergewicht des Hirn- über den Gesichtstheil beim Menschenschädel auf. Ob bei den Menschenrassen, die man als höhere und niedere einander entgegenstellt, ein ähnlicher Unterschied bestehe, haben Tiedemann (Das Hirn des Neger, Heidelberg 1837, S. 21) und Morton (*Edinb. new philosoph. Journ.* 1850. Jan.) durch Messungen der Capacität des Hirnschädels verschiedener Stämme zu entscheiden gesucht. Nach Tiedemann ist die mittlere Capacität des Neger- und Europäerschädels nicht verschieden, nur kommen die höchsten Extreme häufiger bei dem letzteren vor; nach Morton's Durchschnittszahlen ist das Negerhirn um 9" Cub. kleiner als das der germanischen Völkerschaften; allein diese Durchschnittszahlen verdienen nur geringes Vertrauen, weil Morton unterliess, männliche und weibliche Schädel zu sondern.

Der weibliche Kopf ist im Allgemeinen kleiner als der männliche, der Hirnschädel aber im Verhältniss zum Gesichtsschädel grösser. Ebenso sind die Augenhöhlen des weiblichen Schädels verhältnissmässig grösser, alle übrigen Höhlen und Canäle aber minder geräumig, der Unterkiefer enger gekrümmt. Der Schädel des Neugeborenen hat im sagittalen Durchmesser (von der Nasenwurzel zur Spitze der Hinterhauptsschuppe) 120mm, im transversalen Durchmesser (von einem Scheitelbeinhöcker zum anderen) 90mm und ungefähr eben so viel im verticalen Durchmesser. Die Knochen der Schädeldecke, die im Erwachsenen durch zackige Nähte in einander greifen, sind mit glatten oder schwach gekerbten Rändern versehen und durch fibröse Substanz, eine Fortsetzung der Bein- und harten Hirnhaut, zusammengehalten, welche eine geringe Verschiebung gestattet. Dabei treten, wenn der Druck in der Richtung des sagittalen Durchmessers wirkt, Hinteraupts- und Stirnbein unter den Rand der Scheitelbeine. Dieselbe fibröse Substanz füllt die eben erwähnten Knochenlücken an den Winkeln der Scheitelbeine, die Fontanellen (*Fonticuli*) aus. Von diesen Fontanellen sind die oberen, am vorderen und hinteren Ende der Scheitellaht befindlichen unpaar; man kann sie als Fontanellen schlechthin oder als Medianfontanellen bezeichnen und zwar als vordere ¹⁾ und hintere ²⁾. Die an den unteren Winkeln gelegenen Fontanellen nennt man Seitenfontanellen, *Fonticuli laterales*, und unterscheidet ebenfalls eine vordere ³⁾ und hintere ⁴⁾. Die vordere Medianfontanelle ist vierseitig, von der Gestalt eines Papierdrachens, den stumpfen, von den vorderen Rändern der Scheitelbeine eingefassten Winkel rückwärts gerichtet, den spitzen Winkel nach vorn, mehr oder minder tief zwischen die beiden Stirnbeinhälften eindringend. Die hintere Medianfontanelle hat die Form eines kleinen, stumpfwinkligen Dreiecks, dessen Basis von der Spitze des Hinterhauptsbeins gebildet, dessen stumpfer Winkel von den Scheitelbeinen eingeschlossen wird. Die vordere Seitenfontanelle ist eine längliche, mit dem längsten Durchmesser sagittal gestellte Spalte, vorn vom Stirnbein, oben vom Scheitelbein, unten vom oberen Rande des Temporallügels, hinten von der Schläfenschuppe begrenzt. Die hintere Seitenfontanelle, zwischen dem Warzentheil des Schläfenbeins, dem hinteren unteren Winkel des Scheitelbeins und dem Hinterhauptsbein, ist von unregelmässiger Form, medianwärts in die Spalte zwischen der Schuppe und dem Seitenstück des Hinterhauptsbeins, öfters auch in die Querspalte der Hinterhauptsschuppe (S. 97) verlängert. Nicht selten setzt eine streifenförmige Knochenlücke zwischen dem unteren Rande des Scheitelbeins und dem oberen Rande des Schläfen-

des Geschlechts,

des Alters.

Fontanellen.

¹⁾ Grosse, vierseitige oder Stirnfontanelle, *Fonticulus anterior, major, quadrangularis*.

²⁾ Kleine, dreiseitige, Hinterhauptsfontanelle, *Font. posterior, minor, triangularis*.

³⁾ Keilbeinfontanelle. ⁴⁾ *Font. Casseri*, Warzenfontanelle.

beins die vordere und hintere Seitenfontanelle mit einander in Verbindung. Kurze Zeit nach der Geburt schliesst sich die hintere Median- und die vordere Seitenfontanelle. Die vordere Medianfontanelle erhält sich bis zum Anfang und zuweilen selbst bis ans Ende des zweiten Jahres.


Zugleich mit der Ausbildung der Nähte entstehen an der inneren Oberfläche der Schädelknochen die den Gefässen und den Wölbungen der Gehirnoberfläche entsprechenden Eindrücke.

Im höheren Alter findet häufig eine Obliteration der Nähte Statt, welche von der inneren Tafel gegen die äussere fortschreitet, zuerst gewöhnlich in der Scheitelnäht, dann in der Kronen- und Hinterhauptsnaht. Uebrigens gehören auch frühzeitige Verknöcherungen sämtlicher Nähte, noch in den Jahren des Wachstums, nicht zu den Seltenheiten (Sandifort a. a. O.). Durch vorzeitige Verknöcherung der einen oder anderen Naht wird der Schädel verhindert, sich gleichmässig auszudehnen; es entstehen abnorm spitze oder im sagittalen Durchmesser verlängerte oder assymmetrische Schädelformen, je nachdem der Absatz neuer Knochenmaterie zuerst an den transversalen Nähten oder an der sagittalen beeinträchtigt ist (vergl. Virchow, Verh. der physikal.-medizin. Gesellsch. in Würzburg Bd. II. S. 238).

B. Knochen der Extremitäten.

Jede Extremität besteht aus dem Gürtel und der eigentlichen Gliedmaasse (S. 22).

Fig. 188.



Skelett des Rumpfes mit dem Gürtel der oberen und unteren Extremität.

Den Gürtel der oberen Extremität setzen zwei Knochen zusammen, das Schulterblatt, *Scapula*, ein breiter, dreiseitiger, auf der hinteren Fläche des Brustkorbes platt aufliegender Knochen, und das Schlüsselbein, *Clavicula*, der cylindrischen Gestalt sich nähernd und, einer Strebe gleich, zwischen der lateralen Ecke des Schulterblattes und dem Schlüsselbeinausschnitt des Brustbeins befestigt. Den Gürtel der unteren Extremität bildet im Erwachsenen jederseits ein einziger Knochen, das Hüftbein, *Os coxae*, dessen obere, den untersten Theil der Seitenwand des Rumpfes stützende Hälfte breit und platt ist, dessen untere Hälfte, in dem

B. Knochen
der Extre-
mitäten.


Gürtel.

abwärts geneigten untersten Theile der Vorderwand des Rumpfes gelegen, aus ebenfalls platten, aber verhältnissmässig schmalen, eine ovale Oeffnung umschliessenden Knochenleisten besteht.

Bis gegen die Zeit des Zahnwechsels ist das Hüftbein (Fig. 189) aus drei durch Synchondrose verbundenen Stücken zusammengesetzt, eins,

*Thy. mault
pubis. 6*

Fig. 189.



Linke obere und untere Extremität, Profilansicht. Vgl. S. 202 und 205.

Os ilium, für die breite, obere Hälfte, zwei, welche, Halbringen ähnlich, die ovale Oeffnung der unteren Hälfte einfassen, *Os ischii* und *Os pubis*. Da nun auch am Schulterblatt ein Fortsatz sich befindet, der *Processus coracoideus*, welchen man als das verkümmerte und mit dem Schulterblatt verwachsene Rudiment eines bei Vögeln und Reptilien selbständigen

dritten Knochens des oberen Extremitätengürtels ansehen kann: so würden die beiden Extremitätengürtel einander bezüglich der Zahl und einigermaassen auch der Form ihrer Bestandtheile entsprechen. Darin aber weichen sie von einander ab, dass in der Oberextremität nur das Schulterblatt, in der unteren alle drei Knochen an der Bildung der Gelenkpfanne für die Gliedmaassen Antheil nehmen, ferner dass die Gürtel der unteren Extremität unmittelbar, die der oberen durch Vermittelung des Brustbeins in der Mittellinie zusammenstossen.

Glied-
maassen.

Die Gliedmaassen sind aus einer grösseren Zahl zum Theil cylindrischer, zum Theil kurzer Knochen zusammengefügt und lassen sich in Abtheilungen zerlegen, welche gleicherweise, jedoch nicht ohne bedeutende Verschiedenheiten, in der oberen und unteren Extremität wiederkehren. Die oberste Abtheilung — Oberarm, Oberschenkel — bildet ein einziger, verhältnissmässig starker und langer cylindrischer Knochen (*Humerus*, *Femur*); in der zweiten Abtheilung — Unterarm, Unterschenkel — liegen zwei ähnliche, etwas kürzere Knochen neben einander, der Länge nach durch eine fibröse Haut, Zwischenknochenhaut, *Membrana interossea*, an einander geheftet. An der oberen Gliedmaasse trägt das obere Ende des stärkeren dieser Knochen, der *Ulna*, einen aufwärts ragenden Fortsatz, *Olecranon*, welcher der Sehne der Streckmuskeln zur Insertion dient; an der unteren Gliedmaasse ist der gleichbedeutende Fortsatz ein besonderer scheibenförmiger Knochen, Kniescheibe, *Patella*, nur durch Bandmasse mit dem betreffenden Röhrenknochen, *Tibia*, verbunden. Am Bein articulirt nur dieser stärkere Knochen, am Arm articuliren beide mit dem unteren Ende des einfachen Knochens der ersten Abtheilung. Die dritte Abtheilung — Hand, Fuss — zerfällt wieder in drei Unterabtheilungen. Die erste — Hand- und Fusswurzel — enthält eine Anzahl kurzer, in Querreihen geordneter Knochen; in der zweiten Unterabtheilung — Mittelhand, Mittelfuss — liegen cylindrische Knochen, der Zahl der Finger oder Zehen entsprechend, neben einander, am oberen, und, mit Einer Ausnahme (Daumen), am unteren Ende durch Bänder an einander befestigt, mit Zwischenräumen, welche von Muskeln ausgefüllt werden. Die dritte Unterabtheilung machen die Finger und Zehen aus, je vier aus drei cylindrischen Gliedern, ein äusserster — Daumen, Grosszehe (*Pollex*, *Hallux*) — aus zwei Gliedern gebildet. Finger und Zehen werden von der Daumen- und Grosszehenseite an gezählt. Die Länge der Glieder der einzelnen Finger und Zehen nimmt im Allgemeinen von der Wurzel der Hand und des Fusses gegen die Spitze der Gliedmaasse ab; eine Ausnahme machen die kleineren Zehen, deren letztes Glied das vorletzte an Länge übertrifft. Die cylindrischen Knochen der Finger- und Zehenglieder heissen *Phalangen*; wir nennen die Knochen der ersten Glieder Grundphalangen, die der zweiten Glieder Mittelphalangen, die der dritten Endphalangen ¹⁾. Dem Daumen und der Grosszehe fehlt die Mittelphalange. Dagegen besitzen sie beide je zwei scheibenförmige Knöchelchen, *Sesambeine*, an dem lateralen und me-

¹⁾ Chaussier's Bezeichnung *Phalange*, *Phalangine* und *Phalangette* für das erste bis dritte Glied giebt dem Namen *Phalange* einen doppelten, engeren und weiteren Sinn. Die Endphalangen werden auch Nagelglieder genannt.

dialen Rande der Beugeseite des Gelenks des Mittelhand- (Fuss-) Knochens mit der Grundphalange.

Ausnahmsweise kommen einzelne Sesambeine an dem entsprechenden Gelenke des zweiten und fünften Fingers (Zehe) und an dem Gelenke zwischen Grund- und Mittelphalange des Daumens und der Grosszehe vor.

Das Gelenk, in welchem die Gliedmaassen mit dem Gürtel articuliren, ist ein Kugelgelenk, und zwar trägt der Knochen der Gliedmaasse (Arm- und Schenkelbein) den kugeligen Gelenkkopf, *Condylus*, indess die entsprechende Gelenkhöhle den Knochen des Gürtels angehört. Diese Höhle schaut lateralwärts; der Kugelabschnitt, der sich in derselben bewegen soll, muss demnach mit seiner gewölbten Oberfläche medianwärts gerichtet sein; er muss, da die ruhende Extremität mit der Längsaxe vertical am Leibe herabhängt, am oberen Ende der medialen Fläche des cylindrischen Knochens angebracht sein. Hier steht er auf einem, am Schenkel ansehnlichen, am Arm kaum angedeuteten, zunächst hinter dem Rande des Gelenkkopfes gleichsam eingeschnürten, cylindrischen Vorsprung, dem Hals, dessen Längsaxe die Längsaxe des Gliedes unter einem stumpfen Winkel schneidet.


Die Gelenke der Gliedmaassenknochen unter sich sind grösstentheils Winkelgelenke, d. h. Gelenke, in welchen der convexe Kopf einen liegenden Cylinderabschnitt darstellt und sich in einer entsprechenden Aushöhlung um seine Längsaxe dreht, was eine Bewegung der articulirenden Knochen auf- und abwärts in einer Ebene, eine Streckung und Beugung zur Folge hat. Selbst wo die kugelförmige Gestalt der Flächen eine Axendrehung gestatten würde, wie in den Gelenken der Mittelhandknochen mit der Grundphalange, ist die Bewegung durch die Bänder auf Streckung und Beugung eingeschränkt. Ausnahmen machen: das Gelenk zwischen beiden Vorderarmknochen, worauf ich zurückkomme, ferner die sattelförmigen Gelenke der Hand- und Fusswurzel mit den Knochen der Mittelhand und des Mittelfusses; endlich die straffen Gelenke der Hand- und Fusswurzelbeine unter sich, welche aus Flächen von verschiedener Gestalt gebildet sind und geringe Verschiebungen in verschiedenem Sinne gestatten. Uebrigens sind auch die Winkelgelenke nicht alle gleich genau und in vielen derselben hat der Gelenkkopf Spielraum genug, um sich, wie z. B. der Fuss im Knöchelgelenk, nach verschiedenen Richtungen in seiner Pfanne schräg zu stellen.

Im Allgemeinen gehört bei den Winkelgelenken der Extremitäten dem höheren Knochen der Gelenkkopf, dem tieferen die Pfanne an, so dass also der beweglichere Theil nicht in, sondern auf dem minder beweglichen articulirt. Das Umgekehrte findet in den Gelenken des Unterarms mit der Hand, des Unterschenkels mit dem Fusse Statt.

Die Ortsveränderungen, zu welchen die im Winkelgelenk beweglichen Glieder befähigt sind, werden, wie erwähnt, Beugung und Streckung genannt. Gestreckt heissen Glieder, wenn sie eine gerade Linie ausmachen; durch die Beugung wird die gerade Linie in eine gebrochene verwandelt. Dies Kriterium reicht indess nicht überall aus; denn es giebt Gelenke, wie z. B. das Knöchelgelenk der Hand und des Fusses, in welchen die Knochen nach zwei entgegengesetzten Richtungen aus der geradlinigen Lage in die gebrochene ausweichen. Dadurch, dass beide Be-

wegungen gebrochene Linien erzeugen, hört die eine nicht auf, sich zu


Fig. 190.



der anderen als deren Gegensatz zu verhalten, und wenn wir die eine als Beugung betrachten, kann uns die andere nur als Uebermaass der Streckung erscheinen. Was nunmehr Beugung, was übermässige Streckung sei, darüber lassen wir die Analogie entscheiden. An der oberen Gliedmaasse ist die Wahl nicht schwer; Beugung ist hier die Bewegung, welche die Finger gegen die Hohlhand einschlägt, die Vorderfläche des Unterarms gegen die gleichnamige Fläche des Oberarms heraufführt, consequenter Weise also auch die Bewegung, durch welche die Hohlhand sich der Vorderfläche des Unterarms nähert. Hängt der Arm mit vorwärts gerichteter Hohlhand herab, so ist, entsprechend den Flächen des Rumpfes, die ganze hintere Fläche Rücken- oder Streckseite, die ganze vordere Fläche Beuge-seite. Die untere Gliedmaasse richtet die Streckseite des Kniegelenks nach vorn, der Zehengelenke nach oben; darüber, dass die obere, gewölbte Fläche des Fusses dem gewölbten Rücken der Hand, die untere

oder Hohlfläche (Sohle, *Planta*) der vorderen oder Hohlfläche (*Vola*) der Hand entspreche, kann nach der Configuration der Knochen und Muskeln kein Zweifel obwalten. Dann aber ist die Bewegung im Knöchelgelenk, durch welche die Zehenspitzen gegen das Schienbein gehoben werden, Streckung, die Hebung der

Fig. 191.



Ferse Beugung. Die Haltung des Fusses beim aufrechten Stehen ist schon Ueberstreckung und bei der äussersten Beugung erreichen wir es kaum, die Beugefläche des Fusses und Unterschenkels in eine Ebene zu bringen. Bei dieser Haltung aber, in welcher der Fussrücken vorwärts und die Sohle rückwärts sieht, ist die ganze Vorderfläche der unteren Gliedmaasse Streckseite, die hintere Fläche Beugeseite.

Diese Auffassung steht im Widerspruch mit der Sprache des gemeinen Lebens und sogar mit der gangbaren anatomischen Terminologie, wonach „den Fuss strecken“ so viel heisst, als die Spitze desselben abwärts gegen den Boden bewegen. Wir schmeicheln uns auch nicht, dass wissenschaftliche Bedenken mächtig genug sein werden, die populäre Ausdrucksweise umzugestalten. Der Nachtheil des Widerspruchs aber wird aufgewogen durch die Vortheile, welche die consequentere Verfolgung der Analogie bei der Beschreibung der Knochen

und insbesondere der Muskeln gewährt.

Dadurch, dass die obere und untere Extremität ihre Streck- und Beugeseite von einander abwenden, die obere sich im Ellbogen nach hinten, die untere im Knie nach vorn beugt, machen sie eine Ausnahme von dem Gesetz der gleichsinnigen Anordnung der in der Längsaxe des Körpers einander wiederholenden Theile (S. 5) und zeigen vielmehr eine Tendenz zur Symmetrie, die sich, wenn man beide Extremitäten in der Seitenansicht oder wenn man die Vorderfläche der einen mit der hinteren Fläche der anderen vergleicht, selbst in untergeordneten Einzelheiten nicht verläugnet. So ist der Hals des Schenkelbeins vom Körper dieses Knochens an etwas nach vorn, der gleichnamige Theil des Oberarms in gleichem Maasse rückwärts gerichtet. Von den zwei starken Muskelfortsätzen, welche am oberen Ende des Arm- und Schenkelbeins, gegenüber der Verbindung des Halses mit dem Körper, hervorragen, steht am Schenkelbein der kleinere, *Trochanter minor*, hinter dem grösseren, *Tr. major*, am Armbein dagegen der kleinere, *Tuberculum minus*, vor dem grösseren, *Tub. maj.* Die unteren Gelenkhöcker des Armbeins sind nach vorn, die des Schenkelbeins nach hinten umgebogen. *Olecranon* und *Patella*, welche einander entsprechen, liegen jenes an der hinteren, diese an der vorderen Seite des betreffenden Gelenks. Von den beiden Röhrenknochen

Analogie
der oberen
und unteren
Gliedmaasse.

des Unterarmes ist der mediale, *Ulna*, schwach rückwärts convex, am Unterschenkel zeigt der mediale Knochen, *Tibia*, eine schwache Wölbung nach vorn; der laterale Knochen, *Radius*, *Fibula*, ist dort in der Nähe des vorderen Randes, hier in der Nähe des hinteren Randes des medialen Knochens eingelenkt.


Diese ausnahmsweise Symmetrie erstreckt sich indess nicht auf das untere Ende der Gliedmaasse. In dem Verhältniss der Hand zum Fuss stellt sich die regelmässige, gleichsinnige Anordnung wieder her und darauf beruht ein auffallender Mangel an Uebereinstimmung zwischen beiden Extremitäten, dass nämlich der Daumen der Hand unter dem lateralen Knochen des Unterarms oder an dem Radialrande der Hand, der Daumen des Fusses dagegen unter dem medialen Knochen des Unterschenkels oder am Tibialrande des Fusses liegt. Man wird diese Verschiedenheit am leichtesten dadurch verständlich machen, dass man sich die Aufgabe stellt, mittelst einer Operation an der oberen Extremität den Uebergang aus der symmetrischen Anordnung (des Armes und Beines) in die gleichsinnige (der Hand und des Fusses) zu bewerkstelligen. Das Einfachste wäre alsdann, die Hand aus ihrem Gelenke zu lösen und sie, um ihre Längsaxe gedreht, so wieder einzusetzen, dass der Rücken derselben in eine Flucht mit der Beugeseite, die Vola in eine Flucht mit der Streckseite des Armes zu liegen käme. Die Natur erreicht dasselbe, indem sie den Vorderarmknochen eine Einrichtung giebt, vermöge welcher das untere Ende des Radius und mit ihm die Hand sich über die Vorderfläche des unteren Endes der Ulna weg medianwärts herumzuwälzen vermag. Sie stellt so aus der symmetrischen Haltung, wobei die Handfläche vorwärts gerichtet ist, aus der sogenannten *Supination*, jeden Augenblick die gleichsinnige Haltung, die sogenannte *Pronation*, her. Sollen aber die Hand in der Pronation und der Fuss einander decken, sollen ihre Daumen- und Kleinfingerseiten einander entsprechen, so musste der Daumen der supinirten Hand an dem dem Daumenrande des Fusses entgegengesetzten Rande sich befinden.

Um Hand und Fuss mit einander zu vergleichen, muss man sie also so neben einander stellen, als ob man die Hand zur Nachahmung des vierfüssigen Ganges benützte. Die Verschiedenheiten, welche man hierbei gewahrt, scheinen auf den ersten Blick wesentlicher, als sie wirklich sind. Zwar zählt man an der Fusswurzel sieben, an der Handwurzel acht Knochen; allein von den Knochen der Handwurzel liegt einer, das Erbsenbein (3'), nicht in der Reihe und ist nur als ein selbständig gewordener Fortsatz des Knochens zu betrachten, auf dessen Volarfläche er eingelenkt ist. Der analoge, aber angewachsene Fortsatz der Fusswurzel ist der Proc. calcanei des Fersenbeins (III'), welcher freilich durch seine Grösse und seine Verlängerung über das Knöchelgelenk hinaus nach hinten dem Fusse eine eigenthümliche und von der Form der Hand sehr abweichende Gestalt verleiht.

Die Knochen der Handwurzel liegen in zwei Reihen, die der Fusswurzel am Kleinzehe nrande in zwei, am Grosszehe nrande in drei Reihen. Bei näherer Betrachtung löst sich auch diese Differenz auf und es wird

leicht, die einzelnen Hand- und Fusswurzelknochen auf dasselbe Schema zu beziehen. Es besteht nämlich an der Handwurzel eine erste Reihe aus drei Knochen — das Erbsenbein zähle ich aus dem eben angeführten


Fig. 193.



Handwurzel von der Beugeseite.
Mc Mittelhandknochen.

Grunde nicht mit —, welche mit einander einen platten Bogen darstellen, dessen convexe Seite zur Articulation mit den Vorderarmknochen bestimmt ist. Die Concavität dieses Bogens wird ausgefüllt und ein gerader Rand der Handwurzel gegen den zweiten bis fünften Finger hergestellt, durch eine zweite, ebenfalls aus drei Stücken gebildete Reihe, welche demnach einem stumpfen, von der Volar- gegen die Dorsalfläche

zusammengedrückten, mit der Spitze schulterwärts gerichteten Kegel gleicht. Ein siebenter, würfelförmiger Knochen ist an der Daumenseite, gemäss dem Winkel, welchen die Längsaxe des Daumens mit der Längsaxe der ganzen Extremität bildet, in einen rechtwinkeligen Ausschnitt der ersten und zweiten Reihe so eingeschoben, dass die Diagonalen seiner vorderen und hinteren Fläche mit der Längs- und Queraxe der Hand parallel stehen; die eine, der transversalen Diagonale entsprechende Ecke ist demnach gerade auf die Spalte zwischen der ersten und zweiten Reihe gerichtet und die Articulationsflächen mit der ersten Reihe und der Mittelhand, welche bei supinirt hängendem Arme horizontal liegen sollten, sind ab- und lateralwärts geneigt. Die Knochen der ersten Reihe sind, von der Daumen- gegen die Kleinfingerseite gezählt: Kahnbein (1), Mondbein (2), Pyramidenbein (3) mit dem Erbsenbein (3'); in der zweiten Reihe folgen einander in der gleichen Richtung: Trapezoidbein (4), Kopfbein (5) und Hakenbein (6); der Handwurzelknochen des Daumens, den man eben-



Fusswurzel von der Beugeseite. Mt Mittelfussknochen.

sowohl in der ersten wie in der zweiten Reihe mitzählen kann, ist das Trapezbein (7) ¹⁾. Eine Unregelmässigkeit aber ist noch hervorzuheben gleichsam im Gefolge der schrägen Stellung des Trapezbeins: dass nämlich der an das Trapezbein anstossende Knochen, das Trapezoidbein, während es mit seiner unteren Fläche einen wesentlichen Theil der Basis des erwähnten Kegels bildet, doch mit der lateralen und oberen Fläche an der Wölbung des Kegels nicht continuirlich Theil nimmt und in die Concavität der ersten Reihe nicht mit eingeht. Vielmehr ist seine obere Fläche in gleicher Flucht mit der oberen Fläche des Trapezbeins schräg median- und abwärts abgeschnitten und stösst medianwärts vom Trapezbein auf die lateral- und abwärts gewandte Gelenkfläche des Kahnbeins.

Var. Einen neunten Handwurzelknochen zwischen dem Trapezoid- und Kopfbein erwähnt Salzmann vgl. Haller, *disp. anat. Vol. VI. p. 691.* Sömmerring beobachtete eine Verschmelzung des Mond- und Pyramidenbeins.

Der aus den drei Knochen der ersten Reihe gebildete Bogen der Handwurzel kehrt am Fuss mit derselben Knochenzahl wieder. Aber wie im Kniegelenk das obere Ende der Tibia durch seine Ausbreitung die Fibula von der Articulation mit dem Schenkelbein abdrängt, so bemächtigt sich am Knöchelgelenk das Sprungbein (II), der mittlere Knochen der Reihe, für sich allein der Verbindung mit den Knochen des Unterschenkels. Es schiebt sich gleichsam zwischen seinen Nebenknochen hervor und herauf; es richtet die Fläche, die seinem Nachbar zur Kleinzehenseite zugekehrt sein sollte, abwärts, die Fläche, die dem Nachbar zur Grosszehenseite zugekehrt sein sollte, vorwärts und schliesst sich, indem es sich zwischen beide Nachbarn zurückzieht, von der Articulation mit der zweiten Reihe der Fusswurzelknochen aus. Offenbar ist das Sprungbein der dem Mondbein analoge Knochen; der Knochen, welcher vor ihm liegt und, nach Analogie der Hand, daumenwärts neben ihm liegen sollte, das Schiffbein (II), entspricht dem Kahnbein; der unterhalb des Sprungbeins gelegene Knochen, Fersenbein (III) mit dem Fersenfortsatz (III'), entspricht, wie bereits erwähnt, einem mit dem Erbsenbein verschmolzenen Pyramidenbein. Die rechtwinkliche Stellung der Längsaxe des Fusses gegen die Längsaxe des Unterschenkels, welche für den Fuss im Vergleich zur Hand charakteristisch ist, kann man sich so zu Stande gekommen denken, dass bei anfänglich hängendem Fuss die Ueberknorpelung sich von der oberen Fläche des Sprungbeins nach vorn auf die Rückenfläche herabgezogen habe.

In der zweiten Reihe der Fusswurzelknochen liegt zunächst an der Kleinzehenseite ein ähnlicher, aus drei Knochen gebildeter, nur minder regelmässiger Kegel, wie in der Hand, ebenso mit der Spitze in die Concavität der ersten Reihe eindringend und auf der Grundfläche die Gelenkflächen für die vier äusseren Mittelfussknochen tragend. Das Trapezoidbein findet sich in dem zweiten Keilbein (IV), das Kopfbein in dem dritten Keilbein (V), das Hakenbein in dem Würfelbein (VI) wieder, und die Aehnlichkeit beschränkt sich nicht auf die Stellung, sondern lässt sich auch

¹⁾ Ich habe den Namen Pyramidenbein, Trapezoid- und Trapezbein den Vorzug gegeben vor den bei uns mehr eingebürgerten Namen „dreiseitiges, grosses und kleines vielsseitiges Bein“, weil sie in der Anwendung bequemer sind.

in der Form der Knochen nachweisen mit dem Unterschiede, dass in der Hand das Kopfbein, im Fuss das Würfelbein die Spitze des Kegels ausmacht und dass die Gelenkfläche, welche in der Hand an der unteren Fläche des Mondbeins liegt, im Fusse dem Schiffbein mit übertragen ist. Die Rolle des Trapezbeins übernimmt unter den Fusswurzelknochen das erste Keilbein (VII); da aber die Grosszehe den übrigen nicht entgegengestellt wird und ihre Längsaxe von der Längsaxe des Fusses nur wenig abweicht, so stehen auch Flächen und Ränder des ersten Keilbeins den entsprechenden Flächen und Rändern der übrigen Knochen der zweiten Reihe mehr parallel und das erste Keilbein schliesst sich natürlicher an die zweite als an die erste Reihe der Fusswurzelknochen an.

Bezüglich der Proportionen besteht zwischen Hand und Fuss der Unterschied, dass an der Hand jede folgende Abtheilung die vorhergehende an Länge übertrifft, indess an der unteren Extremität die Zehen von dem Mittelfuss, der Mittelfuss von der Fusswurzel an Länge übertroffen werden. Unter den Fingern ist der mittlere, unter den Zehen die zweite am längsten.

I. Knochen der oberen Extremität.

a. Knochen des Gürtels der oberen Extremität.

1. Schulterblatt, *Scapula* ¹⁾.

Das Schulterblatt ist ein platter und sehr dünner, schwach nach hinten gewölbter Knochen, dessen Tafeln nur in der Nähe der Ränder Diploe einschliessen. Es hat die Form eines spitzwinklichen Dreiecks mit wenig gekrümmten Seiten, die schmalste Seite nach oben, den spitzesten Winkel nach unten, etwas mehr als doppelt so hoch (170^{mm}) als am oberen Rande breit. Die Winkel sind demnach als unterer, oberer medialer und oberer lateraler, die Ränder als oberer, medialer und lateraler zu bezeichnen. Die Flächen sind eine hintere, convexe ²⁾ und eine vordere, concave ³⁾. Wegen der gewölbten Form des Rückens, an dessen Seitentheilen das Schulterblatt liegt, ist aber die vordere Fläche zugleich median- und etwas abwärts, die hintere Fläche lateral- und etwas aufwärts gekehrt. In ruhiger Haltung des Armes reicht das Schulterblatt vom ersten Intercostalraum bis zur siebenten Rippe oder bis zum Zwischenraum der siebenten und achten. Sein medialer Rand ist von den Spitzen der Querfortsätze ungefähr eben so weit entfernt, als die Spitzen der Querfortsätze von den Dornen. Der Mittelpunkt des Oberarmgelenks steht in gleicher Höhe mit dem unteren Rande des vierten Rückenwirbels.


Der mediale Rand (Basis) des Schulterblattes ist gegen das obere und untere Ende stärker als in der Mitte; er stellt eine schwach convexe oder

I. Obere
Extremität.
a. Gürtel.
1. Schulter-
blatt.

¹⁾ *Omplata*. ²⁾ *Superf. dorsalis*. ³⁾ *Superf. costalis*.


eine gebrochene Linie dar, welche bis zur Grenze des oberen und zweiten Viertels median- und vom zweiten Viertel an lateralwärts von der Verticalen abweicht, so dass bei ruhiger Haltung des Armes der untere Winkel meist etwas weiter als der mediale obere von der Mittellinie des Rückens entfernt ist. Der Winkel, welchen der mediale Rand mit dem oberen bildet, ist bald stumpf und abgerundet, bald spitz; je spitzer er ist, um so schräger abwärts und um so tiefer ausgeschnitten verläuft der obere Rand von der medialen zur lateralen Ecke. Der untere Winkel ist ab-

Fig. 194.



Linkes Schulterblatt von vorn.

Fig. 195.

Linkes Schulterblatt von der lateralen Kante. *sm* Oberer medialer Winkel.

gerundet. Von ihm aus geht der laterale Rand gerade oder wellenförmig in einer die Mitte zwischen der transversalen und verticalen haltenden Richtung aufwärts; bei starken Körpern springt er zunächst dem unteren Winkel convex oder in Form einer platten, stumpfen Zacke vor und vergrößert so die Fläche, von welcher an der Rückseite der *M. teres maj.* seinen Ursprung nimmt (Fig. 195, 196 *tmj*). Weiter hinauf wird er breiter und durch einen niedrigen, aber scharfen Kamm (*) der Länge nach getheilt in einen halbcylindrischen Wulst (*tm*), welcher die hintere Fläche säumt (Ursprungsstelle des *M. teres minor*), und eine Rinne (**), welche, wie sie aufwärts an Breite und Tiefe zunimmt, sich allmähig mehr auf die vordere Fläche wendet, von der sie durch eine stumpfe Kante geschieden ist.

Die Stelle des oberen lateralen Winkels vertritt der Gelenkknopf, *Condylus scapulae*, mit der lateral- und vor- und etwas aufwärts gerichteten Gelenkgrube, *Cav. glenoidea*, für den Oberarm. Die Gelenkgrube ist im Verhältniss zum Armbeinkopf klein; sie ist flach, eiförmig mit nach oben gerichteter Spitze und am vorderen Rande unter der Spitze leicht eingebogen (Fig. 195). Ihre Höhe beträgt 40^{mm}, ihre grösste Breite (in sagittaler Richtung.) 30^{mm}. Zu dieser Mächtigkeit verdickt sich das Schulter-

blatt, indem seine vordere Fläche allmähig und eben, seine hintere Fläche mittelst eines aufgeworfenen und rauhen Randes an den Rand der Gelenkgrube herantritt. Der zunächst hinter diesem aufgeworfenen Rande gelegene, leicht eingeschnürte Theil wird Hals, *Collum scapulae*, genannt. Die Einschnürung vertieft sich am unteren Rande des Gelenkknopfes zu einem Grübchen und wird um so auffallender, weil gerade unter derselben ein Höcker, *Tuberculum infraglenoidale*, vorragt, worin der eben erwähnte Kamm des lateralen Randes endet. Von dem Höcker, aus dem Grübchen und vom Rande des Gelenkknopfes vor dem letzteren nimmt der lange Kopf des Extensor triceps seinen Ursprung. Am oberen Rande der Oberarmpfanne, gerade über der Spitze derselben, findet sich ein Eindruck oder eine kleine Rauigkeit, *Tuberculum supraglenoidale*, die Ursprungsstelle des langen Kopfes des M. biceps. Unmittelbar neben derselben erhebt sich vom oberen Rande des Schulterblattes ein starker und platter, hakenförmiger Muskelfortsatz, Schulterhaken, *Proc. coracoideus* ¹⁾. Er steigt eine kurze Strecke gerade auf, mit Flächen, welche in der Flucht der Flächen des Schulterblattkörpers liegen, und biegt dann so um, dass seine Flächen nahezu horizontal, die obere zugleich etwas medianwärts, die untere lateralwärts zu liegen kommen. Der Uebergang der vorderen Fläche in die untere ist sanft und glatt; der Uebergang der hinteren in die obere ist durch einen quer über den Fortsatz ziehenden rauhen Wulst bezeichnet. Mit der Flächenkrümmung ist eine Krümmung der Kante verbunden, wodurch der anfangs parallel dem längsten Durchmesser der Gelenkpfanne sich erhebende Fortsatz fast rechtwinkelig in eine Richtung umlenkt, welche einem auf den Mittelpunkt der Pfanne gefällten Loth parallel geht; oder wodurch er, das Schulterblatt in seine natürliche Lage gedacht, sich aus der anfänglich median- und vorwärts aufsteigenden Richtung lateral- und vorwärts wendet. Bei der Drehung des Fortsatzes verringert sich die anfängliche Breite desselben (27^{mm}) fast um die Hälfte; seine platt abgerundete Spitze steht in gerader Linie über dem unteren Rande der Gelenkpfanne.

Der verticale Theil des Schulterhakens scheint am medialen Rande höher als am lateralen, weil sein medialer Rand geradezu in einen mehr oder minder tief halbkreisförmigen Ausschnitt des oberen Randes des Schulterblattes übergeht. Dieser Ausschnitt, *Incisura* ²⁾ *scapulae*, über welchem Nerven und Gefäße von der seitlichen Halsgegend zur Rückenfläche des Schulterblattes verlaufen, ist durch ein Querband überbrückt, welches theilweise oder ganz verknöchern kann und dann den Ausschnitt in eine kreisförmige Oeffnung verwandelt.


Die Vorderfläche des Schulterblatts ist vom medialen Rande her eine Strecke weit durch (drei bis vier) leistenartige, gegen den Gelenkknopf convergirende Vorsprünge getheilt. Auf der Mitte der Höhe des Gelenkknopfes verliert sich die oben erwähnte stumpfe Kante, welche die Furche des lateralen Randes von der Vorderfläche scheidet. Eine unter dem oberen Winkel bogenförmig vom oberen zum medialen Rande ver-

¹⁾ Rabenschnabelfortsatz, Schulterschnabel. *Proc. rostriformis, unciformis.*

²⁾ *Lunula scapulae. Incisura scapularis, suprascapularis, semilunaris.*

laufende Linie rundet den ausgehöhlten Theil der vorderen Fläche, die *Fossa subscapularis*, aufwärts ab und trennt von derselben ein dreiseitiges, planes oder sogar gewölbtes Feld (*s*), auf dessen Rand sich die oberen, starken Bündel des *M. serratus anticus* befestigen. Eine nicht ganz so regelmässige Linie rundet die *Fossa subscapularis* gegen die untere Spitze und gegen ein rauhes Feld (*s''*) ab, dessen Rand den unteren Zacken desselben Muskels zum Ansätze dient. Die untere Spitze des oberen und die obere Spitze des unteren Feldes stehen mitunter durch eine feine, längs dem medialen Rande herablaufende Furche (*s'*) in Verbindung, welche die zarte Sehne des mittleren Theiles des *M. serratus* aufnimmt.

Die hintere Fläche des Schulterblatts theilt ein Kamm, welcher von der Grenze des obersten und zweiten Viertels des medialen Randes fast quer und nur wenig ansteigend gegen den Gelenkknopf verläuft, in ein oberes kleineres und ein unteres grösseres Feld. Dieser Kamm, Schulterkamm, *Spina scapulae* ¹⁾, gleicht, für sich betrachtet, einem stumpfwinklichen Dreieck, dessen eine Spitze sich in einen platten Fortsatz, Schulterecke, *Acromion* ²⁾, auszieht (vgl. Fig. 198). Mit einem der Schenkel, die den stumpfen Winkel einschliessen, ist es auf dem Schulterblattkörper aufgewachsen; der andere, den stumpfen Winkel einschliessende Schenkel erhebt sich von der Fläche des Körpers in der Nähe des Schulterhalses



Linkes Schulterblatt von hinten.

und etwa der Mitte der Höhe des Gelenkknopfes gegenüber als freier, seitlicher Rand des Kammes; er ist dick, abgerundet, schräg vor- und seitwärts geneigt, etwas concav; sanft ausgehöhlt geht er an der Basis in die hintere Fläche des Gelenkknopfes über und bildet mit dem aufgeworfenen Rande desselben eine Art breiter Furche, längs welcher die ober- und unterhalb des Kammes gelegenen Felder mit einander communiciren. Dem stumpfen Winkel gegenüber liegt der hintere, freie Rand des Kammes. Er entsteht am medialen Rande des Knochens aus einem kleinen, dreiseitigen Felde, welches die Spitze seitwärts wendet, zuerst scharf, plattet sich im Aufsteigen ab, so dass er nach oben


und unten die Flächen des Kammes überragt (Fig. 197), verschmälert sich dann in der Regel noch ein Mal, um schliesslich in die breite obere Fläche des *Acromion* überzugehen. Der platte Theil des Randes ist rauh und der Länge nach durch eine schwache Firste getheilt. Mit den Flächen

¹⁾ Schultergräte.

²⁾ Schulterhöhe, Grätenecke, *Proc. acromialis*.

steht der Schulterkamm gegen die Fläche des Schulterblattkörpers geneigt,

Fig. 197.



Sagittaler Durchschnitt des linken Schulterblattes.

Fs Fossa subscapularis.

so dass die obere Fläche des Kammes unter etwas weniger, die untere unter etwas mehr als einem rechten Winkel in die hintere Fläche des Schulterblatts übergeht. In Verbindung mit den Flächen des Kammes, in welche sie sich ohne Unterbrechung fortsetzen, stellen die beiden Felder der hinteren Fläche des Schulterblatts offene Gruben dar, die *Fossa supraspinata* und *Fossa infraspinata*, welche von den gleichnamigen Muskeln ausgefüllt werden.

Das Acromion ist ein platter, breit und abgestumpft sichelförmiger Fortsatz mit stumpfen Rändern, der mit seinen Flächen den Flächen des Schulterblattes parallel liegt und nur mit der oberen Spitze sich vorn überbeugt. Seine hintere Fläche, die allmähig zur oberen wird, entsteht, wie erwähnt, aus dem hinteren Rande des Schulterkammes; seine vordere, an der Spitze abwärts geneigte Fläche geht durch eine Art fächerförmiger Ausbreitung aus dem lateralen Rande des Schulterkammes hervor. Der untere Rand des Acromion, der bei der Krümmung der Spitze zum lateralen wird, ist stark convex, uneben und ragt gleich einem Dach über den Armbeinkopf vor; der obere und an der Spitze des Fortsatzes mediale Rand ist glatter und trägt hinter dieser Spitze zur Articulation mit dem Schlüsselbein eine flache, elliptische Gelenkfläche, *Facies articularis acromii* (Fig. 194, 196), länger als hoch, deren Höhe der Dicke des Fortsatzes gleichkommt. Ernährungslöcher finden sich, ausser am Condylus, in der Fossa supraspinata oder infraspinata in der Nähe des Kammes.


Var. Nicht selten zeigt der laterale Rand und die hintere Fläche unterhalb des Condylus den rinnenförmigen Eindruck der Art. circumflexa scapulae. Hyrtl gedenkt einer grossen Oeffnung in der Fossa infraspinata. Die Epiphyse des Acromion kann sich getrennt erhalten, durch Synchondrose oder selbst durch ein wahres Gelenk (R. Wagner, Cruveilhier) an den Schulterkamm befestigt.

Beim Neugeborenen ist der Schulterhaken, das Acromion und ein Theil zunächst der Basis knorplich. Der Schulterhaken erhält einen Knochenkern schon im ersten Jahre, welcher auf den oberen Theil des Condylus hinabreicht, und ist im fünfzehnten Jahre mit dem Schulterblatt verwachsen. Schon früher hat sich ein Knochenkern in der Basis des Acromion gebildet und im fünfzehnten Jahre erscheint ein zweiter, der einen grösseren oder kleineren Theil der Spitze desselben einnimmt, ferner um dieselbe Zeit ein Knochenstreif längs der Basis des Schulterblattes und ein Kern im unteren Winkel. Die Verschmelzung dieser Epiphysen vollendet sich erst zur Zeit der völligen Reife, im zweiundzwanzigsten bis fünfundzwanzigsten Jahre. Der convexe Rand des Schulterhakens geht, nach Sharpey, zuweilen aus einer besonderen Epiphyse hervor.

2. Schlüsselbein, *Clavicula*.2. Schlüssel-
bein.

Ein schlank S-förmig gebogener Knochen, welcher am oberen Rande des Thorax zwischen dem Acromion und dem Schlüsselbeinausschnitt des Brustbeins in einer diagonalen, die Mitte zwischen der transversalen und sagittalen haltenden Richtung so befestigt ist, dass sein mediales vorderes Ende etwas tiefer steht als das lateral-hintere. Sein mediales Ende kreuzt sich unter spitzem Winkel mit dem vorderen Ende der ersten Rippe; das mittlere Drittel des Schlüsselbeins liegt vor dem ersten Intercostalraume. In Verbindung mit dem Schulterkamm und dessen Fortsetzung, dem Acromion, bildet das Schlüsselbein einen nur von der Haut bekleideten, überall durchfühlbaren Gürtel, welcher die Wölbung, womit der Hals sich zum Rumpf erweitert, ringsum bis in die Nähe der Wirbelsäule unterbricht. Die aufwärts gekehrte und nur wenig nach aussen abhängige Fläche dieses

Fig. 198.




Thorax mit dem linken Schulterblatt und Schlüsselbein und dem Armbeinkopf von oben. *Vt1* Obere Fläche des ersten Brustwirbels. *Fssp* Fossa supraspinata. *S* Spina scapulae. *A* Acromion. *Pc* Proc. coracoid. *Cp* Caput humeri. *Tmj* Tuberc. majus *Tm* Tuberc. minus des Armbeins.

Gürtels ist platt, sie hat die grösste Breite über dem Arm und verschmälert sich gegen Brust und Rücken; sie gewinnt die grösste Breite durch eine Ausladung des lateralen Randes, gegenüber einem spitzen und schnabelförmig nach vorn gekrümmten Winkel, womit der mediale Rand von hinten nach vorn umbiegt. Von der Spitze dieses Winkels fast gerade nach vorn geht die Spalte, welche das Gelenk zwischen Acromion und Schlüssel-

bein bezeichnet. Der laterale Rand, über dem Armbeinkopf in sagittaler Richtung abgestutzt, läuft von da aus an die Vorder- und Rückseite in S-Biegungen von symmetrischer Gestalt, nur dass die Biegung des Schulterkammes kürzer und verhältnissmässig steiler ist als die in den Vorderrand des Acromion sich fortsetzende entsprechende Biegung des Schlüsselbeins.

Denkt man sich das Schlüsselbein in der Mitte seiner Länge getheilt, so erhält man zwei, in entgegengesetztem Sinne schwach gebogene Stücke, und zwar ist die dem Brustbeine zunächst liegende oder sternale Hälfte vorwärts convex, die an das Schulterblatt stossende oder acromiale Hälfte vorwärts concav. Der Bogen der acromialen Hälfte gehört in der Regel

Fig. 199.




Sagittale Durchschnitte des Schlüsselbeins, senkrecht auf die Längsaxe *x* des acromialen Endes, *y* des Körpers, *z* des sternalen Endes, nach den Linien *x*, *y*, *z*, Fig. 200.

einem kleineren Radius an als der Bogen der sternalen Hälfte. In der Mitte ist das Schlüsselbein cylindrisch, jedoch von oben nach unten comprimirt. Gegen das sternale Ende verdickt es sich allmählig und wird dreiseitig prismatisch, indem die obere Fläche sich abplattet und aus der Mitte der unteren eine Kante hervorgeht. Seltener kommt an der Vorderseite eine vierte Kante hinzu, welche durch die Ansätze des *M. pector. maj.* und *sternocleidomastoideus* erhoben wird. Gegen das acromiale Ende gewinnt der Knochen breitere Flächen, schärfere Ränder, im Ganzen also eine mehr platte Form. Die sternale, schwach überknorpelte Endfläche ist von vorn nach hinten gewölbt, unregelmässig dreiseitig, den spitzesten Winkel nach unten und hinten gerichtet; sie überragt am hinteren und noch mehr am oberen Rande die Gelenkfläche des Brustbeins, mit welcher sie articulirt (vergl. Fig. 188). Das acromiale Ende hat eine plane, elliptische, seitwärts schauende Gelenkfläche, welche gleich der Gelenkfläche des Acromion im sagittalen Durchmesser länger ist als im verticalen. In der Nähe des sternalen Endes hat die untere

Kante eine breite, bald hervorragende, bald vertiefte Rauhnigkeit, *Tuberositas costalis*¹⁾, zur Insertion des Lig. costo-claviculare; eine ähnliche Rauhnigkeit, *Tuberositas scapularis*, findet sich an der unteren Fläche in der Nähe des acromialen Endes; in derselben befestigt sich das Lig. coracoclaviculare. Zwischen beiden Rauhnigkeiten verläuft der Länge nach eine seichte Furche (*sc*), in welcher der *M. subclavius* haftet. Nicht selten ist der vordere und hintere

Fig. 200.



Rechtes Schlüsselbein von unten.

Rand vom acromialen Ende vorwärts eine Strecke weit rauh von der Anheftung dort des *M. deltoideus*, hier des *M. cucullaris*. Der Markcanal

¹⁾ *Tuberositas claviculae.*

des Schlüsselbeins ist klein; öfters tritt spongiöse Substanz an die Stelle desselben. Ein oder zwei Ernährungslöcher finden sich an der hinteren Fläche.

Das Schlüsselbein bewegt sich zuweilen mittelst überknorpelter Flächen auf der ersten Rippe oder auf dem Schulterhaken (Gruber, Neue Anomalien, S. 7). Der laterale Theil des Schlüsselbeins kann durch einen Fortsatz des Schulterblattes vertreten sein (Martin, s. Meckel, Anat. S. 200).

Gewöhnlich ist das rechte Schlüsselbein stärker und mehr gekrümmt als das linke. Beim Weibe sind die Schlüsselbeine in der Regel minder kantig und weniger gekrümmt als beim Manne.

Das Schlüsselbein entwickelt sich aus Einem Knochenpunkte. Im fünfzehnten bis achtzehnten Jahre tritt eine Epiphyse in Form einer dünnen Lamelle am Sternalende hinzu, welche einige Jahre später mit dem Körper verwächst.

b. Oberarmknochen.

Armbein, *Humerus* ¹⁾.

b. Ober-
arm.
Armbein.


Das Armbein ist ein Röhrenknochen mit verdickten, articulirenden Enden, leicht gekrümmt, die Convexität gegen den Rumpf gerichtet. Das obere Ende ist ein kuglicher, das untere ein querliegend cylindrischer Gelenkkopf; das Mittelstück (Körper) ist demgemäss in der Nähe des oberen Endes cylindrisch, in der Nähe des unteren Endes abgeplattet.

Um mich nicht von dem populären und ärztlichen Sprachgebrauche zu entfernen, beschreibe ich die Knochen des Armes in der Lage, in welcher die Handflächen gerade nach vorn gewandt sind. Es darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass diese Haltung eine unnatürliche ist. Sich selbst überlassen, befindet sich am Lebenden der herabhängende Arm in mässiger Pronation; der Daumenrand der Hand liegt nach vorn und die Handflächen liegen in Ebenen, welche fortgesetzt nahe vor der Vorderfläche des Körpers einander schneiden würden. Dabei ist der Oberarm so gestellt, dass die obere Gelenkfläche mehr rück- als medianwärts gewandt und die Längsaxe des unteren cylindrischen Gelenkkopfes näher der sagittalen Richtung ist als der transversalen. Die Flächen der Hand, des Vorderarmes und des unteren Theiles des Oberarmes müssten demnach eigentlich als mediale und laterale, die Ränder als vorderer und hinterer unterschieden werden.

Der obere Gelenkkopf des Armbeins, *Caput humeri*, ist kuglich; der Rand des überknorpelten Theiles ist eine ziemlich regelmässige Kreislinie; eine durch dieselbe gelegte Ebene macht mit dem Horizont einen Winkel von etwa 40° ²⁾. Der grössere, untere Theil des Randes ruht auf einem

¹⁾ Oberarmbein, *Os humeri*, *Os brachii*. ²⁾ Genauere Angaben über Form und Maasse der Gelenkflächen behalte ich mir für die Bänderlehre vor, da sie erst im Zusammenhange mit der Beschreibung der Bänder und nur durch die unmittelbare Nebeneinanderstellung der mit einander articulirenden Flächen ein praktisches Interesse gewinnen.

halbcylindrischen, sanft ausgeschweiften Vorsprung (Fig. 201 — 203), den er überragt; der obere Theil des Randes ist mittelst einer schmalen und seichten Furche gegen die sogleich zu beschreibenden Höcker abgesetzt




und so der Kopf ringsum von einer Einschnürung, dem sogenannten Hals, *Collum* ²⁾, umgeben.

¹⁾ Die abgebildeten Extremitätenknochen gehören sämtlich der rechten Gliedmaasse an. ²⁾ Auch anatomischer Hals genannt, zur Unterscheidung vom Hals im Sinne der Chirurgen, wonach die Höcker noch mit zum Halse gerechnet werden.

Den seitlichen **Umfang** des oberen Endes des Armbeins zunächst dem Kopf nehmen zwei Höcker ein, ein grösserer und ein kleinerer, *Tuberculum maj.*¹⁾ und *T. minus*²⁾, durch eine (10mm breite) im oberen Theile überknorpelte Rinne, *Sulcus intertubercularis*³⁾, von einander getrennt. Der grössere dehnt sich von der seitlichen Fläche noch etwas auf die hintere aus (bei ruhendem Arme liegt er gerade nach vorn); der kleinere befindet sich in der Mitte der vorderen Fläche (bei ruhendem Arme am medialen Rande). Der kleinere ist ein einfacher, abwärts zugespitzter Vorsprung mit einem, dem Rande des Gelenkkopfes parallel ab- und medianwärts laufenden Kamm, an den sich von oben her der M. subscapularis ansetzt. Der grössere Höcker wird vermittelst einer queren, stumpfen Kante in eine obere, glatte und eine seitliche, durch Gefässlöcher und Rinnen rauhe Fläche geschieden; die obere Fläche ist in drei neben einander liegende Facetten, Impressiones, von ziemlich gleicher Ausdehnung abgetheilt, in welchen drei von der hinteren Fläche der Scapula entspringende Muskeln haften (Fig. 203).

Fig. 204.



Armbein von vorn.


Vom grösseren Höcker zieht sich, als lateraler Rand des Sulcus intertubercularis, eine Linie, *Spina tuberculi majoris*, herab, welche an der Grenze des obersten und zweiten Viertels des Armbeinkörpers mit einer rauhen Fläche (*pm*), der Insertionsfläche des M. pectoralis major, endet. In gleicher Höhe endet mit einer ähnlichen Rauigkeit (*ld*), für die Insertion des M. latissimus dorsi und teres major, eine vom kleineren Höcker als medialer Rand des Sulcus intertubercularis herablaufende Linie, *Spina tuberculi minoris*. Die Spina tuberculi majoris aber setzt sich ununterbrochen oder nach kurzer Unterbrechung abwärts fort zuerst am Vorderrande einer rauhen Fläche (*d*), auf welcher

der M. deltoideus zwischen den Ursprüngen des Brachialis int. endet, wendet sich sodann von der Mitte der Höhe des Oberarms an als stumpfe, gegen das Ellenbogengelenk mehr und mehr verflachte Kante, *Angulus anterior*, auf die Mitte der Vorderfläche des Armbeins, die sie in eine

¹⁾ *T. anterior* Meckel, *posterior* Weber-H., *externum*. ²⁾ *T. posterior* Meckel, *anterior* Weber-H., *internum*. ³⁾ *Sulcus bicipitalis*, *Semicanalis humeri*.

lateral- und eine medianwärts abhängige Fläche theilt. In der Höhe, in welcher diese Kante auf die Vorderfläche tritt, beginnen auch die gegen

Fig. 205.



Querschnitte des Armbeins nach den Linien x, y, z, von derselben durch eine Furche
Fig. 204.

das untere Ende divergirenden Kanten, welche die beiden vorderen Flächen von der Rückenfläche des Arms scheiden. Die laterale, *Angulus lateralis*, nimmt ihren Anfang hinter der Deltoidens-Rauhigkeit; sie ist (Fig. 202 *) geschieden, die sich im Absteigen von der hin-

teren auf die laterale Fläche des Armbeins herumwindet ¹⁾, und tritt wie ein scharfer, etwas ausgehöhlter Saum neben der vorderen lateralen Fläche hervor. Die mediale Kante, *A. med.*, entsteht vor einer kleinen Rauhigkeit (c), welche von der Insertion des M. coracobrachialis herrührt; sie ist überall minder scharf, biegt aber am unteren Ende weiter von der Längsaxe des Knochens ab. Die von diesen beiden Kanten eingefasste hintere Fläche ist glatt, im oberen Theile noch etwas gewölbt, im unteren platt und in der Nähe des unteren Endes sogar von einer Seite zur anderen vertieft (Fig. 205 z).

Das Haupternährungsloch des Armbeins, in einen abwärts gerichteten Canal führend, findet sich in der Regel auf oder dicht vor der medialen Kante, nicht weit unterhalb der Insertion des M. coracobrachialis; doch kommt es auch an der äusseren Kante und auf der Rückenfläche vor.


Gegen das untere Ende verbreitert sich das Armbein, und zwar, wie aus dem Gesagten hervorgeht, mehr gegen den medialen als gegen den lateralen Rand. Die Ausladung des medialen Randes kommt aber nicht dem Gelenkkopf zu Gute, sondern gehört fast ganz einem von vorn nach hinten platten, am Rande abgerundeten und abgestumpften Fortsatz, dem medialen Knorren, *Epicondylus medialis* ²⁾, an, mit rauher Vorderfläche, von welcher eine Anzahl Muskeln der Beugeseite des Vorderarms entspringen, und glatter, zunächst dem Gelenk etwas eingedrückter hinterer Fläche, in deren Vertiefung, *Sulcus ulnaris*, der N. ulnaris herabläuft (Fig. 202). Die laterale Kante endet, vorwärts umbiegend, auf einem ähnlichen, nur viel stumpferen Fortsatz, dem lateralen Knorren, *Epicondylus lateralis* ³⁾, von dessen Vorderfläche und unterem Rande Muskeln der Streckseite des Unterarms ihren Ursprung nehmen.

Der überknorpelte Theil des unteren Endes des Armbeins, *Processus cubitalis*, bildet zunächst dem medialen Rande einen rollenartigen Gelenkkopf, *Trochlea* ⁴⁾, auf welchem die Ulna articulirt; die Rolle wird er-

¹⁾ *Gouttière de torsion* der französ. Schriftsteller. Dieser Rinne folgt der N. radialis mit der *Art. profunda brachii*. ²⁾ Nebenhöcker, *Condylus internus, flexorius aut. Nodus int. s. flexorius Arn.* Die Benennung *Epicondylus* rührt von Chaussier her. Sie wird sich vielleicht am ehesten Eingang verschaffen, weil sie der bei uns gebräuchlichen, allerdings unpassenden, am ähnlichsten klingt. ³⁾ *Condylus s. Nodus externus, extensorius.* ⁴⁾ *Rotula.*

zeugt durch einen Kugel- und einen liegenden abgestumpften Kegelabschnitt, und zwar liegt der Kugelabschnitt dem medialen Rande zunächst und reicht weiter abwärts als der Kegelabschnitt; die medianwärts gewandte Schnittfläche des ersteren beträgt $\frac{3}{4}$ eines Kreises; die Stelle des vierten Viertels nimmt der Knorren ein, der sich von oben her etwas über den Mittelpunkt der Fläche hinaus erstreckt. Der Kegelabschnitt, mit der abgestumpften Spitze an die Kugelfläche anstossend und in dieselbe übergehend, reicht an der hinteren Fläche weiter hinauf als der Kugelabschnitt und endet lateralwärts mit scharfem überragenden Rande; an der vorderen Fläche ist er durch eine Einschnürung abgesetzt gegen das Köpfchen, *Capitulum* ¹⁾, ein flaches Kugelsegment auf der Vorderfläche des vorwärts umgebogenen lateralen Drittels des Armbeins, welches zur Articulation mit dem Radius bestimmt ist.

Ueber den beschriebenen Gelenkköpfen liegen stumpfwinklich dreiseitige, mit der stumpfen Spitze aufwärts gekehrte Gruben, die breiteste und tiefste, *Fossa olecrani* ²⁾, an der hinteren Fläche des Knochens, eine schmalere und seichtere, *Fossa ant. mj.*, an der vorderen Fläche über der Trochlea, die kleinste, *Fossa ant. min.*, an der vorderen Fläche über dem Capitulum.



Sagittalschnitt des unteren Endes des Armbeins mit dem oberen Ende der Ulna.

Die der Basis entsprechende Seite dieser Dreiecke setzt, ohne überknorpelt zu sein, die Krümmung der Gelenkköpfe fort und nimmt bei äusserster Beugung und Streckung die vorderen und hinteren Ränder der Gelenkflächen der Vorderarmknochen auf. Zwischen der hinteren Grube und der vorderen grösseren bleibt nur eine dünne Knochenwand (Fig. 206), die zuweilen völlig durchbrochen erscheint.

Aus der medialen vorderen Fläche des Armbeins, etwa 40mm oberhalb des vorderen Randes der Trochlea erhebt sich zuweilen ein von vorn nach hinten plattgedrückter und hakenförmig abwärts gekrümmter Fortsatz von 3 — 13mm Länge, *Proc. supracondyloideus* Otto. Der Erste, welcher dieses Fortsatzes gedenkt, ist Tiedemann; er bildet ihn (*Tabb. arteriarum* 1822. Taf. XV. Fig. 3) als einen „ungewöhnlichen Knochenauswuchs“ ab, an welchem ein ungewöhnlicher Theil des M. pronator teres entspringt, indess hinter ihm eine abnorm von der A. brachialis abgehende Interossea zum Vorderarm herabläuft. Das Armbein, der Proc. supracondyloideus und ein Band, welches von dem letzteren zum medialen Epicondylus verläuft, umschliessen eine ovale Oeffnung. Otto (*De rarioribus sceleti h. cum animalium sceletis analogis*. p. 25. Taf. I. Fig. 10, 11) gewann dem Proc. supracondyloideus ein höheres Interesse ab, indem er auf die Analogie dieser Oeffnung mit dem Can. supracondyloideus mancher Säugethiere hinwies. Seitdem wurde der genannte Fortsatz vielfältig beschrieben und abgebildet, von Quain (*The anatomy of arteries in the human body*. Lond. 1840. Taf. 36. Fig. 3), Knox (*Edinb. med. and surg. Journ.* 1841. p. 125), Wilbrand (Ueber einen Proc. supracondyloideus humeri und femoris. Giessen 1843), Tiedemann (*Supplementa ad tabulas arteriar.* Heidelberg. 1846. Taf. 47. Fig. 1, 2), Struthers (*Monthly Journ.* 1848. Oct. p. 265), Gruber (N. Anomalien, S. 8. Taf. VII) und Barkow (Anatom. Abhandl. S. 7. Taf. I. Fig. 1). Nach Gruber ist der Proc. supracondyloideus immer bedingt

¹⁾ *Eminentia capitata, Tuberculum. Eminentia trochlearis* Loschge. *Rotula* M.J. Weber.

²⁾ *Fossa posterior. Sinus maximus.*

durch die von Tiedemann erwähnte Anomalie im Ursprung des M. pronator teres. Art. brachialis und N. medianus treten immer durch die elliptische Lücke, welche von dem anomalen Muskelbauch und dem Knochenfortsatz begrenzt wird. Unter den von Barkow beobachteten Fällen ist einer, in welchem ein Proc. supracondyloideus (lateralis) von der lateralen Kante des Armbeins abgeht, in derselben Höhe, wie sonst der Proc. supracondyloideus (medialis) und von ähnlicher Form.


Zur Zeit der Geburt sind die Enden des Armbeins in der Regel noch vollständig knorplich. Nach Meckel kommt jedoch im Köpfchen des unteren Endes eine Verknöcherung vor, welche entweder selbstständig oder vom Körper aus sich entwickle. Gegen das Ende des ersten Lebensjahres erhält der Armbeinkopf, etwas später der grössere Höcker (nach Béclard auch der kleinere) einen besonderen Knochenkern. Im fünften Jahre sind Kopf und Höcker zu einer Epiphyse verbunden, welche aber erst im zwanzigsten Jahre mit dem Körper verschmilzt. Im unteren Ende entstehen die Knochenkerne später, im Köpfchen gegen Ende des zweiten Jahres, im medialen Epicondylus im fünften Jahre, in der Trochlea im zwölften Jahre, im lateralen Epicondylus im dreizehnten bis vierzehnten Jahre. Bald darauf verbinden sich die Knochenkerne des Cubitalfortsatzes und des lateralen Epicondylus erst unter einander und dann mit dem Körper des Knochens; im achtzehnten Jahre etwa ist auch der mediale Epicondylus mit dem übrigen Knochen verschmolzen.

c. Unterarmknochen.

Die Mittelstücke oder Körper der Unterarmknochen sind in ihrer ganzen Länge durch eine Membran, das Zwischenknochenband, *Ligamentum interosseum*¹⁾, verbunden, welche eine Scheidewand zwischen den Muskeln der vorderen und der hinteren Fläche des Unterarmes darstellt und an beiden Flächen, gleich den Knochen, von Muskelursprüngen eingenommen wird.

c. Unterarm.

Man kann die Knochen als die verdickten und verknöcherten Seitenränder des Zwischenknochenbandes oder Knochen und Zwischenknochenband mit einander als einen der Länge nach rinnenförmig vertieften und im mittleren Theile häutigen Rahmen betrachten, der dem Unterarm zum



Horizontalschnitt der Unterarmknochen mit dem Lig. interosseum.


Gerüste dient. Jeder Knochen ist dreiseitig prismatisch; an beiden ist der Rand, mit welchem sie an das häutige Zwischenstück stossen, Zwischenknochenrand, *Crista interossea*, vorzugsweise scharf; jeder derselben hat eine schräg gegen diesen Rand abfallende vordere und hintere Fläche, beide der Länge nach ausgehöhlt, jedoch die vordere tiefer als die hintere. Die dem Zwischenknochenrande gegenüberliegende Fläche, an der Ulna die mediale, am Radius die laterale, ist glatt und schwach gewölbt; sie ist an der Ulna durch schärfere Kanten gegen die vordere und hintere Fläche abgesetzt, als am Radius. Längs der ganzen Ulna und an der unteren Hälfte

¹⁾ *Membrana interossea*.

des Radius ist sie durch die Haut zu fühlen und nur in der oberen Hälfte des Radius durch Muskeln versteckt.

Da beide Unterarmknochen sich am oberen und unteren Ende gegen

Fig. 208.



1. Ulna.

Unterarmknochen in Verbindung,
von vorn.

einander neigen, um mit einander zu articuliren, so hat der Zwischenraum zwischen beiden eine nach oben und unten zugespitzte Form. Die Breite des Zwischenraumes wird gegen die Mitte der Höhe des Unterarmes noch vergrößert durch eine besonders am Radius merkliche Seitwärtskrümmung des Mittelstückes und von der Mitte des Unterarmes an abwärts durch Verjüngung der Ulna.

In geringem Grade sind beide Unterarmknochen, die Ulna mehr als der Radius, auch nach vorn gebogen. Die *Foramina nutritia* führen in beiden Knochen in schräg aufsteigende Canäle; sie liegen in beiden meistens in ziemlich gleicher Höhe, und zwar in der Mitte oder am unteren Ende des oberen Drittels am einen oder anderen Rande der vorderen Fläche.

An den Gelenkenden compensiren Radius und Ulna einander; die Ulna trägt vorzugsweise zum Ellenbogengelenk, der Radius zum Handgelenk bei.

1. Ulna, Ellenbogenbein ¹⁾.

Die Ulna ist, von vorn betrachtet, schlank S-förmig gebogen, indem sie sich oben medial-, unten lateralwärts zur Seite neigt. Nahe unter dem oberen Ende springt nach vorn ein kragsteinähnlicher Fortsatz mit scharfem Rande vor, der *Proc. coronoideus ulnae*; seine vordere, abwärts geneigte, vier-

seitige Fläche ist eine Fortsetzung der Vorderfläche des Körpers der Ulna; die Stelle des Ueberganges ist durch eine bald erhabene, bald vertiefte rauhe Stelle, *Tuberositas ulnae*, die Anheftungsstelle des M. brachialis int., bezeichnet. Von den dreiseitigen Seitenflächen des Proc. coronoideus geht die mediale (Fig. 209) ununterbrochen aus der medialen Fläche des Körpers der Ulna hervor; die laterale entsteht (Fig. 210) mit abwärts gerichteter Spitze erst gegen das obere Ende des Körpers der Ulna, zwischen dessen vorderer und hinterer Fläche. Ihr oberer Theil ist überknorpelt, in verticaler und sagittaler Richtung schwach ausgehöhlt, eine sichelförmige, mit der Spitze vor- und aufwärts gerichtete Gelenkfläche, *Sinus*


¹⁾ Elle, *Cubitus*, *Focile majus*.

lunatus ulnae ¹⁾, längs welcher bei den Drehungen des Radius der Seitenrand des Köpfchens dieses Knochens sich bewegt. Der Theil der Ulna,

Fig. 209.

Fig. 210.

Fig. 211.



Ulna im Profil, Fig. 209 von der medialen Seite,
Fig. 210 von der lateralen Seite.

Oberes Ende der Ulna von hinten.

welcher über den Proc. coronoideus hervorragt, wird Ellenbogenfortsatz, **Olecranon** ²⁾, genannt. Er ist vierseitig, die vordere Fläche breiter als die hintere und die Seitenflächen demgemäss von hinten nach vorn divergirend. Die hintere Fläche (Fig. 211) ist ein langgezogen-spitzwinkliches Dreieck, mit dem spitzen Winkel nach unten zwischen die mediale und hintere Fläche des Körpers eingeschoben

und mit der dem spitzen Winkel gegenüberliegenden Seite stark nach oben gewölbt. Von der Kante, welche diese Fläche medianwärts begrenzt (*ui*), entspringt der *M. ulnaris internus*; an die laterale Kante derselben (*aq*) befestigt sich der *M. anconaeus quartus*. Ihr oberer Rand begrenzt von hinten die schräg nach hinten abfallende obere Fläche des Olecranon und zunächst die den hinteren Theil dieser Fläche einnehmende Insertionsrauhigkeit (*et*) des *Extensor triceps* ³⁾. Die vordere Fläche des Olecranon, mit dem oberen Rande vorn überhängend, und die obere Fläche des Proc. coronoideus, mit dem vorderen Rande aufwärts gebogen, bilden in Verbindung mit einander eine tief ausgehöhlte, im sagittalen Durchschnitt halbkreisförmige, auf der Trochlea des Armbeins articulirende Gelenkfläche, **Fossa sigmoidea** ⁴⁾. Doch ist der dem Olecranon angehörige Theil dieser Fläche von

¹⁾ *Fossa s. Cavitas s. Incisura semilunaris s. sigmoidea minor.*

²⁾ *Processus anconaeus.*

³⁾ *Tuberositas olecrani.*

⁴⁾ *F. sigmoidea major s. semilunaris major.*

dem dem Proc. coronoideus angehörigen durch tiefe Einbuchtung der Seitenränder und durch eine quer über die Gelenkfläche verlaufende, rauhe Furche abgegrenzt. Unter rechtem Winkel wird diese Furche gekreuzt von einer stumpfen Hervorragung, die mit einer Einbiegung des oberen Randes in der Mitte desselben beginnt und auf einem Vorsprunge des vorderen Randes endet (Fig. 208). Mit dem lateralen Rande stösst der dem Olecranon angehörige Theil der Fossa sigmoidea unmittelbar an den oberen Rand des Sinus lunatus (Fig. 210).

Das untere Ende der Ulna ist ein besonders in der Richtung gegen den Radius verdicktes Köpfchen, *Capitulum ulnae*, mit kreisrunder, überknorpelter, unebener und schwach eingedrückter Endfläche. Mit dieser verbindet sich im stumpfen Winkel der untere Rand einer halbmondförmigen Gelenkfläche, *Circumferentia articularis ulnae*, gegen welche der Zwischenknochenrand des Körpers sich verflacht und welche die dem Radius zugewandte Hälfte des Randes des Köpfchens einnimmt. Der Mitte dieser Gelenkfläche gegenüber liegt hinten am medialen Rande des Köpfchens ein kurzer, cylindrischer, stumpfer, über die Endfläche vorspringender Fortsatz, *Processus styloideus ulnae*, auf welchen die mediale Fläche des Körpers der Ulna übergeht. Eine seichte Furche scheidet ihn von der vorderen, eine tiefe von der hinteren Fläche der Ulna. In der tiefen Furche gleitet die Sehne des Ulnaris externus. An dem Fortsatz ist ein Band der Handwurzel befestigt.

Sömmerring gedenkt, nach Chenal, eines Sesambeines über dem Olecranon, und, nach eigener Beobachtung, eines Sesambeines an der Spitze des Proc. coronoideus.

Die Verknöcherung der beiden Epiphysen der Ulna beginnt erst gegen das sechste Lebensjahr. Am oberen Ende des Olecranon entsteht ein Knochenkern oder mehrere (der Proc. coronoideus ossificirt vom Körper aus); die untere Epiphyse stellt das Köpfchen dar. Die obere Epiphyse vereinigt sich mit dem Körper gegen das fünfzehnte bis sechzehnte, die untere erst gegen das zwanzigste Jahr.

2. Radius ¹⁾.


Auch der Radius ist einigermaassen S-förmig gekrümmt, nur dass die obere, mit der Convexität gegen die Ulna schauende Biegung unverhältnissmässig kurz ist im Vergleich zur unteren, lateralwärts convexen.

Das obere Ende, *Capitulum*, ist eine niedere cylindrische Scheibe, welche die Eine Endfläche frei nach oben kehrt. Diese Fläche ist überknorpelt, leicht eingedrückt, auf dem Köpfchen der Ulna um ihren Mittelpunkt beweglich. Die Seitenfläche des Cylinders steht an ihrer medialen Hälfte vertical und ist von einem Knorpel überzogen, der mit dem Knorpelüberzug der Endfläche continuirlich zusammenhängt, *Circumferentia articularis radii*; an der lateralen Hälfte ist sie rauh, etwas wulstig und abgeschrägt. Das Köpfchen sitzt auf einem engen, gleichfalls cylindrischen Halse, *Collum radii*, in welchen der überknorpelte Theil mit einem schar-

¹⁾ Speiche, Armspindel, *Fore arm bone*.


fen Rande, der rauhe Theil sanft, aber tiefer ausgeschweift übergeht. Die Grenze des Halses gegen den Körper nimmt eine elliptische, mit dem längsten Durchmesser parallel der Längsaxe des Armes gestellte, stark vor-

Fig. 212.



Unterarmknochen in Verbindung, von vorn.

Fig. 213.




Radius, von der Rückseite

springende, rauhe Fläche ein, *Tuberositas radii*, welche unter der Mitte des überknorpelten Theiles der Seitenfläche des Köpfchens steht, nur wenig tiefer als die Tuberosität der Ulna. Sie dient der Sehne des Biceps zur Befestigung. An der Tuberosität beginnt die lateralwärts convexe Krümmung des Radius; von ihr aus erhält auch der Körper die dreiseitig prismatische Form, und zwar dadurch, dass von der Tuberosität drei Kanten ausgehen, die Eine, schärfste, gerade abwärts, als Zwischenknochenkante, und, von ihr anfangs divergirend, die beiden anderen, stumpfen Kanten, welche die laterale Fläche des Knochens von der vorderen und hinteren Fläche scheiden. Auf der lateralen findet sich etwa in der Mitte ihrer Höhe eine Rauigkeit, die Insertionsstelle des M. pronator teres (Fig. 213 pt).

Gegen das untere Ende nimmt der Radius an Umfang zu. Die Zwischenknochenkante verbreitert sich zu einem dreiseitigen Felde, welches über dem unteren Rande die halbmondförmige, mit der Concavität abwärts

gerichtete Gelenkfläche, *Sinus lunatus radii* ¹⁾, trägt, mittelst welcher der Radius auf dem unteren Ende der Ulna rotirt; am gegenüberliegenden

Fig. 214.




Unteres Ende des
Radius, mediale
Fläche.

den Rande geht die Kante zwischen der vorderen und lateralen Fläche in einen stumpf abgerundeten und über den unteren Rand des Knochens hervorragenden Fortsatz, *Processus styloideus radii*, über. Die rauhe Seitenfläche dieses Fortsatzes ist von der glatten und etwas ausgehöhlten Vorderfläche durch eine scharfe Leiste getrennt (Fig. 212), setzt sich aber ohne bestimmte Grenze in die laterale Fläche fort, welche ihrerseits wieder mittelst eines schärferen Vorsprungs sich von der hinteren Fläche scheidet (Fig. 213). Dem letztgenannten Vorsprung parallel und in geringer Entfernung neben demselben verläuft auf der hinteren Fläche ein niedrigerer und kürzerer Kamm; beide gemeinschaftlich begrenzen die Rinne (*epl*), in welcher die Sehne des *M. extensor poll. long.* gleitet, eine

Rinne, die sich flacher gegen den unteren Theil der Zwischenknochenkante schräg hinüberzieht. Durch mehrere stumpfe Erhabenheiten ist auch die laterale Fläche mit der zugehörigen Fläche des *Proc. styloid.* unvollkommen der Länge nach in Furchen geschieden. Die Erhabenheiten und Kämme sind sämmtlich zur Anheftung fibröser Scheidewände bestimmt, welche zur Fascie des Handgelenks aufsteigen und die Fächer abtheilen, in welchen die Sehnen der Streckmuskeln der Hand und der Finger gleiten.

Die überknorpelte Endfläche des Radius, deren medialer Rand mit dem unteren Rande der Rotationsgelenkfläche zusammenfällt, ist in horizontaler und sagittaler Richtung concav, dreiseitig, in eine auf den *Proc. styloideus* übergehende Spitze ausgezogen, durch eine feine sagittale Furche

Fig. 215.



Ulna und Radius in Verbindung, von unten.

oder Kante getheilt in ein vierseitiges und ein dreiseitiges Feld, jenes mit dem Mondbein, dieses mit dem Kahnbein der Handwurzel articulirend. Der sagittale Durchmesser des vierseitigen Feldes ist ungefähr gleich dem transversalen des dreiseitigen. Vor der Gelenkfläche liegt, zur Befestigung der Bänder, eine schräg rück- und abwärts gerichtete, rauhe, dreiseitige Fläche (Fig. 212, 215 *), mit der Basis am *Proc. styloideus*, mit der Spitze gegen den Ulnarrand des Knochens.

Der Radius hat zur Zeit der Geburt noch völlig knorpliche Enden. Die Verknöcherung reicht aufwärts bis an den Rand des Köpfchens, abwärts endet sie mit einer rauhen Fläche etwa in der Gegend der Wurzel des *Proc. styloideus*. Die flachen Knorpelscheiben der Enden verknöchern erst längere Zeit nach der Geburt; zuerst (nach dem zweiten Jahre) die untere, gegen das fünfte Jahr die obere. Die Verbindung der oberen Epiphyse mit dem Körper erfolgt vor Vollendung des Wachstums, die Verbindung der unteren im achtzehnten bis zwanzigsten Jahre.


¹⁾ *Incisura semilunaris.*

d. Knochen der Hand.

α. Handwurzelknochen, *Ossa carpi*.

Die Knochen der Handwurzel stehen in zwei Reihen, in welchen sie mit dem Unterarm und der Mittelhand und unter sich articuliren; an jedem ist die Volar- oder Hohlhandfläche und die Rückenfläche frei; ausserdem sind frei je die Daumen- und Kleinfingerflächen der Knochen, welche an der Daumen- und Kleinfingerseite zu äusserst liegen. Alle übrigen Flächen sind durch Zusammenstossen mit benachbarten Knochen verdeckt. Sie sind wesentlich Gelenkflächen und überknorpelt; doch sind aussergewöhnlich auch Abtheilungen der Flächen, mit welchen je zwei Knochen einander berühren, zur Verbindung beider mittelst straffer Bandmasse benutzt und deshalb rauh. Solcher völlig oder grossentheils überknorpelter Gelenkflächen unterscheidet man an dem einzelnen Knochen vier, eine laterale oder Daumenfläche und eine mediale oder Kleinfingerfläche ¹⁾ zur Verbindung mit den Nebenknochen derselben Reihe, und eine obere und untere Fläche ²⁾. Durch die oberen Gelenkflächen articuliren die Knochen der ersten Reihe mit dem Unterarm, die der zweiten Reihe mit der ersten; durch die unteren Gelenkflächen articuliren die Knochen der ersten Reihe mit der zweiten, die Knochen der zweiten Reihe mit der Mittelhand. Der Handwurzelknochen des Daumens, das Trapezbein, gehört diesen Bestimmungen zufolge zur zweiten Reihe; aber wegen seiner schrägen Stellung (s. oben) ist seine obere Gelenkfläche zugleich kleinfingerwärts und die gegenüberliegende um eben so viel daumenwärts gekehrt.

d. Hand.
α. Hand-
wurzel.

Fig. 216 ³⁾.

Frontaldurchschnitt der Handwurzelknochen in Verbindung mit den unteren Enden der Unterarmknochen und den oberen Enden der Mittelhandknochen. *S* Kahnbein, *L* Mondbein, *Py* Pyramidenbein, *Tr* Trapezbein, *Trd* Trapezoidbein, *C* Kopfbein, *H* Hakenbein.

Die Knochen der ersten Reihe, das Erbsenbein nicht mitgerechnet, sind als Theile eines Reifes, der die Convexität seiner Fläche gegen den Unterarm und die Convexität seines Randes gegen den Rücken wendet, mehr oder minder deprimirt und in sagittaler wie in transversaler Richtung nach der Fläche gebogen. Die Krümmung der oberen, convexen Fläche gehört einem grösseren Radius an als die der unteren, concaven; die obere Gelenkfläche

zieht sich gegen den Rücken der Hand weiter hinab als gegen deren Volarfläche; die Rückenfläche der Knochen der ersten Reihe ist deshalb allgemein

¹⁾ Auch ulnare und radiale. Die Bezeichnungen Daumen- und Kleinfingerflächen haben den Vorzug, für die einander entsprechenden Flächen und Ränder der Hand und des Fusses gleichmässig zu passen. ²⁾ Brachiale und digitale. ³⁾ Nach Günther, Das Handgelenk. Hamb. 1841. Taf. VII. Fig. 5.

minder hoch als die Hohlhandfläche (Fig. 217). Eigenthümlich gestaltet sich das Kahnbein dadurch, dass es neben der unteren und kleinfingerwärts gewandten Gelenkfläche, die zur Vervollständigung des genannten Reifes dient, noch eine schräg daumenwärts gerichtete Fläche zur Articulation mit dem Trapezbein trägt.

Fig. 217.



$$\frac{1}{2}$$

Sagittaler Durchschnitt der Handwurzel durch das Mondbein *L* und Kopfbein *C* mit dem Radius und dem dritten Mittelhandknochen (*M3*). Die Vorderfläche sieht nach links.

Doch sind, einigermaassen symmetrisch, auch die mit einander articulirenden Flächen der am Kleinfingerrande gelegenen Knochen der ersten und zweiten Reihe so gekrümmt, dass der dem Kleinfingerrande zunächst gelegene Theil der Gelenkfläche des Pyramidenbeins convex, des Hakenbeins concav ist (Fig. 216).

In der zweiten Reihe, in welcher die Knochen, abgesehen vom Trapezbein, einen abgeplatteten Kegel darstellen, sind die unteren Gelenkflächen fast plan, die oberen, namentlich des Kopf- und Hakenbeins, stark convex, in der Weise, dass dem Hakenbein der kleinfingerwärts abhängige Theil, dem Kopfbein der Gipfel und der daumenwärts abhängige Theil der Gelenkfläche angehört.

Die Wölbung der Handwurzel im Ganzen vom Kleinfinger- zum Daumenrande, an der Rückenfläche convex, an der volaren concav, bedingt eine keilförmige Gestalt der die Handwurzel zusammensetzenden Knochen, eine Abnahme des transversalen Durchmessers von der Rücken- gegen die Volarfläche. Eine solche findet bei den Knochen der zweiten Reihe regelmässig Statt; unter den Knochen der ersten Reihe findet sie sich aber nur an den beiden äussersten, und auch hier nur wenig markirt, indess der mittlere Knochen, das Mondbein, an der Rückenfläche sogar schmaler ist, als an der volaren. Der Hauptgrund der concaven Form der Volarfläche der Handwurzel liegt in den Vorsprüngen der äussersten Knochen des Daumen- und Kleinfingerrandes, den sogenannten *Eminentiae carpi*. Es sind vier, in jeder Reihe und an jedem Rande zwei, die des Kleinfingerrandes die stärksten. Die obere Hervorragung des Kleinfingerrandes ist das auf dem Pyramidenbein articulirende Erbsenbein, *Pi*, die untere Hervorragung desselben Randes ein hakenförmig lateralwärts umgebogener, comprimierter Vorsprung, *Uncus* ¹⁾, von welchem das Hakenbein den Namen trägt. Die obere Hervorragung des Daumenrandes ist ein platter Höcker des Kahnbeins, *Tuberositas oss. scaph.*; die untere Hervorragung desselben Randes ist eine der Längsaxe des Armes parallel und demnach über die Vorderfläche des Trapezbeins in diagonalen Richtung verlaufende, comprimerte, stumpfe Leiste, *Tuberos. oss. trapez.* (Fig. 218, vergl. Fig. 192). An den Hohlhandvorsprüngen ist das Lig. carpi volare proprium, ein starker Querband, befestigt; über die hohle Vorderfläche der Handwurzel brückenförmig hingepannt, schliesst dasselbe einen Ring, in welchem die Sehnen der Fingerbeuger und die Gefässe und Nerven der Hohlhand gleiten.


¹⁾ *Proc. uncinatus, hamatus.*

1. Kahnbein, *Os scaphoideum* ¹⁾ S.

Die volare, im Ganzen etwas medianwärts gewandte Fläche (*h*) des Kahnbeins gleicht einem spitzwinklichen Dreieck mit gekrümmten Seiten, einer oberen, einer unteren lateralen und unteren medialen. Die kürzeste ist die untere laterale Seite; sie läuft, schwach convex, in schräger Richtung median- und abwärts. Von ihren Endpunkten gehen die beiden längeren Seiten, die obere flach S-förmig gebogen, die untere einfach aber tief concav, median- und aufwärts, um sich in einem spitzen Winkel zu vereinigen. Die Gegend zunächst der lateralen Ecke tritt in Form der bereits erwähnten Tu-

1. Kahnbein.

Fig. 218.




Handwurzelknochen von der Volarseite, das Erbsenbein vom Pyramidenbein getrennt und zur Seite gerückt; *s* obere Fläche, *i* untere Fläche, *d* Daumenfläche, *k* Kleinfingerfläche, *h* Hohlhandfläche.

berosität (*Ts*) um so mehr hervor, als die Mitte der Volarfläche durch eine abwärts laufende breite Furche vertieft ist. Die obere Fläche des Kahnbeins ist in der medialen, aufwärts convexen Hälfte (*s*) überknorpelt, eine dreiseitige, nach hinten (vgl. Fig. 223) überhängende Gelenkfläche mit abgerundeten Winkeln und aufgeworfenem hinteren Rande; die laterale, aufwärts concave Hälfte (*s'*) ist rau und geht ohne bestimmte Grenze in die Rinne und Tuberosität der vorderen Fläche über. Der überknorpelte Theil der oberen Fläche bewegt sich in dem lateralen, dreiseitigen Felde der Endfläche des Radius; der rauhe Theil der oberen Fläche liegt der Vorderfläche des Proc. styloideus radii gegenüber und nimmt die von dem letzteren ausgehenden Bänder auf. Die untere Fläche zerfällt in zwei, unter einem rechten Winkel in einer gemeinsamen Kante zusammenstossende Gelenkflächen, eine mediale und eine laterale. Die mediale (*i*), zur Articulation mit dem Kopf-

¹⁾ Schiffbein, *Os naviculare*.

bein bestimmt, verläuft längs dem unteren medialen Rande der Vorderfläche, von unten auf zuerst medianwärts, dann abwärts und zugleich mit einer geringen Torsion vorwärts schauend; die laterale, zur Articulation mit dem Trapez- und Trapezoidbein bestimmte Fläche (*i'*) zieht sich, etwas lateralwärts gerichtet, an der Rückseite des Knochens herauf; sie ist dreiseitig, eine Spitze nach unten, die eine Seite identisch mit der unteren lateralen Seite der Vorderfläche des Knochens, die andere, wie bemerkt, identisch mit der hinteren Kante der medialen unteren Gelenkfläche, die obere Kante fast horizontal (Fig. 223). Die eigentliche dorsale Fläche des Kahnbeins ist auf eine schmale rauhe Rinne reducirt, die sich zwischen

Fig. 219.



Handwurzelknochen von der Volarseite, das Erbsenbein vom Pyramidenbein getrennt und zur Seite gerückt; *s* obere Fläche, *i* untere Fläche, *d* Daumenfläche, *k* Kleinfingerfläche, *h* Hohlhandfläche.

dem unteren Rande der oberen Gelenkfläche und dem oberen Rande der lateralen unteren Gelenkfläche hinzieht. Die Stelle der Daumenfläche (*d*) vertritt eine rundliche stumpfe Spitze, in welcher die lateralen Ecken der beschriebenen Flächen zusammenstossen; die Kleinfingerfläche (*k*) ist ein niedriger, von zwei aufwärts convexen Linien begrenzter, theilweise überknorpelter Streifen, der sich an das Mondbein lehnt.

2. Mondbein, *Os lunatum* ¹⁾ *L.*

2. Mond-
bein.

Das Mondbein ist ungefähr eben so hoch als breit; sein sagittaler Durchmesser ist der längste, länger am unteren Rande als am oberen. Die Flächen sind sämtlich vierseitig, die volare und dorsale verschobenen Rechtecken ähnlich, mit schräg auf- und medianwärts gerichteten seitlichen Rändern. Die volare ist breiter als die dorsale. Die obere Fläche, dau-

¹⁾ *Os semilunare*.

menwärts abhängig, gewölbt und nach hinten verjüngt, articulirt auf dem medialen, vierseitigen Felde der unteren Gelenkfläche des Radius; die untere, concave Gelenkfläche ruht grösstentheils auf dem Kopfbein; durch eine nahe am medialen Rande verlaufende sagittale Kante ist ein schmales Feld abgegrenzt, welches mit dem Hakenbein articulirt (Fig. 216, 223). Die Daumenfläche ist im oberen Theile rauh und hat längs dem unteren Rande eine halbmondförmige Gelenkfläche, wodurch sie mit dem Kahnbein articulirt; die Kleinfingerfläche, kaum gewölbt, ist überknorpelt zur Articulation mit dem Pyramidenbein.


Var. Man findet statt der oberen Fläche einen scharfen, gewölbten Kamm, in welchem die Daumen- und Kleinfingerfläche zusammenstossen.

3. Pyramidenbein, *Os pyramidale* ¹⁾ **Py.**

Dieser Knochen gleicht einer dreiseitigen, liegenden Pyramide. Die hintere Fläche ist es, welche fehlt oder statt welcher eine schmale Rinne den hinteren Rand der oberen vom hinteren Rande der unteren Fläche scheidet. Am Kleinfingerrande kommen die drei übrigen Flächen in eine stumpfe Spitze zusammen. Die Daumenfläche, welche die Basis der Pyramide darstellt und an das Mondbein stösst, ist wenig vertieft und nähert sich der vierseitigen Form dadurch, dass der Rand, welcher ihr mit der oberen Fläche gemeinschaftlich ist, in einem steilen Bogen, fast einer gebrochenen Linie ähnlich, verläuft. Die obere Fläche ist stark gewölbt, eine gegen die mediale Spitze von rauhen Furchen durchzogene, im Uebrigen glatte Gelenkfläche, welche (durch Vermittelung einer Bandscheibe)

3. Pyramidenbein.

Fig. 220.



Pi Py

Sagittaler Durchschnitt des Erbsen- und Pyramidenbeins.

an der Ulna eingelenkt ist. Die Volarfläche ist gegen den Daumenrand rauh (*h*), gegen den Kleinfingerrand mit einer sehr schwach convexen kreisrunden Gelenkfläche (für das Erbsenbein) versehen (*h'*). Die untere, daumenwärts schauende Fläche ist überknorpelt und concav bis auf die schwach gewölbte mediale Spitze.

4. Erbsenbein, *Os pisiforme* ²⁾ **Pi.**

Ein unregelmässiges, von den Seiten plattgedrücktes Kügelchen mit kreisrunder oder ovaler und schwach ausgehöhlter, von einer seichten Einschnürung umgebener, rückwärts gewandter Gelenkfläche.

4. Erbsenbein.

5. Trapezbein, *Os trapezium* ³⁾ **Tr.**

Das Trapezbein ist ein im Wesentlichen würfelförmiger, mit seinen Flächen in der mehrerwähnten Weise schräg gestellter Knochen, dessen Würfelform aber verschiedentlich alterirt erscheint. Die Hohlhand-, Dau-

5. Trapezbein.

¹⁾ *Os triquetrum, triangulare, cuneiforme.*

²⁾ *Os subrotundum, rotundum, orbiculare.*

³⁾ *Os multangulum majus, trapezoides, rhomboides.*

men- und Rückenfläche sind frei und rauh und gehen ohne eigentliche Kanten in einander über; über die vordere verläuft fast vertical die oben beschriebene Tuberosität (*Tt*), eine tiefe Rinne von der lateralen Seite begrenzend; an jeder der unteren Ecken der hinteren Fläche stehen stumpfe Höcker, wodurch auch die laterale und hintere Fläche einigermaßen der Länge nach ausgehöhlt erscheinen. Die mediale Gelenkfläche, in welcher das Trapezoidbein ruht, ist auf Kosten der oberen medialen Kante tief ausgeschnitten, oben breit und nach unten von der vorderen Fläche her verschmälert. Ihre obere Kante dient zur medialen Begrenzung der oberen Gelenkfläche, welche, halbkreisförmig und leicht concav, die laterale Hälfte der lateralen unteren Gelenkfläche des Kahnbeins einnimmt. An der unteren Fläche des Trapezbeins sind zwei Gelenkflächen zu unterscheiden, getrennt von einander durch einen Streifen rauher Oberfläche (*i*), mittelst welcher zwischen den Mittelhandknochen des Daumens und Zeigefingers die Volar- und Rückenfläche des Trapezbeins zusammenfließen. Die laterale, bei Weitem grössere Gelenkfläche (*i'* für den ersten Mittelhandknochen) ist schräg ab- und lateralwärts gekehrt, sattelförmig, im transversalen Durchmesser concav, im sagittalen convex, im ersteren beinahe doppelt so lang als im letzteren. Die mediale Gelenkfläche (*i''*) ist ein kleines, kreisförmiges oder ovales, mit dem medialen Rande an den unteren Rand der medialen Gelenkfläche stossendes flaches Grübchen, schräg ab- und medianwärts gekehrt, welches zur Articulation der Handwurzel mit dem Mittelhandknochen des Zeigefingers beiträgt (vgl. Fig. 222).

6. Trapezoidbein, *Os trapezoides* ¹⁾ *Trd.*

6. Trapezoidbein.

Das Trapezoidbein nimmt von hinten nach vorn an Höhe wie an Breite ab; es verjüngt sich von unten nach oben im sagittalen Durchmesser, indem die volare Fläche gerade, die dorsale mit dem oberen Rande vorwärts geneigt steht. Die obere Fläche, ein kleines, vierseitiges, überknorpeltes Feld, tritt mit der oberen Gelenkfläche des Trapezbeins zur Aufnahme der lateralen unteren Gelenkfläche des Kahnbeins zusammen. Mittelst einer stumpfen Kante geht sie in die dem Trapezbein zugekehrte Daumenfläche über, deren obere Hälfte (*d*) schräg lateral- und aufwärts, deren untere Hälfte (*d'*) gerade lateralwärts gerichtet ist, jene überknorpelt, diese im vorderen Theile rauh. Die Kleinfingerfläche sieht mit der vorderen Hälfte gerade medianwärts und wendet sich mit der hinteren Hälfte allmählig etwas vorwärts; sie ist ganz oder nur im vorderen Theile überknorpelt und steht mit dem Kopfbein in Verbindung. Die untere Fläche (vgl. Fig. 222) ist gleich der des Trapezbeins sattelförmig, im längeren, sagittalen Durchmesser concav, im schmalen, transversalen Durchmesser convex.

7. Kopfbein, *Os capitatum* ²⁾ *C.*

7. Kopfbein.


Ausgezeichnet durch den kugelförmigen, von den Seiten comprimierten, hoch in die erste Reihe der Handwurzelknochen hinaufragenden Kopf, welcher die obere und einen Theil der medialen Gelenkfläche trägt. Die

¹⁾ *Os multangulum minus, trapezium minus, pyramidale.*

²⁾ *Os magnum.*

obere Gelenkfläche nämlich, mit der medialen unteren Fläche des Kahnbeins und dem grösseren Theile der unteren Fläche des Mondbeins articulirend, beginnt, anfangs vollkommen lateralwärts gerichtet, etwa in der halben Höhe des Knochens und wendet sich mit einer abgerundeten Kante aufwärts; sie setzt sich auf die Rückenfläche und etwas weniger weit abwärts auf die Vorderfläche des Knochens fort, von beiden durch einen fast genau transversalen, überhängenden Rand gesondert. Von der mit dem Trapezoidbein articulirenden Daumenfläche ist sie nur durch eine leichte Einbiegung geschieden. Eine schärfere Kante trennt am oberen Rande des Knochens die obere Fläche von der medialen, mit dem Hakenbein zu-

Fig. 221.



Handwurzelknochen von der Volarseite, das Erbsenbein vom Pyramidenbein getrennt und zur Seite gerückt; *s* obere Fläche, *i* untere Fläche, *d* Daumenfläche, *k* Kleinfingerfläche, *h* Hohlhandfläche.

sammengefügten und nur in der unteren vorderen Ecke durch Anheftung von Bändern rauhen Fläche. Die untere Fläche (vgl. Fig. 222) zerfällt durch zwei stumpfe, sagittale Kanten in drei Felder: ein laterales (*i*), welches die sattelförmige Gelenkfläche des Trapezoidbeins vervollständigt, ein mittleres grösstes, concaves (*i'*), auf welchem der dritte Mittelhandknochen eingelenkt ist, und ein mediales (*i''*), welches nur die hintere Ecke einnimmt und zur Gelenkfläche des vierten Mittelhandknochens mit beiträgt. Die Hohlhandfläche des Kopfbeins ist vierseitig, im queren Durchmesser gewölbt; an der hinteren Fläche ist der untere Rand schräg und kommt mit dem Kleinfingerrande in einer abwärts ragenden Spitze zusammen.

8. Hakenbein, *Os hamatum* ¹⁾ **H.**

Die Volar- und Dorsalfläche des Hakenbeins gleichen, wenn man von dem aus der Vorderfläche vorspringenden Haken absieht, rechtwinklichen

8. Hakenbein.

¹⁾ *Os unciforme, cuneiforme.*


Dreiecken. Von den ziemlich gleich langen Katheten steht die eine vertical, die andere horizontal; die Hypothenuse geht schräg median- und abwärts. Die obere Gelenkfläche, gegen den Kleinfingerrand abhängig und nur in der Nähe dieses Randes aufwärts gekrümmt, trägt einen kleinen Theil des Mondbeins und das Pyramidenbein; die untere, in sagittaler Richtung concave und durch eine sagittale Kante in zwei gleiche Hälften (Fig. 221 *i* und *i'*) getheilte Fläche articulirt mit den Mittelhandknochen des vierten und fünften Fingers. Die obere und untere Fläche stossen medianwärts entweder in einer scharfen Kante unmittelbar zusammen oder werden durch einen niederen Streifen rauher Fläche (*k*) geschieden. Die Daumenfläche, vertical gestellt, ist gleich der entsprechenden Fläche des Kopfbeins bis in die Nähe der unteren vorderen Ecke überknorpelt.

Alle Handwurzelknochen sind zur Zeit der Geburt knorplich: alle verknöchern von einem Knochenkern aus, der im Kopf- und Hakenbein schon im ersten Lebensjahre erscheint, im Pyramidenbein im dritten Jahre, im Mond- und Trapezbein im vierten bis fünften, im Kahn- und Trapezoidbein im achten bis neunten. Das Erbsenbein wird erst zwischen dem zwölften und fünfzehnten Jahre knöchern.

Hand-
wurzel-
Mittelhand-
gelenke.

Die Form des Gelenks der Hand mit dem Unterarm und der beiden Handwurzelreihen unter sich, sowie der Antheil, welchen die einzelnen Knochen an diesen Gelenkverbindungen nehmen, ergiebt sich aus dem Vorhergehenden. Die erste Reihe wendet dem Unterarm eine im transversalen und sagittalen Durchmesser convexe Fläche zu und kann demnach vor- und rückwärts sowie seitwärts bewegt werden. Die Bewegung der zweiten Reihe gegen die erste beschränkt sich auf Beugung und Streckung; die Drehung um die sagittale Axe wird verhindert durch den Winkel, welchen die Gelenkfläche des Kahnbeins gegen das Trapez- und Trapezoidbein mit der Gelenkfläche desselben Knochens gegen das Kopfbein bildet. Noch unregelmässiger, wenn auch nicht in so auffallender Weise

Fig. 222.



Zweite Reihe der Handwurzelknochen von unten.
*M*₁ bis *M*₅ Gelenkflächen für die Mittelhandknochen 1 bis 5.

wechselnd, ist die Krümmung, welche die Knochen der zweiten Reihe den Mittelhandknochen zuwenden. An die gegen die Volarfläche der Hand vortretende, lateralwärts gekehrte sattelförmige Gelenkfläche (*M*₁) des Trapezbeins für den Daumen schliesst sich, durch einen schmalen Zwischenraum getrennt, eine Gelenkfläche (*M*₂) für den Mittelhandknochen des Zeigefingers, welche das ganze Trapezoidbein, die hintere Ecke des Trapezbeins

und ein dreieckiges Feld auf dem Kopfbein einnimmt. Sie hat eine in sagittaler Richtung verlaufende Wölbung zwischen zwei Concavitäten, deren grösste Tiefe mit den zwei Spalten zwischen den drei genannten Knochen zusammenfällt. Die dem dritten Mittelhandknochen bestimmte

Gelenkfläche des Kopfbeins (M_3) ist vierseitig, schmal, mit einer diagonal von der vorderen medialen gegen die hintere laterale Ecke ziehenden Concavität versehen. Die Gelenkfläche (M_4) des vierten nimmt die hintere Ecke des Kopfbeins und die Hälfte des Hakenbeins ein; sie ist flach ausgehöhlt und nur in der Nähe des hinteren Randes etwas convex. Die Gelenkfläche (M_5) des fünften Mittelhandknochens ist gleich der des Daumens sattelförmig, aber im entgegengesetzten Sinne, convex im transversalen, concav im sagittalen Durchmesser. Sie ist im Ganzen lateralwärts abhängig und kommt der medialwärts abhängigen Gelenkfläche des vierten Mittelhandknochens unter einem sehr stumpfen Winkel entgegen.

β. Mittelhandknochen.


Die Mittelhandknochen (Fig. 223) sind Röhrenknochen mit verdicktem oberem und unteren Ende. Indem die Enden im horizontalen Durchmesser die Körper überragen, entstehen zwischen den mit den Enden genau an einander gefügten Knochen die nach oben und unten sich zuspitzenden Zwischenknochenräume, *Spatia interossea*. Indem die im sagittalen Durchmesser verdickten Enden vorzugsweise gegen die Volarfläche über die Körper vorspringen, erscheint die Mittelhand gegen die Vola von oben nach unten ausgehöhlt. In geringem Grade sind indess auch die Körper nach diesem Sinne gebogen. Die Endflächen des oberen Endes (*Basis*) sind den unteren Flächen der Knochen der zweiten Handwurzelreihe entsprechend gebogen, sattelförmig am Daumen und fünften Finger, am Daumen dreiseitig mit vor-, rück- und seitwärts gerichteten Winkeln, am fünften Finger länglich vierseitig mit transversal gestelltem längsten Durchmesser. Sattelförmig und vierseitig ist auch das grössere Mittelfeld des zweiten Mittelhandknochens, transversal tief concav, sagittal convex, durch scharfe Kanten von dem kleineren, vorwärts schauenden lateralen und dem grösseren, medianwärts schauenden medialen Nebengebiet gesondert. Die Endfläche des Mittelhandknochens des dritten Fingers, von einer diagonalen Convexität vor- und rückwärts abfallend, verlängert sich an der hinteren lateralen Ecke in eine Spitze, welche sich an dem sogleich zu erwähnenden Proc. styloideus dieses Knochens hinaufzieht. Die Gelenkfläche des vierten Mittelhandknochens, transversal convex, sagittal concav, hat zwei durch eine rauhe Furche geschiedene Abtheilungen; die kleinere, welche die hintere, laterale Ecke einnimmt, ruht auf dem Kopfbein, die grössere auf dem Hakenbein; die Furche liegt der Spalte des Kopf- und Hakenbeins gegenüber.

β. Mittelhand.

Am Mittelhandknochen des Daumens ist die Endfläche ringsum von einem mehr oder minder abgeschrägten, rinnenförmigen Saume umgeben, durch dessen Vermittelung sie in den Körper des Knochens sich fortsetzt. Der Körper ist dreiseitig prismatisch mit Flächen, welche den Rändern der Endfläche genau entsprechen. Die Mittelhandknochen der übrigen Finger sind am oberen Ende vierseitige, freilich ziemlich unregelmässige Prismen, mit einer volaren und dorsalen, einer Daumen- und Kleinfingerfläche, von welchen die beiden letzteren, insoweit die vier Mittelhandknochen einander mittelst derselben berühren, mit planen, überknorpelten

Gelenkflächen versehen sind. Am zweiten Mittelhandknochen geht die laterale, am fünften die mediale Fläche abgerundet in die volare und dorsale über. An allen ist die

Fig. 223.



Handwurzel mit den Mittelhandknochen, Rückseite.

schräg lateral- und abwärts abgestutzt; die mediale Gelenkfläche, unmittelbar an die überknorpelte Endfläche sich anschliessend, durch eine Einbiegung des unteren Randes fast in zwei Felder getheilt, Fig. 224 *.

Fig. 224.



Fig. 224 zweiter Mittelhandknochen,
Fig. 225 dritter Mittelhandknochen
von der Kleinfingerseite.

Fig. 225.



Die gleiche Form besitzt die laterale Gelenkfläche des dritten Mittelhandknochens, der durch einen aufwärts ragenden stumpfen Fortsatz an der lateralen hinteren Ecke, den genannten *Proc. styloideus*, ausgezeichnet ist, von wo aus der hintere Rand medianwärts ziemlich schräg absteigt. Wegen dieses Fortsatzes ist der dritte Mittelhandknochen hinten breiter als vorn; seine mediale Gelenkfläche ist völlig in zwei hinter einander liegende, durch eine Furche getrennte Felder (Fig. 225 *) zerfallen. So auch die entsprechende, laterale Gelenkfläche des vierten Mittel-

handknochens, dessen mediale Gelenkfläche, gleich der lateralen Gelenkfläche des fünften, einen niederen, halbmondförmigen Saum darstellt. Im Uebrigen ist das obere Ende des vierten Mittelhandknochens im sagittalen und horizontalen Durchmesser kleiner als der entsprechende Theil des dritten; der fünfte ist im sagittalen Durchmesser noch mehr verjüngt, aber breiter. Unterhalb der Gelenkflächen, durch welche die Mittelhandknochen mit einander articuliren, findet sich an allen ein Grübchen (*) und darunter ein Wulst, zur Anheftung von Bändern bestimmt. Die mediale Fläche der Basis des fünften Mittelhandknochens ist ein platter Höcker (*Tuberositas*), an welchen die Sehne des *M. extensor c. ulnaris* sich befestigt.

Die Körper der Mittelhandknochen nehmen von dem zweiten gegen den fünften an Länge ab, so dass die Reihe der Gelenke sowohl der Handwurzel mit der Mittelhand, als der Mittelhand mit den Fingern schräge und zwar gegen den Kleinfingerrand convergirende Linien bildet. Der Mittelhandknochen des Daumens ist kürzer als der des fünften Fingers, aber dicker als alle. Von den übrigen sind der zweite und dritte an Dicke gleich, der fünfte ist schwächer und der vierte am schwächsten. Der Körper des Daumens ist, wie erwähnt, dreiseitig prismatisch, mit sehr schwach gewölbter Dorsalfläche und zwei, durch eine mehr oder minder scharfe Kante geschiedenen volaren Flächen, welche gegen das untere Ende in eine convexe Fläche zusammenfliessen. Die Dorsalfläche des Daumens ist lateralwärts gerichtet. Die Körper der vier medialen Mittelhandknochen sind in der Nähe des oberen Endes undeutlich vierseitig prismatisch oder cylindrisch, werden aber gegen das untere Ende regelmässig dreiseitig prismatisch, so zwar, dass eine fast plane Fläche dem Rücken der Hand angehört und zwei convexe Seitenflächen in einer scharfen, volaren Kante

Fig. 226.



Horizontaldurchschnitt der Körper der Mittelhandknochen, *x* in der Nähe der oberen Enden, *y* in der Nähe der unteren Enden.

zusammenstossen. Die plane Rückenfläche aber spitzt sich gegen die Basen der Mittelhandknochen zu, oder, mit anderen Worten, sie geht aus einer Kante hervor, welche die Mitte der Rückenfläche der Basis einnimmt und, je näher ein Mittelhandknochen dem Daumen liegt, um so weiter abwärts sich erstreckt, bevor sie in die zwei Seitenkanten der Rückenfläche des Körpers aus einander weicht (Fig. 223). Umgekehrt verliert sich die volare Kante an der Grenze des hinteren und mittleren Drittels des Körpers in eine


plane oder schwach gewölbte dreiseitige Fläche, die sich in die volare Fläche der Basis der Mittelhandknochen fortsetzt (Fig. 227, 228). Indem sich diese Kante auch am unteren Ende des Mittelhandknochens zu einer dreiseitigen Fläche ausbreitet, erhält dieses Ende wieder eine vierseitige, seitlich comprimirt und an allen fünf Mittelhandknochen sehr ähnliche Gestalt.

Das untere Ende der Mittelhandknochen, Köpfchen, *Capitulum* ¹⁾, trägt eine kugelförmige Endfläche, welche über die volare Fläche des Körpers weiter vorspringt und weiter an derselben hinaufragt als an der dorsalen Fläche. Der hintere Rand der Gelenkfläche (Fig. 223) ist gerade oder schräg, durch eine seichte Rinne oder ein Grübchen gegen den Körper abgesetzt. Der vordere Rand der Gelenkfläche (Fig. 228) ist tief eingebogen, an jeder Ecke gleichsam in einen abgerundeten, auf einem kleinen Vorsprunge stehenden Zipfel verlängert; auf der Fläche dieser Zipfel gleiten die Sesambeinchen, wo solche vorhanden sind. Die Vertiefung zwischen ihnen ist rau und enthält meistens ein feines Ernährungsloch oder mehrere. Die Seitenränder der Gelenkflächen sind stark abwärts

¹⁾ *Condylus, Caput.*

convex, die Seitenflächen der Köpfchen (Fig. 224, 225) stark eingedrückt ¹⁾

Fig. 227.



Mittelhandknochen
und Phalangen des
Daumens, von vorn.

Fig. 229.



Sagittaldurchschnitt des
Köpfchens des Mittel-
handknochens und der
Phalangen des Dau-
mens mit dem Sesam-
bein.

Fig. 228.



Mittelhand-
knochen und
Phalangen d.
Zeigefingers,
von vorn.

zwischen dem erwähnten Vorsprunge, der den vorderen Theil der Gelenkfläche trägt, und einem ähnlichen Vorsprunge am hinteren Rande.

Die *Ossa sesamoidea* der Hand (S. 202) sind dem Erbsenbein ähnlich, kugelig und an der articulirenden Fläche kreisförmig abgeplattet, 5^{mm} im Durchmesser.

Die Ernährungslöcher der Körper liegen im zweiten bis fünften Mittelhandknochen am Daumenrande der Hohlhandfläche und führen in aufwärts gerichtete Canäle; im Körper des ersten Mittelhandknochens liegt das Ernährungsloch am Kleinfingerrande und durchbohrt den Knochen schräg abwärts.

Zur Zeit der Geburt ist das Mittelstück der Mittelhandknochen knöchern, die Enden sind knorplich. Ein besonderer Knochenkern entsteht im zweiten bis dritten Jahre in der Basis des Mittelhandknochens des Daumens und im Köpfchen jedes der vier übrigen Mittelhandknochen. Nur ausnahmsweise erhalten die Basen der vier medialen und das Köpfchen des ersten Mittelhandknochens ebenfalls besondere Knochenkerne. Diese, wenn sie vorhanden sind, verschmelzen frühzeitig mit dem Körper; die regelmässigen Epiphysen nicht vor dem achtzehnten bis zwanzigsten Jahre.

Der Mittelhandknochen des Daumens weicht demnach hinsichtlich des Ganges seiner Verknöcherung, wie hinsichtlich der Lage des Ernährungsloches, von den übrigen Mittelhandknochen ab. Er stimmt dagegen in beiden Punkten mit den Phalangen überein, eine immerhin bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit, wenn es sich darum handelt, ob der erste cylindrische Knochen des Daumens als Mittelhandknochen oder als erste Phalanx zu deuten sei. Da er in allen anderen Beziehungen den Mittelhandknochen gleicht, und da er ausnahmsweise auch gleich den übrigen Mittelhandknochen verknöchert, so schien es mir nicht zweifelhaft, welche von jenen beiden Ansichten den Vorzug verdiene.

γ. Phalangen.

γ. Finger.

Die Körper der Phalangen sind alle nach demselben Plane gebildet. Ihre sehr regelmässig transversal gewölbten Dorsalflächen und transversal planen oder schwach ausgehöhlten Volarflächen kommen in scharfen Seitenrändern zusammen; der Horizontaldurchschnitt ist demnach halbmondförmig mit vorwärts gerichteter Concavität. An den Grund-

¹⁾ *Impressio lateralis. Sinus tuberculi.*

phalangen wird die Concavität der Vorderfläche noch tiefer dadurch, dass der Rand in Form eines schmalen, rauhen Saumes auf die letztere übergreift. An den Mittelphalangen ist der Saum verhältnissmässig breiter und die Fläche ist der Länge nach in zwei rauhe Seitenfelder und ein glattes, etwas gewölbtes mittleres Feld getheilt. Alle Phalangen sind der Länge nach,

Fig. 230.



Fig. 231.



Fig. 230 Horizontaldurchschnitt der Grundphalange, Fig. 231 desgl. der Mittelphalange des zweiten Fingers.

aber nur in sehr geringem Grade, gegen die Volarfläche gebogen. Diese Biegung ist, weil die Enden den Körper im sagittalen Durchmesser hauptsächlich vorwärts überragen, an der vorderen Fläche auffallender als an der hinteren. An der hinteren Seite wird vielmehr die entsprechende

Wölbung durch die Verdickung der Extremitäten ausgeglichen oder selbst, besonders an den Basen der Mittel- und Endphalangen, in eine Concavität verwandelt (Fig. 232).

Nicht nur im sagittalen, sondern auch im transversalen Durchmesser (Fig. 227) sind die Enden der Phalangen stärker als das Mittelstück. Von

Fig. 232.



$\frac{1}{2}$

Zweiter Finger, Profil.

den oberen Enden an verschmälern sie sich, um am unteren Ende sich wieder in die Breite, doch nicht bis zu dem Umfange des oberen Endes, auszudehnen. Und obgleich jede untere Phalange im Ganzen schmäler ist als die nächst obere, so ragt doch das obere Ende einer jeden um Weniges über das untere Ende der nächst vorhergehenden hervor.

Die einzelnen Phalangen unterscheiden sich von einander durch die Dimensionen und durch die Form der Enden. In letzterer Beziehung sind die Phalangen je einer Reihe einander fast vollkommen gleich; hier bleiben also fast nur die Dimensionen als Unterscheidungsmerkmale übrig. Was nun die Länge der Phalangen betrifft, so nimmt sie an jedem Finger von oben nach unten regelmässig ab; doch ist die Endphalange im Verhältniss zur vorhergehenden am Daumen und fünften Finger länger als an den übrigen Fingern. Die längsten Phalangen besitzt der dritte Finger, ihm folgt der vierte, zweite, fünfte. Die Grundphalange des Daumens ist kürzer als die des fünften Fingers, steht aber an Breite und Dicke der Grundphalange des Mittelfingers nicht nach, und die Endphalange des Daumens übertrifft in jeder Dimension die Endphalange der übrigen Finger. Im Uebrigen ist die kleinste Grundphalange länger als die längste Mittelphalange; die kürzeste Mittelphalange wird dagegen von der Endphalange des dritten Fingers um Weniges an Länge übertroffen, und die Endphalange des Daumens gleicht an Länge der Mittelphalange des zweiten Fingers.

Die Grundphalangen haben an dem dem Mittelhandknochen zugewandten Ende eine kreisförmige oder ovale, mit dem längsten Durchmesser transversal gestellte, flach kugelförmig vertiefte und überknorpelte Endfläche, von einem wulstigen Saume umgeben, welcher an der Vorderfläche jederseits in einem stumpfen Höcker vorspringt. Die Gelenkfläche des unteren Endes der Grundphalange ist ein liegender, in der Mitte eingebogener Cylinderabschnitt, welcher auf der vorderen Fläche weiter hin-

aufricht als auf der hinteren, vorn mit fast geradem, hinten mit convexem

Fig. 233. Rande, nur am Daumen ist der vordere Rand der Gelenkfläche, der Vertiefung derselben entsprechend, deutlich eingebogen. Die Seitenflächen des unteren Endes ¹⁾ sind kreisförmig, leicht vertieft, etwas schräg gestellt, nach hinten convergirend. Das obere Ende der Mittelphalangen trägt eine elliptische, mit dem längsten Durchmesser transversale, durch einen sagittalen Vorsprung getheilte Gelenkfläche; diese ist von einem ähnlichen Wulst umgeben, wie die Gelenkfläche des oberen Endes der Grundphalange; der Höcker aber, welcher hier nach vorn vorspringt, liegt dort mehr am Seitenrande und ist stumpfer. Das untere Ende der Mittelphalange ist dem unteren Ende der Grundphalange vollkommen ähnlich. Ebenso gleicht die Basis der Endphalange der Basis der Mittelphalange, nur dass jene sich rascher verjüngt und der seitliche Vorsprung stärker, zu-



Zweiter Finger, Rückenfläche.

weilen selbst scharf oder spitz hervortritt. Nach unten endet die Endphalange mit einer breiteren, hufeisenförmig gekrümmten Platte, *Tuberositas unguicularis*, welche vorn rauh und hinten glatt ist bis in die Nähe des Randes, der die hintere Fläche einem gezähnelten Wulste ähnlich überragt. Der Rand dieser Platte geht entweder sanft eingebogen in den Seitenrand des Körpers über oder er setzt sich jederseits mit einer stumpfen oder spitzen, aufwärts ragenden Zacke gegen den Körper ab.

Die Ernährungslöcher haben eine unbeständige Lage auf der Volarfläche, die Canäle, in welche sie führen, sind abwärts gerichtet.

Das obere Ende der sämtlichen Phalangen entwickelt sich aus einer besonderen Epiphyse, welche zwischen dem dritten bis siebenten Jahre entsteht und im achtzehnten bis zwanzigsten mit dem Körper verschmilzt.

II. Knochen der unteren Extremität.

a. Knochen des Gürtels der unteren Extremität.

Hüftbein, *Os coxae* ²⁾).

II. Untere Extremität.
a. Gürtel.
Hüftbein.


Das Hüftbein ist ein platter, unter der Mitte sanduhrförmig eingeschnürter Knochen, dessen oberer und unterer Rand convex, dessen vorderer und hinterer Rand concav verläuft. Man kann es sich zusammengesetzt denken aus zwei fächerförmigen, gegen die Spitze abgestutzten und mit den abgestutzten Rändern dergestalt an einander gewachsenen Knochenstücken, dass das Eine über dem anderen steht, das Eine den breiten Rand nach oben, das andere ihn nach unten wendet, zugleich aber durch eine Torsion an der Stelle der Vereinigung das obere Stück in der Seitenwand, das untere in der Vorderwand des Rumpfes eingeschlossen ist (Fig. 188, 189). Die Flächen des oberen Stückes liegen demnach in sagittalen, die

¹⁾ *Impressiones laterales.* ²⁾ Beckenknochen, *Os innominatum*, *Os pelvis*.

des unteren in frontalen Ebenen; aber wegen der cylindrischen Gestalt des Rumpfes hat das obere eine medianwärts, das untere eine rückwärts schauende Concavität, krümmt sich das obere von der seitlichen auf die hintere Wand, das untere von der vorderen auf die seitliche Wand des Rumpfes hinüber, und ausserdem erhalten beide durch die umgekehrt kuppelförmige Wölbung des unteren Endes des Rumpfes eine Neigung mit den äusseren Flächen abwärts. Der convexe (obere) Rand des oberen Stückes ist länger und viel steiler gekrümmt als der convexe (untere) Rand des unteren Stückes. Das obere übertrifft das untere an Breite und Höhe, mehr noch in der Höhe als in der Breite, woraus folgt, dass im Verhältniss zur Höhe das untere Stück breiter ist als das obere.

Das obere Stück nimmt von den Rändern gegen die Mitte an Mächtigkeit ab, zuweilen in dem Grade, dass die Diploe in grösserer oder geringerer Ausdehnung schwindet und die dünne Knochentafel stellenweise sogar durchbrochen erscheinen kann. An dem unteren Stücke ist regelmässig ein grosser mittlerer Theil häutig; nach Entfernung des häutigen Theiles (der *Membrana obturatoria*) bleibt nur ein platter Rahmen übrig, eine ovale (oder nierenförmige oder stumpfwinklich dreiseitige, mit dem stumpfen Winkel nach unten gerichtete) Lücke umschliessend, deren längster Durchmesser (60^{mm})

Fig. 234.



Äussere Fläche des (männlichen) Hüftbeins, Seitenansicht, der Rumpf um die verticale Axe ein wenig mit der rechten Seite rückwärts gedreht. Lga, Lgp Linea glutea ant. u. post.

Os ilium, genannt; die untere wollen wir Leistenbein, *Os pubo-ischiadicum*, nennen. Das Leistenbein ist am kindlichen Becken durch zwei cor-

dem breiteren Rande dieses Knochentheiles parallel verläuft. Die Lücke ist das Hüftbeinloch, **Foramen obturatum**¹⁾.

Die Grenze, welche wir zwischen dem oberen und dem unteren Theile des Hüftknochens soeben in Gedanken gezogen haben, besteht vor dem siebenten Jahre in Wirklichkeit; die Synchondrose, welche beide Abtheilungen scheidet, läuft fast genau transversal, wenig nach unten convex über den schmalsten Theil (Isthmus) des Hüftbeins und fast mitten durch die Gelenkpfanne, welche die Aussenfläche des Isthmus einnimmt. Die obere Abtheilung wird Darmbein,

¹⁾ *F. ovale*.

respondirende verticale Synchondrosen, welche ohne die Unterbrechung durch das Hüftbeinloch als eine einzige erscheinen würden, in zwei stark gekrümmte Halbringe getrennt, einen lateralen und medialen, von welchen aber der laterale, wegen der oben erwähnten Krümmung des Leistenbeins, mehr hinter als neben dem medialen liegt. Der hintere Halbring heisst Sitzbein, *Os ischii*, der vordere Schambein¹⁾, *Os pubis*. Man hat sich gewöhnt, bei der Beschreibung des erwachsenen Beckens sich der Eintheilung in die drei Stücke zu bedienen, welche durch die Entwicklungsgeschichte vorgezeichnet ist²⁾; man muss demnach, wenn man sich das Leistenbein der Länge nach getheilt denkt, an jedem der beiden Halbringe einen oberen und einen unteren Ast unterscheiden. Der obere Ast eines jeden nimmt mit einem verdickten Ende, dem sogenannten Körper, an der Bildung der Pfanne Antheil; zu der unteren Hälfte derselben trägt das Schambein das vordere Drittel, das Sitzbein die beiden hinteren Drittel bei. Von dem Körper geht sodann der obere Ast des Schambeins, *Ramus sup. o. p.*³⁾, vorwärts, der untere, *R. inf. o. p.*⁴⁾, rückwärts; vom Körper des Sitzbeins geht der obere Ast, *R. sup. o. ischii*⁵⁾, rückwärts, der untere, *R. inf. o. i.*⁶⁾, vorwärts.


Ich erwähnte bereits die Gelenkpfanne, *Acetabulum*, welche der Isthmus des Hüftbeins auf seiner äusseren Fläche trägt. Der Durchmesser dieser Pfanne ist eben so gross oder etwas grösser als der längste Durchmesser des Hüftbeinloches, aber kleiner als die Breite des Isthmus; sie liegt näher dem vorderen oberen als dem hinteren unteren Rande des letzteren; mit dem vorderen unteren Theile ihres Randes berührt sie beinahe den Rand des Hüftbeinloches. Ihre Tiefe gewinnt sie dadurch, dass von allen Seiten, besonders aber von der hinteren Seite her, die Oberfläche des Knochens gegen den Rand der Pfanne ansteigt. Ihr Eingang, obgleich an der Seitenwand des Beckens gelegen, richtet sich dadurch nach vorn, indess der hinter der Pfanne gelegene Theil der Aussenfläche des Isthmus vom Pfannenrande an median- und rückwärts verläuft (vgl. Fig. 237).

Von dem schmaleren, aber dickeren Ende, womit sie zur Bildung der Pfanne beitragen, breiten sich Darm- und Leistenbein, indem sie platter werden, so aus, dass, im Groben betrachtet, der vordere Rand des Darmbeins mit dem hinteren Rande des Leistenbeins in Eine Flucht zu liegen kommt und umgekehrt; dass man also die Ränder beider verbundenen Knochen mit einer 8-Tour umschreiben kann, deren Kreuzungspunkt in den Isthmus fällt. Die concaven vorderen und hinteren Ränder des Hüftbeins gehören in der oberen Hälfte dem Darmbein, in der unteren Hälfte dem

¹⁾ Schoossbein. ²⁾ Diese Art der Eintheilung ist weder consequent, noch glücklich; namentlich würde die Beschreibung des von mir sogenannten Leistenbeins minder schwerfällig geworden sein, wenn man dasselbe einfach als durchbrochene Platte oder als Ring aufgefasst hätte. Indessen sind die Benennungen, welche sich auf die Zerlegung des Leistenbeins in Scham- und Sitzbein beziehen, zu zahlreich und zu allgemein verbreitet, als dass man, nur der Bequemlichkeit der Darstellung wegen, davon abzugehen sich erlauben dürfte. Anders ist es mit den Namen der sogenannten Aeste des Scham- und Sitzbeins, die nicht nur unbequem sind, sondern auch falsche Vorstellungen erwecken, und die ich deshalb mit neuen, einfacheren zu vertauschen keinen Anstand nehme.
³⁾ *R. horizontalis oss. pubis.* ⁴⁾ *R. descendens oss. pubis.* ⁵⁾ *R. descendens oss. ischii.*
⁶⁾ *R. ascendens oss. ischii.*

Leistenbein (vorn dem Schambein, hinten dem Sitzbein) an. Die tiefste Einbiegung dieser Ränder entspricht dem Uebergange des Randes des Darmbeins vorn auf den oberen

Fig. 235.



Aeussere Fläche des (männlichen) Hüftbeins, Seitenansicht, der Rumpf um die verticale Axe ein wenig mit der rechten Seite rückwärts gedreht. Lga, Lgp Linea glutea ant. u. post.

stumpfer, platter Fortsatz, *Spina ant. sup. oss. ilium*, *a*; durch einen Ausschnitt, *Incisura iliaca minor* ¹⁾, *b*, von ihm getrennt, folgt dann am vorderen Rande unter ihm ein zweiter, ähnlicher Fortsatz, *Spina ant. inf. oss. ilium*, *c*, beide von Muskelursprüngen eingenommen. Weiter abwärts, vor der Pfanne, liegt der tiefe und glatte Ausschnitt, *Incisura iliaca major*, *d*, mit welchem der vordere Rand des Darmbeins in den vorderen (oberen) des Leisten- (Scham-) Beins umbiegt. An die untere, vordere Ecke *e*, an welcher der vordere Rand des Hüftbeins mit dem unteren convexen Rande sich verbindet, stösst die obere Spitze einer überknorpelten Fläche, der Synchondrose nämlich, welche die beiden Schambeine an einander befestigt, *Synchondrosis oss. pubis*. Gehen wir in umgekehrter Richtung am hinteren Hüftbeinrande von der unteren hinteren Ecke aufwärts, so finden wir diese Ecke abgerundet, rauh und verdickt durch einen von zahlreichen Muskelansätzen bedeckten Vorsprung, *Tuber ischiadicum*, *A*; über demselben zeigt sich ein kleiner, am frischen Becken von Knorpel bekleideter (der Sehne des *M. obturator. int.* als Rolle dienender) Einschnitt, *Incisura ischiadica minor* ²⁾, *B*, dann ein zweiter, platter Muskelfortsatz, *Spina ischiadica*, *C*, und über diesem, hinter der Pfanne, der tiefe, glatte Einschnitt, *Incisura ischiadica major* ³⁾, *D*, womit der hintere Rand des Leisten- (Sitz-) Beins

beins vorn auf den oberen Ast des Schambeins, hinten auf den oberen Ast des Sitzbeins. Im Uebrigen beobachtet man bei Vergleichung des vorderen und hinteren Randes des Hüftbeins eine merkwürdige und eigenthümliche Art von Symmetrie, eigenthümlich durch die gekreuzte Lage der einander entsprechenden Punkte.

Vier mehr oder minder vorspringende Winkel werden an dem Hüftbein erzeugt durch das Zusammentreffen des concaven vorderen und hinteren Randes mit dem convexen oberen und unteren. Der obere vordere dieser Winkel, an der Stelle, wo der obere Rand des Darmbeins in den vorderen übergeht, ist ein


¹⁾ *Incisura semilunaris.*

²⁾ *I. i. inferior.*

³⁾ *Incisura iliaca maj. s. sup.*

sich in den hinteren (unteren) Rand des Darmbeins fortsetzt. Durch die starke Biegung abwärts, welche dem hinteren Rande des Darmbeins eigen ist, erhält die Incisura ischiadica maj. eine von der Incisura iliaca maj. verschiedene Form und steilere Biegung. Wieder aber entspricht die obere hintere Ecke des Darmbeins der vorderen unteren des Leistenbeins dadurch, dass sie an ihrer inneren Seite die untere Spitze *E* einer überknorpelten Fläche trägt, welche zur Verbindung des Hüftbeins mit dem Kreuzbein dient, der *Synchondrosis sacro-iliaca*. Diese Ecke ist fast vertical abgestutzt und durch eine niedrige Einbiegung ¹⁾ in zwei Zacken, *Spina post. inf.* und *Sp. p. sup. oss. ilium*, getheilt. Die untere Zacke, platt und scharf, entspricht mit ihrem abgerundeten Contur dem abgerundeten Rande der *Synchondrosis sacro-iliaca*; zuweilen trägt sie unten eine Zacke oder einen Kamm, von der Anheftung des *M. pyriformis* herrührend. Mit der oberen Zacke beginnt, dick und wulstig, der convexe Rand des Hüftbeins.

Fig. 236.



Hüftbein (eines weiblichen Beckens) von oben.


Dieser Rand ²⁾, von dem die langen Rückenmuskeln ausgehen und an den die Bauchmuskeln sich ansetzen, hat die grösste Mächtigkeit (bis 25mm) unmittelbar über der *Spina post. sup.*, verschmälert sich am vorderen Ende des hinteren Viertheils, um am hinteren Ende des vorderen Viertheils noch einmal auf eine kurze Strecke, und zwar gegen die Aussenfläche des Beckens, an Breite zuzunehmen. Ueber ihn verläuft der ganzen Länge nach ein scharfer Kamm, *Linea interme-*

dia, von welchem aus ein breiterer Theil nach aussen, ein schmalerer nach innen abfällt. Neben der continuirlichen Convexität nach oben, die, bei natürlicher Stellung des Hüftbeins, ihren höchsten Punkt mitten zwischen dem vorderen und hinteren oberen Darmbeinstachel hat, zeigt der obere Rand des Hüftbeins, von oben betrachtet oder in horizontaler Projection, eine S-förmige Krümmung, welche von der *Spina posterior sup.* an eine erste Convexität nach innen, eine zweite nach aussen wendet. Dem höchsten Punkte dieser zweiten Convexität entspricht die erwähnte vordere Breitenzunahme des Randes. Der vordere obere Darmbeinstachel biegt aber wieder nach aussen und der hintere obere, minder auffallend und beständig, nach innen um.

Mit den soeben geschilderten Krümmungen des oberen Randes stimmt die Gestalt der äusseren Fläche des Darmbeins überein. Ihre hintere

¹⁾ *Incisura semilunaris.*²⁾ *Crista oss. ilium.*

Hälfte ist im Querschnitt flach vertieft, jedoch gegen den hinteren Rand wieder etwas gewölbt; die vordere Hälfte ist im Querschnitt gewölbt, nicht selten sogar durch eine stumpfe Kante, die von der breitesten Stelle des



Durchschnitt eines weiblichen Beckens parallel der Ebene des Beckeneingangs. *Vs3* Durchschnittsfläche des Körpers des dritten Kreuzwirlbels. *Ssi* Synchronrosis sacro-iliaca. *Sp* Synchondr. pubis. *Tp* Tuberc. pubis. *So* Sulcus obturatorius. *Fa* Fossa acetabuli. *Iim* Incisura ischiadica maj. *Ti* Tuberositas iliaca.

Randes eine Strecke weit abwärts läuft, getheilt, in der Nähe des vorderen Darmbeinstachels aber leicht eingedrückt. Alle diese Unebenheiten gleichen sich abwärts aus gegen den Rand der Pfanne, zu welchem, wie erwähnt, die Fläche des Darmbeins gleichmässig ansteigt. Gerade über dem Rande der Pfanne und dicht an der Spina ant. inf. findet sich ein rauher Eindruck, an welchem die eine der Sehnen des langen Kopfes des Quadri-

ceps femoris entspringt. Noch sind zwei Linien zu erwähnen, welche, oft nur schwach angedeutet, die äussere Fläche des Darmbeins uneben machen. Die untere, *Linea glutaea ant.* ¹⁾, geht aufwärts convex von der Spina ant. sup. zur Mitte des hinteren Randes des Darmbeins; sie schliesst mit dem oberen Rande des letzteren ein sichelförmiges, mit der Spitze nach vorn gerichtetes Feld ein, Ursprungsstätte des M. glutaeus medius, welches rauher ist als das unterhalb der Linea glutaea inf. gelegene Feld, in welchem die Fasern des M. glutaeus minimus entspringen. Die *Linea glutaea post.* schneidet, indem sie von der Spina post. inf. schräg auf- und vorwärts zum oberen Rande geht, eine hintere Ecke der Aussenfläche des Darmbeins ab, die der Ursprung des M. glutaeus maximus einnimmt (vgl. Fig. 235).


Ernährungslöcher sind auf der Aussenfläche des Darmbeins zerstreut. Ein ziemlich beständiges, grösseres liegt am hinteren Theile der Linea glutea inf.

Unterhalb des vorderen unteren Darmbeinstachels fällt mit dem vorderen Rande des Hüftbeins der Rand der Pfanne zusammen. Oft ist an dieser Stelle, entsprechend der Rinne, über welche der M. iliopsoas aus dem Becken herabgeht, der vordere Rand der Pfanne mehr oder minder eingebogen. Regelmässig findet sich am unteren Rande der Pfanne ein Einschnitt, *Incisura acetabuli*; durch denselben setzt sich die äussere

¹⁾ *Linea arcuata externa. L. semicircularis.*

Fläche des oberen Sitzbeinastes geradezu in ein rauhes, d. h. nicht von Knorpel bekleidetes und unter dem Niveau des überknorpelten Theiles der Pfanne gelegenes Feld fort, welches dem mittleren Drittel der unteren Hälfte der

Fig. 238.



Unterer Theil des Hüftbeins eines um die transversale Axe aufwärts und um Weniges mit der rechten Seite vorwärts gedrehten Beckens.

überragt daher von oben eine Rinne (*), die sich längs dem oberen Rande des Sitzbeinhöckers verflacht nach hinten bis zur Incisura ischiadica minor fortsetzt. Von dem vorderen, spitzen Ende der überknorpelten Fläche der Pfanne gehen zwei Kanten ab: die eine geht schräg rück- und abwärts und verbindet sich bald mit dem scharfen Rande des Hüftbeinlochs; von der Verbindungsstelle springt eine kurze, platte Zacke, *Tuberc. obturatorium superius*, in das Hüftbeinloch vor; die andere Kante, *Crista obturatoria m.* ³⁾, geht, mit jener einen rechten Winkel einschliessend, vor- und abwärts fast über die ganze äussere Fläche des oberen Astes des Schambeins; sie endet, in einer Entfernung von 18^{mm} von der Synchondrose der Schambeine, vorwärts umbiegend, auf einem Vorsprung, *Tuberculum ossis pubis*, auf welchen ich zurückkomme.

Die sogenannten Aeste des Scham- und Sitzbeins, welche das Hüftbeinloch umgeben, wenden dieser Oeffnung scharfe Ränder zu, an welche die Membrana obturatoria sich anheftet. Nur an der vorderen oberen Ecke bleibt zwischen der Membran und dem Knochen eine Lücke, durch welche N. und Vasa obturatoria aus dem Becken hervortreten. Die Membran, vom Tub. obturat. sup. zu einer ähnlichen Zacke, *Tub. obt. inf.*, an der gegenüberliegenden Seite hingespant, wendet dieser Lücke einen geraden und scharfen Rand zu. Der Knochen überwölbt die Lücke mit einer breiten und flachen, an der unteren Fläche des Schambeins von der Höhle des Beckens zu dessen äusserer Wand vor- und abwärts verlaufenden Furche, *Sulcus obturatorius*. Die seitlichen Begrenzungen dieser Furche entstehen so, dass der Rand des Hüftbeinlochs einerseits, wo er vom oberen Ast des Sitzbeins

Pfanne ungefähr gleichkommt. Dieses Feld, *Fossa acetabuli*, ist aufwärts von einer, dem Rande der Pfanne einigermassen concentrischen, jedoch nach vorn flacher gebogenen Linie begrenzt; dem überknorpelten Theile der Pfanne ¹⁾ bleibt demnach die Form eines Hufeisens mit gegen einander gebogenen Schenkeln oder eines mit der Convexität nach oben umgelegten C, von dessen Enden ²⁾ das hintere abgerundet, das vordere zugespitzt und daher schmaler ist. Das hintere abgerundete Ende steht auf einem ansehnlichen, an der Basis eingeschnürten Vorsprunge des Sitzbeins; es

¹⁾ *Superficies lunata.*


²⁾ *Cornua.*

³⁾ *Spina oss. pubis.*

auf den oberen Ast des Schambeins übergeht, gegen die Crista obturatoria hinaufzieht, in deren Mitte etwa er sich verliert, andererseits, wo er sich vom unteren Ast des Schambeins auf dessen oberen Ast wendet, hinter der Crista obturatoria weg auf die der Beckenhöhle zugekehrte Fläche des Schambeins zurückweicht.

Wir haben die Aeste des Scham- und Sitzbeins mit Bezug auf die Gesamtform des Leistenbeins platt genannt, doch nähern sie sich alle durch Aufwulstung der dem Hüftbeinlochrande gegenüberliegenden Ränder mehr oder weniger einer dreiseitig-prismatischen Gestalt. Am meisten ist dies beim oberen Ast des Sitzbeins der Fall; hier ist die Stelle des freien Randes durch einen keulenförmigen, rauhen Wulst, den erwähnten Sitzhöcker, *Tuber ischiadicum*, vertreten, der das breite und abgerundete Ende aufwärts gegen die Incisura ischiadica minor wendet und mit dem zugespitzten Ende auf den unteren Ast des Sitzbeins reicht. Die Fläche des Sitzhöckers schaut rück- und lateralwärts; an ihrer breitesten Stelle erreicht oder übertrifft sie selbst die Breite der glatten, eigentlich äusseren Fläche des oberen Sitzbeinastes, mit der sie in einer stumpfen Kante zusammenstösst. Wo der Sitzhöcker endet, entwickelt sich der freie Rand des unteren Astes des Sitz- und Schambeins zu einer schräg gegen die Axe der Beckenhöhle aufsteigenden Fläche (Fig. 239), so dass hier die Aussenfläche des Kno-

Fig. 239.




Hüftbein, innere Oberfläche, Seitenansicht.

chens plan, die innere Fläche durch eine stumpfe, der Länge nach verlaufende Kante in eine auf- und eine abwärts schauende Fläche getheilt erscheint. Die Aussenfläche ist etwas schräg, mit dem unteren Rande vorwärts gestellt; am auffallendsten ist dies an der Stelle der ehemaligen Synchondrose des unteren Scham- und unteren Sitzbeinastes, die zuweilen noch am Erwachsenen an einer vom freien zum Hüftbeinlochrande verlaufenden Rauigkeit, *Tuberositas pubo-ischiadica*, kenntlich ist. Ueber dieser Rauigkeit findet sich eine flache Vertiefung und über dieser, in der Fortsetzung der inneren unteren Fläche, die untere Spitze der überknorpelten Fläche, die zur Verbindung der beiden Schambeine unter sich dient.

Die letztere, *Synchondr. oss. pubis*, ist langgestreckt-elliptisch, mehr als doppelt so hoch als (im sagittalen Durchmesser) breit (40 : 16^{mm}), in sagittaler Richtung schwach convex. Ihre obere Spitze fällt, wie oben erwähnt, mit der Ecke zusammen, an welcher der untere convexe und der vordere concave Rand des Hüftbeins sich ver-

einigen. Sie liegt der Medianebene näher als die untere Spitze, so wie

Fig. 240.



Hüftbein, innere Oberfläche, Seitenansicht.

auch der hintere Rand der überknorpelten Fläche medianwärts weiter vortritt als der vordere. Der obere Ast des Schambeins erhält durch die Crista obturatoria eine dreiseitig-prismatische Form, und hier ist es also wieder die äussere Fläche des Knochens, die in zwei Flächen zerlegt wird. Die unterhalb der Crista obturatoria gelegene Fläche ist in Folge des Ueberhängens dieser Crista und insbesondere des Tuberc. oss. pubis concav; sie setzt sich einwärts in den Sulcus obturatorius fort; die Fläche, welche auf- und medianwärts von der Crista obturatoria liegt, vereinigt sich mit der inneren Fläche des oberen Schambeinastes in einen scharfen Kamm, welcher von der inneren Fläche des Hüftbeins herkommt und so-

gleich im Zusammenhang beschrieben werden soll.

Auf der inneren Fläche wird das Hüftbein, im Allgemeinen glatt und concav, in eine obere und untere Hälfte getheilt durch eine Kante, welche sich schräg ab- und vorwärts von der Synchondrosis sacro-iliaca bis zur Synchondrosis oss. pubis erstreckt, unter einem spitzen Winkel die transversale Synchondrose des Darm- und Leistenbeins schneidend. Was über dieser Kante liegt, gehört dem oberen, was unter ihr liegt, dem unteren Becken an. Die Kante wird *Crista ileo-pectinea* genannt. Die gleichnamigen Kanten beider Hüftbeine, durch die Wölbung, welche am Kreuzbein die obere Fläche der Flügel von der vorderen trennt, und durch das Promontorium mit einander in Verbindung gesetzt, stellen die obere Apertur des kleinen Beckens dar (Fig. 237).

Die Crista ileo-pectinea ¹⁾ entsteht aus einer planen, spitzwinklich-dreiseitigen, mit der schmalen Seite gegen die Synchondr. sacro-iliaca gerichteten Fläche; sie wird nach vorn allmähig schärfer; recht scharf und mitunter saumartig vorspringend erscheint sie erst nach ihrem Uebergange auf das Schambein ²⁾. In der Nähe des Tuberc. ossium pubis wendet sie sich vorwärts und convergirt auf demselben mit der Crista obturatoria. Von dem Schambeintheile der Crista ileo-pectinea entspringt der M. pectineus. An das Tuberculum ossium pubis und eine von demselben aus medianwärts zur Synchondrose der Schambeine sich erstreckende Rauigkeit befestigt sich der M. rectus abdominis. Bevor aber die Crista ileo-pectinea

¹⁾ Linea ileo-pectinea, L. innominata, L. arcuata int. ²⁾ Crista s. pecten oss. pubis.

das Tuberc. pubis erreicht, zweigt sich von derselben eine stumpfere Kante ab, welche in einem flachen, gegen die Beckenhöhle concaven Bogen zur oberen Spitze der Articulationsfläche der Schambeine verläuft. Diese Firste schliesst mit dem vorderen Theile der Crista ileo-pectinea und der vom Tuberc. pubis zur Synchronrose ziehenden Rauigkeit ein dreiseitiges Feld (s) ein, welches als obere Fläche der vorderen Beckenwand betrachtet werden muss; sie scheidet diese obere Fläche von der inneren oder hinteren.

Da die Crista ileo-pectinea sich mit der Synchronrose des Darm- und Leistenbeins kreuzt, so muss eine Eintheilung des Hüftknochens nach dem Verlaufe jener Crista, d. h. eine Eintheilung in die dem oberen und unteren Becken zugehörige Fläche, Theile des Leistenbeins mit dem Darmbein, und umgekehrt, in Verbindung bringen. Es zeigt sich dabei dieselbe Art von Gleichgewicht der einander kreuzweise gegenüberliegenden Punkte, welche bei der Beschreibung der Ränder des Hüftknochens hervorgehoben wurde. Die Wand des oberen Beckens wird zum bei weitem grössten Theile vom Darmbein, die Wand des unteren Beckens ebenso vom Leistenbein gebildet; die Crista ileo-pectinea schneidet vom Darmbein einen schmalen unteren Streifen ab für das untere Becken; vom Leistenbein schneidet sie einen schmalen oberen Streifen ab für das obere Becken. Der über der Crista ileo-pectinea gelegene Theil der inneren Fläche des Darmbeins setzt sich also von der unteren vorderen Ecke aus auf jene Fläche des Leistenbeins fort, die als äussere obere Fläche des oberen Astes des Schambeins bereits beschrieben wurde, dieselbe, welche nach unten vom Rande der Pfanne und weiter medianwärts von der Crista obturatoria begrenzt wird. Der unter der Crista ileo-pectinea gelegene Theil der inneren Fläche des Leistenbeins läuft dagegen von der oberen hinteren Ecke in einen Streifen aus, welcher längs dem hinteren Rande des Darmbeins als eine Art schmaler unterer Fläche desselben verläuft. Die Stelle, wo die Darmbeinfläche auf das Leistenbein übergeht, entspricht der Incisura iliaca maj., die Stelle, wo die Leistenbeinfläche auf das Darmbein übergeht, entspricht der Incisura ischiadica maj. Die Stelle der ehemaligen Darmleistenbein-Synchronrose ist auf der dem grossen Becken angehörigen Fläche in der Regel während des ganzen Lebens erkennbar an einer Rauigkeit, *Eminentia* ¹⁾ *ileo-pectinea*, welche von der Crista ileo-pectinea vorwärts gegen den Rand der Pfanne geht und die mediale Begrenzung der Rinne darstellt, in welcher der M. iliopsoas aus dem Becken hervortritt. Auf der dem kleinen Becken angehörigen Fläche des Hüftbeins erhält sich von jener Synchronrose kaum eine Spur.

An der Grenze des grossen und kleinen Beckens findet sich die zur Articulation mit dem Kreuzbein bestimmte überknorpelte Fläche, *Facies auricularis*, von ohrförmiger Gestalt, mit vorderem convexen und hinterem concaven Rande. Der Gipfel der Convexität liegt fast gerade über der Stelle, wo der obere Rand des Sitzbeinausschnittes in den unteren umbiegt. Von da an geht der eine Schenkel der Gelenkfläche ab- und rückwärts, um abgerundet auf der Innenfläche der Spina post. inf. zu enden, der andere, kürzere, mit ebenfalls abgerundeter Spitze, in der Flucht der Crista ileo-pectinea auf- und rückwärts. Der hinter der Facies auricularis

¹⁾ *Spina*.

und hinter einer von der oberen Spitze derselben aufwärts zum Darmbeinrande gezogenen Linie befindliche Theil des Darmbeins, *Tuberositas iliaca*, ist sehr rauh und uneben von der Insertion der Bänder, welche das Kreuz- und Hüftbein an einander heften. Die übrige obere Beckenfläche ist eine flach ausgehöhlte Grube, *Fossa iliaca*, vom *M. iliacus* bedeckt. Sie besitzt ein sehr beständiges For. nutritium vor der oberen Spitze der Fac. auricularis. Auf der unteren Beckenfläche beginnt unter der *Crista ilio-pectinea* der *Sulcus obturatorius* und als medialer Rand desselben eine Firste, welche sich abwärts auf die oben beschriebene Weise in den Rand des For. obturatorium fortsetzt und in ihrem oberen Theile meistens mit einer Reihe kurzer Zacken oder scharfer Leisten, *Tuberc. obturat. inf.*, besetzt ist.

Dass das Darmbein an seiner dünnsten Stelle, in der Mitte, zuweilen durchbrochen ist, wurde bereits erwähnt; eine ähnliche Durchbrechung, Folge des Schwindens der Knochenmasse, kommt im Grunde der Pfanne vor. Theilweise Verknöcherungen der mit dem Hüftbein in Verbindung stehenden Bänder, der *Membrana obturatoria*, des *Lig. tuberoso-* und *spinoso-sacrum* erscheinen an dem macerirten Knochen in Form abnormer Zacken und Balken. Hyrtl erwähnt ein Hüftbein, an welchem die unteren Aeste des Scham- und Sitzbeins einander nicht erreichen.

Zur Zeit der Geburt ist noch ein grosser Theil des Hüftbeins knorplich; die drei Stücke, welche dasselbe zusammensetzen, sind in der Pfanne weit von einander getrennt; die Verknöcherung erstreckt sich am Darmbein nicht bis zum oberen Rande und beschränkt sich am Scham- und Sitzbein auf den Körper und die oberen Aeste. Gegen das sechste Jahr ist die Verknöcherung der unteren Aeste dieser Knochen vollendet; der Verknöcherung derselben folgt bald die vollständige Verschmelzung. In der Pfanne vereinigt sich das Darmbein mit dem Sitzbein, dann mit dem Schambein erst zur Zeit der Pubertät, durch Vermittelung eines oder mehrerer platter Knochen, welche sich im dreizehnten bis vierzehnten Jahre in der Y-förmigen Synchronrose der Pfanne entwickeln. Um dieselbe Zeit entsteht eine Epiphyse längs dem ganzen oberen Rande des Darmbeins, eine zweite, unbeständige, an der Stelle des vorderen unteren Darmbeinstachels, eine dritte am Sitzhöcker, eine vierte, dünne und scheibenförmige und wahrscheinlich ebenfalls unbeständige Epiphyse an der Fläche der Schambeine, wodurch dieselben mit einander articuliren. Diese Epiphysen verschmelzen mit dem Körper des Hüftbeins im zweiundzwanzigsten bis fünfundzwanzigsten Jahre, am spätesten die Epiphyse am oberen Rande des Darmbeins.

Becken.


Die Hüftbeine in ihrer natürlichen Verbindung mit dem Kreuz- und Steissbein bilden das Becken, *Pelvis*.

Das Becken, im weiteren Sinne dieses Wortes, wird eingetheilt in das obere ¹⁾ und untere ²⁾; die Grenze zwischen beiden ist aber nur auf der inneren Fläche bestimmt und scharf. Sie ist, wie erwähnt, bezeichnet durch die *Crista ileo-pectinea* der beiden Hüftbeine und eine von dem hinteren stumpfen Ende jeder derselben über die Seitentheile des Kreuzbeins zur Synchronrose zwischen dem letzten Bauch- und dem ersten Kreuzwirbel hinziehende, abgerundete Kante. So beschreibt sie eine kreisförmig oder elliptisch gebogene Linie, welche sich, je nachdem das Promontorium mehr oder weniger vorspringt, der Kartenherz- oder Nierenform nähert. Man nennt diese Linie sowohl als die von ihr umschlossene Ebene den

¹⁾ Grosse Becken.²⁾ Kleine Becken.

Beckeneingang, *Apertura pelvis sup.*¹⁾. Der unterhalb derselben gelegene Theil des Beckens lässt sich, wenn man das Hüftbeinloch verschlossen denkt, im Ganzen einem platten Ringe oder einem cylindrischen Rohre vergleichen, dessen Höhe wegen tiefer Einbuchtungen des unteren

Fig. 241.




Weibliches Becken von hinten.

Randes sehr ungleichmässig ist. Solcher Einbuchtungen finden sich drei, eine mediane - vordere, und zwei einander gegenüber an der Seitenwand des Beckens. Die mediane Bucht ist, von den auf- und vorwärts convergirenden unteren Rändern der beiden Leistenbeine eingefasst; es ist ein bogenförmiger Ausschnitt, Schambogen, *Arcus pubis*, dessen Gipfel von dem unteren (hinteren) Rande der Synchondrose der Schambeine gebildet wird. Die Einbuchtung der Seitenwand, *Incisura sacro-ischia-*

dica, ist länglich, mit dem längsten Durchmesser auf- und vorwärts geneigt, oben abgerundet, vorn und oben vom hinteren Hüftbeinrande, hinten vom lateralen Rande des Kreuz- und Steissbeins begrenzt. Eine genauere Beschreibung der unteren Oeffnung und der Wände des kleinen Beckens unterlasse ich für jetzt, weil an der Bildung derselben die Bänder einen wesentlichen Antheil haben. Namentlich erhält der Beckenausgang, *Apertura pelvis inf.*²⁾, seine Begrenzung zum Theil durch ein Band, welches am Eingange der Bucht der Seitenwand vom Kreuzbein zum Sitzbeinhöcker gespannt ist.

Zu dem unteren Becken verhält sich das obere wie der breite, flache Rand eines Tellers zu dem vertieften Theile. Doch erstreckt sich der Rand

Fig. 242.



Männliches Becken mit dem letzten Bauchwirbel, von vorn.


in dieser Form nicht über die Gegend der Pfanne hinaus nach vorn. Hinten ist er in der Mitte unterbrochen durch die von der oberen Fläche des Kreuzbeins sich erhebende Wirbelsäule; vorn wird er an der *Incisura iliaca major* plötzlich schmal und setzt sich dann, indem er sich allmählig noch weiter verjüngt, bis zum Schambeinhöcker fort. Zwischen den beiden Schambeinhöckern ist der obere Rand des unteren Beckens wieder etwas breiter, nach aussen überhängend, aber minder scharf von der inneren Fläche der vorderen Wand geschieden.

Der Beckeneingang liegt, gleich der oberen Apertur des Brustkorbes, in einer mit dem vorderen Rande abwärts geneigten Ebene. Der Grad der Neigung dieser Ebene wird bestimmt durch den Winkel, welchen eine

¹⁾ Obere Beckenöffnung, *Apert. pelv. abdominalis, Introitus pelvis*. Die Linie wird auch *Linea innominata s. terminalis* genannt. ²⁾ *A. p. perinealis. Exitus pelvis*.

in der Medianebene von einem Punkte der hinteren zu einem Punkte der vorderen Beckenwand gezogene Linie, *Conjugata* ¹⁾, mit dem Horizont oder mit der sagittalen Axe des Beckens (*w*) bildet. Für die Conjugata des Beckeneingangs *x* (vom Promontorium zum oberen Rande der Synchondrose der Schambeine) beträgt dieser Winkel 55 — 65, im Mittel 60°; für die Conjugata des Beckenausgangs *y* (von der Spitze des Steiss-

Fig. 243.



Mediandurchschnitt eines weiblichen Beckens.

beins zum unteren Rande der Synchondrose) beträgt derselbe in gewöhnlichen Fällen 7 — 27°. (Unter 500 Messungen fiel diese Conjugata 20 Mal mit der sagittalen Axe zusammen und 26 Mal stand die Steissbeinspitze tiefer [bis um 20^{mm}] als der untere Rand der Synchondrose, Nägele.) Geringere Schwankungen zeigt die von H. Meyer ²⁾ sogenannte Normalconjugata, eine Linie, deren hinterer Endpunkt in eine quer über die Mitte des dritten Kreuz-

wirbels verlaufende leichte Einknickung, deren vorderer Endpunkt mitten zwischen beide Schambeinhöcker fällt (*z*). Der vordere Endpunkt dieser Linie liegt tiefer als der hintere, und der Winkel, welchen sie mit der Sagittalen bildet, beträgt 30°. Das Promontorium steht um 73^{mm} (3'' 10'') höher als der obere Rand der Schambeinfuge, die Steissbeinspitze in der Regel um 15 — 16^{mm} höher als der Scheitel des Schambogens. Eine vom oberen Rande der Schamfuge gerade nach hinten gezogene Linie trifft auf die Synchondrose zwischen dem zweiten und dritten Steisswirbel; ein Loth, auf dem Mittelpunkt des Beckeneingangs errichtet, würde die vordere Bauchwand etwa in der Gegend des Nabels durchbohren.

Das Becken ist derjenige Theil des Skeletts, in welchem sich der Geschlechtsunterschied am bestimmtesten und zwar ebensowohl in der Form wie in den Dimensionen ausspricht. Die Flächen der Darmbeine nähern sich beim Weibe in der Regel mehr der horizontalen Lage, als beim Manne; das Promontorium springt beim männlichen Becken meistens weiter vor, und so ist für das männliche Becken die Herzform, für das weibliche die quer-elliptische Form der oberen Apertur die normale. Das untere Becken des Weibes ist absolut niedriger als das männliche, aber geräumiger. Bei beiden Geschlechtern nimmt die Weite der Höhle des unteren Beckens gegen den Ausgang ab, bei dem Manne aber in stärkerem Maasse

¹⁾ Gerader Beckendurchmesser.

²⁾ Müll. Arch. 1853. S. 541.

als beim Weibe, so dass also die untere Apertur des weiblichen Beckens absolut und relativ weiter ist. Hiermit steht in Verbindung, dass die unteren Ränder des Leistenbeins am männlichen Becken unter einem spitzeren Winkel zusammenstossen als am weiblichen. Der Schambogen des Weibes ist eine Curve, der Schambogen des Mannes gleicht mehr einer gebrochenen Linie.

Ich entlehne dem Handbuch von Krause folgende Durchschnittszahlen, welche aus Messungen regelmässiger männlicher und weiblicher Becken gewonnen sind:

	Weiblich.		Männlich.	
Grösster Querdurchmesser des oberen Beckens	9'' 6'''	256mm	9'' 6'''	256mm
Entfernung der beiden vorderen oberen Darmbeinstacheln von einander	9''	243	9''	243
Conjugata des Beckeneingangs	4'' 3'''	115	4''	108
Querdurchmesser	5''	135	4'' 9'''	128
Diagonaldurchmesser ¹⁾ (von der Synchondros. sacro-iliaca zur Eminentia ileo-pectinea)	4'' 8'''	126	4'' 6'''	122
Conjugata des Beckenausgangs (Veränderlich u. am frischen Becken durch Zurückbiegen der Steissbeinspitze einer Vergrösserung um etwa 1'' fähig).	3'' 4'''	90	2'' 9'''	74
Querdurchmesser des Beckenausgangs (zwischen den Sitzhöckern)	4''	108	3''	81
Höhe der hinteren Wand (Sehne der Krümmung zwischen Promontorium und Steissbeinspitze)	4'' 9'''	128	5'' 3'''	142
Höhe der Synchondr. der Schambeine	1'' 8'''	45	2''	54

b. Knochen des Oberschenkels.

Schenkelbein, *Femur* ²⁾.


Der Körper des Schenkelbeins ist leicht vorwärts gebogen und, wenn das untere Ende auf einer horizontalen Unterlage ruht, mit diesem Ende etwas schräg medianwärts gestellt. Von allen Röhrenknochen nähert sich der Körper des Schenkelbeins am meisten der Cylindergestalt; doch zeigt sich auch hier eine Tendenz zur dreiseitig-prismatischen Form. Ueber die hintere Fläche läuft nämlich der Länge nach ein rauher (8^{mm} breiter) Kamm, *Crista* ³⁾ *femoris*, öfters der Länge nach gefurcht und dadurch in zwei Lippen, *Labium laterale* und *L. mediale*, getheilt. Durch diesen Kamm zerfällt die hintere Fläche in eine mediale und eine

b. Ober-
schenkel.
Femur.

¹⁾ Schräger oder Deventer'scher Durchmesser. ²⁾ *Os femoris*. ³⁾ *Linea aspera*.


laterale. Eine andere stumpfe Kante, *Angulus medialis*, geht, am oberen Ende des Körpers beginnend, gegen den medialen Rand des unteren

Fig. 244.



Schenkelbein von vorn.

Fig. 245.



Schenkelbein von hinten.

ren Endes herab, als Grenze zwischen der medialen und der vorderen Fläche; indem ferner die vordere Fläche von der Mitte der Höhe des Körpers allmähig breiter und zugleich platter wird, scheidet sie sich, wenn gleich ohne scharfe Grenze, auch von dem lateralen Theile der hinteren Fläche. Das Hauptnährungsloch sitzt unter der Mitte der Höhe des Schenkelbeins auf oder neben der Crista und führt in einen aufwärts verlaufenden Canal (Fig. 245). Von dem oberen Ende des Körpers geht unter einem

stumpfen Winkel median- und auf- und etwas vorwärts der Hals (*Cl*) ab, auf welchem der überknorpelte Gelenkkopf (*Cp*) sitzt. Von seinem Ur-

Fig. 246.





Fig. 247




Querschnitte des Schenkelbeins nach den Linien x, y, z, Fig. 244.

sprunge am Körper an verjüngt sich der Hals, um unmittelbar am Rande des Kopfes wieder an Umfang zuzunehmen. Er ist am Ursprunge von vorn nach hinten comprimirt (der verticale Durchmesser beträgt etwa das Doppelte des sagittalen) und verdickt sich unter dem Kopfe hauptsächlich gegen den hinteren Rand des letzteren. Der Kopf ist ein etwas mehr als die Hälfte betragender Abschnitt einer Kugel, deren Durchmesser dem Durchmesser der Pfanne genau entspricht. Der Rand, mit welchem dieser Kugelabschnitt den Hals überragt, liegt in einer Ebene, welche unter einem Winkel von ungefähr 40° gegen den Horizont geneigt ist; doch ist der Rand nicht ganz eben, sondern am oberen hinteren und zuweilen auch am vorderen Theile in einem flachen Bogen ausgeschnitten. In der Gegend der Mitte der Gelenkfläche, näher dem unteren Rande als dem oberen, findet sich eine rundliche, rauhe, die Spitze des kleinen Fingers aufnehmende Vertiefung, *Fossa capitis* (Fig. 245, 248), Ursprungsstätte des *Lig. teres*.

Wo das obere Ende des Körpers in den Hals umbiegt, zieht über die hintere Fläche des ersteren, parallel dem Rande des Gelenkkopfs, rechtwinklich zur Längsaxe des Halses und also schräg abwärts vom lateralen zum medialen Rande ein Wulst, aus welchem der Hals, wie aus einem Kragen, hervortaucht. Unten endet der Wulst mit einem stumpf kegelförmigen, von vorn nach hinten abgeplatteten, medialwärts vorspringenden Fortsatz; oben geht er auf den Rand eines Fortsatzes über, welcher, im horizontalen Durchmesser abgeplattet, aus der ganzen lateralen Fläche des Schenkelbeins entspringt und mit einer stumpfen, hakenförmig medianwärts

eingebogenen Spitze im Niveau des unteren Randes des Gelenkkopfs oder etwas über demselben endet. Dieser Fortsatz ist der grosse Rollhügel,

Fig. 248.



Oberes Ende des Schenkelbeins von hinten, mit dem lateralen Rande etwas vorwärts um seine Längsaxe gedreht.

Trochanter major. Der Wulst zwischen beiden Trochanteren wird **Crista intertrochanterica**¹⁾ genannt; die Concavität zwischen dem Schenkelhals und der Basis des grossen Trochanter, welche unmittelbar am hinteren Rande des letzteren am tiefsten ist, ist die **Fossa trochanterica**. Alle diese Vorsprünge und Gruben sind von Muskelansätzen und Ursprüngen eingenommen und der grosse Trochanter ist dadurch an seinem oberen Rande und auf seiner lateralen Fläche facettirt, bald durch Furchen, bald durch Leisten getheilt, immer aber gegen den Körper durch eine transversale Leiste abgesetzt. Von der Wurzel des grossen Trochanter geht, an der Vorderfläche des Schenkelbeins, in gleicher Richtung mit der Crista intertrochanterica, aber etwas tiefer, eine Rauhgkeit, **Linea obliqua femoris**²⁾, herab und unter dem Ursprunge des kleinen Trochanter vorbei in die Crista femoris über.


Der obere Theil derselben bis zur Wurzel des kleinen Trochanter ist ein breiter Wulst, der untere Theil eine feine, mitunter nur wenig vorspringende rauhe Linie. An den breiten Theil dieser Rauhgkeit setzt sich von oben her das Kapselband des Hüftgelenks an; von dem breiten und schmalen Theile gehen abwärts die Fasern des M. vastus int. ab. Von der Stelle an, wo diese Linea obliqua mit der Crista femoris zusammenstösst, theilt sich die letztere aufwärts in zwei unter spitzem Winkel divergirende, rauhe Linien, welche leicht gebogen, die eine zum kleinen, die andere zum grossen Trochanter ziehen, jene auf der Spitze, diese auf der hinteren Fläche des betreffenden Fortsatzes sich verlierend. Beide schliessen in Verbindung mit der Linea intertrochanterica ein spitzwinklich dreiseitiges, den spitzesten Winkel abwärts richtendes Feld ein, dessen Ränder medialerseits durch Anheftung der Abductoren des Oberschenkels, lateralerseits durch den Ursprung von Streckmuskeln eingenommen werden.

Auf dieselbe Weise gehen schon von der Grenze des mittleren und unteren Drittels des Körpers an, die beiden Lippen der Crista fem. gegen das untere Gelenkende des Schenkelbeins aus einander, eine plane und gegen den unteren Rand sogar schwach vertiefte Fläche, **Planum popliteum**³⁾, zwischen sich fassend. Durch den Hinzutritt dieser neuen Fläche und durch Verbreiterung der vorderen Fläche, die sich ebenfalls gegen das untere Ende abplattet und von einer Seite zur anderen aushöhlt, gewinnt das untere Ende des Körpers eine vierseitig-prismatische Form (Fig. 247 z), im sagittalen Durchmesser comprimirt, die vordere und hintere Fläche einander beinahe parallel — die vordere tritt mit dem lateralen Rande etwas

¹⁾ Linea intertroch. post.²⁾ Linea intertrochanterica ant.³⁾ Fossa poplitea, Poples.

weiter vor —, die seitlichen Flächen rückwärts divergirend und insbesondere die mediale Fläche schräg vorwärts gewandt. In dieser Weise gewinnt das untere Ende des Schenkelbeins rasch eine bedeutende Ausdehnung in die Breite, welche hinter der Breite des oberen Endes, vom Rande des grossen Trochanter bis zur höchsten Wölbung des Gelenkkopfes gemessen, nicht viel zurücksteht und noch dadurch vermehrt wird, dass an jeder Seitenfläche, dicht über dem Rande, welchen sie mit der unteren Endfläche gemein hat, ein platter, stumpfer Höcker sich erhebt, *Epicondylus lateralis* und *E. medialis* ¹⁾, zur Befestigung von Bändern und Muskeln. In sagittaler Richtung verdickt sich das untere Ende durch zwei, von der hinteren Fläche ausgehende Vorsprünge, *Condylus medialis* und *C. lateralis*. Es sind (28^{mm}) dicke, halbkreisförmige Scheiben, mit dem geraden Rande in verticaler Richtung an die hintere Fläche des Schenkelbeins angewachsen, den gewölbten Rand nach hinten gekehrt, die halbkreisförmigen Flächen in nahezu sagittalen Ebenen. Mit den von einander abgewandten Seitenflächen setzen sich die Condylen ununterbrochen in die Seitenflächen des Körpers fort; die Flächen, welche die Condylen einander zuwenden, sind ausgehöhlt und begrenzen von den Seiten einen tiefen Ausschnitt, *Fossa intercondyloidea* ²⁾, dessen vordere Wand von dem Theile

Fig. 249.



Schenkelbein von unten.

der hinteren Fläche des Schenkelbeins gebildet wird, welche zwischen den Ansätzen der Condylen frei bleibt und deren Breite der Dicke der Condylen (im transversalen Durchmesser) ziemlich gleichkommt. Diese Fläche ist nach oben durch eine deutliche transversale Kante, *Linea intercondyloidea m.*, gegen das Planum popliteum abgesetzt und läuft von dieser Kante aus schräg vor- und abwärts. Die hinteren gewölbten Ränder der Condylen, welche übrigens breit genug sind, um den Namen Flächen zu verdienen, sind überknorpelt und auch im transversalen Durchmesser convex, so dass sie gegen die Fossa intercondyloidea weiter herumgreifen als an den Seitenflächen des unteren Endes des Schenkelbeins. Nach oben endet ihr Knorpelüberzug abgerundet oder quer oder schräg abgestutzt in der Höhe der Linea intercondyloidea. Unten treten die überknorpelten Flächen der beiden Condylen, indem sich die mediale vor der Fossa intercondyloidea schräg herüberzieht, in eine einzige Gelenkfläche zusammen, welche die untere Endfläche des Körpers einnimmt und sich eine kurze Strecke (25^{mm}) an der vorderen Fläche des letzteren heraufstreckt. Der an der vorderen Fläche gelegene Theil dieser Gelenkfläche, zur Aufnahme der Patella bestimmt ³⁾, endet aufwärts mit einem besonders an der lateralen Hälfte überstehenden, leicht eingebogenen und medianwärts ein wenig abhängigen Rande. Er ist durch eine verticale Vertiefung in zwei Felder, von welchen das mediale schmäler zu sein pflegt, getheilt, übrigens gewölbt und gegen den unteren Theil der Gelenkfläche, welcher mit der Tibia in Verbindung steht, durch eine kaum bemerkbare Kante

¹⁾ *Tuberositas ext. et int.*
Sinus condylorum ant.

²⁾ *Fossa intercondylica post. F. poplitea.*

³⁾ *Fossa*

abgesetzt. Der Theil der Gelenkfläche, welcher zwischen dieser Kante und den eigentlichen Condylen liegt, ist ebenfalls gewölbt, aber in schwächerem Maasse wie die überknorpelte Fläche der Condylen, so dass der untere Rand des Schenkelbeins, im Profil betrachtet, einen Bogen darstellt, dessen vorderer Theil einem grösseren Radius angehört als der hintere.

Einen dem Proc. supracondyloideus des Oberarms vergleichbaren Vorsprung beschreibt Wilbrand (a. a. O. S. 7) unter gleichem Namen vom Körper des Oberschenkels, wo er, $1\frac{1}{2}$ " lang und 4" dick, von der Ursprungsstelle des kurzen Kopfes des Biceps oberhalb des lateralen Condylus vorkam. Barkow (a. a. O. S. 9) sah denselben Fortsatz, etwas höher oder tiefer, an drei Schenkelbeinen der Breslauer Sammlung, Gruber (Abhandl. S. 132) sah ihn unter 220 Leichen drei Mal.

In weiblichen Schenkelbeinen ist der Winkel, den die Längsaxe des Halses mit der Längsaxe des Körpers bildet, kleiner, einem Rechten nahe. Wegen der grösseren Breite des Beckens und der geringeren Höhe der unteren Extremität ist beim Weibe in aufrechter Stellung mit aneinanderschliessenden Fersen die Convergenz der unteren Enden der Schenkelbeine auffallender.

Beim Neugeborenen ist das obere und untere Ende des Schenkelbeins knorplich, doch schliesst das untere Ende einen Knochenkern ein; im oberen Ende entsteht der erste Knochenkern, und zwar im Kopfe, am Ende des ersten Lebensjahres; im vierten Jahre kommt ein Kern im grossen Trochanter, im dreizehnten bis vierzehnten Jahre ein Kern im kleinen Trochanter hinzu. Dieser aber verschmilzt zuerst mit dem Körper, ihm folgt der grosse Trochanter, dann der Kopf und zuletzt, im zwanzigsten Jahre, vereinigt sich die untere Epiphyse mit dem Körper. Beim Greise ist besonders das Schwinden der spongiösen Substanz des Schenkelhalses verhängnissvoll, Ursache der in höherem Alter so häufigen Brüche dieses Knochen-theiles.

c. Unterschenkelknochen.

c. Unter-
schenkel.


Das Skelett des Unterschenkels besteht aus drei Knochen. Zwei derselben, Tibia und Fibula, sind cylindrisch und stellen in Verbindung mit einander und mit dem *Lig. interosseum* einen ähnlichen, der Länge nach rinnenförmig vertieften Rahmen zur Aufnahme der Muskeln dar, wie die beiden Knochen des Unterarms; der dritte Knochen, Patella, ist platt, einem Sesambein ähnlich in die Sehne der Streckmuskeln eingeschlossen und durch ein festes Band an die Tibia geheftet.

Von den beiden cylindrischen Knochen des Unterschenkels ist die Tibia allein zur Articulation mit dem Schenkelbeine bestimmt; zugleich liefert sie auch den grösseren Beitrag zur Gelenkfläche des Knöchels. Aus diesem Grunde ist das Uebergewicht der Stärke des medialen Knochens über den lateralen am Unterschenkel viel bedeutender als am Unterarme. Die Fibula ist ein verhältnissmässig dünner Pfeiler, als Stütze unter den am meisten über den Körper vorspringenden Theil des oberen Endes der Tibia gestellt.

Der Körper der Tibia ist nur sehr schwach vor- und medianwärts gebogen, der Körper der Fibula fast vollkommen gerade. Da nun ausserdem die Fibula an ihren Enden nur wenig dicker ist als am Körper und mit dem oberen Ende unterhalb des Randes der Tibia befestigt, mit dem unteren Ende in einen Ausschnitt der Tibia eingelassen ist: so ist der Zwischenraum zwischen beiden Knochen verhältnissmässig geringer als am Arme und besonders im unteren Drittel auf eine schmale (8^{mm} breite) Spalte reducirt.


Dieser Spalte und dem Lig. interosseum wendet sowohl die Tibia als die Fibula eine Kante, *Crista interossea*, zu, in welcher an jedem dieser

Fig. 250.



Tibia und Fibula verbunden,
von vorn. Tp Tuberos. patell.

Fig. 251.



Horizontaldurchschnitt
der Unterschenkel-
knochen nach den Linien
x und y, Fig. 250.

beiden Knochen die Flächen sich verbinden, welche den Muskeln der Streck- und Beuge-seite zur Anheftung dienen. Aber die *Crista interossea* ist an den Knochen des Unterschenkels nicht die schärfste Kante; schärfer ist, besonders an der Tibia, die Kante (a), in welcher die vordere und mediale Fläche zusammenstossen ¹⁾, so wie auch diese beiden Flächen unter einem spitzeren Winkel gegen einander gestellt sind als die entsprechenden Flächen der Ulna.

Am oberen und unteren Ende nimmt die Tibia vorzugsweise im transversalen Durchmesser zu und die Endflächen, vermittelt welcher sie dort mit dem Schenkelbein, hier mit dem Sprungbein articulirt, haben dort eine elliptische, hier eine länglich vierseitige Form. Die grosse Axe jener Ellipse und die längste Seite dieses Vierecks liegen aber nicht parallel; sie schneiden einander in einem Winkel von etwa 20° und die Tibia erscheint demnach in geringem Maasse und zwar mit dem lateralen Rande des unteren Endes nach hinten um ihre Längsaxe gedreht. Stellt man die Tibia mit der grossen Axe der oberen Gelenkfläche genau transversal, so weicht die längere Seite der unteren Gelenkfläche mit dem lateralen Ende rückwärts von der Transversalen ab. Bei dieser Stellung wendet sich der Fuss,

dessen Längsaxe rechtwinklich auf die längere Seite der unteren Gelenkfläche steht, mit der Spitze lateralwärts, so weit, das die medialen Ränder beider mit den Fersen aneinandergeschlossenen Füße einen Winkel von etwa $40 - 50^\circ$ einschliessen. Offenbar ist diese Stellung des Fusses und so auch die entsprechende der Tibia die eigentlich natürliche. Dabei aber hat die Fläche des Körpers der Tibia, an welcher die Muskeln der Streckseite entspringen, Streckfläche, *Facies extensoria*, eine bis gegen das untere Drittel fast genau sagittale Lage und die der *Crista interossea* gegenüberliegende freie Fläche könnte, ihrer Richtung nach, mit eben so viel Recht vordere wie mediale Fläche genannt werden.

Die Haupternährungslöcher, in schräg absteigende

¹⁾ *Crista tibiae ant.*

Canäle führend, liegen hinter der Crista interossea, auf der Tibia an der unteren Grenze des oberen Drittels, auf der Fibula etwas tiefer.

1. Patella, Kniescheibe ¹⁾.

1. Patella.

Die Patella ist platt, elliptisch mit horizontal gestelltem grösseren Durchmesser. Ihre Vorderfläche ist convex, durch verticale Rinnen und Spalten (Gefässöffnungen) rau, ringsum abfallend oder abgerundet gegen

Fig. 252.

Fig. 253.

Fig. 254.

1
4

Patella. Fig. 252 von vorn, Fig. 253 von hinten, Fig. 254 im sagittalen Durchschnitt.

den Rand, in welchem sie sich mit der hinteren Fläche verbindet und hier und da in der Nähe dieses Randes, dem Rande parallel, gefurcht. Die Mitte des oberen Randes springt zuweilen in Form einer stumpfen Spitze vor; der untere Rand wird fast in der ganzen Breite verdeckt durch einen unmittelbar über diesem Rande von der Vorderfläche des Körpers entspringenden und

gerade oder leicht rückwärts gebogen herabragenden platten, stumpf-spitzen Fortsatz, *Apex patellae*, dessen vordere Fläche eine unmittelbare Fortsetzung der Vorderfläche des Körpers der Kniescheibe ist. Derselbe wird von dem Lig. patellae umfasst.

Die hintere Fläche der Patella ist Gelenkfläche, überknorpelt, sattelförmig, von oben nach unten concav und von einer Seite zur anderen convex, doch auch gegen die Seitenränder wieder flach ausgehöhlt. Die stärkste Wölbung, eine stumpfe, verticale Leiste, liegt medianwärts neben der Mitte des Knochens; sie passt in die Aushöhlung der Gelenkfläche des Schenkelbeins, auf welcher die Patella gleitet.

Die Patella des Neugeborenen ist knorplich; die Verknöcherung beginnt erst im vierten bis sechsten, nach Sömmerring zuweilen erst im zehnten Jahre und ist im fünfzehnten bis zwanzigsten vollendet.

2. Tibia, Schienbein ²⁾.

2. Tibia.

An dem Körper der Tibia ist die mediale Fläche, welche, wie erwähnt, eine mittlere Richtung zwischen der frontalen und sagittalen hat und in ihrer ganzen Ausdehnung durch die Haut durchgeföhlt werden kann, vollkommen glatt, leicht vom vorderen zum hinteren Rande gewölbt. Die im grössten Theile ihrer Länge lateralwärts gewandte Streckfläche ist glatt und mehr oder minder rinnenförmig ausgehöhlt. Die hintere oder Beugefläche ist gewölbt oder durch eine stumpfe Kante der Länge nach getheilt und oben von einer schrägen rauhen Linie, *Linea poplitea* ³⁾, durchzogen, welche unterhalb des oberen Drittels des medialen Randes der hinteren Fläche beginnt und an der lateralen Ecke des oberen Endes der Tibia sich verliert. Sie läuft dem unteren Rande des M. popliteus parallel und rührt von der Anheftung eines Theiles des M. soleus her. Die


¹⁾ Rotula.

²⁾ Focile majus. Canna major.

³⁾ Linea obliqua.


Crista interossea ist im oberen Theile nicht viel mehr als eine rauhe Linie, die über die Wölbung, mit welcher die vordere und hintere Fläche

Fig. 255.



Tibia von hinten,

Fig. 256.



von der lateralen Seite.


in einander übergehen, herabzieht, erst an der Grenze des oberen und mittleren Drittels des Knochens bildet sie sich zu einer deutlichen Kante aus. Die scharfe vordere Kante ist leicht S-förmig gebogen; im oberen Drittel des Körpers lateralwärts concav, im mittlern Drittel medianwärts concav, verflacht sie sich im Anfang des untern Drittels (Fig. 250).

Aus dem Körper der Tibia entwickelt sich das obere Ende ungefähr wie der Knauf einer Säule aus dem Schaft, nur dass die Ausladung nicht gleichförmig im ganzen Umfange, sondern hauptsächlich nach den Seiten stattfindet. Die hintere Fläche nimmt von der Gegend des unteren Endes der Linea poplitea an all-

mählig und nach beiden Seiten gleichmässig an Breite zu, an den Seitenrändern sanft ausgeschweift und gegen den oberen Rand leicht nach hinten übergebogen. Vorn entsteht aus der vorderen Kante oder vielmehr indem sich diese Kante im Bogen lateralwärts wendet, medianwärts neben derselben (vgl. Fig. 250) ein dreiseitiges Feld, die Basis gegen den oberen Rand des Knochens gewendet, die Spitze in Form eines langgezogenen, mit einer transversalen oder schrägen rauhen Leiste versehenen Wulstes, *Tuberositas patellaris* ¹⁾, über die Oberfläche vorragend, indess der über diesem Wulst gelegene Theil der Fläche, parallel der hinteren Fläche, im Aufsteigen rückwärts weicht. Die Leiste der Tuberositas patellaris ist die Anheftungsstelle des Ligam. patellae. Die Einschiebung dieser dreiseitigen Fläche

¹⁾ *Tuberositas s. spina tibiae.*

treibt die Streckfläche und die mediale Fläche des Körpers auseinander und ertheilt ihnen zugleich eine Neigung abwärts. Der oberste Theil der Tibia endlich, welcher die Endfläche trägt, ist ein fast verticaler (16^{mm} hoher) rauher Rand, *Margo infraglenoidalis m.*, in den die dreiseitige Vorderfläche des oberen Endes der Tibia geradezu, die Seitenflächen mittelst stumpfer Kanten übergehen und der nur in der Mitte der hinteren Fläche auf eine kurze Strecke (22^{mm}) unterbrochen und durch eine einfache Kante ersetzt ist, welche die hintere Fläche von einer vertieften Stelle der oberen Fläche scheidet. Der Margo infraglenoidalis endet an jeder Seite dieser Kante mit einer abgerundeten Ecke; unter jeder Ecke findet sich eine Hervorragung; die mediale ist eine einfache Spitze oder Rauigkeit, Insertionsstelle des *M. semitendinosus*; die laterale trägt eine rund-



Obere Endfläche der Tibia.

liche oder dreiseitige, ganz seicht ausgehöhlte, ab- und rückwärts schauende Gelenkfläche, *Superficies articularis fibularis* ¹⁾, mit welcher das obere Ende der Fibula articulirt. Die obere Endfläche hat zwei flach vertiefte, zur Aufnahme der beiden Condylen des Oberschenkels bestimmte Gelenkflächen zu den Seiten einer mittleren, von vorn nach hinten ziehenden Rauigkeit. Diese Rauigkeit ist sanduhrförmig, vom vorderen und hinteren

Rande der Fläche gegen die Mitte verschmälert. Der schmale mittlere Theil, *Eminentia intercondyloidea* ²⁾, ragt über das Niveau der beiden Gelenkflächen vor; von ihm aus fallen die rauhen Flächen nach vorn und hinten ab bis unter das Niveau der Gelenkflächen, Gruben darstellend, aus welchen die Lig. cruciata des Kniegelenks entspringen; die vordere Grube, *Fossa intercondyloidea ant.*, ist breiter, die hintere, *F. i. post.*, tiefer. Die Gelenkflächen, von welchen die mediale meist merklich grösser ist als die laterale, sind halbkreisförmig oder elliptisch mit sagittal gestellter grosser Axe und mit einer Ausbuchtung, welche sich an der Eminentia intermedia oder an einem scharfen Kamm heraufzieht, der andererseits nach der Eminentia intermedia abfällt.

Gegen den unteren Rand wird die Tibia vierseitig prismatisch vermöge einer Fläche, welche sich aus der Crista interossea entwickelt, abwärts im sagittalen Durchmesser an Breite zunimmt, sich zugleich in derselben Richtung aushöhlt, eine Aushöhlung, welche durch stumpfe Vorsprünge der Ränder noch vermehrt wird, und mit concavem unteren Rande endet. In dieser Fläche, der *Incisura fibularis* (Fig. 256), ruht das untere Ende der Fibula. Vor derselben wird die von der Crista interossea und der vorderen Kante eingeschlossene, bis dahin lateralwärts gerichtete Streckfläche zu einer vorderen und nimmt an Breite zu, indem die vordere Kante sich, abgestumpft, etwa an der Grenze des mittleren und unteren Drittels des Körpers schräg medianwärts wendet, um an der vorderen medialen Ecke der unteren Gelenkfläche zu enden (Fig. 250). In demselben Maasse, wie die Streckfläche nach vorn umlenkt, gelangt die mediale Fläche, welche am Körper

¹⁾ *S. a. lateralis.*

²⁾ *Spina intercondyloidea, intermedia, media.*

stark nach vorn gekehrt war, in eine reiner medianwärts schauende Stellung, während zugleich die hintere Fläche, medianwärts an Breite zunehmend, sich entschiedener rückwärts richtet. Wie bei der natürlichen Haltung des Fusses die vordere und hintere Fläche des unteren Endes der Tibia aus der frontalen Lage mit dem lateralen Ende rückwärts weichen, wurde oben bereits angegeben. Beide Flächen sind, gleich der medialen, schwach gewölbt (nur bei sehr starker Musculatur ist die vordere Fläche, auf welcher die Strecksehnen gleiten, im transversalen Durchmesser concav); die mediale Fläche geht in ihrer ganzen Breite auf einen abwärts ragenden, abgestutzten oder abgerundeten Fortsatz, den inneren Knöchel, *Malleolus medialis*, über, welcher an den Proc. styloideus des Radius erinnert. Von der hinteren Fläche ist jener Fortsatz durch eine schräg ab- und medianwärts verlaufende, von zwei niederen Leisten eingefasste Rinne, *Sulcus malleoli medialis*, geschieden, in welcher sich Sehnen der Beugemuskeln bewegen, Fig. 255. Gegen die Endfläche schrägen sich sowohl die vordere und hintere Fläche, als auch der Knöchel mit einem niederen rauhen Rande ab, welcher zur Anheftung der Bänder bestimmt und am Knöchel zu diesem Ende mit einer Einbiegung versehen ist.

Die untere Gelenkfläche der Tibia geht von der Endfläche des Körpers auf die laterale Fläche des medialen Knöchels unter einem Winkel von wenig mehr als 90° über. So weit sie dem Knöchel angehört, ist die Gelenkfläche dreiseitig mit verticalem Vorderrande (13^{mm} hoch) und abgerundeter Spitze. Die Endfläche des Körpers habe ich länglich-vierseitig genannt; doch ist an den Seitenrändern eine schwache Convergenz nach hinten, am vorderen und hinteren Rande eine Convergenz gegen den medialen Knöchel zu bemerken, so dass sich die Form der ganzen Gelenkfläche, so weit sie der Tibia angehört, einem Dreieck mit abwärts gebogener Spitze nähert. Sie ist im sagittalen Durchmesser concav, mit einer sehr schwachen, mittleren, sagittalen Erhabenheit, am Uebergange vom Körper zum Knöchel besonders im hinteren Theile sanft ausgerundet.

Zur Zeit der Geburt ist das Mittelstück der Tibia verknöchert; die obere Epiphyse, eine platte Scheibe, von deren unterem Rande vorn in Form eines zungenförmigen Fortsatzes die Tuberositas patellaris herabragt, enthält in der Regel bereits einen Knochenkern, der aber öfters auch erst innerhalb des ersten Jahres nach der Geburt entsteht. Die Verknöcherung der unteren Epiphyse beginnt im ersten bis zweiten Lebensjahre. Die Epiphysen verbinden sich mit dem Körper im achtzehnten bis fünfundzwanzigsten Jahre, die unteren früher als die oberen.

Sharpey sah einen besonderen Knochenkern in der Tuberositas patellaris und Béclard einen solchen im medialen Knöchel.


3. Fibula, Wadenbein¹⁾.

Der mittlere Theil des Körpers der Fibula zeigt in der Regel drei scharfe, gerade oder etwas gebogene Kanten und drei Flächen, eine mediale, gegen die Tibia gewandte, eine laterale und eine hintere. Die mediale und laterale Fläche stossen in der vorderen scharfen Kante zusam-

3. Fibula.

¹⁾ Perone, Focile minus. Canna minor.

men; die Kanten, in welchen die mediale und laterale Fläche sich mit der hinteren Fläche verbinden, sind stumpfer (vgl. Fig. 251). Unter diesen drei zuerst auffallenden Kanten befindet sich die Crista interossea nicht. Diese ist vielmehr auf eine stumpfe, im mittleren Theile des Körpers wenig markirte Linie reducirt, welche der Länge nach über die mediale Fläche



Fibula, von der medialen Seite.

herabzieht. Demnach liegen auch die Flächen, von welchen je die Streck- und Beugemuskeln entspringen, fast in einer Ebene, als vordere und hintere Hälfte der medialen Fläche. Doch wird auch die hintere Fläche etwa von dem unteren Ende des oberen Drittels an für den Ursprung von Beugemuskeln (Flex. hall. long.) in Anspruch genommen, während sie gegen das obere Ende frei, d. h. nur von den Wadenmuskeln bedeckt ist. An der lateralen Fläche nehmen die Mm. peronei ihren Ursprung.


Dicht unterhalb des oberen Endes verschmälert sich die mediale Fläche, die vordere Kante plattet sich ab und der Knochen erhält einen fast cylindrischen, von vorn nach hinten comprimierten Hals, aus welchem der verdickte Kopf, *Capitulum*, hervorgeht. Der Kopf überragt den Körper ziemlich gleichmässig nach allen Seiten; er besitzt eine schräg ab- und medianwärts abgestutzte Endfläche, welche am oberen Theile des hinteren Randes die der Superf. articularis fibularis der Tibia entsprechende, leicht ausgehöhlte Gelenkfläche, *Superf. articularis tibialis*, trägt. Der seitliche Umfang ist in drei stumpfe Höcker oder Zacken getheilt, von welchen die mittlere (*bf*) die höchste ist; sie dient dem Biceps fem. zur Insertion; von der vorderen (*pl*) entspringt ein Kopf des M. peroneus l., von der hinteren (*s*) ein Kopf des Soleus.

Das untere Ende der Fibula ist an der der Tibia zugewandten Seite plan, lateralwärts verdickt, im Ganzen dreiseitig prismatisch, wie der Körper, aber mit etwas veränderter Lage der Flächen. Die hintere Fläche ist nämlich schon am oberen Ende des unteren Drittels des Körpers mit dem hinteren Theile der medialen Fläche zusammengefloßen; dagegen zerlegt sich die laterale Fläche in zwei Flächen, eine schräg vor- und

eine schräg rückwärts schauende, durch eine Kante, welche an dem oberen Ende des unteren Viertels des Körpers aus der vorderen Kante ihren Ursprung nimmt. Die Crista interossea, welche unterhalb der Verbindung der hinteren Fläche mit der medialen an Schärfe gewonnen hat, geht zuletzt, sich allmählig ausbreitend, in eine Fläche über von verschoben vierseitiger Form, die mit der Einen längeren Diagonale vertical, mit der kürzeren Diagonale sagittal gestellt ist. Die sagittale Diagonale theilt diese Fläche in zwei Dreiecke, ein oberes spitzwinkliches, dessen Höhe (50mm) die Höhe des unteren, ziemlich gleichseitigen, um mehr als das Doppelte

übertrifft. Die obere dreieckige Fläche (*) ist rau und passt in die Incisura fibularis der Tibia. Das untere Dreieck (**) ragt über diese Incisur

Fig. 259.



Frontaldurchschnitt der Unterschenkel- und Fusswurzelknochen. Ta Sprungbein, Ca Fersenbein.

abwärts hervor; es ist überknorpelt, in der Mitte vertieft und gegen die Ränder schwach gewölbt; der überknorpelten Fläche des medialen Knöchels gegenüber, aber höher, d. h. weiter nach unten sich erstreckend, als diese, vervollständigt es die Gelenkfläche des Unterschenkels, die den Kopf des Sprungbeins aufnimmt.

Die seitlichen Flächen des unteren Endes der Fibula verlängern sich auf einen, dem Proc. styloideus der Ulna ähnlichen, aber platteren und breiteren Fortsatz, den lateralen Knöchel, *Malleolus lateralis*, welcher mit abgerundeter Spitze, schwach medialwärts gekrümmt, rück- und abwärts über das untere Ende des Knochens hervorragt. Er macht die laterale Begrenzung einer an der hinteren Fläche des lateralen Knöchels vor- und abwärts verlaufenden Furche aus, des *Sulcus malleoli lateralis*, in welcher die Sehnen der Mm. peronei gleiten.

Die Epiphysen der Fibula sind zur Zeit der Geburt noch vollkommen knorplich; der Knochenkern der unteren bildet sich früher als der der oberen, jener im zweiten, dieser im vierten Jahre. Die Verschmelzung der Epiphysen mit dem Körper findet in derselben Ordnung und um Weniges später, wie in der Tibia, Statt.

d. Knochen des Fusses.

Die Knochen der Fusswurzel und des Mittelfusses setzen eine im sagittalen und transversalen Durchmesser aufwärts gewölbte Platte zusammen. Auf dem Gipfel derselben ist der Unterschenkel eingelenkt; sie stützt sich auf den Boden hinten mit dem Rande des Fersenbeins, vorn mit den vorderen Gelenkenden der Mittelfussknochen, insbesondere der grossen und fünften Zehe, mit dem vorderen Ende des Mittelfussknochens der grossen Zehe durch Vermittelung des Sesambeins. Ein Loth, von dem höchsten Punkte der oberen Gelenkfläche des Sprungbeins gefällt, trifft die Sehne des Gewölbes etwa an der Grenze des ersten und zweiten Viertels von hinten an gezählt. Das vordere Ende des ersten Mittelfussknochens ragt indess etwas weiter nach vorn als das vordere Ende des fünften; das Gewölbe ist deshalb am Grosszehenrande weiter gespannt als am Kleinzehenrande: beide Sehnen verhalten sich zu einander wie 8 : 9. Auch die Höhe der Wölbung ist geringer an der Kleinzehen- als an der Grosszehenseite. Dies hängt zusammen mit der Form der transversalen Wölbung, welche ihre grösste Höhe unweit des medialen Fussrandes hat und medianwärts steiler als lateralwärts abfällt, zugleich aber gegen den lateralen Rand sich weiter abwärts senkt, als gegen den medialen. Die Wölbung im Ganzen ist in der Nähe der Zehen flach und nimmt gegen das Knöchelgelenk allmähig zu; in derselben Richtung mindert sich die Breite des Fusses. So erinnert seine Gestalt an die eines Fächers, dessen Stäbe, am bogenförmigen Rande

d. Fuss.

horizontal ausgebreitet, sich gegen die Spitze hin vertical auf einander schichten. In der That kann der Fuss der Länge nach in zwei Abtheilungen zer-

Fig. 260.




Fig. 261.




Fig. 260 Profilansicht des Fusses von der Grosszehenseite. Fig. 261 desgl. von der Kleinzehenseite. *Ca* Fersenbein, *Ta* Sprungbein, *N* Schiffbein, *CI*, *CII*, *CIII* erstes bis drittes Keilbein, *Cb* Würfelbein, *M1*, *M5* Mittelfussknochen der ersten und fünften Zehe, *Os* Sesambein, *St* Sinus tarsi, *Sfh1* Sulcus flex. hall. longi, *Spl* Sulcus m. peron. longi, *Tn* Tub. oss. navicul.

legt werden (Fig. 264), welche mit den vorderen Enden neben einander in einer Horizontalebene liegen, nach hinten aber sich so gegen einander verschieben, dass die mediale Abtheilung über die laterale zu liegen kommt. Die Grenze beider Abtheilungen fällt zwischen die dritte und vierte Zehe; die Spalte zwischen dem dritten und vierten Mittelfussknochen setzt sich in der Fusswurzel fort zwischen dem dritten Keilbein, Kahn- und Sprungbein einerseits und dem Würfel- und Fersenbein andererseits; der Schnitt aber, welcher beide Abtheilungen von einander trennen sollte, müsste an den vorderen Enden der Mittelfussknochen vertical, an den hinteren Enden derselben Knochen schräg ab- und medianwärts geführt werden und, je weiter nach hinten, um so mehr in die horizontale Richtung übergehen. Die laterale Abtheilung ist ein in sagittaler Richtung flacher Bogen; die Knochen der medialen Abtheilung liegen in einer vor- und abwärts geneigten Ebene. Die mediale Abtheilung ist, besonders nach vorn, breiter als die laterale, da jene drei Zehen, und zwar die drei grösseren, diese nur zwei Zehen begreift; an Länge sind sie einander ungefähr gleich, da die mediale Abtheilung sich weiter vorwärts, die laterale dagegen um die Länge der Ferse weiter rückwärts erstreckt. Vergleicht man beide Abtheilungen mit einander, so entspricht dem Fersenbein in der einen das Sprung-

bein in der anderen; die Analogie der Mittelfusssknochen und Zehen der

Fig. 262.




Fig. 263.





Fig. 262 Knochen des Fusses von oben. Fig. 263 Horizontaldurchschnitt des Fusses nach den Linien *w*, *x*, *y*, *z* Fig. 262. *Ct* Canalis tarsi, *Su* Sustentaculum tali des Fersenbeins, *Pl* Proc. lateralis des Sprungbeins, *PI* Grundphalange.


Fig. 264.



Knochen des Fusses von oben, der Länge nach in zwei Abtheilungen zerlegt. *Tu* Tuberos. oss. navicularis.

einen und anderen Abtheilung versteht sich von selbst. Aber an der Stelle des Kahnbeins und der drei Keilbeine, welche in der medialen Abtheilung den Raum zwischen dem hintersten Knochen der Fusswurzel und dem Mittelfuss erfüllen, liegt in der lateralen Abtheilung ein einziger Knochen, das Würfelbein, das sich demnach als Aequivalent eines Kahnbeins und zweier Keilbeine für den vierten und fünften Mittelfusssknochen betrachten lässt. Der Vortheil dieser Betrachtungsweise liegt darin, dass sie anschaulich macht, an welchen Stellen des Fusses die Spalten zwischen den Knochen von Einem Seitenrande zum anderen durchgreifen. Die vorderen Endflächen des Sprung- und Fersenbeins (Fig. 265) liegen fast in derselben frontalen Ebene; die Gelenke der Fusswurzel mit dem Mittelfuss und der Phalangen mit der Fusswurzel schliessen sich an einander in Ebenen, welche

dem vorderen Rande des Fusses parallel und, mit Ausnahme des Mittelfussknochens der zweiten Zehe, ziemlich gleichmässig vom Grosszehen- zum Kleinzehenrande rückwärts weichen. Ein Schnitt aber in das Gelenk zwischen dem Kahnbein und den Keilbeinen stösst auf das Würfelbein und lässt sich nicht bis zum Kleinzehenrande des Fusses fortsetzen.



Fersen- und Sprungbein in Verbindung, von vorn.
St Sinus tarsi.

α. Fusswurzelknochen, *Ossa tarsi*.

α. Fuss-
wurzel.

Die Knochen der Fusswurzel nehmen mit rauhen Flächen an der Bildung des Fussrückens, des Hohlfusses und der Seitenränder des Fusses Theil; die Flächen, welche sie einander zuwenden, sind zum Behuf der Articulation überknorpelt. Doch bleibt namentlich an den medialen und lateralen Binnenflächen ein verhältnissmässig grosser Theil rauh; die Gelenke nehmen nur Streifen in der Nähe des oberen Randes ein, und die Knochen, die am Fussrücken dicht verbunden scheinen, entfernen sich in der Fusssohle von einander und lassen Lücken, die von Bandmasse ausgefüllt werden (Fig. 263 x).

Man hat in Betreff der den Flächen der Fusswurzelknochen zu ertheilenden Bezeichnung zwischen zwei Methoden zu wählen, welche ich als anatomische und physiologische einander gegenüberstellen möchte. Nach der physiologischen Methode unterscheidet man Flächen, welche zur Bildung des Fussrückens, der Sohle, der Gelenke bestimmt sind, und unter den letzteren wieder Flächen zur Articulation mit höheren, mit tieferen, mit Nebenknochen u. s. f. Die anatomische Methode dagegen unterscheidet die Flächen nur nach ihrer Richtung. Eine Fläche im physiologischen Sinne kann z. B. von dem vorderen auf den Seitentheil eines Knochens übergehen; eine Fläche im anatomischen Sinne kann theilweise der Articulation mit Nebenknochen, theilweise der Articulation mit Knochen einer tieferen Reihe dienen. Auf diese Schwierigkeit trafen wir schon bei den Knochen der Handwurzel, doch liess sie sich dort umgehen, weil die meisten Flächen der Handwurzelknochen gekrümmt sind und sich allmählig aus Einer Richtung in die andere wenden. An den Knochen der Fusswurzel dagegen setzen sich die Flächen mit scharfen Kanten gegen einander ab, und es tritt deshalb der Unterschied der Richtung auffallender hervor als der Unterschied der Function. Hierzu kommt noch, dass bei der Art, wie die Handwurzelknochen angeordnet sind, die Flächen von gleicher Richtung auch in der Function übereinstimmen: überall ist zur Articulation mit den Knochen der höheren Reihe die obere Fläche, mit den Knochen der tieferen Reihe die untere Fläche bestimmt. Die eigenthümliche Verschiebung der Fusswurzelknochen, welche oben S. 208 besprochen wurde, das Emporsteigen des Sprungbeins über seine Nachbarn und die Knickung der Längsaxe des Fusses bedingen es, dass hier die bezüglich der Lage gleichnamigen Knochenflächen eine verschiedene Function haben, und umgekehrt. Nachdem ich an der citirten Stelle die Bedeutung der einzelnen Knochen der Fusswurzel, im Vergleich zur Handwurzel, erörtert habe,

woraus sich die Bedeutung der Flächen von selbst ergibt, so werde ich mich im Folgenden bei der Benennung und Einzelbeschreibung der Flächen nur an deren Richtung halten. Ich abstrahire dabei von der geringen Drehung um die verticale Axe, welche die Knochen bei der dem Fusse natürlichen Seitwärtswendung der Spitze (S. 259) erfahren, und nehme die Axe, um welche das Sprungbein sich auf- und abbewegt, genau transversal gestellt an.


Die Grundform der Fusswurzelknochen ist der Würfel, Grundform freilich nur insofern, als wir an jedem dieser Knochen je sechs paarweise einander gegenüberliegende Flächen erkennen, während jeder einzelne sich bald durch das Ueberwiegen des einen oder anderen Durchmessers, bald durch Wölbung oder Aushöhlung der Flächen und bald durch die Convergenz derselben wesentlich von der Würfelgestalt entfernt. Durch die gewölbte Form der Fusswurzel erhalten insbesondere die Knochen der zweiten Reihe gleich den entsprechenden der Hand, aber in noch auffallenderm Grade, die Gestalt von Keilen mit gegen die Sohle gerichteter Schneide.

1. Fersenbein, *Calcaneus* ¹⁾.

Das Fersenbein ist länglich vierseitig, der längste Durchmesser fast parallel der Längsaxe des Fusses, nur wenig mit dem vorderen Ende lateralwärts abweichend. Dieser Durchmesser übertrifft fast um das Doppelte die Höhe des Knochens am hinteren Rande, während die Höhe sich zur Breite an dieser Stelle etwa wie 4 : 3 verhält. Am vorderen Ende ist das Fersenbein ansehnlich (um etwa $\frac{1}{4}$) niedriger, als hinten (Fig. 266); eine

1. Fersenbein.

Fig. 266.



Fersenbein, von der Grosszehenseite.


geneigte Fläche führt in der Mitte der Länge des Knochens von dem höher gelegenen Theile der oberen Fläche zu dem tieferen herab²⁾. Neben diesem Abhange findet sich vom medialen Rande ausgehend ein platter, halbkreisförmiger Anbau, dessen obere Fläche, ebenfalls vorwärts geneigt, mit der oberen Fläche des Fersenbeinkörpers in Einer Flucht liegt, dessen untere, rück- und abwärts schauende Fläche mittelst einer sanften Aushöhlung aus der Seitenfläche

des letzteren hervorgeht, dessen freier Rand, rauh und wulstig, von hinten nach vorn an Höhe abnehmend, abwärts überhängt. Der Anbau, der das Sprungbein tragen hilft, wird Sprungbeinfortsatz, *Sustentaculum tali* ³⁾, genannt (Fig. 266, 267, vgl. Fig. 263 w). Die Fläche, durch welche das Fersenbein mit dem Sprungbein sich verbindet, nimmt den Abhang des Fersenbeinkörpers und des *Sustentaculum tali* ein. Sie dehnt sich vom oberen (hinteren) Rande des Abhanges rück- und medianwärts abfallend,

¹⁾ *Os calcis*. ²⁾ Der niedrigere Theil des Fersenbeins wird vorderer Fortsatz, *Proc. ant. calcanei*, genannt. ³⁾ *Proc. lateralis*.

eine kleine Strecke auf den höher gelegenen Theil der oberen Fläche des Fersenbeins aus und geht von der vorderen Spitze des Sustentaculum tali mehr oder minder weit am medialen Rande des niedrigeren Theiles der oberen Fläche des Fersenbeinkörpers, nicht selten bis zu deren vorderem Rande vorwärts.

Fig. 267.



Fersen- und Sprungbein, das Fersenbein von der oberen, das Sprungbein von der unteren Fläche.

Die Flächen, vermittelt welcher das Fersen- und Sprungbein aneinanderstossen, sind aber nicht in ihrem ganzen Umfange Gelenkflächen. Regelmässig zieht sich ein cylindrischer Canal, *Canalis tarsi*¹⁾ (Fig. 263 w.), von auf einander passenden Rinnen des Sprung- und Fersenbeins zusammengesetzt und von Bandmasse ausgefüllt, zwischen beiden Knochen schräg lateral- und vorwärts hin. Die Rinne des Fersenbeins, *Sulcus interarticularis calcanei*,

ist seichter als die des Sprungbeins; vom hinteren Rande des Sustentaculum aus nach vorn verlaufend, scheidet sie zwei überknorpelte Flächen, eine breitere convexe, unregelmässig vierseitige oder elliptische und mit dem vorderen Ende des längsten Durchmessers lateralwärts abweichende, welche ganz dem Fersenbeinkörper angehört, und eine schmalere concave, welche sich entweder auf den medialen Theil der oberen Fläche des Sustentaculum beschränkt oder sich in langgedehnt elliptischer oder Biscuitform auf die obere Fläche des Körpers verlängert oder endlich durch eine transversale Furche ebenfalls in zwei Gelenkflächen getheilt wird, von welchen die eine das Sustentaculum, die andere die vordere mediale Ecke des Körpers einnimmt. Die Gelenkfläche des Körpers wollen wir die laterale, *Fac. art. lat.*, die von dem Sustentaculum aus nach vorn sich erstreckende die mediale nennen. Entwickeln sich aus der letzteren zwei, so ist die eine die hintere (*F. art. med. post.*), die andere die vordere (*F. art. med. ant.*), die quere Rinne zwischen beiden mag sodann *Sulcus interarticularis access.* heissen. Die auf einander passenden queren Rinnen des Fersen- und Sprungbeins setzen einen *Canalis tarsi accessorius* zusammen, welcher quer vor dem Sustentaculum vorüberführt, und, gleich dem hinteren und beständigen *Canalis tarsi*, in eine weite Grube zwischen der unteren concaven Fläche des Sprungbeins und der oberen Fläche des Fersenbeins vor der lateralen Articulation des Sprung- und Fersenbeins ausmündet. Diese Grube nennen wir *Sinus tarsi* (Fig. 265). Die obere Fläche des Fersenbeins, welche den Boden des Sinus tarsi ausmacht, ist platt, mit scharfen

¹⁾ *Sinus tarsi.*

Kanten gegen die Seitenflächen abgesetzt, dicht am Rande der Gelenkfläche grubenförmig vertieft; hinter der Articulation ist die obere Fläche des Fersenbeins gewölbt, verschmälert und geht abgerundet in die Seitenflächen über.

Von den Seitenflächen des Fersenbeins ist die laterale durch zahlreiche Gefässlöcher rau und plan bis auf einen leisten- oder höckerartigen unter dem vorderen Rande der Gelenkfläche in der halben Höhe des Knochens schräg ab- und vorwärts verlaufenden Vorsprung, welcher von oben her eine Furche begrenzt, *Sulcus M. peronei l.*, Fig. 261, die die Sehne des genannten Muskels aufnimmt. Der Vorsprung kann fehlen oder sich dergestalt verdoppeln, dass die Sehne zwischen zwei Leisten eingeschlossen liegt. Die mediale Fläche ist glatt, in sagittaler Richtung leicht concav, in verticaler durch den Uebergang auf die untere Fläche des Proc. lateralis tief ausgehöhlt, mit einer flachen Rinne, *Sulcus M. flexoris hall. longi*, Fig. 266, versehen. Die hintere Fläche des Fersenbeins ist besonders im verticalen Durchmesser gewölbt, gegen den oberen Rand verschmälert, in der oberen Hälfte glatt, in der unteren (durch die Anheftung der Achillessehne) rau, durch einen Ausschnitt des unteren Randes in zwei an die untere Fläche sich herumziehende und mit den Spitzen vorwärts gerichtete Zacken getheilt (Fig. 193), eine breitere mediale und eine schmalere laterale. Die untere Fläche, vor diesen Zacken vertieft, an den Seitenrändern abgerundet, durch Poren und sagittale Furchen rau, verschmälert sich nach vorn und endet unweit der vorderen Fläche mit einem stumpfen Höcker (Fig. 266*), welcher an der medialen Fläche hinaufzieht, indess vor demselben die mediale mehr und mehr abwärts geneigte Fläche mit der lateralen in einer abgerundeten Kante sich vereinigt. Die vordere, überknorpelte Fläche (Fig. 265) ist demgemäss ein Dreieck, rechtwinklich, die Hypothense durch die Kante gebildet, welche der vorderen mit der medialen Fläche gemein ist, alle drei Winkel abgerundet. Sie ist durch Ueberhängen des oberen Randes in verticaler Richtung concav und durch Zurückweichen der oberen medialen Ecke in transversaler Richtung convex. Am medialen Drittel des oberen Randes dieser Gelenkfläche findet sich zuweilen eine schmale schräg aufwärts gerichtete Facette, auf welche das Schiffbein sich mit seinem Rande stützt.

2. Sprungbein, *Talus* ¹⁾).

Das Sprungbein ist Träger der überknorpelten Rolle, mit welcher der Fuss sich im Knöchelgelenk bewegt. Die in sagittaler Richtung gewölbte, in transversaler Richtung schwach ausgehöhlte obere Fläche dieser Rolle (Fig. 261, 263, 264) nimmt den grössten Theil der oberen Fläche des Sprungbeins ein; der vor der Rolle gelegene rauhe Theil der oberen Fläche ist nicht nur kürzer, sondern auch schmäler als der überknorpelte, und zwar durch Einbiegung am Kleinzehe nrande verschmälert; er ist zugleich vor der Gelenkfläche vertieft, und auch diese Vertiefung ist am Kleinzehe nrande am auffallendsten und wird gegen den Grosszehe nrand flacher. Der vordere Rand der Gelenkfläche ist fast genau transversal; ihre Seitenränder zeigen

2. Sprungbein.


¹⁾ *Astragalus*, Knöchelbein.

eine geringe Convergenz nach hinten; ihr hinterer Rand, der zugleich der hintere Rand der oberen Fläche ist, steigt schräg medianwärts ab (Fig. 269).

Auf die Grosszehenfläche des Sprungbeins (Fig. 260) erstreckt sich der Knorpelüberzug vom oberen Rande her in Form eines halbmondförmigen Saumes, der mit seiner hinteren Spitze die hintere Ecke der oberen Gelenkfläche nicht erreicht, mit seiner vorderen, abgerundeten Spitze dagegen über den vorderen Rand der oberen Gelenkfläche hinaus vorwärts ragt. Der überknorpelte Theil der medialen Fläche hat eine geringe Neigung aufwärts, die zunächst dem vorderen Rande noch etwas deutlicher wird. Der übrige, ziemlich rauhe Theil dieser Fläche steht vertical; ihr unterer Rand ist concav, dem oberen concentrisch gebogen.

Auf die Kleinzehenfläche des Sprungbeins (Fig. 261) geht der Knorpelüberzug vom ganzen lateralen Rande der oberen Fläche continuirlich über, vorn mit einer scharfen, hinten mit einer stumpferen Kante, die sich zuweilen wie eine zwischen beiden Flächen eingeschobene schmale Facette ausnimmt. Der überknorpelten Fläche des lateralen Knöchels ähnlich, aber von grösseren Dimensionen, ist diese laterale Gelenkfläche des Sprungbeins dreiseitig mit abwärts ragender Spitze und ungefähr ebenso hoch, als am oberen Rande (im sagittalen Durchmesser) breit, im oberen Theile vertical und gegen die Spitze sanft aufwärts geneigt, die Spitze getragen von der lateralwärts am meisten vorragenden Ecke, *Proc. lateralis*, des Sprungbeins (Fig. 268). Dem Rande dieser Gelenkfläche genau parallel verläuft der untere Rand der Kleinzehenfläche des

Fig. 268.




Sprungbein, von vorn, um die horizontale Axe wenig aufwärts gedreht.

der Sprungbeins von der hinteren Ecke an erst ab- und lateral-, dann auf- und medianwärts. Nur ein niedriger Streifen rauher Oberfläche, zur Anheftung der Gelenkbänder rinnenförmig vertieft, zieht sich unterhalb der Gelenkfläche hin; er geht hinten aus der niederen hinteren Fläche hervor und grenzt vorn an den vorwärts gewandten Theil der unteren Fläche, welche den Sinus tarsi

von hinten her begrenzt. Unter der vorderen oberen Ecke der Knöchelgelenkfläche findet sich die Kleinzehenfläche des Sprungbeins auf eine

ziemlich scharfe, im Bogen anfangs median-, dann vorwärts laufende Kante beschränkt, welche sich erst in der Nähe des vorderen Randes wieder zu

Fig. 269.



Sprungbein von hinten.

einer Fläche entfaltet, wodurch der vordere Theil des Sprungbeins, von dieser Seite betrachtet, das Ansehen eines durch einen engen Hals von dem Körper abgesetzten Kopfes gewinnt ¹⁾ (Fig. 268).


Die hintere Fläche des Sprungbeins, niedrig, vierseitig, etwas medianwärts gewandt, mit parallelen, medianwärts absteigenden Seitenrändern ist von einer den Seitenrändern parallel verlaufenden Rinne, *Sulcus M. flexor. hall. longi*, zwischen zwei mehr oder minder vorspringenden rauhen Höckern durchzogen. Die Rinne nimmt die Sehne des Flex.

¹⁾ Daher die Benennung *Caput* u. *Collum tali*.

hall. long. auf und setzt sich in die gleichnamige Rinne des Fersenbeins fort. Von den beiden Seitenhöckern ragt der laterale weiter rückwärts und stützt sich auf die obere Fläche des Fersenbeins, der mediale liegt über dem hinteren Eingange des Sinus tarsi (vgl. Fig. 260).

Die vordere Fläche des Sprungbeins ist überknorpelt, Theil einer Kugelfläche, breiter als hoch, mit dem oberen Rande schräg medianwärts abfallend. Sie greift an der unteren Fläche des Sprungbeins weiter herum als an der oberen, und an der medialen Seite weiter als an der lateralen. Das Schiffbein, welches mit der vorderen Fläche des Sprungbeins articulirt, lässt einen Streifen überknorpelter Fläche (Fig. 260, 268, 270**) am unteren und medialen Rande frei, welcher zuweilen durch eine sehr stumpfe Kante von dem mit dem Schiffbein articulirenden Theil der Gelenkfläche abgesetzt ist. Er ruht auf dem Lig. calcaneo-naviculare. Dieser Streifen zieht sich zuweilen medianwärts bis unter das Knöchelgelenk hin.

Fig. 270.



Fersen- und Sprungbein, das Fersenbein von der oberen, das Sprungbein von der unteren Fläche.

Die untere Fläche des Sprungbeins zeigt die beiden, durch eine tiefe rauhe Furche, *Sulcus interarticularis tali* geschiedenen Gelenkflächen, mittelst welcher das Sprung- auf dem Fersenbein ruht. Die laterale, auf dem Körper des Fersenbeins articulirende Gelenkfläche, *Fac. art. lateralis*, ist tief ausgehöhlt, elliptisch; sie liegt mit dem längsten Durchmesser schräg lateral- und vorwärts und reicht


von dem unteren Rande der hinteren Fläche zu dem vorderen Rande des oben erwähnten Proc. lateralis. Die mediale, mit dem Sustentaculum des Fersenbeins articulirende Gelenkfläche ist verschieden geformt, je nachdem die Artulationsfläche des Fersenbeins sich auf das Sustentaculum beschränkt, oder sich bis zum vorderen Rande dieses Knochens ausdehnt. In beiden Fällen geht die Gelenkfläche des Sprungbeins, *Fac. art. med. post.*, hinten schmal und nach vorn sich allmähig verbreiternd, längs dem Grosszehenrande der unteren Fläche bis an den Knorpelüberzug der vorderen. Der Gelenkfläche am vorderen Rande des Fersenbeinkörpers entspricht aber am Sprungbeine eine Facette, *Fac. art. med. ant.*, welche mit der Gelenkfläche für das Sustentaculum sowie mit dem Knorpelüberzug der vorderen Fläche des Sprungbeins in einer stumpfen Kante zusammenstösst. Findet die Articulation nur mittelst der Gelenkfläche des Sustentaculum und der ihr entsprechenden am Sprungbein Statt, so bleibt zwischen Sprung- und Fersenbein vor dem Sustentaculum eine Spalte, die sich in die Spalte zwischen Schiff- und Würfelbein fortsetzt. Ist am Sprungbein

wie am Fersenbein die mediale Gelenkfläche durch eine Furche, *Sulcus interart. ant.*, in zwei getheilt, so entsteht aus den auf einander passenden Furchen der bereits beim Fersenbein beschriebene Can. tarsi accessorius.

3. Schiffbein, *Os naviculare*¹⁾.

3. Schiffbein. Das Schiffbein gleicht einer dicken, elliptischen, mit der grossen Axe transversal gestellten und nach der Fläche gebogenen Scheibe, welche die concave Fläche nach hinten, die convexe nach vorn wendet (vgl. Fig. 193). Die hintere Fläche ist stärker gebogen als die vordere; insbesondere weicht sie mit dem medialen Rande zurück. Die Scheibe nimmt daher medianwärts an Dicke zu. Die hintere Fläche ist ein Hohlkugelabschnitt; sie articulirt auf der Vorderfläche des Sprungbeins. Die vordere Fläche gewinnt durch eine Einbiegung des unteren Randes eine nieren- oder bohnenförmige Gestalt. Sie ist ebenfalls Articulationsfläche und wird durch zwei stumpfe, von der Mitte des unteren Randes ausgehende und nach oben divergierende Kanten in drei Felder getheilt, welche die drei Keilbeine aufnehmen (Fig. 271). Das mediale Feld ist das grösste, halbelliptisch; das mittlere ist drei-

Fig. 271.



Horizontaldurchschnitt des Schiffbeins mit den Keilbeinen und dem Würfelbein.

seitig mit abwärts gekehrter Spitze, das laterale vierseitig mit lateralwärts convergirendem oberen und unteren Rande. An den lateralen Rand desselben schliesst sich unmittelbar die sogleich zu erwähnende laterale Gelenkfläche an. Alle drei Felder sind fast plan oder schwach gewölbt und nur in der Nähe der Ränder etwas vertieft.


Der Rand, welcher die beiden beschriebenen Flächen des Schiffbeins mit einander verbindet, ist grösstentheils rauh und porös. Er vertritt die Stelle der ohne bestimmte Grenzen in einander fließenden oberen und unteren, Gross- und Kleinzehefläche des Knochens. Der medianwärts abfallende Theil des Randes setzt sich auf die mediale Fläche einer comprimierten am Grosszehehrende des Fusses stark abwärts ragenden stumpfen Zacke, *Tuberositas ossis navicularis*, Fig. 260, 264, fort. Der Theil des Randes, welcher etwa der Grenze der lateralen und unteren Fläche des Schiffbeins entsprechen würde, trägt in der Regel

in der vorderen Hälfte eine halbkreisförmige mit dem geraden Rande an die laterale Facette der Vorderfläche anstossende Gelenkfläche, welche, lateral- und abwärts geneigt, auf einer Gelenkfläche des Würfelbeins ruht. Seltener kommt an dieser Stelle, in Verbindung mit dem Rande der hinteren Gelenkfläche, ein schmaler Knorpelstreif zur Verbindung mit dem Rande des Fersenbeins vor.


¹⁾ *Os scaphoideum*, Kahnbein.

4. Erstes Keilbein, *Os cuneiforme primum*.

Dieses Keilbein trägt zwar seinen Namen mit Recht, ist aber, der Regel entgegen, mit der Schneide aufwärts gerichtet (Fig. 272). Die




Frontaldurchschnitt des Fusses durch die Keilbeine und das Würfelbein.



Erstes Keilbein von der Kleinzehenseite.

Schneide, in welcher die Gross- und Kleinzehenfläche, beide lateralwärts gekrümmt, zusammenkommen, besteht aus zwei Abtheilungen, von welchen die hintere, längere, schräg vor-, median- und aufwärts, die vordere gerade vorwärts geht (Fig. 264). Die beiden Seitenflächen sind demnach fünfseitig und die hintere Fläche ist ansehnlich niedriger, als die vordere. Die hintere Fläche (*p*) articulirt auf der medialen Facette des Schiffbeins und wiederholt genau deren halb elliptische Form, nur dass sie leicht ausgehöhlt und gegen die Ränder etwas gewölbt ist; die vordere Fläche, zur Articulation mit dem ersten Mittelfussknochen bestimmt, ist leicht gewölbt, unregelmässig bohnenförmig, den eingebogenen Rand lateralwärts gerichtet, im verticalen Durchmesser etwa doppelt so lang, als im transversalen (Fig. 274). Die Grosszehenfläche ist rau, im verticalen Durchmesser gewölbt, im sagittalen etwas vertieft, an der vorderen unteren Ecke mit einem Eindruck versehen,

der von der Anheftung des *M. tibialis ant.* und der Bänder des medialen Fussrandes herrührt; sie geht mit einer stumpfen Kante in die ebenfalls rauhe Sohlenfläche und diese ebenso in die Kleinzehenfläche über. Die Kleinzehenfläche hat längs dem hinteren und oberen Rande einen überknorpelten Saum. Der Saum des hinteren Randes stösst in einer scharfen Kante mit dem Knorpelüberzug der hinteren Fläche zusammen. Der Saum



Die drei Keilbeine, von vorn.

des oberen Randes ist durch eine Kante oder eine schmale Rinne gerade da getheilt, wo der obere Rand seine Richtung ändert. Die unter dem gerade vorwärts verlaufenden Theil des oberen Randes gelegene kleine, kreis- oder halbkreisförmige Gelenkfläche (*k''*) steht mit dem zweiten Mittelfussknochen in Verbindung; die im Winkel gebogene Gelenkfläche am hinteren Theile des oberen Randes und am hinteren Rande (*k'*) dient zur Articulation mit dem zweiten Keilbein. Der

rauhe Theil der Kleinzehenfläche (*k*) ist eine Strecke weit abwärts durch den zweiten Mittelfussknochen und das zweite Keilbein versteckt. Zunächst dem unteren Rande liegt diese Fläche frei an der Fusssohle (Fig. 272).


4. Erstes Keilbein.

5. Zweites Keilbein, *Os cuneiforme secundum*.

5. Zweites Keilbein.

Das zweite Keilbein liegt am Fussrücken zu Tage mit einer mehr oder minder gewölbten rauhen, vierseitigen Fläche, welche fast eben so lang als breit ist, sich aber gegen den vorderen Rand hin um Weniges verschmälert;

Fig. 275.



Mediale Hälfte des Fusses.

Fig. 276.

Zweites Keilbein,
v. d. Kleinzehenseite.

die scharfe Schneide des Keils liegt in der Fusssohle in einer Vertiefung, welche von den einander zugewandten Flächen der beiden Nebenknochen begrenzt wird. Die vordere und hintere Fläche sind überknorpelt; die hintere (*p*) gleichseitig dreieckig, die vordere, weil am oberen Rande etwas schmaler als die hintere, gleichschenkelig dreieckig (Fig. 277); die hintere in verticaler Richtung leicht concav, die vordere mit einer geringen verticalen Wölbung zwischen zwei Concavitäten. Von den vierseitigen und abwärts convergirenden Seitenflächen ist die mediale mit einem Knorpelüberzug versehen, welcher der eben beschriebenen Articulationsfläche am ersten Keilbein genau gleicht, die obere Hälfte und den hintern Theil der unteren Hälfte der Fläche einnimmt und in scharfen Kanten mit der hinteren und vorderen Gelenkfläche zusammentrifft; das vordere untere Viertel der medialen Fläche ist rauh. Die laterale Fläche ist in der vorderen, grösseren Hälfte (*k*) rauh; die Fläche zur Articulation mit dem dritten Keilbein (*k'*), welche ihrerseits ebenfalls mit dem Knorpelüberzug der hinteren Fläche zusammenstösst, reicht am oberen Rande bis zur Mitte, am unteren nicht über das hintere Viertel und erhält durch S-förmige Einbiegung des vorderen Randes eine der medialen Gelenkfläche ähnliche Winkelmaassform, jedoch mit kürzerem und abgerundetem horizontalen Schenkel.


6. Drittes Keilbein, *Os cuneiforme tertium*.

6. Drittes Keilbein.

Das dritte Keilbein ist im transversalen Durchmesser kleiner, in den übrigen Dimensionen grösser als das zweite; der transversale Durchmesser beträgt etwas mehr als die Hälfte des sagittalen und des verticalen. Die Rückenfläche, plan, rauh, gegen den Kleinzehenrand abwärts geneigt, weicht mit dem lateralen Ende des vorderen und hinteren Randes und zwar mit dem letzteren stärker rückwärts. Die Seitenränder gehen ziemlich parallel in stumpfwinklich gebrochenen Linien vom hinteren Rande an erst bis etwa zur Mitte lateral-, dann median-, endlich gerade vorwärts (vgl. Fig. 261). Diese Aenderungen der Krümmungen treffen zusammen mit Aenderungen


der Beschaffenheit der Seitenflächen, welche längs der hinteren Hälfte überknorpelt, in der vorderen Hälfte rauh und erst ganz in der Nähe des vorderen Randes wieder überknorpelt sind. Der hintere überknorpelte Theil ent-

Fig. 277.



Die drei Keilbeine, von vorn.

Fig. 278.



Drittes Keilbein von der Kleinzehenseite.

spricht medialerwärts der Gelenkfläche des zweiten Keilbeins, lateralerwärts (k') einer Gelenkfläche des Würfelbeins; die Knorpelüberzüge am vorderen Rande dienen zur Articulation mit den Basen des zweiten (d'') und vierten Mittelfusssknochens (k''). Die dem zweiten Keilbein zuge-

wandte Gelenkfläche ist derjenigen, auf welcher sie articulirt, in Form und Grösse vollkommen gleich; sie erreicht demnach nicht den unteren Rand der Fläche; die dem Würfelbein zugewandte Gelenkfläche, von rundlicher halb elliptischer Gestalt, reicht noch weniger weit hinab, dagegen etwas weiter vorwärts. Die zur Articulation mit den Mittelfusssknochen bestimmten Facetten sind schmal- und streifen- oder halbkreisförmig; sie erstrecken sich nicht über das obere Drittel der Seitenfläche und nehmen sich wie auf die Seitenflächen zurückgeschlagene Anhänge der oberen Ecke des Knorpelüberzugs der Vorderfläche aus. Im Uebrigen sind die Seitenflächen rauh, im Umfang der Gelenkflächen rinnenartig vertieft, in der abgerundeten Schneide des Keils vereinigt; die Grosszehenfläche ist aufwärts geneigt, die Kleinzehenfläche schon näher der horizontalen, als der verticalen Lage. Die hintere Gelenkfläche, von der Form der lateralen Facette des Schiffbeins, leicht vertieft, stösst in scharfen Kanten mit den hinteren Gelenkflächen der Seitenflächen zusammen. Unter der abgerundeten und überragenden unteren Spitze derselben bleibt ein niederes und schmales, rauhes Stück der hinteren Fläche frei. Die vordere Fläche (a) ist in ihrem ganzen Umfang zur Articulation mit dem dritten Mittelfusssknochen bestimmt, dreiseitig mit abwärts gerichteter, abgerundeter Spitze, oben plan und gegen die Spitze sehr leicht concav.

Zwischen den Gelenken des dritten Keilbeins mit den Nebenknochen und den Mittelfusssknochen bleibt zu jeder Seite des dritten Keilbeins ein verticaler, von Bandmasse erfüllter spaltförmiger Canal (Fig. 271), welcher am skelettirten Fuss von der Rücken- zur Sohlenfläche führt.


7. Würfelbein, *Os cuboideum*.

Auch das Würfelbein ist keilförmig oder dreiseitig prismatisch. Die Schneide liegt am lateralen Fussrande, gegen welchen die Rücken- und Sohlenfläche convergiren (Fig. 272). Zu dieser Verjüngung des Knochens im verticalen Durchmesser kommt sodann noch eine Verjüngung gegen die Schneide des Keils im sagittalen Durchmesser, indem die vordere Fläche rückwärts, die hintere vorwärts zum Kleinzehenrande geht (Fig. 279). In geringerem Maasse nähern sich Sohlen- und Rückenfläche einander auch nach vorn. Die

7. Würfelbein.

Kante, in welcher Rücken- und Sohlenfläche einander begegnen, ist stumpf

Fig. 279.




Laterale Hälfte des
Fusses.

und etwas eingebogen. Die Rückenfläche ist gegen diese Kante so stark abwärts geneigt, dass sie mit der lateralen Fläche des Fersenbeins in einer Flucht liegt und sich erst gegen den vorderen Rand allmähig mehr aufwärts wendet. Auch die Sohlenfläche liegt mit dem medialen Rande höher als mit dem lateralen, und die Fläche endlich, welche die medialen Ränder der Rücken- und Sohlenfläche verbindet und die Gelenkflächen für das dritte Keilbein und das Schiffbein trägt, ist auf- und wenig medianwärts gerichtet, so dass auf dieselbe kaum mehr der Name einer medialen oder Grosszehenfläche passt. Rücken- und Sohlenfläche sind rauh; die letztere (vgl. Fig. 193) ist ausgezeichnet durch einen stumpfen, leistenartigen Vorsprung, *Tuberositas oss. cuboidei*, welcher von der hinteren lateralen Ecke an parallel dem Vorderrande über die ganze Fläche zieht, am lateralen Theil seiner vorderen Fläche von Knorpel bekleidet, von hinten her eine Rinne, *Sulcus peronei*, begrenzend, in welcher die Sehne des *M. peroneus long.* liegt. Die hinter der Tuberositas befindliche dreiseitige Fläche verlängert sich an der medialen (oberen) Ecke in

eine nach hinten vorragende Zacke mit abgerundetem Rande, welche,

Fig. 280.



Würfelbein von der
Grosszehenfläche.

gegen die Sohle rauh, zur Vergrößerung der Gelenkfläche, auf welche das Fersenbein sich stützt, verwandt wird. Diese Gelenkfläche nimmt die hintere Fläche des Würfelbeins ein; sie ist, genau entsprechend der vorderen Gelenkfläche des Fersenbeins, dreiseitig mit abgerundeten Winkeln, einem unteren, einem oberen lateralen und einem oberen etwas tiefer gelegenen medialen (Fig. 281). Der obere mediale Winkel ist es, welcher auf die eben erwähnte Zacke übergeht und an der übrigens schwach convexen Gelenkfläche des Würfelbeins einen stark concaven Anhang darstellt, der sich an den rückwärts gebogenen oberen medialen Winkel der Gelenk-

Fig. 281.



Würfelbein
von hinten.

Fig. 282.



Dasselbe
von vorn.

fläche des Fersenbeins anlegt. Die vordere Fläche des Würfelbeins (Fig. 282) ist gleichfalls Gelenkfläche und gleichfalls dreiseitig mit abgerundeten Winkeln; ihr spitzester Winkel entspricht der Schneide des Keils, ihre beiden längsten Seiten hat sie mit der Rücken- und Sohlenfläche, die kürzeste Seite mit der Grosszehenfläche gemein. Durch eine dieser kürzesten Seiten ziemlich parallele, stumpfe Kante wird sie in ein vierseitiges

und ein dreiseitiges Feld getheilt, das eine mehr über als neben dem anderen, jenes mit der Basis des vierten, dieses mit der Basis des fünften Mittel-

fussknochens verbunden. Auf der Grosszehenfläche (Fig. 280 d) liegen, wie erwähnt, die Gelenkflächen für das dritte Keilbein und das Schiffbein; sie stossen, durch eine stumpfe verticale Kante getrennt, unmittelbar an einander, jene (d'') etwas vorwärts, diese (d') fast genau medianwärts gewandt. Ihr oberer Rand fällt mit dem oberen Rande der betreffenden Fläche des Würfelbeins zusammen; vom vorderen und unteren Rande dieser Fläche aber stehen sie weit ab und auch zwischen dem hinteren Rande der letzteren und der Gelenkfläche für das Schiffbein bleibt noch ein schmaler rauher Zwischenraum. Dass die Articulation mit dem Schiffbein fehlen kann, wurde bereits bei der Beschreibung des letzteren erwähnt.

Beim Neugeborenen enthält von den Knochen der Fusswurzel nur das Fersen- und Sprungbein, öfters auch das Würfelbein je einen Knochenkern, die Verknöcherung des dritten Keilbeins folgt innerhalb des ersten, die des ersten Keilbeins innerhalb des dritten Lebensjahrs; erst im vierten Jahre verknöchert das zweite Keilbein und das Schiffbein. Im zehnten Jahr erhält das Fersenbein eine Epihyse, die sich als eine platte, gebogene Scheibe an der hinteren Fläche desselben entwickelt und zur Zeit der Pubertät mit dem Knochen verschmilzt.

β. Mittelfussknochen.

Unter den Mittelfussknochen zeichnet sich der der Grosszehe durch ^β seine Stärke aus, indem er im Querdurchmesser die Mittelfussknochen der




Fig. 283.
Frontaldurchschnitt der Mittelfussknochen
 x in der Nähe der hinteren Endflächen,
 y in der Mitte des Körpers.

übrigen Zehen wohl um das Doppelte übertrifft; die grösste Länge kommt dagegen dem zweiten Mittelfussknochen zu, welcher, obgleich mit dem hinteren Ende tiefer in die Fusswurzel vordringend, als seine Nachbarn, doch mit dem vordern Ende über den dritten und meistens auch über den ersten Mittelfussknochen vorragt (Fig. 275). Die drei lateralen Mittelfussknochen sind, wenn man von dem sogleich zu beschreibenden Fortsatz am hinteren Ende des fünften absieht, in Länge und Dicke

nur wenig verschieden, doch nimmt vom dritten zum fünften die Länge beständig um Etwas ab.

Die Körper aller dieser Knochen sind gegen die Plantarfläche leicht gekrümmt, doch rührt, wie in der Hand, die concave Gestalt der Beugeseite hauptsächlich von dem Vorsprung der oberen und unteren Enden her, der an den Knochen des Mittelfusses verhältnissmässig noch ansehnlicher ist, als an den Mittelhandknochen.

Die Form des Körpers der Mittelfussknochen ist die dreiseitig prismatische. Man kann die Flächen bezeichnen als Rückenfläche (r), als mediale (d) (Grosszehen-) und laterale (k) (Kleinzehen-) Fläche. Am ersten Mittelfussknochen sind die Kanten ziemlich gleich scharf, der Querschnitt ist ein gleichseitiges Dreieck; die Flächen sind schwach gewölbt, am meisten die Rückenfläche. Diese ist gegen den medialen Fussrand ab-

hängig, die mediale schaut abwärts und liegt mit dem medialen Rande nur wenig höher, als mit dem lateralen, die laterale Fläche ist aufwärts geneigt. An den übrigen Mittelfussknochen ist nur die Kante deutlich und scharf, welche die Rücken- und Kleinzehenfläche scheidet. Die beiden anderen Kanten sind abgerundet; der Querschnitt stellt ein spitzwinklich-gleichschenkeliges Dreieck dar, dessen kürzeste Seite im Allgemeinen der Rückenfläche entspricht, dergestalt, dass von dem dritten zum fünften Mittelfussknochen das relative Uebergewicht der längeren Seiten zunimmt und der fünfte wie plattgedrückt erscheint. Ueberall, gegen den fünften Mittelfussknochen zunehmend, steht die Rückenfläche grosszehenwärts, die Grosszehenfläche abwärts, die Kleinzehenfläche aufwärts geneigt.

Die Verdickung des hinteren Endes, der Basis, erfolgt am ersten Mittelfussknochen vorzugsweise kleinzehenwärts von der Kante aus, welche die




Erster Mittelfussknochen mit den Sesambeinen, Os, von unten.

mediale und laterale Fläche scheidet, und durch Breiterwerden dieser Flächen. Die erwähnte Kante verdickt sich zu einem Höcker, *Tuberculum*, welcher den grössten Theil der Basis des zweiten Mittelfussknochens gegen die Sohle deckt (vgl. Fig. 283). Die Endfläche, deren Rand eine rinnenförmige Vertiefung umgiebt, ist von Knorpel bekleidet und hat, leicht ausgehöhlt, dieselbe Nierenform, wie die vordere Fläche des ersten Keilbeins.

Die hinteren Endflächen (*p*) des zweiten und dritten Mittelfussknochens sind überknorpelt und nach der Form der vorderen Gelenkfläche des zweiten und dritten Keilbeins spitzwinklich dreiseitig mit abwärts gerichteter und abgerundeter Spitze. Die Basen dieser Knochen sind demgemäss dreiseitig prismatisch mit abwärts gerichteter stumpfer und wulstiger Kante, welche in der Flucht der Schneide der Keilbeine liegt. Sie haben eine plane, längs dem hinteren Rande leicht gefurchte Rückenfläche und abwärts convergirende Seitenflächen. Die Basis des zweiten Mittel-

Fig. 285.



Zweiter bis fünfter Mittelfussknochen, von der Grosszehenseite.

fussknochens trägt an der oberen Ecke der Grosszehenfläche eine kleine, kreis- oder halbkreisförmige Gelenkfläche (*d*), wodurch sie mit dem ersten Keilbein articulirt, an der Kleinzehenfläche zwei durch eine tiefe und rauhe, der Längsaxe des

Knochens parallel verlaufende Rinne geschiedene Gelenkflächen von ähnlicher Form, die obere im sagittalen Durchmesser länger als die untere, beide durch eine verticale stumpfe Kante je in eine hintere kleinere und eine vordere grössere Abtheilung geschieden, jene mit dem dritten Keilbein, diese mit dem dritten Mittelfussknochen articulirend. Vor der Rinne, welche die Gelenkflächen scheidet und sich an deren vorderem Rande herumzieht, liegt ein glatter, rauher Höcker. Die Basis des dritten Mittelfussknochens wendet der Basis des zweiten 2 Gelenkflächen (d) und, dem ebenerwähnten Höcker entsprechend, eine flache Grube (d') zu. Die Gelenkfläche, wodurch der dritte Mittelfussknochen sich mit dem vierten verbindet, nimmt halbkreisförmig oder halbelliptisch die obere Hälfte der Kleinzehefläche der Basis ein; vor sich hat sie eine Vertiefung, die sich nach vorn verliert, mit ihrem hinteren Rande stösst sie, wie alle Seitengelenkflächen der Mittelfussknochen, an die hintere Gelenkfläche.

Die Basis des vierten Mittelfussknochens zeigt eine überknorpelte, leicht gewölbte, vierseitige Endfläche (p), welche auf dem medialen Feld der Gelenkfläche des Würfelbeins eingelenkt ist, und vier Seitenflächen, von welchen aber die mediale und untere abgerundet in einander und gemeinschaftlich in die Grosszehefläche des Körpers übergehen. Die Rückenfläche der Basis, zwischen zwei Firsten der Länge nach vertieft, setzt sich mit der lateralen Fläche der Basis in die laterale (Kleinzehe-) Fläche des Körpers fort; die Rückenfläche des Körpers entsteht aus der medialen Firste der Rückenfläche der Basis. Von der Gelenkfläche an der Grosszehenseite der Basis (d), welche mit dem dritten Mittelfussknochen articulirt, ist zunächst dem hinteren Rande ein schmaler Streifen (d') durch eine verticale Kante geschieden, mit welchem die oben erwähnte kleine Facette am vorderen Rande der lateralen Fläche des dritten Keilbeins in Verbindung steht. Die Gelenkfläche, mit welcher sich die Basis des vierten Mittelfussknochens an den fünften lehnt, ist dreiseitig, nach vorn und unten von einer tiefen Furche begrenzt, die von der hinteren unteren Ecke schräg vorwärts zum oberen Rande geht. Die untere Fläche der Basis ist rauh.

Die Basis des fünften Mittelfussknochens hat dieselben drei Seitenflächen wie der Körper, und eine schräg rück- und lateralwärts abgeschnittene, spitzwinklich dreiseitige und mit der Spitze lateralwärts gewandte, leicht convexe Endfläche (p), an deren medialen Rand sich mittelst einer stumpfen Kante die Gelenkfläche der Grosszehenseite (d) schliesst. Die mediale und laterale Fläche dieses Mittelfussknochens vereinigen sich in einen stumpfen und rauhen, über die Articulation mit dem Würfelbein lateral- und rückwärts hinausragenden Muskelfortsatz, *Tuberositas metatarsi quinti*. Die mediale Fläche ist zwischen diesem Fortsatz und einem Höcker am medialen Rande der Länge nach rinnenförmig vertieft.

Die unteren Enden oder Köpfchen der Mittelfussknochen sind denen der Mittelhandknochen sehr ähnlich. Es sind kugliche Endflächen je auf einem vierseitigen Prisma, dessen verticaler Durchmesser am ersten Mittelfussknochen vom transversalen überwogen wird, an den übrigen aber fast das Doppelte des transversalen beträgt. Die Rückenfläche der Köpfchen geht erst ganz nahe dem vorderen Ende aus der Rückenfläche des Körpers hervor; die transversale Furche hinter dem oberen Rande der Gelenkfläche


erscheint tiefer, als an den Mittelhandknochen, weil die Höcker hinter derselben, welche jederseits die Grenze der Rücken- und Seitenfläche bezeichnen, stärker vorspringen. An den Seitenflächen dieselben Gruben, an der Sohlenfläche dieselben spitzen Zipfel der Gelenkfläche, wie an den Mittelhandknochen; doch springen diese Zipfel an den Fusswurzelknochen weiter über den Körper vor und haben das Eigenthümliche, dass jedesmal der laterale, welcher bei der natürlichen Stellung des Fusses tiefer liegt, den

Fig. 286.



Erster Mittelfussknochen
mit den Sesambeinen
von unten.

Fig. 287.



Horizontaldurchschnitt
des Köpfchens
des ersten Mittelfuss-
knochens mit den
Sesambeinen.

medialen in Länge und Breite übertrifft. Am ersten Mittelfussknochen sind die quere Rinne und die Höcker hinter dem oberen Rande der Gelenkfläche verhältnissmässig schwach. Den unteren Theil der Gelenkfläche theilt eine sagittale Kante in zwei sattelförmige, transversal concave, sagittal convexe Flächen.


In diesen liegen die *Ossa sesamoidea*, zwei längliche, von den Seiten zusammengedrückte Knöchelchen, mit oberer sagittal concaver, transversal convexer Gelenkfläche und rauher, allseitig stark gewölbter Sohlenfläche.

γ. Phalangen.

γ. Phalan-
gen.

Der einzige wesentliche Unterschied, welcher zwischen den Fuss- und

Fig. 288.




Knochen d. s. Fusses von oben.

Fig. 289.



Zweite Zehe,
von unten.

Fig. 290



Frontaldurchschnitt
der Grund- und Mittel-
phalange der zweiten
Zehe.

Handphalangen aufzufinden ist, betrifft die Körper der Grundphalangen, welche an den vier lateralen Zehen, besonders aber an der zweiten bis vierten eine cylindrische oder dreiseitig prismatische, von den Seiten comprimirt Gestalt haben; diese rührt her von einer die Rückenfläche theilenden Kante und einer leichten Wölbung der Plantarfläche.

Sodann sind im Allgemeinen die Phalangen der Zehen und besonders die Endphalangen minder regelmässig, die Kanten minder scharf, die Rauigkeiten weniger genau begrenzt, als an den Fingerphalangen; doch ist dieser Unterschied ohne Zweifel nur die Folge des Drucks und anderer Umbilden, welchen die Zehen ausgesetzt sind.

Aus der gleichen Ursache rührt die so häufige Ankylose der Mittel- und Endphalange der kleinen Zehe her, ferner eine Varietät, die mir bis jetzt nur an den Zehen begegnete, dass nämlich die Tuberositas unguicularis der Endphalange sich mit ihrer Seitenspitze an die Seitenwand des Körpers anlegt und mit dem Körper ein Loch umschliesst, durch welches Zweige von Nerven und Gefässen auf die Rückseite der Glieder treten.

Die Phalangen der Zehen sind nicht so schlank als die der Finger, weil sie weniger an Dicke als an Länge hinter denselben zurückstehen. Insbesondere rücken durch die Verkürzung der Körper der Zehenphalangen die verdickten Gelenkenden einander näher, an den Mittelphalangen der vierten und fünften Zehe so nahe, dass die Knochen abgeplatteten Cylinderchen mit nur schwach der Länge nach ausgehöhlter Seitenfläche gleichen.

Was nun die Dimensionen betrifft, so sind nur die Phalangen der grossen Zehe denen des Daumens an Länge gleich oder etwas überlegen; an den übrigen Zehen haben die Grundphalangen ungefähr die Länge der Mittelphalangen entsprechender Finger, die Mittelphalange der zweiten und dritten Zehe und die Mittel- sammt der Endphalange der vierten und fünften erreicht die Länge der Endphalange entsprechender Finger; die Endphalange der zweiten und dritten Zehe hat etwa die halbe Länge der Endphalange der längeren Finger.

Sehr auffallend ist das Uebergewicht der Stärke der Grosszehenphalangen, deren transversaler Durchmesser ziemlich genau das Doppelte des transversalen Durchmessers der Phalangen der übrigen Zehen beträgt. Was die Länge der Phalangen betrifft, so wurde schon früher die Eigenthümlichkeit erwähnt, dass an den zwei oder drei lateralen Zehen die Mittelphalange kürzer ist als die Endphalange. Vergleicht man die Phalangen der neben einander liegenden Zehen, so nimmt in allen Gliedern die Länge von der grossen gegen die fünfte Zehe ab; die Abnahme der Grundphalangen erfolgt continuirlich und langsam (von 34 auf 23^{mm}). Die Länge der Endphalange der Grosszehe ist ungefähr gleich der Summe der Längen der Mittel- und Endphalange der zweiten Zehe. Die Spitze der zweiten Zehe steht daher bald in gleicher Linie mit der Spitze der grossen, bald um Weniges vor oder hinter derselben. Die Mittelphalangen verkleinern sich von der zweiten Zehe zur vierten um mehr als die Hälfte (13 : 5^{mm}); die Abnahme der Länge der Endphalangen ist eine kaum merkliche (von 10 auf 8^{mm}).

Die Verknöcherung der Mittelfussknochen und Phalangen erfolgt durchaus in derselben Weise, wie die der entsprechenden Knochen der Hand, doch geht die Verbindung der Epiphysen mit dem Mittelstück an den Knochen des Mittelfusses etwas frühzeitiger vor sich, als an den Knochen der Mittelhand.

Die erste Aufgabe der Politik ist es, die Interessen der Nation zu wahren und zu fördern. Dies geschieht durch die Erhaltung der inneren Ruhe und die Befestigung der äußeren Sicherheit. Die Politik muss sich also auf die Erreichung dieser Zwecke richten.

Die zweite Aufgabe der Politik ist es, die Gerechtigkeit zu fördern und die Ungerechtigkeit zu beseitigen. Dies geschieht durch die Erhaltung der Rechte der Bürger und die Beförderung der Gerechtigkeit. Die Politik muss sich also auf die Erreichung dieser Zwecke richten.

Die dritte Aufgabe der Politik ist es, die Wohlstand der Nation zu fördern und die Armut zu beseitigen. Dies geschieht durch die Erhaltung der Wirtschaft und die Beförderung der Wohlstand. Die Politik muss sich also auf die Erreichung dieser Zwecke richten.

Die vierte Aufgabe der Politik ist es, die Bildung der Nation zu fördern und die Unwissenheit zu beseitigen. Dies geschieht durch die Erhaltung der Schulen und die Beförderung der Bildung. Die Politik muss sich also auf die Erreichung dieser Zwecke richten.

Die fünfte Aufgabe der Politik ist es, die Gesundheit der Nation zu fördern und die Krankheit zu beseitigen. Dies geschieht durch die Erhaltung der Gesundheit und die Beförderung der Gesundheit. Die Politik muss sich also auf die Erreichung dieser Zwecke richten.

Die sechste Aufgabe der Politik ist es, die Ruhe der Nation zu fördern und die Unruhe zu beseitigen. Dies geschieht durch die Erhaltung der Ruhe und die Beförderung der Ruhe. Die Politik muss sich also auf die Erreichung dieser Zwecke richten.

Die siebte Aufgabe der Politik ist es, die Freiheit der Nation zu fördern und die Unfreiheit zu beseitigen. Dies geschieht durch die Erhaltung der Freiheit und die Beförderung der Freiheit. Die Politik muss sich also auf die Erreichung dieser Zwecke richten.

Die achte Aufgabe der Politik ist es, die Gerechtigkeit der Nation zu fördern und die Ungerechtigkeit zu beseitigen. Dies geschieht durch die Erhaltung der Gerechtigkeit und die Beförderung der Gerechtigkeit. Die Politik muss sich also auf die Erreichung dieser Zwecke richten.

Die neunte Aufgabe der Politik ist es, die Wohlstand der Nation zu fördern und die Armut zu beseitigen. Dies geschieht durch die Erhaltung der Wohlstand und die Beförderung der Wohlstand. Die Politik muss sich also auf die Erreichung dieser Zwecke richten.

Im Verlage von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig erscheint:

Graham-Otto's ausführliches Lehrbuch der Chemie.

Dritte umgearbeitete Auflage.

4 Bände, in 6 Abtheilungen (Theilen). gr. 8. Satinirt Velinpap. Geheftet.

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten.

Erscheint in Doppellieferungen von 12 — 14 Bogen; Preis jeder einfachen Lieferung 15 Sgr.

Der erste Band enthält das Physikalische, das Allgemeine und Theoretische der Chemie. Dritte Auflage. Von den Professoren Buff, Kopp und Zammer in Giessen.

Der zweite Band in drei Abtheilungen (Theilen) enthält die anorganische Chemie. Vom Medicinalrath Professor Otto in Braunschweig.

Der dritte und vierte Band enthält die organische Chemie. Vom Professor Kolbe in Marburg.

Der erste Band (54 Bogen mit 500 Abbildungen) ist in der neuen Bearbeitung durch die Herren Buff, Kopp und Zammer vollständig erschienen. Preis 4½ Thlr.

Der zweite Band in 3 Theilen (178 Bogen mit 451 Abbildungen) ist gleichfalls vollendet und nunmehr vollständig erschienen. Preis 13 Thlr.

Der dritte Band ist ebenfalls vollständig erschienen; Preis 5½ Thlr. Vom vierten Bande sind bis heute die Lieferungen 1—4. ausgegeben; Preis jeder Lfrg. 15 Sgr.

Herr Medicinalrath Professor Otto spricht sich über diese neue Auflage folgendermassen aus:

„Bei der Bearbeitung der dritten Auflage des Werkes ist der ursprüngliche Plan im Allgemeinen beibehalten worden, aber die verschiedenen Zwecke, welche das Werk erfüllen soll, sind noch schärfer ins Auge gefasst, als früher. Es soll zunächst ein Handbuch für das Laboratorium, ein Rathgeber für den praktischen Arbeiter sein, ein Werk, nach welchem man arbeiten kann; — deshalb giebt es bestimmte und genaue Vorschriften zur Darstellung der in irgend einer Beziehung wichtigen Körper und bietet es alle Hilfsmittel dar, welche dem praktischen Arbeiter das Arbeiten erleichtern. Es soll ferner dem mit der Wissenschaft Vertrauten eine klare Uebersicht verschaffen über den Stand der Dinge in den einzelnen Theilen der Wissenschaft und es soll zu Untersuchungen anregen und befähigen; — deshalb bespricht es die Arbeiten derer, welche auf dem Gebiete der Chemie thätig sind, mit einer dem Werthe und der Wichtigkeit dieser Arbeiten angemessenen Ausführlichkeit und giebt es nicht allein die Resultate der Arbeiten, sondern es zeigt auch die Mittel und Wege, mit denen und auf denen diese Resultate erhalten werden. Endlich soll das Werk als Hilfsmittel bei dem ersten Unterrichte in der Wissenschaft dienen. Diesem Zwecke entsprach es in den früheren Ausgaben nicht völlig, in der neuen Ausgabe wird es demselben vollkommen zu genügen im Stande sein. Es ist dem zweiten Bande, womit die specielle Chemie beginnt, eine kurze Einleitung in den ersten Unterricht der Wissenschaft vorausgeschickt und die Art und Weise der Behandlung der Stoffe, auf den ersten Bogen dieses Bandes, etwas abgeändert worden. Nach dieser Ergänzung und Abänderung kann nunmehr das Werk unmittelbar als Grundlage bei Vorträgen Anwendung finden und ist es zugleich ganz geeignet, diejenigen in die Wissenschaft einzuführen, welche nicht in der Lage sind, Vorträge zu hören, welche also auf Selbststudium angewiesen sind. Der in die Wissenschaft Eintretende lässt anfangs den ersten Theil des Werkes ganz unberücksichtigt, er lernt das Physikalische und Allgemeine, in den Grundzügen, aus der fraglichen Einleitung und wendet sich erst dann den entsprechenden Abschnitten des ersten Theiles zu, wenn er das Bedürfniss fühlt, mehr davon zu hören, das ist, wenn er befähigter geworden, mehr davon zu verstehen.

Es war immer mein Wunsch, für die Bearbeitung des ersten Bandes des vorliegenden Werkes, des theoretischen, physikalischen und allgemeinen Theiles, die Mitwirkung tüchtiger, mit der Chemie völlig vertrauter Physiker zu gewinnen. Es gereicht mir zur Freude, dass mehr als dieser Wunsch erreicht worden ist, dass sich nämlich die Herren Buff, Kopp und Zammer zur selbständigen Bearbeitung dieses Theils vereinigt haben. Ich erkenne dankbar an, dass dieser Theil, in meiner früheren einfachen Bearbeitung, freundlich aufgenommen wurde, aber ohne alle Frage vermögen die genannten Herren besser als ich die höheren Anforderungen zu befriedigen, welche man jetzt an eine physikalische und theoretische Chemie zu stellen berechtigt ist.

Die Bearbeitung der organischen Chemie hat auf meinen Wunsch Herr Professor Kolbe in Marburg übernommen; sie schreitet rüstig in der Vollendung fort, und bildet den dritten und vierten Theil des Gesamtwerkes.

So sind denn nun aus dem Werke drei selbständige Werke entstanden, nämlich

1. Ausführliches Lehrbuch der physikalischen und theoretischen Chemie von Buff, Kopp und Zammer.

2. Ausführliches Lehrbuch der anorganischen Chemie von mir.

3. Ausführliches Lehrbuch der organischen Chemie von Kolbe.

Die drei Werke ergänzen einander und können deshalb als zusammengehörend betrachtet werden, aber sie stehen auch als völlig selbständige da, indem sie getrennt von einander, jedes für sich verkäuflich sind und deshalb einander nicht belästigen.

Otto.“

Im Verlage von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig ist erschienen:

Handbuch der rationellen Pathologie.

Von

Dr. J. Henle,

Professor der Anatomie in Göttingen.

In zwei Bänden. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Erster Band, Einleitung und allgemeiner Theil. Dritte Auflage. Zweiter Band, Specieller Theil in zwei Abtheilungen (erste Abthlg., zweite Aufl.) mit 3 Kupfertafeln.

Preis des vollständigen Werkes 9 Thlr. 15 Sgr.

Die Bright'sche Nierenkrankheit

und

deren Behandlung.

Von

Dr. Fried. Theod. Frerichs,

ordentlichem Professor der medicinischen Klinik an der Königl. Friedrich-Wilhelms-Universität, Geheimen Medicinal-Rath und vortragendem Rathe im Ministerio der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten in Berlin.

Mit einer Kupfertafel. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 20 Sgr.

Grundriss der Physiologie des Menschen.

Für das erste Studium und zur Selbstbelehrung.

Von

Dr. G. Valentin,

Professor der Anatomie und Physiologie in Bern.

Vierte gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 6 Tafeln in Stahlstich, einer colorirten Tafel und 619 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 4 Thlr.

Valentin's Grundriss der Physiologie giebt eine dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft entsprechende Uebersicht, wie sie das Bedürfniss der Studirenden an Universitäten und medicinisch-chirurgischen Lehranstalten sowie der Aerzte erfordert. Die Darstellung ist so gehalten, dass nicht nur dem praktischen Arzte ein Bild vom neuesten Stande der Physiologie, sondern auch dem gebildeten Laien die nöthige Belehrung gewährt wird. Physiker, Chemiker, Pharmaceuten, Lehrer an Gymnasien und Realschulen etc. etc., können in diesem Werke alle Thatsachen, die sie für ihre Zwecke brauchen, kennen lernen. Die schwierige Aufgabe, bei strenger Wissenschaftlichkeit leicht verständlich zu bleiben, und das rechte Maass in der Darstellung einzuhalten, ist von dem Verfasser mit Glück gelöst worden.

Die vierte Auflage wurde gänzlich umgearbeitet und wesentlich vermehrt. Das Streben nach grösserer Klarheit und vollständigerer Belehrung nöthigte die Anzahl der Holzstiche fast um die Hälfte zu vermehren. Was die Holzschneidekunst irgend zu leisten vermochte, wurde zu diesem Zwecke angewendet. Eine colorirte und sechs schwarze Stahlstichtafeln erläutern die feineren Verhältnisse des thierischen Körpers. Indem wir das Urtheil über die Schönheit der Ausführung derselben jedem Leser mit Zuversicht überlassen, bemerken wir nur, dass auch hier die Zahl der Abbildungen fast um die Hälfte vermehrt worden. Zugleich machen wir auf die grosse Sorgfalt in der Ausstattung, namentlich in den zahlreichen Abbildungen, die Aerzte und Studirenden aufmerksam, und zwar unter besonderer Hinweisung auf den ausserordentlich billigen Preis. Die Käufer erwerben mit dem Texte einen physiologischen Atlas, der ihnen in den meisten Fällen die Anschaffung eines besonderen Werkes der Art entbehrlich machen wird.

✓

