

Mémoire sur la petite vérole vraie et fausse et sur la vaccine : Pour l'instruction des parents et des jeunes médecins.

Contributors

Fodéré, F. E. 1764-1835.

Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library

Publication/Creation

Strasbourg : Jean-Henri [etc], 1826.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/teauhajc>

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by the Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library at Yale University, through the Medical Heritage Library. The original may be consulted at the Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library at Yale University. where the originals may be consulted.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>












































































































































































































































qui, au lieu d'être cristallines, contiennent un liquide jaunâtre ou vert foncé, et dont l'aréole, loin d'être rouge, est d'un blanc jaunâtre; 3.^o la formation d'ulcères sur l'endroit piqué est toujours suspecte, et l'on doit se méfier de tout ce qui est purulent, car le bouton vaccin n'est point un abcès, comme la pustule variolique, il est d'une formation organique, celluleuse, presque ressemblante à celle du cristallin; 4.^o les éruptions cutanées, de formes et de nature diverses, qui se montrent quelquefois très-abondamment chez certains sujets irritables, au troisième, quatrième, cinquième jour de l'insertion vaccinale, contribuent assez souvent à rendre la vaccine irrégulière, et doivent, dans ce cas, engager à la réitérer, dans un temps plus opportun; 5.^o la marche régulière de la vaccine est souvent troublée par la présence de la galle, des dartres, de la teigne, des croûtes laiteuses : la première donne quelquefois aux pustules de vaccine un coup d'œil trouble et jaunâtre, qui les rend semblables aux pustules psoriques en suppuration, ou bien elles sont emportées par les frottements, et remplacées par des croûtes jaunes. Sous l'influence dartreuse, l'on voit souvent les pustules vaccinales se couvrir d'une croûte mince, plate, irrégulière, molle et jaune, sans aréole et sans fièvre; d'autre fois ces affections cutanées détruisent toute l'impression locale des piqûres, attirent à elles l'action du virus vaccin et en acquièrent beaucoup plus de vivacité.

L'on voit par là à combien d'accidents qui peuvent faire manquer son effet, la vaccination est sujette, et combien les vaccinés doivent être surveillés pendant tout le temps légitime que doit durer cette légère maladie. En ne revoyant plus les



























































