

## **Josephi Jacobi Plenck ... toxicologia seu doctrina de venenis et antidotis.**

### **Contributors**

Plenck, Joseph Jacob, Ritter von, 1738-1807.  
Francis A. Countway Library of Medicine

### **Publication/Creation**

Viennae : Apud Rudolphum Graeffer, 1785.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/mqjn62sx>


### **License and attribution**


This material has been provided by This material has been provided by the Francis A. Countway Library of Medicine, through the Medical Heritage Library. The original may be consulted at the Francis A. Countway Library of Medicine, Harvard Medical School, where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>







THE  
GEORGE-BURGESS-MAGRATH  
LIBRARY  
OF-LEGAL-MEDICINE  
FOUNDED-IN-HIS-HONOR  
1933


Harvard Medical Library  
in the Francis A. Countway  
Library of Medicine - Boston

VERITATEM PER MEDICINAM QUÆRAMUS









JOSEPHI JACOBI PLENCK

*Chirurgiæ Doctoris; Chemiæ atque Botanices Professoris publici, ordinarii in Academia chirurgica militari, nec non Directoris pharmacopœarum militarium atque chirurgi status militaris supremi.*

TOXICOLOGIA  
S E U  
DOCTRINA  
DE  
VENENIS ET ANTIDOTIS.



---

○ Ingens sub minima mole latet malignitas.

SYDENHAM. Sect. I.



V I E N N A E,  
Apud Rudolphum Græffer. 1785.

HARVARD MEDICAL SCHOOL  
LIBRARY OF LEGAL MEDICINE  
SCHOOL OF MEDICAL MEDICINE  
10 JUL 1977  
LIBRARY

Gift: Mrs. Frances G. Lee

A U G U S T I S S I M O  
G L O R I O S I S S I M O  
R O M A N O R U M I M P E R A T O R I  
J O S E P H O II.

H U N G A R I A E , B O H E M I A E , D A L M A T I A E , C R O A -  
T I A E , S C L A V O N I A E , H A L L I C I A E , N E C N O N L O D O M E -  
R I A E , B O S N I A E , S E R V I A E E T B U L G A R I A E

R E G I A P O S T O L I C O .

A R C H I D U C I  
A U S T R I A E .

D U C I

B U R G U N D I A E , B R A B A N T I A E , M E D I O L A N I , S T Y R I A E ,  
C A R I N T H I A E , C A R N I O L I A E , M A N T U A E , P A R M A E , P L A C E N -  
T I A E , L I M B U R G I , L U X E M B U R G I , G E L D R I A E , Q V A S T A L -  
I A E , D U C A T U S A U S C H V I C E N S I S E T Z A T O V I E N S I S ,  
W Ü R T E M B E R G A E T U T R I U S Q U E S I L E S I A E .

P R I N C I P I  
S U E V I A E E T T R A N S Y L V A N I A E .

M A R C H I O N I  
S . R . I M P E R I I , B U R G O V I A E , M O R A V I A E , S U P E R I O R I S  
E T I N F E R I O R I S L U S A T I A E .

C O M I T I

H A B S B U R G I , F L A N D R I A E , T Y R O L I S , N A M U R T I A E ,  
F E R R E T I S , K I B U R G A E , G O R I T I A E , G R A D I S C A E , A R -  
T E S I A E E T S I C U L O R U M .

L A N D G R A V I O  
A L S A T I A E .

D O M I N O  
M A R C H I A E S C L A V O N I C A E , P O R T U S N A O N I S , S A L L -  
N A R U M , M E C H L I N A E E T C . E T C .

D O M I N O , D O M I N O  
C L E M E N T I S S I M O .

A U G U S T I S S I M E  
I M P E R A T O R  
D O M I N E D O M I N E  
C L E M E N T I S S I M E !



Quamvis scientiarum & artium, quæ ad communem perfectamque populorum felicitatem exiguntur, nulla sit in universis, qua late patent, TUO sceptro subjectis regnis, quæ clementia liberalitateque TUA non fruatur. Nulla tamen magis quam chirurgia, quæ saucio ægrototoque militi medetur, vigorem incrementumque suum TIBI, INVICTISSIME IMPERATOR debet. Luculentissimum, interneque duraturum Academia chirurgica militaris præbet monumentum, quod jam magna imitatur Russia, tota admiratur Europa, non menque TUUM seræ reddet posteritati. Hanc scoltam tam profusis thesauris, tam benefica, tam liberali exstruxisti manu, ut jam nihil profecto deesse nobis videatur ad summum rei chirurgicæ litteraricæ culmen adipiscendum. Dignare igitur CLEMENTISSIME DOMINE, ut exiguum hoc impensorum meorum laborum

*Specimen, quod scollæ TUÆ præmaturus levissimusque fructus est, ad pedes SACRATISSIMÆ TUÆ MAJESTATIS deponam. Hæc clementia me votorum meorum, quo grati animi testimonium exhibere valeam, compotem reddet & mihi atque cœteris hujus scollæ Professoribus efficacissimus ad præstantiora opera molienda erit stimulus. Immortale NUMEN TE, AUGUSTAMque FAMILIAM in communem subditorum felicitatem quam diutissime conservet.*

*SACRÆ, CÆSAREÆ, REGIÆ,  
APOSTOLICÆ MAJESTATIS*

*Fidelissimus subditus  
JOSEPHUS PLENCK.*



## P R A E F A T I O.

**T**oxicologiam in epitomen redactam editurus in limine operis eo minus hujus scientiæ necessitatem , utilitatemque adstruere , opus esse arbitror ; quum nostro præprimis ævo omnibus artis Hippocraticæ cultoribus notissimum sit , vix ullum elabi annum , quo non mortalium plures vel culinæ errore aut casu fortuito , aut imperitia medentis , aut impietate malevoli vel vitæ tædio , furiisve conscientiæ agitati toxicum hauriant.

Non rari igitur sunt casus legales , in quibus medicus forensis ad tribunal , quod crimina judicat , opinionem suam de certitudine exhibiti veneni interponere tenetur . Nullum denique malum adeo perpetim vitæ mortalium insidiatur , nullusque fere morbus promptiorem requirit medelam , quam qui ex hausto provenit veneno . Eo demum felicitatis recentiorum naturæ scrutatorum industria devenit , ut multorum venenorū nomen nostro præprimis ævo terribile esse desinat . Dosis enim utpluri-

## P R A E F A T I O.

mum non benefica Natura venenum a medicamento distinguit.

Multa etenim venena, quæ deleteria ex integro olim habita, hodie tanquam dona pretiosissima in vindicias sanitatis divinitus data veneramur. Multorum enim virtus medicata auxilium adhuc præstat desperatissimis in morbis, in quibus mitiora medicamenta ut plurimum fallunt; exemplo opii, belladonnæ, aconiti, præparatorum mercurialium, antimonia- lium, cantharidum &c.

Hac in medicinæ parte laudem maximam fibi pepererunt viri illustres, qui haud solum vim deleteriam, sed insimul vim medicatam & antidota venenorū recensent. E numero toxicologorum primarii sunt MERCURIALIS, ARDOYNUS, GESNERUS, FRICCIUS, LINDESTOLPE, MEAD, RHEDI, PROGIANI, WEPFERUS, NAVIER, FONTANA, KRAFF, CÆLSI, STOERCK, MURRAY præ omnibus vero *Celeberrimus* GMELIN, cui præstantissimum de venenis opus debemus. Horum virorum dogmata in aphorismos redigi prælectionibusque adaptavi. Sola vero venena hominibus deleteria, non simul ea, quæ animantibus lethalia recensui.



## DE VENENIS GENERATIM.

---

Ens, quod per exigua dosis, corpori humano ingestum aut extus applicatum, vi quadam peculiari morbum gravem vel mortem causat,  
*Venenum seu Toxicum* audit.

Omne venenum solummodo certæ dosis respectu deleterium est, nam atrocissima venena paucis exceptis, in valde exigua dosis sæpe optimæ sunt medicamenta.

Dantur tamen talia entia, quæ corpus semper destruunt & e quibus nulla dosis medicamentosa est, ut venenum hydrophobicum, pestilentiale, &c. hinc dantur venena *medicamentosa* & non *medicamenta seu semper deleteria*.

Sunt iterum, quæ deglutita non destruunt, sed cum aëre ad pulmones delata, vel vulneri instillata eneant. Aer fixus cum musto fermentante copiose deglutitur impune, cum aëre inspirato ad pulmones delatus subito necat. Venenum viperinum ventriculo ingestum impune fertur, vulneri instillatum mortem causat. Sunt denique alia venena, quæ non solum interne sed etiam externe applicata nocent, ut arsenicum.

Dantur denique venena *communia*, quæ omni homini & cuilibet animali noxam inferunt ut arsenicum, mercurius sublimatus corrosivus. Dantur demum venena *relativa*, quæ vel soli homini vel solis animalibus & sæpe uni solummodo animalium generi nocent. \*

\* Sic *Nux Vomica* brutis non æque hominibus deleteria est; *Aloe* canibus & vulpibus nociva; non homini; *Cocculi indici* piscibus & pediculis deleterii; *Phellandrium aquaticum* equis lethale, bobus innoxium est. *Doronicum* canes necat, rupicapras, alaudas & hyrundines nutrit. Semen *Petroselini* avibus; *Piper* suibus damnosum est; *Amygdala amara* vultes, felles & gallinas necant. *Conii maculati* semine sturni, *stramonii* semine phasiani, *lolii temulentii* semine coturnices, *hyoscyami* radicibus suis sine damno vescuntur.

Ex his ergo patet quodlibet venenum solummodo agere respectu *doseos*, qua exhibetur, respectu *partis nostri corporis*, cui applicatur & respectu animalis seu *subjecti*, cui propinatur.

*Dividuntur venena respectu regni*, e quo deprenduntur

- in *animalia*, quæ ex regno animali
- *vegetabilia*, quæ ex vegetabili
- *mineralia*, quæ ex minerali desumuntur ;
- *halituosa* quæ ex atmosphæra hauriuntur.

*Respectu temporis*, quo venena necant, dividuntur  
in *velocia*, quæ mortem cito inferunt, ut magna dosis arsenici, sublimati corrosivi vel aëris fixi pulmonibus hausti.

in *lenta*, quæ lente inducunt mortem, ut *saturnina*.

*Respectu indolis principiorum constitutivorum*, quibus venena maximam partem constant, dividuntur

in *acria*, ut *vegetabilia* draistica, corrosiva, *mineralia* acida, alcalina, metallica, & acido-metallica. *Animalia deleteria*, *necrotica*.

- in *narcotica* ut *vegetabilia* quædam
- *narcotica-acria*, quæ utroque principio nocent.
- *halituosa*, quæ halitu noxio suffocant.
- *mechanica*, quæ structura mechanica agunt.

Respectu *symptomatum*, quæ venena producunt,  
habentur

1. *Inflammatoria*, quæ inflammationem & gan-  
grænam inducunt.
2. *Draſtica*, quæ ſurſum ac deorſum primas  
vias validiſſime evacuant.
3. *Convulſiva*, quæ convulſiones aut ſpaſmos  
toto in corpore excitant.
4. *Paralyticantia*, quæ paralysiſin extremitatum  
ut saturnina, vel cordis ut laurocerasus in-  
ducunt.
5. *Narcotica*, quæ ſoporem, delirium, amau-  
roſim cauſant.
6. *Suffocatoria*, quæ ſuffocant halitu me-  
phitico.
7. *Exſiccantia*, quæ corpus tabe conficiunt, ut  
ſaturnina.
8. *Septica*, quæ ſanguinem ſolvunt, putrefa-  
ciunt, gangrænam inducunt.

*Diagnofis generalis* veneni velociter agentis, interne  
exhibiti, depromitur

1. *Ex ſubitanea invafione symptomatum*, ut fi  
homo ſanus ex ingefto quodam cibo, vel  
potu vel medicamento, aut re quadam  
incognita paullo poſt corripiatur vertigi-  
ne, cardialgia, colica, vomitu, cholera,  
ſpaſmis, convulſionibus, debilitate, ani-

mi deliquiis aut sopore &c. Aut si labia, lingua, fauces, ventriculus & abdomen cum sensu ardoris intumescant.

2. Ex *saburra egesta*, ut si saburra vomitu vel alvo ejecta masticatam herbam, vel radicem, vel fungum, vel pulverem, saltem, succum vel pilulam referat, & si haec saburra cani, felli, vel gallinæ ad devorandum data animal interimat, aut saltem gravissime afficiat. Sed memor sis, venena quædam homines non vero animalia interficere.
3. Ex *cadaveris inspectione*. Si in tali cadavere ventriculus inflatus, vel spasmodice contractus, aut inflammatus vel gangrenosus, vel saltem maculatus inveniatur, absque alia prægressi prius morbi causa.
4. Ex *notitia botanica*. Si in saburra vomitu vel alvo egesta, vel in cadaveris ventriculo inventa, adhuc appareat semen, radix, foliolum, fungus vel pulvis vegetabilis, vel si tale vegetabile in domo denati inveniatur, quod ex notitia botanico-pharmaceutica scimus esse venenatum.
5. Ex *notitia chemica*, si ex adhibito criterio chemico inventi in saburra veneni mineralis indolem inveniamus.

Unicum signum *certum* dati veneni est *notitia botanica* inventi veneni vegetabilis, & *criterium chemicum* dati veneni mineralis. Cum vero perfæpe hæc duo signa certa ob paucitatem inventæ materiæ suspectæ, aut vegetabilis nimium masticati, vel in ventriculo mutati adhiberi nequeant, hinc patet, cur sæpe *judicium de dato veneno maneat incertum.*

*Signa specialia* cuiuslibet peculiaris veneni adhuc dum desiderantur, quorumdam vero signa habemus, quæ in speciali venenorum consideratione sumus relaturi.

Possunt venena *quintuplici via* corpus nostrum ingredi.

1. Per *os & æsophagum*, quo forma cibi, potus, medicamenti vel aëris in ventriculum deglutiuntur.
2. — *anum ope enematis.*
3. — *nares ope odoris.*
4. — *pulmones ope halitus inspirati.*
5. — *applicationem ad cutem integrum vel læsam.*

Ergo respectu *sedis* quam venenum occupat, possunt venena dici *stomachica* — *enterica* — *narrina* — *pulmonica* — *cutanea*. Et si ex his viis ipsum sanguinem jam ingressa sunt, *sanguinea* seu in *toto corpore residentia* audiunt.

## MEDELA VENENORUM.

Medicamenta quæ venena enervant, *Antidota & Alexipharmacæ* dicuntur.

Hæc dividuntur

in *generalia*, quæ omnibus venenis conveniunt  
ut evacuantia, pinguia, mucilaginosa  
plastica.

— *specifica*, quæ vi specifica venenum enervant.

**Venena gastrica**, seu quæ in ventriculo solo adhuc resident, optime eliminantur dato vomitorio; venena vero *enterica* seu quæ in intestinis resident, optime evacuantur purgantibus. Si vero jam valida inflammatio ventriculum vel intestina occupet, tunc sola diluentia, & obvolventia, ut lac, emulsio, ova tenua cocta, oleosa, pinguia, mucilaginea, aqua tépida copiosissime hausta conveniunt.

**Venena sanguinea** seu sanguini immixta iisdem remediis circurantur & simul datis sudoriferis & diureticis e sanguine eliminantur.

**Venena pulmonalia** seu halitus noxii pulmonibus hausti, halitibus contrariis ut acidi alcalinis, alcalini acidis, phlogisticati aëre dephlogisticato &c. sæpe feliciter destruuntur.


**Venena narina** elunntur e naribus vel mox dictis remediis invertuntur.

**Venena cuti externæ applicata exigunt ablationem  
vel suppurationem, qua eliminantur; vel ap-  
plicationem remedii involventis aut specifici;  
de quibus in speciali venenorum consideratio-  
ne dicetur.**

**Respectu antidotì habentur venena, quorum anti-  
dota nobis sunt comperta & alia quorum an-  
tidota ignoramus.**



V E N E N A  
EX  
R E G N O A N I M A L I.



# ELENCHUS.

---

De venenis animalibus generatim.

## COLUBRI AMERICANI.

- Crotalus horridus die *Schauerschlange*.  
— miliarius der *Schleiderschwanz*.  
— Dryinas die *Ungezieferschlange*.  
— Durissus der *Klapperer*.  
— mutus der *Stumpfsschwanz*.

- Coluber Atropos die *Giftschlange*.  
— Leberis der *Schlangenbalg*.  
— Dipfas die *Durstnatter*.  
— Myctericans die *Rumpfnase*.  
— Lacteus der *Milcher*.

## COLUBRI ASIATICI.

- Coluber Naja die *Brillenschlange*.  
— severus die *Japonische Natter*.  
— stolatus die *Schleppennatter*.  
— atrox der *Tyran*.  
— corallinus die *Corallennatter*.  
— Ammodytes der *Sandkriecher*.  
— lebetinus die *Kupfernatter*.

## C O L U B R I A F F R I C A N I.

- Coluber Vipera die *Vipernnatter.*  
 ——— niveus die *Schneeschlange.*  
 ——— Haje die *Kropfnatter.*

## C O L U B R I E U R O P Æ I.

- Coluber Berus die *Europæische Natter.* Germanicus.  
 ——— Prester die *schwarze englische Natter.*  
     Anglicus,  
 ——— Chersea die *schwedische Natter.* Suecicus.  
 ——— Aspis die *französische Natter.* Gallicus.  
 ——— Illiricus die *illirische Natter.* Italicus.

## I N S E C T A V E N E N A T A.

- Furia infernalis der *Tollwurm.*  
 Meloe vesicatorius die *spanische Fliege.* Cantharis.  
 ——— majalis der *Maywurm.*  
 ——— Proscarabæus der *Zwitterkäfer.*  
 Scorpio africanus der *africanische Scorpion.*  
 Phalangium araneodes, die *Scorpionenspinne.*  
 Sirex Gigas die *Holzwespe.*  
 Buprestis der *Stinkkäfer.*  
 Aranea domestica die *Hausspinnerin.*  
 ——— Tarantula die *Tarantel.*  
 Pulex penetrans, der *amerikanische Floh.*  
 Culex pipiens, der *Musqueton.*  
 ——— pulicaris, die *Flohmücke.*  
 Culex Lanio, die *Viehtödende Mücke.*

**Apis mellifica**, die Biene.  
**Vespa vulgaris**, die Wespe.  
 —— **Crabro**, die Hornisse.

### V E R M E S V E N E N A T I.

**Gordius medinensis**, der Hautwurm.  
 —— **marinus**, der Seewurm.  
**Hirudo medicinalis venenatus**, der giftige Blutigel.  
**Tethis marina**, der Meerhase.  
**Urtica marina**, die Seenessel.

### A M P H I B I A V E N E N A T A.

**Rana Buffo**, die Kröte.  
**Lacerta Gecko**, der Gecko.  
 —— **Salamandra**, der Salamander.

### P I S C E S V E N E N A T I.

**Tetradon ocelatus**, der gefleckte Stachelbauch.  
 —— **lineatus**, der gestrichelte Stachelbauch.  
**Trachinus Draco**, das Petermännchen.  
**Perca venenosa**, der Giftbarsch.  
**Raja Pastinaca**, der Pfeilschwanz.  
 —— **Torpedo**, der Krampffisch, der Zitterroche.  
**Gymnotus electricus**, der Zitteraal.  
**Sparus Pagurus**, die Sackflosse.

### V E N E N A E X M O R B O A N I M A L I S.

**Mytilus edulis venenatus**, die giftige Küchenmuschel.  
**Ostrea edulis venenatus**, die giftige Küchenauster,

- Ovum putridum, *gefaultes Ey.*  
 Pinguedo rancida, *ranzige Fette.*  
 Animal putridum, *faules Thierfleisch.*  
 Virus luis bovillæ, *Thierseuchengift.*  
 —— rabiosum, *tolles Hundsgift.*  
 —— variolosum, *Pockengift.*  
 —— morbillosum, *Maserngift.*  
 —— scarlatinum, *Scharlachgift.*  
 —— scabiosum, *Kräzengift.*  
 —— venereum, *Lustseuchengift.*  
 —— plicosum, *Wichtelzopfgift.*  
 —— cancrosum, *Krebsgift.*  
 —— leprosum, *Aussazgift.*  
 —— pestilentiale, *Pestgift.*  
 —— morborum putridorum, *Gift fauler Krankheiten.*





## DE VENENIS ANIMALIBUS GENERATIM.

---

Omne animal vel productum animale, quod corpori nostro ingestum vel externe applicatum mortem aut gravem saltem morbum causat, *venenum* dicitur *animale*.

Regnum animale paucissima suppetitat venena respectu regni vegetabilis & mineralis.

Dividi possunt venena animalia  
in *serpentes venenatos*.

- *Insecta venenata.*
- *Vermes venenatos.*
- *Amphybia venenata.*
- *Pisces venenatos &*
- *animalia ex morbo venenata.*

Ex serpentum classe, quorum *Immortalis LINNÆUS* 132 nobis descriptos dedit, solummodo 24 sunt veneno prædicti.

Omnes serpentes venenati ex ordine Crotalorum  
vel Colubrorum sunt. Nec *Boæ* nec *Angues*

nec *Amphisbænæ* nec *Cœciliæ* fatum dente minantur.

**NOSCUNTUR** serpentes venenati, quod in superiori mandibula præter dentes omnibus serpentibus communes adhuc 2 vel 3 longioribus, pro lumen serpenti exferendis vel retrahendis dentibus caninis, exiguo foramine pertusis, gaudеant. *Crotali* seu *Caudisonæ* præter hos dentes adhuc crepitaculo, quo cauda terminatur, instructæ deprehenduntur.

**VENENUM VIPERARUM** est humor flavus, nec acidus, nec alcalinus nec salinus; olei amygdalini consistentia gaudens, inodorus, pinguedinis recentis sapore præditus, qui in peculiaribus foliculis sub basi dentium caninorum locatis secretus, sub ipsum hominis vel animantium mortsum ex caninis viperæ dentibus gingiværum appressu effluit & vulneri infunditur.

**VIS NOXIA.** Venenum viperarum si degustetur, lingua non inflamat sed stupefacit; nec deglutitum noxam infert ventriculo, intestinis aut reliquo corpori, quod mirum at sanguini per vulnus inmixtum lethale est. \* Non ve-

\* Id veteres jam aliquatenus perspexisse ex *LUCANO L. IX. v. 517.* patet.

*Noxia serpentum est admisto sanguine pestis.*

*Morsu virus habent & fatum in dente minantur,  
Pocula morte carent.*

ro lethale est ipsis viperis a se ipso vel aliis demorsis. Etiam nervis, integumentis, muscularis, tendinibus applicatum innoxium est. Nec cuiuslibet animantium generi nocet. \*

**QUANTITAS** veneni, quæ ad necanda animalia requiritur pro animalis necandi magnitudine major, minorve requiritur.

**SYMPTOMATA** maxime consueta sunt partis demoræ dolor, intumescentia inflammatoria, emphysematosa, gangrænosa; anxietas & languor ingens, fitis, icterus, spasmi, vomitus, vomituritio, diarrhæa, tormina, ventris inflatio; leipothymia, pulsus debilis, intermittens, mors.

Ne vero genus animalium adeo exitiosum in homines cæteraque animantia nimium seviret, nimiumque sese multiplicaret, dedit Providus ac Beneficus **CREATOR** Indis *ichneumonem*; Americanis *suem*, Europæis *ciconiam*; quæ animalia noxios serpentes avidissime venantur atque sine noxa devorant.

**ANTIDOTA SERPENTUM** seu remedia *anticolubrina* dividuntur

\* Cel. F O N T A N A *Traité sur le vénin de la vipere, sur les poisons américains, sur le laurier — cerise.* Florence 1781. 2 Tomes. id variis experimentis solide demonstrat.

in *generalia*, quæ in omnium vel plurium falso  
tem viperarum veneno conveniunt.

— *specialia*, quæ in unius vel alterius vipes  
ræ morsu juvant, quodlibet enim vipes  
genus *distincto* instructum esse videtur viru.

Ad *generalia* pertinent

1. *Scarificatio* vulneris ope lanceolæ & *extra-*  
*ctio* sanguinis ope ventosæ.
  2. *Exsuctio* vulneris ope oris. \*
  3. *Elutio* vulneris ope muriæ vel urinæ.
  4. *Ligatura* partis supra locum vulneris.
  5. *Defossio* membra demorsi in terram.
  6. *Amputatio* membra demorsi.
  7. *Inspersio* pulveris cantharidum & applicatio  
emplastri vesicatorii ut suppuratio vulne-  
ris per 2 vel 3 hebdomades sustineatur. \*\*
  8. *Lac* & *oleum olivarum* magna copia po-  
tatum.
- 

\* Apud veteres Psylli, Lybiæ & Marsi, Italiz  
populi hominibus serpente ictis vulnus exfugendo  
mederi solebant. C E L S U S L. V. cap. 27. Sed cave  
ne ore ulcerofo id fiat.

\*\* Schwed. *Abhandlung* 40 Band p. 100. Ill.  
ACRELL duos recenset casus ægrorum colubro Cher-  
sea demororum, qui sola applicatione externa can-  
tharidum & usu interno lactis sanitati restituebantur.  
In cantharidum defectu inspersio tabaci vel salis cu-  
linaris vel aliis quid acris tentetur.

9. *Theriaca, Roob & infusum sambuei pro sudore movendo.*

**Ad** Anticolubrina *specifica* revocantur

1. *Radix Mungos.* Profuit in morsu *Najæ* & aliis colubris *Asiaticis*. Pulveris drachma una datur interne & externe aqua humectata vulneri applicatur. \*

2. *Radix Senegæ.* Est antidotum in *Crotalophoris* & *Colubris Americanis* nec non in *Chersea*. Americani radicem masticatam vulneri imponunt & grana 15 pulveris deglutiunt. \*\* Tentetur quid *Polygonalia vulgaris* & *amara* præstet, si *Polygonalia Senega* deest.

3. *Radix Serpentariæ virginianæ.* Succus deglutitus & simul vulneri applicatus mortum venenatissimi *Crotali*, Indis *Boiconinga* dicti, enervare fertur. \*\*\*

4. *Radix Aristolochiæ anguicidæ.* Gutta una vel altera serpentis ori instillata serpente adeo per tempus inebriat, ut impune tractari queat. Pluribus guttis deglutitis serpens sub convulsionibus moritur. Est circumforaneorum artificium, qui quæ-

\* *Cel. DARELL* *diff. de ligno colubrino.*

\*\* *Cel. KERNANDER* *diff. de Senega.* in *Ill. LINNÆI amœnit. acad. Vol. VI. p. 214.*

\*\*\* *Cel. GEOFFROY* *mat. med. T. 2. p. 248.*

Itus causa venenatos serpentes tractant, ut plebi spectaculum faciant. Odor radicis serpentibus tam ingratu, ut oblata modo radice auffugiant. Radix vulneri a serpente inficto imposita & simul interne usurpata morsus periculum avertere dicitur. \*

5. *Lignum colubrinum* &
6. *Ophioxylum serpentinum* similes ac *radix mungos* dicitur habere vires in morsu viperarum.
7. *Folia Fraxini*. In iectu Colubri *Cherseæ* & *Colubri Beri* specificie laudantur. *Externe* folia contusa loco læso applicantur. *Interne* 3ij succi foliorum cum vino expressorum bis in hora propinantur, donec symptomata remittant. \*\*
8. *Nux vomica* ad 3j bis de die data in Ceylona ut specificum contra morsum *Najæ* propinatur. \*\*\*
9. *Alcali volatile* tum *simplex*, ut spiritus salis ammoniaci, tum *succinatum*, ut spiritus salis ammoniaci succinatus lacteus, qui *Eau de luce* dicitur in morsu viperæ gal-

\* *Ill. de JACQUIN sel. Stirp. americ. p. 232.*

\*\* *Cel. MONTIN in Schwed. Abh. 26 Band.*

\*\*\* *Cel. LE GRAND in notis ad J. RIBEYRUS Histoire de l' Isle de Ceylon. p. 154.*

- licæ laudatur. \* Guttæ 10 interne dan-  
tur & aliquot vulneri instillantur.
10. Radix gentianæ luteæ &
11. Mercurius gummosus in morsu viperæ Ita-  
licæ laudantur. \*\*
12. Saccharum. In Cajenna contra morsum  
colubrorum interne & externe adhibent  
faccharum. \*\*\*
13. Sal culinare vulneri inspersum in Caudi-  
sonæ morsu profuisse fertur.
14. Oleum olivarum. Locus læsus sæpius de  
die super carbonibus ardentibus oleo inun-  
gatur & lavetur. Interne sæpius de die  
aliquot unciæ olei bibantur. \*\*\*\* Profuit  
oleum in morsu Beri & Presteris nihil ve-  
ro in Aspidis & Cherseæ morsu. An  
axungia viperarum & butyrum vaccinum  
loco olei olivarum in Bero & Prester  
idem præstat?
15. Radix vel folia belladonnæ, quæ generatim  
in morsu viperæ nuper laudata fuit. \*\*\*\*\*

\* Cel. CHARAS *experiences de la vipere*, &  
Cel. JUSSIEU in *Acad. des scienc.* 1747.

\*\* Cel. LAURENTI *synopsis reptilium emen-*  
*data* p. 210.

\*\*\* Ill. RICHTER *Ch. Biblioth.* 5 B. 2 St.  
p. 171.

\*\*\*\* Ill. MURRAY *app. med. Vol. II.* p. 48.

\*\*\*\*\* Ill. RICHTER *l. c.* 6 B. p. 169.

Ex his patet accerrima bella & dissensus authorum  
æternum de antidotis duraturos sola distinc-  
tione specierum serpentum componi posse.

---

## COLUBRI AMERICANI.

### CROTALUS HORRIDUS.

*CROTALUS horridus L. die Schauerschlange.*

**HABITAT** in America. Omnibus crotalis provida Natura crepitaculo caudam munivit; ut illius sonitu, dum serpens caudam agitat, admonitus quilibet tempestive fugiat a vicino ho-ste. Denique hic serpens suo fœtore aves, sciuros, aliaque minora animalia adeo stu-pefacit & consternit, ut in ejus prædam ex arboribus decidant, ac si fascinata essent.

**VIS NOXIA.** Est omnium crotalorum venenatissi-mus. Ab eo fauciati ingentem sentiunt dolorem; respiratio redditur difficilis, summa oritur anxietas, tussis, sputum cruentum: Pulsus fit durus, quandoque celer & debili-s. Vulnus inflammatur, dein sphacelescit. Totum demum corpus intumescit ac in putredinem cito abit. Quandoque intra 10 quandoque intra 5 minuta, sapius vero tardius mors sequitur.

ANTIDOTA hucusque tentata fuerunt radix *senega.*

*Lac.* *Spiritus salis ammoniaci.* \* *Sal culinare.* \*\*

Sues sunt crotalorum infensissimi hostes, hi totum serpentem excepto capite devorant. Tulus est itinerator, qui suem secum habet.

### CROTALUS MILIARIS.

*CROTALUS miliaris* L. der Schleiderschwanz.

HABITAT in Carolina.

### CROTALUS DRYINAS.

*CROTALUS Dryinas* L. die Ungezieferschlange.

HABITAT in America.

### CROTALUS DURISSUS.

*CROTALUS Durissus* L. der Klapperer.

HABITAT in America.

### CROTALUS MUTUS.

*CROTALUS mutus* L. der Stumpfenschwanz.

HABITAT Surinami.

\* *Journal de Medicine* T. 24. p. 533.

\*\* *Cel. LESKE med. Abhandl. aus den philosophischen Transaktionen* 5 Theil. Cel. GALE duos ægrotos candinosa morsos insperso sale culinari curavit.

VIS NOXIA hujus & præcedentium crotalorum eadem fere ac crotali horridi, hinc  
ANTIDOTA eadem.

### COLUBER ATROPOS.

*COLUBER Atropos L.* die *Giftschlange.*  
HABITAT in America.

### COLUBER LEBERIS.

*COLUBER Leberis L.* der *Schlangenbalg.*  
HABITAT in Canada.

### COLUBER DIPSAS.

*COLUBER Dipsas L.* die *Durstnatter.*  
HABITAT in America.

### COLUBER MYCTERICANS.

*COLUBER Mystericans L.* die *Rumpfnase.*  
HABITAT in America.

### COLUBER LACTEUS.

*COLUBER Lacteus L.* der *Milcher.*  
HABITAT in Indiis.

ANTIDOTA. In colubrorum Americanorum morsu eadem ac in crotalis Americanis tententur Antidota.

COLU-

✿ ( 33 ) ✿

## COLUBRI ASIATICI.

### COLUBER NAJA.

*COLUBER Naja L. die Brillenschlange.*

**HABITAT** in India orientali. Iratus in utroque certis latere cutem adinstar alæ, quæ maculam perspicillum referentem gerit, inflat.

**VIS NOXIA.** Est omnium colubrorum Asiaticorum venenatissimus. Nudipedes Indi nullum aliud serpentum genus adeo quam Najam timent. Homines a Naja demorsi subito anxietatem cordis & lipothymias patiuntur, neglectoque alexipharmaco convulsi moriuntur. Antidoto serius assumpto partis læsæ gangrænam, difficulter sanabilem raro effugient.

**ANTIDOTA** sunt radix *mungos*, externe & interne applicata. Inimicus summus Najæ est *Viverra Ichneumon*; hoc animal Najam ita sectatur ut felis apud nos murem.

### COLUBER SEVERUS.

*COLUBER severus L. die Japonesische Natter.*

**HABITAT** in Asia.

### COLUBER STOLATUS.

*COLUBER stolatus L. die Schleppennatter.*

**HABITAT** in Asia.

❀ ( 34 ) ❀  
**COLUBER ATROX.**

**COLUBER atrox** L. *der Tyrann.*

HABITAT in Asia.

**COLUBER CORALLINUS.**

**COLUBER corallinus** L. *die Corallennatter.*

HABITAT in Asia.

**COLUBER AMMODYTES.**

**COLUBER Ammodytes** L. *der Sandkriecher.*

HABITAT in Oriente.

**COLUBER LEBETINUS.**

**COLUBER lebetinus** L. *die Kupfernatter.*

HABITAT in Oriente.

ANTIDOTA. In omnibus Colubris Asiaticis præter  
antidota generalia radix *mungos* tentanda.

---

**COLUBRI AFRICANI.**

**COLUBER VIPERA.**

**COLUBER Vipera** L. *die Egyptische Vipernnat-  
ter. Aspis Cleopatræ.*

HABITAT in Aegypto. Cæde CLEOPATRÆ, novissi-  
mæ Aegypti Reginæ celebris. Inde quotan-  
nis accersita Romam pro confectione theriacæ.

✿ ( 35 ) ✿  
**C O L U B E R N I V E U S.**

**C O L U B E R** *niveus* L. die *Schneeschlange*.

HABITAT in Africa.

**C O L U B E R H A J E.**

**C O L U B E R** *Haje* L. die *Kropfnatter*.

HABITAT in Aegypto inferiore.

ANTIDOTA, tententur anticolubrina generalia & specialia.

---

**C O L U B R I E U R O P Æ I.**

**C O L U B E R B E R U S.**

**C O L U B E R** *Berus* L. die *Europäische Natter*. *Vipera Rhediana*.

HABITAT frequens in Europa. In Germania, Anglia, Italia.

VIS NOXIA. Pars demorsa cito intumescit, ingens languor, anxietas, cardialgia, & vomituritio cum totius corporis emphysematosa intumentia & leipothymiis mortem minantur.

ANTIDOTA, præter anticolubrina generalia folia *Fraxini*\* & *spiritus salis ammoniaci succinatus*

---

\* Cel. MONTIN in *Schwed.* Abh. 26 Theil plures Beri morfu læsos foliis fraxini sanatos refert.

*laſteus* ſeu *Eau de luce* \* laudatur. Axun-  
gia viperina & oleum olivarum in morſu Beri-  
nil juvarunt.

**VIRTUS MEDICATA.** In Germaniæ officinis eſt uſualis  
pro conficienda theriaca & jure viperino, quæ  
in virium defectu & variis morbis cutaneis  
laudantur.

### C O L U B E R P R E S T E R.

**C O L U B E R** *Preſter* L. die *ſchwarze Englische Natter*. *Vipera Anglicana*.

**HABITAT** in Europa ſeptentrionali præſertim in  
Anglia.

**VIS NOXIA** aliquantum minor, quam præcedentis.

**ANDITOTA.** *Oleum olivarum* ſpecifice laudatur.

**VIRTUS MEDICATA.** In Angliæ officinis adhibetur.

### C O L U B E R C H E R S E A.

**C O L U B E R** *Cherſea* L. die *ſchwedische Natter*,  
die *Eſping*. *Vipera ſuecica*.

**HABITAT** in Coryletis, aliisque fruticosiſ depreſſiſ  
Smoldaniæ, Scaniæ nec non in ipſo agro  
Upsaliensi.

**VIS NOXIA.** Morſus inducit ſymptomata teterima  
& mortem.

---

\* Cel. MARTIN in *Recueil périodique d' obſervation de Médecine* I. vi. p. 412.

**ANTIDOTA.** Post scarificationem vulneris & extractionem sanguinis inspergatur vulnus pulvere cantharidum atque tegatur emplastro vesicatorio, ut suppuratio per 2 vel 3 hebdomas sustineatur. Interne hauriatur magna quantitas lactis. \*. Alii radicem senegae \*\* & folia fraxini \*\*\* laudant. Oleum olivarum profuit nihil. In emphysemate totius corporis & febre gangrenosa optimum forsant erit corpus fimo equino fumante sufficienter tegre. Rustici suecici a chersea in digito manus vel pedis demorsi sibi digitum illico abscindunt.

---

\* *Illi. ACRELL in Schwed. Abhandl. 40 Band p. 99.* duos ægrotos chersea demorsos sola hac methodo nempe cantharidibus & lacte curavit.

\*\* *Illi. LINNÆUS amoenit. acad. vol. vi p. 214.* in itinere scanico occurrentem habuit feminam ab hac vipera demorsam, obtulit statim oleum olivarum in praescripta contra anglicam dosi. At infelix mulier rapta est. Adducit vero vir Illustris exemplum ancille suecicæ quæ alvi dejiciendæ causa ruri pone fruticem secedens a serpente quodam in ipsis muliebribus vulnerabatur. Hæc sub gravissimorum symptomatum fatellitio duabus dosibus senegæ convaluit. At non patet certo, an serpens hicce Berus vel Chersea fuit.

\*\*\* *Cel. MONTIN in Schwed. Abhandl. 26* foliis fraxini excelsioris chersea demorsum sanavit.

## COLUBER ASPIS.

**C O L U B E R A s p i s** L. die französische Natter. **Vipera gallica** seu Moysis CHARAS.

HABITAT in Gallia in Delphinatu in agro Lugdunensi & Pictaviensi.

VIS NOXIA præcedentis.

ANTIDOTA. Alcali volatile *simplex*, ut spiritus salis ammoniaci & *succinatum*, ut spiritus salis ammoniaci succinatus lacteus. Inde aliquot guttæ vulneri imponuntur & hoc linteolo spiritu imbuto tegitur. Interne guttæ 10 in aqua dantur. \* *Oleum olivarum* est in aspidi inefficax. \*\*

\* Cel. CHARAS in *experiences de la vipere* cali volatile primus proposuit. Id peculiari observatione confirmavit Cel. JUSSIEUR in *Acad. des sciences* 1747. Spiritum tartari fœtidum ABRAH. BOEK in *Aktis suecicis* 1748. efficacem deprehendit.

\*\* Cel. GEOFFROY & HUNAUD in numerosis experimentis coram Academia Parisiensi institutis oleum olivarum deprehenderunt inefficax at videtur quod Aspidem vel alium colubrum non vero Prestrem vel Berum adhibuerunt pro experimento. Cel. POUTEAU vero, qui in Gallia oleum olivarum cum successu in quatuor viperæ commorsis utile deprehendit, aliam forsitan viperæ speciem quam priores academici adhibuerunt.

## COLUBER ILLYRICUS.

**COLUBER illyricus.**\* *Die Illirische Natter. Vipera Italica.*

**HABITAT** in Illyriæ locis montofis maxime circa Castel de Duino.

**VIS NOXIA.** Teterima symptomata & mortem inducit.

**ANTIDOTA.** Radix gentianæ & mercurius gummosus censentur specifica. Potest unum vel utrumque mixtum adhiberi. Sequens formula in cuniculis & catulo a colubro demorsis efficacissima fuit deprehensa. Recipe mercurii vivi depuratissimi 3ʒ gummi arabici 3ij m. terantur invicem in mortario lapideo guttatum instillando aquæ fontanæ 3iij in mucum, cui adde extracti gentianæ 3ij sacchari albi 3ij m. fiat haustus pro una dosi. \*\*

## INSECTA VENENATA.

## FURIA INFERNALIS.

**FURIA infernalis** L. *der Tollwurm.* Est insectum

\* Cel. SCOPOLI in Anno V. p. 13. hunc colubrum sic definit: *Coluber scutis abdominalibus 177 & squammarum caudalium paribus 68.* hinc distinguitur a Col. Bero L. Videtur esse *vipera illyrica* Cel. LAURETI, vide ejusdem *specimen reptilium* p. 101.

\*\* Cel. LAURENTI l. c. p. 210.

lineam ciliatam, vix duas lineas longam referens. \*

**HABITAT** in Bothniæ, Sueciæ septentrionalibus vastis paludibus cæspitosis.

**VIS NOXIA.** Hoc insectum in Suecia a solsticio æstivali ad hyemale usque ex ære delabitur & momento citius tum in hominum tum in jumentorum corpora penetrat, atque tam diros excitat dolores, ut miseri homines quandoque intra horæ quadrantem pereant. Dantur tamen qui diutius durant. Cognoscitur locus ex stigmate exiguo, fusco, dolentissimo.

**ANTIDOTA.** Fenones lac recenter coagulatum parti vulneratæ imponunt, sic dolor remittit & insectum foras prorumpit: Alii cultro locum incidunt, & animal extrahunt. An inspersio cantharidum, vel sublimati non juvaret? Inspersio salis ammoniaci cum pulvere tabaci & loci affecti punctura ope acus ab aliis laudatur. \*\*

### C A N T H A R I S.

*M E L O E vesicatorius* L. Spanische Fliege.

*O D O R* teterimus piceus. *S A P O R* acris, piceus.

\* *Nova Acta Upsaliensia. Vol. I. p. 44. Furia infernalis & ab ea concitari solitus morbus descripta a D. SOLANDER.*

\*\* *Ill. BALDINGER neues Magazin 3 Band I St. p. 73.*

**VIS NOXIA.** Cantharides interne majori dōsi datæ non solum ventriculum, hepar & intestina inflammant, sed princeps earum vis in vias urinarias agit, unde præter vomitum & dysenteriam torminosam striis sanguineis notatam, immensosque dolores ventriculi, præcordiorum & hypochondrii dextri, sitim, saporem picetum etiam penis ęrectio molesta, libido immoderata seu insatiabile coeundi desiderium, stranguria, ischuria, mictus cruentus, inflammatio remum, vesicæ, penis & tandem his ipsis in partibus gangræna, quam mentis alienatio & mors sequitur,

**ANTIDOTA.** Cantharides adhuc in ventriculo residentes emetico & ex intestinis purgante antiphlogistico eliminantur. Simul symptomata lacte, emulsione, oleo, mucilagineo decocto ex salep, hordeo, malva, althæa, jusculis pinguibus, ovis sorbilibus, clyismaibus & injectionibus mucilagineis, oleofis, lacteis compescantur. Præsertim vero ut antidotum specificum laudatur *camphora*, quæ in lacte vel emulsione cum gummi arabico danda.

**VIRTUS MEDICATA.** Usus *internus* cantharidum in hydrophobia, epilepsia, tussi convulsiva,

\* Cel. STOCKAR a NEVFORN diss. de usu cantharidum interno. GOETTINGÆ 1781.

• morbis cutaneis, hydrope, menostasia, lithiasi, enuresi, ischuria renali, ischuria vesicæ paralytica; diabete, gonorrhœa habituali, typho nervoso \* anaphrodisia. Sed abstine a cantharidibus, si febris, inflammatio vel plethora hos morbus causet vel comitetur. \*\*

**DOSIS.** *Pulveris* granum unum datur in bolo. *Tinctura cantharidum* a guttis x ad xxx bis de die cum syrupo altheæ vel mucilagine gummi arabici vel emulsione amygdalina exhibetur, quæ formula commodissima est.

**EMPLASTRUM VESICATORIUM** laudatur in morbis febris absente febre, plethora & inflammatione sanguinea, ut cephalalgia, apoplexia, paralysi præcipue hemiplexia, epilepsia, vertigine, mania, ophthalmia, amaurosi, morbis aurium, rheumatismo, dolore arthritico vero, podagra, astmate, tussi, incontinentia urinæ \*\*\* ischuria renali. \*\*\*\*

**De usu cantharidum chirurgico** vide *Pharmacologiam chirurgicam*.

---

\* *Cel. HOME Clinische Versuche* p. 21.

\*\* *Cel. STOCKAR l. c.*

\*\*\* *Cel. TRALLES usus vesicantium salubris & noxiis in morborum medela. Vratislaviae 1783. 2 volumina.*

\*\*\*\* *Samml. für Aerzte 3 B. 3 St. p. 453.*

## M E L O E M A J A L I S.

*M E L O E majalis* L. der *Mayenwurmkäfer*.

HABITAT in campis apricis.

VIS NOXIA. Meloe majalis puero 6 annorum propinatus, mortem inducebat, antegressa summa anxietate, doloribus colicis, convolutionibus, hæmorrhagia narium, mictu cruento, sanguinis denique excretione per alvum & cutis poros. \*

ANTIDOTA præcedentis.

VIRTUS MEDICATA. In morsu canis rabidi ad hydrophobiam avertendam censetur specificus.

## M E L O E P R O S C A R A B Æ U S.

*M E L O E proscarabæus* L. der *Zwitterkäfer*.

HABITAT in campis apricis.

ODOR nullus; SAPOR acris.

VIS NOXIA præcedentis.

ANTIDOTA eadem.

VIRTUS medicata antihydrophobica. \*\* Vermes mente Majo colligendi, ea cum cautela, ut for-

\* Göttinger gelehrte Anzeigen 1778. Zug. 46 St.

\*\* Illustre collegium Medicum Berolinense Anno 1777 jussu REGIS AUGUSTISSIMI publicavit remedium contra rabiem caninam, quod Ipse emerat a rustico Silesiensi. *Meloe proscarabæus* & *Meloe majalis* L.

cipula, leviter absque pressione, ne exsudans mucilago perdatur, capti, statim ollæ vel vitro melle aliquantum repleto, postea bene obturando, immittatur.

**Dosis.** Adultis omni hora unum granum hujus infecti cum aliquot granis nitri contriti datur. Continuetur hoc medicamentum, donec urina stranguriosa vel cruenta evadit, simul decompositum mucilaginosum defuper hauriatur. \*

### SCORPIO AFFRICANUS.

**SCORPIO maurus L.** der *Affikanische Scorpion.*

**HABITAT** in Affrica.

**VIS NOXIA.** Ejus ictum gravissima symptomata, mortemque causare itineratores referunt. Scorpionem vero *europœum* esse innoxium experimentis demonstratum est. \*\* Hinc symptomata ab ictu europæi illata vel a terrore vel ab ictu grandioris cuiusdam nervi esse videntur.

principem hujus antidoti virtutem continent. Dolendum, hoc remedium non ea simplicitate gaudere, quæ in specifico desideratur, nec plumbum, quod in ejus compositionem intrat ad usum internum tutum videtur. Vide *Ill. MURRAY med. pract. Biblioth.* p. 640.

\* *Cl. DEHNKE Etwas über und wider den tollen Hundsbiss* 1782. p. 68. dicit solo hoc infecto interne dato sex homines a cane rabido morsos curasse.

\*\* *Cel. MAUPERTUIS in Academie des sciences* 1731.

**ANTIDOTUM** esse dicitur *oleum scorpionum* externe applicatum.

**VIRTUS MEDICATA.** Hoc oleum in dolore nephriticō & suppressione urinæ illinitur lumbis, perinæo, pubi.

### PHALANGIUM ARANEODES.

*PHALANGIUM araneodes* L. die *Scorpionenspinne*.

HABITAT in Asia & Russia.

**VIS NOXIA.** Morsi, præ dolore perpetim clamant, delirant, dein aphonia, risu sordonio & æstu afficiuntur. Pars demorsa præsertim facies vulnerati, intumescit, rubet, livescit & quidam intra biduum vel triduum moriuntur. \*

**ANTIDOTA.** Plurimi intra aliquot dies evadunt, si vulnus theriaca tegitur, & idem hoc remedium interne detur.

### CULEX LANIO.

*CULEX Lanio* L. die *Viehtödende Mücke*. Die giftige Beissfliege.

HABITAT in Russia, in Bannatu Temeswariensi.

**VIS NOXIA.** Morsu magnum tuberculum excitat. Minimæ hæ muscæ copiosissimæ hominum & animalium intrant anum, narres, fauces, pulmones, quos inflammatione afficiunt, & sic mortem inferunt. \*\*

\* Neue Nordische Beyträge. 2 Band p. 346.

\*\* Loco mox citato. p. 349.

**ANTIDOTA.** Viatores caput reti oleo betulino inundato tegunt, hujus olei odor etiam his insectis est infestus.

### SIREX GIGAS.

*SIREX Gigas L. die größte Holzweisse.*

**VIS NOXIA.** Hominibus & brutis suo ictu tuberculum causat, quod intra 24 vel 48 horas mortem infert, ni tuberculum illico exscindatur, ut virus excitata suppuratione larga effluere possit. \*

### PUPRESTIS.

*PUPRESTIS L. der Stinkkäfer.*

**VIS NOXIA.** Deglutitum infectum mortem induxit. \*\*  
Etiam boves aliaque animalia ab hoc deglutito rapiuntur. Est enim hujus acrimonia cantharidi similis.

**ANTIDOTUM.** Oleum, vomitorium.

### ARANEA DOMESTICA.

*ARANEA domestica L. die Hauss-Spinnerin.*

**HABITAT** in fenestris domuum non diligenter purgatarum.

\* Cel. GLASER von der Knottenkrankheit unter dem Rindvieh. Leipzig 1781.

\*\* Cel. MONTI medicinische Dictata. p. 24.

**VIS NOXIA.** Araneæ punctura inflammationem cau-  
fare dicitur. Nondum vero experimentis fide  
dignis evictum araneas cum cibo vel potu  
deglutitas venenata causasse symptomata.

**ANTIDOTA.** Inflammatio ab araneæ punctura spiritu  
falis ammoniaci aut effentia castorei illinita  
fanatur.

**VIRTUS MEDICATA.** Plebs tela araneæ sanguinem e  
vulnere fistere & fumo telæ accensæ hæmorr-  
hoides dolentes dissipare sibi solet.

### ARANEA TARANTULA.

*ARANEA Tarantula L. die Tarantel.*

**HABITAT** in Italia imprimis in Apulia, Barbarie,  
Oriente.

**VIS NOXIA.** Romæ capta experimenta cum ta-  
rantulis docent horum morsum excitare do-  
lorem, dein tumorem liveſcentem, paucis  
post diebus crusta nigricante obſitum; acce-  
dit ſomnolentia, cardialgia vel cordis oppref-  
ſio & dein dolores in ſingulis corporis articu-  
lis; fed nunquam saltandi vel neceſſitas vel  
eupiditas demorſos incessit.

**TARANTISMUS** eſt morbus in Apulia endemicus, cu-  
juſ præcipuum ſymptoma eſt inexplibilis fal-  
tandi aut choreas agendi cupiditas. Taran-  
tatorum plurimi fatentur ſe a nulla tarantula

demorsos unquam fuisse, quantum meminerint.

**ANTIDOTA.** *Interne* dentur diaphoretica. *Externe* applicetur spiritus salis ammoniaci.

### PULEX PENETRANS seu AMERICANUS.

*PULEX penetrans L. der amerikanische Flohe.*

**HABITAT** in America.

**VIS NOXIA.** Hoc insectum in America degens vix conspicuum est, cutim peregrinantum maxime in cruribus subit, imo quandoque sub unguibus in cutem penetrat. Intra aliquot dies sub epidermide magnitudinem pisí acquirit & partem obseßam subinde ad ossa usque erodit, ideo venenatus a quibusdam censemur.

**ANTIDOTA.** Cūratio exigit, ut infecta hæc quotidie ope cultri acuti ex cute evellantur & lœsus cinere tabaci combusti inspergatur. Ubi vero totum crus his insectis obsidetur, limentum oleo picis intinctum applicari debet, hoc remedio hæc infecta cito separantur.

\* *Ill. SAUVAGES Nosol. T. 2. p. 229. & Cel. BüSCHINGS Nachrichten von der Tarantel, welche zur gänzlichen Vertilgung des Vorurtheils von der Schädlichkeit des Bisses und der Heilung desselben durch die Musik hinlänglich sind. Berlin 1782.*

## CULEX PIPIENS.

*CULEX pipiens L. der Musqueton.*

HABITAT in America & in Europæ locis aquœfis.

VIS NOXIA. Ictus causat tuberculum dolentissimum. Advenis in Americanam primo anno tot quot ictus oriuntur tubercula; altero autem anno vix amplius ictus nocent. \*

ANTIDOTA, theriaca, spiritus salis ammoniaci.

## CULEX PULICARIS.

*CULEX PULICARIS L. die Flochmücke.*

HABITAT in America.

VIS NOXIA. Ictus rûbicundam, ardentissimam maculam cum tumore infert, diu quandoque durantem. \*\*

ANTIDOTA præcedentis.

## APIS MELLIFICA.

*APIS mellifica L. die Biene.*

HABITAT in Europæ arboribus éavis, frequentius culta hospitatur in apiariis.

VIS NOXIA. Aculeo venenato pungens infert tuberculum rubrum admodum pruriens. Puer ab agmine apum demorsus pessima febre inflammatoria corripiebatur.

\* Cel. SCHOPPF von der Wirkung des Mohnsafts in der Lustseuche. Erlang. 1781. p. 47.

\*\* Schwed. Abh. 34 Th. p. 352.

ANTIDOTA. Applicatione aquæ frigidæ vel aceti curatur, extracto prius aculeo cuti infixo.

### V E S P A V U L G A R I S.

*VESPA vulgaris* L. die *Wespe*.

HABITAT in Europa frequens sub tectis.

VIS NOXIA. Vesparum aculeus guttulam liquidi cuiusdam minimam vulnusculo instillat. Pars demorsa paucas intra horas erysipelatoso tumore afficitur. \*

ANTIDOTA. Applicatio aquæ frigidæ vel vegeto-mineralis.

### V E S P A C R A B R O.

*VESPA Crabro* L. die *Hornisse*.

HABITAT in Europæ arboribus cavis seu sub earum radicibus.

VIS NOXIA præcedentis.

ANTIDOTA præcedentis.

## V E R M E S V E N E N A T I.

### G O R D I U S M E D I N E N S I S.

*GORDIUS medinensis* L. der *Hautwurm*. *Vena medinensis Arabum* seu *Dracunculus Persarum*. \*\*

\* Cel. FRIZE medicinische Annalen 1 B. p. 265.

\*\* Cel. GRUNER de *vena medinensi Arabum* in Actis Academ. Moguntinae quæ Erforti est. an. 1777.

HABITAT in utraque India frequens in rore matutino.

VIS NOXIA. Est vermis non solum circa Medinam & in Persia sed etiam in omnibus æstuosarum regionum lacubus obvius. In hominum cutem inter lavandum vel ambulandum in aqua lacustri se insinuare solet. Frequentissime crura & scrotum occupat. Hic vermis saepe ad plurium pedum longitudinem in tela cellulosa hominis, quem afficit, increscit, musculorum tractus sequi amat, subinde, quod pejus est, ossa serpentis adinstar amplectitur. Modo unus, modo plures adesse deprehenduntur.

Hic vermis per annum in corpore latitat & præter dolorem loci affecti nullum incomodum facit. Non raro autem tumorem rubentem cum febre plurium dierum, quæ nuncia est prodituri vermis, excitat. Exsurgit demum in tumore vesica pellucida vel nigricans, ex qua rupta profilit rostellum vermis, qui sensim magis erumpit, & ita extrahi paullatim potest.

ANTIDOTA. Curatio exigit, ut tumor cataplasmate lacteo emolliatur, dein ut erumpentis vermis portio circa ligulam rotetur, sic intra 10 circiter dies totus vermis, cavendo ne rumpatur, extrahi potest. Ulcus extracto verme at aliud curatur.

Enormis vermis longitudo, tarda maturatio, implicatio vermis circa ossa vel musculos, vermis ruptura curationem longiorem & difficiliorem reddunt, Alii mercurium laudant. \*

### GORDIUS MARINUS.

*GORDIUS marinus L. der Seewurm.*

HABITAT in maris Norvegici piscibus, frequentissimus in visceribus Clupeæ Halecis intra pustulam residet.

VIS NOXIA. Piscatorum Norvegicorum lepra ab esu horum piscium oriri creditur. \*\*

### HIRUDO VENENATUS.

*HIRUDO medicinalis L. der Blutigel.*

HABITAT in aquis dulcibus.

VIS NOXIA. Hirudo medicinalis ex palude impura captus ac cuti applicatus dolorem inflammationemque causat. \*\*\* Cum aqua deglutitus hirudo etiam si ex aqua pura haustus sanguinem e ventriculo fugens vomitum cruentum, & inflammationem ventriculi inferre posse creditur.

ANTIDOTA. Haustus salis culinaris, olei.

\* Ill. RICHTER Chir. Bibl. 5 B. 2 St. p. 171.

\*\* Ill. LINNE diss. de lepra. Vide amoenitat. academ.

\*\*\* Cel. SCHMUKER vermischte Schriften 1 B. p. 86.

⁂ ( 53 ) ⁂  
**TETHYS MARINA.**

**TETHYS marina** L. der Meerhase *lepus marinus*,  
Est vermis mollusca,

**HABITAT** in mari mediterraneo.

**VIS NOXIA.** Gravidis & hystericis ob foetorem infesta dicitur esse. At peculiare venenum ut quidam opinantur, alere non videtur. \*

**URTICÁ MARINA.**

**MEDUSA æquorea** L. die Seenessel, Die Qualle.

**HABITAT** in mari.

**VIS NOXIA.** Est zoophytum gelatinosum, aquæ marinæ innatans, rubellum, quod intensam oculis & manibus tangentibus uredinem & pruriginem excitat, non secus ac urtica vegetabilis, unde vulgo *urtica marina* vocatur.

**ANTIDOTA.** Spiritus salis ammoniaci, oleum, aqua frigida,

---

**AMPHYBIA VENENATA.**

**RANA BUFO.**

**RANA Bufo** L. die Kröte,

**HABITAT** in Europæ locis nemorosis & ruderatis umbrosis.

---

\* Cel. GMELIN T. 3. p. 266. VESPASIANUM hoc verme fuisse enecatum vero simile non esse dicit.

**VIS NOXIA.** Urina & succus lactescens verrucarum dorsalium censemur acris atque venenatus. Caro autem bufonum saepe loco ranarum esculentiarum absque noxa comedebatur. \*

ANTIDOTA præcedentis.

### LACERTA GEKO.

*LACERTA Geko* L. der Gecko.

HABITAT frequens in Indiis, etiam in domibus.

**VIS NOXIA.** Pedibus exhalare venenum in esculenta, super quibus repit, & Javanos saliva hujus lacertæ sua tela inficere fertur.

ANTIDOTA præcedentis.

### LACERTA SALAMANDRA.

*LACERTA Salamandra* L. der Salamander.

HABITAT in Europa australiori.

**VIS NOXIA.** Hoc animal venenatum non esse experimenta docuere. \*\*

Salamandram in igne vivere antiquitus fe-rebatur, at animal e poroso suo corpore lacfundit, quod igne in formam perlæ indurat, quo mors aliquo tempore arcetur.

\* *Ill. SPIELMANN mat. med.*

\*\* *Cel. MAUPERTUIS in Academie des sciences.*

## PISCES VENENATI.

### TETRADON OCELLATUS.

**TETRADON** *ocellatus* L. der gefleckte Stachelbauch.

HABITAT in Asiæ & Aegypti aquis dulcibus.

VIS NOXIA. Caro est venenata. Venenum pisces acuitur ramulo Illicii decoctioni pisces addito, quo nefando artificio multi sibi mortem accelerare dicuntur. \*

ANTIDOTUM. Vomitoria. Dein detur rex amaroris. \*\*

### TETRADON LINEATUS.

**TETRADON** *lineatus* L. der gestrichelte Stachelbauch.

HABITAT in Nilo,

VIS NOXIA. Carnis esus est noxius. Aculei abdominis censentur venenati, pungunt urticatione in gangrænam abeunte, si cura negligatur,

ANTIDOTUM præcedentis.

### TRACHINUS DRACO.

**TRACHINUS** *Draco* L. das Petermännchen.

HABITAT in Oceano septentrionali.

\* Ill. MURRAY app. medicam. T. 3. p. 564.

\*\* Cel. RUMPF T. 2. p. 49.

**VIS NOXIA.** Piscis hujus spinas dorsales puncturas venenatas inferre scribitur. \*

### PERCA VENENOSA.

**PERCA** *venenosa* L. der Giftbarsh.

**HABITAT** in America.

**VIS NOXIA.** Caro in Anglia censetur venenata.

**ANTIDOTA.** Vomitorium, succus citri.

### RAJA PASTINACA.

**RAJA** *Pastinaca* L. der Pfeilschwanz.

**HABITAT** in Europa.

**VIS NOXIA.** Hic piscis, fato *Ulyssis* infamis, caudæ aculeo venenato vulnus difficillimæ sanationis inducere dicitur.

### RAJA TORPEDO.

**RAJA** *Torpedo* L. der Krampffisch, der Zitterroche.

**HABITAT** in mari mediterraneo sinus Persici.

**VIS NOXIA.** Si quis manu pescem tangit, ingenti stupore brachii afficitur.

### GYMNOTUS ELECTRICUS.

**GYMNOTUS** *electricus* L. der Zitteraal.

\* Cel. BARTHOL. *Acta Hafniens.* Vol. 3. obs. 48.

**HABITAT** in S. amo aliisque Americæ meridionalis ostiis niviorum.

**VIS NOXIA.** Qui hunc pisces manu vel baculo præsertim cuius manubrium metallicum est, tangit, ingenti percussione dolorifica ab exente fulmine electrico afficitur. Imo a majori pisce & cuius vis electrica non ab iterato tactu fuit debilitata homo tangens prosterni solet. Hoc pisce in scapho constituto, digito aquæ immisso per 15 pedes sentitur tremor, hinc natantes a tactu pisces vel aquæ eum circumdantis commotione electrica percussi submergi possunt. Si quis piscom cera sigillatoria tangit, nullam subit percussionem brachii. Eius carnis ejus censetur suspectus.

### SPARUS PAGURUS.

*SPARUS Pagurus L. die Sackflosse.*

**HABITAT** in oceano.

**VIS NOXIA.** Censetur venenatus. \*

**ANTIDOTA.** Emeticum, succus citri.

## VENENA EX MORBO ANIMALIS.

### MYTILUS VENENATUS.

*Mytilus edulis L. die Küchenmuschel.*

\* *Philosophical Transactionis Vol. 65. p. 544.*  
Cet. ANDERSON de piscibus venenatis in mari australi.

HABITAT in oceano.

VIS NOXIA. Mytili quandoque ex morbo, qui omnibus testaceis communis est, evadunt venenati, hi comesti anxietatem, convulsionem, tremorem, capitis intumescentiam, maculas in cute efflorescentes, delirium & febrem producunt,

ANTIDOTA sunt acetum, succus citri, piper præmisso vomitorio. \* Mytili recentes in aqua salita per horam retenti tuto in cibum adhiberi possunt. \*\*

### OSTREA VENENATA.

*Ostrea edulis L. Auster.*

HABITAT in oceano europæo.

VIS NOXIA. Ostreæ eo tempore, quo ova pariunt, innumeris vermiculis rubicundis replentur & summe nocent in cibum adhibitæ.

ANTIDOTA præcedentis.

### OVUM PUTRIDUM.

*Ovum gallinæ domesticæ L. putrefscens, gefau'tes Ey.*

VIS NOXIA. Ova antiqua ut plurimum partim inania & subputrida sunt, hinc pravi odoris & saporis. Si valde putreficiunt, vomituri-

\* Gothaische Gel. Zeitung. 1782. p. 6.

\*\* Cel. SCHERFF Anzeige der Rettungsmit. p. 206.

onem, diarrhoeam, tormina, anxietates, horripilationem & febrem putridam producunt.

**ANTIDOTA** præmisso vomitorio dentur acida, antiseptica.

### PINGUEDO RANCIDA.

*PINGUEDO rancida, ranzige Fette*

**VIS NOXIA.** Rancefrens pinguedo ventriculo ingesta in primis viis pyrozin, cardialgiam, colicam, febrem ardentem causat. \*

**ANTIDOTA.** Evacuantia, saccharum, aër fixus, magnesia aërata.

### ANIMAL PUTRIDUM.

*ANIMAL putridum, faules Thierfleisch.*

**VIS NOXIA.** Nihil potentius humores nostros corrumpit quam putrilago ventriculo vel vulneri ingesta. Cibus putridus nauseam, vomiturationem, virium prostrationem, irritabilitatis deletionem, febrem putridam causat, *Tungsi* & *Baratti* sagittas suas putrida avis carne inficiunt. Lympha scorbutica in ventrem effusa adeo acris fuit, ut chirurgorum digitos excoriaret. \*\*

**ANTIDOTA.** Ingesta putrilago vomitorio excutiatur, dein acida, antiseptica.

\* *Ill. GAUBII institut. pathol.* p. 320.

\*\* *Memoires de l'academ. des sciences.* 1699.

## MIASMA LUIS BOVILLÆ.

**E**st virus, quod luem bovillam generat. *Thierseuchen Gift.*

**V**IS NOXIA. Homines interdum sub inculta pecorum ægrotantium medicatione vel a detractione pellis mortuorum, imo etiam coriarios alutam e pellibus demortuorum animalium fabricantes inficit & febrem putrido-inflammatoriam cum bullis ichorosis aut papulis nigris, partem cui insident, valde inflammantibus excitat.

**A**NTIDOTA. Interne præmissis purgantibus *Elixir Hierneri* detur. Loca inflamma ta cespite vivo contegi debent.

## VIRUS RABIOSUM.

**E**st venenum sui generis quod in animalibus præfertim canibus a causa adhuc ignota quandoque nascitur. *Hundswuth gift.*

Solummodo genus caninum animalium sua sponte rabiosum fit, homo & reliqua animantia sola communicatione virus inficiuntur.

---

\* *Asta Holm.* 1764. & *Ill. HARTMANN sciagraphia morborum.* *Aboæ* 1779. p. 140. &c. Rusticus quidam in suecia bono cum successu defodit boves & equos ægrotantes in terram levem & solutam, arenaque vel humo texit, quo facto animalia intra pau cas horas convalescere dicuntur.

**C**AUSÆ, quæ rabiem canibus inducunt notidum certò cognitæ. Per magnus aëris calor vel frigus, aut horum subitanea vicissitudo. Esus carnium putridarum, potus aquæ corruptæ; famæ, sitisque diu tolerata; potulentoram fervidorum aut gelidorum æstuante corpore ingurgitatio; cursus velocissimus diu continuatus. Salacitas nimia; coitus petulantior aut in cœstro venereo prohibitus. Ira nimis commota, vel tristitia canis valida pro causa assignantur.

Male accusantur vermes, hi enim frēquentissime in cadaveribus canum etiam non rabiosorum reperiuntur.\* Nec *vermiculus sublingualis* (qti tendinosa, muscularis vicina, ope telæ cellulosæ adnexa substantia est, qua longa & tenuis canum lingua firmari & in motibus adjuvari videtur\*\*) catulis non exemptus rabiei causa statui potest. Hac enim substantia dudum exsecta rabies tamen observata legitur.\*\*\*

**SIGNA CANIS RABIDI.** Nascente in canibus rabie sequentia signa se offerunt.\*\*\*\* Tristitia, cibi

\* Ill. VAN SWIETEN in comment. §. 1134.

\*\* Cel. MORGAGNI Epistol. 8. n. 35.

\*\*\* Cel. JAMES treatise on canine madness.

p. 202.

\*\*\*\* Cel. UIBERLACHER diss. de hydrophobia. Vienna 1783. p. 13.

potusque inappetentia, tardus segnisque vocante hero accessus; fuga hominum atque amor solitudinis latebrarumque; murmuratio, ululatus, nullus autem latratus; ingressus languidus subtitubans, caput somnolentum, nutans, aures, caudaque demissæ, oculi tristes, lachrymosi; nares mucō madidæ, stillantes, os apertum, lingua sordibus obducta. Hic *primus* est mali *gradus*, ex quo autem rabies certo prædici nequit, cum eadem symptoma-ta etiam in aliis canum morbis obseruentur.

Ex *secundo* autem rabiei *gradu* certior hau-ritur diagnosis. Hac subeunte canis omnem cibum, maxime autem potum aversatur, vo-cem quamcunque non percipit, neminem ne herum quidem suum amplius cognoscit, oculos nunc flammeos, trucesque contendit rotative, inquietus est, accessuros indignatur, acceden-tes autem mordet; emaciatur, improbe ma-sticat, ore hiante spumat, linguam sordidam, plumbeamque exferit, anhelat, aquam & om-ne aquosum horret, domicilium, qua data porta fugit; profugus contentis oculis, de-missa cauda celerrime & recta plerumque via decurrit; amni vel fluvio si forte occurrit, territus terga vertit, obvia quæque plerum-que invadit, mordet; canes, a quibus odo-ratu procul certissime noscitur, suinmo ter-rore incusso in fugam conjicit; viribus fractis,

vacillans, somnolenti, ebriive instar incedit, consumptis collabitur; collapsus quasi terræ affixus jacet, raro resurgent & membra resoluta trahit, convellitur, moritur.

Alter hicce gradus raro in diem tertium, rarissime in quartum & saepe vix per triginta horas fertur.

Enarrata rabiei phœnomena sunt symptoma *febris acutæ nervosæ* seu febris symptomatibus mere nervosis stipatæ.

Si contingat, ut de rabie canis occisi vel mortui dubitetur, tunc frustum carnis elixæ, quod gingivis & ori canis mortui bene affrictum fuit, cani sano offeratur; hic cum clamore carnem oblatam repudiare, si canis mortuus rabidus fuit, sin minus avide comedere dicitur. Cum autem canes, quidquid cadarer caninum olet, nisi fame coacti respuere soleant, hinc alii micam panis vulneri inflito imponunt, inde eam gallinæ propinant, quæ panem vel repudiare vel ab ejus esu rabis fieri dicitur, si canis rabie laboravit.

MODUS, quo rabies canum & rabiei communicatio præcaveri possit, exigit

1. ut canum non absolute necessariorum numerus imminuat.
2. — causæ rabiei a canibus removeantur.

3. — canis rabidus in via occurrens oxyssime occidatur, & rabiōsi canis domuncula & quidquid ejus saliva contaminari potuit, igni sub dio excitato committatur.

4. — canis cuius valetudo suspecta est, includatur, & si rabie incipiente affectus videntur, variis remediis antihydrophobicis propinatis tentamina fiant a peritis medicis vel chirurgis, ut virtus horum remedium certior reddatur.

5. Homo autem ab animale rabido demorsus illico vulnus aqua salita, urinave probe eluat, cepam discissam applicet, aut ferro ignito urat & ad medicum vel chirurgum peritum confugiat.

MODI, quibus virus rabiosum homini communicari potest, sunt.

1. *morsu* vel levissimo etiam animalis vel hominis rabidi.

2. *osculo*, quo saliva venenata hominis fani ori ingeritur.

3. *lambitu* corporis venenata saliva etiam dum exsiccata infecti.

4. *Adspersione* salivæ venenatæ ad cutim nudam, nisi illico abluatur.

SEDES VENENI in sola saliva esse videtur. Indubius enim observatis constat, carnem, lac, sanguinem animalis rabidi assumi; cutem hydrophobos.

phoborum etiam sudore madentem tangi, cadavera hydrophoborum aperiri, vulnera instrumento, quo animal rabiosum occisum fuit, infligi; coitum denique celebrari posse, quin hydrophobia subsequatur. \*

**TEMPUS**, intra quod *actuosum* fieri virus communicatum incipit, varium est. Nunquam ante primum, raro ante tertium, saepe circa octavum, saepissime circa *quadragesimum* a veneno suscepto diem hydrophobia comparet. Subinde post plures menses imo annos inopinatè erumpit. Eo citius comparet, quo vulnus inflictum glandulis salivalibus proprius est; hinc citius a vulnera faciei, tardius a vulnera artuum. Si canis saliva sub morsu vestiti detersa inhæret, adeo, ut dens solus & detersus mordeat, nulla infectio contingit. Accessu causarum excitantium malum citius erumpit.

**SIGNA RABIEI IN HOMINE.** Vulnera cane rabido inficta ut plurimum cito & facile sua sponte consolidantur. Dum vero virus communicatum actuosum fieri incipit, plerumque in parte demorsa prima signa comparent. Vulneris consolidati cicatrix prurit, dolet, ardet, rubet, hinc inde elevatur, aspera & inæqualis

---

\* Cel. UIBERLACHER l. c. authores hujus sententia allegat.

fit, s<sup>æ</sup>p<sup>e</sup> etiam dehiscit, & rubellam, atram-  
ve fœtentem, acrem saniem stillat, carnem  
quasi fungosam & corrupto sanguine farctam,  
labia autem retorida exhibit; ambitus intu-  
mescit & mollescit. Simili modo vulnus con-  
tagio acturo nondum cicatrificatum mutatur. Si  
cuidam parti absque vulnere virus communi-  
catum fuit, hæc dolere & rubere incipit.  
Circa locum demorsum & vicinia dolores pun-  
gentes, pressorii, vagi, quasi rheumatici per-  
cipiuntur, qui deinde trium, quartuorve di-  
erum spatio ad caput usque ascendunt, ver-  
tiginem faciunt & hydrophobiam brevi secu-  
ram nunciant. Tunc sequitur.

Lassitudo, gravitas, mœstitia; amor soli-  
tudinis, inquietudo, frequens leipothymia;  
suspiria; anxietas; pectoris constrictio; respi-  
ratio difficilis; vox interrupta, tremula, mox  
acuta, mox gravis; faucium angustatio; inap-  
petentia; colica; alvus inordinata; urina  
aquosa aut sponte fluens, aut difficilime mit-  
tenda; cutis sicca, aspera; facies pallida con-  
tracta; frigus continuum, muscularum tremor,  
maxillæ inferioris motitatio, aut ad superi-  
orem arcta appressio; somnus inquietus, in-  
somniis horrendis, convulsione, rigore aut ca-  
lore febrili turbatus; pulsus aut immutatus,  
aut debilis, parvus, inæqualis, intermittens.  
*Hic est primus morbi gradus, die stille Wuth,*

quam post aliquot dies vel septimanas secundus morbi gradus, die offbare *Wuth*, excipit.

Hoc subeunte frigus recedit & calor æquabilis per totum corpus diffunditur, is brevi caput, fauces & locum demorsum tanto ardore afficit, ut ægerrime feratur. Pulsus fortissimus & celerrimus fit, hujus febris vehementia subinde tanta est, ut delirium, convulsiones, apoplexiam & mortem inducat. Subinde nulla febris adest, sed frigus & syncope frequens. Tandem sitis & potus desiderium accedit, sed aquæ & omnis aquosí deglutitio impossibilis est. Subinde fieri quidem potest, sed insigni cum difficultate & acerrimo cum dolore. Si siti urgente tentatur aquæ hauustus, horror, anxietas, convulsio furorve sequitur. Aquæ etiam conspectus, nomen & quidquid aquæ idæam renovat, res pellucida ut speculum, glacies, vitrum, splendidus culter &c. ferri nequit, et tremores muscularum, faciei distorsiones, summam respirandi angustiam &c. creat. Offa autem solida plerumque facile, citoque deglutitur, & saepe avide commeditur. Ipsa saliva, quæ magna copia in os fluit, cum horrore longe exspuitur. Ineluctabile adstantes conspuendi vel etiam mordendi desiderium saepissime per vices invadit. Satyriasis & libidinosa seminis ejaculatio viros, nymphomania fæminas frequenter afficit. Quidam de-

lirant, alii præ anxietate aufugere vel mortem sibi inferre tentant; aliis tamen mens fana est, adeo ut adstantibus consulant, ut a mortu & sputo suo caveant, ut vincula sibi injici petant. Alii nec lucem nec levissimum aëris motum perferre valent, alii bilem nigricantem vomunt, &c. spumosa saliva os circumfluit; lingua arida & aspera ex ore prominet, vox rauca interrumpitur, perit.

Omnia hæc symptomata continuo pejora fiunt, tandem corpus vel convulsionibus agitatur, vel spasmo riget vel paralyfi resolvitur, pulsus vacillat, deficit, respiratio summo molimine peragitur, sudor gelidus & viscidus per totum corpus exit & mors finem miserrimæ vitæ imponit.

Raro vel nunquam hic morbus, ab accessu aquæ metus computando quartum diem excedit. Subinde hydrophobia *periodice* per plures menses recurrens observata fuit. \*

**CADAVERUM INSPECTIO** inflammationem in faucibus vel aliud vitium raro deprehendit, œsophagus valde angustus & contractus, uvula in velum introtracta spasmi post mortem etiam persistentis testimonium præbet hydrophobiam morbum esse mere nervosum a viru canino excitatum.

---

\* Cel. HILDANI *obs. chirurg. cent. I.* p. 65.  
& *Miscell. cur. dec. I. anni 9.* p. 118.

CURATIO hominis ab animale rabido demorsi duplex est.

1. *propylactica* seu hydrophobiam arcens.
2. *therapeutica*, seu hydrophobiam jam præsentem curans.

MEDELA PROPHYLACTICA requirit, ut venenum e vulnere illico afferatur aut in eo destruatur. Aut si jam e vulnere absorptum esset, ut antidoto vel iners reddatur vel aptis remedii expellatur.

Ablatio & destructio veneni exigit, ut fiat illico.

1. *Elutio vulneris* cum sale & aceto. *Scarificatio* & *cucurbitæ applicatio*, qua venenum cum sanguine extrahitur.
2. *Exustio vulneris* ope cauterii, vel pulveris pyrii, qui vulnere impleto accenditur, lapidis caustici \* butyri antimonii.
3. *Abscissio* vel *excisio* partis demorsæ.
4. *Suppuratio* sex septimanarum, qua virus e vulnere eliminatur. Hæc optime inspersis cantharidibus, vel unguento cantharidum emplastro vesicatorio tecto sustinetur. \*\*

Methodus absorptum venenum iners reddendi vel expellendi est multiplex.

\* Cel. MEDERER *Syntagma de rabie cannina*, Friburgi 1783. p. 36. &c.

\*\* Cel. SCHMIDT Ch. *Wahrnehmungen*. 2 Thett.  
E 3

1. *Methodus mercurialis.* Interne detur *mercurius gumosus*, \* vel *dulcis vel turpe-thum minerale*. Externe *vulnus & ambitus unguento mercuriali deligetur*. Vel *adhibeantur frictiones more in syphiliticis solito*.

2. — *diuretica.* Interne *cantharides*, vel *earum tinctura*, in *infuso corticis peruviani*, vel *Meloe majalis* aut *Meloe Proscarabaeus* \*\* aut *Nitrum cum oxymelle squillitico dentur*. Etiam *ceparum cru-*

\* Ego feminæ 27 annorum a cane rabido in crure fauciata ter de die per 6 septimanas 5 pillulas e mercurio gummo dedi, & vulnera unguento digestivo cum neapolitano mixto deligavi. Vidi hanc fœminam post duos annos sanam adhuc & vegetam. Canis certo rabidus fuit, idem enim momordit venatorem, qui hydrophobus periit. *Frater du CHOISEL* inunctionibus mercurialibus, quibus omni decimo die catharticum mercuriale interposuit, trecentos ab animali rabido demorsos restituisse & iisdem binos jam hydrophobos e mortis faucibus eripuisse dicit. *Method of treating persons bit by mad animals 1765.* Interim tamen non infallibile mercurius est remedium, nihil enim præsttit aliquoties. V. VAUGHAN in *Sammel. für pr. Aerzte, & Medical Esais T. 5. P. 2. p. 590.* ubi mercurius hydrophobiam non avertit.

\*\* *Cel. STOCKAR diss. de usu interno cantharid.*

darum esus \* & externa eārum applicatio laudatur.

3. *sudorifera*. Interne exhibeatur belladonna \*\* moschus, alcali volatile, acetum, oleum animale Dippelii, cinnabaris, antimonium, camphora, opium, externe Balneum tepidum.

4. — *amaricantium*. Amygdalæ amaræ \*\*\* Cortex peruvianus \*) qui in hydrophobia periodica conducere videtur.

5. — *composita*. Optime forsan medemur si cum methodo mercuriali, diaphoreticam, diureticam, & antispasmodicam conjungamus. Pilulæ ex mercurio gummoso, pulvere cantharidum, foliis belladonnæ & camphora atque moscho compositæ in hunc finem exhibeantur. Ab aliis laudatur *Arcanum WERLHOFII* \*\*) *Pulvis*

\* Gazette salutair 1773. n. 8.

\*\*) Ill. RICHTER Chir. Biblioth. 5. B. 2 St.

p. 377.

\*\*\* Cel. THEBESIUS in N. A. N. C. T. 1. p. 181. duodecim exemplis laudat amygdalas amaras mane per unam vel alteram hebdomadem comedas.

\*) Cel. HOOGWERFF diss. de hydrophobia. Lugd. Patav. p. 22.

\*\*) Est sequens. R. cantharid. gr. 1. mercurii dulcis gr. iβ turpethi mineralis gr. β camphoræ gr. x mucilag. gummi tragacanth q. 5. ut fiant pillulæ,

*chinensis* \* *Pulvis antilyssus* \*\* MEA-  
DII.

**THERAPIA HYDROPHOBIAE.** Si curatio prophylac-  
tica aut non aut frustra adhibita fuit, at-  
que hydrophobia jam revera accedit, tunc

1. *Vulnus clausum caustico vel scarificatione*  
*aperiatur & apertum insperso pulvere can-*  
*tharidum & unguento mercuriali pulvere*  
*cantharidum animato in magnam suppura-*  
*tionem dederatur.*
2. *Interne detur bolus e cartice peruviano,*  
*mercurio gummofo, opio, moscho & fa-*  
*le cornu cervi. Simul fiant frictiones*  
*mercuriales ad levem salivationem usque,*  
*Sic aliqui saltem e multis evasere.*

### VIRUS VARIOLOSUM.

*Est virus sui generis, quod variolas inducit. Po-*  
*ckengift*

*Ex Aegypto, ut communi miasmatum sentina sœcu-*  
*lo VI haustum, una cum religione Mahume-*  
*dana per Asiam & Africam disseminatum, per*

---

*quæ sumantur pro dosi & repetantur per sex septi-  
manas singulis diebus. Cel. WICHMANN diss. de  
insigni venenorum quorundam efficacia.*

\* *Ex 40 cinnabaris & sedecim moschi granis con-*  
*ficitur, quæ dosis per 30 dies exhiberi debet. Philosoph.*  
*Transact. 1750.*

\*\* *Est muscus caninus cum tertia piperis parte,*  
*Dosis drachma una, Philosoph. Transact. n. 237,*

milites crucigeros ex terra sancta sæculo XII  
in Europam & inde per Hyspanos sæculo XV  
in Americam translatum, nunc per orbem uni-  
versum propagatur.

**VIS NOXIA** contagium solo attactu vel inoculatione  
propagatur. Verum hoc miasma a solis dis-  
positis suscipitur; sunt autem ad hanc suscep-  
tionem omnes homines variolas nondum pas-  
si, dispositi, exemptis valde paucis, cuius  
ratio nondum patet. Rari sunt homines, qui  
bis variolis veris laborant.

**ANTIDOTA.** Quæ miasma hoc redderent iners non-  
dum certo cognita. In mercurio, moscho,  
stibio, camphora a quibusdam quærebatur.  
*Inoculatio* mitiores & pauciores ut plurimum  
generat variolas quam infectio naturalis.

### VIRUS MORBILLOSUM.

Est virus sui generis quod *morbillos* generat.  
*Maserngift.*

Etiam ex Aegypto nobis adlatum fuisse censetur.

**ANTIDOTA** certa adhucdum nobis non nota.

### VIRUS SCARLATINUM.

Est virus sui generis quod *scarlatinam* causat.  
*Scharlachgift.*

**VIS NOXIA.** Homines solummodo dispositos &  
raro bis aggreditur.

**ANTIDOTA** nondum nota.

❧ ( 74 ) ❧  
**VIRUS SCABIOSUM.**

**E**st virus sui generis, quod *scabiem* generat. *Kräzengift.*

**V**IS NOXIA. Homines dispositos sæpius aggredi solet.

**A**NTIDOTA. Primarum est sulphur, & radix hellebori albi. *Unquentum ex anaticis partibus florum sulphuris, vitrioli albi & olei laurini scabiem humidam certo curat, si fabæ magnitudo quotidie volis manuum bis infricitur.* \*

**VIRUS VENEREUM.**

**E**st virus sui generis, quod *morbos venereos* inducit. *Lustseuchgift.*

- **C**laflis *CHRISTOPHORI COLUMBI* anno 1493 hoc virus ex insulis Americanis in Europam tulit. Hominem data occasione sæpius aggreditur. \*\*

**A**NTIDOTA. Unicum & certissimum est mercurius ejusque præparata.

**VIRUS PLICOSUM.**

**E**st virus sui generis, quod *Plicam polonicam* causat. *Wichtelzopfgift.*

---

\* Cel. JASSER in SCHMUKER *vermischte Schriften* 3. B. p. 169.

\*\* Vide *Doctrinam meam de morbis venereis.* Viennæ 1779. p. 16 & 17.

**ANTIDOTA.** Specifice laudatur *lycopodium clavatum.* \*

### VIRUS CANCROSUM.

Est virus sui generis, quod in *cancro* latet.  
*Krebsgift.* \*\*

**ANTIDOTA.** Adhuc nullum certum; in *conio maculato*, in *arsenico citrino* quidam quæsivere. \*\*\*

### VIRUS LEPROSUM.

Est virus sui generis, quod *lepram* generat. *Ausfazgift.*

**ANTIDOTA.** Specifice laudatur *ledum palustre* seu *Rosmarinus sylvestris.* \* )

### VIRUS PESTILENTIALE.

Est virus sui generis, quod *pestem* generat. *Pestgift.*

**ANTIDOTA.** adhuc nulla cognita. *Spiritus sulphuris* & *frictiones glaciales carbuncolorum* comendantur. \*\* )

\* Cel. GABRIEL *diss. de plica polonica.* Budæ 1780. p. 76.

\*\*) Cel. PEYRIHLE *diss. de cancro.* p. 31.

\*\*\*) Cel. RONNOW in *Schwed. Abh. für das Jahr 1778.*

) *Schwed. Abh. 41 Band* p. 194.

\*\*) Cel. SAMOILOWITZ *Lettre sur les expériences des frottements glaciaux pour la guérison*


## VIRUS MORBORUM PUTRIDORUM.

**E**st virus sui generis, quod *morbos putridos* generat. *Gift fauler Krankheiten.*

**V**IS NOXIA. Aegroti febre putrida, vulnere gangrenoso, scorbuto putrido, dysenteria putrida, aut phthisi conclamata laborantes tantum exhalant fœtorem, ut ægrorum atmosphæra non solum quam maxime fœtens observetur, sed etiam ut lecti & omnes res ægrum circumstantes longo tempore miasmate putrido inquinatæ sanos etiam homines inficiant. \*

*Linteum carptum*, quod vulneri gangrenoso jam semel incubuit & elotum iterum vulneri applicatum, aut linteum ab ægrotis in nosocomio putrido carptum vel diu in aëre putrido nosocomiali detentum. in sanissimo etiam vulnere gangrænam humidam lentam producere dicitur. \*\*

**ANTIDOTA.** Acetum; sed vide *aër putridus* in classe venenorum halituosorum.





---

*de la peste. à Paris 1781. & ejusdem Memoire sur l'inoculation de la peste avec la description de trois Foudres fumugatives antipestilentielles. à Strasburg 1782. p. 25.*

\* Cel. EVERS diss. in contagium phthisicum inquirens. Göttingæ 1782.

\*\* Oeures de POUTEAU Tome III. & Ill. RICHTER chirurg. Biblioth. 7. B. 2. St. p. 385.

V E N E N A  
EX  
REGNO VEGETABILI.



# E L E N C H U S

## VENENORUM VEGETABILIU M.

---

D e venenis vegetabilibus generatim.

### V E N E N A N A R C O T I C A

- Papaver somniferum, *schlafmachender Mohn.*  
Opium, *Mohnsaft, Opium.*  
Physalis somnifera, *schlafmachende Judenkirsche.*  
Solanum lycopersicum, *Liebesäpfel.*  
——— mammosum, *Jungfernbrüste.*  
——— insanum, *Tollapfel.*  
——— Dulcamara, *Bittersüß.*  
——— nigrum, *schwarzer Nachtschatten.*  
Atropa Mandragora, *Alraun.*  
Datura Stramonium, *gemeiner Stechapfel.*  
——— Metel, *weisser Stechapfel.*  
——— ferox, *scharfer Stechapfel.*  
——— Tatula blaulichter Stechapfel.  
Hyoscyamus niger, *schwarzes Bilsenkraut.*  
——— albus, *weisses Bilsenkraut.*  
——— physalodes, *sibirisches Bilsenkraut.*  
——— scopolia, *schlafmachendes Bilsenkraut.*  
Azalea pontica, *gelber Rosenlorbeer.*  
Antirrhinum Orontium, *Oront.*  
Actaea spicata, *Christophskraut.*

- Lolium temulentum, Sommerlolch. *Tollkorn*.  
 Ervum Ervilja, giftige Erven.  
 Lathyrus Cicera, purpurrothe Platterbse.  
 Peganum Harmela, gemeiner Harmel.  
 Chænopodium hybridum, unächter Gänsefuss.  
 Taxus baccata, Taxbaum.  
 Chelidonium glaucium, eisengraues Schölkraut.  
 Lactuca scariola, wilder Lattich.  
 —— virosa, giftiger Lattich.  
 Prunus Laurocerasus, Kirschlorbeerbaum.  
 Paris quadrifolia, Einbeer.

### N A R C O T I C O - A C R I A.

- Hippomane Mancinella, gemeiner Manchinelbaum.  
 —— biglandulosa, lorbeerblättricher Manchinelbaum.  
 Menispermum Cocculus, Fischkörner,  
 Coriaria myrtifolia, myrtenblättricher Gerberstrauch.  
 Strychnos Nux vomica, Krähenaugen.  
 —— colubrina, Schlangenholz.  
 Ignatia amara, Ignatiusbohne.  
 Nerium Oleander, Oleander.  
 Atropa Belladonna, Wolfskirsche.  
 Nicotiana Tabacum, gemeiner Tobak.  
 —— rustica, Bauerntobak.  
 —— panicula, Jungferntobak.  
 —— glutinosa, Soldatentobak.  
 Bryonia alba, Zaunrübe.

Chæro-

- Chærophylum sylvestre*, wilder Kälberkropf.  
 ————— bulbosum, bolliger Kälberkropf.  
 ————— temulentum, berauschender Kälberkropf.  
*Aethusa Cynapium*, Geisse.  
*Sium latifolium* breitblätterichter Wassermerk.  
*Cicuta virosa*, Wasserschierling.  
*Conium maculatum*, gefleckter Schierling.  
*Mercurialis perennis*, beständiges Bingelkraut.

## F U N G I V E N E N A T I.

- Agaricus muscarius*, Fliegenschwamm.  
 ————— integer venenatus, Gifttaubling.  
 ————— lactifluus venenatus, Giftbrätling.  
 ————— viscidus, Schmerling.  
 ————— piperatus, Pfefferschwamm.  
 ————— fimetarius, Mistschwamm.  
 ————— pustulatus, warziger Schwamm.  
 ————— Necator, Mordschwamm.  
 ————— sanguineus, blutrother Schwamm.  
 ————— viscidus, klebrichter Schwamm.  
 ————— clypeatus, schildförmiger Schwamm.  
*Boletus versicolor*, der bunte Löcherschwamm.  
 ————— elegans, der zierliche Löcherschwamm.  
*Boleti parasitici*, die schmarotzende Löcherschwämme.  
*Phallus impudicus*, der unverschämte Gichtschwamm.  
 ————— Mukusin, die chinesische Morchel.  
*Lycoperdon carcinomalis*, die Krebstrüfel.  
 Fungi Venenati nondum determinati.

## V E N E N A   A C R I A.

- Delphinia Staphisagria**, *Lauffsaamen*.  
**Semen Sabadilli**, *Sabadillsaamen*.  
**Rhododendron crysanthum**, *sibirische Schneeroſe*.  
**Fritillaria imperialis**, *Kaiserkrone*.  
**Colchicum autumnale**, *Zeitloſen*.  
**Pedicularis palustris**, *Laufkraut*,  
**Digitalis purpurea**, *Fingerhutblume*.  
**Lobelia siphilitica**, *Lufſeuchlobelie*.  
  ——— *longiflora*, *langblümige Lobelie*.  
**Cyclamen europaeum**, *Schweinsbrod*.  
**Plumbago europaea**, *Zahnwurz*.  
**Convolvulus Scamonea**, *Purgierwinde*.  
**Cucumis Colocynthis**, *Coloquinten*.  
**Momordica Elaterium**, *Eſelskürbſe*.  
**Cambogia Gutta**, *Gummiguttabaum*.  
**Cerbera Ahovai**, *Schellenbaum*.  
  ——— *Manghas*, *Herzbaum*.  
**Cynanchum erectum**, *aufrechter Hundswürger*.  
  ——— *vimiale*, *blattloſer Hundswürger*.  
**Apocynum Androsæmifolium**, *canadischer Hundekohl*.  
  ——— *canabinum*, *virginischer Hundekohl*.  
  ——— *venetum*, *venetianischer Hundekohl*.  
**Aſclepias gigantea**, *grosse Aesculapsflanze*.  
**Hydrocotile vulgaris**, *Sumpfnabelkraut*.  
**Oenanthe fistulosa**, *hohlröhrichte Rebenholde*.  
  ——— *crocata*, *ſafrangelbe Rebenholde*.

- Scandix infesta, schädlicher Kerbel.  
 Thapsia foetida, wilder Turbith.  
 Alisma Plantago aquatica, Wasserwegerich.  
 Clematis Vitalba, gemeine Waldrebe.  
 —— Flamula, Brennwurzel.  
 —— erecta, gerade weisse Waldrebe.  
 —— integrifolia, gerade blaue Waldrebe.  
 Anemone palmata, gelbe Anemone.  
 —— Pulsatilla, gemeine Küchenschelle.  
 —— pratensis, schwärzliche Küchenschelle.  
 —— narcissiflora, Anemone mit Narcissenblumen.  
 —— nemorosa, Waldanemone.  
 —— ranunculoides, Hanenfussartige Anemone.  
 Helleborus albus, weisse Niesswurz.  
 —— niger, schwarze Niesswurz.  
 —— foetidus, stinkende Niesswurz.  
 Veratrum nigrum, schwarzrothblumige weisse Niesswurz.  
**Caltha palustris, Dotterblume.**  
 Aconitum Napellus, blaues Eisenhütchen.  
 —— Cammarum, Bergsturmhut.  
 —— lycoctonum, gelbes Eisenhütchen.  
 —— Anthora, Gifttheil.  
 Pastinaca sativa, annosa, alter Pastinack.  
 Polygonum Hydropiper, Wasserpeffer.  
 Sælanthus quadragonus, viereckige arabische Winde.  
 —— glandulosus, arabische Winde mit essbaren Beeren.  
 —— Forskalii, Forskals arabische Winde.

**Jatropha curcas**, americanischer Brechnussbaum.

——— multifida, französische Purgiernuss.

——— manihot, cassava. Manihot.

**Ricinus communis**, gemeiner Wunderbaum.

**Phytolaca decandra**, virginische Phitolacke. Alkermes.

**Croton Tiglum**, molukanischer Purgierholzbaum.

**Daphne Mezereum**, gemeiner Kellerhalss.

——— Thymelæa, Seidelbast.

——— Laureola, immergrüner Kellerhalss.

——— Cneorum, schweizerischer Kellerhalss.

——— Gnidium, italienischer Kellerhalss.

**Cneorum tricoccum**, Zeiland.

**Amyris troxifera**, Giftbaum.

**Rhus Vernix**, Firnisbaum.

——— radicans, wurzelnder Sumach.

——— Toxicodendron, eichenblättrichter Giftbaum.

**Scilla maritima**, Meerzwiebel.

**Excæcaria agallocha**, blindmachender Baum.

**Anacardium occidentale**, abendländische Elefantenlausbaum.

——— orientale morgenländische Elefantenlaus.

**Caryota urens**, brennende Palme.

**Arum maculatum**, gemeine Aronswurz.

——— Dracunculus; Schlangenkraut.

——— Dracontium, americanische Aronswurz.

——— Colocasia, ægyptische Aronswurz.

——— esculentum, essbare Aronswurz.

- Arum virginicum*, virginische Aronswurz.  
 —— *arborescens*, Aronsbaum.  
 —— *seguinum*, Aronswurz mit blätterlosen Blumen.  
*Calla palustris*, Sumpf-Calla.  
*Euphorbia officinalis*, gemeines Euphorbium.  
 ——— *antiquorum*, wahre Euphorbie.  
 ——— *canariensis*, canarisches Euphorbium.  
 ——— *Tirucalli*, ostindisches Euphorbium.  
 ——— *Peplus*, runde Wolfsmilch.  
 ——— *lathyris*, Springkörner.  
 ——— *helioscopia*, Sonnenwolfsmilch.  
 ——— *verrucosa*, warzigte Wolfsmilch.  
 ——— *platyphyllus*, breitblätterichte Wolfsmilch.  
 ——— *Efula*, kleine Wolfsmilch.  
 ——— *Cyparissias*, Cypressenwolfsmilch.  
 ——— *pallustris*, Sumpfwolfsmilch.  
 ——— *hiberna*, irrländische Wolfsmilch.  
 ——— *characias*, französische Wolfsmilch.  
 ——— *amygdaloides*, kleine Wolfsmilch mit Mandelblättern.  
 ——— *sylvatica*, Waldwolfsmilch.  
 ——— *exigua acuta*, kleine Steinwolfsmilch.  
 ——— *mauritanica*, mauritanische Wolfsmilch.  
 ——— *nerifolia*, Wolfsmilch mit Oleanderblätter.  
*Ranunculus sceleratus*, Gifthahnenfuss.  
 ——— *Thora*, schweizerischer Hahnenfuss.  
 ——— *Flamula*, kleiner Sumpfhahnenfuss.  
 ——— *Lingua*, grosser Sumpfhahnenfuss.  
 ——— *ficaria*, Scharbockskraut.

- Ranunculus illyricus**, *illyrischer Hahnenfuss.*  
 ——— *bulbosus*, *Rübenhahnenfuss.*  
 ——— *alpestris*, *Alpenhahnenfuss.*  
 ——— *polyanthemos*, *blumenreicher Hahnenfuss.*  
 ——— *acris*, *brennender Hahnenfuss.*  
 ——— *arvensis*, *Ackerhahnenfuss.*  
 ——— *gramineus*, *grasartiger Hahnenfuss.*  
 ——— *asiaticus*, *Ranunkel.*  
 ——— *aquatilis*, *Wasserhahnenfuss.*  
 ——— *platanifolius*, *Ahornblätterichter Hahnenfuss.*  
 ——— *Breynius*, *breynischer Hahnenfuss.*  
 ——— *Sardous*, *Eppichblätterichter Hahnenfuss.*  
**Raphanus Raphanistrum**, *Ackerrettig.*  
**Secale cornutum**, *Mutterkorn.*  
**Ustilago frumenti**, *der Kornbrand.*  
**Caries frumenti**, *der schwarze Mehlthau.*  
**Rubigo frumenti**, *Kornrost.*

### VENENA GLUTINOSA.

- Gluten ancuparium**, *Vogelleim.*  
 ——— *visci querni*, *Eichenmistelleim.*  
**Fungus Cynosbatos**, *Hagebuttenchwamm.*  
**Spongia marina**, *Baadschwamm.*





## DE VENENIS VEGETABILIBUS GENERATIM.

VEGETABILIA, quæ ventriculo ingesta aut corpori  
externo applicata in dosi exigua gravem mor-  
bum vel ipsam mortem inducunt, *venenata*  
dicuntur.

Respectu eorum *indolis* dividuntur  
in *narcotica*.  
— *narcotico-acria*.  
— *acria*.  
— *glutinosa*.

## DE VENENIS NARCOTICIS GENERATIM.

Vegetabilia, quæ nervos & cerebrum vi narcotica  
stupefaciunt, somnolentiam, stuporem, fatui-  
tatem, delirium inducunt, *narcotica* dicuntur.

MEDELA exigit, ut venenum adhuc in ventriculo  
vel in intestinis hærens *emetico* ejiciatur. In  
hunc finem illico detur.

*Radix ipecacuanhæ, vel tartarus emeticus,* defuper bibatur multum aquæ tepidæ, in qua *butyrum* vel *oleum* defluxit. Et irritentur fauces ope digitæ vel plumulæ oleo madidæ.

Si vero ventriculus omni sensilitate & irritabilitate jam orbus & *paralyticus* deprehenditur, detur *vitriolum album*, ad grana **X** vel **XV**, quod sæpe, dum reliqua fallunt, cito emesim movet.

Si vero pharynx & oesophagus adeo spasm contractus, ut nihil deglutire possit, inveniatur, tunc vomitorium ope *tubi metallici* demitti debet.

Demum si cerebrum & facies a sanguine in caput congesto turgeant Venæ sectio, hyrundines collo & temporibus, synapismi plantis pedum applicata proderunt. Tandem dentur.

#### ANTIDOTA ANTINARCOTICA, qualia sunt.

1. *Acida.* Acetum, succus citri, spiritus vitrioli aqua dilutus.

2. *Coffeæ infusum saturatum.* \*

\* Cel. PERCIYAL med. Essays Vol. 2. p. 128. Id turcarum & arabum exemplo docet. Medico ex 18 guttis laudani liquidi cum tribus cyathis infusi saturati coffeeæ hausti prohibebatnr somnus, qui vero sub alio experimento omissa coffeea rediit. Idem phys. & med. Eff. p. 269.

3. *Ipecacuanha*; duo grana opii & totidem ipecacuanhæ non alium effectum, quam largum sudorem excitant. \*
4. *Enemata* ex aceto, castoreo, vel sapone.
5. *Vesicantia* nuchæ applicata.
6. *Vinum.* \*\*
7. *Sal alcalinum* \*\*\* vel *borax*.

### PAPAVER SOMNIFERUM.

*PAPAVER somniferum L. Schlafmachender Mohn.*

ODOR foliorum, caulinum & capitum debilius narcoticus, opio congruens. SAPOR herbaceus. Capsulæ seu capitula fauciata lac amarum viroli odoris emittunt. Recentia exsiccatis efficiacia narcoticæ antecellunt.

VIS NOXIA. Unius capituli esus mortem, \*) potus

\* *Ill. MURRAY app. m. Vol. I. p. 539.* Puella, quæ scrupulum circiter opii ingessit, etiamsi sopore, convolutionibus, spasmisque dirissimis corriperetur, solo ipecacuanhæ usu repetito servata fuit.

\*\*) *Cel. LORRY in recuel periodique p. 73.* Recensetur maniaci exemplum, per opii usum in summum furorem delapsi, cui vinum quietem conciliavit.

\*\*\*) *Götting. Gel. Nachrichten 1780. St. 104. p. 844.*

\*) *GROSE Voyage aux Indes orientales, traduit de l' Anglois. Paris 1758. p. 193.*

decocti cum capitulis aliquot papaveris cocti insaniam rixosam, dein cum summo gaudio voluptuosam, quæ stupiditatem mentis relinquebat, induxit. \* Exhalatio papaveris in cubiculo clauso congesti asphyxiam cum facie livescente, qua evanida tremor & tabes remansit, causabat. \*\*

Sed petala florum & semina alba, nigrave capsularum omni vi narcotica destituuntur & absque noxa assumi possunt.

**ANTIDOTA.** Vomitorium, dein acida & alia antinarcotica.

**VIRTUS MEDICATA.** In Persia capitula papaveris una cum seminibus decocta in thermopolii ad gratam inebriationem conciliandam bibuntur. Ex decocto capsularum nondum perfecte maturarum *syrupus papaveris albi* conficitur, qui vi anodyna tussim, pervigilium & morbos spasmodicos ad ʒ β datus sopit.

*Cataplasma* vel *fomentum* e capsulis papaveris paratum ad somnum conciliandum, ad erysipelas & alias tumores inflamatorios discutiendos adhibetur.

\* CHARDIN *Voyage en Perse. Amsterd. 1711.*  
B. II. p. 68.

\*\* CHARDIN l. c. B. I. p. 12. præsertim sub collectione & coctione succi id contigit.

## O P I U M.

**E**st succus resinoſo gummosus ex inciso capite **PAPAVERIS somniferi L.** extillans, inspissatus.  
*Mohnſaft.*

**O**DOR opii orientalis validus, narcoticus. **SAPOR** naufeosus, amaricans, acris, caloris sensu labia, linguain, palatum adficiens.

**V**IS NOXIA. Opium *minori* dosi exhilarat, inebriat, vires vitales nempe cordis & arteriarum motum accelerat, ad venerem cum erekione penis stimulat, diaphorhesin cum pruritu cutis auget, alvi & reliquas excretiones supprimat. At *majori* dosi vires vitales augendo simul sensuum & motuum muscularium organa stupefacit, ita ut tactus, visus, auditus inde sublati exempla legantur. Sanguinem in encephalum congerit, inde delirium, convulsio, spasmi vel paralyses, penis erekcio \* demum sub apoplexia vel lethargo sequitur mors.

Cadaver juvenis, qui ex drachma una opii ingesta obiit; paullo post mortem tumores

\* Erectione etiam in praetexto trucidatis militibus Turcis, qui opium sumferunt perstitit. *Eph. N. C. D. I. Ann. 2. obs. 69. p. 127.* Nimia contra dosis ad veteris exercitium viros ineptos reddit.

lividos artuum & intolerabilem fœtorem exhibuit.

Gentes orientales, quibus Muhamedis religio vini usum interdicit, quæ in quotidianum delicium opium assumunt adeo, ut sensim a grano ad drachmam quotidie deglutire assuefecunt, paullatim emaciantur, deperdunt appetitum, melancholici, languidi, stupidi, somnolenti, taciturni redduntur, Demum memoriæ abolitio, senium præcox & mors præmatura sequuntur.

**VIS NOXIA EXTERNA.** Ab opii granis iv, clysmati additis æternum dormire visus est æger. \* Emplastrum opiatum temporibus applicatum furorem, spasmosque oris creavit. \*\*

**ANTIDOTÆ.** Eadem, quæ generatim in venenis narcoticis suafimus

**VIRTUS MEDICATA.** In exigua dosi est egregium remedium anodynum, somniferum, antispasmodicum; antemeticum, antidiarrhæicum, cardiacum. Unde in morbis dolorificis, spasmodicis, evacuatoriis ut vomitu, diarrhæa, &c. in febribus intermittentibus, in agrypnia, in gangræna sicca, in morbis venereis lauda-

\* Ill. GAUBII *de] meth. concin. form.* Lugd. Bat. 1767. p. 420.

\*\* Cel. MONROO in *Essais and. observ. phys. & lit.* vol. 3. p. 297.

tur. Sed plethora, inflammatio, & faburra in mox dictis morbis absint oportet. Vide *pharmacologiam chirurgicam* & authores qui de materia medica scripserunt. \*

### PHYSALIS SOMNIFERA.

*PHYSALIS somnifera* L. *Schlafmachende Judenkirsche.*

**VIS NOXIA.** *Radix* vi somnifera, opio tamen mitiore pollet. *Fructus* urinam vehementer movet.

**ANTIDOTA.** Antinarcotica adhibeantur.

**VIRTUS MEDICATA.** Tentetur in hydrope.

### SOLANUM LYCOPERSICUM.

*SOLANUM Lycopersicum* L. *Paradeissappel.* *Liebesäpfel.* *Pomum Amoris.*

**ODOR** fructus nullus. **SAPOR** acidulus, nanfeofus.

**VIS NOXIA.** *Fructus* liberalius ingurgitatus aphoniā & apoplexiā inducere dicitur. \*\*

**ANTIDOTA.** Vomitorium, dein antinarcotica.

**VIRTUS MEDICATA.** *Fructus* ab Italis sale & pipere conditus vel coctus editur. Ego centies fructum in embemma coctum absque noxa comedи.

\* Inter quos princeps est *Ill. MURRAY app. med. vol. 2. p. 215.*

\*\* *Cel. BAUCHINUS.*

## SOLANUM MAMMOSUM.

*SOLANUM mammosum* L. Jungfernbrüste.**VIS NOXIA.** Fructus censentur venenati. At experimenta desiderantur.**VIRTUS MEDICATA** non nota

## SOLANUM INSANUM.

*SOLANUM insanum* L. Tollapfel.**VIS NOXIA.** Etiam hujus solani fructus dicuntur venenati; nulla autem certa observatione evinci id potest.**VIRTUS MEDICATA** non nota.

## SOLANUM DULCAMARA.

*SOLANUM Dulcamara* L. Bitterfüss. Alpranke.**ODOR** foliorum recentium foetidus. **SAPOR** herbaeus; in stipitibus vero & radice amaricans, postea dulcescens.**VIS NOXIA.** Baccæ vomitum movent & violenter purgant. Largior stipitum usus initio antequam ventriculus assuevit, nauseam, vomitum, imo convulsiones, deliria & paralyсин linguæ excitavit. \***ANTIDOTA.** Vomitorium & antinarcotica.

\* Ill. LINNE diff. de Dulcamara. p. 9. & 10.  
 & Cel. DE HAEN rat. med. V. IV, p. 247.

**VIRTUS MEDICATA.** Decoctum stipitum est resolvens, sanguinem depurans, omnes secretiones augens atque antiscorbutica & antivenerea. Utile fuit deprehensum in rheumatismo, scorbuto, lue venerea inveterata, arthritide, herpete, tophis venereis, tumoribus lacteis, in scabie, oedemate erysipelaceo, in ulceribus crurum. \*

**DOSIS.** Stipitum 3j sensim ascendendo ad 3ij in aquæ ~~Hib~~ coquantur ad remanentiam 3 viij. Hoc decoctum quotidie cum lacte dilutum vasculatim bibatur.

### S O L A N U M   N I G R U M.

**SOLANUM nigrum** L. *schwarzer Nachtschatten.*

**ODOR** herbæ teter. **SAPOR** herbaceus.

**VIS NOXIA.** Effluvia somnum excitasse dicuntur. \*\*  
Ex baccis comestis tres infantes deliriis, cardialgia, & miris membrorum distorsionibus vexabantur. \*\*\* Ex esu foliorum loco oleris matri & 4 infantibus intumuit facies cum artibus sub ardore intolerabili, & accidente gangræna, marito tamen, qui pariter hanc

\* Vide *pharmacologiam chirurgicam* p. 390.

\*\* Cel. BOCCONE *Museo di fis.* p. 284.

\*\*\* Cel. WEPFER *de cicut.* p. 226.

escam ingessit manente fano. \* Quidam vero  
autores succi drachmas tres variis subjectis  
absque malo effectu dedisse narrant. \*\*

**ANTIDOTA** sint antinarcotica.

**VIRTUS MEDICATA.** In ulceribus cancrofis. Vid.  
*Pharmacologiam chirurgicam.*

### A T R O P A M A N D R A G O R A.

*ATROPA Mandragora L. Alraun.*

**ODOR** radicis fortis, ingratus. **SAPOR** amarus,  
nauseofus.

**VIS NOXIA.** Radix stuporem, somnum, ingentem  
lassitudinem & mentis alienationem inducit;  
in majori dosi est emetico-draistica.

**ANTIDOTA.** Vomitorium dein antinarcotica.

**VIRTUS MEDICATA.** Pulvis radicis cum melle vel  
laete in linimenti consistentiam redactus, est  
egregium resolvens tumorum induratorum &  
venereorum. \*\*\*

### D A T U R A S T R A M O N I U M.

*DATURA Stramonium L. gemeiner Stechäpfel:*

\* Cel. RUCKER in *Commerc. Noric.* 1731. p. 372.

\*\* Cel. SPIELMANN *de vegetab. venen.* Alsatiae  
p. 66.

\*\*\* Cel. HOFBERG in *Schwed. Abh.* 25. B.  
p. 243.

ODOR

**ODOR** herbæ recentis virosus, narcoticus, temulenta-  
tiam inducens. **SAPOR** amarus.

**VIS NOXIA.** Inebrians, siccitatem faucium, visus  
obnubilationem cum pupillæ dilatatione \* indu-  
cens. *Dosi* vero *majori* delirium ferox,  
memoriæ abolitionem, convulsionem, sudore-  
rem frigidum, paralyсин, mortem causat. \*\*

**ANTIDOTA.** Vomitorium, ac dein antinarcotica.

**VIRTUS MEDICATA.** *Extractum stramonii* maniam,  
epilepsiam, convulsiones, spasmos abdomina-  
les & delirium post puerperium persæpe  
sopit. \*\*\*

**DOSIS** extracti a grano uno bis de die ad tria sen-  
sim ascendendo datur. Non amplius augenda  
dosis quando pupillæ oculi dilatari observatur.

\* A foliis stramonii ulcusculo ad oculum appo-  
fitis pupillæ midriasm paralyticam observavit *Cel.*  
*DOEDERLIN.*

\*\* Decoctum e tribus capsulis feminalibus stra-  
monii in lacte coctis præter mox recensita sympto-  
mata paralyсин apparentem totius corporis, quæ in  
furorem abiit, per 7 horas induxit, tandem ad se  
rediit æger & tranquille per noctem dormivit. *Cel.*  
*SWAINE* *essays and observat. phys. and litter vol.*  
2. p. 247.

\*\*\* *Ill. L. B. de STOERK libellus de stramo-  
nio, hyosciamo & aconito. Vindob. 1762.* Idem con-  
firmat *Ill. BERGIUS m. med. p. 122.* præsertim  
dicit: si simul setaceum in nucha applicatur.

## DATURA METEL.

*DATURA* Metel L. weißer Stechäpfel.

VIS NOXIA præcedentis.

ANTIDOTA eadem.

## DATURA FEROX.

*DATURA* ferox L. scharfer Stechäpfel.

VIS NOXIA. Infaniam 24 horarum durantem induxit cerevisia hujus plantæ semine intoxicata. \*

ANTIDOTA. Emeticum, dein antinarcotica.

## DATURA TATULA.

*DATURA* Tatula L. blauer Stechäpfel.

VIS NOXIA præcedentis.

ANTIDOTA præcedentis.

## HYOSCIAMUS NIGER.

*Hyosciamus* niger L. schwarzes Bilsenkraut.

ODOR radicis recentis narcoticus. SAPOR narcoticus, submucilagineus. Odor foliorum ficorum debilis; Sapor subinsipidus, vix acridus. Carbonibus ignitis immissa folia scintillant & fremunt ut nitrum, atque fumant fumo narcotico, tabacino.

\* *Cel. Gmelin* l. c. P. 2. p. 218.

**VIS NOXIA.** Integrum monasterium ex coctis præ errore radicibus cum radice eichorei post oris & faucium molestissimum ardorem dementia correptum fuit.\* Ex novem hominibus, qui radices loco pastinacæ in juscule comedenterant, quidam loquela orbati, omnes convolutionibus & distortionibus oris & membrorum, risu sardonio, furoreque dirissimo correpti fuere, & postquam commodis remediis resipuerant, primum visu duplicato laborarunt, dein quælibet objecta colore scarlatino tincta sibi re-præsentarunt sanati, tam integre fuere.\*\*) Ex esu radicum aliquot rustici perierunt. \*\*\*) Duæ radices crudæ comestæ pro pastinaca a servo quodam crearunt ardorem ventriculi, sitim intolerabilem, pervigilia, insaniam & visus imminutionem. Postero die copia macularum & vesicularum gangrenosarum in corpore erupit, quas diarrhæa profusa secuta abstulit. \*)

*Folia* in juscule cocta septem hominibus præter insaniam & alia symptomata tumorem & rigiditatem manuum induxerut. \*\*) Enema quod

\* Cel. W E P P. *Hist. cicut. aqnat.* p. 230.

\*\*) Cel. POTOVILLAT in *Phil. Trans. Vol. 40.* p. 446.

\*\*\*) SIMON PAULI *Quadr.* pag. 384. Ed. FRIKII.

\*) Cel. BLOM in *Schwed. Abh.* 1774.

\*\*) *Phil. Trans. Vol. 47.* p. 194.

hyosciami folia continuit delirium ferox se-  
quebatur. \*

De vi noxia odoris hyosciami vide *venena halituosa*.

**ANTIDOTA.** Vomitorium, dein purgantia, ace-  
tum, oleum.

**VIRTUS MEDICATA.** *Extractum hyosciami* in con-  
vulsionibus & spasmis internis, in palpitatione  
cordis, mania, melancholia, expectorati-  
one languente, in tussi pertinaci, in pervigi-  
lio, in hæmoptysi, in epilepsia & cephalal-  
gia inveterata a grano uno ad duo de die  
datum laudatur. \*\* Alvum non constipat ut  
opium, hinc ei ut narcoticum præferendum.  
*Folia* cum mica panis & lacte in cataplasma  
cocta dissipant tumores inflammatorios, & scir-  
rosos mammarum & tumores rheumaticos at-  
que arthriticos.

### HYOSCIAMUS ALBUS.

*Hrosciamus albus* L. *weisses Bilsenkraut.*

**ODOR** narcoticus, tabacinus. **SAPOR** narcoticus,  
submucilagineus.

\* *Cel. Grünwald* in *Eph. N. C. D.* III.

A. 9. *App. p. 179.*

\*\* *Ill. Baro Störck lib. de Stramonio Hyo-  
sciamo &c. p. 26. &c.*

**VIS NOXIA**, narcotica, dementans, at mitior hyosciami nigri; semina hyosciami albi ad grana xv exhibita stuporem, convulsiones subsultus tendinum cum pulsu exili atque abolitione sensationis causarunt. Proximo mane expergescens fuit æger clysmate antimoniali, amplectu quo velicatorio. \*

#### ANTIDOTA præcedentis.

**VIRTUS MEDICATA.** *Extractum* in cataracta incipiente laudatur. \*\* Alii extractum, cum mercurio dulci combinant. \*\*\*

**DOSIS.** A medio grano incipiendum & ascendendum, si nulla œsophagi siccitas observatur.

#### H Y O S C I A M U S P H Y S A L O D E S.

*Hrosциamus Physalodes L. sibirisches Bilsenkraut. Benge Arabum.*

**VIS NOXIA.** Arabes exinde condimentum parant, quod *Benge* vocant, ac quo bellarii loco in conviviis vesci solent. Major dosis est inebrians, somnifera, phantastica, coma vigil excitans, assuetis adeo familiaris, ut deficien-

\* HAMILTON *Essays and observ.* Vol. p. 243.

\*\* Cel. SAUVAGES *Nosol. meth.* T. 1. p. 724, pluribus observationibus se id expertum habere dicit.

\*\*\* Ill. MURRAY *præf.* Bibl. vol. 2. p. 153.

te Benge cibum fastidian. Abusus totum systema nervosum debile, maxime irritabile reddit, unde tremor corporis, terror ex minimo strepitu, facies leucophlegmatica. \*

**ANTIDOTA.** Vomitorium, dein antinarcotica. Remanens debilitas systematis nervosi cardiacis nervinis & roborantibus curatur.

### H Y O S C I A M U S S C O P O L I A.

*Hrosciamus Scopolia L. schlafmachendes Bilzenkraut.*

**VIS NOXIA.** Demetans, soporifera. Scotti hujus plantæ succo vina & cerevisiam infecerunt, unde Danos, suos hostes ita dementarunt & in soporem adeo profundum induxerunt, ut eorum ducem cum toto exercitu deleverint \*\*

**ANTIDOTA.** Vomitorium, dein antinarcotica.

### A Z A L E A P O N T I C A.

*Azalea pontica L. gelber Rosenlorbeer.*

**ODOR** florum gratus, at narcoticus, caput temulentum reddens.

**VIS NOXIA.** Narcotica, temulentiam, insaniam & majori dosi mortem inducens. Mel, quod apes ex floribus azaleæ colligunt naufragam,

\* Cel. D' ARVIEUX l. c. p. 12.

\*\* BUCHANUS hisp. scotie, B. 2.

animi deliquia & temulentiam causare dici-  
tur. \*

ANTIDOTA. Præcedentis.

### ANTIRRHINUM ORONTIUM.

*ANTIRRHINUM Orontium L. Orant.*

VIS NOXIA. Venenata dicitur. \*\*

ANTIDOTA præcedentis.

### ACTÆA SPICATA.

*ACTÆA spicata L. Christophskraut.*

ODOR fœtidiusculus. SAPOR amaricans.

VIS NOXIA. *Herba* cuti applicata vesicam exci-  
tat. *Baccæ* ventriculo ingestæ & tinctura e  
radice parata summam ægritudinem cum sudo-  
ribus frigidis, sine ulteriori tamen molo, in-  
duxerunt. \*\*\*

ANTIDOTA vomitoria & dein antinarcotica.

\* Cel, GMELIN l. c. p. 242. Mel venenatum  
ex Heraclea, quo decem millia militum græcorum  
vomitu, dissenteria, temulentia & infania corripie-  
bantur ex floribus hujus plantæ collectum suisse  
videtur.

\*\* Ill. LINNÆ spec. plantar. Edit. III. T. II.  
*Vind*, 1764. p. 860.

\*\*\* Cel, COLDEN Act. Upsal. a. 1743. p. 132.

**VIRTUS MEDICATA.** Radix forma cataplasmatis applicata scirrhos resolvere dicitur.

### L O L I U M   T E M U L E N T U M .

**L O L I U M temulentum** L. *Sommerlolch. Trespe.*  
*Schwindelhaber. Tollkorn.*

**ODOR** seminis nullus. **SAPOR** subdulcis non ingratus.

**VIS NOXIA.** Ex classe graminum hoc unicum venenatum est. Semen cerevisiae vel spiritui frumenti additum cito ebrietatem, scotomiam & insaniam causat. Semina in pulmento aut in pane commesta temulentiam, vertiginem, virium lapsum, faciei ruborem, oculorum splendorem, cæcitatem, spasmos, frigus extreborum & non raro mortem inducunt. Semina lolii temulenti cum tritico agris sata adeo fertiliter in agris humidis crescunt, ut triticum suffocent, inde plebis fabula triticum quandoque arte magica in lolium temulentum mutari.

**ANTIDOTA.** Vomitorium ex tartaro emetico, acetum, oleum calide epotum, brasica acidulata.

### E R V U M   E R V I L J A .

**ERVUM Ervilja** L. *giftige Erven.*

**ODOR** semen nullus. **SAPOR** farinosus, subinsipidus.

**VIS NOXIA.** Semina inter alimenta hominum quoniam numerabantur, at panis ex semine vel solo vel cum tritico coctus crurum imbecillitatem adeo vehementem produxit, ut ægris scipionibus binis inniti opus haberent. \* Equos, qui plantam integrum devorarunt, tanta crurum imbecillitas corripuit, ut vix pedibus infistere possent & diu contremiscerent. Gallinæ distensione ingluviei a semine devorato necabantur. \*\*

**ANTIDOTA.** Vomitorium & antinarcotica.

### L A T H Y R U S   C I C E R A.

*LATHYRUS Cicera L. purpurrothe Platterbse.*

**VIS NOXIA.** Semina comesta rigiditatem crurum & claudicationem causabant. Ab esu panis ex semine confecti tota familia paralyssi crurum corripiebatur. \*\*\* An sagæ hoc semine clanculum cibis addito homines reddunt paralyticos ?

\* Cel. BINNINGER observ. & curat. med. Cent. 5. obs. 70. p. 571. & Cel. VALISNERI in Galera di Minerva T. 4. p. 220.

\*\* Cel. ROSSI de plant. venen. p. 39.

\*\*\* Cel. DIVERNOI diss. de lathyri quadam venenata specie in Comitatu Montbelgardeni culta. Basileæ 1770. vel vide Cel. LINGUET und TISSOT über das Getreid und Brot, p. 129.

ANTIDOTA. Vomitorium & antinarcotica.

### PEGANUM HARMELA.

*PEGANUM Harmela L. gemeiner Harmel.*

VIS NOXIA. Inebrians, exhilarans, idæam volatibus per nubes, oblivionem rerum gestarum inducens. \*

ANTIDOTA præcedentis.

VIRTUS MEDICATA. Semina hujus plantæ apud turcas, qui his condimenti instar vescuntur, in foro venalia prostant.

### CHÆNOPODIUM HYBRIDUM.

*CHÆNOPODIUM hybridum L. unächter Gänselfuß.*

ODOR ingratus, stramonio congruens.

VIS NOXIA, nacotica.

ANTIDOTA præcedentis.

\* Ill. LINNÆUS in *amœnit. academ.* vol. 6, p. 183. opinatur ex hoc semine forte bolum fuisse, quem KEMPERUS apud Persas in convivio assumpsit; unde inexplicibili gaudio, risu, joco suffundebatur. Finita cœna, dum ascendisset equum, haud aliter ipsi videbatur, ac si pegaso insidens per nubes & coloratissimos iridis arcus volitasset, cumque Diis cœnasset.

## CHELIDONIUM GLAUCIUM.

**CHELIDONIUM** *Glaucium L. eisengraues Schölkraut.*

**VIS NOXIA.** Narcotica, infaniens. \*

ANTIDOTA præcedentis.

## TAXUS BACCATA.

**TAXUS baccata L. Taxbaum. — Eibenbaum.**

**VIS NOXIA.** *Folia equis, vaccis & capris lethalia sunt. Baccæ rubræ a puerο comestæ post aliquot dies petechias nigerrimas, inappetentiam, vomitum, ingentem debilitatem sine febre & mortem causarunt.* \*\*

Tribus infantibus folia recentia taxi quantitate cochlearis in tres partes divisa sub titulo remedii anthelmintici mane hora septima dabantur, desuper potabatur jusculum. Hora nona infantes animi deliquio, frigore, somnolentia, oscitatione, pondiculatione corripientur. Unus ex infantibus vomebat & torimna sentiebat, reliqui duo nullum doloris signum edebant. Omnes tres adhuc eodem

\* *Philos. Transf. abridg.* ii. p. 642. *Cel. LOWTHORP* ab ejus usu infaniam observavit.

\*\* *Cel. SELLE neue Beiträge zur Natur- und Arzneiwissenschaft* i. Th. p. i.

die moriebantur at absque anxietate & abdōminis meteorismo, mortui videbantur placi-dissimo detineri somno. \*

**ANTIDOTA.** Vomitorium & antinarcotica

### L A C T U C A   V I R O S A.

*LACTUCA virosa* L. giftiger Lattich.

ODOR virosus, vertiginem excitans. SAPOR americans. Tota planta lacte scatet amaro.

VIS NOXIA. Narcotica, diuretica.

ANTIDOTA. Præcedentis.

VIRTUS MEDICATA. Extractum est solvens & absque stimulo urinam movet hinc in ascite cum molumento dabatur. \*\*

### L A C T U C A   S C A R I O L A.

*LACTUCA scariola* L. wilder Lattich.

ODOR ingratus.

VIS NOXIA narcotica.

ANTIDOTA præcedentis.

\* Sammlung zum Gebrauch practischer Aerzte  
3. B. 4. St. PERCIVAL von den tödtlichen Wirkungen der Blätter des Taxus.

\*\* Cel. COLLIN lactucæ sylvestris contra hydro-pem vires &c. Viennæ 1780.

## P A R I S   Q U A D R I F O L I A.

*PARIS quadrifolia* L. Einbeer.

ODOR radicis narcoticus, fumum redolens. SAPOR debilior non ingratus. Baccarum & herbæ odor narcoticus; sapor herbaceus, subdulcis in pisa cruda incidens.

VIS NOXIA narcotica, sublaxans. Nulla observatione constat commestas baccas homini fuisse lethales. \*

ANTIDOTA, si venenati orientur effectus vomitorium & antinarcotica.

VIRTUS MEDICATA. Herba in bubone, convulsionibus, tussi convulsiva \*\* & mania commendatur a quibusdam. Dicitur etiam nucis vomicæ esse antidotum. \*\*\*

Dosis datur ad 3j bis de die.

\* Cel. GESNERUS i. epist. med. fol. 53. sumpsit hujus herbæ 3j cum vino & aceto, unde sudavit copiose & siccitatem faicum expertus est.

\*\* Cel. BERGIUS m. m. p. 313.

\*\*\* Cel. GESNERUS l. e. nucis vomicæ Scrupulum dimidium canibus duobus dedit, quorum alter intra horas 4 periit; alter data herba paridis Drachma dimid. per os admissa, salvus evasit, absque subsequenti emesi.

## PRUNUS LAUROCERASUS.

*PRUNUS Laurocerasus* L. *Kirschlorbeerbaum.*

ODOR foliorum vix ullus. SAPOR validus, sub-  
stipticus, amaricans, ut amygdalæ amarae, ve-  
rum fortior.

**VIS NOXIA.** Narcotica, diuretica, paralyzin cor-  
dis & arteriarum inducens, occidit enim  
absque inflammatione vel excoriatione partium,  
venas omnes præsertim abdominales sanguine  
turgidas, arterias vero vacuas reddens.

*Folia* mitius agunt, *aqua stillatitia* vero  
violentius.

Puella sanissima 18 annorum vix duo coch-  
learia aquæ stillatitiæ hauriebat, elapsa me-  
dia hora concidebat convulsionibus & spuma  
oris correpta ac intra breve tempus morieba-  
tur; cadaver non multum intumuit. \* Lac  
cum uno vel duobus foliis coctum aliquando  
turbas insignes excitavit. \*\*

Vir cum uxore sua drachmam unam & al-  
teram spiritus baccis laurocerasi infusi quoti-  
die per aliquot annos bibit, sed ambo con-  
juges post loquendi impotentiam per aliquod

\* *Cel. MORTIMER* in *Phil. Transf.* Vol. 37.  
p. 137.

\*\* *Cel. INGENHOUZE* *Experiences sur les ve-  
getaux* p. 233. nota.

tempus prægressam, paralytici perierunt. \*  
 Dublini femina, cui tanquam cardiacum aqua  
 destillata ad decem drachmas intra horam da-  
 ta, post molestias ventriculi & loquelæ ja-  
 cturam absque vomitu vel alvi dejectionibus  
 & absque convulsionibus obiit, altera coch-  
 learia duo potavit sed vix sellæ imposita absque  
 ullo planctu & convulsionibus periit. \*\* )

Aqua stillatitiae ʒ ʒ vel una canes necat  
 sive in anum vel ventriculum perforatum ope  
 syringæ injecta fuerit, agit emesi, purgatione  
 alvi & diuresi, excitat convulsiones epilepticas  
 cum subsequente morte. Equum libræ tres  
 simul & semel propinatae enecarunt. Folia  
 deglutita mitius agunt & ad ʒ iij cani quo-  
 tidie data non enecarunt. \*\* Ventriculis ne-  
 catorum animalium nulla signa inflammationis  
 exhibuit, sed muco spisso obductus invenieba-  
 tur. Aqua stillatitia *amygdalarum amararum*  
 ut aqua laurocerasi animalia necat. Vim no-

\* Gött. Magazin Ann. 3. P. 6. p. 886. Phylos.  
 Transact. for the Year 1739. nr. 452. p. 63.

\*) Ill. MURRAY app. med. vol. III. p. 216.

\*\* Cel. FONTANA in Phil. Trans. Vol. 70. P. 1.  
 p. 210. & ejusdem *Traité sur le venin de la ripe-  
 re, sur les poisons Americains, sur le laurier-Ceri-  
 se &c.* T. 2. pagina 125.

xiam, quæ in amygdalis amaris in nucleo est, posuit natura in lauroceraso in folia.

**ANTIDOTA.** Vomitorium \* lac, spiritus salis ammoniaci, & oleum. \*\*

**VIRTUS MEDICATA.** Folia cum lacte cocta saponem amygdalarum dulcium lacti conciliant, lac laurocerasi ex libra lactis cum uno vel duobus foliis parum cocti constat, & pro condimento bibitur. Sed cave ab infida blanditie.

*Infusum* foliorum in obstruktione hepatis & cataplasma e foliis & farina in tumoribus scirrhosis egregios dicitur effectus præstissime. Lac laurocerasi pro gargarismate in angina pituitoso-inflammatoria exhibitum profuit. \*\*\*

Imo ipsa aqua stillatitia laurocerasi ad guttas 30 ter de die data potentissima vi viscidum tenax sine stimulo attenuandi gaudere fertur, ideo in hectica a visciditate feri, in me-

\* Mulier biberat aquæ laurocerasi paullulum supra cochleare, at sine ullo damno vomitorio usa.

\*\* Ill. MURRAY app. med. Vol. 3. p. 222.

\*\*\* Hortulanus noster Ramet pessinam anginam sibi gargarimate ex Libr. lactis cum 4 foliis laurocerasi cocti curavit. Ingens copia muci viscidii excrenebatur a qualibet elutione faucium.

Iancholia a spesitudine sanguinis, in rheumatismo viscidio laudatur. \*

## VENENA NARCOTICO - ACRIA.

Sunt vegetabilia, quæ cum vi narcotica acrimonijsam quandam junctam simul habent.

**SIGNA** sunt odor & sapor acris, & symptomata tum narcotica, tum acrimoniosa, ut vertigo, stupidas, gastritis sopor, spasmus, hæmorrhagia, sanguis putridus.

**ANTIDOTA**, sunt vomitoria & purgantia ante inflammationem ventriculi data, enemata emollientia, laxantia, aqua tepida, oleum, mucilaginosa, lac cum melle.

## HIPPOMANE MANCINELLA.

*HIPPOMANE Mancinella L. gemeine Manchinenbaum.*

**ODOR** fructuum, qui exacte poma sylvestria referrunt, pomaceus, dulcescens; **SAPOR** acidulodulcis. Omnes plantæ partes, præsertim cortex arboris & pulpa pomorum lacte turgent caustico.

**VIS NOXIA.** Lac causticum cuti instillatum vesicam excitat, oculo autem illapsum ingentem

\* Cel. BAYLAES practical essays on medical subjects. p. 37.

inflammationem & cœcitatem aliquot dierum inducit. Succus hicce e foliis vento fractis cum pluvia deciduus idem facit; linteum macula imbuit, quæ lota lacerum relinquit foramen. Sola autem exhalatio arboris innocua est. \*

*Poma* majori copia \*\* ventriculo ingesta ardorem in ventriculo & intestinis, intumescentiam abdominis, sudorem frigidum, animi deliquia, debilitatem ingentem & non raro mortem causant. *Cancer ruricola* impune hoc fructu vescitur, at caro ejus hominibus est noxia.

**ANTIDOTA.** Emetico-purgans, dein lac & oryzae Americani Nigritæ decocto *Jatrophæ multifidæ* emeto-catharsim excitant & decocto aut pulte oryzæ dolores simul leniunt. \*\*\*

**VIRTUS MEDICATA.** Non nota.

\* Cel. JAQUIN cum sociis, tribus horis sub umbra arboris experimenti causa degens nil mali sentiebat.

\*\* Gravida femina tale pomum, Götting: *Anzeigen von gelehrt. Sachen* 1751. p. 70. & alia femina tria poma talia absque noxa comedit. *Gazette salutaire* 1761. m. vi.

\*\*\* *Philosoph. Transact.* vol. I. P. II. p. 277. Miles robustus 24 circiter poma Mancinellæ ob gratum saporem acidum ingurgitabat. Hora elapsa post

## HIPPOMANE BIGLANDULOSA.

*HIPPOMANE biglandulosa* L. Lorbeerblättrichter  
Manchinelbaum.

VIS NOXIA præcedentis. \*

## C O C C U L U S I N D I C U S.

*MENISPERMUM Cocculus* L. Fischkörner. Kas-  
koskörner.

ODOR fructum nullus. SAPOR intense amarus,  
diutissime ori inhærens.

VIS NOXIA. Hi fructus piscibus & aliis animali-  
bus stuporem, felibus & canibus convulsio-  
nes & mortem causant. \*\* Indi ex hisce nu-  
cibus formant pastam admixto subinde ster-  
core humano, quam in aquam injiciunt, cum  
pisces eam delibant, tanto corripiuntur stu-  
pore & vertigiie, ut manibus capi possint. Sic

pastum valde intumescet abdomen, ingentem af-  
dorem in eo sentiebat, erigere se non potuit, labia  
erosa erant, sudor frigidus erupiebat. Nigrità po-  
tum e foliis jatrophæ multifidæ præbebat militi ægro-  
to, sic emesi & catharsi excitata remittebant sym-  
ptomata. Pulmentum ex oryza curam absolvebant  
adeo ut post 24 horas sanatus esset miles.

\* Cel. PLUCKENET almagest. botanicum p.  
369. succum venenatum continere dicit.

\*\* WEPFER p: 184. & 194. Cel. HILLEFELD  
p: 34. & 37.

etiam crocodyli & alia animalia captantur. Non ideo tamen insalubres esui sunt pisces, qui hoc veneno perculsi fuere. Neque alia observatio prostat, quæ hos fructus hominibus esse venenatos probaret.

#### ANTIDOTA antinarcotica & antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** Radix hujus fruticis apud Indos tanta in æstimatione est, ut *radix omnia sanans* vulgo appelletur. Pulverem radicis inspergunt locis pediculosis; vulneribus & ulceribus sordidis, quæ inde deterguntur & sanantur. *Interne* radicis ʒʒ in diarrhæis, indigestione, flatibus, colica, febribus mali- gnis & intermittentibus exhibere solent.

#### CORIARIA MYRTIFOLIA.

**CORIARIA myrtifolia** L. *Myrthenblätterichter Gerberstrauch.*

**VIS NOXIA.** Epileptica, stupefaciens. Homines, qui baccas incaute assument, epilepsia non quidem diu durante at saepius redeunte & mortem brevi inferente corripiebantur. \*

\* Hanc vim epilepticam primus observavit *Ill SAVAGES.* vide *Histoire de l'academie royale des sciences a Paris 1739.* p. 473. Puer 10 annorum & ruricola sanus 40 annorum post medium a baccis commestis horam convulsi periæ.

ANTIDOTA. Vomitorium, antinarcotica cum antacribus.

### N U X   V O M I C A.

*STRYCHNOS Nux vomica*, L. Krähenaugen,

ODOR nucis nullus. SAPOR intensius amarus.

VIS NOXIA. Hominibus magna solummodo dosis deleteria est; vertiginem, pandiculationes, convulsiones, tremores excitans. Periit puella decennis ex nucis hujus granis XV bis ad curandam quartanem ingestis post summas anxietates & vomendi conatus. \* Alia femina ab exhibita nuce vomica periculosis convulsionibus correpta fuit, cum sequente rigore & stupore fere omnium sensuum. \*\*

Non solum animalibus, quæ clausis palpebris in lucem prodeunt sed etiam plurimis aliis, quæ apertis nascuntur oculis, lethale venenum est. Toti canum generi saepe ad pauca duntaxat grana lethalis est. Venatores nuce vomica utuntur ad interimendos vulpes, lupos, mures. Deglutita haec nux intra semihoram vires narcoticas deleterias exferit, tametsi in ventriculo vix solvitur, quod sectiones caderum demonstrarunt.

\* Cel. HOFFMANN med. system 4. p. 385.

\*\* Cel. STEUTER diff. §. II.

**ANTIDOTA.** Vomitorium, acetum, antinarcotica,  
herba Paris. \*

**VIRTUS MEDICATA.** Anodyna & simul roborans.

Circa finem dissenteriæ evacuatis prius primis  
viis cum rheo ad grana vj vel x laudatur. \*\*

*Tinctura nucis vomicæ aliquantum ustulatæ*  
ad vermes, febres intermittentes, cancerum, do-  
lorem uterinum commendatur. In Ceylonia nux  
vomica interne ut specificum contra morsum Co-  
lubri Najæ propinatur. Alii in malo hypochon-  
driaco, hysterico, mania, peste & dolore colico  
laudant. \*\*\*

## L I G N U M C O L U B R I N U M.

**S T R Y C H N O S** *Colubrina* L. *Schlangenholz.*

**ODOR** ligni nullus, **SAPOR** debilius amaricans,  
subacutus.

**VIS NOXIA.** Recens lignum & radix narcotica  
acris, emetica, tremorem, insensilitatem &  
amentiam causans. \*) Aetate & siccatione  
maxima pars virulentia perit.

\* Vide *Paris quadrifolia*.

\*\*) *Schwed. Abh.* 35 Band p. 281. Plurimi da-  
to rheo & nuce vomica ad X grana bis de die a  
dysenteria post febrem putridam orta sanati fuere.

\*\*\*) *Ill. MURRAY ap. med. vol. 1. p. 482.* autho-  
res hac de re citat.

\*) *Haidig observ. Cent. obs. 7.*

**ANTIDOTA.** Vomitorium cum antinarcoticis & antacribus.

**VIRTUS MEDICATA.** Ob modicam virtutem emeticō - catharticā, anthelminticā & tonicā ad curam febrium intermittentium & verium adhibetur. Indi hoc lignum ad morbus fermentem commendant.

### F A B A I G N A T I I.

*IGNATIA amara L. Ignatiusbohne.*

**ODOR** fabæ nullus. **SAPOR** amarissimus.

**VIS NOXIA.** Scrupulus unus & ultra vertiginem, tremorem totius corporis, animi deliquia & motus convulsivos cum sudoribus frigidis excitat, \*

**ANTIDOTA.** Præcedentis.

**VIRTUS MEDICATA.** A granis v ad x est tonica, narcotica, subemetica, anthelmintica, emmenogoga. Ad curam tertianæ laudatur.

### N E R I U M O L E A N D E R.

*NERIUM Oleander L. Oleander.*

**ODOR** florū dulcescens. **SAPOR** totius plantæ amarissimus, acris.

**VIS NOXIA.** Odor florū in clauso cubiculo mortem inferre & qui comedérat assaturam in ver-

\* Cel. HEIDE Cent. observ. 7.

ru ex oleandri ligno exciso pati aestuationem,  
amentiam , syncopen & mortem dicitur. \*

**ANTIDOTA.** Emeticum , antinarcotica & antacria.

**VIRTUS MEDICATA,** non nota.

### A T R O P A   B E L L A D O N N A .

**A T R O P A** *Belladonna* L. *Wolfskirsche.* Multis  
*Solanum furiosum* audit.

**ODOR** foliorum & baccarum vix ullus. **SAPOR**  
foliorum herbaceus , acrisculus , subnarcoticus.  
**SAPOR** baccarum recentium dulcescens ,  
fatuus , subadstringens.

**VIS NOXIA.** Ex plantis veneno narcotico deleteriis fere primaria est ; Pueris baccæ cum cerasa æmulentur, saepe imposuerunt, hinc sexcentæ in observatorum scriptis occurrunt observationes de vi deleteria baccarum belladonnæ comestarum. \*\*

Infantes quatuor , qui copiam baccarum ad satietatem deglutiverant , post semihorium circiter invasit inebriatio , delirium , fitis molestissima , nifus vomendi irritus , dein correpti sunt vero furore , cum stridore dentium & convulsionibus. Pupilla palpebris diductis

\* LIBAUTIUS Comment. de venenis. SCHENUIS de venenis.

\*\* Ill. MURRAY app.-med. vol. I. p. 430.

persistit immobilis. Facies profunde rubra & tumida. Maxillas spasmodus comprimit, & deglutitio labefactata fuit. Ipsa sensilitas & irritabilitas ventriculi adeo deleta apparuit, ut nec larga tartari emeticici dosis effectum exsereret, quem tandem praestitit titillatio faucium per plumam oleo intinctam, ulterius solutione emeticici continuata. Alternis inter emeticum yicibus acetum cum melle aqua mixtum exhibebatur. Hisce furor conticuit, sed sopor profundissimus successit, tendinum subsultibus stipatus, compalluit facies, & haec una cum manibus frigida evasit, cum pulsu duro, parvo, celeri. Clysmata tum ex floribus chamomillæ, aceto, oxymelle & sale applicata copiam baccarum contritarum elicuerunt; Hisce & purgante addito, tertio die resipuerunt & coecitas quoque diu et si superstes disperauit. \* Verum alii, quibus tempestivus vomitus non subvenit vel non sufficiens misere perierunt. \*\* A viño belladonna infecto gangrena universalis & mors memoratur. \*\*\*

*Folia* baccas vi narcotica vincunt, si internè majori dosi deglutiantur. Folii recentis

\* Cel. M A Y in *Hann. Magaz.* 1773. n. 97.

\*\* Cel. BOUCHER in *Journal de Med.* 1766.

frustulum ulcusculo cancroso subter oculum impositum, pupillam insigniter dilatavit, idque repetito aliquoties in eadem persona experimentum. \*)

{ **ANTIDOTA.** Vomitorium, dein acetum, oxymel, elysmata acida, purgans, aqua frigida, lac potatum.

**VIRTUS MEDICATA.** *Usus externus.* *Folia recentia* scirrhos & cancrescentes mammas discusserunt.  
\*\*) In hæmorrhoidibus, ulceribus carcinomatosis, & gangrænōsis eadem applicata laudantur. \*\*\*) *Radix lacte* in cataplasma cocta tumorem insignem intestini recti, obstructiōnem alvi creantem, ano & perinæo applicata, dissolvit. \*)

*Usus foliorum internus* in scirrhis, cancro, ictero obstinato ab infarctu ipsius hepatis in mania & melancholia \*\*) in epilepsia habituali, demum in rabie canina hominum & ani-

\* *Cel. RAYUS Hist. plant.* T. 1. p. 680.

\*\*) Idem l. c.

\*\*\*) *Cel. BÖCLER* in *HERM. M. m.* T. 2. p. 321.

\*\*) *Med. & phil. Commentaries Vol. 1.* p. 419.

\*\*) *Cel. EVERS* in *Berlin. Samml.* T. 5. p. 565, foliorum grana quinque cum totidem granis rhei semel per diem dat, subjuncto plerumque post duodecim doses purgante salino.

maliūm, atque variis pecorum morbis utilis  
fuit s̄epe sed non semper deprehensus. \*

**Dosis** Granum unum *pulveris* saccharo mixti vel  
*extracti* granum unum & dimidium mane &  
vesperi in forma pilulari datur.

**Dosis** in rabidi canis morbu: *Radicis* gr. xv. adul-  
to infanti sexenni grana v. dantur: Idque ma-  
ne vel in aqua vel cerevisia calida. Repe-  
titio prima fiat post 48 horas, secunda & ter-  
tia post idem tempus bis vel ter. Sympto-  
mata a belladonna excitata aqua frigida &  
lacte poto sedantur.

### NICOTIANA TABACUM.

*Nicotiana Tabacum* L. *gemeiner Tobak.*

**ODOR** foliorum recentium debilius narcoticus, sic-  
catorum vero fortior. **SAPOR** recentium ama-  
ricañs, acriusculus.

**VIS NOXIA.** Ventriculo ingesta nicotiana emeto-  
catharsin, vertiginem, stuporem narcoticum  
inducit; a pulvere nimis copioso assumpto co-  
ma somnolentum, tandem apoplexia lethalis  
nata. \*\* Cerevisia cocta enormes vomitio-  
nes, & alvi dejectiones cum anxietate & de-

\* *Ill. MURRAY ap. m. v 1. p. 433. & seq.*

\*\* *E. N. C. Dec. 2. Ann. 10, obs. 131. p. 222.*

bilitate summa crearunt subsequente sopore  
& larga sudatione. \*

**VIS NOXIA EXTERNA.** Fœmina, ad tineam  
capitis sanandam linimentum ex pulvere ta-  
baci & butyro tribus suis filiolis inunxit, un-  
de mox vertigine & vomitionibus diris  
correpti æstuarunt, sudarunt, animo deli-  
querunt; per 24 horas instar temulentorum  
incedentes, sed quiete & syrupo de citro re-  
stituebantur. \* Decoctum foliorum scabio-  
sis partibus applicatum vomitum cruentum &  
convulsiones creavit. \*\*\* Si acu & filo oleo  
tabaci madido pars animalis vivi vulneratur,  
illud mox perit. \*) Etiamsi exigua quantitas  
ab hominibus impune deglutiatur.

**ANTIDOTUM,** acetum, succus citri, aqua cinano-  
mi, oleum cum lacte.

**VIRTUS MEDICATA.** *Infusum* nicotianæ emetici  
loco in initio febrium putridarum in suecia  
adhibetur. *Extractum* in tussi pituitosa ad  
granum unum in cochleari aquæ cinanomi da-  
tum sæpe prodest. *Clysmæ* ex infuso vel fu-  
mo tabaci alvum potenter solvit, hinc in ileo,  
& hernia incarcerata at absente inflammatione

\* Cel. DIEMERBRÖK *Tr. de peste* p. 294.

\*\* Eph. N. C. *Dec. 2. An. 4. p. 46.*

\*\*\* VANDERMOND *Rec. period. T. 7. p. 67.*

\*) Cel. RHEDI *Esperim. nat.* p. 50.

Bonum est remedium. *Fumi suffio obesis,*  
*leucophlegmaticis, odontalgia rheumatica la-*  
*borantibus conductit.* *Fomentum e decocto*  
*tabaci paraphymosin chronicam & alias tu-*  
*mores induratos discussit.*

### NICOTIANA RUSTICA.

*NICOTIANA rustica L. Bauerntobak.*

**VIS NOXIA** præcedentis at debilior.

### NICOTIANA PANICULATA.

*NICOTIANA paniculata L. Jungferntobak.*

**VIS NOXIA** præcedentis at adhuc debilior.

### NICOTIANA GLUTINOSA.

*NICOTIANA glutinosa L. Soldatentobak.*

**VIS NOXIA** major, quam præcedentium omnium.

### BRYONIA ALBA.

*BRYONIA alba L. Zaunrübe. Gichtrübe.*

**ODOR** radicis narcoticus, nauseofus. **SAPOR** acri-  
 usculus, substipticus, nauseofus. *Baccarum*  
 sapor fatuus, odor nauseofus.

**VIS NOXIA** radicis recentis subemetico-purgans;  
 vi narcotica temulentiam, vertiginem & amen-  
 tiam inducens.

**ANTIDOTUM.** Emeticum dein antinarcotica.

VIRTUS MEDICATA. Ut purgans hydrogogum in ascite & astmate laudatur.

### CHÆROPHYLLUM SYLVESTRE.

*CHÆROPHYLLOM sylvestre L. wilder Kälberkropf.  
Herba cicutariæ.*

ODOR herbæ contusæ ingratus. SAPOR amaricans, subnauseofus.

VIS NOXIA. Radix tempore hyberno effossa delirium ferox, soporem, temulentiam, anxietatem & suffocationem procreare dicitur, nihilominus nullum tamen prostat exemplum mortis inde secutæ.

ANTIDOTUM præcedentis.

### CHÆROPHYLLUM BULBOSUM.

*CHÆROPHYLLOM bulbosum L. bolliger Käl-kropf. Peperlsalat.*

ODOR radicis junioris nullus. SAPOR subdulcescens, instar apii.

VIS NOXIA. Semen capitis dolorem, vertiginem & gravedinem inducere dicitur; eadem symptomata esu radicis causari putantur. At ego & mea familia multoties his radicibus recentibus in juscule, tum & acetarii forma sine noxa vescebamus. Forsitan radix plantæ adulæ temulenta est.

VIRTUS MEDICATA. V. *Bromatologiam.*

## CHÆROPHYLLUM TEMULENTUM.

*CHÆROPHYLLOM temulentum L.* berauschender  
Kälberkropf.

VIS NOXIA. Temulentiam inducit.

ANTIDOTUM. Acida.

## AETHUSA CYNAPIUM.

*AETHUSA Cynapium L.* gleise Hundspetersilge  
der kleine Schierling. *Cicuta minor.*

VIS NOXIA. Radix & herba cardialgiam, chole-  
ram atrotem, furorem, soporem, intumescen-  
tiam lividam totius corporis & non raro mor-  
tem infert.

ANTIDOTUM, promisso vomitorio dentur acida  
& obvolventia.

VIRTUS MEDICATA non nota.

## SIUM LATIFOLIUM.

*SIUM latifolium L.* breitblätterichter Wassermerk.

ODOR gravis fere resinofus. Sapor subacris.

VIS NOXIA. Radix ante æstatis medietatem absque  
noxa comedи posse dicitur. Post medietatem  
vero effossa & comesta pueris quibusdam fu-  
rorem & mortem intulit. \*

ANTIDOTA. Præcedentis.

\* Schwed. Abh. XI. B. IV. Viert. g. St.

⁂ ( 128 ) ⁂  
C I C U T A V I R O S A.

*CICUTA virosa* L. *Wasserschierling.* *Cicutæ aquatica.*

**O**DOR foliorum recentium contusorum in apium graveolens incidit, at acutior est. **S**APOR non ingratus petroselino fere congruens. **R**adix recens tempore vernali resecta lacte lutescente valde viroso scatet.

**V**IS NOXIA. Radicis effectus venenati sunt: temulantia, vertigo, cardialgia, vehemens ardor ventriculi, inanis vomendi conatus; meteorismus abdominis, singultus, fitis, spasmodus maxillæ, convulsio, inflammatio ventriculi atque intestinorum, gangræna, & mox.

Pueri duo & puellæ sex radicem loco pastinacæ comederant, unde plerique mortui, pauci post vomitum convaluere. \* Alius homo vertiginem, delirium & superstitem dia ardorem summum ventriculi, fitimque intensam, tumorem præterea erysipelaceum ad collum sese propagantem eadem sibi contraxit. \*\*

---

\* *Ill. WEPFERI historia cicutæ aquatica. Basilea 1716.* & *Cel. SPRÖGEL experimenta circa venena. Göttingæ 1753. p. 15.*

\*\* *Eph. N. C. Cent. 10. obs. 58. p. 355.*

Radix & folia verno tempore magis venenata quam alio esse videntur, herba & radix siccata vix amplius brutis venenum sunt. \*

**ANTIDOTA.** Vomitorium.

**VIRTUS MEDICATA.** Experimenta instituenda loco conii maculati. Radix in pultem contusa cruda vel cocta ad loca rheumatica vel arthritica & herpetica applicatur.

**C O N I U M   M A C U L A T U M .**

*C O N I U M maculatum L. gefleckter Schierling.*  
*Cicuta terrestris.*

**ODOR** plantæ totius fœtidus, murinus; *siecatæ* fortior. **SAPOR** recentis leniter aromaticus, herbaceus, subnauseosus.

**VIS NOXIA.** In subiectis sensilioribus vertiginem, debilitatem, imo & cœcitatem periodicam, delirium, soporem, anxietatem, cardialgiam, vomitum, convulsionem, imo ipsam mortem inducit, quæ vero rarius ex conio contingit quam ex cicuta virofa. \*\*

**ANTIDOTUM.** Vomitorium.

\* *Schwed. Abhandlung* 35. B. & Ill. BERGIUS l. c. extractum sensim ad Drachma j. & decoctum foliorum saturatum ad Lib. iv. absque effectu noxiø intra 24 horas dedit.

\*\* Ill. HALLERI *Hist. stirp. helv.* n. 266.

**VIRTUS MEDICATA.** Uſus *externus* cancerum scrophulosum & alios tumores induratos atque ulcera cancreſcentia \* quandoque curat, ſi *extractum* forma emplaſtri applicetur. *Lotiones* ex cicuta ſcabiem, tineam \*\* aliosque morbos cutaneos, leucorrhæam, ozoenam fanarunt.

Uſus *internus* in iisdem morbis ut & in gonorrhæa, phthysi ſcrophulosa, atrophia infantum, rheumatismo chronico, impotentia virili, cataracta incipiente, polypo cancroſo &c. laudatur. Vid. *Pharmacologiam chirurgicam*.

### MERCURIALIS PERENNIS.

**MERCURIALIS** *perennis* L. beständiges Bin-gelkraut.

**ODOR** graveolens fœtidus. **SAPOR** ingratus, americans.

**VIS NOXIA** stupefaciens.

\* *Ill. L. B. de STÖRCK libelli 2. de cicuta & libelli quo continuantur experimenta.*

\*\* *Ill. MURRAY de medendi tinea capitis ratione paralipomena Göttingæ 1782. p. 21.* puellæ tinea favosa iam a longo tempore deturpatæ præter internum cicutæ uſum, qui a granis 2 ad ſcrupulos tres de die ascendebat, cucupham herba ſicca cicutæ repleteam & aqua coctam die noctuque gestari in capite jussit qua methodo tinea curabatur.

ANTIDOTA. Antinarcotica.

VIRTUS MEDICATA. Non nota.

---

## F U N G I   V E N E N A T I.

Fungi generatim veneno censentur suspecti, qui *odore* tetro & *sapore* acri, rodente instruuntur, atque qui sibi relicti cito in liquamen putridum abeunt.

Color fungi *luridus*, stipes *cavus*; superficies *viscida*; *induratio* sub coctura, *nigredo* cepæ cum fungo suspecto coctæ, nil certi de indole venenata fungi designant. \* Unicum certum criterium est exacta fungorum venenatorum notitia botanica.

In quibusdam fungis ut *Agarico integrō* & *laetifluo* nec botania prodest, cum Agarici venenati & esculenti perfecte eadem sit facies

---

\* Agaricus enim *integer* modo ruber, modo livido-  
cœruleus, modo sordide virens est, & tamen esculen-  
tus. Agarici *mammosi* & agarici *Mouceron* stipes ca-  
vus est & tamen non insalubris &c. demum multi  
viscidam gerunt superficiem & tamen esculenti sunt,  
coctura demum fungi indurescunt omnes. Ill. FRANK  
*System einer vollständigen medicinischen Polizey* 3. B.  
p. 292. & Cel. A. CARTHEUSER *programma de*  
*fungorum venenatorum notis. Giessæ 1717.*

**externa.** At in hoc casu sapor acris venenatum ab esculento sufficienter distinguit. Ideo coqui vel coquæ a singulo agarico, quem pro culina præparant, frustillum dentibus decerpant & manduent, si in eo acritatem deprehendant, illico fungum abjiciant.

**ANTIDOTA.** Emetica, purgantia, haustus aquæ gelidæ. Nec oleum, nec acetum, nec piper quid profundt, imo acrimoniam fungi augendo nocent.

### AGARICUS MUSCARIUS.

*AGARICUS muscarius L. Fliegenschwamm.*

**ODOR** teter nauseofus. **SAPOR** acris.

**VIS NOXIA.** Exigua dosi ventriculo ingestis exhilarat, inebriat, majori dosi vomitum, furorem, tormina, animi deliquia, alvi fluxus dolorificos, convulsiones inducit atque mortem. \* Muscæ aquam cum hoc fungo decoctam bibentes inde stupefiunt, succus cimines necat, si lectorum juncturæ eo illiniuntur.

**ANTIDOTA.** Præter vomitoria & purgantia haustus aquæ frigidissima, glaciata.

**VIRTUS MEDICATA.** Pulvis inspergitur ulceribus

\* Cel. LÖSEL *Flora Pruss.* op. Gottsch. Regiomonti 1703. p. 88. Sex homines ab ejus esu moriebantur.

cancrofis, cancrentibus, cariosis, scrophulosis, in nodis exulceratis mammarum. \*

*Uſus internum.* In epilepsia \*\* 3j quotidie in aqua vel quod melius in aceto datur. Radix abjecto stipite & pileo mense augusti in umbra vel super fornace siccatur, dein radula in pulverem rasa pro uſu servatur.

Kamtschathali ex agarico muscario & epilobio angustifolio potum valde inebriantem sibi conficiunt, quem magnates illorum in deliciis habent; servi qui urinam magnatum ebriorum bibunt, adhucdum inde ebrii redundunt, vix vero afficiuntur, qui servorum urinam hauriunt. \*\*\*

### AGARICUS INTEGER VENENATUS.

*Agaricus integer venenatus* KRAPFII *Gifttaubling.* *Agaricus emeticus* SCHÆFERI *Spey-*

\* Cel. WHISTLING *diss. de virtutibus agarici muscarii vulgo Fliegenschwamm tam internis quam externis, experimentis atque observationibus comprobatis.* Jenæ 1778.

\*\* Cel. BERNHARD. *chymische Versuche und Erfahrungen &c.* Leipzig 1755. p. 323. plures epilepticos dicit se pulvere radicis agarici muscarii curasse. Idem confirmat. D. WHISTLING l. mox citato §. 7.

\*\*\* Cel. KRASCHEMINCKOW *natural history of Kamtschatha.* p. 209.

*teufel.* Habitu, figura & colore agarico integro *esculento* perfecte similis est, sed differt ab *esculento*, ODORE tetro, SAPORE acri, nauseoso, fere caustico & carne laxa. \*

**VIS NOXIA.** Inducit anxietatem, vertiginem, nau-  
seam, vomiturbationem, tormina, alvi fluxum  
dysentericum, meteorismum, quandoque mor-  
tem. Unicus agaricus venenatus cum pluri-  
bus *esculentis* coctus omnes reddit venenatos.  
\*\* Hinc coquæ singuli agarici, quem pro cu-  
lina præparant, fustillum manducare, ut acri-  
tatem detegant, teneantur.

**ANTIDOTA.** Mox ab ingestis fungis venenatis ex-  
hibeatur vomitorium dein purgante intesti-  
na eluenda. Tormina, vomituritio & al-  
vi fluxns optime moderantur aqua frigidis-  
sima, glacie adhuc magis gelida reddita.

---

\* Cel. K R A P P *Beschreibung der in Unterö-  
sterreich wachsenden Schwämmen.* 1. Heft p. 9.

\*\* An ex hac observatione explicari potest, cur quibusdam authoribus visum fuerit, fungos eosdem certis anni temporibus esse *esculentos*, aliis venenatos, aut eosdem fungus pro diversitate soli, quo nutritur esse bonos vel malos, prout hoc de plantis quibusdam dicitur, at Cel. K R A P P II agaricus integer venenatus in eodem solo cum *esculentis* crescebat.

Nec oleum, nec acetum, nec piper antidota sunt, omnia enim hæc acrimoniam hujus fungi augent. \*

### AGARICUS INTEGER VISCIDUS.

*AGARICUS integer viscidus KRAPFII.* \*\* Schmierling, stinkender Taubling — schleimiger gelber Taubling.

Fungus agarico similis est, at viscore digitos tangentes inquinat, foetore & sapore tetro, nauseoso.

**VIS NOXIA.** Odore tetro capitis dolorem & temulentiam infert, sapore nauseoso vomitacionem causat. Siccatus & aridus fungus hanc indolem non perdit.

**ANTIDOTA.** Vomitorium, haustus aquæ frigidissimæ, longior coctura in aqua hunc fungum noxia qualitate adeo privat, ut esculentus evadat.

### AGARICUS LACTIFLUUS VENENATUS.

*AGARICUS lactifluus venenatus KRAPFII* \*\*\*  
Giftbrädling.

\* Cel. KRAPF l. c. 1. Heft p. 14. §. XIV. hic fungus cum aceto masticatus vel in aceto vel oleo coctus acrior evadit, nec piper, nec satureja nec origanum acrimoniam diminuunt, ut multi opinabantur.

\*\* L. c. 2. Heft p. 11.

\*\*\* L. c. 2. Heft p. 11.

Fungus agarico lactifluo similis, sola lactis acrimonia ab eo differens.

**VIS NOXIA**, anxietatem, cardialgiam, enormes vomitus atque torminofas alvi dejectiones causat. \* Mulier sedato vomitu ab esu hujus fungi orto per integrum annum morbosā, languida, emaciata mansit, tandem cum fere esset moribunda copiosissimo corripiebatur sudore, qui in viridem pulverem exsiccabatur, adeo ut magna in copia ex indusio & linteamine executi posset, quo sudore finiente penitus convaluit. Alia mulier cum sua 10 annorum filia aliquot agaricos lactifluos venenatos cum aceto, oleo & pipere conditos comedebat. Infelix puella vomiturionibus rapiebatur, mater vix post vomitus & dolentissima tormina servari potuit.

**ANTIDOTA.** Inde iterum patet nec oleum, nec acetum, nec piper esse hujus fungi antidotum. Fungus in oleo coctus acrior fere evasit, in aqua vero per  $\frac{3}{4}$  horae coctus adeo mitescit, ut impune comedri possit. \*\* Haustus aquae frigidissimae optimae compescuit vomituritionem, tormina & alvifluxum, qui vero ab initio aptis remediis promoveri debet, ut Ipecacuana, sale amaro, manna. Evacuato veneno the-

\* Cel. K R A P P l. c. p. 12.

\*\* Cel. K R A P P l. c. p. 14.

riaca turbæ remanentes sedari & sudor profici debet.

### AGARICUS PIPERATUS.

*AGARICUS piperatus L. Pfefferschwamm.*

**ODOR** fungosus; **SAPOR** acris, piperis ad instar causticus.

**VIS NOXIA.** Fungus crudus lacte croceo valde acri & fere caustico repletur, hinc crudus cardialgiam & alia mala infert imo & mortem.

**ANTIDOTA.** Coctura fungi indoles acris mitescit.

In Russia, ubi fungus hicce in doliis ad tempus quadragesimæ reservatur, comedì solet.

Forsitan in hoc climate fungi venenum est mitius.

### AGARICUS FIMETARIUS.

*AGARICUS fimetarius L. Mistschwamm.*

**VIS NOXIA** præcedentis.

### AGARICUS PUSTULATUS.

*AGARICUS pustulatus POLLICHII. blaterichter Schwamm.*

**VIS NOXIA.** Pluribus infaustis casibus innotuit, hunc fungum venenatum esse. \*

\* Cel. POLLICH *historia plantarum in palat. Electorali sponte crescent.* T. III. p. 286.

ANTIDOTA præcedentium.

A G A R I C U S   N E C A T O R .

*AGARICUS Necator* L. *Mordschwamm.*

VIS NOXIA. Cardialgiam, tormina, vomituritionem causat.

ANTIDOTA. Vomitorium, purgans.

A G A R I C U S   S A N G U I N E U S .

*AGARICUS sanguineus* L. *blutrother Schwamm.*

VIS NOXIA præcedentis, vesicas in lingua excitat masticatus.

A G A R I C U S   V I S C I D U S .

*AGARICUS viscidus* L. *klebrichter Blätterschwamm.*

VIS NOXIA. Censetur venenatus.

A G A R I C U S   C L Y P E A T U S .

*AGARICUS clypeatus* L. *Schildförmiger Blätterschwamm.*

VIS NOXIA præcedentis.

B O L E T U S   V E R S I C O L O R .

*BOLETUS versicolor* L. *bunter Löcherschwamm.*

VIS NOXIA; censetur suspectus.

### BOLETUS ELEGANS.

*BOLETUS elegans* L. zierlicher Löcherschwamm.

VIS NOXIA præcedentis.

### BOLETI PARASITICL.

Boleti generatim fere omnes, qui truncis putridis arborum vetustarum accrescunt, suspecti veneno censentur.

### PHALLUS IMPUDICUS.

*PHALLUS impudicus* L. unverschämter Gichtschwamm.

VIS NOXIA. Fungus adhuc impuber hominibus & animalibus scopo aphrodisiaco ingeritur, \*

### PHALLUS MUKUSIN.

*PHALLUS Mukusin* L, \*\* chinesische Morchel.

HABITAT in China prope Pekin in mori radicibus putridis.

VIS NOXIA. Chinensisbus raro edulis cum saepe venenatus & verminosus reperiatur.

VIS MEDICATA. Laudant Chinenses hunc fungum, ut præstans remedium in ulceribus cancerosis,

\* Cel. GLEDITSCH method. fung. p. 58.

\*\* Ill. LINNÆ supplem. plantar. p. 452. &  
Acta petropol. v. 19. p. 373. t. 5.

si tantum externe adhibetur, ob quam efficaciam incolis notissimus est fungus.

### LYCOPERDON CARCINOMALIS.

*Lycoperdon carcinomalis* L. \* *Krebstrufel.*

HABITAT in capite bonæ spei.

VIS NOXIA præcedentis.

VIS MEDICATA. Pulvis in Capite bonæ spei ad ulcera cancrofa in usu est.

### FUNGI NONDUM DETERMINATI.

Fungi venenati in systemate Linnæano nondum ritte determinati, sunt

1. *Fungus mediæ magnitudinis totus albus.* \*\*
2. *Agaricus pileo coccullato, viscido & nigro;*  
petiolo fistulato candido. \*\*\*
3. *Agaricus pileo plano, viscido citrino &*  
splendente, vertice in conum acutum fa-  
stigiato, lamellis rarioribus. \*)
4. *Agaricus candidus & viscidus ex una basi*  
multiplex, pileolo campanulato, in cen-

\* LINNÆI. c.

\*\* CEL. GMELIN.

\*\*\* Catalog. plantarum sponte circa Giss. nascent.

p. 185. & CEL. CARTHÉUSER I. c.

\*) L. e. p. 130.

tro depresso, petiolo cylindraceo, gracili. \*

5. *Amantia coniformis* viscosa, lutea.
6. *Amantia*, globosa, viscosa, fuscida lutea

DILLENII \*\*

---

## V E N E N A   A C R I A.

Venena, quæ caustica acritate instruuntur, huc pertinent.

*Noscuntur* sapore acerrimo, cardialgia urente, vomititione, colica, tenesmo, sanguifluxu, vesicis in cute excitatis si externe applicentur, mens non adeo ab initio saltem ut a venenis narcoticis afficitur.

**A**NTIDOTA præmisso vomitorio ex vitrioli albi granis decem vel ex rad ipecacuanhae 3 ℥ cum 10 granis boracis, sunt aqua tepida, oleum, mucilago, mel, ovi vitellus & albumen lacte dilutum, mixtura oleoso-mucilaginea, lac, enemata, fomenta, in quibusdam acetum, succus citri, Sal tartari, borax.

## D E L P H I N I A   S T A P H I S A G R I A.

*DELPHINIA Staphisagria* L. *Laussamen.*

ODOR seminum foetidus. SAPOR intense amarus,

---

\* *L. c.*

\*\* *GLEDITSCH meth. fung.* p. 109.

aēris, nauſeofus, diu inhārens, masticata  
fauces erodens.

**VIS NOXIA** vomitoria, draſtico, ventriculum in-  
flammans.

**ANTIDOTA** antacria.

**VIS MEDICATA.** Externe adhibetur ad fugandos  
pediculos, ad curandam scabiem & ulcerā  
fungosa.

### S E M E N S A B A D I L L I.

An *VERATRUM Sabadilli. Sabadillsaamen.*

**ODOR** semen vix ullus, **SAPOR** capsulæ ipsius  
nullus, sed seminis amarissimus & acerrimus,  
linguam & fauces vi cauſtica diu inhārente  
afficiens.

**VIS NOXIA.** Major copia seminis ingesta draſtico-  
emetica, ventriculum & intestina inflammans.

**ANTIDOTA** antacria.

**VIS MEDICATA.** Hæc semina fungant cimices &  
capillis capitis inspersa vel vestibus insuta,  
pediculos. Nuper interne contra tæniam &  
lumbricos ad 3ß quotidie per 15 dies cum  
fructu & absque noxa dabantur. \*

\* Cel. SCHMUCKER vermischtē Schriften 2. B.  
p. 271.

## RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

*RHODODENDRON Chrysanthum L. Sibirische Schneerose.*

**ODOR** herbæ siccæ nullus, **SAPOR** adstringens, amaricans, decoctum fauces urens & adstringens.

**VIS NOXIA.** Draftico - emetica, torminosa, inflammans.

**ANTIDOTA** antacria.

**VIS MEDICATA** antipodagrīca, antarthritica. \*

**DOSIS.** Rx. Stipitum & foliorum rhododendri chrysanthi 3 ij, infundantur cum aquæ fontanæ 3 ix, stent in digestione in vase bene obturato per 24 horas ad ebullitionem usque.  
Colatura detur.

## FRITILLARIA IMPERIALIS.

*FRITILLARIA imperialis L. Kayserkrone. Corona imperialis.*

**ODOR** radicis teter, nauseosus. **SAPOR** acris, mordax, urens.

\* Cel. KOLPIN praktische Bemerkungen über den Gebrauch der sibirischen Schneerose in Gichtkrankheiten, Berlin 1779. & Cel. GRÜNER Almanach für das Jahr 1783. p. 171. Pluribus observationibus demonstrant hi duo viri celeberrimi efficaciam hujus plantæ in podagra.

**VIS NOXIA.** Radix ventriculo ingesta inflammationem & gangrænam producere dicitur.

**ANTIDOTA.** Emeticum, dein antacria.

## C O L C H I C U M A U T U M N A L E.

*COLCHICUM autumnale L. Zeitlose.*

**ODOR** radicis recentis tempore æstivali & autunnali hircinus, irritans, nares faucesque feriens, diu inhærens. **SAPOR** tempore æstivali acris, lingua faucesque fortius rodens, rigidas faciens, diu inhærens. Tempore vero autunnali sapor longe debilior & subfarinosus. Radix *siccata* fere effœta est.

**VIS NOXIA.** Apices digitorum succo radicis illiti stupore afficiuntur. Radix recens ventriculo ingesta fungorum more strangulatione, purgatione torminosa, inflammatione viscerum mortem infert. Cervi a comeditis foliis diarrhæa cruenta & gangræna primarum viarum pereunt.

**ANTIDOTA** præcedentis.

**VIRTUS MEDICATA.** *Oxymel colchici vi solvente* & diuretica hydropem curat & viscera obstruta abdominalia referat. \*

\* Ill. L. B. de STÖRCK libellus, quo demonstratur colchici autumnalis radicem non solum tuto exhiberi posse hominibus sed & ejus asu interno cu-

Decoctum foliorum fugat animalibus pe-  
diculos.

### P E D I C U L A R I S P A L U S T R I S .

*PEDICULARIS palustris* L. *Lausekraut.*

ODOR nullus. SAPOR aeris, urens.

VIS NOXIA. Animalia, quæ hac herba fame cō-  
cta veſcuntur, mictū cruento pereunt.

ANTIDOTA præcedentis.

VIRTUS MEDICATA non nota.

### D I G I T A L I S P U R P U R E A .

*DIGITALIS purpurea* L. *Fingerhutblume.*

ODOR herbæ nullus. SAPOR amarus in omnibus  
plantæ partibus, acris.

VIS NOXIA. Emeto - catharsim torminosam, sin-  
gultum, convulsiones, erosionem oris, ventri-  
culi & intestinorum atque mortem caufat.

ANTIDOTA antacria.

VIRTUS MEDICATA. Decoctum interne datum fru-  
mas & scrophulas curat. \* Alii plantæ

*rari quandoque morbos difficillimos.* Vindob. 1763.  
& Journal de Médecine T. XXIII. 1765. Jul. n. 2.  
p. 20 — 27.

\* V. Pharmacologiam chirurgicām p. 473.

Fl ores contusos cum axungia porcina in formam unguenti redactam externe scrophulis & ulceribus scrophulosis applicant.

**Dosis.** Succi expressi cochleare medium vel, si æger robustus est, integrum in mensura una aquæ dilutum omni die sensim datur.

### C Y C L A M E N E U R O P Æ U M.

*Cyclamen europæum* L. *Schweinsbrod.*

**ODOR** radicis recentis nullus. **SAPOR** acris, pungens, fervidus, amaricâns, ingratus. *Diu servata* fere insipida evadit. *Radix affata* mitis adeo evadit ut esculenta sit.

**VIS NOXIA.** Radix recens drastice purgat. *Sucus umbilico illitus* alvum ducere & abortum procreare fertur.

**ANTIDOTA** antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** Incertum purgans non amplius adhibetur. Grana duo naribus attracta mucum cum vel fine sternutatione eliciunt, hinc in amaurosi & cephalæa profundunt.

### P L U M B A G O E U R O P Æ A.

*Plumbago europæa* *Bleywurzel* vel *Zahnwurz.*  
*Dentillaria.*

**ODOR** nullus. **SAPOR** acris, subcausticus.

**VIS NOXIA.** Ob insignem acrimoniam habetur suspecta. Infectores, qui decoctum plumbagi-

nis europææ in magnis lebetibus parant, ut colorem paleaceum flavum obtineant, non nisi per sex horas huic operi incumbere possunt, secus incident in carum cephalalgia gravi designatum. \*)

#### ANTIDOTA antinarcotica & antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** Radix vel herba carpis applicata odontalgiæ mederi dicitur. \*\*) Oleum foliorum infusione olei olivarum paratum, sæpiusque illitum in inveteratis canceris valuisse dicitur. Alii folia oleo macerata applicant. \*\*\*) Folia necant cimices. Oleo infuso plumbaginis membra scabiosa mane & vesperi abluta curantur. \*)

---

\* Ill. SAUVAGES *Nosol.* T. I. p. 842.

\*\*) Cel. DALE *Pharmacol.* p. 121.

\*\*\*) Cel. CHATELAINE *dij. de Corallorrhiza* *Basil.* 1760. p. 13. In cancro mammarum carnes mortuæ a vivis separabantur, laudabilis suppuratio & sanatio sequebantur. Et Ill. SAUVAGES in *Histoire de l' academie de Paris* 1739. p. 471.

\*) *Angestellte Versuche der Wirkung von der Bleywurz in der Heilung der Kräze.* Vide Auszüge aus den besten französischen periodischen medic. Schriften 5 Band p. 211.

## CONVOLVULUS SCAMONEA.

*CONVOLVULUS Scamonea L. Purgierwinde.*

**ODOR** radicis nauseofus. **SAPOR** acris, ingratus.  
*Scamonium* succus crudus inspissatus hujus  
plantæ radicis est.

**VIS NOXIA.** Scamonium majori dosi datum vehe-  
mentissime purgat & humores in putridum li-  
quamen solvit. \* Inde fœtidissima excremen-  
ta a scamonio obseruantur.

**ANTIDOTA** antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** A granis v ad 10 qua pur-  
gans in morbis chronicis exhibetur.

## CUCUMIS COLOCYNTHIS.

*CUCUMIS Colocynthis L. Coloquinten.*

**ODOR** pulpæ, qua poma scatent, debilis, ingra-  
tus. **SAPOR** amarissimus, nauseofus, acri-  
usculus.

**VIS NOXIA.** Pulpa colocynthidis etiam in exigua  
dosi vehementissimas torminofas, quandoque  
sanguinolentas diarrhæas cum tenesmo, singul-  
tu & summa ægritudine facit. Dosis ma-  
jor necem infert, gravidis abortum movet.

**ANTIDOTA** antacria.

\* Ill. VAN SWIETEN Comment. I.

**VIRTUS MEDICATA.** *Extractum aquosum ad 2 vel 4 grana in morbis chronicis; tinctura ad 15 guttas purgandi causa præbetur.*

### MOMORDICA ELATERIUM.

**MOMORDICA Elaterium L.** *Eselskürbse. Cucumis asininus.*

**ODOR** pomorum nullus. **SAPOR** vix amaricans, acris. Succus lacteus e pomis extractus sub nomine *Elaterii* in officinis prostat.

**VIS NOXIA.** Elaterium majori dosi ingestum violentissimum emetocatharsim torminosum & in gravidis abortum sæpe inducit,

**ANTIDOTA** antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** A grano dimidio vel uno ad aquas hydropicorum per alvum educendas commendatur.

### CAMBOGIA GUTTA.

**CAMBOGIA Gutta L.** *Gummiguttabaum.* Succus ex arbore sauciata effluens & sponte inspissatus *Gummi gutta* dicitur.

**ODOR** hujus gummi-resinæ nullus. **SAPOR** vix nullus.

**VIS NOXIA.** Emetico-draistica, torminosa, inflammatoria.

**ANTIDOTA** antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** A granis 2 ad 4 datur qua purgans hydragogum in hydrope & tænia,  
*Externe* in herpete applicatur.

### C E R B E R A   A H O V A I .

**CERBERA Ahovai L.** *Scheelenbaum.*

**ODOR** ligni teterrimus, ferme alliaceous. **SAPOR** acris.

**VIS NOXIA.** *Nucleus* fructu inclusus est maxime deleterius. *Lignum* in stagna injectum pisces adeo reddit stupidos, ut manu capi queant. *Lignum* ob deterrium odorem pro foco struendo non est aptum.

**ANTIDOTUM.** Indi nullum huc usque contra hoc venenum notum habent. Tententur antacria,

### C E R B E R A   M A N G H A S .

**CERBERA Manghas L.** *Herzbaum.*

**ODOR** nullus. **SAPOR** acris, amarus; omnes partes acri succo lacteo scatent.

**VIS NOXIA.** Fructus valde sunt emetici & in utraque India venenati censentur, licet folia hujus arboris in Amboinia pro olere comedunt soleant.

**ANTIDOTA** antacria.

## C Y N A N C H U M E R E C T U M.

*CYNANCHUM erectum* L. aufrechter Hundswürger.

ODOR nullus. Sapor acris.

VIS NOXIA. Planta succo lacteo acri turgens. Foliorum ʒß cani dato vehementem vomitum, tremorem, convulsionem & mortem causavit.

ANTIDOTA antacria.

VIRTUS MEDICATA. Succus loco scamonei quandoque venditur.

## L O B E L I A S I P H I L I T I C A,

*LOBELIA siphilitica* L. die Lustseuchlobelie, die blaue Cardinalsblume,

ODOR virosus. Sapor tabacinus, acris, linguæ adhærens.

VIS NOXIA. Draſtice purgans, emetica.

ANTIDOTA antacria.

VIRTUS MEDICATA. Feri Americæ septentrionalis decocto hujus radicis luem venereum æque feliciter ut Europæi mercurio vincere dicuntur. In pertinaciōri malo admiscent radicem *Ranunculi abortivi* L. sed parce ne ejus acrimonia intestina inflammentur. Atque hoc decocto simul ulcera eluent aut ulcera putrida

confurgunt cortice interiori *Ceanothi americanus* L. vel pulvere radicis *Gei rivalis* L.

**Dosis.** Radicis manipulus unus coquitur in aqua mensuris tribus & ter de die libra una bibitur vel ultra; si ægrotus vim purgantem amplius ferre nequit, abstineat ab eo per unum vel alterum diem. Sic intra 3 septimanarum spatium lues curari fertur.

### LOBELIA LONGIFLORA,

*Lobelia longiflora* L. langblümige Lobelie.

ODOR florum virosus, suffocans. SAPOR acris, tabacinus, nauseosus.

**Vis NOXIA.** Interne sumpta hypercatharsim creat, nullis remediis cedentem, tandemque lethalem. Equus hanc si comedet rumpi medius fertur, unde nomen apud Hispanos fortita est, *Rubenta cavallos*, id est equorum disruptor. Succo ejus infecta manus, si oculos labrave fricat, inflammationem inducit urentem. ☐

ANTIDOTA antacria.

### CYNANCHUM VIMIALE.

*Cynanchum vimiale* L. blattloser Hundswürger.

\* Cel. JACQUIN *Hijor. Americ. Stirp.* p. 220.

**ODOR** foliorum gratus. **SAPOR** aeris.

**VIS NOXIA.** Succo lacteo caustico turget, quo  
nocere persuademur,

**ANTIDOTA** antacria,

**VIRTUS MEDICATA.** Non nota.

### APOCYMUM ANDROSÆMIFOLIUM.

**APOCYMUM** *Androsæmifolium* L. *canadischer Hundekohl.*

**ODOR** nullus. **SAPOR** acris.

**VIS NOXIA.** Tota planta succo turget lacteo, qui  
linguam & cutem acrimonia caustica afficit.  
Hominibus, qui ramos decerpunt, tota ma-  
nus bullis plurimis afficitur. Cutis succo il-  
lita inflammatur & exulceratur. Ex solo  
halitu hominibus quibusdam facies & manus  
intumescunt,

**ANTIDOTA** antacria,

**VIRTUS MEDICATA** non nota.

### APOCINUM CANNABINUM.

**APOCINUM** *cannabinum* L. *virginischer Hundekohl.*

**ODOR** nullus. **SAPOR** acris.

**VIS NOXIA** succo acri lacteo turget, hinc ut prior  
species nocet.

**ANTIDOTA** antacria,

**VIRTUS MEDICATA.** Galli ex lana seminum sit; pulvinaria & americani ex caule linteum sibi conficiunt.

### APOCYNUM VENETUM.

**APOCYNUM**, *venetum* L. *venetianischer Hundekohl.*

**ODOR** nullus. **SAPOR** acris.

**VIS NOXIA** præcedentis.

**ANTIDOTA** eadem.

### ASCLEPIAS GIGANTEA.

**ASCLEPIAS** *gigantea* L. *große Aesculapspflanze.*

**ODOR** nullus. **SAPOR** acris.

**VIS NOXIA** Ziß succi deglutita, vehementissima symptomata & lethales sanguifluxus excitare dicitur. \*

**ANTIDOTA** antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** Indi hac planta lac coagulare solent. Malabari decoctum foliorum cum oleo mixtum vel folia oleo calido macerata ad tumores arthriticos & podagricos applicant. Decoctum radicis in febre intermittente & puerperis intumescentibus interne propinant. Vulnera eodem depurant.

\* J. BAUCHIN l. c. p. 132.

## HYDROCOTILE VULGARIS.

*HYDROCOTILE vulgaris* L. *Sumfnabelkraut.*

ODOR nullus. SAPOR acris.

VIS NOXIA. Oves hac planta vescentes, stomachace, mictu cruento & inflammatione ventriculi afficiuntur; hinc etiam hominibus haec planta censetur noxia.

ANTIDOTA antacria.

VIRTUS MEDICATA non nota.

## OENANTHE FISTULOSA.

*OENANTHE fistulosa* L. *hohlrohrichte Rebenholde.* *Wasserfilipendul.*

ODOR ingratus. SAPOR acris, nauseofus.

VIS NOXIA. Radix ventriculo ingesta, inducit syncope, summam debilitatem, omnium sensuum internorum & externorum abolitionem, convulsionem, tetanum, mortem.

Mirum est in cadaveribus demortuorum nec in primis viis, nec in alio viscere, nec in sanguine vitium fuisse deprehensum.

ANTIDOTA. Vomitorium, \* potus copiosus, oleum, lac, mucilago.

\* In Corsica ex 17. militibus radice hujus plantæ infectis tres moriebantur, reliqui ope vomitorii servabantur. *Cel. VACHER in Act. helvet.* vol. IV.

VIRTUS MEDICATA non nota.

### OENANTHE CROCAT A.

*OENANTHE crocata* L. *Safrangelbe Rebenholde,*

ODOR ingratus. SAPOR acris.

VIS NOXIA. Radix vel folia comesta furores, vertiginem, capitis & ventriculi dolorem, anxietatem intolerabilem, ardorem in œsophago & ventriculo, epistaxim & mortem inducunt. \* Imo odor ejusdem in clauso cibili vertiginem & animi deliquia causat. \*\*

ANTIDOTA antacria.

VIRTUS MEDICATA non nota.

### SCANDIX INFESTA,

*SCANDIX infesta* L. *schädlicher Kerbel,*

ODOR teter. SAPOR acriuscus.

VIS NOXIA. Confetur venenata.

ANTIDOTA, antacria.

art. 2. p. 81. & *Philosoph. Transact.* vol. L<sup>3</sup>  
P. 2. p. 856. Ex aliis 37 militibus moriebatur unus  
reliqui vomitorio morti eripiebantur. *Cel. VAN DER  
MONDE Journal de Medecine* T. X. 1758. *Mois  
Nov.* p. 430.

\* STALPART VAN DER WIEL *Observ. rarior. Cœnt.*  
1. 1687. ob. 43. p. 182. & *Cel. SCHREBER Samml.  
verm. Schriften* 6 Th. p. 263.

\*\* *Phil. Transact.* vol. 44. P. 1. p. 239.

VIRTUS MEDICATA non nota.

### T H A P S I A F O E T I D A.

*THAPSIA fætida* L. wilder Turbith,

ODOR teter. SAPOR acris.

VIS NOXIA. Vomitum & sanguifluxum lethalem  
excitare fertur. \*

ANTIDOTA antacria.

VIRTUS MEDICATA non nota.

### A L I S M A P L A N T A G O A Q U A T I C A.

*ALISMA Plantago aquatica* L. Wafferwegerich,  
großer Froschlöffel.

ODOR nullus. SAPOR acris.

VIS NOXIA. Ab ejus esu animalia trucidata scri-  
buntur; hinc etiam hominibus funesta cen-  
fetur.

ANTIDOTA antacria.

VIRTUS MEDICATA. Loco vesicatorii membris  
œdematosis applicatur. \*\*

### C L E M A T I S V I T A L B A.

*CLEMATIS Vitalba* L. gemeine Waldrebe.

ODOR nullus. SAPOR acris, causticus.

VIS NOXIA. Usum internum hujus plantæ fune-

\* Cel. BLACKWELL.

\*\* ET MULLER op. omnia. T. I. p. 437.

stum esse docet ejus applicatio ad cuteim, quam mendici, ut corda hominum ad elemosinas mouent, sibi pustulas & ulcera excitant.

**ANTIDOTA antacria.**

**VIRTUS MEDICATA.** Trita planta loco vesicatorii applicari potest. \* Parisiis turiones tenellæ plantæ tempore vernali forma acetarii sapidissimi commeduntur. \*\* Seminis 3j scopo purgandi a rusticis quondam adhibebatur.

**C L E M A T I S F L A M M U L A.**

**CLEMATIS Flammula** L. *Brennwurzel.*

**ODOR** nullus. **SAPOR** acris, labia masticatione inflammans.

**VIS NOXIA** præcedentis.

**ANTIDOTA antacria.**

**C L E M A T I S R E C T A.**

**CLEMATIS recta** L. *gerade weiße Waldrebe.*  
Est STÖRKII *Flamula jovis.*

**ODOR** nullus. **SAPOR** acris, causticus, os & labia rubefaciens.

\* *Cel. CHESNEAU observ. medic. lib. IV.  
obs. 2. p. 421.*

\*\* *Memoires de l' Academie de Paris 1739. p.  
473. & Cel. ROHDIUS observ. posterior. Cent. IV. 6.*

**VIS NOXIA.** Externe cuti applicata ruborem, pustulas & excoriationes excitat, hinc ingesta majori copia ventriculum inflammare deberet.

**ANTIDOTA** antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** *Infusum* foliorum in morbis venereis, ulceribus mali moris, tumoribus fungosis & scabie chronica, cephalæa chronica utile fuit deprehensum. *Pulvis* externe inspergitur ulceribus fungosis & aliis difficulter sanandis. \*

**DOSIS.** A grano dimidio ad unum cum scrupulo facchari datur.

### CLEMATIS INTEGRIFOLIA.

**CLEMATIS integrifolia** L. gerade blaue Waldrebe.

**ODOR** vix ullus. **SAPOR** acris, ardens.

**VIS NOXIA** præcedentis. Equi Principis EUGENII cum vescerentur hac planta, in quodam Hungariæ prato copiosissime crescente, magnam inde stragem patiebantur. \*\*

\* Ill. L. B. de STORK libellus, quo demonstratur, flammulam Jovis posse tuto & magna cum utilitate exhiberi ægrotantibus. Viennæ 1769. & Cel. PETIT in *Memoires de Paris* 1733. p. 233.

\*\* Cel. TARGIONI TOZZETI ragionamenti sull' agricoltura Toscana. Lucca 1759. p. 196.

**ANTIDOTA** antacria.

**VIRTUS MEDICATA** non nota.

### A N E M O N E   P A L M A T A.

*ANEMONE palmata* L. gelbe *Anemone*, portugiesisches *Anemonröslein*.

**ODOR** vix ullus. **SAPOR** acris, ingratus, naufragus.

**VIS NOXIA.** Ob dolorem ardenter, quem in ore & constrictionis sensum, quem in faucibus & larynge excitat, venenata censetur.

**ANTIDOTA** antacria.

**VIRTUS MEDICATA** non nota.

### A N E M O N E   P U L S A T I L L A.

*ANEMONE Pulsatilla* L. *gemeine Küchenscheelle*.

**ODOR** vix ullus. **SAPOR** acerrimus, in radice simul dulcescens.

**VIS NOXIA.** Plantæ hujus partes omnes, cuti impositæ ruboreni & vesicas, naribus attracta sternutationem & ardorem excitant, & solis effluviis oculos lœdunt. Hinc non possunt non intus sumptæ funestos edere effectos, et si nulla hactenus id demonstrari possit observatione. \*

\* Cel. HELWIGII *Flora Campana Lips.* 1719, p. 86. a floribus in syrum redactis productam dicit videlicet tabem pulmonalem.

## ANTIDOTA antacria.

VIRTUS MEDICATA. Folia ad ulcera inveterata  
hominum & vulnera equorum laudantur.

## ANE MON E P R A T E N S I S.

*ANEMONE pratensis L. schwärzliche Küchen-*  
*scheele. Est STOERKII *Pulsatilla nigricans*.*

ODOR herbæ recentis vix ullus. SAPOR acris in-  
hærens, masticata fauces & lingüam corro-  
dens, etiamsi fauces aqua frigida eluantur.

VIS NOXIA. Ob acrimoniam ventriculo magna do-  
si ingesta, funesta produceret symptomata.  
*Aqua stillatitia acris & emetica est.*

*Vapor sub inspissatione succi in extractum*  
*emanans puero intumescentiam & ruborem*  
*palpebrarum cum obnubilatione visus, quæ*  
*tamen mala post nonnullos dies sponte eva-*  
*nescebant, causavit. \**

## ANTIDOTA antacria.

VIRTUS MEDICATA. Extracti vis est diuretica,  
emmenagoga, resolvens, specifica in oculos  
agens, quos levi rubore afficit. Laudatur in  
panno, amaurosi, cataracta & aliis inventera-  
tis oculorum vitiis. \*\* Infusum foliorum ex-

\* Ill. BERGIUS *m. med.* p. 490.

\*\* Ill. STÖRK *libellus de usu medico pulsa-*  
*tilla nigricantis. Vienna 1771.*

terne & interne in ulceribus mali moris, in  
tophis, condylomatibus applicatur.

**DOSIS.** Extractum a grano dimidio ad unum cum  
scrupulo sacchari datur.

### A N E M O N E   N A R C I S S I F L O R A .

*ANEMONE narcissiflora* L. *Anemone mit Nar-*  
*cissenblumen.*

**ODOR** nullus. **SAPOR** dulcescens, acris.

**VIS NOXIA.** Genus & sapor hanc plantam red-  
dunt suspectam.

### A N E M O N E   N E M O R O S A .

*ANEMONE nemorosa* L. *Waldanemone. Ranun-*  
*culus albus.*

**ODOR** nullus. **SAPOR** herbaceus, acris, fauces  
linguamque stimulans.

**VIS NOXIA.** Folia & flores recentes cuti applica-  
ta ruborem inflammatorium & diutius relictæ  
vesicam atque ulcus manans, dolorificum at-  
que difficillimæ sanationis inducunt. Majori  
copia ventriculo ingesta sumam angustiam  
& mortem inferunt. \*

Kamtschatkenses succo hujus plantæ ad fa-  
gittas suas venenandas utuntur. \*\*

\* *Cel. GMELIN Flora Sibirica* T. IV. [p. 199.]

\*\* *Hallerus* l. c. II. p. 199.

ANTIDOTA antacria.

VIRTUS MEDICATA. Herba recens forma epispa-  
stici brachio imposita tertianas vernales sæpe  
curat. \* Extractum est emmenagogum. Aqua  
stillatitia censemur cosmetica, at nimis adhi-  
bita faciem arodit.

### A N E M O N E R A N U N C U L O I D E S.

*Anemone ranunculoides* L. *Hahnenfussartige*  
*Anemone.*

ODOR nullus. SAPOR acris.

VIS NOXIA. *Sapor & ordo naturalis* hujus stir-  
pis vim virosam indicant, licet nulla experi-  
menta pro confirmanda hac probabili opinio-  
ne adduci possint.

ANTIDOTA antacria.

### H E L L E B O R U S A L B U S.

*Veratrum album* L. *weisse Niesswurz.*

ODOR radicis ingratus. SAPOR nauseosus, acer-  
rimus, fauces adurens, diu inhærens.

VIS NOXIA. Exigua quamvis dosis interne pro-  
pinata, horrenda sæpe excitat symptomata, ut  
cardialgiam, tormina, singultum, vomitum  
enormem, fitim, tremorem, convulsiones, lei-  
pothymias, sudorem frigidum, inflammatio-

\* *Ill. BERGIVS m. m. p. 492.*

nem œsophagi, ventriculi, intestinorum, gangrenam, mortem. \*

Etiam *externa* hellebori albi applicatio fuisse quandoque produxit effectus. Pulvis naribus attractus vehementissimam movet sternutationem. Radix abdomini applicata enormem excitavit vomitum. \*\* Radix forma suppositorii ano indita idem præstitit. \*\*\* Succus cum butyro cuti ovium scabiosarum inflicatus mortem attulit. Cuspides telorum hoc succo illiti animalia vulnerata celeriter necant. \*)

**ANTIDOTA.** Lac, oleum, oxymel, multus potus aquosus.

**VIRTUS MEDICATA.** Decoctum & unguentum *helleboratum* externe applicatum scabiem & tineam sanat. Ad pediculos fugandos in decocto radicis intingitur saepius pecten, que

\* Regius princeps a scrupulo hellebori albi assumpto, intra trihorium convulsus periit. HELMONT. A scrupulo convulsiones motæ. *Ephem. N. C.*

\*\* ETTMULLER in *præfatione ad chirurgiam*.

\*\*\* Cel. SCHRÖDER.

\*) Venenum esse *pharicum*, quo veteres lethalia sua conficiebant tela censet Cel. HEUCHER Vide MITHRIDATES opp. omnia T. I. p. 435. & CÆSALPINI tract. de venenis p. 141.

plectuntur capilli ; quod remedium efficacissimum in hoc morbo esse dicitur. An lotio corporis cum hoc decocto remedium in ptyriasi ? Decoctum hoc in aures cophosi labrantes cum successu injicitur. \*

**VIRTUS MEDICATA.** *Interne* hæc radix scopo emeticō vel purgante vix adhibetur nec unquam ultra grana quædam dari debet. *Oxymel helleboratum GESNERI* ad resarandas obstrunctiones exhibetur.

### H E L L E B O R U S N I G E R.

*HELLEBORUS niger L. schwarze Nießwurz.*

**ODOR** nauseofus. **SAPOR** radicis recentis acris, nauseosa , leviter amaricans, inhærens. **Masticata** linguam acrimonia obstupefaciens. **Siccata** mitior, in pharmacopoliis diu asservata vix acris, nisi diutius masticata.

**VIS NOXIA.** Radix *externe* cuti applicata, rube-facit & vesicas instar vesicatorii trahit. Pulvis naribus attractus immanem sternutationem movet, idem sub pulverisatione radicis observatur. Antiquis moris erat cuspides sagittorum succo hujus radicis intingere.

\* Cel. ROTHERAM diss. de remediiis purgant.  
Upsalæ 1775. p. 18.

*Interne* data radix multo mitior est quam hellebore albi, at majori quantitate præsertim radicis recentis ingesta hypercatharsim, tormina & animi deliquia imo mortem causare potest. \*

### ANTIDOTA præcedentis.

VIRTUS MEDICATA. Radix fetaceum pro pecoribus præbet. Decocci forma ad pedieulos fugandos, pulverata radix ad fistularum labia callosa tolenda quondam adhibita fuit. Tincturæ martis hellborata WEDELII in suppressione menstruorum aut hæmorroidum commendatur. Extractum in melancholia, mania, hydrope, quartana, in lepra & aliis morbis cutaneis, in vermibus intestinalibus.

### HELLEBORUS FOETIDUS.

HELLEBORUS fætidus L. stinkende Niesswurz, Helleborastum.

ODOR herbæ præsertim recentis fætidus. SAPOR acerrimus, amaricans, masticata os faucesque corrodens.

VIS NOXIA emetico-purgans, cardialgiam, animi deliquia excitans, quidam perdidérunt pilos & ungues, quin separationem subierunt epideridis in toto corpore. \*\* Ex radice in

\* MURRAY l. c. vol. III. p. 56.

\*\* Oxford. Magaz for March. 1779. p. 99.

pulpa pomi data infans intra biduum Londini periit. \*

### ANTIDOTA præcedentis.

**VIRTUS MEDICATA.** Est egregium anthelminthicum. Foliorum siccatorum grana XV dantur pueris in decocto. Syrupus ex succo recenti confectus ad unum cochleare mane & vesperi propinatur. \*\* Ab aliquibus laudatur in nephritide, astmate pituitoso. Miscella ex syrupo hellebori fœtidi & tinctura rhei ad eliminandum viscidum intestinorum, ad febres viscidas tollendas valde commendatur.

### V E R A T R U M N I G R U M.

*VERATRUM nigrum L. die weisse Niesswurz mit schwarzrothen Blumen.*

Vis NOXIA ut hellebori albi,

ANTIDOTA eadem.

### C A L T H A P A L U S T R I S.

*CALTHA palustris L. Dotterblume.*

ODOR nullus. SAPOR acris, ardens,

\* *Lond. Chronicle* 1768. n. 1760.

\*\* *Cel. BISSET essay on the medical constitution of grait Britain* p. 329.

**VIS NOXIA.** Ob ardētem acrimoniam **venenata** censetur. \*

**ANTIDOTA** antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** Gemmæ florū immaturorum muria acetoque conditæ quondam ut capparides in cibum adhibebantur.

### A C O N I T U M   N A P E L L U S.

**ACONITUM** *Napellus* L. *blaues Eisenhütchen,*  
*blaue Wolfswurz.*

**ODOR** herbæ recentis fortis, herbaceus. **SAPOR** herbaceus.

**VIS NOXIA.** Quum radix, quæ veneni atrocia reliquis plantæ partibus superior est, quatuor latronibus exhiberetur, horum quidem duo post multos cruciatos & opem præstitam evaserunt, reliqui vero misere perierunt. Horum uni post paucarum horarum inducias imbecillitas insignis, sudor frigidus faciei, asphyxia, spasmi, animi deliquium, involuntaria alvi dejectio, vomitio biliosa & livida, obmutescientia, mors apoplectica nascetatur. \*\* Inter acetaria comesta radix multos necasse traditur. \*\*\* Homo ex ingestis teneris foliis

\* *Illi.* HALLER l. c. p. 82,

\*\* MATTIOLUS in DIOSCORID *ed* C. BAUCH. p. 768,

\*\*\* DODON.  *Stirp.* Pempt. 3. L. 4. p. 442.

Napelli in aceterio cum aliis herbis maniacus intra nychhemeri spatium moriebatur. \*  
 Vir in acetario foliis Napelli usus, servabatur quidem per vomitiones, antispasmodica & annaleptica sed præcesserant sensus caloris linguam & maxillas, dein reliquum corpus adurentis, intumescentia faciei, debilitas artuum, subsultus tendinum, languens sanguinis motus, post oleum ingestum vomitio, vertigo, caligo oculorum, animi deliquia. \*\*  
 Chirurgus, qui copiam herbæ recentis devoravit, post pertinacissimum soporem moriebatur, relictis post mortem maculis lividis circa collum, dorsum & hinc inde in reliquo corpore. \*\*\* Septem flores Napelli in acetario comestri hominem perimerunt. \*)

**VIS NOXIA EXTERNA.** Succus herbæ per exiguum vulnus pollicis, quum præcideretur stirps, intrans non solum digitæ & brachii dolores sed etiam cardialgiam, anxietatem cum metu suffocationis, lipothymiam, æstum, gangrænam atque suppurationem insignem excita-

\* WILLIS *de anima brutor.* p. 289.

\*\* Philos. Trans, vol. 38. p. 287.

\*\*\* Schwed. Abhandl. für das Jahr 1739.

\*) MATHIOLUS & BRANDLEY.

vit. \* Quæ de intumescientia, anxietate, animi deliquio & debilitate ex gestata unice manu planta aut in sinu a puellis recondita narrantur, hæc vel falsa observatione vel peculiari corpori idiosyncrasia niti videntur \*\* uti attactus toxicodendri aliquos afficit, quibusdam vero non nocet.

**ANTIDOTA.** Evacuantia cum lacte, oleo, mucilagine, ovis mollibus, dein antispasmodica, & analeptica.

**VIRTUS MEDICATA.** *Extractum* in rheumatismo arthridide, febre quartana, scrophulis, scirrhis, tumoribus offeis, spina ventosa, tumore rheumatico articulorum, ankyloſi, œdematoſo tumore crurum post febres remanente, \*\*\* epilepsia, mania, amauroſi; ulceribus obſtinatis venereis \*) aſtmate \*\*) laudatur.

**DOSIS.** *Extractum* a grano uno ter de die cum

\* Cel. RÖDDER in ALBERTI *Jurisp. med.* T. VI. p. 724.

\*\*) Ill. MURRAY *app. med.* vol. III. p. 12.

\*\*\*) Schwed. *Abhandl. für das Jahr 1776.*

\*) De his omnibus vide Ill. L. B. A STÖRK lib. de stramonio Hyosciamo Aconito, & Ill. MURRAY *app. med.* Vol. III. p. 14. &c.

\*\*) Cel. GREDING, *med. und chirurg. Schriften* Caf. 7. p. 101.

scrupulo sacchari contritum ad grana plura  
sensim datur.

### A CONITUM CAMMARUM.

*Aconitum Cammarum* L. *Bergsturmhut, blaue  
Wolfswurz,*

**ODOR** herbae recentis herbaceus, fortis. **SAPOR**  
ardens, inhærens, acrior quam in Napello.

**VIS NOXIA** præcedentis.

**ANTIDOTA** præcedentis.

### A CONITUM LYCOCTONUM.

*Aconitum lycoctonum* L. *gelbes Eisenhütchen,  
gelbe Wolfswurz.*

**ODOR** nullus. **SAPOR** acris.

**VIS NOXIA.** Radix in acetario comesta universo  
convivio perniciem intulit. Flores tantummodo  
manducati linguae tumorem & ardorem atque  
vertiginem excitarunt, \*\* Equi & capræ hac  
planta innocue vescuntur; lupis vero atque  
reliquis animalibus venenum est,

**ANTIDOTA**, præcedentis.

**VIRTUS MEDICATA.** Radix aqua vel lixivio co-  
cta dat lotionem pro capite pediculofo. Alii

\* BAUHINUS l. c. p. 653.

pulverem radicis cum oleo in unguentum redigunt, quo caput illiniunt. \*

## A C O N I T U M A N T H O R A.

*Aconitum Anthora L. Giftheil.*

ODOR radicis vix ullus. SAPOR amarus, acris, masticata fauces corrodit, diuque inhæret.

VIS NOXIA. Ob acritatem suspecta.

ANTIDOTA præcedentis.

VIRTUS MEDICATA. Veteres radicem anthoræ pro antidoto aconitorum reliquorum habebant, at defunt experimenta, quæ id confirmarent.

## PASTINACA SATIVA ANNOSA.

*Pastinaca sativa annosa L. alter Pastinak,* hoc est, quæ post anni spatum hyeme elevatur.

VIS NOXIA. Pastinacæ annosæ radix delirium, vertiginem, ardorem ingentem ventriculi & oris uti & oculorum, labiorumque intumescenciam creat, hinc aliquibus *Pastinaca insana* audit. \*\* Pecora hanc plantam intactam relinquunt.

\* *Cel. GEORGI Bemerkungen einer Reise im russischen Reiche, im Jahr 1772.*

\*\* *Cel. MURRAY app. med. vol. I. p. 285. & N. A. N. C. vol. I. p. 247.*

ANTIDOTA, evacuantia, antacria.

### POLYGONUM HYDROPIPER.

*POLYGONUM Hydropiper L. Wasserpeffer.*

ODOR nullus. SAVOR acris, planta siccata mitior.

VIS NOXIA. Herba recens ob rodentem acrimoniā suspecta est.

ANTIDOTA præcedentis.

VIRTUS MEDICA: A. Ad ulcera equorum sananda laudatur.

### SÆLANTHUS QUADRAGONUS.

*SÆLANTHUS quadragonus L. viereckige arabische Winde.*

ODOR vix ullus. SAVOR acris, ardens.

VIS NOXIA. Ob acrimoniam ardenter, quam linguae, si masticetur, & manui, si tangatur, imprimit, venenata in Arabia censetur.

ANTIDOTA præcedentis.

### SÆLANTHUS FORSKALII.

*SÆLANTHUS Forskalii. Arabische Winde.*

VIS NOXIA præcedentis.

### SÆLANTHUS GLANDULOSUS.

*SÆLANTHUS glandulosus FORSKALII. Arabische Winde mit essbaren Beeren.*

ODOR radicis nullus. SAPOR dulcescens, deinde acris, ardens.

VIS NOXIA præcedentis.

ANTIDOTA præcedentis.

VIRTUS MEDICATA. Baccæ absque noxa comedendi possunt.

### J A T R O P H A C U R C A S.

*JATROPHA Curcas L. amerikanischer Bröchnussbaum. Semina Ricini majoris.*

ODOR seminum nullus. SAPOR gratus, amygdalinus, subdulcescens, tum acriusculus, postea fauces mordens.

VIS NOXIA. Semen comedum vehementissimam emeto-catharism, tormina, inflammationem & erosionem ventriculi atque intestinorum excitat.

ANTIDOTA præcedentis.

VIRTUS MEDICATA. Semina sine noxa comedunt, si duo illa foliola, quæ medietatem nuclei dividunt (plumula nempe & dissepimentum) antea probe auferantur.\* Oleum

\* *Cel. BANCROFT's natural history of Guiana London 1779. p. 34. & 35. proprio in corpore experimentum instituit Cel. IVE's Reise nach Indien 2 Th. 1775.*

e feminibus expressum vocatur *oleum ricinum*.  
Dosi cochlearis unius datum ut purgans va-  
lidum in omnibus hydropis speciebus, iliaca  
passione, arthritide, psora & ulceribus ma-  
nentibus laudatur \* Hoc oleum purgandi  
vim exserit, sive deglutiatur, sive in anum  
injiciatur, sive denique extus ventri illi-  
niatur.

### J A T R O P H A M U L T I F I D A.

*JATROPHA multifida* L. französische Purgiernuß,

**ODOR** nullus. **SAPOR** foliorum amarus, acris.

**VIS NOXIA.** Nuclei semen comesti periculosam  
emeto-catharsim cum vehementissimis tormenti-  
bus & intestinalis inflammationem excitant.

**ANTIDOTA** præcedentis.

**VIRTUS MEDICATA.** Decoctum foliorum, quod  
etiam emeto-catharticum est, antidotum man-  
cinellæ esse fertur.

### J A T R O P H A M A N I H O T.

*JATROPHA Manihot* L. *Cassava - Manihot.*

*Manipuera.*

**ODOR** radicis nullus. **SAPOR** subdulcis, minime  
acris.

\* Cel. CLUSII T. I. p. 299.

**VIS NOXIA.** Radix cruda & recens comeſta cito perimens venenum est, quod convulsiones, meteorismum abdominis & demum abolitionem virium vitalium cauſat. Eadem ſymptoma ſuccus recens expreſſus excitat. Succo illo intus hauſto corpus inflatur, ventriculus dolet cum ructu, nauſea, tenefmo, oculi obfuscantur, vertigines, perpetuique dolores capitis accedunt, tandemque extremonum frigus, animi deliquium & ipſa mors ſucceſdit. \*

**ANTIDOTA** ſunt prægresso emetico ſal alcalinus (ut ſal abſynthii cum aqua menthae) pi- per, taffia ſeu ſpiritus facchari. Mirum de- niue eſt radicem in farinam pulveriſatam ſola toſtione & ſuccum expreſſum ſola coſtione aut ſola fermentatione innocuum redi.

**VIRTUS MEDICATA.** Radix ſiccata eſt panis ame- ricanorum. Americani e radice in aqua ma- cerata, dein rastro in farinam redacta ſuccum venenatum torcularis ope exprimunt; tum farinam in lamina ferrea igne moderato tor- rent. Ex hac farina panem candidiſſimi co- loris & delicati ſaporis ſibi conficiunt, quem abſque omni noxa comedunt. Farina Mani- hot per ſæcula ſine corruptione ſervari poſſe dicitur.

\* Piso Hist. natur. l. 5. cap. 17.

Ex succo expresso & fermentato potus valde inebrians ab Americanis paratur & succum recentum cum pipere pro embemmate gratissimi saporis ad carnes ferinas coquunt. Animalia hac radice vel succo perempta tanto manducari possunt. \*

### R I C I N U S C O M M U N I S.

*RICINUS communis* L. *gemeiner Wunderbaum*,  
*Cataputia major*, ad differentiam *Euphorbiæ lathyris*, quæ *Cataputia minor* etiam audit.

ODOR seminis nullus. SAPOR debilis, vix dulcescens, acriusculus, masticata semina fauces rodunt.

VIS NOXIA seminis emetico-purgans, inflammans. Semen unicum tempore vespertino, a viro fano & vegeto masticatum & deglutitum, sensationem mordentem in faucibus reliquit. Nox tranquilla fuit, sed sequenti die mane expergefactus, emesi violenta correptus fuit & per totam diem sustinuit nisus alternantes vomitionis & purgationes alvi et siamsi pa-rum dejiciebat. \*\* Acrimonia draftica in testa

\* Cel. BANCROTTS l. c. p. 41. & Cel. FERMIN *description historique de la colonie de Surinam*. Vol. I. 1769.

\*\* Ill. BERGJUS l. c. p. 773. & 774.

& membrana nucleum obvelante residet; matrona nobilis semen unicum testa abjecta comedit & nullam noxam inde sensit.

**ANTIDOTA** antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** Oleum e seminibus pressum, *Oleum ricini seu Oleum Palmæ Christi* vocatur. Recens & non rancidum vix acre & blandum est atque ut tutum purgans in colica, volvulo, nephritide, hernia incarcerata, colica pectorum, gonorrhæa, febris biliosis & inflammatoriis atque in tænia & aliis vermisbus intestinorum impense laudatur. \*

In volvulo & calculo felleo, ubi vomiturations frequentes cum singultibus urgent & ubi alia purgantia communiter fallunt ob vomitus insequentes, insigni cum emolumento hoc oleum datum fuit. \*\* Spasmi scilicet relaxati & alvus soluta fuere, inde non solum levamen sed & plenaria curatio secuta. \*\*\*

**DOSIS.** Ad unum cochlear singulis horis exhiberi

\* *Medical observations and inquiries.* vol. 2. p. 235. & Cel. CAVANE on the *oleum palmæ Christi seu oleum ricini or, as it is commonly called, Castor-oil &c.* London 1769.

\*\* *Ill. BERGIUS l. c.* p. 773.

\*\*\* De usu externo vide *pharmacologiam chirurgicam*. p. 83.

solet, usque dum alvus duci incipiat. **Infan-**  
**tibus** ad unam vel duas drachmas propinatur.

### PHYTOLACCA DECANDRA.

*PHYTOLACCA decandra L. Alkermes. Virginische Phytolacke.*

**ODOR** herbæ nullus. **SAPOR** herbæ teneræ mitis,  
herbæ adultæ acris.

**VIS NOXIA.** Succus radicum & foliorum adulto-  
rum vehementem emeto-catharsim excitare di-  
citur.

**ANTIDOTA** antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** Tenella planta primo vere à  
Virginiae incolis in olere eduntur. *Baccæ* in  
autumno ab infantibus impune sæpe comedun-  
tur. *Succus expressus* jam adulorum folio-  
rum in sole ad unguenti consistentiam inspi-  
fatus contra cancerum & ulcera antiqua pro-  
funda laudatur. \* Ego in cancro faciei nul-  
lum inde vidi effectum.

### CROTON TIGLIUM.

*CROTON Tiglium L. Molucanische Purgierkörner,*  
*Grana Tiglia vel Tilli. Pineæ purgantes.*

**ODOR** semen vix ullus. **SAPOR** aeris, urens,  
nauseofus.

\* Acta suecica de anno 1743 & 1744.

**VIS NOXIA.** Draftico-emetica, ventriculum inflammans. Horum nucleorum granum unum valide purgat, dosis major emeto-catharsim excitat; nuces quatuor deglutitæ enecant. *Oleum e nucleis expressum* pariter acerrimum est, & lignum arboris, quod *lignum Pavanae* vel *Moluccanum* dicitur, majori dosi idem præstat.

#### ANTIDOTA antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** Grana duo *granorum Tigliae* cum sacchari albi 3*ʒ* in tænia laudatur. \* *Oleum externe* scopo purgandi umbilico illinatur. Decoctum *ligni Pavanae* ob vim purgantem & diureticam in hydrope commendatur. Moluccenses, dum purgare volunt, nūcem unam pro dosi deglutiunt. Hisce nucibus etiam pisces captare solent.

#### D A P H N E M E Z E R E U M.

**DAPHNE** *Mezereum* L. *Kellerhalss.* *Coccumgnidium.*

**ODOR** baccarum nullus. **SAPOR** acerrimus, lingua & fauces deurens, inflammans.

**VIS NOXIA.** Emetico-draſtica, cardialgica, ventriculum inflammans. *Baccæ* recentes preſſæ *oleum* fudant, quod degustatum mox linguam & fauces inflamat, atque suffocationem in-

ducit. \* Empyrici & mulierculæ ruri bac-  
cas Coccumgnidii deleterio sæpe effectu in  
morbis chronicis propinat. \*\*

**ANTIDOTA** antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** Cortex radicis in decocto  
datus, laudatur ut specificum in tophis vene-  
reis & doloribus osteo-copis. \*\*\*

**D A P H N E T H Y M E L Æ A.**

**DAPHNE Thymelæa** L. Seidelbast. *Cortex me-*  
*zerei officinarum.*

**ODOR** corticis nullus. **SAPOR** corticis siccii vix  
ullus, sed si diutius in ore retineatur, valde  
acris, fauces excandefaciens, ardore diu in-  
hærente, etiam si fauces cum aqua frigida be-  
ne elutæ fuerint. Recens cortex acerrimus,  
inflammans.

**VIS NOXIA** emetico-draſtica, cardialgica, ventricu-  
lum inflammans, deurens.

**ANTIDOTA** præcedentis.

\* Ill. VAN SWIETEN Comment. T. 1. p. 638.

\*\* Puella febre intermittente laborans, cui ma-  
ter 12 baccas scopo purgandi propinavit, hæmoptoi-  
ca misere periit. Ill. LINNAEI Flora suecica. n. 338.

\*\*\* Cel. RUSSEL medical observat. and inquir.

T. 3. p. 189. id sedecim casibus practicis compre-  
bat. V. Pharmacologiam chirurgicam.

**VIRTUS MEDICATA.** Cortex in aqua emollitus & cuti applicatus, illam epidermide derafa leviter exculcerat, serum allicit, hinc sub forma cauterii, quod *Exutorium* vocant, adhibetur. V. *Pharmacologiam chirurgicam.*

### D A P H N E L A U R E O L A.

**DAPHNE laureola** L. *Immergrüner Kellerhalss.*  
**ODOR** nullus. **SAPOR** acerrimus.  
**VIS NOXIA** præcedentis.  
**ANTIDOTA** eadem.

### D A P H N E C N E O R U M.

**DAPHNE Cneorum** L. *schweizerischer Kellerhalss.*  
**VIS NOXIA** præcedentis.

### D A P H N E G N I D I U M.

**DAPHNE Gnidium** L. *Italienischer Kellerhalss.*  
**VIS NOXIA** præcedentis,

### C N E O R U M T R I C O C C U M.

**CNEORUM tricoccum** L. *Zeiland.*  
**ODOR** nullus. **SAPOR** acerrimus.  
**VIS NOXIA** convenit cum Daphnide laureola,

### A M Y R I S T O X I F E R A.

**AMYRIS toxifera** L. *Giftbaum.*

**VIS NOXIA.** E trunko arboris succus nigerrimus effluit, qui ab incolis Carolinæ venenatus censetur.

### R H U S V E R N I X.

**R H U S vernix L.** *Firnisbaum.*

**ODOR** plantæ fauiciatæ, succum lacteum stillantis ingratissimus.

**VIS NOXIA.** Sola evaporatio præsertim calidis æstatis diebus & fumus ligni recentis præsertim vero ad tactus ligai, vel ejus succi oculorum pruritum, parvas urentes pustulas, tumores dolorificos faciei, manuum & sæpe totius corporis excitat. Operarii, qui vernicem ex hac arbore extrahunt, erysipelate universali intra diem afficiuntur, facies deformatur, corpus intumescit, quasi lepra infectum videtur, cutis ubique crepat, unde multum seri effluit, demum cutis exsiccatur, decidit & nova succrescit.

Nihilominus tamen sunt nonnulli, quibus arborem hanc manibus contrectare, excorticare, lignum inter digitos terere, succo inungi impune licet.

**ANTIDOTA.** Cura petitur ex hydragogo vehementi, dein balnea in decocto cimarum abietis, & corticis castanearum cum nitro & basella,

stuphæ hujus decocti adhibentur & cinis ba-  
sellæ vulneribus inspergitur. \*

### R H U S R A D I C A N S.

*Rhus radicans* L. *wurzelnder Sumach.*

**VIS NOXIA** at multo debilior quam præcedentis,

### R H U S T O X I C O D E N D R O N.

*Rhus Toxicodendron* L. *Eichenblätterrichter Giftbaum.*

**VIS NOXIA** præcedentis. Succus ejus in nonnullorum corpus nullas exerit vires; cum aliorum cutim adeo afficiat, ut desquamari debeat. Idem succus in vulnus canis vel gallinæ immissus, aut cum carne illis exhibitus, nil præter leves spasmos contractionesque produxit.

**ANTIDOTA.** Applicetur lac cum herbis emollientibus in quo camphora soluta,

### S C I L L A M A R I T I M A.

*Scilla maritima* L. *Meerzwiebel.*

**ODOR** bulbi recentis vix ullus. **SAPOR** intensius amarus, acris, nauseosus, diu inhærens. **Siccatione** manet amarities, perditur acredo.

**VIS NOXIA.** Largior dosis ventriculum valde offendit, appetitum dejicit, non raro vomitum

\* Cel. du HALDE *Histoire de la Chine* p. 317.

movet, in quibusdam alvum torminofam & spe-  
ciem dysenteriae producit, imo in subjectis  
sensilioribus alvi tormina in convulsiones, ut in  
infante vidi, transeunt. Sanguinis crassim dis-  
solvit, hinc in hydropicis quandoque ab ejus  
largiori usu, intensior quandoque sanguineus ur-  
næ color, fœces alvinæ & serum hydropicum  
sanguine confusata. Scilla muribus vene-  
num est.

**ANTIDOTA** mucilaginea, oleosa, lac, nervina.

**VIRTUS MEDICATA.** *Oxymel scilliticum* est præ-  
stantissimum solvens, exspectorans & diureti-  
cum in astmate pituitoso & hydrope. Sed  
in ascitide, ubi ardor viscerum, pulsus durus,  
heparque infarctum est, nocet, scirrhos vi-  
scerum irritat.

### EXCOECARIA AGALLOCHA.

*Excoecaria Agallocha* L. blindmachender  
Baum,

**VIS NOXIA.** Magnam quantitatem succi lactei  
acerrimi maxime in ramis hæc arbor continet;  
adeo ut vulnerata planta succus vi maxima  
exsiliat, qui cutim immediate attingens, non  
tantum dolores vehementissimos excitat, sed  
etiam maxime si ad oculos pervenerit, in-  
flammationem, tumorem & nisi citam adfe-  
ras opem, cœcitatem causat. \*

---

\* RUMPF, I, c. p. 237.

**ANTIDOTA.** Applicetur cataplasma e lacte, emollientibus & anodynis.

### ANACARDIUM OCCIDENTALE.

**ANACARDIUM** *occidentale* L. *abendländische Elephantenlaus.*

**ODOR** receptaculi maturi suavis. **SAPOR** testæ causticus, os inflammans, at sapor nuclei gratus ut amygdalæ dulcis.

**VIS NOXIA** fructus recens cum testa deglutitus nocuus.

**ANTIDOTA** antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** Incolæ Jamaicæ fabas has carbonibus injiciunt, donec exterius putamen, quod acre est, dehiscat & separari possit, atque nucleus dein comedunt. Oleum acre sub fructus tostione transudans ad verucas & clavos delendos adhibent.

### ANACARDIUM ORIENTALE.

**ANACARDIUM** *orientale.* \* *Morgenländische Elephantenlaus.*

**VIS NOXIA.** Succus diploes oleofus, ater, acerimus, hinc venenatus.

\* Ill. BERGII m. m. p. 887. Statuunt quidam, nuces has ab *Avicennia tomentosa* L. esse. Sed Cel. JACQUIN, qui Avicenniam in solo natali examinavit, id negat.

**VIRTUS MEDICATA.** Succus diploes potissimum ab Indis usurpatur ad lintea litterarum notis insignienda, hæc nigrities nec salibus lixiviosis nec sapone deleri se sinit; & succus utut valde causticus est, lintea tamen non corrodit.

### C A R Y O T A U R E N S.

**CARYOTA urens** L. *brennende Palme.*

**ODOR** baccarum nullus. **SAPOR** ardens, causticus.

**VIS NOXIA.** Baccæ ob acrimoniam causticam ventriculo fine inflammationis metu ingeri nequeunt.

**ANTIDOTA** antacria,

**VIRTUS MEDICATA.** Apices foliorum ab Indis forma oleris præparantur & comeduntur. E medula caulium speciem Sagu conficiunt.

### A R U M M A C U L A T U M.

**ARUM maculatum** L. *gemeine Aronswurz.*

**ODOR** radicis recentis nullus. **SAPOR** primum insipidus, mox vero pungens, qui sensus pectorius paullatim increscit hand aliter ac mille acus pungerent, sensatio diu inhæret etiamsi os eluatur aqua pura; oleofis vero mitigatur. *Diu siccatae* vero radicis sapor mitis, farinaceus est & iners.

**VIS NOXIA.** A majore recentis radicis dosi cardialgia lethalis, & vomitus cruentus, inflammatio ventriculi.

**ANTIDOTA.** Radix exsiccata, aut in vino vel acetato macerata mitior evadit.

**VIRUS MEDICATA.** *Radix* magno cum successu ad fundendam pituitam, ad erigendas atoni ventriculi vires, & obstrukiones hypochondriacorum solvendas adhibetur in anorexia a colluvie pituitosa, in cephalæa sympathica, & astmate pituitoso, cachexia, febris intermittentibus, subito ingruente aphoniam, & paralyssi debellanda. *Folia* iisdem at minoribus quam radix, pollent viribus. Usus externus ad ulcera inveterata & cariosa forma cataplasmatis adhibetur.

Expresso radicis succo radix in nonnullis regionibus in escam cedit.

\* *Illi. L. B. DE STÖRK* juvenem cardialgia rapi vidit. Ab infuso foliorum recentium cardialgia lethalis, *Illi. HALLER* l. c. p. 160. Ab infuso foliorum vomitum cruentum adnotavit STEHELINUS.

\*\* *Illi. BERGIUS* l. c. p. 723. Pulvis ari compositis dicit, pertinacissimas cephalæas sympathicas, quæ omnes eludunt medelas, curat.

\*\*\* *Cel. BURGGRÆF Lexic. univers. med.* I,  
p. 1092.

## A R U M   D R A C U N C U L U S.

*ARUM Dracunculus L. Schlangenkraut.*

VIS NOXIA. Radicis sapor urens analogiam cum priori monstrat.

## A R U M   D R A C O N T I U M.

*ARUM Dracontium L. amerikanische Aronswurz.*

VIS NOXIA præcedentis.

## A R U M   C O L O C A S I A.

*ARUM Colocasia L. Colocasia. Egyptische Aronswurz.*

VIS NOXIA. Totius plantæ sapor ardens, acer-  
rimus.

VIRTUS MEDICATA. Acerrima hæc radix cocta  
vel affata nutriens & sapidissimus fertur esse  
cibus; hinc etiam radix cruda dicitur escu-  
lenta esse, ideo in Aegypto toti agri hæc  
planta sunt consiti. Tenella folia & caules  
forma acetarii comeduntur.

## A R U M   E S C U L E N T U M.

*ARUM esculentum L. essbare Aronswurz.*

VIS NOXIA. Arum hoc crudum acerrimum, cor-  
rosivum & lethale est.

VIRTUS MEDICATA. Hoc arum in Africa & Ame-

merica editur coctum in duplice aqua vel  
affatum.

### A R U M   V I R G I N I C U M.

*ARUM virginicum* L. *virginische Aronswurz.*

**VIS NOXIA** præcedentis.

**VIRTUS MEDICATA.** Radix, quæ quandoque cras-  
fitem hominis adulti obtinet, ab Americanis  
vel affata vel cocta editur, saporem solani  
tuberosi vel convolvuli Batatas referre dici-  
tur cocta. \*

### A R U M   A R B O R E S C E N S.

*ARUM arborescens* L. *Aronsbaum.*

**VIS NOXIA.** Tota planta succo acerrimo turget.  
Caules cocti tamen pro olere eduntur ab Ame-  
ricanis.

### A R U M   S E G U I N U M.

*ARUM seguinum* L. *Aronswurzel mit Blumen  
ohne Blätter.*

**VIS NOXIA.** Succo turget acerrimo, qui sola  
lingua gustatus aphoniā inducere dicitur.

\* Cel. KALMS *Reise nach dem nördlichen Amerika.* Göttingen II Theil p. 273. & 426. III Th. 1764. p. 67.

## C A L L A P A L U S T R I S.

*CALLA palustris* L. *Sumpf-Calla.*

**O D O R** radicis recentis debilis, subaphrodisiacus.

SAPOR acris; masticata primum insipida dein pungens, qui sensus punctoriis sensim increscit etiam abjecta radice & post vehemens fit, manifestans se in toto ore cum affluente saliva copiosa & tenaci molestissimus, inhærens, durans, labiis ipfis pallecentibus, exsanguibus quasi, obstupescentibus & velut aqua fervida adustis, tandem sponte evanescent hæ sequelæ. \*

**V I S N O X I A.** Radix saporem habet urentem fere causticum ignis adinstar, attamen, quod mirum est, ex ea panem conficere norunt Westrobothinenses, Ostrobothinenses & Novaculæ lapponiæ. \*\*

## E U P H O R B I A O F F I C I N A R U M .

*EUPHORBIA officinarum* L. *gemeines Euphorbium. Gummi Euphorpii.*

**O D O R** gummi debilis. SAPOR primum nullus, deinde valde punctoriis, calidus, nauseosus,

\* *Ill. BERGIUS* m. m. p. 724.

\*\* *Cel. KALM* l. c. III Th. p. 68. & *LINNÉ* *flora lapponica* n. 320.

inhærens. *Masticata* hæc gummi-resia inter dentes friabilis, solvitur in ore, linguam & fauces pungit uti mille acus, fere ut radix ari, sed fervida simul sentitur & diutissime inhæret, quamvis fauces aqua frigida sæpius eluantur.

**VIS NOXIA.** Interne data vi sua caustica inflammationem oris, ventriculi, intestinorum, emeto-catharsim, dysenteriam dolentissimam altero die lethalem, convulsiones periodicas cum gravissimis doloribus, sitim, singultum, animi deliquia, sudorem frigidum, mortem inducit.

Euphorbium *externe* cuti applicatum ruborem inflammatorium, vesicas, erosionem partium mollium & ipsorum ossium.

*Naribus* forma pulveris attractum vehementissimam sternutationem, ingentem capitis, faciei & oris intumescentiam inflammatoriam cum dyuria causat.

**ANTIDOTA.** Obvolventia oleosa, mucilaginosa, lac, antacria.

**VIRTUS MEDICATA.** Ob vim summe causticam & inflammantem nunquam interne tuto datur. Nec vis sternutatoria tuto adhibetur. *Tinctura* in carie ossium, & decoctum in seabie equorum laudatur.

### EUPHORBIA ANTIQUORUM.

*EUPHORBIA antiquorum* L. seu *Tithymalus*,  
wahre Euphorbie.

**VIS NOXIA.** Omnes Euphorbiæ seu Tithymali in eo convenient, ut sint valde acres, causticæ hinc interne propinatæ volentissime sursum & deorsum purgant, atque intestina inflammant.

### EUPHORBIA CANARIENSIS.

*EUPHORBIA canariensis* L. canarisches Euphorbium.

**VIS NOXIA** præcedentis.

### EUPHORBIA TIRUCALLI.

*EUPHORBIA Tirucalli* L. ostindisches Euphorbium.

**VIS NOXIA** præcedentis.

### EUPHORBIA PEPLUS.

*EUPHORBIA Peplus* L. runde Wolfsmilch.

**VIS NOXIA** præcedentis.

### EUPHORBIA LATHYRIS.

*EUPHORBIA Lathyris* L. Springkörner. Cata-putia minor.

**ODOR** nullus. **SAPOR** vix ullus. *Masticati* se-

minum nuclei teneri sunt, postea acres, linguam  
& fances rodunt, diu inhærent.

**VIS NOXIA** draftice purgans.

### EUPHORBIA HELIOSCOPIA.

**EUPHORBIA helioscopia** L. Sonnenwolfsmilch.

**ODOR** debilis, herbaceus. **SAPOR** acris. Tota  
planta lactescens, lacte albo e corticali parte  
plantæ promanante.

**VIS NOXIA** rubefaciens, draftice purgans. Capræ  
& vaccæ hac planta absque ulla noxa præter  
ventris fluxum vescuntur. At caro illorum  
pessimi & nauseosi saporis evadit.

**VIRTUS MEDICATA** in tinea & verrucis lac illi-  
nitur.

### EUPHORBIA VERRUCOSA.

**EUPHORBIA verrucosa** L. warzigte Wolfs-  
milch.

**VIS NOXIA** præcedentis.

### EUPHORBIA PLATYPHYLLOS.

**EUPHORBIA platyphyllos** L. breitblätterichte-  
Wolfsmilch.

**VIS NOXIA** præcedentis.

EUPHORBIA ESULA.

*EUPHORBIA Esula L.* kleine Wolfsmilch.

Vis noxia præcedentis.

EUPHORBIA CYPARISSIAS.

*EUPHORBIA Cyparissias L.* Cypressenwolfsmilch.

Vis noxia præcedentis.

EUPHORBIA PALLUSTRIS.

*EUPHORBIA pallustris L.* Sumpfwolfsmilch.

Vis noxia præcedentis.

EUPHORBIA HIBERNIA.

*EUPHORBIA hiberna L.* Irrländische Wolfsmilch.

Vis noxia præcedentis.

EUPHORBIA CHARACIAS.

*EUPHORBIA Characias L.* französische Wolfsmilch.

Vis noxia præcedentis.

EUPHORBIA AMYGDALOIDES.

*EUPHORBIA amygdaloïdes L.* kleine Wolfsmilch mit Mandelblättern.

Vis noxia præcedentis.

EUPHORBIA SYLVATICA.

*EUPHORBIA sylvatica* L. *Waldwolfsmilch.*

**VIS NOXIA** præcedentis.

EUPHORBIA EXIGUA ACUTA.

*EUPHORBIA exigua acuta* L. *kleine Steinwolfs-milch.*

**VIS NOXIA** præcedentis.

EUPHORBIA MAURITANICA.

*EUPHORBIA mauritanica* L. *Mauritanische Wolfsmilch.*

**VIS NOXIA** præcedentis.

EUPHORBIA NERIFOLIA.

*EUPHORBIA nerifolia* L. *Wolfsmilch mit Oleander Blättern.*

**VIS NOXIA** præcedentis.

RANUNCULUS ACRIS SEU PRATENSIS.

*RANUNCULUS acris* L. *brennender Hahnenfuss. Schmalzblümlein.*

**VIS NOXIA.** Acris est tota planta, at germina florum urentius feriunt linguam, pertinaciorum dolorem & citius se manifestantem inducunt. Applicatio externa intolerabilem, urentissimum dolorem, & profunda ulceras, & dia-

super cute relinquatur, atque animi deliquia causat. Copiose in pascuis crescens epidemiæ pecudum sœpe sœpius est causa. In articulis, quibus applicabatur, immobilitatem genuit.

**A**NTIDOTA. Augent acrimoniam acetum, mel, saccharum; vinum ejusque spiritus, acida mineralia, oleum tartari per deliquium, aliaque sapida. Nec minuit eandem vinum dulce, castoreum, Melissa vel Melissophyllum. Inter plantas septingentas exploratas unice folia *acetosæ* manducata vel contusa acrimoniam enervant, incassum vero succus ejusdem tentabatur. Proxime vi acetosæ accedunt baccæ *immaturæ ribium rubrorum*. *Aqua* vero frigida omnibus antidotis antecellit in veneno ranunculorum mitigando. \* Ulcera pertinacia a ranunculis excitata *balsamus peruvianus* optime curat.

**V**IRTUS MEDICATA. Medici antiqui cantharidum loco ranunculos applicabant. Folia ranunculi in mortario ligneo vel marmoreo contusa & multo suœo madentia per emplastrum denarii amplitudinis foramine perforatum applicantur, superimposito emplastro non perforato, & duarum horarum spatio totus apparatus reliquitur, tandem aufertur, in tenero & depilato loco cutis aperitur, in capitis

\* Cel. K R A P P I. c. p. 101.

parte capillata mora trium vel quatuor horarum relinqu potest. Hoc epispaisticum in hemicrania atroci, medio loco dolenti impositum; in malo ischiadicō, in podagra, in inveteratis articulorum doloribus quandoque profuit. \* Demum forma epicarpii in intermittentibus laudatur.

Sed hæc epicarpia nimis diu relicta profundā & pessima ulcera excitant, aut febrem intempestive fugant, unde hydrops & alia mala sæpe sequuntur. Puer octennis tali epicarpio a febre liberatus mox in ascitem cum hydrocele incidit, & ulcus sibi contraxit ligamentum annulare & tendines flexorum digitorum afficiens.

## RANUNCULUS SCELERATUS.

*Ranunculus sceleratus* L. *Gifthahnenfuss.* \*\*  
*Ranunculus palustris.*

OPOR. Planta recens in mortario contusa, spiritum inodorum spargit, acrem, nares oculosque ferientem, qui mucum e naribus & lacrumas ex oculis prolicit. SAPOR. Succus expref-

\* Ill. MURRAY l. c. vol. III. p. 79.

\*\* Cel. KRAPE experimenta de Ranunculorum nonnullorum venenata qualitate, horumque externo & interno usu. Windob. 1766.

fus apici lingue in paucissima tantum quantitate applicatus excitat dolorem urentem.

**VIS NOXIA.** Folioli recentis medietas vel & flosculus unus parum percontusus a prandio lauto deglutitus, mox in diversis abdominis partibus produxit dolores ingratissimos cum levibus animi deliquiis & internarum abdominis partium agitationibus quasi convulsivis, diu perseverantibus. Eosdem effectus edidere duæ guttulæ succi expressi foliorum.

Canis post deglutitum succum reddebat<sup>r</sup> anxius, vomebat, se agitabat, ejulabat; oblatâ dein aqua & magna licet quantitate potata nihil melius habuit. Vomitus, contorsiones & inquietudo ingens per noctem perstiteret. Cadaver canis sclopeto occisi exhibuit ventriculum contractum, in variis locis inflammatum, ruberrimum, in interna superficie erosum: Pylorus tamidus, rubro-livescens, arctatus ita fuit, ut vix pervius permaneret.

**VIS NOXIA EXTERNA.** Mendici astuti nundinas petentes ranunculo exulcerant pedes, ut miserationem in se convertant. \* Applicatio externa in Centurione ad os usque cum immanibus doloribus penetrans sœvum ulcus per plures menses reliquit. Auriga inde inter paucas horas immensam vesicam per totum bra-

\* *Ill. LINNÆI Flor. Suec. n. 499.*

chium cum febre , delirio , phrenitide , rabiei specie , imo gangrænam sibi contraxit. \*

**ANTIDOTA.** Haustus aquæ frigidæ . Acetosæ folia , baccæ ribesiorum rubrorum immaturorum , minus tamen quam acetosa folia , atque balsamus peruvianus , acrimoniam mitigant. Coctura longior adeo domat acritatem , ut oleris instar a pastoribus Murlachiæ cum debito condimento ranunculus hicce comedи soleat. Ulcera a rannunculo excitata balsamo peruviano curantur.

**VIRTUS MEDICATA.** Succi Drachma dimidia cum unciis sex aquæ fontanæ diluta tuto deglutitur. Hæc forma vel in decocto sine noxa tentari poterit in morbis , qui solvente , stimulante & diuretica medicina opus habent. In tussi ab acri stimulo , ab excoriatione vel catarrho incipiente profuit , in senecte decrepito sic dysuriam sanavit , ulcera pulmonum depuravit , venerem effœtam restituit. \*\*

Plantæ herba & flores , ad manipulos duos per bihorium decocti innocuum cibum præprimis in annonæ difficultate præbet. Demum incipiente catarrho & tussi ab acri vel erosione ut remedium leniens laudatur. *Succus expressus* cum centupla aquæ vel frigidæ vel

\* Ill. Trissot epist. med. pr. 317.

\*\* Cet. KRAFF l. c. p. 22 & p. 103,

tepidæ debilitatus tuto ut remedium folvens  
& penetrans in morbis cutaneis commendatur.

### RANUNCULUS FLAMULA.

*RANUNCULUS Elamula L. kleiner Sumpfahnenfuß.*

**V**IS NOXIA. Scelerato haud inferior est acrimonia caustica. Externe applicata planta vesicatorii vices agit. Mendicantes sibi crura & lacertos hac ipsa planta dilaniant, quo possunt impudentius stipem a transeuntibus aucupari. Quam fraudem vesiculæ parvæ circa ulceræ præsentes forte detegunt. Matrona quædam, ut tolleret obstinatam febrem, prope carpum sinistro antibrachio Flammulam imposuit. Quum per nychthemerum integrum effectu destrueretur, ei adhuc per dimidium diem moram concessit, sed die post locus applicatio-  
nis albus, insensibilis, durus exstitit, doluitque intense brachium & locus dictus postea in sphacelum transiit, ita ut tendines muscu-  
lorum & ipsum os in conspectum prodirent, antiseptis tamen sanitas pristina restituebatur. \*

*Interne* assumpta planta eosdem tristes facit effectus ac de scelerato dixi. Animalia hanc plantam non attingunt, quamdiu in statu fano versantur aut non ingenti compellan-

---

\* Ill, MURRAY app. med. vol. III. p. 87.

tur fame, ovibus comesta phthisim purulentam, equis vero morbum hepatis hydatidum procreant.

**ANTIDOTA** præcedentis. Siccata planta viribus causticis orba est & pecudibus impune in pabulum cedit.

**VIRTUS MEDICATA.** Antiquis jam ad extirpandos pedum clavos & verrucas in auxilium vocata est, item tumoribus induratis discutiendis applicabatur. Imponi solet carpis appropinquante paroxysmo febris intermittentis.

### RANUNCULUS BULBOSUS.

*RANUNCULUS bulbosus* L. *Rübenhahnenfuss.*

**VIS NOXIA.** Hæc species ranunculo scelerato acrior est & eadem symptomata creat, sed majori longe gradu.

**ANTIDOTA** ranunculi scelerati.

**VIRTUS MEDICATA.** Bulbi virides sub fabulo per integrum hiemem recentes servari possunt pro scopo vesicante. Taleolus ejus digito interiorius applicatus jam post duo minuta prima unctionis sensum causat, sensim vesica generatur fero plena, quam excipit ulcus dolens, tardius pus cocipiens & tardius consolidandum.

### RANUNCULUS FICARIA.

*RANUNCULUS Ficaria* L. *Scharbockskraut,*

*klein Schölkraut, Schmalzsternblume. Chelidonium minus.*

**ODOR** herbæ recentis contusæ debilis nasturcinus.

**SAPOR** acriusculus, fauces irritans. Inter ranunculos hæc species minus acris, forte quia planta vernalis est. Radix recens, si ante florētū tempus effodiatur, acris est ita, ut fortiter linguam vellicet & simul ingrato styptico, primum acido, dein amarescente naufoso sapore prædita.

**VIS NOXIA.** Recens contusa cuti applicata vesicantis vices agit, si diutius super cutim relinquatur.

**VIRTUS MEDICATA.** Folia verno tempore lecta in Uplandia inter olera coquuntur. Coctione enim mitescit sapor acriusculus. Decoctum ad hæmorrhoides & scorbutum curandum laudatur. Alii succum expressum cum axungia coctum unguenti forma externe ad hæmorrhoides applicant.

### R A N U N C U L U S   T H O R A .

*RANUNCULUS Thora L. schweizerischer Hahnenfuß,*

**ODOR** nullus. Radix *masticata* fere insipida: at folia linguæ igneum imprimunt saporem.

**VIS NOXIA.** Hæc planta excepta radice, scelerato non mitior est. Folia tamen maximam

acrimoniae partem amittunt, dum semina maturescere incipiunt, ac totius plantae evanescit acredo, si exsiccatur, aut coquitur. Externe applicata vel interne sumpta eosdem edit praeter invincibilem pigritiem effectus, quos de ranunculo scelerato memoravi. Populi antiqui succo hujus ranunculi tela imbuisse dicuntur, quo possint magis lethale vulnus infligere.

**ANTIDOTA** præcedentis.

### RANUNCULUS ARVENSIS.

*RANUNCULUS arvenis* L. *Ackerhahnenfuss.*

**VIS NOXIA.** Quamvis radix & semina nocivos in humano corpore non edant effectus; foliis tamen eadem acrimonia inest ac bulboso, qui in germinibus florum urentior adhuc.

**ANTIDOTA.** Drachma semis succi mista 3 iij aquæ ita mitis fit, ut in ore detineri & tolerari acriitas queat. Unciae vero octo aquæ totam acrimoniæ adeo delent, ut impune ægris absque noxa fuerint ingesta. Imo functionum animalium major observabatur agilitas. \*

### RANUNCULUS LINGUA.

*RANUNCULUS Lingua* L. *grosser Sumpfhahenfuss.*

\* Cel. KARPF. l. c.

VIRTUS NOXIA prioris. Vis caustica in foliis præ-  
primis & feminibus sita.

### RANUNCULUS ALPESTRIS.

*RANUNCULUS alpestris* L. *Alpenhahnenfuss.*  
*Jägerkraut.*

VIS NOXIA. Planta acerrima & vesicans. Aqua  
destillata draſtice purgat.

ANTIDOTA eadem; nempe aqua, acetosæ folia, bac-  
cæ ribium ruborem immaturæ.

VIRTUS MEDICATA. Venatores in alpibus hunc  
ranunculum contra vertiginem masticare solent.

### RANUNCULUS POLYANTHEMOS.

*RANUNCULUS polyanthemos* L. *blumenreicher*  
*Hahnenfuss.*

VIS NOXIA acris, vesicans.

ANTIDOTA eadem.

VIRTUS MEDICATA quondam vices vesicatorii  
gerebat. \*

### RANUNCULUS ILLYRICUS.

*RANUNCULUS Illyricus* L. *Illyrischer Hah-*  
*nenfuss.*

VIS NOXIA congruit cum ranunculo bulboſo.

\* *Cel. BAUMIN histor. plant.* III Th. 416.

## RANUNCULUS GRAMINEUS.

*RANUNCULUS* gramineus L. *grasartiger Hahnenfuss.*

**VIS NOXIA.** Radix, præfertim vero flos valde acris.

## RANUNCULUS ASIATICUS.

*RANUNCULUS* asiaticus L. *Ranunkel. Gartenranunkel.*

**VIS NOXIA.** Foliorum sapor nauseosus & acris. Observata practica de illorum indole venenata non prostant.

## RANUNCULUS AQUATILIS.

*RANUNCULUS* aquatilis, L. *Wasserhahnenfuss.*

**VIS NOXIA.** Acrimonia hujus plantæ ut etiam præcedentis speciei differt pro diversitate soli, ubi crescit. Herba antequam flores prodierunt, longe magis vero ipsi flores cuti applicati vesicas attolunt.

**ANTIDOTA** præcedentium.

**VIRTUS MEDICATA.** Hæc planta ad usus medicos neendum adhibita fuit.

## RANUNCULUS PLATANIFOLIUS.

*RANUNCULUS* platanifolius L. *Ahornblättericherter Hahnenfuss.*

**VIS NOXIA.** Foliorum acritas minor est, quam in reliquis huc usque recensitis ranunculorum speciebus. \*

### RANUNCULUS BREYNIUS.

**RANUNCULUS Breynius L.** *Breynischer Hahnenfuss.*

**VIS NOXIA.** Flores acritate urente pollent majore quam ranunculus sceleratus & bulbosus. At horticultura multum hanc acrimoniam mitigat.

### RANUNCULUS SARDOUS.

**RANUNCULUS Sardous L.** *Eppichblätterichter Hahnenfuss. Apium risus.*

**VIS NOXIA** pistilla florum lignæ ardorem dolentissimum & cuti per 12 horas applicata vesicam inducunt. Usus internus risum fardonium & mortem causare dicitur. Reliquæ plantæ partes mites sunt.

Ranunculus *auricomus, repens, lanuginosus & pyreneus* acrimonia caustica carent.

### RAPHANUS RAPHANISTRUM.

**RAPHANUS Raphanistrum L.** *Ackerrettig, Ackerkal, Hederich.*

\* BAUHIN I. c. III. p. 859.

**ODOR** debilis nasturcinus. **SAPOR** similis.

**VIS NOXIA.** Semina hujus plantæ cum farina hordeacea in panem cocta, in quibusdam Sueciæ regionibus morbum funestum convulsioni cereali simillimum, *raphania* nuncupatum, produxisse dicuntur. \* At recentiora experimenta docuere talem panem nec animalibus, nec infantibus nec adultis hominibus in cibum adhibitum attulisse ullum damnum. \*\*

**VIRTUS MEDICATA.** Herba formia acetarii vel olearis in suecia adhibetur. \*\*\*

### S E C A L E   C O R N U T U M.

**SECALE** cornutum seu corniculatum. *Mutterkorn*, *Kornzapfen*. *Clavus secalinus*. *Ergot*. *Seigle ergotè*.

Est **SECALIS cerealis** L. morbosa excrescentia, qua spicæ secalinæ evadunt nigræ, incurvatae, ut gallinarum gralli, longiores, atque parenchyma continent livescens, subfarinosum, rancidum, combustibile.

**ODOR** seminum sub pulverisatione assurgens nares titilat tabaci adinstar. **SAPOR** farinosus, dein

\* *Ill. LINNE amænitas academicæ T. VI. p. 430.*

\*\* *Schwedische Abhandl. 33 Band p. 30.* Hinc Linnæi *Raphania* ab alia causa quam a raphanistri semine originem habuisse opinor.

\*\*\* *l. c. p. 29.*

rancidus, nauseofus, mordax, siccitatem ardentem ori & faucibus imprimens, diuque adhærens, nec aqua pura nec aqua calcis nec aceto delenda, solo lacte mitiganda. Aqua stillatitia degustata ardorem & siccitatem in ore relinquit.

Est vero secale cornutum *venenatum* a secali *luxuriante* seu cornuto *sano*, quod parenchyma farinaceum sanum recondit & venenatum non est, bene distinguendum. Innocui clavi fecalini *foraminulo* carent, quo foraminulo ab infectis forsan inflicto clavi infecti notantur. Semina infecta terræ commissa non germinant. *Culmus infectus* minor manet & citius straminefcit quam culmi sani.

**Causa disponens** ad cornutionem secalis videtur anni tempus humidum cum subsequenti solis vehementiori ardore esse.

**Causa intoxicans** clavos seu cornicula fecalina, videtur infectum esse, quod amyllum consumit & gluten remanens in semine veneno inficit, inde foraminulum in clavis infectis. Non videtur seminum corruptio a rore venenato fieri, cum nunquam omnia semina sed solummodo quædam in uno eodemque culmo infecta deprehendantur. Hinc hypothesis, quæ ab infecto quodam hoc venenum seminibus inferri opinatur, non improbabilis.

**VIS NOXIA.** Panis e secali corrupto confectus nec bene fermentat, nec bene coqui se finit, sed glutinosus & nauseosus manet. Farina secalis corrupti vulneri inspersus sanguinem spissat, initio ardorem, dein stuporem in vulnere & digitis causat. Panis talis ventriculo ingestus ebrietatem, lassitudinem, stuporem artuum & cutis sensum formicationis, tandem articulorum contractionem spasticam cum agitatione convulsiva & dolore vehementissimo periodice recurrente, causat, hicce morbus *Raphania* dicitur. Horum quidam simul evadunt orthopnoeici, maniaci, epileptici, catarractosi, tabidi, multi laborant simul siti, bulimia, exanthematibus purpureis, ulceribus cutaneis. Durat morbus a 10 diebus ad 3 menses & ultra. Multi post integrum annum mense Januario & Februario recidivam patiuntur. \* Aliis prægressa formicatione, dolore & stupore pedes ad tibiam; manus ad brachia usque ita exsiccantur & nigrescunt ac si fumo essent induratæ, partes mortuæ, sicæ, indolentes, corrugatæ deprehenduntur. Hoc symptoma *Necrosis cerealis* audit. Necrosis demum fistitur in tarso, tibia, genu &c.

\* Cel. TAUBE *Geschichte der Kriebelkrankheit.*  
Götting. p. 97. qui optimus de raphania auctor est.

& tunc linea humida, putridi artus integri aut partes mortuæ per frusta a vivis sine haemorrhagia segregantur, aliquamdiu ligamentis, tendinibusque nondum dissolutis adhaerentes. Sanguis est niger, viscidus & veluti siceus & caro est carbonis instar nigra, indurata, tenax.

Videtur secale cornuta in *climate frigidiori* raphaniam *spasmodicam*, in *calidiori* raphaniam *necroticam* producere.

**ANTIDOTA.** Panis, cuius pars decima nona secale corruptum fuit hominibus & secale corruptum eum lacte cani datum non nocuit. Ergo lac antidotum est. \*

**M E D E L A** raphaniæ cerealis exigit, ut *vomitorii* reiteratis \*\* ventriculus a faburra glu-

\* *Ill. Tissot von Nervenkrankh.* 4 B. p. 236.  
**Cel. Poluché** dicit. non solum animalia, quibus experimenti causa secale cornutum dabatur, sed etiam rusticos, qui panem ex hoc fecali manducabant, dieta lactea restituebat. *Journal Encyclopédique* 1772. T. II. *Fevrier.* p. 122. Infantes à matre raphania laborante lactati, morbo non inficiebantur.

\*\* Nempe ex 10 granis tartari emetici in lib. aqua solutis, difficulter enim tales ægroti ob irritabilitatem ventriculi quasi deletam vomunt, & actio tartari emetici per alvum nihil juvat.

tinosa evacuetur, dein intestina ope salis amari ad 3ij dati depurentur. Verminosis simul mane ac vesperi 10 grana mercurii dulcis per aliquot dies exhibeantur. Tandem sudor promoveatur ope aceti camphorati cum radice ari & oleo animali DUPPELLII, vel ope salis cornu cervi & laudani liq. \* cochleatim ingesti. Spasmus pertinax crurum *vesicatoria* ad ea exigit, in orthopnoea dorso, in strangulatione colli nuchæ applicentur.

*Venæfætio*, nisi plethora valde urgeat, semper in hoc morbo noxia fuit. Stupiditas & dolor topicus fixus *hirudinibus* vel *scarificatione* optime tolluntur. Frictiones & extensiones membrorum spasmus & formicationem sublevant, præsertim vero balnea calida, eletrisatio, & *linimentum* ex butyro, spiritu vini & camphora.

*Medela necrozeos* exigit, ut evacuatis primis viis, membra stupore affecta illico oleo *terebinthinæ* sæpius laventur, quo remedio sæpe necrosis impeditur. \*\* Si sola cutis exulce-

\* *Schwed. Abhandl.* 33 Band p. 161.

\*\* *Cel. TAUBE* l. c. p. 152.

rata secedit, atque ulcus gangrænescens re-linquit, *unguentum saturninum* opem tulit. \* Cortex peruvianus externe & interne cum la-te datus in ipsa gangræna sicca profuit. \*\* Cortex peruvianus in aqua calcis coctus ad-dito sale ammoniaco fomentum fistit egregium, quo altero vel tertio die sphacelus siccus fi-stitur. \*\*\* Alii in hac gangræna laudant fo-mentum ex aluminis calcinati ʒ iv. vitrioli romani & salis culinaris ℔ iiiij in ℥ viij ad remanentiam ℥ iiij coctis. Hoc brevi for-mat crustam, qua decidua sequens *unguen-tum* applicetur. Rx. Olei olivarum ℥ viij vi-ni boni mensura semis, terebinthinæ crudæ ℥ iij ceræ flavæ ℥ iiij, ligni santali rubri ʒ ij \*) Amputatio in parte sanâ ex 20 ne-croticis ægrotis vix unum servavit. \*\*)

\*) *Idem* p. 153.\*\*) *Idem* p. 197.\*\*\*) *Idem* p. 219.\*) *Sammlung der Auffärs und Beobacht. aus den Schriften, der medicinisch. Gesellschaft zu Paris* p. 403.\*\*) *Idem l. c. p. 402.*

## U S T I L A G O F R U M E N T I.

*USTILAGO FRUMENTI*, der Kornbrand,  
Est degeneratio substantiae farinaceae seminum  
in massam nigram vel fuscum pulverulento-  
glutinosam, instar halecis infumati foetentem:  
Reliquae plantae partes sanae permanent, se-  
mina infecta exterius rotundiora & crassiora  
videntur.

Hæc degeneratio rarissime aggreditur seca-  
le sed ut plurimum hordeum, triticum, ave-  
nam, speltam & frumentum turicum.

**VIS NOXIA.** Exigua quantitas frumenti ustilagi-  
nei non censeatur noxia. \* Major vero dosis  
certo nocet.

Panis inde confectus non bene fermentat nec  
sufficienter coqui se finit, manet glutinosus,  
gravis, nigricans & inassuetis nauseosus. Mor-  
bos chronicos abdominis & cutis inducens.  
Semina ustilaginea a viro quodam deglutita  
dolores artuum causabant, qui non nisi subor-  
ta diarrhœa cessabant. \*\*

\* Cel. CAMERER de *ustilagine frumenti*. Tu-  
bing. 1709.

\*\* Ill. TISSOT *Abh. van den Nervenkrankh.*  
*Editio WEBERI* 4 B. p. 204.

ANTIDOTA. Vomitoria , purgantia , solventia.

### C A R I E S F R U M E N T I.

*CARIES frumenti* seu *Carbunculus frumenti*, *der schwarze Mehlthau*. Est glutinoso-pulverula nigredo, quæ non solum semina ut ustilago sed etiam omnes reliquas culmorum cerealium partes corrumpit.

**ODOR & SAPOR** hujus pulveris vix perceptibiles sunt.

**VIS NOXIA** præcedentis,

### R U B I G O F R U M E N T I.

*RUBIGO frumenti*, *der Kornrost*. Est glutinosa fusco-rubens pulverulenta substantia, quæ culmis & glumis graminum frumentaceorum adhærens farinam seminum adeo corrumpit, ut nuclei vix farinam contineant.

**VIS NOXIA** præcedentis.

---

### V E N E N A G L U T I N O S A.

Venena, quæ glutine suo ventriculum infarciunt, obturant.

## V I S C U M A U C U P A R I U M.

**I**LEX *Aquifolium* L. *Vogelleim.* Est massa resina-  
nosa tenacissima, plastica; valde adhærens.

**O**DOR visci est terebinthinatus, SAPOR consimilis.

**V**IS NOXIA. Viscus hoc masticatum labiis adglu-  
tinatur, in ore non solvitur, nec ullo modo  
cum saliva miscetur. Hinc si quis hoc viscus  
majori copia deglutiret, sensatio ponderis,  
cardialgia & alia symptomata exspectanda  
forent.

**A**NTIDOTA. Optimum effet vomitorium. Solvi-  
tur hoc gluten in oleis expressis & stillatitiis,  
minime vero in aqua simplici.

**V**IRTUS MEDICATA non nota.

## B A C C Æ V I S C I Q U E R N I.

*VISCUM album* L. *Eichenmistelbeere.*

**V**IS NOXIA. Baccæ succo viscoso turgidæ ventri-  
culo ingestæ visci aucuparii adinstar agerent.

**A**NTIDOTA. Vomitorium.

**V**IS MEDICATA non nota.

## S P O N G I A M A R I N A.

*SPONGIA officinalis* L. *Badeschwamm.* Est do-  
micilium zoophyti vel polypi cellulose, in  
mari mediteraneo copiose obvium.

## SAPOR &amp; ODOR nullus.

**VIS NOXIA.** Ventriculo frustutatim ingesta spongia turgescendo, putrescendo & pylorum obstruendo nocet. Puellam 14 annorum a sua matre severius tractata in eum melancholiæ gradum incidit, ut intra biduum integrum manipulum spongiæ vulgaris in minuta frusta discerptam sensim deglutiret. Intumuit ventriculus, inanes vomendi experiebatur conatus, omnem fastidiebat cibum, anxia & subdellirosa fuit; dedi illico vomitorium & evomuit gluten putridum una cum integris frustis spongiosis ac convaluit.

**ANTIDOTA.** Vomitorium.

**VIS MEDICATA.** Spongia usta contra strumas lardatur saepius de die cochleare parvum in ore diu volvitur, & dein deglutitur, quod efficacius est quam si statim deglutiatur. Spongia preparata pro dilatandis fistulis, coercenda hæmorrhogia & nimia suppuratione vulnerum, demum pro retinendo prolapsu vaginæ & uteri inservit. *V. Pharmacologiam chirurgicam.*

F U N G U S C Y N O S B A T O S.

Est spongia in *Rosa canina* L. ab insecto forma-  
ta. *Hagebutten-schwamm.*

ODOR nullus; SAPOR adstringens.


VIS NOXIA præcedentis.

ANTIDOTA eadem.



VENE-

V E N E N A  
EX  
REGNO MINERALI.



# E L E N C H U S

## VENENORUM EX REGNO MINERALI.

---

D e venenis mineralibus generatim.

### V E N E N A   M E C H A N I C A .

Vitrum contusum, *Glass.*

Smalta, *Schmalte.*

Adamas, *Diamant.*

Alumen plumosum, *Federweiss.*

Lapis lazuli, *Lasurstein.*

Fuligo camini anglicana, *englischer Caminruss.*

### V E N E N A   T E R R E A .

Gypsum, *Gips.*

Glacies Mariæ, *Marienglass.*

Crystallus montana, *Bergkrystall.*

### V E N E N A   A C I D A .

Acidum vitrioli concentratum, *Vitriolsaure.*

— salis concentratum, *Salzsaure.*

— nitri concentratum, *Salpetersaure.*

Aqua fortis, *Scheidewasser.*

— regia, *Königswasser.*

- Vitriolum album, *weisser Vitriol.*  
 —— cœruleum, *blauer Vitriol.*  
 —— viride tabernarum, *Grüner Vitriol.*  
 —— vulgare Goslariense, *gemeiner Goslarischer Vitriol.*

### VENENA ALCALINA CAUSTICA.

Sal alcalinus vegetabilis causticus, *kaustisches Pflanzenlaugensalz.*

- mineralis causticus, *kaustisches Minerallaugensalz.*  
 — volatilis causticus, *flüchtiges kaustisches Laugensalz.*

Lapis causticus, *Aerstein.*

Lixivium causticum saponariorum, *äzende Seifensieder Lauge.*

Calx viva, *ungelöschter Kalk.*

### VENENA METALLICA.

*Auri præparata.*

Aurum monetarium, *Münzgold.*

Aurum fulminans, *Knallgold.*

*Argenti præparata.*

Argentum monetarium, *Münzsilber.*

Lapis infernalis, *Höllenstein.*

Argentum hydragogum Boylei, *Boyles Silberarzney.*

*Bismuthi præparata.*

Magisterium bismuthi, *Wismuthweiss.*

*Cuprum, ejusque præparata.*

*Cibus cupratus, Kupferhaltige Speise.*

*Aqua cuprata, kupferhaltiges Waffer.*

*Vinum cupratum, kupferhaltiger Wein.*

*Spiritus vini cupratus, kupferhaltiger Wein-  
geist.*

*Medicamenta cuprata, kupferhaltige Arzneyen.*

*Plumbum, ejusque præparata.*

*Cibus plumbatus, bleyhaltige Speiss.*

*Aqua plumbata, bleyhaltiges Waffer.*

*Vinum plumbatum, bleyhaltiger Wein.*

*Medicamenta saturnina, bleyhaltige Arzneyen.*

*Stanni præparata.*

*Stannum plumbatum, bleyhaltiges Zinn.*

*Mercurius, ejusque præparata.*

*Mercuris vivus. Lebendiges Quecksilber.*

— — sublimatus corrosivus, aezender Sublimat.

— — dulcis, versüsstes Quecksilber.

— — præcipitatus ruber, rother Quecksilber  
Präcipitat.

— — albus, weißer Quecksilber Präci-  
pitat.

*Turpethum minerale, mineralischer Turbith.*

*Antimonii præparata.*

*Regulus antimonii, Spiessglaskönig.*

*Flores antimonii, Spiessglasblumen.*

*Butyrum antimonii, Spiessglasbutter.*

*Mercurius vitae, Algarothisches Pulver.*

Tartarus emeticus, *Brechweinstein.*

Hepar antimonii, *Spiessglasleber.*

Vitrum antimonii, *Glass des Spiessglases.*

Crocus metallorum, *Metallsafran, Spiessglas-safran.*

Sulphur auratum antimonii, *Spiessglasgold-schwefel.*

*Arsenicum, ejusque præparata*

Arsenicum album, *weisser Arsenik.*

\_\_\_\_\_ citrinum, *gelber Arsenik.*


\_\_\_\_\_ rubrum, *rother Arsenik.*

Auripigmentum, *Operment, Goldgelb.*

Regulus arsenici, *Arsenik-König.*

Arsenicum porosum, *Fliegenstein.*

Cobaltum arsenicale, *Arsenik-Cobalt.*



## DE VENENIS MINERALIBUS GENERATIM.

Venena ex regno minerali petita frequenter admodum in perniciem hominum, ob parvam, qua necant & ingeri possunt molem, ab hominibus sceleratis adhiberi solent.

Dividuntur in venena mechanica, terrea, acida, alcalina & metallica. Hæc iterum subdividuntur in cyprea, plumbata, mercurialia, antimonialia & arsenicalia.

Antidota venenorū mineralium in generalia & specialia dividuntur.

*Generalia* sunt

1. *Emetica*, si venenum adhuc in ventriculo vel purgans, si jam in intestinis haeret, atque gastritis aut enteritis abeat.
2. *Involventia*, ut Oleum, lac, mucilago, pinguedo, pulmentum farinosum, potio oleoso-mucilaginea & ova mollia. Potus diluens copiosus.
3. *Antispasmodica*, si spasmi valde urgent.

*Specialia Antidota.* Præter generalia adhibeantur alcalina & terræ absorbentes in venenis acidis. Acida diluta in venenis alcalinis. In venenis metallicis ut plurimum sola generalia antidota convenient.

---

\* Ex mucilaginis gumini arabici parte una, olei expressi partibus duabus, & aquæ, vel lactis partibus octo.



## VENENA MECHANICA.

---

Sic illa vocantur mineralia, quæ duris & acutis spiculis terreis in primas vias agunt.

### VITRUM CONTUSUM.

*VITRUM commune, Glass.* Est corpus diaphanum ex terra silicea & alcali fixo productum.

ODOR & SAPOR nullus.

**VIS NOXIA.** In pulverem contusum & ventriculo ingestum cardialgiam, colicam, spasmos, vomitum cruentum, inflammationem ventriculi & mortem inferre valet. Vitrum contusum faccharo admixtum muribus, ut pereant, exponitur.

**ANTIDOTA.** Oleum, butyrum, pinguedo vervecina, pulmentum farinaceum lacteum, desuper ipecacuanha, ac dein purgans.

**VIRTUS MEDICATA.** Ad leucoma cornes defrumentum.

## S M A L T A.

**S M A L T A.** *Schmalte.* Est vitrum cœruleum ex cobalto calcinato, silice & alcali fixo vegetabili confectum.

**ODOR & SAPOR** nullus.

**VIS NOXIA.** Suis spiculis duris ac scindentibus ut vitrum contusum agit.

**ANTIDOTA** hinc eadem.

**VIRTUS MEDICATA** nulla. Pictoribus, lotricibus, ac figulis pro coloratione inservit.

## A D A M A S.

**G E M M A** *Adamas L. Diamant.*

**ODOR & SAPOR** nullus.

**VIS NOXIA.** Integer deglutitus adamas nullum infert malum; at contusus ventriculo ingestus acuminatis & rigidis suis superficiebus, quas in pulverem etiam tenuissimum tritus, habere amat, cardialgiam, vomitum cruentum, inflammationem, gangrenam ventriculi, spasmos & mortem causare valet.

**H R A C I N T H U S , G R A N A T U S , S M A R A G D U S , S A P H I R U S , C A R N E O L U S** & omnes reliquæ gemmæ in pulverem contusæ, ut vitrum contusum agunt & ventriculo ingestæ nocivos exertunt effectus.

**ANTIDOTA** eadem ac in vitro contuso.

**VIRTUS MEDICATA** nulla.

### A L U M E N   P L U M O S U M.

**AMIANTHUS** *plumosus* L. *Federweiss.* — *Federalauñ.*

**ODOR & SAPOR** nullus.

**VIS NOXIA.** Ventriculo ingestum alumén plomo-sum sua figura pungente iritat & rubefacit ventriculum. *Externe* cuti applicatum intole-rabilem inducit cuti pruritum.

**ANTIDOTA.** Pinguia, oleosa cum emetico. Ve-næfæctio si gastritis jam adesset.

**VIRTUS MEDICATA.** Ad revocandam scabiem re-tropressam linterminibus qua iritans & rube-faciens cutis inspergitur.

### L A P I S   L A Z U L I.

**CUPRUM** *Lapis lazuli* L. *Lasurstein.*

**ODOR & SAPOR** nullus.

**VIS NOXIA.** Cupro non scatet, ut vulgo putatur. Hinc ventriculo ingestus duritie mechanica nocere videtur. *Ultramarinum* e lapide lazu-li paratum ejusdem indolis est.

**ANTIDOTA** ut in alumine plumoso.

**VIRTUS MEDICATA** nulla.

## FULIGO CAMINI ANGLICANA.

*FULIGO splendens Caminorum in Anglia. Englischer Ofenrus.*

**VIS NOXIA.** Ulcus cancrosum scrotale, caminorum purgatoribus in Anglia familiare, ex fuligine scroti plicis adhaerente nascens, labem insanabilem in partes genitales, inque ipsa imi ventris viscera transmittens inducit.

**ANTIDOTUM.** Excisio loci cancerosi in scroto. \*

## V E N E N A T E R R E A.

Quæ terra tenui in primas vias agunt.

## G Y P S U M.

*G Y P S U M usuale L. Gips.* Est terra calcarea acido vitrioli imbuta,

**ODOR & SAPOR** nullus.

**VIS NOXIA.** Gypsum crudum & magis adhuc ustum ventriculo ingestum causat gravitatem, cardialgiam, vomituritiones, pertinacissimam alvi obstructionem & mortem. \*\*

\* Cel. Pott *Abhandl. über verschiedene Gegenstände der Wundärzneykunst*, 2 Theil.

\*\* Perfidia *Emanuelis*, Imperatoris Bizantini nota est, qui gypso pulverato farinæ triticeæ admix-

**ANTIDOTUM.** Potus cum aceto, vomitorium, purgans.

**VIRTUS MEDICATA.** Externe ad massam ceraceam pro obducendis pessariis adhibetur.

### GLACIES MARIAE, seu SELENITES.

**NATRUM** *glaciale* L. *Marienglas* — *Frauenglas*,  
*Lapis specularis*. Est terra calcarea acido vi-  
trioli penitus in sal terreum mutata.

**ODOR** nullus; & **SAPOR** terreus.

**VIS NOXIA.** Stimulo mechanico agit quidem in  
ventriculum & intestina, at simul symptomata  
gypsi inducit.

**ANTIDOTUM** præcedentis.

**VIRTUS MEDICATA** nulla.

### CRYSTALLUS MONTANA,

**NITRUM** *Crystallus montana* L. *Bergkrystall*,

**ODOR** nullus. **SAPOR** terreus.

**VIS NOXIA.** In pollinem tenuissimum redacta cum  
muco ventriculi & intestinalium concrescens,  
irresolubilem constituit gluten terreum, late-  
ra ventriculi & intestinalium obducens, vasa

to, magnam Imperatoris CONRADI III. exercitus  
partem necaverat, & sic hujus expeditionem bellum  
irritam reddiderat.

excretoria & absorbentia obstruens. Hinc appetitus, ciborum digestio & chyli absorptio impeditur. Unde atrophia & mors ni malo succurratur.

### ANTIDOTUM præcedentis.

---

## V E N E N A . A C I D A .

Quæ suo *acore minerali* in primas vias agunt.

### ACIDUM VITRIOLI CONCENTRATUM.

*OLEUM vitrioli glaciale. Vitriolohl.*

Est acidum sui generis ex vitriolo, alumine vel sulphure elicitem.

ODOR peculiaris. Sapor acidissimus, causticus.

VIS NOXIA. Ventriculo ingestum, os, linguam, fauces, œsophagum, ventriculum & intestina inflamat, arrodit, spasmus constringit, humores coagulat, tussim, motus epilepticos excitat, & non raro gangræna ventriculi necat.

ANTIDOTUM. Potio oleoso-mucilaginosa, oleum, butyrum, alcali, terræ absorbentes.

VIRTUS MEDICATA. Ob vim antisepticam & corroborantem in morbis putridis, quibusdam nervosis, scabie convenit, at aqua dilutum, externe in epulide seu excrescentia gingivarum cernosa guttatum applicatum prodest.

### ACIDUM SALIS CONCENTRATUM.

*Spiritus salis marini concentratus, concentrirter Salzgeist.* Est acidum e sale culinari elicium.  
**ODOR** croceus. **SAPOR** acidissimus, causticus.  
**VIS NOXIA** præcedentis. \*

**ANTIDOTA** eadem ut in acido vitrioli.

**VIRTUS MEDICATA.** Guttæ quædam cum decocto corticis peruviani in febribus putridis, in ischuria renali laudatur. Externe cum melle roseo mixtum in angina gangrænosa & ulceribus scorbuticis atque in tinea convenit.

### ACIDUM NITRI CONCENTRATUM.

*Spiritus nitri fumans, est acidum sui generis, quod e nitro elicetur. Salpetersaure, rauchender Salpetergeist.*

**ODOR** peculiaris. **SAPOR** acidissimus.

**VIS NOXIA** præcedentis.

**ANTIDOTA** præcedentis.

**VIRTUS MEDICATA.** Qua causticum in excrescentiis externe ope penicilli caute illinitum, laudatur.

### A Q U A F O R T I S.

Est acidum nitri aqua dilutum. *Scheidewasser.*

\* N. A. N. C. T. vi. p. 383. ossa solvit.

**ODOR** peculiaris. **SAPOR** acidissimus.

**VIS NOXIA** præcedentis. Est autem acido nitri multo debilior. *V. halitus nitrosus.*

**ANTIDOTUM** præcedentium.

**VIRTUS MEDICATA** præcedentis.

### A Q U A R E G I A.

Est acidum salis cum acido nitri. *Königswasser.*

**ODOR** peculiaris. **SAPOR** acidissimus.

**VIS NOXIA** præcedentium acidorum.

**ANTIDOTUM** præcedentium.

**USUS MEDICUS**, causticus, externus.

### V I T R I O L U M A L B U M.

**VITRIOLUM** album L. *weisser Vitriol, weisser Galizenstein.* Est sal metallicus ex acido vitrioli & zinco constans, si purum est, at nativum & venale simul ferrum & cuprum continet.

**ODOR** nullus; **SAPOR** nauseosus, stipticus, acidus.

**VIS NOXIA**, vomitum enormem, cardialgiam, tormina excitat si majori dosi ingeratur.

**ANTIDOTUM.** Lrides cancerorum, \* oleoso-mucilaginea, alcalina.

\* Sammlung für prakt. Aerzte 7. B. 1. St. p. 183.

**JSUS MEDICUS.** Interne pro vomitorio, ad  $\Theta\beta$  cito agente laudatur; ad gr. ij vel iij in epilepsia, diarrhæa chronica, in arthritide, \* Externe pro aqua ophthalmica adhibetur, quæ aqua cum melle rosaceo mixta egregium remedium in aphthis oris est.

### VITRIOLUM COERULEUM.

**VITRIOLUM cyprium L.** blauer oder Cyprischer Vitriol. Est sal metallicus ex acido vitrioli & cupro constans.

**ODOR** nullus. **SAPOR** nauseosus, metallicus.

**VIS NOXIA.** Ingenti vi stiptica & caustica ventriculū afficit, hinc vomitus enormis, \*\* cardialgia, tormina, inflammatio & gangræna primarum viarum.

**ANTIDOTA** præcedentis.

**USUS MEDICUS.** Externe qua causticum adhibetur, in ulceribus fungosis ingreditur etiam lapidem divinum. Interne qua vomitorium in peste, in hydrope \*\*\* quandoque datur.

\* Cel. PETR. WIEL de usu interno nucis vomicae & vitrioli albi in pertinacibus morbis curandis conspicuo. Vitembergæ 1771.

\*\* A granis seu interne datis ingentes auxetas & enormes oriebantur vomitus. Ill. HOPFMANN med. rat. syst. II. p. 290.

\*\*\* Sammlung für Aerzte 7 B. I. St. p. 188,

## VITRIOLUM VIRIDE TABERNARUM.

**VITRIOLUM** *martis* L. *grüner Vitriol.* Est sal metallicus ex acido vitrioli & ferro constans.  
At nativum vitriolum viride fere semper cu-  
pro nonnihil contaminatum est.

**ODOR** nullus ; **SAPOR** stipticus, acidus.

**VIS NOXIA**, aliquantum minor quam præcedentis.

**ANTIDOTA** præcedentium.

**VIRTUS MEDICATA.** *Vitriolum martis arte factum*  
ut roborans, anthelminthicum & emmenago-  
gum adhibetur.

## VITRIOLUM VULGARE GOSLARIENSE.

Est vitriolum ferrum & cuprum acido vitrioli jun-  
ctum gerens. *Gemeiner Goslarischer Vitriol.*  
*Kupferwasser.* Cupri præsentiam immissa so-  
lutioni vitrioli lamina ferrea prodit.

**ODOR** nullus. **SAPOR** nausofus, stipticus, acidus.

**VIS NOXIA**, aliquantum minor quam vitrioli cœ-  
rulei.

**ANTIDOTA** præcedentium.

**VIRTUS MEDICATA.** Ad varia medicamenta vi-  
triolica paranda in officinis pharmaceuticis  
adhibetur.

## V E N E N A   A L C A L I N A .

---

Quæ sale alcalino caustico in primas vias agunt,  
si interne assumentur.

### S A L   A L C A L I N U S   V E G E T A B I L I S C A U S T I C U S .

**E**st sal alcalinus vegetabilis causticus ut *Sal tartari causticus. Aerendes Pflanzenläugensalz.*

**O**DOR nullus; SAPOR lixiviosus, causticus.

**V**IS NOXIA. Vomitum, alvifluxum & inflammationem ventriculi causat, si majori copia ingeatur. Ægrotus robustæ constitutionis unciam unam salis tartari hauſiebat, inde vomitus enormis 48 horarum, qui ventriculi simul inflammationem excitabat, quæ mortem vix non attulit. \*

**A**NTIDOTA involventia & acida diluta, emulsio, lac, oleosa, pinguia, mucilaginea.

**V**IRTUS MEDICATA. In acrimonia acida, in indurationibus lacteis, in rachitide.

### S A L   A L C A L I N U S   M I N E R A L I S   C A U S T I C U S .

Sal alcalinus fixus mineralis cum calce viva paratus. *Aerendes Minerallaugensalz.*

---

\* *Sammlung für Aerzte, 7. B. 1. St.*

ODOR nullus; SAPOR amaricans, lixiviosus, blan-

dior tamen, quam in priore.

VIS NOXIA præcedentis.

VIRTUS MEDICATA præcedentis.

### SAL ALCALINUS VOLATILIS CAUSTICUS.

Sal alcalinus volatilis causticus cum calce paratus,  
ut *spiritus salis ammoniaci causticus* est, *flüchtiges äzendes Laugensalz*.

ODOR penetrantissimus alcalinus, nares horrende fe-

riens & irritans; SAPOR causticus, lixiviosus.

VIS NOXIA. Majori copia ori & ventriculo inge-

stus *spiritus salis ammoniaci causticus* inflam-

mationem & gangrænam harum partium indu-

cit. Hominis a cane rabido demorfi integra

lagenula *spiritus salis ammoniaci oris cavo*

*infundebatur*; labia, lingua & palatum ilico

nigricabant ex combustione & æger intra quar-

tuor minuta moriebatur. \* Abusus salium vo-

latilium, quos juvenis majori copia adsueve-

rat esitare, hæmorrhagias de intestinis, nari-

bus, gingivis pruritum, intolerabilem, fe-

brem hecticam, mortemque intulit. \*\*

\* Cel. MARTINET *Experiences nouvelles sur les propriétés de l'alkali volatil fluor.* 1780.

\*\* HUXHAM of the malignant Sore-throat. p.  
68. Ill. HALLERI *de partium fabrica & functionib.*  
T. 3. p. 152.

**ANTIDOTA.** Multus potus cum acido vegetabili,  
lac, oleum, butyrum.

**USUS MEDICUS** in tumoribus arthriticis, in mor-  
su viperæ gallicæ. Est optimum remedium  
excitans in asphyxiis a mephitide acida.

### L A P I S C A U S T I C U S.

Est sal alcalinus fixus materia caustica calcis val-  
de imbutus. *Aerstein.*

**ODOR** nullus; **SAPOR** igneus, lixiviosus, causticus.

**VIS NOXIA.** Partes animales in escharam & ta-  
bum corrodit, hinc interne majori dosi da-  
tus eandem stragem ventriculo & intestinis in-  
duceret.

**ANTIDOTA** præcedentium.

**VIRTUS MEDICATA.** Pro caustico ad apériendos  
tumores infervit.

### LIXIVIUM CAUSTICUM SAPONARIORUM.

Est liquidum ex alcali vegetabili fixo & materia  
caustica calcis vivæ constans. *Aerende Seifen-  
siederlauge.*

**ODOR** nullus; **SAPOR** lixiviosus, causticus.

**VIS NOXIA** præcedentium.

**VIRTUS MEDICATA** ad aliquot guttas calculosis  
datur.

✿ ( 239 ) ✿  
C A L X V I V A.

**LAPIS CALCAREUS** *ustus*, *ungelöschter Kalch.* Est terra calcarea materie caustica imbuta.

**ODOR** nullus; **SAPOR** causticus, acris.

**VIS NOXIA.** Calx viva ventriculo ingesta vi caustica ejus inflammationem & arrosionem inducit. Inde ardor & fitis inexplebilis, cardialgia, tormina, spasmi, convulsio, mors.

**ANTIDOTA**, oleum, mucilago, aér fixus, acidula.

**VIRTUS MEDICATA.** Pro paranda aqua calcis, & pro linimento ad nævos v. *auripigmentum*.

---

## VENENA METALLICA.

Venena quæ indole metallica nocent, dividi solent

in venena *cuprea*

----- *plumbata*

----- *mercurialis*

----- *antimonialia* &

----- *arsenicalia*.

## A U R U M.

**AURUM NATIVUM** L. *Gold.* Est metallum perfectum ex calce auri & phlogisto constans.

**VIS NOXIA.** Aurum perfecte purum non est venenum, sed corpus in nostro ventriculo inge-

stum iterum immutatum e primis viis eliminatur. \* Aurum vero in aqua regia solutum vim venenatam hujus aquæ adauget.

**ANTIDOTUM.** Solutio auri in aqua regia exigeret antidota mineralium acidorum.

**USUS MEDICUS** nullus. Si pretium non obstat pro affervandis cibis & medicamentis secundis præberet vasa. Denique paupertatis optimum est antidotum.

### A U R U M M O N E T A R I U M.

Est aurum plus minus cupro commixtum, ex quo monetæ aureæ, vasa aurea, aliaque supplex aurea confici solent. *Münzgold.*

**VIS NOXIA** ab admisto cupro dependet, hinc cupri symptomata venenata causat. Vide *Cuprum*.

**ANTIDOTA** etiam sub consideratione cupri dicentur.

\* D. V A I L L A N T medicinæ Doctor & Regis Galliæ Atiquarius, quem prædones navigantem insequebantur, timens ne in rapaces eorum manus incideret, numisnata aurea viginti, quæ secum habebat, deglutivit, exque iis quædam in Galliam redux sumta spinachia feliciter reddidit alvo. Cel. CÆLSI ratio occurendi morbis a mineralium abusu produci solitis 1783. p. 8.

## A U R U M F U L M I N A N S.

Est calx auri cum alcali volatili intime juncta.

*Knallgold.*

ODOR nullus; SAPOR insipidus.

VIS NOXIA. Interne majori dosi assumptum excitat tormina, anxietatem, spasmos, convulsiones, vomitum, diarrhæam, profusissimam salivationem, \* animi deliquia & non raro mortem. \*\*

VIS NOXIA EXTERNA. A frictione vel accedente calore etiam sine flamma admota cum horrendo strepitu exploditur. Juvenis 22 annorum lagunculæ vitreæ aurum fulminans injecit, non attendens infelix unam alteramve particulam collo adhærere, eam clausurus epistomium vitreum vertendo intrudebat; eodem momento cum ingenti tonitru in innumeris moleculas dissipavit lagenula; homuncio inter furnos laboratorii magno impetu projicitur, facie dissidentis lagenulæ frustulis tota vulnerata, & oculis ambobus deperditis. \*\*\*

\* In duobus ægrotis a tribus granis auri fulminantis tormina, ingentein debilitatem & profusissimam vidi salivationem.

\*\* *Ill. HOPMANN med. rat. system II. p. 287.*  
& *Cel. GMELIN T. III. p. 98.*

\*\*\* *Cel. MACAUEUR Chymisch. Wörterb. Leipzig 1781. p. 186.*

**ANTIDOTA.** Oleosis, mucilaginosis, sulphuris vel  
salis marini spiritu enervatur.

**VIRTUS MEDICATA.** Quondam ut catharticum ad  
grana IV in ileo \* dabatur; at abstinendum  
ab infido remedio.

### A R G E N T I P R A E P A R A T A.

**ARGENTUM nativum L. Silber.** Est metallum  
perfectum ex calce argenti & phlogisto con-  
stans.

**ODOR & SAPOR** nullus.

**VIS NOXIA.** Argentum perfecte purum non est  
venenum. At argentum in aqua forti solu-  
tum, reddit aquam fortem multo acriorem,  
hæc acerrima est, ac omnes partes molles  
corrodit.

**ANTIDOTA** antacida & obvolventia, si argenti so-  
lutio in aqua forti ventriculo ingereretur.

**VIRTUS MEDICATA.** Externe solutio argenti pro  
caustico inservit, cuti maculam obscure ru-  
bram inducit, cum plurima aqua diluta so-  
lutio ad capillos nigro colore imbuendos  
inservit.

### A R G E N T U M M O N E T A R I U M.

Est argentum plus minus cupro vel plumbo con-  
taminatum, ex quo monetæ, vase & multi-

\* Cel. MACCVER Chymisch. Wörterb. p. 187.

plex alia supplex argentea confici solet.  
*Münzsilber.*

**VIS NOXIA.** Vinum vel alia acida in vasis argenteis conservata hinc vomitum, tormina & alios noxios effectus producebant. \*

**ANTIDOTA** cupri vel plumbi.

**VIRTUS MEDICATA** nulla, nisi pro instrumentis quibusdam chirurgicis.

### L A P I S I N F E R N A L I S.

**LAPIS infernalis.** *Höllenstein.* Est argentum acido nitroso junctum.

**ODOR** nullus; **SAPOR** deterimus, causticus.

**VIS NOXIA.** Destruit vi corrosiva partes molles, epidermidi maculam nigram cum solo epidermidis secessu evanidam inurit. Hinc ventriculo ingestum est atrocissimum venenum corrosivum.

**ANTIDOTA.** Oleosa, pinguia, aquosa, mucilaginosa, alcalina, ut sapo venetus, absorbentes terræ.

\* *Ill. VAN SWIETEN Comment. T. IV. p. 703.*  
novi dicit optimum & sincerum vinum in phiala argentea clausa servatum, pessima mala produxit, dum potaretur. Illud autem non ab argento factum fuit, sed a cupro, quod in utensilibus ex argento paratis semper adest. Phialæ enim illius argenteæ superficies interna ærugine obducta inveniebatur, dum in causam horum malorum inquirebatur.

**VIRTUS MEDICATA.** Externe pro consumenda & siccanda carne fungosa ulcerum epuloticorum infervit.

### ARGENTUM HYDRAGOGUM BOYLEI.

**Sal metallicus** ex argento & acido nitri confectus.

*Boyles Silberarzney.*

**ODOR** nullus, **SAPOR** amarissimus.

**VIS NOXIA.** Caustica, draistica, valde hydrago-  
ga, debilitatem ventriculi diu reliquens.

**ANTIDOTA** præcedentis. Debilitatem ventriculi  
remanentem rob baccorum juniperi fanat.

**VIRTUS MEDICATA.** Ad grana duo in hydrope  
& vermibus laudatur, sed cave a periculoſo  
remedio.

### BISMUTHI PRÆPARATA.

*BISMUTHUM nativum L. Wismuth. Marcasita.*

**VIS NOXIA.** An hoc metallum per se venenum  
fit, non patet.

### MAGISTERIUM BISMUTHI.

Est *calx bismuthi. Wismuthweiss.*

**VIS NOXIA.** Interne assumptum intolerabiles an-  
xietates causavit. \*

ANTIDOTUM lac, oleosa cum ipecacuanha.

\* *Mémoires de l' academie de Berlin, 1753.*

USUS MEDICUS nullus. Externe pro cosmetico albo adhibetur.

### C U P R U M.

*CUPRUM nativum L. Kupfer.*

**O**DOR proprius, si manu teratur. **S**APOR valde nauseofus.

**V**IS NOXIA. Cuprum purissimum & non æruginosum est innocuum, at quocunque humore solutum veneni atrocissimi edit effectus. Solvitur vero ab omnibus salibus acidis, alcalinis & neutris nec non a pinguibus.

Cuprum vel ex eo parata intus sumpta, horrenda sequuntur symptomata, nempe sapor valde nauseofus seu æruginosus, ariditas linguae ac faucium, sitis ingens, ventriculi & intestinorum dolores acerbissimi, enormes vomitus ac alvi fluxus, aut inanes & frequenter nifus reddendi alvum, urinæ suppressione pertinax, anxietas summa, spirandi difficultas, vertigo, capitis dolor, phrenitis, inflammatio ac ulcera ventriculi & intestinorum, intumescentia totius corporis, convulsiones, mors. \*

Potest cuprum forma cibi, potus, vel medicamentum corpori nostro ingeri

\* Cel. CÆLSI ratio occurendi morbis a mineral. abusu. p. 18.

1. *Cibus cupratus.* Integras familias a cibis in vasis cupreis præparatis & conservatis fuisse extinctas frequens docuit experientia. Huc pertinent *cucumeres* \* *Gemmæ caparidum*, \*\* *phaseoli* in vasis cupreis conditi. *Carpiones* in aheno cupreo cum aceto cocti & reservati, *leguminæ*, *butyrum* in iisdem diu retentum. \*\*\* Vasa ex ære campano, vel auricalcho aut metallo principis vel cupro albo confecta minus sunt nociva, quia minus cupri continent, non tamen absque noxa adhiberi possunt.

2. *Aqua cuprata.* Aqua fontana in vase cupreo diu reservata. *Aqua Neusoliensis* maxime hoc pertinet.

3. *Vinum cupratum.* Vinum, quod diu in amphora cuprea stabat.

4. *Spiritus vini cupratus.* Spiritus vini ex alembico cupreo destillatus prodit quidem pellucidus & coloris expers at ta-

\* FALCONET observations and experiments on the poison of copper. London 1724. & Götting. Gel. Anzeigen 34 St. 1776 p. 88.

\*\* Journal de medecine 1766. T. 24. Febr. p. 150.

\*\*\* Cel. GMEIN Geschichte der mineralischen Gifte p. 63.

men cuprum in se continet. **Criterium optimum** est sapo spiritui immissus, hic enim forma striae viridescentium in spiritu vini cuprato solvitur, nam a solo spiritu salis ammoniaci spiritus vini cupratus non viridescit, \*

**Optimum & securissimum remedium spiritum vini a cupro liberandi est immissio calcis extinctae, quæ cuprum e spiritu vini præcipitat.**

¶. **Medicamentum cupratum.** Medicamenta in mortariis æneis trita vel præparata & ipsa medicamenta ex cupro præparata huc spectant, ut *cuprum ustum*, *cuprum ammoniacum*, *aerugo*. *Ens veneris*, *crocus veneris*. *Lapis armenus*, *cœruleum monitanum*, *Vitriolum cœruleum*.

**VIS NOXIA EXTERNA.** A policis punctura ope acus cuprei æruginosi ingens inflammatio, gangræna brachii & mors oriebatur. \*\*

**CRITERIUM CUPRI** est spiritus salis ammoniaci, qui cuprato cibo vel medicamento instillatus sa-phirino colore cuprum prodit.

\* Cel. PLOVIAUET *Warnung an das Publikum für einem in manchen Brandweinen enthaltenen Gift, sammt den Mitteln es zu entdecken und auszuscheiden.* Tübingen 1780.

\*\* MISSA in *Recueil periodique II, Art. 1755.p. 284,*

**ANTIDOTA.** Ubi quis cibum cupro infectum vel æruginem asumpsit, vomitus si non sponte succedat, irritatione faucium mechanica protinus concitandus, Dein

Aqua tepida pura, mucilagines, lac vacinum, amygdalarum aut olivarum oleum recens pressum, butyrum non salsum, una cum putaminibus ovorum vel creta aliisque acidum absorbentibus affatim haurienda. Cuprum *sale alcalino* solutum mere oleosa & mucilaginosa exigit. *Externe* cataplasmata emollientia & balnea calida admoveantur.

*Tremorem* post alia remedia adhibita remanentem, potus thermarum sulphurearum & balnea ex iis tollunt.

**VIRTUS MEDICATA.** Ab interno usu cupri plane in praxi abstinere consultissimum est. *Externe* viride æris in *unguento ægyptiaco* ad ulcera fordida depuranda adhibetur. *Aqua ophthalmica saphirina* in morbis oculorum quibusdam adhuc in usu est.

### P L U M B U M.

**PLUMBUM nativum L. Bley.**

ODOR nullus. Sapor dulcescens.

**VIS NOXIA.** Plumbum ventriculo ingestum varios morbos, quos *saturninos* appellant, inducit. Inde oriebatur fapor dulcis, siccitas oris, con-

strictio gulæ, ponderis sensatio in ventriculo, appetitus ac virium dejectio; corporis pallor & macor, anxietas præcordiorum, vertigo, animi deliquium, tussis, astma siccum; singultus, nausea, vomitus, vigiliæ perpetuæ, cachexia, febris lenta, icterus, tremor, palpitatio cordis, dolores artuum nec non cardialgici ac colici intolerabiles, inflammatio lenita viscerum abdominalium; fæces alvinæ, ovilis stercoribus similes, introductio abdominis, alvus ita stricta ut enema injici nequeat, ischuria, dysuria, aphonia, paralysis extremorum, sudores frigidi, tandem convulsiones & mors.

Symptoma in variis morbi saturnini gradibus præ ceteris constans est *pulsus durus ligneus* seu chordæ ad instar densus. Hic præter cognitam plumbi tractationem præ aliis signis certius labem saturniam subesse arguit. Sunt, qui *ventrem durum & ligneum* pro signo pathognomico adsignant, sed hoc signum vel in gravissimis colicis pictonum nonnunquam desideratur. Alvus pertinacissime clausa, umbilici introtractio & assiduus materiæ æruginosæ vomitus ferme tantum in graviori colica pictonum spectatur. \* Possunt autem saturnina

\* Cel. HÆBERL de febribus annuis. Monach. 1784. p. 70, & Cel. STOLL rat. medendi, T. II.

1) cibœ, potui, medicamentis fraudulenter vel ex ignorantia admixta ventriculo ingeri; vel 2) forma halitus cum saliva deglutiri aut una cum aëre ad pulmones deferri vel 3) externæ cuidam corporis parti applicata in vasæ absorberi.

**CIBUS PLUMBATU.S.** Periculofsum est cibos acidos, acescentes, aut oleosos in *vasis plumbeis* vel ex *stanno plumbato* confectis aut in *fistilibus* vitro plumbato coloratis coquere vel diutius fervare. Agricolæ in Belgio butyrnum augendi ponderis causa tempore annonæ *cerussa* miscabant. Alii panem eadem mangonizabant, Mercatores fraudulenti oleis rancidis cerussam addebant, ut ea pro olivarum oleo recens professo incautis venderent. \*

**AQUA PLUMBATA.** Integra familia paralysi vexabatur, dum ad culinares usus adhibebatur aqua in magno *receptaculo plumbeo* reservata diu hærens. \*\* Integra familia, quæ aquam ex puteo, cuius *enibolus plumbeus* ab aqua selenitica corrosus erat, hauserat, ægrotabat. Pater jam a longo tempore paralysi afficiebatur; mater colica & ictero diu laborans moriebatur. Ex 21 infantibus 8 in infantia moriebantur, reliqui ægrotabant toto tempo-

\* Cel. CÆLSI l. c. p. 30.

\*\* ILL. VAN SWIETEN Comment. T.

re, quo in domo paterna habitabant. \* Eadem mala & ab aqua per plumbeos aquæductos advecta, ab aqua pluvia e tectis plumbo obductis in receptaculum suppositum depluente, oriebantur.

**VINUM PLUMBATUM.** Lucripeti & turpes œnopolæ vina immatura & acida *plumbo raso*, aut *lithargyrio*, *minio*, *cerussa* vel *saccharo saturni* dulcificare solent. Vinum in *vasis* ex stanno plumbato confectis vel cerevisia aut mustum vini vel pomacei in *receptaculis plumbeis* diu relictum, colicam saturninam & paralyses epidemice totas familias, vel cœtus hominum corripientes induxit. \*\*

**PRÆPARATA SATURNINA**, quæ sœpe scopo medicandi dantur, ut *Cerussa plumbi*, *Minium*, *Lithargyrium*, *Saccharum saturni*, *Magisterium saturni*, *Extractum saturni*, *Aqua vegeto-mineralis*, *Plumbum ustum*, *Plumbum cornuum*. *Tinctura saturnina* &c. atrocissimos morbos saturninos procreant. Idem oriuntur a medicamentis aliis in *vasis* plumbeis trita aut alio modo parata, nec non a medicamentis plum-

\* *Cel. WALL in medical traetis.*

\*\* *Ephem. N. C. Dec. III. A. 4. obs. 100.* & *Cel. BAKER. Medical Transact. Vol. I. p. 175.* & *Vol. II. p. 240.* & *Cel. ZELLER de vinis lithargyrio mangonatis.*

plumbo adulteratis, ut a cinnabari, quæ minio, a mercurio vel stanno quæ plumbo adulterari solent.

**H**ALITUS PLUMBATUS, qui a multis artificibus cum saliva deglutitus aut cum aëre in pulmones respiratus eosdem producit morbos. Vide inter venena halituosa *halitum plumbatum*.

**V**IS NOXIA EXTERNA. Nocent saturnina particulis venenatis ad interioria corporis a cute absorptis; quandoque simul materiam acrem critice ad cutim depositam ad interiora corporis repellendo. **A** *Fuco saturnino* diu adhibito tabes pulmonalis, \* contractura paralytoidea, & colica saturnina fuit visa. \*\* Homo, qui, quum in ollam braxatoriam incidisset & a chirurgo quodam empyrico *emplastrum saturnino* obvolutus esset, colica pictonum dein laborare cepit. \*\*\* A *cataplasmate* seu *fomento ex saccharo saturni soluto* spasmodic contractura, cardialgia, vomitus & colica orie

---

\* *Ill. BOERHAAVIUS* in *Elem. chym.* T. II p. 309. sex vel septem nobiles puellas hujus usu mortuas novit.

\*\* Nuper *Ill. DE BRAMBILLA* puellam colica pictonum a fuci saturnini usu laborantem oleo & laudano servavit, cuius mater ab eadem contractura extremitatum superiorum laboravit & ejus altera filia convulsionibus atque colica jam mortua fuit.

\*\*\* *Cel. HAEBERL de febribus annuis* p. 68.

bantur, \* Etiamsi s̄ solum diebus saturninum remedium applicabatur. Ab aqua vegeto-minerali & emplastro saturnino quo ulcus cruris quadriduo deligabatur, colica saturnina & paralyfis oriebatur, quæ symptomata omissis remediis saturninis & usu interno olei ricini brevi evanescabant. \*\* Canis qui super laminis plumbeis dormire & vir qui juxta caminum plantas pedum laminis plumbeis impunere longo tempore confuevit, paralyfi crurum afficiebantur. \*\*\* Puer biennis sanissimus, qui nudatis pedibus super laminas plumbeas adhuc a fusione calentes incedere amabat, subito doloribus colicis, febre & convulsionibus corripiebatur \*) a cerussa, qua intertrigo genitalium infantis inspergebatur colicam & paralyfim femorum vidi.

DIAGNOSIS MORBI SATURNINI. Vinum v. g. lithargyro mangonifatum noscitur

1. Ex sapore dulcescenti.
2. — cardialgia, capitis dolore, paralyfi colica pictonum aut alio morbo post vini usum superveniente.

\* Cel. PERCIVAL. on the poison of lead. p. 12.

& 15.

\*\* PERCIVAL. l. c. p. 13.

\*\*\* Idem p. 77.

\*) Cel. WALL apud PERCIVAL p. 126.

- 3 — *præcipitato nigro si vino liquoris probatorii, recenter parati & vel tincturæ sulphuris volatile exigua portio instilletur.*  
*Minus certa criteria acidum salis vel vitrioli & sal alcali sunt.*
4. — *Particulis metallicis griseis & splendentibus, quæ in fundo vasis, quo vinum continebatur, oculo nudo vel armato, quandoque conspicitur.*
5. — *regulo plumbi, qui ex residuo post 8 librarum evaporatarum per ignem fuso re-*

\* *Liquor probatorius* sequenti modo conficitur.  
*P. pulv. auripigmenti drachma dimid. calcis vivæ drachma ij. misce & coque in aquæ pluvialis purissimæ drachma XII. dimidiæ horæ spatio, decoctum refrigeratum percoletur & in phialis rite obturatis servetur usui. Jubent authores ut vini unciis duabus vel tribus guttæ aliquot liquoris probatorii instillentur; si hoc fiat rubrum vel fuscum vel nigrum atque turbidum, vinum saturninis adulteratum esse contendunt; ubi vero lacteï coloris nubecula apparet, vinum asserunt meracum esse. At cum stannum, cuprum, mercurius & aurum simili modo & colore ex acido vegetabili per liquorem probatorium præcipitentur, hinc hicce solus liquor non sufficit ad detegendum plumbum in vino, nisi cætera criteria simul adhibeamus. Cel. W O L L I N *Verfälschung des Weins mit Bleyglätte* p. 70. & Cel. DELII *Revision der Weinprobe auf Bley.* Erlang. 1779. Nullum vero aliud metallum dulcificat vinum quam saturnus.*

manet. Hoc ex omnibus signis *infallibile*  
solum est.

6. *Aqua plumbata*, noscitur ex colore liliaceo,  
seu violaceo-roseo, si aquæ hujus ʒ iv  
guttæ seu solutionis argenti in acido nitri  
confectæ instillentur. \*

**MEDELA MORBORUM SATURNINORUM.** In ipso co-  
licæ saturninæ *paroxysmo* omni hora uncia una  
*olei amygdali* cum aliquot guttulis *laudani*  
*liquidi* præbeatur. Efficacissimum remedium  
vero est *oleum ricini*, quod præter vim ob-  
volventem & spasmos sopientem insimul al-  
vum movet. Externe enemata oleosa, balneum  
tepidum, fomentum oleosum convenient.

*Paroxysmo remittente* illico detur *purgans*  
cum opio vel extracto *hyosciami*, ut plum-  
bum cum alvo evacuetur. Opium vel extra-  
ctum *hyosciami* idcirco purganti additur, ut  
solvat spasmum alvi obstinatæ causam. For-  
tissima purgantia & enemata alvum non mo-  
vent sed aucto ventris cruciatu vomitus *enor-*  
*mes* excitant, non præmisso opio. Opium  
solum quandoque sine addito purgante alvum  
movet.

*Mixtura* ex fatis amari & mannae ʒ iß  
cum uno grano opii & syrupo quodam in ʒ iv

\* Cel. S A G E *Untersuchung verschiedener Mine-*  
*ralien.* *Götting.* p. 23.

aqua<sup>e</sup> solutis. Vel Pilulæ ex resina jallapæ & pilulis pacificis Edinb. aa gr. viij atque oleo-facchari aurantiorum Өj pro una dosi, valde conveniunt. Alii rheum cum lapidibus cancrorum vel magnesia aut quod efficacius cum sale sodæ laudant. \* Alii denique aluminis crudi grana xv. omni quadrihorio in ipso paroxysmo dant. \*\*

Reliqui morbi saturnini ut paralysis, contractura &c. saepius purgatis primis viis sanantur remediis *nervinis*, e quibus camphora, castoreum, aza foetida, electricitas, decoctum valerianæ sylvestr. vel cort. peruviani, ligni sassafras, \*\*\* cum antimonio crudo maxime conferunt. Nec non lacticinia, balnea frigida, opium in refracta dosi, sal alcali, sapo venetus cum rheo diu continuata. Aquæ alcalinæ & mar-

\* *Cel. WEBER Physik. Chem. Magaz.* I Th. p. 18. ter de die drachmam rhei & totidem lapidum cancrorum vel salis sodæ enixe comendat. *Cel. MALOUIN in medic. Chymic. Altenb.* 1764. Th. II. p. 37. Sal tartari ut antidotum plumbi laudat.

\*\* Tertia dosis colicam jam mitigabat. *Gesammelte Schriften zur Erkenntniss und Behandlung der Bleykolik* p. 335.

\*\*\* *POTERIUS* figulum paralysi saturnina affectum decocto ligni sassafras & baccarum lauri brevi pristinæ saluti restituit,

tiales

tiales , diæta lactea. \* Mercurius vi-  
vus. \*\*

Quandoque colica saturnina tempore æstivo cum  
*saburra biliosa*, quæ emético purgans exigit &  
tempore hyemali cum *plethora* vel *phlogosi abdo-*  
*minali*, quæ venæ sectionem & antiphlogi-  
stica poscunt, antequam opiata porrigi que-  
unt, complicatur.

VIRTUS MEDICATA. Ab interno ex plumbò præ-  
paratorum remediorum usu in praxi medica  
plane abstinentiam est, sunt quidem non in-  
fimi subselii medici, qui usum internum plum-  
bi, ut *tincturam saturninam*, quæ in phthisi  
laudatur \*\*\* salutarem esse male crediderunt.  
At remedium quod centies detrimentum at-  
tulit, & semel iterumve forte fortuna aut

\* *Illi WERLHOFIUS* podagricos duos partim  
ex materia arthritica, partim ex colica saturnina vi-  
nosa omnium membrorum paralyssi affectos, lentaque  
tabefactos febre, in integrum restituit lactea diæta.

\*\* *Cel. CAELSI ratio occurrenti morbis a mi-*  
*neralium abusu produci solitis. Romæ 1780. p. 39.*  
scire etiam oportet dicit: mercurium vivum per os  
ingestum pessima nonnunquam symptomata debellasse  
a salis saturni abusu producta.

\*\*\* *Cel. VOGEL Versuch einiger Beobachtun-*  
*gen. Gött. 1777. p. 12. & Cel. WHITE in medicin.*  
*Comment. von Edimburg 3 B. 1 St. p. 79.*

benignæ naturæ industria non nocuit aut etiam profuisse solummodo videtur, fugiendum est.

**P**USUS EXTERNUS plumbatorum, et si non omni periculo careat, in exigua dosi facilius tamen fertur. *Oleum cum minio coctum* variorum emplastrorum basis est. *Lamella plumbea*, vel succus dauci cum aliquot guttis aceti lithargyrii mixtus in seirrho cancroso cōrcendo laudatur.

### S T A N N I P R A E P A R A T A.

*STANNUM crystallinum L. Zinn.*

ODOR ingratus, si calefiat; SAPOR metallicus.

**V**IS NOXIA. Stannum perfecte purum interne exhibatum non est venenum. Neque stannum, cuius uncia unum arsenici granum continuit, interne in rasura cani datum vim noxiam intulit, ut experientia docuit. Arsenicum enim non formafalina sed regulinā & intime comixta stanno adhæret. \* Neque cuprum, quo stanni molilities ad vasa culinaria paranda adaptatur, in exigua dosi, (nempe  $\frac{1}{12}$  cupri  $\frac{1}{12}$  Bismuthi & 97  $\frac{1}{12}$  stanni) malos inducit effectus.

---

\* Cel. BAYEN chym. Untersuchung über das Zinn und Beantwortung der Frage: ob man sich ohne Gefahr zu oekonomischen Gebrauche der zinnernen Gefäße bedienen könne? Leipzig 1784. p. 176. & 179.

Cuprum enim nisi ærugine infectum non nocet. \* Sed stannum *valde arsenicatum* vel *valde cupratum* noxas sanitati infert.

Pessima vero stanni mangonisatio est miscela cum *plumbo*.

**ANTIDOTA** cupri & plumbi.

**VIS MEDICATA.** Rasura stanni ad tæniam expellendam laudatur.

### STANNUM PLUMBATUM.

Stannum, quod ad stannanda vasa cuprea adhibetur, quandoque a lucripetis stannatoribus ex una parte stanni & sex vel septem partibus plumbi conficitur. \*\*

**VIS NOXIA** hinc a plumbo. Stannum purum nimis molle est, quam ut vasa culinaria inde confici possent, ideo a multis plumbō miscetur. Noscitur stannum plumbatum si ovum recens coctum dimidio dissectum imponatur cum adfuso aceto patinæ e stanno plumbato confestæ. Sic acetum dulcescit & ovi superficies livescit sat profunde, si stannum valde plumbatum.

**ANTIDOTA** plumbi:

\* BAYEN l. c. p. 191.

\*\* Cet. PLOUQUET l. c. p. 40.

## VENENA MERCURIALIA.

## MERCURIUS VIVUS.

**H Y D R A R G Y R U M** *virgineum* L. *Quecksilber.* Est semimetallum in atmosphæræ calore fluidum, coloris argentei.

**ODOR** nullus. **SAPOR** metallicus.

**VIS NOXIA.** Mercurii vivi magnam copiam absque noxa deglutiri posse, multiplici experientia constat. Diutinus tamen ejus usus inducit varios morbos, *mercuriales* dictos, nempe tremorem artuum & impotentiam crurum.

**VIS NOXIA EXTERNA.** Imprudenter aut nimis diut adhibita *frictio mercurialis* non raro inducit anorexiā, sītim, oris fœtorem peculiarem, febrim, gingivarum, linguæ, palati, tonsillarum, labiorum, genarum tumorem, dolorem, calorem, inflammationem, ulcera alba dolentissima, gangrenam sphacelumque; copiosum diu noctuque viscidæ salivæ effluxum, tumorem capitū immanem una cum oculis turgidis, prominentibus, sanguineis, dentium antea sanissimorum dolorem, cariem, lapsum; totius sanguinis dissolutionem, debilitatem summam, animi deliquia, stuporem, paralysin, claudicationem perpetuam, œdema crurū, sævissimam cardialgiam, vomitum, alvi fluxum aquo-

fum, oolidissimum cum acerbissimis torminibus; aneurysmata, hæmoptisis, aliasque hæmorrhagias, atrophiam, maxillarum aliorumque oris ac nasi ossium cariem, diras anxietates, respirandi difficultatem, suffocationem aut convulsiones lethales. Luctuosissima exempla mortis ab innunctione mercuriali inductæ apud authores prostant.

Quandoque mercurius per inunctionem corpus ingressus in maiores globulos coit, ac in ossium cellulosis recessibus, nec non in aliis corporis partibus sub nativa forma sua reperitur. \*

**ANTIDOTA.** Quam primum hydrargyrosis aliquem morbum causat, a frictione illico abstinentem, tibialia, femoralia, indusia, lecti linteamina, unguento mercuriali conspurcata, statim removenda, partes inunctæ spongia saponis lixivio madente detergendæ, totum corpus balneo calido abluendum.

Morbi mercuriales sequenti medela curandi; nempe *plethora, febris cum inflammatorio oris & capitis tumore venæ sectiones, alvi ductiones refrigerantes & potus emollientes mucilaginosos cum nitro exigit.*

*Linguæ tumor suffocationem minatus, simul ut hirudines ei affigantur aut scarificetur, poscit.*

\* *Cel. CÆLS I. c. p. 43.*

*Ptyalismus* leniora clysmata, purgantia mitiora, flores sulphuris, atmosphæræ calorem moderatum, balnea tepida postulat. Docuit observatio camphoram ptyalismum minime compescere et si ab aliquibus commendetur.

*Alvi fluxus dysentericus* nullo remedio tam efficaciter curatur quam opio cum mucilaginous per os anumque ingestis nec non sudore stragulorum.

*Tremori* a mercurialibus orto infusum vel essentia radicis enulæ; efficacius adhuc reputatur cortex peruvianus cum floribus sulphuris.

*Paralyſi* medentur flores arnicæ, frictiones, vis electrica &c.

*Cachexiam, tuffim* cum febre purisque sputo ac sudoribus colliquativis nec non *haemorrhagias* varias, oris ulcera mercurialia, aliaque mala chronica a mercurialium abusu inducta, cortex peruvianus, decoctum turionum pini, infusum mali diurno usu tutissime curat.

**VIRTUS MEDICATA.** Internus *mercurii gummosi* usus in omnibus morbis venereis, in vermis, in tetano, in morsu canis rabidi, in morsu viperæ italicæ laudatur. Vide *Pharmacologiam chirurgicam*.

## MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

**E**st sal metallicus ex mercurio & acido salis constans. *Aezender Quecksilbersublimat.*

**O**DOR nullus. SAPOR metallicus, austerus, ingratissimus.

*Criterium* mercurii sublimati in liquore quodam soluti, est præter saporem metallicum pulvis lateritii coloris, ab aqua calcis recenti affusa præcipitatus, & mercurius ex hoc pulvere sublimatus.

**V**IS NOXIA. Ultra unum alterumve granum ventriculo ingestus est deterrium venenum, quod vomitu enormi, alvi fluxu dysenterico, inflammatione & gangrena ventriculi atque intestinorum, convulsionibus &c. celeriter necat.

Minima vero copia, nimisque diurno usū ingestus, tabem, hæmoptoen, tussim inducit atque eodem modo ac immoderata hydrargyrosis nocet.

**V**IS NOXIA EXTERNA. Nec externa mercurii sublimati applicatio sine summa circumspetione adhibenda est. Nam matrona, cui mercurius sublimatus ope emplastri applicabatur, doloribus intolerabilibus, convulsionibus, vomitionibus, faucium ingenti tumore, salivatione miserrime excruciatæ obiit. Cuidam puellæ contra pediculos capitis unguentum ex mer-

curio sublimato illinebatur; inde caput adeo intumuit, ut brevi infanti pereundum fuisset, nisi forte lixivium e cineribus ope linteorum applicatum fuisset, quo remedio brevi convalluit, ita tamen ut capilli deciderent.

**ANTIDOTA.** Copiosus potus mucilaginosus, emul-  
fio, lac, oleum, butyrum, adeps. Urina vac-  
cina vel equina. \*

Antidota *specialia* sunt sales alcalini & ter-  
ræ absorbentes, hinc lapides cancrorum, pu-  
tamina ovorum, aqua calcis, lixivium ci-  
nerum.

Mercurius sublimatus *externe applicatus* li-  
xivio alcalino ablucatur eoque locus affectus  
fomentetur.

**VIRTUS MEDICATA.** Ab interno usu plane absti-  
nendum esse opinor.

### M E R C U R I U S   D U L C I S.

**EST** mercurius sublimatus mercurio vivo valde dul-  
cificatus. *Verfürstes Quecksilber.*

**ODOR** nullus. **SAPOR** terreus fere insipidus. **Aqua**  
fere insolubilis.

**VIS NOXIA.** Mercurius dulcis male præparatus  
seu non bene dulcificatus eadem fere ac mer-  
curius sublimatus corrosivus excitat sympto-

\* *Cel. CÆLSI l. c. p. 51.*

mata. Mercurii dulcis etiam si bene præparati usus diuturnus ac copiosior eosdem morbos ac inunctionum mercurialium abusus producit.

**ANTIDOTA** hinc eadem quæ sublimatus corrosivus exigit.

**VIRTUS MEDICATA.** Vide *Pharmacologiam chirurgicam.*

### MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

Est calx mercurii ex acido nitri ope acidi salis præcipitata. *Weisser Quecksilber-Præcipitat.*

**ODOR & SAPOR** nullus. Aqua fere insolabilis.

**VIS NOXIA.** Est mercurio dulci aerior hinc majori dosi ac minor sublimati agit. Quandoque *cerussa mangonisatus* est.

**ANTIDOTA** eadem ut in sublimato corrosivo.

**VIRTUS MEDICATA.** Granum unum diu cum granis decem sacchari albi purissimi in mortario vitro triti, omni trihorio datum in morbis venereis præsertim ossium laudatur. \* Unguentum e mercurio præcipitato in malis cutaneis est efficax.

\* *Illi, VAN SWIETEN Comment. T. v. p. 532.*

## MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

Est calx mercurii ex acido nitri abstracto: *rother Quecksilber-Präcipitat.*

ODOR & SAPOR nullus.

VIS NOXIA. Majori dosi ingeritus, cum præcipitato albo sit magis causticus, eadem mala ac exigua dosis sublimati inducit.

ANTIDOTA mercurii sublimati corrosivi.

VIRTUS MEDICATA præcedentis, de usu externo vide *Pharmacologiam chirurgicam.*

## TURPETHUM MINERALE.

Est calx mercurii, acido vitrioli imprægnata. *Mineralischer Turbith.*

ODOR nullus, SAPOR nauseofus.

VIS NOXIA. Mercurii sublimati corrosivi. Turpethum minerale naribus tantummodo attrahit sudores, vomitum, alvi fluxum, urinas, ptyalismum, lacrymas una cum capitis ingenti tumore movisse dicitur. \*

ANTIDOTA ejusdem.

USUS MEDICUS. Scopo vomitorio ad gr. ij laudatur in morbo canis rabidi.

\* Boyleus id refert.

## VENENA ANTIMONIALIA.

---

**A N T I M O N I U M** striatum L. *Spiessglas* seu *Spiessglanz*. Est semimetallum ex regulo proprio & sulphure constans; Odore & sapore carens.

Antimonium crudum olim pro veneno habitum fuit, experientia autem docuit præstantissimum hoc esse remedium quod tuto interne dari sine noxa possit. Sed antimonii præparata regulina noxia sunt, ut

### R E G U L U S A N T I M O N I I.

Est antimonii pars semimetallica, a sulphure separata. *Spiessglas König*.

**V I S N O X I A.** Incaute assumptus vomitum & alvi fluxum enormem, ventris tormenta intolerabilia, diras anxietates ac corporis jactationes, hæmorrhagias, convulsiones, ventris inflationem summam; ventriculi & intestinorum inflammationem, erosionem, gangrenam, mortem etiam hominum robustissimorum causat.

**A N T I D O T A.** Censentur sulphur, oleosa, mucilaginosa, ceracea absorbentia, ori & ano ingesta. *Acida* non convenient.

### F L O R E S A N T I M O N I I.

Est antimonium tostione desulphuratum & sublimatum. *Spiessglasblumen*.

**VIS NOXIA** præcedentis.

**ANTIDOTA** præcedentis.

### B U T Y R U M A N T I M O N I I.

**E**st regulus antimonii acidq; salis solutus. *Spiess-glasbutter.*

**O**DOR croceus. **S**APOR acidus, causticus.

**V**IS NOXIA. Vi corrosiva partes corporis vivi, quas tangit, celerime destruit ac in escharam convertit; acrimonia sua longe superat quæcumque alia stibij præparata.

**A**NTIDOTA. Præter oleosa & mucilaginosa dentur terræ absorbentes & sales alcalini.

**V**IRTUS MEDICATA. Ad callos ulcerum & staphyloma corneæ dissipandum ope penicilli corneæ quotidie illinitur & statim iterum injectione lactis tepidi ablutur. \*

### V I T R U M A N T I M O N I I.

**E**st antimonium in crucibilo per se fusum. *Spiess-glasglas.*

**V**IS NOXIA. Violentius agit quam regulus antimonii & crocus metallorum. Grana octo vitri antimonii in substantia exhibiti post vomitus ingentes, dolores intolerabiles, ventricu-

\* *Cel. JANIN Beobacht. über das Auge p. 348.*

li inflammationem atque convulsiones, mortem intulerunt.

Inde patet, quid vitrum antimonii ceratum, ac Vinum antimoniatum Huxhami majori dosi præstent.

### ANTIDOTA reguli antimoniales:

#### CROCUS METALLORUM seu ANTIMONII.

Est regulus antimonii, phlogisti sui parte aliqua spoliatus. *Spiesglassafran; Metallsafran.*

ODOR & SAPOR nullus.

VIS NOXIA, emetico-draistica, diarrhæam chronicam cum humorum putrida solutione inducens. \*\*

ANTIDOTA. Præcedentis nempe oleosa, mucilaginosa, syrpus ceratus.

VIRTUS MEDICATA. Pro præparatione aquæ benedictæ Rulandi. Equi crocum metallorum ad  $\frac{3}{4}$  absque noxa ferunt.

#### T A R T A R U S E M E T I C U S.

Est sal metallicus ex regulo antimonii & acido tartari constans. *Brechweinstein.*

ODOR nullus; SAPOR metallicus.

\* H O F F M A N N *Med. rat. & system.* T. II.  
p. 238.

\*\* *Cel. LINDESTOLPE* p. 81.

**VIS NOXIA.** Majori dosi ingestus hyperemefim & hypercatharsim, ventriculi & intestinorum inflammationem, gangrænam atque mortem inducit. \*

**ANTIDOTA.** Oleosa, mucilaginosa, lac, alcalina, cera.

**VIS MEDICATA.** Ad tria grana scopo emetico aqua solutus cochleatim datur.

### M E R C U R I U S V I T Æ.

Est regulus antimonii ope aquæ e butyro antimonii præcipitatus. *Pulvis ALGAROTI. Algarots Pulver.*

**ODOR** nullus. **SAPOR** insipidus.

**VIS NOXIA.** Emetico-draſtica, inflammationem & gangrænam ventriculi inducens, hinc potius *Mercurius mortis* dicendus.

**ANTIDOTA** præcedentium.

### H E P A R A N T I M O N I I.

Est antimonium sale alcalino fusum. *Spießgläſe leber.*

**VIS NOXIA** præcedentium.

### SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

Est antimonii regulus minus sulphuratus quam in

\* *Ill. HOFMANN Med. rat. & system. T. II. p. 238.*

antimonio crudo, ope aceti ex lixivio antimonii præcipitatus. *Spiessglas-Goldschwefel.*

**ODOR & SAPOR** nullus.

**VIS NOXIA.** Majori dosi ingestum hyperemesis, hyperchatarsim atque inflammationem excitat; præsertim sulphur auratum *primæ præcipationis.*

**ANTIDOTA** præcedentium.

**VIRTUS MEDICATA.** Resolvens, diaphoretica, expectorans.

## VENENA ARSENICALIA.

### ARSENICUM ALBUM.

**ARSENICUM nudum L. weisser Arsenik. Razengift.** Est semimetallum ex phlogisto & calce acida propriæ indoles constans. \*

**ODOR** nullus, accensi vero alliaceus; **SAPOR** nullus.

**Criteria** arsenici albi sunt, quod

1. *Saccharo pulverisato* haud sit absimile at multo gravius.

\* Arsenicum quatenus in aqua solvitur & crystallisatur, *salibus*; quatenus acido constat & phlogisto, *sulphuribus*; quatenus cum multo phlogisto regulum dat, *metallis* adnumerari potest, dicit *Cel. Schreber* in *LINNEI mat. med.* p. 288.

2. *Alliaceus odor*, quem carbonibus ardenti-  
bus injectum cum fumo albo spiret.
3. *Lamina cuprea* ab hoc albo fumo maculas  
nigras vel albas contrahat.
4. A solutione *hepatis sulphuris aquæ arsenicali*  
instillata, *flavum* decidat *præcipitatum*,  
quod auripigmenti seu arsenici sulphura-  
ti est species. \*

**VIS NOXIA.** Arsenicum deglutatum sequuntur sa-  
por austerus, expuitio frequens, vertigo;  
labiorum, linguae, palati, faucium, œsophagi,  
ventriculi & intestinorum ardor, dolor  
acerbissimus, rosio ac inflammatio; febris,  
siftis inexstinguibilis, nausea, vomitus assumpto-  
rum, crebri singultus, palpitatio cordis, vi-  
rium defectio ingens; respirandi difficultas,  
anxietates summae, delirium, circulus lividus  
circa os & oculos; repentina corporis intu-  
mescentia; manuum ac pedum stupor; his  
accedunt priapisinus, totius corporis convul-  
siones, pulsus tardus, inæqualis, cutis pru-  
ritus ingens, icterus, maculæ rubræ, fœtor  
oris, suspiria, mictus cruentus, sudores fri-  
gidi, gangræna aut sphacelus ventriculi &  
intestinorum ac nonnunquam etiam genitalium;  
ventriculi & intestinorum perforatio aut etiam

\* Cel. BERGMAN opusc. chemi. Vol. I. p. 131.  
erosio

erosio seu extenuatio talis, ut eorum membranæ quandoque folium papaveris vix superent crassitie; vomitus & alvi fluxus nigri fœtidi, cadaverosi; capillorum defluvium, lypothymia; horum malorum omnium horrendum agmen plerumque claudit mors, quam epidermidis secessus & totius corporis putredo subito sequuntur;

Verum qui letho eripiuntur valetudinem deinceps vitream, nonnunquam febre hectica, paralyfi, aliorumve malorum serie exasperatam, trahere solent. \*

**VIS NOXIA EXTERNA.** Haud minora pericula circumstant illos, qui arsenicum extrinsecus variis admovent partibus. Sic amuletum arsenicale pectori applicatum ardorem & anxietatem præcordiorum ac pustulas nigricantes in medio pectore producebat. Vi tam corrosiva pollet arsenicum, ut fossorum manus ac pedes nudatos exulceret. Arsenicum butyro mixtum & capiti illitum, febrem, delirium, syncopen, totius capitis intumescentiam ac celerem mortem intulit. Decocto arsenici duabus militibus corpus scabiosum abluebatur; scabies quidem hac ablutione evanuit, sed utriusque genitalia inflammatio atque intume-

\* *Cel. CÆLSI l. c. p. 62.*

scentia invasit, quæ cum ingentibus doloribus,  
febre & vigiliis in gangrænam scroti abiit.

**ANTIDOTA** generalia sunt multus potus aquæ  
tepidæ, olei, butyri insulsi, axungiæ porcinæ,  
adipis non rancidi, gummi tragacanthi, aut  
arabici aqua soluti. His palmam præripit *lac*  
*merum* vel quod melius butyro sociatum.  
*Oleum ricini.* *Balnea tepida aquosa* vel *oleo-*  
*sa.* *Hepar sulphuris*; *oleum essentiale anisi*,  
ad  $\Theta$ j cum ovi vitello & gum. arabico da-  
tum. \* *Salia alcalina.* *Terræ absorbentes.* *Flo-*  
*res sulphuris.* *Extraustum martis.* *Thermæ*  
*sulphureæ & jus pulorum* se commendant, ubi  
ægri qui mortis discrimen evasere, stupore,  
paralyssi aut convulsionibus vexantur.

**VIRTUS MEDICATA.** *Usus internus* arsenici in fe-  
ribus intermittentibus atque in cancro commen-  
datur, at præstat arsenico interne non uti.  
*Usus externus* in cancro verrucoso faciei lauda-  
tur. Nempe *Pulvis anticancrosus BERNARDI*, \*\*  
qui ex arsenico crystallino, cineribus calceo-  
rum antiquorum combustorum, sanguine dra-  
chonis, & cinnabari constat, ulceri applicatur,  
sic trium dierum dolor vehemens & œdema  
calidum faciei atque totius fere capitis sequitur;

\* *Sammlung für pract. Aerzte* 5 B. 2 St. p. 539.

\*\* *Sammlung für pract. Aerzte* 7 B. 3 St. p.  
512. In *medizinischen Wochenblatt für Aerzte und*

ulcus cāncrosum laudabili supuratione depūratur & emplastro Norimbergensi sanatur.

### ARSENICUM CITRINUM SEU FLAVUM.

*ARSENICUM citrinum.* *Gelber Arsenik.* Ex una sulphuris & decem arsenici albi partibus intime mixtis ope sublimationis paratur.

ODOR nullus, accensi vero sulphureo - alliaceus:  
SAPOR nullus.

VIS NOXIA, arsenici albi, at ob admixtum sulphur aliquantum debilior.

ANTIDOTA arsenici albi.

VIRTUS MEDICATA in carcinomate. \* Exiguae lamellæ ex arsenico flavo ulceri cancroso imponnuntur, donec omne cancerosum consumatur.

### ARSENICUM RUBRUM SEU SANDARACA.

*ARSENICUM Sandaraca L. rother Arsenik. Realgar,* ex duabus sulphuris & novem arsenici albi partibus conficitur. *Arsenicum rubinum*

*Wundärzte*, 5 Jahrgang. 3 Quartal p. 444. dux prostant observationes de cancro faciei hac methodo feliciter sanato.

\* *Schwed. Abhandl. für das Jahr 1778.* Cels RÖNNOW hac methodo viginti ægratos, cancro tum in labiis tum in laborantes mammis feliciter curalle ait. Arsenicum acrimoniae cancerosæ veruin esse antidotum & non solum vi caustica cancerum destruere opinatur:

ex anatica sulphuris & arsenici albi parte conflatur.

**ODOR** nullus; **SAPOR** vix ullus.

**VIS NOXIA** arsenici, arsenico citrino vix debilior.

Mulier, quæ cum brassica rubra hujus veneni portionem comedebat intra aliquot horas prægressis vehementissimis torminibus moriebatur. \*

**ANTIDOTA** arsenici.

### A U R I P I G M E N T U M.

*PYRITES* *Auripigmentum* L. *Operment*; *Goldgelb*.

Est arsenicum plurimo sulphure mineralifatum.

**ODOR** nullus, **SAPOR** sulphureus.

**VIS NOXIA** arsenici, at ob copiam sulphuris admixti minor, adeo ut animalibus ad drachmam unam absque noxa ingereretur. Sed mulier ab uncia semis in cerevisia cocti auripigmenti torminibus, convulsionibus, animi deliquiis, vomitu, dysenteria, polydipsia, & inexplicabili anxietate in alterum usque diem corripiebatur. Alia mulier a paucis granis ad cunctandam febrem deglutitis 30 dies convellebatur. \*\*

**ANTIDOTA** arsenici.

\* *Ephem. N. C.* vol. V. obs. 102. p. 355.

\*\* *Cel. GMELIN l. c. T. 3. p. 136.*

**VIRTUS MEDICATA.** *Linimentum depilatorium*, quod ex auripigmento & calce viva constat, ad pilos extirpandos adhibetur. *Collyrium LANFRANCI*, quod auripigmentum continet, ad ulcera cancroidea faucium laudatur. *Unguentum terebinthinatum* cum auripigmento in tinea unguium & rhagadibus chronicis manuum atque pedum vidi utile. In greditur etiam *liquorem probatorum* vini plumbati.

### R E G U L U S A R S E N I C I.

**EST** arsenicum ope phlogisti in formam metalli reductum. *Arsenik-König*.

**VIS NOXIA** arsenici at debilior,

**ANTIDOTA** arsenici.

### A R S E N I C U M P O R O S U M.

**ARSENICUM** porosum L. *Fliegenstein*. *Schwarzer Arsenik*. *Cobaltum officinarum*.

**VIS NOXIA** arsenici at debilior. Aqua cum melle vel faccharo & arsenico poroso infusa ad muscas necandas exponitur ; infantes inde bibentes quandoque vomitu, cardialgia, & aliis symptomatibus imo ipsa morte fuere affecti.

**ANTIDOTA** arsenici.

C O B A L T U M   A R S E N I C A L E.

**C O B A L T U M** arsenicale L. *Arsenik-Kobolt.* Est cobalti arsenicum continens species. Cobaltum autem non arsenicale venenum non est,

**VIS NOXIA** arsenici sed multo debilior.


**ANTIDOTA** arsenici.



VENE-

V E N E N A  
H A L I T U O S A  
S E U  
M E P H I T I C A,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



# E L E N C H U S

## VENENORUM HALITUOSORUM.

---

De venenis halituosis generatim.

### HALITUS ACIDORUM MINERALIUM.

Halitus sulphuris accensi, *Schwefeldunst.*

Aer vitriolicus, *Vitriolsauerluft.*

— muriaticus, *Salzsauerluft.*

— nitrosus, *Salpetersauerluft.*

### HALITUS AERIS FIXI.

Aer fixus artefactus, *fixe Luft.*

Aura cavernæ caninæ, *Luft der Hundes-Grotte.*

— musti fermentantis, *Luft des gährenden Mosts.*

Aura cerevisiæ fermentantis, *Luft des gährenden Biers.*

- aquarum acidularum, *Luft der Sauerbrunnen.*
- salium effervescentium, *Luft aufbrausender Salze,*
- ædificiorum recentium, *Luft frisch getünchter Zimmer.*
- usturæ calcis, *Luft der Kalchbrennerei.*

### H A L I T U S A L C A L I N I,

*Aer alcalinus, alkalische Luft.*

*Halitus urinæ, Harnduft,*

- cloacarum, *Kloakenkothluft.*

### . H A L I T U S P H L O G I S T I C I,

*Aer phlogisticatus, phlogistirte Luft.*

- inflammabilis, *brennbare Luft.*
- igne corruptus, *durch Feuer verdorbene Luft,*
- carbonum ardantium, *Kohlenluft,*
- paludosus, *Sumpfluft.*
- lutī platealis, *Gassenkothluft.*
- fodinarum metallicarum, *Metallgrubenluft,*
- — — — carboniarum, *Kohlengrubenluft,*
- — — — salinarum, *Salzgrubenluft.*
- hepaticus, *Schwefelleberluft.*

*Halitus rancidus, ranziger Fettduft.*

*Fumus ignis inclusus, eingeschlossener Rauch.*

## HALITUS PUTRIDI.

- Aura animalium putrescentium, faule Thierluft.  
 — vegetabilium putrescentium, faule Pflanzenluft.  
 — respiratione animali corrupta, durch thierischen Aushauch verdorbene Luft.  
 — transpiratione animali corrupta, durch thiersche Ausdünstungen verdorbene Luft.  
 — multitudine hominum corrupta, von Menge der Menschen verdorbene Luft.  
 — aëris diu inclusi, langverschlossene Luft.  
 Aura aquæ corruptæ, verdorbene Wasserlust.  
 — cœmteriorum, Leichenackerluft.  
 — nosocomiorum, Spitalluft.  
 — carcerum, Kerkerluft,  
 — navium, Schiffsluft.  
 Ventus Samu-el, Giftwind.

## HALITUS METALLICI.

- Halitus arsenicalis, Arsenikdunst.  
 — plumbatus, Bleydunst.  
 — cupratus, Kupferdunst.  
 — mercurialis, Quecksilberdunst.  
 Fumus cinnabarinus, Zinnoberrauch.

## HALITUS TERREI.

**Halitus gypsi**, *Gipsstaub.*

## HALITUS VEGETABILES.

Aer vegetabilium mephiticus, *giftige Pflanzenluft,*  
**Halitus peculiaris** quorumdam vegetabilium.

- *Anagyridis*, *Stinkbaum.*
- *Dracunculi*, *Schlangenwurz.*
- *Juglandis*, *Wallnussbaum.*
- *Sambuci*, *Hollunder.*
- *Santali albi*, *weisser Santelbaum.*
- *Alceæ moscatæ*, *Muskatellerkraut.*
- *Mancinellæ*, *Manchinelbaum.*
- *Cannabis*, *Hanf.*
- *Lini*, *Lein.*
- *Toxicodendri*, *Giftbaum.*
- *Vernicis*, *Fiernisbaum.*
- *Dracontii polyphylli*, *vielblättriche Zehrwurz.*
- *fœtidi*, *stinkende Zehrwurz.*
- *Hellebori albi*, *weisse Nieswurz.*
- Odor florum** quorumdam.
- *violarum*, *Violen.*
- *rofarum*, *Rosen.*
- *Liliorum alborum*, *weisse Lilie.*
- *Caprifolii*, *Geissblattblumen.*

Odor Polyanthes, *Tuberosen.*

- Phaseoli, *Bohnenblüthe.*
- Fœni recentis *frisches Heu.*
- Oleandri, *Oleanderblüthe.*

Odor aromatum *vegetabilium.*

- caryophyllorum, *Gewürznelken.*
- Asæ foetidæ, *Teufelsdrek.*
- Ambræ, *Ambra.*

Odor aromatum *animalium.*

- Moschi, *Bisam.*
- Castorei, *Bibergeil.*
- Zibethi, *Zibeth.*
- Cantharidum, *spanische Müken.*

Odor plantarum narcoticarum.

- Hyosciami, *Bilsenkraut.*
- Stramonii, *Stechapfel.*
- Opii, *Mohnsaft.*
- Croci, *Safran.*
- Tabaci, *Toback.*
- Lolii temulenti, *Lolch.*
- Cicutæ, *Wütterich.*
- Conii maculati, *Schierling.*
- Fungorum venenatorum, *giftiger Schwämme.*

## APPENDIX.

*Venena, quorum indoles non nota.*

Aqua Toffana, *Toffanisches Giftwasser.*

Pulvis Successionis, *Successionspulver.*

Venenum Macassariense, *Macassarisches Gift.*

— Americanum Ticunas, *amerikanisches Ticunesgift.*





## DE VENENIS HALITUOSIS GENERATIM.

---

Venena, quæ sub halitus, vaporis vel aëris formâ in corpus nostrum agunt, *halituosa* seu *mephitica* dicuntur.

DIVIDUNTUR in acida, alcalina, phlogisticata, putrida metallica terrea, vegetabilia & incognita.

VIS NOXIA. Agunt maximam partem in pulmones, asphyxiā vel suffocationem inducendo. Quædam simul nervos olfactorios afficiendo in cerebrum.

Noscuntur ut plurimum odore ingrato, sensatione oppressionis & difficilioris respirationis.

MEDELA exigit transportationem ægroti in *aërem atmosphæricum*, eluitionem narriū & faciei cum *aqua frigida*, applicationem *remedii antimephitici* & excitationem systematis nervos.

REMEDIA ANTIMEPHITICA dividuntur

- in *acida* ut acetum vini, quæ in halitibus alcalinis, putridis, narcoticis, & phlogisticis,
- *alcalina* ut spiritus salis ammoniaci, quæ in halitibus acidis.
- *antiphlogistica* ut aër atmosphæricus, aër dephlogisticatus, aqua frigida, quæ in halitibus phlogisticatis convenient.
- 

## HALITUS ACIDORUM MINERALIUM.

### HALITUS SULPHURIS ACCENSI.

Est fluidum aëriforme ex sulphure accenso evaprans. *Schwefeldunst.*

**O**DOR sulphureus, suffocans. **S**APOR aquæ immisfi halitus, sulphureus. **F**lama coerulei coloris.

**V**IS NOXIA. Majori copia pulmonibus haustus hominem & reliqua animantia, canibus forte exceptis \* celerrime suffocat, ut incruenta mors phasanorum docet, quorum ori vapor accensi sulphuris admovetur. Ubi vero is mi-

---

\* Cel. BROWNE LANGRISCH in *physical experiments opon bruter.* Lond. 1746. Canibus vapor sulphuris non nocuit. Sed elephantem necabat, LINDESTOLPE *liber de venenis* 1739. p. 103.

nori copia inspiratur, tussim, sternutationem, \* raucedinem, capitis dolorem, lippitudinem, diarrhæam, dysenteriam, asthma, \*\* peripneumoniam, hæmoptisim, & phthyfim inducit.

*Vina* multum *sulphurata* morbos fere eosdem producunt. Vide *Bromatologiam*.

ANTIDOTA fint antialcalina.

VIRTUS MEDICATA. Vestimenta fumo sulphuris imbuuntur ad curandam pestem, scabiem, arthritidem. Dolia sulphuris fumo replentur, ut vina a fermentatione arceantur. Fumus sulphuris est fortissimum excitans in asphyctis.

\* Cel. RAMAZZINI historiam refert mœchæ mulieris, quæ cum amasium suum, marito superveniente, sub lecto abscondisset, superimposito velamine sulphurato, se ipsam prodidit, ille enim sulphuris odore percitus non potuit, quin alte tussiret & sternutaret.

\*\* Ill. VAN SWIETEN insanabili astmate laborantem vidit eivem, qui in juventute apud œnopaliam habitans jubebatur aperto ingentis dolii sulphuris vapore repleti spiraculo, olfacere: miser ille valide naribus attraxit infestum hunc vaporem, mox concidit, atque aliquot horis cum morte luctatus evasit quidem, verum tota vita mansit astmaticus, & nunquam somnum capere potuit, nisi erecto corpore in sedili hæret.

## A E R V I T R I O L I C U S.

Aërisforme fluidum *ex acido vitrioli* volatilisato constans. *Vitriolsauerluft.*

**O D O R** sulphureus, suffocans. **S A P O R** aquæ immis-  
si halitus, acidus.

**V I S N O X I A.** Chemici, quibus vasa sub destilla-  
tione acidi vitriolici distiliunt aut qui ejus  
vaporem incaute inspirant, hoc halitu infi-  
ciuntur. Inducit suffocationem & mala accensi  
sulphuris.

**A N T I D O T A** alcalina. \*

**V I R T U S M E D I C A T A.** Corrigit aërem putridum.

## A E R M U R I A T I C U S.

Fluidum aërisforme ex *acido salis* volatilisato con-  
stans. *Salzsauerluft.*

**O D O R** croceus ; **S A P O R** halitus aquæ immis-  
si acidus.

**V I S N O X I A p r æ c e d e n t i s.** Quibus vasa sub acidi  
muriatici destillatione rumpuntur, hoc halitu  
afficiuntur.

**A N T I D O T A p r æ c e d e n t i s.**

**V I R T U S M E D I C A T A** antiseptica.

\* Ill. BOERHAAVE vix non suffocatus periisset  
*ex* hoc vapore, si ipsi spiritus salis ammoniaci ad  
manus non fuisset.

## A E R N I T R O S U S.

Fluidum aëris forme ex acido nitri volatilisato:  
*Salpetersauerluft.*

ODOR acidi nitroſi. SAPOR halitus aquæ commiſſi acidus, nitroſus.

VIS NOXIA. Inducit tuſſim, ſuffocationem, cata-  
ractam. \* Chemici & artifices, quibus ſub  
deſtillatione ſpiritus nitri vel aquæ fortis va-  
fa diſſiliunt hoc halitu afficiuntur.

ANTIDOTA præcedentis.

VIRTUS MEDICATA antifeptica.

## H A L I T U S A E R I S F I X I.

## A E R F I X U S.

Fluidum aëris forme ex ſpecifico acido conſtant, ex  
creta vel ſpatho calcareo opè adfuſi ſpiritus  
vitrioli diluti expulſum. *Fixe Luft. Acidum  
aereum. Luftsautre.*

ODOR nullus. SAPOR aquæ immiſſi aëris acidu-  
lus. Aquam calcis præcipitat, flammam car-  
delæ extinguit.

\* Cel. SZEN diff. de cataracta ab effluriis aquæ  
fortis ortæ 1774. Jenæ.

**VIS NOXIA.** Dum animal vasi vitreo includitur, & vitrum dein aëre fixo impletur, sequentia phœnomena in morituro animali observantur. \*

1. Dum fatalis irruit aura mox animal anxie circumspicit, exitum quærens, dein incipit anhelare, bulbi oculorum expanduntur, tremit, omnes hebefcunt sensus, tandemque quasi obdormiens exspirat.
2. *Aves* plerumque prius quam *cane*s & hincitius quam *felis* succumbunt, diutius vero *amphybia* & pertinacissime *insecta* resistunt. Respectu ætatis animalia juniora paullo segniter enecantur; præsertim paulatim adsuefacta; nam quæ in ipso agone, libero exposita aëri pluries vitam recuperarunt, dein tardius hoc fluido perireunt, quam quæ illud prima vice hauriunt.
3. Post mortem *pulmones* parum collapsi periuntur, in aqua non subsident, uti in vacuo pereuntium, sed natant, & sæpe plura monstrant loca inflammata.
4. *Truncus arteriæ pulmonalis*, *cordis ventriculus dexter* cum sua auricula, *vena ca-*

---

\* *Ill. BERGMAN opusc. chem. & physic. Vol. I. p. 65.*

va, jugulares & vasa cerebri sanguine turgent, isque in ventriculo dextro polypi instar non semel concretus fuit visus. Venæ pulmonales, aorta, ventriculus cordis sinister cum sua auricula plerumque flaccescunt.

5. *Fibrarum muscularium* in toto corpore deleta reperitur irritabilitas. Ipsum cor ex animali adhuc calente extractum, nec halitu, nec scalpello, nec acido vitrioli concentratissimo ad motum excitari potuit.

6. Eadem phænomena in hominibus aëre fixo mortuis observantur. Mirum est aërem huncce pulmonibus esse atrocissimum venenum, impune tamen hocce cum musto fermentante vel aqua acidula ventriculo posse ingeri.

**ANTIDOTA.** Expositio ægroti in aërem atmosphæricum; applicatio spiritus salis ammoniaci, cuius odor penetrans naribus & ori ut pulmones intret, admovetur.

**VIRTUS MEDICATA**, antiseptica, irritabilitatem minuens. \* Acidulæ maximam virtutem ab hoc aëre habent.

\* Vide *Pharmacologiam chirurgicam* p. 265. & *Cel. Dobson Abhandl. über die Kräfte der Fixen Luft.* Leipzig 1781.

## AURA CAVERNÆ CANINÆ.

**E**st aëris fixus, qui fundum famosæ cavernæ, *Grotta dei cani* dictæ, quæ in Italia Neapolim inter & Puteolum invenitur, ad aliquot pedum altitudinem replet. *Hundsgrottenluft*, quia in canibus frequentissime explorata fuit ejus necandi vis.

**V**IS NOXIA. Canes & cuncta animalia fundo hujus cavernæ immissa illico necantur, adeo ut vel mortui vel saltem asphycti ex ea extrahuntur.

## ANTIDOTA aëris fixi.

## AURA MUSTI FERMENTANTIS.

**E**st aëris fixus, qui e doliis musti fermentantis extricatur & celaria tempore vindemiarum replet. *Mostgährungsluft*.

Noscitur aëris fixi in celari præsentia, si flamma candelæ ope perticæ celari immissa extinguitur.

## VIS NOXIA præcedentis

ANTIDOTA aëris fixi, asphycti ope hamorum lignorum e celaribus caute extrahantur.

## AURA CEREVISIÆ FERMENTANTIS.

**E**st aëris fixus, qui superficiem cerevisiæ in receptaculo aperto fermentantis ad pedis altitudinem tegit. *Biergährungsluft*.

**VIS NOXIA** præcedentis.

**ANTIDOTA** eadem.

**VIRTUS MEDICATA.** Aqua ope vasorum in atmosphæra aëris fixi refusione repetita agitata, potest reddi acidula.

### AURA AQUARUM ACIDULARUM.

Est aër fixus, qui e superficie aquarum acidularum exhalat. *Sauerbrunnenluft,*

**VIS NOXIA.** Fossa Pyrmontana vapore adeo funesto repletur, ut anates innatantes aquæ & supra fontes oberrantes interficiantur & animalia majora in suffocationis periculum inducuntur.

**ANTIDOTA** aëris fixi.

**VIRTUS MEDICATA** aquarum acidularum maximam partem a contento in illis aëre fixo pendet.

### AURA SALIUM EFFERVESCENTIUM.

Est aër fixus, qui sub effervescentia salium extricatur. *Luft aufbrausender Salze,*

**VIS NOXIA** præcedentis.

**ANTIDOTA** eadem.

**VIRTUS MEDICATA.** Sal absynthii cum succo citri sub actu effervescentiæ haustum est antiemeticum.

## AURA AEDIFICIORUM RECENTIUM.

Aer, qui in ædificiis noviter exstructis aut recen-  
ter dealbatis, reclusa præsertim atmosphæræ  
communicatione, cubilia implet. *Luft neuge-  
tünchter Zimmer.*

VIS NOXIA. Inducit anginam \* capitis dolorem,  
anxietatem, aphoniā, \*\* debilitatem paraly-  
toideam, quandoque mortem.

ANTIDOTA. Fuga e cubiculo noxio, spiritus salis  
ammoniaci, irritatio faucium ad vomitum.

## A U R A U S T U R A E C A L C I S.

Est aér fixus ignifer, qui e furno ustulatōrio cal-  
cis emanat. *Kalchbrennerey luft.*

VIS NOXIA. Mater atque duæ proles suffocan-  
tur, cum aér fixus per apertam angusti cubi-  
culi portam de nocte ex vicina calcis ustura

\* Ill. HOFFMANN med. rat. system. T. II. p.  
297. <sup>1</sup> Tres infantes, qui in cubiculo ante aliquot  
dies noviter dealbato aliquot noctibus dormiebant,  
angina intra biduum rapiebantur.

\*\* Cel. STENZEL de venenis 1739. p. 93. Duo  
fratres in cubiculo, quod prima vice calefiebat, dor-  
mientes, capitis dolore, aphonia & tanta corripie-  
bantur debilitate cruruin, ut se lecto movere non  
valerent, at subsecuto vomitu spontaneo sanū eva-  
debant.

penetraret. \* Duæ feminæ quæ juxta calcis usturam dormiebant suffocatæ inveniebantur.

ANTIDOTA præcedentis.

---

## HALITUS ALCALINI.

### AER ALCALINUS.

Est aër, qui evolvitur e salibus alcalinis volatilibus, dum calefiunt, vel e sale ammoniacō, si cum calce viva vel minio destillatur. *Alkalische Luft.*

VIS NOXIA. Animalia hūic aëri inclusa pereunt. Odor hominibus sternutationem & oculorum pruritum inducit, pulmones minus afficit, quam aëres acidi. Chemici sub destillatione spirituum urinosorum, si vasa diffiliunt, hoc halitu alcalino afficiuntur.

ANTIDOTA. Acetum vini, quod summum est antimephiticum antialcalinum, naribus & ventriculo applicatum.

## HALITUS URINÆ.

Est halitus alcalino-phlogisticatus, ex urina putrefacte exhalans. *Harndunst.*

---

\* Cel. PLENCIZ Acta & observata medica p. 183.

**VIS NOXIA.** Aër in cubilibus orphanotrophiorum a siccatione linteorum ab urina infantum conspurcatorum, teterrimam spargit odorem urinosum qui oculos rubefacit & tussim inducit. An inde infantum febris miliaris, aphthosa & necrosis buccarum atque genitalium? qui morbi in orphanotrophiis folididis tot neunatos rapiunt.

**ANTIDOTA.** Mundities cubilium, irroratio pavimentorum & linteorum cum aceto vini, cuius pars una cum quatuor aquæ miscetur. Hoc antidotum momento citius odorem urinosum delet.

### H A L I T U S C L O A C A R U M.

Est halitus alcalino-phlogisticatus, qui e fœcibus cloacarum seu latrinarum exhalat. *Kloakenkothluft.*

**VIS NOXIA.** Teter cloacarum odor oculos rubore afficit & obnubilat. Foricarii si per quatuor horas latrinis expurgandis incumbunt, nisi per 24 horas oculos a luce avertant & aqua tepida abluant, cœci evadunt. \* Alii in latrinarum cavernis intra pauca minuta asphycti vel mortui concidunt.

**ANTIDOTA.** Primarium est acetum vini. *Antime-*

\* *Cel. RAMAZZINI morbi artificum c. 13.*

*phiticum JANINI* \* quod ex unciis sex acetati vini & uncia una spiritus lavendulae constat, latrinæ infusum momentaneam & ad aliquot dies durantem foetoris stercoreacei cessationem efficit. Asphyctis ex cloacarum foetore nares cum aceto vini eluantur, unum vel alterum cochleare ejusdem ventriculo ingeratur, facies, & totum corpus aceto abluitur. Aër castrensis a patulis latrinis infectus infuso in latrinas aceto, multum emendari potest.

---

## HALITUS PHLOGISTICI.

### AER PHLOGISTICATUS.

Est fluidum aëris forme maximam partem ex phlogisto constans. *Phlogistirte Luft.*

**VIS NOXIA.** Flammam extinguit, & animalia huic aëri inclusa necantur.

**ANTIDOTA.** Transportatio in atmosphærā frigidam, ablutio faciei, narium & totius cor-

---

\* Cel. JANIN Vorschlag, die schädlichen und südtlichen Ausdünstungen und Dünste der Kloake, den verderbten Geruch der Gassen, der Krankenhäuser, der Kriegsschiffe unschädlich zu machen. Vide Cel. SCHERE Archiv der medicinischen Polizey I. Band p. 203.

poris cum aqua frigida. Inflatio aëris de-phlogisticati, applicatio aceti.

### A E R I N F L A M M A B I L I S.

Est aër, qui admota candela flamمام concipit.  
*Brennbare Luft,*

VIS NOXIA. Animalia huic aëri inclusa moriuntur.  
ANTIDOTA præcedentis.

VIRTUS MEDICATA. Vide *Balneum ferri granula-ti* in Pharmacologia chirurgica.

### A E R I G N E C O R R U P T U S.

Est aër, in quo candela defragravit, partim phlo-gisticatus, partim fixus est: *Durch Feuer ver-dorbene Luft,*

Relinquitur denique ex accensa miscela aëris inflammabilis & respirabilis, atque ex aëre, qui fulmine & electricitate & deflagratione phosphori corrumpitur. Ejusdem indolis est aër, qui cavernam *Vesuvii* circumfluit.

VIS NOXIA. Animalia huic aëri inclusa suffocan-tur, vel asphycta redduntur.

ANTIDOTA. Ab initio alcalina dein antimephitica - antiphlogistica.

### A E R C A R B O N U M A R D E N T I U M.

Est aër fixo-phlogisticatus, qui e carbonibus vel li-thantracibus exhalat. *Kohlenluft. Steinkohlenluft.*

**VIS NOXIA.** Inducit capitis dolorem, asphyxiam vel mortem.

**ANTIDOTA.** Transportatio in aërem atmosphæricum, lavatio totius corporis cum aqua frigida. Applicatio spiritus salis ammoniaci & ad nares, & guttulæ quædam ad os.

### A E R P A L U D O S U S.

**EST** aër maximam partem inflammabilis, qui e paludum fundo lutoſo, si bacculo perfodiatur, bullarum formâ affurgit. *Sumpfluſt.*

**VIS NOXIA.** Febres inducit intermitentes vel remittentes putridas, malignas. \*\*

**ANTIDOTA.** Acetum vini. Infusum florum arnicæ cum cortice pèruv. in febre paludosa valde proficuum inveni. Exſiccatio vel procuratio motus aquæ paludosæ.

\* Cel. SAGE Erfahrungen dass der flüchtige Salmiak-Geist das wirksamste Mittel sey, Erstickte wieder zu erwecken, p. 27.

\*\* Cel. LANCISIUS de noxiis palud. effluviis I. II. quinque distinctas epidemias perniciosarum, caſtrenſium febrium, quæ diuersas Pontificiæ ditionis urbes pene vaſtarunt describit, omnes a stagnante aquoſo laticē, æstivis caloribus corrupto & putido reddito exclusas. Vide Cel. TRALLEſ vera patrem patriæ ſanum & longærum præſtandi methodus p. 106. &c.

## AER LUTI PLATEARUM.

**E**st aër, qui e luto platearum in acervos congesto emanat. *Gassenkothluft.*

**V**IS NOXIA præcedentis:

**A**NTIDOTA. Calx viva in cremorem ope aquæ diluta acervis luti adfundatur. Sic fœtor luti cessat. Lutum hocce calce mixtum agros valde fœcundat. \*

## AER FODINARUM METALLICARUM.

**E**st aër noxius, qui in fodinis metallicis subito quandoque erumpit. *Metallgrubehluft. Mephitis fodinarum. Gifschwaden böser Wetter à metallifofforibus dicitur.*

Est quandoque *inflammabilis & tonitruans.* Quandoque vero *flammam extinguit;* hinc aër fixus vel phlogisticatus. Quandoque *arsenicalis* est.

**V**IS NOXIA. Aëris phlogisticati vel fixi vel inflammabilis.

**A**NTIDOTA varia pro diversitate mephitidis.

## AER FODINARUM CARBONARIARUM.

**E**st aër, qui in fundo minerarum lithantracum, si hæ ignem concipient, observatur. *Kohlengrubenluft.*

---

\* *Cel. JANIN* l. c. p. 231.

**VIS NOXIA.** Asphycti vel mortui extrahuntur,  
qui in tales fodinas descendunt.

**ANTIDOTA** carbonum ardentium.

### AER FODINARUM SALINARUM.

**E**st aér, qui fodinas salinarum quandoque replet.  
*Salzgrubenluft.*

**VIS NOXIA** præcedentis.

**ANTIDOTA** præcedentis.

### A E R H E P A T I C U S.

**E**st aér, qui ex hepate sulphuris affusis acidis, præter nitrosum, quibuslibet, obtinetur. *Schwe-felleberluft.*

Hospitatur præterea in aquarum mineralium sulphuriferarum effluviis, odorem habet ovi putridi. Constat ex sulphure per phlogiston & materiam caloris volatilisato.

**VIS NOXIA.** Animalia huic aëri inclusa suffocantur.

**ANTIDOTA** aëris phlogisticati.

### H A L I T U S R A N C I D U S.

**E**st halitus qui ex oleo vel pinguedine rancida vel igni imposita emanat. *Ranziger Fettdunst.*  
Constat ex phlogisto & acido pinguedinis.

**VIS NOXIA.** Oculorum ruborem in aëre libero inducit. Animalia huic halitui inclusa per-eunt. Oleum napi in usum lampadum a ple-be adhibitum, ardens fuligine sua gravat pe-ctus & suppellectilem inquinat, stupaque dum extinguitur, graviter fœtet. Puer morieba-tur, dum ipsius naribus a petulanti suo socio fumus extinctæ candelæ inflaretur.

**ANTIDOTA** præcedentis.

### FUMUS IGNIS INCLUSUS.

Fumus e ligno ardente emanans, maximam par-tem ex aqua, phlogisto & acido ligni con-stans, in cubiculo quodam inclusus. *Einge-schlossener Holzrauch.*

**VIS NOXIA** oculis inducit ruborem. Homines & animalia suffocat.

**ANTIDOTA.** Renovatio aëris, antidota aëris phlo-gisticati.

**VIRTUS MEDICATA.** Ad pisces & carnes infu-mandas.

### HALITUS PUTRIDI.

#### AURA ANIMALIUM PUTRESCENTIUM.

Est halitus, qui ex animali putrefcente exit. *Fau-le Thierlust.*

**VIS NOXIA.** Vapores fœtidi cadaverum malignas excitant febres putridas. Sola cadaverum nimirum consuetudo multos ante diem abstulit anatomicos. \* Si cadavera militum post prælia non cito inhumentur, febres putridæ pagorum vicinorum incolas epidemice devastant:

**ANTIDOTA.** Acetum vini & antiseptica.

### AURA VEGETABILIUM PUTRESCENTIUM.

Est aër putridus, qui e vegetabilibus putrefactis emanat. *Faule Pflanzenluft.*

**VIS NOXIA.** Acervi brassicæ putrefactis & tabescentes cumuli muscorum margaritiferorum putridas fere excitarunt febres.

**ANTIDOTA** præcedentis.

### AURA RESPIRATIONE ANIMALI CORRUPTA.

Aër e pulmonibus hominis vel animalis respirantis exhalans. *Ausgeathmete Luft.*

*Constat* aër exspiratus ex aëre phlogistica-to, aëre fixo & aëre putrido.

**VIS NOXIA.** Animalia aëri exspirato inclusa per-eunt. Flamma extinguitur. Caro diu aspi-

\* *Ill. HALLER de præcip. corp. hum. part. T. III. p. 155.* dicit: memini proprii morbi miliaris & innumerabilium fere febrium contingiarum, quas Göttingæ passus sum, cum inter cadavera sex fere mensibus in annum viverem:

rata citius putreficit. Halitu phthisici hominis muscae interemptæ fuere. Fœtidissima rachiticæ puellæ anima aviculam occidit. \*

ANTIDOTA præcedentis.

### AURA TRANSPiratione ANIMA- LI CORRUPTA.

Est aër e cute hominis vel animalis exhalans. *Luft  
der Hautausdünstung.*

**VIS NOXIA.** Aqua cadi in quo homo etiam sanissimus balneavit, intra aliquot horas fœtebat, quod designat aërem putridum aquæ communicari. Aer e superficie corporis nostri egrediens flammarum candelæ extinguit & animalia in eo vix uno momento supervivunt. \*\*

ANTIDOTA præcedentis.

### AURA AB HOMINUM MULTITUDINE CORRUPTA.

Est aër, a nimia hominum copia in cubiculo angusto conclusorum corruptus.

**VIS NOXIA.** Nimius hominum numerus in eodem cubiculo aërem dephlogisticatum seu *principium vitale* in aëre latens, pulmonibus perpetuo absorbet & aërem atmosphæræ phlo-

\* Ill. HALLER l. c. p. 155.

\*\* *Perill. INGEN - Housze experiences sur les vegetaux.*

gisticatum relinquit. Inde anxietas, respiratio difficilis, languor, animi deliquum, asphyxia, mors. Nota est anglorum in nigra caverna inclusorum sors, in quo ex 146 in exiguo atque ubique clauso carcere intra unicam noctem tempestate calida existente 123 moriebantur. Oxfordii 300 homines, qui in exiguo cubiculo judicio criminali auscultabant, subita morte rapiebantur. Ovium magnus numerus in nimis exiguo stabulo inclusarum cito peribant. \*

**ANTID.** Admissio aëris atmosphærici dephlogisticati.

### AURA AERIS DIU INCLUSI.

Est aër atmosphæricus diu in loco quodam recluso stagnans. *Lang verschlossene Luft.*

Aer diu in cubilibus, granariis, puteis, fodinis, carceribus, cistis aliisve receptaculis inclusus hic pertinet.

**VIS NOXIA.** Aer ut aqua diu stagnans corruptitur. Homines hunc aërem subito haurientes anxii, difficulter respirantes redduntur, & asphycti vel mortui in eo concidunt.

**ANTIDOTA.** Aeris inclusi expulsio ope admissi aëris atmosphærici. Acetum vini.

### AURA AQUÆ CORRUPTÆ.

Est aër, qui ex aqua diu stagnante exhalat. *Verdorbene Wafferluft.*

---

\* *Cel. G MELIN* l. c. I. Th. p. 239.

**VIS NOXIA.** Inducit febres putridas, petechiales, quæ post domum inundationes, si non cito & bene purgentur, sæpius observantur. Quandoque ex solo vapore aquæ putridæ mors adnotata. \*

**ANTIDOTA.** Acetum vini. Exsiccatio & purgatio cubilium. Aqna fontana, quæ in doliis affer-  
vatur ut in navigationibus ad duos annos a  
putredine præservatur, si cuilibet mensuræ aquæ  
14 guttæ olei vitrioli addantur. \*\*

### A U R A C O E M E T E R I O R U M.

Est aér, qui e cadaveribus hominum vel animalium non bene sepultorum in cœmeteriis & cata-  
cumbis exhalat. *Leichenackerluft.*

**VIS NOXIA.** Nauseam, vomitum, capitis dolorem,  
animi deliquium, asphyxiam, febrem putri-  
dam \*\*\* morbos epidemicos quibus sepulti

\* *Ill. SAUVAGES Effets de l'air p. 54. & Cel. PLATNERI diss. de pestiferis aquarum putrescen-  
tium exhalationibus.* Ex stagnationibus aquarum post copiosas pluvias & inundationes superstitibus perti-  
nacissimas tertianas enatas observavit RAMAZZINI  
*Misc. N. C. Dec. II. anno IX.*

\*\* *Neue Schwed. Abhandl. 2 B. p. 234. Cel.  
FAXE Versuch, Wasser auf der See durch Vitriol-  
säure vor Faulnis zu bewahren.*

\*\*\* In *Gazette salutaire N. 25. & 26.* plures fu-  
nesti hujus rei narrantur casus. In urbe *Talento*  
*vespillones* fossam pro defuncto non satis profundam

morebantur ut variolas, pestem & mortem inducit. \*

---

fecerunt; feretrum itaque obtegebant terra, quam pedibus comprimebant. Paucis diebus post exhalationes cadaverosæ ex sepulchro emanantes templum sensim ita adimplebant, ut illud derelinqui deberet. Consilium capiebatur corpus exhumandi. E tribus vespillonibus, qui hanc translationem in se suscipiebant, duœ insigniter vomebant, tertius in febrem incidit & 10 vel 12 diebus post morebatur.

In vico *Saulieu* in templo aperiebatur sepulchrum pro sepelienda muliere febri putrida defuncta. Vespillones detegebant feretrum cadaveris, quod ante sex hebdomadas sepeliebatur. Cum femina fœs mandaretur, ipsius & alterum feretrum aperiebatur, illico odor adeo fœtidus oriebatur, ut omnes, qui assistebant, exire cogerentur. Inter 190 homines, 114 graviter ægrotabant, sicuti etiam prædicator, vicarius & vespillones. Interim ultra 18 ex toto hoc numero mortui non sunt, inter quos prædicator & vicarius primi e medio tollebantur.

\* In Diario anglicano seu *London Magazine* mense Sept. 1752 memorabilis prostat historia: Vespillo aperiebat sepulchrum in quo ante 30 annos vir quidam variolis defunctus sepultus erat, percusso operculo feretri extemplo odor fœtidus exiit. Paucis diebus post 14 ex adstantibus variolis corripiebantur & omnes incolæ hujus pagi hunc morbum nondum passi duobus exceptis decubuerunt. Notabile est variolas omnia oppida, quorum incolæ sepulturæ adfuerunt, invasisse.

**ANTIDOTA.** Sepultura mortuorum non tantum in ecclesiis sed etiam in cœmeteriis circa muros civitatis plane prohibetur. Et locus pro cœmterio ad quadrantem horæ a civitate distans, sat amplius, aëre perflatus, arboribusque, quæ miasma putridum absorbent, hinc inde circumvalatus assignetur.

Cadavera in feretro ad sex pedum profunditatem inhumentur & feretrorum apertura atque ossium corruptorum exemptio & disposatio in ossilegium ad 50 annos plane interdicitur. Si vero locus quidam revera jam odore cadaveroso impletus esset, aëris atmosphærici perflatio, effusio & evaporatio acetii & aëris vitriolici vel muriatici adhibeatur.

### A U R A N O S O C O M I O R U M.

Est aër, qui in nosocomiis sordidis observatur. \*

*Spitalluft.*

*Causæ* aërem in nosocomiis noxium reddentes in *producentes* & *adjuvantes* dividuntur.

*Producētes* sunt

1. *Transpiratio ægrarum morbosa* seu *putrida febricitantium,*

\* Cel. NAHUYs *diss. de qualitate noxia aeris in nosocomiis & carceribus ejusque remediis.* Harleiani 1770.

2. *Alvi excrementa*, præsertim disentericorum, febri putrido biliosa, aut diarrhæa colliquativa laborantium, in cubilibus diu reicta. Idem fit si januæ latinarum in cubilia ægrorum se aperiant.
3. *Ulcera fœtentia*, *vulnera multum suppurrantia*, præsertim partes gangrænosæ, *urina*, *sanguis corruptus*, *sputa phthisicorum*, *imundities lectorum*, *cortinarum*, *indusiorum*, apparatus purulentus ulcerorum &c. quæ causæ aërem putridum exhalant.
4. *Nimius œgrorum numerus* in eodem cubiculo, qui perpetuo aërem dephlogistica-  
tum seu *principium vitale* in aëre latens pulmonibus absorbent & aërem phlogisticatum relinquunt.
5. *Nimius calor cubiculorum*, qui aërem putridum activum reddit

*ad causas adjuvantes refertur*

1. *Nosocomii situs* aliis undique domibus vel magnis ædificiis arboribusve dense locatis circumdatus, ita ut venti & aëris liber accessus impediatur. Vel nosocomii situs ad pedem montis, quo aëris accessus denegatur.

2. *Cubicula ægrorum nimis angusta nec alta satis.* Inde idem fit, ac si nimius ægrorum numerus in cubiculo majori locetur.
3. *Januarum & fenestrarum cubiculi nimia parvitas,* quo aëris renovatio satis libere fieri nequit.
4. *Rara nimis pavimentorum lavatio,* qua fordes putridæ in pavimentis remanent.
5. *Rara nimis lectorum & stragulorum renovatio.* Aut ægroti depositio in lectum, super quo ægrotus febre putrida labrans mortuus est vel decubuit. Etiam cortice lectorum aërem putridum retinendo valde in nosocomiis nocent.

#### **VIS NOXIA.** Aer putridus nosocomialis

1. *Morbos leviores sœpe in gravissimos imo lethales mutat.* Variolæ benignissimæ, alvi fluxus innocui, febres leviores in civitate cito & faciles curatu in aëre nosocomico iisdem remediis & ab iisdem medicis tractati in malignas febres petechiales cum diarrhæa colliquativa stipatas abeunt. \* Ulcera leviora, quæ aliis in locis facillime curantur in nosocomiis sœpe incurabilia manent. Quoties non ulcera & vulnera ab aëre putrido nosocomii in gangrænam abeunt.

---

\* Cel. NAHUY S l. c. p.

2. *Novos producit morbos, Aer nosocomialis sa-*  
*nissimos homines diu in nosocomio degentes*  
*febre putrida nosocomiali vel diarrhæa pu-*  
*trida afficit. Quandoque contingit, si unus &*  
*alter febre putrida vel dysenteria decum-*  
*bens nosocomio inferatur, ut ex improviso*  
*hi morbi in nosocomio grassari incipient.*
3. *Longam reddit ægrorum convalescentiam,*  
*ægroti enim debiles in aëre putrido diu*  
*adhuc languent vel a levissima causa ac-*  
*cidente fæpe pejus quam ante decum-*  
*bunt.*

**ANTIDOTA.** *Excrementa* morbosa adfuso vini ace-  
 to vel antimephitico *JANINI* cito auferan-  
 tur. Aegroti morbo putrido laborantes a re-  
 liquis ægris in peculiaria & diffita cubilia se-  
 parentur. Evitentur, quantum fieri potest, cau-  
 sæ aërem putridum *producentes, adjuvantes*  
 vel *retinentes.* Ventilatoribus, & *machina*  
*SUTTONIANA* correpta aër cubiculorum  
 aliquoties de die *renovetur.* Singulis diebus  
 pavimentum aliqua aceti portione *irroretur*,  
 vel ollæ aliquot acetō plenæ prunis imponan-  
 tur ardentibus, ut sic aceti vapor assiduo per  
 nosocomium *dispergatur.*

### A U R A C A R C E R U M.

**E**st aër atmosphæricus a squallore carceris corru-  
 ptus. *Kerkerluft.*

*Causæ* aërem in carceribus depravantes sunt per spiratio captivorum, excrementorum & urinæ depositio in ipso carceris cubiculo. Sordes putridæ pavimenti, carcerum situs profundus sub terra, quo situ omnis aëris renovatio prohibetur; humiditas parietum, qui carcerem constituunt; nimia carceris angustia, fenestris lateralibus destituta; vel nimia copia captivorum, qui principium vitale ex aëre absorvent; neglecta mundatio carcerum, neglecta renovatio vestium & stramentorum.

**VIS NOXIA.** Morbi, quibus captivi ab aëre putrido, humido, & frigido carceris vexantur, sunt febres malignæ \* pessimis stipatæ symptomatibus & dysenteriæ putridæ. Captivi vero, qui acutis his non corripiuntur morbis, febre lenta, hydrope & scorbuto perennantur.

**ANTIDOTA.** Constructio carcerum supra solum elevatorum, dein adhibeantur, quæ in aëre nosocomiali landavimus.

### A U R A N A V I U M.

Est aër atmosphæricus a sordidie navium corruptus. *Verdorbene Schiffluft.*

---

\* Aer ventilatoris, qui carcerem repurgabat proprius receptus & haustus perniciöissimam febrem civit. *Ill. PRINGLE phil. Trans. n. 48.*

**VIS NOXIA.** Etiam si aëris marinus multo purior & salubrior sit aëre rurali, in cubiculis tamen navium majorum a diurna aëris stagnatione, ab exhalatione putrida aquæ stagnantis, a transpiratione & respiratione copiosorum hominum in angustis cubilibus reclusorum putridus evadit, inde febris putrida *navalis*, scorbutis & alii morbi putridi navigantium.

**ANTIDOTA.** Aeris perpetua renovatio ope *machinæ SUTTONIANÆ*. \* Mundatio loculamentorum & cubilium, irroratio cum acetato vel antimephitico *JANINI*.

### V E N T U S S A M U - E L.

Est ventus venenatus, qui in Persia, Arabia, Aegypto quandoque observatur & homines subito necat. *Der Giftwind.*

---

\* Hujus machinæ effectus tantus fuit, ut in illa nave, in qua prima vice hæc machina tentabatur, duo tantummodo morerentur homines, dum antea in simili itinere fere dimidium nautarum peribat, vel saltem periculosissime decumbebat; atque egregius ille effectus postea semper constans repertus est, ita quidem ut Hollandi atque Sueci similes suis in navibus construentes machinas longe minorem habuerint ægrorum atque mortuorum numerum, & totus navis aëris ejus ope tam bene depuratus fuit, ut vix aliquem odorem ingratum etiam in profundissima navis parte, ubi alias yix per momentum morari licuit animadverterint nautæ. *Cel. Nakuy. l. c. p. 150*

**VIS NOXIA.** Continuo putrescunt viatores, quos ventus Samu-el percussit, adeo ut membra tracta manum sequantur \* nisi se humi prosternant aut domibus bene includant.

---

## HALITUS METALLICI.

### HALITUS ARSENICALIS.

Est halitus arsenicum volatilisatum continens. *Ar-  
senikdunst.*

Qui in *fodinis* arsenicalibus laborant, aut arsenicum e suis mineris sublimant, vel arsenici diu inclusi halitum *narius* attrahunt, halitu arsenicali afficiuntur.

**VIS NOXIA.** Animi deliquium, suffocationem, astma, cardialgiam, vomiturbationem, vertiginem, capitis dolorem, crurum dolorem, anxietatem inducit. E *fodinis* promontorii bonæ spei halitus arsenicalis *Giftschwaden* exhalans omnia, quæ propinquant animalia, interficit.

*Prophylaxis.* In *fodinis* arsenicalibus aëris bona perflatio procuretur. *Labores* arsenicales in laboratoriis bono camino instructis peragan-  
tur. *Diæta* sit pinguis ex butyro; pingue-

---

\* *Cel. CHARDIN* *voy. en Perse* T. IV. p. 22.  
& *Cel. THEVENOT* *voy.* T. III. L. 1. p. 10. &  
T. II. L. 1. p. 12.

dine anserina , lardo, lacte. \* Spiritus *alcalinus* saepius ori & naribus admoveatur & guttulæ aliquot deglutiantur.

**ANTIDOTA** lac , alcalina, oleum blandum & oleum essentiale anisi. V. *arsenicum*.

### H A L I T U S P L U M B A T U S.

Est halitus plumbum volatilisatum continens. *Bleydunst.*

Vapore plumbeo afficiuntur , qui in fodinis mineralium plumbiferarum laborant, aut plumbum e mineris excoquunt. \*\* Vel in cubilibus co-

\* Cel. GMELIN *de venenis* T. I. p. 190. TACHENIUS quum vas aperiebat, in quo aliquoties sublimaverat arsenicum, percipiebat odorem suavem, sed ab eo oriebatur cardialgia, syncope, sudor aigidus, nausea, vomitus, mictus cruentus & contractura totius corporis nec potuit nisi longo tempore lactis usu restitui. Cel. BOERHAAVE *de morbis nervorum* T. I. p. 244. Homines, qui cuprum arsenico dealbare in clauso cubiculo tentabant, fere suffocabantur, linguam ex ore protendebant, capitis dolor, vertigo, lassitudo & maculae flavæ circa thoracem erumpentes aliquot dies remanebant.

\*\* Vapores plumbi Freybergæ homines metallarios potissimum enecant, ideo 17 anno uxores decidunt & 30 annum vix superant. Ill. HALLER *Elem. physiol.* T. VIII. p. 103. in addendis: & Cel. STOCKHAUSEN *libellus de lithargyrii fumo noxie, pulgo disto Hüttenkaze.* Gosl. 1656.

*lore plumbeo* recenter illinitis habitant, præfertim janua & fenestris clausis, aut plumbum in igne fundunt; vel *præparata plumbata* parant, ut

*Tritores pigmentorum plumbeorum.*

*Decoloratores rhedarum,*

*Pictores*, qui imagines coloribus plumbeis simulant.

*Deauratores*, qui ad ignem vel absque igne deaurant, qui mercurialia plumbō adulterata adhibent.

*Stannatores vasorum*, qui stannum plumbō mala fraude ad ulceratum tractant.

*Figuli*, qui vasa terrea incrstant, maxime qui lithargyrium, quo ad incrustedum utuntur, in pulvrem terunt.

*Politores*, qui mediante rota plumbēa vel stanno plumbō mixta opus faciunt.

*Fibularii*, qui compositione ex stanno & plumbō confecta utuntur, præcipue autem ii, qui hæc artefacta iterum in pulvrem conserunt.

*Apothecarii*, qui plumbata in pollinem terunt emplastraque saturnina parant.

**VIS NOXIA.** Plumbi halitus varios & multiplices inducit morbos. Est ubi unus vel duo tantum digitū fiunt paralytici; quandoque manus vel integrum brachium refolvitur; alias

sub larva rheumatismi vagi, arthritidis vagæ, podagræ anomalæ latitat, alias sub larva morbi nervosi, hypochondriaseos, melancholiæ, maniæ, fatuitatis, epilepsiæ, constrictionis thoracicæ cum plenaria lotii retentione, palpitationis cordis &c. ludit: altior & manifestior gradus is est, quando immanni ventrem dolore excruciat cum vomitu enormi matreie æruginosæ, porraceæ, alvo pertinaciter clausa. Vide *Plumbum*.

*Phrophylaxis.* Fodinarum & laboratorii, in quo labores plumbati instituuntur bona aëris perfatio. *Diæta pinguis.* Denique alumén ad grana XV cum gummi arabico aliquoties in septimana deglutitum.

**ANTIDOTA.** Morbi saturnini jam præsentis medæla exigit, ut purgante remedio plumbum expellatur V. *Plumbum*.

### H A L I T U S C U P R A T U S.

Est halitus cuprum volatilisatum continens. *Kupferdunst.*

**VIS NOXIA.** Artifices cuprum frequenter tractantes capillos non raro virides habent, vertigine, nausea, vomitu, tussi sicca, ulceribusque pulmonum laborant, & excrementa viridia nonnunquam alvo reddunt.

**ANTIDOTA oleosa, mucilaginosa, purgantia.** V.  
*Cuprum.*

## HALITUS MERCURIALIS:

Est halitus mercurium volatilisatum continens:  
*Quicksilberdunst.*

Qui e *fodinis hydrargyrum vel cinnabarim* eruunt.

Artifices, qui *præparata mercurialia* conficiunt.

Qui in cubiculis, cuius *atmosphæra atomis mercurialibus* seatet; degunt, halitu mercuriali afficiuntur.

**VIS NOXIA.** Inducit vertiginem, tremorem præfertim manuum, faciei pallorem cachecticum; astma; ptyalismum; dentium nigredinem, vaillationem, lapsum; ulceram putridam oris. Quandoque surditatem, aphoniam; stupiditatem; cui apoplexia fæpe finem imponit. Nocet præcipue scorbuticis. \* Dum mercurium sublimatum conficiunt chemici, ab ejus vapore graviter nonnunquam lœduntur; oculis naribusque receptus pessimas ophthalmias, vo-

\* Cel. GOULARD duos milites scorbuticos in quo venerei quidam mercurio curabantur, locatos, a seila atmosphæra salivantum in capitis intumescenciam, ingentem salivationem & pessima ulcera oris incidiisse vidit.

Venetiis in lazaretto, quando per salivationem multi ægroti iue venerea liberantur, adeo vehementer aër inficitur, ut sanissimo homini intra paucas horas pustulæ efflorescant. Cel. TRISTING *cypria*: p. 169.

lentosque sternutationes inducit, ubi vero fauces, asperam arteriam, pulmonesque tangit, tussim, respirandi difficultatem summum, phthisim affert, aut suffocatione subito necat. \*

**PROPHYLAXIS.** *Perflatio aëris fodinarum & laboratorii.* *Diæta pinguis.* *Purgantia eccoprotica* sæpius assumpta.

**ANTIDOTA.** Mucilaginosa & diaphoretica. **V.**  
*Mercurius.*

### F U M U S C I N N A B A R I N U S.

Est fumus e cinnabari prunis ardentibus adspersa ascendens. *Zinnoberrauch.*

**VIS NOXIA.** Cum ignis cinnabarim in vaporem mercurialem & vaporem sulphureum resolvat; hinc dupli halitu noxius est. Sulphureus halitus pulmonibus incaute haustus suffocationem & halitus mercurialis cito salivationem causat.

**ANTIDOTA**, quæ in halitu sulphureo & halitu mercuriali laudavimus.

**VIRTUS MEDICATA.** Fumus cinnabarinus cante ope infundibuli applicatus in ozœna venerea, ulceribus, tophis & condylomatibus venereis obstinatis quandoque egregium præstat effectum **V.** *Pharmacologia chirurgica.*

\* *Cel. Cælsi l. c. p. 47.*

## HALITUS TERREI.

## HALITUS GYPSI.

**H**alitus, qui gypsum pulveratum continet. *Gipsstaub.*

**V**IS NOXIA. Gypsi pulvis una cum aëre ad pulmones delatus in lapillos concrevit, linguae & faucium ariditatem, singultum, tussim siccam, anxietatem, syncopem, cachexiam, peripneumoniam, phthisim inducit. Hinc gypsoplastæ fere semper debiles incedunt, gypsataque facie referunt simulacula.

**A**NTIDOTA. Evitata atmosphæra' gypsata, aceti vapor pulmonibus inspiratus gypsum solvit & tussi excitata educit. \*

## HALITUS VEGETABILUM.

## AER VEGETABILUM MEPHITICUS.

**E**st aér, qui e vegetabilibus in locis umbrosis de die, atque de nocte exhalat. *Verdorbene Pflanzenluft.*

Folia viridia luci solari exposita aërem salubrem seu dephlogisticatum exhalant, at eadem fo-

\* *Cels. Cælest. c. p. 88.*

lia in locis umbroſis de die & nocte aërem  
infalubrem, noxiū exhalant. Idem aér no-  
xius e *floribus*, *fructibus* & *radicibus* etiam  
de die irradiante quamvis sole exit. \*

**VIS NOXIA.** Animalia huic aëri inclusa necantur:  
Flammam extinguit. Qui summo manē cal-  
darium plantarum adeunt, summam experiun-  
tur pectoris oppressionem. Hinc patet, quid  
valeat consilium, quod suadet, ut arbuscula  
aut frondes virides in conclavi ægrotorum  
locentur. Si pleno id die irradiante sole fiat,  
aliqua haurietur inde utilitas, humiditate ea-  
rum refrigerationem conciliante. Sed non idem  
sequentur eventus, si frondes numerosi viri-  
des in parvo & umbroſo conclavi locentur.  
Minus tamen pertimescendum est a plantis  
quam a floribus & fructibus.

**ANTIDOTA.** Aér atmosphæricus, depilogisticatus;  
acetum.

## HALITUS PECULIARES QUORUN- DAM VEGETABILIUM.

### HALITUS ANAGYRIDIS:

*ANAGYRIS fætida* L. Stinkbaum:

\* Ill. INGEN-HOUZ Experiences sur les ve-  
getaux:

**VIS NOXIA.** Foetor in Creta gravedinem capit is infert.

### HALITUS DRACUNCULLI.

*ARUM Dracunculus L. Schlangenkraut.*

**VIS NOXIA** præcedentis.

### HALITUS JUGLANDIS.

*JUGLANS regia L. Wallnussbaum.*

**VIS NOXIA.** Umbra ejus suspecta censetur, ac febrem inducere dicitur.<sup>23</sup>

### HALITUS SAMBUCI.

*SAMBUCUS nigra L. Hollunder.*

**VIS NOXIA** præcedentis.

### HALITUS SANTALI ALBI.

*SANTALUM album L. weißer Santelbaum.*

**VIS NOXIA.** Arbor recens concisa halitum venenatum spirat, qui febrem synocham deliriosam causat, \*\* quam Indi radice mungos curant.

\* Ill. LINNE diff. de odoribus medicamentorum  
In amœnit. acad. vol. III. p. 200.

\*\* PONTIUS hist. nat. & med. Ind. Orient.  
p. 46.

## HALITUS ALCEÆ MOSCATÆ.

*ALCEA moscata* L. *Muskatellerkraut.*

Vis noxia. Odor hystericas, viduas, prostibula suffocare dicitur. \*

## HALITUS MANCINELLÆ.

*HIPPOMANE Mancinella* L. *Manchinelbaum.*

Vis noxia. Europæos quam plurimos Surinamum appellantes solo halitu occidisse dicitur. \*\*  
At id alii negant. \*\*\*

## HALITUS CANNABIS.

*CANNABIS sativa* L. *Hanf.*

Vis noxia. Effluvia cannabis macerati noxia censentur.

\* LINNE l. c.

\*\* LINNE l. c.

\*\*\* Ill. JACQUIN *Select. stirp. amer. hist.* p. 251. dicit: fertur etiam arboris umbram noxam inferre subtus recumbenti; sed per trihorium ipsi mihi cum sociis periculum facienti, nihil mali evenit. Tum etiam pluviam trans hanc arborem cadentem, corporeque nudo exceptam, innocuam sum expertus. Noxia fortasse fuit ubi rupti ventis vel imbribus rami foliave lac suum venenatum simul destilaverint pluviæ immistum.

HALITUS LINI.

*LINUM usitatissimum* L. *Lein.*

**VIS NOXIA.** Linum in aqua ut fieri solet, mace-  
ratum, odorem & saporem habet piscibus le-  
thalem, hominibus noxiūm. \*

HALITUS TOXICODENDRI.

*RHUS Toxicodendron* L. *eichenblätterichter Gift-  
baum.*

**VIS NOXIA.** Halitus censetur suspectus.

HALITUS RHUS VERNICIS.

*RHUS Vernix* L. *Firnisbaum.*

**VIS NOXIA** præcedentis. \*\*

HALITUS HELLEBORI ALBI.

*VERATRUM album* L. *weiße Nießwurz.*

**VIS NOXIA.** Radix incaute effolkia horrendum vo-  
mitum causavit.

HALITUS DRACONTHI POLYPHYLLI.

*DRACONTIUM polypodium* L. *vielblättriche Zehr-  
wurz.*

**VIS NOXIA.** Spatha longitudinaliter dehiscens,

---

\* *Cel. RITTER* in *Acad. N. C.* vol. 10.

\*\* *Cel. MONTI* in *Institut. Bonon.* *Act. T. III,*  
*p. 165.*

quantum fœtorem putridissimi cadaveris spargit, ut olfuentes, adtonitos reddat & catalepticos; sed quod mirum, cum post aliquot dies pollinem ejaculare incipiunt antheræ una eademque hora venenatus iste fœtor, totus quantus penitus abolitur. \*

### HALITUS DRACONTII FOETIDI.

*DRACONTIUM* fœtidum L. *Stinkende Zehrwurz.*

**VIS NOXIA.** Flos teterimum odorem spargit, qui capitis dolorem causat,

**VIRTUS MEDICATA.** Radix virtutem ari maculati possidet ac præcipue in scorbuto laudatur. \*\*

### ODORES FLORUM QUORUMDAM.

#### ODOR VIOLARUM.

*VIOLA odorata* L. *Violen.*

**VIS NOXIA.** Corollæ recentes odorem gratissimum spirant at adeo fragrantem, ut virgo nobilis ex patina, violis repleta & per noctem in cubiculo servata, apoplexia interierit. \*\*\*

\* *Hort. Clif.* p. 434.

\*\* *Cel. KALM* in *suo itin.* p. 59.

\*\*\* *Cel. TRILLER* *diff. de morte subita ex simili violarum odore,* in *opusc. vol. I.* p. 240.

Omnia odora valde fragrantia halitibus angustiori spatio occlusis, caput tentant, sensus denique omnes suppressimunt.

### ODOR ROSARUM.

*Rosa centifolia* L. Rosen.

VIS NOXIA. Etsi florum horum odor vix non omnibus hominibus gratissimus sit, quibusdam tamen solo olfactu sternutationem, catarrhum, inflammationem oculorum, animi deliquia, hystericas affectiones, alvi dejectiones excitant, imo abortus mortisque inde orta exempla leguntur. Facile patet ejusmodi effectus vitio idiosincrasiae maxime oriri. \*

### ODOR LILIORUM ALBORUM.

*Lilium candidum* L. weisse. Lilie.

VIS NOXIA præcedentis.

### ODOR CAPRIFOLII.

*Lonicera periclimenium* L. Geissblut.

VIS NOXIA. A florum recentium odore vomitatio, lassitudo & linguæ paralyfis animadvertebantur. \*\*

\* Ill. MURRAY *apparat. medicam.* Vol. III.  
p. 160.

\*\* Cet. GMELIN über die Entdeckungen in  
der Lehre von der Luft p. 93.

## ODOR POLIANTHES.

*POLIANTHES tuberosa* L. *Tuberose.*

VIS NOXIA præcedentis.

## ODOR PHASEOLI.

*PHASEOLUS vulgaris* L. *Bohne.*

VIS NOXIA florum ut præcedentium.

## ODOR OLEANDRI.

*NERIUM Oleander* L. *Oleander.*

VIS NOXIA. Florum odor intra conclave inclusus occidit sæpe dormientes. \*

## ODOR FOENI RECENTIS.

*FOENUM recens.* *Frisches Heu.*

VIS NOXIA. Mortui inveniebantur, qui super acervo foeni recentis in loco occluso dormiebant.

ODORES AROMATUM  
VEGETABILIUM.

## ODOR CARYOPHYLI AROMATICI.

*CARTOPHYLLUS aromaticus* L. *Gewürznelke.*

VIS NOXIA. Homines, qui in camera, ubi acer-

\* Ill. LINNE in diff. citata.

vus caryophyllorum congestus erat, per uniam solum noctem dormiebant, nausea, vomititione, anxietate & ingenti capitis dolore afficiebantur. \*

### O D O R C A M P H O R Æ.

**R**esina volatilis ex *LAURO Camphora* L. *Kampfer*,  
**V**IS NOXIA. Aromatarii, qui magnas sarcinas, camphora, croco, asa foetida similibusque aromatis repletas, resignabant insuperabili somnolentia corripiebantur. Vir illustris Amstelodami penurium, aromatum odoribus refertum ingressus, vertigine, sensuum stupore correptus, pectoreque oppressus, nisi protinus pedem titubantem retraxisset, sine dubio concidisset. \*\*

### O D O R A SÆ F O E T I D Æ.

**G**ummi-resina ex *FERULA Asa fœtida* L. *Asand*,  
*Teufelsdrek*.

**V**IS NOXIA præcedentis.

### O D O R A M B R Æ,

*AMBRA ambrosiaca* L. *Ambra*.

**V**IS NOXIA præcedentis.

\* RUMPFIUS.

\*\* Ill. TRILLER in diss. citata.

## O D O R E S A R O M A T U M A N I M A L I U M.

---

### O D O R M O S C H I.

*Moschus Moschifer L. Bisam.*

VIS NOXIA. Moschi odor multis mulieribus animi deliquium, vertiginem, vomitum & affectiones hystericas movet. Vesica animalis moschiferi naribus alicujus hominis admota sanguinem ex illis provocabat, \* in aliis menstrua movebat.

### O D O R C A S T O R E I.

*Castor Fiber L. Bibergeit.*

VIS NOXIA præcedentis at mitior.

### O D O R Z I B E T H I.

*Viverra Zibetha L. Zibeth.*

VIS NOXIA. Qui cameram, in quo animal zibethinum conservabatur, primi intrabant, fere inebriabantur. Fæminæ teneriores ab hoc odore animi deliquio afficiuntur. \*\*

---

\* Cel. TRALLES de limitandis laudibus & abusu moschi in medela morborum dissertatio. Vratisl.

1783. §. 3 & 4.

\*\* Ill. BOERHAAVE prælect. inst. §. 1112.

## ODORES PLANTARUM NARCOTICARUM.

### ODOR HYOSCIAMI.

*HROSCIAMUS niger L.* schwarzes Bilsenkraut.

**VIS NOXIA.** Inducit temulentiam & vertiginem. \*  
A famo seminum combustorum mentis alienatio cum furore & altercatione, imo etiam ab effluviis seminum eadem mala fuere visa. \*\*  
Hæc semina videntur esse artificium, cuius vapore sagæ ad altercationes inter homines excitandas utuntur.

### ODOR STRAMONII.

*DATURA Stramonium L.* Stechapfel.

**VIS NOXIA.** Odor foliorum comminutorum post somnum in eodem cubiculo captum, capitis dolorem obtusum paullo post evanidum causavit. \*\*\*

### ODOR OPII.

*PAPAVER somniferum L.* Mohnsaft.

---

\* *Ill. BOERHAAVIUS* cum suo amico dum emplastrum de hyosciamo pararent a solo vapore temulentii fiebant.

\*\* *Ephem. N. C.*

\*\*\* *Ill. STÖRCK libellus de stramonio p. 5.*

**VIS NOXIA.** Homines, qui in colligendo opio occupantur, luridimarcidi & tremuli comparent. Sola translatio opii crudi recentioris in alia vasa mentis emotionem excitavit, somno dimidiæ horæ dissipatam. \*

### ODOR CROC I.

*CROCUS sativus L. Safran.*

**VIS NOXIA.** Immoderatus ejus odor caput gravat, mentem turbat, apoplexiam risum fardorium inducit. \*\*

### ODOR TABAC I.

*NICOTIANA Tabacum L. Toback.*

**VIS NOXIA.** Inassueti, dum fumum ore hauriunt, vertigine, cephalalgia, anxietate, somnolentia, vomitu, alvi solutione corripiuntur. \*\*\*

\* Cel. LORRY in VANDERMONDE *Recueil period. T. 4. p. 70.*

\*\* Uxor aromatarii, quæ in conclavi parvulo calefacto crocum pulverisatum in minutas portiones dividebat, subito in terram prolapsa instar apoplecticæ jacuit. Cel. TRALLEs *de limitandis laudibus moschi* p. 40. Judæus qui facco, croco replete incumbens dormiebat, mortuus inveniebatur. Muli, qui crocum transportant sœpe ab ejus odore pereunt.

Cel. GMELIN *Entdeckungen von der Luft*, p. 93.

\*\*\* Ill. MURRAY app. m. V. I. p. 468.

Excessus in assuetis idem facit. Homo, qui  
25 fistulas post meridiem exhauserat, stupi-  
dus inde evasit cum jactura sensuum, quos  
recuperavit vomitionibus violentis. \* Duo  
fratres quorum unus 17 alter 18 fistulas eva-  
cuarunt more apoplectico exspirarunt. \*\*

**ANDITOTA** sunt irritatio fauci ut vomitus cia-  
tur. Acetum vini

**VIRTUS MEDICATA.** V. *Pharmacologiam chirug.*

### ODOR LOLII TEMULENTI.

*LoliuM temulentum L. Lolch.*

**VIS NOXIA.** Halitus, qui sub seminis tostione,  
projectione ad prunas ardentes aut sub fer-  
mentatione seminum in cubiculo clauso ema-  
nat, stuporitatem & cephalalgiam causat. \*\*\*

### ODOR CICUTÆ.

*Cicuta virosa L. giftiger Wüterich. Wasserschierling.*

**VIS NOXIA.** Odor in loco clauso inducit somno-  
lentiam. \*)

\* VANDERMOND *Rec. period.* T. VII. p. 68.

\*\*) HELLWIG *obs. phys. med.* p. 45.

\*\*\*) Cel. GMELIN *Geschichte der Gifte I Th.* p. 187:

\*) Cel. TREW in *Commerc. Litt.* Nro. 1740:  
p. 395. Pharmacopoei tiro, qui æstate calida sudans plati-  
tam domum tulit, stupore & somnolentia affiebatur.

## ODOR CONII MACULATI.

**C O N I U M** maculatum L. *Schierling.***V I S** NOXIA. Ab odore murino plantæ inter dgitos tritæ vertigo inducebatur. \*\*

## ODOR FUNGORUM VENENATORUM.

**F U N G I** venenati. *Giftige Schwämme.***V I S** NOXIA. Solus odor nauseam movit. \*\*

## A P P E N D I X.

DE VENENIS, QUORUM INDOLES  
ADHUC IGNOTA

## A Q U A T O F F A N A.

**E**st liqñor venenatus, qui scelleratæ feminæ italæ,  
**T O F F A N I A** dictæ, malignum inventum est.*Toffanisches Giftwasser. Aquetta Italorum.***V**era compositio hujus veneni medicos adhuc fugit, at *arsenicum crystallinum* in larga aquæ copia per simplicem decoctionem solutum esse videtur. \*\*\*\* *Ill. BOERHAAVE de morbis nervorum* p. 236.\*\* *Ill. LINNE de viribus plant. in Amœ. acad.*  
p. 451.\*\*\* *Ill. HOFFMANN Med. rat. system. T. II.*  
p. 185. & *Cel. G MELIN mineralische Gifte* p. 131.

**VIS NOXIA.** Homines, quibus hæc aqua ingeritur, febre ardentissima utplurimum diu durante, vomitu chronico, siti inexplebili corripiuntur, cui tabes hectica & mors finem imponit. Cadavera mortuorum valde rubebant. Hoc veneno præfertim in Italia ingens maritorum numerus a nefariis uxoribus sub regmine Pontificis *ALEXANDRI VII.* interficiebatur. Malitiosas has mulieres artem citio aut tarde mortem hac aqua accersendi caluisse legitur. \*

**ANTIDOTA.** Succus citri magna copia ingestus valde proficuus fuit. Sed tentur sal alcalinum, lac, oleum & reliqua antidota, quæ contra arsenicum laudavimus.

### P U L V I S S U C C E S S I O N I S,

Est venenum pulveris forma, quod priori sæculo præprimis in Gallia consuetum erat. \*\*

Teterrimum hoc venenum fæminæ cujusdam Parisiensis *Madame DE BRIAVILLIERS* dictæ inventum esse, censetur. Ob dulcem saporem, & lentam, quam ejus ingestio causat mortem,

\* Cel. LEBRET *Magazin zum Gebrauch der Staaten und Kirchengeschichte IV.* Th. p. 141.

\*\* Cel. ERNDT *diff. med. ex veneno salutem fistente.* Gieß. 1691. Thes. 21.

ex saccharo saturni & pauco arsenico confite,  
re videtur. \*

**ANTIDOTA.** Certa non constant ; hinc quæ contra  
venena plumbata & arsenicalia laudantur, ad-  
hibe.

### VENENUM MACASSARIENSE.

*VENENUM Macassariense, das Macassarische Gift.*

**VIS NOXIA.** Dirissimum hoc venenum est succus  
lacteus ignotæ nobis adhuc arboris, fauciatio-  
ne per arundinem acuminatam prolicitus, tam  
virosus, ut halitus vulneratæ arboris suffocet,  
nisi eminus vulneretur, & ventus a facie aver-  
sus spiret: unde etiam collectio capitis damna-  
tis modo committitur.

**ANTIDOTUM** est radix mungos, quæ ad drachmanæ  
cum aqua hauritur. \*\*

### VENENUM AMERICANUM TICUNAS.

Est venenum incognitum, quod ab Indis Ticunen-  
sibus in America ad sua tela intoxicanda præ-  
paratur. *Amerikanisches Tikunasgift.* \* \*

\* Cel. WEPFER hist. cicut. aquat. Cap. 20<sup>o</sup>  
Schol. 4.

\*\* ILL. MURRAY ap. med. T. I. p. 376.

\*\*\* Cel. FONTANA traité sur le venin de la  
vipere, sur les poisons américains &c. p. 83. Philos.  
Transact. vol. 47. N. 12.

**VIS NOXIA.** ODOR nauseofus; SAPOR amarissimus.

VAPOR e veneno ficcato emanans & veneni applicatio ad cutem sanam vel corneam oculi nihil nocuerunt. At tela hoc veneno intoxicata cutem hominis vel animalis vulnerantia celerrime necant, si venenum recens. Caro horum animalium impune comedи solere dicuntur. Veneni major dosis & ventriculo vacuo ingesta animalia intra aliquot minuta interimit. Mera excitat symptomata nervosa, subitaneum virium lapsum, insensibilitatem, convulsionem, lethargum &c.

**ANTIDOTA.** Nulla adhuc cognita, nec acida mineralia nec acetum, nec alcali, nec spiritus sacchari, nec Sal, nec Saccharum \* vulneri inditum, quidquam profuere.




---

\* Ut *Ill. La Condamine* proposuit.

# I N D E X.

A.

I N D E X.

I N D E X.

<b>Arsenicum rubrum</b>	• • • • • • • • •	275
— rubinum	• • • • • • • • •	275
<b>Asclepias Gigantea</b>	• • • • • • • • •	154
<b>Aspis</b>	• • • • • • • • •	34-38
<b>Atropa Belladona</b>	• • • • • • • • •	120
— Mandragora	• • • • • • • • •	96
<b>Arum maculatum</b>	• • • • • • • • •	187
— Dracunculus	• • • • • • • • •	189
— Dracontium	• • • • • • • • •	189
— Colocasia	• • • • • • • • •	189
— esculentum	• • • • • • • • •	189
— virginicum	• • • • • • • • •	190
— arborescens	• • • • • • • • •	190
— seguineum	• • • • • • • • •	190
<b>Aura Cavernæ caninæ</b>	• • • • • • • • •	294
— musti fermentantis	• • • • • • • • •	294
— cerevisiæ fermentantis	• • • • • • • • •	294
— aquarum acidularum	• • • • • • • • •	295
— salium effervescentium	• • • • • • • • •	295
— ædificiorum recentium	• • • • • • • • •	296
— usturæ calcis	• • • • • • • • •	296
— animalium putrescentium	• • • • • • • • •	304
— vegetabilium putrescentium	• • • • • • • • •	305
— respiratione animali corrupta	• • • • • • • • •	305
— transpiratione animali corrupta	• • • • • • • • •	306
— multitudine hominum corrupta	• • • • • • • • •	306
— aeris diu inclusi	• • • • • • • • •	307
— aquæ corruptæ	• • • • • • • • •	307
— cœmteriorum	• • • • • • • • •	308
— nofocomiorum	• • • • • • • • •	310
— carcerum	• • • • • • • • •	313
— navium	• • • • • • • • •	314
<b>Auripigmentum</b>	• • • • • • • • •	276
<b>Aurum</b>	• • • • • • • • •	239
— monetarium	• • • • • • • • •	240
— fulminans	• • • • • • • • •	241
<b>Azalea Pontica</b>	• • • • • • • • •	102

## I N D E X.

## B.

Belladonna	120
Benge arabum	101
Berus	35
Bismuthi Magisterium	244
Boletus elegans	139
— versicolor	138
Boleti parasitici	139
Bryonia alba	125
Buffo	53
Butyrum antimonii	268

## C.

Calla palustris	191
Caltha palustris	167
Calx viva	259
Cambogia Gutta	149
Cannabis halitus	325
Cantharis	40
Carbunculus frumenti	215
Caries frumenti	215
Carneolus	227
Caryota urens	187
Catflava	175
Cataputia major	117
— minor	193
Cerbera Ahoyai	150
— Manghas	150
Ceruilla	251
Chærophylum sylvestre	126
— bulbosum	126
— temulentum	127
Chelidonium glaucium	107
— minus	203
Chænopodium hybridum	106
Cherfea	36
Cicera	105
Cicuta minor	127
— virofa	128

I N D E X.

I N D E X.

<i>Crabro</i>	50
<i>Crocus antimonii</i>	269
— <i>metallorum</i>	269
— <i>Veneris</i>	247
<i>Crotalus horridus</i>	30
— <i>miliaris</i>	31
— <i>Drynias</i>	31
— <i>Duriflus</i>	31
— <i>mutus</i>	31
<i>Croton Tiglum</i>	179
<i>Crystallus montana</i>	230
<i>Cucumis Colocynthis</i>	148
<i>Culex lanio</i>	45
— <i>pipiens</i>	49
— <i>pulicaris</i>	49
<i>Cuprum</i>	245
<i>Cyclamen europaeum</i>	146
<i>Cynanchum erectum</i>	151
— <i>vimiale</i>	152
<i>Cynapium</i>	127

D.

<i>Daphne Mezeretin</i>	180
— <i>Thymelaea</i>	181
— <i>laureola</i>	182
— <i>Cneorum</i>	182
— <i>Gnidium</i>	182
<i>Datura stramonium</i>	96
— <i>Metel</i>	98
— <i>ferox</i>	98
— <i>Tatula</i>	98
<i>Delphinia staphisagria</i>	141
<i>Dentillaria</i>	146
<i>Digitalis purpurea</i>	145
<i>Draco</i>	55
<i>Dracontium</i>	189
<i>Dracunculus</i>	189
<i>Dulcamara</i>	94

E.

I N D E X.

E.

F.

Z

# I N D E X.

<b>Fungi nondum determinati</b>	140
<b>Fungus cynosbatos</b>	218
<b>Furia infernalis</b>	39

## G.

<b>Geko</b>	54
<b>Glacies mariae</b>	230
<b>Gordius medinensis</b>	50
—— <i>marinus</i>	52
<b>Granatus</b>	227
<b>Gatta Guimmi</b>	149
<b>Gymnotus electricus</b>	56
<b>Gypsum usuale</b>	229

## H.

<b>Halitus sulphuris accensi</b>	288
—— <i>urinæ</i>	297
—— <i>cloacarum</i>	298
—— <i>rancidus</i>	303
—— <i>arsenicalis</i>	316
—— <i>plumbatus</i>	317
—— <i>cupratus</i>	319
—— <i>mercurialis</i>	320
—— <i>gypsi</i>	322
—— <i>anagyridis</i>	323
—— <i>dracunculi</i>	324
—— <i>juglandis</i>	324
—— <i>sambuci</i>	324
—— <i>fantali albi</i>	324
—— <i>alceæ moscatæ</i>	325
—— <i>mancinellæ</i>	325
—— <i>cannabis</i>	325
—— <i>lini</i>	326
—— <i>toxicodendri</i>	326
—— <i>Rhus vernicis</i>	326
—— <i>dracontii polyphyli</i>	326
—— — <i>fœtidi</i>	327
—— <i>hellebori albi</i>	326
<b>Harmela</b>	106
<b>Helleborastruum</b>	166

I N D E X.

Helleborus albus . . . . .	163
——— niger . . . . .	165
——— fœtidus . . . . .	166
Hepar antimonii . . . . .	270
Hippomane Mancinella . . . . .	113
——— biglandulosa . . . . .	115
Hirudo venenatus . . . . .	52
Hyacinthus . . . . .	227
Hydrocotile vulgaris . . . . .	155
Hydropiper . . . . .	173
Hyoscyamus niger . . . . .	98
——— albus . . . . .	100
——— physalodes . . . . .	100
——— scopolia . . . . .	102

L.

Jatropha Curcas . . . . .	174
——— multifida . . . . .	175
——— Manihot . . . . .	175
Ignatia amara . . . . .	119

L.

Lacerta Geko . . . . .	54
——— Salamandra . . . . .	54
Lapis infernalis . . . . .	243
——— causticus . . . . .	238
——— lazuli . . . . .	228
——— specularis . . . . .	230
——— armenus . . . . .	247
Lactuca virosa . . . . .	108
——— scariola . . . . .	108
Lathyris . . . . .	193
——— Cicera . . . . .	105
Laureola . . . . .	182
Laurocerasus . . . . .	110
Lepus marinus . . . . .	53
Lignum colubrinum . . . . .	118
——— Pavane . . . . .	180
——— moluccanum . . . . .	180

## I N D E X.

<i>Lithargyrum</i>	251
<i>Lixivium causticum saponarium</i>	238
<i>Lobelia siphilitica</i>	151
— <i>longiflora</i>	152
<i>Lolium temulentum</i>	104
<i>Lycoperdon carcinomalis</i>	140
<i>Lycopersicum</i>	93

## M.

<i>Mancinella</i>	117
<i>Mandragora</i>	96
<i>Manghas</i>	150
<i>Manihot</i>	175
<i>Manipuera</i>	175
<i>Meloe visicatorius</i>	40
— <i>majalis</i>	43
— <i>proscarabaeus</i>	43
<i>Menispermum Cocculus</i>	115
<i>Mercurialis perennis</i>	130
<i>Mercurius vivus</i>	260
— <i>dulcis</i>	264
— <i>præcipitatus albus</i>	265
— <i>ruber</i>	266
— <i>sublimatus corrosivus</i>	263
— <i>vitæ</i>	270
<i>Metel</i>	98
<i>Mezereum</i>	180-181
<i>Miasma suis bovillæ</i>	60
<i>Minium</i>	257
<i>Momordica Elaterium</i>	149
<i>Mytilus edulis</i>	57

## N.

<i>Naja</i>	33
<i>Napellus</i>	168
<i>Natrum glaciale</i>	230
<i>Nerium Oleander</i>	119
<i>Nicotiana Tabacum</i>	123
— <i>rufstica</i>	125

I N D E X.

<i>Nicotiana paniculata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	125
<i>Nicotiana glutinosa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	125
<i>Nitri spiritus fumans</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	232
<i>Nux vomica</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	117

O.

<i>Odor violarum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	327
— <i>rofarum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	328
— <i>liliorum alborum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	328
— <i>caprifolii</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	328
— <i>polyanthes</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	329
— <i>phaseoli</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	329
— <i>fœni recentis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	329
— <i>oleandri</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	329
— <i>caryophyllorum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	329
— <i>afæ fœtidæ</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	330
— <i>ambræ</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	330
— <i>camphoræ</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	330
— <i>moschi</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	331
— <i>Castorei</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	331
— <i>Zibethi</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	331
— <i>hyosciami</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	332
— <i>stramonii</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	332
— <i>opii</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	332
— <i>croci</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	332
— <i>tabaci</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	333
— <i>lolii temulentii</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	334
— <i>cicutæ</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	334
— <i>conii maculati</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	335
— <i>fungorum venenatorum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	335
<i>Oenanthe fistulosa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	155
— <i>crocata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	156
<i>Oleander</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	119
<i>Opium</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	91
<i>Orontium</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	103
<i>Ostrea venenata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58
<i>Ovum putridum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	58

## I N D E X.

## P.

Papaver somniferum	89
Paris quadrifolia	109
Pastinaca venenata	172
Pedicularis palustris	145
Peganum harmala	106
Perca venenosa	56
Pineæ purgantes	119
Pinguedo rancida	59
Phalangium araneodes	45
Phallus impudicus	139
— Mukusin	139
Phyfalis somnifera	93
Phytolacca decandra	179
Plantago aquatica	157
Plumbago europaea	146
Plumbum	248
Polygonum hydropiper	173
Pomum amoris	93
Prunus laurocerasus	110
Pulex penetrans	48
— americanus	48
Pulsatilla nigricans	161
Pulvis successionis	33
Puprestis	46

## R.

Raja Pastinaca	56
— Torpedo	56
Rana Bufo	56
Ranunculus acris	196
— pratensis	196
— palustris	196
— sceleratus	198
— Flammula	201
— bulbosus	202
— Ficaria	204
— Thora	205
— arvensis	206

I N D E X.

Ranunculus lingua . . . . .	204
— alpestris . . . . .	205
— polyanthemos . . . . .	205
— gramineus . . . . .	206
— Illyricus . . . . .	206
— asiaticus . . . . .	206
— platanifolius . . . . .	206
— aquatilis . . . . .	207
— Sardous . . . . .	207
Ranunculus albus . . . . .	162
Raphanistrum . . . . .	207
Realgar . . . . .	275
Regulus antimonii . . . . .	267
— arsenici . . . . .	227
Rhododendron Chrysanthum . . . . .	143
Rhus radicans . . . . .	184
— Toxicodendron . . . . .	184
Rhus vernix . . . . .	183
Ricinus major . . . . .	174
— communis . . . . .	177
Rubigo frumenti . . . . .	215

S.

Sabadilli semen . . . . .	142
Sælanthus Forskalii . . . . .	173
— glandulosus . . . . .	173
Sælanthus quadragonus . . . . .	173
Salamandra . . . . .	54
Sal alcalinus vegetabilis causticus . . . . .	236
— mineralis causticus . . . . .	236
— volatilis causticus . . . . .	237
Salis marini spiritus concentratus . . . . .	232
Samu-el ventus . . . . .	315
Sandaraca . . . . .	275
Saphirus . . . . .	227
Saturni faccharium . . . . .	251
— magisterium . . . . .	251
— extractum . . . . .	251
— tinctura . . . . .	251
Scamonea . . . . .	148

I N D E X

T.

I N D E X.

Tinctura saturnina . . . . .	251
Tithymallus . . . . .	193
Toffania . . . . .	335
Torpedo . . . . .	56
Toxicodendron . . . . .	184
Trachinus draco . . . . .	55
Turpethum minerale . . . . .	266

V.

Venenum macassariense . . . . .	337
——— americanum Ticunas . . . . .	337
Ventus Samu-el . . . . .	315
Veratum album . . . . .	163
——— nigrum . . . . .	167
Yespa vulgaris . . . . .	50
——— Crabro . . . . .	50
Vipera . . . . .	34 35 36 38-39
Virus rabiosum . . . . .	60
——— variolosum . . . . .	72
——— morbillosum . . . . .	73
——— scarlatinum . . . . .	73
——— scabiosum . . . . .	74
——— venenerum . . . . .	74
——— plicosum . . . . .	74
——— cancrosum . . . . .	75
——— leprosum . . . . .	75
——— pestilentiale . . . . .	75
——— morborum putridorum . . . . .	76
Visci querni baccæ . . . . .	216
Viscum aucuparium . . . . .	216
Vitalba . . . . .	157
Vitriolicus aer . . . . .	290
Vitrioli acidum concentratum . . . . .	230
——— oleum . . . . .	230
Vitriolum album . . . . .	233
——— cœruleum . . . . .	234
——— cyprinum . . . . .	234
Vitriolum viride tabernaruim . . . . .	235
——— martis . . . . .	235
——— vulgare goslariense . . . . .	235


I N D E X.


Vitrum contusum . . . . .	226
— antimonii . . . . .	263

U.

Urinæ halitus . . . . .	297
Urtica marina . . . . .	53
Ustilago frumenti . . . . .	214







LM 34. N. 17 85.1

COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE

QP  
941  
P71

RARE BOOKS DEPARTMENT

