

**Traité zoologique et physiologique sur les vers intestinaux de l'homme. :
Atlas / [J.G. Bremser].**

Contributors

Bremser, Johann Gottfried, 1767-1827.
London School of Hygiene and Tropical Medicine

Publication/Creation

Paris : Imprimerie de C.L.F. Panckoucke, [1824]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/szpmcj96>

Provider

London School of Hygiene and Tropical Medicine

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by London School of Hygiene & Tropical Medicine Library & Archives Service. The original may be consulted at London School of Hygiene & Tropical Medicine Library & Archives Service. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>





LIBRARY

Date 16 February 1951

Class Mark * M Accession No. 36623

1824
(fol)



Digitized by the Internet Archive
in 2015

<https://archive.org/details/b21365441>

GREENSEN

1824

TRAITÉ

ZOOLOGIQUE ET PHYSIOLOGIQUE

SUR

LES VERS INTESTINAUX

DE L'HOMME.

ATLAS.

Robert Dickson M.D.

47 Finsbury Square

9.5.0
3.15
5.10.0

146

TRAITÉ

ZOOLOGIQUE ET PHYSIOLOGIQUE

SUR

LES VERS INTESTINAUX

DE L'HOMME.

ATLAS.

36623

PARIS, IMPRIMERIE DE C. L. F. PANCKOUCKE,
Rue des Poitevins, n°. 14.



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

Fig. 1. Le trichocéphale mâle de l'homme, de grandeur naturelle; *1a*, grossi fortement; *1b*, la queue d'un autre individu encore plus grossie.

Fig. 2. Le trichocéphale femelle de l'homme, de grandeur naturelle; *2a*, très-grossi.

Fig. 3. L'oxyure vermiculaire mâle de grandeur naturelle; *3a*, très-grossi.

PLANCHE II.

Fig. 1. L'oxyure vermiculaire femelle de grandeur naturelle; *1a*, considérablement grossi.

Fig. 2. Autre individu du même sexe, de grandeur naturelle; *2a*, très-grossi; *2b*, un tronçon du corps du même encore plus grossi pour montrer les œufs.

Fig. 3. L'ascaride lombricoïde femelle de grandeur naturelle, les intestins et les oviductes sortis par une déchirure; *3a*, extrémité céphalique vue de profil; *3b*, vue de face; *3c*, extrémité anale du mâle grossie pour montrer le double pénis.

Fig. 4. L'ascaride lombricoïde femelle très-jeune, de grandeur naturelle.

PLANCHE III.

Fig. 1. Un très-petit dragonneau.

Fig. 2. L'hamulaire subcomprimé; *2b*, son extrémité céphalique grossie.

Fig. 3. Le strongle géant mâle, de grandeur naturelle; *3a*, extrémité céphalique; *3b*, extrémité caudale du mâle; *3c*, *id.* d'un individu femelle, toutes trois assez grossies; *4d*, extrémité caudale d'un autre mâle de grandeur naturelle.

Fig. 4 et 5. Petits vers rendus avec l'urine, présumés de jeunes strongles, et de grandeur naturelle; *5a*, l'un d'eux grossi considérablement; *5b*, extrémité céphalique encore plus grossie; *5c*, extrémité anale également grossie¹.

¹ Je n'ai pu, dit M. Bremser, voir rien d'annelé sur le corps des échantillons que m'a communiqués M. le professeur Spedalieri, de Pavie, et qui ont servi de modèles.

PLANCHE IV.

Le bothriocéphale large ou tænia large entier, mais encore jeune, et paraissant plutôt ridé qu'articulé, si ce n'est en avant.

PLANCHE V.

Détails du bothriocéphale large¹: *a* et *b*, tête fortement grossie avec un cou distinct; *c*, tête grossie sans cou distinct; *d*, *f*, morceaux détachés, dont il est parlé pag. 25 et 26; *g*, autre morceau considérable-

¹ On distinguera les morceaux détachés sans extrémité céphalique d'un bothriocéphale de ceux d'un véritable tænia, par la forme et la disposition des protubérances avec concavité qui existent aux articulations de tout le corps.

ment grossi pour montrer les dards; *h*, tronçon avec difformité; *i*, *id.*; *k*, autre morceau difforme; *l*, quelques œufs grossis.

PLANCHE VI.

Le tœnia de l'homme presque entier, d'après un individu de près de huit pieds de long, tronqué en arrière, avec des points indiquant les interruptions: *a*, la tête de grandeur naturelle; *b*, *c*, *d*, la même très-grossie, la figure *c* montrant la couronne de crochets.

PLANCHE VII.

Détails du tœnia de l'homme: *a*, quelques articulations très-épaisses et solides; *b*, plusieurs autres très-rétractées; *c*, *id.* difformes; *d*, quelques articulations montrant la disposition phytoïde des organes de la génération; *f*, *id.* perforés; *g*, *h*, *i*, *id.* monstrueuses, représentant des individus accolés ou jumeaux. Voyez page 193.

PLANCHE VIII.

Fig. 1. Le cysticerque du tissu cellulaire; *1a*, plusieurs individus de grandeur naturelle dans un morceau de muscle; *1b*, un individu de grandeur naturelle, attaché à de la graisse; *1c*, *id.* avec son kiste; *1d* et *1e*, *id.* sans kiste, le cou et la tête rentrés; *1f*, le cou à demi développé; *1g*, *id.*, le cou et la tête entièrement développés; *1h*, la tête, le cou et une partie du corps considérablement grossis; *1i*, un crochet isolé et encore plus grossi.

Fig. 2. L'échinoccoque de l'homme; *2a*, un individu plus petit; *2c*, un plus gros l'un et l'autre offrant l'aspect d'un autre individu

contenu, mais dont la membrane interne s'est détachée; 2e, partie de la membrane comme couverte de granulations très-fines; 2d, granulations vues à l'œil nu; 2b, une de ces granulations de la figure 2d, considérablement grossie.

PLANCHE IX.

Fig. 1. La douve du foie de grandeur naturelle; 1a, un autre individu de grandeur naturelle; 1b, la première considérablement grossie, avec des vaisseaux visibles; 1c, le second également très-grossi, et paraissant entièrement vide.

Fig. 2. Le polystome pinguicole, copié de Treutler, dans la cavité formée par la graisse; 2a, *id.*, vu d'un autre côté; 2b, extrémité prétendue céphalique montrant les six suçoirs.

Les figures indiquées par des lettres représentant des pseudohelminthes.

Fig. a. *Hexathyridium venarum*, copiée de Treutler.

Fig. b. *Cercosoma*.

Fig. c. *Ascaris stephanostoma*.

Fig. d. *Dyrachuceros rudis*, copié de Sulzer.

Fig. e. *Ascaris conosoma*.

Fig. f. *Hydrometra hydatica*.

Fig. g. *Diacanthos polycephalos*.

Fig. h. Concrétions polypeuses de Barnett.

Fig. i. Prétendus œufs d'oxyures grossis dix fois (graines de fraises).

Fig. k. Germes d'alkekengi ou coqueret.

Fig. l. Germes de jusquiame.

PLANCHE X.

Fig. 1. L'échinocoque de l'homme, copié de Rentdorff; 1a, une des plus grosses hydatides de forme globuleuse, et contenant une très-grande quantité d'échinocoques; 2b, une plus petite et ovale;

1c, plusieurs échinocoques considérablement grossis, sur trois desquels on voit très-bien la couronne de crochets.

Fig. 2. Le coenure cérébral, copié de Fischer; 2a, une assez grosse hydatide avec un grand nombre de têtes groupées à sa surface; 2b, une plus petite; 2c, deux têtes considérablement grossies, dont l'une est rentrée et l'autre sortie montrant les suçoirs et les crochets.

APPENDICE.

PLANCHE I.

Fig. 1. Le polystome de Delaroche grossi vu en dessous; 1a, vu en dessus; 1b, une ventouse avec les deux crochets assez mal exprimés.

Fig. 2. La linguatule tænioïde, copiée de M. Rudolphi; 2a, la tête grossie pour montrer la bouche et les crochets.

Fig. 3. La tête du cucullan élégant; 3a, celle du cucullan fovéolé, copiées de M. Rudolphi.

Fig. 4. Tête du nétorhynque vue en dessous; 4a, vue en dessus, copiées des Mémoires d'Edimbourg.

Fig. 5. Le géroflé changeant mâle, vu en dessus; 5a, *id.* femelle vue de profil, copiés de M. Rudolphi.

Fig. 6 (*d.* par erreur). Le liorhynque denticulé de M. Rudolphi.

Fig. 7. L'ophiostome mucroné, copié de M. Rudolphi.

Fig. 8. L'ophiostome de Pontier, copié de M. H. Cloquet.

Fig. 9. Le gordius aquatique d'après nature; 9a, la tête grossie vue de profil.

Fig. 10. Le phydaloptère fermé; 10a, la queue grossie, copiés de M. Rudolphi.

Fig. 11. Le sclérostome du cheval d'après nature; 11a, son extrémité céphalique grossie vue de face.

Fig. 12. Vers trouvés en abondance dans la cavité péritonéale d'un trigle fixé au tissu cellulaire de l'estomac, et remarquable par l'espèce de vésicule dure, presque cartilagineuse de l'une de ses extrémités.


Fig. 13. La tête du sclérotique ou du trichocéphale du lézard ; copiée de Pallas.

Fig. 14. La sagittule de Bastiani (appareil hyo-laryngien d'un oiseau vu en dessus) : *a* trompe, *b* nageoires ou ailes, *c* articulation du fémur, *d* cuisse, *e* genou, *f* jambe, *g* queue, *h* bouche, c'est-à-dire ; langue tronquée, base de la langue, corps de l'hyoïde, cornes de l'hyoïde, composées de deux articulations, comme de coutume, et ouverture du larynx.

PLANCHE II.

- Fig. 1.* L'hypostome caryophillin, copié de M. Rudolphi.
Fig. 2. Le festucaire tenuicole du même.
Fig. 3. Le lobostome lauriné, *id.*
Fig. 4. L'hirudinelle en massue, copié de Menzées.
Fig. 5. L'alaire de Brongniart (fig. origin.).
Fig. 6. L'échinorhynque de la baleine (fig. origin.).
Fig. 7. L'échinorhynque de la limnée (fig. origin.).
Fig. 8. Le dibothriorhynque du lépidope vu de côté ; *8a*, la tête grossie de face ; *8b*, la même encore plus grossie de côté (fig. origin.).
Fig. 9. Le tétrarhynque appendiculé, copié de M. Rudolphi.
Fig. 10. La tête grossie du triscupidaire, copiée de M. Rudolphi.
Fig. 11. La massette microscopique ; *11a*, sa tête grossie.
Fig. 12. Le tentaculaire de Bosc grossi ; *12a*, la tête vue de face et encore plus grossie, copiés de M. Rudolphi.
Fig. 13. Le tétrabothris macrocéphale, grandeur naturelle, et la tête grossie, copiés de M. Bremser.
Fig. 14. Le tétrabothris auriculé, de grandeur naturelle ; *14a*, la tête grossie, copiés de M. Bremser.
Fig. 15. Le bothridie du pithon, sa tête ; *15a*, son extrémité postérieure (fig. origin.).
Fig. 16. La ligule des poissons (part. ant.) ; *16a*, partie postérieure (fig. origin.).
-









Delavigne del.

Lign. Lith. de C. Malaprom.




Heteromera lita

Fourchil de Malapouze




Lith. par Delaroux


Imp. par C. Malaplan




Lith. par Delavigne.

Imp. par Malaplan.










Delorsiana lithog.

Imp. lith. de C. Malapertus curvatus.







Polysiphonia, etc.

Emp. etc. de C. Malapoutou, etc. Manarato, etc.



b. M
1824



S 15 7155

