

Dissertatio medica inauguralis de variolis secondariis : quam annuente summo numine ... D. Georgii Baird ... / eruditorum examini subjicit Andreas Smith.

Contributors

Smith, Andrew, 1797-1872.
University of Glasgow. Library

Publication/Creation

Edinburgi : Excudebat P. Neill, 1819.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ybcgutrj>

Provider

University of Glasgow

License and attribution


This material has been provided by The University of Glasgow Library. The original may be consulted at The University of Glasgow Library. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>






486-1887

Cc 4- c . 18





To

Dr. Thomson

With the most respectful & affec^t copy
of the author

descripción
varios
varios

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS
DE
VARIOLIS SECUNDARIIS;
QUAM,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,
EX AUCTORITATE REVERENDI ADMODUM VIRI
D. GEORGII BAIRD, SS. T. P.
ACADEMÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NECNON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU, ET
NOBILISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ DECRETO;

Pro Gradu Doctoris,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS:

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

ANDREAS SMITH,

SCOTUS,

SOCIET. WERNERIAN. SOCIUS,

ET

NOSOCOMIOR. EXERCIT. BRITANN. CHIRURGUS SECUNDARIUS.

E' volgar' errore il credere, che chi ha una volta sofferto, specialmente il vajuolo non vi sia piu sottoposto; mentre che l'osservazioni fan fede che per la seconda, ed ancora per la terza volta, comeche sieno cosi rari, vi s' inciampa.—*Moxa, dell' Aria e de Morbi dall' Aria dependente, Dissert. 2. Parti 2. tom. II. p. 106.*

Cujusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare
in errore.

CICERO.

IV. Nonas Augustas, horâ locoque solitis.

EDINBURGI:
EXCUDEBAT P. NEILL.

MDCCCXIX.

JACOBUS DE GELDINGA
MAGISTER

VARIORUM SECUNDARII

1. Адмиралтейская инспекция
и её методы изыскания статистики из

2. Третий раздел
статистической информации из архива
изданий.

на личном опыте Третий раздел
статистической информации из архива

3. Четвёртый раздел

4. Пятый раздел
статистической информации из архива

5. Шестой раздел

6. Седьмой раздел
статистической информации из архива

7. Восьмой раздел

9. Девятый раздел
статистической информации из архива

10. Десятый раздел
статистической информации из архива

11. Единадцатый раздел
статистической информации из архива

12. Дванадцатый раздел

13. Тринадцатый раздел
статистической информации из архива

14. Четырнадцатый раздел

15. Пятнадцатый раздел

JACOBO MCGRIGOR, EQUITI, M. D.

S. R. L. & E. S.

COL. REG. MED. EDIN. SOCIO,

PRINCIPIS BRITANNIAS REGENTIS

MEDICO EXTRAORDINARIO,

EXERCITUS BRITANNICI SUMMO PRÆFECTO MEDICO,

QUI

NOTITIA SUÆ ARTIS, ALIARUMQUE SCIENTIARUM

ÆQUE AC SUAVITATE MORUM,

ÆSTIMATIONEM ET OBSERVANTIAM OMNIUM

OBTENUIT,

OB MULTA SUA BENEFICIA NUNQUAM OBLIVISCENDA,

HOCCE OPUSCULUM,

TESTIMONIUM GRATI ANIMI

D. D. D. que

A U C T O R.

JACOB MCGREGOR, Esq., M.D.

1830. 8vo. pp. 250.

COL. RICH. M'D. WILK. SOCIO,

PHYSICAL AND MEDICAL INVESTIGATIONS

MEDICAL EXAMINATIONS

BY DR. JACOB MCGREGOR,

PROFESSOR OF PHYSICS AND MEDICAL SCIENCE IN THE UNIVERSITY OF MONTGOMERY.

1830.

WITH A HISTORY OF ALTERNATIVE MEDICINE,

AND A SELECTION OF HISTORIES

Digitized by the Internet Archive
in 2014

Digitized by

BY THE BIBLIOTHECA MUNICIPALIS OUTARVICENSIS.

HOCCE OPUSCULUM.

TRANSLATED FROM THE FRENCH BY DR. JACOB MCGREGOR,

DR. J. D. GALT,

AUTOR.

<https://archive.org/details/b21452568>

ERRATA.

In dedicatione *pro* obtenuit, *lege* obtinuit,

Pag, 19. lin. 21. *pro* aliqui, *lege* aliique,
— 23. — 4. — King — Ring

ATAVII

diario agli amici e amiche di PEGGY KEEGAN

scritto agli ospiti da lei al suo
nido — giallo — 4 — 19 —

DISSESSATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

VARIOLIS SECONDARIIS.

Auctore ANDREA SMITH.

AN corpus humanum sæpius quam semel contagione variolarum affici possit? quæstio est quæ multam controversiam creavit, et de qua, medici etiam temporibus nostris, sententias contrarias et discordantes recipiunt. Auctores multi primi ordinis, non solum ut homines subeant tentationem secundam, aut tertiam asseverarunt, sed tales ut nequaquam raras habuisse videntur; dum

A

alii, æqua eruditione, diversam opinionem sustinent. Agitatio recens, quam hæc quæstio experta est, variis conatibus qui ad naturam variolæ, et varicellæ utpote eandem probandam, nuper facti sunt, quendam generalem relationem permittat, rerum quæ ab auctoribus qui morbum iterum interdum redire credunt, enumeratæ sunt; ut illa opinio si vera, accurationem illorum inductionum ultra dubitationem probabit.

Mihi in animo est, in hac dissertatione, brevem narrationem quorundam casuum qui optime probati sunt, dare, ubi variolis homines sæpius quam semel affecti sunt, simul cum enumeratione opinionum talium, quæ suam originem aut ab observatione, aut ab consideratione illorum casuum derivaverint.

Differentia multa opinionis inter medicos scriptores extitit de tempore, et regione, in quibus variola primum exoritur. Alii ad Græciam, alii ad Sinas, et alii ad Arabiam, originem retulerunt *. Primæ descriptiones accuratæ quæ nos pervenerunt hujus morbi, opera sunt Medicorum

* MOORE's History of Small Pox, page 1. et seq.

Arabicorum, a quorum plurimis credebatur ut singuli eo plus semel implicati essent.

RHAZIS *, qui inter primos eorum scriptorum fuit, et cuius descriptio est plenissima, et perfectissima, morbum aliquando recursurum esse credidit, ut ab variis indiciis ejus in nonnullis partibus sui operis videatur. Is de conditionibus corporis diversis loquens, in quibus variola accidat, his verbis utitur : “ Iis etiam accidunt (variolæ) qui bus calor est hebes vel humiditas non copiosa ; et iis qui in pueritia eorum variolis correpti fuerunt debilioribus.” Iterum in enumeratione remediorum quæ ad morbo præveniendum adhibeantur, præscribit missionem sanguinis ad juvenes, “ qui vel nondum variolis fuere correpti, vel qui correpti fuerunt olim variolis languidis, debilibus : ” etiam, in folio 252, recursum variolarum “ bis vel ter” in eodem homine admittit.

Nonnullis annis peractis, mentionem factam fuisse ejusdem rei ab AVICENNA †, invenimus ; qui verbis sequentibus utitur : “ Et multoties qui-

* RHAZIS, de Variolis et Morbillis, pag. 27. et seq.

† AVICENNA, Opera Omnia, tom. ii. lib. 4. pag. 73.

dem variolatur, homo duabus vicibus, quando aggregatur materia ad expellandum bis."

Ista opinio generaliter recepta esse videtur, ad tempus usque AVERRHOIS, qui sub finem undecimi seculi vixit, et qui primus ut homo variola tantum semel in vita laborare potuisset, affirmavit.

Post hoc per quædam secula ita obscura, et imperfecta est, historia morbi, ut nos non præbeat occasionem, indagandæ viæ quæ ad propagacionem per Europam cepit, aut aspectuum variorum quos probabiliter per illud tempus exhibuit. A quibusdam trans Mediterraneam in Hispaniam fuisse gestum, existimatum est, et ab aliis via Constantinopolis, pervagatum esse.

Omissis illis controversiis, quium consequentiæ morbi magis ferri ægre inceperunt, et fatalis vis attentionem sedulissimam medicorum requirebat, natura ejus melius nota facta est, et aspectus generales accuratissime descripti sunt, et aliquæ aberrationes ab legibus quas variola plerumque observat, ab illis auctoribus dignæ memoria fuerunt.

Scripta medicorum in regionibus multis Europæ, ab illo tempore descriptionibus morbi accura-

tis abundant, ut plerumque visus est, et etiam diversitatum, quæ aliquando observatæ sunt.

In Italia—AMATUS LUSITANUS * scriptor sexdecimi seculi mentionem variolarum recursus fecit. Post res, quas credidit quasdam causarum esse illius morbi enumeravit, dicit: “ His accidit “ causis, aëris infectio, sive ea a causa particulari “ procedat, sive ab universalis et cœlesti originem “ trahat, ut hoc anno millesimo quingentesimo “ quinquagesimo primo, Anconæ contigit, in qua “ civitate pueri omnes et grandes natu aliqui, qui “ olim jam variolas et morbillos passi sunt, in eas “ rursus incurserunt, præsagium sane (quod Deus “ Optimus Maximus avertat) futuræ pestis.”

In Appendice ad Opera Medica MESSUÆ †, edita a Francisco de Piedmont, scriptis tradita est plena relatio varietatum morbi varioloïdes, inter quas de eruptionis reditu mentionem fecit his verbis: “ Et de iis (variolis) sunt quæ semel exeunt “ et apparent, et quæ apparent bis.”

* AMATUS LUSITANUS, Curation. Medicin. cent. iii. p. 233.

† MESSUÆ Opera Medica, Supplement. Franc. de Pedemont. p. 130. **D**

FORTIS*, etiam dicit de variolarum causis, "Et sicut non est credendum cum FERNELIO, solam aëris constitutionem variolarum causam esse posse, pluries enim, non semel aut bis in homine eruperunt."

Præter hos alii scriptores Italici a BURSERIO† commemorantur, qui recursum hujus morbi viderunt. Quorum duo sunt SARCONE et MOSCA, qui tales recursus non raros esse in regno Neapolitano dicunt, et interdum speciei confluentis secundum aut etiam tertium impetum fuisse.

In Florentia idem observatus fuit; et JO. ALOYSIUS TARGIONUS casus duos, in quibus variola bis apparuisset, narrat. DOMINICUS JUVANILLIUS tres casus sororum quæ bis hoc morbo correptæ essent, et duo similes a LALIO dantur.

Reversio morbi etiam in *Gallia* observata fuit, et casus, a nonnullis medicorum scriptorum illius regionis, editi fuerunt.

BORELLUS‡ dicit: "Sed multoties vidi qui

* FORTIS, Consult. et Respon. Medicinal. tom. ii. cent. 4. p. 604.

† BURSERII Inst. Medic. vol. ii. pag. 101. 4to.

‡ BORELLI, Hist. et Obs. Med. cent. iii. observat. 10. p. 203.

“ unquam iis (variolis) laborarunt, aliosque dua
 “ vel tria ejus grana habuere vidi, etiam qui bis
 “ et ter, imo in senectute, ea cruciati fuere, sed
 “ nihil adeo circa hæc notandum occurrit, ac mu-
 “ lier quædam Bononiensis Gallæ quæ septies
 “ eas passa est, et anno centesimo et decimo oc-
 “ tavo tandem eodem morbo periit.”

SIDOBRE *, causas variolarum enumerans, et conatus ut illæ productæ sint viscido statu sanguinis probare, asseverat Italos, Hispanos et Lusitanos nunquam eo morbo sæpius quam semel, dum Suedi, Dani, Angli, et etiam Parisii frequenter temptationem secundam, tertiam, aut etiam quartam habent; quod ad temperamenti differentiam earum regionum ascribit.

M. R. DE HAUTESIERCK†, in sua historia Variolæ epidemicæ quæ grassata est apud Challon-sur-Saone anno MDCCLXIV, dicit, “ Vers le commencement de Juillet, la petite verole devint si generale que quelques uns qui l'avoient déjà eue,

* SIDOBRE, Tract. de Variolis et Morbillis, pag. 6.

† HAUTESIERCK, Recueil d'Obs. de Med. des Hopit. Militaires, tom. i. p. 130.

“ soit grands, soit petits, en furent attaqués une
“ seconde fois.”

M. GAULARD* duos casus descriptsit; unum
infantis, Domini MANERS, qui bis cum variola
in spatio duorum mēsium affectus est, alterum
pueri qui post variolas ante nonnullus annos ha-
buerat, iterum hoc morbo in forma confluentissi-
ma correptus est.

M. OLIVIER† casum Luciae Pore narrat, quæ
vestigia prioris affectionis retinens secundum ten-
tationem morbi subiit, quæ blande cursum tran-
ssiit.

M. MARESCHALL DE ROUGERS‡ mentionem
fecit seipsum vidisse ultra viginti casus variola-
rum secundariarum. Dicit, “ Il vient de mourir
“ en cette ville (*Lamballe*) plusieurs personnes qui
“ portoient en grand les marques de cette maladie,
“ et je puis assurer en avoir vu devant plus de
“ vingt en pareil cas.”

M. DAR CET §, casum M. Haricourt dat,
qui anno MDCCCLVI, inoculatus fuit, et anno

* Journal de Medecine, tom. x. p. 261.

† Idem, tom. xi. pag. 417.

‡ Idem, tom. xxxix. pag. 242.

§ Idem, tom. xlix. pag. 303.

MDCCLXXVI, veras variolas sed discretissimas et mitissimas habuit.

Liber apud Monspeliensem nuper editus est*, in quo variolas, et varicellas, oriri ex eadem contagione suggeritur; sententia originem ex rebus sequentibus trahit. *Primo*, Ut variola et varicella, circa idem tempus sese ostendunt. *Secundo*, Ambo plerumque semel prevalent. *Tertio*, Ambo morbi, in iisdem domis ad idem tempus videntur. *Quarto*, FRANK et RIEL, variolas spurias ortas esse, ex inoculatione cum pure variolarum verarum, se vidisse asseverant. *Quinto*, Variolarum easus purissimi semper quasdam vesiculos imperfectas, ut varicella apparent, exhibent. *Sexto*, Variola et varicella, in quibusdam casibus ita citissime superveniunt, ut aliquis eos morbos ad eandem originem referre, duceretur. *Septimo*, Varicella variolis maximam similitudinem, in symptomatis, in circuitu, in forma pustularum et in contagione ostendunt. *Octavo*,

B

* Essai sur les Anomalies de la Variole, et de la Varicelle. Par. M. F. BERARD, et par M. DE LAVIT, Montpellier, 1818.

Varicella easdem formas inordinatas variolæ ostendit. Nono, Eodem affinitas et etiam eadem differentia inter variolas et varicellas, ac inter vaccinam veram et spuriam existit. Si hæc vera sint, factum erit revertiones variolarum non tam raras inventum iri ut olim creditæ sunt.

Exempla similia, illis jam descriptis, in multis scriptorum medicorum *Germanorum* inveniuntur. STALPART VANDER WIEL * dicit, “ Initio “ Decembris anno MDCLXXXII, duæ infantes, “ hic Hagæ variolis non tamen copiosis, corripie-“ bantur, inde febri acutiore gravibusve non labo-“ rabant symptomatibus. Verum, tribus hebdo-“ madis elapsis, natu minorem, exsiccatis variolis, “ denuo in morbum incidisse mirabundus intel-“ lexi, quem triduo post aliæ, et sextuplo majore “ quantitate erumpentes comitabantur variolæ. “ Convaluit tamen iterum infans.”

Tres casus ab SERVANS VAN DE CAPILLO dantur †. *Primus*:—“ Noster anno MDCCCLII,

* STALPART VANDER WIEL, Obs. Rar. Med. Anat.
Chir. tom. ii. par. 1. obs. 42. p. 424.

† Comment. De Rebus Lip. vol. xvii. p. 135.

“ contagio varioloso qui grassante, in familiam
“ accersitus duos infantes, variolis benignis labo-
“ rantes brevi sanavit. Alter eorum, cum post
“ quatuor septimanas eodem contagio iterum in-
“ fectus diceretur, signa consueta ostendit, ex
“ quibus tamen noster certi quid nondum deter-
“ minare ausus est; sed postremo die variolas
“ toto corpore præcipue in extremitatibus prodire
“ vidit, ex quibus æger stadiis, ut solent, celebra-
“ tis, brevi restitutus est.” *Secundus et Tertius:*
—“ Variolis anno MDCCXLIV in familia merca-
“ toris grassantibus, filia prima major, deinde ju-
“ nior, ab iis infectæ, brevi sanatæ sunt, ex eo,
“ quid de contagio reversuro sentiret, quæreretur,
“ hoc fieri posse asservit. Neque erravit; nam
“ utraque filia variolis post aliquod tempus cor-
“ repta, utramque quoque restituit.”

VAN DŒVEREN *, imprimis casum uxoris propriæ quæ bis variolis correpta fuit, dat. Secundam affectionem ut spuriam primo considerare inclinatus fuit, sed post tempus certum, morbus talia signa vera ostendebat, ut nullum dubium

* Comment. De Rebus Lip. vol. xviii. p. 587.

in suo animo de natura ejus relinquere; addit hunc casum a CAMPERO, GRUNNER, BRILL, et SURGHUISEN, visum esse, et etiam casum istius descriptionis illi ab ultimo missum esse, qui olim suæ hypothesi fortiter opposuit: sed ab observatione illorum casuum, ille nunquam postea accusationem opinionis dubitavit.

F. DRYFHOUT *, in commentariis de infantum variolis mentionem fecit, de casu hominis qui correptus fuit variolis nonnullis annis post inoculationem.

KRAUSE †, in sua dissertatione inaugurali de extirpatione variolarum, inoculationis substitutione; casum puellæ narrat, quæ temporibus quatuor diversis hoc morbo laboraverat; “bis nempe veris, semel accuminatis et semel lymphaticis.”

In HAGENDORNI ‡ operibus observatio sequens invenitur, et etiam relatio quibusdam in casibus recursus morbi: “Mihi nota sunt ali-

* Comment. De Rebus Lip. vol. xvii. p. 139.

† Opus citat. vol. xiii. p. 49.

‡ HAGENDORNI Obs. et Hist. Med. Pract. Rar. Cent. i.
Hist. lx. et lxi. p. 235.

“ quot in praxi exempla eorum, qui bis variola-
“ rum insultus experti sunt. *Casus Primus*, No-
“ bilissima quædam virgo in Ducatu Gorlicensi,
“ ex antiqua quadam prosapia oriunda, annorum
“ triginta plus minus, per multos annos valetudi-
“ naria, postquam juvenilibus in annis variolas
“ sustinuerat, easque ad votum sui et parentum
“ optime exantlaverat, ob visam a se ex impro-
“ viso ministram variolis insigniter deturpatam
“ terrore hinc concepto, iterum, et sic altera vice,
“ iisdem affligi cœpit, cum tanta symptomatum
“ sævitia stipatis, ut paucis ab efflorescentia die-
“ bus convulsa emori juberetur.” *Secundus*,
Casus est ille suæ filiæ quæ morbum transiverat
et convalescens fuit; sed addit, “ Factum tamen
“ est, ut maculisa ex variolis nondum penitus
“ evanescentibus, variolas aquosas confertim per
“ totam corporis peripheram efflorescentes vide-
“ ret.”

CALCERIUS*, in suis observationibus de in-
oculatione, casum sequentem habet: “ Puer sep-
“ tum annorum post insitionem dextro adminis-
“ tratur, variolas bis expertus est.”

* Comment. De Rebus Lip. vol. xii. p. 150.

WICHMANN*, in reversione morbi credidit, ut dicit, “Sunt exempla verarum variolarum plus semel infestantum, sed inter nos certe oppido rara: nisi eo referre velis vel retrogressas et repullulentes, vel eas quæ sine accurato morbi typo, nutricibus aliisque a frequente variolosorum corporum attactu subnasci solent, quod apud nos perquam vulgare est. Ad retrogressas et repullulentes spectari, videtur curiosissima historia SPIGELLI de semitert. p. m. 28. juvenem una cum semiter tiana, in variolas illapsum, in tribus recidivis febris tres variolarum recidivas passum, posteaque parotidas.”

VOGEL †, de reversione variolarum dicens, primo mentionem fecit, nonnullorum auctorum quibus ea visa erat, et deinde dicit, quod ipse, “recidivam illarum in puella quadam observave rat.”

DE HÆEN ‡, in libello de inoculatione, recur-

* WERLHOFFI, Opera Medica, part. i. p. 477. edit.
WICHMANNO.

† VOGEL, Manuale Praxeos Medicæ, tom. iii. p. 12. et seq.

‡ DE HÆEN, Refutation de l'Inoculation, p. 31. et seq.

sus variolarum nonnullos casus collegit, et edidit quoque excerpta ex octodecim auctoribus, qui suæ opinionis fuerunt. Unus casuum quos dedit sub observatione venit; alter illi a Domino MACKEVEN KELLY communicatus est. Tertius a chirurgo perito; et quartus casus est hominis, qui ter variolis correptus fuit.

Præter hos in altero libro * narrat, unum casum variolarum post inoculationem, et quatuor qui post variolas naturales, acciderunt.

HENSLER †, sententiam plerumque receptam fuisse scribit, ut aliquis non sæpius vice simplice variolis corripi possit, deinde nonnullos casus dat, ut fallaciam ejus opinionis probaret. *Primus* est casus nutricis, quæ ex sua infante contagionem secundo tempore recepit, pustulæ “suppurrarent rite.” *Secundus* fœminæ quæ ex ejus filio contagionem recepit, postquam tempore priore morbum subiverat; pustulæ apparuerunt, “1, in facie, in digitis 3, in pedibus 2 magnas, cum “latissimo halone inflammato, quæ multum pu-

* DE HÆEN, Ratio Medendi, tom. ii. p. 119.

† HENSLER, De Morbo Varioloso, p. 77. et seq.

“ ris mali moris fuderunt, per septiduum floruerunt, et simul ac pus effluxerat, nono denuo sunt repletæ.” *Tertius* puellæ quæ in mense Januarii MDCCLXII, morbum transierat, et die 25to Februarii, “ denuo ægrotat et febrit; d. 26. lecto affigitur, d. 27. prænunciæ papulæ efflorescunt, d. 28. ubitum erumpunt. Bene quidem elevantur: sed exiguæ sunt, non multum suppurantes, et eschara brevi contracta, decidunt.” *Quartus* et *Quintus* pueri, qui morbo primo in Januario MDCCLXI, correptus est, et in Aprili sequente eundem morbum expertus est: “ D. 11. et 12. febriit; d. 13. erumpunt papulæ, et d. 14, plures; sed multæ iterum evanuerunt. Manebant quædam in manibus et facie, plures sub capillitio. Illæ d. 17, erant liquore purulento flavescente repletæ, et halone levi cinctæ; aliæ jam exsiccabantur: hæ vero in vertice puris spissi plenæ erant, flaventes, et figuram non multum convexam eas exacte referebant, quæ in dorso et thorace florere solent. Exsiccabantur dein, licet solito lentius, et puer opime valuit.” Idem contigit fratri. *Sextus*, Puer quarto anno post inoculationem, “ e commercii cum sorore variolis insititiis laborante,

“ miasma denuo suscepit.” Papulæ “ sparsæ erant per totum corpus, numerum centenarium tamen non multum superabant. Parvæ erant, notabiliter elevatae, colliculo suo rubro insidentes. Non adeo multum puris concipiebant: sed fastigia alba brevi exsiccabantur; detumescebat colliculus et furfurum instar reliquiae defluebant; d. 28. exsiccatæ fere omnes: at nova progenies propul lulabat, et medio m. mart. tertia, ut ante sine incommodo idem eodem modo accedit fratri, sed pauciores fuere et non nisi una eruptio.” *Septimus* filiæ, quæ post variolas benignissimas ante quadriennum subierat iterum, morbo correpta est. Febris levis fuit, tertia die ab initio “ pa-
“ pulæ in facie efflorescunt exiles: in corpore
“ licet quoque parvæ, attamen, paulo majores et
“ levi cum ambitu rubello;” d. 4. “ parum ele-
“ vabantur et sero subalbente scatebant;” d. 5.
“ jam arescere incipiunt;” d. 6. “ plurimæ sic-
“ cæ;” d. 7. “ exiguae escharæ seu potius squamæ
“ defluunt.” Quoque seipsum bis variolas trans-
sivisse narrat, sed secundam tentationem levem
et propitiam fuisse.

Perfectione scriptorum eorum qui medicinam in *Belgia* et in *Dania* exercuerunt, quibusdam

illorum ut variolæ visæ sint eundem secundo aut etiam tertio tempore affecisse invenimus.

DIEMERBROECK * in sua narratione variolarum epidemicarum qui in Ultrajecto mense Julii et Augusti MDCXL apparuerunt, dicit, “Varios “hoc tempore vidimus qui cum variolas copio-“sissimas habuissent, iis sanati paulo post in idem “malum reciderunt, atque illis ista secunda vice, “sæpe multo majore copia erumperunt, quam “prima; imo aliqui visi sunt, qui intra spatium “sex mensium ter copiosissimis variolis labora-“runt, quod alioque raro solet contingere, im-“primis tam parvo temporis spatio.” Etiam in pagina 295. casus quatuor infantum ISACI SCHÖRER dat, qui morbum transiverunt. Cum natu majore incipit, et cum natu minore terminat: deinde iidem infantes paulo post eodem morbo, qui similem progressum habuit, scilicet a majore ad minorem natum correpti sunt.

FORESTUS † relationem similis epidemici dat,

* DIEMERBRŒCK, Oper. Omnia, Hist. i. p. 290.

† FORESTI Opera Omnia, tom. i. lib. vi. obs. lxiii. et lxiv. p. 244.

in quo fere eadem res observata fuit, “ anno
 “ MDLXII a mense Octobri per totam fere hye-
 “ mem, deinde MDLXIII, per totam æstatem Del-
 “ phis contigit, in qua urbe Bataviæ admodum
 “ celebri non solum pueri natuqe grandiores,
 “ verum etiam seniores aliqui, qui olim jam va-
 “ riolas et morbillos passi erant, rursus in eas-
 “ dem pustulas inciderunt: quod idem contigisse
 “ scribit Amatus anno MDLI, quo tempore etiam,
 “ ut prius dictum est, idem malum Alcmariæ po-
 “ pulariter grassabatur.” Præterea mentionem
 casus sui filii facit, qui, “ cum bis variolas ha-
 “ buisset, in morbillos incidit mense Septembre,
 “ ac febre corripi cœpit.”

MEZA *, in sua historia variolarum epidemi-
 carum anno MDCLXXXVI Helsingoræ grassan-
 tium, dicit, “ Vidua tantum inter omnes paren-
 “ tes quorum gnati mihi curandi tradibantur,
 “ constantissime affirmabat ejus filiam sex annos
 “ natam, olim jam morbo laborasse. Quod et
 “ VAN DOEVEREN aliqui, nec non noster A-

* Actæ Regiæ Societatis Medicæ Harniensis, vol. iii,
 p. 66.

" BILDGUARD DE BUCHWALD cum cæteris ob-
" servasse, perhibent?"

Quando morbus varioloides in Europa appa-
ruit, *Britannia* nondiu ex ejus stragibus immu-
nitatem habuit; mentionem de eo a scriptoribus
Anglicis factam esse simul ac anno MCXLVII in-
venimus; et JOANNES DE GADDESSEN *, qui
ad finem seculi decimi tertii floruit, evidenter in-
tellixisse quosdam aliquando morbi secundam ten-
tationem subiisse videtur. Nam quum dicit fluxum
menstrualem hujus morbi causam esse, his verbis
loquitur, " Et contingit aliquando ut homo va-
" riolatur bis, quando prima vice non totus expel-
" litur." Ex hoc tempore usque ad introductio-
nem inoculationis, circiter anno MDCCXXI, ve-
risimile est aliquos medicos reversionem morbi ad-
misisse, saltem pauca ad sententiam diversam sus-
tinendam proposuerunt. Post annum MDCCXXI
multi scriptores aliquem posse corripi variolis
plus vice simplice negaverunt, dum ab aliis quæ-
dam exempla morbi bis accidentis narrantur.

+ GADDESSEN, Rosa Anglica, p. 40.

MAITLAND * (qui primum attentionem medicorum Anglorum ad consuetudinem arte hunc morbum excitandi, direxit) casum Honorabilis Domini GEORGII PERCIVAL narrat, qui, post tres hebdomadas ex tempore inoculationis, impetum variolarum, cum leni febre subiit, multæ rubræ papulæ cum vesiculis aquosis ad summum apparuerunt, quæ a Domino ARNAUD et Doctore MONRO esse varicellæ creditæ sunt; sed per cursum morbi Doctor MONRO hunc morbum exemplum fuisse duorum morborum in eodem conjunctorum credere addictus est.

KIRKPATRICK † trium exemplorum morbi redditus mentionem facit. *Primum* est casus nutricis, ab Domino SAMUEL DWIGHT narratus, quæ bis variolas confluentes passa est; et tertio morbi impetu mortem obiit. *Secundum*, adolescentulæ, quæ variolis ex fratre et sorore inoculatis contractis, mortua est, viginti quatuor annis peractis postquam ipsa eam operationem

* MAITLAND, Account of inoculating the Small Pox Vindicated, p. 46.

† KIRKPATRICK, Analysis of Inoculation, p. 38. et seq.

subiisset. *Tertium variolarum confluentium*, quæ post duos annos ab inoculatione accesserunt.

Dominus BRYCE * postquam nonnullos casus variolarum secundariarum transcripsisset, dicit, “There are now before me nearly one hundred cases on record, in which the human constitution has suffered more or less severely from a second attack of small-pox; in many of these the attack has proved fatal.”

“In anno MDCCXIV, quum variolæ epidemicæ grassatæ sunt in Forfora †, nonnulli qui priore tempore per eum morbum transierant, æque ac qui vaccinati fuerunt, eruptione quæ habita fuit pro variolis correpti sunt. Epidemicæ valente, observatum est, febrem cum eruptione non solum vaccinatos invadere, sed et etiam qui antea variolas fortuito contraxerant, vel inoculationem passi. In his non secus atque in vaccinatis, morbus lenior et gravior tentare solitus, et una eui interfui non dubium est quin bis variola laboravit.”

* BRYCE on the Cow-Pox. Appendix, No. 6. p. 30.
edit. 2.

† ADAMS de Variola et Vaccina, pag. 41.

Quadraginta duo casus reversionis variolarum in tomis diversis Diarii Medici et Physici Londonensis recordantur, quorum viginti sex ab Domino KING * attestantur. *Primus* est casus fœminæ quæ quinque menses nata, morbo in modo gravissimo afflita est; et iterum impetum secundum morbi, quoque gravis, post annos viginti duos subiit. Pustulæ circiter nonam diem mutare inceperunt. *Secundus*, variolarum quæ quendam aggressæ sunt, qui hunc morbum antea subiisse creditus est. *Tertius* casus post inoculationem accedit, quæ idoneum affectum habuisse visa est. *Quartus*, variolarum post inoculationem octodecim annis peractis. *Quintus* inoculationis secundariæ, quæ morbum confluentem genuit. *Sextus*, Domini FEWSTER inoculatoris celebris, qui secunda tentatione variolarum ob puncturam scalpelli veneno variolarum imbuti correptus est, postquam morbum ante multos annos habuisset. *Septimus*, Domini SCOTT qui inoculatus fuit, et eruptionem confluentem habuit; nihilominus morbum ite-

* London Medical and Physical Journal, vol. 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 37.

rum, subiit contractum in modo naturali annos circiter viginti post. *Octavus*, pueri qui morbum post annum a tempore inoculationis contraxit, quam secuta est eruptio copiosa. *Nonus*, morbi fortuiti post inoculationem accidentis. *Decimus*, secundæ temptationis morbi' naturalis. *Undecimus*, Dominæ THOMSON, quæ tempore secundo variolis confluentissimis laboravit, vestigia cuius insignia remanserunt. *Duodecimus* et *Decimus tertius*, post variolarum inoculationem acciderunt, quæ in eodem casu bis perfici postulavit, antea idonea indicia exhibuit. *Decimus quartus*, infantis Comitis WESTMEATH, qui inoculatus fuit ante duos annos et incolumis fuisse dictus est, cum variolis confluentibus correptus est, et, toto corpore pustulis variolarum tecto, luctuosum spectaculum exhibuit. *Decimus quintus*, variolarum secundariarum in quibus æque ac in temptatione priore æger oculis captus est. *Decimus sextus*, ex contagione naturali post inoculationem ortus est, et pergravis fuit. *Decimus septimus*, variolarum lenium post inoculationem. *Decimus octavus*, infantis Doctoris CROFT, qui morbo acerbo implicitus est, post inoculationem, cui etiam eruptio copiosa super-

venit. *Decimus nonus*, impetus acerbi secundarii post inoculationem, quæ pustulas sex exhibuit. *Vigesimus*, variolarum mitium circiter tres annos post inoculationem quæ bene respondit. *Vigesimus primus*, eruptionis levis pustularum, quæ leni febre comitata est; æger tenera ætate variolas habuerat, quæ foveolas reliquerunt. *Vigesimus secundus*, est casus proximo subsimilis, post inoculationem accidens, cum febre symptomatica. *Vigesimus tertius*, variolarum post inoculationem, cuius indicia subsequentia suo medico satisfecerunt. *Vigesimus quartus*, est secundus impetus variolarum, qui fatalis factus est. *Vigesimus quintus*, variolarum circiter duas hebdomadas post perfectam inoculationem accidentium. *Vigesimus sextus*, impetus pergravis secundi, postquam duas pustulas variolosas super genu annis circiter tribus antea a contractu habuisset, et quæ cum febre et cynanche tonsillari comitatæ sunt. *Vigesimus septimus*, variolæ secundariæ acerbæ; impetus primus etiam acerbus fuit. *Vigesimus octavus*, post inoculationem accidit, quæ operatio circiter octodecim pustulas produxit; hic impetus multas foveolas reliquit. *Vigesimus nonus*, fœminæ nigræ quæ bis vario-

lam habuerat, cuius notæ insigne remanserunt, nihilominus tertio impetu mortua est. Dixit tertiam tentationem variolæ semper in India fatalem fore. *Trigesimus*, variolæ quæ post inoculationem ordinatam incidit. *Trigesimus primus*, fœminæ quæ bis morbum transierat et in ambobus temptationibus oculis capta est. *Trigesimus secundus*, impetus gravis variolæ post inoculationem, quæ operatio signa acerba excitavit, ut ægra per dies tres oculis capta est. *Trigesimus tertius*, in fœmina reversionis variolæ in modo multum mitiore, quam cum infantem nutriebat, qui morbo laborabat, contraxit. *Trigesimus quartus et quintus*, post inoculationem quæ in quacunque perfecte satisfecit acciderunt. *Trigesimus sextus*, impetus secundarii variolæ in fœmina, dum infantem nutriebat morbo afflictum. *Trigesimus septimus, octavus, nonus, et quadrigesimus*, SUB CAPITE NUNTII narrantur; duo illorum post inoculationem, et alii post morbum naturalem, evenerunt. *Quadrigesimus primus et secundus*, in narratione Institutionis Vaccinæ Generalis, anno MDCCCXI, traduntur. Unus post inoculationem, et alter post variolam naturalem fuit.

Tres casus variolæ secundariæ in **Diario Medico et Chirurgico Edinensi** referuntur *. **Primus**, variolæ gravis post intervallum duodecim annorum ab primo impetu ; morbus in ejus cursu et in continuatione ordinatus fuit. **Secundus**, variolæ quæ homini accedit, qui signa prioris temptationis morbi tulit : Pustulæ circiter octavam diem siccare inceperunt. **Tertius**, ægri qui variolam bene distinctam habuisset, post eum morbum antea subierat.

Casus Domini LANGFORD a Domino WITHERS † narratus, exemplum insigne recursus variolarum præbet. Iste vir quando mensem natus variolam habuit ; cuius vestigia conspicua remanserunt ; attamen iterum hoc morbo, qui fatalis fuit, correptus est.

Casus variolæ secundariæ Doctore BATEMAN ‡, traditur : ægra impetu morbi secundario correpta est, dum nutriebat infantem variola la-

* Edinburgh Medical and Surgical Journal, vols. 3.
6. and 14.

† Memoirs of the Medical Society of London, vol. iv.
p. 314.

‡ Medico-Chirurgical Transactions, vol. ii. p. 32.

borantem, quem morbum veram variolam esse probavit pus capiendo ab illa die octava, quod in juvenis brachium insertum est, dum virus ex ægro in Nosocomio Varioloso in alterum brachium insertum est; ambæ operationes pustulas plenas eodem tempore protulerunt. Ex his rebus Doctor BATEMAN hanc variolam veram fuisse concludit; nam si varicella fuisset, una ex eruptionibus interrupta fuisset; dum altera ejus cursum transiisset. Hæc variolam habuerat tenera ætate, in modo ita pergravi, ut de vita desperatum sit; capta oculis est per dies sex. Deinde de casu altero mentionem facit, qui Doctori LAIRD accedit; tum ex variis auctoribus ejusdem generis exempla dat, et tum concludere pergit eo modo; “Enough, however, has probably been stated, to render the occasional recurrence of small-pox unquestionable; and at least, to make us pause, before we reject the evidence which may come before us on the subject; and to lead us to a careful and accurate examination, where appearances, tending to invalidate the received dogmas, occur.”

Variola epidemica quæ in variis partibus Scotiaæ nuper grassata est, et ad hunc diem usque

in Edinburgo, occasiones haud paucos ægros videndi afflictos eo morbo per tempus secundum nobis præbuit; quidem eorum casuum jam edidi fuerunt in lucem. Dominus HENNEN *, in sua narratione exacta morborum qui nuper in Nosocomiis Militaribus Edinensibus, cum eruptione cutis apparuerunt, quatuor casus refert; duos post inoculationem, et duos post variolas naturales. Idem auctor etiam dicit ut præfectus equitatum nunc in vicinitate, alterum exemplum vivens morbi secundum tempus accidentis præbet.

Doctor MONRO † quoque exempla quædam redditus variolæ narravit. Primo casum qui post inoculationem occurrebat, scriptis tradidit; deinde dixit: “I have lately had occasion to meet with four persons, who had had small-pox twice in the progress of life, and three of these were very much marked by the first attack of the disease.”

* Edinburgh Medical and Surgical Journal, vol. xiv.
p. 418. et seq.

† MONRO's Observations on the different Kinds of Small Pox., p. 84.

Doctor THOMSON me certiorem facit, se quadraginta casus recursionis variolæ vidisse ab Junio MDCCCXVIII, et triginta alios sibi communicatos fuisse a variis medicis. Opinio, quam ille nuper formavit, ut variola, et varicella, ex eadem contagione oriantur*, si vera sit, reversiōnem prioris morbi non tam raram fuisse ut generaliter credita est, probabit.

Dominus CHRISTIE, in literis ad JACOBUM MACGREGOR Eq. dicit: "Since my return to England, I have only met with two well authenticated cases of secondary small-pox; the one in a baker's apprentice, pointed out to me by Dr JENNER, and another in a Mrs Williams, who, after being much marked with small-pox, caught the disease a second time in 1816, from nursing her child, who died of confluent small-pox."

Nunc, cum auctoritate tam multorum auctorum, et cum notitia casuum fere trecentorum ægrorum, (perplurimi e quibus in auctoribus de hoc morbo inveniri possunt) qui, bis aut saepius, variola laborarunt, credimus nobis liceat opus

* Edinburgh Medical and Surgical Journal, vol. 14.
p. 518.

nostrum ad finem ducere in verbis BURSERII * :
“ A vero etiam aberrant qui existimant, in no-
“ bis, postquam semel variolis genuinis perfuncti
“ fuerimus, destrui habitatem, sive diathesim
“ corporis, qua uti dictum est (CLXI.) ad eas re-
“ cipiendas idonei aptique reddimur. Nam cer-
“ tissimis ex factis, observationibusque medico-
“ rum probatae fidei, et summæ auctoritatis, cog-
“ nitum est, non paucos, qui jam spontaneas, et
“ naturales, aut insititias, artificialesque, et qui-
“ dem veras et legitimas pertulissent, secundo
“ et tertio in easdem incidisse. Atque hinc pla-
“ num perspicuumque fit, diathesim illam non
“ semper omnino post toleratas semel variolas in
“ nobis aboleri, aut certe iterum suscitari quando-
“ que posse.”

* BURSERII Instit. Med. Pract. ictom. ii. p. 100. 4to.

FINIS.

