

Essai thérapeutique du thigénoïl "Roche" combinaison organique du soufre (10 0/0) : préparée par Synthèse.

Contributors

University of Glasgow. Library

Publication/Creation

Paris : F. Hoffmann, 1902.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/etacja2e>

Provider

University of Glasgow

License and attribution


This material has been provided by This material has been provided by The University of Glasgow Library. The original may be consulted at The University of Glasgow Library. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>





* P 83 - 1903
ESSAI THÉRAPEUTIQUE

DU

THIGÉNOL "Roche"

COMBINAISON ORGANIQUE

du Soufre (10 0/0)

Préparée par Synthèse



F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co

7, RUE SAINT-CLAUDE, 7

PARIS (III^e)

GLASGOW
UNIVERSITY
LIBRARY

Thigénol Roche

Combinaison organique du **SOUFRE**

Plus actif que l'**ICHTYOL**



Le **THIGÉNOL** contient **10 % SOUFRE**
L'**ICHTYOL** — **8 % SOUFRE**

*Pour éviter les
Contrefaçons, Exiger
sur chaque bidon le
plomb de garantie.*

PROPRIÉTÉS :
Liquide brun, visqueux

**INODORE
INSIPIDE
SOLUBLE EAU**

POSOLOGIE :

S'emploie comme l'Ichtyol,
mais est administré à
l'intérieur plus facilement
que ce dernier.

*Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent rapidement
par simple lavage à l'eau.*

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o, 7, Rue St-Claude, PARIS (III^e).

ESSAI THÉRAPEUTIQUE

DU

THIGÉNOL "Roche"

COMBINAISON ORGANIQUE

du Soufre (10 0/0)

Préparée par Synthèse



F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o

7, RUE SAINT-CLAUDE, 7

PARIS (III^e)

Messieurs,

Les quelques observations que j'ai recueillies dans mon service sur l'action du Thigénol "Roche" me donnent la certitude que ce médicament sera accueilli favorablement en dermatologie.

Le Thigénol "Roche" présente de grands avantages sur les préparations similaires employées jusqu'à présent. Il est inodore, il se dessèche sur la peau en formant une couche non adhérente, les taches sur le linge disparaissent immédiatement par simple lavage à l'eau. Parmi ses propriétés thérapeutiques, l'action antiprurigineuse apparaît au premier plan; il calme les démangeaisons, il est résolutif.

Depuis sept mois, j'ai substitué le Thigénol "Roche" à l'Ichtyol, dans mon service, et je n'ai pas été obligé de revenir une seule fois à ce dernier.

Agréés, Messieurs, mes salutations sincères.

Prof^r JAQUET.

MM. les Médecins qui changeront d'adresse sont priés de vouloir bien indiquer leur nouveau domicile, de cette façon ils recevront régulièrement les informations nouvelles de nos bureaux scientifiques.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o

7, rue Saint-Claude, 7

PARIS (III^e)

Das folgende Experiment ist für die Zwecke der
Messung des Widerstandes eines Drahtes
bestimmt. Die Drahtlänge ist 100 cm und
die Drahtdicke ist 0,5 mm. Der Draht ist
an einem Ende an einen Stromkreis angeschlossen,
an dem ein Amperemeter und ein Voltmeter
angeschlossen sind. Die Drahttemperatur ist
auf 20°C gehalten.

Die Drahtlänge ist 100 cm und die Drahtdicke
ist 0,5 mm. Der Draht ist an einem Ende an
einen Stromkreis angeschlossen, an dem ein
Amperemeter und ein Voltmeter angeschlossen
sind.

Die Drahttemperatur ist auf 20°C gehalten.
Die Drahtlänge ist 100 cm und die Drahtdicke
ist 0,5 mm. Der Draht ist an einem Ende an
einen Stromkreis angeschlossen, an dem ein
Amperemeter und ein Voltmeter angeschlossen
sind.

Die Drahttemperatur ist auf 20°C gehalten.
Die Drahtlänge ist 100 cm und die Drahtdicke
ist 0,5 mm. Der Draht ist an einem Ende an
einen Stromkreis angeschlossen, an dem ein
Amperemeter und ein Voltmeter angeschlossen
sind.

Die Drahttemperatur ist auf 20°C gehalten.
Die Drahtlänge ist 100 cm und die Drahtdicke
ist 0,5 mm. Der Draht ist an einem Ende an
einen Stromkreis angeschlossen, an dem ein
Amperemeter und ein Voltmeter angeschlossen
sind.

Die Drahttemperatur ist auf 20°C gehalten.
Die Drahtlänge ist 100 cm und die Drahtdicke
ist 0,5 mm. Der Draht ist an einem Ende an
einen Stromkreis angeschlossen, an dem ein
Amperemeter und ein Voltmeter angeschlossen
sind.

Die Drahttemperatur ist auf 20°C gehalten.
Die Drahtlänge ist 100 cm und die Drahtdicke
ist 0,5 mm. Der Draht ist an einem Ende an
einen Stromkreis angeschlossen, an dem ein
Amperemeter und ein Voltmeter angeschlossen
sind.

Die Drahttemperatur ist auf 20°C gehalten.
Die Drahtlänge ist 100 cm und die Drahtdicke
ist 0,5 mm. Der Draht ist an einem Ende an
einen Stromkreis angeschlossen, an dem ein
Amperemeter und ein Voltmeter angeschlossen
sind.

Die Drahttemperatur ist auf 20°C gehalten.
Die Drahtlänge ist 100 cm und die Drahtdicke
ist 0,5 mm. Der Draht ist an einem Ende an
einen Stromkreis angeschlossen, an dem ein
Amperemeter und ein Voltmeter angeschlossen
sind.

Die Drahttemperatur ist auf 20°C gehalten.
Die Drahtlänge ist 100 cm und die Drahtdicke
ist 0,5 mm. Der Draht ist an einem Ende an
einen Stromkreis angeschlossen, an dem ein
Amperemeter und ein Voltmeter angeschlossen
sind.

DU THIGÉNOL “ Roche ”

Le Thigénol “ Roche ” est une préparation synthétique de soufre qui a déjà acquis une place définitive dans la Thérapeutique en raison de son action physiologique, tant comme succédané de l'ichtyol que pour ses propriétés particulières.

Le Thigénol “ Roche ” est une huile sulfitée sodique sulfurée, obtenue par synthèse, ou bien encore, le sel sodique d'un acide sulfoné de la série grasse combiné au soufre dans la proportion de 10 pour 100. Le Thigénol “ Roche ” est naturellement plus actif que l'ichtyol qui, d'après les recherches du Dr O. Helmer (*Virchow's Archiv*, vol. 135, p. 485), ne contient que 8,8 pour 100 de soufre.

Le Thigénol “ Roche ” est un liquide brun foncé, d'une consistance sirupeuse, inodore, presque insipide.

Il se dissout en toute proportion, sans aucune altération, dans l'eau, l'alcool étendu et la glycérine en donnant des liquides d'une réaction alcaline extrêmement faible.

La composition chimique du Thigénol “ Roche ” est identique et stable.

Le Thigénol “ Roche ” possède sur les préparations à base de soufre, couramment employées aujourd'hui, les avantages suivants :

- 1° *Il est inodore et presque insipide ;*
- 2° *Il se dessèche très rapidement sur la peau en formant une couche mince, résistante et souple ;*
- 3° *Les traces de Thigénol “ Roche ” sur la peau, disparaissent par simple lavage à l'eau ;*

4° Les taches de Thigénol “ Roche ” sur le linge, disparaissent également par simple lavage à l'eau ;

5° Le Thigénol “ Roche ” n'a pas d'action irritante, mais au contraire une action adoucissante, antiprurigineuse et analgésique ;

6° Le Thigénol “ Roche ” est moins coûteux que l'ichtyol, ce qui permet de l'employer dans la pratique médicale des classes peu fortunées.

A l'extérieur, le Thigénol “ Roche ” agit comme vaso-constricteur, par conséquent comme anémiant local, antiphlogistique, résolutif et desséchant. Il possède des propriétés kératoplastiques, antiseptiques et surtout antiparasitaires ; il a en outre une action calmante sur le prurit.

A l'intérieur, il exerce une action favorable sur la circulation des vaisseaux cutanés en les contractant. Il diminue les processus putréfactifs de l'intestin en conservant le péristaltisme.

Les propriétés du Thigénol “ Roche ” ont donné par leur application dans la pratique les meilleurs résultats.

I. — Maladies de la Peau

a) Eczémas aigus et chroniques, dans leurs diverses formes et localisations

Tous les auteurs qui l'ont employé reconnaissent au Thigénol “ Roche ” le pouvoir de calmer les démangeaisons d'une façon remarquable et d'arrêter les infiltrations cutanées, comme l'avait déjà démontré M. le Professeur Jaquet.

Même dans les formes graves, l'humidité disparaît, la douleur s'atténue sensiblement, puis l'amélioration progresse rapidement, la peau devient souple, onctueuse, et reprend dans un temps très court son aspect normal. Lorsqu'il n'existe que de la rougeur, sans forte tuméfaction de la peau, on recommande de tamponner ou de lotionner la partie malade avec une solution alcoolique de Thigénol

1. Thigénol Roche.....	5 gr.
Alcool.....	100 »

ou bien de badigonner une ou deux fois par jour avec une solution aqueuse qui formera sur la partie malade, en se desséchant, une mince pellicule souple et résistante.

- | | |
|------------------------|-------|
| 2. Thigénol Roche..... | 5 gr. |
| Eau distillée..... | 25 » |

Dans les cas de tuméfaction intense, on appliquera des compresses de la solution précédente que l'on renouvelera fréquemment. Pendant la nuit, on pourra employer pour plus de commodité la pommade suivante :

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 3. Thigénol Roche..... | 1 gr. |
| Onguent simple ou lanoline..... | 25 » |

Dans l'eczéma vésiculeux, le Thigénol "Roche" diminue l'inflammation et amène la dessiccation des vésicules.

On emploiera les compresses comme dans le cas des eczémas humides où la propriété kératoplastique du médicament joue encore un rôle particulier.

Dans la période de formation des croûtes et de la desquamation, les pommades suivantes seront particulièrement employées :

- | | |
|------------------------|-------|
| 4. Thigénol Roche..... | 5 gr. |
| Onguent diachylum..... | 50 » |

F. S. A. une pommade.

- | | |
|---------------------------|----------|
| 5. Thigénol Roche..... | 4 gr. |
| Oxyde de zinc..... | } àà 3 » |
| Poudre d'amidon..... | |
| Glycérine..... | } àà 1 » |
| Eau distillée..... | |
| Onguent de glycérine..... | 8 » |

F. S. A. une pâte.

Parmi les eczémas des diverses régions du corps, nous signalerons surtout ceux de la face, dans lesquels le Thigénol a donné de très bons résultats, soit pur, soit mélangé intimement à la pâte d'oxyde de zinc de Lassar.

- | | |
|----------------------------|--------|
| 6. Thigénol Roche pur..... | 20 gr. |
|----------------------------|--------|
- En applications externes.

7. Thigénol.....	10 gr.
Oxyde de zinc.....	} àà 12 »
Amidon.....	
Vaseline jaune.....	q. s. pour 50 gr.

Pour usage externe.

Dans les eczémas diffus de la jambe, on nettoie complètement les points eczémateux avec de l'ouate, puis on les badigeonne de Thigénol pur à l'aide d'un pinceau souple, par dessus, on applique une mince couche de gaze saupoudrée d'amidon et on fait un pansement compressif. Ce pansement reste appliqué deux ou trois jours et la guérison complète, même dans les cas graves, a lieu en cinq ou six semaines, sans aucun phénomène accessoire désagréable et sans que le malade soit dérangé de ses occupations. Tous les patients font particulièrement remarquer que la démangeaison disparaît complètement dès le premier pansement. A la place du pansement indiqué, on peut employer la pommade suivante :

8. Thigénol Roche.....	20 gr.
Poudre d'amidon.....	10 »
Vaseline.....	30 »

F. S. A. une pommade.

Dans les eczémas des paupières, la formule suivante rend de très bons services :

9. Thigénol Roche.....	} àà 3 gr.
Oxyde de zinc.....	
Gélatine.....	3 »
Eau distillée.....	} àà 15 »
Glycérine.....	

Chauffer avant l'emploi.

En même temps que le traitement local, on recommande de donner le Thigénol à l'intérieur, car ce dernier agit favorablement sur l'eczéma par sa propriété constrictive sur les vaisseaux cutanés. Après la guérison, on pourra continuer le traitement intérieur pour diminuer la prédisposition aux eczémas et empêcher les récurrences. On prescrira aux adultes trente gouttes trois fois par jour, aux enfants dix gouttes trois fois par jour de la solution 1 : 2 (voir la formule n° 34).

b) *Urticaire*. — Le Thigénol exerce dans ce cas son action éminemment antiprurigineuse. On badigeonne avec du Thigénol pur ou bien on emploie la solution ou la pommade suivantes :

10. Thigénol Roche.....	20 gr.
Eau distillée.....	} àà 50 »
Alcool rectifié.....	
Us. ext.	

11. Thigénol Roche.....	5 gr.
Oxyde de zinc.....	2 »
Vaseline.....	5 »
Onguent de glycérine.....	50 »
En badigeonnages.	

L'urticaire étant déterminé souvent par des fermentations intestinales anormales, on recommande en même temps que le traitement local, l'emploi du Thigénol à l'intérieur (comme dans l'eczéma).

c) Le prurit de la peau ou de la vulve est traité efficacement par des badigeonnages de Thigénol. Dans le prurit anal, on emploie la pommade au Thigénol à 1/5^e, ou des suppositoires

12. Thigénol Roche.....	0 gr. 20
Beurre de cacao.....	q. s. pour 1 suppos.
F. S. A. n° 10. Introduire 1 suppositoire matin et soir.	

Les effets des piqûres d'insectes, souvent si désagréables, sont évités par l'application d'une pommade au Thigénol à 50 pour 100.

d) *Acné vulgaire et rosacée*. — En raison de sa grande richesse en soufre, le Thigénol a été employé avec succès à la place des pommades ou des pâtes soufrées usitées de tout temps. Le savon à 10 pour 100 de Thigénol est inodore ; il rend la peau souple et onctueuse. Les solutions concentrées de Thigénol peuvent le remplacer (voir formule n° 2) :

13. Thigénol Roche.....	5 gr.
Glycérine.....	10 »
Alcool.....	20 »
Pour usage externe.	

Le Thigénol peut également être employé associé à l'acide salicylique :

14. Thigénol Roche.....	}	à à 10 gr.
Eau distillée.....		
Alcool.....		
Acide salicylique.....		

En badigeonnages.

Dans les cas où les nodules résistent au traitement, la préparation suivante rend de bons services :

15. Sous-nitrate de bismuth.....	}	à à 2 gr.
Précipité blanc.....		
Thigénol Roche.....		
Vaseline.....		

F. S. A. un onguent.

Dans l'*acné rosacée*, la face est lavée le soir avec de l'eau ou une solution boriquée très chaude, essuyée, puis badigeonnée avec le mélange suivant qu'on laisse sécher :

17. Thigénol Roche.....	5 gr.
Résorcine.....	1 »
Lanoline.....	25 »
Huile d'olive.....	10 »
Eau distillée.....	50 »

Pour application externe.

Dans la *couperose opiniâtre*, on badigeonne pendant trois jours de suite les pustules scarifiées avec la solution suivante :

18. Résorcine.....	1 gr.
Thigénol Roche.....	2 »
Collodion.....	30 »

Usage externe.

e) Les *brûlures* constituent des lésions auxquelles s'adapte tout particulièrement le traitement au Thigénol, qui manifeste son action analgésique aussitôt après l'application. On badigeonne de Thigénol pur les régions brûlées, immédiatement après l'accident, ou bien on applique le liniment suivant :

19. Thigénol Roche.....	10 gr.
Lanoline.....	20 »
Vaseline.....	30 »
Eau distillée.....	10 »

F. S. A. un liniment au Thigénol.

Dans les brûlures superficielles plus étendues, les compresses de la solution de Thigénol à 5 pour 100 conviennent très bien.

C'est ici qu'il faut mentionner le traitement des engelures, qui éprouvent une rapide amélioration grâce à l'action vaso-constrictive du Thigénol Roche. On emploie à cet effet la préparation suivante :

20. Thigénol Roche.....	10 gr.
Collodion élastique.....	20 »

Pour usage externe.

Ou on applique la pommade suivante :

22. Thigénol Roche.....	3 gr.
Pommade à l'oxyde de zinc benzoïnée.	20 »

F. S. A. une pommade.

On obtient aussi de très bons résultats avec les bains locaux (voir plus loin) pris à une température élevée, une à deux fois par jour, pendant dix à quinze minutes. Le soir, on fait un massage avec le mélange n° 17 dont on recouvre pendant la nuit les régions malades.

Le Thigénol "Roche" est un antiparasitaire puissant.

Gale. — L'absence d'odeur du Thigénol "Roche" est particulièrement appréciée dans le traitement de cette maladie.

Le patient est frictionné d'abord au savon vert, une heure après, il prend un bain et est frotté ensuite sur tout le corps avec du Thigénol. Le soir il prend un second bain suivi d'une deuxième friction de Thigénol. De nombreux malades soumis à ce traitement ont été immédiatement guéris.

Les avantages de ce procédé sont : l'absence de démangeaison, l'absence d'odeur du médicament, et la possibilité d'un traitement ambulatoire.

h) Le *Favus* est traité de la façon suivante :

Après avoir enlevé les croûtes et les godets, et après épilation des parties malades, on badigeonne avec la mixture suivante :

23. Thigénol Roche	10 gr.
Acide salicylique	3 »
Glycérine.....	} àà 50 »
Alcool.....	

Pour us. ext.

i) La *Trichophytie du cuir chevelu* est traitée en frictionnant le cuir chevelu rasé avec la pommade suivante :

24. Thigénol Roche	} àà 5 gr.
Chrysarobine	
Acide salicylique	2 »
Lanoline	30 »
Vaseline àà	100 »

F. S. A. une pommade.

k) *Erysipèle*. — On badigeonne les parties malades jusqu'à deux travers de doigt au-delà des limites de la rougeur, avec le Thigénol pur ou le collodion au Thigénol, deux ou trois fois par jour (form. n° 20), afin d'exercer une plus forte compression sur la peau, et on applique par dessus des compresses froides. Le traitement par le Thigénol peut très bien se combiner avec le traitement de l'alcool recommandé dans ces derniers temps, en appliquant des compresses imbibées d'une solution d'une ou deux parties de Thigénol pour dix d'alcool, compresses qu'on recouvre d'un tissu imperméable perforé.

l) *Furonculose*. — On peut faire avorter de petits furoncles au début en les badigeonnant deux ou trois fois par jour avec une solution de Thigénol et d'alcool par parties égales. Au bout de quelques jours, il se produit déjà une diminution des phénomènes inflammatoires et des douleurs, et il en résulte la dessiccation et l'atrophie du foyer ainsi que la résorption des tissus déjà nécrosés. Les furoncles ouverts ont une évolution plus rapide et moins douloureuse sous l'action des badigeonnages de Thigénol pur ou de compresses imbibées d'une solution alcoolique de Thigénol à 20 pour 100, car l'inflammation et l'infiltration périphériques diminuent rapidement.

Pour régulariser la fonction intestinale qui aurait une importance-étiologique dans la furunculose, certains médecins donnent aussi le Thigénol à l'intérieur.

Un deuxième groupe considérable de maladies dans lequel le Thigénol a donné des résultats remarquables est constitué par :

II. — Le Rhumatisme

a) Dans le *rhumatisme articulaire aigu*, le Thigénol "Roche" en badigeonnages complète le traitement salicylé.

b) Dans le *rhumatisme articulaire chronique*, l'utilité du traitement sulfureux est universellement reconnue. Aussi le Thigénol

“Roche” par sa composition chimique est-il une des meilleures formes de ce traitement :

On l'emploie en frictions selon la formule suivante :

25. Thigénol Roche	} àà 20 gr.	
Glycérine		
Alcool.....		10 »

Pour usage externe.

et on recouvre les parties frictionnées avec de l'ouate.

Les bains locaux additionnés de Thigénol à la température de 35°, conviennent très bien aux affections rhumatismales et goutteuses. Comme le Thigénol trouble l'eau calcaire, on prépare d'abord un bain savonneux. A cet effet, on dissout dans une baignoire à peu près 50 grammes de savon, et on ajoute seulement ensuite le Thigénol. (Pour les bains locaux, 10 à 20 grammes ; pour un bain entier, 50 à 100 grammes.) L'action des bains de Thigénol et des frictions sur la résorption des exsudats articulaires même invétérés est frappante.

c) Dans le rhumatisme musculaire, on pratique deux fois par jour des frictions sur les parties atteintes avec le mélange suivant :

26. Thigénol Roche	} àà 10 gr.	
Chloroforme.....		
Alcool camphré.....		40 »

Pour frictions.

Le Thigénol “ Roche ” remplace agréablement le sulfure de potassium dans la préparation des bains sulfureux. Les bains sont absolument inodores et peuvent être pris dans une baignoire de métal.

Un troisième groupe de maladies, dans lesquelles le traitement au Thigénol trouve un champ d'applications est représenté par :

III. — Les affections gynécologiques

Catarrhe cervical, endométrite, para et périétrite, salpingite, ovarite, maladies des annexes.

Ici, les actions antiphlogistiques, résolutives et calmantes du Thigénol se font brillamment valoir. Le Thigénol possède sur l'ichthyol, si souvent employé dans ces maladies, les avantages incontestables de son absence d'odeur et d'irritation sur la

muqueuse vaginale. Si le col est suffisamment large, on porte directement le Thigénol dans la cavité utérine au moyen de la sonde de Playfair, ou bien on emploie le tampon vaginal que l'on imbibe avec la glycérine à 10,50 pour 100 de Thigénol; on fait, en outre, des onctions avec une pommade à 20 pour 100 de Thigénol.

27. Thigénol Roche.....	10 gr.
Lanoline	40 »

Ou on applique les ovules vaginaux suivants :

28. Thigénol Roche.....	0 gr. 30
Chlorydrate de morphine.....	} àà 0 » 01
Extrait de belladone.....	
Beurre de cacao.....	1 » 50

F. S. A. un ovule vaginal n° 10.

Introduire dans le vagin un ou deux ovules par jour.

Cette formule s'emploie particulièrement bien dans le traitement de la para et la périmérite.

Dans la vaginite blennorrhagique, on badigeonne le vagin avec de la glycérine à 50 pour 100 de Thigénol après avoir fait une large irrigation vaginale, et on applique un tampon de gaze aseptique. On enlève le tampon après deux ou trois jours, on fait une irrigation vaginale et on introduit ensuite tous les jours un tampon de gaze fortement imbibé de glycérine à 70 pour 100 de Thigénol.

L'action résolutive du Thigénol a été utilisée par beaucoup de médecins dans le traitement de :

IV. — La Pérityphlite

Dans les cas où les résidus de cette maladie subsistent sous forme d'exsudats dans la région cœcale, des badigeonnages avec la solution suivante amènent une résorption rapide des produits de l'inflammation.

29. Thigénol Roche.....	} àà 3 gr.
Huile de ricin	
Collodion.....	24 »

En badigeonnages trois fois par jour.

V. — Hémorroïdes et fissures de l'anus

Un badigeonnage des tumeurs hémorroïdales pratiqué deux fois par jour après un bain de siège froid, amène non seulement la disparition des démangeaisons et des douleurs, mais encore une diminution sensible du volume de ces tumeurs. Au lieu du Thigénol pur, on peut employer la pommade suivante :

30. Chrysarobine	0 gr. 60
Thigénol Roche.....	5 »
Vaseline.....	25 »

F. S. A. — Une pommade.

Sous l'action du traitement par le Thigénol, les fissures anales présentent une amélioration. On recouvre d'abord la fissure avec un tampon d'ouate trempé dans une solution de cocaïne à 5-10 pour 100, puis à l'aide d'une baguette de verre, on verse une ou deux gouttes de Thigénol pur. On renouvelle ce procédé tous les jours, ou bien on emploie les crayons suivants :

31. Thigénol Roche.....	5 gr.
Beurre de cacao.....	20 »

F. S. A. — 5 crayons.

Introduire matin et soir un demi-crayon après avoir été à la selle.

Sous l'action du traitement au Thigénol, la démangeaison douloureuse et le ténésme diminuent et la fissure guérit.

VI. — Fissures du sein

Sitôt après la première apparition d'une légère fissure, celle-ci est nettoyée à l'eau tiède après la tétée et badigonnée avec du Thigénol pur. Le Thigénol s'y dessèche en quelques minutes et forme une couche protectrice sous laquelle la fissure guérit. L'enfant n'est pas dérangé pendant les tétées, car le Thigénol ne sent rien et s'enlève facilement et complètement par un lavage.

Il y a d'autres indications de l'emploi du Thigénol :

VII. — Blennorrhagie

D'après Jaquet, le Thigénol agit dans la blennorrhagie comme l'ichthyol, on obtient avec lui une amélioration plus ou moins étendue; dans la plupart des cas, on doit, au bout d'un certain temps, employer des médicaments plus énergiques. On emploie pour les injections les solutions suivantes :

32. Thigénol Roche.....	2 gr.
Eau distillée.....	98 »

Pour injections.

VIII. — Prostatite

On obtient dans la prostatite comme dans l'hypertrophie de la prostate une diminution considérable des troubles subjectifs par l'emploi des suppositoires suivants :

33. Thigénol Roche.....	0 gr.	10
Extrait de belladone.....	0 »'	01
Beurre de cacao q. s. pour un suppositoire.		

F. S. A. 10 suppositoires.

Introduire un suppositoire après être allé à la selle.

IX. — Epididymite

L'action antiphlogistique et résolutive du Thigénol en fait un médicament précieux dans l'épididymite. Les badigeonnages du testicule malade avec de la glycérine à 2/10^e de Thigénol ou les frictions avec une pommade à 20 pour 100 calment les douleurs et amènent une diminution du gonflement de l'épididyme.

Comme on l'a déjà mentionné, le Thigénol est employé pour soutenir le traitement local dans les maladies dénommées, mais surtout dans

X. — Les affections catarrhales des organes respiratoires, où il restreint la sécrétion bronchique, diminue la toux et facilite l'expectoration.

XI. — Dans la **Tuberculose Pulmonaire**, où, dans les cas légers et de moyenne gravité, on obtient une amélioration de la toux, une diminution de l'expectoration, une augmentation de l'appétit et le relèvement de l'état général, sans nuire aux fonctions de l'estomac.

Des observations ultérieures montreront quelle peut être la valeur de quelques observations isolées relevées par des médecins sur l'emploi du Thigénol dans la fièvre typhoïde et dans les maladies de l'estomac et de l'intestin. Mais toutes les observations faites jusqu'à présent confirment l'innocuité complète du Thigénol employé à l'intérieur. Cette qualité et son absence d'odeur font qu'il mérite en tout cas d'être employé partout où l'ichthyol est donné à l'intérieur.

Pour l'usage interne on donne le Thigénol aux doses de 1 à 2 grammes par jour en solution ou en pilules.

34. Thigénol Roche.....	10 gr.
Eau de menthe.....	20 »

A prendre 20 à 30 gouttes trois fois par jour dans de l'eau.

35. Thigénol Roche.....	3 gr.
Eau distillée.....	137 »
Suc de réglisse.....	10 »

1 cuillerée à soupe 3 fois par jour.

36. Thigénol Roche.....	6 gr.
Poudre de réglisse.....	} q. s.
Poudre d'althea.....	

F. S. A. 60 pilules. — Prendre 3 à 5 pilules par jour.

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

OBSERVATIONS

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

OBSERVATIONS

PREMIER CAS

A. H..., âge 65 ans, souffre depuis des années d'un eczéma chronique du scrotum. De violentes démangeaisons troublent le sommeil du malade. La peau du scrotum, du pénis et de la marge de l'anus est d'une coloration rouge bleu, elle est épaissie, luisante, craquelée en de nombreux points; par les rhagades sort une sécrétion rare qui se dessèche bientôt en croûtes minces. Pansement avec une pommade au Thigénol " Roche " à 20 pour 100. La démangeaison diminue aussitôt, de sorte que le patient passe une bonne nuit. Le traitement est continué pendant quatre jours. L'amélioration persiste. On constate une diminution très nette de l'infiltration; la peau devient plus fine et plus onctueuse. Le malade est guéri au bout de dix jours.

DEUXIÈME CAS

H. H..., 23 ans, a eu en janvier une dermatite aiguë des mains à la suite de manipulations prolongées de lessives. Guéri une première fois, il récidive le 29 février. On constate sur et entre les

doigts de nombreuses vésicules qui se développent la nuit. Les mains et les doigts sont considérablement tuméfiés le matin, et le patient se plaint de brûlures et de douleurs.

TRAITEMENT : Le premier jour, compresses d'une décoction de son additionnée de 3 pour 100 d'acide borique. La sensation de brûlure persiste. A partir du 3 mars, pansement avec une pâte au Thigénol à 20 pour 100. La sensation de brûlure disparaît, le gonflement rétrocede, l'épiderme se dessèche et commence à se détacher. A partir du 8 mars on donne tous les jours un bain de son pour activer la chute de l'épiderme ; après le bain on fait un pansement au Thigénol. Le 13 mars, les mains sont complètement guéries et recouvertes d'un nouvel épiderme.

TROISIÈME CAS

B. J..., 63 ans, souffre depuis six mois d'un eczéma sec de la face, des bras et des jambes. Le patient éprouve un prurit très violent qui l'empêche de dormir. Figure rouge vif avec desquamation épidermique fendillée en grandes plaques. Les bras présentent plusieurs plaques infiltrées dures, de la dimension d'une pièce de 5 francs, excoriées par suite de la confluence de petits nodules durs et recouverts de croûtes. Efflorescences semblables sur les régions fessières et sur la face postérieure de la cuisse jusqu'au-dessous du creux poplité. Diminution rapide des troubles subjectifs après application de pâte au Thigénol ; les phénomènes inflammatoires entrent en résolution et disparaissent. Le malade sort guéri un mois après le début du traitement.

QUATRIÈME CAS

M. E..., 24 ans. Depuis un mois et demi, eczéma aigu de la poitrine, des bras et de la face. Peau d'une coloration rouge diffuse, sèche, avec de très nombreux nodules du volume d'une tête

d'épingle, très serrés les uns contre les autres, en partie recouverts d'écailles et de croûtes minces. Fortes démangeaisons.

Les deux premiers jours, pansement avec du cold cream boriqué à 4 pour 100, puis pâte au Thigénol à 20 pour 100 sur le visage, pommade au Thigénol à 20 pour 100 sur les bras et la poitrine. — Rapide amélioration, le prurit disparaît, au bout de huit jours, la peau est lisse, non humide et de couleur normale, le malade sort guéri après trois semaines de traitement.

CINQUIÈME CAS

C. P..., 22 ans. Eczéma aigu dont le début remonte à dix jours; il s'est rapidement généralisé sur tout le corps et présente sur le tronc une intensité particulière. L'exanthème détermine de si violentes démangeaisons que le patient ne peut dormir la nuit. Sur tout le corps on voit de petits nodules ou groupes de nodules très serrés, de couleur rose clair, ils sont rugueux et durs et le plus souvent recouverts d'une croûte mince.

Le patient est frictionné deux fois par jour avec une pâte au Thigénol; au bout de trois jours la démangeaison a disparu presque complètement. Huit jours après le début du traitement, les nodules sont pour la plupart entrés en régression; l'épiderme s'écaille.

Légère récurrence au cou. Guérison définitive et sortie seize jours après l'entrée à l'hôpital.

SIXIÈME CAS

L. F..., 25 ans. Depuis trois semaines environ est atteint d'un petit eczéma papuleux sec, notamment aux bras et aux cuisses, très prurigineux.

Le malade a été traité avant son entrée à l'hôpital, pendant trois jours avec une pommade à base de caséine, résorcine et soufre. Il

prétend avoir éprouvé une amélioration au début et puis après de violentes démangeaisons.

Thigénol pur. Suppression immédiate des démangeaisons. Continuation des badigeonnages pendant huit jours. Guérison.

SEPTIÈME CAS

B. H..., 49 ans. A été atteint l'hiver dernier pendant plusieurs mois d'un eczéma papuleux sec des mollets. Depuis trois semaines, récurrence qui détermine de très fortes démangeaisons. Les régions eczémateuses sur chacun des mollets sont de la grandeur de la main. Peau rouge, modérément infiltrée avec nombreux petits nodules desséchés en partie.

Traitement par le Thigénol pur. Le prurit s'est aussitôt amélioré d'une façon considérable.

Le patient a été renvoyé guéri après quatorze jours.



Airol Roche

Succédané de l'**Iodoforme**
INODORE
NON CAUSTIQUE
MOINS TOXIQUE que **L'IODOFORME**

Ce produit, dont la constitution chimique a été longuement discutée et enfin nettement établie, est l'**Oxy-Iodo Gallate de Bismuth iodé**.

Il **contient 24,8** pour 100 d'Iode.

L'Airol est à la fois un **dessiccant** et un **antiseptique** (LEGUEU).

Les expériences très concluantes ont démontré que l'Airol avait un **pouvoir antiseptique égal, sinon supérieur à celui de l'Iodoforme** (FRIEDLANDER).

Moins toxique que l'Iodoforme, l'Airol a encore sur ce dernier l'**avantage d'être inodore** et de n'exercer **sur la peau aucune action irritante** (LEGUEU).

L'Airol a été préconisé à l'hôpital Saint-Louis dans le traitement de l'**urétrite Blennorrhagique**.

POUDRE A L'AIROL

Airol..... 40 gr.
Talc..... 20 gr.

Pour saupoudrer les plaies de toutes sortes : Brûlures, Abscès, Ulcères, etc.

POMMADE A L'AIROL

Airol..... 2 gr. 5 ou 5 gr.
Vaseline blanche..... 45 gr.

A employer pour remplacer la poudre dans les cas où elle présente des inconvénients (pour les yeux, etc.).

GAZE à l'AIROL

10 %.

De fabrication irréprochable, cette gaze est stérilisée avec le plus grand soin.

La gaze à l'Airol est inodore.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o


7, Rue Saint-Claude, 7

PARIS (III^e)

MONSIEUR LE DOCTEUR,

Après le rapport fait à l'Académie de Médecine de Paris et les nombreux travaux publiés en France et à l'étranger, le **Thiocol** se répand chaque jour davantage, aussi les contrefaçons deviennent-elles de plus en plus nombreuses.

La fabrication du **Thiocol** est très difficile et nécessite l'installation d'une grande industrie. Nous avons toujours obtenu un produit de composition chimique stable, répondant à la formule



grâce aux chimistes qui nous assurent leur concours.

Nous prenons la liberté de vous mettre en garde contre certains médicaments introduits dans le commerce sous le nom scientifique du **Thiocol** (sulfo-gaïacolate de potassium) et dont l'inefficacité est due à une composition mal définie.

Nous avons confié à M. Ch. WEISS, pharmacien de 1^{re} classe, les préparations galéniques à base de **Thiocol**.

Ces préparations présentent le grand avantage de contenir le médicament authentique. De plus, le prix du **Thiocol**, par suite des difficultés de fabrication, étant aujourd'hui encore assez élevé, les préparations de M. Ch. WEISS vous permettront de l'administrer à des prix très abordables.

Nous vous rappelons que le **Thiocol**, expérimenté et adopté dans les hôpitaux de Paris, est un médicament chimique dérivé de la Créosote. Il est inodore, soluble dans l'eau, de saveur légèrement amère, facilement toléré par l'estomac à la dose de 2 à 8 grammes par jour. Calculé chimiquement, 1 gramme de **Thiocol** correspond à 0,52 de gaïacol actif, c'est donc le véritable médicament des affections pulmonaires. Nous nous tenons toujours à votre disposition pour les échantillons et la littérature.

Agréez, Monsieur le Docteur, l'assurance de nos sentiments dévoués.

F. HOFFMANN-LA ROCHE et C^{ie}, Paris-Bâle

Pour éviter les contrefaçons nuisibles, MM. les Médecins sont priés de prescrire le Thiocol "Roche"

Bien préciser la Marque "ROCHE"

COMPRIMÉS
de **Thiocol Roche**

Préparés par **CH. WEISS**, Ph^{en} de 1^{re} Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — **MÉDAILLE D'OR**
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50^{mg} de **THIOCOL** pur.

Sirop Roche
AU **THIOCOL**

Préparé par **CH. WEISS**, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'OR,
Ph^{en} de 1^{re} Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.
GUÉRISON de la **TUBERCULOSE** par la **CRÉOSOTE** à **H^{tes} DOSES**
Dose de Thiocol: par cuillerée à soupe, 1 gr.; par cuill. à café, 0.33

AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par

le Thiocol Roche

(Sulfogaïacolate de Potassium)

Dérivé de la **Créosote**

Le **THIOLCOL** est le succédané de la **CRÉOSOTE**

PROPRIÉTÉS. — Soluble.
Insipide.
Inodore.
Non toxique.
Non caustique.
Facilement toléré par l'estomac.

POSOLOGIE. — 2 à 8 gr. par jour.
1 gr. Thiocol = 0.42. Gaïacol actif.

Le Thiocol a été expérimenté dans
les HOPITAUX de PARIS et présenté à
l'ACADÉMIE de MÉDECINE.

*Nous avons confié à M. Ch. WEISS, pharmacien de 1^{re} classe,
les préparations galéniques à base de Thiocol pour donner aux
médecins l'assurance qu'ils emploient le médicament authentique.*

F. HOFFMANN-LAROCHE & Co, Bâle.

COMPRIMÉS
de **Thiocol Roche**

Préparés par **CH. WEISS**, Ph^m de 1^{re} Classe.
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE d'OR
30, Boulevard Magenta, PARIS
Chaque Comprimé renferme 0,50^{mg} de **THIOLCOL** pur.

L'Echo Thérapeutique

RÉDACTEUR EN CHEF : **D^r F. BOUSQUET**
Pharmacien de 1^{re} classe, Licencié en Sciences
Ancien préparat. à la Faculté de Méd. de Paris, Ex-Interne des Hôpit.
63, Rue La Boétie, PARIS (VIII^e).

Paris. — Imp. des Beaux-Arts (A. Muller), 36, rue de Seine.

