Der Augenspiegel und Seine Anwendung in der praktischen Medizin / von S. Klein.

Contributors

Klein, Salomon, 1845-
University College, London. Library Services

Publication/Creation

Wien : Urban & Schwarzenberg, 1876.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/x3vubvwd

Provider

University College London


License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by UCL Library Services. The original may be consulted at UCL (University College London) where the originals may be consulted.
This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

wellcome collection

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
https://wellcomecollection.org



11.

DER

AUGENSPIEGEL

UND

SEINE ANWENDUNG

IN DER

PRAKTISCHEN MEDIZIN.

VON

Dr. S. KLEIN.

SEPARAT-ABDRUCK AUS DER WIENER KLINIK.

WIEN, 1876.
URBAN & SCHWARZENBERG,
MAXIMILIANSTRASSE NR. 4.

Meine Herren! [1]) Der Gegenstand, der uns hier beschäftigen soll, ist nicht nur sehr interessant und lehrreich, sondern er bietet auch einige Schwierigkeiten, die überwunden werden müssen. Diese Eröffnung soll Sie aber nicht abschrecken, im Gegentheil, sie diene Ihnen als Ermunterung, in Ihren Bemühungen fortzufahren, wenn Ihnen die ersten Hindernisse sich entgegenstellen, in dem Bewusstsein, dass es jedem vor Ihnen ebenso erging und dass Sie endlich, nach Ueberstehen der anfänglichen Hemmnisse, siegreich zum Ziele gelangen werden. Das Ophthalmoskopiren ist nämlich deshalb eine etwas schwierigere Kunst, als alle übrigen mit Hilfe von künstlicher Beleuchtung, reflektirenden Apparaten und sogenannten speculis vorzunehmenden Untersuchungsmethoden, weil bei diesen mit Beseitigung etwaiger mechanischer oder anatomischer Hindernisse, oder solcher durch mangelhafte Beleuchtung, was eben durch Konstruktion der verschiedenen dazu benützten Apparate geschieht, auch schon das Wichtigste geschehen ist und jeder nach Erfüllung dieser Bedingungen auch schon das zu sehende Objekt wahrnehmen wird, welches sich überdies in seiner natürlichen Lage, Beschaffenheit, Grösse, Farbe etc. oder doch nur unter unwesentlicher Veränderung präsentirt. Der Laryngoskopiker also z. B. oder derjenige, der mit dem Ohrenspiegel u. dgl. mehr untersuchen will, hat sich blos mit einigen technischen Fertigkeiten und Handgriffen vertraut zu machen und die Bedingungen für das zur Anschauung zu bringende Objekt, für das Sehen sind gegeben. Ganz anders aber verhält es sich beim Ophthalmoskopiren. Hier gilt es einer ganzen Reihe dioptrischer Verhältnisse Rechnung zu tragen, alle Einflüsse, welche von diesen auf Sichtbarwerden, auf Grösse, Gestalt, Glanz, Farbe, auf grössere oder geringere Deutlichkeit u. s. w. des Gegenstandes ausgeübt werden, in Kombination zu bringen, die subjektiven Hindernisse, welche in der durch die vitale Kraft des Auges, seine Refraktion beliebig zu verändern, die Akkommodation, gegebenen Vielgestaltigkeit des Brechzustandes des eigenen Auges begründet sind, sich zur Kenntniss zu bringen und sie nach Belieben

[1]) Vorgetragen im Wintersemester 1875 in seinen in seiner Eigenschaft als Secundararzt erster Classe auf Prof. v. Jäger's Klinik abgehaltenen Cursen.

beherrschen und ebenso die Mannigfaltigkeit derselben Zustände des zu untersuchenden Auges gebührend würdigen zu können. Mit einer einfachen Instruktion also, wie der Augenspiegel zu halten sei, ob mehr schief oder mehr gerade, höher oder niedriger, ist es hier nicht abgethan und diese Umstände machen sich nicht etwa erst bei dem Studium verschiedener physiologischer und pathologischer Zustände des Augeninnern, sondern gleich im Beginne beim Bestreben, mit Hilfe des Augenspiegels überhaupt etwas zu sehen, geltend. Und darin liegt die Schwierigkeit, dass man zunächst mit dem Augenspiegel schauen lernen muss.

Um die Sache Ihnen auf's klarste darzustellen, wollen wir das Prinzip, auf welchem die Kunst des Ophthalmoskopirens begründet ist, des Weiteren untersuchen. Doch müssen wir dieser Untersuchung einige Bemerkungen über das Augenleuchten vorausschicken.

In seinem klassischen Lehrbuche zeigte uns MAUTHNER [2]) auf Grundlage historischer Nachforschungen, dass schon in den ältesten Zeiten einzelne Beobachtungen über das Leuchten der Augen mancher Thiere gemacht wurden. Dieses Leuchten der Thieraugen war in den letzten Jahrhunderten eine allgemein bekannte Thatsache. Gegen Schluss des vorigen Jahrhunderts wurden auch menschliche Augen, aber blos nicht pigmentirter, albinotischer Individuen leuchtend gesehen, bis gegen Schluss der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts auch an normal pigmentirten, nicht albinotischen Menschen das Phänomen des Augenleuchtens beobachtet wurde. Die Vorstellung, die man über die Ursache und das Wesen des Leuchtens der Thiere und Menschen hatte, war höchst abenteuerlicher Natur. „Man schweifte stets in die Ferne, während das Gute doch so nahe lag" und glaubte, das Leuchten sei eine Erscheinung der Phosphoreszenz, indem eine eigenthümliche Art von Phosphor im Auge abgesondert werde. Eine andere Anschauung brachte das Augenleuchten mit der Elektrizität in Verbindung und man stellte sich auch vor, dass das Thier, dessen Augen leuchten sollen, in einem gewissen Zustande der Erregung sich befinde, und dass es selbst willkürlich das Leuchten hervorrufen könne. Bis zum Jahre 1810 hatte man von dieser so interessanten Erscheinung keine plausible Erklärung zu geben vermocht und ahnte man auch nicht, dass sie eine der einfachsten und natürlichsten Vorgänge in der Natur darstelle.

Um das genannte Jahr herum wurden gleichzeitig von zwei ausgezeichneten Gelehrten, Benedict PRÉVOST [3]) und GRUITHUISEN [4]), u. z. unabhängig von einander Erklärungen gegeben, welche vorläufig als zufriedenstellend angesehen werden mussten und welche darin gipfelten, dass das Augenleuchten ein einfaches Reflexphänomen sei, indem das Licht, welches in das Thierauge fällt, von demselben zurückgestrahlt werde. Es wurde damit auch gezeigt, dass im Gegensatze zu der Meinung, nach welcher das Leuchten blos in der Dunkelheit hervortrete, dasselbe in absolut finsteren Räumen nicht zum Vorschein gebracht werden könne. GRUITHUISEN gab auch an, dass das Licht von

---

[2]) Lehrbuch der Ophthalmoskopie, 1868, pag. 1.
[3]) Biblioth. britannique, 1810, T. 45.
[4]) Beiträge zur Physiognosie u. Eautognosie, pag. 190—201.

dem im Auge der Thiere befindlichen Tapetum zurückgeworfen werde. 1821 wurden wir durch RUDOLPHI[5]) in der Erklärung dieser Naturerscheinung der Wahrheit noch um einen Schritt näher gebracht. Dieser betonte nämlich, dass man das Leuchten der Augen nur bei einer gewissen Stellung derselben, bei welcher Licht hineinfällt, beobachten könne und bewies auch gleichzeitig die rein physikalische, mit den Lebensvorgängen in gar keinem Kausalnexus und ebensowenig mit Phosphoreszenz oder Elektrizität im Zusammenhang stehende Natur der in Rede stehenden Erscheinung. 1826 wurde durch ESSER[6]), der den Gegenstand weitläufig behandelte, auch gezeigt, dass die verschiedenen Farben, unter denen man das Leuchten wahrnehme, von der verschiedenartigen Färbung des Tapetum herrühren, und 1836 machte HASSENSTEIN[7]) die für unsern Gegenstand, wie wir später sehen werden, hochwichtige Beobachtung, dass ein ausgeschnittenes Hundeauge, wenn es in der Richtung der Längsaxe komprimirt wurde, das Leuchten hervortreten liess.

So standen die Dinge, bis in den Jahren 1846 und 1847 durch William CUMMING[8]) und Ernst BRÜCKE[9]), welch' letzterer ganz zufällig einmal das Aufleuchten des normal pigmentirten Menschenauges wahrnahm, Methoden angegeben wurden, nach welchen man nach Belieben ein jedes Auge leuchtend machen kann. So weit waren die Kenntnisse über diesen Gegenstand gediehen, ohne dass man noch eine ausreichende Erklärung dafür hatte, warum die Lichtreflexion, also das Augenleuchten unter gewissen Verhältnissen eintrete und warum wir die Pupille eines Andern nicht unter allen Umständen leuchtend sehen. Die Beantwortung dieser Frage war dem ruhmbekränzten Helden unseres Jahrhunderts, dem unsterblichen HELMHOLTZ vorbehalten, welcher uns plötzlich um unmessbare Distanzen in der Wissenschaft vorwärts brachte und welchem es gelang, das Augenleuchten besser und intensiver, als alle diejenigen, die vor ihm mit dieser Frage sich beschäftigten, es vermochten, zu produziren. Noch muss hier ergänzend erwähnt werden, dass im Winter 1846/1847 Karl v. ERLACH, der vermittelst seiner Brillen das Auge seines Freundes, wie dieser das des Ersteren leuchten sah, eine Methode angab, welche in ihrer Vollkommenheit der HELMHOLTZ'schen fast gleich kam[10]).

Um zu verstehen, warum wir unter gewissen Verhältnissen, also z. B. im Dunkeln die Augen mancher Thiere, z. B. der Katzen, oder auch anderer Raubthiere, oder albinotischer Menschen, oder unter ganz besonderen Umständen selbst die Augen nichtalbinotischer Menschen hell aufleuchten sehen, müssen wir die Frage beantworten, warum wir überhaupt nicht immer und nicht alle Augen leuchten sehen und warum

---

[5]) Grundriss d. Physiologie, I, pag. 197.

[6]) In Kastner's Archiv f. die gesammte Naturlehre, Bd. VIII., pag. 399.

[7]) De luce ex quorundam animalium oculis prodeunte atque de tapeto lucido. Jenae 1836.

[8]) Medico-chirurgical Transactions XXIX, pag. 284.


[9]) J. Müller's Archiv f. Anatomie und Physiologie, 1847, pag. 225.

[10]) Siehe Zehender's Klin. Monatsbl. f. Augenh. Bd. VI, pag. 29.

uns unter gewöhnlichen Verhältnissen die Pupille der Menschen und der Thiere schwarz erscheint.

Man glaubte bis zu HELMHOLTZen's Entdeckung, dass die Pupille unter gewöhnlichen Verhältnissen deswegen schwarz erscheine, weil die Retina vollkommen durchsichtig ist und daher gar kein Licht reflektire und weil alles in das Innere des Auges fallende Licht von der Chorioidea absorbirt werde. Dies ist aber unrichtig. Wir wissen, dass selbst ganz durchsichtige Körper, z. B. die Glasscheiben, auch etwas, unter Umständen sogar viel Licht reflektiren, und so strahlt auch die Netzhaut etwas zurück, dann aber reflektirt auch die Aderhaut viel Licht und absorbirt durchaus nicht die gesammten auf sie auffallenden Lichtmengen. Es gibt aber ausserdem, wie wir später sehen werden, unter physiologischen wie pathologischen Verhältnissen Gebilde im Augeninnern, die sogar sehr viel Licht zurückwerfen, z. B. die glänzende Eintrittsstelle des Sehnerven, oder die rothen Blutsäulen u. s. w. Wenn aber die Schwärze der Pupille nicht durch die dunkle Färbung des Augengrundes und die hier erwähnten Faktoren begründet wird, so muss die Ursache für dieselbe in der Lichtbrechung zu suchen sein. In dieser Folgerung fand HELMHOLTZ[11]) den Weg zur Lösung des so lange vergeblich studirten Problems. Der Gang der Lichtstrahlen also im Innern des Auges, die Brechung, welche sie beim Durchgang durch die Augenmedien erfahren, erklärt uns, weshalb man die Pupille gewöhnlich schwarz sieht. Die Betrachtung eines einfachen physikalischen Gesetzes, des Gesetzes von der konjugirten Vereinigungsweite, wird uns dies bis zur Evidenz klar machen. Dasselbe besagt: Wenn durch irgend eine optische Vorrichtung, welche wir uns hier durch eine gewöhnliche konvexe Glaslinse der Einfachheit wegen repräsentiren lassen wollen, von irgend einem leuchtenden Objekte *a* (Fig. 1) ein Bild z. B. im Punkte *b* erzeugt wird, so wird, falls im Punkte *b* ein leuchtendes Objekt wäre, das Bild desselben, wenn die Lichtstrahlen dieselbe optische Vorrichtung passiren, im Punkte *a* seinen Platz haben. Die Punkte *a* und *b* sind sohin konjugirte Vereinigungspunkte.

Fig. 1.



Wenn wir diese Verhältnisse auf das Auge übertragen, so finden wir, dass das Bild, welches von einem leuchtenden Gegenstande auf einem bestimmten Punkte der Netzhaut entworfen wird, die Lichtstrahlen wieder zurück zu ihrem Ausgangspunkte, zum leuchtenden Objecte senden wird. Alles Licht, was daher in das Innere des Auges geworfen wird, kehrt, so lange die regelmässige Brechung des Lichtes durch den dioptrischen Apparat des Auges keine Störung erleidet, zur Leuchtquelle zurück; und da unser Auge für gewöhnlich keine Leuchtquelle ist, d. h. kein Licht aussendet, kann auch keines zu ihm zurückkehren. Wenn

[11]) Helmholtz Beschreibung eines Augenspiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge, Berlin 1851.

wir also in ein Auge noch so viel Licht hineinwerfen, wird wohl dasselbe reflektirt werden, allein es wird nicht in unser Auge, da es nicht von demselben ausging, hinein, sondern zur Lichtquelle zurückgestrahlt werden. Wir können deshalb die Schwärze der Pupille nur dann verschwinden machen, wenn wir die Lichtquelle in unser Auge verlegen, wenn das Licht, welches wir in das andere Auge werfen wollen, von unserem Auge selber ausgeht und daher zu demselben zurückkehrt. Dies gelang HELMHOLTZ, wie wir sehen werden, auf sehr einfache Weise, und er erzielte daher das intensivste Augenleuchten.

Man kann nämlich, um das Auge zur Leuchtquelle zu machen, dies nur dadurch erreichen, dass man es in die Richtung der Lichtstrahlen bringt, welche in das zum Leuchten zu bringende Auge fallen sollen. Zu diesem Zwecke müsste der Beobachter sich zwischen die Lichtquelle und das zu beobachtende Auge postiren, wodurch aber alles Licht abgehalten wird, da der Kopf des Untersuchers die Lichtquelle verstellt. Man kann aber auch das Augenleuchten beobachten, wie CUMMING[12]) und BRÜCKE[13]) gezeigt haben, wenn man sein Auge nicht genau in die Richtung des einfallenden Lichtes, sondern wenn man es nur ungefähr in diese Richtung bringt, und das gelingt auf sehr einfache Weise und zwar unter folgenden Bedingungen:

Da das Auge die Fähigkeit besitzt, für verschiedene Entfernungen sich einzustellen, so wird nicht jedesmal das Licht gerade zur Lichtquelle zurückgestrahlt werden, sondern das hängt von dem jeweiligen Einstellungs- oder Akkommodationszustande ab. Das oben bei Gelegenheit der Erwähnung der konjugirten Vereinigungsweite gegebene Beispiel hat nur insofern Geltung, als das Auge gerade für die Entfernung eingestellt ist, in welcher sich die Lichtquelle befindet, d. h. von allen Objekten, die in dieser Entfernung gelegen sind, deutliche Bilder auf seiner Netzhaut entstehen. Unter solchen Verhältnissen, wenn das Auge gerade für die Entfernung der Leuchtquelle akkommodirt ist, könnten wir, wenn die Medien klar und durchsichtig sind, und wir nur ungefähr in die Richtung des einfallenden Lichtes unser beobachtendes Auge bringen, kein Leuchten beobachten, weil alles Licht zur Lichtquelle zurückkehrt. Nur wenn die optischen Medien des Auges nicht vollkommen klar, für Licht nur zum Theil durchgängig sind, wird unter diesen Verhältnissen trotz Akkommodation für die Lichtquelle nicht alles Licht zu dieser zurückkehren, sondern weil ein Theil der Lichtstrahlen nicht mehr den Gesetzen der regelmässigen Brechung im Auge folgen kann, und an einzelnen Stellen der dioptrischen Medien reflektirt wird, bevor er zur Netzhaut gelangen kann, so wird er mehr weniger seitlich zerstreut werden.

Die Lichtstrahlen werden deshalb ein solches Auge auf verschiedenem Wege verlassen. Der Theil derselben, welcher die durchsichtigen Partien der Medien passirte, folgt dem regelmässigen Gange der Lichtbrechung, gelangt bis zur Netzhaut und kehrt dann zur Leuchtquelle zurück. Der andere Theil aber, welcher getrübte Partien


---

[12]) l. c.
[13]) l. c.

trifft, folgt ganz anderen, den verschiedenartigsten Gesetzen und tritt deshalb nach den diversesten Richtungen aus dem Auge und bei dieser Gelegenheit kann es geschehen, dass ein Theil der Lichtstrahlen auch in das Auge des Beobachters gelangt, der nun das Auge leuchtend sieht. Dies kommt aber nur unter krankhaften Verhältnissen vor und das Leuchten hierbei ist nur schwach. Wir können deshalb das Augenleuchten unter normalen Verhältnissen, indem wir ungefähr in die Richtung des einfallenden Lichtes unser beobachtendes Auge bringen, bei Einstellung des zu beobachtenden Auges für die Entfernung der Lichtquelle nicht sehen, sondern nur dann, wenn dieses Auge für jede beliebige andere Entfernung, nur nicht für die der Lichtquelle eingestellt ist, indem dann das Gesetz von der konjugirten Vereinigungsweite keine Anwendung findet, weil auf der Netzhaut eines solchen Auges von der Lichtquelle kein scharfes Bild entworfen wird und deshalb das Licht nach der Reflexion nicht zur Lichtquelle zurückkehrt. Zum richtigen Verständnisse des hier Gesagten wollen wir uns den Gang, welchen die Lichtstrahlen, wenn sie die Medien des Auges passiren, einhalten können, vergegenwärtigen. Es ist bekannt, dass man im Allgemeinen nach der anatomischen Bauart des Auges dreierlei Augen unterscheidet, das emmetropische, hypermetropische und myopische Auge. Wir wollen ganz kurz eine Definition dieser Augen geben und das emmetropische Auge dadurch charakterisiren, indem wir sagen: Die Lichtstrahlen, welche aus dem Innern desselben austreten, haben eine unter einander parallele Richtung; die aus dem Innern eines hypermetropischen Auges austretenden Lichtstrahlen aber haben eine divergirende Richtung und die Richtung der aus einem myopischen Auge kommenden Strahlen ist bis zu einem Punkte, an welchem eine Kreuzung derselben stattfindet, konvergent und in weiterem Verlaufe ebenfalls divergent. Alle diese Definitionen müssen auf das Auge angepasst werden, während es sich im Zustande der Akkommodationsruhe befindet, d. h. während derjenige Muskel, durch dessen Kontraktion das Auge seine natürliche, durch seine Bauart bedingte Brechkraft vermehren kann, sich ausser Aktion befindet.

Wenn wir nun in eine bestimmte Entfernung, z. B. von zwölf Zoll von diesen Augen eine Lichtflamme aufstellen, so werden die Lichtstrahlen von dieser in die drei genannten verschiedenen Arten von Augen einfallen und aus denselben zurückkehren, aber nicht zur Lichtflamme, von welcher kein deutliches Bild auf der Netzhaut entworfen wurde, weil diese Augen im Zustande der Akkommodationsruhe nicht für eine Entfernung von zwölf Zoll eingestellt sind, sondern sie werden sich folgendermassen verhalten. Aus dem emmetropischen Auge kehren sie parallel zurück und bilden ein der Weite der Pupille des betreffenden Auges entsprechendes Lichtbüschel, welches in die Gegend der Lichtquelle angelangt, daselbst auf unser beobachtendes Auge, wenn wir dasselbe knapp in die Nähe der Lichtquelle postirt haben, um ungerfäh in der Richtung der von ihr ausgehenden Strahlen in das Auge schauen zu können, zum Theil auffallen müssen, und so werden wir das Auge leuchten sehen, aber nur schwach, weil das Lichtbüschel dünn ist und daher nicht viel Strahlen in unser Auge gelangen können.


Fig. 2.



Die von einem in endlicher Entfernung gelegenen Leuchtpunkte *a* ausgehenden Strahlen *ac* u. *ad* vereinigen sich in dem emmetropischen akkommodationslosen Auge hinter der Netzhaut in *b*. Auf der Netzhaut entsteht ein Zerstreuungskreis. Die von einem Punkte *e* desselben ausgehenden Strahlen *ec* u. *ed* sind nach ihrem Austritte aus dem Auge parallel, sie verlaufen in der Richtung von *cf* u. *dg*. Im Querschnitte *fg* des Strahlenbündels ist Raum für das beobachtende Auge.

Um so besser sehen wir das hypermetropische Auge leuchten. Dieses ist ebensowenig wie das emmetropische, oder besser gesagt, noch weniger als dieses, für die Lichtquelle akkommodirt. Die Lichtstrahlen bilden ein weit auseinander fahrendes divergentes Bündel, welches in die Nähe der Lichtflamme angelangt, woselbst unser beobachtendes Auge sich befinden möge, mit einem grösseren Theile seiner Strahlen auf dasselbe auffallen wird.


Fig. 3.



Hypermetropisches Auge. Punktirte Linien einfallende Strahlen, die anderen Linien die austretenden Strahlen. Sämmtliche Buchstaben haben die gleiche Bedeutung wie in der vorigen Figur.

Weniger leuchten als das hypermetropische, aber mehr als das emmetropische wird das myopische Auge. Aus demselben kommen die Lichtstrahlen, — wenn wir z. B. annehmen, es handle sich um ein Auge mit $M^1/_6$, d. h. ein Auge, dessen Fernpunkt 6″ vor seinem Knotenpunkte gelegen ist, so dass dieser der entfernteste Punkt ist, von welchem aus deutliche Bilder auf seiner Netzhaut erzeugt werden und von jedem entfernteren Punkte aus nur undeutliche —, in der Weise konvergent, dass sie schon 6″ vor dem Knotenpunkte des Auges ihre Vereinigung finden und von hier aus in divergenter Richtung bis zur Leuchtquelle, woselbst unser beobachtendes Auge sich befindet, weiterschreiten. Hier werden sie zum Theil von diesem aufgefangen und wir machen die Wahrnehmung des Augenleuchtens. Die beistehenden Figuren (Fig. 2, 3 und 4) werden diese Verhältnisse in noch klareres Licht setzen. Es versteht sich von selbst, dass das Leuchten um so intensiver sein wird, je höher der Grad der Hypermetropie oder Myopie, weil in geradem Verhältnisse zu diesem der Strahlenkegel umso mehr divergent sein wird und deshalb eine grosse Anzahl Lichtstrahlen auf das beobachtende Auge fallen.

Fig. 4.



Myopisches Auge. *e* ist der Punkt der Strahlenvereinigung im Innern des Auges, vor der Netzhaut. Alle übrigen Buchstaben und die Linien haben die Bedeutung, wie in den ersten zwei Figuren.

Dass alle diese Angaben richtig sind, geht aus der ganzen hier skizzenhaft entworfenen Geschichte des Augenleuchtens hervor und werden sie durch jede einzelne Thatsache bestätigt. Es geht aber auch aus diesen Brechungsverhältnissen hervor, dass die Ursache des Augenleuchtens nicht im Tapetum zu suchen sei, da man ja dasselbe nur in einzelnen Thierklassen u. z. bei vielen nur auf einem Theil des Augengrundes findet. Das Tapetum ist nämlich nach BRÜCKE [14]), welcher dasselbe untersuchte, eine zwischen dem inneren Kapillar-Gefässnetze und der Chorioidea propria eingeschobene Schichte, über welcher das Epithelstratum, dessen Zellen sonst mit Pigment erfüllt sind, nämlich bei den Thieren, die kein Tapetum besitzen, entweder nur unvollständig oder gar nicht pigmentirt ist. Das Tapetum besteht entweder aus Fasern oder aus Zellen und führt einen dem entsprechenden Namen, kommt allen Säugethier-Ordnungen zu, findet sich aber auch in der Klasse der Fische, bedeckt aber blos bei den Robben und Delphinen den ganzen Augengrund, bei den übrigen Ordnungen blos einen Theil desselben. Die Amphibien und Vögel besitzen kein Tapetum. Falls nun das Tapetum die Quelle des Augenleuchtens wäre, so sollten blos die mit einem solchen versehenen Augen die Erscheinung bieten, was ja, wie wir sahen, nicht der Fall ist, da wir es nach unserem Belieben in jedem Thier- oder Menschenauge hervorrufen können. Allerdings übt die Gegenwart eines Tapetes auf die Farbe und Intensität des Leuchtens einen Einfluss aus, indem es mehr Licht reflektirt, als der normal pigmentirte Augengrund und dem reflektirten Lichte seine Farbe verleiht. Genau so verhält es sich auch mit dem Albinoauge. Der pigmentlose Augengrund desselben ist nicht die Ursache für das Leuchten des Albinoauges und wird dasselbe, falls Verhältnisse gesetzt werden, unter denen alles in dasselbe eindringende Licht den gewöhnlichen Gesetzen regelmässiger Brechung folgt, ebenso eine schwarze Pupille aufweisen, wie die Pupille der Thiere, die ein Tapet besitzen, trotzdem dasselbe den ganzen fundus oculi bedeckt, gewöhnlich schwarz erscheint. Wenn man nämlich vor das Albinoauge einen undurchsichtigen Schirm setzt, welcher nur in der Mitte, entsprechend der Pupille, ein Loch hat, so dass durch dasselbe nur den Gesetzen regelmässiger Brechung folgende Strahlen dringen und eben solche wieder austreten können, so wird die Pupille des albinotischen Auges auch schwarz erscheinen. Dieselbe leuchtet nämlich deswegen, weil durch die Sclerotica, die nicht pigmentirte Iris und Aderhaut ebenfalls Licht in's Auge dringt, welches Licht nicht

[14]) J. Müller's Arch. f. Anat. und Phys. 1845, pag. 394.

regelmässig gebrochen wird, wie das durch die Pupille einkehrende und deshalb nach den verschiedensten Richtungen hin reflektirt wird, so dass es auch auf das Auge des Beobachters fallen kann. Der pigmentlose Augengrund trägt also wohl zum Charakter der Farbe und zur Intensität, mit welcher er leuchtet, wesentlich bei, begründet aber an und für sich das Phänomen nicht.

Mit der HELMHOLTZ'schen Theorie stimmen aber auch alle Thatsachen, die vor Kenntniss derselben beobachtet wurden, indem es klar wird, dass in allen jenen Fällen, in denen Augenleuchten wahrgenommen wurde, die Augen nicht für die Leuchtquelle eingestellt waren. So ist es heutzutage erwiesen, dass das Katzenauge, welches von jeher das Phänomen am schönsten und intensivsten zeigte, bedeutend hypermetropisch ist, was ja, wie wir sahen, das Zustandekommen des Augenleuchtens begünstigt und dasselbe verstärkt; ebenso erklärt sich die Beobachtung HASSENSTEIN'S vom Leuchten des ausgeschnittenen Hundeauges, wenn er es in der Richtung der Längsaxe komprimirte, weil es dadurch hypermetropisch wurde.

In gleicher Weise können wir uns das Leuchten der Augen, welches man bei gewissen pathologischen Zuständen, die BEER[15]) unter dem Kollektivnamen des amaurotischen Katzenauges, wegen des Leuchtens gleich dem Auge der Katzen, zusammenfasste, erklären, indem bei diesen entweder neugebildete Massen, Exsudat oder Tumoren oder die total abgelöste Netzhaut u. dgl. im Auginnern sich vorfinden, und da sie gegen das Augenzentrum vorgerückt sind, so ist die Axe des Auges an dieser Stelle kürzer und das Auge demnach hypermetropisch.

Nach all dem Gesagten wird es uns ein Leichtes sein, die Bedingungen zusammenzustellen, unter welchen das Augenleuchten bei ungetrübten Medien hervortreten kann.

Dasselbe wird um so eher zum Vorscheine kommen und um so intensiver:

1. Je unrichtiger das Auge für die Lichtquelle eingestellt ist, also eine je höhergradige Myopie oder Hypermetropie besteht.

2. Je weiter die Pupille ist, weil um so mehr Lichtstrahlen eindringen, und also auch mehr reflektirt werden, beim vollständigen angeborenen oder erworbenen Irismangel also am stärksten.

3. Je glänzender das Augeninnere, resp. der Augengrund, weil desto mehr Licht reflektirt wird, also ein je grösseres oder glänzenderes Tapetum oder ein die Stelle eines solchen vertretender physiologischer oder pathologischer Pigmentmangel besteht, z. B. beim Albinoauge oder bei ausgedehnten hinteren Skleralstaphylomen oder Pigmentschwund, wie STELLWAG[16]) es nachwies.

4. Je dunkler die Umgebung, weil im Kontraste zu dieser das Leuchten um so bemerkbarer ist, also in einem verdunkelten Zimmer besser als etwa bei Tagesbeleuchtung.

5. Je näher wir unser eigenes Auge der Richtung des einfallenden Lichtes bringen, weil dasselbe dann einen um so grösseren Theil der rückkehrenden Strahlen auffangen kann.

---


[15]) Lehre von den Augenkrankheiten, Wien 1817.
[16]) Wiener Med. Wochenschrift 1864, pag. 163.

Auf diesem letzteren Punkte beruht auch die Cumming-Brücke'sche Methode, nach welcher man sich knapp neben eine Lichtquelle, z. B. eine Lampenflamme, auf einige Entfernung und vis-à-vis von dem zu beobachtenden Auge postirt und in dasselbe hineinsieht. Besser gelingt dies noch, wenn man bei derselben Stellung eine gewöhnliche durchsichtige, noch besser eine foliirte Glasplatte, oder einen bei so vielen Zweigen der Medizin zur Untersuchung in Anwendung gezogenen Reflektor, wie Kehlkopf-, Ohren- etc. Reflektor, oder einen Augenspiegel an die Schläfe anlegt und in solcher Weise bei dunkler Umgebung das zum Leuchten zu bringende Auge intensiv beleuchtet. Es werden dadurch eine grössere Menge Lichtstrahlen ins Auge geworfen und daher wird ein intensiveres Licht erzielt.

Wenn nun, wie wir gesehen haben, das Augenleuchten caeteris paribus um so stärker ist, je mehr wir unser Auge in die Richtung des einfallenden Lichtes bringen, weil dann die relativ grösste Menge der Lichtstrahlen in dieses fallen, so muss das Leuchten am intensivsten dann sein, wenn es uns gelingt, unser Auge, ohne dabei die Lichtquelle zu verstellen, genau in die Richtung des einfallenden Lichtes zu situiren, weil bei dieser Stellung nun alle rückkehrenden Lichtstrahlen unser Auge treffen. Dies erreichte nun HELMHOLTZ durch folgende höchst einfache Vorrichtung:

Stellen Sie sich vor, meine Herren, das Auge A (in untenstehender Fig. 5) sei das beobachtende, hingegen B dasjenige, welches leuchten soll. Die Linie $a\,b$ sei die zusammenfallende Gesichtslinie beider Augen, deren Endpunkte mit der fovea centralis eines jeden Auges koinzidiren. Vor das Auge A sei nun eine gewöhnliche planparallele Glasplatte SS in der Weise angebracht, dass die durch sie gelegte Ebene einen Winkel von 45°, den Winkel β in der Figur, mit der Gesichtlinie der Augen bilde. Im Punkte x befinde sich nun eine Lichtquelle, z. B. eine Oellampe, von welcher nun die Strahlen auf die Glasplatte auffallen. Wir wollen hier nur einen einzigen Strahl in Betracht ziehen. Derselbe kommt im Punkte g bei der Glasplatte an, mit welcher er einen Winkel, (α) von 45 Grad bildet. Der weitere Gang des Lichtes, welcher uns durch den Weg dieses einzigen Strahls vorgezeichnet wird, ist nun folgender:

Fig. 5.




Ein Theil desselben geht bei *g* durch die Glasplatte, die ja durchsichtig ist, hindurch und geht für uns verloren, der andere Theil aber wird reflektirt, und da nach den bekannten Reflexionsgesetzen der Reflexionswinkel genau so gross ist, wie der Einfallswinkel, wird nun der Lichtstrahl *x g*, mit der Glasplatte einen Winkel von 45° bildend, gerade in der Richtung der Gesichtlinie, welche mit dem Strahl *x g*, wie ersichtlich, einen rechten Winkel einschliesst, also in das zu beobachtende Auge hinein, reflektirt werden müssen. Die Richtung des Lichtes ist hierbei, wie Sie sehen, eine solche, als ob es direkt vom beobachtenden Auge herkäme, wir haben thatsächlich das Auge des Beobachters gleichsam zur Leuchtquelle gemacht. Im Punkte *b* angelangt, wird nun faktisch ein Theil des Lichtes vom Chorioidealpigment absorbirt, der andere aber reflektirt und tritt in der Richtung der Gesichtslinie, also auf demselben Wege aus dem Auge, schreitet bis zur Glasplatte ungestört weiter, woselbst ein Theil des rückkehrenden Lichtes in der Richtung des einfallenden Strahles *x g* zur Leuchtquelle zurückgeworfen wird, der andere Theil aber passirt die Platte und gelangt solchermassen in der Richtung der Gesichtslinie des beobachtenden Auges durch die Pupille desselben auf seine fovea centralis und ruft nun hier die Empfindung des Leuchtenden hervor.

Bei der Stellung des Auges *B*, wie wir sie hier angegeben haben, wird übrigens das Leuchten das schwächste sein, weil gerade die Stelle der Macula lutea eingestellt ist, an welcher die grössten Pigmentmengen gelegen sind und welche deshalb am ganzen Augengrunde am wenigsten Licht reflektirt. Wenn nun aber das Auge Bewegungen ausführt, so dass andere, hellere, mehr Licht zurückstrahlende Stellen dem Beobachter gegenüber zu stehen kommen, so wird das Leuchten intensiver werden, am stärksten dann, wenn die glänzende Eintrittsstelle des Sehnerven sich gerade gegenüber befindet. Die Farbe, in welcher das Auge aufleuchtet, ist für gewöhnlich rothgelb oder röthlich, diese verwandelt sich nun in eine mehr weissliche, wenn die Eintrittsstelle des Sehnerven den Endpunkt *b* der Linie *b g* enthält und diese weisse Farbe kann unter pathologischen Verhältnissen eine grössere oder geringere Beimischung von himmelblauem oder smaragdgrünem Lichte erhalten, was dann einen besonders prächtigen Anblick bietet.

Wenn nun einmal nach HELMHOLTZ' Vorgange es ohne weiteres gelingt, das Auge zum Leuchten zu bringen, so liegt auch gar kein physikalisches Hinderniss mehr vor, die Details des Augengrundes zur Anschauung zu bringen. Wenn wir uns wie in dem früher angeführten Beispiele vorstellen, dass *A* das untersuchende ist, *B* (Fig. 6) hingegen dasjenige, dessen Grund durch *A* gesehen werden soll, und beide Augen emmeptropisch und im Zustande der Akkommodationsruhe sich befinden, so werden diese Augen Lichtstrahlen in unter einander paralleler Richtung austreten lassen und andererseits nur parallele Strahlen auf der Netzhaut zu einem deutlichen Bilde zu vereinigen im Stande sein. Wenn wir nun zwischen diese beiden Augen, gerade wie früher, u. z. zunächst dem untersuchenden, eine durchsichtige Glasplatte *SS* als Reflektor anbringen, und von einer seitlich aufgestellten Lampe *x* Licht auf dieselbe fallen lassen, so werden die Strahlen, wie es aus der Figur ersichtlich

Fig. 6.



ist, von der Glasplatte so reflektirt, dass sie in das Auge B fallen, auf dessen Grund sie aber kein deutliches Bild erzeugen, weil ja das Auge B nicht für divergente Strahlen, die von einem in endlicher Entfernung gelegenen Punkte ausgehen, eingestellt ist, sondern da das Auge für die unendliche Entfernung, also für parallele Strahlen eingestellt ist, werden die vom Punkte x ausgehenden auf dessen Grunde einen sogenannten Zerstreuungskreis bilden. Nur durch diese Einstellung des Auges B ist es möglich, dass die von jedem einzelnen Punkte des Zerstreuungskreises zurückkehrenden Lichtstrahlen bei ihrem Austritte aus dem Auge eine parallele Richtung haben, welche für unsere Zwecke nothwendig ist; denn in dieser Richtung schreiten die Lichtstrahlen bis zur Glasplatte, welche sie, immer noch unter einander parallel, passiren, um in diesem Zustande auf die Cornea des beobachtenden Auges A aufzufallen. Nachdem aber dieses Auge, wie wir früher sagten, gerade parallele Strahlen durch seinen brechenden Apparat auf seiner Netzhaut zum deutlichen Bilde zu vereinigen im Stande ist, werden nun die Details des Auges B vom Auge A klar und deutlich wahrgenommen werden. Wäre der gesetzte Fall vom akkommodationslosen Zustande des Auges B nicht vorhanden und wäre dasselbe z. B. durch seine Akkommodation für die Entfernung des Lichtpunktes x eingestellt, so hätten die aus ihm austretenden Strahlen keine parallele, sondern eine so konvergente Richtung, dass sie gerade in einer dem Punkte x entsprechenden Entfernung zur Vereinigung kämen, und würden mithin auch nicht auf der Netzhaut des Auges A zum deutlichen Bilde vereinigt, was, wie wir bald sehen werden, für das zu untersuchende Auge zutrifft, falls dieses myopisch ist. Das Auge A sähe in diesem Falle wohl den Grund des Auges B leuchten, aber es könnte keine Detailwahrnehmung machen, weil die aus letzterem kommenden Strahlen im Innern des ersteren schon vor der Retina zur Vereinigung kämen. Die Art und Weise, nach welcher das Auge A den Grund des Auges B deutlich sieht, ist genau dieselbe, wie diejenige, nach welcher wir ein Objekt,

welches im Brennpunkte einer sogenannten Loupe, d. h. einer Konvexlinse, sich befindet, deutlich sehen. Die Strahlen, welche nämlich von einem im Focus einer Konvexlinse befindlichen leuchtenden Gegenstande ausgehen, sind, nachdem sie die Linse passirt haben, parallel, und wenn wir auf eine solche Loupe unmittelbar unser Auge auflegen, sehen wir das besagte Objekt deutlich, u. z. im aufrechten virtuellen Bilde. Ganz dasselbe ist beim Auge *B* der Fall. Der dioptrische Apparat desselben ist mit einer gewöhnlichen einfachen Konvexlinse in Bezug auf die Beeinflussung des Ganges der Lichtstrahlen vergleichbar, das Objekt in dessen Brennpunkte ist der fundus oculi, welcher nun durch die Wirkung des als Loupe fungirenden dioptrischen Apparates des eigenen Auges parallel werdende Strahlen aussendet, die das Auge *A* zum Bilde vereinigt. Dieses empfängt sonach vom Grunde des Auges *B* ebenfalls ein virtuelles aufrechtes Bild. Es ist aber nothwendig, dass das Auge *A* dem Auge *B* sich möglichst nähere, nachdem es sich nicht unmittelbar, wie auf die Loupe, auf dasselbe legen kann, da aus einer grösseren Entfernung, wie wir später sehen werden, Vergrösserungsverhältnisse resultiren, welche eine Wahrnehmung von Details unmöglich machen.

Aehnlich verhält es sich, wenn das zu untersuchende Auge *B* hypermetropisch aber akkommodationslos ist. Die aus einem solchen kommenden Strahlen sind, wie wir bereits wissen, divergent, passiren in dieser Richtung die Glasplatte, wobei sämmtliche Vorrichtungen im Uebrigen die gleichen bleiben, und gelangen als solche auf die Cornea des akkommodationslosen emmetropischen untersuchenden Auges *A*. Dieses vermag keine divergenten Strahlen auf seiner Netzhaut zu vereinigen und wird deshalb den Grund des hypermetropischen Auges *B* nicht deutlich sehen. Um dies zu bewirken, müssten erst die aus letzterem kommenden Strahlen parallel gemacht werden. Wir können dies durch Vorlegen einer Glaslinse vor das Auge *A* bewirken, indem, wenn die Brennweite dieser Linse gerade der Entfernung entspricht, welche nothwendig ist, um parallelen Strahlen den ihnen eben zukommenden Grad von Divergenz zu geben, der Leuchtpunkt sich dann gleichsam im Brennpunkte dieser Linse befindet, und unter diesen Umständen sind die Lichtstrahlen nach den allgemein bekannten optischen Gesetzen nach ihrem Durchgange durch die Linse parallel. Nachdem es aber ganz einerlei (für unsere Betrachtungen hier nämlich) ist, ob wir eine solche Glaslinse vor das Auge hinsetzen, oder in das Innere des Auges, etwa in die Gegend des Knotenpunktes, jedenfalls an eine Stelle, welche vor derjenigen gelegen ist, an welcher die Lichtstrahlen im Innern des Auges, welches ja ein kombinirtes optisches System ist, die letzte Brechung erleiden, so können wir uns diese Glaslinse auch dadurch ersetzt denken, dass das Auge *A* durch das ihm innewohnende physiologische Vermögen, die Akkommodation, die Brechkraft seines dioptrischen Apparates erhöht. Dadurch nämlich, dass das Auge seine Krystalllinse konvexer macht, wird ihr Brechwerth ein grösserer, er wird gleich der ursprünglichen Brechkraft derselben, plus derjenigen, welche die Glaslinse besitzen muss, um die Strahlen von bestimmter Divergenz parallel zu machen. Die Wirkung dieser erhöhten Refraktion der Linse wird die gleiche


sein, wie die der vor das Auge zu setzenden Glaslinse, die Lichtstrahlen werden endlich nach ihrer letzten Brechung trotz ihrer ursprünglich divergenten Richtung auf der Netzhaut des Auges vereinigt werden und dieses wird nun in gleicher Weise — aber wie wir sehen, eben nur mit Hilfe seiner Akkommodation oder einer Glaslinse und nicht ohneweiters — wie vom emmetropischen Auge ein virtuelles aufrechtes und deutliches Bild erhalten.

Dieselben Grundsätze sind, aber in entgegengesetzter Weise zur Anwendung zu bringen, um klar zu machen, wie dasselbe Auge *A* den Grund des Auges *B* sehen kann, wenn dieses myopisch ist. Wie uns bekannt, verlassen die Strahlen ein solches Auge im Zustande konvergenter Richtung und können nun, nachdem sie in dieser Richtung verharrend, die Glasplatte passirt hatten, und auf die Hornhaut des Auges *A* auffallen, von diesem nicht auf der Netzhaut vereinigt werden, indem sie schon früher, noch bevor sie die Netzhaut des Auges *A* treffen, ihre Vereinigung finden. Das Auge wird deshalb in diesem Falle nur ein undeutliches Bild vom Grunde des Auges *B* haben, ein um so undeutlicheres, je früher vor der Netzhaut, je entfernter von dieser die Strahlen ihre Vereinigung finden, je stärker also ihre Konvergenz beim Eintreffen auf der Cornea von *A* ist, d. h. je höhergradig die Myopie von *B* ist. Um in diesem Falle dem Auge *A* ein deutliches Bild zu verschaffen, müssten die Strahlen, bevor sie die Cornea von *A* treffen, parallel gemacht werden. Dies kann dadurch geschehen, dass vor dieser Cornea eine Konkavlinse angebracht wird von solcher negativer Brennweite, dass die konvergenten Strahlen, wenn sie ungehindert ihren Lauf fortsetzen könnten und nicht darin durch das Konkavglas beeinträchtigt würden, gerade an dem Punkte ihre Vereinigung fänden, welcher den negativen Brennpunkt der Linse bildet. Bei einer solchen Beeinflussung der Lichtstrahlen werden diese bekanntlich nach ihrem Durchgange durch die Konkavlinse parallel sein, also jene Eigenschaft besitzen, welche nothwendig ist, damit sie auf der Netzhaut des Auges *A* zum deutlichen Bilde vereinigt werden. Wir können hier nicht analog wie bei Hypermetropie die Konkavlinse durch einen physiologischen Prozess ersetzen. Das Auge vermag durch seine Akkommodation sich eine Konvexlinse gleichsam zuzulegen, d. h. seine Brechkraft zu vermehren, vermag aber nicht sich eine Konkavlinse zuzulegen, d. h. einen Theil seiner vom Hause aus ihm zukommenden Brechkraft, gleichsam eine schwächere Konvexlinse, als es repräsentirt, sich wegzunehmen und so seine ursprüngliche Brechkraft herabzumindern. Das Auge muss also, um dies doch zu erreichen, zu einem optischen Hilfsmittel, zu einer Glaslinse seine Zuflucht nehmen und so wird das emmetropische Auge *A* vom Grunde des myopischen Auges *B* nur mit Hilfe einer Konkavlinse, aber auch in diesem Falle ein deutliches, aufrechtes und virtuelles Bild empfangen.

Wir können uns aber in diesem Falle, wenn das zu untersuchende Auge *B* myopisch ist, noch in anderer Weise ein deutliches Bild verschaffen. Nehmen wir an, die Myopie des Auges *B* wäre hochgradig, sie betrüge z. B. $\frac{1}{3}$; d. h. der Fernpunkt des Auges liegt 3″ vor seinem Knotenpunkte. Die aus diesem Auge kommenden

Lichtstrahlen werden, wie uns bereits geläufig ist, in einer Entfernung von 3″ (wir werden hier der Kürze halber die Entfernung des Knotenpunktes von der Cornea im weiteren Verlaufe, so lange diese Distanz für unsere Zwecke nicht einschlägigere Bedeutung gewinnt, vernachlässigen und nur einfach die Entfernungen als von der Cornea aus gemessen, angeben, uns dabei aber stets vorstellen, dass sie vom Knotenpunkte aus berechnet sein müssen) vom Auge, im Punkte *b* (Fig. 7) ihre Vereinigung finden. An dieser Stelle der Kreuzung der Lichtstrahlen entsteht ein sogenanntes reelles, d. h. ein wirkliches Bild, welches man

Fig. 7.



auf einem Schirme auffangen, und falls der Schirm eine chemisch präparirte Platte wäre, auch photographiren kann. Es handelt sich also hier im Gegensatze zu den früher genannten virtuellen Bildern, welche eben, weil sie nicht durch Strahlenvereinigung zu Stande kommen, nur scheinbare Bilder darstellen, wie die unserer gewöhnlichen Toilettenspiegel, um ein veritables, um ein — sit venia verbo — greifbares Bild, welches an der Stelle seiner Entstehung in der Luft schwebt und welches deshalb und weil es nicht aufrecht, wie die virtuellen Bilder, sondern umgekehrt ist im Verhältnisse zum Leuchtobjecte — dasselbe ist hier der Augengrund von *B* — den seit lange eingebürgerten Namen des umgekehrten Luftbildes führt. Wenn nun das beobachtende Auge *A*, wie das die obenstehende Fig. 7 veranschaulicht, sich auf einige Entfernung z. B. auf die von 9″ von diesem 3″ vor dem Auge *B* befindlichen Bilde begibt, und seinen dioptrischen Apparat für diese Entfernung einstellt, d. h. so akkommodirt, als ob es einen beliebigen 9″ entfernten Gegenstand anschauen wollte, oder um sich die Akkommodation zu ersparen, eine Konvexlinse von 9″ Brennweite bei entspannter Akkommodation vorlegt, so wird es zur Anschauung dieses umgekehrten Luftbildes gelangen.

Die Art und Weise, wie wir in diesem Falle sehen, ist ganz dieselbe, nach welcher wir das Bild eines Objektes sehen, welches sich ausserhalb der Brennweite einer Loupe befindet. Die Loupe ist hier durch den dioptrischen Apparat des myopischen Auges repräsentirt, das Objekt der Fundus oculi, welcher ja bekanntlich bei Myopie ausserhalb der Fokaldistanz gelegen ist.

Resumiren wir das bisher Gesagte, so finden wir, dass das untersuchende emmetropische Auge unter der Voraussetzung, dass es seine Akkommodation in seiner Gewalt hat, d. i. dass es dieselbe nach Belieben anspannen oder entspannen kann, mit Hilfe der HELMHOLTZ'schen Beleuchtungsmethode zur klaren Anschauung gelangen kann, u. zw. im virtuellen aufrechten Bilde und ohne artifizielle optische Hilfsmittel des Augengrundes.

1. des emmetropischen akkommodationslosen Auges;

2. des hypermetropischen akkommodationslosen Auges, u. zw. unter Zuhilfenahme der eigenen Akkommodationskraft.

3. Dass es im reellen umgekehrten Bilde zur klaren Anschauung gelangen kann des Grundes des hochgradig myopischen Auges ohne optisches Hilfsmittel. — Theoretisch könnte man jedes myopische Auge ohne Rücksicht auf den Grad der Myopie im umgekehrten Luftbilde ohne optische Hilfsmittel sehen; doch ist es klar, dass dieser Versuch in absteigendem Verhältnisse zum Grade der Myopie, d. h. je geringer dieser würde, um so schwieriger und endlich aus technischen Gründen gar nicht ausführbar wäre. Wenn wir z. B. den Grund eines Myopie $\frac{1}{16}$ bietenden Auges im umgekehrten Luftbilde sehen wollten, so müssten wir uns, da das Bild 16″ vor diesem Auge in der Luft schwebt und wir, wie früher auf eine Distanz von wenigstens 9″ dieses ansehen wollen — da bei grösserer Annäherung das untersuchende Auge sich bedeutend anstrengen müsste und für die Dauer selbst mit Hilfe eines Konvexglases es nicht aushielte — auf eine Entfernung von 25″ begeben. Ist die Myopie noch geringer, z. B. $\frac{1}{24}$, so müssen wir 33″ weit und bei einer $M\frac{1}{60}$ endlich 69″ weit vom zu untersuchenden Auge uns entfernen. Bei solchen Distanzen ist aber die Beleuchtung, deren Intensität in umgekehrt geometrischer Proportion zur Entfernung steht, eine so schwache, dass das Bild uns in sehr unklaren Umrissen erscheint oder gar nicht mehr wahrnehmbar ist. Dazu kommt aber noch etwas. Das umgekehrte Luftbild hat eine bestimmte Grösse, welche um so bedeutender ist, je mehr es vom optischen Zentrum der dasselbe erzeugenden Linse absteht; das Bild steht aber um so mehr von dieser Linse ab, je grösser deren Brennweite, d. h. je schwächer ihre lichtbrechende Kraft ist. Da nun bei $M\frac{1}{16}$ z. B. die Linse, welche gleichsam als Repräsentant der Myopie dieses Auges angesehen werden muss, eine sehr grosse Brennweite hat, nämlich 60″, so wird das Bild auch sehr weit abstehen und im Verhältniss zu dieser Entfernung nimmt auch die Bildgrösse zu und wird schon bei geringeren Distanzen ganz enorm sein, während das Gesichtsfeld im Verhältniss zur Bildgrösse abnimmt, und bei 60″ so ungeheuer, dass wir nicht mehr ein einzelnes Objekt, z. B. ein Netzhautgefäss, auf einmal und als solches wahrnehmen, sondern dasselbe erscheint uns nur in einem unbestimmten röthlichen Lichtschimmer. Deshalb können wir bei mässiger Kurzsichtigkeit das umgekehrte Luftbild, wohl gemerkt, ohne optisches Hilfsmittel nicht erzeugen, sondern nur bei höheren Graden. Wo diese anfangen, dafür ist keine bestimmte Grenze gesetzt, der erfahrene Untersucher weiss dies schon beiläufig. Man kann z. B. schon bei $M\frac{1}{8}$ einzelne Details im umgekehrten Bilde sehen, aber kein Gesammtbild erhalten, weil die Vergrösserung schon zu stark ist. Am besten gelingt es bei mindestens $M\frac{1}{3}$ und natürlich um so leichter und ein um so besseres Gesammtbild bietend, je höhergradig die Myopie von $\frac{1}{3}$ angefangen ist.

4. Wir finden weiters, dass das untersuchende emmetropische Auge ein wenn auch undeutliches, so doch immerhin zur Wahrnehmung von Details zuweilen hinreichendes, aufrechtes virtuelles

Bild erhalten wird vom nicht hochgradig kurzsichtigen Auge ohne optische Hilfsmittel und natürlich ein um so tauglicheres Bild, je geringer, je näherstehend der Emmetropie die Myopie des Auges *B* ist, und ein um so weniger verwendbares, um so verschwommeneres, je höhergradig die Myopie von *B* ist, bis bei einem gewissen Grade die Undeutlichkeit so weit steigt, dass man von der Untersuchung gar keinen Nutzen mehr ziehen kann.


5. Wir finden endlich, dass wir als Emmetropen optischer Hilfsmittel nur dann bedürfen, wenn wir das myopische Auge, gleichviel welcher der Grad der Myopie ist, oder das emmetropische oder hypermetropische Auge, wenn diese beiden letzteren nicht, wie sub 1 und 2 vorausgesetzt, im akkommodationslosen Zustande sich befinden, sondern willkürlich oder unwillkürlich für irgend welche positive endliche Entfernungen eingestellt sind, im deutlichen aufrechten Bilde sehen wollen.

Wir sehen also, dass der mit Gewandtheit und Uebung über seine jedenfalls nothwendigerweise von der Natur wohl beschaffene Akkommodation verfügende Emmetrope in den meisten Fällen beim Ophthalmoskopiren sich ohne künstliche Mittel zurechtfinden wird. Wie es dem untersuchenden Myopen oder Hypermetropen ergeht, das auseinanderzusetzen, müssen wir uns für eine andere Gelegenheit vorbehalten, obwohl einzelne, bei den praktischen Uebungen unbedingt erforderliche Angaben hierüber noch im Verlaufe dieses Vortrages ihren passenden Platz finden werden. Wir müssen uns aber vorläufig mit unserem emmetropischen Paradigma begnügen, für welches also optische Hilfsmittel nur ausnahmsweise nothwendig sind. Diese optischen Hilfsmittel sind Konkavgläser. Nehmen wir ein Beispiel an. *B* sei kurzsichtig, seine Myopie betrage $^1/_{12}$; *A* wie immer emmetropisch und akkommodationslos. Die Strahlen kommen aus *B* konvergent u. z. so, dass sie sich 12″ vor *B* vereinigen würden. Die Distanz zwischen *A* und *B* betrage 2″; — wir werden später sehen, dass diese Distanz in der Praxis begründet und die häufigst vorkommende ist — die Lichtstrahlen fallen also auf die Cornea von *A* so konvergent auf, dass, wenn sie ihre Richtung, die dadurch geändert wird, dass sie die optischen Medien von *A* passiren, beibehalten könnten, sie an einem Punkte ihre Vereinigung fänden, welcher 10″ hinter dem gelegen ist, wo sich soeben die Cornea von *A* befindet; so aber werden sie im Innern von *A* noch mehr konvergent gemacht und finden ihre Vereinigung sehr rasch, noch bevor sie bis zur Netzhaut von *A* gelangten, auf dieser entsteht deshalb kein deutliches Bild, weil dieses schon im Glaskörper entstand. Wenn wir nun aber vor die Cornea von *A* — die Distanz zwischen dem Glase und der Cornea, obwohl sie nicht ohne optische Bedeutung ist, können wir hier vernachlässigen — ein Konkavglas von 10″ negativer Brennweite setzen, so werden die Lichtstrahlen, welche ja sonst ihren Vereinigungspunkt gerade dort gefunden hätten, wo der negative Brennpunkt dieses Glases ist, in Folge der lichtbrechenden Wirkung dieser Linse nach dem Durchgange durch dieselbe, also gerade da sie auf die Cornea von *A* fallen sollen, parallel gemacht sein, in welchem Zustande sie sich ja befinden sollen, um auf der Retina von *A* ein deutliches Bild zu erzeugen.

Wir können aber ausser der hier ausführlich besprochenen Methode des aufrechten Bildes auch noch ein jedes Auge, nicht allein das hochgradig kurzsichtige, sondern auch das emmetropische, hypermetropische und nicht hochgradig kurzsichtige, nach der Methode des umgekehrten Bildes untersuchen, einfach dadurch, dass wir es in ein hochgradig kurzsichtiges verwandeln, durch Vorsetzen einer stark brechenden Konvexlinse.

Wenn wir uns vorstellen, wie dies Fig. 8 zeigt, dass das zu untersuchende Auge *B* emmetropisch ist, so treten die Lichtstrahlen aus ihm parallel aus. Wenn wir nun vor dieses Auge eine Konvexlinse von kurzer Brennweite, z. B. von 3″ setzen, so werden die auf sie parallel fallenden Strahlen nach den allgemeinen Linsengesetzen in ihrem Brennpunkte, also 3″ von ihrem optischen Centrum und etwa 4″ vom Auge, falls die Distanz, wie wir annehmen wollen, zwischen diesem und dem Glase 1″ beträgt, zum reellen, umgekehrten, deutlichen Bilde vereinigt werden, welches wir, in derselben Weise, wie wir bereits beim hochgradig kurzsichtigen Auge zeigten, ansehen können. Ist *B* nicht emmetropisch, so macht das keinen wesentlichen Unterschied, dieser bezieht sich dann blos auf den Ort und die Grösse des Bildes, indem dasselbe, wenn *B* hypermetropisch ist, so dass die aus ihm kommenden Strahlen später, also entfernter von der Linse als der Brennpunkt ist, vereinigt werden, entfernter liegen und grösser sein, dagegen kleiner sein und der Linse näher als der Brennpunkt liegen wird, nämlich innerhalb der sogenannten Brennweite, wenn *B* myopisch ist, so dass die aus diesem kommenden konvergenten Strahlen, durch die Linse noch konvergenter gemacht, sich rascher, also der Linse näher, sammeln und das Bild erzeugen.

Fig. 8.



Bevor wir nun weiters über den unterschiedlichen Werth, die optische Bedeutung und die praktische Verwendbarkeit, sowie über die sonstigen Unterschiede der beiden genannten Untersuchungsmethoden, im aufrechten und umgekehrten Bilde sprechen, müssen wir hier einiges über die beim Ophthalmoskopiren in Anwendung zu ziehende Beleuchtung sagen.

Es ist nicht gleichgiltig, welche Art von Lichtquelle beim Ophthalmoskopiren benützt wird, ebensowenig darf die Quantität des in das Auge zu werfenden Lichtes ohne Berücksichtigung bleiben. Jedes andere, bei künstlicher Beleuchtung zu untersuchende Organ kann ohne weiters bei reflektirtem Tageslichte angesehen werden, ja wird am besten bei Tagesbeleuchtung untersucht, weil das weisse Licht das Objekt am meisten erhellt und die Wahrnehmbarkeit von Details erleichtert. Im Auge aber handelt es sich darum, eine Beleuchtungsart

zu wählen, bei welcher die natürliche Färbung des Augengrundes am wenigsten verändert wird und bei welcher doch eine genügende, die Unterscheidung von Einzelheiten gestattende Intensität der Beleuchtung zu erzielen ist. Wenn nämlich ein beliebig gefärbtes Objekt durch intensives Licht angesehen wird, so verliert sich nach HELMHOLTZ [17]) die ursprüngliche Färbung „in der Weise, dass“ . . . sie sich „dem Weiss oder Weissgelb nähert. Am leichtesten geschieht dies mit dem Violett“, aber auch mit der blauen Farbe geht diese Veränderung sehr leicht vor, so dass sie sich also „bei steigender Lichtstärke gleichsam mit Gelb zu mischen scheint“. [18]) Es ist deshalb nicht einerlei, ob wir viel oder wenig Licht in's Auge werfen, und weiters durchaus von verschiedenem Effekte, ob wir bei Gas- oder Petroleumlicht, welche wenig, oder bei der Flamme einer Oellampe, welche verhältnissmässig mehr gelbes Licht enthält, untersuchen; jedenfalls aber sind die Farbennuancirungen stets andere, je nach der Art der Lichtquelle. Die Angaben, welche wir im Verlaufe über Färbungen einzelner Objekte des Augengrundes machen werden, beziehen sich auf Ergebnisse, wie sie bei Beleuchtung durch eine gewöhnliche gut brennende Oellampe, die auf der v. JAEGER'schen Klinik ausschliesslich in Verwendung steht, gewonnen werden.

Die Beleuchtung muss aber ihrer Intensität nach auch verschieden gewählt werden, je nachdem man im aufrechten virtuellen oder im umgekehrten reellen Bilde zu untersuchen beabsichtigt. Während das erstere, bei welchem der Untersucher dem anzuschauenden Auge sich möglichst nähert, schon bei einer mässigen Erleuchtung, wie sie zum Beispiel durch Reflexion des Lichtes einer Oellampenflamme nach HELMHOLTZ' Vorgange vermittelst einer gewöhnlichen planparallelen durchsichtigen Glasplatte, oder besser mehrerer solcher übereinander gelegter Platten erreicht wird, hinreichend sichtbar ist, um Detailstudien zu ermöglichen, bedarf es zur deutlichen Wahrnehmung des letzteren, von welchem sich ja der Untersucher und gleichzeitig auch und noch mehr von dem zu untersuchenden Auge bis auf eine gewisse, meistens ca. 12″ betragende Distanz entfernen muss, einer weit stärkeren Beleuchtung. Wenn wir also über den Unterschied beider Untersuchungsmethoden urtheilen sollen, so muss dieses Urtheil zum Theil mit dem über die Bedeutung der unterschiedlichen Beleuchtungsgrade zusammenfallen, indem in der Regel beim aufrechten Bilde eine schwache Beleuchtung verwendet wird, wiewohl eine starke die Wahrnehmbarkeit im Allgemeinen nicht verhindert, beim verkehrten jedoch stets eine starke Beleuchtung nothwendig ist.

Nachdem aber intensive Erleuchtungsgrade unter gewöhnlichen Verhältnissen, d. h. wenn die brechenden Medien des Auges klar und durchsichtig sind, zum mindesten überflüssig, in der weitaus grösseren Zahl der Fälle aber störend und sogar nachtheilig sind, so ergibt sich aus diesem Grunde vorläufig von selbst, dass wir das aufrechte Bild dem umgekehrten vorziehen müssen.

Die starke Beleuchtung des zu untersuchenden Auges und

---

[17]) Physiol. Optik pag. 233.
[18]) l. c. pag. 319.

durch dieselbe die Methode des umgekehrten Bildes schliesst folgende Nachtheile in sich:

1. Die starke Beleuchtung ist dem zu untersuchenden Auge unangenehm, es ist geblendet, dasselbe wird unruhig, bewegt sich fortwährend, ermüdet sehr bald, thränt auch leicht und erschwert dadurch die genaue Untersuchung, ja macht sie zuweilen unmöglich. Unter abnormen Verhältnissen, z. B. bei Retinitis kann sogar eine zu starke Beleuchtung von erheblichem Nachtheile und selbst von Erblindung begleitet sein. Jedenfalls wird selbst dem gesunden Auge von schwachem Lichte weniger Schaden erwachsen, als durch die Blendung in Folge von grossen Lichtintensitäten.

2. Das grelle Flammenbild bei starker Beleuchtung fesselt stets die Aufmerksamkeit des zu Untersuchenden, welcher dasselbe, anstatt in die Ferne hinzustarren, stets fixirt und so erstens nicht nur seinen natürlichen Refraktionszustand maskirt und die Wahrnehmbarkeit von Details veränderten Bedingungen unterwirft, sondern auch theilweise zur Verengerung der Pupille durch die Akkommodation beiträgt und zweitens dadurch seine Macula lutea, also diejenige Partie des Augengrundes einstellt, welche am wenigsten Licht reflektirt, dafür die anderen vom Untersucher gewünschten, dem Blicke desselben entzieht.

3. Die intensive Beleuchtung bewirkt, dass sich die Pupille des zu untersuchenden Auges ad maximum kontrahirt und so den durch das starke Licht angestrebten Zweck, eine grössere Helligkeit zu erlangen, illusorisch macht, weil man bei dem aus der engen Pupille kommenden Lichte kaum etwas zu sehen vermag, während die in der Dunkelheit sich einstellende spontane Pupillenerweiterung durch die schwache Beleuchtung fast gar nicht verändert wird.

4. Der Reflex, welchen die Hornhaut nach den für den Konvexspiegel geltenden Gesetzen von allen in positiver Entfernung befindlichen Leuchtobjecten, also auch von der beim Ophthalmoskopiren verwendeten Leuchtquelle entwirft, ist natürlich um so stärker und sofort um so störender, je intensiveres Licht diese aussendet.

5. Wie bereits angedeutet, wird der natürliche Farbenton des Augengrundes und der einzelnen Objekte desselben durch das starke Licht wesentlich verändert und vermögen wir deshalb über die zuweilen sehr wichtige Färbung mancher Theile nur bei dem schwachen Lichte des aufrechten Bildes gehörigen Aufschluss zu erlangen. Ich erinnere mich bei dieser Gelegenheit, in einem Falle Flecke am Augengrunde gesehen zu haben, die von Allen, welche vor mir (im umgekehrten Bilde) untersucht haben, für Blutextravasate gehalten wurden, und die ich im aufrechten Bilde für Pigmentflecke erkannte und die bald darauf von Herrn Prof. v. Jaeger auch als solche bestätigt wurden. Freilich ist hierbei auch die Wirkung der verschiedenartigen, bei beiden Methoden in Betracht kommenden Vergrösserungsverhältnisse ebenfalls von Einfluss.

Wenn nun jedes einzelne der hier angeführten Momente die Augenspiegeluntersuchung in hohem Grade erschweren kann, um wie viel mehr muss dies der Fall sein, wenn alle zusammenwirken, was ja thatsächlich so häufig geschieht. Die Untersuchung im umgekehrten Bilde ist deshalb hauptsächlich wegen der dabei zu benützenden starken Beleuchtung

für gewöhnlich nicht mit viel Vortheil anwendbar. Dazu kommt aber noch, dass wir

6. bei der Untersuchung im aufrechten Bilde ein ziemlich einfaches optisches System haben, während die Untersuchung im umgekehrten Bilde ein komplicirtes, aus dem Auge des Untersuchers und des zu Untersuchenden, dem Konkavspiegel als Reflektor, der das umgekehrte Bild erzeugenden Konvexlinse von kurzer Brennweite und in den meisten Fällen auch noch einer zweiten, hinter dem Reflektor anzubringenden, die Akkommodation des Untersuchers ersetzenden Konvexlinse von ebenfalls ziemlich kurzer Brennweite (etwa 8″), also aus vielen lichtbrechenden und reflektirenden Flächen und Körpern sich zusammensetzendes optisches System erheischt, an dessen einzelnen Begrenzungsflächen eine vielfache, und da die einzelnen Spiegelbilder nur zum Theil sich decken und so an Ausdehnung sehr gewinnen, dadurch sehr störende Reflexion des Lichtes, noch mehr aber wegen der ziemlich bedeutenden sphärischen Krümmung derselben eine bedeutende chromatische und achromatische Aberration desselben stattfindet wodurch das Zustandekommen scharfer Bilder unmöglich ist und blos verschwommene, verzerrte Bilder gesehen werden, die sich nicht weiter verwerthen lassen.

7. Im aufrechten Bilde sehen wir die Objekte des Augengrundes in ihren natürlichen Lagerungsverhältnissen, im umgekehrten Bilde aber wird die Orientirung wenigstens bedeutend erschwert.

8. Im aufrechten Bilde erhalten wir eine sehr bedeutende Objektivvergrösserung u. z. nach SCHWEIGGER eine achtfache, nach MAUTHNER und HELMHOLTZ eine mehr als vierzehnfache, nach ED. JAEGER eine nahezu fünfzehn- bis vierundzwanzigfache, ja unter Umständen sogar eine nahezu vierzigfache Vergrösserung, während im umgekehrten Bilde nur eine geringe, eine zwei- bis drei-, allenfalls vierfache und nur in seltenen Fällen und zwar bei hochgradiger Hypermetropie eine stärkere Vergrösserung erzielt wird. Dass das Studium der Details nur bei so starken Vergrösserungen mit Vortheil durchzuführen und unsere Kenntnisse zu bereichern vermag, muss wohl nicht erst betont werden. Ich habe diesen Punkt zu allerletzt abgehandelt, weil er mir der wichtigste zu sein schien, weil er schon für sich allein den dem aufrechten Bilde einzuräumenden Vorrang zu dokumentiren im Stande wäre.

Die Einwendungen, dass man den Einfluss des konzentrirten Lichtes auf die Weite der Pupille und auf die aus der Intensität des Kornealreflexes sich ergebenden Unbequemlichkeiten durch Atropinisirung paralysiren könne, ist aus zwei Gründen nicht stichhaltig, und zwar, weil damit eben nur das eine oder andere hier namhaft gemachte Hemmniss beseitigt würde, die anderen aber in ihrer Bedeutung ungeschwächt fortbestünden, dann aber, weil die Atropinisation ein nicht in allen Fällen anwendbares Mittel ist. Die Kranken, die sich einmal atropinisiren liessen, ohne den Effekt dieses Vorganges früher zu kennen oder vom Arzte zu erfahren, dulden es ein zweites Mal nur ungern oder gar nicht und die durch die Mydriasis erzeugte Sehstörung steht in ihrer Dauer und unbehaglichen Wirkung auf das Individuum häufig genug in gar keinem Verhältnisse zu dem Ergebnisse der Untersuchung oder zu dem Grade von ärztlicher Leistung, die man ihm angedeihen lassen kann.

Von Ausnahmsfällen, in welchen wegen genauer Untersuchung selbst im aufrechten Bilde eine Pupillenerweiterung dringend und absolut nothwendig ist, muss natürlich hier abgesehen werden. Auch ist die Atropinisation zuweilen unwirksam, z. B. bei alten Leuten, bei denen selbst auf energische Einträufelung keine erhebliche Erweiterung zu erzielen ist, oder bei Synechien oder Entzündungs- und Reizzuständen der Iris. Jedenfalls aber wird die Untersuchung wenigstens etwas verzögert, denn zuweilen tritt die Wirkung erst nach 10 Minuten oder $^1/_4$ Stunde ein oder lässt noch länger auf sich warten. Von dem falschen Urtheile der Kranken oder der Angehörigen derselben, welches sehr oft eine Verschlimmerung des Leidens oder geradezu eine Erzeugung von Schlechtsehen oder Erblindung auf die Instillation zurückführt, ganz abgesehen, können doch in einzelnen Fällen wirkliche Nachtheile erzeugt werden, z. B. bei bestehendem glaukomatösem Leiden oder selbst bei einem scheinbar ganz gesunden Auge, in welchem vielleicht das Glaukom latent ist, der Ausbruch desselben gefördert werden, wie ich das bei Individuen beobachtete, denen ein Auge wegen Glaukoms operirt wurde, während das andere, scheinbar ganz gesunde, unmittelbar nach der Atropinisirung, etwa nach 12—24 Stunden, den Ausbruch entzündlichen Glaukoms erlitt. Wenn wir zum Schlusse noch bedenken, dass das Atropin immerhin häufig genug, entweder dadurch, dass es durch die Thränenwege abfliesst oder selbst bei den skrupulösesten Kautelen, eine solche Verbreitung zu verhüten, doch Intoxikationserscheinungen hervorruft, so muss wohl selbst der Hartnäckigste zugeben, dass die Atropinisirung durchaus kein gleichgiltiges, jedenfalls ein nur ausnahmsweise zu ergreifendes Auskunftsmittel ist und dass wir billig von jedem Ophthalmoskopiker zu fordern berechtigt sind, dass er auch ohne künstliche Mydriasis zu untersuchen im Stande sei, was ja, wie wir sahen, im aufrechten Bilde auf's leichteste gelingt.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass wir mit Vortheil in der Regel nur das aufrechte Bild benützen werden und zum umgekehrten nur ausnahmsweise u. z. dann unsere Zuflucht nehmen werden, wenn die Untersuchung im aufrechten Bilde zur Unmöglichkeit geworden, oder wenn wir dieses in einzelnen Fällen wirksam kontroliren wollen. Das erstere ist der Fall, wenn die brechenden Medien stark getrübt sind, oder wenn hochgradige Myopie zugegen ist. Da tritt das umgekehrte Bild in seine Rechte ein, ohne aber desshalb das aufrechte uns ersetzen zu können, allein man muss sich in solchen Fällen begnügen, überhaupt etwas sehen zu können. Freilich können so genaue Studien damit niemals gemacht werden wie im aufrechten Bilde, auf welche man eben dann gezwungen ist, zu verzichten. — Das letztere ist beispielsweise der Fall bei der ophthalmoskopischen Untersuchung auf Astigmatismus, wie wir das an anderer Stelle sehen werden. Wo das umgekehrte Augenspiegelbild ein ganz anderes Ergebniss liefert, als das aufrechte, wie es z. B. bei Untersuchung der Macula lutea der Fall ist, gewinnt natürlich das erstere eine ganz besondere Bedeutung.

Der Rath, der gewöhnlich ertheilt wird, die Untersuchung nach beiden Methoden vorzunehmen u. z. zuerst im umgekehrten Bilde,

welches eine grössere Uebersicht verschafft, indem dabei das Sehfeld grösser ist, um so einen allgemeinen Eindruck zu gewinnen, und dann erst behufs genauerer Betrachtung der Einzelheiten im aufrechten Bilde, ist nur mit einiger Beschränkung zulässig. Durch die Verengerung der Pupille büsst nämlich das Sehfeld bedeutend an Ausdehnung ein und man kann höchstens durch rasche Durchmusterung der einzelnen Partien des Augengrundes nach einander einen Ueberblick gewinnen, nicht aber grosse Partien auf einmal sehen. Will man aber durch Zusammensetzung von Theilen ein Gesammtbild sich konstruiren, so kann man dies bei einiger Uebung im aufrechten Bilde eben so gut, ja fast noch besser und fast ebenso schnell. Jedenfalls aber ist es zweckmässiger, zunächst im aufrechten Bilde zu untersuchen und erst, wenn dies durchgeführt, sich durch das umgekehrte Bild gewissermassen rasch ein Resumé zu verschaffen. Untersucht man früher bei der intensiven Beleuchtung des umgekehrten Bildes, so wird schon dadurch das Auge unruhig und für den nun folgenden wichtigeren Theil der Untersuchung im aufrechten Bilde ungeeignet gemacht, der Kranke wird von vorneherein durch die Blendung misstrauisch und empfindsam gemacht und sehnt das Ende der Untersuchung herbei. Wird aber zunächst das schwache Licht des aufrechten Bildes benützt, das dem Krauken gar keine Beschwerden verursacht, so hält er besser aus, gewinnt mehr Vertrauen und gewöhnt sich allmälig an die Beleuchtung des Auges, die zum Schlusse, selbst wenn deren Intensität gesteigert wird, ihn nicht erheblich belästigt. Die Einleitung der Untersuchung mit Benützung des aufrechtes Bildes bietet aber auch den Vortheil, dass man sich die Ueberzeugung verschaffen kann, ob der Zustand des Auges die starke Beleuchtung überhaupt verträgt und ob nicht vielleicht pathologische Zustände die starke Beleuchtung verbieten. Beim Beginnen mit dieser könnte man, ohne es zu wissen, schon geschadet haben, noch ehe man ein Urtheil über den Grund des Bedürfnisses nach Untersuchung erhält. Schliesslich bleibt es ja Jedem noch immer unbenommen, falls die schwache Beleuchtung, was man nicht immer voraussehen kann, resultatlos bleibt, zur starken überzugehen und ist es jedenfalls zweckmässiger diese Reihenfolge des Steigens einzuhalten als den umgekehrten Weg des Fallens in der Intensität, weil, wenn man bereits an eine gewisse Lichtstärke gewöhnt ist, das Sehen bei Herabsetzung derselben schwieriger ist, als wenn man von Anfange her sich derselben bediente. Von welch' kardinaler Bedeutung aber die schwache Beleuchtung bei Untersuchung mancher krankhafter Veränderungen, besonders der brechenden Medien ist, davon zu handeln müssen wir uns an anderer Stelle vorbehalten.

Nachdem wir nun über das Prinzip der Augenspiegeluntersuchung und über die Art und Weise, wie bei derselben vorzugehen ist, Klarheit gewonnen haben, wollen wir uns von dem Objekte derselben, vom Augengrunde u. z. zunächst, wie er unter normalen Verhältnissen sich präsentirt, Kenntniss verschaffen.

Der Augengrund setzt sich aus drei wesentlichen Faktoren zusammen, nämlich aus der Aderhaut, der Netzhant und der Eintrittsstelle des Sehnerven, von welchen wir jeden einzeln für sich betrachten wollen.

Die Aderhaut.

Um das Augenspiegelbild derselben zu verstehen, müssen wir uns deren anatomischen Bau wenigstens oberflächlich vergegenwärtigen. Sie besteht, wie wohl bekannt, von der Retina gegen die Sclerotica gerechnet, aus folgenden Schichten:

1. Die Schichte der sechseckigen Zellen, welche bei den meisten Menschen mit mehr weniger dunkelbraunem Pigment gefüllt und nur bei leukotischen Menschen und Thieren ganz pigmentlos sind, welche Schichte im Verlaufe unserer Vorträge den Namen der Pigmentepithelschichte oder nur kurzweg des Epithelstratums führen wird. Obwohl dieses Stratum, soweit aus der Entwicklungsgeschichte hervorgeht, als noch zur Netzhaut gehörig angesehen werden muss, indem es ebenso wie die Retina aus der sekundären Augenblase u. z. aus dem äussern Blatte derselben, während die Netzhaut aus dem innern Blatte entsteht und thatsächlich auch als solche angesprochen und von manchen Autoren als die Pigmentschichte der Netzhaut bezeichnet wird [19]), will ich hier doch davon absehen, und zwar hauptsächlich deswegen, weil die Verhältnisse der Lichtbrechung und Lichtabsorption, welche bei unserem Gegenstande eine so hochwichtige Rolle spielen und welche, wie wir sehen werden, durch die ganze Dicke der Netzhaut so gleichmässig bleiben, an dieser Schicht eine so plötzliche Veränderung erfahren, dass es von diesem Standpunkte aus gerechtfertigt erscheint, sie von der Retina zu sondern.

2. Die elastische oder Glaslamelle, eine strukturlose Membran, wie ihr Name zeigt.

3. Die Choriocapillaris.

4. Die Membrana propria Chorioideae, welche neben anderen wie bindegewebigen, zelligen, muskulösen Elementen, hauptsächlich aus dem Netze der grösseren Aderhautgefässe, und aus einer mehr weniger grossen Menge pigmentirter Zellen besteht, welche letztere zum Unterschiede vom Epithelpigmente als das Stromapigment der Aderhaut bezeichnet werden.

5. Endlich die Lamina fusca oder Ruyschiana. [20])

Für uns haben hier nur die erste und vierte der genannten Strata ein Interesse, weil nur sie auf den Augenspiegelbefund einen Einfluss nehmen.

Alles Licht, welches nämlich von Aussen kommend, in das Innere des Auges dringt und welches nicht an einzelnen Partien der Medien oder der Netzhaut reflektirt wird, schreitet ungehindert durch alle Medien des Auges und selbst durch die Netzhaut bis zum Pigmentepithelstratum vor, woselbst der grösste Theil absorbirt, ein kleiner Theil aber reflektirt wird. Es wird somit die Färbung des Augengrundes durch das

---

[19]) Schwalbe, Hdb. Graefe und Sämisch Bd. 1, pag. 357.

[20]) Wir können hier von den Ergebnissen der neueren anatomischen Forschungen, nach welchen ein Theil der lam. fusca als zur Sclerotica gehörig betrachtet werden muss (Schwalbe in Schulze's Arch. VI.) und ausser den Genannten noch einige zartere Schichten in die Zusammensetzung der Aderhaut eingehen (Sattler, Arch. f. Ophth. XXII, 2, pag. 1—100), abstrahiren und bei diesem älteren Schema verharren, weil die genannten Strata auf das ophthalmoskopische Bild ganz einflusslos sind.

Pigmentepithel bestimmt, welches uns die hinter demselben liegenden Gebilde zu sehen nicht gestattet. Natürlich spielt hierbei die stärkere oder mindere Pigmentirung, d. i. der grössere oder geringere Gehalt der Zellen an Pigment, dann die lichtere oder dunklere Färbung desselben eine wichtige Rolle, indem der Augengrund um so dunkler erscheinen wird, je stärker die Pigmentirung, und umgekehrt desto heller, je schwächer diese ist. Blondhaarige Individuen, bei denen im ganzen Körper und also auch im Auge weniger Pigment abgelagert ist, wie dies die blaue Iris beweist, haben deshalb einen im Allgemeinen lichter gefärbten Augengrund, als dunkelhaarige. Der Augengrund des Negers ist fast schwarz und der des Albino dafür ungemein hell und leuchtend. Die Färbung ist eine ziemlich gleichmässige und erscheint in der Umgebung des Sehnerven und an der Stelle der Macula lutea verhältnissmässig viel dunkler, an letzterer Stelle auffallend dunkel, indem hier eine weit grössere Menge von Pigment, welches da auch dunkler ist und die Zellen, in denen es eingeschlossen ist, grösser sind, angehäuft sich findet; von da aber nimmt die Färbung gegen den vorderen Bulbusabschnitt hin allmälig ab und während man an einem gut pigmentirten Individuum in dieser Gegend nichts als eine gleichmässige gelbbräunliche Färbung vor sich hat, kann man, der Peripherie sich nähernd, immer deutlicher die hinteren Gebilde, besonders einzelne der Chorioidealgefässe durchschimmernd, endlich ganz deutlich wahrnehmen. Wenn die Pigmentirung weniger dicht ist, die Zellen also spärlicher und mit lichteren Pigmentkörnern erfüllt sind, so sieht man die Gefässe der Chorioidea propria schon im Zentrum des Augengrundes, wenn auch nicht ganz deutlich, bei sehr schwacher Pigmentirung oder bei pathologischem Verluste des Epithelpigmentes aber sieht man ganz klar und scharf gezeichnet das Netzwerk der Chorioidealgefässe mit dem in den Interstitien desselben befindlichen und diese mehr weniger ausfüllenden, je nach Umständen blassgrau oder dunkelschwarzgrau oder schwarz erscheinenden Stromapigmente blossliegen. Ist das Individuum vollends pigmentlos, wie die albinotischen Menschen und Thiere (Kaninchen), so liegt die Chorioidea propria frei zu Tage und deren Intervaskularräume erscheinen von der dahinter liegenden Sclerotica glänzend weiss.

Von der Unversehrtheit des Chorioidealepithelpigmentes hängt daher die Gleichmässigkeit des fundus oculi ab, welche sofort verloren geht, wenn dieses Stratum physiologischerweise oder durch pathologische Prozesse irgendwie lückenhaft ist. Die Färbung des Augengrundes ist der Ausdruck der Färbung dieser Schichte und zu derselben trägt nur sehr wenig der von den Aderhautgefässen oder von den Gefässen der Netzhaut ausgehende und sich ihr zugesellende Schimmer bei. Natürlich ist die Farbe auch je nach dem Beleuchtungsgrade, den wir anwenden, verschieden, und unsere Angaben beziehen sich hier blos auf ein Beleuchtungsmass, welches durch Verwendung nicht foliirter Glasplatten in Form des nach HELMHOLTZEN'S Prinzipe konstruirten JAEGER'schen lichtschwachen Spiegels, über den wir noch sprechen werden, erzielt wird. Die Farbe, die wir hiebei vom Augengrunde gewinnen, ist nicht leicht zu definiren, sie hält die Mitte zwischen weissgelb, gelb-

roth, rothbraun, gelbbraun oder besser gesagt, sie besitzt von allen diesen Nuancen etwas und zwar herrscht bei lichthaarigen Individuen der weissgelbröthliche, bei dunkelhaarigen der gelbrothbräunliche Ton mehr vor. Wie die Farbe durch starke Erleuchtungsintensitäten, z. B. bei Verwendung einer foliirten Konkavplatte als Reflektors, verändert wird, kann man am besten aus dem Unterschiede ermessen, welcher sich selbst bei schwacher Beleuchtung in der Färbung des eben beleuchteten Bezirkes des Augengrundes, auf welchem also das Flammenbild entworfen ist, und der demselben unmittelbar benachbarten und beschatteten Partien ausspricht. Diese letzteren sind natürlich dunkler gefärbt als das direkt beleuchtete Gebiet. Und so glänzt auch bei Verwendung einer intensiven Lichtquelle, wie sie z. B. für's verkehrte Bild nöthig ist, Alles am Augengrunde weit mehr und diese bedeutende Erhellung dürfte das Wesentlichste zur ungerechtfertigten Popularität des verkehrten Bildes beigetragen haben, indem sie die Täuschung aufkommen liess, als ob man vermittelst derselben besser sähe. Wie unrichtig das ist, haben wir bereits gezeigt. Die hier geschilderte Färbung bleibt so lange aufrecht, als das Epithelpigment intakt ist und nicht die Eintrittsstelle des Sehnerven, welche ein glänzendes Licht verbreitet, dem untersuchenden Auge gerade zugekehrt ist. Ist das Pigmentstratum irgendwie defekt, so leidet die Färbung gleich, indem nun die hinter demselben liegenden Gebilde, die Chorioidea propria mit ihren Gefässen und unterschiedlich dunkel gefärbten Pigmentmassen, vielleicht auch gar Partien der Sclerotica, welche alle bis dahin vor unseren Blicken verborgen lagen, nunmehr hervortreten und das von ihnen ausgehende, nach deren Eigenthümlichkeiten gefärbte Licht dem Colorite des Augengrundes beimengen oder dasselbe ganz verdrängen, wenn die Defekte sehr ausgedehnt sind.

Der Augengrund zeigt ausserdem ein gekörntes oder, wie man sagt, chagrinirtes Aussehen, was sich aber nur bei der Vergrösserung des aufrechten Bildes sehen lässt und aus der Zusammensetzung der das Licht reflektirenden Pigmentschichte aus polygonalen oder 6eckigen Zellen erklärt.

Die Gefässe der Membrana propria sind als solche, wo sie sichtbar sind, leicht kenntlich und von anderen, z. B. den Netzhautgefässen, die einen eigenthümlichen Typus haben, leicht zu unterscheiden, und zwar indem sie ein vielfach verschlungenes, aus gleichmässig rothen oder orangefarbenen Streifen sich zusammensetzendes, länglich rhomboidale, eckige oder auch unregelmässige Lücken bildendes Maschenwerk, konstituiren, welches von entsprechend geformten Pigmentklumpen, die man wieder solchermassen von pathologisch neugebildetem Pigmente, wie auch durch die weit dunklere Färbung dieses letzteren auf's leichteste unterscheiden kann, ausgefüllt erscheint.

Da die übrigen in die Zusammensetzung der Choroiden eingehenden Schichten mit dem Augenspiegel niemals sichtbar sind, so kommen sie hier nicht weiter in Betracht.

Wir wenden uns nun zum zweiten Faktor, zur

Netzhaut.

Um ihre ophthalmoskopische Bedeutung zu erfassen, ist es gleichfalls nothwendig, uns einiges über ihre histologische Natur aus der Anatomie zu rekapituliren.

Bekanntlich besteht die Retina aus einer grossen Anzahl von Schichten, welche indessen noch nicht abgeschlossen zu sein scheint, indem dieselben in den letzten Jahren zum Schrecken aller Studirenden eine Vermehrung erfahren hat und eine noch weitere zu versprechen scheint.

Nach dem jüngsten Stande der Forschung zählt man, wenn man von der Pigmentepithelschichte absieht, wie wir das thaten, 9, eigentlich 10 Strata, und zwar von innen gerechnet: 1. Membrana limitans interna; 2. Nervenfaserschicht; 3. Ganglienzellen; 4. innere granulirte; 5. innere Körnerschicht; 6. äussere granulirte; 7ª äussere Faser —; 7. äussere Körnerschicht; 8. limitans externa; 9. Stäbchen und Zapfenschicht.[21]) Diese Schichten sind von einem System feiner radiär von vorne nach rückwärts angeordneter Fasern, der Radialfasern oder MÜLLER'schen Stützfasern, deren nervöse Natur H. MÜLLER in Abrede stellte, durchzogen. In welcher Weise diese Fasern einen Zusammenhang der einzelnen Schichten, namentlich der Nervenfaserschichte, mit den Stäben und Zapfen vermitteln sollen und welche ihre Funktion überhaupt ist, darauf, wie auf die ganze subtile Anatomie der Retina können wir uns hier umsoweniger einlassen, als selbst die so emsig betriebenen Forschungen der neuesten Zeit noch nicht im Stande waren, hinlängliche Klarheit in diese Sache zu bringen. Für unsere Zwecke hier reicht es aus zu wissen, dass, wie aus HEINRICH MÜLLER's Messungen hervorgeht[22]) die Netzhaut ihrer ganzen Dicke nach sowohl wie in ihren einzelnen Schichtungen von der Eintrittsstelle des Sehnerven, in dessen Umgebung sie die bedeutendste Mächtigkeit besitzt, gegen die Ora serrata hin allmälig sich verjüngt, und dass sie in der Umgebung der Macula lutea, eine Zunahme in der Dicke sämmtlicher Schichten, mit Ausnahme der Nervenfaserschicht, welche an Mächtigkeit abnimmt und bald ganz schwindet, besonders der Ganglienschicht, gewinnt und am gelben Flecke hauptsächlich durch das Fehlen der Nervenfasern dünner wird, — obwohl SCHULTZE's Untersuchungen dem widersprechen; jedenfalls wird die Verdünnung hier minimal sein — und dass sie schliesslich entsprechend der Fovea centralis, die eben nur dadurch zu Stande kommt, eine fast jähe Verdünnung erfährt, so dass sie hier fast nur $^1/_3$ der Dicke besitzt, wie in der Umgebung des Sehnerven.[23]) Diese letztere Verdünnung, die bis zur Bildung der Fovea centralis gedeiht, entsteht dadurch, dass zum Mangel der Nervenfaserschichte eine ziemlich rapide, wenn auch nicht in gleichem Grade erfolgende Abnahme der Ganglienzellen sowie noch 3 folgender Schichten sich hier hinzugesellt, um an der Fovea entweder ganz zu fehlen, wie die Nervenfasern und Ganglien, oder nur sehr zart entwickelt vorhanden zu sein. Dafür sind die Zapfen hier prävalirend an Zahl und Grösse gegenüber den anderen Stellen.

Das ophthalmoskopische Bild der Netzhaut ist mit wenigen Worten gegeben. Trotzdem die Retina aus einer so grossen Anzahl von Schich-

---

[21]) Schwalbe, Hdb. Graefe u. Sämisch Bd. 1.

[22]) H. Müller, Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. VIII. Schwalbe Hdb. v. Graefe u. Sämisch, pag. 360 u. 361.

[23]) Schematischer Durchschnitt der Mac. lut. und Fov. centr. Max Schultze in Stricker's Handb. Fig. 361, pag. 1024.

ten und aus so zahlreichen verschiedenartigen Elementen zusammengesetzt ist, ist dieselbe doch im höchsten Grade durchsichtig, was in dem nahezu ganz gleichen Brechungskoeffizienten der einzelnen Theile und selbst ihrer Gefässwände begründet erscheint.[24]) Die Durchsichtigkeit der Retina ist eine nahezu glasartige und deshalb können wir sie im Augenspiegelbilde als solche nicht sehen. In der That markirt sich die Retina durch nichts anderes als durch ihre grossen Gefässe, von welchen wir an anderem Orte handeln werden. Das capillare Blut aber, welches in ihr zirkulirt, verleiht ihr wohl einen ungemein zarten Schimmer, welcher aber ihre Diaphanität ebenso wenig beeinträchtigt[25]), wie ihre durch nichts weiter sich verrathende Gegenwart die Färbung des Augengrundes beeinflusst. Nur in der Umgebung der Eintrittsstelle des Sehnerven, wo sie eine beträchtlichere Dicke besitzt, markirt sie sich einigermassen durch einen leicht graulichen, radienstreifigen Reflex, welcher daselbst den Farbenton des Augengrundes ein wenig abschwächt.

Auch an der Stelle der Macula lutea gibt sich ihre Präsenz durch eine eigenthümliche Erscheinung kund, welche indessen noch nicht genügend studirt ist. Was man unter normalen Verhältnissen an dieser Stelle mit dem Augenspiegel im aufrechten Bilde sieht, wird von verschiedenen Beobachtern verschieden beschrieben; was man im umgekehrten Bilde sieht, besitzt wenigstens den Vorzug, eine Uebereinstimmung Aller für sich zu haben. Ich will deshalb von dem, was im aufrechten Bilde gesehen werden soll, ganz schweigen und nur hervorheben, dass es mir bei meinen zahlreichen Untersuchungen, während deren meine Aufmerksamkeit ganz auf die Stelle des deutlichsten Sehens konzentrirt war, niemals gelang, etwas Bestimmtes, etwa eine abgegrenzte, zirkumskripte Figur zu sehen, während ich in denselben Fällen im umgekehrten Bilde dasjenige sah, was auch Andere beobachteten. Ich befinde mich hier zu meiner Genugthuung in Uebereinstimmung mit ausgezeichneten Meistern der Ophthalmoskopie. Allerdings fällt hier auch im aufrechten Bilde eine dunklere Färbung auf, als die der Umgebung, allein diese hat keinen scharfen Rand und kommt nur durch allmälige Zunahme der Färbung zu Stande. Das einzige, was zu sehen ist, das ist ein weisslicher, glänzender Punkt, entsprechend der Fovea centralis, den auch JAEGER abbildet.

Im umgekehrten Bilde sieht man eine auffallend dunkel gefärbte querovale Partie, deren Gestalt nur dadurch hervortritt, dass sie von einem elliptiformen glänzenden weissen Streifen eingerahmt ist.[26]) Dieser letztere besitzt eine wahrnehmbare Breite und ist gegen die dunkle Partie scharflinig begrenzt, dagegen nach aussen hin sieht man zuweilen helle strahlige Lichtbüschel von ihm ausgehen. Diese Büschel sah ich deutlicher und ausgedehnter, also breiter, an der dem Sehnerven zugekehrten Seite, weniger markirt an der entgegengesetzten, am wenigsten und kaum angedeutet oben und unten. Die Lichtbüschel sind übrigens nicht in

---

[24]) Siehe Ed. Jaeger, Ergebnisse der Untersuchung mit dem Augenspiegel. 1876, pag. 59 u. 60.

[25]) Jaeger l. c. pag. 114.

[26]) Siehe Jaeger's Handatlas, Taf. V, Fig. 30.

allen Fällen, in denen man die Erscheinung sieht, zu beobachten. Im Durchschnitt sah ich dieselben häufiger bei dunkelhaarigen Individuen, bei denen ich auch das ganze hier beschriebene Bild leichter, klarer und bestimmter zur Anschauung bringen konnte, als bei blondhaarigen, bei denen der elliptische Streifen auch einen äusseren scharfgezeichneten Kontour zeigte. In manchen Fällen sieht man auch im umgekehrten Bilde nichts oder nur Andeutungen des hier Geschilderten. Die Untersuchung des gelben Fleckes gehört überhaupt zu den schwierigsten Aufgaben des Ophthalmoskopikers und darf es deshalb nicht Wunder nehmen, dass dessen physiologische wie auch pathologische Zustände noch so wenig Aufklärung erfahren haben und dass es bisher noch Keinem gelungen ist, eine befriedigende Deutung des mit dem Augenspiegel Gesehenen zu geben. Dazu kommt noch, dass die so spärlich vorgenommenen anatomischen Untersuchungen meistens ein den Erscheinungen im Leben geradezu widersprechendes Ergebniss lieferten, und MAUTHNER'S Frage [27]), ob der gelbe Fleck durch seinen Zustand bei Lebzeiten seinen Namen verdiene, und ob nicht die gelbe Färbung einzig und allein eine Leichenerscheinung sei, scheint trotz der jüngsten Untersuchung HERM. SCHMIDT's [28]) noch immer ihre Berechtigung zu haben. Erklärungen von dem ophthalmoskopischen Bilde wurden von mehreren Autoren versucht, doch scheint dies noch keinem gelungen zu sein. Wie natürlich, beschäftigte man sich zumeist mit der Erklärung des Lichtstreifens um den ovalen Fleck und LIEBREICH [29]) glaubt in ihm den Ausdruck der am gelben Flecke fehlenden und denselben umkreisenden Nervenfasern zu sehen. SCHWEIGGER [30]) erklärt die dunklere Färbung, also den Mangel an Glanz der Macula innerhalb des ovalen Lichtstreifens, dadurch, dass die Radialfasern, von denen wir früher sprachen und welche an den übrigen Netzhautpartien nach Art der Basis eines Kegels auseinander fahrende, verbreiterte und mit der Membrana limitans interna verschmelzende Enden besitzen, an dieser Stelle eben keine solche Enden haben. Wenn auch hierdurch der verminderte Glanz — wiewohl sehr problematisch — der Macula erklärt sein sollte, so wissen wir, wie auch MAUTHNER hervorhebt, noch immer nicht den Grund des weissen Streifens. BRECHT [31]) sucht durch Reflexerscheinungen in Folge von durch die Verdünnung hier zu Stande kommende Grubenbildung der Netzhaut die dunklere Färbung zu erklären, sowie auch SCHWEIGGER [32]) neben dem oben erwähnten Mangel der Radialfaserenden die grössere Dünnheit der Netzhaut und dadurch erfolgende geringere Beeinträchtigung der Aderhautfärbung durch dieselbe für die Erscheinung verantwortlich macht. Allen diesen Behauptungen gegenüber muss die bereits berührte Thatsache hervorgehoben werden, dass die Macula lutea gar nicht oder nicht erheblich dünner als ihre Umgebung ist, und

---

[27]) Lehrb. d. Ophthalmoskopie, Wien 1868, pag. 317.
[28]) Arch. f. Ophth. XXI, 3, pag. 17—28.
[29]) Arch. f. Ophth. IV, 2.
[30]) Vorlesungen über den Gebrauch des Augenspiegels, Berlin 1864, pag. 69.
[31]) Arch. f. Ophth. XXI, 2, pag. 1—26.
[32]) l. c.

dass deshalb alle aus der Verdünnung gezogenen Schlussfolgerungen unrichtig sind. Dagegen sind die an der fovea centralis beobachteten Phänomene — der weisse Fleck und inmitten desselben noch zuweilen ein dunkler Punkt als Ausdruck des Bodens derselben — thatsächlich Reflexphänomene, die sich aus der Grubenbildung erklären lassen. HERM. SCHMIDT [33]) glaubt, dass der Gegensatz zwischen dem abgestumpften Tone des gelben Fleckes und dem Reflexe der anliegenden Netzhautpartien die Veranlassung gebe, dass wir so oft im umgekehrten Bilde einen glänzenden Lichthof diese Partie umsäumen sehen. Wäre dies der Fall, so müssten wir den Lichthof im aufrechten Bilde ebenfalls sehen können. Die Einwendung, dass das aufrechte Bild nicht lichtstark genug sei, wird auf's leichteste dadurch entkräftet, dass man selbst bei starker Beleuchtung, erzielt durch Verwendung eines Konkavspiegels als Reflektor, im aufrechten Bilde selbst nicht eine Andeutung davon sieht und fast noch mehr dadurch, dass der von SCHMIDT betonte Gegensatz zwischen Färbung der Makula und Umgebung, ja bei jeder Beleuchtung im aufrechten oder umgekehrten Bilde stets derselbe bleiben muss. Die Behauptung, dass die Vergrösserung des aufrechten Bildes daran Schuld sei, dass man den Lichthof nicht sehen könne, ist unmöglich begründet, da wir selbst bei mässig weiter Pupille, bei Mydriasis aber mit grösster Leichtigkeit, die Zirkumferenz der Eintrittsstelle des Sehnerven und auch noch etwas von der Nachbarschaft auf einmal überblicken können. Der vertikale kleinere Durchmesser des Ovals der Macula wird aber von allen Beobachtern einstimmig als dem des Sehnerveneintrittes gleich und der grössere horizontale als zirka noch ein Drittel oder die Hälfte darüber betragend, angegeben und so müssten wir ja wenigstens die Hälfte des Lichthofes auf einmal erblicken können; jedenfalls aber müsste es wenigstens gelingen, das Bild nach Wahrnehmung einzelner Segmente der elliptischen Linie in continuo sich konstruiren zu können, wie das mit anderen Partien des Augengrundes geschieht, die wegen ihrer Ausdehnung oder wegen Enge der Pupille nicht mit einem Blick übersehen werden können. Aber auch das ist nicht der Fall. Und so ist der Widerspruch zwischen dem Befunde im aufrechten und dem im umgekehrten Bilde noch nicht gelöst. — Gegenüber den Angaben von BRECHT [34]) und SCHMIDT [35]), dass die Erscheinung bei erweiterter Pupille abgeschwächt sei, was zu der jeweiligen Erklärungstheorie dieser beiden Autoren ganz gut passen mag, muss ich für meine Person hervorheben, dass ich bei erweiterter Pupille das Bild jedesmal weit deutlicher und bestimmter sah, als bei normalweitem Sehloche, welches überhaupt die Untersuchung der Macula erschwert. Ich glaube den beiden geschätzten Autoren nicht zu nahe zu treten, wenn ich meine, dass der intensive Cornearefiex, welcher bei enger Pupille sich mehr geltend macht, dem Lichthofe einen Theil seines Glanzes beimengt und so eine Täuschung, als sei derselbe unter diesen Verhältnissen in sich begründet intensiver und glänzender, erzeuge.

Die Form der Macula bei der anatomischen Untersuchung anlan-

[33]) l. c.
[34]) l. c.
[35]) l. c.

gend, widerspricht SCHMIDT denen, die, wie SCHWALBE, dieselbe konform dem ophthalmoskopischen Bilde als Queroval angeben, indem er sie stets rund fand und sieht nun die ovale Form als durch die Wirkung des regulären und wohl des normalen — ich glaube nicht zu irren, wenn ich SCHMIDT so auffasse — Astigmatismus erzeugt an, was wieder sehr prekär erscheint, indem die Vergrösserung, welche durch die den normalen, gewöhnlich äusserst geringen Grad von Astigmatismus [36]) erzeugende Cylinderlinse erzielt wird, so unbedeutend verschieden ist von der, welche erreicht wird, wenn keine Krümmungsdifferenz der Meridiane da wäre — wie wir das im Kapitel über die Beurtheilung der Refraktionszustände mit Hilfe des Augenspiegels sehen werden — dass sie gewiss nicht wahrnehmbar ist. Eine andere Frage wäre, ob nicht ein solcher Astigmatismus durch Schiefhalten der Umkehrungslinse in so merkbarem Grade erzeugt würde, dass dadurch eine Vergrösserungsverschiedenheit in den beiden Meridianen resultirte, indem ja bei einer Drehung der Linse um ihre horizontale Axe dieselbe im vertikalen Meridian an Brechkraft so gewinnt, als ob ihr eine Cylinderlinse mit horizontaler Axe zugelegt worden wäre, welche, zum normalen, durch stärkere Brechkraft des vertikalen Meridians erzeugten Astigmatismus addirt, schon eine merkbare Zunahme der Vergrösserungsverhältnisse bedingen könnte; das müsste jedenfalls noch näher untersucht werden, sowie es auch für jeden einzelnen Fall festgestellt sein müsste, einen wie hohen Grad von normalem oder abnormem Astigmatismus des Auge aufweist und ob im geraden Verhältnisse zu diesem das Uebermass des horizontalen Durchmessers des Ovals der Macula über den vertikalen, welches sich nach SCHIRMER [37]) ziemlich konstant wie 4 : 3 stellt, gleichen Schritt hielte. Selbst dann wäre aber die Sache sehr schwierig, weil der abnorme Astigmatismus jedenfalls die Vergrösserungsverschiedenheiten beeinflusst, aber da dieser nicht so konstant im gleichen Meridian ist, sondern je nach dem vertikalen oder horizontalen sich verschieden gestaltet, so könnten schon manche Anhaltspunkte gewonnen werden. Dagegen spräche für die Annahme der Entstehung des Querovals, falls es nicht wirklich in anatomischer Präformation begründet ist, durch fehlerhafte Linsenhaltung das konstante Vorkommen desselben im umgekehrten Bilde und Fehlen desselben, d. h. eines Längsovals, im aufrechten, während ja der im Baue des Auges selbst begründete Astigmatismus beim Ophthalmoskopiren, sowohl im aufrechten, als im umgekehrten Bilde, wie wir das an anderem Orte sehen werden und wie das jeder Ophthalmoskopiker weiss, sich geltend macht [38]). Die anatomisch querovale Form würde durch diese Annahme nicht verändert, sondern das Oval würde durch schiefe Linsenhaltung nur etwas vergrössert. Ich habe ja schon Gelegenheit gehabt, darauf hinzuweisen, wie sehr durch das kombinirte optische System des umgekehrten Bildes die Schärfe und Präzision durch Aberration des Lichtes leiden, und das in Rede stehende

---

[36]) Derselbe beträgt nach Donders bei den meisten scharfsichtigen Augen nicht mehr als $^1/_{140}$ bis $^1/_{60}$, häufig noch weniger, keinesfalls mehr als $^1/_{40}$. Anomalien d. Refr., deutsche Ausgabe, pag. 385 u. 386.

[37]) Arch. f. Ophth. X, 1.

[38]) Mauthner. l. c. pag. 199—206.

Phänomen scheint mir nun ebenfalls eine Wirkung dieser Aberration im umgekehrten Bilde zu sein. Der Umstand, dass BRECHT im Phantome, welches er zur Nachahmung der Verhältnisse im Auge mit sphärischen Krümmungsflächen anfertigen liess, nur eine runde und nicht ovale Figur zu sehen bekam, lässt sich gegen das hier Gesagte nicht verwerthen, weil er thatsächlich entsprechend der Macula eine Vertiefung anbringen liess, die ja im Menschenauge nicht existirt.

HERM. SCHMIDT versucht aber auch gegen MAUTHNER zu beweisen, dass die Stelle des gelben Fleckes in der Netzhaut thatsächlich gelb sei, wiewohl er zugibt, dass dies zu sehen nur dann gelingt, wenn die Durchsichtigkeit der Netzhaut verloren ist und sie bereits in einem gewissen Grade getrübt ist. So scheint also dennoch ein bestimmtes Mass von Leichenveränderung nöthig zu sein, um die gelbe Farbe hervortreten zu lassen. Warum das am „gelben" Flecke geschieht, an anderen aber nicht, dafür ist nach SCHULTZE [39]) die grössere Weichheit der Netzhaut und ihre grössere Geneigtheit zu Leichenveränderungen, ihre leichtere Quellbarkeit an dieser Stelle vielleicht verantwortlich zu machen.

Ich glaube deshalb, dass wir selbst nach den neuesten Untersuchungen doch nichts Bestimmtes über den gelben Fleck wissen, namentlich nicht, ob er wirklich im Leben gelb ist, so lange wir nicht die Ursache der gelben Färbung, des Pigments als solches, oder irgend einen physikalischen, die gelbe Färbung erzeugenden Grund, mit Bestimmtheit kennen, dass wir aber mit Bestimmtheit wissen, dass beim Ophthalmoskopiren keine Spur einer gelben Färbung zu erblicken ist, dass wir uns deshalb auch nicht weiters äussern können, als dass im umgekehrten Bilde in den meisten Fällen eine ovale Figur, umgeben von einem weissen Streifen, sichtbar ist, über deren Entstehung alles bisher Vorgebrachte die Grenze der Hypothese nicht überschritten hat und dass die Lichtbüschel, die man vom Streifen aus sich verbreiten sieht, wahrscheinlich nur das Ergebniss der Irradiation sind.

Die Eintrittsstelle des Sehnerven.

Dieselbe fesselte von jeher die Aufmerksamkeit der Ophthalmoskopiker am meisten, sie reflektirt das meiste Licht und an ihr sind die meisten Beobachtungen in physiologischen wie pathologischen Verhältnissen zu machen. Ihr Augenspiegelbild kann jedoch nur durch eine genauere Kenntniss der Anatomie des Sehnerven erklärt werden, weshalb wir uns das zum Verständniss eben Nothwendigste aus diesem Kapitel in's Gedächtniss zurückrufen wollen.

Der Sehnerv ist in seinem ganzen orbitalen Verlaufe von einer ziemlich festen fibrösen Scheide umgeben, zwischen welcher und dem Sehnervenstrange noch eine zweite, ihn umgebende und von der ersteren durch einen freien nur von zartem Bindegewebe durchsetzten Raum — dem Scheidenzwischenraum, Intervaginal- oder Subvaginalraum — geschiedene Hülle, die innere Scheide sich befindet. So wurde die Sache

[39]) l. c.

bis vor wenigen Jahren dargestellt. Die Untersuchungen SCHWALBE's [40]) sowie die von AXEL KEY und RETZIUS [41]) aber zeigten, dass der Optikus von drei Scheiden in Form dreier in einander steckender Hohlzylinder umgeben ist, u. z. in der Weise, dass die früher für die äussere Scheide gehaltene eigentlich aus zwei Scheiden besteht, zwischen welchen jedoch kein so beträchtlicher Zwischenraum existirt, wie der früher erwähnte. Diese drei Scheiden erweisen sich nun als Fortsetzungen der drei Hirnhäute, welche den Sehnerven bis zu seiner Insertion am Bulbus begleiten, u. z. in der Art, dass der äussere stärkere Theil der früher als äussere Scheide angesehenen Hülle eine Fortsetzung der Dura mater ist und nunmehr den Namen Dural-Scheide des Sehnerven führt, ihr innerer schwächerer aber, eine Fortsetzung der Arachnoidea des Gehirns, Arachnoidealscheide des Optikus (AXEL KEY und RETZIUS) [42]) und endlich das auch früher als inneres bekannt gewesene Neurilemm, als Fortsetzung der pia mater, mit dem Namen der Pialscheide belegt wird. Zwischen dieser letzteren und der Arachnoidealscheide befindet sich der Subarachnoidealraum des Optikus, welcher dem früher sogenannten intervaginalen Raume entspricht, zwischen der Dural- und Arachnoidealscheide aber ist der früher nicht gekannte Subduralraum des Optikus, welche beiden Lückensysteme nach den klassischen Untersuchungen SCHWALBE's [43]) direkte Fortsetzungen der gleichnamigen Räume des Gehirnes bilden, und welchen sehr bald nach ihrem Bekanntwerden in ihren anatomischen Beziehungen zum Zentralnervenorgane sehr bedeutende Rollen bei manchen Krankheitsvorgängen im Gehirne zugewiesen wurden. Wie weit mit allgemeiner Berechtigung, das scheint noch nicht ganz entschieden zu sein. Sowohl der äussere, als auch der innere Scheidenzwischenraum, wie wir auch kürzer und, wie ich glaube, ganz gut verständlich den subduralen und subarachnoidealen Raum nennen können, sind nach SCHWALBE unzweifelhaft von Endothelmembranen ausgekleidet und kömmt ihnen solchermassen die Bedeutung seröser Behälter zu. Auch die feinen Bälkchen, die von der einen Wand zur andern ziehen, zeigen diesen Endothelüberzug und es unterliegt heutzutage keinem Zweifel mehr, dass die beiden Scheidenzwischenräume als Lymphräume anzusehen sind. Von der Pialscheide ausgehend, erstrecken sich, wie man an sehr leicht anzufertigenden Längs- und Querschnitten sehr deutlich sehen kann, ziemlich mächtige longitudinale Scheidewände, wodurch der Sehnervenstrang in eine Anzahl von Fächern getheilt wird, welche die Faserbündel des Optikus einschliessen. Die ausserdem die einzelnen Nervenfasern umgebenden Hüllen bestehen aus einer der Neuroglia des Gehirnes ganz gleichkommenden eiweissartigen Substanz.

Der äussere Scheidenzwischenraum ist kleiner, enger als der innere, und hört früher als der letztere auf, indem in der Nähe des Bulbus

---

[40]) M. Schultze's Arch. f. mikr. Anatomie Bd. VI, 1869 und Bd. VI, 1870, pag. 330 und Hdb. v. Graefe u. Sämisch. 1. Bd. pag. 328, 329 u. s. w.


[41]) Nordisk medicinsk Arkiv. Bd. 2. Nr. 6, 13, 46. Referat s. Jahresber. von Virchow-Hirsch für 1870, pag. 28—31.

[42]) l. c.

[43]) l. c.

eine stärkere Verbindung der äusseren und mittleren Scheide, wie wir die Dural- und Arachnoidealhülle abgekürzt benennen wollen, besteht. Nur bei krankhaften Veränderungen sind beide Hohlräume, wie MANZ [44]) und MICHEL [45]) zeigten, stark erweitert.

Fig. 9



Längsschnitt durch den Sehnerven bei seiner Insertion am bulbus und durch die Membranen des Auges. *aa* innere, *bb* äussere Netzhautschichten; *cc* Aderhaut; *dd* Sclerotica; *e* physiologischer Trichter; *f* arteria centralis ret. im Axenkanal; *g* Bifurkationsstelle derselben; *hh* lamina cribrosa; *ll* äussere (Dural-) Scheide; *m* äusserer (Subdural-) Scheidenraum; *n* innerer (Subarachnoideal)-Scheidenraum; *r* mittlere (Arachnoideal-) Scheide; *p* innere (Pial-) Scheide; *i i* Nervenfaserbündel; *k k* bindegewebige (longitudinale) Sepimente.

In der Nähe des Bulbus angelangt, erweitert sich die äussere Scheide trichterförmig, indem sie unmittelbar in die Sclerotica übergeht, sie bildet den am meisten nach aussen gelegenen Theil der Faserzüge der Sclerotica, während die mittlere Scheide noch weiter den Optikus begleitet und dann erst nach aussen sich umschlagend, die mittlere Skleralschicht bildet, so dass der äussere Scheidenzwischenraum innerhalb der Sclerotica bis in die Nähe der Aderhaut vordringt. Die Pialscheide dringt aber noch weiter fast bis zum Niveau der Chorioidea auf, so dass der innere Scheidenzwischenraum nur durch die dünne, von den nach aussen sich umlegenden Fasern der Pialscheide gebildete innerste Lage der Skleralfaserzüge von der Aderhaut getrennt ist. Ein Theil der Fasern der Pialscheide reicht aber noch weiter als das Ende des Subarachnoidealraumes bis zur Aderhaut hinauf und umgreift hier den Optikusstrang innerhalb des Loches, welches die Aderhaut für die

[44]) Arch. f. Ophth. Bd. XVI, 1.
[45]) Arch. f. Heilkunde, 1872.

Passage des Sehnerven hier besitzt, rahmenartig und bildet den von JAEGER sogenannten Bindegewebs- oder Scheidenring, der von LIEBREICH den Namen der Skleralgrenze des Optikus erhielt.

Beiläufig in der Gegend, wo der Subduralraum aufhört, aber doch noch beträchtlich früher sehen wir von der Pialscheide, welche nunmehr durch Umbiegen die Sclerotica bilden zu helfen beginnt, und weiter höher, da wo sie thätsächlich als Sclerotica fungirt, Faserzüge, ähnlich den früher erwähnten Sepimenten in das Innere des Optikus dringen, mit dem Unterschiede jedoch, dass die Fasern hier mehr eine quere, auf die Axe des Nervenstranges senkrechte Richtung einschlagen, auch reichlicher und mächtiger und dichter angeordnet sind und engere Lücken bilden als diejenigen, welche auf Querschnitten des extraokularen Nervenstranges durch die longitudinalen Fortsätze der Pialscheide gebildet, hervortreten, so dass man hier, wenn man sich die Nervenbündel aus den Maschenräumen entfernt denkt, eine vielfach durchbrochene, ziemlich feste, mehrfach geschichtete Bindegewebsplatte, welche nach vorne gegen das Augeninnere zu schwach konkav ist, vor sich hat. Dieses Balkenwerk hängt aber auch fest mit dem Bindegewebsstrange zusammen, welcher die in der Axe des Sehnerven, wie wir wissen, verlaufenden Zentralgefässe scheidenförmig umgibt. Da man in einzelnen Fällen in diesem Balkenwerke, welches mit Recht den Namen lamina cribrosa führt, Pigmentzellen fand, glauben Einige, dass an ihrer Bildung die Chorioidea ebenfalls Theil nimmt.

Die Nervenfasern des Optikus anlangend, zeigen diese ausserhalb des Auges mit nur geringen Differenzen dieselben Eigenschaften, wie doppeltkontourirte Nervenfasern anderer Organe, nur dass ihre Axenzylinder sich etwas schlechter mit ammoniakalischer Karminlösung färben, als z. B. die des Rückenmarkes [46]), auch fehlt ihnen die SCHWANN'sche Scheide. Bei seinem Uebertritte in das Auge erleidet der Optikus als Ganzes sowohl, wie in seinen einzelnen Bündeln, eine sehr auffallende und wesentliche Veränderung. Er verschmälert sich nämlich zunächst und beim Eintritte in die lamina cribrosa verlieren seine Fasern die Markscheide, so dass die Lücken der Siebplatte nur mehr von marklosen, aus blossen Axenzylindern bestehenden Bündeln passirt werden und nur solche in's Innere des Auges dringen. Es ist auch einleuchtend, dass dem so sein muss, da ja die Sehnervenfasern dazu bestimmt sind, die innere Schichte der Netzhaut, die ja ganz durchsichtig sein soll, zu bilden. Die Axenzylinder sind im höchsten Grade diaphan, während ihre Markscheiden undurchsichtig sind, und das Sehen wäre unmöglich, beträten die Nervenfasern das Innere des Auges mit Markscheiden umgürtet, weil diese dann die Lichtstrahlen nicht zur hintersten, lichtperzipirenden Netzhautschicht gelangen liessen. Die Grenze zwischen dem markhaltigen Theile des Sehnerven und dem marklosen ist nach SCHWALBE [47]) durch eine scharfe Linie gekennzeichnet, indem die weisse Farbe des extraokularen Theiles des Nervenstranges scharf gegen den intraokularen grau durchscheinenden absetzt. Das Fehlen der Mark-

[46]) Leber, Archiv f. Ophth. XIV, 2.
[47]) Hdb. Graefe-Sämisch. I. Bd. pag. 336 u. 337.

scheiden begründet auch die Dickeabnahme des Nervenstammes, welcher am dünnsten im Niveau der Chorioidea wird, wo er wie eingeschnürt aussieht und nach HEINR. MÜLLER'S und ED. JAEGER'S Messungen nicht mehr als 1·5 bis 1·6 Mm. an Durchmesser hat, während sein Durchmesser vor der Einpflanzung in die Sclerotica 3 Mm. beträgt.

Haben die Sehnervenfibrillen die lamina cribrosa verlassen, so theilen sie sich und biegen in die Ebene der Netzhaut um, u. z. in der Weise, dass in der Regel der weitaus grössere Theil der Fasern zur inneren Netzhauthälfte und nur ein ganz kleiner Theil zur äusseren Hälfte der Retina zieht. Man hat sich vermuthlich aus diesem Grunde, indem man glaubte, dass die in der inneren Hälfte des Sehnerven sich anhäufende Nervenfasernmenge nicht in einer Ebene mit der Netzhaut, sondern höher als diese zu liegen komme, und vielleicht auch, weil im Kadaverauge eine leichte Anschwellung als Leichenerscheinung sichtbar ist, veranlasst gefühlt, die Eintrittsstelle des Sehnerven mit dem Namen Papilla nervi optici zu belegen, was ganz und gar nicht zutrifft, indem diese eine Scheibe bildet, welche durchaus nicht das Niveau der Netzhaut überragt; im Gegentheil, wenn schon von einer Niveaudifferenz die Rede ist, so besteht diese in einer leichten trichterförmigen Vertiefung ungefähr in der Mitte der Scheibe, welche dadurch zu Stande kommt, dass die Optikusfasern bei ihrem Umbiegen in die Netzhautfläche nach den verschiedenen Richtungen auseinanderweichen. Der Name Papille ist deshalb unrichtig, aber derselbe ist so allgemein verbreitet, dass auch wir desselben uns werden bedienen müssen. ED. JAEGER zeigte, dass „Sehnervenquerschnitt" die passendste, die bezeichnendste Benennung wäre.

Der Theil des intraokularen Sehnervenendes, welcher innerhalb der Lücken der lamina cribrosa steckt, führt den Namen des Sehnervenkopfes; dieser besteht nach der Unterscheidung ED. JAEGER'S [48]) aus zwei Antheilen, dem sklerotikalen und chorioidealen; der im Netzhautniveau liegende Theil, bevor die Fasern in die Retina übergehen, erhielt von JAEGER [49]) den Namen des Sehnervenscheitels.

Wir haben uns jetzt mit den Gefässen des Optikus zu beschäftigen. Das Haupternährungsmaterial bezieht der Sehnerv aus den Verzweigungen der Arteria centralis retinae, welche eben dazu bestimmt ist, den Sehnerven, u. z. vorzugsweise den Sehnervenscheitel und die ganze Netzhaut mit Blut zu versorgen. Die Zentralarterie, die ein Ast der Arteria ophthalmica ist, dringt nach HENLE in einer Entfernung von 15 bis 20 Mm. vom Augapfel, nach SCHWALBE in einer viel geringeren, in einem Falle blos 7 Mm., nach DONDERS selbst in 5 Mm. Entfernung vom Augapfel in schiefer Richtung in den Optikusstrang ein, woselbst sie nunmehr in dessen Axenkanal von der Vena centralis, welche jedoch jedesmal eine kürzere Strecke innerhalb des Nerven verläuft, so dass sie von DONDERS [50]) schon 2 Mm. hinter dem Bulbus den Nerven verlassen gesehen wurde, begleitet, bis zum porus opticus

---

[48]) Ergebnisse der Untersuchung mit dem Augenspiegel, 1876.
[49]) l. c.
[50]) Arch. f. Ophth. I, 2, pag. 86.

verläuft, um von da austretend auf der Netzhaut sich zu verzweigen. Unterwegs gehen nun von der Zentralarterie zahlreiche Zweigchen, die Nervenbündel umspinnend und mit den von anderen Gefässsystemen herstammenden Aederchen anastomosirend, in den Optikus hinein, welcher nämlich auch noch von anderer Seite her Blut bezieht, u. z. zunächst von den Ziliargefässen, welche die Sclerotica und die Aderhaut mit Blut versorgen. Von diesen dringen feine Zweigchen in den Chorioidealantheil des Sehnervenkopfes [51]), um diesen zu ernähren, und vom Sklerotikalgefässkranze aus wird der sklerotikale Theil, also die grösste Partie des in der siebförmigen Lamelle steckenden Theiles des Sehnervenkopfes mit Blut versehen.

Was ist der Sklerotikalgefässkranz?

Derselbe war der Wesenheit nach schon einigen Anatomen des vorigen Jahrhunderts bekannt, wie HALLER und ZINN, war jedoch ganz in Vergessenheit gerathen, bis ED. JAEGER [52]) ihn derselben wieder entriss. Zwei bis drei, auch vier von den kurzen hinteren Ziliararterien treten, in der Nähe des Sehnerven, meistens in der Horizontalebene medial- und lateralwärts, die Sclerotica durchbohrend, in diese ein und bilden hier, mit den von ihnen abgehenden Zweigchen den Sehnerven umgebend, einen geschlossenen Kranz, den arteriellen Gefässkranz, Circulus arteriosus nervi optici (LEBER) [53]), welcher nach JAEGER beim neugeborenen Kinde den Sehnerven fast unmittelbar umschliesst, während er im Auge des Erwachsenen meistens einen vom Optikus weiter abstehenden grösseren Kreis bildet. Dieser in die Sclerotica eingeschlossene arterielle Gefässkranz ernährt nun den Theil der Lederhaut, in welchem er verläuft und den von diesem Skleraltheile umschlossenen Antheil des Sehnerven, natürlich auch die lamina cribrosa, sowie den Theil des Glaskörpers, welcher vor dem Sehnervenquerschnitte gelagert ist. Wenn auch sämmtliche Gefässsysteme, das Ziliar-, das Netzhaut- oder Zentral- und das eben genannte Gefässsystem eine bedeutende Selbstständigkeit von einander an den Tag legen, was gebührend gewürdigt zu haben, nicht das kleinste Verdienst ED. JAEGER'S ist, so bestehen doch durch die zahlreichen Anastomosen, sowie durch das Uebertreten der Abzweigungen der verschiedenen Systeme in dasselbe Organ innige Relationen zwischen denselben und es können mithin Krankheitsprozesse mit Leichtigkeit aus dem einen Gefässgebiete ins andere übergreifen. Unrichtig aber ist es, wenn man glaubt, dass der Sklerotikalgefässkranz blos die Bestimmung hat, eine Verbindung zwischen dem Gefässgebiete der Netz- und dem der Aderhaut herzustellen. Es unterliegt nach ED. JAEGER [54]) keinem Zweifel, dass derselbe einem bestimmt abgegrenzten Ernährungsgebiete angehört, welchem er mit der gleichen Selbstständigkeit vorsteht, wie die anderen dem ihrigen, und dass Krankheitsprozesse hier eben so isolirt verlaufen können, wie in anderen Gefässgebieten.

Wir kehren nun nach dieser kurzen Exkursion zum Zentralgefäss-

---

[51]) Jaeger, Ergebnisse etc. 1876.

[52]) Ueber die Einstellungen des dioptrischen Apparates, 1861, pag. 55 u. Taf. III, Fig. 34—36.

[53]) Handb. v. Graefe-Sämisch, II, Kap. VII, pag. 305—8 u. Fig. 3.

[54]) Ergebnisse, 1876.

systeme, bei welchem wir noch, als dem ophthalmoskopisch bedeutsamsten, verweilen müssen, zurück.

Hat die Zentralarterie den Axenkanal des Sehnerven verlassen, so theilt sie sich in der Regel sofort in zwei grosse Zweige, deren einer nach oben, der andere nach unten zieht. Bevor diese den Sehnervenquerschnitt verlassen, erfolgt meistens noch eine Theilung in zwei, so dass wir in der Regel zwei nach oben und eben so viel nach unten ziehende grössere arterielle Zweige zu unterscheiden haben. Indessen gibt es zahlreiche Ausnahmen von dieser Regel, darin bestehend, dass entweder eine grössere Anzahl von Abzweigungen erfolgt oder dass auf einer grösseren Strecke blos zwei Hauptzweige sichtbar sind, welche in beträchtlicher Entfernung vom Ursprunge in mehrere kleinere Zweige zerfallen. Ist die Vertheilung eine regelmässige, so sieht man von den zwei oberen, nachdem sie früher beide eine Strecke weit direkt nach oben gezogen, die eine im Bogen temporalwärts, die andere entweder weiter gerade aufwärts oder diagonal auf- und nasalwärts ziehen, desgleichen zieht die eine von den unteren Arterien temporalwärts, während die zweite ähnlich wie die obere sich verhält, so dass also die Stelle der Macula lutea von dem oberen und unteren Gefässe in weitem grossem Bogen, der in beträchtlicher Distanz von ihr liegt, umrahmt wird, während sie selber wenig oder gar keine Gefässe aufweist. Vom Ursprunge ziehen nämlich nur ein oder zwei viel kleinere Gefässchen horizontal direkt nach aussen, erreichen aber den gelben Fleck nicht, indem sie schon früher spitz endigen. Für den Fall einer solchen regelmässigen Gefässanordnung kann man nach HUGO MAGNUS [55]), wenn man gerade Lust dazu hat, die Gefässe als arteria temporalis et nasalis superior et inferior — nicht selten gibt es auch eine nasalis media — und arteria macularis u. s. w. benennen, obwohl es dasselbe ist, wenn man, wie es gewöhnlich geschieht, von der obern äussern oder der untern innern u. s. w. Arterie spricht.

Ein ganz gleiches Verhalten wie die Arterie zeigt die Vena centralis retinae, nur dass das, was bei der Arterie die Regel ist, nämlich erst nach dem Verlassen des porus opticus sich zu theilen, bei ihr als Ausnahme gilt, während das regelmässige Verhalten der Zentralvene, bereits in zwei grosse Aeste getheilt aus dem Axencanal des Sehnerven heraus zu kommen, nur äusserst selten bei der Arterie beobachtet wird.

Wir haben bei der Anatomie des Sehnerven etwas länger verweilt, weil deren Kenntniss für das Verständniss des Augenspiegelbildes unbedingt nothwendig ist, und haben uns ohnedem, viele selbst sehr interessante Details unberücksichtigt lassend, nur auf das eben Unerlässliche beschränkt, um nun, auf dieser Basis fussend, das gesicherte Gebäude des ophtalmoskopischen Befundes aufführen zu können.

Das Bild des Sehnerven ist natürlich verschieden je nach der Art und Intensität der Beleuchtung und der Methode der Untersuchung. Wir wollen zunächst vom aufrechten Bilde sprechen, weil in diesem

---

[55]) Die makroskopischen Gefässe der menschlichen Netzhaut. Leipzig 1873.

die hier anzuführenden Details sich deutlich und für jeden leicht wahrnehmbar ausprägen.

Der Sehnervenquerschnitt erscheint als eine runde Scheibe, welche sich durch ihren hellen Reflex in auffallender Weise von der im Verhältniss dunkleren Umgebung abhebt. Von der nicht immer mathematisch kreislinigen Begrenzung derselben abgesehen, indem der Kontour zuweilen sehr leichte Ein- und Ausbiegungen zeigt, weicht in manchen Fällen auch in sonstiger Beziehung die Sehnervenscheibe von der kreisrunden Gestalt ab, indem sie entweder an Höhen- oder an Querdurchmesser prävalirt, so dass sie ein aufrechtstehendes oder querliegendes Oval repräsentirt. Das erstere ist ziemlich häufig, besonders in hypermetropischen Augen, das letztere dagegen sehr selten. Auch ist die eine oder andere Seite zuweilen in viel flacherem, mehr geradlinigem Bogen gekrümmt, wodurch die Kreisform noch mehr leidet. Aber alle diese Abweichungen sind nicht sehr erheblich und geht der Eindruck einer runden Scheibe in den wenigsten Fällen verloren.

Ueber die wirkliche Grösse des Sehnerveneintrittes sprachen wir bereits, seine Dimensionen bei der Augenspiegeluntersuchung sind nur scheinbare, indem die Objekte des Augengrundes durch den dioptrischen Apparat des untersuchten Auges, welcher für den Untersucher die Bedeutung einer Loupe hat, beträchtlich vergrössert erscheinen, welche Vergrösserung sich gerade so wie bei der Loupe nach deren Brennweite, hier nach dem Refraktionszustande des Auges verschieden gestaltet, was wir einer späteren Vorlesung auseinander zu setzen vorbehalten müssen. Begnügen wir uns hier vorläufig mit der Angabe, dass für das emmetropische Auge im aufrechten Bilde eine beiläufig 15fache Vergrösserung erzielt wird.

Ueber die Farbe des Sehnerven kann man viel sprechen, allein mit Worten lässt sich das Bild, wenn man es noch so beredt schildert, unmöglich so getreu wiedergeben, wie dies die Zeichnung, von JAEGER'S Meisterhand entworfen,[56]) thut. Wie man von gut gelungenen Porträts sich befriedigt äussert, dass sie „zum Sprechen" getroffen seien, so können wir von JAEGER'S Abbildungen sagen, dass sie leben, athmen und zu pulsiren scheinen. Man kann kaum einen Unterschied zwischen JAEGER'S Darstellung und dem Ergebniss der unmittelbaren Beobachtung finden, und wer einmal eine von JAEGER gemalte Papille gesehen hat, der erkennt sie sofort auch im Auge wieder. Ich glaube, die echte Kunst nähert sich dem Wahrhaften in der Natur am meisten und sicherlich ist derjenige der grösste Künstler, der die Geheimnisse der Natur abzulauschen versteht und dem Beschauer ein täuschendes Bild vorführt. In diesem Sinne offenbart sich in JAEGER'S Werken die echte unverfälschte Künstlernatur, der die Phantasie fremd oder doch nur so weit eigen ist, als sie nothwendig ist, um die Wege finden zu lassen, die zur unmittelbaren Anschauung der Natur führen. Hier reicht der Naturforscher dem Künstler die Hand. In JAEGER ist beides vereinigt.

Die Farbe des intraokulären Sehnervenendes lässt sich am ehesten

[56]) Handatlas, Taf. IV, Fig. 25 u. folg.

erfassen, wenn wir die Faktoren analysiren, die zu deren Zusammensetzung beizutragen haben. Wir sahen schon früher, dass die im Augeninnern befindlichen Axenzylinder bei auffallendem Lichte eine leichte grauglänzende Färbung bieten, welche bei durchfallendem Lichte eine leise Beimischung von Blau erhält. Zwischen diesen Fasern aber befindet sich Bindegewebe, besonders aber das mächtige Gerüste der lamina cribrosa, welche weisses Licht reflektirt. Hierzu kommt nun ein leichter röthlicher Schimmer, welcher sich über das Ganze verbreitet, zuweilen ganz erhebliche Intensität erreicht und welcher von dem im Sehnervenkopfe zirkulirenden Blute herrührt. Sollen wir nun die Farbe des Optikus definiren, so ist sie als eine rosaweisse oder weissgelbliche oder allenfalls schwach gelbröthliche zu bezeichnen und sie tritt in ihrer Helligkeit — besonders im jugendlichen Individuum — um so mehr hervor, je dunkler der ihn umgebende Augengrund ist. Wir müssen aber auch Abstufungen in der Färbung der Papille — diesen Ausdruck werden wir fortan häufig gebrauchen — unterscheiden; sie ist nämlich nicht in ihrer ganzen Ausdehnung gleichmässig gefärbt. — Zunächst beobachten wir eine andere Färbung in der äussern Hälfte als in der innern, obwohl diese Schattirungen nicht scharflinig abgegrenzt sind. Wir sagten früher, dass die Mehrzahl der Optikusfasern nach innen, die Minderzahl nach aussen zieht; dadurch muss die innere Hälfte schon an und für sich dunkler gefärbt sein; denn wenn die Nervenfasern noch so durchsichtig sind, so müssen sie in dichten Lagen übereinandergehäuft doch saturirter erscheinen. Wenn ich durch ein lichtblaues Glas hindurchsehe, so werden die Objekte merklich heller gefärbt erscheinen, als wenn ich durch zwei solche Gläser hindurchsehe. — Es zirkulirt aber auch naturgemässer Weise, da wo mehr Nervenmasse ist, mehr Blut, und so ist die röthliche Färbung in der innern Hälfte mehr ausgeprägt, als an der äussern. Diese letztere erscheint daher heller, lichter, und da die Durchsichtigkeit der Nervenfasern uns bis in die Tiefe des Sehnervenkopfes mit unserem Blicke vorzudringen erlaubt, werden wir an dieser Stelle auch die siebförmige Platte sehen können, welche sich durch ihr von den Nervenbündeln ausgefülltes Lückenwerk kenntlich macht. Die Lücken haben eine den Nervenfasern entsprechende graubläuliche Färbung, eine der Umlegungsart derselben konforme Gestalt, indem sie rund sind da, wo die Fasern in nahezu rechten Winkeln, und länglich oder oval, wo sie, in stumpfen Winkeln zur Netzhaut aufsteigend, die Lücken der Siebplatte verlassen. In der innern Hälfte, wo die Durchsichtigkeit aus bereits erwähnten Gründen leidet, ist es nicht so leicht, meistens gar nicht möglich, die lamina cribrosa zu sehen.

Ausser dieser Farbenverschiedenheit ist noch die Zentrumsgegend zu erwähnen, wo die beschriebene aus der Zweitheilung der Fasermasse hervorgehende trichterförmige Vertiefung sich durch einen hellglänzenden weissen Fleck, von dem hier ungehindert und unbeeinflusst ihr eigenthümliches Licht aussendenden Gewebe der lamina cribrosa herrührend, manifestirt.

Die Begrenzung des Sehnerven ist eine ziemlich scharfe und tritt um so deutlicher hervor, je grösser der Kontrast zwischen seiner Farbe

und der der Umgebung ist, also in dunkelpigmentirten Individuen mehr als bei blondhaarigen. Indessen richtet sich dieser Unterschied nicht allein nach der Färbung des Individuums, sondern ist ohne Rücksicht auf diesen Umstand und unabhängig von demselben zu beobachten. Caeteris paribus ist die Begrenzung in hypermetropischen Augen, soweit ich beobachtete und abgesehen vom Astigmatismus, häufiger minder scharf ausgeprägt, dann tritt sie in Augen, die eine sogenannte physiologische Exkavation haben, von der wir erst später handeln können, deutlicher hervor, als in denen, die eine solche nicht aufweisen. Die scharfe Begrenzung hängt aber von noch anderen zwei Umständen ab.

Wir sehen nämlich den Sehnerven unmittelbar umgeben von einer hellen kreisförmigen Linie, welche nach aussen und innen scharf abgegrenzt ist und eine messbare Breite besitzt. Diese weisse Linie ist der Ausdruck der letzten, bis zur Aderhaut aufsteigenden Faserzüge der innersten Optikusscheide und führt, wie wir bereits wissen, den Namen des Bindegewebs- oder Scheidenringes. Natürlich ist er um so besser sichtbar, je grösser die Oeffnung der Aderhaut hier ist; denn reichen die Grenzen dieser Apertur weiter gegen die Axe des Sehnervenstranges hin, so müssen sie den Scheidenring zum geringern oder grössern Theile decken oder auch ganz verbergen, und der Sehnerv ist dann zum Theile oder in seiner ganzen Peripherie von der Aderhaut umgeben. Ist aber die Oeffnung der Chorioidea grösser als das Lumen des Scheidenringes, so dass die beiden staffelförmig über einander lagern in der Weise, dass der Chorioidealsaum mehr zurücksteht, so wird der Bindegewebsring in seiner vollen Breite zu Tage liegen.

Aber auch der Saum des Chorioidealloches prägt sich im Augenspiegelbilde auffallend durch weit stärkere Pigmentirung aus; er erscheint den Bindegewebsring konzentrisch umgebend, als eine dunkelschwarze vollständige oder lückenhafte, zuweilen selbst grosse Bogensegmente entbehrende Kreislinie, die im Verein mit dem weissen Rahmen der Skleralgrenze oder auch ohne diese, wenn sie gedeckt ist, und dann den Optikus unmittelbar einsäumend, gewiss wesentlich dazu beiträgt, das helle Bild der Papille von seinem Untergrunde sich abheben zu lassen. Der Chorioidealring ist zuweilen nur an der einen, entweder an der äussern oder innern Peripherie oder an beiden bei Fehlen desselben oben und unten sichtbar, oder wird durch kreisförmig angeordnete Punkte mit lichteren Intervallen ersetzt, besitzt in der Regel keine merklich grössere Breite als die Skleralgrenze, indessen aber sieht man ihn ausnahmsweise diese Breite um das Vier- bis Fünf- und Mehrfache überragen und sich so eine Strecke weit in die Chorioidea hinausreichend wie ein breites Band präsentiren; freilich ist er in diesen Fällen viel heller gefärbt und besitzt eine stark schwarzgraue Nuance.


Wir haben hier noch zu erwähnen, dass der Skleralring gewöhnlich an der Aussenseite, wo er von einer dünnen Schicht von Nervenfasern bedeckt wird, besser sichtbar ist, dagegen an der innern Peripherie häufig durch die dicke Faserlage undeutlich wird. Die Chorioidealgrenze aber ist dafür an der innern Seite in den meisten Fällen sichtbar, wenn sie auch an allen anderen Stellen fehlt.

Wir haben aber noch weiters hervorzuheben, dass in manchen Fällen

gegen die Peripherie des Sehnerven hin sich ringsherum eine leicht graubläuliche Färbung in markanter Weise bemerkbar macht, welche gegen die Sehnervengrenze hin an Dunkelheit zunimmt und dass so die wenig erleuchtete Peripherie durch eine äusserst zarte bläuliche Kreislinie endigt, wodurch der weisse Skleralring prägnanter wird und der Sehnerv gewissermassen noch innerhalb des Skleralringes von einem blauen Kontour umgeben ist. Natürlich prägt sich auch diese Färbung in der äussern Hälfte mehr als in der innern aus.

Nach JAEGER[57]) müssen wir daher, quoad colorem papillae, zweierlei Menschen unterscheiden, solche, bei denen die Papillenfarbe mehr weissgelblich oder grauweissgelblich ist, und solche, bei denen mehr das Graubläuliche hervorsticht, also weissgelb- oder grauweissgelb- (blass-) nervige und graublau- (dunkel-) nervige Menschen.

Fig. 10.



Die Eintrittsstelle des Sehnerven sammt dem sie nächst umgebenden Bezirke eines normalen Augengrundes (nach Ed. Jaeger).
A Sehnervenscheibe (Papille), *a* Bindegewebsring, *b* Chorioidealring, *c* Arterien, *d* Venen, *g* Theilungsstelle des Zentralarterienstammes, *h* Theilungsstelle des Zentralvenenstammes, *L* lamina cribrosa, *t* temporale (äussere) Seite, *n* nasale (innere) Seite.

Wir wenden uns nunmehr zum ophthalmoskopischen Bilde der Netzhautgefässe. Die Zentralarterie verlässt regelmässig den porus opticus, welcher nicht genau der Papillenmitte entspricht, sondern meistens mehr nasenwärts verschoben ist, bevor sie in ihre Zweige zerfällt, und so können wir ihren Stamm sehen oder wenigstens die Theilungsstelle, wenn diese etwas tiefer gelegen ist. Tritt der Stamm der Arterie etwas schräge gegen die Sehnervenfläche aus, so können wir ihn ohne weiters sehen, tritt er aber senkrecht zur Nervenfläche aus, so markirt er sich durch einen dunkel-, fast schwarzrothen Fleck, indem wir den natürlichen Querschnitt des Gefässes vor uns haben, in dessen Blutsäule wir nach der Längsaxe desselben tief hineinschauen.

Dass bei der Zentralvene uns dies seltener gelingen wird, geht aus den bereits angegebenen Theilungsverhältnissen hervor, indem wir deren Stamm, durch eine dickere Nervenschicht gedeckt, nicht sehen können, bevor dessen tiefer erfolgende Theilung eintritt.

Von der Austrittsstelle ziehen die Gefässe, wie wir bereits angegeben, meistens nach zwei Hauptrichtungen, nach oben und unten über die Papille hinweg zur Netzhaut sich dichotomisch theilend und die Netzhaut mit einer mehr weniger grossen Anzahl bevölkernd, deren

---

[57]) Ergebnisse etc. 1876, pag. 182.

einzelne Ausläufer bis in ihre feinsten Verästelungen und weit in die Peripherie zu verfolgen sind. Der Reichthum der Netzhaut an Gefässen ist von der frühern oder spätern Theilung der grossen Aeste abhängig und somit ist eine in manchen Fällen auffällige Armuth an Gefässen nur eine scheinbare, indem gewöhnlich der Durchmesser der einzelnen Zweige zur Anzahl der Gefässe im umgekehrten Verhältnisse steht.

Um Arterien von Venen zu unterscheiden, haben wir drei Merkmale, von denen in den meisten Fällen schon eines zur Differenzirung hinreicht, so dass es uns also mit Leichtigkeit gelingt, dieser Aufgabe zu genügen. Die drei Merkmale sind: der Durchmesser und Verlauf, die Farbe und der Reflex der Gefässe.

Wenn wir von Durchmesser sprechen, so müssen wir uns wohl merken, dass darunter nicht der Durchmesser der Blutsäule sammt der Gefässwand zu verstehen sei, sondern nur der erstere allein. Indem die Wandungen der Netzhautgefässe ebenso durchsichtig sind, aber gleichzeitig von derselben optischen Dichtigkeit, wie die sie umgebenden übrigen Netzhautelemente, so können sie (die Wandungen) als solche unter normalen Verhältnissen nicht sichtbar sein, ebenso wenig wie wir ein Glasrohr in einem mit Flüssigkeit von demselben Brechungsexponenten, wie der des Glasrohres, gefüllten Gefässe sehen können. Es ist allerdings, wie JAEGER [58]), der diese Verhältnisse experimentell und am lebenden Auge mit tiefem Verständnisse studirte, angibt, nicht leicht ein Glasmateriale und eine Flüssigkeit zu finden, deren Brechungsindex einander vollkommen oder nahezu vollkommen gleichen. Die grösste, das Gelingen des Experimentes eben noch ermöglichende Uebereinstimmung fand er zwischen einem Glasrohre aus einer böhmischen Fabrik und Kreosot. Die dunkle Randkontour des Glasrohres verschwand beim Eintauchen dieses Glases in Kreosot im durchfallenden Lichte. So können wir auch bei den Netzhautgefässen, deren Wandungen also unsichtbar sind, und nur in Folge von Bildungsanomalien oder pathologischen Veränderungen derselben sichtbar werden, nur vom Durchmesser der durch die Gefässwand mit voller Klarheit durchscheinenden Blutsäulen sprechen, welcher im Allgemeinen für die Arterien geringer, für die Venen beträchtlicher ist. Die Venen erscheinen also breiter, die Arterien schmäler und gleichzeitig ist der Verlauf der ersteren mehr geschlängelt, der der letzteren mehr gestreckt. Dieses Verhältniss ist im normalen Auge ziemlich konstant und erleidet nur sehr geringe Schwankungen. Ebenso verhält es sich mit der Farbe: diese ist beim Venenblute dunkler, zinnoberroth, bei dem Blute der Arterien mehr licht, etwa gelbroth. Auch hievon gibt es nur geringe Abweichungen.

Was den Reflex betrifft, so ist dieser das auffallendste Phänomen der Gefässe der Netzhaut, wodurch sich diese sehr wesentlich von anderen Gefässen unterscheiden. Die Zentralgefässe erscheinen nämlich nicht als einfache rothe Streifen, sondern sie haben einen doppelten Kontour, wodurch jedes Netzhautgefäss als aus zwei rothen Streifen, zwischen denen ein heller weisslicher Streifen sichtbar ist, bestehend, sich präsentirt.

---

[58]) l. c. pag. 55, 56, 57 etc.

Dieser Streifen, welcher intensiver und breiter an den stärkeren, verhältnissmässig schwächer und schmäler an den kleineren Gefässen erscheint, bei günstigen Beleuchtungsverhältnissen bis in die feinsten Gefässverzweigungen zu verfolgen ist und welcher im Allgemeinen auffallend lichtstärker, breiter und schärfer begrenzt und von lichterer Farbe an den Arterien ist als an den Venen, wurde von HELMHOLTZ [59]) für den Ausdruck der Gefässwandung gehalten. VAN TRIGT und ED. JAEGER [60]) erklärten den Streifen für ein Reflexphänomen, was er in der That ist, entworfen von der vordern Gefässwand, indem die Lichtstrahlen, welche, in der Gesichtslinie des beobachtenden Auges fortschreitend, die zylindrische Gefässwand senkrecht treffen, in derselben Richtung in das beobachtende Auge zurückgeworfen werden und gelangen hier als glänzender Streifen zur Wahrnehmung. Dieser Deutung entsprechend, wandert auch der Reflex zur Seite, wenn wir unsern Kopf und den Augenspiegel seitliche Bewegungen ausführen lassen. Die Erklärung ist thatsächlich nicht antastbar mit Ausnahme des Mediums, von dem der Reflex erzeugt wird. Gegenüber LORING [61]) und OTTO BECKER [62]), welche behaupten, dass die den Reflex erzeugenden Lichtstrahlen theilweise vielleicht von der hintern Gefässwand, hauptsächlich aber von den dahinter liegenden Geweben reflektirt werden, sowie gegenüber SCHNELLER [63]), welcher im Wesentlichen eine der oben gegebenen Erklärung JAEGER's gleichkommende Meinung ausspricht, und gänzlich verlassend seine ältere Erklärungsweise ist es nun JAEGER [64]) mit überzeugender Beredtsamkeit gelungen, auf Grundlage experimenteller Untersuchungen, sowie auf Grund kritischer Analyse der aufgestellten anderweitigen Ansichten und der sich ergebenden Erscheinungen im lebenden Auge bis zur Evidenz nachzuweisen, dass der Reflex einzig und allein durch die Blutsäule entworfen werde und der Ausdruck ist der Verschiedenheit des Brechungsexponenten der Blutflüssigkeit von dem der Gefässwand, u. z. in der Weise, dass gegenüber dem nahezu einheitlichen Brechungskoëffizienten sämmtlicher Netzhautelemente, die Gefässwände mit einge-

---

[59]) Beschreibung eines Augenspiegels, pag. 34.
[60]) Ergebnisse etc. 1855.
[61]) Arch. f. Augen- u. Ohrenheilkunde 1871, 2. Bd. 1. Abth. pag. 202.
[62]) Arch. f. Ophth. 1872, XVIII., 1. pag. 283.
[63]) Arch. f. Ophth. 1872, XVIII., 1. pag. 119.
[64]) l. c. pag. 45—65. Ich habe mich im Verlaufe dieses Vortrages bereits zu wiederholten Malen auf Ed. Jaeger's jüngstes Werk berufen und habe das thatsächlich auch in meinen Vorträgen auf der Klinik gethan, d. h. ich habe manche der in dem Buche niedergelegten Thatsachen und Anschauungen durch das lebende Wort verbreitet, noch bevor das Buch im Drucke erschien. Ich konnte dies, obwohl das Buch erst Jänner 1876 in den Buchhandel gerieth und in den letzten Monaten des Jahres 1875 gedruckt wurde, thun, ohne den Vorwurf, einen Anachronismus zu begehen, zu verdienen, weil der grösste Theil des Inhaltes des genannten Buches mir schon lange früher bekannt war, indem Professor v. Jaeger fast alle hier in Betracht kommenden Lehren in seinen öffentlichen Vorträgen allen seinen Zuhörern und Schülern tagtäglich mittheilte. Ich hatte aber auch dadurch Gelegenheit an der Seite des grossen Ophthalmoskopikers die meisten seiner Angaben selber zu studiren und so durch eigene Erfahrung dieselben bestätigt zu finden. Von anderen neueren Bereicherungen der einschlägigen Literatur konnte ich allerdings erst, während ich meine Vorträge zu Papier brachte, Notiz nehmen.

schlossen, der des Blutes erheblich geringer sei, und somit erreicht auch sofort der Reflex eine Veränderung seiner Intensität mit Zu- oder Abnahme der optischen Dichtigkeit des Blutes natürlich in umgekehrtem Verhältnisse. Gleichzeitig zeigt JAEGER, dass der Reflex um so intensiver ist, je lichter die Färbung der Blutflüssigkeit, und dass also in der lichteren Färbung der Blutes in den Arterien gegenüber den Venen zum grösseren Theile der stärkere Reflex der ersteren und der schwächere der letzteren begündet ist.

Wir haben nun noch zum Schlusse eine Merkwürdigkeit in den Zirkulationsverhältnissen des Zentral-Gefäss-Systemes zu erörtern. Im ganzen übrigen Körper sind es die Arterien, welche Pulsationsbewegungen zeigen. Es ist nun zweifellos, dass während der Systole des Herzens Blut in die Zentralarterie geworfen, und diese mithin ausgedehnt wird; allein die Vergrösserungsverhältnisse reichen nicht hin, um diese Ausdehnung wahrnehmen zu lassen, und so sehen wir die Arterien der Netzhaut als gleichmässige starre Blutstreifen und können also unter normalen Verhältnissen keinen Arterienpuls sehen.

Dafür ist es die Zentralvene, welche die Erscheinung der Pulsation erkennen lässt.

Der Venenpuls ist nichts anderes, als ein Regurgitationsphänomen, erzeugt durch Kompression der Vene an der Gefässpforte. Zur Erklärung des Zustandekommens des Venenpulses verfolgen wir die Strömung der Blutflüssigkeit in der Netzhaut. Die Systole des Herzens treibt Blut in die Arterien und erzeugt Diastole derselben. Durch Ausdehnung der Arterien steigt der Blutdruck in ihnen, welcher sofort auf den Glaskörper übertragen wird, was gleichbedeutend ist mit einer Steigerung des intraokulären Druckes, welcher in gleichem Verhältnisse zur Zu- und Abnahme des Augeninhaltes steigen und fallen muss und solchermassen durch Vermehrung des im Auge zirkulirenden Blutquantums gewinnt.

Der gesteigerte intraokuläre Druck hat eine Kompression der Venen, weil in ihnen der Blutdruck geringer ist, zur Folge, und zwar natürlicher Weise desjenigen Theiles des venösen Gefässsystems zunächst, welcher dem Drucke den geringsten Widerstand entgegensetzt.

Nachdem nun der Seitendruck in denjenigen Venen geringer ist, welche dem Herzen näher liegen, weil das Blut nunmehr den grössten Theil der Widerstände überwunden hat, so ist innerhalb des Auges in dem Stamme der Zentralvene oder in deren ersten Theilungsästen der geringste Seitendruck vorhanden, und werden deshalb diese die Kompression zunächst erleiden. Die Folge dieser Kompression ist, dass ein Theil des Blutes durch die Gefässpforte wohl entweicht, der andere Theil aber zurückfliesst, wodurch wir ein Blasswerden der Zentralvene oder ihres grössten Astes vom Zentrum gegen die Peripherie hin, sehen. Während dies vor sich geht, muss der Seitendruck in den Venen allmälig zunehmen, weil das Blut von zwei Seiten her in ihnen sich anhäuft, nämlich von Seiten der Kapillaren, von welchen aus das aus den Arterien kommende Blut fortwährend in die Venen nachströmt, ohne einen Abfluss zu haben, und von Seite der Gefässpforte durch die rückläufige Strömung. Da nun während der nunmehr erfolgenden Diastole des Herzens und Systole der Arterien kein neues Blut ins Auge gelangt,

so nimmt der Blutdruck in den Arterien, und sofort auch der intraokuläre Druck ab. Das Stromhinderniss in der Gefässpforte wird nun von Seiten des mit grösserer Gewalt ausströmenden, weil unter höherem Drucke stehenden Venenblutes um so leichter durchbrochen, als die die Kompression erzeugenden Kräfte nunmehr schwinden, und so erfolgt eine Füllung der Zentralvene von der Peripherie her gegen das Zentrum. Der Venenpuls besteht mithin in einem abwechselnd erfolgenden Erblassen und Gefülltwerden der Vene, und ist immer nur an den grössten Gefässen sichtbar, meistens blos an einem grossen Aste, oder an dem Stamme selber, wenn dieser sichtbar ist; zuweilen sieht man jedoch auch zwei oder, obwohl sehr selten, gar drei Gefässe pulsiren, immer ist es aber nur der dem Ursprunge der Gefässe benachbarteste Theil, welcher die Erscheinung zeigt, und nie sieht man die Pulsation der Venen die Grenze der Papille überschreiten. Der Rhythmus des Venenpulses ist folgender: Unmittelbar vor dem Eintritte des Radialpulses beginnt die Verengerung und das Blasserwerden der Venen in der Richtung von der Gefässpforte gegen die Netzhautperipherie hin sich verbreitend, und unmittelbar auf den Radialpuls folgt die Erweiterung und Füllung der Gefässe in entgegengesetzter Richtung; hierauf folgt eine kurze Pause und das Spiel beginnt von Neuem. Eine ausführliche, genaue Beschreibung des Venenpulses gab zuerst EDUARD JÄGER[65]), gesehen aber wurde die Erscheinung schon früher von VAN TRIGT[66]) und COCCIUS[67]); um die Erklärung derselben erwarben sich v. GRÄFE[68]), DONDERS[69]) und MEMORSKI[70]) hervorragende Verdienste. Der Venenpuls ist fast in allen Augen unter normalen Verhältnissen sichtbar, zuweilen ist er jedoch so schwach, dass er gar nicht oder nur schwer wahrgenommen wird. Man kann ihn jedoch dann mit Leichtigkeit künstlich erzeugen oder verstärken, und zwar durch einen leichten Fingerdruck auf das Auge. Durch den Fingerdruck wird nämlich der Glaskörperdruck, wenn dieser in solchen Fällen nicht ausreicht die Erscheinung wahrnehmbar zu machen, künstlich gesteigert. Am stärksten und deutlichsten ist der Venenpuls in der Regel da, wo das Gefäss eine Biegung oder Knickung erleidet, z. B. bei angeborenen Exkavationen am Rande der Aushöhlung. Der zur Erzeugung des Venenpulses angewandte Fingerdruck darf nicht übermässig sein, weil er sonst die Zirkulation vollständig unterbricht.

Zuweilen gelingt es auch durch einen stärkeren Fingerdruck eine sichtbare Pulsation der Zentralarterie, welche sonst unter normalen Verhältnissen spontan nicht hervortritt, zu erzeugen.

Wenn wir nun das bisher Gesagte, kurz zusammenfassend, wiederholen, so lautet es: Wir sehen im aufrechten Bilde bei schwacher Beleuchtung mit einem HELMHOLTZ'schen Planspiegel den Augengrund eines normalen, jugendlichen Individuums im mehr oder weniger dunkelgelbrothen Farbenton, die ganz diaphane nur durch ihre Gefässe sich

---

[65]) Wiener med. Wochenschr. 1854, Nr. 3—5.
[66]) Nederlansch Lancet 1853, pag. 456.
[67]) Ueber die Anwendung des Augenspiegels, Leipzig, 1853, pag. 3.
[68]) Arch. f. Ophth. I, 1, pag. 382.
[69]) Ibidem I, 2, pag. 75.
[70]) Ibidem XI, 2, pag. 107.

kundgebende Netzhaut und die mehr weniger genau kreisrunde, in der äussern Hälfte mehr lichtfarbige und die graublaue Fleckung der Lücken der lamina cribosa zeigende, in der innern mehr röthlich gefärbte und gleichmässige und im Ganzen glänzend weissgelb oder grauweissgelb erscheinende, scharf abgegrenzte, von dem weissen Bindegewebs- und schwarzen Chorioidealring konzentrisch begrenzte Sehnervenscheibe mit einem mehr weniger glänzenden hellen Fleck ungefähr in der Mitte, von welcher aus das System der hier in's Augeninnere tretenden Zentralgefässe, bestehend aus den lichtrothen schmäleren, und gleichmässig starren Arterien und den dunkelrothen, breiteren, in der Nähe der Gefässpforte spontan oder auf Fingerdruck pulsirenden Venen über die Papille zur Netzhaut ziehend und dichotomisch sich theilend, sich verbreitet und überall die eigenthümliche Erscheinung der doppelten Kontourirung, bestehend in dem glänzenden, von zwei dunklen Streifen begrenzten zentralen Reflexe, bis in die feinsten Ausläufer erkennen lässt.

Im umgekehrten Bilde sieht man von all' dem Angeführten viel weniger. Die bedeutend geringere Vergrösserung gestattet nicht, so eingehende Detailstudien der Strukturverhältnisse zu machen, selbst wenn wir den günstigsten Fall setzen und bei Atropinmydriasis, wodurch also die Pupillenkontraktion wegfällt und der Reflex der Cornea weniger störend ist, untersuchen. Die starke Beleuchtung verändert auch die Farbe des Augengrundes und vermehrt die Reflexe. Und so sehen wir zwar alles heller erleuchtet, aber weniger natürlich tingirt, die Papille ist viel kleiner, schärfer begrenzt, der Bindegewebsring selten und nur äusserst schwach, die lamina cribrosa gar nicht wahrnehmbar. Die doppelte Kontourirung der Gefässe kaum, in den meisten Fällen gar nicht zu unterscheiden, ebensowenig lässt sich der Unterschied zwischen Arterien und Venen mit Leichtigkeit oder überhaupt erfassen. Ein vorhandener Venenpuls, selbst wenn er stark ist, ist nur mit Mühe zu erkennen.

Augenspiegel.

Ich will Ihnen nunmehr, meine Herren, nachdem wir das Objekt, das Ihnen zur Untersuchung vorliegen wird, in den Hauptzügen kennen gelernt, Einiges über das Instrument, dessen Sie sich bedienen werden, und dessen Handhabung mittheilen.

Ich wurde so oft von meinen Zuhörern und auch von anderer Seite darüber befragt, welcher Augenspiegel der beste sei, welchen man sich zum eigenen Gebrauche anschaffen solle. Die Frage brachte mich, da ich sie gewissenhaft beantworten sollte, in Verlegenheit und keinesfalls konnte ich sie mit einem einfachen Namen beantworten. Ich musste mit einer mehr weniger breiten Auseinandersetzung entgegnen.

Wenn Sie, meine Herren, musste ich sagen, Klarheit über das jeweilige, der Konstruktion der einzelnen Ophthalmoskope zu Grunde gelegte Prinzip besitzen werden, dann werden Sie selber entscheiden können, welcher Augenspiegel der beste sei, welcher für Ihre Zwecke am meisten passend ist. Die Zahl der Augenspiegel ist eine so grosse, dass man wirklich von einem Embarras de richesse sprechen könnte, bestünden zwischen ihnen wirklich kardinale Unterschiede. Glücklicherweise ist dies so arg nicht und viele unterscheiden sich blos durch

kleine, selbst sehr unwesentliche, oft genug weder optisch-wissenschaftliche noch technische Unterschiede von einander und haben fast kein anderes Merkmal, als den Namen ihres Autors. Fast gibt es keinen irgendwie bedeutenderen Okulisten, der nicht mit der Erfindung „seines" eigenen Augenspiegels debutirt hätte, und wir müssen denjenigen Ausnahmen, die dies unterliessen, ob ihrer Enthaltsamkeit und ob ihrer Standhaftigkeit, der Versuchung nicht zum Opfer gefallen zu sein, volles Lob spenden.

Im Artikel „Funktionsprüfungen des Auges" von SNELLEN und LANDOLT [71]) finden wir die stattliche Reihe von nicht weniger als 52 verschiedenen Augenspiegeln aufgeführt und wir müssen sagen, trotz der Gewissenhaftigkeit und der Bemühungen der beiden Autoren, gründlich zu sein, ist die Zahl durch diese Ziffer, die sich noch erheblich steigern lässt, noch nicht erschöpft. Namentlich sind die in den letzten Jahren modern gewordenen sogenannten Refraktions-Ophthalmoskope, (COHN [72]), WECKER [73]), LORING [74], KNAPP [75]) die allein einer ganzen dichten Phalanx von Varietäten sich rühmen dürfen, in der obgenannten Ziffer nicht inbegriffen. Dass übrigens, nebenbei bemerkt, jeder Erfinder seinen Augenspiegel für den besten, ja für den allein guten, alle anderen aber für untauglich hält, muss sich stets im Stillen von selber verstehen. Soll nun da die Wahl nicht wehe thun? Wir wollen es trotzdem versuchen, uns in diesem Ueberflusse zurechtzufinden.

Der wichtigste und wesentlichste Bestandtheil eines jeden Augenspiegels ist der Reflektor und bei diesem kommt hauptsächlich in Betracht, ob er intensives oder nur schwaches Licht reflektirt.

Der einfachste derartige Reflektor ist der von HELMHOLTZ konstruirte und aus 3—4 planparallelen übereinander gelegten durchsichtigen Glasplatten bestehende, nach welchem ED. JAEGER [76]) seinen lichtschwachen Spiegel zusammensetzte, da HELMHOLTZ'S Spiegel durch seine ziemlich schwerfällige Technik und durch sein Gewicht und seine Grösse mindestens sehr unbequem zu handhaben ist. Es würde zwar eine einzige Platte zur Spiegelung hinreichen, allein HELMHOLTZ liess sich bei der Wahl von 4 Gläsern von anderen Erwägungen leiten. Durch eine Vermehrung der Glasplatten wird nämlich eine grössere Helligkeit erzielt, die man aber bei Verwendung einer einzigen Glastafel durch Vergrösserung des Einfallswinkels ebenfalls erreichen kann; aber mit Steigerung der Lichtstärke auf diese letztere Weise steigt auch die Intensität des so störenden Kornealreflexes. Nun galt es, die Mitte zu halten zwischen einem genügend starken Beleuchtungsgrade und Vermeidung eines zu störenden Kornealreflexes. Soll zu diesem letzteren Ende die Grösse des Einfallswinkels herabgemindert werden, so musste behufs Erreichung einer genügenden Lichtstärke die Zahl der Glasplatten vermehrt werden. Nach HELMHOLTZ beträgt der Reflexionswinkel, wenn die relativ grösste Helligkeit erzielt werden soll, bei Verwendung einer einzigen Glas-

[71]) Handb. v. Graefe u. Sämisch, Bd. 3, pag. 141 bis 164.
[72]) Zehend. klin. Mon. Bl. f. Aug. X, pag. 307.
[73]) Ibidem XI, pag. 266.
[74]) Amer. Journ. of med. science. April 1870, pag. 323.
[75]) Zeh. Mon. Bl. XII, pag. 379.
[76]) Ueber Staar und Staaroperationen, 1854, Taf. II.

platte 70°, dagegen nur 55°, wenn zur Erreichung der grössten Lichtstärke vier Platten in Verwendung kommen. Und bei einem solchen Winkel ist thatsächlich der Kornealreflex der relativ geringste und am wenigsten störende. JAEGER'S schwacher Spiegel besteht aus drei unbelegten Platten, der Einfallswinkel ist noch geringer als 55° und die Beleuchtungsintensität daher noch unter der durch HELMHOLTZ'S Spiegel zu erzielenden stehend. Wie aber die Erfahrung zeigt, ist der durch JAEGER'S schwachen Spiegel zu erreichende Helligkeitsgrad nicht nur ausreichend — nämlich für's aufrechte Bild — für die meisten Fälle, sondern auch geradezu allen anderen höheren Lichtstufen vorzuziehen.

Eine andere Art von Reflektor ist eine mit Quecksilberfolie belegte plane Spiegelplatte mit einer unbelegten für das durchsehende Auge bestimmten Stelle in der Mitte. Ein solcher Spiegel wird begreiflicherweise ein stärkeres Licht reflektiren, als der früher beschriebene und findet sich namentlich bei dem sogenannten LIEBREICH'schen Augenspiegel.

Weit mehr Licht, als durch die beiden früher genannten, erhält man von einem aus einem foliirten Konkavspiegel bestehenden Spiegelapparate, wie sich solche bei den meisten Augenspiegeln und unter Anderen auch beim JAEGER'schen Augenspiegel als „lichtstarker" Spiegel, besonders für die Untersuchung im umgekehrten Bilde geeignet, vorfinden. Der JAEGER'sche starke Spiegel hat eine Brennweite von 7 Zoll.

Es wurden ausserdem die verschiedenartigsten Kombinationen von Linsen mit spiegelnden konkaven oder konvexen Flächen als Augenspiegel verwendet, so wurde dem nichtfoliirten Planspiegel von FOLLIN eine Konvexlinse beigefügt, auch der DONDERS-EPKENS'sche Augenspiegel und der von COCCIUS besteht aus einem Planspiegel mit einer Konvexlinse. Ebenso wurden Konvexspiegel mit Konvexlinsen kombinirt, z. B. das Ophthalmoskop von ZEHENDER. Man kann auch Konvexspiegel allein benützen, wenn man ein schwächeres Licht erhalten will, als es Planspiegel geben, was hauptsächlich dann wichtig ist, wenn die Lichtquelle an sich zu stark ist, z. B. direktes Sonnenlicht. Uebrigens macht MAUTHNER [77]) die Konvexspiegel mit Unrecht lächerlich, da ein foliirter Konvexspiegel jedenfalls schwächeres Licht gibt, als ein foliirter Planspiegel, und Jedem, der an einen nichtfoliirten Spiegel gewohnt ist, wird in Ermangelung eines solchen ein Konvexspiegel willkommen sein. So liess ich für meinen Gebrauch einen Konvexspiegel anfertigen, den ich einem foliirten Planspiegel vorziehe, weil er mir in dem Gestelle der modernen Ophthalmoskope, in welches ich keinen lichtschwachen JAEGER'schen Reflektor einfügen kann, diesen durch sein schwächeres Licht eher zu ersetzen vermag. Dieser Konvexspiegel, welcher eine negative Brennweite von 60 Zoll hat, beleuchtet noch immer stärker als JAEGER's schwacher Spiegel, aber doch merklich schwächer als ein foliirtes Planglas, und damit scheint die nicht absolute Werthlosigkeit desselben doch erwiesen zu sein.

Ebenso hat man Prismen nach dem Prinzipe der totalen Reflexion als Augenspiegel verwendet u. s. f. Alle diese Kombinationen haben nur den Zweck, eine stärkere oder schwächere Beleuchtung zu erzielen,

---

[77]) Lehrb. d. Ophthalmosk. pag. 88

oder auf eine grössere oder geringere Distanz der Lichtquelle Rücksicht zu nehmen, eine grössere oder geringere Bequemlichkeit für den Untersucher zu erreichen oder auch nur irgend ein optisches Gesetz zur Geltung zu bringen.

Jede dieser Wirkungen lässt sich aber durch die einfachsten Apparate erreichen, und so erkennen Sie sofort, dass wir mit einem einfachen Planspiegel für schwache und einem einfachen Konkavspiegel für starke Beleuchtung in allen Fällen uns zurechtfinden können.

Auch hat man, um die Korrektionsgläser, die optischen Hilfsmittel, die zuweilen — ja eigentlich so häufig — nöthig sind, von denen wir oben andeutungsweise handelten, also die Konkav- und Konvexlinsen zu ersparen, solche mit Folie belegt und blos eine Zentralstelle vom Belag freigelassen und als Reflektoren benützt. Dass damit nicht sehr viel erspart werden kann, ist sofort einleuchtend, da bei der grossen Zahl von Korrektionsgläsern, die zuweilen als erforderlich sich erweisen, der Untersucher im Besitze ebenso vieler gleichzeitig als spiegelnder Apparate zu verwerthender Linsen sich befinden müsste. Freilich wurden die MENISCUS-Augenspiegel meistens zur Untersuchung im umgekehrten Bilde benützt.

Die Augenspiegel werden überdies noch eingetheilt in stative und transportable, deren Wesenheit die Benennung schon erschöpft.

Es gibt weiters Autophthalmoskope, die zur Untersuchung des eigenen Auges bestimmt sind, solche sind von COCCIUS, mittelst dessen Vorrichtung das Auge seinen eigenen Fundus, und von HEYMANN und GIRAUD-TEULON angegeben. Durch den Apparat der Letzteren sieht das eine Auge den Grund seines Partners; also z. B. das rechte den Grund des linken.

Auch ein binokuläres Ophthalmoskop wurde von GIRAUD-TEULON nach dem Prinzipe der totalen Reflexion des Lichtes beim Durchgange desselben durch Glasrhomboëder konstruirt, dessen Werth besonders beim Anschauen von Niveauverschiedenheiten im Augengrunde, z. B. Vertiefungen und Erhabenheiten hoch gepriesen wird, indem der gleichzeitige Gebrauch beider Augen ein körperliches, ein stereoskopisches Sehen ermöglichen soll. Schliesslich gibt es noch Augenspiegel für zwei gleichzeitig untersuchende Beobachter — u. zw. im umgekehrten Bilde — auf Grundlage der totalen Reflexion durch Prismen construirt (v. WECKER und ROGER[78]), und A. SICHEL FILS).[79]) In der neuesten Zeit wurde sogar ein solcher für drei Beobachter construirt.

Auf die detaillirte Beschreibung all' der genannten Prinzipien und Konstruktionen können wir uns hier nicht einlassen, das würde den engen Rahmen unserer Vorträge weit übersteigen, und muss ich die dafür besonders sich interessirenden Herren auf die einschlägige, ziemlich reiche Literatur, die sich übrigens im Lehrbuche von MAUTHNER[80]) und in der Bearbeitung dieses Gegenstandes von SNELLEN und LANDOLT[81])

---

[78]) Bull. de l'Académie des Sciences. 4. April 1870.
[79]) Ann. d'Ocul. LXVII, pag. 57, 1872.
[80]) l. c. pag. 84—122.
[81]) l. c.

und selbst bei ZANDER [82]) ziemlich vollkommen berücksichtiget und zusammengestellt vorfindet, verweisen.

Wir wollen uns deshalb hier mit einer ganz kurzen Beschreibung des JAEGER'schen Augenspiegels, der in der That vor allen übrigen bedeutende Vorzüge besitzt, begnügen. [83]) Dieser besteht aus einem an einer Handhabe befestigten kurzen zylindrischen Rohre, dessen vorderes Ende für das Einfügen des Reflektors, welchen wir beliebig wählen können, bestimmt, schräge abgeschnitten ist, so dass die durch die Fläche des Reflektors gelegt gedachte Ebene mit der Axe der Röhre und sofort auch mit der Gesichtslinie des Untersuchers, die mit dieser Axe zusammenfällt, einen bestimmten Winkel bildet, von welchem wir bereits gesprochen haben. Im rückwärtigen Ende der kurzen Röhre ist ein durchbrochenes Diaphragma angebracht, dessen Mittelloch das Hindurchsehen gestattet und durch dessen Hilfe hier ein Behälter für anzubringende Korrektionslinsen entsteht, die durch einen Deckel hier befestigt werden. Dem JAEGER'schen Spiegel ist ein bereits beschriebener, lichtschwacher und ein lichtstarker Reflektor, sowie die für die gewöhnlichsten Fälle ausreichenden Korrektionsgläser, nämlich Konkav 16 oder 15, 10, 8, 6, 5, 4, 3 und Konvex 20, 8 und Konvex 2 als Umkehrungslinse beigefügt. Die früher erwähnte, rückwärtige, kastenartige Vertiefung ermöglicht aber das Hineinlegen jedes beliebigen Glases, so dass man sämmtliche Gläser eines Brillenkastens, wenn dies nöthig ist, z. B. für Refraktionsbestimmungen, verwenden kann. Zwei Mängel haften dem JAEGER'schen Spiegel an; diese bestehen darin, dass er ziemlich voluminös und also unbequem transportabel ist, und dass der Wechsel der Korrektionsgläser mit einem bedeutenden Zeitverluste verbunden ist. Dem ersteren Mangel sollte durch die „kompendiöse" Ausgabe abgeholfen werden, indem bei dieser alle Dimensionen geringer sind, allein dies gelingt auch dem Kompendiösen nicht ganz, denn er ist noch voluminös genug und eignet sich für einen Taschenaugenspiegel nur schlecht. Noch weniger entspricht der sogenannte „kleine Jaeger", indem bei ihm gerade die kostbarsten Prinzipien der JAEGER'schen Konstruktion verloren gehen. Der „grosse Jaeger" hat nämlich neben seinem schwachen Reflektor noch die Vorzüge des bestimmten Winkels, welcher es ermöglicht, dass man durch die rückwärts eingelegten Korrektionsgläser in der Richtung ihrer Axe durchsehen kann, dann, dass das untersuchende Auge, indem der rückwärtige, das Gestell begrenzende Ring sich an die Orbita genau anlegt, ganz in Schatten gestellt ist und blos das durch den Augenspiegel dringende Licht, von anderer Seite aber keines, empfängt. Da nun beim „kleinen Jaeger" zur Verminderung des Volumens die reflektirende Platte parallel an einer dunklen Scheibe befestigt ist, so muss der Einfallswinkel durch Schiefhalten der Platte erzeugt werden, und da die Korrektionsgläser parallel zur Platte liegen, machen sie die Drehung mit und so sieht man nicht durch ihre Hauptaxe, sondern schief durch dieselben, was die Deutlichkeit der Bilder sehr beeinträchtigt. Wenn man also nach JAEGER'S unverfälschten Grundsätzen untersuchen will, so

[82]) Dr. Adolf Zander, Der Augenspiegel, Leipzig und Heidelberg 1862. pag. 7—56.

[83]) Derselbe ist vorräthig zu haben bei Mechanikus Kraft, Kärntnerstrasse und bei Optikus Fritsch, Alserstrasse, Wien.

kann dies nur durch seinen grossen oder allenfalls kompendiösen Augenspiegel geschehen.

Den zweiten, auf den schwerfälligen Modus des Gläserwechsels bezüglichen Mangel des JAEGER'schen Augenspiegels zu beseitigen, ist die Aufgabe der seit einigen Jahren eingeführten sogenannten Refraktions-Ophthalmoskope. Dieselben besitzen eine auf der rückwärtigen Fläche des foliirten, in der Mitte der Folie entbehrenden Plan- oder Konkavspiegels exzentrisch aufliegende, mit mehr weniger (je nach der Güte der Arbeit) Leichtigkeit drehbare Scheibe, in deren Peripherie nun eine beträchtliche Anzahl (20—25) Korrektionsgläser angebracht sind, deren jedes einen zirka dem nichtfoliirten Zentrum des Spiegels gleichkommenden, oder dieses um etwas, höchstens um das Gleiche übertreffenden Durchmesser besitzt. Beim Drehen der Scheibe werden nun stets neue Gläser hinter der Spiegelöffnung, d. h. ihrer von Folie freien Stelle, welche sich gegenseitig decken, zum Vorscheine kommen, und so wird ein rascher Gläserwechsel ermöglicht. Eine von den Lücken der Scheibe ist frei und enthält kein Korrektionsglas, um zur Untersuchung zu dienen, wenn kein solches nöthig ist. Bei manchen dieser Ophthalmoskope, z. B. dem LORING'schen, sind die Gläser auf zwei oder auch drei abwechselnd einzufügende Scheiben vertheilt, was jedenfalls zweckmässiger ist, weil, je weniger Gläser auf einer Scheibe sind, desto grösser kann der Durchmesser der einzelnen genommen werden. Haben nämlich die Gläser eine gewisse Kleinheit erreicht, so ist deren korrekter, fehlerfreier Schliff nicht leicht zu bewerkstelligen, wenigstens sind die kaum 4—5 Millimeter im Durchmesser haltenden, auf einer Scheibe von 4—5 Centimeter Durchmesser angebrachten Gläser, die hier in Wien nach dem Muster des KNAPP'schen Augenspiegels verfertigt wurden, wegen der bedeutenden Krümmungsfehler ihrer Oberflächen kaum zu verwenden. Es lassen sich eben gar zu kleine Gläser nicht entsprechend gut schleifen. Ob die in Amerika nach Professor KNAPP's Angabe [84]) angefertigten derlei Spiegel besser sind, weiss ich aus eigener Erfahrung nicht anzugeben, da ich die einzelnen Gläser nicht geprüft habe, doch lauten die Zeugnisse der Fachgenossen günstig für dieselben.

Den Augenspiegeln der eben abgehandelten Kategorie haftet der Mangel an, dass für schwache Beleuchtung nur durch foliirte Planspiegel gesorgt ist und andererseits der Mangel des beim „grossen Jaeger" so bedeutsamen, am Gestelle schon praedestinirten Einfallswinkels mit der Schiefstellung des Reflektors auch ein Schiefhalten der Korrektionslinsen zur Folge hat und dass schliesslich die Orbita nicht vollkommen abgeschlossen ist, wodurch auch seitlich, besonders von der Temporalseite her, Licht in's beobachtende Auge gelangt.

Es ist deshalb von hoher Wichtigkeit, wenn eine Konstruktion es ermöglicht, beiderlei Prinzipe, die am JAEGER'schen Spiegel zum Ausdrucke kommenden und die der Drehscheiben mit rasch zu wechselnden Gläsern zu verbinden. Eine solche Kombination ist, so viel ich weiss, von Dr. SCHNABEL sehr glücklich zur Ausführung gebracht worden und man kann sagen, das sei der beste Augenspiegel. Derselbe besteht, genau wie der JAEGER'sche, aus einer vorne schief abgeschnit-

[84]) Zehender's Klin. Mon. Bl. 1874, pag. 379.

tenen, sehr kurzen Röhre, deren Länge an der tiefsten Stelle des Ausschnittes fast Null ist, gestattet das Einsetzen eines nicht foliirten Reflektors und besitzt rückwärts die drehbare, mit sehr gut geschliffenen, auf ihre mathematische Genauigkeit sehr gewissenhaft und exakt geprüften Gläsern versehene Scheibe, deren Drehungsmechanismus noch dazu weit besser und leichter ist, als alle, die ich bisher gesehen habe. Die Korrektionsgläser bei diesem SCHNABEL'schen Augenspiegel sind auf zwei Scheiben, deren eine die schwächsten Konkav- und Konvexgläser, und deren andere die stärkeren Gläser trägt, aufgetragen, wodurch es möglich wurde, den Gläsern eine gewisse nicht zu geringe Durchmessergrösse zu geben und den oben erwähnten Fehler zu vermeiden. Mit dieser technisch relativ vollkommenen Konstruktion verbindet das Instrument ein mässiges Volumen und ist als Taschenformat leicht transportabel. SCHNABEL ist also das gelungen, was ich für meine Person, nach dem vorläufigen Stande unserer Kenntnisse, als das Ideal eines Augenspiegels ansehen muss. Eine Beschreibung dieses Instrumentes wurde, soviel mir bekannt ist, bisher nicht publizirt. [85])

Soll ich noch des „LIEBREICH'schen" Augenspiegels Erwähnung thun? Ich gestehe, nur sehr ungerne. Der unter diesem Namen im Handel vorkommende, und sehr häufig gekaufte Spiegel ist nichts Anderes als der „kleine Jaeger" mit dem einzigen Unterschiede, dass er statt eines durchsichtigen einen foliirten Planspiegel als Reflektor hat. Alles Uebrige aber, wie der Griff und die gabelförmige, auf einem Charnier sich bewegende Vorrichtung hinter dem Reflektor, zur Aufnahme der Korrektionsgläser, die diesem in noch geringerer Anzahl beigegeben sind, als dem „kleinen Jaeger", tragen genau dasselbe Gepräge und unterscheiden sich gar nicht von diesem. Jedenfalls ist der eine wie der andere sehr wenig verwendbar und die aus blos einem Konkavreflektor bestehende „LIEBREICH'sche Ausgabe" ist blos für's umgekehrte Bild zu verwenden.

Die Zahl und die Brennweite der Korrektionsgläser, die in einem Augenspiegel, der auch für genaue Refraktionsbestimmungen geeignet ist, aufzunehmen sei, kann von jedem Untersucher nach dessen Gutdünken, wenn er sich eigens das Instrument bestellt, gewählt werden. Will sich Jemand darnach richten, wie ich beispielsweise in diesem Punkte vorgehen würde, so möge man sich die Gläser nach dem Prinzipe eines Intervalles von $\frac{1}{60}$ wählen. Man kann natürlich auch $\frac{1}{120}$ wählen, um minutiöser zu sein, oder bei weiterem optischem Gewissen auch mit $\frac{1}{48}$ oder $\frac{1}{36}$ sich begnügen. In meinem Augenspiegel, wie gesagt, besteht zwischen dem einen Glase und dem nächstfolgenden der Unterschied von $\frac{1}{60}$, natürlich bei den Gläsern von kürzerer Brennweite ist dies nicht ohne Bruchtheile durchführbar und so muss man da bei einer Annäherung an dieses Intervall es bewenden lassen. Auch kann man bei Konvexgläsern weniger rigoros vorgehen und in der Reihenfolge das Prinzip umgehen. Ich besitze demnach folgende Gläser: Plus und Minus 60, 30, 20, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3 und 2. Aus der Reihe der Plusgläser kann man z. B. 20, 12, 5 ohne merkbaren

---

[85]) Dieses Instrument wird vom Fabrikanten Leiter, Wien, Alserstrasse, verfertigt.

Uebelstand entbehren. Auf die bei der Auswahl dieser Gläser massgebenden Grundsätze hier weiter einzugehen, ist unmöglich, dies kann nur im Kapitel über die Refraktionsbestimmungen geschehen, auch richtet sich dies nach den von der Refraktion des Untersuchers abhängigen Bedürfnissen.

Praktische Regeln.

Sie besitzen nun, meine Herren, die nothwendigsten Vorkenntnisse, mit welchen ausgestattet, Sie an die Untersuchung eines Normalauges herantreten können, um Ihre theoretischen Kenntnisse praktisch zu verwerthen. Bevor Sie jedoch selbst Hand anlegen, will ich Ihnen noch einige praktisch wichtige Fingerzeige geben. Sie lassen den zu Untersuchenden in einem möglichst vollkommen verdunkelten Zimmer sich gegenüber setzen, zu dessen Seite und etwas rückwärts von ihm, damit dessen Kopf und Auge beschattet und nicht durch direktes Lampenlicht erhellt seien, beiläufig in eine Entfernung von 12″ die Lichtflamme, am besten von einer gut brennenden Oellampe, aufgestellt ist. Sorgen Sie dafür, dass das Auge des zu Untersuchenden mit Ihrem Auge und mit diesen beiden die Flamme in gleiche Höhe zu stehen kommen. Unsere stellbaren Lampen gestatten ein Verschieben der die Flamme tragenden Vorrichtung nach oben und unten innerhalb weiter Grenzen. Nun fügen Sie in das vor Ihnen liegende Spiegelgestelle den „lichtschwachen Jaeger“ ein und setzen den Spiegel an das Auge, dessen Orbita durch diesen so abgeschlossen wird, dass sie quasi beide zu einem Ganzen verschmelzen und die Orbita eine Fortsetzung des Spiegelgestelirohres bildet und so Ihr Auge gewissermassen in eine Röhre, durch welche Sie hindurchzusehen haben, ein- und vom Aussenlichte abgeschlossen ist. Nun weisen Sie den Kranken — wiewohl er ganz gesund ist, wollen wir ihn doch mit gewohnheitsmässiger Kürze so nennen — an, in die Ferne und nach innen — also nasalwärts — zu schauen, ohne einen bestimmten Punkt zu fixiren. Durch die nasenwärtige Drehung bezwecken wir, gerade die Eintrittsstelle des Sehnerven, welche, da der Optikus sich nicht am hinteren Bulbuspole, sondern etwas nach innen von diesem einpflanzt, innen gelagert ist, in's Sehfeld zu bekommen, welche wir ohne eine solche Drehung, also bei geradeaus gerichteter Kornealaxe, nur dann zu Gesichte bekommen, wenn wir von der temporalen Seite des Auges in dasselbe hineinsehen, was dem Geübteren ein Leichtes ist, dem Anfänger jedoch Schwierigkeiten bereitet, so dass die angegebene Haltung, bei welcher der Untersucher entweder geradeaus oder nur sehr wenig von der Nasen- oder Schläfenseite her hineinsehen kann, die zweckmässigste ist. Dadurch, dass wir den Kranken in die Ferne sehen heissen, erreichen wir mehrere Zwecke auf einmal. Zunächst soll seine Akkommodation entspannt werden, um die natürliche Refraktion des Auges hervortreten zu lassen, dann aber soll es vermieden werden, dass die Macula lutea sich einstellt. Würden wir den Kranken einen Punkt in der Nähe fixiren lassen, oder würde er mit oder ohne unser Geheiss in den Augenspiegel hineinsehen, so verengerte sich die Pupille, der gelbe Fleck stellte sich ein und wir erhielten das relativ schwächste Licht und gleichzeitig wäre die Wahrnehmung von Details unter bestimmten Bedingungen verhindert,

weil der Kranke seine Refraktion nunmehr maskirte und das Sehen von Einzelnheiten anderen Bedingungen unterwirft, als diejenigen, mit deren Voraussetzung wir uns zur Untersuchung hinsetzen. Es ist deshalb lächerlich und verräth dem Kenner augenblicklich den Mangel an Verständniss des Ganges und des Wesens der Augenspiegeluntersuchung, wenn man, wie das nicht gar zu selten von manchen sogenannten Ophthalmoskopikern geschieht, hört, wie diese den Kranken apostrophiren: „Schauen Sie auf mein rechtes Ohr, schauen Sie auf mein linkes Ohr.“ Aber selbst ein Punkt in der Ferne soll dem Kranken nicht zur Fixation angewiesen werden, weil schon durch das Fixiren allein ein gewisser Grad von Akkommodation eintritt; auch soll in keinem zu kleinen Zimmer untersucht werden, damit es dem Patienten möglich sei, anstatt jeder Fixation, nur in die Ferne hinauszustarren.[86]) Sind diese Bedingungen erfüllt, so schliessen Sie das andere Auge, um sich zu überzeugen, ob Sie in gerader Richtung durch den Spiegel in das Auge hineinsehen, was immerhin dem ungewohnten Untersucher einige Schwierigkeit zu bereiten pflegt. Ist dies geschehen, so müssen Sie sofort, während Sie sich noch in ansehnlicher Entfernung etwa in 1′ vom Auge befinden, die Pupille in röthlichem Lichte erglänzen sehen. Nun nähern Sie sich, ohne Ihre Kopf- oder Spiegelhaltung zu ändern, sehr allmälig dem Auge und mit der grösseren Annäherung wird das Leuchten intensiver werden, bald werden Sie auch ein Gefässstück erblicken und haben Sie sich ad maximum dem Auge genähert, so dass Ihr Instrument fast die Gesichtshaut des Kranken berührt, so werden Sie nach und nach sämmtliche Details in ihrer geschilderten Beschaffenheit wahrnehmen. Die Annäherung muss eine maximale sein, weil sonst die optischen Vergrösserungen eine wesentliche, das deutliche Sehen störende Veränderung erleiden. Aber der Anfänger muss sich nicht plötzlich nähern, weil er sonst sofort bei dieser ungewohnten Beschäftigung, mit deren kleinen Technicismen er noch nicht vertraut ist, die Beleuchtung verliert, und daher kommt es, dass Anfänger so oft sich vom Auge entfernen und in grösserer Entfernung besser zu sehen vorgeben, d. h. es gelingt ihnen leichter das Augenleuchten zu produziren. Während der allmäligen Annäherung muss stets auch auf die Spiegelhaltung geachtet werden, dass diese dieselbe bleibe und so die Beleuchtung nicht störe. Der Spiegel darf sich während der ganzen Zeit von der Orbita, mit welcher er wie verwachsen sein muss, nicht entfernen, und will man sich überzeugen, ob der Reflex auf die richtige Stelle projizirt ist, so soll dies nicht durch Entfernung des Spiegels vom Auge geschehen, sondern es muss der Kopf des Untersuchers die Bewegungen des Spiegels mitmachen, bis er sich mit dem nicht untersuchenden Auge vergewissert, dass die Orbita ringsherum von einem scheibenförmigen Reflex eingenommen ist. Kommt diese Erhellung der orbitalen Umgebung zum Vorschein, so ist die Spiegelhaltung die richtige.

Es ist weiters wichtig, stets das gleichnamige Auge zu untersuchen, d. h. das rechte Auge mit dem eigenen rechten, das linke mit dem linken, weil sonst die beiden Nasen mit einander in Kollision gerathen und die

---

[86]) Siehe hierüber auch Mauthner Lehrb. d. Ophth. pag. 173 und Schnabel Arch. f. Ophth. XX, 2, pag. 1—33.

Untersuchung wenigstens sehr erschweren. Der Augenspiegel aber kann dabei je nach Gewohnheit in der rechten oder linken Hand behalten bleiben.

Und nun, meine Herren, werden Sie eine eigenthümliche Beobachtung machen; trotzdem Sie alle hier auseinandergesetzten Bedingungen erfüllt haben, werden Sie, dem Auge sich nähernd, Nichts von Details sehen. Woher kommt dies? — Das Räthsel hat eine sehr einfache Lösung.

Indem man sich den Augengrund, als ein in beträchtlicher Nähe liegendes Objekt, zu sehen bemüht, setzt man ganz unwillkürlich seine Akkommodation in Bewegung, man stellt sein Auge für die Nähe ein, gleich wie dies geschieht, wenn man lesen oder schreiben will. In diesem Zustande kann aber das untersuchende Auge kein deutliches Bild von dem des Kranken, welches emmetropisch ist und akkommodationslos, erhalten. Das untersuchende Auge ist durch seine Akkommodation myopisch geworden und muss sich zunächst durch Neutralisirung dieser künstlichen Myopie wieder zum Emmetropen machen, was durch Vorsetzen von Konkavgläsern geschieht. Jeder emmetropische Anfänger muss sich deshalb hinter seinen Reflektor eines der jedem Augenspiegel beigegebenen Konkavgläser einsetzen und wird erst mit diesem im Stande sein, Details zu sehen. Man beginnt am besten mit dem schwächsten der vorhandenen Gläser, also z. B. mit —15 und erst wenn man die Ueberzeugung hat, dass es mit diesem nicht geht, greift man zum nächst stärkeren, also etwa zu —12 oder —10 u. s. f. Manche akkommodiren so krampfhaft, dass sie ganz starke Konkavgläser z. B. —6 brauchen, für die meisten Emmetropen reicht jedoch nach den Erfahrungen, die ich in meinen Coursen machte, —10 hin; mit diesem wurde in der Regel deutlich gesehen. Aber auch der myopische Untersucher, von welchem man annehmen sollte, dass er, wenn er seine korrigirende Brille, die er gewöhnlich trägt, anbehält, oder wenn er diese aus Bequemlichkeitsgründen durch ein Glas von demselben Numero hinter dem Augenspiegel ersetzt, als emmetropisch anzusehen und zur sofortigen Wahrnehmung von Details befähigt sei, kann dies thatsächlich nicht, indem auch er akkommodirt und dadurch eine Steigerung seiner Kurzsichtigkeit erfährt; und so braucht auch der Myope im Beginne ein weit stärkeres Glas, als es seiner Myopie entspricht. Viele meiner Hörer, die beispielsweise M $^1/_{10}$ hatten und sich dem entsprechend —10 einlegten, behaupteten starr und hartnäckig, wenn ich ihnen zu einem stärkeren etwa —8 überzugehen rieth, mit diesem schlechter zu sehen, und kehrten im unbewachten Augenblicke wieder zu —10 zurück, bis sie nach langer vergeblicher Mühe die Ueberzeugung gewannen, dass sie damit durchaus nicht, sondern zu ihrem grössten Erstaunen erst, als sie nachgaben und etwa —6, —5 oder gar —4, einzelne auch —3 wählten, zum Ziele gelangten. Nur der hochgradig myopische Untersucher, dessen Kurzsichtigkeit also etwa $^1/_5$, $^1/_4$ oder noch mehr beträgt und der mithin gar nicht gewohnt ist, seine Akkommodation, deren Breite ohnedem gering ist, zu gebrauchen, bedarf in der Regel keines stärkern als des seine Myopie eben neutralisirenden Glases. Ich hielt es für nothwendig, diese für den Myopen wichtige Daten in Kürze hier anzuführen, weil die grosse Mehrzahl der Untersucher myopisch ist; ist doch die Myopie

der bei geistig stark Beschäftigten vorzugsweise vorkommende Brechzustand, die Refraktion des Gelehrtenstandes.

Um nun auch die selteneren hypermetropischen und unter einem die jedenfalls sehr raren presbyopischen Untersucher (ich meine nämlich, soweit sie unter den Anfängern vorkommen) nicht unberücksichtigt zu lassen, so sei hier bemerkt, dass die ersteren, wenn es sich um geringe Grade von Hypermetropie handelt, fast ebenso vorgehen müssen wie die Emmetropen, indem sie sehr stark akkommodiren. Handelt es sich um einen mehr weniger hohen Grad von manifester Hypermetropie des Untersuchers, so werden verhältnissmässig schwächere oder gar keine Konkavgläser, hie und da sogar schwache Konvexgläser nothwendig sein, weil der in diesen Fällen aufgewandte Akkommodationsgrad in den meisten Fällen die Wirkung hat, die Hypermetropie ganz oder nahezu verschwinden zu machen und einen der Emmetropie gleichen oder ihr nahestehenden Brechzustand zu bewirken. Die Presbyopen nun gar, da sie entweder gar nicht oder nur in einem kleinen Bruchtheil akkommodiren, bedürfen, falls sie emmetropisch sind, keines oder eines nur sehr schwachen Konkavglases und ein solcher Presbyope erfüllt eigentlich die ideale Bedingung zum Ophthalmoskopiren, er ist der einzige, der wirklich emmetropisch auch bei der Untersuchung bleibt. Dieses Ideal kann jedoch auch von dem nicht presbyopischen Untersucher erreicht werden, u. z. entweder für jeden Untersuchungsfall speziell oder mit bleibendem Erfolge für alle Zeiten. Das erstere geschieht durch Atropinisirung, indem das Mydriaticum gleichzeitig den Akkommodationsmuskel lähmt, das letztere durch die Gewohnheit. Wenn man längere Zeit sich im Ophthalmoskopiren übt, so wird man die angenehme Beobachtung machen, dass man in immer geringer werdendem Masse akkommodirt und endlich nach langer Uebung hat man es dahin gebracht, als Emmetrope ganz ohne Glas untersuchen zu können oder als Myope mit dem der eigenen Myopie entsprechenden Glase. Man hat thatsächlich seinen Akkommodationsapparat bei der Untersuchung zu entspannen gelernt und bedarf keiner künstlichen Hilfsmittel mehr. Diese Gewohnheit lässt sich viel leichter und viel schneller erwerben, wenn man sich für die ersten Untersuchungen atropinisirt. Durch Atropinmydriasis ist man nämlich in der Lage, schon am ersten Tage ziemlich gut zu sehen, und hat man bereits einmal Details gesehen, so findet man sie das nächstemal selbst, wenn man nicht atropinisirt ist, leichter, was schon an sich einen geringen Grad von Akkommodationsentspannung zur Folge hat. Wenn man nämlich eine halbe Stunde lang sich vergeblich plagt und es nicht gelingt, der Objekte des Fundus ansichtig zu werden, und man diese seine Bemühungen fortsetzend, im „Schweisse seines Angesichtes“ nach dem zu sehenden Objekte fahndet, ohne es zu finden, so wird dadurch die Akkommodation nur noch mehr angespannt. Ich würde deshalb jedem Anfänger rathen, das Studium der Ophthalmoskopie mit der Atropinisirung wenigstens eines seiner Augen einzuleiten, er wird in solcher Weise viel rascher zum Ziele gelangen. Die Atropinisirung hat aber auch den Vortheil, dass man nicht so rasch ermüdet. Indem man krampfhaft akkommodirt, hält man's kaum länger als eine Stunde täglich aus; das Auge ermüdet, schmerzt sogar mitunter, zeigt die bekannten asthenopischen Beschwerden und mancher Kollege freute sich, wenn der Sonnabend kam, der ihm

eine zweitägige Ruhe versprach. Mit erweiterter Pupille jedoch kann man mehrere Stunden im Tage ophthalmoskopiren, ohne im Geringsten zu ermüden, ohne eine Beschwerde zu empfinden.

Aber selbst, wenn alle hier aufgezählten Postulate erfüllt werden, ist noch immer nicht das Sehen ohneweiters zu erreichen. Das Ophthalmoskopiren ist so etwas fremdartiges, man ist so wenig Dinge zu sehen gewohnt in der Weise, wie es hier geschehen soll, die Objekte, die gesehen werden sollen, sind dem Untersucher so neu und unbekannt, der anfangende Beobachter ist so wenig Herr der Bewegungen, überhaupt der Funktionen seines Auges, er vermag so wenig die zweckmässige oder zweckwidrige Haltung des Kranken und dessen Bewegungen zu kontroliren, dass es gar nicht Wunder nehmen darf, wenn nur Wenige so glücklich sind, gleich in der ersten Stunde die Papille zu sehen, die meisten erst in der 3., 4. Stunde oder noch später etwas sehen, manche selbst noch in der 10. Stunde zu kämpfen haben. Es gibt auch sehr seltene Ausnahmen, denen es nie gelingt, etwas zu sehen, die also das Ophthalmoskopiren überhaupt nicht erlernen. Hat der Anfänger auch ein Netzhautgefäss oder die Papille für einen Moment erblickt, so entwischt ihm dies sofort wieder, er vermag dem verschwindenden Objekte nicht rasch genug und in der gehörigen Richtung zu folgen. Bald geht ihm auch die Beleuchtung verloren, bald steht der Spiegel schief, jetzt ist es die Kopfhaltung, die unzweckmässig ist, ein andermal ist es wieder der Kranke, der das Auge in eine andere Richtung lenkt oder in den Spiegel hineinsieht oder gar stets sein Auge hin und her bewegt. Am besten, wie erwähnt, fährt noch der atropinisirte Untersucher, weil er wenigstens einen Faktor, seine Akkommodation ausser Rechnung lassen kann und weiss, dass es kein optisch-physikalischer Fehler ist, der ihn im Sehen hindert, sondern allenfalls ein Geheimniss der Handgriffe, das er sehr bald erräth.

Um von dem Kranken möglichst unabhängig zu sein, ist es sehr gut, wenn auch dieser atropinisirt ist. (Wohl gemerkt, nur für das Studium, denn der Geübte bedarf dieses Hilfsmittels nicht.) Natürlich ist dies nicht überall ausführbar, jeder lässt sich dies nicht gefallen. Wir gaben gewöhnlich unseren Anfängern atropinisirte Kranke, die auch sonst im Halten einstudirt und geübt waren und dem Untersucher sein schwieriges Werk erleichterten.

Es muss noch hervorgehoben werden, dass es dem Anfänger besonders, sogar bei durch Atropin erweiterter Pupille des Kranken kaum, bei enger Pupille aber gar nicht möglich ist, das ganze Bild des fundus oculi, wie es an einer Zeichnung zu sehen ist, auf einmal oder auch nur die ganze Papille auf einmal zu erblicken, vielmehr sieht man gewöhnlich nur Fragmente und man muss sich das Bild aus den einzelnen nach einander zu sehenden Theilen im Geiste zusammensetzen. Dies thut jedoch der Genauigkeit keinen Abbruch, im Gegentheil, es ist dem gründlichen Studium förderlicher, wenn man statt eines glänzenden überraschenden leicht zur oberflächlichen Betrachtung verleitenden Gesammtbildes erst nach und nach zur Anschauung der Gesammtheit gelangt. Man sieht erst die äussere Papillenhälfte mit der Fleckung der lamina cribrosa genau an, dann die innere, betrachtet die Skleral- und Chorioidealgrenze, studirt die Verhältnisse der Centralgefässe, verfolgt

sie in ihrem Verlaufe von ihrem Ursprunge zur Peripherie und umgekehrt, zählt die Gefässe, sucht Arterien und Venen von einander zu unterscheiden oder, was besser ist, man zeichnet gleich auf ein bereit gehaltenes Papier den ganzen Gefässbaum ab, wodurch sich dem Gedächtnisse leicht die jeweiligen individuellen Differenzen in Farbe, Durchmesser, Intensität und Glanz etc. des Gefässreflexes u. dgl. mehr einprägen, fahndet nach einem etwa vorhandenen Venenpuls oder sucht einen solchen durch sanften Fingerdruck an der äusseren Bulbushälfte zu erzeugen u. s. w. Das dies nicht alles an einem, viel weniger am ersten Tage geschehen kann, ist wohl nicht nöthig zu wiederholen. Es ist weiters nicht zu übersehen, dass der Hornhautreflex, selbst bei schwacher Beleuchtung, wenn auch weniger stark, aber doch vorhanden und störend ist. Lange vermag der Anfänger nichts anderes als diesen Reflex zu sehen, der ihm die nicht erweiterte Pupille sogar auch vollständig zu okkupiren und zu decken pflegt. Nach und nach gelingt es nun auch von diesem Hinderniss zu abstrahiren und durch diesen Reflex hindurchzusehen. Wie ersichtlich, habe ich in meiner Einleitung nicht übertrieben, der Ophthalmoskopiker, d. h. derjenige, der es werden will, hat viel Widerwärtigkeiten zu besiegen und er muss mit Geduld, Ausdauer Konsequenz und einem festen Willen gestählt sein. Gut ist es, wenn man auch ein wenig Talent mitbringt. Aber endlich gelangt man, mit diesen Eigenschaften ausgerüstet — post tot discrimina rerum — glücklich an's heissersehnte Ziel und hat eine Kunst erlernt, die jedenfalls ihres Gleichen sucht in der Medizin, die unter den Untersuchungsmethoden an wissenschaftlicher Grundlage, an mathematischer Genauigkeit und an positiven Ergebnissen obenan steht und deren Zukunft noch verheissender ist, als ihre bereits erfolg- und triumphreiche Vergangenheit, der eine ähnliche, vielleicht noch grössere Rolle beschieden ist, als der Perkussion und Auskultation, die, abgesehen von den ausserordentlich wichtigen Diensten, die sie bereits dem Augenarzte geleistet, indem sie die Augenheilkunde als Wissenschaft und als praktisch auszuübende Kunst in einer Spanne Zeit von kaum $2^1/_2$ Dezennien um ein Jahrhundert vorwärts brachte, berufen ist, noch weit wichtigere Ergebnisse dem Mediziner zu liefern, so dass wir die Worte JAEGER'S [87]) vollinhaltlich unterschreiben können, welche lauten: „Ich glaube aber auch durch die kommende Zeit nicht widerlegt zu werden, wenn ich behaupte, dass der Augenspiegel in der Hand des Mediziners wichtigere und wohlthätigere Erfolge aufzuweisen haben wird, als in der Hand des Okulisten, und dass er in der Zukunft mindestens ein ebenso häufig angewendetes und geschätztes diagnostisches Hilfsmittel für den Mediziner abgeben wird, wie das Stethoskop und der Plessimeter."

Um es bis zu dieser Stufe der Vollkommenheit zu bringen, bedarf es jedoch einer bedeutenden Uebung, die man nur erlangen kann, wenn man viele, sehr viele Augen, besonders aber sehr viele gesunde Augen untersucht hat. Darum ist die Ungeduld, mit welcher manche Herren die Untersuchung des ersten pathologischen Falles herbeisehnen, nicht sehr gerechtfertigt. Auffallende pathologische Veränderungen erkennt man sehr bald, es ist keine Kunst, einen Exsudatfleck, ein Blutextravasat,

[87]) l. c. pag. 196.

eine Pigmentscholle u. dgl. mehr zu erkennen, dagegen bedarf es reicher Erfahrung, um unbedeutende Verschiedenheiten, besonders aber die Grenze zwischen den in so weiten Grenzen schwankenden individuellen Differenzen einerseits und den an der Schwelle des Pathologischen stehenden Abweichungen andererseits zu erkennen. Und nur wenn man sehr viele gesunde, normale Augen, die über keine Funktionsstörung zu klagen haben, untersuchte, vermag man dieser Aufgabe zu entsprechen, nur wenn man auf's Bestimmteste weiss, was alles als gesund anzusehen ist, vermag man eine, wenn noch so wenig sich markirende krankhafte Veränderung als solche zu erfassen. Darum verschmähen Sie die normalen Augen nicht, Sie können nie genug von diesen untersucht haben, jedes einzelne bringt wieder neue Eigenthümlichkeiten und nur ein sehr geübtes Auge vermag feine, subtile Nuancirungen an Farbe, Grösse, Glanz, Reflex und andern Erscheinungen zu würdigen.

Die früher verhältnissmässig weitläufig angegebenen Verhältnisse über die Art des Vorganges bei der Untersuchung haben nur insolange Geltung, als der Untersuchte, wie wir annahmen, emmetropisch ist. Sollte dieser nun eine andere Refraktion haben, so ändern sich die Massregeln. Ist der Untersuchte myopisch, so bedarf der sonst ohne Konkavglas Untersuchende eines Konkavglases, um deutlich zu sehen, und umgekehrt aus dem Bedürfnisse eines solchen Glases lässt sich die Myopie erschliessen. Dass das Glas um so stärker sein muss, je stärker die Myopie, muss wohl nicht noch extra erwähnt werden. Ebenso wird derjenige, der z. B. schon durch Erfahrung weiss, dass er in Folge seiner Akkommodation oder seiner myopischen Refraktion, um einen emmetropischen Augengrund deutlich zu sehen, ein bestimmtes Konkavglas, etwa —10 braucht, wissen, dass es sich um Myopie des Untersuchten handelt, wenn er zum deutlichen Sehen eines stärkern Glases bedarf. Ist der Untersuchte hypermetropisch, so wird der Untersucher entweder mit seiner Akkommodation sich zurechtfinden, oder er nimmt ein Konvexglas zu Hilfe, oder ein schwächeres Konkavglas, als dasjenige ist, mit welchem er erfahrungsweise den Grund eines Emmetropen deutlich sieht. Diese skizzenhaften Andeutungen müssen hier genügen, da das Kapitel über die Refraktionsbestimmungen ein gar grosses und wichtiges ist und eine gesonderte Behandlung erfordert.

Zum Schlusse mögen Sie noch folgende kurz gefasste Anhaltspunkte merken. Wenn Sie bei Ihrer gewöhnlichen Art, vorzugehen, also etwa mit dem für emmetropische Kranke bestimmten Glase, sich ad maximum dem Auge nähernd und eben nur in solcher Nähe deutlich sehen, so können Sie wissen, der Untersuchte ist emmetropisch; wenn Sie bei einer solchen Annäherung schlecht, undeutlich oder gar nicht sehen, so ist der Untersuchte — vorausgesetzt, dass sonst keine Anomalie im Auge ist — myopisch; wenn Sie aber mit Ihrem gewöhnlichen Glase bewaffnet oder gar ohne dasselbe schon aus grösserer Entfernung Einzelnheiten, z. B. doppelt contourirte Netzhautgefässe deutlich sehen, so ist das untersuchte Auge hypermetropisch. — Ich sage doppelt contourirte, weil man auch aus einem hochgradig myopischen Auge schon in grösserer Entfernung Netzhautgefässe erblicken kann, u. z. im eingangs beschriebenen umgekehrten Luftbilde, diese Gefässe entbehren wegen der geringeren Vergrösserung des doppelten Contours. Auch haben wir noch ein anderes

Mittel, um dieses umgekehrte, schon von der Ferne erkennbare Luftbild des hochgradig kurzsichtigen Auges vom aufrechten des hypermetropischen zu unterscheiden. Wenn wir seitliche Bewegungen mit unserem Kopfe und Spiegel ausführen, so bewegt sich das Bild entweder in gleicher oder entgegengesetzter Richtung. Im ersten Falle ist es ein aufrechtes und betrifft ein hypermetropisches Auge, im letztern ein umgekehrtes und kommt aus einem hochgradig kurzsichtigen Auge.

Haben Sie eine genügende Fertigkeit im aufrechten Bilde erlangt, so dass Sie beim Anlegen des Spiegels wenigstens sehr bald die Papille auffinden und das Gefundene festhalten können, und haben Sie sich mit dessen gewöhnlichem Aussehen vertraut gemacht, so können Sie zur Uebung im umgekehrten Bilde übergehen. Sie entfernen zu diesem Behufe aus Ihrem Spiegelgestelle das etwa vorhandene Korrektionsglas und den planen Reflektor, um diesen letzteren durch einen Konkavspiegel zu ersetzen. Nun legen Sie wie früher das Gestelle an Ihre Orbita, beleuchten das Auge und schieben die zur Erzeugung des umgekehrten Bildes nothwendige Konvexlinse, am besten von 2″ Brennweite, dieselbe zwischen dem gestreckten Zeige- und Mittelfinger einerseits und dem ganz leicht gebogenen Daumen andererseits der zweiten Hand haltend, zwischen Krankenauge und Spiegel auf etwa $^1/_2$—1″ Distanz vom ersteren und möglichst parallel zu einer die Orbita vorne abschliessend und zur Gesichtslinie des Auges daher senkrecht gedachten Ebene, und das Luftbild in seinem Glanze und seiner Farbenpracht wird in kurzer Distanz vor Ihnen erscheinen, welches Sie nun mit Hilfe Ihrer Akkommodation, oder indem Sie, diese sich ersparend, an der für die Korrektionsgläser bestimmten Stelle des Spiegels ein Konvexglas, gewöhnlich von 8″ Brennweite einlegen, anschauen. Das Einlegen eines Konvexglases hat zwei Vortheile u. z. den, dass man sich beim Hindurchsehen durch ein solches Glas viel leichter gewöhnt, weil man dazu optisch gezwungen wird, seine Akkommodation aufzugeben, was beim Ophthalmoskopiker von hohem Werthe ist, und dann den, dass das Bild dadurch etwas vergrössert erscheint. Auch muss man sich mit einem solchen Glase ein wenig mehr dem Auge nähern als ohne ein solches. Nicht selten bereitet das Entwerfen des umgekehrten Bildes dem Anfänger weit mehr Schwierigkeiten als das Sehen im aufrechten Bilde, ja man kann das als Regel hinstellen. Dass trotzdem das erstere so allgemein verbreitet und bevorzugt ist, dass man so auf evidente Vortheile zu Gunsten eines nicht bestehenden, allenfalls imaginären Gewinnes freiwillig verzichtet, ist thatsächlich ein unergründbares, ein unlösbares Räthsel.

Soll die Stelle der Macula lutea zur Anschauung gebracht werden, so wird gewöhnlich der Rath ertheilt, man möge dem Kranken zurufen, dass er direkt in den Spiegel hineinschaue. Das ist gewiss der allerunzweckmässigste Weg, der zum Sichtbarmachen des gelben Fleckes eingeschlagen werden kann. Wir sahen bereits, dass bei einer solchen Fixation die Pupille sich verengert und die Refraktion sich ändert. Aber selbst im Zustande der Atropinmydriasis ist diese Art und Weise unsicher. Es ist deshalb besser, wenn man sich, wie gewöhnlich, die Papille aufsucht und selber die Bewegung vornimmt, um vom Sehnerven aus sich entfernend, während das zu untersuchende Auge ganz in seiner Lage unverändert verharrt, den gelben Fleck aufzusuchen. Da dieser auf

einer dem Durchmesser der Papille auf's zweifache oder $2^1/_2$fache gleichkommenden Entfernung von dieser in der Richtung nach aussen, also temporalwärts und etwas nach unten gelegen ist, so werden wir im umgekehrten Bilde, um ihn zu sehen, uns nach innen, also nasenwärts und etwas nach oben von der Papille auf diese annäherungsweise leicht abzuschätzende Distanz begeben. Hat man einmal das Bild der Macula gefunden, so kann man, weil die nasenwärtige Bewegung beschwerlich und die dieser entsprechende Stellung für längere Zeit nicht leicht beizubehalten ist, zudem auch schwer die ganze oben beschriebene Figur erscheinen lässt, das Auge ein wenig nach aussen wenden lassen, wobei wir ihm in dieser Bewegung gegen die Schläfenseite, jedoch mit langsamerem Tempo zu folgen haben, und nun können wir das Bild der Macula mit Musse und Bequemlichkeit längere Zeit anschauen und studiren.

Auch im aufrechten Bilde ist es zu rathen, in gleicher Weise zu verfahren und sich durch eigene Bewegung bei unveränderter Stellung des Auges den gelben Fleck aufzusuchen. Wegen der grösseren Annäherung ist es jedoch hier etwas unbequemer, indem die Nase des Kranken eine sehr ausgiebige medialwärtige Bewegung nicht leicht zulässt, und so ist es gut, auch hier, wenn man der Nasenseite ad maximum sich genähert hat, das Auge allmälig sich lateralwärts wenden zu lassen, jedoch ohne ihm zu folgen, bis man die bewusste Stelle vor sich zu haben glaubt. Dass man im aufrechten Bilde zur Aufsuchung der Macula lutea nach deren natürlichem Situationsverhältnisse, also nach aussen und etwas nach unten von der Papille sich zu bewegen hat, und folglich mit Kopf und Spiegel gegen die Nasenseite des Kranken, dürfte sich ja von selbst verstehen.

Und nun, meine Herren, sind Sie in das Nothwendigste und Wichtigste eingeweiht. Macte nova virtute, gehen Sie mit frischem Muthe an die Untersuchung, erproben Sie Ihre Kräfte. Ich wünsche Ihnen den besten Erfolg. Glück auf!

Anhang.

A. Physiologische Exkavation.

Wir müssen hier noch von einer von der geschilderten abweichenden Erscheinungsart des intraokularen Sehnervenendes handeln, weil sie in das Bereich des Normalen gehört, weil sie weder eine angeborene Bildungsanomalie noch auch das Produkt eines krankhaften Vorganges darstellt, sondern schon in dem früher gezeigten constanten Verhältnisse der Masse der Sehnervenfasern der inneren Papillenhälfte zu der in der äusseren sowie in dem Auseinanderweichen der Optikusfibrillen vor dem Umlegen zur innersten Netzhautschicht begründet ist und weil die hier zu besprechende Formverschiedenheit eine so häufig vorkommende ist, dass man sagen kann, sie komme wenigstens in der Hälfte der Fälle vor. Für das emmetropische und myopische Auge ist das sicherlich der Fall, denn in einer Reihe von hundert Augen dieser Art wird man sogar finden, dass noch mehr als jedes andere Auge eine physiologische Exka-

vation hat, dass sich die eine solche besitzenden Augen zu den ihrer entbehrenden beiläufig wie 3 : 2 verhalten. Dagegen verändert sich diese Proportion sehr bedeutend beim hypermetropischen Auge. In einer Reihe von Augen dieser Bauart wird man höchstens jedes 4. oder 5. Auge mit einer angeborenen Exkavation ausgestattet finden.[88]) Es wäre vielleicht mit Rücksicht hierauf, indem das hyperopische Auge als das in seinen Dimensionen und seinen gesammten Entwickelungsphasen mehr zurückgebliebene schon seit geraumer Zeit angesehen wird, die Annahme gerechtfertigt, nach welcher der regelmässige Typus des Sehnerven der mit einer Exkavation ist und der ohne eine solche einen unvollkommneren Grad der Entwickelung zeige. Eine Prüfung des Verhältnisses zwischen der Sehschärfe und der Exkavation dürfte vielleicht einen noch weiteren Aufschluss hierin bringen.

Wir sagten an einer früheren Stelle, dass beiläufig im Centrum, da wo die Austrittsstelle der Centralgefässe ist, die stets etwas mehr nasalwärts verschoben ist, aber gewöhnlich nach aussen von dieser letztern, eine trichterförmige Vertiefung sich findet, als der Ausdruck des Auseinanderweichens der Sehnervenfibrillen. HEINRICH MÜLLER[89]) zeigte nun, dass diese Vertiefung breiter werden könne dadurch, dass die Nervenfasern, anstatt in scharfen, rechten Winkeln sich umzulegen, in sanftem stumpfem Bogen zur Netzhaut hinüberziehen. Wenn nämlich die äusseren Netzhautschichten in unveränderter Dicke bis an die Eintrittsstelle des Sehnerven heranreichen und hier plötzlich aufhören, so müssen die Sehnervenfasern, um die innerste Netzhautschicht zu bilden, senkrecht aufsteigen und im rechten Winkel sich umlegen; wenn aber die äusseren Retinallagen allmälig an Dicke verlieren und in der Umgebung des Sehnerven von ihrer Dicke sehr bedeutend eingebüsst haben, so dass sie hier mit zugeschärftem Rande aufhören, so werden die Nervenfasern nicht so weit aufsteigen müssen, sondern schon von der lamina cribrosa aus, unmittelbar nachdem sie deren Lücken verlassen, sich und zwar schräg hinüberziehend umzulegen beginnen; der Sehnervenscheitel (ED. JAEGER) wird unter solchen Umständen eine Grube, eine Vertiefung bilden, der physiologische Trichter gewinnt bedeutend an Breite und stellt nun eine Höhle dar mit mehr weniger steilen Wänden. So wie wir das anatomische Zustandekommen hier schilderten, fehlt es der Grube allerdings an scharfem Rande, aber man findet, u. z. in nicht geringer Zahl, eine derartige Aushöhlung auch mit ganz scharf ausgeprägtem Rande, so dass

---

[88]) Ich habe als Stichprobe bei einer Reihe von 186 Augen das Häufigkeitsverhältniss der physiologischen Exkavation sowie deren Verhältniss zur Refraktion notirt und gefunden, dass von diesen eine Exkavation hatten 115, also 61·8 %, keine solche 71, mithin 38·2 %. Von den 186 Augen waren emmetropisch und myopisch 144, hypermetropisch 42; von den ersteren hatten Exkavation 106, also mehr als 74%, keine 38, daher weniger als 26%; von den letzteren waren 9 (21·4%) mit, 33 (78·6%) aber ohne Exkavation. Man sieht, diese Zahlen steigern noch die oben gegebene allgemeine Häufigkeitsskala und reden einem noch überwiegenderen Vorkommen der physiologischen Exkavation bei Emmetropen und Myopen (etwa wie 3 : 1) das Wort. Da aber die hier zu Grunde gelegte Ziffer im Ganzen eine verhältnissmässig viel zu kleine für diese Frage ist, möchte ich mich doch eher zu Gunsten der obigen Proportion entscheiden.

[89]) Arch. f. Ophth. IV, 2.

die Wände der Höhle steil abfallen, während sie nach der hier gegebenen Darstellung allmälig vom Boden der Höhle, der durch das Gewebe der lamina cribrosa gebildet ist, bis zur Ebene der innersten Netzhautschichten sich erheben. Zur Bildung einer scharfrandigen, steilwandigen Höhle müssen natürlich die Optikusfasern nach ihrem Durchtritte durch die Siebplatte erst parallel zu dieser und dann senkrecht oder schief aufsteigend zur Netzhaut sich begeben. Die Wände einer solchen Höhle sind von den Nervenfasern gebildet und so ist es klar, dass der Durchmesser derselben, der mehr weniger gross sein kann, doch niemals dem Durchmesser der Papille gleich kommen kann; mit anderen Worten, die physiologische Exkavation ist niemals so gross wie die ganze Papille, die Grenzen der beiden fallen nie zusammen, die Aushöhlung betrifft nur einen Theil der Papille und ihre Tiefe ist nie grösser als die Dicke der Netzhaut und allenfalls eines Theiles oder der ganzen Chorioidea, weil ja die Grube an der siebförmigen Lamelle ihr Ende erreicht. Wir müssen diese Merkmale scharf betonen, weil sie uns in den Stand setzen, die physiologische von anderen, von krankhaften Exkavationen, z. B. der glaukomatösen zu unterscheiden, bei welcher die Wände von der Sclerotica, zum Theil von dem obersten Ende der Pialscheide und von einigen Resten der ausgehöhlten lamina cribrosa gebildet sind. Die Grenze der hier geschilderten Aushöhlung ist durch eine vollkommene oder unvollkommene, mit den Papillencontouren nahezu konzentrische oder exzentrisch gelagerte, kreisförmige oder ovale Linie gebildet. Immerhin darf man diese Art von physiologischer Exkavation als centrale bezeichnen.

Es gibt nämlich noch eine andere Art physiologischer Exkavation, die zuerst von H. Müller, dann wieder von Schweigger [90]) beschrieben und abgebildet wurde. Bei dieser betrifft die Vertiefung blos eine Hälfte der Papille, u. z. die äussere. Wir sahen, dass der grössere Theil der Optikusfasern nach innen, der kleinere nach aussen zieht. Ob nun diese ungleiche Vertheilung deshalb eingerichtet ist, weil zur Macula lutea keine Nervenfasern zu ziehen haben, sondern dieselbe bogenförmig umkreisend zur Peripherie der Netzhaut, oder wie neuere Forschungen, nach welchen am gelben Fleck die Nervenfasern nicht ganz fehlen, sondern blos eine sehr dünne Schicht bilden, es postuliren, gerade deswegen nur die wenigen zur Macula gehörigen Fasern die äussere Optikushälfte okkupiren, das ist für unsern Gegenstand hier gleichgiltig. Thatsache ist die ungleiche Vertheilung und es hängt nur von dem Grade der Ungleichheit ab, ob eine Vertiefung zu Stande kommt, die den Namen einer Exkavation verdient, und im Vereine damit von der Dicke der äusseren Netzhautschichten, ob der Exkavation eine grössere oder geringere Tiefe zukommen soll. Sind nämlich die äusseren Netzhautschichten an der der Macula lutea gehörigen Seite bis zum Optikus reichend gleichmässig dick und hören plötzlich wie abgeschnitten auf, andererseits aber auf der nasalen Seite zugeschärft, verdünnt, so kann es trotzdem geschehen, dass, wiewohl innen eine weit grössere Menge Nervenfasern sind als aussen, doch das Niveau der beiden Hälften nicht oder nur unbedeutend different wird. Sind die äusseren Retinalschichten

[90]) Augenspiegel, Taf. I, Fig 2.

innen und aussen gleich dick, so kann es schon eine Differenz im Niveau geben; diese wird jedoch einen bedeutenden Grad dann erst erreichen, wenn sämmtliche Einflüsse sich summiren, wenn also sowohl die Retina an der temporalen Seite, an der Grenze des Chorioidealloches mit sehr verdünntem Rande aufhört und gleichzeitig eine minimale Zahl von Nervenfasern bekommt, als auch die der Macula lutea abgewendete Seite, ihre gewöhnliche Mächtigkeit beibehaltend, den grössten Theil der Nervenfasern, die sich hier emporthürmen, empfängt. Da wird die äussere Papillenhälfte eine beträchtliche Vertiefung bilden, deren Grund stets die Siebplatte ist, deren äussere allmälig ansteigende Wand von wenigen schief zur Netzhaut verlaufenden Nervenfasern gebildet wird, deren innere steile Wand die innere senkrecht sich aufthürmende und fast bis zum Papillenzentrum hereinreichende, nach SCHWEIGGER'S Beschreibung einen Halbmond mit randständiger Konvexität, mit zentralwärts gewendeter Konkavität und mit nach oben und unten auslaufenden Hörnern bildende Nervenmasse darstellt.


Da die Natur sich nicht schematisiren lässt, so wird es begreiflicherweise zahlreiche Uebergänge zwischen beiden Formen geben, aber doch nicht so, dass nicht eine sehr grosse Anzahl die eine oder andere der beiden Arten, in ihrer Erscheinungsweise scharf gesondert und ausgeprägt, darböte.

Bei scharfbegrenzten, mehr weniger zentralen Exkavationen ist der Rand nicht nur deutlich ausgeprägt, sondern auch mitunter überhängend und nach JAEGER'S Angaben ist deren Wandung zuweilen ausgebuchtet oder durch Vorkommen von Scheidewänden daselbst die Höhle in zwei oder mehrere Buchten getheilt.

JAEGER sah auch die Exkavationen von zarten hyalinen, vollständig durchsichtigen Membranen zum Theil ausgefüllt, er nannte dieselben scheinbare Exkavationen, weil das Augenspiegelbild wie die übrige anatomische Anordnung ganz dasselbe ist, wie bei den bisher beschriebenen.

Nachdem wir nun die anatomische Grundlage der physiologischen Exkavation kennen, wird es uns leicht sein, ihre ophthalmoskopische Erscheinung zu verstehen. Wir müssen uns Folgendes vergegenwärtigen. Wir nehmen an, wir untersuchen im aufrechten Bilde. Wenn im Auge B (Fig. 11), in welchen die Eintrittsstelle des Sehnerven schematisch eine zentrale Einsenkung zeigt, a ein Punkt ist, der in der Netzhautebene liegt, b ein Punkt in der Tiefe der Aushöhlung, also weiter rückwärts als a, so ist es nach den bisher mehrfach berührten dioptrischen Gesetzen klar, dass wir nicht gleichzeitig beide Punkte deutlich sehen können. Angenommen, das Auge B ist emmetropisch und hat eine bestimmte Axenlänge, auf deren Grundlage im Verein mit den anderen für die Refraktion bestimmenden Faktoren die Netzhaut gerade im Brennpunkte des dioptrischen Apparates sich befindet, so wird der Untersucher, wenn er emmetropisch und akkommodationslos ist, ohne Konkavglas, wenn seine Refraktion vom Hause aus oder durch Akkommodation eine andere ist, mit Hilfe des entsprechenden, durch Gewohnheit ihm bereits als für

Fig. 11.




emmetropische zu untersuchende Augen für ihn nothwendigen Konkav- oder Konvexglases den Punkt a, welcher in derselben Ebene wie die Netzhaut, also in der Brennebene gelegen ist, deutlich sehen. Ziehen wir nun vom Punkte b zum Corneazentrum eine gerade Linie, so ist diese länger als eine vom Punkte a zu demselben gezogene, d. h. die Axe des Auges ist in der Richtung des Punktes b eine längere und die Refraktion, besser gesagt die dioptrische Einstellung, eine andere, u. z. da die Brechkraft des Auges dieselbe bleibt und nur der Abstand des Objektes sich vergrössert, eine myopische. Der Punkt b liegt nicht in der Brennebene, sondern hinter derselben, genau so wie im myopischen Auge die Netzhaut hinter der Brennebene gelegen ist. Wir müssen deshalb, um den Punkt b deutlich zu sehen, so einstellen, als wollten wir die Retina eines kurzsichtigen Auges sehen, also ein Konkavglas zu Hilfe nehmen, wenn wir den Punkt a ohne Glas sahen, oder wenn schon zum Deutlichsehen des Punktes a ein Konkavglas erforderlich war, ein stärkeres für b und natürlich ein um so stärkeres, je weiter b von a liegt, d. h. je tiefer die Aushöhlung ist, woraus auch schon hervorgeht, dass wir aus der Stärke des Glases die Tiefe der Höhle berechnen können; und falls der Untersucher ein Konvexglas brauchte, um a deutlich zu sehen, braucht er für b ein schwächeres Konvexglas, oder gar kein Glas oder ein schwaches Konkavglas. Selbstverständlich wird, wenn für Punkt b eingestellt wird, a undeutlich erscheinen, weil man immer nur die in demselben Niveau gelagerten Objekte gleichzeitig deutlich sehen kann. Wir sind aber dadurch in der Lage, die feinsten Niveauverschiedenheiten im Augengrunde zu erkennen.

Das Bild einer zentralen Exkavation wird deshalb folgendes sein: Wir sehen alle im Netzhautniveau, wenn wir für dieses eingestellt haben, situirten Objekte in ihrer gewöhnlichen Färbung und sonstigen Erscheinung, namentlich die Netzhautgefässe scharf und klar, doppelt kontourirt u. s. w. Verfolgen wir sie gegen das Zentrum der Papille, so sehen wir sie vom Rande her allmälig an Farbenbestimmtheit, an Deutlichkeit abnehmen und in der Mitte ganz verschwommen sein. So verhält sich's, wenn der Uebergang von der Höhle zur Netzhaut nach und nach erfolgt. Ein weit ausgeprägteres Bild erhält man von Exkavationen, die einen scharfen oder gar überhängenden Rand haben. Die Peripherie der Papille ist dann zart geröthet, was darin begründet ist, dass ja in diesem peripheren Theile die sämmtlichen Nervenfasern und auch das in ihnen eingeschlossene Kapillargefässsystem zusammengedrängt sind, während der zentrale ausgehöhlte Theil weisses von der Siebplatte reflektirtes Licht ausstrahlt und glänzt. Die Röthung des Randtheiles der Papille ist zum Theil auch die Wirkung des Kontrastes zwischen ihm und dem weisslichen Zentrum und ist nie so stark, dass die scharfe Begrenzung des Optikus gegen die Aderhaut hin dadurch litte. Das Verhalten der Netzhautgefässe ist besonders charakteristisch; verfolgen wir ein Gefäss in seinem Verlaufe von der Peripherie gegen den Ursprung, so sehen wir dasselbe den Bindegewebsring, die Papillengrenze überschreiten und ungestört weiterziehen, bis es an die Grenze der Exkavation angelangt ist, wo wir es plötzlich halten sehen. Hier muss nämlich das Gefäss umbiegen und der Höhlenwand entlang in die Tiefe ziehen, weshalb es plötzlich wie abgeschnitten aufhört und unserem Blicke sich entzieht.

Das umbiegende Gefässstück erscheint gewöhnlich dunkler und breiter, wie angeschwollen. Wir können das an der Exkavationswand hinziehende Gefässstück nicht sehen, und da, was wir von dem einen Gefässe sagten, von allen übrigen auch gilt, so hören rings herum alle Gefässe auf, anstatt wie wir es zu sehen gewohnt sind, zu einem Stamme sich zu vereinigen. Gewöhnlich sieht man das am Exkavationsrande liegende, knieförmig umbiegende Venenstück, wie bereits erwähnt, pulsiren. Wenn wir uns nun mit unserem Blicke weiter gegen die Mitte der Papille bewegen, so sehen wir allerdings auch hier auf der glänzenden Unterlage rothe Streifen, die wir unschwer als Gefässe erkennen, allein dieselben sind viel lichter gefärbt, entbehren des doppelten Kontours und gestatten keine Unterscheidung zwischen Arterien und Venen, und je tiefer die Aushöhlung ist, desto verschwommener sind die Gefässe in der Mitte, zuweilen kaum angedeutet. Von einem Zusammenhange aber dieser in der Mitte gelegenen Gefässe mit den am Randtheile der Papille verlaufenden ist nichts zu entdecken. Ein solcher wird uns erst klar, wenn wir es durch Aenderung der dioptrischen Einstellung ermöglichen, dass wir vom Grunde der Exkavation ein deutliches Bild erlangen. Stellen wir mit einem entsprechenden Glase, also als Emmetropen mit einem mässig starken Konkavglase für die Tiefe der Aushöhlung ein, so sind wir von dem geänderten, früher so unbestimmten, nunmehr klaren deutlichen Anblick der Papillenmitte auf's angenehmste berührt. Zunächst fällt uns das Lückenwerk der Siebplatte, von dem wir früher gar nichts sahen, durch die bekannte graublaue Fleckung auf, dann erkennen wir meistens den Gefässursprung und sind im Stande, Arterien und Venen durch die bekannten Merkmale von einander zu sondern. Auch gelingt es uns zuweilen, den Zusammenhang der intra und extra excavationem gelegenen Gefässstücke herauszufinden, besonders wenn wir bei stark zur Seite geneigtem Kopfe und Spiegel in das nach der entgegengesetzten Seite gelenkte Auge sehen und so die Höhlenwand zur Anschauung zu bekommen uns bemühen, ein Beginnen, das übrigens nicht zu den leichtesten Aufgaben der Ophthalmoskopie zählt. Wir machen bei dieser Gelegenheit nicht selten die Beobachtung, dass das als unzweifelhafte Fortsetzung eines bestimmten, ausserhalb der Höhle verlaufenden Gefässes

Fig. 12.



Normaler Augengrund mit (zentraler, scharf begrenzter) physiologischer Exkavation. (Nach Ed. v. Jaeger.)

a Bindegewebs-, *b* Chorioidealring, *c* Arterien, *d* Venen, *e* (scharfer) Rand der Exkavation, *f* (nicht ausgehöhlte) Randpartie des Optikus, *E* die Aushöhlung mit ihrem Inhalte, den blassen verschwommenen Gefässfragmenten, *L* lam. cribrosa, *n* nasal, *t* temporal.


anzusehende Aderfragment in der Höhle nicht in der gleichen ursprünglichen Richtung verläuft, sondern dass die beiden Stücke seitlich zu einander verschoben sind, indem das verbindende Zwischenstück schräge gestellt ist. Wir sind jetzt in der Mehrzahl der Fälle im Stande, Arterien von Venen zu scheiden, und haben überhaupt ein deutliches Bild von der Tiefe, während gleichzeitig die peripheren Gefässverzweigungen sowie alle in der Netzhautebene situirten Objekte verschwommen, unklar sind.

Aehnlich, aber doch etwas verschieden verhält sich die andere Art physiologischer Exkavation, welche ich in unseren Vorträgen gewöhnlich als SCHWEIGGER'sche zu bezeichnen pflege. Hier liegt, wie bereits bekannt, die Höhle in der äussern Papillenhälfte und darum werden wir die bezeichnenden Symptome nicht im Papillenzentrum suchen, sondern in der äusseren und inneren Hälfte. Die letztere ist nämlich im Kontrast zur ersteren blassen Partie auffallender röthlich, sie verhält sich gleichwie bei der zentralen Exkavation die Peripherie zum zentralen Theil. Einen scharfen Rand kann die Höhle blos innen haben, während sie aussen allmälig in das Netzhautniveau übergehend emporsteigt. Da nach aussen schon normalerweise keine grösseren Gefässe ziehen, so wird sich die äussere Papillenhälfte zunächst durch ihre Blässe, ihre Gefässlosigkeit, aber auch durch ihren Glanz bemerkbar machen, gleichwie bei der früher beschriebenen Form das Zentrum, wir werden aber selbst in der dem gelben Fleck zugekehrten Hälfte bei Einstellung für die Netzhaut nicht leicht die Fleckung der lamina cribrosa sehen, höchstens einzelne unbestimmte Andeutungen in der Nähe des äusseren Randes. Die Netzhautgefässe, welche an der innern Wand der Höhle, also angeschmiegt an die hier angehäufte Nervenmasse, zur Netzhaut ziehen, werden wir auf dieser letzteren in der Richtung von der Retinalperipherie zum Papillenzentrum bis zum Porus opticus deutlich sehen, von hier weiter aber nicht, indem sie an dieser einen Stelle dieselben Erscheinungen von Biegung, Knickung, Anschwellung, plötzlichem Verschwinden und deutlicherer Venenpulsation bieten, wie bei der zentralen Exkavation ringsherum um den Höhlenrand. Bei Einstellung für die Tiefe können wir ein oder mehrere Fortsetzungen der Netzhautgefässe hinlänglich bestimmt, und in der äusseren Papillenhälfte die lamina cribrosa mit überraschender Klarheit sehen.

Was wir hier für das Studium der physiologischen Exkavation angaben, ist nichts anderes als ein allgemeines Gesetz, mit spezieller Anwendung, welchem wir bei Beurtheilung von Niveauverschiedenheiten, bei Bemessung und Berechnung von Tiefendimensionen am Augengrunde noch häufig begegnen werden, und welches, wie wir sehen, nur für das so distinkte und dioptrisch so sensible aufrechte Bild Geltung hat. Wollten wir im umgekehrten Bilde in dieser Weise vorgehen, es gelänge uns nicht, eine Exkavation zu erkennen. Stellen wir uns, wie in dem frühern Beispiele, das Auge B (Fig. 13) mit einer zentralen Einsenkung im Sehnerven ausgestattet vor, von dessen Grunde nun ein umgekehrtes Bild entworfen würde, so liegt das Bild des in der Netzhautebene befindlichen Punktes a in a', das Bild des Punktes b, der in der Höhlentiefe ist, in b'. Beide Bilder schweben in sehr geringer Distanz von einander in der Luft. Wenn wir nun auf einige Zoll Entfernung von diesen sie anschauen sollen, so gelingt uns dies ohneweiters gleichzeitig,

indem wir uns kaum bewusst werden einer Akkommodationsänderung, welche wir ausführen müssen, um beispielsweise einen $8^1/_2''$ entfernten Punkt deutlich zu sehen, nachdem wir unmittelbar früher einen $8''$ entfernten Punkt deutlich sahen. Da aber die Distanz zwischen den beiden reellen Bildern noch weniger beträgt, als $^1/_2''$,


Fig. 13.



so werden wir keine gesonderten Eindrücke empfangen, wir werden die beiden Bilder gleichzeitig deutlich sehen, und die Verschiedenheit er Ebenen, in welchen ihre Objekte liegen, kommt nicht recht zur Wahrnehmung, höchstens ist es die scharfe Knickung der Gefässe am Höhlenrande, welche allenfalls auch im umgekehrten Bilde, aber keineswegs mit solcher Bestimmtheit wie im aufrechten, bemerkt werden kann.

Wir besitzen aber ein anderes bei der Untersuchung im umgekehrten Bilde mit Erfolg anzuwendendes Mittel, um uns von dem Vorhandensein von Niveauverschiedenheiten zu überzeugen, das ist das Phänomen der parallaktischen Verschiebung. Wenn wir uns, wie im früheren Beispiele, im Schnerven des Auges B (Fig. 14) eine zentrale Einsenkung denken, so wird bei Entwerfung des umgekehrten Bildes das reelle Bild des Punktes a des Augengrundes, welcher dem Sehnervenrande angehört und in der Netzhautebene liegt, in a', das des Punktes b vom Grunde der Aushöhlung in b' zu liegen kommen. Wir sehen b' auf


Fig. 14.



der Hauptaxe der Linse liegend, a' hingegen auf einer Nebenaxe entworfen. Gleich wie zwischen a und b eine Tiefendifferenz, besteht auch zwischen a' und b' eine gewisse seitliche Distanz, die in der Figur durch die punktirte Linie a' c' ausgedrückt ist. Wenn wir nun unsere Umkehrungslinse seitlich verschieben, wie in Fig. 15 ersichtlich, so werden nun beide Bilder, b'' und a'', auch das Bild des Punktes b also, auf Nebenaxen entworfen, u. z. das dieses Punktes auf einer der Hauptaxe näheren, das des Punktes a auf einer von der Hauptaxe entfernteren als b'' und als es bei der früheren Position der Umkehrungsloupe der Fall war. Wenn wir die nunmehrige seitliche Distanz der beiden Bildpunkte a'' c'' betrachten, so sehen wir, dass sie gewachsen ist, u. z. dadurch, dass sich a' in grösserem Masse von seinem früheren Standorte entfernte als b' von dem seinigen. Durch Entwerfung der beiden Bilder auf Nebenaxen verliessen sie ihren Platz und machten

seitliche Exkursionen, u. z. um so grössere Exkursionen, je grösser die Entfernung ihrer Objektpunkte, je mehr b hinter a gelegen ist, und um so grössere, je mehr wir die Linse seitlich verschieben. Im Verhältniss zu der grossen Exkursion, welche a′ gemacht hat, ist die von b′ nur gering, so gering, dass sie schwer wahrnehmbar ist und der Punkt stille zu stehen scheint. Vor dem nun scheinbar stille stehenden oder in geringen Exkursionen sich bewegenden Grunde der Exkavation bewegt sich bei seitlicher Verschiebung der zur Erzeugung des umgekehrten Bildes verwendeten Loupe der Rand der Aushöhlung in deutlich wahrnehmbaren Dimensionen, die um so grösser sind, je grösser der Abstand der beiden, also je tiefer die Höhle ist. Der Rand scheint sich also gleichsam wie ein Deckel über die Höhle hinüber zu schieben. Dieses Phänomen von der parallaktischen Verschiebung tritt im umgekehrten Bilde jedesmal ein bei Verschiebung der Linse, wenn Objekte in differenter Tiefe im Augeninnern gelegen sind, also auch bei Prominenzen, nur wird bei solchen der elevirteste, als der dem Beobachter nächstgelegene Punkt die relativ grössere Exkursion ausführen, und so wird z. B. die Spitze einer Erhabenheit über deren Basis sich hinüberzuschieben scheinen. Das Mittel ist untrüglich, gestattet aber nicht eine genaue Berechnung der Tiefendifferenz der beiden Objekte, wie die bei der Untersuchung im aufrechten Bilde in Betracht kommenden dioptrischen Verschiedenheiten, welche uns in den Stand setzen die genaueste ziffermässige Bestimmung der Tiefe einer Grube oder der Höhe einer Prominenz vorzunehmen.

Fig. 15.



Die schraffirte Zeichnung stellt die Linse in ihrer ursprünglichen Lage dar, die andere in der neuen bei seitlicher Verschiebung.

Die physiologische Exkavation ist zweifellos angeboren, bisher ist es wenigstens noch nicht bekannt, ob die Entwickelung oder Vergrösserung einer solchen bei Lebzeiten beobachtet wurde. Es ist denkbar, dass, wenn das Auge des Neugeborenen und des in den ersten Lebensjahren stehenden Kindes unentwickelt, in allen Durchmessern klein und von hypermetropischer Einstellung ist und so häufig keine Exkavation aufweist, dasselbe bei seiner Entfaltung eine Aenderung der Refraktion, was oft genug beobachtet wurde, und vielleicht die Ausbildung einer Exkavation erfährt, was eben bisher noch nicht bekannt ist. Man müsste zu diesem Zwecke

eine Anzahl neugeborener Kinder bald nach ihrer Geburt und dann nach einigen Jahren neuerdings untersuchen, was eben nicht leicht ausführbar ist.

Trotzdem ist die Benennung „physiologische Exkavation“ passender als „angeborene“, weil es sicherlich auch andere, ebenfalls angeborene Exkavationen gibt, die eine eminent pathologische Bedeutung haben, jedenfalls von der hier abgehandelten sehr verschieden sind.

Der Erste, der eine Einsenkung des Sehnerven sah, war Ed. Jaeger 1855 [91]; mit Bestimmtheit spricht erst 1857 Förster [92] von einer partiellen Vertiefung in der Papille; H. Müller [93] machte 1858 die erste anatomische Untersuchung derselben bekannt und 1861 behandelte Ed. Jaeger [94] den Gegenstand ausführlich und erschöpfend anatomisch und ophthalmoskopisch.

B. Senile Veränderungen.

Es ist von Wichtigkeit, die mit dem Augenspiegel wahrnehmbaren Altersveränderungen kennen zu lernen, weil man dieselben sonst leicht für pathologisch halten könnte, während sie doch blos den normalen senilen Involutionsvorgang zum Ausdrucke bringen. Indem die Netzhaut sowohl als Ganzes, als auch die Optikusfasern in ihrem papillären sowohl als retinalen Antheile mehrfache histologische Veränderungen erfahren, die zum Theil als eine der kolloiden ähnliche Metamorphose, zum Theil vielleicht als eine fettige Degeneration, zum Theil als Sklerosirung aufgefasst werden dürfen, zum Theil anderweitige Umgestaltungen, die alle im Ganzen noch wenig studirt sind, so ist der erste Effekt derselben, dass ihre Durchsichtigkeit verloren geht, dass sie in mehr oder weniger hohem Grade getrübt wird. Da aber auch die brechenden Medien des Auges im höheren Alter von ihrer Durchsichtigkeit mehr weniger, mitunter sehr bedeutend einbüssen, so wird das Augenspiegelbild darunter wesentlich leiden und an Klarheit verlieren. Dazu kommt, dass auch die Aderhaut ihren Theil an den senilen Veränderungen hat, welche anatomisch nicht genauer gekannt sind, als die der beiden nervösen Faktoren des Fundus oculi, und welche auch hier zum Theile in einer Art Kolloiddegeneration, zum Theile in hyaliner Verdickung einzelner Lamellen, zum Theile in einer Verschiebung und partiellem oder auch hochgradigem Schwunde des Pigmentepithels sowohl als des Stromapigmentes zu bestehen scheinen; und so wird das Augenspiegelbild eines alternden Auges von dem eines jugendlichen grundverschieden sein. Wüsste man nicht, dass im höhern Alter derartige Veränderungen sich einstellen, man wäre häufig versucht, ein solches Bild als pathologisch anzusprechen, und thatsächlich muss man dies, wenn bei einem jugendlichen Individuum die für das senile Auge charakteristischen Zeichen gesehen werden. Aus dem Gesagten ergibt sich Folgendes: Der Augengrund eines senilen Auges ist theils wegen der Trübung der Medien, theils wegen der Netzhauttrübung weit weniger

---

[91] Ergebnisse etc. pag. 9.
[92] Arch. f. O. III, 2, pag. 86.
[93] Arch. f. O. IV, 2.
[94] Einstellungen etc. pag. 31 u. Taf. I, Fig. 4—9.

erhellt, die Pupille leuchtet nicht so intensiv, man glaubt nicht genug Licht in's Auge geworfen zu haben. Die Aderhaut ist wegen des mehr weniger defekten Epithelstratums nicht gleichmässig, sondern gefleckt. Da nämlich das Pigmentepithel zum Theil geschwunden, so scheint das Aderhautstroma mehr weniger durch; ist der Schwund des Epithelpigmentes ausgedehnt, so können auch grössere mehr weniger deutlich circumscripte epithelpigmentlose Stellen, an denen das Stroma sichtbar ist, erscheinen, ja es kann auch das Stroma chorioideae am senilen Schwunde partizipiren, und wir sehen dann die Sclerotica blossliegen. Die wichtigste und häufigste, ophthalmoskopisch zu beobachtende Erscheinung ist der Schwund des Epithelpigmentes. Ich sah einzelne höchst marastische Greise, in deren Augen die Tunica vasculosa chorioideae propria in der ganzen Ausdehnung des Augengrundes blosslag, also das Epithelpigment vollständig geschwunden war. So etwas ist jedenfalls selten, das gewöhnlichste aber ist eine Rarefikation dieses Pigmentes. Am meisten lässt der Optikus den Einfluss der Seneszenz erkennen. Wenn man zwei Individuen neben einander setzt, ein jugendliches, von Lebensfrische strotzendes, und ein verblasstes, dem Lebensende zuneigendes, und dieselben unmittelbar nacheinander untersucht; wie überraschend verschieden ist der Eindruck, den der Anblick des Sehnerven hervorruft. In jenem alles voll Glanz und Frische, voll Helligkeit und ausdrucksvoll markirt, hebt sich der Sehnerv von seiner Umgebung scharf ab, ist diaphan und glänzend wie Krystall, in ihm prägt sich der Lebensfrühling aus, er erscheint noch nicht abgenützt, er hat, wie nach einer Angabe MAUTHNER's [95]) v. GRAEFE sich häufig ausdrückte, ein virginales Aussehen. In diesem aber ist alles welk, verblüht, matt und trübe, ohne Glanz, der Optikus zeigt eine verschwommene, undeutliche wie verschleierte Begrenzung, die Undurchsichtigkeit der Sehnervenfibrillen gestattet nicht das Deutlichwerden der lamina cribrosa, deren Lücken wir also im Auge der Greise auch in der äussern Papillenhälfte nicht oder sehr schlecht sehen, die Papillenfarbe ist verändert, das weisse und rothe Licht ist aus ihr grösstentheils geschwunden und nur opakes graugrünes Kolorit, das den senilen Optikus charakterisirt, bleibt zurück. Es versteht sich von selbst, dass alle diese Symptome um so ausgeprägter sein werden, je vorgerückter das Lebensalter, und um so minder hervortretend, je näher das Individuum dem jugendlichen Alter steht.

Und so hätten wir das Nothwendigste, was zum Erlernen der ophthalmoskopischen Erscheinung des Normalauges erforderlich ist, mit der hier gebotenen, ohne Beeinträchtigung des Verständnisses möglichen Beschränkung und Kürze abgehandelt und müssen wir uns die Darstellung der angeborenen Abnormitäten und der erworbenen pathologischen Veränderungen des Augengrundes, soweit sie der Beurtheilung mit dem Augenspiegel zugänglich sind, für eine spätere Publikation vorbehalten.

[95]) l. c. pag. 270.

Verlag von **Urban & Schwarzenberg** in Wien. — Druck von **Gottlieb Gistel & Comp.** in Wien.

12.

DER AUGENSPIEGEL

UND

DIE OPHTHALMOSKOPISCHE DIAGNOSTIK.

VON

DR. F. DIMMER

DOCENT AN DER WIENER UNIVERSITÄT UND ASSISTENT AN DER KLINIK DES PROF. FUCHS.

MIT 73 ABBILDUNGEN IM TEXT.

LEIPZIG UND WIEN.

TOEPLITZ & DEUTICKE.

1887.

Alle Rechte vorbehalten.

1643485

ROYAL LONDON OPHTHALMIC HOSPITAL

Vorwort.

Der Titel der vorliegenden Arbeit zeigt bereits das Ziel an, welches sich der Verfasser gesteckt hat. Es sollte in möglichst gedrängter Form dasjenige zusammengestellt werden, was der Praktiker wissen muss, um den Augenspiegel zur Diagnose der Refractionsanomalien und der intraoculären Erkrankungen mit Erfolg verwenden zu können. Es wird daher der Fachmann Manches vermissen, was in einem vollständigen Lehrbuche der Ophthalmoskopie nicht fehlen dürfte. In den Cursen über Ophthalmoskopie, die ich gehalten habe, war mir Gelegenheit geboten, die Bedürfnisse der Anfänger in dieser Richtung kennen zu lernen und die dabei gesammelten Erfahrungen versuchte ich hier zu verwerthen.

Für völlig überflüssig hielt ich es, die verschiedenen Augenspiegel, von denen ein grosser Theil nicht mehr in Verwendung steht, genauer aufzuzählen und zu beschreiben. Es genügt, die Principien, nach denen die gebräuchlichen Augenspiegel construirt sind, darzulegen und zu erwähnen, wie ein Ophthalmoskop je nach dem speciellen Zwecke, zu dem es verwendet werden soll, beschaffen sein muss. Es erschien mir aber unerlässlich, in einer „optischen Einleitung" kurz die zum Verständnisse der Theorie des Augenspiegels und die zum Gebrauche desselben nothwendigen Vorbegriffe darzulegen. Hiebei ist Manches streng genommen nicht hieher Gehörige (z. B. die Erklärung des Dioptrien- und Zollsystems) auch angeführt worden. Dies geschah, um dem Leser das eventuelle Nachschlagen in anderen Büchern zu ersparen.

Das Capitel über Refractionsbestimmung ist dem Zwecke des Buches entsprechend ausführlich gehalten worden. Es ist in demselben der Retinoskopie, die bisher, bei uns wenigstens, nicht die gebührende Beachtung gefunden hat, eine genauere Beschreibung zu Theil geworden.

Die in den Text eingedruckten Figuren werden, so hoffe ich, das Verständniss wesentlich erleichtern. Es fehlen dagegen Abbildungen der normalen und abnormen Befunde, die uns durch den Augenspiegel erschlossen werden. Statt dessen habe ich mir die Freiheit genommen, den Leser auf drei Bildwerke zu verweisen: vor Allem auf den Jaeger'schen Handatlas, der von keinem anderen annähernd erreicht, viel weniger übertroffen wurde. Da derselbe aber einige Lücken aufweist, so war ich gezwungen, mich auch auf den Liebreich'schen „Atlas der Ophthalmoskopie" und auf die „Ophthalmoskopie clinique" von Wecker und Masselon zu beziehen, welch' letztere zwar nicht in Farben, aber sehr gut ausgeführte Bilder enthält.

Wenn ich, über den Rahmen der Arbeit hinausgehend, auch Einiges über Aetiologie der intraoculären Erkrankungen angegeben habe, so geschah dies nur, um anzudeuten, welche Richtung der Gedankengang des Untersuchers zur Erforschung der Grundkrankheit nehmen muss.

In der Hoffnung, wenigstens theilweise den Anforderungen, welche an ein solches Buch gestellt werden können, gerecht geworden zu sein, empfehle ich diese Arbeit der gütigen Nachsicht der Leser.

Wien, im November 1886.

Der Verfasser.

Inhalt.

Seite

I. Theil.

Theorie des Augenspiegels, normaler Fundus, Refractionsbestimmung.

Optische Einleitung.

I. Reflexion des Lichtes 3
1. Planspiegel 3
2. Concavspiegel 5
3. Convexspiegel 10
II. Refraction des Lichtes 12
1. Prismen 13
2. Linsen 14
a) Convexlinsen 14
b) Concavlinsen 19
3. Brechkraft und Numerirung der Linsen 24
4. Optische Systeme 26
5. Das Auge und seine Refraction 27

I. Capitel.

1. Theorie des Augenspiegels 31
2. Construction der Augenspiegel 35
3. Vorgang bei der Augenspiegeluntersuchung 38

II. Capitel.

Der normale Augenhintergrund.

1. Anatomische Uebersicht 47
2. Der ophthalmoskopische Befund im normalen Auge 49
Anhang: Senile Veränderungen 55
3. Ophthalmoskopische Vergrösserung im aufrechten und umgekehrten Bilde . . . 56
4. Das ophthalmoskopische Gesichtsfeld 58
5. Wahrnehmung und Berechnung von Niveaudifferenzen im Augenhintergrund . 59

III. Capitel.

Die Refractionsbestimmung.

1. Bestimmung von E, M, H im aufrechten Bilde 62
2. Bestimmung von E, M, H im umgekehrten Bilde 71
3. Bestimmung des regelmässigen Astigmatismus im aufrechten und umgekehrten Bilde 76
4. Refractionsbestimmung mittels Retinoskopie 80
5. Erkennung des irregulären Astigmatismus 88

Seite

II. Theil.

Diagnostik der mit dem Augenspiegel sichtbaren Anomalien des Auges.

I. Capitel.

Die brechenden Medien.

1. Differentialdiagnose der Trübungen 94
2. Cornea 96
3. Iris 97
4. Linse 98
5. Glaskörper 106
Angeborene Anomalien 106
Erworbene Anomalien 107

II. Capitel.

Sehnerv.

A. Angeborene Anomalien 112
Physiologische Excavation 112
Anomalien der Centralgefässe 115
Anomalien der Farbe 116
Colobom der Sehnervenscheide 116
Opticustheilung 117
Bindegewebe auf der Papille 117
B. Erworbene Anomalien 117
Hyperaemie und Anaemie 117
Glaukomatöse Excavation 118
Neuritis optica 122
Atrophia nervi optici 127
Geschwülste, Concretionen, Pigmentirung im Sehnerven 131

III. Capitel.

Netzhaut.

A. Angeborene Anomalien 132
Markhaltige Nervenfasern 132
B. Erworbene Anomalien 133
Circulationsstörungen 133
1. Arterienpuls 133
2. Sichtbare Blutbewegung in Arterien und Venen 134
3. Hyperaemie 134
4. Anaemie 136
5. Embolie der Arteria centralis 136
6. Thrombose der Vena centralis 138
Gefässveränderungen 139
Netzhautblutungen 140
Retinitis 142
1. Retinitis albuminurica 143
2. Retinitis leukaemica 146
3. Retinitis diabetica 147
4. Diffuse chronische Retinitis 147
5. Haemorrhagische Retinitis 148
6. Andere seltene Formen von Retinitis 149
Pigmentdegeneration der Retina 150
Ablatio Retinae 152
Cysticercus subretinalis 155
Glioma Retinae 156
Verletzungen 157

IV. Capitel.

Aderhaut.

A. Angeborene Anomalien 158
Anomalien des Skleral- und Pigmentringes 158
Coloboma Chorioideae 158

Seite

B. Erworbene Anomalien 161
Hyperaemie 161
Haemorrhagien 161
Chorioiditis 161
1. Chorioiditis disseminata 163
2. Chorioiditis areolaris 164
3. Chorioretinitis centralis 165
4. Chorioretinitis specifica 165
Staphyloma posticum 166
Tuberkulose 168
Ablatio Chorioideae 169
Tumoren 169
Ruptura Chorioideae 170

Abkürzungen:

P. D. = Papillen-Durchmesser.
J. A. = ophthalmoskopischer Handatlas von Jaeger, Wien 1869.
L. A. = Atlas der Ophthalmoskopie von R. Liebreich, Berlin 1885.
W. u. M. = Ophthalmoskopie clinique par Wecker et Masselon, Paris 1881.

I. THEIL.

Theorie des Augenspiegels, normaler Fundus, Refractionsbestimmung.

Optische Einleitung.

Um ein Instrument mit Verständniss zu gebrauchen, ist es nothwendig, dass man einen Einblick in die Principien habe, auf welchen die Construction desselben beruht. Beim Augenspiegel werden nun verschiedene Arten von Spiegeln und Linsen verwendet, deren Wirkungsweise man kennen muss, um sie mit Erfolg benützen zu können. Im Folgenden soll daher eine kurze Uebersicht der bei der Reflexion und Refraction des Lichtes geltenden Gesetze gegeben werden. In späteren Capiteln werden wir dann oft in die Lage kommen, auf diese Einleitung zu verweisen.

I. Reflexion des Lichtes.

1. Planspiegel.

Fällt ein Lichtstrahl auf eine ebene spiegelnde Fläche, so wird er nach bestimmten Gesetzen in bestimmter Richtung und Ebene reflectirt. Errichtet man in dem Punkte, wo der einfallende Strahl (Fig. 1, a b) den Spiegel (S P) trifft, eine Senkrechte, das Einfallsloth (b c), so ist der Winkel, den der Lichtstrahl mit dieser Linie bildet, der Einfallswinkel (α); die Ebene, die durch das Einfallsloth und den einfallenden Strahl gelegt werden kann, die Einfallsebene. Der Winkel, den der reflectirte Strahl (b d) mit dem Einfallslothe bildet, ist der Reflexionswinkel (β), die durch den reflectirten Strahl und das Einfallsloth gelegte Ebene die Reflexionsebene.

Bei der Reflexion des Lichtes ist die Reflexionsebene die einfache Verlängerung der Einfallsebene. Der einfallende und der reflectirte Strahl liegen daher in derselben Ebene. Reflexions- und Einfallswinkel sind einander gleich.

Befindet sich ein leuchtender Punkt (Fig. 2, a) vor einem Planspiegel, so entwirft der Spiegel ein Bild von ihm. Zwei der von dem Punkte auf den Spiegel fallenden Strahlen, die wir hier allein betrachten wollen, seien a b und a c. Beide werden nach den soeben angegebenen Gesetzen reflectirt (b d und c e sind die Einfallslothe; $\alpha = \alpha_1$; $\beta = \beta_1$). Verlängere ich die reflectirten Strahlen nach rückwärts, bis sie sich schneiden, so bekomme ich den Ort, wo ein vor dem Spiegel befindliches Auge das Bild des Punktes a sieht. Dasselbe

liegt in a_1 und ist eben so weit hinter dem Spiegel gelegen, als a vor demselben. Ziehe ich von a eine Senkrechte (a l) auf den Spiegel (S P) und verlängere dieselbe über ihren Fusspunkt hinaus hinter den Spiegel, so bekomme ich die Lage des Bildes, wenn ich auf dieser Linie den Punkt bestimme, der eben so weit von der Spiegelfläche entfernt ist, als a (a l = a_1 l).




Fig. 1.*)

a_1, das Bild des Punktes a, ist ein sogenanntes virtuelles Bild, dies ist ein Bild, von dem nicht wirklich Strahlen ausgehen, sondern das man nur erhält, wenn man die von der spiegelnden Fläche reflectirten Strahlen nach rückwärts verlängert, bis sie sich schneiden.




Fig. 2.

Dreht man den Planspiegel S P (Fig. 3), so dass er jetzt in S_1 P_1 liegt, so bewegt sich das virtuelle, hinter dem Spiegel gelegene Bild a_1

*) In den Figuren 1 bis inclusive 32, mit Ausnahme der Figuren 12, 13 und 17, sind die auf Spiegel, Prismen oder Linsen auffallenden Strahlen als ungebrochene Linien gezeichnet, die reflectirten oder gebrochenen Strahlen sind durch — . — . — . — . Linien, die Hilfslinien als – – – – Linien dargestellt.

des leuchtenden Punktes a von a_1 nach a_2. Man stelle sich vor einen Planspiegel, und zwar so, dass die Spiegelfläche der Gesichtsfläche parallel liegt. Dann drehe man den Spiegel so um die verticale Axe, dass seine Fläche gegen die linke Hand sieht. Man wird, indem man dem Spiegel diese Drehung ertheilt, wahrnehmen, dass das Bild im Spiegel in entgegengesetzter Richtung wandert, als man den Spiegel gedreht hat, nämlich gegen die rechte Seite des Beobachters.




Fig. 3.

Haben wir es nicht mit einem leuchtenden Punkte, sondern mit einem leuchtenden Gegenstande zu thun, so können wir uns sein Bild construiren, indem wir von jedem seiner Endpunkte das Bild zeichnen.

Von a b (Fig. 4) wird ein Bild vom Spiegel S P in a_1 b_1 entworfen, $a\,l = a_1\,l$ und $b\,m = b_1\,m$.

Das Bild, das ein Planspiegel von einem Gegenstande erzeugt, ist also eben so gross wie der Gegenstand und aufrecht. Nur muss nothwendig das, was im Gegenstande rechts ist, im Bilde links sein. Steht man vor einem Planspiegel und hebt die rechte Hand, so erhebt das Bild im Spiegel die linke.




Fig. 4.

Wirft man mittels eines schräg gestellten Planspiegels das Licht einer Flamme auf eine dunkle Wand, so erscheint eine verschwommene, ziemlich matt erleuchtete Stelle auf derselben.

In einem Planspiegel sieht man sein Bild aufrecht und immer scharf in welcher Entfernung man sich auch vom Spiegel befinden möge.

2. Concavspiegel (Sammelspiegel).

Einen Concavspiegel kann man sich aus unendlich vielen, sehr kleinen Planspiegeln zusammengesetzt denken, ähnlich wie man sich einen Kreis als Polygon von unendlich vielen Seiten denken kann

Auf jedem dieser kleinen Planspiegel steht natürlich der Radius der Kugel, als deren Stück der Concavspiegel erscheint, senkrecht. Dieser Radius heisst Krümmungshalbmesser, der Mittelpunkt der Kugel ist der Krümmungsmittelpunkt des Spiegels. Jeder solche Radius bildet zugleich für den Strahl, der in seinem Endpunkt auf den Spiegel einfällt, das Einfallsloth. Die Hauptaxe des Spiegels ist eine durch den Mittelpunkt desselben und den Krümmungsmittelpunkt gelegte gerade Linie. Die Reflexion erfolgt nun nach den oben bei den Planspiegeln angegebenen Gesetzen.




Fig. 5.

S P (Fig. 5) ist ein Concavspiegel, dessen Krümmungsmittelpunkt in O liegt. O b ist der Krümmungshalbmesser, $x x_1$ die Hauptaxe, K der Mittelpunkt des Spiegels. Fallen parallele Strahlen (a b, c d) auf den Spiegel, so werden sie in F vereinigt: $\alpha = \alpha_1$; $\beta = \beta_1$. Als parallele Strahlen werden solche angesehen, die aus einer Entfernung von wenigstens 6 Meter herkommen. F ist der Focus oder Brennpunkt des Spiegels. Er liegt in der Mitte zwischen dem Spiegel und seinem Krümmungsmittelpunkt. Die Brennweite (Focaldistanz), d. i. die Entfernung des Brennpunktes vom Spiegel, ist also gleich dem halben Krümmungshalbmesser. Je kürzer der Krümmungshalbmesser, je stärker der Spiegel also gewölbt ist, desto kürzer ist die Brennweite und desto stärker der Spiegel.




Fig. 6.

Liegt der leuchtende Punkt in endlicher Entfernung, z. B. in a (Fig. 6), so liegt sein Bild in b, zwischen F und O. a c ist der einfallende Strahl, O c der Krümmungshalbmesser, c b der reflectirte Strahl, $\alpha = \alpha_1$.

Rückt der leuchtende Punkt näher dem Spiegel, so entfernt sich sein Bild vom Spiegel. Befindet er sich endlich in O, dann liegt sein Bild ebenfalls in O, Bild und Gegenstand fallen also in O zusammen. Denn die in der Richtung des Krümmungshalbmessers einfallenden Strahlen werden in sich selbst reflectirt, da Einfalls- und Reflexionswinkel gleich Null sind.

Befindet sich der leuchtende Punkt zwischen Krümmungsmittelpunkt O und Brennpunkt F, dann rückt sein Bild von O wieder nach

rückwärts hinweg. In Fig. 6 brauchen wir uns nur den leuchtenden Punkt a dort zu denken, wo b liegt, so können wir nach dem Gesetze der conjugirten Vereinigungspunkte b an die Stelle von a setzen.

Das **Gesetz der conjugirten Vereinigungspunkte** sagt aus, dass, wenn durch irgend eine optische Vorrichtung von einem leuchtenden Punkt oder Gegenstand ein Bild erzeugt wird, man Gegenstand und Bild mit einander vertauschen kann. a sei der Gegenstand, der sich an einer bestimmten Stelle befindet, b sein durch eine optische Vorrichtung erzeugtes wirkliches oder scheinbares Bild. Bringe ich nun a an die Stelle von b, so befindet sich das Bild b an der Stelle, wo früher a lag. Dies bezieht sich nicht nur auf den Ort des Bildes und Gegenstandes, sondern auch auf Umkehrung und Grösse.

Je näher nun a an F liegt, desto weiter rückt b vom Spiegel ab. Kommt a nach F, dann sind die vom Spiegel reflectirten Strahlen parallel. Dies zeigt uns Fig. 5, wenn wir uns a an der Stelle von F denken.

Gelangt a innerhalb die Brennweite des Spiegels, d. h. zwischen O und F, so werden die Strahlen divergent reflectirt (Fig. 7). Es entsteht also kein wirkliches Bild vor dem Spiegel, das Bild ist vielmehr nach dem, was bei den Planspiegeln gesagt worden ist, ein virtuelles, wird also erhalten, wenn man die vom Spiegel reflectirten Strahlen nach rückwärts verlängert.




Fig. 7.

Dieses virtuelle Bild findet man sehr weit hinter dem Spiegel, sobald a noch nahe an F liegt. Je näher a an den Spiegel heranrückt, desto näher kommt auch b von hinten her an den Spiegel, bis a und b in der Spiegelfläche zusammenfallen.

Die Lage des Bildes lässt sich leicht bei bekannter Entfernung des leuchtenden Punktes und bei bekannter Brennweite des Spiegels nach der Formel $h = \frac{gf}{g-f}$ finden. In dieser Formel bedeutet h die Entfernung des Bildes vom Spiegel, g die Entfernung des Gegenstandes vom Spiegel und f die Brennweite des Spiegels. Diese Formel lässt sich umwandeln in $h = \frac{f}{1-\frac{f}{g}}$. Für $g = \infty$ erhält man also $h = f$;

für $f = 3$ und $g = 4$, also für $g > f$ aber $g < 2f$ ist $h = \frac{3}{1-\frac{3}{4}} = 12$.

Bisher haben wir nur von einem leuchtenden Punkte gesprochen, der in der Hauptaxe des Spiegels liegt. Wir wollen nun sehen, wie sich das Bild eines leuchtenden Punktes verhält, der nicht auf der Hauptaxe des Spiegels sich befindet. Man kann sich das Bild eines solchen Punktes sehr leicht construiren. a (Fig. 8) sei

ein solcher Punkt. Man braucht nur von a eine Linie a m parallel zur Hauptaxe ($x\,x_1$) des Spiegels zu ziehen. Ein Strahl, der in dieser Richtung auf den Spiegel fällt, wird, wie wir früher sahen, so reflectirt, dass er durch den Brennpunkt des Spiegels geht. Ein zweiter von a ausgehender Strahl geht durch den Krümmungsmittelpunkt (O), der Strahl a l. Dieser wird in sich selbst reflectirt. Das Bild des Punktes a muss also dort liegen, wo sich diese beiden Strahlen schneiden, d. i. in b.




Fig. 8.

Es ist nun sehr einfach, den Ort und die Lage des Bildes eines leuchtenden Gegenstandes zu finden.

1. Befindet sich der Gegenstand in unendlicher Entfernung, so dass parallele Strahlen von ihm ausgehen, so entsteht ein umgekehrtes, sehr stark verkleinertes Bild im Brennpunkt des Spiegels (Fig. 9).

2. Rückt der Gegenstand näher (Fig. 10, a b), so entsteht ein umgekehrtes, immer noch verkleinertes Bild (a_1 b_1) zwischen Brennpunkt und Krümmungsmittelpunkt. Je näher der Gegenstand dem Krümmungsmittelpunkt des Spiegels kommt, desto näher rückt ihm auch sein Bild und desto weniger ist dasselbe verkleinert.




Fig. 9.

3. Liegt der Gegenstand im Krümmungsmittelpunkte, dann liegt auch das Bild dort und Gegenstand und Bild sind gleich gross, das Bild aber verkehrt.

4. Befindet sich der Gegenstand zwischen Brennpunkt und Krümmungsmittelpunkt des Spiegels, so entsteht ein verkehrtes und vergrössertes Bild jenseits des Krümmungsmittelpunktes (Fig. 10, mit Vertauschung von Bild und Gegenstand). Dasselbe entfernt sich immer

mehr vom Spiegel, je näher der Gegenstand an den Brennpunkt herankommt.

5. Liegt der Gegenstand im Brennpunkt des Spiegels, so werden die Strahlen parallel reflectirt (Fig. 9). Ein vor dem Spiegel befindlicher Beobachter, der für parallele Strahlen eingestellt ist, sieht dann hinter dem Spiegel ein virtuelles, sehr stark vergrössertes, aber aufrechtes Bild. Es ist aufrecht, denn nun sind die Verhältnisse eben so, als ob der Gegenstand in unendlicher Ferne läge und parallele Strahlen aussenden würde.




Fig. 10.

6. Liegt der Gegenstand zwischen Brennpunkt und Spiegel, also innerhalb der Brennweite desselben, so entsteht ein vergrössertes, aufrechtes, virtuelles Bild hinter dem Spiegel in endlicher Entfernung (Fig. 11, $a_1 b_1$). Dasselbe nähert sich dem Spiegel, wenn der Gegenstand sich dem Spiegel nähert und seine Grösse nimmt hiebei immer mehr und mehr ab bis

7. Bild und Gegenstand in der Spiegelebene zusammenfallen.




Fig. 11.

Man kann die Brennweite eines Concavspiegels finden, wenn man in der Entfernung von mindestens 6 Meter eine Lichtquelle (Lampe) aufstellt und von dieser mittels des Spiegels ein scharfes Bild auf einem Schirm entwirft. Die Entfernung des Spiegels von dem Schirm ergibt die Brennweite.

Dreht man einen Concavspiegel SP (Fig. 12), durch den ein umgekehrtes Bild einer Flamme erzeugt wird, um seinen Mittelpunkt in eine andere Lage $S_1 P_1$, so bewegt sich das Flammenbild mit ihm nach derselben Seite.

Bewegt sich ein leuchtender Punkt oder Gegenstand, der weiter von einem Concavspiegel entfernt ist, als sein Krümmungsmittelpunkt, in einer bestimmten Richtung, so wandert das Bild dieses Punktes oder Gegenstandes in der entgegengesetzten Richtung. In Fig. 13 bewegt sich ein leuchtender Punkt von a nach a_1, sein Bild von b nach b_1.

Das aufrechte, virtuelle Bild, das entsteht, wenn der Gegenstand innerhalb der Brennweite des Spiegels liegt, geht mit dem Gegenstande.




Fig. 12.

Einen Concavspiegel unterscheidet man sehr leicht von einem Planspiegel dadurch, dass man sich im Planspiegel aus jeder Ent-




Fig. 13.

fernung sieht, während man im Concavspiegel nur dann ein aufrechtes, aber vergrössertes Bild sieht, wenn man sich zwischen Brennpunkt und Spiegel befindet.

3. Convexspiegel (Zerstreuungsspiegel).

Bei einem Convexspiegel können wir eben so wie bei einem Concavspiegel Krümmungsmittelpunkt, Brennpunkt und Hauptaxe unterscheiden. Auch hier liegt der Brennpunkt mitten zwischen Krümmungsmittelpunkt und Spiegelfläche, beide aber in negativer Entfernung, hinter dem Spiegel. Parallel auffallende Strahlen werden so reflectirt, dass sie rückwärts verlängert sich im Brennpunkte

schneiden. a m und b n (Fig. 14) sind die einfallenden Strahlen, o l und o p die Krümmungshalbmesser (Einfallslothe), m k und n l die reflectirten Strahlen, wobei $\alpha = \alpha_1$ und $\beta = \beta_1$ ist. F ist der Brennpunkt.

Die von einem in endlicher Entfernung gelegenen Punkte ausgehenden Strahlen werden natürlich unter einem noch grösseren Winkel




Fig. 14.

reflectirt, so dass sie nach rückwärts verlängert sich zwischen Brennpunkt und Spiegel schneiden. Dort ist das virtuelle Bild des leuchtenden Punktes. Das Bild irgend eines Punktes liegt also immer




Fig. 15.

innerhalb der Brennweite, hinter dem Spiegel, ist also immer virtuell. Das Bild ist desto näher der Spiegeloberfläche, je geringer die Entfernung des Leuchtpunktes davon ist.

Ganz analog wie beim Concavspiegel verhält es sich auch hier mit der Auffindung des Bildes eines Gegenstandes.

1. Fallen die von einem Gegenstande ausgehenden Strahlen parallel auf den Spiegel auf, so ist das Bild sehr stark verkleinert, aufrecht und liegt im Brennpunkt.

2. Liegt der Gegenstand in endlicher Entfernung (Fig. 15, a b), so liegt das verkleinerte und aufrechte Bild a_1 b_1 zwischen Brennpunkt




Fig. 16.

und Spiegel, und zwar um so näher dem Spiegel, je näher der Gegenstand demselben liegt.

3. In der Spiegeloberfläche fallen Bild und Gegenstand zusammen.

Bewegt sich ein leuchtender Punkt a (Fig. 16) vor einem Convexspiegel nach a_1, so bewegt sich das virtuelle Bild hinter dem Spiegel in derselben Richtung von b nach b_1.

II. Refraction des Lichtes.

Wenn ein Lichtstrahl aus einem Medium in ein anderes tritt, so erleidet er, wenn er nicht senkrecht auf die Trennungsfläche der beiden Medien auffällt, eine Aenderung in seiner Richtung, er wird abgelenkt.




Fig. 17.

Wir unterscheiden demnach einen einfallenden Strahl und einen gebrochenen Strahl. Unter dem Einfallslothe versteht man eine Senkrechte, die man dort, wo der einfallende Strahl die Trennungsfläche der beiden Medien trifft, auf diese Trennungsfläche errichtet. Der Winkel, den der einfallende Strahl mit dem Einfallslothe einschliesst, heisst der Einfallswinkel, die Ebene, in der der einfallende Strahl und das Einfallsloth liegen, die Einfallsebene.

Der Winkel, den der gebrochene Strahl mit dem verlängerten Einfallslothe bildet, ist der Brechungswinkel die Ebene, in der der gebrochene Strahl und das Einfallsloth liegen, die Brechungsebene.

In Fig. 17 ist a b der einfallende Strahl, b c der gebrochene; α der Einfalls-, β der Brechungswinkel.

Die Brechnungsebene bildet die Erweiterung der Einfallsebene.

Zwischen dem Winkel α und dem Winkel β besteht eine gewisse Beziehung. Wenn man den Sinus des Einfallswinkels durch den Sinus des Brechungswinkels dividirt, so erhält man immer dieselbe Zahl, sobald die beiden Medien dieselben bleiben. $\frac{\sin. \alpha}{\sin. \beta} = n$. Diese Zahl n heisst der Brechungsindex oder Brechungsexponent.

Tritt ein Lichtstrahl aus einem weniger dichten in ein dichteres Medium, so ist der Brechungswinkel kleiner als der Einfallswinkel — der Strahl wird zum Einfallslothe gebrochen. Tritt ein Lichtstrahl dagegen aus einem dichteren in ein weniger dichtes Medium, so wird er vom Einfallslothe gebrochen. Man erkennt dies leicht ebenfalls aus Fig. 17, indem man b c als den einfallenden, a b als den gebrochenen Strahl ansieht. Kommt ein Strahl unter einem gewissen Einfallswinkel auf die Trennungsfläche zweier Medien, so kann es geschehen, dass der Brechungswinkel = 90° oder noch grösser wird. Es bleibt also alles Licht im ersten Medium. Dies nennt man totale Reflexion.

1. Prismen.

Man versteht unter Prisma in der Optik ein Stück eines durchsichtigen Stoffes, welches durch drei Flächen begrenzt ist. Zwei dieser Flächen, die brechenden Flächen, durch die eben bei Benützung des Prismas der Lichtstrahl geleitet wird, bilden zusammen einen Winkel, der der brechende Winkel heisst. Die Linie, in welcher die brechenden Flächen zusammenstossen, heisst die brechende Kante des Prismas. Die Basis des Prismas ist die dieser Kante gegenüberliegende Fläche. Dieselbe ist öfters nur gedacht, denn man bekommt die Wirkung eines Prismas, wenn man an einem beliebigen, durchsichtigen Körper zwei unter einem Winkel zusammenstossende Flächen herstellt und durch diese beiden Flächen einen Lichtstrahl fallen lässt.




Fig. 18.

a b c (Fig. 18) ist der Durchschnitt eines Primas, gebildet durch eine Ebene, die senkrecht auf der brechenden Kante durch dasselbe gelegt ist. Es ist das ein Hauptschnitt. a b und b c sind die brechenden Flächen. a b c ist der brechende Winkel. Eine in b senkrecht auf die Ebene der Zeichnung errichtete Linie ist die brechende Kante. a c ist der Durchschnitt der Basis des Prismas mit der Ebene der Zeichnung.

Ist innerhalb des Prismas ein dichteres Medium als ausserhalb, so ist der Verlauf eines die eine brechende Fläche a b treffenden Lichtstrahles durch das Prisma und aus demselben wieder heraus in die Luft nach dem früher über die Brechung Gesagten ohne Schwierigkeit zu finden. Der Strahl d e trifft in e die eine brechende Fläche a b des Prismas und wird beim Eintritt in das dichtere Medium des Prismas zum

Einfallslothe 11 gebrochen. Er nimmt also seinen Weg durch das Prisma von e nach f. In f, beim Austritt in das dünnere Medium, wird er vom Einfallslothe l_1 l_1 gebrochen, gelangt also nach g.

Hieraus geht hervor, dass, wenn man es mit einem Prisma zu thun hat, welches aus einem dichteren Medium besteht, als das umgebende, ein durch dasselbe gehender Strahl von der brechenden Kante gegen die Basis des Prismas abgelenkt wird.

Befindet sich bei g ein Auge, so sieht es einen in d gelegenen Gegenstand nicht in der natürlichen Lage, sondern gegen die brechende Kante zu verschoben, in der Verlängerung von g f in i.

2. Linsen.

Als Linsen werden in der Optik durchsichtige Körper bezeichnet, die von gekrümmten Flächen begrenzt werden. Sind diese gekrümmten Flächen Theile einer Kugeloberfläche, so sind die Linsen sphaerische.

Es gibt sphaerisch-convexe oder Sammellinsen und sphaerisch-concave oder Zerstreuungslinsen. Eine Convexlinse kann planconvex, biconvex oder concavconvex sein, eine Concavlinse planconcav, biconcav oder convexconcav, je nachdem sie von einer ebenen und einer sphaerisch-gekrümmten, zwei sphaerisch-gleichgekrümmten oder einer convexen und einer concaven Fläche von verschiedenem Krümmungsradius begrenzt werden.

Bei jeder Linse gibt es einen optischen Mittelpunkt, d. i. derjenige Punkt, in dem Gegenstand und Bild zusammenfallen. Eine gerade Linie, die durch diesen optischen Mittelpunkt und die Krümmungsmittelpunkte der die Linse begrenzenden Flächen geht, heisst die Hauptaxe der Linse. Jede andere durch den optischen Mittelpunkt der Linse gehende gerade Linie ist eine Nebenaxe.

Lichtstrahlen, die in einer Axe der Linse durch dieselbe hindurchgehen, werden nicht gebrochen.

Im Folgenden soll nur von biconvexen und biconcaven Linsen die Rede sein.

a) Convexlinsen (Sammellinsen).

Wir wollen zunächst angeben, in welcher Entfernung von der Linse und auf welcher Seite derselben das Bild eines leuchtenden Punktes sich befindet, wenn dieser in verschiedener Entfernung von der Linse auf der Hauptaxe liegt. Das Bild eines solchen Punktes ist natürlich auch immer auf der Hauptaxe zu suchen.




Fig. 19.

1. Fallen Strahlen auf die Linse auf, von denen man annehmen kann, dass sie parallel sind, so werden diese Strahlen in einem Punkte vereinigt, den man den Focus oder Brennpunkt der Linse (F) nennt (Fig. 19). Die Entfernung dieses Punktes von der Linse ist die Focaldistanz.

2. Rückt der leuchtende Punkt auf der Hauptaxe der Linse näher, sendet er also divergente Strahlen aus, so entsteht ein Bild auf der anderen Seite der Linse in grösserer Entfernung von der

Linse als die Focaldistanz, aber in geringerer als die doppelte Focaldistanz. In Fig. 20 ist a der leuchtende Punkt, b sein Bild, F_3 die einfache, F_4 die doppelte Focaldistanz.

3. Ist die Entfernung des leuchtenden Punktes von der Linse gleich der doppelten Brennweite (Fig. 20: a in F_1), so liegt b in der gleichen Entfernung von der Linse (F_4).

4. Liegt a zwischen F_1 und F_2 (Fig. 20), dann ist der Abstand des Bildes auf der anderen Seite grösser als die doppelte Focaldistanz Dies kann ebenfalls durch Fig. 20 veranschaulicht werden, indem man an a und b ihren Platz tauschen lässt und die Bezeichnung von F umkehrt.

5. Fällt a in den Brennpunktsabstand (nach F_2), so sind die Strahlen, nachdem sie durch die Linse durchgegangen sind, parallel (Fig. 19).




Fig. 20.

Alle bisher erwähnten Bilder von a sind reelle Bilder.

In allen den bis nun angeführten Fällen, wo das Bild auf der entgegengesetzten Seite liegt wie der Gegenstand, sagt man: das Bild befindet sich in positiver Entfernung, oder: die Bilddistanz ist positiv.

6. Liegt a zwischen F_2 und O (dem optischen Mittelpunkte der Linse), so werden die jetzt sehr stark divergent auffallenden Strahlen




Fig. 21.

nur weniger divergent gemacht. Es entsteht also kein reelles, sondern ein virtuelles Bild auf derselben Seite wie der Gegenstand — die Bilddistanz ist jetzt negativ (Fig. 21).

7. Im optischen Mittelpunkt O fallen der leuchtende Punkt und sein Bild zusammen.

Bisher war der Leuchtpunkt in positiver Entfernung, die Objectdistanz war positiv. Fallen convergente Strahlen auf eine Sammellinse, so werden sie durch dieselbe noch convergenter gemacht. Convergente Strahlen entstehen aber nur durch Reflexion oder Re-

fraction des Lichtes. Alle Strahlen, die direct von einem leuchtenden Punkt oder Gegenstand ausgehen, sind entweder divergent oder parallel, convergente Strahlen werden nur durch Concavspiegel oder Convexlinsen erzeugt.

Nehmen wir an, dass durch die Linse l (Fig. 22) von einem in grösserer Entfernung, in der Richtung von a_1 gelegenen Punkt ein Bild in a erzeugt wird. Schieben wir nun zwischen a und die Linse l eine zweite Linse L ein, so fallen auf diese letztere convergente Strahlen und wir können a für die Linse L als den leuchtenden Punkt ansehen, von dem durch die Linse L wieder ein Bild entworfen wird. Dieses Bild muss, da die Strahlen durch die Linse L noch convergenter gemacht werden, in b entstehen. Der leuchtende Punkt a, der für die Linse L das Object abgibt, liegt jetzt auf der anderen Seite als früher, er liegt in negativer Entfernung die Objectdistanz ist negativ.*)

8 Liegt nun der Leuchtpunkt in irgend einer endlichen, negativen Entfernung, so liegt sein Bild in positivem Bildabstand zwischen dem Brennpunkt und der Linse.




Fig. 22.

9. Liegt a in unendlicher, negativer Entfernung, d. h. fallen parallele Strahlen auf die Linse auf, so liegt das Bild im Brennpunkt auf der positiven Bildseite.

Fassen wir das bisher Gesagte noch einmal zusammen: Während der Leuchtpunkt aus unendlicher, positiver Entfernung bis in die Entfernung des Brennpunktes der Linse, d. i. bis zum vorderen Brennpunkt wandert, bewegt sich sein reelles Bild mit positiver Bilddistanz vom Brennpunkt bis in die unendliche Entfernung. Dieses Bild in der positiven Unendlichkeit erscheint einem Beobachter, der sich auf der entgegengesetzten Seite befindet, als der leuchtende Punkt, als virtuelles Bild, von ihm aus hinter der Linse. Während nun weiter der Leuchtpunkt vom vorderen Brennpunkt bis zum optischen Mittelpunkt der Linse rückt, wandert das Bild in negativem Abstande, also auf derselben Seite wie der Leuchtpunkt, als virtuelles durch alle Abstände, bis der Leuchtpunkt und sein Bild im optischen Mittelpunkt der Linse zusammenfallen. Liegt nun der leuchtende Punkt auf der negativen Objectseite (welche Lage, wie wir gesehen haben, nur gedacht ist und durch Verlängerung der auf die Linse

*) In den Fig. 19 bis 33 ist fast durchwegs durch + und — die positive und negative Seite für das Object, durch ⊹ und ⊸ die positive und negative Seite für das Bild bezeichnet.

fallenden convergenten Strahlen über dieselbe hinaus gefunden wird) und bewegt er sich vom optischen Mittelpunkte an immer weiter von der Linse weg bis in die Unendlichkeit, so macht das Bild im positiven Bildabstand nur den kurzen Weg vom optischen Mittelpunkt der Linse bis zum Brennpunkt, kehrt also dorthin zurück, von wo es ausgegangen ist.

Wir haben bis jetzt einen auf der Hauptaxe liegenden Leuchtpunkt betrachtet. Liegt nun aber ein solcher auf einer Nebenaxe der Linse, so können wir leicht sein Bild finden, indem wir uns blos zwei von ihm aus durch die Linse gehende Strahlen und ihren Verlauf aufsuchen. a (Fig. 23) ist der Leuchtpunkt. Wir verfolgen nun einen parallel der




Fig. 23.

Hauptaxe gehenden Strahl a m. Dieser wird zum Brennpunkt F gebrochen. Der durch O gehende Strahl erleidet gar keine Ablenkung. Dort, wo sich diese beiden Strahlen schneiden, in b, liegt das Bild von a.

Ein leuchtender Gegenstand kann in leuchtende Punkte zerlegt gedacht werden. Von jedem einzelnen derselben kann man auf die soeben angegebene Weise das Bild finden, welche Bilder dann das des Gegenstandes zusammensetzen. Hienach können wir folgende Sätze über die Lage und Grösse des Bildes bei verschiedener Ent-




Fig. 24.

fernung des Gegenstandes von der Linse ableiten. Der Ort des Bildes ergibt sich jedesmal aus dem, was bereits oben über das Bild eines leuchtenden Punktes gesagt wurde.

1. Sendet der leuchtende Gegenstand parallele Strahlen aus, liegt er also in mindestens 6 *m* Entfernung von der Linse, so entsteht ein verkehrtes, sehr stark verkleinertes, reelles Bild im Brennpunkt.

2. Liegt der Gegenstand in positiver Entfernung (wir wissen jetzt, was wir darunter zu verstehen haben), aber weiter als die doppelte Brennweite, so liegt das Bild in positivem Bildabstand, ist reell, verkleinert und umgekehrt und liegt zwischen einfacher und doppelter

Brennweite (Fig. 24). Je näher der Gegenstand an die Linse heranrückt, desto weniger ist das Bild verkleinert und desto mehr rückt es gegen F_4.

3. Ist der Gegenstand um die doppelte Brennweite von der Linse entfernt (F_1), so liegt das Bild in derselben Entfernung (in F_4), ist ebenso gross wie der Gegenstand, aber verkehrt.

4. Liegt a b zwischen F_1 und F_2, so ist a_1 b_1 verkehrt und vergrössert und liegt weiter als F_4 (Fig. 24 mit Vertauschung von a b und a_1 b_1).

5. Sobald a b in F_2 sich befindet, dann verlassen die von a b kommenden Strahlen die Linse parallel. Ein auf der entgegengesetzten Seite der Linse als der Gegenstand befindlicher Beobachter sieht ein sehr stark vergrössertes, virtuelles, aufrechtes Bild hinter der Linse. Dieses Bild liegt in unendlicher Entfernung von der Linse.




Fig. 25.

6. Bei der Lage von a b innerhalb der Brennweite (Fig. 25) ist die Bilddistanz negativ und endlich. Das Bild ist aufrecht und vergrössert. Je näher a b der Linse rückt, desto geringer ist a_1 b_1 vergrössert und desto näher liegt es der Linse.

7. Im optischen Mittelpunkte der Linse (O) fallen Bild und Gegenstand zusammen. Man könnte sich diesen Fall dadurch verwirklicht denken, dass man durch eine Convexlinse ein reelles Bild eines Gegenstandes erzeugt und dann eine zweite Convexlinse mit ihrem optischen Mittel-




Fig. 26.

punkt genau an die Stelle bringt, wo das umgekehrte Bild des Gegenstandes entsteht.

8. Ist die Objectdistanz negativ, dann bekommt man ein aufrechtes, reelles, verkleinertes Bild in positiver Bilddistanz zwischen Brennpunkt und Linse. Man entwirft (Fig. 26) von einem Gegenstande A B ein verkehrtes Bild a b und dieses ist für die Linse L der Gegenstand mit negativer Objectdistanz. Das durch diese Linse entworfene Bild a_1 b_1 ist ebenso wie a b ein verkehrtes Bild von A B, in Bezug auf a b aber aufrecht. Je weiter a b von der Linse entfernt ist, desto näher rückt a_1 b_1 dem Brennpunkt und desto kleiner wird es.

9. Liegt der Gegenstand in negativer, unendlicher Entfernung, so liegt a_1 b_1 im Brennpunkt und ist in Bezug auf a b aufrecht.

Zwischen der Brennweite einer Convexlinse, dem Abstand des Gegenstandes und dem Abstand des Bildes gibt es eine Beziehung, die durch die Formel $\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ ausgedrückt wird, wobei f die Brennweite, a die Entfernung des Gegenstandes, b die Entfernung des Bildes von der Linse andeutet. Mittelst dieser Formel kann man für jeden Abstand des Gegenstandes bei bekannter Brennweite der Linse den Abstand des Bildes berechnen.

Die Brennweite einer Convexlinse findet man, indem man durch sie das umgekehrte Bild eines mindestens 6 *m* entfernten, leuchtenden Gegenstandes (z. B. einer Flamme oder eines Fensters) auf einem Schirm entwirft und dann die Entfernung der Linse von dem Schirm misst.

Man findet hiebei z. B. in einem speciellen Fall die Brennweite $= 10\,cm$. Der Gegenstand sei $50\,cm$ entfernt, so folgt daraus die Entfernung des Bildes $\left(\frac{1}{b} = \frac{1}{f} - \frac{1}{a} = \frac{1}{10} - \frac{1}{50}\right) \frac{1}{12{\cdot}5}$.

Fallen convergente Strahlen auf die Linse (Fall 8), so muss a negativ gesetzt werden. Wir erzeugen z. B. durch eine Linse l ein umgekehrtes Bild einer Flamme und dieses würde $40\,cm$ von der Linse entfernt entstehen. Nun stellen wir eine zweite Linse L, die $10\,cm$ Brennweite hat, so auf, dass die Entfernung zwischen beiden Linsen $10\,cm$ beträgt. Für L ist jetzt $a = 30\,cm$; $\frac{1}{b} = \frac{1}{f} - \frac{1}{-a} =$

$$= \frac{1}{f} + \frac{1}{a} = \frac{1}{10} + \frac{1}{30} = \frac{1}{7{\cdot}5}.$$

b) Concavlinsen (Zerstreuungslinsen).

Wie bei den Convexlinsen soll zunächst erörtert werden, wo sich das Bild eines auf der Hauptaxe befindlichen Leuchtpunktes befindet, wenn derselbe in verschiedener Distanz von der Linse liegt. Das Bild liegt immer auf der Hauptaxe, es können aber folgende Fälle eintreten:




Fig 27.

1. Sendet der leuchtende Punkt parallele Strahlen aus (Fig. 27), so werden die Strahlen so divergent gemacht, dass sie von F, dem Brennpunkt der Linse zu kommen scheinen. Das Bild ist ein virtuelles, auf der negativen Bildseite gelegenes, auch hier ist FO die Brennweite der Linse.

2. Ist der Leuchtpunkt in endlicher Entfernung (Fig. 28 a), dann werden die ohnehin divergenten Strahlen durch die Linse noch divergenter gemacht und das Bild von a entsteht in b zwischen F und O.

3. Im optischen Mittelpunkt der Linse fallen a und b zusammen.

Liegt der Leuchtpunkt in negativer Entfernung, d. i. fallen convergente Strahlen auf die Linse, so können diese durch die Linse weniger convergent, parallel oder divergent gemacht werden. Es hängt dies von der Entfernung des Gegenstandes ab.

4. Convergiren die Strahlen nach einem Punkte innerhalb der Brennweite der Linse, so werden sie nur weniger convergent, b ist reell und hat positiven Abstand (siehe Fig. 28 mit Vertauschung von a und b). Je weiter a von der Linse abweicht, desto weiter entfernt sich b von ihr.




Fig. 28.

5. Ist a im Brennpunktsabstand auf der negativen Objectseite, so ist b in unendlicher Entfernung (wie in Fig. 27).

6. Liegt a zwischen einfacher und doppelter Focaldistanz auf der negativen Seite, dann werden die Strahlen durch die Linse divergent gemacht, die Bilddistanz ist also negativ, das Bild ist virtuell (Fig. 29 mit Vertauschung von a und b).




Fig. 29.

7. Liegt a in F_4 (Fig. 29), dann liegt b in F_1.

8. Ist a noch weiter auf der negativen Objectseite entfernt als die doppelte Focaldistanz, so liegt b zwischen F_1 und F_2 (Fig. 29).

9. Fallen die Strahlen parallel auf, liegt a in unendlicher Entfernung, dann liegt sein Bild wieder im Brennpunkt.

Auch hier können wir die soeben besprochenen Sätze in Bezug auf die Entfernung des Bildes eines leuchtenden Punktes wie folgt zusammenfassen:

Während a aus der positiven unendlichen Entfernung zum optischen Mittelpunkt der Linse wandert, bewegt sich b, als virtuelles

Bild in negativer Bilddistanz vom Brennpunkt bis zum optischen Mittelpunkt 0. Geht a auf der negativen Objectseite von 0 bis zum Brennpunktsabstand, dann ist b reell, in positiver Entfernung und bewegt sich von 0 bis in die Unendlichkeit. Bewegt sich a auf der negativen Seite weiter, dann ist das Bild virtuell, liegt in negativer Entfernung und rückt von der Unendlichkeit immer näher, bis, sobald a in der doppelten Focaldistanz sich befindet, b die gleiche Entfernung von der Linse hat. Rückt a noch weiter, dann nähert sich b auf der anderen Seite der Linse dem Brennpunkt, um mit diesem zusammenzufallen, wenn a in unendlicher negativer Entfernung ist.




Fig. 30.

Das Bild eines leuchtenden Punktes, der ausserhalb der Hauptaxe liegt, kann man bei Concavlinsen in ähnlicher Weise finden wie bei Convexlinsen (Fig. 30). Man braucht nur den Verlauf zweier Strahlen zu zeichnen, den einen parallel zur Hauptaxe der Linse, den anderen durch den optischen Mittelpunkt der Linse. Wo beide sich treffen (in b), dort liegt das Bild von a.

Es erübrigt uns noch das Bild, das durch eine Concavlinse von einem Gegenstand entworfen wird, seiner Lage und seiner Grösse nach, bei verschiedenen Entfernungen des Gegenstandes von der Linse zu bestimmen:

1. Liegt der Gegenstand a b in unendlicher Entfernung, dann ist das Bild virtuell, aufrecht, stark verkleinert und liegt auf der negativen Bildseite im Brennpunkt.




Fig. 31.

2. Liegt a b in positiver, endlicher Entfernung (Fig. 31), so ist das Bild aufrecht und verkleinert, virtuell. Je näher a b an 0 herankommt, desto näher kommt auch a_1 b_1 an 0 und desto geringer ist dessen Verkleinerung.

3. In 0 fällt a b und a_1 b_1 zusammen.

4. Ist a b in negativer Entfernung zwischen Brennpunktsabstand und Linse, so ist das Bild reell, in positiver Bilddistanz gelegen, aufrecht und vergrössert (Fig. 32). Es ist desto stärker vergrössert und desto weiter von der Linse entfernt, je näher a b an F kommt.

5. Ist a b im Brennpunkt F, dann sind die Strahlen nach der Brechung durch die Linse parallel. Ein auf Seite von a b befindlicher

Beobachter sieht hinter der Linse ein verkehrtes vergrössertes Bild von a b.

6. Ist a b in negativer Objectdistanz zwischen einfacher und doppelter Brennweite (F_3 und F_4 Fig. 33), dann ist das Bild virtuell, vergrössert, verkehrt und liegt in negativer Bilddistanz desto näher an F_1, je näher a b an F_4 kommt. Gleichzeitig nimmt die Vergrösserung immer mehr ab.

7. Ist a b in F_4, dann liegt a_1 b_1 in F_1 und ist ebenso gross wie a b, aber verkehrt.




Fig. 32.

8. Ist a b weiter von 0 entfernt als F_4, dann ist a_1 b_1 verkleinert, verkehrt und liegt zwischen F_1 und F_2.

9. Liegt der Gegenstand a b in der negativen Unendlichkeit, dann ist a_1 b_1 sehr stark verkleinert in F_2.

In der Formel $\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$, welche wir bei den Convexlinsen kennen gelernt haben, brauchen wir nur das Vorzeichen von f zu ändern, und wir bekommen die für die Bezeichnung von Bild- und




Fig. 33.

Gegenstandsweite bei Concavlinsen giltige Formel. Der Brennpunkt liegt ja bei Concavlinsen auf der entgegengesetzten Seite als bei Convexlinsen. Also: $-\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$, $\frac{1}{b} = -\left(\frac{1}{f} + \frac{1}{a}\right)$. Ist der leuchtende Punkt in negativer Entfernung, dann ist auch das Vor-

zeichen von a negativ zu nehmen und die Formel verwandelt sich in:
$\frac{1}{b} = \frac{1}{a} - \frac{1}{f}$.

Die Brennweite einer Concavlinse findet man auf verschiedene Weise:

1. Man kann jede sphaerische Linse zusammengesetzt denken aus zwei Prismen, die bei einer Convexlinse mit der Basis, bei einer Concavlinse mit der brechenden Kante zusammenstossen. Doch nimmt die brechende Wirkung dieser Prismen gegen ihre Kante zu, da die brechenden Flächen sphaerisch gekrümmt sind. Die Strahlen, die durch das Centrum einer Linse gehen, erfahren also keine Ablenkung. Die prismatische Wirkung der Linse nimmt aber bei der Convexlinse gegen den Rand, bei der Concavlinse gegen die Mitte zu.

Wir haben oben (Seite 13, Fig. 18) gesehen, dass durch ein Prisma ein Gegenstand gegen die brechende Kante desselben verschoben erscheint. Wenn ich also eine Convexlinse in bestimmter Richtung bewege und durch dieselbe auf einen entfernten Gegenstand blicke, so bewegt sich, sobald der Gegenstand nicht mehr durch das Centrum, sondern durch die peripheren Partien der Linse gesehen wird (wenn der Beobachter Emmetrop ist), das undeutliche Bild des Gegenstandes in entgegengesetzter Richtung, als ich die Linse bewegt habe. Es erklärt sich dies aus der gegen den Rand der Linse zu immer bedeutender werdenden Ablenkung in der Richtung gegen den Linsenrand. Umgekehrt verhält es sich natürlich bei einem Concavglase, denn sobald ich dasselbe in einer gewissen Richtung verschoben habe, so blicke ich durch ein Prisma, dessen Kante gegen die Seite zu liegt, nach der ich die Linse bewegt habe. Hier bewegt sich der Gegenstand in derselben Richtung.




Fig. 34.

Ich lege also zu der Concavlinse, deren Brennweite ich bestimmen will, ein beliebiges Convexglas und bestimme, ob sich diese Combination wie eine Convex- oder wie eine Concavlinse verhält. Im ersteren Falle ist die Concavlinse zu schwach, im zweiten zu stark und man versucht nun so lange, bis man eine Convexlinse findet, die mit der Concavlinse zusammengehalten dem Gegenstande, vor dem man sie herumbewegt, keine Bewegung mittheilt. Diese Combination verhält sich dann wie ein Planglas und man hat somit die Convexlinse gefunden, die ebenso stark ist wie die Concavlinse.

2. Auf eine andere Weise, bei welcher man nicht eine Reihe von Convexlinsen zur Verfügung zu haben braucht, kann man ebenfalls die Focaldistanz einer Concavlinse finden. Man stelle in mindestens 6 *m* von der Linse eine Lampe auf und bringe auf die andere Seite der Linse einen Schirm. Auf diesen zeichnet man mit dem Durchmesser der Linse als Radius einen Kreis. Auf dem Schirm entwirft die Linse nun einen hellen Ring, der eine dunkle Scheibe umgibt. Der Durchmesser dieses Ringes ist desto grösser, je weiter man die Linse von dem Schirm

hält. Man verschiebt nun die Linse so lange, bis die äussere Circumferenz des hellen Ringes mit dem auf dem Schirm gezeichneten Kreis zusammenfällt. Die Entfernung des Schirmes von der Linse ist dann gleich der Focaldistanz. Ein Blick auf die Fig. 34 lehrt, warum dies der Fall ist. Denn da $0F_3 : F_2F_3 = ab : cd$ und da $ab = \frac{1}{2}cd$ ist, so muss auch $0F_3 : F_2F_3 = 1:2$ sein. $0F_3 = \frac{F_2F_3}{2}$, d. h. die Entfernung der Linse von dem Schirme ist gleich der Focaldistanz.

3. Brechkraft und Numerirung der Linsen.

Je kürzer die Brennweite einer Linse ist, desto grösser ist ihre Brechkraft, desto stärker also die Linse. Hat eine Linse von der Brennweite f eine bestimmte Brechkraft, so hat eine Linse mit der halben Brennweite die doppelte Brechkraft.

Es gibt zwei gebräuchliche Arten, die Linsen zu numeriren. Die eine Art, die nach dem Zollsystem, nimmt eine Linse von 1 Zoll Brennweite als Einheit an. Die Gläser werden nach der Grösse der Focaldistanz bezeichnet. Eine Linse Nummer 10 bedeutet eine Linse von 10 Zoll Brennweite. Die brechende Kraft einer solchen Linse beträgt $^1/_{10}$ der brechenden Kraft einer Linse von 1 Zoll Brennweite. Die Gläser mit den höheren Nummern sind also die schwächeren, die mit den niederen die stärkeren.

In neuerer Zeit ist eine andere Art der Gläserbezeichnung eingeführt. Dieselbe ist bereits weit verbreitet und auch an vielen Augenspiegeln in Anwendung. Bei diesem System werden die Brennweiten nach Centimetern gemessen, die Bezeichnung erfolgt aber nicht nach der Brennweite, sondern nach Dioptrien oder nach der brechenden Kraft der Linsen. Als Einheit wird eine Linse von 1 Meter Brennweite (also eine sehr schwache Linse) angenommen und als Meterlinse oder Dioptrie (*D*) bezeichnet. Eine Linse von 2 Dioptrien (2 *D*) hat die doppelte brechende Kraft als eine Linse von 1 Dioptrie (1 *D*), also die halbe Focaldistanz, i. e. 50 *cm*; eine Linse von 3 *D* hat $^1/_3$ der Brennweite einer Linse von 1 *D*, also 33 *cm*, aber natürlich die dreifache brechende Kraft; eine Linse von 4 *D* hat $^1/_4\ m = 25\ cm$ Brennweite u. s. w. Da auch schwächere Linsen als solche von 1 *m* Brennweite gebraucht werden, so spricht man auch von Bruchtheilen einer Dioptrie. 0·5 *D* hat die doppelte Focaldistanz als 1 *D*, also 2 *m*.

Man erfährt also aus der Nummer der Linse nach der Dioptrienbezeichnung die brechende Kraft, nicht aber die Brennweite. Diese muss man erst berechnen, und zwar, wie wir gesehen haben, auf ganz einfache Weise. Man braucht blos 100 durch die Zahl der Dioptrie zu dividiren und erhält die Focaldistanz der betreffenden Linse in Centimetern.

Da 1 *m* = 38 Wiener Zoll (genau 37·96),
= 38·2 preussische Zoll,
= 37 Pariser Zoll (36·94),
= 39 englische Zoll (39·37),

so würde 1 *D* gleich sein Nummer 37 nach Pariser Zollmass, Nummer 38 nach Wiener und preussischem Mass und Nummer 39 nach englischem

Zoll. In Praxi kann man aber diesen Unterschied vernachlässigen und sich nach einer für alle Masse gemeinschaftlichen Formel halten. Dies kann man aus folgendem Grunde: Die Numerirung der Gläser erfolgt in den optischen Fabriken nicht nach der Brennweite, sondern nach dem Krümmungshalbmesser, der zur Erzeugung der Gläser verwendeten Schleifschalen. Für eine biconvexe oder biconcave Linse besteht folgende Beziehung zwischen dem Brechungsindex des Glases, dem Krümmungsradius und der Brennweite: $\frac{1}{f} = 2\left(\frac{n-1}{r}\right)$. In dieser Formel bezeichnet f die Brennweite, r den Krümmungsradius der Begrenzungsflächen der Linse und n den Brechungsindex. Unter der Voraussetzung, dass n = 1·5 ist, ergibt sich: $\frac{1}{f} = 2\left(\frac{1{\cdot}5-1}{r}\right) = \frac{1}{r}$ also f = r. Nun ist aber der Brechungsindex gewöhnlich nicht gleich 1·5, sondern grösser. Die Brennweite der meisten Gläser entspricht also nicht genau ihrer Nummer.

Nagel hat nun mit Berücksichtigung dieser Verhältnisse zur Umrechnung von Zollnummern in Dioptrien die Formel $DZ = 40$ angegeben, d. h. das Product aus der Nummer des Glases in Zoll (Z) und der Nummer desselben in Dioptrien (D) ist immer = 40. Es ist somit $Z = \frac{40}{D}$ und $D = \frac{40}{Z}$. Diese Formel lässt sich mit sehr geringen Fehlern für alle Zollmasse verwenden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Nummern der Gläser nach Zoll und Dioptrien und die Brennweite derselben in Centimeter zusammengestellt. Die eingeklammerten Zahlen fehlen in der Reihe der Zollgläser.

Dioptrien	Brennweite in Centimetern	Zoll.
0·25	400	(160)
0·5	200	80
0·75	133	50
1·00	100	40
1·5	67	(27)
2·0	50	20
2·5	40	16
3·0	33	13
3·5	28·5	11
4·0	25	10
4·5	22	9
5·0	20	8
5·5	18	7
6·0	16·5	6·5
7·0	14	(5·75)
8·0	12 5	5
9·0	11	4·5
10·0	10	4
11·0	9	3·5
12·0	8	3·25
13·0	7·5	3
14·0	7	2·75
16·0	6	2·5
18·0	5·5	2·25
20·0	5	2

4. Optische Systeme.

In einem jeden optischen System, sei es aus noch so vielen brechenden Flächen und brechenden Medien zusammengesetzt, kann man eine Hauptaxe und darauf mehrere Punkte finden, die in einer gewissen Beziehung zu einander stehen und durch die man den Verlauf der Lichtstrahlen nach der Brechung durch die brechenden Flächen darstellen kann.

Diese Punkte heissen Cardinalpunkte, und zwar gibt es zwei Brennpunkte (einen vorderen und einen hinteren), zwei Knotenpunkte (einen vorderen und einen hinteren) und zwei Hauptpunkte (einen vorderen und einen hinteren).

Die Bedeutung dieser Punkte wird durch Folgendes klar werden:

xx_1 (Fig. 35) ist die Hauptaxe eines optischen Systems, f_1 und f_2 sind die beiden Brennpunkte, h_1 und h_2 die beiden Hauptpunkte, k_1 und k_2 die beiden Knotenpunkte.

Es gelten nun folgende Sätze:

1. Ein Strahl, der durch den vorderen Brennpunkt geht, ist, nachdem er durch die letzte brechende Fläche gegangen ist, also im letzten Medium, der Hauptaxe des optischen Systems parallel.




Fig. 35.

2. Der eine Hauptpunkt ist das Bild des anderen.

3. Ein Strahl (Richtungsstrahl), der im ersten Medium gegen den vorderen Knotenpunkt gerichtet ist, verläuft im letzten Medium so, als ob er vom hinteren Knotenpunkt herkäme und parallel seiner Richtung im ersten Medium.

4. Ein Strahl, der im ersten Medium der Hauptaxe parallel ist, geht im letzten Medium durch den hinteren Brennpunkt.

Die im vorderen und hinteren Brennpunkt auf der Hauptaxe senkrechten Ebenen heissen die vordere und hintere Hauptebene. Jeder Punkt auf der vorderen Hauptebene hat sein Bild auf der hinteren Hauptebene in derselben Entfernung von der Hauptaxe, in der der Punkt von ihr liegt.

Nach diesen Gesetzen kann man (Fig. 35) das Bild des Punktes a leicht finden, indem man die durch den vorderen Brennpunkt und gegen den Knotenpunkt gerichteten Strahlen zieht.

Die Entfernung des vorderen Brennpunktes vom vorderen Hauptpunkt (f_1 h_1) heisst die vordere Brennweite, die Entfernung des hinteren Brennpunktes vom hinteren Hauptpunkt die hintere Brennweite.

Es bestehen ferner folgende Beziehungen zwischen den Entfernungen der einzelnen Punkte voneinander:

1. $h_1\ h_2 = k_1\ k_2$
2. $f_1\ k_1 = h_2\ f_2$
   $k_2\ f_2 = h_1\ f_1$
3. $f_1\ h_1 : h_2\ f_2 = n_1 : n_2$
4. $l_1\ l_2 = F_1\ F_2$,

in welch letzterer Formel l_1 die Entfernung des Objectes vom vorderen Brennpunkt, l_2 den Abstand des Bildes vom hinteren Brennpunkt, F_1 die vordere, F_2 die hintere Brennweite bezeichnet.

Wenn wir die Grösse des Bildes eines Gegenstandes finden wollen, so brauchen wir nur von den Endpunkten des Gegenstandes die Richtungsstrahlen gegen die Knotenpunkte zu zeichnen und finden, wenn uns der Ort des Bildes bekannt ist, auch seine Ausdehnung. Hiebei sieht man, dass, je weiter die Knotenpunkte von der Stelle, wo das Bild entsteht, abrücken, desto grösser das Bild erscheinen muss.

Bei den sphaerischen biconcaven und biconvexen Linsen sind die beiden Brennweiten einander gleich, da $n_1 = n_2$ (das erste und letzte Medium ist Luft). Ferner fällt der erste Hauptpunkt mit dem ersten Knotenpunkt und der zweite Hauptpunkt mit dem zweiten Knotenpunkte zusammen. Das optische Centrum der Linse ist jener Punkt, dessen Bilder die beiden Knotenpunkte sind, d. h. stellen wir uns vor, es befindet sich im optischen Mittelpunkte einer Linse ein leuchtender Punkt, so entwirft die eine brechende Fläche in dem einen Knotenpunkt, die andere im anderen von ihm ein Bild. Wir haben im Vorhergehenden der Einfachheit wegen die Knotenpunkte gar nicht berücksichtigt.

Würde es sich nur um Eine sphaerisch gekrümmte, brechende Fläche handeln, so fallen beide Hauptpunkte in einem zusammen, und dieser Punkt liegt an der Stelle, wo die Hauptaxe des optischen Systems die einzige brechende Fläche schneidet. Auch die Knotenpunkte fallen zusammen und in den Krümmungsmittelpunkt der brechenden Fläche.

5. Das Auge und seine Refraction.

Im Auge fallen die beiden Hauptpunkte in die vordere Kammer und die beiden Knotenpunkte in die Linse sehr nahe ihrer hinteren Fläche. Die brechenden Flächen sind die vordere Cornealoberfläche, dann die Begrenzungsflächen der Linse. Die brechenden Medien sind die Cornea, das Kammerwasser, die Linse und der Glaskörper. Die hintere Fläche der Cornea verläuft fast parallel der vorderen und der Brechungsindex der Cornea ist fast gar nicht von dem des Humor aqueus verschieden, es hat daher die hintere Fläche der Cornea keinen Einfluss auf die Brechung. Der Brechungsindex des Kammerwassers ist nahezu gleich dem des Glaskörpers.

Unter Refraction des Auges versteht man seinen Brechzustand bei vollkommener Accommodationsruhe. Wir unterscheiden folgende Refractionszustände des Auges:

I. Emmetropie (E). Dieser Zustand wird, da er bei der überwiegenden Mehrzahl der Augen vorkommt, als der normale angesehen. Bei demselben liegt der hintere Brennpunkt in der Retina, parallel

aus unendlicher Ferne kommende Strahlen werden also in der Retina vereinigt (Fig. 36).




Fig. 36.

II. Myopie (M). Bei der Myopie fällt der hintere Brennpunkt vor die Retina, d. h. Strahlen, die parallel auf die Cornea fallen, werden vor der Netzhaut vereinigt. Strahlen aber, die aus einer bestimmten, endlichen Entfernung kommen und also divergent die Hornhaut treffen, werden auf der Netzhaut wieder in einem Punkte vereinigt (Fig. 37). Je näher der Punkt ist, für den das Auge eingestellt ist oder, anders ausgedrückt, je näher der Punkt liegt, von dem die Strahlen divergiren müssen, um auf der Netzhaut vereinigt zu werden, desto stärker ist die Myopie. Ist ein Auge im Zustande der Accommodationsruhe auf einen Punkt eingestellt, der 50 *cm* vor dem vorderen Knotenpunkt (Fig. 37 k) liegt, so sagt man: das Auge hat eine Myopie von 2 *D* und jener Punkt heisst der Fernpunkt (r) des Auges.




Fig. 37.

III. Hypermetropie (H). Bei der Hypermetropie liegt der hintere Brennpunkt des optischen Systems hinter der Retina. Parallele Strahlen werden also hinter der Retina vereinigt. Auf der Retina werden blos solche Strahlen in einem Punkte vereinigt, die gegen einen in bestimmter Entfernung hinter der Retina gelegenen Punkt convergiren (Fig. 38). Dieser Punkt ist der Fernpunkt (r) des Auges. Je näher er dem Auge liegt, desto stärker ist die Hypermetropie. Liegt er z. B. 20 *cm* hinter dem vorderen Knotenpunkt (k) des Auges, so besteht H = 5 *D*. Das hypermetropische Auge hat also eine Fähigkeit, die es gar nicht braucht, nämlich die, convergente Strahlen auf der Netzhaut zu vereinigen. Solche Strahlen kommen in der Natur aber nicht vor, sie werden nur durch optische Hilfsmittel erzeugt.




Fig. 38.

IV. Astigmatismus (As). Unter Astigmatismus versteht man jenen Brechzustand des Auges, bei welchem die von einem Punkte des Raumes ausgehenden Strahlen nach ihrer Brechung durch die brechenden Medien des Auges nicht mehr in einem Punkte vereinigt werden. Man unterscheidet folgende Arten des Astigmatismus:

1. Regelmässiger Astigmatismus. Hier besteht in verschiedenen Meridianen verschiedene Refraction, also z. B. in einem Meridian E, in dem darauf senkrechten Meridian M. Die Strahlen, die von einem Punkte ausserhalb des Auges ausgehend durch einen dieser Meridiane oder überhaupt durch einen Meridian des dioptrischen Systems ins Auge gelangen, werden in einem Punkte vereinigt. Dies geschieht in jedem Meridian, nur fallen die einzelnen Brennpunkte

für die Meridiane nicht in einem Punkte zusammen, wie das beim nicht astigmatischen Auge der Fall ist. Der regelmässige Astigmatismus kann wieder sein:

A. Einfacher Astigmatismus. Hier ist in einem Meridian E.

a) Einfach myopischer Astigmatismus (Am) in einem Meridian E, in dem darauf senkrechten M.

b) Einfach hypermetropischer Astigmatismus (Ah). In einem Meridian E, im darauf senkrechten H.

B. Zusammengesetzter Astigmatismus. Hier sind beide Meridiane hypermetropisch oder beide myopisch, jedoch in verschiedenem Grade.

a) Zusammengesetzter myopischer Astigmatismus (M+Am).

b) Zusammengesetzter hypermetropischer Astigmatismus (H+Ah).

C. Gemischter Astigmatismus. In einem Meridian H, im anderen M.

a) Gemischter Astigmatismus mit überwiegender M (Amh).

b) Gemischter Astigmatismus mit überwiegender H (Ahm).

Die Grade der Refractionsanomalien in den einzelnen Meridianen werden ebenso bestimmt wie bei H und M überhaupt.

2. Unregelmässiger Astigmatismus. Bei diesem ist die Krümmung der brechenden Flächen in jedem einzelnen Meridian so unregelmässig, dass auch Strahlen, die durch einen einzelnen Meridian ins Auge fallen, nicht mehr in einem Punkte vereinigt werden.

Durch die Accommodation wird die Refraction in jedem Auge vermehrt, so dass aus einem emmetropischen Auge gleichsam ein myopisches, aus einem myopischen ein noch stärker myopisches, aus einem hypermetropischen, je nach der Stärke der aufgewendeten Accommodation, ein weniger hypermetropisches, ein emmetropisches oder ein myopisches wird.

In ganz ähnlicher Weise, wie die Accommodation, wirkt das Vorsetzen einer Convexlinse, wogegen eine Concavlinse die Refraction des Auges vermindert, also bei einem emmetropischen Auge Hypermetropie, bei einem hypermetropischen noch stärkere Hypermetropie, und endlich bei einem myopischen Auge, nach der Stärke der Linse, geringere Myopie, Emmetropie oder sogar Hypermetropie erzeugt.




Fig. 39.

Wir haben gesehen, dass man die Hypermetropie und die Myopie nach der Stärke des Glases bestimmt, welches, in den Knotenpunkt des Auges gebracht, die Einstellung für parallele Strahlen bewirken, das Auge also zu einem emmetropischen machen würde. Nun kann man aber das Correctionsglas thatsächlich nicht in den Knotenpunkt bringen (es ist hiebei, wenn wir hier kurzweg vom Knotenpunkt sprechen, genau genommen der vordere gemeint).

Wenn wir z. B. einem Myopen ein Concavglas vorsetzen, um seine Myopie zu corrigiren, so muss das Glas so stark sein, dass die

parallel auf dasselbe fallenden Strahlen durch dasselbe so divergent gemacht werden, als ob sie vom Fernpunkte des myopischen Auges herkämen. Der Brennpunkt des Glases muss also mit dem Fernpunkt des Auges zusammenfallen. Da wir aber die Linse nicht in den Knotenpunkt des Auges, sondern vor das Auge setzen müssen, so muss das Glas um etwas stärker sein als die Myopie des betreffenden Auges (Fig. 39).

Hat Jemand 4 *D* Myopie, so heisst das soviel, dass der Fernpunkt des Auges 25 *cm* von dem Knotenpunkt desselben entfernt liegt. Wenn nun die Entfernung der Linse, welche das Auge corrigirt, von dem Knotenpunkte 3 *cm* beträgt, so muss das Glas 4·5 *D* haben, denn nur dann fällt der Brennpunkt des Glases mit dem Fernpunkt des Auges zusammen.

Umgekehrt verhält es sich bei Hypermetropie. Bei diesem Refractionszustand muss das Glas, welches man behufs Correction vorsetzt, schwächer sein als die Hypermetropie (Fig. 40). Auch hier gilt derselbe Grund wie bei der Myopie, nämlich die Unmöglichkeit das Glas in den Knotenpunkt zu bringen. Wir hätten ein Auge mit 7 *D* Hypermetropie zu corrigiren. Ist die Entfernung des Glases vom Knotenpunkte 2·5 *cm*, so muss die Linse 6·0 *D* convex sein.

Es kommt die Entfernung der Linse vom Auge allerdings nur bei höheren Graden von Refractionsanomalien in Betracht. Bei schwächeren Graden ist der Unterschied so gering, dass er vernachlässigt werden kann. Der Unterschied zwischen einem Glase von 133 *cm* Brennweite (0·75 *D*) und einem solchen von 130·5 *cm* Brennweite beträgt nur 0·016 *D*, also noch lange nicht 0·25 D. Ein Glas dagegen von 16·5 *cm* Brennweite (6 *D*) und ein solches, das eine um 2·5 *cm* kürzere Brennweite hat (7 *D*), unterscheiden sich um eine Dioptrie.




Fig. 40.

In einem Auge, in dem die Linse durch Operation oder Trauma aus dem Auge entfernt ist, oder, wo sie in Folge Luxation das Pupillargebiet verlassen hat, sind die Brechungsverhältnisse sehr einfach. Man bezeichnet diesen Zustand als Aphakie, das Auge ist aphakisch. Wir haben jetzt nur eine einzige brechende Fläche, die vordere Fläche der Cornea und ein einziges brechendes Medium (denn der Glaskörper und das Kammerwasser haben nahezu denselben Brechungsindex).

Zur leichteren Vornahme von Berechnungen hat man (Listing) den optischen Apparat des Auges in ähnlicher Weise vereinfacht, wie er sich bei Aphakie darstellt. Dieses sogenannte „reducirte Auge" hat nur Eine brechende Fläche von 5 *mm* Radius. Dahinter erstreckt sich bis zur Retina Ein brechendes Medium von einem Brechungsindex von 4/3. Der Hauptpunkt liegt in der brechenden Fläche, die vordere Brennweite ist 15 *mm*, die hintere 20 *mm*, der Knotenpunkt liegt 5 *mm* hinter der brechenden Fläche und 15 *mm* vor der Retina im Krümmungsmittelpunkt der brechenden Fläche.

I. Capitel.

1. Theorie des Augenspiegels.

Es ist eine bereits seit Langem bekannte Thatsache, dass die Augen vieler Thiere unter Umständen leuchten können. Ebenso erscheint auch die Pupille des Menschen unter gewissen Bedingungen nicht, wie gewöhnlich, schwarz, sondern erstrahlt in einem gelblichrothen oder gelben Licht. Dies ist bei Albinos der Fall, ebenso in Fällen, wo ein Exsudat oder ein Tumor oder die abgehobene Netzhaut unweit hinter der Linse im Auge liegt (amaurotisches Katzenauge — Beer), ferner dann, wenn die Pupille sehr weit ist, oder die Iris gar fehlt (angeborene oder erworbene Irideremie).

Warum erscheint nun die Pupille gewöhnlich schwarz und nicht, wie in den eben erwähnten Fällen, hell? Die Erklärung dafür ist folgende: Ist ein Auge für eine Lichtquelle, von der aus Licht in dasselbe fällt, accommodirt, so sind die Stelle der Retina, auf der das Bild der Lichtquelle entsteht, und die Lichtquelle selbst conjugirte Vereinigungspunkte. Wir können dieselben also untereinander vertauschen, d. h. das Licht, welches von der Retina reflectirt wird, muss auf dieselbe Weise aus dem Auge herausgehen wie es hereingekommen ist und die Strahlen müssen sich also in der Lichtquelle wieder vereinigen. Das vom Augenhintergrunde zurückstrahlende Licht könnte man wahrnehmen, wenn man sein Auge zwischen die Lichtquelle und das Auge, dessen Pupille leuchtend gesehen werden soll, bringt. Sobald man dies aber thut, schneidet man den Lichtstrahlen den Weg in das beobachtete Auge ab und die Pupille desselben erscheint schwarz.

Anders liegen die Verhältnisse, wenn das Auge nicht für die Lichtquelle eingestellt ist. Ist das Auge emmetropisch und accommodirt nicht, so verlassen die von der Retina zurückgeworfenen Strahlen das Auge parallel; ist das Auge hypermetropisch, so sind sie divergent, ist es myopisch, so convergiren sie (siehe Fig. 36, 37, 38).

Um die Pupille eines Auges leuchten zu sehen, muss ich mein Auge möglichst in die Richtung der vom Fundus reflectirten Strahlen bringen, ohne aber dabei den Lichtstrahlen den Weg in das Auge abzuschneiden. Am leichtesten wird mir dies bei einem hypermetro-

pischen Auge gelingen, denn hier kommt, wenn das Auge nicht accommodirt, ein breiter Strahlenkegel aus dem Auge heraus, dessen Spitze hinter der Retina im Fernpunkte des hypermetropischen Auges liegt (Fig. 38). Dies ist der Grund, warum in Fällen, die man als amaurotisches Katzenauge bezeichnet, die Pupille hell erscheint. Denn da sind die von der Oberfläche des Exsudats oder des Tumors unfern hinter der Linse herkommenden Strahlen nach ihrem Austritte aus dem Auge stark divergent. Das Auge ist durch die pathologischen Veränderungen gleichsam kürzer geworden und dadurch stark hypermetropisch. Ferner ist die Hypermetropie mit Ursache, warum man die Augen so vieler Thiere leuchten sieht. Die meisten sind eben hypermetropisch. Viel schwerer als bei Hypermetropie muss es bei Emmetropie oder Myopie sein, die vom Fundus des Auges kommenden Strahlen mit unserem Auge aufzufangen, ohne den Lichtstrahlen, die von der Lichtquelle kommen, zugleich den Eintritt in das beobachtete Auge durch Dazwischentreten unseres Kopfes unmöglich zu machen. Denn bei Emmetropie ist es ein Strahlencylinder, der aus dem Auge kommt (Fig. 36), bei Myopie wohl auch, wie bei Hypermetropie, ein Strahlenkegel, dessen Spitze aber vor dem beobachteten Auge in dessen Fernpunkt liegt (Fig. 37).

Dass ein Auge unter übrigens gleichen Verhältnissen desto leichter zum Leuchten zu bringen ist, je weiter die Pupille ist, das bedarf keiner Erklärung. Daher das Auftreten von Augenleuchten bei Mydriasis, Fehlen der Iris oder bei breiten Colobomen.

In das albinotische Auge fällt ungemein viel Licht, indem der Fundus nicht nur durch die Pupille, sondern auch von dem durch die Iris, Sklera, Chorioidea eindringenden, bedeutenden Lichtquantum erleuchtet wird. Da so das ganze Augeninnere beleuchtet ist, so erfolgt auch die Rückstrahlung von den verschiedensten Punkten des Fundus und nach verschiedenen Richtungen, und dieses Licht können wir mit unserem Auge auffangen. Wenn man in einen undurchsichtigen Schirm ein Loch von der Grösse der Pupille macht und diesen Schirm vor das albinotische Auge hält, so erscheint die Pupille so wie bei anderen Augen schwarz. Es wird eben dann das durch Iris und Sklera gehende Licht abgehalten.

Je grösser ferner die Lichtmenge ist, die von dem Augenhintergrund reflectirt wird, desto leichter nehmen wir das Augenleuchten wahr. Bei vielen Thieren unterstützt das schillernde Tapetum das Augenleuchten, denn es reflectirt sehr viel Licht und dies ist auch beim amaurotischen Katzenauge hinsichtlich der pathologischen Producte der Fall.

Endlich muss auch ein gewisser Contrast zwischen der Beleuchtung der Umgebung und der der Pupille bestehen. Man wird deshalb das Augenleuchten am leichtesten in einem nur von Einer Lichtquelle beleuchteten Raume wahrnehmen.

Es gelingt aber auch auf einfache Weise, die Pupille jedes menschlichen Auges auf künstlichem Wege leuchten zu machen. Man stelle eine Lampe in einem verdunkelten Zimmer in der Entfernung von etwa 3 *m* von dem Auge, das man untersuchen will, auf, so dass sich die Lampe in gleicher Höhe mit dem betreffenden Auge befindet. Dann postire man sich selbst hinter die Lampe und verdecke sich dieselbe durch einen Schirm. Knapp neben diesem blicke man

nun gegen das Auge des Untersuchten. Das letztere muss neben der Lampe vorbei ins dunkle Zimmer sehen. Bei einer bestimmten Stellung der Lampe zum untersuchten Auge gelingt es, die Pupille leuchten zu sehen.

Unter allen diesen Umständen, sowohl beim spontanen, als beim künstlich erzeugten Leuchten der Pupille, sieht man aber nichts als eine gleichmässige Beleuchtung derselben. Die Farbe des vom Fundus reflectirten Lichtes ist eine gelblichrothe. Von Details des Augenhintergrundes, von den Gefässen, von der Papille etc. kann man aber nichts wahrnehmen. Worin hat nun dies seinen Grund? Die Lichtstrahlen, die vom Fundus des betreffenden Auges zurückgeworfen werden, gelangen doch in unser Auge. Warum vermitteln sie uns nicht die Wahrnehmung der Einzelheiten, welche wir erblicken, wenn wir von einem Auge den vorderen Abschnitt entfernen, wo wir dann die Retina mit ihren Gefässen vor uns liegen sehen? Man wird sich die Ursache am besten durch folgenden Versuch veranschaulichen:

Man nehme eine Convexlinse von 10 *D* (10 *cm* Brennweite) und bringe 10 *cm* hinter derselben ein bedrucktes Papier an. Da die Schrift sich nun im Brennpunkt der Linse befindet, so sind die Strahlen, die von derselben kommen, nach ihrem Durchtritt durch die Linse parallel. Man erblickt, wenn man sich mit dem Auge nahe an der Convexlinse befindet und durch dieselbe auf die Schrift sieht, die Buchstaben stark vergrössert und ist im Stande, die Schrift fliessend zu lesen, da man mehrere Worte zugleich im Gesichtsfelde übersieht. Nun entferne man sich von der Linse, ohne dass der Abstand zwischen Linse und Schrift geändert würde. Man wird jetzt wahrnehmen, dass die Buchstaben um ein Bedeutendes grösser erscheinen. Zugleich sieht man, je weiter man sich von der Linse entfernt, immer weniger und weniger im Gesichtsfelde derselben. Man sieht zunächst nicht mehrere, sondern nur Ein Wort, später nur einige Buchstaben, nur Einen, ja nur einen Theil eines solchen, bis man endlich gar nichts mehr von der Schrift erblickt. Die absolute Grösse der Netzhautbilder der Buchstaben bleibt hiebei in unserem Falle, wo die Schrift im Brennpunkte der Linse steht, bei jeder Entfernung des Auges von der Convexlinse gleich. Im Falle, dass wir die Schrift innerhalb der Brennweite der Linse postiren, würde sogar die Grösse des Netzhautbildes in unserem Auge bei grösserer Entfernung der Linse von dem Auge abnehmen. Dagegen nimmt das Netzhautbild der Linse selbst, deren Gesichtsfeld durch den Rand derselben begrenzt wird, ab. Wohl aber nimmt in der That die Vergrösserung im Vergleich zur Entfernung, in welcher man sich befindet, zu. Das dioptrische System unseres Auges plus der Convexlinse ist das combinirte optische System, durch welches wir die Druckschrift betrachten. Das optische Centrum dieser Combination rückt nun vor, wenn wir uns mit unserem Auge von der Convexlinse entfernen. Hiedurch wird aber die Grösse der Netzhautbilder beeinflusst. Die Netzhautbilder sind jetzt grösser, als wenn das Auge wohl in derselben Entfernung, der Knotenpunkt aber nicht vorgerückt wäre.

Ganz so verhält es sich beim Leuchten der Pupille. Der Grund, warum man in Fällen, wo die Pupille leuchtet, nichts von den Gefässen der Retina sieht, ist eben der, dass man sich in zu grosser Entfernung vom beobachteten Auge befindet. Unter-

sucht man ein Auge mit dem Augenspiegel, indem man sich ganz nahe an das Auge begibt, in welcher Stellung man alle Details im Fundus sieht, und entfernt sich dann mit dem Augenspiegel vom untersuchten Auge, so nimmt man ganz ähnliche Veränderungen an dem Bild der Gefässe im Fundus wahr, wie wir sie eben an der Druckschrift beschrieben haben. Die scheinbare Grösse der Netzhautgefässe nimmt hiebei, ebenso wie das bei den Buchstaben der Fall ist, bedeutend zu. Die Netzhautgefässe scheinen bald wie dicke Stricke durch die Pupille zu ziehen. Es ist dies uns jetzt sehr leicht erklärlich. Die Grösse der Netzhautbilder in unserem Auge nimmt wohl mit der zunehmenden Entfernung zwischen beiden Augen ab, aber wir wissen, da wir die Grösse der Pupille kennen, sehr gut, dass sie nicht kleiner geworden ist — ebensowenig als wir einen Menschen von bekannter Grösse für kleiner halten, weil von seiner Gestalt in Folge grösserer Entfernung von unserem Auge ein kleineres Netzhautbild entsteht. Dagegen nimmt das Netzhautbild der Retinalgefässe, im Vergleiche zur Entfernung zu, da das optische Centrum des aus den dioptrischen Systemen beider Augen bestehenden optischen Apparates nach vorn rückt. Wir ziehen also unwillkürlich den Schluss, dass die Gefässe dicker geworden sind. Bei grösserer Entfernung des Spiegels vom Auge des Untersuchten sieht man dann in Folge Abnahme des Gesichtsfeldes immer weniger Gefässe und schliesslich nur eine gleichmässig helle Erleuchtung der Pupille.

Um daher den Fundus mit seinen Details sehen zu können, musste ein Instrument construirt werden, welches es ermöglicht, das Augeninnere zu erleuchten und das von dort reflectirte Licht mit unserem Auge aus nächster Nähe aufzufangen. Dies gelang Helmholtz im Jahre 1851. Er hat damit der Diagnose ein ganz neues Feld erschlossen, so dass auf einmal eine ganze Reihe von Erkrankungen bekannt und während des Lebens erkennbar wurden, welche Sehstörung oder Blindheit bei ganz normaler Beschaffenheit des vorderen Bulbusabschnittes und der brechenden Medien bedingen können. Ferner wird der Augenspiegel von kundiger Hand geführt zum Mittel, um Krankheiten anderer Organe mit Sicherheit zu diagnosticiren. Wie oft ist es nur durch das Ophthalmoskop möglich, die Diagnose eines Gehirntumors zu stellen! Endlich kann man mit dem Augenspiegel in vollständig objectiver, von den Angaben des Patienten ganz unabhängiger Weise die Refraction des Auges bestimmen, was auch bei herabgesetzter Sehschärfe oder gar bei Amaurose, bei Kindern und Simulanten in Betracht kommt.

Der erste Augenspiegel, den Helmholtz construirte, hatte einen sehr einfachen spiegelnden Apparat. Derselbe bestand nämlich aus mehreren planparallelen, aufeinandergelegten Glasplatten. Ein Theil des auf eine solche Vorrichtung (S P Fig. 41) fallenden Lichtes dringt durch sie hindurch, geht also für uns verloren, ein anderer Theil wird von der vorderen Fläche der Glasplatten reflectirt. Dieses Licht ist es, das bei schiefer Haltung der Glasplatten zur Beleuchtung des Fundus des untersuchten Auges K verwendet wird. Auf diese Weise wird die Pupille des Beobachters selbst gleichsam zur Lichtquelle. Diese Anordnung gestattet es auch dem Beobachter, möglichst nahe an das Auge, das untersucht werden soll, zu kommen.

Man erblickt so als Emmetrop den Fundus eines emmetropischen Auges ganz so, wie man durch eine Loupe einen in ihrem Brennpunkte gelegenen Gegenstand sieht. Die Loupe wird hier durch die brechenden Medien des beobachteten Auges selbst dargestellt. Man sieht also ein virtuelles, aufrechtes, vergrössertes Bild, welches hinter der Retina des untersuchten Auges sich befindet. Nicht bei allen Refractionszuständen des untersuchten Auges wird es aber gelingen, den Fundus ohne optische Hilfsmittel zu sehen. Ist das Auge myopisch, so verlassen die von seiner Retina reflectirten Strahlen das Auge convergent. Man muss dieselben also, wenn man selbst Emmetrop ist, durch eine vorgesetzte Concavlinse wenigstens parallel machen, um sie auf seiner Retina vereinigen zu können. Die soeben besprochene Art der Untersuchung mit dem Augenspiegel bei möglichster Annäherung an das zu untersuchende Auge nennt man die Untersuchung im aufrechten Bild.




Fig. 41.

Man kann aber den Fundus auch auf andere Weise zur Anschauung bringen, wobei man sich nicht so nahe dem untersuchten Auge hält. Es geschieht dies so, dass man die aus dem Auge austretenden, vom Fundus herkommenden Strahlen durch Vorhalten einer starken Convexlinse (15 bis 20 *D*) zu einem umgekehrten Bilde vereinigt und dies vor der Linse in der Luft entstehende Bild aus der Entfernung von 20 *cm* von demselben betrachtet (Fig. 42). Diese Art der Untersuchung wurde zuerst von Ruete empfohlen, der auch zuerst den Concavspiegel in Anwendung brachte.




Fig. 42.

Es sei hier nur kurz auf diese zwei Methoden der Untersuchung im aufrechten und umgekehrten Bild hingewiesen. Ausführliches über den Vorgang bei der Anwendung derselben folgt später, nachdem wir uns erst über die Construction der Augenspiegel orientirt haben.

2. Construction der Augenspiegel.

Es soll hier nicht eine vollständige Beschreibung und Aufzählung sämmtlicher verschiedener Arten der Augenspiegel gegeben werden.

Dies würde sehr viel Ueberflüssiges bringen. Denn von den vielen Augenspiegeln, die angegeben worden sind, stehen einerseits nur eine geringe Zahl im Gebrauch, andererseits sind die Unterschiede zwischen vielen von ihnen nur sehr gering, beziehen sich nur auf Modificationen in der Anbringung und Zahl der Correctionsgläser. Endlich haben manche Augenspiegel, wie solche zur Beobachtung seitens mehrerer Personen auf einmal oder zur binoculären Untersuchung, für den Praktiker keinen Werth, und es bleibt daher deren Beschreibung besser weg. Wer sich hierüber genauer informiren will, der nehme die Arbeit von Snellen und Landolt im 3. Bande des Handbuches von Graefe-Saemisch zur Hand.

Jedem Augenspiegel sollte sowohl ein Concav- als auch ein Planspiegel beigegeben sein. Der Concavspiegel ist zur Untersuchung im umgekehrten Bilde nothwendig, denn hiezu ist eine starke Beleuchtung erforderlich. Für gewisse Zwecke (Erkennung feiner Trübungen im Glaskörper, Untersuchung der Maculagegend etc.) ist dagegen die schwache Beleuchtung, wie sie ein durchbohrter Planspiegel oder noch besser der Helmholtz'sche Apparat aus planparallelen Glasplatten gibt, geeigneter, ja manchmal unentbehrlich.

Die meisten Spiegel sind aus belegtem Glas gefertigt und in der Mitte entweder durchbohrt, oder es fehlt in der Mitte an einer runden Stelle der Beleg. Die durchbohrten Spiegel sind vorzuziehen. Wenn nämlich bei den nichtdurchbohrten Spiegeln die centrale, zum Durchsehen bestimmte Stelle zerkratzt wird, so ist der Spiegel unbrauchbar. Bei den durchbohrten Spiegeln entsteht allerdings mitunter am Rande des Bohrloches ein Reflex, der sehr hinderlich ist. Es muss deshalb der Canal des Bohrloches gut geschwärzt sein. Bei Metallspiegeln lässt sich der Rand des Loches leicht zuschärfen, wodurch die Entstehung eines Reflexes verhindert wird. Die Brennweite des Concavspiegels beträgt gewöhnlich etwa 20 *cm*. Manche empfehlen auch Concavspiegel von viel kürzerer Brennweite (8 *cm*). Das Loch im Spiegel darf nicht zu gross sein, denn gerade die in der Umgebung des Loches gelegenen Theile des Spiegels werden zumeist zur Beleuchtung des Augeninnern verwendet. Andererseits soll es aber auch nicht zu klein sein, denn dies erschwert das Durchsehen bedeutend. Der Durchmesser desselben soll nicht über 3 *mm*, aber auch nicht viel geringer sein.

Der Helmholtz'sche Reflector muss oft auseinandergenommen und gereinigt werden. Zwischen je zwei Glasplatten befindet sich ein schmaler Metallring, um das Auftreten der Newton'schen Farbenringe zu verhüten.

Es ist sehr gut, wenn der Spiegel etwas schräg gestellt ist, so dass er mit den im Spiegelkörper eingefügten Correctionsgläsern einen Winkel von etwa 30 ° bildet. Hiedurch wird es ermöglicht, dass man immer gerade durch die Correctionsgläser hindurchsieht. Ist der Spiegel den letzteren aber parallel, so geht dies nicht. Der Spiegel muss ja (siehe Fig. 41 und 42) schräg stehen. Mit ihm stehen im letzteren Falle dann auch die Correctionsgläser schief und man blickt dann schief durch dieselben. Ein jedes sphaerische Glas zeigt uns die Gegenstände aber etwas verzogen, wenn wir schräg durchsehen. Ist

der Spiegel in einem Winkel zu den Correctionsgläsern angebracht, so muss er natürlich gedreht werden können, da ja das Licht einmal rechts, einmal links vom untersuchten Auge sich befindet. Am besten wird dies durch einen kleinen Cylinder erreicht, der an einem Ende schräg abgeschnitten ist und auf dessen schräger Fläche der Spiegel (Concav-, Planspiegel oder Helmholtz'scher Reflector) durch eine federnde Klammer festgehalten wird. Dieser Cylinder ist ebenfalls durch eine federnde Klammer auf der vorderen Fläche des Spiegelkörpers drehbar. (Die kürzere Seite des abgestutzten Cylinders muss möglichst kurz sein, da man sich sonst nicht genügend dem untersuchten Auge nähern kann.) Auch wird manchmal der Spiegel um seine senkrechte Axe drehbar gemacht, eine Vorrichtung, die aber nicht gestattet, Concav- und Planspiegel zu wechseln.

Jedem Spiegel muss ferner eine Convexlinse von 15 bis 20 *D* zur Erzeugung des umgekehrten Bildes beigegeben sein. Es ist praktisch, wenn sich dieselbe in einer mit einem Stiel versehenen Fassung befindet, da sie so viel leichter und sicherer gehandhabt werden kann und weniger leicht zerkratzt wird.

Unter den gebräuchlichen Augenspiegeln kann man in Bezug auf die Anbringung der Correctionsgläser zwei Arten unterscheiden. Die eine Gruppe von Spiegeln soll blos die Besichtigung des Fundus und die Erkennung der etwa vorhandenen Anomalien desselben ermöglichen. Zu diesem Zweck bedarf es nur einer geringen Zahl von Correctionsgläsern. Man kann ja sehr leicht ein Convexglas durch die eigene Accommodation ersetzen oder ein zu starkes Concavglas durch Accommodation überwinden. In solchen Spiegeln ist es auch nicht nöthig, dass die Correctionsgläser hinter dem Spiegel rasch gewechselt werden können. Die nöthigsten Linsen zur Untersuchung im aufrechten Bild sind 2, 3, 5, 8 *D* concav und 3 und 6 *D* convex. Für einen myopischen Untersucher sind etwas stärkere Concavgläser erforderlich, da er sonst bereits bei mässiger Myopie nicht mehr im aufrechten Bilde untersuchen kann. Dagegen kann man dann das stärkere Convexglas weglassen. Einer der einfachsten Augenspiegel dieser Art ist der von Liebreich, bei dem sich hinter dem Spiegel eine Klammer befindet, in welche die Correctionsgläser eingesetzt werden.

Eine andere Reihe von Spiegeln soll aber gleichzeitig den Untersucher in den Stand setzen, die Refractionsbestimmung vorzunehmen. Es erscheint zu diesem Zwecke nöthig, dass man viele Correctionsgläser in rascher Folge hinter dem Spiegel einsetzen kann. Die Linsen sind daher bei diesen sogenannten Refractionsophthalmoskopen auf Scheiben angebracht und die einzelnen Spiegel unterscheiden sich durch die Anzahl der Gläser und der Scheiben. Die Gläser können auf einer Scheibe beisammen sein, wie z. B. bei den Spiegeln von Wecker, Knapp; oder es sind mehrere Scheiben vorhanden, die gewechselt werden können, so der Spiegel von Loring, Hirschberg; oder endlich es sind zwei Scheiben da, die, miteinander combinirt, eine grosse Zahl von Linsen vorzusetzen gestatten — Landolt's Spiegel.

Die Gläser sind entweder durch den Intervall von 1 *D* unterschieden oder sie bilden eine Reihe von 0·5 *D* zu 0·5 *D*. Man kann auch bei manchen Augenspiegeln einen beweglichen Sector mit 0·5 *D*

convex oder concav noch den anderen Linsen hinzufügen und so die halben Dioptrien zwischen die auf der Scheibe befindlichen ganzen einschalten (Spiegel von Fox, Cooper, Loring).

Um die Scheiben besser drehen zu können, ohne den Spiegel vom Auge entfernen zu müssen, haben manche Spiegel (z. B. der von Fox) eine zweite Scheibe unter der die Gläser tragenden. Die untere bewegt durch Zähne die obere.

Was die Zahl und Stärke der Linsen anbelangt, so ist es zur Refractionsbestimmung erforderlich, dass man Gläser von 1 bis 10 *D* convex und ebensoviel concav habe. Für myopische Untersucher und in speciellen Fällen auch für emmetropische ist es wünschenswerth, stärkere Concavgläser (bis etwa 20 *D*) zur Verfügung zu haben. Doch wird die Refractionsbestimmung mit solchen aus später zu erörternden Gründen ungenau.

3. Vorgang bei der Augenspiegeluntersuchung.

Das Zimmer, in dem man ophthalmoskopirt, sei vollständig verdunkelt. Doch zieht hier die Uebung des Untersuchers verschiedene Grenzen: ein Geübter wird auch in einem nicht vollständig verdunkelten Zimmer zu spiegeln im Stande sein, während einen Anfänger die auf der Cornea von den hellen Gegenständen der Umgebung entworfenen Bilder stören werden.

Als Lichtquelle bedient man sich einer Petroleum- oder Gaslampe mit einem breiten Rundbrenner, der am Stativ der Lampe höher und tiefer gestellt werden kann. Denn die Flamme soll immer in gleicher Höhe mit dem Auge stehen. Man ist unter Umständen genöthigt, Kranke im Bette zu untersuchen. Dieselben können mitunter nur mit Mühe, ja selbst gar nicht aufgesetzt werden. In diesem Falle ist das Anbringen der Lichtquelle oft ungemein schwierig. Zu diesem Behufe wurden neuerlich kleine elektrische Glühlampen empfohlen, die man beliebig neigen oder auch auf den Polster neben den Kopf des Patienten hinlegen kann. Die Lampe wird durch Accumulatoren gespeist.*)

Die Anwendung von Atropin zur Erweiterung der Pupille des zu untersuchenden Auges ist im Allgemeinen nicht nothwendig, ja nicht einmal angezeigt. Die durch das Atropin hervorgerufene Accommodationslähmung und Erweiterung der Pupille, die durch mehrere Tage besteht, wird vom Patienten in sehr unangenehmer Weise empfunden und kann auch zu falschen Deutungen einer mittlerweile eingetretenen Verschlimmerung und zur Verdächtigung des Arztes führen. In Fällen jedoch, wo bei sehr enger Pupille eine Erweiterung derselben wünschenswerth erscheint (und es gibt Augen, wo man in der That eine genaue Untersuchung ohne künstliche Mydriasis gar nicht vornehmen kann), verwende man lieber Homatropinum hydrobromatum in 1procentiger Lösung, welches die Accommodation nur durch einige Stunden lähmt, oder man träufle wiederholt eine 2procentige Cocainlösung ein. Beim Cocain muss man die Vorsicht gebrauchen, dass der Patient zwischen den einzelnen Einträufelungen

*) Siehe Birnbacher: „Eine Glühlampe zum Ophthalmoskopiren in der Rückenlage". Hirschberg's Centralblatt für Augenheilkunde, Juni 1884.

die Augen geschlossen halte. Es entsteht sonst in Folge des selteneren Lidschlages Vertrocknung des Epithels. Dies stört die ophthalmoskopische Untersuchung oder macht sie selbst unmöglich. Beim Cocain muss man länger, etwa 20 Minuten, auf das Auftreten der Mydriasis warten, es erfolgt aber keine merkliche Accommodationslähmung. Bei alten Leuten erzielt man durch das Cocain nur eine ziemlich unvollkommene, für die Untersuchung nicht genügende Pupillenerweiterung.

Zunächst soll es als **Regel** hingestellt werden, dass man jedes Auge, das man ophthalmoskopirt, zuerst bei **seitlicher Beleuchtung** untersuche. Unter der Methode der seitlichen Beleuchtung versteht man die Untersuchung der Augen mittels des durch eine starke Convexlinse auf das Auge concentrirten Lichtes. Zu diesem Behufe verwendet man eine Convexlinse von 15 bis 20 *D*. Man kann also dieselbe Linse brauchen, die man zur Erzeugung des umgekehrten Bildes besitzt. Das Licht einer Lampe, die seitlich und etwas vor dem zu untersuchenden Auge steht, wird durch diese Linse auf das Auge geworfen. Man kann die Linse entweder so halten, dass ein umgekehrtes, scharfes Bild der Flamme auf dem Auge entsteht, oder dass ein kleiner Zerstreuungskreis gebildet wird. Untersucht man die Cornea, so muss man die Linse weiter vom Auge halten, als wenn man die tieferen Theile, z. B. die Linse, betrachten will. Mitunter erscheint es von Vortheil, die beleuchtete Partie noch durch eine zweite Convexlinse als Loupe zu vergrössern.

Es ist sehr viel, was man auf diese Weise sehen kann. Trübungen der Cornea, Trübungen in den vorderen Theilen der Linse, Veränderungen der Iris wird man leicht erkennen können. Man wird die Tiefe der vorderen Kammer betrachten, wird nachsehen, ob nicht bei Bewegungen des Auges Erzittern der Iris zu sehen ist u. s. w. — kurz man wird bereits manches über den Zustand des Auges wissen, bevor man noch das Ophthalmoskop zur Hand genommen hat. Auch wird man in manchen Fällen gleich von vornherein mehr vom umgekehrten Bilde erwarten, dort, wo starke Trübungen der Hornhaut z. B. die Untersuchung im aufrechten Bilde voraussichtlich hindern. Man wird sich besonders als Anfänger vor vielen Irrthümern bewahren und auch viel Zeit ersparen, wenn man die Untersuchung mittels der seitlichen Beleuchtung niemals verabsäumt. Man hat auf diese Weise bereits einen Theil der brechenden Medien, nämlich Cornea, Kammerwasser, vordere und mittlere Theile der Linse (bei erweiterter Pupille auch die peripheren und hinteren Theile der Linse, ja selbst theilweise den Glaskörper) im auffallenden Lichte untersucht.

Man schreitet nun zur Untersuchung der brechenden Medien im durchfallenden Lichte mittels des Augenspiegels. Zu diesem Behufe stellt man die Lampe seitwärts und etwas hinter dem zu untersuchenden Auge auf. Die Flamme muss in gleicher Höhe mit dem Auge sein. Hierauf beleuchtet man mit dem Augenspiegel das Auge und hält sich mit dem knapp vor das eigene Auge gehaltenen Spiegel, durch dessen Oeffnung man blickt, in der Entfernung von etwa 20 *cm* vom Auge des Patienten. Dies gilt von einem emmetropischen Untersucher. Ein myopischer Untersucher muss sich dem Auge unter Umständen mehr nähern. Man gibt entweder keine Linse hinter den

Spiegel (besonders wenn man myopisch ist), oder als Emmetrop convex 3 bis 4 *D*, als Hypermetrop oder Presbyop noch mehr. Man muss hiebei den Patienten das Auge nach allen Richtungen bewegen lassen. Dies hat einmal den Zweck, sehr peripher gelegene Trübungen, die sich sonst hinter der Iris verstecken würden, dem untersuchenden Auge sichtbar zu machen. Ferner sollen im Glaskörper bewegliche Trübungen, die, wenn dieser verflüssigt ist, bei Verflüssigung desselben in seinen untersten Partien sich ansammeln, zur Ansicht gebracht werden. Durch die Bewegungen des Auges werden dieselben emporgewirbelt und können erst dann gesehen werden. Indem man sich bei dieser Untersuchung dem Auge des Patienten allmählich nähert, kann man als Emmetrop in einem emmetropischen oder hypermetropischen Auge den ganzen Glaskörper durchmustern. In einem myopischen Auge darf man als Emmetrop nicht vergessen, dass die Trübungen im hinteren Glaskörperabschnitt erst dann gesehen werden, wenn man sich ein Concavglas vorsetzt. Doch thut man dies am besten erst später, wenn man die Untersuchung des Fundus im aufrechten Bilde vorgenommen hat, indem man successive immer schwächere Concavgläser nimmt als jenes ist, welches den Fundus deutlich zu sehen gestattet.

Auch im umgekehrten Bild kann man den Glaskörper und die brechenden Medien überhaupt untersuchen. Man entwirft zuerst auf die sogleich zu beschreibende Weise das umgekehrte Bild des Fundus und entfernt dann allmählich die Convexlinse vom Auge, bis man das umgekehrte Bild der Pupille erhält. Dadurch bringt man Trübungen, die in den einzelnen Theilen der brechenden Medien liegen, im umgekehrten Bilde zur Anschauung. Doch sind dieselben natürlich nicht so stark vergrössert, wie bei der erwähnten Untersuchungsmethode im aufrechten Bild.

Hierauf schreitet man zur Untersuchung des Fundus im umgekehrten Bild. Man beleuchtet das Auge aus grösserer Entfernung und bringt dann die Convexlinse von 15 bis 20 *D* vor das Auge. Man fasst den Stiel der Fassung, in der die Convexlinse befestigt ist, zwischen Daumen und Zeigefinger und stützt sich mit den übrigen Fingern an Stirne und Schläfe des Patienten auf der Seite des zu untersuchenden Auges. Hiebei kann man beliebig mit dem rechten oder linken Auge schauen und dementsprechend den Spiegel mit der rechten oder linken Hand halten. Auch kann man ebensowohl das rechte wie das linke Auge des Kranken untersuchen, ohne die Stellung der Lampe oder des Patienten zu ändern. Steht also die Lampe an der rechten Seite des Patienten, so kann man beide Augen untersuchen, ohne die Lampe wegzustellen oder den Kranken auf die andere Seite der Lampe zu setzen. Die Linse soll in der Entfernung ihrer Brennweite vom Auge des Patienten gehalten werden — also die Linse von 10 *D* 10 *cm* vom Auge entfernt. Auf diese Weise wird die Pupille, die dann ungefähr in den Brennpunkt der Linse zu liegen kommt, so stark als möglich vergrössert und das Gesichtsfeld ist so gross, als es überhaupt erreichbar ist. Die Entfernung des Augenspiegels von der Convexlinse muss in jedem einzelnen Falle durch Annäherung und Entfernung des Spiegels gefunden werden. Sie beträgt immer die Summe aus der Entfernung, in welcher das umgekehrte Bild des Fundus vor der Linse entsteht, und der Entfernung, für welche das Auge des

Untersuchers (durch Accommodation, durch eine Convexlinse oder durch den Brechzustand des Auges [Myopie]) eingestellt ist. Wenn man Emmetrop oder Hypermetrop ist, so erleichtert man sich die Untersuchung im umgekehrten Bilde dadurch sehr, dass man in den Spiegel eine Convexlinse von 3 bis 4 *D* (oder auch mehr) nimmt. Es fällt eben den Meisten schwer, auf einen Punkt in der Luft, über dessen Lage sie sich keine rechte Vorstellung machen können, zu accommodiren. Bei starker Hypermetropie oder bei Presbyopie des Untersuchers, oder dann, wenn diese beiden Zustände zusammenwirken, erscheint die Convexlinse sogar unentbehrlich. Ausserdem wirkt diese Convexlinse wie das Ocular eines Mikroskops, indem sie das umgekehrte Bild, welches die vor das Auge gehaltene Convexlinse erzeugt, noch vergrössert. Ist man selbst Myop, dann sieht man leichter, wenn man keine Correctionslinse nimmt. Man sieht dann das Bild in seinem Fernpunkt oder innerhalb desselben. Eine durch den Rand der Linse gelegte Ebene soll auf einer durch Spiegelloch und Linsencentrum gehenden Linie senkrecht stehen. Durch ein Schiefhalten der Linse wird eine Verzerrung der Details des Fundus bewirkt.

Der Patient muss, wenn man die Papille zu Gesicht bekommen will, bei der Untersuchung etwas gegen seine Nase sehen, also mit dem rechten Auge etwas nach links, mit dem linken Auge nach rechts. Am besten ist es, den Kranken anzuweisen, dass er, wenn man das rechte Auge untersucht, neben dem rechten Ohr des Untersuchers vorbei ins Zimmer blicke. Untersucht man das linke Auge, so muss er neben dem linken Ohr des Untersuchers vorbeisehen. Da die Papille etwas nach innen vom hinteren Pol des Auges gelegen ist, so wird sie bei dieser Stellung des Auges in die Richtung, in welcher man ins Auge blickt, kommen und so am leichtesten gesehen werden.

Durch geringe seitliche Verschiebung der Linse vor dem Auge gelingt es, verschiedene Theile des Fundus zu durchmustern, ohne dass der Patient sein Auge, oder der Untersucher den Spiegel zu bewegen braucht. Hiebei folgt das Bild den Bewegungen der Linse. Man bewege z. B. die Linse aus der genau centrirten Stellung bei der Untersuchung des rechten Auges etwas gegen die Nase des Patienten. Nun wirkt der äussere Theil der Linse, der jetzt vor der Pupille steht, wie ein Prisma (siehe Seite 13), bei welchem die Strahlen ja von der brechenden Kante gegen die Basis abgelenkt werden. Man sieht also jetzt die nach innen von der Papille gelegenen Fundustheile. Im umgekehrten Bilde erscheinen diese natürlich nach aussen vom Bilde der Papille. Wir sehen also die Papille nicht mehr wie früher in der Mitte unseres Bildes, sondern sie ist gegen die Nase des Patienten in derselben Richtung wie die Convexlinse verschoben. Die Papille bewegt sich also immer mit der Linse, und auf der der Richtung der Linsenverschiebung entgegengesetzten Seite der Papille erscheinen diejenigen Theile des Augenhintergrundes, die in der Richtung der Verschiebung liegen. Will man sehr periphere Partien des Fundus sehen, so lasse man den Patienten hinauf, hinunter, rechts oder links blicken. Beim Blicke nach unten muss man öfter das obere Lid mit dem vierten und fünften Finger der Hand, welche die Linse hält, heben.

Durch das umgekehrte Bild bekommt man bei schwächerer Vergrösserung einen Ueberblick über den Augenhintergrund. Man ist

damit im Stande, einen grösseren Theil des Fundus auf einmal zu übersehen — das Gesichtsfeld ist grösser.

Schliesslich untersuche man das Auge im aufrechten Bilde. Während bei den bis jetzt beschriebenen Vorgängen es ziemlich gleichgiltig ist, ob sich die Lampe auf der Seite des untersuchten Auges befindet oder nicht, ist dies bei der Untersuchung im aufrechten Bilde nicht ganz einerlei. Diese Methode erfordert eine sehr starke Annäherung des Spiegels und des Untersuchers an das untersuchte Auge. Dies gelingt aber nur schwer, wenn man z. B. das linke Auge untersuchen will, sobald die Lampe rechts neben dem Kranken steht. Es ist nicht leicht, das Licht aus so grosser Nähe über den Nasenrücken des Patienten in das von der Lampe abgewendete Auge zu werfen. Es ist daher besser, die Lampe immer an die Seite des zu untersuchenden Auges zu stellen, also an die rechte Seite des Kranken, sobald man das rechte Auge untersuchen will; an die linke, wenn es sich um die Untersuchung des linken Auges handelt. Die Lampe soll im Uebrigen genau so stehen, wie bei der Untersuchung im umgekehrten Bilde, d. h. so, dass die Flamme in gleicher Höhe mit dem Auge und etwas hinter demselben placirt ist. Das Auge darf nicht direct von der Lampe beleuchtet werden.

Im umgekehrten Bilde kann man die Untersuchung beider Augen mit dem rechten Auge vornehmen. Ebenso kann man die Medien beider Augen entweder mit dem rechten oder mit dem linken Auge untersuchen. Anders aber im aufrechten Bilde. Hier muss man das rechte Auge mit dem rechten, das linke mit dem linken untersuchen. Wenn man nämlich z. B. das linke Auge mit dem rechten untersuchen wollte, so könnte man sich nicht so stark annähern, als es die Untersuchung mit dieser Methode verlangt. Bei dem Versuche starker Annäherung wird man finden, dass die Nasen des Beobachters und des Beobachteten collidiren. Gebraucht man aber zur Untersuchung des rechten Auges das rechte Auge, zur Untersuchung des linken das linke, so fällt dies Hinderniss hinweg, indem dann z. B. bei der Untersuchung des rechten Auges die rechte Gesichtshälfte des Untersuchers der rechten Gesichtshälfte des Patienten gegenüberliegt, die Nasen also gar nicht in Betracht kommen.

Die Blickrichtung des Patienten muss ganz dieselbe sein wie bei der Untersuchung im umgekehrten Bilde.

Im aufrechten und umgekehrten Bilde ist der Reflex des Spiegels auf der Cornea für Anfänger sehr störend. Man muss lernen, bei demselben vorbeizusehen. Im umgekehrten Bilde kommen noch die Reflexe auf der Convexlinse hinzu. Durch eine, aber nur ganz leichte Drehung der Linse um ihre senkrechte Axe können dieselben etwas zur Seite geschoben und weniger störend gemacht werden. Eine einigermassen bedeutende Drehung der Linse muss vermieden werden, da sonst das Bild verzerrt wird.

Der Untersucher kann das Auge, welches er nicht zur Untersuchung braucht, schliessen. Es gelingt den meisten Leuten leicht, das linke Auge zu schliessen und mit dem rechten zu schauen, dagegen können sehr Viele nicht umgekehrt das rechte schliessen und mit dem linken sehen. Solchen ist im Anfang zu rathen, das betreffende Auge durch ein davor gebundenes Läppchen zu bedecken. Man kann

aber auch, und dies ist gewiss vortheilhafter, sich angewöhnen, beide Augen offen zu halten, ebenso wie man beim Mikroskopiren beide Augen offen lassen kann. Man lernt sehr bald von den Bildern, die in dem nicht zur Untersuchung benützten Auge entstehen, abstrahiren.

Es soll in Folgendem nur eine kurze Andeutung bezüglich der Correctionsgläser gegeben werden, die man bei der Untersuchung im aufrechten Bilde braucht. Das Genauere hierüber folgt in dem Capitel über Bestimmung der Refraction.

Als Emmetrop kann man, wenn man gar nicht accommodirt, parallele Strahlen auf seiner Netzhaut vereinigen. Aus einem emmetropischen Auge kommen, wenn es nicht accommodirt, die Strahlen daher parallel heraus. Ein emmetropischer Untersucher kann also den Fundus eines emmetropischen Auges, wenn beide Augen nicht accommodiren, ohne Correctionsglas sehen (siehe Fig. 46). Meistens accommodirt man aber als Anfänger. Man ist nicht im Stande, seine Accommodation bei Betrachtung eines Gegenstandes, den man so nahe weiss, vollkommen zu entspannen. Der Untersuchte dagegen gibt im dunklen Zimmer, wo er keinen Punkt zum Fixiren hat, seine Accommodation meist sehr bald auf. Man kann, wenn man accommodirt, nur divergente Strahlen auf seiner Netzhaut vereinigen. Es müssen also die aus dem untersuchten Auge herauskommenden parallelen Strahlen durch eine Concavlinse divergent gemacht werden. Untersucht man einen Myopen, so muss man natürlich ein um so stärkeres Concavglas nehmen. Bei hypermetropischen Augen kann man, wenn man ein genügendes Accommodationsvermögen hat, im aufrechten Bilde immer ohne Correctionslinse untersuchen. Die Strahlen treten aus einem hypermetropischen Auge divergent aus, und zwar so divergent, als ob sie vom Fernpunkte des Auges herkämen, der in negativer Entfernung hinter der Netzhaut liegt. Es genügt, auf diesen Punkt zu accommodiren, um deutlich zu sehen (Fig. 48). Ein Emmetrop mit gutem Accommodationsvermögen braucht also, wenn er ohne Glas nicht gut sieht, blos ein Concavglas zu nehmen, wobei er sich auch eines stärkeren Glases, als gerade nöthig ist, bedienen kann. Er muss nur dann das, um was die Linse zu stark ist, durch seine Accommodation überwinden. Ein Untersucher mit schwacher Accommodation wird bei stärkerer Hypermetropie des Patienten genöthigt sein, ein Convexglas in den Spiegel einzulegen.

Ist man selbst Hypermetrop, dann wird man ein emmetropisches Auge leicht mittels der eigenen Accommodation untersuchen können. Dabei braucht man sich nur für parallele Strahlen einzustellen. Nichtsdestoweniger sieht ein junger, mit guter Accommodation ausgestatteter Hypermetrop manchmal im Anfang auch nur mittels eines Concavglases. Er accommodirt eben zu stark und macht sich myopisch. Hypermetropische Augen wird man ohne Correctionslinse untersuchen können, sobald man entsprechend accommodiren kann. Ist dies nicht der Fall, so muss ein Convexglas die mangelhafte Accommodation unterstützen. Aus einem myopischen Auge kommen die Strahlen convergent heraus. Ist nun der Untersucher Hypermetrop und accommodirt nicht oder wenigstens nicht so stark, dass er dadurch seine Hypermetropie corrigirt, so kann er möglicherweise ohne Glas sehen. Bei stärkeren Graden

von Myopie wird man aber auch als Hypermetrop ein Concavglas nöthig haben, um die aus dem Auge austretenden, stark convergenten Strahlen weniger convergent zu machen. Auch ein Hypermetrop wird also, sobald er ohne Glas nicht sieht, meist nur Concavlinsen versuchen. Es hängt von der Accommodation des Untersuchers ab, ob man diese Linsen bereits bei Emmetropie, oder nur bei Myopie, oder nur bei Myopie höheren Grades braucht. Denn wenn man seine Accommodation entspannt, so muss man bei einer Myopie gewissen Grades ohne Correctionslinse sehen können. Nur wer eine schwache Accommodation oder sehr starke Hypermetropie besitzt, wird für manche Fälle eines Convexglases bedürfen.

Ist der Arzt Myop, so muss er seine Myopie corrigiren, um ein emmetropisches Auge zu untersuchen. Aus dem emmetropischen Auge kommen ja die Strahlen parallel heraus, und wenn ein Myop sich für parallele Strahlen einstellt, so corrigirt er sich (Fig. 49). Untersucht er ein myopisches Auge, so muss er ein noch stärkeres Concavglas nehmen als das, welches seine Myopie corrigirt (Fig. 50). Bei Hypermetropie des Patienten kann der Untersucher entweder ohne Glas sehen (Fig. 51), oder mit einer Linse, die schwächer ist als die seine Myopie corrigirende. Die Strahlen, die das hypermetropische Auge verlassen, sind eben divergent; und divergiren sie von einem Punkte, der ferner liegt als der Fernpunkt des Untersuchers, dann muss der letztere seinen Fernpunkt mittelst einer Linse weiter hinaus verlegen, d. h. etwas von seiner Myopie wegnehmen, und dies geschieht durch Vorsetzen einer Concavlinse (Fig. 52). Bei stärkeren Graden von Hypermetropie, wo die Strahlen, die aus dem Auge kommen, sehr stark divergiren, kann ein Myop ohne Correctionsglas mit Hilfe seiner Accommodation sehen. Dies ist dann der Fall, wenn der Fernpunkt des hypermetropischen Auges näher liegt, als der Fernpunkt des myopischen. Nur bei schwacher Accommodation muss ein moypischer Untersucher eine Convexlinse einschalten, um den Fundus eines hypermetropischen Auges zu sehen (Fig. 53).

Ist es, mag man irgend einen Refractionszustand besitzen, nur mit Hilfe eines Concavglases gelungen, den Fundus des betreffenden Auges deutlich zu sehen, so nehme man immer schwächere und schwächere Concavgläser, um so den Glaskörper in seinen hintersten Partien sehen zu können. Hat man nur mit einer Convexlinse den Augenhintergrund deutlich wahrgenommen, so entfernt man sich mit dem Spiegel vom Auge und nimmt eventuell noch stärkere Convexlinsen, um die brechenden Medien zu durchforschen.

Es sei hier noch darauf aufmerksam gemacht, dass bei sehr hochgradiger Myopie nur die Untersuchung im umgekehrten Bilde möglich ist. Die Ursachen sind folgende: Einmal dringen aus einem sehr hochgradig myopischen Auge die Strahlen sehr convergent heraus und vereinigen sich im Fernpunkt des Auges. Hat ein Auge z. B. 15 *D* Myopie, so liegt der Fernpunkt 7 *cm* vor dem Knotenpunkt des Auges. Der von der Retina kommende Strahlenkegel ist also vom Knotenpunkt an blos 7 *cm* lang und an seiner Spitze entsteht bereits durch das dioptrische System des Auges selbst ein umgekehrtes Bild des Fundus. Es muss also sehr schwer sein, das aus einem solchen Auge herauskommende Licht aus grösserer Nähe aufzufangen und die Pupille roth zu sehen, da man nur sehr schwer mit der Spiegelöffnung in den aus

dem Auge hervorkommenden kurzen Strahlenkegel hineingelangt. Leicht dagegen ist es, aus grösserer Entfernung, wo die Strahlen nach ihrer Kreuzung wieder divergiren, die Pupille zu erleuchten. Ferner müsste man sehr starke Concavgläser nehmen, durch die man den Fundus, allerdings unter sehr starker Vergrösserung, sehen würde. Das Gesichtsfeld ist dann aber so klein, dass es sehr schwierig ist, sich in dem, was man sieht, zu orientiren. Es ist also in diesen Fällen nur die Untersuchung im umgekehrten Bilde anzuwenden.

Wie weiss man aber, ob ein Auge sehr stark myopisch ist? Man könnte allerdings im aufrechten Bild immer stärkere Concavlinsen vorsetzen, doch gibt es auch einen viel kürzeren Weg, um dies zu erfahren. Blickt man aus grösserer Entfernung (36 bis 40 *cm*) mittels des Augenspiegels in ein Auge, so sieht man, wenn das Auge emmetropisch ist, nichts von den Details des Fundus. Warum das so ist, wurde oben (Seite 33) auseinandergesetzt. Anders verhält es sich aber bei einem hypermetropischen Auge. Hier bekommt man bereits aus der angegebenen grösseren Entfernung ein Bild des Augenhintergrundes, indem das Gesichtsfeld grösser ist. Man kann sich dies leicht dadurch veranschaulichen, dass man zunächst eine Druckschrift in den Brennpunkt einer Convexlinse bringt und aus der Entfernung von 30 bis 40 *cm* betrachtet. Alsdann wird man nur wenig oder nichts von der Schrift sehen. Dies stellt den Fall dar, wo das Auge emmetropisch ist. Rückt man jetzt die Schrift näher an die Linse, so dass sie also innerhalb der Brennweite derselben zu liegen kommt, so kann man auch aus grösserer Entfernung einen grösseren Theil der Schrift übersehen — das Gesichtsfeld ist jetzt grösser. Das Bild, das man nun ebenso wie beim stark hypermetropischen Auge sieht, ist ein aufrechtes, virtuelles. Bei sehr starker Myopie sieht man auch aus grösserer Entfernung ein Bild. Dasselbe ist aber umgekehrt und reell und wird bereits durch die dioptrischen Medien des untersuchten Auges selbst entworfen. Sobald wir so weit vom Auge entfernt sind, dass wir auf dieses Bild accommodiren können, so nehmen wir es wahr. Auch das kann uns der Versuch mit der Convexlinse darstellen. Wir brauchen die Schrift nur weiter von der Linse zu halten als die Brennweite beträgt, und dann wieder aus grösserer Entfernung durch die Linse auf das Object zu sehen. Wir werden dann bei einem ziemlich grossen Gesichtsfeld die Schrift verkehrt sehen.

Also bei starker Myopie sowohl als bei starker Hypermetropie sieht man aus grösserer Entfernung die Papille. Bei Myopie ist das Bild verkehrt und reell, zwischen beiden Augen gelegen, bei Hypermetropie aufrecht, virtuell, hinter dem Augenhintergrund des untersuchten Auges.

Wie unterscheidet man nun, ob es sich um starke Myopie oder um starke Hypermetropie handelt? Man kann dies auf zweierlei Art thun:

1. Bei Hypermetropie bleibt das Bild immer deutlich, wenn man sich auch noch so sehr an das Auge annähert. Man braucht nur immer stärker und stärker zu accommodiren, was man unwillkürlich thut, um fortwährend deutlich zu sehen. Bei Myopie verschwindet das Bild, sobald man in gewisse Entfernung vom untersuchten Auge kommt. Befindet man sich nämlich so nahe, dass man nicht mehr

auf das reelle, umgekehrte Bild accommodiren kann, so muss es undeutlich werden und verschwinden.

2. Bei Hypermetropie wandert das Bild mit dem Beobachter, bei Myopie in entgegengesetzter Richtung, d. h. wenn der Beobachter mit seinem Kopfe und dem Spiegel eine Bewegung nach rechts macht, so bewegt sich bei Hypermetropie das Bild in derselben Richtung, bei Myopie in entgegengesetzter. Zum besseren Verständniss der hiebei obwaltenden Verhältnisse halte man sich folgenden Vergleich vor Augen: Es befindet sich eine Person in einem Zimmer und blickt gegen ein Fenster. Zwischen ihr und dem Fenster sei ein Gegenstand, z. B. eine auf einem Tische stehende Lampe. Durch das Fenster sieht der im Zimmer Stehende einen Baum. Bewegt sich nun der Beobachter im Zimmer gegen seine rechte Seite hin, so wird im Rahmen des Fensters der Baum mit ihm wandern, dagegen die Lampe sich scheinbar in entgegengesetzter Richtung bewegen. Das Fenster stellt die Pupille dar, die Lampe im Zimmer das umgekehrte, reelle, zwischen beiden Augen liegende Bild bei hochgradiger Myopie. Der Baum draussen ist das virtuelle, hinter der Pupille gelegene aufrechte Bild bei Hypermetropie.

Man könnte also ein hochgradig myopisches Auge auch auf diese Weise untersuchen, ohne Vorsetzen eines Convexglases. Die Vergrösserung ist aber so stark und das Gesichtsfeld so klein, dass man sich schwer über das Gesehene orientirt. Es ist daher dennoch vorzuziehen, auch in solchen Fällen das umgekehrte Bild auf die gewöhnliche Weise zu erzeugen.

II. Capitel.

Der normale Augenhintergrund.

1. Anatomische Uebersicht.

Die Eintrittsstelle des Sehnerven liegt nach innen vom hinteren Pol des Auges. Der Sehnerv selbst ist von einer äusseren und einer inneren Scheide umgeben. Die innere Scheide (Fig. 43 a) umgibt den




Fig. 43.

Opticus ganz knapp und heisst Pialscheide; die äussere (b) ist durch den Zwischenscheidenraum (c) von der inneren getrennt. Man kann von der äusseren Scheide zwei, jedoch nur mikroskopisch trennbare Schichten unterscheiden: die äussere ist die Duralscheide, die innere die Arachnoidealscheide. Der subvaginale oder Zwischenscheidenraum des Opticus hängt mit dem subarachnoidealen Raum

des Schädels zusammen. Er reicht nur wenig in die Sklera (k) hinein. Die äussere Scheide schlägt sich in die äusseren, die innere in die inneren Lagen der Sklera um. In der Nähe dieser Umschlagsstelle sieht man auf dem Längsschnitt mehrere Gefässquerschnitte (d). Es sind dies die Durchschnitte der Gefässe des Skleroticalgefässkranzes. Derselbe liegt in einiger Entfernung vom Opticus in der Sklera und wird von den kurzen hinteren Ciliararterien gespeist. Er versorgt zum Theil auch den Opticus. Am Längsschnitt des Opticus unterscheidet man mikroskopisch der Länge nach verlaufende Bündel von Nervenfasern (e), die durch Bindegewebssepta voneinander getrennt werden. Diese Bindegewebssepta zeigen jedoch auch Queranastomosen. Im Niveau der inneren Oberfläche der Sklera finden sich zahlreiche, den Nerven quer durchsetzende Bindegewebsfasern, die zusammen die Lamina cribrosa (f) constituiren. Diese hängt mit der Sklera und Chorioidea zusammen und durch ihre zahlreichen Oeffnungen lässt sie die Nervenfaserbündel hindurchtreten. Die letzteren werden ungefähr in der Gegend der Lamina cribrosa marklos, nach innen von dieser Stelle des Sehnerven finden sich also blos die Axencylinder. Es ist dies bereits an der Färbung des Sehnerven zu erkennen. Während der markhaltige Theil sehr schön weiss aussieht, erscheint die Partie des Sehnerven nach innen von der Lamina cribrosa mehr graulich. In der Mitte des Sehnerven verlaufen die Centralarterie und die Centralvene (g).

Jener Theil des Sehnerven, der nach innen von der Lamina cribrosa liegt, wird auch als Papilla nervi optici oder Sehnervenkopf bezeichnet. Der Durchmesser dieses Theiles ist bedeutend geringer als jener des hinter dem Bulbus gelegenen Abschnittes des Sehnerven, indem der Opticus bei seinem Durchtritte durch die Sklera eine Einschnürung erleidet. Der anatomische Durchmesser der Papille beträgt 1·5 *mm*. Der Name Papilla nervi optici ist nichtentsprechend, indem der Sehnervenkopf nur in den seltensten Fällen unter normalen Verhältnissen eine Erhebung gegen das Augeninnere darstellt. Entweder er ist vollkommen flach oder in seiner Mitte befindet sich eine seichte Grube. Sämmtliche Nervenfasern schlagen sich über den Papillenrand um und gelangen so in das Niveau der Retina (h), deren innerste Lage sie bilden. Ueber den inneren Rand der Papille verlaufen im Allgemeinen mehr Nervenfasern als über den äusseren, ebenso auch mehr Gefässe. Das ganze Gewebe der Papille besteht aus Nervenfasern, Gefässen und einem Stützgewebe.

Die Retina besteht aus 10 Schichten, zu denen nach seiner Abstammung auch das Pigmentepithel als am weitesten nach aussen gelegene Schicht gerechnet werden muss. Es entwickelt sich dasselbe bekanntlich aus dem äusseren Blatt der secundären Augenblase. Die 10 Schichten sind von innen nach aussen gerechnet folgende: 1. Die Membrana limitans interna. 2. Die Nervenfaserschicht. 3. Die Ganglienzellenschicht. 4. Die innere granulirte Schicht. 5. Die innere Körnerschicht. 6. Die äussere granulirte Schicht (Zwischenkörnerschicht). 7. Die äussere Körnerschicht. 8. Die Membrana limitans externa. 9. Die Stäbchen- und Zapfenschicht. 10. Das Pigmentepithel. Die letztere Schicht besteht aus sechseckigen pigmentirten Zellen, die beim Abziehen der Retina von der Chorioidea an der letzteren sitzen bleiben.

Die Müller'schen Stützfasern sind Bindegewebsfasern, die von der Membrana limitans externa zur Membrana limitans interna hinziehen und also fast alle Netzhautschichten durchsetzen. Die Gegend der Macula lutea erscheint an einer nach dem Tode bereits getrübten Netzhaut als gelb aussehende gefässlose Stelle von der Grösse der Papille. Betrachtet man in einem ganz frischen Auge, wo die Netzhaut noch ganz durchsichtig ist, die Gegend der Macula in situ, so sieht man nur einen dunklen, braunrothen Fleck, dagegen keine gelbe Stelle. Innerhalb derselben liegt die Fovea centralis, die Stelle des deutlichsten Sehens: eine kleine Vertiefung, die dadurch entsteht, dass daselbst die Netzhaut durch Verdünnung einiger Schichten und gänzlichen Mangel anderer bedeutend verdünnt ist. Die grösseren Gefässe der Netzhaut verlaufen sämmtlich innerhalb der Nervenfaserschicht, also in der zweiten Schicht der Netzhaut. Nur sehr kleine Zweige findet man allenfalls noch bis zur Zwischenkörnerschicht.

Die Chorioidea (i) besteht von innen nach aussen gerechnet aus der Membrana limitans Chorioideae, einer structurlosen Glashaut, der nach innen die Pigmentepithelzellen der Netzhaut aufsitzen. Auf diese folgt die Schicht der Capillargefässe, die Choriocapillaris, dann kommt die Schicht der grösseren Gefässe und endlich die Suprachorioidea, welche zunächst der Sklera liegt. In der Schicht der grösseren Gefässe und in der Suprachorioidea finden sich verästelte Pigmentzellen. Gegen den Aequator des Bulbus zu treten zahlreiche Venen zu den sogenannten Wirbelvenen — Venae vorticosae — zusammen, deren es vier bis sieben gibt. Die Chorioidea muss natürlich für den Durchtritt des Opticus ein Loch frei lassen, das jedoch öfter grösser erscheint als das Loch in der Sklera, so dass zwischen dem Rande der Papille und dem Rande der Chorioidea ein Streifen Sklera von der Chorioidea unbedeckt bleibt.

2. Der ophthalmoskopische Befund im normalen Auge.

Der auffallendste und hervorstechendste Theil des Fundus ist die Papille mit der Austrittsstelle der Gefässe. Wenn man bei der Untersuchung im aufrechten Bilde, wie angegeben wurde, den Patienten etwas gegen seine Nase blicken lässt, so bekommt man die Papille zur Ansicht. Sollte dies nicht sogleich gelingen, so verfolgt man die Gefässe gegen ihre Theilungen, d. h. sieht man ein Gefäss sich nach oben theilen, so ist die Papille unten und man findet sie, wenn man den Spiegel so dreht, dass das Licht auf weiter unten gelegene Partien des Augenhintergrundes fällt, oder man weist den Patienten an, etwas hinunterzublicken, dann bewegt sich die Papille etwas nach oben und kommt in den Bereich unseres Gesichtsfeldes. Man wird übrigens bereits von weitem durch das Aufleuchten eines helleren Reflexes auf die Richtung, in der sich die Papille vorfindet, aufmerksam. Man braucht, um diesen zu finden, nur aus etwas grösserer Entfernung, 40 bis 50 *cm*, seitliche Bewegungen mit Kopf und Spiegel zu machen. Wenn man sich dem Auge nun allmählich nähert, ohne diesen hellen Reflex zu verlieren, so wird man meist leicht die Papille erblicken.

Die Papille (J. A. Fig. 25, 26) erscheint als gelblichrothe oder rosarothe Stelle, heller als der übrige Fundus und sticht in stark

pigmentirten Augen sehr stark von ihrer Umgebung ab. Ihre Form ist entweder vollkommen rund oder oval, und zwar häufiger längs- als queroval. Fast regelmässig ist der innere Rand weniger deutlich als der äussere. Dies findet leicht seine Erklärung in dem oben beschriebenen Verlaufe der Nervenfasern. Dem entspricht auch, dass gewöhnlich die innere Hälfte der Papille röther erscheint als die äussere; in der letzteren tritt eben wegen der dünneren Lage der Fasern der helle Reflex der Lamina cribrosa und der markhaltigen Nervenfasern im Sehnerven deutlicher hervor. Sehr oft erscheint die Papillengrenze durch zwei Ringe deutlich markirt. Der eine derselben, der Skleral- oder Bindegewebsring, entspricht dem von der Chorioidea freigelassenen, schmalen Skeralstreifen zunächst der Papille. Es zeigt sich dieser Ring dann, wenn das Loch für den Opticus in der Chorioidea grösser ist als in der Sklera. Meist ist dieser Ring als weisslicher Streifen um die Papille zu erkennen, häufiger blos an der äusseren Seite, als rings um dieselbe (J. A. Fig. 27, 28, 37, 38; W. u. M. Fig. 1, 2, 4). Nach aussen von diesem umgibt öfters ein zweiter, aber dunkler, schwarzbrauner oder schwarzer Ring entweder die ganze Papille oder nur ihre äussere Hälfte. Es ist dies der Pigment- oder Chorioidealring. Er stellt den stark pigmentirten Rand der Chorioidea dar und kann von verschiedener Breite sein. Manchmal ist er nur sehr schmal, manchmal so breit wie etwa $^1/_4$ P. D.; auch findet sich manchmal Pigment nur an ganz circumscripten Stellen des Papillenrandes angesammelt (J. A. Fig. 25, 29, 37, 39, 41, 42, 43 in normalen, 45, 46, 47, 89, 90 in pathologisch veränderten Augen, W. u. M. Fig. 2). Manchmal sind auch zwei feine dunkle Ringe um die Papille herum vorhanden (J. A. Fig. 87; W. u. M. Fig. 3). Es können beide Ringe, sowohl der Skleral- als der Chorioidealring, deutlich vorhanden sein oder nur einer, es können auch beide fehlen. Es gibt in der That normale Papillen, die so verschwommen aussehen, dass ein weniger Geübter sie leicht für pathologisch halten könnte.

Die Gefässe (J. A. Fig. 25, 26) treten in der Mitte oder etwas nach innen von der Mitte der Papille hervor. Arterien und Venen sind leicht zu unterscheiden: die Arterien sind etwas enger als die Venen, haben eine hellrothe Farbe und verlaufen ziemlich gestreckt; die Venen dagegen sind dunkler, bläulichroth, dicker und verlaufen mehr geschlängelt. Auf den grösseren Arterien ebensowohl als auf den grösseren Venen sieht man in der Mitte einen hellen, weissglänzenden Streifen, so dass die Gefässe wie doppelt contourirt aussehen; diese Streifen sind jedoch viel heller und schärfer auf den Arterien ausgeprägt; sie werden hervorgerufen durch den Reflex des Lichtes auf der vorderen Wand der Blutsäule in den Gefässen. Die Gefässwandungen sind nämlich fast immer vollkommen durchsichtig. Wohl gibt es Fälle, in denen man feine, weisse Streifen an den Gefässen sehen kann, die dem Verlaufe derselben folgen und die beiden rothen Streifen, die an der Seite des mittleren Reflexstreifens liegen, nach aussen begrenzen. Diese Streifen sieht man nur auf der Papille und in ihrer allernächsten Umgebung. Sie sind der Ausdruck der Gefässwandungen.

Die Vertheilung der Gefässe ist derart, dass die grösseren Aeste nach oben und unten gehen. Nach innen treten ebenfalls

über den Papillenrand einige grössere Gefässe; nach aussen dagegen verlaufen gewöhnlich nur sehr kleine Aeste der Arterie und Vene. Die weitere Vertheilung ist sehr verschieden und hängt zumeist davon ab, ob sich die Hauptstämme der Arterie und Vene bereits innerhalb des Opticus oder erst auf der Papille theilen. Im ersten Falle treten die einzelnen grösseren Aeste gesondert und mitunter ziemlich weit von der Mitte der Papille hervor. In den meisten Fällen verlaufen nach oben und nach unten je zwei grössere Aeste der Arterie und Vene, so dass man eine Arteria und Vena nasalis superior und inferior und eine Arteria und Vena temporalis superior und inferior unterscheiden kann. Ausserdem geht nach innen ein Ast von der Arterie und einer von der Vene ab, die als Arteria und Vena mediana bezeichnet werden. Ueber den äusseren Rand der Papille gehen zwei feine Arterien, Arteria macularis superior und inferior. Im weiteren Verlaufe biegen sich die Gefässe so in grossem Bogen nach aussen, dass sie die Gegend der Macula aussen von der Papille frei lassen und nur kleinere Aeste gegen diese Partie hinschicken.

Bei manchen Augen, die einen sehr stark pigmentirten Fundus haben, wird man öfter in der Umgebung der Papille eine leichte graue Färbung wahrnehmen, die wie ein leichter Schleier auf dem Augenhintergrunde liegt und in der Ausdehnung von einigen PD (= Papillendurchmesser) sich von der Papille in den Fundus hineinerstreckt und ganz verwaschene Grenzen hat. Bei genauer Untersuchung kann man in dieser Partie eine sehr zarte graue, von der Papille ausstrahlende Streifung erkennen. Es ist dies wohl nicht direct der Ausdruck der Ausstrahlung der Sehnervenfasern, sondern dadurch bedingt, dass die Bindegewebstheile der Netzhaut dem radiären Verlaufe der Nervenfasern entsprechend angeordnet sind und durch diese ihre Anordnung das Ausstrahlen der letzteren wiedergeben. In Augen jugendlicher Individuen sieht man ferner oft sehr, zarte, wellige, glänzendweisse Streifen im Fundus, die meist den Retinalgefässen folgen oder auch quer über dieselben hinwegsetzen und sich dann auf der anderen Seite des Gefässes weiter verfolgen lassen. Solche Streifen geben sich sehr leicht als Reflexe dadurch zu erkennen, dass sie bei leichten Drehungen des Spiegels ihre Lage und Form ändern. In manchen Augen werden sie sehr zahlreich gesehen, so dass die Retina ein Aussehen gewinnt, das an sogenannten „Moirée"-Stoff erinnert. Diesen Zustand muss man als einen normalen kennen und im Gedächtniss behalten, sonst kommt man leicht in Versuchung, denselben für den Ausdruck einer Netzhautentzündung zu halten; die Reflexe werden nach Einigen durch die Limitans interna, nach Anderen durch die Sehnervenfaserschichte selbst bedingt.

Wie erscheint nun der Grund, auf dem wir die Retinalgefässe sehen? In sehr vielen Augen ist er, im umgekehrten Bilde betrachtet, gleichmässig gelblichroth bis dunkelrothbraun gefärbt. Es entspricht dies meist der Haarfarbe des Individuums, indem blonde Personen meist einen helleren Fundus haben als dunkelhaarige. Untersucht man dagegen im aufrechten Bilde ein solches Auge, so kann man deutlich ein sehr fein gekörntes Aussehen des Augenhintergrundes bemerken, welches durch das Pigmentepithel bedingt ist (J. A. Fig. 25, 26). Ueber dieses sieht man in solchen Augen also nicht

hinaus. Die ganze Chorioidea ist unseren Blicken durch das Pigmentepithel entzogen.

Bei anderen, meist blonden Personen liegen die Netzhautgefässe aber nicht auf einem gleichmässig gefärbten Grunde. Der in diesen Fällen sehr hell gelblichroth erscheinende Fundus wird nämlich von zahlreichen, hell- oder dunkelorangegelben, bandartigen, vielverästelten, untereinander anastomosirenden Streifen, den grösseren Chorioidealgefässen, durchzogen (J. A. Fig. 27). Sie sind leicht von den Retinalgefässen zu unterscheiden: einmal haben sie immer jenes bandartige Aussehen, man kann Arterien und Venen nicht unterscheiden; ferner liegen sie deutlich unter den Retinalgefässen und stellen ein Convolut verästelter und vielfach untereinander anastomosirender Gefässe dar. Reflexstreifen wie an den Retinalgefässen sind an ihnen niemals zu erkennen. Gegen die Peripherie zu werden die zwischen ihnen gelegenen Intervascularräume schmäler und gestreckter. Blickt man im umgekehrten Bilde sehr schräg ins Auge hinein, so nimmt man auch wahr, wie sich die Venen der Chorioidea zu den Vortexvenen in strahliger Form sammeln. Immer sieht man nur die grösseren Gefässe der Chorioidea; die unmittelbar unter der Membrana limitans Chorioideae gelegene Choriocapillaris ist nicht sichtbar.

In manchen Augen treten die Intervascularräume zwischen den Chorioidealgefässen sehr deutlich dadurch hervor, dass sie dunkelbraun bis schwarzbraun pigmentirt sind. Man sieht dann die Chorioidealgefässe zwischen diesen dunkleren Stellen sehr deutlich hervortreten. Der Fundus bekommt hiedurch ein sehr eigenthümliches Aussehen, das man als „getäfelt" bezeichnet (J. A. Fig. 58, 118, 120); es wird dadurch bewirkt, dass in diesen Fällen das Pigmentepithel nur schwach pigmentirt ist, so dass es den Durchblick auf die Chorioidealgefässe gestattet. Das Stroma der Chorioidea dagegen enthält so viel Pigment, dass die zwischen den Chorioidealgefässen gelegenen Stellen als dunkle Flecken sehr prägnant hervortreten. Wer ein solches Auge zum erstenmale sieht, wird den Befund sehr leicht für pathologisch halten können und es sind auch schon Fälle vorgekommen, wo dieses Aussehen des Fundus für Chorioiditis gehalten und der Patient darnach behandelt wurde. Doch wird man den Zustand leicht als normal erkennen, wenn man die Regelmässigkeit der Pigmentvertheilung wahrnimmt, die vollständig dem Verlaufe der Gefässe in der Chorioidea entspricht, wenn man ferner nachweisen kann, dass die dunklen Stellen in der Peripherie schmäler und gestreckter werden.

Ein albinotisches Auge, in dem das Pigment vollkommen, sowohl im Pigmentepithel als in der Chorioidea mangelt, zeigt auch die Chorioidealgefässe als rothe Bänder, doch sieht man zwischen ihnen mit hellem, weissem Glanze die Sklera durchleuchten. Nur in der Gegend der Macula erscheint ein gleichmässig rosenrother Schimmer über dem Fundus ausgebreitet (J. A. Fig. 28).

Es bleibt uns nun noch eine für die Function des Auges wichtige Stelle des Augenhintergrundes zu besprechen übrig, nämlich die Gegend der Macula lutea. Dieselbe stellt eine etwa papillengrosse, mit ihrer Mitte ungefähr 2 *PD* nach aussen von der Papille gelegene

Stelle dar, die an der herausgenommenen Retina eine deutlich gelbe Farbe zeigt. Innerhalb derselben liegt die Fovea centralis als kleine Grube. Wenn man sich diese Gegend bei der Augenspiegeluntersuchung zur Ansicht bringen will, so genügt es bei der Untersuchung im umgekehrten Bild, sobald man die Papille im Gesichtsfeld hat, den Patienten anzuweisen, er möge etwas weniger zur Seite sehen. Oft sieht man dann diese Partie gleichzeitig mit der Papille im Gesichtsfelde. Um mit der Methode des aufrechten Bildes die Macula zu finden, sucht man am besten zunächst die Papille auf, und zwar ihren äusseren Rand. Dann wirft man durch eine leichte Drehung des Spiegels das Licht etwas nach aussen. Findet man die Macula nicht, so ist es am besten, wieder zum äusseren Rande der Papille zurückzukehren und von da aus neuerdings nach aussen zu gehen, sonst geschieht es leicht, dass man ziemlich weit ober- oder unterhalb der Papille sucht. Es ist von Vortheil, sich eines lichtschwachen Spiegels zu bedienen, also entweder eines belegten Planspiegels oder eines Helmholtz'schen Beleuchtungsapparates. Denn gerade die Hauptschwierigkeit bei der Untersuchung dieser Gegend, welche ja die Stelle des deutlichsten Sehens ist, besteht darin, dass sich die Pupille, sobald man das Licht mit dem Spiegel dorthin wirft, sehr stark contrahirt. Dies geschieht natürlich in geringerem Masse, wenn die Beleuchtung eine nur schwache ist. Erleichtert wird die Untersuchung durch künstliche Erweiterung der Pupille, ja bei manchen Augen mit sehr enger Pupille ist es unmöglich, ohne artificielle Mydriasis zu sehen.

Die Gegend der Macula charakterisirt sich zunächst dadurch, dass sich in ihr keine ophthalmoskopisch sichtbaren Gefässe finden. Es erscheint also eine etwa papillengrosse Stelle, deren Centrum circa $2\,PD$ nach aussen von der Papille liegt, gefässlos. Diese Partie markirt sich, besonders wenn man im umgekehrten Bilde untersucht, doch auch häufig im aufrechten Bilde durch einen hellen, weissen Ring, der gewöhnlich queroval ist, im senkrechten Durchmesser so gross wie die Papille. Dieser Ring ist meist gegen seine Mitte scharf begrenzt, nach aussen verliert er sich mehr diffus. Man kann ihn aber nicht in allen Augen finden (J. A. Fig. 30, W. u. M. Fig. 5, L. A., Taf. II, Fig. 1). Innerhalb dieses Ringes erscheint der Fundus dunkler als in der Umgebung. Im aufrechten Bilde kann man nur in der Mitte der gefässlosen Stelle einen dunkler, gewöhnlich rothbraun gefärbten Fleck erkennen, innerhalb dessen der Augenhintergrund mehr gekörnt aussieht. Dies ist die Gegend der Fovea centralis. Diese selbst gibt sich meist durch eine kleine, weissliche, glänzende Sichel zu erkennen. Dieselbe ist sehr klein, ihr Durchmesser etwa so gross wie der eines mittelstarken Astes der Arteria centralis, manchmal aber auch grösser. Es ist dies der Reflex des Lichtes in der Fovea centralis. Man überzeugt sich davon sehr leicht, wenn man den Spiegel etwas dreht: sogleich nimmt die kleine Sichel eine andere Stellung ein, so dass die Concavität, die z. B. früher nach aussen sah, nun nach unten gerichtet ist. Man kann so die Sichel in alle möglichen Stellungen bringen. Oft sieht man, wie sie sich plötzlich in einen hellen Ring umwandelt, nämlich dann, wenn der Lichteinfall ganz direct von

vorne erfolgt. Oefters kann man in der Gegend der Fovea centralis auch nur einen kleinen hellen Punkt sehen (J. A. Fig. 26, 29, 43, 44, 116; L. A., Taf. II, Fig. 1, 2).

Die Erklärung jenes grösseren, besonders im umgekehrten Bilde hervortretenden Ringes ist strittig. Die Einen halten ihn für bedingt durch den Gegensatz zwischen der dunkleren Färbung der Macula und ihrer helleren Umgebung. Durch die gelbe Eigenfarbe der Macula wird ein grosser Theil des darauf geworfenen Lichtes absorbirt. Deshalb erscheint diese Stelle dunkler als der übrige Fundus. Andere erklären den hellen Ring damit, dass in der Gegend der Macula die Sehnervenfaserschicht nur sehr dünn ist, wodurch das Spiegeln der Retina an dieser Stelle fehlt. Wiederum Andere nehmen an, dass die Verdünnung der Retina an dieser Stelle die Ursache ist; die Ränder dieser verdünnten Partie würden dann den Lichtreflex hervorrufen. Der Grund, warum im aufrechten Bilde jener grössere Ring um die Macula meist nicht erscheint, scheint in der geringeren Beleuchtung bei dieser Untersuchungsmethode zu liegen.

So sieht man also nach dem, was wir soeben über das Aussehen des normalen Fundus gesagt haben, in vielen Augen von der Chorioidea nichts, von der Retina das Blut in den Gefässen und die Reflexstreifen an der inneren Oberfläche der Netzhaut, sowie die Reflexerscheinungen in der Gegend der Macula. In anderen Augen aber, wo das Pigmentepithel die Durchsicht in die Tiefe gestattet, kann man die Chorioidealgefässe sehen. Auch dann aber nimmt man nur die grösseren Gefässe wahr, indem die Capillarschicht der zu schwachen Vergrösserung wegen unseren Blicken entgeht.

An den Gefässen nimmt man in vielen Augen eine Bewegungserscheinung wahr, und zwar den Venenpuls. Derselbe findet sich normalerweise nur auf der Papille, besonders dort, wo die stärkeren Venen in das Gewebe des Opticuskopfes hineintauchen oder wo sie um den Rand einer physiologischen Excavation (siehe Seite 112) herumbiegen. Gerade dort zeigen sie oft sackartige Anschwellungen. Dieser Puls gibt sich dadurch kund, dass die Vene etwas vor dem Eintritte des Radialpulses an der betreffenden Stelle zusammensinkt und sich hierauf im Momente, wo die Arterien des Körpers sich verengern, wieder erweitert. Man kann den Venenpuls, wenn er nicht spontan vorkommt, durch leichten Druck mit dem Finger auf den Bulbus in jedem Auge hervorrufen.

Der Puls wird in folgender Weise erklärt. Im Momente, wo durch die Systole des Herzens der Blutdruck in den Arterien steigt, wird dieser gesteigerte Gefässdruck auf den Glaskörper übertragen, und dort, wo der geringste Widerstand ist, findet eine Compression der Venen statt. Im Anfange scheint hiebei auch ein vermehrtes Ausströmen von Venenblut aus dem Auge stattzufinden. Der geringste Widerstand wird sich aber an den Venen nahe ihrem Austritte aus dem Bulbus finden, denn dort hatte das Blut bereits die Widerstände in den Capillaren und kleineren Venen zu überwinden gehabt. Der erhöhte Blutdruck in den Arterien gibt sich also durch eine Compression der Venen kund. So ist der Venenpuls gleichsam der Ausdruck der regulirenden Wirkung, welche die Bulbuskapsel auf den intraoculären Druck hat. Es ist hienach auch begreiflich, wie eine künstliche

Vermehrung des letzteren durch Fingerdruck den Venenpuls in einem Auge hervorruft, wo er spontan noch nicht vorhanden war. Setzt man diesen Druck noch nach Auftreten des Venenpulses weiter fort, so zeigt sich auch Arterienpuls. Spontaner Arterienpuls ist immer pathologisch.

Der von Boll entdeckte Sehpurpur scheint unter gewöhnlichen Verhältnissen am lebenden Auge mit dem Augenspiegel nicht sichtbar zu sein, obzwar einige Autoren und anfangs auch Boll die Meinung ausgesprochen haben, dass wenigstens ein Theil der rothen Farbe des Augenhintergrundes durch den Sehpurpur bedingt sei.

Anhang.

Das normale Bild des Augenhintergrundes geht im hohen Alter mannigfache Veränderungen ein. Der Sehnerv erscheint nicht so hellglänzend und scharf begrenzt wie im jugendlichen Auge. Er hat eine mehr grauröthliche Farbe, erscheint trüb, man erkennt das Ausstrahlen der Nervenfaserbündel nicht mehr. Auch die Retina zeigt eine Verschiedenheit von dem Verhalten in der Jugend. Die Reflexe an den Netzhautgefässen sind nicht so glänzend, die unregelmässigen, oben beschriebenen Reflexstreifen entlang der Gefässe fehlen. Auch die Reflexerscheinung in der Gegend der Macula tritt nicht mit derselben Helligkeit und Schärfe hervor, wie früher, ja sie kann vollständig fehlen. Untersucht man im aufrechten Bilde, so findet man manchmal den Fundus nicht gleichmässig roth gefärbt, sondern erblickt eine sehr grosse Zahl gelblichweisser Tüpfel, meist sehr klein, eben sichtbar, in deren Umgebung der Fundus dunkler aussieht, so dass sie mitunter von schwärzlichen, kleinen Ringen eingefasst werden. Diese sehr feinen Veränderungen, die im Pigmentepithel ihren Sitz haben, liegen sowohl in der Umgebung des Sehnerven, als auch in grösserer Entfernung von der Papille. Es gewinnt dadurch der Fundus in sehr ausgesprochenen Fällen ein sehr fein marmorirtes Aussehen, indem solche Tüpfel auch miteinander verschmelzen können. Das anatomische Substrat für diese Veränderungen sind jene geschichteten Auflagerungen auf die Membrana limitans Chorioideae, die man als Drusen der Glaslamelle der Chorioidea bezeichnet. An den Stellen, wo diese sich entwickeln, fehlt das Pigmentepithel oder es liegen nur einzelne Pigmentschollen auf diesen Körpern. Dagegen treten in der Umgebung der Drusen vermehrte Ansammlungen von Pigment durch Wucherung der Pigmentepithelzellen auf, die sich dann mitunter in deutlichen Ringen um die hellen Drusen anatomisch, ja selbst manchmal ophthalmoskopisch ausprägen. Solche Drusen können auch confluiren und dann grössere Auflagerungen auf der Limitans Chorioideae bilden. In der Chorioidea selbst können diffuse Entfärbungen, bedingt durch Atrophie, auftreten, besonders häufig in der äussersten Peripherie, so dass selbst die Sklera durchscheinen kann. Auch um den Sehnerven kommt eine ringförmige Atrophie vor, welche sich als ein gelblichweisser Ring um die Papille zu erkennen gibt.

3. Ophthalmoskopische Vergrösserung im aufrechten und umgekehrten Bilde.

Wenn man ein Object in der Entfernung von 21 *cm* ansieht, so hat das Netzhautbild, das von diesem Object entsteht, eine bestimmte Grösse. Rücken wir dagegen den Gegenstand bis z. B. auf 7 *cm* heran, so nimmt die Grösse des Netzhautbildes natürlich zu. Man wird nun mittels einer Loupe im Stande sein, einen Gegenstand ohne Accommodationsanstrengung in 7 *cm* zu betrachten. Das Netzhautbild ist jetzt dreimal grösser als früher. Wir erhalten die Zahl, welche die Vergrösserung angibt, wenn wir, die Entfernung von 30 *cm* als Grundlage, i. e. als deutliche Sehweite angenommen, 30 durch die Zahl, welche die Brennweite der Linse in Centimetern angibt, dividiren. Wir betrachten nun den Augenhintergrund eines Auges im aufrechten Bilde eigentlich durch eine Loupe, die durch das dioptrische System des untersuchten Auges dargestellt wird. Der Abstand des Knotenpunktes von der Retina im emmetropischen Auge beträgt 15 *mm*. Es ist also gleich, ob wir die Netzhaut durch eine Linse von 15 *mm* Brennweite oder durch die brechenden Medien des Auges selbst betrachten. Die Vergrösserung ist nach dem soeben Gesagten $= \frac{300}{15} = 20$. Hiebei müssen wir allerdings die Entfernung der Knotenpunkte beider Augen voneinander vernachlässigen.

Beim myopischen Auge ist nun im Allgemeinen die Vergrösserung stärker, beim hypermetropischen schwächer. Doch ist es nicht gleich, wodurch die Refractionsanomalie hervorgerufen wird. Es kann Myopie entstehen durch Verlängerung der Axe des Auges oder durch stärkere Brechkraft des dioptrischen Systems. Andererseits kann Hypermetropie einmal hervorgerufen werden durch Verkürzung der Axe des Auges, ein andermal durch geringere Brechkraft des optischen Apparates (z. B. durch Entfernung der Linse — Aphakie). Man hat nun gefunden, dass, im Falle die Hypermetropie durch Axenverkürzung bedingt ist, die Vergrösserung stärker ist, als wenn sie durch eine geringere Brechkraft der Medien erzeugt wird, doch immer noch geringer als bei Emmetropie. Bei Myopie hinwiederum ist die Vergrösserung stärker, wenn eine vermehrte Brechkraft des dioptrischen Systems die Myopie bewirkt; geringer, wenn Axenverlängerung da ist — in beiden Fällen aber stärker als bei Emmetropie. Entfernt man sich mit dem Spiegel vom Auge eines Hypermetropen, Emmetropen oder Myopen, so nimmt die Vergrösserung zu, indem der Knotenpunkt des dioptrischen Systems, welches aus dem dioptrischen Apparat des Auges des Untersuchers und des Untersuchten besteht, von der Netzhaut des Untersuchers abrückt.

Im umgekehrten Bilde verhält sich die Sache anders. Hier ist die Vergrösserung von sehr vielen verschiedenen Umständen abhängig. Erstens von der Stärke der Linse: je stärker die Linse ist, desto geringer ist die Vergrösserung. Entwirft man z. B. mit einer Linse von 5 *cm* Brennweite (20 *D*) das Bild eines 6 *m* entfernt liegenden Fensters auf einer Wand, die im Brennpunkte der Linse steht, so ist das Bild viel kleiner, als wenn ich eine Linse von 10 *cm* Brennweite (10 *D*) nehme und mittels dieser von dem Gegenstande ein

Bild auf einem im Brennpunkte der Linse stehenden Schirm entwerfe. So auch beim Auge. Aus dem emmetropischen Auge treten die Strahlen parallel aus und das umgekehrte Bild entsteht gerade im Brennpunkt. Es ist desto kleiner, je stärker die Linse ist.

Bei Myopie ist die Vergrösserung unter sonst gleichen Umständen, d. h. wenn man dieselbe Linse nimmt und sie ebensoweit vom Auge entfernt hält, geringer als bei Emmetropie, denn hier liegt der Gegenstand in negativer Gegenstandsweite, also vor der Linse. Auch ohne Dazwischenstellung der Linse würde sich bereits ein verkehrtes Bild durch das dioptrische System des untersuchten Auges in dessen Fernpunkt bilden. Dieses verkehrte Bild ist es, von dem die Linse dann ein Bild erzeugt, welches natürlich innerhalb der Brennweite der Linse liegen muss (siehe Seite 18, Punkt 8). Dasselbe ist im Vergleiche zu dem Bilde, das durch den dioptrischen Apparat des untersuchten Auges schon entworfen wird, aufrecht, also ein verkehrtes Bild des Fundus. Dieses Bild ist kleiner als das, welches durch die dioptrischen Medien des Auges ohne die Linse entworfen würde, und dieses Bild ist auch kleiner als das beim emmetropischen Auge durch die Methode des verkehrten Bildes erzeugte. Beim emmetropischen Auge liegt die Papille im Brennpunkt des dioptrischen Systems und es entsteht durch das letztere ein aufrechtes virtuelles, sehr stark vergrössertes Bild in negativer unendlicher Entfernung. Es liegt dieses also hinter dem untersuchten Auge (siehe oben Seite 18, Punkt 5). Dieses Bild ist es, welches der vor das Auge gesetzten Linse als Gegenstand dient und von der sie ein verkehrtes, stark verkleinertes Bild in ihrem Brennpunkte erzeugt. Im myopischen Auge dagegen entsteht durch das dioptrische System des Auges allein ein verkehrtes Bild des Fundus, das in endlicher Entfernung vor dem Auge liegt (im Fernpunkt des Auges) und welches natürlich kleiner ist als das virtuelle Bild beim emmetropischen Auge. Von dem kleineren Bilde wird noch ein verkleinertes Bild bei der Untersuchung im umgekehrten Bilde gesehen. Es muss somit dies Bild kleiner sein als das bei Emmetropie des untersuchten Auges.

Beim hypermetropischen Auge treten die Strahlen bekanntlich divergent aus, und zwar liegt hier die Retina innerhalb der Brennweite des dioptrischen Apparates. Durch die brechenden Medien des Auges entsteht also ein aufrechtes, virtuelles, in endlicher Entfernung hinter dem untersuchten Auge gelegenes Bild (siehe Seite 18, Punkt 6). Dieses Bild ist für die Linse der Gegenstand und das schliesslich entworfene Bild muss natürlich grösser sein als das bei Emmetropie, denn das Bild, das eine Convexlinse von einem unendlich weit entfernten Gegenstand erzeugt, ist kleiner als das eines in endlicher Entfernung gelegenen Objectes (siehe Seite 17, Punkt 2 und 3). Die Vergrösserung beim hypermetropischen Auge ist also ceteris paribus beim umgekehrten Bilde bedeutender als beim emmetropischen Auge.

Die Vergrösserung im umgekehrten Bilde ist bei den verschiedensten Refractionszuständen immer geringer als im aufrechten Bilde. So wurde sie bei einer Convexlinse von 20 *D* bei Emmetropie auf 3·6mal berechnet.

Beim emmetropischen Auge bleibt es sich ganz gleich, wie gross die Distanz der Convexlinse vom untersuchten Auge ist. Die aus

dem Auge herauskommenden Strahlen sind immer parallel und das Bild entsteht immer im Brennpunkte der Linse. Wohl aber macht bei Hypermetropie und Myopie die Entfernung, in der man die Linse vom untersuchten Auge hält, einen Unterschied.

Wir sahen, dass beim myopischen Auge das durch die dioptrischen Medien erzeugte, umgekehrte Bild für die Linse der Gegenstand ist. Je weiter dieses verkehrte Bild (A) von der Linse liegt, desto kleiner ist das schliesslich entworfene Bild (denn je weiter in negativer Objectdistanz der Gegenstand von der Linse liegt, desto kleiner ist das Bild (siehe Seite 18, Punkt 8). Je näher nun die Linse am Auge des Untersuchten steht, desto weiter ist A von ihr entfernt. Durch Annäherung der Linse an das Auge wird also bei Myopie die Vergrösserung geringer, durch Entfernung stärker.

Umgekehrt verhält es sich beim hypermetropischen Auge. Je geringer die Entfernung des Gegenstandes vom Brennpunkte der Convexlinse ist, desto grösser ist das von der Linse entworfene Bild (siehe oben Seite 17, 18, Punkt 1, 2, 3, 4). Bei Hypermetropie ist das von dem dioptrischen Systeme des untersuchten Auges hinter demselben erzeugte virtuelle Bild (A_1) der Gegenstand für die Convexlinse, mit der man untersucht. Je näher ich die letztere an das untersuchte Auge halte, desto näher ist A_1 dem Brennpunkt und desto grösser ist das Bild.

Wenn man im umgekehrten Bilde ein Convexglas hinter dem Spiegel einlegt, so wird das umgekehrte Bild der Papille dadurch vergrössert. Es wirkt dieses Glas vollkommen wie das Ocular eines zusammengesetzten Mikroskops und es ist überhaupt dann die Anordnung vollkommen so wie bei diesem Instrumente, denn die vor das Auge gehaltene Convexlinse stellt das Objectiv dar.

4. Das ophthalmoskopische Gesichtsfeld.

Wenn wir vom ophthalmoskopischen Gesichtsfelde sprechen, so meinen wir zunächst die Area des Fundus, die auf einmal übersehen werden kann, dann aber soll hier auch noch im Anschlusse daran die Rede davon sein, wie weit man überhaupt die peripheren Partien des Augenhintergrundes mit dem Augenspiegel durchforschen kann.

Die Grösse der auf einmal sichtbaren Partie des Fundus hängt auch ab von der Form und der Beleuchtung des beleuchteten Netzhautfeldes. Nicht immer wird der ganze Theil des Fundus, den wir nach optischen Bedingungen sehen könnten, auch wirklich gesehen, da er nicht immer ganz beleuchtet ist. Zunächst kann unter Umständen ein ganz scharfes Bild der zur Beleuchtung verwendeten Flamme auf der Retina entstehen. Dies ist dann der Fall, wenn das Auge durch Refraction oder Accommodation auf das als Leuchtobject dienende, von dem Spiegel entworfene Flammenbild eingestellt ist. Ein Planspiegel entwirft z. B. ein Bild der Flamme, das ebensoweit hinter dem Spiegel steht als die Flamme vor dem Spiegel. Ein Concavspiegel erzeugt, je nach der Distanz der Flamme von seiner Fläche, entweder ein virtuelles, hinter ihm gelegenes, aufrechtes Bild, oder ein vor ihm gelegenes, reelles, umgekehrtes Bild. Immer muss das

untersuchte Auge auf dieses Bild eingestellt sein, wenn ein scharfes Bild der Flamme auf der Netzhaut entstehen soll. Gewöhnlich ist dies aber nicht der Fall, sondern es findet die Vereinigung der von dem Flammenbilde herkommenden Strahlen entweder vor oder hinter der Retina statt. Auf der Retina selbst entsteht also ein Flammenbild in Zerstreuungskreisen, das natürlich im Centrum gut, an der Peripherie weniger gut beleuchtet ist.

Weiter hängt das Gesichtsfeld von der Weite der Pupille ab. Bei weiterer Pupille wird man mehr vom Fundus übersehen.

Im aufrechten Bilde ist die Entfernung des Spiegels vom Auge sehr massgebend. Je näher der Spiegel dem untersuchten Auge ist, desto grösser ist das Gesichtsfeld.

Im umgekehrten Bilde dagegen hängt das Gesichtsfeld von der Entfernung der Linse vom Auge und auch von der Stärke der Linse ab. Eine stärkere Linse gibt eine schwächere Vergrösserung, wohl aber ein grösseres Gesichtsfeld. Am grössten ist bei Gebrauch derselben Linse das Gesichtsfeld aber dann, wenn ihr Brennpunkt in die Pupillarebene fällt. Dann wird die Pupille durch die Linse ad maximum vergrössert und verschwindet vollkommen aus dem Gesichtsfelde.

Im Allgemeinen übersieht man im aufrechten Bilde, wenn man das Licht auf die Papille wirft, diese selbst, aber kaum etwas Nennenswerthes von ihrer Umgebung. Beleuchtet man andere Theile des Fundus, so ist wegen der Contraction der Pupille das Gesichtsfeld oft noch kleiner. Im umgekehrten Bilde sieht man nicht nur die Papille, sondern auch einen mehr oder weniger grossen Theil des Fundus. Es gelingt mitunter, Papille und Macula zugleich zu sehen.

Durch Bewegungen des Spiegels und durch Bewegungen der Augen des Patienten gelingt es, im aufrechten und umgekehrten Bilde peripherer gelegene Theile des Fundus zu sehen. Immer kann man im umgekehrten Bilde auf diese Weise weiter nach der Peripherie gelangen als im aufrechten. Bei sehr stark seitlichem Einblick ins Auge und bei weiter Pupille kann man im umgekehrten Bilde noch die etwas vor dem Aequator gelegenen Partien untersuchen.

Mitunter erscheint innerhalb des beleuchteten Theiles der Retina eine runde schwarze Scheibe. Es ist dies das Bild der Spiegelöffnung. Es kann natürlich nur dann scharf entstehen, wenn das Auge des Patienten auf dasselbe eingestellt ist. Da dies gewöhnlich nicht der Fall ist, so greifen die Zerstreuungskreise der Ränder des Loches über die unbeleuchtete Stelle hinüber und füllen so diese Lücke im ophthalmoskopischen Gesichtsfelde aus.

5. Wahrnehmung und Berechnung von Niveaudifferenzen im Augenhintergrunde.

Mit dem Augenspiegel kann man, da ja nur mit einem Auge untersucht wird, keine directe Tiefenwahrnehmung haben. Man kann aber recht gut Niveaudifferenzen erkennen durch die parallaktische Verschiebung, indem man in verschiedener Richtung bei der Untersuchung im aufrechten Bilde ins Auge hineinblickt. Hiebei müssen sich Details, also z. B. Gefässe, die in verschiedenen Ebenen liegen,

gegeneinander verschieben. c und d (Fig. 44) wären zwei Gefässe im Querschnitt. Das eine (c) liegt auf der Spitze einer geschwollenen Papille, das andere (d) fast im Niveau der Retina. Blicken wir nun gerade mit dem Augenspiegel ins Auge hinein in der Richtung $d\,d_1$, so sehen wir die Gefässe in deutlichem Abstande voneinander. Aendert man aber die Stellung des Spiegels, so dass man in der Richtung $c_2\,d_2$ — c, also schräg ins Auge hineinsieht, so nimmt man nur ein Gefäss wahr, indem das tiefer gelegene von dem höher gelegenen verdeckt wird. In ähnlicher Weise kann man eine Excavation an den Verschiebungen der Gefässe erkennen. Während man da z. B. in gerader Richtung $a_1\,b_1$ — a ins Auge blickt, sieht man nur ein Gefäss, da das Gefäss a das tiefer liegende Gefäss b verdeckt. Beim Einblick in der Richtung a_2 a und b_2 b erscheint nun aber das tiefer gelegene Gefäss b. Hier kommen also bei einer Aenderung der Blickrichtung des Patienten Gefässe an der einen Wand der Excavation zum Vorschein, die bei der gleichen Aenderung der Blickrichtung bei einer Vorwölbung an der correspondirenden Wand derselben verschwinden.




Fig. 44.

Doch ist man auch im Stande, im aufrechten Bilde die Tiefe einer Excavation oder die Höhe einer Vorwölbung ziemlich genau zu messen. Mit Hilfe des reducirten Auges von Listing (siehe oben Seite 30) können wir sehr leicht annähernd berechnen, welcher Grad von Myopie dadurch erzeugt wird, dass z. B. die Retina in einem emmetropischen Auge um 1 *mm* nach hinten rückt. Wir haben früher (Seite 26) gesehen, dass $l_1\,l_2 = F_1\,F_2$. Im reducirten Auge ist $F_1 = 15$, $F_2 = 20$ *mm*. Rückt die Retina um 1 *mm* nach rückwärts und entsteht auf ihr von einem vor dem Auge gelegenen Gegenstande ein Bild, so ist $l_2 = 1$ *mm*. Es lässt sich also l_1 finden: $l_1 = F_1\,F_2 = 15.20 = 300$. Die Strahlen, die auf l_2 der Retina in einem solchen Auge sich vereinigen sollen, müssen von einem Punkte kommen, der 300 *mm* oder 30 *cm* vor dem Auge liegt. Ein solches Auge hat aber eine Myopie von 3 *D*. Wir können daraus schliessen, dass einer Refractionsdifferenz von 3 *D* eine Niveaudifferenz von 1 *mm* entspricht. Erblicken wir also in einem emmetropischen Auge erst mit — 3 *D* die Gefässe in der Gegend der Excavation, so ist die Tiefe derselben 1 *mm*. Zeigt sich z. B. auf der Papille eine Hypermetropie von 3 *D*, während der Fundus emmetropisch ist, so ist die Papille 1 *mm* hoch geschwollen. Im Allgemeinen hat also eine Excavation im emmetropischen Auge myopische Einstellung, während auf einer Erhabenheit hypermetropische Refraction zu finden ist. Ist in einem myopischen Auge eine Excavation da, so ist an dieser Stelle stärkere Myopie vorhanden. Im hypermetropischen Auge ist der Grund einer Excavation weniger hypermetropisch, emmetropisch oder selbst myopisch, eine Erhabenheit dagegen immer stärker hypermetropisch. Diese Messung einer Niveaudifferenz ist besonders wichtig, wenn es sich darum handelt, nachzuweisen, ob eine Erhebung oder Vertiefung an Höhe oder Tiefe zu- oder abgenommen hat.

Auch im umgekehrten Bilde ist man im Stande, Niveaudifferenzen nachzuweisen, doch gelingt dabei eine genauere Messung derselben nicht. In Fig. 45 entwirft eine Convexlinse von den Punkten a und b in a_1 und b_1 Bilder. Das Bild des näher der Linse gelegenen Punktes a entsteht weiter von der Linse entfernt (siehe Seite 17, 18, Punkt 1, 2, 3, 4). Verschieben wir nun die Linse in der Richtung des Pfeiles, so entstehen jetzt die Bilder von a und b in a_2 und b_2. Wir finden den Ort derselben leicht, indem wir die Richtungsstrahlen durch das optische Centrum der Linse ziehen. Das Bild des Punktes a, der näher an der Linse liegt, hat, wie wir sehen, eine grössere Excursion gemacht als das Bild von b. Daraus folgt: Ist eine Niveaudifferenz im Fundus vorhanden, so machen im umgekehrten Bilde bei seitlichen Bewegungen der Convexlinse die Bilder derjenigen Theile, die weiter nach vorne liegen, ausgiebigere Bewegungen als die Bilder der weiter hinten befindlichen Partien. Es machen also bei einer Excavation die Gefässe am Rande derselben grössere Excursionen als die in der Tiefe, umgekehrt müssen bei einer Erhebung, z. B. einer Neuritis, die Gefässe am Gipfel der Vorwölbung sich weiter bewegen, als die Gefässe im Fundus. Diese parallaktische Verschiebung im umgekehrten Bilde erscheint allerdings nur deutlich bei einem etwas bedeutenderen Unterschiede im Niveau.




Fig. 45.

III. Capitel.

Die Refractionsbestimmung.

Man ist im Stande, mit dem Augenspiegel in vollkommen objectiver Weise die Refraction eines Auges im Zustande der Accommodationsruhe zu bestimmen, also die Refraction, wie sie dem Baue des Auges entspricht. Hiedurch ist man in den Stand gesetzt, die mit den Sehproben gewonnenen Resultate zu controliren. Es ist dies eine dringende Nothwendigkeit und darf von keinem Arzte bei Verschreibung der Brillen versäumt werden, denn nur so kann man etwaige Irrthümer, die durch das Dazwischentreten der Accommodation verursacht werden, vermeiden. Nur ein Beispiel: Man findet z. B., dass ein Patient durch Vorsetzen eines Concavglases von 5 *D* für die Ferne corrigirt wird. In der That würde ihn aber ein viel schwächeres Glas corrigiren, wenn nicht durch einen Krampf des Ciliarmuskels eine stärkere Myopie vorgetäuscht würde. Die wirkliche, durch den Bau des Auges bedingte Myopie kann man aber messen, wenn man mittelst des Augenspiegels die Refraction bestimmt. Würde man dem betreffenden Individuum das Concavglas, welches man bei den Sehproben gefunden hat, zum Gebrauche empfehlen, so würde man das Auge thatsächlich übercorrigiren und den bestehenden Accommodationskrampf nur unterstützen. Weiter kann man selbst an schlecht sehenden oder ganz amaurotischen Augen, dann bei Kindern die Refraction mit dem Augenspiegel bestimmen. Man ist ja von den Angaben des Patienten ganz unabhängig.

Man kann die Refraction mit dem Augenspiegel auf dreierlei Art bestimmen: 1. Im aufrechten Bilde. 2. Im umgekehrten Bilde. 3. Mittels der Retinoskopie.

1. Bestimmung von E, M, H im aufrechten Bilde.

Um die bei dieser Bestimmungsmethode vorkommenden Verhältnisse möglichst einfach zu gestalten, wollen wir zunächst zwei Voraussetzungen machen: 1. Wir wollen supponiren, dass weder der Patient noch der Arzt accommodiren. Es sollen sich also beide Augen im vollständigen Ruhezustand befinden. 2. Wollen wir vorerst die Entfernung, die nothwendigerweise der Spiegel vom Auge des Patienten

haben muss, vernachlässigen. Erst später soll auf die Bedeutung dieser zwei Momente und auf die durch sie gegebenen Modificationen eingegangen werden.

Die bei der Untersuchung im aufrechten Bilde möglichen Fälle sind in folgenden drei Reihen erschöpft, wobei immer die Refraction des Arztes links, der Refractionszustand des Patienten rechts hinter der Klammer angemerkt ist.

I.		II.		III.	
E	E	M	E	H	E
	M		M		M
	H		H		H

Wir wollen nun in Folgendem alle diese Fälle durchnehmen. Vorher soll noch an das erinnert werden, was Seite 29 über die Wirkung von Linsen gesagt wurde.

I. Der Arzt ist Emmetrop.

1. Der Arzt ist Emmetrop, der Kranke ebenfalls Emmetrop (Fig. 46). *)

In diesem Falle sieht der Arzt ohne Glas. Aus dem Umstande, dass er das Auge eines Patienten ohne Glas gut sieht, erkennt der emmetropische Arzt, dass das Auge des Kranken ebenfalls emmetropisch ist.




Fig. 46.

2. Der Arzt ist Emmetrop, der Kranke Myop (Fig. 47).

Hier bedarf der Erstere eines optischen Hilfsmittels. Ein emmetropisches Auge kann ja im Zustande der Accommodationsruhe nur parallele Strahlen auf seiner Retina vereinigen. Die aus dem myopischen Auge hervortretenden Strahlen sind aber convergent. Sie müssen also durch Vorsetzen eines Concavglases parallel gemacht werden. Was haben wir also für eine Linse vorzusetzen? Eine solche, die parallele Strahlen so divergent macht, dass sie vom Fernpunkte r des untersuchten Auges herzukommen scheinen. Die vorgelegte Linse entspricht also der Myopie des untersuchten Auges. Braucht man z. B. concav 3 *D*, um den Fundus eines Auges deutlich zu sehen, so schliesst man hieraus, das untersuchte Auge habe eine Myopie von 3 *D*.




Fig. 47.

3. Der Arzt ist Emmetrop, der Kranke Hypermetrop (Fig. 48).

*) In den Fig. 46 bis 58 ist mit A das Auge des Arztes, mit K das Auge des Kranken bezeichnet. Die Contouren des letzteren sowie die dasselbe verlassenden Strahlen sind punktirt gezeichnet, während das Auge des Arztes und die in dasselbe eindringenden Strahlen durch ausgezogene Linien dargestellt sind; S P ist der Spiegel. Mit E, M und H ist die Refraction sowohl im Auge A als im Auge K eingezeichnet. Unter den Correctionsgläsern steht ihre Stärke in D; R ist der Fernpunkt von A, r der Fernpunkt von K.

Auch in diesem Falle muss sich der Arzt einer Linse, und zwar einer Convexlinse bedienen. Die Strahlen, die aus dem untersuchten Auge hervortreten, sind divergent, und zwar divergiren sie von einem Punkte, der in endlichem Abstande hinter der Netzhaut des Auges liegt. Dies ist der Fernpunkt (r) des Auges, der Punkt, nach dem die Strahlen convergiren müssen, damit sie mittels des dioptrischen Apparates des Auges auf der Retina zu einem scharfen Bilde gesammelt werden. Man muss also eine Convexlinse zu Hilfe nehmen, welche die aus dem Auge austretenden divergenten Strahlen parallel macht, denn erst dann kann sie der Emmetrop auf seiner Netzhaut vereinigen. Das Convexglas muss natürlich auch andererseits parallele auf dasselbe auffallende Strahlen so convergent machen, dass sie gegen den Fernpunkt des untersuchten Auges gerichtet sind. Das ist aber dasjenige Glas, das die Hypermetropie des Auges corrigirt. Sieht also ein emmetropischer Arzt das Auge eines Patienten erst mittels eines Convexglases, so ist der Kranke hypermetropisch und die vorgesetzte Linse gibt die Stärke der Hypermetropie an.




Fig. 48.

II. Der Arzt ist Myop.

1. Der Arzt ist Myop, der Kranke Emmetrop (Fig. 49).

Da muss der Arzt eine Linse nehmen, die parallele Strahlen so divergent macht, dass sie von dem Fernpunkte seines Auges herzukommen scheinen, d. h. er muss seine Myopie corrigiren. Sieht also ein myopischer Untersucher mit seinem Correctionsglase den Fundus eines Auges deutlich, so ist das untersuchte Auge emmetropisch.




Fig. 49.

2. Der Arzt und der Kranke sind myopisch (Fig. 50).




Fig. 50.

In diesem Falle muss der Arzt die aus dem Auge kommenden convergenten Strahlen durch Vorsetzen eines Concavglases divergent

machen, und zwar so divergent, dass sie von seinem Fernpunkte herzukommen scheinen. Es ist nun ganz klar, dass diese Linse stärker sein muss als die, welche die Myopie des Untersuchers corrigirt. Denn um dies zu erreichen, braucht man blos eine Linse zu wählen, die parallele Strahlen divergent macht. Hier müssen aber convergente Strahlen divergent gemacht werden. Die dazu nöthige Linse übertrifft an Stärke umsomehr die Myopie des Arztes, je stärker die Myopie des Kranken ist. Sieht somit ein Untersucher, der Myopie (z. B. 3 *D*) hat, nur unter Zuhilfenahme eines Concavglases (5 *D*), welches stärker ist als das seine Myopie corrigende, so ist der Patient ebenfalls Myop und der Untersucher erfährt den Grad der Myopie des untersuchten Auges (2 *D*), wenn er von dem gebrauchten Glase seine eigene Myopie abzieht (5 — 3 = 2).

3. Der Arzt ist Myop, der Patient Hypermetrop.

Es kann die Myopie des Arztes gleich, stärker oder schwächer sein als die Hypermetropie des Kranken; drei Fälle, die gesondert behandelt werden müssen.

a) Die Myopie des Arztes und die Hypermetropie des Kranken sind gleich (Fig. 51).

In diesem Falle fällt der Fernpunkt des myopischen Auges, der in gewisser Entfernung vor dem Auge liegt, mit dem Fernpunkt des hypermetropischen Auges zusammen. Der Arzt kann also die aus seinem Fernpunkte herkommenden Strahlen sehr leicht ohne optisches Hilfsmittel auf seiner Netzhaut vereinigen. Sieht ein myopischer Untersucher ohne Correctionsglas den Fundus des untersuchten Auges deutlich, so ist der Untersuchte gerade so stark hypermetropisch als der Untersucher myopisch.




Fig. 51.

b) Der Untersucher ist stärker myopisch als der Patient hypermetropisch (Fig. 52).




Fig. 52.

Es liegt dann der Fernpunkt des myopischen Untersuchers näher an diesem Auge als der Fernpunkt des untersuchten hypermetropischen Auges. Denn je schwächer die Hypermetropie eines Auges ist, desto weiter liegt der Fernpunkt hinter der Retina desselben. Der myopische Arzt muss also in einem solchen Falle seinen Fernpunkt auf eine grössere Distanz hinaus verlegen, er muss demnach seine Myopie verringern, aber nicht corrigiren. Er braucht sich ja nicht für

parallele, sondern auch nur für divergente Strahlen einzustellen — divergente Strahlen, die aber von einem Punkte divergiren, der weiter entfernt liegt als sein Fernpunkt. Wenn ein myopischer Arzt ein schwächeres Glas braucht als das, welches seine Myopie corrigirt, so ist der Kranke hypermetropisch und er erfährt die Hypermetropie des Patienten, wenn er von seiner Myopie das gebrauchte Concavglas subtrahirt.

c) Der Arzt ist schwächer myopisch als der Patient hypermetropisch (Fig. 53).

Hier liegt natürlich der Fernpunkt des Arztes in viel grösserer Entfernung vor seinem Auge als der Fernpunkt des Kranken. Um sich also für die Strahlen einzustellen, die von dem Fernpunkte des untersuchten Auges herkommen, muss er sich ein Convexglas vorsetzen. Nun ist er stärker myopisch. Ein myopischer Untersucher, der nur mit Hilfe einer Convexlinse ein bestimmtes Auge untersuchen kann, schliesst daraus, dass der Untersuchte Hypermetrop ist. Er erfährt den Grad der Hypermetropie, wenn er zu der eigenen Myopie die Convexlinse addirt.




Fig. 53.

III. Der Arzt ist Hypermetrop.

1. Der Arzt ist Hypermetrop, der Kranke Emmetrop (Fig. 54).




Fig. 54.

Der Untersucher muss hiebei einfach seine Hypermetropie corrigiren. Er muss die Convexlinse vorsetzen, die parallele Strahlen so convergent macht, dass sie gegen den Fernpunkt seines Auges gerichtet sind. Ein hypermetropischer Untersucher, der mit der seine Hypermetropie corrigirenden Linse deutlich sieht, weiss, dass der Kranke Emmetrop ist.

2. Der Arzt ist Hypermetrop, der Kranke Myop.

Da sind ganz ähnliche drei Fälle möglich wie bei II, 3. Es kann die Hypermetropie des Arztes gleich, stärker oder schwächer sein als die Myopie des Patienten.

a) Die Hypermetropie des Arztes und die Myopie des Kranken sind gleich (Fig. 55).

Hier fallen die beiden Fernpunkte zusammen, der Untersucher sieht also ohne Correctionslinse. Aus dem Umstande, dass man als Hypermetrop ohne Correctionslinse ein Auge untersuchen kann, schliesst

man, dass dasselbe eine ebenso starke Myopie hat, als die eigene Hypermetropie beträgt.




Fig. 55.

b) Der Arzt ist stärker hypermetropisch als der Kranke myopisch (Fig. 56).

Jetzt muss der Arzt sich durch Vorlegen einer Convexlinse schwächer hypermetropisch machen. Er muss die nach einem ferneren




Fig. 56.

Punkte convergirenden Strahlen durch diese Linse nach seinem Fernpunkte convergiren machen. Hiebei darf er natürlich nicht seine Hypermetropie corrigiren, sondern muss ein schwächeres Glas nehmen. Sieht demnach ein hypermetropischer Untersucher mit Hilfe einer Convexlinse, die schwächer ist als die, welche ihn corrigirt, so ist der Patient Myop und der Arzt erfährt die Myopie, wenn er von seiner Hypermetropie die Convexlinse abzieht.

c) Der Arzt ist schwächer hypermetropisch als der Kranke myopisch (Fig. 57).




Fig. 57.

In diesem Falle muss der Arzt seine Hypermetropie durch eine Concavlinse verstärken. Die stark convergirenden Strahlen werden durch die Linse weniger convergent gemacht, so dass sie gegen den weiter gelegenen Fernpunkt des hypermetropischen Auges gerichtet sind. Dasselbe hat jetzt seinen Fernpunkt auch in r, ist also stärker hypermetropisch. Sieht ein hypermetropischer Arzt blos mit Hilfe

eines Concavglases den Fundus eines Auges, so ist dieses letztere myopisch. Der Grad der Myopie ist gleich der Hypermetropie des Untersuchers plus dem Concavglase.

3. Der Arzt und der Kranke sind Hypermetropen (Fig. 58).




Fig. 58.

Es müssen die aus dem untersuchten Auge kommenden divergenten Strahlen durch eine Convexlinse convergent gemacht werden. Die dazu nöthige Convexlinse muss stärker sein als die Hypermetropie des Patienten. Sieht ein hypermetropischer Arzt das Auge eines Patienten blos mit einer Convexlinse deutlich, die stärker ist als die seiner Hypermetropie entsprechende, so ist der Kranke ebenfalls hypermetropisch und der Arzt erfährt die Hypermetropie des Patienten, wenn er von der Correctionslinse seine Hypermetropie abzieht.

Hiemit wären sämmtliche Fälle, die sich bei der Untersuchung im aufrechten Bilde die Refraction von Arzt und Patienten betreffend ereignen können, besprochen und es erübrigt nun noch auf die eingangs gemachten Voraussetzungen bezüglich der Accommodation und bezüglich der Entfernung zwischen beiden Augen zurückzukommen.

Was die Accommodation betrifft, so ist es allerdings nothwendig, dass bei der Refractionsbestimmung im aufrechten Bilde Arzt und Patient gar nicht accommodiren. Der Letztere gibt wohl sehr leicht seine Accommodation auf, wenn man ihn im dunkeln Zimmer untersucht, wo er keinen Gegenstand zum Fixiren hat. Schwieriger ist es dagegen, die Accommodation des Untersuchers auszuschalten. Einmal kommt in dieser Beziehung schon der Refractionszustand in Betracht. Ist der Beobachter Emmetrop, so wird er nicht so leicht seine Accommodation aufzugeben im Stande sein, als wenn er Myop ist. Ein Myop mittleren oder stärkeren Grades betrachtet ja nahe gelegene Gegenstände einfach in seinem Fernpunkte, ohne zu accommodiren. Am allerschwersten wird es einem Hypermetropen fallen, sich die Accommodation beim Ophthalmoskopiren vollständig abzugewöhnen. Ein Hypermetrop muss ja für die Entfernung bereits accommodiren. Es genügt also nicht, dass er seine Accommodation so weit erschlaffen lasse, bis er entfernte Gegenstände wahrnehmen kann.

Fast jeder Anfänger accommodirt bei der Untersuchung im aufrechten Bilde ziemlich stark. Man weiss den Gegenstand in grosser Nähe hinter der Pupille und strengt in Folge dessen unwillkürlich seine Accommodation an, obzwar man dadurch das Gegentheil dessen erreicht, was man erreichen will. Man sieht nämlich jetzt nur undeutlich oder gar nicht. Selbst Myopen vermehren mitunter noch durch Accommodation ihre Myopie. Es ist wohl am besten, beim

Ophthalmoskopiren so zu blicken, als ob man einen sehr fernen Gegenstand betrachten wollte. Das meiste muss dabei wohl die Uebung machen. Sollte man im Anfange accommodiren, so dass man sich als Emmetrop bei emmetropischen Augen durch Vorlegen eines Concavglases corrigiren muss, so suche man nach und nach zu immer schwächeren Linsen überzugehen und trachte dieselben schliesslich vollkommen abzulegen.

Wohl gibt es Leute, die stets vollständig durch das Muskelgefühl darüber orientirt sind, ob sie accommodiren oder nicht. Ja Manche bringen es sogar so weit, dass sie annähernd anzugeben vermögen, wie stark sie accommodiren. Wer aber nicht im Stande ist, auf diese Weise zu erfahren, ob er accommodirt, der muss sich auf andere Weise helfen. Auf hohe Grade von Hypermetropie wird ein emmetropischer Arzt schon dadurch aufmerksam, dass er, wie wir früher angegeben haben, aus grösserer Entfernung die ganze Papille sieht, wobei er Myopie von Hypermetropie auf die oben (Seite 45) beschriebene Weise unterscheidet. Nähert man sich nun, nachdem man aus grösserer Entfernung die Papille gesehen hat, dem Auge, so bleibt das Bild deutlich. Dies ist natürlich nur dadurch ermöglicht, dass man, je mehr man sich annähert, desto stärker accommodirt. Das geschieht ganz unwillkürlich, indem man eben immer das Bild scharf zu erhalten trachtet. Bei geringen Graden von Hypermetropie ist aber dieses Symptom nicht vorhanden. Hier übersieht man den Fundus erst, wenn man ziemlich nahe ist. In diesem Falle muss man, um zu erkennen, ob Hypermetropie da ist, die schwächste Convexlinse (0·5 *D*) in den Spiegel einlegen. Sieht man durch diese die Details aus der Nähe ebenfalls deutlich, so ist bewiesen, dass das untersuchte Auge hypermetropisch ist. Denn wäre dasselbe emmetropisch, so würden die aus dem Auge parallel herauskommenden Strahlen durch die Linse convergent und könnten nicht mehr auf der Retina des emmetropischen Untersuchers zur Vereinigung gelangen. Sieht man nun durch dieses schwächste Convexglas deutlich, so nehme man das nächst stärkere und steige so hoch als möglich. Die stärkste Convexlinse, mit der man noch sieht, ist dann das Mass für die Hypermetropie. Würde man nicht die stärkste Linse als Mass annehmen, so würde man keine richtige Bestimmung bekommen. Man sieht wohl mit einem schwächeren Glase ebenfalls, doch wird ein Theil der Hypermetropie des Patienten durch die Accommodation des Beobachters gedeckt.

Man muss also, wenn man Emmetrop ist und den Fundus eines Auges ohne Correctionslinse deutlich sieht, immer noch Convexlinsen versuchen. Auch als Hypermetrop oder Myop muss man, sobald man ohne Glas sieht, noch Convexlinsen einlegen, um zu sehen, ob man nicht auch mit diesen deutlich sieht (siehe die Fälle II, 3 c und III, 2 b). Umgekehrt muss man bei Myopie vorgehen, wo man als Emmetrop ein Concavglas braucht. Hier muss man die schwächste Linse nehmen, mit der man noch deutlich sieht. Stärkere Linsen geben auch ein gutes Bild, doch muss man die durch das zu starke Glas bewirkte zu bedeutende Divergenz der Strahlen durch die eigene Accommodation überwinden.

Bei der Refractionsbestimmung gilt also im allgemeinen die Regel, dass man, sobald man eine Concavlinse braucht, die

schwächste nehmen soll, mit der man noch scharf sehen kann. Benützt man eine Convexlinse, so muss die stärkste genommen werden. Nur dann bekommt man eine richtige Bestimmung. Dies ist auch für die Fälle anzuwenden, wo ein hypermetropischer oder ein myopischer Untersucher Convex- oder Concavlinsen benöthigt.

Bei der Refractionsbestimmung ist es wünschenswerth, dass man die Linse im Spiegel rasch wechseln könne. Man soll, ohne den Spiegel vom Auge zu entfernen, im Stande sein, andere Linsen vorzuschieben. Besonders bei Hypermetropie ist dies deshalb wichtig, weil man am sichersten seine Accommodation entspannt, wenn man, fort durch die Linsen blickend, successive immer stärkere Linsen vorsetzt. Sieht man endlich mit einem Convexglase nicht mehr scharf, so geht man um einige Nummern zurück und sucht dann wieder womöglich höher als früher zu steigen.

Es fragt sich nun, nach welchen Theilen des Fundus man sich bei der Refractionsbestimmung zu richten habe. Vor Allem muss man natürlich durch das vorgesetzte Glas ein scharfes Bild zu erhalten suchen. Man kann ja selbst bei höheren Graden von Myopie im aufrechten Bilde noch undeutlich die Papille und die Gefässe wahrnehmen. Damit darf man sich nun nicht begnügen, sondern man muss so lange andere Linsen vorsetzen, bis man vollkommen scharf sieht. Es handelt sich weiter darum, welche Gefässe man zur Richtschnur nehmen soll. Eigentlich sollte man die Refraction in der Gegend der Macula bestimmen. Nun aber findet sich gerade in dieser Gegend so wenig vor, auf was man scharf einstellen könnte. Es sind ja daselbst keine ophthalmoskopisch sichtbaren Gefässe vorhanden. Ausserdem ist die Untersuchung gerade dort sehr schwierig und durch die Verengerung der Pupille erschwert. Die Papille selbst zeigt aber nicht immer die gleichen Niveauverhältnisse. Oefters ist ein Theil etwas mehr prominent als ein anderer. Es ist also die Refraction für diese Theile auch verschieden. Sehr häufig ist die äussere Hälfte der Papille etwas flacher, die innere ragt etwas mehr hervor. Wollte man auf der letzteren die Refraction bestimmen, so würde man zu starke Hypermetropie oder zu schwache Myopie finden. Es ist daher wohl das beste, sich nach den kleinen Gefässchen zu richten, die über den äusseren Rand der Papille in der Richtung gegen die Macula zu verlaufen. Selbst bei dieser Art der Bestimmung kann man, wenn auch allerdings in seltenen Fällen, einen Fehler machen, indem die Refraction auf der Papille und in der Gegend der Macula einen ziemlich bedeutenden Refractionsunterschied zwischen 1 bis 1·5 *D* zeigen kann. In Fällen, wo man dies vermuthet, muss man die Refraction mitunter nach vorhergehender Erweiterung der Pupille an den kleinen Gefässen bestimmen, die zunächst der Maculagegend liegen.

Noch hätten wir die zweite Voraussetzung zu besprechen, nämlich jene bezüglich der Entfernung zwischen beiden Augen. Wir haben schon in der optischen Einleitung (Seite 29, 30) auseinandergesetzt, dass die Linse, welche man vor ein Auge setzt, um Hypermetropie oder Myopie zu corrigiren, nicht genau der Refraction des betreffenden Auges entspricht, vielmehr ist die Myopie immer schwächer, die Hypermetropie immer stärker als das Glas. Nun aber vernachlässigt man

doch meistens diesen Fehler und sagt: ein Auge habe 6 *D* Myopie, wenn es durch Vorsetzen einer Concavlinse von 6 *D* corrigirt wird. Wenn wir nun bei der Untersuchung im aufrechten Bilde möglichst nahe an das zu untersuchende Auge herangehen, so werden wir nahezu dieselben Resultate bekommen, wie bei den Sehproben durch Vorsetzen von Correctionsgläsern. Bei einiger Uebung kann man ja wirklich mit dem Augenspiegel fast so nahe an das Auge kommen, als man die Correctionsgläser vorsetzt. Allerdings, je höhergradig die Refractionsanomalie ist, desto schwieriger wird die Bestimmung derselben werden. Denn bei geringer Annäherung oder Entfernung vom Auge wird es bereits nöthig sein, schwächere oder stärkere Linsen zu nehmen. Nun entfällt aber bei sehr hohen Graden von Myopie ohnehin die Refractionsbestimmung im aufrechten Bilde, da ja selbst die Untersuchung solcher Augen mittels dieser Methode auf sehr erhebliche Schwierigkeiten stöss (siehe Seite 44).

2. Refractionsbestimmung von E, M und H im umgekehrten Bilde.

Ob *E*, *M* oder *H* da ist, kann man im umgekehrten Bilde auf folgende Weise erfahren (siehe Seite 58): Man entwerfe das umgekehrte Bild zuerst auf die gewöhnliche Weise, wobei man die Convexlinse sehr nahe an das untersuchte Auge halten soll. Hierauf entferne man die Linse allmählich vom Auge des Patienten. Man wird hiebei Folgendes beobachten:

1. Bei *E* wird die Papille bei den verschiedensten Entfernungen der Linse vom Auge gleich gross bleiben.
2. Bei *M* wird das Bild der Papille bei Entfernung der Linse vom Auge immer grösser.
3. Bei *H* wird, je weiter man die Convexlinse vom Auge hält, die Papille desto kleiner.

Wir haben oben bereits gesehen, dass die Untersuchung im aufrechten Bilde bei sehr hochgradiger Myopie des untersuchten Auges nicht gut möglich ist und auch die Gründe dafür auseinandergesetzt. In solchen Fällen muss natürlich die Refractionsbestimmung auch auf eine andere Weise bewerkstelligt werden. Es gelingt dies mittels des umgekehrten Bildes.

Bei hochgradiger Myopie sieht man auch ohne Vorsetzen eines Convexglases bereits aus grösserer Entfernung den Fundus des Auges, und zwar das umgekehrte Bild desselben. Wir wollen nun voraussetzen, dass der Untersucher selbst Myop ist. Dann kann es nur eine bestimmte grösste Entfernung geben, in welcher derselbe das umgekehrte Bild des Fundus sieht. Diese Entfernung wird durch den Abstand des Fernpunktes vom Auge des Arztes bestimmt. Entfernt sich nämlich der Untersucher so weit vom untersuchten Auge, dass das umgekehrte Bild des Fundus ausserhalb seines Fernpunktes liegt, dann kann er es nicht mehr wahrnehmen. Die grösste Entfernung zwischen beiden Augen, bei der noch die Details des Fundus gesehen werden können, muss also gleich sein der Summe der Fernpunktabstände beider Augen oder gleich der Summe beider Myopiegrade. Hat der Patient (Fig. 59) 10 *D* Myopie, so entsteht in 10 *cm* vor seinem Auge das umgekehrte Bild des Fundus. Hat der Untersucher eine Myopie von

5 *D*, so liegt sein Fernpunkt 20 *cm* vor dem Auge. Der Arzt sieht also das umgekehrte Bild nur dann, wenn die Entfernung zwischen beiden Augen höchstens 30 *cm* beträgt. Ist sie grösser, so sieht er




Fig. 59.

nichts mehr, denn nun liegt das Bild ausserhalb seines Fernpunktes. Es braucht der Untersucher also nur die grösste Entfernung zu suchen, in der er die Details des Fundus noch sieht und dann mit einem Massstabe möglichst genau von einer dritten Person die Entfernung beider Augen voneinander messen zu lassen. Von dieser braucht er nur den eigenen Fernpunktsabstand zu subtrahiren und es bleibt die Entfernung, in der das umgekehrte Bild vom dioptrischen Systeme des untersuchten Auges vor demselben entworfen wird. Damit erfährt man ja sogleich die Myopie des betreffenden Auges. So gelingt es also ziemlich einfach, den Grad der Myopie des untersuchten Auges zu bestimmen, wenn der Untersucher selbst myopisch ist.

Wie geht man aber vor, wenn man nicht myopisch ist? Man greift dann zu dem einfachen Auskunftsmittel, sich selbst myopisch zu machen. Wenn der Arzt z. B. Emmetrop ist und er setzt sich convex 5 *D* vor, so bekommt er eine Myopie von 5 *D*. Das heisst, wenn er nicht accommodirt, so ist er für Strahlen eingestellt, die von einem 20 *cm* vor der Linse gelegenen Punkte herkommen. Jetzt kann er also die Messung ganz in derselben Weise vornehmen, als ob er wirklich eine Myopie von 5 *D* hätte. Gemessen wird hier vom Spiegel bis zum untersuchten Auge. Nun ist man allerdings nicht sicher, ob man nicht auch bei Benützung der Convexlinse etwas accommodirt und dadurch die Myopie steigert Es dürfte also gerathen sein, empirisch zu bestimmen, welches die grösste Entfernung ist, in welcher man mit dem betreffenden Convexglase noch lesen kann.

Diese Art der Refractionsbestimmung für hochgradige Myopie ist nicht ganz leicht auszuführen. Es ist nämlich ziemlich schwierig, genau die grösste Entfernung zu bestimmen, in der man noch die Gefässe und die Details des Fundus deutlich wahrnimmt. Man muss sich wiederholt mit dem Spiegel wieder annähern und dann wieder entfernen, um möglichst genau den weitesten Punkt bestimmen zu können. Auch ist zu erwähnen, dass die Messung sehr sorgfältig vorzunehmen ist. Man legt das eine Ende des Massstabes am besten am äusseren Orbitalrand an, wobei man ungefähr die Entfernung des Fernpunktes vom Knotenpunkt des Auges, also die wahre Myopie bekommt. Die Messung muss also nicht erst wie bei der Untersuchung im aufrechten Bilde corrigirt werden, wenn man nicht blos das Correctionsglas, sondern die wirkliche Myopie erfahren will.

Es gibt noch eine andere Art der Refractionsbestimmung im umgekehrten Bilde, die von Schmidt-Rimpler angegeben wurde. Das Flammenbild, das bei der Untersuchung des Auges im umgekehrten Bilde zwischen Spiegel und Convexlinse entsteht, gibt die Lichtquelle für die Beleuchtung des Fundus ab. Es ist nun in gewissen Fällen möglich, dass von diesem Flammenbilde ein scharfes Bild auf der Netzhaut des untersuchten Auges entsteht. Dies geschieht dann, wenn der Punkt im Raume (Fig. 60 a_1), wo jenes Flammenbild




Fig. 60.

von dem Spiegel (S_1 P_1) entworfen wird, und die Retina des untersuchten Auges conjugirte Brennpunkte für das optische System sind, das aus der Convexlinse und dem dioptrischen Apparate des untersuchten Auges besteht. Bei einem emmetropischen Auge sind die Strahlen, die aus dem Auge herauskommen, parallel. Das umgekehrte Bild entsteht also gerade im Brennpunkte der Linse. Haben wir eine Linse von 10 *D* genommen, so liegt das Bild 10 *cm* vor der Linse. Bei Myopie ist es näher, bei Hypermetropie weiter. Gibt man der Linse eine constante Entfernung vom untersuchten Auge, so kann man aus der Entfernung, in welcher das umgekehrte Bild vor der Linse entsteht, den Grad der Ametropie berechnen. Die beste Stellung der Convexlinse ist jene, wo der Brennpunkt mit dem Knotenpunkte des untersuchten Auges zusammenfällt. Von diesem aus werden ja die Fernpunktsabstände bei Ametropie berechnet.

Nun wissen wir, dass das Product aus der Entfernung eines Gegenstandes vom vorderen Brennpunkte und der Entfernung seines Bildes vom hinteren Brennpunkte gleich ist dem Producte der beiden Brennweiten $l_1 l_2 = F_1 F_2$ (siehe Seite 27). Wenn das Auge eine Hypermetropie = 1 *D* hat, so liegt sein Fernpunkt 100 *cm* hinter dem Knotenpunkte des Auges. Strahlen, die von der Netzhaut des Auges kommen, divergiren nach ihrem Austritte aus dem Auge so, als ob sie von dem Fernpunkte herkämen. r ist 100 *cm* hinter k. Dort liegt also eigentlich der Gegenstand, von dem die Linse (b) ein Bild in a_2 entwirft. Nennen wir die unbekannte Entfernung dieses Bildes vom Brennpunkte (a_1) der Linse x, so ist offenbar nach der soeben citirten Formel $x \cdot k r = F^2$, denn k r ist die Entfernung des Gegenstandes vom hinteren Brennpunkte der Linse, der nach unserer Voraussetzung in k liegt. Da die vordere Brennweite der Linse gleich der hinteren ist, so verwandelt sich $F_1 F_2$ in F^2. Es ist nun $x = \frac{F_2}{k r} = \frac{100}{100} = 1$. Bei einer Hypermetropie von 2 *D* ist k r = 50,

x also $= \frac{100}{50} = 2$, bei 3 *D H* ist k r = 33, $x = \frac{100}{33} = 3$, bei 4 *D H* ist k r = 25, $x = \frac{100}{25} = 4$ u. s. w. Kurz, mit jeder Dioptrie mehr wächst x um 1 *cm*. Bei *M* ist natürlich die Entfernung des Fernpunktes von dem Knotenpunkte (k r) negativ zu nehmen, denn Bild und Gegenstand liegen auf derselben Seite. Der Gegenstand ist jetzt das umgekehrte Bild, das ohne Intervention der Linse durch das dioptrische System des Auges gebildet wird. $x = \frac{F^2}{-(k\,r)}$. x ist also ebenfalls negativ, d. h. es liegt das Bild näher als der Brennpunkt der Linse, nämlich in a_3. Bei Myopie = 1 *D* ist nach der früheren Berechnung x = — 1, bei *M* 2 *D* x = — 2 u. s. w. Mit der Zunahme der *M* um je 1 *D* nimmt der Abstand des Bildes von der Linse immer um je 1 *cm* ab.

In der Praxis muss man also folgende Postulate erfüllen: 1. Man muss die Linse von 10 *D* in der Entfernung von 10 *cm* vom Knotenpunkte des Auges anbringen und dort fixirt erhalten. 2. Man muss x bestimmen. Wenn nun ein scharfes Bild der Flamme auf der Retina des untersuchten Auges entstehen soll, so muss das Bild der Flamme von dem Spiegel bei *E* in a_1 entstehen, a_1 und b_1 sind conjugirte Brennpunkte, in b_1 liegt die Retina des emmetropischen Auges. Hiebei hat der Spiegel die Stellung $S_1 P_1$. Bei Myopie muss der Spiegel in $S_3 P_3$ stehen, damit das scharfe Flammenbild in a_3 entsteht. Da a_3 und b_3 (die Retina des myopischen Auges) conjugirte Brennpunkte sind, so ist auch am Fundus ein scharfes Bild der Flamme. Bei *H* endlich, wo die Retina in b_2 liegt, muss sich der Spiegel in $S_2 F_2$ befinden, damit in a_2, also auch in b_2, deutliche Bilder der Flamme entworfen werden. Man findet also x, wenn man zuerst von der Entfernung des Spiegels von der Linse ($S_1 P_1 - b$, $S_2 P_2 - b$, $S_3 P_3 - b$) die Entfernung, in welcher das umgekehrte Bild der Flamme sich bei jeder Stellung des Spiegels bildet ($S_1 P_1 - a_1$, $S_2 P_2 - a_2$, $S_3 P_3 - a_3$), subtrahirt. Was man hiebei bekommt, ist $a_1 - b$, $a_2 - b$, $a_3 - b$, und die Differenz dieser Entfernung von 10 gibt x.




Fig. 61.

Schmidt-Rimpler hat nun hiezu einen einfachen Apparat*) construirt. Um zunächst das Erkennen der Schärfe des Flammenbildes leichter zu machen, wird ein feines Blechgitter (Fig. 61 k) vor der Lampe angebracht. Dahinter ist eine Convexlinse (*b*) befestigt, und zwar mittels der Schraube x an dem in Centimeter getheilten Stabe t so, dass der Brennpunkt derselben ungefähr mit dem Orte der Flamme zusammenfällt. Die von der Linse austretenden Strahlen sind also nahezu parallel. Von diesem Gitterwerk entwirft man mittels eines gut gearbeiteten Concavspiegels von 13 bis 16 *cm* Brennweite ein umgekehrtes Bild. Dieses Bild wird ins Auge geworfen und es gibt nun nur eine einzige Stellung des Spiegels, bei welcher das Bild des

*) Anmerkung. Den Apparat liefert Optiker Holzhauer in Marburg.

Gitters vom Beobachter scharf gesehen wird. Das ist diejenige Stellung, bei der das Gitterbild gerade dort entsteht, wo das umgekehrte Bild des Fundus liegt. Jetzt entsteht ein scharfes Bild des Gitters auch auf der Retina, wird von dort zurückgeworfen und gleichzeitig mit den Details des Fundus gesehen. Bei jeder Annäherung oder Entfernung des Spiegels kann man wohl das umgekehrte Bild des Fundus, nicht aber gleichzeitig ein scharfes Bild des Gitters sehen, denn jetzt entsteht auf der Retina des untersuchten Auges von dem Gitter nur ein ganz verschwommenes Bild.

Der zweite Theil des Apparates von Schmidt-Rimpler besteht in Folgendem (Fig. 62): Unter der Convexlinse c befindet sich ein




Fig. 62.

Bandmass d, das so eingerichtet ist, dass nur bei Druck auf die Feder e das Mass, welches in Centimeter getheilt ist, sich abwickeln lässt. Sobald man wieder mit dem Drucke auf die Feder e nachlässt, bleibt das herausgezogene Stück des Bandes fixirt. An dem Stabe a, welcher ebenfalls in Centimeter getheilt ist, lässt sich die Linse c sammt dem Bandmass verschieben. Die Platte p wird an dem unteren Orbitalrand angestemmt und dort festgehalten. Hierauf stellt man die Linse c so fest, dass sie 9·5 *cm* von p absteht. Dann ist die Linse ziemlich genau 10 *cm* vom Knotenpunkte des Auges entfernt. Die Linse und der ganze Apparat wird nun mit der linken Hand an den unteren Orbitalrand angedrückt erhalten. Der Daumen dieser Hand drückt auf den Knopf e, und die rechte Hand, die den Spiegel hält, kann das Bandmass, welches an den Spiegel befestigt ist, abrollen. Nun sucht man genau die Entfernung des Spiegels vom Auge, bei welcher man das Bild des Gitters deutlich in der Luft vor der Linse erblickt und hört dann auf, mit dem Daumen der linken Hand auf den Knopf e zu drücken. Dabei muss man jedoch darauf Acht haben, dass das Band nicht wieder zurückrutsche. Nun kann man den Apparat herunternehmen und die Entfernung zwischen Linse und Spiegel ablesen (also SP bis b, Fig. 60). Dabei muss man, wenn die Oeffnung des Bandmasses vor der Linse liegen sollte, diese kleine Entfernung noch dazu addiren.

Um nun x zu bestimmen, müssen wir noch die Entfernung des in der Luft entstehenden umgekehrten Gitterbildes von dem Spiegel messen. Es genügt nämlich nicht, ein- für allemal die Brennweite des Concavspiegels als Mass zu verwenden. Die von dem Gitter ausgehenden Strahlen sind nämlich nicht genau parallel, das Bild entsteht

also nicht immer genau im Brennpunkte des Spiegels. Man muss vielmehr für jede Entfernung des Spiegels von der Flamme die Entfernung des Bildes vom Spiegel bestimmen. Zu diesem Behufe muss man, während man die erste Messung abliest, den Kopf ruhig halten. Die zweite Messung macht man dann so: Man legt den Spiegel neuerdings an das eigene Auge und nähert und entfernt den Stab a vom Spiegel, indem man das Bandmass auszieht und wieder zurückfahren lässt. Dies thut man so lange, bis ein deutliches Bild des Gitters auf der Platte p_1 entsteht. Dann fixirt man das Bandmass und liest wiederum ab. Dieses Mass gibt die Entfernung $S_1 P_1$ bis a_1 oder $S_2 P_2$ bis a_2 oder $S_3 P_3$ bis a_3. Diese Zahl subtrahirt man dann von der bei der ersten Messung gefundenen. Die Differenz ist natürlich $a_1 - b$ oder $a_2 - b$ oder $a_3 - b$. Ist die letzterhaltene Zahl kleiner als 10, so besteht Myopie; ist sie grösser, so ist Hypermetropie da. Die Differenz von 10 gibt die Zahl der Dioptrien. Bei hohen Graden von *M* kann das umgekehrte Bild bereits näher als 10 *cm* vom Auge entstehen, also zwischen der Linse und dem Auge. Es ist in diesem Falle, die Zahl, die man durch Subtraction der beiden Messungsresultate erhält, grösser als 10, aber negativ. Bei 12 *D* M z. B. ergibt die erste Messung z. B. 20 *cm*, die zweite 22. Wenn ich also die zweite von der ersten subtrahire, so bleibt — 12, d. h. das umgekehrte Bild des Fundus entsteht zwischen Linse und dem untersuchten Auge, und zwar 2 *cm* von der Linse entfernt, folglich 8 *cm* vom Auge. Dies allein gibt schon die *M* 12 *D*. Damit stimmt auch das Resultat, wenn ich x berechne. x ist dann gleich 12 *cm*, denn zu den 2 *cm* kommt noch die Brennweite der Linse = 10.

Diese Methode der Refractionsbestimmung lässt sich wohl nicht so rasch ausführen wie die im aufrechten Bilde mittels eines Refractionsaugenspiegels, sie hat aber manche Vortheile. Einmal ist es möglich, auch hohe Grade von *M* auf diese Weise zu bestimmen, bei denen die Bestimmung im aufrechten Bilde bereits unmöglich ist oder wegen der schwer zu bestimmenden Entfernung des Spiegels vom Auge nicht genau ausfallen kann. Ferner ist es nicht nöthig, bei dieser Methode seine Accommodation zu entspannen. Endlich ist es leichter, die Refraction in der Maculagegend zu bestimmen. Im aufrechten Bilde hat man wegen des Gefässmangels daselbst keinen Anhaltspunkt für die Deutlichkeit des Bildes. Hier aber hat man nur die Schärfe des Gitterbildes zu beurtheilen, und dieses lässt sich sogar leichter neben als auf der Papille entwerfen, wo so viele Unebenheiten eine Verzerrung des Bildes erzeugen können. Selbst bei Nystagmus kann man die Refraction mit dieser Methode bestimmen. Ihre Genauigkeit ist nach Schmidt-Rimpler eben so gross wie die der Methode im aufrechten Bilde. Es gelingt, die Refraction mit Fehlern von nicht ganz 1 *D* zu bestimmen.

3. Bestimmung des regelmässigen Astigmatismus im aufrechten und umgekehrten Bilde.

Wir wollen zur Erläuterung der beim *As* in Betracht kommenden Verhältnisse zunächst den einfachsten Fall eines einfachen myopischen Astigmatismus (A m) — *E* im horizontalen, *M* im verticalen Meridian — annehmen.

Wir müssen bei der Besprechung der Veränderungen, die durch den *As* im Aussehen der Details des Fundus hervorgerufen werden, sowie bei der Besprechung, des Verfahrens, wie man die Art und den Grad desselben bestimmt, das aufrechte und das umgekehrte Bild streng auseinanderhalten.

Betrachten wir zunächst die Verhältnisse bei der Untersuchung im aufrechten Bilde. Wir haben früher (siehe Seite 56) gesehen, dass im myopischen Auge die Vergrösserung im aufrechten Bilde bedeutender ist als im emmetropischen. Ist also ein Auge nur in einem — wie wir angenommen haben im verticalen — Meridian myopisch, so ist diesem Meridian entsprechend auch die Vergrösserung eine bedeutendere. Die Papille erscheint also in einem solchen astigmatischen Auge, wenn sie wirklich rund ist, längsoval. Diese ovale Form nimmt zu, wenn man sich etwas mit dem Spiegel vom Auge entfernt. Dies erklärt sich aus folgendem Umstande: Blicken wir durch eine convex-cylindrische Linse (eine Linse, die in einem Meridian als Convexlinse wirkt, in dem darauf senkrechten die Strahlen ungebrochen durchlässt) auf eine runde Scheibe und halten unser Auge einige Zoll von der Linse, so erscheint die Scheibe oval, und zwar nach der Richtung des brechenden Meridians der Linse, ausgezogen. Die Strahlen, die durch den nicht brechenden Meridian der Linse herauskommen, haben keine Ablenkung erfahren. Das Netzhautbild der Scheibe hat also in dieser Richtung bei zunehmender Entfernung des Auges von der Linse an Grösse abgenommen. Nicht so aber das Netzhautbild, das von dem als Convexlinse wirksamen Meridian der Cylinderlinse entworfen wird. Dieses hat an Grösse im Verhältniss zur Entfernung zugenommen (siehe Seite 33). Das astigmatische Auge können wir uns durch ein emmetropisches Auge veranschaulichen, dem gleichsam eine convexcylindrische Linse hinzugefügt ist. Die erwähnte Erscheinung, die Zunahme der ovalen Form der Papille bei grösserer Entfernung des Spiegels vom untersuchten Auge, ist allerdings nur bei weiter Pupille gut wahrnehmbar.

Indem man nun die Papille eines astigmatischen Auges im aufrechten Bilde betrachtet, wird man noch bemerken, dass nicht alle Details auf derselben gleich deutlich erscheinen. Während die verticalen oder nahezu vertical verlaufenden Gefässe, ferner der äussere und der innere Rand der Papille ganz scharf erscheinen, sind der obere und der untere Rand der Papille, sowie die horizontalen Gefässe nur verschwommen zu sehen (J. A. Fig. 31). Die Gefässe also, die dem myopischen Meridian entsprechen, erscheinen scharf; die, welche dem emmetropischen Meridian parallel liegen, dagegen undeutlich.

Woher rührt nun diese Erscheinung? Wir betrachten zunächst (Fig. 63) die Strahlen, die von einem Punkte o des untersuchten Auges ausgehen. Die Cornea ist gleichsam im Halbprofil gezeichnet, a a ist der verticale, b b der horizontale Meridian. Die Strahlen, die, von o ausgehend, durch den horizontalen Meridian b b austreten, sind parallel. Der untersuchende Emmetrop kann dieselben also auf seiner




Fig. 63.

Netzhaut in einem Punkte wieder vereinigen. Die Strahlen aber, die, von o kommend, den verticalen Meridian passirt haben, sind convergent, denn in diesem Meridian ist ja das Auge myopisch. Durch die dioptrischen Medien des untersuchenden Auges werden diese Strahlen natürlich noch mehr convergent gemacht und überkreuzen sich vor der Retina des Untersuchers. Es entsteht also daselbst kein Punkt, sondern eine Linie m n. Das Resultalt ist, dass von jedem Punkte im Fundus des untersuchten Auges auf der Retina des Untersuchers eine senkrechte Zerstreuungslinie entsteht.

Betrachten wir nun ein senkrecht verlaufendes Gefäss im Auge des Patienten (Fig. 64, 1), so können wir uns ja die senkrechten Linien, die die Contouren des Gefässes bilden, in eine unendliche Zahl von Punkten, von denen a, b, c, d, e, f, g, h einige seien, zerlegt denken. Von jedem dieser Punkte entsteht auf der Retina des Untersuchers eine senkrechte Zerstreuungslinie (Fig. 64, 2, linke Contour). Dieselben legen sich, wenn man sämmtliche Punkte in Betracht zieht, in die man die Linie zerlegt hat, mit ihren Enden übereinander und geben so eine scharf begrenzte gerade Linie (2, rechte Contour). Das Gefässstück a b erscheint somit nur um ewas verlängert, da die Zerstreuungslinien die Endpunkte überragen müssen. Es ist nun sehr leicht, auch das Aussehen eines horizontalen Gefässstückes zu construiren. Auch hier entstehen aus den Punkten a, b, c, d, e, f, g, h (Fig. 64, 3) senkrechte Zerstreuungslinien und ebenso natürlich von jedem die horizontale Linie zusammensetzenden Punkte. Diese Zerstreuungslinien liegen aber nicht, wie bei dem Bilde eines verticalen Gefässes, zum Theil übereinander, so dass sie sich zum Theil verdecken, sondern sie liegen nebeneinander (Fig. 64, 4). Die Folge davon ist, dass die Gefässcontour nicht scharf, sondern verschwommen erscheint.




Fig. 64.

Es ist somit erklärlich, warum in einem Auge, wo der horizontale Meridian emmetropisch, der verticale myopisch ist, die verticalen Gefässe scharfbegrenzt, die horizontalen aber undeutlich aussehen.

Durch ein hinter dem Spiegel eingelegtes Concavglas (Fig. 63) können die durch den verticalen Meridian austretenden, convergenten Strahlen parallel gemacht werden. Jetzt vereinigen sie sich auf der Retina des Untersuchers zu einem Punkte. Jetzt entstehen natürlich keine verticalen Zerstreuungslinien mehr, die Contouren eines horizontalen Gefässes erscheinen scharf. Die schwächste Concavlinse, mit der man die horizontalen Gefässe sieht, gibt die Myopie im verticalen Meridian. Wir wollen nun das, was wir an dem concreten Fall auseinandergesetzt haben, verallgemeinern.

Dem Meridiane mit der stärkeren Brechkraft entsprechend erscheint die Papille ausgezogen. Also im verticalen Durchmesser verlängert: bei $A\,m$ mit M im verticalen Meridian, bei $M + A\,m$ mit stärkerer M im verticalen Meridian, bei $A\,h$ mit E im verticalen Meridian, bei $H + A\,h$ mit stärkerer H im horizontalen Meridian, und endlich bei $A\,m\,h$ oder $A\,h\,m$ mit M im verticalen Meridian. Die längsovale Form der Papille ist bei angeborenem As die gewöhnliche, denn bei

diesem ist gewöhnlich der verticale Meridian der stärker brechende. Umgekehrt erscheint natürlich die Papille queroval, wenn der horizontale Meridian der stärker brechende ist. Nicht immer liegen aber die Meridiane der stärksten und der schwächsten Krümmung horizontal und vertical, öfters auch schräg und findet dem entsprechend dann auch die Verzerrung der Papille statt. Es ist hiebei noch auf einen Umstand zu achten. Wie wir wissen, ist die Papille nicht immer vollständig rund, sondern häufig oval, und zwar häufiger längs- als queroval. Eine runde Papille wird natürlich bei stärker brechendem, verticalem Meridian längsoval erscheinen, eine querovale aber unter denselben Refractionsverhältnissen möglicherweise rund. Dass es nun der *As* ist, der die Form der Papille bedingt, kann man daran erkennen, dass die Contouren der Papille nicht nach allen Seiten hin gleich deutlich erscheinen und dass man auch nicht alle Gefässe zugleich und mit denselben Correctionslinsen deutlich sieht. Noch leichter gelingt in diesen Fällen die Diagnose des *As*, wenn man das Aussehen der Papille im aufrechten und umgekehrten Bild vergleicht, wie dies gleich erläutert werden soll.

Es gelingt nun, bis zu einem gewissen Grade auch die Refraction in den Meridianen der stärksten und schwächsten Brechkraft zu bestimmen, indem man die stärksten Convex- und die schwächsten Concavlinsen bestimmt, mit denen man noch die Gefässe, z. B. in verticaler und horizontaler Richtung, sieht. Doch kann man dabei ziemlich leicht Irrthümer begehen. Es finden sich ja nicht immer Gefässe, die so genau den Meridianen der stärksten und schwächsten Brechkraft entsprechen. Besonders bei schräger Richtung der Meridiane ist dies der Fall. Man findet, wie wir früher auseinandergesetzt haben, durch die betreffende Correctionslinse die Refraction des Meridians, der senkrecht steht, auf der Richtung des Gefässes, auf welches man einstellt.

Um uns die Verhältnisse bei der Untersuchung im umgekehrten Bilde klar zu machen, wollen wir zunächst wieder zu dem concreten Falle des einfachen myopischen *As* mit *M* im verticalen Meridian zurückkehren. Entwerfen wir hier das umgekehrte Bild auf die gewöhnliche Weise, so muss die Vergrösserung entsprechend den beiden verschieden brechenden Meridianen auch verschieden sein. Der verticale Meridian ist myopisch, folglich ist in diesem Meridiane die Vergrösserung eine geringere als im horizontalen Meridian. Die Papille erscheint also der Quere nach verzogen, sie ist queroval, wenn sie anatomisch rund ist. Die Papille erscheint so, wenn man die Convexlinse nahe vor das Auge hält. Entfernt man dieselbe aber, so nimmt die querovale Form immer mehr ab. Die Papille wird rund und schliesslich kann sie bei noch grösserer Entfernung der Linse selbst längsoval werden. Wir haben oben (siehe Seite 56) gesehen, dass bei *E* die Vergösserung gleich bleibt, mag man die Linse, mit der man das umgekehrte Bild erzeugt, nahe an das Auge halten oder weiter von demselben entfernt fixiren. Bei *M* nimmt aber mit der grösseren Entfernung der Linse vom Auge auch die Vergrösserung zu. Diese Zunahme der Vergrösserung erklärt es, warum bei grösserem Abstande der Linse vom Auge die Papille rund, später sogar längsoval wird.

Es ergeben sich also folgende allgemeine Regeln für das umgekehrte Bild: Die Papille eines astigmatischen Auges erscheint in der Richtung des schwächer brechenden Meridians in die Länge gezogen. Ist dies z. B. der verticale Meridian, so präsentirt sich eine anatomisch runde Papille im umgekehrten Bilde längsoval. Die Verziehung der Papille erfolgt also im aufrechten und umgekehrten Bilde in entgegengesetzter Richtung.

Daraus geht auch hervor, wie man z. B. eine anatomisch längsovale Papille von einer solchen unterscheidet, die durch *As* diese Form angenommen hat. Die durch *As* bedingte ovale Form muss im aufrechten und verkehrten Bilde anders aussehen. Die längere Axe des Ovals im umgekehrten Bilde muss auf der Richtung der längeren Axe im aufrechten Bilde senkrecht stehen. Diese Veränderung der Form im aufrechten und verkehrten Bilde findet bei einer anatomisch ovalen Papille natürlich nicht statt. Dieselbe behält vielmehr ihre Gestalt bei beiden Untersuchungsmethoden.

Da nun durch Abrücken der Linse vom Auge die Vergrösserung im myopischen Meridian stärker, im hypermetropischen schwächer wird, so könnte man aus der Formänderung der Papille beim Abrücken der Linse allein schon nicht blos erkennen, dass überhaupt Astigmatismus da ist, sondern man wäre auch im Stande, dessen Art zu bestimmen. In Fällen von etwas bedeutenderem *As* ist nun wohl das erstere möglich, das zweite aber wird man in praxi kaum ausführbar finden. Denn es ist äusserst schwierig, mit Sicherheit zu entscheiden, ob das Auftreten einer ovalen Form der Papille durch Verkürzung eines Durchmessers oder durch Verlängerung des darauf senkrechten entstanden ist.

Es erscheint daher wichtig, dass bei der Astigmatismusbestimmung die combinirte Untersuchung im aufrechten und umgekehrten Bilde platzgreife, wobei allerdings die Methode des aufrechten Bildes noch den Vortheil hat, dass es damit auch gelingt, den Grad des Astigmatismus sowie seine Art wenigstens annähernd zu bestimmen.

Auch mittels der Schmidt-Rimpler'schen Methode gelingt es, den *As* seiner Art und seinem Grade nach zu bestimmen. Es ist klar, dass man bei *As* für die horizontalen und die verticalen Stäbe des Gitters verschiedene Messresultate bekommen muss. Statt des Gitters kann man auch noch vortheilhafter eine Strahlenfigur anwenden. Damit bestimmt man, welcher Strahl bei der grössten und welcher bei der kleinsten Entfernung des Spiegels vom Auge deutlich erscheint. Dadurch hat man die Richtung der Meridiane herausgebracht. Es versteht sich, dass man durch Bestimmung der Refraction für einen Strahl die Refraction des darauf senkrechten Meridians findet.

4. Refractionsbestimmung mittels der Retinoskopie (Keratoskopie).

Ausser den soeben besprochenen Methoden der Refractionsbestimmung gibt es nun noch eine, die ursprünglich als Keratoskopie bezeichnet wurde, die aber besser Retinoskopie, am besten Skiaskopie (von σκια, der Schatten) genannt werden sollte.*) Nach ihrem Erfinder

*) Der Name Keratoskopie ist, da dabei die Cornea nur als ein Theil der brechenden Medien eine Rolle spielt, sehr unglücklich gewählt. Auch der Name Retino-

trägt sie auch den Namen: Cuignet's Methode. Dieselbe hat vor der Methode der Bestimmung im aufrechten Bilde das voraus, dass der Beobachter hiebei nicht seine Accommodation zu entspannen braucht. Ja es ist sogar denkbar, dass Jemand diese Art, die Refraction zu ermitteln, lernt, ohne im Ophthalmoskopiren eine nennenswerthe Uebung zu besitzen. Ferner bedarf es keines besonderen Apparates wie bei der Methode nach Schmidt-Rimpler. Die Resultate sind nicht weniger genau als die, welche man auf anderen Wegen erhält.

Das Verfahren ist in Kürze folgendes: Um sich die dabei vorkommenden Verhältnisse zu veranschaulichen, nehme man eine Convexlinse und halte sie vor einen Schirm. Das von einer seitlich vom Schirm befindlichen Lampe ausgehende Licht werfe man mittels eines Concavspiegels durch die Linse auf den Schirm. Der Spiegel muss so weit von der Linse gehalten werden, dass das umgekehrte Bild der Flamme, welches er erzeugt, noch vor der Linse zu Stande kommt. Wenn wir nun die gegenseitige Entfernung von Spiegel und Linse verändern, so werden wir eine bestimmte Stellung derselben zueinander finden, bei welcher ein deutliches und scharfes Bild der Flamme auf dem Schirm entsteht. Dies Bild ist auch sehr lichtstark. Nähern und entfernen wir jetzt die Linse vom Schirm, ohne aber die Lage des Spiegels zu ändern, so werden wir wahrnehmen, dass das Flammenbild verschwommen wird. Je mehr dies der Fall ist, desto schwächer beleuchtet erscheint das Bild.

Halten wir nun die Linse in irgend einer Entfernung vom Spiegel ruhig und drehen den Spiegel nach verschiedenen Richtungen, so wird man wahrnehmen, dass das Bild der Flamme auf dem Schirm in entgegengesetzter Richtung wandert, als sich der Spiegel bewegt.

Wir können das Gesagte sehr leicht auf das Auge übertragen. Die Linse stellt uns das dioptrische System des Auges dar, der Schirm die Retina. Wir entwerfen durch einen Concavspiegel (Fig. 65 SP) das umgekehrte Flammenbild in a zwischen dem Spiegel und




Fig. 65.

dem untersuchten Auge. Von diesem Bilde gehen Lichtstrahlen in das Auge des Untersuchten und es entsteht auf der Retina desselben in b ein deutliches oder verschwommenes Bild der Flamme, je nach-

skopie entspricht nicht vollkommen, da man bei dieser Methode die Bewegung des Flammenbildes auf der Retina, nicht aber diese selbst beobachtet. Am besten würde wohl der Name Skiaskopie entsprechen. Wirklich ist es ja ein Schatten in der Pupille und dessen Bewegungen, woraus man Schlüsse auf die Refraction des Auges zieht.

dem die Strahlen genau in der Retina oder etwas vor oder hinter ihr zur Vereinigung kommen. Ist das untersuchte Auge in Accommodationsruhe und fällt sein Fernpunkt mit a zusammen, so ist das Bild auf der Retina scharf und sehr lichtstark. Je mehr die Lage des Fernpunktes von a abweicht, desto undeutlicher und desto lichtschwächer erscheint das Bild. Drehen wir nun den Spiegel so, dass er nach $S_1 P_1$ kommt, so muss das Flammenbild von a nach a_1 wandern. Nun zeigt es sich, dass das Flammenbild auf der Retina des untersuchten Auges ebenfalls seinen Ort geändert haben muss. Es hat sich von b nach b_1 bewegt, also in der entgegengesetzten Richtung, als man den Spiegel gedreht hatte, wie es die beiden Pfeile anzeigen.

Wenn wir aber durch das Loch des Spiegels auf die Pupille des untersuchten Auges blicken, so sehen wir das Flammenbild, das auf dem Fundus entworfen wird, nicht direct vor uns, sondern wir sehen es durch den dioptrischen Apparat des untersuchten Auges. Dieser muss natürlich einen Einfluss auf die Art, wie uns das Flammenbild erscheint, haben. In manchen Fällen werden wir nämlich ein aufrechtes Bild erhalten, in anderen ein umgekehrtes. In allen jenen Fällen, wo die Strahlen, die aus dem untersuchten Auge heraustreten, sich zwischen uns und dem untersuchten Auge kreuzen, so dass an einem Punkte zwischen beiden Augen, auf den wir accommodiren können, ein umgekehrtes Bild zu Stande kommt, ist es dieses, welches wir sehen. In allen anderen Fällen sehen wir ein aufrechtes Bild. Das umgekehrte Bild macht aber auch bei einer Bewegung des Flammenbildes auf der Retina die verkehrte Excursion. Während sich also in der That das Flammenbild immer in entgegengesetzter Richtung bewegt, als man den Spiegel gedreht hat, sieht der Beobachter doch mitunter dasselbe in derselben Richtung wandern, dann nämlich, wenn er ein Auge untersucht, welches so myopisch ist, dass die aus demselben heraustretenden Strahlen sich zwischen dem Untersucher und dem Untersuchten an einer Stelle kreuzen, auf die der Erstere accommodiren kann. Er sieht eben dann ein umgekehrtes Bild des beleuchteten Theiles der Retina.

Um mittels der Retinoskopie die Refraction zu bestimmen, geht man nun in folgender Weise vor:

Der Spiegel, den man zur Retinoskopie verwendet, muss eine Brennweite von etwa 20 *cm* haben. Er soll ferner nicht zu klein sein. Man setze sich so vor den Kranken, dass die Entfernung zwischen dem Spiegel und dem zu untersuchenden Auge etwa 120 *cm* beträgt. Ist der Untersucher Myop, so muss er sich durch Vorsetzen einer Concavlinse so einstellen, dass er das Auge des Patienten aus dieser Entfernung deutlich sehen kann. Bei der Untersuchung darf das Zimmer nur von einer einzigen Lichtquelle erleuchtet sein. Die sonst auf der Cornea leicht auftretenden Reflexe stören beim Retinoskopiren sehr stark. Das Auge des Patienten muss durch einen Schirm vollständig beschattet sein, so dass von der Lampe kein Licht direct auf dasselbe fällt. Die Anwendung eines Mydriaticums ist bei engeren Pupillen nothwendig und man verwendet wohl hiezu am besten eine 1procentige Homatropinlösung. Der Kranke darf nur sehr wenig nach seiner Nase sehen, bei artificieller Pupillenerweiterung kann man auch direct in den Spiegel blicken lassen.

Nun wirft man das Licht der Flamme in das Auge des Patienten, so dass die Pupille hell erleuchtet ist, und dreht dann den Spiegel in kleinen Excursionen zunächst um seine verticale Axe, während man, wie bei der Augenspiegeluntersuchung, durch das Spiegelloch blickt. Sobald der Spiegel etwas gedreht ist, wird man sehen, dass die Pupille nicht mehr vollkommen roth erscheint, vielmehr nimmt man in derselben auf der Nasen- oder Schläfenseite einen Schatten wahr. Das Flammenbild ist eben in Folge der Drehung des Spiegels auf der Retina weitergewandert und wir sehen jetzt neben demselben einen Theil des Fundus nicht erleuchtet. Dies ist der Schatten, den wir in der Pupille bemerken.

Wenn wir z. B. das rechte Auge eines vor uns sitzenden Kranken erleuchten und den Spiegel nach unserer rechten Seite drehen, so wissen wir nach dem Obigen, dass jetzt in Wirklichkeit das Flammenbild im untersuchten Auge schläfenwärts wandert. Der Schatten in der Pupille erscheint nun entweder an dem temporalen oder an dem nasalen Rande derselben. Erscheint er am nasalen Rande, dann sehen wir das Flammenbild sich in entgegengesetzter Richtung bewegen, wie wir den Spiegel gedreht haben, und ihm folgt natürlich der Schatten. Wir wissen also, dass wir ein aufrechtes Bild sehen. Erscheint dagegen der Schatten an der temporalen Hälfte der Pupille und wandert er gegen die Nase, so geht eben das Flammenbild und mit ihm der Schatten scheinbar in derselben Richtung wie die Spiegeldrehung. Dies sagt uns, dass wir ein verkehrtes Bild wahrnehmen. Der dioptrische Apparat des untersuchten Auges ist also derart, dass er ein umgekehrtes Bild von dem erleuchteten Theil der Retina zwischen uns und dem Auge des Kranken entwirft. Bei der angegebenen Entfernung von 120 *cm* wird bei einer Myopie von 1 *D* in 20 *cm* vor unserem Spiegel ein umgekehrtes Bild des Fundus entworfen. Bei stärkeren Graden von *M* entsteht dasselbe natürlich entsprechend näher dem untersuchten Auge, im Fernpunkt desselben.

Sehen wir also bei den Spiegeldrehungen das Flammenbild in der gleichen Richtung mit dem Spiegel sich bewegen, so schliessen wir daraus, dass eine *M* von 1 *D* oder mehr vorliegt. In allen anderen Fällen, nämlich bei $M < 1$ *D*, bei *E* und bei *H* muss die Schattenbewegung uns in entgegengesetzter Richtung zur Spiegelbewegung erscheinen, so wie es auch in der That der Fall ist.

Das verkehrte Bild der Flamme, das durch den Spiegel entworfen wird, entsteht bei 20 *cm* Focaldistanz desselben und bei dem angegebenen Lampenabstande, natürlich in etwas grösserer Entfernung als 20 *cm* von dem Spiegel. Fällt der Fernpunkt des untersuchten Auges genau mit dieser Stelle zusammen, so entsteht auf der Retina des Patienten ein ganz scharfes und lichtstarkes Bild der Flamme. In allen Fällen, wo derselbe anderswo liegt, ist das Bild verschwommen und lichtschwach. Je schärfer aber der Schatten begrenzt und je heller die Pupille erleuchtet ist, umsomehr nähert sich der Refractionszustand einer M von etwa 1 D. Da man feinere Unterschiede nicht genau beurtheilen kann, so kann man sagen: Bei *E*, geringen Graden von *M* oder *H* ist der Rand des Schattens scharf, die Beleuchtung der Pupille hell, bei höheren Graden von

Myopie oder Hypermetropie ist die Begrenzung des Schattens verschwommener und die Erleuchtung der Pupille schwächer.

Ein weiteres Moment der Unterscheidung ist folgendes: Bei E und bei geringen Graden von *M* und *H* wandert der Schatten bei den Excursionen sehr rasch, bei höheren Graden von H und *M* dagegen viel langsamer. Die Erklärung hiefür ist einfach. Bei stärkeren Graden von *H* und *M* übersieht man einen ziemlich grossen Theil des Fundus (siehe Seite 45). Es geschieht dies im aufrechten Bilde (*H*) oder im umgekehrten (*M*). Je grösser nun das Gesichtsfeld ist, desto langsamer wird natürlich das Flammenbild und ihm nach der Schatten in demselben zu wandern scheinen, während bei kleinem Gesichtsfelde es nur einer sehr kleinen Drehung des Spiegels bedarf, um dem Schatten eine rasche Bewegung zu ertheilen. Ja man braucht den Spiegel gar nicht stark zu drehen, und schon ist alles Licht in der Pupille verschwunden.

Aber nicht allein die Schärfe des Schattens, die Beleuchtung der Pupille und die Schnelligkeit der Bewegung gestatten einen Schluss auf die Refractionsanomalie und ihre Stärke, sondern auch die Form der Begrenzung des Schattens ist von Wichtigkeit. Es ist einleuchtend, dass man, je grösser das Gesichtsfeld ist, desto mehr von dem Flammenbilde auf der Retina des untersuchten Auges sieht. Ist dies der Fall, so muss, wie uns Fig. 66 darstellt, die Contour des Schattens bogenförmig sein. Der Schatten erscheint also sichelförmig. Der Kreis C *D* umschreibt das Gesichtsfeld, das in diesem Falle sehr gross ist, während der grosse Kreis A B die Ausdehnung der beleuchteten Netzhautpartie bezeichnet. Der halbmondförmige schraffirte Theil innerhalb des kleinen Kreises ist der in der Pupille erscheinende Schatten. In einem zweiten Falle, wo das Gesichtsfeld sehr klein ist, sieht man natürlich nur einen kleinen Theil des Flammenbildes, der durch den Kreis E F umschrieben ist. Nun erscheint die Grenze des Schattens, da man eben nur einen kleinen Theil der Kreisperipherie sieht, nahezu geradlinig. Bei geringen Graden der Refractionsanomalien also und bei *E* ist der Rand des Schattens geradlinig, bei höheren Graden von *M* und *H* bogenförmig.




Fig. 66.

Wenn wir endlich die verschiedenen Erscheinungen, die am beleuchteten Theile und an dem Schatten wahrzunehmen sind und die daraus zu ziehenden Schlüsse auf die Refraction zusammenfassen, so ergibt sich Folgendes:

1. Der Schatten bewegt sich entgegengesetzt: *E*, *H* oder $M < 1\,D$.

a) Die Grenze des Schattens ist scharf, fast linear, er bewegt sich rasch, die Pupille daneben ist hell erleuchtet: *E*, $M < 1\,D$ oder schwache *H*.

b) Die Grenze des Schattens ist verschwommen, bogenförmig, er bewegt sich langsam, die Pupille daneben ist schwach erleuchtet: starke *H*.

2. Der Schatten bewegt sich gleichgerichtet: $M > 1\,D$.

a) Die Grenze des Schattens ist scharf, fast linear, er bewegt sich schnell, die Pupille daneben ist hell erleuchtet: *M* geringen Grades, aber stärker als 1 *D*.

b) Die Grenze des Schattens ist verschwommen, bogenförmig, er bewegt sich langsam, die Pupille daneben ist schwach erleuchtet: starke *M*.

So ist man also im Stande, aus der Form des Schattens, seiner Bewegung, der Intensität der Beleuchtung ungefähr einen Schluss auf die Refractionsanomalie und ihren Grad zu ziehen. Doch würde man nach dem Bisherigen noch im Zweifel bleiben können, ob es sich um *E*, schwache *H* oder $M < 1\,D$ handelt. Auf einfache Weise kommt man auch hierüber ins Klare und kann selbst den Grad der Refractionsanomalie, sei es *H* oder *M*, bestimmen.

Setzt man vor ein emmetropisches Auge ein Convexglas, so wird das Auge myopisch Durch eine Concavlinse wird das dioptrische System des Auges schwächer, das Auge also hypermetropisch. Eine schon bestehende *H* wird durch eine Convexlinse vermindert oder corrigirt, durch eine Concavlinse vermehrt — *M* aber durch eine Concavlinse verringert oder corrigirt, durch eine Convexlinse vermehrt. Man kann also durch Vorsetzen eines Convexglases *H* in *M* oder andererseits durch eine Concavlinse *M* in *H* überführen. Dies gibt den Weg an die Hand, um die Refractionsanomalie mit der Retinoskopie auch genau dem Grade nach zu bestimmen.

Hat man z. B. gefunden, dass der Schatten sich in entgegengesetzter Richtung bewegt, so muss man zunächst entscheiden, ob es sich um *H*, *E* oder $M < 1\,D$ handelt. Man setzt dem Kranken ein Brillengestell auf und legt $+ 0{\cdot}5\ D$ ein. Wandert der Schatten noch entgegengesetzt, so ist $M < 1\,D$ ausgeschlossen. Denn durch dies Glas wäre bei $0{\cdot}5\ D$ *M* eine *M* von 1 *D* erzeugt worden, der Schatten hätte sich also gleichgerichtet bewegt. Es bleibt also nur *E* oder *H* übrig. Diese Zustände werden nun dadurch unterschieden, dass man $+ 1\,D$ vorzulegen versucht. Bewegt sich jetzt der Schatten in gleicher Richtung mit dem Spiegel, dann liegt *E* vor, denn ein emmetropisches Auge bekommt durch $+ 1\,D$ eine $M = 1\,D$. Geht der Schatten auch mit $+ 1\,D$ entgegengesetzt, dann ist *H* da. Diese kann man dem Grade nach bestimmen, indem man nach und nach immer stärkere Convexlinsen vorsetzt, bis sich der Schatten in gleicher Richtung bewegt. Dann hat man $M = 1\,D$ erzeugt. Das vorgesetzte Glas weniger 1 *D* ergibt die *H* des untersuchten Auges.*)

Bewegt sich der Schatten in derselben Richtung wie der Spiegel, so ist blos $M > 1\,D$ möglich und man legt nun successive immer stärkere und stärkere Concavlinsen vor, bis man eine Linse findet, bei deren Anwendung sich die Bewegung des Schattens umkehrt. Das letzte Glas, mit dem der Schatten sich noch so wie ohne Glas bewegt hatte, lässt natürlich noch 1 *D M* uncorrigirt, denn sonst würde sich ja der Schatten entgegen-

*) Anmerkung. Man muss dabei eine um etwa 20 *cm* grössere Entfernung als 1 Meter einhalten, da sich der Schatten sonst nicht bei 1 *D M* im gleichen Sinne bewegt.

gesetzt bewegen. Diese Linse um 1 *D* vermehrt, gibt die Stärke der *M* an.

Sehr leicht ist es, sich über das Vorhandensein von regelmässigem *As* und die Lage der Meridiane der schwächsten und stärksten Krümmung mittels der Retinoskopie zu orientiren. Im Allgemeinen wird beim Vorhandensein von *As* auf der Retina des untersuchten Auges kein Zerstreuungskreis, sondern eine ovale Figur entstehen, deren durch die brechenden Medien des untersuchten Auges entworfenes Bild der Untersucher wahrnimmt. Die Durchmesser dieses Ovals müssen den Meridianen der stärksten und der schwächsten Krümmung entsprechen. Besteht z. B. eine $M = 3\,D$ im verticalen Meridian und *E* im horizontalen, so entsteht auf der Retina des untersuchten Auges ein senkrecht ovales Zerstreuungsbild der Flamme. Es entstehen ja von jedem Punkte des vom Spiegel vor dem Auge entworfenen Bildes senkrechte Zerstreuungslinien (siehe Seite 78). Diese fallen zum Theil übereinander und schliesslich resultirt dieses Zerstreuungsbild der Flamme. Das, was der Untersucher aber von dieser auf der Retina des untersuchten Auges entstehenden Zerstreuungsfigur sieht, ist wiederum anders gestaltet. Die durch den verticalen Meridian hervorkommenden Strahlen vereinigen sich im Fernpunkt dieses Meridians, i. e. 33 *cm* vor dem Auge, während die durch den horizontalen Meridian hervorkommenden Strahlen parallel sind. Es entsteht also von jedem beleuchteten Punkte der Netzhaut des untersuchten Auges vor dem Auge eine horizontale Zerstreuungslinie. Hieraus entsteht schliesslich ein querovales Bild. Auch bei diesem stehen aber die Durchmesser des Ovals senkrecht und horizontal, entsprechend den Meridianen der stärksten und schwächsten Brechung des dioptrischen Apparates.

In einem anderen Auge seien dagegen diese Meridiane nicht vertical und horizontal, sondern schräg. Nun muss auch die ovale Figur auf der Retina mit dem längeren Durchmesser schräg gestellt sein. Untersuchen wir nun ein solches Auge mit der Retinoskopie und drehen den Spiegel entweder um seine verticale oder um seine horizontale Axe, so werden wir den Schatten nicht in der Richtung nach rechts und links oder nach oben und unten wandern sehen, sondern er muss sich in schräger Richtung bewegen. Auch zeigt der Schatten keine horizontale oder verticale, sondern eine schräge Begrenzung, deren Rand der Richtung des Meridians entspricht.

Warum dies der Fall ist, kann man sich leicht dadurch veranschaulichen, dass man hinter einer runden Oeffnung in einem Papierbogen, welche die Pupille darstellt, ein schräg liegendes Viereck (Fig. 67 a b c d) in der Richtung des Pfeiles p verschiebt. Trotzdem diese Richtung horizontal ist, scheint sich doch der Rand des Vierecks innerhalb der runden Oeffnung schräg, und zwar in der Richtung des Pfeiles P zu bewegen.




Fig. 67.

Umgekehrt kann man den *As* mit verticalen und horizontalen Meridianen dadurch erkennen, dass man den Spiegel schräg hält und dann dreht. Man

richtet sich dabei nach der Bewegung des Flammenbildes, das bei grösseren Spiegelexcursionen auf dem Gesichte des Patienten erscheint und drehe den Spiegel so, dass dieses z. B. von innen oben nach aussen unten wandert. Jetzt wird bei einem Falle von *As* mit verticalen und horizontalen Meridianen der stärksten und schwächsten Brechung der Schatten sich trotz der schrägen Spiegelstellung doch vertical und horizontal bewegen. Bei gewissen Fällen von *As* ist es allerdings möglich, dass diese Verschiedenheit in der Bewegung des Schattens und des Spiegels erst dann hervortritt, wenn man bereits mit sphaerischen Linsen zu corrigiren angefangen hat. Sehr auffallend sind dagegen gleich von vornherein Fälle von einfachem *As*, indem in der einen Richtung der Schatten nur sehr undeutlich erscheint, während er in der Richtung des anderen Meridians sehr in die Augen springt.

Wir werden also zu dem Obigen noch Folgendes hinzuzufügen haben:

Man beginne damit, den Spiegel um die verticale und horizontale Axe zu drehen. Entspricht hiebei die Schattenbewegung der Spiegeldrehung, so ist kein *As* mit schrägen Meridianen vorhanden. Hierauf drehe man den Spiegel in schräger Stellung um die Axe, die seinem Griffe entspricht. Wenn auch jetzt der Schatten sich so bewegt, wie man den Spiegel dreht, so ist auch kein *As* mit verticalen und horizontalen Meridianen da — abgesehen von denjenigen Fällen, wo sich der *As* erst bei beginnender Correction mit sphaerischen Linsen zu erkennen gibt.

Der *As* gibt sich ferner dadurch zu erkennen, dass der Schatten sich in verschiedener Richtung verschieden schnell oder in der einen Richtung gleichgerichtet, in der anderen verkehrt bewegt.

Hat man so *As* ausgeschlossen, so kann man zur Refractionsbestimmung nach den früher angeführten Regeln übergehen. Findet man aber *As*, so kann man auch Art und Grad desselben bestimmen. Man dreht nämlich den Spiegel entsprechend den gefundenen Meridianen. Man kann dann durch Vorsetzen von sphaerischen Linsen im Brillengestell die Refraction in den einzelnen Meridianen erfahren. Schliesslich überzeugt man sich durch Vorlegen von Cylinderlinsen oder von Combinationen von Cylinderlinsen mit sphaerischen von der Richtigkeit des Gefundenen.

Bei der Retinoskopie gibt der Untersuchte, so wie beim Ophthalmoskopiren, sehr bald seine Accommodation auf. Der Untersucher aber braucht seine Accommodation gar nicht zu entspannen.

Manche nähern sich beim Retinoskopiren dem untersuchten Auge auf 70 *cm*, wobei natürlich erst bei einer *M* von 2 *D* der Schatten sich in gleicher Richtung mit dem Spiegel bewegt. Im Uebrigen sind die Regeln ganz ähnlich wie die für die Entfernung von 120 *cm* gegebenen. Diese Modification hat den Vortheil, dass man dem Patienten näher ist, die Bewegung des Schattens leichter wahrnehmen kann und, um die Linsen im Brillengestell zu wechseln, nicht immer aufzustehen braucht. Uebrigens kann der Beobachter die eine oder die andere Entfernung annehmen, nur sollte er in allen Fällen, die er untersucht, entweder 70 oder 120 *cm* beibehalten.

Nimmt man zur Retinoskopie einen Planspiegel, so sind sämmtliche Bewegungen des Schattens umgekehrt, wie beim Concavspiegel. Denn beim Planspiegel erfolgt keine Kreuzung der Strahlen vor dem untersuchten Auge. Das Flammenbild auf der Retina bewegt sich in derselben Richtung wie man den Spiegel dreht. Auch mit einem Planspiegel kann man retinoskopiren und zu gewissen Zwecken eignet sich derselbe sehr gut. So z. B. wenn man erfahren will, ob die *M* des Auges einen bestimmten Grad erreicht oder nicht. Bei der Assentirung in Frankreich soll man z. B. herausbringen, ob der Untersuchte 6 *D* Myopie hat oder mehr oder weniger. Man placirt sich mit einem Planspiegel in der Entfernung von 16 *cm* vom zu untersuchenden Auge. In allen Fällen, wo die *M* schwächer ist als 6 *D*, wird sich der Schatten gleichgerichtet bewegen; in Fällen, wo man nicht unterscheiden kann, in welcher Richtung der Schatten wandert, ist etwa 6 *D M* vorhanden. Uebersteigt die *M* 6 *D*, so bildet sich ein umgekehrtes Bild des Fundus zwischen beiden Augen, das sich auch verkehrt bewegt. Dann wandert der Schatten in einer der Spiegeldrehung entgegengesetzten Richtung. So kann man sehr rasch entscheiden, ob 6 *D* oder mehr da ist.

Die Retinoskopie ist eine Methode, die bei uns wenigstens nur sehr wenig bekannt ist, die aber mehr angewendet zu werden verdiente. Besonders für Nichtspecialisten ist sie sehr brauchbar. Sie ist sehr leicht zu erlernen, erfordert nur sehr geringe Uebung in der Handhabung des Augenspiegels und, was wohl die Hauptsache ist, der Beobachter ist nicht genöthigt, seine Accommodation zu entspannen. Die Resultate, die sie gibt, sind kaum weniger genau als die mittels der anderen Methoden gewonnenen. Ein Nachtheil der Retinoskopie ist allerdings der, dass eine genaue Refractionsbestimmung wegen des etwas umständlichen Wechselns der Linsen ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt.

5. Erkennung des irregulären Astigmatismus.

Die letzte Refractionsanomalie, die uns noch in Bezug auf die Diagnose durch den Augenspiegel zu besprechen bleibt, ist der irreguläre *As*. Wir wollen hier nur den Einfluss betrachten, den derselbe auf die Wahrnehmung der Details des Fundus hat, dagegen soll später noch bei den Trübungen der Medien manche Erscheinung erwähnt werden, die, durch irregulären *As* bedingt, bei der Untersuchung der Medien im durchfallenden Licht hervortritt. Hier sei nur kurz daran erinnert, dass der irreguläre *As* durch Veränderungen der Cornea (Keratokonus, Facetten, Krümmungsänderungen nach Operationen), der Linse (beginnende Cataract, Linsenluxation) oder des Glaskörpers (feine noch Licht durchlassende Glaskörpertrübungen) bewirkt werden kann.

Beim unregelmässigen *As* finden sich in dem dioptrischen Apparate Stellen von starker Refraction neben solchen, wo die Refraction geringer ist. In einer Partie kann *M* da sein, an einer anderen *E* oder *H*. Dadurch wird natürlich das Aussehen des Fundus im aufrechten und verkehrten Bilde bedeutend verändert. Nicht nur dass die Bilder, die durch die verschieden brechenden Partien der Medien entworfen werden,

nicht immer alle (besonders im aufrechten Bilde) gleichzeitig deutlich gesehen werden können, sie sind auch von verschiedener Grösse und decken sich zum Theil. Es kann ferner geschehen, dass man Theile des Fundus, durch die Ablenkung, welche die Strahlen erfahren, doppelt sieht, ja theoretisch wäre auch ein Mehrfachsehen der Details nicht ausgeschlossen, sowie ja auch die Patienten, die mit irregulärem *As* behaftet sind, die Gegenstände mehrfach sehen, an monoculärer Polyopie leiden können. Endlich müssen bei Bewegungen des Auges oder des Spiegels sich die einzelnen Bilder auch in verschiedener Weise parallaktisch verschieben.

Untersucht man ein Auge, das irregulären *As* hat, im aufrechten Bilde, so fällt zunächst das sehr verzerrte Aussehen der Papille auf. Sie erscheint nach einer Richtung oft sehr stark verzogen, die Gefässe theilweise geknickt, manche von ihnen sogar doppelt. Man sieht dieselben an manchen Stellen undeutlich oder dicker, an anderen deutlich oder dünner. Wenn man nun in etwas anderer Richtung ins Auge hineinblickt oder wenn der Patient sein Auge etwas bewegt, so ist es höchst überraschend zu sehen, wie sich das ganze Bild des Fundus rasch verändert. Die Papille erscheint wieder in anderer Richtung verzogen, Stellen, die früher deutlich erschienen, sind jetzt nur undeutlich zu sehen. Man blickt eben jetzt durch ganz anders brechende Partien des dioptrischen Apparates und bekommt in Folge dessen ein ganz anderes Bild. Gerade dieser Wechsel des Bildes bei veränderter Richtung des Einblickes ist ungemein charakteristisch und prägt sich wohl Jedem, der diese Erscheinung einmal aufmerksam beobachtet hat, leicht ein. Es gelingt auf diese Weise, auch sehr geringe Grade des irregulären *As* bei einiger Uebung mit dem Augenspiegel zu erkennen.

Versucht man durch Gebrauch von Convex- oder Concavlinsen ein deutliches Bild zu bekommen, so ist dies nur sehr unvollkommen möglich, indem wohl einzelne Partien dadurch deutlicher erscheinen können, andere aber um so verschwommener und verzogener aussehen müssen. Durch das vorgesetzte Convexglas z. B. kann wohl an einer Stelle die *H* corrigirt werden, man vermehrt aber gleichzeitig die *M* an einer anderen Partie. Niemals kann man beim irregulären *As* wahrnehmen, dass es eine Linse gibt, mit der die Gefässe wohl in einer Richtung schärfer, in der darauf senkrechten aber um so undeutlicher erscheinen.

Auch im umgekehrten Bilde gibt der irreguläre *As* ein sehr auffallendes Bild. Es kann die Papille (wie bei Linsenluxation oder in seltenen Fällen bei Keratokonus) doppelt gesehen werden. Immer sind die beiden Bilder dann von verschiedener Grösse, denn sie werden durch sehr verschieden brechende Theile des Auges erzeugt. Auch kann man bei Verschiebung der Convexlinse eine ganz verschiedene Verschiebung der Bilder beobachten. Das von einer myopischen Partie des dioptrischen Apparates entworfene Bild liegt der Linse näher und bewegt sich also weniger, während das durch einen hypermetropischen Theil der brechenden Medien erzeugte Bild weiter von der Linse entfernt ist und grössere Excursionen macht. Auch im umgekehrten Bilde sieht man dann, wie bei Bewegungen des Spiegels, des untersuchten Auges oder der Linse die Papille sich auffallend verzerrt.

Der Einblick auf den Augenhintergrund, das Erkennen der Details daselbst, wird bei Anwendung der Methode des umgekehrten Bildes lange nicht so behindert, als wenn man im aufrechten Bilde untersucht. Deshalb kann es wohl vorkommen, dass ein geübter Untersucher, sobald er bei der Untersuchung der Medien die Zeichen des irregulären *As* (siehe unten Seite 96) wahrnimmt, gar nicht mehr zum aufrechten Bilde greift, sondern blos im umgekehrten Bilde untersucht.

II. THEIL.

Diagnostik der mit dem Augenspiegel sichtbaren Anomalien des Auges.

I. Capitel.

Die brechenden Medien.

Wie man die brechenden Medien untersucht, das ist schon früher (siehe Seite 39) auseinandergesetzt worden. Es erübrigt nur noch betreffs der Untersuchungsmethode einiger Vorkommnisse zu gedenken, die Anlass zu Irrthümern geben könnten.

Zunächst kommt es bei Conjunctivalkatarrh häufig vor, dass sich Schleimfäden über die Cornea ziehen: man kann dieselben als Anfänger leicht für Trübungen der Medien halten. Das Abwischen der Cornea mittels des oberen Lides oder auch nur ein einmaliges Schliessen des Auges, wozu man den Patienten auffordert, genügt, um sich über den wahren Sachverhalt aufzuklären. Ebenso geschieht es, dass Luftbläschen in der Flüssigkeitsschicht, die die Cornea bedeckt, sich vorfinden und im durchfallenden Lichte als feine, dunkle Punkte erscheinen. Auch hier wird das soeben angegebene Mittel helfen.

Die Trübungen erscheinen im durchfallenden Lichte mehr oder weniger dunkelgrau bis schwarz, je nachdem sie mehr oder weniger Licht abhalten. Dies rührt daher, dass sie eben einen Theil oder auch alles Licht, das vom Fundus reflectirt wird, abhalten. Daher kommt es auch, dass Linsentrübungen, die im auffallenden Lichte, also bei Tageslicht oder bei seitlicher Beleuchtung, hellgrau oder selbst weiss aussehen, im durchfallenden Lichte (bei der Augenspiegeluntersuchung) vollkommen schwarz erscheinen. Andererseits gibt es aber Medientrübungen, die so viel Licht reflectiren, dass sie auch bei der Untersuchung mit dem Ophthalmoskop sehr hell, ja glänzend erscheinen. Wir brauchen nur an die im Glaskörper mitunter vorfindlichen Cholestearinkrystalle zu erinnern.

Weiters darf nicht vergessen werden, dass bei der Untersuchung im durchfallenden Lichte manche Partien der brechenden Medien dunkel erscheinen können, ganz so als ob sie getrübt wären, während sich in der That keine Trübung an dieser Stelle vorfindet. Das kann darin seine Ursache haben, dass an der betreffenden Stelle das Licht, das vom Fundus reflectirt wird, so unregelmässig zerstreut wird, dass nur ein ganz geringer Theil desselben ins Auge des Beobachters zurückgelangt. Die Untersuchung mit der seitlichen Beleuchtung wird

dann, verglichen mit der Augenspiegeluntersuchung, einen Aufschluss geben können.

1. Differentialdiagnose der Trübungen.

Im Allgemeinen kann man fixe und bewegliche Trübungen unterscheiden. Wenn nach einigen raschen Bewegungen des Auges dasselbe wieder ruhig gehalten wird, so machen die beweglichen Trübungen noch eine weitere, von der Bewegung des Auges nunmehr unabhängige Excursion. Bewegliche Trübungen kommen nur im Glaskörper vor. Trübungen in der Linse und in der Cornea sind unbeweglich. Wohl können Linsentrübungen dann beweglich erscheinen, wenn die Linse selbst sich im Auge bewegt. Man nimmt dann bei Bewegungen des Auges auch Schlottern der Iris (Iridodonesis) wahr.

Schon bei seitlicher Beleuchtung wird man den Sitz vieler Trübungen erkennen können. Hornhauttrübungen sind leicht in dieser Membran zu localisiren. Schon bei dieser Untersuchungsmethode wird man eruiren können, ob die Linse im Auge ist oder nicht. Davon später (Seite 98). Dann wird man leicht Auflagerungen auf der vorderen Linsenkapsel, Trübungen im Bereich der vorderen Partien der Linse diagnosticiren können. Auch Opacitäten im centralen und tiefen Theile der Linse, ja selbst solche im vorderen Abschnitte des Glaskörpers kann man auf diese Weise sehen. Vielfach wird die Unbeweglichkeit der Linsentrübungen, sowie oft ihre strahlige Form, die Diagnose wesentlich erleichtern.

Auch im durchfallenden Lichte lässt sich aber eine genaue Localisation der fixen Trübungen ausführen. Es gelingt dies mittels der Beobachtung der parallaktischen Verschiebung der Trübungen bei Bewegungen des Auges.

Es sind zwei Dinge, auf die man hiebei ganz besonders zu achten hat:

1. Auf die Lage der Trübungen im Verhältniss zum Pupillarrand und die Verschiebungen aus derselben bei Bewegungen des Auges.

2. Auf die Lage der Trübungen im Verhältniss zum Hornhautreflex des Spiegels und die Verschiebungen aus derselben bei Bewegungen des Auges. Die folgende Auseinandersetzung wird dies sogleich klar machen.




Fig. 68.

Ad 1. Es würden sich (Fig. 68I) auf der optischen Axe des Auges 3 Trübungen befinden, die eine (a) in der Cornea, die zweite (b) in der Ebene der Pupille, also in, unmittelbar vor oder hinter der Linsenkapsel, und eine dritte (c) hinter der Ebene der Pupille. Blicken wir nun ungefähr in der Richtung der optischen Axe in das Auge hinein, so sehen wir nur Eine Trübung etwa in der Mitte der Pupille, da sich ja alle 3 Trübungen nun decken (1). Nun wollen wir den Kranken z. B. nach oben sehen lassen. Sogleich werden uns nun alle 3 Trübungen sichtbar werden.

Die Trübung b bleibt in der Mitte der Pupille, a hat sich dem oberen Pupillarrand genähert, c dem unteren. Hieraus können wir folgende Sätze ableiten:

1. Bleibt die Trübung bei allen Bewegungen des Auges immer in der gleichen Lage zum Pupillarrand, so liegt sie in der Pupillarebene.

2. Wandert eine Trübung in der Pupille in demselben Sinne, wie sich das Auge bewegt (nähert sie sich z. B. beim Blick nach oben dem oberen Pupillarrand), so liegt sie vor der Ebene der Pupille, also zumeist in der Hornhaut oder auf ihrer vorderen oder hinteren Fläche.

3. Bewegt sich eine Trübung in der Pupille im entgegengesetzten Sinne wie das Auge (nähert sie sich also z. B. dem unteren Rande der Pupille, wenn das Auge nach oben sieht), so liegt sie hinter der Ebene der Pupille (also entweder in der Linse oder im Glaskörper).

4. Je grösser die Excursionen sind, desto grösser ist die Entfernung der Trübung von der Pupillarebene.

Auf diese Weise hat man sich ein Urtheil über die Lage der Trübungen relativ zur Pupillarebene gebildet.

Ad 2. Eine Trübung, die hinter der Pupillarebene liegt, kann verschieden tief im Auge liegen. Wir können nun bei einer solchen ganz gut unterscheiden, ob sie vor, in oder hinter dem Drehpunkt liegt. Der Drehpunkt des Auges liegt hinter der Mitte der Augenaxe im vorderen Theile des Glaskörpers. Seine Entfernung von der Hornhautoberfläche beträgt im emmetropischen Auge 13·5 *mm*, er ist 6 *mm* vom hinteren Linsenpole entfernt. Dieser Punkt bleibt natürlich bei allen Bewegungen des Auges im Raume vollständig ruhig, ebenso eine Trübung, die sich an dieser Stelle befindet. Beleuchtet man mit dem Augenspiegel das Auge, so sieht man auf der Cornea, die wie ein Convexspiegel wirkt, ein verkleinertes, aufrechtes Bild des Augenspiegels (siehe Seite 11). Dieses Bild muss bei ruhiger Haltung des Spiegels immer dieselbe Lage im Raume behalten, es mag sich das Auge wie immer drehen. Bei Bewegungen des Bulbus erscheint das Bild allerdings auf verschiedenen Stellen der Cornea, die immer den Bewegungen des Auges entgegengesetzt liegen. Blickt der Patient z. B. nach oben, so sieht man das Reflexbild des Spiegels auf dem unteren Theil der Cornea.




Fig. 69.

Wir setzen nun zunächst voraus, dass der Untersuchte gerade in den Spiegel hineinsieht. Jetzt liegen die Spiegelöffnung, der Reflex des Spiegels auf der Cornea, dann der Drehpunkt des Auges in ein und derselben geraden Linie und bleiben in dieser Lage zueinander auch bei den verschiedensten Bewegungen des Auges: wofern nur der Spiegel und der Kopf des Patienten ruhig bleiben. Wir hätten nun (Fig. 69 I) 3 fixe Trübungen im Auge, die eine fiele mit dem Drehpunkt zusammen (b), die andere läge vor ihm (a), eine dritte hinter ihm (c). Alle drei wären auf der

Gesichtslinie situirt. Blicken wir also in der Richtung derselben ins Auge (I), so sieht man eine Trübung, da sich alle drei decken (1). Zugleich werden sie vom Cornealreflex des Spiegels je nach ihrer Grösse ganz oder theilweise verdeckt. Anders ist es, wenn der Untersuchte hinauf blickt (II). Jetzt nähern sich alle 3 Trübungen dem unteren Pupillarrande (2), denn alle drei liegen hinter der Pupillarebene (siehe oben). Während aber b (II, 2) sich noch immer mit dem Hornhautreflex des Spiegels deckt, hat sich a nach oben von ihm bewegt, b nach unten. Hieraus folgen wiederum folgende allgemeinen Regeln:

1. Liegt eine Trübung im Drehpunkt des Auges, so deckt sie sich mit dem Cornealreflex des Spiegels, und zwar bei allen Bewegungen des Auges.

2. Liegt eine Trübung vor dem Drehpunkt des Auges, so entfernt sie sich vom Cornealreflex des Spiegels im gleichen Sinne wie das Auge (wenn das Auge hinauf sieht, so geht die Trübung nach oben).

3. Liegt eine Trübung hinter dem Drehpunkt des Auges, so wandert sie vom Cornealreflex des Spiegels im entgegengesetzten Sinne, als sich das Auge bewegt hat (beim Blick nach oben geht sie nach unten).

4. Je grösser die Excursionen sind, desto weiter ist die Trübung vom Drehpunkt entfernt.

Bei grösseren Trübungen kann es natürlich geschehen, dass auch bei Bewegungen des Auges der Cornealreflex noch immer auf der Trübung zu sehen ist. Doch hat er seine Lage zu den Rändern derselben geändert.

Es ist klar, dass die beschriebenen Erscheinungen oft nur gut bei erweiterter Pupille zu sehen sind.

2. Cornea.

Starke **Trübungen** der Cornea sind sehr leicht schon bei einfacher Inspection zu erkennen. Zartere werden durch das Verfahren der seitlichen Beleuchtung aufgedeckt. Im durchfallenden Lichte, also mit dem Augenspiegel gesehen, erscheinen Trübungen der Cornea überhaupt als mehr oder weniger dunkle Wolken in dem Roth der Pupille.

Noch muss aber eine eigenthümliche Erscheinung ganz besonders hervorgehoben werden, welche bei der Untersuchung der brechenden Medien hervortritt, wenn sich **Unebenheiten, Facettirungen** auf der Cornea vorfinden. Dann bekommt man beim Durchleuchten der Medien, wenn man den Spiegel etwas dreht oder den Patienten mit dem Auge Bewegungen machen lässt, ein ganz eigenthümliches Spiel von grauen Wolken, das eben durch seine Veränderlichkeit charakterisirt ist. Nach einer Drehung des Spiegels erscheinen plötzlich Partien der Pupille, die früher dunkel erschienen waren, wieder roth und umgekehrt. Es beruht dies auf der unregelmässigen Brechung der Lichtstrahlen durch die unebenen Stellen. Bei einer gewissen Stellung des Auges und des Spiegels zueinander erscheint z. B. ein Theil der Pupille dunkel, weil die Lichtstrahlen, die durch dieselbe durchtreten, in Folge unregelmässiger Brechung und Reflexion nicht mehr ins Auge des Untersuchers zurückkommen. Aendert sich aber die Richtung

des Lichteinfalls in Folge einer Bewegung des Spiegels oder des Auges, dann gelangt das Licht, welches durch die betreffende Partie, die früher dunkel aussah, geht, ins Auge des Arztes. Natürlich ist jetzt dieser Theil der Cornea zu durchleuchten. Will man dies recht deutlich wahrnehmen, so ist es ungemein wichtig, sich einer ganz schwachen Beleuchtung zu bedienen, ja für sehr geringe solche Oberflächenveränderungen ist es unerlässlich, den Helmholtz'schen Beleuchtungsapparat anzuwenden. Das starke Licht eines Concavspiegels macht diese feinen Beleuchtungsunterschiede vollkommen unkenntlich. Graue Wolken, die durch wirkliche Trübungen der Cornea bedingt sind, werden sich leicht dadurch erkennen lassen, dass sie bei jeder Stellung des Spiegels zum Auge dunkel erscheinen.

Bei **Keratokonus** ist ebenfalls eine ganz eigenthümliche Erscheinung bei der Durchleuchtung der Pupille wahrzunehmen, die besonders bei geringeren Graden darauf führen kann, die Wölbung der Cornea einer genaueren Inspection zu unterziehen. Da bei Keratokonus die Mitte der Cornea gewöhnlich eine stärkere Wölbung zeigt, die peripheren Theile aber im Gegentheil abgeflacht sind, so kann man bei der Untersuchung der Medien einen eigenthümlichen ringförmigen Schatten in der Pupille constatiren, der besonders an der einen Seite dunkler erscheint. Diese dunkle Stelle ändert bei Bewegungen des Spiegels ihre Lage. Dies beruht darauf, dass die Strahlen, die durch die abgeflachten Partien der Cornea austreten, in Folge der daselbst vorhandenen geringeren Refraction divergent sind. Durch die centralen, stärker gewölbten Theile der Cornea kommen dagegen convergente Strahlen hervor. Es muss also zwischen diesen beiden Strahlenbündeln eine Zone vorhanden sein, in die keine aus dem Auge herauskommenden Strahlen hingelangen.

In manchen Fällen von Keratokonus sieht man übrigens bereits bei der Untersuchung der Medien die Papille. Durch den myopischen, centralen Theil der Medien wird nämlich ein sehr kleines, umgekehrtes Bild der Papille wenige Centimeter vor dem Auge entworfen, und dies bekommt man zu sehen, wenn man, wie gewöhnlich in einiger Entfernung vom Auge sich haltend, die Medien untersucht. Nimmt man eine Convexlinse und betrachtet den Fundus im umgekehrten Bilde, so sieht man die Papille in solchen Fällen wohl auch doppelt. Man bekommt eben ein sehr kleines Bild durch die mittleren Theile der Cornea, ein zweites, viel grösseres durch die seitlichen.

3. Iris.

Die meisten Verhältnisse an der Iris kann man sehr gut bei seitlicher Beleuchtung erkennen, besonders genau, wenn man die beleuchtete Partie noch durch eine Loupe betrachtet. Für gewisse Fälle kann aber auch die Untersuchung mit dem Augenspiegel im durchfallenden Lichte wichtig werden. So gelingt es, dunkle Stellen als **Lücken**, entstanden durch Irisatrophie oder Eindringen fremder Körper, zu erkennen. Vorausgesetzt, dass die dahinter liegende Linse und der Glaskörper Licht durchlassen, muss eine solche im auffallenden Lichte dunkle Stelle mit dem Augenspiegel betrachtet in demselben rothen Lichte erscheinen, wie die Pupille.

Auch Losreissung der Iris vom Ciliarrand — **Iridodialysis** — kann auf diese Weise erkannt werden. Findet eine solche Abreissung in grösserer Ausdehnung statt, so kann man allerdings schon durch die eigenthümlich abgeschrägte Form der Pupille an der Seite, wo sich die Abreissung befindet, auf dieselbe aufmerksam werden. In Fällen aber, wo nur ein ganz kleiner Theil der Iris losgetrennt ist, sieht man bei auffallendem Lichte einen schwarzen Streifen in der Nähe des Cornealrandes, der auch (unten) für eine Blutansammlung oder für eine pigmentirte Geschwulst gehalten werden könnte. Kann man dagegen durch diese Stelle den Fundus roth aufleuchten sehen, so ist bewiesen, dass dort die Iris vom Ciliarkörper getrennt ist (J. A. Fig. 8).

Hintere Synechien zeigen sich als dunkle Streifen und Zacken am Pupillarrand, der, wenn Atropin gegeben wurde, dazwischen bogenförmig retrahirt erscheint (J. A. Fig. 1). Pigmentpunkte, die nach Zerreissung von Synechien auf der Kapsel zurückbleiben, erscheinen als dunkle, feine Flecken, die in Kreisform angeordnet sein können (J. A. Fig. 2). Hintere Synechien können sich auch in manchen Fällen zu langen, bräunlichen Fäden ausziehen. Sie geben dann ein ähnliches Bild wie eine **persistirende Pupillarmembran.** Sie sind von dieser aber meist leicht zu unterscheiden. Bei den Resten einer Pupillarmembran sieht man oft eine centrale, bräunliche oder graue Auflagerung auf der Linse in der Mitte der Pupille, zu der feine, braune Fäden von der Iris hinziehen. Das Verhalten dieser Fäden ist für die Diagnose sehr wichtig. Sie kommen nämlich von der vorderen Fläche der Iris, und zwar vom kleinen Kreise, und ziehen von dort zur Mitte der Pupille. Dadurch unterscheiden sie sich von zu Fäden ausgezogenen hinteren Synechien, die immer vom Pupillarrand der Iris ihren Ursprung nehmen. Uebrigens müssen sie nicht immer zu einer Auflagerung auf der Linse hinziehen, sondern können auch blos die Pupille überspannen.

Bei Albinos lässt die ganze Iris rothes Licht durch.

4. Linse.

Wir müssen zunächst hier die Symptome anführen, die es gestatten, das Fehlen der Linse — **Aphakie** — zu erkennen. Dieselben treten in gleicher Weise in Erscheinung, mag nun die Linse vollständig aus dem Auge entfernt worden sein oder mag sie nur die tellerförmige Grube verlassen haben und in den Glaskörper gesunken sein. Die vordere Kammer erscheint sehr tief. Die Iris schlottert bei Bewegungen des Auges, da sie keine Stütze an der Linse hat (Iridodonesis). Diese Zeichen können aber auch fehlen, nämlich dann, wenn die Iris fixirt ist, z. B. durch hintere Synechien an Kapselreste. Die Pupille ist auch bei seitlicher Beleuchtung vollkommen schwarz. Dies fällt besonders bei alten Leuten auf. Bei solchen nimmt man nämlich mitunter schon bei Tageslicht, mitunter aber erst bei seitlicher Beleuchtung einen grauen Schimmer in der Pupille wahr. Dies rührt davon her, dass der Brechungsindex des Kammerwassers und der Linse nicht der gleiche ist und dass die einzelnen Linsenschichten verschieden stark Licht brechen. Es wird somit nicht alles Licht durchgelassen, wie dies bei einem vollkommen homo-

genen Medium der Fall wäre, sondern es wird ein Theil des Lichtes an den Trennungsflächen der verschiedenen brechenden Flächen reflectirt. Je älter das Individuum ist, desto bedeutender ist im Allgemeinen die Differenz zwischen dem Brechungsindex des Kammerwassers und dem der vorderen Linsenschichten. Dann erhält man einen starken Reflex aus der Pupille, der selbst bei gewöhnlichem Tageslichte so auffallend sein kann, dass man an das Vorhandensein von Cataracta denkt.

Die sichere Diagnose der Aphakie kann man aber erst machen, wenn man das Fehlen des Reflexbildes von der hinteren Linsenkapsel nachweisen kann. Wenn man schräg mit einer Flamme in das Auge hineinleuchtet, so sind drei Reflexbilder der Flamme wahrnehmbar (Purkinje-Sanson). Die Cornea wirkt als Convexspiegel, entwirft also ein aufrechtes, stark verkleinertes, virtuelles, hinter der Cornea gelegenes Bild, welches mit der Lichtquelle in derselben Richtung wandert, wenn man diese bewegt (siehe Seite 11 und Fig. 14, 15). Da der Brechungsindex der Cornea und der der Luft sehr verschieden sind, so ist dieses Bild auch sehr lichtstark. Die vordere Linsenkapsel ist ebenfalls ein Convexspiegel, sie entwirft also ebenfalls ein aufrechtes, virtuelles Bild, das aber sehr lichtschwach ist, da der Brechungsindex des Kammerwassers und der der Linse weniger verschieden sind. Wir können dieses Bild hier vernachlässigen. Es ist schwer zu sehen und wird zur Diagnose der Aphakie nicht benöthigt. Wichtig ist aber das Bild, das durch die hintere Linsenkapsel entsteht. Diese als Concavspiegel entwirft ein reelles, umgekehrtes, stark verkleinertes Bild, das umgekehrt wandert als die Lichtquelle und das zwischen Krümmungsmittelpunkt und Brennpunkt der spiegelnden Fläche liegt (siehe Seite 10 und Fig. 13).

Wenn man also von der Schläfenseite im dunkeln Zimmer mit einer Kerzenflamme das Auge beleuchtet, so sieht man auf der äusseren Hälfte der Cornea ein aufrechtes, lichtstarkes Bild der Flamme. In der inneren Hälfte der Pupille sieht man das verkehrte, bedeutend kleinere und lichtschwächere Bild, das von der hinteren Linsenkapsel gebildet wird. Geht man mit der Flamme gerade vor das Auge, so nähern sich die Bilder während dieser Bewegung einander und decken sich, sobald man gerade von vorn ins Auge hineinleuchtet. Bewegt man die Flammen noch weiter in dieser Richtung, so dass jetzt das Licht von der Nasenseite ins Auge fällt, so sieht man jetzt das Cornealreflexbild innen, das Reflexbild der hinteren Linsenkapsel aussen. Kurz, diese Bilder bewegen sich immer entgegengesetzt, das grössere (Corneal-) Bild geht mit der Lichtquelle, das kleinere (Linsen-) Bild in entgegengesetzter Richtung. An dieser entgegengesetzten Richtung kann man die beiden Bilder leicht erkennen, wenn man als Lichtquelle den Augenspiegel benützt. Hier kann man die Bilder nämlich nicht dadurch unterscheiden, dass das eine aufrecht, das andere verkehrt ist, denn der Reflex ist eben eine runde Scheibe.

Fehlt also in einem Auge, bei dem sich die Pupille vollständig durchleuchten lässt, das Reflexbild von der hinteren Linsenkapsel, so ist die Linse nicht im Pupillargebiete. Wir werden also schliessen, dass sie entweder durch Operation oder durch Trauma aus dem Auge entfernt wurde, oder wenigstens dass sie das Pupillargebiet vollständig verlassen hat (**Linsenluxation**). In den beiden

ersten Fällen wird man sehr oft Reste der Linsenkapsel nachweisen können, im letzten Falle dagegen wird man oft die Linse am Boden des Auges im Glaskörper finden. Man kann dann, wenn man stark von oben ins Auge hineinsieht, mit dem Augenspiegel oder auch bei genügend erweiterter Pupille bei seitlicher Beleuchtung eine meist graue, scharf begrenzte Masse finden, die schon durch ihre Form sehr leicht als Linse zu erkennen ist. In manchen Fällen ist sie dann im Glaskörper beweglich, kann bei entsprechenden Bewegungen des Auges und bei Beugung des Kopfes in das Pupillargebiet, ja selbst durch die Pupille in die vordere Kammer gelangen. In anderen Fällen ist sie aber fixirt und kann dann natürlich auch seitlich oder oben liegen.

Mitunter hat die Linse das Pupillargebiet nur theilweise verlassen. Dann sieht man oft an der Stelle, wo die Linse fehlt, die vordere Kammer tiefer. Daselbst kann auch Schlottern des betreffenden Iristheiles sichtbar sein. Durch die Pupille streicht dann der Linsenrand, an dessen Krümmung man leicht erkennen kann, nach welcher Seite die Linse verschoben ist. Ist die Linse getrübt, so erscheint sie im auffallenden Lichte meist grau, der linsenlose Theil der Pupille aber tiefschwarz. Ist dagegen die Linse durchsichtig, so ist der Linsenrand im auffallenden Lichte als hellglänzender Streifen zu sehen. An der hinteren Wand der Linse wird nämlich das von vorn einfallende Licht in der Nähe des Linsenäquators nicht durchgelassen, sondern total reflectirt (siehe Seite 13).

Nimmt man nun den Augenspiegel zur Hand, so erscheint der Theil der Pupille, in dem sich keine Linse vorfindet, hell erleuchtet. Ist die Linse ganz rein oder sind nur einige, mehr centrale Opacitäten in ihr vorhanden, so erscheint der Rand der Linse als schwarzer Streifen (J. A. Fig. 19). Die Ursache davon ist ebenfalls die totale Reflexion, welche die vom Augenhintergrunde reflectirten Strahlen an der vorderen Wand der Linse in der Nähe des Aequators erfahren. So kann also kein Licht von dieser Stelle ins Auge des Untersuchers gelangen und der Linsenrand nur schwarz aussehen.

Eine genaue Untersuchung des Theiles der Pupille, wo die Linse fehlt, kann uns darüber unterrichten, ob die Zonula zerrissen, oder nur gedehnt ist. Die Zonulafasern erkennt man als äusserst feine, graue Fäden, die vom Linsenrande gegen den Ciliarkörper hinziehen.

Ist die Linse durchsichtig, so kann man die Papille natürlich ebensowohl durch dieselbe als durch den linsenlosen Theil der Medien sehen. Im aufrechten Bilde gelingt es leicht, schon bei grösserer Entfernung den Fundus unter geringer Vergrösserung zu sehen, wenn man neben dem Linsenrande vorbeiblickt. Nähert man sich dem Auge, so kann man dann oft erst nach Correction wie für myopische Augen die Papille auch durch die Linse wahrnehmen. Dann erscheint sie natürlich grösser. Im umgekehrten Bilde fällt es dann auch nicht schwer, die Papille sowohl durch die Linse, als neben ihr vorbei, also doppelt zu sehen. Die peripheren Theile der Linse wirken ja wie die zerschnittene Convexlinse in einem Stereoskop, nämlich zugleich als Prisma und als Linse. Es erfolgt also eine Ablenkung der vom Fundus kommenden, durch die Linse gehenden Strahlen gegen die Basis dieses Prismas, in unserem Falle also gegen das Centrum der

Linse. Ist die Linse z. B. nach unten luxirt, so werden die von der Papille kommenden Strahlen durch die obere, in der Pupille sichtbare Hälfte der Linse nach unten abgelenkt. Wir erblicken dann unter dem Bilde der Papille, welches durch den linsenlosen Theil der Pupille sichtbar ist, ein zweites Bild, das durch die Linse entworfen wird. Diese Bilder sind nicht gleich gross. Das erste ist wegen der starken *H* im aphakischen Theile des Auges grösser, das zweite, untere, kleiner (siehe Seite 56). Auch können selbstverständlich die beiden Bilder nicht in derselben Ebene liegen. Das obere entsteht in grösserer Entfernung vom Auge, das untere in geringerer. Man kann sich leicht denken, dass das Sehvermögen des Patienten unter diesen Verhältnissen stark leiden muss. Es tritt eben monoculäre Diplopie auf. Es soll noch erwähnt werden, dass es, um die Papille doppelt zu sehen, meist nöthig ist, die Pupille künstlich zu erweitern, besonders dann, wenn der Linsenrand nicht genau durch die Mitte der Pupille streicht und erst bei erweiterter Pupille sichtbar wird.

Bei normaler Lage der Linse kann man den Linsenrand nur dann zu Gesicht bekommen, wenn die ganze Iris oder ein Theil derselben angeboren, nach Operation oder nach Trauma fehlt (bei Irideremie, bei Iriscolobom), oder wenn die Iris vom Ciliarrande abgerissen ist (Iridodialysis). Auch da erscheint er natürlich als ein feiner, dunkler Streifen, der besonders bei schrägem Einblick ins Auge sichtbar wird und parallel zum Cornealrande verläuft. Peripher davon können in solchen Fällen auch die Ciliarfortsätze als dunkle, kleine Hervorragungen von ungleicher Höhe zu sehen sein. Die feinen Fasern der Zonula kann man bei sehr genauer Untersuchung auch öfters von den Ciliarfortsätzen zum Linsenrande hinziehen sehen.

Bei den angeborenen Iriscolobomen zeigt mitunter der Rand der Linse eine eigenthümliche Veränderung. Er ist nämlich nicht in der gewöhnlichen Weise convex gegen die Ciliarfortsätze, sondern er zeigt an der Stelle des Coloboms eine leichte Einkerbung, ein sogenanntes **Linsencolobom.**

Nun zu den **Linsentrübungen**! Eine grosse Zahl der Linsentrübungen charakterisirt sich schon durch ihre Form, welche an die Linsenstructur erinnert. Sie sind eben speichen- oder strahlenförmig. Ferner sind die Linsentrübungen nicht selbständig beweglich, sie bewegen sich nur entsprechend den Bewegungen des Auges. Nur wenn die Linse selbst schlottert, so können sie sich sammt der Linse bewegen. Man wird dann an ihren sehr beschränkten Bewegungen, sowie an der Form der Trübungen und an dem gleichzeitigen Irisschlottern sie leicht als Linsentrübungen erkennen. Ferner müssen Linsentrübungen das Zustandekommen des Reflexbildes von der hinteren Linsenkapsel hindern, was ein wichtiges Merkmal ist, um sie von manchen fixen Glaskörpertrübungen, besonders solchen, die der hinteren Oberfläche der Linse anliegen, zu unterscheiden.

Von den Linsentrübungen sind zunächst solche zu unterscheiden, die an der Axe der Linse liegen, die sogenannten axialen Trübungen. Sie können zunächst am vorderen Pol der Linse liegen. Dahin gehört die Cataracta polaris anterior. Sie stellt im auffallenden Lichte einen kleinen, weisslichen Punkt oder eine kleine, weissliche Scheibe dar, die fast immer genau in der Mitte der Pupille sitzt. Ragt sie als

kleine Pyramide in die vordere Kammer hinein, so nennt man sie Cataracta pyramidalis. Sehr häufig ist sie mit centralen Hornhauttrübungen vergesellschaftet. Betrachtet man diese Staarform im durchfallenden Lichte, so erscheint sie als schwarzer Punkt in der Mitte der Pupille und bleibt natürlich bei jeder Stellung des Auges in der Mitte der Pupille, da sie in der Pupillarebene liegt. Sie sieht immer schwarz aus, weil sie sehr dick ist und gar kein Licht durchlässt.

Im Centrum der vorderen Corticalis kann man auch mitunter eine Gruppe von kleinen, weisslichen Pünktchen als angeborene Linsentrübung wahrnehmen oder man sieht eine Figur, die aus kurzen drei Strahlen besteht, die in Form eines umgekehrten Y angeordnet sind (J. A. Fig. 4). Manchmal sind auch unregelmässigere Streifen ebenfalls nahe dem vorderen Pole in der Corticalis gelegen (J. A. Fig. 3).

Genau im Centrum der Linse finden sich in seltenen Fällen angeborene, kugelige Trübungen von nur sehr geringem Durchmesser, die bei seitlicher Beleuchtung weisslichgrau, in durchfallendem Lichte sehr dunkel oder selbst ganz undurchsichtig sind. Auch durchscheinende, sehr zarte, kugelige Trübungen im Centrum der Linse wurden schon gesehen. Alle diese Trübungen manifestiren sich im durchfallenden Lichte als mehr oder weniger dunkelgraue Scheiben, die in der Mitte am wenigsten Licht durchlassen. Sie sind als angeborene Kernstaare aufzufassen.

Am hinteren Pole der Linse kommt, ebenfalls angeboren, eine Cataracta polaris posterior vor. Dieselbe ist meist nicht grösser als ein Hanfkorn, bei seitlicher Beleuchtung weiss und ragt wohl auch spitz gegen den Glaskörper vor. Nach vorne zeigt sie eine glatte Begrenzung. Es handelt sich hier um eine Cataracta spuria. In Wirklichkeit liegt diese Trübung nicht in der Linse, sondern blos an ihrer hinteren Fläche. Sie stellt den Rest des vorderen Endes der Arteria hyaloidea dar.

Ebenfalls nahe dem hinteren Pole, doch aber eigentlich in der hinteren Corticalis, sitzen manche erworbene, scheiben- oder sternförmige Trübungen. Durch die strahlige Form ist schon ihre Lage in der hinteren Corticalis angedeutet (J. A. Fig. 6, 7, 8). Sie weisen sehr oft auf tiefere Erkrankungen des Auges hin, indem sie mit Retinal- und Chorioidealkrankheiten in Verbindung stehen, so dass man durch sie erst aufmerksam gemacht wird, den Fundus genau, besonders in der Peripherie zu untersuchen.

Die ganze Axe der Linse vom vorderen zum hinteren Pol der Linse durchsetzt der Spindelstaar, Cataracta fusiformis. Diese Staarform besteht aus einem bei seitlicher Beleuchtung bläulich-weiss aussehenden Faden, der sich vom hinteren zum vorderen Linsenpol erstreckt und im Kern sich etwas angeschwollen zeigt. Natürlich muss man schräg ins Auge hineinsehen, um die Trübung in ihrem ganzen Verlaufe sehen zu können.

Der Schichtstaar — Cataracta perinuclearis, zonularis — kann nur bei erweiterter Pupille in seiner ganzen Ausdehnung übersehen werden. Bei enger Pupille nimmt man zumeist wahr, dass es sich um eine in der Tiefe der Linse gelegene Trübung handelt.

Bei sehr schrägem Einblick kann man wohl auch die Diagnose stellen, indem man z. B., von der Schläfenseite her in das Auge sehend, nahe dem inneren Rande der Pupille einen schmalen, hellrothen Streifen freier Pupille wahrnimmt, während die übrigen Theile der Pupille eine graue Trübung erfüllt. Findet man bei allen verschiedenen Blickrichtungen denselben Befund, so kann man sich das Bild der Trübung hieraus construiren.

Doch wird man dieselbe auf einmal erst bei Mydriasis sehen können. Dann zeigt sich, gerade von vorne betrachtet, eine zum Pupillarrande concentrisch gelegene, scheibenförmige Trübung von mehr oder weniger bedeutendem Durchmesser. Es fällt an derselben oft auf, dass sie im Centrum weniger saturirt ist als am Rande (J. A. Fig. 15, 16). Dies erklärt sich daraus, dass die Trübung nur die um den Kern gelegenen Schichten der Corticalis betrifft, wie dies schon der Name „Cataracta perinuclearis" besagt. Das Licht, das durch das Centrum der Trübung hindurchfällt, passirt den durchsichtigen Kern, während das Licht, das durch die Randtheile der Trübung geht, auf eine grosse Zahl trüber Schichten, die hier unmittelbar hintereinander liegen, trifft. Die trüben Schichten haben ganz die Form zweier mit den hohlen Flächen gegeneinander zusammengelegter Uhrgläser. In dem von diesem eingeschlossenen Hohlraum liegt der durchsichtige Kern. Freilich ist manchmal die Trübung der perinuclearen Lagen so dicht, dass selbst im Centrum wenig oder gar kein Licht durchdringt. Um die scheibenförmige Trübung lagert sich ein hellrother Ring, gebildet durch den daselbst unbehinderten Reflex vom Fundus.

Nicht immer ist aber die periphere Zone der Corticalis vollständig durchsichtig. Manchmal finden sich kleine, radiär gestellte Streifchen vor, die vom Rande der Trübung in diese Randzone hineinragen. Diese bezeichnet man als „Reiterchen", und zwar deshalb, weil man (am besten bei seitlicher Beleuchtung) sehen kann, dass sie $\wedge$förmig sind und mit dem einen ihrer Füsse in der vorderen Corticalis, gewöhnlich unweit vom Rand der Trübung beginnen und mit dem anderen Fusse in der hinteren Corticalis aufhören, also gleichsam auf dem Rande der grossen, scheibenförmigen Trübung reiten (J. A. Fig. 17, 18). Doch finden sich auch mitunter ganz unregelmässige Trübungen in der peripheren Corticalzone vor, z. B. dem Linsenrande parallel verlaufende Streifen. Im Centrum der trüben Scheibe lagern derselben oft kleine, fleckige, bei seitlicher Beleuchtung weissliche Trübungen auf.

Eine solche Perinuclearcataracta kann auch in einem Auge in doppelter, selbst dreifacher Form vorkommen, das heisst, es finden sich zwei oder drei solche schalige Trübungen sowohl vorne als hinten in der Linse, welche eine von der anderen immer durch durchsichtige Lagen getrennt sind. Ja selbst eine axiale Trübung kann sich noch hinzugesellen, die sich nach vorne in einen Pyramidalstaar fortsetzt, so dass sich ein sehr complicirtes und zierliches Bild darbietet. Diese Details sind allerdings hauptsächlich bei seitlicher Beleuchtung wahrnehmbar.

Durch den durchsichtigen Randtheil der Linse kann man in allen Fällen, wo diese Randzone genügend breit und frei von Trübungen ist, leicht im aufrechten und umgekehrten Bild durchsehen. In anderen

Fällen, wo der Durchmesser des Schichtstaars sehr gross ist und wo sich ausserdem noch Reiterchen oder andere Trübungen in der Randzone finden, gelingt dies nur im umgehrten Bilde, manchmal nur sehr mühsam, stets natürlich nur bei künstlich erweiterter Pupille.

Bei beginnender Cataracta senilis gehen den eigentlichen Trübungen oft graue radiäre Streifen voraus, die im durchfallenden Lichte, aber nur bei einer gewissen Richtung des Lichteinfalls, zu sehen sind. Sie sind bedingt durch Spaltbildung zwischen den Linsenfasern, welche mit Flüssigkeit von anderem Brechungsindex als die Linsenfasern erfüllt sind. Durch totalen Reflex an diesen Stellen bei einer bestimmten Stellung der Lichtquelle erscheinen diese grauen Streifen. Die eigentlichen Linsentrübungen treten dann als graue, immer sichtbare Streifen in der vorderen und hinteren Corticalis meist nur von geringer Breite auf (J. A. Fig. 10, 11, 12, 13). Dieselben liegen gewöhnlich hauptsächlich im unteren Theile der Linse, verbreitern sich später immer mehr und geben dann die glänzenden, breiten Speichen, wie sie bei Cataracta nondum matura gesehen werden. Mitunter besteht im Beginne von Cataracta senilis eine eigenthümliche Linsentrübung, die man wegen ihrer Aehnlichkeit mit dem Greisenbogen der Cornea als Gerontoxon lentis — Greisenbogen der Linse — bezeichnet. Es sind das in den Randtheilen der Linse gelegene, aber immer vom Linsenäquator durch eine durchsichtige Schichte noch getrennte, gabelförmige Trübungen, die zum Theil nach der vorderen, zum Theil nach der hinteren Fläche der Linse gerichtet sind, sich also ähnlich verhalten wie die Reiterchen bei Cataracta perinuclearis. Sie liegen nahe aneinander, haben ganz kurze Fortsätze und bilden einen Ring, der aber immer etwas vom Linsenäquator absteht, ähnlich wie der Greisenbogen der Cornea durch einen durchsichtigen Streifen der Hornhaut vom Hornhautrande getrennt ist. Sie verlängern sich später gegen die Linsenpole hin und verbreitern sich an der Basis. Auch Combination von sternförmigen, centralen und streifigen, peripheren Corticaltrübungen kommt vor (J. A. Taf. II, Fig. 14).

Oft und besonders häufig bei hochgradiger Myopie beginnt die Cataracta mit einer Trübung der zunächst um den Kern gelegenen Corticalschichten, so dass man ein Bild bekommt, das fast an eine Cataracta perinuclearis erinnert, nur dass die Begrenzung niemals eine so scharfe ist.

In sehr seltenen Fällen kann es sich auch ereignen, dass die Corticalis sich verflüssigt und durchsichtig wird, der Kern aber sich innerhalb derselben senkt. Wir haben es dann mit einer Cataracta Morgagni zu thun, die aber statt wie gewöhnlich aus einer trüben Emulsion aus einer klaren Flüssigkeit mit dem darin liegenden Kern besteht. Auf den ersten Blick ähnelt der Befund sehr dem einer luxirten Linse. Der gesenkte Kern aber hat viel geringere Dimensionen als diese und ist in den Grenzen des Kapselsackes beweglich, welch' letzteren man manchmal ganz deutlich an den seiner inneren Wand anhaftenden Linsenresten oder Cholestearinkrystallen erkennen kann.

Bei Cataracta nigra erscheint die Pupille bei oberflächlicher Betrachtung dunkel. Bei seitlicher Beleuchtung allerdings wird man die Trübung erkennen und vollends wird man darüber aufgeklärt

werden, wenn man den Spiegel zur Hand nimmt, denn die Pupille ist nicht zu durchleuchten.

Diffuse Linsentrübungen, welche noch so viel Licht durchlassen, dass das Reflexbild von der hinteren Linsenkapsel entstehen kann, bewirken, dass dasselbe roth erscheint, sowie die aufgehende Sonne durch eine trübe Atmosphäre roth gesehen wird.

Der Totalstaar jugendlicher Individuen kann in ganz verschiedener Weise beginnen. Entweder ebenfalls mit radiären Trübungen in der Corticalis (J. A. Fig. 5; Fig. 9), oder mit ganz unregelmässig in der ganzen Linse und auch in ihrem Kern verstreuten grauen Flecken.

Bei complicirten Cataracten geht die Trübung sehr häufig von der hinteren Corticalis aus. Doch kommt dies auch bei jugendlichen Individuen vor, bei denen man im Stadium der Cataracta incipiens und auch nach einer von vorzüglichem Erfolge für das Sehen begleiteten Operation keine Veränderungen im Fundus nachweisen kann.

Seltene Formen von angeborenen Cataracten, die aus einzelnen kleinen, über die ganze Linse verbreiteten Trübungen bestehen, sind die Cataracta stellata und die Cataracta punctata. Bei der ersteren liegen eine grosse Zahl von kleinen, grauen Punkten in der Linse verstreut und gruppiren sich manchmal in der vorderen Corticalis zu einer strahligen Figur. Bei der zweiten findet man eine sternförmige Zeichnung, an deren Strahlen sich wieder secundäre, feine Streifen ansetzen, so dass man ein sehr zartes, an die Zusammensetzung der Linse aus ihren Fasern erinnerndes Bild vor sich hat.

Haben fremde Körper die vordere Linsenkapsel durchbohrt, sind sie in der Linse stecken geblieben, so sieht man sie im durchfallenden Lichte als schwarze, unbewegliche Flecke. Meist sind sie von einer Linsentrübung umgeben, die allerdings in seltenen Fällen auch fehlen oder so gering sein kann, dass man, im Falle es sich um einen Metallsplitter handelt, selbst den Glanz desselben bei seitlicher Beleuchtung sehen kann.

Nach Staaroperationen sowie nach Traumen bleiben Kapsel- und Linsenreste zurück, die als Cataracta membranacea bezeichnet werden. Sie stellen entweder eine dichte Membran dar, die keine Lücken zeigt und nur rothes Licht vom Fundus durchlässt, oder es sind Lücken nachweisbar, durch die man den Fundus deutlich sehen kann. Man bemerkt oft, dass solche membranöse Trübungen ein ganz verschiedenes Aussehen im auffallenden und durchfallenden Lichte zeigen. So sieht man manchmal im auffallenden Lichte eine ziemlich zarte Membran, kann aber bei der Untersuchung mit dem Spiegel sehr gut verstehen, wie durch dieselbe das Sehen stark beinträchtigt wird, denn solche Membranen benehmen nicht nur Licht, sondern sie machen auch durch die unregelmässige Brechung des Lichtes, die sie bewirken, starken unregelmässigen Astigmatismus.

Es gibt auch Veränderungen, auf die wir gleich hier eingehen wollen, weil sie leicht mit Cataract verwechselt werden können, weshalb sie auch den übrigens sehr unpassenden Namen des Glaskörperstaars erhalten haben. Es bildet sich nämlich besonders häufig nach Verletzungen und bei Fällen, wo sich fremde Körper im Corpus vitreum befinden, eine Trübung hauptsächlich der vorderen Partien des

Glaskörpers, die wie eine Schale die hintere Fläche der Linse umgibt, während die Linse selbst noch von Trübungen frei sein kann. Man erhält dann aus der Tiefe des Auges durch die Pupille einen hellgelben oder graugelben Reflex, den man leicht auf eine Trübung der hinteren Schichten der Linse zurückzuführen geneigt sein könnte. In allen Fällen, wo die Linse davor klar ist, kann man mittels des Reflexbildes von der hinteren Linsenkapsel nachweisen, dass die Trübung nicht in der Linse ihren Sitz hat. Selbst wenn dies nicht gelingen sollte, weist die äusserst glatte Begrenzung der Trübung nach vorn darauf hin, dass es sich um eine hinter der Linse gelegene Glaskörpertrübung handelt. Ausserdem kommt die gelbliche Farbe viel häufiger einem Exsudat im Glaskörper zu.

5. Glaskörper.

Im Glaskörper sind zunächst fixe von beweglichen Trübungen zu unterscheiden. Die fixen Trübungen kann man durch ihre tiefere Lage, durch ihre zur Linsenstructur in keiner Beziehung stehende (vor Allem nicht strahlige) Form diagnosticiren. Ferner wird man mittels der seitlichen Beleuchtung bei erweiterter Pupille die Linse durchmustern und sich von ihrer Durchsichtigkeit durch die Erzeugung des Reflexbildes von der hinteren Linsenkapsel überzeugen. Bei stärkeren Linsentrübungen und gleichzeitig vorhandenen fixen Glaskörpertrübungen kann es allerdings schwer werden, die Unterscheidung zu machen.

Bewegliche Trübungen des Glaskörpers sind dagegen leicht als solche zu erkennen, indem sie mehr oder weniger ausgiebige Excursionen machen, die von den Bewegungen des Auges selbst unabhängig sind. Mit Linsentrübungen könnte man sie nur dann verwechseln, wenn die Linse selbst beweglich ist. Zugleich kann man aus der Schnelligkeit, mit welcher sie die Pupille durchfliegen, einen Schluss auf die Consistenz des Glaskörpers ziehen. Je schneller sie sich bewegen, desto flüssiger ist natürlich der Glaskörper. Uebrigens ist es auch möglich, dass sich der Glaskörper von den ihm benachbarten Theilen abgehoben hat und zwischen ihm und den letzteren sich seröse Flüssigkeit mit darin suspendirten Flocken befindet, so dass man dann einen Fehlschluss zieht, wenn man die sichtbare Beweglichkeit dieser Flocken benützt, um sich über die Consistenz des Corpus vitreum ein Urtheil zu bilden.

Angeborene Anomalien.

Als solche müssen wir die persistirende Arteria hyaloidea, den sichtbaren persistirenden Cloquet'schen Canal, die angeborenen Glaskörpergefässe und das Colobom des Glaskörpers anführen.

Bekanntlich zieht im fötalen Auge die Arteria hyaloidea, von einem Haupt- oder Nebenaste der Arteria centralis Retinae entspringend, von hinten nach vorne durch den Glaskörper zum hinteren Linsenpol. Von diesem Gefäss, von dem Reste bei gewissen Thieren constant gefunden werden, sieht man auch beim Menschen in seltenen Fällen Ueberbleibsel in verschiedenen Formen als **persistirende Arteria**

hyaloidea. Es sind dies entweder kurze graue Zapfen, die von der Papille, wo sie fixirt sind, in den Glaskörper hineinragen. Man kann ihre Spitze bereits aus grösserer Entfernung mit dem Spiegel sehen. Ebenso kann man mit Convexlinsen genauer untersuchen, wie weit sie nach vorne prominiren. Es kommt nun aber auch vor, dass ein solcher Bindegewebsstrang bis zur hinteren Linsenkapsel zieht, wo er sich ungefähr am hinteren Linsenpol befestigt. Aeusserst selten ist es, dass man innerhalb eines solchen Stranges noch eine Blutsäule wahrnehmen kann.

Mitunter erscheint das Gefäss von einem grauen, schlauchartigen Gebilde umgeben, ein Rest des Cloquet'schen Canals, dessen Wandungen verdickt sind. Es erweitert sich in seinen hinteren Theilen und bedeckt die ganze Papille oder einen Theil derselben, in den Fundus hinein strahlige, graue Ausläufer schickend. Auch andere Bildungen müssen hieher gezählt werden; so sah man in einem Falle einen glockenartig geformten, durchscheinenden Körper mit der Spitze an der Papille sitzen.

Angeboren kommen auch **Gefässe in Glaskörper** vor, die mit den Retinalgefässen zusammenhängen. Es sind dies Gefässschlingen, die ganze Convolute bilden und nicht nur in der Gegend der Papille, sondern auch an anderen Stellen ihren Ursprung nehmen können. Dahin gehören wohl auch jene Fälle, wo man Gefässe sieht, die von der Papille entspringen, weit nach vorne in den Glaskörper verlaufen und dann wieder zur Papille zurückkehrten. Die Vascularisation der Retina erfolgt eben bei der Entwickelung des Auges vom Glaskörper aus. Bei einzelnen Thieren (Fröschen) besteht eine Vascularisation des Glaskörpers durch das ganze Leben hindurch.

Meist in Verbindung mit Colobomen der Chorioidea, doch auch ohne solche finden sich im unteren Theile des Auges als angeborene Anomalien bläulichweisse oder grünlichweisse bindegewebige Massen, die sich bis gegen die Papille, ja bis zu derselben hinauf erstrecken und also einen nach unten (doch nicht immer direct nach unten) gelegenen Sector des Fundus einnehmen können. Dieselben sind vascularisirt und stellen einen **Rest der bindegewebigen Glaskörperanlage** dar. Im Embryo nämlich tritt die Anlage des Glaskörpers, vom mittleren Keimblatte ausgehend, durch die Retinalspalte und gelangt so hinter die Linse.

Erworbene Anomalien.

Glaskörpertrübungen können sich in verschiedenen Formen zeigen: 1. Als Glaskörperstaub. 2. Als Fäden, Flocken oder grössere Klumpen. 3. Als Membranen. 4. Als diffuse Glaskörpertrübung

Ad 1. Der Glaskörperstaub ist sehr oft ungemein schwer zu sehen und entgeht sehr leicht einer oberflächlichen Untersuchung. Man muss unbedingt zu einem lichtschwachen Spiegel — Helmholtzschen Beleuchtungsapparat oder wenigstens Planspiegel greifen, um ihn zu sehen. Ausserdem ist es fast immer nothwendig, die Pupille künstlich zu dilatiren und sich, vorausgesetzt dass man nicht Myop ist, durch Vorsetzen von Convexlinsen für den Glaskörper einzustellen. Man wird dann in solchen Fällen einen ungemein feinen Staub sehen,

der zumeist den hinteren Theil des Glaskörpers erfüllt und bei Bewegungen des Auges deutlich durcheinanderwirbelt. Die einzelnen Theile, aus denen diese Trübung besteht, sind ungemein klein, eben sichtbar. Allerdings können grössere Flocken oder Wolken darunter gemischt sein, die dann viel leichter zu sehen sind. Der Staub ist so fein, dass er den Einblick auf den Fundus gar nicht hindert. Man ist im Stande, die Papille im aufrechten und umgekehrten Bilde ganz gut zu sehen. Der Nachweis des Glaskörperstaubes ist deshalb so wichtig, weil er für Lues als aetiologisches Moment einer Retinochorioiditis nahezu pathognomonisch ist (J. A. Fig. 21).

Ad 2. Glaskörpertrübungen in Form von grösseren Flocken oder Fäden erscheinen entweder sehr leicht beweglich oder sie sind nur wenig oder gar nicht beweglich. Das letztere kommt selten vor. Sie erscheinen grau, fast schwarz (J. A. Fig. 22, 23), in seltenen Fällen dagegen, wo sie viel Licht reflectiren, bläulich- oder grünlichweiss, sehnig glänzend.

Ad 3. Glaskörpermembranen verbinden oft grössere flockige oder klumpige Trübungen. Sie entstehen häufig in Folge von Blutungen, doch kommt auch in Folge von Cysticercus eine eigenthümliche Art von membranösen Glaskörpertrübungen vor. Es ist dies ein ganzes Fächerwerk von schleierartigen Trübungen, die miteinander zusammenhängen und sich bei Bewegungen des Auges nicht durcheinander bewegen, sondern zusammen Locomotionen machen. Sie sind so eigenthümlich, dass ihr Vorhandensein allein schon für Jemand, der solche Fälle gesehen hat, auf Cysticercus hinweist. Glaskörpermembranen können sich auch vascularisiren und dann zur Verwechslung mit Netzhautabhebung Veranlassung geben.

Ad 4. Diffuse Glaskörpertrübung ist nur daran kenntlich, dass in Fällen, wo Trübungen der übrigen Medien, Hornhaut und Linse auszuschliessen sind, die Details des Fundus doch durch keine Correction zur Anschauung gebracht werden können. Die Papille erscheint in solchen Fällen stark geröthet, was durch das trübe Medium bedingt ist. Eine diffuse Glaskörpertrübung ganz ohne eingestreute geformte Opacitäten, als: Flocken, Fäden, kommt wohl sehr selten vor. Es ist aber häufig zu sehen, dass bei Glaskörperflocken die dazwischen gelegenen Partien des Glaskörpers diffus getrübt erscheinen.

Glaskörperblutungen. Viele der flockigen und klumpigen Glaskörpertrübungen sind auf Blutungen zurückzuführen. Doch kann man in manchen Fällen direct die Blutfarbe der Trübungen nachweisen. Entweder, wenn das Roth sehr hell ist, bei der Spiegeluntersuchung, oder im auffallenden Lichte, wenn man bei maximaler Mydriasis den Glaskörper mit seitlicher Beleuchtung durchleuchtet. Oft behalten solche blutige Ergüsse sehr lange ihre hellrothe Farbe bei. Gleichzeitig ist mitunter ein blutiger Beschlag auf der hinteren Wand der Linse zu finden oder man kann den Zusammenhang der im Glaskörper suspendirten Blutklumpen mit einem Gefässe der Retina constatiren. Diese Blutungen können sehr plötzlich auftreten und so massenhaft sein, dass sie das qualitative Sehen vollständig aufheben. Es ist nur mehr quantitative Lichtempfindung vorhanden, ja selbst diese kann fehlen (ohne dass Netzhautabhebung gleichzeitig vorhanden sein

müsste). In solchen Fällen gelingt es meist nicht mit dem Augenspiegel Licht aus der Pupille zu bekommen. Dieselbe erscheint schwarz, als ob reife Cataracta da wäre. Das Reflexbild von der hinteren Linsenkapsel ist aber mit voller Deutlichkeit zu demonstriren. Oefters bekommt man übrigens in gewisser Richtung mit dem Augenspiegel einen rothen Reflex, kann aber bei genauerer Untersuchung constatiren, dass dies nur der Reflex von der vorderen Fläche der Blutmasse ist, nicht der Reflex vom Fundus. Solche Blutungen können sich übrigens wieder resorbiren, so dass der Fundus sichtbar wird.

Bei sehr schiefem Einblick mit dem Spiegel kann man auch Blutungen oder Extravasate in der Gegend des Petit'schen Canals nachweisen (J. A. Fig. 20).

Synchysis scintillans. Ein sehr schönes Bild gibt die Synchysis scintillans oder Scintillatio bulbi (von scintilla, der Funke). Bei diesem Zustande, der auch in sonst ganz normalen Augen vorkommen kann, doch meist bei solchen mit anderen pathologischen Veränderungen gesehen wird, sind Krystalle von Cholestearin, Tyrosin und Phosphatmassen im Glaskörper vorhanden. Sie stellen sich als hellglänzende Punkte dar, die wie Funken aussehen (J. A. Fig. 24). Sie sind von verschiedener, aber nie sehr bedeutender Grösse und entweder ganz frei beweglich oder nur wenig beweglich, ja sie sind auch schon im Glaskörper ganz fixirt gesehen worden. Auch auf Glaskörpermembranen können sie aufsitzen.

Luftblasen sind nach perforirenden Verletzungen der Augenmembranen wiederholt im Glaskörper gesehen worden. Sie zeigen sich als hellglänzende, vollständig runde Blasen mit dunklem Rand. Sie verschwinden übrigens bald.

Glaskörperabhebung. In Folge verschiedener Processe kann sich der Glaskörper von seiner Umgebung abheben, und zwar entweder im vorderen Bulbustheil (vordere Glaskörperabhebung), oder am hinteren Pol des Auges oder dessen Umgebung, so dass der Glaskörper in der Gegend der Papille fixirt bleibt, während er sich ringsherum abhebt und so eine Trichterform annimmt. Eine Spiegeluntersuchung und eventuelle Diagnose dieser Veränderung ist natürlich nur dann möglich, wenn Cornea und Linse den Einblick auf den Glaskörper gestatten. So kommen also hier nur diejenigen Fälle in Betracht, wo hochgradige Myopie, eine Cataractoperation oder allenfalls eine Verletzung die Ursache der Glaskörperabhebung ist. Im ersteren Falle löst sich der Glaskörper sowohl von der Retina im hinteren Bulbusabschnitt, als auch von der Papille ab, nimmt also nur den vorderen Theil des hinter der Linse gelegenen Raumes ein. Im zweiten Falle bleibt der Glaskörper meist mit der Papille im Zusammenhange. Bei progressiver Myopie findet man manchmal, wenn man sich nicht vollständig für den Fundus einstellt, eine weissglänzende bogenförmige Linie, welche in einiger Entfernung von der Papille ihren inneren Rand halbkreisförmig umgibt und welche gegen die Details der Retina leichte parallaktische Verschiebung zeigt. Dieselbe wird als der Rand des abgehobenen Glaskörpers betrachtet. Nach Operationen ist es in seltenen Fällen gelungen, die Glaskörperabhebung zu diagnosticiren, indem man in einem Theil des Glaskörpers eine

Membran sah, die blasenartig gegen das Centrum des Glaskörpers hereinhing, mit ihren Rändern an die Retina fixirt war und keine Gefässe zeigte, vielmehr konnte man durch dieselbe die Gefässe der Retina sehen. Die Blase zeigte durch ihr Schwappen, dass sie einen serösen Inhalt besass. Das Erkennen einer solchen Glaskörperabhebung nach Operationen wäre deshalb von praktischer Wichtigkeit, weil sich an dieselbe sehr leicht Netzhautabhebung anschliesst und so der anfangs sehr gute Erfolg der Operation vernichtet werden kann.

Glaskörperabscesse. In sehr seltenen Fällen wurden Glaskörperabscesse als gelbliche oder grauliche, mitunter durchscheinende, gelatineartig zitternde Massen im Auge gesehen. Es sind hier nur eben jene seltenen Vorkommnisse gemeint, wo eine ganz circumscripte Infiltration des Glaskörpers erfolgt, während die Umgebung ganz oder fast ganz durchsichtig ist, denn bei diffusen Eiterbildungen ist natürlich die Augenspiegeluntersuchung unmöglich.

Gefässneubildung im Glaskörper. Wir haben schon oben erwähnt, dass auf Glaskörpermembranen sich Gefässe bilden können, welche mit Gefässen der Retina oder des Ciliarkörpers in Verbindung stehen. Es sind auch einzelne, seltene Fälle bekannt, wo sich in den durchsichtigen Glaskörper Gefässschlingen hinein erstreckten, die von den Gefässen der Retina hervorsprossten und deren Bildung und Rückbildung beobachtet werden konnte (J. A. Fig. 72).

Fremde Körper, die durch die Augenmembranen in den Glaskörper gedrungen sind, können, sobald die vor dem Corpus vitreum gelegenen Medien den Durchblick gestatten und sobald der Glaskörper selbst nicht ganz dicht getrübt ist, mit dem Augenspiegel oder, wenn sie weit vorne liegen, auch bei seitlicher Beleuchtung gesehen werden. Meist sind sie nur im Anfang von durchsichtigem Glaskörper umgeben, so dass man sie in ihrer wahren Form und mit ihrem wahren Glanze (Metallsplitter) sehen kann. Gewöhnlich umgibt sie bald eine trübe Schicht des Glaskörpers. Zu solchen fremden Körpern sieht man dann manchmal strangförmige Glaskörpertrübungen ziehen, die entweder den Weg bezeichnen, den der Fremdkörper nach seinem Durchtritt durch Sklera und Chorioidea bis zu seiner jetzigen Lage genommen hat, oder, wenn der Fremdkörper den ganzen Glaskörper durchflogen hat und an einer seiner Einbruchspforte gegenüberliegenden Stelle der Glaskörperumhüllung wieder abgeprallt ist, so kann auch von dieser Stelle zu dem Fremdkörper selbst eine verdichtete Partie des Glaskörpers ziehen. Indessen hat man auch Fälle beobachtet, wo Metallsplitter sehr lange Zeit nach der Verletzung von gar keiner Trübung des Glaskörpers umgeben waren. Meist aber vermehrt sich die Glaskörpertrübung bald so, dass man nur durch die stärkere Ansammlung an einer Stelle den Sitz des fremden Körpers erkennen kann oder es ist auch dies nicht mehr möglich. Ausserdem gesellt sich dann oft Iridokyklitis hinzu, wodurch die Pupille durch Exsudat verschlossen wird. Der Nachweis eines fremden Körpers im Glaskörper hat bedeutende Wichtigkeit, da man dann eventuell im Stande ist, denselben zu beseitigen.

Entozoen. Im Glaskörper des menschlichen Auges kommt der Cysticercus cellulosae vor, und zwar kann derselbe sich gleich

daselbst vorfinden, oder er sitzt ursprünglich subretinal, durchbricht später die Netzhaut und gelangt so in den Glaskörper. Dort liegt er entweder frei oder ist von Trübungen umgeben. Man sieht eine bläulichweise, gefässlose Blase, die an der Oberfläche feinkörnig erscheint und am Rande irisirt. Entweder erblickt man nur die Stelle, wo der Kopf sitzt, als weissen Fleck, oder derselbe ragt mit Saugnäpfen und Hakenkränzen hervor (L. A. Taf. VII, Fig. 5). An der Blase selbst sieht man, wenn das Thier lebt, eigenthümliche undulirende, mit der peristaltischen Bewegung des Darmes vergleichbare Bewegungen. Der Hals und der Kopf zeigen dagegen sehr selbständige Bewegungen, die jedoch nur zu Zeiten auftreten. Liegt die Blase noch ganz hinten an der Netzhaut, so beträgt ihre Grösse 2 bis 4 P. D.

II. Capitel.

Sehnerv.

A. Angeborene Anomalien.

Physiologische Excavation.

Die Aushöhlungen des Sehnerven — Excavationen — können entweder partiell oder total sein. Dieser Unterschied fällt hinsichtlich der Diagnostik zusammen mit der Unterscheidung zwischen den physiologischen (angeborenen) und den pathologischen Excavationen. Hiemit ist nicht gesagt, dass pathologische Excavationen nicht auch im Beginne partiell sein können, doch kann man unter den gewöhnlichen Umständen eine Excavation erst als pathologisch bezeichnen, sobald sie total geworden ist, den einzigen Fall etwa ausgenommen, wo man die Erweiterung und Vertiefung einer partiellen Excavation mit dem Augenspiegel verfolgen kann.

Es gibt also folgende Arten von Excavationen:

I. **Physiologische Excavation** (angeborene, partielle Excavation).




Fig. 70.

Sie besteht in einer Einsenkung der Papille entweder in ihren centralen Partien oder der Theile aussen vom Centrum. Nie nimmt sie die ganze Papille ein, sondern immer ist ein ring- oder sichelförmiger Theil derselben nicht excavirt (siehe Fig. 70).

II. **Pathologische Excavation.** Alle pathologischen Excavationen haben das Gemeinsame, dass sie total sind, dass sie die ganze Papille betreffen. Man kennt zwei Arten der pathologischen Excavation:

1. **Die glaukomatöse Excavation.** Bei dieser findet man an Stelle der Papille eine tiefe Grube, die bis zum Rande reicht. Die Lamina cribrosa ist nicht in ihrer normalen Lage, sondern nach hinten in den Opticus hinein ausgebaucht (siehe Fig. 72).

2. **Die atrophische Excavation.** Hier erstreckt sich die Vertiefung wohl auch über die ganze Papille, doch ist sie nicht bedeutend, nur seicht, muldenförmig. Die Lamina cribrosa ist in ganz normaler Lage. Die Einsenkung ist nur dadurch hervorgerufen, dass das Gewebe des Nervenkopfes geschwunden ist (siehe Fig. 73).

Bezüglich der ophthalmoskopischen Diagnose der Excavation sei gleich darauf hingewiesen, dass dabei ganz besonders das Verhalten der Gefässe massgebend ist. Die physiologische Excavation stellt sich bei der Augenspiegeluntersuchung folgendermassen dar: Zunächst bemerkt man, dass die Farbe der Papille keine gleichmässige ist. Das Gelbroth derselben geht an einer Stelle entweder plötzlich oder ziemlich allmählich in eine weissliche oder ganz weisse Farbe über. Diese Stelle zeigt sich rund oder oval und liegt entweder in der Mitte der Papille oder etwas nach aussen davon (J. A. Fig. 41, 42, 43, 44; W. u. M. Fig. 2, 3, 4, 5; L. A. Taf. II, Fig. 4, 5). Manchmal ist sie auch ganz excentrisch gelagert, so dass ihr äusserer Rand mit dem äusseren Rande der Papille zusammenfällt. In solchen Fällen ist natürlich der übrige, in gewöhnlicher Weise gefärbte Theil der Pupille sichelförmig mit der Concavität nach aussen. Nur selten kommt es vor, dass diese entfärbte Stelle den unteren Theil der Papille einnimmt. Diese helle Farbe rührt davon her, dass dem Bereiche derselben eine Vertiefung von grubiger oder trichterförmiger Gestalt entspricht, die bis in die Gegend der Lamina cribrosa reicht. Man bekommt in Folge dessen den hellen Reflex von dem Bindegewebe dieser letzteren sehr deutlich.

Die Grösse der excavirten Partie ist sehr verschieden. Sie kann nur einen kleinen Theil der Papille einnehmen oder auch so gross sein, dass der normal gefärbte Theil ganz klein gegen dieselbe erscheint und z. B. nur auf einen Ring oder eine Sichel reducirt ist, deren Breite etwa den sechsten oder achten Theil des P. D. beträgt. Immer muss sich aber ein deutlich nicht excavirter Theil der Papille nachweisen lassen (J. A. Fig. 44).

Die Gefässe biegen um den Rand dieser hellen Stelle entweder ziemlich allmählich oder sehr stark geknickt herum und senken sich in die Tiefe. Sie können wohl je nach der Beschaffenheit der Excavation an einer Stelle fast am Rande der Papille umbiegen, immer aber muss ein Theil der Gefässe ohne Biegung über den Papillenrand verlaufen und erst innerhalb der Papille Biegungen zeigen. Steigen die Gefässe sehr plötzlich in die Tiefe, so zeigen sie am Rande der Excavation eine auffallend dunkle Farbe, sie enden daselbst gleichsam mit einer sehr dunkel gefärbten Anschwellung (J. A. Fig. 42, 43, 44; W. u. M. Fig. 3). Dies kommt daher, dass man an dieser Stelle ganz senkrecht auf die Blutsäule sieht, so, als ob man von oben in ein mit dunkler Flüssigkeit gefülltes Glasrohr hinein-

sehen würde. Die sehr dicke Flüssigkeitsschichte, in welche man so das Licht hineinwirft, bedingt die dunkle Färbung. Manchmal sieht man auch die Gefässe mit einem schnabelförmigen Fortsatz an dem Rand der Excavation aufhören. Dies ist dann der Fall, wenn der Theil der Gefässe, der an der Seitenwand der Grube liegt, nicht gerade von vorne nach hinten verläuft, sondern schräg, so dass wir noch ein Anfangsstück desselben sehen. In Folge der Biegungen der Gefässe geschieht es oft, dass die centralen, in der Excavation gelegenen Stücke nicht mit den auf dem normal gefärbten, nicht vertieften Theile der Papille liegenden, zusammenzupassen scheinen. Die Gefässe erscheinen wie unterbrochen (J. A. Fig. 44, W. u. M. Fig. 3). Man kann sich dies sehr leicht erklären. Das Gefässstück, das an der Seitenwand der Grube hinuntersteigt, braucht nur nicht direct von vorne nach hinten zu verlaufen, sondern etwas schräg. Es ist dieses Verhalten bei steilrandigen Excavationen zu sehen. Bei solchen, die allmählich abfallen, kann man die Gefässe die ganze Wand hinab verfolgen. Im aufrechten Bilde kann man auch sehr deutlich parallaktische Verschiebungen der in verschiedenem Niveau liegenden Gefässe gegeneinander wahrnehmen. Zum Auftreten der parallaktischen Verschiebung im umgekehrten Bilde ist die Niveaudifferenz meist zu gering.

Bei seichten physiologischen Excavationen sieht man die Gefässe innerhalb der Excavation und in dem nicht excavirten Theil der Papille im aufrechten Bilde mit denselben Correctionslinsen. Oft muss man sich aber für den Grund der Excavation im aufrechten Bilde corrigiren, muss also, falls das untersuchte Auge emmetropisch ist, Gläser wie für ein myopisches Auge vorsetzen. Bei einem hypermetropischen Auge wird man als Emmetrop dagegen wahrnehmen können, dass man wohl die Gefässe im Niveau der Retina noch mit Convexlinsen sehen kann, während die Gefässe in der Excavation, bereits verschwinden. Der Grund der Excavation kann also emmetropisch sein, während der Rand hypermetropisch ist.

Im Grunde der Excavation sieht man bei einer gewissen Einstellung in sehr vielen Fällen eine grosse Zahl von graublauen Tüpfeln (J. A. Fig. 41, 44). Dieselben wurden immer als die Lücken der Lamina cribrosa gedeutet. Ihre Entstehung wird aber wohl auf andere Weise zu erklären sein (Arlt). Die Nervenfasern des Opticus verlieren in der Gegend der Lamina cribrosa ihr Mark. Dieses letztere erscheint bei der ophthalmoskopischen Untersuchung (wie man bei den Fällen von markhaltigen Nervenfasern in der Netzhaut sieht) weiss. Die markhaltigen Nervenfasern des Opticus würden sich also von dem Bindegewebe der Lamina cribrosa gar nicht unterscheiden, wenn das Mark genau im Niveau der Lamina cribrosa in allen Nervenfaserbündeln aufhören würde. Dadurch aber, dass innerhalb der Nervenfaserbündel nicht alle Nerven ihr Mark an der gleichen Stelle verlieren, sondern viele Fasern schon hinter der Lamina cribrosa marklos werden, entstehen scheinbare Gruben, in die man mit dem Spiegel hineinsehen kann. Man sieht durch die durchsichtigen marklosen Fasern auf das weiter hinten liegende Mark hinein. In diese Grube fällt weniger Licht, sie sehen deshalb graublau aus. Sie zeigen gegen die Retina eine Refractionsdifferenz von 1·5 bis 2·0 *D*, was mit der soeben gegebenen Erklärung übereinstimmt.

Die Details im Grunde der physiologischen Excavation und jene, die im Niveau der Retina liegen, können parallaktische Verschiebung zeigen, woran man auch geringe Niveaudifferenzen erkennen kann.

Mit der physiologischen Excavation kann sich auch eine physiologische Elevation in der Weise verbinden, dass der nicht vertiefte Theil der Papille ungewöhnlich prominirt. Es kommen übrigens auch seltene Fälle vor, wo die Papille blos in einer Partie eine starke Erhöhung zeigt, so dass z. B. ein Quadrant derselben in den Glaskörper hinein vorragt. Man findet z. B. das untersuchte Auge emmetropisch, auf der erhabenen Stelle aber besteht eine *H* von bis 3 *D*.

Als ganz seltene Formen der Excavation wurden auch nierenförmige beobachtet mit einer horizontalen Leiste, welche die Vertiefung in zwei ungefähr gleiche Hälften theilte.

Innerhalb einer sonst normal gestalteten Papille fanden sich in einem Falle mehrere, unregelmässig vertheilte, sehr tiefe Löcher, in die sich Gefässe mit sehr scharfen Biegungen hineinsenkten.

Anomalien der Centralgefässe.

Die Papille kann angeboren **gefässlos** erscheinen. Die Retinalgefässe treten dann an ihrem Rande oder selbst ausserhalb der Papille hervor.

In der **Vertheilung der Centralgefässe** auf der Papille herrscht eine grosse Mannigfaltigkeit. Manchmal sieht man eine sehr grosse Zahl von Gefässen, in anderen Fällen wieder nur wenige grössere Aeste auf der Papille. Es hängt dies von dem Orte ab, wo die Theilung des Stammes der Arteria centralis erfolgt. So findet man mitunter unten nur Eine Vene auf der Papille, weil die Theilung in die zwei Haupäste erst ausserhalb der Papille geschieht. Andererseits können sich die Gefässe schon innerhalb des Opticus theilen, so dass man bereits kleinere Aeste nicht in der Mitte der Papille, sondern etwas näher ihrem Rande hervortreten sieht.

Am äusseren Rande zeigen sich manchmal Gefässe von ganz eigenthümlichem Verlauf. Es sind dies Gefässe, die am Rande der Papille, am Chorioidealring ihren Ursprung nehmen und dann gegen das Centrum der Papille verlaufen. Nachdem sie eine kurze Strecke in dieser Richtung zurückgelegt haben, machen sie eine scharfe Biegung und kehren wieder zum Rande der Papille zurück, von wo sie sich dann weiter in die Retina begeben. Sie bilden also eine auf der Papille liegende Schlinge. Diese Gefässe hängen, wenn auch nicht immer, mit dem Sklerotikalgefässkranze zusammen, von welchem sie entspringen, dann um den Rand der Chorioidea herumbiegen und so in die Retina gelangen. Der von ihnen versorgte Theil der Netzhaut würde also nicht dem Gebiet der Centralgefässe, sondern dem der hinteren Ciliararterien angehören. Man nennt diese Gefässe **cilioretinale Gefässe.**

Nur in äusserst seltenen Fällen verlaufen grössere Gefässe gegen die Macula lutea zu.

Korkzieherartige, umeinander gewundene Gefässe sind nicht allzu selten zu beobachten.

Eine besondere Art der Gefässanordnung wird als **verkehrte Gefässvertheilung** bezeichnet. Bei derselben verlaufen die grösseren

Gefässe statt wie normal hauptsächlich nach oben und unten, zumeist nach innen, so dass es aussieht, als ob sämmtliche Gefässe für die innere Netzhauthälfte bestimmt wären. In scharfen Biegungen kehren sie erst später gegen die äusseren Netzhautpartien zurück. Solche Augen sind zumeist in geringem Grade amblyopisch und oft astigmatisch.

Anomalien der Farbe der Papille.

Die Farbe der Papille bietet in verschiedenen Augen gewisse Verschiedenheiten dar. Es gibt Augen mit ganz normaler Function, in denen die Papille ungemein blass, und andere, in denen sie sehr roth erscheint. Ein Beobachter sah einen Fall von blauer Verfärbung des Sehnerven. Die Gefässwandungen traten in diesem Falle als weisse Streifen auf der Papille sehr deutlich hervor, und ausserdem sah man noch zahlreiche andere weisse Streifen die Papille durchsetzen (J. A. Fig. 40).

Bei albinotischen Augen erscheint die Papille nicht nur in den meisten Fällen sehr verschwommen, sondern auch oft eigenthümlich grau. Aber auch in normal pigmentirten Augen kann sich die Papille schiefergrau, selbst schwärzlichgrau, mitunter mit schwarzen Flecken darstellen.

Pigmentflecken auf der Papille selbst gehören zu den Seltenheiten. Der Chorioidealring ist ja in vielen Augen so stark ausgesprochen, dass ein Anfänger leicht versucht sein kann, an einen pathologischen Ursprung des Pigmentes zu denken. Doch innerhalb der Papille sieht man nur selten Pigment. Es kann in Form von Pigmentschollen oder als ein zum Rande der Papille concentrischer Ring auftreten (J. A. Fig. 37, 38, 39). Auch büschelförmige Pigmentflecke können sich an der Eintrittsstelle der Retinalgefässe auf der Papille finden (L. A. Taf. XII, Fig. 3).

Glänzende, sehr kleine Punkte auf der Papille müssen als Cholestearinkrystalle gedeutet werden.

Colobom der Sehnervenscheide.

Beim Colobom der Sehnervenscheide ist zunächst ein partielles von einem totalen zu unterscheiden. Als partielles sind solche Fälle aufzufassen, wo im unteren Theile der Papille zumeist eine tiefe Excavation liegt, die gewöhnlich bis zum Rande geht und um deren Rand die Gefässe mit scharfen Knickungen umbiegen (J. A. Fig. 87). Gleichzeitig finden sich wohl meist andere angeborene Anomalien, besonders Colobombildungen in Chorioidea und Retina vor.

Beim totalen Sehnervenscheidencolobome fällt zunächst auf, dass die Papille bedeutend, etwa vier- bis fünfmal, grösser ist als normal. Die Grenzen sind wohl scharf aber sehr unregelmässig. Die Centralgefässe entspringen nicht alle im Centrum der Papille, sondern häufig zum Theil nahe der Peripherie, und bei genauer Einstellung im aufrechten Bilde kann man sehr leicht constatiren, dass die ganze grosse Stelle einer trichterförmigen Vertiefung entspricht, an deren Wand die Gefässe sich hinabsenken (L. A. Taf. XII, Fig. 4). Auch diese Verbildung kommt sowohl allein als in Verbindung mit anderen

angeborenen Anomalien, besonders Colobomen der Retina und persistirender Arteria hyaloidea vor.

Als rudimentäre Sehnervenscheidencolobome sind gewiss mit Recht jene Fälle angesprochen worden, wo sich nach unten, innen-unten oder aussen-unten an die Papille angrenzend, eine helle Sichel vorfindet, deren Grenze gegen die Papille meist sehr stark verschwommen ist. Die Papille selbst ist dann gewöhnlich schräg oder queroval und die Gefässe treten sehr oft aus einer ganz eigenthümlich geformten physiologischen Excavation heraus. Diese letztere ist nämlich schräg nach unten gerichtet, so dass sie einen oberen scharfen Rand hat, während sie sich nach unten allmählich verflacht. Um den oberen Rand biegen die Gefässe sehr plötzlich um. Auch solche Augen sind meist amblyopisch und astigmatisch. Diese hellen Sicheln nach unten mit der beschriebenen Difformität der Papille sind wohl genau von zumeist nach aussen gerichteten erworbenen, auf Chorioidealatrophie beruhenden, zu unterscheiden, die als Staphyloma posticum oder Conus sich in myopischen Augen finden.

Opticustheilung.

Diese Anomalie besteht in einem abnormen Verlaufe der Opticusfasern und der Gefässe. Es scheint, als ob Opticusfasern und Gefässe in zwei Bündel zusammengefasst wären, von denen eines nach oben, das andere nach unten verläuft. Der obere und der untere Rand der Papille ist verschwommen, der äussere und der innere tritt schärfer hervor. Fast alle Gefässe verlaufen nach oben und nach unten (J. A. Fig. 33). Das Aussehen der Papille ist sehr ähnlich dem bei Astigmatismus, unterscheidet sich aber dadurch, dass selbst bei Anwendung von Correctionslinsen keine Gefässe aussen und innen hervortreten, und ferner durch den Umstand, dass die Form der Papille sowohl im aufrechten als im umgekehrten Bild dieselbe ist.

Bindegewebe auf der Papille.

Man sieht in seltenen Fällen auf der Papille weissliche oder bläulichweise, entweder schleierartig zarte oder dichtere flächenhaft ausgedehnte Massen. Dieselben verdecken die Retinalgefässe, sind gewöhnlich ziemlich scharf begrenzt und am Rande manchmal zackig, mit Fortsätzen versehen. Sie können auch eine deutliche Prominenz zeigen und so ausgedehnt sein, dass ein grosser Theil der Papille dadurch unseren Blicken entzogen wird.

Dabei ist der Verlauf der Retinalgefässe und alle übrigen Verhältnisse ganz normal. Auch dies sind angeborene Bildungen, und zwar Bindegewebsmembranen und -Massen, die wohl der Arteria hyaloidea, respective dem hinteren Ende des Cloquet'schen Canals ihre Entstehung verdanken.

B. Erworbene Anomalien.

Hyperaemie und Anaemie des Sehnerven.

Die **Hyperaemie des Sehnerven** kann sich auf zweierlei Weise kundgeben. In einem Falle kann der Sehnerv geröthet sein, so dass

er sich in der Farbe kaum von der übrigen Retina unterscheidet. Die Grenzen der Papille sind verschwommen, im aufrechten Bilde ist die Ausstrahlung der Opticusfasern ungemein deutlich ausgesprochen. Die Gefässe, besonders aber die Venen, sind stark gefüllt und geschlängelt (J. A. Fig. 61). In anderen Fällen ist der Opticus wohl auch geröthet, es ist aber nur eine leichte Schlängelung der Gefässe zu sehen. Die Erscheinungen hören dagegen ganz plötzlich am Rande der Papille auf. Der Bindegewebs- und der Chorioidealring sind deutlich sichtbar. Die erstere Form der Hyperaemie kommt gleichzeitig mit Retinalhyperaemie vor und betrifft die innersten Partien des Sehnervenkopfes, die hauptsächlich von einem Capillarnetze durchzogen werden, welches mit den Centralgefässen in inniger Verbindung steht. Man sieht diese Art der Hyperaemie bei beginnender Entzündung des Opticus und der Retina. Bei Meningitis, bei Tumoren der Orbita und des Sehnerven ist sie sehr oft das einzige Symptom. Dann findet sie sich bei Leuten, die ihre Augen excessiv anstrengen, bei Hypermetropen, die an accommodativer Asthenopie leiden. In einigen dieser Fälle, wo es sich um Stauungshyperaemie handelt, entspricht das Bild der Hyperaemie auch dieser Ursache. Es sind die Venen sehr stark erweitert und geschlängelt, die Arterien aber im Gegentheil verdünnt. Es ist jedenfalls zu rathen, mit der Diagnose der einfachen Hyperaemie sehr vorsichtig zu sein, da individuelle Verschiedenheiten in dem Ausgeprägtsein der Papillengrenzen, dann in der Farbe des Opticus und im Verlaufe der Gefässe sehr leicht zur Annahme von Hyperaemie verleiten können. Nichts ist besser, als sehr viele normale Augen auf diese Verhältnisse zu studiren. Dann erst wird man finden, in wie weiten Grenzen die Norm schwankt.

In den Fällen, wo die Papille scharf begrenzt ist, die Veränderungen am Rande der Papille aufhören, liegt eine Hyperaemie des Opticus in Verbindung mit einer Hyperaemie der Chorioidea vor. Da die Aderhautgefässe und der Sklerotikalgefässkranz mit den Capillaren in den tieferen Theilen des Opticus zusammenhängt, so ist das angegebene Verhalten leicht erklärlich.

Bei **Anaemie des Sehnerven** ist die Papille wohl scharf begrenzt, aber sehr blass. Die grösseren Gefässe erscheinen entweder normal oder verengt. Das eclatanteste Beispiel einer höchstgradigen Anaemie der Papille findet sich bei Embolie der Centralarterie und bei vollständiger Continuitätstrennung des Opticus vor. Auch bei retrobulbärer Neuritis ist die Papille manchmal blass. Bei allgemeiner Anaemie gibt sich nur in sehr hochgradigen Fällen die Störung auch an der Papille kund, und zwar entweder blos durch Blässe oder durch ein weisslichtrübes Aussehen mit Verengerung der Gefässe. Dabei ist im letzteren Falle auch eine zarte, streifige Trübung und Verschleierung der Papille vorhanden.

Glaukomatöse Excavation.

Wir erinnern hier an das oben (Seite 113) bezüglich der Anatomie Gesagte. Bei der glaukomatösen Excavation (Fig. 71) nimmt die Vertiefung die ganze Papille ein. Die Lamina cribrosa ist nach hinten mehr oder weniger tief ausgebaucht und an Stelle der Papille liegt eine tiefe Grube, an deren Wandungen die Gefässe hinaufsteigen,

um dann mit scharfen Biegungen in das Niveau der Retina sich umzulegen. Die Form der Excavation kann die einer Grube mit steilen Wandungen und ausgehöhltem Boden sein, oder die Ränder der Vertiefung können überhängen, so dass die Gestalt ampullenförmig wird.

Das ophthalmoskopische Bild der Papille betreffend wollen wir vorausschicken, dass es sich hier natürlich nur um die Fälle handeln kann, wo die Trübung der brechenden Medien die Untersuchung gestattet. Durch die beim entzündlichen Glaukom vorkommende Trü-




Fig. 71.

bung der Medien kann der Einblick auf die Papille ganz unmöglich gemacht werden. Der Wechsel in der Intensität dieser Veränderungen und ihr periodisches Auftreten wird natürlich bewirken, dass man zu Zeiten den Fundus eines solchen Auges wird ganz leicht und genau durchmustern können, während wenige Stunden später dies nicht mehr gelingt. Uebrigens ist im Beginne eines inflammatorischen Glaukoms die Diagnose des glaukomatösen Processes schon durch die äussere Inspection des Auges zu stellen, während der Augenspiegel keine Symptome zeigt, da sich die Excavation noch nicht entwickelt hat. Bei reinem Glaukoma simplex dagegen ist die Diagnose nur mit Hilfe des Ophthalmoskops möglich.

An einer glaukomatös veränderten Papille fällt zunächst die Veränderung in der Farbe der Papille auf. Sie ist meist bedeutend blässer als normal, selbst bläulich- oder grünlichweiss. Nicht auf der ganzen Papille erscheint dies aber gleichmässig. Während die centralen Theile sehr hell erscheinen, viel Licht reflectiren, so sind die Randtheile etwas dunkler, an ihnen ist die grünliche oder bläuliche Beimischung viel stärker ausgesprochen. Es ist dies Verhalten jedoch nicht in allen Fällen gleich gut sichtbar. Die Erscheinung hängt von der Beschaffenheit der Excavation ab. Dort, wo das ins Auge geworfene Licht sehr schief auf einen Theil der Wand auffällt, wird nicht alles Licht so reflectirt, dass es ins Auge des Beobachters zurückgelangt. Bei einer Excavation, wo die Ränder überhängen,

sieht man von den seitlichen Wandungen der Grube gar nichts. Eine solche Papille erscheint also ziemlich gleichmässig gefärbt. Die helle Farbe des Sehnerven ist darauf zurückzuführen, dass die Lamina cribrosa am Grunde der Excavation fast entblösst daliegt. Wir bekommen also ungetrübt durch darüberliegendes Gewebe den hellen Reflex ihres Bindegewebes. Hiezu kommt noch, dass gleichzeitig, wenigstens in etwas älteren Fällen, Sehnervenatrophie besteht, die das blässere Aussehen der Papille vermehrt.

Die Sehnervenscheibe wird fast immer von einem gelblichweissen Ringe, dem glaukomatösen Hof, umgeben, der manchmal nur so breit ist, dass man ihn als eine Verbreiterung des Skleralringes bezeichnen könnte. In anderen Fällen kann er selbst einen P. D. oder noch mehr erreichen. Er ist sehr häufig nach allen Seiten hin gleich breit, also vollständig ringförmig, er ist aber auch mitunter an einer Seite, gewöhnlich nach aussen, breiter. Seine Begrenzung ist ziemlich regelmässig, fast nie zeigt sein peripherer Rand Ausbuchtungen und ganz unregelmässige Contouren, so wie dies bei atrophischen Plaques nach Chorioiditis vorkommt. Dieser Ring ist gegen den Sehnerven zu oft mehr gelblichweiss, gegen die Peripherie zu mehr gelblichroth und gekörnt. Pigmentveränderungen an seinem peripheren Rande sind gewöhnlich nicht nachweisbar. Eine durch Dehnung bedingte Atrophie der Chorioidea um die Papille ist es, die diese Veränderung bedingt (J. A. Fig. 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60; W. u. M. Fig. 14, 15).

Die Arterien sind zumeist etwas enger als normal, die Venen können dagegen selbst weiter sein. Einmal wurden auch Varicositäten der Netzhautvenen bei einem Falle von Glaukom gesehen (L. A. Taf. XI, Fig. 1). Sehr charakteristisch ist aber der Verlauf der Gefässe. Sie ziehen in gewöhnlicher Weise bis zum Rande der Papille: dort aber sieht man sie mit plötzlichen Biegungen in die Tiefe tauchen und manche von ihnen zunächst völlig verschwinden. Dort, wo sie sich so schroff umbiegen, erscheinen sie dunkel, öfters wie in einen dunkeln Knopf auslaufend. Der Grund dieser Erscheinung ist derselbe, wie für die gleiche Erscheinung bei der physiologischen Excavation.

Untersucht man im aufrechten Bilde und ist man für die Retina richtig eingestellt, so sieht man im Bereiche der Papille selbst die Details nicht scharf. Untersucht z. B. ein Emmetrop ein emmetropisches glaukomatöses Auge, so sieht er die Gefässe in der Retina ohne Linse ganz gut. Auch ihre Umbiegungsstellen am Rande der Papille sind deutlich sichtbar, die Gefässe innerhalb der Papille sind verschwommen und man wird deshalb ein Concavglas vorsetzen müssen. Dass mit einer solchen Linse scharf gesehen wird, das beweist eben, dass an dieser Stelle das Auge länger, folglich die Papille excavirt ist. Wenn man für den Grund der Excavation eingestellt ist, so treten dann auch die grauen Tüpfel der Lamina cribrosa hervor (siehe J. A. Fig. 53 eine glaukomatöse Excavation bei der Einstellung für die Retina, Fig. 54 dieselbe Excavation bei der Einstellung für den Grund der Excavation). Nach dem, was oben (Seite 59) auseinandergesetzt wurde, kann man die Tiefe der Excavation auch messen und eventuell nachweisen, ob sie durch einen operativen Eingriff (Iridektomie, Sklerotomie) seichter geworden ist. Die Refractionsdifferenz zwischen dem Grunde

der Excavation und dem Rande der Papille kann oft sehr bedeutend, 5 bis 6 *D* sein.

Verfolgt man so den Verlauf der Gefässe vom Papillenrande bis zum Eintritte in den Centralcanal des Opticus, so gelingt dies oft nicht vollständig. Das Stück des Gefässes, das auf der Seitenwand der Excavation liegt, entzieht sich sehr oft, dann, wenn der Rand der Excavation überhängend ist, ganz unseren Blicken. Ist der Verlauf dieses Gefässtheiles nicht gerade nach hinten gerichtet, sondern schräg, so nimmt man noch eine eigenthümliche Erscheinung an den Gefässen wahr. Sie erscheinen nämlich wie unterbrochen. Der Theil, der am Boden der Excavation liegt, bildet nicht die directe Fortsetzung des Theiles in der Retina (J. A. Fig. 52, 53, 55, 56, 57, 59; W. u. M. Fig. 14, 16, 20; L. A. Taf. XI, Fig. 8, 9).

Es kann auch geschehen, dass die Gefässe zwei Biegungen zeigen. Die eine am Rande der Papille, die andere innerhalb derselben (J. A. Fig. 60). Dies ist nur dann möglich, wenn innerhalb der Excavation noch eine Niveauverschiedenheit existirt, wenn dem Grunde der Excavation gleichsam eine zweite, kleinere aufsitzt.

Die äusseren Theile der Papille sind immer sehr gefässarm. Die grösseren Gefässe sind sämmtlich stark nach innen verschoben. Dies wird dadurch bedingt, dass dieselben normalerweise zumeist über die innere Hälfte des Randes der Papille in den Fundus treten. Die pathologische Excavation entwickelt sich (offenbar in Folge des geringeren Widerstandes daselbst) zuerst in der äusseren Papillenhälfte. Wenn die Vertiefung nun immer bedeutender wird, so rückt die Gefässpforte immer mehr nach innen. Die Gefässe bleiben eben gleichsam am inneren Papillenrande hängen. Sehr überrascht wird man in manchen Fällen sein, selbst bei der Einstellung, bei der man die graublauen Tüpfel der Lamina cribrosa hervortreten sieht, keine Gefässe innerhalb der Papille zu finden. Bei einer ampullenförmigen Excavation mit überhängenden Rändern können eben die zur Seite getretenen Gefässe ganz unter dem Rande der Excavation verschwinden (J. A. Fig. 58). Solche Excavationen kann man auch nicht vollständig übersehen. Denn dem schrägen Einblick ins Auge wird ja durch die Pupille eine Grenze gesetzt.

Durch parallaktische Verschiebung im aufrechten und umgekehrten Bilde lässt sich die Excavation diagnosticiren, aber nicht ihre Tiefe messen (siehe Seite 61).

An den Gefässen nimmt man oft Venenpuls, seltener Arterienpuls wahr; der letztere ist vollkommen entsprechend dem Puls der übrigen Arterien des Körpers. Gleichzeitig, etwa mit der Erweiterung der Radialarterie, sieht man einen oder mehrere Aeste der Arteria centralis sich rasch erweitern und dann wieder langsamer zusammensinken. Diese Pulserscheinung ist nur innerhalb der Papille, besonders häufig dort, wo die Arterien um den Rand der Excavation herumbiegen, zu sehen. Ist sie nicht spontan vorhanden, so kann man sie oft durch ganz leichten Fingerdruck auf das Auge hervorrufen. Hiezu genügt eine so geringe Compression, wie sie im normalen Auge nie Arterienpuls erzeugt.

Die Erklärung für diese Erscheinung ist folgende: Der gesteigerte intraoculäre Druck lastet auf der Arteria centralis. Nur im Momente

der Herzsystole, wo der Blutdruck in den Arterien steigt, erweitern sich die Aeste derselben. Sinkt der Blutdruck in den Arterien später wieder, so werden dieselben durch den gesteigerten intraoculären Druck comprimirt. So kann man ja auch im normalen Auge durch künstliche Steigerung des intraoculären Druckes (mittels Compression des Bulbus) Arterienpuls hervorrufen. Ist der Druck in einem Auge bereits abnorm hoch, aber noch nicht hinreichend hoch, um zur Entstehung spontanen Arterienpulses Anlass zu geben, so genügt eben ein leichter Druck auf das Auge und schon pulsiren die Arterien.

Nach dem soeben Gesagten ist es klar, dass, wenn Arterien- und Venenpuls gleichzeitig in einem glaukomatösen Auge vorkommen, Arterien und Venen sich abwechselnd erweitern und verengern. Doch kann man auch ausnahmsweise sehen, dass Arterien- und Venenpuls vollständig gleichmässig erfolgen. Bei Compression des Bulbus, um Arterienpuls bei Glaukom hervorzurufen, kann ein leichter Druck schon die centralen Stücke der Venen vollständig verschwinden machen.

Neuritis optica.

Wenn man den Namen Neuritis gebraucht, so spricht man damit aus, dass es sich um Entzündung des Sehnerven handelt. Doch ist damit nicht gesagt, dass dieselbe auch mit dem Augenspiegel sichtbar ist. Es kann eine Neuritis im hinteren Theile des Sehnervenstammes ihren Sitz haben und an der Papille kann vielleicht gar nichts oder nur eine Verdünnung der Netzhautarterien, eine Ischaemia retinae zu finden sein. Was wir von den Veränderungen am Opticus sehen, das sind ja nur die, welche am sogenannten Sehnervenkopf sitzen. Was hinter der Lamina cribrosa liegt, entzieht sich unseren Blicken. Es ist daher auch der Vorschlag gemacht worden, den Namen Papillitis zu gebrauchen, wo man die Veränderungen mit dem Spiegel sehen kann, dagegen von Neuritis nur zu sprechen, wenn es sich




Fig. 72.

um Entzündung des ganzen Sehnervenstammes handelt. Im Leben kann man nun diesen Unterschied nicht immer machen. Man sieht

eben die Erkrankung des Sehnervenkopfes und es genügt, darauf hinzuweisen, dass, da es sich um die Diagnostik der Sehnervenentzündung mit dem Augenspiegel handelt, nur von den am intraocularen Sehnervenende sichtbaren Veränderungen die Rede sein kann.

Man hat in diesem Sinne die eigentliche Neuritis, bei der sich die Erscheinungen auf die Papille beschränken, von der Neuroretinitis zu unterscheiden, wo auch die zunächst an die Papille angrenzende Partie der Retina mitergriffen ist.

Die Neuritis optica tritt in manchen Fällen als sogenannte **Stauungspapille** in die Erscheinung. In solchen Fällen ist immer eine starke Schwellung der Papille zu finden (Fig. 72). An den Gefässen zeigen sich erhebliche, der Stauung entsprechende Erscheinungen, nämlich Erweiterung der Venen und Verengerung der Arterien.

Das Bild einer solchen ausgeprägten Stauungspapille (L. A. Taf. VIII, Fig. 6; Taf. XI, Fig. 2; W. u. M. Fig. 12) stellt sich folgendermassen dar: Die Papillengrenzen sind entweder vollständig verwischt oder noch aussen, wenn auch undeutlich, kenntlich. Die Farbe der Papille ist entweder roth, von der des übrigen Fundus nicht viel verschieden, oder grauröthlich. In Fällen, wo der Papillenrand nicht zu sehen ist, greift die Trübung des Gewebes wohl auch etwas auf die benachbarte Retina über, so dass es auf den ersten Blick, besonders im umgekehrten Bilde, so aussieht, als ob die Papille vergrössert wäre. Die Gefässe zeigen einen sehr auffallenden Unterschied in Bezug auf die Füllung. Die Venen sind dunkel, blauroth und sehr stark erweitert, mit sehr deutlichen Reflexstreifen in ihrer Mitte, die Arterien dagegen fadendünn, oft kaum zu finden. Auch der Gefässverlauf ist alterirt. Die centralen Partien der Papille erscheinen oft gefässlos, indem daselbst die Gefässe von dem stark getrübten Gewebe des Sehnerven verdeckt werden. Ferner sind die Gefässe stark geschlängelt, besonders die Venen, welche Veränderung noch weit hinaus in den Fundus zu sehen ist. Arterien und Venen sind stellenweise scheinbar unterbrochen. Dort nämlich, wo ihre Windungen sehr tief liegen, werden sie von der darüber befindlichen Gewebsschichte bedeckt und kommen erst später, wenn sie wieder oberflächlicher sind, zum Vorschein. Mitunter werden sie auch ganz deutlich von weissen Streifen begleitet, was auf eine Verdickung ihrer Gefässwand, besonders Wucherung der Adventitia, zu beziehen ist.

Die Prominenz der Papille ist theils durch die parallaktische Verschiebung im aufrechten und umgekehrten Bilde, theils durch den Nachweis einer Refractionsdifferenz auf der Papille und im übrigen Fundus erkennbar. Man kann im aufrechten Bilde die Höhe der Vorwölbung messen oder im Verlaufe eine Abnahme derselben constatiren.

In manchen Fällen finden sich innerhalb des geschwollenen Sehnervenkopfes oder auch in seiner nächsten Umgebung zahlreiche Haemorrhagien. Auf der Papille selbst erscheinen sie immer streifig und radiär gestellt, da sich das Blut zwischen den radiär ausstrahlenden Opticusfasern verbreitet. Ebenso sehen die in der Umgebung der Papille befindlichen Netzhautblutungen aus, sobald sie in der Nervenfaserschicht liegen. Auch da gilt derselbe Grund für ihre besondere Form (J. A. Fig. 64, 65; W. u. M. Fig. 12; L. A. Taf. VIII, Fig. 6). Sitzen die Haemorrhagien dagegen in den

äusseren Netzhautschichten, so bilden sie unregelmässige Flecken (wie in: L. A. Taf. VIII, Fig. 1; W. u. M. Fig. 17). Die Haemorrhagien können so zahlreich sein, dass sie der ganzen Papille oder einem grossen Theile derselben ein rothes und schwarzes Aussehen geben.

Bei genauer Durchmusterung der Papille erkennt man oft röthliche, radiäre Streifen, die nicht auf Blutungen, sondern vielmehr auf neugebildete Gefässe zurückzuführen sind.

Ausserdem sieht man in der Papille oder in ihrer nächsten Umgebung kleine oder grössere weissglänzende Flecken von etwas verwaschener Begrenzung, die zum Theile die Netzhautgefässe bedecken. Manchmal lassen sich die Contouren dieser Flecken deutlich in radiär gestellte, feine, weissliche Striche auflösen (ähnlich den markhaltigen Nervenfasern). Es sind diese Flecke zumeist durch Hypertrophie der marklosen Nervenfasern bedingt.

Durch einen leichten Druck auf den Bulbus kann man an den Gefässen Veränderungen erzeugen, wie sie am normalen Auge nur durch viel stärkeren Druck entstehen. Die Hauptstämme der Venen erscheinen sehr rasch blutleer und zeigen sich nur als sehr feine rothe Streifen. Es tritt Arterienpuls auf, der übrigens in manchen Fällen auch spontan beobachtet wurde. Derselbe verhält sich hinsichtlich seines Verlaufes und seiner Form ganz so, wie der bei Glaukom. Auch ist die Erklärung für sein Zustandekommen dieselbe. In beiden Fällen ist es der erschwerte Eintritt des Blutes ins Auge, welcher ihn hervorruft. Beim Glaukom ist der gesteigerte intraoculäre Druck die Ursache, bei der Stauungspapille die Schwellung des Sehnerven.

Manchmal beschränken sich die Erscheinungen auf die Papille allein, doch fehlen die Zeichen hochgradiger Blutstauung, die starke Erweiterung der Venen und Verengerung der Arterien, sowie die starke Prominenz. Solche Fälle, die man schlechtweg als Neuritis optica bezeichnen kann, zeigen nur Verschwommenheit der Papillengrenzen, leichte Erweiterung der Venen, Schlängelung sämmtlicher Gefässe, geringe Schwellung und rothe oder grauröthliche Verfärbung der Papille. Die Vorragung der Papille ist nur so gering, dass die Refractionsdifferenz gegen den übrigen Fundus, wenn überhaupt nachweisbar, unbedeutend ist (L. A. Taf. XI, Fig. 11).

In den Fällen, die man als **Neuroretinitis** bezeichnet, ist die Prominenz der Papille keine so hochgradige und die um die Papille liegenden Partien der Netzhaut sind stärker mitergriffen. Auch fällt der Hügel, den die Papille bildet, viel sanfter, nicht so steil gegen das Niveau der übrigen Retina ab. Ferner sieht man die Erscheinungen der venösen Hyperaemie nicht in dem Masse, wie bei der Stauungspapille ausgeprägt. Die Venen sind nicht so stark erweitert, die Arterien nicht so stark verengt. Es treten aber noch manchmal weissliche Herde hinzu, die zumeist knapp am Rande der Papille sitzen und durch Einlagerung von Fettkörnchenzellen in die Körnerschichten der Retina oder auch durch fettige Degeneration des Stützgewebes der Netzhaut bedingt werden. Auch können diese Degenerationsherde in der Gegend der Macula eine unregelmässige Gruppe oder eine Gruppe von ganz eigenthümlicher Form bilden, wie man sie sonst nur bei der Retinitis ex morbo Brightii wahrnimmt. In der Maculagegend nämlich tritt eine sternförmige Figur auf, deren Strahlen von vielen

kleinen, sehr glänzenden Punkten oder kurzen Streifen gebildet werden. Die Gegend der Fovea centralis selbst bleibt zumeist davon frei. Der Stern muss auch nicht nach allen Richtungen deutlich ausgebildet sein (Sternfigur in Fällen von Retinitis ex morbo Brightii: J. A. Fig. 66, 67, 68 W.; und M. Fig. 21, 22; L. A. Taf. IX, 2). Es lässt sich in solchen Fällen aber doch meist die Neuritis von der Retinitis ex morbo Brightii unterscheiden. Anhaltspunkte dazu geben die starke Schwellung der Papille und die Lagerung der weisslichen Herde zunächst der Papille, während sie bei Retinitis albumiurica sich meist in einem Abstande von der Papille vorfinden.

Die Veränderungen einer Neuritis (sei es einer Stauungspapille oder einer Neuroretinitis) können sich nur sehr allmählich zurückbilden. Zunächst wird man wahrnehmen, dass die Schwellung der Papille abnimmt und die Grenzen derselben immer deutlicher hervortreten. Zuerst ist dies an der äusseren Papillengrenze zu sehen. Oft ist diese schon fast ganz scharf, während die innere noch vollständig verdeckt ist. Auch erfolgt die Abflachung zuerst in der äusseren Hälfte (L. A. Taf. XI, Fig. 13, 14). Die etwa bestehenden Haemorrhagien verschwinden, die Papille wird immer blässer und nimmt eine mehr weisslichgraue Farbe an. Die Schlängelung der Gefässe nimmt ab, ebenso ihre Erweiterung. Dagegen können jetzt noch, ja für immer, weisse Streifen an den Gefässen zurückbleiben. Mitunter geht die Schwellung der Papille nie ganz zurück, indem es bereits zu Bindegewebswucherung in ihr gekommen ist. Auch da wird man aber die Enge der Gefässe und die blasse Farbe der Papille erkennen. Schliesslich bekommt man so das Bild einer neuritischen Atrophie, das sich gewöhnlich ganz gut von einer einfachen Sehnervenatrophie, die ohne Entzündung entstanden ist, unterscheiden lässt (L. A. Taf. XI, Fig. 3, 6, 12; J. A. Fig. 49, 50, 51). Sind weissliche Herde in der Retina, in der Umgebung der Papille oder in der Gegend der Macula vorhanden gewesen, so bleiben dieselben oft sehr lange zurück. Nicht so selten sieht man an den Stellen, wo dieselben bestanden haben, also besonders in der Gegend der Macula, feine Pigmentepithelveränderungen, die sich durch ein sehr fein marmorirtes Aussehen des Fundus zu erkennen geben. In ähnlicher Weise kann der Fundus auch in der Umgebung der Papille verändert sein, indem eben dort die stärkeren Veränderungen der Retina auch auf ihre äusseren Schichten übergegriffen haben.

Die Neuritis optica kann vorkommen: I. In Folge pathologischer Processe innerhalb der Schädelhöhle. II. In Folge pathologischer Processe in der Orbita. III. In Folge Erkrankung entfernter Organe. IV. In Folge von Allgemeinerkrankungen. V. Als selbständiger Process.

I. In Folge pathologischer Processe innerhalb der Schädelhöhle. Die Affection ist dann immer doppelseitig und tritt meist unter dem Bilde der Stauungspapille auf. Hieher gehören:

1. Tumoren. Der Einfluss des Sitzes, der Grösse und der Beschaffenheit des Tumors auf die Entstehung der Neuritis ist oft nicht mit Sicherheit nachweisbar. Bezüglich der letzteren Eigenschaft kommen in Betracht: Sarkome, Gliome, Carcinome, Tuberkel, Gummata, wobei natürlich der Ausgangspunkt der Geschwulst auch die Meningen oder die Knochen der Schädelhöhle sein können. In gleicher Weise wie Tumoren wirken Entozoen (Cysticercen, Coenuren und Echinococcen), ferner Abscesse und Haematome der Dura mater, endlich Gehirnabscesse. Es kann ebensogut ein faustgrosser Tumor im Stirnlappen, als ein nussgrosser im Kleinhirne eine Stauungspapille bedingen, ja die Tumoren des Kleinhirns erzeugen sogar auffallend häufig Stauungspapille. Das Auftreten der Stauungspapille

gehört zu den allerwichtigsten Symptomen bei Tumoren, ja ist sehr häufig die einzige Erscheinung, welche die Diagnose desselben ermöglicht. Man denkt sich den Zusammenhang zwischen dem Tumor und der Neuritis in folgender Weise: Es ist nachgewiesen, dass der subarachnoideale Raum des Schädels mit dem intervaginalen Raume des Sehnerven zusammenhängt. Bei allen Erkrankungen, die mit einer Vermehrung des intrakraniellen Druckes einhergehen, wird nun die Cerebrospinalflüssigkeit in den Zwischenscheidenraum des Opticus ausweichen und einen Hydrops der Sehnervenscheide erzeugen, indem die Flüssigkeit den Raum zwischen der äusseren und inneren Scheide des Opticus ausdehnt, die äussere von der inneren abhebt. Dieser Hydrops der Sehnervenscheide bedingt eine Compression des Sehnerven und damit die Stauungsneuritis (Schmidt-Manz). Indessen ist es auch möglich, dass die Neuritis als descendirende Neuritis entsteht durch Fortsetzung einer Entzündung der Hirnhäute auf den Sehnerven.

2. Meningitis basilaris, ganz besonders die tuberculöse Form und auch die epidemische Cerebrospinalmeningitis. Hier findet man meist Neuroretinitis und jene weisslichen Degenerationsherde in der Retina, um die Papille und in der Maculagegend. Es ist aber erwähnenswerth, dass bei Meningitis sehr häufig, ja viel häufiger als Neuritis blos venöse Hyperaemie der Papille und leichtes Verwaschensein ihrer Grenzen sich vorfindet. Die Pathogenese kann dieselbe sein wie bei Tumoren.

3. Bei Gehirnerweichung wurde nur sehr selten Neuritis beobachtet.

4. Bei Blutungen ins Gehirn tritt nur selten Stauungspapille auf, leicht dagegen dann, wenn das Blut an der Schädelbasis durchbricht und so in den Zwischenscheidenraum des Opticus gelangt.

5. Bei Thrombose der Hirnsinus wird auch Stauungspapille gesehen, gleichzeitig mit Chemosis und Protrusion der Bulbi.

6. Hydrocephalus ganz besonders bei Kindern und

7. Aneurysma cirsoideum der Karotis kann auch Neuritis erzeugen.

II. Neuritis in Folge von Processen in der Orbita, wobei die Erkrankung natürlich oft einseitig ist. Dahin gehören:

1. Tumoren. Hier tritt auch häufig ausgeprägte Stauungspapille oder Neuroretinitis auf. Immer ist aber die Affection einseitig und dadurch, sowie durch die auftretende Beweglichkeitsbeschränkung und Protrusion des Auges von Stauungspapille durch intrakranielle Erkrankung unterschieden.

2. Entzündungen des orbitalen Zellgewebes, wie solche durch Periostitis und Caries der Knochen der Augenhöhlenwand, durch Eiterungsprocesse im Antrum Highmori oder im Sinus frontalis, durch Erysipel, durch Verletzungen und Operationen, durch Metastase bei septischen Processen entstehen.

3. Verengerung des Foramen opticum. Dieselbe kann in periostitischen Processen (die durch Lues bedingt sein können) oder in angeborener Deformation und Hyperostose des Schädels ihren Grund haben.

Der Zusammenhang zwischen der Neuritis und den Erkrankungen in der Orbita ist nicht vollständig erklärt. Man wird ihn wohl auch in vielen Fällen auf Retention der im Zwischenscheidenraume enthaltenen Flüssigkeit zurückführen müssen. In manchen Fällen aber wurde Thrombose der Retinalgefässe als Ursache von Neuroretinitis nachgewiesen.

III. Neuritis in Folge entfernter Organerkrankungen. Als solche sind aufzuzählen:

1. Anomalien der weiblichen Geschlechtsorgane — Menstruationsanomalien. Hier ist die Neuritis meist doppelseitig.

2. Myelitis. Nur sehr selten wurde dieser Zusammenhang beobachtet.

3. Sympathische Neuritis. Folge der Erkrankung des anderen Auges.

IV. Neuritis bei Allgemeinerkrankungen.

1. Acute Infectionskrankheiten: Typhus, Pneumonie, Variola, Scarlatina, Morbilli, Diphtheritis, Febris recurrens.

2. Lues. Diese kann in zweierlei Weise Neuritis hervorrufen: entweder es kann ein Gumma innerhalb der Schädelhöhle sowie ein Gehirntumor eine Stauungspapille, hervorrufen, oder es tritt die Neuritis als ganz selbstständige Erkrankung auf.

3. Bleiintoxication.

4. Anaemie. Dahin gehören auch die Fälle von Neuritis nach Haematemesis, Metrorrhagien und überhaupt nach starken Blutverlusten.

V. Selbstständige Entzündungsprocesse des Sehnerven. Solche treten auf

1. in Folge von rheumatischen Einflüssen;

2. bedingt durch congenitale Anlage — Fälle, wo in gewissen Familien Neuritis bei vielen Geschwistern oder auch durch zwei Generationen, zumeist auf die männlichen Familienglieder beschränkt, auftritt.

3. nach Verletzungen.

Atrophia nervi optici.

Bei der Sehnervenatrophie erscheint in Folge Schwund der Nervenmasse jene seichte, aber über die ganze Papille sich erstreckende muldenförmige Vertiefung, die man als atrophische Excavation bezeichnet (Fig. 73). Dieselbe kann ja nicht tief sein, da die Lamina




Fig. 73.

cribrosa in ihrer normalen Lage bleibt und nicht so wie bei Glaukom in den Opticus nach hinten zu ausgebaucht ist.

Die Sehnervenatrophie, wie sie sich mit dem Augenspiegel zu erkennen gibt, kommt hauptsächlich unter drei verschiedenen Bildern vor, die wir im Folgenden beschreiben wollen, wobei aber gleich im Vorhinein bemerkt werden soll, dass es nicht immer möglich ist, diese Formen auch mit Sicherheit auseinanderzuhalten. Es sind dies: 1. Die genuine Sehnervenatrophie, bei der keine Entzündung die Ursache der Atrophie ist, sondern bei der es sich um einfachen Schwund des Nervengewebes handelt; 2. die neuritische oder papillitische Atrophie. Der letztere Name bezeichnet besser das Wesen dieser Form, denn eine Neuritis des hinter dem Auge gelegenen Theiles des Sehnerven — eine retrobulbäre Neuritis — kann das Bild der einfachen, genuinen Sehnervenatrophie an der Papille ergeben, während die hier in Rede stehende Form nur durch eine Entzündung des Sehnervenkopfes — Papillitis erzeugt wird; 3. die retinitische Atrophie, ein ascendirender, von einer Netzhautentzündung ausgehender Opticusschwund.

1. **Die genuine Sehnervenatrophie.** Die Atrophie ist hier Ausdruck einer Degeneration des Sehnervenstammes an und für sich, oder die Folge einer retrobulbären Entzündung desselben, oder die Folge einer Leitungsunterbrechung.

Bei einer vollständig ausgeprägten, genuinen Sehnervenatrophie stellt sich die Papille in folgender Weise dar: Zunächst fällt die sehr stark veränderte Farbe des Sehnervenquerschnittes auf. Sie ist viel heller als eine normale Papille, bläulich- oder häufiger grünlichweiss. Diese Verfärbung erscheint oft am auffallendsten in der äusseren

Hälfte, kann aber auch auf der ganzen Papille ziemlich gleichmässig sichtbar sein. Manchmal hat die Papille eine sehr helle, sehnig glänzende Farbe. Die kleinen Gefässe auf ihr sind vollständig geschwunden, so dass die äussere Papillenhälfte, auf der normalerweise nur kleinere Gefässe zu sehen sind, vollkommen gefässlos erscheinen kann. Die grösseren Gefässe sind dagegen anfangs von ganz normalem Caliber. Erst nach sehr langem Bestehen der Atrophie zeigt sich eine leichte Verdünnung der Arterien. Die Gefässe werden nicht von weissen Streifen begleitet und die Begrenzung der Papille ist vollkommen scharf (J. A. Fig. 45, 46, 47; W. u. M. Fig. 10, 11; L. A. Taf. XI, Fig. 4, 5).

In manchen Fällen ist das Bild einer atrophischen Excavation vorhanden. Man erkennt diese nur an den leichten Biegungen der Gefässe am Rande der Papille (J. A. Fig. 49; L. A. Taf. XI, Fig. 4). Deutliche parallaktische Verschiebung oder eine irgend auffallende Refractionsdifferenz fehlen bei der geringen Tiefe der Excavation. Durch die gleichzeitig vorhandene Atrophie der Nervenfaserschicht der Retina wird die Vertiefung noch geringer und ihre Ränder sind noch weniger steil (Fig. 73).

In Fällen, wo früher eine physiologische Excavation da war und manchmal auch in anderen treten die Tüpfel der Lamina cribrosa in Folge der Atrophie ganz besonders deutlich hervor.

Eine Verkleinerung des P. D. oder eine durch Schrumpfung bedingte Unregelmässigkeit der Begrenzung zeigt sich niemals, auch bei alten Atrophien, in deutlicher Weise, und wäre auch sehr schwer zu erkennen, da ja die individuellen Verschiedenheiten und die verschiedene Vergrösserung bei verschiedener Refraction in Betracht kommen.

Ist die genuine Sehnervenatrophie noch nicht vollständig ausgebildet, so bemerkt man zunächst nur eine Verfärbung der äusseren Papillenhälfte. Erst später zeigt auch die innere Papillenhälfte dieselbe Veränderung.

2. Die **neuritische Sehnervenatrophie.** Auch hier zeigt sich eine Verfärbung der Papille, sie ist grünlich- oder bläulichweiss gefärbt, aber oft von einem trüben schmutzigen Aussehen. Die Papillengrenzen sind meist nicht deutlich, besonders innen, was mitunter noch dadurch vermehrt wird, dass sich in der Umgebung der Papille Pigmentepithelveränderungen zeigen, die in einem unregelmässigen, verwaschenen, etwas abgeblassten Ring bestehen. Dies ist eben dann der Fall, wenn die Entzündung des Sehnerven auch etwas auf die umgebende Retina und in dieser letzteren auf die äusseren Schichten übergegriffen hatte. Die Lamina cribrosa ist stets durch das getrübte Gewebe verdeckt, jene grauen Tüpfel sind nicht sichtbar. Die Gefässe, und zwar ganz besonders die Arterien, zeigen eine deutliche Verdünnung. Die letzteren erscheinen oft als ganz feine, gleichmässig rothe Streifen. Dennoch kann man aber oft deutliche Reste der früheren abnormen Gefässschlängelung sehen. Dagegen treten die Gefässe jetzt in ihrem ganzen Verlaufe deutlich hervor und erscheinen nicht mehr wie zerrissen. Sehr oft begleiten sie weisse Streifen nicht nur auf der Papille (denn das kommt auch in normalen Augen vor), sondern auch im Fundus bis zu einer grösseren Ent-

fernung von der Papille. Es zeigt dies eine durch den Entzündungsprocess entstandene Verdickung der Gefässwand an. Die Gefässe können streckenweise sogar als weisse Stränge erscheinen, indem die Gefässwände vollkommen undurchsichtig werden, so dass man die Blutsäule gar nicht mehr durchsieht. Eine deutliche Excavation ist meist nicht nachzuweisen, denn die Volumsverminderung durch Schwund der Nervensubstanz wird gewöhnlich durch die im Sehnervenkopf stattfindende Bindegewebswucherung reichlich aufgewogen, ja mitunter kann man deutlich eine schwache Vorwölbung der Papille constatiren, die entweder noch ein Residuum der entzündlichen Schwellung ist, oder eben durch Bindegewebswucherung innerhalb der Papille bewirkt wird (J. A. Fig. 49, 50, 51; L. A. Taf. XI, Fig. 3, 6, 12).

Es ist nur noch zu erwähnen, dass in Fällen, wo die Entzündungserscheinungen sehr gering waren und bereits längere Zeit seit der Entzündung verflossen ist, die angegebenen Zeichen der neuritischen Atrophie so undeutlich sein können, dass man in der Diagnose zwischen einer genuinen und einer neuritischen Atrophie schwankt. Es kann die Papille in solchen Fällen ziemlich scharf begrenzt und wie durchsichtig aussehen, die Verdünnung der Gefässe braucht nur sehr wenig markirt zu sein und auch eine atrophische Excavation kann sich entwickeln.

3. **Die retinische Atrophie.** Diese Form unterscheidet sich hauptsächlich durch die andere Farbe von den beiden anderen Formen der Atrophie. Die Papille ist hier nämlich nicht hellgrünlich- oder bläulichweiss, sondern sie ist von einer schmutzig-wachsartigen, fahlgelblichen oder röthlichgrauen Farbe. Die Grenzen der Papille sind verschwommen, mitunter sind Zeichen einer atrophischen Excavation vorhanden. Die Gefässe zeigen immer eine excessive Verdünnung und sind überhaupt nur sehr spärlich oder sind selbst ganz verschwunden. Wenige sehr zarte Stämmchen gehen von der Papille aus. Solche retinitische Atrophien findet man nach Retinitis, Retinitis pigmentosa, Chorioretinitis (J. A. Fig. 48, 79).

Es kommen auch partielle Opticusatrophien vor. Es kann nur ein Theil der Papille die für die Atrophie charakteristische Verfärbung zeigen. In welchem Theile und wie stark die Papille verfärbt ist, dies hängt natürlich von der Mächtigkeit und Lage des atrophischen Nervenfaserbündels ab. Die Farbe des äusseren Theiles der Papille wird durch das sogenannte Papillo-maculäre Bündel bestimmt: das sind die Fasern, die zur Macula und zu dem zwischen Macula und Papille liegenden Theil der Retina gehen. Bei retrobulbärer Neuritis axialis, bei der jenes Bündel ergriffen ist, das im Opticus weiter hinten in der Mitte des Querschnittes liegt, erscheint die äussere Papillenhälfte blass. Solche Verhältnisse findet man bei Patienten, die an Amblyopie in Folge von Tabak- und Alkoholmissbrauch leiden, dann auch bei Bleiintoxication. In ähnlicher Weise ist die Papille auch bei centraler, auf die Maculagegend beschränkter Retinochorioiditis verändert. Die diese Gegend versorgenden Fasern werden eben in solchen Fällen in aufsteigender Richtung atrophisch.

Sonst wird die Farbe der Papille hauptsächlich beeinflusst durch das gekreuzte Bündel, das aus dem anderen Tractus kommt und

die nasale Hälfte der Retina mit seinen Fasern versorgt. Dieselben haben nicht nur den nach innen von der Papille liegenden Theil der Netzhaut, sondern auch jenen zwischen Papille und Macula zu versehen. Functioniren sie nicht, so geht die Grenze im Gesichtsfeld durch den Fixationspunkt und nicht durch die Gegend des blinden Fleckes. Daraus folgt, dass bei heteronymer temporaler Hemianopie, wo also die beiden nasalen Retinahälften z. B. durch Compression der gekreuzten Bündel durch einen Tumor atrophisch geworden sind, beide Papillen atrophisch aussehen. Ist dagegen eine homonyme Hemianopie vorhanden, bei der die gleichnamigen (rechten oder linken) Netzhauthälften unempfindlich sind, so ist die Papille an dem Auge blass, wo die innere Netzhauthälfte erblindet ist. Besteht also homonyme, rechtsseitige Hemianopie (fehlen beide rechten Gesichtshälften), so functioniren in beiden Augen die linken Retinahälften nicht. Im rechten Auge muss demnach die Papille atrophisch erscheinen, während an der linken keine Veränderung erkennbar ist.

Die Erklärung für dieses Verhalten ist folgende: Die für die äussere Netzhauthälfte bestimmten Nervenfasern, welche dem nicht gekreuzten, schwächeren Bündel des Tractus opticus angehören, treten nahe dem nasalen oberen und unteren Rand der Papille hervor und sind durch die übrigen zumeist verdeckt. Ihre Atrophie gibt sich daher nicht durch eine deutliche Verfärbung der Papille kund.

Die für die Macula selbst bestimmten Fasern stammen sowohl aus dem gekreuzten als aus dem ungekreuzten Bündel und liegen im unteren äusseren Quadranten der Papille.

Nach Embolie eines grösseren Astes der Centralarterie und nach Verletzungen des Opticus kann auch die obere oder untere Hälfte der Papille atrophisch erscheinen.

Die Ursachen der Sehnervenatrophie brauchen wir hier nur bezüglich der genuinen Form zu besprechen, da die neuritische und retinitische Atrophie eben durch Alles bedingt werden können, was Neuritis oder Retinitis erzeugt.

Das ophthalmoskopische Bild der genuinen Atrophie kann hervorgerufen werden:

1. Durch absteigende Degeneration bei Gehirnleiden, die eine Compression der Tractus oder Nervi optici im Gefolge haben. Dahin gehören: Tumoren, Ausdehnung des dritten Ventrikels, Druck durch über das Chiasma hinübergespannte Gefässe oder seitens der Karotis. Auch der Vorderlappen des Grosshirns kann bei Raumbeengung in der Schädelhöhle diese Compression ausüben. In ähnlicher Weise wirken entzündliche Schwarten um das Chiasma nach Meningitis.

2. Graue Degeneration des Opticus bei Gehirn- und Spinalleiden, als: bei Erweichungsherden im Grosshirn, bei disseminirter Sklerose des Gehirns und Rückenmarks, bei Tabes dorsalis, bei progressiver Paralyse der Irren, bei combinirten Rückenmarksleiden, bei Degeneration der Seitenstränge. Bezüglich des Zusammenhanges zwischen dem Spinalleiden und der Opticusatrophie hat man vasomotorische Störungen als Ursache bezeichnen zu müssen geglaubt. Doch ist dies nicht erwiesen und es verdient die Annahme, dass es sich um ein isolirtes Auftreten desselben Processes im Opticus handle, mehr Glauben.

3. Es kann die Atrophie einen ganz selbstständigen Process im Sehnerven bilden. Man beschuldigt in solchen Fällen Verkältung, mangelhafte Ernährung, Excesse verschiedener Art, psychische Aufregungen etc. mit mehr oder weniger Grund als aetiologische Momente.

4. Acute oder chronische retrobulbäre Neuritis, wobei nur auffällt, dass bei dem Bilde einer einfachen Sehnervenatrophie eine bedeutende Verdünnung der Gefässe wahrnehmbar sein kann. Es sind also alle Ursachen der retrobulbären Neuritis, als: Bleiintoxication, chronischer Alkoholismus und Nicotinintoxication, Syphilis, Er-

kältung, fieberhafte Krankheiten, Blutverluste, Entzündungen des orbitalen Zellgewebes auch hier anzuführen.

5. Embolie der Centralarterie hinterlässt eine Atrophie, die ein der genuinen sehr ähnliches Aussehen hat. Nur die Gefässe sind auch hier auffallend verengt.

6. Manche Formen von Retinitis, so auch die Retinitis albuminurica, können eine Sehnervenatrophie erzeugen, die sich nur durch die etwas engeren Gefässe, aber oft nur wenig von einer Atrophie, die durch eine extraoculäre Ursache bedingt ist, unterscheidet.

7. Endlich bewirken Verletzungen des Nervus opticus Atrophie, die das Bild einer genuinen Atrophie gibt und durch Leitungsunterbrechung hervorgerufen ist.

Geschwülste, Concretionen und Pigmentirung im Sehnerven.

Von den Geschwülsten des Sehnerven, von denen Myxome, Myxofibrome, Myxosarkome, Gliome, scirrhöse Carcinome, Psammome, Neurome und Tuberkel gesehen wurden, soll natürlich hier nur insoweit die Rede sein, als sie sich im ophthalmoskopischen Bilde durch einen besonderen Befund zu erkennen geben. Dies ist nur äusserst selten der Fall. Gewöhnlich ist mit dem Augenspiegel nichts Charakteristisches zu sehen, ja in manchen Fällen ist der Befund überhaupt negativ. In anderen zeigt sich venöse Hyperaemie, Neuritis, Neuroretinitis oder eine aus diesen Processen hervorgegangene Atrophie. Auch eine einfache Sehnervenatrophie kann sich finden. In den seltensten Fällen, wo der Tumor auch den Sehnervenkopf ergriffen hat, sah man an Stelle der Papille eine starke hügelige Prominenz, von bedeutend grösserem Umfange als die Papille. Die Oberfläche derselben war sehr uneben, höckerig, an verschiedenen Stellen verschieden gefärbt, die Gefässstämme völlig verdeckt, in der Geschwulst dagegen ganz unregelmässige Gefässe sichtbar.

In seltenen Fällen, zumeist in atrophischen Papillen, dann ganz besonders häufig bei Retinitis pigmentosa wurden drusige Bildungen an der Sehnervengrenze und auch innerhalb der Papille vorgefunden. Sie hatten ein blaugraues oder weissglänzendes Aussehen und man konnte ihre Vergrösserung mit dem Augenspiegel verfolgen. Es handelt sich hier wohl um Bildungen, die von der Limitans Chorioideae oder vom Pigmentepithel als Drusen der Glaslamelle der Chorioidea (siehe S. 55) ausgehen und in den Opticus hineinwuchern. Auch Cholestearinkrystalle wurden als sehr feine glitzernde Punkte in atrophischen Sehnerven gesehen.

Nach Verletzungen mit Blutungen in die Sehnervenscheide hat man öfter Pigmentirung der peripheren Theile der Papille und des Bindegewebsringes gefunden. Es kann auf diese Weise $^1/_3$ bis $^3/_4$ der Papille von Pigment bedeckt erscheinen.

III. Capitel.

Netzhaut.

A. Angeborene Anomalien.

Markhaltige Nervenfasern.

Gewöhnlich verlieren die Nervenfasern ungefähr im Niveau der Lamina cribrosa ihr Mark und es treten blos die durchsichtigen Axencylinder ins Auge hinein, so dass in der ganzen Nervenfaserschichte der Retina blos marklose Fasern zu finden sind. Als angeborene Anomalie kommt es aber vor, dass die Nervenfasern ihr Mark, nachdem sie als nackte Axencylinder durch die Lamina cribrosa getreten sind, etwa am Rande der Papille wieder bekommen, um es dann während ihrer Ausstrahlung in der Retina eine gewisse Strecke zu behalten. Es ist dies ein Verhalten, wie es in ähnlicher Weise bei vielen Thieren stets vorkommt, beim Menschen aber zu den Seltenheiten gehört.

Das ophthalmoskopische Bild dieser Veränderung ist sehr charakteristisch und kann wohl kaum je zu Verwechselungen mit anderen Befunden Anlass geben. Anschliessend an den Rand der Papille sieht man nämlich in solchen Fällen einen weissen, hellglänzenden Fleck. Derselbe ragt meist nur wenig über den Rand der Papille hinüber, so dass der Bindegewebsring verdeckt ist. Nur bei sehr ausgebreiteten Plaques markhaltiger Fasern kommt es auch vor, dass ein grösserer Theil der Papille von ihnen bedeckt ist. Sie finden sich am häufigsten oben und unten entlang den grösseren Gefässen, mitunter auch innen, am allerseltensten aussen. Selbst wenn die Papille ringförmig von ihnen umgeben ist, so ist dieser Ring doch gegen die Macula schmäler. Nur in Einem Falle wurden bisher die markhaltigen Nervenfasern in der Maculagegend selbst gefunden.

Diese weissen Flecke haben ganz besonders in ihren Contouren ein eigenthümliches Verhalten. Man sieht nämlich deutlich, dass sie sich an ihrem centralen und peripheren Rande in feine radiäre Fasern auflösen. Da dies nicht nach jeder Richtung hin in derselben Entfernung von der Papille geschieht, so haben sie häufig ein flammenartiges Aussehen. Die Papille erscheint oft, wahrscheinlich durch Contrast, auffallend roth. Der Verlauf der Retinalgefässe lehrt, dass diese Bildungen in den inneren Netzhautschichten liegen. Die Gefässe verschwinden nämlich an manchen Stellen unter dem Fleck

markhaltiger Nervenfasern für eine kurze Strecke um dann wieder emporzutauchen. Die grösseren Gefässe verlaufen aber mitunter auch frei über die weisse Stelle hinweg.

Oft sieht man nur ein oder mehrere kleine Büschel solcher markhaltiger Nervenfasern am Papillenrand (J. A. Fig. 34, 35; W. u. M. Fig. 6, 7, 8, 9; L. A. Taf. XII, Fig. 2). In anderen Fällen ist selbst ein grösserer Theil des Fundus davon bedeckt (J. A. Fig. 36; L. A. Taf. XII, Fig. 1). Zu den Seltenheiten gehört es auch, dass ein aus markhaltigen Fasern gebildeter Fleck nicht am Rande der Papille, sondern im Fundus in geringerer oder grösserer Entfernung von der Papille anzutreffen ist (J. A. Fig. 34; W. u. M. Fig. 9; L. A. Taf. XII, Fig. 1).

Die Diagnose unterliegt gewöhnlich keinen Schwierigkeiten. Von einer Chorioidealatrophie kann man den weissen Fleck leicht unterscheiden. Einmal ist die Farbe viel weisser und glänzender als die der Sklera, und dann erkennt man am Verlaufe der Gefässe, dass der Sitz der Veränderung in den inneren Netzhautschichten ist. Mit entzündlichen Producten in der Netzhaut wird man den Befund nicht leicht verwechseln. Die Grenzen der aus markhaltigen Nervenfasern bestehenden Plaques zeigen nämlich die erwähnte Ausstrahlung in feine, weisse Streifen. Endlich ist auch jene flammige Gestalt und die Lage am Papillenrande sehr charakteristisch.

Eine Sehstörung wird durch die markhaltigen Nervenfasern nur in sehr geringem Grade hervorgerufen, ausgenommen den Fall, wo sie sich auch in der Maculagegend finden würden. In der gewöhnlichen Form, wo sie sich dem Papillenrande anschliessen, bewirken sie höchstens eine Vergrösserung des blinden Fleckes.

B. Erworbene Anomalien der Retina.

Circulationsstörungen.

1. Arterienpuls.

Vom Venenpuls als von einer an normalen Augen vorkommenden Erscheinung war bereits oben (Seite 54) die Rede. Auch vom Arterienpuls wurde schon bei Besprechung des Glaukoms (Seite 121) gehandelt und daselbst erwähnt, dass der Arterienpuls durch Compression des Bulbus auch am normalen Auge hervorgerufen werden könne. Doch findet man Arterienpuls nicht nur bei Glaukom und nicht immer in der dort beschriebenen Form. Er kann auch in S-förmigen Schlängelungen und Verschiebungen der Arterienstämme seinen Ausdruck finden.

In derselben Form wie bei Glaukom kommt der Arterienpuls auch bei Orbitalerkrankungen, bei Neuritis vor. Auch ist da ebenfalls eine Compression der Centralarterie die Ursache.

Ein anderes Moment, das Arterienpuls bewirkt, kann gesunkene Herzaction sein. Bei schwachen oder seltenen Contractionen des Herzens kann die Spannung des Bulbus ein solches Hinderniss für den Eintritt des Blutes ins Auge sein, dass kein gleichmässiger Blutstrom erhalten wird. Aus diesem Grunde tritt auch bei beginnender Ohnmacht, dann im Stadium asphycticum der Cholera Arterienpuls auf. In allen diesen Fällen überschreitet die Pulsation niemals die Grenzen der Papille. Sie ist an den Anfangsstücken der Gefässe oder

besonders dort, wo sich dieselben bei Niveauunterschieden der Papille um einen Vorsprung herumbiegen, zu sehen.

Bei Aorteninsufficienz, bei Aortenaneurysma, dann bei Morbus Basedowii wurden an den Arterien ebenfalls Pulsationserscheinungen beobachtet. Dieselben bestehen aber da aus kurzen seitlichen Verschiebungen und S-förmigen Schlängelungen der Arterien. Diese Bewegungen erinnern an jene, die man z. B. an der Temporalarterie bei Atherom der Gefässe wahrnimmt. Man sieht diese Erscheinung nicht nur auf der Papille, sondern auch an den grösseren Gefässstämmen in der Retina. Etwas Aehnliches hat man bei Morbus Basedowii auch an den Venen gefunden, da jedoch nur in geringem Grade.

In Fällen, wo bei Aorteninsufficienz Capillarpuls an den Nägeln auftritt, sieht man an der Papille ebenfalls Capillarpuls, d. h. ein rhythmisches Erblassen und Rothwerden derselben. Diese Erscheinung ist nur sehr schwer zu sehen und es bedarf besonderer Aufmerksamkeit, um sie wahrzunehmen. Sie beruht ebenso wie der Capillarpuls an den Nägeln auf den bis in die Capillaren fortgesetzten Schwankungen des Blutdruckes.

2. *Sichtbare Blutbewegung in Arterien und Venen.*

Dieses Phänomen hat man nur in sehr seltenen Fällen, viel häufiger in den Venen als in den Arterien beobachtet. Die Blutsäule zeigt sich nämlich in den Gefässen unterbrochen, so dass bluthaltige Partien und solche, die nahezu blutleer erscheinen, miteinander abwechseln. Die Blutsäule ist in kleine Blutcylinderchen zerrissen, zwischen denen das Gefäss wie blutleer aussieht. Es lässt sich das Bild ganz mit jenem vergleichen, das entsteht, wenn die Quecksilbersäule in einem Barometer durch eingedrungene Luft in kleine Stücke zerrissen ist. Diese Blutcylinderchen bewegen sich nun entsprechend dem Blutstrom in den Gefässen zumeist langsam fort. Die Erscheinung kann nach einiger Zeit verschwinden, dann wieder auftauchen. In den Venen sah man diese Blutcylinderchen auch durch die Gefässpforte entweichen. Ferner konnte man auch wahrnehmen, dass die Blutbewegung ganz stockte, nach einiger Zeit wohl wieder begann, jedoch nun die ganz verkehrte Richtung hatte, so dass das Blut sich in den Venen centrifugal bewegte. Die Blutsäulchen werden entweder ganz unregelmässig stossweise vorgeschoben, oder sie rücken rhythmisch vor.

Die beschriebene Erscheinung dürfte wohl in einer mangelnden vis a tergo ihren Grund haben, wie sie bei Embolie der Centralarterie im Stadium asphycticum der Cholera vorkommen kann. Auch bei Netzhautablösung und bei Thieren nach Durchschneidung des Opticus wurde sie gesehen.

3. *Hyperaemie der Netzhaut.*

Die Hyperaemie der Netzhaut ist entweder eine active oder eine Stauungshyperaemie. Bei der activen Hyperaemie sind die Venen bedeutend überfüllt, während die Arterien in ihrem Caliber meist keine deutliche Veränderung erkennen lassen. Arterien und

Venen, besonders die letzteren, sind stärker geschlängelt, und zwar liegen die Windungen derselben nicht blos in einer Ebene, sondern in verschiedenem Niveau. Einzelne Theile der Windungen liegen dem Beobachter näher, andere sind weiter von ihm entfernt. Man kann dies im aufrechten Bilde durch einen geringen Unterschied in der Refraction nachweisen. Ferner erscheinen die Gefässe an verschiedenen Stellen verschieden gefärbt. Dort nämlich, wo das Gefäss von einer tiefer gelegenen Stelle zu einer höher liegenden aufsteigt, erscheint es dunkler, da man dort sehr schräg auf die Blutsäule sieht. Auch fehlen dort die Reflexstreifen in der Mitte des Gefässes, die bei Hyperaemie besonders deutlich, auch an den Venen, hervortreten. Die ausgedehnten Venen haben auch eine viel dunklere Farbe als gewöhnlich. Auch werden eine grosse Zahl sonst äusserst feiner Gefässe durch ihre Erweiterung sehr deutlich sichtbar. Hiezu kommt noch das Verhalten des Sehnerven, wie wir es bei Hyperaemie bereits beschrieben haben, nämlich das Verschwommensein seiner Grenzen, die deutliche radiäre Streifung vom Papillenrand in die Retina ausstrahlend (J. A. Fig. 61). Auch hier muss man davor warnen, allzuleicht eine Hyperaemie der Retina zu diagnosticiren. In normalen Augen sind sehr bedeutende individuelle Verschiedenheiten vorhanden. Auch ist die ophthalmoskopische Vergrösserung bei Beurtheilung der Dicke der Gefässe immer in Betracht zu ziehen.

Die active Hyperaemie der Netzhaut kommt bei jenen Zuständen vor, die wir schon bei der Hyperaemie des Sehnerven als Ursachen erwähnt haben. Dahin gehören: Uebermässige Anstrengung der Augen, musculäre und accommodative Asthenopie, Conjunctivalreizungen und Entzündungen, Entzündungen der Cornea und Iris. Weiter kommt Hyperaemie vor bei Retinitis und bei Hyperaemie und Entzündung der Meningen.

Bei der Stauungshyperaemie zeigen sich neben der Verschwommenheit der Papille auf derselben sehr oft eine grosse Zahl von sehr feinen Gefässchen und eine deutliche radiäre, grau-röthliche Streifung, die von der Papille aus in den Fundus sich hineinerstreckt. Die Arterien sind auffallend verdünnt, die Venen dagegen sehr stark erweitert und geschlängelt. Man sieht an ihnen ebenfalls die oben erwähnten Veränderungen in der Farbe und dem Reflexstreifen (W. u. M. Fig. 12; L. A. Taf. XI, Fig 1, 2, 8, 9).

Solche Stauungshyperaemie findet sich vor bei Stauungspapille, bei Glaukom, dann bei Orbitaltumoren. Auch manchmal bei einfacher Retinitis sieht man ein ähnliches Bild. In Fällen von allgemeiner Cyanose, bei angeborenen Herzfehlern (Stenose der Pulmonalis, Offenbleiben des Foramen ovale und Septum membranaceum, abnormem Ursprung der Aorta oder Pulmonalis) sieht man auch oft eine bedeutende Ausdehnung der Gefässe, aber merkwürdigerweise sehr oft sowohl der Arterien, als der Venen. Das Blut in den Gefässen erscheint in solchen Fällen auffallend dunkel. In einem Falle, der von Liebreich als Cyanosis Retinae beschrieben wurde, waren die Venen auf das Doppelte des Calibers ausgedehnt. Uebrigens muss erwähnt werden, dass Stauungshyperaemie der Retina in Folge Kreislaufstörungen in dem venösen System nur selten entsteht. Das Auge wird eben von allgemeinen Kreislaufstörungen nur verhältnissmässig wenig beeinflusst,

da es durch die Spannung der Bulbuskapsel eine ziemlich selbstständige Circulation besitzt.

4. Anaemie der Retina.

Dieselbe charakterisirt sich durch eine hochgradige Verdünnung der Gefässe und ganz besonders der Arterien. Dabei erscheint die Papille immer auffallend blass (W. u. M. Fig. 19; L. A. Taf. VIII, Fig. 4).

Die Anaemie der Retina ist zumeist durch im Auge gelegene Ursachen bedingt, nur selten Folge einer allgemeinen Anaemie. Im höchsten Grade ausgeprägt trifft man sie bei Embolie der Centralarterie. Ferner kommt sie auch bei retrobulbärer Neuritis und unmittelbar nach Durchtrennung des Opticus, dann bei Blutung zwischen den Opticusscheiden vor. In Folge von allgemeiner Anaemie nimmt man ähnliche Erscheinungen an der Retina nur im Stadium asphycticum der Cholera wahr, wo auch das Blut in den Venen auffallend dunkel gefärbt ist. Auch bei Chinin- und Bromkaliamaurose konnte man Blässe der Papille und Ischaemie der Retina finden.

Die einfache Anaemie der Retina darf nicht mit der Verengung der Netzhautgefässe, wie sie nach chronischen Entzündungen der Retina so oft zur Beobachtung kommt, verwechselt werden.

5. Embolie der Arteria centralis retinae.

Das Bild, das durch Embolie der Centralarterie entsteht, ist wesentlich verschieden, je nachdem es sich um Embolie des Stammes oder eines Astes handelt. Das erste und wichtigste Symptom bei totaler Embolie ist eine höchstgradige Ischaemie der Netzhaut. Die Arterien sind nur als ganz feine rothe Streifen sichtbar und verschwinden in einiger Entfernung von der Papille oft ganz. Die Venen dagegen zeigen sich mehr, doch nicht normal gefüllt. Die Papille ist auffallend blass, weisslich, aber zunächst scharf begrenzt. Diese Symptome wird man jedoch nur zu Gesicht bekommen, wenn man sehr bald nach dem Auftreten der Erblindung, die in diesen Fällen meist vollständig ist, den Patienten untersucht. Die Gefässe, und zwar häufiger die Venen als die Arterien, können auch eine deutliche Verschiedenheit im Caliber auf der Papille und in ihrer Umgebung darbieten. Sie erscheinen nämlich auf der Papille sehr eng, wie zugespitzt, im Fundus dagegen deutlich weiter. Durch Druck auf das Auge lässt sich in der Gefässfüllung meist keine Veränderung hervorrufen. Auch Venenpuls ist nicht zu erzeugen.

Schon in kurzer Zeit, mehrere Stunden nach Auftreten der Embolie, findet man andere Veränderungen. Man sieht eine Trübung der Retina von graulichweisser oder milchweisser Farbe um die Papille und ganz besonders in der Maculagegend auftreten. Die Papillengrenzen sind ziemlich gut erkennbar, dagegen ist die Trübung in der Maculagegend viel intensiver, sehr ausgedehnt, diffus begrenzt und in manchen Fällen konnte man sehen, dass sie aus feinen, weissen Punkten zusammengesetzt war. In der Gegend der Fovea centralis findet sich meist ein blutrother, ziemlich scharf begrenzter Fleck von verschiedener Grösse, doch nicht grösser als etwa $^1/_4$ P. D. (L. A. Taf. VIII, Fig. 4; W. u. M. Fig. 19; J. A. Fig. 70, wo indess der rothe Fleck nicht in der Macula liegt).

Man erklärt die Trübung der Retina wohl leicht durch eine Ernährungsstörung. Dagegen kann jener rothe Fleck dadurch entstehen, dass in Folge der Verdünnung der Retina in der Fovea centralis die Trübung nur sehr unbedeutend bleibt. Es kann dort also die Aderhaut durchscheinen, und zwar ist die Farbe dieser Stelle in Folge des Contrastes gegen die helle Umgebung um so dunkler. So treten auch in der Maculagegend sehr feine, sonst nicht sichtbare Gefässe hervor, da sie sich von dem weissen Grunde besser abheben, so dass man bei dieser Erkrankung direct die Gefässvertheilung daselbst studiren kann. Manche erklären den rothen Fleck dagegen für eine Haemorrhagie, wofür das weiter unten zu erwähnende Verhalten nach Verschwinden der Netzhauttrübung und bei Embolie eines Astes der Centralarterie spricht.

Blutungen kommen in diesem Stadium in der Retina auch, doch meist spärlich vor. Die Blutfüllung der Gefässe zeigt schon in den nächsten Tagen eine Veränderung. Dieselben sind bedeutend besser gefüllt als früher, man kann Venen- und Arterienpuls durch Druck hervorrufen, und entlang der Gefässe treten oft weisse Streifen auf. Mitunter stellt sich auch das oben besprochene Phänomen der sichtbaren Blutbewegung in Arterien und Venen ein. Später werden die Papillengrenzen wieder besser sichtbar, mit dem Zurückgehen der Netzhauttrübung wird auch der rothe Fleck in der Fovea centralis immer undeutlicher, in manchen Fällen wurde derselbe auch nach dem völligen Verschwinden der Trübung noch gesehen (L. A. Taf. VIII, Fig. 5). Manchmal blieben an der Stelle feine, glänzende, farbenschillernde oder dunkle Flecke zurück. Die Gefässe werden nun wieder enger, die Papille wird nach und nach vollständig weiss und schliesslich hat man das Bild einer genuinen Sehnervenatrophie vor sich. Nur die bedeutende Verengerung der Gefässe weist auf den Ursprung hin. Auch sind die Gefässe manchmal von weissen Streifen begleitet oder streckenweise in weisse Stränge verwandelt.

In sehr seltenen Fällen, wo das Auge nicht vollständig erblindet, sondern ein sehr kleines Gesichtsfeld mit ziemlich gut erhaltener, centraler Sehschärfe zurückgeblieben war, konnte man wahrnehmen, dass an einer circumscripten, aussen von der Papille gelegenen Stelle keine Netzhauttrübung vorhanden war; auch war dort ein kleines Gefässchen gut gefüllt. Es handelte sich hier um solche Gefässe, die von den anderen getrennt am äusseren Papillenrande hervorkommen, und entweder cilioretinale Gefässe (siehe Seite 115) waren oder solche kleine Aestchen der Centralarterie, die, im Opticus selbst, von dem Hauptstamme entspringend, von einem weiter peripher gelegenen Embolus nicht beeinflusst wurden.

Bei Embolie eines Astes der Centralarterie ist nach der Grösse des Astes entweder die halbe Retina oder nur ein Sector derselben verändert. Ist z. B. der nach oben gehende Hauptast der Arteria centralis obturirt, so sind die nach oben gehenden Gefässe ungemein dünn und es fehlt die untere Hälfte des Gesichtsfeldes. Die centrale Sehschärfe kann hiebei gut sein oder auch herabgesetzt. Die Netzhauttrübung tritt entsprechend dem Bezirke, wo die Gefässe verdünnt sind, auf. Der rothe Fleck in der Fovea ist ebenfalls zu sehen und sitzt dann nur zur Hälfte innerhalb der getrübten Partie der Netzhaut. Bei schliesslich eintretender Atrophie ist auch nur die be-

treffende Papillenhälfte blass und die Gefässe in dem unempfindlich gewordenen Theile der Retina bleiben verdünnt, während die Netzhauttrübung wieder zurückgeht.

Ist nur ein kleinerer Ast der Arteria centralis verstopft, so treten nur in einem Sector der Retina Veränderungen auf und man kann den Embolus als spindelförmige, weisse Anschwellung im Verlaufe eines Gefässes manchmal direct sehen. Die Centralarterie stellt eine Endarterie dar, da die Verbindungen ihres Gefässsystems mit den Gefässen der Chorioidea und des Scleroticalgefässkranzes nur capillarer Natur sind. Es kann in Folge dessen nicht zu einem rückläufigen Venenstrom und zu haemorrhagischem Infarkt kommen. Dagegen ist dies bei Embolie eines Astes der Centralarterie möglich. Man findet dann das von dem betreffenden Aste versorgte Gebiet der Retina dicht mit Haemorrhagien vollgepfropft.

In sehr vielen Fällen, die den beschriebenen Symptomencomplex zeigen, kann man Herz- oder Gefässerkrankungen nachweisen. Uebrigens ist trotz mehrerer, zweifellos anatomischer Befunde nicht erwiesen, ob nicht in manchen Fällen andere Ursachen, so retrobulbäre Neuritis mit Thrombose der Arterie oder Blutung in den Zwischenscheidenraum zu Grunde liegen.

Bei Durchtrennung des Opticus zwischen der Eintrittsstelle der Centralarterie in denselben und dem Bulbus zeigen sich ähnliche Erscheinungen wie bei Embolie der Centralarterie. Zunächst erscheint die Netzhaut sehr anaemisch, die Gefässe kaum sichtbar. Mitunter ist die Blutsäule in ihnen unterbrochen. Die Netzhaut trübt sich, wird fast weiss, die Papillengrenzen sind unkenntlich. Oefter stellt sich später wieder einige Gefässfüllung in der Retina ein, ja die Venen können selbst ziemlich voll aussehen. Endlich tritt Atrophie der Papille und der Netzhaut auf. Zugleich sieht man eine Entfärbung des Pigmentepithels und eine Pigmentwucherung in der Retina, die sich sogar in die Papille hineinerstrecken kann. Erfolgt dagegen die Durchtrennung des Opticus hinter der Eintrittsstelle der Centralarterie, so dass diese also nicht verletzt wird, so ist der Spiegelbefund im Anfang völlig normal und erst später tritt allmählich das Bild einer genuinen Atrophie auf.

6. Thrombose der Vena centralis.

Bei alten Leuten mit Sklerose der peripheren Arterien, Hypertrophie des rechten Ventrikels, Lungenemphysem, bei Leukaemie wurde Thrombose der Vena centralis anatomisch nachgewiesen. Es handelt sich um Fälle, wo das Sehvermögen plötzlich schwindet.

Man findet ophthalmoskopisch ein verschiedenes Bild bei vollständiger und bei unvollständiger Thrombose. Im ersteren Falle sieht man den Sehnerv sehr roth, verschwommen und zahlreiche Haemorrhagien in der Retina, und zwar nicht nur in der Umgebung der Papille, sondern auch in der Peripherie. Besonders auffallend ist aber das Verhältniss der Venen zu den Arterien. Während die letzteren ganz fadendünn, kaum sichtbar sind, zeigen die Venen kolossale Schlängelung und Erweiterung. Die Farbe des Blutes in ihnen ist ungemein dunkel, schwärzlichroth (J. A. Fig. 65; L. A. Taf. IX, Fig 3).

Wo die Thrombose keine vollständige ist, zeigt sich wohl ebenfalls eine starke Verschiedenheit im Durchmesser der Arterien und Venen, doch sind in der Retina nur spärlichere Extravasate nachweisbar.

Der Ausgang des Leidens ist immer eine Verfärbung der Papille. Sehr oft bleibt auch Trübung der Retina sowie Verdickung der Gefässwände in Form weisser Streifen an den Gefässen und sehr bedeutende Erweiterung der Venen zurück.

So wie Thrombose des ganzen Venenstammes, kommt auch Thrombose kleinerer Aeste vor. Die Veränderungen sind dann ganz ähnliche wie die eben beschriebenen, nur sind sie auf den der betreffenden Vene entsprechenden Bezirk beschränkt.

Gefässveränderungen in der Retina.

Zu den seltenen Bildungen gehören **Teleangiektasien** und **Varicositäten** der Netzhautgefässe. Man fand in einem Falle von ausgebreiteten Teleangiektasien der Lider und der Conjunctiva auch eine sehr starke Erweiterung und Schlängelung der Netzhautvenen. Auch Varicositäten der Netzhautvenen sind beobachtet worden, so dass die Venen ein rosenkranzartiges Aussehen bekamen. Solche Veränderungen der Gefässe treten bei Glaukom (L. A. Taf. XI, Fig. 1), besonders bei haemorrhagischem Glaukom, auf. Bei alten Leuten findet sich öfter eine auffallende Schlängelung der Netzhautvenen (auch manchmal der kleineren Arterien), so dass sie korkzieherartig gewunden erscheinen.

Aneurysmen der Centralarterie sind ebenfalls als Raritäten beobachtet worden. Man sah in diesen Fällen eine ei- oder spindelförmige Geschwulst, die sich in eine Netzhautarterie fortsetzte und deutlich pulsirte, und zwar so, dass die Ausdehnung der Geschwulst mit der Systole des Herzens zusammenfiel. Wichtig wäre, das Vorkommen multipler, miliarer Aneurysmen an den Aesten der Centralarterie zu erkennen, da dieselben anatomisch zugleich mit multiplen, miliaren Aneurysmen der kleinen Gehirnarterien nachgewiesen wurden.

Aneurysma arterio-venosum, bei welchem die Anastomose von Aesten der Arterie und der Vene vorzukommen schien, wurde nach Contusion des Auges beschrieben.

Verdünnung der Gefässe ist in vielen Fällen mit dem Augenspiegel erkennbar und man kann dabei gleichzeitig die Gefässe von weissen Streifen gefolgt sehen, manchmal kann das Gefäss sogar in einen weissen Strang verwandelt sein. Zumeist ist dies jedoch nur auf kurze Strecken der Fall (J. A. Fig. 50, 75; L. A. Taf. XI, Fig. 3, 6). Dass das Gefäss noch Blut führt, kann man dann oft daran erkennen, dass an einem peripher gelegenen Theile des Gefässes wieder deutlich der centrale, rothe Streifen zu sehen ist oder dasselbe auch ganz roth erscheint. Es lässt sich auch manchmal das Blut in den Gefässen direct nachweisen, wenn die Verdickung der Gefässwand nicht zu hochgradig ist. Es gelingt dies in folgender Weise: Man entwirft unmittelbar neben dem Gefäss ein sehr kleines Flammenbild mit dem Spiegel. Es wird dann Licht, von den tieferen Theilen der Retina reflectirt, durch das Gefäss dringen und die Blutsäule in demselben sichtbar machen. Liegt das weisse Gefässstück peripher, so muss man auf den Verlauf der Contour desselben achten.

Schliesst sich die Begrenzung des weissen Stückes vollkommen der Contour des roth erscheinenden Gefässtheiles an, so handelt es sich wohl um eine Obliteration des Gefässes. Ist aber die weisse Stelle dicker als die rothe, dann kann man eine Verdickung der Gefässwand vermuthen. In Folge des letzteren Processes erscheinen die Gefässe in der Retina sehr viel zahlreicher als in einem normalen Auge, indem viele kleinere Gefässverzweigungen, die früher kaum sichtbar waren, in Folge der Verdickung und des weissen Aussehens deutlich in die Augen springen (J. A. Fig. 75). In Fällen, wo die Gefässwandungen als weisse Streifen sichtbar sind, handelt es sich um eine Infiltration der Adventitia mit Lymphkörperchen, um eine sogenannte Perivasculitis. Die Veränderungen in der Gefässwand selbst, in der Tunica propria, sind ophthalmoskopisch nicht wahrnehmbar. Diese Perivasculitis Retinae wird bei verschiedenen entzündlichen Processen der Retina und des Sehnerven beobachtet.

Neubildung von Netzhautgefässen. Von den Netzhautgefässen ausgehende und in den fast ganz durchsichtigen Glaskörper hineinragende Gefässschlingen sind ein sehr seltener Befund (J. A. Fig. 72). Auf bindegewebigen Schwarten des Glaskörpers findet man aber öfter neugebildete Gefässe, die freilich häufig nur bei seitlicher Beleuchtung gesehen werden, indem die Durchsetzung des Glaskörpers mit Exsudat so dicht ist, dass sie eine Untersuchung im durchfallenden Lichte nicht zulässt.

Verengerung und Atrophie der Gefässe. Die Gefässe können in Folge einer hyalinen Verdickung der Gefässwand enger aussehen, als sie in der That sind. Die Blutsäule ist schmäler geworden, die noch immer durchsichtige Gefässwand dagegen ist ebensowenig wahrnehmbar als im normalen Zustand. Es kann aber mit Verdünnung und Atrophie der Gefässe auch eine Verdickung ihrer Wand einhergehen, die dieselbe weiss und undurchsichtig macht. Immer sind in solchen Fällen die Gefässe sehr spärlich und oft nur auf eine kurze Strecke in den Fundus hinein zu verfolgen. Ja die Retina kann selbst fast ganz gefässlos erscheinen (J. A. Fig. 51; L. A. Taf. VIII, Fig. 1; Taf. XI, Fig. 10). Dies Verhalten unterscheidet den Befund auch sehr gut, trotz der bei beiden Processen vorkommenden weissen Farbe der Gefässe, von der Perivasculitis Retinae. Die Atrophie der Gefässe ist die Folge entzündlicher und degenerativer Processe in der Netzhaut.

Netzhautblutungen.

Die Netzhauthaemorrhagien sind von verschiedener Form, je nach der Schicht der Retina, in der sie sich vorfinden. Liegen sie in der Nervenfaserschicht, so haben sie ein streifiges oder flammiges, zur Papille radiär gestelltes Aussehen. Liegen sie dagegen in den äusseren Schichten der Retina, so haben sie eine rundliche oder fleckige Gestalt mit ziemlich scharfer, aber zumeist welliger, oder ganz unregelmässige Begrenzung (J. A. Fig. 64, 65, 93; L. A. Taf. VIII, Fig. 1, 2, 3, 6; Taf. IX, Fig. 1, 3; Taf. X, Fig. 1; W. u. M. Fig. 17, 23).

Die Grösse der Haemorrhagien ist sehr verschieden. Es gibt solche, die im aufrechten Bilde eben als feine, röthliche Streifen oder

Flecken sichtbar sind, andererseits ausgebreitete Blutungen, die man fast als Blutlachen bezeichnen möchte.

Die Netzhautblutungen liegen zumeist in der Nähe der grösseren Gefässe, ja können dieselben auf eine grössere Strecke einscheiden. Mitunter liegen sie in einem Sector der Retina sehr dicht beisammen. Auch kann eine Blutung durch die äusseren Netzhautschichten durchbrechen und so auf die äussere Fläche der Retina gelangen und auf diese Weise eine haemorrhagische Netzhautabhebung hervorrufen. Nicht immer ist dieselbe aber so bedeutend, dass sie auch mit dem Augenspiegel als solche erkannt werden kann. Auch durch die Limitans interna der Retina kann sich das Blut einen Weg bahnen und sich dann zwischen Netzhaut und Glaskörper schalenartig ausbreiten (L. A. Taf. VIII, Fig. 2 (?), 3). Solche Blutungen treten mit Vorliebe in der Gegend der Macula auf. Man erkennt dieselben daran, dass sie vollkommen die darunterliegenden Details verdecken, ziemlich scharf begrenzt, aber doch unbeweglich sind. Sicher wird die Diagnose aber erst dann, wenn sich der rothe Fleck auch noch über die Papille theilweise erstreckt. Es ist damit natürlich der Sitz in der Retina ausgeschlossen. Es kann auch vorkommen, dass sich eine solche Haemorrhagie nach oben durch eine ganz horizontale Linie begrenzt. Die Partie darüber, die wahrscheinlich Blutserum enthält, erscheint grau (wie in L. A. Taf. VIII, Fig. 2). Auch in das Gewebe des Corpus vitreum kann das Blut eindringen und man kann in solchen Fällen direct den Zusammenhang des Extravasates im Glaskörper und in der Retina wahrnehmen.

Blutungen, die unmittelbar an den Rand der Papille angrenzen und sich von dort aus in die Retina ausbreiten, sind oft auf Blutungen in den Zwischenscheidenraum des Opticus zurückzuführen. (W. u. M. Fig. 17). Manchmal sieht man in der Mitte der Haemorrhagien eine hellweisse Stelle, die gewöhnlich durch Ansammlung weisser Blutkörperchen bedingt ist. Eine Continuitätstrennung der Gefässe kann man meist nicht wahrnehmen. Man nimmt deshalb an, dass die meisten Haemorrhagien durch Diapedesis entstehen.

Im späteren Verlaufe verhalten sich die Blutungen verschieden. Entweder sie resorbiren sich vollständig oder es bleiben kleine weissliche oder gelbliche Flecke, sogenannte Degenerationsherde, zurück. Hat die Haemorrhagie die äusseren Netzhautschichten eingenommen, so wird auch das Pigmentepithel in Mitleidenschaft gezogen. Man findet dann nach Verschwinden der Blutflecke in der Netzhaut einen unregelmässig begrenzten, atrophischen Herd des Pigmentepithels gewöhnlich mit Wucherung des Pigmentepithels am Rande (J. A. Fig. 94; W. u. M. Fig. 18). Pigment wird an Stelle der Blutung selbst später nur höchst selten gefunden, wenn es auch anatomisch öfter, jedoch nur in so geringer Menge nachgewiesen werden kann, dass es mit dem Augenspiegel nicht sichtbar ist. Die Haemorrhagie kann auch in mehrere kleinere zerfallen, die immer kleiner werden und schliesslich verschwinden. Frische Blutungen sind meist hellroth, später werden sie dunkelbraun oder rothbraun. Die hellrothe Farbe kann aber sehr lange bestehen bleiben.

Blutungen in der Retina können entstehen:

1. Durch Traumen, und zwar durch Einwirkung einer stumpfen Gewalt oder durch eine Verletzung, bei der die Retina durchtrennt wurde.

2. Durch plötzliche Herabsetzung des intraocularen Druckes, besonders bei früher bestandener pathologischer Erhöhung desselben. Daher sieht man so oft nach Glaukomiridektomien Netzhauthaemorrhagien. Dazu kommt noch, dass bei Glaukom die Gefässwandungen oft nicht normal sind.

3. Durch Circulationsstörungen. So findet man bei Pulmonalstenose, bei Menstruationsstörungen, bei Thrombose der Centralvene, bei Embolie der Centralarterie, bei Karotisunterbindung und Suffocation öfters Blutungen in der Retina. Dahin gehören auch die Haemorrhagien bei Neugeborenen.

4. Veränderte Blutbeschaffenheit und Veränderungen der Gefässwände concurriren sehr häufig in denselben Fällen. Man findet Netzhautblutungen bei Sepsis, maligner Endocarditis, bei Ikterus, bei Leberleiden, bei Anaemie (auch nach Blutverlusten, z. B. durch Metrorrhagien, Haematemesis), bei Nephritis, Leukaemie, perniciöser Anaemie, Intermittenskachexie, Febris recurrens, Diabetes, Haemophilie, Purpura haemorrhagica, Scorbut, Atherom der Gefässe.

5. Bei Entzündungen der Retina, und da auch ein Theil der im vorigen Punkte angeführten Zustände Retinitis erzeugt, so können beide Ursachen zusammenwirken.

6. Es gibt Fälle, wo die Netzhautblutungen gewöhnlich in Verbindung mit Glaskörperblutungen, mitunter auch mit haemorrhagischer Ablatio Retinae bei jungen Leuten zwischen 10 und 20 Jahren auftreten, bei denen man sonst absolut keine Veränderungen an den Gefässen und überhaupt keine der angeführten Ursachen der Blutungen nachweisen kann. Meist ist in diesen Fällen das linke Auge stärker ergriffen.

Retinitis.

Unter den ophthalmoskopisch sichtbaren Retinitisformen kann man im Allgemeinen zwei Formen unterscheiden, nämlich die Retinitis der inneren und die der äusseren Schichten, die man auch als Retinitis externa und interna bezeichnen kann.

Bei der ersteren zeigt sich neben Hyperaemie der Retina Trübung derselben. Es treten Extravasate und weissliche Herde auf, die entweder durch weisse Blutkörperchen, durch Fettinfiltration des Stützgewebes der Retina, durch Einlagerung von Körnchenzellen, zumeist in die Körnerschichten, oder durch sogenannte Sklerose der marklosen Fasern der Retina bedingt sind. Ausserdem können sich noch Veränderungen der Gefässwände als weisse Streifen entlang denselben oder durch Verwandlung der Gefässe in weisse Stränge kundgeben. Die Papille ist immer verschwommen, mitunter auch deutlich geschwollen.

Bei Retinitis der äusseren Schichten springen dagegen vornehmlich die Pigmentepithelveränderungen in die Augen. Sie zeigen sich als hellere, entfärbte, atrophische Flecken, die das Aderhautstroma oder, falls dieses ebenfalls durch Chorioiditis atrophisch geworden ist, auch die Sklera hervortreten lassen. Gleichzeitig findet man, besonders in der Umgebung der atrophischen Stellen, Wucherung des Pigmentepithels, die sich durch schwarze oder braune Pigmentflecke, -Streifen und -Klumpen erkennen lässt. Es kann auch Pigment in die inneren Netzhautschichten gelangen und dort entlang den Gefässen oder zwischen denselben sich ansammeln, so dass man Pigmentflecke sieht, die zum Theil die Netzhautgefässe bedecken. Indem das Stützgewebe der Retina hypertrophirt, wird es anfangs an manchen Stellen verdickt, später verdünnt erscheinen, welche Veränderungen sich mitunter durch den abnormen Verlauf der Retinalgefässe verrathen. Natürlich erscheint die Netzhaut an solchen Stellen ebenfalls getrübt und später können sich weissliche Stränge

entwickeln oder wirkliche Narben in der Netzhaut auftreten. Natürlich gibt es Fälle, wo die Retina ihrer ganzen Dicke nach von pathologischen Gewebsveränderungen durchsetzt ist. Es ist dies namentlich bei der Retinitis der äusseren Schichten in ihren späteren Stadien der Fall. Auch können anfänglich die Alterationen des Pigmentepithels durch Trübung der inneren Schichten verdeckt werden, oder es gesellen sich im weiteren Verlaufe einer Retinitis interna auch Pigmentepithelveränderungen hinzu. Im Allgemeinen wird man aber doch nicht fehlgehen, wenn man, was das ophthalmoskopische Bild betrifft, die Unterscheidung der beiden Formen von den Pigmentephithelveränderungen abhängig macht.

Die Retinitis externa findet sich fast immer in Verbindung mit Chorioiditis vor. Es lässt sich sehr oft nicht entscheiden, ob die Retinitis oder die Chorioiditis das Primäre war, jedenfalls aber ist in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die Chorioidea diejenige Membran, von der der ganze Process ausgeht. Von dort werden die Veränderungen in der Retina eingeleitet. Es ist daher auch am besten, die Retinitis externa nicht gesondert, sondern zusammen mit der Chorioiditis zu besprechen.

Auch bezüglich der Aetiologie besteht ein Unterschied. Die Retinitis interna wird zumeist hervorgerufen durch Erkrankungen der Gefässe (Retinitis apoplectica), oder durch veränderte Blutbeschaffenheit (Retinitis albuminurica, leukaemica, diabetica), oder sie kommt gleichzeitig mit Neuritis in Folge Erkrankungen der nervösen Centralorgane vor. In allen diesen Fällen ist die Chorioidea unverändert. Bei der überwiegenden Mehrzahl dieser Fälle ist auch der Glaskörper rein. Die Retinitis der äusseren Schichten zeigt sich dagegen fast immer bei Allgemeinerkrankungen, die mit Vorliebe die Gefässhaut des Auges in Mitleidenschaft ziehen. So z. B. bei Syphilis, ebenso entsteht sie bei localen Erkrankungen des Auges, die mit Chorioidealveränderungen einhergehen, so z. B. bei Myopie.

Die Retinitis pigmentosa gehört nicht zu den Retinitiden, da sie eine mit Pigmentirung verbundene nicht entzündliche Degeneration der Netzhaut darstellt. Sie muss deshalb auch ganz gesondert beschrieben werden.

Indem wir zur Betrachtung der verschiedenen Retinitisformen übergehen, sei noch bemerkt, dass es durchaus nicht immer angeht, z. B. eine Retinitis albuminurica von einer Retinitis diabetica mittels des Ophthalmoskops zu unterscheiden. Doch ist es am besten, diese Formen getrennt zu beschreiben, da sie doch oft gewisse Besonderheiten darbieten. Ueberhaupt ist eine logische Eintheilung der Retinitis entweder nach einem anatomischen oder einem aetiologischen Eintheilungsgrund nicht möglich, da hiezu unsere Kenntnisse weder in der einen noch in der anderen Richtung ausreichen. Uebrigens genügt es hier für unseren Zweck, die einzelnen Retinitisbilder darzustellen und auf die differentielle Diagnostik sowie auf die aetiologischen Momente, die einem und demselben Augenspiegelbild zu Grunde liegen können, hinzuweisen.

1. Retinitis albuminurica.

Bei dieser Retinitisform treten weisse Herde in der Netzhaut auf, die theils durch Rundzellen, theils durch varicöse Hypertrophie der Nerven-

fasern, theils durch fettige Degeneration bedingt sein können. Die letztere besteht entweder in einer fettigen Infiltration in das Stützgewebe der Retina, oder in einer Einlagerung von Fettkörnchenzellen in die Körnerschichten. Die varicöse Hypertrophie der Nervenfasern kann natürlich nur in der Nervenfaserschicht vorkommen. Sie tritt nie so ausgebreitet auf, als die fettige Degeneration. Sehr oft verdecken die Herde hypertrophirter Nervenfasern wegen ihrer Lage in der innersten Netzhautschichte streckenweise die Retinalgefässe, so wie dies bei den markhaltigen Nervenfasern der Fall ist. Ueber einen weissen Fleck aber, der durch fettige Degeneration gebildet ist, laufen die Netzhautgefässe in der Regel ungehindert hinweg, im Gegentheil, sie treten auf dem weissen Grunde nur um so deutlicher hervor. Ganz besonders charakteristisch ist aber, wie wir gleich sehen werden, die Form und Vertheilung der weissen Flecke.

Die Zeichen der Hyperaemie sind gewöhnlich bei der Retinitis albuminurica nicht sehr hochgradig. Meist ist die Papille wohl verschwommen, aber sie ist nicht bedeutend geschwollen. Um sie herum findet man manchmal eine feine Netzhauttrübung, bestehend aus feinen, weisslichen, radiären Streifen. Wie es scheint, beruht dies auf einer geringgradigen, varicösen Hypertrophie der Nervenfasern. Die Netzhautvenen sind erweitert und geschlängelt, hie und da wohl auch vom trüben Netzhautgewebe verdeckt. Haemorrhagien in der Netzhaut sind gewöhnlich spärlich. Sie sind klein und streifig, in der Nähe der grösseren Gefässe gelegen, manchmal punktförmig in der Gegend der Macula sitzend. In einiger Entfernung von der Papille liegen dann oft grössere weissliche oder weisslichgelbe Flecke von mattem Glanz. Sie bilden eine ringförmige Zone um die Papille (ähnlich wie in J. A. Fig. 64).

Der äussere Rand dieses Ringes ist höchstens 3 bis 4 P. D. von der Papille entfernt. Meist ist dieser Ring gegen die Maculagegend zu offen. In der Macula selbst treten aber viele kleine, weisse, matt glänzende, scharf begrenzte Flecken auf. Sie sind daselbst in Sternform angeordnet. Die Gegend der Fovea centralis selbst ist gewöhnlich frei. Um sie herum sind aber Strahlen zu finden, die aus den soeben erwähnten kleinen, weisslichen Punkten oder kürzeren oder längeren Strichen bestehen. Nicht immer ist diese Figur vollständig regelmässig nach allen Seiten hin entwickelt. Sehr oft sind die Strahlen nur nach einer Seite hin von ansehnlicher Länge, in anderen Richtungen sind sie aber nur kurz oder fehlen selbst, so dass man nur $^2/_3$ bis $^3/_4$ eines Sternes wahrnimmt. Auch können diese Punkte zu längeren Strichen zusammenfliessen (J. A. Fig. 66, 67, 68; W. u. M. Fig. 21, 22; L. A. Taf. IX, Fig. 2). Es handelt sich hier zumeist um fettige Infiltration der inneren Enden der Müller'schen Stützfasern der Retina. Der Grund, auf dem man die Sternfigur sieht, erscheint oft deutlich dunkler als der übrige Fundus, und zwar von so dunkelbrauner Farbe, dass man entschieden eine Wucherung des Pigmentepithels annehmen muss. Veränderungen des Pigmentepithels findet man auch manchmal in der Peripherie des Fundus als hellere abgeblasste Stellen.

Die hellen, oben erwähnten weissen Plaques, die die Papille umgeben, können mitunter zusammenfliessen und es entsteht dann

um die Papille ein sehr breiter, weisser Hof, welcher aber bereits am Rande der Papille beginnt (L. A. Taf. IX, Fig. 1). Die Retina ist daselbst sehr stark wallartig verdickt und uneben. Man erkennt dies an dem sehr geschlängelten Verlaufe der Gefässe, sobald sie an den Rand dieser weissen Stelle kommen. Die Venen sind sehr bedeutend erweitert und alle Gefässe heben sich sehr deutlich von der weissen Unterlage ab, sind aber dort, wo sie etwas tiefer liegen von dem trüben Retinagewebe so verdeckt, dass sie wie zerrissen aussehen. Zahlreiche Haemorrhagien in Form von Streifen und Flecken liegen innerhalb der so veränderten Netzhautpartie. Die Grenzen der Papille sind gewöhnlich ganz unkenntlich und die Netzhauttrübung erstreckt sich längs der grösseren Netzhautgefässe in den Fundus hinein. Gegen die Macula zu ist der weisse Hof dagegen sehr wenig ausgebildet oder fehlt auch vollständig. In anderen Fällen ist aber die Maculagegend mitergriffen. Weisse, stärker als die übrige Netzhauttrübung glänzende Flecke können im Bereiche der Macula in unregelmässiger Lagerung oder in Sternform sich vorfinden.

Im Allgemeinen kann man im Verlaufe der Retinitis albuminurica drei Stadien unterscheiden: 1. Das der Hyperaemie, wobei die Hauptveränderungen in starker Hyperaemie, Trübung der Retina von mehr diffuser Form und zahlreichen Netzhauthaemorrhagien bestehen. 2. Das Stadium der fettigen Degeneration. Hier ist nur geringe Hyperaemie vorhanden, es treten aber jene weissen Flecke in die Erscheinung. Im dritten Stadium erfolgt Rückbildung oder Atrophie. Die Veränderungen können, selbst wenn sie sehr ausgeprägt sind, noch rückgängig werden, die weisslichen Herde können verschwinden. Am längsten hält meist die sternförmige Figur in der Gegend der Macula Stand. Schliesslich kann man eine blasse Papille, leichte Veränderungen an den Gefässen (weisse Streifen) und Pigmentepithelanomalien in der Maculagegend finden. Mitunter können auch weissliche, verästelte Streifen (sogenannte Netzhautstränge) in der Retina zurückbleiben, die offenbar narbigen Veränderungen entsprechen (J. A. Fig. 73, 74). Tritt Atrophie ein, so sind die Gefässe sehr verdünnt und die Papille nimmt meist das Aussehen einer Atrophie aus extraoculärer Ursache an, sie wird also weiss und ziemlich durchsichtig. Oft kann es selbst schwer werden, aus dem Spiegelbefund auf die früher vorhanden gewesene Retinitis zu schliessen. Nur die Verdünnung der Gefässe ist auffallend und führt auf die richtige Diagnose. Uebrigens sei hier bemerkt, dass oft die Besserung des Sehvermögens in sehr auffallendem Contraste zu den mit dem Spiegel vorgefundenen Veränderungen steht.

Die Diagnose ist in ausgeprägten Fällen nicht schwer zu stellen. Nur bei Neuritis in Folge von Meningitis findet man auch jene Sternfigur in der Maculagegend. Auffallend ist aber doch in diesen Fällen die starke Schwellung der Papille, die bei Retinitis albuminurica gewöhnlich fehlt. Retinitis diabetica kann ganz ähnlich aussehen wie die bei Albuminurie. Statt der typischen Retinitis findet man andererseits bei dem letzteren Zustande auch eine einfache Neuroretinitis oder haemorrhagische Retinitis; auch können blos Netzhautblutungen zugegen sein, ja in seltenen Fällen wurde auch

Stauungspapille bei Morbus Brightii gesehen. Zur Retinitis albuminurica kann sich auch Netzhautablösung gesellen.

Die Kenntniss der Retinitis albuminurica ist deshalb so wichtig, weil es nicht allzuselten vorkommt, dass der Patient zunächst blos auf seine Sehstörung aufmerksam wird. Die übrigen, sehr wenig auffallenden Symptome, welche das Grundleiden hervorgerufen hat, sind von ihm vollständig übersehen worden. Es ist also der Augenarzt, an den er sich zuerst wendet. Ein Blick mit dem Augenspiegel kann in solchen Fällen genügen, um sogleich auf ein Nierenleiden als Grundkrankheit mit grösster Wahrscheinlichkeit zu schliessen. Wir sagen hier absichtlich „Nierenleiden" und haben auch im Vorigen stets den Ausdruck Retinitis albuminurica und nicht Brightica gebraucht. Es können nämlich auch andere Erkrankungen der Niere, nicht blos Morbus Brightii, dieselbe Form der Retinitis hervorrufen. Zumeist ist allerdings die chronische Nephritis die Ursache. Doch kann auch eine acute Nephritis (bei Schwangeren und nach acuten Exanthemen) zu Grunde liegen. Selbst amyloide Degeneration der Nieren erzeugt eine ähnliche Retinalerkrankung. Der Zusammenhang zwischen dem Nierenleiden und der Retinitis liegt offenbar in der veränderten Blutbeschaffenheit und der dadurch bedingten Ernährungsstörung in der Netzhaut. Die Hypertrophie des linken Ventrikels, die von Manchen für wichtig bei der Entstehung der Retinitis gehalten wurde, kann höchstens an einer stärkeren Ausbildung der Haemorrhagien schuld sein.

Entsprechend der allgemeinen Ursache ist die Retinitis albuminurica doppelseitig zu finden, doch sind auch sehr seltene Fälle bekannt, wo sie nur an einem Auge auftrat.

2. *Retinitis leukaemica.*

Bei Leukaemie kommt gleichzeitig mit Retinitis eine eigenthümliche Veränderung der Blutfarbe in den Gefässen vor. Die Venen erscheinen hell, rosenroth, die Arterien orangegelb. Sind die Chorioidealgefässe sichtbar, so sind sie ebenfalls von bedeutend hellerer, gelbrother Farbe. Diese helle Farbe beruht jedenfalls auf der Vermehrung der weissen Blutkörperchen und tritt natürlich nur dann auf, wenn die Veränderung in der Zusammensetzung des Blutes eine hochgradige ist.

Die retinitischen Erscheinungen bieten oft nichts Charakteristisches. Die Papillengrenzen sind verschleiert, die Papille selbst nur wenig geschwollen, die Retina diffus getrübt. Retinalhaemorrhagien von auffallend blasser Farbe und weisse Flecke, unregelmässig in der Maculagegend angeordnet, sind sichtbar (L. A. Taf. X, Fig. 3).

Das ophthalmoskopische Bild der Retinitis leukaemica wird nur dann derart, dass man daraus die Diagnose auf Leukaemie stellen kann, wenn man weisse Flecken mit rothem Saume findet, die besonders nahe dem Aequator und im Bereiche der Macula liegen (schon ihre Localisation unterscheidet sie also von jenen bei Retinitis albuminurica). Diese weissen Herde zeigen sogar manchmal eine deutliche Prominenz. Sie bestehen aus Ansammlungen von Lymphkörperchen, der rothe Saum aus rothen Blutkörperchen. Manche der einfach weissen Flecke können sich aber auch aus varicös hypertrophirten Nervenfasern und Herden von fettiger Degeneration zusammensetzen.

Auch die Retinitis leukaemica tritt immer doppelseitig auf.

3. Retinitis diabetica.

Die Retinitis bei Diabetes mellitus, die eine ziemlich seltene Folgekrankheit desselben ist, zeigt oft nichts Charakteristisches. Manchmal tritt sie unter dem Bilde einer haemorrhagischen Retinitis auf, manchmal wieder kann man den Befund von dem bei Retinitis albuminurica nicht unterscheiden. Nur das Confluiren der weissen Herde zu jenem grossen Hof um die Papille, wie bei der Retinitis albuminurica, scheint hier nicht vorzukommen (W. u. M. Fig. 23; J. A. Fig. 64).

Während bei Retinitis albuminurica Glaskörpertrübungen gewöhnlich vollständig fehlen, findet man dieselben hier nicht so selten in bedeutender Ausbildung. Sie scheinen durch Blutungen in den Glaskörper bedingt zu sein.

Immer ist die Retinitis diabetica doppelseitig.

4. Diffuse chronische Retinitis.

Das Augenspiegelbild bei der diffusen chronischen Retinitis besteht in einer starken Verschleierung der Papillengrenzen und den Zeichen der Hyperaemie. Die Retina ist in der Umgebung der Papille entweder diffus oder in Form feiner, radiärer, graulicher Streifen getrübt (W. u. M. Fig. 32; J. A. Fig. 62, 63, 69; L. A. Taf. V, Fig. 1). Diese Trübung ist ganz besonders in der Nähe der grösseren Gefässe sichtbar und erstreckt sich auch da am weitesten in den Fundus hinein, so dass man besonders deutlich bei der Untersuchung im umgekehrten Bilde die Gefässe von breiten grauen Streifen mit verschwommenen Grenzen begleitet sieht. Eine beträchtliche Schwellung der Papille ist nie zu constatiren. Haemorrhagien und jene weissen Degenerationsherde, wie bei der Retinitis albuminurica, fehlen hier gewöhnlich, oder sind nur spärlich und sehr wenig entwickelt. Bei der diffusen, chronischen Retinitis besteht meist Infiltration der inneren Netzhautschichten durch Lymphkörperchen und Wucherung des Stützgewebes, wozu auch noch Wucherung der Körnerschichten und der Stäbchenzapfenschicht kommen kann. Nicht so selten sind auch Veränderungen im Pigmentepithel wahrnehmbar, die zumeist erst später, wenn die Netzhauttrübung abgenommen hat, sichtbar werden und welche in Entfärbung des Augengrundes an circumscripten Stellen oder in grösserer Ausdehnung bestehen. An diesen Stellen sieht man dann meist die Chorioidealgefässe ungemein deutlich. In der Umgebung derselben ist auch Pigmentwucherung in Form schwärzlicher oder schwarzbrauner Streifen oder Schollen sichtbar. Ja selbst im Aderhautstroma können Veränderungen wahrnehmbar sein, die man dort, wo das Pigmentepithel atrophisch ist, an der Spärlichkeit der Gefässe und der dazwischen durchschimmernden Sklera erkennt. Solche Stellen sind ganz besonders in der Nähe des Aequators zu finden (L. A. Taf. X, Fig. 2). Es sind dies Fälle, welche den Uebergang zu der Retinitis der äusseren Schichten und der Chorioiretinitis bilden, die genauer erst mit den Erkrankungen der Chorioidea besprochen werden soll. Gleichzeitig ist auch öfters Glaskörpertrübung vorhanden, die, wenn Lues die Ursache ist, zumeist in Form eines feinen Staubes auftritt, wie wir dies oben (Seite 107) beschrieben haben.

In solchen, durch Lues hervorgerufenen Retinitisfällen sind mitunter vorzugsweise in der Gegend der Macula, doch auch an anderen Stellen grössere, grünlich- oder bläulichweisse, undeutlich begrenzte Herde zu sehen. Dieselben sind oft bedeutend grösser als die Papille, die Retina ist in ihrem Bereiche stark verdickt, was man an dem Verlaufe der Gefässe erkennt. Manchmal erstrecken sich diese Plaques bis zur Papille und gehen direct in das trübe Gewebe derselben über. Innerhalb dieser grösseren Herde ist offenbar die Retina in ihrer ganzen Dicke von Exsudat durchsetzt. Im weiteren Verlaufe einer diffusen Retinitis tritt entweder Rückbildung oder auch Atrophie ein. Die letztere gibt sich durch immer deutlicher werdende Verschmälerung der Gefässe, und zwar besonders der Arterien, zu erkennen. Die Papille nimmt ein atrophisches Aussehen an. Doch erscheint sie hier nicht weiss, sondern sie hat die schmutzig-grauröthliche oder wachsgelbe Farbe, wie sie oben, als der retinitischen Atrophie zukommend, beschrieben wurde. Die Grenzen der Papille sind verschwommen, eine atrophische Excavation ist meist nicht zu constatiren. Der Grund dafür dürfte die interstitielle Bindegewebswucherung sein, wie sie in Folge der Retinitis auch innerhalb des Sehnervenkopfes auftreten kann. Die besprochenen Veränderungen in der Maculagegend schwinden nie spurlos. Sie verwandeln sich manchmal in eine helle, verästelte Figur, die sich aus weissen, bläulich- oder grünlichweissen Streifen zusammensetzt, an denen man noch deutlich die Prominenz sehen kann. Es ist dies nichts Anderes als eine strahlige Narbe in der Retina, gebildet durch bindegewebige Umwandlung des in der Retina gesetzten Exsudates (L. A. Taf. X, Fig. 1). In anderen Fällen findet man schliesslich eine stark entfärbte Stelle mit deutlich sichtbaren Chorioidealgefässen dort, wo früher das grünlichweisse Exsudat sass. In der Umgebung kann auch Pigmentwucherung vorhanden sein (J. A. Fig. 92).

Die diffuse, chronische Retinitis entsteht ausser in Folge von Lues auch noch bei sympathischer Affection als sympathische Retinitis.

5. *Haemorrhagische Retinitis.*

Bei der haemorrhagischen Retinitis ist die Netzhaut entweder ihrer ganzen Ausdehnung nach oder nur in einem Theile von streifigen und fleckigen Haemorrhagien dicht durchsetzt. Ausserdem aber zeigt sich das Netzhautgewebe getrübt, die Papillengrenzen verschwommen, die Venen stark erweitert und geschlängelt. Oft findet man an den Gefässen weisse Streifen, oder die Gefässe sind streckenweise in weisse Stränge verwandelt. Auch weissliche Herde von ähnlichem Aussehen wie bei Retinitis albuminurica können vorhanden sein. Diese bestehen ebenfalls aus Fettdegenerationsherden, oder sie enthalten varicös hypertrophirte Nervenfasern. In der Mitte der Blutungen können sich auch weissliche Stellen vorfinden (W. u. M. Fig. 17; L. A. Taf. VIII, Fig. 1, 3; Taf. IX, Fig. 3).

Der Verlauf und Ausgang einer solchen Erkrankung ist oft Atrophie der Retina und der Papille. Die Papille bietet dann gewöhnlich das Bild einer Atrophie aus extraoculärer Ursache. Die Blutungen können die oben angegebenen Veränderungen eingehen, das heisst entweder vollständig verschwinden oder weisse Degenerationsherde oder Pigmentirungen zurücklassen. Die Veränderungen an den Gefässen

bleiben oft stationär. Nicht so selten sind auch gleichzeitig Haemorrhagien in dem Glaskörper vorhanden, die sich später als graue Glaskörpertrübungen präsentiren.

Die Ursachen, die wir oben bei den Netzhauthaemorrhagien angeführt haben, können auch Retinitis haemorrhagica bedingen. Auffallend ist, dass trotz der ganz allgemeinen Ursache doch oft nur Ein Auge erkrankt. Man kann sich dies durch multiple Embolien kleiner Zweige der Arterien, die dann zufällig nur Ein Auge betreffen, oder durch Thrombose von Venenästen erklären.

Bei Lues tritt, jedoch selten, eine ganz eigenthümliche haemorrhagische Retinitis auf. Die Blutungen sind dabei auf den Verbreitungsbezirk eines grösseren Gefässes beschränkt, punktförmig oder fleckig. Die Gefässe selbst sind von weissen Streifen begleitet oder ganz in weisse Stränge verwandelt. Es handelt sich hier wohl um eine durch die Lues hervorgerufene Gefässerkrankung mit Verhinderung der Circulation in einem Theile der Retina, wodurch sich auch die eigenthümliche Localisation der Blutungen erklärt.

6. Andere seltene Formen von Retinitis.

Als **centrale, recidivirende Retinitis** wurde von v. Graefe eine Erkrankung beschrieben, die durch Lues, und zwar in ihren späteren Stadien, bedingt ist. Sie gibt sich durch eine sehr zarte diffuse Trübung oder durch Auftreten von sehr kleinen, helleren Pünktchen in der Gegend der Macula zu erkennen. Die letzteren sind unregelmässig gruppirt, graulich oder graugelb, manchmal weisslich, doch zeigen sie nie den hellen Glanz, den jene Flecken haben, die die Sternfigur in der Maculagegend bei Morbus Brightii zusammensetzen. Die Papille selbst zeigt keine auffallende Veränderung. Bei dieser Krankheit ist ein centrales Skotom vorhanden.

Retinitis proliferans (Manz). Bei dieser Form zeigen sich dichte, bindegewebige Massen von bläulichweisser oder weisser Farbe, die aus der Retina entstehen und in den Glaskörper hinein prominiren (J. A. Fig. 84; W. u. M. Fig. 16). Sie bedecken oft einen grossen Theil des Fundus, selbst die ganze Papille und erscheinen vielverästelt und bilden, indem die Ausläufer der Stränge sich wieder vereinigen, rundliche Lücken, durch die der Fundus durchgesehen werden kann. Oft folgen wenigstens die grösseren dieser Massen dem Verlaufe der Netzhautgefässe. Diese liegen zum Theil unter diesen Bildungen, zum Theil lassen sie sich deutlich auf denselben verfolgen. Nicht alle diese auf den bindegewebigen Massen liegenden Gefässe sind aber Netzhautgefässe, manche sind auch neugebildet. Retinalhaemorrhagien, weissliche Degenerationsherde in der Netzhaut, ja auch Ablatio Retinae kommt gleichzeitig vor, und immer sind Glaskörpertrübungen, oft Glaskörperblutungen vorhanden. Die Abhebung ist allerdings in diesen Fällen oft schwer zu erkennen und schwer von den bindegewebigen, von Gefässen überzogenen Massen zu unterscheiden. Feine, glitzernde Punkte auf den hellen Bindegewebswucherungen sind Cholestearinkrystalle.

Diese soeben geschilderten Veränderungen in der Retina und im Glaskörper gehen wohl manchmal aus wiederholten Blutungen hervor. Gewöhnlich sind es junge Leute, bei denen diese Krankheit vorkommt.

Retinitis bei Oxalurie. In Fällen, wo im Urin reichliche Mengen von oxalsaurem Kalk gefunden wurden, kam auch Retinitis vor, die der soeben beschriebenen Retinitis proliferans sehr ähnlich war.

Retinitis punctata albescens. Als solche wurde von Mooren eine eigenthümliche Form von Netzhautdegeneration beschrieben: es fanden sich im Fundus eine grosse Zahl von mattweissen Flecken vor; sie sahen so aus, „als wären Retina und Chorioidea mit einem Locheisen durchbohrt worden, so dass der mattweisse Reflex der Sklera durchzusehen ist". Die Netzhautgefässe waren nirgends von den Flecken bedeckt, diese ziemlich regelmässig vertheilt. An der Papille waren nur geringe Veränderungen, nämlich leichtes Verwischtsein der Grenzen und graue Verfärbung, zu bemerken.

Retinitis mit grünlichen Streifen. So nannten Jaeger und Mauthner eine eigenthümliche Art von Retinitis, die nur in diesem Einen Falle gesehen wurde (J. A. Fig. 71). Die Retina war hyperaemisch, die Papille verwischt. Die Netzhaut zeigte im aufrechten Bilde eine deutliche, grünliche Verfärbung, die sich bei genauer Betrachtung aus zahlreichen kurzen, radiär gestellten grünlichen Streifen, die in der Nervenfaserschicht lagen, zusammengesetzt zeigte.

Retinitis paralytica (Klein). Diese Retinitis wurde vornehmlich bei Fällen von progressiver Paralyse beobachtet und charakterisirt sich durch eine sehr schwache Netzhauttrübung, ähnlich der, wie sie sich im hohen Alter einstellt. Ferner sieht man die Arterien an manchen Stellen eigenthümlich verbreitert, indem nämlich die rothen Streifen, die seitlich den Reflexstreifen begleiten, breiter erscheinen ohne dass der letztere in seiner Breite alterirt wäre.

Pigmentdegeneration der Retina.

Wie wir schon früher erwähnt haben, sind in den Fällen von Pigmentdegeneration der Retina oder sogenannter Retinitis pigmentosa niemals die klinischen Symptome von Netzhautentzündung vorhanden. Die einzigen Erscheinungen, die man an den Gefässen beobachten kann, sind eine allmählich fortschreitende Verdünnung derselben. Der Name Retinitis pigmentosa ist deshalb, wenn auch der gebräuchlichere, nicht am Platze. Es handelt sich eben auch anatomisch um eine sehr langsam fortschreitende, bindegewebige Degeneration — Sklerose der Retina —, gewöhnlich einhergehend mit Einlagerung von Pigment in dieselbe. Doch kommen auch Fälle vor mit vollständig gleichen subjectiven Symptomen, in denen es auch zu Atrophie der Retina und Papille kommt, wo aber die Pigmentirung in der Netzhaut fehlt. Solche Fälle hat man als Retinitis pigmentosa ohne Pigment bezeichnet. Man könnte sonach eine Sklerose der Netzhaut mit und ohne Pigmentirung unterscheiden. Das charakteristische, ophthalmoskopische Bild ist natürlich nur im ersteren Falle gegeben.

Eine ausgesprochene Retinitis pigmentosa stellt sich folgendermassen dar: Die Papille ist verfärbt, hat eine gelblichgraue, röthlichgelbe oder auch wachsgelbe Farbe und ist ziemlich scharf begrenzt, doch nimmt man im aufrechten Bild meist wahr, dass ein ganz leichter Schleier über ihr zu liegen scheint. Auffallend ist die sehr bedeutende Verdünnung der Retinalgefässe. Sie sind fadendünn und lassen sich oft nur eine ganz kurze Strecke in den Fundus hinein verfolgen.

Selten nur sind sie von feinen, weissen Streifen begleitet. Es ist eben zumeist nur eine hyaline Degeneration der Gefässwandungen vorhanden. Dabei sind sie sehr spärlich; man kann Fälle beobachten, wo sie in ganz geringer Zahl (3 bis 4) auf der Papille zu sehen sind. Immer ist das sehr deutliche Bild eines „getäfelten Fundus" sichtbar: es ist dies durch Atrophie des Pigmentepithels bedingt. Doch ist dieselbe nicht immer gleichmässig verbreitet. Blässere Stellen wechseln mit dunkleren ab, in deren Bereich man die Chorioidealgefässe nicht so deutlich sieht. Im aufrechten Bilde sieht man meist, dass die Netzhaut ganz zart getrübt ist und wie ein feiner, grauer Schleier über den Gefässen der Chorioidea liegt.

In der Netzhaut selbst sieht man dann sehr charakteristische Pigmentflecke liegen. Sie haben gewöhnlich eine sehr stark an die Knochenkörperchen erinnernde Form, greifen mit ihren Fortsätzen oft ineinander und bilden so manchmal ein sehr dichtes Pigmentnetz, das einen grossen Theil des Fundus überdeckt. Sind die Gefässe der Retina noch deutlich zu verfolgen, so sieht man das Pigment entlang der Gefässe liegen, dieselben gleichsam einscheiden (J. A. Fig. 77, 78; W. u. M. Fig. 24; L. A. Taf. VI, Fig. 1). Das Pigment bedeckt also, stellenweise wenigstens, die Retinalgefässe, woraus erkennbar ist, dass es in den inneren Netzhautschichten liegt. In manchen Fällen ist die ganze Netzhaut bis zur Papille von den Pigmentflecken erfüllt, in anderen, weniger weit vorgeschrittenen, lässt es noch einen mehr oder weniger breiten Gürtel um die Papille frei. Ist aber der Process erst in seinen Anfangsstadien, so sind die Pigmentflecke blos in der äussersten Peripherie zu finden. Die Papille und der übrige Fundus sehen noch normal aus.

Dies Bild kann nun auch manche kleine Abänderungen zeigen, welche die Diagnose Retinitis pigmentosa nicht beeinflussen. Die Pigmentflecke sind nicht immer ganz typisch, sondern auch wohl unregelmässig fleckig. Manchmal sieht man über den ganzen Fundus verstreut, helle, kleine Punkte, die nur im aufrechten Bilde gut sichtbar sind und unterhalb der Netzhautgefässe liegen. Mitunter sind sie in der Umgebung der Papille in sehr grosser Menge angesammelt und confluiren daselbst zu grösseren, drusig angeordneten, weissglänzenden Massen, deren Bildung und Vergrösserung man verfolgen kann. Auch auf die Papille selbst können solche Bildungen übergreifen. Es sind dies sogenannte Drusen der Glaslamelle, geschichtete Auflagerungen auf der Limitans Chorioideae, wie sie auch als Altersveränderung entstehen (siehe Seite 55).

In anderen Fällen haben die sichtbaren Chorioidealgefässe nicht ihre normale Farbe, sondern sind stark gelb gefärbt. Auch werden sie an manchen Stellen von breiten, weissen Streifen begleitet. Es zeigt uns dies Verhalten eine Sklerose der Chorioidealgefässe an.

Eine häufige Complication der Retinitis pigmentosa ist hintere Corticalcataracta, und zwar entweder in Form eines kleinen Punktes, einer kleinen Scheibe, oder auch in Form eines Sternes. Der Glaskörper ist aber in allen Fällen von typischer Retinitis pigmentosa rein.

Oefter kommen bei Pigmentdegeneration der Retina Reste der embryonalen Glaskörpergefässe vor, was um so auffallender ist, als beide Veränderungen zu den Seltenheiten gehören. Auch Ueberbleibsel des Cloquet'schen Canales findet man (siehe Seite 107).

Der Nystagmus, mit dem sehr viele der an Retinitis pigmentosa Leidenden behaftet sind, erschwert die Untersuchung oft bedeutend.

Die Erkrankung ist immer doppelseitig.

Gewöhnlich ist es nicht schwer, die Diagnose zu stellen. Mit einer Chorioiditis disseminata kann das Bild kaum verwechselt werden. Es fehlen ja bei der Pigmentdegeneration der Retina erhebliche Veränderungen der Chorioidea. Die einzige Erkrankung, mit der man die Retinitis pigmentosa zusammenwerfen könnte, ist jene Form der Retinochorioiditis specifica, die Förster beschrieben hat. Das Bild, das durch diesen Process in seinen späteren Stadien hervorgerufen wird, ist in der That oft dem bei Retinitis pigmentosa sehr ähnlich. Auffallende Chorioidealveränderungen fehlen nämlich auch da oft. Man sieht einen getäfelten Fundus, Atrophie der Retina und Pigmentflecke in der Netzhaut. Nur zeigt sich doch meist in der Anordnung und Form der Pigmentflecke eine deutliche Differenz gegenüber der Pigmentdegeneration. Die Pigmentflecke sind nämlich nicht so regelmässig gestaltet und gelagert, sondern ganz unregelmässig, fleckig, streifig, nicht den Netzhautgefässen folgend (ähnlich wie in J. A. Fig. 79). Ferner sind auch oft Glaskörpertrübungen nachweisbar, gewöhnlich aus einzelnen grösseren Flocken oder Klumpen bestehend. Oft kann man bei Untersuchung der peripheren Partien des Fundus Chorioidealveränderungen als gelbliche, inselförmige Flecke mit schwarzem Pigment am Rande finden. Auch gelblich entfärbte Stellen oder bläulichweisse Narbenstränge in der Maculagegend bleiben als Reste jener oben beschriebenen Infiltrate in diesem Stadium bestehen. Die wirkliche Pigmentdegeneration ergreift endlich stets beide Augen, während die Retinochorioiditis specifica nicht allzuselten blos in Einem Auge zu finden ist.

Einen Fall von atypischer Pigmentdegeneration hat Mauthner beschrieben. Es handelte sich um einen jungen Mann, bei dem in grösserer Entfernung von der Papille Gruppen von eigenthümlichen rundlichen Pigmentflecken zu sehen waren, die sich stellenweise auf grauschwarzem Grunde zeigten. Sie bedeckten die Netzhautgefässe (J. A. Fig. 76). Es lag gewiss keine angeborene Anomalie vor, sondern man konnte die Weiterentwickelung dieser Flecke mit dem Augenspiegel verfolgen.

Ablatio Retinae.

Die Netzhautablösung besteht in einer Trennung dieser Membran von der unterliegenden Chorioidea. Es kann zwischen Netzhaut und Chorioidea seröse Flüssigkeit, Blut, Exsudatschwarten, ein Tumor oder ein Cysticercus liegen.

Es versteht sich von selbst, dass das Auge dort, wo die Netzhaut abgehoben ist, eine andere Refraction zeigen muss. In einem emmetropischen Auge muss im Bereiche der Ablatio Hypermetropie an den Retinalgefässen nachweisbar sein. In einem myopischen Auge muss daselbst geringere Myopie, Emmetropie oder selbst Hypermetropie vorhanden sein. Ist das Auge hypermetropisch, so ist die Hypermetropie an der betreffenden Stelle vermehrt. Das sicherste Symptom wird daher sein, wenn wir an Gefässen, die man deutlich als Netzhautgefässe erkennen kann, eine andere Refraction als im übrigen

Auge vorfinden. Durch die Beschaffenheit der abgehobenen Netzhaut und durch das Wesen des zwischen Retina und Chorioidea befindlichen Gebildes wird das Aussehen der Ablatio wesentlich verändert. Wir wollen zunächst das gewöhnliche Bild der Abhebung beschreiben und dann die Modificationen, die es eingehen kann, besprechen.

Untersucht man in einem Auge mit Netzhautabhebung die brechenden Medien, so findet man in einem Theil derselben, am häufigsten nach unten, eine graue oder bläulichgraue, schleierartige Membran. Sie ragt in den Glaskörper vor und ist daher schon meist aus grösserer Entfernung, ja selbst mit Convexlinsen sichtbar, kurz sie bietet einen anderen Refractionszustand dar als der übrige Fundus. Das Gewöhnliche ist, dass man in gewisser Richtung die abgehobene Netzhaut bereits aus einiger Entfernung erblickt. Es ist eben in dieser Partie der Retina Hypermetropie vorhanden. Lässt man den Kranken in anderer Richtung sehen, so bekommt man plötzlich wieder das rothe Licht, wie es gewöhnlich in der Pupille bei reinen Medien sichtbar ist. Die abgehobene Netzhaut zeigt zahlreiche Falten, aus deren Tiefe ein grünlichgrauer Reflex hervorkommt, während die prominirenden Stellen stark glänzen, so dass man ein Bild bekommt, das an das Aussehen eines Gletschers erinnert. Auf der Membran sieht man dünne, dunkel- bis schwarzrothe, baumförmig verästelte Gefässe, die man nach rückwärts in die Netzhautgefässe verfolgen kann. Sie erscheinen so dünn, weil man sie in Folge des geänderten Brechzustandes an dieser Stelle (Hypermetropie) unter geringerer Vergrösserung sieht. Da man schräg auf sie blickt, so fehlt auch in ihrer Mitte der Reflexstreifen. Die dunkle Farbe endlich erklärt sich nicht etwa aus einer Veränderung des in ihnen circulirenden Blutes, sondern daraus, dass man sie, ähnlich wie Glaskörpertrübungen, zum Theil im durchfallenden Lichte sieht. Es dringt nämlich doch immer etwas Licht durch die abgehobene Netzhaut, das, von der Chorioidea reflectirt, in das Auge des Beobachters gelangt. Dementsprechend haben die Gefässe eine um so dunklere Farbe, je durchsichtiger die abgehobene Netzhaut ist. Ist die Retina im Bereiche der Ablatio grau getrübt, so sind die Gefässe roth. Der Verlauf der Gefässe ist ganz eigenthümlich. Sie sind stark geschlängelt und folgen den Faltungen der Retina ganz genau. Man sieht sie in die spaltenartigen oder muldenförmigen Vertiefungen hinabsteigen und daraus wieder hervortauchen (J. A. Fig. 81, 82; W. u. M. Fig. 25, 26; L. A. Taf. VII, 1 Fig. 2).

Der häufigste Fall ist, dass die Membran flottirende Bewegungen macht. Es ist dann Flüssigkeit unter ihr vorhanden. Es kann diese Erscheinung aber auch, wenn ein Tumor oder überhaupt ein festes Gebilde unmittelbar unter der Retina liegt, fehlen.

Die Form der Abhebung und ihre Ausdehnung kann sehr verschieden sein. Oft nimmt sie einen grossen Theil des Fundus, ja selbst die ganze Netzhaut ein. Dabei sieht man sie gegen die Papille zu in eine trichterförmige Vertiefung hineinziehen. Es gelingt dann nur bei gewissen Blickrichtungen und bei Schwankungen der abgehobenen Retina, die Papille zu Gesicht zu bekommen, ja es ist die Papille oft gar nicht zu sehen. In anderen Fällen ist die Abhebung stark überhängend und kann z. B. von oben vorhangartig über die Papille hereinhängen, so dass man die letztere nur

manchmal bei Bewegungen des Auges und der Retina sieht. Vielfach kommt es auch vor, dass tiefe Spalten in der abgehobenen Retinalpartie in meridionaler Richtung verlaufen. Durch diese Einziehungen erscheint die Ablatio in mehrere, selbstständig vorragende Buckel getrennt. Liegt ein Tumor unter der Netzhaut, so kann die Abhebung, wenn die Retina der Geschwulst knapp anliegt, eine blasenartige Form haben.

Doch nicht immer ragt die abgelöste Netzhaut weit in das Corpus vitreum hinein. Es gibt auch ganz seichte Abhebungen. Dann sieht man auch auf dem abgehobenen Theil in stark myopischen Augen die Gefässe nur mittels einer Concavlinse, allerdings mit einer schwächeren als die, mit der man den Fundus deutlich erblickt. Bei solchem Verhalten kommt es hauptsächlich auf den abnormen Verlauf der Gefässe an. Besonders im umgekehrten Bilde muss man darauf achten: zunächst sind die Gefässe abnorm geschlängelt und geknickt. Gleichzeitig sieht man mitunter eigenthümliche Falten in der Retina. Sie sind sehr zart, bogenförmig, zur Papille manchmal concentrisch angeordnet und von leicht grauer Farbe. Zwischen ihnen kann der Fundus fast ganz roth aussehen (W. u. M. Fig. 26). Sie können so klein sein, dass das durch sie bedingte Aussehen des Fundus mit dem Anblick einer gekräuselten Wasserfläche verglichen werden kann.

In manchen Fällen sieht man durch die noch durchsichtige Retina das Gefässsystem der Chorioidea oder das eines Tumors tiefer im Auge liegen. Man findet dann natürlich eine verschiedene Refraction an diesen beiden Gefässverästelungen und kann im umgekehrten Bilde deutliche parallaktische Verschiebung nachweisen. Doch ist auch ein anderes Verhalten möglich: liegt nämlich unmittelbar unter der Retina, die ihre normale Lage verlassen und nach vorne getreten ist, die Chorioidea oder ein Tumor und ist die Retina durchsichtig, so sieht man beiderlei Gefässsysteme: das der Retina und das der Chorioidea oder des Tumors unter derselben Einstellung; Chorioidealgefässe erkennt man an dem sehr regelmässigen Verlaufe. Auch Cholestearinkrystalle, Blutcoagula oder einen Cysticercus kann man unter der Retina sehen.

In der abgelösten Netzhaut finden sich manchmal pathologische Veränderungen: so weissliche Flecke von einer früher bestandenen Retinitis albuminurica, selten Pigmentflecke, da ausgebreitete Retinochorioiditis durch Verwachsung zwischen Retina und Chorioidea gewöhnlich das Zustandekommen der Ablatio verhindert. Ferner beobachtet man mitunter Cholestearinkrystalle oder helle Flecke, durch Drusen der Limitans Chorioideae oder Kalkablagerungen bedingt. Unter der Retina oder auch in ihr sieht man wohl auch ausgedehnte Stränge von weisslicher Farbe und verästelter Form, manche auch mit kolbig angeschwollenen Enden. Dies sind Bindegewebsentwickelungen in der Retina. Risse in der abgelösten Partie geben sich als schlitz-, sehr oft hufeisenförmige rothe Stellen zu erkennen, durch die man die Chorioidea oder überhaupt die tiefer liegenden Theile im umgekehrten oder bei richtiger Einstellung auch im aufrechten Bilde sehen kann (W. u. M. Fig. 26; L. A. Taf. VII, Fig. 1).

Liegt die Ablatio in der Gegend der Macula, so sieht man daselbst einen ganz ähnlichen rothen Fleck, wie er oben (siehe Seite 136) bei Embolia der Arteria centralis beschrieben wurde. Man erklärt

sich das Zustandekommen desselben entweder so wie dort durch die stärkere Trübung der umgebenden Netzhautpartien und Durchschimmern des rothen Reflexes von der Chorioidea, oder auch in manchen Fällen so, dass an Stelle des rothen Fleckes in Folge besonderer pathologischer Veränderungen (Verwachsung zwischen Retina und Chorioidea) keine Abhebung erfolgt.

Die abgelöste Retina kann sich später wieder anlegen. Es kann dies z. B. auch dann geschehen, wenn bei einer durch seröse Flüssigkeit hervorgerufenen Ablatio sich diese letztere senkt, so dass sich neue Partien der Retina abheben, während der ursprünglich abgehobene Theil wieder mit der Chorioidea in Verbindung tritt. An diesen Stellen sieht man dann wohl Pigmentepithelveränderungen oder Netzhautstränge; oft ist es aber sehr schwierig oder kaum möglich, zu erkennen, dass daselbst früher eine Ablatio bestanden habe. Bei sehr lange bestehender Netzhautabhebung wird die Retina auch wieder durchsichtig.

Eine sehr häufige Complication der Netzhautabhebung sind Glaskörpertrübungen.

Die Diagnose der Ablatio kann nur dann schwierig werden, wenn der Zusammenhang jener Gefässe, die auf der schleierartigen Membran liegen, mit den Netzhautgefässen sich nicht sicher erweisen lässt. Dies kann geschehen, wenn der Glaskörper sehr trüb ist, oder wenn die Verhältnisse der Abhebung (ihre Form, ihr Ueberhängen etc.) diesen Nachweis erschweren. Es kann dann zweifelhaft sein, ob es sich um Ablatio oder um Bindegewebswucherung im Corpus vitreum mit neugebildeten Gefässen handelt. In der That können die Verhältnisse so liegen, dass eine sichere Diagnose überhaupt nicht möglich ist.

Man muss beim Vorfinden einer Ablatio Retinae an folgende aetiologische Momente denken:

1. Trauma, und zwar Contusionen ohne Eröffnung der Bulbuskapsel und Durchtrennungen der letzteren, sowie fremde Körper.
2. Spontane Blutungen. Da sind gewöhnlich Glaskörper- oder Netzhautblutungen vorhergegangen.
3. Myopie mit Staphyloma posticum — eine sehr häufige Ursache der Ablatio.
4. Intraoculäre Tumoren, also ganz besonders Sarkome der Chorioidea.
5. Cysticercus subretinalis.
6. Orbitalabscesse und -Tumoren.

Cysticercus subretinalis.

Schon früher, bei Besprechung der Anomalien der brechenden Medien (siehe Seite 108), war von jenen eigenthümlichen Glaskörpertrübungen die Rede, die sich bei Cysticercus subretinalis vorfinden können. Im Fundus findet man gewöhnlich eine circumscripte Ablösung, unter der man, wenn die abgehobene Netzhautpartie durchsichtig genug ist, eine blaugraue Blase mit hellerem, weisslichem Rande sieht, welche die Papille mehrfach an Grösse übertrifft. An dieser Blase sieht man einen helleren Fleck — die Gegend des Kopfes, ja mitunter gelingt es, den Kopf selbst mit seinen Hakenkränzen und Saugnäpfen zu erblicken (J. A. Fig. 83). Weiter sind selbständige, wellenartige, der Peristaltik des Darmes ähnliche Bewegungen an der Blase zu beobachten, sobald das Thier noch lebt. Nicht immer kann man freilich die Blase so genau sehen, da oft eine starke

Glaskörper- oder Netzhauttrübung dies unmöglich macht. Auch da wird freilich die sehr circumscripte Abhebung der Retina (L. A. Taf. VII, Fig. 6) in Verbindung mit den eigenthümlichen Glaskörpertrübungen eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose gestatten, die sich, wenn man nach längerer Beobachtung jene selbstständigen Bewegungen an der abgelösten Retina sieht, in eine sichere Diagnose verwandelt. Immer wird es, behufs eventueller Extraction des Parasiten, wichtig sein, die Lage desselben, dem Meridian und dem Abstande von der Cornea oder von der Papille nach, zu bestimmen.

Es geschieht auch, dass die Cysticercusblase unter der Retina wandert. Die Theile der Netzhaut, unter denen sie früher lag, können sich wieder anlegen, oft kann man aber diese Stelle noch später an der Entfärbung des Pigmentepithels daselbst erkennen. Der Cysticercus kann durch die Retina durchtreten und ist dann im Glaskörper sichtbar (siehe Seite 110).

Er wurde bisher immer nur an Einem Auge, doch auch in Einem Bulbus zu zweien gesehen.

Glioma Retinae.

Beim Glioma Retinae findet sich meist, wenn man den Fall zu Gesicht bekommt, schon das Bild eines amaurotischen Katzenauges, d. h. es dringt aus der Tiefe der Pupille ein gelblichweisser Reflex hervor. Da die Geschwulst immer bei kleinen Kindern von ein bis vier Jahren vorkommt, so gelangt das Auge meist erst in diesem weit vorgeschritteneren Stadium der Geschwulstbildung zur Beobachtung. Freilich braucht da noch nicht die ganze Retina in dem Tumor aufgegangen zu sein. Oft sieht man dann eine buckelförmige, gelblichweisse Geschwulst in den Glaskörper vorragen. Die übrige Netzhaut zeigt entweder einfache Abhebung oder liegt selbst noch an. Man erblickt mitunter in ihr kleine gelblichweisse Knötchen — Geschwulstherde. Die Retinalgefässe verlieren sich in der Geschwulst, sie selbst kann von sehr feinen Gefässchen überzogen sein. In anderen Fällen, wo das Leiden bereits weitergegriffen hat, sieht man mehrere grosse Buckel ins Augeninnere prominiren. Die Papille ist dann oft gar nicht mehr sichtbar. Der grösste Theil des Glaskörpers wird von dem Tumor eingenommen, der an seiner Oberfläche dann auch wie abgeplattet aussehen kann.

Die Diagnose ist in vielen Fällen leicht zu stellen. Doch können auch manchmal Fälle von eitrig-plastischer Chorioiditis mit starkem Exsudat im Glaskörper, nach Meningitis, bei Skrophulose und Tuberculose entstanden, und auch sehr häufig bei Kindern ein ähnliches Bild geben. Auch kann eine Verletzung mit Perforation der Bulbuswand mit oder ohne Fremdkörper vorliegen. Man hat diese Zustände als Pseudogliom bezeichnet. Aufmerksam wird man in diesen Fällen wohl oft durch Veränderungen an der Iris — Atrophie, hintere Synechien, die auch oft im anderen Auge zu finden sind. Ferner fehlen hier die gesonderten Buckel, die sich beim Gliom so oft darbieten. Die Farbe des Reflexes ist beim Gliom meist mehr weiss, bei den angeführten Processen mehr gelb.

Ein sehr wichtiges Symptom für einen Tumor ist Steigerung des intraoculären Druckes, die sich im Verlaufe in einer gewissen Periode einstellt.

Sonst wird auch, jedoch selten, die Retina bei Aderhauttumoren mit in die Geschwulstbildung einbezogen.

Verletzungen der Netzhaut.

Commotio Retinae. Das, was als Commotio Retinae zuerst von Berlin beschrieben wurde, entsteht immer durch eine stumpfe, auf den Bulbus einwirkende Gewalt — durch Contusion des Bulbus, z. B. durch einen Steinwurf, einen Faustschlag etc. Man sieht in solchen Fällen die Retina von einer milchweissen Trübung eingenommen, die eine grosse Strecke des Fundus überzieht. Sie ist gewöhnlich von diffuser, wolkiger Begrenzung, nur manchmal kann man am Rande feine weisse Streifen wahrnehmen. Immer gehen die Netzhautgefässe darüber ungestört hinweg und heben sich sehr deutlich von dem hellen Grunde ab. Auf den ersten Blick könnte man an eine Ablatio Retinae denken. Das normale Verhalten der Gefässe und der Mangel einer Refractionsdifferenz wird den Untersucher aber bald eines Anderen belehren.

Die Trübung liegt in der Umgebung der Papille, oder auch in der Peripherie, manchmal auch an zwei Stellen, nämlich an der dem Stoss direct ausgesetzten Stelle und an einer gegenüberliegenden Partie (directe und indirecte Trübung).

Dieser Befund ist nur kurze Zeit nach der Verletzung wahrnehmbar. Am nächsten Tage oder vielleicht nach zwei Tagen ist Alles verschwunden, nur etwaige Haemorrhagien in der Retina können noch zurückbleiben.

Ruptura Retinae. Man erkennt dieselbe leicht an dem unterbrochenen Verlaufe der Retinalgefässe. Der Rand der Netzhaut ist sehr oft eingerollt, die Retina in der Nachbarschaft getrübt. Oft ist der Riss schon innerhalb einer abgehobenen Retina zu finden. Dann sieht man eine schlitz- oder hufeisenförmige Stelle, aus der der rothe Reflex von der Chorioidea hervorkommt. Dort sieht man auch bei passender Correction im aufrechten oder im umgekehrten Bilde die darunter liegenden Theile, also gewöhnlich die Chorioidealgefässe. Bei letzterer Untersuchungsmethode kann auch parallaktische Verschiebung zwischen den Gefässen der Chorioidea und denen der Retina nachweisbar sein (L. A. Taf. VII, Fig. 1; W. u. M. Fig. 26). Gleichzeitig mit dem Netzhautriss kann auch Chorioidealruptur da sein (siehe diese).

Fremdkörper bleiben manchmal in der Retina stecken und sind da als grosse, oft sehr glänzende Körper sichtbar, meist von Netzhautblutungen umgeben. Gewöhnlich bildet sich bald eine Bindegewebsschwarte um den fremden Körper. Bei grossen Verletzungen mit Durchtrennung der ganzen Bulbushüllen finden sich oft dichte Narbenstränge in der Retina, oder es sind grosse Theile der Netzhaut durch bläulich- oder grünlichweisse Bindegewebsmassen, die aus der Retina hervorzuwachsen scheinen, verdeckt. Unter denselben kommen die Netzhautgefässe zum Vorschein, auch neugebildete Gefässe können sich auf ihnen verästeln.

IV. Capitel.

Aderhaut.

A. Angeborene Anomalien.

Vom Aussehen des albinotischen Fundus war bereits oben (Seite 52) die Rede. Es bleiben uns also zunächst hier

Anomalien des Skleral- und des Pigmentringes

zu besprechen. Der Pigmentring stellt bekanntlich nichts Anderes dar, als den stärker pigmentirten Rand der Chorioidea an der Papille. Diese Pigmentirung kann nun excessiv sein. Es umgibt dann ein sehr breiter schwarzer Ring die ganze Papille oder nur einen Theil derselben. Er kann überall gleich breit sein oder nach einer Seite (aussen) breiter (J. A. Fig. 39; W. u. M. Fig. 2). Doch muss man bei diesem Befunde auch an alte Haemorrhagien in den Zwischenscheidenraum des Opticus denken.

Da, wo zwischen dem Rande der Chorioidea und dem Rande der Papille ein Streifen Sklera sichtbar bleibt, entsteht ein Skleral- oder Bindegewebsring. Auch dieser kann angeborenerweise abnorm breit sein, meistens nach aussen (J. A. Fig. 109). Diese Bildungen und ein Theil jener, die (siehe Seite 166) als Staphyloma posticum benannt werden, bezeichnete Jaeger als „Conus". Der Name Conus ist nicht etwa von einer an dieser Stelle vorhandenen Ektasie der Sklera herzuleiten, sondern nur von der oft dreieckigen, an den Kegeldurchschnitt erinnernden Form (J. A. Fig. 111) hergenommen. Diese Fälle wurden von ihm als angeborene Anomalie bezeichnet. Doch pflegt man jetzt den grössten Theil dieser Befunde als erworben zu betrachten, und zwar durch eine Dehnungsatrophie der Chorioidea. Man braucht dafür fast allgemein den Namen Staphyloma posticum, den Jaeger blos für die bei hochgradiger Myopie vorkommende Ausdehnung des Bulbus am hinteren Pole anwendete.

Coloboma Chorioideae.

In Folge des Zusammenhanges des Coloboms der Chorioidea mit der foetalen Augenspalte findet sich das Colobom meist nach unten,

wohl aber nicht immer gerade nach unten, sondern auch nach aussen-unten oder innen-unten gerichtet.

Gleichzeitig ist oft Iris- und auch wohl Linsencolobom vorhanden. Im Allgemeinen kann man zwei Formen unterscheiden: nämlich eine Form, wo die Papille ausserhalb des Spaltes liegt, und eine zweite, wo sie sich innerhalb desselben befindet. Im ersten Falle erscheint die Papille meist ganz normal, oder es kann auch wohl eine congenitale Anomalie an derselben, z. B. ein angeborenes partielles oder totales Sehnervenscheidencolobom vorhanden sein. Ein oder mehrere P. D. unterhalb der Papille nimmt man dann eine sehr grosse, weissliche, bläulich- oder gelblichweisse Fläche wahr, die nach oben mit einem gegen die Papille convexen, bogenförmigen Rand endet. In einem Theil der Fälle lässt sich das ganze Colobom überblicken, so dass man beim Einblick in der Richtung nach unten auch den vorderen Rand der hellen Stelle zu sehen bekommt. Der Rand ist entweder ebenfalls abgerundet, oder er hat in der Mitte eine Zacke, so dass er in eine Art Raphe auszulaufen scheint (wie in L. A. Taf. XII, Fig. 5). Das ganze Colobom hat gewöhnlich eine ovale, mit dem grösseren Durchmesser etwa vertical gestellte Form und ist meist im Vergleich zur Papille sehr gross, übertrifft auch im kürzeren horizontalen Durchmesser den P. D. um das Mehrfache. Noch grösser ist der Defect dann, wenn man beim Einblick von oben nicht mehr den vorderen Rand desselben zu sehen im Stande ist (J. A. Fig. 86, 87). Es fährt der nach oben convexe Rand des Coloboms dann blos in zwei nach unten divergirende Schenkel aus. So weit man auch in die Peripherie zu sehen trachtet, man ist nicht im Stande, etwas Anderes zu sehen als den weissen Reflex von der Sklera. Am Rande des Chorioidealdefectes ist oft schwarzes oder schwarzbraunes Pigment angesammelt, manchmal in Form grösserer Schollen. Die grösseren Retinalgefässe weichen der weissen Stelle aus und nur kleinere Aeste gehen auf den Chorioidealdefect hinüber. Im umgekehrten Bilde, in welchem man überhaupt die ganzen Veränderungen am besten überblickt, sieht man dann noch viele Gefässe innerhalb der weissen Stelle, die schon durch ihren sehr bedeutenden Durchmesser auffallen. Sie sind fünf bis sechsmal so dick als die grossen Netzhautgefässe. Sie kommen manchmal oft mitten in der blossliegenden Sklera hervor und verlaufen in einer den Retinalgefässen ganz entgegengesetzten Richtung gegen den Rand des Coloboms. Dort verschwinden sie meist plötzlich unter dem Pigmentepithel. Es sind hintere Ciliargefässe, die da eintreten und sich dann in die Chorioidea einsenken. Die blossliegende Sklera liegt nun durchaus nicht in Einem Niveau mit der Netzhaut, sondern zeigt eine bedeutende Ausbuchtung nach hinten. Dies erkennt man leicht an der parallaktischen Verschiebung, noch besser aber im aufrechten Bilde an der Refractionsdifferenz zwischen den Netzhautgefässen und den Gefässen innerhalb des Coloboms. Man braucht oft sehr starke Concavlinsen, um in die Tiefe des Coloboms gleichsam hinabzusteigen. Innerhalb dieser Grube, welche die Sklera daselbst bildet, finden sich noch oft kleinere Vertiefungen, welche sich mehr blaugrau darstellen. Dann sieht man öfter vorspringende Leisten in querer oder meridionaler Richtung durch das Colobom verlaufen, die es in zwei vor- oder nebeneinanderliegende Gruben theilen. Als be-

sondere Form sind auch Fälle beschrieben worden, wo sich zwei solche Defecte in der Chorioidea vorfinden, der eine unter dem anderen gelegen und durch eine schmale Brücke normalen Fundus getrennt.

Jene Fälle, wo der Opticuseintritt selbst innerhalb des Coloboms liegt (J. A. Fig. 88; L. A. Taf. XII, Fig. 5), sind gewöhnlich noch viel ausgedehnter. Auch hier ist die Begrenzung nach oben convex. Die Papille liegt, undeutlich begrenzt, unweit vom oberen Rande des Coloboms. Manchmal fällt auch die an den oberen Rand des Defectes sich anschliessende Wand der von der Sklera dargestellten Grube sehr steil ab, und in dieser Wand inserirt sich der Opticus. Man sieht dann natürlich die Papille in ihrer Form verändert. Sie erscheint nicht mehr rund, sondern queroval, da ihre Fläche nach vorne und unten sieht. Die von ihr ausgehenden, nach oben in die Netzhaut verlaufenden Gefässe biegen sehr plötzlich am oberen Rand des Coloboms um, ähnlich wie bei Glaukom.

Als ganz besondere, übrigens sehr seltene Form des Coloboms ist jene in der Maculagegend zu erwähnen (W. u. M. Fig. 39, 40). Man sieht in der Maculagegend, von der Papille meist durch eine Brücke normaler Chorioidea getrennt, eine grosse weisse Stelle, die die Papille mehrfach an Grösse übertrifft. Sie hat eine rundliche oder ovale Form und verhält sich ganz so wie die oben beschriebenen Defecte, die nach unten gelegen sind, d. h. sie ist von einem schwarzen Saume umgeben und vertieft. Von Gefässen erkennt man innerhalb des Chorioidealdefectes nur solche, die am Grunde der Grube liegen und am Rande des Pigmentepithels verschwinden, also jedenfalls hintere Ciliargefässe sind.

Bei beiden Arten des Coloboms, dem nach unten gelegenen und jenem in der Macula, ist die Diagnose meist nicht schwer zu stellen. Eine Verwechslung könnte nur bei der letzteren Form mit centraler Chorioidealatrophie nach Retinochorioiditis stattfinden, und in der That kann das Aussehen des Fundus in diesen Fällen ganz ähnlich sein. Es kann sich auch da eine weisse, von Pigment umgebene Stelle, in der Chorioidealgefässe verlaufen, vorfinden. Der wesentliche Unterschied aber beruht darin, dass bei der Chorioiditis in der Macula keine circumscripte grubige Ektasie an der betreffenden Stelle vorhanden ist.

In den gewöhnlichen Fällen von Chorioidealcolobom fehlt auch die Retina an Stelle des Chorioidealdefectes, oder ist wenigstens nicht normal entwickelt. Beweis dafür ist der entsprechende Gesichtsfelddefect. Beim Colobom in der Maculagegend aber kann es auch vorkommen, dass ein Gesichtsfelddefect fehlt, ja dass selbst die Sehschärfe fast normal ist.

Nach der Erklärung, die uns die Entwickelungsgeschichte für die Entstehung der Chorioidealcolobome gibt, muss auch die Retina in Mitleidenschaft gezogen sein. Oder es ist vielmehr gerade diese, welche den Anlass zur Spaltbildung in der Chorioidea gibt. Die sogenannte primäre Augenblase entsteht nämlich als Ausstülpung der vorderen Hirnblase. In Folge Einstülpung der vorderen Wand derselben durch die Linsenanlage entsteht die Aushöhlung der secundären Augenblase. Diese wird immer grösser, während gleichzeitig die Höhlung der primären Augenblase immer kleiner wird und schliesslich verschwindet. Aus den zwei Blättern der secundären Augenblase entsteht die Retina, und zwar aus dem äusseren Blatt das Pigment-

epithel, aus dem inneren die übrigen Netzhautschichten. In den Blättern der secundären Augenblase ist im Embryo eine Spalte, die Netzhautspalte, durch welche die Glaskörperanlage ins Auge hineinwuchert und so hinter die Linse gelangt. Das Offenbleiben der Netzhautspalte ist es nun, das eine mangelhafte Entwickelung der aus dem mittleren Keimblatte enstehenden Chorioidea und Sklera bedingt. Die Entstehung der Colobome in der Gegend der Macula ist strittig.

B. Erworbene Anomalien der Chorioidea.

Hyperaemie der Chorioidea.

Schon bei der Beschreibung des normalen Aussehens der Chorioidea haben wir gesehen, dass man von den Gefässen der Chorioidea blos die Schichten der grösseren Gefässe sieht. Wir haben hervorgehoben, wie vielfach verästelt und unregelmässig ihr Verlauf ist; auch ihre Dicke ist ungemein verschieden. Es wäre in Folge dieser, in verschiedenen Augen sehr wechselnden Verhältnisse äusserst schwer, eine Hyperaemie oder Anaemie der Chorioidea zu diagnosticiren. Und in der That gelingt dies auch auf diesem directen Wege nicht. Dagegen kann man aus einer Veränderung an der Papille auf die Chorioidealhyperaemie zurückschliessen: die Capillaren in den tieferen Theilen des Opticus hängen mit jenen der Chorioidea zusammen. Wenn daher die Chorioidea mit Blut überfüllt ist, so gibt sich dies durch eine Röthung des Opticus kund, die aber ganz plötzlich am Rande der Papille aufhört.

Haemorrhagien in die Chorioidea.

Wir haben früher bei Gelegenheit der Besprechung der Netzhautblutungen gesehen, dass Blutaustritte in der Nervenfaserschicht von solchen in den äusseren Netzhautschichten sich unterscheiden lassen, und zwar nach der besonderen Form, die sie annehmen. Chorioidealblutungen sehen nun so wie die Haemorrhagien in den äusseren Retinalschichten unregelmässig fleckig aus, und man kann sie daher von diesen nicht mit Sicherheit unterscheiden.

Chorioiditis.

Ein Theil der Entzündungen der Chorioidea verläuft mit so starker Glaskörpertrübung, dass es nicht möglich ist, mit dem Augenspiegel dieselbe zu durchdringen. Hier dagegen sprechen wir von jenen plastischen, exsudativen Chorioiditisformen, bei denen die Medien verhältnissmässig rein sind. Es soll noch einmal daran erinnert werden, dass das Pigmentepithel uns in vielen Fällen die Untersuchung der Chorioidea unmöglich macht. Nur in Augen, wo das Pigmentepithel schon so schwach pigmentirt ist, dass die Chorioidealgefässe durchzusehen sind oder bei Chorioiditis, dann wenn ein ursprünglich stark pigmentirtes Pigmentepithelstratum durch den Entzündungsprocess atrophisch geworden ist, kann man die pathologischen Veränderungen in der Chorioidea wahrnehmen.

Wir wollen zunächst nun im Allgemeinen die Veränderungen angeben, die bei Chorioiditis mit dem Augenspiegel sichtbar sind.

Die einzelnen Formen der Chorioiditis werden ja zumeist nach der verschiedenen Localisation unterschieden.

Zunächst sieht man hellgelbliche, gelbrothe oder rosenrothe rundliche Flecken mit ziemlich scharfen Grenzen, die oft so gross sind, wie ein beträchtlicher Theil der Papille, oder dieselbe selbst an Grösse übertreffen, also auch im umgekehrten Bilde deutlich hervortreten (J. A. Fig. 99, 100, 101, 102, 124; W. u. M. Fig. 29; L. A. Taf. IV, Fig. 1). In ihrer Umgebung oder auch auf ihnen sieht man oft unregelmässig gestaltete, schwarzbraune oder schwarze Pigmentflecke. Diese Herde können auch zu grösseren hellen Flächen confluiren. Entweder sind dieselben durch Exsudat in der Chorioidea oder durch Atrophie der Chorioidea bedingt. Im ersteren Falle kann man manchmal wahrnehmen, dass die Netzhautgefässe am Rande dieser Partien Biegungen machen, und zwar derart, dass sie auf einen leichten Hügel hinanzusteigen scheinen. Dieser Niveauunterschied ist auch an der parallaktischen Verschiebung der Gefässe in der Umgebung und auf dem Herde zu erkennen. Es sind diese Exsudationen in die Chorioidea ziemlich undeutlich begrenzt, mit einer Vorwölbung der Retina an der betreffenden Stelle verbunden und das Pigmentepithel über ihnen oder in ihrer Umgebung gewuchert. Aber auch durch weit vorgeschrittene Atrophie der Chorioidea werden helle, weissliche oder gelblichweisse Plaques erzeugt, indem an diesen Stellen die Sklera durchscheint. Die Ränder dieser atrophischen Plaques sind aber oft recht scharf, sie werden wohl auch von Pigment umgeben oder zum Theil davon überdeckt, aber durch sie sieht man oft Chorioidealgefässe oder Reste von solchen als gelbe oder rothe Streifen ziehen (J. A. Fig. 105, 106, 107, 122, 125, 126, 127). Es ist dies bei Exsudaten in der Chorioidea nicht zu bemerken. An diesen Stellen ist, im Gegensatze zu dem Verhalten bei Exsudaten, eine leichte Depression am Verlauf der Retinalgefässe sowie an der parallaktischen Verschiebung im aufrechten Bilde, doch nicht immer deutlich, zu erkennen. Einen weiteren Anhaltspunkt zur Stellung der Diagnose, ob es sich um Exsudatherde oder um atrophische Plaques handelt, gibt die Färbung derselben. Die Farbe der Sklera bei Atrophie ist gewöhnlich heller, das der Exsudatknoten und -Herde gewöhnlich dunkler: gelb oder röthlichgelb. Mitunter lässt sich aber überhaupt keine bestimmte Diagnose stellen.

Einen ganz anderen Anblick gewähren jene verwaschenen oder auch scharf begrenzten Flecke von gelblicher oder röthlicher Farbe, die auch oft von Pigmentsäumen umgeben sind und in deren Bereiche man die Chorioidealgefässe mit grosser Deutlichkeit sehen kann. An den letzteren kann man oft eine auffallend blasse Farbe und weisse, begleitende Streifen sehen, oder das Chorioidealstroma zeigt innerhalb dieser helleren Stellen leichte Zeichen von Atrophie: man sieht die Sklera durchschimmern (J. A. Fig. 97; L. A. Taf. V, Fig. 2; Taf. VI, Fig. 2). Solche Veränderungen entstehen hauptsächlich durch Atrophie des Pigmentepithels und geringere Alteration des Chorioidealstromas. Dort, wo später diese hellen Stellen hervortreten, zeigt sich anfänglich oft im Gegentheil ein dunkelbrauner bis schwarzer Pigmentfleck (L. A. Taf. VI, Fig. 2).

Sehr feine, helle Punkte und ganz kleine Flecken von heller Farbe und manchmal von krystallartigem Glanze, oft zu Gruppen ver-

einigt und von dunkler pigmentirten Stellen umgeben, gewöhnlich nur im aufrechten Bilde sichtbar, rühren von jenen drusigen Verdickungen der Glasmembran der Chorioidea her, die sich auch als senile Veränderung finden können (siehe Seite 55).

Die Chorioidealgefässe zeigen nicht immer ihr normales Verhalten; oft sind sie auffallend blass, gelblich gefärbt, manchmal sieht man sie als schmalen rothen Streifen von weissen Linien oder feinen Streifen begleitet (Verdickung der Gefässwand. — Sklerose der Chorioidealgefässe). (J. A. Fig. 97, 98.)

Nicht nur die äusseren Schichten der Retina enthalten in diesen Fällen Pigment, sondern auch bis in die inneren kann es einwandern. Man erkennt dies daran, dass die Pigmentflecke hie und da die Netzhautgefässe ganz verdecken. Die Form dieser Pigmentansammlungen in der Retina ist meist unregelmässig fleckig oder streifig, seltener von jener typischen, bei Retinitis pigmentosa vorkommenden, strahligen oder Knochenkörperchen ähnlichen Gestalt. Die Retinalgefässe sind in der Regel stark verengt — Netzhautatrophie; die Papille zeigt das Bild, das als retinitische Atrophie beschrieben wurde.

1. Chorioiditis disseminata.

Bei der Chorioiditis disseminata bildet die Papille das Centrum der Affection und die Veränderungen treten meist zuerst in der Peripherie des Fundus auf. Die Herde vermehren sich immer mehr und mehr, es treten solche auch in der Nähe der Papille auf und schliesslich kann der ganze Fundus davon übersäet sein (J. A. Fig. 100, 101). Es hängt sehr viel von der Pigmentirung des Pigmentepithels ab. Ist dieses wenig pigmentirt, so sieht man die Herde in der Chorioidea als helle Flecke durch, im anderen Falle muss erst Wucherung oder Atrophie des Pigmentepithels darüber eintreten (L. A. Taf. VI, Fig. 2; W. u. M. Fig. 30). Die hellen Plaques werden immer zahlreicher, confluiren auch zu grösseren, diffus begrenzten hellen Stellen und zeigen die oben angeführten Zeichen der Atrophie. Innerhalb dieser sieht man dann Chorioidealgefässe, manchmal nur in geringer Anzahl verlaufen, ferner Pigmentflecke in unregelmässiger Weise verstreut, von denen manche in der Retina sitzen (J. A. Fig. 106, 107). Es ist eben dann schon Atrophie in grosser Ausdehnung aufgetreten, in deren Bereich man die Sklera sieht. Es kann so der grösste Theil des Fundus den weissen Reflex der Sklera darbieten, so dass man schon bei Durchleuchtung der Medien durch den hellen Reflex, der aus der Pupille kommt, überrascht wird. Man könnte in solchen Fällen eigentlich von rothen Inseln innerhalb der weissen Fläche sprechen.

In anderen Augen mit Chorioiditis überwiegt aber die Pigmententwickelung. Es sind wohl auch weisse Flecke oder diffus abgeblasste Stellen in der Chorioidea sichtbar, aber das Auffallendste sind sehr grosse und compacte Pigmentschollen und -Flecke, die zum Theil auch in der Netzhaut liegen. In diesem Falle sehen sie manchmal ganz ähnlich aus wie bei Pigmentdegeneration der Netzhaut; neben denselben sieht man wieder grössere, atrophische Stellen des Pigmentepithels von dunkleren Säumen umgeben und sehr deutlich die Chorioidealgefässe hervortreten lassend.

Bei alten Fällen sieht man neben der Pigmentirung immer andere Veränderungen in der Retina, die auf Atrophie zu beziehen sind, nämlich eine bedeutende Verengerung der Gefässe. Auch sind dieselben sehr spärlich, mitunter gar nicht weit von der Papille in den Fundus zu verfolgen. Die Papille, die manchmal förmlich unter pathologischen Pigmentanhäufungen vergraben erscheinen kann, ist zuweilen blos dadurch zu finden, dass man die Retinalgefässe gegen ihre Theilungen hin verfolgt. Auch dies wird aber oft durch die bedeutende Verengerung der Gefässe sehr erschwert.

Ist die Chorioidea in der Umgebung der Papille so atrophisch, dass die Sklera durchzusehen ist, so bleibt doch meist ein dunkler, graubrauner, oder schwärzlicher Ring von Pigment um die Papille zurück. Die Papille selbst ist von schmutzig grauröthlicher oder gelber Farbe, verschwommen und nicht deutlich excavirt. In manchen Fällen sieht man auch narbige Veränderungen in der Retina oder Exsudate zwischen Retina und Chorioidea in Form grünlich- oder bläulich-weisser Stränge, manchmal von verästelter Form, die deutlich prominiren können, was man am Verlaufe der Gefässe erkennt (L. A. Taf. IV, Fig. 1).

Im Vorhergehenden haben wir den Befund bei sehr ausgebreiteten Fällen von Chorioiditis beschrieben, doch können sich die angegebenen Veränderungen auch blos auf einen Theil des Fundus beschränken. So kann die Peripherie erkrankt sein, die centralen Theile der Chorioidea aber ziemlich unverändert aussehen. In Fällen von peripherer Chorioiditis disseminata kommt aber auch oft um die Papille eine Atrophie der Chorioidea in Form eines gelblichweissen Ringes von geringerer oder grösserer Breite vor, die ganz das Aussehen eines Staphyloma posticum (siehe dieses), aber nicht dieselbe Bedeutung hat. Während es sich nämlich beim Staphylom um eine durch Ektasie des Bulbus bedingte Atrophie der Chorioidea handelt, so ist in den soeben erwähnten Fällen ein entzündlicher Ursprung anzunehmen. Die Papille bietet leichte Zeichen von Atrophie, und wenn man das erwähnte Verhalten kennt, so wird man öfters durch die Atrophie der Chorioidea um die Papille aufmerksam gemacht, die Peripherie genauer zu untersuchen.

Als Ursache dieser Chorioiditisform ist mitunter Lues zu bezeichnen. Besonders die Fälle, wo kleine, helle Herde weit in der Peripherie, in der Nähe des Aequators sitzen, sind oft durch Lues bedingt. Ferner disponirt hochgradige Myopie sehr stark zu Chorioiditis. Menstruationsanomalien, schwere Allgemeinerkrankungen sind auch als ätiologische Momente anzuführen. Bei alten Leuten findet man als senile Veränderung oft ziemlich bedeutende Atrophie der Chorioidea in der äussersten Peripherie.

2. *Chorioiditis areolaris (Förster).*

Diese Form kommt nur sehr selten zur Beobachtung. Es fällt dabei zunächst auf, dass das Centrum für ihre Verbreitung die Macula ist. Die frischesten Herde sind kleine, schwarze Pigmentflecke. Innerhalb derselben tritt ein hellgelblicher Fleck auf, der immer mehr an Grösse zunimmt. Man sieht also dann helle Flecke, die von schwarzen Ringen oder Halbringen umgeben werden. Um die Herde

und manchmal im weiteren Verlaufe auch in ihnen sind die Chorioidealgefässe in auffallender Deutlichkeit sichtbar. Die Papille ist anfangs normal, aber später wird sie atrophisch.

Der Name Chorioiditis areolaris kommt daher, dass man in einem Fall, in dem man ähnliche Herde anatomisch in der Chorioidea untersucht hatte, die Knoten von areolärem Baue fand.

3. Chorioretinitis centralis.

Die Chorioretinitis centralis zeigt alle verschiedenen Erscheinungsformen, wie sie früher von der Chorioiditis disseminata angegeben wurden. Sie kann sich also durch dunkle Pigmentflecke (J. A. Fig. 91) oder weisse, atrophische Herde von Pigment umgeben und von Chorioidealgefässen durchzogen manifestiren (J. A. Fig. 92), dann auch durch weisse Flecke mit Pigmentveränderungen am Rande oder innerhalb derselben (J. A. Fig. 95, 96, 122, 127), oder es ist das Pigmentepithel in grösserer Ausdehnung wie mit einem Schwamme weggewischt (J. A. Fig. 97). In hochgradig myopischen Augen findet man nicht zu selten eine eigenthümliche Veränderung in der Gegend der Macula, die aus vielen gelblichweissen, vielverästelten Strichen besteht. Es sieht ganz so aus, als ob in einem Lacküberzug Sprünge entstanden wären, so dass man die helle Unterlage durchsieht (J. A. Fig. 123; W. u. M. Fig. 34). Alle angeführten Formen der centralen Retinochorioiditis kommen ganz besonders in hochgradig myopischen Augen mit Staphyloma posticum und auch bei Lues zur Beobachtung.

4. Chorioretinitis specifica.

Schon oben wurde erwähnt, dass die durch Lues hervorgerufene Chorioiditis manchmal unter den Symptomen einer einfachen Chorioiditis disseminata auftritt. Doch gibt es eine für Lues im Auftreten und Verlauf charakteristische Form, die von Förster genau beschrieben wurde.

Zuerst tritt dabei eine Glaskörper- und Netzhauttrübung auf. Im Glaskörper findet sich jene eigenthümliche, staubförmige Trübung, wie wir sie schon oben (Seite 107) beschrieben haben. Die Netzhaut ist um die Papille herum diffus getrübt, entlang den Gefässen etwas stärker; die Papille ist geröthet und verschwommen. An den Gefässen sieht man ausser einer stärkeren Schlängelung der Venen nichts (W. u. M. Fig. 32). Gleichzeitig damit, noch mehr aber später, wenn die Netzhauttrübung geringer geworden ist, zeigen sich Veränderungen im Pigmentepithel. In grösserer Ausdehnung oder im Bereiche circumscripter Stellen ist das Pigmentepithel atrophisch, so dass die Chorioidealgefässe deutlich hervortreten. Ferner findet man Pigmentflecke in der Netzhaut, und zwar unregelmässige Pigmentschollen von bedeutender Grösse oder auch kleinere, unregelmässig geformte Flecke oder kurze Striche. Dieselben liegen zum Theil über den Gefässen der Retina, zum Theil wohl unter ihnen, aber deutlich über den Gefässen der Chorioidea. Sie haben in ihrer Vertheilung gewöhnlich weder eine Beziehung zu den Retinal-, noch zu den Chorioidealgefässen. Hie und da, doch ziemlich spärlich, nimmt man stärker atrophische Partien in der Chorioidea wahr, die sogar die Sklera

durchscheinen lassen. Wohl aber sind die Chorioidealgefässe oft nicht normal, sondern blass, gelblich oder von weissen Streifen eingesäumt.

Bei längerem Bestehen der Krankheit ist die staubförmige Glaskörpertrübung verschwunden, doch sind immer noch grössere, flockige oder klumpige Trübungen in geringer Anzahl zu finden. Die Retina ist deutlich atrophisch, ihre Gefässe sind sehr eng und spärlich. Die Papille hat eine trübe, grauröthliche oder wachsgelbe Farbe, ist verschwommen und bietet ein ausgeprägtes Bild retinitischer Atrophie. Im ganzen Fundus sieht man die Chorioidealgefässe hervortreten, doch nicht überall mit der gleichen Deutlichkeit. Man hat so das Bild eines sehr stark „getäfelten" Fundus. In der Retina liegen jene oben beschriebenen Pigmentflecke. Der ganze Befund ähnelt auf diese Weise ungemein jenem bei Pigmentdegeneration der Netzhaut. Ja auch die Complication mit hinterem Polarstaar kommt hier vor.

Doch ist es zumeist möglich, die Differentialdiagnose zu stellen. Die Pigmentflecke zeigen nämlich nicht jene typische Knochenkörperchen ähnliche Form wie bei Retinitis pigmentosa, auch folgen sie nicht dem Verlauf der Gefässe. Die erwähnten Chorioidealveränderungen fehlen auch bei der typischen Pigmentdegeneration der Netzhaut.

Gleichzeitig mit dem soeben dargelegten Befunde der Chorioretinitis specifica können auch jene Exsudate in der Retina vorkommen, die mit Vorliebe in der Gegend der Macula sitzen (siehe Seite 148). Dann ist gewöhnlich die Glaskörpertrübung ungemein stark, so dass man oft kaum den Fundus sehen kann. Später hellt sich das Corpus vitreum wohl so weit auf, dass man den Augenhintergrund besser wahrzunehmen im Stande ist, doch bleiben auch jetzt grosse, oft membranöse Trübungen im Glaskörper zurück, die an die Retina nach rückwärts fixirt und wenig beweglich sein können.

Staphyloma posticum.

Unter Staphyloma posticum versteht man eine circumscripte Atrophie der Chorioidea um die Papille von verschiedener (Sichel-, Dreieck-, Ring-) Form, die sich fast immer in myopischen Augen vorfindet und der bei Myopie erfolgenden, allmählichen Verlängerung der Bulbusaxe und der dadurch bedingten Dehnung der Chorioidea ihre Entstehung verdankt. Man sieht also mit dem Spiegel die durch die Ektasie erzeugte Dehnungsatrophie und bezeichnet sie als Staphyloma posticum. Der Name wird auf diese Weise eigentlich im übertragenen Sinn für die Chorioidealatrophie gebraucht, während er in der That eine Vorwölbung der Sklera am hinteren Pol des Bulbus anzeigen sollte, die man aber mit dem Augenspiegel gewöhnlich nicht sehen kann. Doch ist diese Bezeichnung so eingebürgert und allgemein gebraucht, dass man sie kaum durch eine andere ersetzen kann (siehe Seite 158).

Die Form und Grösse der Staphylome ist ungemein verschieden. Die geringsten Anfangsbildungen sind sehr schmale, sichelförmige Streifen, die kaum von einem angeborenen, breiteren Skleralring unterschieden werden können (J. A. Fig. 109). Dann kommen Sicheln vor, die an der breitesten Stelle $^1/_2$ bis $^3/_4$ P. D. haben (J. A. Fig. 110, Fig. 117; W. u. M. Fig. 28, 34), ja es kann der P. D. von der Chorioidealatrophie an Breite übertroffen

werden. In anderen Fällen hat die Atrophie eine fast dreieckige Form (J. A. Fig. 111, 118), oder man kann ihre Gestalt mehr einem Kappenschirme vergleichen (W. u. M. Fig. 27, 35, 36). Ferner kann die Atrophie die Papille vollständig umkreisen, das Staphylom also ringförmig sein: ein Ring, der allerdings oft an einer Seite breiter ist als an der anderen (J. A. Fig. 112, 125; W. u. M. Fig. 8), oder endlich man findet eine sehr grosse, unregelmässig begrenzte, runde oder ovale Chorioidealatrophie (J. A. Fig. 127, 128; L. A. Taf. VII, Fig. 6). Ihre Breite kann oft 3 bis 4 P. D. betragen.

Handelt es sich um Bildungen, die nicht die ganze Papille umgeben, so liegen sie gewöhnlich aussen, oft aber auch schräg nach aussen-unten, aussen-oben. Auch ringförmige Atrophien sind in der Regel aussen breiter. Von den nach unten gerichteten Staphylomarten haben wir bereits früher gesprochen und erwähnt, dass sie in der Mehrzahl der Fälle als congenitale Anomalie aufzufassen sind (siehe Seite 117). Nach innen kommt kaum je ein Staphylom vor, wohl aber, wenn auch äusserst selten, direct nach oben.

Die Farbe der Staphylome ist zumeist weiss oder gelblichweiss, doch kann man, gewöhnlich nur bei schmalen Sicheln, sehen, dass die Chorioidea in ihrem Bereiche nicht vollständig atrophisch ist. Es sind eben die Chorioidealgefässe daselbst sehr deutlich sichtbar (J. A. Fig. 119, 120; W. u. M. Fig. 9). Dann gibt es Fälle, wo man eine Pigmentirung sieht, die nur ganz andeutungsweise dem Bilde des „getäfelten Fundus" entspricht (J. A. Fig. 117, 118). Es sind da Reste des Stromapigmentes der Chorioidea auf der Sklera sitzen geblieben. Sehr selten ist das ganze Staphylom braun, ja selbst schwarz gefärbt (J. A. Fig. 115, 116). Diese Pigmentansammlung lässt sich dann wohl auch in zur Papille concentrische Ringe auflösen. Auch kann es bei grösseren Staphylomen geschehen, dass die Farbe nicht im ganzen Staphylom die gleiche ist. Vielmehr kann der der Papille zunächstliegende Theil z. B. braun, der übrige Theil weiss erscheinen.

Die Grenzen der atrophischen Partie sind sehr verschieden, manchmal ganz scharf, ein andermal sehr verwaschen und durch verstreute braune und schwarze Pigmentflecke undeutlich gemacht. Helle Sicheln werden oft scharf von einem einfachen oder doppelten schwarzen Streifen begrenzt.

Die Papille selbst bietet entweder ein normales Aussehen oder sie erscheint röthlich und verschwommen, was wohl zum Theil auch durch den Contrast gegen die helle Partie um sie herum hervorgerufen ist. Die Netzhautgefässe sind sehr dünn und verlaufen oft auffallend gestreckt. Der geringe Durchmesser derselben ist zwar oft Täuschung, bedingt durch die im umgekehrten Bilde bei Myopie sehr schwache Vergrösserung. Bei nach einer Richtung sehr ausgebreitetem Staphylom ist die Form der Papille oft verändert. Sie ist oval, und zwar zeigt die Stellung dieses Ovals eine gewisse constante Beziehung zu der Richtung, in der das Staphylom am breitesten ist. Erstreckt sich das Staphylom am weitesten nach aussen, so erscheint die Papille senkrecht-oval; ist dagegen das Staphylom z. B. nach aussen-unten am breitesten, so ist der längere Durchmesser des

Ovals, das die Papille darstellt, von aussen-oben nach innen-unten gerichtet. Es fällt also immer der kürzere Durchmesser des Ovals mit dem längsten Durchmesser des Staphyloms zusammen (L. A. Taf. III, Fig. 3, 4, 5; W. u. M. Fig. 27). Die Erklärung für diesen Befund ist folgende: In Fällen von hochgradiger Myopie mit starker Ektasie des Auges am hinteren Pole sieht man die Papille nicht von vorne, sondern gleichsam im Halbprofil. Die Papille rückt nämlich, da sie ja innen vom hinteren Pol liegt, desto mehr an die innere Wand des sich ausdehnenden Bulbus, je bedeutender diese Ausdehnung ist, sobald sie eben hauptsächlich an einer Seite der Papille erfolgt. Da nun dort, wo die stärkste Ausdehnung der Bulbuswand ist, auch gewöhnlich die bedeutendste Chorioidealatrophie sitzt, so ist jene Beziehung zwischen Form des Staphyloms und der Papille leicht verständlich. Dementsprechend fehlt die ovale Form bei ringförmigen Staphylomen.

Nur selten kann man am Rande des Staphyloms eine Biegung der Netzhautgefässe und damit eine circumscripte Ektasie des Bulbus nachweisen. Ebenfalls selten machen die Retinalgefässe im Bereiche des Staphyloms selbst Biegungen, die dann natürlich auf Niveauverschiedenheiten in der blossliegenden Skleralpartie hindeuten. Leichter gelingt die Erkennung solcher Verhältnisse noch, wenn man im aufrechten Bilde mit sehr starken Concavgläsern untersucht. Man wird auf diese Unebenheiten auch aufmerksam, wenn man die Refraction im umgekehrten Bilde nach Schmidt-Rimpler untersucht. Das Gitterbild zeigt dann eine starke Verzerrung.

Ein sehr seltener Befund ist eine sogenannte Supertractionssichel. Man sieht nämlich correspondirend einem nach aussen liegenden sichelförmigen Staphylom eine zweite, schwarzbraune Sichel über dem inneren Theile der Papille liegen (J. A. Fig. 114). Es ist dies durch eine Hinüberziehung des Pigmentepithels von innen her auf die Papille bedingt, so dass die Oeffnungen für den Opticus in Sklera und Chorioidea gegeneinander verschoben sind.

Von sonstigen Veränderungen in Augen mit Staphyloma posticum ist besonders der Atrophie des Pigmentepithels zu gedenken. Man sieht daher oft die Chorioidealgefässe und bekommt das Bild des „getäfelten Fundus" (J. A. Fig. 120).

Sehr oft sind retinochorioiditische Veränderungen in der Gegend der Macula zu sehen, wie sie schon oben beschrieben wurden. Die Atrophie der Chorioidea in der Gegend der Macula kann so gross wie das Staphylom werden, so dass man beim ersten Blicke glaubt, zwei grosse Staphylome zu sehen. Auch Chorioiditis disseminata findet man oft. Die Herde können in das Staphylom gleichsam hineinwachsen und so zur Vergrösserung desselben beitragen und eine sehr unregelmässige Form der atrophischen Stelle hervorrufen (J. A. Fig. 125; L. A. Taf. III, Fig. 7).

Glaskörpertrübungen fehlen fast in keinem Auge mit ausgebreitetem Staphylom. Sie sind oft so leicht beweglich, dass man auf Verflüssigung des Glaskörpers schliessen kann.

Auch Linsentrübungen sieht man häufig und man darf nicht vergessen, dass Netzhautablösung in vielen Fällen ihre Ursache in Myopie hat.

Tuberculose der Chorioidea.

Das Auftreten von Tuberkelknötchen in der Chorioidea kommt in Fällen von acuter, miliarer Tuberculose vor. Der Nachweis mit dem Augenspiegel kann für die Diagnose der ganzen Erkrankung wichtig werden. Die Tuberkel der Aderhaut stellen sich als kleine, selten nur grössere, blassgelbe, immer runde Flecke dar. An manchen von ihnen kann man durch parallaktische Verschiebung eine leichte Prominenz nachweisen. Sie haben dann eben die Retina emporgehoben. Anatomisch wurden Tuberkel bis zur Grösse einer Linse in der Chorioidea gefunden. Solche müssten natürlich ein sehr ansehnliches, ophthalmoskopisches Object abgeben. Fast nie nimmt man in ihrer Umgebung Pigmentveränderungen wahr, wie sie so oft bei chorioiditischen Herden vorkommen (J. A. Fig. 121).

Sind sie nur in geringer Anzahl vorhanden, dann sitzen sie in der Umgebung der Papille, so dass sie dem Untersucher nicht so leicht entgehen können. Sind sie zahlreicher (auch 40 bis 50 Knötchen hat man schon beobachtet), so liegen sie auch in der Peripherie des Fundus.

Auch conglobirte, solitäre Tuberkel wurden schon gesehen. Sie zeigen dieselben Symptome wie ein Chorioidealtumor. Zur Diagnose kann das Auffinden kleiner, gelblichweisser Knötchen in der Umgebung der grossen Geschwulst wichtig sein, doch ist mit dem Ophthalmoskop die Natur des Tumors kaum mit Sicherheit zu erkennen.

Ablösung der Chorioidea.

Durch alle Umstände, die Glaskörper- oder Netzhautablösung hervorrufen können, kann auch eine Ablösung der Chorioidea entstehen. Auf den ersten Blick hat man den Befund einer blasenartigen Netzhautabhebung, die unbeweglich ist. Unmittelbar unter den Netzhautgefässen, also unter derselben Einstellung wie diese, sieht man, wenn die Retina genug durchsichtig ist, die Gefässe der Chorioidea. Doch kann man auch bei einem Tumor der Chorioidea Gefässe unmittelbar unter den Gefässen der Netzhautablösung sehen. Die Chorioidealgefässe bei Abhebung der Chorioidea zeigen die ihnen eigenthümliche Regelmässigkeit, während Gefässe eines Tumors unregelmässig verlaufen. Nicht immer ist es möglich, mittels des Augenspiegels die Diagnose zu stellen. Mitunter gesellt sich zur Ablatio Chorioideae auch noch eine Ablatio Retinae, d. h. zwischen Retina und Chorioidea ist noch ein gewöhnlich durch Flüssigkeit ausgefüllter Zwischenraum vorhanden. Wenn die Netzhaut und die darunter befindliche Flüssigkeit genügend durchsichtig sind, so nimmt man die Gefässe der Chorioidea unter den Netzhautgefässen wahr, doch nicht unter derselben Einstellung, aber auch nicht mit jenen Gläsern, mit denen man die Papille sieht.

Tumoren der Chorioidea.

Pigmentirte und nicht pigmentirte Sarkome der Aderhaut können mit dem Augenspiegel in einer Anzahl von Fällen diagnosticirt werden. Sehr leicht ist dies, wenn sie im vordersten Theil der Chorioidea sitzen und von hier aus in den Glaskörper prominiren. Schwieriger ist die Diagnose dagegen, wenn der Tumor den hinteren Theil des

Bulbus einnimmt. Hier kommt der Umstand in Betracht, dass eine gleichzeitige Netzhautablösung den Tumor verdecken kann, so dass das Bild einer einfachen Netzhautablösung vorhanden ist. Dort dagegen, wo die Retina dem Tumor vollständig anliegt, oder wo die zwischen Netzhaut und Tumor befindliche Flüssigkeit, sowie die abgehobene Netzhaut durchsichtig ist, kann man den Tumor und seine Gefässe sehen. Sie sind meist ganz unregelmässig und man sieht sie entweder mit ebenso starken Linsen wie die Netzhautgefässe, oder sie haben eine andere Refraction, doch aber nicht jene des übrigen Fundus. Hat der Tumor sich in der Gegend der Macula entwickelt, so bleibt die Netzhaut meist sehr lange mit ihm in inniger Verbindung, was natürlich die Diagnose erleichtert.

In den vorderen Partien der Chorioidea findet man häufiger nichtpigmentirte Sarkome als in den hinteren Abschnitten.

Gestattet die gleichzeitig vorhandene Trübung der Retina keinen Einblick auf die tieferen Theile, so wird oft die Unbeweglichkeit der abgehobenen Retina und die Form der Ablatio den Verdacht auf Tumor erwecken. Eine hinzugetretene Drucksteigerung im Auge wird die Diagnose Tumor sichern.

Ruptura Chorioideae.

In Fällen, wo eine stumpfe Gewalt, z. B. ein Faustschlag, ein Steinwurf den Bulbus trifft, kann die Chorioidea zerreissen, während meist die inneren Lagen der Retina intact bleiben, das Pigmentepithel aber einreisst. Diese Risse erfolgen am leichtesten dort, wo die Chorioidea am meisten an die unterliegende Sklera fixirt ist. Dies ist in ihren vordersten Theilen und in der Gegend der Papille der Fall. Die vorne liegenden Risse kann man nur selten mit dem Augenspiegel sehen, da sie meist zu peripher liegen. Wenn dies doch gelingt, so sehen wir sie als breite, weisse, mit Pigment, im frischen Zustande mit Blut umsäumte Streifen. Sie laufen an den Enden spitz zu und ihr längster Durchmesser liegt gewöhnlich äquatorial.

Häufiger sieht man Aderhautrisse in den hinteren Theilen des Auges. Es sind hell gelblichweisse Streifen zumeist mit zugespitzten Enden. Sie pflegen in der Nähe der Papille zu liegen, am häufigsten aussen von ihr. Die typische Form der Chorioidealruptur ist die einer mit der Concavität gegen die Papille gerichteten Sichel, doch kommen auch in horizontaler oder verticaler Richtung ausfahrende Risse vor (J. A. Fig. 103; W. u. M. Fig. 37, 38).

Die Retinalgefässe verlaufen in den meisten Fällen ganz unverändert über diese Stellen hinweg. An den Rändern der Rupturen sind gewöhnlich nur geringe Pigmentveränderungen zu beobachten.

Bei frischen Fällen pflegen Blutungen im Glaskörper vorhanden zu sein, die selbst eine genaue ophthalmoskopische Untersuchung unmöglich machen können. In der Umgebung des Risses ist bald nach der Verletzung gewöhnlich eine deutliche Retinaltrübung nachweisbar.

Hat ein spitzer Körper die Sklera und Chorioidea durchbohrt, so ist der Befund ganz ähnlich, wie wir ihn soeben für die durch Contusion entstandene Ruptur beschrieben haben. Da dabei in der Regel auch die Retina durchtrennt wird, so zeigen sich auch Continuitätstrennungen der Netzhautgefässe.

Sachregister.

Seite

A.

Ablatio Chorioideae 169
„ Retinae . . . 110, 134, 152, 169
Abscess der Dura mater 125
Accommodation 29, 68
Albinotisches Auge 32, 52, 116
Altersveränderungen 55
Amaurotisches Katzenauge 31
Amblyopia ex abusu spirituos. et tab. 129, 130
Anaemie, allgemeine . 118, 126, 136, 142
„ des Opticus 118
„ perniciöse 142
„ der Retina 136
Aneurysma der Centralarterie . . . 139
„ cirsoideum der Karotis . 126
Antrum Highmori 126
Aortenaneurysma 134
Aorteninsufficienz 134
Aphakie 30, 98
Arachnoidealscheide 47
Arteria hyaloidea 102, 106, 151
Arterienpuls 121, 124, 133
Arteriosklerose 138
Arten der Augenspiegel 37
Asthenopie 118, 135
Astigmatismus 28
„ regulärer 28
„ Bestimmung des regulären 76, 86
Astigmatismus, irregulärer 29, 88
Atrophia Chorioideae 162
„ nervi optici 127
„ nervi optici, genuine . . . 127
„ nervi optici, neuritische 125, 128
„ nervi optici, partielle . . . 129
„ nervi optici, retinitische . 129
„ Retinae 140, 163

B.

Basis eines Prismas 13
Bild, aufrechtes (Methode) 35, 42

Seite

Bild, umgekehrtes (Methode) . 35, 40, 44
Bilddistanz, negative 15
„ positive 15
Bindegewebsring siehe Skleralring.
Bindegewebe auf der Papille 117
Bleiintoxication 126, 129
Blutbewegung, sichtbare 134
Blutverluste 126, 131
Blutung ins Gehirn 126
Brechende Flächen 13
Brechende Kante eines Prismas . . 13
Brechende Medien 27, 93
„ „ Untersuchung . . 39
„ „ Trübung . . . 93, 94
Brechkraft einer Linse 24
Brechungsebene 12
Brechungsindex 13
Brechungswinkel 12
Brennpunkt eines Concavspiegels . . 6
„ eines Convexspiegels . . 10
„ einer Concavlinse . . . 19
„ einer Convexlinse . . . 14
Brennweite, vordere und hintere . . 26
„ einer Concavlinse . . 19, 23
„ einer Convexlinse . . 14, 19
„ eines Concavspiegels . . 6, 9
Bromkaliamaurose 136

C.

Capillarpuls 134
Cardinalpunkte 26
Caries der Orbita 126
Cataracta fusiformis 102
„ membranacea 105
„ Morgagni 104
„ nigra 104
„ perinuclearis 102
„ polaris anterior 101
„ polaris posterior 102
„ punctata 105
„ pyramidalis 101
„ senilis 104
„ stellata 105

Seite
Centralgefässe, siehe Retinalgefässe.
Ciliarfortsätze 101
Cilioretinale Gefässe 115, 137
Circulationsstörungen in der Retina . 133, 142
Chininamaurose 136
Cholera 133, 134, 136
Cholestearinkrystalle . 109, 116, 149, 154
Chorioidea, Anatomie 49
„ normale 49, 52
Chorioiditis 161
„ areolaris 164
„ disseminata 163
Chorioretinitis centralis 165
„ specifica . . . 152, 165
Cloquet'scher Canal 107, 151
Coenuren 125
Colobom der Chorioidea 158
„ der Linse 101
„ der Sehnervenscheide . . 116
Commotio retinae 157
Conjunctivalentzündungen 135
Concavlinsen 14, 19
Concavspiegel 5
Concretionen im Opticus 131
Conjugirte Vereinigungspunkte . . 7
Construction der Augenspiegel . . 35
Contusio Bulbi 155, 157
Conus, siehe Staphylom.
Convexlinsen 14
Cornea 27, 96
Correctionslinsen . 29, 37, 43, 69, 70, 78, 79, 107
Corticalis, vordere 102
„ hintere 102
Cyanose 135
Cyanosis retinae 135
Cysticercus i. Glaskörper . . 108, 110
„ subretinalis 155
„ in cerebro 125

D.

Degeneration des Opticus 130
Diabetes 142, 147
Dioptrien 24
Diphtheritis 126
Drusen der Glaslamelle 55, 131, 151, 162
Duralscheide 47

E.

Echinococcen 125
Einfallsebene 3, 12
Einfallsloth 3, 12
Einfallswinkel 3, 12
Elevation, physiologische 115
Embolie der Centralarterie . . 118, 130, 134, 136, 149
Emmetropie 27
„ Bestimmung 63, 64, 66, 73. 82
Endocarditis 142
Entfernung beider Augen . . . 62, 70
Seite
Entfernung der Linse im umgekehrten Bilde 40, 58, 71
Entozoen 110
Entzündung des orbitalen Zellgewebes 126, 130, 131
Erysipel 126
Excavation des Opticus 59, 112
„ atrophische, 113, 127, 128, 129
„ glaukomatöse . . 113, 118
„ partielle 113
„ pathologische 113
„ physiologische 112
„ totale 113
Exsudat in der Chorioidea 162
„ „ „ Retina 148

F.

Facettirung der Cornea 96
Febris recurrens 126, 142
Fernpunkt 28
Fettige Degeneration der Retina . . 142, 144, 146
Fieberhafte Krankheiten 131
Foramen opticum 126
Formel für Concavlinsen 19
„ „ Concavspiegel 7
„ „ Convexlinsen 19
Fremde Körper i. Glaskörper . . . 110
„ „ i. d. Iris 97
„ „ i. d. Retina . . . 157

G.

Gefässe, neugebildete, i. Opticus . . 124
Gefässvertheilung i. d. Retina . . . 50
„ Anomalien derselben 115
Gefässvertheilung, verkehrte . . . 116
Gehirnabscess 126
Gehirnerweichung 126
Genitalien, weibliche 126
Gerontoxon lentis 104
Gesichtsfeld, ophthalmoskopisches . 58
Getäfelter Fundus 52, 168
Glaskörper 27, 94, 106
Glaskörperabhebung 109
Glaskörperabscess 110
Glaskörperanlage 107, 160
Glaskörperconsistenz 106
Glaskörperblutung . 101, 142, 149, 170
Glaskörperflocken 108
Glaskörpergefässe . . . 107, 110, 155
Glaskörpermembranen . . . 108, 155
Glaskörperstaar 105
Glaskörperstaub 107, 165
Glaskörpertrübung . . 94, 106, 107, 110, 147, 161, 168
Glaskörpertrübung, diffuse 108
Glaukom 118, 133, 135, 139
Glaukomatöser Hof 120
Glioma Retinae 156

Seite

H.

Haematom der Dura mater 125
Haemophilie 142
Haemorrhagien i. d. Chorioidea . . 161
„ im Opticus 123
„ i. d. Retina . . 123, 140
Hauptaxe der Spiegel 6, 10
„ „ Linsen 14
Hauptebene 26
Hauptpunkte 26
Hauptschnitt eines Prismas 13
Helmholtz' Spiegel 34, 36, 107
Hemianopie 130
Herzfehler 135, 138
Hornhautreflex 42, 94, 99
Hyperaemie des Opticus . . . 117, 126
„ der Retina 134
„ der Chorioidea 161
Hydrocephalus 126
Hydrops der Sehnervenscheide . . 126
Hypermetropie 28
„ Bestimmung derselben 45, 63, 65, 68, 72, 83

I.

Ikterus 142
Infarkt, haemorrhagischer 138
Infectionskrankheiten 126
Intermittenskachexie 142
Intervaginalraum siehe Zwischenscheidenraum.
Intraocularer Druck 54, 121, 142, 157, 170
Irideremie 31, 101
Iridodialysis 98, 101
Iridodonesis 94, 98
Iris 97
Iriscolobom 101, 159
Irisatrophie 97
Iritis 135, 118

K.

Kammer, vordere 98
Karotisunterbindung 142
Keratokonus 97
Keratitis 135
Kernstaar 102
Knotenpunkt 26
Körnerschicht (Wucherung) 147
Krümmungshalbmesser 6
Krümmungsmittelpunkt eines Concavspiegels 6
Krümmungsmittelpunkt eines Convexspiegels 10

L.

Lamina cribrosa 48, 114, 128
Leberleiden 142
Leukaemie 138, 142, 149
Leuchten der Pupille 31
Lichtquelle 38

Seite

Linse 27, 98
Linsencolobom 101
Linsenluxation 99
Linsenrand 101
Linsenreflex 99
Linsentrübungen 94, 101
Linsentrübung diffuse 105
Lues . 108, 126, 130, 148, 149, 152, 165
Luftblasen 93, 109

M.

Macula lutea, normal 49, 52, 70
„ „ rother Fleck . . 136, 154
Macularcolobom 160
Meningitis . . . 118, 126, 130, 135, 156
Menstruationsanomalien 126, 164
Morbilli 126
Morbus Basedowii 134
Morbus Brightii 142, 146
Mydriasis 38
Myelitis 126
Myopie 28, 109, 155, 164, 165
„ Bestimmung derselben 45, 63, 64, 66, 72, 83

N.

Nebenaxe einer Linse 14
Nephritis 142, 146
Nervenfasern, markhaltige 132
„ Hypertrophie 124, 142, 144, 146, 148
Netzhaut, siehe Retina.
Neuritis optica . . 122, 124, 133, 145
„ durch congenitale Anlage . 126
„ descendens 126
„ retrobulbaris 118, 129, 130, 136, 138
„ sympathica 126
Neuroretinitis 124, 145
Niveaudifferenz 59
Numerirung der Linsen 24

O.

Objectdistanz, positive 15
„ negative 16
Ohnmacht 133
Opticus, Anatomie 47
Opticusdurchschneidung 118, 134, 136, 138
Opticusfasern, gekreuztes und ungekreuztes Bündel 129
Opticusscheide 47
Opticustheilung 117
Optischer Mittelpunkt einer Linse . 14
Optische Systeme 26
Orbitalerkrankungen . . 126, 131, 133
Oxalurie 150

P.

Papille, Anatomie 48
„ doppelt 89, 100

Seite

Papille, Farbe 49, 108
„ Farbenanomalien 116
„ normal 49, 77, 79, 80
„ Verzerrung . . 41, 77, 89, 167
Prominenz der Papille . . 59, 115, 123
Papillitis 122
Papillomaculäres Bündel 129
Parallaktische Verschiebung . . 60, 61
Paralyse, progressive 130, 150
Periostitis orbitae 126
Perivasculitis retinae 140
Pialscheide 47
Pigmentdegeneration d. Retina, atypisch 152
„ „ „ typisch 143, 150, 166
Pigmentepithel, normal 48, 51
Pigmentepithelatrophie . 141, 142, 162
Pigmentepithelwucherung . 141, 142, 162
Pigment im Opticus 131
„ auf der Papille 116
Pigmentring 50, 158
Planspiegel 3, 36, 88, 107
Pneumonie 126
Prismen 13
Pseudogliom 156
Pupillarmembran 98
Purpura haemorrhagica 142

R.

Reducirtes Auge 30
Reflexbild der hinteren Linsenkapsel 99, 109
Reflexion des Lichtes 3
„ totale 13
Reflexionsebene 3
Reflexionswinkel 3
Refraction des Auges 27
„ „ Lichtes 12
Refractionsbestimmung im aufrechten Bilde 62, 70
„ nach Cuignet 80
„ im umgekehrten Bilde 71
Refractionsbestimmung n. Schmidt, Rimpler 73, 80
Refractionsbestimmung durch Retinoskopie 80
Refractionsophthalmoskop 37
Reiterchen 103
Retina, Anatomie 48
Retinalgefässe, Atrophie 140
„ Neubildung 140
„ normal 50, 78
„ weisse Streifen an denselben 123, 128
Retinalgefässe, Teleangiektasien . . 139
„ Varicositäten . . . 139
„ Verdünnung . . 139, 151
Retinalhaemorrhagien 140
Retinalspalte 107, 160
Retinitis 135, 142
„ albuminurica . . 125, 130, 143
„ centrale, recidivirende . . 149

Seite

Retinitis diabetica 145, 147
„ diffuse chronische 147
„ externa 142
„ haemorrhagica . 145, 147, 148
„ interna 142
„ leukaemica 146
„ bei Oxalurie 150
„ paralytica 150
„ pigmentosa, siehe Pigmentdegeneration
Retinitis proliferans 149
„ mit grünlichen Streifen . . 150
„ sympathica 148
Retinochorioiditis centralis . . 129, 165
Retinoskopie 80
Rheumatische Einflüsse . . . 126, 130
Ruptura Retinae 154, 157
„ Chorioideae 170
Rückenmarksleiden 130

S.

Scarlatina 126
Scorbut 142
Scrophulose 156
Schichtstaar 103
Schiefstellung der Papille 167
Sehnerv, siehe Opticus.
Sehpurpur 55
Seitliche Beleuchtung 39
Sepsis 126, 142
Skiaskopie 80
Sinus frontalis 126
Skleralring 50, 158
Sklerose der Chorioidealgefässe 151, 163
„ multiple 130
„ der Retina 150
Skleroticalgefässkranz 48
Spiegelnde Apparate 36
Spindelstaar 102
Staphyloma posticum 155, 165
Staphylom nach unten 117
Stauungshyperaemie i. Opticus . . 118
„ i. d. Retina . . 135
Stauungspapille 123, 135, 145
Sternfigur in der Macula . . 124, 144
Subvaginaler Raum, siehe Zwischenscheidenraum.
Suffocation 142
Supertractionssichel 168
Synechien 98
Synchysis scintillans 109

T.

Tabes 130
Thrombose der Hirnsinus 126
„ „ Vena centralis . . . 138
Tuberculosis Chorioideae 169
Tuberculose 156
Tumor Cerebri 125, 130
Tumoren der Chorioidea 152, 155, 157, 169
„ des Opticus 131

Seite

Tumor orbitae 126, 135
Typhus 126

V.

Variola 126
Venenpuls 54, 122
Vergrösserung, ophthalmoskopische . 56
Verletzungen der Orbita 126
„ des Opticus 118, 126, 131
Verletzungen der Retina . . . 142, 157
Virtuelles Bild 4

Z.

Zollsystem 24
Zonula 100
Zwischenscheidenraum 47, 126
„ Blutung 136, 138, 141

K. k. Hofbuchdruckerei Carl Fromme in Wien.

