

**Ueber die Operation des dynamischen Auswärtsschielens : besonders in
Rücksicht auf progressive Myopie / von A. v. Graefe.**

Contributors

von Graefe, A.
Ophthalmological Society of the United Kingdom. Library
University College, London. Library Services

Publication/Creation

Rostock : Druck von Adler's Erben, [1869]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/jcz8q7zv>

Provider

University College London

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by UCL Library Services. The original may be consulted at UCL (University College London) where the originals may be consulted.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>





Ueber die Operation

des

dynamischen Auswärtsschie

besonders

in Rücksicht auf progressive Myo

von

A. v. Graefe.

1869

Opuscul-Abdruck aus den Klinischen Monatsbl. f. Augen
VII. Jahrg. August-September-Heft.)

Rostock.
Druck von Adler's Erben.



C

Ueber die Operation

des

(4)

dynamischen Auswärtsschielens,

besonders

in Rücksicht auf progressive Myopie

von

972

A. v. Graefe.

~~~~~  
1869

(Separat-Abdruck aus den „Klinischen Monatsbl. f. Augenhkde.“  
VII. Jahrgg. August/September-Heft.)

---

Rostock.

Druck von Adler's Erben.



Über die Operation

des

dynamischen Auswärtsschielens

besonders

in Rücksicht auf progressive Myopie

von

A. v. Hummer

(Separat-Abdruck aus dem Klinischen Monatsblatt für Augenheilkunde)  
VII Jahrgang August-September 1869

Hofdruck

Druck von J. Neumann, Neudamm

1844921

(Separat-Abdruck aus den „Klinischen Monatsbl. f. Augenhlkde.“  
VII. Jahrgg. August/September-Heft.)

## **Ueber die Operation des dynamischen Auswärtsschielens, besonders in Rücksicht auf progressive Myopie**

von  
A. v. Graefe.

Es giebt gewisse Gegenstände, welche uns insofern nicht zu Veröffentlichungen auffordern, als die wesentlichen Gesichtspunkte, die sie betreffen, entweder bereits entwickelt oder wenigstens angedeutet vorliegen, welche aber dennoch einer erneuten Erörterung bedürfen, weil über dieselben noch keineswegs eine übereinstimmende Verständigung durchgedrungen ist. Mit Recht taucht rücksichtlich derselben bei uns die Vermuthung auf, dass die früher von Anderen oder von uns selbst gegebene Darstellung nicht erschöpfend genug gewesen sei, dass sie nicht vermocht habe, Bedenken und Einwürfe ausreichend zu entkräften, dass sie vielleicht das Integrirende nicht gehörig in den Vordergrund gestellt, dem Nebensächlichen eine ungebührende Rolle zuertheilt habe.

Zu diesen Gegenständen gehört meines Erachtens die operative Beseitigung der Insufficienz der inneren Augenmuskeln oder des dynamischen Auswärtsschielens. Während ich selbst diese Operation jährlich 120 bis 150 Mal ausführe und in derselben eins der



wirksamsten Heilmittel, nicht bloß gegen eine häufig vorkommende Asthenopieform, sondern den Schutz gegen eine der allerverbreitetsten Gefahren, welche die Erhaltung der Augen bedrohen, nämlich gegen die fortschreitende Kurzsichtigkeit erblicke, finde ich dieselbe noch immer von einigen sehr schätzenswerthen Fachgenossen auf seltene, fast exceptionelle Indicationen eingeschränkt und da vernachlässigt, wo grade die glänzendsten Bedingungen für deren Gelingen vorliegen, von noch anderen finde ich sie aus Befürchtung einer etwaigen excessiven Wirkung geradezu unterlassen; und wirklich kommen mir alljährlich wohl ein Dutzend wegen des fraglichen Zustandes Operirter unter die Hände, bei welchen auf Grund ungenauer Abmessung des Effects eine störende Diplopie entstanden ist.

Unter solchen Umständen halte ich es für nützlich, auf eben diesen Gegenstand noch einmal zurückzukommen. Kann ich es auch hierbei nicht vermeiden, bereits Erörtertes zu wiederholen, so habe ich doch nach dem Verlaufe, den die Praxis inzwischen genommen hat, verschiedene Umstände anders zu betonen und einige Winke und Ergänzungen hinzuzufügen, die hoffentlich den Fachgenossen nicht ganz überflüssig erscheinen werden.

#### I.

Was zunächst die Einwirkung der Operation auf vorhandene asthenopische Beschwerden anbetrifft, wenn diese letzteren von der Störung des lateralen Muskelgleichgewichts abhängen, so ist diese ziemlich allgemein anerkannt worden. Schon die oft glänzende Abhülfe, welche abducirende prismatische Brillen gegen solche Beschwerden gewähren und die ja in der Regel nichts anders darstellt, als einen Theil der zu erreichenden Operationswirkung, mußte das Urtheil hierüber günstig stimmen; dann aber die schlagende Angabe so vieler Patienten, welche unmittelbar nach der Operation mit einem ganz anderen Behagen als vorher zu fixiren und dauernd zu fixiren versichern. Wir können uns die Wandlung des Zustandes in dieser Beziehung nicht besser versinn-



lichen, als wenn wir selbst, voraussetzlich mit gesunden Lateral Muskeln begabt, uns ein adducirendes Prisma aufsetzen, und so beim Arbeiten mit den betreffenden Accommodationsständen ganz ungebräuchliche, nach der Grenze der positiven Fusionsbreite gewaltsam verrückte Convergenzstände vergesellschaften. So gut als das Arbeiten unter einem solchen adducirenden Prisma die Augen eines Gesunden im höchsten Grade angreift, ziehende, reissende und allerlei schmerzhaft Empfindungen in denselben und in deren Umgebungen hervorruft, welche auch wohl bald die Nothwendigkeit der Arbeitsunterbrechung herbeiführen, endlich durch Rückwirkung auf die Gefässnerven zuweilen sichtbare Augencongestionen einleiten — ganz ebenso wird ein an dynamischem Auswärtsschielen Leidender von Beschwerden der verschiedensten Art betroffen werden, wenn sich seine beiden Sehlinien im Objecte kreuzen. Für ihn ist die divergirende Stellung die natürliche, d. h. die ohne besondere Anspannung von Willenskraft mit dem betreffenden Accommodationszustande associirte, die fixirende dagegen entspricht eben jener Fusionsanstrengung, wie sie das gesunde Auge unter dem adducirenden Prisma vollführt. Nothwendigerweise wird ein solcher Patient auch von der Abnahme jener Fusionsanstrengung auf operativem Wege ganz dieselbe Wohlthat erfahren, wie der Gesunde, wenn wir ihn von dem lästigen adducirenden Prisma befreien.

## II.

Nicht so rasch und allgemein als der Einfluss auf die asthenopischen Beschwerden ward die Einwirkung der Operation auf die Fortschritte der Myopie anerkannt. Natürlich konnten empirische Beweisgründe hierfür nur durch lange, meist Jahre hindurch fortgesetzte und zahlreiche Beobachtungen gewonnen werden. Schon in meiner ersten Arbeit (siehe A. f. O. VIII, 2, pag. 362) theilte ich mit, dass ich bei progressiven Myopieen, bei welchen Insufficienz der Interni vorhanden, einen entschieden günstigen Einfluss der Externus-Tenotomie auf die Fortschritte



der Myopie mehrfach constatirt. Da es ausserdem a priori annehmbar war, dass grade die gegen das musculäre Gleichgewicht erzwungenen Convergenzstellungen weit mehr als hohe Convergenzstände an sich die Fortschritte der Myopie fördern (l. c.); so glaubte ich schon damals, zureichenden Grund zu haben, die Operation, auch unabhängig von Asthenopie, gegen progressive Myopie zu empfehlen.

In den letzten sieben Jahren ist nun meine Aufmerksamkeit ganz besonders auf diesen Punkt gerichtet gewesen. Wenn man sich die Folgenreihe von Gefahren vergegenwärtigt, mit welchen die an progressiver Myopie Leidenden bedroht sind, so musste gewiss ein Verfahren der Beachtung werth erscheinen, welches hiergegen Schutz zu bieten verheisst, ohne den Patienten die für die Meisten undurchführbare, für Alle überaus grausame Abstinenz von jeder Arbeit aufzuerlegen. Ich habe mich deshalb die Mühe nicht verdriessen lassen, über sämmtliche Fälle exquisit progressiver Myopie, welche zu einem mehrjährigen Verfolg vor der Operation und nach der Operation Gelegenheit boten (hiesige oder solche Patienten, die in regelmässigen Zeitabständen nach Berlin kommen), ein genaues Journal zu führen, und ich kann als Gesamteresultat dieser Aufzeichnungen hervorheben, dass sich der günstige Einfluss der Operation gegen Myopia progrediens auf das Glänzendste bewährt hat.

Ich beabsichtigte von achtzig während eines mindestens vierjährigen Zeitraumes verfolgten derartigen Fällen hier eine tabellarische Uebersicht zu geben, allein bei der Ausarbeitung selbst stellte sich heraus, dass, wenn hierdurch der tatsächliche Boden, auf welchem meine Ueberzeugung fusst, erhellt werden sollte, für die einzelnen Patienten sehr viele Zusätze nöthig wären, rücksichtlich auf die eingehaltene Arbeitsdauer, den gleichzeitig, resp. nach der Operation zu Hülfe gezogenen Gebrauch prismatischer Brillen, die Wirkungsweise der Operation selbst, die ja die Gleichgewichtsstörung für die Nähe sehr häufig nur verringert, nicht aufhebt, etwaige Exclusion des einen Auges für die Distanz der



Arbeit, die Nothwendigkeit, sich stärkerer Concavgläser für einen Theil der Beschäftigungen zu bedienen u. s. w. Statt dieser extensiven und wahrscheinlich für die meisten Leser ermüdenden Zusammenstellung, begnüge ich mich anzuführen, dass von jenen achtzig Fällen progressiver Myopie nur sechs in stärkerem Grade progressiv, vier schwach progressiv geblieben sind, während in allen übrigen der stationäre Character, resp. jene scheinbare Verringerung der Myopie sich herausstellte, auf welche ich unten zurückkommen werde. — Ich betone, dass alle Fälle in den letzten zwei Jahren vor der Operation sich auffällig verschlechtert hatten, z. B. von M.  $\frac{1}{7}$  auf M.  $\frac{1}{4,5}$ , von M.  $\frac{1}{24}$  auf M.  $\frac{1}{10}$ , von M.  $\frac{1}{12}$  auf M.  $\frac{1}{5}$ , während überhaupt Fälle geringer Zunahme nicht registrirt wurden; ferner, dass in fast allen Fällen prismatische, resp. concav-prismatische Gläser vor der Operation mit unzureichendem Erfolg gebraucht waren, endlich, dass die Arbeit, allerdings meist mit Unterstützung prismatischer Gläser, nach der Operation mindestens in demselben Umfange und derselben Dauer gestattet wurde, als es vor der Operation geschehen war.

Unmöglich darf man den Skepticismus so weit treiben, für den plötzlichen Anhalt der Myopie, der in der überwiegenden Mehrzahl jener Fälle constatirt ward, lediglich dem Zufall die Vermittelung in die Hände zu legen. Freilich kann, als Ausnahme, ein jeder Fall progressiver Myopie nach einer gewissen Fortschrittsperiode in eine stationäre Periode eintreten, und ich würde einen Schluss gewiss nicht wagen, wäre das Verhältniss ein umgekehrtes gewesen und von den achtzig Fällen zehn stationär geworden, siebenzig progressiv geblieben. Aber so wie die Zahlen lauten, können wir füglich nicht im Schwanken bleiben und es ergiebt sich der für die Lehre höchst wichtige Schluss, dass die Störung des lateralen Gleichgewichts ein überaus wichtiges Moment für die Fortschritte der Myopie abgiebt.



## III.

Wir können über diesen Satz nicht hinweggehen, ohne bei den näheren Beziehungen des dynamischen Auswärtsschielens zu dem Wachsthum der Myopie etwas zu verweilen.

Es ist zunächst nicht ausser Acht zu lassen, dass, falls anders die (dynamische) Gleichgewichtsstörung sich durch die ganze Sehstrecke ausdehnt, der Patient überhaupt seinen Accommodationsapparat nie mehr völlig entspannt. Ermitteln wir für die Entfernung binocular seinen Myopiegrad, so fällt derselbe zu hoch aus und sinkt erst auf das richtige Maass, wenn wir entweder durch ein abducirendes Prisma den musculären Gleichgewichtszustand herstellen, oder wenn wir durch Verdecken eines Auges dem Patienten anheimgeben, eine diesem Gleichgewichtsstande entsprechende Divergenz einzuleiten, oder endlich, wenn er spontan das eine Auge excludirt. Da letzteres vielen Kurzsichtigen in der Nähe geläufiger ist, als in der Entfernung, so stellt sich denn auch nicht selten bei diesen Patienten ein dem gewöhnlichen Ergebnisse bei Kurzsichtigkeitsbestimmungen grade entgegengesetztes heraus, nämlich, dass man aus den Leseprüfungen mit unbewaffnetem Auge die Myopie geringer taxirt, als aus der Ermittlung der Correctionsbrille für die Entfernung. Wir finden z. B., dass Patient Diamantschrift vollkommen scharf bis auf sieben Zoll Abstand erkennt, während er für die Entfernung erst durch Concavbrille  $5\frac{1}{2}$ , nicht mehr durch Concav 6 dicht vor das Auge gehalten, seine volle Sehschärfe erreicht, weil er nämlich bei der ersten Prüfung nur mit dem einen Auge fixirt und das andere ganz nach den Bedürfnissen des musculären Gleichgewichts divergirend abgelenkt, demnach auch seine Accommodation wirklich entspannt hat, während er bei der zweiten Prüfung noch binocular gesehen hat, aber mit Forcierung der Interni und demnach unter unvollkommener Abspannung seines Tensor. Ich brauche nicht hinzuzufügen, dass diese scheinbare Vermehrung der Kurzsichtigkeit durch Muskelinsufficienz sich, ganz wie es bei latenter Hyperopie



der Fall ist, als Beschränkung der Accommodationsbreite darstellt. Ebenso nun wie durch abducirende Prismen der gebundene Theil von A für das Binocularsehen wieder frei gemacht wird, ebenso geschieht es durch die Operation, und darf es uns nicht in Staunen setzen, dass zuweilen Patienten, die früher Concav 12 brauchten, um in der Entfernung scharf zu sehen, nach der Tenotomie genau denselben Effect mit Concav 14, 16, ja selbst 18 erreichen; auch kann man dies sehr wohl prognosticiren, wenn man eben den wirklichen Myopiegrad vor der Operation genau bestimmt.

Aber diese Reduction der Myopie auf ihr wirkliches Maas, resp. die Auslösung des früher durch die Fusionsanstrengung gebundenen Accommodationsbruchtheils (scheinbar directe Besserung von M. durch die Tonotomie) hat nichts zu thun mit der Frage, die wir oben in den Vordergrund gestellt haben, nämlich mit der Sistirung der Fortschritte der wirklichen Myopie. Als Hebel dieser Fortschritte während bestehender Muskelinsufficienz können wir auch keineswegs die eben hervorgehobene Unmöglichkeit einer freien Erschlaffung der Accommodation anrufen. Es werden vielmehr, wie es unter einem adducirenden Prisma bei gesunden Augen geschieht, so auch hier durch die Convergenzanstrengung sämtliche relativen Accommodationsbreiten dem absoluten Nahepunkte angenähert, und es wird demnach auch der Patient für jede bestimmte Entfernung einen geringeren Theil des ihm zu Gebote stehenden Kraftmaasses in Thätigkeit setzen, als ein anderer Myop gleichen Grades. Die Convergenzanstrengung an sich muss ja das Accommodiren erleichtern, und es kann demnach auch der fragliche Zustand nicht etwa in der Weise wie das Tragen zu starker Concavgläser, d. h. durch habituelle Accommodationsanstrengung die Myopie vermehren.

Wir müssen offenbar für die Erklärung auf die forcirte Convergenzarbeit selbst zurückgehen. Zunächst ergibt sich, dass die Nothwendigkeit des Convergirens vergleichsweise zu der wirklich bestehenden Myopie noch durch die Lagen



der relativen Accommodationsbreiten gesteigert ist. In einer ziemlich ansehnlichen Strecke diesseits des absoluten Fernpunktes fällt, auf Grund der Convergenzanstrengung, der relative Fernpunkt diesseits des Objectabstandes und ist diese Strecke natürlich für das binoculare Sehen unverwerthbar. Patient wird, wenn er nicht etwa bereits das eine Auge excludirt — und grade das hier in Rede stehende Dilemma treibt ihn verhältnissmässig so früh zum Excludiren<sup>1)</sup> — das Object noch weiter annähern, d. h. in Distanzen bringen müssen, in welchen ihm das Muskelleiden die binoculare Fixation noch mehr erschwert. Er wird mit einem Worte, so sehr sein Gebrechen das Annähern behindert, mehr convergiren müssen, als ein regulärer Myop gleichen Grades, dessen relative Accommodationsbreiten weit mehr nach Seiten des absoluten Fernpunktes hin liegen.

Und je länger die Arbeit fortgesetzt wird, desto tiefer prägt sich das Dilemma aus; die gegen das musculäre Gleichgewicht durchgesetzte Adductionsrotation erfordert successive eine immer stärkere Anstrengung und zieht als solche die relativen Accommodationsbreiten immer mehr heran<sup>2)</sup>. Hiermit

<sup>1)</sup> Die Vortheile für den Sehsact, welche ein solcher Patient durch das Divergiren (Excludiren) erreicht, sind denen völlig analog, welche ein Hyperop durch sein Convergiren (Excludiren) erreicht. So gut wie dieser durch Einleitung der abnormen Convergenz den Nahepunkt der relativen Accommodationsbreite diesseits des Objectabstandes verlegt, rückt der Myop beim willkürlichen Divergiren den Fernpunkt der relativen Accommodationsbreite über den Objectabstand hinaus. Er ermöglicht sich also durch die divergirende Exclusion eine grössere Sehdistanz, ebenso wie der Hyperop durch die convergirende Exclusion sich die Distinctionsfähigkeit für geringere Distanzen verschafft.

<sup>2)</sup> Die Wandelung der relativen Accommodationsbreiten während der Arbeit selbst, resp. nach lange fortgesetzter Arbeit ist überhaupt in ihrem näheren Verfolge sehr interessant. Man wird staunen, wenn man die relativen Accommodationsbreiten der an accommodativer Asthenopie leidenden Arbeiter in den Vormittags- resp. Nachmittagsstunden, am Montage resp. am Sonnabend bestimmt, (einfach durch Ermittlung der positiven und negativen Gläser,



steigt die Nothwendigkeit, das Object anzunähern und mit dieser wieder die musculäre Bedrängniss. So ist ein *cercle vicieux* gesetzt, welcher zu den bekannten Beschwerden und endlich zur Nothwendigkeit der Unterbrechung (oder zur Exclusion) führt. Durch diese progressive Annäherung, welche an das progressive Abrücken bei vielen Formen accommodativer Asthenopie erinnert, unterscheidet sich der mit dynamischem Auswärtsschielen behaftete Myop sehr kenntlich von dem einfachen, mit völlig leistungsfähigen Internis begabten Myopen.

Wenn wir nun die bei progressiver Myopie sich bethätigenden materiellen Veränderungen in Betracht ziehen, so ist es gut annehmbar, dass die den Bestrebungen der Muskeln gewissermaassen abgerungenen Convergencebewegungen, deren Zwang während der Arbeit continuirlich steigt, und unter denen wie bei Ueberwindung eines abnormen Widerstandes der Druck auf die Umhüllungshäute des Auges nothwendig steigt, die einmal

welche für bestimmte Arbeitsentfernungen noch überwunden werden), welche stark abweichenden Ergebnisse sich herausstellen. Nicht allein, dass für die Vorgänge der Ermüdung durch solche vom Beginne der Arbeit bis zum Moment der nöthigen Unterbrechung intervallenweise durchgeführte, Bestimmungen lehrreiches Material gewonnen wird, sondern auch für diagnostische Zwecke haben dieselben Werth. So ereignet es sich nicht selten, dass wir nicht sofort über die Ursachen einer Asthenopie im Klaren sind, z. B. weil dieselbe weniger in Anomalie des Refraktionszustandes oder in einer beschränkteren Accommodationsbreite, als in einer Reduction der Energie liegt. Ich pflege unter solchen Umständen den Patienten ein Weilchen oder selbst bis an die Grenzen der Ermüdung arbeiten zu lassen, und untersuche alsdann auf's Neue die Factoren, welche von Belang sind. Nicht selten zeigt sich dann, wovon anfänglich keine Rede war, ein für die Arbeit exquisit ungünstiges Verhältniss zwischen den positiven und negativen Bruchtheilen der relativen Accommodationsbreiten, welches über den accommodativen Ursprung der Asthenopie keinen Zweifel lässt. In anderen Fällen dagegen ist eine derartige Wandelung nicht eingetreten, wohl aber bekundet sich die retinale Natur der Asthenopie durch den augenblicklich lindernden und die Ermüdung herausrückenden Einfluss tief blauer Gläser.



vorhandene krankhafte Disposition anfachen. Man denke nur wiederum an den mit dem adducirenden Prisma ausgestatteten Gesunden, resp. an das fortwährende Unbehagen, welches er durchzumachen hat. Ob es übrigens der die Adductionsanstrengung begleitende Muskeldruck an sich ist, der die Ectasia posterior fördert, oder ob es mehr die Congestivzustände sind, welche sich an die unzweckmässige und unbehagliche Functionirung knüpfen, das lasse ich dahingestellt, allein jedenfalls liegen hier alle Momente vor, welche die Ursachen der Myopiefortschritte activiren.

Schliesslich erinnere ich bei dieser Gelegenheit an das Factum, dass bei solchen Patienten, deren Myopie seit der Kindheit auf durch einen grossen Abschnitt des Lebens ohne Brillengebrauch stationär geblieben ist, fast ausnahmslos, falls nicht etwa durch die ganze Sehstrecke das eine Auge excludirt ward, normal fungirende Lateralmuskeln vorgefunden werden. Ich meine, dass diese Thatsache neben dem fast regulären Vorhandensein dynamischen Auswärtsschielens in den exquisit progressiven Formen recht erweisend für die nahe Beziehung des Muskelleidens zu dem Wachsthum des Refractionsleidens ist.

#### IV.

Es liegt uns lediglich die Absicht vor, auf die Coexistenz des dynamischen Auswärtsschielens und des progressiven Myopiecharacters, resp. auf die Heilbarkeit des Letzteren durch die Beseitigung des Ersteren aufmerksam zu machen. Hätten unsere Deductionen nicht einen rein practischen Zweck, so würde sich auch — was wir für diesmal ablehnen — die Pflicht aufdrängen, auf die eigentliche Pathogenese des Muskelleidens, resp. auf das Causalitätsverhältniss einzugehen, welches zwischem diesem und der progressiven Myopie besteht. Die interessanten Aufschlüsse, welche Donders hierüber gegeben hat, sind allgemein bekannt. Im Uebrigen müssen wir der musculären Prädisposition, für welche, ganz unabhängig vom Refractionszustande, der hereditäre Einfluss nachweisbar ist, einen sehr breiten Spielraum zuerkennen; sonst



wäre es unverständlich, dass bei geringen Graden von Myopie, bei welchen die Formveränderung des Bulbus kaum irgend einen Einfluss auf die Beweglichkeitsverhältnisse und auf die Lage der Sehlinien beziehungsweise zu den Hornhautaxen ausüben kann, doch oft eine ausgeprägte Störung des lateralen Gleichgewichts existirt, während dieselbe bei hohen Myopiegraden gänzlich fehlen kann. Auch sah ich in Familien, in denen nicht alle Mitglieder myopisch waren, zuweilen das Muskelleiden selbst auf diejenigen vererbt, welche mit einem ganz normalen Brechzustand begabt waren. Nur in der Kürze wollte ich hierauf hindeuten, da sich eben an die Abhängigkeit der Gleichgewichtsstörung von dem Refractionsleiden Einwürfe gegen die operative Beseitigung der ersteren geknüpft haben. Man hat wohl so argumentirt, dass, da nicht das Muskelleiden die Fortschritte der Myopie, sondern vielmehr die Fortschritte der Myopie das Muskelleiden herbeiführten, auch die Operation sich statt an die Ursachen der Schädlichkeiten, vielmehr in unnützer Weise an die Wirkungen wende.

Sehen wir die Sache etwas genauer an, so dürfen wir allerdings nicht abläugnen, dass ein sehr rascher Fortschritt der Kurzsichtigkeit und ein hieraus hervorgehendes jähes Wachsthum des Convergenzbedürfnisses die Anforderungen an die inneren Graden rasch steigern und zur Insufficienz derselben disponiren kann. Allein einmal ist das Eintreten dynamischen Auswärtsschielens, so lange die Myopie keinen excessiven Grad erreicht, keine Nothwendigkeit; es können vielmehr sehr wohl, wie es ja andere Fälle beweisen, die inneren Graden in entsprechender Weise an Energie zunehmen, um auch den vermehrten Anforderungen zu genügen. Sodann wäre, selbst wenn die Gleichgewichtsstörung unter den gewöhnlichen Verhältnissen der Musculatur nothwendig aus den Convergenzanforderungen hervorginge, doch sehr wohl eine Aufhebung jener Succession unter künstlicher Abänderung der musculären Verhältnisse denkbar. Endlich aber ist der ganze Schluss der vorgetragenen Argumentation unberechtigt, indem so mancher Consecutivzustand



wieder zu einer Schädlichkeitsursache wird, welche eine Rückwirkung auf die ursprüngliche Ursache ausübt. Unser therapeutisches Handeln befindet sich oft genug in der Lage, der primitiven Ursache nicht direct beikommen zu können, wohl aber durch die Beseitigung schädlich wirkender Folgen die Kette nachtheiliger Einflüsse und Rückwirkungen zu lösen und somit auch jene Ursache indirect zu entkräften. Denken wir — die Analogie liegt nahe — an den durch Hyperopie hervorgerufenen Strabismus convergens. Obwohl wir der Grundursache, nämlich dem Refractionsleiden, nicht beikommen können, so zögert doch die Heilkunst keinen Augenblick, diese Strabismusform zu beseitigen, denn einmal braucht ja Hyperopie nicht Strabismus hervorzurufen, sodann tritt selbst da, wo letzterer sich entwickelte, dieselbe Wirkung doch nicht wieder ein, wenn wir (durch Rücklagerung) andere Mittelglieder in die musculären Verhältnisse einführen, endlich ist die Deviation etwas Nachtheiliges, an sich die Integrität der Functionen Gefährdendes.

Halten wir also in der Hauptsache fest: a) dass die Abhängigkeit des dynamischen Auswärtsschielens von progressiver Myopie nur eine bedingte ist, b) dass die Bedingungen der Abhängigkeit durch Eingriffe in die Musculatur zu modificiren sind, c) dass die Beseitigung deshalb eine wesentlich zweckmässige ist, weil die Gleichgewichtstörung, sei sie inducirt oder für sich bestehend, jedenfalls wieder eine schädliche Rückwirkung auf die Myopie ausübt.

#### V.

Die hauptsächlichsten Bedenken gegen die Operation sind indessen nicht aus den pathogenetischen Betrachtungen, sondern aus der Berücksichtigung des vorwaltend relativen Characters des dynamischen Auswärtsschielens entsprungen. Je hochgradiger die Myopie — hat man argumentirt — desto grösser werden auch die Adductionsansprüche, und scheint es bei einer Myopie  $\frac{1}{4}$  oder  $\frac{1}{3}$  unbillig zu verlangen, dass die Muskeln sowohl in den enormen, durch den Brechzustand bedingten Annäherungen, als in unendlicher Entfernung den



Gleichgewichtsvertrag einhalten. Wenn vielmehr in solchen Fällen für die Entfernung laterales Gleichgewicht, für die Distanz des Arbeitens dynamische Divergenz vorhanden ist, so scheint dies vollkommen natürlich und nicht begreiflich, dass ein Eingriff in die Musculatur dem Uebelstande für die Nähe abhelfen sollte, ohne einen entgegengesetzten für die Entfernung herbeizuführen. Und verhält sich auch — so folgert man weiter — die Sache nicht immer grade in dieser Weise, sondern treten in der Nähe stärkere Deviationen auf, als sie den gewissermaassen natürlichen Insufficienzen entsprechen, und lassen sich wirklich in der Entfernung Anwandlungen von Gleichgewichtsstörung nachweisen, so ist doch das Missverhältniss zwischen der Störung in der Nähe und in der Entfernung zu erheblich, um für die überwiegende Mehrzahl der Fälle wirksam abhelfen zu können. — Nach dieser Auffassungsweise wäre die Operation eben auf diejenigen Fälle zu beschränken, in denen auch für die Entfernung eine auffällige Gleichgewichtsstörung zu Gunsten der Externi vorliegt.

Es lässt sich, um auf diese Argumentation näher einzugehen, zunächst nicht verkennen, dass eine gewisse Summe von Fällen existirt, welche im engsten Sinne des Wortes die Bezeichnung eines relativen dynamischen Auswärtsschiellens verdienen: In der Entfernung vollkommenstes Gleichgewicht, Unmöglichkeit absolute Divergenzen einzuleiten (mit Ausschluss des geringen Grades, von höchstens Prism.  $4^0$ , welchen wir auch dem gesunden Auge zuerkennen müssen), Gleichgewicht auch für die mittleren Distanzen und erst bei den abnormen, durch die Myopie geforderten Annäherungen, oder in Nachbarschaft derselben, dynamische Divergenzen. Für ein emmetropisches Auge würden hier die Muskeln als völlig gesund gelten. — Diese Fälle sind selbstverständlich von der Operation ausgeschlossen, für welche die erste Bedingung, wie ich es bei früherer Gelegenheit entwickelt habe, in der willkührlichen Abductionsfähigkeit für die Entfernung liegt.

Allein man täuscht sich wesentlich, wenn man annimmt,



solche Bedingungen bilden die Regel. Obwohl sich die Fälle von dynamischem Auswärtsschielen je nach dem Myopiegrade und dem Zustande der Augenmuskeln äusserst variabel verhalten, so ist doch bei dem Gros derselben zunächst auffällig, dass die dynamischen Ablenkungen für geringe Objectabstände einen weit höheren Grad erreichen, als er gewissermaassen dem Principe jener streng relativen Insufficienz entspricht; ferner pflanzen sich jene Deviationen auch auf grössere Abstände fort; endlich aber — und dies ist der capitale Punkt für die Zulässigkeit der Operation — zeigt sich für die Entfernung eine abnorme Fähigkeit zum Abduciren von Prism.  $8^{\circ}$ ,  $10^{\circ}$ ,  $12^{\circ}$ ,  $16^{\circ}$  u. mehr. Eine auffällige Wahrnehmung hierbei ist, dass der einfache Gleichgewichtsversuch (mit dem vertical brechenden Prisma) für die Entfernung nicht immer, ja selbst nur in der Minderzahl der Fälle, eine nennenswerthe Lateraldeviation ergiebt, während es doch sonst in der regelmässigen Functionirung der Augen liegt, mit dem Sehen in die Ferne den äusserst möglichen Erschlaffungszustand der Interni, oder wenigstens nahezu denselben, zu verbinden. Es dürfte dieses wohl dadurch zu erklären sein, dass überhaupt absolute Divergenzen während des Sehactes solcher Patienten — wir setzen bis jetzt immer ein streng dynamisches Schielen, ohne Exclusion, voraus — nicht verwerthet werden, und deshalb, so sehr sie dem Muskelbestreben an sich conform wären (wie es die Abductionsfähigkeit lehrt), doch ungeläufig sind, vielleicht weil sich ein Complex ungewohnter Empfindungen daran knüpft. Es muss der Patient gewissermaassen erst durch positive Vortheile im Sehact, wie es bei der Fusion von Doppelbildern geschieht, auf das Bestehen seiner Abductionsfähigkeit aufmerksam gemacht werden, um sie zu benutzen. Hat man diese Abductionsversuche oft genug wiederholt oder besser noch dem Patienten einige Zeit hindurch, wie ich es zuweilen vor der Operation thue, abducirende prismatische Brillen tragen lassen, so tritt dann auch meist beim einfachen Gleich-



gewichtsversuch die anfänglich fehlende Lateraldeviation hervor. Eine weitere für die Praxis nicht unwichtige Wahrnehmung, welche sich hieran knüpft, ist die, dass bei Unterhaltung der absoluten Divergenzen die Abductionsfähigkeit sich noch erheblich (und weit mehr, als etwa am gesunden Auge) vermehrt. Ich fand nicht selten nach zweitägigem Tragen abducirender Gläser ein Grenzprisma von  $10^0$  statt  $6^0$ , von  $15^0$  statt  $10^0$  u. s. w.

Aus alle dem geht zur Genüge hervor, dass es sich hier bereits um eine wirkliche Gleichgewichtsstörung durch die ganze Sehstrecke handelt. Wenn dieselbe auch für die Entfernung einen viel geringeren Grad oder einen quasi verkappten Charakter hat, so giebt uns jedenfalls die vorhandene Abductionsfähigkeit, wie dies früher erörtert worden ist, volle Indicationen zum Operiren. Denn wenn wir den Patienten, bei richtiger Benutzung dieses Maasses, durch die Operation in die Lage setzen, unter grösstmöglicher Anspannung seiner Externi in die Ferne zu sehen, so ist dies kein Uebelstand, indem es bei dem unterbrochenen Charakter des Fernsehens überhaupt auf Muskelanstrengung nicht wesentlich ankommt und es selbst im Princip eines physiologischen Sehacts liegt, für die Entfernung die Interni auf ihr Maximum zu erschaffen. Wenn wir andererseits bei demselben Patienten die dynamischen Ablenkungen für die Arbeit um einen Werth von Prisma  $10^0$ ,  $14^0$ ,  $16^0$  verringern, so ist hiermit ein ganz eminenter Vorthail erreicht und es wird nun fast immer eine gute Correction durch abducirende Prismen oder prismatisch concave Gläser möglich. — Im Uebrigen hat man ja auch die Frage angeregt, ob es in solchen Fällen nicht erlaubt sei, für die Entfernung eine leichte reale Convergenz einzuführen, die sich durch abducirende Prismen gut corrigiren liesse, um den Vorthail für die Nähe noch zu vergrössern. Ich möchte dies aber heute womöglich noch strenger als früher widerrathen, da sich die Störung der ungewohnten gleichnamigen Diplopie sehr schwer berechnen lässt und das adducirende Prisma, welches unter



solchen Umständen für die Medianlinie corrigirt, jedenfalls einen guten Theil lateraler Diplopie übrig lässt.

Ausser diesem Gros der Fälle, in welchem zwar die Gleichgewichtsstörung bereits durch die ganze Sehstrecke verbreitet ist, aber immer noch der relative Character, d. h. die Zunahme mit der Annäherung prädominirt, begegnen wir in einem geringeren Bruchtheil des dynamischen Auswärtsschielens \*) solchen, bei welchen auch für die Entfernung bereits eine grobe Gleichgewichtsstörung sich ausspricht, welche dann für die Nähe successive zunimmt. Hier sind die Indicationen der Operation, deren Maas immer wieder in der facultativen Divergenz liegt, weniger controvers.

So sehr der relative Character des dynamischen Auswärtsschielens zu einer achtsamen Dosirung des Effectes auffordert, so liegt doch in demselben keine rationelle Contraindication, sofern anders eine ausreichende Abductionsfähigkeit (von wenigstens Prism. 8°, bei gesenkter Blickebene) zugegen ist. Ueber die Abmessung des Operationseffectes habe ich bereits früher Normen aufgestellt und werde noch einige Winke im Verlaufe dieser Blätter hinzufügen. Nirgends ist übrigens die Aufgabe in einer vollkommneren Weise gelöst, als grade für das dynamische Auswärtsschielen, wovon sich ein jeder aufmerksame klinische Zuhörer tagtäglich überzeugen kann, wenn es auch noch hier und da von Lehrbuchverfassern in Abrede gestellt wird.

## VI.

Bis jetzt haben wir nur von dem streng dynamischen Auswärtsschielen, d. h. von den Formen gesprochen, in welchen die Deviationen niemals real zu Tage kommen. Bekanntlich stellt sich aber die Sache, namentlich bei hochgradiger Myopie, häufig genug anders dar. Die Patienten schliessen für geringe Objectabstände, vielleicht gerade für

\*) In der Regel ist unter diesen Umständen für geringe Abstände Exclusion des einen Auges eingeleitet, weshalb die Patienten bereits zum grösseren Theil in die Kategorie des relativen realen Auswärtsschielens fallen.



die bei ihrem Refraktionszustande verwerthbaren, das eine Auge aus, lenken es, ganz dem Gleichgewichtszustande der lateralen Muskeln entsprechend, divergirend ab, während sie für mittlere und grössere Abstände binocular fixiren. Unendlich viele Variationen oder richtiger Stadien in diesem partiellen Aufgeben des Binocularsehens können verzeichnet werden, je nachdem die Patienten nur für die Arbeit oder auch sonst, je nachdem sie von Anfang an oder erst nach eingetretener Ermüdung excludiren u. s. w.

Auch der Modus des Exclusionsvorganges stellt sich je nach der Fusionsbreite in sehr verschiedener Weise dar. Wir treffen Patienten, welche, wenn man ihnen ein Object in der Medianlinie successive annähert, dasselbe mit beiden Augen gut verfolgen, bis auf die Nähe von 8", 6", 4"; dann tritt auf einmal eine excursive Ablenkung des einen Auges um  $1\frac{1}{2}''$ ,  $2''$ ,  $2\frac{1}{2}''$  ein, dasselbe scheint an dieser Stelle der Sehstrecke wie durch einen Krampf des Externus nach aussen getrieben. Hier handelt es sich um Individuen mit gut ausgebildeter Fusionsbreite; dynamische Ablenkungen waren schon in grösseren Abständen vorhanden, wurden aber durch wachsende Adductionsanstrengung unterdrückt, bis sie an der betreffenden Grenze ihres Grades wegen nicht mehr zu bemeistern sind und deshalb plötzlich, natürlich in der vollen Grösse, bis zu welcher sie angewachsen sind, real werden \*). In anderen Fällen sehen wir dagegen das eine Auge diesseits eines gewissen, meist auf 6" bis 12" gelegenen Punktes einfach in der Adduction zurückbleiben oder gewissermaassen eine associirte statt der geforderten accommodativen Bewegung machen. Hier war die Fusionsbreite ausserordentlich gering, so dass die Ablenkungen, wo sie irgend eine nennenswerthe Grösse erreichten, sofort real wurden, dann

---

\*) Der Gleichgewichtsversuch mit dem abwärts brechenden Prisma erweist, dass die dynamischen Ablenkungen vollkommen continuirlich wachsen, auch in Nachbarschaft desjenigen Punktes der Sehstrecke, an welchem die excursive Realdeviation plötzlich eingeleitet wird.



natürlich in geringer Excursion und unter weiterem allmählichem Wachsthum. Es giebt auch Patienten, welche für die nächste Nähe excludiren, in mittleren Abständen gemeinschaftlich sehen und in die Entfernung wiederum excludiren. Bei diesen existirt eine ausgesprochene Gleichgewichtsstörung durch die ganze Sehstrecke, auch in der Entfernung, welche zwar mit der Annäherung wächst, aber für mittlere Abstände nicht so rasch wächst, als die auf Grund des schärferen Sehens (wegen der Myopie) hier ausgebildete Fusionsbreite. In der That giebt es Myopische, welche wenig Brillen und Lorgnetten getragen haben, deren Fusionsbreite für die Entfernung, in welcher sie ihr Sehen gewissermaassen vernachlässigt haben, ausserordentlich gering ist.

So interessant die Details der hierbei obwaltenden Umstände erscheinen, so würde uns deren Verfolg doch von unserem Ziele abführen. Wir haben hier des Ausganges in Exclusion gedenken müssen, weil man daraus einen Einwurf gegen die Operation gemacht hat. Mit der Exclusion für die Nähe hört allerdings die, durch Forcirung der dynamischen Ablenkungen für das Auge gesetzte Gefahr auf; es ist dadurch eine natürliche Abhülfe gegeben. Wozu sollten wir uns Mühe geben — hat man gefolgert — diesem Zustande wieder ein, bei hohen Myopiegraden kaum ohne Anstrengung der Interni denkbare Binocularsehen zu substituiren. Von anderer Seite hat man aber auch überhaupt die Möglichkeit einer solchen Zweckerreichung, wenn einmal die Gewohnheit zum Excludiren Platz gegriffen hat, abgeleugnet.

Auf beide Einwürfe müssen wir mit einigen Worten eingehen. Was zunächst den zweiten anbetrifft, so ist er für solche Fälle, in denen eben nur diesseits einer gewissen Grenze die Exclusion eintrat, jenseits jener Grenze aber binocular gesehen wurde, unbedingt zurückzuweisen. Die Position jener Grenze in der Sehstrecke ist durchaus Product des musculären Verhältnisses; die Gewohnheit des Excludirens knüpft sich nicht an die eine oder andere Beschäftigung an sich, sondern lediglich an die für diese Beschäftigung erfor-



derliche Muskelspannung. Kann das binoculare Lesen nach der Operation mit demselben Kraftaufwand durchgesetzt werden, mit welchem früher für mittlere Entfernung binocular gesehen ward, so kann man auch versichert sein, dass Patient dasselbe wieder annimmt. Da die Fusionsbreiten im Allgemeinen mit der auf die Verwerthung der Gesichtseindrücke gerichteten Aufmerksamkeit steigen, so kann man sogar annehmen, dass Patient für das Lesen die Grenze des Binocularsehens noch näher heranziehen wird, als es nach den Eingriffen in die Musculatur zu erwarten stand. Nur wo durchgängig durch die ganze Sehstrecke excludirt ward, oder allenfalls da, wo zwar auf weitere Abstände noch gemeinschaftlich gesehen ward, aber die Fusionsbreiten sehr dürftig und wenig ausbildungsfähig sind, wird die Gewohnheit für die Nähe zu excludiren nicht mehr zu bemeistern sein.

Besonders einleuchtend scheint a priori der erstere der beiden Einwürfe, welcher die Vortheile des Excludirens vergleichsweise zu dem forcirten Binocularsehen hervorhebt. Wir müssen es nach allem, was wir (sub III) ausgeführt haben, natürlich einräumen, dass die Exclusion bei der Arbeit die Bedingungen hinsichtlich der Myopiefortschritte verbessert. Aber einen tadellosen Ausweg der Natur können wir in diesem Verzicht auf das Binocularsehen nicht erblicken. Es ist keinem Zweifel unterworfen — und der Verfolg der hier in Rede stehenden Fälle entscheidet in demselben Sinne — dass das exclusive Sehen mit einem Auge durchschnittlich angreifender ist, mehr zu Ermüdung und zu Congestionen disponirt, als ein unter leidlich günstigen Nebenbedingungen vor sich gehendes Binocularsehen; es ist demnach auch wahrscheinlich, dass es die Fortschritte der Myopie mehr fördert als dieses. Kann man deshalb statt des Ausganges in einseitige Exclusion Binocularsehen ohne forcirte Convergencebewegungen erhalten, so scheint dies unbedingt vorthafter. Nur bei den exceptionellen Myopiegraden  $> \frac{1}{3}$  müssen wir einräumen, dass ein solches Resultat nicht zu erwarten und deshalb das einseitige Sehen bei der



Arbeit gewissermaassen als das Natürlichste zu betrachten ist. Bei Myopie  $> \frac{1}{4}$  mag ein gleiches Zugeständniss gelten, wenn die Verhältnisse in der Musculatur besonders ungünstig sind. Für geringere Grade von M. gelingt es dagegen in der Regel, jenes bessere Resultat zu erzielen, vorausgesetzt, dass man die optischen Hilfsmittel prismatischer und concav-prismatischer Gläser\*) mit zu Hülfe zieht.

Es ist aber noch ein anderer Umstand, welcher hier erwähnt werden muss. Die Patienten, welche in der Distanz des Lesens excludiren, befinden sich für etwas grössere Entfernungen, zuweilen schon beim Schreiben, in der Regel aber bei den Zimmerbeschäftigungen, ganz unter den Bedingungen des dynamischen Auswärtsschielens. Namentlich trifft dies diejenigen mit entwickelter Fusionsbreite, über deren Exclusionsmodus wir oben (pag. 241) gesprochen haben. Ist nun auch die Frage der Muskelanstrengung für die einzelnen Beschäftigungen ihrer flüchtigen Dauer wegen meist wenig gewichtig, so ist es doch gewiss nichts Gleichgültiges, dass die Patienten fast permanent und für alle Sehstrecken, welche sie bei ihrem Refraktionszustande noch leidlich verwerthen, Adductionsanstrengungen machen. Hierauf ist es auch zu schieben, dass sie über anhaltende Beschwerden bei jedweder Fixation klagen. Greift man nun solche Fälle, falls die betreffende Abductionsfähigkeit für die Entfernung vorliegt, durch die Operation kunstgerecht an, so wird man zunächst

---

\*) Es wird sich nach den allgemein hin bei progressiver Myopie geltenden Grundsätzen immer nur um schwache Concavitäten handeln dürfen, welche die Sehdistanz um einen oder wenige Zoll erweitern. Es ist indess bereits früher darauf aufmerksam gemacht worden, dass hier die Gefahren der negativen Gläser bei der Arbeit weniger in die Wagschale fallen, als bei einfacher Myopie theils wegen der Lage der relativen Accommodationsbreiten, an welche sich eine geringere Verwendung der disponiblen A. schliesst, theils wegen des Muskelleidens selbst, welches an sich von einer unnützen Annäherung abhält.



die Nachtheile des dynamischen Auswärtsschielens für mittlere Entfernungen beseitigen, resp. günstig influenciren. Die Patienten werden bei ihrem Binocularsehen eine viel grössere Leichtigkeit, ein grösseres Behagen verspüren und hierbei von schmerzhaften Empfindungen befreit sein. Ferner aber wird der Punkt in der Sehstrecke, diesseits welches excludirt wird, näher herandrücken, vielleicht so nahe, dass nun auch bei der Arbeit das Binocularsehen mit Benutzung der erlaubten optischen Hülfsmittel zu verwerthen ist. Steht dies nicht in Aussicht, so ist zweierlei möglich; entweder Patient fährt fort, bei der Arbeit zu excludiren, oder er fixirt binocular, jedoch mit unerlaubten Adductionsanstrengungen. Im ersteren Falle werden wir ihm allerdings für die Arbeit durch die Operation keinen Vortheil verschafft haben, sind aber durch das leichtere und gewiss hinsichtlich der Myopiefortschritte vortheilhaftere Sehen in mittlere Distanzen für die Operation hinlänglich belohnt. Im zweiten Falle aber bedarf es nur einer, auf der einen Seite etwas gebläuten oder matten Brille um die Nachtheile forcirter Adductionsbewegungen für die Arbeit zu annulliren, ohne die eben erwähnten Vorthteile zu verlieren.

Ueberblicke ich die Fälle einseitiger Exclusion bei der Arbeit, so kann ich höchstens zugeben, dass die Operation hinsichtlich der Myopiefortschritte weniger dringlich ist, als da, wo die Patienten bis in die nächste Nähe unter bedeutender Forcierung ihrer Interni binocular fixiren; indicirt aber bleibt sie meines Erachtens, wenn es sich nicht etwa um excessive Grade von M. ( $> \frac{1}{3}$ ) oder um sehr hohe Grade ( $> \frac{1}{4}$ ) bei ungünstigen Fusionsverhältnissen handelt. Auf diesen letzteren Punkt komme ich in den folgenden Abschnitten noch zurück.

## VII.

Vielleicht hätten sich die Indicationen der Operation rascher allgemeine Geltung verschafft, wenn man die betreffenden Krankheitszustände unter recht übereinstimmenden



Gesichtspunkten untersucht, sich gegen Fehlerquellen hierbei streng geschützt, die directen Operationserfolge mit Rücksicht auf den Endesausgang gehörig gewürdigt und bei Graduirung derselben alle Cautelen beobachtet hätte, welche gegen excessive Wirkungen sicher stellen. Es sei mir erlaubt, diese verschiedenen Punkte mit Beziehung auf meine früheren Rathschläge hier noch einmal durchzugehen. Ich beginne mit der Untersuchungsmethode.

Viele Fachgenossen fühlen sich immer noch versucht, die Diagnose des dynamischen Auswärtsschielens vorwaltend auf die Lage des binocularen Punctum proximum zu gründen. Wenn sie bei der successiven Annäherung eines Objectes in der Medianlinie constatiren, dass Patient bis auf die gebührende Nähe von  $2\frac{1}{2}$ " mit beiden Augen gut fixirt, so sind sie geneigt, ihren Verdacht niederzuschlagen. Auf dieser Basis würde ein grosser Theil der betreffenden Patienten, und grade der für die Therapie allerdankbarste, der Erkenntniss entgehen. Bei den jugendlichen Myopen, deren Brechzustand sich in kurzer Zeit rapide steigert, und zwar meines Erachtens durch Einfluss ausgeprägten dynamischen Auswärtsschielens, findet sich häufig eine völlig befriedigende Lage des binoculären Punctum proximum auf  $2\frac{1}{2}$ " und darunter. Schon bei normalen Augen ist jener Abstand sehr variabel, sodann knüpft sich, bei den ohnehin geringen Distanzen, an Differenzen von  $\frac{1}{4}$ " bereits ein namhafter Ausschlag; endlich aber — und hierin liegt ein fundamentaler Einwurf — steht die Lage des binocularen Punctum proximum in einem ganz indirecten Zusammenhange mit der Gleichgewichtsfrage. Sie resultirt zugleich aus der Fusionsbreite, und grade, wo diese vortrefflich ist und demnach das Punctum proximum verhältnissmässig gut liegt, fallen die Gefahren des dynamischen Auswärtsschielens am meisten ins Gewicht.

Wir können aus dem Punctum proximum nur allenfalls entnehmen, ob sich ein reales relatives Auswärtsschielen eingefunden hat; unserer Frage aber müssen wir direct durch



Prüfung des lateralen Gleichgewichts beikommen. Bekanntlich kann dieses durch Verdecken eines Auges ausgeführt werden, indem wir die Rotation, die das verdeckte Auge bei seinem Ausschluss vom Fixirobject macht, resp. die Einrichtungs-drehung constatiren, durch welche es wieder in die Fixation zurückkehrt, wenn wir es auf's Neue frei geben. Da wir indessen hierbei von der Blickruhe des Patienten abhängig sind und auch die kleinen Drehungen sich schwer taxiren und gar nicht messen lassen, so wird diese Prüfung nur zur Unterlage zu benutzen und sofort durch den cardinalem Versuch mit dem vertical brechenden Prisma zu ersetzen sein. Der Sinn dieses letzteren ist bekannt. Das vertical brechende Prisma löst, indem es unfehlbar Diplopie einleitet, jedwede Fusionsanstrengung auf und documentirt durch die gekreuzte Position der Doppelbilder eine vorhandene dynamische Divergenz, die sich dann auch leicht durch den horizontalen Abstand der Bilder, resp. durch Ermittlung eines diesen corrigirenden Prismas messen lässt. Diese Ermittlung und Messung muss natürlich zunächst in der Distanz der Arbeit geschehen, um zu erforschen, ob während derselben Adductionsanstrengungen stattfinden. Für die Form des Versuches, den wir schlechtweg den Gleichgewichtsversuch nennen wollen, ist der mit einem Punkt versehene verticale Strich ziemlich allgemein angenommen worden.

So vortrefflich dieser Versuch im Principe ist, so können doch aus demselben, wenn gewisse Nebenumstände unberücksichtigt bleiben, sehr grobe Fehlschlüsse entspringen. Schon früher hatte ich darauf aufmerksam gemacht, dass die Linie sehr fein, der Punkt verhältnissmässig stark sein müsse, widrigenfalls dieser nicht gehörig in der Aufmerksamkeit dominirt und Fusionsanstrengungen für die Doppelbilder der Linie (in der Absicht, dieselben in eine verticale Flucht zu bringen) eintreten. So wie hiervon auch nur Anwandlungen vorhanden sind, fällt natürlich das ganze Princip des Versuches, er ergiebt ebenfalls das Product gewisser Fusionsanstrengungen und nicht die Lage des dynamischen Gleich-



gewichts. Man kann übrigens sofort erkennen, ob der Versuch nach dieser Richtung correct ist. In diesem Falle wird bei jeder, auch der geringsten Neigung des Prismas (Drehung desselben um die Sehlinie) sofort eine entsprechende Veränderung des horizontalen Abstandes der Doppelbilder stattfinden. Wurde beispielsweise bei verticaler Haltung des Prismas eine Linie mit zwei übereinander liegenden Punkten (Lateralabstand = 0) gesehen, so wird, sowie man die Basis des Prismas etwas schläfenwärts wendet, sofort gekreuzte Diplopie, so wie man sie im mindesten nasenwärts dreht, gleichnamige Diplopie entstehen. Sind dagegen noch Fusionsanstrengungen thätig, so wird, nachdem bei einer gewissen Haltung des Prismas das Doppelbild der Linie in eine verticale Flucht fiel, also eine Linie mit zwei Punkten gesehen ward, eine Neigung des Prismas temporalwärts und nasalwärts bis zu einer gewissen Grenze keinen anderen Effect haben, als den verticalen Abstand der beiden auf der Linie liegenden Punkte zu verkleinern, ohne ein Doppelbild der gesammten Figur zu liefern. Sowie nicht jedwede Neigung des Prismas den Lateralabstand der beiden Punkte ändert, sowie namentlich in einem gewissen Bezirke der Prismaneigung und nicht blos in einer ganz bestimmten Stellung, **eine** Linie mit zwei Punkten gesehen wird, darf aus dem Versuch nichts gefolgert werden.

Man nehme dann zunächst ein andere Figur, in welcher die Linie noch weit feiner, der Punkt gröber ist, und mache den Patienten darauf aufmerksam, nur auf den Punkt zu achten. Wird auch hierbei der Zweck, jedwede Fusionstendenz für das Bild der Linie zu vernichten, nicht erreicht, so nehme man eine Figur, in der die verticale Linie sehr kurz ist, so dass sich bei einem genügend starken vertical brechenden Prisma deren Doppelbilder der Höhe nach nicht mehr erreichen; oder man nehme einen einfachen Punkt. Die Linie ist ja ohnedem nur dazu bestimmt, den Lateralabstand der Punkte sofort richtig wahrzunehmen, resp. zu taxiren. Im-



merhin kann ein jeder Patient auch für die Doppelbilder eines einfachen, nicht mit einer Linie durchsetzten Punktes angeben, ob sie grade oder schräg übereinander liegen, und, da zu einer genauen Messung des Lateralabstandes doch ein Correctionsprisma ermittelt werden muss, so ist der Versuch auch noch in dieser reducirten Form (des einfachen Punktes) völlig brauchbar.

Endlich kommen ganz vereinzelte Patienten vor, deren Aufmerksamkeit von der blossen Vorstellung verticaler Contouren so erfüllt ist, dass sie selbst für die Doppelbilder eines einfachen Punktes eine senkrechte Flucht herzustellen suchen und zu diesem Zweck Fusionsanstrengungen — wenn man es noch so nennen darf — einleiten. Man erkennt es wieder dadurch, dass in einem gewissen Drehungsbezirke die Doppelbilder fortfahren, gerade übereinander zu liegen. Hier hat man sich zunächst dadurch zu helfen, dass man den Punkt selbst äusserst fein nimmt, im Nothfall aber demselben einen kurzen schrägen Strich substituirt und das Blatt, auf welchem dieser Strich verzeichnet ist, während des Versuches dreht. Alsdann verschwinden, aus Gründen, die der Leser sich wohl selbst entwickeln kann, die erwähnten Fusionsanstrengungen, resp. es erlöschen die sie anfachenden Vorstellungen. Im Allgemeinen fördert es auch, den ganzen Versuch rasch anzustellen, da sich die aus der Vorstellung hervorgehenden Fusionsanstrengungen nicht augenblicklich einstellen. — Ich wiederhole indessen, dass die letzteren Schwierigkeiten sich äusserst selten geltend machen, und wird man mit dem Gleichgewichtsversuch durchschnittlich sehr gut zu Stande kommen, wenn man in der ursprünglichen Form dessen Correctheit durch minimale Drehungen des Prismas (von der Position aus, in welcher die Linie einfach erscheint) prüft und nöthigenfalls die kürzere Linie oder den einfachen Punkt\*) substituirt.

---

\*) Es könnte wohl auch zweckmässig erscheinen, diese letztere Form des Versuches als die durchgängig correctere von Anfang an zu benutzen, allein es ist am leichtesten für die Patienten, Lateral-



Nachdem in dieser Weise und mit diesen Cautelen die Gleichgewichtsstörung in der Distanz des Arbeitens ermittelt und (durch ein laterales Correctionsprisma) gemessen ist, wird man zunächst gut thun, dasselbe für etwas grössere Entfernungen zu wiederholen, um sich sofort eine ungefähre Einsicht in das Verhalten der Gleichgewichtsstörung längs der Sehstrecke zu verschaffen. Endlich stellt man denselben Versuch in der Entfernung an, für welche ganz zweckmässigerweise der punktirten Linie ein brennendes Licht — auch hier ist die Aufmerksamkeit vorwaltend durch die Flamme gefesselt, wie dort durch den Punkt — substituirt wird. Ein excessives Gewicht hinsichtlich der Operationsfrage ist indessen auf die Ergebnisse dieser letzteren Versuche nicht zu legen, denn es kann, worauf bereits in Abschnitt V hingewiesen worden ist, für die Entfernung jedwede Spur von dynamischer Divergenz fehlen, selbst eine gewisse dynamische Convergenz vorhanden sein, ohne dass dadurch die Operation ihre Zulässigkeit verliert.

Den zweiten integrirenden Theil der Untersuchung bildet vielmehr die Bestimmung der Abductionsfähigkeit für die Entfernung. Wenn die Gleichgewichtsstörung in der Nähe eine operative Abhülfe wünschenswerth macht, so wird diese letztere durch eine ausreichend excursive Abductionsfähigkeit für die Entfernung (facultative Divergenz) sanctionirt. Um das wirkliche Grenzprisma zu finden, welches für die Entfernung durch willkürliche Divergenz überwunden wird, müssen folgende Regeln befolgt werden:

1) muss man von geringen Objectabständen anfangen. Es ist ja ein für die Bestimmung der Fusionsbreite durchgängig gültiges Prinzip, dass man nicht vom Terrain des Doppelsehens, sondern von dem des Einfachsehens beginnt und so die Anforderungen successive steigert. Ich fange gewöhnlich damit an, dem Patienten ein starkes, etwa 18gra-

abstände anzugeben und zu taxiren, wenn eine Linie die verticale Flucht bezeichnet und am allerleichtesten, wenn die Doppelbilder dieser (langen) Linie noch theilweise neben einander stehen.



diges Prisma aufzusetzen und entferne dann die Kerze allmählig so weit, bis gleichnamige Doppelbilder aus einander weichen. Die Distanz, in der dies geschieht, giebt schon einen ungefähren Anhaltspunkt betreffs des Abductionsvermögens; geschieht es in 5', so wird man den Versuch mit einem 16gradigen, geschieht es in 3', mit einem 14gradigen Prisma wiederholen u. s. w., immer aber muss man ganz allmählig mit dem Object von der Nähe in grössere Entfernung übergehen, widrigenfalls man zu geringe Grenzprismen erhält;

2) zeigt sich die Abductionsfähigkeit verhältnissmässig zu der in geringen Distanzen stattfindenden Gleichgewichtsstörung sehr gering, resp. unter dem für die Operation als minimum einzuhaltenden Werthe ( $8^{\circ}$ ), so thut man gut, dem Patienten zunächst das Prisma, welches er überwindet (besser zwei, deren Summe jenem äquivalent), in Brillenform tragen zu lassen und nach einiger Zeit wieder zu untersuchen. Sehr häufig findet man bereits nach einigen Stunden die Abductionsfähigkeit um Prisma  $2^{\circ}$  bis  $3^{\circ}$ , nach einigen Tagen um Prisma  $4^{\circ}$  bis  $5^{\circ}$  stärker und gelangt nun zu einer willkürlichen Divergenz, welche die Operation im Gegensatz zu der ursprünglich gefundenen durchaus indicirt. Es ist diese Erscheinung, welche offenbar auf dem Mangel an Uebung, absolute Divergenzen einzuleiten, beruht, bereits oben (s. pag. 238) gedacht worden;

3) hat man, so wie sich bei der allmählichen Entfernung des Objectes zuerst Doppelbilder zeigen, auf ein strictes horizontales Niveau derselben zu achten. Ist dieses nur ein approximatives, so ist es zunächst durch eine, gewöhnlich minimale, Neigung des Prismas zu vervollkommen, und Patient überwindet dann oft nicht allein das in Gebrauch gezogene Prisma bis in die Entfernung, sondern noch ein weit stärkeres. — Einmal kann es sich ereignen, dass der Untersucher bei der Haltung des Prismas von der streng horizontalen Lage um ein Geringes abweicht und dadurch Höhenunterschiede künstlich erzeugt, welche die Fusion erschweren, sodann aber gesellt sich gar nicht selten bei den betreffenden



Patienten zu der Störung des lateralen Gleichgewichts eine geringe Störung des Höhengleichgewichts hinzu, mit deren Correction erst die Abductionsfähigkeit ihren vollen Werth erlangt. Auf letzteren Umstand, der nicht selten überhaupt eine die Therapie erschwerende Verringerung der Fusionsbreite bedingt, komme ich später noch zurück. So wird z. B. als Grenzprisma ein Prisma von  $8^{\circ}$  ermittelt, aber es zeigt sich, dass da, wo zuerst die gleichnamigen Doppelbilder auftauchten, sofort ein Höhenunterschied, entsprechend Prisma  $\frac{1}{2}^{\circ}$ , zugegen war, der wohl für sich durch verticale Fusionsanstrengung überwunden worden wäre, aber inclusive der bereits angewachsenen Abductionsanstrengungen zu hohe Anforderungen setzt. Corrigirt man denselben durch eine minimale Drehung des Prismas, so gelangt man nun zu einem Abductionsprisma  $12^{\circ}$  oder mehr. Und immer wieder muss, so wie die Doppelbilder von einander weichen, dieselbe Frage an den Patienten gerichtet werden, ob ein vollständiges horizontales Niveau obwalte. Ist sich der Patient hierüber selbst nicht ganz klar, so mache man dicht hinter dem vorläufigen Nullpunkt der Diplopie kleine probatorische Drehungen und sehe zu, ob jener Nullpunkt nicht weiter heranrückt, resp. ob nicht noch stärkere Prismen überwunden werden.

Ebenso wie häufig aus Mangel an Umsicht zu kleine Grenzprismen für die facultative Divergenz gefunden werden, so kommen auch zuweilen Irrthümer nach der anderen Richtung hin vor. Hierfür dürfte hauptsächlich Folgendes zu bemerken sein:

1) muss man sich ja davor hüten, dass Patient nicht unter dem Prisma excludirt. Von den Practicanten in der Klinik, die auf Grund dieses Fehlers zu übertrieben starken Prismen gelangen, höre ich dann häufig die Motivirung, dass, da bei der geringsten Neigung des präsumirten Grenzprismas sofort Doppelbilder hervorgetreten seien, und ausserdem das nächst stärkere Prisma constant gleichnamige Diplopie erzeugt habe, die Unterdrückung des einen Bildes füglich nicht annehmbar gewesen sei. Diese Gründe sind aber unzureichend,



denn bei Patienten, die sich gewöhnt haben, periodisch zu excludiren, wie es ja hier häufig der Fall ist, tritt a) oft genug dieser Vorgang für Bilder ein, die in demselben Niveau liegen, während er mit Einleitung des geringsten Höhenunterschiedes aufhört; b) wird aus Gewohnheitsrücksichten grade für gewisse Excentricitäten des einen Bildes excludirt und nicht über dieselben hinaus.

Man soll sich, da ein Missgriff in dieser Beziehung ein völlig unrichtiges Operationsresultat verschulden würde, bei Wahrscheinlichkeitsgründen nicht beruhigen, sondern muss absolut sicher sein, dass wirklich das vorgehaltene Prisma durch adäquate Divergenz der Sehlinien überwunden wird. Und diese Ueberzeugung kann man sich leicht verschaffen, indem man bei vorgehaltenem Grenzprisma successive beide Augen schliessen lässt. Befand sich das mit dem Prisma bewaffnete Auge in der der Refrationswirkung entsprechenden Abduction und das unbewaffnete in directer Fixation, so wird, wenn man das eine oder das andere Auge verdeckt, genau die frühere Stellung beibehalten und nicht die mindeste Rotation zur Einhaltung der Fixation ausgeführt werden. Ward dagegen excludirt, so sind zwei Dinge möglich: entweder das unbewaffnete Auge war in der directen Fixation und das excludirte bewaffnete Auge stand nicht in der der Prismawirkung entsprechenden Abduction; oder das bewaffnete Auge war das sehtüchtigere und hatte deshalb mittelst einer der Prismawirkung entsprechenden Abduction die Fixation übernommen, doch war diese von einer associirten Bewegung (Adduction) des unbewaffneten Auges begleitet gewesen. Im ersteren Falle wird bei Verdecken des unbewaffneten Auges auf dem bewaffneten eine Rotation nach aussen erfolgen, im letzteren wird ein Gleiches (Einrichtungsdrehung aus der früheren Adduction) auf dem unbewaffneten Auge eintreten, wenn das bewaffnete Auge verdeckt wird. — Niemals darf man meines Erachtens diese Probe als Sicherstellung gegen Exclusion unterlassen. Der Vorschlag, eine etwa vorhandene Exclusion durch gefärbte Gläser aufzudecken,



ist hier nicht am Platze, denn da sich die Fusionsbreiten unter gefärbten Gläsern ganz anders verhalten, als bei freien Augen, so ermitteln wir durch jene nicht das, was wir suchen.

2) Ein zweiter Fehler ist der, dass man das Grenzprisma bei horizontaler und nicht bei gesenkter Blickebene ermittelt. Grade bei den betreffenden Patienten sind die Unterschiede der Gleichgewichtslage nach dem Höhenstande der Blickebene oft sehr ausgeprägt, und dürfen wir als Maass für die Operation nur dasjenige Grenzprisma nehmen, welches bei einer um  $15^{\circ}$  bis  $20^{\circ}$  gesenkten Blickebene überwunden wird. Es kann vorkommen, dass durch diese Regel Fälle von der Operation ausgeschlossen werden, welche, wenn eine Prüfung in der horizontalen Blickebene zu Grunde gelegt ward, durchaus geeignet erschienen. Man findet z. B. bei stark gesenkter Blickebene Grenzprisma nur von  $6^{\circ}$ , bei horizontaler von  $9^{\circ}$  bis  $10^{\circ}$  u. s. w.; wird letzteres Maass benutzt, so bleibt eine der störendsten Formen von Diplopie (nach unten, bei der Arbeit) zurück.

3) Endlich muss man sich überzeugen, dass das betreffende Prisma nicht bloß momentan, sondern auf die Dauer überwunden wird. Es ist zwar die Regel, wie wir schon oben (Abschn. V und Eingang dieses Abschn.) hervorgehoben haben, dass die Abductionsfähigkeit allmählig steigt, aber es kommen auch Patienten mit eigenthümlich energielosen Muskeln vor, bei denen ein betreffendes Prisma einen Augenblick überwunden wird, während nachher in unbesiegbarer Weise die Doppelbilder auseinanderweichen. Zur Sicherstellung reicht es gewöhnlich aus, den Abductionsversuch selbst einige Minuten fortzusetzen. Sind die Fälle aber hinsichtlich der Indicationen intricat, so empfiehlt sich auch nach dieser Richtung — was oben in umgekehrten Motiven vorgeschlagen worden — dem vorübergehenden Versuche das mehrtägige Tragen der Grenzprismen in Brillenform zu substituieren.

#### VIII.

Besondere Rücksichten sind zuweilen noch vor der Operation zu nehmen bei denjenigen Patienten, welche für



die Nähe excludiren. Es kann hier der Defect an Adductions-fähigkeit völlig ergänzt werden durch den Grad der für die Ferne bestehenden Abductionsfähigkeit, viel häufiger aber ist diese Ergänzung defectuös, indem die facultative Divergenz ganz fehlt oder vergleichsweise von geringem Betrage ist; es kann sogar für die Entfernung die binoculare Fixation einer reellen Convergenz gewichen sein. Im ersteren Falle haben wir eine normale Adductionsbreite\*), lediglich mit Verrückung beider Grenzen in gleichem Sinne und Grade, in den beiden letzteren aber Verringerung der Adductionsbreite mit Verrückung der Grenzen in ungleichem Grade, resp. selbst in ungleichem Sinne vor uns. Dass die erstere Kategorie die allergünstigsten Bedingungen für die Therapie darbietet, ist selbstverständlich. Laut Voraussetzung wird hier dasselbe Prisma, welches die Grenze der facultativen Divergenz bezeichnet, auch die Lage des binocularen Punctum proximum ausgleichen, und so gut als dieses Prisma beide Adductionsgrenzen normirt, wird es auch ein, demselben aequivalenter operativer Eingriff thun können. In der zweiten Kategorie dagegen, die unendlich umfangreicher, wird, wenn die Adductionsfähigkeit für die Ferne nur einen geringen Bruchtheil des Adductionsdefectes für die Nähe repräsentirt, auch das durch jene gegebene Operationsmaas die

---

\*) Unter Adductionsbreite verstehen wir den gesammten, für die Sehlinienconvergenz disponiblen Spielraum. Fusionsbreite bedeutet den bei einem bestimmten Accommodationszustande disponiblen Spielraum der Sehlinienconvergenz. Adductionsbreite und Fusionsbreite verhalten sich also ähnlich wie absolute und relative Accommodationsbreite. Fusionsbreite ist die relative Adductionsbreite; hier gewährt der Accommodationszustand die Beziehung, wie bei den Accommodationsbreiten die Sehlinienconvergenz. Nothwendig wird — ganz analog den Accommodationsverhältnissen — eine bedeutende Herabsetzung der Adductionsbreiten Verringerung der Fusionsbreiten zur Folge haben, während andererseits bei guter Adductionsbreite die Fusionsbreiten relativ sehr beschränkt sein können.



Lage des Punctum proximum nur in einer untergeordneten Weise ausbessern können. Fehlt die facultative Divergenz vollkommen und ist demnach die Adductionsbreite um den vollen Ausfall positiver Adductionsfähigkeit, der sich vorfindet, beschränkt, so kann, wie bereits mehrfach bemerkt, überhaupt gar keine Ausbesserung des Punctum proximum stattfinden, die Operation ist contraindicirt; vollends wird dies der Fall sein, wenn für die Ferne bereits Strabismus convergens existirt. Was uns in allen diesen Fällen hinderlich in den Weg tritt, die Operation entweder ausschliesst oder ihre Resultate beeinträchtigt, ist — die Verringerung der Adductionsbreite.

Es fragt sich nun, in wiefern wir den Ursachen dieser Beschränkung beikommen können, um dennoch Terrain für die Operation zu gewinnen. Wenn auch die mit hohen Myopiegraden verbundenen Form- und Motilitätsstörungen der Augen hier wesentlich mitspielen und es beispielsweise ausreichend erklären, wenn ein mit M.  $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$  behafteter Patient diesseits 4" divergirend, für die Ferne convergirend schießt, so erschöpft sich doch hiermit keineswegs die Herleitung des Uebelstandes, was schon daraus erhellt, dass wir oft bei mittleren Myopiegraden eine Verringerung der Adductionsbreite um  $\frac{1}{2}$  und mehr constatiren. Wir finden vielmehr sehr häufig unter den betreffenden Umständen Bedingungen vor, welche den Werth des Binocularsehens schwächen, wie Differenzen der Sehschärfe und des Brechzustandes. Separatübungen des schwächeren Auges, resp. genaue Ausgleichung des Brechzustandes durch Gläser können hier zur Erweiterung der Adductionsbreite Nutzen entfalten. Sodann ereignet es sich auch, dass, wenn einmal für die Distanz des Lesens eine binoculare Fixation unmöglich geworden ist, und demnach hierbei Exclusion Platz gegriffen hat, dass Patient auch für mittlere Entfernung sich zu excludiren gewöhnt, obwohl seine Fusionsbreiten ihm hier noch sehr wohl Fortbestand des Binocularsehens gestatten würden. Die Vortheile des Excludirens — Seitens der Musculatur Befreiung von jedweden



Convergenzanstrengungen, Seitens der Accommodation eine bessere Sehweite — tragen zu dieser Nachgiebigkeit nicht wenig bei. Methodische, auf die positive Adduction gerichtete Uebungen, mit sorgfältiger Vermeidung aller Uebermüdung, bei deren Einrichtung zugleich die Vortheile des Excludirens unfehlbar gemacht werden müssen (besonders adducirende Prismen für die Entfernung und Stereoskop), können hier sehr wohl die unbenutzten Fusionsanstrengungen wieder geläufig machen. Die allerglänzendsten Einflüsse habe ich aber von der Ausgleichung kleiner Höhenunterschiede (deren schon theilweise bei Ermittlung der Adductionsfähigkeit gedacht) gesehen, und bin ich jetzt in allen Fällen auffällig verringerter Adductionsbreite zuerst hierauf bedacht. Folgender Fall, der sich bereits vor etlichen Jahren darbot, aber mich damals besonders frappirte, mag als Beleg dienen:

Fräulein de B. stellte sich vor wegen zunehmender Kurzsichtigkeit und „Unfähigkeit, die Augen für die Arbeit zusammenzubringen“. Ich fand: M.  $\frac{1}{4}$ , Binocularsehen von der Entfernung bis auf 10", diesseits Divergenz des linken Auges; hart jenseits des Nullpunktes der Deviation, etwa in 11", erwies sich dynamische Divergenz von knapp Prism.  $4^{\circ}$ , jenseits 18" bis in die weiteste Entfernung dynamisches Gleichgewicht; Abductionsfähigkeit für die Entfernung bei gesenkter Blickebene Prism.  $8^{\circ}$  — demnach eine sehr starke Beschränkung der Adductionsbreite (etwa um  $\frac{2}{3}$ ), durchaus disproportionirt zum Myopiegrade, und sehr geringe Fusionsbreiten, da in der Nähe die dynamischen Divergenzen von mehr als  $4^{\circ}$  bereits real wurden. — Die Operation war freilich indicirt, doch konnte derselben als Maas nur Prism.  $8^{\circ}$ , entsprechend der facultativen Divergenz bei gesenkter Blickebene zu Grunde gelegt und deshalb eine Heranrückung des Punctum proximum nur auf etwa 7" erwartet werden. Diese trat vorschriftsmässig ein, allein Patientin konnte weder durch einfache Prismen noch durch die erlaubten concav-prismatischen Gläser das Binocularsehen bis in eine für sie brauchbare Nähe bringen. Gelegentlich einer nach einem halben



Jahre erneuten Untersuchung der Abductionsfähigkeit für die Entfernung, die sich ziemlich  $= 0$  ergab, wurde auf das horizontale Gleichgewicht strenger als früher geachtet und es ergab sich, dass für alle Distanzen ein geringes Aufwärtsschielen des linken Auges vorhanden war. Von der Entfernung bis auf einen Abstand von 7", in der Strecke der binocularen Fixation, hatte auch dieses Aufwärtsschielen natürlich den dynamischen Character, es entsprach in der Ferne einem Prisma  $1^\circ$ , auf 7" einem Prisma  $2^\circ$ . Diesseits 7" traten neben den realen Divergenzen auch die realen Hebungen des linken Auges, und zwar auf 4" Abstand, entsprechend einem Prisma von  $3^\circ$ , hervor. In mittleren Entfernungen (von 2' bis 3') konnte ein abwärts brechendes Prisma  $3^\circ$  vor das linke Auge gehalten leicht überwunden werden, während ein aufwärtsbrechendes von  $2^\circ$  und selbst von  $1^\circ$  übereinanderstehende Doppelbilder hervorrief.\*\*)

Setzte ich nun der Patientin eine Brille auf, rechts indifferent, links Prism.  $2^\circ$  abwärts brechend, so zeigte sich sofort eine Heranrückung des binocularen Punctum proximum von 7" bis fast 5", ausserdem aber eine Abductionsfähigkeit für die Entfernung von  $4^\circ$ , demnach eine sehr erhebliche Erweiterung der Adductionsbreite. Eine solche Brille wurde jetzt verordnet, ausserdem für die Arbeit eine ähnliche mit Prisma  $3^\circ$  (wegen der mit der Nähe wachsenden Höhendifferenz). In 14 Tagen konnte Patientin bis auf  $4\frac{1}{4}$ " adduciren und zeigte für die Entfernung Abductionsfähigkeit von  $8^\circ$ . Es konnte nun ohne Bedenken eine Tenotomie auf dem zwei-

---

\*) Prismatische Höhenwirkungen unter  $2^\circ$  oder jedenfalls unter  $1^\circ$  stellt man bekanntlich dadurch her, dass man vor jedes Auge ein seitlich — nach rechts oder links — brechendes Prisma legt und dann das eine um die Sehlinie dreht. Es wird hierbei, neben der gewünschten verticalen Refraction allerdings eine kleine Reduction der lateralen Refraction eingeführt, doch fällt diese gerade bei dem geringen Postulat in ersterer Beziehung gewöhnlich nicht in die Wagschale. Im Uebrigen kann man das zu drehende Prisma auch je nach der Anforderung um  $1^\circ$  bis  $2^\circ$  stärker nehmen, als das für das andere Auge bestimmte.



ten Auge verrichtet werden, durch welche das glänzende Endresultat einer Adductionsbreite von  $\infty$  bis 3" (völlig entsprechend dem Myopiegrade) erreicht ward. Nachdem einmal die Fixation für die Entfernung gehörig eingeübt war, gelang es bald, das zweigradige Prisma mit einem eingradigen zu vertauschen und später auch dieses wegzulassen. Für die Nähe, wo ohnedem der Gebrauch abducirender Prismen zweckmässig erschien, wurde dem linksseitigen Brillenprisma eine leichte Neigung mit der Basis nach unten, dem rechtsseitigen eine leichte Neigung mit der Basis nach oben ertheilt. Derselbe Effekt (fast die dreifache Abductionsbreite der früheren) hätte sich vielleicht auch durch stereoskopische Uebungen (in der Javal'schen Art) erreichen lassen, doch erschien mir die Behandlung mit Prismen unter den hier obwaltenden Verhältnissen, schon wegen des dauernden Einflusses, als die bei weitem zweckmässigere.

Aehnliche Fälle, die keineswegs zu den Seltenheiten gehören, und denen man auch diejenigen anreihen kann, in welchen eine Ausgleichung des Brechzustandes von auffälliger Wirkung ist, erweisen, dass man wegen einer Abschwächung der Adductionsbreite, die nicht etwa an einen excessiven Myopiegrad mit Nothwendigkeit gebunden ist, die Normirung des Gleichgewichtsverhältnisses nicht sofort aufgeben soll.

#### IX.

Wenden wir uns nun zu den, den Operationsact näher berührenden Fragen, so ist zunächst die Entscheidung zu treffen, an welchem der beiden Augen die Tenotomie zu vollziehen sei. Häufig allerdings liegt die Entscheidung auf der Hand. Hat sich z. B. reales relatives Auswärtsschielen entwickelt und weicht constant das eine Auge für die Nähe ab, so ist selbstverständlich dieses Auge anzugreifen. Ebenso wird man mit der Wahl nicht zögern, wenn zwar innerhalb der brauchbaren Sehstrecke keine reale Divergenz stattfindet, wenn aber bei übertriebener Annäherung eines Objects, etwa bis auf 4", 3" und darunter, constant das eine Auge abweicht. Es ist dies der gewöhnliche Versuch,



der zur Bestimmung der Operationsseite unternommen wird; man muss bei demselben mit dem Fixirpuncte recht genau die Medianlinie einhalten, und erhält man meist ein schlagenderes Resultat, wenn das Object in einer stark gehobenen Blickebene angenähert wird, weil sich hier die divergirende Ablenkung immer bereits auf grössere Abstände und in auffälligerem Grade einstellt.

In manchen Fällen aber zeigen sich die Verhältnisse ziemlich symmetrisch: bei dem eben erwähnten Versuch sehen wir bald das eine bald das andere Auge abweichen, wenn man das Punctum proximum überschreitet; sowie wir nur im Geringsten von der Medianlinie abweichen, so bleibt allemal dasjenige Auge in der Fixation, nach dessen Seite das Fixiobject hinüberneigt u. s. w. — In solchen Fällen suche man zunächst die Entscheidung in dem Abductionsversuch für die Ferne. Es ereignet sich auch unter diesen Bedingungen nicht gar selten, dass mit dem einen Auge ein etwas stärkeres Prisma durch Abduction überwunden wird, als mit dem anderen, und eignet sich dann natürlich das erstere vorwaltend zur Tenotomie. Scheint der momentane Versuch ebenfalls keinen Unterschied zu ergeben, so lasse man abducirende prismatische Brillen tragen und sehe zu, auf welchem Auge die Abductionsfähigkeit sich höher entwickelt \*). Ergiebt sich auch hier völlige Symmetrie, so operire man dasjenige Auge, dessen Sehschärfe die geringere ist. Ist das Schielen streng dynamisch, so findet man meist, dass das eine Auge etwas kurzsichtiger und dasselbe zugleich weniger scharfsichtig ist. Man könnte deshalb auch die Regel geben, das kurzsichtigere Auge zu operiren; doch dürfte dies nur in der Voraussetzung geschehen, dass für sämtliche Fälle mit einseitiger Exclusion die Seite der Operation bereits hierdurch bestimmt ist; denn nach eingetretener Exclusion verhält es sich meist so, dass das für die Nähe

\*) Begreiflicherweise werden die Differenzen zwischen beiden Augen nur sehr gering sein. Es handelt sich höchstens um Unterschiede der Abductionsfähigkeit, entsprechend Prism. 1° oder 2°.



fixirende Auge scharfsichtiger und zugleich etwas kurzsichtiger ist. Zeigt sich endlich auch in der Sehschärfe kein Unterschied, so pflege ich dasjenige Auge zu operiren, an welchem Patient bei der Arbeit die meisten Beschwerden empfindet.

Es ist übrigens bei symmetrischer Musculatur immer das Vollkommenste, auch den Eingriff symmetrisch auf beide Seiten zu vertheilen, und stehen wir hiervon gewöhnlich nur ab, weil der kleine Nachtheil einer einseitigen Correction, bei mässiger Störung des Gleichgewichts, nicht schwer genug in die Wagschale fällt, um seinetwegen die Unbequemlichkeiten einer doppelten Operation in den Kauf zu nehmen. Ist aber die Gleichgewichtsstörung erheblicher, äquivalent einem Prisma  $14^{\circ}$ ,  $16^{\circ}$  und sind die Verhältnisse der Musculatur völlig symmetrisch, so würde ich immerhin anrathen, den Effect, mit der gehörigen Beschränkung jederseits, auf beide Augen zu vertheilen, so leicht wir auch die bestehende Insufficienz an sich durch einen einmaligen Eingriff beseitigen können.

#### X.

Wir kommen nun auf einen integrirenden Punkt, nämlich auf die Dosirung der Operation. Dass das Maas derselben sich auf den Grad der facultativen Divergenz gründet und durch das Grenzprisma für die Abduction in der Entfernung bezeichnet wird, ist früher genugsam dargelegt und im Verlaufe dieser Blätter selbst mehrfach wiederholt worden. Allein die Möglichkeit, dieses Maas wirklich einzuhalten, selbst mit kleinen Schwankungen, wird immer noch hier und da in Zweifel gezogen. Zunächst beruht es auf einem Irrthume, wenn man zu verstehen geglaubt hat, der blosse, durch keine nachträgliche Controle und Nachbehandlung modirte Operationsact könne eine sichere Graduirung des definitiven Effectes bewerkstelligen. Wahr ist, dass die Einrichtung der Operation hierfür die Grundlage giebt und bereits engere Grenzen einsetzt, aber innerhalb dieser sind die Schwankungsgrößen immer noch von Bedeutung und ist die vollendete Abmessung des Endeffectes nur durch eine drei-



fache Arbeit zu erreichen: 1) durch Anpassung des Operationsactes selbst an das zuertheilte Maas; 2) durch Controle, resp. regelrechte Correction des unmittelbaren Effectes kurz nach verrichteter Operation; 3) durch eine den Endeffect präcisirende Nachbehandlung.

Die blosse Einrichtung der Operation kann schon deshalb den Effect nicht genau bestimmen, weil bei deren Einflüsse unberechenbare Nebenumstände mitwirken; so ist die Muskelelasticität, von welcher grossentheils der Retractionsgrad abhängt, nicht unbedeutenden individuellen Schwankungen unterworfen, die Suture, welche meistens zu Hülfe gerufen wird, wirkt vollends verschieden nach der sehr variablen Nachgiebigkeit der Conjunctiva, eine etwa eingetretene subconjunctivale Haemorrhagie setzt eine Spannung, welche die Wirkung der Suture vor der Hand steigert u. s. w. Aus der Einmischung dieser unberechenbaren Factoren ergeht die Nothwendigkeit, jeden unmittelbaren Operationseffect nach bestimmten Principien zu controliren und zu corrigiren. Wer dies vernachlässigt, kann von vorne herein keine Ansprüche darauf machen, die minutiöse Aufgabe, um die es sich handelt, glücklich zu lösen. Endlich lässt sich auch a priori ersehen, dass, mögen wir die Muskelinsertion verlagern, wie wir wollen, doch der Gebrauch, den wir den Augen in der Verheilungsperiode zuertheilen, die Dehnung der frischen Verbindungsmasse u. s. w. von Einfluss auf die definitive Gestaltung sein wird. Zugegeben, dass für diese Dinge, falls wir ein gewisses Durchschnittsverfahren befolgen, auch die Schwankungen nicht übergross sind, und dass wir deshalb auch nicht immer besondere auf dieselben bezügliche Rücksichten zu nehmen haben, so ist andererseits eine Leitung derselben nach der einen oder anderen Seite ohne Zweifel von Einfluss und liefert ein werthvolles Mittel, kleine Abweichungen der Resultate in den ersten Heilungsperioden zu beherrschen auf den Endeffect zu präcisiren.

Will man sich zunächst über die Graduierung des Operationsactes einigen, so muss man an eine ge-



wisse, allgemein bekannte Ausführungsweise anknüpfen. Nehmen wir als solche die bei uns gebräuchliche Form der Tenotomie, bei welcher eine möglichst kleine Conjunctivawunde hart am Hornhautrande verrichtet, das subconjunctivale Bindegewebe nur an dem einen Muskelrande eben so weit durchstossen wird, um einen Schielhaken unter die Sehne zu bringen, endlich diese letzte ganz hart von der Sklera abgelöst wird, ohne anderweitige Bindegewebslösungen, so können wir zur vorläufigen Orientirung Folgendes aufstellen: Bei dem dynamischen Auswärtsschielen (allenfalls in relativ reales übergegangen) entspricht die einfache Tenotomie einem Grenzprisma von  $16^{\circ}$ . Betrug also das Abductionsvermögen für die Entfernung gerade Prisma  $16^{\circ}$  oder allenfalls  $18^{\circ}$ ,  $17^{\circ}$ ,  $15^{\circ}$ , so wird zunächst die einfache Tenotomie verrichtet. Betrug das Abductionsvermögen Prisma  $14^{\circ}$  oder darunter, so muss der Effect sofort durch eine Conjunctivalsutur beschränkt werden. Bekanntlich kann man je nach der näheren Wirkungsweise der Suture den Effect einer Tenotomie beliebig, bis 0, beschränken, ja man kann ihn — worauf das Princip der Vornähung beruht — sogar negativ machen. Hieraus resultirt, dass wir in der Conjunctivalsutur das geeignete Mittel besitzen, um die hier zur Sprache kommenden Reductionen zu erreichen.

Ueber die Wirkungsweise der Suture gilt im Näheren Folgendes: Der Effect hängt ab a) von der Richtung der Suture, b) von dem Quantum Conjunctiva, das wir hineinnehmen, c) von der Energie, mit der wir zusammenschnüren. Hinsichtlich der Richtung, so ist die aufsteigende unwirksamer, als die horizontale. Verbiethet uns auch die enge Nachbarschaft der Wunde mit dem äusseren Hornhautrande, die Naht streng im horizontalen Durchschnitt des Auges anzulegen, so können wir ihr doch eine schwächer oder stärker aufsteigende Richtung von aussen-unten nach innen-oben geben, je nachdem wir den Effect der Tenotomie mehr oder weniger verringern wollen. Hinsichtlich b und c, so erinnere ich hier daran, dass die Conjunctivalsuturen allgemeinhin



nur den Zweck einer Verlagerung der Conjunctiva auf der Episklera (neben etwaiger Deckung einer Wundfläche), nicht aber einer Wiederverheilung der Wundränder unter sich verfolgen. Hierzu ist die Conjunctiva viel zu dünn und nachgiebig; sie rollt sich beim Anziehen der Suture sofort nach innen um, so dass die beiden Epithelialflächen in Berührung kommen. Wir sind deshalb vollkommen in unserem Recht, wenn wir behufs einer schwachen Suturewirkung die Wundränder nicht einmal in Contact treten lassen, behufs einer starken dagegen eine diesen Contact weit überschreitende Annäherung der Stichpunkte bewirken. Es kann begreiflicherweise durch ein stärkeres Anziehen der Suture compensirt werden, was etwa hinsichtlich der Breite der Brücke weniger gethan ward. Einige Uebung wird natürlich für diese Abmessungen grössere Sicherheit erschaffen. Für den weniger Geübten mögen folgende Anhaltspunkte dienen:

Soll die Tenotomie einem 14 gradigen oder 13 gradigen Prisma gleichkommen, so darf der Effect nur leicht beschränkt werden: durch eine stark aufsteigende, etwa jederseits 1" Conjunctiva einschliessende, kaum bis zum Wundschluss angezogene Suture.

Handelt es sich um ein Abductionsprisma von 12 oder 11 Grad, so steige die Suture nur mässig an, fasse etwa jederseits 1" Conjunctiva und schnüre bereits bis zum innigen Wundcontact.

Bei Prisma 10° schliesse man bei gleicher Richtung 1 1/2" Conjunctiva in die Suture.

Bei Prisma 9° und 8° gebe man der Suture eine möglichst horizontale Richtung, nehme 2" Conjunctiva hinein und ziehe energisch, wenn auch nicht bis zur äussersten Annäherung der Stichpunkte, zusammen.

Da wir unter einem Werthe des Grenzprisma von 8° die Operation durchschnittlich nicht anrathen, so werden auch stärkere Beschränkungen des Effectes als die letzterwähnte nicht gar häufig zur Sprache kommen; dennoch aber kann es sich ereignen, dass bei einer Abductionsfähigkeit



von Prisma  $14^{\circ}$  und selbst  $12^{\circ}$  wegen absolut symmetrischer Verhältnisse der Wunsch auftaucht, den Operationseffect auf beide Augen zu vertheilen. In diesem Falle, um etwa dem Maasse eines Prismas  $7^{\circ}$  oder  $6^{\circ}$  zu entsprechen, rathe ich nach der äusseren Commissur zu noch eine breitere Conjunctivalbrücke von  $2\frac{1}{2}$  bis  $3'''$  einzuschliessen und noch energischer, fast bis zur möglichsten Annäherung der Stichpunkte, zusammenzuschnüren.

Betrug das Grenzprisma mehr als  $18^{\circ}$ , so ist der Effect, selbst wenn die Verhältnisse in der Muskulatur sich nicht als symmetrisch herausstellten, besser zwischen beiden Augen zu vertheilen, ganz nach den Grundsätzen der gewöhnlichen Tenotomie. Es kann indessen exceptionelle Umstände geben, unter welchen wir vorziehen, auch dann noch den vollen Effect an einem Auge zu erreichen, beispielsweise, wenn dieses Auge hochgradig schwachichtig, das andere sehscharf ist, oder vielleicht an excessiver Reizbarkeit leidet, oder wenn Patient eine Operation an dem besseren Auge ausserordentlich scheut. Es wird alsdann die Vermehrung des Effectes nach den ebenfalls aus der Technik der Tenotomie bekannten Regeln dadurch erreicht werden, dass man die Bindegewebswunde nächst beiden Rändern der Sehne vergrössert und hierdurch die Retraction erleichtert. Sollte ein ganz ungewöhnlich grosses Maas vorliegen, was für unsere Fälle sich kaum ereignet, so würde ich eine kleine Procedur empfehlen, mit welcher man überhaupt den Effect einer Tenotomie in einer ausserordentlich wirksamen und zugleich völlig unverletzenden Weise steigern kann. Man hebt nämlich, nach vernichteter Externus-Tenotomie, hart an der Carunkel mit der Pincette eine Conjunctivalfalte von der Episklera ab, geht durch den medialen Abhang dieser Falte mit der Spitze einer gekrümmten Nadel in den Subconjunctivalraum ein und lässt, indem man den Fassungspunkt der Pincette in geeigneter Weise nach dem inneren oberen Hornhautrand verlegt, die Nadelspitze unter der Conjunctiva vorgleiten, bis sie eine  $3'''$ ,  $4'''$  selbst  $5'''$  breite Conjunctivalbrücke untersticht.



Alsdann wird die Spitze wieder nach aussen durchgestochen (je nach der Länge des subconjunctivalen Ganges noch medianwärts vom inneren-oberen Hornhautrand oder selbst oberhalb des Hornhautscheitels), die Naht bis zur äussersten Annäherung der Stichpunkte zusammengeseht und geschlossen. Das Auge rollt hierbei, je nach der Breite der umstochenen Brücke, mehr oder weniger stark medianwärts und die Beweglichkeitsbeschränkung nach aussen wird namhaft gesteigert. Ich wiederhole, dass unsere Fälle höchst selten dies Verfahren \*) indiciren und dass, wenn es ausnahmsweise geschieht, immer nur ein verhältnissmässig kurzer subconjunctivaler Gang der Nadel erfordert wird. In der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle wird es sich um Beschränkung des Tenotomie-Effectes durch die Conjunctivalsutur handeln.

# XI.

Mit Befolgung der eben gegebenen Regeln wird man häufig, bei gehöriger Uebung sogar gewöhnlich, aber, wie es am Eingang des vorigen Abschnittes erörtert wurde,

\*) Vortreffliche Dienste leistet es mir dagegen bei hochgradigem Strabismus divergens, und bin ich seit Verwerthung desselben mit der Vornähung des Muskels weit reservirter geworden; ich vollführe letztere eigentlich kaum mehr wegen des Grades der Divergenz, sondern nur wegen namhafter Beschränkung der medialen Beweglichkeit. Vollends aber erreicht man durch das erwähnte Verfahren bei den excessiven Graden von Einwärtschielen jedwede nur irgend wünschenswerthe Correction. Es constituirt so zu sagen die Kehrseite der Conjunctivalsutur und erlaubt eine methodische Vergrösserung des Effectes ebenso wie jene die methodische Reduction in die Hände giebt. Man muss aber die „verstärkende Sutur“ (im Gegensatz zur „beschränkenden“) mindestens  $2\frac{1}{2}$  Tage liegen lassen. Vor Jahren machte ich, um einen gleichen Zweck zu erreichen, auf der, der Tenotomie entgegengesetzten Seite einen horizontalen Schnitt in die Conjunctiva und verwandelte ihn durch eine Sutur gewissermassen in einen verticalen; ich habe mich aber von der Ueberflüssigkeit dieser Verletzung zur Genüge überzeugt, indem die subconjunctivale Sutur ganz dieselbe Flächenverlagerung bewirkt. Ich komme wohl bei einer anderen Gelegenheit noch einmal ausführlicher auf diese kleine, aber sehr werthvolle Hülfe zu sprechen.



nicht durchgängig das richtige Maas getroffen haben, und ist, um hierfür Sicherheit zu gewinnen, sofort nach der Operation, resp. nach völlig überstandnem Chloroformrausch\*) die Controle des Immediateffectes anzustellen. Obenan steht hier wieder der Gleichgewichtsversuch. Es war ein Fehler, durch welchen die Einsicht in die späteren Wandelungen der Operationseffecte lange erschwert worden ist, unmittelbar nach der Tenotomie die Gleichgewichtsprüfung in der Medianlinie anzustellen. Es betheiligt sich hier die transitorische (operative) Insufficienz des zu-

---

\*) Der völlige Ablauf der Narkose ist hier nicht blos deshalb nöthig, um verlässliche Angaben von den Patienten zu erhalten, sondern auch deshalb, weil der geringste Rest von Chloroformschläfrigkeit Disposition zur Divergenz unterhält. Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, dass während Betäubungen und während des Schlafes eine eigene positive Innervation der Augenmuskeln, die wesentlich von dem Ruhezustand abweicht, zu statuiren ist; es geht dies schon aus dem höheren (den äussersten Erschlaffungszustand der Interni weitaus überschreitenden) Grade absoluter Divergenz, die an Gesunden während der Narkose beobachtet wird, hervor. Ich führe dies hier an zur Erklärung der von Helmholtz mitgetheilten (s. Phys. Optik pag. 476) und von Hering angezwifelten Beobachtungen über die Stellung der Augen während des Einschlafens. Die Genauigkeit dieser Beobachtungen, deren ich (bei häufigem Opiumgebrauche) ganz ähnliche an meinen eigenen Augen mache, in Frage zu stellen, finde ich nicht den mindesten Grund. Deren Erhärtung bedarf häufiger Wiederholung und besonders günstiger Nebenumstände beim Erwachen, ungefähr so, wie die Reconstruction der Träume. Nur möchte ich in jenen Stellungen nicht einen ungeregelten, vom Trieb des Sehactes entbundenen, sondern einen positiv mit den Innervationszuständen des Schlafes verbundenen Zustand erblicken. Die sehr starken Raddrehungen, welche ich während der Halb-Betäubung an meinen Augen constatire, entsprechen einer vermehrten Trochleariswirkung. Sie lassen sich nicht etwa durch die blosse Abduction bei gehobener Blickebene unter Einhaltung des Listing'schen Gesetzes erklären. Dass während des Schlafes auch der Orbicularis activ innervirt ist, lässt sich nicht bezweifeln, und scheint sich demnach die positive Schlafeserregung über die centralen Enden des Facialis Abducens, Trochlearis (der rect. sup. stellt wohl nur die übliche Mitaction mit dem Lidschluss dar) zu erstrecken.



rückgelagerten Muskels viel zu sehr bei dem Verhalten und es stellt sich deshalb auch hier zwischen den Immediateffecten und den definitiven Effecten ein äusserst inconstantes Verhältniss heraus. Zeigt sich diese Thatsache durchgängig bei der Tenotomie, so tritt sie nirgends deutlicher hervor, als bei der Operation des dynamischen Auswärtsschielens. Prüft man in der Medianlinie, so könnte eine dynamische Convergenz von Prisma  $8^{\circ}$  bereits die Befürchtung einer zu starken Wirkung erwecken, während bei eben diesem Befunde eine noch vorhandene Divergenz in der gleich zu empfehlenden Electionsstellung uns hiergegen völlig sicherstellt, oder selbst auf einen unzureichenden Effect deutet. Man stelle den Gleichgewichtsversuch (mit dem abwärts brechenden Prisma) in mindestens 10' Entfernung für eine Richtung an, welche von der Medianlinie etwa  $15^{\circ}$  nach Seite des gesunden Auges abweicht und sich um eben so viel unter die horizontale Blickebene neigt. Wir wollen der Kürze wegen diese Position des Fixiobjectes die Electionsstellung nennen. Die Erfahrung hat erwiesen, dass die Immediateffecte und die definitiven Effecte\*) in dieser Richtung in einem weit regelmässigeren, der Berechnung mehr unterliegenden Verhältnisse stehen, als es für die Medianlinie gilt, ohne Zweifel weil die operative Muskelinsufficienz, der transitatorische Factor, sich hier weniger einmischt. In dieser Electionsstellung nun muss unmittelbar nach der Operation Gleichgewicht existiren.

Waren die Fälle an der Grenze der Operationsfähigkeit (entsprechend einem Abductionsprisma von  $8^{\circ}$  oder  $9^{\circ}$ ), so mag selbst in der Electionsstellung noch eine minimale Diver-

---

\*) Auch der Operation des Strabismus convergens wird man, wenn man sofort die Effecte in der Electionsstellung prüft — hier fällt die Neigung der Richtung selbstverständlich nach Seite des operirten Auges — die Nothwendigkeit oder Ueberflüssigkeit einer zweiten Operation mit weit grösserer Sicherheit voraussehen, als wenn man in der Medianlinie prüft.



genz, von Prisma 1 bis 2° als richtig gelten, desgleichen, wenn etwa ein grösseres Ekehymom die Conjunctiva anspannt und dadurch die Suturenwirkung temporär erhöht. Dynamische Convergenz über Prisma 3° muss allemal für übertriebenen Effect gelten. Geringere Convergenzgrade von Prisma 1°, 2° und eine Spur darüber darf man allenfalls noch gut heissen, wenn es sich um ein hohes Operationsmaas, von Prisma 15°, 16°, handelte und wenn zugleich bei einer Annäherung des Fixiobjectes (immer in der Electionsstellung) auf 4' diese Convergenzen bereits völlig ausgeglichen sind. — Innerhalb der angeführten Grenzen kann man auch die relativ grösseren Operationseffecte da zulassen, wo, entsprechend dem präexistirenden Character des Uebels, nach der Tenotomie noch sehr erhebliche Divergenzen für die Nähe zurückblieben.

Zeigt sich bei diesen Prüfungen ein Resultat, welches die erlaubten kleinen Schwankungen, die durch die Nachbehandlung corrigirt werden mögen, überschreitet, so ist dem entsprechend sofort die Correction anzubringen. Soll der Operationseffect vermindert werden, so muss die zu schwach wirkende Suture durch eine stärker wirkende (nach den pag. 264 erörterten Grundsätzen) ersetzt werden, resp. es muss da, wo keine Suture eingelegt ward, eine solche nachträglich eingelegt werden. Soll dagegen der Operationseffect vermehrt werden, so ist eine schwach wirkende Suture entweder ganz zu entfernen oder durch eine noch schwächer wirkende zu ersetzen, während einer stark wirkenden eine schwächer wirkende substituirt wird. Da bei diesen Substitutionen allemal die früher eingelegte Suture zuerst aus dem Auge zu entfernen ist, so empfiehlt es sich, an dem von der Suture befreiten Auge noch einmal den Gleichgewichtsversuch in der Electionsstellung anzustellen. Das comparative Resultat bezeichnet die Wirkung der früheren Suture und giebt weitere Anhaltspunkte über das einzuführende Plus oder Minus; ja es kann sich, wenn zum Beispiel eine weitere Abschwächung einer ohnedem schwachen Suture



indicirt ist, zuweilen hierbei herausstellen, dass die Suture völlig entbehrlich ist. Jedenfalls ist der Vergleich der Resultate auch geeignet, dem weniger Geübten Einsicht in die Suturewirkungen, je nach den Modalitäten des Einlegens, zu verschaffen.

Wenn man die eben empfohlenen Vorsichten befolgt, so wird man nicht zu befürchten haben, dass eine reale Convergence mit Diplopie in der Medianlinie zurückbleibt; dagegen ist man gegen eine temporale Diplopie noch nicht völlig geschützt. Solche temporale Diplopie fällt freilich nur dann in die Wagschale, wenn sie bereits bei einer seitlichen Deviation der Blickrichtung von weniger als  $< 20^\circ$  auftritt. Ueber diese Grenze hinaus wird ja die Seitenbewegung der Augen im gewöhnlichen Sehen, bei welchem wir viel lieber die Kopfdrehung benutzen, nicht verwerthet. Um sich nun auch in dieser Richtung gegen ein fehlerhaftes Resultat zu schützen, rathe ich, neben dem Gleichgewicht in der Electionsstellung auch noch den Defect absoluter Beweglichkeit kurz nach der Operation einer Controle zu unterwerfen.

Im Allgemeinen ist der Ausfall an Beweglichkeit nach der Operation des dynamischen Auswärtsschielens weit erheblicher, als in den gewöhnlichen Fällen von realem Strabismus divergens. Wir beobachten, wenn keine Suture eingelegt ward, in der Regel Defecte von  $2\frac{1}{4}''$  bis  $3''$  und selbst darüber; nach einer Suture mittlerer Wirkung Defecte von  $1''$  bis  $1\frac{3}{4}''$ . Nun lehrt zwar die Erfahrung zur Genüge, dass der bei Weitem grösste Theil dieses Defects transitorisch ist, so dass kaum  $\frac{1}{3}$  oder  $\frac{1}{4}$  desselben dauernd zurückbleibt; allein selbstverständlich knüpft sich an die Verrückung der Beweglichkeitsgrenze noch eine ausgedehntere Herabsetzung der Muskelwirkung in der betreffenden Lateralparthie des Blickfeldes, respective die Ursache temporaler Diplopie. Ich meine deshalb, dass man allzugrosse Beschränkungen der Beweglichkeit unbedingt corrigiren muss, will man mit Sicherheit das Zurückbleiben temporaler



Diplopie vermeiden. Beweglichkeits-Defecte von  $3''$  und mehr lasse ich niemals zurtick, sondern moderire dieselben durch eine nachträglich eingelegte Suture. War das Operationsmaas ein starkes ( $> \text{Prism. } 14^0$ ), so lasse ich allenfalls Defecte von  $2\frac{1}{4}''$  bis  $2\frac{1}{2}''$  bestehen; war dagegen das Operationsmaas ein geringes, so moderire ich selbst Beweglichkeits-Beschränkungen von  $2''$ . Ein Defect von  $1\frac{1}{2}''$  darf selbst bei ganz geringem Operationsmaas (von Prism.  $8^0$  bis  $9^0$ ) bestehen, ohne dass sich daran die Gefahr lateraler Diplopie knüpft, immer natürlich in der Voraussetzung, dass zuvor den Anforderungen in der Electionsstellung Genüge geleistet worden ist.

Es drängt sich nun hinsichtlich der soeben empfohlenen Vorsichten der Einwand auf, inwiefern sich dieselben in Harmonie bringen lassen mit den für die Electionsstellung zuvor hervorgehobenen Postulaten. Nothwendig wird die Moderirung des Beweglichkeits-Defects wiederum auf die Resultate des Gleichgewichtsversuchs influiren, resp. dieselben stören, wenn sie früher richtig erschienen. Ich setze z. B. den Fall eines hohen Operationsmaasses (entsprechend Prism.  $16^0$ ); nach einer einfachen Tenotomie ohne Suture zeige sich nunmehr in der Electionsstellung das gewünschte Gleichgewicht, die Controle der absoluten Beweglichkeit ergebe aber einen Defect von  $3''$ . Wollen wir diesen, um mit Sicherheit temporaler Diplopie zu entgehen, durch eine mässig wirkende Suture bis auf  $2\frac{1}{4}''$  beschränken, so werden wir natürlich in der Electionsstellung wieder einen gewissen Grad dynamischer Divergenz erhalten und so von den gestellten Anforderungen abweichen. Es ist begreiflich, dass diesem Dilemma durch eine Operation an einem Auge nicht zu entgehen ist. Wo sich bei richtigem Resultat hinsichtlich der Electionsstellung zunächst ein zu grosser Defect seitlicher Beweglichkeit ergibt, muss dieser bis auf den zukömmlichen Grad (bei hohem Operationsmaas  $2\frac{1}{4}''$ , bei niedrigem Operationsmaas  $1\frac{1}{2}''$ ) reducirt und der hierdurch entstandene Fehler durch eine spä-



tere Operation am zweiten Auge ausgeglichen werden. Es liegt übrigens in der Natur der Sache, dass sich die fragliche Disharmonie vorwaltend nur bei einem hohen Operationsmaasse äussern wird, welches meist schon an sich den Wunsch einer Vertheilung des Effectes motivirt.

## XII.

Wenn man die an dynamischem Auswärtsschielen Operirten recht genau unter fortwährender Befragung des Gleichgewichtsversuchs beobachtet, so stellen sich in der Regel folgende Wandelungen des Effectes ein: Bereits wenige Stunden nach der Operation pflegt eine leichte Zunahme des Effectes zu beginnen, so dass man z. B. 6 Stunden nachher in der Gleichgewichtsstellung dynamische Convergenz, entsprechend Prism. 1 bis 2°, vorfindet, da, wo kurz nach der Operation absolutes Gleichgewicht existirte. Diese Zunahme pflegt sich, allerdings in verschiedenen Graden, während der nächsten Tage weiter zu steigern und am 3. oder 4. Tage ihr Maximum zu erreichen. Man findet dann meist in der Electionsstellung dynamische Convergenz, entsprechend Prism. 3° bis 4°, zuweilen selbst 5° und noch etwas darüber. In der Medianlinie existirt zu dieser Zeit gewöhnlich starke dynamische Convergenz von Prism. 8° bis 16°. Je nach ihrer grösseren oder geringeren Fusionsbreite sehen die Patienten jenseits 4', 3', selbst 1½' in der Mittellinie gleichnamige Doppelbilder. Trotzdem braucht man, wenn nur die Controle unmittelbar nach der Operation richtig gehandhabt ward, einen excessiven Endeffect in keiner Weise zu fürchten. Jene Maximum-Wirkung besteht gewöhnlich einige Tage, verringert sich aber vom 5., 6., 8. Tage ab successive, so dass die Diplopie in der Medianlinie bereits meist in der zweiten, höchstens dritten Woche und die laterale Diplopie (bis zu einer Seitenrichtung von 20°) einige Wochen später geschwunden ist.

Die erwähnten Wandelungen des Effectes variiren übrigens nach der Verschiedenheit der Fälle und besonders nach dem stattgehabten Gebrauch der Suturen. Bei stark



fassenden Suturen und namentlich da, wo die Conjunctiva sich durch Bluterguss anspannte, steigert sich der Operationseffect in den ersten Tagen stärker als im Durchschnitt; wenn nämlich die Schwellung zurückgeht, weichen auch die Stichpunkte etwas mehr auseinander und nimmt hierdurch die Suturewirkung ab. Wir haben deshalb bereits oben (Absch. XI.) gerathen, in solchen Fällen lieber eine minimale Divergenz in der Electionsstellung zurtückzulassen. Sodann kann, worauf ich bei der Nachbehandlung noch zurückkommen werde, durch eine ungewöhnliche Schlaffheit und Zerreibbarkeit der Conjunctiva der Effect der Suture in einer regelwidrigen Weise abnehmen. Zuweilen beobachtet man auch, ohne dass ich die näheren Gründe anzugeben wüsste, dass, nachdem der Operationseffect laut Resultat des Gleichgewichtsversuchs in den ersten 3 bis 4 Tagen nur in einer sehr mässigen Weise zugenommen hat, alsdann eine ungewöhnlich starke weitere Zunahme erfolgt, welche noch bis gegen Ende der ersten oder Anfang der zweiten Woche wächst und den Immediat-Effect in der Electionsstellung selbst um Prism. 8° steigert. Aber selbst unter diesen Eventualitäten findet, wenn bei der ursprünglichen Controle kein Fehler gemacht war und wenn man die Hülfen der Nachbehandlung nicht unbenutzt lässt, eine völlig erwünschte Ausgleichung statt.

Der Defect absoluter Beweglichkeit pflegt sich einige Tage hindurch nach der Operation ziemlich stationär zu erhalten, dann nimmt er continuirlich ab, beträgt nach 2 bis 3 Wochen die Hälfte des ursprünglichen Maasses und ist in einigen Monaten etwa auf  $\frac{1}{4}$  desselben reducirt. Wurde eine stärker fassende Suture eingelegt, so fällt er schliesslich fast unmerklich aus.

Wenn man etwas rügen will, so besteht es darin, dass zuweilen Patienten, die nach 3 bis 4 Monaten, also zu einer Zeit, in der man die definitiven Effecte festzustellen gewöhnt ist, den Anforderungen völlig genügen, nach einigen Jahren eine nachweisbare Verringerung der Operationswir-



kung darbieten. Es liegt dies im Gebrauch der Augen und ist theilweise auf eine ungenaue Befolgung der mitgegebenen Rathschläge zu beziehen. Tritt bei solchen partiellen Recidiven wieder eine, die Operation indicirende Abductionsfähigkeit für die Entfernung ein, so ist die Compensation natürlich nach den allgemeinen Regeln der Tenotomie auf dem zweiten Auge auszuführen.

### XIII.

Es erübrigt noch, einige Worte über die Nachbehandlung anzuschliessen, in welcher, wie wir (Abschn. X.) erörtert hatten, neben dem Operationsacte und neben der Controle des Immediat-Effects ein Mittel liegt, den Endeffect den vorliegenden Postulaten anzupassen.

Ein immobilisirender Verband während der ersten 24 Stunden ist hier besonders zweckmässig, um gegen eine Verschiebung der abgelösten Theile zu schützen und die möglichste Erhaltung des Immediateffectes zu erwirken. Ferner ist es, wo eine Suture angelegt war, erforderlich, den Patienten 6 bis 8 Stunden nach der Operation wieder zu sehen und den Gleichgewichtsversuch in der Electionsstellung anzustellen. Dass man alsdann den Operationseffect etwas grösser, als kurz nach der Tenotomie findet, ist bereits im vorigen Abschnitt als reguläres Vorkommniss hingestellt worden. Es kann sich aber ereignen, dass diese Zunahme das gebührende Maass überschreitet, dass z. B. bereits um diese Zeit eine Abweichung von dem Immediateffect, entsprechend Prism.  $5^{\circ}$ ,  $6^{\circ}$  und mehr, stattfindet. Dies beruht in seltenen Fällen darin, dass die Suture völlig durchgerissen ist, weit häufiger darin, dass eine besonders nachgiebige Conjunctiva durch Aufreissen der Stichpunkte von der ertheilten Stellung zurückgewichen ist, in noch anderen darin, dass eine ursprünglich vorhandene Ecchymosirung, welche die Suturewirkung erhöhte, sich zurückgebildet hat. In dem einen oder anderen dieser Fälle muss man die Suture lösen und eine neue einlegen, welche, wie nach der Operation, in der Electionsstellung Gleichgewicht herstellt.



Das Nachgeben der Suture wirkt in einer integrierenden Weise auf den Operationseffect nur, wenn es in den ersten 10, in einer unvollkommenen allenfalls, wenn es in den ersten 20 Stunden stattfindet. Ich habe mich hiervon überzeugt, indem ich in den aller- verschiedensten Terminen nach der Operation die eingelegten Suturen entfernte und die nun entstehende Wandlung theils mit dem Zustand, der beim Liegen der Suture stattfand, theils mit demjenigen verglich, der nach der Tenotomie vor Einlegung der Suture beobachtet ward.

Im Näheren hat sich bei diesen Versuchen herausgestellt: dass, wenn man eine Conjunctivalsuture 2, 4, 6 Stunden nach der Operation entfernt, genau dieselbe Stellung wieder eintritt (laut Resultat des Gleichgewichtsversuchs in der Electionsstellung), welche vor Einlegen der Suture vorhanden war. Es ist also innerhalb dieser Fristen noch keine die Stellung influencirende Adhärenz der inneren Conjunctivalfläche mit der Episklera eingetreten. Wurde die Suture nach 8, 10, 12 Stunden entfernt, so trat in einzelnen Fällen ebenfalls noch die frühere Stellung, wie sie vor Einlegen der Suture bestand, wieder ein; in den meisten Fällen aber etablirte sich eine intermediäre Stellung zwischen jener und derjenigen, welche bei liegender Suture bestand. Zuweilen zeigte sich auch unmittelbar nach dem Herausnehmen der Suture in dieser Frist ein Fortbestehen der Stellung, aber nach einigen Minuten ein Zurückgehen in eine Intermediärstellung, oder selbst in die Stellung, wie sie vor dem Einlegen der Suture bestand. Es hat also zweifelsohne innerhalb dieser Frist ein Beginn von Flächenadhäsion Platz gegriffen, die aber noch ausserordentlich zart ist und sich leicht wieder löst. Wird die Suture zwischen 12 und 18 Stunden entfernt, so beobachtet man bereits in der Regel (bei völlig ruhigen Patienten und weiterem Verband) ein unverändertes Fortbestehen der Stellung, in einzelnen Fällen jedoch noch ein Rückgehen zu einer intermediären, und, falls die Kranken beim Herausnehmen sehr unruhig sind, selbst zu der primitiven (suturelosen) Stellung. Nach der 18. Stunde hat das Herausnehmen der Suture keine Einwirkung mehr auf die Position, wenn nicht etwa bei besonderer Unruhe der Patienten oder durch Absicht des Operateurs die Conjunctiva während des Herausnehmens der Suture besonders angezerrt wird. Es sind dann die Flächenverklebungen jedenfalls kräftig genug, um die Stellung zu sichern.

Weit seltener ereignet es sich, dass man bei der Abendvisite nach der Operation den Effect der Tenotomie verringert findet, so dass Patienten, die in der Electionsstellung Gleichgewicht darboten, nunmehr wieder mehrere Grade Divergenz zeigen. Es erklärt sich dies durch eine



nachträgliche Ecchymosirung oder auch durch einige entzündliche Aufschwellung der in der Suture eingeschlossenen Conjunctiva, wodurch die Spannung zunimmt und die Stichpunkte mehr angenähert werden. Ist die Wandlung nur mässig, etwa entsprechend Prisma 2 oder 3°, so enthält man sich, besonders wenn das Operationsmaas gering war, jeder Correction; es pflegt bereits am folgenden Tage unter Rückbildung der Ecchymosirung oder der Schwellung der erwähnte Zuwachs wieder in der Abnahme zu sein. Ist die Wandlung dagegen bedeutend, entsprechend Prisma 5°, 6°, so ist eine Correction nöthig. Löst man die Suture zu dieser Zeit völlig, so schlüpft, wie bereits erwähnt, das Auge in die primitive Stellung, wie sie vor Anlegung der Suture bestand, zurück. Es wird also das definitive Weglassen derselben nur etwa da am Platze sein, wo das Operationsmaas ohnedem sich an der Grenze der Indication für die Suture befand. Unter allen andern Umständen muss man darauf bedacht sein, nach Entfernung der Suture eine neue, weniger wirksame, einzulegen. Immerhin soll man, namentlich wenn die Besichtigung des Patienten später als zur 8. Stunde fiel, nach Entfernung der Suture den Gleichgewichtsversuch anstellen, da vielleicht ausnahmsweise schon eine die Stellung etwas influencirende Flächenadhäsion eingetreten sein könnte. Es ist die Anstellung des Versuchs nach entfernter Suture auch aus dem bei Controle des Immediateffects angeführten Grunde rathlich, dass man aus dessen Resultate recht genau das Quantum von Wirkung für die neu einzulegende Suture entnimmt. — Man kann übrigens die Verminderung des Operationseffects bei wenig reizbaren Augen auch dadurch corrigiren, dass man die frühere Suture am Platze lässt und mit einem Faden englischer Seide eine kleine Falte Conjunctiva zwischen Carunkel und innerem Hornhautrand untersticht und umschnürt, in der Weise, nur in viel moderirterem Grade, wie ich es pag. 265 allgemein zur Vermehrung des Effects einer Tenotomie empfohlen habe.



24 Stunden nach der Operation findet man, wie ich im vorigen Abschnitte erwähnt, den Operationseffect in der Regel noch etwas mehr gesteigert, als am Operationsabend. Die Suture darf zwar unter diesen Umständen, da ihr Effect etabliert ist, entfernt werden; bei unruhigen Patienten ist es indessen, namentlich wenn die Steigerung des Operationseffectes ausgeprägt war, rathlich, sie noch einen zweiten Tag liegen zu lassen, damit nicht etwa durch Lockerung der Verlöthungen beim Acte des Herausnehmens der Operationseffect sich über das Maas steigere. — Sollte sich durch ein inzwischen stattgefundenes Ausreissen oder übertriebenes Nachlassen der Suture eine regelwidrige Steigerung des Operationseffectes, entsprechend Prisma  $6^{\circ}$  bis  $7^{\circ}$  und mehr in der Electionsstellung, herausstellen, so muss auch jetzt noch die Suture entfernt und durch eine neue ersetzt werden, welche Gleichgewicht in der Electionsstellung erzeugt. Wenngleich zu dieser Frist, wie wir erörtert haben, bereits Flächenadhäsionen vorhanden sind, die bei ruhigem Verhalten des Auges die Stellung sichern, so werden dieselben doch ausreichend gelockert, so wie man nach entfernter Suture den temporalen Wundrand der Conjunctiva fasst und leidlich energisch vom Augapfel abzieht. — Zeigt sich umgekehrt gar keine Vermehrung des Operationseffectes, so ist zunächst die Suture zu lösen und dem Patienten der Rath zu geben, nach Seite des gesunden Auges hinüber zu blicken. Die hierbei eintretende Innenwendung des operirten Auges wirkt bei den in dieser Periode noch zarten Verlöthungen entschieden steigernd auf die Retraction der abgelösten Sehne.

Am 2. Tage sind ungefähr dieselben Principien für die Nachbehandlung zu beobachten; bei einer dynamischen Convergenz in der Electionsstellung, entsprechend Prisma  $2^{\circ}$  bis  $4^{\circ}$ , keine specielle Ordination; bei etwas grösserer Convergenz, entsprechend Prisma  $5^{\circ}$  bis  $6^{\circ}$ , Einlegen einer zweiten, die Wundränder unterstechenden möglichst horizontalen Unterstützungs-Suture, falls die erstere noch lag,



resp. Wiedereinlegen einer neuen Suture, wenn die erstere bereits entfernt war; bei noch höherer Convergenz, entsprechend Prisma  $7^{\circ}$  und darüber, Entfernung der früheren Suture und Einlegen einer stärker wirkenden, nachdem zuvor die Conjunctiva an ihrem temporalen Wundrand ziemlich energisch von der Episklera abgezogen ward; bei dynamischem Gleichgewicht eine energischere Richtung des Blicks nach Seite des gesunden Auges, welche jetzt am besten durch die üblichen Schielbrillen erreicht wird; bei dynamischer Divergenz Einlegen einer, den Tenotomie-Effect vermehrenden Suture auf der inneren Seite der Hornhaut, selbstverständlich nach zuvor entfernter Conjunctival-Suture, wenn dieselbe nicht, wie unter diesen Umständen anzunehmen, bereits Tags zuvor entfernt war.

Weichen in den nächsten Tagen, etwa vom 3. bis zum 6., die Positionen von den Postulaten ab, so wird man, wo Steigerung des Effectes nöthig ist, noch recht energisch die associirten Bewegungen nach Seite des gesunden Auges durch die üblichen Schielbrillen verwerthen. Es ist wohl annehmbar, dass diese Uebungen auch noch in dieser Periode, wenn auch vielleicht nicht mehr in grossem Umfange, durch Dehnung der zarten Verlöthungen auf die definitive Lage wirken. Anders verhält es sich mit den zu etwaiger Beschränkung des Effectes proponirten Uebungen nach Seite des operirten Auges. Ich glaube, dass dieselben in den ersten 6 Tagen nach der Tenotomie eher das Gegentheil von dem, was man bezweckt, herbeiführen, denn es wird, so lange bei zarten Verlöthungen die Anlagerung noch nicht völlig gesichert ist, eine dauernde Contraction des Externus die Klaffung der Bindegewebs-Wunde und hiermit den Endeffect eher vermehren. Diese Uebungen kommen deshalb in so früher Periode nach der Operation noch nicht, sondern erst später, und dann in einem ganz anderen Sinne, zur Sprache. — Zeigt sich in der erwähnten Periode eine Vermehrung des Operationseffects bis auf Prisma  $5^{\circ}$  allenfalls  $6^{\circ}$ , so kann man,



wie bereits erörtert, falls früher Alles richtig berechnet war, mit voller Sicherheit auf eine günstige Rückbildung derselben rechnen. Zeigt sich dieselbe aber erheblich grösser, so würde immerhin noch das einzige Mittel zur Correction darin liegen, dass man, unter Abhebung des temporalen Wundrandes mit einem kleinen Schielhaken, die Verlöthungen löst und eine neue Suture einlegt. Ich glaube jedoch, dass dies kaum je bei einer aufmerksamen Controle des Immediateffects und Ueberwachung in den ersten 3 Tagen nöthig sein wird, wie denn überhaupt alle angeführten chirurgischen Nachhülfen für die Nachbehandlung höchst ausnahmsweise zur Sprache kommen.

In der 2. und 3. Operationswoche hat man, wie erörtert, bereits wieder ein Rückgehen des Operationseffects zu gewärtigen. Tritt dieses nicht in ausreichendem Grade ein, so werden, etwa vom 8. Tage an, mit gutem Erfolg die associirten Bewegungen nach Seite des operirten Auges, welche wir in der früheren Periode widerriethen, benutzt. Die Lagerung der Theile ist jetzt völlig gesichert, so dass ein Zurückweichen, weder bei dauernder Adduction, noch bei dauernder Abduction, stattfindet. Dagegen haben diese Uebungen, immer durch die üblichen Schielbrillen vermittelt, eine anhaltende Dehnung des Internus zur Folge, wodurch, wie die Erfahrung lehrt, gerade in dieser Periode der Widerstand, den dieser Muskel seinem geschwächten Antagonisten bietet, sichtlich gemindert wird. Man sieht deshalb auch unter Einfluss dieser Uebungen jetzt den Beweglichkeits-Defect rascher zurückgehen und die Grenze der Diplopie nach Seite des operirten Auges hinüberweichen. Selbstverständlich sind diese immerhin lästigen Uebungen nur da zu ordiniren, wo die Rückbildung nicht nach den Regeln, etwa vom Ende der ersten Woche ab erfolgt, was wohl theilweise an einer übertriebenen, elastischen Retraction des Internus nach der plötzlichen Verringerung des Widerstandes liegen dürfte.

Fängt übrigens Patient gegen Ende der 2. Woche



wieder an zu lesen, so sind gleichzeitig mit jenen Uebungen für die Arbeit in der Nähe möglichst starke abducirende Prismen zu ordiniren. Umgekehrt empfiehlt sich in diesen und in den späteren Heilungs-Perioden, wenn es sich um Vermehrung des Effectes handelt, ausserordentlich, adducirende Prismen, mit den erlaubten Concavgläsern verbunden, für die Entfernung tragen zu lassen. Ich habe dieses Mittel bereits früher zur nicht-operativen Kur des dynamischen Auswärtsschielens empfohlen und erfreue ich mich immer von Zeit zu Zeit recht schöner Erfolge desselben, da, wo die Indicationen zur Operation nicht vorliegen; eine noch wichtigere Rolle aber spielt dasselbe gerade in der Nachbehandlung der Tenotomie. Auf die Principien der Methode brauche ich hier nicht zurückzukommen.

Dasjenige Mittel, welches uns bei der Nachbehandlung des gewöhnlichen Einwärtsschielens so ausgezeichnete Dienste leistet, nämlich die Verwerthung grösserer oder geringerer Accommodations-Anstrengungen zur Regulirung des Convergenz-Standes\*), ist hier ausgeschlossen, denn,

---

\*) Von diesem vortrefflichen Verfahren wird zwar jetzt in der Praxis ein sehr umfangreicher, aber noch nicht durchweg ein umsichtiger Gebrauch gemacht. Man darf einem an Strabismus hyperopicus Operirten, selbst wenn sich noch eine ziemlich starke Neigung zu abnormer Convergenz herausstellt, nicht die sein Refractionsleiden corrigirenden Gläser à discretion für alle Zeiten mitgeben, sondern muss ihn womöglich in grösseren Terminen neuen Prüfungen unterziehen, oder, wenn dies nicht statthaft ist, wenigstens darauf aufmerksam machen, mit Verringerung der abnormen Convergenz einen reservirteren Gebrauch von den Brillen für die Entfernung zu machen, resp. dieselben nur für die Nähe beizubehalten oder denselben auch hierfür schwächere zu substituiren. Beobachtet man diese Vorsichten nicht, so kann man zuweilen noch nach 4, 6 Monaten und darüber das Auftauchen eines Uebergewichts des Externus constatiren, welchem sehr wohl durch eine zeitgemässe Verwerthung etwas grösserer Accommodations-Anstrengungen vorzubeugen gewesen wäre. Sofern solche Anstrengungen nicht etwa Ermüdungsphänomene herbeiführen, ist gegen dieselben nicht das mindeste Bedenken



da die Operation des dynamischen Auswärtsschielens vorwiegend als Dienerin der Refractions-Verhältnisse auftritt, so darf sie eine Unterstützung von dieser Seite her nicht in Anspruch nehmen. Wir werden vielmehr, wenn die Tenotomie bei progressiver Kurzsichtigkeit verrichtet war, für den nachträglichen Gebrauch der Augen, für die Benutzung der Gläser u. s. w. alle diejenigen Vorsichten aufs Strengste beobachten, welche uns vor Verwendung grösserer Bruchtheile des Accommodationsvermögens sicher stellen.

zu erheben, da irgend welche gefährvolle amblyopische Zustände durch Accommodations-Anstrengungen bei hyperopischen Augen niemals hervorgerufen werden. Hierin liegt eben ein gewichtiger Unterschied gegenüber progressiver Myopie. — Die richtige Methode in der Nachbehandlung der am gewöhnlichen Einwärtsschielen Operirten besteht darin, den dynamischen Gleichgewichts-Zustand periodisch zu bestimmen und je nach den Postulaten grösserer oder geringerer Convergenz die Accommodations - Anstrengungen, sofern nicht Ermüdungs-Phänomene vorliegen, zu dosiren. Selbst da, wo durch den grössten Theil der Sehstrecke Binocularsehen wiederhergestellt ist, kann die nachträgliche Steigerung des Operationseffectes, bei herabgesetzten Accommodationsanstrengungen, nach Zeiträumen von 4, 6 Monaten zu einem scheinbar plötzlich auftretenden (weil früher dynamisch vorhandenen) Strabismus divergens führen. Ich habe ein solches plötzliches „Umschlagen der Augen“ nach langer Frist gerade da beobachtet, wo hyperopischen Patienten, im Vertrauen auf das wiederhergestellte Binocularsehen, für unbestimmte Zeiten die corrigirenden Convexgläser mitgegeben worden waren. Ueberzeugt man sich in solchen Fällen durch den intervallenweise angestellten Gleichgewichtsversuch, dass mehr und mehr dynamische Divergenz Platz greift, dass endlich die fixirende Stellung fast die ganze positive Fusionsbreite in Anspruch nimmt (die Interni erschöpft), so kann man auch das scheinbar unerklärliche plötzliche „Umschlagen der Augen“ gut prognosticiren; besser noch ist es demselben vorzubeugen, wenn man bei Zeiten (d. h. bei Beginn dynamischer Divergenz) die Brillen abschwächt oder weglässt.

---



da die Operation des dynamischen Auswärtseinschleusens vor-  
wiegend als Dienen der Reaktionen-Verhältnisse antritt,  
so darf sie eine Unterstützung von dieser Seite her nicht  
in Anspruch nehmen. Wir werden vielmehr, wenn die  
Lebensdauer bei progressiver Kurzsichtigkeit vermindert war,  
für den nachträglichen Gebrauch der Augen, für die Be-  
nutzung der Gläser u. s. w. alle diejenigen Vorrichtungen  
mit's strengsten beobachten, welche uns zur Vermeidung  
irgend einer Bruchstelle des Accommodations-Vertrages abhelfen

zu können, da nämlich, welche fehlerhafte, anpassende Zustände  
durch Accommodations-Anstrengungen bei hyperopischen Augen  
entstande hervorgebracht werden. Hierin liegt eben ein gewichtiger  
Unterschied gegenüber progressiver Myopie. — Die richtige Methode  
in der Nachbehandlung der aus gewöhnlichen kranken Zuständen Ge-  
büten besteht darin, das dynamische Gleichgewicht wieder herzu-  
stellen zu bestimmen und so auch den kranken Zustand oder kran-  
ken Contrast der Accommodations-Verhältnisse, wobei nicht  
lediglich die Phänomene vorliegen, sondern, selbst da, wodurch  
der größte Teil der Sehkraft durch die Bruchstelle wiederhergestellt ist,  
dann die nachträgliche Beseitigung der Operationen, bei denen  
gezielte Accommodations-Anstrengungen nach Zuständen von 4, 5  
Monaten zu einem schmerzhaften physischen Zustand (weil früher ge-  
wöhnlich vorhanden) Störungen divergenz führen. Ich habe ein  
solches physisches „Umschlagen der Augen“ nach langer Zeit gerade  
zu beobachten, wo hyperopischen Individuen, im Fortschritt und der  
unvollständigen Bruchstellen, für unbestimmte Zeiten die cor-  
rigierenden Contrasten entgegen werden können. Letzteres man  
auch in solchen Fällen durch den intensiven Gegenstand  
stärker hervorgebracht, das mehr und mehr dynamische Divergenz  
Tendenz greift, dass endlich die ständige Stellung hat die ganz posi-  
tive Fokaldistanz in Anspruch nimmt (die Intensität erschöpft), so kann  
man auch das schmerzhaft unvollständige physische „Umschlagen der  
Augen“ mit progressiver Myopie, das noch bei der kranken Ver-  
änderung, wenn man bei Nerven ist, bei kranken dynamischen Diver-  
genz die Bruchstellen wieder herstellt.







die Operation des dynamischen Ausweichens vor-  
 während als Dienen der Reaktion-Verschleiss anstalt  
 hat sie eine Unterstützung von dieser Seite her nicht  
 in Anspruch nehmen. Wir werden vielmehr, wenn die  
 Maschine bei progressiver Kurvensteilheit versagt war,  
 die den nachträglichen Gebrauch der Augen, für die Be-  
 zeugung der Glanz u. v. alle diejenigen Vorzeichen  
 als strengste beobachten, welche aus der Verwerfung  
 der Bruchstelle des Accommodationsvermögens sicher

...den, da stand welche kühnvolle anstaltliche Zustände  
 nach Accommodations-Anforderungen bei hyperopischen Augen  
 ...den werden. Hierin liegt eben die gewöhnliche  
 ...den progressiver Myopie. — Die richtige Methode  
 ...den der nachträglichen Gebrauch der Augen, für die Be-  
 ...den der dynamischen Gleichgewichts-Nachstand perio-  
 ...den ist festzuhalten, und so nach den Postulaten gewissermaßen  
 ...den der Accommodations-Anforderungen, sofern nicht  
 ...den Postulaten vorliegen, zu denken. Solche da wodurch  
 ...den Teil der Postulaten nachher wiederhergestellt ist,  
 ...den die nachträgliche Einstellung der Operation-Beobachtung, bei lang-  
 ...den Accommodationsunterbrechungen, nach Zuständen von 4. 8  
 ...den zu einem schneller physisch aufzufassen (weil früher dy-  
 ...den vorhanden) ist, dann divergent. Ich habe ein  
 ...den physisches „Entweichen der Augen“, nach langer Zeit konnte  
 ...den, wo hyperopische Linsen, im Fortsetzen und das  
 ...den physische Binnensetzen, für unbestimmte Zeiten die vor-  
 ...den Convergence mitgegeben werden. Beobachtet man  
 ...den in solchen Fällen durch den intermetrischen Gegenstand  
 ...den ist, dass mehr und mehr dynamische Divergenz  
 ...den, dass endlich die fixierende Stellung fast die ganz post-  
 ...den in Anspruch nimmt (die Intermetrie erschöpft, so kann  
 ...den, dass sich daher unvollständig physische „Entweichen“ dar-  
 ...den, dass noch so es anstellen kann  
 ...den, dass man bei Nöthen ist, die dynamische Diver-  
 ...den die Intermetrie nicht verliert.