

**De usu cantharidum interno : dissertatio medica inauguralis ... pro gradu  
doctoratus summisque medicina honoribus ... d. XIX. Martii a. MDCCCLXXXI  
/ eruditorum examini submittet auctor Io. Conradus Stockar, a Neufern ...**

## **Contributors**

Stokar von Neufern Johann Konrad, 1757-1794.  
Royal College of Physicians of Edinburgh

## **Publication/Creation**

Goettingae : Litteris Ioann. Christ. Dieterich, Acad. Typogr, [1781]

## **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/brh9djad>

## **Provider**

Royal College of Physicians Edinburgh

## **License and attribution**

This material has been provided by the Royal College of Physicians of Edinburgh. The original may be consulted at the Royal College of Physicians of Edinburgh, where the originals may be consulted.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

*& Libris Bibliotheca.*

DE  
**VSV CANTHARIDVM  
INTERNO.**

*Medicorum* DISSE<sup>T</sup>ATI<sup>O</sup> MEDICA IN AVGVRALIS

QVAM

*Edinburg-*

*R. L.*

AVCTORITATE

GRATIOSAE FACVLTATIS MEDICAE

PRO

**GRADV DOCTORATVS  
SVMMISQVE IN MEDICINA HONORIBVS**

ET

*PRIVILEGIIS RITE AC LEGITIME CONSEQVENDIS*

D. XIX. MARTII A. MDCCCLXXXI.

ERUDITORVM EXAMINI SVBMITTET

AVCTOR

**IO. CONRADVS STOCKAR, A NEVFORN**  
SCAPHVSA HELVETIVS.

---

*GOETTINGAE,*

*Litteris IOANN. CHRIST. DIETERICH.  
ACAD. TYPOGR.*

LIBER DE MALLEIS ET CURE  
DE GEMMIS ET CURE  
DE GEMMIS ET CURE

*Validiorum remediorum communis ut plurimum fortuna fuit, vt insigniorum neque indifferentium, quas in corpore suscitant, mutationum vi male exhibita, funestos pepererint effectus, ex quibus tamen non modo aliquam prudens Philosophus remediorum illorum deprompsit accusacionem, quin eo maxime titulo laudanda et vera esse remedia censuerit.*

Dom. BROGIANI Tr. de veneno animantium. p. 67.

R54630

VIRIS GENEROSISSIMIS  
GEORGIO STOCKAR  
A NEVFORN

PATRICIO SCAPHVSENSI.

PATRVO PATRONOQVE OPTIMO AC BENEFICENTISSIMO

NEC NON

IO. GEORGIO STOCKAR  
A NEVFORN

MEDICO SCAPHVSENSI VERVDITISSIMO

FELICISSIMOQVE  
AGNATO HUMANISSIMO, ET AMANTISSIMO

ITEMQVE

IO. HENRICO RAHN

MEDICO TIGVRINO DOCTISSIMO ATQVE EXPERIENTISSIMO  
PRAECEPTORI ET FAVTORI MEO PLVRIMVM  
COLEND

OB INSIGNIA SVA CVIVSQVE IN ME MERITA

TENTAMEN HOCCE MEDICVM

GRATI ANIMI DOCVMENTVM,

D. D. D.

AVCTOR.

---

## PRO O E M I V M .

---

Magna de cantharidum vsu et interno et externo inter medicos cum veteres tum recentiores est dissensio. A tempore quidem HIERONYMI MERCVRIALIS, ALEXANDRI MASSARIAE et HERCVLIS SAXONIAE vesicatoria magis increbuerunt, ad variosque morbos sanandos fuerunt adhibita. Omnis de vsu externo controuersia, cum ex priuatis inter autores odiis, tum maxime inde enata est, quod ex sua quisque hypothesi potius, quam ex certis experimentis effectus vesicantium explicarent. Vnde nihil aliud oriri poterat, quam a recta via aberratio. Neque minus falsi sunt, qui in omnibus sine discrimine morbis, quam qui in nullis vesicantia adhibere voluerent. Sed nostra aetate *Dottissimi Medici BAGLIVVS, HVXHAM, WERLHOF, PRINGLE, TRALLES, FORSTEN, AEPLI,* alii vtrorumque litem composuerunt. Nam practicis non minus, quam theoreticis, physiologicis maxime principiis nixi, nobis indicarunt, quibusnam in morbis ac quonam morborum in stadio vesicatoria recte adhiberentur. Verum alia plane ratio est vsus cantharidum interni. Pauci eum admittunt; timent plurimi. Quam timiditatem etiam optimis medicis nostris sollemnem saepe mirari soleo, cum hodie nec vis

A

medi-

medicamenti venenosa id ex selectiori medicaminum apparatu prorsus excludi sinat, nec vero salutares cantharidum interius adhibitarum effectus multorum auctorum testimoniis corroborati, negari possint. Licebit horum hanc in rem experimenta expondere et quae de vsu cantharidum interno tradiderunt, colligere. Neque enim ipse quidquam noui hoc in genere obseruare potui. Sane periculosum est huiusmodi experimentum et valde subactum iudicium requirit. Vnde morbum, hujusque symptomata et causas, aegroti item constitutionem ac temperamentum plane cognoscere debet, qui medicamentum drasticum, venenum, quod cum non prodest, fere semper nocet, adhibere ei voluerit. Fortasse aliquis, me multo peritior, cui et frequentior cantharides adhibendi occasio, hac opella nostra ad plura huius generis pericula facienda, eaque cum orbe litterario communicanda, incitatatur.

---

CAN-

---

## CANTHARIDVM ANALYSIS CHEMICA.

### §. I.

**C**hemia cum vires remediorum ex partibus illorum constituentibus explicat, saepius fallax est, vtpote nisi generaliora tantum doceat. Medicamenta ex partibus gummosis, resinosis, terreis, itemque ex salibus quibusdam componi, inde discimus nos quidem, raro autem peculiarem illorum compositionis modum, nec cur v. g. aliud resinae genus aliter, atque aliud, corpus nostrum afficiat. Pauca tamen de cantharidum analysi chemica dicere non ab re esse puto. Multi auctores, qui de his animalculis scripsere, eorumque tam exterius, quam interius adhibitorum, effectus explanare tentarunt, opinionem suam per experimenta chemica, iisdem instituta, probare sunt conati. Quid quo iure hoc fecerint, infra videbimus.

### §. II.

Natura cantharidum partim ignis, partim variorum menstruorum ope chemice peruestigata fuit. Si vehementior fuerit ignis, varia inde producta accipimus. Omnes quidem auctores sal alcalinum ex iis elicuerunt; sed quidam et acidi quiddam in iis latere; ex suis experimentis statuerunt. T O V R N E F O R T I V S fane a) canthrides recentes examinans, statim a processus initio ex duabus earum libris cum dimidia praeter liquorem alcalinum, sal volatile et oleum, vnam quoque spiri-

A 2

tus

a) Traité de la matiere medicale. T. I. Lib. I. p. 265.

tus acidi libram extraxit. Sed *Cl. FORSTEN* b) recte eum reprehendit, originem acidi huius cantharidum recentium liquoris inde potissimum repetens, quod alimento vegetabili acescente adhuc sint repletæ. Usus etiam forte est *TOVRNEFORTIVS* cantharidibus illis continuo post, quam aceti vapore essent enecatae, eoque modo ex ipsis, quae aquosis partibus adhuc turgerent, leni igni adhibito liquorem acidum obtinuit, qui accuratius peruestigatus, fortasse dilutioris aceti proprietates monstrasset. *Cl. BROGNIART* c) satis late quidem de analysi vermium terrestrium et formicarum exponit, sed cantharides non attingit, nisi, quod eas eadem fere, quae formicas, producta, magnam acidi quantitatem, praebere ait. Cum haec aliorum experimentis, de quibus quidem mihi constat, valde repugnare videantur: operaे pretium fuerit, quae destillatione cantharidum sicca obtinentur, producta paullo accuratius examinare. Liquorem statim ab initio e cantharidibus transeunte variorum reagentium ope tentanti mihi, ille nihil prorsus acidae naturae demonstrabat. Fortasse *Cl. BROGNIART*, aut sicut *TOVRNEFORTIVS* adhibuit cantharides recentes, aceti vapore vixdum enecatas, aut potius ex comparatione cum aliorum insectorum productis acidi aliquid ipsis inesse coniecit; certe breuius analysin cantharidum chemicam pertractauit, quam ut ex dictis ipsis earum naturam satis intelligere possemus.

### §. III.

Alii principium tantum alcalinum in cantharidibus obseruarunt: quod quidem omnium primus, quantum inuenire potui, fecit *OLAVS BORRICHIVS*. d) Hic ignis ope ex Vncia earum una obtinuit olei crassi et foetidi Drachm. vnam, cum minima aquae flauae portiuncula, salisque volatilis vrinosi circiter Drachm. dimidiam. Nihil acidi ullo deprehendit indicio, sal autem vehementer cum acidis effebuit. Plerique dein auctores, qui igne in nostra insecta inqnisuerunt, eadem inde pro-

b) *Diss. med. Cantharidum historiam naturalem, chemicam et medicam exhibens.* Lugd. Batav. 1775. p. 27.

c) *Tableau analytique des combinaisons et des decompositions de différentes substances.* Paris 1778. p. 446.

d) *THOM. BARTHOLINI Acta Hafniensis Vol. IV. p. 185.*

producta acceperunt; sed varia proportione, quae tamen ad rem nostram nihil facit, cum a rebus tantum externis, veluti ignis vehementia, amplitudine vasorum, maiori vel minori cantharidum siccitate ac copia pendeat. Superuacaneum duco, omnia a *PIT CARNIO*, e) *COKBVRNIO*, f) *VERATTO* g) *PROBSTIO* h) aliisque i) facta in cantharidibus pericula enarrare. Nam plane cum *Cl. FORSTENII* k) experimentis congruunt, quae tanquam exactissima et naturam cantharidum, quantumus eam per chemiam illustrare licet, luculenter commostrantia, omnium hic loco breuiter exponam. Is ad processum suum Vnc. XII. cantharidum integrarum, quales apud pharmacopolas reperiuntur adhibens, in operc ipso saepius excipulum mutauit. Scopus enim erat, omnia producta, quantum fieri posset, separata habere. Initio infimum caloris gradum adhibuit, sed hunc sensim ad summum adauxit. Producta omnia haec fuerunt: Liquoris albescantis alcalini Vnc. III. Dr. VI. Gr. X. Salis volatilis alcalini Vnc. I. Dr. VII. Olei rubelli fluidioris Dr. VI. cum dim. Olei profunde rubri, rufi, spississimi Vnc. I. scrup. II. cum dim. Caput mortuum in fundo retortae relictum pondere erat Vnc. III. et Drachm. VII. Eundem *Cl. FORSTENII* processum repetii ipse, sed nihil obseruaui, quod dignum videretur adferre, quia eadem inde producta, quamquam varia proportione habui. Cum sub finem operis, dissoluto apparatu, candelam orificio admouisse, per totam retortam excipulumque pulcherrima flamma caerulea se diffundebat, cuius incensionis causam aëri particulis cantharidum oleosis et volatilibus replete attribuo.

## A 3

## IV.

- e) Opera omnia. Hagae comitum 1722. 4. Tom. II. p. 142.
- f) Transact. abr. T. III. p. 267.
- g) Comment. BONONIENSES T. II. P. I. p. 175. T. II. P. altera p. 115.
- h) I. FRANC. IGNATII PROBSTII Diss. de sale volatili cantharidum. Argentor, 1759. §. III. recusa in WITTWERI Delectu Diss. medicar. argentoratensi. Norimb. 1777. p. 91.
- i) WHITAKER Diss. de cantharidibus, praeside RAV L. B. 1718. §. IV. NEVMANN Praelect. chemicae Edit. ZIMMERMANNI Berlin 1740. p. 1225.
- k) FORSTEN Diss. citata p. 23. Proc. VII.

---



---

 §. IV.

Nuperrime etiam *Cl. THOVVENEI*<sup>D)</sup> corpora animalium, quae medicinae inseruiunt, chemice est perscrutatus. Is, facta analysi chemica formicarum, quibus reperiebat: acidum volatile acre, oleum volatile, oleum pingue et substantiam extractiuam, quorum illud expressione, hanc coctione obtinuit; ex cantharidibus, praeter materiam residuam, quae dimidiā earum partem constituebat I<sup>o</sup> substantiam extractiuam luteo-viridem, superiori illi ex formicis erutae similem, II<sup>o</sup> Oleum flauum et fatuum, III<sup>o</sup> materiem oleosam, concretam et viridem accepit, quae maximam cum cera affinitatem haberet, easdemque etiam partes constituentes demonstraret. Et secundum *Cl. THOVVENEI* vis cantharidum princeps maxime inest in hac ipsa materie. Mixtio partium aequalium spiritus vini et aquae eam penitus soluit. Miror *Virum Cl.* nullam spiritus et salis alcalini mentionem facere. Oleo tantum, quasi parte cantharidum efficaci occupatus fuisse videtur. Sane si unquam destillatione cantharidum sicca, pars earum efficax obtineri potest, in oleo, quod inde separatur, reperiri eam oportet. Sal enim volatile cantharidum, ab oleo adhaerente depuratum, ad salia alcalina vrinosa pertinet et omnes horum salium edit effectus. Ex liquore alcalino, qui destillatione sicca cantharidum, statim ab initio, in excipulum transibat, cum spiritu salis communis saturato, Sal ammoniacum accepi. Ut certior fierem, an in oleo rufo, spisso et perquam foetido, quod igne e cantharidibus extraxeram, vis efficax lateret, sequens experimentum insitui. Quantitatē quandam huius olei primum aqua desillata ab omni adhaerente sale liberaui, deinde ei superaffudi, aequales partes spiritus vini gallici et aquae fontanae. Quamquam satis diu hanc mixturam leni digestioni submiseram, nunquam tamen, ut *Cl. THOVVENEI*, oleum soluere potui. Obtinui equidem tinturam summa amaritie preditam, sed haec in lingua nullum acritudinis sensum excitabat. Eandem cum lenis ignis auxilio spissauissem et extractum cuti admouissem, nec pruritum, nec dolorem hinc percepi et ablato post XII. horas extracto, nec ruboris, nec vesiculae indicia notaui. Ex verbis quidem *Cl. THOVVENEI* non satis appetet, quomodo

D) Histoire et Memoires de la Société royale de Medecine, pour l'Année 1776. Paris 1779. p. 333.

modo efficax oleum suum concretum e cantharidibus elicuerit. Sed Cl. FORSTENII, PROBSTII atque etiam mea experimenta iuculenter satis ostendunt, omnia producta, quae cantharides destillatione sicca exhibent, propria his vi rodenti et vesicante carere, partesque cantharidum efficaces ignis vehementia ita destrui, aut in operatione auolare, ut iure concludere liceat, eiusmodi chemica tentamina, ad naturam horum infectorum illustrandam, aut partes earum efficaces demonstrandas, parum facere.

### §. V.

Disquisitio cantharidum chemica, quae leniori igne instituitur, simulque varia menstrua adhibet, magis quidem partem horum animalium colorum efficacem oculis subiicit, nondum tamen sufficere potest, quod natura earum et in corpus humanum agendi modus inde satis intelligi nequit. Aqua et spiritus vini rectificatissimus, digestione per aliquod tempus continuata, partes cantharidum gummosas et resinosas extrahunt; plusque extrahit aqua, quam S. V. R. — IOSEPHVS VERATTVS<sup>m)</sup> Vnciam cantharidum vnam cum magna aquae quantitate infundebat. Infusione euaporatione inspissata, extractum remanebat pondere Drachm. V. et dim. — Idem Vnciae pulueris contharidum tantum vni spiritus superaffundebat, quantum necessarium esse duxerat ad tinturam oinnem obtinendam: atque igne lento extractum pondere Vnc. dim. obtinebat, CASPER NEVMANN<sup>n)</sup> extracti aquosi fere  $\frac{1}{2}$ ; spirituosi ultra  $\frac{1}{3}$ ; Cl. IAEGER autem <sup>o)</sup> extracti aquosi  $\frac{1}{4}$ , spirituosi  $\frac{1}{15}$  obtinuit. Et Cl. FORSTEN ex aequali cantharidum pondere non tantum extracti, ope alcoholis, accepit, quam per aquam, vbi Vnc. VI. residuum pondere erat Vnc. III. Dr. IV., cum in experimento ope alcoholis instituto ex Vnc. VI. remanerent Vnc. IV. Dr. V.; differentia itaque erat IXDrachm.<sup>p)</sup> Omnes fere auctores in hoc conueiunt, acredinem causticam et virtutem

<sup>m)</sup> Comment. BONON. T. II. P. II. p. 112. 114.

<sup>n)</sup> Praelect. chem. Edit. ZIMMERM. p. 1224.

<sup>o)</sup> KAISER Diff. de cantharidibus earumque actione et vsu Tubing. 1769. praeſide CHR. FR. IAEGER. §. VII.

<sup>p)</sup> Diff. cit. p. 19.

tem cantharidum vnicce propemodum in ea parte quaerendam esse, quam spiritus vini extrahit. Extractum spirituosum vesicas excitare, aquosum autem nunquam, **VERATTI**, **ALEXANDER**, **NEVMANN**, **CARTHEVSE** q) obseruarunt. **Cl. IAEGER** et aquosum et spirituosum efficax inueniebat: *Parau*, inquit, *et ope S. V. R. et ope aquae, effentias easque filtratas ad extracti consistentiam inspissaui.* *Haec extracta ad lingua admota, caustica gaudebant acrimonia et loco vesicatorii adhibita vesicas excitarunt.* r) *Multum tamen, idem inquit alio loco, s) mordaci ardore aquosum superabatur extracto spirituoso, quod idem quoque brachio impositum citius maiorem quam aquosum vesicam excitauit.* Experimenta **Cl. FORSTEN** iit) quae in suo ipsius corpore instituebat, eum docuerunt, nec guminosam, nec resinosa cantharidum partem vi vesicante gaudere, nec tamen superesse in cantharidum puluere excocto. Certe non melius haec auctorum controuersia tolli potest, quam repetita obseruatione. Institui ergo et ipse idem experimentum, et *Vnciam cantharidum vnam, cum aquae Vnciis VIII. in balneo arenae ei ignis gradui submissi, ut mixtura per sex horas leniter ebulliret, filtrataque tintura atque spissata Drachm. II. et Scrup. II. extracti aquosi obtinui.* Ex eadem cantharidum quantitate, ope S. V. R. eodem caloris gradu adhibito, Dr. I. et Scrup. II. extracti spirituosi accepi. Nullam extractum aquosum excitauit vesicam, nec magis ruborem. Extractum autem spirituosum cuticulam satis cito in vesiculam extulit. Eam itaque cantharidum partem, quae spiritu vini extrahitur, in primis vim earum efficacem continere satis appetat, quod nec experimentis **Cl. FORSTEN** valde repugnat. Ille enim cani tinturam cantharidum spirituosam propinavit et prava symptomata inde exorta animaduertit. Immo Drachma vna huius tinturae animal illud fere enecauit, cum tamen grana extracti aquosi viginti, ei nullum symptomia morbosum inferrent. u)

QVO-

q) *Fundamenta Mat. Med. Sect. X, Cap. XIII. §. II.*

r) *KAISER* Diss. cit. §. V.

s) loco cit. §. VII.

t) Diss. cit. p. 37.

u) loc. cit. p. 50.

## QVONAM PRINCIPIO CANTHARIDES AGANT.

### §. VI.

Pauci actionem cantharidum ex mechanicis principiis explicarunt.  
**O L A V S B O R R I C H I V S** *x)* cum nec in oleo, nec in sale volatili cantharidum vim efficacem inueniret, et microscopium illi corpusculum mille spinis inhorrescens monstraret, similitudine eius cum vrticae foliis inductus fuit, vt totam cantharidum vim spiculis earum attribueret, quae non solum cuticulam in vesicam attollere, sed etiam massam humorum ingredi et sic cum sero sanguinis ad renes et vesicam delata illas partes afficere valerent. Attamen quasi mechanicae cantharidum actioni non satis fidens, existimabat vim cuspedum sale earundem volatili increscere atque auctiorem reddi. Omnes cantharidum effectus explicat **F R I C C I V S** *y)* ex particulis illarum aculeatis et pungentibus, a quibus summa partium internarum, vt ventriculi, intestinalium, vesicae erosio oriatur. Huic opinioni etiam addictus est **L I S T E R**. *z)* Atque eidem fauere videtur **C l. C L O S S I V S**. *a)* *Aetio cantharidum*, inquit, *neutriquam est physica, sed mere mechanica*, *Epidermidi impositae, spiculis, quibus armantur tenuissimis et subtilissimis mucum, vasorum capillarium apicibus circumfusum, dissoluunt atque attenuant, remotoque hac ratione naturali illarum operculo, ductus inhalantes paullo liberius subeunt et per hos ad ipsum sanguinem deferuntur, in quem eodem passo quo in mucum illum agunt, naturalem particularum cohaesionem imminuendo, eas ab se inuicem disiungendo et in minores moleculas dividendo*. *Aetio igitur vesicatoriorum, in partes fluidas in hoc confisit, ut maiorem ipsis fluiditatem concilient*. Quibusnam argumentis haec *Viri Cl.* theoria nitatur et quomodo ille sibi omnem cantharidum vim, ex mera mechanica earum actione

*x)* **T H. B A R T H O L I N I** Acta *Hafnienia* Volum. IV. p. 186.

*y)* Paradoxa de venenis. Aug. Vindel. 1710. 8. p. 161.

*z)* In notis ad **I. G O E D A R T I V M** de insectis. Num. 43.

*a)* Noua variolis medendi methodus Traj. ad Rhen. 1766. 12. p. 26.

actione explicare possit, non satis intelligo. Verum quidem est emplastra vesicatoria, quae in pharmacopoliis prostant, plerumque esse nimis infirma, vel plane inertia, et recte precepit Vir Cl. emplastrum emolliens super alutam extensem, cantharidibusque selectioribus liberalius conspersum cuti admouendum esse. Sed emplastra officinarum vesicatoria non ideo subinde repaciuntur inertia, quod spicula cantharidum nimis obvolumantur, nec libere satis in cuticulam agere possint, sed potius propterea, quia cantharidum pars efficax, quae in parte in primis resinosa latet, partibus oleosis et emollientibus emplastrorum inuoluitur sive iners redditur, ob antidotum sumimum, quod partes eae praestant. — Non sufficit cantharidum actionis explicatio mechanica et ne verisimilis quidem est. Extractum cantharidum spirituosum summam vim vesicantem habet et in puluere residuo, ubi aculei adhuc conspici possunt, nulla amplius vis exulcerans obseruatur. Multa etiam exstant insecta, quorum corpora non minus, quam cantharidum aculeis repleta sunt. Nec tamen vila illis inest vis vesicas excitandi. Succus quoque Euphorbiae, Ranunculi aliarumque plantarum pariter vesicatorius est. Nec tamen cuspides, spinasue in illis animadvertas.

### §. VII.

Plerique auctores sali cantharidum volatili fauent et huic in primis vim efficacem adscribunt, omnemque fere actionem in corpus humanum vnicce ex ea virtute deriuant, quam salibus volatilibus alcalinis tribuunt. Cantharidum effectus aliquo modo cum effectibus salis alcalini volatilis conuenire, negari nequit. Vtrumque medicamentum stimulat, circulationem humorum auget, excretiones serosas accelerat, et, si peruerse adhibeatur, praesertim cum humores iam nimio calore et motu ad putredinem dispositi sunt, stimulatione illa, quae caussam putredinis auget, omnino dissolutionem sanguinis promouere potest. Sed alios praeterea effectus edunt canthrides, qui ex principio alcalino volatili explicari nequeunt. Undenam earum vis yasa cutanea simulandi, excedendi, humores serosas sub cuticulam alliciendi, et sic vesiculos excitant? Undenam earum actio specifica in viscera, excretioni vrinae inferuentia? Optime hanc difficultatem auctores fenserunt et propriam

quan-

quandam huic sali cantharidum volatili īdolem, ex qua omnis illarum virtus pendeat, attribuerunt. Ob sal volatile oleosum erodens et stimulans, et ob sulphur volatile cantharides vrinam potentissime pellere. sententia est *W E D E L I I . b)* Insectorum nostrorum vires a sale volatili acerrimo, sulphuris penetrantioris atque impurioris copia adiuto, deriuat *S T E N Z E L I V S . c)* Itaque huic vni principio sulphureo aut alii cuicunque, quod simul cum sale volatili effectus cantharidum exserit, vim, vesicas excitandi et in vias vrinæ agendi specificam adscribendam esse omnia nos docent. Nondum salis volatilis alcalini in cantharidibus existentia experimentis evidenter demonstrata fuit. Omnes fere scriptores chemici in eo conueniunt, ut hoc sal non obtineri posse statuant, nisi igni vehementiori. Quae a *C I . V E R A T T O d)* a *C I . I A E G E R O e)* et a me hoc consilio instituta fuerunt experimenta, nullam unquam effervescentiam demonstrabant, si acida cantharidibus sub variis circumstantiis erant assuſa. Cum nitri quidem acido commixtæ cantharides magnum strepitum excitant, sed certe non ob sal alcalinum; verum ob partes inflammabiles, quae facilime se cum spiritu nitri coniungunt. Ea effervescentia peracta, cantharidum structura prorsus destruitur et ipsæ in magma glutinosum resoluuntur. Eaedem oleum vitrioli tingunt colore nigro sine vlla effervescentia. Videtur itaque opinio illa cantharides principio suo alcalino volatili agere, hoc potissimum niti, quod eae destillatione sicca magnam salis alcalini volatilis copiam praebent. Sed etiam si hoc sal iam antea cantharidibus inesset, quod quide[m] vix admitti potest, tamen non foret pars earum efficax. Aliud plane principium requiritur, a quo vires animalculorum nostrorum pendeant. *C I . P R O B S T* idem sal volatile extrinsecus cuti applicauit, et felici audacia primo Gr. vnum, dein paulatim dosin angens ad extremum Scrup. duo absorbuit, sed nullas vires rodentes, inflammantes et specifice in renes agentes in eo obseruavit. *f)*

## B a

## §. VIII.

*b)* Amoenitates Mat. med. p. 387.

*c)* Diss. de cantharidibus prosperae aduersaeque auctoribus valetudinis. Vitemb. 1740. §. IX.

*d)* Comment Bonon. l. c.

*e)* Diss. cit. §. VII.

*f)* Diss. supra cit. §. IX.

---

### §. VIII.

Sed cum nec mechanice, nec ex principio salis alcalini vis cantharidum explicari possit, aliis acidum quiddam volatile partem earum efficacem constituere videbatur. At iam supra monui per analysis chemicam vix acidum posse in cantharidibus detegi. C A R T H E V S E R g) tamen et Cl. I A E G E R h) hanc amplectuntur sententiam. Nempe cantharidum resinam in primis inueniebant efficacem et quia ad formandas resinas veras, non sal alcalinum, sed acidum tantummodo facit, nostra animalcula vim suam acido debere concludebant. Sed non tam certo demonstratum est, acidum quiddam in resinis omnibus reperiri et etiamsi foret: tamen acidum illud non aliter ex resina obtineri posset, quam igne violentiori iecircoque inter genuina eius educta numerare amplius nequiret. Atque eodem iure, quo hoc acidum, etiam sal volatile partem cantharidum effiacem constituere concluderes. Acida quidem virtutem vesicatorium intendere videtur, sed nihil aliud inde colligi licet, quam actionem cantharidum non in principio alcalino latere, cuius vis omnino rebus acidis debilitatur. Resinam cantharidum principio acido agere non prorsus quidem reiiciam, sed plura adhuc, ut mihi videtur, ad acidum quiddam huic resinae vindicandum, requiruntur experimenta.

### §. IX.

Facillimum quidem plura argumenta aliorum Hypothesibus opponere, sed eis probabiliorem proferre difficillimum. Qua vi, quoque principio cantharides effectus suos edant, nemo adhuc luculentiter satis explicauit, nec quisquam a me postulabit, vt verum insectorum nostrorum agendi modum ceteris omnibus melius explicem. Omnes fere auctores in eo conueniunt, vt partem cantharidum efficacem spiritu vini extrahi putent, iecircoque in partibus resinosis earum vim in primis inesse: id quod iam §. V. abunde, vt puto, demonstrauit. Sed notum est, spiritum vini etiam rectificatissimum non modo resinam e can-

g) Fundamenta materiae medicae Sect. X. Cap. XIII

h) Diss. cit. §. VII. VIII. IX.

**cantharidibus extrahere**, verum etiam partes saponaceas, extractiuas. Vnquam cantharidum vnam cum S. V. rectificatissimo commixtam, per aliquot dies leni calore digesti, tincturam dein cum magna aquae destillatae copia miscui, sicque resinae praecipitatae Scrup. duos et grana quatuor obtinui, cum tamien ante (vid. §. V.) ex eadem cantharidum quantitate obtinuisse extracti spirituosi Dr. I. et Scrup. II. — Luculenter hoc experimentum indicat, S. V. R. etiam alias partes e cantharidibus extrahere quam resinosas. Haec resina cuti a me admota satis cito dolorem ruboremque produxit, et cuticulam in vesicam leuauit. Tincturam a resinae praecipitatione residuam, non minus efficacem inueni. Linteolum enim hac tinctura bene imbutum et cuti admotum, eam in magnam satis vesiculam sero repletam extulit. Partes igitur cantharidum extractiuae, saponaceae, eodem modo, quo resina earum, vim efficacem possident.

## VIS CANTHARIDVM VENENOSA.

### §. X.

Quas nobis Chemia partes cantharidum constituentes praebeat et quoniam principio agant ipsae, hactenus perspeximus. Necesse erit, quaedam de vi cantharidum nocua praemittere ante, quam earum vim salutarem accuratius pernestigemus. Quum omne illud inter venena numeretur, quod, minori dosi propinatam, effectus nocuos, saepe etiam mortem corpori humano infert: animalcula nostra nullo modo ex Venenatorum classe deleri possunt. Ob insignem veneni ipsarum acrimoniam, inter venena acria et corrosiva refertur. In medicorum libris ad cantharidum vim venenatam probandam passim proponuntur exempla, quorum plurima recensita inuenimus a Cl. RUMPEL<sup>i</sup>) et Cl. FORSTEN.<sup>k)</sup> Effectus deterimi qui usum cantharidum internum sequuntur, ut eo melius perspiciantur, liceat mihi locum DIOSCORIDIS re-

B 3

cita-

<sup>i)</sup> Diff. de Cantharidum earumque tam interno, quam externo in medicina usu. Erfordiae 1767. recusa in III. BALDINGERI Sylloge Vol. V. p. 175.

<sup>k)</sup> Diff. cit. p. 120.

citare: *Quibus datae sunt cantharides, inquit, signa eueniunt grauissima.*  
*Ab ore enim ad vesicam usque cuncta erodi sentiantur: picem aut simile*  
*quiddam eedriae resipiunt: dextra praecordia inflammantur, vrinam aegre*  
*reddunt et subinde cum lotio sanguinem emittunt: strigmenta non secut*  
*atque dysentericis alio deseruntur: fastidia urgent: animo linquuntur obor*  
*taque vertagine concidunt, postremo mente abalienantur.* l) Et **BAGLIVVS:**  
*Cantharides inquit, per os sumtae solent pessima producere symptomata:*  
*primo quidem exulceratur vesica et meatus vrinarius, dein paulatim in*  
*flammatur et hepar et erodantur intestina, immensique dolores in hypoga*  
*stro excitantur, quos dolores mentis alienatio et mors subsequitur, nisi*  
*statim expellantur cantharides, vel earundem vis infringatur.* m) Egregie  
 haec demonstrant, totum corpus hoc veneno affici, nec id in vrinarias  
 tantum vias vim suam exsererere. — *Cl. HILLEFELD* n) cani Drachim,  
 vnam pulueris cantharidum praebuit et postquam ea extinctum inuenit,  
 aperto cadauere, vesicam vrinariam contractam, rugosam, vrinae tur  
 bidae pauxillum continentem, in fundo areolis quibusdam inflammati  
 notatam; intestinorum tractum externe rubentem, interne aere inflatum,  
 valde inflatum, quibusdam in locis instar panni atri coloratum de  
 prehendit. In renibus et hepate vidit nihil, quod praeter naturam esset.  
 Sed vesica fellea summe dislenta et bile viscida, atra et fulua repleta  
 erat. Pohnones sanguine fugillati et inflammati: Ventriculi cordis,  
 eiusque auriculae sanguine atro et valde coagulato turgidissimae reperi  
 bantur. *Cl. FORSTEN* o) cani grana XXX pulueris cantharidum dedit,  
 quae citam satis producebant mortem. Et exta animalis, hoc veneno  
 enecati, violentissimorum symptomatum indicia exhibebant, inter quae  
 praecipuum erat inflammatio partium et sanguinis dissolutiv. Vnde au  
 tem hic dissensus respectu sanguinis? *Cl. quidem HILLEFELD* animal  
 suum statim post mortem eius aperuit; at *Cl. FORSTEN* sequenti de  
 num die: quae differentia omnino etiam experimentorum diuersitatem  
 efficere poterat.

## §. XI.

l) *de Medica Materia Lib. VI. Cap. I. p. 903. Edit. MATHIOLI Venetiis*  
*1670 sol.*

m) *Diss. de usu et abusu Vesicantium Cap. II. §. 4. v. Ei. opera. Lugd. 1704.*

n) *Diss. Experimenta circa venena Goetting. 1760. S. III. p. 65.*

o) *loco cit. p. 50.*

## §. XI.

Quamquam ex his appareat, canalem intestinorum valde a cantharidibus inflammari: tamen princeps earum vis in vias vrinarias agit. Symptomata his in partibus a cantharidibus excitata sunt haec, ardor inflammatorius, penis erectio molesta, libido immoderata et coëundim desiderium insatiabile, stranguria, ischuria, mictus cruentus, inflammatio renum, vesicae, penis et tandem his ipsis in partibus gangraena. Refert PARAEVS scortum iuuenem quendam lauta coena exceptisse, additis etiam condimentis, puluere cantharidum conspersis: qui postero die virga rigida et ano sanguinem reddiderit et frustra exhibitis medicamentis interierit. p) LANZONI obseruauit, ex tabaco, cui cantharidum puluis immixtus fuerat statim sumnum capitis dolorem cum minctione cruenta esse exortum. q) HERMANN comperit, vel quartam grani partem eiusdem pulueris aliquando renes inflammaasse, unde diuresis copiosa, dolorifica, immo cruenta. r) Italum quendam robustum, succique plenum, sumto puluere, ex satyrio, pipere longo, et cantharidibus composito, magnis ventris torminibus et vomitu continuo exagitatum esse, auctisque tandem ventriculi vniuersique abdominis doloribus, tribus interiectis diebus perissc SCHENKIVS auctor est. s) Idemque memorat atque etiam BACCVS, t) virum quendam ad pellendam vrinam suppressam pollinis cantharidum ad quatuor grana sumfisse et post tres horas summo ventris cruciatu decessisse. Iuuenis quidam expetulantia duodecim muscas Hispanicas deuorauit. Media nocte exorti atrocissimi dolores ventriculi, ventris, renum, immo totius corporis, sanguineisque maximo cum dolore minxit. Vomitorio tamen, enematibus lenitiuis, inunctionibus oleosis, potu lactis recentis, intra paucos dies feliciter restitutus fuit. Ratio autem cur tanta cantharidum copia interemptus non fuerit, haec est, quod et integras fere eas deuorauerat et statim ab initio summa diligentia est curatus. u)

Tan-

p) v. LANZONI Obs. med. T. I. p. 147.

q) Obs. med. T. I. p. 275.

r) Cynosura mat. med. Pars II<sup>da</sup> Edit. BOECLERI p. 56.

s) Obseru. med. rariores. Lugd. 1644. folio. Lib. VII. obs. 35. et 40.

t) de venenis et antidotis. Romae. 1586. 4. p. 23.

u) HILDANI obseruat. medicae ex edit. 1. s. HENNINGERI. Argent. 1713. 4. T. I. p. 220.

Tanta denique est huius animalis in vesicam et prouocondae  
 vrinae sanguinisque mictum excitandi vis, vt non solum interne datum,  
 sed etiam exterius impositum, effectus illos saepius prodere soleat.  
 Ex vesicatorio ceruici applicato incidit femina in inflammationem ve-  
 sicae, ardorem vrinae et tandem in mictum eruentum. *x)* HENR. AB  
 HEER vidit puellam, quae cum in eius collo esset bubo pestilens et  
 huic applicitum esset vnguentum, quod multas continebat cantharides,  
 postridie mane conuulsa et miserabiliter cruciata interiit, postquam vrina  
 sanguinea matulas aliquot implerat. *y)* PARAEVS nobilis feminae vni-  
 versae faciei, quae vndique pustulis ardentibus et aequo foedis, atque  
 in Elephantiasi deformabatur, vesicatorium imponebat. Paullo post in-  
 signiter illi ardore vesica, ceruix vero vteri intumescere coepit, cum  
 ipsa torminibus, assiduo vomitu et febre acuta vexaretur. Variis reme-  
 diis tamen omnia symptomata mitigabantur. Cum tota facies in ves-  
 cas esset sublata, multa inde sanies prorumpebat et tandem deformitas  
 faciei in perpetuum euanescebat. *z)* Quidam cantharides genibus ap-  
 plicans, quinque amplius libros sanguinis minxit. *a)* FABRICIVS AB  
 A Q V A P E N D E N T E appositis capiti cantharidibus, vrinae suppressionem  
 superuenisse vidit, non quod eae vtantur facultate vrinae supprimendae,  
 vt ait, sed quia tam copiosa vrinae secretio facta fuerat, vt, nimis  
 repleta vesica, resolueretur vis eius excernendi. *b)* Apud HILDANVM  
 ab adhibito ad tumens genu vesicatorio, dolorem lumborum, renum  
 et totius ventris, cum tanto vrinae ardore exortum esse legimus, vt  
 homo sine cruciatu et eiulatu ne guttulam quidem emittere posset. *c)*  
 Optime autem exempla eorum, qui veneris stimulandae consilio can-  
 tharides sumebant, nobis probant, eas praecipue partibus vrinariis et se-  
 minis secretioni et excretioni inferuentibus inimicas esse.

## §. XII.

*x)* Miscell. Acad. Nat. curi. Dec. I. An. II. p. 178.

*y)* Obseru, medicae. L. B. 12. 1685. obf. IX.

*z)* Opera chirurgica. Francof. ad Moen. 1594. folio, Lib. XX. de venenis,  
 Cap. XXVIII.

*a)* LINDESTOLPE de venenis p. 136.

*b)* Chir. p. 688.

*c)* Obf. T. I. p. 217.

---



---

### §. XII.

Satis iam ex his cantharidum vis maligna elucet. Ab omni etiam tempore medicorum diligentia hoc occupata fuit, ut antidotis aptis earum vim infringere, et symptomata inde orta idoneis remediis tolleret. Non difficile est agnoscere, hoc venenum alicui esse propinatum. Symptomata, quae usum cantharidum sequuntur, veneno illi tam propria sunt, ut medicum non facile dubium reddere possint. Praeter saporem oris amarum, doloris sensum in hypochondriis, adeo pruritus in pudendis, stranguria, mox urina cruenta, quae cum summo ardore et guttatum secernitur. Nisi securratur statim, animi diliquum, delirium, vertigo, conuulsio et tandem mors superuenit. Omnia antidota generaliora, quae aliis venenis corrosiuis opponi solent, etiam hic optimo cum successa adhibentur. Statim ab initio opera est danda, ut fomes irritans ex corpore euacuetur: quod optime fit vomitorii. Vomitoria autem nou esse debent irritantia; aqua tepida melli mixta huic indicationi iam satisfacere potest. Eliminato sic fomite, symptomata nisi nimis vehementia sunt, potu diluente, oleoso, refrigerante, facile tolluntur. Si in intestinis iam materia irritans latet, clysmata emollientia, purgans antiphlogisticum mannatum, tamarindinatum prodefit. In primis autem vesicae urinalis ratio habenda, et remediis tam externis, quam internis inflammatio hoc in loco praecauenda est. Solo lactis recentis paullo largiori potu maxima dysuria, ardor, dolorque ab infuso cantharidum commotus, profligatus fuit, teste W E D E L I O. *d)* Cantharidum antidotum praesentaneum efficit lac natuum et artificiale. *e)* Mucilagines ex sem. frigid., pinguia iuscula, emulsiones, olea, oua sorbilia, theriaca, decoctum maluae, oxymel simplex, acetum et putredini resistentia acida, ab aliis ad antidota cantharidum referuntur. Quorum remediiorum usui externa quaedam, venaesectionem, inunctiones abdominis oleosas, in primis circa pubem, clysteres, semicupia tepida, injectiones in vesicam emollientes et anodynias adiunxerim.

### §. XIII.

*d)* de Medicament. compos. p. 63.

*e)* W E D E L Ammonit. Mat. Med. p. 342.

---



---



---

### §. XIII.

Cantharidum autem antidotum quasi specificum est Camphora. Quod animalcula nostra interne in morbis tuto adhiberi possint, mixtioni earum cum hoc remedio debemus. 10. GROENEVELT f) primus nos docuit camphorae hanc in rem usum: *Cantharides, inquit, optime camphora corrigi, a plurimis annis expertus sum. Est remedium aptissimum, prae aliis omnibus ad vim cantharidum septicam corrigendam.* Ex virtute camphorae alexipharmacis et effervescentias praeternaturales tollente, acute satis conuiebat idem, eam aptissimam fore acutis et septicis cantharidum particulis obtundendis et acrioribus, quae ipsae praebent, salibus temperandis. Nec conjecturae ipsius repugnabat experientia. Iuvenis enim, cui commilitonum petulantia largani satis cantharidum dosis cum vino propinarat, paucis horis elapsis, pruritum et punctiones sensit, tandemque ardorem summum atque stranguriam intolerabilem passus est. Ex venaelectione, emulsionibus, injectionibus, opiatibus, nihil leuaminis aeger percipiebat. Itaque diebus quinque elapsis, duos camphorae scrupulos, in duplicem bolum formandos, praescripsit GROENEVELT. Prima dosis dolores quam maxime subleuauit, ultima plane sustulit. g) Hac obseruatione fretus Vir Cl. cantharidibus saepius camphoram iunxit et mirabiles inde in morbis successus expertus est. Ex hoc tempore usum cantharidum internum minus timere possumus. Exigua quoque camphorae dosis metuendam cantharidum acrimoniam obtundit. Ill. HVXHAM frequentius camphora usus est ad cantharidum acrimoniam corrigendam. Nihil spicula salium, inquit, quam hoc summe subtile, volatile, vegetabile sulphur efficacius obtundere bene cognitum habeo: mercurii immo quoque praeparationes hoc multo redduntur mitiores. h) Experimenta a Cl. FORSTENO instituta i) etiam magis hanc rem illustrant. Camphora cum eadem cantharidum pulueris quantitate

f) de tuto cantharidum in medicina usu interno. Londini. 1698. 12. p. 32. — Anglice edidit, multisque obseruationibus hunc tractatum auxit IOH. MARTEN A. 1706. Valde doleo, me hanc posteriorem editionem non ad manum habere.

g) liber cit. p. 61.

h) Opera physico medica cura REICHELII Lips. 1773. Tom. II. p. 116.

i) Diss. cit. p. 40. et 51.

titate mixta, et cuti apposita, vesicantem horum infectorum vim ita infregit, ut nullam ea cuti mutationem inducerent. Cani vbi Drachm. cantharidum dimidiā cum granis XX camphorae propinarat Vir Cl., leuia tantum symptomata orta sunt. Magis aegrotabat canis, cum ingesserat pulueris cantharidum Gr. XXX cum Gr. XII. camphorae mixta; rediit tamen ad sanitatem pristinam. Idem etiam Cl. Auctor in oleo olivaru[m] et theriaca Andromachi vim inesse inueniebat cantharidum proprietatem venenosam infringendi. Optime ergo haec antidota, si satis caute agatur, tam interne quam externe contra vim cantharidum adhiberi posse haud dubitat.

## VSVS CANTHARIDVM INTERNVS GENERATIM.

### §. XIV.

Effectus noxiui, qui usum cantharidum internum sequuntur, etiam viros in nostra arte celeberrimos, non procul deterrueront, quo minus eas ad profligandos morbos, remediis lenioribus non facile curandos, adhiberent. Verum quidem est, summam vim deleteriam iis animalculis inesse: sed omnia exempla, vbi mors ab illis inducta fuit, probant, eas hunc effectum aut propter nimiam quantitatem sumtam, aut propter constitutionem hominis earum usui aduersam, edidisse. Nunquam conueniunt, vbi plethora, nimia corporis sensibilitas et siccitas adest. Usus cantharidum internus antiquior est externo, saltim magis frequentatus apud veteres. HIPPOCRATES, GALENVS, DIOSCORIDES, P. AEGINETA scopo potissimum diuretico eius meninerunt. Verum hi non eandem, quam nos, cantharidum speciem adhibuerunt. Nam duae omnino cantharidum species a medicis in usum vocatae sunt, *Meloë Vescatorius* L. et *Meloë Cichorei* L., quorum hic a veteribus medicis adhibitus fuit, ille vero nostro tempore usurpat et in pharmacopoliis ad usus medicos proflat. Utramque tamen speciem viribus inter se couenire nos docet DIOSCORIDIS descriptio (v. supra §. X.) effectuum Meloës cichorei, qui omnino cum effectibus nostrae speciei conueniunt. Recentiori quidem aetate a pluribus cantharides in morbis tentatae fuerunt; sed earum obseruationes per varios libros dispersae

reperiuntur. THOM. BARTHOLINVS, GROENEVELT et superius BRISBANE aliique *Angli* frequentissime eas adhibuerunt. At hominum viorum experientias deinde adducam, cum illos morbos, ad quos curandos prodest possunt cantharides, recensabo.

### §. XV.

Non ab re esse ducam, generaliora quaedam praemittere atque indicare qualiter vim cantharides interius exhibitae, tam in solidas quam in fluidas nostri corporis partes habeant, si paullo minori dosi propincentur. Ex summa earum vi stimulante et diuretica omnem mutationem, quam corpori inducunt, si interius adhibeantur, explicare possumus. Cantharides a veteribus usurpatae fuerunt, vbi magno stimulo indigere corpus, illudque expurgandum esse, iudicabant. Illa pars cantharidum, quae proprie est activa, caustica et irritans, in canali intestinali ab humoribus, digestioni inferuentibus, soluitur, diluitur, per vasa lactea cum massa humorum circulantium commiscetur et hoc pacto ad remotiores corporis partes delata, manifestos ibi effectus edit. Hoc principium agit in partes solidas, per quas meare debet, illis stimulandis et ad frequentiores ac fortiores motus incitandis, ne quisque illarum stimulo suo commouendis. Circulatio igitur humorum ac sanguinis augetur, oritur febris artificialis, partes solidae maiorem in fluidas actionem acquirunt, sanguinis particulae magis inter se miscentur, serum viscidum dissoluuntur et sic obstrunctiones tolluntur. Vis cantharidum resoluens et massam humorum tenuorem reddens a vi earum stimulante deriuetur oportet. Experimenta quidem BAGLIVI *k)* atque etiam FORSTENI *l)* in sanguine humano extra corpus instituta, demonstrant, cantharides sanguine humano mixtas eum dissoluere et ad putredinem disponere, si sanguis calori ei exponatur, qui corpori humano est naturalis. Contrarium VERATTVS statuit *m)* et vidit, sanguinem a cantharidibus admixtis potius coagulari. Et tamen experimenta sua in sanguine hominum diuersi temperamenti, qui et variis mor-

*k)* Diss. de Vesicantibus et Ei. opera p. 581.

*l)* Diss. cit. p. 56.

*m)* Comment. BONONIENSES Tom. II. P. II. p. 109.

morbis laborabant, varia tempestate, variaque aëris temperie instituit. Sic. et *III. PRINGLE, n)* *Cl. PERCIVAL o)* et *GESNER p)* nullam putredinem aut dissolutionem obseruarunt a puluere cantharidum sanguini extra corpus admixto. Sed etiamsi sanguis a puluere cantharidum adiuncto dissoluatur: vix tamen credi potest, talem effectum parua pulueris cantharidum quantitate in tota massa sanguinis circulantis produci. Tunc denum humorum putredo ab vsu cantharidum timenda erit, vbi iam antea corpus ad eam est proclive et circulatio sanguinis aucta eandem arcessere potest. Summam utilitatem a cauto cantharidum vsu nobis exspectare licet, quando corpus serosis et viscidis impuritatibus turget, quae neruos et vasa relaxant, eorumque actiones impediunt, sicque a solidorum flacciditate ac languore maxima imminent pericula. Canthrides ab *HIPPOCRATE* non praescribuntur, nisi quoties fortiori stimulo opus est, quo nerui flaccescentes, motuique et sensu rite promouendo non amplius pares, irritentur. *q)* Nocent autem canthrides, etiam cum minima dosi adhibentur, corpori nimis tenui et sicco, vbi iam adest nimia solidorum rigiditas, viresque naturæ nullo stimuli augmento indigent. In nulla ergo febre acuta tuto usurpari possunt, neque magis in statu corporis plethorico.

Canthrides interius adhibitae scopo antispasmodico aliquando utiles esse possunt. Cum spasmus et inflammationem in renibus excitent: ad prophylaxin Hydrophobiae facere videntur. Non facile autem earum usum ferat corpus irritabile, et ad motus spasticos nimis proclive. Fibrae musculares ab hoc medicamento, quod summam stimulandi vim habet, potius ad motus inordinatos incitantur. Caute itaque in omni morbo, vbi systema neruosum valde affectum est, propinandum erit.

## C 3

## §. XVI.

*n)* Beobachtungen über die Krankheiten einer Armee. Anhang p. 450.

*o)* Essays Vol. I. p. 183. confer Samml. für pract. Aerzte Band 2. Stück 2. p. 106.

*p)* Sammlungen von Beobachtungen. III. Band. p. 196. sequ.

*q)* v. STENZELII Diff. de cantharidum et his similiū medicamentorum calculis compactis atterendis minus parium virtute Vitemb. 1741. §. X.

---



---

### §. XVI.

Vis cantharidum euacuans, in primis per diuresin, alium nobis praebet modum, quo ad varios eae morbos sanandos prodesse possunt. Ab omni tempore cantharides inter remedia vrinam mouentia relatæ fuerunt. Potentissime omnium vrinam pellunt cantharides, sed caute iis est vtendum et dosi refracta. *r)* Frequens et felix earum usus in Ischuria et Hydrope, de quo poslea videbimus, hoc egregie demonstrat. Difficile est, causam indicare, cur cantharides tam interius quam exterius usurpatae, inimicissimae sint organis vropoëticis. Vires corporis nostri naturales semper in eo occupatae sunt, ut materiem acrem et nociuam, quæ massæ humorum similis fieri nequit, eliminent: unde etiam materiae acri cantharidum exitum per renes parant. Omnis ergo cantharidum vis in has in primis vias dirigitur, eaedemque ob vim suam stimulantem semper maiorem seri quantitatem alliciunt, atque adeo diuresin quam maxime augent. WILLISIVS iam causam, cur vasa vrinalia a cantharidibus laedantur, nec tamen aliae corporis partes similiiter afficiantur, explicuit. *Aciores cantharidum particulae, a sanguine imbibitae, inquit, totum eius serum inficiunt: qui tamen latex ita aculeatus, quam diu cum sanguine balsamico confunditur, nulli parti afficit, verum ab hoc per renes separatum, quandoque illis noxam affigit et vesicae collum non modo acrimonia sua vellicat, sed etiam corrodens inde mucum ac pelliculas, immo et cruorem abscedere facit. In sanguine autem eaedem particulae aciores, sanguinis compaginem nimis striclam reserant, adeoque recrementa serosa, prius inuisata ab ea secerni et per vrinas et sudores facilius amandari faciunt. Porro vias obstructas reserant atque sanguinis aut seri portiones alicubi stagnantes commouent et circulationi reddunt. s)* Stranguriam, miętum cruentum et interdum vrinae suppressionem cantharidum usum sequi ex §. XI. perspici potest. Quomodo autem hunc effectum cantharides exserant, ex verbis *ILL. GLASS* patet: *Cantharidum venenum, inquit, quacunque denum via sanguini admisceatur, vesicam potissimum petit et primo quidem mucum vias vrinae oblinientem consumit, deinde fibras illarum exquisite sentientes lacefit; unde hæ partes do-*

*r)* WEDEL Amoenit. Mat. Med, Lib. II. S. II. C. X. p. 387.

*s)* *Pharmacia rationalis.* P. II. S. III. C. III. de Vesicantibus. v. opera. Geneuae 1686.

*dolores habent atroces. Si vero vasa vltima renum tomentosa eroduntur, sequitur mihius cruentus, si membranae vreterum et vesicae, supra cruciatus pelliculae cum urina redduntur, si fibrae musculares, renum papillas ambientes, distenti ne ab acri cantharidum stimulo corripiuntur, retinetur ex toto urina, vacua interim vesica. t)* In loco neruoso et acutissimi sensus, facillime solutae atque exasperatae cantharidum particulae, dolorem et inflammationem excitant. Minor enim liquoris mucosi quantitate, quam cetera vasa, interior vesicae vinalis superficies oblituit ac defendit; nec in aliam quamcunque corporis partem, quamdiu quidem circulatione humorum in motum trahuntur, vim rodente exserere possunt particulae eae. In renibus autem et vesica vinalia cum quiescant: neruosam membranam irritare queunt. Si autem recte et caute adhibeantur, sine vlla viarum vinalium labe diuresin promouent et vniuersi corporis fordes per renes et vesicam vinaliam exonerant, ALLIONI noluit theoretice inquirere, quid canthrides in homine viuo agant, cum ad sanguinem et serum peruererint, sed experientia didicit, vnam cantharidum vsu cieri, actionem vasorum excitari, haerentes humores in circuitum pelli, hosque attenuandi consilio illas a practicis adhiberi. Certum esse, acria pleraque et quorum natura causticis proxima, lenitos humores soluere. u) In seri excessu et solidorum flacciditate, canthrides, vt fortius remedium stimulans et diureticum adhiberi possunt.

### §. XVII,

Vesicatoriorum effectus, quod ad stimulandi virtutem attinet, cum effectibus usus cantharidum interni congruunt. Vis vesicantium irritans et caustica princeps est, et ex illa fere omnes reliquae explicari possunt. Irritando vesiculam sero plenam excitant: et si vlcus istud diutius aperturn seruetur, vim reuulsoriam exserunt. Ad retiellendos igitur succos malos a sedibus corporis internis, eosque ad cutem deriuandos usurpari solet id genus remedii. In morbis spasticis summae utilitatis sunt vesicantia et vim antispasmodicam exserunt, dum aliam sensationem in cutem

t) Commentarii de febribus. Editio curante Ill. BALDINGER. Ienae et Lipsiae. 1771. p. 159.

u) Allioni tract. de miliarium progressu, §. 225, 226.

tem inducunt et humores noxiōs à partibus nobiliaribus deducunt. Ob eandem etiam virtutem antispasmodicam inflammations topicas solunt, si venaesactio[n]es necessariae anteā sint instituta[e].

Principium autem cantharidum acre et volatile in systema vasorum immisum, et per illud diffusum eosdem effectus in corpore excitat, quam si per os massae humorum traditum foret. Attamen exigua tantum quantitas intermentu vesicatoriorum resorbetur. Nam unius grani dimidium, ori inditum, in viis urinariis magnos interdum edit effectus. Cum e contrario vesicatoria cuti applicata raro huiusmodi effectus exserant. Haec itaque longe minor quantitas, in tota humorū massa dispersa, vix potest sanguinem mutare per se[me] et putrefactionem nostris humoribus inducere. Sed propter vim suam stimulantem in partes solidas corporis efficacior est. Nam vesicantibus febrem artificiosam induci licet. In febribus cuti imposta intendunt, cum sitim, tum linguae ariditatem: pulsus frequentiores et celeriores redduntur: aliquando etiam plane eandem vim in vias urinales demonstrant, ac si canthrides interius propinatae forent, qua de re supra §. XI. Consensum quidem inter neruos cutis et renūm non nego, sed ex eo vim vesicantium in vias secretioni urinae inseruientes explicare necio. Cum cantharidum interne adhibitarum specifica in vias urinae vis non consensui neruorum ventriculi et intestinorum cum neruis renūm; sed potius materiae acri per circulationem sanguinis ad renes delatae adscribatur: resorptionem in vesicatoriorum applicatione animaduerti, negare non possumus. Resorptioni enim, cutanea non magis quam intestinorum vasa resistunt. Atque aut omnium fere medicamentorum per vasa lāctea in sanguinem transitum negari oportet, aut materiam cantharidum acrem, liquoribus intestinorum solutam, resorberi. Experientia etiam illa, ex medicamentorum saturniorum applicatione saepius dolores colicos ortos esse, satis demonstrant, remedia summe adstringentia sanguinis massam per cutem intrare posse. Sina-pismi, ignis, aliaque caustica, cuti admota, eam quidem valde irritant et in vesiculam attollunt: nunquam tamen inde stranguriam ortam esse animaduersum est. Particulae cantharidum, quae in sanguinem penetrant, praecipuam virtutis vesicantium euacuantis caussam constituant. Vires naturae ab iis intenduntur, actio solidarum in fluidas augetur, stagnatio

gnatio humorum praepeditur, secretiones et excretiones incitantur. Inde cantharidum, exterius applicatarum, virtus diaphoretica, diuretica, sanguinemque purificans facile intelligitur. Sed haec sufficient, de vſu cantharidum externo, qui ad scopum meum proprie non pertinet. Iam recensita antea methodo, qua cantharides optime interne proponentur, ad illos morbos, quibus feliciter adhibitae fuerunt, transibo.

## MODVS ADHIBENDI CANTHARIDES.

### §. XVIII.

Diu a veteribus disceptatum fuit, vtrum omnibus cantharidum partibus eadem vis efficax inesset, an potius caput, alae et pedes essent reiiciendi, quia his maxime in partibus venenum latitaret. Vix operae pretium foret, omnes hac de re auctorum opinones adferre. Experimenta *Cl. FORSTENI*<sup>x)</sup> nos docent capitibus, pedibus et elytris cantharidum non prae reliquis inesse vim causticam vel venenosam, sed illas partes potius pro inertibus et vesicante vi expertibus esse habendas; ventribus autem earum in primis inesse vim causticam et venenatam. Omnes itaque partes cantharidum hodie recte ad vſum medicini adhibentur. — *G E Y E R I* iam sententia fuit<sup>y)</sup> cantharides totas esse assertandas ac praeparandas: et si hoc legitime fiat, iusta que obseruatur dosis, posse sine discrimine omnes partes dari. *HIPPOCRATES*, qui primus vſum cantharidum internum suavit, eas in substantia dedit, vel cum aqua vel cum vino albo. Quod extremitates semper reiici iussit idem, id *S T E N Z E L I V S* propterea factum existimat, quia hae partes duriores et solidiores difficilis soluantur, et sic haustae sua asperitate multa creare queant mala. <sup>z)</sup> Praeparatio ita instituta, vt cantharides plane comburantur,

vix

<sup>x)</sup> Diff. cit. p. 40.

<sup>y)</sup> v. *G E Y E R I* Tractatus de cantharidibus. Francofurti 4. 1687. Cap. I. §. 6.

<sup>z)</sup> Diff. de Dantharidibus prosp. aduersaeque auctoribus valetudinis, Vit. 1740. §. IX. p. 28.

vix admittenda est. Nam tostione vis earum caustica fere prorsus tollitur, vt non eosdem in corpore edere possint effectus, qui tamen semper requiruntur, si cantharides in morbis cum successu adhiberi volumus. Magis mihi arridet methodus illa, qua simul cum camphora praescribuntur. Camphora mitigat cantharides; nec tamen vim earum admodum infringit. GROENEVELT aut cantharides cum camphora miscebant aut duas horas post cantharidum adhibitionem dabat bolum ex camphora. Dosis huius remedii, si id in substantia adhibeatur, vix definiri potest. Magnam certe quantitatem GROENEVELT praescripsit: Rec. Cantharidum integrarum grana XXXVI. Camphorae oleo amygdal. dulcium solutae Scrup. duos, cum conserua Nymph. qu. satis, misce, fiat Massa, ex qua formentur Boli N. VI. quorum vnum capiat aegrotus quarta quaque hora. a) Optime a minori dosi, grano tantum dimidio aut integro incipiatur, et saepius haec dosis repetatur: qualis cautio in omnibus remediis drasticis valet. Proderit fortasse eas minori dosi et sine camphora dari. Nam omnium venenorum debilitantur vires, si cum antidoto exhibeantur.

Alii, quibus integrorum animalculorum usus minus placuit, varias ei praeparationes preferunt easque tutiores putant. WILLIS b) tinturam diureticam parat, ex Millepedibus, Apibus, Cicadis et Cantharibus, cum tintura salis tartari, cuius dosis a guttis XV ad XXX in vehiculo idoneo. THOM. BARTHOLINV<sup>s</sup> sequentem infusionem nobiscum communicat: Scrup. unus cantharidum in puluerem redactus infundatur in Vnciis tribus ad quatuor vini Rhenani, stetque in infusione per aliquot dies, dein per chartam bibulam filtretur. Ex colato liquore cochlear vnum septem aliis seu vini seu cereuisiae admisceatur, et ex hoc mixto primo die vnum, altero duo et sic deinceps propinentur. Tinctura cantharidum in FULLERI *Pharmac.* ita paratur: Rec. Pulueris cantharidum Vnciam semis, Spiritus Nitri dulcis Vnc. unam. digere per horas XXIV. dein adde spiritus vini camphorati Vncias tres, fiat digestio.

a) Liber cit. p. 121.

b) *Pharm. rationalis Pars I. Sect. IV. Cap. II.*

digestis per aliquot dies, postea filtrā. Dosis est guttarum IV ad XX bis de die in decocto Maluae. Securissima ac commodissima forma, qua cantharides praescribuntur, est tinctura spirituosa: Rec. Cantharidum contusarum Drachm. duas, Coccionellae Drachm. semis, spiritus vini simplicis sesquilibram. Digere per quatuor dies et cola per chartam, quae tinctura a guttis X ad XXX bis de die cum aqua fontana dari potest. Optime vim suam exferant cantharides, si initium cum parua dosi faciamus, et in quaque propinazione dosin aliquot tincturae guttis augeamus, donec leuis stranguria in vrinae excretionē oriatur. Dosis dein aliquantulum diminuenda est et usus tincturae continuandus ea quantitate, ut non amplius incommode inde sentiat aeger; attamen tanta, ut minimum dosis augmentum eandem rursus sensationem foret excitaturum. Si constitutio corporis nec minimam dosin ferat, et mali effectus sequantur, summum leuamen, et securitatem, idem medicamentum meliori successu adhibitum iri, ab emulsione camphorata nobis exspectare licebit. Si cantharides iussum vocantur, nunquam ea cautio negligenda est, ut corpus ad illum praeparetur potu diluente et demulcente. Et in adhibitione cantharidum ipsa emulsiones ex amygdalis et gummi arabico, aut etiam lac nativum optime nimiam cantharidum stimulandi vim et actionem earum nimis vehementem in vias vropoēticas mitigat.

Tincturae cantharidum *Pharmacopeae Londinensis* et *Edinburgensis* alia adhuc remedia simul adhibet, ut Balsamum de Copaiua, Gummi Guaiacum, puluerem Rhei. Sed cum guttatim tantum tinctura Cantharidum propinetur et minori dosi, quam ut alia remedia effectum salutarem in corpus edere possint: vix ab ea admixtione aliquid boni exspectari potest. c) Aliae Cantharidum praeparationes aut minus usitatae sunt, aut usum tantum externum respiciunt, ut varia emplastra vesicatoria, vnguenta episistica, oleum, balsamum, extractum, electuarium, morsuli, magisterium cantharidum, quae praeparata omnia apud G E Y E R V M d) descripta inuenimus et ipse hic, quia ad consilium meum proprie non faciunt, praetermitto,

D 2

CAN-

c) LEWIS Mat. Med. London. 1761. 4. p. 174.

d) Tract. cit. Sect. III. Cap. V.

---

## CANTHARIDVM VARIIS IN MORBIS VSVS INTERNVS.

*In Hydrophobia.*

### §. XIX.

Omnis medicorum diligentia a longo iam tempore in eo occupata fuit, ut specificum quoddam contra dirissimum hunc morbum medicamentum inueniret. Tale tamen huc usque tantum in votis fuisse, dissensus auctorum de variorum, quae laudarunt, remediorum efficacitate, horumque irrita saepius adhibitio, luculenter satis demonstrant. Remedia mercurialia et antispasmodica, secundum obseruatores fide dignissimos plurimum quidem ad praecautionem Hydrophobiae, et expulsionem miasmatis per saliuae vias valent; sed debita vulneris tractatio si negligatur, remedia etiam optima et indicationi prophylacticae ac curatoriae Hydrophobiae quam maxime congruentia, frustra adhibebuntur. — Inter euacuantia, quibus medici studuerunt canis rabidi venenum, cum massa humorum iam communicatum, ex corpore eliminare, diuretica etiam inuenimus. R. MEAD affirmat, tutissima omni aetate remedia contra hoc venenum fuisse ea, quae copiosam vrinæ secretionem efficerent. e) Ex diureticis cantharides et variae scarabaeorum species egregiis laudibus celebrantur. Non RHASIN; f) sed AVICENNAM pro inuentore huius methodi, Cantharides contra morsum canis rabidi adhibendi, habendam esse, Cl. WICHMANN g) iam probauit. AVICENNA h) eas trochiscorum forma usurpandas commendauit, quorum praeparatio sequens est: Cantharidum pinguium ablatis pedibus et alis P. I. lenticum excorticat. P. I. croc. spic. caryophyll. cinam. piperis ana P. sexta vnius. Ter. opt. et confian-

e) Opera omnia. Goett. 1749. 8. Tom. II. p. 123.

f) Ut BACCIVS de venenis et antidotis Romae 1586. 4. p. 80 et post eum BROGIANI de veneno animantium p. 142., FRICCIUS aliique crediderunt. —

g) Diff. de venenorum quorundam virtute medica in primisque cantharidum ad morsum animalium rabidorum praestantia Goett. 1762. p. 34.

h) Oper. Edit. Venet. 1555. fol. p. 501. Lib. IV, fen. VI. tract. IV.

ciantur cum aqua (vt ipse loquitur) et formentur trochisci ex eis, quorum unusquisque contineat tertiam Drachmae vnius. D. omni die trochiscus unus cum aqua tepida. Et si acciderit punctura in vesica, bibat decoctum lentium excorticatarum et oleum amygdal: *Cum ergo, addit idem, minxerit sanguinem, tum iam securabitur a timore aquae.* Ad saeculum decimum sextum vsque non amplius mentionem huius remedii inuenimus. Sed apud HIER. BRAVNSCHWEIG reperimus formulam, cuius partem praecipuam cantharides constituant. Eam ipse ex AVICENNA descripsit i) MATHIOLVS, k) *Cantharides*, inquit, *deuoratae in necem hominem trahunt, atque iisdem curantur a cane rabido demorsu.* Aequalis illi Italus HIER. CARDANVS, e) *omnia*, inquit, *venena, quae magnam similitudinem mouent, velut Dipsadis et canis rabidi, urinam provocantibus sunt curanda*, et paullo post: *Tertium auxilium est a cantharidibus, quae ut per se venenum sunt, ita egregium sunt alexipharmacum canis rabidi.* HIER. CAPIVACCIVS m) medicamentum in memorat ex cantharidum ventribus et pari pondere lentium excorticatarum quotidie ad X grana propinandum. Idem cantharides iam externe vulneri applicuit. D. SPIELENBERGIVS testatur. *Hungaros Ultratibiscanos cantharides pro alexipharmacu habere in singulari ac valde acuta hydrophobiae specie, ad quam curandam decem cantharides puluerisatas assumant, ex quo puluere, cum vehiculo hausto, largi plerumque sudores proueniant; interdum etiam, sed tamen citram vllum dolorem, copiosus urinae fluxus.* n) Mirandum hos homines tantam cantharidum quantitatem innocue ingere posse. Sed addit ille, Hungaros earum regionum durissimae et solidissimae esse naturae, et forte cantharides, quae illo in climate reperiantur non tantam possidere vim causticam. Forte et natura morbi dosin requirit; quae alias mortem induce

D 3

duce

- i) In opere von der Chirurgie. vom Jahr 1539. 14. Capitel des andern Tractats: Von den Wunden die vergiften Thier beisen, es sey von einem wüthenden Hund, Schlange oder Scorpion. cfr. Hannov. Magazin 1778. Stück 44.
- k) Comment. in *Dio/coridem Venetiis folio 1570.* Epist. nuncupatoria.
- l) Opera Edit. Lugdun. 1633. fol. Tom. VII. Cap. X. de venenis. p. 336.
- m) Opera omnia. Francof. 1603. Lib. VII. Cap. III. de rabie canina. p. 930.
- n) Ephem. Nat. curiosorum Dec. I. Anno I. Obs. 133.

duceret. **F**RICCIUS o) laudat contra morsum canis rabidi formulam sequentem: Rec. Ciner. caneror. fluuiatil. Dr. dim. pulueris rad gentianae Scrup. I. Nuc. vomicae Gr. V. Cantharidum Gr. III. Decocti Allii Vnc. III. Syrup Limon. Vnc. I. M. pro vna dosi sumendo et saepius reiterando. **A**LBERTINVS, *Bononiae et in vicinis montibus*, inquit, *circumfertur antidotum adversus rabiosorum canum morsus, cuius natura et compositio non hercule satis nota est. Sed usus ipse atque experientia comprobauit, idque virinas ciere adeo frequentes, ut interdum sanguineae appareant.* p) *Per illustri VAN SWIETEN videtur satis verosimile esse, arcanum illud remedium nihil aliud esse, quam cantharides, cum quidam his hydrophobiae tollenda vim tribuant.* q) Multi *Siciliae* incolae, rabidorum canum morsu misere afficti, teste **B**OCCONE r) cantharidum puluerem assumunt, creduntque, se ingestu hoc puluere, vna cum copiosa urina caniculas quasdam emittere et hoc pacto sanitatem recuperare. Antidotum, quod a rustico nactus est **R**EIMANNVS maximam partem constat e cantharidibus in puluerem tritis. s) **K**RAME-RVS remedium specificum certissimum perhibet hoc, ut grana IV-X cantharidum in puluerem redigantur, cum vncia vna et dimidia aceti acerrii decoquantur, atque, dum adhuc caleant, aegro vel per vim vna cum aceto, propinentur, iisque deglutitis, aliquot cochlearia eiusdem aceti, sed frigidi, ab aegro hauriantur. Plurimos ille iam maxime hydrophobos ope huius remedii curatos vidit et cantharidibus non minus, quam aceto vini acerrimo vim huic morbo aduersam inesse putat t). — Ill. denique **W**ERLHOFIVS libenter uti consuevit cantharidibus et ultimis etiam praxeos annis ad morsum animalis rabidi curandum eas adhibuit, cum ad hydropis et gonorrhoeae sanationem eas non amplius usurparet. Formula medicamenti **W**ERLHOFIANI ex mandato regiminis regii,

Anno

o) de venenis p. 171.

p) Institution. *Bononienses* Tom. I. p. 410.

q) Commentarii Tom. III. p. 578.

r) Museo di fisica obs. 21. confer. **S**TENZEL Diff. de cantharidum calculis compactis atterendis virtute. p. 18.

s) *Breslauer Samml.* 1723. Mens. Ianuar. artic. 15.

t) Commercium Noricum. A. 1735. Hebdom. XI. p. 83.

Anno 1766 publici iuris facta fuit, atqne pilulae officinales, quae dieuntur, in pharmacopoliis totius Electoratus Hannouerani adhuc prostant. *u)* Methodum ipsam b. WERLHOFIVS Anno 1762. cum Cl. WICHMANNO per litteras communicauit, qui eam descripsit primus. *v)* Cantharidibus solis b. WERLHOFIVS non fidebat; sed mercurium ipsis admiscebat: Vulnus quoque, postquam cauterio actuali adustum, vel saltim scarificatum fuerat, inungebat vnguento mercuriali. Pilulae ipsae, ex camphorae scrupulo dimidio, cantharidum grano vno, et mercurii dulcis grano vno semis (vel turpeti mineral. grano dimidio) ope mucilaginis Tragacanthae compositae erant. Per sex menses quotidie vesperi has pilulas exhiberi oportet. Initio b. WERLHOFIVS nonnunquam grana cantharidum tria per tres dies exhibuit, vnde secutus nichil nonnihil dolorificus, at mox cessans, nunquam cruentus. Illorum, qui post rabidi animalis morsum his remediis vsi fuerint, neminem vnquam in hydrophobiam incidisse testatur. Canthrides vero se iam ante, quam mercurii in hoc malo efficacia innotuerit, in vsum vocasse et morsos sic quoque sine mercurio euassisce, ait. Venerandus Praeceptor meus Cl. R A H N nuperrime mecum per litteras communicauit casum hominis a fele irata vulnerati. Quatuor post diebus vulnus iam sanatum iterum tumere et inflammari incipiebat. Aegrotus febricula, anxietate et timiditate corripiebatur. Cui ipse ad Hydrophobiae prophylaxin optimo cum successu exhibuit pilulas WERLHOFIANAS externeque vulnus recte atque ordine tractari curauit. Credit Cl. Vir, illa symptomata timoris tantum suis effectus, nec Hydrophobiam inde orituram suisse.

### §. XX.

Variae Scarabaeorum species a veteribus adhibitae sunt, quia specifica ad vrinae vias actione diuresin valde mouent. Nec eorum usus contra canis rabidi morsum nouus est. Iam SCHWENKFELDIVS qui vixit initio Saeculi XVI. Scarabaeum maialem tanquam remedium tutissimum contra Hydrophobiam commendauit *x)*, et IOH. COLER eundem scarabaeum

*u)* WERLHOFII opera omnia, Edit. WICHMANNI Hannouerae 1775.  
4. p. 699.

*v)* In Diff. sua inaugurali supra citata p. 31 et 32.

*x)* In Theriatrophio suo Silesiae. Ligniz 1603. 4.

baeum hoc in morbo vtilem comperit y). Perro mentionem eius scarabaei iam fecit SENNERTVS et venenum hydrophobicum huius remedii ope per vias vrinae educi putauit z). GEOFFROY a) accuratam huius scarabaei descriptionem dedit, eamque tanquam efficax rabiei caninae remedium laudauit. Domina ASTANGE in WAGNIZ duos vermes maiales capitibus priuatos exhibuit duobus pueris a cane rabido demorsis, qui se exinde male habuere: ita ut mortem instare putaretur. Sed postquam sanguinem minxerant intra aliquot horas restituti sunt b). Memoratu digna sunt, quae apud DEGNERVM leguntur in Dissert. de Scarabaeorum maialium in morsu canis rabidi effectu specifico salutari, qui eos, abscissis capitibus, melle suffocari, atque ita quasi conditos adulto quinque; iuniori tres per septem dies praeberi iubet. Simul haud negligi oportet quae vulneri externe conueniunt c). Collegium Medicum Berolinense Anno 1777. iussu REGIS AVGUSTISSIMI publicauit remedium contra rabiem caninam, quod IPSE ermat ab rustico Silesienſi. Meloë proscarabaeus et Meloë maialis L. certe principem huius antidoti virtutem continent. Dolendum, hoc remedium non ea simplicitate gaudere, quae in specifico vel in primis desideratur. Nec plumbum, quod in eius compositionem intrat mihi ad usum internum placet \*) A Cl. BEIREISIO Meloë proscarabaeus tanquam medicina, hydrophobiam a morsu canis rabidi oriri solitam, certissime et forsan uisce auerrucans celebratur d). Cl. DEHNE e) grauissima hydrophobiae symptomata, usu huius scarabaei semper praecauta

y) In oeconomia rurali et domestica. Wittemb. 1614. Fol. p. 482 et 775.

z) Med. pract. Lib. I. P. II. cap. 16.

a) Mat. Med. p. 554. v. etiam WEICKARDVM in thesauro suo pharmaceutico. NENTER Fundam. Med. Argent. 1718. p. 799. STAHLII Mat. Med. Dresd. 1718. et VOGEL Hist. mat. med. Fr. 1760. p. 351.

b) Ephém. Nat. Curi. Dec. I. A. III. obs. 302. et Gazette salutaire Année 1768. No. 36.

c) Acta Nat. Curi. Vol. VI. obs. 92. p. 325.

\*) v. Bekanntmachung eines spezifiken Mittels wider den tollen Hundsbiss in D. P. LAYARDS Versuch über den tollen Hundsbiss. Leipz. 1778. p. 153 nec non Samml. für pract. Aerzte Band III. p. 623. — Iudicium hoc de remedio latum vide Ill. Equ. MVRRAYI Med. pract. Bibl. p. 640. et in Hannöverischem Magazin Jahrgang 1778. Stück 18. 44. 45. et 46.

d) Dispensat. Brunswicensis P. L. p. 161. —

e) Hannöverisches Magazin 1778. Stück 45.

cauta vidit. Pro aetate aegroti vnius scarabaei pars  $\frac{1}{8}$  usque ad  $\frac{1}{2}$  qualibet hora a *Viro Cl.* propinatur, donec sequatur mictus cruentus. *Vulnus scarificatur*, et vnguento mercuriali quotidie inungitur. Idem *Vir Cl.* sex amplius homines hac methodo curatos vidit: et ipse duo exempla refert, vbi hoc scarabaeo nihil aliud interne adhibuit; externe autem puluerem cantharidum, quia *vulnus ipsum* non satis excindi poterat. Summam in huius remedii usu cautionem nobis esse adhibendam docet casus ille, vbi *Meloë maialis*, puero sex annorum propinatus, mortem inducebat, antegressa summa anxietate, doloribus colicis, conuulsionibus, haemorrhagia narium, mictu cruento, sanguinis denique excretione per aluum et cutis poros f). Animaduertitur omnino variorum scarabaeorum confusio: nec satis constat, quae potissimum eorum species a quoque commendata fuerat. Ab *ILL. DEGNERO* et *VOGELIO* g) *Scarabaeus Melolontha L.* intelligi videtur; ab aliis autem, ut in antidoto *Silesiaco*, *M. Proscarabaeus* et *M. maialis L.* Ratione tamen effectum utriusque inter se conuenire videntur.

### §. XXI.

Tot nunc grauissimorum virorum saepius feliciter instituta in Cantharidibus et Scarabaeis experimenta vix de eorum contra rabiem caninam efficacitate dubitare sinunt. An eadem insecta venenum hydrophobicum resorptum per diuresin rursus ex corpore eliminare valent? Sane non omnem contra hoc virus vim facultati cantharidum et scarabaeorum diuretiae tribuere possunt. Spaslii atque conuulsiui motus abunde satis testantur, sistema neruoso a veneno canis rabidi maxime affici. Fortassis itaque cantharides ac scarabaei vi antispasmodica potissimum Hydrophobiam praecaudent. Dum inflammationem et spasnum in renibus excitant, in reliquo systemate neruoso tollere eundem et praecauere videntur. Cum aegrotus minxerit sanguinem, tunc iam securabitur a timore aquae, verba sunt AVICENNAE. Cantharides exterius vulneri, a cane rabido inficto, applicatae, plurimum quidem valent ad resorptiunem veneni praecaudam, et illud euacuandum. Sed nisi statim ab initio

f) Gött. gelehrt. Anzeigen 1778. Zug. 46. Stück.

g) Hist. Mat. Med. Lips. 1764. p. 350.

initio haec curatio instituitur, resorptio non prorsus potest impeditiri. Et tunc summa inflammatio, per scarificationes, cucurbitulas et cantharidum pulueris insersionem, in vulnere excitata, summam vim antispasmodicam et reuulsoriā exscretere et sic hydrophobiam ipsam praecaueere potest.

### *In Epilepsia.*

#### §. XXII.

Tantam inter causas epilepsiae diversitatem inuenimus, vt vix hodie abs quoquam assumatur vniuersalis huic morbo medendi methodus. Aliquando, si aut vermes, aut alia quaecunque epilepsiae causa iam sublata est, impressio tam ob vehementiam, quam ob morbi diurnitatem in systemate neruoso remanet, cuius sublatio eandem semper medelam requirere videtur. Attamen summum interdum medici acumen requiritur, vt originem epilepsiae detegat et curationem suam causae inuentae conuenienter instituat. Sic imminuta vrinae secretio corpus tandem humoribus serosis et acribus ita replet, vt motus epileptici a serositate hac, ad cerebrum et neruos redundante facile oriri possunt. Diuretica et interdum fortiora hic morbi causam educunt et saepissime morbum ipsum tollunt. ZAC. LVSITANVS casum refert, vbi aeger ex vrinae per septem dies suppressione, in saeuam epilepsiam incidebat. Variis remediis incassum adhibitis, cum, iam sero per vniuersum corpus disseminato, aegrotus similis cachectico esset, cantharidum scrupulum vnum cum oleo amygdalarum dulcium ei propinavit ipse. Quo facto, calculum cum magna muci copia et octo vrinae libris aegrotus excrevit et sic ab epilepsia et ischuria liberatus est h). Fortassis etiam irritando neruos ventriculi et intestinalium, et alliciendo deriuandoque epilepsiae causam materialem, multum ad huius morbi curationem facere possunt canthrides. Certe et vesicatoria non semel conuulsiones epilepticas curarunt. Si lentoſ humorum causam epilepsiae constituit, stimulandi adeoque refoluendi scopo canthrides praescribi possunt. H. MERCVRIALIS canthrides epilepsiae infantum utilissimas praedicat, iccircoque eae puluerem eius antiepilepticum ingrediuntur, cuius formula haec est: Rec. semen. Paeon. Visc. querc. ana Dr. II. Card. Dr. I. Cantharid. praepar. Scrup. II.

Pul-

h) Praxis admiranda Lib.I. obs. 35.

Paluerisentur omnia, iisque cum melle exacte mixtis, fiat Bolus. cuius Dr. dim. vel integra singulis vicibus tribus horis ante cibum sumatur i).

### *In Tussi conuulsiua.*

#### §. XXIII.

Qui cantharides ad curationem huius morbi adhibebant, ad indolem eius potissimum respiciebant. Pituita glutinosa et tenax, cuius sedes in aspera arteria et in pulmonibus pariter atque in primis viis figuratur, causam tussis conuulsiuae proximam constituit. Infantes huic morbo maxime subiecti sunt, quia eorum corpus et vitae ratio ad muci vel pituitae collectionem in primis apta est. Idem utantur praeterea tenerioribus sensibus ac nervis: unde facile motus spasticos contrahunt. Medicamenta resoluentia, euacuantia et neruina curationem tussis conuulsiuae optime perficiunt. Ob suminam tamen materiae morbi visciditatem et lentorem humorum talia medicamenta resoluentia desiderantur, qualia stimulent et actionem partium corporis solidarum in fluidas adaugeant, siveque ulteriori generationi pituitae resistant. Cantharides simul cum aliis remediis hunc ad scopum, saepissime optimo cum successu adhibitae fuere. Cum actio cantharidum naturae tussis conuulsiuae non prorsus repugnet: operae saltem pretium foret, experimenta iam facta iterare. Quo pacto fortassis tandem in cantharidibus remedium efficacissimum contra tussim ferinam, optimis interdum remediis repugnantem, inueniremus. Febris quidem k), plethora, inflammations et diathesis humorum putrida et biliosa semper usum cantharidum interdicunt, sed haec ad indolem tussis conuulsiuae non pertinent, et, si adsint, ante cantharidum adhibitionem tolli debent. Euacuantia, in primis vomitoria, si indicatio adest, praemittenda aut cantharidum usui interponenda sunt.

E 2

Dr.

i) Libr. I. de morbis puerorum Cap. III. et FRICCIUS de venenorum virtute medica p. 161.

k) Febris tamen si adest, prudentem cantharidum in hac tussis specie usum non interdit. CL LETTSOM eas feliciter adhibuit, cum quidem et vehemens febris adesset.

*Dr. BURTON* primum A. 1738. methodum suam tussim conuulsivam cantharidum ope curandi proposuit. Quam exhibuit formulam haec est: Rec. Puluis Canthar. Camphorae ana Scrup. I. His bene mixtis adde extracti corticis peruviani Dr. III. Misce. Fiat Puluis. Omni trichorio vel quadrihorio grana octo vel nouem aut cum aqua simplici aut iulapio et balsamo Copaiuae infanti propinavit *Vir Cl.*, potusque loco debet emulsionem communem. Hac methodo, si tussis cum tenaci et glutinoso muco coniunctum erat, eam ut plurimum intra quinque vel sex dies sustulit <sup>1)</sup>.

*Experientissimus LETTSOM* cum methodum *Dr. BURTON* ob saporem medicamenti nauseosum infantibus nimis molestam inuenisset: sequenti modo cantharides, quinque annorum infanti, propinavit: Rec. Dclii Corticis Peruviani Vncias quatuor, Elixirii sudorifici Drachm. II. Tincturae Cantharidum Scrup. II. M. capiat Dr. III: ter de die. Alii autem infanti quatuor annorum hac ratione: Rec. Tincturae Cort. Peruu. spirit. Vniciam, Elix. sudor. m) Dr. II. Tincturae Canth. Scrup. II. M. capiat Dr. II. ter de die. A minori dosi incipiebat augebatque eam hactenus, quoad levius stranguria oriebatur. Et tum quidem dosin vel diminuebat vel longioribus interuallis ingerendam iubebat. Stranguria plerumque die tertio solebat euenire, quamquam illa non semper producebatur. Ipse morbus raro sextum excurrebat diem et apparente stranguria citius foluebatur, siue additus fuerat cortex peruvianus, siue minus. Per viginti annos *Vir Cl.* hanc methodum felici cum successu adhibuit. Idem viginti quinque tussis conuulsivae exempla nobis refert, in quibus tinctura cantharidum adhibita fuerit et morbi medelam effecerit. Cortex peruvianus per aliquot dies solus propinatus, nullam leuamen adferebat. Nec tinctura cantharidum morbum unquam prorsus suscitavit, nisi cum cortice et anodynō aliquo coniuncta. Quamvis canthrides

1) Appendix to his treatise on the Non Naturals cfr. I. C. LETTSOMS Medicinische Nachrichten von dem allgemeinen Dispensatorio in London, aus dem Englischen. Altenb. 1777. p. 213. et MILLAR on the asthma and Hooping cough p. 152. qui forsan per errorem in formula *Dr. BURTON* Dr. I. pulueris Canth. pro Scrup. I. posuit. Magna enim est dosis et vix adhibenda, cum pulueris illius grana XV., quatuor fere cantharidum grana recipient.

m) Cuius Elixirii sudorifici Semi-Vncia habet opii grana duo.

tharides non pro vniuersali tussi conuulsuæ remedio habeat *Vir Cl.* tamen, si caute et pro rerum circumstantiis, adhibitæ fuissent, præmissis prius euacuantibus, felicem semper, infelicem nunquam inde se successum expertum esse ait *n*).

*Dottissimus MILLAR* interno cantharidum hoc in morbo vsui non fauebat, ob suminam earum vim stimulantem, sed topicae earundem applicationi, linimenti forma, quod ex olei Laurini Vnctia vna, Tinct. Cantharidum Dr. II. et Camphoræ Dr. I. constaret, magis fidendum esse putabat. Cum tamen postea ex *Illustri LETTSOM* stupenda, quae cantharides in tussi conuulsuæ edunt effecta audiuerat, repetit experimente et nunquam infaustum inde se obseruasse effectum, sed semper morbum hoc medicamine a se victum testatur *o*).

*G.E. ARMSTRONG* methodum *Dr. LETTSOM* in tussi conuulsua bono cum successu secutus est multosque infantes ea feliciter restituit *p*). *Cl. HILLARY*, sedem morbi praecipuam in peculiari humorum lymphaticorum visciditate ponens, viscidos sucos attenuare conatur sequenti formula: Rec. Millepedum viuorum semiunciam, contunde in mortario vitro et superaffunde infusionis radicis Glyzirrhizæ vnc. VIII.: probe conterantur, dein cola et Colaturaæ adde: Aquæ Semin Foeniculi Vnc. II. Aquæ Nucis moschatae, spiritus nitri dulcis ana semiunciam: Tincturae cantharidum Drachm. duas, Syrupi e Meconio semiunciam. Exhibe cochlearium vnum subinde urgente tussi. Augetur dosis illa pro aetate aegroti. Si symptomata increscant et pulsus ferat, Venæfæctio instituitur. Sin autem est paruus et debilis, vesicatorium admouetur aut tinctura cantharidum maiori dosi propinatur. *q*)

*Celeberrimus in America Septentrionali Practicus L. CHALMERS* similiter ad tussi conuulsuæ medelam canthrides usurpauit. Infanti

E 3

trium

*n*) Medicin. Nachrichten p. 213 - 257.

*o*) *LETTSOMS* Medicinische Nachrichten p. 218.

*p*) An account of the diseases most incident to chilidren from their birth, till the age of puberty. London 1777. p. 102.

*q*) Observations on the diseases of Barbadoes London 1766. p. 46.

trium vel quatuor mensum omni bihorio quinque vel plures guttas sequentis compositionis propinavit: Rec. Spiritus C. C. Tinctoriae cantharidum ana Drachm. I. Laudani guttas sex, Essentiae antimonii guttas XX. Adultiori *Vir Cl.* exhibebat omni bihorio bolum ex opii grano dimidio, salis volatilis C. C. granis sex, cantharidum puluere grano dimidio et kermes mineralis grano uno. Effectus huius methodi fuit, vt aegroti fere semper tempore dierum sex aut decem, et si leuis stranguria suborta fuerat etiam citius a tussi conuulsua liberarentur: quam tamen stranguriam a tinctoria cantharidum oriti nunquam obseruabat. Morbo ad finem tendente, compositioni suae adhuc Serpentariam et Corticem Peruianum optimo cum successu solebat admiscere. Nec euacuantia, vomitoria in primis, nec venaesectionem, si quidem haec indicabantur, omisit. r) *Cl. MELLIN* s) contra tussim conuulsuam vix valere aliquid sequentem mixturam obseruavit: Rec. Extr. Corticis Peruiani Drachm. II. Laudani Dr. I. Tinctoriae Cantharidum guttas XXIV. (quae forte nimis parua dosis) aquae et Mellis Vncias quatuor. D. per cochlearia. — Nec *Cl. RAHN*, vt ex litteris ad me datis video, huc usque satis bonos effectus ex vsu Cantharidum in tussi conuulsua percepit.

### *In morbis cutaneis.*

#### §. XXIV.

Cutis morbi chronicus, qui nimiam lymphae tenacitatem et peculiarem acrimoniam pro causa proxima agnoscunt, tanta interdum sunt pertinacia, vt vel efficacissimis remediis, diu adhibitis, non cedant. Contagium ab alio corpore, per eundem morbum afflito, suscepimus, aut retentiones excretionum naturalium, massam humorum tali acrimonia vix superanda afficer possunt. In primis vrina retenta aut imminuta eius excretio saepissime varios cutis affectus excitat. Magnus enim est renes inter et cutis glandulas consensus, ita vt humores in has delati, per illos facillime viam inueniant, et vrinae profluvio expurgentur. Contra vero vbi renibus diutius quacunque de causa defuerit vrinosus liquor,

r) An account of the weather and diseases of South-Carolina. London 1776. Vol. 2. p. 161.

s) Practische Materia Medica p. 116.

quor, is per cutis meatus interdum transfludat. *t)* Vna itaque excretio facilliime per alteram compensatur: et vbi exanthemata cutis chronica parcam. vrinae secretionem secum coniuncta habent, remedia diuresin mouentia certissime praefantissimum auxilium allatura sunt. Prudentis erit, leniora diuretica, vt millepedes, scillam cet. praemittere, et si haec non profint aegrotique constitutio fortiora admittat, tum demum cantharides caute adhibere. ROB. MEAD conpertum habet, non esse aduersus Lepram Arabum et Elephantiasin Graecorum praefantius remedium tinctura cantharidum, qualis in *Pharm. Londinensi* prostat. Idem hanc eius vim insigni illi vrinae mouendae virtuti, qua pollent ista infecta, adscribit. *u)* Observauit Dr. BRISBANE cantharides etiam maiori dosi datas, in variis morbis cutaneis, optimo cum successu adhibitas fuisse. *x)* CL. RAHN aliquoties exanthemata cutis chronica, aliis aduersus ea commendatis medicamentis frustra exhibitis, cantharidum ope felicissime profligavit. Neque aegroti tam facile in eundem morbum reciderunt, quam post aliorum remediorum usum fieri solet.

### *In Hydropoe.*

#### §. XXV.

Saepius per vrinae vias aquae hydropicorum euacuatae fuerunt. Natura ipsa non raro nobis hanc euacuationem demonstrat: et medici officium est, salutares naturae excretiones adiuuare, eamque si nimis langueat, incitare. — Praeterea medicamenta, vrinam mouentia, simul attenuant, viscida soluunt, obstrukiones referant et euacuant per viam, quam natura ad excretionem seroforum humorum plerumque eligit. Cantharides inter diuretica primum occupant locum, sed ob vim suam stimulantem raro ad hydropis medelam adhibentur. Et summopere noceant necesse est, nisi summa cum prudentia propinentur. Hinc SWIETENIUS, *y)* Cum tuta,

*t)* v. MEAD opera. Edit Goett. Tom. II. de morbis insignioribus qui in Bibliis memorantur. p. 19.

*u)* MEAD l. c. et LEWIS an experimental history of the Mat, Med. p. 173.

*x)* Select. cases in the practice of Medicine London 1772. p. 14.

*y)* Commentarii Tom. IV. p. 258.

tuta, inquit, et satis efficacia remedia diuretica habeatur, prudentiores cantharidibus abstinere solent. A vetustissimis tamen temporibus aduersus hunc morbum adhibitae fuerunt. Sic **HIPPocrates** horum insectorum usum internum praecipit. *Potionem, inquit, aqua subtercutem laboranti containabis, si cantharidum trium, ablato eiusque capite, pedibus et aliis, corpora ex tribus aquae cyathis exhibueris.* z) Non autem ut specifcum omnis aquae inter cutem remedium **HIPPocrates** cantharides commendat, sed tum, cum nimia seri copia vasa relaxauit ac flaccida reddidit, tumque viscera adhuc sunt integra, nulloque vlcere aut scirro obsessa. Lenioribus frustra exhibitis, ad potentiora confugiendum fortiorique stimulo vtendum putavit. a) **GALENVS** quidem duo memorat exempla, vbi hydropis curatio per cantharides, imprudenter adhibitas, infeliciter est tentata. b) *Nonnulli, inquit DIOSCORIDES, cantharides antidotis admixtas etiam hydropicis auxiliari prodiderunt; quippe quae urinas moueant.* c) **RHASIS** pilulas ad promouendam urinam ex apio, petroselino, amygdalis et cantharidibus compositas aduersus Hydropis in commendat. d) Saeculo decimo sexto **CAPIVACCIVS** e) in hydrope et urinae suppressione, intro dari tuto et utiliter cantharides dicit, testaturque se vidisse ab omnibus desertos cantharidum usu restitutos. Sed eas prescripsit parvadosi et aliis remediis temperatis, nempe unam cantharidem integrum cum Scrupulo uno pulueris vel rutae vel spicae. Et iuris pinguis **VNICIAS** quatuor vel sex bibi simul iussit. Contra Hydropem, laudat **KOENIGIVS** puluerem ex cantharidum granis sex, oculorum cancerorum, tartari vitriolati et falcis ononidis ana scrupulo uno compositum, cuius tertia pars dosin constitut. Et **WIERI** Decoctum radicum diureticorum cui cantharides admixtae fuerint propinat. f) Cantharides non modo sine detimento, verum etiam maximo cum fructu in hydrope ad-

z) De victus ratione in acutis Sect. IV. Edit. FOESII p. 406.

a) **STERZEL** Diff. de canth. prosperae aduersaeque auct. valetudinis §. V.

b) In Comm. ad **HIPPOCRATIS** librum de rat. victus in acutis. P. V. p. 116.

c) Mat. med. Lib. II. C. LXV. p. 102.

d) Diuision. L. XLI.

e) Pract. Lib. III. Cap. XIX. in Oper. p. 736.

f) Medicarum observationum rararum Lib. I. Basileae 1567. 4. p. 71.

adhiberi affirmat ION. SCHMIDT. g) Sie testatur quoque VALESCVS DE TARANTA se medicamento ex cantharidibus facto multos anasarca et ascite laborantes restituisse. h) Tanquam extremum desperati plane hydropis remedium, cum alia remedia non amplius profunt et res est in angusto, cantharides a SCVLTETO i) et EPIPHANIO FERDINANDO k) commendantur. Sed iam GEYERVIS l) monuit, ne adhibentur cantharides in summo hydropis statu, ubi tenor partium ianit resolutus adsitque cacochymia scorbutica. BEN. SYLVATICVS exhibebat in hydropice cantharides integras puluerisatas cum puluere ameos et rutaee, ac sale absynthii. m) Varias mulieres hydropicas cantharidum camphora correctarum ope GROENEVELT restituit. Femina XL. annorum, mirum in modum tuuida, de vrinæ suppressione et siti intensa conquerebatur. Vnde ipse praemissis praemittendis praescripsit: Rec. Cantharidum grana nouem, medullæ panis qu. satis. M. F. Pil. III. pro vna dosi. Post horas duas Camphorae Scrup. dim. Conseru. fruct. cyanobati qu. satis, ut fiat Bolus; quamprimum vrinas excreuit copiosissimas. Conualuit. n) Aduersus asthma, ingruente hydrope ortum, commendat FRICCIUS o) tale remedium: Rec. Millep. praepar. Scrup. dim. Caantharid. gr. IV. Decocti Allii Vnc. IV. Syrupi Byzant. Vnc. duas. M. D. pro vna dosi.

Cantharides interie exhibitas maximum leuamen adferre notat HOFFMANNVS, caussamque reddit hanc quod eae irritando nerueas tunicas fortioriem reddant arteriarum systolen: quo ipso vniuersa sanguinis et humorum massa velociore cursu per vasa feratur et veteres sub-  
inde

g) Specul. chirurg. Lib. IV. p. 829.

h) FRICCIUS de venenis p. 169.

i) Ephem. Natur. curios. An. V. et VI. obs. 148.

k) Hist. med. 38. p. 147.

l) Tract. de Cantharidibus S. IV. C. III. §. 1.

m) Consil. med. Centur. 3. Cap. 32. de hydrope.

n) Liber citatus p. 150. 152. 154.

o) De venenis p. 168.

inde obstruktiones hac ratione resoluantur. p) Et alio loco, *Quia pur*  
*vrinae fluxum, inquit idem; q) hydropicus tumor absunitur paluis can-*  
*tharidum cum sale tartari mixtus, additis aliquot ad arcendum inflammatio-*  
*nem nitri depurati granis et uno camphorae, diuresi largissimae mouenda*  
*inseruit, modo humores ad hanc excretionem sint dispositi.* Ill. quidem  
**T R A L L E S r)** sicut in omni morbo: ita etiam in hydrope cantharidum  
 vsum internum reiicit. Haud repugnare velim viro, qui in artis medicæ  
 exercitatione consenuit. Et sane verissime loquitur *Ill. Vir*, si peruersam  
 cantharidum adhibitionem intelligit. Vesicatoriorum quidem vsum in  
 hydropicis morbis, semper gangraenam induxisse, observatum fuit. Sed  
 incisiones et scarificationes hydropicorum pedum, incongruo tempore in-  
 stitutas, non minus periculosas fuisse saepissime, apud auctores legimus.  
 Et quid a vulnere in parte laxa, quo deprauati humores aquosi sem-  
 per confluunt exspectare licebit aliud, quam vlcus difficillime curan-  
 dum aut gangraena. Canthrides contra hydropem interius adhibitæ val-  
 de quidem stimulant et diuresin mouent; sed nec rodunt, nec vrunt, si  
 parua dosi et constitutioni corporis congruae adhibeantur. In hydrope  
 saltum nunquam tanta cantharidum dosis adhibenda, vt inde oriatur dif-  
 ficultas vrinae et stranguria. Ex cauto cantharidum vsu b. W E R L H O F I V S  
 in hydrope saepius vberimos fructus percepit. Ultimis tamen praxeos  
 annis tutiorem hydropi et gonorrhœæ medendi rationem secutus est. s)  
**D**octissimus G R A I N G E R t), *Difficile est, inquit, in hydropicis vrinae quan-*  
*titatem augere. — Et quoniam alia diuretica non aequa semper vrinam pro-*  
*vocant, vsum remedii quod sequitur potiorem habeo: Rec. pulu. Canth. grana*  
*quatuor, sal tartari grana sex, addantur grana aliquot nitri depurati et*  
*duo camphorae. Fiat massa pilul. cum elestuarii lenitini qu. satis; diuidend.*  
*in tres pil. capiat unam omni trihorio: inde excitatur frequens meiendi*  
*desiderium; exeunt cum vrina aliquando folliculi digito collabentes aqua*  
*pleni, et si dosis augeatur, stranguria maxime inquieta suscitabitur.* Cl.

A L I X

p) Med. Syst. Tom. II. P. II. C. 8. §. 6.

q) Med. Syst. Tom. III. S. II. C. 8. §. 14.

r) De vsu vesicantium in morbis acutis. Wratislau. 1776.

s) Opera omnia p. 699.

t) Histor. febris anomalaæ Batanae An. 1746. Edimb. 1753. p. 130.

**A L I X.** u) homini XL annorum, anasarca laboranti, omnia medicamenta hoc in morbo visitata frustra ministravit. Tandem praescripsit illi medicamentum, cui quatuor grana cantharidum subtilissime puluerisatarum mixta erant, simulque admonuit, vt, cum eo vteretur, multam hordei aquam insuper biberet. Aegrotus postquam quartam partem dosis ter sumserat, sensit continuum ad mingendum stimulum, ita vt inde a tertia post meridiem hora usque ad sequentis diei antemeridianum tempus vrinam perpetuo excerneret, tandemque excussa aqua et roberantibus exhibitis, intra sex hebdomadum spatium pristinam recuperaret sanitatem. — Hydropem pectoris cantharidum ope curauit **D E F O S.** Dedit canthrides cum oleo amygdalarum mixtas, initio quidem quotidie granum unum. x) **C L T O D E** aegroto hydropem laboranti, per aliquot hebdomadas, quotidie cantharidum aliquot grana bono cum successu exhibuit. y) Frequentissime etiam cantharidibus in hydropem usus est **C L C H A L M E R S.** Tinctoram z) aut puluerem earum cortici Peruuiano et remediis purgantibus admiscet, et si tumor hydropicus subsideat, purgantia omittit. Casum refert vbi **M a u r o** cuidam qui anasarca vehementissime laborabat bolos sex e cantharidum granis sex et camphorae drachma dimidia paratos, ita praescripsit, vt unum ille omni bihorio bolum sumeret. Aegrotus cum quatuor eodem die bolos cepisset: tale vrinae profluum intra noctem iis excitabatur, vt hic cuius corpus pridie eius diei adhuc aqua turgebat, nunc sceleto similis videretur. Cortex Peruuianus, aromata et chalybeatā simul cum balneo frigido curationem absoluebat.

### In Mensum suppressione.

#### §. XXVI.

Nemo facile inficias ibit, canthrides summam vim possidere, fanguinem versus partes generationi et vrinae secretioni inferuentes con-

F 2

ge-

u) Obseruat. chirurg. Fascic. I. Obs. VIII. p. 37.

x) Journal de Medecine par **M R. LE ROUX** Tome XLII. p. 326.

y) Med. chir. Bibliothek B. VII. p. 499.

z) An Account of the diseases of South Carolina Vol. 2. p. 170.

Tincturam, quam adhibet perficit ita, vt pulueris cantharidum et Camphorae Vnicam unam sextario (a pint) Spiritus volatilis admisceat,

gerendi. Vis itaque emmenagoga et abortiuia cantharidibus inest. An autem vñquam in fluxus menstrui suppressione tuto propinari possint, vix decernere audeam. Si menses subito supprimantur, vt plurimum symptomata acuta et febrilia oriuntur, quae cantharidum, sicut omnium stimulantium vsum nonquam admittunt. Magis chronicie sunt effectus, si sensim sensimque fluxus menstruus supprimatur, aut propter statum inanitionis et debilitatis corporis aut propter sanguinis spissitudinem. Nullis stimulantibus inopia sanguinis indiget. Diaeta lauta, Cortex Peruuianus et ferrum sanitatem et mensium fluxum reuocabunt. Humorum immeabilitas et spissitudo talia potius resoluentia requirit, qualia in fluida inprimis agant, et non nimirum stimulent, vt Diaeta humectans, corporis exercitatio et salia media. Omnia stimulantia humorum motum augent, secretiones et excretiones accelerant. Hinc corpori siccitatem inducunt, sanguinisque spissitudinem adaugent. Sed si viscidum glutinosum mensium retentionem gignit, stimulantia interdum maxime prosunt. Huius viscidii glutinosi praesentiam ex statu corporis chlorotico, hydropico, pulsu debili et molli, ac relaxatione partium solidarum cognoscimus. Sed et hic nos oportebit leniora stimulantia praemittere et simul viatum siccum et aromaticum praecepere. Si vñquam canthrides cum successu aduersus mensium obstrunctiones exhibitae fuerunt, certe in hac spissitudinis humorum specie fuit.

HIPPocrates canthrides non tantum pessō immiscendas iubet a) vbi menses, secundinae aut foetus mortuus eiiciendus est; sed et potionem ex iis praebuit, cui magnam vim tribuere videtur, cum idem remedium saepius adferat. b) MERCVRIALIS, GALENV M ad mensium fluxum promouendum, solis cantharidibus, Gr. quinque vsum fuisse, tradit. c) VELSCHIVS Canthrides eodem consilio, potionē ex succo mercurialis et essentiae cinnamoni factae, exoptato successu addidit, exhibens externe simul pessarium ex cantharidibus, gummi galbano et Myr-

a) De superfoetatione p. 266. de morbis mulierum Lib. I. p. 620. 624. 634. et de natura mulieri p. 573. Edit. FOESII.

b) De natura muliebri p. 570. de morbis mulierum Lib. I. p. 625. 632. et Lib. II. p. 653.

c) FRICCIUS de venenis p. 167.

Myrrha. *a)* In contumaci obſtructione lochiorum ac mensium, in partu diffīcili et retentione ſecundinarum optatiſſimos ſuccēſlus p̄aeſlitit bolus ex tribus cantharidibus, trochiscorum e myrrha ſcrupulo diuidio, ſeminis ammeos granis ſex et roob cynosbati qu. fatis apparatus. *e)* Ad expulſionem ſecundinarum plurimum facere a nonnullis putatur uſus cantharidum, ſed non probatur a ZACVTO LVSITANO. *f)* Teste BOCCONE atque IO. SCHROEDERO libidinosis feminis, illūcito coitu grauidis, abortu ciendi ſcopo, frequens ac familiare remedium eſt. *g)*

### *In Lithiaſt.*

#### §. XXV.

Cantharides a nonnullis etiam inter remedia lithontriptica numeratae ſunt. Eadem calculis compactis atterendis et diſſoluendis impares eſſe, STENZELIVS cenſet, cumi calculi, in tinctura C. ſpirituosa et liquore, ex earum puluere cum oleo tartari per deliquium parato, diſteſioni commiſſi, manerent integri. *h)* Cum calculus ad notabilem iam magnitudinem et duritieſ peruenit, ſemper ab inſectorum noſtrorum vlu abſlinendum erit. Nam ſi paullo maior eſſet calculus, inquit FELIX PLATERVS, a fortiter impellente et ſumime ſtimulante remedio intra vrinarios meatus detruaderetur, quos non tranſire valens, dolores nephriticos augeret. *i)* Alia autem res eſt, ſi ſabulin et calculum iam imminutum ex renibus et vesica extrudi oporteat. Id cantharidum vi diuretica et fibras renum relaxatas incidente perfici poſſe adfirmat STENZELIVS. *k)* Stimulant cantharides vias vrinarias, in hominibus calculofis plerumque laxas et debiles, ſicque forſitan ut Vua Vrſi etiam ad-

F 3

ſtrin-

*a)* Hecat. II. Obs. 72. p. 43.

*e)* Transact. Philosoph. abbr. Tom. V. P. I. p. 405.

*f)* Praxis Histor. Lib. III. Cap. XIX.

*g)* SCHROEDERI Pharmacop. Lib. V. Cl. IV. §. 98.

*h)* Diſſ. de cantharidum calculis compactis atterendis virtute §. XIII.

*i)* De ventr. dolor. curatione p. 594.

*k)* Diſſ. citata §. XIV. cfr. GEYERI Tract. de Canth. Sect. IV. C. III. §. 3.

stringendo, fabuli excretionem promouent. Prudens cantharidum usus  
ulteriore calculorum aut fabuli genesin impedit forsitan valet, non tam  
ob earum vim diureticam, quam quia eae stimulo suo partium solidarum  
actionem in fluidas adaugent siveque ortum illius muci, qui quasi  
calcareae est naturae et, nisi corpus peregrinum accedit, primus cal-  
culi fons, impediunt.

Lithontripicum ex cantharidibus paravit **TULPIVS**, ab **HOM-  
BERGIO** descriptum in *actis Parisinis. I)* Sic et ingrediuntur electua-  
rium linthontripicum **ANDREAE GALLI**, *Medici Tridentini*, cuius  
formulam apud **I. CRATONEM** inuenies. **m)** Calculo vesicae, stran-  
guria et dysuria affectus aeger, summis cantharidibus cum conserua ca-  
pilli veneris, summis doloribus obortis, extinctus est. **n)** **M. LISTER**  
homini paene iam animam agenti, qui aliquoties calculos e renibus  
excreuerat ultimoque paroxismo, quo se arcessuerat triduum dysu-  
riam magna corporis iactatione atque anxietate fuerat passus, sic  
praescripsit: Rec. Cantharidum probe tostorum, tantum non creimata-  
rum scrup. semis, Aquae spermatis ranarum libram unam. Misc. Fiat  
Haustus. Paucis horis elapsis, urinae quatuor minimum libras et  
una plurimos calculos reddidit, et conualuit. Idem inter medica-  
menta calculo maxime accomodata cantharidum cinerem refert. **o)**  
Cantharides in mercatore, calculo reuin afflictio cum successu adhi-  
buit **I. O. B. A. MEKRE'N.** **p)** Plura certe desiderantur experimenta ante-  
quam cantharides ad calculorum expulsionem tuto commendare possimus.  
Consultius videtur, eas nunquam hoc consilio adhibere, cum, nisi sta-  
tim auxilium praestent, certissime dolores nephriticos et cruciatus, a  
calculo orientes, alant, ita ut prae doloribus ringant aegri.

Nec magnum a cantharidibus et scarabaeis in *Arthrite* et *Podagra*  
auxilium sperem. **q)** In paroxismo saltem ipso nunquam adhibeam.

Ad-

**i)** A. 1709. p. 456.

**m)** Consil. med. 18. Lib. 4. p. 133.

**n)** BENED. SYLVAT. Cent. III. Cons. 30.

**o)** Exercitationes medicinales. Amstel. 1698. 8. p. 137 et p. 143.

**p)** Obs. med. chirurg. C. 34.

**q)** FRICCIUS de venenis p. 172 sequ.

Ad curationem radicalem eodem modo, quo ad calculi prophylaxin, interdum utiles esse possunt, si corporis constitutio earum usum admittat. Corpus nempe laxum et serosis humoribus turgens fortiora diuretica et stimulantia desiderat. Et toto corpore his remediis mutato, forsan etiam dispositio arthritica tollitur.

### *In variis Renum et Vesicae morbis.*

#### §. XXVI.

In eruendis veris caussis morborum, quibus viae vrophorae laborare solent, summa interdum medicis practicis obiicitur difficultas. Et si unquam morbi diagnosis ad felicem curationem necessaria est, erit certe his in morbis. Ita enim caussae eorum discrepant, ut plane oppositam medelam requirant ipsi. Et si in diagnosis peccetur, remedium quae huic errori consentaneum exhibeatur, saepius vera mali causa et cum ea morbus ipse peior redditur. Anceps itaque est res, cantharidibus tali in morbo vti, quae tamen praestantissimum erunt remedium, si caute et post indicationem adhibeantur.

Quatuor in primis animaduertimus *Ischuria vesicariae* seu retentae vrinae causas, quae maxime inter se sunt distinguendae, quarum quae una *Vesicae Paralysis* cantharidum usum admittit. Vbi enim inflammatio aut spasmus colli vesicae ischuriam producit, desiderantur antiphlogistica, hirudinum applicatio et fomentationes emollientes: simusque ad causam occasionalem respiciendum est. Omne remedium irritans hic nocet, quanto magis ergo cantharides? Nec minus nocebunt vbi obstructio aut colli vesicae, aut vrethrae causam ischuriae constituit. Nihil valent contra prostaten scirrhosum, calculum in vrethra haerentem et alias tumores, vrethrae lumen angustantes. Paralysis vesicae adeat, si vesicae contrahendi se facultas debilitetur aut penitus resolvatur. Ex hac imminuta aut abolita vesicae contractione necessario vrinnae retentionem oriri opertere, satis appareat. Diagnosis huius ischuriae ex paralysi natae, causae antecedentes nobis praebent. Frangitur vesicae vis contractilis, si quis ob intempestiuam verecundiam, negotiorumue impor-

importunitatem, stimulo vrinam excernendi minus obedit ac talera lotii quantitatem in vesica accumulari sinat, vt fibrae musculares eam amplius superare nequeant. Eadem expansio vesicae in aliis ischuriae speciebus locum habet, ita vt, etiam si causa talis ischuriae tollatur, interdum tamen ischuria ex paralyssi remaneat. Paralyssin vesicae saepe etiam obseruatum fuit, ictu dorsi effectam. Et *Ischuria illa sinilis* vt plurimum statum vesicae paralyticum pro causa agnoscit. Certissimum autem ischuriae ex paralyssi signum in catheteris applicatione inuenimus. Si enim hoc instrumentum sine difficultate in vesicam immitti potest, nec inflammatio, nec spasmus, nec obstructio aderit. Statim post catheterismum vrina effluet; ob torporem autem vesicae, vrina mox iterum accumulabitur repetitionemque operationis necessariam faciet. Praeter continuum catheteris flexibilis usum, talia medicamina optime medelam huius ischuriae perficiunt, qualia vesicae pristinum tonum conciliant. Topicus aquae frigidae usus et vesicatorii ad os sacrum applicatio hic maxime prosunt. Inter remedia tonica interna non infimum locum tenent cantharides. Post tertiam enim earum adhibitionem vrina effluit. Ischuriam desperatam puluere cantharidum curatam memorat **T I M . A G V L D E N K L E E .** r) Et **B A L L O N I V S** in vrinae suppressione optimo cum successu praescripsit cantharides. s) **R I E D L I N V S** per errorrem propinauit feminae, vrinae difficultate laboranti, loco millepedum drachmam dimidiam cantharidum: quae dosis, cum esset nimia, haustibus olei amygdalarum dulcium emendata, sanitatem restituit. t) **H E L M O N T I V S** narrat, mercatorem quandam iam octiduo flagrantem vrinam passum, iamque vicinum morti, diureticum e succo millepedum et succo conchyliorum, nigrorum cui granum unum cantharidum incoclum esset, paratum, sumisse idque vno haustu ebibisse. u) In ischuria infusum cantharidum vinosum felici successu non semel expertum esse, refert. **T H O M . B A R T H O L I N V S .** v) Frustra tamen id adhibuit in ischuria a calcu-

r) Cas. med. Lib. IV. Cap. V. Obs. 15.

s) Lib. I. Cons. 52.

t) Lin. med. Obs. 19.

u) Tract. de Lithiasi. Cap. V. §. 17.

v) Epist. medicinales. Cent. IV. Ep. LIV. LXV.

calculo orta. *x)* Supra iam attuli notabilem obseruationem *ZACVTI LUSITANI*, qua vir quidam cantharidum ope ab epilepsia, ex vrinae suppressione enata, liberatus fuit. Male vero cessit hoc remedium, cum monacho cuidam ad iuuandam vrinae excretionem exhiberetur. *y)* Post mitiorum vsum propinare suadet *CHR. GVARINONIVS* cantharidum grana duo cum vnciis duabus olei amygdalini amari. *z)* *GROENEVELT* iuueni cuidam, qui per dies tredecim vrinam mittere prorsus nequuerat, iam lethargicus esse incipiebat et in summo vitae periculo versabatur, infusionem cantharidum cum spiritu vini camphorato paratam propinavit. Is post tertiam dosin materiam serosam, vrinae similem, magna quantitate per sedes excreuit et paullo post eminxit vrinam per viam naturalem. Atque ita conualuit. *a)* Etiam *III. WERLHOFIVS* feliciter adhibuit cantharides. Sartor quadragenarius, neque nephriticus antea, neque calculi signa habens, in alui et vrinae suppressionem incidebat. Aluo soluta sale catharitico amaro multa frustra tentata sunt. Die yndecimo accesserunt deliria, subsultus tendinum, sudor in facie frigidus, durus abdominis tumor, pulsus inaequalis, debilis, frequens. Necessitate ergo urgente, remedium diureticum certissimum, cantharidum puluerem cum emulsione ad granum vnum, quarta quaque hora exhibuit *Vir. III.* Post tertium granum fluere vrina paullum grumosa et sanguinolenta, dein pituitosa coepit cum dysuria. Continuauit medicaminis vsum ad nonam vsque dosin. Quo facto, tandem largissime, ad plures in dies mensuras sine febre et dolore prodiit yrina limpida imminutis symptomatis omnibus. *b)* *Cl. CLOSSIVS* grauisimam ischuriam, omnibus aliis remediis immorigeram, cantharidibus persanauit. *c)* Quatuor cantharidum grana cum dimidio, demtis capite, alis et pedibus cum totidem camphorae et conseruae granis, duobus bolis

*x)* I. c. Epist. XXI.

*y)* *BENED. SYLVAT.* Cent. III. Obs. 45.

*z)* Consult. 238.

*a)* Liber cit. p. 119.

*b)* Opera medica Edit. *Cl. WICHMANNI* p. 698.

*c)* De noua variolas curandi methodo p. 24.

lis dedit in vrinae suppressione YOVNG. *d)* Etsi HVXHAM cantharides sperato cum successu in ischuriis datos fuisse satis perspexit: tamen si illae non satis cito exspectationi respondeant, timet, ne simul acribus cum salibus agant et aegroti mortem accelerent, excitando deliria et conuulsiones: quod factum esse saepius animaduertere illi licuit, maxime in femina pingui, quae renali ischuria laborabat. *e)*

In *spuria* illa *Ischuria*, vbi ex vitio renum nulla vrina ex vesica excernitur vix pro sint cantharides, nisi forte languente solidorum fluidorumque motu totum corpus sero turgeat, lotiique simul suppressio adsit. Sic *ILL. MONRO* in ischuria vesicali paralytica his quotidie duo grana cantharidum cum tribus granis camphorae et decem granis sachari in mortario contrita frustra praebuit. Nulla quidem secuta stranguria aliudve incommodum; sed postquam febrem hecticam contraxerat aegrotus, mortuus est. Sectio deinde instituta renes inflammatos inque earum substantia tuberculæ purulenta, inferioremque partem renis sinistri sphacelatam monstrauit. Vesicae membranae valde tuniidae et inflammatae inueniebantur. Idem *ILL. Vir* tinctoram cantharidum per XIV dies sumtam aduersus ischuriam et renum dolores nihil valuisse perhibet. *f)*

In ea *Enuresi*, seu incontinentia vrinae, quae originem suam a paralytico sphincteris vesicae statu traxit, eadem spe, qua in ischuria paralytica, cantharides usurpari queunt. Hoc malum externis remediis tonicis saepissime non cedit: tamen summam aegroto incommoditatem creat, quae forsan prudenti cantharidum vsu interno tolli posset. Certe *ILL. Archiater RICHTER* mihi confirmauit, se non tantum in *Ischuria* paralytica sed et in incontinentia vrinae saepius summa cum euphoria cantharides adhibuisse: Sic et *Cl. STOELLER* tinctoriae cantharidum ope Enuresin in viro quodam sanavit, cum nec *Cortex Peruvianus*, nec vesicatorium ossi sacro applicitum, usque aquae frigidae externus multum leuaminis adferret. Primo iam die, quo tinctoram cantharidum sumebat aegrotus, vrinam melius poterat retinere. Et intra quatuorde-

cim

*d)* Transact. Philosoph. No. 280.

*e)* Opera Physico-med. cura REICHELII Tom. III p. 124.

*f)* An account of the diseases in the british military hospitals in Germany. London 1764. p. 227, 233.

cim dies malum ipsius prorsus cessabat. Externe in perinaeo etiam vnguento, ex duabus partibus tincturae cantharidum, parte vna spiritus salis ammoniaci volatilis et eadem olei quantitate facto, inungi eum curauit *Vir Cl. g)*

Minus mihi placet cantharidum usus contra *Renum seu vesicae ulceram*. Attamen **GROENEVELT h)** totus in eo est, vt eas in primis aduersus vesicae exulcerationes valere ostendat. Et multas in eius libro observationes iuuemus, quibus canthrides semper pulcherrimam earum curationem perficiebant. Sed ipse eas nunquam ita usurpare velim propterea, quod nimiam vrinae acitudinem conciliant, quae eiusmodi ulcerum curatione valde aduersa est, cum e contrario vrina, potu diluente blandior redita, plurimum ad depurationem eorum confert. Nihil etiam canthrides contra vesicae aut renum exulcerationis causas valent, quales sunt, inflammatio, a materia per metastasis ibi deposita, oriens, calculus item, et tubercula renum scirrhosa et purulenta. Semper fere malum augebunt animalcula ista, cum stimulo suo ac nimia irritatione inflammationem iam praesentem foveant potius, quam minuere possint. Certe **GROENEVELT** nimis audacter canthrides adhibuit, mihique ille saepius nimis celeriter concludisse videtur, vesicae exulcerationem adesse, vbi fabuli aut muci accumulatio vrinae retentionem producebat, quae dein facile cantharidum usu tolli poterat. Difficili est diagnosis huius morbi ac mucus hic facile ita decipit specie sua, vt pro pure habeatur.

### *In Diabete.*

#### §. XXVII.

Qui naturam Diabetis considerat, qui in vrinae secretione frequenti et potus quantitatem multo superante consilit, omnino mirari debet, remedium, cui summa vis diuretica inest, ad eius curationem valere. Attamen **Cl. BRISBANE** curationem diabeticis perficiebat cantharidibus, vbi remedia robotantia et adstringentia nullam opem adferebant. Nempe suspicaba-

G 2

tur

g) Beobachtungen und Erfahrungen. Gotha 1777. p. 147.

h) Praefatio p. III, et in tractato ipso p. 6. 98. 106. 113. 116. 122. 12°

tur ille paralytici quidpiam nervis systematis vrinosi hoc in morbo subesse. Praebuit itaque tinturae cantharidum guttas decem cum aquae quantitate, sufficiente bis quotidie, tanto cum successu, ut ante quartum diem morbus remiserit. Adauxit igitur medicamenti dosis ad guttas viginti, immo denique ad triginta, simulque aegrotum emulsione amygdalina et gummi arabico vti iuslit. Quo factum est, ut is in dies viribus increaseret, vrinaeque quantitas, color et sapor sensim euaderent secundum naturam. Duo etiam alia exempla addit *Cl. BRISBANE*, vbi cantharidum efficacia minus certa fuit. Vnum praebat aegrotus, qui fabulo renum et diabete obnoxius leuamen quidem a tintura cantharidum sentiebat, morae tamen pertaesus plenam curationem non exspectabat. Alterum suppeditabat femina, variis neruorum malis obnoxia, quae per aliquot menses magnam lotii limpidi copiam reddebat, quam quidem tintura cantharidum, sed cum aliis simul antihystericis usurpata, multum imminuit. Hic autem diabetes forsan morbi hysterici symptoma fuit, quod usui antihystericorum facile cedere poterat. *i)* Primus qui canthrides contra diabeten in usum vocavit, fuisse videtur *T. MORGAN.* *k)* Ille e cantharidum *Venia dimidia et Elixiri Vitrioli Libra vna tincturam paravit, cuius guttas XV. usque ad XXX. bis terue quotidie pro dosi exhibuit.*

Laxitas vasorum vinalium praecipuam diabetis causam constituere videtur, ita tamen, ut stimulus interdum simul adsit, qui humores totius corporis versus renes laxos allicit. Adstringentia et roborantia certissima sunt remedia hanc renum laxitatem corrigendi, diarrhaeamque illam renalem fistendi. Interdum tamen nervis et vasorum status paralyticus atque atonia inducit, qua de causa sanguinis laticem nimis prompte excipi, indeque diabeten oriri posse, omnes affirmant. Medicamenta adstringentia eiusmodi in casu non tantam promittunt utilitatem, quam nervina et stimulantia. Iam similiter hic canthrides paralysin vasorum renalium stimulo suo sanare, ac in ischuria vesicali paralytica muscularibus vesicae fibris tonum suum restituere videntur. Sed et in hoc morbo nunquam canthrides usurpari debent, si quidem stimulus causam morbi occasionalem constituant. Facilius enim usu cantha-

*i)* Select. cases in the practice of Medecine. Lond. 1772. p. 5 sequ.

*k)* THOM. MORGAN Mechanical practice of Physik, Lond. 1715. p. 354.

tharidūm vis eius stimuli augetur quam minuitur. Cum etiam difficillimum sit discernere, simplexne vasorum renalium laxitas, an simul paralytici quid adsit, optime medicus aegroto consulet, si huic vna cum cantharidibus alia adstringentia et roborantia remedia praebeat.

### *In Gonorrhoea.*

#### §. XXVIII.

Circumforanei etsi Gonorrhœam specificis, quae dicuntur, celeri-  
rime se sanaturos audacter profliteantur, non eo tamen imprudentiae procedunt, vt in stadio gonorrhœae inflammatorio cantharidibus vtantur. Methodum antiphlogisticum hic vnicē conducere, omniaque remedia irritantia et obſtrucentia esse vitanda omnes auctores statuunt. At contra ſillicidium materiae mucosae, quod tragicae illius ſcenæ finem conſtituit et a laxitate, in vrethrae membranis remanente, naſcitur, canthrides ſaepius non ſine fructa vſurpatae fuere. Difficillimae interdum cura-  
tionis eſt ſillicidium illud mucosam et subinde ne efficacissimis quidem remediis roborantibus cedit. Prudens cantharidum vſus, ſi aliis reme-  
diis adiungatur, hic fortassis efficax erit, cum ſaltem aliorum remedio-  
rum actionem intendere et versus partes laefas magis dirigere poſſit. Forte etiam, vt *Ill. C V L L E N I*) putat, inflammationem in partibus la-  
xis excitando, canthrides hunc morbum sanant, eodemque modo ad-  
versus fluorem album vtiles eſſe poſſunt. THOM. BARTHOLINVS  
litteras M. I. MATHIADIS, *Medici Lugduno-Bataui*, ad ſe datas ex-  
hibet, quibus ille refert, quendam illius vrbis doctorem, gonorrhœam virulentam feliciter curare ſolere ſolis cantharidibus, quas vino *Rhenano* maceret, infusionemque alio liquore temperata propinet. Sed cum initio non ſine ſummo aegroti cruciatu et vesicae exulceratione curatio-  
nem abſolueret, miſcuit tandem cum oleo amygdalarum dulcium, Sy-  
rupo *Fernelii*, ſuccoque thapsi barbatae: et intra triduum beneficio co-  
piosae vrinae malum proſuſus ceſſauit. m) Infuſum cantharidum vino-  
ſum ſe in gonorrhœa virulenta felici cum ſucessu ſaepius adhibuiffe,  
nec vñquam cruciatum vel exulcerationem vesicae inde in aegroto obſer-

G 3

vaffe,

I) Lectures on the materia medica. p. 318.

m) Epist. medicinales Cent. IV. Epist. LIII.

vasse, si modo legitime esset praeparatum, testatur T H. BARTHOLI-  
 n v.s. n) Cantharides cum oleo therebinthinae et spiritu vini digestas ad  
 profluvii seminalis maligni extirpationem in primis facere auctor est  
 STEPH. BLANCARD. o) In curatione gonorrhoeae bonum tincturæ  
 cum cantharidibus compositæ effectum se expertum esse scribit M. LI-  
 STER. p) Ceu extremum inueteratae gonorrhœæ virulentæ remedium  
 P. HERMANN praedicat infusum cantharidum vinosum. q) BOCCONE  
 memorat curandæ gonorrhœæ methodum in India orientali solemneum.  
 Sumunt ibi florum hyperici Man. vnum et oculorum cancerorum Va-  
 ciam dimidiā, coquuntque duobus vini sextariis. Cum hoc vino com-  
 miscent tincturam cantharidum spirituosam, paullumque huius mixturae  
 interne exhibent. r) GROENEVELT commendat eundem in finem  
 tincturam ex cantharidum Vncia vna et spiritus nitri fortissimi Vnc. dua-  
 bus paratam, cui, extractione peracta, Spiritus Vini Vnc. quatuor affun-  
 dantur et cum ea digerantur et colentur. Dosis est gutterum XII- XL.  
 R. MEAD contra humoris mucosi distillationem, quæ gonorrhœam in-  
 terdum excipit, et balsamicis plerumque non cedit, sequentein tincturam  
 confecit: Rec. Rhabarb. Drachm. tres, gummi guaiaci sesquidrachmam,  
 laccae Dr. vnam, cantharidum contusarum Dr. duas, coccinellæ semi-  
 drachmam, infunde spiritus vini rectificati sesquilibram et cola. Hanc  
 tincturam semper efficacissimam expertus est Vir III. Guttae autem XXX  
 usque ad L (tot scilicet quot sine vrinae difficultatis metu ferri poterunt)  
 mane et hora decubitus ex aquae tepefactæ haustulo assumuntur. s) In  
*Collectaneis chymicis Leydenibus* t) nephriticum et lithontripticum exhi-  
 betur remedium ex cantharidibus, spiritu nitri et spiritu vini paratum,  
 quod simul gonorrhœae, podagrae, arthritidi vagae et ictero medetur.  
 Ill. WERLHOFIVS Cantharidum usum persaepe in gonorrhœa perti-  
 naci

n) l. c. Epist. L. IV. et Hist. anatom. et medic. Cent. V. Hist. 82.

o) Chirurg. Lib. III. Cap. 35.

p) Exercitationes medicae p. 83. 84.

q) Cynosura Mat. Med. p. 56.

r) Museo di Fisica Obs. 23. et Eph. N. C. D. I. A. I. p. 297.

s) Monita et præcepta medica, Lips. 1759. p. 143.

t) p. 119.

naci tuto et cum fructu exploravit. Dedit in substantia granum vnum usque ad tria, cum ossis sepiæ Drachma: et, pro efficaciae obseruatae ratione, continuauit ad plures dies: minorique id molestia fieri animadvertisit, quam si de BARTHOLINI, LISTERI aliorumqun more, et ipso feliciter ab se tentato, infusio vino facto usurpetur. Sublata antea inflammatione, correctis humoribus, imminuta plenitudine, et factis ex methodo reuulsionibus, cantharides in gonorrhœa adhibuit *Vir* ille *Ill. u)* Attamen ASTRVC cantharides aduersus gonorrhœam, vel minima dosi, siue in substantia, siue in infuso, interna exhibitas, non tam infidum, quam adperte perniciosum perhibet remedium.

### *Vis Cantharidum Aphrodisiaca*

#### §. XXIX.

Frequenter cantharides eo consilio interius usurpatae fuerunt, ut homini veneris excessu aut senectute iam exhausto, nouos stimulos adderent ad res venereas ulterius exercendas. Subinde etiam laudabili scopo, cauteque a medicis exhibitae sunt homini corporis non effoeti; sed obseri et viscidae pituitae abundantiam languentis. Vim partes generationi inseruientes stimulandi cantharidibus inesse, iam saepius dixi, amatoriamque vim non aliter, quam ita exserunt, ut orgasmum quendam stimuluum in partibus veneri sacris excitent. Boni quidem seminis quantitas augeri illis non videatur. Quapropter nisi simul adsint succi laudabiles ex quibus inseruentia generationi organa, cantharidum usu stimulata, semen praeparare possint, exhausto omni semine stimuloque perdurante sanguinem excerni necesse est. Quod si nimia cantharidum dosis adhibita fuit, stimulusque adhuc diu perdurat, vita in periculo versatur, idque tam ob summa illarum partium inflammationem, quam ob continuam sanguinis ejaculationem. Vnde moriuntur interduim citius stimulati, quam satiuntur. Cuius quidem rei duo horrenda refert exempla IOB à MECKRE'N. Vir quidam febre quartana laborans, consilio vetulae remedium, cui cantharidum Drachinae duae inerant, cum sumisset, ita in venerem exarsit, ut vxor eius iuraret, se binocli spatio octua-

*u) Opera p. 699.*

octuagies septies ab eo initam fuisse. Tandemque ipse e vita excessit. Alius eadem satyriasi, a simili medicamento, contra febrem tertianam praebito exorta, correptus, vxorem suam, de praepostera libidine mariti expostulante, quadragies vna nocte frequentauit. Mane mortuus, hiantre ore iacens, membroque gangraena correptus inueniebatur. x) Fides sit penes auctores. Porro iuuenis quidam, qui post ingestas cantharidum drachmas duas cum scinco marino et radice Satyr. mixtas, insatiabili coëundi desiderio vexabatur, deficiente semine, sanguinem usque ad diem XI, quo moriebatur, profudit. y) Bononiae z) adolescens canthrides, iuscule inditas, capiebat ne in conflictu veneris succumberet et exinde loco illecebrarum ad coitum, per universum corpus functionibus vellicabatur, cedrinaeque picis sapore, amenia, animi deliquiis, vertigine aliisque permultis symptomatibus deleteriis, difficulter admodum profligandis, cruciabatur. Paraeus casum Abbatis, eiusdemque egregii scortatoris narrat, qui cum ad irritandam venerem cantharidum puluerem ingessisset, misere pereundo petulantiae ac libidinis poenas luit. a) Viduus sexagenarius ducta mediae aetatis vxore, ut se virum ostenderet, canthrides syrupo mixtas sumebat. Vxori dein accubans tentigine primum, insano paullo post pruritu corripitur, mox vertigine capitis affectus parum cohaerentia infelix amator loquitur. Sub auroram sanguinem mingebat purum stranguriaque non toleranda lancinabatur. Variis tamen remediis, tam externis, quam internis, sanitati restitutus fuit. b)

Moderate canthrides ad stimulum venereum excitandum esse adhibendas, funesta haec exempla satis probant. Melius forsan foret eas nunquam hunc ad finem adhibere. Existant tamen auctores, qui eas aliquando contra impotentiam admittant. Sic apud Mynsichtum formulam canthrides continentem inuenimus, quam ille venerem sopitam mirabiliter excitare

x) Obseru. Med. Chirurg. Cap. XXXIV.

y) Ephém. N. Curj. D I. A. IX. et X. Obs. 148. Similia exempla v. Dec. I. A. IX. Obs. 34. Dec. III. A. VII. Obs. 236. SALMVTI Obseru. Cent III. Obs. 23. FORESTI Lib. XXIV. Obs. 7. SCHENKII Liber VII. de venenis animalium. Obs. 39.

z) LANGII Epist. medic. Lib. I. Epist. 47.

a) Praxis Lib. XX C. 28.

b) HENR. AB HEER Obseruat. medicae L. B. 1785. 12. Obs. IX.

tare et irritare scribit. Species diaueneris, quas ingrediuntur cantharides, moschum, Ambram et oleum destill. Macis alio loco describit idem Auct<sup>or.</sup> c) **FELIX PLATERVS** contra impotentiam sequens habet: Sem. eruc. Vnc. dimid. Piper. Dr. i. Zingib. Cinam. ana Dr. dimid. Borac. Dr. vnam et dimid. caudarnm Stinci Dr. dim. Cantharidum No. VI. Fiat pulvis subtilissimus, cui adde sachari albi Vnc. vnam. Dosis est Dr. vnius et dimid. Cum lacte cubitum iturus sumat. Cum successu fuit usurpatum. d) Prostat etiam electuarium magnanimitatis **ZWELFERI**, quod cum radice Satyrii, confectione alkermes etc. etiam cantharides recipit. Prae ceteris omnibus aphrodisiacis G. W. WEDEL Essentiam ex confectionis alkermes Vncia vna, Chocolad. Ind. Vnciis tribus, cantharidum scrupulo vno cum Spiritu Magnanimitatis factam, saepius adhibuit. Prouida tamen cura, ait, opus esse, ne quid nimis e). *Aethiopes* ad excitandum stimulum venereum non sine successu vtuntur tinctura quadam cantharidum, quam magno satis pretio emunt f).

## APPENDICVLA.

### §. XXX.

Plurimorum auct<sup>orum</sup>, de interno cantharidum aduersus varios morbos vsu, obseruationibus ea, qua potui, diligentia, hactenus relatis, non possum non pauca adhuc addere. Ex **HIPPOCRATE** cognoscimus ipsum aduersus eum morbum regium, qui ex temulentia, et rigore, hyemis tempore enato, oritur, et in quo humidum sub cute concrescit, cantharides, cum vino albo et melle mistas, praebuisse g). Ob nimis laxum partium solidarum statum, humorumque visciditatem, fortiori hoc medicamine stimulante illo et vel maxime diuretico, ad eius morbi sanatio nem vtebatur. Multis sane in morbis, quibus vulgo non adhibentur, efficacis.

c) *Armament. Med. chym. S. VIII. et V.*

d) *Obseruat. Lib. I. p. 239.*

e) *Amoenitates Mat. med. p. 480 et 484.*

f) *Cl. FORSTEN Diff. cit. p. 132.*

g) *De internis affectionibus. p. 552. Edit. FOESII.*

cissimum remedium praestarent cantharides recte usurpatae. Mihi etiam videntur Vesicatoria, aduersus varios morbos insigniter commendata, ideo in primis laudem meruisse, quia pars eorum efficax cutis poros intrat, sicque cum massa humorum communicata egregios plane effectus edit. Quanto igitur certius sanaremus morbos, tales in primis, qui ex paralytico neruorum statu oriuntur, si externo cantharidum usui substituereimus internum? Saepissime Dr. BRISBANE tincturam cantharidum apprime utilem comperit in affectionibus paralyticis, hydrope, urinae suppressione a causa spasmodica; in asthmate item spasmodico et morbo hysterico. Sic eandem laudat tanquam medicamentum cardiacum, si naturae vires defecerint: idemque cantharides hic non minorem quodammodo, quam opium utilitatem praestare ait h). In febre lenta neruosa (slow continued nervous feuer) tincturam cantharidum, una cum spiritu Mindereri, Sale C. C. volatili, Croco et Camphora adhibitat, valde extollit Dr. HILLARY i). Inter remedia stimulantia, quae vires naturae in febre putrida neruosa excitare valeant, Experientiss. CHALMERS etiam tincturam cantharidum saepius adhibuit. Optime, ut putat, atonia vasorum hoc remedio corrigitur, restituiturque vis eorum contractilis, qua absente, humorum dissolutio et colliquatiuae omnis generis excretiones orientur necesse est. k) Idem Vir Cl. in secundo stadio peripneumoniae nothae sive catharrhalis, si vitae vires langueant, et pulmones materia viscida infarcti remedia stimulantia et resoluentia desiderent, cantharides laudat. Et si in substantia praebantur, granum dimidium qualibet hora dari praecipit; sin minus, cum aliis remediis tincturam cantharidum exhiberi iubet. l) Denique Cl. FORSTEN m) duo adfert exempla, ubi tinctura cantharidum contra conulsiones, a magna quantitate Laudani opiorum ortas, itemque contra maniam profuit.

i) Select. cases p. 13.

j) Observations on the diseases in the Island of Barbadoes. Lond. 1759. p. 39.

k) An account on the weather and diseases of South-Carolina. Lond. 1776. Tom. I. p. 152.

l) I. c. T. II. p. 114. 115.

m) Diss. cit. p. 126.

---

## T H E S E S.

---

### I.

*Omnis sympathia inter varias C. H. partes, sensorio communi siue cerebro, ex quo omnes nerui oriuntur, soli videtur tribuenda.*

### II.

*Menstrua muliebria ex sola oriuntur plethora particulari et periodica uteri et adiacentium partium.*

### III.

*In Diarrhoea biliosa caute vomitoria propinanda sunt.*

### IV.

*In Hydrope venaesctionem aliquando utilissimam esse, statuo.*

### V.

*Diabetis caussam proximam in renum laxitate quaerendam esse, puto.*

### VI.

*Hydrophobia prophylaxi auerti nequit, nisi longa vulneratae partis suppuratione.*

### VII.

---

**VII.**

*Cauterisatio vulneris propterea maxime Hydrophobiam auer-  
tit, quod spasmos ac inflammationem, in vulnere excitans, veneni  
actionem in Systema Nervosum impedit.*

**VIII.**

*Carnes animalium cibis a vegetabili regno petitis in victu praef-  
ferendas esse censeo.*

**IX.**

*Anne infantibus debilibus atque infirmis variolae potius inferenda?*

**X.**

*Adamas siue physice, siue chemice consideratus, proprium lapi-  
dum genus constituit, a reliquis gemmis diuersum.*

**XI.**

*Omnis verae gemmae maiorem eius terrae, quae ab alumine  
dicitur, quam quidem siliceae continent portionem, falso igitur siliceis  
adscriptae.*

---