Institutiones materiae medicae praelectionibus academicis accommodatae / Jac. Reinboldi Spielmann.

Contributors

Spielmann, Jacob Reinbold, 1722-1783. Royal College of Physicians of Edinburgh

Publication/Creation

Argentorati : Sumpt. Joh. Georgii Treuttel, 1784.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/h47sgcp6

Provider

Royal College of Physicians Edinburgh

License and attribution


This material has been provided by This material has been provided by the Royal College of Physicians of Edinburgh. The original may be consulted at the Royal College of Physicians of Edinburgh. where the originals may be consulted.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org










Digitized by the Internet Archive in 2015


https://archive.org/details/b21915283














AUDITORIBUS SUIS

S. P. D.

J. R. SPIELMANN

umerum librorum, quibus Materia Medica traditur, augere nullus dubito, quotiescunque enim Vestra commoda, quæ meis femper antepono, promoveri posse perspicio, nulla res tanta est, ut ab ea me unquam retineri patiar. Instrumentorum notitiam, quorum ope fanitas confervatur æque ac restituitur, Medico omnino necessariam este, vel ex eo quod omni arti, fimpliciffimæ quoque commune eft, liquet, quarum nulla nisi perspectis mediis, quibus tractatur, potest administrari. Varii, id quod Vos non latet, Auctores Historiam remediorum concinnarunt, & eam varia ratione disposuerunt, quidam etiam tali, quæ non male Artis scopo videbatur respondere, eorum lectionem Vobis commendavi, & nunquam definam commendare; varios etiam pro basi mearum Prælectionum selegeram, cum autem in tanta rerum, quas tirones in Foro Medico addiscere tenentur multitudine, non melius intellectui fuccurri posse ducam , quam fingulas Artis partes ea ratione tradendo, qua proxime Х

cum Praxi nectuntur, hinc Materiem Medicam ordine Therapeutico explicare, præ aliis methodis; quibus Auctores uti folent, magis proficuum mihi videbatur, & cum ad ductum, quo Vos Pathologiam Generalem doceo, componere; ita enim affecuturum spero, ut junior Medicus, quam primum perspicit quid sibi sit agendum, statim in promptu habeat media, idonea fini, quem intendit. Omnia recenfere medicamenta, quæ unquam morbis oppofita fuerunt aut adhucdum opponuntur, operofum nimis negocium fuilset, nec utilitas, quæ inde surrexisset, tempus quod & Vos & ego in eo confumfiffemus, compensasset; sed nec rei medicamentariæ contractum pimis penum volui exhibere, qui compendiariam instructionem semper perniciosam esse, certissimus sum; multa sane sunt, quæ suadent plura in promptu habere corpora, quæ viribus vix differunt, & si medicamenta quæ alii magni faciunt, ipfi non vultis in usum trahere, ea faltem debetis noffe, & rationem callere, cur ea relinquenda effe judicetis; cum autem omnino ea, quæ crebrius in usum ducetis præ reliquis firmius menti imprimenda fint, hinc minus, inter nos faltem, usitata, asterisco (*) notavi, ut mox positis videre, quæ recentislima femper memoria fint fervanda, & ea ab illis distinguere, quæ modo aliorum ergo nosse, tenemini. Prolixior fui circa alimenta, Arras pastes en ratione tradendo, qua proxima

PRÆFATIO.


quam'alias in Materie Medica effe folent, certus quippe facilius fanitatem confervari quam reftitui, confultum fore duxi, materiem, quæ tanti momenti est in morbis præcavendis, non perfunctorie tractare; omnes utique homines nutrimentis opus habent, medicamentis nonnisi ægrotantes, nec hi illis possunt carere, ideo in tractatu unde Medici media, quibus suum scopum assequi possint, difcere debent, non mediocrem alimentis locum dandum esse, judicavi. Corporum quæ recenseo & genericas & specificas notas adduxi, ut certo constaret, quæ debeant recipi. Circa animalia Eximios BRISSON & KLEIN maxime fum fecutus; circa Vegetabilia Illustrem LINNEUM, hujus cum jure maxima fit in Historia Naturali auctoritas, ejus denominationes ubique adjeci, etiam tunc cum alios characteres, quam ipfe dedit, duxi allumendos effe, & cum adhucdum, non fine dolore videam, Rei Herbariæ studium neutiquam ab omnibus qui stadium Medicum ingrediuntur pro dignitate tractari, vegetabilibus adjeci, qua tabula in Opere BLACWELLIANO eorum icon occurrat, ut Medici inde faltem circa plantas officinales supplere possint, quæ in Academiis neglexerunt, & fibi cavere ne rhizotomarum, feplasiariorum &c. fidei Artis dignitatem & hominum falutem superstruant. Analyses ex proborum Auctorum & propriis experimentis adjeci,

PRÆFATIO.

ut videre possitis sub qua forma optima medicamenta administrari & ad fines propositos accommodari queant. Ceterum cum non semper certo constat, num vox, quæ apud Veteres occurrit, idem medicamentum denotet, quod hodie eo nomine venire folet, id indicavi fincere, & recentiorum medicamentorum epocham, quantum potui, determinavi. Cautionem æque ac diligentiam adhibui in recenfendis viribus; aft non eas, quas ex hypothefi finxerunt, aut quas tumultuariis experimentis collegerunt, sed quas ipsa Natura evidenter dictitat, aut quas haud fallax experientia confirmavit, adduxi; allegavi præterea Auctores præcipuos quorum fide nobis de illis conftat. Plures, quos variis negociis distractus quondam eliminare non licuit errores Typographicos, in hac nova editione emendavi, multis nævis maculatum indicem follicite correxi & auxi. Valete & femper recordamini e ratione, qua studia academica tractatis, pendere quicquid commodiper reliquam vitam ipfi expectatis, quicquid Refpublica, cui foli vivit Vir bonus, a Vobis fibi pollicetur.



PROLE.



PROLEGOMENA.



§. I.

ATERIES MEDICA Jan isleuxì est doctrina, quæ corporum naturalium in Corpus humanum effectus ab eorum natura pendentes docet; receptum vulgo est in Materia Medica corpora sim-

plicia & a Natura producta recenfere, in Pharmacologia autem & Chemia ea enarrare, quæ ars parat, aut inter fe mifcet. Materiæ Medicæ *fubjectum* eft Corpus humanum; *objectum* ejus conftituunt corpora naturalia; *finis* verfatur in eo, ut Medicus adminiculis ad fcopum obtinendum idoneis inftruatur. Elucefcit hinc Artis antiquitas, nobilitas, dignitas; & fimul evidens fit, quod is, qui eandem cum fructu cupit addifcere, callere debeat & *Hiftoriam Naturalem*, quæ corporum naturalium characteres docet, & *Chemiam*, unde eorum natura patefit, & *Phyfiologiam*, ut, qua ratione effectus in Corpus noftrum poffint edere, perfpiciatur.

\$. II.

Corpora, quæ homini applicata in ejus naturam mutantur, & partes nobis inquilinæ fiunt, dicuntur Alimenta; illa autem, quæ hominis, à quo recipiuntur, statum mutant, nec in ejus naturam verti poffunt $p_{\alpha \ell \mu \alpha \pi \alpha}$, Medicamenta dicuntur. Illi, qui strictius loqui malunt, nonnisi illis Medicamenti denominationem reliquerunt, quæ corpus ægrotum in sanum convertunt; Venena, quæ talem mutationem producunt, unde mors sequitur; alimenta autem, quæ dum assumationem, etiam aliquid quod præter naturam obtinet, corrigunt, Medicamenta Alimentosa vocant.

§. III.

Corpora naturalia agunt in Corpus humanum ex indole ipfis propria, ex natura hominis priva, & ex varia ratione qua applicantur: prius nunc explicatum imus, alterum ex Phyfiologia & Pathologia liquet, tertium Phyfices principia declarant, & quæ huc pertinent medicamenta, creberrime *Mechanica* folent appellari. Patet hinc quemvis, quo magis hypothefibus & ingenii lufibus indulget, eo minus adæquate de actionis medicamentorum ratione præcipere, quemvis illam eo magis jufte explicare, quo caftius & exquifitius Naturam fequitur.

§. IV.

Idem corpus diversos omnino effectus edere posse facile perspiciet, qui perpendit homines eorumque varias partes vario irritabilitatis & fensibilitatis gradu gaudere, ipfam variam rationem qua medicamenta adhibentur, multum eorundem actionis modum posse variare, in corpore ægrotante per ipfam mutationem morbo factam, affumtis varia posse commissioneri a quibus eorum natura mutatur, & ipfam irritabilitatem a modo naturali recedere, nec nullos esse idiosyncrasiæ & confuetudinis essectus.

PROLEGOMENA.

old maxim seeded §. V.

Vires corporum externorum in humanum fola experientia nobis potest cum certitudine patefacere, præcipiente jam GALENO; probe autem cavendum eft. ne quodvis quod post applicatum homini corpus videmus in illo oriri phænomenon, mox pro iftius effectu habeamus, & ejus virtutibus deberi reputemus; tunc demum de efficacia corporum externorum in nos certi evadimus, quando eandem crebrius, iteratis vicibus, & fub variis circumstantiis obtinuisse nobis constat, nec id quod hac ratione inde furrexisse vidimus phænomenon, aliunde poteft explicari : neglecta hæc cautela, ut pluribus medicamentis vires alienæ fuerint adscriptæ, erat in causa. Sed nec inde, quod aliquod corpus non femper aliquem effectum edat, licet eundem eidem in totum denegare; varia enim poffunt obtinere in certis individuis obstacula, quæ morantur vim, quam in universum obtinere, plurima tentamina evicerunt.

§. VI.

Circa vires corporum, quas experientia nondum claræ luci exposuit, eruendas, non una ratione procedebant Auctores; id ipfum cum ad amplificandum artis nostræ ambitum plurimum faciat, quia experientia, monente HIPPOCRATE, periculosa, & longum tempus, antequam certi quid inde statui queat, requiratur, (§. V.) nimis diu etiam inter Medicos receptum fuerit corporum vires ad principia generalia potius, quam ad experientiam dijudicare, hinc non inconfultum erit, variam rationem, qua circa hoc argumentum versari mos erat, recensere.

Vetustissimi à brutis medicamenta addidicisse dicuntur, id quod quoque circa nonnulla quæ ex America nobis afferuntur, perhibere folent, multum hic omnino fabulofi fubelt, & hanc viam valde ambiguam effe, facile patet.

GALENUS ad hypothefin, quam de quatuor qualitatibus cardinalibus $\delta \dot{v} \alpha \mu \varepsilon \varsigma$, $\dot{\varepsilon} \sigma i \alpha \iota$, Facultates, Effentia dictis aluit, medicamenta quoque in humida, ficca, calida & frigida diftinxit, pro qualitate nimirum præ reliquis emmente, quamlibet harum claffium in quatuor gradus $\tau \alpha' \xi \varepsilon \varsigma$, $\dot{\alpha} \sigma \delta \varsigma \sigma \sigma \varepsilon \varsigma$, Ordines, Exceffus, Receffus, appellatos divifit, minimum primum, maximum quartum appellavit. Ratio hæc per quindecim fecula in fcholis Medicorum viguit; cum autem felici omine theoria Galenica ex arte noftra fit proferipta, & facile pateat, multo plures virtutes à corporibus externis in corpus noftrum exferi, quam quæ ad quatuor modo genera poffint referri, eaque ipfa in fingulis determinare plerumque multum difficultatis habeat, hinc hodie optime negligitur.

Illos hic non effe audiendos, qui, præeunte PA-RACELSO, five ex fiderum in corpora naturalia influxu, five ex horum figuræ & coloris cum illa vifcerum aut morborum caufis convenientia, id quod Signaturam dixerunt, eorum vires indicare aufi funt, quæ ultima ratio jam apud Veteres Ægyptios obtinuit, vix opus erit ut moneam; omnia enim hic imaginatione, nihil plane obfervatione cafta determinari nemo non videt.

Sed & ipfa Chemica analyfis hic crebro non fufficit, cum inde non raro remota duntaxat, non proxima corporum principia obtineantur, eæ quas Chemia ex corporibus educit fubftantiæ, non femper etiam per vires corporis humani inde poffint feparari, principia præterea cum aliis in compofitione corporum nexa, plane alios creberrime edant effectus, quam figillatim adhibita. Chemia omnino multum Materiem Medicam juvat, neutiquam autem ejus ope femper cum

PROLEGOMENA.

plenaria certitudine de viribus medicamentorum licet præcipere.

§. VII.

Corporum Naturalium in hominem effectus ex eorum odore & fapore dijudicare, jam HIPPOCRATES & GALENUS fufceperunt, ad id ipfum per omnia fecula Medici attenderunt & vel noftra ætate egregii Auctores uberius illuftrarunt; cum hac ratione omnino ad vires corporum detegendas magnum nobis furgat adminiculum, hinc præcipuos, qui huc faciunt, canones exponere, non inconfultum fore judico:

I. Amara humores attenuant, folida roborant& ftimulant, digeftionis & venæ portarum vitiis maxime medentur, putredinem arcent, vermes necant.

II. Acria humores refolvunt, solida stimulant, fanguinem commovent, scorbuticis conducunt, urinam cient.

III. Aromatica humores fluidiores reddunt, folida irritant & roborant, vim nerveam augent, morbis capitis & primarum viarum maxime laudantur, putredini quoque refiftunt.

IV. Auftera, acerba, humores cogunt, folida roborant, ad fiftendos fluxus præternaturales faciunt.

V. Acida refrigerant, ad morbos biliofos maxime conducunt, putredini refiftunt, laudantur fcorbuticis.

VI. Salfa folida ftimulant, humores attenuant, in morbis à muco conducunt.

VII. Infipida, quæ non male in ficca, aquofa, vifcofa & pinguna diftinguuntur, emolliunt, relaxant, obtundunt, crebro faponum vires edunt.

VIII. Dulcia etiam evidentiores infipidorum effectus edunt, ad nutritionem faciunt.

IX. Odore virulento prædita motus humorum fiftunt, caput obnubilant, morbos phantafiæ gignunt. 6

X. Fragrantia motum fpirituum incitant, morbis à debilitate oriundis profunt, omnes vires motrices intendunt.

Hæc licet creberrime obtineant, tamen nequaquam adeo conftantia funt, ut non corpora præter vires, quas fapor indicare videtur, interdum etiam alias habeant, quas non nifi experientia difcimus; id quod nec HIPPOCRATEM latuit.

§. VIII.

Inde quoque quod plura genera Corporum Naturalium, ad eandem claffem pertinentia, viribus convenire videamus, non improbabiles conjecturæ nafcuntur circa virtutem corporum, quorum effectus nondum per experientiam confirmati funt. Poft CÆsALPINUM Recentiores maxime hanc vires medicamentorum determinandi rationem ftabilire conati funt. En præcipua quæ inde hactenus innotuerunt momenta:

I. Filices roborant & humores attenuant.

II. Gramina nutriunt & humores refolvunt.

III. Liliacea folida stimulant, humores spissos corrigunt.

IV. Flore composita instructa nutriunt, humores attenuant, obstructa referant.

V. Cruciformi flore inftructa, ad tetradynamiam pertinentia, folida ftimulant, humores exagitant & valide refolvunt.

VI. Afperifolia folida leviter roborant.

VII. Apocyna evidenter acria funt.

VIII. Malvacea relaxant, obtundunt, infpiffant.

IX. Oleracea nutriunt, refrigerant, attenuant, relaxant.

X. Verticillata morbis offium præcipue medentur.

XI. Umbellifera nutriunt, humores commovent & folvunt, folida ftimulant, maxime ad vitia digeftionis adhibentur. XII. Cucurbitacea refrigerant, vires faponaceas edunt, interdum alvum movent.

XIII. Pomifera & quæ baccas habent cum Cucurbitaceis conveniunt.

XIV. Craffifolia refrigerant, faponacea funt.

XV. Leguminofa nutriunt, demulcent, relaxant.

XVI. Ringentia roborant, stimulant, refolvunt.

XVII. Amentacea adstringunt, nutriunt, balfamica funt.

XVIII. Lactescentia ad §. VII. nº. 1. 2. 7. 8. determinanda.

XIX. Pinguedines animalium fecundum §. VII. n°. 1. 7. 9. 10. dijudicandæ.

XX. Infecta aliquid acris habent, in renes maxime agunt.

XXI. Teftæ teftaceorum vires alcalium edunt, in putredinem excitandam pronæ.

XXII. Quicquid ad lapides vitrescentes pertinet, iners est

XXIII. Calcarea in modum' alcalium agunt.

XXIV. Bitumina refolvunt, abstergunt, vim nerveam varia ratione modificant.

Sed hic quoque notandum, non raro exceptiones valde infignes dari, & hos etiam canones nonnifi conjecturis anfam præbere fola experientia (§. V.) confirmandis.

§. IX.

Ab effectu, quem medicamenta edunt, illa varie diftinguere folent : Squera, generoja, heroica dicuntur illa, quæ exigua dofi affumta, infignes in homine mutationes producunt : Panacea, qua voce Veteres pro denotando medicamento polychrefto, ad multos ufus faciente, ufi funt, ab Alchemicis dicitur fubftantia, quæ omnibus omnino morbis medetur, talem medicinam ad non entia referendam effe, nec tyro Pathologiæ ignorat, & quid quæfo magis abfurdum potest cogitari, quam morbis à contrariis inter fe caufis oriundis idem medicamentum opponere velle? Specifica vocant illa medicamenta, quæ per rationes hactenus ignoratas in certas corporis partes agunt, vel propriis morbis medentur; eorum numerum multum auxere mox superstitio, mox sœda lucri cupido, mox falfæ theoriæ pathologicæ, mox vel nimis frequens in nostra Arte argumentandi ratio à particulari ad universale; hinc quo magis Medicina crescit, quo dignus Ars nobiliffima exercetur, eo magis specificorum catalogus decrefcit : eorum quæ omnino obtinent agendi ratio, ex eis quæ in Phyfiologia de certis corpufculis fanguini commixtis ad certas, præ aliis partibus, fecedentibus demonstrat, aliquatenus poteft illustrari; probe autem & circa specifica notandum, quod non debeant, nisi ex justa indicatione exhiberi. Medicamenta minus bene a partibus corporis humani, quibus præcipue mederi putantur, denominari prudenter jam GALENUS annotavit. Medicamenta magnetica & sympathetica Medicum rationalem, Arcana ingenuum, philosophum, christianum dedecent.

§. X.

Medicamenta *interna* appellantur ea, quæ deglutienda offeruntur, agunt ea evidenter in fauces & œfophagum, non raro quoque in ipfam tracheam, nec non in ventriculum & canalem inteftinalem; quæ fub hoc itinere à vafis reforbentibus hauriri poffunt, cum fanguine commifcentur, & inde ad omnes corporis receffus perveniunt; fed etiam illa quæ in primis viis fubfiftunt, ob confenfum, qui inter has & reliquum corpus intercedit, in remotas a canali alimentari partes operari quoque poffunt; ea quæ fanguinem subierunt, magna humorum quantitate in vasis majoribus merfa, in minimis demum, per quæ globuli folitarii & cum difficultate transeunt, fuas vires videnter exferere; ea præterea, quæ Phyfiologi circa fingula viscera, per suam fabricam certas moleculas præ aliis admittentia, demonstrant, illustrant quomodo dentur medicamenta in propria vifcera evidentius efficacia. Externa appellantur illa, quæ alio quovis modo quam per deglutitionem corpori applicantur; nec horum quoque effectus fubliftit modo in parte, cui admoventur, ipfa enim circulatio & quicquid inde pendet, pro vario corporis externi habitu varie se habet, & omnis corporis superficies innumeris gaudet vasis reforbentibus, quæ ea quæ receperunt, fanguini, cordi & omni corpori tradunt; hinc medicamenta externa, partibus fubtilioribus aut talibus inftructa, quæ ab humoribus folvi poffunt, eofdem effectus, ac si intus fuissent recepta, producere folent, hac fola differentia, quod mitius operentur quam interna, quæ integra fua mole in sensilem multum & irritabilem canalem alimentarium agunt.

§. XI.

Infignem medicamentorum farraginem recenfet Materies Medica; Medicum enim nil debet latere, quod aliquem effectum in fanitatem edere certa fide compertum eft, aut faltem dicitur; hæc autem omnia enarrare, cum multum limites Compendii excederet, hinc illa modo tradam, quæ in Syllabis Parifino, Wurtembergenfi & Nostrate occurrunt, & ex his, omiffis illis quæ tota eviluerunt, amplam fatis penum proponere vel ideo confultum duxi, quia Medicus varia, quæ viribus conveniunt, tenetur in promptu habere, cum ei incumbat ægrorum guftui, quantum id per morbi naturam licet, blandiri, idiofyncrafiæ quoque rationem habere, per quam non raro certa medicamenta ferri non poffunt, & in morbis longis, eadem indicatione fubfiftente, non raro indicata mutanda fint; multa præterea virtute convenientia remedia Medicus noffe debet, quia ejus opera non raro imploratur in locis, ubi medicamenta felecta ad manus non funt, & tunc præftat minus efficax, quam nullum remedium dare. Medici prudentis interim eft ad monitum ERASISTRATI pauco modo medicamenta & ea efficaciffima in ufum trahere, cum fefquipedales formulæ, coacervatio talium quæ viribus conveniunt, & crebra medicamentorum mutatio five ignorantem five fluctuantem artificem demonftrent, Pharmacopolæ præterea melius adftringi queant, ut medicamenta exquifita affervent, fi pauca modo eorum curæ committuntur.

CAP. I.

§. I.

Alimentum, Nutrimentum, reoch, ortior, oµwrn dicitur omnis illa fubstantia, quæ restituit ea, quæ per vitam erant deperdita. Distinguunt alimenta in euwewra & du wewra, concoctu facilia & difficilia, in Juria porro & eulura, quæ firmum nimirum, & quæ facile dissipandum nutrimentum largiuntur, præterea in πολύτgoga & chipórgoga multum & parum nutrientia.

§. 2.

Modus agendi alimentorum in eo confiftit, ut eorum partes partibus corporis noftri analogæ, inde ope vifcerum chylopoicorum extrahantur, fyftemati arteriofo tradantur, ejus actione in naturam noftram vertantur, fluida humoribus commifceantur, folida foveoles fibrarum fubeant & in eis fe firmari patiantur; cum Phyfiologia evincat aquam, olea, mucilagines, glutina effe fubftantias, quæ corporis noftri partibus analogæ funt, hinc quæ corpora alimentis fint adfcribenda elucefcit, & patet fimul, quod fingula ex propria non folum natura, fed etiam ex ftatu virium chylo & hæmatopoieticarum ejus hominis à quo affumuntur, debeant dijudicari; illa præterea, cum facilius aut difficilius partes alibiles, quas vehunt, dimittant, craffiora fint & teneriora, partes nutritias parcius five largius vehant, & hæ, pro vario quo gaudent genio, magis aut minus firmiter partibus corporis noftri poffint accrefcere, hinc ratio differentiarum (§. 1.) perfpicitur.

§. 3.

Ipfam vitam Nutrientia indicare Phyfiologia evincit, facile etiam perfpicitur ea eo copiofius ingerenda effe, quo majus obtinet corporis incrementum, & quo major eft confumtio; hinc infantes, fanguinei, qui fub cœlo frigido vivunt, qui corpus multum exercent &c. largius funt nutriendi, fenibus, phlegmaticis, otiofis &c. parciora alimenta fufficiunt; fames in quantitate ciborum menfuranda optimus ut plurimum index eft; confuetudinis præterea etiam ratio haberi debet, nec non vifcerum ad chylopoiefin & hæmatopoiefin facientium, hinc his fe præter naturam habentibus, parcius omnino nutrientia erunt exhibenda. Quæ mala ex excedente nutrientum ufu furgant, egregie tradit Illuftris GAUBIUS.

\$. 4.

Defumuntur alimenta ex omni Naturæ regno: Vegetabilia dant Substantias farinaceas, Olera, Fructus horræos, Nuces; Animalium & folidæ & fluidæ partes

NUTRIENTIA.

nobis in alimentum cedunt; ex Fossilium ordine Aqua huc pertinet.

FARINAM appellamus fubstantiam pulverulentam, quam vegetabilia includunt, cum aqua in pastam reducendam, quæ fermentationi obnoxia eft; illa cum in formam granulorum diffracta eft mlisavn, Ptisane. Gruau, Grütz dicitur; hæret five in fructibus, five in radicibus, five in caudicibus. Fructus, qui farinam habent, five ad graminum ordinem pertinent, & Grana cerealia, Frumenta, Far, Blé, Getreide dicuntur, five defumuntur ex plantis flore papilionaceo instructis & Legumina appellantur, quia non fecando, fed vellendo leguntur, Legumes, qua voce tamen etiam olera comprehendere folent, nostratibus Gekærns, Gekirns. Grana cerealia dum in usum cibarium recipiuntur, opus eft, ut cribri ope tam à granis macilentioribus, quam à seminibus heterogeneis, quibus ab herbis peregrinis, vix non omnium agrorum pestibus, solent inquinari, separentur.

turig to summer shine \$1.6. manod

Farina ab involucris, quibus à Natura obvoluta eft, vulgo ope molendini feparatur; hæc involucra poftquam à farina fuerunt feparata $\pi i \tau v q \alpha$, $rnq v G i \alpha$, *Furfures*, du Son, Kleyen dicuntur; illis fi in corpus noftrum vires funt, eæ a farina ipfis adhærente, five ab afperitate qua gaudent, erunt deducendæ. Cum farina mucilaginem habeat, hinc nutrit, demulcentes præterea, relaxantes, imo abftergentes vires habet (*Inftit. Chem* Exp. 4.), eadem cum calore acida fiat, hinc refrigerat & putredini refiftit, quod ultimum recentiora experimenta egregie confirmant.

\$. 7.

Farina, dum aquam ipfi affundimus, ex eadem quidem se suspendi patitur, sed mora interposita, inde iterum fecedit, & in fubstantiam abit non mediocri viscedine instructam, primis viis hinc ingesta validas earum vires exigit, ut digeri queat, & istis deficientibus, mala quæ a Viscido oriri Pathologi oftendunt, excitat, pueros inde tumido ventre languisse & hydropicos mortuos effe van Swieten vidit; præterea multum aëris fixi eidem inhærere cum HALES evicerit, hinc cur ejus esus flatulentus sit, evidens est. Dum autem validæ vires primarum viarum viscido fubigendo pares fint & id ipfum nutrimentum non facile diffipandum largiatur, hinc farina hominibus robuftis & qui valide corpus movent, non modo concedenda, fed etiam commendanda eft. Romanorum antiquiffimi fortes & bellicofi ea utebantur PLINIO tefte. Varium pulmentorum, pultium, placentarum, bellariorum, cruftulorum, artocreatum &c. genus inde paratur, quod præterea, quæ nunc dixi, pro vario infuper Cerealis genere, variis quæ farinæ additæ futerunt substantiis, vario etiam calore, qui ad ejus coctionem fuit adhibitus, dijudicandum eft. Multo præterea in usu est eadem cum aqua subacta & in fila ducta, quæ Vermicelli, Nudlen nomine venit, in iis parandis maxime Italorum industria occupata fuit, hodie pluribus in locis parantur Macaroni, Karagni, Vermicelli, Semoulles, Paters &c. Farina extus adhibita integumenta relaxat, materiem acrem ad cutem hærentem demulcet, materiem perspirabilem absorbet, hinc digerendi, maturandi, diffipandi ergo ad eryfipelas, intertriginem, tumores œdematofos, fub forma epithematis vel asperginis in usum trahitur.

Pulvis Erysipelatodes MYNSICHT. Saturnina quoque & refinas habet, agit evidenter repellendo; inspergi-

tur parti affectæ & supra eam ope chartæ cæruleæ retinetur.

Farinæ in cibum receptæ ufus cum multum incommodi habeat, hinc à longiffimo jam retro tempore obtinuit, eandem certo gradui fermentationis committere, quo ejus principia laxentur, eo autem cum pervenerit, ulteriorem refolutionis progressum caloris furni ope cohibere, furgit ita Panis, agros, Pain, Brod, quem a Mythologorum PANE quidam derivant; illi tam gratiæ ergo, quam ut fi adhuc aliquid viscidi retinuisset, mox medicina adsit, Salem communem adjicere folent. Commendat fe panis albedine, levitate & fubstantia multis foraminibus distincta. quæ vulgo oculi dicuntur, ab aëre, ope caloris & fermentationis expulso, relictis. Panis portio fuperior & ob majorem, quem paffa est, furni calorem, & magis ficca & magis colorata dicitur Devuna, Crusta, la Croute, Rinde; substantia mollis à crusta tecta MUELOS, Mica, Mie, Krume, Brosame. Panis automugos, cibarius, secundarius, ater, confusaneus, Pain de munition, Commissbrod ex farina à furfuribus non separata coquitur; Bewrw, fordidum, gregarium, squarrosum, acerosum, furfuraceum, Pain de recoupe, Klevenbrod. Hundsbrod illum appellant, qui ex furfuribus coquitur, is pro varia ratione, qua furfures farinam retinuerunt, varius est. Panis iterata coctione ficcisfimus redditus vaulinos, Junios, bucellatus, nauticus, biscoctus, Biscuit, Zwieback dicitur, hic omni humido privatus longiffimam ætatem fert, & cum nutrientem panis partem habeat in arctius volumen coactam, hinc præ reliquis panis generibus largiffime nutrit; hujus ad naturam Crustam supra dictam propius accedere facile patet. Sed multas adhuc panis folet induere

14

differentias, pro vario cereali unde paratur, pro varia ejusdem farinæ ætate, ubi notandum, quod eadem quo recentior est, eo difficilius viscidi medelam affumat, pro varia ratione qua molendinum furfures a farina separavit, aut hæc ipsa a molliori molari inquinata fuit, de quo tristes observationes apud Ill. LIN-NÆUM prostant, pro ratione porro fermentationis & cocturæ, pro vario etiam humore quo farina subigitur, & pro variis substantiis quæ ipsi adjiciuntur.

5. 9.

Panis exfequitur vires ejus cerealis unde erat paratus, & cum aquam facile fubeat, nec ipfi lentorem conciliet, hinc facillime a primis viis fubigitur, nec debilibus reformidandus, omni ætati & omni temperamento optimum alimentum. Calens panis plus aquæ & aëris habet quam pridianus, hinc difficilius digeritur & flatus gignit, ejufdem odorem excitantes vires edere DEMOCRITUS jam expertus eft. Mica extus emolliendi ergo adhibetur ; ejufdem ope medicamentis ex tempore formam pilularem dari poffe alibi docetur; crufta cum fucceffu ex jure coquitur pro illis roborandis, quorum ventriculo nec leviffimus cibus conducit.

* Aqua Panis Wurtemberg. Est aqua spirituofa a crusta panis & aromatibus abstracta, roborandi ergo cochleatim exhibetur.

* Emplastrum de crusta Panis MONTAGNANE, præter crustam panis etiam varia aromata recipit; compofitio Wurtembergensium magis aromatica est quam illa Nostratium, ventriculo aut umbilico imponitur in vomitu & vario diarrhϾ genere.

§. 10.

I. α. GRANA CEREALIA. Avena, βgωμος, Avoine, Haber. Grana sistit stri-

SUM100

gofa, utrinque acuta, uno extremo obtufiore, facie una convexa, altera plana fulco medio diftincta, fapore leviffime dulci inftructa, fub cuticula alba, flava, nigricante, medullam albam includentia.

AVENA. Locusta multiflora, corolla biglumis, ariftam versus basin emittens, trianthera, digyna, calice mutico biglumi sustentata. Sativa L. BLACKWELL 422. locusta bislora, glumis & seminis glabris gaudet.

Ubi fponte crefcat hodie ignoratur, Anson fe illam in Infula Maris Auftralis Ivas Fernandez reperiffe teftatur.

Varietas cortice nigro, Eichel-Haber, reliquis præferri folet; illa quæ gryfea eft, reputatur viliffima cum parciffimam farinam vehat; flavicans, quæ alba Anglica vel gravis dicitur, reliquas largioribus meffibus & granis majoribus & craffioribus vincit, copiofe in Palatinatu & Bohemia, tefte Cl. SCHREBER, colitur, creberrime etiam inter nos feri folet.

Avena nuda L. in Anglia septentrionali, Avena fatua L. in Dalekarlia colitur.

Seritur mense Martio, sub finem Julii, inter nos, maturescit.

Farina Avenæ dimidium fui ponderis mucilaginis pellucidæ & albæ largitur. Cl. KESSELMAYER.

Refragante omnino experientia GALENUS avenam minus bonum alimentum hominibus largiri contendit, teftatur enim PLINIUS, Veteres Germanos pulte avenacea victitaffe, & RAYUS cum HALE, rufticos Scotos & illos qui Angliam feptentrionalem inhabitant robuftiffimos homines, nullo alio cereali quam avena vivere; omne præterea avium & pecorum genus, equi quoque & fues optime inde nutriuntur. Ptifanum avenæ, quam recentiores *Grualdum* dicunt, Medicorum Gallorum inventum, tefte BRUYERINO, fuaviffimum omnino edulium eft, & inter nos non modo ægrotis, tanquam cibus digeftu facilis, exhibetur, fed etiam optimis optimis mensis apponitur. Puls ex avena tofta, in Helvetia septentrionali teste Illustr. HALLER, & inter nos comeditur. Panis ex avena paratus niger est, amarus & difficilius digeritur; amara etiam observatur cerevisia ex avena parata.

Scopo medicato Avena ob largam, qua gaudet, mucilaginem, tam relaxandi, quam demulcendi fcopo optime præfcribitur & fub forbitionis forma exhibetur, aquam cum eadem coctam, præeunte HIP-POCRATE, ad febres ardentes & inflammatorias exhibemus, ut inde tenfioni fibrarum medeamur, acrimoniam temperemus, fpiffitudini medelam afferamus, putredinem arceanus, & cum præ reliquis cerealibus citius acefcat, hinc hoc ultimo fcopo etiam reliquis præferenda effe videtur.

Avenam degenerantem morbos phantafiæ producere plures Auctores cum FABRO tradunt, fed hic effectus granis Lolii temulenti, quod cum Avena adolevit, omnino eft adfcribendus.

* Decoctum Avene Loweri Hecticis, & illis quibus fanguis æstuat, multum commendatur; de eodem bis de die duo cyathi exhibentur.

* FAGOPYRUM, Fagotriticam, Frumentum Saracenicum, Bled noir, Sarrasin, Buchweitzen, Heidenkorn, hoc nomine veniunt grana triquetra, quæ sub cortice nigro farinam albissimam & insipidam includunt; a colore & figura ad sructus Fagi accedente, denominationis ratio petita est.

-RUELLIO teste seculo XIV ex Oriente in Europam hæc grana fuerunt illata.

POLIGONUM Corolla 4 vel 5 fida, stamina à 5 ad 8, 2 vel 3 styli, semen unicum, nudum Fagopyrum L. Folia cordato sagittata, caules inermes, semina integerrima

Asie indigena planta, hodie in terris sterilioribus & talibus, que facile a frigore vernali afficiuntur, feritur, cum femen versus Maji finem satum adhuc maturescat; post avenam demetitur.

Ad urbem noftram non colitur, nec inter nos in usum trahitur.

Panis inde coctus niger est, nec ejus mica cohæret.

Digestu facile esse exiguum alimentum hominibus præbere dicitur; avibus faginandis exhibetur. Pultes inde paratæ, quæ cineritium colorem habent, hominibus alvi segnioris commendantur.

HORDEUM, zei3n, Orge, Gerst, fistit grana oblonga, medio ventricosa, ad utrumque extremum acuta, angulata, facie magis convexa sulco notata, sub cuticula leviter flavescente, dulcescentem & albam farinam includentia.

HORDEUM locusta triflora, involucro hexaphyllo tres corollas biglumes, quarum una gluma in aristam terminatur, triantheras, digynas suftentat.

Hordeum Vulgare L. Orge quarrée, Reisgerste, BLACWELL tab. 423. flosculi omnes hermaphroditi, sexfariam positi, ordinibus duobus magis eminentibus; grana cortice tenuiore tecta & magis flavicante; farina propius ad triticeam accedit.

Hordeum hexastychum L. Wintergerst, Escourgeon, ab antecedente ordinibus omnibus æqualibus differt.

Hordeum diftychum L. Orge de Mars, hleine Gerft, Sommergerft, floribus lateralibus muticis, mafculis diftinguitur. Hanc fpeciem fponte in montibus inter Sibiriam & Tatariam occurrere, monet Clar. HEINZELMANN. Duze priores fpecies autumno feruntur & fub finem menfis Junii maturefcunt, ultima Martio menfe terræ committitur, ejus meffis fit menfe Julio.

Hordeum suo cortice privatum Veteribus Alooavn, Ptisana dicebatur, hodie Mundatum, Orge mondé, geröllte Gerst solet appellari, cum integrum Crudi nomine veniat; illius plura genera molendinæ ope parari folent, grana quo funt minora & exquifitius rotunda, eo magis laudantur, optima à margaritis five ab Ulma nomen accipiunt.

Sed nec id omittendum, quod apud HIPPOCRA-TEM & GALENUM etiam aqua in qua hordeum decoctum fuit $\pi l_{105\sigma dvn}$ dicatur. Hordeum toftum apud Veteres $A \lambda \varphi lov$, Polenta appellabatur; aqua ab hordeo viscida reddita autem $\pi l_{105\sigma dvns} \chi v \lambda \phi$: Cremor, is hodie Créme d'Orge, Gersten-Schleim audit.

Mucilago hordei dodrantem efformat. KESSELMAIER.

Panis ex hordeo albus eft, fed gravis & diu vifcedinem retinet.

Parum nutrire post ARISTOTELEM communis semper opinio fuit, interim illud antiquissimum hominum alimentum fuisse, tradit PLINIUS, & illo Suecos feptentrionales vitam fustentare, testatur-Illustris LINNÆUS, idem quoque de Alpicolis affeverat Celeb. HALLER. Medicato fcopo HIPPOCRATI jam in creberrimo ufu fuit, quem etiam omnium ætatum Medici fecuti funt; maxime laudatur propter vim refrigerantem, quam folida laxando, humorum alcalefcentiam arcendo, eorundem acrimoniam obtundendo, & efficiendo ut aqua fanguinem phlogisticum fubire poffit, edere videtur; datur hinc ad omne febrium genus; fed exhibetur quoque cum fuccessu in plurimis aliis morbis, ubi vel acrimonia peccat, vel ftrictura aut irritabilitas excedens; idem calculum diffolvere vidit LOBB. Propinatur vel fub forma Cremoris cum jure coctum, vel ejus una uncia cum duabus libris aquæ usque dum grana diffilierint, id quod crepaturam vocant, coquitur, & pro potu ordinario datur, five pro eodem fcopo aliis vegetabilibus, morbo appropriatis, adjicitur, cum vix aliquid efficacis à glumis expectari poffit, hinc mundatum femper crudo præferendum effe videtur; licet hoc etiam, imo ipfos furfures commendaverit HIPPOCRATES. Polentam quidam in modum fabarum Caffée folent affumere, illa autem cum igne aliquam acrimoniam contraxit, (Inft. Chem. §. 80.) hinc frustra hordei virtutes inde expectantur.

Hordeum germinando laxatum Maltam Recentiores appellant, ejus cum Aqua infusi contra Scorbutum usum recentissimæ observationes commendant.

Farina hordei quatuor refolventibus adicribitur. Hordeatum, Orgeut, ab amygdalıs maxime fuas vires habet, pro eo ex tempore parando proftat * Syrupus hordeatus Parif. Decoctum hordei. Saccharum hordei Sacchari vires sequitur. Cerevisia historia Inft. Chem. Exp. 125. tradita; illam vulgo ex hordeo folent parare, ejus in corpus humanum effectus, partim ex fpiritu quo scatet, & cujus vires l. c. Exper. 128. recenfui, fluunt, partim ex mucilaginofo quod de cereali recepit, ob hoc ad nutritionem facit, fed cum id ipfum fibras primarum viarum relaxet, hinc cereale torrendo & eidem amara, Lupulum maxime adjiciendo, ut cerevisia ventriculo non obsit, efficere tentant; horum igitur ad variam, quæ in variis cerevifiis obtinent, rationem attendendum effe liquet, & quia mucilago pro vario cereali variat, hinc etiam horum ergo cerevifiæ funt dijudicandæ; triticeam reliquis magis nutrire, fed etiam facilius vifcera abdominalia obstruere docuit experientia, largiori præterea qua cerevifiæ gaudent mucilagini debetur hominum, ea pro potulento ordinario utentium, habitus ut plurimum spongiosus, humores mucosi, folida inertiora. Sed cum largam quoque copiam cerevifia habet, hinc hujus quoque vires exfequitur & illas eo evidentiores, quo magis tenuis est, pauciora amara recepit, ex cereali minus tofto parata eft. Cerevifia non rite fermentata producit mala a viscido & ab acrimonia fermentante & acore furgentes fuscitat. Cerevisiam antequam fermentaverit pro potu ordinario haustam egregie ad ulcera phagædenica curanda facere experti funt Cl. GIBSON & RUSH.

* MANNA, Schwaden, Polnifche, Frankfurter, Berliner Manna. Grana exigua, fere cylindracea, cortice fusco instructa, quo privata albissima funt, fapore dulci instructa,

FESTUCA L. Locusta multiflora, corolla biglumis aristam infra apicem emittens, biglumi calice sustentata. Fluitans L. panicula ramosa; spicæ subsessiles. Pois omnino reddenda.

Crefcit in omni Europa.

0

Mannæ quæ femen graminis eft, reftauratores Botanices meminerunt, omnes illud a fpecie quadam Panici derivarunt, num recentiores id quod hodie obtinet, illi veterum fubftituerunt? num MATTHIO-LUS primus erravit & fucceffores in errorem induxit?

In Germania feptentrionali & regionibus ipfi vicinis colligitur, modum eam colligendi tradit Celeb. SCHREBER.

Hordeo minus nutrire, Milio facilius digeri dicitur; in fuave pulmenti genus cum jure vel lacte folet cogi Noftrates Gallos imitantes eidem alicæ Tritici Barbarici genus, quod Semoules dicunt, folent fubftituere.

* MAYS, Frumentum Turcicum, Blé de Turquie ou d'Espagne, türkisch Korn. Sistit grana rotunda, inferne leviter angustata & compressa, utrinque plana, altera facie-sulco distincta, altera substantia graniformi parva notata, sub cortice varie colorato, medullam albissimam includentia.

ZEA Mays L. BLACWELL tab. 547. Planta relativa monophyta, mares locusta biflora, calyce & corolla biglumi, antheris tribus gaudent & in spicam laxam ordinantur, feminæ calice & corolla maribus simili, stylo longissimo instruuntur, & inhærent re-

B 3

ceptaculo magno, fucculento, vagina foliacea incluío.

Planta in America a longiffimo retro tempore culta, fub initium XVI feculi in Europam allata, jam diu in regionibus meridionalibus feritur; in Germania ferius coli cœpta eft.

Frigoris impatientisfima planta, mense Aprili seritur, Octobri maturescit.

Mays ultra dimidium fui ponderis de mucilagine, grata aciditate gaudente edit Cl. KESSELMAIER. Panis inde paratus non ingratus est, & albus si ex granis albis coquitur, fed gravis; cum autem Mays granis cerealibus, unde vulgo panis paratur, adjiciunt, bonus omnino panis furgit. Digestu facilis farina, obfervantibus HERNANDEZ & DUPUY DEMPORTES egregium omnino alimentum præbet, cum teste HERNAN-DEZ hoc uno cereali Americani ab omni tempore vitam fustentarint, & vulgari experientia constet, omne armentorum, porcorum, avium &c. genus inde optime faginari. Aciditas quæ ejus mucilagini inest, illud refrigerandi ergo vel aliis cerealibus præferendum esse fussioner facit, quam fussionem etiam HERNANDEZ confirmat.

Receptacula florum femininorum tenella, cum aceto condita, fuaviffimum edulium cum carne comedendum fiftunt.

* MILIUM, xírxe@, Millet, Hirs, habet grana exigua, rotunda, fplendentia, striata, grysea, substantiam albam farinaceam includentia.

PANICUM Calice triglumi, unifloro, corolla biglumi gaudet. *Miliaceum* L. paniculam laxam habet, flores muticos, foliorum vaginas pilofas. Apud Indos fponte crefcit, quo tempore in Europa coli cœperit, ignoratur.

Martio mense feritur, sub finem Augusti ejus messis fit. Molendinæ ope in grana flava frangitur & hac ratione in ufum trahitur.

Farina pauciffimam aquam recipit & in panem abit viscidum, gravem & cujus mica nulla foramina habet

Æthiopum & Sarmatarum olim cibo, a multo jam tempore Itali utuntur. Gallis quoque & Hifpanis ufitato; pultes inde paratæ, ad illas quæ ex Manna cereali coquuntur, videntur accedere, illas difficilioris digeftionis & pauci alimenti effe, omnes per omnia fecula tradunt auctores, alvum inde ftringi jam HIPPOCRATES monuit, qui ipfa grana ad varios morbos commendavit; apud nos nonnifi infimæ plebi in ufu funt.

Variarum aliarum *Panici* fpecierum grana quæ hinc inde 11 Europa, calidiore maxime, coluntur, ratione virium cum Milio videntur convenire.

ORTZA, Calix biglumis uniflorus, corolla ex quatuor glumis inæqualibus, quarum una ariftata eft, efformatur, hexanthera, digyna.

Panis ex oryza coctus illi fimilis eft qui ex Milio paratur.

Planta Indiæ, Nigritiæ & Infulis Philippinis, Americæ quoque indigena, hodie vix non in omni Oriente colitur, inde ejus 1200000 centenarios ex una Damiata Ægypti in Europam duci teftatur HAS-SELQUIST; fed colitur præterea in Carolina, Georgia, Jamaica, nec non in Italia & Hifpania. Orientalis & Hifpanica rubet, Carolinensis Europæam magnitudine & albedine superat.

Oryza dimidium fui ponderis mucilaginis largitur.

Vulgaris cum fit omni Orienti cibus, hinc ipfi vires nutrientes nequeunt denegari, eas autem cedere illis quibus triticum, fecale & hordeum gaudet, docuit experientia; eadem cum aquam facile fubeat, nec ipfi tenacem visciditatem conciliet, hinc manifestum, quod digeftu facilis fit, mucilagine qua fcatet demulcentes quoque vires edit & hordeo fubstituitur. Vim alvum fistendi, quam ipsi secundum DIOSCORIDEM vulgo folent adfcribere, tunc demum videtur obtinere, quando alvus, ob acrimoniam in inteftinis hærentem, laxa eft. Calculum inde diffolvi LOBB obfervavit. In Oriente grana emollita per aquam, ad omne ciborum genus, ea ratione qua inter nos panem adhibemus, folent comedi; Europæi eam fub forma cremoris menfis apponunt, scopo medicato quoque decoctis adjiciunt.

Arack spiritum inflammabilem ex oryza paratum effe, vulgo perhibent, sed RUMPHII & SHAW fide constat, Indos omnem spiritum inflammabilem hoc nomine insignire, OSBECK asseverat, illum qui ad nos affertur ex oryza, faccharo & coccos nucibus confici.

SECALE, Seigle, Roggen, Korn. Exhibet grana ftrigofa, inferne acuta, fuperne obtufa, teretia, fulco longitudinali notata, fub cuticula flavicante veftigio nigri tincta, farinam albiffimam includentia.

SECALE. Calix biglumis, glumis acutis, bi-vel triflorus, feffilis, corollæ una gluma in aristam terminata, aspera. Cereale L. BLACWEL 424. glumas scabras habet.

In Sibiria spontaneum esse dicitur.

Vernum grana minora & leviora, fed farinam magis albam largitur, illud apud nos non colitur; hybernum quod autumno feritur, primis mensis Julii diebus apud nos metitur.

Ejus dodrans a mucilagine efformatur. KESSEL-MAIER. Secalis dimidiam partem a fpiritu acido, undecimam circiter ab oleo conftitui, Cl. ROSE ope deftillationis est expertus.

Cereale, quod nunc Secale dicitur, a Secali veterum diversum esse, ex descriptione, quam PLINIUS de eodem tradit, est evidentissimum, ad id cum multi non attenderint, hinc nostrum Secale vilissimæ notæ frumentis adscribere nulli dubitarunt.

Bonum inde alimentum furgere Germania & regiones magis feptentrionales, apud quos panis fecalinus frequentifimo in ufu folet effe, abunde probant; eft is quidem triticeo minus albus, fed ejus fapor eundem multis commendat, nec non quod præ omni reliquo, ex aliis cerealibus cocto, minus cito arefcat: non raro vel apud Noftrates farinæ triticeæ aliquid fecalinæ adjicitur, pro coquendo pane familiari.

Secale toftum ultra $\frac{7}{8}$ fui ponderis de Extracto aquofo largiri, $\frac{1}{4}$ modo Extracti refinofi, Cl. Rose tradit; SCHWANECKE & Cl. NONNE $\frac{3}{8}$ modo Extracti aquofi adducunt, ejus infuíum illi fabarum Caffée fubftitui posse afferit DILLENIUS, sed obtufo omnino gustu gaudent, qui unum ab altero vix distingui posse contendunt.

Secale cum aqua maceratum facile acorem contrahit, hinc vulgo ferro, quod ftannum recipere debet, folet illiniri, nec male forfan refrigerandi fcopo reliquis cerealibus anteponeretur. Secalis viridis fuccum ad nephritidem facere TIMÆUS à GULDENKLEE monet, & illum non fine fucceffu adhibitum fuiffe novi.

In locis feptentrionalibus, ubi nullus viticulturæ locus eft, ex fecali fermentato fpiritum inflammabilem parant, qui gratia & viribus genuino fpiritu Vini multo inferior eft.

Accidit interdum ut grana secalis proprio morbi

NUTRIENTIA.

genere afficiantur, quo præter modum elongantur & turgent, creberrime quoque incurvantur, extus fusco vel nigro colore tinguntur, aspera & striata evadunt, intus fubstantiam albam includunt, circa quam ego faltem nihil acris potui detegere; talia grana Secale turgidum, cornutum, Clavos Siliginis, Blé ergotté. Korn-Zapfen, Mutterkorn folent appellare : inde, fi ab hominibus comeduntur, graviffimos morbos convulfivos & gangrænas deterrimas excitari multi auctores obfervationibus probare nituntur. Sed alii & inter hos magnæ auctoritatis viri, hos ipfos morbos non tam Secali cornuto, quam potius epidemiæ, quæ ab eodem tempestatis vitio, quod fecale corrupit, etiam homines afficiente, originem duxit, vel etiam aliis causis adscribendos esse ducunt, experimenta inter nos circa homines, columbas, gallinas & canes instituta illud innocuum nobis stiterunt; & licet nostrum fecale crebro hoc vitium & quidem uno anno copiofius quam altero habeat, tamen epidemiæ, quas inde oriri alibi observarunt, nunquam apud nostros homines obtinuerunt; id unum adhuc addendum effe duco, observatores Gallos a Secali cornuto ortas gangrænas, Germanos autem convultiones recenfere.

Glumæ Secalinæ in fasciculum collectæ pro scarificatione oculorum adhibentur.

TRITICUM, mogos, Froment, Waitzen. Exhibet grana cylindroidea, utrinque rotundata, una facie planiore fulco longitudinali notata, fub cuticula flavefcente farinam albiffimam includentia.

TRITICUM. Calyx biglumis glumis obtufis, 3 vel 4 florus, feffilis, corolla biglumis una gluma femper mutica, altera mox aristata, mox non.

Triticum astivum L. trimestre repumuai@, orran@ Veterum, calyces quadrislori, flores aristati, nostras hyemes non fert & grana graciliora dat, in montibus Sibiriam inter & Tatariam sponte crescere dicit HEIN-ZELMANN.

Triticum hybernum L. BLACWEL 40 f. 1, 2, 3 locuftæ quadrifloræ, flores mutici, fed ejus varietatem multum ariftatam, etiam colunt noftrates in agris fylvis vicinis & incurfui ferarum expositis.

Triticum spelta L. Zuz d'inorr@, Arinca, Kern, Dunckel, Spelt, Epautre, locusta mutica, quadrislora, sed cujus duo modo flores fertiles sunt; in fabuloss Alsatiæ inferioris agris colitur. Cum farinam & pauciorem & leviorem det, panis ex ea confectus citius arescat, hinc nonnisi solo pro reliquis speciebus nimis macro, mandatur.

Varia ratione Triticum molæ ope folent frangere, illud fi ita comminuitur, ut inde corculum modo remaneat fub forma grani exigui & albiffimi $\chi \acute{o}v \Im gov$, Alica, Gruau, Grütze, Gries dicitur, farina quæ hoc ambiebat Pollen $\Pi_2 \acute{o}_{2}\kappa$, Semoule, Farine de blé, Boll audit, alica in farinam redacta Similago, $\sigma \epsilon \mu \acute{o} \partial \lambda \kappa$, fleur de Farine, Farine de Bourgeois, Semmel appellatur.

Panis, qui ex Tritico furgit, omnes reliquos albedine vincit.

Triticum omnia reliqua cerealia nutriendi facultate anteire, omnium feculorum experientia evincit, hujus vis ratio patet per experimenta a Cel. BECCA-RIO primum inftituta & a Cl. KESSELMAIER repetita, ex quibus quippe patet eidem præter fubftantiam farinaceam, aliam ad naturam animalem proxime accedentem, cafeofæ lactis parti valde analogam inefle, quæ cum ex fe in aqua folubilis non fit, ope fubftantiæ farinaceæ difponttur, ut fe ex aqua fufpendi patiatur, & ejus rationem in vario tritico variam effe obfervavit KESSELMAIER. Hinc elucefcit minus bene illum acturum, qui reliquis cerealibus vellet triticum in febribus fubftituere. Dum grana tritici cum aqua

calida infunduntur, usque dum eorum farina inde digitis exprimi poffit, dein ex illis, proprio molendinæ genere, quod habet laminas metallicas foraminibus perforatas, elifis, farina in lacum ligneum eliquatur, ea iteratis vicibus per angustius cribrum tranfmittitur & ab omnibus furfuribus feparatur, id quod dein fublidet autor, Amidon, Ammlung dicitur, & duplici facie apparet, infima tenacior optimum Amylum conftituit, id faccis immittitur ut omnem aquam dimittat & dein in aëre exficcatur, est hoc amylum albiffimum, aft friabile, glutinofum & aquam cui committitur viscidam reddit. Lotricibus & tinctoribus multo in usu est, ut pannis splendor concilietur; pulverem cofmeticum inde parari notiffimum est, a Medicis demulcendi & glutinandi ergo, tam extus quana intus adhibetur.

§. II.

I. B. LEGUMINA.

Siliquæ tenellæ xóßor, Gouffes, Schiffen, Schoten, quæ fi in cibum affumuntur, proxime ad olera accedunt, ejufdem fere naturæ funt graua recentia nondum indurata, grana adulta vero & exficcata farina gaudent difficilius præ cereali digerenda & multo aëre fixo fœta, hinc nifi fub eorum efu validior corporis exercitatio organorum chylo-& hæmatopoieticorum actionem intendat, flatus inde excitari, & chylum crudum fanguini varium acrimoniæ genus affricare obfervamus; cortex, cui farina inclufa eft, ipfe etiam magis primis viis oneri eft.

Legumina fracta Fresa, ¿guila, egrugés, geschroten appellant, farinam ipsam Lomentum Aciama Veteres dixerunt.

* CICERA ¿géßur Gou, pois Chiches, Kichererbsen, funt grana rotunda, pisis majora, inferne in acumen producta, hinc inde levissime compressa, includunt sub cortice rufo-fusco, medullam flavicantem, insipidam.

CICER BLACWELL 557. Calicis laciniis quatuor vexillo incumbentibus, vexillo reliquis petalis majore, carina minore, fructu irregulariter rotundo, inflato gaudet.

Extracti aquofi fusci dulcis $\frac{1}{4}$ inde obtinetur.

Sponte in Europa Meridionali & Syria crefcit.

In Helvetia meridionali, Gallia meridionali, Italia, Hifpania & Lufitania, ubi calidius cœlum minus culturæ piforum favet, copiofe feritur & in ufus cibarios recipitur, inter nos, cum nonnifi ad ufus medicatos recipiatur, hinc inde modo, & quidem fatis parce feritur. Multum nutrire, fed flatulentum effe auctores contendunt, urinam inde moveri HIPPO-CRATES jam monuit, & adeo validos effe ejus in vias urinarias vires quidam afferunt, ut illud in ulcere aut calculo vesicæ non usurpandum esse moneant; Calculum renalem autem ejus ope comminui tradit GALENUS. Ego non video, quod aqua cum his granis decocta præter leves vires abstergentes, alias adhuc inde poffit acquirere. Farina extus adhibita potenter resolvit & abstergit, tumoribus mammarum & testiculorum maxime commendata.

FABE, ¢áβaı, zúzµz, Feves de Marais, welsche Bohnen, Saubohnen magnitudine & colore multum variant, nostrates gilvas & minores colere solent, oblongæ sunt, uno margine hilo exciso, sub cortice duriore medullam albam & insipidam includunt.

ViciA. Calice bilabiato, vexillo reliquis petalis majore; carina minore, fructu oblongo, acumine terminato gaudet, Faba L. cirrhis caret BLACWEL 19.

Agypto indigena : apud nos copiolifime in agris colitur, cum ejus fructibus frequentifime pro pabulo brutorum utantur.

Fabas flatulentas effe post HIPPOCRATEM omnis ztas affirmavit, virides quz non raro, cortice privatæ, mensis nostris imponuntur, præssiccis magis flatulentas esse nemo GALENO credet; siccarum flatulentiam adjectis ipsis aromatibus tentant corrigere, diarrhæam chronicam inde curatam vidit SIMON PAULI.

Farina cum abstergens sit, ad eosdem ac præcedens adhibetur usus, quatuor resolventibus adscribitur, scopo quoque cosmetico usurpatur.

Flores fragrantifimum fpirant odorem, qui diutius, circa agros ubi obtinent, obambulantibus non raro caput afficit; exficcati omnem fragrantiam amittunt, plane inertes evadunt.

Aqua florum Fabarum. VAL. CORD. ob fragrantiam ad medicamenta cofmetica recipitur. * Sal Fabarum præ aliis falibus alcalinis nihil proprii habet.

LENTES Ø2201, Lentilles, Linsen funt grana rotunda, utrinque convexa, margine acuto cincta, colore albido instructa, includunt farinam quæ coctione fusca evadit.

LENS. HALLER. Fructu brevi & lato ab Ervo, cui a LINNÆO adferibitur, differt. Sponte crefcit in Europa Meridionali, apud nos copiofe in agris colitur. Quarta lentium pars extracto gummofo badio & naufeofo conftat. KESSELMAIER.

Lentes minus bonum nutrimentum largiri vix non omnes Medici docuerunt, GALENUS peffime de eis judicat & inde affectus cutaneos imo cancrum excitari tradidit, de legumine quod decoctum ad nigrum colorem accedit, morbos quos a melancholia deducere folebat, excitatum iri finxiffe videtur: docet fane experientia lentes non alia incommoda quam quæ grana ficca altorum leguminum producere folent, gignere. Arabes Decoctum lentium variolis opitulari contendebant, morbo, fub quo corpus intumefcit, melancholiam, id eft, ficcitatem inducens medicamentum opponendum effe rati; explofa abfurda theoria, cur tamen a non paucis adhuc retinetur inde deducta medendi ratio? HIPPOCRATES Decocto lentium abstergendi fcopo est usus.

* LUPINI, Sigua, Lupins, Feigbohnen. Sunt grana compressa, rotunda, margine leviter angulato, utraque facie levi fulco rotundo notata, sub cortice albo, medullam flavam & amaram includunt.

LUPINUS. Calicem bilabiatum, petala fere æqualia, fructus oblongos habet. Albus L. BLACWELL tab. 283. calicibus non appendiculatis & feminibus compreffis gaudet. Quibufdam in hortis apud nos curiofitatis ergo colitur.

Reliquis leguminibus minus malorum facere ab HIPPOCRATE dicitur.

In Europa meridionali in cibum recipiuntur, apud nos eorum farina nonnifi ad ufus medicatos adhibetur, quæ ob amaritiem, qua gaudet, reliquas farinas leguminofas vi abstergente vincit.

PHASEOLI, φασίολοι. σόλιποι, Haricots, Bohnen, quibusdam welsche oder türkische Bohnen, sunt semina fabis minora, facie utrinque convexa, convexo utroque extremo, in uno margine hilo excisa, sub cortice variis coloribus ludente, substantiam albam includunt.

PHASEOLUS. Calicem bilabiatum, carinam fpiraliter convolutam, fructum oblongum, acumine terminatum habet. Vulgaris L. flores racemofos, geminos, vexillum alis æquale, filiquas turgidas, pendulas & glabras fiftit. Sponte in India crefcit apud nos in agris & hortis colitur, frigoris impatientiffima planta.

Innumeræ ejus varietates colore florum & maxime feminum, altitudine & firmitate caulium, nec non rectitudine fructuum differentes hodie obtinent.

Tertiam circiter Phafeolorum partem mucilago efformat. KESSELMAIER.

Phafeolorum filiquas jam Veteres in cibum acceperunt, digeftu faciles fi recentes fuerint, nam five exficcatæ five muria affervatæ ventriculo oneri funt, leve est quod inde furgit alimentum, iisdem nostrates Satureiam solent adjicere. Ipsa grana exsiccata etiam in cibum recipiuntur, ea minus flatulenta esse reliquis leguminibus HIPPOCRATES statuit; eadem tritico adjecta in bonæ notæ panem coqui posse nuperiora experimenta probant.

PISA $\pi i\sigma a$, Pois, Erbfen, funt femina rotunda, quæ fub cortice gryfeo, vel flavefcente, medullam flavant includunt, hilo longitudinali in uno latere notata, coctione in pultem flavam proprio odore & fapore inftructam abeuntia. Pifa tota viridia, quæ ipfa tamen quoque cum coquuntur ad flavedinem vergunt, rariffime adhuc apud nos in ufum trahuntur.

PISUM. Calix bilabiatus, vexillum reliquis petalis majus, carina minor, stylus triangularis, fructus latus plus minus tumidus. Sativum L. BLACWELL 83. pedunculos habet multifloros & petiolos teretes.

Apud nos in agris & hortis copiofe colitur; plurimæ ejus varietates occurrunt, quæ rectitudine & altitudine caulis, colore floris & feminis, & filiquarum craffitie & teneritate differunt.

Pifa fui ponderis dimidium mucilaginis largiuntur. Eadem minus flatulenta effe poft HIPPOCRATEM vulgo folet affumi, fed inter nos faltem experientia omnino evincit eadem multum flatuum gignere, alvum obstruere & chylum crudum efficere, hæc incommoda, dum cortices inde auferuntur, minuuntur quidem, non autem tolluntur; eadem tenella nondum matura, minus nutriunt, fed facilioris digestionis funt. Siliquæ tenellæ, magis pulposæ, Pois goulus olim Gallis & Belgis multum usitatæ inter nostrates Schiffen, Schoten dicuntur & frequenti in usu funt, ratione virium ad filiquas Phaseolorum accedunt, eis tamen difficilius digeruntur.

In locis montibus vicinis, ubi Pifum fativum facile a phalænis deftruitur, Lathyri fativi L. grana loco piforum ferere folent. §. 12.

32

§. 12.

I. y. RADICES.

Veteres jam confueverunt farinam ex radicibus parare, recentior ætas plurium talium radicum notitiam accepit, cum varia calamitate preffi mortales, deficientibus granis cerealibus, quicquid urgentem famem lenire poffet, conquifiverunt, cum etiam tales regiones fuerint detectæ, quarum incolæ omnis agriculturæ expertes, ea tantum, quæ fponte ex terra nafcuntur, in cibum recipiunt. Tuberofas maxime farinam alibilem largiri, quæ hactenus proftant, obfervationes evincunt, illæ quæ multa acrimonia gaudent, aut quæ alia aliena qualitate fcatent, fuccum ex iis exprimendo, aut eafdem multa aqua macerando, ad ufus cibarios aptantur; earum duplex maxime genus apud homines noftros in ufu eft.

* POMA TERRÆ, Topinambours, Erdapfel. Sunt radices tuberofæ quæ interdum ad duorum pugnorum magnitudinem afcendunt, plura in tubera elevatæ, fub cuticula ex rufo-fufca fubstantiam albam, proprio fapore instructam, continentes.

HELIANTHUS. Florem compositum habet, calice imbricato fustentatum, receptaculo paleaceo & seminibus tetragonis, involucro proprio cinctis gaudet. Tuberosus L. radice tuberosa instructus est.

Plantæ Americæ meridionalis civis radix per ætatem altiflime fub terram defcendit, hinc noftras hyemes optime fert, menfe Octobri apud nos floret. In Europa fub initium feculi fuperioris jam innotuit, fed verfus ejus finem demum crebrius cœpit coli; inter nos hinc inde in hortis plantatur, in fabulofis, Alfatiæ inferioris maxime, agris & montibus vicinis colitur.

Nonnifi ex menstruo aquoso coctæ hæ radices recipiuntur in usum cibarium, ob majorem qua gaudent visciditatem & ad panificium & ad acetaria ineptiores. Evidenter nutrientes poffident vires, fed cum majori gaudeant vifcedine, hinc digeftu difficiliores funt. Noftrates eas nonnifi pro alendis brutis adhibent, & hoc quoque valde raro obtinet. In Alfatia Inferiore, Lotharingia & Ducatu Bipontino crebriori in ufu funt.

PYRA TERRÆ, Pommes de Terre, Tartufflen, Grundbieren, Kartofflen funt radices tuberofæ mox rotundæ, mox oblongæ, hinc inde protuberantiis notatæ, fub cortice, pro varia varietate five rufefcente, five alba, five nigricante, carnem albam includunt, quæ exficcata, radulæ ope, in tenerrimam farinam poteft reduci, integra comefta fapore proprio, ad Caftaneas accedente gaudent, varia magnitudine inftructæ, quæ apud nos vix pugnum excedit. Varietas ab Anglia denominata radices vel caput æquantes largitur.

SOLANUM. Corolla campaniformi quinquefida, calice quinquefido fustentata, isanthera, monogyna & bacca biloculari polysperma instruitur: Tuberosum, BLACWELL 523 a & b & 587, caulem habet inerment, folia pinnata, pinnis integerrimis & pedunculis divisis.

Americæ meridionalis planta, verfus finem feculi fexti & decimi jam in Italia fub nomine *Taratouffle* colebatur, inde Belgio & reliquæ postea Europæ innotuit; hodie copiosiffime per omnem Europam feritur; nostras hyemes non fert, radices exiguæ aut majores in frusta sectæ mense Martio terræ committuntur, Julio florent & Octobri radices e terra eruuntur; dantur varietates præcoces, ubi radices jam versus finem mensis Junii ita adolescunt, ut ex terra possint erui.

Quartam sui ponderis partem mucilaginis largiuntur, Cl. KESSELMAIER.

Multum & egregium inde alimentum & hominibus & brutis furgere, innumeræ obfervationes evincunt, quæ etiam confirmant eafdem omnino digeftu faciles effe; crudæ affumuntur, nec non toftæ, etiam elixæ, earum farina, unde Americani panem coquunt, optime Triticeæ adjicitur, utriufque fi recipiuntur pares partes, furgit optimus panis, non adeo cito arefcens & per aliquot menfes abfque ulla labe affervandus. Amylum egregium inde parari poffe Recentioribus innotuit. Has radices calculum quoque folvere LOBB eft expertus.

\$. 13.

I. J. CAUDICUM MEDULLA.

* SAGO. Hoc nomine ad nos adducuntur grana illis, fub quibus Hordeum mundatum proftat. fimilia, non raro angulofa & variæ magnitudinis, extus ex albo flavicantia, intus medullam albiffimam includentia, faporis & odoris expertia, evidenti tenacitate inftructa, ita ut in teneram farinam nequeant reduci.

Formantur hæc grana, tefte RUMPH, ex duplici Palmarum genere. SAGO nimirum & CrCA L. illud relativum monophytum eft, mares polyantheræ, fructus drupa aliquot nuces continens, fpadix ramofus, ejus species quatuor RUMPH recenset; Cycæ character nondum innotuit. Crescunt in Insulis Moluccis & Australibus nec non a Borneo ad Siam usque. Ex his palmis medulla ope aquæ eluitur, exsiccatur, denuo cum aqua in pastam reducitur, quæ ope lapidum soraminibus exsculptorum, in panis modum coquitur, & formam, sub qua ad nos mitti solet, induit.

Hæc grana tota in aqua fervida folvuntur & eam viscidam reddunt, bonus quoque panis inde potest parari, Cl. STECK. Angli primi eadem sub initium hujus seculi ad usus medicatos adhibuerunt, anno 1740 a Gallis & anno 1744 a Germanis fuerunt recepta.

Farina Sago in omni Afia meridionali pro cibo vulgari utuntur, tenue inde alimentum furgere annotat RUMPH. In Europa pro nutriendis infantibus &

NUTRIENTIA.

fustentandis phtificis adhibentur grana, quæ cum menftruis aquofis, lacte, interdum etiam cum vino coquuntur, eundem plane in modum quo Hordeum mundatum exhiberi folent.

§. 14.

II. OLERA.

OLUS, $\lambda a \chi avov$, herbe Potagere, Légume, Gemüs, Gartenwaar, dicitur omnis plantæ pars, præter fructum, quæ in ufum cibarium recipi folet & nullam farinam condit.

Nutriunt olera ratione mucilaginis qua fcatent, hæc cum in ipfis femper multum diluta obtineat, hinc paucum & tenerum eft quod inde furgit alimentum; eidem cum pro vario olere, varia in ratione partes terreftres, aër fixus aut etiam principia acria adhæreant, hinc olera, tam refpectu alimenti, quod inde furgit, quam refpectu effectus in primas vias, differunt

Coctio olera teneriora reddit & multum aëris fixi inde expellit, unde digeftu faciliora evadunt; peffime eadem prius cum aqua coquere, hanc aquam rejicere & denuo demum oleri menftruum aquofum adjicere folent, cum priori aqua enim, obfervante jam GALENO, optimas & efficaciffimas oleris partes rejicunt. Quæ condiendi fine oleribus elixis adjiciunt, non parum tam ad eorum faporem quam ad rationem, qua digeftioni parent, contribuunt.

Ea quæ cruda comeduntur & geftui & primis viis magis accommodantur, aceto, fale & pipere, quæ ipfis folent adjicere; oleum quod addunt Acetaria guftui, fecus ventriculo accommodant. Olera frixa vix non omni propria vi carent, facile præterea acrimoniam oleofam excitant.

ACETOSA, ¿Earlis, ¿Eurama Dov, Ofeille, Saueram-

& culinarios fcopos adhibentur. Radices funt fibrofæ ex uno capite plures fibrælongæ & tenues prodeunt, fub cortice ex rufo flavefcente, medullam albidiorem includentes, fapore gaudent leviter amaricante, qui evidentius adftringit & in aquam transit; decoctum præterea colorem rubellum habet, quem acida deftruunt, alcalia non mutant, martialia fuscum reddunt.

Folia funt oblonga, fagittata, pro varia varietate five oblonga five evidentius rotunda, fapore gaudent evidenter acido.

RUMEX. Corolla tripetala, fimili calice fustentata, diplofanthera; ifogyna, monofperma; fpecies quæ huc pertinent funt relativæ diphytæ. Acetofa L. BLACWELL 230, foliorum fagittas rectas habet, copiofe in pratis omnis Europæ occurrit, hæc inter nos præcipue in hortis colitur & in cibum recipitur. Lapathum n. 1598 HALLER, folia magis rotunda, fuperne obtufa, fagittas parvas, divergentes habet, in Europæ feptentrionalis & Helvetiæ montibus crefcit, in hortis inter nos quoque culta, Hispanica dicitur. Succus Rumicis Acetofæ $\frac{1}{400}$ circiter fui ponderis partem Salis effentialis largitur.

A radicibus ego faltem præter adftringentes, vix alias vires expectarem. Folia in cibum recepta vix videntur nutrire, grata autem qua pollent aciditate appetitum excitant, digeftionem juvant, hinc ad embammata recipiuntur, infipidis quoque aliis oleribus adjiciuntur, aut cibis animalibus, quorum in alcalefcentiam nifum corrigunt. Eadem attenuandi & refrigerandi ergo cum fucceffu ad febres adhibentur. GEOFFROI eorum fucci unciis fex aut octo, ante quemlibet paroxyfmum exhibitis, febrem intermittentem vidit curatam. BARTHOLINUS, MORIN, Illuftr. LINNÆUS fcorbuticos inde curatos viderunt, & LOBB calculum diffolutum. Extus adplicata egregie refolyunt & maturant.

C 3

* Syrupus ex Succo MESUE. Refrigerandi & sitim extinguendi ergo adhibetur. * Aqua destillata NIC. PRÆPOS. iners omnino. * Conserva.

ALLIUM, subjector, Ail, Knoblauch. Ejus triplex genus in usum recipitur; Vulgare quod radicem sistit ex multis bulbis, quæ olim a'z Ai Dec, yézyec, nuclei, spice audiebant, Zehen dicuntur, efformatam, qui incurvi funt & ad margines angulati, fuperne in acumen educti, sub cuticula levissime rufescente carnem albam, folidescentem, proprio, forti & evidenter acri odore & fapore præditam includentes; quælibet radix plures fasciculos harum spicarum habet, tunicis albis & ficcis involutos. Ascalonicum, Eschalottes, Chalottes, Schalotten structum ex pluribus bulbis qui nulla communitunica in caput colliguntur, finguli bulbi fub tunica rufescente includunt bulbos prioribus minus angulares, convexo concavos, fuaviori odore & fapore minus acri quam antecedentes instructos. Scorodoprasum, Rocambole exhibet bulbos, qui in umbella inter flores colorati funt, magis ad figuram rotundam accedunt, ad latera compressi, cuticulæ color ad violaceum vergit, fapore & odore parum Allio vulgari cedunt.

ALLIUM. Corolla hexapetala, ifanthera, monogyna, fructu triangulari & triloculari, vagina marcida communem florum ortum fuftentante conftituitur: Sativum L. stamina alterna tricuspidata, umbellam bulbiferam, folia plana habet; ex Africa in Europam, Veterum fide, illatum, hodie ubique colitur. Ascalonicum L. nequaquam Veterum, stamina tricuspidata, umbellam nudam, scapum nudum, solia subulata habet. Palæstinæ civis inter nos in agris colitur. Scorodoprasum L. staminibus gaudet tricuspidatis, umbella bulbifera, foliis planis, scapo ante maturitatem contorto; cum antecedentibus colitur; varietas sylvestris in Gallia, Helvetia, Germania & Septentrione frequens.

WEDEL ex Allio Vulgari Spiritum acidum cum pauxillo Olei obtinuit, GEOFFROI largam quantitatem Acidi, minorem Liquoris alcalini volatilis, aliquid Salıs volatilis & Oleum empyreumaticum : NEU-MANN Extracti aquofi $\frac{3}{8}$, spirituofi $\frac{1}{8}$, Olei odorati ziz: Spiritum ammoniacalem VERATTI. Ego ex bulborum, unde omnes pelliculas feparaveram, libra una accepi libram dimidiam spiritus colorati, qui leviffime colorem Syrupi Violarum mutavit, Mercurium ex ejus folutione non dejecit, & ob oleum quo scatebat cum alcalinis non efferbuit, huic spiritui pauciffimæ modo Olei moleculæ inhærebant. Aqua a fex libris Aliji abstracta mihi exhibuit unicam drachmam olei, quod omnia reliqua olea odorata odore penetrante vincit, in aqua fundum petit & citrinum eft. LEWIS obfervavit Allii fuccum infpiffatum omnes fuas vires retinere, Extractum aquofum iners effe, fpirituofum vires Allii fervare, fpiritum a bulbis abstractum illos parcifime redolere.

Ob evidentem, qua pollet, acrimoniam vix nutrientes poterit edere vires, sed eadem acrimonia in caufa est, ut cum summo successu tanquam condimentum cibis adjiciatur, hinc in frequenti usu effe folet in regionibus calidioribus, ubi ventriculi languent, nec non in regionibus frigidioribus & apud homines victu duro utentes, ut viscidis menstruis primarum viarum opem ferat. Sed medicato etiam scopo adhibetur, & quidem ad non pauca morborum genera, cum ad minimos quoque vaforum ordines penetret; & stimulantes æque ac incidentes vires edat testibus anima, lacte, perspiratione &c. eorum qui illud affumserunt, & BLAIR observavit plantis pedum applicatum animam olidam reddidiffe, BENNET autem quarta a comestione hora fonticulos inde fuisse vellicatos, ad mucum pulmones obfidentem jam HIPPO-CRATI celebratur, qui idem in humoribus spiffis ab-

C 4

domen vel uterum occupantibus quoque laudat; colicam-a muco fuscitatam inde curatam viderunt GA-LENUS & TOURNEFORT; ad hydropem conducere præter HIPPOCRATEM, DIOCLES, FORESTUS, SYDEN-HAM, COHAUSEN observarunt, huic morbo medetur etiam ob evidentem, qua pollet, virtutem diureticam, qua quoque adversus calculum valere a BARTHOLI-NO, HOYER, MOEHRING, LOBB, GOETZ confirmatum est, sed etiam acri in massa humorum hærenti medelam affert. Scorbuticos inde fanatos RIEDLIN vidit. BINNINGER ejus vires anthelminticas, jam DIO-SCORIDE memoratas, probat, has vel inter nos innumera experimenta extra dubitationem ponunt. Podagricis inde medelam afferri, id quod TILEMANN annotalle lego, aliquoties inter nos fuit obfervatum, fed habemus quoque exempla, quod apud eofdem in caffum fuerit tentatum. Scopo medicato ad tres ejus fpicarum pro dosi dantur.

Ejus usum illis qui morbo facro laborant HIPPO. CRATES, fiphyliticis etiam FALLOPIUS interdicunt.

Extus bulbi vel inter cineres cocti, five pinguedine recepti, rubefaciendi ergo, imponuntur, odontalgiam curatam poft SERAPIONEM, PARÉ vidit & WE-DEL verrucas inde confumtas; extus quoque ad morbos varios, ob quos intus commendatur, folet adhiberi.

APIUM, σέλινον, Ache, Eppich. Inde recipimus in officinas Radices, quæ ex capite craffiore aliquot fibras emittunt, fub cuticula flava carnem albam condentes, vix odoratam, fapore acri ad illam Paftinacæ accedente, diverfo omnino ab illo, quo varietates hortenfes gaudent, inftructam. Culinæ utuntur varietate quæ Celeri dicitur, cujus radix ex capite craffo fibras interdum ad calami anferini craffitiem accedentes dimittit, fub cuticula nigricante carnem albam, dulci, cum grata acrimonia, fapore inftructam, proprio non ingrato odore, nares irritante, includit. Inde duplex varietas proftat, una cujus radicum capita valde craffa evadunt, ita ut pugnum excedant, *Rüben*- vel Knollen-Selery, altera radices minores habet, magis albas, dulciores & gratius odoratas, *Franzöfifcher Selery* hujus folia prioribus latiora & lætius viridia, fub terra condita, ut dealbentur, fuaviffima redduntur & una cum radicibus ad acetaria recipiuntur, utraque varietas iterum alias produxit, quæ in hortis noftris coluntur.

APIUM Flores umbellatos habet, involucro utroque pauci folio inftructos, femina convexo plana, profunde fulcata. Graveolens L. BLACWELL 443. pinnis cuneiformibus gaudet.

Paffim crefcit per omnem Europam, præter maxime feptentrionalem. Sub initium Seculi fuperioris Celeri tanquam propriæ plantæ cœperunt meminiffe, ipfum Veteres femper adhibuiffe certum eft. Extracti aquofi fui ponderis dimidium, refinofi $\frac{1}{5}$ circiter largitur NEUMANN. Spiritus Vini inde Saccharum extrahit, tinctura ulterius evaporata Refinam albidam, dulci & pungente fapore linguam afficientem fiftit, Extractum aquofum dulce eft, omnis aromatis expers. Semina aliquid Olei odorati fundunt, omnem odorem & faporem Spiritui Vini cum ipfis digefto relinquunt. LEWIS.

Planta evidenter aromatica tanquam condimentum cum aliis cibis recipitur, ut appetitum excitet, digeftionem promoveat, flatulentiam arceat; Radices, annotante HIPPOCRATE, obstructionibus medentur, quinque aperientibus annumerantur, nec non medicamentis urinam moventibus.

Calculum inde diffolvi LOBB vidit. PLINII & TRALLIANI commenta de Apio oculis, & illis qui morbo comitiali laborant noxio, experientia non confirmavit. Folia & Succum inde expressium quidam

CS

NUTRIENTIA.

ad ulcera mundanda laudant. Seminum ufus exfolevit, cum habeamus alia femina carminativa, quæ magis grata funt.

* Aqua destillata NIC. PRÆP. * Conserva. * Syrupus. * Unguentum Mundificans de Apio Lugd. Inconcinna compositio.

ARMORACIA, papavic àygia, Raifort, Meerrettich. Recipimus inde Radices quæ cylindraceæ funt in varios ramos divifæ, totæ albæ, infigni acrimonia & nares & linguam vellicant, comestæ spiritum alliaceo odore afficiunt, brachium humanum interdum æquant.

COCHLEARIA. Florem cruciformem, filiculam fphæroideam, stylo notatam habet: Armoracia L. BLACWELL 415. folia lanceolata & flores spicatos.

Crefcit in Europa magis septentrionali, quæ in temperata spontanea occurrit, ex cultæ seminibus furrexisse videtur.

Non eft $i_{\alpha}\varphi_{\alpha\nu}i_{\beta}a_{\nu}\varphi_{\alpha}i_{\alpha}$ DIOSC. & multa dubitare faciunt, noftram plantam effe Armoraciam Romanorum. Extracti aquofi $\frac{1}{8}$, fpirituofi $\frac{1}{9}$, circiter $\frac{1}{256}$ Olei odorati in aqua fubfidentis, linguam non adurentis vehit NEUMANN. Extracti aquofi $\frac{1}{8}$, refinofi $\frac{1}{160}$, Oleum odoratum parciffimum CARTHEUSER. Coctione & exficcatione fua acrimonia privatur, eandem tam aqua quam alcohol inde recipiunt LEWIS. Ego inde accepi $\frac{2}{3}$ fpiritus ammoniacalis & $\frac{1}{24}$ circiter Olei empyreumatici tenaciffimi.

A radice infigniter acri vix vires nutrientes poffunt expectari, recipitur ad intinctus, ut digeftionem promoveat. Multum inde humores attenuantur, vermes expulfos vidit SEBIZIUS, calculum & fcorbutum curatum BARTHOLINUS, arthriticos levatos RAYGER, a vi diuretica jam DIOSCORIDI erat laudata.

Folia extus applicata inflammationem curaffe vi-

42

NUTRIENTIA.

dit GOHL nec non eryfipelas HERMANN & VRATIS-LAVIENSES.

* Aqua destillata VAL. CORD.

ASPARAGUS, asmagay @, Asperge, Spargel: inde turiones; quos Græci asmagayes dixerunt, in usus cibarios, radices in medicatos recipimus.

Turiones pro varia varietate variam habent magnitudinem, variam craffitiem, colorem mox album, mox viridem, capite gaudent squammoso, fapore dulci & urinam eorum qui ipsos comedunt, fœtentem reddunt.

Radices ex uno capite craffiore multas fibras longas emittunt, ftriis longitudinalibus notatas, fub cortice leviter lutefcente medullam albam includunt, infipidæ.

ASPARAGUS. Corolla gaudet hexapetala, ifanthera, monogyna, bacca polyfperma: Officinalis L. BLAC-WELL tab. 332. caule inermi, foliis mollibus & capillaribus nec non ramis erectis agnofcitur.

Crefcit per omnem Europam, præter maxime feptentrionalem & meridionalem, cultura fuavior & craffior fit.

Veteres Asparagum acutifolium L. sub nomine Corrudæ coluerunt, nostra Species demum TIBERII ætate innotuisse videtur.

Turiones alvum fiftere vix aliquis credet HIPPO-CRATI, experientia etiam contra GALENUM, quod omnino boni fucci fint, teftatur, renes inde abstergi CELSUS annotat & fœtor inde in urina excitatus, cujus primus SIMON SETHI meminit, probat; rationes & obfervatio quibus HELMONTIUS calculum inde gigni evincere contendit, nullius momenti funt; calculum ab eis folvi LOBB vidit; adeo valide urinam pellere, ut etiam mictus cruentus inde furrexerit, SCHULTZ affirmat; ad rem veneream ob vim diureticam facere videntur. Radices ob vires aperientes laudantur, & quinque aperientibus adfcribuntur, diureticæ quoque habentur, valde metuo vires folis turionibus competentes festinanter nimis radicibus fuisse adfcriptas, cum interim aquæ, cum qua coquuntur, aliquid acris foleant affricare, hinc nollem eis vires aperientes denegare.

* ATRIPLEX, ai Sea o zEu, Arroche, Bonne-ou Belle dame, Milten, Melten. Folia exhibet triangularia, evidenter mollia, farina quasi conspersa, pro varia varietate sive rubra sive viridia, sapore fatuo instructa.

ATRIPLEX. Corollam habet pentapetalam, irregularem, ifantheram, monogynam, femen unicum, nudum: Hortenfis BLACWELL 99 & 552 foliis triangularibus diftinguitur.

Afiæ feptentrionalis civis, in nostris hortis culta mense Augusto semen maturat & perit, semen Octobri terræ committitur & sequente anno solia, antequam caulis prodierit, in usum recipiuntur.

Rarius hodie menfis apponitur, per id anni tempus, ubi Betæ folia nondum germinarunt, illis fubftituitur.

Humida HIPPOCRATI dicitur, ventriculum gravare & exiguum alimentum præbere GALENO, illis maxime, qui alvum strictam habent, laudatur. In tanta, quam habemus Emollientium copia, ad usus medicatos non recipitur.

BETA, τεύτλον, Betta, Poirée, Mangold. Variarum ejus varietatum Folia, duarum Radices in usum trahuntur.

Folia magna funt & lata, ovata, ad marginem plicata, magnis & latis petiolis fuftentata, varie pro varia varietate colorata, levi dulcedine inftructa, quæ etiam in petiolis evidentior eft.

Radices ex capite rotundo fubito in caudam gracilem terminantur, evidenti dulcedine inftructæ, & vario, pro varia varietate, colore. BETA. Corollam viridem habet, quinquefidam, regularem, ifantheram, digynam & capfulam mox mono-, mox polyfpermam, Cicla L. floribus congeftis agnofcitur. Crefcit in Europa meridionali. Apud nos in hortis colitur.

Varietas vulgaris alba vel pallescens est, τεῦτλον σικελικόν, Beta Sicla; rubra & lutea major, Englischer aut Römischer Mangold seculo XVI innotuit, hujus cauliculi maxime recipiuntur.

Radices defumuntur ex Beta Vulgari L. quæ flores ternos habet, & quidem, five ex Beta rubra radice Rapa C. B. Beta nigra Veterum BLACWELL 235, quæ feculo XVI nondum in aliis præter Germaniam regionibus colebatur, five ex Beta radice flava. Sola varietas Sicla noftras hyemes fert, omnes biennes. Illuftris MARGGRAFF ex fucco Betæ albæ $\frac{1}{16}$ facchari, Betæ rubræ $\frac{1}{25}$ obtinuit.

Alvum inde folvi HIPPOCRATES annotat, facile fed parcum nutrimentum largiri GALENUS, uterque refolvendi ergo noftrum olus exhibuit, quam vim quoque fapor ejus fufpicare facit. Succum errhinis GALENUS adfcribit & BORRICHIUS confirmat, inde in cephalalgia BAGLIVIUS, in odontalgia Cl. VOGEL egregios effectus viderunt. Folia recentia cuti, unde epidermis ablata fuit, cum fucceffu imponuntur.

BRASSICA, ja qar@, Græcis antiquissimis, zga und En, Olus, Caulis, Choux, Kraut, Kohl.

Plantæ ab antiquissifimis retro temporibus cultæ plures species, plures varietates, pluresque partes culinis inferuntur, quæ omnes dulci sapore gaudent, & aquam, cum qua coquuntur, sætidissimo odore afficiunt.

BRASSICA. Corolla cruciformi, calice tetrapetalo, deorfum gibbo, filiqua tereti, polyfperma, parvo apice eminente inftructa gaudet: Oleracea L. calice virescente, foliis petiolatis, filiqua quadrangulari gaudet: ad mare crefcit. Num recte LINNÆUS ex hae una omnes reliquas tanquam varietates furrexisse contendit?

Illæ species, quæ superficiem rugosam habent a Sabaudia denominantur, nostratibus Kohl vel Wirfing, Chou de Milan, an Cumana PLIN. Superficie lævi inftructæ capitatæ L. nostratibus Kraut, alias Cappus. audiunt, Choux, hujus varietas rubra inter nos ad acetaria & usus medicatos recipitur. Ex, quarum folia profunde & tenuiter laciniatæ funt, Apiacon, Selenoides Veterum, Chou-Brun, Blau-Kohl, Feder-Kohl; hæ tunc demum cum gelu expertæ funt, omnem fuam gratiam affequuntur. Eæ, qu'arum germina florum in cibum recipiuntur Botrytis L. Pompejanæ Veteribus. Choufleur, Blumen - Kohl dicuntur & varietates tenerioribus caulibus instructæ Broccoli Italorum, Aricinia PLIN. Spargel-Kohl. Gongylodes L. dicuntur illæ, quarum caulis in tuber excrescit, Choux raves, Kohlraben, harum demum auctores feculi XVI mentionem faciunt, videntur cum Botrytide & aliis forfan speciebus per exercitus Christianorum, ex Oriente in Europam allatæ fuiffe. Ex his fpeciebus plures furrexerunt varietates, quæ largiffime inter nos coluntur; omnes præter Botrytidem L. quæ annua eft, & Selenoidem, quæ perennat, funt biennes.

Aqua cum Braffica cocta nullos alcalium effectus edit, fed Mercurium ex folutione in Acido Nitri albo colore dejicit, id quod etiam eadem destillata facit; ipfa Braffica per se destillata Spiritum ammoniacalem fundit.

Olus jam a PYTHAGORA celebratum, ab HIPPO-CRATE dicitur boni fucci effe, ad feceffum facere & biliofa ducere, CATONEM illud ad omnes morbos commendaffe conftat; ANDROCYDIS, de Braffica crapulam fedante, commentum, quod ab ARISTOTELE receptum, maximam auctoritatem accepit & ad nos usque descendit, debetur falsæ Veterum opinioni de vitæ Brafficæ adsita inerticula evadente. Omnem Brafficam inflare CELSUS rectiffime monet; in universum, quo quævis ejus varietas est tenerior, eo citius digeritur, eo minus in primis viis moram agit & ad majorem corruptionis gradum ascendit; Botrytidis cimæ præ reliquis citius digeruntur, Gongylodes autem difficilius.

Braffica capitata, ratione inter Turcas quoque obtinente, folet condiri, & ita condita in cibum recipi; cum & fal & fermentatio olus attenuent, multum quoque aëris fixi inde expellant, hinc eam digestu faciliorem reddi, verofimile esse videtur.

Folia Brafficæ mammis folent imponi pro difcutiendo lacte.

Brafficam ad ufus medicatos adhibituri, nefcio qua ex ratione, rubram recipere folent, ea ob vires abstergentes, quæ tantæ funt, ut inde verrucas confumtas viderit PAULI, ad morbos pectoris pituitofos multo in ufu eft, nec male datur in principio ulcerum pulmonalium. Lobb inde calculum vidit diffolvi. Concionatores & cantores ejus decocto cum Paffulis frequenter uti ad arcendam raucedinem GEOFFROI monet, eadem hydropicum curatum adducit GRUBE. Brafficam muria conditam multum claffiariis ab Illuftr. LINNÆO commendari reperio.

* Semen Brafficæ rubræ exolevit.

Syrupus Brassica Mesue fapore fuavi, odore ingrato gaudet, egregium ad morbos pectoris pituitofos remedium.

CAPPARIS, un magus, Capres. Inde gemmæ florum ad usus culinarios, Cortices ad medicatos adhibentur.

Gemmæ virides funt, pedunculo inftructæ, variam habent magnitudinem, angulares, conftant ex aliquot petalis, quæ rudimenta antherarum includunt, fapor ipfis eft proprius & levis; adducuntur ad nos aceto, ad morem a GEOFFROI indicatum, conditæ, fenio viriditatem perdunt, quam peffima ratione, ope æris, illis reddere vulgo audent. Exiguæ, Cubebis non majores, virides, pedunculo præditæ optimæ habentur.

Cortices defumuntur a radice, variam longitudinem & craffitiem habent, convoluti adduci folent, ftriis transverfalibus & longitudinalibus notati, flavicantes & aliqua tenacitate inftructi, odore nullo, fapore leviter amaro, cum vestigio acris gaudent.

CAPPARIS. Corolla gaudet tetrapetala regulari polyanthera, stylo unico, bacca carnosa: Spinosa L. BLAC-WELL 417. pedunculos solitarios & folia rotunda habet.

In Europa meridionali, Afia & Africa crefcit: Tolofæ præcipue colitur, & inde gemmæ per Europam divehuntur.

Aqua cum corticibus cocta colore ex rufo citrino & leviffimo fapore acri inftruitur, iidem dant Extracti rufescentis, falini $\frac{1}{2}$; refinosi, rufi, amaricantis $\frac{1}{16}$.

Gemmæ fuas vires ab Aceto maxime habent, hinc præeunte GALENO non male tanquam condimenta affumuntur; obfervationes, quæ de earum efficacia ad morbos splenis occurrunt, suspectæ sunt.

GALENUS Cortices aperiendi ergo multum commendat & eos tam intus, quam extus adhibet.

Oleum de Capparibus DE DONDIS. Varia Difpenfatoria varias ejus præscriptiones habent; ad induratum hepar & lienem adhibetur.

CEPE, rejupua, Oignons, Zwieblen: Exhibent radices & folia.

Radices funt bulbofæ, mox fphæroideæ, mox utrinque compreffæ, mox oblongæ, albæ vel rubræ, continent fub aliquot tunicis ficcis, carnem albam, quæ linguam, nares & oculos valide afficit.

Folia viridia funt & fiftulofa, fapore & odore bulborum, fed mitioribus.

Allium

Allium Cepa L. stamina alterne trifida, & scapum nudum inferne ventricosum habet, folia sistulosa.

Patria ignoratur, apud nos variæ varietates copiofiffime coluntur.

Allium fistulosum L. staminibus simplicibus, scapo foliis vix altiore & radicibus oblongis a priore differt. Jacobs-Zwiebel.

Ego a quatuor libris Ceparum cum abstraxerim aquam, illam odoratisfimam inde accepi, linguam non ferientem, cui nec guttula olei adhærentis innatavit, nec ex duodecim libris Ceparum NEUMANN aliquid ejus obtinuit, qui expertus est Cepas exficcatas $\frac{3}{4}$ extracti spirituosi, aquosi autem $\frac{4}{5}$ circiter largiri.

Ratione compositionis & virium proxime ad Allia accedunt, quibus autem minorem acrimoniam habent; & odorem minus nauseofum.

Calidæ, æftuofæ, nullum alimentum corpori exhibentes, urinam moventes dicuntur HIPPOCRATI; inter nos albæ ad effectus pectoris maxime adhibentur, ad quem fcopum duæ aut tres pro dofi, ex jure vitulino coctæ, exhibentur. LANZONIUS folo efu ceparum afciticum curatum vidit. Eædem fub cineribus affatæ hypogaftrio imponuntur pro pellenda urina, nec non abfceffibus quibufcunque maturandis.

CHÆROPHYLLUM, Cerfeuil, Kærbelkraut. Recipimus inde folia, quæ læte viridia funt, duplicato pinnata, pinnis parvis & integris & incifis, oblongis, exigua fpinula terminatis, ut plurimum ternis, ultima impari; fustentantur folia petiolis convexo-planis, fulco notatis: nervi foliorum hinc inde pilos habent; proprius & aromaticus odor & fapor ipfis est. Nostram herbam eandem cum illa Veterum esse dubito.

SCANDIX, flores umbellati, involucrum partiale, femina convexo plana, roftrata. Cerefolium L. BLACWELL 236, feminibus lævibus, laciniis obtufis agnofcitur. In Gallia Auftrali, Helvetia, Suecia fponte crefcere dicitur: annua planta, vulgatisfimus nostrorum hortorum hospes, ex sponte cadentibus seminibus quotannis resurgens, per ipsam hyemem durat.

Succus infpitsatus evidenter falinus est, levissime Chærophyllum fapit; aqua & Spiritus vini, fi cum herba digeruntur, ejus odorem & faporem recipiunt. LEWIS. Parum Olei odorati, Extracti aquosi $\frac{5}{12}$, refinosi fere totidem fovet NEUMANN.

Non tam alimenti, fed potius condimenti loco ad cibos recipitur, cum appetitum excitet, flatulentiam & viscofitatem ciborum corrigat. Scopo medicato folida stimulando, & humores attenuando morbis a debili, muco, obstructionibus oriundis egregie conducit. GEOFFROI ejus fuccum, quarta quaque hora affidue sumtum, in qualibet hydropisi, maxime proficuum est expertus, & eundem paulo ante paroxyfmum ad uncias fex epotum, febres intermittentes profligaffe afferit. Ad grumos fanguinis post partum in utero hærentes poft SCHENCK commendat CRANZ. ER-HARDT, Illustr. HALLER & PLENK vifcera inde referata fuisse observarunt. Diuturmorem ejus usum tuffim excitare & hinc hæmopticos ejus usu interdicendos effe GEOFFROI monet. Mammas induratas eo curavit PLENK. PAULLI eodem ex butyro frixo & pectini impofito ischuriam fanavit, abdomini impofito & enemati commixto graviffimam colicam; mos ab Eo-DEM recenfitus idem extus ad cardiogmum infantum applicandi, etiam inter nos viget. Sugillatis, mammis induratis & hæmorrhoidibus cum fucceffu imponitur, herba, quæ per omnem annum recens haberi poteft, & quæ exficcatione vix non omnem virtutem perdit, femper recens adhibenda.

Aqua destillata omnino efficax est. * Oleum destillatum Wurtembergenses habent. Oleum coctum a Chærophyllo nihil habet, quippe cujus virtus coctione in auras agitur. CICHORIUM, zix wegior, zix wen, mingle, Intubus, Ambubeja, Chicorée, Wegweis. Inde recipiuntur radices & folia; flores & femina jure eviluerunt.

Radix fibrofa fub cuticula leviffime fufca carnem & medullam albam includit, illam dulcem, hanc amaram.

Folia petiolis latis fuftentantur, ex fine angusto latefcunt, utrinque levissime hirsuta, viridia, amara, laciniis latis eundo crescentibus dentata, ad marginem notata.

CICHORIUM. Florem habet compositum ligulatum, calice ex duplici ferie squammarum constante suftentatum, receptaculum paleaceum, femina dentibus coronata: Intybus L. BLACWELL 177 & 183, caule glabro, floribus seffilibus, radicibus perpendiculariter sub terram descendentibus gaudet.

Crefcit per omnem Europam.

Planta fylvestris in hortis culta omnes partes majores experitur, laciniæ foliorum minus profundæ sunt, minor ipsis foliis hirsuties, quæ etiam non raro aliquid purpuræ recipiunt; nostratibus Hollændische Cichorien, inde varietas, cujus radix & fola pulcherrime purpura variegantur, surrexit.

Pro ufibus cibariis varietates hortenfes, pro medicatis planta fylvestris adhibetur. Folia ad acetaria adhibenda terra obruendo, alba & dulcia reddere folent.

Coctione nihil perdit, plus Extracti aquofi quam fpirituofi largitur, hoc præ illo linguam evidentius afficit. LEWIS.

Cultura amaritie privata planta optime in cibum recipitur. Sibi relicta ob amartiem roborat & fucco fuo faponaceo fpiffis humoribus medelam affert, hinc variis in morbis refrigerantes effectus edit; foliorum affidue in acetariis comeftorum ufu diuturnas & contumaces febres profligatas vidit GEOFFROI; decocto radicum melancholiam hypochondriacam RHODIUS, phtifin HOYER, ulcus ferofum tibiæ HENNING. VAN SWIETEN folo decocto meraciore Cichorii icteros fatis pertinaces curavit.

Aqua destillata NIC. PRÆPOS. Iners. * Syrupus fimplex BAUDERON paratur ex fucco. Syrupus compositus FLORENTINI; variæ ejus prostant præscriptiones; fimplicissima est illa Wurtembergensium, Nostrates minorem rationem Rhabarbari, quam reliquæ admittunt. * Extractum efficax omnino. * Conditum Radicum VAL. CORD. * Conferva Florum.

CINARA, zúvaça, Artichaut, Cardon, Artischock. Inde calix rodrsud@ GALEN. Archiocco Italorum, & petioli cum costis mensis nostris apponuntur.

CINARA. Flores compositos tubulosos, calice imbricato, spinoso, & carnoso sustentatos habet receptaculo setoso gaudentes, semina tetragona, pilosa. Scolymus L. BLACWELL 458. soliorum nervo angustiore, soliis inermioribus, pinnatis & integris distinguitur. Dracunculus L. soliis omnibus pinnatifidis & nervo soliorum latiore gaudet.

Utraque in Europa & America meridionali nec non Syria crefcit, varias varietates produxit, in hortis colitur, apud nos per hyemem contra frigus defendenda eft, altero demum a fatione anno floret. Primæ fpeciei calices, menfe Majo prodire cœperunt; alterius folia, quæ prodit autumno, antequam caulefcat, ligantur & contra lucem defenduntur, ut alba & dulcia evadant.

Calices, refecta fquammarum parte non eduli, cum aqua cocti, eam viridefcentem & leviffime fapidam reddunt, 4 circiter Extracti aquofi largiuntur.

Calicum primæ speciei antequam flores excludunt receptacula, & squammarum basis edulia sunt, proprium & illum non fortem saporem habent; varietas ab Hispania denominata, cujus calices parvi sunt, conoïdei, rubri, suavissima ad acetaria reputatur. Petioli & cofta, ablatis fpinis, de Cinara carcunculo adhibentur, varietas a Turonio Galliæ denominata, pinnis angustioribus & copiosioribus spinis instructa præfertur. Etiam Cinaræ Scolymi L. costas edules esse, hodie constat.

A vegetabili tenero & dulci cur GALENUS melancholiam metuat, ego faltem non video, tam calices, quam nervos foliorum digeftu faciles effe, innumeræ obfervationes evincunt, urinam inde fætidam reddi experientia non confirmat. Decoctum radicis in gonorrhæa proficuum vidit LANG. Succus foliorum cum paribus Vini Maderenfis partibus mixtus, & ad tria cochlearia mane & verfus vefperam affumtus, tanquam fpecificum contra hydropem laudatur in Journal Etranger.

DAUCUS, Saúz, Carotta, Carottes, Vogelnest, gelbe Rüben, Mahren. Inde defumuntur radices & femina ex specie vulgari, aliud seminum genus ex propria planta.

Radices fibrofæ funt pro varia varietate albæ, luteæ, rubræ, proprio gaudent aromatico odore, & fapore multum dulci.

Semina *Vulgaris* funt convexo plana, altera facie ftriis rigidis, quæ fingulæ pilis rigidiufculis albis obfidentur, notata, fufca, fapor eorum eft evidenter aromaticus, cum quadam amaritie.

Semina Dauci Cretici cylindracea funt, vix striata, villosa, fapore antecedentibus simili, sed evidentiore instructa.

Daucus. Flores umbellatos habet, utroque involucro, quorum laciniæ divifæ funt, fuftentatos, femina hifpida: Carotta L. Umbella ad bafin ufque divifa gaudet.

Crefcit per omnem Europam; varietates hortenses fosculo centrali purpureo sterili carent.

ATHAMANTA flores umbellatos sistit utroque in-

volucro, cujus laciniæ integræ funt, inftructos & femina villofa, *Cretenfis* L. BLACWELL 471. minus bene; pinnis linearibus, hirfutis diftinguitur.

In montibus Helvetiæ, Auftriæ, Galliæ Meridionalis crefcit.

Utrumque femen aliquid Olei odorati largitur, Extractum aquofum amaricat, refinofum fortem faporem, exiguum autem odorem habet. LEWIS.

Daucum & Paftinacam Veteres videntur confudiffe. Radices bonum alimentum largiri & ex earum fapore eft evidens & experientia evincit, licet fecus videatur GALENO, qui flatus inde gigni, recte monet; diureticæ quoque vires ab iis non male expectantur; refolvendi ergo ab HIPPOCRATE adhibebantur. Berliner Sammlungen radicum & femmum vires ad nephritidem calculofam, obfervationibus ex variis novellis collectis, probant. In Journal de Medecine, Obfervations by a Society of Phyficians & Illuftr. RI-CHARD Recueil d'Obfervations multæ exhibentur obfervationes de radicum, cum aqua in cataplafma reductarum, egregiis effectibus ad ulcera cancrofa.

Semen utrumque a vi carminativa & diuretica laudatur, quam ultimam etiam obfervationibus HEL-MONTIUS probat.

DRACUNCULUS Barbar. Estragon, Dragun, Kayfer Sallat. Inde in usum trahuntur folia, quæ angusta sunt, oblonga, integerrima, acuta, atro viridia, sapore grato, acri, aromatico instructa.

ARTEMISIA. Flores habet compositos tubulos, calice imbricato suftentatos & receptaculo nudo, semina quoque nuda.

Dracunculus L. BLACWELL 116, foliis integerrimis & glabris distinguitur.

In Afia septentrionali sponte crescit; apud nos in hortis colitur, perennis.

Ad embammata & acetaria inter nos multum re-

cipitur tam gratiæ ergo, quam ad juvandam digestionem. * Acetum odore & fapore gratisfimum.

ENDIVIA, Scariola Barbar. Ange MARGO, Introbus Sations, Chicorée blanche, Endivie: inde recipinus Folia, quæ pro varia unde defumuntur varietate, five lata funt & finuata, five angustiora & in tenuiores lacinias divisa, non raro crispa fucco lacteo turgent, amaro multum sapore gaudent, quo ad usus culinarios recipienda privantur, dum sive vinculis colliguntur, sive terra obruuntur, usque dum alba evalerint.

* Semina a Scariola denominata, & quatuor frigidis minoribus annumerata, eviluerunt.

Cichorium Endivia L. BLACWELL 378 floribus pedunculatis & radicibus horizontaliter fub terra repentibus diftinguitur.

Sponte in Palæftina dicitur crefcere, annua planta, apud nos in hortis colitur; menfe Junio folia adolefcunt & per omnem æftatem & autumnum vigent.

Cum Cichorio ratione virium convenit, folia magis fucculenta, etiam efficaciora funt.

* Aqua destill. NIC. PREP. iners.

FUNGUS, Moza, Champignon, Schwamm. Eft vegetabile nihil herbacei excludens, nec filamentofum, nec cruftofum, a confiftentia muci ad eam, qua lignum gaudet, afcendens

AGARICUS. Pilei fuperficiem inferiorem lamellatam habet: Cump.ftris L. Champignon flipite gaudet, pileo convexo & integro, lamellis integris; odorem proprium non ingratum habet; per æftatem & autumnum copiofe occurrit, copiofe quoque in hortis colitur. Interdum etiam adhibent alios, qui funt fungi verni, Moucerons dicti J. B. Dornfchwamm avellana non majores, toti albi, petiolo rugofo, pileo convoluto, proprio & grato odore & fapore inftructi. Primo vere in Germania, Gallia, Italia, Boruffia occurrunt.

PHALLUS. Subtus glaber eft, fuperne callis reti-

culatus, *Esculentus* L. *Morille*, *Morchel* ftipitem latum, planum, rugofum habet, pileum nulla volva tectum, recens ochroleucus, exficcatus gryfeus, fapore gaudet fatuo, odore proprio.

In omni Europa, præter maxime feptentrionalem, occurrit.

TUBER, öfvov, Trufle. Parum a figura rotunda recedit, fuícus, extus fquammis afper, intus fubitantia fuíca lineis albis variegata gaudet, odoris & faporis aromatici, magnitudinis variæ. Eft Lrcoperdon, quod figuram fubrotundam habet, Tuber L. apice non dehifcens & radice carens. Occurrit in tota Europa, autumno demum fapidum fit & odorum. Veteres tubera immatura recepiffe videntur.

Phalli exficcati dederunt $\frac{7}{16}$ Spiritus urinofi, $\frac{1}{16}$ Olei empyreumatici, $\frac{1}{3}$ Carbonis.

Tubera recentia perparum Olei limpidiffimi & fragrantis, fpiritum urinofum & falem volatilem exhibuerunt.

Minus bonum alimentum fungos præbere, poft GALENUM omnis femper Medicorum fchola contendit; nec a cibo facillime in putredinem ruente, & cujus ftructura adeo evidenter ab illa, qua noftra alimenta gaudent, recedit, bonam nutritionem exfpectamus. Cum præterea multa dentur fungorum pernicioforum genera, quæ facile pro efculentis poffunt affumi, hinc cautiffime circa fungos in cibum recipiendos verfandum eft. Tubera ob oleum odoratum, quo fcatent, fibras primarum viarum irritant & motum fluidi nervei incitant, hınc aphrodifiacæ ab illiş exfpectantur vires, languentes & decrepitos inde juvari WOLFF eft expertus.

LACTUCA, Seidaz, Seidaziun, Laituë, Lattich-Sallat. Inde recipiuntur folia tenella, quæ colore, magnitudine, figura &c. plurimum variant, in planta

56

adulta, quæ caulem producit, amara funt & lacteo fucco turgent.

* Semen oblongum est, utrinque acutum, sub cuticula leviter flavicante paucam medullam albam & dulcem includit.

LACTUCA. Flore composito ligulato, calice cylindraceo, receptaculo nudo & seminibus pappo stipitato coronatis gaudet: Sativa L. BLACWELL 88, foliis rotundis & lævibus distinguitur.

Plantæ, a vetustiffimis retro temporibus in hortis satæ, originem ignoramus, numerosiffimas varietates colimus: hæ ad duo genera reducuntur, quorum unum, folia in caput plus minus rotundum colligit: Lactuca rotundicaulis, Laconica, Astylida, Eunuchion, Laituë pommée, Kopf-Sallat; alterum folia in meditullio, in formam oblongam, coïre cogit Romana CRESCENT. Chicon, welscher Sallat. A primo vere ad hyemem usque nostri horti mensis Lactucas exhibent.

Frigidam effe & imbecillitatem corpori afferre HIPPOCRATES monuit, optimis cibis eam GALENUS adfcribit, tenerum olus digeftu facile effe & tenue alimentum præbere, liquet omnino, illud cum non in modum plurimorum ex reliquis oleribus, flatus gignat, fomnumque turbet, fomnum inde excitari putarunt Veteres & ipfi vires refrigerantes adfcripferunt. GALENUS in fe ipfo fomnum illud conciliare expertus eft, malum hypochondriacum ejus efu curatum viderunt LANZONIUS & GEOFFROI

Semen cum pauciffimum medullæ vehat, hinc hodie eviluit, olim quatuor frigidis minoribus adfcriptum.

* Aqua destill. VAL. CORD. iners.

LACTUCA AGNINA, Barb. Valerianella, Barb. Locusta, Barb. Mâche, Blanchette, Rebkressen. Sumimus inde Folia, quæ ex basi angusta in finem latio-

DS

rem & obtusium educuntur, levissime crenata, læte viridia, fapore grato austeriusculo instructa.

VALERIANA. Corollam quinquefidam irregularem, stamina quatuor pauciora, stylum unicum, fructum non dehiscentem habet: Locusta Olitaria L. flores triandri, caulis dichotomus.

Communis per omnem Europam, maxime feptentrionalem fi excipis, planta, etiam in agris & hortis colitur, unde majora & craffiora folia accipit. Annua & per hyemem perftans.

Aquæ, cum qua coquitur, fuum faporem impertit, eam leviffime modo tingit, $\frac{1}{10}$ Extracti aquofi largitur.

A Recentioribus demum in usum tracta, digestu facilis est, & refolventes vires habere videtur.

* LEPIDIUM, non *headstor* Græcorum, *Passerage*, *Pfefferkraut*: inde recipiuntur folia, quæ longa funt & mediocriter lata, ferrata, in acumen definentia, fapore evidenter acri instructa.

LEFIDIUM. Corolla cruciformi, calice quadrifolio fustentata, filicula compressa, non marginata, stylo instructa gaudet: Latifolium L. BLACWELL 448. foliis latis distinguitur.

In Gallia, Anglia & Helvetia fponte provenit, nostris hortis molestissima planta, cum ejus radices infigniter repant.

Danorum mos a PAULI recenfitus, quo illud ad intinctus recipiunt, etiam apud nos obtinet; ad quos appetitum excitando, humores attenuando, digeftionem promovendo eximie conducit.

* Aqua destill. Parif.

LUPULUS MESUE, Lupus Salistarius, PLIN. Houblon, Hopfen. Inde turiones & strobuli ad alimentarios æque ac medicatos usus recipiuntur. Turiones parvi & graciles sunt, exiguis nodis distincti; angulosi, extus subrufi, intus albi, sapore amariusculo, qui aliquid aromatici habet, instructi. * Strobuli efformantur a squammis flavescentibus, laxis, uni communi axi affixis, odorem spirant aromaticum, saporem aromaticum & amarum habent.

HUMULUS L. BLACWELL 536. Planta relativa diphyta; mares corollam quinquepetalam ifantheram habent, feminæ in amentum feu strobilum collectæ monopetalæ, digynæ, unum femen concludunt.

Per omnem Europam copiofus, in Anglia, Belgio & Germania colitur. Turiones primo vere, ftrobili autumno colliguntur.

Aqua cum turionibus infusa roseum colorem induit & Extracti falini $\frac{1}{5}$ inde recipit.

Spiritus vini æque ac aqua principia strobilorum extrahunt, utrumque Extractum cum aromate amarum est. LEWIS.

Turiones, quos nos tanquam olus recipimus, cum evidentiorem quam Afparagi faporem habent, eis etiam fcopo maxime humores attenuandi, præferendi effe videntur, eofdem non male ad jufcula medicata aperientia recipimus.

Strobili amaritie fua & aromate primas vias roborant, humores refolvunt, obstructa referant, folida stimulant & urinam movent.

Eos extus applicatos ad difcutiendos humores & dolores multum facere obfervat PAULI.

* Extractum Parif. quod est fuccus inspissatus.

NASTURTIUM, zágo aµor, λετίδιοr, Kresson, Kresson, Kresson, Ejus quadruplex genus in usum recipimus Hortense nimirum, Aquaticum, Sylvestre & Indicum. Hortensis folia angusta sunt, oblonga, obtusa, irregulariter & prosundius dissecta, pallide viridia, sapore acriusculo, cui aliquid amaricantis accedit, instructa, ad semina odorem acrem spirant; Semina sunt oblonga, glabra, rusa, sapore oleoso non multum acri instructa. Lepidium Sativum L. BLACWELL 23. solius dif-

formiter fectis instruitur.

Planta annua per longe maximam anni partem in hortis colitur.

Ad eofdem fcopos ac Dracunculus & cum eodem effectu adhibetur. PARÉ hæc folia cum Axungia Porci fubacta multum ad tineam commendat. * Semen HIPPOCRATES & GALENUS refolvendi & excretiones aquofas promovendi ergo in ufum receperunt; & extus rubefaciendi fcopo.

* Aqua destill. VAL. CORD.

Nasturtium Aquaticum, razdaµin, oiov, Cresson d'eau, Brunnkressen, recipiuntur folia cum cauliculis, quæ sunt impari pinnata, pinnis rotundis leviter incisis, sapore acri, amaricante, odore proprio & sapore analogo gaudent, cauliculi cavi, sulco longitudinali distincti.

SISTMBRIUM. Corolla cruciformi, calice non deorfum gibbo fuftentata, filiqua tereti, parvo ftylo notata gaudet, Nafturtium Aquaticum L. BLACWELL 260. pinnis rotundatis diftinguitur.

Crefcit ubique, in Germania quoque coli cœpit.

Ejus principia activa, tam ab aqua, quam a Spiritu vini extrahuntur, utrique etiam menstruo inde abstracto accrescunt, a planta exsiccata absunt, extractum aquosum falinum est, Oleum odoratum recens vegetabile fundit LEWIS.

Tanquam condimentum, ut antecedens, adhibetur. Scopo medicato multum a GALENO ad calculum laudatur, cui RIEDLIN, GRUGER & ZWINGER obfervationes fuffragantur; ejus vires multum attenuantes in dolore ventriculi gravativo RIEDLIN; in morbis pulmonum MUSCHEL DE MOSCHAU & ZWINGER, in caro FORESTUS funt experti. Ad fcorbutum, præeunte E U G A LENO, ab omnibus laudatur. Adjicitur jufculis manipulus illius, fuccus inde expressus ad uncias quatuor pro dofi datur. * Aqua destill. VAL. CORD. parum efficax. * Syrupus e succo LEMERY. * Conserva.

* SYLVESTRE, nogewoorse, Cresson sauvage, Feldkressen. Folia habet longa, laciniis angustis pinnata, sapore prioribus proximum est.

Cochlearia Coronopus L. BLACWELL 120, foliis pinnatifidis agnofeitur, Vulgaris per Europam.

Olim recipiebatur ad acetaria, hodie eviluit, illi cum ratione foliorum fimilis fit *Plantago Coronopus* L. hinc hunc interdum ad acetaria folent recipere, inertem & infipidum.

Nasturtium Indicum, la Capucine, Capucinerlein: recipiuntur gemmæ florum nondum apertorum & flores ipfi.

* Gemmæ virides funt, fapore gaudent leviter aromatico & odore, qui ad fructus Rubi Idæi accedit.

Flores ex fundo conoideo, qui cum cucullis Capucinorum folet comparari, in quinquepetala ciliata terminantur, colore five aurantio five luteo gaudent, odore proprio, fapore acriuículo.

TROPÆOLUM. Corollam quinquepartitam irregularem habet, fimili calice fustentatam, stamina octo, stylum unicum, fructum carnosum, irregulariter angulatum: Minus L. soliis integris & petalis acuminatis distinguitur.

Sponte in America meridionali crefcit, inde a MONARDES in Europam allatum, hodie ubivis hortos ornat; per omnes æstatem & autumnum flores excludens.

Flores non evoluti, cum carne comeduntur aceto conditi, & gemmis Capparidis ob majorem gratiam & evidentius aroma omnino præferendi videntur; evoluti acetariis admifcentur; eos contra fcabiem malignam infigniter facere PAULI annotat.

Aqua a floribus destillata odore acri nares ferit. CARTHEUSER.

NUTRIENTIA.

PASTINACA, 5aquilivos, Panais, Pestnægel: inde radices in cibarios, semina in medicatos usus recipiuntur.

Radices figura ad Daucum accedunt, carne magis laxa inftructæ, albæ, proprio odore & fapore, cui præter dulcedinem etiam aliquid aromatici accedit; gaudent.

* Semina flavicant, odorem plantæ habent, faporem evidenter acrem & aromaticum.

Pastinaca flores habet umbellatos, involucro nullo sustantas, femina plana, elliptica, marginata, striata Sativa L. BLACWELL 379. soliis simpliciter pinnatis distinguitur.

Paffim per Europam crefcit; cultam, quæ omnia majora habet, neutiquam ex fylvestri surgere observavit MILLER.

Radices oleum odoratum fundunt, Alcohol inde extractum dulce fiftit: femina $\frac{1}{640}$ olei odorati mediocriter acris exhibent, extractum eorum tam aquofum quam fpirituofum acre & amarum eft, LEWIS. Radices $\frac{1}{8}$ extracti aquofi exhibent, KESSELMEYER. Saccharum ex radice obtinuit MARGGRAFF.

Ratione virium ad illas, quas Daucus habet videtur accedere. Si unquam radicum annofiorum efum morbi phantafiæ fecuti funt, ut poft REBECQUE varii Auctores obfervationibus probare contenderunt, illi five radicibus Cicutæ pro radicibus Paftinacæ affumtis, five aliis caufis debentur, radices faltem Paftinacæ cum annotinæ jamjam lignefcant, nemo pro olere affumfiffe videtur.

PETROSELINUM, melgoore's wow, Perfil, Peterfilien.

Radices fibrofæ funt, fub flavicante cuticula includunt carnem albam, fapore dulci, cui aliquid acriufculi accedit inftructam.

Folia infident petiolis fulcatis, duplicato pinnatis, pinnis & integris & incifis, ternatis, omnibus acutis, funt glabra, fapore aromatico proprio fimilique odore inftructa.

* Semina convexo plana funt, oblonga, profundius ftriata, fapore leviter mordicante, minus fuavi gaudent: illa femina quæ a Macedonia denominantur his ipfis fimilia funt, leviter hirfuta, evidentius aromatica.

Apium Petroselinum L. BLACWELL 172 pinnis acutis distinguitur.

Fide COLUMNÆ in Sardinia crefcere dicitur, fed non exstat in Indice PLAZÆ. Copiose cum suis varietatibus apud nos colitur.

* Semina Petrofelini Macedonici largitur Bubon quod flores umbellatos habet, involucro utroque fuftentatos, femina striata, pilis mollibus ornata, Macedonicum L. BLACWELL 382 foliis ovatis & crenatis distinctum. Orienti indigena planta, Seculo XVI ex Macedonia in Italiam allata.

Ex radicibus Alcohol omne actuofum extrahit, refinam dulcem efformat, $\frac{1}{\tau 2800}$ Olei odorati fpiffi largiuntur, herba $\frac{1}{2560}$, fimilis Olei, femina $\frac{1}{\tau 6}$ Olei odorati in aqua fundum petentis, eadem parum virium aquæ impertiunt, refina inde parata mordax eft & amara. LEWIS.

Recentiores demum Petrofelinum in usum receperunt; ad vires Apii accedit. * Semen monente GALENO, humores incidit & commovet, urinam quoque pellit, herbæ ad tussim effectus FORESTUS obfervavit; radicem autem ad expellendas variolas facere observavit Illustr. DU HAMEL. Folia mammis imposita lac discutere A CASTRO & WELSCH viderunt.

* Aqua VAL. CORD. melius fecundum Parifinos a feminibus abstrahitur.

PIMPINELLA, Barb. Sanguisorba, Barb. Pimprenelle, Pimpernell. Folia pinnata in usum recipiuntur, nervo hirfuto notata, margine profundius crenato, fapore nullo proprio inftructa.

POTERIUM. Planta relativa diphyta corollis quadrifidis, calice triphyllo fustentatis, sive polyantheris five digynis, capsula disperma gaudet; Sanguisorba L. BLACWELL 413 habitu inermi & caule subanguloso distinguitur.

Non ultra Saxoniam afcendit.

64

A vi leniter roborante laudatur, olim hæmoptycis multum commendabatur, hodie ad acetaria recipitur aut jufculis vernalibus adjicitur.

PORRUM, $\pi_{ga'sov}$, Porreau, Lauch: ejus duplex genus culinæ noftræ recipiunt, unum, quod folia longa, plana, profundius viridia, odorem proprium, faporem reliquis cepaceis mitiorem & cui etiam aliquid dulcis accedit, habet; alterum Recentiores Schænoprafum, Schnittlauch, præeunte DODONÆO, appellant, funt illi folia fiftulofa five juncea, odor & fapor priori magis mordicantes, reliquis cepaceis mitiores.

Allium Porrum L. BLACWELL 421 caulem foliaceum habet, stamina alterna trifida, & radicem solitariam.

Patria ignoratur.

Allium Schænoprafum L. fcapum nudum, folia fiftulofa, ftamina fimplicia habet; in Alpibus Helveticis; Tyrolenfibus; Hercynicis; Oelandicis, occurrit, apud nos in hortis colitur.

Ejus varietas foliis craffioribus & majoribus Ciboule, etiam a nostratibus seritur.

Prius tanquam olus coquitur, alterum tanquam condimentum ad embammata recipitur.

Vires ad cepaceas accedunt; vocem claram inde reddi post ARISTOTELEM plures monuerunt, diureticum HIPPOCRATES monuit & ejus vires contra calculum observatione probavit, id quod quoque LOBB experimenta confirmant.

PORTULACA

11

2

fu

T

S

PORTULACA, Avdezxvn, Pourpier, Burzel: Exhibet folia, quæ rotunda funt, inferne angulata, craffa, viridia, multo fucco fcatent, faporis & odoris nullius.

* Semina exigua funt, nigra, fapore oleofo instructa.

PORTULACA. Corollam pentapetalam habet, calice quinquefido fuftentatam, polyandram, monogynam, capfulam polypyrenam Oleracea L. BLACWELL 287 foliis cuneiformibus diftinguitur.

In Saxoniam usque ascendit, in hortos translata fucculentior fit & fuavior.

Planta fucco aquofo & faponaceo gaudens aperientes, demulcentes, refrigerantes vires edit, obfervante GALENO, ad fcorbutum quoque commendatur. Semina, quæ refrigerantibus minoribus adfcribebantur, eviluerunt, ab HIPPOCRATE emenagogis adfcripta.

* Aqua destillata VAL. CORD. Iners. * Syrupus SCHROED.

RAPA, Kapum, yoyyúhn, Rave, olim Navet, Navau, Rübe, hoc nomine veniunt radices rotundæ, aut fere totæ cylindraceæ, illæ autem, quæ propius ad figuram fusiformem accedunt NAPI, Burladec, Stech-vel Stückel-Rüben, nostratibus Franzæsische Röben audiunt.

Rapæ totæ rotundæ parvam caudam emittentes olim feminæ appellabantur, oblongæ autem mares, multæ earum porro varietates occurrunt, tam ratione coloris, quam magnitudinis differentes; omnibus odor proprius est, fapor, antequam adoleverint, amarus, fed dulcissimus in adultis.

Brassica Rapa L. BLACWELL 231, stylo superstite majore & foliis caulinis dentatis agnoscitur.

Belgio & Angliæindigenæ plantæ, varietates apud nos in agris & hortis coluntur.

Extractum aquofum inde paratum flavicat, Raparum odorem non habet, fubdulse eft, & radicum quartam partem æquat. LEWIS. Optimum pabulum inde brutis furgere vulgaris experientiæ res eft, qua etiam conftat, earum faporem & in lac & in carnes animalium, quæ eis vefcuntur, tranfire, homines inde quoque aluntur, eafdem longiorem coctionem requirere, ut flatulentiam exuant, obfervavit GALENUS; ob vim evidentem faponaceam in morbis, ubi refolventia indicantur, multum conducunt, morbis nimirum pectoris & faucium, obfervantibus LANZONIO & KETELAER, hydropi præterea, atrophiæ, renibus muco obfeffis.

Externum ad perniones usum jam CELSUS refert. Radices Napi ad variam magnitudinem folent afcendere, inter nos cultæ ad pedis longitudinem perveniunt, non taro etiam quatuor pollicibus crassiores, sub cuticula nigricante carnem albam, quæ nucleorum dulcedinem linguæ imprimit, includunt, cui autem evidenter aliquid acris accedit, cæterum odor Raparum.

* Semen Rübfaamen, Rebs, Levat, Colfat rotundum eft, fub cortice modo fufco, modo rufo nucleum album, multo oleo turgidum includit, inodorum, nec gratum, nec naufeofum.

Ultra $\frac{1}{3}$ Olei unguinofi limpidi inodori & infipidi inde obtinui.

Defumitur a varietate, quæ habitu magis glauco, foliis angustioribus, radicibus minoribus & gracilioribus instructa est.

Brassica Napus L. BLACWELL 410 foliis festilibus lyratis, caulinis amplexicaulibus integris distinguitur.

Crefcit in littore maris feptentrionalis Europæ, unica adhuc dum ejus varietas pro ufibus cibariis inter nos colitur. Germani Teltavienfes Marchicas & Bavaricas maxime laudant. Galli Vaugirardienfes & Frenefenfes.

Cum Rapis ratione virium conveniunt, inter nos juribus ad affectus pectoris folent adjici.

Semen venenis mederi Veteres tradiderunt, hinc in officinas receptum est, sed non videtur aliquid proprii præ aliis seminibus oleosis habere. * Syrupus. Parif. Oleum ex feminibus expression, quod vulgo prostat, cum multum calorem passum sit sub expressione, flavum & fapore & odore minus gratum solet esse, multum a nostratibus ad lucern s adhibetur.

RAPHANUS, pagar@, pagaric, Radicula, Radis, Rave, Rettich: Semen, quod Veteres Banarov appellaverunt, hodie eviluit: Radices fibrofæ pro varia varietate, magnitudine, colore, figura, acrimonia differunt, proprio odore & fapore acri gaudent.

RAPHANUS, Corollam tetrapetalam regularem, calice tetraphyllo fustentatam, filiquam oblongam feminibus eminentibus distinctam habet: Sativus L. BLAC-WELL 81, filiquis glabris & bilocularibus distinguitur.

In China dicitur sponte crescere, numerosæ ejus varietates inter nos coluntur.

Vires Armoraciæ edit, fed debiliores, non male tanquam condimentum cibis adjicitur, fed flatulentum effe experientia evicit, fuccum intus datum in fpiffitudine mucofa egregiam opem attuliffe, obfervavit SCHROECK. Rubefaciendi ergo plantis pedum interdum applicatur.

* Aqua VAL. CORD.

* RAPUNCULUS Barb. Raiponce, Rapunzel: hoc nomine veniunt radices digito minimo angustiores, albidæ, fapore dulci instructæ.

Variarum plantarum genus hoc nomine culinas folet ingredi, earum nulla inter nos colitur, fed noftrates hoc nomine recipiunt radices *PHTTEUMATIS* corolla quinquefida recurva; calice quinquefido fuftentata, ifanthera, monogyna & capfula multiloculari inftructi, *Orbiculari*, L. capitulo rotundo & foliis ferratis gaudentis, & *Spicati* L. quod capitulo oblongo diftinguitur: Europæ temperatæ civium: nec non *ENOTHERÆ* corolla tetrapetala calice quadrifido fuftentata, diplofanthera, fructu tetragono & quadriloculari gaudentis: *Biennis* L. foliis ovato lanceolatis, dentatis, glabris, caule tuberculato præditæ, fuperiori feculo ex Virginia allatæ, nunc per Europam, præter feptentrionalem, fpontaneæ.

SCORZONERA Barb. Scorzonere, Scorzoneren. Culinas æque ac officinas ingrediuntur Radices, quæ longæ funt, fibrofæ, pollicaris ut plurimum craffitiei, cuticula nigra obductæ, fub qua fubftantia alba, proprio fapore dulci inftructa, & quæ diffracta lac fundit, continetur: hæ radices, ablata inde cuticula, exficcatæ in officinis affervantur, extus rufæ, intus albæ, fere infipidæ.

Scorzoner.A. Flores compositos ligulatos, calice imbricato & receptaculo nudo fustentatos, femina pappo fessili coronata habet: Hispanica L. BLACWELL 406 caule ramoso, foliis amplexicaulibus & ferratis distringuitur.

Hifpaniæ, Siberiæ & Corficæ civis, medio Seculi XVI. in ufum recipi cæpit; primum a JOHANNE ODORICO MELCHIORIO memorata, inter nos copiofe colitur; radices primo aut altero a fatione anno in ufus cibarios recipiuntur, trimæ vel quadrimæ ad medicatos.

Extractum tam aquofum, quam fpirituofum dulce eft, prius radicis dimidiam, alterum tertiam partem æquat. CARTHEUSER & LEWIS.

Ad ufus medicatos primum recepta radix, demum fuperiore feculo ad culinarios affumta fuit, tenera, faponacea, dulcis omnino egregium cibum effe apparet, apud debiles flatus excitare obfervatur, ad morfus ferpentum commendata, inde quoque denominata, contra morbos malignos, a veneno quippe oriri creditos, diu ufurpabatur, fed experientia medicamentum falfa theoria nixum, nunquam confirmavit; refolvendi ergo ad fpiffos humores attenuandos facit omnino, vifcera abdominalia inde referari, PAULI confirmat.

Succum ad abstergendas corneæ maculas folent. adhibere. Aqua destill. SCHROED. plane iners. * Extractum efficax omnino. * Conditum SCHROED.

SISARUM nequaquam σίσαςου vel Sifer Veterum, Chervi, Zuckerwurzeln inde recipiuntur ad ufus culinarios Radices tuberofæ, quæ oblongæ funt, teretes, circulis diftinctæ, quarum plures capitulis cohærent, includunt fub cuticula flavefcente carnem albiffimam, fpongiofam, admodum dulcem, cui aliquid aromatici ad Petrofelinum accedentis commixtum eft.

SIUM. Corolla umbellifera gaudet, involucro utroque fustentata, & feminibus ovatis convexo planis, striatis: Si/arum L. foliis floralibus ternis distinguitur. Patria ignoratur, apud nos in hortis, sed minus frequenter quam alia olera, colitur.

Radices tenerrimæ vix coctionem admittunt, quin diffolvantur: Saccharum inde paravit Illustr. MARG-GRAFF; aquam coctione levi flavedine tingunt, protracta coctione aroma perdunt, evidenter falino sapore linguam feriunt, Extracti aquosi $\frac{1}{4}$ largiuntur.

Radices teneræ & dulces omnino tanquam egregius cibus commendandæ funt, cum etiam iftas aroma, quod habent, primis viis valde acceptas reddat.

SPINACHIA Barbar. Epinars, Binetsch, nostratibus grün Kraut. Folia inde recipimus, quæ ex ovatis rotunda sunt, ad basin hastata, appendicibus rotundis, utrinque viridia, sapore levissimo instructa.

SPINACIA planta relativa diphyta, mares quinquefidi, ifandri, feminæ quadrifidæ, ifogynæ; femen unicum nudum: Oleracea L. BLACWELL 49 fructibus feffilibus agnofeitur.

Planta annua, quæ autumno fata, per hyemem viget, ex Hifpania in noftros hortos venit, primi Arabes ejus mentionem fecerunt.

Folia Spinachiæ aquam, cum qua coquuntur, non tingunt, eandem autem protracta coctione dulciufculam reddunt, edunt ¹/_a Extracti aquofi adeo falini ut & crystalli in ipso possint distingui.

Cum huic oleri, dum illud ad usus cibarios præparant, multum semper butyri soleant adjicere, hinc primæ viæ apud non paucos inde debilitantur, alvus solvitur, interdum quoque nausea excitatur, ergo minus bene olim illis, quibus debilis ventriculus est, laudabatur.

TRAGOPOGON, $\tau_5 a \gamma c \varpi \omega \gamma o v$, Serfifi, Salfifi, Haberwurzeln, Artififen Radices exhibet fibrofas, Scorzoneræ figura, magnitudine, craffitie fimiles, fub cuticula flava albam carnem includentes, lacteum fuccum fundentes, Scorzonera magis, Sifaro minus dulces.

TRAGOPOGON Flores compositos, calice simplici & receptaculo nudo sustentatos habet, atque semina pappo stipitato coronata: Porrifolium L. calice corolla longiore & soliis integris, strictis, glabris distinguitur.

In Europa Meridionali & Anglia sponte crescit, apud nos in hortis colitur, radix plantæ, quæ floruit, lignosa est.

Radix vetustioribus abhinc temporibus mensis apponitur, cum Scorzonera viribus conveniens, qua tamen magis flatulenta observata est.

* TARAXACUM Barb. Dens Leonis Barb. Piffenlit, Pfaffenröhrlein, Seichblumen: interdum in ufus cibarios recipiuntur folia tenella, primo vere erumpentia, oblonga, pallidius viridia, majoribus dentibus diffecta, leviter amara, lac fundentia: ad ufus medicatos autem adhibent fcapos teneros, lacte leviter amaro turgentes: Noftrates in officinis affervare jubent * Radices, quæ exficcatæ fub cortice nigricante medullam albam & dulcem includunt; recentes lac amaricans largiuntur.

LEONTODON. Flores compositos ligulatos habet, calice ex duplici ferie squammarum constante & receptaculo nudo sustentatos, semina pappo, stipitato coronata: To avacum L. BLACWELL I. calice inferne reflexo distinguitur. Vulgaris per Europam planta.

Folia ficca $\frac{1}{8}$ circa refinæ viridis, & quæ non ingrata acrimonia linguam ferit, $\frac{1}{5}$ Extracti Gummofi, nec non falem vere nitrofum largiuntur. DELIUS.

Claffe & fapore a Cichorio haud diftat, ad quod etiam a Veteribus relatum fuiffe videtur, hinc ejufdem quoque vires jure inde expectare licet; ejus fuccum ad icterum laudat VAN SWIETEN, fanguinem viscidum inde attenuari, vidit DELIUS, ejus vires ad referenda viscera abdominalia patent ex observationibus BONAF. apud Illustrem RICHARD & Lipsiensium apud Cl. BEHMER.

5. 15.

III. Fructus HORAI, Obft.

Denominantur ab anni tempore, quo in fuo vigore ultra citraque confiftunt, æftate nimirum, quam Græci $\tilde{\omega}_{\xi^{\alpha\nu}}$ dixerunt; pertinent huc omnes fructus, qui fubftantia fucculenta gaudent & in ufus cibarios recipiuntur, eofdem non male fub Romanorum *Pomi* denominatione comprehendunt. Recentiores hos fructus diftinguunt in *Poma*, quæ pulpam confiftentem, & in *Baccas*, quæ diffluentem vehunt. Pro fcopo qui huc facit, eos ratione faporis diftinguimus in acidos, dulces, adftringentes & amaros.

§. 16.

Hos fructus ab HIPPOCRATE jam minus laudatos, GALENUS perniciofos pronuntiat, factum est inde, ut per omnia fecula nostro fuperiora, nonnisi cum metu & varia ratione præparati, ab illis, qui su fanitati prospicere voluerunt, fuerint assuming. Sed ratio æque ac experientia evincunt, crassifissimum vel hic quoque error em errasse Scholam; principia enim nostrorum fructuum verum saponem constituere probatum dedit BOERHAAVE; & eosdem saponum effectus edere evici in Inft. Chemia, incredibili vi folvente omnia fundere, testatur VAN SWIETEN, jure itaque effectus folventes & abstergentes inde expectamus, & cum eodem eximio Auctore adoramus creatorem, qui eos justit abundare eo tempore, dum molesto calore astuant sub astivo sole homines, & disponitur sanguis ad atrabiliariam, nec non inflammatoriam cacochymiam, durant in autumnum usque, ut illorum usu solvi possit, S blanda vi alvum laxante expelli melancholica [aburra. astatis tempore collecta; nec inde dysenteriam excitari, ut vulgo creditur, evicit inter multos alios Illustris PRINGLE; tam eorum dulcedine, quam exemplis primævorum hominum & plurium calidarum regionum incolarum, vires nutrientes poffidere liquet, acido quoque, quod pluribus eorum ineft, & egregie sitim fedant & putredini refiftunt, hinc eximie conducunt in morbis a putrido oriundis, iidem autem cum larga aëris quantitate scateant, hinc flatus inde gigni, non raro est observatum, cum porro eorum succus in fermentationem pronus sit, hinc largius debiliori ventriculo, si ingeruntur, mala varia & gravia solent excitare: Evitantur hæ noxæ, fi modice affumuntur, & fi pro debilibus ex aqua coquuntur: vinum, dum ipfis fuperbibitur, efficit, ut citius iter per canalem intestinalem abfolvant. Saccharo fi condiuntur, eorum vires folventes & nutrientes etiam intenduntur, Spiritu Vini omni virtute orbantur. Optime ingeruntur ventriculo vacuo, qui integras fuas vires in eos exercere, aërem inde folutum valide expellere, ipfos, antequam fermentent, ex canali inteftinali propellere valeat.

a. ACIDI.

BERBERIS Barbar. Epine Vinette, Saurauch. Inde radices & baccas recipinus.

* Radices fibrofæ funt ad infignem magnitudinem & craffitiem perveniunt, fub cortice rugofo & fufco luteæ funt & infigniter amaræ.

72

Baccæ cylindraceæ fub cute transparente fuccum vehunt læte rubrum, acido fapore instructum & femina includunt oblonga, fapore adstringente instructa, exficcatione nigrescunt.

BERBERIS. Corollam habet hexapetalam, calyce hexaphyllo irregulari fuftentatam, ifantheram, baccam umbilicatam, oligopyrenam. Vulgaris L. BLAC-WELL 165 floribus racemofis diftinguitur.

Crefcit in omni Europa, Oriente quoque & America.

Autumno baccæ maturantur, tunc demum omnem gratiam habent, quando pruinam fuerunt expertæ.

Aqua cum radicibus cocta flava & intenfe amara evadit, extracti aquofi lutei, amari, falini $\frac{1}{4}$ inde extrahit, Spiritus Vini inde etiam flavefcit & amarus evadit, ejus ope $\frac{1}{24}$ refinæ nigricantis & amaræ obtinetur.

Baccas primi Arabes in usum traxerunt, ob virtutem faponaceam, indolem acidam & fitim fedantem multum refrigerant, commendantur cum fucceffu ad morbos inflammatorios & biliofos; ALPINUS eas Ægyptiis multo in usu effe ad febres ardentes & pestilentes testatur, ipfe febre pestilentiali cum diarrhœa biliofa inde curatus, id quod idem etiam in fe ipfo expertus est PAULI.

Alvum a radicibus duci amicus CLUSII expertus eft & confirmatur a VAN SWIETEN, apud Cel. CRANZ, eafdem egregie contra Icterum facere RAJUS obfervavit; rariffime hodie præfcribuntur.

Conditum VAL. CORD. * Rob VAL. CORD. huic fuavius Gelatum folet fubstitui. Syrupus SCHRED. Tabula SCHRED.

CERASI, régatou, Cerifes, Kirschen. Sunt fructus varia figura rotunda instructi, vario colore, rubro maxime, præditi, sapore gaudent plus minus acido & includunt officulum rotundum, in quo nucleus albus pellicula fusca cinctus, amaricans & rotundus hæret.

PRUNUS. Corollam pentapetalam regularem ha-

74

bet, calice quinquefido fuftentatam, polyantheram, monogynam, baccam monopyrenam: Cerafus L. BLACWELL 449 floribus aggregatis & pedunculatis diftinguitur, hanc arborem ultimo ante Chriftum natum feculo ex Cerafunte Ponti oppido Romam delatam faufe teftatur, PLINIUS. Varietates aliquot fylvestres copiose occurrunt, plures in hortis coluntur.

Præstant Cerafa acida abunde quæ de fructibus horæis in universum monui, VAN SWIETEN viginti & ultra libris quotidie comestis, gravissimas manias vidit solutas, decocto exficcatorum plures melancholicos convaluisse testatur FERNELIUS, id ipsum non raro iis, qui febribus acutis afficiuntur, nostrates propinant; ad eundem quoque scopum faccharo condita exhibentur.

Syrupus SCHRŒD. ut majorem gratiam accipiat, ex Cerafis cum nucleis contufis parandus. Conditum Wurtemberg.

CITREUM MALUM, Medicum, uñhov unduróv, megornov, mdgóuéhov, uírquor, heiudóviov, Citron, Limon. Fructus varia magnitudine præditus, figura ut plurimum ovata inftructus, creberrime fuperne in papillam eductus, inferne calice refiduo notatus; fub cortice per maturitatem flavo, fragrante, proprio odore & aromatico fapore inftructo, fubftantiam albam fpongiofo tenacem minus fapidam & odoram vehit, fub hac, cui varia craffities eft, reperitur pulpa in novem ut plurimum loculos diftincta, fucco flavo odorato & qui frequenter acidus eft, interdum dulcis, interdum etiam aufterus repleta. * Semina oblonga, inferne anguftata, ad latera compreffa, leviter flavefcentia, parum odorata, amara, condit.

CITRUS. Corollam habet pentapetalam regularem, polyantheram; polyadelpham, monogynam, pomum novemloculare, polypyrenum: Medica L. BLAC-WELL 361 petiolis linearibus diftinguitur. Arbor Orienti indigena, jam PLINII temporibus in Italia culta fuit, a Lufitanis in Americam translata eft, hodie in Gallia Meridionali, Infulis Stœchadibus ad Lacum Benacum & in territorio Genuenfi maxime colitur; inter nos cultæ fructus vix cedunt iis, qui ex regionibus meridionalibus adducuntur. Varietas Bergamotte dicta ob olei fragrantiam multum laudatur. Ad ufum internum citra, primo a C. N. Seculo recepta fuiffe, ex ATHENÆO patet. Centum poma unicam unciam olei odorati largiuntur. FER RARIUS.

Cortices, qui etiam Flavedo dici folent, non modo gratiæ ergo vario ciborum generi adjiciuntur, fed etiam refocillandi fcopo, nec non ad roborandas primas vias, in usum trahuntur; ad priorem finem recentes præferendi, ad alterum qui exficcati proftant tenues, fubstantia spongiosa privati, plicati, grata amaritie instructi. Pulpa, quæ etiam Caro dicitur, omnem fuam virtutem a fucco habet, qui, cum multum faponaceus fit, humores attenuat, obstructiones referat, digestionem juvat, evidenti præterea qua gaudet aciditate, appetitum stimulat, sitim extinguit, æstum fanguinis temperat, putredinem arcet, princeps ad febres inflammatorias & malignas remedium, notante FRANCO, nec non ad fcorbutum, observante RIVERIO & testibus passim Itinerariis, ad varium quoque vomitus genus, annotantibus PISONE, PAULI &c. facit, ejus usu nephritidem calculofam curatam, testantur Berliner Sammlungen, contra venena facere jam Veteres annotarunt, WEPFER & Loss confirmant & ex nota virtute acidorum vegetabilium in venena narcotica liquet; externe cofmetico fcopo ad abstergendas cutis fordes adhibetur.

Seminum, quæ ad vermes & morbos vifcerum abdominalium commendabant, ufus eviluit, & in locum Florum, Aurantiorum flores adhibentur. Poma integra cibis condimenti loco adjiciuntur, gratum inde & fanis & qualicunque febre correptis furgit potulenti genus, fi, præeunte MYNSICHT, eorum tria in taleolos fecta cum fex libris Aquæ ad remanentiam librorum quatuor coquuntur, & decoctum colatum tribus unciis facchari edulcoratur.

Vinum cum corticibus infusum & faccharo edulcoratum olim inter nos multum appetebatur.

Aqua a Corticibus abstracta SCHROED. aromatica, * eadem a Bergamotte destillata etiam prostat; Oleum odoratum & destillatione & expressione ex corticibus paratum, hoc illo majorem evidenter gratiam habet, & ex Italia sub nomine Quinta Essentia adducitur, prostat etiam ex Bergamotte elicitum. Elao faccharum optime paratur faccharnm pomis recentibus affricando. Conditum Corticum nec Arabibus ignoratum, ficcum Citronade dictum, ex Italia ad nos advehitur, liquidum VAL. CORD. Syrupus Corticum MESUE, eum Parifini addito Elæo faccharo gratiorem reddunt, Wurtembergenfes ad morem Arabum granis Chermes tingunt. * Spiritus Wurtemberg. eft claretum Stomachicum gratum. * Electuarium de Citro Mesue Parifini parum mutatum receperunt & fub forma Morfulorum affervant, inconcinna compositio, quæ refinosa purgantia recipit & ad drachmas fex pro dofi præscribitur. * Conserva ex Pulpa PH. AUGUST. Rotule ex Succo Nostrat. & adhuc gratiores ex Succo & Elao faccharo proxime ad Morful. de Citro SCHROED. accedunt. Syrupus Acetofitatis Citri MESUE & hunc fuavitate fuperans Syrupus Citri e toto Wurtemberg. ab illo non differt * Syrupus Limonum VAL. CORD.

MALUM, Pomum, µñλov, Pomme, Apfel. Græca & latina vox interdum pro omni fructu fumitur, proprie autem denotat fructum varia fuperficie, varia magnitudine, vario odore inftructum, utrinque excavatum, fub cuticula varii coloris, pulpam varie tinctam proprii faporis, qui autem varios quoque modos

NUTRIENTIA.

affumere folet, inftructam includit, ipfi innidulantur femina ex angusto fine obtuse & latius terminata, convexo-plana, quæ sub cuticula nigricante medullam albam & dulcem continent.

Prrus. Corolla pentapetala regulari, calice quinquefido fuftentata, polyanthera, pentagyna; pomo nudo, quinqueloculari gaudet: Malus L. BLACWELL 141. pomis bafi concavis & foliis ferratis diftinguitur.

Arbor Orbi temperato propria, quæ in regionibus calidioribus non bene vegetat, in frigidioribus autem fructus non maturat. Hujus loci funt varietates, quæ vinofo fapore gaudere dicuntur, eæ autumno folent maturefcere, per tempus affervatæ demum fummam gratiam acquirunt.

Malis multum aëris fixi ineffe, docet unanimis Medicorum ab HIPPOCRATE ad noftra ufque tempora confenfus, nec dubium, flatulentiæ vel idiofyncrafiæ attribuendos effe malos effectus, quos inde natos HOFFMANN, PAULI, J. BAUHINUS &c. obfervarunt; evicit fane experientia, quod mala bene matura reliquorum fructuum horæorum virtutes omnino exferant. Ob fragrantiam, qua pollent, analepticas quoque vires edunt.

Ex fucco malorum, fylvestrium maxime, & earum varietatum, quæ proxime ad ea accedunt, fit Vini genus iJgóµmλov, Pomatium, Cidre, cujus parandi rationem GEOFFROI, Journal Œconomique, Illustr. DU HAMEL &c. tradunt, illud si bene paratum suerit, ad septem & ultra annos potest asservari, Vini effectus, infra dicendos, edit, acidulum & pauciore Alcohole fœtum æstate maxime bibitur, optimum in Normannia paratur, minus bene defæcatum, aut nimis recens colicam Pictonum gignit. Gelatum SCHROED. suere multum.

* Syrupus MESUE. * Compositus SAPOR Regis, ejus unciæ uni duo circiter scrupuli foliorum Sennæ respondent; Helleboratus Parisin. Unguentum Pomatum PH. HAG. correctum Parifini habent, ad cofmeticos maxime ufus adhibetur. Unguentum Pomatum Rubrum. Purif. ad filfuras labiorum conducit.

RIBES Arab Grossula Barbar. Johannis - Beeren; Grosseilles funt baccæ rotundæ piss majores, sive rubræ sive albæ, umbilico notatæ, sapore acido proprio instructæ: illæ quæ nigræ sunt Chassis, saporem minus acidum, & nauseosum cimicum odorem habent

RIBES. Corollam pentapetalam regularem habet, calice quinquefido fultentatam, ifantheram, monogynam, baccam unilocularem, polypyrenam: *Rubrum* L. BLACWELL 285 racemis glabris & pendulis diftinguitur. Crefcit in omni Europa, & copiofe in hortis colitur, varietas alba Seculo XVI. innotuit: *Nigrum* L. BLACWELL l. c. pedunculos villofos habet, occurrit ubique, Europa maxime feptentrionali excepta.

Prioris speciei baccæ ad vires fucci Citri accedunt, Ischiaticum inde refocillatum allegat WOLFF, earum pelliculæ difficilius digeruntur, hinc varia mala inde surrexisse observatum est, testibus HANNEMANN & GRUBEL; Ribesia nigra primum a SCHWENCKFELD ad morbos tentata, ob vim diureticam solent laudari.

Conditum VAL. CORD. Rob VAL. CORD. quod aqua dilutum in morbis acutis egregium medicamentum effe, propriis experimentis confirmat Ill. HALLER; in angina falutare vidit Cl. UNZER. * Syrupus PH. AUGUST.

p. DULCES.

ANANAS Barb. Eft receptaculum variæ magnitudinis, ovatum, fub cuticula folidiore, quæ fructus tegit, varie colorata creberrime flava & multum fragrante, includit pulpam citrinam, feptis tenacibus, diftinctam, gratiffimo fapore, dulci & vinofo inftructam.

BROMELIA. Corollam trifidam habet, fimili calice

78

fustentatam, diplofanthera, monogyna, pomo polypyreno gaudet: Ananas L. BLACWELL 567 & 568 receptaculo fimplici diftinguitur.

Americæ Meridionalis civis, in Madagafcar quoque occurrit, apud nos in hortis colitur.

Multum negotii cum facessat ejus cultura, magnatum modo mensis folet apponi, fragrantia sua motum spirituum refocillat, succo saponaceo humores attenuat, digestionem hinc promovet, urinam quoque pellere dicitur. In taleolas diffectam a febricitantibus ore detineri, refrigerandi & sitim sedandi ergo, annotat HERNANDEZ.

ARMENIACA MALA, Pracocia, Chryfomele, $\mu \tilde{n} \lambda a$ Aqueviana, Abricots, Apricofen, Mallelein. Noftr. Sunt fructus variæ magnitudinis, qui figuram rotundam habent, fulco longitudinali in uno latere notati, fub cuticula pellucida pulpam folidiufculam, flavam, fragrantem, fapore proprio dulci inftructam fovent, hæc includit officulum læve, rotundum, inferne compreffum, quod nucem globofam, fub flavicante cuticula medullam fuavem, amaricantem fiftentem, vehit.

Prunus Armeniaca L. BLACWELL 281 floribus fessilibus & foliis fubcordatis in acumen productis distinguitur.

Plures ejus varietates horti nostri colunt.

Ob dulcedinem, qua pollent, nutrientes vires edunt, Perficis a GALENO præferuntur, quia folidiora funt, nec ita facile corrumpuntur, neutrum experientia circa nostratia confirmat.

* Nuclei effectus faponaceorum, oleoforum & amarorum edunt.

AURANTIA Barb. negav Jua Græc. Rec. Oranges, Pomeranzen. Fructus ut plurimum rotundi funt, illi qui dulces funt fuperficie lævi, per maturitatem crocea, umbilico non multum eminente, pulpa five flavicante five rubra gaudent, fapore vinofo, dulci, gratifimo prædita, cortex five infipidus five levifime modo amarus eft.

Flores a Napha denominantur, albi funt, carnofi, odorem fpirant gratiffimum, faporem habent amaricantem, exficcati multum de fua gratia perdunt & flavefcunt.

Folia funt ex ovatis oblonga, firma, læte viridia, fapore gaudent aromatico, amaro, odor eorum eft fragrans.

Citrus Aurantium L. BLACWELL 349 petiolo cordiformi diftinguitur.

Arbor a Veteribus communi cum Citro nomine comprehenfa, Seculo XIII. circiter distingui cœpit, iisdem cum Citro locis crescit & colitur, frigoris magis patiens.

Aurantia dulcia ut plurimum defumuntur ex arbore Chinæ indigena, unde primum Oliffiponem traducta funt, hinc Aranza de Sina dicuntur.

Folia destillatione cum aqua oleum odoratum fundunt; Florum libra una vix grana tria olei flavi, odoratisfimi exhibet. FERRARIUS.

Folia quidem paffim ab Auctoribus laudabantur, fed Illustris DE HÆN demum ipsis magnam famam conciliavit, dum exempla adducit de convultionibus, quæ eorum decocto aquoso æque ac ipsis in pulverem redactis, sublatæ fuerunt, quibus etiam observationes Cl. HANNES, LOCHER & STOERCK accedunt; Cel. TISSOT non magnos inde effectus vidit.

Flores, ob fragrantiam, qua pollent, motum spirituum intendunt & in illis casibus, ubi analeptica indicantur, locum habent, id quod autem præcipue de recentibus valet, ope facchari in confectionem siccam redacti, non male pro mensis secundis apponuntur.

Pulpa, cum illa pomorum Citri, ratione virtutis folventis folventis convenit, eidem ob majorem gratiam, & ubi humores etiam demulcendi funt, præfertur; in affectibus pectoris, febribus biliofis & inflammatoriis cum fucceffu propinatur; fcorbuticis quoque folet laudari: integrum pomum cum cortice ante paroxyfmi acceffum comeftum, tertianas perfæpe curaffe RAJUS notat.

Aqua florum, illam vernacula Italica Nanfa, qua voce aquam fragrantem denotant, inter primos RENO-DEUS Aquam Napha appellavit; cadaveris Comitis cujufdam, qui ante mortem per plures dies hac aqua ufus fuit, omnia vifcera & omnes ventres eandem redoluiffe, expertus eft HEISTER; præcipuus ejus inter nos ufus eft, ut medicamentis gratia concilietur. * Oleum ex floribus deftillatum colorem rubrum habet & Neroli dicitur, illud cum fit valde pretiofum, hinc ei vulgo oleum Behen cum floribus digeftum, & inde eorum odore imbutum, folent fubfituere, optimum Graffæ & in territorio Nicæenfi paratur. * Syrupus Florum Parif. * Conferva florum SCHROED. * Spiritus florum per ferment. Parif. Tinctura * florum Parif. Unguentum five Pomatum florum. Parif.

CERASA dulcia, ab acidis fapore maxime differunt, varia illis est magnitudo, color niger, ruber, albidus, confistentia plus minusve folida. Plurimas varietates habet, quæ desumuntur ex varietate fylvestri, Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci nigro colore inficiente dicta, parva funt, nigra, dulcissima Merises, nostratibus Ruprechtsauer Kirschen, Actiana PLINII creduntur esse: illa, quæ magna & lateribus compressa funt Bigarottes, Herzkirschen dicuntur, Duracina PLIN. & hujus denuo multas varietates nostri horti colunt.

Cerafa dulcia ratione virium fatis prope ad mala armeniaca accedunt, non video, cur GALENUS ea digestu difficilia dixerit. Nigra vetus fabula, quz au-

F

tem vix Seculo XVI. antiquior est, morbis nervinis mederi, tradit.

* Nuclei funt oblongi, ventricofi, fub cuticula pallida includunt medullam albam, multum gratam.

* GUMMI flavescens est, pellucidum, insipidum, inodorum, fordes si habet, solutione in aqua, colatione & inspissatione depuratur.

Succus ceraforum nigrorum cum nucleis contuforum, cui faccharum adjicitur, fi vino commifcetur Vinum Ceraforum furgit, quod Nostrates magni faciunt, qui quoque multum delectantur Clareto Rataffia dicto, quod ex fucci quatuor partibus, cum una Spiritus Vini mixtis, & faccharo edulcoratis paratur.

Aqua VAL. CORD. omnem gratiam a nucleis habet. Spiritus per fermentationem SCHROED. copiofe a monticolis noftratibus paratur, & post largiora prandia, ut digestionem promoveat bibitur, a non paucis omnibus reliquis claretis anteponitur.

Nuclei cum Armeniacis viribus conveniunt, laudantur maxime ob virtutem diureticam.

Gummi pro acrimonia demulcenda exhibetur, & iis maxime commendatur, qui difficultate urinæ laborant, rarius in ufum trahitur, ab Illuftr. LINNÆO nutriendi fcopo commendatur.

* CITRULLI Barb. Anguriæ Barb. Melons d'eau, Wassermelonen. Sunt fructus prægrandes, ita ut HAS-SELQUIST in Ægypto viderit, quorum diameter longitudinalis tres pedes & transversalis duos æquavit, glabri, virides, qui sub cortice teneriore, pulpam rubram multo succo saccharina dulcedine instructo gaudentem, Cucumeres redolentem includunt; in pulpa nidulantur semina majora ex ovatis oblonga, utrinque compressa, quæ sub cortice nigro, ad basin marginato sovent medullam albam, inferne acutissime terminatam.

Cucurbita. Planta relativa, monophyta: Corolla

82

quinquefida, fimili calice aucta, nectario ornata mares anthera unica inftruuntur, tribus filamentis fuftentata, feminæ stigmate trifido, & pomum triloculare efformant. *Citrullus* L. BLACWELL 157. foliis multifidis distinguitur.

Afiæ civis in Europæ hortis colitur, rarius inter nos.

Evidenter nutritii fructus, ita ut vulgus Ægypti, per omne id tempus quo vigent, tefte HASSELQUIST vix alio nutrimento utatur, fucco, quo fcatent, faponaceo humores folvunt, attenuant & contra alcalefcentiam defendunt, hinc æftate fanis multum proficui, in morbis calidis quoque multum laudantur; ad noxas ab affumto opio conferre RUMPH expertus eft, Cl. KALM autem quod fortiter urinam moveant: cum infigniter refrigerent & facile fermentent, hinc cum prudentia debent in ufum trahi. Optime menfis fecundis apponuntur.

Semina cortice 'privata, unguinoforum & faponaceorum effectus edunt, humores demulcendo & folida relaxando æftum fanguinis imminuunt, refrigerantes vires exerunt, unum ex quatuor feminibus frigidis majoribus conftituunt, per morem receptum vix non femper reliquis tribus adjecta in ufum trahuntur, & quidem five fub forma Emulfionis, five quod eis contufis repleatur venter pulli gallinacei exenterati, qui dein cum libris tribus aquæ ad remanentiam librarum duarum coquitur, & fub nomine *Eau de Poulet* exhibetur.

* Aqua Citrullorum Parif. iners. * Oleum S. quatuor frigidorum VERNY.

CUCUMIS, Cucumer, sizos, Concombre, Cucumer. Est fructus oblongus, variis tuberculis obsets, non raro incurvus, utrinque obtus, per maturitatem, pro varia varietate sive flavescens sive albescens, pulpam albam multo succo scatentem, proprio odore & fapore leviter dulci instructam includens; in pulpa hærent copiofa femina parva, oblonga, utrimque compreffa, ad unum extremum leviffime emarginata, ad alterum, apicem acutiffimum & exiguum emittentia & quæ fub cortice duriufculo, flavefcente, medullam albam & dulcem continent.

CUCUMIS. Planta relativa diphyta, Corolla quinquefida fimili calice fustentata, maribus anthera unica, tribus filamentis infidens, feminis monogynis stigmata tria bipartita, pomum triloculare. Sativus L. BLACWELL 4 foliis angulatis & angulis acutis distinguitur.

Ejus varietates in nostris hortis coluntur, fructus per omnem æstatem obtinent.

Cucumim pinguefacere HIPPOCRATES tradit, id quod de fructu, quem nostra ætate nondum maturam affumunt, vix auderem promittere, vires quas de Citrullo dixi, etiam a Cucumere non male expectamus; ut eorum in fermentationem nifus, & quæ inde oriri possent mala, minuatur, portionem fucci inde exprimere, eostem quoque aromatibus condire solent, antequam in usum trahantur: refrigerandi, abstergendi, urinam movendi ergo ab HIPPOCRATE laudantur. Pulpam jusculis incoctam cum successure laudantur. Pulpam jusculis incoctam cum fuccess fanatam vidit HEURNIUS; in variis mente captis eostem utilissimos expertus est HOFFMANN; Succo Cucumerum ad duas uncias bis de die exhibito, tabidos & hecticos curatos vidit SCHULZ.

Fructus tenellos fale & aceto conditos, Cornichons, cum carne comedere folent, horum vis, vix non omnis, a condimentis pendet, cavendum ne tales affumantur, qui, ut læte virides fint, ære inquinati fuerunt. Semina cum reliquis frigidis majoribus ufurpantur.

Aqua destill. Parif. iners.

CUCURBITA, RODORUUM, Courge, Kürbis, Calabasse Indis & Hispanis. Est fructus variæ magnitudinis & figuræ, cortice inftructus, qui ut plurimum per maturitatem flavefcit & totus ficcus evadit, five lævi five tuberculis obfeffo, pulpa autem magis quam in congeneribus ficca, ut plurimum infipida, includente femina majora, utrimque plana, medullam albam vehentia; illa ex *Pepone* tota margine tumido cincta funt, fuperne ovata, inferne quafi refecta, eorum nucleus cuticula viridi tegitur.

Cucurbita Pepo L. Plebejá PLIN. foliis afperis & pomis lævibus diftinguitur.

Colitur in hortis & prægrandes fructus fiftit.

Cucurbita Melopepo L. Pepo Veterum Pfaffenhütel caulem erectum habet & poma depresso nodofa.

Inter nos in agris copiofe colitur.

Pepones noftrates maxime ad faginandos porcos adhibent, Melopepones cum lacte a plebejis in cibum recipiuntur.

Cucurbitas parum nutrire GALENUS monet, refrigerantes & abstergentes inde effectus HIPPOCRATES pollicetur. Pulpa Cucurbitæ capiti imposita phreneticos curatos testantur BORELLUS & BARTHOLETTUS.

* Syrupum ex succo MESUES, philicis multum commendare folent. Syrop de Calabasse ex America in Galliam allatus & contra Hecticam multus laudatus; paratur ex fructibus Crescentia L.

Semina inter quatuor frigida majora recipiuntur.

DACTYLI, ¢oivinec, ¢oivoCáharoi, Dattes, Dattlen funt fructus, qui ad Prunorum majorum magnitudinem accedunt, recentes nagwirai, teste KÆMPFER, carnem habent pellucentem, mollem, rusefcentem, dulcissimam, vinosam, exsiccati quales inter nos prostant, sunt Tragemata Veterum, figuram habent oblongam, superne pulvinati, umbilico cartilagineo notati, inferne parum angustati, rugosi, sub cuticula tenerrima carnem includunt viscidam, ex ruso flavescentem, quam sequitur membrana ex multis lamellis conftans, alba, in qua officulum hæret convexo planum, oblongum, albidum, in facie plana fulco longitudinali diftinctum.

Rejiciuntur profundius fulcati, albidi, molliores æque ac aridi, flaccidi & qui concuffi fonitum edunt.

PHOENIX. Palma relativa diphyta, corolla hexapetala irregularis, calice trifido fuftentata, marium ifanthera, feminarum monogyna. In Afia Occidentali, Africa & Americæ regno Mexicano fponte crefcit, in Europa Meridionali & Occidentali colitur & fructus maturat

Utiliffima arbor, cujus folia corbes, fcopas, flabella, lignum egregiam materiem, liber funes, fpatha mafculina gratiffimum & aphrodifiacum obfonium præbent, truncus vulneratus autem dulciffimum & fuaviffimum potulenti genus, officula fructuum recentium in pabulum camelis cedunt.

Dactyli inter nos proftantes ex Syria, Ægypto & Regno Tunetano adducuntur, in ipfa arbore fole exficcati. Hifpanicos & Salonenfes rejiciendos effe GEOF-FROI monet.

In Ægypto integras familias folis Dactylis vivere, & eofdem per omnem Turciam in cibum cedere teftatur HASSELQUIST, eofdem in Perfia olus & panem plebi præbere KÆMPFFER monet, hinc nutrientes ipfis vires effe, facile liquet; levis adftrictio cum pulpæ faponaceæ accedat, hinc non male menfis fecundis apponuntur, ipfi demulcentes & relaxantes non male aliis hujus generis medicamentis adjiciuntur ut nimiam relaxationem moderentur. Aquam ex Dactylis HIPPOCRATES ad diarrhœam commendat.

* Electuarium Diaphænicon MESUE Parifini mutatis dofibus receperunt, inconcinnum medicamentum.

FICUS, σύπον, σύπη, Figue, Feige. Eft fubstantia, quæ figura rotunda & turbinata variat, cuticula violacea vel alba includens concolorem pulpam dulcem, proprio odore & fapore inftructam, per quam plura grana fparfa funt, quæ & vulgus cum PLINIO Grana appellat, Botanici flores & femina effe evincunt.

Ficus immatura ਹੋਨਹਾਰਿ ਵਿਸ਼ਾ©, Groffus dicitur; exficcata logae Carica colorem flavum habet, faporem dulciflimum, cuticulam arctiflime cum pulpa cohærentem.

Caricarum quadruplex genus tabernæ affervant, unum eft magnum flavum & rotundum, denominatur a *Smyrna*, alterum a *Genua* nomen habet, magnum, flavum & oblongum, tertium eft *Ma/Jilienfe* flavum, rotundum, dulciffimum & gratiffimum, quod autem vix ultra unum annum poteft affervari. *Cairicum* Maffilienfi fimile minus eft & parciore dulcedine gaudet. Rejiciuntur ficciores, pulvere albo obfeffæ, vermibus exefæ, nigricantes & quarum fapor five ad acidum, five ad aufterum vergit.

-

FICUS. Receptaculum pulpofum excludit, quod & mafculinos & femininos flores continet, illi trifida corolla gaudent, ifanthera, hi corollam habent quinquefidam, monogynam & femen nudum. Carica L. BLACWELL 125 foliis palmatis, & quod relativa monophyta fit, diftinguitur.

Vulgaris in Europa Occidentali & Meridionali arbor, noftras hyemes, nifi terra vel ftramine defendatur, vix fert, plurimas dedit varietates. In Archipelago crefcit fpecies nonnifi flores mares vehens circa quam tor ignaturo, Caprificationem jam THEOPHRAsto memoratam, egregie a TOURNEFORTIO, PON-TEDERA & Illuftri LINNÆO defcriptam, folent inftituere, ficus hac ratione fœcundatæ, ne a larvis teredinum ficariarum deftruantur, clibano exficcari folent, fed inde eorum gratia & virtus multum imminuuntur. Nullam ficum dioicam dari Cl. BERNARD contendit.

Ficus dulces multum nutrire Veteres jam noverunt, hinc, PLINIO tefte, eas athletis exhibuerunt, hodieque præcipuum Archipelagi rufticorum alimentum constituere, TOURNEFORTIUS refert. Multum virtute abstergente & relaxante pollent, observante HIPPOCRATE, ad alvum strictam, morbos pectoris etiam & renum, quia demulcentes quoque vires habent. cum fucceffu, præcipiente GALENO, adhibentur; notat Illustris LINNÆUS, " quod fi quis ante prandium in-"fignem caricarum copiam comederit, tamen confue-" tam fere ciborum quantitatem, fine ulla ventriculi "moleftia confumere queat"; Sed hoc ipfum de omnibus fructibus horræis valet; eafdem ad minores ufque vaforum ordines penetrare, fudoris fætor, quem frequentem earum ufum excitare, poft ATHENÆUM, SI-MON PAULI quoque observavit, nobis persuadet; hinc non male ab AVICENNA ad exanthemata laudari videntur, num etiam inde GALENI effatum, a multis Medicis confirmatum, quod eis crebro utentes pediculis infestentur, id quod tamen jam ATHENÆUS refutavit, explicandum eft? certe vis earum contra venena, post GALENUM & PLINIUM, ab Arabibus maxime commendata, inde erit deducenda.

Sed extus quoque cum fucceffu refolvendi ergo adhibentur, aflatæ imponuntur abfceffibus, illis maxime qui ad gingivas hærent, aqua cum iis cocta ad morbos faucium, præeunte HIPPOCRATE, adhibetur, nec male fuppofitorii vice ano intruduntur.

FRAGA, Fraises, Erdbeeren. Nostri fructus ab illis Veterum diversi esse videntur.

Radices tenues funt longæ, repentes, plurimas fibrillas capillares emittunt, fub cortice ex fufco rufescente fubstantiam magis albam includunt, fapore gaudent evidenter adstringente.

Folia ternata, ex ovatis oblonga funt, ferrata, hirfuta, adftringentia.

Fructus funt receptacula carnofa five oblonga five rotunda, eorum tota superficies acinis efformatur five rubra five alba, odore proprio vinofo, fapore fimili nec non dulci gaudent.

FRAGARIA. Calice decemfido corollam pentapetalam, regularem fustentat, polyantheram, polygynam, fructus est receptaculum pulposum, copiosa femina in superficie gerens. Vesca L. BLACWELL 77 foliis ternatis distinguitur & quod flagellis repat. Vulgaris per omnem Europam planta; in nostris hortis variæ ejus varietates coluntur & quidem præcipue le Fraisier Fresant DU CHESNE, le Fraisier Ananas Ejusp. & le Fraisier écarlate Ejusp.

Radices exhibent $\frac{3}{8}$ Extracti aquofi, fufci, multum falini, Fraga ipfa fimilis Extracti fufci, fapore amaricante, grate vinofo inftructi $\frac{1}{6}$.

Radices cum aqua decoctæ eam rubro colore afficiunt, & hoc decoctum etiam fæces rubras reddere eft obfervatum, celebrantur multum ad vifcera aperienda, in ictero conducere a BARTHOLINO & S. PAULI annotatum fuit. Adítringendi quoque ergo in ufum trahuntur.

Folia ad eofdem ac radices usus commendantur. NEBEL eorundem usum ad ulcera pedum iteratis obfervationibus probavit.

Fraga ipfa, fructibus horræis hactenus recenfitis, nequaquam viribus cedunt, ab HILDANO obfervatæ noxæ, quæ eorum abufum excipiebant, neutiquam ea fufpecta reddunt; cum largius comefta evidenter fuo odore urinam imbuant, notante GEOFFROI, hinc evidens fit eorum virtus ad vitia viarum urinariarum jam a GESNERO perfpecta & a LOBB confirmata; hecticos inde curatos SCHULZ vidit, & phtificum HOFFMANN. Furentiffimos melancholicos & maniacos ad viginti libras quotidie per aliquot feptimanas comeftis vAN SWIETEN curatos allegat, fragis quotannis copiofe comeftis per plures annos a podagra immunis vixit III. LINNÆUS. Mos non laudandus effe videtur, quo fraga five vino & aromatibus, five lacte condita affumere folent, prior ratio præcipuas eorum vires enervat, altera coagulo lactis ventriculum onerat.

* Aqua Fragaria VAL. CORD. iners. Aqua Fragorum VAL. CORD. licet odorem fragorum habeat, eorum tamen vires frustra inde expectantur. Syrupus Fragorum SCHRŒD. * Spiritus Fragorum per ferment. SCHRŒD.

GRANATUM, Malum Punicum, jon, oida. Recipimus Flores Badaúzia, Balaustia, quos, si germen in ipsi jam intumuerit, xorives dixerunt, pomi præterea pulpam, & qui ipsam ambit, Corticem, hic oida, unde Barbarorum Pfidium ortum, nec non Malicorium dicitur.

Balauftia plena modo nostras officinas ingrediuntur, efformantur a petalis pluribus fanguineo colore fulgentibus, ovatis, inodoris, fapore leviter adstringente & amaricante instructis; calice comprehensis folidiore, tenaci, magno, quinquesido, flavescente & purpura tincto, amaro & adstringente.

Fructus est rotundus, varia magnitudine præditus, umbilico quinquefido coronatus, includit fub cortice extus purpureo intus luteo, folido, rugofo, multum adstringente, pulpam liquidam, rubram, fragrantem, vinofo & dulci fapore præditam; feptis carnofis diftinctam, & cui femina *rorracovec* innidulantur, propria membrana rubente *Cico* inclufa, oblonga, ventricofa, angulata, fub cortice duro medullam amaricantem includentia.

PUNICA. Corollam pentapetalam regularem habet, calice quinquefido fustentatam, polyantheram, monogynam, pomum calice coronatum, novem loculare, polypyrenum. Granatus L. BLACWELL 97 foliis lanceolatis distinguitur.

In Afia, Africa, Europa Meridionali & Occidentali fponte provenit, noftras hyemes difficilius fert.

Aqua & alcohol pallida a Balauftiis rubedine &

90

fapore adstringente imbuuntur, extracta evidenter adstringunt, spirituosum præ aquoso parcius obtinetur, pallidius & magis adstringens: Cortex sui ponderis dimidium extracti aquosi largitur; alcohol vix aliquid inde recipit. LEWIS.

Balaustia adstringendi scopo ad omne genus sluxuum intus ad drachmam unam pro dosi exhibentur; externe roborandi ergo ad medicamenta gingivalia; nec non ad injectiones & epithemata adstringentia recipiuntur. Malicorium HIPPOCRATES puerperis exhibuit, valide adstringit, nonnisi caute ægrotis propinandum, mensium obstructiones inde referatas observavit LANGELOTT. Pulpa reliquorum fructuum horræorum vires exsequitur, cardialgiam inde curatam vidit HIPPOCRATES, id quod etiam FABRICIUS apud SIM. PAULI observavit, ille quoque eandem ad humores attenuandos commendat. Succo granatorum, diarrhœas & dysenterias curavit vAN SWIETEN. * Semina hæmorrhoidariis conducere BARTHOLINUS & LENTILIUS viderunt.

Syrupus MESUE egregium medicamentum roborans & æftum fedans. * Vinum Granatorum PALLA-DII proxime ad Syrupum accedit.

JUJUBÆ Arabum, Jujubes, Brustbeeren exficcatæ quales apud nos prostant, ventricosæ sint, cylindraceæ, utrinque pulvinatæ, sub cuticula sicca, præ laxitate rugosa, rubra, pulpam includunt, slavam, dulcem, sungosam, quæ condit officulum ventricosum, utrinque acutissimum, nucleum crassiussiculum includens, qui sub cuticula rubra medullam albam continet.

RHAMNUS. Corollam quinquefidam habet regularem, fquammis auctam', ifantheram, mono- vel digynam, fructum baccam officulo biloculari gaudentem. Zizyphus L BLACWELL 569 foliis ovato oblongis, aculeis geminatis, rectis diftinguitur. In Italiam tempore Augusti translata, hodie in omni Europa Meridionali copiofa est.

Recentes in Gallia Meridionali vulgarem populo cibum largiuntur, fcopo medicato caricis vulgo folent adjici, cum autem pulpa parciore & minus fuavi gaudeant, hinc prudentius omitterentur.

* Syrupus de Jujubis MESUE mutatum Wurtembergenfes recipiunt, adhuc magis a præscriptione MEsue Nostrates recedunt; demulcendi & relaxandi ergo ad morbos pectoris commendatur.

MALA DULCIA inertia licet a GALENO dicantur, tamen & vires omnibus fructibus horræis proprias habent, & præter effectus, quos ob fragrantiam edunt, egregiam opem ferunt, ubi demulcendi fcopus obtinet, laudantur maxime ad morbos pectoris, ftricturas laxandi, acre temperandi, mucum attenuandi fcopo. Hunc in finem five datur aqua cum eis cocta, five ipfa comeduntur affata, five ex aqua cocta & cum faccharo edulcorata, folent quoque umbilicum inde refecare, ejus in locum fruftum facchari Candi illis committere, & ita affare.

MELO, Mnhomémor, Melon, Melone. Est fructus variæ magnitudinis interdum malo non major, interdum ad cucurbitarum volumen accedens, figura gaudet mox rotunda, mox oblonga, fuperficie viridi five lævi, five reticulo obducta, five tuberculis notata, cortex etiam variam craffitiem habere folet, pulpa interdum viridis est, crebro rubra, creberrime flava, odore grato qui varios gradus habet, fapore dulci, leviter vinoso, cui interdum aliquid aromatici accedit, gaudet; includit semina minora, compressa, ex albo flavicantia, inferne marginata & angustata, quæ sub cortice durius foundation medullam albam & dulcem fovent.

Cucumis Melo L. BLACWELL 329 foliorum angulis & pomis rotundatis distinguitur.

Ex Oriente ad nos descendit, varietas, cujus to-

ta fuperficies in tubercula elevata est, & quæ carne duriuscula, cui evidenter aroma accedit, gaudet, ex Armenia in Europam delata est & cum primum Cantoloupæ in Italiæ Marchionatu Anconitano culta fuerit, inde quoque denominatur.

Ob vinofum & aromaticum quo gaudent principium cucurbitis & fuaviores funt & citius e ventriculo defcendunt, hinc quoque a GALENO laudati Perfpirationem inde minui, diurefin autem augeri annotat SANCTORIUS; BORELLUS phtificum Melonum efu curatum adducit. Immaturi tenelli in modum cucurbitarum conditi, harum quoque in modum dijudicandi funt.

Semina quatuor frigidis majoribus adscribuntur.

* Aqua destillata iners.

MORA, soza µwa, µóga, Meures, Maulbeeren. Sunt fructus qui prunorum minorum magnitudinem habent, ex acinis rotundis conflati, fucculenti, fapore dulci vinofo inftructi, colore fanguineo præditi.

* Radices fibrofæ funt, dulces potius quam amaræ, Lavo colore præditæ.

Morus Planta relativa diphyta: mares amentacei tetrandri, feminæ corollam habent tetraphyllam, digynæ. Nigra L. BLACWELL 126 foliis cordatis & fcabris diftinguitur.

Europæ Meridionali indigena arbor, apud nos sopiofe colitur & optime noftras hyemes fert.

GALENUS radices contra lumbricum latum laudat. Fructus vires reliquorum horræorum habent, ego faltem nihil adstringentis in eis possum deprehendere. Laudantur quoque ab HIPPOCRATE.

Syrupus jam ante GALENUM usitatus, ad morbos oris & faucium maxime adhibetur. Rob NICOL. Syrupus optime substituitur.

PERSICA MALA, MALA, Mira megoma, Pêches, Pfersich. Sunt poma variæ magnitudinis, superficie sive lanuginosa instructa sive glabra, hæc Nucipersica Barbaris, Brugnons, Nectarines, nackete Pferfich dicuntur, colore varie rubro & flavo variant, odore fragrante gaudent, fapore plus minus vinofo, includunt officulum ventricofum, oblongum, fulcatum in quo nucleus hæret compreffus, qui fub cuticula fufca, medullam grata amaritie linguam ferientem continet. Perfica quorum pulpæ officulum fortius adhæret, dicuntur Pavies.

Flores affervantur cum calicibus, rofeo colore, proprio & fuavi odore nec non fapore amaricante gaudent.

AMIGDALUS. Corollam pentapetalam calice quinquefido fuftentatam habet, polyantheram, monogynam, fructum drupam. Perfica L. BLACWELL 101 fructu pomo diftinguitur.

Americæ & Afiæ indigenæ arboris aliquot varietates in agris & vinetis crefcunt, plurimæ, magis exquifitæ, in hortis coluntur.

Saluberrimi fructus non paucis, nimis Veterum auctoritati tribuentibus fufpecti funt, quippe qui non raro, quæ de Perfea arbore venenata, hodie ignorata, dicebantur, de noftris quoque fructibus metuebant; Decocto hordei intrita in obftructuonibus & febribus biliofis folatio fuiffe vidit VAN SWIETEN. Saccharo, Vino, coctione fictitias eorum noxas correcturi, laudandas qualitates imminuunt. Spiritu Vini condita hæc mala cum inde indurentur, minus bene menfis fecundis apponuntur.

Nuclei demulcent, abstergentes quoque, cum amari fint, vires habent, laudantur illis, qui renibus laborant.

Flores exficcati aquæ cum qua infunduntur, fuavem odorem, qui nucleos refert, affricant, faporem evidenter amarum, & cui aliquid acris junctum eft, colorem flavum ad rubrum accedentem habent. Extracti aquofi fusci, amaricantic, parum falini $\frac{1}{3}$ circiter, exhibent. Refolventes & Catharticas vires edunt, majori dofi, aut hominibus delicatioribus dati, tormina & vomitum excitaffe obfervatum eft, non male quoque fcopo anthelmintico exhibentur. Ad drachmas duas pro dofi five cum fero lactis infunduntur, five medicamentis eccoproticis adjiciuntur.

* Oleum ex Nucleis expressum COSTEI. Nefcio cur fpecifice ad dolores capitis laudetur. * Aqua destillata Florum Nostrat. unice pro parando Syrupo asservatur. * Conserva Florum SYLVII Syrupus Florum MEsue ratione a Nostratibus tradita præparatus & fragrans & multum efficax evadit; infantibus ad unciam dimidiam, adultis ad uncias duas cathartico scopo exhibetur.

PRUNA, monumentary Romannia, Prunes, Zwetschen, Pflaumen. Sunt fructus ab avellanæ usque ad majoris ovi magnitudinem variantes, vario quoque colore tincti, five oblongi five rotundi, fapore dulci, qui interdum aquofus, interdum acidulus est, præditi, includunt officulum ventricosum five rotundum five oblongum, in quo nucleus dulcis hæret, cui paucissima amarities est.

Prunus Domestica L. BLACWELL 305 pedunculis fubfolitariis, foliis lanceolato-ovatis & ramis inermibus diftinguitur.

Ex arbore Europæ Auftrali indigena, varietates copiofiffimæ in noftris hortis coluntur.

Prunus Infitiva L. BLACWELL 494 quæ pedunculis geminis & ramis fpinefcentibus gaudet, copiofe apud nos crefcit; ejus fructus fub nomine Haberschlehen a plebe comeditur.

Pruna cum malis Armeniacis ratione virium conveniunt; varietates magis aquofæ facilius in ventriculo fermentant; dulces exficcatæ vi fua faponacea alvum laxant, obfervante jam GALENO, & hoc fcopo eorum decoctum non raro apud nos adhibetur.

* Pruna laxativa Wurtemberg. ratione virium cum

Paffulis laxativis conveniunt. * Electuarium Diaprunis fimplex MVREPSI correct. Parif. demulcentes & adftringentes vires habet. * Electuarium Diaprunis laxativum Parif. Ejus uncia una grana duo Diagrydii vehit. Electuarium Catholicon fimplex Noftrat. Ad fefquiunciam in clyfteres ftimulantes & flatus pellentes recipitur.

RUBI, $\beta \alpha' \tau w \alpha$, eorum tria maxime genera in ufum trahuntur; unum *Rubi mora*, *Meures de Renard*, *Brombeeren*, fatis prope ad mora ratione figuræ appropinquat, colore nigro, odore nullo, fapore aquofo dulci, cui aliquid vifcidi accedit, gaudet, fecundum primo fimile faporem magis aquofum habet & colorem cærulefcentem, tertium *Framboifes*, *Himbeeren* rubrum eft, interdum album, fapore gratiffimo vinofo, odore fuaviffimo gaudet.

RUBUS. Corolla pentapetala regularis, calice quinquefido fuftentata, polyanthera, polygyna, fructus ex multis baccis tanquam totidem acinis exftructus. Fruticofus L. BLACWELL 45 foliis quinotis & ternatis fubtus tomentofis, fructu glabro diftinguitur, Cafius L. folia ternata utrinque viridia habet. Idaus L. BLAC-WELL 289 a primo, caule magis recto, aculeis rigidioribus inftructo & fructu hirfuto differt. Hæ tres fpecies per omnem Europam copiofe crefcunt.

Priorum specierum fructus effectus horræis communes edunt, cum minus suaves sint, hinc nonnisi a ruriculis in cibum recipiuntur. Idæi ob fragrantem quo scatent odorem, analepticis quoque adscribuntur, humores attenuandi, sitim sedandi, æstum sanguinis restrænandi ergo cum successure recipiuntur, & optimo consilio, præeuntibus GESNERO & BARTHOLINO, sebricitantibus exhibentur.

Rubi Idai Aqua destill. & odore & acidulo fapore se commendat: Syrupus SCHROED. * Conditum Wurtemberg.

96

temberg. Rob Wurtemberg. *, Vinam Wurtemberg. Syrupo etiam gratius est: * Spiritus per ferment. Parif.

Uva, $\neg \alpha \varphi u \lambda n$, Raifin, Traube. Eft racemus lignofus, qui baccas gerit Acinos, Beeren, grains dictas variæ magnitudinis, varii coloris, figuræ five rotundæ five oblongæ, faporis dulcis, fub cuticula tenaci includentes pulpam plus minus folidefcentem & femina vinacea, $\gamma i \gamma \alpha g \alpha$, fapore leniter adftringente prædita.

VITIS corollam pentapetalam habet, calice quinquefido fustentatam, ifantheram, monogynam, baccam unilocularem, polypyrenam.

Vinifera L. foliis lobatis & finuatis gaudet; Laciniata L. Cioutat, spanische Trauben foliis multifidis distinguitur.

Prior maxime fpecies innumeras varietates dedit, colitur in Europa calida & temperata, nec non in omni reliquo orbe, ubiæftates non nimis breves funt, aut clima non longiores pluvias gignit. Viticulturam non ultra quinquagefimum primum gradum feptentrionalem & trigefimum verfus æquatorem locum habere obfervarunt. Ultimo demum ante C. N. feculo Romæ, in Avernis nec non & Sequanis vites coli cœperunt, in Gallia Narbonenfi poftquam ipfa in provinciam Romanam redacta fuit, in reliqua Gallia demum poft feculum quartum, verfus finem tertii in Alfatia, octavo autem in Rhingovia.

Uvæ five fole aut clibano exficcatæ five recentes in ufum trahuntur, priores Passulæ dicuntur.

Passularum duplex genus tabernæ asservant, unum quod dicitur : Corinthen, Rosinlein, Raisins de Corinthe efformatur ab acinis varietatis Apyrenæ L. sunt illi exigui, ribessis minores, ex purpura nigricantes, saporis dulcissimi, cui levis aciditas accedit. Rejiciuntur aridæ, situm redolentes, & quæ ob mel ipsis adspersum humidæ sunt. Olim petebantur ex Corintho, ibi autem hodie non ulterius coluntur, noftra ætate in Maris Jonici infulis Ithaca, Cephalene & Zacyntho, nec non in Moreæ Natolico, Voftiza & Patris in Siciliæ infula Liparo quoque parantur, acinos fole & aëre exficcando, & propriis cellis, fuperne apertis, committendo, ubi fubfident & adeo fortiter cohærent, ut nonnifi inftrumentorum ope feparari poffint, ex his cellis doliis immittuntur, pedibus conculcantur & aqua marina confperguntur. Quotannis ultra centum millia centenariorum divendi tradunt.

Paffularum majorum, Zibebarum Arabum, Meertrauben, Zibeben duplex genus proftat, maximæ parvis prunis æquales, denominantur a Damafco five a Smyrna, Raifins de Damas, oblongæ funt, compreffæ, rugofæ, fulvæ, non raro fale faccharo fimili confperfæ, dulces, minus gratæ; ab his fapore magis grato & quod ventricofæ funt, differunt Raifins aux Rubis, quæ in Gallo-Provincia exficcantur, Calabrinæ his fimiles, racemis adhuc adhærentes & filo connexæ proftant; minores in, Gallo - Provincia exficcantur, ubi lixivio, quod oleum habet, immittuntur, fole coquuntur, in areis exficcantur.

Paffulas a vi faponacea & fopiente jam HIPPOCRA-TES laudat, alvum laxant, egregie demulcent, & hinc ad varium affectuum pectoris & renum genus cum fucceffu adhibentur; nutrientes quoque vires habent, notante HIPPOCRATE.

* Passula laxativa August. ad unciam unam & ultra affumuntur ab illis, quibus alvus stricta est.

Uvæ recentes immaturæ Verjus, fuccum habent dupazion & Vernacula Italica Agresta, acidum, multum adstringentem, qui ab HIPPOCRATE ad lippitudinem laudatur, hodie rarius scopo medicato usurpatur, juribus gratiæ ergo adjicitur.

* Syrupus de Agresta ÆGINETÆ cum alios Syrupos acidulos habeamus, eviluit: * Rob Uvarum Parif. * Unguentum de Uvis Brandeb. egregium ad herpetem & fiffuras labiorum remedium, quo magis omnino præftat Unguentum ad fiffuras labiorum Noftrat.

Uvæ recentes fructuum horæorum vires exfequuntur, ventriculo debili largius ingeftæ facile in eodem fermentant, pelliculæ earum difficillime a primis viis fubiguntur, notante jam GALENO, & KERCKRING obfervavit uvas per tres menfes integras in ventriculo fubftitiffe.

Vinacei adftringentes vires poffident, ab HIPPO-CRATE puerperis laudantur. Id quod ab uvis remanet, quando fuccus inde expressive fuit Vinacea, σέμφυλα, Mare, Draberen, Treberen adstringentes vires, & ob mustum, quod ipsi adhuc adhæret, roborantes quoque habet, five sub epithematis, five sub balnei forma adhibetur illis, qui five rheumaticis, five paralyticis affectibus laborant; egregias inde in fistendo sphacelo vires vidit Cl. PLENCK.

Succus ex uvis expressus 22000, Mustum, Moust, Most appellatur, fine pressione effluens medreowov, Lixivum, Mere-goutte, Vorlauf, id autem quod post primam pressure, ex incisis vinaceis obtinetur Circumcidaneum, Tortivum, Vin du pressure dicitur. Est autem Mustum liquor turbidus & dulcis, qui licet linguæ blandiatur, tamen bibendus non est, dum facillime inde noxæ a fermentatione in primis viis oriri possint, monente HIPPOCRATE, id quod observationibus confirmarunt PLATERUS, ZACUTUS LUSITA-NUS &C.

Mustum ad tertias partes decoctum «Inua, Defrutum, Weinmus, Vin cuit dicitur, Sapa autem olgaiov, «Ingov fi ad dimidium, Carenum denique fi ad duas tertias; nostrum mustum etiam ad quartas reducendum est pro parando inde Defruto. Mustum coctione spissies evadit, faporem acidulum, & colorem qui ad nigrum accedit, induit. Musto varia ratione inspissato olim tanquam medicamento faponaceo multum utebantur, illud etiam adhibebant ad condiendos cibos, ipsi hodie mel vel faccharum folemus fubstituere; Defrutum patrum nostrorum ætate in deliciis erat; Sapa, quam Parisini in officinas recipiunt, vulgo pro femine Sinapeos in embamma reducendo adhibetur.

Muftum justa fermentatione in Vinum vertitur, quod ex aqua, alcohole, mucilagine, refina & tartaro constat, ab alcohole generositatem habet, a reliquis principiis cæteras, quibus pollet, qualitates; innumera cum prostent vitis genera, varia tellus & varium cœlum quoque uvas diversifismis rationibus alant & coquant, hinc diversifisma quoque Vina obtinent, ea pro nostro scopo non incommode ratione coloris & faporis distinguuntur in talia, quæ propria dulcedine faccharina linguam feriunt, & in talia, quæ hac dulcedine carent; in alba porro & rubra; in albis semper evidens acidum eminere, refutatur a Vinis albis Burgundiæ, Aquitaniæ & Burdigalensibus rubris autem omnino femper aliquid adstringentis inest.

Vina dulcia illa funt, quæ ex regionibus orientalibus & Europa meridionali, orientali & occidentali ad nos adducuntur; hæc vina enim cum ob cœli calorem facile in fermentationem acetofam tranfeant, five aliquid careni illis adjiciunt, more apud Romanos ufitato, five eadem aliqua aquæ portione, vel parum coquendo vel calcis vivæ ope, privant, five nonnifi uvas paffas exprimunt & ita Veterum Vinum paffum parant; tale in Alfatia fuperiore conficitur, quod a ftramine denominant, & quod nec optimo Canarienfi fuavitate cedit. Hæc vina multum generofa funt, hinc Gallis Vins de Liqueurs, Italis autem Vini Secchi dicuntur, cum plura eorum ex uvis paffis parentur.

Hujus generis vinorum generostas non a largiore

alcoholis ratione pendet, cum post PORZIUM per experimenta NEUMANNI pateat, illa ejus nonnisi modicam vehere portionem, sed potius a majori partium resinosarum, qua scatent quantitate, quippe quæ fibras evidentius stimulant, deducenda esse videtur, id quod experimenta ejusdem auctoris, sicca horum vinorum viscositas, saturatus magis præ aliis color & eminentior vis corpora ipsis commissa contra corruptionem defendendi, evincere videntur.

Vina etiam fecundum patriam diftinguere folent, circa quod argumentum BOECLER, BEHR & NEU-MANN mire copiofi funt; cum autem innumeris fraudibus, hac diftinctione admiffa, locus concedatur, idem etiam terræ tractus diverfiffimæ indolis vinum largiatur, hinc melius ex qualitatibus, quas in vino deprehendimus, quam fecundum patriam, quæ ipfi non raro affingitur, ejus præftantiam dijudicamus.

Lora, Surgias die, Piquette, Leger, furgit ex aqua vinaceis affusa & in fermentationem acta, tanquam tenue valde vinum dijudicanda.

Plurium vinorum analyfes NEUMANN habet, nimis prolixas, quam quæ hic adduci poffent.

Neocomenfe $\frac{1}{6}$ alcoholis vehere *Prince* vidit; HOFF-MANN eandem vinum Rhenanum proportionem fervare expertus eft, in Franconico $\frac{1}{9}$ alcoholis, in Hungarico $\frac{2}{7}$, in Burgundico $\frac{2}{9}$ invenit.

Vinum partes, quibus conftat, fi refpicimus, alios atque alios edit effectus; hinc HIPPOCRATES jamjam pro variis cafibus varia vini genera commendat; ab aqua, ejus vires diluentes & fitim fedantes pendent; ob gummofas partes demulcet & nutrit, obfervante GALENO; alcohol caput petit, exhilarat, ebrietatem caufatur, motum humorum accelerat, fudorem promovet, hinc ad febres malignas a LENTILIO, RIE D-LINO commendatur, & ubi ægroti refocillandi funt, ommbus analepticis omnino præferendum eft, fed ob eandem caufam, & cum evidenter fanguinem & ferum cogat, ego nollem in febribus inflammatoriis, continuis & intermittentibus illud concedere, licet ab HIP-POCRATE, GALENO, CÆLIO AURELIANO, BORELLO, HELMONTIO &c. multum commendatum; refinofæ, quibus fcatet, partes & multum ad odoris & faporis fuavitatem faciunt, & roborantes æque ac exæftuantes ejus vires augen⁺, tartaro debet diureticas vires ab HIPPOCRATE & GALENO celebratas, a RIEDLINO confirmatas, nec non quod fcorbuto medeatur obfervante SACHSIO. Idem fragrantia, qua pollet, ad fubitaneam refectionem multum facere, omnis ætatis experientia docet.

Vina dulcia præ reliquis in ufum trahuntur, cum vires multum augere animus eft; rubra roborandi & adftringendi ergo reliquis præferuntur; alba præ cæteris evidentius fitim fedant, & urinam movent, minus caput petunt. Illa vina, in quibus fermentatio fupprefla fuit, & quæ eam, cum aër ad ipfa accedit, denuo fufcipiendo multam fpumam faciunt *Vins mouffeux*, tam quia partes mucilaginofas non debita ratione attenuatas habent, quam quia non poffunt non in primis viis fermentationem violentam continuare, ab iis, qui fanitati fuæ confulere ftudent, nunquam haurienda funt.

Vini cura, quam HOFFMANN commendat, ubi homines per aliquot feptimanas nullo alio potu quam vino uti jubentur, vix nifi apud valde phlegmaticos videtur locum poffe habere.

Infantibus licet vinum HIPPOCRATES commendet, & RIEDLINUS exempla proferat infantum, quibus matres mammas præbere non potuerunt, folo vino aqua temperato fustentatorum, ego tamen ætati teneræ, fumme irritabili, potum qui caput petit, fibras denfat & stimulat, humorum impetum intendit, commendare nunquam auderem; illi quoque qui vinum, lac

102

fenum effe reputant, meminerint quæfo, ejus ufu rigiditatem folidorum, unde præcipue fenectutis incommoda pendent, non poffe non augeri.

Id præterea circa ufum vini adducendum effe duco, mucilaginem ejus, quando per fermentationem non fufficienter fuit attenuata ad renes ferri & calculi ortui occafionem dare, id quod vulgo peffime a tartaro, five calce, quæ nunquam in vino obtinere poteft, derivare folent.

Sed externe quoque vinum conducit, adhibetur fotus vel balnei forma ad partes roborandas, nec non ad fluida loco errantia difcutienda, eodem butyro five oleis unguinofis juncto ad ulcera abstergenda & ad cutis fquammas auferendas utuntur; vinum rubrum præcipue pro roborandis partibus in tenefmo, prolapfu &c. adhibent.

Acetum fimplex, Acetum destillatum, Spiritus Vini, rectificatus, tartarifatus, Tartarus, Cremor Tartari, Sal Tartari, Tinctura Tartari, Terra foliata Tartari, Tartarus Chalybeatus, Tartarus Emeticus, Tartarus tartarifatus, Spiritus & Oleum empyremat. Tartari, Sal Polychrestus de Seignette, Sal Tartari, Oleum Tartari per deliquium; de singulis in Instit. Chemiæ egi. * Syrupus Acetofus MESUE multum hodie in Gallia ad Julapia recipitur: Tinctura Tartari acris Wurtemb. vix videtur a Tinctura Tartari vulgari differre : Liquor terre foliate Tartari per deliguium limpidus eft folutio terræ foliatæ in quadruplo aquæ fecundum Nostrates, in triplo vero ad normam Wurtembergenfium: * Sal Tartari volatile Wurtemb. * Sal Tartari volatile TACHENII: * Specificum Tartari pharyngicum ZOBEL abfurda compositio.

UVE CRISPE, GESNER, Groseilles à maquereau, Kriselbeeren. Sunt baccæ ex rotundis ovatæ, umbilico eminente notatæ, per maturitatem sive flavæ sive rubræ, striatæ, multum dulces. Ribes Uva crispa L. habitu spinoso & fructu glabro distinguitur; crescit per omnem Europam; in hortis culta, fructus majores sistit. Fructus immaturi loco uvarum immaturarum ad condiendos cibos recipiuntur; maturi cum cerasis dulcibus, vires quod attinet, conveniunt.

2. ADSTRINGENTES.

CORNI, ngávua, ngávua, Cornouilles, Cornes, Cornel, welsche Kirschen. Sunt fructus umbilicati, qui olivarum figuram & cerasforum magnitudinem habent, vel cerei vel fanguinei, sub cuticula tenui includunt carnem dulcem, cui aliquid adstringentis accedit & in qua officulum hæret, quod fructui parum magnitudine cedit, durissimum, duos nucleos exiguos condens.

CORNUS. Corollam habet tetrapetalam regularem, calice quadrifido fuftentatam, ifantheram, monogynam & pomum umbilicatum dipyrenum. Mas L. BLACWELL 121 involucro umbellas æquante diftinguitur.

Habitat in Europa temperata, non ultra Saxoniam afcendit.

Proxime ratione virium ad pyra minus adstringentia accedunt, minus bene a GALENO adstringentibus fortioribus adscripti.

* Aqua destill. Parif. iners omnino: * Rob VAL. CORD. demulcendi & refrigerandi ergo laudatur.

CYDONIA, Cotonea, rodóvia, rodúpada, Coings, Quitten. Sunt poma variæ magnitudinis; turbinata, mox plus mox minus rotunda, plus turbinata a Pyris, rotundiora a Malis denominantur, umbilicata, ad umbilicum angulis eminentibus notata, cute aurea inftructa, quam denfior lanugo tegit; caro firma eft, flavicans, multum adftringens & acida, proprio odore prædita, quinque loculis offeis inftructa, in quibus Semina hærent oblonga, muco obducta, quæ fub cortice spadiceo medullam albam vehunt, & cum aqua confistentiam mucilaginis induunt.

Pyrus Cydonia L. BLACWELL 137 foliis integerrimis diftinguitur. Ex Creta in Italiam advecta hodie per omnem Europam colitur, multis etiam in regionibus spontanea occurrit.

Una feminum pars viginti quatuor aquæ partes vifcidas reddit, eadem dimidium fui ponderis de mucilagine vehunt.

Fructus nimis acerbus, recens per fe non poteft comedi; in taleolos fectus & exficcatus multum de fapore acerbo deponit, evidentes vires adftringentes habet, notante jam HIPPOCRATE, & ideo tam menfis fecundis imponitur, quam ægrotis exhibetur, varia ratione præparatus. Eorum decoctum ad procidentias commendat GALENUS, analeptico quoque fcopo ob fragrantiam laudantur. Semina primi Arabes in ufum traxerunt; mucilago inde parata demulcendi & relaxandi fcopo apprime infervit, cum fructu ad morbos faucium, & cum acre in ventriculo hæret, exhibetur; extus ad ambufta, fiffuras, ophthalmiam ufurpatur.

Conditum Græcis & Romanis jam ulitatum, hodie adhuc mensis apponitur: * Panis Recentiorum, Diacydonium VAL. CORD. Mullow Aurenta Iberiæ edulium GALENI, vel hodie adhuc tam fimplex quam aromatifatum prostat: Syrupus Arabum ideopmlor PAULI, ab hoc parum differt Rob Wurtemberg. Parisini Rob simplex habent: * Miva Arabum exfolevit: Vinum SCHROEDERI ad illud DIOSCORIDIS accedit, ab illo Veterum, quod per fermentationem parabatur, diversum est: * Spiritus per fermentationem Wurtemb. rarissime usurgatur: * Diacydonium, Cotignac, Quitten - Lattwerg, Simplex Augustanorum, Marmelata SCHROED. Aromatisatum GALENI: * Diacydonium laxativum pellucidum ZwOELFERI, Nostrates

Gs

hoc modo parant ut $\frac{1}{20}$ circiter refinæ Jalappæ vehat, vix non in totum eviluit, crebrius ufurpatur *Diacydonium Jalappinum* VILLANOVANI, quod ope menftrui aquofi in hauftum reducitur & $\frac{1}{16}$ refinæ Jalappæ continet, fecurum fatis medicamentum, fi rite fuerit paratum: *Oleum Cydoniorum* DIOSCORID. leniter adftringit, id quod MESUE habet cum Omphacium receperit, validius erat.

* MESPILI, Méranda, Nefles, Mespeln. Sunt fructus turbinati, qui ad magnitudinem minorum malorum accedunt, umbilico cavo coronati, rubiginofi, villo conspersi, qui ab arbore decerpti, elapso demum aliquo tempore mollescunt, & saporem gratum, vinosum, cum evidenti adstrictione, induunt, clibano exsiccati, quales in officinis prostant, fusci funt, evidenter adstringentes.

MESPILUS. Corolla pentapetala regulari, calice quinquefido fustentata, polyanthera, pentagyna, bacca coronata, umbilicata, pentapyrena gaudet: Germanica L. BLACWELL 154 foliis lanceolatis integerrimis distinguitur.

Crefcit in Europa temperata, ultra circulum Rhenanum in Germania non occurrit.

Crudi comeduntur, minus quam Cydonia adftringentes, fed rarius in menfas ditiorum affumuntur. A virtute adstringente jam HIPPOCRATI laudati fuerunt, alvi fluxus inde sopitos vidit FORESTUS.

* Aqua Parif. iners.

MYRTILLI Barb. Vitis Idea fructus GESNER Airelles, Heidelbeeren. Sunt fructus globofi, umbilico notati, cæruleo - nigricantes, labia inquinantes, ex ftyptico dulces.

VACCINIUM. Corolla quadrifida vel quinquefida calice fimili fuftentata, diplofanthera, monogyna, bacca globofa gaudet. Myrtillus L. BLACWELL 463 folia habet ovata, glabra, ferrata.

-1

Crefcit in omni Europa.

Præter vires omnibus fructibus horæis communes, etiam adftringentes edunt, eorundem ufum in cachexia fcorbutica vidit BSCHERER.

* Syrupus Brandeburg. raro in usum trahitur.

OLIVE, Olea, inaïar, Olives, Oliven. Sunt fructus fubovati, variæ magnitudinis, maximi ex Hıfpania adducuntur, carnofi, virides, per maturitatem albefcentes, demum nigricantes, fapore adstringente, plus minus amaro gaudent & includunt officulum oblongum, & duriffimum, in quo nucleus parvus & dulcis hæret.

OLEA. Corollam regularem quadrifidam, fimili calice fustentatam habet, oligantheram, monogynam, fructus drupa est bilocularis. *Europæa* L. BLACWELL 199 & 213 foliis lanceolatis distinguitur.

In Europa meridionali & Afia orientali fponte crefcit & copiofiffimæ ejus varietates coluntur, pro quibus & fructus & oleum inde obtinendum differunt.

Fructus versus initium mensis Octobris colliguntur, nondum maturi, lixivii cinerum ope, privantur amaro, qui ipsis proprius est, fapore, tunc collocantur cum aromatibus per strata, & aqua ipsis affunditur, hac ratione conditi eduntur & embammatibus adjiciuntur, άλμάδες, κολυμεάδες Græcis dicti.

Vires roborantes edere Olivæ creduntur, & appetitum excitare, notante jam GALENO. Pro bono oleo unguinofo inde acquirendo nec immaturæ, nec tales quæ juftum maturitatis terminum excefferunt, debent recipi; illæ oleum amarum & quod difficulter clarum fit; hæ tale quod acrius, rancidum & nimis pingue eft, largiuntur; Novembri menfe ut plurimum juftum maturitatis terminum folent affequi, mox poftquam decerptæ fuerunt torculari committendæ funt, nam fermentatio fi conceditur, copiofius quidem, fed quod minus bonum eft, folent largiri oleum; id quod primum defluit; Virgineum dici folet, & præftantiffimum eft; vilioris autem conditionis id habetur quod obtinent, dum Olivis jam expreffis aqua adjicitur & denuo torcular adigitur. Limpiditas & faporis & odoris abfentia, de olei bonitate teftantur, his adde ut non nimis unctuofum fit, quale Hifpanicum effe folet.

Oleum vires oleorum unguinoforum exfequitur, apud gentes meridionales loco butyri ad cibos recipitur, fcopo medicato non male oleo amygdalarum fubstitui folet, ejus vires contra venena quæ animalium ictus vulneri instillat, observationibus evincere annituntur Philosophical Transactions, VATER POUTEAU, fed has dubias reddunt experimenta -2 GEOFFROI & HUNAULD coram Academia Parifina instituta, nec non observationes BROGIANI & Illustris LINNÆI. OLIVER, præcuntibus GALENO & DIOSCO-RIDE, hujus olei abdomini illiti ope, hydropem tolli affeverat, & Cl. MEDICUS observationibus confirmare fatagit. Hoc oleum vix non omnia Emplastra, Unguenta, Linimenta, Olea infusa & cocta officinalia ingreditur; creberrime quoque clysteribus adjicitur, cum autem ad hæc medicamenta ut plurimum viliusoleum, aut quod per ipfam præparationem corrumpitur, soleat recipi, hinc illa potius ab abstergente quam a demulcente & relaxante virtute funt commendanda.

Sapo vid. Institut. Chem.

* Pilulæ Saponaceæ Parif. funt fapo in formam pilularem redactus : * Oleum Saponis JUNGKEN vires oleorum empyreumaticorum exfequitur : * Oleum Philosophorum vid. Instit. Chem.

PYRI, and, Poires, Birnen, Bieren. Sunt fructus turbinati variæ magnitudinis & varii coloris, fapor eorum varium adítrictionis gradum habet, eidem creberrime aliquid aromatici aut vinofi jungitur, femina in eis hærentia proxime ad malorum femina accedunt; eorum quidam cito a maturitate in corruptionem ruunt, quidam demum postquam per septimanas, imo menses collecti fuerunt, omnem gratiam acquirunt; quidam acerbum saporem nunquam deponunt, & nonnisi aqua cocti & faccharo edulcorati in usu sunt.

Pyrus Communis L. pomis basi productis agnofcitur; ejus innumeræ varietates in hortis coluntur; fructus speciei fylvestris $a_{\chi_{\xi}\alpha J_{\xi\xi}}$, Holzbieren nunquam, ob acerbum nimis saporem, in cibum recipiuntur, pauperiores rustici ex iis Pyraceum parant.

Pyra cum malis dulcibus ratione virium conveniunt, primæ viæ inde minus laxantur, HIPPO-CRATES alvum ducere afferit.

SORBA, 32, Cornes, Sorbes, Speyerlinge, Afchenröslein. Sunt fructus rotundi, umbilicati, parvorum pyrorum magnitudinem habent, uno latere pallidi, altero rubri, pulpam includunt flavam, adítringente & leviter vinofo-fapore inftructam; aliquo demum, poftquam ab arbore decerpti fuerunt tempore, edules fiunt.

Sorbus. Corollam habet pentapetalam, regularem, calice quinquefido fustentatam, polyandram, trigynam, pomum tripyreneum. Domestica L. BLAC-WELL 174 foliis pinnatis & fubtus villosis distinguitur.

In iifdem cum Mespilo locis crescit.

Sorba alvum fiftere HIPPOCRATES monuit, mefpilis autem minus adstringere GALENUS. BRUYERI-NUS eorum ope dyfenteriam curavit, apud nos infantum & plebis deliciæ, ad usus medicatos nunquam recipiuntur.

J. AMARI.

AURANTIA AMARA. Immatura folent Curasfavica dici. Conveniunt aurantia amara, ratione fragrantiæ,

cum dulcibus, ad intinctus recipiuntur, & vel integra vel eorum cortex ad ufus medicatos, nimirum ad roborandas primas vias & referandas obstructiones vifcerum abdominalium, adhibentur. Pomis his, ex vino albo coctis, futorem quendam quartanam pertinacem curaffe, RIVERIUS refert. Corticibus, quos Flavedinem dicunt, rejecta, qua intus obducuntur, fubstantia albescente, fungosa, tanquam inutili, & tunc Seplafiariis Cortices Curaffavienfes dictis Medici maxime utuntur; eosdem multum ad flatus discutiendos commendat HOFFMANN, ob vires aperientes fluxum menstruum & hæmorrhoidalem inde moderari vidit WERLHOFF, & hydropicos curatos HEISTER, eorum evidentes in curandis febribus intermittentibus effectus observationibus adstruunt LANZONIUS, NIGRISO-LIUS, WERLHOFF, MOEHRING, HEISTER.

Aqua SCHROED. efficax omnino; * Aqua vinofa Wurtemberg. * Spiritus abstractitius Parif. * Ille Wurtembergenfium est claretum gratum & stomachicum : Syrupus ZWOELFFER, ipfi oleum effentiale Parisienses adjiciunt; iidem cum nostratibus cortices cum aqua infundere jubent; Wurtembergenses, præ fcripto Zwoelfferi inhærentes, vinum recipiendo, eum & gratiorem & fuaviorem parant: Conditum ficcum ex Italia adducitur: liquidum VAL. CORD. ad Electuaria recipitur : Effentia ex Corticibus ficcis Augustan. ex corticibus recentibus Hamburg. parata omnino præferenda: * Eandem quoque cum Vino Malvatico Wurtembergenses parant: Elixir balsamicum stomachicum temperatum HOFFMANNI egregium ad roborandas primas vias medicamentum: circa * Oleum esfentiale ea, quæ circa Oleum Citri monui, retinenda: * Eleofaccharum Augustanis Esfentia Corticum Aurantiorum dicitur.

CONSCRETZAGE SPRANET

NUTRIENTIA.

§. 17.

IV. NUCES.

Nuces, ragra, funt substantia, que involucro plus minus duro, fubftantiam ficcam tegunt, oleo unguinofo fætam, quæ mugn, Nucleus, Noyau, Kern folet dici. Dum nuclei & oleo unguinofo gaudent & etiam mucilaginem habent, quæ efficit, ut illud ab humoribus nostris possit recipi, hinc evidens eft, quod multum ad nutritionem faciant, cruorem enim & pinguedinem ab oleo præcipue constitui, alibi evincitur; cum autem mite modo oleum in noftrum nutrimentum poffit verti, hinc de illis folum Nucibus hic verba faciam, quæ dulci, quem linguæ imprimunt, fapore de miti olei, quod vehunt, natura testantur. Sed medicatos quoque effectus Nuces edunt, ratione olei enim, quo scatent, acria obtundunt, & hinc Demulcentibus adscribuntur, stricturas quoque relaxant & ob utramque hanc virtutem annumerantur Rcfrigerantibus, sopientes præterea effectus edunt; cum autem inde primæ viæ debilitentur, eædem infuper diutius in primis viis fubfistentes facile corrumpantur. hinc five nimia quantitate ingefta, five ab hominibus, quibus ventriculus debilis eft, affumtæ, viscera digestionis debilitant, acrimoniam etiam oleofam caufantur. Ea denique, quæ in Inst. Chem. circa tostionem monui, evincunt, quod inde Nuces quidem fapidiores reddantur, fed cum evidenti virium medicatarum & nutrientium dispendio.

AMYGDALÆ, Nuces Graca, auío Sada, Sásia, Amandes, Mandlen. Sunt nuclei oblongi, mox ventricofi, mox compressi, variæ magnitudinis, sive dulces, sive amari, albi, cuticula tenui, rusescente vestiti.

Amygdalas longas Jordanicas, latas Hispanicas, parvas Barbaricas quidam folent appellare: graciles,

NUTRIENTIA.

quarum medulla flavescit, diffractæ, rugosæ rejiciuntur.

Amygdalus Communis L. BLACWELL 105 fructu exfucco dignofcitur.

Arbor Syriæ & Arabiæ indigena, CATONIS ævo ex Græcia in Italiam allata, in Europa occidentali & meridionali copiofiffime colitur, apud nos quoque & in Palatinatu viret. Flores fub initium Aprilis apparent, autumno fructus maturat.

Amygdalæ dulces fui ponderis dimidium Olei fundunt, quod leviffime flavicat & amygdalas redolet; furfures ab expreffione reliqui femper aliquid olei retinent, hinc cum aqua lactefcunt, & vires faponaceas edunt. Amaræ fui ponderis quartam partem olei largiuntur, antecedenti fimillimi, amarities in mucilagine & partibus terreftribus hæret, ab aqua & fpiritu vini recipitur & ab iifdem fupra alembicum ducitur. LEWIS. Aqua ab amygdalis deftillata proprium odorem, quem a nucibus denominant, habet.

Nutrientes, demulcentes & relaxantes vires amygdalis ineffe HIPPOCRATES jam monuit, pro his fcopis five in emulfiones redactæ, five varia ratione cum faccharo mixtæ, ad fopiendam tuffim, mitigandos dolores inteftinorum & viarum urinariarum, nec non fanguinis qualefcunque fluxus adhibentur; nutricibus dantur, ut ipfis lac augeatur; refrigerandi quoque fcopo in multo febrium genere ufurpantur: externe ad excoriationes, fiffuras, ambuftiones præfcribuntur,

Amygdalæ amaræ, cum evidentem acrimoniam habeant, brutis omnino lethalem, obfervantibus Ephemeridibus Naturæ Curioforum, WEPFERO &c. hinc refolvendi fine, præeunte GALENO, laudantur, roborandi appetitus ergo, ad mucum renum folvendum SOLENANDRO & UNZERO monentibus, nec non fcopo anthelmintico adhibentur, earum vis ebrietatem tatem arcendi, a DIOSCORIDE celebrata, jam diu eviluit : ad præcavendam hydrophobiam facere Cl. THE-BESIUS eft expertus. Externe ad delendas cutis maculas, & ut ipfi nitorem concilient, ufurpantur, quo fcopo eafdem in paftam tundunt, illis varia adhuc cofmetica nec non fuaveolentia adjiciunt; diverfæ tales compositiones fub nomine *Pâtes d'Amandes* proftant.

Oleum Amygdalarum dulcium MESUE cum gratia reliqua olea unguinofa vincat, hinc præ reliquis intus exhibetur. * Oleum Amygdalarum amararum DIOSCORID. ratione virium a priori non differt. * Ceratum Amygdal. Parif. non male Refrigeranti GA-LENI fubftituitur.

AVELLANE, Nuces Pontice, Pranestina, raqua inganlewrina, Noisettes, Haselnüsse. Sunt Nuces calice viridi complexæ, qui si nuce minor est Calva Veteribus audiebat, sive rotundæ, sive oblongæ, majores, minores, sub cortice lignoso, fragili, umbilico notato, includunt nucleum album, pellicula sive alba, sive rubra tectum, suavi & proprio odore instructum.

CORTLUS. Arbor relativa monophyta, amentacea. Mares inter fingulas fquammas ad 8 ufque antheras habent; feminæ folitariæ, ftylis duobus gaudent: Avellana L. BLACWELL 293 ftipulis ovatis & obtufis diftinguitur.

Crefcit per omnem Europam.

Primo vere flores prodeunt, sub finem æstatis fructus maturescunt.

Varietatis propriæ fructus, quæ præcipue in Avellino Regni Neapolitani Ducatu colitur, fub nomine *Kömische Haselnüsse* in nostris tabernis per omnem annum prostant.

Avellanæ fui ponderis dimidium olei unguinofi fundunt, amygdalino, præter odorem, fimillimi.

Est his nucibus evidens quædam adstrictio, hinc præferuntur amygdalis ubi roborandi scopus obtinet, ad alimentarios potius quam ad medicatos usus adhibentur.

Ligni S Visci Corylini usus eviluit, nec non Olei empyreumatici, quod sub Heracleotici nomine olim celebrabant.

* Oleum Avellanarum MESUE maxime ad augendum capillorum incrementum laudatur.

CACAO NUCES fubrotundæ funt, interdum oblongæ, includunt fub putamine rufefcente fragili, duriufculo, medullam ficcam, oleofam, in plures partes inæquales divifam, extus fulvam, intus fufcam, fapore proprio grato, leniter acerbo, leviffime amaro inftructam, & odore proprio levi præditam.

Quadruplex harum genus in tabernis folet proftare. Caraccas a Nicaragua, Regni Mexicani regione, denominatæ, reliquis majores funt, earum cuticula externa miculis albis ut plurimum videtur confpería effe, nucleus fpadiceus & evidenter oleo turgens; Barbiches priores magnitudine fequuntur, pellicula ex rufo fuíca, medulla profundius quam antecedens tincta, minus olei vehit, ex Antillis majoribus afferuntur; Infularum reliquis minores & magis aridæ a Caribæis nobis mittuntur; Brafilienfes reliquis longiores funt & magis rufæ.

THEOBROMA. Corollam quinquefidam, calice quinquefido fuftentatam, nectariis inftructam, ifantheram, monogynam, fructum oblongum, multas nuces continentem habet: Cacao L. BLACWELL 373 foliis integerrimis gaudet.

Præter regiones jam dictas ad fluvium Amazonum quoque crefcit, ab Hifpanis in Infulas Philippinas etiam transplantata, per omnem annum fructus gerit; nuces ex fructibus exemtæ, in acervos colliguntur, ut incalefcant & inde fapore acerbo & amaro priventur.

Nuces Cacao feculo fexto & decimo, imo fuperio-

114

ris medio adhuc parum frequentes in Europa fuiffe ex CLUSIO & SCHROEDERO patet; fui ponderis tertiam circiter partem Olei albiffimi, quod in nostro climate confistentiam spissam habet, & hinc Butyrum dicitur, fundunt. $\frac{1}{8}$ Extracti resinosi amari & acerbi exhibent. CARTHEUSER.

Hæ nuces ob oleum unguinofum, quo fcatent, vires nutrientes omnino edunt, cum autem idem fpiffum fit & hinc difficilius digeri queat, ideo vix nudæ in ufum trahi folent, fi autem torrentur, faccharo præterea & aromatibus condiuntur, quo fit ut facilius viribus coctionis cedant, & humoribus noftris commisceri queant, tunc demum corpus nostrum inde infigniter nutritur, hinc jam Hifpani, cum primum Regnum Mexicanum adierint, viderunt quod Americani istas tostas & cum aromatibus mixtas fub Chocolatæ nomine receperint; Chocolata ante medium superioris seculi in Europa in usu esse & parari cœpit, priores illam parandi rationes fuerunt admodum prolixæ, hodie fimplicior & melior componitur, parum refert, ex qua urbe petatur, dummodo rite fuerit confecta; illam quæ aromatibus & Vaniglia caret a Sanitate folent denominare, quam ego faltem cum Chocolata medicamentum roborans effe debeat, alteri nequaquam vellem præferre. Tanquam infigne nutriens fenibus & debilibus exhibetur, phtificum inde curatum MUNDIUS vidit, aphrodifiaco quoque fcopo laudatur. Ejus uncia cum aqua aut lacte pro dofi datur. Recipitur quoque ad Electuaria, Morfulos &c.

Butyrum quod, refragante omnino experientia, nunquam rancorem recipere dicitur, tam ad internos quam ad externos ufus spermati ceti substituitur, imo cum eodem majorem gratiam habeat, etiam præfertur.

CAFFEA, Cofea, dicuntur Semina variæ magnitudinis, ovata, convexo plana, quorum facies plana fulco longitudinali notata eft, odore pauco, fapore leniter auftero, colore flavicante gaudent, sub cortice ficco medullam ficcam includunt.

Hæc femina pro varia patria, unde advehuntur, varia ratione differunt: illa quæ ex Arabiæ Yemen adducuntur, ab Oriente denominantur *du Levant*, parva funt, pallide flava, cum veftigio viroris, reliqua gratia vincunt; his proxime accedunt, quæ Mocca nobis largitur, prioribus magis flava; Semina ex America in Syriam vehi & ibi cum Orientalibus mifceri præter POCOCKE plures autoptæ teftantur. Ea fequuntur in Infula Bourbon collecta, propius ad albedinem accedentia; Java grana majora & quæ evidentius flava funt, nobis mittit, his etiam majora funt Surinamenfia, quibus præferri folent minora, quæ Martinica fubminiftrat.

COFFEA. Corollam quinquefidam regularem habet, calice quadrifido fuftentatam, ifantheram, digynam, fructum baccam: Arabica L. BLACWELL 337 bacca dipyrena gaudet.

Arabiæ indigena arbor, de cujus fructu primum Schehabeddin Ben Abdalgiafar Almaleki feculo XV fcripfiffe HALLER monet; in Infulis Americanis circa annum 1715, in Afiaticis & in Infula Bourbon anno 1719, in Martinica anno 1720, in Java anno 1723, coli cœpit, illam anno 1680 RAUPES Divioni fuo horto intulit, anno 1710 in horto Amftelodamenfi ex feminibus furrexit, hodie non infrequenter in caldariis curioforum occurrit. Ubi fub libero cœlo crefcit per omnem annum fructibus maturis abundat, largiffimas meffes Majo menfe fundit, baccæ ab arbore decerptæ fole exficcantur & cylindris ligneis agitantur, ut femina dimittant.

MAPPUS destillatione spiritus $\frac{3}{76}$, olei $\frac{1}{16}$, DU FOUR olei $\frac{1}{6}$ fere, BOURDELIN spiritus $\frac{1}{2}$ fere, olei $\frac{1}{6}$ fere, GEOFFROI spiritus $\frac{3}{8}$ fere, olei ultra $\frac{1}{5}$ NEUMANN spiritus $\frac{3}{8}$ fere, olei ultra $\frac{1}{3}$ Clar. Rose spiritus $\frac{7}{16}$, olei $\frac{1}{7}$ fere inde obtinuerunt. Ex fabis toftis NEUMANN Extracti aquofi fuavis dimidiam earum partem & quartam Extracti fpirituofi extraxit, Clar. Rose de Extracto aquofo eandem quantitatem ac NEU-MANN accepit, Extracti autem fpirituofi $\frac{1}{3}$ fere. Aqua & fpiritus vini, fi a fabis toftis abstrahuntur, earum odore & fapore imbuta destillant.

Infuíum horum feminum verfus finem feculi XVI in frequentifimo ufu apud gentes Orientales fuit, ipfa femina anno 1657 primum Maffiliam & anno 1669 Parifios fuerunt advecta; ex illo tempore immenfa quotannis quantitas in Europam adducitur. Du Four testatur eorum ultra 120000 Centenaria quotannis ex Arabia divendi; anno 1723, 19061 Centenaria Amstelodamum fuisse advecta memorant Bresslauer Versuche & ex Martinica anno 1756, 180000 Centenaria Europam missa fuisse refert Cel. JACQUIN.

Fabæ Caffe antequam in usum trahuntur, torrentur, unde & fapidæ & odoræ redduntur, ita ut multum earum gratia a justo tostionis modo pendeat, sed inde quoque earum oleum attenuatur & disponitur, ut & aquam possit subire & ventriculum irritare & ad humores nostros pervenire.

Infuíum cum amarum fit & evidenter linguam ftimulet, ideo rectifiime medicamentis, quæ digeftionem promovent & obstructionibus viscerum medentur adscribitur (§. VII.) hoc scopo etiam, teste AL-PINO, apud Orientales laudatur & ejus ad cephalalgiam sympathicam utilitatem a BONETO, BAGLIVIO, STAHL, DU FOUR, LENTILIO, NEBEL, Cl. RITTER &c. observatam accepimus, evidens porro fit, quod prudenti consilio post prandium hauriatur, ex hac ejus virtute vitia digestionis corrigendi patet, cur febres & diarrhœas inde curatas inde viderit DU FOUR & vertiginem DE MURALTO. Sed idem infusum etiam pro indole olei empyreumatici, quo scatet, folida ftimulando & humores attenuando agit, quem ulti-

H 3

mum effectum quoque, dum fanguini e vena fluenti affunditur, quotidiano experimento poffumus videre, denuo itaque, quod ad referandas obstructiones egregie faciat, patet, hinc ALPINUS & DU FOUR catamenia inde referata viderunt, ultimus quoque podagram curatam & afthma pituitofum fopitum. Hoc autem infuium, quia penetrante suo odore evidenter quoque in nervos agit, hinc fomnum arcere & tremores interdum excitare obfervatur, fed id quod abufui aut idiofyncrafiæ debetur, nihil contra virtutes optimi potulenti probat. HOFFMANNI hypothesis, quod Caffeæ usus ortui exanthematis miliaris caufam præbuerit, vel ex inde refutatur, quod probante Cl. ALLION hoc exanthema obtinuerit, antequam illa in usum tracta fuerit, & quod apud plures gentes hoc demum feculo exanthema fuerit observatum. Vapore decocti Caffe grandinem curatum vidit ZWINGER, & eodem fub forma clyfmatis injecto apoplexiam fanatam MALLEBRANCHE. Optime fabarum toftarum & in pulverem comminutarum uncia una cum unciis fex aquæ femel modo ebullire permittitur.

Varia femina oleofa, dum torrentur, dant infufum, quod ad illud fabarum Caffe accedit, fed omnia quæ hactenus tentata fuerunt, ipfi omnino gratia multum cedunt.

CASTANEA, Báhav, Châtaigne, Caftanie, Kefte. Eft Nux ventricofa, ex ovato triangularis, umbilico notata, uno latere convexa, altero plana, inferne in exiguum mucronem producitur, fub cortice coriaceo, tenaci, badio, interne multum tomentofo includit nucleum album, folidum, proprio fuavi odore & fapore dulci inftructum, cuticula ftriata & fulva tectum.

FAGUS. Planta relativa monophyta, marium amentum corollas quadri, quinque ad fex fidas, octantheras continet, feminarum corollæ quadri, imo fex fidæ, trigynæ, amento oblongo inclusæ, capfula spinosa polypyrena est: Castanea L. BLACWELL 330 Amentis maribus prælongis & foliis nudis dignofcitur, inoculatione in fativam mutatur, cujus fructus Marons dicti, fylvestres & volumine & gratia superant.

Crefcit in Europa minus frigida, non alte in Germaniam afcendit; fativa in Gallia Meridionali & Italia colitur.

Ex duabus Castanearum libris torcularis ope nullum oleum, fed fuccum, qui in fermentationem vinofam ruit, obtinui.

Caftaneas efficaciter nutrire GALENUS monet, eafdem Græcos olim pro pane comediffe X E N O P H O N teftis eft, hodie etiam vulgarem monticularum in Gallia Meridionali & Italia cibum conftituunt; elixando vel torrendo digeftu faciliores redduntur; minus bene nuces difficilius a ventriculo fubigendæ cum butyro menfis fecundis apponuntur.

* Coccos NUCES quæ fructus τε φοίνια@ ἐλάτης, videntur effe, prægrandes funt, irregulariter rotundæ, fuscæ vel nigræ, inferne uno foramine & duabus foveolis femilunatis notatæ, sub cortice duro, præter liquorem dulcissimum, medullam albam, duram, dulcem, fapidam includunt.

Coccos L. Palma relativa, monophyta, fpatha univalvi & fpadice ramofo gerens corollas tripetalas fimili calice exceptas, in maribus diplofantheras, in feminis autem monogynas, drupa gaudet coriacea, fibrofa, obfolete trigona, nucem includente.

Crefcit inter Tropicos.

Nuces Indi comedunt, & variarum Infularum Americanarum coloni eis folis vitam fuftentant; recentium fuccus in potum recipitur, nec non liquor, qui ex vulnerata fpatha ftillat, quem Vin de Palma dicunt, probe diftinguendum a Vino, quod ex Palma, una Canarienfium infula, ad nos adducitur.

De his Nucibus tegmen offeum ad nos mittitur, quod five tabernas Seplafiariorum ornat, five vario artificio condecoratum in musea recipitur; habemus præterea oleum inde expressum, quod in officinis dicitur

* Oleum Palmarum; albiffimum, inodorum, infipidum & in nostro aëre confistentiam spitsioris unguenti habens, quod a propria Coccos specie, quam Butyraceam dicunt, defumitur.

Emplastrum Diapalmæ feu Dialchaciteos GALENI, hinc inde Difpenfatoria a præfcriptione GALENI recedunt. Multum exficcat, ad inflammationes diffipandas & ulcera exficcanda adhibetur; a GALENO præterea rheumaticis, arthriticis, herniofis commendatum.

JUGLANDES NUCES, Perfica, Regia, raqua, raqua pariluna, Noix, Nüsse. Sunt nuces rotunda, varia magnitudinis, quæ sub putamine viridi, tenaci, adstringente, amaro, digitos nigredine inficiente, sulco longitudinali notato, Caliola Barbarorum, includunt officulum durum, albicans, rugosum, sub quo nucleus quadrilobus, septo distinctus, rugosus, dulcis, cuticula flavicante & adstringente tectus reperitur. Juglandes officulo fragili tectæ Tarentinæ PLINIO Moluscæ Recentioribus audiunt, qui illas, quæ præduro cortice gaudent, Moracillas, illas vero, quæ magnitudine multum eminent Caballinas, Junio mense demum vernantes, a festo Johannis denominant.

JUGLANS. Planta relativa monophyta, flores mares amentacei, corolla fexfida, polyanthera gaudent, feminæ calice quadrifido, corollam quadrifidam, digynam fiftunt, fructus drupa: Regia L. BLACWELL 247 foliis pinnatis quinatis & feptenis agnofcitur.

Syriæ & Perfiæ civis apud nos copiofiffime in hortis, agris & ad vias colitur; floret menfe Aprili, Septembri fructus maturat.

Exficcatæ dimidium fui ponderis olei fundunt, dulcis, flavicantis, fuavifimi, nullo frigore confiftentis, pictoribus utilifimi.

Nuces immaturæ, fub nomine Cerneaux mensis folent imponi, substantia potius aquosa, viscida, quam

120

oleofa gaudent, justo majore quantitate si assumptionem fubventriculum gravando & in eodem corruptionem subeundo, graves noxas excitant. Maturæ & recentes nutriunt evidenter, ab omni tempore contra venena fuerunt laudatæ, quem effectum ratione olei videntur edere. Per aliquod tempus asservatæ slavescunt & rancorem suscipiunt, tunc omnino noxius est earum usus.

Reliquæ Juglandum partes five ad Medicinam non adhibentur, five eviluerunt.

* Aqua deftillata. * Oleum MESUE vix amygda, lino inferius, olivaceo ad lucernas magis præstare dicitur, intus fumtum tæniæ mederi GEOFFRO1, PAS-SERAT DE LA CHAPELLE & BINET observarunt. * Conditum VAL. CORD. ob putaminis vires adstringentes ventriculum roborat. * Rob GALENI vires refolventes & roborantes habet, ad collutiones & gargarismata maxime adhibetur.

PINEE NUCES Barbar. Nuclei Pinei Veterum, 566/BIAA, 2012200, Pignons, Pinien. Nuclei parvi, oblongi, ventricofi, utrinque obtufi, albiffimi, tunica rufescente, sicca, gracili vestiti, sapore dulci cui aliquid proprii, minus grati accedit, gaudent.

PINUS. Arbor relativa monophyta, amentacea, flores mares in racemos difpofiti, plura ftamina inferne connata habent; feminæ in conum fquammis ligneis efformatum difponuntur, monogynæ, fructus nux eft, ala membranacea fuperne aucta. *Pinea* L. BLACWELL 189 foliis in juniore planta folitariis diftinguitur.

Crefcit in Hifpania, Italia & Gallia meridionali.

Ultra tertiam fui ponderis partem olei unguinofi fundit.

Ab HIPPOCRATE ad morbos inflammatorios commendantur, eas multum nutrire GALENUS perhibet; a gentibus meridionalibus in cibum recipiuntur, inter

HS

nos vix nifi ad refinofa in pulverem aut emulfionem reducenda adhibentur.

PISTACIÆ NUCES, miçánia, Pistaches, Pistacien. Nuclei oblongi, obfolete trigoni, sub cuticula rufefcente includunt medullam viridem, dulcem, suavem.

PISTACIA. Arbor relativa diphyta. Mares amentacei corollam quinquefidam, ifantheram, feminæ trifidam & trigynam, drupam autem ficcam monopyrenam habent. Vera L. BLACWELL 461 foliis impari pinnatis & foliolis fubovatis diftinguitur.

Sponte in Afia crefcit, colitur in Europa Meridionali & Occidentali, quo primo noftrææræ Seculo fuit delata.

Olei aurei $\frac{1}{1 T}$ circiter largiuntur.

Ratione virium ad Pineas accedunt, eis fuaviores in bellaria & morfulos,, fcopo nutriendi, recipiuntur.

* Oleum expressum SCHRED.

* TRIBULUS AQUATICUS, τείζολ@, ἔνωδε@, Châtaigne d'eau, Wassernüsse. Est fructus castanea minor, quatuor alis acutis instructus, qui sub cortice nigro, nucleum cordiformem, album, sapore dulci præditum condit.

 T_{RAPA} L. Calice quadripartito fuftentat corollam tetrapetalam regularem, tetrantheram, monogynam.

Crefcit in omni Europa, præter maxime feptentrionalem.

A GALENO contra inflammationes laudatur, proxime ratione virium videtur ad Caftaneas accedere.

§. 18.

Animalia cum vehant gelatinam, hæc autem fit præcife id, quod folida noftra reftituit, ferum quoque a gelatina reftituatur, pinguedo præterea ad reparandas oleofas, quas continuo perdimus, partes faciat, & præcipuum cruoris principium conftituat, hinc evidens eft, animantia ad nutriendos homines apprime facere, quia autem quodlibet animantium genus propriam & gelatinam & pinguedinem habet, quæ tunc demum nos nutrire valent, quando per noftras vires in noftram naturam mutantur, eædem præterea pro vario animali, aut varia ejus parte, variam digeftionis operam requirunt; hinc Medicorum eft determinare, quomodo varia animalia & variæ eorum partes fefe circa nutriendos varios homines gerant.

§. 19.

Docuit autem experientia, gelatinam teneriorem, facilius per vires digeftionis extrahendam, & nutritioni aptandam, largiri animalia juniora & animantium musculos, qui sub Carnis nomine veniunt, succofiores, viscera porro laxa, nec non offa spongiofa & tenera; hæc gelatina, quo tenerior eft, eo tenuiores gignit humores, eo laxiora inde furgunt folida, eo citius per vitam confumitur alimentum quod fubministrarunt: gelatinam viscidiorem, digestu difficiliorem, difficilius nostris partibus affimilandam, humores denfiores, folida firmiora efficientem, ægrius per vitam confumendam, exhibent animalia annofiora, carnes tenaciores, cartilagines, tendines, ligamenta, membranæ, vifcera spissiora membranacea, osfa denique duriora. Obfervandum præterea eft, quodlibet animal non modo eo meliorem gelatinam vehere, quo ipfum magis perfecta fanitate gaudet, fed etiam reliquorum fuccorum, quo gaudet, rationem habendam effe, cum illi una cum gelatina nostrum corpus fubeant, hinc non alia, nisi quæ integra fanitate gaudent bruta, quæ loca falubria inhabitant, & quæ vitam rite exercitiis temperatam vivunt, funt affumenda, & probe attendendum quo pabulo fuerint pasta. Carnes animalium, quæ in fylvis & agris verfantur, optime laborant, fanguine abundant, locis minime aquofis, ficcis & æftuofis vitam agunt, reliquis magis nutrire, monuit HIPPOCRATES. Alcalinum principium, quod in brutis victu animali utentibus obtinet, in caufa eft, ut minus homines nutriant, & varium morbi genus ipfis facile affricent. Quadrupedum ftructura cum proxime ad noftram accedat, hinc eorum gelatinam nobis proxime accommodatam effe evidens eft, & docuit experientia inter hæc, pecora nobis nutriendis præ reliquis aptiora lacte nutrita & femellas digeftu quidem faciliora, fed minoris nutrimenti effe, caftrata optime digeri & largiffimum alimentum præbere. Poft quadrupeda aves nos optime nutriunt, fequuntur pifces, ipfi ab amphibiis excipiuntur & hæc a vermibus.

§. 20.

Animalia, si testacea excipimus, rarissime cruda affumuntur; horror quo corripimur, fi eis crudis vesci debemus, num exemplo debeatur, an sit vox Naturæ, hic non difputo: comeduntur five Elixa. ubi menstrui aquosi ope fibræ emolliuntur, & digeftioni aptantur, five Affata, cum carni is admovetur caloris gradus, ut cruor & ferum in exterioribus valis denfentur, fibræ exficcentur, & ita crusta excitetur, fub qua coërciti in interioribus humores per continuantem calorem agitantur, in vapores refolvuntur, fibræ omnes in vero balneo vaporis maceratæ emolliuntur, five Frixa, dum ope pinguedinis calore denfatæ, crusta carnibus inducitur, sub qua ea fiunt, quæ fub aflatione contingere dixi, five Sale condita Ef fumo indurata. De carne elixa multum gelatinæ aquam, cum qua coquitur, fubit, quæ inde Juris nomen induit, hinc fi coctio modum excedit, talis caro plane iners redditur, notante jam HIPPOCRATE; dum fub

124

affatione optime fibræ emolliantur, nec quicquam de gelatina perdatur, hinc pro optima carnem ad cibum præparandi ratione jure habetur; Frixa facile incommoda ab acrimonia oleofa metuenda caufatur. Dum fale carnem condimus, fub ipfa conditura multum gelatinæ inde eluitur, fibræ rigidiores & hinc digeftu difficiliores redduntur, fal qui fibris accrefcit, in gelatinam ufque penetrat, refolutioni, quæ in primis viis fieri debet, obicem ponit, gelatinam ad nutritionem minus aptam reddit; fumus, dum vernice quafi fibras obducit, empyreumate quoque ipfam gelatinam afficit, ea quæ a fale fieri dixi, etiam auget, imo ipfam pinguedinem carni interpofitam rancore afficit; hinc tali ratione præparatam carnem minus laudandam effe, evidens fit.

I. QUADRUPEDA.

a) CICURA.

Bos. Animal quadrupes, pedibus bifulcis inftructum, utraque maxilla duodecim molares, inferior præterea octo incifivos gerit; *Tourus* L. cornubus erectis, teretibus, fronte glabra, dorfo non gibbofo juba mediocri a congeneribus differt. Pro varia patria magnitudine quoque boves diftant, feptentrionales maximi funt, meridionales minimi, illi maxime quos Barbaria alit.

Mares ταύζοι, Tauri, Taureaux, Stiere verfus fecundum ætatis annum puberes evadunt, & ad hanc vitæ periodum ufque δαμάλαι, Juvenci dicuntur, taurus caftratus proprie β8ς, Bos, Ochs, Bæuf, appellatur; femellæ βόκς, Vaccæ, Vaches, Kühe, fefqui ætatis anno puberes, ab Aprili ad Julium ufque taurum admittunt, prægnantes Hordarum, βόων έγκύων, Vaches pleines, tragende Kühe nominibus veniunt, per novem menfes utero gerunt, & edunt Vitulum, μόλον, Veau, Kalb, qui fexta a partu feptimana optimus ad cibum eft, tauri & vaccæ post nonum ætatis annum decrefcunt, vix ultra quintum & decimum vitam extendunt.

Bos ut plurimum in latus finistrum folet decumbere, hinc hujus lateris renem, quem Galli Rognon dicunt, majorem effe, & copiosiorem pinguedinem habere observatur; triennis novos dentes & nova cornua producit, quæ ultima quotannis novo circulo augentur; decennis ad us cibarios adhibendus est, & tunc granis cerealibus & radicibus alendus.

Caro bovina $\frac{1}{16}$ fere gelatinæ, vitulina ultra $\frac{1}{12}$, cor vituli $\frac{1}{24}$ fere, pedes ultra $\frac{1}{12}$ vehunt. Gelatina ex carne bovina & corde vitulino nunquam confiftentiam ficcam acquirit. GEOFFROI.

Carnem vitulinam bovina leviorem effe, monet HIPPOCRATES, est illa mollis & tenera, & ideo digestu facilis, fed debilius inde furgit nutrimentum, multum eadem præterea muci vehit, hinc jura vitulina in morbis, ubi demulcendi & relaxandi animus est, præ reliquis commendantur, & patet cur in morbis pectoris & inflammatoriis multum laudentur. Pulmones præ carne plus muci vehere evicit experientia.

Caro taurina & vaccina ficcior, durior, digeftu difficilior eft bovina, quam difficilius digeri minus bene dicit HIPPOCRATES. Eodem afferente, & fuffragante omnino experientia, reliquis validius roborat, cum autem varii musculi variam firmitatem habeant, hinc omnino caro bovina, pro vario loco, unde defumitur, varia eft, five lanionum five culinæ vitio debetur omnino, quod veteres eam minus commendarint.

Lingua dotes optimæ carnis fequitur.

Ventriculi in frusta dissecti, sub Trippes, Kuttelfleck, Bletzer, Caldaunen nomine veniunt, membranacei cum sint, hinc difficilius digeruntur, & minus nutriunt. Medulla eft liquor oleofus, qui omne offium longorum cavum replet, ipfa pinguedo largiori aquæ portione inftructa, & hinc facilius, quam ea, quæ in membrana cellulari hæret, humoribus noftris commifcenda, hinc recte validioribus nutrientibus adfcribitur; extus fi quidem reliquis pinguibus præftat, id ipfum majori, qua gaudet, penetrandi virtuti erit adfcribendum.

Sebum. Pinguedo confiftentiæ folidæ & duriufculæ, proprio naufeofo odore & fapore gaudet, nunquam interne datur, externe fcopo demulcendi & relaxandi adhibetur interdum; æconomicis maxime ufibus relinquitur.

* Sanguinem Tauri, præeunte NICANDRO, Veteres venenis adfcripferunt, ut videtur, ex hypothefi potius quam ex experimento.

Fel Tauri cui creberrime bovinum fubftituitur, infpiffatum, a quibufdam ad morbos ab inertia bilis oriundos & ad vifcerum abdominalium obftructiones referandas adhibetur: HOFBERG eodem, ad drachmam unam bis de die exhibito, epilepfiam vidit curatam: externe abftergendi, refolvendi, vermes necandi ergo adhibetur, ab HIPPOCRATE fuppofitoriis pro educendis fæcibus immifcebatur.

Lac Vaccinum, yina, Lait, Milch, eft liquor albus in uberibus vaccæ fecretus, ex triplici principio conftans Cremore, miag, mior, Crême, Rahm, Saane, Sero, öpi@, petit Lait, Molken, Schotten & Cafeo rugos, Fromage, Kas. Cremor quoad maximam partem ex oleo conftat in Butyrum efformandus, ferum copiofiffimam aquam habet, aliquas partes oleofas & falem effentialem, qui inde fub Sacchari nomine educitur, cafeus genium animalem fert.

Cum Lac conftituatur a chylo circulationem paffo, quæ ejus partes in naturam animalem vertit, hinc illud ficuti pro vario animalium genere, ita & in varia ejufdem generis fpecie, imo in eodem individuo pro

NUTRIENTIA.

affumtis, conftitutione corporis, motu humorum, ætate, diftantia a paftu &c. differt; id quod ex vacca trienni, nigricante, tribus circiter a partu menfibus, tempore verno, cœlo fereno, matutino tempore emulgetur, pro optimo habetur. In univerfum, lac per quod albedo æqualiter diffufa eft, odoris alieni expers, & quod illam pinguedinis rationem habet, ut ejus gutta fupra unguem effufa non diffluat, commendari folet.

Lac vaccinum, caprino & equino levius effe, copiofiorem quam reliqua ufitata aquam vehere, post ovillum largius oleum, parciorem quam ovillum & caprinum, cafeum habere probavi in Differtatione de optimo infantis recens nati alimento.

Secedit lac in fua principia mora, calore, acidis, alcalinis, fpiritu vini. Si femel aut bis ebulliverit, diutius fine feceffione principiorum poteft affervari.

Innumeri, quos lac præstat usus, ad tres potissimum classes possunt revocari.

I. Cum fit liquor per fabricam animalem ad nutritionem aptatus, hinc inter nutrientia primum locum habet, eodem non modo integræ gentes vivunt, obfervante jam ARETÆO, fed idem, illis quorum viscera chylo & hæmatopoietica ita debilitata funt, ut non fufficiant nutrimento ex cibis parando, optimum alimentum est, cum habeat partes nutritias, per viscera vaccæ jamjam ad nutritionem aptatas. Infantes loco lactis materni non raro vaccino nutriuntur, quod aqua diluunt, amvedalarum ope ejusdem partes cafeofas ita temperari, ut humano proximum fiat, oftendi in Differtatione citata. Kusticum, qui lacte potissimum vescebatur, ultra centum annos vixisse GALENUS refert, & BETTUS adducit aliquem, qui lactis ufu ad centefimum quinquagefimum fecundum ætatis annum afcendit. Tabidis ab HIPPOCRATE commendatur.

Lac calidis primis viis ingestum, & quæ vix non femper aliquid acidi continent, in eis quidem secedit, fed

128

NUTRIENTIA.

fed cafeofæ partes a faponaceis liquoribus chylopoieticis ita attenuantur, ut oneri effe non poffint, debili autem ventriculo cum lac ingeritur, id ipfum, ne is a partibus oleofis relaxetur, aqua diluere, unde Gallorum *Lait coupé* furgit, five adjecto faccharo, monente AVICENNA, ejus feceffum in partes impedire folemus.

II. Ob dulcedinem & oleofas, quibus fcatet, partes ad omnem acrimoniam, fi acidam exceperis, commendatur, ejus usum ad scorbutum omnes Auctores post EUGALENUM laudant; in morbo articulari ad præcepta HIPPOCRATIS, a WERLHOFF, PYE, GAL-10 &c. confirmata usurpatur, sunt qui his morbis fæpius vexatis diætam, quam lacteam dicunt, commendant, sub qua, per plures menses, imo annos nullus alius cibus præter panem & lac affumitur, & non paucos magnum inde folamen expertos effe, constat omnino, sed cum sub tali vitæ regimine primæ viæ debilitentur, & folida digerere defuescant, hinc non raro, fi ad pristinam diætam redeunt ægroti, ut plurimum graviores recidivas experiri folent, Syden-HAM & VAN SWIETEN observantibus; ad venena, acria maxime, lac etiam ab omni tempore, tanquam optimum remedium fuit in usum tractum; illis etiam qui ulceribus internis laborant, tam pro demulcendo ichore, quam pro alendo debili corpore, exhibetur, HIPPOCRATIS & GALENI confilio, auctoritate & propriis obfervationibus longe plurimi Auctores commendant, inter quos GALLO, GULLMANN, MOR-TON, HOFFMANN, BERHAAVE, VAN SWIETEN, Cl. TRALLES, Illustr. PRINGLE allegaffe fufficiat; fed interdum in his morbis obtinent dispositiones, quæ optimi medicamenti usum diffuadent, quo præter febrem fortiorem, etiam ab ejus usu surgentes cardialgia, ructus, pressiones ventriculi, diarrhϾ &c. pertinent; his in cafibus lac erit diluendum aqua

Ι

hordeata aut infuío quodam roborante, vel ad monita MORTONI & HOFFMANNI aquis foteriis; id præterea notandum, prudentes medicos etiam lac appropriata morbo vegetabilia five vaccæ exhibendo, five cum lacte infundendo, fuo fcopo adhuc magis aptare.

III. Ratione omnium fuarum partium fibras relaxat, ftricturas & inde furgentes morbos tollit, fpafmos mitigat, dolores lenit; alvum ejus ope laxari, poft DIOSCORIDEM omnium feculorum obfervata docent, TRALLIANUS & GALLO hæmoptifin, WEPFER colicam, SYDENHAM paffionem hyftericam, SYLVA-TICUS malum hypochondriacum, HIPPOCRATES Dyfenteriam, RIVERIUS tuffim chronicam, GALLO motus convulfivos, tuffim convulfivam, anginam, gravia a vermibus fymptomata, nephritidem &c. curata viderunt.

Curam lacteam fuscepturi purgante eccoprotico primas vias evacuare tenentur, mane & verfus vefperam ejus, mox postquam e vacca emulctum est, uncias fex bibant, fenfim fenfimque ad duas libras usque de die hauriendas afcendant, eidem faccharum adjicere nunquam oblivifcantur; peffime agunt, qui illud coquendo & follicite cuticulas inde auferendo, dum nefcio quam viscedinem inde auferre volunt, illud spiffius reddunt, ut difficilius ex alvo exeat, id quod jam veteres perspexerant, efficiunt, & fubtili principio privant, cujus præfentiam egregie VAN SWIETEN evicit; id denique adhuc notandum, quod per omne, quo cura lactis usurpatur, tempus, id quod ad minimum per quatuor feptimanas extendendum est, cibis eupeptis, vino generofo, rubro maxime, debeant uti ægroti, corpus decenter movere, puro & libero aëre vesci, omnes graviores animi motus evitare &c. & ut omnia paucis comprehendam, talem debeant sequi vitæ rationem, ut lactis effectus inde juventur, corruptio arceatur.

130

Lactis ufu febricitantes interdicendos effe HIPPO-CRATES rectiffime monuit, cum tales homines vires digerentes vitiatas habeant, nutriendi non fint, & major, quo ardent, calor facile pinguedinem lactis rancidam poffet reddere, hypochondriaci quoque inde abstinere debent, nec non illi, quibus viscera abdominalia obstructa funt, observante GALLO etiam tuberculis pulmonum laborantes, plethorici porro, phlegmatici & obesi. Gravia quæ usum lactis præposterum excipiunt fymptomata, egregie delineavit HOFF-MANN; dentes quoque inde lædi GALENUS monet. Externe ad cataplasmata, balnea, enemata emollientia, nec non ad abluendas partes excoriatas adhibetur.

Serum, præ equino pauciorem aquam vehere evici in Differtat. citat; ejus partes oleofæ, & fi quas adhuc fovet, cafeofæ paucæ funt, & principio faponaceo, quo gaudet, folutæ, hinc qui a lactis infignioribus viribus nutrientibus & laxantibus, aut ab ejus in partes feceffu metuuntur effectus, fub feri ufu locum non habent.

Pingues partes, quibus ferum scatet, ut illud vires nutritias habeat, efficiunt, eo folo BOERHAA-VE per aliquot menses, FERGUSON per octodecim annos vixit; medicato fcopo ob vim faponaceam maxime commendatur, inde ejus vires alvum ducendi, GALENO notatæ, fluunt, & quidem fine commotione, ita ut in febribus continuis ipsis, suadente jam HIP-POCRATE, cathartico scopo possi exhiberi, in quibus ipfis fanguinem diluendo, fpiffitudinem phlogifticam arcendo & tollendo, stricturas relaxando, excretiones aquofas promovendo, egregie conducit; dyfentericis quoque, fecundum HIPPOCRATEM, cum fucceffu datur, nec non illis qui qualicunque acrimonia laborant; hinc tempore verno optimo confilio, ad eluendas e corpore fordes per hyemem collectas exhibetur, fpiffitudini cuivis humorum egregie medetur. SYLVATICO ob-

I 2

fervante ad obstructiones viscerum abdominalium referandas, mala hypochondriacum & hystericum sopienda, ad rheumaticos porro & arthriticos morbos arcendos & curandos, fecundum observata SYDENHAM, præstans omnino medicamentum, multum quoque ad mitigandam drasticorum virulentiam, & leniendas, quæ inde ortæ fuerunt, noxas conducit, confirmante HIPPOCRATIS monita HOFFMANNO. Datur sive folum, sive cum medicamentis morbo appropriatis unitum, ad libram unam pro dosi, non malo consilio quoque pro potu ordinario præscribitur. Idem GALENUS abstergendi scopo ad ulcera adhibuit, & intestino recto infudit.

Serum Lactis dulce HOFFMANNI acido evoluto caret, copiofiores partes pingues fovet, & illas levi empyreumate inftructas; ubi demulcendi fcopus eft vulgari præferendum, in febribus autem & obstructionibus referandis isti omnino postponendum.

* Aqua destillata Seri lastis Parif. iners. * Aqua Lastis Alexiteria BATEI: parum mutata a Parifinis recipitur; nomini non respondet.

Butyrum, sérver, Beurre, Butter. Est pinguedo ex lacte, ope agitationis, a fero separata & collecta, eidem autem & seri & casei partes adhuc connexas manere, docet ejus coctio, qua illæ partim quoad maximam partem in auras abeunt, partim cum his sub nomine Ankentröster secedunt.

Cum butyrum ex lacte furgat, hinc hujus indolem fequitur, & evidens fit, cur Mayale reliquis præferatur.

Optimum habetur, quod fatis pingue est, flavo colore gaudet, gratum præterea saporem & odorem exhibet.

Alcohol inde aliquid recipit, ultra $\frac{1}{2}$ olei, ultra $\frac{1}{5}$ aquæ, vix $\frac{1}{3}$ terræ vehit. NEUMANN.

Ut ætatem ferat, five fale condiri, five coctione difponi folet, hæc moderato igne inftituitur, ufque dum per butyrum limpidiffimum fundus vafis poffit videri & fordes, quæ fub coctione fecedunt, probe inde removentur. Optimum butyrum falitum ad nos ex Belgio adducitur, Galli id quod in Normannia aut Gallo-Britannia paratur maximi faciunt, eo rarius utimur, cum ex montibus Alfatiæ fuperioris & fylvæ Martiæ larga quantitas butyri nobis advehatur, quod coctione, ut affervari poffit, noftrates difponere folent.

Butyrum, Scytharum præparatum, monente HIP-POCRATE, & Barbarorum cibus fecundum PLINIUM, hodie creberrimo in ufu folet effe, oleorum unguinoforum & virtute & nocendi facultate pollet, large nutrit, fed primas vias quoque relaxat, & acrimoniam oleofam gignendo, non raro graviffima excitat fymptomata. Medicato effectu in morbis a rigiditate fibrarum, aut cum hæ præter naturam irritantur, conducit. Butyrum calore diffolutum & faccharo mixtum feminas Lufitaniæ ad menfes dolorificos haurire, ZACUTUS refert; illi qui per vitæ rationem vaporibus acribus fefe exponere coguntur, non male Butyrum jentaculi loco affumunt; Externe relaxandi & demulcendi fcopo in ufum trahitur, clyfmatibus quoque, emolliendæ alvi ergo, adjicitur.

Butyrum coctum, beurre fondu, Anken; coctione aliquam mutationem paffum eft, hinc & odore & fapore a butyro integro recedit, eo maxime culinæ opus habent ad paranda ea frixorum genera, quæ ficca fragilitate debent gaudere, Medici eodem vix interne, crebro autem externe utuntur, abstergendi maxime scopo. * Unguentum Potabile Rubrum August. parum mutatum Wurtembergenses & Argentoratenses recipiunt, cur medicamento, quod resolvendi scopo commendant, adstringentia addantur, non video. Unguentum Potabile Viride SCHROEDERI. Wurtembergenses aliqualiter a SCHROEDERI wurtemberdisfima compositio, evidenter roborans, a nostrati-

Iz

bus crebro ventriculo infantum, qui cardiogmo laborant, folet inungi.

Cafeus formatur a lactis partibus tenacioribus, illæ pro varia forma qua fecedunt, varie denominantur. Serum & cafeus, dum cremore in butyrum acto, remanent, Lactis ebityrati Barb. Babeure, Buttermilch nomine veniunt, fi lac affufo acido cogitur, $\partial \xi \partial \gamma a \lambda a$, χ_{150} , Lac fchiftum, Recocta Barb. Lait caillé, Zieger appellari folet, inde fi ferum effufum & ponderibus quoque impofitis expression eft, Cafeus furgit; variat is non modo pro vario lactis genere unde fuit paratus, fed etiam eo, quod quidam ex integro lacte paretur, butyraceis hinc partibus fcatet, pinguis, alius ex lacte furgat, unde prius cremor fuit ablatus, hinc ficcior. Vaccinum ovillo minus, reliquis magis tenacem esfe in Differtatione citata oftendi.

Quidam cafei ex regionibus ubi parantur famam affecuti funt. Parmefan præparatur ad Parmam, nec non in Laudenfi Ducatus Milanenfis tractu, flavus, recens, non pinguis eligitur; ex Helveticis Gruyerenfes ab oppido pagi Freiburgenfis denominati, annofi, pingues & Glaromenfes multum acres, ficciffimi & Trifolio Meliloto cæruleo L. viridi colore, nec non fapore & odore aromatico imbuti laudantur; inter Belgicos illi, qui cruftam rubram habent, reliquis præferuntur, ad eos Castrienses Anglorum proxime accedunt, inter Gallicos Castenaticum Delphinatus & Briensem ad Campaniæ Meldas paratum valde laudant; Roquefortensis ex lacte ovillo conficitur.

Ab acidis & alcalibus quoad maximum partem diffolvitur, ultra $\frac{1}{2}$ fpiritus alcalini, $\frac{1}{16}$ falis urinofi, $\frac{1}{4}$ fere olei, $\frac{1}{5}$ circiter aquæ fundit. NEUMANN.

Cum cafeus ex partibus lactis jam in naturam animalem versis surgat, hinc eundem multum nutrire est evidens, ut jam HIPPOCRATES monuit, qui autem etiam eundem difficilis digestionis esse, sagar perspexit & non pauca quæ inde furgere poffunt mala adduxit, id quod ex infigni, qua gaudet tenacitate, facile patet, hinc quoque videmus ejus abufum primas vias onerare, chylum fpiffum & acrem fanguini infundere, varium acrimoniæ genus gignere, calculos renum inde caufari GALENUS monet, cum recocta & lac ebutyratum cafeum faponaceo fero dilutum vehant, hinc fecurior eft eorum ufus, id quod & GALENUS monet.

Cafeus extus applicatus refolvit & glutinat, in arthritide & vulneribus egregios ejus effectus vidit GALENUS.

* CANIS, zów, Chien, Hund. Animal quadrupes, quod in utraque maxilla fex dentes incifores habet, digitos unguiculatos quinque in pedibus anterioribus, quatuor in posterioribus. Familiaris L. cauda finiftrorfum recurva distinguitur, Canem familiarem L. ex Aureo Ejustem originem ducere evincit Clarist. PAL-LAS. Animal carnivorum, innumeris varietatibus ludit, hinc difficillime ejus characterem naturalem determinare licet, nono aut decimo ætatis mense puber evadit, tempus libidinis per decem circiter dies durat, & bis de anno graviditas per duos menses obtinet, plures catuli uno partu excluduntur, vitam canes ad viginti usque annos protrahere folent.

Stercus caninum $\frac{1}{80}$ extracti spirituosi, $\frac{1}{12}$ aquosi falini, $\frac{1}{6}$ fere phlegmatis, $\frac{1}{11}$ spiritus $\frac{1}{64}$ olei empyreumatici NEUMANN dedit.

Carne canina in Infulis Canarienfibus, India, China, Africa & Canada vefci folent, Illam facile digeri & parum nutrire HIPPOCRATES præcipit, qui ejus efum ægris inflammationibus, alvo adftricta aut vifceribus abdominalibus obftructis laborantibus commendat. ROBERTI FLUDD animadverfionem de podagra lambitu canum curata Illuftr. LINNÆUS confirmat, obfervationes de epilepfia & aliis morbis in canes transplantatis mitto.

14

* Stercus, quod Barbari Album græcum dixerunt, eligitur ficcum, & quod ab immixtis offium recrementis album eft, illud GALENUS aliquem fuorum Præceptorum ad anginam, dyfenteriam, ulcera inveterata adhibuiffe, fe quoque cum optimo fucceffu eodem ufum effe, teftatur. In Suecia tanquam polychreftum remedium ad mammas induratas adhiberi refert VI-GELIUS. Stercus, oleo acri & alcali conftans, vires refolventes editurum facile largior, fed non video cur caninum aliis fit præferendum, & in tanta remediorum refolventium quantitate quam habemus, fordidum medicamentum fit in ufum trahendum. * Axungia nihil proprii videtur habere. * Hepar canis rabidi virtutes antilyffas nondum probavit * Oleum Catellorum Parif. ad morbos nervorum laudatur.

CAPRA, aiz, Chevre, Geis. Cornubus rectis a bove differt: Hircus cornua apice recto instructa, femel modo arcuata, extus rotundata, intus cultrata, pilos rectos, aures minores habet.

Mares givo, Hirci, Tragi, Boucs, Bæcke, anniculi jam puberes funt, fexennes jam effœti; capræ, quæ non raro cornubus carent & pauciores quam hirci dentes habent, feptimo ætatis menfe puberes, per quinque menfes utero gerunt & tunc deponunt igique, Hados, Chevraux, Zickelchen, Geisbæckgen, Geislein; per quinque a partu menfes copiofifimum lac fundunt, feptimo ætatis anno effætæ, hædi fexto a partu menfe caftrantur, & tunc Capri folent dici.

Gens caprina in septentrione procerior esse folet, vix ultra duodecimum annum vitam extendit.

Cum & hircorum & caprarum caro durior fit, hinc nonnifi hædorum in cibum recipitur, quæ de ejus minus falubri efu adducunt HIPPOCRATES & GALE-NUS hircinam & caprinam non hædorum fpectant, quippe quam & digestu facilem esse, & bonum alimentum largiri quotidiana experientia docet. Lac caprinum afinino & equino copiofiorem pinguedinem vehere, & minus cafei, qui vaccino tenerior eft, ejus ferum poft ovillum minus oleofarum partium habere, evici in *Differtat. citat*. Cum capræ plantis adftringentibus vefcantur; hinc earum lac, cum roborare volumus, reliquis præferre folemus, eodem ad malum hyftericum cum fucceffu ufus eft GALLO.

* Sanguis Hirci inspissatus unde ventriculus, præter quasdam partes empyreumaticas, nihil extrahere valet, jure exfolevit inter Medicos rationales. * Sevum Hirci præ bovino nihil proprii habet, nisi quod mollius sit, & ad colorem cærulescentem vergat.

OVIS, πεόβατον, οι, Brebis, Schaaf. Cornubus retrorfum verfis a pecoribus cicuribus reliquis differt. Aries L. a Capra Ammone L. defcendere post Illustr. BUFFON evincit Clar. PALLAS caudam rotundam, brevem & corpus lanigerum habet.

Mas zeros, Aries, Belier, Widder fefquiennis puber, octennis effœtus, ad decimum quartum annum vitam extendit, fexto ætatis anno castratur & tunc ¿Seis, Vervex, Mouton, Hammel dicitur. Ovis annicula puber est, duo loco cornuum tubera in fronte fert, per quinque menses utero gerit, per octo, menfes a partu lac fundit, octavo ætatis anno esfœta; ejus catuli æser, Agni, Agneaux, Læmmer.

Oves, in locis ficcis vitam degentes, multo meliorem carnem largiuntur, quam illi, qui humida inhabitant, antequam macello committuntur, cerealibus & leguminibus nutriri folent.

Caro arietis tenax est, & in modum hircinæ faporis nauseosi, ovilla insipida, viscida. Testiculi Animelles varia ratione a coquis præparantur: multum dicuntur nutrire. Caro vervecina succulenta, digestu facilis, ultra $\frac{1}{\tau\tau}$ gelatinæ largitur, GEOFFROI; præ reliquis transpirationem auget observante SANCTORIO;

IS

agnina caro, notante etiam HIPPOCRATE, facillime digeritur, $\frac{1}{32}$ gelatinæ teneræ & mucofæ fundit.

Lac ovillum præ reliquis copiofius & tenerius butyrum, largiorem & tenaciorem cafeum vehere in Dissertat. citat. monui; patet hinc quod cæteris magis nutriat quidem, fed difficilius digeratur.

Pedes vervecini glutinofi funt, in morbis ubi acre intestina tenet, aqua cum eis cocta ano injicitur.

Lana Succida est talis, que pinguedine farta est, ea inde aque ope secundum DIOSCORIDEM extracta oligora dicitur & non videtur aliquid proprii præ reliquo adipe habere, monente jam GALENO; lana fuccida e collo & abdomine pendens oligiorane Græcis dicitur, calore partes quibus applicatur fovet & hinc relaxat, mammis induratis, membris luxatis, collo, cum fauces affectæ funt, imponitur, creberrime, ex præcepto HIPPOCRATIS, tanquam vehiculum, quo medicamenta emollientia partibus affectis imponuntur, adhiberi folet.

PORCUS, Sus, Sc, Xõg@, Cochon, Schwein. Eft quadrupes dentibus incifivis in utraque maxilla & pedibus bifulcis inftructum.

Sus Scrofa L. cauda pilofa, auriculis oblongis, abdomine non ad terram ufque propendente diftinguitur, ubique in antiquo orbe occurrit, Hifpani eam demum Americæ intulerunt, in regionibus meridionalibus nigra & procerior eft.

Mas Verres Verrat, Eber, nono menfe puber evadit, dentes caninos extra os prominulos habet, triennis effœtus eft, fexto ætatis menfe caftratur & tunc Majalis, Barg folet dici. Scrofa, Truïe, Mohr bis de anno porcellos, Ferklein, Heitzlein deponit & illos plures qualibet vice, porcelli qui ubera ducunt, Cochons de Lait, Spanferklein duos feu tres menfes nati in cibum recipiuntur, fcrofa vulgo postquam quarta vice peperit evadit effœta. Gens fuilla fimplici ventriculo gaudet, & inteftina habet illis, quæ in ruminantibus obtinent, multo minora, ad vigefimum ufque ætatis annum folet pervenire. Vegetabili æque ac animali victu vefcitur, optime impinguatur glandibus Quercus & Fagi, fed hæ lardum minus folidum gignunt.

Lardum, Lard, Speck. Eft pinguedo dura in panniculo adipofo fubcutaneo hærens; Axungia, Saindoux, dicitur mollior pinguedo ex inteftinis, mefenterio &c. collecta.

Caro fuilla digeftu difficilis eft, & chylum vifcidum largitur, hinc nonnifi hominibus robuftis & qui vitam exercitatam vivunt concedenda, eam hac ratione in ufum tractam copiofe nutrire HIPPOCRATES tradit, multum inde transpirationem imminui obfervavit SANCTORIUS. Porcellos digeftu difficiliores effe, & alvum laxare jam HIPPOCRATES præcepit & experientia confirmat.

Farcimina quæ ex hac gente maxime parantur ex eis quæ de vifceribus & partibus animalium fumo induratis, fub Bovis Hiftoria dicta fuerunt, dijudicanda funt, aromatibus quæ ipfis adjici folent & linguæ & ventriculo magis accommodantur.

* Stercus quod CUMMIUS contra febres intermittentes commendat, Illustr. LINNÆUS autem ad drachmæ pondus intus datum dysentericis, extus ad hæmorrhagiam narium laudat, in tanta quam habemus, meliorum & minus nauseoforum remediorum caterva negligitur.

* Vulvas Romanis olim multum ufitatas MOEL-LEBROECK & LEDEL in incontinentia urinæ auxilium afferre tradunt, fed quis talibus fidem adhibebit?

P. FERA.

Quadrupeda fera cum fub cœlo libero vivant, & illa maxime, quæ ficciora & montana loca inhabitant, exercitatam magis quam cicura vitam agant, hinc præ his melius alimentum præbere videntur, cum autem eorum caro, ob eam vitæ rationem, magis firma fit, hinc validiores vires digerentes exigunt, nec conducunt debilibus; ut caro tenerior & fapidior evadat, animal demum aliquot a morte diebus folent in cibum recipere, ubi autem probe cavendum, ne putredo jufto majores progreffus fecerit, & ab ejus ufu acrimonia putrida furgat; fera animalia præ cicuris ficciora, crudiora, digeftu faciliora effe & minus nutrire tradit HIPPOCRATES.

Cum aper corpus fuum magis quam porcus domeiticus exerceat, alimento etiam minus fordido, quam Sus fcrofa utatur, hinc ejus caro fuilla & fapidior eft, & digestu facilior.

Dentes canini, Défenses, Fangzahne, ut pluzimum ex maxilla inferiori defumuntur, toti cavi funt, albi, in annofiore animali flavicant, in arcus formam flexi funt, tribus faciebus longitudinalibus inftructi, ad pleuritidem laudantur, fed quis a fubftantia abforbente aliquid boni ad morbum inflammatorium expectabit?

CAPREOLUS, Jognas, Chevreil, Reh. Pedes bifulcos, cornua ramofa, in maxilla inferiore octo, in fuperiore nullos dentes habet. Cervus Capreolus L. cornubus teretibus, erectis, nudis diftinguitur. Sub finem Octobris venere agitatur, femella Cheorette, Ziege, per viginti & duas feptimanas utero gerit, circa finem Aprilis duos ut plurimum catulos edit dognadua, Faons, Rehkitzlein, qui duodecimo jam a partu die matrem fequi poffunt. Capreoli non gregatim vivunt; fingulæ familiæ ex parentibus & catulis anniculis compofitæ fingulatim vivunt; eorum vita vix ultra decimum & quintum annum extenditur.

In variis Galliæ provinciis nulli, nulli in Anglia, pauci in Italia & Suecia, in America copiofi. Colles amant & fylvarum regiones steriliores, agris cerealibus vicinas, in fylvas densiores se nunquam immittunt.

Mares anniculi typhos exiguos, Dagues, Spiefe, edunt, eos ad finem autumni deponunt & per hyemem reftituunt, Martio menfe cutim, qua nova cornua teguntur, abradunt; fingulis annis ufque ad quartum, ramorum, in quos cornua dividuntur, Andouillers, Ende, numerus augetur. Caro Capreolorum biennio majorum, quos vieux Brocards folent appellare, durior & minus fapida eft, catellorum mucofa, anniculorum optima, exquifitiffima ad lumbos Filet, Ziemer hæret, hanc fequitur illa pedum pofticorum Schlegel, Cuiffot.

* CATUS, chas, Chat, Katze. Differt a cane unguibus hamatis & retractilibus, nec non lingua aculeis instructa. Felis Catus L. caudam elongatam, annulis distinctam & pilos ex susce, nigro, flavicante & albido variegatos habet. Sylvestris per omnem Europam occurrit.

A plebe interdum comeditur, ejus carnem ad leporinam accedere, testatur GESNER.

Aliquoties de anno libidine agitatur, femella per duos circiter menfes utero gerit, primo jam ætatis anno puber evadit, raro vitam ultra decem annos extendit, animal carnivorum. * Axungia præter vires cum reliquis communes aliquam acrimoniam ob catorum victum animalem & vitam valde agitatam videtur poffidere, & hinc evidentiores effectus refolventes edere.

CERVUS, $i \wedge a \varphi \oplus$, Cerf, Hirsch. Dentes in inferiore maxilla octo & cornua ramosa habet, Nobilis L. cornubus teretibus nudis, solidis, ad latera incurvis & collo non jubato distinguitur.

Septembri mense libidine agitatnr & per omne hoc tempus, quod raro ultra quatuor feptimanas extenditur, multum furit & validiffimum odorem spirat. Cerva, Bica, Biche, Hündin, Hirschkuh per octo menfes utero gerit, & Junio menfe unum Hinnulum, Faon, Hirschkalb excludit, cujus corpus striis & maculis variegatur, accipit is fexto ætatis menfe, fi mas fuerit, tubera in fronte, quæ fi in cornua fimplicia excreverunt, animal maltaxia, Subulo, Ferula, Daguet, Spieshirsch dicitur, a tertio ad quintum vitæ annum Furcarius Barbar. jeune Cerf, Gabelhirsch appellatur, septennem Galli Cerf de dix Cors, annofiorem vieux Cerf denominant. Ad octavum usque ætatis annum crefcit, quadragefimum raro excedit, fingulis annis menfe Aprili cornua deponit, Augusto cuticulam, qua nova teguntur, ad arborum truncos abradit, caftratus nova cornua non protrudit, ramorum, in quos cornua finduntur, numerus nihil constantis habet, sed pendet a quantitate & qualitate alimenti, idem cervus uno anno plures & altero anno pauciores habet, apud nostrates raro ultra duo & viginti occurrunt.

Gens cervina hyeme gregatim pafcitur, vere juniores modo fe in greges colligunt, cervi colles, valles, planitiem inhabitantes majores funt, & capita magis rufa habent. Vefcuntur Vegetabilibus.

Dum HIPPOCRATES & GALENUS carnem cervinam difficilem & mali fucci effe pronunciant, de cervis annofioribus aut hyeme captis verba faciunt, quæ a cerva vel fubulone defumitur fatis tenera, fapida & nutritia folet effe; maxime fi a talibus animalibus recipitur, quæ loca altiora inhabitant. T_{gphi} Barb. Crues, Kolben cornua tenella, a prolongatione integumentorum perioftei & vaforum, quæ apophyfes frontales cingunt, efformata, alimentum quidem guftui gratum fed viscidum, hinc digestu difficile, & unde minus bonus fanguis furgit, largiuntur.

Cornua una, cum bafi, quæ ea nectit, Merein, Geweih nomine veniunt, cornu corpus Perche, Stange, rami Andouillers, Ende, bafis eorum tumida Meule, Rofe dicitur. Cornuum omnis fuperficies tuberculis Perlen obfidetur, majoribus ad bafin Pierrures, minoribus per reliquum corpus Perlures.

Cornua ultra $\frac{1}{6}$ fpiritus urinofi, $\frac{1}{29}$ fere olei empyreumatici, ultra $\frac{1}{12}$ falis volatilis fundunt. Inft. Chem. NEUMANN inde ultra $\frac{1}{77}$ fpiritus urinofi, ultra $\frac{1}{28}$ olei, $\frac{1}{15}$ fere falis obtinuit. Gelatinæ $\frac{1}{4}$ fere Inft. Chem. NEUMANN, CARTHEUSER.

Rafura Cornu Cervi est cornu radula comminutum, minus bene ex officinis famiariorum, cultrariorum &c. recipitur, quippe tale non raro ramentis æris inquinatum esse folet, nec placet cornu cervi torno comminutum, quippe quod caret interna cornuum substantia, præ exteriore largiorem gelatinæ rationem vehente. Coquitur ex aqua & illi vires relaxantes & demulcentes impertit, ejus uncia circiter ad libram aquæ hoc scopo recipitur.

Gelatina SCHRŒD. demulcendi & nutriendi fcopo adhibetur, ejus uncia dimidia duodecuplo juris diluta pro dofi datur, ad morbos pectoris & febres lentas maxime adhibetur. * Gelatina ficca Noftrat. ad pulveres demulcentes, ubi acrimonia primis in viis obtinet, adhibetur. * Gelatina Cornu Cervi Citrata Wurtemberg. egregium medicamentum ad fe-

bres lentas. Cornu Cervi ustum a GALENO adstringendi scopo commendatur, præter absorbentes, nullas alias vires exferit, peffime ad decocta præscribitur. Cornu Cervi philosophice praparatum SCHROED. per ipfum quo præparari folet, laborem iners redditur, bezoardicæ quæ ipfi adscribuntur vires debentur fomniis superiorum seculorum de vi cervi alexipharmaca. * Cornu Cervi auratum FINCK antecedenti viribus par eft. * Decoctum album SYDENHAM non placet. Aqua Cornu Cervi Citrata Noftrat. inconcinna compositio, quæ si quas virtutes habet, illas corticibus citri maxime debet, mixturis mediis, gratiæ ergo folet adjici. * Pulvis Cervinus CAMERAR. Inconcinna compositio, quæ præter absorbentes, nullas alias vires habet. Spiritus, Oleum, Sal, vid. Institut. Chem. * Spiritus Cornu Cervi externus Wurtemberg. est spiritus vini oleo empyreumatico fœtus. * Aqua destillata e typhis Cervi SCHROED. iners omnino, * Aqua e typhis Cervi composita Wurtemb. est aqua vinofa analeptica, parum efficax. Liquor Cornu Cervi Succinatus vid. Succinum.

Medulla Cervi etiam HIPPOCRATI laudata, vix aliquid proprii præ bovina videtur habere.

* Os de Corde Cervi planum, figura irregulari instructum, est portio cordis ad ortum utriusque orificii arteriosi, per frictionem, indurata, de substantia osfea, jam a PLINIO ad usus medicatos laudata, quis aliquid efficacis exspectabit?

Sevum quod folidum & album est Pinguedinum vires exfequitur.

* Aqua e Corde Cervi MYNSICHT correcta, a Wurtembergenfibus recipitur, vires, fi quas habet, eas vino & aromatibus debet.

Oleum animale DIPPELII vid. Institut. Chemia.

CUNICULUS, Sasúass, Lapin, Kunigle, Kaninichen,

144

chen; ad lepores pertinet, qui pedibus digitatis, unguiculatis, duobus in utraque maxilla inciforibus, caninis nullis, cauda minima gaudent: Lepus Cuniculus L. pupillas rubras habet. Frigus regionum feptentrionalium non fert; cuniculos fylvestres femper gryfeos effe, domefticos nullas foveas fodere, quibus fe cum catulis abscondant, Perillustris BUFFON annotat; fexto ætatis mense puberes fiunt, marem vel fexies in una hora congredi cum femellis ferunt; femella per unum mensem utero gerit, & quolibet partu fex ad octo catulos, Lapraux, edit, quibus per fesqui mensem mammas præbet, duplicem uterum habet, minus frequenter tamen quam lepus superfœtationem experitur, ad nonum usque ætatis annum cuniculi perveniunt, caro albicat, præ leporina magis fucculenta, alimentum dat laudabile.

* Axmugia a Leporina parum differt.

LEPUS, $\lambda \alpha \gamma \omega \varsigma$, Lievre, Haas. Lepus timidus L. auriculis apice nigris diftinguitur; in Europa copiofiffime, parcius in Afia, parciffime in America occurrit. Primo jam ætatis anno puber eft; femella Haale per unum menfem utero gerit, uno partu tres ad quatuor catulos, Levrauts, excludit, & mox a partu marem denuo admittit; ob uterum duplicem, quo gaudet, facile fuperfœtationem experitur, per viginti dies catulos lactat. Lepores, qui loca paludofa inhabitant, Ladres, carnem habent naufeofam; nec exquifiti faporis funt, qui in planitie & vallibus degunt; monticolæ & majores & magis bruni funt, & carnem habent magis acceptam, in locis feptentrionalibus per hyemem albi funt, fed tales quoque interdum in Gallia fuerunt obfervati.

Tali eorum $\frac{1}{16}$ Extracti fpirituofi, $\frac{1}{4}$ aquofi falini, $\frac{1}{5}$ fere fpiritus, $\frac{1}{12}$ olei empyreumatici, $\frac{1}{5}$ falis volatilis exhibuerunt. NEUMANN.

Carnem leporinam digestu facilem esse, & corpus

bene nutrire HIPPOCRATES & GALENUS tradunt; vires pilis jam ab HIPPOCRATE, veficæ & talis, fuperioribus feculis adferiptas, experientia non confirmavit.

* Axungia flava eft, refolvendi & absceffus maturandi ergo laudatur.

* LUTRA, *inodoje*, Loutre, Otter. Dentibus in utraque maxilla fex & digitis membrana interfe junctis gaudet, *Mustela Lutra* L. digitis palmatis, glabris, æqualibus agnoscitur. Vivit piscibus & avibus aquaticis, piscinis perniciosiffimum animal; caro ejus dura est, tenax, nauseoso piscium putridorum odore perfusa, difficilis digestionis, mali nutrimenti.

* TAXUS Barb. Meles, Blaireau, Dachs. Eft animal quadrupes, quod dentes incifivos in utraque maxilla fex, digitos in fingulis pedibus quinque, & pollicem reliquis digitis proximum habet. Urfus Meles L. Corpus fupra fordide cinereum, inferne nigrum, caput tæniis albis & nigris variegatum oftendit. Animal carnivorum maximam vitæ partem dormiendo tranfigit.

In Europæ spiffioribus fylvis occurrit,

* Axungia, pinguedini Cati fylvestris similis, cum meles vitam parum agitatam agat, minus resolvens effe videtur.

* URSUS, agel, Ours, Bar. Non male ab Illustr. LINNEO ad idem cum melibus genus reducitur & cauda abrupta distinguitur.

Occurrit in Alpibus, Germania & regionibus magis feptentrionalibus.

Animal carnivorum, autumno libidine corripitur, per centum & duodecim dies utero gerit, raro ultra quintum & vigefimum annum vitam extendit.

Pedes ursi gratum edulii genus constituere, Perillustris BUFFON monet.

* Axungia alba eft, porcina mollior, ego nullum proprium in eadem odorem poffum detegere, ad alo-

A

m

146

pœciam laudari GALENUS refert, hinc eam vel hodie adhuc, vulgus pro accelerando incremento pilorum adhibet.

* VULPES, ἀλώσηξ, Renard, Fuchs. Canis Vulpes L cauda recta diftinguitur, animal carnivorum proprium fœtorem emittens, hyeme libidine agitatur, ad quatuordecim annos vitam extendit.

Interdum in cibum recipitur, & tempore vindemiarum pro exquisita habetur, ut post GALENUM Perillustris de BUFFON monet.

* Pulmones cum arteria afpera exficcati affervantur, probe cavendum ne vermibus exedantur, naufeofum faporem habent, & præeunte GALENO, ab omni tempore afthmaticis fuerunt commendati, per fe vix hodie præfcribuntur, fed crebriori in ufu eft.

Loch de Pulmone Vulpis quod MESUE a GALENO deducit, refolvens omnino medicamentum, ad morbos pectoris non inutile, ex quo optime Pulmones Vulpis exularent.

* Oleum Vulpis fimplex GALENUS, quod in principio arthritidis profuerit, fe crebro expertum effe, teftatur; Wurtembergenses & Parisini, præeunte MESUE, varia vegetabilia aromatica ipsi adjiciendo illud magis resolvens reddunt, Wurtembergenses majorem præ Parisinis aromaticorum rationem recipiunt.

II. AVES.

Aves facile digeri, fed parum nutrire HIPPOCRA-TES præcipit, circa eas æque ac circa quadrupeda experientia docuit, annofiores carnem tenaciorem habere, quæ autem etiam validius nutrit, inter eas granis vel baccis vescentes, eis quæ infectis vivunt, & hæ ichthyophagis præferuntur, cadavera sectantes a mensis noftris jubemus exulare; minus bonum præ reliquis alimentum, eas quæ ad aquas vivunt præbere, jam K 2 HIPPOCRATES monuit; verno tempore, avium in univerfum efus minus laudatur, quippe quo plurima earum genera rem veneream exercent, migratoriæ autem, poft longiora itinera, ad nos veniunt. Illæ etiam quas in cortibus alimus, cum largiore alimento nutriantur, illis quæ vaga Cerere vivunt, præftant. Aves annofæ five ad jura recipiuntúr, five in ollis lutatis per plures horas vapore aquæ maceratæ, elixantur; aves exiguæ frixantur, reliquæ omnes folent affari.

a. GRANIS CEREALIBUS AUT BACCIS VESCENTES.

ALAUDA, rógud , Alouette, Lerche. Gaudet digitis quatuor, quorum unus posticus est, & cujus unguis ipsum digitum magnitudine superat, rostro subulato & naribus detectis. Vulgaris L. Feldlerche dorso nigricante, griseo, rusescente & albido vario, abdomine ex ruso albo, tænia supra oculos albo-rufescente distinguitur.

Inhabitat prata & agros cereales, inter æquinoctium vernale & hybernum ter ova, & fingulis vicibus quatuor deponit, primo vere & autumno gregatim folet volare, & tunc in cibum recipi, verfus Calendas Novembris noftras terras relinquit, ad decimum annum ufque vitam extendit.

Caro facile digeritur & bonum alimentum largitur.

ANSER, χ_{inv} , Oie, Gans. Rostro craffitie, latitudinem æquante ab anate differt. Domessica BR. Anas Anser domesticus L. corpore inferiore semper albo, superiore cinereo, albo, susce ludente gaudet, rostrum & pedes in adultis rubent.

Herbis & granis vescitur, anseres, qui ad loca paludofa degunt, majores & obefiores funt illis, qui in ficcis vivunt; a Martio ad Julium usque ova excludunt, mensem integrum in cubando transigunt, vere & autumno deplumantur.

Anferis carnem digestu difficiliorem esse HIPPO-CRATES & GALENUS annotarunt; hepar hodie multum a delicatioribus expetitur, ut illud voluminosum & pingue multum evadat, variis artificiis solent obtinere; esu omnino suavissimum, ventriculo minus amicum est, multum nutrit.

* Axungia vix aliquid proprii habere videtur.

* Solvestris BR. Anas Anser ferus L. Oie Sauvage, Schneegans, dorfum cinereo fuscum, pectus album, rostrum nigrum in medio croceum habet & pedes luteos aurantios.

Tenacioris carnis avis hyeme in artocreata recipitur.

* CARDUELIS, χg somirger, Chardonneret, Diftelfink. Digitos quatuor habet, quorum unus est posticus, pedes ad calcaneum plumosos, rostrum conoideum in verticem gracilem, acutum, elongatum abiens. Carduelis BRISSON. Fringilla Carduelis L. tænia nigra utrinque, a rostro ad oculum, protensa, dorso ex susco rusescente, pectore albo, rostro albo & pedibus susci distinguitur: Ligurinus BRISSON. Fringilla spinus L. anardic, Zisel, Zeisig, dorsum ex viridi olivaceo suges habet.

Bonum chylum largiri & facilis digestionis effe dicitur.

COLUMBA, *mequerequ*, *Pigeon*, *Taube*; digitos quatuor habet, quorum unus pofticus, pedes ad calcaneum ufque plumofos, roftrum conoideum, mandibulæ fuperioris apicem craffum & incurvum: *Domestica* L. parte dorsi inferiore alba, pedibus rubris, roftro fusco, materia farinacea tecto solet distingui; plurimæ ejus varietates prostant, aliquoties de anno bina ova ponit, per viginti dies incubat, tres septimanas eduationi pullorum impendit, quinto ætatis menfe puber, fexennis effæta, ad vigefimum ætatis annum pervenire dicitur; caro juniorum, pigeonnaux quæ nondum volare potfunt, digeftu facilis eft, & bonum chylum largitur; adultiores elixatione ventriculo accommodantur, & bonum alimentum fiftunt: Qui columbam dilaceratam capiti aut pectori phreneticorum, apoplecticorum, pleuriticorum &c. imponunt, præter vires a calore expectandas, dum nihil fibi promittere potfunt, caveant ne præter horrorem, quem cruento fpectaculo ægroto incutiunt, putridas animalis partes, mafiæ humorum in putredinem abeuntium ingerant. Columbæ fpecies fylveftres apud nos non in cibum recipiuntur.

COTURNIX, ögrož, Caille, Wachtel. PERDIX. BRIS-SON. digitis tribus anticis, uno poftico, roftro conico incurvo, capite paleis deftituto, pedibus nudis gaudet: Coturnix, Tetrao Coturnix L. tres in capite tænias, dorfum nigrum, rufo & pauco gryfeo variegatum, pectus rufum, nigricantibus maculis varium, roftrum cinereum, pedes carneos habet; ad Septembrim ufque ova ponit, fingulis vicibus ad quatuordecim ufque, Octobri menfe nos relinquit, Majo reditura.

Ob pinguedinem, qua abundant, digeftu paulo difficiliores funt, fed copiofum & bonum alimentum largiuntur, frequentifime cum inter nos edantur, nec unquam evidentem noxam inde furrexisse fuerit obfervatum, hinc morbi qui a GALENO, RIEDLIN, NEBEL inde orti recensentur, aliis omnino causis, quam optimis avibus, funt adscribendi.

* Axungia Wurtemb. officinalis eft.

GALLINA CORVLORUM Barb. Attagen, arlavas, Gelinotte, Haselhuhn. LAGOPUS BRISSON. Cruribus ad calcaneum usque plumosis, tribus digitis anticis, uno postico gaudet, rostro conico incurvo, capite paleis destituto, pedibus plumosis: Bonasia, Tetrao Bonafa L. dorfum cinereum, lineis minimis & punctis fufcis, rufis, nigricantibus varium, faciem maculis albis diftinctam, pectus album inter quod fufcum translucet, roftrum nigrum, pedes gryfeo-fufcos habet, appendiculis fquammofis ornatos.

Ad decem ova usque ponit, in calidiore Europa non occurrit, altiora coryleta & pineta inhabitat.

Carnem teneram & albam habet', bonum alimentum largitur.

GALLUS, alertwg, Coq, Hahn. Roftrum conicum incurvum, tres digitos anticos, unicum posticum habet, caput paleis ornatum, pedes ad calcaneum ufque plumofos: Domefficus BRISSON. Phasianus Gallus L. paleis binis longitudinalibus, fub gutture pendulis & crifta membranacea in fronte diftinguitur; varietates Caudata L. ex Perfia, Morio L. ex Guinea & Senegal, Pufilla L. ex Bantam in Europam fuerunt allatæ; mares calcaribus distinguuntur & duabus rectricibus mediis longiffimis, reflexis: femina aneuropic, Poule, Henne, æque ac mas quarto ætatis anno effæta evadit, Pouffins, Glücklein ex ovis per tres feptimanas incubatis prodeunt, ad aliquot feptimanas cum pervenerunt, Poulets dicuntur, mares tertio ætatis mense castrantur & tunc Caponum, Chapons, Capaunen nomine veniunt. GALLO PAVO BRISSON. MALEAGRIS L. Dindon, Cog d'Inde, Calecutischer Hahn, welscher Hahn palea unica fub gutture pendente, ornamento frontis carneo gaudet. Malabar & Coromandel veram ejus patriam effe, affeveratur apud OSBECK. Americæ indigenum anno 1524 Angliæ illatus fuisse dicitur in Philos. Transact. Vol. 71. Inter nos coloribus ludit, harum avium greges quotannis ex Lotharingia ad nos adductæ omnes nigro colore gaudent, quem Americanis proprium effe, testatur Illustris LINNÆUS. Per integrum mensem ova incubant, bis de anno ad quindecim usque ova excludunt

K 4

* MELFAGRIS BRISSON. NUMIDA L. Peintade, Perlhuhn, paleis binis ad rictum oris pendentibus & cornu conico in fronte distinguitur. Africana avis, rarius in nostris cortibus ob horridos, quos edit, clamores educatur, ejus caro ad carnem gallo pavonis accedit.

Galli, qui crebrius rem veneream exercuit, caro ficca, tenax, digestu difficilis est, elixatione emollitur, ejus gelatina sextam partem æquat, recipitur præcipue ad jura nutrientia. Gallinæ, quæ aliquoties ova exclusit, caro etiam tenax eft, hinc nonnisi ex, qux nulla adhuc ova ediderunt & Poulardes dicuntur, affari folent. Galli æque ac gallinæ juniores & digeftu faciles funt, & egregium chylum largiuntur, HIPPOCRATI multum laudati, jus inde paratum, demulcendi & relaxandi ergo commendatur, noftrates illud puerperis exhibent, pertinaciffimam alvi obftructionem ejus ope feliciflime curatam vidit Ovelgün. Jus ex pullis paratum, ad attenuandos humores & relaxanda folida egregie facit, hinc in morbis inflammatoriis, acutis & ubi primæ viæ fpafmo agitantur, cum fuccessu folet exhiberi. Capo & fapore & facili digestione & nutriendi facultate præstat. Gallo-pavo Gallo domestico etiam validius nutrit.

Ventriculi membrana interior roborandi ergo laudatur, noftrates illam infantibus pro firmando ventriculo exhibent, videtur hunc effectum ratione acidi, quod ejus vis lac cogens evincit, exferere.

Ovorum albumen quod $\frac{7}{8}$ fere phlegmatis, $\frac{1}{24}$ fpiritus urinofi, $\frac{1}{40}$ olei empyreumatici, $\frac{1}{36}$ falis volatilis NEUMANN fudit, cum fero fit analogum, hinc nutritioni omnino infervit, egregium præterea medicamentum eft demulcens, hinc ad morbos pectoris multum commendatur, cum muci defectum fuppleat, etiam ad vocem claram reddendam multum confert; extus relaxando, lubricando, demulcendo, contra aërem defendendo, in inflammationibus & ambuftis '

nec non ubi epidermis deficit, egregiam opem fert. Calore induratum, digeftu difficillimum eft. Vitellus multo oleo unguinofo turgens, unde NEUMANN destillatione $\frac{6}{11}$ fere aquæ, $\frac{1}{9}$ spiritus urinosi, $\frac{1}{3}$ olei empyreumatici obtinuit, cum totus in aqua diffolvi poffit, hinc multum faponaceus eft, digestu facilis & multum alit, viribus medicatis cum oleis unguinofis convenit, aqua agitatus & edulcoratus ad pertinaciffimas tuffes, fub nomine Lait de Poule adhibetur. Testa, destillatione 5, spiritus urinosi, paucissimum olei empyreumatici, de falis volatilis fundunt fecundum NEUMANN. Præter vires abforbentes nullas alias habent; præparatæ Alcali de Rotrou dicuntur. Cum itaque ova habeant fubstantiam nutritioni aptiffimam, quæ fine difpendio primarum viarum fanguinem fubire poteft, hinc vel ægrotis cum fucceilu, nutritionis ergo, exhibentur, confentiente HIPPOCRA-TE, fed fimul elucefcit quod in febribus exulare debeant. Putamen ovi ad fiftendas hæmorrhagias adhibetur.

* Aqua Caponum quam VAL. CORD. a Florentinis recepit, phtificis laudatur, rectiflime ZWOELF-FER jura, aquis destillatis præfert. * Axungia Gallina: Oleum Ovorum. vid. Inst. Chem. * Loch de Ovo Parisiensium suave medicamentum demulcens & relaxans.

OTIS non Veterum, $\dot{\omega\tau ic}$, Outarde, Trappe. Pedes tridactylos habet, crura inferiora denudata, roftrum conicum incurvum. Tarda L. maris os pennis gryfeis barbatum eft, dorfum nigricans, flavo & rufescente variegatum, pectus album, cui aliquid fulvi accedit, rostrum gryfeo-fuscum, pedes cinerei.

Nonnifi rigidiore hieme nos accedit, caro dura, vix elixatione in vafis claufis emollienda, & tunc validum nutrimentum largitur.

* PASSER, 59890, Moineau Franc, Sperling, Spatze. Crura ad calcaneum usque plumosa habet. tres digitos anticos, unum posticum, rostrum conicum attenuatum, apice crasso & brevi terminatum, mandibulam utramque rectam, integram, rostri basi capite multo minore : *Domesticus* BRISSON. Fringilla domestica L. tænia spadicea per occiput ad alterum oculum ducta, dorso superne nigro & ruso, inferne gryfeo & ruso variegato, pectore cinereo-fusco, rostro nigricante, inferne ad basin slavicante distinguitur. Ter de anno quinque ova ponit, præter grana cerealia infecta quoque assument.

Passeres juniores pingues funt, sed raro in cibum recipiuntur, cum inde epilepsiam excitari posse, vulgus reputet, cui faventes etiam observationes quidam Medici litteris confignarunt, figmentum falsissimum omnino.

PERDIX, mégdiž, Perdrix, Feldhuhn. Gryfea BRISSON. Tetrao Perdix L. dorfum ex cinereo, rufo & nigro transversim varium, pectus ex cinereo-cærulescens, nigrum, transversim striatum, maculis rufis ornatum habet, rostrum & pedes cinereo-cærulescunt. Mares calcar in pedibus gerunt.

Formicas quoque in cibum recipiunt, 16 ad 18 ova ponunt, hyeme gregatim incedunt, a Julio mense ad hyemem usque optimæ; in Europa temperata & feptentrionali obtinent.

Caro digestu facilis & egregii alimenti est; annosæ in jura nutrientia recipiuntur.

* Rubra BRISSON. Tetrao rufa L. Dorfo gryfeo fufco, pectore dilute cinerefcente, roftro & pedibus rubris, qui in maribus calcar habent, agnofcitur. In Europa calida maxime, apud nos rarius occurrit.

A quibusdam, priorem gratia superare, dicitur, id quod alii negant, decidant delicata lingua præditi.

* Graca BRISSON. Bartavelle, Rebhuhn; prioribus major, dorfo & pectore cinereis cum aliqua rufi mixtura, tænia nigra utrinque a naribus fupra oculos per collum ad pectus ducta, roftro rubro, pedibus pallide rubris, in maribus calcaratis. Italiæ propria avis, in Alpibus Helveticis quoque occurrit, & inde ad nos mittitur; exquifiti omnino faporis eft.

PHASIANUS, $\varphi_{\alpha\sigma_{1}\alpha\nu\delta_{5}}$, Faijan, Fajan. A Perdice cauda longe differt: Phafianus BRISSON. Phafianus Colchicus L. dorfo fufco, caftaneo-purpureo, maculis albis variegato, pectore caftaneo, purpureo, nigricante, fplendente agnofcitur; femina & magnitudine & pulchris coloribus mari cedit.

Sylvarum incola, nonnifi Martio & Aprili menfibus venerem exercet, ad triginta ova ponit, & per quinque & viginti dies incubat.

Exquifiti faporis avis, facile digeritur, & optimum alimentum largitur.

TURDUS. Crura ad calcaneum ufque plumofa, tres digitos anticos, unum posticum habet, rostrum sub rectum, maxillam superiorem convexam, apice deflexo & utrimque emarginato habet : Major BRIS-SON. Viscicorus L. Grive, grosser Grammetsvogel, dorso gryseo-sufco, ventre ex albo flavicante, maculis nigris notato, rostro gryseo-sufco & pedibus sufcis distinguitur; vescitur baccis & insectis, bis de anno ad quatuor usque ova ponit, optimus versus hyemem.

Bonum alimentum largitur, digestu facilis.

* Minor BRISSON. Musicus L. petite Grive, Drossel, magnitudine & pectore rufescente, rectricibus, nullo albo marginatis a priori differt; nidificat in sepibus, infectis maxime vescitur, hinc minus quam reliqui falubris.

* Iliacus BR. & L. Mauvis, Weindroftel, tænia utrimque a naribus ad occiput ducta, albo-flavicante, dorfo gryfeo-fufco, pectore maculis gryfeo-fufcis variegato, roftro nigro, pedibus dilute gryfeis agnofcitur. Gregatim autumno ad nos advolat, uvas maxime appetit, in fepibus nidificat.

Pilaris BRISSON & L. Terzas, Litourne, Tourdelle,

Krammetsvogel. Dorfum fuperne fufco-rufefcens, inferne cinereum, pectus rufefcens maculis nigris variegatum, roftrum flavicans, pedes nigros habet; autumno nos adit, vere relinquit, baccis juniperi maxime vefcitur, quas quoque ejus caro fapit, in Europa non midificare dicitur.

* Merula BR. & L. 260000, Merle, Amfel, corpore toto in maribus nigro, in feminis fusco, rostro luteo & pedibus nigris distinguitur, vere ad nos venit, autumno nostras regiones relinquit, bis de anno quinque ova ponit; qui hyeme apud nos manent, omnes mares sunt; caro minus quam antecedentium æstimatur.

UROGALLUS Barb. I agopus Urogallus major BR. Tetrao Urogallus L. Coq de Bruyere, Auerhahn. Dorfo tæniis transversis undulatis, alterne cinereis & nigricantibus instructo, pectore ex suscente, maculis aliquot albis variegato, rostro cinereo albo, digitis suscentes, appendiculatis, utrinque squammosis gaudet.

Copiofus in pinetis, feptentrionalibus præcipue, occurrit, gemmis abietis vefcitur, quas etiam ejus caro fapit, per æftatem baccis & infectis vivit, tempore verno venere agitatur, femina ultra tredecim ova excludit & ea per quatuor feptimanas incubat. Caro ejus duriufcula, ficca, validum alimentum largitur.

* Lagopus Urogallus minor BR. Tetrao Tetrix L. Coq de Bruyere à queue fourchue, Birkhahn. Dorfo & pectore nigro violaceo, cauda bifurca, rostro nigro, digitis fuscis, utrinque appendiculatis, dignoscitur.

Ad Europam calidam non descendit, montium altiorum betulaçeas fylvas inhabitat, femina duodecim ova ponit, vario genere vegetabilium & infectis vescitur.

β. INSECTIS VIVUNT :

* FICEDULE Br. Motacilla L. Crura ad calca-

156

neum ufque plumofa, tres digitos anticos, unum posticum, qui in arcum flexus est, rostrum subulatum, nares nudas habent, plures species in cibum recipiuntur.

Digestionis facilis & boni alimenti esse reputantur. * HIRUNDO, $\chi_{\ell\lambda\ell}\partial\omega_{\nu}$, Hirondelle, Schwalbe. Cruribus ad calcaneum usque plumosis, tribus digitis anticis, uno postico, rostro minimo basi compresson, uno postico, rostro minimo basi compresson. Urbica L. capite & dorso nigro-cærulescentibus, collo inferiore, pectore & ventre niveis, pedibus lanugine alba obsessis, rostro nigro, cauda - bifurca distinguitur.

Martio mense nos adit, Augusto ulterius migrat, sub tectis nidificat, bis de anno & qualibet vice quatuor aut quinque ova excludit.

Rarius in cibum recipitur & inde minus bonum alimentum fubministrari dicunt, a virtute antepileptica SERENO SAMMONICO laudari cœpit, quam autem æque ac illam, qua vifus aciem acuere & morbis faucium mederi, Veteribus dicebatur, experientia non confirmavit; pro his scopis eos in cineres combustos folebant fecundum GALENUM exhibere : nidum hirundinum ad anginam adhibere, jam ante GALENM in more fuit, & hodie adhuc a quibusdam laudatur, fi quis inde effectus fequitur, is debetur refolventi stercoris, quod continet, virtuti. Proprium lapidis 'genus quod in ventriculis & nidis hirundinum reperiri olim annotante DIOSCORIDE afferuerunt, Chelidonium dixerunt, & de eo miras vires prædicarunt, hodie eviluit, ipfi Achates Chelidonios minerales WALLER. folent fubstituere, inertes omnino.

* Aqua Hirundinum cum Castoreo August. Ad spasmos hystericarum commendatur. * Aqua Hirundinum fine Castoreo August. præ aqua Sambuci vix aliquid proprii habet. * PARUS, añy Jax @, Mesange, Meise. Digitos tres anticos, unum posticum habet, crura ad calcaneum usque plumosa, rostrum subulatum, nares plumis tectas: Fringillago BR. Major L. Charbonniere, Brandmeise macula utrinque candida infra oculos, dorso viridi, olivaceo, pectore flavescente, rostro nigro, pedibus plumbeis distinguitur.

Autumno in hortis & fylvis occurrit, novem ova excludit, nucibus, mufcis, cadaveribus vefcitur, faporis minus boni est & difficilis digestionis.

PLUVIALIS Barb. digitis tribus, omnibus anticis, cruribus inferne nudis, roftro, recto brevi gaudet. Aurea BRISSON. Charadrius Pluvialis L. Pluvier doré, Brachvogel, extimo digito cum medio postice, ope membranæ nexo, dorfo nigricante, flavo variegato, pectore gryseo-fusco, cum maculis flavis, roftro & pedibus nigricantibus agnoscitur; in campis & ad aquas degit.

Exquifiti faporis avis; digeftu facilis, alimentum inde furgens facile diffipari afferit LEMERY.

* RALLUS Barb. tribus digitis anticis, uno poffico inftructus eft, cruribus inferne deplumatis, roftro longo, recto, lateraliter compresso: Aquaticus BR. & L. Rasle - d'eau, Rohrhünlein dorso in medio nigricante, ad margines ex susco rusescente, pectore cinereo, rostro ad originem rubro, reliquo nigro, pedibus susco viridescentibus agnoscitur.

Julio menfe ova ponit.

Exquifiti faporis est, difficilius digeri, minus bonum alimentum præbere dicit LEMERY.

* Maruette BR. Porzana L. Weinkernel dorfum medium nigrum, margine fusco olivaceo, maculis candidis vario, pectore cinereo, olivaceo, maculis albis distincto, rostro & pedibus fuscis olivaceis gaudet; ad aquas cum priori occurrit. * Ortygometra BR. Crax L. Rasle de Genet, Roi des Cailles, Wachtelkonig dorfum uigrum gryfeo rufescente variegatum habet, pectus cinereum, cui aliquid rufi accedit, rostrum antecedentibus brevius, cum pedibus gryfeum.

In pratis & ericetis occurrit, ad octodecim per annum ova excludit.

Prioribus & exquifitioris faporis eft, & digeftu facilior & magis probum alimentum fubministrat.

SCOLOPAX, σκολόπαξ, Beccasse, Schnepfe. Pedes tres anticos, unum posticum sisti, crura inferne denudata, rostrum gracile, longissimum, rectum, apice obtuso: Russicola L. tænia nigra utrinque ab ore ad oculum descendente, dorso castaneo & nigro variegato, pectore gryseo rusescente, nigricante, transversim striato, rostro ex gryseo ad carneum tendente, inferne nigro, pedibus gryseo-fuscis distinguitur.

Occurrit ad loca paludofa, autumno optimus.

Exquifiti faporis avis, fed monente LEMERY digestu minus facilis.

Gallinago BR. & L. Beccafine, Wafferschnepfe, priore minor, dorso nigricante & fulvo diluto, utrinque binis tæniis notato, pectore albo, rostro susco in extremitate nigro, pedibus susco virescentibus gaudet.

Ad rivos & paludes degit, priore fapidior & digestu facilior.

STURNUS, 4a, Etourneau, Staar, tres digiti antici, unus posticus, pedes ad calcaneum usque plumosi, rostrum integerrimum, rectum, convexum, apice obtuso, latiusculo: Vulgaris BR. & L. dorso & pectore nigris, albo maculatis, rostro slavescente, pedibus luteis distinguitur.

Habitat ad paludes & ftagna.

Multis in deliciis eft, sed antequam in cibum recipiatur, multa aqua abluendus est, ut amarities ejus carni propria inde auferatur, * TRINGA Barb. tres digitos anticos habet, unum posticum, crura inferne nuda, rostrum gracile, longum, apice obtuso & levi. Glareola L. Cul blanc, Steingallel, digito medio utrimque membranula aucto, dorso fusco & candido maculato, tæniis utrinque duabus a rostro supra oculos ductis, pectore albo, rostro & pedibus virescentibus distinguitur.

Habitat ad stagna, annumeratur avibus faporis exquisiti & digestu facilibus.

* Guinetta BRISSON. Hypoleucos, Guignette, Pfifterlein, digito medio membranula aucto, dorfo gryfeo-fufco undulato, pectore albo, fufco variegato, roftro & pedibus fufcis diftinguitur: ab Aprili ad Novembrem inter nos occurrit; priori etiam præfertur.

* Totanus ruber BRISSON. Gambetta L. Chevalier rouge, Rothbeinel, digitum medium utrinqe appendiculatum, dorfum ex fufco & gryfeo variegatum, pectus album, gryfeo-fufco variegatum, roftrum fufcum, pedes rubros habet.

A vere ad autumnum usque apud nos obtinet, carnem habet exquisitam, autumno optimam.

VANELLUS Barb. ale, digitis tribus anticis, uno postico, crurum parte inferiore denudata, rostro recto, ad apicem craffiore, unguiculis brevissimis instruitur.

Tringa Vanellus L. Vanneau, Kibitz, Fifitz, criftam nigram habet, dorfum viride aureum, pectus album, roftrum nigrum, pedes ex fusco rufescentes.

Degit ad aquas, autumno & hyeme optima, quatuor ad quinque ova excludit, digestu facilis, minus bonum alimentum largitur. LEMERY.

Gryfeus BR. Squatarola L. xágðað, Koppel, dorfum ex albo & fufco-variegatum fiftit, pectus album, fufco nigricante diftinctum, roftrum cum pedibus nigrum. Gregatim volat, ejus caro priori quoque præfertur.

ICH-

». ICHTHYOPHAGI.

ANAS, whora, Canard, Ente. Tres digitos membrana nexos, posticum folutum habet, crura extra abdomen posita, rostrum, cujus latitudo crassitiem fuperat, denticulatum, fuperne convexum, in apicem unguiculatum, obtusium terminatum. Domestica BR. Bojchas L. Rostro recto, ex viridi flavescente, capite nec criftato, nec papillofo, collo torquato, cauda parva, pedibus aurantiis, pectore caftaneo, dorfo cinereo variegato diftinguitur: mas Canard, Entrich, Erpel, Entvogel, rectricibus quatuor intermediis fur--fum erectis, torque, capite, gutture, collo viridi aureo splendentibus &c. a femella Cane, Ente differt; hæc ad quatuordecim ufque ova excludit, & per quatuor feptimanas incubat. Octobri mense & per omnem hyemem gregatim volat, & mensis apponitur, eadem avis etiam in cortibus coli folet.

Anatis feræ caro fuavior & digestu facilior est, quam caro domesticæ, quæ omnes sordes devorat & corpus minus movet.

* Axungia nihil proprii habet.

Querquedula BRISSON. & L. Sarcelle, Kernel Priori magnitudine multum cedit, tæniis candidis ad oculos, dorfo fufco, pectore rufefcente, fufco, undulato, roftro nigro, pedibus ex fufco plumbeis gaudet,

Querquedula minor BR. Crecca L. petite Sarcelle, Dræfel. Antecedente minor, tæniam albo-rufefcentem per omnem faciem habet, aliam quoque exiguam fub utroque oculo, dorfum ftriis albidis & nigricantibus undulatum, pectus rufefcens, nigro variegatum, roftrum nigrum, pedes gryfeos.

Utraque querquedula exquifitioris faporis & digeftu facilior quam Bofchas reputatur.

* ARDEA, igosio, Héron, Reiger. Digitis nudis, tribus anticis, uno postico ad extimum anteriorem inclinato, roftro longo, recto, acuto, fuperne fulco longitudinali gaudet: *Cinerea* L. Caput habet cinereo nigrum, dorfum gryfeum, tæniam, quæ inferius corpus percurrit, nigram, roftrum ex flavo viridefcens, pedes viridefcentes.

Botaurus BR. Stellaris L. 25 eglas, Butor, Rohrdommel, priori minor, tænia fusca utrinque a maxilla inferiori ad collum ducta, dorso & pectore fulvo & nigro variegato, rostro fusco & pedibus viridi flavicantibus distinguitur.

Caro pifces fapit, chylus inde minus bonus furgit.

COLVMBUS Barb. Digitos quatuor habet, quorum tres anteriores membranis lobatis connexi funt, crura ad podicem pofita & intra abdomen abfcondita, roftrum rectum, acutum. *Auritus* BR. & L. *la Grebe à Oreilles*, *Tauchentlein*. Dorfum ipfi ex fufco nigricat, pectus, venter & crura albent, latera candida, aurantio variegata, roftrum nigrum, pedes exterius obfcure viridefcentes, interius rubefcentes, ad utrumque oculum fafciculus plumarum aurantiarum obtinet.

Pifciculos fapit, minus bonum chylum largitur.

FULICA, $\varphi \alpha \lambda \alpha \varphi \alpha$, Foulque, Pfaff. Tres digitos anticos, unum pofticum, totos membrana lobata obfeffos, roftrum conicum, lateraliter compression, crurum partem inferiorem nudam, frontem deplumatam, callofam habet. Atra L. fronte coccinea, dorfo & pectore gryfeis, roftro flavo olivaceo & pedibus fusco-olivaceis distinguitur.

Boni faporis eft, nec illaudabilem chylum fubminiftrat.

GALLINULA Barb. Crura inferne deplumata habet, æque ac finciput, tres digitos anticos, unum postieum, per totam longitudinem membranis fiss & fimplicibus auctos. Gallinula minor BRISSON. Fulica fusca L. Poule d'eau, Wasserhühnlein. Caput, collum, dorfum, fusco-olivacea funt, pectus & venter cinereum colorem habent, finciput craffiffima membrana flavo-olivacea obducitur, roftrum & pedes viridiolivaceum colorem habent.

Exquifiti faporis, nec digeftu difficilis eft.

* STERNA Barb. digitos tres anticos membrana nexos, posticum folutum habet, pedes extra abdomen positos, parvos, rostrum rectum, lateraliter planum, mandibulam utramque æqualem : *Major* BR. *Hirundo* L. grande Hirondelle de Mer, Spyrer: capite toto nigro, dorso cinereo, pectore niveo, rostro & pedibus rubris distinguitur.

Ab Aprili ad autumnum usque inter nos occurrit, in Rheni infulis nidificat.

Ejus caro minus tenera est, & pisciculos fapit.

Minor BR. Nigra L. Fischerlein fincipite albo, reliquo capite nigro instructus, pectore niveo, rostro & pedibus rubris.

Mense Majo optima, priori præfertur.

Nigra BR. Fissipes L. l'Epouvantail, Brandvogel. Caput nigrum, dorfum cinereum, pectus ex cinereo nigrum, rostrum nigrum; pedes obscure rubro sistit.

Cum infectis potius quam piscibus vescatur, hinc reliquis pro cibo præfertur.

III. PISCES.

Teneram ob carnem, qua gaudent, digeftu faciles funt, fed cum eorum fabrica ab humana infigniter diftet, hinc alimentum leve largiuntur, docente HIP-POCRATE, quod facile diffipatur, nec hominibus multum virium fubminiftrat, eadem caro cum facile in putredinem ruat, hinc non auderem illis accedere, qui febricitantibus aut a graviori morbo reconvalefcentibus pifces commendant. Marinos, ut fapore, ita quoque falubritate anteire, vulgo afferere folent, ad nos cum rariffime nifi faliti adveniant, carnes falitas autem minus falubres effe, monitum fuerit, (§. 17.) hinc tale encomium inter nos non merentur ; illi qui limum fluviorum aut stagnorum inhabitant, multo inferiores sunt, HIPPOCRATE jam observante, illis qui in fluviis aut torrentibus crebro motu agitantur. Sed etiam idem piscium genus, pro vario quo vescitur alimento, observatur differre, hinc minus laudantur pisces quos in fluviis, ad majores urbes, multo fordium genere inquinatis, capiunt, notante GALENO: pinguedo pisces commendat gustui, digestu difficiliores reddit; multi tempore verno minus commendandi, cum per hyemem & venerem fuerint exhausti: ætas non tantam in piscibus differentiam facit, quam in quadrupedibus & avibus.

a. FLUVIATILES.

* ACIPENSER Elops, animision, yalažias, Efturgeon, Stær. Branchias apertas habet, corpus longum, verfus caudam attenuatum, os in acumen eductum, edentulum, pronum. Sturio L. ore obtufo, quatuor cirrhis instructo, cute tuberculis rigidis aspera, non maculata distinguitur.

Pifcis marinus, a Majo ad Septembrem ufque in Rheno capitur, olim apud nos rariffimus, nunc frequentior, ad novem pedes longitudine, ad trecentas libras pondere accedit, quod omne volumen in fluviis acquirit, cum in mari vix cubitum excedat; femellæ maribus majores funt, caro marium præfertur, bovinæ pingui fimilis, lactes maximi fiunt, ejus ova contrita & fale condita, fub nomine *Caviat* per Ruffiam, Italiam & Turciam in cibum recipiuntur.

Digeftu difficilior ob copiofam, qua fcatet, pinguedinem; validum alimentum dat, exficcatus aut fale conditus multum gratiæ perdit, ventriculum magis gravat.

ALOSA, Alofa, Mayfifch. Ad HARENGOS a KLEI-

NIO refertur, qui branchias apertas, pinnam unicam brevem ad medium dorfi, corpus cultellatum spissum, caput imberbe habent: *Clupea Alofa* L. ventre ita compresso, ut carina ejus in aciem producatur, dorfo ex albo flavescente, lateribus nigro maculatis distinguitur.

Ex Oceano, Aprili menfe nos adit, quo etiam ad cibum optimus eft, fub finem Maji femen emittit, Junio noftras aquas relinquit, minus pinguis apud nos eft, quam ad mare captus, digeftu facilis, mediocris alimenti.

BARBO Barb. Barbeau, Barbe, Bärbele. MISTUS KLEIN. branchiis apertis, pinna una folitaria brevi, ad medium dorfi, corpore cultellato, ore barbato gaudet: Cyprinus Barbus L. maxillam fuperiorem longiorem, caudam bifurcam, dorfum cultellatum, dilute olivaceum, punctis nigricantibus diftinctum habet.

Illi qui in Ello capiuntur Rhenanis præferuntur, Junio sperma dimittunt, optimi Augusto, non exquisitisfimis piscibus annumerantur, digestu faciles, ova naufeosa & emetica esse dicuntur.

BRAMA Barb. Breme, Brefem. Branchias habet apertas, unicam pinnam dorfalem & illam brevem, ad medium dorfi, corpus præterea latum & fpiffum; *Cyprinus Brama* L. dorfo ex cæruleo nigricante, ventre plumbeo & pinnis ex cæruleo nigricantibus diftinguitur; in fluviis & aquis ftagnantibus occurrit; Februario optimus effe reputatur, Majo fperma emittit; ejus varietas occurrit minor, magis nigricans & pinguior *Wafferbrefem*, hæc elixata, illa frixa, menfis imponitur. Difficulter digeri, SEBITZ annotavit.

BALLERUS Bordelure, Blieck; Cyprinus Ballerus L. corpus ex plumbeo argenteum habet, pinnas fufcas, caudam ex rubro liventem. Vilioribus pifcibus adferibitur. Cyprinus Rutilus L. Rottel pinnis omnibus, præter pectorales, cum cauda rubris, dorfo fufco

165

cærulescente, ventre argenteo, iride rubra agnoscitur: Aprili semen emittit, Februario & Martio optimus, in fluviis & stagnis occurrit; ad pisces meliores refertur.

CAPITO, Schnotfisch. Ad Leuciscos KL. pertinet, qui branchiis apertis, pinna brevi ad medium dorfi, corpore castigato, ore imberbi, dorfo ventreque æqualiter arcuatis gaudent. Cyprinus Dobula L. pinnam dorfalem glaucam, squammas in dorfo fulvas, ad latera argenteas habet. Februario femen emittit, ad pedis longitudinem & libræ pondus interdum excrescit; digestu facilis, mediocris faporis.

* Cyprinus Jeses L. Kopp. dorfum carinatum habet, latera pressa, pinnas rubescentes.

LEUCISCUS Barb. Cyprinus Leucifcus L. Vandoife, Lauche. Ventrem argenteum, pinnas albas fiftit & ventrem linea recta divifum. Junio femen emittit, optimus Aprili & Majo, boni faporis eft & digeftu facilis; ejus fquammæ adhibentur ad margarithas artificiales.

LUCIUS, Brochet, Hecht. Branchiis apertis inftructus eft, pinna dorfali unica, parva, ano proxima. Efox Lucius L. mandibula inferiore longiore, dentata, dorfo fufco, ventre albo, & pinnis maculatis diftinguitur. Lucii anniculi Brochetons, Heuerling, folent appellari.

Primus AUSONIUS Lucii meminit, furit is in propriam gentem, & anates feras jam in ejus primis viis fuiffe repertas, funt qui afferunt, Lucii vel viginti libras pondere excedentes in fluviis noftris occurrunt; Martio & Aprili femen emittit, optimus a Junio ad Decembrem.

Digestu paulo difficilior esse reputatur, sapore exquisitus, bonum alimentum largitur; hepar ejus a delicatioribus multum laudatur; ova nauseosa & cathartica esse, sunt qui asseverant. * Mandibulæ inferiores, antice furfum flexæ dentibus prioribus parvis, pofterioribus majoribus inftructæ in officinas recipiuntur, $\frac{1}{50}$ circiter Extracti fpirituofi, $\frac{1}{3}$ fere aquofi, $\frac{1}{5}$ fpiritus urinofi, $\frac{1}{8}$ olei empyreumatici, $\frac{1}{5}$ fere falis volatilis edunt, NEUMANN. Præter vires abforbentes vix alias poffident.

* Fel & Axungia abstergendi ergo ad ulcera corneæ & meatus auditorii adhibetur.

NASUS Barb. Cyprinus Nafus L. roftro oblongo, pinnis flavicantibus, fuíco & rubro variegatis, ore edentulo agnofeitur.

Illi qui in Ello capiuntur, Rhenanis meliores reputantur, Aprili femen emittunt, optimi Junio effe cenfentur; ad trium librarum pondus interdum accedunt, mediocribus cibis adfcribuntur, digeftu, tefte SEBITZ, difficiles.

PERCA, mégun, Berfing, Kaulbarfch, Perche. Branchias apertas, pinnam dorfalem unicam, longam, interruptam habet. l'erca fluviatilis L. pinnis duabus ventralibus cum cauda rubris, corpore nigris maculis confperfo, agnofcitur.

Ad quatuor librarum pondus afcendit, Martio & Aprili femen emittit, pifcium prædator, in aquis non multum agitatis habitat. Julio optimus, ob carnem duriufculam minus bene digeri reputatur.

* Lapides Percarum funt exigui, elliptici, albi, femipellucidi, fuperne duplici linea longitudinali diftincti, inferne albi, duri, infipidi, cum acidis effervescunt, bini in fingulis piscibus, ad offis occipitalis inferiorem partem, vertebris vicinam, hærent. NEU-MANN inde Extracti aquosi, $\frac{1}{4}$ fere, $\frac{1}{32}$ liquoris empyreumatici obtinuit.

Præter absorbentes nullas vires habent.

* PERCIS KL. pinna dorfali finuata ab antecedente diftinguitur: Perca Cernua L. Kutt, caput compreffum habet, & pinnæ dorfalis radios duos minores,

L4

Majo & Junio femen emittit, Aprili optimus, priori æquiparatur.

SALMO, Saumon, Salm, Trutta KL. branchiis apertis, pinnis dorfalibus duabus, quarum una cutanea est, agnoscitur. Salmo Salar L. corpore argenteo, maculis distincto gaudet, & rostro acuto. Piscis marinus, qui inde in fluvios ascendit, plurimus in Rheno.

A Februario menfe ad Augustum nostratibus Lachs dicitur, a Martio ad Junium usque pro cibo optimus esfe reputatur, ad sexaginta librarum pondus interdum excressit; Novembri semen emittit. Majo menfe ejus ova inter lapides excluduntur: juniores Salmling, Saumonnaux a Septembri ad Majum usque capiuntur, Majo optimi, eo elapso ad Oceanum descendunt, nec ad nos redeunt usque dum ad quatuor circiter librarum pondus excreverint, in torrentibus exclusi, in illis ad secundum usque ætatis annum hospitantur, Rhenanis majores, stavessentes, rubris punctulis notati; cum Rhenani albi sint, nigris maculis distincti.

Caro Salmonis rubet, & coctione ejus rubedo intenditur, caput reliquis partibus folent præferre, ob pinguedinem, qua abundat, digeftu difficilior eft, cum primæ viæ validæ funt, bonum alimentum largitur; Salmerones & facile digeruntur, & probe alunt.

THYMALLUS Barb. In MG, Omare, Asche. Salmo Thymallus L. ventre plano, ore edentulo, dorso in acumen contracto agnoscitur.

Martio femen emittit, Junio ad cibum optimus, illi qui in torrentibus occurrunt minores & fapidiores funt fluviatilibus, digestu faciles funt & boni alimenti.

* Axungia abstergendi scopo & ad oculos & ad aures adhibetur.

TRUTTA, Truite, Forelle. Ejus duas maxime species nostrates in cibum recipiunt: Salmonem nimirum Farionem L. qui os dentatum, ventrem album, maculis conspersum habet, hæ maculæ si rubræ fuerint Lachs Forelle, Truite Saumonée dicitur; in torrentibus occurrit, Novembri mense semen emittit, optimus Junio & Julio habetur, nostri piscatores hunc piscem culturæ ope ad sex librarum pondus ascendere faciunt, omni respectu egregius piscis, & * Salmonem Truttam L. Weissforell qui cauda æquali, corpore albo, maculis nigris & rubris distincto agnoscitur, raro inter nos occurrit, ex Rheno piscatur, Farioni quoque anteponitur.

ρ. LIMO INHABITANTES.

ANGUILLA, $i_{\gamma\chi\epsilon\lambda\nu\epsilon}$, Anguille, Aal. Ad Congros a KLEINIO refertur, qui branchias occultas habent, pinnati funt & fpiraculo unico gaudent: Murana Anguilla L. dorfo fusco, ventre ex flavo albo, tubulis brevissimis in mandibula superiore, distinguitur.

Semper fub aqua in limo hæret, pifciculis, cancris & infectis vefcitur, ad trium pedum longitudinem afcendit, in vivariis culta vel decem libras pondere exceffiffe eft obfervata, Majo menfe femen emittit, pifcis viviparus.

Exquifitifimi faporis eft, fed digeftu difficilis & humores vifcidos gignit, hinc menfis imponendus five aromatibus five finapi conditur.

* Hepate Anguilla nyctalopiam curatum fuisse, quis credet PAULLINI observationi? & mulier, quam exuviis intus assumits ischuria liberatam refert CRU-GER, aliis medicamentis potius suam debuit falutem.

* Axungia abstergendi scopo commendatur.

* CENTRISCUS Barb. Stichling. Branchias apertas & corpus aculeatum habet; Gasterosteus acu-L 5 *leatus* L. aculeis tribus in dorfo; duobus in ventre, uno ad anum diftinguitur.

Aquas stagnantes inhabitat; Aprili semen emittit, vilioribus piscibus a nostratibus annumeratur.

COBITIS, Goujon, Gründling, Grundel. ENCUE-LIOFIS a KLEINIO adferibitur, Colvitis Barbatula L. cirrhos fex, maculas fufcas, corpus flavefeens, pinnam dorfalem brevem habet; in fundo fluviorum occurrit, Martio menfe optimus habetur, Aprili femen emittit, exquifitioribus pifeibus annumeratur, digeftu difficilior eft: * Cobitis tania L. Perée, Steinbeiffer cirrhis fex, pinna dorfali brevi, maculis rotundis, nigricantibus, lineas longas efformantibus agnofeitur & aculeo utrimque retro oculos diftinguitur.

Sub finem Junii fperma emittit, optimus Aprili, aquas stagnantes inhabitat, carne tenaciore gaudet, inter viliores pisces numeratur.

CYPRINUS, zwægir@, Carpe, Carpfe. Branchias apertas, pinnam dorfalem unicam longam, æqualem & os edentulum nobis fiftit: Cyprinus Carpio L. ore quatuor cirrhis instructo, dorfo fusco, squammis majoribus distinguitur.

In fluviis & lacubus copiofus, multi etiam ex Lotharingiæ lacubus nobis advehuntur, qui autem æque ac illi qui in pifcinis coluntur, illis quos ex fluviis pifcantur, gratia multum cedunt, quam vero, fi fluviis per aliquot menfes immittuntur, affequuntur; Aprili optimi, Majo & Junio fperma ejaculant, ad quadraginta libras interdum afcendunt, ultra centum annos vitam extendunt.

Digestu non adeo difficiles sunt, paroxysmos podagricorum inde excitari dicitur in Suite de la Matiere Medicale de GEOFFROI.

* Lapides Carpionum funt cartilagines inter palatum & primam vertebram fitæ, cornu confiftentiam

& colorem habent, facies eorum altera linea longitudinali divifa eft, & duabus facieculis gaudet, cum acidis non effervefcunt, $\frac{3}{4}$ gelatinæ vehunt. CARTHEU-SER. $\frac{1}{48}$ Extracti fpirituofi, $\frac{1}{8}$ aquofi, $\frac{1}{4}$ fpiritus ac $\frac{1}{3}$ olei empyreumatici, $\frac{1}{4}$ falis volatilis fere. NEU-MANN. Quas ipfis adferibunt vires antepilepticæ & diureticæ, experientia non confirmat.

GOBIO. Loche, Kresse, Cyprinus Gobio L. a reliquis ENCHELTOPIS KL. cirrhis duobus, ventre albo, pinna dorfali brievi, dorfo nigris maculis confperfo diftat.

Ad fundum fluviorum occurrit, Aprili & Majo optimus, Junio femen emittit, primus AUSONIUS ejus mentionem fecit; annumeratur pifcibus mediocribus, frixus maxime comedi folet.

* LAMPETRA, yaležía, Lamproie, Lampret, Neunauge. PETROMIZON KL. branchias occultas, pinnas laterales & ventrales nullas, fpiracula feptem, habet: Petromyzon fluviatilis L. ore nudo, unico ordine dentium minorum, præter inferiores majores, duabus pinnis cutaneis dorfalibus, una ad caudam gaudet. Martio mense nos adit & tunc optimus eft, Aprili femen emittit, carne gaudet tenaci & quæ limum fapit, digestu difficilis est & minus boni alimenti; qui conditi ad nos adducuntur adhuc minus falubres funt. * Varietas corpore minore & lineis transversalibus nigris distincta, Brüke Februario & Martio mense nos copiose adit, Aprili femen emittit, priore digestu facilior esfe reputatur. * Petromyzon branchialis L. Neunhacken ore edentulo, appendicibus in margine oris agnofcitur, Martio & Aprili femen dimittit, a Januario ad Martium optimus; vilis valde pifcis.

MUSTELA FLUVIATILIS, Lotte, Ruffolck. En-CHELTOPIS a KLEINIO annumeratur, qui branchias apertas habent & corpus anguillæ - forme. Gadus Lota L. pinnam dorfalem longam habet, mentum barbatum & caudam flabellatam.

Junio & Julio mense optimi habentur, a nostris piscatoribus culti, ad sex librarum pondus usque ascendunt, faporis exquisiti sunt, alimentum bonum largiuntur, digestu non multum difficiles.

TINCA Barb. Teinte, Tanche, Schley. BRAMÆa KLEINIO adferibitur. Cyprinus Tinca L. cauda atra, integra, pinnis circinatis nigris, corpore ex atro viridi & flavicante diftinguitur.

Occurrit in aquis stagnantibus & turbidis, Majo optimus esse censetur, Junio semen emittit, ad quinque librarum pondus non raro ascendit. Digestu difficilis & minus boni alimenti est.

2. MARINI.

ASELLUS, & Callarias KL. branchiis apertis & tribus pinnis dorfalibus gaudet; Gadus Morbua L. ore cirrhato, cauda æquali, corpore fordide olivaceo, maculis flavis notato, agnofcitur. Recens Cabeliau, exficcatus Merluche, Stockfifch, falitus exficcatus Morue dicitur.

Occurrit in Oceano feptentrionali, maxime ad Terram novam, nec non in mari Baltico, interdum etiam ad Galliam feptentrionalem, pifcibus & cancris vefcitur. Pifcatura ejus quæ anno 1500 cœpit, a Martio ad Octobrim ufque inftituitur.

Pifcis recens exquifitifimi faporis est, inter nos nonnifi exficcatus prostat, digestu difficilis & omnem gratiam a condimentis accipit.

Gadus Ægelfinus L. Callarias PLIN. Merlan, Labberdan, Bolchen ore cirrhato, cauda divifa, corpore albicante distinguitur: copiose in mari Baltico & ad littora Galliæ septentrionalis occurrit, vescitur ut antecedens animalibus; recens reputatur saluberrimus, ad nos fale conditus adducitur, hinc digeftu facilior eft, fapidior & magis falubris.

ENCRASICOLUS Barb. interaction 2006., Anchois. Chupea Encraficolus L. Maxilla fuperiore longiore & fquammis exiguis, facile decidentibus diftinguitur. Hi pifces ex mari Mediterraneo ad nos adducuntur, muria conditi, condimenti loco apud nos aliis cibis, in modum gari Veterum adjiciuntur; appetitus inde excitatur, & vifcidum ciborum corrigitur.

HARENGUS Barb. Clupea PLIN.? Harang, Haring. Clupea Harengus L. corpore toto argenteo, cum interlucente cæruleo, diftinguitur.

Infignes turmæ mare Germanicum ex ulteriore Septentrione, lacubus Kamtschatkæ maxime, adeunt, eorum piscatura, cujus initia ad annum 1565 referuntur, a festo Johannis Baptistæ ad Decembrem ufque inftituitur; variæ ejus varietates a mercatoribus Belgis recenfentur: Virgineos illos appellant in quibus genitura nondum potest distingui, reliquis pinguiores, plenos dicunt, qui eandem integerrimam habent, clausos denique, qui venerem exercuerunt, hi viliores effe reputantur; illi qui ad Magnam Britanniam capiuntur, reliquis præferri folent. Adducuntur ad nos haleces five fale conditi five infumati; rationem illos condiendi BEUKELSEN circa initium Seculi XV. reperisse dicitur, illi, præ reliquis, fal marinus & quidem Hilpanicus & Lusitanicus conducit, infumati Bücking, Pickling parantur dum muria macerati, capitibus ex verubus suspenduntur, & sub eis per quatuor & viginti horas ligna, quæ multum fumum emittunt, comburuntur.

Haleces recentes & digeftu facillimi effe & exquifiti faporis dicuntur, faliti digeftu difficiles funt & alimentum fubministrant & tenue & ad gignendam acrimoniam pronum, deteriores etiam funt fumo indurati (§. 17.)

NUTRIENTIA.

SARDINA, $\tau_{qi\chi}$ ize, Sardine, Sardelle. Encraficoli varietas, minus longa & lata, fex maculas nigras ad latera habet; cum encraficolo pifcatur, falita nobis adducitur & eodem modo as ifte in cibum recipitur.

IV. AMPHIBIA.

Ad naturam piscium propius accedunt, carnem habent digestu minus facilem, & unde minus laudabile alimentum surgit, cum hæc animalia ut plurimum ad loca paludosa degant, nec corpus multum moveant.

RANA, $\beta a \tau \rho a \chi \Theta$, Grenouille, Frosch: corpore quadrupede, cauda & alis carente, gaudet: Esculenta L. Capite producto & antice acuminato, dorso viridescente, maculis nigris consperso, tæniis tribus flavis longitudinalibus distincto, agnoscitur: ad aquas & paludes copiosa occurrit, ultra sedecim annos vitam producit, juniores sub finem Martii, annosiores ad finem Aprilis ex limo, quo se per hyemem recipiunt, prodeunt; æstate & autumno optima pro cibo est; infectis & junioribus aviculis vescitur, tertio demum ætatis anno puber evadit: cum hæc rana ferius ex limo prodeat, hinc evidens est, quod femora, quæ primo vere comedere solent, sive a busonibus sive a rana temporaria defumantur.

Digeftu difficilem effe & humores vifcofos gignere, obfervatur; fcopo medicato jura ex femoribus cocta, demulcendi & relaxandi ergo, cum fucceffu affumuntur; hinc, præeunte HIPPOCRATE, hecticis & phtificis laudantur, nec non illis, qui affectibus cutaneis laborant; hoc fcopo fex ad octo paria femorum, cum carne vitulina & vegetabilibus indicationi infervientibus, cum tribus libris aquæ ad remanentiam libræ unius decoquuntur. * Sperma Ranarum fubstantia alba, viscida, albumen ovorum referens, germina novorum animalium, fub forma corpusculorum rotundorum & nigrorum gerens, recipitur, tempore verno aquis innatans, a Rana Bufone L. five a Rana temporaria L. emista. A PARACELSO in usus medicatos receptum, extus modo adhibetur, demulcendi & refrigerandi scopo laudatur.

* Oleum Ranarum coctum, quod Arabibus in ufu fuit, eviluit, ejus in locum hodie adhibemus Emplastrum de Ranis VIGONIS, cujus descriptiones in Dispensatoria receptæ variant, nullæ non reprehendendæ; refolvendi ergo adhibetur, quam virtutem id cui Mercurium addunt, eminentem poffidet, & cum fucceffu ad glandulas induratas adhibetur, fi ejus uncia drachmam Hydrargyri fuscepit, cum fimplo Mercurii dicitur præparatum effe. Emplastrum de spermate Ranarum ZWELFFER, correctum hodie proftat, ad inflammationes diffipandas, levia vulnera & ulcera curanda conducit; gangrænam unquam inde fuiffe curatam multum dubito, egregias ejus vires ad diffipandum lac in mammis stagnans expertus eft FISCHER. * Oleum de spermate Ranarum Wurtemb. vix præ fimplici oleo olivarum, aliquid proprii videtar habere: * Aqua Spermatis Ranarum, quam PARACELSUS fub nomine Sperniola descripfit, plane iners eft: * Sperniola CROLLII, abfurdum medicamentum, peffime ad fiftendas hæmorrhagias commendatur.

Bufo L. Rubeta, ogéo G., Crapaud, Krott, Kröte. Pedibus posticis minoribus & duplici tuberum genere retro oculos, quorum posticum foraminibus pertufum est, distinguitur.

Vitam ultra quindecim annos extendit, tempore verno venerem exercet, Junio mense ejus pulli apparent.

Bufonem venenatum effe, post NICANDRUM omnium temporum scholæ Medicæ asseruerunt, non pauci id idem lepidis fabulis confirmare allaborarunt; postquam Medici curatius observationes instituere. & res naturales propriis, non alienis, oculis confiderare, nec cuilibet historiolæ fidem adhibere, fed ipli in veritatem eorum, quæ facta fuisse dicebantur inquirere, cœperunt, numerus observationum de effectibus venenatis animalis vulgatifimi, multum eft imminutus : BORELLUS, CLAUDER, VALISNERIUS bufones fine noxa comestos viderunt, id ipfum testantur innumera exempla eorum, qui ipforum crura, loco crurum Ranæ esculentæ, primo vere, affumunt; BLAU vidit liquorem e bufonibus laceffitis in oculos jaculatum, nonnisi pruritum excitasse, urina eorum manibus æque ac vultu excepta SAUVAGES nulla noxa affecit, ROESEL fe creberrime pulmones bufonum impune inflasse testatur. Minus recte itaque effectus venenati a bufonibus metuuntur, licet omnino concedendum fit, animal quod vulgo horrere folent, apud homines fenfiles præternaturales affectus producere poffe.

* Bufones exficcati a MARCELLO primum laudati, fi unquam hæmorrhagiam narium stiterunt, illud horori inde excitato erit adscribendum.

* Cineres Bufonum. Illorum, fub forma amuleti adhibitorum, laudes apud prudentiores recte ridentur, fi vera est SOLENANDRI de hydrope, eorum usu interno curato observatio, id ipsum a virtute cineribus communi erit deducendum.

* TESTUDO, Xerden, Tortue, Schildkröte. Eft amphibium quadrupes, carne molli gaudens, caput & pedes verrucis, in modum fquammarum obfidentur, testa dura, ex duabus laminis constante, variis maculis picta tegitur. Orbicularis L. pedibus palmatis, testa orbiculata, planiuscula distinguitur.

Occur-

Occurrit in Gallia meridionali & Italia.

Seculo decimo quinto ad ulcera interna ufurpari cœpit, ejus ufus in Gallia & Italia maxime obtinet: una testudo, rejectis capite & pedibus, ex aquæ libris duabus ad remanentiam unius coquitur & pro una dosi exhibetur. Mihi nulla exacta observatio nota est, quod hoc jus, a BIANCHI maxime laudatum, præ aliis gelatinosis proprias vires ediderit.

* Syrupus de Testudinibus resuntivus RENOD. Syrupus egregie demulcens est, maxime si melius ad artis regulas, quam præscriptio jubet, præparatur.

V. INSECTA.

CANCER, ragning, Ecreviss, Krebs. Animal exfangue, pedibus fex pluribus, duobus prioribus chelatis, oculis duobus, cauda articulata, inermi gaudet: Astacus L. corpore cylindraceo, cauda squammata & longa, thorace levi, basi utrinque dente simplici aucta distinguitur: duplex ejus inter nos varietas prostat, una cujus chelarum basis rusescit Edelkrebs, illa in altera albescit, nec coctione colorem mutat Steinkrebs, hæc nonnisi ab infima plebe in cibum recipitur.

Vescitur infectis, amphibiis, interdum in propriam gentem furit, mense Augusto totam, qua tegitur loricam deponit, una cum interna ventriculi tunica, & tunc cuticula modo tectus est, hoc tempore ad ventriculum lapides, quos oculos dicere solent, occurrunt, substantiæ pro firmando & indurando novo thorace collectæ, hinc eodem confirmato disparent.

Caro digeftu difficilior eft, & aliquid acris fovet, quod non raro fauces fub deglutitione incommodat; exanthemata, cardialgias, affectus arthriticos excitaffe eft obfervatum, gelatina quæ inde fanguinem fubit, & valde nutriens eft, & demulcentes vires exerit; hinc jura cancrorum debilibus, hecticis, vitiis cutaneis laborantibus laudantur, humectare & ventrem refrigerare ab HIPPOCRATE dicuntur, a FRANCO & BRUN-NER tam ore haufta, quam ano injecta, multum ad gangrænam inteftinorum commendantur; alcalina effe, nec in gelatinam confiftentem cogi poffe, obfervarunt BONONIENSES; RIVINUS efu cancrorum melancholiam vidit curatam, & SCHULZ fcorbutum.

Oculi Cancrorum Barb. Yeux d'écrevisse. Krebsaugen. Substantiæ rotundæ, convexo-concavæ, recentes cærulescunt, dein albi evadunt, proprio odore gaudent, ex lamellis arcte fibi invicem incumbentibus, ad faciem concavam laxioribus conflati, hærent inter utramque ventriculi tunicam, unus in utroque latere; maxima eorum copia ex Ruffia, ubi ad confinia Tartariæ leguntur, ad nos folet adduci, ibi cancros five piftillis ligneis contundunt, five in acervos collectos putredini relinguunt, carnem aqua eluunt, & hac ratione lapides colligunt, observante BAKER. Sed factitii quoque interdum proftant ex qualicunque terra alba alcalina parati, hos CRUGER a veris differre monuit absentia impressionis venularum, levitate, friabilitate, fortiore ad linguam adhæfione, minori, fi calcinantur, falfedine & fpuma cum in acidis diffolvuntur, citius fublidente. Exhibent 7/2 fpiritus urinofi, NEUMANN. Hujus medicamenti usus feculo superiore non videtur antiquior effe, quæ ipfi præter abforbentes adfcribuntur vires, Auctorum luxurianti ingenio & hypothefi de acido. communi febrium causa, debentur. Lapides cancrorum ad femunciam de die fumtos, fpecifice fluori albo mederi annotatur in Comment. by a Society of Phylicians in Edinburg I. Vol. 3.

* Sal vel Solutio & Magisterium Oculorum Cancrorum SCHROED. rectiffime exfoleverunt. Oculi Cancr. citrati A&. Med. Berol. cum fint terra ope acidi, vel abforbendi virtute privata, mihi faltem inertes effe

videntur. * Tabella de Oculis Cancrorum Parif. ad acrimoniam acidam non ineptæ funt.

* Cancri Paguri qui cauda parva, thorace utrinque obtufo plicato, & chelarum apice nigro gaudent,Oceani civis, chelæ recipiuntur ad * Pulverem e chelis cancrorum HAMILTON, eidem viperas Parifini adjiciunt, nullas alias nifi abforbentes vires edit; ingredientia pretiofa omittendo, Brandeburgenfes eum incompletum, nequaquam virtute minorem reddunt.

VI. VERMES TESTACEI.

COCHLEA, xox Mas, Limaçon, Schneck. Ex numerofa gente recipitur HELIX, testa spirali, cujus apertura coarctata est, semilunata, segmento circuli deficiente gaudet: Pomatia L. eo quod subovata sit, decolor, umbilicata & anstractus in siguram coni sibi invicem impositos habeat, agnoscitur.

In Europa temperata vel nimis vulgaris, hortorum noftrorum pestis.

Animal oviparum, cujus ova crufta quadam obducta funt & conglutinata; copiofiffimo femper muco turget; hyeme fub terram defcendit & teftæ orificium muco claudit, qui in operculum prædurum cogitur. Vefcitur vegetabilibus. Hodie etiam, more apud Romanos multum ufitato, cochleæ propriis receptaculis five vivariis affervantur, ut femper hyeme præfto fint.

Multum in cibum recipiuntur & gratum omnino edulii genus conftituunt, fi probe a muco, qui ipfis extus adhæret, mundantur; mollem carnem digeftu non difficilem fore prævideo, fed ab animali, adeo infigniter a noftra natura diverfo, non auderem multum alimenti promittere, plane aliter vifum fuit GALENO, cui plures Medici fubfcribunt. Cum hæc animalia plures partes vifcidas aquæ, cum qua coquuntur, largiantur, hinc jura inde parata ad acres humores M 2

State of the

demulcendos maxime laudantur, multo hinc in ufu contra tuffim funt, nec hecticis dantur fine fucceffu: fcopo medicato earum octo ad decem cum una aquæ libra decoquuntur.

* Aqua destillata LEMERY hecticis laudatur.

OSTREA, Huitre, Auster. Animal quod foramina lateralia sinistra gemina habet, & in testa bivalvi, cujus valvæ inæquales sunt & cardine edentulo, fossulam ovatam intercipiente, uniuntur, habitans: Edulis L. semi orbiculata est, valva superiore undulata, inferiore plana, integerrima, gaudet.

Oceani civis.

Magnitudine & colore variat; quæ ad Angliam piscantur, & illæ quæ in foss, ubi aqua marina stagnat, reperiuntur, virides evaferunt, reliquis solent præferri. Digestu facilis est, alvum laxat, paucissimum alimentum nobis subministrat. GALENUS.

Testæ vires absorbentes habent; quæ circa illa observatæ fuisse leguntur vires antilyssæ, jure suspectæ funt.

§. 21.

Foffilium ordo multa quidem condimenta, unicum modo alimentum nobis fubministrat, cum enim quotidie multam aquæ jacturam faciamus & hæc omnino, fi fanitas stare debet, fit restituenda, hinc hujus loci omnino est.

AQUA, JSwg, Eau, Wasser. Liquor qui certo frigoris gradu in substantiam solidam, pellucentem, decolorem, quam Glaciem dicunt, abit.

Aquæ elementi confiderationem Chemia fuscipit, eam, quæ vulgo in usum trahitur, pro nostro scopo, distinguimus in insipidam, quam *dulcem* appellant, & sapidam, quam Recentiores *Mineralem* dicunt, de illa intelligendi sunt Auctores, quando simpliciter de aqua loquuntur.

fa

AQUAM DULCEM five defumimus ex terra, five meteora illam nobis fubministrant.

Fontana, Eau de Roche, Quellwaffer; femper ex ftrato filiceo, creberrime media inter faxa, fcaturit, ex aqua marina, calore fubterraneo in vapores refoluta, furgens, qui per fiffuras montium in cavernas afcenderunt, ad eorum lacunaria in guttas denfati, inter filicea decurrentes, in propria gazophylacia collecti, per canales inde defcendentes, vi quæ a lapfu furgere folet, ex terra erumpunt; vehit quidem hæc aqua principia quæ aquæ marinæ propria funt, fed ea vehit in parca adeo ratione, ut nullos plane effectus edere queant, hinc hæc aqua omnem reliquam, ratione levitatis & puritatis, vincit.

Putealis quam labente ævo etiam Aquam fundi nec non vivam appellare confueverunt, Eau des Sources vel des Puits; Brunn- vel Grundwasser occurrit, quando terra corticalis ad usque stratum filiceum foditur, & fub hoc argilla obtinet; est ipfa aqua fontana, quæ ex receptaculo in stratum argillofum descendit, & ibi collecta, in confpectum noftrum prodit, five quando ipsi incumbens terra fodiendo removetur, sive quando hujus adeo exigua ratio eft, ut propria vi inde erumpere possit, sive fluvius quidam ad ipsam usque ftratum, quod scaturiginem emittit, penetravit; interdum etiam efformatur a pluvia ad stratum argillofum ufque descendente, creberrime utraque ratione surgit: ea si nulla strata percurrit, unde aliquid peregrini dissolvere potuit, æque pura eft ac antecedens, imo fi heterogeneis etiam inquinata fuerit, dummodo antequam fe hauriendam præbeat, per stratum filiceum fuerit filtrata, priori omnino erit æquiparanda: variam itaque hanc aquam effe perspicitur, mox purifimam, mox variis alienis inquinatam, falia fi vehit, ea affufione Mercurii in acido Nitri foluti deteguntur, terras & fapor & quod legumina non emolliat, declarat, in gru-

M 3 -

NUTRIENTIA.

mos inde coiens fapo acidi index eft; justa evaporatio & reliqua ad principia Chemiæ accommodata analysis, cum plena demum certitudine quas fovet substantias determinat.

Fluviatilis, Eau de Rivieres, Bach-five Flufswaffer, ex fontana furrexit, non raro putealem quoque recipit, meteorica eam etiam fubit. Dum per fylvas, vicos, urbes fluit, plures fordes accipit, inquinatur præterea a ftratis alveum fluvii efformantibus, nec non a pifcibus, amphibiis, vegetabilibus, quæ vehit, tam integris quam putredine refolutis, unde ejus limus, & hinc a motu impedita adeo facile putrefcit; cum autem fluvius celeri curfu fupra arenam aut filices fertur, fuas fordes deponit & hinc hæc etiam aqua pro vario fluvii alveo, variis locis quibus vicinus decurrit &c. variæ puritatis folet effe.

Aqua Lacuum, Eau de Lac, Seewasser, non multum a genio fluviatilis recedit, minus hæc mota, etiam minus bona esse reputatur.

Palustris, stagnans, Eau de Marais, Sumpfwasser, ob infecta, quibus scatet, vegetabilia putrescentia, inter quæ stagnat, innumeras sordes, quæ in ipsam illabuntur, & ob soli laxitatem inde non secedunt, omnium deterrima est, ita ut vel ejus exhalationes gravissimos morbos excitare constet.

Ad aquas meteoricas pertinet

Pluvialis, Eau de Pluie, Regenwasser Ab Alchemicis multum celebrata, recte a BOERHAAVE athmosphæræ lixivium dicitur, continet quicquid ex terra in aërem ascendit, sed quantis fordibus hinc inquinetur nemo non videt, diversissima præterea pro vario unde ascendit folo, pro varia qua decidit tempestate, pro vario quo adducitur vento; Cl. RUTTY in eadem alcali fossile, salem mirabilem, salem communem, nitrum, petroleum, & terram calcaream detexit; Ill. MARGGRAFF nitrum, salem communem & terram calcaream, fed vehit præterea innumera infecta, ovula, femina vegetabilium &c. unde mox fulphur, mox fanguinem habere credita fuit, hinc ex eadem, vegetabilia furrexisse mirati funt Alchemici, & ideo jure impurissima habetur.

Nivalis, Eau de Neige, Schneewasser: cum aqua frigore conftricta omnes fordes deponat, hinc fi pura nix fuerit liquata, aqua furgit, fi quæ alia pura, formata quippe a vaporibus in altum elevatis, & hinc ab omni heterogeneo liberis, per frigus autem ab omni heterogeneo, quod ipfis accreverat, depuratis; eadem ac antecedens principia habet, præter nitrum, terra quoque in ipfa in minori ad reliqua ratione eft, RUTTY & MARGGRAFF; cum autem laxæ nivi facile aliquid heterogenei, five dum ex aëre defcendit, five dum terram tegit, accrefcat, hinc ea omnino purior effe videtur.

Aqua Grandinis, Eau de Grêle, Hagelwasser, quippe quæ in altioribus athmosphæræ locis efformata, quæ vix fordes habent, in glaciem concreta quicquid heterogenei habuerat deposuit, & sub hac forma per inferiorem aërem descendens, etiam nihil peregrini potuit recipere.

Aqua Roris, Eau de Rosée, Thauwasser: formatur ab exhalationibus, calore in non magnam altitudinem elevatis, hinc impurissima est, pro variis unde furgit locis & vario anni tempore, varia omnino; hinc patet iteratas quoque analyses, nihil certi circa ejus naturam posse determinare,

Depuratur aqua dulcis quiete, coctione, filtratione per fabulum, putrefactione, optime deftillatione, fed nec hæc omne heterogeneum inde valet auferre, in aqua deftillata ELLER & acidi & olei veftigia deprehendit, BOYLE & Ill. MARGGRAFF ex aqua iteratis deftillationibus non mediocrem terræ quantitatem obtinuerunt, ita ut aquam in terram mutari, non pauci crediderint, & phænomenon ab aqua calore agitata, femper aliquid terræ fecum elevante, pro metamorphofi aquæ in terram habuerint.

AQUÆ MINERALES quæ calore gaudent illo, quem temperata athmofphæra habet, majore, Thermæ dicuntur, furgit ille five a calore, quo vifcera terræ femper calent, five a ftratis, in quibus pyritæ refolvuntur, & quas tales aquæ, brevi antequam ex terra fcaturiverint, perfluxerunt Thermææque ac aquæ minerales frigidæ a fapore vulgo folent diftingui, in terreftres, tophaceas W. duras vulgo, falinas & fulphureas. Salis fapore inftructæ, five vinofi quid linguæ imprimunt Acidulæ, Eaux aigres, Sauerwaffer, five falem communem fapiunt Salinæ, five amaritiem junctam habent, quæ naufeofiffima eft in Aqua Marina, Eau de Mer, Seewaffer, multo mitior in Amaris, Eaux Ameres, Bitterwaffer. Sulphureæ hepar fulphuris & olent & fapiunt.

Multa ratione in principia aquarum mineralium inquirere folebant, illa quæ per reagentia fit, multum ambigui habet, optima eft cum largam aquæ quantitatem rite evaporant, prudenter fingula, quæ ita obtinentur, examini fubjiciuntur, probe obfervando id quod creberrima experimenta evicerunt, nimirum eandem aquam, vario tempore tentatam, variam principiorum rationem exhibere.

Aqua tophacea vel ipfo fapore fefe produnt, terram quam habent calcaream, feleniticam, argillaceam, corporibus, fupra quæ decurrunt, aut quæ illis immittuntur, appendent, varias incruftationes, varia lapidum genera, quæ Tophi vel Stalactites dicuntur, efformant, legumina non emolliunt, terram, qua fcatent, cum ipfis alcali adjicitur, dimittunt; eafdem pro elixandis pifcibus, candefaciendis linteis, paranda cerevifia, conficiendo cæmento, fcopis tinctoriis &c. reliquis præftare Cl. RUTTY annotavit, innoxie bibi BORRICHIUS & SCHEUCHZER obfervationibus probant, sed videtur hic aliquid consuetudini dandum esse, terra enim harum aquarum vix non primis viis potest non oneri esse, & ad viscera delata & obstructiones & varia concrementa causari. Illustris DE LUC, ubicumque scrophulos & amentes vidit, aquas tophaceas obtinere observavit. Lettres sur les Montagnes I. p. 17.

Acidula five martiales funt, five alcali foffili fcatent : ochra, quam tales aquæ ad fundum dimittunt, violaceus infuper vel niger color, quem cum vegetabilibus adstringentibus induunt, martiales ex tempore detegunt; hæ aquæ vix non femper etiam alcali foffile vehunt, quod, dum five jam fub terra five illæ fupra terram erumpunt, vitriolum, fub cujus forma ferrum receperunt, aggreditur & effervescentiam excitat, fub qua aër fixus, qui his aquis copiofior, per experimenta jam annotata a Cl. VENEL inhæret, vi quadam erumpit, aquam in bullas agit, ut ea propria ratione linguam afficiat, efficit & vitra, quibus includitur, disrumpat, hic aër, ita per effervescentiam agitatus, constituit illum spiritum æthereum, circa cujus naturam explicandam & vires prædicandas adeo multi funt Auctores. Vitriolo omni refoluto, ferrum, quod in aqua hærebat, inde dijicitur, & perit omnis ejus qualitas, quæ ab effervescentia five a ferro pendebat; fed dantur etiam aquæ martiales, quæ five nullum five pauciffimum modo alcali vehunt, ex his ope evaporationis verum vitriolum martis obtinetur, nec in illis spiritus æthereus hæret, testibus SHORT, Cl. RUTTY, Cel. CADET; interdum etiam vitriolum fub terra jam fuit destructum, tunc aquæ neutiquam vinofum faporem habent, nihil spirituosi exhibent & falem mirabilem, dum evaporantur, fistunt, observante Cl. BROUZET: Acidula alcali fossili scatentes etiam aëre fixo copiofiore gaudent & acidum vehunt, quod, quando supra terram erumpunt cum alcali coit & effer-

MS

NUTRIENTIA.

vescentiam excitat, hinc ipsis quoque spiritum æthereum solent adscribere; hoc genus aquarum, antequam acidum cum alcali coiit, alcalium éffectus solet edere.

fer

0

t

0

pe

M

Aque Amare : A fale mirabili Glauberi, quo fcatent, & faporem & vires habent, huic fali cum terra quædam alcalina in varia ratione juncta fit, hinc falia amara crystallifationis ope ex his aquis obtinenda, tam a fincero fale mirabili, quam fingula a fe invicem differunt.

Aqua Sulphurea : Odore, qualitatibus alcalinis, colore nigro, quem metallis, quæ ex eorum menftruis dejiciunt, affricant, aut argento ipfarum vaporibus expofito, non raro etiam fulphure folidis fcaturigini vicinis accrefcente, agnofcuntur.

Quando ad ea quæ de ortu aquæ fontanæ monui, applicantur obfervationes apud Auctores occurrentes de pyritis refolutis, alcali foffili, fulphure, fale communi & vaporibus acidi vitriolici creberrime fub terra occurrentibus, harum omnium aquarum origo facile perfpicitur & ratio patet, cur in illis crebro præter reliqua principia, felenites, fal ammoniacus fixus & fal communis occurrant.

Immenfus est numerus aquarum mineralium, quæ hactenus innotuerunt, copiosifimæ earum descriptiones prostant, præcipuas collegit Cl. RUTTY, de Germanicis multum meruit Cl. ZUCKERT. En illas quæ apud nos usitatæ funt.

MARTIALES.

Petrinæ falis mirabilis $\frac{1}{960}$, terræ calcareæ & vitrefcentis $\frac{1}{1920}$, falis ammoniaci fixi, acidi falis, petrolei, ferri vestigium. BOECLER.

Pyrmontanæ ferri $\frac{1}{2880}$, falis mirabilis $\frac{1}{288}$, felenitiæ $\frac{1}{1440}$, terræ calcareæ $\frac{1}{720}$, alcali foffilis veftigium. SEIP.

Rippelsavienses falis mirabilis 3, terræ calcareæ

& vitrescentis $\frac{1}{640}$ falis communis, ammoniaci fixi, ferri, petrolei, vestigium. BOECLER

Schwalbacenses falis mirabilis & alcali foffilis $\frac{1}{443}$, ochræ $\frac{1}{823}$. HOFFMANN.

Spadanæ falis mirabilis $\frac{1}{1152}$, totidem terræ martialis, terræ calcareæ $\frac{1}{823}$. SPRINGSFELD.

Sulzbacenses alcali foffilis $\frac{1}{1440}$, terræ seleniticæ, calcareæ, vitrescentis $\frac{1}{1440}$, falis mirabilis, ferri, petrolei, vestigium. HAUSMANN.

Wadwilenses $\frac{1}{1920}$ falis mirabilis cum ochra mixti. MOREL.

SALINAE.

Castonacenses falis mirabilis $\frac{1}{798}$, falis communis $\frac{1}{380}$, terræ vitrescentis & calcareæ $\frac{1}{115}$, petrolei vestigium. Kürschner.

Plumbaria faponacea fubstantiæ ex petroleo, argilla, calce, fale communi & alcali foffili compositæ $\frac{1}{2880}$. MALOUIN.

Selteranæ falis communis & alcali foffilis $\frac{1}{120}$, terræ $\frac{1}{180}$. VENEL.

AMARA.

Sedlizensis falis mirabilis $\frac{1}{36}$, terræ $\frac{1}{576}$. WALTH: THERMÆ.

Aquifgranenses calore gaudent ad illum aquæ ebullientis proxime accedente, $\frac{1}{215}$ alcali foffilis, $\frac{1}{960}$ terræ calcareæ, totidem falis polychrefti, nec non fulphur continent. SPRINGSFELD.

Badenses in Marchionatu, præcalidæ scaturiunt, $\frac{3}{320}$ falis communis, ochram quoque & selenitem vehunt. Abhandl, von dem im Marggraftum Baaden gelegenen warmen Baad. 756.

Bourbonenses multum quidem calent, fed albumen ovorum inde non induratur, substantiæ ex sale mirabili, petroleo, sale communi, selenite, terra calcarea, alcali sossili & sulphure constantis $\frac{1}{192}$, continent. BAUDRY.

NUTRIENTIA.

Carolina Sprudel calore ad 165 gradus Farenheit, afcendente calent, falis mirabilis $\frac{1}{192}$, alcali foffilis $\frac{1}{660}$, falis communis $\frac{1}{1440}$, totidem fere terræ fovent; fcaturigo Molendina thermometrum ad 123° afcendere facit, continet falis mirabilis $\frac{1}{288}$, alcali foffilis $\frac{1}{576}$, falis communis $\frac{1}{1440}$, terræ ultra $\frac{1}{1920}$. BECHER.

Ferinarum Wurtembergenfium calor 100° æquat, exhibent $\frac{1}{2880}$ fere fubftantiæ ex fale communi, petroleo & felenite conftantis. GESNER.

Niederbronnenses calorem 63° habent, falis communis $\frac{1}{240}$, falis mirabilis $\frac{1}{3840}$, falis ammoniaci fixi, terræ vitrescentis, petrolei, ferri vestigium. LEUCHSENRING.

Piperina ad 93° calent, terræ pinguis 1920 fere, falis communis vestigium habent. RAHN.

Wisbadenses falis communis $\frac{1}{384}$ & vestigium ferri vehunt. HOFFMANN.

Aqua Marina naufeofo fapore gaudet, fi deftillatur prima aqua infipida eft, pofterior autem naufeofa, acido falis fœta, eandem ab alcali fixo abstrahendo, optime depurari, & potui aptari, viderunt Recentiores; in eadem præter falem communem, alcali fixum quoque, fal Glauberi & petroleum hæret. RUTTY.

Dum rimamur maximam humorum noftrorum quantitatem ex aqua efformari, ejufdem autem non mediocrem quantitatem nunquam non per varium excretionis genus e corpore eliminari, nullam præterea non lædi functionem, fi humores jufta aquæ ratione non attenuantur, nulli omnino dubitabimus aquæ dulcis maximam effe ad fuftentandam vitam neceffitatem. Sed eadem non modo præcipuum eft alimentum, optimis etiam omnino medicamentis adfcribenda eft, fi quod aliud polychrefti nomine celebranda: glutinis dum in folidis auget rationem, emollientes edit effectus, medetur præterea ex fua natura *Inftitut*. *Chemia*. Omni morbo a fpiffitudine oriundo, eadem, cum omnis acrimonia genium falinum habeat, ipfam & mitigat, & ut e corpore eliminetur, efficit, excretiones aquofas præterea promovet, & quicquid commodi inde nobis furgit; ab indicatione vitali itaque femper, a reliquis creberrime indicatur, vix non omnes Obfervatores ab HIPPOCRATE ad recentiffimum quemque, effent adducendi, fi morbos, ubi aquæ potus profuiffe obfervatus eft, vellem colligere.

Sed infignis quoque est aquæ usus, quando externe adhibetur, five ea partes modo abluantur, & ita a fordibus liberentur, five eadem partibus extus patentibus injecta, eluantur in ipfis quæ hærent heterogenea, ipfa relaxentur, five eadem dum fibi partes corporis immittuntur, Balnei vice fungatur; hujus & antiquiffimus & ampliffimus omnino usus eft, inde non modo auferuntur fordes, & transpiratio restituitur, fed pars eidem commissa relaxatur evidenter, hunc effectum moderatus balnei calor etiam multum juvat, hic si excedit, omnia mala ab aucto præter naturam calore oriunda, debent timeri omnino : Illustris TIS-SOT Traité des Nerfs T. II p. 2. egregie observat ob confensum cutis cum nervis balnea summum contra spasmos remedium esse. Cum humores semper eo ruant, quo ipfis minus refiftitur, hinc balneorum ope ab interioribus ad exteriora, a ramis aortæ superioris in inferioris, vel vice versa, evocantur, hinc pro varia Medici intentione, variæ partes balneo folent committi; fed nec negligenda est aquæ a vasis cutaneis reforptio, quam balneantes experiuntur, id quod experimentis ad stateram captis MARTYN; & alii a Cl. SPRINGSFELD, & Illustr. HALLERO, citati auctores evincunt, inde cur balnea excretiones aquofas promoveant, in scabie aut aliis exanthematibus retropulfis adeo egregie conducant, ad vifcera indurata vel stricta, laxandam alvum faciant &c. fit evidens; pressio denique, quam experiuntur partes bal-

neo merfæ omnino quoque debet attendi, ejus effectus eo funt majores, quo altior est aquæ columna corpori imminens, cam, fi ad duos pedes mergimur, vel 2280 libris æqualem effe, WAINEWRIGHT evicit, inde roborantur vafa, acceleratur refluxus fanguinis venofi, retardatur arteriofi fanguinis motus, novum de vi balneorum aperiente argumentum furgit. Commoda & pericula, quæ ab excedente balnei calore vel frigore oriuntur; ex eis quæ circa effectus caloris & frigoris Pathologia præcipit, funt dijudicanda, quicquid etiam in laudem talium balneorum adducatur, illa mihi faltem, cum omnem mutationem fubitaneam periculofam effe nemo ignoret, femper funt fuspecta. Aquam ex alto in partes induratas cadentem eas quoque efficacius emollire, Auctores medii feculi primi perspexerunt, hanc rationem a Græcorum en Becxn, Embrocationem dicunt, Ducia quoque, la Douche, Tropfbad folet appellari, & vel hodie cum fucceffu in usum trahitur, fi aliquam partem infignior durities occupat, aut si fuspicio est, quod a nervo preflo morbus originem habeat, hoc in cafu, five vertici capitis, five medullæ fpinali, five loco, fub quo non multum ab integumentis remotus nervus decurrit, aqua ex alto inftillatur: maxime autem vires aquæ emollientes intenduntur, fi ea fub forma vaporis applicatur, hic mos crebro olim apud Lacedæmones obtinuit, hinc talia balnea Laconica folent dici, Badavez Enpa, Balnea ficca, Sudatoria, Vaporaria, Etuves, Schwitzbader &c. ea aut per artem parantur, dum in conclavi detinentur vafa aqua plena, ex quibus suppositus ipsis ignis, continuo vapores afcendere facit, five fub conclavi excitati vapores per varia fpiracula in illud admittuntur, five instituuntur in propriis domunculis, quas æque ac modo dicta conclavia medii ævi Auctores Stuphas appellarunt; aut nativa occurrunt ad metalli fodinas, montes ignivomos, scaturigines fontium,

NUTRIENTIA.

ubi vaporibus copiofe ex terra afcendentibus fornices fuperstruuntur, tales plures in Italia occurrunt, Pyrmonti quoque obtinent, teste SEIP. Cubiti articulationem, ob indurata ligamenta immobilem, priftinam flexilitatem per talia balnea recuperaffe, VAN SWIE-TEN vidit & CAPPEL contracturam a Mercurio in corpore retento, curatam. Ex his quæ de effectibus balneorum hactenus monui, sequuntur regulæ, quæ sub eorum usu observandæ sunt; earum præcipuæ sunt, monente HIPPOCRATE, corpus a fordibus prius liberandum; plethora venæfectionibus imminuenda; frigus & omnes mentis perturbationes fedulo vitanda; æftate maxime usus balneorum suscipiendus, debiles præcipue, nonnisi fensim sensimque in balneum descendant, in univerfum regulis diæteticis accuratiffime fit obtemperandum.

Aquæ minerales, quas etiam Veteres adhibuifle, FALLOPIUS probat, præter effectus, quos ratione, aquæ edunt, propriis quoque a reliquis quibus scatent principiis, pollent, omnes cum falia media vehant, hinc omnes vires aperientes edunt, spisso humores attenuant, excretionem urinæ & transpirationis intendunt. Aquam marinam in morbis Glandularum maxime, & omnibus cutis vitiis ad libram unam pro dofi hauftam, balnei autem fub forma adhibitam roborare in Epilepfia, Scorbuto, Morbis cutaneis egregie conferre Cl. Russel observationes evincunt. Illæ quæ Ferrum fovent, evidenter etiam roborant ad morbos, qui ab humoribus difficilius per systema venæ portarum movendis furgunt, cum magno fucceffu adhibentur, & fi quæ aliæ ad ulcera interna etiam cum fucceffu poffunt adhiberi, cum ichorem diluant & temperent, viscus debilitatum roborent, vires bonum fanguinem præparantes restaurent, id idem MORTON & SEIP multa experientia fuffulti confirmant, mirandum omnino quod AVICENNE commentum de his aquis

ad morbos pectoris noxiis, adhuc dum etiam nimis frequenter obtineat : aquæ, quæ Alcali fossile vehunt, cum mucum pulmonum attenuent, & aliquid roboris pulmonibus dare videntur, hinc ad pulmones debiles aut tophis obfessos laudantur; illæ quæ salis mirabilis eam vehunt rationem, ut etiam amaræ inde evadant & incidentes effectus edunt, & alvum movent; [ulphure scatentes ad promovendam diaphorefin, roboranda folida, ulcera interna folidanda, præprimis faciunt. Spiritus, quem præeunte HOFFMANN, vulgo mire extollere folent, ad virtutem harum aquarum plane nihil facit, cum Phyfiologi uberrime evincant, aerem elasticum fanguinem fubire non posse, & fi eum fubiret perniciofisfimos editurum effectus; ex eis præterea, quæ in Pathologicis circa elasticorum in primas vias effectus docentur, fequitur elasticum aquarum mineralium ventriculo & inteftinis adeo non conducere, ut eis etiam noxium effe jure reputetur, eodem sane res redibit, aer sive per fermentationem five per effervescentiam extricatus & calore primarum viarum rarefactus, tragoediam ludat. Circa potum harum aquarum, præter ea quæ fanitatis leges in univerfum fuadent, cavendum ne a non affuetis nimis frigidæ affumantur, ne major quantitas, intervallis nimis brevibus, ingurgitetur, ne ventriculo cibis repleto ingerantur; purgantium dofin limitat numerus feceffuum, inde excitatus, reliquæ non per dies fed per septimanas sunt usurpandæ, usque dum effectus, quem inde expectamus, obtineatur; earum quantitatem de die hauriendam, determinat ventriculus inde non gravatus; tandem & id adhuc eft observandum, quod aquis foteriis, quarum ope demulcendi nobis animus est, aut a quarum stimulo noxiam quandam irritationem metuimus, optimo confilio lac adjiciatur.

Aquæ minerales, fi fub forma balnei adhibentur, fe ratione aquæ gerunt, ut fupra dictum eft, cum autem

autem & ferrum & falia & fulphur & terræ, quibus fcatent, fibras roborent, hinc effectus quidem balneorum aquæ dulcis edunt, quamdiu corpus ipfis immerfum eft, cum autem cuti applicatas relinquant partes, quæ'illam firmiorem reddunt, alios quoque,qui ipfis proprii funt,edunt effectus, hinc eædem quoque & vario alio fine præfcribuntur & multis cafibus vel aquæ dulci præferuntur. Cum falia refolvant, terræ & inter has maxime felenites, nec non fulphur & ferrum evidenter adftringant, alcalia infigniter abftergant, maxime fi petroleo unita funt, argillæ faponis effectus edant, hinc patet quomodo pro varia Medentis indicatione varium balneum debeat feligi, imo quomodo balnea naturalia per artem etiam efficaciora poffint reddi.

Cum ex hactenus dictis liqueat, aquas foterias ratione principiorum quæ fovent agere, hæc principia autem jufta analyfi quam accuratiflime poffint determinari, hinc evidens eft, easdem, monente jam GALENO, ubivis poffe imitari, nec opus effe ex longinquo accerfere aquas, aut longo itinere adire, quas domi æque efficaces poffumus parare: cum autem mutationi aëris, remotioni ab objectis domefticis, vitæ, toti profpiciendæ fanitati accommodatæ, non paucæ omnino vires fint ad mitigandos & curandos, chronicos maxime, morbos, ratio quoque fiduciæ in medicamentum a multis laudatum habenda fit, hinc nollem in totum morem ægrotos ad fontes foterios mittendi improbare.

De fedimento thermarum, quod vulgo *Lutum* dicere folent, non est quod multa verba faciam, fequitur illud naturam fubstantiarum unde efformatur, has Chemia inde eruit, earum autem facultates fuis quæque locis dicentur.

Aqua destillata tanquam purissima ad scopos me-

ROBORANTIA.

CAP. II.

ROBORANTIA.

§. 22.

Alimenta robur nativum confervant, id fi per morbum fuerit imminutum, Medicamentis Roborantibus restituitur; imminuitur autem robur nativum five vitio fluidorum, & tunc his profpiciendum vel per Chirurgiam, vel per medicamenta fuis locis indicanda, five vitio folidorum, horum robur, cum tam a foliditate pendeat, quam a propriis, quibus in corpore vivo gaudent, viribus, irritabilitate nimirum & vi nervea, hinc Roborantia quintuplici maxime modo videntur agere 1-) fibras mechanice condenfando, 2) glutinis rationem imminuendo, 3) partes terrestres augendo, 4) irritabilitatem intendendo, 5) vim nerveam excitando, primum Gymnastica, frictiones, frigus ligaturæ efficiunt, duo fequentia Amara, Adstringentia & Refine præstant, posteriora Refine & Aromata, ultimum, præprimis Fragrantia.

5. 23.

Placuit Auctoribus Roborantia pro variis, quæ ex eorum actione fluunt, effectibus variis nominibus appellare : Visceralia Barb. dicuntur, dum viscerum robori medentur, & cum Recentioribus receptum fit juftum viscerum robur tonum appellare, hinc eadem etiam Tonica folent dici, imo ipsis fequior ætas pro vario viscere, quod roborare putabantur adhuc propria nomina indidit Cephalica, Cardiaca, Stomachica, Uterina &c. aut pro varia quæ inde intenditur actione Carminativa, Aphrodisiaca, Emmenagoga, Nervina &c. eadem quia efficiunt, ut vasa minorum ordinum, craffiores quos acceperunt humores, majoribus reddant, Discutientia folent appellari, Indicari Roborantia quoties nativum robur deficit, aut id ipsum ex intentione Medici intendendum eft, facile liquet: eorum abusus, in univerfinm morbos a rigiditate, ab angustia, ab errore impactorum, a retentione excernendorum post fe ducit; de indicantibus & contra indicantibus fingularum Classium, fingulis titulis dicetur.

S. 24.

I. AMARA.

Præ reliquis roborantibus indicantur Amara, 1) cum debilitati lentor quoque junctus eft, hinc maxime conducunt in obftructione vifcerum abdominalium, 2) fi bilis five iners eft, five non rite in canalem inteftinalem effunditur, 3) fi acrimonia alcalina primas vias obfidet, 4) fi vermes obtinent, hinc Anthelminticis fequioris ævi adfcribuntur, 5) Extus, ad humores frigidos refolvendos 6) Ad fphacelum exteriora occupantem.

Eorundem abufus, fystema Venæ Portarum præcipue offendit, intestina exficcat & inflammat, alvum obstruit, hæmorrhoides, febres & turbas in utero excitat.

a. VEGETABILIA.

ABROTANUM vid. Aromata.

ABSYNTHIUM, a 4/109100, Absinthe, Wermuth. Ejus duplex genus hodie in officinis prostat, unum quod Vulgare, alterum quod Ponticum dicunt; valde probabile videtur, nostrum vulgare Veterum ponticum fuisse.

Vulgaris Folia laciniata funt, laciniis latiufculis, utrinque alba, proprio odore, minus grato & fapore amariffimo inftructa.

* Pontici Folia tenera funt, tenuissime laciniata, odorem non fortem spirant, saporem habent levissime amarum, evidenter aromaticum.

Artemisia Absynthium L. BLACWELL 17. Receptaculo villoso, foliis multifidis, floribus cernuis, caule tomentoso distinguitur: Pontica L. BLACWELL 527. receptaculo nudo, foliorum laciniis linearibus, floribus ernuis & caule herbaceo agnoscitur; prior in omni Europa; posterior in Helvetia & Germania Orientali occurrit, in hortis nostris colitur.

Folia Vulgaris $\frac{1}{3}$ fere Extracti aquofi largiuntur, quod amariffimum eft, fed naufeofo odore caret, alcohol inde ex viridi flavicante colore tingitur, & omnem ejus odorem, æque ac faporem retinet; aqua inde deftillata & odorata & fapida eft, fpiritus vini parum fub deftillatione inde recipit. LEWIS. Olei flavi & amari $\frac{1}{256}$ fundit.

Sanguinem diffolvit SCHWENCKE.

Abfynthium vulgare, infigni qua gaudet amaritie, & oleo æthereo quod fovet, potens medicamentum eft ad roborandas primas vias, attenuandum mucum, & corrigendam bilis inertiam, hinc ab omni tempore tanquam medicamentum polychreftum ad vitia digeftionis fuit commendatum. HIPPOCRATES illud ad icterum, GALENUS hypochondriacis laudat, febres inde curatas ALBRECHT, afcitem VOLCKAMER vidit, & ad arcendum calculum, præeunte AETIO, Illustr. LINNÆUS laudat; longo ufu podagram avertiffe expertus est Illustr. HALLER qui & ejus vires ad icterum & hydropem vidit, EUGALENUS autem antifcorbuticas; idem cum egregie ad cavendam putredinem faciat, hinc celebratur ad omnes morbos malignos, & vel nimis frequenter præfervationis ergo vino infufum, more a PALLADIO jam laudato, adhibetur; nec inefficax eft ad necandos vermes & nidum eorum destruendum. Sed probe femper fub ejus ufu retinendum, motum humorum inde augeri. Ejus Drachmæ duæ cum libra aquæ aut vini infunditur. Externe scopo stomachico & anthelminthico adhibetur, nec non discutiendi & contra sphacelum defendendi ergo.

* Aqua destillata NIC. PRÆP. vix efficax, * Spiritus parum proprii habet. Conserva VAL. CORD. Syrupus simpl. LEMERY: * Syrupus compositus MESUE non ingratum medicamentum: Sal VAL. CORD. præ

aliis falibus alcalinis, nullas proprias vires habet: Effentia fimpl. ZWOELFFER. * Effentia composita JUNG-KEN, fimplicior est illa quam Parisiens habent: * Oleum destillatum VAL. CORD. ob acrimoniam, qua gaudet, vix intus datur, extus scopo carminativo & anthelmintico præscribitur: Oleum costum VAL. CORD. ad unguenta & clyfinata carminativa, anthelmintica, stomachica recipitur: Extractum VAL. CORD. * Vinum tam per fermentationem paratum COLUMELLE, quam id quod infusione fit, olim magni fiebat, Parisiensibus officinale. Species pro Vino Abjynthii Nostrat. non male ad infusia stomachica adhibentur.

Ponticum ab aromate potius, quam ab amaritie dijudicandum est.

AGARICUS vid. Purgant. Specific. ALOES vid. Purgant. Specific.

AMMEOS SEMEN vid. Aromata.

AMMONIACUM GUMMI. Succus concretus mediocri calore lentefcens, qui fub forma magnorum fruftorum ad nos adducitur, conftat ex grumis flavefcentibus, quibus copiofe grana lactei coloris, quæ fequior ætas Ungues, Lachrymas, Amygdalas dixit, immixta funt, odorem habet fragrantem, faporem amarum, acriufculum, naufeofum.

Quo pluribus unguibus gaudet, eo melius.

Noftrum non videtur Soulaua a'uuwwater Veterum effe : ignoramus plantam unde defumitur, femina, quæ ipfi interdum commixta reperiuntur, illud ex umbellifera quadam planta defumi, videntur fuadere.

Ex deferto Africæ Barca, ubi olim Jovis Ammonis templum celebrabatur, Alexandriam & inde ad nos ducitur.

Totum fe ex aqua fuspendi patitur & ipsi lacteum colorem affricat, inde autem elapso aliquo tempore denuo recedit, alcohol ejus dimidium diffolvit; nec oleum odoratum fundit, nec aqua inde abstracta evadit odorata, fpiritus inde destillatus levem odorem contrahit. Extracti aquosi, debiliore sapore instructi $\frac{9}{10}$ circiter & $\frac{3}{4}$ circiter extracti spirituosi sinde obtinuit CARTHEUSER. Extracti aquosi $\frac{5}{6}$ circiter, spirituosi $\frac{3}{4}$ NEUMANN.

Validas vires refolventes poffidet, laudatur maxime ad mucum pulmonum attenuandum, nec non ad obstructa viscera abdominalia. Datur ad drachmam dimidiam, sub forma sive emulsionis sive pilularum. Extus quoque cum magno successi adhibetur ad refolvendos tumores scirrhodeos, scrophulas, tophos &c. Applicatur sub forma cataplasmatis, emplastri, unguenti &c.

* Spiritus & Oleum VAL. CORD. præ aliis fpiritibus & oleis empyreumaticis vegetabilibus nihil proprii videntur habere: Pilula de Ammoniaco QUERCE-TANI. Rationem G. Ammoniaci auxerunt Noftrates, & adhuc magis Wurtembergenses, qui minus extra-Eti Aloës & Myrrhæ quoque recipiunt; medicamentum variam adhuc correctionem admittens, vi refolvente infigni gaudet, & cum fucceffu ad attenuandum mucum pulmonalem, & referanda vifcera abdominalia adhibetur, fcopo refolvendi ad fcrupulum unum, purgandi ergo ad drachmam dimidiam datur; magis placent * Pilulæ Tartareæ BONTII, cum fimpliciores fint, in his Tartarus Vitriolatus expungendus. * Syrupus Wurtemberg. egregium ad affectus pectoris mucofos videtur medicamentum effe. Emplastrum five Ceratum de Ammoniaco FOREST. Recentior noftri Difpenfatorii editio præscriptionem Wurtembergenfium fequitur, magis placet illa FORESTI, laudatur hoc medicamentum ob vires refolventes, quas & ad ipfa vifcera extendere dicitur.

* ANAGALLIS, Muron, Gauchheil. Recipimus Cauliculos cum foliis, quæ ovato oblonga funt, acumine terminata, integerrima, fapore acri & amaro linguam feriunt. ANAGALLIS. Corollam habet quinquefidam, rotatam, regularem, ifantheram, monogynam, calice quinquefido fustentatam & capfulam horizontaliter dehiscentem: Arvensis L. BLACWELL 43. & 274. foliis ovatis & seffilibus agnoscitur, vulgo illa quæ florem phœniceum habet, solet in usum trahi.

Crefcit in omni Europa, præter maxime feptentrionalem.

Dat extracti aquofi & amari $\frac{3}{8}$, refinæ magis amaræ & acris $\frac{1}{4}$. BUCH. SCHRADER inde $\frac{1}{3}$ extracti aquofi, ultra $\frac{1}{5}$ refinofi obtinuit.

Refolvendi ergo jam a GALENO laudatur, hinc feminæ Westphalæ illam ad pellendos menses adhibent, teste HOFFMANN; sub seculi superioris initia, QUERCETANI & HARTMANN maxime auctoritate ejus contra melancholiam vires cœperunt extolli, unde quoque Germanica denominatio furrexit. BOENNCKEN eas etiam propriis obfervationibus confirmare nititur; maxime autem ejus vis antilysfa folet laudari, quam post RUFUM plures Auctores adducunt, MAROLDUS & BRUCH propriis observationibus evincere cupiunt, inefficacem Ill. HALLER vidit; fed & fateor me femper plus Chirurgiæ, quam cuicunque etiam specifico, cum homo ab animali rabido morfus fuerit, fidere. Datur fingulis diebus demorfis ad fcrupulos quatuor, fub forma pulveris, quem quoque quotidie vulneri, ufque dum confolidatum fuerit, jubent infpergi. Externe abstergendi ergo ab HIPPOCRATE commendatur.

* Aqua defiillata VAL. CORD. iners æque ac * Oleum coctum August. quod nescio cur ad dolores colicos laudant.

* ARISTOLOCHIA. Potius a viribus fecundum PLINIUM & DIOSCORIDEM, quam a proprio alicujus Viri nomine, ut CICERO autumat, denominata effe videtur. Sub hoc nomine varium radicum genus officinæ recipiunt. Aristolochia longa, mas aque ci byta µanga, appnv, Aristoloche longue, lange Osterluceywurzel, pollicis circiter crassitiem, dimidii pedis longitudinem habet, leviter rugosa, extus dilute susce intus ex luteo-albens, leviter spongiosa, odore nullo, sapore aromatico, quem acriuscule amarus excipit, instructa.

ARISTOLOCHIA. Corolla nuda gaudet, ex bafi ventricofa in limbum producta, hexanthera, monogyna, capfula fexangulari: Longa BLACWELL 257. foliis cordatis, integerrimis, petiolatis & floribus folitariis diftinguitur.

Crefcit in Europa meridionali.

Tam aquæ quam alcoholi fuas vires transmittit ,, fpiritus vini inde fi deftillatur, fere iners, aqua odorata & fapida, cum ipfi oleum odoratum fit immixtum, Extractum fpirituofum faporem radicis retinet, aquofum naufeofum eft. LEWIS. Extracti aquofi rob fambuci redolentis, fubfalfo amaricantis $\frac{1}{3}$, fpirituofi aloen fpirantis, valde amari, aufteriufculi $\frac{1}{4}$ obtinuit inde CARTHEUSER.

Ob vires abstergentes, quarum sufpicionem ejus fapor præbet (§. 7.) in morbis pectoris frigidis, obstructione viscerum abdominalium aut vasorum uterinorum, præeunte HIPPOCRATE, laudatur. Externe ab ejus pulvere egregios in ulcere cacœtheo tibiæ effectus vidit SIMON PAULI.

Aristolochia rotunda, femina Diosc. Malum terra, agi50202000 50020020, Suda Aristoloche ronde, runde Ofterlucey. Radices nobis subministrat ex pluribus tuberibus concretas, rugosas, priore pallidiores, intus rusas, antecedente acriores & magis amaras.

Aristolochia rotunda L. BLACWELL 256 folia cordiformia, parum petiolata & flores folitarios habet.

In iifdem cum priori locis crefcit; fimili quoque ratione fe ad menstrua habet. LEWIS.

Præ longa magis abstergere; GALENUS monuit &

ROBORANTIA.

fapor fuadet, tincturæ spirituofæ inde extractæ vires antarthriticas celebrat KLAUNIG.

* Extractum Wurtemb.

Aristolochia Clematitis, Cretica, agizodózia udmuatítis, Aristoloche de Vigne, Osterlucey. Radices & Folia officinæ recipiunt.

Radices longæ funt, fibrofæ, digito minimo angustiores, extus rufefcunt, intus pallidæ, antecedentibus minus acres & minus amaræ, inodoræ.

Folia cordiformia; firmula, viridia, fapore acriusculo prædita funt.

Aristolochia Clematitis L. BLACWELL 255 foliis cordatis & floribus confertis axillaribus diftinguitur.

Etiam in Europam temperatam afcendit, creberrimum ad vites noftras vitium.

Radices ad eofdem ac antecedentes adhibentur ufus, iis evidenter debiliores, ab HELDIO multum ad arthritidem celebrantur. Folia noftrates vino macerant & tanquam vulnerarium polychreftum adhibent.

* Extractum Wurtemb.

Aristolochiæ Pistolochiæ, Maris DIOSC. Polyrrhizæ, Aristoloche menue, petite Aristoloche, Radices ex communi capite plures fibras longas & tenues emittunt, subluteæ, odore non ingrato, sapore acri & amaro gaudent.

Aristolochia Pistolochia L. foliis cordatis crenulatis & floribus folitariis gaudet.

Crefcit in Europa meridionali.

Proxime antecedentis vires habet.

Aristolochiæ fabaceæ Barb. Holwurzel, Radices funt bulbofæ mox folidæ, mox cavæ, cute fusca tectæ, fub qua caro alba & amara hæret.

FUMARIA. Corolla irregulari, in calcar educta, calice nullo aut diphyllo fustentata, hexanthera, monogyna, filicula uniloculari gaudet: Bulbofa L. BLAC-WELL 534. caule fimplici & bracteis longitudine florum distinguitur.

NS

Copiofe in Europa calida & temperata crefcit, in Boruffiam ulque ascendit.

Extracti aquosi valde amari ultra $\frac{3}{8}$, refinosi amari, acris $\frac{3}{76}$ circiter siftit. CARTHEUSER.

Inter primos TRAGUS has radices Aristolochiis annumeravit, nulla propria vi, præ aliis amaris, instructas.

AURANTIA AMARA V. Fr. Horræi.

* BDELLIUM GUMMI, BARMON. Sub hoc nomine hodie affervamus maffas majufculas ex rubro fufcas, quarum portiones a fordibus liberæ pellucent, inter dentes friabiles, & eis leviter adhærentes, earum fumus fuavem odorem fpirat, fapor evidenter amarus eft.

Ex Arabia, India & Africa ad nos adducitur, nondum conftat ex quo vegetabili.

Et alcohol & aqua largam ejus portionem diffolvunt, aqua inde abstracta ejus odore imbuitur, spiritus vini levissime. LEWIS. Extracti aquosi amaricantis & aromatici ultra $\frac{3}{8}$ & totidem spirituosi largitur. CAR-THEUSER. Extracti aquosi $\frac{5}{6}$, spirituosi $\frac{1}{4}$. NEUMANN.

Valide refolvit, hinc jam a GALENO ad mucum viarum primarum & urinariarum nec non pectoris, externe quoque ad tumores aquofos & mucofos commendatur; multi quoque illud, præeunte FORESTO, five intus fumtum, five accenfi fumum, ano recipiendum, ad hæmorrhoides laudant.

BEHEN NUCES vid. Emollientia.

BERBERIS RADIX vid. Fr. Horrai.

BRYONIA vid. Emetica

* BUCULA Barb. Confolida media Barb. Bugle, Goldengunfel. Folia recipimus ovato oblonga longis petiolis fustentata, margine dentato notata, fapore amaro instructa.

Ajuga. Corolla labiata, cujus labium fuperius bifidum & minimum est, inferius trifidum, calice

-

ROBORANTIA.

quinquefido fustentata & seminibus nudis gaudet: Reptans L. stolones reptantes habet.

In Boruffiam ufque afcendit.

A vi adstringente laudata, hodie evilescere cœpit. * Aqua destillata VAL. CORD. plane iners.

CALAMUS vid. Aromata.

* CALENDULA Barb. Soucy, Ringelblume. Flores læte luteos exhibet, ligulatos, fuperne incifos, qui exficcati omni odore & fapore carent, aquam autem, cum qua infunduntur, amaram reddunt.

CALENDULA. Flore mixto gaudet, calice fimplici multipartito, receptaculo nudo, feminibus triangularibus, incurvis: Officinalis L. BLACWELL 106 feminibus craffis, muricatis & foliis spatulatis distinguitur.

Crefcit in Europa Meridionali, apud nos copiofe in hortis colitur.

Extracti aquosi $\frac{3}{8}$ fere, $\frac{1}{4}$, circiter spirituosi inde obtinuit CARTHEUSER.

Cum hi flores exficcatione omnem odorem, quem recentes fpirabant, exuant, hinc ab illis minus bene five aromaticæ five balfamicæ vires expectantur.

* Aqua destillata VAL. CORD. omnino iners, * Acetum & * Conferva Seculo XVI in officinas intrarunt, cum flores Calendulæ multum feculo antecedente contra pestem fuerint laudati.

CAPPARIS CORTICES vid. Olera.

* CARDIACA Barb. Agripeaume, Herzgespann. Sistit Folia quæ ex angustiore fine dilatantur & tribus dentibus inæqualibus terminantur, odorem nullum, faporem intensius amarum habent.

LEONURUS. Corollam exhibet labiatam, calice pentagono & quinquefido fustentatam, labium superius integerrimum, villosum, inferius tripartitum, parum inæquale, reflexum, semina nuda: Cardiaca L, soliis trifidis, laciniis vix inciss distinguitur. BLACW. 171.

Ubique in Europa occurrit.

Ob amaritiem vifcidos primarum viarum humores attenuare, eafque roborare videtur, hinc ad diftenta hypochondria & cardiogmum infantum multum olim laudabatur.

Unguentum Cardiacum SCHROED. Cardiacam non pro basi habet, medicamentum resolvens, multo in usu est ad cardiogmum.

CARDUUS BENEDICTUS Barb. Chardon Benit, Cardenbenedicten. Et Folia & Semina adhibemus : illa funt oblonga magnis finubus dentata, hifpida, inodora, intenfe amara; hæc majufcula, ventricofa, ftriata, flava, margine rotundo coronata, qui in fetas rigidas educitur, medulla alba & dulci farta.

CENTAUREA flores compositos tubulos, calice imbricato comprehensos habet, receptaculum setofum, semina papposa: Benedicta L. BLACWELL 476. calice per maturitatem clauso, duplicato spinoso, storibus parum difformibus, soliis semidecurrentibus, denticulato-spinos distinguitur.

Europæ Meridionali & Orienti propria planta, FRIDERICO Imperatori ex India, fub initium Seculi XVI allata, tefte TRAGO, apud nos in agris colitur.

Extracti fpirituofi $\frac{1}{7}$ circiter, aquofi autem $\frac{3}{4}$ circiter largiuntur folia. NEUMANN.

Primæ viæ a foliis roborantur, hinc eadem ad febres intermittentes & alios morbos a læfis digeftionis viribus commendantur: laudari quoque folent a vi propria fudorifera, non video quo jure, & fi quidem ad morbos malignos profunt, de quo mihi faltem nulla justa observatio innotuit, proderunt virtute omnibus amaris communi. (§. VII.)

* Semina unice ratione nuclei oleofi agunt, hic cum parvam ad involucrum, quo cingitur, rationem habeat, & illa fæpe carie exefa in officinis occurrant, hinc rarius in ufum trahuntur.

Aqua destillata VAL. CORD. iners: * Extractum

204

EJUSD. Estentia Noric. * Syrupus QUERCET. * Sal per incinerationem paratus nihil proprii habet.

CARLINA vel CARDOPATIUM Barb. Ebertsmurzel num $\chi_{\alpha_{\xi}\alpha_{\ell}\lambda_{\xi}\alpha_{\ell}}$ Veter. ? Defumitur inde Radix quæ fibrofa eft, digitum craffa, aliquot pollices longa, rugofa, fuperne in aliquot ramos divifa, extus fusca, intus ex albo flava, odore proprio naufeoso, fapore acri & multum amaro instructa.

CARLINA. Florem compositum habet tubulosum, calice imbricato & cujus squammæ externæ siccæ sunt cinctum, receptaculum paleacum & semina papposa: Acaulis L. BLACWELL 532 caule unifloro distinguitur.

Non afcendit ultra Germaniam feptentrionalem, nec in Anglia occurrit.

Aqua parum inde recipit, $\frac{1}{220}$ olei odorati fpiffi largitur. LEWIS. Olei fpiffi $\frac{1}{108}$, Extracti refinofi ultra $\frac{1}{11}$ & ultra $\frac{1}{2}$ aquofi inertioris NEUMANN inde obtinuit. Extracti aquofi ultra $\frac{3}{8}$, refinofi $\frac{1}{4}$ circiter. CARTHEUSER.

A viribus contra pestem maxime laudatur, quas cum in exercitu CAROLI M. probasse dicitur, inde nomen suum accepisse volunt, hodie rarissime hominibus exhibetur, multus autem ejus usus est in Mulomedicina.

CASCARILLA vid. Aromata.

CENTAUREUM MINUS, REPTAUGIOV MIRGOV, AIMVAIOF, Centaureum Lepton, Fel terræ, petite Centaurée, tausend Gulden-Blumen. Ejus flores adhibentur cum fummis caulibus, quos aggregatim terminant, rubri inodori, intense amari, cum sensu acrimoniæ.

GENTIANA. Corollam monopetalam, cujus laciniarum numerus varius est, calice sustentiatam, pentantheram, digynam, capsulam unilocularem habet: Centaurium L. BLACWELL 452 corollis quinquesidis, infundibuli formibus, stylo unico, & caule dichotomo distinguitur. Crefcit ubique per Europam.

Tam aquofa quam fpirituofa menstrua vires inde extrahunt. LEWIS. Extracti spirituosi $\frac{1}{2}$ fere, aquosi $\frac{2}{3}$ exhibet. NEUMANN.

Multum laudatur ad roborandas primas vias & aperiendas obstructiones viscerum abdominalium, monente jam GALENO, hinc ad fugandas febres multum commendatur, ad podagram ab AETIO; a MAUR. HOFFMANN hydropicis auxilium attulisse fuit observatum. Extus ad ulcera maligna laudatur.

* Aqua destillata VAL. CORD. & odore & fapore fatis evidentibus, fed minus gratis gaudet, evidenti acrimonia linguam ferit, hinc nollem inertem dicere: * Extractum EJUSD. ad fcrupulum dimidium pro dofi datur: * Essentia Wurtemberg a collectoribus Difpenfatorii ad drachmas duas data, alvum ducere eft obfervata: * Syrupus ZWELFFER. Conserva Hafnienf. Sal per incinerationem SCHROED.

CHAMÆDRIS, χαμαίδους, χαμαίδοω, λινόδους, Germandrée, Gamanderlein. Inde proftant Folia parva, oblongo-ovata, crenata, inodora, amara.

TEUCRIUM. Corolla labiata, labio fuperiore deficiente, inferiore quinquefida, lacinia media maxima, calice quinquefido fuftentata, gymnosperma gaudet: Chamadris L. BLACWELL 180 foliis ovatis petiolatis & floribus pedunculatis, crenatis distinguitur.

Crefcit in Europa minus septentrionali, in Saxonia adhuc occurrit.

Tam aquæ quam alcoholi fuas vires largitur, Extractum aquofum magis amarum eft quam fpirituofum. LEWIS. Utrumque in pari ratione vehit. CARTHEUS.

A vi refolvente & aperiente maxime commendatur, præeunte GALENO. VESALIUS ad podagram commendatam recenfet, RAJUS polychreftam ad referandas menfium obstructiones & curandas scrophulas, RIVERIUS & CHOMEL ad febres intermittentes.

* Extractum VAL. CORD.

CHAMEMELUM, Chamomilla Barbar. $\chi = \mu = i \mu \pi \lambda \sigma r$, ardeps, Camomille, Camillen. Affervamus ejus Flores, qui parvi funt, compositi, mixti, radio albo & disco flavo instructi, odorem proprium fortem spirant, fapore gaudeat amaro, cui quædam acrimonia juncta est. Triplex florum Chamæmeli genus recensetur inter plantas officinales, quorum uni Vulgaris nomen relinquunt, alterum a Roma, tertium a fatore denominant.

Primum defumitur a *MATRICARIA* floribus mixtis, calice hemifphærico, cujus fquammæ fere æquales funt, fuftentatis, receptaculo & feminibus nudis inftructa : *Chamomilla* L. BLACWELL 298 receptaculis conicis, ligulis non deflexis & foliis fetaceis, parum tomentofis diftinguenda.

In omni Europa vulgaris.

Secundum est ANTHEMIS floribus mixtis, calice hemisphærico, seminibus nudis, receptaculo-paleaceo instructa: Nobilis L. BLACWELL 526 foliis setaceis & canescentibus distincta.

In Europa temperata, inter nos quoque occurrit & in Anglia.

Officinæ Germanicæ nonnisi varietatem floribus plenis recipiunt, quæ minus adorata est, & minorem saporem habet; in hortis apud nos colitur.

* Tertium fubministrat Anthemis Cotula L. receptaculo conico, ligulis angustissimis & foliis viridibus agnoscenda : in iisdem cum prima locis crescit.

Florum Chamomillæ Vulgaris libra, olei quod per plures annos cæruleum colorem fervat, Cl. LEWIS drachmas tres, NEUMANN fcrupulum unum, mihi drachmam unam fubministravit, flores Chamomillæ Romanæ LEWIS olei flavi drachmas quinque exhibuerunt, ego ex triginta libris florum Chamomillæ fætidæ plane nihil olei recepi. NEUMANN porro expertus eft Vulgares æque ac Romanos $\frac{1}{2}$ extracti aquofi & $\frac{3}{8}$ extracti fpirituofi vehere, quod utrumque inertius eft. Ex floribus Chamomillæ Romanæ CAR-THEUSER $\frac{1}{2}$ fere extracti aquofi, $\frac{1}{3}$ fpirituofi, ex Vulgaribus fimiles fere rationes obtinuit.

Poffidet Chamæmelum vires infignes ad referandas obstructiones viscerum abdominalium, observante GALENO, & ab HOFFMANN infigniter ad malum hypochondriacum laudatur, principio, quo fcatet, odorato evidenter in nervos agit, hinc jam ab Ægyptiis, ad febres intermittentes fuit commendatum, id quod quoque plurimi ex posterioribus Medicis observarunt, inter quos GASER, ZACUTUM, DIEMERBROECK, BA-GLIV, MORTON, WERLHOFF, HOFFMANN, SCHULZ, BOERHAAVE nominaffe fufficiat, ejus vires fopientes etiam, in omni spasmorum genere infignes fuerunt obfervatæ, ad dolores ventriculi & inteftinorum multum a FORESTO laudatur, ad nephritidem a S. PAULI & HAGENDORN, ad dolores post partum a FORESTO, ad referanda lochia a TREW, & intus & extus applicatum fe egregie gerere ad tormina dyfenterica vidit Illustris PRINGLE & eximias vires antisepticas habere.

Extus cum magno fuccessu ad epithemata & cataplasmata discutientia & resolventia adhibetur.

Aqua destillata VAL. CORD. efficax omnino. Aqua Carminativa DORNCRELLII præter flores Chamomillæ, etiam varia alia carminativa recipit, concinnior omnino posset parari, ad duo cochlearia pro dosi datur in colica flatulenta. * Aqua Carminativa SCHROED. vinosa est, calidiora quoque quam antecedens ingredientia habet, hinc nonnisi in casibus frigidis adhibenda. * Aqua Carminativa Wurtemb. est Dorncrelliana correcta: * Aqua Carminativa spirituosa Wurtemberg. Calidum medicamentum, quod ad ad aliquot drachmas, post usum flatulentorum, affumitur: * Oleum destillatum VAL. CORD. ad guttas octo intus datur, egregium antispasmodicum: Oleum per Infusionem AETII, male per coctionem parari jubetur, discutiendi & sopiendi ergo præscribitur, cynanchen gravissimam ejus usu externo sopitam vidit SARTO-RIUS: Syrupus August. * Tinctura Spirituosa Paris.

CHAMÆPITYS, zaµavælivs, ödönugov, iavia, ordnjiris, Ivette, Schlagkräutlein. Folia exhibet officinis hirfuta, trifida, odore nullo, fapore amaro, qui aliquid aromatici habet, inftructa.

Teucrium Chamapitys L. BLACWELL 528. folia trifida habet & flores feffiles, folitarios.

In Marchiam ufque afcendit.

Aqua æque ac alcohol vires inde extrahunt, Oleum odoratum fundit, Extractum aquofum amarum eft & falinum, fpirituofum dulciufculum & acre. LEWIS; Extracti aquofi $\frac{1}{4}$ & totidem fpirituofi largitur. CAR-THEUSER,

Ad eosdem ac Chamædrys, præeunte GALENO, morbos adhibetur; ob evidentius principium balsamicum vel præferenda esse videtur.

CICHORIUM vid. Olera.

CHINE CORTEX vid. Aromata.

CINÆ SEMEN Barb. an σαντόνων Veterum? hanc vocem in Sanctum inflexerunt, prouti Italorum Zina in Cina, Semen Contra, Wurmsaamen. Proftant his nominibus Semina oblonga, flava, stipitibus inquinata, sapore amaro cui aliquid acris junctum est, odore forti, nauseoso instructa. Id quod ab Aleppo denominatur reliquis præstat, hoc excipit Orientale, Indicum ab exiguis flosculis, Barbarum seu Africanum, a cauliculis maxime constituitur.

Artemisia Judaica L. foliis caulinis obovatis, obtusis, lobatis, floribus paniculatis & pedicellatis distinguitur. Crescit in Syria, Persia &c. Tam aqua quam alcohol ejus faporem & odorem recipiunt, infufum fpirituofum majorem, præ aquofo, gratiam habet, Extractum aquofum inodorum eft LEWIS: NEUMANN $\frac{7}{17}$ Extracti fpirituofi $\frac{1}{24}$ aquofi, fere inertis obtinuit: CARTHEUSER autem hujus ultra $\frac{3}{4}$, illius $\frac{5}{4}$.

Inter Latino-Barbaros hoc medicamentum cœpit in usum trahi, nec male remedium, quod acrimoniam habet, sætet & amarum est, ad hunc scopum recipitur. Datur ad scrupulum unum. Cum multi nauseosum medicamentum horreant, hinc a MAT-THIOLI ætate prostat, saccharo incrustatum sive

Confectio: * Pulvis contra Vermes Nostrat. præter femen Cinæ etiam alia anthelmintica & cathartica recipit; inde parantur Tabulæ Nostrat. * Morfuli contra Vermes Wurtemb. $\frac{1}{24}$ Æthiopis mineralis & totidem radicis Jalappæ vehunt.

COLOCYNTHIS vid. Purgantia Specifica.

* COLUBRINUM LIGNUM Barb. Bois Couleuvrée, Schlangenholz. Adducitur ad nos fub forma fruftorum, quæ dimidii pedis circiter craffitiem habent, folida funt, ponderofa, colore albo, cui lutefcens accedit inftructa; cortex, quo teguntur, caftaneus eft, rugofus, & tuberculis concoloribus, fparfis gaudet, odor nullus, fapor valde amarus.

STRICHNOS. Corollam quinquefidam, fimili calice fuftentatam habet, ifantheram, monogynam, baccam unilocularem, feminibus villofis fartam: Colubrina L. BLACWELL 403 foliis trinerviis diftinguitur.

Crefcit in India.

CARTHEUSER inde $\frac{1}{5}$ circiter Extracti aquofi amariffimi, $\frac{1}{4}$ fere fpirituofi æque amari obtinuit, & obfervavit aquam inde abstractam, balfamicum odorem spirare.

Ab Indis commendatur ad morfus ferpentum; Seculo XVI in Europa innotuit, ad curandas febres & enecandos vermes a quibufdam laudatur : HEYDE inde ftuporem, tremorem, fatuitatem, furrexisse observavit. A medicamento suspecto, & quod præ aliis securioribus nihil proprii habet, jure abstinemus. Commendatur ad sesqui drachmam, aqua infusum.

* CONSOLIDA REGALIS Barb. Calcatrippa Barb. *Pexquivior*? Pied d'Alouette, Rittersporlein. Inde recipimus Flores qui cærulei funt, amari, inodori, & qui cum aqua infusi tincturam rusam sistunt.

DELPHINIUM. Corollam quinquepetalam irregularem, nectario caudato inftructam, polyantheram, mono-feu triginam, capfulam unam feu tres habet: Confolida L. BLACWELL 29. nectariis monophyllis, caule fubdivifo gaudet

Crefcit ubique in Europa.

Extracti fpirituofi $\frac{5}{24}$, aquofi ultra $\frac{3}{8}$ largitur, utrumque Extractum odorem fuavem fpirat. CAR-THEUSER.

Præter vires, quas cum omnibus amaris communes habet, ego faltem nullas proprias inde expecto, nec video quo jure ipfi olim traumaticas adfcripferint. Aqua destillata VAL. CORD. Cur ad morbos oculorum laudetur, non perspicio.

* COSTUS, zóz @. Noster ab illo Veterum evidenter diversus est; primus AVICENNA amari mentionem fecit, Græci recentiores demum dulcem addiderunt; inter Recentiores de hoc non constat, hodie pro eo Canellam albam exhibere solent; tam dulcis quam Arabicus, quos POMET habet, ex mente potius ficti esse, quam vere obtinere videntur; unicus igitur modo prostat Costus nimirum *Amarus*, qui constituitur a Radicibus aliquot pollices longis, unum craffis, extus flavis, intus profundius tinctis, medulla laxa fartis, violas olentibus, fapore evidenter amaro & acri instructis.

Costus L. Corolla a quatuor petalis efformatur,

quorum unum labiatum eft, labio fuperiore fimplici; inferius fexpartitum, calice tridentato fupero fuftentata, monanthera, monogyna; fructus eft capfula trilocularis, polypyrena.

Crefcit in India.

Extractum aquofum vix odorum, non multum amarum $\frac{2}{3}$, fpirituofum magis amarum, vix $\frac{1}{9}$ radicis æquat. Lewis.

Amaritie, qua gaudet, & principio acri humores attenuat & folida roborat, expectorantibus, diureticis & diaphoreticis adícribitur.

Dofis ad drachmas duas in Infufo.

* Caryocoftinum BAYRI eft medicamentum purgans quod $\frac{1}{16}$ Diagrydii vehit, * Extractum Maracoftinum MINDERERI, abfurda formula in qua Aloes primas, Coftus autem & Marum exiguas valde rationes habent, Wurtembergenfes aliquatenus correctum præfcribunt: * Oleum Coftinum, MESUE nec hujus compofitio placet.

CROCUS vid. Aromata.

CUPRESSI NUCES vid. Adstringentia.

* CVANUS Barb. Bluet, Kornblumen. Recipimus Flores ex calice evulfos, tubulofos, in plures lacinias diffectos, pulchre cæruleos, inodoros, qui, fi ficci guftantur, infipidi funt, aquam autem, cum qua infunduntur, evidenter amaram reddunt.

Centaurea Cyanus L. BLACWELL 270 calicis fquammis ferratis & foliis linearibus diftinguitur.

Crefcit per omnem Europam, æstate floret.

Vires refolventes, aperientes, diureticas inde se expertos effe, HOFFMANN & ALBRECHT testantur.

Aqua destillata SRHROED. quid ad curandos oculorum morbos debeat facere, ego faltem non perspicio.

DICTAMNUS ALBUS vid. Aromata.

ELATERIUM vid. Vomitoria. ENDIVIA vid. Olera. * EUPATORIUM, edwarden, illud Græcorum eft omnino Agrimonia, quos quoque AVICENNA fequitur, id autem cujus MESUE mentionem facit, ita vage defcriptum reperio, ut nihil de eo audeam decidere; quod hodie *Cannabini*, *Kunnigundskraut*, *Eupatoire* nomine proftat, fub Latino-Barbaris demum cœpit in ufu effe. Ejus recipimus Folia cum floribus, illa funt digitata, oblonga, acuminata, ferrata, amara, hi parvi, rufefcentes, tubulofi, femini pappofo infident.

EUPATORIUM. Floribus compositis tubulosis, calice imbric to, inæquali suftentatis, thalamo nudo infistentibus & seminibus papposis instruitur. Cannabinum L. BLACWELL I 10 foliis digitatis gaudet.

Crefcit ad aquas, rarius in Septentrione occurrit.

Ad aperienda vifcera abdominalia olim laudabatur & ad referandos menfes, & ad curandum hydropem commendabatur; extus contra œdemata & hydrocelen in ufum trahitur.

EUPHRASIA potius Eufragia Barb. Euphraise, Augentrost. Caules officinis exhibet teneros, foliis viridibus, rugosis, dentatis, levius amaris, adstringentibus, falinis vestitos, nec non floribus albis, qui sive luteis sive purpureis lineis picti sunt.

EUPHRASIA. Calice quadrifido fustentat florem labiatum, cujus labium fuperius concavum, inferius tripartitum est, laciniis æqualibus, capsula gaudet biloculari. Officinalis L. BLACWELL. 427. foliis ovatis, argute dentatis distinguitur.

Frequentissime per omnem Europam occurrit.

Ad vitia oculorum a Latino-Barbaris commendata, HILDANUS ejus ope feptuagenariis videndi facultatem reftituit : LANZONIUS eandem ad caliginem curandam cum fucceffu adhibuit, inter nos Vir vixit qui vino cum Euphrafia, ad monitum VILLANOVANI, confermentato utens, octogenarius optima vifus acie pollebat; num hi effectus vere Euphrafiæ adfcribendi funt? vix id mihi perfuadere poffum, & nullus dubito, noxas, quas commilito LOBELII a vino, quod Euphrafiam habuit, expertus eft, potius vino in nimis magna quantitate haufto, quam innocenti omnino herbæ, adfcribendas effe. Scopo oculos roborandi, five cum mufto confermentatur, five pani incoquitur & per annos ejus ufus continuatur; vires quas ab hac herba in referandis obftructis viis biharibus HOFFMANN eft expertus, ex ejus indole amara & fubfalfa fluunt. Extus quoque ad affectus oculorum adhibetur.

Aqua destillata NICOL. PRÆPOS. iners omnino est. * Conferva VAL, CORD. * Tragea Ophthalmica Wurtemberg. in morbis oculorum a spissitudine humorum conducere videtur.

* FABÆ ST. IGNATII Recent. funt Nuces oblongæ, avellana majores, angulares, fubftantia duriore, intus fplendente, ad cornu accedente, efformatæ, extus gryfeæ, fapore amariffimo inftructæ.

CAMELLUS ad infulas Philippinas Miffionarius primus harum fabarum meminit fub finem feculi fuperioris, arborem unde defumuntur adeo imperfecte defcribit, ut ejus character definiri non poffit; ipfas fabas, venenis refiftere & incantationibus afferit, antifebriles præterea, diureticas, emenagogas, ariftolochicas, anthelminticas, ftomachicas vires poffidere, vomitum, catharfin, tremores & convulfiones inde excitari quoque vidit. Medicamento, de cujus viribus nonnifi per tumultuaria experimenta conftat, rectiffime hodie abftinemus. In Société Royale de Médecine pro dofi exhibitum, efficax contra febres cortice Chinæ non fugiendas fuit obfervatum.

Continent $\frac{1}{2}$ Extracti aquofi, $\frac{5}{24}$ fpirituofi. Neu-MANN.

FOENUGRÆCUM vid. Emollientia.

FRAXINUS, meria, Fresne, Eschenbaum. Inde Cortex

& Semen ad ufus medicatos adhibentur, ille gryfeus eft cum admixto fufco, fapore evidenter amaro gaudet; hoc oblongum, compreifum, fufcum, tenax, fapore adftringente præditum eft cum quadam acrimonia, cui aliquid oleofi & leviffime acris accedit, obvolvitur involucro ficco, dilutius fufco, quod ipfum multum excedit, progrediendo dilatatur & obtufe terminatur, unde a Latino-Barbaris Lingua Avis dicitur.

FRAXINUS. Corolla mox bifida, mox quadrifida gaudet, interdum calice fuftentata, flores mox hermaphroditi, mox relativi funt, & hi in quibufdam monophyti, in aliis diphyti, mares diandri, feminæ monogynæ; femen crufta membranacea compreifa & producta, tectum, characterem effentialem conftituit: Excelfior L. BLACWELL 328 foliis ferratis, oblongis, floribus apetalis, androgynis agnofcitur.

Crefcit in omni Europa.

Semen HIPPOCRATES ad dolores uteri & pellendam urinam adhibuit, FLOYER quartanum inde vidit curatam, vis aphrodifiaca, quam ipfi Arabes adfcribunt, fabulofo de fignaturis commento nititur.

Corticem a longo jam retro tempore multum ad aperienda vifcera abdominalia commendant, funt qui eundem ligno quajaco omnino fubftitui poffe contendunt.

FUMARIA Barb. nárv@, Fumeterre, Taubenkropf. Ejus proftant cauliculi teneri, ramofi, quadrangulares, quibus longis petiolis infident folia tenuiter fecta, una cum floribus parvis & rubentibus; tota planta evidenti amaritie gaudet.

Fumaria officinalis L. BLACWELL 237 pericarpiis monofpermis & foliis nudis diftinguitur.

Per omnem æftatem in omni Europa obtinet.

Extractum aquofum amarum est & falinum, spirituosum parum amarum est, neutiquam salinum. LEWIS.

Ab omni tempore ad referanda vifcera abdominalia

laudata fuit, icterum & vomitum inde curatos vidit RIVERIUS, efficax præterea ad fcorbutum eft & ad dyfcrafiam, unde varium fcabiei genus furgit, ut S. PAULI obfervationibus probat, DE LINDERN illam cum egregio fucceffu tæniæ latæ oppofuit. Datur five fuccus ad uncias quatuor, five ejus manipulus cum appropriato, ad Medici intentionem, menftruo, infunditur.

Aque Fumaria VAL. CORD. iners omnino aqua, quam, JUNCKERI auctoritate feducti non pauci medici, fanguinem acrius commovere & impellere fibi perfuaferunt : * Conferva VAL. CORD. * Extractum VAL. CORD. ad fcrupulum unum exhibetur : * Syrupus August. * Esfentia Wurtembergens.

GALBANUM vid. Resolventia.

GENISTA vid. Diuretica.

GENTIANA, 200711a'rn, Enzian. Radix ejus exficcata, aliquot pollices crafla est, rugosa, fungosa, secedit in plures fibras digitum crassas, extus sus fusca, intus flava, odore nullo, sapore amarissimo instructa.

Gentiana lutea L. Corollis quinquefidis, rotatis, verticillatis distinguitur.

Ad Lapponiam & Norwegiam ufque afcendit, non occurrit in Floris Saxonıæ.

Spiritus vini inde majorem, quam aqua amaritiem extrahit. LEWIS.

Extracti aquofi $\frac{9}{16}$, fpirituofi $\frac{7}{16}$ fere obtinuit NEUMANN. CARTHEUSER autem illius fere $\frac{3}{8}$, hujus ultra $\frac{1}{4}$.

A GENTIO Illyriæ Rege, qui XXXVIII ab orbe condito feculo floruit, primum in ufum tracta radix primas vias roborat, obftructiones abdominales referat, monente jam GALENO, ad curandas febres intermittentes & necandos vermes adhibetur, laudatur quoque podagricis, nec non ad curandum calculum. Ill. PRINGLE ejus vim antifepticam confirmavit ; Cl. PLENCK efficaciam extracti ad fcrophulas. Extus inde turundæ efformantur ad dilatanda orificia vulnerum & ulcerum, adhibetur quoque ad mundificanda ulcera.

Extractum DIOSCORIDIS ad drachmam dimidiam præscribitur: * Essentia Brandeburg.

Paffim, in Germania maxime, Radices Gentianæ rubræ L. recipiunt; non crediderim illam, quæ a Gentiana cruciata defumitur, ratione virium a priori differre, hinc miror utrafque in quibufdam Indicibus publicis proftare juberi.

GRATIOLA vid. Emetica.

HELENIUM vid. Incidentie.

JAPONICA TERRA, Cachou. Est fubstantia, ficca, dura, extus rufa, nigricans, intus e rubro fusca, fapore adstringente primum dulci, deinde amaro instructa.

Rejicimus, quæ in ore detenta non tota deliquefcit, nec non illam quæ arena, aut aliis fordibus inquinata eft.

Neutiquam ex Japponia, fed ex India ad nos adducitur, pelfime quoque terra appellatur, cum fuccus fit, qui ex variis $M_{IMOS} \neq L$. fpeciebus, & diverfis aliis plantis, cortice adftringente & rubro præditis, paratur, referente de JÆGER; cum hoc fucco tanquam masticatorio utantur, ex nucibus autem Arecca Catechu L. Indi quoque masticatorium parent hinc fama obtinuit, terram Japonicam esse hunc ipfum fuccum, cum autem Auctores autoptæ de Arecca loquentes nostri præparati non meminerint, Arecca Catechu tesse GARÇIN in variis locis, unde tamen noftrum medicamentum adducitur, non crefcat, hinc potius narrationi tess autoptæ credo adhærendam esse, quam hypothesi in Europa esse.

Vix non tota, fi pura fuerit, in aqua potest diffolvi, non parum ejus etiam spiritus vini recipit. O 5 LEWIS: ejus $\frac{15}{16}$ aquam $\frac{3}{4}$ Alcohol folvere, NEU-MANN vidit.

Hujus medicamenti ufus, medio fuperioris feculi inter nos obtinuit, fcopo adftringente maxime adhibetur, in vomitu, fluxibus alvi, hæmorrhagiis, gonorrhæa, fluore albo HAGENDORN & WEDEL non fpernendos inde viderunt effectus, medicina roborans & refolvens etiam bene fe gerit in affectibus muci, hinc ad morbos catarrhales multum laudatur, ulcus fordi lum narium, & pertinaciores tuffes eodem HAGENDORN curavit, idem non male ad reftituendas vires digeftionis adhibetur. Datur fub forma pulveris ad fcrupulum unum; extus ad dentifricia adhibetur.

Effentiam Noftrates fpiritu vini, Wurtembergenfes fpiritu Cydoniorum parant, multum aditringit; Trochifci præter faccharum etiam varia fuaveolentia recipiunt, Wurtembergenfes majorem facchari rationem admittunt quam Noftrates & Parifini, Ambram & Mofchum quoque adjiciunt, efformantur ad figuram mufcerdarum, ut commode poffint fub lingua teneri, cum præcipuus eorum ufus fit ad oris fœtorem corrigendum. * Alios adhuc Wurtembergenfes habent, qui fuccum Liquiritiæ & fpecies Diatragacanthæ recipiunt, & quos multum hæmoptycis commendant: * Tabellæ Parif.

Proftant interdum in tabernis * Placentulæ variæ magnitudinis, aliquot pollices latæ, lineam circiter craffæ, extus faturatius flavæ, intus pallidiores, albefcentes, fapore aromatico, amariufculo, fubadftringente præditæ, quas *Catagamber* appellant, earum jam JÆGER anno 1684 meminit, SEBA refert eas parari ex Cachou cum argilla mixto, affufa aqua & calore folis in fermentationem acto, fpuma liquori fermentanti fupernatante collecta, & in modulis orbicularibus exficcata, harum placentularum drachmæ duæ, cum aqua per aliquot horæ minuta in-

218

fundunt, & in morbis pectoris, oris &c. adhibent, DU BUISSON eafdem cum fucceffu in anginofis & aphtofis faucium affectibus, nec non in diarrhœis, dyfenteriis &c. adhibuit. GEOFFROI meminit * paftillorum, qui nucis vomicæ magnitudinem & figuram habent, ex terra Catechu, variis aromatibus mixta, parantur & a Belgis nomine Siri Gata Gamber in Europam advehuntur.

IMPERATORIA vid. Incidentia.

LAURUS vid. Aromata.

LILIUM CONVALLIUM vid. Aromata.

LUPINI SEMEN vid Legumina.

LUPULI FLORES vid. Olera.

* MARRUBIUM, πεάσιον, Andorn. Folia nobis largitur quæ fubrotunda funt, margine crenata, rugofa, inferne maxime tomento obfessa, inodora, fapore amaro, cui aliquid falini accedit, instructa.

MARRUBIUM. Corolla labiata, quæ calice mox quinquefido, mox decemfido fustentatur, & cujus labium fuperius bifidum, inferioris trifidi lacinia media latior & emarginata est, gaudet, gymno-sperma: Vulgare L. BLACWELL 479 foliis crenatis, superne viridibus distinguitur & calice decemfido.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Extracti aquofi inertioris $\frac{9}{16}$, fpirituofi viridis, odorati, amari $\frac{5}{16}$ inde obtinuit NEUMANN. Extracti fpirituofi ultra $\frac{1}{6}$, aquofi $\frac{5}{16}$ CARTHEUSER.

Ejus decoctum fanguini e vena fluenti affufum cum rubicundiorem & fluidiorem reddit. SCHWENCKE.

Humores spissos resolvit, hinc a GALENO ad obtructiones pulmonum, viscerum abdominalium & uteri laudatur, nec non extus detergendi scopo ad vitia oculorum & aurium. Arabibus maxime ad morbos pectoris pituitos in usu fuit, BORELLUS assert fe innumeris comprobavisse exemplis marrubium mire ad menstrua promovenda, stomachum roborandum, appetitum restituendum, cachexiam & sædos virginum colores curandos secisse; vermem inde expulsum LENTILIUS vidit; salivationem, quæ ultra annum juvenem, cui curandæ luis ergo Mercurius exhibitus fuerat, excruciaverat, brevi se ope nostræherbæ fustulisse, testatur Illustris LINNÆUS. Eximii HALLER & DE HAEN in abscessibus pulmonum bonos inde viderunt effectus, sed non constanter; LOESECKE & HAL-LER in difficili screatu.

* Aqua destillata VAL. CORD. quam & fapidam & odoram CARTHEUSER dicit, prouti vulgo prostat, plane iners est. * Syrupus de Prasio DIOSCORID.

MENTHA vid. Aromata.

* MATRICARIA Barb. magGévior, Matricaire, Metram: inde prostant Folia pinnata, pinnis ovatis & crenatis, albicantia, nullo, fi exficcata fuerint, odore, fapore leviter amaro instructa.

Matricaria Parthenium L. BLACWELL 192 pinnis ovatis, inclus diftinguitur.

Vulgaris per Europam minus Septentrionalem, in Boruffiam ulque afcendit.

Oleum destillatum fundit observante jam SCHROE-DER : Extracti spirituosi $\frac{3}{8}$, aquosi ultra $\frac{1}{2}$ inde separavit NEUMANN.

Variæ ipfi adfcribuntur vires, quæ omnes ab ejus principio odorato pendere videntur, quod cum a planta exficcata abfit,non multum virtutis inde audeo polliceri.

* Aqua destillata NIC. PRÆP. si ex herba paratur, plane iners. * Spiritus Paris. etiam vix aliquid proprii videtur habere.

MYRRHA, σμύζνα, Æolibus μύρρα, fub variæ magnitudinis fruftis, quæ mox avellanas, mox juglandes æquant, ad nos adducitur; pellucida, rufa, diffracta maculas albas, quas ungues dicunt, exhibet, gaudet fapore fubacri, aromatico, infigniter amaro & odore proprio gravi; hanc fpeciem Veteres rdefine, dixerunt, cum fponte ex arbore effluxerit, nec non $\tau g \omega \gamma \lambda o d' d' u e ne$, a tractu in quo provenire dicebatur, magis tincta $\pi \lambda \alpha r n$ illis audiebat, incifione arboris obtenta, hodie ambæ fub communi *Electa* nomine proftant; frusta ad nigredinem vergentia, arida, fordibus inquinata apud seplasiarios *in Sorten* appellanter, rejicienda omnino.

Planta, unde obtinetur, nos adhucdum latet.

Adducitur ex Arabia & Æthiopia, inde magni facci ex corio confecti quatuor aut quinque centenarios ponderantes apportantur, in quibus variæ bonitatis grana hærent, pro varia forfan patria, ubi colliguntur, differentia; Veteres fane Myrrham, pro vario ejus loco natali, diftinxerunt.

Exhibet $\frac{25}{32}$ Extracti aquofi, $\frac{5}{16}$ fpirituofi, & cum deftillatur $\frac{3}{8}$ fpiritus acidi, $\frac{1}{9}$ circiter olei empyreumatici fundit, aquæ ab ejus una libra abftractæ, tres drachmæ olei innatant NEUMANN. Eandem olei odorati quantitatem inde obtinuit HOFFMANN, ego folummodo aliquot guttas olei butyracei accepi. Ultra $\frac{7}{8}$ Extracti aquofi, $\frac{1}{2}$ fpirituofi refert CAR-THEUSER.

Valide refolventes & abstergentes vires possidet, jam a GALENO ad asthma & tussim laudata, ob eafdem virtutes, quibus etiam roborantes accedunt, ad læfam digestionem & aperienda viscera abdominalia cum successive adhibetur, ad febrem singultuosam & dolores uteri ab HIPPOCRATE commendabatur, Cl. CARTHEUSER hypochondriacum ejus ope vidit curatum, præterea ab omni tempore vis ejus putredinem arcendi fuit celebrata, hinc ad ulcera interna quoque cum successive fuit applicata, Cl. CARTHEUSER in hæmoptysi ad phtisin tendente, in ipsa phtisi LOESECKE egregios inde viderunt effectus, nec non in ulcere renali, & multi illam in febribus malignis præscribunt, contra vermes quoque facere facile perfpicitur, fed probe notent quæfo Medici, motum humorum etiam infigniter fub ufu Myrrhæ incitari, abortum inde excitari monet GALENUS, & mictum cruentum ab eadem excitatum a LEBENWALD obfervavit. Cum experientia evicerit hanc Myrrhæ vim æftuantem, a refinofo præcipue ejus principio pendere, hinc prudenter nonnifi ejus extractum aqua frigida paratum, ad ufus internos recipitur:

Datur ad fcrupulum unum pro dofi, HIPPOCRA-TES eam ultra drachmam dimidiam extendit.

Extus abstergendi, contra putredinem defendendi & confolidandi ergo adhibetur, ab HIPPOCRATE medicamentis ocularibus adscripta, & ad ulcera capitis, morbos aurium a muco, scirrhum uteri, referanda catamenia &c. præscripta, ad carjem offium etiam & ulcera cacoethea, probante CARTHEUSER, cum successure adhibetur, nec male medicamentis dentifriciis adjicitur, Cosmeticis Veteres annumerabant,

* Aqua deftillata Wurtemberg. non inefficax medicamentum, roborans & analepticum videtur effe: * Spiritus & * Oleum Parif. præ aliis empyreumaticis nihil proprii habent: Tinctura five Essentia Mamburg. pro vario Dispensatorio variam Myrrhæ rationem recipit, Wurtembergenses & Nostrates etiam alcalisatam pro usibus internis præscribunt, commovens valde medicamentum dosi viginti guttas non excedente propinandum. * Oleum per deliquium vid. Inst. Chem. * Trochiscorum de Myrrha RHAZES prolixam jam descriptionem, adhuc ampliorem reddiderunt Parisini. Medicamento insigniter commovente jure abstinemus.

* OPOPANAX, ¿ποπάναξ. Est fuccus spissus, qui sub forma granorum, quorum maxima, vix ad juglandem accedunt, ad nos adducitur, extus hæc grana lutescunt, intus albida, saporem habent amarum cum pingui & proprio naufeofo mixtum, odor ipfis est balfamicus non ingratus; eodem autem etiam nomine ad nos adducuntur massa majores, in quibus grana, substantia quadam granulosa variis fordibus inquinata, conglutinata funt.

Ex Oriente ad nos adducitur.

Pastinaca Opopanax L. foliis bipinnatis distinguitur & in Europa Meridionali crescit.

Ex aqua se patitur suspendi, ea inde abstracta odorata evadit. LEWIS. Ultra $\frac{1}{3}$ Extracti spirituosi, $\frac{1}{2}$ aquosi inde NEUMANN obtinuit.

Cum Gummi refina fit, hinc humores valide attenuat & ad morbos a viscerum abdominalium obstructione oriundos, aut a pulmonibus muco obseffis, cum successfu exhibetur.

Datur ad drachmam dimidiam pro dofi.

Externe quoque ad qualefcunque indurationes, refolvendi ergo exhibetur.

PAREIRA BRAVA Recent. Eft Radix five Sarmentum lignofum, cujus frufta variæ craffitiei, quæ interdum ad brachium ufque accedit, fub cortice rugofo, fufco, fubftantiam lignofam, obfcure flavefcentem, inodoram & amaram condunt. Denominatio Lufitanis debetur, qui Parra vitem & brava fylveftrem appellant.

CISSAMFELOS. Relativa dyphyta, mares monopetali indivisi, calice quadrifolio fustentati, tetrandri, feminæ superæ monopetalæ, trigynæ, bacca monopyrena: Pareira L. solia peltata habet.

Crefcit in America meridionali.

Anno 1688 ex Lusitania per Dominum AMELOT Galliæ Oratorem, Parisios suit allata, & cum ibi suerit tentata, in officinas recepta.

Extracti fpirituofi ultra $\frac{1}{4}$, aquofi autem priore debilioris $\frac{7}{24}$ inde obtinuit NEUMANN, qui præterea vidit, nec aquam nec spiritum vini, si inde abstrahuntur, ejus aliquid recipere.

Eximia gaudet vi refolvente & ad renes depurandos & urinam pellendam jam a PISONE laudatur, id quod etiam Medici Parifini apud POMET, HELVETIUS, LOCHNER & GEOFFROI confirmarunt, duo posteriores etiam propriis observationibus ejus vires ad obstructiones viscerum abdominalium & asthma evicerunt. Drachmæ duæ cum sesque ad remanentiam libræ unius coquuntur.

* Effentia Wurtemb.

PERSICÆ NUCLEI & FLORES vid. Fructus Horai.

* PETASITES, mplasitne, Pestilenzwurzel. Radices habet fibrofas, digitum craffas, extus fuscas, intus albas, sapore acriusculo & amaro præditas.

Tussilago. Flore composito mox tubuloso, mox mixto, calice imbricato cylindraceo sustentato, receptaculo nudo, seminibus papposis gaudet: Petasites L. BLACWELL 222 thyrfum ovatum habet & flores tubulos.

Crefcit in omni Europa.

Aqua inde abstracta odora est, & aliquid olei odorati sisti; Extracti aquosi $\frac{1}{4}$ circa, spirituosi autem $\frac{1}{8}$ exhibet. CARTHEUSER.

Radix a GALENO ad curanda ulcera laudata, putredini opem ferre creditur, FORESTUS in pefte utilem fuiffe teftatur, nondum certis obfervationibus, quod aliquas virtutes proprias habeat, eft evictum. Folium membro podagrico applicatum eidem magno folatio effe, obfervavit RAJUS.

PIX vid. Refinas.

POPULI OCULI vid. Refinas.

* QUASSIÆ LIGNUM Recent. Hoc nomine afferuntur frusta, varia longitudine & craffitie instructa, cortice ex gryseo albo tecta, nonnunquam fisso, fisso, tenui, intus albescente, lignum flavicat & in tenues lamellas fecedit, odor nullus, fapor intense amarus.

QUASSIA L. Corollam habet pentaphyllam, fimili calice fustentatam, quinque nectariis, decem antheris, uno stylo instructam, fructus a quinque capsulis, receptaculo carnoso innatis, monopyrenis, efformatur.

Crefcit in Americæ Meridionalis Surinam.

Extracti aquofi $\frac{1}{6}$ inde Cl. SCHLEGER obtinuit, Cl. PAARMANN vix $\frac{1}{8}$ Extracti aquofi amariffimi, $\frac{1}{24}$ fpirituofi feparavit.

Medicamentum, quod Surinami ad putridas febres multo in usu esse dicunt, servus nigrita QUASSI Illustri DAHLBERG recentissimis temporibus detexit, qui illud Celeberrimo LINNÆO misit, a quo tentatum & laudatum fuit, ab aliis poftmodum Medicis in usum tractum. Ejus vires adstringentes in fudoribus nocturnis hecticorum, falivatione nimia, diabete & diarrhœa colliquativa expertus eft Cl. SCHLEGER, ad roborandum ventriculum etiam ipfo cortice chinæ præstare, observationibus nifus, contendit Eximius TISSOT. Evincunt Cl. SCHRADER Exper. GESNER & Cl. SCHLEGER, nec non Illustr. HALLER observata. ejus virtutem refolventem in podagra retropulfa, Ill. LINNÆUS in doloribus podagricis cum fucceffu adhiberi nec non Cel. VALMONT DE BOMAR & SCHLEGER probant, qui etiam ejus fuccessus in lue venerea, apoplexia & hydrope vidit, vermes inde curatos TIS-SOT adducit; de ejus virtute antifeptica, etiam SCHLECER testatur, quam tamen cortici chinæ multum cedere, experimenta Cl. PAARMANN evincunt, a quo etiam respectu virtutis febrifugæ vinci, & Ill. TISSOT & inter nos inftituta experimenta evincunt.

Datur optime sub forma Infusi aquosi, unam ejus drachmam cum libra aquæ infundendo & aliquoties de die aliquot cochlearia exhibendo.

P

RHABARBARUM vid. Purgantia Specifica. RUTA vid. Aromata.

SABINA vid. Aromata.

SALVIA vid. Aromata.

SCHOENANTHUM vid. Aromata.

SCORDIUM, subgelier, le Chamaras, Lachen-Knoblauch. Exhibet folia ex ovatis oblonga, crenata, hirfuta, odore proprio ad allium accedente, fapore amaro, acriuículo inftructa.

Teucrium Scordium L. BLACWELL 485 foliis ex ovato oblongis & floribus geminis pedunculatis diftinguitur.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Extracti aquofi $\frac{9}{16}$, fpirituofi magis amari & efficacioris $\frac{3}{8}$ fiftit. NEUMANN. Illius ultra $\frac{3}{8}$, hujus vix $\frac{1}{16}$ obtinuit CARTHEUSER.

Duobus demum retro feculis in Germania innotuit.

Ejus vires, qua putredini refiftit, GALENUS obfervatione probat, IDEM illud ad recludenda vifcera & promovendas excretiones laudat, KLEINKNECHT anafarcam inde curatam & catamenia referata vidit, ob vires anthelminticas multum a RIVERIO laudatur; noftram herbam ad morbos malignos adhibituri probe meminerint, obfervante jam GALENO, corpus rude calefieri. Extus ad ulcera adhibetur & gangrænam.

* Aqua destillata VAL. CORD. licet recens aliquid odorati habeat, tamen prouti vulgo in officinis prostat, omnino iners est. * Extractum VAL. CORD. minus omnino quam herba efficax. * Syrupus August. non contemnendus: * Essentia vel Tinctura STAHL integerrimas plantæ vires habet, multum calefacit: * Essentia de Scordio composita seu Diascordium liquidum HOFFMANN præter scordium multa insuper calefacientia & opium recipit, Wurtembergenses Camphoram omiserunt: * Essentia Alexipharmaca STAHL præter fcordium plura ingredientia calida habet, in compositione Nostratium fcordium omissium est : * Essentia Alexipharmaca temperata STAHL minus quam antecedens calefacit; omnes hæ essentiæ, cum hodie evictum sit, quam perniciofa sit therapia calida, rarissime adhibentur : Diascordium FRACASTORII prolixæ & inconcinnæ compositioni Parissini & Nostrates rosa adjiciunt; cum vini & mellis ratio, tempore labente, imminuatur, hinc non accurate, quantum opii certum ejus pondus vehat, potest determinari, in præscriptione Nostratium drachma una tertiam circiter grani partem opii habet. Medicamentum evidenter adstringens, hodie unice adhibetur ad sistendos alvi fluxus, & minus bene ad febres commendatur.

SERPENTARIA vid. Aromata.

SIMAROUBA Recent. Hoc nomine ad nos adducitur Cortex in fruftis teneris, pede etiam longioribus, aliquot pollices latis, in lacinias divifis, fractu contumacibus, tenacibus, extus levifime rugofis, intus magis albis, odore nullo, fapore valde amaro inftructis: * Ligni frufta, quæ nobis mittunt, craffa funt, levia, alba, infipida.

A proprio arborum genere defumitur quod Quaffiam Dioicam Pharmacopœa Suecica appellat, fed defcriptio Cl. AUBLET ad monœciam pertinere evincit.

Largitur $\frac{1}{4}$ fere extracti aquofi amarifimi, naufeofum odorem fpirantis, $\frac{1}{40}$ Extracti fpirituofi. CAR-THEUSER. CRELLIUS inde $\frac{1}{6}$ Extracti aquofi obtinuit.

Jesuitæ fratri SOLEIL collegio Parisino adscripto anno 1713 quædam hujus corticis specimina miserunt, ille in dysenteria gravi, quæ anno 1718 Parisis surebat, jussu Regio, suit tentatus, bonos inde observatos effectus, anno 1723 reiterata experimenta uberius confirmarunt, variis itaque in locis in usum tractus efficaciam suam in sistenda dysenteria ubivis

P 2

probavit DEGNER, SCHWENCK, TISSOT, GRAS-HUIS, BOENNICKEN, WERLHOFF teftibus, efficacem quoque in alvi fluxu chronico & lienteria SCHWENCK, TISSOT, BOENNICKEN, JUSSIEU funt experti, in hæmorrhagia uteri DU BUISSON & JUSSIEU: has ejus virtutes non modo a vi adftringente, qua pollet, pendere, fed illum ipfam materiem quoque horum morborum corrigere & e corpore educere, SCHWENK & JUSSIEU ex eo probant, quod fub ejus ufu excretiones aquofæ promoveri obferventur.

Datur five fub forma pulveris ad fcrupulum unum, five & quidem melius, cum a pulvere ventriculum gravari DEGNER obfervarit, corticis tenuiter incifi drachmæ duæ cum duabus libris aquæ, ad tertiæ partis confumtionem coquuntur, & decocti quatuor unciæ tertia quaque hora exhibentur.

SQUILLA, Scilla, $\sigma ni\lambda\lambda\alpha$, Meerzwiebel. Eft Radix bulbofa, quæ non raro ad aliquot pugnorum magnitudinem accedit, ex bafi anguftiore rotunda, fibrillas emittit, mox in corpus amplum & ventricofum distenditur, quod in formam conoideam contrahitur, & ex apice primum flores, deinde folia emittit, aliquot ftrata cuticulæ ficcæ, aridæ, rubræ tegunt bulbi fquammas albas, levi rubore fuffufas, fapore exquifite amaro inftructas, cui propriam adhuc acrimoniam accedere non potui detegere, meditullium, $\tau o \mu v \xi \omega \sigma \omega$ HIPPOCRATIS multo minorem amaritiem habet.

Scilla. Corollam habet hexapetalam, naufeam, ifantheram, monogynam, capfulam trifulcam, trilocularem: Maritima L. fcapo fpicato ante folia erumpeute & bracteis flexis diftinguitur.

Crefcit ad littora maris Europæ Meridionalis, Afiæ Occidentalis & Africæ.

* Varietatem radice alba instructam Marem PLIN.

228

étiam quædam officinæ, qua ex ratione non perspicio, affervant.

Aquæ & fpiritui vini fuas vires communicat, ejus amaritiem alcalina infringunt, largitur Extracti refinofi; evidenter acris $\frac{1}{20}$ circiter, aquofi $\frac{15}{16}$ fere. SCHULZ.

Ad vetustiffima, quæ habemus, medicamenta pertinet, ab EPIMENIDE primum in usum tracta, de ejus viribus volumen condidiffe PYTHAGORAM, teftatur PLINIUS. Ejus amaritiei propriam ineffe acrimoniam uno ore omnes contendunt Auctores, catos & cuniculum inde periisse, vidit Cl. HILLEFELD, ut acrimonia temperetur, radicem pasta farinacea, ad præceptum DIOSCORIDIS, obduci jubent & clibano coqui, hunc morem, rationibus, quæ minus placent, impugnat ZWOELFFER Ab omni tempore a vi refolvente laudabatur, & a Veteribus ac Recentioribus æque ad urinam pellendam, & hydropem curandum commendata fuit. DIOSCORIDEM, SCRIBONIUM LAR-GUM, HOFFMANN, WAGNER, VAN SWIETEN, CO-HAUSEN, KOEHLER, JERDENS, SCHUSTER, D'AP-PLES, hic allegaffe fufficiat, in afthmate egregias ejus vires viderunt HESSE, ALBRECHT, BAUMLIN, SCHULZ, in nephritide calculofa & pituitofa WAGNER; ipfis empyicis ab HIPPOCRATE præscribitur, qui eandem quoque extus tanquam peffarium in ufum traxit: ad verrucas & perniones in oleo fervescentem, aut cum refina liquefactam efficaciter illini, monet Cl. VOGEL:

Dofis est ad scrupulum dimidium, etiam minor ejus quantitas apud delicatiores cardialgiam & naufeam folet excitare.

Acetum ex schola PYTHAGORÆ ad nos descendit, infusio viginti quatuor horarum omnino sufficit, eximium medicamentum resolvens, quod etiam in pituitosis faucium morbis, prudenter sub forma gargarismatis adhibetur. Oxymel Scilliticum Nostrates ra-

P 3

tionem NICOLAI PRÆPOSITI sequentur, & gratia & viribus priore præstat; ab eo vix differt * Syrupus Wurtembergenfium, Oxyfaccharum Londin. his omnino inferius est * Mel scilliticum BAUDERON. * Vinum quod COLUMELLA per confermentationem parat, Parifini per infusionem jubent conficere: * Loch ad Afthma NESUE non male refolvendi ergo in morbis pectoris adhibetur : * Effentia Wurtemb. nunquam placent spirituofa, cum refolvendi animus est: * Pulvis compositus STAHL, præcunte HELMONTIO, fcillæ radix vincetoxici adjicitur, non video cur? * Pilula Edimburgenf. fcopo aperiendi ad pectoris æque ac abdominis morbos cum fucceffu adhibebun-Trochisci ANDROMACHI differunt præscriptiotur: nes Dispensatoriorum, inconcinna compositio nonnifi ad præparandam Theriacam adhibetur.

SENNÆ FOLIA vid. Purgantia.

SPICA NARDI vid. Aromata.

* TAMARISCUS, Tamarix, pogian, Tamaris, Tamarisken. Ejus caulium recipimus Cortices, qui funt tenues, angusti, extus rufi, intus albi, fapore amaricante, qui evidenter adstringit, instructi.

TAMARIX. Corollam habet pentapetalam calice quinquefido fustentatam, quinque vel decantheram, trigynam, fructu unilocularem, feminibus pappofis fartum. Germanica L. BLACWELL 381. corolla diplofanthera agnofcitur.

In Auftria, Pannonia, Helvetia & apud nos crefcit.

Præeunte GALENO ad obstructiones lienis & omnes morbos inde oriundos commendatur; datur ad drachmas duas in Infuso.

* Sal per incinerationem paratus, fi ex Tamarice Gallica paratur, est fal mirabilis Glauberi observante MONTET, qui autem ex plantis apud nos crescentibus non obtinetur.

TANACETUM Barb. Tanais, Rheinfarn fiftit.

* Folia quæ longa funt, viridia, pinnata, pinnis dentatis, odore proprio minus grato, fapore amaricante inftructa

* Flores tubulofi funt, flavi, odore & fapore foliis fimiles. Tanacetum Corollis tubulofis compositis calice hemifphærico comprehensis feminibus & receptaculis nudis gaudet: *Vulgure* L. BLACWELL 464 folia bipinnata & habitum lævem habet.

Crefcit in omni Europa.

Spiritus vini, faporem & odorem inde, magis quam aqua extrahit. LEWIS. Flores ultra $\frac{1}{4}$ Extracti aquofi, $\frac{1}{6}$ fere fpirituofi, linguam evidentius ferientis, largiuntur. CARTHEUSER.

Oleum odoratum quod fundit flavum est, acre & amarum.

Ad vermes maxime laudatur, nec non ad morbos uteri, fcopo aperiendi etiam, a quibufdam adhibetur, naufeofum medicamentum eviluit.

* Aqua destillata VAL. CORD. * Oleum destillatum Wurtemberg. ad aliquod guttas pulveribus anthelminticis adjicitur : Extractum Wurtemb.

TRIFOLIUM FIBRINUM, TABERNÆMONT. Menyanthe, Biberklee. Recipiuntur folia quorum tria uni petiolo infident, ovata funt, firmula, odore nullo, fapore intenfe amaro prædita.

MENTANTHES. Corollam habet monopetalam, quinquefidam, hirfutam, calice quinquefido fustentatam, isantheram, monogynam, capfulam polypyrenam; Trifiliata L. BLACWELL 474. foliis ternatis distinguitur.

Occurrit per omnem Europam.

Extracti aquofi $\frac{1}{3}$ & Oleum odoratum largitur. SCHROER.

CORDUS inter primos, hujus plantæ meminit, ejus vires antifcorbuticas PAULI, DOLÆUS, WILLIUS & SCHROER funt experti, in roborandis primis viis per observata VAUGHAN, & attenuando muco, aperiendis obstructionibus viscerum abdominalium conducit egregie, œdemata inde curata SCHROER, hydropem DOLÆUS, febres intermittentes WILLIUS, arthritidem SCHULZ & DOLÆUS, paralysim WILLIUS, videre.

Optime datur sub forma infusi aquosi, ejus pugillus dimidius pro dosi, cum aquæ unciis quatuor aut sex infunditur.

* Aqua destillata Paris, iners. * Extractum quod Parisini habent, est succus inspissatus: * Essentia Augustan. * Spiritus abstractitius Wurtemb.

* VERBENA, Verveine, Eisenkraut non est Verbena Romanorum, quibus omnes herbæ facræ hoc nomine venerunt, nec est migic igiew Veterum; Folia, quæ hodie ita appellantur, funt longiuscula, laciniata, laciniis denuo divisis, viridia, fapore amaro instructa.

VERBENA. Corolla inftruitur monopetala, quinquefida, irregulari, di- vel tetranthera, monogyna, fructu capfula: Officinalis L. BLACWELL 41 corollam tetrantheram, caulem folitarium, folia multifido laciniata habet.

Crefcit in omni Europa.

Quæ apud Veteres de virtutibus verbenæ legimus, & fuperstitioni debentur & non ad nostram plantam spectant, quæ præ reliquis amaris omnino nihil proprii præstabit.

* Aqua destillata VAL. CORD. plane iners.

VINCETOXICUM vid. Refolventia.

VOMICE NUCES Barb. Noix Vomiques, Krahenaugen. Sunt Nuclei rotundi, utrinque plani, five leviffime convexo-concavi, villofi, gryfeo albidi, intus cornei, amariffimi.

Strychnos Nux Vomica L. BLACWELL 395 foliis ovatis & caule inermi distinguitur.

Crefcit in India.

Extracti aquofi circiter $\frac{1}{2}$, refinofi ultra $\frac{3}{16}$ vehit, NEUMANN.

Primi Arabes harum nucum mentionem faciunt, easdem contra ictus ferpentum homines immunes reddere, si una aut duæ per duos continuos annos quotidie affumuntur, testatur VAN RHEDE, FALLO-PIUS fe a Germanis audivisse memorat, eas ad drachmam unam in peste assumi cum successu, febres intermittentes inde curatas WEDEL adducit, & confirmant Collectores Dispensatorii Brandeburgici, nec non MURALTUS & Medici Scaphusienses apud KOE-NIG, qui quoque cas in gonorrhœa virulenta præfens remedium effe, afferunt, THEBESIUS earum vires ad hydrophobiam, & ad delirium hypochondriacum eft expertus, MONTINUS Lappones contra colicam, dimidiam nucem vomicam cum fpiritu vini non fine fuccessure, testatur. Cum interim GESNER, WEPFER, LOSSII, DE HERDE, SEUTTER, Cl. HILLEFELD &c. experimentis pateat canes, feles, cuniculos &c. inde convulsos perire, MATTHIOLUS quoque, HOFFMANN, DE SORBAIT & SEUTTER exempla adducant homines inde convulfos imo necatos fuisse, prudentis Medici esfe duco, cum fecutiora proftent medicamenta, ab usu fuspecti desistere, & licet, præter quas adduxi observationes, etiam MELICHIUS, GEBAUER & omnes, qui olim famofum Electuarium de Ovo laudarunt Auctores, nuces vomicas impune affumi posse fidem faciant, ego faltem eas unice pro necandis animalibus, glizibus &c. ad quem fcopum etiam in frequenti usu funt, duco effe adhibendas.

ZEDOARIA vid. Aromata.

B. ANIMALIA.

FEL TAURI vid. Ros.

*LAPIS PORCINUS Recent. Lapis Hystricis, Fedro del Porco Lusitanis. Ejus duæ species in commercio prostant, quæ secundum patriam distinguuntur, Malaccensis multo majori pretio quam Zeilanicus venit, illius unum vidi, qui unciam dimidiam circiter pondere æquabat, cui pretium feptingentorum florenorum mercator Amftelodamenfis ftatuerat. Uterque lapis evidenti amaritie gaudet, quam etiam aquæ, cui immittitur, communicat. *Malaccenfis* mox ovatam, mox rotundam figuram habet, utrinque compreffam. colorem corneum cum rufo mixtum, fuperficiem lævigatam, fplendentem, aqua, fi ipfi affricatur, aliquid vifcidi, in modum faponis fiftit. *Zeylanicus* quem poffideo, coloris nigricantis eft, confiftentiam habet, qualem folent habere fucci infpiffati, quorum quoque in modum fuperficies extima in fquammas dehifcit, quas Auctores tunicas folent appellare, fapore gaudet amariffimo, quem etiam aquæ communicat, unam circiter unciam pondere æquat, pro eo trecentos florenos folvi.

Dicitur reperiri in vesicula fellea *ERINACEI*, qui duobus dentibus incisivis in utraque maxilla gaudet, quibus etiam canini accedunt: *Malaccensis* L. auriculis pendulis distincti. Asiæ civis.

Luxurians gentium Orientalium ingenium, huic lapidi maximas ad vincenda venena adfcribit vires, illum deinde Europæi ad omnes febres malignas & exanthematicas multum facere afferebant, accedebat his auctoritas ab enormi ejus pretio furgens, & molimina eorum, qui eos poffidebant, ut fibi de quæftu bene profpicerent: fateor me non poffe perfpicere, quod calculus felleus Erinacei præ aliis debeat aliquid proprii habere, & quod bili infpiffatæ, cui particulæ terreftres accreverunt, adeo infignes infint vires, quales ab hoc calculo in febribus malignis DECKER, RAYGER, BEHRENS &c. obfervationibus probare funt annifi, morbus a Natura victus non raro remedio creditur ceffiffe, quod eo tempore dabatur, quando ejus caufa a Natura fuit fuperata.

Dantur aliquot grana pro dosi, aut integer lapis alicui aquæ destillatæ per horæ quadrantem immittitur & infusum exhibetur.

234

Ægagropilarum quoddam genus rotundum, fufcum, valde leve, cujus diameter fefqui pollicem circiter æquat, in animalis ventriculo reperiri dicitur, & fub nomine *Lapidis hyjiricis (purii* a curiofis affervatur.

\$ 25.

II. AROMATA.

Vegetabilium partes folidæ, quæ linguam acri & calefaciente sapore afficiunt, & evidenti sapore nares stringunt, dicuntur Aromata, roborant ista fibras irritando & fragrantia, qua pollent, vim nerveam intendendo. Cum eorum usu cor & arteriæ stimulentur, hinc Calefacientibus adscribuntur, dum fanguinem folvunt & ejus motum intendunt, fudorem movent, ab hac earum vi, & a virtute, qua gaudent, antifeptica Alexipharmacis folent annumerari. Abufus aromatum circulationem augendo febres acutas gignit, primas vias rigidas & torpidas reddit, proprio acrimoniæ genere humores inficit. Cum eorum vis ab oleo odorato, quo fcatent, pendeat, hinc patet, quomodo fub forma concentrata poffint dari, & quod vinum & spiritus vini sint optima menstrua, quando eadem fub specie Infusorum exhibendi animus eft. Ob gratiam, qua gaudent, & vires stomachicas æque ac carminativas quas habent, creberrime tanquam condimenta cibis adduntur. Indicantur præcipue 1) cum fpiffitudo frigida obtinet, 2) quando debilitas a vi mufculari imminuta originem ducit, 3) in debilitate vifcerum, 4) in evacuationibus nimiis primarum viarum. Extus in usum trahuntur, ad diffipandos humores, in inflammatis, contufis, fugillatis, œdematofis, rheumaticis, arthriticis, contufionibus capitis &c. nec non ad membra refoluta.

* ABROTANUM, a'ßgotravor a'pper, Aurone, Stabwurzel. Ejus affervamus cauliculos herbaceos, foliis fetaceis, albis obsessos, forti & grato odore, nec non sapore aromatico proprio instructos, cui aliquid amari accedit.

Artemisia Abrotanum L. BLACWELL 555. Caule frutescente erecto & foliis setaceis distinguitur.

Sponte in Europa Meridionali crefcit, apud nos in hortis colitur & optime noftras hyemes fert.

Extracti aquofi $\frac{1}{3}$ fere, $\frac{3}{8}$ fpirituofi efficacis largitur. CARTHEUSER. Valde exiguam quantitatem Olei odorati. LEWIS.

Ad peripneumoniam ab HIPPOCRATE laudatur, calefacere, vermes necare, incidere, digerere, difcutere jam a GALENO est observatum, qui autem minus bene monet, stomacho inimicum esse, & ejus cinerem cum oleo subactum ad alopæciam, & promovendum crinium incrementum conducere; raro hodie in usum trahitur, non quod iners sit, sed quod per seculi mores, alia, quibus similes vires sunt, medicamenta usurpantur. Laudatur ad sugandos cimices.

* Oleum coctum SCHROED. melius per infusionem paratur.

* Montanum algiraror Shito, la Garde robe: inde recipiuntur cauliculi teneri, cum foliis angustis, dentatis & albentes, odore grato, sapore levi, aromatico & amaricante instructis.

SANTOLINA. Flores compositos tubulos, calice imbricato, hemisphærico suftentatos, receptaculum paleaceum, semina nuda habet: Chamacyparissus L. foliis dentatis distinguitur.

Crefcit in Europa Meridionali, noftras hyemes non fert.

Priore vires remiffiores habet.

ABSYNTHIUM PONTICUM vid. Amara.

AGNUS CASTUS vid. Adstringentia.

* AMMI, aµµı, zúµıvov abdióminov? prostant hoc nomine semina exigua, ovata, grysea, fulcata, inodora,

236

fapore aromatico & amaricante instructa; hæc femina, præeunte LOBELIO, a Creta denominantur. * Ammi Vulgaris femina, exigua funt, fusca, striata, fapore levissime aromatico, odore nullo instructa.

Prius nobis exhibet SISON, quod flores umbellatos habet, involucrum utrumque pauci folium, femina ovata ftriata: Ammi L. foliis decompositis, illis quæ vaginam petiolarem terminant, reliquis longioribus distinguitur.

Crefcit in Italia, ubi Seculo XVI innotuit.

Alterum defumitur ab *AMMI* quod floribus umbellatis, involucro utroque polyphyllo, univerfali pinnatifido & feminibus ftriatis gaudet : *Majore* L. cujus foliorum inferiorum pinnæ laciniatæ funt, fuperiorum lineares.

Crefcit in Europa Meridionali, eadem, cum priori æra annotata.

Creticum vulgari efficacius effe, monent Auctores, ad movendam urinam a GALENO laudatur, ad morbos ventriculi ab aliis.

AMOMUM, apopor, illud Veterum nos latet omnino, Parifini ejus in locum Cardamomum fubftituunt, vulgo, præeunte CLUSIO, fub nomine Amomi recipiuntur Fructus, variæ magnitudinis, pifis crebro majores, badii, rotundi, umbilico notati, rugofi, biloculares, in utroque loculo femen utrinque depreffum, uniforme, fufcum, rotundum includentes, fapore acri caryophyllos & cinamomum referente, fimilique odore inftructos.

Mrrtus. Corolla pentapetala regulari, calice quinquefido sustentata, polyanthera, monogyna, bacca triloculari, calyce umbilicato gaudet : *Pi*menta L. BLACWELL 355. Calyce duplici, corolla tetrapetala, fructu biloculari diftinguitur. Non male a BROWN ad *Cary phyllum* videtur referri.

Jamaicæ indigena planta.

Baccæ, antequam plenariam maturitatem induerint, colliguntur & in fole exficcantur.

Largiuntur Oleum in aqua fubfidens, ad oleum Caryophyllorum accedens, Extractum aquofum iners, fpirituofum aromaticum. LEWIS; Olei proxime ad oleum Caryophyllorum accedentis $\frac{1}{TC}$, Extracti aquofi fere inertis ultra $\frac{1}{4}$, fpirituofi viridis ultra $\frac{1}{8}$. NEU-MANN. Olei $\frac{1}{257}$ CARTHEUSER.

In Anglia crebro, loco aliorum aromatum ad condiendos cibos adhibetur.

Ratione virium, medium inter anthophyllos & caryophyllos locum videtur tenere.

ANETHUM, divideor, Anet, Dyll. Proftant ejus Semina, ovata, fusca, flavo margine marginata, una facie levissime convexa & evidentius striata, altera plana & obscurius striis notata, odore leviore, sapore aromatico instructa.

* Herba constituitur a foliis glaucis, tenuissime diffectis, odore gravi, sapore aromatico instructis.

ANETHUM. Flores umbellatos habet, involucrum neutrum, femen ovatum, ftriatum: Graveolens L. BLACWELL 545 feminibus planiufculis, marginatis diftinguitur.

Sponte in Lusitania & Hispania crescit, inter nos colitur.

 $\frac{1}{\tau_6}$ Olei odorati inde obtinui, ad ejus infusionem melius spiritus vini quam aqua recipitur. LEWIS.

Herbam olim ad condiendos cibos recipiebant. Semen HIPPOCRATES ad morbos pectoris maxime adhibuit, ad ufus carminativos laudatur, in cohibendo fingultu a DIOSCORIDE commendatur, & egregias inde vires vidit FORESTUS. Non raro illius carboni injecti fumum, odontalgia laborantes ore hauriunt.

* Oleum coctum ex herba GALENUS, ad conciliandum fomnum, & digerendi ergo præfcribit: * Oleum destillatum VAL. CORD. * Oleum ex seminibus expressum habent Parisini.

ANISUM, avicov, Anis. Semen quod hoc nomine inter nos affervatur ab illo Veterum differt omnino. Est illud rotundum, & cum ut plumbum duo grana cohærentia occurrant, hinc ventricosum solet prostare, striatum præterea est, cinereum, odore proprio fuavi instructum, sapore evidenter dulci cum levissima acrimonia.

PIMPINEILA. Flores fiftit umbellatos, petalis cordatis efformatos, involucro neutro fuftentatos & femina ftriata: Anifum L. BLACWELL 374 foliis radicalibus trifidis diftinguitur.

Sponte provenit in Ægypto & Syria, apud nos large in agris colitur, largiffime in Thuringia, nec non apud Turonenfes Galliæ & in Hifpania, quod ultimum ab Alona denominatur, reliquis minus & magis aromaticum.

Omnem odorem & faporem fpiritus vini inde recipit, Olei destillati $\frac{1}{18}$, expressi $\frac{1}{16}$. LEWIS. Olei destillati $\frac{1}{32}$ circiter NEUMANN. Ego olei destillati $\frac{3}{85}$, expressi, viridis $\frac{1}{16}$ obtinui. CARTHEUSER Extracti aquosi inertis $\frac{1}{3}$, spirituosi efficacis $\frac{1}{10}$ fere.

Multum extollitur ob vires, quibus pollet, humores spissos attenuandi, ventriculum roborandi, & flatus discutiendi, non raro cibis tanquam condimentum adjicitur, sepe quoque scopo carminativo catharticis validioribus admiscetur. HEURNIUS observavit ejus scrupulo uno, recens natos egregie purgari.

Aqua destillata VAL. CORD. efficax omnino: Oleum destillatum VAL. CORD. thermometro ad gradum temperatum descendente, substantiam albam

crystalli in modum pellucentem fistit, magna quantitate in Thuringia paratur, & inde late per Europam devehitur; minor illi quam aliis odoratis, acrimonia inest, non modo intus datur, sed etiam extus; scopo carminativo usurpatur cum successu, tumoribus a contufione ortis inunctum citam opem ferre, obfervavit FORESTUS. * Olenm expression CHARAS vix in usum trahitur: Spiritum abstractitium pro remedio polychresto ad discutienda tormina adhibent, multum ejus Manhemio ad nos adducitur, & fub titulo Mannheimer - Wasser prostat: * Confectio Anisi simplex SCHROED. * Confectio Anifi laxativi August. variæ ejus compositiones in variis Dispensatoriis prostant, omnes refinofa recipiunt, medicamentum incertum omnino. Eleofaccharum August. frequentissimo in usu est ad tormina infantum. * Balfamum sulphuris Anifatum MYNSICHT. differunt præscriptiones ratione fulphuris ad oleum, naufeofum medicamentum prudentiores negligunt: Spiritus falis Ammoniaci Anifatus Hamburg. ad affectus pectoris & inteftinorum, cum refolventia & roborantia indicantur, præscribitur: * Species Dianifi MYNSICHT. congeries plurium aromatum, quæ ad reftituendas vires primarum viarum a mucofis humoribus dejectas facit.

ANISUM STELLATUM Recent. Anis de la Chine, Stern Anis. Hoc nomine proftant fructus ex pluribus, ad octo ufque, capfulis efformati, fufcis, oblongis, inferne convexis, fuperne apertis, in figuram ftellæ horizontaliter connatis, non raro inæqualibus, compreffis, quælibet capfula continet femen rotundum, quod fub cortice fplendido, fpadiceo, fragili, nucleum album condit, proprio odore & fapore aromatico dulci inftructum.

ILLICIUM. Corolla polypetala irregularis, calice quinquefido fuftentata, polyanthera, polygyna; fructus,

etus, capfulæ ad duodecim ufque, in formam stellæ concretæ. Anijatum L. sloribus slavescentibus distinguitur.

Hæc arbor in Japonia & Florida crefcit.

Primus CLUSIUS feminis Anifi stellati mentionem facit, & refert illud sub finem Seculi XVI in Europam ex Insulis Philippinis suisse allatum. ELSHOLZ illud multo in usu apud Russos esse tradit, & ab eis Badiani appellari monet.

Oleum odoratum fundit, Extracti aquofi $\frac{1}{2}$ circiter inertioris, fpirituofi aromatici $\frac{1}{4}$. CARTHEUSER.

Laudatur a vi aromatica, carminativa, fœtorem oris corrigente. Proftant interdum * Cortices convoluti, qui digiti craffitiem & dimidii pedis longitudinem habent, rugofi, gryfei, fapore aromatico, cui dulcedo jungitur, fimilique fapore, inftructi, quos *Cortices Lavola*, vel *Seminis Anifi* appellant.

ANTOPHYLLI vid. Caryophilli.

ARISTOLOCHIA LONGA vid. Amara.

ARTEMISIA, Armoife, Beifus. Ejus folia funt pinnata, pinnis latiusculis, dentatis, inferne tomentofa, fapore aromatico instructa.

Artemisia Vulgaris L. BLACWELL 131. caule herbaceo, foliis pinnatifidis incisis & floribus erectis distinguitur.

Copiofe crefcit per omnem Europam, nec non in Afia.

Oleam odoratum inde BAYER obtinuit: Extractum aquofum amarum, levissime fapidum, spirituofum aromaticum inde educi testatur LEWIS, utrumque iners esse, asseverat CARTHEUSER.

Artemisiam ad pellenda ea quæ utero continentur, facere contendit HIPPOCRATES unquam autem abortum inde excitatum fuisse, ut AMMANN contendit, dubito, ZACUTUS ejus infusi ope, menses per decennium obstructos curatos fuisse testatur. * Moxa qua gentes Orientales membra eorum, qui morbo articulari laborant, curare folent, est tomentum ab Artemisia probe exsiccata & trita remanens, quod digitorum ope in turundam formant; hoc medicamentum non tam ratione Artemisiæ, quam quia cauterium est, operatur.

* Aqua destillata NIC. PREPOS. * Extractum Wurtemb. Utrumque medicamentum iners, * Syrupus simplex Parisiensium. * Syrupus compositus FE*NELII, etiam auctus apud Parisinos occurrit, Wurtembergenses sequuntur Augustanos: * Oleum destillatum SCHROED.

* CALAMINTHA, radauívon, Calament, Bergmünze. Recipimus inde Folia petiolata, ex ovatisoblonga, hirfuta, evidentius crenata, quæ exficcata parum odoris & faporis aromatici habent.

MELISSA. Calice bilabiato quinquefido fuftentat corollam labiatam, cujus labium fuperius fornicatum eft, inferius trifidum, lacinia media majore: Calamintha L. BLACWELL 166 flore parvo, foliis minoribus, minus acutis differt. Crefcit in Europa Meridionali, Helvetia & Anglia.

Proftant interdum folia Melissa Nepeta L. pedunculis axillaribus, dichotomis, folia excedentibus, distinctæ, quæ minora sunt, magis ovata, magis odorata & fapidiora.

In iifdem cum priori locis crefcit.

Oleum odoratum fundit, Extractum aquofum iners eft, fpirituofum aromaticum. LEWIS.

Vires reliquarum plantarum aromaticarum habet, a meliffa & mentha depressa, exfolere cœpit, cum III, HALLER a Melissa Nepeta vessicas excitari viderit, hinc ea præ reliquis propius ad Calamintham Veterum accedere videtur.

CALAMUS AROMATICUS Barb. Azog@- Veterum, Calmus. Proftant hoc nomine Radices longæ, compreffæ, lineis longitudinalibus & transversis, nec non tuberculis notatæ, quæ exsiccatæ, extus ex flavo rubent, intus albæ & fungosæ funt, fractu faciles, odore gaudent grato & aromatico, fapore amaro, linguam feriente.

Acorus L. BLACWELL 466. Spadice amentaceo, flores hexapetalos, ifantheros, monogynos, in capfulas triangulares abeuntes gerit.

In Europa, præter maxime Septentrionalem multum occurrit, ultra Alfatiam in Galliam non afcendit.

* Radices tenuiores interdum proftant rufescentes, odore jucundiore, fapore leviter amaro, aromatico, minus acri instructæ, ex varietate Acori in India Orientali & China Septentrionali crescente desumtæ, & has *Radices Acori veri* solent appellare.

Olei odorati vix $\frac{1}{128}$, ultra $\frac{3}{16}$ Extracti fpirituofi multum aromatici, $\frac{1}{2}$ fere aquofi inertis largitur NEUMANN. Extracti aquofi $\frac{3}{8}$ fere, $\frac{1}{4}$ circiter fpirituofi CARTHEUSER. Spiritus vini a radice Calami abstractus parum fapidus & odoratus inde evadit. LEWIS.

Vi multum refolvente & primas vias roborante gaudet, hinc in affectibus ventriculi maxime, in obstructionibus mensium cachecticarum, morbis pectoris pituitosis, multum laudatur, lotii suppressione laborantes eodem FALLOPIUS curavit; ad drachmam dimidiam in hæmorrhagiis internis exhibitum, egregios effectus edidisse LE BEAU observavit.

* Aqua destillata VAL. CORD. * Oleum destillatum VAL. CORD. * Electuarium de Acoro SCHROED. minus bene Pseudacorum recipit, ex magna farragine medicamentorum aromaticorum concinnatum, & ad roborandas primas vias laudatum: * Extractum spirituosum & aquosum commixta, Wurtembergenses affervant: * Conditum SYLVII Confectio SCHROED.

* CARDAMOMUM, ragdaµwµor, hoc nomine •ccurrunt Folliculi ficci, ventricofi, trifido septo intus distincti, seminibus angulatis, aromaticis fœti.

Majus L. BLACWELL 385 & 584 appellantur folliculi oblongi, aliquot pollices longi, turbinati, fuperne apertura lacera hiantes, cinereo-rufi, ftriati, tenaces, quæ femina includunt coriandro non minora, fub cute ex cinereo-ferruginea medullam albam vehentia, fapore acri, ad camphoram accedente, linguam ferientia, fingula fepti productionibus involuta

Ex Syria, Malabaria, Ægypto & littore Orientali Africæ ad nos adducitur, creberrime cum folliculo Granorum Paradifi confufum.

Olei effentialis ex albo viridefcentis, $\frac{1}{43}$ circiter, Extracti aquofi ad caryophyllorum faporem accedentis $\frac{1}{5}$, Extracti fpirituofi parum aromatici $\frac{1}{12}$ largitur.

Rotundum, Javanicum, Medium LOBEL. Figura & magnitudine avellanas refert, in tres angulos obtufos diftinguitur, extremitas fuperior parum eminet, neutiquam hiat, folliculus fragilis est, color plus minus flavus, semina angulata, cinerea, fusca, intus alba, suavem odorem spirant, fapor aliquid amari habet, evidenter ad Camphoram accedit.

Ex Java & Malacca nobis mittitur.

Extracti aquofi, fpiculis falinis diftincti, butyrum Cacao fapientis $\frac{1}{4}$, fpirituofi inertioris $\frac{1}{32}$, olei odorati pellucidi $\frac{1}{16}$ fere fundit.

Zeylanicum, Majus CLUS. Medium MATTHIOL. fiftunt folliculi triquetri, unciales, apice acuto, fufco inftructi & feminibus badiis, rugofis, angulofis, odore fuavi, fapore amariufculo, minus quam antecedentium acri, gaudentibus.

Ex Ægypto, Persia, India & Java, in Europam fertur.

Olei odorati, fpiffiufculi, dulciufculi $\frac{1}{192}$, Extracti aquofi, inodori, fpiculis falmis diftincti $\frac{1}{12}$, fpirituofa acris & aromatici $\frac{1}{20}$ exhibuit.

In Germania præcipue ufurpatur,

Minus, Malabaricum, Majus C. B. Folliculos femiunciales circiter habet, fubflavos, leviffime ftriatos, in tres angulos diftinctos, papilla in apice coronatos; femina angulofa funt, rugofa, fubrufa, fapore & odore Camphoræ propiora. Defumitur ab

Амомо. Corolla quadrifida irregulari, calice trifido fuftentata, monanthera, monogyna, capfula triloculari gaudente: Cardamomo L. BLACWELL 584 & 585 fcapo fimpliciffimo & bracteato diftincto.

In Malabaria & Zeylana crefcit.

Olei odorati pellucidi, $\frac{1}{26}$, Extracti aquofi omnis aromatis expertis, falini $\frac{1}{4}$, fpirituofi aromatici $\frac{1}{16}$ inde extraximus : NEUMANN Olei odorati $\frac{1}{24}$, Extracti aquofi $\frac{1}{27}$, refinofi $\frac{1}{32}$: CARTHEUSER autem Extracti aquofi $\frac{1}{8}$, refinofi perparum; LOESECKE Olei odorati $\frac{1}{12}$.

Reliqua Cardamoma, quæ unquam in ufum recepta fuiffe non novi, mitto, id faltem adhuc monens quod Cl. HERMANN evicerit, PLINIUM primum Zeylanici meminiffe, rotundum a DIOSCORIDE & GALENO intelligi, quando fimpliciter de Cardamomo præcipiunt, majus autem ab Arabibus.

Medicamentis uterinis HIPPOCRATES Cardamomum adfcribit, a DIOSCORIDE roborandi ventriculi ergo laudatur, nec non ad movendam urinam & necandos vermes, quos etiam effectus ab indole ejus aromatica jure expectamus, & præcipue quidem a rotundo; extus difcutiendi fcopo, nec non tanquam mafticatorium, ut fætorem oris corrigat, folet adhiberi.

Oleum Cardamomi Majoris fub nomine OLEI CA-JEPOET in officinis proftat, ejus inter primos LOCHNER, undecim circiter retro lustris, meminit, videtur fuccedaneum effe olei, quod apud Indos ex foliis Melaleuca Leucodendra L. quam ipsi Cajepoet dicere folent, paratur, illud ad cephalalgiam, odontalgiam, retrogreffa exanthemate & apoplexiam, egregium me-

Q 3

dicamentum BEYER eft expertus. In Commercio Norico, valide inde fudorem moveri, convultiones, epilepfiam, catalepfin mitigari, ab una aut altera ejus gutta, goffypio excepta & denti dolenți immisfa, odontalgiam ferofam fascini instar curari, cæcitatem, podagram retropulfam, cardialgiam curari observationibus probatur, Cl. RAMSPECK eximios inde effectus in morbis convulsivis & vertigine vidit: * Gleum destillatum Cardamomi VAL. CORD. * Essentia Brandeb.

CARUM, ragor, Carvi LONICER. Carvi, Mattenkümmel. Semina exhibet convexo - concava, incurva, oblonga, ftriata, fubnigricantia, odore & fapore proprio, aromatico, fuavi inftructa.

CARUM L. BLACWELL 529. Involucrum nullum, flores umbellatos fere regulares, femina oblonga, striata habet.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Meridionalem, occurrit adhuc in Lombardia; hinc inde colitur.

Spiritus vini inde plus faporis, aqua plus odoris recipit, Extractum fpirituofum aromaticum, gummofum fere infipidum eft, Oleum odoratum $\frac{1}{30}$ æquat. LEWIS. Ego inde faltem $\frac{1}{64}$ obtinui, CARTHEUSER ultra $\frac{1}{6}$ Extracti fpirituofi, aquofi autem $\frac{3}{16}$ fere.

Radices olim ad usus alimentarios recipiebantur, eas ad urinam ciendam; & flatus pellendos GALENUS commendat, illis fcopo medicato efficaciora hodie fubftituuntur femina, puellas Suecicas inde pallidas reddi, monet Illustris LINNÆUS, & illud in tertiana non floccifaciendum esse; nostrates ejus aliquot pugillos ex jure carnium coquunt, & inde in colica flatulenta egregios experiuntur effectus, idem, more apud Veteres jam usitato, cibis flatulentis adjicitur, fed a femine paulo acriore caveant fibi homines fensibiliores. Clyfmata carminativa, nec non epithemata difcutientia non male ingreditur. * Aqua destillata VAL. CORD. * Oleum expressum Parif. Oleum destillatum VAL. CORD. Ob evidentem acrimoniam rarius interne usurpatur, externe ad unguenta & clysmata carminativa recipitur.

* CARYOPHYLLATA Barb. la Bénoite, Benedictenwurzel. Exhibet Radices quæ ex capite craffiufculo, fibras emittunt capillares, extus rufas, intus albas, odore ad caryophyllos aromaticos accedente, & fimili fapore, qui aliquid adstringentis linguæ imprimit, instructas.

GEUM. Calice decemfido, fustentat corollam pentapetalam regularem, polyantheram, polygynam, gymnospermam: Urbanum L. BLACWELL 253, seminibus caudatis, uncinatis, floribus erectis & soliis lyratis distinguitur.

Crefcit in omni Europa.

Oleum destillatum album, spissum, fragrans, Extractum aquosum leniter adstringens, spirituosum aromaticum & adstringens largitur. Lewis ultra $\frac{1}{6}$ Extracti aquosi subministrat.

Potius a vi adstringente, quam ab aromatica videtur effe dijudicanda, hanc tamen non omnino negligendam effe ex Ill. HALLER observatione patet, qui inde in febre maligna deliria excitata fuisse vidit, & OVELGUN ejus vim aphrodifiacam attestantis; ab Ill. LINNÆO post PARACELSUM ad confervandam cerevisiam laudatur. Extus discutiendi scopo adhibetur.

CARYOPHYLLI Græcorum recentiorum, neutiquam PLINII Cloux de Geroffles, Nægelein: funt germina, quæ aliquot pollicum longitudinem habent, inferne obtufa, fuperne in quatuor lacinias æquales diffecta, quibus creberrime globulus, ex quatuor petalis convolutis conftans, infidet, floris rudimentum, rugofa, rubiginofo colore tincta, faporis proprii, linguam urentis, odoris proprii fragrantiffimi. Varietas, cujus latera in aliquot quafi alas producuntur Caryophyllorum regiorum nomine venit. Pinguiores, acriores, & qui pressi humidum pingue digitis affricant, eligendi sunt.

Carpuntur hæc germina, antequam florem dimittunt, menfibus Octobre & Novembre, collecta per aliquot dies fumo exponuntur, unde colorem rufum contrahunt, deinde in fole exficcantur, & inde illum inducunt colorem, quo ad nos mittuntur.

Caryophylli, quando arbori relinquuntur, ut maturescant, abeunt in fructus, qui exficcati, nostras officinas intrant, & dicuntur. A NTOPHYLLI MY-REPSI Caryophylli mares A VICENNE Meres de Geroffles, Mutternægelein, unciam circiter longi, ventricosi, utroque extremo parum angustati, inferne exiguo pedunculo instructi, superne umbilico quadrisido coronati, in cujus medio exiguus stylus conspicitur; sub eorum cortice susce & tenui hæret substantia nigra, splendens, sinu longitudinali in duos lobos divisa, odore & fapore caryophyllorum, sed remissionisus gaudent.

CARTOPHTLLUS L. BLACWELL 338. Corollam tetrapetalam habet, calice quadrifido fupero fuftentatam, polyantheram, monogynam, capfulam umbilicatam, monofpermam.

Arbor, quæ olim in omnibus Moluccis copiofe crefcebat, ex conventione Belgarum cum Rege Ternatenfi anno 1652 pacta, ubivis destructa, hodie nonnifi in Amboina colitur. In Tartaria quoque crefcere dicitur.

Caryophylli, olei limpidi $\frac{7}{32}$ fundunt, quod integris minus acre eft, Extracti fpirituofi acerrimi, minus odorati $\frac{1}{4}$; fpiritus vini inde minus odoris, fed plus faporis quam aqua, recipit. LEWIS, Olei odorati $\frac{1}{7}$ circiter, Extracti fpirituofi $\frac{3}{8}$ & paulo majorem quantitatem aquofi CARTHEUSER obtinuit : NEUMANN olei odorati $\frac{1}{7}$, Extracti aquofi $\frac{5}{12}$ circiter, fpirituofi $\frac{5}{16}$. Caryophylli fragrantia fua, modum fpirituum augent, acri, quo pollent fapore, fibras ftimulant, & hinc non male tanquam condimenta cibis adjiciuntur, ad morbos præterea, a primis viis debilitatis, aut muco fpiffo oriundos, apprime adhibentur. Probe autem circa eorum ufum cavendum, ne acrimonia aromatica inde excitetur. Dantur ad fcrupulum dimidium & in Infufis ad drachmam unam. Extus ad epithemata ftomachica recipiuntur.

Oleum destill. WECKER gratiæ ergo aliis medicamentis adjicitur, & ad offa cariofa maxime adhibetur. * Aqua destillata SCHROED. minus bene eviluisse videtur. * Conditum VAL. CORD. ex India ad nos adducitur.

Antophylli, quorum primus AVICENNA meminit, easdem vires cum Caryophyllis habent, sed remissiones.

CASCARILLA Recent. hoc nomine veniunt Cortices in tubos convoluti, aliquot pollices longi, lineam craffi, extus rugofi, cinerei, intus nigri, odore proprio, fapore amaricante, acriufculo, aromatico inftructi, & qui accenfi odorem non ingratum fpirant.

Defumuntur hi cortices fide Ill. LINNÆI a

CROTON. Planta relativa monophyta, cujus mares corolla interdum pentapetala gaudent, fimili calice fuftentata, nectario ornata, diplos-interdum polyanthera, ftaminibus connatis; feminarum corolla mafculinæ fimilis eft, trigyna, capfula triloba, trilocularis: *Cafcarilla* L. foliis lanceolatis, acutis, fubtus tomentofis diftincta.

Crefcit arbor in America Meridionali, præcipue in Peru.

Extracti refinofi $\frac{5}{8}$ BOULDUC inde obtinuit, HOFF-MANN olei odorati $\frac{1}{128}$, Extracti fpirituofi $\frac{1}{5}$, Extracti aquofi ultra $\frac{1}{6}$; CARTHEUSER Extracti aquofi inertioris $\frac{1}{3}$ circiter, fpirituofi autem parum fapidi $\frac{7}{24}$; Ego $\frac{1}{4}$ extracti aquofi & ultra $\frac{1}{32}$ olei odorati.

Primus STISSER fub finem feculi fuperioris, noftri corticis tanquam novi medicamenti, quod in Anglia, nicotianæ, cujus fumum hauriunt, adjicere folent meminit, & addit, fuo tempore eundem pro cortice Chinæ venditum fuisse, id quod etiam DE LA CON-DAMINE testatur, qui ipfum corticem Chinæ, in regno Peruviano Cafcarillam dici, refert, quod ab Hifpanis factum non miramur, qui omnem tenuem corticem, Cascarilla, suo idiomate folent appellare. Ex homonymia ortus error, APINUM feduxit, ut febre epidemica annis 1694 & 1695 graffante, hunc corticem ad fugandas febres adhibuerit, illum deinde omnis fecta Stahliana, pro fummo, quo corticem Chinæ prosequebantur, odio, est secuta; nec medicamentum valide refolvens in vario febrium genere Medicorum spem frustrare, facile largior, sed omni experientiæ refragrantur illi, qui corticem Cafcarillæ æque univerfale febrifugum effe ac cortex Chinæ contendunt. Cafcarilla ratione vis valide refolventis, cui roborans accedit, ad morbos pectoris cum fuccesfu adhibetur. eandem in dyfenteria, hæmorrhoidibus, malo hypochondriaco & hysterico conducere observavit Boul-DUC. Datur ejus pulvis ad scrupulum unum.

* Aqua destillata Parif. efficax omnino. * Essentia Brandeburg. Extractum aquosum Parifini, spirituosum & aquosum mixta Wurtembergenses, aquosum & vinosum Nostrates habent, omne ipso cortice minus efficax est. * Syrupus Parif.

* CASIA CARYOPHYLLATA PISON. Canelle gerofflée, Nageleiu Rinde; hoc nomine proftant cortices aliquot pollices longi, tenues, femi convoluti, extus dilutiores, hinc inde lichene albo obfeffi, intus fere nigri, odore & fapore caryophyllorum, fed remiffioribus, inftructi.

Myrtus Caryophyllata L. pedunculis trifido multifloris & foliis obovatis distinguitur.

Arbor Indiæ indigena & in Americæ Martinica, Guadelupa & Grenada occurrit. Ill. JACQUIN eam odorem laurinum, non caryophyllaceum, habere, afferit.

Hic cortex medio feculi fuperioris adhuc, nonnifi in collectionibus eurioforum occurrit.

Cum aqua & fpiritu vini fe in modum Caryophyllorum gerit, Oleum destillatum vehit illo Caryophyllorum acrius LEWIS. Ex integra libra corticis, nonnifi aliquas miculas Olei aquæ innatantis obtinuit CAR-THEUSER, qui ex hoc cortice præterea vix $\frac{1}{8}$ Extracti spirituosi, valde acris & $\frac{1}{16}$ aquosi, non aromatici accepit.

Ratione virium ad Caryophyllos accedit, quorum pulveri quoque non raro, augendi quæstus ergo, adjicitur.

* CASIA LIGNEA, Arab Eulonaría MYREPSI, Mutterzimmet. Ita appellantur Cortices, qui pollicis circiter latitudinem habent, antecedentibus parum craffiores, mox plani, mox in tubos convoluti, colore obfcuriore cinamomeo, fapore & odore cinamomi, fed multo remiffioribus, inftructi; mafticati evidentem vifcedinem linguæ imprimunt.

Varii alii cortices, infuper fub Cafiæ ligneæ nomine, apud Auctores, interdum quoque in tabernis occurrunt, videtur in univerfum, varias Lauri fpecies cortices habere cinamomeo odore & fapore inftructos, hos omnes Cafiæ ligneæ nomine folent infignire, illum, qui inter nos proftat, ajunt defumi a

LAURO, corolla hexapetala, enneanthera, nectario instructa, monogyna, fructu drupa, nuce fœta gaudente: Cassa L. foliis trinerviis, lanceolatis distincta. Arbor Indiæ Orientalis.

Ex integra libra CARTHEUSER ne guttulam quidem Olei obtinuit, idem inde Extracti aquofi multum mucilaginofi, parum aromatici, falini $\frac{1}{5}$ circiter, fpirituofi quoque debilis fere totidem feparavit. In Malabaria, infulis Afiaticis, Philippinis maxime crefcit.

Cinnamomo multo debilior cortex hodie vix ulterius in usum trahitur.

* CATARIA Barbar. Nepeta PLIN. l'Herbe aux Chats, Katzenkraut. Recipiuntur ejus Folia tomento obfessa, profundius crenata, ex ovatis in acumen protensa, proprio odore & sapore minus gratis instructa.

NEPETA. Corollam labiatam habet, cujus labium fuperius emarginatum est, inferius trifidum, lacinia media majore, calice bilabiato fustentatam: Cataria L. BLACWELL 455. floribus spicatis, pedunculatis & foliis integris gaudet.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Parum Olei odorati fundit, Extractum spirituosum gratum est. LEWIS.

Laudatur ad morbos uterinos, chloreticis ab Illuftri LINNÆO commendatur, ejus in locum Pulegiu a fuccedit.

CHÆROPHYLLUM vid. Olera.

CHAMEPITYS vid. Amara.

CHINE CORTEX Recent. Cortex Peruvianus, Quinquina, Fieberrinde qualis ad nos adducitur, vix digitum longitudine excedit, extus fcaber eft, fufous, non raro lichene obfeffus, intus lævis ferrugineus, odore proprio aromatico aliqualiter mucorem fpirante, fapore amaro, evidenter aromatico, cui aliquid mucidi accedit, inftructus. Rejiciendi funt cortices evidentius amari, non convoluti, linea craffiores, minus aromatici; ftyptici aut vifcidi aliquem fenfum linguæ imprimentes; nec non illi qui extus albi, intus gryfei funt, fapore amaro, acriufculo, aromatico quidem, fed ab illo, quo genuinus gaudet, diverfiffimo gaudent, & Corticis Peruviani albi nomine veniunt.

CINCHONA. Corollam habet quinquefidam, fimili calice fustentatam, isantheram, monogynam, fructum bilocularem, feminibus parvis fœtum, proprio receptaculo affixis: Officinalis L. floribus paniculatie diftinguitur.

Crefcit in montibus Loxæ regni Peruviani.

Cortex inde omni anni tempore deglubitur, & probe in fole exficcatur. Si a variis Auctoribus inftituta experimenta rimamur, $\frac{1}{3}$ circiter Extracti gummofi & $\frac{1}{5}$ refinofi vehit; ego Extracti aquofi $\frac{3}{8}$ & refinofi $\frac{1}{6}$ obtinui.

Egregium remedium primum ab Americæ incolis uxori Comitis DE CINCHON, qui in regno Peruviano regis locum tenuit, anno 1638 fuit detectum, -quæ, cum eodem in pulverem redacto a febre pertinaci convaluit, magnam ejus quantitatem inter ægrotos distribuit, unde Pulvis Comitissa dicebatur, ministerio Jesuitarum ad hunc scopum usa, hi per Procuratorem generalem Regni Peruviani in Europam reducem, ejus largam quantitatem Cardinali DE LUGOS miserunt, in cujus primum palatio, dein in collegio Jefuitarum Romano difpenfabatur, hinc a Cardinali æque ac a Jesuitis denominatur; anno 1640 Comite DE CINCHON Europam repetente, ejus Medicus largam corticis quantitatem fecum attulit, & illum infigni pretio vendidit; inde factum, ut quæftu incitati mercatores cortici genuino varios alios cortices commiscerent, & ita optimi medicamenti fama, malis artificiis malorum hominum, multum imminueretur. Interim semper extiterunt, qui cortice, & illo genuino, cum fuccessu utebantur. Schedula quædam anno 1649 Italico idiomate impressa, STURM Medicus Delphensis anno 1659, BADUS Medicus Genuensis anno 1663 publica circa ejus præstantiam ediderunt testimonia. Difficultas interim Medicorum novani medendi rationem tentandi, falfa de febrium & corticis natura hypothefes & perniciofus mos medicamenta non ad experientiæ lucem, fed ex theoria di-

ne

fit

qu

e

1

judicandi, parca, qua medicamentum nonnifi magno pretio comparandum dabatur, dosis quam vix ad duas drachmas extendebant, ejusdem crebra præterea fophisticatio, unde spei creberrime non respondit, fuerunt in caufa, ut per aliquod tempus rarior ejus fuerit usus. Ea ætate TALBOT Eques Anglus genio hominum se accommodans, corticem sub persona arcani dedit, is ipfe sub Febrifugi Anglici titulo multum celebrabatur ; LUDOVICUS XIV qui noluit fummi medicamenti notitiam diutius latere, eam a TALBOT vere regia liberalitate emit, & anno 1682 publici juris fieri juffit, ex hoc tempore cortex, non obstantibus varia ratione occœcatorum clamoribus, fe non in febribus modo, fed etiam in aliis morbis non tam egregium fed unicum, quo certiffime vinci poffint, probavit medicamentum.

Ad quinque præcipue capita corticis, Peruviani falutares effectus possunt reduci: 1) sistit dispositionem nervorum ad fuscipiendos spasmos; hac ratione omne febrium genus fopit, & medetur omni morbo, qui per periodos invadit: 2) stomachicorum princeps eft, primas vias roborat, & viscerum obstructiones referat, hinc & ad icterum, & ad malum hypochondriacum, & ad hydropem debellanda egregie facit, nec non ad destruendum vermium nidum, obfervantibus TORTO, WERLHOFF & Cel. TISSOT: 3) roborat organa quæ fanguinis motui præfecta funt, omne genus hæmorrhagiarum inde curatum, menfes referatos, morbos arthriticos fugatos, excretiones colliquativas fopitas, fluorem album curatum legimus: 4) specifica plane virtute, fanguinis in putredinem nifui refiftit, id quod inter alios Ill. PRINGLE, TORACCA & MAUTH experimentis probarunt, primus Douglas, proprio tractatu 1732 edito, ejus in curanda gangræna effectus recensuit, quos omnino edere longe pluribus exemplis in omni morborum ge-

ROBORANTIA.

nere, quod putredo humorum comitatur, hucufque fuit obfervatum, ipfas obfervationes, nec non illas quæ priora confirmant, non cito, cum vix non omnes Obfervatores effent adducendi. 5) Suppurationem egregie promovet primum obfervante STRIPTON Phil. Tranjact. N. 426. Vi, cujus rationem ego faltem non audeo allegare, etiam aliis humorum corruptionibus refiftere, compertum eft, ad cruftam aphtofam feparandam egregie facere, SYDENHAM, VAN SWIETEN, Ill. PRINGLE, Cl. KRATZENSTEIN teftantur, fpinæ ventofæ mederi Cel. DE HAEN vidit, qui poft DIE-TRICH æque ac Cl. RITTER & VAN SWIETEN corticem in cancro mammæ exulcerato vidit efficacem. Cl. FORDYCE & FOTHERGILL, quantum in morbis fcrophulofis conducat, probatum dederunt.

Qua ratione fua miracula cortex edat, non audeo decidere, id tamen nolo ignorari, illum, peffime adstringendo agere reputari, BLEGNY, a BRUNN, AL-BERTINI, HOFFMANN, BERGER, LOESECKE obfervationibus fane constat, sub ejus usu semper aliquam excretionem augeri, id quod & ipfe creberrime vidi; BRUNNER & SCHWENKE viderunt, eundem fanguinem e vena emiffum rubicundiorem & fluidiorem reddere. Exhibetur optime fub forma pulveris ad drachmam dimidiam pro dosi, & datur quater de die, per omne, quo morbus urget, tempus, febres si inde fuerint profigatæ, prudenti confilio ejus ufus adhuc per aliquot feptimanas continuatur, & fenfim dofium numerus imminuitur, non male iidem interdum alia medicamenta ad morbum facientia commiscentur, sed non raro, dum ipfi, quæ corrigentium vice fungi debent, adjiciunt, falutaribus ejus effectibus obicem ponunt. Contra gangrænam etiam majoribus & crebrius repetitis dofibus datur. Forma infusi exhibitus debilius agit, optime ad tales infusiones menstruum aquosum recipitur. Sub forma clyfmatis, ad ductum HELVETII,

ano injectus, fuas vires quoque edit, nec non fub forma balnei, fi in ufum trahitur, obfervante Cl. ALE-XANDER. Febre per corticem curata, fi indicatio alvum adhuc ducere fuadet, fine ullo recidivæ metu eccoprotica poffunt exhiberi, licet fecus videatur SY-DENHAMO & aliis, qui illum adftringendo agere fingunt. Cl. BEAUMÉ non male obfervat, efficaciffimum effe illum corticis pulverem, unde is qui primus fub contufione furgit, quippe inertior, fuit feparatus.

Extractum Parifini aquofum habent, Noftrates fpirituofum, Wurtembergenfes ambo commixta, optimum id eft quod in modum Comitis DE LA GARAYE paratur, jam diu in Gallia fub nomine falis celebratum, datur ad fcrupulum unum ufque: * Syrupus, duplicem Parifini habent, quorum alteri, præeunte LEMERY, infufum vinofum adjiciunt, idem quoque Wurtembergenfes recipiunt: * Decoctum febrifugum Parif. etiam falia recipit: * Vinum febrifugum Parif. * Tinctura five Effentia TALBOT, minus bene corticem fpiritu vini extrahi, experientia evicit: ille ipfe folus, multo melius febres malignas profligabit, quam Tinctura compofita HELWIGII, & multum metuo in Elixir Antifebrili Wurtemberg. corticis vires potius imminui, quam augeri.

CINAMOMUM, neutiquam una populor Veterum, Canelle, Zimmetrinde; cortices convolutos, prælongos, tenues fiftit, proprio colore fusco, qui extus dilutior est, odore proprio fragrantissimo, fapore grato, & cui aliquid dulcis accedit, instructos.

Laurus Cinamomum L. BLACWELL 354 foliis trinerviis, nervis versus basin coëuntibus distinguitur.

Crefcit in Zeylan, Malabar, Moluccis, Tartaria, Martinica Americæ.

Cortex ex arbore Zeylanica defumtus reliquis præftat; ftat: arboris radix camphoram & oleum odoratum, quod istam perfecte redolet, fundit.

Olei deftillati vix $\frac{1}{128}$ largitur, quod fragrantifimum eft, aureum colorem habet, & gratiffima acrimonia, dulci juncta, linguam ferit. Extracti fpirituofi aromatici $\frac{1}{6}$ largitur. LEWIS. Extracti fpirituofi ultra $\frac{1}{8}$, aquofi $\frac{1}{70}$ circiter. NEUMANN. Olei deftillati $\frac{1}{64}$, Extracti aquofi leviter adftringentis $\frac{1}{8}$, refinofi $\frac{3}{16}$. CARTHEUSER.

Penetrante & fragrantiffimo, quem fpirat, odore evidenter in origines nervorum agit, & hinc egregie conducit in encephali & nervorum morbis a languore oriundis, datur quoque cum fucceffu ad roborandas primas vias, & cum mucum attenuet & vires circulationes ftimulet, hinc opponitur morbis, quos frigidos folent appellare, adjicitur quoque gratiæ ergo tam medicamentis, quam alimentis.

* Aqua Cinamomi fimplex GARZIÆ ab HORTO jam memorata, efficax omnino, cum oleum Cinamomi, præ omnibus reliquis pertinacius aquæ, cum qua destillat, adhæreat; Wurtembergenses Aquam Ceraforum a Cinamomo abstrahunt: Aqua hordeata Parifinis a nostratibus prioris in locum recipitur: * Aqua Buglossata a prioribus neutiquam diversa : * Aqua (pirituosa Parif. non multum differt ab Aqua cum Vino Colonienf. gratiæ multum habet: * Aqua Cinamomi cordialis Noricorum ab aqua Bugloffata non diversa est: Aqua Cinamom. Cydoniata ad sistendos alvi fluxus maxime commendatur; * Aqua Cordialis temperata Augustan. a ZWOELFFER jam correcta, & a Collectoribus Pharmacopaa Wurtemberg. adhuc magis contracta, nimis tamen adhucdum eft prolixa: * Aqua Cordialis frigida Norimberg. correctam Wurtembergenfes exhibent : cum Cinamomum habeat, neutiquam medicamentis frigidis poteft adfcribi : * Confectio cinamomi regia Wurtemb. egre-

gium omnino medicamentum analepticum, & quod multum ad roborandas primas vias facit : * Species Diacinamomi MESUE, congeries aromatum ad morbos a viscido primarum viarum faciens : * Tinctura SCHROED. gratum omnino medicamentum: Syrupus Augustan. optime fecundum præscriptum Nostratium paratur: Vinum Hippocraticum RENODEI, parum mutatum Nostrates recipiunt, gratum potulenti genus vix ad usus medicatos adhibetur : Species Ejusdem tam roborandi ergo variis Infusis adjiciuntur, quam a cauponibus uvis adduntur, quibus vinum fuperfundunt, & ita Rebs parant : Oleum Cinamomi VAL. CORD. cum genuinum cariffimo pretio vendatur, hinc vix non femper adulteratum prostat, pertinet ad præcipua medicamenta analeptica, extus adhibetur ad offa cariofa; inde parant * Balfamum SCHROED. * Eleofaccharum August. nonnisi usus tempore præparandum : Pulverem auratum Germanicum feu Zellensem. Parif. Wurtembergenfes ambram omittunt, Noftrates matrem perlarum & folia auri adjicunt, rationem olei imminuunt, remedium princeps pro refocillandis viribus cordis.

CITRI CORTICES vid. Fructus Horai.

CONTRAJERVA Recent. Ejus Radices funt fibrofæ, plurimis fibrillis inftructæ, tenues, parvæ, rugofæ, foris rufæ, intus pallidæ, fapore gaudent fubadítringente, leviffime aromatico, exiguo quoque odore.

DORSTENIA. Flores habet quadrifidos, ifantheros, monogynos, receptaculo communi tectos, quod per maturitatem carnofum evadit, *Contrajerva* L. BLAC-WELL 578-581 habitu acauli, foliis pinnatifidis & pinnis ferratis diftinguitur.

Crefcit in America Meridionali.

Contrajerva est vox Hispanica, qua plantam venenis oppositam denotant, tales cum plures prædicare folent, hinc plures Contrajervæ apud Auctores occurrunt. Primus DRACKEN Eques Anglus anno 1581 quafdam radices in Europam attulit, illa demum medio feculo fuperiore in officinas fuit recepta,

Aquam inde multum viscidam reddi LEWIS observavit. Extractum spirituosum, aquoso, multo magis sapidum est. LEWIS & CARTHEUSER. Extracti aquosi ultra $\frac{3}{13}$, spirituosi $\frac{1}{5}$ circiter. NEUMANN.

Olim cum morbos malignos a veneno oriri crediderunt, hæc radix magni fiebat, explofa hac theoria, ipfa etiam evilefcere cœpit.

* Pulvis compositus Edinburg. ad morbos exanthematicos commendatur: Syrupus Argentoratenf. a suoco citri præcipue, in morbis exanthematicis laudandus: * Syrupus Contrajervæ compositus Viennensium, inconcinna compositio: * Tinctura Parif.

CORIANDRUM, xogiavvov, xogiavSqov Græcis recentioribus, Coriandre, Coriander. Semina fiftit rotunda, cava, striata, sapore proprio aromatico, odore in recentibus cimices redolente, in exsiccatis non ingrato, instructa.

CORIANDRUM. Flores umbellatos habet, involucro utroque paucifolio fustentatos, semina sphærica, concava: Sativum L. BLACWELL 176 fructibus globosis distinguitur.

In Italia & Palæstina sponte crescit, apud nos in agris colitur.

Exiguam Olei destillati portionem fundit, spiritus vini omnem inde odorem extrahit. LEWIS. Extractum aquosum parum, spirituosum multum aromaticum est. CARTHEUSER.

Neutiquam aliquid venenati his feminibus ineffe, ut NICANDER & DIOSCORIDES finxerunt, HIPPOCRA-TES jam perspexit, qui Coriandrum ventriculo gratum effe afferit, ad morbos pectoris quoque, hepatis & nteri commondat, nec non ad ructus acidos. TARZA-

R 2

gus, a Coriandro cum vino ante paroxyfmum exhibito, crebro quartanam fugatam fuisse, observavit.

* Confectio SCHROED. * Aqua destillata SCHROED. * Oleum destillatum VAL. CORD.

Costus vid. Amara.

CROCUS, *rgénG*, *Safran*: ita appellantur filamenta fulva, inferne angustata, proprio odore & sapore aromatico, amaro instructa, aquam luteo colore tingentia.

Rejicitur humidus, qui inter digitos preffus eos non tingit, levem aut peregrinum odorem fpirans, & cui filamenta alba aut lutea commixta funt.

CROCUS. Corollam fexfidam habet, fpatha monophylla fustentatam, triandram, monogynam & capfulam trilobam : Sativus Officinalis L. BLACWELL 144 tubo longiore & foliis per æstatem disparentibus, distinguitur.

Crefcit in Natolia & Archipelago. Colitur in variis Europæ regionibus. Orientalis & Auftriacus optimus cenfetur effe, his non cedit Vaftinienfis, quem per annos non poffe affervari, minus bene dicunt, Italicus ex Magliano minus puniceus eft, fed in pulverem redactus, præ reliquis magis tingit, Hifpanicus oleo irroratus rejici debet.

Stigmata ex floribus recentifime explicatis decerpuntur, & chartis impofita, in proprio fornacis genere exficcantur, ftamina, quæ fub eorum collectione admifcentur, manuum ope feparantur.

Extracti fpirituofi, minus odorati $\frac{2}{3}$, aquofi $\frac{3}{4}$ largitur. NEUMANN. Extracti fpirituofi $\frac{3}{4}$, totidem aquofi, $\frac{1}{82}$ Olei odorati. LEWIS.

Crocus ad quatuor scrupulos assuntus, neque in calore, neque in pulsu aliquid mutavit, neque urina inde fuit tincta, per experimenta ALEXANDRI.

Evidenti vi humores refolvendi gaudet, hinc concoquentibus a GALENO adfcribitur, & ad morbos

pectoris jam a SERAPIONE laudatur, & ad hunc ufque diem cum fucceffu adhibetur, hanc etiam maxime ob rationem ad promovendas excretiones uterinas eo utuntur; fed inde quoque motum fpirituum retardari obfervatum eft, ita ut & anodynas vires edat, & largiori dofi datus, delirium, imo mortem producat; cachinnum lethalem inde excitari, finxerunt Arabes, & obfervationibus voluerunt confirmare LUSITANUS, CAMERARIUS & KOENIG, vel folo ejus odore exanimatos adducunt LUSITANUS & BORELLUS. Vim ejus antifepticam omnis ætas confirmavit. Interdum quoque cibis aut potulentis adjicitur. Dofis ad fcrupulum unum.

Externe refolvendi & fopiendi ergo in ufum ducitur. HIPPOCRATES ad morbos-oculorum commendat, in inflammationibus, abfcelfibus, tumoribus arthriticis & rheumaticis cum fucceffu adhibetur.

Extractum VAL. CORD. Noftrates minus efficax fpirituofum recipiunt, datur ad grana quatuor: Tinctura ZWOELFFER etiam externe difcutiendi ergo adhibetur: * Tinctura vel Effentia Vinofa SCHULTZ priore minus calefacit: * Oleum infufum DIOSCORID. * Syrupus Wurtemberg. datur pueris fcopo anodyno: Emplastrum Oxycroceum NICOL. a ZWOELFFER correctum, in Difpenfatoria recipitur, fed ita, ut fere fingula, ratione proportionis ingredientium varient, Noftrates præ reliquis minorem Croci rationem recipiunt, vix monendum eundem demum addendum effe, quando maffa mox refrigefcit: laudatur fcopo refolvendi ad luxationes, fracturas, fugillationes.

CUBEBÆ Arab. zóµπεβa, zsµπεπεg Græcor. Recent. Poivre à queue, funt Fructus rotundi, qui piperis circiter magnitudinem & figuram habent, rugofi, includunt granum ex rufo nigrum; intus album, fapore gaudent acri aromatico, & fustentantur pedunculo brevi & tenui. Majores, nucleo ventricoso instructæ, reliquis præferuntur.

Nil certi de planta, unde defumuntur, conftat, nifi quod caulem volubilem habeat, & in Java, Malabar & infula Bourbon crefcat.

Parum Olei effentialis mitis fundunt, utrumque Extractum inde paratum, acre eft. LEWIS. Extracti spirituosi $\frac{1}{3}$ circiter, aquosi $\frac{5}{72}$ fere. NEUMANN. Extracti spirituosi $\frac{5}{76}$, aquosi $\frac{3}{8}$. CARTHEUSER.

Præter vires, quas cum reliquis aromatibus communes habent, specifice, præeunte CRATONE, vertiginofis laudantur.

* Oleum destillatum Parif. * Confectio SCHROED.

* CULILAWAN CORTEX Recent. fub forma fruftorum lineam crafforum, felqui pollicem circiter latorum, five planorum five concavorum, colore cinamomeo inftructorum, tenera & rugofa epidermide tectorum, ad nos adducitur, textura gaudet laxiore, odore fragranti ad caryophyllaceum accedente, fapore lenius aromatico, caryophyllos fapiente.

Laurus Culilaban L. foliis trinerviis, ovato acutis distinguitur.

Crefcit in Amboina.

Nequidem $\frac{1}{100}$ Olei limpidi, quod Caryophyllos & L. Saffafras fapit, Extracti fpirituofi acris & glutinofi $\frac{1}{5}$, totidem aquofi, modice amaricantis fundit, CARTHEUSER.

Sub finem Seculi fuperioris demum, Europæinnotuit, ratione virium inter Cafiam ligneam & Caryophyllatam medius effe videtur.

* CUMINI SEMEN róµnov, Cumin, Römischer Kammel. Est Semen majusculum, odore & fapore minus gratis instructum : oblongum, striatum, ex gryseo flavescens, quod hodie obtinet, ab illo Veterum evidenter diversum est.

CUMINUM L. Planta umbellifera est, involucro

utroque, germine flore majore, feminibus striatis instructa.

Ægypto & Palæstinæ indigena; In Sicilia & Melito colitur.

Olei odorati $\frac{1}{32}$ exhibet. LEWIS. Extracti aquofi ultra $\frac{3}{8}$, fpirituofi evidentius aromatici vix $\frac{1}{5}$. CAR-THEUSER.

Ob vires carminativas interne, ob refolventes externe, ad lac difcutiendum maxime, tumores tefticulorum & fugillationes ufurpatur.

* Aqua destillata SCHROED. * Oleum destillatum VAL. CORD. * Emplastrum Hamburg. Baccis Lauri & Oleo destillato auctum receperunt Wurtembergenfes, abdomini imponitur, dum intestina slatibus distenduntur.

* CURCUMA Barbar. xúmergov Ivdudov DIOSCORID. Cyperis Indica PLIN. Crocoma Arab. Terru merita Gallis, largitur Radices tuberofas, geniculatas, geniculis & cylindraceis & fubrotundis, foris pallidas, intus fplendentes & croceas, rugis diftinctas, fapore acri & aromatico, odore leviffimo vel nullo inftructas.

CURCUMA. Corollam quadrifidam habet, calice fustentatam, monantheram, monogynam, filamentis quinque præditam, fructum trilocularem, polyspermum: Longa L. BLACWELL 396 foliis multi nerviis distinguitur.

Crefcit & colitur in omnia India aquofa.

Olei odorati $\frac{1}{120}$, Extracti refinofi $\frac{1}{8}$, aquofi autem $\frac{1}{2}$ feparavit. LOEBER. Extracti aquofi $\frac{1}{3}$, fpirituofi ultra $\frac{1}{8}$ NEUMANN. Olei odorati vix $\frac{1}{256}$, Extracti aquofi amaricantis & plurimum falfi $\frac{1}{4}$ fere, fpirituofi acris, aromatici quidem fed fimul naufeofi $\frac{1}{5}$ circiter. CARTHEUSER. Aqua cum his radicibus cocta, aurantium colorem induit, qui ab acidis citrinus fit, ab alcalinis ex rufo-fufcus evadit. POERNER.

Virtute aromatica, qua gaudet, primas vias ro-R 4

20

borat, hinc tefte RUMPH vulgare in India ciborum condimentum eft, humores quoque attenuat, & ideo egregie ad hepar obstructum facit, ad icterum hinc conferre multoties BONTIUS vidit, ad œdemata & febres intermittentes LOEBER.

Dofis ad fcrupulos duos, in Infuso ad totidem drachmas.

* CYPERUS, κύπειζον, κύπεζον, le Souchet. Duo ejus genera occurrunt.

Rotundi Radices sunt turbinatæ, extus pallide rufæ, intus albæ: odore gaudent leviore, sapore evidentius aromatico, olivæ magnitudinem habent.

CrPERUS. Spicam disticham imbricatam habet, corollam glumosam, nudam, triantheram, monogynam: Rotundus L. culmo triquetro, umbellæ ramis divisis, spiculis alternis linearibus distinguitur.

Crefcit in India, maxime Java, nec non in Ægypto & Syria.

Extracti fpirituofi $\frac{3}{16}$, aquofi $\frac{3}{4}$ largitur. NEU-MANN. Extracti amari & aromatici $\frac{1}{3}$ & totidem fpirituofi obtinuit CARTHEUSER.

Longi Radices, quæ demum a Latino-Barbaris in ufum tractæ fuiffe videntur, evidentius quam antecedentes odoratæ funt; calamo anferino craffiores, circulis & nodis notatæ, extus fere rufæ, intus pallide rufæ, utroque extremo incraffatæ, fapore prioribus remiffiore gaudent.

Cyperus Longus L. culmum triquetrum foliofum habet, umbellam foliofam, multum divifam, pedunculos nudos & fpicas alternas.

Crefcit in Gallia Meridionali & Italia, noftras quoque hyemes fert.

Extracti aquofi inodori, fubacris & amari $\frac{1}{5}$ circiter, fpirituofi amari & aromatici ultra $\frac{1}{4}$ largitur. CARTHEUSER.

HIPPOCRATES Cyperum extus ad morbos uteri

adhibet, GALENUS ad nephritidem, obstructiones mensium, levandam urinam commendat; extus autem ad ulcera manantia; hodie rarius in usum trahitur.

* Aqua destillata Parif.

* DICTAMNUS, d'ala prov. Ejus duo genera officinæ recipiunt : unum quod a Creta denominant, genuinus Veterum Dictamnus, alterum Recentiores addiderunt, & illud album appellant.

Dictemni Cretici folia rotunda funt, multo albo tomento obfessa, odorem levem, faporem evidenter, aromaticum, fed parum acrem habent.

ORIGANUM. Flores habet involucro fuftentatos, corolla ringente gaudentes, cujus labium fuperius emarginatum est, inferius trifidum, laciniis parum irregularibus, femina nuda: Dictamnus L. BLACWELL 462, foliis tomentosis & spicis nutantibus distinguitur.

Crefcit in Europa multum Meridionali.

Olei odorati $\frac{5}{25\pi}$, Extracti fpirituofi $\frac{3}{76}$, aquofi autem inertioris $\frac{7}{24}$ inde obtinuit NEUMANN.

Pro pellendis menfibus & fecundinis ab HIPPOCRA-TE laudatur, olim ad promovendum partum commendabatur, cum id, quod hodie inter nos proftat, parum aromatis habeat, hinc vix ulterius in ufum trahitur.

Dictamni albi Radices oblongæ funt, albæ, intus aliqualiter fungofæ, calami circiter craffitiem habent, faporis & odoris expertes, aquam cum qua infunduntur amaram reddunt.

DICTAMNUS L. BLACWFLL 75. Calice quinquefido fuftentat corollam irregularem pentapetalam, diplofantheram, monogynam, fructus quinquecapfularis.

Crefcit in Europa temperata, in Saxoniam ufque ascendit.

Planta in Italia fub nomine Fraxinellæ nota, feculo XVI demum Dictamni nomine cœpit appellari. Extracti aquosi leviter amari 5 exhibet. CAR-THEUSER.

Radicem, de qua nullæ, quod proprias vires habeat, proftant observationes, jure omnino negligimus.

* DORONICUM Barbar. Gemsenwurzel. Recipimus Radices quæ parvæ sunt, rotundæ, in finem angustum terminatæ, totidem nimirum articuli radicis longioris, extus flavicantes, intus albæ, odore nullo, sapore dulciusculo, cui aliquid aromatici accedit, instructæ.

DORONICUM. Flores mixtos habet, calice duplici ferie foliorum efformato, fustentatos, receptaculo plano & nudo inhærentes, & femina papposa: Pardalianches L. BLACWELL 239 foliis eordatis gaudet.

Crefcit in montibus Europæ Meridionalis.

Extracti aquofi $\frac{7}{8}$, fpirituofi magis dulcis & aromatici $\frac{7}{32}$ NEUMANN obtinuit.

MABANTÆ figmentum a MATTIOLO fuftentatum, hanc plantam effe Aconitum Pardalianches Veterum, effecit ut plures Auctores has radices venenatas effe reputarint, falfum commentum, experimento in fe ipfo capto, refutavit GESNER; earum vires medicatæ, cum nulla obfervatione fint confirmatæ, hinc hodie negliguntur.

* FILIPENDULA Barb. $\phi_{i\lambda}$ of the Græc. Recent. rother Steinbruch. Radices fibrofas fiftit, plures fibrillas emittentes, quarum extremitatibus noduli adhærent, foris ex rubro nigræ, intus albæ, fapore leviter aromatico & amaricante, odore fuavi inftructæ.

SFIRMA. Corolla pentapetala regulari, calice quinquefido fuftentata gaudet, polyanthera, quinque vel polygyna, & capfulis pluribus: Filipendula L. BLACWELL 467. foliis pinnatis, ferratis, uniformibus & floribus cymofis diftinguitur.

Crefcit in omni Europa.

Ob vim diureticam, uterinam & roborantem laudata, eviluit.

FOENICULUM Maga Seov, Fenouil, Fenchel. Inde Radices, Folia & Semina proftant.

* Radix alba eft, fusiformis, digiti craffitiem habet, faporem dulcem cum aromate, odorem proprium, fragrantem.

* Folia longa, capillaria, in longa filamenta fecta, feminum odori & fapori proxime accedunt.

Semina oblonga funt, convexo plana, ftriata, odore proprio, fimili fapore, qui aromaticus eft & aliquam dulcedinem habet, inftructa; quo magis calido fub climate planta adolefcit, eo majora & magis dulcia femina perficit; hinc dulce, Italicum, Creticum Auctores folent laudare.

Anethum Fæniculum L. BLACWELL 288 feminibus oblongis, non marginatis diftinguitur.

Sponte in Europa Occidentali & Meridionali, nec non in Anglia crefcit, apud nos multum colitur.

Radices Extracti fpirituofi aromatici, & cum quadam amaritie dulcis $\frac{1}{\overline{12}}$, aquofi, infipidi parum, largiuntur. Semen $\frac{1}{25}$ Olei odorati, qnod fub aëre temperato confiftit, largitur. NEUMANN Olei deftillati $\frac{1}{48}$, expreffi viridis $\frac{1}{8}$, Extracti refinofi $\frac{1}{\overline{12}}$, aquofi $\frac{1}{4}$ fere inde obtinuit. CARTHEUSER $\frac{3}{8}$ Extracti refinofi & paulo majorem quantitatem aquofi refert.

Radices refolvendi ergo laudat HIPPOCRATES, eas in fuffulione profuisse REUSNER allegat, quidam ad debellandas febres intermittentes profuisse testantur. Folia rariffime in usum trahuntur, creberrime autem semina, quæ vires seminis Anisi exserunt, quo tamen largiore aromate turgent, a GALENO ad augendum lac & scopo discutiendi commendantur, hoc ultimo fine maxime ad morbos oculorum solent adhiberi.

Aqua destillata quæ non bene ex herba ad moni-

tum NICOLAI PRÆPOSITI, fed melius ex femine, fecundum VAL. CORD. paratur, morbis oculorum maxime dicata: * Confectio SCHROED. * Oleum expressum Parifini recipiunt: * Oleum destillatum VAL. CORD. rariffime interne præscribitur: Elæosaccharum Nostrat.

* GALANGA Barb. yaláyyas MYREPS. Ejus duplex genus in officinis proftat: Major conftituitur a Radicibus intortis, variis ramis & tuberculis notatis, circulis diftinctis, extus rufis, intus parum pallidioribus, odore aromatico ad Camphoram accedente, fapore fimili inftructis, aliquot pollices longis, unum circiter craffis: Minor & magnitudine & craffitie priori cedit, fapore acriori linguam ferit.

Plantam autopta RUMPH corollam tetrapetalam habere, & baccam duobus vel tribus feminibus cordiformibus fœtam edere, teftatur, hinc non audeo eam MARANTÆ L. adfcribere.

Crefcit in India.

RUMPH monet Galangam minorem, quæ in officinis Europæorum obtinet, ex China adduci, eandem ex China in Indiam transplantatam, hodie ibi coli ex Histoire générale de Voyages XVII. video.

Triplo plus Extracti aquofi, quam fpirituofi & $\frac{1}{128}$ Olei deftillati parum odori & acris largitur. LEWIS. Olei deftillati $\frac{1}{187}$, Extracti aquofi aromatici $\frac{3}{8}$, fpirituofi $\frac{1}{11}$ circiter. NEUMANN. Olei deftillati $\frac{1}{128}$, Extracti aquofi $\frac{1}{3}$ circiter, fpirituofi acerrimi fervidi $\frac{1}{12}$. CARTHEUSER.

Primi Arabes Galangam in usum traxerunt, reliquorum aromatum effectus edit, ventriculo maxime & utero proficua credita. Minor, magis quippe aromatica, majori præfertur. Extus in paralyfi linguæ & atrophi membrorum profuisse Cl. PLENCK monet.

* Effentia Wurtemberg.

* GRANA PARADISI Recent. Malaghetta Barb. Graine de Paradis, Paradies-Korner, funt Grana parva, angulata, badia, odore non magno, fapore fervido inftructa. Folliculus, quo continentur, multa cum Cardamomo majore communia habet, hinc creberrime cum Cardamomo ab auctoribus confunduntur.

Ill. LINNÆI auctoritate noftra grana fubministrat Amomum Gran. Paradisi L. quod scapo ramoso brevissimo distinguitur.

Copiofe ad Africam Occidentalem occurrit.

Pauxillum Olei odorati fuaveolentis fundunt, Extractum aquofum acre, fpirituofum caufticum eft. LEWIS. Ultra $\frac{1}{8}$ Extracti aquofi, $\frac{1}{7}$ Extracti fpirituofi. CARTHEUSER.

- Ab Arabibus ad nos defcendisfe videntur, piperi ratione virium multum vicina.

HISSOPUS, vorwa@, l'Hyffope, Ifop, nostra, ab illa Veterum diversissima, per Arabes demum in officinas recepta : ejus prostant Folia quæ oblonga sunt, acuta, tota viridia, proprio odore & sapore aromatico instructa.

Hrssopus. Corollam labiatam habet, cujus labium fuperius rectum & emarginatum est, inferioris trifidi lacinia intermedia major & crenata, calice quinquefido fustentata, semina nuda: Oficinalis L. BLACWELL 296 floribus, unum latus spectantibus, distinguitur.

In Europa Meridionali & Sibiria sponte crescit, apud nos in hortis colitur.

Olei odorati $\frac{2}{96}$, Extractum fpirituofum valde acre, aquofum fubfalinum & amarum largitur. LEWIS. Extracti aquofi $\frac{1}{2}$, fpirituofi $\frac{1}{4}$, Olei odorati $\frac{1}{728}$. NEUMANN. Olei odorati $\frac{1}{64}$, Extracti fpirituofi ad $\frac{1}{8}$, aquofi $\frac{3}{8}$. CARTHEUSER.

A virtute multum humores attenuante laudatur, & præcipue ad mucofos pectoris morbos facere obfervata eft: Extus adhibitam egregie fugillationibus mederi, RIOLANUS & BOYLE viderunt.

Aqua destillata VAL. CORD. * Oleum destillatum

VAL. CORD. * Syrupum simplicem Parisini habent: Wurtembergensium Syrupus compositus egregium medicamentum resolvens est, omnino præserendum absurdæ MESUE præscriptioni.

IRIS. Ejus duæ species hodie in officinis prostant; una Florentina Latino-Barbaris, sive simpliciter Iris Veteribus dicta, sive ab Illyria, Africa, Macedonia denominata, altera a Latino-Barbaris Pseudacorus dicta, Iridis Nostratis nomine etiam venit.

Radices Iridis Florentina, Violenwurzel pollicem eraffæ funt, paulifper compreffæ, hinc inde tuberculis notatæ, intus leviter flavefcunt, extus albæ, fapore acri, leviter amaricante, & odore qui ad violas accedit, inftructæ: illas, quæ rectæ funt & longiores, in tabernis Longas folent appellare.

IRIS. Corollam habet fexpartitam, spatha bivalvi sustantian, triantheram, monogynam, stigmate trissido, quod petala mentitur instructam & capsulam triangularem : *Florentina* L. BLACWELL 414 corolla barbata, caule foliis altiore, paucifloro, floribus session distinguitur.

Crefcit in Italia, nostras hyemes optime fert.

Ego ex exficcatarum decem libris nullum Oleum potui obtinere. LEWIS $\frac{1}{\tau 5}$ refinæ exhibuit. KORTUM exiguam valde Olei portionem, $\frac{1}{\tau 2}$ Refinæ, $\frac{1}{9}$ Extracti aquofi, pulpam prunorum redolentis, amaricantis, leviffime acris. Extracti aquofi $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{8}$ fpirituofi. NEU-MANN. Extracti aquofi $\frac{1}{5}$ circiter, refinofi valde acris $\frac{1}{\tau 2}$. CARTHEUSER.

Radicis recentis fuccus evidentem acrimoniam habet, hinc ad alvum ducendam, poft DIOSCORI-DEM, a multis Medicis adhibebatur, & medicamentis hydragogis adfcribebatur, ob hanc rationem hodie ulterius non ufurpatur, fed exficcatione mitior reddita radix, tanquam eximium refolvens, ad morbos pectoris pituitofos adhibetur, & præeunte MARTINI cum fucceffu infantibus datur, quos tormina, a muco excitata, torquent: Externe cum fucceffu ad masticatoria & errhina adhibetur, recipitur etiam ad dentifricia, ut mucus & fordes dentium incidantur & abstergantur, ad epithemata refolventia quoque recipitur, & ad usus cosmeticos adhibetur; Radices, quas Longas dicunt, creberrime, sed minus laudando consilio, infantibus dentientibus mordendas exhibent.

Species five Pulvis Diaireos FUCHS. non placent, cum species Diatragacanthæ, quas recipiunt, vires Iridis obtundant: Rotulæ sive Tabulæ Diaireos WE-CKER nostrates rationem Ireos augendo, inde medicamentum mucum pulmonum incidens, gratissimum parant. * Aqua destillata VAL. CORD. * Oleum Irinum PLIN. iners omnino. * Extractum SCHROED.

* Radices Iridis Nostratis figuram priorum habent, odore & sapore quoque ad eas accedunt, magis rugosæ, extus rufæ, intus pallidæ.

Iris Pfeudacorus L. BLACWELL 261 corollas imberbes, petala interiora stigmate minora & folia ensiformia habet.

Occurrit per omnem Europam.

Hujus præcipue fuccum, fcopo hydragogo & purgante, recentiores adhibuerunt, recte FALLOPIUS monet : Iridis radix non est in ussu ad purgandum, quia habemus meliora medicamenta purgatoria. WOLFE Acta Med. Berol. RAMSEY, PLATER observationes hydropis inde curati adducunt: ETTMÜLLER lumbricos inde vidit dejectos.

* Extractum Brandeburg.

JUNIPERUS, derev96, Genevre, Wachholder. Lignum, Baccas & Refinam, quæ improprie Gummi dicitur, recipiunt officinæ.

Lignum prostat sub forma frustorum aliquot digitos longorum & quasdam lineas crassorum, tegitur cortice extus gryseo, intus ferrugineo, ipsum album eft, odore gaudet aromatico & fragrante, qualem etiam, fi accenditur, fumum emittit, fapor leviffimum aroma habet.

Baccæ pifis magnitudine & figura æquantur, fuperne umbilico exiguo notatæ, nigræ, pulpam includunt dulcem, viscidulam, rusescentem, aromaticam, grato odore præditam & tria femina.

Gummi, quod eft Sandarax five Sandaracha SERA-PIONIS, efformatur a granis variæ magnitudinis & figuræ, pellucidis, citrinis, inodoris, inter dentes non lentefcentibus & quæ accenfa, fumum non ingratum dimittunt. Ex Africa ad nos mittitur.

JUNIPERUS. Planta relativa diphyta, flores mares amentaceos habet, nudos, tribus ad octo antheris inftructos: feminæ corolla trifida & trigyna efformantur, baccæ globofæ funt. Communis L. BLACWELL 187 foliis ternis, patentibus, mucronatis diftinguitur.

Crefcit in omni Europa.

Baccæ biennes demum maturantur: Gummi in Europa Meridionali ex fpecie, quam dixi, ftillat, in Africa etiam ex aliis fpeciebus, in Suecia formicas illud in fuos acervos colligere, monet Illuftr. LINNÆUS.

Ex Ligno $\frac{1}{16}$ Extracti aquofi amaricantis & falini obtinui. CARTHEUSER Extracti aquofi $\frac{1}{12}$ & $\frac{1}{8}$ fpirituofi accepit.

Baccæ mihi $\frac{1}{32}$ Olei odorati ftiterunt: CARTHEU-SER $\frac{1}{42}$ circiter, Extracti refinofi autem ultra $\frac{1}{2}$, totidem aquofi.

Lignum humores valide attenuat & excretiones aquofas promovet, copiofam urinam, cui multus mucus innatavit, inde a fene affectibus catarrhalibus obnoxio feceffisse Cl. SCOPOLI observavit, morbos venereos quoque, qui reliqua efficacissima remedia eluserant, inde vidit curatos, id quod PLA-TER

TER prius animadverterat: BRUCH exempla adducit de cacochymia ulcera excitante, fcabie, fuffufione, obftructione hepatis, gonorrhœa virulenta, affectubus arthriticis inde fugatis, & idem extus cum fucceffu ad ulcera uteri & ozænam adhiberi. Ejus fuffitus non modo gratum per atmofphæram difpergit odorem, fed hujus indolem malignam quoque corrigit, œdemata & rheumatifmos curat.

Baccas medicamentis uterinis HIPPOCRATES adfcribit, humores inde attenuari, hepar aperiri, urinam pelli, ventriculum calefieri GALENUS monet, ob vires ftomachicas, quas quoque HILDANUS confirmat, non raro cibis folent adjici; Assverus & S. PAULI calculos inde viderunt pulfos, afciticis multum conducere VOLCKAMER, RIEDLIN, DU VERNEY, VAN SWIETEN obfervationibus patet. ACOLUTHUS ab earum diutius protracto ufu vidit excitatam diabetem lethalem. Externe fuffitus forma ad eofdem ac Lignum adhibentur ufus, KHUNRATH fuadente epithema inde paratur contra cephalalgiam.

Gummi refinarum vires exfequitur, ejus fuffitus aërem corrigit, partes, ad quas admittitur, roborat, & hinc ad catarrhos & œdemata commendatur. HIPPOCRATES hoc medicamentum naribus manantibus immifit.

* Aqua destillata a baccis medicamentum non iners eft: Oleum destillatum ex baccis TRAG. calida multum medicina, tormina intestinorum inde sopita vidit WELSCH, verminosis conducere RIVERIUS observavit, multi ejus auribus instillati ope, surditatem curatam fuisse, contendunt, eos ego saltem non auderem imitari: Rob sive Extractum VAL. CORD. integerrimas baccarum vires habet, Germani ipsi etiam saccharum solent adjicere, quorum Theriaca a quibusdam dicitur, ob polychrestum usum; tanquam egregium remedium etiam ad raucedinem & tussim com-

S

mendatur; Dofis ad unciam dimidiam: Spiritus ex baccis SCHROEDERI per abstractionem a Wurtembergensibus paratur, vix interne datur, externe discutiendi fine adhibetur: Elixir Malvaticum Juniperinum Nostrat. est Elixir Juniperinum SCHROED. bene Nostrates loco spiritus Juniperi vinum Malvaticum recipiunt, egregie non modo in affectibus renum, obfervante SCHROEDER, sed etiam in torminibus ventris medicamentum, quod ad dimidiam usque unciam potest exhiberi: * Tinctura baccarum Parist. * Spiritus SCHROED. & Oleum empyreumaticum Mesue.

LAVENDULA Barb. zázus Græcorum Recent. Spica, Spica Nardi &c. Recent. Lavande, Aspis, Lavendel, Spick. Inde & Folia & Flores recipiuntur.

Folia folidiufcula funt, obtufa, pro varietate unde defumuntur mox latiora, mox angustiora, incana, grato multum odore & sapore aromatico instructa.

Flores affervantur calici inclusi, non magni, cærulei, odore gratisfimo similique fapore gaudent.

LAVENDULA. Calice regulari fuftentat corollam labiatam, cujus labium fuperius bifidum eft, inferius parum irregulariter trifidum, femina nuda: Spica L. BLACWELL 264 & 295 foliis integerrimis & fpica nuda diftinguitur.

Crefcit in Europa Meridionali & in Helvetiam ufque afcendit, apud nos in hortis, ejus varietas angustifolia maxime colitur.

 $\frac{1}{256}$ Olei odorati ex floribus obtinui: LEWIS autem $\frac{1}{160}$ & CARTHEUSER vel $\frac{1}{22}$ circiter, qui præterea ad $\frac{1}{5}$ Extracti amaricantis & fubfalfi & fere $\frac{1}{4}$ Extracti fpirituofi, balfamico fapore præditi.

Ob fragrantiam capiti maxime dicata effe reputatur & affectibus nervorum opponitur, rarius interne ufurpatur; frequentius multo externe ad epithemata roborantia & difcutientia recipitur.

* Syrup. e Stæchad. compos. Parif. * Aqua destil-

274

lata VAL. CORD. Parifini aquas a fingulis varietatibus abstractas affervant: Spiritus Noricorum optimus Monspelio ad nos mittitur & cosmetico & medicato scopo creberrime adhibetur: * Conserva VAL. CORD. una cum * Tinctura Parifin. optime ex nostris officinis exulat: * Acetum Wurtemberg. cosmeticis maxime usibus dicatum: Oleum destillatum gratum æque ac nervinum, ejus ope maxime infecta sugari observatum est, inde * Balsamus Lavendula SCHROED. * Pomatum Fl. Lavendula Paris. & * Gutta Anglica Wurtemberg. quæ cum successur in affectibus capitis ferosis solent exhiberi, parantur: Oleum Spica quod ad encausticam & ad vernices maxime adhibetur, monente jam GEOFFROI, oleum terebinthinæ est, cui pauxillum olei Lavendulæ adjecerunt.

LAURUS, Sapon, Laurier, Lorber. Folia & Baccæ recipiuntur.

Folia funt viridia, firma, lanceolata, integerrima, multis nervis notata, fapore proprio aromatico, amaricante, odore fimili inftructa.

Bacca funt ovatæ, nigræ, exiguo acumine terminatæ, levissime rugosæ, continent sub cuticula tenera & fragili nucleum ad colorem castanearum accedentem, facillime in duas partes secedentem, odore laurino minus grato, sapore acri, aromatico, amaro, nauseoso instructum.

Laurus Nobilis L. BLACWELL 175 Floribus dioicis distinguitur.

In Europa Meridionali vulgatiffima arbor.

Ex baccis $\frac{\tau}{\tau_6}$ Olei unguinofi, viridis, quod unguenti confiftentiam habet & ipfas multum redolet, obtinui.

Folia, ob aroma quo pollent, calefaciunt, teste GALENO, ideo ab omni tempore primis viis roborandis commendabantur, & vel hodie adhuc variis cibis, tanquam condimenta adjiciuntur, male igitur a quibufdam, PLINIO & DIOSCORIDE præcuntibus, vomitoriis folent adferibi. Medici illa hodie rariffime adhibent, fed culinis relinquunt. Ab HIPPOCRATE extus contra tetanum fuerunt præferipta.

Baccæ, GALENO jam notante, vehementius calefaciunt & in uterum præcipue agunt, maxime ob vim abortum promovendi infames funt, & fummo omnino jure, medicamento fanguinem multum exæftuante abstinemus: cujus dofin ad aliquot grana fub forma pulveris, & ad fcrupulum unum in infusis determinant. Ab HIPPOCRATE extus abstergendi ergo adhibebantur.

* Aqua deftillata ex foliis Parif. * Aqua deftillata ex baccis Eorund. Oleum expression HIPPOCRATES ad ulcera mali moris commendavit, ex Italia ad nos mittitur, multum a vi resolvente laudatur, adjicitur quoque medicamentis nervinis. * Oleum per Insussion nem & costionem DIOSCORID. * Oleum destillatum VAL. CORD. * Electuarium de baccis lauri RHAZES mutatis dosibus varia Dispensatoria ingreditur, Nostrates quædam expunxerunt, & parvam rationem falis gemmæ jubent adjicere, in doloribus intestinorum a causa frigida, ad unciam unam clysmatibus adjicitur: * Emplastrum de Baccis Lauri MESUE a Bergomensibus correctum, valide resolvit, abdomini imponitur ad discutiendos flatus.

LILIUM CONVALLIUM Barb. Muguet, Mayenblümlein. Flores exhibet qui campanæ figuram habent, recentes gratiffimum odorem fpirant, unde caput nunquam obnubilatur, iidem exficcati toti inodori funt & leviffime amari.

CONVALLARIA. Corolla nuda monopetala, fexfida gaudet, ifanthera, monogyna, bacca triloculari: *Majalis* L. BLACWELL 70. diftinguitur corolla campaniformi.

Crefcit in omni Europa, etiam Meridionali.

ETTMÜLLER inde exiguam Olei odorati portionem feparavit, LEWIS nullum obtinuit; Extractum utrumque, quod inde paratur, amarum est. LEWIS & CARTHEUSER.

Flores recentes grato fuo odore, fenforium commune grate afficiunt, & non fruftra, ubi vires refocillandæ funt, naribus admoventur; exficcati cum odore etiam omnem vim nervinam depofuerunt, amarities, qua gaudent, eis acrimoniam quandam incffe, teftatur, inde vis purgans a SCHULTZ obfervata, & errhina, dum naribus haurjuntur, creberrime annotata.

Baccarum virtutem antepilepticam & antifebrilem SENCKENBERG aliquot observationibus tentavit probare.

* Aqua destillata VAL. CORD. vulgari ratione parata, nihil proprii habet, æque ac * Aqua vinosa SCHROED. & * Spiritus SCHROED. & * Oleum Insus August. nec * Conserva VAL. CORD. aliquid de odore florum retinet.

MACIS vid. Moschata Nux.

MAJORANA Barb. Marjolaine, fi non est à magazor & sam fuzzor Veterum, faltem eo proxime accedit. Folia fubministrat quæ ovata funt & albida, proprio odore & sapore aromatico instructa.

Origanum Majorana L. BLACWELL 319 fpicis fubrotundis, pubefcentibus agnofcitur.

Crefcit in Europa Meridionali, apud nos in hortis colitur.

HOFFMANN $\frac{1}{54}$ Olei odorati inde obtinuit, cum quo etiam mea experimenta conveniunt & CARTHEU-SER; qui præterea ex foliis $\frac{1}{7}$ circiter Extracti aquofi obtinuit.

Cephalicæ, nervinæ & uterinæ ipfi adscribuntur virtutes, rarius tamen hodie intus datur, crebrior ejus

S 3

usus est ad epithemata capitis roborantia & discutientia nec non ad formulas errhinas.

* Aqua destillata NIC. PRÆPOS. * Oleum destillatum VAL. CORD. quod nonnisi ad usus externos recipitur; * Oleum coctum VAL. CORD. iners. * Balsamum Norimberg. id ego semper præserrem Unguento seu Butyro ad Argentoratensium præscriptionem parato, quod a nostratibus radici & alis narium inungitur, muci spissi, nares obsidentis, attenuandi ergo.

* MALABATHRUM, Φύλλον, Folium, Φύλλον Ϊνδικον Græc. Recent. Hoc nomine affervamus Folia firma, ex viridi flavescentia, variæ magnitudinis, tribus nervis percursa, ad basin coëuntibus, odore vix ullo, fapore aromatico ad caryophyllos accedente, cui aliquid viscidi immixtum est, prædita.

Spithamæa reliquis præferuntur.

COMMELINUS fuspicatur hæc folia defumi a Lauro Cinamomo L. in Malabara crefcente.

In tanta aromatum abundantia, folia Malabathri negliguntur, & nonnifi ad compositiones, quæ a Veteribus ad nos descenderunt, adhibentur, & in his quoque non raro casiam ligneam eis solent substituere.

MELILOTUS, μελλίλω?. Summitates nobis exhibet foliis ternatis, ex oblongo rotundis, crenatis, fuperne quafi refectis & floribus papilionaceis luteis obfeffas, proprio non grato odore, & fapore leviter amaricante præditas.

TRIFOLIUM. Florem papilionaceum habet, calice quinquefido fuftentatum, vexillum reliquis petalis longius, legumina cylindracea: Melilotus Offic. L. BLACWELL 80 leguminibus nudis, rugofis, racemofis & pedunculis fulcatis diftinguitur.

Crefcit in omni Europa.

Ob nauseosum quem spirat odorem, nunquam

intus datur; GALENUS digerendi & concoquendi ergo exhibuit, hodie difcutiendi & anodyno fcopo adhibetur, epithematibus, cataplafmatibus; enematibus adjicitur, revellendi ergo quoque in pediluvia recipitur.

* Aqua deftillata VAL. CORD. leviter odorata, fragrantium odores, quando illis admifcetur, augeri contendit Ill. LINNÆUS: * Oleum infufum MESUE: Emplastrum de Meliloto, GALENUS compositionem AN-DROMACHI adducit, quæ cum pro roborando stomacho fuerit præscripta, varia ingredientia aromatica habet, MESUE inconcinnam formulam ex resolventibus & emollientibus confarcinatam substituit, quam sive integram sive correctam Dispensatoria recipiunt, Wurtembergensis præ reliquis placet, sed evidenter resolvens est: * Emplastrum de Meliloto simplex Paris.

MELISSA Barb. μελιτσόφυλλον Græc. Apiastrum Latin. Folia exhibet cordata, leviter hirfuta, odore & fapore suavi ad Citrum accedente instructa.

Melissa Officinalis L. BLACWELL 27 foliis cordatis agnofeitur.

Crefcit in Europa Meridionali, in Helvetiam usque ascendit, apud nos in hortis colitur.

Olei odorati exiguam valde rationem largitur, Fxtracti fpirituofi, minus grati ad $\frac{1}{5}$, aquofi autem aufteriufculi & amaricantis $\frac{1}{3}$. CARTHEUSER.

Vegetabilium aromaticorum vires, fed mitiores habet, affectibus capitis maxime laudatur.

Aqua destillata NICOL. PRÆPOS. mixturas cephalicas vulgo ingreditur : Aqua Melissa composita LE-MERY, Eau des Carmes vulgo, Nostrates Melissæ Dracocephalum Moldavicam L. substituunt, spiritus aromaticus in morbis capitis & cordis non frustra extus applicatur : * Aqua Melissa um Vino Wurtemberg. * Aqua Melissa Antihysterica Wurtemberg. * Spiritus Augustan. * Oleum destillatum VAL. CORD. fi quidem tantæ vires ab aqua iteratis vicibus fupra Melissam cohobata exspectandæ funt, quantas BOERHAAVE promittit, crebrior hujus olei usus omnino esset commendandus : * Conserva VAL. CORD. * Syrupus SCHROED.

MENTHA, µív9n, Müntz, duplicem quædam officinæ habent, Aquaticam nimirum & Cri/pam.

* Aquatica Folia ex ovatis acuminata funt, glabra, majufcula, ferrata, odore & fapore evidenter aromaticis & omnino gratis inftructa.

MENTHA. Corolla labiata, non multum irregulari, calice quinquefido fustentata, labio inferiore regulariter trifido, parum superiore majore, seminibus nudis gaudet: Aquatica L. BLACWELL 32 spicis capitatis, foliis ovatis, staminibus corolla longioribus distringuitur.

Crefcit in omni Europa.

Crispa, Krausbalfam, Folia funt cordata, rugofa, margine dentato & plicato inftructa, odore proprio valido & fapore evidenter amaro prædita, prioribus evidenter minus grata.

Mentha crispa L. BLACWELL 290, 2 spicis capitatis, foliis cordatis, hirsutis, staminibus corollam æquantibus gaudet.

Sibiriæ indigena, ubique in hortis colitur.

 $\frac{1}{42}$ Olei odorati, $\frac{1}{8}$ Extracti aquofi fere inertis & totidem fere refinofi aromatica fundit. CARTHEUSER.

Hanc vulgo adhiberi folent, qua tamen omnino & aquatica & adhuc magis *Piperita* L. & majorem gratiam & evidentius aroma habent.

Mentham calefacere, urinam provocare, vomitum fiftere, obstructiones referare, HIPPOCRATES afferit, qui etiam inde viris facultatem gignendi adimi contendit, id quod ANGELUS SALA multum impugnat, nec experientia confirmat. Lactis coagulationem inde

ROBORANTIA.

impediri, ita ut vaccarum eo copiofius paftarum lac vix cafeum largiatur monet Illustr. LINNÆUS, qui, præeunte CRATONE, eam se in bubonibus mammarum a lacte stagnante egregie gerere, observavit, & in lochiis suppressis ejus efficaciam quoque expertus est. Eandem quoque ad tormina sistenda, tam intus dare, quam abdomini imponere solent.

Aqua destillata NICOL. PRÆPOS. a SYDENHAMO ad fistendum vomitum laudatur, omnino fi qua alia efficax, quater cohobatam in roborando debili ventriculo, in frigida pituita stomachi, & vomitu hinc orto, & in lienteria incomparabile medicamentum esse, promtissime fuccurrens laborantibus, ut nihil st fupra, afferit BOERHAAVE: * Aqua composita Paris. ess aqua aromatica spirituosa, in colica statulenta omnino laudanda: majorem gratiam, nec minores virtutes habet * Aqua stomachica Wurtemb. * Spiritus BOERHAAVE: * Oleum destillatum VAL. CORD. Oleum infusum VAL. CORD. abdomini inungitur & clysmatibus adjicitur: * Syrupus Argentoratens. parum in usu esse a causa frigida oriundis proficua: * Conferva VAL. CORD.

MOSCHATA NUX Lat. Barb. zígo@, µuge4mòc, Noix Muscade, Muscatnuss; hoc nomen dant Nucleis, qui vulgo figuram olivarum habent; magis oblongas olim Mares dixerunt, prostant quoque interdum quarum una facies compressa & plana est, & has Mutter-Muscatnusse appellant; variam magnitudinem præsse ferunt facies externa grysea & reticulata est, interna purpura variegatur, odor proprius aromaticus, fapor fimilis, paucam amaritiem, nullam acrimoniam habet, tota substantia oleo turget.

Arbor BLACWELL 353 unde defumuntur hæ nuces, fide RUMPH. Corollam trifidam habet, nullo calice fustentatam, monogynam & pomum maturat, quod fub pulpa acerba non eduli, nucem nigram, unico nucleo fœtam, includit.

Crefcit in omnibus Moluccis, Banda maxime, & in Borneo colitur, occurrit quoque in America Meridionali.

Ter de anno, Martio nimirum, Julio & Novembri nuces colliguntur, aufertur inde tegmentum ex laminis angustioribus, in modum retis flexis, efformatum oleosum, proprio odore & sapore aromatico parum acri & amaro instructum, MACIS Fleur de Muscade, Muscat - Bläthe dictum, colore chermesino tinctum, quem autem exsiccatio in sole in croceum mutat; hoc ipsum aqua marina conspersum, & in saccis contra aërem defensum ad nos mittunt: nucleos autem aliquoties aqua calcis mergunt, & sumo exponunt, quo toti penetrentur, & ita a corruptione defendantur.

Macis $\frac{1}{5}$ Olei unguinofi bruni, odoratiffimi, quod unguenti confiftentiam habet & $\frac{1}{64}$ Olei odorati exhibuit. NEUMANN $\frac{1}{24}$ Olei odorati, ultra $\frac{1}{4}$ Extracti fpirituofi, aquofi $\frac{1}{4}$ inde obtinuit.

Nuces moschatæ ultra $\frac{1}{3}$ Olei unguinosi, odorati, flavi, quod sebi consistentiam habet, $\frac{1}{16}$ Olei odorati mihi stiterunt; NEUMANN illius ultra $\frac{1}{4}$, hujus $\frac{1}{32}$ circiter, $\frac{1}{4}$ Extracti spirituosi & $\frac{5}{16}$ aquosi, plane inertis; CARTHEUSER Olei unguinosi ad $\frac{3}{8}$, odorati ultra $\frac{1}{25}$, Extracti aquosi ultra $\frac{1}{3}$.

Utrumque aroma primum inter . abes obtinuit, reliquorum aromatum vires habet, & cum minori acrimonia gaudeat, hinc in morbis primarum viarum, ubi acrimonia vel strictura obtinet, eis quoque præfertur; sed præterea etiam eadem sopientes vires habent, ita ut in majori dosi, dum suerunt assumta, temulentiam, delirium, apoplexiam excitasse a BONTIO, LOBEL, RUMPH, SCHMID &c. suerint observata, hinc evidens fit, cur in vomitu & fluxibus alvi cum tanto fuccessu dentur; HOFFMANN pro gravidis, vomitione aut tussi correptis, non certius novit auxilium Nuce moschata cum faccharo commixta, addit præterea, eandem Alumini junctam paroxysmos febrium intermittentium potenter sistere.

Macis ad fcrupulum unum, Nux mofchata ad drachmam dimidiam datur.

* Oleum Macis expressum Parifini habent : * Oleum Macis destillatum VAL. CORD. * Esfentia Macis JUN-CKEN olim, cum guttæ stomachicæ in usu erant, crebro ufurpabatur : * Eleofaccharum Macis August. Oleum expressium Nucis moschata NICOL. PRÆPOS. cum in Belgio venale variis pinguedinibus adulterare foleant, hinc optandum, ut Pharmacopolæ illud ipfi parent; datur intus ad fcrupulum dimidium, extus ad fiftenda tormina & fedandas evacuationes primarum viarum umbilico illinitur, temporibus vero, provocandi fomni ergo; id ipfum, fecundum SCHROE-DER, ope Alcoholis colore & odore privatum * Corpus pro balsemo evadit : * Oleum destillatum Nucis Moschate: * Balfamum Nucis Moschate SCHROED. * Syrupus Nucifiæ Brandeburg. Nuces Indica Condita VAL. CORD. funt ipfa poma, quæ faccharo condita, ad nos adducuntur, roborandi ergo comeduntur, Electuariis, Morfulis &c. adjiciuntur.

MYRRHA vid. Amara.

MYRTUS, puppin, pugro inde Folia & Baccæ in usum trahuntur.

* Folia funt ex ovatis acuta, firma, viridia, proprium aroma fpirant, fuaviffimum, fapore gaudent aromatico, proprio, cum evidenti adftrictione amaricante.

* Baccæ exficcatæ oblongæ funt, umbilico, ex cujus medio ftylus eminet, inftructæ, nigræ, odorem nullum, faporem leviter adftringentem habent.

MTRTUS. Corollam pentapetalam habet, calice

quinquefido fustentatam, polyandram, monogynam & baccam trilocularem umbilicatam : *Communis* L. BLACWELL 114. floribus folitariis, involucro fustentatis distinguitur.

In Europa Meridionali & Afia obtinet.

Varietas Italica vulgo dicta, foliis ovato-lanceolatis, acutis, laxe difpofitis, præcipue in ufum trahitur.

Folia a vi aromatica & adstringente, baccæ a viribus adstringentibus laudantur, utraque ad morbos uteri maxime HIPPOCRATES adhibuit.

* Aqua destillata Paris. * Spiritus Paris. * Syrupus e summitatibus siccis LEMERY. * Syrupus Myrtinus compositus WECKER, MESUE vulgo solet adscribi, evidenter adstringens: * Oleum foliorum per infusionem VAL. CORD. est Myrtinum Paris. * Oleum baccarum per infusionem est Myrteum GALENI.

NIGELLA Barb. $\mu \epsilon \lambda \dot{u} \sigma \partial \sigma v$, Gith PLIN. Nielle, fchwarzer Kümmel Semina exhibet parva, utrinque acuta, angulata, nigerrima, quæ medullam virefcentem includunt, odore proprio aromatico, fapore acri, linguam pungente gaudent.

NIGELLA Corollam format pentapetalam, regularem, nectariis bilabiatis, in orbem politis ornatam, polyandram, penta- vel decagynam, & capfulas numero ftylorum refpondentes: Sativa L. BLACWELL 558 piftillis quinque, capfulis fubrotundis, muricatis diftinguitur.

In Europa Meridionali & Oriente fponte provenit, in nofteis hortis colitur.

Pauciffimum Olei odorati, $\frac{1}{12}$ Olei unguinofi, $\frac{1}{5}$ fere Extracti fpirituofi, totidem aquofi inde obtinuit NEUMANN. Extracti aquofi inertis $\frac{1}{4}$. CARTHEUSER.

Intus data, a GALENO ob vires anthelminticas, becchicas & emenagogas laudatur, extus autem naribus admoveri jubetur in catarrhis. Hodie tanquam

284

medicamentum internum non ulterius præscribitur, ruricolæ illud loco aliorum aromatum cibis solent adjicere; aquam cum eo conquassatam scopo errhino in usum trahimus.

* OCIMUM, wannov, Basilinov Græc. Rec. Basilic, Brasilicum. Folia inde & Semina in officinis occurrunt.

Folia ex ovatis oblonga funt, albida, fuavi & proprio odore, fimilique fapore, qui non acris eft, inftructa.

Semina funt exigua, oblonga, nigra, faporis fatui, odoris nullius.

OCIMUM. Calice bilabiato, fustentat corollam labiatam, cujus labium inferius quadrifidum, superius integrum est & serratum, semina nuda in calice maturantur: **Bosilicum** L. BLACWELL 104-foliis non ferratis & calicibus ciliatis distinguitur.

In Afia fpontaneum, apud nos in hortis colitur.

Cum multæ apud Veteres de facultate Ocimi infecta generandi, viguerint fabulæ, hinc ejus ufum internum diffuadet GALENUS, Recentiores illud ob fragrantiam, qua pollet, cibis adjicere in more habent, nec ullam unquam inde noxam furrexiffe fuit obfervatum; HIPPOCRATES roborandi ergo intus dedit.

Semen plane iners eft.

ORIGANUM, Cunila bubila PLIN. desiyavov, Doften, Wolgemuth. Vulgare quod igantewrizov, DIOSCO-RIDIS effe videtur & Creticum, reayogiyavov altera EJUSDEM? affervantur.

Vulgaris folia funt ovata, integerrima, proprio & grato odore nares, fapore autem aromatico linguam feriunt.

* Cretici nomine proftant spicæ imbricatæ, pryfmaticæ, luteæ, aromatico multum odore, similique linguam pungente sapore instructæ. Origanum Vulgare L. BLACWELL 280 spicis subrotundis & paniculatis distinguitur.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Origanum Creticum L. fpicas pryfinaticas & bracteas calice duplo longiores habet.

In Europa Auftrali occurrit.

* Origanum Hispanicum quod interdum proftat, a capitulis ovatis, acutis, hirfutis, Saturejæ odore & fapore inftructis constituitur, & defumitur ab Origano Maro L. spicas hirfutas & folia tomentosa proferenti, Archipelagi cive.

Olei odorati T 536 ex Origano vulgari accepi.

HIPPOCRATES origanum multum roborandi & refolvendi ergo, maxime ad ulcera interna laudavit, incidentem &- calefacientem ejus virtutem commendat, rariffime hodie intus exhibetur; frequenter autem ad epithemata difcutientia & balnea roborantia recipitur; & cum Vulgare evidens fatis aroma habeat, hinc non male exotica negligimus.

* Oleum destillatum VAL. CORD.

PIPER, πίπεςι, Poivre, Pfeffer. Ejus tres species jam Veteribus innotuerunt, nimirum:

* Longum quod cylindraceum est, dimidii digiti longitudinis, amentum, cujus squammæ coalitæ sunt, refert, odore aromatico & simili sapore, linguam urente instructum.

Nigrum. Grana parva, rugofa, intus alba, fortiori, quam antecedens, odore & fapore acerrimo prædita, fiftit.

Album. Grana nigro æqualia, lævia, alba, nigro paulo mitiora constituunt.

PIPER. Corollam nullam habet, Hortus Malabaricus tri-quinque-fexfidam recenfet, duas antheras, tres stylos exhibet: Longum L. BLACWELL 356 foliis cordatis, petiolatis & seffilibus dignoscitur: Ni-

286

grum L. BLACWELL 348 foliis ovatis, fubseptinerviis, glabris, petiolis fimpliciffimis dicitur diftingui, cum autem nulla amenta gerat, sed spicas, quæ fructibus seffilibus arctissime congestis præditæ sunt, quales non raro in Europam advehuntur, multum suspicor, utrumque hoc aroma a plantis genere diverfis subministrari.

Ambæ hæ plantæ in Infulis Afiaticis crefcunt.

Tam Piper longum, quam nigrum immatura decerpi, cum maturitate eorum aroma imminuatur, testatur RUMPH & addit, baccas virides, quæ exficcando nigrefcunt, per maturitatem lutescere, & tunc ut confervari possint, in aqua falsa conteri, donec exterior cuticula decidat, & dein in sole vel fumo indurari.

Aquam parum de Piperis fapore recipere, Alcohol illum integerrimum affumere, obfervavit LEWIS, qui inde $\frac{1}{2}$ Extracti aquofi fervidi & $\frac{1}{8}$ fpirituofi fervidiffimi obtinuit : HEISTER Olei mitis $\frac{1}{128}$: Illustris GAUB. $\frac{1}{64}$ inde feparavit, quam etiam eandem rationem ego accepi; Eximius GAUB. porro inde $\frac{1}{7}$, Extracti spirituofi, unde omnem aromatis acrimoniam pendere expertus est, feparavit : NEUMANN ultra $\frac{1}{51}$ olei, Extracti spirituosi ultra $\frac{1}{7}$, aquosi $\frac{5}{8}$ inodori & infipidi adducit : CARTHEUSER autem Olei $\frac{1}{96}$, Extracti spirituosi ultra $\frac{1}{8}$, aquosi $\frac{1}{2}$ fere.

Recenfitis Piperis generibus, recentiori ævo varia alia fuerunt addita, inter ea præ reliquis folet in ufu effe :

* Piper Indicum Recentiorum, xa-fundor ACTUAR. id cum Hifpani, postquam primum in Europam allatum fuerit, crebro in fuis hortis severint, ab Hispania vulgo solet denominari. Efformatur a Siliquis variæ, pro varia varietate, figuræ, vulgo ovatooblongis & rubris, in pulpa flavicante sicca, semina reniformia, compressa, includentibus: Siliquis & feminibus rodens fapor & plane nihil aromatici inest.

CAPSICUM. Corollam quinquefidam, fimili calice fustentatam habet, pentantheram, monogynam, fructus pulpa ficca fartus est: Annuum L. BLACWELL 129 caule herbaceo & pedunculis fimplicibus agnofcitur.

In America Meridionali spontaneum, colitur in nostris hortis.

Extractum spirituofum linguam adurens sistit. Lewis.

Piper HIPPOCRATES refolvendi ergo tam intus quam extus adhibuit, illud multum calefacere annotavit GALENUS, & ad morbos ventriculi frigidos quoque laudavit, in ructibus acidis egregie profuisse, RIVERIUS vidit, ante frigus paroxysmi febrilis idem DIOSCORIDES commendat, qui mos vel hodie adhuc inter plebem obtinet, pessimus omnino, probante VAN SWIETEN. A CELSO urinam pellere & lumbricum latum curare dicitur: HEISTER aphrodifiacum observavit, non male, præeunte DIOSCORIDE, cibis adjicitur.

Datur ad fcrupulum dimidium.

Extus detergendi ergo ad vitia oculorum, & refolvendi ad morbos faucium a DIOSCORIDE laudatur, nec ignotum est, quod magno cum successur tumenti uvulæ admoveatur, revellendi præterea & apophlegmatizandi scopo usurpatur. Dentem cariosum non male granis Piperis repleri, HEISTER monet.

* Oleum destillatum VAL. CORD.

Piper Indicum ob infignem, qua eminet, acrimoniam, vix a Medicis in ufum trahitur; œnopolæ illud maxime ad acuenda vilioris notæ aceta, folent adhibere.

* POLIUM, πόλιον, Poley. Ejus duas species officinæ recipiunt : Montanum sistit cauliculos, foliis oblongis, oblongis, craffiusculis obsessos, quos multa capitula florigera distinguunt, omnia multum tomentum habent, odorem fragrantem, faporem pungentem & amarum. Cretici nomine in nostris officinis affervantur calices parvi, tomentosi, vix odorati, quibus multi cauliculi pauco aut nullo tomento obsessi, nec non folia linearia superne crenata, interdum quoque capitula oblonga, quadrangularia, intermixta sunt, fapor & odor prioris.

Teucrium Polium L. BLACWELL 456 floribus in capitulum collectis & foliis oblongis, obtufis diftinguitur.

Crefcit in Europa Meridionali.

Teucrium Creticum L. folia lanceolato-linearia & flores racemofos habet.

Archipelagi civis.

Ad vifcera referanda, urinæ menfiumque excretionem promovendam, & ad ulcera curanda a GALENO laudatur; hodie, cum tantam aromaticorum quantitatem habeamus, exolevit.

PULEGIUM, $\beta \lambda \dot{r} \chi \omega v$, Puliot, Poley. Cauliculos cum foliis & floribus nobis fubministrat: folia funt ovata, parva, obtusa, levissime crenata, omnia proprium odorem & saporem aromaticum habent.

Mentha Pulegium L. BLACWELL 302 floribus verticillatis, foliis ovatis, obtufis & caule repente diftinguitur.

Crescit in Europa non nimis frigida, in Marchiam & Daniam usque ascendit.

HIPPOCRATIS temporibus ad condiendos cibos adhibebatur, ab Eodem & a GALENO ad morbos uteri præcipue commendatur, BOYLE illud ad tuffim convulfivam puerorum multum laudat; infufum vinofum cum chalybe Illuftrem HALLERUM nunquam fefellit in referandis menfibus.

Aqua destillata VAL. CORD. ad mixturas uteri-

Т

nas maxime recipitur: * Oleum destillatum Wurtembergensibus officinale est.

ROSMARINUS, *Aißavwris* sepavwµarını, av9@ Actuar. Romarin, Rosmarin. Ejus & folia & flores recipiuntur.

Folia funt oblonga, integerrima, fuperne viridia inferne alba, faporem habent aromaticum & odorem proprium.

* Flores affervantur cum calice, cærulescunt, fapore & odore foliis multo inferiores.

ROSMARINUS L. BLACWELL 159. Corollam labiatam habet, calice labiato fuftentatam, labium fuperius bifidum est, inferius majus, trifidum, lacinia media maxima, diantheram, semina nuda.

In Europa Meridionali vulgatiffima planta, in Helvetiam ufque afcendit, apud nos multa in hortis colitur, contra rigidiores hyemes defendenda.

 $\frac{1}{200}$ Olei odorati, Extractum aquofum debile & amaricans inde obtinuit Cl. Li WIS; Olei destillati minimam rationem, Extracti spirituosi $\frac{1}{3}$ circiter, aquosi $\frac{1}{2}$ NEUMANN: Olei odorati, viridescentis $\frac{1}{52}$, Extracti spirituosi $\frac{1}{8}$, aquosi ultra $\frac{1}{3}$ CARTHEUSER.

A vi refolvente GALENO laudatur, olim quoque multum, ob fragrantiam, qua pollet, capiti commendabatur; WELSCH in diarrhœa ad tabem vergente, & SCHULZ in fluore albo, egregios ejus effectus viderunt. Hodie rariffime intus datur, crebrius ad ufus externos difcutiendi & roborandi ergo adhibetur; inertiores flores vix non toti negliguntur.

* Aqua destillata minus bene jubetur cum floribus parari: * Conferva MESUE: * Acetum NIC. PRÆPOS. cofmetico maxime fcopo ufurpatur: * Mel Anthofatum MESUE clyfmatibus carminativis adjicitur: * Oleum destillatum VAL. CORD. ST. JACQUES Medicum Parifinum, hoc oleo ad guttas fex ante paroxyfmum exhibito, febres curaffe S. PAULI refert, HANNÆUS

gravissimum offis coccygis dolorem inde vidit curatum : * Tinctura Parif. * Species Dianthos NICOL. congeries aromatum ad viscidum resolvendum faciens: * Aqua Cephalica BOECLER est claretum aromaticum, cujus basin folia rosmarini constituunt : * Spiritus per fermentationem Parif. Spiritus abstractitius, PREVOT refert, Elifabetham Hungariæ Reginam, illum propria manu tanguam remedium, fibi ab Angelo detectum, quo a podagra liberata fuit, breviario fuo annotaffe, unde vulgo Aqua Regina Hungaria appellatur : adhibetur cum fucceffu externe refocillandi, discutiendi, roborandi scopo, ab ejus usu interno, unde non poffunt non humores commoveri, prudentiores fibi cavent, funt qui Rorimarino etiam alia adhuc aromatica pro paranda Aqua Reginæ Hungariæ adjiciunt.

RUTA, μυτή, πήγανον, Ruë, Raute. Folia, interdum quoque semina usibus medicatis subministrat.

Folia pinnata funt & crebrius divifa, pinnæ rotundæ & glaucæ, fapor acris, amarus, minus gratus, odor proprius & gravis; fed odor & fapor exficcatione multum imminuuntur.

* Semen exiguum est, angulare, nigrum, fapore & odore ad folia accedit.

RUTA. Corollam tetrapetalam habet, calice quadrifido vel quinquefido fustentatam, diplofantheram, monogynam, capfulam quadrilobam, polypyrenam: Graveolens L. BLACWELL 7 foliis decompositis distringuitur.

In Europa Meridionali fponte crefcit, in Helvetia adhuc occurrit; apud nos in hortis colitur & optime fert nostras hyemes.

Olei odorati $\frac{1}{512}$, Extractum fpirituofum actuofum, aquofum amarum & calidum LEWIS inde feparavit; NEUMANN Extracti fpirituofi $\frac{1}{3}$ circiter, ultra $\frac{1}{2}$ aquofi; CARTHEUSER Olei odorati $\frac{3}{320}$, Extracti T 2 aquofi ultra $\frac{1}{3}$, fpirituofi $\frac{1}{6}$ circiter; Ego $\frac{1}{464}$ olei, quod frigore confiftit, inde deftillavi.

Medicamentum jam a PYTHAGORA celebratum, HIPPOCRATE refolvendi, urinam ducendi & venena arcendi ergo commendat, ad flatus diffipandos GA-LENUS adhibuit; rariffime hodie intus datur; externe difcutiendi fcopo, nec non a vulgo maxime, in morbis malignis, rubefaciendi ergo in ufum trahitur. Ruta vino decocta Cl. PLENK ozænam curavit, & ulcus malignum gingivarum. Seminis ufus exfolevit.

Sanguinem e vena emiffum attenuat. SCHWENCKE.

* Oleum infusum MESUE vix aliquid proprii habet: * Oleum destillatum VAL. CORD. præcipue infervit ad parandum Balsamum SCHROED. quod ad affectus nervorum commendare folent: * Acetum SCHROED. prophylaxeos ergo olim in usu suit sit: * Tinctura Paris. * Extractum Wurtemb.

SABINA, Beadouc, Sevenbaum. Folia fiftit longa, ex foliolis imbricatis efformata, odore forti, gravi, fapore amaricante & acri prædita.

Juniperus Sabina L. BLACWELL 214 foliis alterne oppositis, cauli appressis agnoscitur.

Crefcit in Europa Meridionali, Helvetiæ quoque indigena, apud nos in hortis colitur, noftræ hyemis patientiffima.

Olei odorati ultra $\frac{1}{6}$ largitur HOFFMANN: Extractum aquofum amarum, pungens, minus odoratum eft LEWIS: CARTHEUSER Olei odorati, ultra $\frac{1}{95}$, Extracti aquofi ultra $\frac{1}{4}$, fpirituofi $\frac{1}{5}$ circiter inde obtinuit.

Sanguinem e vena emiffum refolvit. SCHWENCKE.

Validiffime Sabinam in uterum agere, ita ut non modo menfes moveat, fed etiam fœtus occidat & pellat, GALENUS monet, qui eandem quoque valide urinam pellere, & externe applicatam cutim inflammare, fordidiffima ulcera expurgare & putredini refiftere contendit ; medicamentum quod fanguinem vehementifime exæftuat ; ita ut eundem e pulmonibus prorumpere fecerit , obfervante III. HALLER , abortum quoque facile poterit excitare , cum , etfi non femper inde excitari IDEM vidit & ALBERTI probat , CL. SCOPOLI quoque obfervavit non conftanter menfes inde referari , rectiffime tamen prudentes Medici ab ejus ufu interno abftinent , & Pharmacopolæ coërcentur , ne medicamentum , unde graviffima mala furgere poffunt , promifcue vendant. Externe ad cafus a GALENO recenfitos vel hodie adhuc cum fucceffu adhibetur , nec fine effectu umbilico contra vermes imponitur. Pulvis fungis cerebri infpergitur & offibus cariofis,

* Aqua destillata NIC. PREPOS. * Oleum destillatum HOFFMANN. * Extractum Wurtemberg, foliis inertius.

SALVIA, oganic, Sauge, Salbey. Folia ejus & Flores in officinis obtinent.

Folia funt ex ovatis oblonga, rugofa, crenata, tomentofa, odore proprio, fapore aromatico, amaricante gaudent.

* Flores majores funt, cærulei, fapore & odore foliorum sed mitioribus instructi.

SALVIA. Corollam ringentem, calice bilabiato fustentatam habet, labium fuperius integrum est, inferius trifidum, lacinia media majore, dianthera, filamenta bifulcata includens : Officinalis L. BLAC-WELL 10 & 71 foliis lanceolato - ovatis & calicibus acutis distinguitur.

Crefcit in Europa Meridionali, apud nos copiofe in hortis colitur, nec a nostra hyeme læditur.

Exiguum Olei odorati momentum largitur, Extractum aquofum leviter amarum & fubadítringens eft, fpirituofum aromaticum, fapore ad camphorana accedit. LEWIS. Olei odorati $\frac{1}{142}$, Extracti aquofi $\frac{1}{3}$, spirituofi vix $\frac{1}{6}$ CARTHEUSER inde obtinuit.

Sanguis ex vena miffus inde attenuatur. SCHWEN-CKE.

Excalefacere & leniter adftringere GALENO dicitur, refolventes etiam evidentes vires habet, HIP-POCRATES ad morbos uteri & pulmonum commendat, ad quos ultimos ab ORPHEO ufurpatam fuiffe, AETIUS refert; ad eofdem etiam hodie adhuc præfcribitur; ad fudores nocturnos poft morbos laxitatem folidorum relinquentes, & in fluxu ferofo mammarum, poft ablactionem, fuperftite, Salvia nihil efficacius invenit VAN SWIETEN, fabulæ de noxia qualitate, qua a bufonibus imbuitur, exolevit; num palpebræ inflammatæ & inflammatio oculorum, quas CULLEN ufum falviæ excepiffe vidit, innocenti alias herbæ, an aliis potius caufis debentur?

Florum, qui foliis evidenter inferiores funt, usus eviluit.

* Aqua destillata VAL. CORD. Nonnulli minus bene eam a floribus jubent abstrahi, linteolo ea imbuto & linguæ imposito aphoniam curatam fuisse, GOETZ refert: * Aqua composita Wurtemberg. a spiritu multo aromate ditato, potius arcessi quam arceri apoplexiam, metuo. * Acetum QUERCETAN. * Conferva VAL. CORD. & hæc potius ex foliis quam ex floribus paranda est: * Oleum odoratum VAL. CORD. * Oleum infusum Paris. * Spiritus Paris. * Tinctura Paris.

SASSAFRAS LIGNUM Recent. Ejus Radicis magna ad nos & ramofa frusta adducuntur, quæ sub cortice, qui etiam seorsim in officinis prostat, rugoso, ferrugino, spongioso, lignum continent pallidius, minus durum, cujus fibræ, si transversim secatur, facillime a se mutuo recedunt, odor fragrans ad seniculum accedit, fapor valde aromaticus est; tam odor quam fapor in cortice, pro ligno magis eminent.

Laurus Saff.: fras L BLACWELL 267 floribus dioicis, & foliis integris & trilobis distinguitur.

Copiofe in Florida, Virginia, Penfylvania, Carolina & Canada crefcit.

 $\frac{1}{32}$ Olei odorati inde accepi : HOFFMANN $\frac{1}{55}$ circiter : Extracti aquoli $\frac{1}{2}$ GMELIN : NEUMANN $\frac{1}{48}$ Olei & præterea Extracti fpirituoli $\frac{1}{2}$, aquoli autem $\frac{1}{4}$: CAR-THEUSER Olei $\frac{1}{48}$, Extracti fpirituoli $\frac{1}{4}$ circiter, aquoli vero ultra $\frac{1}{4}$.

MONARDES medio Seculi XVI primus ejus meminit: MUNTING primus arborem in Europa coluit.

Ratione aromatis, quo fcatet, humores valide folvit & folida ad frequentiores contractiones ftimulat, hine ad catarrhos maxime & morbos rheumaticos commendatur, perfpirationem quoque multum intendit; & ad affectus cutaneos, nec non ad virus venereum miris laudibus celebratur; circa homines calidæ temperiei caute cum eodem mercandum eft.

In infuso Cortex ad drachmam unam, Lignum ad fesqui drachmam adhibetur.

* Aqua destillata Ligni Parif. * Aqua destillata Corticis Parif. Utraque non inefficax est: * Aqua composita Wurtemb. in affectibus ventriculi frigidis non contemnenda: Oleum destillatum SCHROED. ejus paucissimæ guttæ, pro dosi, aliis medicamentis admiscentur: * Extractum Wurtemb. inertius: * Essentia Brandeburg. eam momentaneam operam ad discutiendos flatus præstare, BAGLIV. monet: * Essentia composita Wurtemberg. * Syrupus Wurtemberg.

SATUREJA, Júµßez? Sariette, Bohnenkraut. Recipimus cauliculos teneros, vestitos Foliis parvis, lanceolatis, acutis, odore aromatico, sapore forti & acri æque ac ipsi cauliculi, instructis.

SATUREJA. Calice quinquefido fustentat corollam

ringentem, cujus labium fuperius inferiori æquale est, inferius in tres partes, parum inæquales divisum, femina nuda: *Hortensis* L. BLACWELL 419 pedunculis bifidis distinguitur.

Sponte in Europa Meridionali crefcit : multum in nostris hortis colitur.

Spiritus omne aroma inde recipit, aqua odorem & paucum faporem, Olei odorati parum largitur, Extractum aquofum fubadítringens est, spirituosum aromaticum. LEWIS. Extracti aquosi $\frac{1}{3}$ circiter exhibuit, CARTHEUSER.

OUMBERS ad eofdem usus ac reliqua aromatica adhibuit HIPPOCRATES, Saturejam rarius scopo medicato, crebrius ad condiendos cibos adhibemus, a nostratibus siliquis phaseolorum adjicitur, ut earum gratiam augeat.

* Oleum destillatum VAL. CORD.

* SCHOENANTHUS AETII, goive av9@ GALEN. Squinanthos & Juncus odoratus PLIN. Cameel - Heu: hoc nomine proftant Culmi teretes, flavi, superne angusti & in plures ramos parallelos, capillares terminati, aliquot foliis vaginantibus, arctissime convolutis tecti, substantiam sungosam includentes, fapore acri, amaricante, aromatico præditi.

ANDROPOGON. Locustam unifloram habet, quæ calice biglumi suftentat corollam biglumem, a basi valvæ longæ aristam longam emittentem, triantheram digynam, semen aristatum est: Schænanthum L. paniculæ spicis conjugatis, arista intorta, floribus, rachi pubescente gaudet.

In defertis Arabiæ copiole crefcit.

Exiguam quantitatem Olei odorati largitur, Extractum aquofum minus gratum eft, fpirituofum evidenter aromaticum. LEWIS.

Ab HIPPOCRATE ad injectiones in uterum ulceratum recipiebatur, a GALENO ad movendam urinam, referandos menfes, morbos viscerum abdominalium & hæmoptyfin laudabatur: in tanta quam habemus medicamentorum aromaticorum copia, ejus usus eviluit. Pulverem cum successur fungoso inspergi, GOHL vidit.

SERPENTARIA VIRGINIANA Recent. Eft Radix, quæ ex tenui capite plurimas fibrillas, aliquot pollices longas, emittit, ex albo-flavefcens, odore evidenter camphoram redolente, fapore acriufculo, amaro prædita; ipfis non raro adhuc cauliculi foliis ornati adhærent.

Aristolochia Serpentaria L. BLACWELL 359 foliis cordato-oblongis, planis, caulibus flexuosis, teretibus & floribus solitariis gaudet.

Crefcit in Virginia.

Extracti aquofi balfamici, camphorati $\frac{1}{4}$, fpirituofi magis acris $\frac{1}{8}$ circiter largitur. CARTHEUSER.

Verfus finem fuperioris Seculi inter Anglos & Gallos, fub initium hujus inter Germanos cœpit in ufum recipi.

A vi venenis refiftendi in America laudatam radicem, Europæi a virtute alexipharmaca commendant, Angli eadem crebro in morbis exanthematicis utuntur, ut virus ad cutim determinetur; motum fpirituum inde compefei, WILLISIUS & WEDEL obfervarunt. Vires antifepticas Illustr. PRINGLE vidit.

Datur in pulvere ad fcrupulum, & in infuso aquoso ad drachmam unam.

* Esfentia Wurtemberg.

SERPYLLUM, Equil & Equillor, Serpolet, Quendel. Cauliculos teneros exhibet, vestitos foliis parvis, ovatis, obtusis, sapore & odore aromatico æque ac cauliculi instructis.

THTMUS. Corollam habet ringentem, fimili calice fustentatam, labium superius emarginatum, inferius fere regulariter trifidum, semina nuda: Serpillum

297

BLACWELL 418 floribus capitatis, caulibus decumbentibus & foliis ovatis distinguitur.

Crefcit per omnem Europam.

Menfes & urinam inde moveri GALENUS annotat, hodie vix intus exhibetur; ejus ope cephalæam a crapula tolli, afferit LINNÆUS: extus difcutiendi & roborandi ergo in ufum trahitur.

* Aqua destillata VAL. CORD. * Aqua benedicta Serpylli MYNSICHT. est aqua vinofa aromatica roborans & refolvens, quæ in morbis frigidis ad aliquot cochlearia dari potest: * Spiritus Brandeburg. * Oleum destillatum VAL. CORD.

SESELI, GEGENI, Bergkümmel. Creticum & Massiliense in officinis occurrit, prius Nostrates sub Montani nomine recipiunt.

Creticum oblongum est convexo-concavum, tribus lineis eminentibus notatum, rufum, odore nullo, fapore levi, parum aromatico gaudet.

Massiliense priore minus album est, & fapore evidenter aromatico gaudet.

Creberrime in officinis unum alteri fubstituitur.

Prius defumitur a *Torbertio*, planta umbellifera, utroque involucro & feminibus planis, margine elevato crenulato inftructa: *Officinali* involucro partiali floribus aquæ & foliolis ovatis, laciniatis, Orientis, Europæ Meridionalis cive: alterum nobis fubminiftrat *Seseli* cujus umbella involucrum univerfale nullum, partiale paucifolium habet, femina ftriata funt: *Tortuofum* L. foliolis linearibus fafciculatis diftinctum, Europæ auftrali indigenum.

Non raro variarum aliarum plantarum umbelliferarum femina, his ipfis fubstituunt.

Ab HIPPOCRATE medicamentis uterinis Sefeli adfcribitur, Galenus illud ad movendam urinam, morbum comitialem & orthopnœam laudat; cum plurima semina aromatica habeamus, illud hodie eviluit.

* SPICA NARDI, 5 a zus vago G, Ejus duplex genus hodie prostat:

Spica Indica, Cretica, Syriaca, Nago G Indun, Maria Magdalena Blumen. Est capitulum exiguum radicis, plurimis nervis foliorum marcıdorum instructum, qui sibi invicem incumbunt & convoluti funt, colore ferrugineo, odore gravi, cui aliquid situm redolens accedit, fapore levissime amaro instructum.

Spica Celtica, Nzed @ zed Tuzn. Efformatur a Radiculis, quæ foliis exiguis tanquam fquammis vestiuntur, unde quoque nervi foliorum marcidorum prodeunt, odore ad priorem accedit, sapore gaudet evidentius amaro, leviter salino & aromatico.

Andropogon Nardus L. paniculæ ramis multum fubdivisis & proliferis gaudet.

Crefcit in India & Syria.

Valeriana Celtica L. floribus triandris & foliis ovato-oblongis, obtufis, integerrimis diftinguitur.

Alpium Europæ Meridionalis & Helvetiæ civis.

Ex Indica NEUMANN $\frac{1}{8}$ Extracti fpirituofi, aquofi autem $\frac{1}{6}$ & pauciffimum Olei odorati obtinuit : CAR-THEUSER Extracti fpirituofi $\frac{1}{14}$ circiter & $\frac{1}{6}$ aquofi aromatici.

GALENUS inde urinam moveri, & fluxiones vifcerum medelam recipere, Celticam præterea Indica debiliorem effe, monet, quod ultimum faltem de noftris afferere non auderem, hodie utraque vix intus datur, fed interdum ad balnea adhibentur HASSELQUIST refert, apud populos interioris Africæ & Abyffiniæ, qui inde unguentum cofmeticum parant, adeo magnum Spicæ Celticæ ufum effe, ut quotannis pro pretio 6000 thalerorum ex Germania, per Venetias, in Ægyptum mittatur.

* Effentia Wurtemb.

* STOECHAS, $\neg i\chi ac$, $\neg i\chi ac$. Ejus affervantur Spicæ cylindraceæ, multis calicibus fibi arctiffime incumbentibus efformatæ, ex quarum fummitate flores marcidi eminent, colore gaudent cinereo, odore levi, fapore aromatico ad lavendulam accedente, fed magis refinofo.

Lavendula Stæchas L. BLACWELL 241 foliis lanceolato-linearibus & fpica comofa diftinguitur.

Crefcit in Oriente & Europa Meridionali.

Olei odorati largam quantitatem, Extractum aquofum amarum & fubadítringens, fpirituofum autem aromaticum largitur. LEWIS. Olei odorati perparum, Extracti fpirituofi $\frac{1}{7}$ circiter, aquofi $\frac{5}{12}$ fere. NEUMANN.

Hanc Stoechadem Arabicam MESUE dixit, quam denominationem adhucdum fervat, ut ab aliis plantis cognominibus diftinguatur.

Cum flores stoechadis Arabicæ, prouti hodie in officinis prostant, ut plurimum effœti sint, eviluerunt, & ipsis lavendula, efficacior omnino ad obstructiones viscerum referandas, humores attenuandos & solida roboranda, ad quos a Galeno laudati suerunt, fubstituitur.

THYMUS, Ξύμον, Thym, Thymian : Recipimus ejus Cauliculos teneros, foliis exiguis ovatis & verticiliis florum exiguorum vestitos, odore proprio, sapore aromatico, grato, linguam pungente instructos, albidos.

Thymus Vulgaris L BLACWELL 211. floribus verticillatis & foliis ovatis diftinguitur.

Crefcit in Europa Meridionali, apud nos in hortis colitur, & noftras hyemes optime fert.

Olei Odorati 128 inde obtinui : LEWIS 180 & præterea Extractum aquofum, fubfalinum, fpirituofum parum odoratum, faporis penetrantis camphorati

300

accepit : CARTHEUSER olei odorati $\frac{1}{85}$ circiter, Extracti aquofi $\frac{1}{3}$ fere, refinofi ad $\frac{1}{5}$.

Quas HIPPOCRATES de reliquis aromaticis vires adducit, etiam de thymo laudat; hodie magis in culinis tanquam condimentum, quam tanquam medicamentum in officinis usurpatur.

* Aqua destillata VAL. CORD. * Spiritus Parif. * Oleum destillatum VAL. CORD.

VALERIANA Barb. Baldrian. Radicem officinis fubministrat, quæ ex capite craffiusculo & brevi, cui fovea, unde caulis exierat, insculpta est, copiosifimas fibras capillares emittit, extus sus fusca, intus alba, odorem fortem, qui ad Nardum accedit, saporem falinum habet.

Valeriana Officinalis L. BLACWELL 271 floribus triandris & foliis omnibus pinnatis diftinguitur.

Crefcit in omni Europa, præter multum Meridionalem.

Aquam valde odoratam, fed nullum Oleum largitur, $\frac{1}{4}$ Extracti aquofi, naufeofe dulcis & acris, $\frac{1}{8}$ fpirituofi. LEWIS: Extracti aquofi $\frac{13}{24}$, fpirituofi $\frac{3}{8}$ circiter NEUMANN: Extracti aquofi $\frac{5}{16}$ fere & $\frac{1}{5}$ circiter fpirituofi. CARTHEUSER.

FABIUS COLUMNA virtutem hujus radicis antepilepticam, in fe ipfo & multis aliis expertam, celebrat, eandem propriis obfervationibus confirmarunt MAR-CHANT, CRUGER, LENTILIUS, SCHUCHMANN, SAUVAGES, Cl. SCOPOLI, Illuftres STOERCK, TISSOT, HALLER & c. qui ultimus eandem, iis quorum nervi nimis fenfiles funt, quoque utilem effe, vidit; Illuftr. STOERCK præterea eam egregie ad fugandos vermes facere obfervavit; ejufdem intus fumtæ vires oculos roborantes, TABERNÆMONTANUS & STANTKE probant. Datur fingulis diebus ejus pulvis ad drachmam unam.

* Aqua destillata VAL. CORD. omnino efficax:

* Essentia Valeriana composita Wurtemb. est Essentia Bezoardica HERMANN ad febres malignas laudata.

VANIGLIA Recent. Conftituitur a Siliquis dimidio pede longioribus, dimidium pollicem latis, utroque extremo producto & obtufo, compreffis, ftriis longitudinalibus notatis, uno margine craffiufculo, altero acuto inftructis, profunde fufcis, fplendore quodam, quafi oleofo, fimilique tenacitate gaudentibus, pulpam granulatam includentibus, odore fragrante ad flores Perficorum accedente, & fapore aromatico fenfus recreantibus.

EFIDENDRON. Corollam pentapetalam, nectario quadrifido & ringente auctam, fpathis vagis fustentatam, diantheram, monogynam habet, & filiquas longas: Vanilla L. habitu scandente, foliis ovato-oblongis, nervosis, seffilibus distinguitur.

Crefcit in Jamaica, Cajenna & America Meridionali.

Fructus maturi ut conferventur, oleo inungi folent; fub initium Seculi fuperioris, parum adhuc in Europa noti.

Oleum odoratum fundit, spiritu vini omni odore privatur.

Ob fragrantiam æque, ac evidens, quo pollet, aroma, ad roborandum caput, & reftituendum robur primarum viarum adhibetur. Datur in Infuso ad drachmam unam. Præcipuus ejus usus est ad parandam Chocolatam, aut ad condimenta.

* WINTERANUS CORTEX vulgo. Canella alba. Hoc nomine venit cortex craffus, in tubos convolutus, extus striis transversis notatus, flavicans, intus albus, fapore acriusculo, aromatico instructus.

WINTERANIA L. BLACWELL 206. Corollam pentapetalam habet, nectario auctam, calice trifido fuftentatam, polyantheram, monogynam, baccam tripyrenam. Crefcit in America Meridionali.

Oleum effentiale calidum fundit, quod crebro Oleo caryophyllorum folent adjicere. BROWN: Olei fpiffiufculi ultra $\frac{1}{768}$, Extracti fpirituofi parum aromatici $\frac{1}{7}$ fere, aquofi, amari $\frac{1}{5}$ circiter obtinuit CAR-THEUSER.

Genuinus CORTEX WINTERANUS fiftit Frusta plana, non convoluta, Canella alba craffiora, colore Cinamomeo, odore grato aromatico, fapore linguam pungente instructa. Drymis Winteri FORSTER Nov. A&. Upfal.

WILHELMUS WINTER nauclerus anglus anno 1579 hunc corticem ex freto Magellanico Europæ intulit.

Ob vires ad fcorbutum facientes maxime laudatur, vi quoque refolvente & roborante morbis ferofis, aut cum vifcera obstructa fuerint, commendatur. Datur ad drachmam dimidiam.

* Aqua destillata Wurtemberg.

* ZEDOARIA Lat. Barb. Zittwer. Siftit Radices aliquot pollices longas, minimum digitum craffas, levibus rugis & tuberculis diftinctas, extus gryfeas, intus rufas, odore proprio, ad camphoram accedente, fapore acri, aromatico, amaricante inftructas : Radices rotundiores olim a vulgaribus, quas longas dixerunt, diftinguere folebant.

Kampfferia Rotunda L. BLACWELL 399 folia habet lanceolata & petiolata.

Crefcit in Madagafcar & in India.

Largitur Oleum odoratum fpiffum GEOFFROI, *Extractum aquofum* debile & naufeofe amarum eft: fpirituofum calidum, aromaticum, grate odoratum LEWIS: Olei odorati $\frac{1}{128}$, Extracti aquofi $\frac{1}{3}$ circiter, fpirituofi $\frac{1}{17}$ fere. NEUMANN: Extracti aquofi $\frac{1}{3}$, fpirituofi $\frac{1}{16}$ CARTHEUSER.

Primi Arabes hanc radicem in usum traxerunt.

Laudatur medicamentum aromaticum, incidens, roborans.

* Aqua destillata Wurtemberg. est aqua vinosa: * Aqua composita JUNCKEN, non ingratum medicamentum stomachicum & carminativum: * Oleum destillatum VAL. CORD. * Extractum spirituosum & aquofum commixta Wurtemberg.

ZINGIBER, $\langle i\gamma\gamma i\beta_{igis}$, Zinziber Barb. Gingembre, Ingwer, Imber. Largitur Radices plus minus lobatas, lobis varie figuratis, omnibus rotunde terminatis, rugis plus minus eminentibus notatas, extus flavicantes, intus ex rufo flavas, odore proprio, fapore multum acri, aromatico inftructas.

Rejicimus rubras & illas quarum fuperficies, ad tegenda foramina, crusta quadam terrea obducta est.

Amomum Zinziber L. BLACWELL 402 obfervante BROWN, duas antheras habet & calicem fpathaceum, fcapo nudo & fpica oblonga gaudet.

Crefcit copiofe in omni India, inde per Lufitanos in Americam Meridionalem translatum, ibi frequenter hodie colitur & in Europam mittitur.

Radices epidermide privatæ & aqua coctæ nos adeunt.

Largitur $\frac{1}{78}$ circiter Olei odorati, ipfa radice minus acris & Extractum aquofum fervidum GESNER : Olei odorati $\frac{1}{128}$, Extracti fpirituofi $\frac{1}{15}$ fere, aquofi $\frac{1}{4}$. NEUMANN. Olei odorati $\frac{1}{128}$, Extracti aquofi $\frac{1}{4}$, fpirituofi $\frac{1}{12}$. CARTHEUSER.

Ratione virium fatis prope ad piper accedit, fed eodem, obfervante GALENO, mitius agit, attenuando & ftimulando concoctionem ciborum juvat, hinc & hodie adhuc tanquam condimentum illis adjicitur; interdum admifcetur medicamentis, quibus mucum priorum viarum incidere tentamus. Datur ad grana octo. Extus ad evocandum ex tumente uvula mucum remedium præfentaneum effe folet. STENO Zinziberis radice radice faliva humectata & oculo admota vifus aciem reftitutam recenfet, & BORRICHIUS eandem in pulverem comminutam & aqua madefactam, palpebris cum fucceffu in imminente cataracta impofitam testatur, recipitur etiam ad apophlegmatismos.

* Oleum destillatum SCHROEDER. Tabella Zinziberis SYLVII, Zinziber coctum Nostr. ad restituendas vires digerentes cum successur datur. Conditum Zinziberis VAL. CORD. ex India ad nos adducitur, ad sessaria drachmam exhibetur eis, qui morbis frigidis primarum viarum laborant.

5. 26.

III. RESINÆ.

Huc refero fubstantias, ignem capientes, evidenti odore instructas, in aqua non solvendas, quarum plurimæ calore liquantur & in modum olei fluunt, omnes, una saltem excepta, oleum odoratum, aquæ inde abstractæ impertiunt, & hinc ad aromata (§. 25.) accedunt.

5. 27.

Docet experientia, Refinas partibus, quas obducunt, evidentem rigiditatem conciliare, hinc roborantibus jure adferibuntur (§. 22.). Sed eafdem putredini quoque refiftere, omnis ævi experientia evicit, hunc effectum videntur præftare, dum a partibus, quibus adhærent, aërem arcent, in fubftantiam fibrarum defeendendo, nexum earum firmant, motum deftructorium cohibent, acidum quoque, putrido femper adverfum, fubministrant, hinc Antijepticis adferibuntur; eædem faponaceis unitæ disfolutionem obstructorum in pus juvant, & sua vi antifeptica: ne hoc corrumpatur, cavent, hinc Digerentium vires optime exsequentur, & cum novam, quæ sub pure furgit, carnem roborent, confolidationem egregie promovent & Confolidantia, Traumatica, Epulotica conftituunt. Sed id circa earum adhibendi modum notandum eft, eas, cum omne aquæ commercium refpuant, & hinc a noftris humoribus recipi non poffint, femper alicui faponi effe jungendas, quando tanquam medicamenta debent ufurpari.

§. 28.

Indicantur Refinæ 1) ubicunque aromata profunt, 2) cum tonus viscerum multum fuerit dejectus, 3) aut ulcera aliquam partem internam depascuntur: extus eastdem adhibemus, 4) sub qualicunque læssione continui partium mollium, 5) ad roborandas membranas, 6) ad discutiendas stagnationes: in penultimo casu sub forma suffitus maxime in usum trahuntur, in ultimo tanquam suffitus, cataplassmata, emplassica. Abusus Refinarum 1) eadem ac ille aromatum mala gignit (§. 25.) 2) rigiditatem producit, 3) morbos ab incretione salutari cohibita oriundos excitat, 4) falubrem abscessiones ulcerum depurationem impedit.

a. VEGETABILES.

* ALOES LIGNUM Arab. a'ra'Moxor, Agallochum Veterum. Advehuntur ad nos fub hoc nomine, frusta lignofa variæ magnitudinis & craffitiei, ponderofa, colore badio aut nigro tincta, striis nigricantibus distrincta, aut refinam nigricantem, parum sapidam in sinubus quasi exessi vehementia; dum hæc frusta ignem capiunt, fundunt refinam, quam habent, & fragrantem odorem emittunt, qui autem a subsequente Ligni fumo mox turbatur.

Quo plus refinæ hæc frusta vehunt, quo magis ponderofa sunt, quo evidentius badia vel nigra, eo reputantur meliora. De arbore, unde hoc lignum defumitur, nihil certi conftat, non vana videtur conjectura, varium arborum genus in montibus Indiæ Orientalis contingere, quod per fenium refinam recipit, ea plane ratione, quam circa varias Pinus fpecies in Europa obtinere videmus, arbores refina fœtæ cædi & frufta. L. Aloës nomine in univerfum venire; illa, quæ copiofiffimam & fuaviffimam refinam habent, *Calambac* appellant, & ab Indis tam ad ufum religiofum, quam ad luxum adhibentur, frufta parciore refina farta fub *Garo*, L. *Afpalathi*, *Agallochi*, *Aquilæ* titulo ad nos mittuntur, colore & ratione refinæ, quam vehunt, adeo differentia.

Cum L. Aloës inter nos proftans adeo diverfum fit, hinc facile patet, rationes ejus principiorum etiam multum differre.

HOFFMANN inde vix $\frac{1}{320}$ Olei odorati, quod confiftentiam butyraceam habet, obtinuit : NEUMANN Extracti refinofi $\frac{1}{2}$ fere, aquofi $\frac{1}{3}$ circiter : CARTHEUSER $\frac{3}{2}$ Extracti fpirituofi inertioris & aquofi $\frac{1}{4}$.

Laudatur hujus ligni fuffitus ob vires cephalicas & cardiacas, olim sub forma pulveris quoque intus dabatur, sed certiffime sine effectu.

* Refina ANGELI SALÆ iners: * Esfentia Hamburg. * Aqua destillata Parif.

* ANIME GUMMI Recent. fub fruftis variæ magnitudinis ad nos adducitur, quæ citrina funt, pellucent, & odorem fuavem fpirant. Minus bona reputantur cortice refinofo, magis nigricante hinc inde obfeffa.

HIMENÆA L. Corollam pentapetalam habet, fere regularem, duplici calice, quorum exterior bifidus, interior quinquefidus est, diplosantheram, monogynam & siliquam pulpa farinaceo-fibrosa fartam.

Crefcit in America Meridionali.

Primus AMATUS hujus refinæ mentionem facit,

& illam a Lufitanis ex Guinea & Mina in Europam vehi, in patria autem *Animum* vocari; ex quo PLU-MIER arborem *Courbaril* dixit, Galli etiam refinam hoc nomine appellant. Hodie omnis ex America ad nos adducitur.

Nonnisi in spiritu vini solubilis, paucissimum Olei odorati fundit. LEWIS. Tota in alcohole dissolvitur, Extracti aquosi $\frac{1}{16}$ largitur. NEUMANN.

Laudatur ejus fuffitus, fed rariffime præfcribitur. BENZOES G. Barb. Afa dulcis Recent. Eft refina cujus magnæ maffæ, quarum fuperficies veftigia ipfis a texto junceo impreffa gerit, ex laminis rubro-fufcis conflata, quibus grana variæ magnitudinis Ungues feu Amygdalæ dicta inhærent, odorem gratum fpirat, faporem dulcem habet, calore liquatur.

Quo magis frusta pellucent, quo albidioribus & copiosioribus unguibus scatent, eo sunt meliora; sordibus obsessa, corrupta a Mercatoribus en Sortes, in Sorten dicuntur, quæ appellatio etiam ad reliquas viliores medicamentorum species transit.

Minus bene fubstantiam, ex Sumatra, Java, Siam, Borneo, Madagafcar ad nos allatam, a Lauro Benzoin L. repetere folent, Virginiæ cive & nostræ hyemis patientissima. Ill. LINNÆUS eam recentissime a Croton Benzoe L. foliis linearibus nudis & venis rubris distincta, derivat.

GRIMM refert, eam ex vulnerato arboris fexennis cacumine effluere & unam arborem non ultra tres libras refinæ largiri.

Innotuit demum, quum Europæi navigationes in plagas Orientales instituerunt.

Tam, fi cum aqua tractatur, quam fi fub jufto inftrumentorum apparatu calori exponitur, falem effentialem oleofum fundit, qui fub *Florum* nomine venit, & vulgo $\frac{1}{10}$ æquat. Deftillata $\frac{1}{3}$ florum impu-

1

riorum, 34 Olei, 5 spiritus acidi circiter fundit. NEUMANN.

Intus rariffime datur, ad fuffimigia maxime recipitur.

Flores vid. Inft. Chem. * Oleum VAL. CORD. exolevit: Tinctura SCHROEDERI est folutio Benzoës spirituosa; ejus aliquot guttæ aquæ instillantur, quæ deinde, sub nomine Lactis Virgmei, ad usus cosmeticos recipitur: * Essentia simplex Wurtemberg. est folutio Benzoës in spiritu Anisi, * Essentiam compositam Eorundem ego saltem, cum non possit non sanguinem commovere, ad morbos pectoris nunquam auderem exhibere, usibus cosmeticis melius respondebit,

CAMPHORA Lat. Barb. Ejus varia genera recenfent Auctores : * 1, um ex radice Lauri Cinnamomi L. ope destillationis cum aqua obtinetur, & ad nos in exiguis granulis pellucidiffimis adducitur, odore & fapore cum Camphora inter nos vulgari convenit; * fecundum a Borneo vel Sumatra & hujus fede regia Baros denominatur, granis majoribus constat, centuplo cariori pretio quam tertium, vel recentifime DE-JEAN, apud Ill. GAUB, testante venditur, nec hoc unquam in tabernis occurrit: tertium fub forma granorum parvorum, flavicantium, quæ interdum in maffas majores collecta funt, ad nos adfertur, eandem Amstælodami, ratione in Institutionibus Chemia dicta, in propriis vafis fublimant, unde in panes concavo-convexos, crystallina albedine splendentes, quorum vertex, ob fublimationis rationes perforatus eft, fragiles, efformatur; adeo inflammabilis, ut etiam supra aquam ardeat, proprio fortiffimo, caput quoque obnubilante, odore gaudet & fapore, qui linguæ levisfimum amari, evidentifimum frigoris fenfum imprimit, dentibus adhæret, nec nisi cum aliis substantiis subacta in pulverem teri poteft; ex omni menstruo ab aqua præcipitatur, in qua tamen fe omnino diffolvi patitur, si multum cum ea agitatur.

V 3

Laurus Camphora L. BLACWELL 347 floribus dioicis & foliis trinerviis, ovato-oblongis, diftinguitur.

Crefcit copiofiffime in Japan.

Hujus arboris partes confeisfæ; cum aqua in lebete, qui operculo, stramine intus obducto, tegitur, coquuntur, & ita efficitur, ut Camphora operculo stramineo accrescat.

Arabibus egregium hoc medicamentum debemus, fagaces illi, id ipfum medicamentis refrigerantibus adfcripferunt, licet multa habeat, quæ calidis annumerandum effe fuadent; fapor, & non pauca cum illo instituta experimenta probant, non modo illud corpora, quibus ingeritur, non exæft. re, fed evidenter etiam refrigerare : HOFFMANN ab ejus drachma dimidia calorem non intendi, pulfuum numerum non crefcere, fenfum frigoris ad præcordia excitari, eft expertus, vel duas drachmas pulsum non accelerare LOESE-CKE vidit, a scrupulo uno pulsum imminui, a drachma dimidia eundem augeri & caput obnubilari, a scrupulis duobus convulfiones quoque furrexisfe observavit ALEXANDER, Cl. CULLEN a largiore dosi frigus & pallorem caufari monet. Hos effectus videtur producere ejus virtus motum spirituum retardandi, id quod obnubilatio capitis, vel folo ejus odore excitata, quotidiano experimento experiunda, & convulfiones imo mors in quadrupedibus, avibus & ranis a Cl. MENGHINI observatæ, facile evincunt, ab hac ejus vi sedante fequuntur virtutes contra maniam, a PARACELSO jam annotatæ, & observationibus KINNEIR, TRIEWALD, WERLHOFF, BOENNECKEN confirmatæ, illæ præterea quibus epilepham varii generis curari, Cl. CULLEN, HANNES & LOCHER monuerunt, & quibus vires fialogogas mercurii & evacuantes drafticorum infringi QUINCY, BARRY, RAULIN, SCHREIBER, HUXHAM & MISSA fide conftat & cantharidum vim irritantem,

notante QUINCY, & febres intermittentes sisti observante BARTHES, cardialgiam quoque sopiri teste KULBEL. Ea infuper quæ a Camphora extus applicata effici, iterata multum tentamina docuerunt, occasionem dederunt eandem ad casus analogos intus quoque exhibendi, eamque in illis quoque cum fuccessu dari, confirmavit experientia; in inflammationibus internis fummo cum fructu propinari, quotidie videmus, & CRAANEN, HOFFMANN, WERL-HOFF, TREW, BERGER, ALBRECHT, WOLFF, POUTEAU &c. observationibus probant. In his cafibus fanguinem fpilfum inde attenuari, evidens eft. id quod fibi in univerfum iteratis experimentis innotuisse, HOFFMANN testatur, qui etiam ipfam veneream spissitudinem inde minui, observavit. Vim Camphoræ, qua putredinem arcet, Ill. PRINGLE & Esfais pour servir à l'histoire de la putréfaction multis experimentis probarunt, hinc liquet cur eandem in morbis malignis cum tanto fuccesfu adhibitam fuisfe, apud RIVERIUM, WERLHOFF, BOESSEL, WEIT-BRECHT, ROSEN, WAGNER, HESS, HÆNEL, WOLFF, VITALIS, TRAMPEL, SCHREIBER, Illustr. HALLER, Cl. HUXHAM, LYSON &c. legamus. Eandem denique ad fugandos vermes cum fucceffu exhiberi, ex MENGHINI observationibus circa infecta ejus odore pereuntia, probabile fit & Cl. PRANCE evicit.

In morbis inflammatoriis ad grana tria, aliquot per diem vicibus exhibetur, in morbis malignis ad fcrupulum unum, in mania ad drachmam dimidiam datur.

Externe ad discutiendas fugillationes & inflammationes polychresta est, & ad arcendum sphacelum cum successfu applicatur; glandulas eandem difficilius ferre, LOESECKE monet, denti carioso immissa dolores multum lenit.

Spiritus Vini Camphoratus, Esfentia Camphorata QUERCETANI Parifini duplicem habent, unum cum V 4. fpiritu vini fimplici, alterum cum rectificato; polychreftum omnino medicamentum discutiens: * Oleuns ope argillæ obtinendum ROLFINCK ipsius Camphoræ vires videtur habere: * Oleum per spiritum Nitri paratum LEMERY medicamentum rodens: * Oleum Bezoardicum WEDEL, potius ROLFINCK egregium tana ad internas, quam ad externas inflammationes discutiendas, medicamentum, ejus ope WHYTT atheroma curavit.

* CARANNÆ GUMMI Recent. Apportatur ad nos in magnis maffis ex viridi nigricantibus, quibus extus reliquiæ involucri juncei, quo involvi folent, adhærent, fapore gaudet non multum refinofo, accenfum, odorem non ingratum fpirat.

Apportatur ex America Meridionali, character arboris unde obtinetur, nos adhucdum latet.

MONARDES refert G. Carannæ medio Seculi XVI primum in Hispaniam allatum fuisse, sed id quod hodie prostat a MONARDES descripto sive vilius est, five ab eo omnino diversum.

Aqua ejus quartam partem diffolvit, reliquum alcohol, Olei odorati largiorem quantitatem fundit : Extractum aquofum amaricat. L E W I S. Extracti aquofi $\frac{3}{4}$, fpirituofi $\frac{3}{4}$. CARTHEUSER.

Ad usus nonnisi externos resolventes & roborantes usurpatum, hodie exfolevit.

COPAIBA BALSAMUM Recent. Est liquor refinofus, terebinthina magis fluidus, coloris pallide citrini, faporis acris, amaricantis, linguæ diu inhærentis, odoris proprii aromatici, minus grati.

Minus pellucidum & tenacius rejiciendum.

Copaifera L. Corollam tetrapetalam habet, decantheram, monogynam; fructus nux eft.

Crefcit in Americæ Meridionalis terra firma.

Primus Celeberrimus JAQUIN accuratiorem arboris notitiam dedit, ex cujus trunco incifo balfamum effluit, quod sub finem Seculi XVI satis rarum adhuc in Europa fuisse, ex CLUSIO patet, seculo superiore ad finem vergente demum in officinas receptum est.

Olei odorati $\frac{1}{2}$ fere. LEWIS, ego $\frac{1}{5}$ inde obtinui, nequaquam viride, ad $\frac{3}{5}$ usque CARTHEUSER.

Urinam inde amaram reddi, FULLER contendit,

Apud Indos multo usu est ad consolidanda vulnera, PISONE & Ill, JAQUIN testibus, & ad gonorrhæam laudatur, etiam nimis frequenter ab empyricis Europæis ad ultimum finem adhibetur, sed a medicamento multum calido hic non posse non gravia mala furgere, facile evincitur, quod præterea non abstersi ulceris ichorem cohibendo, multum omnino lædit: in fistula perinæi & ischuria contumaci profuisse, Hoppe vidit, in fluore albo RIEDLIN, in suppurationibus pectoris internis VALCARENGHI. Datur ad guttas decem, cum vehiculo faponaceo, quando balfamicis uti, rationalis indicatio fuadet; quia autem præ reliquis magis humores commovet, hinc rarius a prudentibus usurpatur.

Solutionem cum Spiritu Vini alcalisato paratam, Nostrates sub titulo : * Tincturæ Balsami Peruviani albi affervant, medicamentum admodum calidum.

* COPAL GUMMI. Prostat sub forma frustorum variæ magnitudinis, quæ pellucida sunt, citrino colore tincta, ita dura ut ungue radi possint, inodora, insipida, accensa jucundum odorem emittunt.

Color dilutius citrinus, durities, absentia odoris & indiffolubilitas in alcohole funt figna bonitatis.

Cum Indi, tefte HERNANDEZ, quodlibet gummi, Copalli appellent, hinc non miramur adeo varia Copal genera in tabernis occurrere.

RHUS. Corollam pentapetalam regularem, calice quinquefido fustentatam habet, isantheram, trigynam, & baccam monopyrenam: Copallinum L. folius pinnatis integerrimis, petiolo membranaceo, articulato diftinguitur.

Crefcit in Virginia.

Sed HERNANDEZ inter novem Copalliferarum arborum species, unam modo adducit Rhois foliis instructam, & vulgo asserunt, G. Copal ex America Meridionali ad nos adduci.

Egregia est Ill. MACQUER conjectura, Copal esse oleum unguinosum acido densatum.

Unice ad Vernices adhibetur.

ELEMI GUMMI Lat. Barb. Est substantia flava, cum immixta viriditate, sicca, inter digitos lentescens, odore proprio, ad sceniculum accedente, instructa; olim in frusta cylindracea densata, foliis arundinaceis involuta ad nos mittebatur, & hoc verum Elemi, sive Æthiopicum esse, GEOFFROI reputat, ab aliquot retro lustris prostat in magnis massis, cistis inclusis, ego inter utrumque nullam, quæ notari meretur, reperio differentiam.

AMTRIS. Corollam edit tetrapetalam, calice quadrifido fustentatam, diplofantheram, tetrantheram Cel. BURMANN dicit, monogynam & drupam nuce nitida fartam : Elemifera L. foliis ternatis & quinatis, fubtus tomentofis distinguitur.

Crefcit in Nova Hifpania.

Num alia arbor in Oriente alia in Occidente noftram Refinam fundit? illa, quam RUMPH adducit, genere faltem ab Americana differt.

Nonnisi in alcohole folubile, $\frac{1}{76}$ Olei odorati fundit. LEWIS: totidem Olei odorati, $\frac{1}{76}$ refinæ, $\frac{1}{48}$ Extracti gummosi NEUMANN inde obtinuit.

Interne nunquam usurpatur, externe applicatum in modum reliquarum refinarum agit, & bafin conftituit.

Balfami ARCÆI, cui Wurtembergenses Santalum rubrum, & parciorem unguinosorum rationem adji-

314

ROBORANTIA.

ciunt, polychreftum, quo vulnera devincire folent, medicamentum, ipfi proxime accedit * Balfamum Vulnerarium MINDERER magis adhuc refinofum : * Oleum destillatum SCHROEDER.

GALBANUM GUMMI vid. Refolventia. GUAJACI RESINA vid. L. Guajacum. Juniperi G. vid. Juniperus.

*LADANUM GUMMI, $\lambda \alpha' \beta' \alpha v ov$. Eft fubftantia refinofa, nigra, levi odore, fapore nullo inftructa, calore manus emollienda, igne non fundenda, fumum proprii odoris, fuaveolentem emittens. Id quod nobis ex Creta mittitur, in placentulas tortum eft, vulgo *in Tortis* dicitur, non raro plures talium placentularum inter fe conglutinatæ occurrunt: *liquidum ex Canada* dimidio prioris pretio venditur, maffam mollem in modum extracti fiftit: *Hifpanicum* in bacillos, illis quibus fuccus liquiritiæ proftat, fimiles efformatum occurrit: *Barbaricum* maffas refert paulo molliores, priore & tertio; in omnibus his, ego faltem, refpectu odoris & faporis non magnam poffum reperire differentiam.

CISTUS. Corolla gaudet pentapetala regulari, calice pentaphyllo, cujus duo foliola minima funt, fuftentata, polyandra, monogyna & capfula calice tecta: Cretica L. caulem arborefcentem, folia fpatulato-ovata, petiolata, enervia, fcabra habet.

Crefcit in Archipelago.

Refina, observante TOURNEFORT, ex foliis exfudat, inde in Candia proprio instrumento, loris coriaceis efformato, colligitur, unde derasa in massas efformatur, quibus arenam nigram admiscere solent.

Totum in alcohole diffolubile, aquam fuo odore & fapore imbuit, Oleum odoratum fundit. LEWIS. Refinæ $\frac{3}{8}$, Extracti aquofi $\frac{1}{8}$ circiter, inertis. CAR-THEUSER.

Emolliendi, digerendi, adstringendi, scopo & ad defluxum capillorum a GALENO commendatur; hodie vix non totum eviluit, cum efficaciores & puriores refinas habeamus.

* Refina Parif. * Oleum destillatum KUHNRADT.

* LIQUIDAMBAR Rec. Ambra liquida Recent. Eft balfamum, Peruviano magis spissum, nigrum, fapore gaudet acriusculo, odore styracis.

LIQUIDAMEAR, Corollam amentaceam, relativam, monophytam, polyandram, digynam, fructum lignofum, globofum, femina, quorum appendices membranaceæ eminent, vehentem habet: Styraciflua L. BLACWELL 485 foliis palmatis gaudet.

Crefcit in omni America.

Arbores Americæ Meridionalis ex cortice vulnerato, hanc refinam dimittunt, annotante Cl. KALM.

Ob vires balfamicas & fuaveolentiam olim laudabatur, hodie ejus ufus eviluit, & ipfi ftyrax fubstituitur.

MASTYX Lat. Barb. $\mu a \neq i \chi n$, Mastiche PLIN. Proftat sub forma granorum variæ magnitudinis, siccorum, fragilium, avellanas nunquam excedentium, pellucidorum, colore levi citrino tinctorum, proprio odore, non ingrato, similique sapore, cui aliquid aromatici accedit, instructorum, sub dentibus lentescentium, supra carbones fluentium & gratum odore exhalantium:

Massa ex his granis, mediante refina viliori conglutinatis, occurrentes in Sorten dicunt.

Pistacia Lentiscus L. BLACWELL 195 foliis abrupte pinnatis distinguitur.

Viret in Europa Meridionali, Archipelago, Palæstina.

Hujus arboris, quem Veteres zivor, Leutiscum appellarunt, * Lignum affervatur sub forma frustorum variæ magnitudinis, ex pallido flavescens, cortice parum rugofo, levissime rufescente tinctum, odoris & faporis nullius.

Ipfa Mastyche ex arboribus in infula Chio cultis, quarum cortex Augusto & Septembri mensibus vulneratur, effluit, in terram stillat & ibi densatur; tantus est horum granorum proventus, ut coloni infulæ eorum 300000 libras quotannis pro tributo folvant, teste TOURNEFORT.

Mastyche tota in alcohole dissolvitur, aquam suo odore inficit, parum Olei odorati fundit. LEWIS. Olei odoratum nullum, refinæ $\frac{1}{12}$, plane nihil Extracti aquosi largitur. NEUMANN.

Lignum Lentifci adftringendi fcopo commendare folebant, Veteres inde dentifcalpia pararunt, cum certiora adftringentia habeamus, nec ullum hoc lignum in linguam effectum edat, hinc ejus ufus eviluit.

Mastyche interne roborandi ergo & quidem præcipue, cum primæ viæ debilitatæ fuerint, adhibetur, olim quoque pro roborandis pulmonibus in usum trahebatur. Dosis est ad scrupulum unum.

Extus tanquam difcutiens a GALENO ad inflammationes vifcerum abdominalium laudatur, ejus fuffitu membranam Schneiderianam in catarrhis, tunicas inteftini recti in prolapfibus ani roboramus, illud pro firmandis dentibus & halitu oris fuavi reddendo ufurpare vel hodie adhuc inter Turcas obtinet, tefte HASSELQUIST, apud nos ad dentifricia adhibetur.

Spiritu vini folutam, fuper alutam extenfam ifchiaticis folatio effe, multiplici experimento vidit Cl. CARTHEUSER, in odontalgia egregie conducit five mafticata, five denti cariofo immiffa.

* Aqua Summit. Lentifci Parif. * Oleum destillatum VAL. CORD. Oleum infusum seu potius solutio in oleo unguinoso ÆGINETÆ ad roboranda viscera abdominalia ventri inungitur : Aquam Mastichinam August. a ZWOELFFER correctam, vinofam Nostrates præscribunt, Wurtembergenses simpliciorem & spirituosam; egregium medicamentum stomachicum, quod in hyperemesi maxime cum successfu adhibetur; datur ad unciam dimidiam * Pilulæ Mastichinæ DE ABANO Aloës $\frac{3}{5}$, Mastichis $\frac{1}{5}$, Agarici $\frac{2}{15}$ vehunt, non male exoleverunt: * Spiritus Mastichinus Wurtemberg. præter Mastichen varia adhuc aromata recipit, in frigidis ventriculi affectibus conducit: * Syrupus Brandeburg. medicamentum omnino laudandum.

OLIBANUM Lat. Barb. $\lambda i \partial_{2v} \oplus$, Thus Veter. Encens, Weyhrauch. Efformatur a granis variæ magnitudinis, citrinis, rufo tinctis, transparentibus, figura irregulari instructis, fragilibus, sub dentibus lentescentibus, odore proprio instructis & fapore levi, suffitum gratum fundentibus: grana fordidiora Olibanum in Sorten constituunt.

Veteres grana rotunda Mares, illa ubi grano majori minus infidet Feminas, granula exigua, rotunda Thus Orobaum, ramenta denique a detritis fruftulis orta µa'ıvav dixerunt.

Olibanum fylvestre vid. Refina Pini.

Incerta est arbor unde obtinetur, nec dum evictum illud a *Junipero Lycia* L. foliis ternis, undique imbricatis, ovatis, acutis Africæ & Arabiæ cive fundi.

HASSELQUIST refert, illud in utraque Arabia colligi, Meccam portari, inde Cairum duci, unde maxima pars Maffiliam vehitur.

Patitur se ex aqua suspendi. Refinæ $\frac{3}{4}$ fere, Extracti aquosi $\frac{5}{12}$, Olei odorati nihil fundit. NEUMANN.

HIPPOCRATES illud intus & extus, tam roborandi quam abstergendi ergo adhibuit, GALE-NUS ad hæmoptoën & fluxus alvi commendat, hos etiam Veteres Medici fecuti funt, hodie rariffime intus dari folet, fed ob gratum, quem carbonibus in-

ROBORANTIA.

jectum odorem spargit, ad suffitus roborantes & refolventes adhibetur.

* Oleum odoratum Parif.

OPOBALSAMUM, ¿ποβάλσαμον, Balfamum de Mecca Recent. Est Balfamum, quod confistentiam terebinthina fluidiorem, reliquis balfamis non folidis spissiorem habet, colorem citrinum, ad rubrum vergentem, odorem fragrantem, ad citrum accedentem, faporem amaricantem, qui linguam, sed mitius quam balfamus de Copaiba, ferit.

Amyris Opobalfamum L. foliis ternatis, integerrimis & floribus lateralibus, folitariis diftinguitur.

Crefcit in Arabia, & quæ alibi vigere dicitur, eo transplantata colitur.

Autopta HASSELQUIST testatur, ipfum balfamum ex Arabia petræa, aliquot dierum itinere Meccam ferri.

Balfamum creberrime fophifticari, jam Veteres funt conquesti, hinc multi fuerunt Auctores circa notas, quibus genuinum possit distingui, sed nulla earum adeo certa est, ut ipsi possimus fidere, suavitas odoris enim, varios gradus habet, & tefte ALPINO pro varia balfami ætate variat, qui etiam monet, confistentiam pro varia ætate diversam effe. fed ab illa evidenter pendet ejus qualitas, qua gutta aquæ instillata, se in telam calamo auferendam diffundit, coagulatio lactis a recente forfan poteft fieri, nequaquam ab annofo, unde acidum five avolavit, five partibus oleofis obductum fuit, nec ego faltem mihi refinam liquidam imaginari posium, quæ panno illita, nullam plane maculam ipfi relinquat. Id quod vulgo in tabernis proftat, aliquo oleo unguinofo, quod Sefameum vel Axungiam struthionis effe, HASSELQUIST annotat, adulteratum effe videtur.

Tanta fuit semper bujus balsami auctoritas, ut fruticis * Lignum sub nomine Eurogaraque, fructum *παρποβάλσαμον* Græc. Recent. imo etiam * Vifcum arbori innatum in tabernas receperint; prius efformatur a virgis exiguis, gracilibus, cortice rugofo, gryfeo tectis, inodoris, infipidis, & quæ accenfæ gratum odorem fpirant; alterum capfulas fubrotundas fiftit, pifis minores, quatuor lineis eminentibus diftinctas, fuperne ftylo exiguo terminatas, rugofas, ex cinereo-rufefcentes, inodoras, levi fapore balfamico inftructas, nucleum album includentes. Vifcus præ aliis nihil proprii habet.

Multi quidem funt omnium temporum Auctores in celebrandis hujus balfami viribus, fed luxurians gentium Orientalium phantafia multa vel hic quoque finxiffe videtur, quæ experientia nequaquam probavit, raritas famam auxit, & cum jam Veteres, quod adulteretur, fuerint conquefti, hinc habuerunt ejus præcones, quo fe excufarent, quando promiffis non refpondebat; ob gratiam & minorem vim calefaciendi, reliquis balfamis pro confolidandis ulceribus internis præfertur.

OPOBALSAMUM SICCUM vid. Balfamus Peruvianus.

PERUVIANUS BALSAMUS Recent. Medium, ratione confiftentiæ inter Opobalfamum & Balfamum de Copaiba, locum tenet, odore fragrante, colore ex purpureo nigricante, fapore leniter acri gaudet. Adhucdum non conftat de planta, unde fubministratur.

Ex America Septentrionali & Meridionali, nec non ex infulis Philippinis ad nos mittitur.

Noftrum balfamum, ajunt, virgulta arboris cum aqua coquendo obtineri. * Album autem effe, & præftantius, quando fponte ex incifa arbore effluit.

Mox a detecto novo orbe licet nostrum balfamum innotuerit, sub initio tamen seculi superioris valde rarum adhuc in Europa suit.

Ab oleis unguinofis non diffolvitur. BARTHOLI-NUS. Olei odorati, quod evidenter Benzoën olet, 102 & per se destillatum Flores, benzoinis similes, largitur. LEHMANN. Olei odorati 15. HOFFMANN.

Prostat & *Balfamus Peruvianus Siccus*, quod quoque Opobalfamum ficcum appellant, refina cum colore purpurascente flavicans, ficca, Benzoen evidenter redolens, quæ parvis cucurbitis, propria substantia sungofa obduratis, inclusa, ad nos advehitur.

Vires antecedentis edit, eo tamen cum calidius fit, hinc nonnifi ad fex vel octo guttas pro dofi datur; ad gonorrhæam & reftituendum inteftinis tonum, multum ab HOFFMANN laudatur, dyfenteriam inde curatam SCHROECK vidit, fluorem album & colicam RIEDLIN, colicam nephriticam WELSCH, abfceffum renalem LEHMANN, colicam Pictonum, ejus guttis 40 cum faccharo datis, SYDENHAM. Extus ad folidanda vulnera, roborandas primas vias & curandas læfiones tendinum & membranarum adhibetur.

* Essentia Balsami Peruviani Hamburgenf. medicamentum præcalidum, nostris fane hominibus non fuaderem, illis minime qui ulceribus internis laborant: Syrupus Balsamicus HOFFMANN optime paratur, Balsamosaccharum saccharo ad consistentiam cocto adjiciendo; ad ulcera interna, nec non ad asthma pituitosum cum successu adhibetur: * Spiritus abstraæitius HOFFMANN, scope analeptico maxime laudatur.

* PINI STROBILI Barb. Sunt Pinus Vulgaris tenella amenta, fere exclusa, intus viridia, extus rufis summis tecta, cylindroidea, odore balfamico & fimili sapore instructa. Melius Summitates dicuntur, cum Veteres non amenta, sed fructus 530 gives dixerint.

Pinus Sylvestris L. BLACWELL 190. foliis geminis, primordialibus folitariis distinguitur.

Per omnem Europam occurrit.

Laudantur multum ad morbos scorbuticos & eotum bonos effectus S. PAULI, MOELLENBROECK ; MICHAEL, VAN WOENZEL apud LE CLERC probant?

Earum uncia una cum tribus aquæ libris per viginti quatuor horas infunditur, ter de die infufi unciæ fex exhibentur, & ejus ufus per aliquot fubfequentes menfes continuatur.

* Esfentia Hamburg. * Extractum Wurtemb.

PIX, πίσσα, πίλτα, Poix, Pech. Eft fubstantia tenax, nigra, refinofa, odorem proprium minus gratum fpirat & fapore amaro linguam ferit.

Varia ratione ex Pinu Sylvestri L. paratur: dum five arborem incidunt & more Canadenfium, Burdegalenfium, Gallo - Provincialium, Thuringorum refinam exfudantem hoc nomine recipiunt, non raro fuligine tingunt, five ad rationem inter Macedones olim usitatum, quæ hodie in Gallo-provincia etiam obtinet, nec non in Louisiana, Aquitania, Suecia, Valefia & inter nos, ex humore fub deftillatione per descensum frustorum inde elicito & ad justam consistentiam cocto. Nostrates destillationem suscipiunt ex fornace, cujus amplus venter fuperne & inferne multum angustatur, inferiori angusto fini craticulam, & huic infundibulum fupponunt, quod in canalem horizontalem terminatur, cui doliolum admovent; huic fornaci e limo structæ, circumponitur paries quoque ex limo exftructus, qui unius circiter pedis intervallo a fornace distat & ejus tria latera cingit, quartum quod anticum est nudum relinquens & ad illud utrinque apertus hians; fornax fruftis pinus repletur, ejus orificium superius limo clauditur, ignis in intervallo parietem & fornacem inter excitatur, ita destillat primum phlegma, quod Syros Cedrinum dixiffe, PLINIUS monet, hoc fequitur Oleum empyreumaticum, Pix liquida vel navalis, Goudron, Theer. dicta, quod in proprio lebete, continuo agitatum in Picem vulgarem coquitur; hæc ipfa variis ufibus accommodanda, variis substantiis mifeetur & varia no-

322

mina induit πισσέλαιον, Pix sutoria, Oleum Pissinum &c. Pici liquidæ folet Oleum tenuius supernatare, quod prius destillat πίσσαν 3@., gelber Theer.

Extracti refinofi vix ultra $\frac{1}{2}$, parum ultra $\frac{1}{8}$ Extracti aquofi, $\frac{7}{35}$ circiter fpiritus acidi, $\frac{1}{3}$ fere Ölei inde obtinuit NEUMANN.

Cum Pix empyreuma habeat, hinc humores humanos diffolvit & eorum motum intendit, picem liquidam jam GALENUS afthmaticis & purulentis commendavit, anno 1744 BERCKLEY Episcopus Britannus morem Americanorum, quo aquam cum fubquadruplo picis liquidæ per quatuor dies infundere, ambas crebrius agitare & aquam limpidam intus ad variolas five arcendas five mitiffimas reddendas adhibere folent, repetiit, & eandem, ad uncias fex mane & vespera datam, quoque in inflammatione viscerum, pleuritide, phtifi, febribus epidemicis, afthmate, ventriculo debilitato, malo hysterico & hypochondriaco, nephritide fabulofa, & morbis cutaneis egregios effectus edere vidit: ANONYMUS in Recueil periodique in fe ipfo egregios effectus ad restituendum ventriculum, LE BEAU in ulceribus & fiftulis, HASSELQUIST in lepra & lue venerea funt experti; hi effectus a partibus refinofis ope acidi folubilibus redditis, & hinc vires abstergentes, roborantes, antisepticas edentibus videntur. pendere. BARTHOLINUS monet picem liquidam a Norwegis magno cum fuccesfu ad febres malignos adhiberi.

Extus abstergendi & refolvendi ergo a GALENO ad lichenes, ad duros crudosque tumores, hodie maxime ad emplastra adhibetur, quæ cuti fortius adhærere debent: ejus usus ad dropacismos alibi explicatur.

* Oleum destillatum VAL. CORD. quod est Templinum SCHROED. ad usus medicatos vix ulterius recipitur. * POPULI OCULI, aigrigs nónnos, bourgeons de Peuplier, Pappel- Knöpfe. Sunt gemmæ oblongæ ex flavo rubræ, e fquammis variæ magnitudinis, fibi invicem incumbentibus efformatæ, fuccum vehunt viscidum, digitis adhærentem, fuaveolentem, amarum; colligendæ sunt, antequam folia erumpunt, quibus quippe prodeuntibus fuccus imminuitur, imo totus deficit.

Populus. Relativa, diphyta est, mares in amentum longum colliguntur, cujus squammis multæ antheræ accrescunt, seminæ quoque amentaceæ, mcnogynæ, capsulas ovatas, seminibus papposis sætas maturant: Nigra L. BLACWELL 548. soliis deltoidibus, acuminatis, serratis distinguitur.

Crefcit per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem.

Oculi populi aqua cocti & prelo preffi fuccum fundunt, Olei odorati exiguam quantitatem aquæ inde abstractæ largiuntur, spiritus vini inde destillatus odoratus evadit. WEISSMANN.

Oculos Populi HIPPOCRATES medicamentis uterinis adferibit, hodie per se non in usum trahuntur, fed adhibentur ad

Unguentum Populeum MYREPS. quod refolvendi & refrigerandi fcopo in frequenti ufu est; varia ingredientia recipit, quæ fine virium detrimento possent omitti, hæ ipfæ potius a plantis solanaceis & fucculentis, quam a gemmis videntur pendere: * Essentia Wurtemb. vulnerariis adscribenda.

RESINA, Putiun, Refine, Harz. Eft fuccus refinofus ficcus, tenax, ex arboribus coniferis Europæ obtentus.

Refina alba, vulgaris, Poix grasse, Poix de Bourgogne. Est substantia alba, quæ sub magnis frustis prostat, ex flavo albis, odoratis, siccis, tenacibus, fumum minus gratum, dum accenditur, emittit. Obtinetur ex Pinu Abiete L. BLACWELL 198: foliis folitariis, tetragonis, mucronatis instructa,

Ubique in Europa obtinente, præter maxime Meridionalem.

Ex arbore portio corticis aufertur, & ita efficitur, ut ligno denudato, refina fub forma cruftæ accrefcat, illa in lebetibus, quæ aquam habent, funditur, fufa, committitur panno & fub prelo exprimitur, hac ratione a fordibus liberata, doliis committitur.

Refina Pini, Poix Refine, Variæ magnitudinis massa efformat, fragiles, ficcas, flavas, translucidas, quæ cum flammam fuscipiunt, fumum non ingratum emittunt; ejus minora frusta formicæ in suos acervos solent congerere, & ea Olibanum Sylvesse constituunt.

Sponte ex annofa Pinu Sylvestri L. effluit.

Varia alia refinarum genera ex Abiete & Pinu quomodo parentur, Ill. DU HAMEL tradit.

Ad ulcera viscerum curanda, tam extus quam intus adhibebatur ab HIPPOCRATE; hodie interne nunquam datur, extus roborandi, defendendi, maturandi ergo imponitur, unguentis & emplastris adjicitur, ut ipsis confistentiam folidiorem & tenacitatem conciliet.

Emplastrum Citrinum August. ad ulcera & vulnera claudenda adhibetur : * Emplastrum Ischiaticum BEZÆ valide resolvit.

* SAGAPENUM, σαγάσηνον, Gomme Seraphique, Serapin Gummi. Adducitur ad nos fub forma Granorum, avellanis minorum, colore ex rufo flavescente, cornu referente, odore nauseoso & fapore ingrato, amaro, cui aliquid alliacei accedit, gaudent, carbonibus injecta non liquantur, sed in carbonem abeunt, calore manus liquescunt, accensæ odorem minus gratum spirant. Massæ majores, quæ pannis cæruleis involutæ ad nos adducuntur, profundius fuscæ, evidenter fordibus inquinatæ, in Sorten dicuntur.

Plantam, unde obtinetur, ignoramus, umbelliferam effe auctoritas Veterum, folia & femina, quæ ipfi interdum commixta funt, videntur indicare.

Ex Alexandria ad nos adducitur.

Ejus dodrantem aqua recipit, aliquid Olei odorati fundit. LEWIS. Extracti refinofi $\frac{3}{4}$, aquofi $\frac{3}{8}$ fere, NEUMANN. Extracti aquofi $\frac{5}{3}$, refinofi $\frac{2}{5}$. CAR-THEUSER.

Calidum & abstergens medicamentum a GALENO dicitur; purgantes vires, ipfi MESUE adscripfit, quas autem experientia non confirmavit, multum ad referandas obstructiones viscerum laudatur, id quod quoque tanquam Gummi refina penetrante oleo instructa, videtur præstare.

Extus quoque refolvendi ergo adhibetur.

* Pilulæ de Sagapeno QUERCETAN. a Trochifcis Alhandal potius, quorum majorem præ reliquis ingredientibus rationem vehunt, denominandæ $\frac{7}{20}$ Trochifcorum Alhandal, ultra $\frac{1}{6}$ Dagrydii habent.

STORAX, sugaz. Triplex ejus genus in officinis prostat.

* In granis: fub forma maffarum variæ magnitudinis ad nos adducitur, ex badio rufarum, tenacium, proprio odore, multum fuavi inftructarum, pinguium, fapore leviffime acri præditarum, hanc Vulgarem GEOFFROI, Calamitam CHARRAS, in granis vulgo appellant.

Calamita. Diversa omnino ab illa Veterum, magnas massas fistit, quæ evidenter preli, in quo presse erant, indicia habent, fabulo & lapillis inquinatæ, friabiles, colore, odore, fapore evidenter ad priorem accedunt; quo ficciores, eo minus bonæ.

Liquida. Confistentiam unguenti spissi habet,

gryfea, fæculenta, fordida, odore antecedenti fimili gaudet.

Duæ posteriores, evidenter ex variis substantiis, quibus ope styracis odorem conciliant, arte parantur, priorem, quam nec ipsam mangonii expertem pronuntiare auderem, largitur.

STIRAX L. Carolla quinquefida regulari, fimili calice inftructa, polyanthera, monogyna, & drupa duabus nucibus fœta, gaudet.

Crefcit in Europa Meridionali, Syria, Æthiopia.

Ex arboribus Gallo - provinciæ refinam effluere, -vidit Illustris DU HAMEL, in agro Tiburtino eandem incisione arboris obtineri, Cl. MAZEAS testatur.

Styracem folidam pauciffimum Olei odorati fundere & falem effentialem dimittere, monet LEWIS, Extracti fpirituofi, $\frac{3}{4}$ aquofi $\frac{1}{4}$, Olei odorati nihil NEUMANN.

Ad fuffitus uteri ab HIPPOCRATE adhibebatur, à GALENO autem ad affectus pectoris ferofos digerendos, nec non ad pellendos menfes, hodie rarius interne, creberrime ad fuffitus folet ufurpari, ubi fe fragrantia æque ac indole balfamica commendat. Liquidam, cujus primi Arabes meminerunt, ad médicamenta balfamica externa folent recipere.

* Oleum defiillatum in Codice Parifino, vix in pharmacopoliis occurrit : * Oleum crassum & tenue Parif. * Tinctura Pharm. Batean. Pilula de Styrace a variis Dispensatoriis variæ præscribuntur : Parifinæ ad $\frac{1}{5}$ Opii, Wurtembergenses ejusdem $\frac{1}{8}$, Nostrates $\frac{1}{50}$ vehunt, inconcinna compositio, cui optime Extractum Opii, extracto Croci mistum substituitur : Unguentum de Styrace PENICHER in frequenti usu est ad ulcera contra corruptionem defendenda & solidanda : * Emplastrum de Styrace Parif. priore etiam magis ad arcendam gangrænam facit.

* TACAMAHACA Lat. Barb. Eft Refina ficca, au-X 4 reo colore fulgens, fuaviter odorata, accenfa minus gratum fuffitum emittit, naufeofa, infipida, calore liquanda: apportatur five in cucurbitis dimidiatis, hæc magis pallet & en Loques dicitur, five fub forma maffarum aliquot pollices æquantium, rufo-flavefcentium, fplendentium, five maffarum prægrandium, in quibus genuina refina multis fordibus inquinata eft, & hæc en Masse, in Sorten dicitur.

fuquilus balfamifera L. foliis ovatis, ferratis & fuaviffimo odore gemmarum multa refina turgentium agnofeitur.

Crefcit in America Meridionali & Madagafcar, nostras hyemes optime fert.

Vera refina tota in alcohole folubilis, præter paucas, quæ ipfi accreverunt fordes, ex quibus aqua aliquid recipit. NEUMANN.

Refina odorata roborandi ergo cum fuccessu adhibetur, extus maxime debilitato ventriculo imponitur, intus nunquam datur.

* Spiritus Parif. empyreumaticus , * Oleum empyreumaticum Parif * Emplasirum stomachicum de Tacamahaca SCHROEDER auctum Wurtembergenses habent, egregium omnino pro roborando ventriculo medicamentum.

TEREBINTHINA, required in im). Est fuccus refinofus five Balfamum tenax, balfamis hactenus recensitis spission, odore proprio, pro varia arbore, unde defumitur, vario, sapore refinis proprio instructum, pellucens, sive album sive flavum.

Cum refinam ex Terebintho arbore fluentem Veteres colore vitreo gaudentem, pellucidam & fluiditatem diu confervantem defcripferint, hinc labente etate, variæ refinæ ad illas qualitates accedenti, eandem denominationem dederunt & varia terebinthinæ genera in tabernas introduxerunt.

* Vera de Chio, de Cypero Lat. Barb. Confisten

328

tiam refinæ fpiffioris habet, ita ut non diffluat, pellucida, alba, leviffima flavedine tincta, nec acris, nec amara, odore grato inftructa.

Fistacia Terebinthus L. BLACWELL 478. foliis impari pinnatis & foliolis ovatis distinguitur.

Cortice inde ablato teste Pocock Terebinthina obtinetur.

In Europa Meridionali, Afia & Africa obtinet.

Argentoratenfis Recent. Balfamo de Mecca fpiffior est, tenax, pellucens, flavicans, odore grato abiegno, fapore refinoso, amaricante instructa.

Pinus Picea L. BLACWELL 203. folia folitaria, plana, emarginata habet.

Crefcit in Europa temperata, in Scotia & Germania magis meridionali ahhuc occurrit.

Hujus arboris epidermis, æftate veficulis obfidetur, quas proprio inftrumento cylindraceo, quod fuperne in aciem terminatur, aperiunt & balfamum inibi contentum legunt, cum quælibet veficula vix aliquot grana terebinthinæ habeat, hinc per diem non magnas ejus meffes operarii facere poffunt.

Veneta priori fatis fimilis est, sed fluidior, nec grati balfamici odoris dives.

Pinus Larix L. BLACWELL 477. foliis fasciculatis, deciduis gaudet.

Crefcit in iifdem cum antecedente locis, fi montes fatis altos habent, tales cum in Alfatia defint, hinc apud nos non obtinet.

Balfamum a Majo ad autumnum ufque terebrationis ope obtinetur, & per canales ligneos vulneribus immifíos in fuppolitos urceos fluit.

* Communis Recent. Confiftentiam spissiorem, colorem ad rusum accedentem, odorem minus gratum habet, non pellucida sed sordida: est resina Pini sylvestris L, quæ ex arboribus decorticatis desluit, es non raro Sordes Refinæ fub depuratione innatantes coctas & oleo Templino commixtas fubftituunt.

Balfamum de Canada Recent. Reliquis terebinthinæ generibus, fi Chiam exceperis, fpiffius, & fi qua alia in modum vitri pellucet, minus odorum, acre & amarum.

Obtinetur ex Abiete Taxi-folio odore Balsami Gileadensis RAJI.

Terebinthinam $\frac{1}{4}$ Olei odorati fubministrare Ill. DU HAMEL monet, ultra $\frac{1}{4}$ NEUMANN, $\frac{1}{70}$ circiter CARTHEUSER, Ego $\frac{1}{5}$ inde obtinui, id quod remanet cum aqua inde abstracta fuit, consistentiam refinæ ficcæ habet, & Terebinthina costa dicitur.

Vires reliquarum refinarum edit, eis cum fit minus calida, hinc noftris hominibus magis videtur conducere, interne fcopo abftergendi & confolidandi datur, & cum urinam violaceo odore afficiendo, evidenter, quod in renes agat, commonftret, hinc ad vitia viarum urinariarum maxime adhibetur. Balfamum Canadenfe cum reliquis mitius fit, hinc illis pro ufu interno præfertur. Datur ad drachmam dimidiam. Externe Terebinthinam ad vulnera & ulcera abftergenda adhibemus, vix non ad omnia unguenta & emplaftra recipitur, non folum ob vim medicatam, fed etiam ut ipfis mollitiem largiatur, & menftrui vice fungatur, cujus ope refinofa cum unguinofis mifceantur.

Oleum Terebinthinæ BRUNSVICENS. tenerius, quale ope aquæ obtinetur, five cauta deftillatione primum prodit, Spiritus a quibufdam dicitur, qui olei nomen illi relinquunt, quod cum Terebinthina per fe deftillatur, & magis tinctum & craffum obtinetur, prius ad ufus medicatos femper posteriori præferendum est: intus fumtum vehementer calefacit & vias urinarias multum stimulat, ita ut ab ejus etiam non larga dofi, graves effectus furrexisse, Vratisla-

330

vienses observarint, STEDMANN diabeten & validos viarum urinariarum spasmos viderit, prudentiores taque illud nunquam intus exhibent ; extus applicatum validiffime refolvit, & partes membranaceas coborat, hinc laudatur ad rheumatifmos, & nervofis equæ ac tendineis partibus vulneratis applicatur cum fucceffu, ganglion inde curatum Cl. PLENK vidit; quantum idem ad arcendam putredinem valeat, vel ubivis mufea anatomica evincunt; primum monente YONGE ad vafa diffecta stringenda & hinc ad fiftendas hæmorrhagias adhibetur: Oleum craffunt, * Balfamum SCHROEDER, optime empyreumatico hoc medicamento caremus : Colophonia, zoropovía, Geigenharz hodie dicitur refina, quam terebinthina per le destillata, relinquit, ficca, friabilis, extus nigra, intus fusca, ad usus externos eadem ratione ac refina vulgaris recipitur, ejus fuffitus contra prolapfus ani atque uteri adhibetur: Terebinthina cocta SCHROED. multo oleo privata eft, hinc terebinthina integra minus calida: * Sapo Tartareus, Corrector Starckey vid. Inft. Chem. Unguentum Digestivum Bononienf. medicamentum digerens polychreftum, cujus vires balfamicas Chirurgi, pro varia indicatione addito unguento Bafiliconis vel Balfamo Arcæi intendere folent: * Pilulæ de Terebinthina Brandeburg. roborant & abstergunt, varie mutatæ, varia Dispensatoria ingrediuntur: * Aqua Anhaltina Noric. calidum valde medicamentum nunquam intus dari debet, extus roborandi ergo ventriculo aut membris debilitatis imponitur: * Aqua balfamica RIVERII potius gonorrhæam graviorem reddere, quam ipfam allevare poterit : * Balfamum Vulnerarium Wurtemberg. ad vulnera recentia & tendinum cum fuccessu poterit adhiberi.

Toletanum Balfamum Recent. Confiftentiam Opobalfami habet, colorem aureum, odorem non ingratum, faporem balfamo de Mecca magis acrem; prostat ctiam ficcum quod cucurbitis inclusum ad nos adducitur.

TOLVIFERA L. Corollam pentapetalam irregularem, calice quinquefido fustentatam, diplofantheram, monogynam habet.

Crefcit ad Americæ urbem Tolu in Præfectura Cathagenæ.

Aliquid Olei odorati largitur, nec non faltem effentialem in modum benzoes. LEWIS.

Primus HERNANDEZ ejus mentionem fecit; Mo-NARDES multum est in ejus laudibus deprædicandis, ratione virium ad Balfamum de Mecca accedit, quod ipfi, cum gratius & mitius acre fit, vulgo anteponitur.

* Oleum crassius Parif. * Tinctura Eorund. * Syrupus Eorund.

β. ANIMALES.

CERA, ungos, Cire, Wachs. Eft fubstantia folida, tenax, calore liquescens, colore citrino & proprio odore instructa. Efformatur a polline antherarum, quem APIS alis quatuor membranaceis, aculeo caudæ in spadonibus & femellis, ore duabus maxillis & proboscide instructo, gaudens : Mellifica L. cujus corpus pubefcit, abdomen fuscum, & cujus primus annulus planus eft, colligit, in globos format, tibiis posticis appensum, domum portat, commilitonibus inde deglubendum relinquit & deglutiendum, denuo e corpore emittendum; eo dein animalcula pro exstruendis favis & claudendis cellulis penum hybernum five nymphis includentibus utuntur; cum pollen antherarum, demum quando ex ventriculo apum eliminatur, ceram constituat, hinc illud ab apibus omnino aliquam mutationem experiri, fit evidens.

Soliditas, color flavus & proprius odor, ceram commendat; illa optime ex favis obtinetur, dum hi

332

postquam mel inde defumtum fuit, aquæ ebullienti committuntur, ita cera aquæ supernatat, refrigerata facile inde auferenda & sordes in fundo lebetis relinquit; hæ committuntur torculari calido & ita expresssione, quicquid ceræ retinuerunt, dimittunt.

Ceræ genus eft fubftantia plus minus fusca, rufa, durior, proprio non ingrato odore instructa, quam apes ex corticibus variarum arborum defumere videntur, & æque ad claudendas alvearium fissuras, quam ad fuspendendos favos adhibent, * Propolis dicitur Stopwachs, Bienenharz.

Ceræ genus, quod baccas Myrizæ ceriferæ L. coquendo, coloni Americæ feptentrionalis parant, ad olea unguinofa videtur referendum effe: Cera Chinenfium a proprio infectorum genere, propriæ arboris foliis dicitur appendi.

Aqua ceram non diffolvit, inde abstracta ejus odore imbuitur, spiritus vini ejus aliquid recipit. LEWIS.

Cera intus adhibita, effectus refinarum edit, & cum nullum oleum odoratum vehat, hinc præ reliquis minus humores commovebit, Cl. JACOBI inde in pulmone debilitato, tuffi convulfiva, mictu cruento & dyfenteria egregios effectus eft expertus; DIE-MERBROECK, VALLERIOLA, Illuftris PRINGLE vel graviffimas dyfenterias inde curatas viderunt, fed probe meminerint Medici, iidem intus dandæ femper aliquem faponem jungendum effe. Ill. PRINGLE eam fapone vulgari diffolvit & folutionem aqua diluit; extus adhibita, in modum reliquarum refinarum, refolventes, maturantes, antifepticas, traumaticas virtutes exferit, plurimorum emplaftrorum & unguentotum conftituens præfcribitur; pileoli inde parati, mammarum papillis fiffis imponuntur.

* Oleum destillatum VAL. CORD. iterata destillatione attenuatum; nunquam intus exhibendum, em-

pyreumaticum quippe & valde calidum, maximis laudibus a BOERHAAVE extollitur ad fiffuras epidermidis, perniones, tendines contractos & articulos obrigescentes, abdomini infantum illitum eorum alvum ducere, IDEM afferit: Cera alba GALEN. obtinetur ceram aliquoties fundendo, & actioni radiorum folis exponendo, creberrimo febo adulterata folet prostare, vulgari durior est, & grato, quo illa gaudet, odore orba, HIPPOCRATI in formulis emollientibus externis usitata, adhibetur ad emplastra, quæ album colorem debent habere : Cera viridis Noftrat. refinam terebinthinam & I Viridis æris recipit; adhibetur ad clavos pedum: Ceratum refrigerans GALENI, cum albo colore nitens expetatur, hinc loco Olei rofarum, amygdalarum Oleum ad illud recipiendum, medicamentum egregium, emolliens & demulcens: Cera arborea Wurtemberg. vix ad alios quam ad hortulanorum ufus recipitur: * Cera figillaris rubra & viridis Wurtemb. recipiendis figillis dicatæ funt: * Unguentum rubrum ad labia Wurtemb, cum fucceffu ad fiffuras labiorum adhibetur.

7. FOSSILES.

A M B R A, aµβga AETII, Ambregris. In variæ magnitudinis fruftis ad nos adducitur, extus nigra crufta tectis, intus gryfeis, maculis & ftriis notatis, ex lamellis conftantibus, levibus cum aliqua tenacitate fragilibus, per fe non in pulverem terendis, proprio, qui gratiffimus eft, odore, fapore fere nullo inftructis, leni calore fundendis & flammam capientibus. Varia exempla prægrandium fruftorum NEUMANN collegit.

In omni mari, quod Afiam & Africam alluit, pifcatur, five rupibus appenfum colligitur.

Verum bitumen ficcum, ut jam AVICENNA mo-

nuit & NEUMANN multis argumentis probavit, quod interdum varias fordes vegetabiles vel animales recipit, interdum a balænis deglutitur, interdum a mari agitato ad remota valde loca disjicitur, & hinc diverfiffimis opinionibus circa fuam originem & patriam dedit occafionem.

Una fola Ambra ambrofiaca L. Gryfea vulgo dicta, genuina eft, levitate, odore non mnlto, fi integra eft, fragrante autem, fi laminæ candenti imponitur, aut cum aliis fubftantiis mifcetur, quod facile ad candelam liquefcat, & igni commifla vix non omnis aërem fubeat, agnofcenda, Vulgatior L. Unicolor WALLER. omnis per artem imitata effe videtur.

Aqua inde destillata, ejus odore imbuitur LEWIS. Olei $\frac{5}{6}$, spiritus acidi $\frac{1}{12}$, falis $\frac{1}{30}$ inde NEUMANN obtinuit, KRIELE spiritus acidi $\frac{1}{12}$, Olei $\frac{7}{8}$ fere.

Ambræ ufus inter Arabes demum multum invalescere cœpit.

Ea ob gratiffimum, quem spirat odorem & gratiæ ergo aliis fubstantiis admiscetur, quarum magnum volumen exiguum ejus momentum fuaviffimo odore replet ; intus pro roborando fystemate nervoso adhibetur, aphrodifiaco quoque scopo multum commendatur: BoswEL a granis decem affumtis, nihil in corpore mutari est expertus, a triginta autem granis pulsum celeriorem & fortiorem, placidum, non moleftum per omnes nervos tremorem, firmius ad omnes mentis actiones cerebrum, auditum magis acutum, vifum perfpicaciorem, veros ad rem veneream stimulos, & hæc omnia fatis evidenter per integram horam obtinere, observavit. Nonne parva, qua Ambram vulgo exhibere folent, dosis, quæ vix ad aliquot grana extenditur, in caufa eft, cur infignes, quos inde jure expectamus effectus, nondum crebrius fuerint observati?

Ambræ odorem mulieribus, hypochondriacis &

quibus propria idiofyncrafia est, contrarium esse inter omnes constat.

Essentia Ambra HOFFMANN Parisini majorem, quam Noftrates & Wurtembergenfes, rationem Ambræ, ultimi Liquorem anodynum pro menstruo recipiunt & moschum adjiciunt; medicamentorum nervos roborantium princeps HOFFMANN dicitur : * Efsentia Ambra balsamica DIPPEL. * Essentia Ambra ficca August. pulvis analepticus egregius, qui ad fcrupulum unum datur : * Tinctura seu Esfentia regia Parif. fragrans multum medicamentum, quod tam ad incitandum motum spirituum, quam ad usus cosmeticos adhibetur : * Species Diambra MESUE ex aromatibus potius, quam ex Ambra, quam in exigua valde ratione, a Nostratibus etiam adhuc imminuta, vehunt, dijudicandæ: * Trochisci de Ambra Wurtemberg, gratum & efficax omnino medicamentum nervinum.

BITUMEN, dogalto . Hodie dicitur omnis fubftantia foffilis, quæ verum oleum vehit, in ufus medicatos recipitur tale, quod nigrum eft, fplendens, ficcum, friabile, odore minus grato gaudens, totum calore liquandum. Illud quod vulgo in officinis proftat factitium effe, & pro maxima parte a pice vegetabili efformari, valde probabile eft.

Oleum quod ex terræ visceribus obtinetur, varia forma folet apparere: fluidum, nigrum, fætens. acriusculo fapore instructum. * Petroleum L. nigrum dicitur: illud fi antequam a terra erumpat, calore fubterraneo in vapores fuit resolutum, sub forma magis fluida & colore plus minus rubro, fapore & odore eminentiore apparet, Naphtam Veterum, * Petroleum L. rubrum constituit: idem sub terra adhuc magis attenuatum, parum tinctum apparens, hodie proprie * Naphta dicitur, tale ad Babylonem reperiri & Veteres & Recentiores afferunt, KÆMPFER KEMPFER illud etiam in Media offendit. Petroleum eo ufque a calore fubterraneo infpiffatum, ut confiftentiam unguenti fpiffioris habeat, * πισσάσφαλτον, Maltham Veterum & L. efformat: ad confiftentiam picis induratum ασφαλτον fupra dictum, illud improprie Gummi dicunt, & cum olim copiofe, unanimi Veterum confenfu, ex Judææ Mari mortuo fuerit extractum Bitumen Judaicum folet appellari, idem adeo induratum, ut polituram admittat, γαγάτης, * Gagates, Jay audit: Petroleum argilla mixtum Lithunthraces L. cum arena aut calcareo Ampelitis L. Mine d'A/phalt, fi exigua in ratione calcareum fubiit, Bitumen Suillum L.

Ex Afphalto NEUMANN destillatione paucifimum phlegmatis & $\frac{3}{4}$ Olei, extractione autem Extracti refinofi $\frac{1}{54}$ obtinuit.

Bituminis varia, quæ hactenus recenfui genera, five aquis innatare obfervantur, five ex terræ vifceribus eruenda funt, & paffim per Europam quoque obtinent. Petroleum non nigrum, quod fi pallidius rubet, *Album* officinæ dicunt, five ex vario bituminis genere destillationis ope obtinetur, five ex Italia sponte inter faxa propullulans, hauritur.

Si ea, quæ fupra de pice dixi, rimamur, nec non quæ circa ortum & destillationem refinarum & oleorum empyreumaticorum iterata in vapores resolutione, attenuatione, Chemia explicat, si his addere placet, quæ cum Ampelite nostrate institui & in Differtatione anno 1758 *Memoires de l' Académie de Berlin* inferta, recensui experimenta, nec non copiosa quas terra nostra passa est fubversiones, & calorem qui in visceribus terræ semper obtinet, & quod nulla alia substantia fossilis, præter bitumina, oleo scateat, plus quam probabilis evadit conjectura, omnia bitumina ex arboribus, coniferis maxime, substantia, substantia, se pro vario, quem experimentar,

Y

calore, pro variis, quæ ipfis admifcentur, fubstantiis, varias quas recensui induere formas.

Sequitur hinc, quod eis optime in Medicina poffimus carere, cum ob varia, quæ ipfis fub terra accrefcere poffunt, heterogenea, femper fufpecta fint, & pice & oleis empyreumaticis, quæ ipfi paramus, eofdem, ob quos laudari folent, effectus poffimus obtinere. HIPPOCRATES Afphaltum ad fuppofitaria & fuffitus adhibuit.

Bituminibus etiam adjungo

* MUMIAM Officinarum, Partes nimirum humanas bitumine conditas, nigras, odore & fapore Afphaltum referentes.

NEUMANN inde obtinuit $\frac{9}{16}$ Extracti refinofi, $\frac{1}{3}$ Extracti aquofi.

Sordidum hoc medicamentum primi Arabes ad ufus medicatos cœperunt adhibere, circa illud fuperfluum effet ad condituram, qua veteres Ægyptii cadavera contra corruptionem defendere tentarunt, attendere, tales enim mumiæ nonnifi in cimeliis affervantur, officinas noftras nunquam intrant; noftræ funt varii generis cadavera Afphalto, Myrrha, Aloe &c. perfufa & clibani calore exficcata, earum vires cum unice ab his condimentis pendeant, eadem autem pro lubitu noftris ægrotis exhibere poffimus, & ita non opus habeamus carnem cadaveris, nefcio quo morbo defuncti, eis devorandam dare, hinc incerto, naufeofo, imo periculofo medicamento prudentes omnino defiftunt.

* Spiritus, * Oleum, * Sal Volatil. Gagatis Parif. * Esfentia Mumia purificans CLAUDER. absurdo medicamento optime caremus.

SUCCINUM, n'Aulgor A'SG, Glesum Veter. German. Carabe & Ambra Arabum, quos Galli sequuntur, Bernstein, Agtstein. Est Bituminis genus, quod in glebis variæ magnitudinis, irregularis figuræ, coloris citrini plus minus profundi, grate odoratis, fumum fuavem exhalantibus, fapore leviter refinofo instructis, pellucidis, non liquandis, ad nos adducitur.

Varia ratione hæc frusta folent distinguere, quo magis pellucent, & quo minus tincta funt, eo reputantur magis pretiosa esse, candida sive falerna pretiosifsima, venduntur præterea eo majori pretio, quo sunt majora, inde quoque varie a mercatoribus denominantur: Tonnenstein reliqua magnitudine vincunt, hæc excipiunt Tamenstein, quæ majora sunt Knæbel, his Firnis magnitudine cedunt, quæ Schlug sequentur, Sandstein superantia; ramenta, quæ decidunt, dum Succinum in varia utensilia tornatur, Rasura nomine veniunt.

Maxima Succini quantitas in Boruffia ad littus Maris Balthici Sudavicum colligitur, & ibi five in collibus arenofis per strata collocatum occurrit, five mari innatans, ex his collibus elutum, propriorum instrumentorum ope piscatur; frusta in collibus reperiunda acervatim congesta deprehenduntur, eorum matricem five lignum bitumine & pyritis refolutis fœtum, five lutum constituit; idem etiam in variis aliis Europæ regionibus interdum repertum effe dicunt, sed interdum etiam substantias colore & foliditate modo ad fuccinum accedentes, ejus nomine compellare folent, * id faltem quod ab India Occidentali, nonnunquam etiam ab Oriente denominant. & quod quibusdam quoque Gummai Look audit, odore, colore magis tincto, fragilitate & analyfi chemica evidenter a Succino vero differt, non male G. Copal adscribendum, cum in Alcohole non diffolvi queat, tefte Cl. DE NEUPORN.

Cum Succinum bitumen fit, hinc in ejus ortum hic non ulterius inquiram, fragrantia, duritie, fubfidentia in aqua, & quod igne liquari fine destructione non possit, cum evidenter a reliquis bituminibus

Y 2

differat, hinc proprium arborum genus oleum, unde furgit, largiri, probabile est, rationem acidi quoque in eodem evidenter majorem esse, experimenta loquuntur. Illud aliquando liquidum fuisse evidenter ex substantiis, quæ ipsi inclusæ deprehenduntur, liquet, quas Veteribus jam notas fuisse, ex TACITO & MARTIALI patet.

NEUMANN fpiritus $\frac{1}{8}$, olei $\frac{3}{4}$, falis $\frac{1}{15}$ inde obtinuit, NEUFORN ex viliori fpiritus $\frac{1}{5}$, olei ultra $\frac{2}{3}$, falis $\frac{1}{34}$, ex puriore autem paulo plus fpiritus, minus olei, $\frac{1}{24}$ falis, ego ex rafura $\frac{1}{8}$ olei & $\frac{1}{60}$ circiter falis. Acidum fuccini, vegetabilis indolis effe Cl. POTT evicit; acidum falis, cujus quoque veftigia in Succino deprehenduntur, ex mari ipfi videtur accreviffe.

Magna, qua Succinum ad morbos capitis maxime & nervorum commendatur, fama, ipfi demum Seculo XVI videtur furrexiffe, eam ulla jufta obfervatione evictam effe, ego non novi & omnino Cel. TRALLES fubfcribo exclamanti, quam immerito pradicatur vis fuccini antifpaſmodica, nervina, cephalica! Veteres illud roborandi ergo duntaxat, & ad catarrhos laudabant; faponi junctum, dum intus adhibetur, ob analogiam bituminum cum refinis, vires abſtergentes & confolidantes forfan edit & hinc ad ulcera interna conducet, fed vel hoc in caſu reſinæ vegetabiles ipſi videntur præferendæ efſe. Ejus ſuſfitus diſcutiendi, roborandi, aërem corrigendi, vim nerveam excitandi ergo cum ſucceſſu adhibetur.

Oleum CROLLIUS multum prædicat, cui quoque BOERHAAVE accedit, mihi nulla obfervatio innotuit, qua proprias præ aliis oleis empyreumaticis vires probaverit: Salis inter primos AGRICOLA meminit, illum BOERHAAVE antihystericorum & diureticorum principem appellat, quo magis depuratum est, eo minus humores exagitat, hinc nunquam, nisi albissimus fuerit, debet in usum trahi, & tanquam sapo

acidus, cui oleum fumme penetrans junctum eft, in folvenda varia humorum spissitudine & referandis obstructionibus cum successure poterit exhiberi. Dosis ad scrupulum dimidium usque potest extendi : Esfentia HELMONT, ea nihil stomacho, intestinis, nervis, imo cerebro gratius effe, HELMONT dicit, quæ BOERHAAVE repetit, & eam præterea ad morbos frigidos multum commendat; spiritum vini partibus refinosis fragrantibus fœtum, vires roborantes habere non dubito, num promiffis Auctorum, quos adduxi, refpondeat, decidat experientia : externe claudendis vulneribus conducit, pro hoc scopo Essentia sine alcali prostat, ea quæ intus dari debet optime ad rationem ab HOFFMANN traditam paratur: * Esfentia Succini GMELIN Liquorem anodynum pro menstruo recipit, reliquis omnino magis ad curandos affectus encephali potens : * Trochifci de Carabe MESUE, varias eorum ingredientium rationes Difpenfatoria præscribunt, secundum Auctorem $\frac{1}{2}$ circiter Opii vehunt, apud Parifinos $\frac{1}{19}$ in circa, ad ductum Wurtemberg. 1/25 absurda compositio, valide quoscunque fluxus sistens : * Syrupus de Karabe Parif. ab Opio potius, quam a pauca, quam recipit, spiritus fuccini quantitate denominandus: * Eleosaccharum Wurtemberg. Ballamum SCHROEDER, minus bene cum cera parari jubetur, temporibus & vertici in affectibus nervinis illinitur : Spiritus falis Ammoniaci succinatus August. melius destillando quam digerendo paratur, eidem jure præfertur * Eau de Luce quæ, fpiritui falis Ammoniaci oleum fuccini commiscendo paratur, fapo ex alcali volatili & oleo valde penetrante compositus, egregios omnino effectus in resolvendis humoribus præbebit & naribus admotus vires refocillabit: Liquor Cornu Cervi succinatus MI-CHAEL est fal ammoniacalis oleo empyreumatico. fœtus, hinc valide humores refolvit & folida stimulat, scopo sudorifero cum successu adhibetur, exulet

Y 3

omnino in affectibus capitis & nervorum fanguineis, Datur ad guttas 20. * Liquor Cornu Cervi fuccinatus albus Wurtemberg. debilior est antecedente, nec rite faturatus : Pilulæ de Succino CRATONIS absurda compositio, cujus basin Aloë constituit : * Pilulæ de fuccino auctæ Wurtemberg. $\frac{1}{4}$ refinæ Jalappæ prioribus adjiciunt, validius hinc catharticæ : * Spiritus Bezoardicus Bussi vid. Sal Ammoniacus.

SULPHUR, Ouior, Soufre, Schwefel. Eft fubstantia folida, cum crepitatione fragilis, proprio odore, minus grato, nares feriens, mediocri calore fundenda, & dum fluit, colorem rubrum præ fe ferens, volatilis, ignem capiens & tunc flamma cærulea, evidenter acidum emittente ardens, per fe aquam non fubiens, in oleis & fpiritu vini folvenda.

Occurrit fulphur I. Nativum 1) in maffis folidis, plus minus coloratis & pellucidis anugor, Vivum, Veterum, Pyrites Nativus L. a) flavum, quale ex America advehitur, in Helvetia ex montibus eruitur, ad montes ignivomos occurrit &) rubrum, quale in Hungaria obtinet. 2) fub forma pulveris flavi, ad aquas Aquifgranenses reperitur. II. Terris immixtum, quæ inde variis coloribus ludunt. III. Cum metallis in formam mineræ concretum, de hoc fuis titulis dicetur. IV. Aquæ immixtum vid. Aqua sulphur. Quod aliis fubstantiis a Natura commixtum occurrit, inde separatur, sive dum mineræ ustulantur & efficitur, ut calore liquatum, in foramen, quo acervus ustulandus pertunditur, confluat, cochlearium ope inde hauriendum, Sulphur stillatitium, Tropfschwefel vulgo dictum, five fubstantias eo prægnantes, ollis vel tubis terreis aut retortis ferreis immittendo & illud in appofita excipula deftillando; hac ratione obtentum depuratur, modis in Institut. Chem. dictis, depuratum in formam cylindraceam cogitur Sulphur fusum Lat. Barb. Commune, Citrinum,

Vivum nostris officinis audit, fordes inde remanentes a recentioribus Scoria Julphuris, Sulphur caballinum vel gryseum dicuntur, interdum etiam, sed valde improprie Vivum.

Sulphur ex acidi vitriolici maxima & principii inflammabilis minima ratione efformari, patet ex Instit. Chem.

Attrahentes fulphuri vires GALENUS adscribit, & illud extus ad morfus animalium venenatorum commendat, nec non ad morbos cutaneos, quos abíque periculo repulfionis curare affirmat, aliter videbatur recentioribus Medicis, qui ab eo materiem acrem falutari Naturæ confilio ad exteriora depositam, ut ad interiora regurgitet, cogi, graviffima mala excitari, monent, & fulphur five nunquam, five faltem nonnifi post multorum evacuantium & fanguinem depurantium usum, cuti scabiosorum inungendum effe : Illustris VOGEL Veterum auctoritate & ex natura fulphuris, illud ab omni vi repellente immune effe, egregie evincit, & noxas quas ab ejus ufu excitatas observarunt, siquidem medicamento debentur, potius a vehiculo pingui, poros obstruente, & hinc perspirationem supprimente, quam a sulphure effe repetendas : ejusdem accensi fumum, qui ad corrigendum aërem exhalationibus alcalinis corruptum, commendant, non meminerunt, idem obtineri poffe per fuffitus minus naufeofos & pectori minus inimicos; eundem fumum ad morbos pulmonum commendantes, craffiffimam Chemiæ ignorantiam produnt.

Sed etiam ab omni tempore fulphur intus cum fucceffu fuit datum, DIOSCORIDES illud ad ulcera pulmonum commendat, & eum vix non omnium Seculorum Medici fequuntur; refolvendo, abstergendo, folidando dicitur agere & ex ejus cum refinis vegetabilibus convenientia illustratur. Ex eo, quod illi, qui fulphur affumferunt, illud evidenter oleant,

Y 4

GEOFFROI, ROSEEN & Cel. BALDINGER annotantibus, & quod aurum vel argentum, quæ gestant, nigro colore obducantur, evidens eft, illud intus fumtum ad inferiores vaforum ordines penetrare, cum fuccesfu hinc ad promovendam transpirationem datur & in morbis arthriticis egregios effectus edidisfe dicitar, inde quoque ejus virtutes ad morbos cutaneos videntur pendere, quos Illustris PRINGLE & ROSEEN observationibus confirmant : a vi ejus refolvente derivandus ejus effectus in alvum ducendam & referanda vifcera abdominalia a WERLHOFF observatus; Cl. VAN DOEVEREN tæniam inde curatam adducit. Regulum Antimonii & Mercurium inde cicurari, notiffimum eft, quod autem idem quoque obtineat, quando ipfis in corpus ingeftis fuperingeritur, ego faltem multum dubito, cum fola natura fulphur cum regulo Antimonii ita miscere noverit, ut istius vis emetica fuspendatur, neque exactiffima mercurii cum fulphure trituratio & adhuc minus fublimatio in corpore nostro locum habeat, & si vera funt, quæ QUELMALZ de Hydrargyri viribus a fulphure fufpenfis allegat exempla, illa a vi diaphoretica fulphuris, actionem hydrargyri ad cutim determinante, erunt deducenda. Intus si fulphur datur, semper ejus Flores, qui illud purifimum fiftunt, funt exhibendi; præscribitur ad drachmam dimidiam.

* Sulphur Lotum Parif. * Cremor Sulphuris Parif. Vtrique optime flores fulphuris fubftituuntur: Flores vid. Inft. Chem. * Flores Sulphuris compositi JUNG-KEN inconcinna compositio : Magisterium five Lac Sulphuris, Balsamum Sulphuris Anisatum vid. Institut. Chem. * Balsamum Sulphuris Amygdalatum Wurtemberg. Balsamum Sulphuris Rulandi fimpliciter cum oleo nucum parant & inde denominant Parifini Nostrates, præeunte SCHROEDER, vinum & acetum adjiciunt, Wurtembergenses SCHINDLERUM sequen-

344

tur, & folutioni fulphuris in oleo Lini, oleum Terebinthinæ addunt, ad hæmorrhoides externas maxime adhibetur. * Balf. Sulph. Terebinth. * Spiritus vid. Instit. Chem. * Oleum vid. Instit. Chem. Sal Polychreftus vid. Instit. Chem. * Unguentum ad Scabiem Parif. 1 circiter Sulphuris habet: Unguentum Bernhardinum August. 1/2 Sulphuris recipit: * Tabella de Sulphure Parif. * Tabella de Sulphure composita Paris. Utræque ad affectus pectoris apprime faciunt : Æthiops mineralis vid. Inft. Chem. Cinnabaris vid. Inftit. Chem. * Emplastrum Diasulphuris RULAND. Wurtembergenfes propius SCHROEDER sequentur, rationem balfami fulphuris & myrrhæ Nostrates imminuerunt, in ulcere scrophulofo, maligno, egregios inde effectus Cl. PLENK vidit. * Tinctura Sulphuris BEGUIN. * Hepar. * Syrupus Sulphuris Wurtemb. eft Arcanum Becchicum WILLIS.

\$. 29.

IV. FRAGRANTIA.

Corpora validiore, & qui non ingratus eft, odore inftructa & fubitaneo effectu & valde evidenter vires lapfas reftituunt, ut copiofis ex obfervationibus, quarum plures Ill. HALLER collegit, manifeftum eft; exinde quod corpora multum odora in nervos omnino molles & pia modo matre veftitos agunt, quod adeo evidenter in fenforium commune operantur, & quod adeo celer eorum eft effectus, ut nequaquam illo tempore, quod eorum applicationem & operationem intercedit, per vulgares circulationis vias ad encephalum pervenire potuerint, valde probabilis evadit conjectura, fubtiliffimas, quæ olfactum afficiunt, partes, immediate a nervis reforberi, fenforio communi adduci, & ibi, pro fua, nunquam forfan determi-

5

nanda natura, influxum fluidi nervei in fibras musculares five intendere, five fupprimere; prius fuaveolentia, alterum graveolentia præstare, docuit experientia. Hæc remedia Recentiores avaléeduma appellare folent, qua voce Veteres nutrimenta, quibus a morbis convalescentibus vires restituuntur, indigitabant, sed alias quoque substantias analepticis adscribere folent, sequente sectione dicendas.

\$. 30.

Exhibentur præcipue fragrantia, ubi vires multum deficientes subitanea refectione opus habent, cum autem id, quod fubministrant, fubtile valde fit & cito diffipetur, hinc vires inde restitutæ per paucum modo temporis momentum vigent, & hæc medicamenta creberrime palliativæ potius, quam reliquis indicationibus inferviunt. Cum ea vim nerveam augeant, quæ autem excedens omne genus spafmorum & dolorum producat, eadem etiam evidenter fenforium commune afficiant, hinc evidens fit, quantæ noxæ ab iifdem præpostere, five in nimia quantitate exhibitis poffint excitari, vix non omnes Obfervatores tales casus sistent, plures Celeberrimi TRILLER & TRALLES collegerunt. A vi nervea cum erectionem penis pendere vulgaris inter Medicos recepta opinio statuat, hinc suaveolentia etiam Aphrodifiacis folent adfcribere.

a. VEGETABILIA.

Aromata omnia, Fructus horæi fuaveolentes, Refinæ fragrantes.

PRIMULA VERIS, Paralysis Lat. Barb. la Prime vere, Schlüsselblumen, Himmelsschlüsslein. Flores in-

346

fundibuliformes, flavi, fuavi odore, etiam cum exficcati fuerint, inftructi & fapore dulciufculo.

PRIMULA. Corollam habet infundibuliformem, quinquefidam, calice quinquangulari fuftentatam, ifantheram, monogynam, capfulam in qua multa femina proprio receptaculo affixa hærent: *Veris officinalis* L. BLACWELL 226. foliis rugofis, dentatis, umbella magis cernua, limbo corollarum concavo & floribus minoribus, faturatius flavis dignofcitur.

Crefcit in omni Europa.

Extracti aquosi ultra $\frac{1}{4}$ & $\frac{1}{6}$ fere Extracti spirituosi inde obtinuit CARTHEUSER.

Ob gratum, quo scatent, odorem ad infusa cephalica hi flores præscribuntur, propriis quod polleant viribus, nullæ succurrunt observationes.

Aqua destillata VAL. CORD. Prouti vulgo prostat vix aliquid proprii habet: * Conserva VAL. CORD. * Syrupus August.

* RHODIUM LIGNUM Recent. Bois des Roses, Rosenholz: prostant hoc nomine frusta variæ longitudinis & crassitiei, sub cortice gryseo, non raro rugoso, substantiam lignosam, albam, rubris & stavis tæniis percursam includunt, Rosarum odore instructa, varie torta & ramosa: quo magis colorata sunt & odorata eo præstantiora.

GENISTA. Corolla gaudet papilionacea, carina reliquis petalis majore, vexillo toto reflexo, calice bilabiato fustentata, legumine fubrotundo, turgido: Canariensis L. folia ternata, tomentosa & ramos angulatos habet.

Rariffime & nonnifi ad fuffitus in officinis ufurpatur.

Innotuit demum Seculo XV. ex Antillis & Canarienfibus infulis adducitur.

 $\frac{1}{50}$ Olei odorati largitur, fpiritus vini inde abstractus vix olet, Extractum refinofum fuaveolens eft, aquofum leviffime amarum. LEWIS $\frac{1}{32}$ ufque Olei odorati, $\frac{3}{8}$ Extracti fpirituofi, $\frac{1}{4}$ aquofi. CARTHEU-SER, CHAMBERS & NEUMANN ex largiore ligni quantitate vix vestigium Olei odorati potuerunt separare, his & mea experimenta accedunt, ultimus Extracti spirituofi $\frac{1}{8}$, aquofi ultra $\frac{1}{10}$ inde obtinuit.

Oleum destillatum Hamburg. femper multo oleo unguinofo adulteratum proftat, ad $\frac{4}{5}$ ejus NEU-MANN inde feparavit: * Aqua destillata multum gratiæ habet.

ROSARUM FLORES vid. Adstringentia.

TILIA, ¢iλuga, Tilleul, Linde. Ejus Flores flavicant & infident pedunculo trifido, qui ex nervo intermedio, proprii foliorum generis oblongi, obtufi, integerrimi prodit, recentes, fragrantiffimo odore gaudent, qui ab exficcatis abest, aquam flavicante colore & falino fapore inficiunt.

TILIA. Corolla pentapetala, calice quinquepartito fustentata, polyanthera, monogyna & capfula quinqueloculari gaudet: Europaa L. BLACWELL 469. defectu nectarii distinguitur.

Crefcit per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem.

Arbor Veteribus notiffima, XVI feculo demum ad ufus medicatos cœpit recipi & multum ad convulfiones laudari, flores exficcati, inodori, quomodo debeant in nervos agere, ego faltem non poffum hariolari. Num epilepfia chronica, quam HOFFMANN inde curatam refert, revera ab infuío horum florum fuit fugata?

Aqua destillata VAL, CORD. iners omnino : * Conferva VAL. CORD.

TUNICA Lat Barb. Oeillet, Nelcke, Grasblume. Ejus Florum petala (recipiuntur, ovata, inferne in unguem angustata, saturate rubra, gratum, qui caryophyllos redolet, odorem fpirantia, fapore dulci inftructa.

DIANTHUS. Corolla gaudet pentapetala, regulari, calice quinquefido, cui inferne fquammæ accedunt, inftructa, diplofanthera, digyna, capfula polypyrena: Caryophyllus L. BLACWELL 81 flores fubfolitarios, fquammas calicinas, fubovatas, breviores habet.

Crefcit in Europa Meridionali, cultura innumeras inde varietates produxit.

Evicit RUELLIUS quod nequaquam Sids and Gu

Aqua inde fuaveolens deftillat, fed nullum Oleum odoratum ab ea poteft feparari, Extractum aquofum leviffimum, refinofum gratiffimum odorem fpirat. LEWIS. Extracti aquofi ultra $\frac{1}{4}$, fpirituofi $\frac{1}{6}$ CAR-THEUSER.

Rariffime flores præscribuntur, quippe qui exficcati vix odori funt.

Aqua destillata SCHROEDER. scopo analeptico & antispassinodico crebro præscribitur, prouti vulgo prostat iners omnino: Syrupus SCHROEDER ad eosdem ac aqua usus adhibetur, utique efficacior: * Acetum QUERCETAN. * Conserva SCHROEDER.

VIOLA, idv, Violette, Viole. Ejus Folia, Flores & Semina in officinis occurrunt.

* Folia Violaria Barb. cordata funt glabra, longis petiolis nixa.

Flores affervantur calycibus inclusi, cærulei, surulei, fuavissime olentes, sapore dulci instructi.

Semina parva funt, rotunda, alba, medullam albam condentia.

VIOLA. Corollam pentapetalam irregularem, calice irregulari fustentatam, isantheram, monogynam habet : Odorata L. BLACWELL 17. habitu acauli & foliis cordatis agnoscitur. Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Folia GALENUS refrigerandi ergo commendat, labente ævo emollientibus adfcribebantur, hodie raro in ufum trahuntur. Flores, qui melius fubito clibani calore exficcantur, quam quod in umbra diu aëris actioni relinquantur, & ita tam colore quam odore priventur, demum inter Latino-Barbaros frequentius in ufum fuerunt tracti, eorum, prouti in officinis proftant, vires analepticæ non magnæ videntur effe, cum relaxent & demulceant, hinc, notante jam DIOSCORIDE, ad morbos pectoris adhibentur, eofdem viribus alvum ducentibus pollere, Arabes annotarunt & PECHLIN iteratis experimentis probavit, adfcribuntur floribus cordialibus. Seminum vires diureticas, circa quas SCHOLZ & S. PAULI obfervationes adducunt, experientia non confirmavit.

* Aqua destillata VAL. CORD. * Conferva five Zuccara violata MESUE: Syrupus minus bene a MESUE fub nomine Julepi descriptus, ad morbos pectoris crebro exhibetur, & gratiæ ergo formulis adjicitur. * Syrupus Solutivus Wurtemb. vires catharticas a foliis fennæ maximæ habet: Julepus Honesti fuas vires faccharo debet: * Oleum per Infusionem, ialor, ÆGINETÆ nihil proprii habet: * Mel MESUE eviluit: Emulsio Violata MYNSICHT præ aliis emulsionibus vix aliquid proprii videtur habere.

B. ANIMALIA.

CHERMES Arab. xóxxos, Cocci Veterib. Folliculi qui piforum magnitudinem habent, unde inferne aliqua portio refecta fuisse videtur, rotundi, splendentes, intus, grana minima sub forma pulveris sive sanguinei sive flavicantis includentes, ex rubro sufci, sapore leviter adstringente & amaricante, odore levissimo instructi. Coccus. Infectum quatuor alis, fuperioribus femicrustaceis, rostro pectorali, abdomine postice setoso, feminis apteris gaudet: *Ilicis* L. habitat in Quercu Coccigera L. soliis ovatis, indivisis, spinoso dentatis, glabris distincta, Europæ Meridionalis cive. Insecta in Aquitania & Gallo-Provincia occurrentis, reliquis præstant.

Folliculi, qui in usum trahuntur, funt exuviæ femellarum, quæ Martio mense femine milii non majores, axillis foliorum, & divisionibus ramorum accrescunt; Majo autem sua ova excludunt, succo rubro turgentia, eis exclusis moriuntur & siccescunt; hi folliculi unguibus a frutice derasi, in cubiculo, aëri libero pervio, exponuntur, & aceto, ut ovulorum exclusio impediatur, consperguntur, ne incalescant, linteis, ut exsiccentur expositi, aliquoties de die debent versari, fed ita non potest non fieri, quin multum ovulorum, quæ continent, inde excutiatur, id ipsum, cribri ope, a folliculis separatum, digitis, in pastillos efformatur, qui * Pastel d'Ecarlate se serains dicuntur.

Hæc infecta, cum facile a paulo majore frigore lædantur, hinc pro varia quæ meffem antecedit hyeme, illa five largior five mediocris folet effe.

Extracti aquofi falini $\frac{1}{2}$ inde obtinui. CARTHEU-SER Extracti aquofi $\frac{1}{3}$, totidem fere fpirituofi.

Roborandi ergo a GALENO laudantur, primi Arabes ipfis vires cordiales adfcripferunt, in alvi fluxibus, hæmorrhagiis & ad præcavendum abortum præfcribuntur ad dimidiam drachmam ufque, fed fateor, me parum virium ab exficcatis exuviis expectare, efficacior eft omnino.

Succus, qui in Gallia Meridionali ex recentibus folliculis exprimitur, per fubfidentiam depuratur & pari facchari quantitate ipfi adjecta, contra corruptionem defenditur & per orbem divenditur : huic fucco $\frac{1}{3}$ facchari adjiciendo Noftrates Syrupum Granorum Chermes parans, Wurtemberg. multo majorem rationem facchari, Coccionellam quoque & Rofarum & Cinnamomi aquas addunt : Confectio Alchermes MESUE correctam primi Monfpelienfes confecerunt ; BAR-THOLINUS inter primos Mofchum & Ambram, feminarum ergo, juffit inde exulare, hinc hodie completa & incompleta proftat. Noftratium præfcriptio fimplicior quam aliorum, hinc magis placet, licet nec ipfa omni numero abfoluta fit ; polychreftum medicamentum analepticum, quod ad drachmam dimidiam pro dofi exhibetur: Trochifci Alkermes Auguft.

MOSCHUS, Musc, Bisam, Pulverem ex parvis granulis conftantem refert, ferrugineo gaudet colore, fapore amaro, odore proprio fortissimo, inflammabilis, mox nudus, mox vesiculis inclusus ad nos adducitur, quæ pilis rigidis obsidentur, hi si albi fuerint, vesiculæ a Russi denominantur, si badii Chinenses & Tunquinenses appellantur.

Tanguticus & Sinenfis reliquos multum odore fuperant.

Probatur Moschus, quod ferro candenti impositus, flammam capiat & vix non totus confumatur.

 $T_{RAGULUS}$ dentibus inciforiis in maxilla fuperiore nullis & defectu cornuum agnofcitur: *Mofchus* BRISson, *Mofchus Mofchifer* L. dentibus caninis ex maxilla fuperiore extra os prominulis, & ventris parte, quæ in aliis penem educit, in tumorem prominula diftinguitur.

In Tataria, Sibiria & China occurrit.

Est autem nostra substantia sebi genus, quod in proprium solliculum colligitur, unde tumor inter umbilicum & testiculos efformatur, duplici foramine extra corpus hians, sibris muscularibus tectus, & membrana firma efformatus.

Ab

Ab alcohole omni fua fragrantia privatur, quod tamen non multum odoris inde recipere videtur, aqua a Moscho abstracta, multum odorata evadit, secus spiritus vini. LEWIS. Extracti aquosi $\frac{2}{5}$, spirituosi $\frac{1}{3}$ largitur NEUMANN.

Gentes Orientales, quibus odorifera multum placent, a longo retro tempore Mofcho utebantur: DIOSCORIDES in Europift. ejus mentionem fecit, Arabes & fequioris ævi Medici illum valde laudarunt, fed nulla certa obfervatione de ejus viribus medicatis conftabat; recentioribus demum temporibus infignes ejus in curatione morborum convulfivorum, deliriorum, maniæ, podagræ retrogradæ, morfus canis rabidi, vires per WALL, PARSON, OWEN, Illuftris PRINGLE, HAARTMANN, GALEATI, ZANETTI, VAN ŚWIETEN, Cl. MEDICI, SEBASTIANI, MORGENSTERN &c. experientias innotuerunt: MASSE epilepfiam inde vidit curatam; Mofcho collo appenfo, contra contagium variolaceum infantes Ill. LINNÆUS defendit.

Datur a decem granis ad triginta ulque, femper aliquo fapone mixtus. Feminæ & hypochondriaci ejus odore non raro offici folent.

* ZIBETHUM Lat. Barbar. Civette, Zibet. Eft fubftantia, quæ confiftentiam unguenti vel axungiæ habet, odore fortiffimo, proprio, colore albido gaudet, is quo magis ad brunum accedit, eo vilius reputatur unguen effe.

Duplex animalium genus hoc unguen largiri Illustr. BUFFON & D'AUBENTON annotarunt, unum Zibet est Viverra Zibetta L. Meles Zivetta BRISSON. Asix proprium: alterum Civette sex dentes incifores in utraque maxilla habent, digitos ad omnem pedem quinque, distinctos, unguibus parvis & debilibus instructos: hoc ab altero fronte eminente, auriculis minoribus, dorso setos, & pollice a reliquis digitis remotiore distinguitur.

Z

Per Afiam & Africam multis in locis occurrunt.

Unguen continetur in duobus receptaculis, in communem truncum hiantibus, qui proprio foramine inter orificia fexus & ani hiant, tecta funt folliculis, qui finguli unguen fecernunt & in receptaculum plorant, unde cochlearis ope, bis vel ter per feptimanam, hauritur.

Multum unguinis olim ex animalibus, quæ in Belgio alebantur defumtum fuit, illa cum multis retro annis perierint, hinc hodie zibethum infigni valde pretio venditur.

Nec ab aqua, faponibus quoque mixtum, necin alcohole fe diffolvi patitur, utrique tamen menstruo suum odorem affricat.

Medio ævo in Europa innotuisse videtur; interne nunquam datur: externe varis medicamentis, odoris ergo adjicitur; quem exigua ejus ratio, in modum Ambræ & Moschi, per largum materiæ, cui additur, volumen diffundit.

§. 30.

V. SPECIFICA.

Huc illa medicamenta refero, quæ vulgaris opinio analepticis & roborantibus adfcribit, etfi ea tales vires poffidere, nec ex eorum odore, nec fapore fufpicari licet. Virtutes roborantes de ipfis prædicatas, cum nulla fida obfervatio probaverit, hinc ea, hunc in finem modo allego, ut occafio nafcatur monendi, nullum robur inde exfpectandum effe, & ne corpora multum diu laudata, neglexiffe videar, ut denique quid proprie inde fit exfpectandum, exponam.

«. VEGETABILIA.

BORRAGO Barb. Bourage, Boretsch. Folia & Flores inde recipimus. Folia funt ovato-oblonga, pilis hirfutis afpera, odoris & faporis expertia.

Flores funt rotati, in quinque lacinias secti, cærulei, nec sapidi, nec odori.

BORRAGO. Corollam rotatam, quinquefidam, quinque eminentiis notatam, ifantheram, monogynam, calice quinquefido fustentatam habet, in quo femina rugofa, ex basi lata in mucronem acutum terminata, maturantur: Officinalis L. BLACWELL 36. foliis ovatis, alternis distinguitur.

- Ex Aleppo olim in hortos Europæos delata, hodie in illis colitur, & ad eos quoque sponte provenit.

Ex fucco foliorum nitrum & falem communem obtinuerunt BOULDUC & MARGGRAFF, fed alibi notavi, hæc falia plantis non propria, ex folo, cui innafcebatur, eas fubiiffe.

Cum fub renatis in Europa litteris hanc plantam Bugloffum Veterum effe reputarint, hinc lætificantes ipfi adfcripferunt vires; folia, nefcio cur, refrigerantibus annumerabantur, & cum nitrum fovere Chemici afferuerint, majori quoque cum veri fpecie id affirmari poffe credebatur; fed nulla mihi faltem innotuit obfervatio, quæ vel florum vel foliorum virtutem confirmaverit. Flores, ornatus ergo acetariis adjiciuntur. Folia jufculis vernalibus.

Aqua destillata NICOL. PRÆPOS. * Syrupus VAL. CORD. a Wurtemberg. ex floribus, a Parifinis ex fucco paratur: * Conserva VAL. CORD.

BUGLOSSUM, Bizzawroor, Buglosse, Ochsenzunge. Folia & Flores recipiuntur.

* Folia funt oblonga, angusta, in acutum mucronem terminantur, hirfuta, odoris & faporis expertia.

Flores parvi, inodori, infipidi, infundibuliformes.

ANCHUSA. Corollam infundibuliformem habet, quinquefidam, quinque appendiculis claufam, calice quinquefido fustentatam, ifantheram, monogynam,

Z 2

femina gibbofa in calice maturantur: Officinalis L. BLACWELL 500. Foliis lanceolatis, hirfutis & fpicis imbricatis agnofcitur.

GALENUS, communi Veterum confenfu, hilaritatem inde excitari afferit, illud ad tuffim quoque commendat. Eadem de hoc ac de antecedente notanda funt.

Aqua destillata VAL. CORD. * Syrupus VAL. CORD. ut antecedens parari jubetur : * Conserva MESUE.

* NINSING Japonenfium, Ginsem, Ginsing Chinensium: Est Radix quæ calami craffitiem habet, leviter rugosa, cornu colore & pelluciditate refert; odorem nullum, saporem levissime dulcem possidet.

SIUM. Flores umbellatos habet, involucro utroque instructos, semina subovata & striata: Ninsi L. BLACWELL 514. soliis caulinis pinnatis, racemis ternatis distinguitur.

Crefcit in Corea ad Chinam Septentrionalem & in Japan.

Cum hæc radix inferne bifurcetur, illam inter & hominem, fimilitudinem quandam intercedere ftatuerunt, huxurians Chinenfium phantafia finxit ejus ope calidum innatum, vitæ fontem, fi languerit inde fuftentari & refufcitari poffe, fumma igitur apud ipfos in exiftimatione eft; Europæi fibi a Chinenfibus imponi paffi funt, has-radices ad nos adduxerunt & Medicos repererunt, qui eas tanquam certiffimum mortis antidotum confiderarunt, & non obftante cariffimo pretio, uncia quippe centum & quinquaginta florenis Amftelodami venditur, ægrotis exhibuerunt, fed vel ullum earum ope morti ereptum fuiffe, ego faltem non novi.

Anno 1718 LAFITAU Pater Jesuita se in Canada radicem reperisse publicavit, eandem cum Ninsin, est hæc radix illa Chinensium crassione & magis rugosa, eidem aliquid russi accedit, nec pelluciditatem habet, id quod a diversa exsiccationis ratione videtur pendere; faporem ejus primum dulcem, alius, qui evidenter linguam ferit, folet excipere, hanc feplafiarii hodie fub nomine *Radicis Ginfeng* folent, & quidem multo minori pretio, quam antecedentem, vendere.

Defumitur a PANACE, floribus umbellatis, involucro utroque instructis & baccas excludentibus, gaudente: Quinquefolio L. BLACWELL 513, Canadæ & Virginiæ cive.

Ab hac radice, æque ac ab illa aliquid proprii ut expectemus, nec ratio nec experientia permittunt; Orientalis ad aliquot grana, Canadenfis ad drachmam dimidiam datur.

B. ANIMALIA.

* ÆGAGROPILÆ Recent. Gemsen - Kuglen. Sunt pilæ variæ magnitudinis, pugnum usque æquantes & variæ figuræ, a recrementis variarum plantarum efformatæ, quæ involucrum tenax & folidum quod interdum partes calculofas recipit, obduxit, coloris fusci vel nigri, odoris leviter aromatici, qualis etiam fapor est, cui aliquid adstringentis accedit.

Reperiuntur in primo aut fecundo ventriculo Capræ Rubricapræ L. cornubus teretibus, rugofis & uncinatis diftinctæ, ad altiorum Alpium Gallicarum, Helveticarum & Carpaticarum vertices habitantis.

Hæ pilæ Seculo XVI fub nomine Lapid. Bezoar. notæ erant, primus WELSCH ipfis nomen, quod nunc habent, dedit.

A concrementis morbofis, formatis ex plantis unde vires digeftionis omnia principia efficacia extraxerunt, ope liquorum ventriculi animalis, lapides multum lingentis, conglutinatis & crufta obductis, nullas omnino vires medicatas poffumus expectare. Auctoritas lapidibus ex animalibus defumtis attributa, figmentum quod concentratas Alpeftrium plantarum vires poffideant, & conjectura de rupicabris inde nulla vertigine laborantibus; hæc concrementa capiti opitulari Medicis perfuafit, meliora hodie edocti, medicamentum iners omnino missum facimus, facile curationes a WELSCHIO inde observatas plane aliis rationibus adscribendas esse perspicientes.

BEZOAR LAPIS Lat. Barb. Arabicæ originis vox, quæ apud Arabes Bedezahar, Bezarahat, Bezaar &c. fcribitur, vario fignificatu apud Auctores occurrit, five latiffimo, pro omni medicamento, quod veneno refiftit, & hoc in fenfu Arabibus ufu venit, five latiore, pro omni calculo animali, effectus medicatos edente, qui Seculo XVI obtinuiffe videtur, & hic præter mox dicendam & Lapidem Hyftricis, illum qui ex vacca marina ad Coromandel defumitur, Crocodilinum, quem Caimanum dicunt, & calculum Simiæ comprehendit, five ftricto, quo Arabes proprium quendam lapidem foffilem, inter nos hodie ignoratum, indigitarunt, five ftrictiffimo, præeunte VILLANOVANO, lapidem proprium ex proprio animali obtinendum

Hodie duplex ejus genus in officinis affervatur Orientale & Occidentale.

* Bezoar Orientalis. Variam figuram & variam magnitudinem habet, & pro hac crefcente etiam ejus pretium crefcit, fuperficies ejus lævis eft, polita, fplendens, color nigricat cum aliquo admixto virore, ex ftratis fibi invicem incumbentibus efformatur, quorum intimum cavitatem includit, cui ut plurimum aliqua fubftantia heterogenea inhæret, cum acidis non effervefcit, faporis & odoris expers eft.

* Bezoar Occidentalis. Sub diversifimis figuris & variante multum magnitudine occurrit, evidenter quoque ex stratis compositus, nec splendens, nec politus, cum acidis non effervescit, colorem cinereum plus minus dilutum habet, cui non raro aliquid nigri accedit, nec sapidus, nec odorus. Primum dicunt defumi ex Capra Bezoardica L. quæ cornibus erectis, ab imo ad fummum fere annulatis & gula jubata diftinguitur, in Perfia occurrente.

Alter cum nihil habeat, quo differat a calculis, qui in animalibus ut plurimum obtinent, hinc qui ipfi adfcribuntur lapides ex vario brutorum genere videntur defumi, id quod etiam ACOSTA teftatur.

Nec aqua nec fpiritus vini aliquid ex Orientali recipiunt fecundum NEUMANN, qui inde $\frac{7}{12}$ liquoris empyreumatici, nequaquam urinofi, $\frac{1}{40}$ fublimati flavi, falini, empyreuma olentis, $\frac{1}{120}$ fuliginis obtinuit; ex Occidentali autem liquoris empyreumatici urinofi $\frac{1}{5}$ fere, & aliquot guttas olei empyreumatici.

Utrumque concrementum morbofum, ratione, quæ in Pathologia explicatur, furgit; pabulo proprio Capræ bezoardicæ videtur adfcribendum effe, quod ipfius calculus fuperficiem splendentem habeat. Plures qui fub nomine Bezoar Orientalis prostant calculos factitios effe lubenter largior, fed argumenta a NEUMANN adducta, nequaquam mihi perfuadent, omnes qui occurrunt arte factos effe, nullum ex animali defumtum, genuinum occurrere, quomodo autem nativi debeant agnofci, non audeo determinare, cum NEUMANN egregie insufficientiam omnium, quæ vulgo huc facere dicuntur, tentaminum evicerit, fi id quod Veteres allegarunt criterium in ullo reperire poffem, quod nempe animali cui venenum exhibitum fuit, & morti proximo propinatus, vitam reddat, ille mihi vel adamante effet pretiofior.

Cum Pathologia demonstret, calculos quoscunque animales a partibus terrestribus maxime efformari, frustra & ab his calculis aliquid medicati expectari patet; falsæ hypotheses de talibus lapidibus concentratas vires herbarum, quibus animalia pascuntur, possidentibus, de præstantia medicamentorum ex animalibus defumtorum, absurda opinio, corpora quæ

fu

magno pretio venduntur, etiam magnas in corpus humanum vires editura effe, mercium cariorum, quæftus ergo, multa commendatio, omnis generis hiftoriolis fuffulta, auctoritas Medicorum qui talibus fe falli paffi funt, medentium ardor fpecifica ad morbos curatu difficiles reperiundi, in caufa fuerunt, ut inertia hæc medicamenta, fine ulla fuffragante experientia, quis enim fidem adhibebit a C. BAUHINO collectis obfervationibus ? tanquam analeptica, cardiaca, antidota, cephalica &c. fuerint commendata,

Qui eis uti volunt, fecure dosin etiam ultra drachmam dimidiam possunt extendere.

* Bezoar de Goa BATEI fi quas vires habet, eas moscho & ambræ debet.

CORALLIA, "Beadia, Rogadia, Rugadia, hoc nomine veniunt duo genera zoophytorum, Rubrum nimirum & Album.

Rubrum substantiam lapideam refert, in plures ramos divisam, nullis foraminibus pertusam, colore rubro infignitam, faporis expertem.

* Album præter colorem etiam eo ab antecedente differt, quod copiofisfimis foraminulis hiet, quæ stellæ figuram habent.

Corallia dum per aliquod tempus extra mare affervantur, extima eorum membrana, quæ cortex dicitur, reliquo corpori accrefcit, ea ut Lævis & splendens evadat, pumice lævigatur.

Corallium rubrum est *Isis* polypus, polycephalus, stirpi lapideæ rigidæ inhærens: *Nobilis* L. BLACWELL 341. stirpe continua æquali, & ramis vagis distingutur.

Nullibi nifi in Mari Mediteraneo occurrit.

Officinæ nonnifi fragmenta minima & graciliora recipiunt, majora lapidariis & curiofis relinquuntur.

Calcarei omnes qualitates habet, igne quoque in optimam calcem vivam abit, LEWIS. Spiritus urinosi ultra $\frac{1}{64}$, vestigium olei empyreumatici destillatione fundunt. NEUMANN.

Multi licet Auctores ab omni tempore fuerint in extollendis laudibus Coralliorum, nulla tamen proftat fida obfervatio, quod præ aliis fubftantiis animalibus terreftribus aliquid proprii habeant, principium martiale, quod in illis obtinere ajunt, & a quo vires adftringentes derivant, experimentis demonftrari nequit, præter abforbentes itaque nullas alias inde expectamus virtutes.

* Tinctura Corallorum a PARACELSO præcipue celebrata, evicit fanior Chemia, quod ad Veterum Alchymicorum fomnia pertineat, quæ fumivendulum hoc hominis genus circa tincturas in univerfum & illam Corallorum in specie effinxerat; omnes quæ hodie prostant de Coralliis plane nihil recipiunt, omnes qualitates, quas habent, aliis, quæ Coralliis adjiciuntur, substantiis debent. Parisini, præeunte QUERCETANO, spiritum vini adhibent fucco Berberum dilutum, Wurtembergenses ad mentem KUHNRADT spiritum vini, aceti inspissati magmate tinctum, præscribunt: * Sal Corallorum: Solutio Corallorum SCHROEDER. ad indolem terræ foliatæ Tartari accedit, eadem omnino inferior: * Magisterium SCHROEDER. vix non totum iners : Syrupus Corallorum SCHROEDER præ Syrupo Berberum nihil proprii habet, eodem quoque inferior, cum Corallia ejus acidum imminuerint, Parifini fuccum Granorum Chermes adjiciunt : * Tabella Parifin.

Corallium album, est *MADREFORA*, polypus polycephalus qui stirpi lapideæ, stellis lamelloso-striatis ornatæ inhæret : *Oculata* L. BLACWELL 342, 343. habitu ramosissimo, ramis stexuosis & stellis immersis distincta.

Copiofe in Oceano Indico occurrit.

ZS

Aliarum etiam Madreporæ specierum fragmenta, in officinis sub nomine Corallii albi prostare, observavit Cl. PALLAS.

Ratione virium cum Corallio rubro convenit.

MARGARITE, Uniones, µagyagitai, Perla Barb. funt corpuscula plus minus rotunda & splendentia, alba, ex squammis sibi invicem incumbentibus efformata, odoris & saporis expertia.

Estimantur Margaritæ ab albedine, splendore & volumine, ut pro hujus crescente ratione pretium multiplicetur, prægrandes decem ceratiorum, quæ singula quatuor granis æquantur, pondus excedentes Paragon dicuntur, tribus granis non leviores Coronariæ, Perles de compte, Zahlperlen appellantur, minores Textiles, Lothperlen, Saatperlen, Perles à Ponce, Semence de Perles vocantur, illæ autem, quarum figura irregularis est, Baroques; minus splendentes denique, colorem lacteum habentes & superficiem irregulariter in tubera elevatam, Occidentales dicuntur, cum prioribus Orientalium nomen imponant.

Substantiæ quæ in conchis eam rationem habere videntur, quam lapides in cancris, in vario concharum genere folent occurrere, præcipue autem in *Mrrico* testa bivalvi, cardine edentulo, quem linea longitudinalis distinguit, gaudente: *Margaritifero* L. cujus testa compresso-plana, suborbiculata est, semi auriculata, rugis undatis distincta.

Occurrit in magna profunditate Oceani Orientalis, Sinus Perfici & Maris Auftralis, unde ab Aprili menfe ad Octobrim ufque, reliquo enim anno, nullas margaritas habet, per urinatores pifcatur.

Margaritæ Occidentales, quas paffim fluvii Europæ exhibent, occurrunt in $Mr_{\mathcal{A}}$ cujus teftæ bivalvis altera extremitas hiat, cardo dente crasso, alteri testæ non inserto gaudet: Margaritisera L. testa antice coarctata, cardinis dente primario conico distincta. Testa Mytuli Margaritiferi Mater Perlarum, Nacre de Perle dicitur: variæ magnitudinis specimina inde prostant, quæ extus grysea ad flavedinem vergunt, intus splendore argenteo nitent.

Margaritæ $\frac{1}{17}$ liquoris urinofi & aliquid Olei empyreumatici fundunt, Mater perlarum $\frac{1}{24}$ liquoris urinofi & exiguam Olei empyreumatici rationem dimittit. NEUMANN.

Primi Arabes margaritas in usum traxerunt & ex co, quod magno pretio veniunt, magnas quoque vires fibi funt polliciti, iifque cephalicas, cordiales, & venenis refistentes virtutes adscripferunt; fimiles etiam a Matre perlarum exspectarunt, fed minores cum minori pretio potuerit comparari, nulla autem experientia Arabum promissa confirmavit & prudentes, præter absorbentes, nullas alias ab iis exspectant vires.

* Species Diamargarit. calida AVICENN. Vires roborantes unice ab aromatibus habent: * Species Diamargarit. frigida August. Wurtemberg. correxerunt, inconcinna compositio: * Tabella de Margaritis Paris. * Tabella de Matreperlarum Paris. absorbendi ergo conducent: * Magisterium Margarit. SCHROEDER iners omnino medicamentum, ipsi fimile est Magisterium Matris perlarum Wurtemberg. * Sal perlarum PARACELSI: * Sal & Solutio Matris perlarum Wurtemberg. harum substantiarum unicam quam habent virtutem, vel imminutam fistunt.

2. FOSSILIA.

ARGENTUM, agrogor, Argent, Silber. Metallum album, aqua undecies gravius, inter aurum & regulum antinionii, ratione ignis gradus, quo fluit, inter aurum & ferrum ratione firmitatis, medium locum tenet, post aurum maxima ductilitate gaudet, in acidis folubile, igne nihil perdit, nec a vitro faturni nec a nitro destruendum.

Reperitur Argentum I. Nativum & quidem fub diversifimis figuris & variante multum magnitudine, interdum moleculæ vifum fugientes matrici inhærent, ut in Minera Alcalina JUSTI: II. fub forma mineræ 1) nigræ A. textura folida gaudentis a) cultro fcindendæ, Argentum vitreum Auctorum, quod ad 4 ufque argenti vehit, ex fulphure & argento concretum b) cultro non scindendæ a) zinco gravidæ Argentum zincosum L. Pechblende, &) zinci expertis sprodes Glas - Erzt JUSTI: B. texturæ laxæ Argentum nigrum L. a) pulverulentæ Silber - Schwärtze, ruficht Erzt JUSTI, b) in fibras capillares efformatæ Minera Argenti, antimonialis capillaris CRONSTEDT. Feder-Erzt $\frac{1}{100}$ argenti habet: 2) rubræ, quæ varios rubedinis gradus habet, cinabarinum ad Fanum divæ Mariæ occurrit, & in varias figuras, non raro in pulcherrimas crystallos, concretum Argentum rubrum L. Rothgulden, ex Argento & Arfenico efformatum ad 3 ulque argenti fovet: 3) gryfeæ, hæc cuprum, fulphur, arsenicum argento immixta habet, quo magis ratio cupri crefcit, eo magis color ad nigrum vergit A. albidior a) ferri expers Album L. Weisguldig, hoc in crystallos efformatum, quale in Fano D. Mariæ occurrit, Nostrates Glaskopfen dicunt: b) ferrum recipiens Minera alba CRONST. Argentum arfenicale L. B. Cinerea Argentum cinereum L. Fahl-Erzt, in hujus generis mineris ratio Argenti ad $\frac{1}{7}$ ufque folet ascendere. C. Gryfea cum fusco mixta & superficie granulata instructa Roschgewachs ad 4 Argenti cum arfenico, ferro & cupro commixti continet, nonnifi in Hungaria occurrit. 4) Flavicantis femipellucidæ, mollis, Argenteum corneum L. Minera Cornea vulgo ad ²/₃ Argenti, ope acidi falis in mineram redacti, creberrime etiam fulphur habet, raro

364

occurrit. III. fub forma terræ 1) folidioris, argillaceæ: flavicantis, cum immixto virore Gansekotig. Erzt vulgo, 2) laxioris quasi pinguis, rubræ, flavæ, cæruleæ Silber - Mulm ad $\frac{1}{100}$ Argenti habet, 3) in squammas rigidas, fuscas, splendentes efformatæ Colophonien - Erzt. 4) foliola fusca & laxa sistentis, ad $\frac{1}{200}$ Argenti continentis, Bergkorck LEHMANN Blættel - Erzt, 'nonnisi in Hercynia hactenus repertæ.

In America & paffim per Europam occurrit.

Argentum nativum femper ære inquinatum occurrit, finiffimum quod ex officinis metallicis ad nos mittunt $\frac{1}{\tau_6}$ Cupri vehit; puritas Argenti lapide lydio, cupellatione, nitro inquiritur; idem amalgamationis, fufionis, cupellationis ope ex matricibus obtinetur.

Primi Arabes argentum ad ufus medicatos adhibuerunt & ex eo eafdem ac ex auro virtutes fibi fpoponderunt, vel hic quoque tam ratione, quam experientia refragantibus; ejus folutione pro capillis nigro colore tingendis folent uti. Folia ejufdem ornatus ergo variis medicamentis adjiciuntur.

* Crystalli Lunæ vid. Institut. Chem. * Lapis Infernalis vid. Instit. Chem.

* AURUM, Xgurds, Or, Gold. Eft Metallum, reliqua gravitate vincens, aqua vigecuplo fere gravius, medium inter argentum & æs ignis gradum, ut fundi poffit, exigit: & fuíum fmaragdino colore fulget ratione firmitatis medium inter Argentum & ferrum locum tenet, maximam extensionem patitur, ita ut unum ejus granum in filum quingentorum pedum elongari queat, nonnisi aqua regis & hepate fulphuris dissolvi potest, igne nihil perdit, nec fulphuri, vitro faturni, nitro, qualescunque in illud vires funt.

Non aliter nisi Nativum occurrit I. varia figura & varia craffitie lapidibus, ex vitrescentium maxime genere, interdum quoque glebis metallicis innatum : II. forma palearum arenæ sive montium sive fluvio-

alba

2010

cr

2

fin

tic

py he

P

21

Vi

ì

i

rum commixtum : III. glebis metallicis, moleculis adeo minutis, ut omnem fenfuum aciem effugiant, innatum, & has glebas Aurum mineralifatum vulgo folent dicere.

Multum Auri ex America & Littore Africano (Côte de Guinée) ad nos adducitur; Germania, Hungaria, Scandinavia, Siberia lapides & mineras eo prægnantes fovent, plurimi Europæ fluvii arenam auro fcatentem vehunt, de Rheno id jam diu notum, nec noftra Brufca tali caret.

Aurum, quod natura largitur, nunquam perfecte purum est, observante jam REAUMUR.

Amalgamationis, fusionis, cupellationis, separationis cum acido nitri aut sulphuris ope, a substantiis, quibus commixtum occurrit, separari solet.

Ad usus medicatos, nullum aliud quam purifimum debet recipi.

Arabes, quos omnis Alchemicorum cohors fecuta eft, & non pauci Medicorum, qui a majorum præceptis non audent recedere, Auro infignes vires cordiales ineffe & illud multum contra melancholiam facere afferuerunt, id quod quidem fenfu morali omnino verum eft, fed ullum in corpus humanum inde fequi effectum, nec ratio poteft perfpicere, nec experientia confirmat. Ejus folia ornatus ergo aliis medicamentis adduntur. Medicamenta non raro aurum vehere jactant, ut ea majori pretio vendere poffint, folutio ftanni impofturam ex tempore detegit.

* Tinctura Auri Parif. omnes fuas vires ab oleo Rorismarini habet, cui omnino confultius effet oleum Cinamomi vel Ætherem fubftituere: * Crocus Solis MYLII ab Auro ratione virium non differt: * Aurum fulminans vid. Inftit. Chem.

* CRYSTALLUS, 200 a hoc nomine proftant hodie in officinis varia fragmenta pellucida, duriffima,

366

alba, angulata, inodora, infipida, nec aqua, nec acidis, nec igne fundenda, limam non admittentia.

Sunt fragmenta Crystalli montanæ AUCTOR. Quarzi crystallisati CRONSTEDT, Nitri Crystalli montanæ L.

Pluribus in Europæ regionibus occurrit, non taro aliorum lapidum cavitates replet, interdum in profundioribus telluris receffibus, interdum in terra corticali, interdum in fluviis reperitur.

Omnibus figura eft hexagona, ita ut utrinque pyramide hexagona terminentur, inter quas columna hexagona intercipitur, interdum columna, interdum pyramis inferior deficit, interdum numerus laterum augetur, interdum unus aut alter angulus deeft; variant multum volumine, & colore, interdum nihil, interdum varias fubftantias in fua cavitate includunt, interdum folitariæ, interdum plures aggregatæ occurrunt; color earum ab artificibus *aqua* dicitur.

Volumen, puritas, immunitas a fiffura & maculofa nube, pretium augent, tales PLINIUS Acenteta dixit, noftri lapidarii Mediolanenses, illas quæ levius inde recedunt halbe Wahr, viliores Rottan dicunt, exiguas, npn coloratas, pellucidas Pseudo-adamantes solent vocare.

Inter primos MATTHIOLUS crystallo vires adstringentes adscripfit, lithontripticas, absorbentes &c. alii, a substantia, quæ nullo menstruo cedit, frustra vires medicatæ exspectantur; præparatæ, qualis in officinis prostant, non raro partes de marmore supra quem tritæ suerunt, adhærent.

* LAZULUS Lat. Barb. RUZVOS Veterum, Caruleus Eorund. quo tamen nomine etiam alios lapides comprehenderunt, Azur.

Cuprum Lazulus L. Zeolites caruleus CRONSTEDT. Lapis vitrescens opacus, polituram admittens, in oleo Vitrioli coctione folubilis, ex chalybe nullas fcintillas eliciens, pulcherrimo colore cæruleo gaudens, faporis & odoris expers; creberrime flavas maculas habet, quæ interdum moleculæ auri funt, creberrime autem a pyrite efformantur.

Verus Lazulus vix in officinis pharmaceuticis occurrit, creberrime ejus in locum Cuprum Armenum L. affervant, eo quod majoribus fruftis occurrat, mollius fit, cum acidis effervescat, vera gleba cupri, a lapide Lazuli diversiffimum.

Ex Oriente & Regno Peruviano ad nos adducitur.

Lapidem Lazuli nec vestigium cupri vehere Ill. MARGGRAFF & CRONSTÆDT experimenta evincunt.

Cum creberrime Lapis Armenus pro lapide Lazuli fuerit adhibitus, hinc non pauci ipfi vires evacuantes adfcripferunt & eum contra melancholiam laudarunt, Seculo fuperiore & nervinis & analepticis annumerarunt, faniores, medicamentum pro quo creberrime fubftantiam corpori humano perniciolam fubftituere folent, & quod fincerum, nullos proprios effectus poteft edere, ex penu pharmaceutica jubent exulare.

* PRETIOSORUM QUINQUE LAPIDUM FRAGMEN-TA. MESUE, Granati nimirum, Hyacinthi, Smaragdi, Sapphiri & Sardi.

Granatus Barb. Est lapis pellucidus, colore obscure rubro instructus, igne fundendus, limæ exquisitiori cedens, varia ratione angularis, ferro semper non raro etiam stanno scatens.

Qua magis transparet, quo propius color ad flores balaustiorum accedit, eo pretiosior, quo magis fuscus, eo vilior reputatur gemma.

Borax Granatus L. Granatus CRONSTEDT, eo quod per se igne fluat, a reliquis crystallis differt.

Ex Oriente ad nos adducitur, Saxonia, Silefia, Hungaria, Suevia, Hifpania, eos quoque largiuntur, Bohemia duriffimos exhibet.

368

HVACINTHUS ab illo Veterum diversus: est Crystallus igne liquescens, colore rubro, cui flavedo admixta est, distincta, quo magis color ad melleum vergit, eo vilior este reputatur, quo magis rubedo eminet, eo pretiosior.

Nitrum fluor purpureo - fulvum L.

Ex India Orientali præftantissimi adducuntur, occurrunt quoque in Lusitania, Hispania, Bohemia, Silesia, Saxonia, Hassia.

SMARAGDUS, σμάζαγδ, Emeraude, Crystallus grenato durior, fapphiro mollior, igne colorem non mutans.

Borux gemma viridis L. Smaragdus gemma CRON-STÆDT fe viriditate diftinguit.

Illi qui ex Oriente ad nos adducuntur, quo non folum Indicos fed etiam Peruvianos & Brafilienfes referunt, Bohemicis, Helveticis, Anglis dilutiores funt.

SAPPHIRUS, sámœuç@ ab illa Veterum, quæ nofter Lazulus fuisse videtur, diversa: est Crystallus, duritie propius ad Rubinum accedens, colore cæruleo splendens, igne colorem perdere dicitur.

Alumen, gemma pretiosa, caruleum L. Sapphirus gemma CRONSTÆDT: colore distinguitur, quo profundior, eo majori pretio venit gemma.

India Orientalis pretiofisfimos nobis mittit, Saxonia, Silesia, Bohemia, Gallia, Occidentales subministrant.

Creberrime in ejus locum Muria Chrysolampis L. Fluor spatosus CRONSTÆDT cærulescens substituitur.

SARDUS, ságdior, ságdi@ xi3@, Carneolus Recent. Cornaline : est Silex variæ magnitudinis, qui politura femipellucidus evadit, colorem carneum plus minus dilutum habet.

Silex Carneolus L. & CRONSTEDT colore rubro uniformi distinguitur. Afiatici & Americani, quos Orientales dicunt, magis fulgent, præ Europæis, quos Hungaria, Bohemia, Silefia, Saxonia &c. fubministrant.

Arabes, quos Latino-Barbari fecuti funt, vires cordiales horum lapidum multum extollunt, adítringentes quoque & roborantes ipfis adfcribunt, fed facile patet, de eis idem ac de reliquis lapidibus, ad claffem vitrefcentium pertinentibus judicium effe ferendum, nec aliquid a principio metallico, quod dicuntur vehere eft exfpectandum, fi enim & tale in illis hærere effet evictum, non liqueret tamen, quomodo illud per vires corporis noftri inde poffet educi.

Confectio de Hyacintho, absurdiffimam AVICEN-NÆ compositionem correxerunt quidem, fed non parum tamen inconcinnam adhuc reliquerunt Monspelienses apud RENODÆUM, Mediolanenses moschum & ambram addiderunt pro Completa reddenda: Monspeliensem formulam, Wurtembergenses & Nostrates receperunt, magis placet Parifina; quæ fimplicior eft, in omnibus difplicet, quod Syrupum acidum recipiant: ingredientia ficca fub forma pulveris quoque affervantur & Specierum de Hyacintho nomine veniunt, vires leniter adstringentes inde exspectamus, in alvi fluxu, hæmorrhagiis, fudoribus colliquativis Confectionem ad drachmam dimidiam, Species ad grana quindecim pro dosi exhibemus : * Species de Gummis frigidas VAL. CORD. inconcinnam & inertem compositionem, paucis mutatis, Wurtembergenses receperunt.

5. 31.

VI. ADSTRINGENTIA.

Adstringentium titulo comprehenduntur omnia reliqua corpora naturalia, quæ foliditatem fibrarum augent: ea, cum eorum actionis intensitas multum diversa sit, optime pro hujus vario modo distinguuntur, hunc autem non male ab eorum in lin-

ROBORANTIA.

guam actione determinamus, ea, quæ linguam levi modo ratione adstringunt, Subadstringentia appellamus; Adstringentium nomen illis relinquimus, quæ linguæ imposita, eandem evidenter constringunt.

§. 32.

a. SUBADSTRINGENTIA.

Subadítringentia levi valde modo partium terreftrium fibræ rationem videntur augere, hinc parum evidens eft eorum effectus: ut plurimum folummodo adhibentur, ubi ab ufu emollientium, quem indicatio fuadet, nimiam relaxationem metuimus, vel ubi morbus roborantia quidem exigit, fed neque validiores ftimulos, neque fortiora adítringentia admittit. In univerfum, eorum virtutes non admodum evidentes funt, fed nec magnum difcrimen inferunt, nec adeo ftricta eft eorum dofis.

ADIANTUM, adiavlov, καλλίφυλλον, τειχομανές, καλλίτειχον, πολύτειχον, Capillus Veneris Barb. Capillaire, Frauenhaar: officinæ appellant plantas cauliculis teneris instructas, quibus foliola parva infident, & quæ nullos flores perfectos excludunt.

* Adiantum album? Ruta muraria TRAG. Sauvevie; Mauer-Raute: fiftit cauliculos teneros, teretes, folidos, herbaceos, albidos, fuperne ramofos & tribus foliolis veftitos, quæ parva funt, rotundatooblonga; crenulata, maculis feminalibus linearibus, quæ in foliis exficcatione contractis totum difcum occupant, obfeffa, cum cauliculis infipida, inodora.

ASPLENIUM Maculas feminales in lineas ad nervum folii convergentes habet: Ruta Muraria L. BLACWELL 219. frondibus non pinnatis gaudet.

Crefcit copiose per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem.

ROBORANTIA.

Parifini pro Adianto albo Polypodium fragile La præscribunt.

Adiantum Americanum Recent. Adiantum Canadense, Capillus Veneris Canadensis efformatur a petiolis rubris, ramosis, quibus pinnatim insident solia oblonga, inferne integra, superne crenis majoribus crenata, dulciuscula cum levi adstrictione.

ADIANTUM: maculas feminales apicibus foliorum fubjectas habet: Pedatum L. frondibus ramofis, foliolis in uno latere rotundo incifis, diftinguitur.

Crefcit in Jamaica, Virginia, Canada.

Adiantum aureum TABERN. Percemousse, golden Wiederthon: cauliculi inferne raro ramosi, foliis angustis & acutis obsessifi, quæ exsiccatione multum contrahuntur & rubiginosum colorem induunt, rubri, longi, superne capitulum quadratum gerunt, calyptra laxa, in villos terminata tectum, leviter adstringunt.

POLITRICUM. Muscus relativus diphytus, calyptra villofa: Commune L. BLACWELL 375. foliis ferratis & capfula quadrata distinguitur.

Vulgaris per omnem Europam.

* Adiantum nigrum Veterum? Capillaire commun, Frauenhaar: Petioli rubri, foliis majoribus quam in reliquis Adiantis obfeffi, pinuatis, triangularibus, utrinque incifis, faporis leviter adftringentis.

Asplenium Adiantum nigrum L. BLACWELL 220. frondes duplicato pinnatas, pinnas inferiores majores, folia lanceolata habet.

In Europa temperata occurrit, in Saxoniam ufque ascendit.

Ipfi creberrime Noftrates fequens fubstituunt.

* Adiantum rubrum LONICER, reixomarie, Trichomanes: efformatur a cauliculis rubris, utrinque foliolis parvis, rotundis obseffis, saporem præsedentis habet.

372

Asplenium Trichomanes L. foliis pinnatis, pinnis rotundis gaudet. Vulgatissima ad rupes in omni Europa planta.

Adiantum verum TRAG. Capillus Veneris SYLVII. Cauliculos habet fere nigros, ramofos, vestitos foliolis ex fine angustiore, in finem ovatum terminatis, in aversa, quæ reflexa est, foliorum parte maculas albas habet

- Adiantum Capillus Veneris L. frondibus decompofitis, foliolis alternis, pinnis cuneiformibus, lobatis diftinguitur.

Crefcit in Gallia Meridionali, Helvetia & Anglia.

Cum hoc & Canadense reliqua, gratia anteant, & Canadense præ ipso quoque majorem gratiam habeat hinc solo Canadensi possumus omnino contenti esse.

Adiantum HIPPOCRATES refolvendi & urinam ducendi ergo commendat, craffos & vifcofos pectoris humores digerere & ad fcreatum difponere, a GALENO dicitur, ab hac etiam virtute ad noftra ufque tempora folet commendari, ea fub ratione qua Adianta in ufum trahuntur, eorum vires potius ab aqua quam ab Adianti mucilagine videntur pendere, num aliquid roboris pulmonibus inde accedit? alvum inde ftringi, male contra HIPPOCRATEM contendit GALENUS, qui vires calculum frangendi & incrementum capillorum promovendi, ex loco natali cauliculorum & eorum forma potius finxit, quam obfervatione haufit.

Syrupus PLANTII gratia se commendat : * Syrupus compositus Augustan. a Brandeburg. auctus magis medicatus est.

* AGNUS CASTUS Barb. 2700, Agnos: Capfulas inde recipimus tomentofas, rotundas, parvas, aliquot feminibus fœtas, fapore aromatico, ad cardamomum accedente, instructas.

VITEX. Corollam ringentem habet, calice quinquefido fustentatam, labium utrumque trifidum, ca-

Aa 3

pfulam tetrospermam: Agnus Castus L. BLACWELL 139. foliis digitatis, serratis, gaudet.

Crefcit in Europa Meridionali.

Arboris virgulta, matronæ Athenienfes caftitatem cuftodientes in thefmophoriis lectis fubftraverunt, inde $\tau \tilde{e}$ $a_{\gamma r 8}$ nomen ipfi furrexit, ab omni dein tempore ejus fructus, quos vulgo femen dicere folent, venerem extinguere crediti fuerunt, abfurdiffimum commentum, per plura fecula inter Medicos fe fuftinuit; femen ab HIPPOCRATE attenuandi ergo, a GALENO ad difcutiendos flatus & aperiendas obftructiones vifcerum abdominalium commendatur, quibus fcopis medicamentum aromaticum etiam magis aptum effe videtur, quam adftringentibus, quibus a Recentioribus fuit dicatum.

AGRIMONIA Barb. wwarwgur, Aigre moine, Odermenning. Folia exhibet longa, pinnis inæqualibus, & quarum margines incifi funt, obfeffa, inferne incana, odoris expertia, fapore falino prædita.

AGRIMONIA. Corollam pentapetalam habet, duplici calice fustentatam, polyantheram, digynam, calix femina includit: Eupatoria L. BLACWELL 21. foliis pinnatis & fructu hispido distinguitur.

Occurrit in omni Europa.

A GALENO medicamentis aperientibus & roborantibus adferibitur, FORESTUS ea intus affumta, hæmorrhoides & prolapfum alvi fanatum, & lapidem veficæ ita comminutum, ut per frusta cum lotio exierit, ejusque usu externo ulcus cruris malignum curatum, fe vidisse affirmat. Hodie ad usus externos maxime adhibetur, gargarismatibus quoque adjicitur.

ALCHYMILLA HIERON. BRUNSVIC. Pied de Lion, Sinau, Frauenmantel. Folia largitur officinis quæ rotunda funt, margine crenata, inferne albida, inodora, fapore adstringente instructa.

ALCHEMILLA. Corolla gaudet octofida, tetran-

dra, monogyna, gymnosperma: Vulgaris L. BLAC-WELL 72. foliis lobatis agnoscitur.

Vulgaris per Europam planta.

Extracti aquofi, quod odorem mellis & faporem acidulo-aufterum habet $\frac{7}{16}$, refinofi, aufteri & balfamicum odorem emittentis $\frac{1}{4}$ circiter, largitur. CAR-THEUSER.

Vires leniter adstringentes possidet, ejus autem ope vasa claudi, mammis & vaginæ rigiditatem, quam perdiderunt, restitui, ad muliercularum commenta pertinet; ad hæmorrhagias internas, & ulcera - viscerum folet præscribi.

* Emplastrum Defensivum FELICIS WURZ. Ab Alchemilla vires adstringentes habere & affluxum humorum ad partes, quibus imponitur, creditur arcere.

* ALKANNA Arab. ayx85a, Anchufa Veter. Orcanette, rothe Ochfenzunge. Recipiuntur Radices fibrofæ, longæ, ad calami anferini craffitiem accedentes, fub cortice fanguineo, fubftantiam albam includentes, fapore adftringente præditæ.

Anchusa tinctoria L. habitu villoso, foliis lanceolatis obtusis & staminibus corolla brevioribus distinguitur.

Crefcit in Europa Meridionali, nec a noftra hyeme læditur.

Extracti aquofi rubro fufci, acriufculi & fubadftringentis $\frac{3}{8}$ fere, fpirituofi autem rancorem olentis, rufo-fubfufci ultra $\frac{1}{6}$ inde obtinuit CARTHEUSER. Cortex fpiritum vini & olea rubedine tingit, aquam nequaquam. LEWIS, aut post longam demum digestionem BERGIUS. Ad nullos alios quam tinctorios usus adhibetur.

Alkanna, quæ fub Orientalis nomine in officinis proftat, ex capite craffo copiofas lamellas fibi invicem incumbentes dimittit, profundiore quam priores rubedine tinctas a LAWSONIA, Corolla tetrapetala, calice quadrifido fustentata, diplofanthera & capfula globofa, quadriloculari instructa: *Inermi* L. racemis inermibus distincta, Orientis cive, defumtas.

AURICULÆ JUDÆ CLUS. Fungi Sambuci TRAG. Oreilles de Judas, Holderschwæmmchen. Fungi membranacei subnigri, subrotundi, quorum superficies in sulcos elevata & in sinus his respondentes depressa est, superne villo obsessa, inferne glabra.

PEZIZA. Fungus est uniformis, membranaceus, gelatinæ formis: Auricula L. BLACWELL 334. figura auriformi & colore nigricante distinguitur.

Autumno ad varias arbores per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem, reperitur.

Fungis perniciofis, præeunte CLUSIO, adferibitur, intus nunquam datur, extus ad morbos faucium & oculorum, difeutiendi ergo, adhibetur aqua infufa & parti affectæ impofita.

AURICULA MURIS LONICER. Pilosella JAC. DE MANLIIS, Pes Cati PARCKINS, non eft $\mu i \oplus \tilde{\omega} \tau z$ DIOSC. Fieds de Chat, Katzendæplein. Inde recipimus Folia & Flores.

* Folia ex angustiore origine, in finem obtusium & ellipticum terminantur, superne viridia, inferne tomentosa, odore nullo, sapore levissime adstringente instructa.

Flores tubulofi funt, compositi, calice ficco comprehensi, rosei coloris, saporis expertes.

GNAPHALIUM. Flores compositos tubulosos, calice squammis imbricatis siccis efformato, comprehensos, receptaculum nudum, semina papposa habet: Divicum L. calice argenteo, caule & corymbo simplici distinguitur.

Occurrit in omni Europa.

Vires leniter roborantes habet, folia interdum, flores crebrius ad infuía pectoralia recipiuntur.

* Conferva Parif.

BELLIS, Marguerite, Zeitlosen, Mazlieben. Ejus integri Flores affervantur, qui parvi funt, radiati, radio mox albo, mox roseo, disco luteo; exsiccati odorem nullum, saporem lenissime falinum habent.

BELLIS. Flore composito mixto, calice cujus squammæ duplicem seriem formant, receptaculo nudo, seminibus nudis gaudet : Perennis L. BLACWELL 200 & 530. scapo nudo distinguitur.

Habitat in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

3 Extracti falini inde obtinui.

Multum hi flores ad affectus pectoris laudantur, leniter incidendo & roborando videntur agere, vulnus thoracis eorum ope curatum apud KOENIG & phtifin, quam per illos WEPFER fanaffe dicitur, ab ipfis folis non auderem deducere. Multi, præeunte MIN-DERER, folia fub forma acetarii illis commendant, qui æftuanti corpori frigidam ingefferunt.

* Aqua destillata SCHROED. iners : * Conferva Nostrat. * Syrupus Nostrat. * Tinctura August. si quas vires habet, illas debet spiritui vitrioli.

* BETONICA, Belouin, Betoine, Betonien: Inde Folia & Flores officinæ affervant.

* Folia funt oblonga, profundius crenata, rugofa, inodora, infipida.

Flores labiati obtinent, purpurascentes, odoris & faporis expertes.

BETONICA. Calice quinquefido fuftentat corollam labiatam, cujus tubus incurvus est, labium superius integrum & erectum, inferjoris lacinia media latior, rotunda, emarginata: Officinalis L. BLAC-WELL 46. spicam habet interruptam.

Num revera Cl. LEWIS oleum odoratum inde obtinuit? Extracti aquofi infipidi $\frac{5}{8}$, refinofi fere $\frac{1}{2}$. NEUMANN. Extracti aquofi fubfalfi, balfamico-amari $\frac{1}{4}$, refinofi fubacris & balfamici $\frac{1}{6}$. CARTHEUSER.

Aas

GALENUS refolventes ipfi virtutes adfcribit, ad comitialem morbum & morbos convulfivos quoque laudat, inde Recentiores eam cephalicis annumerare permoti fuiffe videntur, nulla has vires fida obfervatio probavit, nec confirmati fuerunt ejus effectus ad fugandam arthritidem, circa quas HILDANUS maxime multus eft.

* Aqua destillata NICOL. PRÆPOS. meas faltem nares nunquam odore feriit: * Conserva VAL. CORD. * Emplastrum Luminar. Majoris. Parisini habent, a KALDE correctum, Wurtembergenses & Nostrates; a refinis, quas recipit, potius quam a Betonica efficax. Quis credet S. PAULI hujus cerati ope vulnus sub quo falx cerebri discissa erat & cerebrum pure diffluebat, fuisse curatum.

* CETERACH Lat. Barb. Ceterac, Milzkraut. Efformatur a Foliis pinnatifidis, parvis, quæ tota maculis ferrugineis obfeffa funt, odore nullo, fapore adftringente gaudent.

Asplenium Ceterach L. BLACWELL 216. frondibus pinnatifidis, pinnis alteris confluentibus agnofcitur.

Crefcit in Europa Meridionali.

Herbis vulnerariis vulgo adfcribitur, ratione faporis propius ad linguam cervinam accedit, MORAND, egregios effectus antinephriticos inde editos fuiffe, refert: ejus infufo nullam aliam plantam, ad depellendum ex renibus fabulum, aptiorem effe, afferit Cl. CRANTZ.

* FILIX, #TERIC, BANXRON, Fougere, Farren. Recipiuntur inde Radices, quæ fibrofæ funt, extus nigræ, intus rufæ, fapore adstringente instructæ.

POLTPODIUM. Planta epiphyllosperma, cujus fructificationes in puncta subrotunda, ad nervum solii parallela colliguntur: Filix Mas frondibus bipinnatis, pinnis obtusis crenulatis distinguitur. Crefcit in omni Europa. Non raro pteris filix cujus fructificationes in lineas, margini frondis fubjectas ordinatæ funt: Aquilina L. BLACWELL 325. frondibus multum divifis, pinnis integerrimis, ultimis lanceolatis, ubique per Europam occurrens radices fubminiftrat.

Ad lumbricum latum GALENUS laudavit, fed inertem ad vermes SCOPOLI observavit, rhachiticis tam interne, quam externe laudatur, fœtum inde pelli, se expertum esse OLIVIER contendit; in summa anonæ caritate panem inde coxerunt; ejus usus hodie eviluit.

* GALEGA Barb. Geisrauthen. Folia exhibet, pinnis oblongis pinnata, angusta, faporis & odoris expertia.

GALEGA. Corollam papilionaceam habet, vexillo & alis fere æqualibus, calice quinquefido fuftentatam legumen longum, compression, feminibus turgens: Officinalis L. BLACWELL 92. foliolis lanceolatis & glabris distinguitur.

In Italia & Hifpania crefcit, noftras hyemes impune fert.

In peste, quæ anno 1576 Lombardiam vastavit, cum non sine successfu ut ajunt adhibita suerit, a multis vis ejus alexipharmaca suit laudata, sed cum nulla se fida observatione probaverit, hodie jure eviluit.

* Aqua destillata SCHROEDER. iners omnino.

HEDERA arborea æque ac terreftris in ufu eft.

Arborea, 210505, 2150: Lierre, Epheu, inde folia, baccas & gummi recipiunt.

Folia firma funt, coriacea, cordata, viridia, five angulata, five integra, pro varia plantæ ætate, odore nullo, fapore adftringente gaudent.

* Baccæ nigræ funt, rotundæ, umbilicatæ, style ex medio umbilico prodeunte instructæ.

* Gummi prostat sub forma frustorum majorum, rotundorum, ex granis semipellucidis, ad granatorum colorem aecedentibus, efformatorum, quibus variæ fordes intermixtæ funt, aridorum, fapore leviter aromatico inftructorum.

HEDERA. Corollam habet pentapetalam regularem, ifandram, monogynam, baccam globofam, polypyrenam: Helix L. BLACWELL 188. foliis fimplicibus agnofcitur.

Occurrit ubique.

Europææ arbores, etiam interdum Gummi fuderunt, id quod in officinis proftat, ex Oriente adducitur.

Gummi $\frac{1}{16}$ Extracti refinofi, $\frac{1}{4}$ aquofi, cui multum refinofi adhæret, exhibuit. NEUMANN. Extracti gummofi $\frac{1}{8}$, refinofi $\frac{5}{8}$ CARTHEUSER.

De baccarum viribus plane nihil certi conftat : Gummi obfcure adurere & depilare afferitur; tanquam acrimoniam nec fapor prodit, nec experientia confirmat, a STAHL intus fcopo emmenagogo commendabatur. Folia ad ufus externos adhibentur & maxime pro deligandis fonticulis ufurpantur : pulverem ad aliquot fcrupulos de die datum egregie in atrophia infantum fe gerere NEBEL vidit.

Terrestris Barb. Lierre terrestre, Tarette, Gundelreb, Folia sistit, quæ reniformia sunt, crenata, levissime hirsuta, cum exsiccata suerint vix odora, sapore proprio leniter aromatico instructa.

GLECOMA L. BLACWELL 225. Calice bilabiato, fustentat corollam ringentem, cujus labium superius bifidum, inferius majus & trifidum est, lacinia intermedia majore, semina nuda maturat.

Crefcit in omni Europa.

Aqua inde odorata destillat, ultra $\frac{3}{8}$ Extracti aquosi multum acris, Extractum refinosum mitius largitur. CARTHEUSER.

Refolvente & roborante virtute fe commendat, hinc calculofos juvaffe, obfervata est, notantibus S.

380

PAULI & REUSNER, hydropicis profuisse, ETTMÜLLER refert, in phtisi falutares ejus effectus WELSCH vidit, & a MORTON phtisicis hæmopticis multum commendatur. Optime exhibetur sub forma Insus aquosi.

* Aqua destillata VAL. CORD. prouti vulgo in officinis prostat inodora est: * Conserva Paris. * Syrupus VAL. CORD. * Extractum Paris. ut ulterius tentetur, videtur mereri.

HEPATICA, hoc nomine triplex plantarum genus Latino-Barbaris venit, unum quod a fontibus denominant, alterum Nobile dictum, & tertium, quod a fitu foliorum Stellaris nomine infignitur.

* Fontana, l'hépatique d'eau, Steinleber-Kraut, conftituitur a foliis fubrotundis, quæ in modum fquammarum cohærent, fuperne viridia funt, inferne copiofiffimas radiculas emittunt, lobata, fapore & odore nullo prædita.

MARCHANTIA. Alga relativa monophyta, flores mares habet pedunculatos, ex communi calice eo numero prodeuntes, qui est calicis laciniis, monandros; feminas seffiles, corolla nuda integra instructas & infundo semina gerentes: Polymorpha L. calice communi octo vel decemfido distinguitur.

Crefcit fub aquis in omni Europa.

Adstringens planta, cum ex genio vegetabilium fub aqua crescentium, etiam aliquid acris habeat, hinc a multis Auctoribus aperiendi scopo commendatur.

* Nobilis Folia exhibet in tres lobos rotundos divifa, petiolo longo indentia, cum petiolo tomentofa, infipida, inodora.

ANEMONE. Corollam polypetalam habet, nudam, polyantheram, polygynam & femina nuda: Hepatica L. BLACWELL 207. foliis trilobis integerrimis gaudet.

Occurrit in omni Europa.

Exiguarum virium planta, raro a Medicis præfcribitur.

* Aqua destillata SCHROED.

* Stellata, pro ea quidam primam recipiunt, fed vulgo, præcunte TABERNÆMONTANO, Matrifylva TRAG. hoc nomine adhibetur, quam Muguet de bois, Waldmeister appellant, ejus Folia funt oblonga, acuta, angusta, levi falino fapore instructa, recentia multum & grate olent, exsiccata parum odoris spargunt.

ASPERULA. Calice quadrifido, fustentat corollam infundibuliformem quadrifidam, ifantheram, monogynam, fructus a duabus capfulis efformatur: Odorata L. BLACWELL 60. foliis octonis distinguitur.

In omni Europa obtinet, præter maxime Septentrionalem & Belgium.

Aperiendi ergo laudatur, rarius in usum medicatum trahitur, a quibusdam vino immittitur.

HYPERICUM, voigues, Millepertuis, Johannis-Kraut. Summitates inde prostant, floribus flavis, qui exficcati odorem nullum & faporem adstringentem habent, instructæ & foliis ovatis, inodoris & insipidis.

HTPERICUM. Corolla instruitur pentapetala regulari, calice quinquesido nixa, polyanthera, tri-vel pentagyna, capsula polysperma: Persoliatum L. BLAC-WELL 15. soliis ovatis, persoratis distinguitur.

Crescit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Omnia menstrua inde rubrum colorem extrahere Cl. GUDD probavit: Extracti spirituosi $\frac{1}{2}$, aquosi adstringentis $\frac{5}{8}$ obtinuit NEUMANN.

HIPPOCRATES Hypericum abstergendi & aperiendi ergo adhibebat. GALENO ad confolidanda vulnera & ulcera laudabatur, & hanc virtutem etiam per omnem ætatem probavit, eandem ratione refinæ, qua scatet, videtur edere; datur quoque interne tam vulnerario scopo, quam aperiente, hinc melancholicis commendabatur, & Damonum fuga appellabatur, ab hac denominatione dein, præeunte PARACELSO ad abfurdiffimos ufus adhibebatur. Cum habeamus balfamica efficaciora, hinc hodie vix ulterius ad ufus internos adhibetur.

* Tinctura ANGELI SALÆ: eam ad lumbricos pellendos facere, BARTHOLINUS vidit: * Oleum JAC. DE MANLIIS crocum & terebinthinam habet, vulnerarium egregium & polychreftum: * Oleum fimplex VAL. CORD. * Extractum aquofum & fpirituofum commixta Wurtemberg. * Syrupus QUERCETANI: * Balfamum Magicum Pforzheimenfium illis, qui medicamenta antimagica quærunt, dignum.

* LIGUSTRUM Troëfne, Hartriegel: coloni noftrates Dintenhælzel dicunt, & Cornum fanguineam L. fub nomine Hartriegel indigitant: proftant inde Flores, qui infundibuli formes funt, angusti, parvi, sub exsiccatione flavi evadunt, omni colore & fapore privantur.

LIGUSTRUM L. BLACWELL 140. Corolla crebro quadrifida, fimili calice comprehensa, dianthera, monogyna, & bacca uniloculari distinguitur.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Minus confulto omnino, flores inertes fcopo adftringendi in officinis affervantur, cui fini folia omnino melius refponderant. WELSCH mulieris meminit, quæ ex his floribus, cum pauxillo olei olivarum in fole colliquatis, balfamum paraverat, quod in Italia magnam famam ad curationem fcrophularum & ulcerum putridorum erat adeptum.

Aqua destillata VAL. CORD. ad morbos faucium & roborandas gingivas laudatur, iners omnino.

* LINGUA CERVINA Barb. non est onorowie Selov fed potius quiting Veterum Scolopendrium, Scolopendre, Langue de Cerf, Hirschzunge. Recipimus inde Folia oblonga, fine leviter acuto terminata, ora integerrima instructa, firma, odoris expertia, saporis leviter adstringentis.

Afplenium Scolopendrium L. BLACWELL 138. frondibus fimplicibus cordato-linguiformibus, integerrimis gaudet, stipitibus hirsutis.

Habitat inter rupes Europæ, præter maxime Septentrionalem.

Adstringendi scopo ad diarrhœas & dysenterias a GALENO laudatur, vires aperientes, si quas habet, quas ego saltem ne unica quidem sida observatione stabilitas novi, debentur ejus virtuti roboranti.

Folia recentia interdum ad juscula aperientia recipiuntur, exficcatorum usus eviluit.

LYCOPODIUM DODON. Pied de Loup, Bærlappe. Semen officinis relinquit, quod pulverem impalpabilem refert, flavum, inodorum, linguæ aliquem adstrictionis fensum imprimens, & per flammam trajectum in flammam abiens.

LICOPODIUM. Muscus est capfulis pulverulentis, in foliorum alis fessilibus instructus: Clavatum L. BLAC-WELL 535. ramis prolixis & spicis petiolatis, gemellis agnoscitur.

In fylvis montanis omnis Europæ crefcit.

Extracti spirituosi $\frac{1}{8}$ inde obtinuit NEUMANN; qui etiam vidit aquæ nullas in illud vires esse.

GARMANN hoc femen a mulieribns Mifnenfibus, infantibus cardialgia & torminibus flatulentis laborantibus exhiberi afferit, difficultatem mingendi inde tolli LENTILIUS & WEDEL obfervarunt, qui ultimus illud etiam calculo opem ferre annotavit: extus non modo ad intertriginem curandam facit, & hoc fcopo noftratibus in frequenti ufu eft, fed ad ulcera manantia exficcanda etiam multum facere DE HEL-WIG obfervavit. Decantatus a multis Lycopodii ufus

usus ad curandam plicam polonicam non tam de femine, quam de ipfo musco est intelligendus

MILLEFOLIUM, $A_{\chi}iM\omega G$, Millefeuille, Schaafgarben. Folia largitur, quæ longa funt, viridia, hirfuta, pinnis tenuiter fectis inftructa, odorem fpirant aromaticum, fapor ex amaricante leviffime falinus eft.

ACHILLEA. Floribus compositis mixtis, calice oblongo, ovato, imbricato suftentatis, receptaculo paleaceo, feminibus non papposis gaudet: Millefolium L. BLACWELL 18. foliis bipinnatis, dentatis, congestis distinguitur.

Crefcit ubique per Europam.

Oleum mox cæruleum, mox viride, mox flavum, pro vario folo, quo colebatur, inde obtineri LEWIS monet, nunquam aliud, quam flavum & quidem in minima ratione accepi; CARTHEUSER ex floribus $\frac{1}{3}$ circiter Extracti aquofi falini, & $\frac{1}{5}$ fere fpirituofi acris & amaricantis feparavit; NEUMANN $\frac{5}{12}$ Extracti aquofi, $\frac{5}{8}$ fpirituofi largita eft.

Herba olim ad pestem præcavendam celebris, KOELICHEN teste, STAHL & HOFFMANN auctoritate, valde ad obstructiones viscerum abdominalium & inde oriundos motus præternaturales fopiendos fuit commendata, HOFFMANN per longum usum infusi ex Millesolio parati, non paucos ab affectione calculosa, cui diutius obnoxii fuerunt, liberatos vidit. Extus ad vulnera solidanda ab omni ævo fuit laudata.

Non tam folia quam fummitates debent recipi, & Achilleæ Millefolio L. Nobilis L. camphoram evidenter fapiens & olens, est præferenda.

* Aqua destillata NIC. PRÆPOS. * Syrupus VAL. CORD. * Oleum destillatum Wurtemberg. * Essentia Brandeburg. ei ad effectus hypochondriacos exhibendæ, SCHULZ rectissime Infusium aquosum præfert. * MOMORDICA Barb. Pomum in medio ventricofum, utrinque contractum, pulchra rubedine tinctum, plurimis nodulis afperfum, multis feminibus turgens, exhibet.

Momordica. Planta relativa monophyta, Corolla quinquefida, fimili calici infidente, maribus triandris, connatis, feminis monogynis, pomo ficco, triloculari, vi elastica, diffiliente gaudet : Balfamica L. BLAC-WELL 539. pomis angulatis, tuberculatis, foliis palmatis, glabris distinguitur.

Crefcit in India, inter nos hinc inde in hortis colitur.

Seculo demum XVI in Europa innotuit.

A multo retro tempore oleum quoddam unguinofum cum fructibus Momordicæ infufum, tanquam medicamentum dolores leniens & vulnera confolidans fuit laudatum, fed vix oleum aliquid a fructibus præter paucum mucilaginofi videtur recipere.

* Oleum Parif. de ejus vi vulnera & ulcera folidandi multas obfervationes collegit FRANCUS, ejus interne fumti ufum ad curandam dyfenteriam HER-MANN obfervationibus probat, & Cl. DELIUS uberius confirmat.

* MUSCORUM, βείων, υπνων, σπλάχνων Ufnearum Arab. Moussie, Moos varium genus, quibus quoque Lichenes quosdam annumerant, affervare solent officinæ.

Muscus albus quernus Wurtemb. efformatur e filis aphyllis, inæqualibus, ramofis, varie contortis, plicatis, gryfeis & per senium crusta alba tectis; est Lichen plicatus L. habitu filamentoso, pendulo, multum ramoso & albo agnoscitur. Ab arboribus, maxime a fagis, solet pendere.

Muscus arboreus Parif. Muscus Acacia Wurtemb. Est Lichen ex foliis latiusculis varie sectis, cornu damæ referentibus efformatus, mollis, superne cinereo glaucus,

inferne incanus & lanuginofus, fapore, fi ad quercus crefcit, amaro, alias fatuo inftructus: Lichen l'runaftri L. figura foliacea & fuperficie fubtus tomentofa dignofcitur. Ad varias arbores, prunos maxime crefcit.

Muscus Pyxidatus Parif. formam crustæ in folia fuperne virescentia, inferne candicantia, abeuntis habet, edit scyphos infundibuliformes, ex cinereo canescentes: Lichen Pyxidatus L. habitu sicco & scyphis crenatis agnoscitur. Terræ & arborum truncis adhæret.

Muscus Vulgaris Parif. Est Hypnum triquetrum L. quod caulibus ad dimidium usque pedem æquantibus, fuperne vage ramosis, foliis triangularibus, distantibus, lutescentibus gaudet. Ubique ad truncos arborum & in pascuis nascitur.

WILLIS contra tuffim convulfivam remedium vulgatiffimum effe dicit.

Muscus terrestris vulgo, ex foliis magnis & latis, mox folitariis, mox fibi invicem incumbentibus, finuatis & quorum margines deorfum flexi funt, efformatur, cinereus, cinereo-glaucus, interdum obfcure virens fuperne, inferne tenuissima lanugine obductus. Plerumque terram tegit, ad sepes & loca fylvarum umbrosa, non raro ad truncos arborum alios muscos tegit, mucidum fastidiosum faporem habet. Lichen Caninus L. habitu coriaceo plano, lobato, obtuso, pelta marginali gaudet. MOREV anno 1679 Academiæ Londinensi observationes de viribus hujus Lichenis adversus morsum canis rapidi enarravit, his cum recentiore ætate MEAD fuum calculum adjecerit, ejus vires antilystæ in Anglia maxime celebrantur.

Use Cranii humani nomine varium Muscorum & Lichenum genus solet venire, cum omnes, qui substantiis terreis innascuntur, etiam cranio, libero aëri exposito, possint accrescere, hinc jam a BERNIZ, use am cranii humani, in herbaceam & crustaceam distinxit. Sed mitto medicamentum, quod deliriis PARACELSI, explosa jam diu generatione æquivoca, & nescio quo spiritu in partibus hominum, maxime si carnificis manu necati fuerint, inhærente, nititur.

Omnes hi musci a vi adstringente laudantur, apud nos in usu non funt, cum nulla fida observatio aliquid proprii medicati illis inesse probaverit. Muscos HIPPOCRATES tanquam medicamenta uterina extus adhibuit.

* Syrupus a Musco querno, FULLER demulcens, roborans, balfamicus, ad effectus pectoris laudatur: * Pulverem Antilyssum Londin. crebro fine fucceffu adhibitum fuiffe, observationes docent.

* PERFOLIATA Lat. Barb. Percefeuille, Durchwachs; Folia & femina officinis relinquit:

Folia funt ovato-oblonga, obtufe terminata, glabra, integerrima, omni fapore & odore carent.

Semina parva funt, nigra, duriufcula, inodora, fapore adstringente austero gaudent.

BUPLEURUM. Flores habet umbellatos, involucro polyphyllo fuftentatos, femina ovato-oblonga, convexo-plana, ftriata: Rotundifolium L. BLACWELL 95. involucro universali nullo & foliis perfoliatis diftinguitur.

Obtinet in Europa temperata, in Saxoniam ulque ascendit.

Adstringendi ergo ad hernias commendatur, fed norunt Medici, quam parum adstringentia in univerfum ad hunc scopum faciant, nec ulla observatio has Perfoliatæ vires confirmat, cæterum eandem scopo adstringendi usurpaturus, semina omnino præ foliis debebit adhibere.

PLANTAGO, agrónhauror, sedechigo, Plantain, Wegerich Inde Radices, Folia & Semina ad usus medicatos recipiuntur.

* Radices parvæ funt, ex capitulo minore emittunt

fibrillas copiofiffimas, fapore leviffime falino, quem e dulci fatuus excipit, gaudent.

* Folia e duplici fpecie defumunt, quam a Veterum ufque ætate in Majorem & Minorem diftinguunt: illa Breitwegerich funt ovata, ad aliquot pollices ampla, longis petiolis fuftentata, glabra, feptem nervis percurfa, fapore vix ullo, qui diftingui poffit, inftructa, odoris expertia, margo eorum mox integer eft, mox finuatus; hæc Spitzwegerich evidenter lanceolata funt, angusta, longa, acute terminata, quinquenervia, ora ferrata, fapore & odore carent.

* Semina exigua funt, rubra, lævia, odorem nullum, faporem mucilaginofum habent.

PLANTAGO. Corollam habet hypocrateri-formem, quadrifidam, regularem, calice quadrifido fuftentatam, ifandram, monogynam, capfulam ovatam, bilocularem, polypyrenam: Major L. BLACWELL 35. foliis ovatis & scapo tereti distinguitur: Lanceolata L. BLACWELL 14. folia lanceolata & spicam ovatam sistit. Parisini quoque Plantaginem mediam L. habent.

Occurrit ubique in Europa.

Succus infpiffatus evidenter falinus eft.

Planta, quam primus THEMISON in usum traxiffe dicitur, a GALENO ad referanda viscera abdominalia & fanandas fluxiones, dysenterias & hæmorrhagias laudatur; eandem ulcera & finus quoque glutinare & radices ad dentium dolores valere ait; vires quas recentior ætas prædicavit antipestilentiales & antifebriles, quas GERBEZ observationibus confirmare annititur, experientia non probavit; SCHULZ fibi compertum effe, febres hecticas inde curatas fuisso, asserrat; folia recentia puncturis infectorum cum fuccessi imponuntur.

Aqua destillata VAL. CORD. iners omnino: * Syrupus VAL. CORD. non alias, quam quas a faccharo B b 3 accepit, vires habet: * Extractum Wurtemb. refolventes potius, quam adstringentes effectus videtur editurum.

* POLYGONUM, πολύγονον, Centumnodia Barb. Sanguinaria, Sanguinalis Recent. Renouée, Trainasse, Weggras. Cauliculi inde recipiuntur nodulis exiguis instructi, qui singuli par foliorum ovato oblongorum emittunt, sapore leviter adstringente instructi.

Polygonum Aviculare L. Caule procumbente & foliis ovato - oblongis diftinguitur.

Copiofiffime ad vias provenit,

Præeunte GALENO per plurima fecula ejus qualitates adstringentes & discutientes laudabantur, prostant observationes, ab eodem sive axillis supposito, sive manibus detento, hæmorrhagias suisse coërcitas, fed quis talibus sidem adhibebit; Cl. Scopoli, se ejus ope diarrhœas sanasse, narrat.

PRUNELLA Barb. Bonette: Recipimus inde Folia, quæ elongata funt, fubrotunda, crenata, leviter hirfuta, fapore falino, neque styptico, neque amaro instructa.

PRUNELLA. Calice quinquefido fustentat corollam labiatam, cujus labium fuperius integrum est, inferius in tres lacinias sectum, media reliquis latiore, semina nuda sunt: *Vulgaris* L. BLACWELL 24. soliis omnibus crenatis distinguitur.

Crefcit in omni Europa.

Adstringentes ejus vires laudant, a primis Germanis ad gargarismata contra anginam adhibitam & inde denominatam fuisse, sunt qui contendunt, ad vulnera & ulcera tam interna quam externa deprædicata etiam fuit, & hinc a MATTHIOLO Consolida minor appellata, hodie ad gargarismata maxime recipitur.

Aqua destillata VAL. CORD. iners, in collutiones & gargarismata recipitur. * Syrupus Wurtemberg.

PULMONARIA. Duo plantarum genera fub hoc nomine MATTHIOLUS in officinas introduxit, Maculofam nimirum & Arboream.

Maculofa, Pulmonaire, gefleckt Lungenkraut. Folia fiftit ex ovatis lanceolata, hirfuta, maculis albis obfita, facie fupina albicantia, infipida, inodora.

PULMONARIA. Corollam habet infundibuliformem, quinquefidam, cujus faux pervia est & quæ calice pentagono sustentatur, isandram, monogynam, semina nuda sunt: Officinalis L BLACWELL 376. tubo corollæ caliciæquali & soliis ovatis gaudet.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem

Nulla, quantum ego faltem novi, fida obfervatio, quas MATTHIOLUS huic plantæ adferibit vires pulmones & hæmoptoën fanandi, confirmavit.

Arborea, Pulmonaire de Chène, Lungenmoos est Lichen e latis & varie laciniatis foliis efformatus, flavicans, una facie levi tomento tecta, eminentiis, quæ vesiculas æmulantur, obsession, quibus in altera totidem soveolæ respondent, odore nullo, sapore salino, cui levissima amarities accedit, instructus.

LICHEN defectu verorum foliorum & fructificationibus fcutiformibus agnofcitur : *Pulmonarius* L. BLAC-WELL 335. habitu foliaceo & quod una facies foveolas, altera colliculos habeat, dignofcitur.

Per omnem Europam in fylvis, majoribus arboribus adhærens, deprehenditur.

Extracti spirituosi 5 fere, quod facile situm contrahit, 3 aquosi dedit NEUMANN.

Vires ad morbos pulmonum, huic plantæ, ex fignatura potius, quam ex experientia fuerunt adfcriptæ: ejus fapor refolventes potius ut inde exfpectemus fuadet: eam in curando ictero pertinaci efficacem fuiffe, BREYNII obfervatione & Illustris LINNÆI auctoritate constat.

Bb 4

* PYROLA Barb. Wintergrun. Folia siftit rotunda, petiolata, leviter serrata, sapore adstringente prædita.

calice quinquefido nixa, diplofanthera, monogyna, capfula quinqueloculari Rotundifolia L. piftillo declinato diftinguitur.

Occurrit in omm Europa,

Scopo roborandi & adstringendi intus datur, extus ad gargarifmata & injectiones confolidantes usurpatur.

* SANICULA Lat. Barb. Folia duriuscula sistit, variæ profunditatis lobis lobata, ferrata, altera facie pallida, saporis leviter adstringentis, cui aliquid salini jungitur.

SANICULA, Flores umbellatos in globum coactos habet, utroque involucro fustentatos, femina hirfuta & aspera: Europæa L. BLACWELL 63. slosculis omnibus seffilibus distinguitur.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Tam intus quam extus exhibita, multum ad usus vulnerarios laudatur, nec non ad sistendas hæmorrhagias; SALERNE, se inde largos sudores motos & sanguinem effusum dissolutum observasse, contendit.

* Aqua destillata SCHROED.

* SANFALUM Arab. Ejus tres species Album, Citrinum & Rubrum asservant officinæ, omnes in magnis & craffis frustis ad nos adducuntur, rubrum in maximis.

Album ponderofum eft, nullo vel odore vel fapore gaudet.

Citrinum colorem flavicantem habet, & fragrantem, fi fricatur, fpargit odorem.

Rubrum extus obscurius rubet, intus intensius rubrum, ita ut sanguineum colorem præ se ferat, linguam levi adstringente sapore afficit, ejus fibræ evidenter crispæ sunt.

SANTALUM. Corolla quadrifida gaudet, calice fupero instructa, diplofanthera, monogyna, fructu bacca.

Grefcit in India, maxime in Timora.

Citrinum, effe meditullium arboris, quod album tanquam alburnum ambit, testatur RUMPH: Santalum rubrum etiam meditullium alicujus trunci effe facile ex ejus forma patet, a proprio arboris genere defumi, IDEM fidem facit, ex Coromandel & Africæ regionibus Orientalibus ad nos mittitur.

Santalum citrinum largitur Oleum butyraceum, cujus odor ad ambram accedit, fpiritus vini inde plures quam aqua partes recipit, rubrum aquam vix tingit, fpiritum vini large. LEWIS. Ex Santalo citrino TA Olei odorati, Extracti aquofi, 5 fpirituofi; ex rubro $\frac{7}{16}$ Extracti fpirituofi, ultra $\frac{1}{8}$ aquofi obtinuit NEUMANN. Santalum citrinum I Olei odorati, Extracti aquofi 1/2, fpirituofi 1/6; rubrum Extracti aquofi falfo fubadftringentis 1/2, fpirituofi 1/2 circiter dederunt CARTHEUSER.

Primi Arabes tria Santala in Medicinam receperunt, citrinum ob fragrantiam, qua in regionibus Orientalibus maxime gaudet, ab analepticis virtutibus laudarunt, cum autem efficaciora cordialia inter nos proftent, ejus usus eviluit; quæ Rubro adferibuntur vires in hepar, denuo ex fignatura defumtæ fuiffe videntur & cum ardores ab affecto hepate furgere finxerint, hinc medicamentum, quod hepati opem fert etiam refrigerantes vires editurum effe fibi perfuadebant. Sanior pathologia etiam hoc medicamentum expunxit, illud unice adhuc coloris ergo adhibetur.

* Aqua destillata Santal. citrin. Parif. * Oleum destillatum Eorund. * Diatrion. Santalon. MyREPS. inconcinnam compositionem, a Rosis potius quam a Santalis denominandam, sub titulo Specierum Wurtembergenses recipiunt, simpliciorem Parisini Pulveris nomine : Emplastrum Santalinum five Incognitum Au-

Bbs

gustan. inconcinna compositio, quam a refolvente virtute valde laudant, si quas vires habet, Croco, quem recipit, erunt adscribendæ: * Unguentum Santalinum Viennens, minus laudanda compositio.

SCABIOSA Lat. Barb. Inde Radices, Folia & Flores folent proftare.

* Radices funt fibrofæ, ex parvis capitulis, quorum ad latus germen novi caulis accretum, quafi morfu notatæ effent, quibufdam impofuit, emittunt plurimas fibrillas capillares, gryfeas, ex rufo-flavicantes, evidenter amaras.

* Folia ex ovatis oblonga funt, hirfuta, odoris expertia, eorum fapor herbaceus, aliquid amari in receffu habet.

Flores tubulofi, cærulescunt, omni fapore æque ac odore carent.

Scabiosa. Corollas quadrifidas vel quinquefidas habet, irregulares & proprio calice fingulas inftructas, & plures calice communi comprehenfas, tetrantheras, monogynas & femina coronata: Arvensis L. BLAC-WELL 185. quæ Folia & Flores officinis subministrat, corollis quadrifidis, soliis pinnatifidis & laciniis distantibus agnoseitur; omnis Europæ civis: Succisa L. Barbaris Succisa seu Morsus Diaboli, Mors de Diable, Teusels Abbiss BLACWELL 142. Radices largitur, corollis quadrifidis, vix irregularibus, soliis lanceolato-ovatis, integerrimis distinguitur: Ubique præter Europam maxime Septentrionalem occurrit.

Herbam & flores a vi bechica & vulneraria folent laudare, flores priore fcopo in frequenti ufu funt & videntur demulcendo agere. Abfurdum commentum de radice a dæmone morfa, occafionem dedit, ut a non paucis, qui fibi plus fictionibus quam veri ftudio placent, ad graviffimos morbos fuerit commendata, fed nulla obfervatio circa eam aliquid, præ reliquis amaris præftantius detexit.

Aqua destillata VAL. CORD. ab aqua fimplici de. stillata nequaquam diversa. * Conserva foliorum Wurtemberg.

VERONICA Lat. Barbar. Veronique, Ehrenpreis. Ejus Folia ovata funt, crenata, leviter hirfuta, fapore inftructa leniter adstringente, cui levis, grata, & quæ aliquid aromatici habere videtur, amarities accedit.

VERONICA. Corolla inftruitur quadrifida; irregulari, fimili calice fustentata, dianthera, monogyna, fructu cordiformi : Officinalis L. BLACWELL 143. Spicis lateralibus, foliis ovatis, crenatis, caule decumbente distinguitur.

Crefcit in omni Europa.

Extractum aquofum & refinofum in pari ratione fubministrat, hoc magis amarum est, testibus LEWIS & CARTHEUSER. Extracti aquosi $\frac{2}{3}$, spirituosi $\frac{1}{2}$ fere, destillatione liquorem alcalino - urinofum, $\frac{1}{23}$ falis alcali fixi, cui non paucum falis communis commixtum erat, inde NEUMANN obtinuit.

Crebro omnino in ufu hæc planta folet effe, apud Germanos vix non ad omnia infufa pectoralia recipitur, pulmones roborando & ita expectorationem juvando agere videtur; ejus ope tuffes quæ phtifin minabantur curatas adducit HOFFMANN, in fuffocationibus, catarrhalibus nocturnis ufu fuiffe, vidit Ill. HALLER, fcabiem inde curatam HOFFMANN adducit, ELSNER calculum renalem ejus ope ad veficam promotum, eodem extus applicato ulcera cacoëthea fanata S. PAULI recenfet; præ reliquis plantis Europæis propius ad theam videtur accedere.

* Conferva VAL. CORD. * Extractum Wurtemb-* Aqua destillata VAL. CORD. iners omnino: * Aqua destillata cum Vino August. nec de hac aliquid proprii expectandum: * Syrupus August. * VIRGA AUREA MATTHIOL. Confolida Sarracenica THAL. Verge d'or, heidnisch Wundkraut. Ejus Folia longa sunt, angusta, fine acuto terminata, serrata, leviter hirsuta, pallidius viridia, fapore gaudent leviter adstringente, cui aliquid amari accedit.

SolidAgo. Floribus compositis mixtis, calice imbricato, oblongo comprehensis, receptaculo nudo, feminibus papposis gaudet : Virgaurea L. caule anguloso, racemis paniculatis, erectis distinguitur.

Ubique in Europa occurrit.

Ab ANDREA DORIA Genuenfi ex Africa in Europam, teste CÆSALPINO, allata est, cave tamen putes, eam tune demum Europæ indigenam evasisse, fed ex quo Dux Genuensis in Africa ejus vires est expertus, illa ex eo tempore semper ob virtutes traumaticas laudari cæpit, quas tam in externis quam in internis vulneribus confirmatas viderunt PONTEDERA & Cl. SCOPOLI, ejusdem vires vias urinarias ab arenulis liberandi, vulnera folidandi & graves pectoris morbos fanandi, propriis observationibus probat LISCHWIZ; BURGGRAFF mictum cruentum inde vidit curatum.

* Vinca per Vinca, $\chi_{2,\mu\alpha\beta}$ down, Pervenche, Inngrün, Sinngrün. Folia fiftit ex ovatis oblonga, integerrima, duriufcula, faturate viridia, inodora, leviffime fapida.

VINCA. Corolla infundibuliformi, calice quinquefido fuftentata, ifanthera, monogyna, folliculis duobus, teretibus, acuminatis agnofcitur: *Minor* L. BLACWELL 59. foliis ovato-lanceolatis diffinguitur.

Crefcit in Europa temperata, ad Boruffiam ulque afcendit.

A vi aditringente quibusdam laudatur, eam non notabilem esse fapor evincit, interdum recipitur ad infusa pectoralia.

VISCUS, ¿ia, Gui, Mispel, proftant hoc nomine in officinis furculi lignei, mox recti, mox incurvi, ramofi, qui fub cortice fusco & rugoso, substantiam includunt lignosam, ex ruso slavescentem, leviteradstringentem.

VISCUM habitu relativo diphyto, corolla quadrifida, in maribus tetrandra, in feminis monogyna & bacca globofa, monopyrena agnofcitur: Album L. BLACWELL 184. foliis lanceolatis obtufis & floribus axillaribus gaudet.

- Parafitica planta per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem, vario arborum generi, apud nos Pyris maxime innafcitur.

In plantis Americanis, fructificationem ab ea, quæ in Europæis obtinet, differre, LOEFLING annotat: Illustris DU HAMEL præ reliquis vegetationem illustravit & quod nonnisi a cacantibus turdis seminari possit, Veterum figmentum esse, ostendit.

Extracti aquofi falsi & amaricantis ultra $\frac{1}{4}$, refinosi austeri, nauseosi $\frac{1}{5}$ fere dedit CARTHEUSER.

Viscum pro varia arbore, cui innascitur, variare, & quernum reliquis præstare asserunt, & omnino inde differentiam surgere posse, tam ea quæ circa arbores pro varia matre, quibus inoculantur, variantibus obfervamus, quam ipsum Viscum diversis arboribus sustarte annotante CARTHEUSER, videntur surgers.

HIPPOCRATES folia vifci refolvendi fine adhibuit; ipfum vifcum roborantes vires edere WEISMANN obfervationibus probat, idem comitialibus proficuum effe PLINIUS monuit, ad epilepfiam etiam multum PARACELSUS laudavit, BOYLE feminam epilepticam eo curatam adducit, COLBATCH proprio tractatu multis obfervationibus id idem probare annititur, fimiles BOERHAAVE, CARTHEUSER, LOESEKE, Cl. VOGEL fubministrant; fateor me multum fufpicari, hunc visci usum a Druidarum superstitione originem habere, his cum Viscum, teste PLINIO, facrum suit, hinc illud etiam facro morbo medelam allaturum præsumebant, ejus memoria confervata suit inter eos, quibus magica placebant: cum nonnunquam exhibitum suerit epilepticis, quorum morbum vel antecedens medicatio vel Natura curaverat, quoque rationales Medici, sub ejus usu morbum cedere videntes, illud magni fecerunt; innumera, quod fine fructu datum fuerit, exempla præsto funt.

Substantia glutinosa, quam olim ex baccis parare folebant, hodie teste Ill. DU HAMEL ex cortice separant * izoc, Viscus, Vogelleim, Glu a Veteribus; monente GALENO, rubefaciendi ergo adhibebatur; hodie ejus usus inter Medicos eviluit.

B. ANIMALIA.

* COCCIONELLA Recent. Cochenille. Proftant inter nos hoc nomine Infecta, duas circiter lineas æquantia, utrinque rugofa, coloris intus punicei, extus atro-rufi, odoris nullius, faporis leniter adítringentis, cui aliquid naufeofi empyreuma referentis accedit.

Primus HERNANDEZ ejus mentionem fecit; DE ROUSCHER documentis etiam judiciariis, quæ ad naturam, collectionem & culturam faciunt, probat.

COCCIONELLA. Infectum alas quatuor, quarum fuperiores crustaceæ funt & marginatæ, antennas extrorfum incrassfatas, truncatas, thoracem marginatum & abdomen planum habet: Cacti L. Alis fuperioribus nigris, utrinque macula rubra notatis distinguitur.

In Regno Mexicano, Carolina & Georgia, obtinet; ad Antequera in valle Guaxaca maxime colitur.

Hæc animalcula per hyemem in domibus affervantur, tempore verno, propriis corbibus commifía variis *Cacti* L. fpeciebus admoventur, quas confcendunt & fpatio aliquot dierum novam prolem edunt, matres moriuntur, proles fefe Cacto fuftentat; cadavera matrum, proles quæ tertium aut quartum ætatis menfem attigit, hujus quoque progenies tri-vel quadrimeftris, refervatis eis quæ fequente anno gentem propagare debent, five aqua ebulliente, five calentibus laminis ferri enecata, nobis mittitur.

Extracti aquofi $\frac{3}{4}$, fpirituofi, magis rubri paulo minorem quantitatem, ultra $\frac{1}{11}$ aquæ, $\frac{1}{5}$ fpiritus urinofi, $\frac{1}{22}$ fere falis volatilis, ultra $\frac{1}{3}$ Olei empyreumatici inde obtinuit NEUMANN. Ejus colorem ab acidis exaltari, ab alcalinis profundiorem reddi compertum est.

Ab usu diuretico maxime laudatur, in comminuendo calculo vesicæ efficacem vidit STISSER, in Ischuria LISTER, in incontinentia urinæ STRUVE. Ad infucanda medicamenta inter nos præcipue adhibetur.

* ERINACEUS Barb. $i\chi \tilde{\mu} \oplus$, Herinaceus Veter. Herisson, Igel. Est animal quadrupes, cujus omne corpus præter ventrem, qui pilos habet, & pedes, aculeis ex susce albido variis obsidetur, insidias metuens, totum corpus in globum undique aculeatum contrahit, noctu modo incedit, interdiu quiessit, digitis quinque unguiculatis instructum.

ERINACEUS dentibus inciforiis in utraque maxilla duobus, quibus & canini accedunt & corpore aculeato gaudet: Europaus L. auriculis erectis distinguitur.

Occurrit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

In cibum nunquam recipitur, AVICENNA ejus carnem pueris in lectum mingentibus commendavit, Latino-Barbari adhuc magis abfurde, animal in cineres redactum, pro hoc scopo laudarunt, & doleo vel hodie adhuc hoc commentum obtinere, prudentius omnino GALENUS hos cineres ad excrefcentias & ulcera fordida abstergenda adhibuit, & carnem & cineres Poloni in plica adhibent. ERNDL.

LACCÆ GUMMI Arabum. Ejus triplex genus vulgo in officinis proftat:

* Lacca in baculis, Stocklack, crusta obscure rubra, inodora, frustulis ligneis teretibus accreta, accensa fuavem odorem emittens, evidenter ex cellulis sibi invicem agglutinatis efformata,

Lacca in granis, Gomme Lacque. Grana irregularia, parva, læte rubra refert, faporis & odoris expertia, igni commiffa in carbonem abeuntia, non fundenda, fuavem dimittunt fuffitum, inter dentes lentefcunt.

* Lacca in tabulis, Schellack, frusta refert majora, profundius rufa, quæ evidenter fusionem passa esse videntur, insipida, inodora, calore liquanda & suffitum non ingratum emittentia.

Laccam in baculis a formicis colligi & ramulis arborum agglutinari, GARTIAS AB HORTO vidit & GEOFFROI uberius probat; qui primus fagax perfpexit, eam fpeciem favorum effe, in quos propria infecta fuam prolem deponunt, & hanc ipfam pulchrum Laccæ colorem conftituere.

Laccam in granis, Croton Lacciferum L. foliis ovatis, tomentofis, petiolatis & calicibus tomentofis diftinctum, Indiæ civem, fubministrare, funt Auctores qui contendunt: Utrumque ex Afia Meridionali, Bengala maxime & Pegu ad nos adducitur.

Laccam in tabulis ex Lacca in baculis, in tabulas fuía, unde pro ufibus baphicis color extractus fuit, efformari, facile Auctoribus credo, nequaquam vero illorum opinioni poffum fubfcribere, qui illam ex Lacca in granis parari dicunt, quippe quæ colliquari nequit.

Lacca in tabulis tota a fpiritu vini diffolvitur, plane nullæ funt aquæ in eam vires.

Lacca

Lacca in granis $\frac{1}{9}$ Extracti aquofi, $\frac{7}{8}$ fpirituofi & cum deftillata fuerit $\frac{5}{8}$ fere Olei butyracei, $\frac{1}{8}$ fere liquoris aquofi, non falini, exhibuit NEUMANN.

Omni laccæ aliquid flavi accedit, rubedinem acida extollunt, alcalia deprimunt.

Multi fuerunt Arabes occupati circa laudandas Laccæ vires roborantes, hodie ea quæ in granis proftat, ad dentifricia maxime adhibetur: Lacca in tabulis unice ad ceram figillatam reciditur.

Tinctura G. Lacca MYNSICHT alumen recipit, Parifini minus bene fpirituofam præfcribunt, Noftrates majorem justo rationem Aluminis ei addere videntur.

SEPIÆ Os Lat. Barb. $\Sigma in \pi ior$, Sepiæ testum Veter. Os de Sèche, weiss Fischbein. Est testa e squammis coalitis efformata, albissima, oblonga, utrinque angustata, dura, cujus faciei concavæ substantia inhæret alba, pulverulenta, laxa, insipida, quæ cum ipsa testa faporem falsum habet.

SEFIA. Corpore nudo inftructus vermis est, bracchiatus, cujus corporis alterum latus os efformat; Officinalis L. tentaculis duobus & corpore ecaudato agnoficitur.

Copiofiffime in Oceano æque ac in Mari Mediterraneo occurrit.

Substantia pulverulenta $\frac{1}{40}$ Extracti spirituosi , $\frac{1}{72}$ aquosi falini, destillata autem $\frac{1}{8}$ spiritus urinosi , pauxillum Olei empyreumatici exhibuit; testa, similia extracta & eadem proportione dedit, destillatione inde $\frac{1}{72}$ spiritus urinosi & $\frac{1}{96}$ olei empyreumatici prodierunt. NEUMANN, qui quoque utramque substantiam in acidis solubilem esse vidit.

Vires, quæ ipfi adlcribuntur vel adltringentes, vel diureticæ, & ob quas ad gonorrhœam laudari folet, nulla fida obfervatio probavit; abstergentes, quas GA-LENUS inde prædicat, a caustica, quam in modum omnium testarum, dum calcinantur, induit, indole

ROBORANTIA.

pendent; abforbentes inde vires recte exfpectantur; præcipuus ejus ab Eodem jam annotatus ufus eft ad mundandos dentes, & hoc fine fubstantia ejus spongiosa maxime adhibetur.

2. FOSSILIA.

FERRUM, $\Sigma i \partial n g \oplus$, Fer, Eifen. Eft Metallum aqua octuplo gravius, præ reliquis difficillime fundendum & majore elafticitate inftructum, inter aurum & cuprum mediam firmitatem habet, rite cufum malleabile evadit, & fe in tenerrima fila duci patitur, a nitro & vitro faturni deftruitur, igne fcintillas evomit & in fcoriam nigram abit, ab omni fale, ab ipfa quoque aqua folubile, & hinc in aëre rubiginem contrahens, a magnete attrahitur, cum liquoribus inftringentibus nigrefcit, cum alcali principio inflammabili ditato cærulefcit, difficillime cum Mercurio jungitur, majori principii inflammabilis ratione ditatum Chalybs evadit.

Rariffime Nativum occurrit, in Senegal integras rupes efformare dicitur, quod fine ulla ulteriore præparatione in perticas cudunt, annotantibus Cl. Cour-TIVRON & BOUCHU. Mineræ ferri optime diftinguuntur in tales I. quæ formam glebæ metallicæ habent 1) fubflavæ, Pyrites crystallinus, figuratus, ferri, cupri L. 2) nigræ fubcærulescentes A. granulatæ a. granis lamellatis, Ferrum granofum & commune L. Hamatites niger CRONSTEDT. b. granis angulatis Sidereum 3 arenosum L B. totæ uniformes, a. magneti obsequiofæ, Ferrum chalybeatum, rhombeum, felectum L. Minera ferri Retractoria CRONST. Nigricans WALLER. b. magneti non cedentes, Minera Ferri grysea WALLER. c. polituram admittentes Ferrum chalybeatum L. Minera ferri specularis WALLER. C. in formam stalactitarum five stiriarum crystallifatæ, Ferrum hamatites nigrum L. Hamatites nigrescens CRONSTEDT, Hama. tites turritus WALLER. D. figura prysmatica, Molybdana Spuma lupi L. Spuma Lupi Auctorum, Wolfram vulgo. E. figura cubica vel octoëdra, Ferrum tessellare, crystallinum L. Minera ferri crystallisata WALLER. 3) albæ, Arsenicum album L. Mispickel CRONSTEDT, Pyrites albus Auctor. II. tales quæ forma terræ aut lapidis gaudent, 1) forma pulveris a. flavi aut rubri, Ochra ferri, martis L. Ochra vulgo, b. cærulei, Caruleum Berolinense nativum CRONSTEDT c. arenæ nigræ, Arena ferrea L. 2) forma lapidis mollioris a. in lamellas efformati a) rubri, Argilla rubrica L. Rubriga vulgo, B) rubiginosi, Minera lacustris numismalis WALLER. Pfenning-vel Blættel Erzt. 2) nigri splendentis Ferrum talcosum, virens, squammosum, micaceum L. Mica ferrea WALLER. Eifenrahm, Eifenmann, b. in globos figurati, Minera lacustris globosa WALLER. Ferrum glomeratum L. Mine en feves, Bohn-Erzt vulgo. 3) forma lapidis durioris a) rubri plus minus ad cæruleum vergentis a) figura angulari, Granatus metallicus CRONSTÆDT &) fubstantia radiata instructi, Hæmatites Auctorum Sanguine, Blutstein, Glaskopf, 2) fubstantia irregulari a. cum chalybe scintillas evomens Synople CRONSTEDT, b. mollior Minera lapidea VOGEL. b) flavi, Hamatites flavus CRONSTÆDT. c) albi a) figura angulari, Stannum cry= stallisatum album CRONSTEDT, Spuma lupi cudica WALLER. B) nulla figura regulari, Ferrum (pato/um L. Minera ferri alba CRONSTÆDT, Stahl-Erzt vulgo, d) cærulei Lapis Lazuli, e) nigri angularis Schoert vulgo, f) gryfei a) ferrum attrahentis Magnes, (3) duriffimi ad polienda metalla apti Smiris Auctorum Emery, Smyrgel,) laxioris Minera ferri grysea WAL-LER. g) rubiginosi Minera ferri palustris WALLER. Stuf-Erzt Noftrat.

Cc 2

Pyrita, Rubrica, Mica ferrea, Lapis Lazuli, Magnes, Granatus, Sinopel. non adhibentur ad excoctionem ferri, cum five fub forma nativa majori quæftu queant vendi, five difficilius fundi poffint, five ferrum pejoris notæ largiantur.

Vix aliquis occurrit terræ angulus, ubi non variæ mineræ ferri occurrunt, Suecia multas habet, quas Magnes attrahit, & quæ optimum ferrum largiuntur. Pyrites, hæmatites, ochra, rubrica, arena nigra, minera lacuftris utraque, minera alba, gryfea, & lapidea apud nos copiofe occurrunt.

Ferrum ex multis terris obtineri, non quod in iis hæferit, fed quod demum fub excoctione formetur, monui in *Inst. Chem.*

Ferrum, quod candens malleum non fert, dicitur Rothbrüchig & hoc vitium ab immixto acido vitriolico dicitur habere, id quod frigidum, dum malleo percutitur, diffilit, Kaltbrüchig appellant, & id arfenico adfcribunt.

Ferrum jam MELAMPUM intus roborandi ergo adhibuiffe, patet ex APOLLODORO, GALENO integri metalli virtus roborans, & ejus calcium vis adstringens fuit nota: MENGHINI experimentis, tam circa homines quam bruta institutis, ferri efficaciam in roborandas fibras evicit, ab ejus usu in omnibus numerum pulsuum augeri est expertus, qua hunc effectum edat ratione, non audeo decidere, id faltem mihi videtur, hoc metallum nexum elementorum fibræ modo,qui noftræ naturæ præ reliquis respondet, augere, cum reliqua five minus fufficienter agant, five rigiditatem, quæ præter naturam eft, inducant, in chlorofi derepenter pulsum ab usu Chalybis majorem & celeriorem fieri, exteriora corporis incalefcere, vividum facies reddi colorem, SYDENHAM observavit, VAN SWIETEN numerofiffimos cafus vidit, ubi folo ferro fuperabatur cachexia, Cel. TRALLES fæpius phlegma-

ticis & mucofis dedit, & pro fummo remedio habuit, inter hactenus cognita, ad inftaurandam vim hæmatopoieticam, quoties hæc ex fola debilitate folidorum, aut ex humorum aquofa, frigida, inerti indole furrexit; ob hanc vim roborantem ferrum, cum viscera fuerint obstructa, & in omnibus morbis inde oriundis cum magno fuccessu exhibetur, efficit enim, ut vafa obstructa se validius contrahant, & spissum quo obsidentur ulterius promovere queant, arteriis præterea inde roboratis, spissum humoribus inhærens attenuatur, in materiæ podagricæ anomaliis egregios inde effectus WERLHOFF vidit; inter emmenagoga & certiffimum & fecuriffimum effe, innumeræ obfervationes docuerunt. Nec male ferrum ad corrigendam acrimoniam acidam facit, illam abforbendo, & debilitatem ventriculi, unde furrexerat, corrigendo; idem etiam vermibus mederi, WERLHOFF & Cl. VAN DOEVEREN observationibus patet.

Dum intus affumitur, fæces ab eo folent nigrefcere.

Datur fecure ad grana viginti pro dofi; fed probe cavendum, ne limaturæ fordes, maxime de cupro, adhæreant, ipfa in tenerrimum pollen reducenda, & in vitro probe claufo affervanda eft, ne rubiginem contrahat.

Mineræ ferri, quas medicamentis adfcribunt, cum foveant ferrum principio inflammabili privatum, hinc Crocorum adftringentium vires edunt. Magnetem dentibus admotum odontalgiæ mederi, BORELLUS jam annotavit, recentius id ipfum varii Auctores confirmare funt annifi in *Gættingifche Anzeigen von gelehrten Sachen*, & apud GLAUBRECHT allegati, nec non apud REICHEL & LUDWIG, qui Auctores quoque obfervationes falutares ejus effectus in rheumatifmo, arthritide & affectibus nervorum teftantes recenfent.

* Æthiops Martialis LEMERY, firite paratus fuerit, est limatura ferri in tenuissimum pollen redacta; * Balfamum Chalybeatum, BEAUME d'Aiguilles Parif,

ad usus externos scopo adstringendi adhibetur: * Chalybs Sulphure preparatus ROLFINCK eft Crocus Martis ad indolem vitrioli accedens : * Bezoardicum Martiale, Pulvis Cachecticus LUDOVICI, Antimonium diaphoreticum martiale Wurtembergenf. vid. Instit. Chem. * Crocus Martis aduringens ad mentem RoL-FINCK a Parifinis & Nostratibus paratar, ferrum, ope ignis, principio inflammabili privando, Wurtembergenses pro illo vitriolum ad rubedmem calcinatum recipiunt: * (rocus Martis aperiens cum Sulphure ROLFINCK evidenter aliquid vitriolici recipit: Crocus Martis aperiens a Parifinis & Nostratibus paratur ferrum, fecundum POTERIUM, ope aquæ in rubiginem reducendo, Wurtembergenfes ad præcepta STAHL ferrum ex vitriolo ope alcali dejiciunt: * Crocus Martis cum sulphure & nitro, * Pulvis cachecticus BOECLER eft Crocus martis Sali polychrefto unitus: * Crocus Martis Antimoniatus STAHL. Cum omnes croci fint ferrum evidenter alteratum, hinc evidentius quam limatura martis adstringunt, & ipfi, ubi moderate roborandi & adstringendi scopus est, debent postponi: * Electuarium Chalybeatum August. cachecticis & fcopo emmenagogo olim ad drachmam unam pro dosi præscribebatur: * Essentia Martiata aperitiva Wurtemberg. est spiritus vini aromatibus & ferro imbutus: * Extractum Martis pomatum Wurtemb. evidenter adstringit: Flores Salis Ammoniaci Martiales vid. Inft. Chem. * Liquor Vulnerarius mineralis, Balsamum Vulnerarium DIPPEL. vix differt a Tinctura Martis adstringente Wurtemb. Globuli Martiales a fex circiter retro lustris in Gallia cœperunt in usum trahi, tam interne quam externe adhibentur, ferrum vehunt, cui tartarus unitus est: * Pilula aperientes STAHL. Pilulæ cachect. Wurt. * Pilulæ chalybeatæ Parif. Aloën recipiunt: magis omnino placent Pilula Martiales SYDENHAM, utinam optimum medi-

camentum semper recens pararetur, ne ferrum ab extracto vegetabili ad croci indolem deflectere poffet: Pulvis Cachecticus QUERCET, ad roboranda folida, incidendum mucum, absorbendum acidum facit; ambram & margaritas adjiciendo Completum reddunt Wurtemberg. minus placet * Pulvis de Chalybe Parifin. * Sal Martis RIVERII proxime ad Vitriolum martis accedit: * Tabellæ de Chalybe Parif. in parca nimis ratione videntur ferrum recipere: Tartarus Chalybeatus v. Inft. Chem. * Tinctura Hamatita Parif. non differt a Mynfichtiana: * Tinctura Martis adstringens Wurtemb. parum recedit ab Aperiente nigra ROLFINCK. * Tinctura Martis aperiens tartarisata LEMERY momentum spiritus vini adjiciunt, ut arceatur corruptio, prolixo labori optime folutio Tartari chalybeati in aqua substituitur: * Tinctura Martis cydoniata WE-DEL. Wurtembergenses aquam cinamomi spirituofam, nostrates 1/2 spiritus vini adjiciunt : Tinctura Martis pomata ROLFINCK: * Tinctura Martis carulea ETTNER ad morem Wurtemb. fi paratur, non evadit cærulea, curiofitati unice infervit: * Tinctura Martis helleborata WEDEL hypochondriacis olim multum laudabatur: * Tinctura Martis Mynsicht. Aperitiva Wurtemb. Azoph. PARACELSI a ZWOELF-FER reputata, non illepidum medicamentum aperiens videtur effe, fed fateor, in medicamentis aperientibus, spiritum vini semper mihi fuspectum effe : * Tinctura Stomachica martialis Edinburg. præter ferrum, aromata & amara recipit, non contemnendum medicamentum stomachicum: * Tinctura Martis cum vino malvatico & pomis aurantiorum Wurtemb. Tinctura Vitrioli Martis LUDOVICI vid. Instit. Chem. Wurtemberg. aquam Cinamomi adjiciunt, Noftrates coloris ergo flores Papaveris Rhœad. gratum medicamentum, olim in multo usu fuit pro roborando ventriculo: ab hac ratione virtutis medicatæ parum - differt. Tinctura Martis ex vitriolo ZWOELFFER. Omnes hæ tincturæ cum habeant ferrum per acida magis stypticum redditum, hinc manifestius adstringunt, & inter nos saltem exolescere cœperunt : Vinum Chalybeatum FALLOPII summis laudibus a BOERHAAVE extollitur, & egregium omnino medicamentum est ad vim hæmatopoieticam restituendam : datur ad aliquot uncias vel ante vel post pastum : Vitriolum Martis vid. Instit. Chem.

* MARCASITA Barbar. Bifmuthum vel Wifmuthum Eorund. Eft Semimetallum plumbo magis album, rigidum, in pulverem reducendum, ex teffulis majoribus efformatum, aqua decuplo circiter gravius, cum cobalto & zinco fusione non coiens, præ omnibus reliquis metallis minore igne fluens, ab acidis nitri & falis diffolvendum, in vasis clausis sub forma metallica sublimandum, ope ignis in vitrum flavum fundendum.

Occurrit I. Nativum. II. mineralifatum 1) facie Galenæ α) fquammis majoribus Vifmutum iners L. β) fquammis exiguis Vifmuthum commune L. hoc vulgo occurrit, 2) fquammis cuneatis Vifmuthum Martiele L.

Paffim per Europam occurrit, creberrime cobalto junctum.

Vires Marcafitæ in corpus humanum nondum liquent, qui vina inde mangonizata colicam Pictonum excitaffe contendunt, videntur plumbum pro marcafita habuiffe, hæc enim, dum cum acido vegetabili acidum & ftypticum faporem contrahat, nunquam certe tanquam vini mangonium poteft adhiberi.

Magisterium BASIL. VALENT. Blanc d'Espagne ad cofineticos unice usus adhibetur, frequentius usurpatum cutim defœdasse observatum est, post ejus usum internum insignes anxietates præcordiorum surrexisse, POTT observavit.

* PUMEX, zurongic, Pierre Ponce, Bimfenstein. Est Lapis variæ magnitudinis, aqua levior, multis foraminibus pertusus, non admodum durus, ejus habitus, quod aliquando calore liquatus fuerit, evidenter evincit, fapor & odor, fi quos habet, ipfi non proprii funt, fed a mari, cui innataverat, accreverunt.

Pumex Vulcani L. Occurrit in mari, in quod ex montibus ignivomis, in quibus folis formatur, ejici folet, illi qui in fluviis reperti fuerunt, eo plures per caufas fuerunt delati.

Efformatur evidenter a vario terrarum genere, igne validiffimo fuío & quod fubito aqua extinctum fuit.

Tanquam medicamentum quod dentes detergit, nec non tanquam farcoticum a GALENO laudatur, meliora hodie de regeneratione carnis edocti, eum ad hunc fcopum non ulterius adhibemus, nec ad dentifricia laudandum ducimus, cum inde non modo fordes, fed etiam crufta lapidea, ad confervationem dentium adeo neceffaria, abradatur. Num illi fidem merentur, qui lapidem nulla aqua folvendum, ad decocta fanguinem depurantia laudant?

* STANNUM, *nassiregG. Plumbum album* Veterum, qui proprie plumbum ex glebis argento divitibus excoctum, *Stannum* dixerunt. Eft metallum, bifmutho & zinco exceptis, leviffimum, albedine & elasticitate plumbum vincit, leviori calore funditur, post plumbum metallorum molliffimum, in omnibus acidis nec non per alcali folubile.

Occurrit I. Nativum in Anglia & Suecia II. Sub forma glebæ 1) non figuratæ a) fplendentis minera hermaphrodita, Zwitter, β) non fplendentis Stannum amorphum L. 2) crystallina a) nigra Stannum crystallinum & granulatum L. Graupen β) rufescente Granatus CRONSTÆDT. γ) alba Stannum spatosum La In America, Anglia, Suecia, Saxonia, Bohemia & Silefia occurrit.

Omnes glebæ stanni arsenico sætæ sunt, quod ipsum etiam stannum adeo pertinaciter retinet, ut ejus aliquid, vix non ex omni, quod vulgo prostat, ratione ab Illustri MARGGRAFF indicata, inde possit separari. Præterea notandum, quod stannum nunquam sincerissimum in tabernis occurrat, eidem semper alia metalla adjecta sint, ut in *Inst. Chem.* monui, a quibus quoque effectus, qui inde in corpus humanum sluunt, erunt dijudicandi, rarior hinc ejus est us internus & omnino optandum esset, ut metallum vix non semper substantiis homini evidenter noxiis instructum, parcius ad supellectilem cibarium reciperetur.

Primus PARACELSUS stannum contra vermes laudavit, ALSTON ejus usum ab Empirica quadam Belgica accepit & eum pluribus observationibus, ad ipfam etiam tæniam cucurbitaceam fugandam facere vidit, primo die stanni comminuti unciam unam cum syrupi simplicis unciis quatuor exhibet, fecundo & tertio die singulis unciam dimidiam cum Syrupi unciis duabus propinat, quarto die eccoprotico alvum laxat. MEAD afferit, se jam pluribus retro annis stannum rasum cum successur vermes exhibuisse; sed idem non femper votis respondere Cl. VAN DOEVE-REN annotat.

* Bezoardicum Joviale Wurtemb. eft Bezoardicum minerale, cui aliquid calcis stanni accrevit : * Antihecticum POTERII vid. Inst. Chem. ad sudores colliquativos hecticorum commendatur; nonne absurdum est ad sudores sistendos calcem antimonii exhibere?

ZINCUM Recent. Spiauter. Est fubstantia metallica, cujus primus PARACELSUS meminit, nec malleabilis, nec in pulverem terenda, ejus color ad cæruleum vergit, fusum in flammam viridescentem erumpit, totum in floccos albos vertitur, cuprum flavo colore tingit, ejus gravitas septuplam circiter rationem habet, ab omnibus acidis solubile, ab alcali nequaquam.

Occurrit I. fub forma lapidis xad µuía, Cadmia, Lapis Calaminaris Lat. Barb. Gallmey, Zincum Calaminare L. qui vario colore ludit, in Polonia, Anglia, Silefia, Germania Inferiore obvius. Obiter hic annotandum duco, Veteres Cadmiam dixiffe, quicquid parietibus fornacum, dum glebæ metallicæ fundundur, adhæret, feculo demum quarto hoc nomen illi, de qua nunc loquor, fubftantiæ inditum fuit: occurrit Zincum II. fub forma mineræ 1) in cryftallos efformatæ Zincum cryftallifatum L. 2) non cryftallifatæ A. compactæ Zincum Swabii, ftibiatum, fterilum L. B. fquammofæ Zincum rapa L. II, I. & II. 2. B. rarius, II, 2. & vix non ubique ad metallifodinas fub nomine Galenæ fterilis, Blende reperitur.

Zinci maxima quantitas ex India Orientali adducitur, in Europa, Goflariæ proprio fornacum apparatu, a SCHLUTER defcripto, paratur. Cum Zincum igne fufum in flores refolvatur, hinc, dum fubftantiæ eo prægnantes funduntur, illi & parietibus vaforum & vafis, in quibus fufio inftituitur, folent accrefcere, quia autem ipfis illis fubftantiis variæ aliæ vix non femper junctæ effe folent, quæ vi ignis agitatæ in fublime quoque aguntur, & Zinco accrefcunt, hinc iftud hac ratione obtentum diverfiffimum occurrit, de cadmia fornacum nihil in univerfum poteft determinari, illa nunquam ad ufus medicatos eft adhibenda.

Pulvis albus, qui fornacibus & crucibulis, in quibus Lapis Calaminaris five zincum liquatur, adhæret $\pi \circ \mu \phi \delta \lambda \sigma \xi$ Veterum, Nil medio ævo audire cœpit, hodie creberrime terra qualicunque alba & macra folet adulterari; hic idem cum penitus exuftus non fit, gryfeus, & fornacis lateribus five virgis accre. scendo in formam laminarum efformatus omodoc Veterum esse videtur, & ab Arabibus Thutia dicitur, eam cum hi ab Alexandria petierint, hinc & hodie adhuc inde denominatur.

Zincum fub forma metallica nunquam in ufum medicatum recipitur, Lapis Calaminaris, Nihilum & Thutia fcopo adftringendi & exficcandi extus adhibentur & his fcopis in morbis oculorum præcipue ufurpantur, Thutia partes excoriatas afpergere folent: cum autem Nihilum vix non femper adulteratum & Thutia variis heterogeneis inquinata proftent, hinc illis melius fubftituuntur, quos in officinis parant.

* Flores Zinzi, qui obfervante Illustri GAUB, ad aliquot grana de die dati, epilepsiam fugare solent: Empl. Diapomphol. vid. Plumbum: Empl. Gryseum vid. Plumbum. * Unguentum de Thutia Paris. proxime accedit ad Unguentum ad oculos August. sed nullam Camphoram habet, non contemnendum ad lippitudinem serosam medicamentum: * Unguentum Diapompholygos NICOL. Exsiccandi ergo ad vulnera & ulcera oculorum, discutiendi scopo ad ophthalmiam adhibetur: Unguentum Nihili August. ad omne ophthalmiæ genus præscribitur, absorbentia non male ex eo expungerentur : * Unguentum Ophthalmicum Nostrat. antecedente validius repellit & abstergit.

§. 33.

B. ADSTRINGENTIA FORTIORA.

Hæc cum vix non omnia, quando fanguini adjieiuntur, eundem cogant, hinc quoque Incrassantium vel Coagulantium nomine veniunt, eadem dum exhibentur, ut orificia vasorum angustent, servolued. surlued appellantur: cum cutis inde densior reddatur runevolueov seu Condensantium nomen accipiunt, ad vulnera & ulcera solidanda dum adhibentur, Trau-

matica, in quibus error impactorum obtinet, aptur, vafis, in quibus error impactorum obtinet, applicata, Repellentium vices fubeunt, dum autem eorum ope vafa conftringere tentant, ne humores noxios admittant, Defensiva five Intercipientia audiunt; horum medicamentorum agendi modus evidenter ex eorum effectu in pelles animalium elucefcit, quippe quæ inde in corium denfantur; videntur agere, gluten ex fibris imbibendo.

§. 34.

Indicantur Adstringentia fortiora, quando aliquis humor cum magno periculo excernitur, ut vafa con. stringendo effluxum moderentur, vel inhibeant, adhibentur porro cum successfu, quando ope republionis discussio potest obtineri. Contraindicantur autem omnino, quoties a retento intus humore graviores noxæ metuendæ funt, aut obstructio eo usque est progressa, ut nonnisi resolutione aut suppuratione posse vinci. Per eandem fibræ non tam roborantur, quam potius rigidæ redduntur, hinc ab eorum imprudentiori usu omnia, quæ a rigiditate & ab immeabilitate humorum metuenda funt mala, furgere folent, læfæ vires digestionis præcipue & varium obstructionum genus, maxime in fystemate Venæ Portarum.

a) VEGETABILIA.

ACACIA, anaría, Schlehen; hoc nomine Succi, Fructus exficcati & Flores proftant.

* Succus. Ejus duplex genus officinæ affervant, Ægyptiacum & Nostratem. Ægyptiacus occurrit sub forma panum rotundorum octo unciarum pondus usque æquantium, ex ruso nigricantium, in ore liquantium & sapore austero, adstringente instructorum. Adducitur ex Ægypto, ubi exprimitur, observante jam DIOSCORIDE, & confirmantibus ALPINO & HAS-SELQUIST, ex fructibus immaturis.

MIMOSÆ. Corolla quinquefida fimili calice fuftentatæ, ut plurimum polyanthera, monogyna, fructu longo inftructæ: Niloticæ L. fpinis patentibus, foliis bipinnatis, partialibus extimis glandula diftinctis, fpicis globofis pedunculatis diftinctæ.

Primi Arabes huic fucco fubftituerunt

Nostratem magis nigricantem, cæterum fapore & reliquis qualitatibus priori fatis fimilem, eum five in tabulas efformatum, five vesicis inclusum olim affervabant. Solent etiam affervare ipfas * Acacias exficcatas quæ nigræ funt, parvæ, rugosæ, & cum ob adstringentem, qui inde expectatur, virtutem, immaturæ foleant adhiberi, fapore acerbo præditæ, hi fructus enim, quando sub finem demum Octobris decerpuntur, fatis mites solent esse, & a plebe tanquam fructus horæi comedi; fed prostant quoque

Flores, qui funt albi & exficcati, parum ad flavedinem vergunt, fuavi odore & amaricante fapore inftructi.

Prunus spinosa L. BLACWELL 494. foliis lanceolatis glabris & ramis spinosis agnoscitur.

Crefcit in omni Europa præter maxime Septentrionalem & Meridionalem.

Ex floribus Extracti aquoli & amari $\frac{1}{2}$, refinoli falini & amari $\frac{1}{4}$ obtinui.

Fructus immaturi & uterque Acaciæ fuccus valide adîtringunt, a fructibus îtomachum lædi & dolores capitis excitari GALENUS monet, SCHWENCKFELD inde dyfenterias fufcitatas obfervavit. Flores cathartico fcopo adhibere folent, hunc effectum ratione principii refinofi, quo fcatent, videntur edere, hinc obfervavit Cl. VOGEL, quod non raro tormina excitent; apud nos obtinet mos, tempore verno corum manipulum unum cum fero lactis infundere, & hoc medicamentum per aliquot continuos dies exhibere, ut fordes per hyemem collectæ evacuentur; exficcatos infufis laxantibus adjiciunt.

Aqua destillata florum HIERONYM. BRUNSVIC, grato, quem a nucleis denominant, gaudet, odore, præeunte TRAGO, ad affectus pectoris adhibetur: * Syrupus florum WITTICH cum Syrupo florum Perficorum ratione virium convenit.

ACETOSÆ RADICES vid. Olera.

AGARICUS QUERCUS Parif. Non raro pugnum aliquoties magnitudine fuperat, portione, qua ex arboris trunco eminet, ventricofus, ex oblongo rotundus, hinc inde in tubera non multum eminentia elevatus, bafi gaudet plana extremitatibus tubulorum fufcis obfeffa, præter bafin tegitur cuticula umbrina, ficca, tenaci, fub qua caro fulva hæret, ex tubulis arctiffime congeftis efformata, ut continua effe videntur, medium fungi & ejus bafin fines tubulorum magis diftantes efformant, odor ipfi nullus eft, fapor adftringens.

BOLETUS fungus est, qui substantia porosa gaudet : Igniarius L. colore cinereo & carnis majore parte visui continua & habitu acauli distinguitur.

Frequens antiquarum arborum truncis accrefcit.

A longiffimo retro tempore hujus fungi caro, coctione & malleo emollita, pro fomite igniario infervit, pro hoc fcopo ipfi quidam nitrum, quidam pulverem pyrium, quidam plane nihil adjiciunt. Fomitem igniarium, bibulam fubftantiam vafis diffectis applicare, jam diu in more eft, ut fanguinem recipiat, ipfis vafis arctiffime adhæreat, & illis tempus, quo fe contrahere & claudere queant, concedat; Anno 1751. Cl. BROSSARD Chirurgus oppidi Chartres in Ducatu Bituricenfi, munere honorifico & ftipendio annuo ab augustissimo Rege fuit donatus, quod eundem, ad sistendam ex præcisis majoribus etiam arteriis hæmorrhagiam adhibere docuerit, sed prolixa quam præcipit fungum præparandi ratio, a vulgari, qua in fomitem vertitur, vix differt: Brossardianum remedium suis observationibus confirmarunt Cl. MORAND, FAGET, WARNER, SHARP, ACRELL, WATSON, MOLINELLUS, RIVERIUS, ROCHARD, CHABRON, DE HAEN, MONTET, ANDOVILLET, FORD,' THORNHILL, PARSON, PLENCK &c. varii etiam fungum ex quacunque arbore defumtum efficacem funt experti; LE CAT ob infignes, quos inde oriri vidit dolores, eum rejicit.

AGRESTÆ SUCCUS vid. Uve.

BISTORTA Lat. Barb. Schlangen- oder Natterwurzel. Recipimus inde Radices, quæ pollicis craffitiem habent, extus profundius rubræ, cum vestigio flavi, transversim rugosæ, incurvæ, interdum aliquoties flexæ, faporis evidenter adstringentis.

Polygonum Bistorta L. BLACWELL 254. Caule fimplicisfimo monostachyo, foliis elliptico-lanceolatis, petiolis alatis distinguitur.

Crescit in omni Europa, præter magis Septentrionalem.

Tam spiritus vini, quam aqua, ejus principia adstringentia recipiunt, & Extracta multum adstringentia largiuntur. LEWIS. ³/₈ Extracti aquosi exhibuit CARTHEUSER.

Recipiuntur hæ radices ad infusa & decocta, quibus valide volumus adstringere, dosis vix ultra sessari drachmam extenditur, externe quoque ad eosdem scopos in usum trahitur.

* BOLETUS CERVINUS Latin. Barb. Hirschbrunst. Est Tuberis genus quod ad magnitudinem Juglandis usque

ROBORANTIA.

ulque ascendit, exficcatum sub cortice sicco, tenaci, flavicante, copiosifsimum pulverem nigrum includit, odoris & faporis expers.

Lycoperdon Cervinum L. quod fub terra hæreat & farinam includat, diftinguitur.

Occurrit passim per Europam, diversisfimis figuris ludens.

Primus MATTHIOLUS fabulam, hunc fungum a cervis libidinofis e terra erui, adduxit, eam dein alii magis exornarunt, fingendo eum ex liquore feminali cervorum furgere, unde ad rem veneream facere creditus fuit. Sed omnino præ Bovifta nullas alias vires habet.

BOVISTA Barb. Crepitus Lupi, Bubenvist, Vesse de Loup, Bovist. Hoc nomine prostat substantia laxa, spongiosa, levissima, ferruginea, odore nullo, sapore adstringente instructa, inclusa sungi generi quod dicitur.

Lycoperdon Bovista L. eo, quod supra terram eminet, extus glabrum est & laciniis irregularibus dehiscit, agnoscendum.

Crefcit per omnem Europam.

Ad fiftendas hæmorrhagias a longo retro tempore in ufu fuit, fubftantia bibula vulneri applicata fanguinem recipit, vulneri accrefcit & illud obturat, Cl. LA FOSSE hæmorrhagias post amputationem femoris in equis ejus ope stitit, naribus quoque fanguinem fundentibus admovetur.

* CUPRESSUS, nomágios @, Cypres, Cypressen, inde recipimus Nuces, quas Veteres Galbulos dixerunt, Folia & Lignum.

Nuces funt Coni fubrotundi, qui dimiffis feminibus, ex fquammis clavos referentibus, uni communi axi affixis conftant, fuperne gryfeis, inferne rufis, fapore gaudent adftringente, cui aliquid refinofi & falini accedit.

Dd

Folia pinnata funt, pinnis imbricatis, non raro denuo fectis, viridia, fapore refinofo adftringente, nequaquam amaro, inftructa.

Lignum sub cortice ferrugineo ex albo flavicat, odore nullo gaudet, nec ego saltem aliquem proprium in illo potui detegere saporem.

CUPRESSUS. Relativa monophyta, floribus gaudet amentaceis, maribus tetrantheris, feminis stylis evidentibus carentibus, nucem angulatam excludentibus: Sempervirens L. BLACWELL 127. folia imbricata quadrangularia habet.

Græciæ & Afiæ indigena arbor, noftræ hyemis quoque patiens eft.

GALENUS fructus ad alvi fluxus laudavit adftringendi ergo, fequior ætas eis ad fugandas febres ufa eft, & in pulverem redactos ad drachmam dimidiam adhibuit, hodie una cum foliis, ipfis minus efficacibus, eviluerunt, æque ac lignum, HIPPOCRATES ramentorum fuffitum ad morbos uterinos laudat.

CYDONIA vid. Fructus horai.

* EQUISETUM, ^{Immegic}, Prêle, Queue de Cheval, Katzenwadel. Hoc nomine proftant Cauliculi virides, nodis diftincti, ex quibus prodeunt fetæ prælongæ cauliculis nonnifi craffitie cedentes, fapore gaudent mediocriter adftringente & leviter falino.

EQUISETUM. Fructificationibus imperfectis clavæformibus, polline fætis, in fpicam collectis gaudet : Arvense L. BLACWELL 217. scapo folioso sterili & foliis prælongis distinguitur.

Crefcit per omnem Europam.

Parifini Equifetum byemale L. adhibent.

Arabes adstringentem plantam effe reputarunt, hinc a variis Auctoribus ad fistendos alvi fluxus & diarrhœas commendatur, sed Illustri HALLER vacca ab ejus usu diarrhœa periit, evidentius in renes agere videtur ex observatione HOYER, & quod armenta eo pasta, urinam fanguineam minxerint Verhandl. der Holland. Maatschapp. & in nephritide calculosa prodesse, testatur HOFFMANN; sed eodem se mictum cruentum in puella curasse DE HELWICH, Vratislavienfes, BURGMANN testantur. Medicamentum incerti usu, a quo ego faltem resolventes potius, quam adstringentes effectus exspectarem, jure exsolevit.

FRAGARIA vid. Fructus Horai.

FRAXINUS vid. Amara.

GRANATUM vid. Fructus Horai.

* HYPOCISTIDIS SUCCUS, 2020 The imoniput , confiftentia, colore, fapore, Succo Acacize adeo fimilis eft, ut vix ab eodem poffit diftingui.

CTTINUS L. Corollam quadrifidam habet, calice diphyllo fuftentatam, diplofantheram, monogynam, baccam polypyrenam.

In Europa Meridionali, ad radices Ciftorum crefcit. Totus fere in fpiritu vini diffolubilis, LEWIS.

Eafdem cum Succo Acaciæ vires habet.

JAPONICA TERRA vid. Amara.

MALVA ROSEA vel ARBOREA, Rose tremiere, Erndtrose. Hoc nomine officinæ recipiunt flores pentapetalos nigricantes, duplici calice fustentatos, odore nullo, sapore adstringente præditos.

ALCEA L. BLACWELL 45. Corolla pentapetala regulari, calice duplici, externe fexfido, interne quinquefido, cincta, polyanthera, monadelpha, monogyna, feminibus circa receptaculum commune articulatis agnofcitur.

Sponte in Afia crefcit, Seculo XVI demum in Italia innotuit, ex innumeris ejus varietatibus, nigra modo, præ reliquis quippe magis adstringens, in ufus medicatos recipitur.

Ob vim adstringentem, qua gaudent, ad gargarismata, ubi fauces roborandæ sunt, solent assumi, earum fex drachmæ hoc scopo, cum una menstrui aquosi libra decoquuntur.

MESPILI vid. Fructus Horai.

* MYROBALANI, MugoBararos nequaquam veterum fed recentiorum Græcorum. Sunt Fructus carnofi, exficcati, nucem includentes, fapore adstringente præditi. Quinque species Arabes & Græci recentiores recensent & officinæ adservant : Citrinæ L. BLAC-WELL 401, 3. funt rotundæ, pollice longiores, ad nigricantem colorem vergunt, utrinque obtufæ, ftriatæ, tenaces, amaræ, austeræ, continent sub officulo fcabro, angulofo, obtufo, nucleum corneum: Chebulæ 401, 2. Citrinis majores sunt, turbinatæ, ad colorem fuscum vergunt : Bellirica BLACWELL 401, 1. Nucem moschatam subrotundam referunt, pedunculo instructæ, pallidiores: Emblicæ BLACWELL 400 antecedentibus minores, figuram habent hexangularem, irregularem, nigricant, potius frusta quam integri fructus videntur effe: Indæ BLACWELL 401. 4quas quoque Nigras appellant, ex ovatis oblonga funt, non striatæ, sed rugosæ, foris nigræ, intus substantia quasi picea refertæ, omnium minimæ.

Omnia hæc Myrobalanorum genera ab eadem arbore fubministrari, ratione maturitatis maxime differre, olim jam creditum fuit, conf. MESUE, & nostra ætate autoptis Patribus KERNER, COEURDOUX & BOURDIER confirmatum, fecus aliis autoptis videtur GARCIA AB HORTO, RUMPH &c. Lis folis oculis decidenda, in Europa non potest decidi. RUMPH teste, Emblicam fubministrat.

PHILLANTHUS. Planta relativa monophyta, corolla fexfida non colorata, in maribus trianthera, in feminis trigyna & nectario ornata, capfula triloculari gaudens: *Emblica* L. foliis pinnatis floriferis, caule arboreo, fructu baccato diftinguitur.

Crefcit in Java, Malacca & Macaffar.

ROBORANTIA.

Primi Arabes hos fructus inter medicamenta receperunt, evidenter adítringentes, ita ut Indi eis pannos imbuant, quo melius pigmenta retineant, & obfervante ALTSON, cum Vitriolo atramentum efforment, hinc pro corrigenda virulentia purgantium adhibebantur. Multi ex eo, quod Veterum $\phi_{ouvome}\beta_{\alpha\lambda\alpha'}$ ves, quibus purgantes vires adfcripferunt, cum $\mu vgo \beta_{\alpha\lambda\alpha'vou}$ Recentiores confuderint, has quoque catharticis adfcripferunt; hodie eviluerunt.

MYRTUS vid. Aromata.

QUERCUS, Seus, Chêne, Eiche. Inde Folia, Glandes, Gallæ, officinas ingrediuntur.

* Folia funt oblonga, firmula, laciniis pinnatis finuata, lingua inde multum adstringitur.

* Glandes, Bazavos, Eicheln ovato-oblongæ funt, ventricofæ, continent fub cortice ficco & fragili nucleum ovatum, intenfe amarum & adstringentem.

Gallæ, untides, funt fubftantiæ rotundæ, tuberculis obfeffæ, foramine perforatæ, extus colore albido, rufefcente, nigricante inftructæ, varia magnitudine ludunt, intus fubftantia mox fungofa, mox denfa & nigra fartæ, faporem habent adítringentem & acerbum; non raro accidit, ut fubftantia nigricans in proprium corpus colligatur, quod in modum nuclei Gallæ medium a reliqua fubftantia fungofa liberum occupat.

QUERCUS. Planta relativa monophyta, flores mares hex-ad decantheri in amentum collecti; feminini corollam ex foliolis imbricatam habent, monogyni, capfulam uno nucleo fœtam maturant: Robur L. BLACWELL 487. foliis femipinnatis, pinnis obtufis, finubus acutioribus diftinguitur.

Crescit per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem, nec in altiores montes ascendit. Multum genus Cynipis L. infecti quatuor alis membraceis inftructi & cujus femella aculeum in cauda habet, genus, teneras quercuum partes fuo aculeo perforare, eo ovulum deponere, & ita efficere folet, ut pars vulnerata copiofiores humores accipiat, magis dilatetur, in tumorem excrefcat; vermis ex ovulo exclufus, cum ad juftum incrementum pervenerit, carcerem erodit & foramen, per quod exierat, relinquit, fi autem vermis, antequam potuerit evolare, perit, Galla imperforata manet, & tales olim $\partial_{\mu} \varphi_{\pi\pi} / \partial_{\pi c}$ appellabantur; in ufum trahuntur illæ gallæ, quæ ad bafin petiolorum hærent, & quarum Cynips colore nigro, pedibus gryfeis & femoribus fufcis diftinguitur.

Quo calidior est regio, quæ gallas producit, eo ipfæ reputantur meliores, hinc Orientales præferuntur Europæis, & illæ, quæ ex Aleppo adducuntur, reliquis omnibus folent anteponi; pondere, quod multis tuberculis quasi spinosæ sint, diffractæ nucleum fuscum includant, & extus flavæ sint, probantur; gryfeas ad nigrum accedentes solent cæruleas appellare.

 $\frac{7}{8}$ Extracti aquofi, $\frac{3}{4}$ fere Extracti refinofi exhibuerunt. NEUMANN.

Omnes quercus partes, adîtringentes vires habere rectifime GALENUS monet, & earum decoctum ad omne genus fluxuum commendat; a foliis autem, præeunte HIPPOCRATE, difcutientes effectus exfpectat, folis foliis magnum vulnus folidavit RENEALME. Idem GALENUS gallas ad drachmam unam pro dofi, pro fugandis intermittentibus commendavit, quam præpoftere autem hic adhibeantur alibi monetur; eafdem tanquam medicamentum uterinum externum HIPPO-CRATES in ufum traxit. Hodie nulla ulterius quercus pars intus propinatur, folia & gallæ ad decocta roborantia externe interdum adhibentur, gallæ, præcipue cum validius adftringendi mens eft, cortices ad debilitatem poft hydrocelen, ad ulcera inveterata & putrida cum fuccessi extus adhibitos Cl. PLENK adducit. Glandibus dum primas gentes vixisse legimus, id non de Quercus Roboris L. fructibus, fed de speciebus quibus dam exoticis, quarum fructus edules funt, & quarum unam PARCKINSON allegat, erit intelligendum.

* Aqua destillata foliorum VAL. CORD.

* PENTAPHYLLUM, Terri pollor, Quinquefolium, Quinte feuille, fünf Fingerkraut. Radices inde & Folia recipimus.

Radices funt fibrofæ, earum modo cortex, qui rufus est, & sapore evidenter adstringente gaudet, in usum trahitur.

Folia in quinque, interdum in feptem lacinias fecta, laciniæ variam magnitudinem habent, viridia, ferrata, leviter modo linguam ftringentia.

POTENTILLA. Corolla pentapetala gaudet, calice decemfido fuftentata, polyanthera, polygyna & feminibus nudis: Reptans L. BLACWELL 454. foliis digitatis, caule repente, pedunculis unifloris diftinguitur: Anferina L. foliis pinnatis, inferne tomentofis, pedunculis folitariis diversa, a quibusdam quoque recipitur, priori ratione faporis & virtutis medicatæ omnino fimilis.

Utraque per Europam vulgaris.

Radicem deficcandi scopo GALENUS laudat, adstringendi ergo interdum ad decocta recipitur; foliorum, quæ leviores vires habent, usus eviluit.

Rosa, ¿¿Jor, variarum ejus specierum Flores, aliquarum quoque Fructus recipimus, nec non Excrescentiam morbosam.

Rofarubra, Rofes de Provins, Effig-Rofen affervantur petala, calice, qui Veteribus Alburnum dicebatur, exempta, nondum expansa, quæ radoutes Veteres dixerunt, & unde ungues refecti funt, profundius ru-D d 4 bra, odorata, fapore adstringente instructa; desumi proprie debent de

RosA. Corolla pentapetala regulari inftructa, calice quinquefido fuftentata, polyanthera, polygyna, calice in fructum carnofum umbilicatum abeunte gaudente: Gallica L quæ floribus folitariis, calicis foliis fex paribus pinnarum inftructis, petiolis & pedunculis aculeis mollibus obfeffis diftinguitur; ad vicum Provins non procul Parifiis occurrit.

Sed ut plurimum inter nos faltem & in Germania fubstituuntur flores Rofa fativa rubra C B BLAC-WELL 78. cujus calicis folia, paucioribus pinnis instruuntur, & flores congesti præcedente minores funt & minus ad nigredinem vergunt.

In hortis & ad vicum Mittel-Hausbergen ad vineta colitur.

Rofarum pallidarum, bleiche Rofen, leibfarbene Rofen nomine, petala variarum Rofarum fpecierum, quæ colore rubro dilutiore gaudent affervantur, odore fuavi nares feriente gaudent, fapore dulci, cui aliquid adftringentis accedit.

Rofa Damascena L. BLACWELL 82. floribus congestis, ex albo rubellis, calicis laciniis tribus, totidem paribus pinnarum laciniatis, & pedunculis spinosis distincta & Rosa Centifolia L. præcedente major & petalis magis rubris instructa.

Utraque in hortis colitur, ultima versus finem Seculi XVI innotuit.

Rofa alba petala, colore albo, nec non odore remiffiore, ab antecedentibus differunt; apud Parifinos petala minora funt, gratiffimo odore inftructa.

Rofa alba L. BLACWELL 73. flores congestos, tres lacinias calicis pinnatas, & pedunculos spinosos habet. Parisienses adhibent Sempervirentem L. floribus racemosis, calice oblongo, hirsuto, reflexo agnoscendam, Galliæ Meridionalis civem, & quæ

424

in nostris hortis culta contra graviores hyemis rigores defendenda est.

* Rosa Rubra vulgares, gemeine oder Zucher-Rosen Wurtemberg. dilutius rubent, odorem multum fundunt, faporem dulcem, cum levi adstrictione habent.

Rofa Canina L. BLACWELL 8. calicis cylindracei folia reflexa, ejus tres lacinias pinnatas, flores congestos, pedunculos molles habet.

Crefcit per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem.

Ab hoc ultimo frutice etiam defumuntur Fructus, zovós βatoi, Cynofbati, quibus vocibus autem non raro Veteres Ruba indigitarunt: Cynorrhoda, Hagenbutten vel Butten fimpliciter; qui affervantur fecundum longitudinem bipartiti, feminibus & hirfutie, quibus a natura obfidentur, privati, carnofi, ex purpureo nigricantes, leviore odore & fapore inftructi: Cupediarii recipiunt fructus Rofa villofa L. cujus folia utrinque levi villo obfidentur, fructus reliquis multo majores funt & fpinulis obfeffi, paffim in hortis cultæ.

* Fungus Rofarum, Spongiola, Bedeguar Barb. Schaffkuntzen, Schlaffapfel: Substantia rotunda, intus cava, variis finibus instructa, ornamento retiformi cincta, coloris rofei, faporis & odoris nullius. Eft excrefcentia, eodem modo ac galla quercus efformata, a Cynipe Rofæ L. abdomine ferrugineo, postice nigro & pedibus ferrugineis gaudente.

Flores Rofarum pallidarum $\frac{1}{2560}$ olei odorati albi, in aëre temperato fpiffi largiuntur Inft. Chem. Ejufdem $\frac{1}{2133}$. CARTHEUSER; partes gummofas majori in quantitate continent quam refinofas, LEWIS.

Vario ex principio Rofæ in corpus humanum folent agere, ob fragrantiam, qua pollent, vim nerveam excitant, analepticas vires edunt & ad refocillandas vires adhibentur, fed ob eandem fragrantiam etiam caput turbare, fyncopes excitare, funt obfervatæ, a

SCHENCK, HOEER, LEMERY, LEDEL, HÜNER-WOLF, KHON &c. cum Rofæ pallidæ præ reliquis fragrantiores fint, hinc illas maxime analeptico fcopo adhibemus; eædem cum fuccum faponaceum largiorem habeant, hinc refolvendi & alvum leniter ducendi ergo adhibentur, hoc fcopo, recentium manipulus, ficcarum pugilli duo, cum menstruo aquoso infunduntur, Nostrates eas uti flores acaciarum vel persicorum folent exhibere. Rofæ rubræ, quas folas Veteres in usum traxerunt, cum Arabes pallidas demum receperint, evidenter, vel fapore teste, adstringunt, & non bene a GALENO dicuntur relaxare, usurpantur tam intus, quam extus ad partes roborandas vel evacuationes moderandas, extus præterea ad fcopos difcutientes adhibentur. Rofas albas a vi ophthalmica maxime folent laudare, nefcio quo jure.

Fructus Cynosbatos vim urinam pellendi poffidere & hinc in nephritide & hydrope proficuos effe BORELLUS, SCHELHAMMER, RIEDLIN, REISEL, Cl. HOEER & c. obfervationibus probant.

Spongiolæ vires diureticas, adstringentes, fomniferas, antilysfas, cum nulla fida obfervatio probaverit, hinc ejus ufus eviluit.

Aqua Rofarum primum ab Arabibus memorata, ob fragrantiam, qua pollet, fcopo analeptico in ufum trahitur, aliis quoque medicamentis gratiæ ergo adjicitur; Aquam Kofarum albarum VAL. CORD. ad collyria præcipue recipiunt: * Aqua deftillata ex Rofis rübris VAL. CORD. optime caremus, æque ac Aquis deftillatis ex calycibus Parif. * Oleum deftillatum Rofarum, quod tanquam medicamentum fumme vires reficiens HOFFMANN extollit, ipfo cum oleum Cinamomi omnino præftet, hinc pretiofum nimis medicamentum vix præfcribitur: Oleum Rofarum per infufionem MESUE illud Parifini tam ex Rofis rubris, quam ex pallidis jubent proftare, Wurtembergenfes & Noftra-

tes non male pallidas præscribunt, minus bene coctione jubetur parari; medicamentum jam ab HOMERO memoratum, ab HIPPOCRATE ad morbos uterinos commendatum, multum ad diffipandas inflammationes a GALENO laudatur & hoc fcopo hodie adhuc adhibetur : Ceratum refrigerans GALENI vid. Cera. Unguentum Nutritum vid. Plumbum : Unguentum Rofarum MESUE a COSTEO correctum adhuc fimplicius redditum Parif. & Wurtemb. recipiunt, omnes minus bene coctionem præcipiunt; in noftris officinis receptum est, axungiam porcinam cum aqua rofarum lotam, cui aliquot guttas olei citri aut jafmini adjiciunt, fub nomine Unguenti Pomati affervare, pro unguento rofato adhibere & fcopo cofmetico maxime usurpare : * Unguentum Rosatum simplex Viennens. perplacet ad usus cosmeticos : * Mucharum Rosarum Damascenarum MESUE hodie eviluit, cum pharmacopolæ justo tempore eam ex recentibus Rosis parant Syrupi quantitatem, quæ ipfis per annum fufficit: Tabulæ seu Rotulæ Manus Christi GUAINERI veteres Margaritas addiderunt, Wurtembergenses matrem perlarum, hinc etiam * Saccharum perlatum dicuntur, Sylvius eas Saccharum Rosatum vocavit : * Syrupus Rosatus simplex VAL. CORD. vix differt a * Syrupo Rofarum folutivo AVICENNE, & eft Syrupus e Rofis pallidis Parif. * Syrupum de Rohs solutivum MONTANI correctum sub nomine Syrupi de Rosis pallidis cum Senna & Agarico receperunt Parifini, cum hujus medicamenti integræ unciæ, foliorum fennæ unus circiter scrupulus, & dimidius Agarici respondeat, quorum vires evacuantes, etiam carminativis, quæ præterea recipit, infringant, hinc vix antecedente validius alvum ducit : Julepus Rosarum AVICENNE, Syrupi Alexandrini nomine in Gallia maxime olim venit, gratiæ ergo adjicitur medicamentis: * Electuarium de Succo Rosarum MyREPSI Parifini fub forma

tabellarum affervant, inconcinnum medicamentum. quod ob Diagrydium, quod vehit, alvum movet, ad unciam dimidiam, pro dosi præscribitur: * Spiritus Rosarum Wurtemberg. & Parisin. per fermentationem, a Nostratibus abstractionis ope paratur : * Conferva Rosarum pallidarum SCHROEDER. alvum ducendi ergo affumitur : Conserva Rosarum a Mesue sub nomine Sacchari præscribitur, Latino Barbari, qui primi Confervæ nomen effixerunt, tres partes facchari receperunt, a SYLVII temporibus duas modo partes adjiciunt : Parifini ad modum MANARDI & COSTEI fuccum rofarum per setaceum trajectum cum faccharo in confiftentiam tabulandi cocto mifcent & fic confervam molliorem parant; vix differre Parifienfium * Confervas Rofarum rubrarum omni tempore parandas patet; hoc medicamentum roborandi ergo crebro adhibemus, id cum AVICENNA multum phtificis commendaverit, hinc per longum tempus ad hunc morbum fuit laudatum : aliquot guttas fpiritus vitrioli adjiciendo, eam magis adstringentem reddunt & * Vitriolatam SCHROEDERI dicunt: * Succharum Rosatum MANARDI cum pulvere florum loco fucci hodie paratur, Parifini illud Confervam Rofarum rubrarum solidam dicunt, & præeunte Zwoelffer, leviffime acidulum reddunt, parciffima cum in eo fit Rofarum ratio, hinc præter odorem, vix aliud quid rosis proprium inde potest expectari: * Syrupus de Rosis siccis a MESUE sub Julepi titulo adducitur, eft ideogósator AETII, qui pro more fui temporis mel recipit, optime placet præscriptio Wurtembergenfium : Mel Rofarum, Rhodomel PALLAD, denuo Wurtembergenfium ratio reliquis videtur præferenda effe, cum Parifini loco aquæ decoctum calycum recipiant, hinc medicamentum magis adstringens accipiunt; utimur eo frequenter, ubi fine nimia partium relaxatione abstergere volumus, vulgo ad morbos oris

& faucium adhibetur : * Mel Rofarum laxativum WELSCH ad clyfinata olim adjiciebatur : Acetum Rofarum NICOL. PRÆPOS. ob vires fragrantes naribus eorum, qui deliquium patiuntur, folet admoveri, fcopo cofmetico quoque in ufum trahitur : Tinctura Rofarum SCHROEDER Wurtembergenfes eam acidiorem reddunt, Noftrates, ipfi non levem quantitatem facchari adjiciendo, julapium faciunt; fallendæ fitis & virium reftaurandarum ergo adhibetur : Rob Cynosbati SCHROED. Conferva Cynarrhodon Parif ob gratiam vel menfis fecundis imponitur.

SANGUIS DRACONIS Barb. Sang de Dragon, Drachenblut. Est Refina quæ in variis massis ad nos adducitur, coloris fanguinei, odoris & faporis fere expertibus, non tenacibus, & quæ accensæ non ingratum fuffitum emittunt.

Optimus in maffis, quæ Juglandis magnitudinem habent, ad nos vehitur & colore fanguineo probatur; hunc fequuntur tales, quæ nucem myrifticam æquant, tegminibus junceis involutæ, in modum articulorum inter fe nexæ; evidentiflime fpuriæ funt, quæ fub forma tabularum proftant, & figura gaudent, qua fatis fuperque patet, quod fufionem fubierint, & odore heterogeneo, mangonium produnt.

Varium in Oriente, æque ac Occidente occurrit arborum genus, quod hanc refinam fundit; de que optime Cl. CRANZ meruit: triplex ad nos spectat.

DRACÆNA. Corolla fexpartita, ifanthera, monogyna, erecta, bacca triloculari gaudet: Draco L. caule arboreo, foliis fubcarnofis, apice fpinofis, diftinguitur. Crefcit in Canariis & paffim in Oriente. PTEROCARPUS Corollam papilionaceam habet, calice quinque dentato fuftentatam, legumen fubrotundum, oblongum, planum, femina appendiculata includens. Indiæ & Americæ civis. CALAMUS. Corolla hexaphylla nuda, ifanthera, monogyna, fructu drupa monofperma, agnofcitur. Indiæ proprius. Occurrit in India.

Obtinetur tam arbores vulnerando, quam fructus cum aqua coquendo & ita refinam inde eliciendo.

Vix in aqua, multo largius in fpiritu vini & oleis folubilis. LEWIS. Non levia argumenta fuadent, hanc refinam non effe xura bagi DIOSCORID. ideo verofimile eft, eam demum ab Arabibus in ufum receptam effe.

Laudatur a vi adstringente, abfurdiffime in cafu ab alto commendatur, rarius intus datur, adhibetur præcipue ad dentifricia.

* SUMACH Græc. Recent. per, Rhus, Proftant ejus fructus exficcati, racemo adhærentes, rubri, multo villo obducti, includentes femina nigra, acido & multum adítringente fapore prædita.

RHUS. Corollam pentapetalam habet, calice quinquefido fustentatam, isantheram, trigynam, baccam monopyrenam: Coriaria L. BLACWELL 486 & 541. foliis pinnatis, obtuse ferratis, subtus villosis distinguitur.

Crefcit in Europa Meridionali & Oriente, noftras hyemes impune fert.

Rami teneriores cum foliis comminuti, in tabernis proftant pro ufibus tinctoriis, integros agros eo apud Hifpanos conferi, ut femper fufficiens ejus copia pro parando corio proftet, CLUSIUS teftatur. Semina ad præcepta GALENI tam intus quam extus, cum valide adftringendi animus eft, adhibentur.

TERRA CATECHU vid. Amara.

THEA Recent. Hoc nomine ad nos adducuntur Folia varie contorta, variæ magnitudinis, colore mox læte viridi, mox profundiore inftructa, fapore plus minus adftringente, odore vel rofas vel violas fpirante.

Plurimæ ejus in commercio proftant fpecies, quæ ad duo genera Viridem nimirum & Boe reducuntur : illi folia funt viridia, violas redolentia, aquam cum qua infunduntur virefcente colore tingentia, huic folia minus contorta, quorum color magis ad nigredinem vergit, fapore gaudent magis adstringente, rofas spirant, infusum cum martialibus nigrescit.

THEAL. BLACWELL 351, 352. ex observatione Cl. LETTSOM Corolla fexfida gaudet, calice quinquefido fustentata, polyanthera, trigyna, capsula tricocca.

Crefcit in China Septentrionali & Japan.

Folia tenella exquisitissima effe, eorum triplicem messem fieri, ea, quæ ultima messe colliguntur, reliquis viliora effe, omnia fupra laminas ferreas ignis ope exficcari, afferunt autoptæ, inter quos TEN RYNE & KEMPFER præcipui funt, a vario igitur collectionis & exficcationis modo variam bonitatis Theam furgere facile liquet; his fi addimus, folia a frutice fylvestri æque ac culto colligi, eundem cum per longum tractum terræ obtineat, pro varia regione differentia folia exhibere, id quod etiam itineratores testantur, varia præterea mangonia his foliis addi, non mirum, eundem fruticem adeo multum inter se differentia foliorum genera nobis præbere, quæ melius ex odore & fapore, quam denominatione, dijudicantur. Ut autem omnem Theæ gratiam poffimus experiri, requiritur, ut eam justa dofi, in aqua optimæ notæ, exquifite ebulliente, per aliquot modo minuta infusam, ex vasis porcellaneis forbeamus.

Aqua a foliis Theæ abstracta omnem ejus odorem recipit. LEWIS. Extracti aquosi, amari, styptici, adstringentis $\frac{3}{4}$ fere obtinuit LETTSOM. $\frac{7}{12}$ Extracti aquosi & $\frac{7}{16}$ Extracti spirituosi NEUMANN.

Folia Theæ anno 1666 primum in Europam allata, ex eo tempore gratia, qua pollent, adeo fe commendarunt, ut quotannis eorum circiter quinque milliones librarum ad nos advehantur, multum ad eorum famam contribuit, quod mox postquam in Europa innotuerunt, BONTEKOE & WALDSCHMID auctoritate fuerint fustentata. Plurima & in laudem & in vituperium eorum dicta funt & litteris evulgata, ea principio odorato, quo fcatent, aliquem stimulum excitare posse, unde in quibus dam propria symptomata furgunt, & quorum non pauca Cl. LETTSOM collegit, non inficias eo, hunc stimulum autem in assutis negligi posse innumeris exemplis nixus, certus sum, & mihi in universum videtur, pro illa, qua Thea vulgo assumi solet, ratione, effectus, qui ejus usum fequi observantur, aquæ calidæ potius, quam foliis adscribendos esse.

TORMENTILLA Radices nobis fiftit nodofas, tuberofas, ex omni ambitu copiofas fibrillas emittentes, extus ferrugineas, intus pallide rubras, fapore evidenter adftringente inftructas.

TORMENTILLA. Corollam tetrapetalam regularem habet, calice octofido fuftentatam, polyantheram, polygynam, & femina nuda: Erecta L. BLACWELL 445. caule erecto & foliis feffilibus agnofcitur.

Crefcit per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem.

Maxima ftypticitas in Extracto fpirituofo hæret, decoctum aquofum turbidum fit & partes refinofas ad fundum dimittit; LEWIS. Extracti refinofi $\frac{3}{8}$ circiter, aquofi $\frac{5}{8}$ fere, lenius adstringentis inde obtinuit NEU-MANN; $\frac{1}{4}$ Extracti aquofi valde adstringentis CAR-THEUSER.

Adhibetur ejus decoctum tam intus quam extus in omnibus affectibus, ubi validiora adftringentia indicantur, vires alexipharmacas, quas fuperioribus feculis ipfi adfcripferunt, experientia non confirmavit; ejus ufum ad rem coriariam, apud Feronenfes, tefte BARTHOLINO, obtinentem, confirmant experimenta recentiora.

* Extractum VAL. CORD.

UNA

Uva URSI CLUSII, qui hanc plantam, & quidem non fine veri specie, The SZQUAN den Veterum effe reputavit, Boussers, Steinbeer; exhibet Folia parva, ovato-oblonga, ad finem evidentius angustata, glabra, duriuscula, superne viridia, inferne pallida, integerrima, evidenter cum quadam amaritie adstringentia.

ARBUTUS. Corolla ovata, quinquefida, fimili calice exiguo fustentata, decanthera, monostyla, bacca rotunda, superne leviter compressa & puncto notata, quinqueloculari agnoscitur: Uva Ursi L. Caulibus procumbentibus & soliis integerrimis distinguitur.

Crescit in omni Europa, calidiore quoque.

Exhibet Extracti aquosi valde amari & adstringentis 3, spirituosi intense amari, paulo plus quam aquosi, MURRAY.

Primos Medicos Monfpelienfes ejus vires ad vitia viarum urinariarum celebraffe, teftatur Illuftris LIN-NÆUS, eafdem novis & multis obfervationibus confirmarunt Editor Formul. Medic. BARBEYRAC, WERL-HOFF, Cl. VOGEL, TAUBE, PALLAS, DE HAEN, QUER, MURRAY & GIRARDI, qui ultimus etiam multis experimentis ejus vim calculum folvendi probare annititur. Datur foliorum pulvis ad drachmam unam ufque, quater de die, vel drachmæ duæ decoquuntur cum una aquæ libra pro dofi.

B. FOSSILIA.

ALUMEN, Erværngíz, Alun, Alaun. Eft Sal in magnas maffas concretus, ex cryftallis polyedris, majoribus efformatus, evidenter linguam adftringens, calore intumefcens & pelluciditatem deponens, trigecuplo circiter aquæ folubilis, fuccorum vegetabilium colorem non mutans, dum in aqua funditur aliquid frigoris gignens.

Reperitur Alumen sive Nativum, & tale Veteres præcipue in usum traxisse videntur, sive ope artis ex

propriis glebis eductum. De Nativo Veteres plures fpecies adducunt, quas & a confistentia & figura distinxerunt: Liquidum erant illis aquæ, quæ Alumen in majore quantitate vehunt, tales in Europa nullæ hodie notæ funt, TOURNEFORT in infula Melos, GMELIN in Sibiria detexerunt: Alumen sponte efflorescens, cum varias figuras assumat, Schisti feu fiffilis, Trichitis five plumofi, Strongyli five rotundi meminerunt, quia autem etiam vitriolum ex pyritis refolutis exfudans, album colorem & adstringentem faporem habet, hinc valde fuspicor, hoc fæpe cum illo fuisse confusum. ALBERTUS MAGNUS primus Aluminis petrofi, quod hodie vulgo prostat & ab Italorum voce Rocca denominatum fuit, mentionem fecit; rudibus his feculis quafdam etiam gypfi fpecies Alumini annumerabant, quia eorum figura ad Rupeum accedit & a forma fquammofa, Italica vernacula Seaglia five Scajola appellarunt; Alcali fixum quoque Alumen dixere & illud Catini epitheto distinxerunt, imo lapidem Amiantum pro Alumine sciffili vel plumoso exhibere cœperunt.

Omne quod hodie in tabernis proftat Alumen ex propriis glebis paratur, quæ funt 1) Selenites fpecies, ex flavo gryfea, quæ calcinata demum, unde rubra evadit, alumen edit, occurrit Tolfæ ad Centum cellas, Alumen inde paratum a *Roma* denominatur & aliquid rubedinis habet, BRASSAVOLÆ jam memoratum, ratio illud parandi optime a Cel. FOUGEROUX DE BONDAROY defcribitur. 2) Carbones foffiles five integri, five refoluti 3) Lignum foffile 4) Pyrites (5 Ardefiæ 6) Turfæ.

Glebæ Aluminis fatis copiofe per omnem Europam occurrunt.

Alumen ex ejus glebis feparaturi, glebam justo caloris gradui exponunt, ut acidum in substantiam, cum qua in alumen concrescat, agere possit, fal hac ratione ortus, elixivationis ope extrahitur, cum autem experientia docuerit, acidum terra aluminis faturatum difficilius in cryftallos abire, nifi aliquod alcali ipfi adjiciatur, hinc lixivio five urinam putridam five lixivium cinereum addunt; glebæ, quæ aëri expofitæ alumen exhibuerunt, denuo poft aliquod tempus novum largiuntur, non quod acidum ex aëre hauferint, fed quod acidum, quo fcatent, & quod in motum actum fuit, denuo terram alumini propriam diffolvit. Alumen Romanum præ reliquis puriffimum effe reputatur, fed etiam urina ipfi adjicitur tefte Cl FERBER.

Alumen ultra dimidium fui ponderis aquæ, $\frac{1}{4}$ acidi & $\frac{1}{4}$ terræ vehit: acidum idem est cum eo, quod in vitriolo obtinet, terra ab omnibus reliquis differt, non est argilla, sed in argilla occurrit, & ipsi proprias ejus qualitates largitur. MARGGRAFF.

Alumen valide adftringere ab omni tempore notum fuit, hinc externe tam ad fiftendas hæmorrhagias, quam etiam fcopo difcutiendi magno femper fuit in ufu, ad medicamenta ftomachica quoque fuit adhibitum; recentiores quoque illud intus exhibere cœperunt, & ad grana octo vel decem pro dofi propinare, primus MVNSICHT illud cum dimidia ratione fanguinis draconis mifcuit & fub nomine *A'uminis tincti* ad febres & alvi fluxus commendavit, HELVE-TIUS partibus quatuor aluminis unam fanguinis draconis adjecit, inde pilulas formavit & eas ad drachmam dimidiam ufque in omni hæmorrhagiæ genere cum fucceffu dari, affirmavit: CULLEN ab alumine cum aromatibus mixto & ante paroxyfmum exhibito febrem intermittentem vidit curatam.

* Alumen Saccharinum BRASSAVOLÆ eft Alumen cum aqua Rofarum & albumine ovorum in parvas pyramides efformatum, id quod Wurtembergenses habent, validius adstringit & repellit, in collyria anti-

Ee 2,

phlogistica, multa aqua dilutum recipitur: Alumen ustum DIOSCORID. cum in eo validum acidum nulla ulterius aqua diluatur, hinc vires rodentes edit, & in crebro usu est ad carnem luxuriantem confumendam, cui sub forma pulveris solet inspergi: * Alumen tinstum MYNSICHT: * Spiritus Aluminis a spiritu Vitrioli non differt: * Aqua Aluminis Paris. est solutio drachmæ unius aluminis, in libra una aquarum destillatarum inertium.

BOLUS, $\beta \tilde{\omega} \lambda G$. Utraque vox demum Seculo XV pro denotando proprio terræ genere cæpit adhiberi, cum græca vox qualemcunque terræ glebam denotet : recentior ætas argillas, quæ aliquid unguinofi fenfibus exhibere videntur, mox Bolorum, mox terraram figillatarum nomine comprehendit.

* Bolus Alba fub forma frustorum majorum, oblongorum, trium pollicum longitudinem & duorum latitudinem & crassitiem æquantium inter nos prostat, albus & evidentius pinguis.

Ex Germania nobis mittitur.

* BOLUS ARMENA, Argilla bolus rubra L. Argilla Lemnia L. quem & Orientalem dicunt, est Argilla indurata, quæ pallide rubrum colorem habet, tactu pinguis & glabra. Diversifimas terras sub hac denominatione venire, rectifime LUDWIG monet.

Ex variis Europæ locis ad nos adducitur.

* Bolus Rubra, Argilla bolus rubra L. fub fruftis albæ fimilibus, magis fiticulofis & pinguibus, paulo brevioribus & rubris ex Germania ad nos advehitur.

* Terra Lemnia, pro ea, diversiffimas omnino terras in officinas accipiunt, notante LUDWIG, ea, quæ vulgo prostat, ab illa PLINII & GALENI, quam in modum rubricæ ruberrimam esse dicunt, est diversifsima Possideo frusta, quæ omni dote conveniunt cum Marga Lemnia d. LUDWIG & quæ a seplasiariis sub nomine Terra Lemnia in Sorten accepi: ea, quæ fub Electa titulo proftat, efformatur a bacillis oblongis, cum admixta rubedine flavicantibus, fuperficie pulverulenta digitos tingente inftructis, eorum dorfo ad pauca intervalla varia figna impressa funt; fed sub hoc nomine etiam masse informes, flavæ, quibus rubedo accedit, juglandis circiter volumen æquantes prostant.

* Terra sigillata alba tribus montibus, quibus arbores affident, sive pluribus arboribus & propriis insignibus notata est, in parvos cylindros efformata, alba, digitos inquinans.

* Terra sigillata alba Goldbergensis, Argilla Bolus alba L. cylindrum aliquot lineas altum, superne & inferne planum refert, uni ejus basium aquila tribus montibus insistens & titulus impressa funt, ab albedine splendente, qua gaudet, Axungia Luna, & a Ducatu in quo Goldberg occurrit Terra Lignicensis quoque dicitur, a BERTHOLDO AB OSCHATZ, qui versus finem Seculi XVI floruit, primum celebrata.

* Terra sigillata alba Turcica sisti trochiscos convexo-planos, læves, ut nec splendor iis desit, multum siticulos, in facie plana characteribus arabicis notatos.

* Terra sigillata rubra. In massis terra sigillata alba parum majoribus adducitur, colorem dilutius rubrum habet, tres ipsi arbores insculptæ sunt e regione montium positæ, illis luna dimidiata, his sol imminet, inferne nomen inscriptum est.

* Terra sigillata rubra Turcica solo colore, qui dilutius rubet, a cognomine alba distinguitur.

* Terra Silefiaca grysea feu sublutea, Argilla bolus flava L. sub eadem ac terra sigillata alba facie ad nos adducitur, tactu rudior, Strigæ erui dicitur; primus MON-TANUS eam circa annum 1570 in usum trahere cœpit.

Omnes, quas hactenus recensui, terræ, sunt argillæ, hinc in aqua non solubiles, & ideo frustra qualescunque

Ee 3

etiam inde in fecundas vias expectantur vires, præterea non perspicio, quid boni corpora, in nullo menstruo folvenda, in primis viis debeant præstare, potius in testina obstructum, debilitatum, oneratum itura prævideo. Superstitio terram Lemniam commendabat gentilibus, tanquam specificum contra morbos malignos & venena remedium, eidem bolum Armenum accedere credebant; his a patribus acceptis fabulis, per multam seculorum seriem tanquam oraculis adstipulabantur; rationes dein politicæ & aliæ innumeras Europæarum terrarum species, facris Veterum terris similes, deprædicare suaferunt; Chemicorum fecta novam illis ipfis auctoritatem conciliare non dubitavit, cum aurum aut argentum vehere, & inde eminentibus omnino viribus imbui, reputarint. Magnum omnino erat opus, corpora a longiffimo retro tempore laudata, commendata & præscripta, a Medicis æque ac a vulgo magni habita, inertia effe evincere, fed tandem ratio vicit & prudentiores eas vix ulterius præscribunt. Qui aliquem adhuc earum defensionem suscipiunt, sive a latente in eis acido vires refrigerantes expectant, five roborantes a colorum principio martiali, sed cur substantiis dubiis, quæ non possunt non primis viis incommodo esfe, in tanta certiorum & fecuriorum refrigerantium & roborantium copia nostros ægros onerabimus?

Extus dum imponuntur vulneribus, pastam formant, ea obturantem & hæmorrhagiam sistentem, sed in hoc quoque casu habemus remedia & certiora & quorum usum minora mala sequentur.

CALAMINARIS LAPIS vid. Zincum. CERUSSA vid. Plumbum. LITHARGYRIUM vid. Plumbum. MAGNES LAPIS vid. Ferrum. MUMIA vid. Bitumen.

438

OSTEOCOLLA vid. Absorbentia.

PLUMBUM, $\mu \delta \lambda \mathcal{CSG}$, Plomb, Bley. Plumbum nigrum Veterum. Eft Metallum imperfectum, cujus dolor ad nigredinem vergit, mediam inter mercurium & argentum denfitatem habet, omnium corporum metallicorum molliffimum, 5 50 gradu Farenheitiano fundendum; ab aqua, omni acido & alcali, nec non ab oleis unguinofis folubile, cum omni metallo, præter ferrum, colliquandum.

Nunquam Nativum obtinet, fed occurrit fub forma I. Terræ 1) informis A. cohærentis Terra Plumbi WALLER. hæc fub variis coloribus reperitur, B. laxæ Cerussa Nativa CRONST. 2) Crystallifatæ (A) fpathiformis Spathum plumbi CRONST. Plumbum (pathofum L. (B) prvfmaticæ Plumbum cryftallifatum L. a) albæ a) pellucidæ, Minera Plumbi spathacea pellucens WALLER. b) opacæ Minera Plumbi (pathacea ramofa WALLER. B) viridis Plumbum virens L. hoc acido falis efformari & vix vestigium cupri vehere fum expertus. 2) Rubræ Plumbum Rhombeum L. hæc rariffima ad Catharinæburg occurrit. II. Mineræ A. in cubos efformatæ, Galenæ Auctorum B. fub forma molecularum vix visibilium matrici incluse Galena mineralisata WALLER Plumbum pauperum L. C. texturæ striatæ a) fibris continuis Plumbum Stibiatum L. Plumbago WALLER. Bleyschweif. B) fibris contiguis Galena striata WALLER. Plumbum Basalticum L.

Mineræ Plumbi fatis copiofe per Europam occurrunt.

GALENUS plumbum fcopo repellendi & exficcandi multum commendat, fed etiam obfervat ab eodem intus fumto, dyfenteriam oriri: D105C0RIDES fingultum, tuffim, linguæ ariditatem, extremorum refrigerationem cum mentis alienatione & motus difficultate, nec non ventri & inteftinis gravitatem cum magnis torminibus inde afferri, inteftina, vulnerari & urinam fupprimi: fimilia fere Avi-

CENNA tradit; FERNELIUS dyfenteriam cum graviffimis doloribus ventris, & subsequente ictero inde surrexisse vidit; TIMÆUS A GULDENKLEE vehementiffimos inteftinorum dolores, cum præcordiorum angustiis, membrorum tremore & articulorum debilitate ejus usum excitaffe deprehendit. Magna præterea teftium nubes peffimos a plumbo intus affumto effectus furgere & viderunt & monuerunt, inter quos RHODIUM, BORELLUM, JE-GERSCHMID, GOECKEL, CUMENIUM, DETHARDING, COHAUSEN, VICARIUM, HENCKEL, HOFFMANN, BOERHAAVE, Illustres TRONCHIN, TRALLES & PER-CIVAL nominaffe fufficiat, plures adhuc ab ALSTON & Celeb. TRILLER adducuntur, patet his observationibus a Plumbo, & qualicunque ejus præparato, imo vel folo fumo, peffimum colicæ genus, quod a Pictonibus denominant, excitari, minori autem dosi corpori ingesto, atrophiam gigni, eo citius marasmum inducturam, quo plura vafa lactea fuerint obstructa. Tot documentis de triftibus hujus metalli affectibus proftantibus, miramur omnino dari adhuc Medicos, qui ejus usum internum defendere nitantur.

Externe applicatum roborandi, difcutiendi, exficcandi ergo cum magno fucceffu adhibetur, Cl. Gou-LARD maxime, illud in difcutiendis inflammatione & eryfipelate, detergendis ulceribus, curandis cancris nec non morbis a relaxatione ligamentorum oriundis, leniendis doloribus rheumaticis, tollendis morbis cutaneis, fanandis herniis incarceratis, auferendis morbis venereis topicis, valens multum vidit.

Quædam de Plumbo præparata proftant, quæ non modo ad medicinam, fed etiam ad varias artes faciunt, nimirum

Cerussa, Junidion, Bleiweis. Eft Plumbum ope aceti in calcem albam erofum, ejus parandi ratio jam apud THEOPHRASTUM occurrit, illam, quæ Roterodami obtinet, ALSTON defcribit: ejus triplex genus hodie prostat : Veneta nimirum, quæ sub panum conoideorum forma, charta cærulea involutorum, ad nos adfertur; Belgica in majores panes efformata & laxius charta cincta est, hæc paucissimum calcis plumbi, multum terræ albæ calcareæ vehit : Blanc de Plomb, Schieferweis, lamellas albas friabiles sistit, præ reliquis sincerissima.

Cerussam HIPPOCRATES utero inflammato commisit.

Lithargyrium, Spuma Argenti, $\lambda_i \Im_{agyug} \bigoplus$, Litharge, Silberglætt. Veteres omnem fæcem, quæ argento aut plumbo, dum funduntur, fupernatat, hac voce videntur indigitaffe, tam eam, quæ hodie adhuc hoc nomine venit, quam alias ab ea diverfiffimas: appellamus autem hoc titulo fubftantiam ex fquammis plus minus rutilis compofitam, fapore adftringente præditam, efformatam a Plumbo, quo metalla nobiliora in cineritiis majoribus depurata fuerunt; eft igitur vitrum Saturni, quod qualecunque metallum ignobile, æs maxime recepit, hinc variis ludit coloribus, fed fulvum modo in tabernas recipiunt: non levem in Chemicis ignorantiam produnt, qui id in Lithargyrium Auri & Argenti diftinguunt.

Minium, μίλτ@, Menning. Veteribus, qui fubstantias a colore præcipue denominabant, Cinabaris hoc nomine veniebat, nec non proprium terræ genus rubro colore infignitum, ut ex THEOPHRASTO, PLINIO, DIO-SCORIDE patet; nostrum Minium est σάνσυξ Græcorum, & ejus, qui hodie obtinet, fignificatus demum Seculo XVI originem debere videtur: est calx plumbi, quæ in propriis Germaniæ, Angliæ & Belgii officinis calcinatur, usque dum colorem læte rubrum induerit. Acetum Lithargyrii sive Saturni, primi Mediola-

nenfes receperunt, cur ad illud parandum vulgo Acetum destillatum præcipiant, non video; Parisini omnino laudandi, qui Lithargyrio, semper cupro inquinato,

plumbum fubstituunt, egregium medicamentum difcutiens; idem, protracta per horam coctione, magis inspissatum, sistit Extractum Saturni GOULARD, quod largiore aquæ quantitate dilutum polychreftum medicamentum ad omne genus inflammationum, & reliqua mala fupra dicta evadit, fub nomine Aqua Vegeto mineralis GOULARD; Acetum Saturni affusione folutionis aluminis lacteum redditum * Lac Virginis efformat, quod nonnifi ad ufus cofmeticos adhibetur : dum autem Acetum Saturni eo usque evaporatur, ut refrigeratum in crystallos crescat, Saccharum Saturni BASIL. VALENTIN. furgit, hoc in Belgio plerumque parari folet, & pretio multo minori venditur, quam quo in nostris officinis posset confici, aqua dilutum antecedentium vires habet : ejus aliquid, fi oleo terebinthinæ diffolvitur, * Balfamum Saturni Ph. Batean. efformatur, quod ad ulcera antiqua multum laudant : * Butyrum Saturni Parif. parum ab Unguento Nutrito differt : * Emplastrum ABBATIS DE GRACE ab emplaîtro albo, spissiore consistentia & colore a cera citrina inquinato differt : * Emplastrum ad clavos & verrucas pedum vid. Acria : Emplastrum Album coctum vid. Inft. Chem. * Emplastrum Antipodagricum JUNGKEN correctum receperunt Wurtemb. * Emplastrum Ceroneum Myreps. correctum Parif. habent, minimam rationem in eo calx plumbi fistit: * Emplastrum Defensivum rubrum duplex Wurtembergenfes præscribunt, eorum unum WEPFERUM auctorem habet, hoc altero omnino præftat, laudantur ad arcendam inflammationem & ad ulcera antiqua: * Emplastrum de Cumino vid. Cuminum Emplastrum de Galbano vid. Galbanum : * Emplastrum de Linimento Lugd, ad imitationem Unguenti de panno linteo MESUE, confolidandi ergo vulneribus & ulceribus imponitur : Emplastrum de Minio LEMERY Wurtemb. ei Camphoram adjiciunt, partibus inflammatis & am-

pustis imponitur: * Emplastrum de Plumbo seu Saturinum MYNSICHT scopo diffipandi ad omne genus nflammationum, nec non ad ulcera maligna commenlatur, Emplastrum de Ranis vid. Ranas: Emplastrum le Spermate ranarum vid. Sperma ranarum : Empla-Brum de Styrace vid. Styrax : * Emplastrum Diabotonon BLONDEL : compositio theriacalis ex ingredientibus lexaginta pluribus, diversifimis viribus instructis, conarcinata, ad refolvendos tumores glandularum maxine laudatur : Emplastrum Diachylon PAULI ÆGINETÆ, olei ratio melius, quam a reliquis, apud Wurtembergenses determinata est, cur medicamento, quod exficcare, roborare, cicatricem inducere debet, mucilagines adjiciant, ego faltem non video: Emplastrum Diachylum cum Gummatibus SYLVII: Diachylum magnum MESUE, Crocum Wurtemb. adjiciunt, tanquam validum refolvens ad abfceffus frequentiffime adhibetur : Emplastrum Diapalma GALEN. Diachalcyteos Ejusp. validius adstringit : * Emplastrum Diapompholygos Pharm. Hag. a plumbo potius quam pompholyge denominandum, cujus triplum præ hoc vehit, refrigerandi & dolores leniendi fine commendatur : Emplastrum Divinum NICOL. PREPOS. refolvendi, roborandi, confolidandi ergo ufurpatur, inter primos Lugdunenses magnetem adjecerunt, ut ferrum, quod vulnus fubiit, extrahat, id quod jam ZWOELF-FER rectiffime ridet: Emplastrum Frigidum emolliendi & digerendi scopo cum successu in usum trahitur; Emplastrum Gryseum VAL. CORD. discutit & exficcat, diversiffima est præscriptio Parisiensium, unde medicamentum multum refolvens prodit : * Emplastrum Mamillare pro refolvendo lacte in mammis stagnante cum fucceffu adhibetur; * Emplastrum Manus Dei CHARAS, qui illud fuo tempore a certis matronis paratum, & gratis distributum fuisse dicit, non multum ab Emplastro Divino recedit : Emplastrum Mercuriale vid. Mer-

curius : * Emplastrum Miraculosum Brandeb. vix a faponato BARBETTE differt, a SCHULZ multum laudatur ad referandum hepar obstructum, laxandam alvum & ciendos menses, BUCHNER afferit infantes contra atrophiam, quam obstructæ glandulæ mesaraicæ minabantur, ejus ope fuisse defensos : * Emplastrum Nigrum Parif. * Emplastrum Noricum proxime ad Emplastrum de Minio accedit : * Emplastrum de Opodeldoch, de quo diversas compositiones PARACELSUS reliquit, Parifini præscriptionem MINDERERI vere Paracellisticam receperunt, correctam magis Wurtembergenses habent : * Emplastrum Resolvens Nostr. fuo titulo respondere posse videtur. * Emplastrum Saponaceum BARBETTE ratio calcium faturni augenda, si justa consistentia emplastri surgere debet, vitium typographicum effe videtur, quod apud Noftrates Axungia Porci loco Camphoræ præscribatur ; ego faltem ad dolores arthriticos nunquam medicamentum faturninum vellem præscribere, triftes ab hoc Emplastro suscitatos effectus RIEDLIN vidit. Emplastrum Sticticum CROLLII, varia Parifini ex inconcinna compositione expunxerunt, Wurtembergenses limatiorem dederunt, discutiendi & consolidandi scopo ad vulnera & ulcera laudatur : Emplastrum Triapharmacum EHRNSINGER viribus non differet ab albo cocto: * Magisterium Saturni LEMERY scopo cosmetico usurpatur : * Plumbum ustum DIOSCORID. est species vitrioli albi, Parifini & Wurtemberg, ipfam calcem gryfeam plumbi recipiunt: * Sparadrapus seu Tela GUALTIERI egregie pro discutiendo lacte, quod mammas indurat, nec non ad ulcera antiqua & excoriationes adhibetur : * Species pro decocto ad Gangranam Wurtemb. ea ratione, qua adhiberi jubentur, omnino suo titulo respondebunt : * Tinctura Antiphtifica GRAMMANNI a medicamento parum fido jure abstinemus : * Trochifci albi Parif. Col-

444

ivrium album RHAZES, Siefalbum VAL. CORD. repellendi, demulcendi, fopiendi ergo ad ulcera & inflammationes, oculorum maxime adhibentur: Trochifci elcharotici de Minio vid. Mercurius : Unguentum album RHAZES Wurtemberg. Axungiam porci, ceræ & oleo fubstituunt, diffipandi & exficcandi ergo in frequenti usu est: Unguentum album Camphoratum August. ob. discutientem Camphoræ virtutem etiam priori præfertur : * Unguentum ad Ambusta Brandeb. fuo titulo egregie respondet : * Unguentum ad Scabiem vid. Mercurius : * Uuguentum de Lithargyrio August. cum Unguento Nutrito ratione virium convenit: * Unguentum de Minio Camphoratum RENOD. Albo camphorato, magis ficcat & repellit : Unguentum de Solano vid. Solanum : * Unguentum Diapompholygos unice confistentia ab Emplastro cognomine differt : * Unguentum Desiccativum rubrum Lugd. Rubrum exficcans Parif. ad exficcanda ulcera & scabiem humidam præcipue adhibetur: Unguentum Fuscum de la Mere Parif. proxime ad Emplastrum nigrum LEMERY accedit, ad ulcera fordida abstergenda multum laudatur : * Unguentum Hamorrhoidale extemporaneum Parif. Unguentum de Liquiritia, * Unguentum Mundificans STAHL ad fcabiem laudatur, sed a medicamento repellente omnino abstinendum : Unguentum Nutritum, * Emplastrum ex Argenti Spuma & Oxalaa GALEN. * Unguentum Tripharmacum MESUE, ad partes prurientes, desquammatas, intertriginem, ulcera manantia adhibetur.

VITRIOLUM Lat. Barb. $\chi_{a\lambda vav} \Im_{ov}$, Atramentum Sutorium Veterum Vitriol Est Sal ex proprio acido & quodam metallo compositus, fapore & acri adstringente præditus.

Pro vario, quod vehit, metallo ejus color varius eft, viridis dum ferrum habet, cæruleus, fi cuprum fovet, albus, dum plumbum vel zincum continet. Omne, quod apud feplafiarios proftat, Vitriolum furgit ex Pyrite, quem Arabes Marchafitam dixerunt. Est autem Pyrites crystallinus, figuratus, Ferri L. gleba metallica ex fulphure & ferro constans, subflava, odoris & saporis expers, ei si cuprum accedit, flavedo exaltatur & Pyrites Cupri L. dicitur.

Quando in pyrite motus intestinus surgit, acidum, quod in fulphure copiofe hæret, ferrum aggreditur, illud folvit, tota pyritæ mixtio destruitur, ortum hac ratione Vitriolum fub forma pulveris tenerrimi, tomenti in modum, primum ex pyrita efflorescit, tandem totus pyrites refolutus dilabitur in pulverem, qui pro variis, quæ Vitriolo accrefcunt, partibus heterogeneis mox flavicat, mox nigrefcit, pro variis his coloribus Vitriolum ex suis matricibus efflorescens Mify, Chalcitis, Sory nominibus veniebat, illis hodie non male Vitriolum calcinatum fubstituunt; Vitriolum fub terra ratione, quam dixi, ortum, fi fub forma pulverulenta occurrit Terra Vitriolica nigra WALLER. dicitur & Melanteria Veterum videtur effe, si autem in lapidem induratur Lapidem Atramentarium WALLER. Vitriolum Atramentarium L. efformat, si vero aquis subterraneis disfolutum supra terram erumpit Acidulas martiales efformat, Aquas Camentatorias vero, fi vitriolum ex pyrite cupri furrexit, inde ablata, sub terra adhuc, aliqua portione aquæ rimis & cavernis montium Vitriolum Nativum Auctorum appenditur.

Omne Vitriolum, ex pyritis refolutis ope elixivationis obtinetur, & vulgari ratione in crystallos, sub quarum forma apparet, cogitur.

Pyritas cupri fupra terram hactenus nondum potuisse disponi, ut resolvantur, observavit HEN-CKEL, hinc omne quod prostat Vitriolum cæruleum five nativum est, sive ex aquis cæmentatoriis crystallifatum, sive ope sulphuris & cupri paratum, ut in Inst. Chem. oftendi; cum GALENUS illud, quod in infula Cypro parabatur, descripferit, hinc hodie adhuc omne de Cypro denominatur. Vitriolum viride hodie Commune appellare folent, cum pyritæ illud exhibentes fint vulgatiffimi, & in omnibus officinis, ubi Vitriolum parant, tales duntaxat recipiant; cum autem illis ipfis non raro cuprum, & quidem varia ratione foleat accretum effe, hinc Vitriolo communi, varia non raro proportione, cuprum immixtum inhærere deprehendimus, id ipfum Hermaphroditum appellare quibufdam placet, color ad cæruleum vergens & macula rubra, quæ inde ferro inducitur, hoc ipfum evincunt. Vitriolum commune non bene a patria diftingui, HENCKEL optime monuit, cum in eadem varii pyritæ poffint obtinere, hinc etiam ex eadem regione diverfum omnino Vitriolum ad nos mitti.

Vitriolum album, quod tabernas feplafiariorum intrat,Goflariæ paratur ad modum a Duce JULIO Brunfvicenfi duobus retro feculis repertum, & a SCHLUTER defcriptum : uftulantur nimirum glebæ argenti & galenæ Rammelfpergenfes, zinco femper feraces, aquæ ope elixantur, lixivium in cryftallos cogitur, quæ in lebete cupreo fufæ, continuo, ufque dum refriguerint, rutabulo ligneo agitantur, efficitur ita, ut furgat forma facchari in panes coacti, & fub hac forma Vitriolum hoc venditur, illud in officinis metallicis Jæckelguth, in tabernis Galitzenstein nominare folent, idem zincum, Plumbum & æs vehere in Inst. Chem. monui.

Vitriolum viride $\frac{3}{8}$ ferri, $\frac{1}{1}$ acidi, $\frac{2}{3}$ aquæ vehere, Cæruleum $\frac{1}{8}$ cupri, $\frac{1}{6}$ acidi, $\frac{1}{2}$ aquæ continere NEU-MANN est expertus, sed hæ rationes omnino nihil constantis habent.

Vitrioli viridis & cærulei vires in Inftit. Chem. recenfui. Veteres Vitriolum, extus maxime rodendi & adftringendi ergo adhibuerunt: Vitriolo albo maxime ad ophthalmias utuntur, ejus fcrupulum unum ad aquæ libram recipere folent, cum cuprum habeat, nunquam intus debet exhiberi.

Phlegma, Spiritus, Oleum vid. Inft. Chem. Vitriolum martis vid. Inft. Chem. * Colcothar, Caput mortuum Vitrioli vid. Inft. Chem. minus bene quidam hic Vitriolum ad rubedinem calcinatum intelligunt, Wurtembergenses Terram Vitrioli dulcem appellant: * Sal Vitrioli Parif. eft Gilla Theophrasti Inst. Chem. * Gilla Theophrasti Wurtemb. & Parif. est Sal Vitrioli CROLLII: * Terra Vitrioli dulcis Parif. eft Crocus Martis adftringens: Arcanum duplicatum vid. Inft. Chem. Tartarus Vitriolatus v. Inft. Chem. eundem MYNSICHT fub nomine Spiritus Vitrioli coagulati describit: Aqua Rabelliana vid. Inft. Chem. Liquor Anodynus mineralis HOFF-MANN Inft Chem. * Turpetum minerale v. Inft. Chem. * Pulvis Sympatheticus PAPINII, cum therapia fympathetica, ex rationali praxi medica ejecta fit, hinc miror hanc Vitrioli calcinationem adhuc in Difpenfatoria recipi: Aqua flyptica Parif valide adstringit: * Collyrium detergens BARBETTE præcipuas vires a Vitriolo albo habet, cujus duo grana ejus uncia vehit: * Elixir Vitrioli MYNSICHT parciorem Wurtemb. fpiritus vitrioli rationem recipiunt, egregium medicamentum ftomachicum & roborans, Cl. VAN DER BOSCH ejus ufum anthelminticum multum celebrat & Illustr. DE HAEN vires antiphtyficas : * Lapis Divinus BIRON, aqua diffolutus ad ulcera & cicatrices corneæ adhibetur, circa Camphoræ rationem Dispensatoria variant : Lapis medicamentosus CROLLII Parifini præscriptionem LE-MERY recipiunt, Noftrates propius CROLLIUM fequuntur, diffolvitur duodecuplo aquæ, fi exficcandi, roborandi, adstringendi animus est: * Spiritus Aperitivus PENOTI abfurdum medicamentum, quod prolixa ratione, Spiritum Tartari, spiritui Vitrioli jungit: * Spiritus antiscorbuticus DRAWIZ est antecedens, cui spiritum Cochlearize adjiciunt : * Unguentum purpureum WURZ vid. Cuprum.

まる

EMOLLIENTIA.

CAP. III.

EMOLLIENTIA.

5. 35.

Medicamenta, quæ rigiditati morbofæ fibræ medentur, dicuntur Emollientia, Madanlina, nec non Relaxantia, yalasua: non male GALENUS duritiem ab exficcatione, repletione, concretione derivat, prima huc, duæ reliquæ ad alia capita pertinent. Rigiditas ab exficcatione furgens, ficcitatis elementi, five terræ excessium denotat, hinc exigit elementi humidi restitutionem, hoc cum gelatina sit, cui mucilago proxime accedit, utraque autem ex aqua & oleo unguinofo efformetur, hinc Aquam, Olea, Gelatinas & Mu. silagines huc pertinere evidens fit; olea præ reliquis magis emollire & aquam in vapores refolutam, hæc gelatinam & mucilagines excipere, has vero aquam, quæ humoris formam habet, docuit experientia : calor horum actionem juvat, dum, fibram distendendo, horum in ipfam ingreffum juvat, nec non quies, quæ ne justo citius evaporent, cavet.

9. 36.

Dum Emollientia fibras viarum aërearum, digeftionis, & urinæ relaxant Bnxina, na Saglina, Sisgulina evadunt, dum fpafmis medentur & doloribus Antispasmodica, avasora, dum autem vasorum fines obstructos laxant, & eos, ut a fanis secedere possint, disponunt, Digerentia, Suppurantia, Pus moventia dicuntur, eadem partes quibus applicantur debilitando Derivantes & Repellentes edunt effectus & omnes excretiones promovent; Aperientia etiam evadunt, softructio a canalibus angustatis orta, Refrigerantes quoque effectus edunt, Ff dum efficiunt, ut frictis minuatur; dum morbis catarrhalibus opponuntur Arteriaca Recchica illa, quæ aquam, cui committuntur, viscidam reddunt, Inviscantia solent dici.

Abusus Emollientium morbos a fibra debili oriundos gignit, & præterea, observante Illustri PRINGLE, ad putredinem disponit.

\$. 37.

α) VEGETABILIA.

GRANA CEREALIA (§. 10.) LEGUMINA (§. 11.) OLERA (§. 14.) minus fapida, FRUCTUS HORÆI (§. 16.) dulces, NUCLEI (§. 17.)

* ACANTHUS, anav 96, Acanthe, Branche urfine, Branca urfina Italica TRAG. Folia mollis & spinosi recipiuntur.

Folia Mollis magna funt, lata, finuata viridi-nigricantia, nitida, infipida, inodora.

Spinofi a prioribus habitu, laciniis acutis & angustioribus & colore evidentius viridi differunt.

ACATHUS. Calice quinquefido ringente, corollam labiatam fuftentat, cujus labium inferius trilobum est, & capfulam oligopyrenam: Mollis L. foliis finuatis, inermibus gaudet, Spinofus L. folia pinnatifida spinosa habet.

Uterque in Europa Meridionali crefcit, nostras quoque hyemes optime fert.

Emolliendi ergo externe adhibebatur, hodie vulgo ipfi Branca urfina fubftituitur.

* ALSINE, anoirn, Morgeline, Hünerdarm, Vogelkraut. Recipiuntur ejus Folia, quæ parva funt, ovata, leviffime hirfuta, infipida, inodora.

ALSINE. Corollam pentapetalam regularem habet, calice quinquefido fustentatam, isantheram, trigynam & capfulam polypyrenam: Media L. petalis bipertitis distinguitur.

Vulgaris per omnem Europam planta.

Vix vires emollientes inde expecto, apud nos nunquam in usus medicatos recipitur.

ALTHEA, a'Dala, a'Déa, islonov, Guimauve, Ibisch.; Radices, Folia & Semina recipiuntur.

Radices fibrofæ funt, plures ex uno capitulo pendent, calami craffitiem habent, albæ, extus leviter flavescentes, proprio odore gaudent; prostant in officinis cuticula privatæ.

Folia cordata funt, acute ferrata, petiolata, utrinque tomentofa, infipida, inodora.

* Semen parvum, reniforme, fuscum, insipidum, inodorum est, non multa mucilagine fartum.

ALTHAA. Corollam monopetalam habet, regularem, quinquefidam, polyantheram, filamentis connatis, monogynam, calice duplici, externo novemfido, interno quinquefido, fustentatam, femina reniformia in orbem posita: Officinalis L. BLACWELL 90 foliis fimplicibus & tomentosis distinguitur.

Crefcit per omnem Europam, præter Sueciam & Ingriam.

Radix $\frac{1}{2}$ mucilaginis vehit, NEUMANN ad $\frac{3}{4}$, parum ultra $\frac{3}{4}$ CARTHEUSER, extracti fpirituofi $\frac{3}{8}$ NEU-MANN. Folia $\frac{1}{4}$ mucilaginis LEWIS, ultra $\frac{1}{3}$ NEU-MANN & ultra $\frac{1}{4}$ Extracti fpirituofi exhibuerunt.

Ratione mucilaginis, qua fcatet, folida relaxat & humores demulcet, cum fucceffu ad morbos pectoris, intestinorum & viarum urinariarum adhibetur; extus demulcendi, emolliendi & anodyno fcopo applicatur. Radicis uncia dimidia ad libram aquæ pro decoctis internis adhibetur.

Syrupus Compositus FERNEL cum præter Althæam alia adhuc relaxantia, quædam etiam, quæ specifice in renes agunt, vehat, creberrime in usu est: * Syrupus simplex facile ex officinis potest exulare, cum prior omnino efficacior est, ipse in rotulas efformatus, * Tabellas de Althea Paris. efformat, quarum primus LOBEL meminit: * Tabellæ de Althea fine igne Amftelod. gratum medicamentum, quod, quoties viæ aëreæ ab acri quodam ad tuffim ftimulantur, commode poteft affumi: Pafta Altheæ, Maffa Altheæ alba S mollis Parif. egregium medicamentum demulcens, tabulis quoque præftat: Unguentum de Althea MYREPS. coloris ergo quidam Curcumam adjiciunt, emolliendi & refolvendi fine in frequenti ufu eft, vix ad nervorum refolutiones & vulnera claudenda videtur facere.

* AQUILEGIA Lat. Barb. Ancoline, Agley. Flores & Semina recipiunt.

Flores cærulei funt, infipidi, inodori.

Semina exigua funt & fub cortice nigro, fplendente, medullæ albæ & dulcis exiguam portionem includunt.

Aquillegia. Duplici petalorum ordine efformatam corollam habet, quorum unus petala plana, alter corniculata habet, quæ hodie Nectaria dicuntur, polyantheram, pentastylam & totidem capfulas: Vulgaris L. BLACWELL 409. corniculorum apicibus in curvis distinguitur.

Occurrit ubique per Europam, præter maxime Septentrionalem.

Succum Aquilegiæ ad varias acrimonias curandas facere, EYSEL & SCHUBERT obfervationibus probare nituntur. Non video quales vires ab inodoris floribus poffint expectari : & licet TRAGI affertum de feminum ad icterum efficacia SCHRIZER & S. PAULI obfervationibus confirmari videatur, fateor tamen, quod nec in hoc morbo, nec in variolis & morbillis aut vertigine proprias vires inde expectem, licet S PAULI & PAULINI fe eas vidiffe afferant.

* Pilulæ de Aquilegia Parif. ad mentem TRAGI paratæ, fi quem effectum edunt, is Croco debetur: * Tinctura Brandeb. a spiritu acido, vires habet. * BLITUM, BAirov, Blète, Meger. Folia habet ovato-oblonga, profundius viridia, undulata, fapore viscidulo instructa.

AMARANTHUS. Planta relativa monophyta, corolla tri-vel quinquefida, in maribus ifanthera, in feminis trigyna & capfula monopyrena inftruitur. Viridis L. Corolla trifida, foliis ovatis, caule erecto diftinguitur.

Crefcit in Europa Meridionali, in Saxoniam ufque ascendit.

Nec ab hoc vegetabili magnæ vires expectandæ.

* BONUS HENRICUS. TRAG. Folia triangula habet, fuperne glabra, inferne polline confpersa, inodora, levissime falina.

CHENOPODIUM. Corolla nuda, quinquefida, ifanthera, digyna gaudet, femen nudum in calice maturat: Bonus Henricus L. foliis triangularibus, fagittatis distinguitur.

Copiose per Europam, præter maxime Septentrionalem occurrit.

Scopo emolliendi laudatur, S. PAULI cataplasma inde paratum podagricis laudat, œdema pedum foliorum recentium ope curatum vidit DILLENIUS.

*BRANCA URSINA Barb. o povoliziov, Berca, Bærenklan. Recipiuntur Folia quæ magna funt, pinuata, pinnis lobatis, hirfuta, infipida & inodora.

HERACLEUM. Planta umbellata, involucro utroque, feminibus compressis, foliaceis, medio utrinque striatis instructa: Sphondylium L. BLACWELL 540. Foliis pinnatifidis distinguitur.

Crefcit in omni Europa.

Polonis & gentibus magis septentrionalibus tanquam olus in usu est, spiritum ardentem ex ea parare dicuntur Russi, GMELIN : falsum esse rumorem, quo ad plicam polonicam adhiberi dicitur, ERNDTEL evicit; ex quo MANARDUS hanc plantam Acanthum Veterum esse dixit, illam emollientibus solent adscribere.

CANNABIS, zzvvzßis, Chanvre, Hanf. Ejus * Semina funt ovata, uno margine acutiore instructa, sub cortice cinereo, spadiceo, fragili, nucleum album, dulcem includit, tenera membrana involutum, odor recentium caput obnubilat.

CANNABIS. BLACWELL 322. Planta relativa diphyta, maris corolla quinquefida, ifanthera, feminæ bifida, digyna, capfula nucem includit.

In India Orientali & Ruffia Meridionali sponte crescit, passim per Europam colitur.

Versus finem Aprilis femen terræ committunt, quo id denfius feritur, eo teneriores furgunt caules, & hac ratione utuntur Noftrates; trans Rhenum rarius ferunt & caules & craffiores & altiores obtinent; Augusto mense plantæ superne flavescunt & tunc evelluntur, evulfæ five fub aquam five fupra terram collocantur, ut certum corruptionis gradum acquirant, id quod Rouir, Rosen dicunt, epidermis & parenchyma destruantur, cortex a ligno detrahi possit; obtinetur hoc five digitorum, five proprii instrumenti Broye, Knitsch ope, lignum inde decutitur, ligni moleculæ, quæ frangibulo fe fubduxerunt, ope lapidis molendina moti, Reib, five ope malleorum ligneorum, auferuntur, pectinibus dein Seran, Hechel omnes fibræ corticis e mutuo nexu folvuntur, quidquid lignofi eis adhuc adhæret & fila breviora inde separantur, quæ Etoupe, Werk, & fi paulo longiora fuerint Barthel dicuntur; hac ratione Cannabis aptatur, ut in fila duci poffit; quæ non raro vehiculi vice, pro medicamentis externis adhibendis, ufurpantur.

Semen aliorum nucleorum (§. 17.) vires edit, Olei viridis, quod demum, thermometro Farenheitiano ad ciphram descendente, confistit, $\frac{1}{4}$ fere largitur,

454

ejus præftantia ad icterum, quam DE LE BOE SYLvius maxime extollit, ab vi spasmos viarum biliariarum relaxante videtur pendere.

* Oleum Cannabis expressum VERNY.

* CYNOGLOSSUM, zuroz Aws our, Langue de Chien, Hundszung. Radices & Folia in officinis proftant:

RADIX oblonga est, crassifiuscula, extus ex atrorubens, odore, si recens est, minus grato gaudet, saporem habet fatuum.

Folia funt oblonga, acuminata, incana, odoris & faporis expertia.

CrNogLossum. Calice quinquefido, fuftentat corollam infundibuliformem quinquefidam, cujus faux fquammis augetur, ifantheram, monogynam & femina crusta tecta, medio stylo affixa : Officinale L. BLACWELL 249. foliis ovato-lanceolatis, corolla calicem æquante & ultra stamina eminente distinguitur.

Crefcit per omnem Europam.

Plantam, quæ ab omni ætate innoxia reputata fuit, MORISON primus diffamavit; GEOFFROI, FUL-LER, Cl. SCOPOLI & Ill. TRALLES, duce experientia, nequaquam deleteriam effe, affeverant, primus radicem ad integram unciam, folia ad manipulum unum intus exhibuit, unica & illa incerta obfervatio non fufficit, ut femper innoxia planta, pro venenata habeatur. Externe ad Cataplafmata recipitur.

* Syrupus FULLER: Pilulæ a MESUE fub nomine Pilularum ad omnes morbos catarrhales defcriptæ, frequentifime in ufu funt fcopo anodyno, quas vires nonnifi ab opio & S. hyofcyami habent, quorum fingulorum apud Wurtemb. ultra $\frac{1}{7}$ vehunt, Parif. $\frac{1}{6}$ S. hyofcyami præfcribunt, Opium omittunt. Qui inde crocum & caftoreum expunxerunt, & Pil. de Cynogloffo cum Croco & Caftoreo ad modum Augustanorum, feorfim affervant.

FOENUGRÆCUM, Bénezas, naklinepus, Fænugrec, Ff 4 Bockshorn. Semina officinis exhibet, quæ flava funt, dura, naufeofo odore, fapore amaro inftructa, irregulariter quadrata, fulco obliquo ad unum marginem notata.

TRIGONELLA. Corollam papilionaceam habet, calice fustentatam, alas vexillo æquales, legumen compressum, incurvum, polypyrenum : Fænugræcum L. BLACWELL 84. Leguminibus sessibus, subsolitariis & caule erecto instruitur,

In Gallia Meridionali sponte crescit, apud nos in agris colitur.

 $\frac{1}{3}$ circiter Mucilaginis largitur, ad $\frac{3}{8}$ usque CAR-THEUSER obtinuit.

Interne nunquam hominibus datur, externe emollientibus admifcetur & cum ejus odor, illud quoque altius penetraturum effe, fuadeat, fapor refolventes vires etiam polliceatur, (§. 7.) hinc maturandi & difcutiendi fcopo maxime adhibetur, hyftericas ab ejus ufu abftinere jubet S. PAULI.

GLYCYRRHIZA, YAUNÚPPIZA, GRUĐINA GIZA, YAUNÚMA, YAUNÚA, GRUĐINOV ŽÚAOV, Radix dulcis, Liquiritia Barb. Regolitia Hetrufcis, Regliffe, Süsholz, Lakritzen-Holz. Subministrat usibus medicatis Radices oblongas, repentes, farmentofas, ad pollicis usque craffitiem ascendentes, foris rusefcentes, intus buxeas, evidenti dulcedine, cui aliquid amari accedit, odore nullo instructas; exsiccatæ foris cinereæ, intus magis luteæ apparent, ex his Hispanicæ, reliquis quippe magis dulces, præferuntur.

Rejiciuntur digito minimo teneriores & quæ fitum habent, a Medicis fi præfcribuntur, femper exficcatæ debent recipi.

GLICIRRHIZA. Calice bilabiato fustentat Corollam, cujus alæ vexillo majores funt, legumen ovatum & polypyrenum est: Glabra L. BLACWELL 495. foliis stipularum expertibus & leguminibus glabris distinguitur, In Europa Meridionali fponte crefcit; in Anglia, Germaniæ agro Bambergensi & Lotharingia copiose colitur.

Extracti aquofi dulciffimi $\frac{1}{2}$, refinofi aquofo etiam dulcioris $\frac{1}{4}$ LEWIS & CARTHEUSER. Extracti aquofi $\frac{9}{16}$, fpirituofi $\frac{5}{15}$ NEUMANN.

Jam a THEOPHRASTO ob vim demulcentem & refolventem ad affectus pectoris & renum laudatur, hoc ultimo fcopo eam præprimis S. PAULI & MAURIT. HOFFMANN multum commendant; Veteres illam præterea ad corrigendam acrimoniam drafticorum adhibuerunt; ulceribus quoque internis opponitur, ejus vires fitim fedantes THEOPHRASTUS adducit, quæ ab ejus indole faponacea pendent: Extus eryfipelati ejus pulvis infpergitur, ut humorem acrem demulceat.

Succus Liquiritia, zurioua zrauppilas: prostat inter nos, forma maffarum oblongarum, quæ fex circiter pollices longitudine, unum craffitie æquant, ficcarum, nigrarum, & quæ diffractæ splendent, una facie planarum, altera convexarum, fapore dulci instructarum, foliis laurinis involutæ ad nos adducuntur. Adustus, & qui non totus in ore deliquescit, rejiciendus est : optimus ex Hispania mittitur, ubi, teste autopta Jussieu, in Catalonia maxime ex radicibus Julio mense collectis, exficcatis, aqua coctis, expreffis, igne in extracti formam coctis, & in fole ulterius ficcatis paratur : vires radicum magis concentratas habet : * Syrupus MESUE non bene coqui jubetur : Trochifci Becchici nigri VAL. CORD. fuccum liquiritize pro basi recipiunt : multum correctos Nostrates præscribunt; Parifini magis compositam & efficaciorem compositionem habent, quæ etiam Extr. capit. Papaveris admittit : Trochifci Becchici citrini Hamburg. * Tabella Becchica Paris. * Bacilli de Liquiritia albs Wurtemberg. non multum differunt a Succe Liquiri-

tie albo vel Confectione Rebeche GEOFFROI: * Bacilli de Liquiritia citrini Wurtemb. * Extractum Liquiritie simplex Parif. fucco omnino inferius est: Extra-Stum Liquivitia gummosum vel Gluten Pectorale Noftrat. Succus Glycyrrhize gummatus Blesensium PENNICHER additis albuminibus a Parifinis & Wurtemb. album redditur, prioribus Massa Liquiritia alba, posterioribus Pasta liquiritia dicitur, Reglisse, Brustleim in frequentifimo usu est tuffientibus, ut acre fauces irritans obtundat, vix non antecedentia fede depulit : * Maffa Liquiritia fusca Parif. antecedente magis refolvit, fed minus grata est : Unguentum de Liquiritia August. nescio cur recentiora dispensatoria albumina ovorum omiserint, vires exficcantes, demulcentes, discutientes, potius a ceruffa, pompholyge & camphora, quam a Liquiritia habet.

GUMMI ARABICUM, SERAPIONIS, róµµí's áráv9s, róµµí 9:βairór, Gummi ex Ægyptia ſpina. Apportatur ad nos fub forma granorum, quorum figura ad rotundam accedit, varia magnitudine, ita ut interdum Juglandes fuperent, inftructorum, colore falerno, qui mox magis, mox minus ad fuícum accedit, gaudentium, intus fplendentium, inodororum, infipidorum, quorum fuperficies rugofa eft, & quæ adjecta aqua lentefcunt, eidem autem viscedinem conciliant, & efficiunt, ut aqua evaporata crustam splendentem relinquat.

Grana quo profundius tincta, eo deteriora funt, quo magis pellucent & alba funt, eo meliora, huc ea, quæ a Senegal denominantur, illuc Gomme Turique aut Turis pertinet.

Sponte ex Mimofa Nilotica L. fluit, nec non ex Mimofa Senegal L. quæ fpinis ternis, intermedia reflexa, foliis bipinnatis & floribus fpicatis gaudet. Multum fufpicor, ficut variæ Pruni fpecies inter nos gummi fundunt, ita quoque Mimofas Orientales, non duas modo, sed plures, tale dimittere.

Quadruplum aquæ in fpiffitudinem Syrupi denfat, ab utroque alcali ex folutione dejicitur, LEWIS; quod idem faponis effectus edat in *Inft. Chem.* monui & Cl. FRENCH multis experimentis probavit. Nutrientes G. Arabicum vires edere, HASSELQUIST annotavit, relaxandi & demulcendi fcopo cum fucceffu in morbis pectoris & viarum urinariarum exhibetur, datur ad drachmam dimidiam pro dofi. Externe minus bene emolliendi fcopo adhibetur, cum crufta, quam exficcatum relinquit, evidenter rigida fit; recipitur ad collyria & infpergitur ulceribus acri humore madentibus. Mercurium ope Gummi Arabici ex aqua fufpenfum multum laudat Cl. PLENCK.

LILIUM, regivor, Lis, Lilie, Radices & Flores nobis exhibet.

Radicis bulbofæ fquammæ affervantur, a fe invicem feparatæ, plus minus flexæ, colore carneo inftructæ, fragiles, infipidæ, inodoræ.

Florum petala in officinis proftant membranacea, infipida, inodora, exficcatione quippe & pulpa & odore privata.

LILIUM. Corolla hexapetala, campanulata, petalis linea longitudinali notatis, capfula vulvis pilo cancellato connexis gaudet. *Candidum* BLACWELL 11 foliis fparfis, corollis campanulatis, intus glabris diftinguitur.

Radices 1/4 mucilaginis largiuntur.

Radices nunquam interne, copiofe externe emolliendi & fuppurandi fcopo exhibentur; GODER earum fucco cum farina hordeacea in panem cocto hydropicos curavit.

Flores recentes communes fragrantium effectus edunt, refocillant & odor eorum largius nares fubiens saput obnubilat, exficcati plane inertes effe videntur. Aqua destillata VAL. CORD. cur ad cosmeticos usus adhibeatur, ignoro: Oleum infusum MESUE paucum mucilaginosum, quod oleum ex floribus recipit, vix aliquid proprii ipsi affricabit.

C

ł

LINARIA, *ösugis*, *Linaire*, *Harnkraut*. Recipiuntur Folia oblonga, angusta, levissimo fapore prædita, odoris, si exsiccata fuerint, omnino expertia.

ANTIRRHINUM. Corollam ringentem habet, labio fuperiore bifido, inferiore trifido, palato eminente, calice quinquefido fuftentatam, capfulam rotundam, polypyrenam: Linaria L. BLACWELL 115. Corolla in calcar educta, foliis lanceolato-linearibus, confertis diftinguitur.

Crefcit in omni Europa.

Vires relaxantes ipfi adscribuntur & diureticæ, refolventes potius ego inde expectarem, muscas ea occidi Ill. LINNÆUS observavit, extus ex oleo, vel lacte cocta, partibus dolentibus imponitur.

Unguentum de Linaria Hamburg. multum ad hæmorrhoides laudatur.

LINUM, $\lambda ivov$, Lin, Flachs, Lein. Subministrat nobis femina, quæ plana funt, uno extremo acuto, altero obtuso, sub cortice splendente, ex sulvo albicante, nucleum album & dulcem vehunt.

LINUM. Calice quinquefolio fustentat Corollam pentapetalam regularem, isantheram, isogynam, capfulam habet decemlocularem : Usitatissimum L. BLACWELL 160. foliis alternis, lanceolatis, glabris, calycibus & capfulis acutis distinguitur.

In Europa Meridionali sponte crescit, in relique colitur : semen septentrionale reliquo præsertur.

Lini fatio, & ejus corticis, ut in fila trahi possit, præparatio, proxime ad Cannabis rationem accedunt.

 $\frac{1}{5}$ circiter Olei unguinofi, ultra $\frac{1}{6}$ Mucilaginis femen largitur.

HIPPOCRATES semen Lini tanquam cibum assumi

monet, fed vidit TRAGUS Zelandiæ incolas inde cachecticos evalisfe; relaxandi & abstergendi ergo ab HIPPOCRATE tam intus, quam extus adhibebatur, illud hodie tanquam demulcens & relaxans ad morbos viarum urinariarum maxime, intus adhibemus: extus ad clyfmata & cataplasmata fopientia recipitur.

Oleum MESUE evidentius flavicat, aliis oleis unguinofis citius exficcatur, frigore, quod thermometrum Farenheitianum ad ciphram deprimit, confiftere folet, cum fpiritu nitri concentrato in flammam erumpit, evidenter aliquid refinofi videtur vehere, COSTÆUS illud ad fex unciarum dofin pleuriticis affumendum commendat; colicæ, tam intus fumtum, quam fub forma clyfmatis injectum, egregie conducit : extus ad pertinaciores alvi obftructiones ano injicitur, hæmorrhoidibus dolentibus & mufculis crampo correptis cum fucceffu inungitur.

 * MALVA, μαλάχη, Mauve, Pappel. Radices,
 Folia, Flores, Semina in usus medicatos recipiuntur: Radices fibrofæ funt, digito non craffiores; dulces.

Folia cordata occurrunt, orbiculata, leviter quinqueloba, levi canitie tecta, inodora, infipida.

Flores affervantur calycibus inclusi, pallide rubri, odoris æque ac saporis expertes.

Semina parva funt, reniformia, inodora & viscidulum faporem linguæ imprimunt.

MALVA Calicem exteriorem trifidum, internum quinquefidum habet, corollam pentapetalam regularem, polyantheram, staminibus connatis, monogynam, arillos circa receptaculum commune articulatos: Rotundifolia L. BLACWELL 22. foliis obsolete lobatis distinguitur.

Communis per omnem Europam.

Parifini Malvam fylvestrem L. & Lavateram arboream L. recipiunt.

Radices ¹/₄ Mucilaginis ficcæ largiuntur, earum Extractum fpirituofum admodum dulce eft. LEWIS.

tur

Ve

qu

ar &

la le

38

te

b

tr

al

PYTHAGORÆ jam celebratum olus, Græcorum & Romanorum menfis apponebatur, de viribus ejus alvum ducentibus meminit GALENUS; radices ob vim dolores fedantem commendavit HIPPOCRATES. Jam diu ex olerum numero, per fpinachiam maxime, pulfum, parum etiam hodie ad medicatos ufus recipitur, cum ipfi efficaciorem Altheam præferant.

* Conferva ex floribus multum AMATO LUSITANO laudata: * Unguentum Wurtemb.

NYMPHÆA, rougaia, régagor MYREPS. Nenufar, Seeblum. Ejus Radices & Flores nobis in usum cedunt.

Radices longæ funt, brachium interdum craffæ, fungofæ, extus fufcæ, nodofæ, intus albidæ, leviter amaræ.

* Florum affervantur petala, quæ alba funt, oblonga, inodora, infipida.

NTMPHÆA. Calice quadrifolio fuftentat Corollam polypetalam, polyandram, monogynam, capfula collo coarctata eft, apice coronata, multilocularis: Alba L. BLACWELL 498. foliis integerrimis diftinguitur. Radices $\frac{1}{4}$ Extracti aquofi exhibuerunt CAR-THEUSER.

Crefcit in aquis per omnem Europam.

Radices, quas Parifini a Nymphæa lutea defumunt, leviter demulcent & relaxant, hinc, præeunte AVICENNA, refrigerare dicuntur & fomnum inducere, DETHARDING eis in longum fiffis & pedum plantis applicatis, tertianam crebro curatam fuisse affeverat. Flores exficcati omnino inertes funt.

Aqua deftillata iners : Conferva Lumin. Major. demulcentes & sopientes vires habet : * Syrupus confervæ vires exsequitur : * Oleum per Infus. DE SALI-CETO: Mel RHAZES ad clysteres anodynos recipitur.

* OLEUM NUCUM BEHEN. Eft Oleum unguinofum, limpidum, infipidum & præ omnibus reliquis inodorum, aëre temperato confistens; illud largiuntur, Nuces Behen Arab. Badavoi µuge-Inoi, Myrobalani Veterum, quæ avellanæ magnitudinem habent, triquetræ, fub cortice albido, fragili, nucleum pinguem, amarum, pellicula nivea & fungofa tectum includunt, & ultra $\frac{1}{6}$ olei fundunt.

GUILANDINA. Calice quinquefido fuffulcit Corollam pentapetalam, diplofantheram, monogynam & legumen rhomboideum habet: Mobringa L. BLACWELL 386 habitu inermi, foliis bipinnatis & inferioribus ternatis diftinguitur.

Crefcit in Syria, Ægypto, Malabar & Zeylon.

Vires purgantes & viscera subvertentes nuces habere dicuntur, hinc earum usus eviluit.

Oleum, quod Seculo XV demum cœpit in ufum trahi, reliquorum oleorum unguinoforum effectus edit, ab antiquiffimis retro temporibus ejus præcipuus ufus est apud unguentarios, qui illud odore vegetabilium fragrantium, infusionis ope, imbuunt.

PSYLLII SEMEN vid. Purgantia Specifica.

* SARCOCOLLA, σαρποπόλλη. Adducitur ad nos forma granorum variæ magnitudinis, maxima juglandem æquant, rugoforum, flavicantium, cum vestigio rubedinis, odoris nullius, suavem autem, dum accenduntur, odorem, spirantium, fapor ex dulci nauseoso amariricat & aliquid acris in lingua relinquit. Eliguntur grana minus tincta & nullis fordibus inquinata.

PENÆA. Corolla gaudet quadrifida, calice bifolio cincta, ifanthera, ftylo quatuor alis tetragono inftructa & capfula tetragona, quadriloculari, dipyrena: Sarcocolla L. foliis ovatis planis diftinguitur.

In aqua totum, in spiritu vini quoad maximam partem dissolvitur. Ultra $\frac{3}{8}$ Extracti spirituosi & $\frac{15}{16}$ Extracti aquosi NEUMANN exhibuit.

Ad ulcera exficcanda & glutinanda a GALENO commendatur, Arabes ipfi vires catharticas adfcripferunt, cum lacte ad ophthalmiam ferofum commenda-

2 1 4

tur, nec non ad delendas faciei maculas. Potius refolventes, quam relaxantes vires edet.

* SATYRIUM, multum a Satyriis DIOSCORIDIS diverfum äzzu, Stendelmurzel. Dat Radices fphæroideas colore flavescente præditas, tenaces, insipidas, inodoras.

Defumuntur ex omnibus Orchidis & Satyrii fpeciebus, quæ radices bulbofas & indivifas habent, gaudet autem

ORCHIS Petalis fex irregularibus, quorum maximum & infimum bilabiatum eft, labio inferiore varie fecto, antheris duabus, cum ftilo, labio petali maximi fuperiori accretis, capfula oblonga polypyrena gaudet. Ab ea SATTRIUM, quod nullum calcar educat, diftinguitur.

Radices Satyrii ad nos etiam ex Oriente adducuntur fub nomine *Radicum Salep*, quam vocem apud Turcas Orchidem denotare BUXBAUM teftatur, nequaquam a noftratibus nifi ratione, qua exficcantur diverfæ, hæc fecundum GEOFFROI in eo confiftit, quod recentibus cuticula detrahitur, eædem per aliquot horas frigidæ infunduntur, coctæ dein, ex filis fuspenduntur & exficcantur, quo fit, ut & ventricosæ maneant & aliquem splendorem accipiant.

Radices Salep ¹/₄ Mucilaginis ficcæ largiuntur. Ultra ⁷/₄ Mucilaginis CARTHEUSER afferit.

Radices Satyrii hodie vix præfcribuntur, crebriori autem in ufu funt Radices Salep, quæ fua mucilagine egregie relaxant & demulcent, DEGNER eafdem cum fucceffu ad dyfenteriam adhiberi obfervavit, SEBA autem ad epilepticos & convulfivos motus, eafdem in Gallia nutriendi ergo hecticis & phtificis exhiberi in Journal de Medecine T. XI. monetur. Vires aphrodifiacas, GALENO jam celebratas, nonnifi fignatura nixas, mitto.

Dantur ad drachmam dimidiam fub forma pulveris,

ris, five ad drachmam unam ex aqua aut lacte coctæ.

* Electuarium Diasatyrii NICOLAI Nostrates receperunt, Wurtembergensium præscriptio se majort simplicitate commendat, ab aromatibus potius quam a radicibus satyrii vires habet : * Conserva Paris. * Conditum VAL. CORD.

* SEBESTEN. AVERROES, Myxa PLIN. fchwarze Bruftbeeren. Fructus avellanarum magnitudine, prunis exficcatis fimiles, rugofi, calice ficco, flavicante, vix incifo fuftentati, vertice acuto terminati, pulpa fufca & dulci officulum oblongum duriffimum continent, nucleo dulci fœtum.

Pleni, calyce instructi, dulces eligendi.

CORDIA. Corolla monopetala, in plures, ad fex usque, lacinias fecta, calice suftentata, isanthera, monogyna, & drupa sphæroidea nucem includente gaudet: Myxa L. foliis ovatis, supra glabris, corymbis lateralibus, calice decem striato distinguitur.

Crefcit in Malabaria & Java.

Cum prunis exficcatis ratione virium conveniunt, rariffime hodie in usum trahuntur, olim reliquis fructibus, unde decocta pectoralia parabant, adjiciebantur.

SILIQUÆ DULCES, Siliquæ, Siliquæ Græcæ, regationa, xægovæ, ræðforælia, Græc. Junior. Carobes, Carouges, Johannis Brod. Fructus oblongi, plani, plus minus incurvi, rugoli, fusci, pluribus disseptimentis distincti, pulpa dulci, susca farti, singula septimenta semen subrotundum, splendens, suscember 1000 nucleum album includit, continent.

Macræ, & quæ concussæ crepitant, rejiciendæ sunt.

CERATONIA L. BLACWELL 209. Et hermaphrodita est & relativa diphyta, Corolla quinquefida, isanthera, monogyna & fructu, qui legumen est, gaudet.

Vulgatisfima per Europam Meridionalem & omnem Orientem arbor, adeo fœcunda, ut ejus fructus jumentis in cibum cedant. Ultra $\frac{5}{8}$ Extracti aquofi, ad $\frac{1}{11}$ fpirituofi inde obtinuit NEUMANN. Extracti aquofi $\frac{2}{3}$ CARTHEUSER.

Jujubarum vires habent, & ut plurimum una cum illis ad decocta pectoralia recipiuntur.

* SIGILLUM SALOMONIS Lat. Barb. Sceau de Salomon, Weiswurzel. Radices fibrofæ funt, quæ ubique eandem fere craffitiem habent, flavefcentes, intus albæ, striis transversalibus eminentibus notatæ, fapore dulci instructæ.

Convallaria Polygonatum L. BLACWELL 251. Foliis alternis amplexicaulibus, pedunculis axillaribus, paucifloris diftinguitur.

Crefcit in omni Europa, in Italia quoque.

A vi demulcente & abstergente olim, & forfan non immerito laudabatur, WERLHOFF illam ad inflammationes uteri commendasse, sub forma cataplasmatis applicatam, fidem facit Ill. HALLER; Cl. CULLEN ex ejus dimidia uncia cum libra una lactis decocta in hæmorrhoidibus & hæmorrhagiis egregios effectus vidit.

* Aqua destillata VAL. CORD.

* SYMPHYTUM, σύμφυτον, Confolida Major Barb. Grande Confoude, Schwarzwurz. Radices & Folia officinis relinquit.

Radices oblongæ funt, aliquot pollices craffæ, foris nigræ, intus albæ, inodoræ, infipidæ.

* Folia oblonga, hirfuta, afpera.

STMPHTTUM. Corollam quinquefidam, cujus faux claufa est, calice pentagono fustentatam sistit, ifantheram, monogynam, semina nuda: Officinale L. BLACWELL 252. folia decurrentia habet.

Crefcit fere per omnem Europam, non videtur in Italiam Meridionalem defcendere.

Nullam unquam ex his radicibus mucilaginem potui obtinere, fed Extracti aquofi bruni, evidenter falini $\frac{1}{2}$; CARTHEUSER $\frac{3}{4}$ Mucilaginis tenaciffimæ inde obtentæ allegat; NEUMANN $\frac{3}{4}$ Extracti aquofi, $\frac{1}{4}$ fpirituofi. Radices ob vires demulcentes & relaxantes hæmoptoicis, nephriticis, & dyfentericis laudantur.

* Syrupus FERNEL. ex relaxantibus & roborantibus compositus, exhibetur vomentibus, dysentericis, phthisicis: * Syrupus simplex LEMERY: * Aqua destillata VAL. CORD. * Tabelle Paris.

TRAGACANTHÆ GUMMI, reavaravJa, Gomme Adraganth, Tragant. Est Gummi album, inodorum, insipidum, sub dentibus lentescens, mox vermium, mox filorum in se revolutorum, interdum granorum figuram habet.

Frusta flava, rubra, nigra, fordibus inquinata, quæ in Sorten a mercatoribus dicuntur, pro scopis medicis rejicienda & coriariis relinquenda sunt, talia aliquando sub nomine G. de Bassora accepi.

ASTRAGALUS. Corolla papilionacea, calice quinquefido irregulari fustentata, alis carinæ æqualibus, legumine biloculari gaudet : Tragacantha L. BLAC-WELL 264. caule arborescente & petiolis spinosis distinguitur.

Crefcit in Europa Meridionali & vicinis Afiæ regionibus.

In Afia crefcentis fruticis truncus & rami, menfe Julio fucco turgent, qui inde five fponte erumpit, five incifione elicitur.

Aqua mucilaginem valde spissam efformat, cui tenta est visciditas, ut sponte ex aqua secedat.

Relaxandi & demulcendi ergo præscribitur, ejus mucilago est vulgare constituens vix non omnium trochiscorum.

Species Diatragacantha frigida NICOLAI. Nostrates radices Altheæ adjiciunt & faccharum omittunt, Wurtembergenses etiam semina, omnino imitandi, omnes Camphoram: crebro in usu sunt ad morbos pectoris maxime. Pulticula de Tragacantha Nostrat. ad tormina infantum cum successu per parva cochlearia præscribitur. TUSSILAGO, Farfara, Lat. Barb. Farfugium, Tufficularis, βήχιον, Pas d'Ane, Rosshub. Radices, Folia & Flores recipiuntur.

* Radices tenues sunt, fibrosæ, albidæ, insipidæ, inodoræ.

* Folia majora funt, fubcordata, angulofa, fuperne viridia, inferne alba, fapore leviter adstringente instructa.

Flores tubulofi funt, calice multifido comprehensi, flavi, parum odorati, levissime dulces.

Tussilago Farfara L. BLACWELL 204. scapo unifloro, imbricato & foliis subcordatis, angulatis, denticulatis distinguitur.

Occurrit in omni Europa, scapi florigeri prime vere erumpunt, quos dein folia excipiunt.

Planta relaxans & emolliens, ab omni tempore tuffientibus fuit commendata. Fumus foliorum, per fistulam fumifugam ore haustus, ad odontalgiam laudatur.

* Aqua destillata VAL. CORD. iners omnino: * Conferva VAL. CORD. * Syrupum Nostrates, præeunte SCHROEDER, ex tota planta, Parisini & Wurtembergenses ex floribus jubent parare: * Loch de Farfara August. bonum medicamentum demulcens, ad affectus pectoris cochleatim exhibetur.

VERBASCUM, 4λόμ, φλόν, Thapfus Barbatus Lat Barb. Bouillon blanc, Wollkruut. Folia & Flores recipimus.

* Folia funt longa, acuminata, utrinque tomento obfeffa, fapore leniter adstringente prædita.

Flores affervantur calice exemti, rotati, quinquefidi, leni & fuavi odore inftructi, fapore dulci.

VERBASCUM. Corolla rotata, irregulariter quinquéfida, calice quinquefido nixa, ifanthera, monogyna & capfula biloculari gaudet : Thapfus L. BLAG-WELL 502, foliis decurrentibus distinguitur. Occurrit per omnem Europam.

Aquam, a floribus odoratam destillare, eosdem aliquid Olei odorati fundere, eorum fuccum faccharum dare, eosdem ultra $\frac{1}{2}$ Extracti fuavi odore & fapore instructi largiri, folia autem similis Extracti amaricantis $\frac{1}{3}$ fere fundere, vidi cum RISLER. Confentit NEUMANN ratione Extracti ex floribus; qui $\frac{3}{8}$ Extracti spirituosi dulcis, & ex foliis $\frac{3}{8}$ fere Extracti aquosi, $\frac{3}{16}$ autem spirituosi obtinuit.

Flores præcipuæ fcopo demulcendi & relaxandi adhibentur, & inter nos faltem in frequentiffimo ufu ad affectus pectoris funt, fed probe cavendum, ne tomentum calicibus adhærens fauces irritet, & ne ultra juftum temporis modum infufio protrahatur, unde quippe plurimum gratiæ perditur. Decocto ad phthifin pulmonalem hominum æque ac brutorum utuntur in Norwegia tefte LIE. Iidem etiam cum fucceffu ad clyfimata emollientia & fopientia adhibentur.

Oleum per Infolationem seu Liquamen MATTHIOL. relaxandi scopo, hæmorrhoidibus applicatur : Oleum per Infusionem SCHROEDER,

B. ANIMALIA.

AXUNGIA vid. Nutrientia Animalia.

BUTYRUM vid. Bos.

EBUR, žhepac, Ivoire, Helfenbein. Hoc nomine veniunt dentes Elephantis laniarii, quorum ab utroque probofcidis latere unus, ex maxilla fuperiori eminet, varia magnitudine præditi, quæ ut plurimum ad quinque pedes accedit, exempla centum librarum pondus excedentium apud Auctores occurrunt, & decem pedes longitudine æquantium; albiffimi funt, fed fenio lutefcunt, refimi, bafi, ubi alveolo inhærebant, latiffimi funt, ftrias habent & cavitate conoidea exsculpuntur, cujus axis non raro pedis longitudinem excedit.

ELEPHAS L. Animal quadrupes, dentibus molaribus & caninis, nec non proboscide instructum.

In Africa & Afia Meridionali occurrit.

 $\frac{1}{\tau_2}$ Gelatinæ ficcæ inde obtinui, GEOFFROI $\frac{5}{\tau_6}$ præ gelatina Cornu Cervi minus cohærentis, NEUMANN $\frac{1}{5}$ gelatinæ ficcæ, $\frac{1}{80}$ Extracti fpirituofi, fpiritus urinofi $\frac{1}{3}$ fere, Olei empyreumatici $\frac{1}{24}$ & $\frac{1}{8}$ falis volatilis inde feparavit.

DIOSCORIDES Ebur ab adftringendi virtute laudat; quam autem neque ejus in linguam effectus, nec ulla obfervatio probat; labentibus demum in Europa litteris crebrius cœpit in ufum trahi, & per omnia illa fecula, quibus non tam ex Natura, quam ex ingenio de viribus medicamentorum ftatuebant, multum ad morbos capitis & cordis, nec non ad hæmorrhagias commendabatur; hodie non alias, quam quas ab omni offe, ratione gelatinæ, qua fcatent, exfpectamus vires, ab eo nobis promittimus, ut plurimum cum Cornu Cervi præfcribitur, quo quidem magis albam, fed parciorem omnino gelatinam fovet.

* Rafura * Ebur ustum peffime a Latino - Barbaris Spodium dictum, qua quippe voce, Græci Cadmiam fornacum, Arabes varias fubstantias, nunquam autem Ebur ustum indigitarunt, de albo valent, quæ de Cornu Cervi usto dixi, cur autem ab Ebore usto nigro aliæ, quam ab omni reliquo carbone, vires debeant exspectari, non video: * Ebur fine igne præparatum pari passu

* Ebur fossile, «λεφας δουκτός, quod absurde omnino Unicornu soleut appellare, in officinas quoque recipiunt; occurrunt de eo interdum integri dentes, interdum eorum modo frusta, ut plurimum extus nigro aut gryseo cortice obducta, intus continent substantiam offeam, quæ per aërem, aquam &c. in strata

470

variæ magnitudinis refoluta est, albissima, cum acidis effervescens, calcarea.

Repertum est hoc Ebur in variis per Europam regionibus, talibus quoque, & quidem fat copiose, ad quas nulli unquam elephantes pervenerunt, non raro in Rheno occurrunt, in quæ sæpius etiam horum animalium dentes molares reperiuntur. Cum nihil intersit, os quoddam, sive calore fornacis brevi tampore, sive aliis injuriis externis post longam demum ætatem, in naturam calcis vertatur, hinc Ebur fossile ab illo, quod ustum dicitur, ratione virium medicatarum non differt, quicquid etiam luxurians medii ævi Medicorum ingenium fudoriferæ, cordialis &c. virtutis, illi adscripferit.

* HIPPOPOTAMI Dentes, Dents du Cheval Marin, Wallrofszähne a bafi ad apicem ufque incurvi funt, & parum angustati, duorum circiter pollicum diametrum habent, lineis longitudinalibus curvaturæ parallelis distinguuntur, quas ad bafin circulares fecant, apex fensim in conum abit incurvum, cujus vertex aduncus est, apex totus albissimus, basis terminatur cavitate conoidea, aliquot pollices longa. Hi dentes funt laniarii prominentes.

HIPPOPOTAMUS L. & BRISSON. Quadrupes, dentibus inciforibus in utraque maxilla, pedibus quatuor ungulatis antice & postice gaudet.

In Nilo & fluviis Afiæ obtinet.

 $\frac{1}{8}$ Extracti aquofi tenaciffimi , falini NEUMANN inde obtinuit.

Dentes fuperiori demum Seculo in ufus medicatos recepti fuerunt. Laudantur ad fiftendas hæmorrhagias & fopiendos motus irregulares, has vires cum nulla fida obfervatio confirmaverit, hinc eorum ufus eviluit, æque ac molarium Trichechi Manati L. qui fub nomine Lapidum Manati olim celebrabantur. * ICHTHYOCOLLA, I_{χ} Suozólka, Colle de Poisson, Hausblaas. Prostat sub forma massarum cylindroidearum, in spiras convolutarum, evidenter ex laminis efformatarum, digitum circiter crassarum, insigni tenacitate instructarum, faporis & odoris expertium. đ

t05

di

2

1

Z

I

ſ

Frusta alba, pellucida, non nimis crassa eligenda, quo profundius flava sunt, eo deteriora.

Colla, quæ ex variis pifcium generibus, Cetis, Afellis &c. vulgari ac conftanti præparari folet ratione, hujus loci non eft, qualis ichthyocolla Veterum fuit; genuina paratur ex veficulis aëreis omnium Acirenseris L. generum, quarum tunicæ internæ argenteo fplendore nitentes, convolvuntur & comprimuntur, ut fibi invicem agglutinentur, & exficcatæ dein commercium intrant, Huso L. viliorem, Sturio L. mediam, Ruthenus L. optimam fiftit. Maximum Ichthyocollæ commercium ad Fanum St. Archangeli obtinet.

Ex Ichthyocolla NEUMANN ultra $\frac{1}{2}$ fpiritus urinofi, 3 Olei empyreumatici, $\frac{1}{16}$ falis volatilis obtinuit.

Tota in aqua diffolvitur & eidem viscedinem affricat, ita ut ad vitra & vasa porcellanea glutinanda possit adhiberi, filis sericeis splendorem dat, vinis turbidis claritatem.

Menstruis aquosis diluta, demulcet & relaxat, hinc ad hæmorrhagias, diarrhœas &c. cum successfu exhibetur, FABRICIUS ab Ichthyocolla, ope aquæ in formam tenuioris gelatinæ redacta, cujus cochlear unum, jure dilutum, pro dosi exhibebatur, egregios in curanda dysenteria effectus vidit. Clysteribus demulcentibus quoque adjicitur.

LAC vid. Bos.

* LACERTA, saugo, Lezard, Eidex. Animal amphibium, quatuor pedibus & cauda instructum.

Lacerta Agilis L. Caudam verticillatam habet, longam, squammas acutas, collare subtus majoribus

EMOLLIENTIA.

efformatum squammis, pedes pentadactylos, & digitos unguiculatos.

Occurrit in omni Europa, frequentius in Meridionali.

Vulnerariæ ipfi vulgo adferibuntur vires, quas autem non aliter quam emolliendo, & hine fuppurationem promovendo, videtur edere.

* Oleum infusum BRASSAVOL. Noftrates, præeunte ZWOELFFER, pro illo parando, jubent oleum nucum recipi, refert hic Auctor, hoc medicamentum tanquam summum ad hernias remedium fuisse adhibitum.

MEDULLA vid. Bos.

OESYPUS vid. Ovis.

OVORUM ALBUMEN & VITELLUS v. Gallus.

SEBUM vid. Bos.

SPERMA CETI Lat. Barb. Blanc de Baleine, Wallrath. Est substantia alba, pinguis, proprio odore & sapore instructa, quæ sub forma frustorum siccorum, splendore quodam instructorum, e lamellis compositorum ad nos adducitur.

Frusta vel levissima flavedine tincta, aut rancorem spirantia, debent rejici.

Defumitur ex vario Balanarum five Cetorum Auctorum genere, præcipue ex PHISETERE, qui dentes in maxilla inferiore habet, Macrocephalo L. Cachalot BRISSON, dorfo impinni & fiftula in cervice gaudet, fed obtinetur quoque ex Catodone L. dorfo impinni & fiftula in roftro diftincto, ex Micrope L. pinna dorfali & dentibus acutis inftructo, & ex Turfione L. qui ab antecedente apice dentium plano differt.

Omnes Oceanum feptentrionalem inhabitant, maxime inter Norwegiam & Americam.

Efformatur Sperma Ceti in propriis cerebri cavitatibus, quarum ad octo & viginti ulque occurrant, in proprio præterea canali, qui omnem spinæ longitudinem legit; dum in pifce continetur, formam olei habet, mox autem poltquam inde defumtum eft, in formam floccorum nivis denfatur, idem interdum mari innatare obfervatur, quando ex animali putredine refoluto fecedit, & inde denominationis ratio furrexit; pinguedo hæc ex animali defumta, aqua, a fanguine & encephali portionibus, quæ ei adhærere folent, nec non coli ope, per quod liquata trajicitur, depuratur, committitur deinde prelo, ut oleum peregrinum, quod ipfi accrevit, inde exprimatur, oleum quod preli vires elufit per lixivium caufticum aufertur, & ut hoc melius in fubftantiam ab expreffione refiduam agere poffit, hæc in frufta diffecatur, fperma ceti hac ratione optime depuratum fole & acre exficcatur.

Notatu dignum est quod hæc pinguedo cum alcali fixo non possit uniri, & quod, observante NEUMANN, tota ex retorta destillet, consistentiam fluidiorem, sed vix vestigium empyreumaticis induat.

Oleorum unguinoforum vires habet, cum fucceffu, relaxante, demulcente & antifpafmodico fcopo ad morbos pectoris, inteftinorum, viarum urinariarum adhibetur; extus egregie ad fiffuras & lac infpiffatum attenuandum in ufum trahitur; recte jam LANG a fpermate ceti intus affumto, ut grumos fanguinis diffolvat, fruftra expectari monet.

Datur ad drachmam unam pro dosi cum aliquo fapone.

Emplastrum de Spermate Ceti MYNSICHT. Wurtembergenses Galbani rationem imminuunt, Parisini illud totum omittunt. Optime mammis a lacte induratis imponitur.

2. FOSSILE. AQUA (§. 21.)

474

IRRITANTIA.

CAP. IV.

IRRITANTIA.

\$. 38.

Irritantia appellamus medicamenta, quæ efficiunt, ut fibræ motrices corporis humani in fortiores motus agantur: fit hoc 1) dum irritabilitas fibris propria augetur, hujus autem ratio, adhuc nobis incognita, quomodo illa immediate poffit intendi, indicare vetat, cum autem evictum fit, eam cum vi nervea ita nexam effe, ut hac aucta, ipfa quoque intendatur, hinc Fragrantia (§. 29.) huc pertinent: 2) dum ftimulus fortior, quam cui a Natura aptatæ funt, fibris applicatur, medicamenta hac ratione agentia, Acrium nomine folent venire, ea fi ita valide agunt, ut partes fibræ, ob nimiam contractionem e nexu folvantur; aut fi virtute menftrua, qua pollent, folida diffolvunt, Rodentia appellantur.

\$. 39.

Cum irritantia actionem folidorum augeant, ab hac autem motus æque, ac impetus humorum pendeat, hinc illa femper efficiunt, ut ad partem, cui applicantur, affluxus humorum copiofior fiat, & pro hujus vario gradu, diverfi obtineant effectus; illa quæ faciunt, ut fanguis vafa minorum ordinum fubeat, vel etiam in cellulofam effundatur, $\phi_{\alpha\mu\nu\nu\rho\muoi}$, Rubefacientia dicuntur, cum autem epidermidem a cute fecedere, & humorem in intervallum hac ratione efformatum, colligi faciunt, indógua, Veficantia appellantur; Acria quæ integumenta cum ipfa carne exedunt, naugua Adurentia, Exedentia nominantur,& dum fimpliciter partem rodunt na Saugerma', fi autem humores effufos in cruftam

lis el

U

ta

cogunt izaguina, & quando parti putredinem affricant onntura. Quando irritantium ope, materiam peregrinam ad certum locum evocare, aut humoribus in quadam parte stagnantibus novum impetum dare animus est, Attrahentia vel inomaguna potius avriomaguna appellantur, eadem, dum impetum humorum a trunco & ramis internis avertunt, Derivantia dicuntur, Revellentia autem, quando eorum ope quantitatem motus fanguinis in alterutra Aorta refrænare tentamus. Illud præterea adhuc noto, quod rubefacientia majori dosi adhibita, vesicantium & causticorum effectus edant, & quod minor ratio causticorum, vesicantes modo aut rubefacientes vires habeat.

\$. 40.

Indicantur Irritantia in omni tempore fibrarum, & morbis inde oriundis; acria extus præcipue applicantur, & egregios effectus præstant in ægritudinibus, quæ a congestionibus humorum ad partes nobiliores furgunt, dum illos ad externa alliciendo, ab his avocant, hinc jam CELSUS in inflammationibus pectoris, epispastica externo pectori imponi juffit, cujus medendi rationis præftantiam, etiam innumeris graviffimorum Practicorum observatis recentior ætas confirmavit ; ad hæc ipfa medicamenta Urticationes quoque, Fusticationes, Fonticuli, Setacea, Scarificationes, Ustiones seu Cauteria actualia pertinent, nec. male huc Electrica concussiones videntur esse referendæ; acria præterea, dum efficiunt, ut humores majori impetu per vafa partis, cui applicantur, moveantur, a materie spissa in minimis maxime valis hærente, nec non ab his ipfis collapfis quoque indicantur, in paralyfi & atrophia cum magno fucceffu adhibentur; cum etiam evictum sit, una parte fortius irritata, reliquas validius quoque se constrin-

476

gere, hinc ad hæc medicamenta in languore virium, naxime in febribus nervosis, & illis ubi coctio & criis promoveri jubentur, prudenter omnino recurri lucescit; Catharetica ad partes morbosas confumendas, ilcera fordida abstergenda, fonticulos excitandos idhibentur.

9. 41.

Interne, nonnisi mitiora irritantia locum habent, a tunc quoque debent exulare, quando ab aucto notu humorum aliquod periculum metuendum, nec ion cum primæ viæ inflammatæ, excoriatæ, fpafmo constrinctæ funt; acria, nonnifi cicurata, aut fub minina dosi debent exhiberi, tanquam emetica drastica gunt, & si dosi majori dantur, ceu venena rolentia graviffima fymptomata excitant & hominem occidunt, fi autem exigua adeo quantitate, ut venriculum subvertere nequeant, validissime humoes refolvunt. Extus dum adhibentur, non debent upplicari locis, ubi magna vafa aut magni nervi deurrunt, vel ubi tenuis modo cellulofa integumentis ubjacet, nec in usum trahenda, cum vasa sanguine urgent, probe quoque cavendum, ne irritatio, quam aufantur, in tempus paroxyfmi febrium cadat. Quibus cautelis caustica locum habeant, Chirurgia radit. Id tandem adhuc addendum duco, noftris emporibus Rubefacientia & vesicantia creberrime in ufum trahi in morbis internis, ubi Veteres Caustica, Scarificationes, Cucurbitulas præceperunt.

a) VEGETABILIA.

ARMORACIA vid. Olera.

AROMATA (§. 25.)

ARUM, deov. Eft Radix tuberofa, alba, rotunda, arinacea, recens acerrima, exficcata, paulo mitiorem faporem habet, odorem nullum; ab eadem pro ufibus pharmaceuticis exficcanda, cuticulam externamfolent auferre.

ARUM. Corolla gaudet auriculam referente, conoidea, uno latere aperto, altero concavo, partibus genitalibus fummo pedunculo, in corollam recepto, infidentibus, polyanthera, polygyna, fructibus baccatis: Maculatum L. BLACWELL 228. Habitu acauli & foliis haftatis diftinguitur.

Vulgatisfima in Europa temperata planta, quæ non ultra Saxoniam afcendit.

Radices vere, antequam flores erumpant, colligendæ.

Succus ex radicibus recentibus expressus, fyrupum Violorum viridem reddit, ab omnibus acidis coagulatur, nec non a calore, inspissatus dulcius culus est: Radices recentes destillatæs surinos $\frac{2}{5}$, ammoniacalis $\frac{3}{10}$, olei empyreumatici $\frac{1}{60}$ exhibuerunt, exsiccatæ $\frac{1}{12}$ circiter Extracti spirituosi naufeose dulcis, ad $\frac{1}{3}$ usque aquosi dulcis & viscidi dederunt, & aliquid Olei amari & acris, GESNER; Extracti ressons $\frac{1}{30}$, aquosi $\frac{3}{8}$ fere, NEUMANN; Extracti spirituosi $\frac{1}{30}$, aquosi $\frac{1}{4}$, CARTHEUSER.

Angli & Pictones has radices loco faponis ad mundanda lintea adhibent, RAJO & GEOFFROI testibus.

Radices, evidenti acrimonia & indole faponacea inftructæ, ab omni tempore ad mucum attenuandum, valde laudatæ fuerunt, HIPPOCRATE præeunte, & omnino egregie faciunt ad eundem refolvendum, & fibras, ut refolutus excerni queat, incitandas; GESNER, MÜLLER, HORSTIUS obfervationes habent; hoc ipfum confirmantes, quibus innumeræ adhuc experientiæ accedunt, quæ ulterius evincunt eafdem quoque optime ad morbos ventris, a muco aut debilitate fibrarum oriundos, adhiberi. Dantur ad drachmam dimidiam: Extus ab HIPPOCRATE abstergendi ergo ulceribus jubentur infpergi. * Rad. Ari cum Aceto præparata HELMONT. * Fæcula ANGEL. SALÆ utrique pulvis præferendus: Pulvis Stomachicus BIRCKMANN, Pulvis ad omnes Ventriculi affectiones mirabilis Birckmann. QUERCETANI. Pulvis Ari compositus Paris. Egregium omnino ad morbos mucosos pectoris & abdominis medicamentum, nec non ad obstructiones viscerum abdominalium, pulcherrimos effectus inde in variis ventriculi affectibus RIEDLIN vidit.

* CATAPUTIÆ SEMINA Lat. Barb. Eorum duo genera, Majus nimirum & Minus, in officinis occurrere folent. Majus, καgπός τε κρότων@ aut τε κικέως, Semen Ricini Veter. Semence de Chasse taupe, Purgierkorn..
Est femen ovatum, quod sub cortice fragili, sicco, nigro, lineis gryfeis pulchre variegato, medullam albam includit, acerrimo fapore linguam ferientem.

RICINUS L. Habitu relativo monophyto, marium corolla quinquefida, feminarum tripartita, illa polyandra, hac trigyna, capfula triloculari & aculeata gaudet: Communis L. BLACWELL 148. Foliis palmatis & ferratis diftinguitur.

In Europa Meridionali & reliquis Orbis partibus occurrit.

Fundit $\frac{1}{3}$ circiter olei, urente acrimonia linguam & fauces ferientis.

GALENUS Semen purgantibus adfcribit, & oleum ejus, oleo olivarum magis detergens effe, afferit, MEsue ejus dofin ad grana feptem limitat, a medicamento, quod acrimonia fua facile primas vias inflammare poffet, prudentiores abstinent. * Oleum inde expression Veteres *univov* dixerunt, jam ab Arabibus contra colicam laudatum testibus BANCROFT & FRASER, in America ad colicam Pictonum exhibetur, qui ultimas, illud quoque in affectibus nephriticis & dysenteria cum fuccessi adhiberi, testatur, de eodem in colica, omni hora unum cochlear propinat, usque dum alvus folvatur, imo ejusdem parvum cochlear infantibus, pro ducendo meconio optime dari, afferit. Ex nucleis rejecto cortice exprimendum est.

Minus, ragadi The da Sugidae, Grains de l'Epurge, Springkorner constituunt Grana prioribus multo minora, ovata, sub cortice sicco, litturis rusis variegato, medullam acerrimam, fauces inflammantem, includentia.

EUPHORBIA. Corollam tetrapetalam vel pentapetalam, cujus calicis laciniæ numero petalorum refpondent, polyandram, trigynam habet & capfulam trilocularem, Latbyrus L. BLACWELL 123. Umbella quadrifida agnofcitur. Europa Meridionalis civis.

Maxime purgatoria hæc grana GALENUS pronunciat, medicamentum evidenter causticum ex praxi hodierna jure exulat.

CEPÆ vid. Olera.

COCCULI Recent. Sunt Grana, quæ piforum majorum magnitudinem habent, gryfea, rugofa, ventricofa, non raro pedunculo fustentat & quæ sub cortice tenaci, nucleum amarissimum & fervido sapore linguam afficientem, includunt.

MENISPERMUM. Planta relativa diphyta, calice diphyllo, fuftentat Corollam polypetalam, vel polyantheram, vel diftylam, baccas monopyrenas maturat: Cocculus L. BLACWELL 389. Foliis cordatis, retufis, mucronatis diftinguitur.

Crefcit in India.

RUELLIUS inter primos Cocculorum mentionem fecit, quos primi Veneti Europæ intulerunt, eos venenatos apud homines effectus edere, nulla, quantum ego faltem novi, obfervatio probat, RUMPH catharticos eft expertus. apud nos nunquam ad ufus internos fuerunt adhibiti, eorum pulverem locis, quos pediculi infeftant, infpergere, nec non ad capiendos pifces eos recipere, in more habent, quippe

4.80

quippe qui inde vertigine corripi & supra aquam natare dicuntur.

* COLCHICUM, xol Xurdy, faule Fuden. Radices exhibet bulbofas, multis fquammis tectas, quæ rejiciendæ funt, cuticula propria flava eft, magnitudo ad nucem juglandem accedit, noftræ aliquem acrimoniæ fenfum linguæ imprimunt, nequaquam inflammantem, cui quædam amarities juncta eft. Cl. CRAT-CHOWILL & Illuftr. HALLER nullam caufticitatem deprehenderunt.

COLCHICUM. Corolla fexfida, ifanthera, trigyna & capfula triloculari gaudet : Autumnale L. BLACWELL 566. Foliis lanceolatis & flore diu ante folia erumpente diftinguitur.

Crefcit in Europa temperatiore, ultra Saxoniam non ascendit.

Has radices intus datas, funeftos effectus fecutos effe, plures Auctores afferuerunt & obfervationibus confirmarunt, quarum multas III. HALLER collegit. Primus GOERIZ ejus virtutes ad morbos ab obftructis vifceribus oriundos recenfuit, III. STOERCK eas multis tentatis fuffulfit, quibus Cl. COLLIN, PLANCHON &c. alias quoque addiderunt: Exhibetur vulgo Oxymel ex eis fequenti ratione paratum: Radices recentes infunduntur per quadraginta & octo horas cum Aceti duodecuplo, infufum cum mellis dupla ratione coquitur, ufque dum nativa ipfi fpiffitudo reddita fit, hujus medicamenti fefqui uncia partitis vicibus de die datur hydropicis & cachecticis.

Quæ de radicum Colchici fub forma amuleti ufurpati viribus contra pestem a quibusdam Auctoribus funt allata, jure hodie spernuntur.

* ERUCA, wijours, Roquette, weiser Senf, Rauken. Semina exhibet, quæ minuta funt, rotunda, alba, leviter flavicantia, sapore acriore instructa.

Hh

SINAPI. Corollam cruciformem, calice tetraphyllo fustentatam, filiquam inferne torofam, in longum cornu terminatam edit : Alba L. filiquis hispidis & rostro obliquo, longissimo distinguitur.

In Italia, Gallia, Anglia & Belgio fponte crefcit, Noftrates in agris colunt.

Apud nos & in Germania, fecundum BRUNFELS, hoc femen recipitur, in aliís regionibus, Semen Braffica Eruca L. adhibent, quod rufum est & mitiorem faporem habet.

Semine Sinapeos minus acre, debiliores quoque quam illud vires habet.

EUPHORBIUM, Ed pógßior. Proftant hoc nomine grana variæ magnitudinis, figuræ plus minus rotundæ & angularis, coloris ex rufo flavicantis, faporis acerrimi, linguam rodentis, quæ accenfa fuffitum non ingratum spirant.

Euphorbia Officinarum L. BLACWELL 340 caule nudo, multangulari, aculeis geminatis agnofcitur.

Habitat in Africa.

Æqua ratione partes refinofas & gummofas continet, acrimonia hæret in partibus refinofis. LEWIS. Extracti aquofi $\frac{5}{8}$, totidem fpirituofi obtinuit NEU-MANN.

A JUBA, qui non diu ante æram Chriftianam vixit, repertum & in honorem ejus Medici denominationem factam effe tradunt, illud caufticæ virtutis effe, præeunte GALENO, omnes per omnem ætatem Medici ftatuerunt, convulfiones periodicas ab eo ortas, obfervavit TULPIUS, hypercatharfin cum graviffimis doloribus GULDENKLEE, dyfenteriam altero die lethalem ALEXANDER BENEDICTUS, licet itaque intus in morbis, ubi draftica proficua fore reputantur, a quibufdam commendetur, prudens Medicus nunquam ægrotos, fuæ fidei commiffos. graviffimis ab eo metuendis periculis exponet. Extus interdum rubefacientibus & veficantibus commifcetur, a quibufdam quoque sternutatoriis adjicitur, sed hoc scopo nimis acre esse videtur, BARTHOLINUS inde caput intumuisse & faciem cum faucibus inflammatam, insequente stranguria, vidit; frequentissime, id quod inter Veteres jam obtinuit, pulvis ejus offibus inspergitur, quorum exfoliatio promovenda est, & nervis, quos destrui, indicatio jubet.

Succus, quo fcatent, plurimæ Euphorbiæ L. species, eandem cum possideat ac succus inspissatus, de quo hactenus egi, acrimoniam, idem etiam de eo retinendum.

* Oleum Euphorbii Parif. ad imitationem GALENI parant Euphorbium oleo coquendo, Wurtembergenfes fecundum MESUE, oleo etiam vinum adjiciunt. Attrahendi ergo, capiti & extremitatibus in morbis capitis frigidis & in paralyfi illinunt: * Euphorbium Succo Citri correctum QUERCETANI non videtur titulo refpondere: * Extractum Efulæ Wurtemberg. a validiffimo cauftico omnino abstinemus.

MEZERÆUM nequaquam Arab. Omedaía, non DIOSCORID. forte Ejus Xamedaía, Daphnoides Veterum, Laureola Lat. Barb. Bois gentil, Bois de Garou, Sain-bois. Cortices & Grana ejus recipimus.

Cortices sunt tenues, striati, rusescentes, sapore valde acri instructi.

* Grana, quæ non bene zvide Zagnòc, Granum Cnidium Veterum effe reputantur, rotunda funt, ad pili magnitudinem accedunt, in brevem apicem educta, fub cortice fusco, striato, fragili, nucleum oleofum, flavicantem includunt, acertimum.

DAPHNE. Corollam quadrifidam habet, diplofantheram, monogynam & baccam monopyrenam: Mezeraum L. BLACWELL 582. floribus fubfeffilibus, axillaribus, confertis, erectis, caulibus ramofis & foliis lanceolatis, deciduis gaudet.

Crefcit per omnem Europam, præter maxime Hh 2 Meridionalem, occurrit adhuc in Gallo-Provincia & Agro Veronenfi.

Laureola L. BLACWELL 62 ab antecedente floribus nutantibus & viridibus differt.

In Europa temperata Anglia & Helvetia adhuc occurrit, impune nostras hyemes fert.

Gnidium L. panicula nuda terminali, foliis lanceolatis, basi angustioribus insignitur.

Europæ Meridionalis civis.

Hanc speciem Galli proprie Garou dicunt, & ejus corticem reliquis efficaciorem esse, contendit LE ROI $E \int ais \int ur \ les \ effets \ de \ l'écorce \ de \ Garou;$ quorum extat versio germanica.

Parifini duarum priarum specierum folia recipiunt, ultimæ autem radicem.

Omnes harum plantarum partes infigni gaudent acrimonia, TRAGUS, hac planta impostores multos ad orci fauces milife, monet; WEDEL adducit hydropicum hypercatharfi inde correptum & per fex continuas septimanas quotidie vomentem; a quatuor baccis comeftis lethalem fere hypercatharfin & hyperemefin vidit J. M. HOFFMANN, intolerabili oris & faucium æstu stipatam, subsequente febre acuta & fummo virium dispendio, & tandem cuticulæ ab omni corpore fuccesfu; a duodecim granis virginem purpuream animam evomuiffe Ill. LINNÆUS teftatur, a baccis comeftis ardorem in lingua ad ftomachum usque, vomitum cum febre ardentissima, quæ presso pede subsequebatur, & tanto virium lapsu, ut mors in propinquo effe vifa fuerit, legimus in Actis Helveticis. Rationalis igitur Medicus omnino a medicamento fumme periculofo fibi cavebit; nec fe auctoritate HIPPOCRATIS excufare tentabit, cum hæc grana a Gnidiis omnino diversa fint. Folia vesicas excitare, MATTHIOLUS monet, & idem de Radice notifimum effe, PETIT affirmat. Cortice, ab aliquot retro luftris,

484

loco fonticuli in Gallia uti folent, quo omnino multo minora incommoda, & vix inferiores vires habet, hoc fcopo, five recentis, five exficcati, ope aceti flexilis redditi, fruftum pollicem longum, & fex circiter lineas latum, five bracchio five femori imponitur, five furis, linteo & fascia continetur, furgit inde pruritus fenfus, pars, quæ corticem habet, leviffime inflammatur, & aquam fundit, altero mane removetur cortex, & ipfi folium hederæ, betæ, brafficæ &c. fubstituitur, novum corticis frustum applicatur cuti, immediate contiguæ illi, quæ priore die aquam dimiferat, & ita continuatur, usque dum iterum ad primum locum perventum fuerit; reliqua hic obfervanda conveniunt cum eis, quæ circa fonticulos obtinere folent. Auctor fupra citatus egregios ejus effectus in acrimonia humorum, pertinacius manus, glandulas, oculos afficiente, affectibus pectoris, doloribus capitis & lumborum, ferpigine &c. adducit, inter nos quoque non pauca de ejus efficacia in morbis, quibus fonticuli alias conducere folent, exempla proftant. RUSSEL ex Corticis una uncia, cum aquæ libris duodecim ad remanentiam octo decocta, & quater de die ad uncias octo epota, in nodis venereis offium maxime, eximios effectus vidit.

PIPER vid. Aromata.

PYRETHRUM, muge Seon. Recipimus Radices, quæ aliquot pollices longæ funt, fibrofæ, ad caput vix incraffatum rudimenta foliorum emittuut, gryfeæ, intus albæ, calamum craffitie æquant, odore nullo, fapore fervidiffimo, linguam urente gaudent.

Anthemis Pyrethrum L. BLACWELL 390. Caulibus fimplicibus unifloris diftinguitur.

Crefcit in Europa Meridionali & Africa Septentrionali. Colitur in Thuringia & ad Magdeburgum.

Extracti refinofi acerrimi $\frac{1}{20}$, aquofi acris $\frac{1}{4}$ largitur. LEWIS. NEUMANN Extracti fpirituofi $\frac{1}{24}$. Hh 3

IRRITANTIA.

aquosi & obtinuit; CARTHEUSER hujus 3 fere, illius 1/24.

Radices, quas ex regno Tunetano adducunt, craffiores & acriores esse perhibent.

GALENO fuadente, vel hodie adhuc in doloribus dentium rheumaticis malticatur, ut humor peccans evocetur; Idem oleo, cum iis infuso, spinam ante paroxysmum febrilem inungi jubet, & easdem resolutis & stupidis commendat.

* Ros Solis Rec. Herbe de la Goutte, Sonnenthau. Vegetabilis, cujus demum Seculo XVI Auctores mentionem faciunt, proftant Folia exficcata, parva, rotunda, hirfuta, rubra, margine fimbriato inftructa, longioribus petiolis innixa, fapore acriufculo & adftringente prædita, aqua cum eis cocta falinum & acrem, qui autem non adeo fortis eft, acquirit faporem.

DROSERA. Corollam pentapetalam regularem habet, calice quinquefido fuftentatam, ifantheram, pentagynam & capfulam polyfpermam: Rotundifolia L. BLACWELL 432. foliis orbiculatis gaudet.

Crefcit in omni Europa.

Tribus Paracelfiftica hanc plantam maximi facit, cum humorem, qui femper ex ejus folliculis exfudat, pro rore habuerint, & nescio quas vires astrales, infi ineffe somniaverint, phthisicis eam maxime commendarunt; recentem cutim in vesiculas elevare Dodo-NÆUS & C. BARTHOLINUS testantur, eam pabulum emortuale ovibus esse, BORRICHIUS assert, qui quoque observavit, aquam destillatam neutiquam flavam esse, ut Alchemici asseruerunt. Exsiccata planta resolventes forsan vires edere poterit.

* Syrupus simplex Paris. * Syrupus compositus Eorundem in asthmate humido poterit tentari.

SABADILLI SEMEN Rec. Mexicanischer Laus-Saamen. Constituitur a Folliculis oblongis, flavicantibus,

486

trilocularibus, in quibus Semina hærent nigra, acuta, fervidissimo fapore linguam ferentia.

Planta unde defumitur defcribit & veratri speciem effe tradit Cl. REZ, affertur ex regno Mexicano.

VAN DER BECK anno 1727 hujus medicamenti mentionem fecit, acerrima fubftantia, hactenus vix ad alios ufus, quam ad necandos pediculos fuit adhibita, quo fcopo five Axungia recipitur, five fub forma pulveris infpergitur, fed inde aliquem maniacum evafiffe, apud CL PLENK lego. In affectibus nephritidis, ad drachmam unam intus fumtum, profuide, RANSON teftatur; omni mane ad drachmam dimidiam datum, interpofito omni quinto die purgante fortiore tæniam curare apud CL SCHMUCKER reperio.

SINAPI, Simm, Moutarde, Senf. Ejus affumimus Semina, parva, rotunda, rubra, acerrimo fapore linguam vellicantia, & cum in pulverem reducta fuerint, etiam nares irritantia.

Sinapis nigra L. BLACWELL 446. Siliquis quadratis, glabris, cornu recto minore, distinguitur.

Paffim in Europa occurrit & colitur.

Sanguinem inde cogi VERATTI monet; principia alcalina fundit. Inft. Chem. Lac inde cogitur, Extracti fpirituofi amariufculi & oleofi $\frac{1}{16}$ largitur, aquofum Extractum dulciufculum eft, oleum destillatum exhibet acerrimum, LEWIS.

Pro refolvendis humoribus ab HIPPOCRATIS ævo femper adhibebatur, optime, præeunte COLU-MELLA, ad embammata recipitur, vel ratione a JOH. BAUHINO indicata, fapa conditum, cum carne comeditur, quia, vifcidum attenuando & fibras ftimulando, appetitum excitat & digeftionem juvat. Hydropem inde fublatum, cum fingulis diebus mane & vefpera unum ejus cochlear deglutiretur, MEAD vidit, hypochondriacum curatum Illuftris HALLER

Hh 4

ex Galeria de Minerva excitat. Ejus ad fcorbutum efficacia, tam ex ordine botanico, fub quo comprehenditur, quam Rupellenfium exemplo, apud EUN-DEM patet.

Extus crebro in ufu est, revellendi ergo, cum fermento panis, in pastam redactum & plantis pedum applicatum, nec non scopo derivandi, in inflammationibus viscerum.

* Confectio Wurtemb. * Unguentum Epispasticum alterum Paris. varia fortius rodentia vehit, quæ minus bene forma diffluente adhibentur.

STAPHIS AGRIA, $\neg \alpha \varphi i \le \alpha \gamma \le i \ge \gamma$, Uva taminea, herba pedicularia. Nimis breves funt Veterum defcriptiones, ut cum certitudine, qualem plantam his nominibus intellexerint, poffimus statuere. Hodie ita appellantur Semina, quæ sunt subrotunda, inferne latiore basi instructa, superne apice contracto terminata, in facie compressa linea longitudinali distincta, sub cortice rugoso, nigro, nucleum oleosum, albidum, amarum, acerrimum includunt.

Delphinium Staphis agria L. BLACWELL 265. Nectariis tetraphyllis, petalo brevioribus & foliis palmatis distinguitur.

Occurrit in Gallia Meridionali & reliqua Europa calida.

Alcohol omnem acrimoniam recipit. LEWIS. Olei unguinofi ultra $\frac{3}{16}$, Extracti fpirituofi $\frac{1}{11}$ circiter, aquofi $\frac{1}{5}$ fere NEUMANN obtinuit.

Canem inde convulfum & ejus primas vias inflammatas vidit HILLEFELD.

A medicamenti acerrimi ufu interno, omnino abstinendum, nec tuto apophlegmatizantibus admifcetur, cum os facile poffet inflammari, olim ad phœnigmos recipiebatur, hodie unguentis contra pediculos adjicitur.

* TIGLIA GRANA Recent. Pignons d'Indes, Pur-

girkörner. Mediam inter utramque Cataputiam magnitudinem habent, obtufe triangularia, una facie plana inftructa, fub cortice nigro, flavo rufefcente, variegato, includunt nucleum, eadem acrimonia ac nuclei cataputiarum inftructum, tenerrima cuticula tectum.

Croton Tiglium L. Caule arboreo, foliis ovatis, glabris diftinguitur.

Crefcit in India.

Ratione virium omnino cum feminibus Cataputiæ conveniunt, primus MONARDES eorum sub nomine *Pinearum Purgantium* meminit.

R) ANIMALIA.

CANTHARIDES, xavJagides, funt infecta corpore oblongo, toto viridi, aureo, capite duabus antennis nigris instructo, elythris viridibus, flexilibus, multis striis distinctis & alis sufcis prædita; singula tria circiter grana pondere æquant.

MELOE. Alas quatuor fuperiores cruftaceas, flexiles, antennas filiformes articulatas, caput gibbum, thoracem fubrotundum, non marginatum habet: Veficatorius L. elythris longitudine corporis alas tegentibus, corpore viridi & antennis nigris diftinguitur.

Per omnem Europam occurrit, præter maxime Septentrionalem.

Artis noftræ Patres non Vesicarium, sed Cichorei Meloen nigrum, & cujus elythræ fasciis latis percurruntur, in usum traxisse, post IMPERATUM, Ill. LIN-NÆUS evicit.

Varias arbores, liguítra maxime, falices & fraxinos inhabitant, tempore meridiano fefe fub terram condunt, Junio mense maxime occurrunt & propagationi gentis prospiciunt, hac peracta per omnem reliquum annum frustra quæruntur. Arbores istas concutiendo colliguntur, & in clibano optime exficcantur.

Tam aqua, quam fpiritus vini earum vires proprias recipiunt. LEWIS. Extracti aquofi $\frac{1}{4}$, fpirituofi $\frac{1}{177}$, JÆGER, Extracti aquofi $\frac{1}{5}$ circiter, fpirituofi $\frac{1}{2}$ VERATTI, $\frac{1}{3}$ fpiritus urinofi, $\frac{1}{12}$ olei empyreumatici, ultra $\frac{1}{12}$ falis volatilis, Extracti aquofi fere $\frac{1}{2}$, ultra $\frac{1}{5}$ fpirituofi NEUMANN, obtinuerunt. Extractum fpirituofum veficas excitare, omnes confentiunt, aquofum nequaquam, VERATTI, ALEXAN-DER & NEUMANN, contrarium fe expertum effe JÆGER affeverat. Salem volatilem nullas cantharidum vires poffidere, poft BORRICHIUM ego iteratis experimentis vidi. Mihi fpiritus urinofi ultra $\frac{1}{5}$, olei empyreumatici ad $\frac{1}{6\pi}$, falis volatilis $\frac{1}{8}$ exhibuerunt. Sanguinem a Cantharidibus cogi, VERATTI, contrarium autem Cl. TRALLES vidit.

Cantharides movendæ urinæ ergo intus exhibuit GALENUS, & earum vim diureticam BARTHOLINUS, SPILENBERG, DE HELWIG, YONGE, WERLHOFF, observationibus confirmarunt, contra hydropem, ad icterum & referanda catamenia ab HIPPOCRATE commendantur; se easdem in aqua intercute cum fuccessu dediffe, testantur WERLHOFF & WELSCH; hydrophobiæ, ad monitum AVICENNÆ, feliciter oppolitæ leguntur a Spilenberg, Reimann & Werl-HOFF; in gonorrhæa curanda egregios earum effectus viderunt SACHS A LEVENHEIM, HANNÆUS, BARTHOLINUS, LISTER, WERLHOFF, MEAD, Cl. CULLEN; medicamentum diureticum etiam pro more aphrodifiacis est adscriptum : in universum GREENFIELD multus est in commendando usu interno horum infectorum. Cum autem cantharides infigni omnino acrimonia gaudeant, hinc dofi paulo majore affumti, viam alimentariam rodunt & inflammant, adscripti hinc ab omni retro ætate venenis;

fed propria quoque, qua gaudent vi, humorum ad renes affluxum augendi, ifchurias, nephritides, mictum cruentum excitaffe, obfervatum eft. Cl. RUMPEL plures obfervationes collegit circa noxa a cantharidibus intus fumtis, præcipuæ earum apud CICERO-NEM, PLINIUM, LANG, HILDANUM, FORESTUM, BONETTUM, GULDENKLEE, PARÉ, LENTILIUM, Ill. LINNÆUM, TRALLES de ufu veficant. &c. occurrunt. HIPPOCRATES tres ad quatuor, ablatis capitibus, pedibus & alis, tanquam partibus minus efficacibus, commendat pro dofi id, quod, notante BRASSA-VOLA, fex vel octo grana æquat; circa medicamentum heroicum optime placet WERLHOFFI ratio, qui granum unum una vice dedit, & id quovis quadrihorio repetiit.

Extus ad decem granorum dofin ab HIPPOCRATE, ad peffaria, in menfibus obstructis, fuffocatione hysterica & hydrope adhibebantur, eafdem, veficas excitandi ergo, primos ARCHIGENEM & Cl ARETÆUM adhibuiffe, LE CLERC monet, ut ab earum applicatione furgentes dolores & inflammatio minuantur, eafdem vehiculo emolliente excipere, illifque camphoram adjicere folent, fed cum etiam extus applicatæ non raro evidenter in renes agere observentur, & justo major earum quantitas & dolores nimios & ulcerationem nimis magnam excitare queat, hinc etiam, dum extus imponuntur, justus earum modus fervandus est, qui nunquam drachmam dimidiam debet excedere, pro ægri ætate, temperamento, morbo &c. etiam non raro imminuendus; minus hinc placet mos, quo unum emplastrum vesicatorium officinale habent, quod indifcriminatim omnibus & in omni cafu adhibetur, omnino Medici monendi, ut, quoties tali medicamento opus habent, justam dosin cum aliquo emplastro emolliente officinali & quadam camphoræ portione ex tempore misceri jubeant, & cum prudentiffime licet cuti admotæ, tamen non raro spasmos in renibus excitent, nunquam in morbis, ubi hæc viscera laborant, debent in usum trahi, atque semper ad manus sint medicamentas, quæ spasmos excitatos valeant sopire, necesse est.

Emplastrum Epispasticum Paris. Vesicatorium Wurtemb. & Nostrat. Ultimi Augustanos fequuntur, qui fine necessitate prolixiorem præscriptionem habent, ¹/₄ Cantharidum recipiunt, Wurtembergenfium compositio se commendat simplicitate, earum 1/5 circiter vehit, Parifina propius ad dropaces Veterum accedit, Cantharidum $\frac{1}{5}$ circiter, & $\frac{1}{40}$ Euphorbii continet, nec Camphoram habet. DICKSON & Fo-THERGILL varias observationes habent de hujus emplastri, offi facro impositi, efficacia ad incontinentiam urinæ curandam : * Pasta Epispastica Paris. formatur a Cantharidibus, quintuplo circiter fermenti panis exceptis; hac ratione in Italia maxime velicas excitant, illa inter nos apud ruricolas interdum obtinet : * Unguentum Epispasticum Parif. minus laudandum, cum unguenta se facile nimis diffundant : * Tinctura Cantharidum Edinburg.

* FORMICA, µύgµ@, µύgµnž, Fourmi, Ameife. Eft Infectum parvum, oblongum, fex pedibus inftructum & duabus antennis, totum exiguis pilis obfeffum, colore five nigro five rufo inftructum, æ ejus larva eft cylindroidea, albo colore gaudet, & vulgo fub nomine ovi folet venire, Rufa, Fufca, æ Nigra L. in ufum trahuntur, fquammula thoraci & abdomini interjecta gaudent, mares & feminæ quatuor alis membranaceis inftruuntur.

Formicas acido scatere docet formicetorum odor, dolor & ardor, quo afficitur manus illis immissa, analysis chemica denique.

e

Obtinui inde fpiritus acidi $\frac{3}{8}$, alcalini ultra $\frac{1}{5}$, olei empyreumatici $\frac{1}{43}$. NEUMANN autem fpiritus acidi $\frac{5}{11}$, urinofi ultra $\frac{1}{4}$, olei empyreumatici $\frac{1}{8}$ allegat, qui quoque Oleum odoratum accepit, & MARGRAFF Oleum unguinofum.

Recentior demum ætas formicas in ufum recepit, per fe nunquam adhibentur, formiceta facculo inclufa applicant partibus, quas irritare volunt, maxime membris paralyticis, aut balneis adjiciunt.

* Aqua Magnanimitatis KUNRATH variis aromatibus, ad præfcriptum HOFFMANN, inftructa proftat, quæ de ejus vi heroes audaces reddendi prædicantur, noftris temporibus naufeam movent, nec multum ejus virtuti aphrodifiacæ prudentiores tribuunt, extus roborandi ergo poterit adhiberi & ad membra paralytica: præftare videtur Spiritu Formicarum Hamburg. qui etiam in frequenti ufu eft ad membra rheumatica: Ol. Infuf. NIC. PRÆP. ftimulandi ergo adhibetur, ipfi omnino oleum ex formicis expreffum videtur præferendum effe.

* SCORPIUS, ouderai@. Hoc nomine recipitur inter nos animal parvum, quod raro ad pollicarem magnitudinem afcendit, & cujus fronti utrinque una antenna adhæret, ex variis articulis conftans, in appendicem, quæ chela eft, terminata, cauda inftructum ex articulis efformata, & in aculeum arcuatum abeunte. Ad nos juniores, qui vix aliquot lineas æquant, ex Italia afferuntur, & hos oleo olivarum conditos Pharmacopolæ affervant, colorem argenteum habere folent, quia juniores ad nos mittuntur, adulti enim has exuvias depofuerunt, & colorem rufum & fufcum habent.

Scorpius habitu aptero, antennis cheliformibus & cauda aculeata gaudet: Europaus L. non audeo ejus characterem specificum determinare, cum Illustr. LINNÆUS pectinibus varium numerum dentium adfcribat, & accuratissimus ROESEL etiam pauciores numeret. Scorpium animal venenatum effe, & ejus ictum occidere, vulgo perhibent, Europæum autem non venenatum effe, PLINIUS jam monet, & obfervationibus confirmant REDI, FALLOPIUS, VALISNERI, MAUPERTUIS & MORGAGNI qui juftiffime afferit, fymptomata, quæ a morfu fcorpionum orta fuiffe leguntur, five foli imaginationi, timore turbatæ deberi, five quod cafu ictus aliquem grandiorem nervum tetigerit. Scorpiones autem Orientales omnino venenum vehere, itineraria docent, & Græcorum æque ac Arabum obfervata.

Oleum Scorpionum fimplex MESUE, & vulgare ad ictum fcorpionum remedium effe reputatur, & omni veneno, ipfi quoque pesti, auxilio effe, creditum fuit, id quod se aliquoties expertum effe, MONARDES non erubescit affirmare, regioni lumbari illitum, aut urethræ injectum, calculum renum & vessicæ frangere fomniarunt Arabes. * Oleum compositum MATTHIOLI absurda compositio.

VIPERA, $i\chi/dvn$. Eft Serpentis genus, quod ut plurimum pollicem craffum & fefquipedem longum eft, cervice parva & angusta, & capite compresson gaudet, cauda tereti, dorso flavescente & cujus medium squammæ rhomboideæ gryseæ, maculis nigris notatæ, in catenam quasi ordinatæ distinguunt, latera utrinque alba sunt, venter totus scutis transversalibus nigris tectus est, cauda conica acute terminatur, odore proprio gaudet, sapore nullo.

Pro variis regionibus variæ COLUBRI, qui fcutis abdominalibus & fquammis fubcaudalibus gaudet, fpecies adhibentur, cum numerus fcutorum incertus fit, cum KLEIN fpecies quæ proprie Viperæ dicuntur, dentibus ganglymoideis, & fingulas habitu & colore diftinguere, erit confultum. Berus L. fufcocanefcens eft & linea dorfali atra, repando-dentata inftruitur; paffim in Europa etiam in Suecia occurrit, nos, cum Alfatia nullos habeat, ex Helvetia vel Comitatu Burgundiæ eos accerfimus: Vipera L. corpore in medio craffiore, fere quadrato, abdomine albo, dorfo ex ferrugineo albo, maculis intenfius ferrugineis notato, diftinguitur: ex Ægypto Venetias mitti, pro paranda theriaca, teftatur HASSEL-QUIST: LOEFLING autem monet, in Hifpania adhiberi Ammodytem L. cujus caput exiguæ fquammulæ tegunt, cauda perbrevis eft & roltrum inftar cornu erectum.

Gelatinæ $\frac{1}{4}$ viridescentis, pellucidæ, jucundissimæ obtinuit BECCARI, qui etiam vidit Jus Viperarum, seri coagulum morari. HOMBERG $\frac{2}{3}$ circiter spiritus urinosi, $\frac{1}{7}$ Olei, $\frac{1}{26}$ falis volatilis inde elicuit; Ego $\frac{1}{16}$ gelatinæ siccæ, $\frac{1}{5}$ spiritus alcalini, $\frac{1}{64}$ Olei, $\frac{1}{8}$ falis volatilis nactus sum.

Viperæ ictum homini mortem inferre, nullo non tempore notum fuit, MEAD, quo nemo accuratius phænomena, hunc iclum excipientia, descripsit, ex eo dolorem acutum in parte vulnerata furgere & tumorem, primo inflammatorium, deinde gangrænodeum, qui gradatim ad partes vicinas ferpit, infequi affectus cordis, qui semper gangrænam solent comitari, ventriculum biliofa per vomitum ejicere, colorem icteritium per omne corpus diffundi, de quo tamen aliæ observationes tacent, monet. Quid fit id ipfum, quod adeo perniciofum reddit viperæ morfum, nec dum liquet, illud in vesicula retro dentes hærere, post ABBATIUM vulgo tradere folent, sed patet REDI & MEAD experimentis, liquorem in hac vesicula hærentem neutiquam venenatam effe, fed talem demum evadere, quando vulneri instillatur.

Primus NICANDER viperas medicamento cuidam contra venenum adjecit, eas in famofum fuum antidotum recepit ANDROMACHUS, & illud etiam ab eis denominavit, inde per longum tempus viperas me-

dicamentis contra venena facientibus annumerarunt, virtutem vana theoria nixam, nulla experientia confirmavit; magis autem liquet, earundem efficacia, morbis cutaneis, etiam gravisfimis, medendi a MUSA apud PLINIUM, GALENO, ARETEO, RHASES, GATINARIA, PORPHYRIO, MEAD & Cl. HAEN laudata & observationibus probata, præter hæc, duo ultimi egregii Medici viderunt, inde non levem open afferri etiam ulceribus internis. Primi, qui viperas hominibus exhibuerunt Medici, eas ex aqua coctas, in modum piscium edendas propinarunt; medii ævi Auctores, ridendo omnino confilio, eafdem gentis gallinaceæ pabulo adjecerunt, & ita pasta animalia affumi jufferunt; optima ratio eft, quando vipera, unde caput & caudam rejicere folent, cum carne fere de-stituantur, in frusta secta, cum juris pulli libris duabus ad remanentiam libræ unius coquitur, colatura mane affumitur, & talis juris usus per tres septimanas continuatur; interdum etiam adhuc alia medicamenta indicationi respondentia, juri folent addere.

Axungia est unguinosa, consistentiam olei spifsiusculi & colorem slavum habet, a PLATEARIO ad paralysin, a LUDOVICI, WEDEL & SLOANE ad oculorum pustulas & profunda ulcera multum commendatur.

* Pulvis Viperarum Parifini, præeunte MICHAEL DE FABIIS, truncos, corda & jecinora in pulverem redigunt, Wurtemberg. folos truncos : Sal volatilis WEPFER, magnarum litium inter TACHENIUM & ZWOELFFER auctor, vix aliquid proprii præ aliis congeneribus videtur habere : * Spiritus Parif. * Oleum Parif. Jus & * Gelatina femper recens debet parari : * Syrupus de Viperis roborans Parif. vires roborantes ab aromatibus habet : * Trochifci de Vipera GALEN. unice pro paranda Theriaca affervantur.

Viperis

IRRITANTIA.

Viperis interdum serpentes substituunt, a quorum tamen * Exuviis & * Axungia, quæ officinales sunt, nihil proprii expecto.

2. FOSSILIA.

ARSENICUM Latin. Barbar. Eft fubftantia falina, quæ, fi pura eft, albo colore gaudet, linguæ levem acrem faporem imprimit, debita ratione fufa in formam femimetallicam, colore, qui plumbeo magis nigricat, inftructam abit, volatilis, fupra carbones in fumum album, qui allium redolet, refolvitur, cupro maculam albam affricat, in omnibus menftruis, ipfa aqua quoque, notante jam WEPFER, folubilis.

Reperitur Arfenicum I. Nativum, 1) fub forma mineræ A. ex squammis sibi invicem incumbentibus efformatæ, Arsenicum testaceum L. Cobaltum testaceum Auctorum. B. ex fibris paralele decurrentibus, friabilibus, Arsenicum nativum friabile & porosum CRONST. Arsenicum nigrum WALLER. Fliegenstein. 2) fub forma terræ, Calx Arfenici nativa CRONST. Terra Arsenicalis WALLER. Schwaben. 3) fub forma crystallorum albarum, Arsenicum nudum L. II. Cum aliis fubstantiis in proprias glebas concretum, 1) lapideas A. flavas appeninco, agrevinov, Auripigmentum Veterum & Recentiorum, Pyrites Auripigmentum L. Orpiment B. rubras ourdean, Sandracha Veterum, Rauschgelb, utrumque fulphur vehere evictum eft, 2) mineras, in quibus A. metallis adhæret, paffim dictas B. Cobalto unitum in variis hujus speciebus, C. cum Niccolo. Cuprum Nicolai, Kupfernickel, Cuprum Nickleum L.

Occurrit ubique per Europam.

Quomodo in Saxonia Arfenicum ex mineris colligatur, & ut album evadat, depuretur, recenset ROESEL, nec alia ratione quam depuratum folet in usum recipi.

Arfenicum album, cujus prima mentio apud AVICENNAM occurrit, vires infigniter rodentes edere, ab eodem etiam parcius affumto, fummos per ventrem dolores, intumefcentiam abdominis, nec raro lividum colorem hinc inde per habitum corporis furgere, gangræna tandem & convulfionibus mori homines, vel nimis frequentes experientiæ docuerunt, ex innumeris observatoribus WEPFER, Mül-LER, HOFFMANN, WOLFF, ETTMÜLLER, HEN-CKEL, STAHL, BONETTUM, FORESTUM, GULDEN-KLEE, SPROEGEL, MORGAGNI allegaffe fufficiat. Sed etiam extus applicatum, non modo partes, quibus imponitur, rodere, sed quoque reforberi, & æque triftes effectus, ac fi deglutitum fuisset, excitare WEPFER, HILDANUS, AMATUS LUSITANUS, HEIMREICH, HODGES, DIEMERBROECK, ANGE-LUS SALA, DEGNER, SPROEGEL viderunt. Peffimum autem licet venenum Arfenicum per omnem ætatem habitum fuerit, extiterunt tamen nunquam non homines fatis audaces, qui illud tam intus quam extus adhibuerunt, AVICENNA ad varios morbos internos fuadet id potandum, quem WIRTH Archiatrum Hungarum fequutum effe, LANG testatur; MYREPSUS in Antidotum Perficum, quod contra febres laudat, recepit ; versus finem Seculi superioris , illud frequentius ad fugandas febres intermittentes præferipferunt, SLEVOGT innumeris exemplis, eius facultatem febres intermittentes, cito, tuto & jucunde curandi, comprobatam effe afferit, MOLITOR multa etiam exempla adducit, JACOBI variis observationibus probare annititur, potiuncula ex una Arfenici parte, duodecim falis alcali & centum cum octo & fexaginta partibus aquæ, ter de die ægroto exhibita, febres curatas fuiffe. Externe Arfenicalia GA-

LENUS ad morbos fplenis & fub forma clyfmatis dyfentericis, commendat, Seculo XIII illud ad carcinomata adhibere cœperunt, GUIDONE & THEODORICO auctoribus. Mitto illos, qui arfenicalibus, feptico scopo promiscue usi funt, aut illud, præeunte CAR-PO, tanquam amuletum contra peftem adhibuerunt. Corpus de cujus triftiffimis effectibus redundant Obfervatorum libri, ego faltem nunquam vellem in usum trahere, maxime cum ne unica quidem prostet fida obfervatio, illud in morbis, ad quos laudatur, plus præstitisse, quam medicamenta multo securiora, ejus usus absurdiffimis theoriis nitatur, aut male intellectis Veterum locis, ut HEIMREICH oftendit. Et licet lubenter concedam, fulphur ejus virulentiam corrigere & hinc Auripigmentum, Sandaracham &c. mitiora effe Arfenico albo, id quod etiam HOFFMANN experimentis probat, nulli tamen vellem auctor effe, ut vel hæc in ufum trahat, ufque dum certiffimis experimentis evictum fit, quod aliis magis fecuris medicamentis præitent.

* Magnes Arsenicalis ANGEL. SALÆ paratur pro * Emplastro Magnetico HARTMANN, quod bubonibus peftilentialibus imponi jubetur, veneni extrahendi ergo, JUNGKEN, se illud in quartana lienis regioni impositum & in hernia incarcerata valde proficuum expertum essertum esserti : * Arsenicum rubrum & * Arsenicum nicum citrinum vid. Inst. Chem.

CUPRUM Lat. Barb. $\chi \alpha \lambda n \partial \varsigma$, Æs Veter. Cuivre, Kupfer. Eft Metallum rubrum, odore proprio, fapore multum naufeofo inftructum, quod fufum pulcherrimo colore corrufcat, fenfim ignitum iridis colores optime refert, præ reliquis metallis minus nobilibus tardius ignis ope in calcem abit & tunc Æs Uftum dicitur, id quod mallei ictibus ab ære decutitur Squamma Æris appellatur; ab omnibus menftruis folubile, ejus fuperficies ab aëre in crocum

IRRITANTIA.

viridem vertitur, Æruginem dictum, ad aquam eft: 9: 1.

Cuprum reperitur I. Nativum 1) fub forma ficca, Cuprum Nativum Auctorum, 2) fub forma liquida, Aqua Camentatoria Auctorum, unde Cuprum Camentatorium Auctorum, Pracipitatum L. obtinetur. II. fub forma terræ 1) laxæ a) cæruleæ Caruleum montanum Auctorum, B) viridis Viride montanum Auctorum, Arugo nativa WALLER. Terra viridis Wurtemb. 2) induratæ a) viridis a) mollioris Chryfocolla PLIN. Atlas-vel Sammet-Erz, &) polituram admit .. tentis Malachites PLIN. b) cæruleæ Lapis Armenus Auctorum, c) rubræ Cuprum rubrum L. III. fub forma mineræ 1) ex rufo cærulescentis Cuprum vitratum L. 2) gryfeæ Cuprum cinereum L. 3) albidæ Cuprum albidum L. 4) fulvæ Minera cupri hepatica WALLER. 5) flavæ Cuprum fulvum L. Kupfer - Kies. 6) variis coloribus cæruleo maxime & viridi ludentis Cuprum purpureum L. Minera cupri viridescens WAL-LER. Præterea Æs etiam in variis mineris argenti occurrit.

Satis copiose cuprum per Europam passim obtinet.

Cuprum vires rodentes edere , jam GALENUS monet, & præparatis inde conflatis, extus ad confumendas carnes, quæ præter naturam furgunt, ab omni tempore Chirurgi usi funt, nulli igitur miramur, idem intus assumente as an aufeam, mox vomitus & alvi fecessumente and antiquissa a nauseam, mox vomitus & alvi fecessumente apud antiquissa an gentes æris usus ad supellectilem etiam cibariam obtinuerit, certum tamen est, eas propriis artificiis fuisse usa, quibus impedirent, ne edulia a metallo inquinarentur, & omnino non fatis caute in hac ipfa re possium verfari, cum adeo multa exempla gravissimorum fymptomatum a contagio æneo excitatorum prostent, ex

500

innumeris fequentia modo adduco : Cibos in vafis cupreis, viridi æris infici, & viride æris venenum effe, AVICENNA monet, LEDEL & TACHENIUS inde vomitus & feceffus cieri observaverunt, LANZONIUS dirum vomitum, dolores, alvi fecesfus ab eduliis in cupreis valis coctis furgere, variis experientiis docet, MAUCHART infignes inde ortos vomitus & ipfam mortem adducit, cui TESTI obfervatio accedit, MISSA plura exempla allegat de effectibus venenatis & ipfa morte inde excitatis, COSNIER & FABAS acutiflimos dolores & convulsiones enarrant, in cœnobio Angelimontano vix non omnes conventuales colica Pictonum affectos, unum etiam mortuum effe, ob cibum ex supellectili ænea, unde stannum derasum erat, assumtum, SCHEUCHZER enarrat. fimilem de monasterio Beinvilensi historiam Cl. ZWINGER allegat & de monasterio Neuenburgenfi HUEBER, Cl. RAMSAY plures inde convulfos & delirantes adducit, Idem, fcorbutum clafficorum a fupellectile ænea, qua utuntur, derivare annititur, non pauca etiam inter nos de his noxis occurrunt exempla. Tot cum prostent documenta de deleterio cupri effectu in corpus humanum, quis credet, quod tamen extiterint Auctores, qui illud innoxie ad vafa cibaria adhiberi poffe propriis differtationibus voluerint evincere. Imo prudentes Chirurgi medicamento, quod dum rodit, etiam fimul adstringit, ne quidem extus utuntur, & fi intus fumtum, medicatum unquam effectum edidit, idem ab omni alio draftico, validas excretiones excitante, omnino quoque furrexiffet.

* Æs Uftum, Xaluis nenzopér@ DIOSC. varia ratione folet præparari, id quod falia recipit etiam inde magis rodens evadit, cum id cui fulphur adjicitur, ad indolem vitrioli cærulei vergat; ab eo non abludit * Crocus Veneris Wurtemb. Ærugo, 105, Verd de

Ii 3

Gris, Grünspan Conf. Instit. Chem. ut fordes in ulceribus cacoëtheis furgentes confumantur, olim adhibebatur. Flores Æris, Æs viride crystallisatum BASIL. VALENT ad pictorios potius, quam ad medicatos usus adhibentur: * Spiritus Veneris LEMERY naufeolo medicamento, aliis rationibus paratum acetum concentratum fubstituitur, excitandi ergo naribus admovetur : Unguentum Ægyptiacum, apud veteres emplastra & unguenta, quæ æs habebant, ab Ægypto folebant denominare, ea ad medicamenta uterina externa HIPPOCRATES recipiebat, id quod hodie proftat, MESUE præscripsit, ad ulcera fordida & fistulofa usurpatur, ut fordes confumat & ulteriorem corruptionem impediat, ad ulcera oris a quibufdam etiam adhibetur, quos ego faltem fequi nollem : * Unguentum purpureum WURZ Ægyptiaco minus, septicum, magis adstringens eft : * COLLYRIUM LANFRANCI auripigmentum etiam recipit, rodens valde medicamentum, cautifime in morbis oculorum usurpandum, commendatur quoque ad ulcera venerea: Aqua Ophthalmica Sapphirina Pharm. Batean. ad diffipandam ophthalmiam laudatur : * Balfamum viride Metenfium DU CLOS abstergendi ergo ad ulcera adhibetur, unguento Ægyptiaco mitius eft : * Ens Veneris vid. Instit. Chem.

CAP. V.

SOPIENTIA.

§. 42.

Medicamenta, quæ nimiæ irritabilitati medentur fub Sopientium nomine venire folent : illa quæ ftimulum enervando agunt, hujus loci non funt, nec hic recenfemus medicamenta, quæ tenfionem

minuendo, irritabilitatem quoque moderantur, IIagnrogina, Lenientia dicta, illa enim fub Emollientium titulo fuerunt tractata, Refrigerantia quoque, quæ circulationem imminuendo omnino huc faciunt. jam paffim fuerunt indicata, hic illa modo confideramus, quæ ob arctiffimum inter irritabilitatem & vim fentiendi intercedentem nexum, hanc imminuendo. illam quoque minorem reddunt. A nimia irritabilitate, cum & dolores & spasmi furgant, hæc medicamenta Antispasmodica & A. worve folent appel--lari, illa, quæ fenfus & motus ita inhibent, ut fomnum producant, Hypnotica dicuntur; Narcotica autem ea, quæ fenforium commune adeo turbant, ut & fenfus interni lædantur. Indicantur Sopientia, cum dolores urgent, aut nimiæ vigiliæ, circulatio juftum modum excedit, aut motus involuntarii membra agitant, five obrigere faciunt; exulare autem debent, quando vafa encephali humoribus turgent, in illis morborum periodis, ubi humores coquuntur, nec non quando evacuationem criticam molitur Natura. Tandem quoque apud infantes & debiles cautifimus debet eorum usus effe.

a. VEGETABILIA.

ACONITUM, andrifor, Napellus Arab. Eifenhütlein. Ejus Folia hodie in ufus medicatos recipiuntur, quæ longa funt, laciniis profundioribus denuo divisis secta, inferne nervis eminentibus percursa, glabra viridi nigrore splendentia, inodora, recentia, aliquo ex quo gustata suerunt tempore elapso, acrimoniam sat evidentem produnt, exsiccata insipida sunt.

ACONITUM. Corollam pentapetalam irregularem habet, petalo fupremo cucullato duobus nectariis cochleariformibus imminente, polyantheram; ftylos aliquot, & his refpondentes capfulas habet: Na-

Ii4

pellus L. BLACWELL 561. laciniis eundo latefcentibus, glabris, agnofcitur.

Crefcit in montibus altioribus Europæ, præter maxime Septentrionalem.

Succus, colore fpiffiorem cerevifiam refert, odorem ingratum fpirat, faporem acrem habet, dum ad confiftentiam Extracti evaporatur, ad nonam fui ponderis partem redit, & hac ratione infpiffatus, falfum & leviter acrem faporem habet, odorem autem virofum, humidum etiam ex aëre attrahit; Folia, cum aqua fi extrahuntur, fui ponderis dimidium circiter Extracti aquofi, fatui, vix olidi fiftunt, cum fpiritu vini autem dant Extracti refinofi aquofo fimilis $\frac{1}{3}$. REINHOLD.

Veteres admodum vage Aconiti voce ufi, ea diversifimas plantas, & vel Ranunculos indigitarunt, nec ad liquidum deducta est Sylvatici conjectura, quod Napellus Arabum nostra planta sit, hinc neutiquam omnes, quas Veteres de Aconito habent observationes, huc credo adducendas esse, vomuisse inde, resoluta & convulsa fuisse bruta WE-PFER, HILLEFELD, SPROEGEL observarunt, qui fimul viderunt, in primis viis animalium enecatorum nulla five inflammationis five rofionis figna adfuisse : vertigine , fyncope , paralysi , affectibus foporofis periisfe latrones, quibus experimenti ergo Aconitum datum fuit, MATTHIOLUS & CASPAR BAU-HINUS referunt; WILLISIUS quoque, BACO, LENTILIUS, NORÆUS exempla habent de affectibus soporofis ab eo excitatis. Qui effectus rodentes inde ortos adducunt, aut impune tanguam olus comedi tradunt, de alia omnino quam de noftra planta videntur loqui. Plantam adeo evidenter perniciofam primus Illustris STOERCK, ad usus medicatos recipere aufus est & frequenti experientia nifus evicit, eam, si justa exhibetur dosi, potentissime lymphæ spif-

504

fitudines folvere, & eandem in valis aponeurofium & ligamentorum hærentem, ut inde transpiret, difponere, multas infuper observationes enarrat de rheumatifmis etiam pertinacioribus ejus ope curatis, cum quibus etiam ROSENSTEINIANE & RIBEANE apud REINHOLD, nec non LUDWIGIANE conveniunt; Hallenfes apud BOEHMER & ANDREE, Nostrates apud REINHOLD, LUDWIG & Cl. COLLIN egregios ejus effectus in arthritide viderunt, COLLIN & convulsiones fugatas adducit, Ill. STOERCK præterea ejus efficaciam circa glandulas induratas & morbos venereos, fcabiem, fpinam ventofam, amaurofin, anchylofin & febres intermittentes, iteratis experimentis est expertus. Succi inspissati, quem Extractum Ill. STOERCK dicit, grana duo probe miscentur cum facchari drachmis duabus, & de hoc pulvere mane & vefperi grana decem, fingulis vicibus dantur, pro ratione circumstantiarum dosis etiam augetur, & ad grana quatuor vel fex ufque Extracti una vice, fine incommodo dari poffe, egregius Vir vidit : Cl. KEMPF ab effentia ex Herbæ Aconiti exficcatæ parte una, cum. Spiritus Vini fex partibus digesta, ad quadraginta usque guttas data, in arthritide & glandulis induratis egregios effectus deprehendit.

Asa FOETIDA Lat. Barb. Teufelsdreck. Non eft fuccus 18 oiaque vel Laferis vel Laferpitii Veterum, innotuit demum inter Arabes & a Græcis, qui Seculo XII floruerunt, oxogododado agov fuit dicta, SALMASIUS contendit, Barbaros ex Lafere Afæ vocem formaffe & noftrum medicamentum fætidum dixiffe, cum Veterum Lafer fuaveolens fuiffe legerint.

Prostant autem hoc nomine frusta variæ magnitudinis, quibus color fuscus est, flavo dilutus & aliqua pelluciditas, tenacitas præterea maxima, cum sub dentibus comminuuntur, sapor leviter amarus

lif

cum quadam acrimonia, odor virofus, alliaceus, infignis; tali ratione efformata frusta *in granis*, en *larmes* dicuntur, eadem, cum inhærent massis tenacibus, grumulos, *Electam* constituunt, masse autem nigricantes, ficcæ, minus odoræ, paucissis granis instructæ, *in Sorten* dicuntur.

FERULA. Flores umbellatos habet, utroque involucro instructos, & semina plana tribus striis notata: Afa fætida L. pinnis sinuatis, obtusis distinguitur.

Crefcit in Persia.

Observante KEMPFER unice ex fauciata radice fluit, & effluit sub forma succi lactei, qui sole exsiccatur, & colorem suscement induit; idem testatur, drachmam unam succi recentis, fortiorem odorem spirare, quam centum libræ lacrumæ inter nos prostantis.

Extracti aquofi $\frac{3}{4}$ circiter, fpirituofi $\frac{3}{8}$ fere & ultra $\frac{1}{64}$ olei odorati exhibuit NEUMANN; Extracti refinofi parum ultra $\frac{1}{3}$ CARTHEUSER. Tam fpiritus vini quam aqua, quando inde deftillantur, ejus odorem recipiunt. LEWIS.

Tanquam Gummi refina, evidenti odore imbuta, humores valide refolvit & magni usus eft ad omnes morbos ab obstructione viscerum oriundos, fed ipfum quod exfpirat volatile & quod, observante MILLARS, omnes excretiones eorum, qui afam fœtidam affumferunt, suo odore imbuit, evidenter motum fluidi nervei fopit; hyftericis & viris debilioribus nihil aliud pulchrius effe, quam afam fœtidam in pilulas efformatam, & ter de die affumtam, testatur BOERHAAVE; MILLARS eandem infantibus in afthmate convulfivo cum fucceffu dari vidit; HIRSCHEL affectum spafmodicum inde egregie curatum adducit. Vim anthelminticam, cujus fuspicionem ratio movet, WOLFF experientia confirmavit. Dofis est ad fcrupulum unum aliquoties de die. Extus refolvendi ergo partibus induratis, cum fucceffu applicatur, vel fopiendi ergo

naribus admovetur, Cl. PLENCK ejus ope multas fcrophulas & indurationes vidit curatas.

* BELLADONNA Barb. Mardeazógas THEOPHRAST? 580x10 marinòs DIOSCORID. Ejus Folia ex ovatis acuta funt, odoris & faporis expertia.

ATROPA. Corolla, calice quinquefido fustentata, gaudet quinquefida, ifanthera, monogyna, bacca calici infidente, biloculari, polypyrena: Belladonna L. BLACWELL 564. caule herbaceo & foliis ovatoacutis integris agnofictur.

Crefcit in Europa præter Sueciam & regiones magis Septentrionales.

Folia destillatione spiritum ammoniacalem fundunt. ALBERTI & OETINGER.

THALIUS adducit aliquem, qui ex decocto foliorum fopore lethali fuit affectus, LAMBERGEN & Illustr. HAEN a foliorum granis duobus aut tribus cum aqua infus, temulentiam, vertiginem, debilitatem visus furrexisse viderunt.

Mitto copiofissimas, quæ de radicum & baccarum deleterio effectu, prostant observationes.

Si quidem prioribus, post renatas in Europa litteras, Seculis, nostram plantam, ut vero valde fimile effe videtur, sub Solano comprehendebant, solia ejus jam diu ad usus medicatos adhibuerunt; GESNER succum baccarum interne ad sistendos alvi fluxus & dolores, nec non ad conciliandum somnum intus dedit. Folia contra cancrum JUNCKER, notantibus ALBERTI & OETINGER, LAMBERGEN, AMOREUX, MARTEAU, COLLIGNON, VAN DEN BLOCK, LUDWIG, CULLEN cum success adhibuerunt, DARLUC insignes glandularum colli scirrhos inde curatos, & feminam tympaniticam multum inde allevatam adducit. GATAKER in ulcere cacoëtheo & doloribus nephriticis egregios ejus vidit effectus. GREDING ex Extracti partibus octo, & pulveris foliorum quinque, pilulas paravit, quarum fefqui granum, mane & vefpera datum, pertinaciffimos icteros fanavit. Foliorum ficcorum fcrupulus cum unciis decem aquæ infunditur, & per priores dies duæ modo Infusi unciæ exhibentur, augetur dein dosis quotidie, usque dum ficcitas oris aut vertigo furgant, & ita pateat, quantitas medicamenti ut augeatur, Naturam non concedere. Externe ad cancrum jam GALENUS folia adhibuit, RAJO teste, WILLUGBY eadem extus cum fuccessu mammis fcirrhoss & cancross imposuit.

CAMPHORA vid. Refinofa.

CHAMOMILLA vid. Amara.

CICUTA, závelov, Ciguë, Schierling. Recipiuntur Folia, quæ funt triplicato pinnata, glabra, odore naufeofo & levi fapore instructa.

CONIUM. Floribus gaudet umbellatis, utroque involucro fustentatis, seminibus convexo-planis, striatis, striis crenatis: Maculatum L. BLACWELL seminibus non spinosis dignoscitur.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Extracti aquofi falini ultra $\frac{3}{8}$, Extracti fpirituofi, infipidi & inertis $\frac{1}{2.4}$ largitur, quod utrumque aquam ex aëre attrahit; fuccus ex foliis expresses, dum in Extracti confistentiam densatur, $\frac{7}{8}$ ponderis perdit, evidentius falsus, leviter nauseofus evadit, proprium & foetentem odorem spirat. Cl. EHRHARDT. Spiritum ammoniacalem, Oleum empyreumaticum, falem volatilem fundit IDEM.

Tanta cum fuerit apud Medicos per plurima fecula Botanices ignorantia, ut per quam multis in ufu fuerit, plantam quamlibet floribus umbellatis inftructam, & unde malos effectus in corpus humanum redundare viderunt, Cicutam appellare, hinc non audeo, quæ circa Cicutam obfervata lego, omnia illi, quæ hodie hoc nomine venit, applicare; interim

tamen quædam ad eam fpectare vix poterit negari, Cl. GUYOT a foliis affectum soporosum ortum vidit, & WATSON vertigines, comata, convultiones, mortes, Experientiff. ERHARDT deliria & fummam debilitatem. Extus applicata per longam annorum feriem sese insigne resolvens probavit, ita ut eandem quoque ad indurationes ipforum vifcerum adhibuerint, ZORN, rufticos folia cancro exulcerato cum fuccessu imposuisse, testatur, eorum ope gravissimum præputii tumorem ab HEERS curavit, phimofin scirrhoideam SULZER, cataractam MAZARS DE CA-ZELLE, ulcera fiftulofa STOERCK, NOLANUS &c. tumores glandularum, ulcera cacoëthea NOLANUS &c. Noftram plantam intus dare primus Illustr. STOERCK fuscepit, sed non audeo dicere num illam intellexerit HIPPOCRATES & GALENUS, qui revresor intus dederunt, & num RENEAULME Cicuta, cujus radicem ad drachmam unam contra obstructiones dedit, huc pertineat, an illa quam PETRUS SPANUS Seculi XIII Medicus, qui tandem fub nomine JOHANNIS XXI. folium papale confcendit, contra epilepfiam commendavit, monente NOLANO; Illustris Viri auctoritate commoti Medici, eam paffim in ufum trahere cœperunt, & nunc copiolissimis & fidiffimis observationibus compertum eft, eam justa dosi validiffime refolvere & obstructiones referare, quæ non raro aliis hactenus notis medicamentis refiftunt, glandulas fcirrhofas ejus ufu refolutas, præter copiofa apud STOERCK observata, DESMILLEVILLE, LANDEUTTE, MAZARS DE CAZELLE, QUERIN, Cl. RAHN, SULZER, LUDWIG fide constat; cancrum inde curatum plus quam quinquagefies STOERCK vidit, & viderunt præterea LUDWIG, Cel. TISSOT, LOCHER, DE COTE, PORTE, LARROUTURE, RENARD, COSTE, MAZARS DE CAZELLE, RUTTY, NICOL-SON, CULLEN, OTTMANN, ipsum uteri cancrum

nostro medicamento cessifie, testantur ENGELBERG, MOLINARIS, NOLANUS, RAHN, Exper. LAUTH, Scrophulis ab ea medelam allatam fuiffe, poft STOERCK, TISSOT, LUDWIG, NOLANUM, LOCHER, MAR-TEAU, PELET, FINANTNEVEU, MARTEAU, DE RO-OUEMONT, DUPUY DE LA PORCHERIE, MAZARS DE CAZELLE, RAHN, RUTTY, FARR, spinam ventofam fublatam STOERCK, HARTMANN & HUDE-MANN annotarunt, circa ulcera cacoëthea inde curata non paucis STOERKII obfervationibus accedunt etiam a NOLANO, LOCHER, BIESHAAR, RAHN, RUTTY, FOTHERGILL, LAUTH, Prud. GUERIN capta, Phtifin fuperatam cum STOERCK, QUARIN, NOLA-NO, FOTHERGILL, LARROUTURE, morbos cutaneos etiam præter STOERCK, NOLANUS & FOTHER-' GILL viderunt, obstructiones abdominales referatas, morbos ex iis furgentes fugatos, copiofiffimis exemplis STOERCK probat & fuis experientiis confirmant QUARIN, NOLANUS, HARTMANN & HUDEMANN, AUBRELIQUE, LOTTINGER, FARR, GUERIN, PA-RIS, Cl. ERHARDT; cataractam curatam STOERCK aliquoties expertus eft, nec non CHEMIN & MAZARS DE CAZELLE, ophthalmiam quoque STACHER & ZIEGENHAGEN ; hæmorolopiam BRIDAULT ; ipfam amaurofin STOERCK; egregios effectus in omni arthritidis & rheumatifmi genere multis exemplis STOERCK probat, quibus QUARIN, NOLANI, COSTE, FOTHERGILL observationes accedunt; Polypi narium curam BRIDAULT adducit ; de rachitide fugata, cedemate, cephalea chronica, anginis chronicis, cardialgia, leucophlegmatia, STOERCK exempla habet; qui etiam partes sphacelatas inde separari vidit, cum fucceffu ad morbos venereos adhibitam Cicutam non paucis exemplis STOERCK evincit, quibus etiam experientiæ QUARIN, NOLANI, HARTMANN & HU-DEMANN, LANGE & LOCHER accedunt ; epilepfiam

profligaffe STOERCK, asciten GUERIN, apoplexiam & furditatem, PARIS viderunt.

Tanta testium nube evictam præstantiam Cicutæ, nequaquam evertunt observationes, quibus fine successu adhibitam fuisse memoratur, illæ partim evidenter oftendunt animum pruritu Illustri STOERCK contradicendi agitatum, partim debentur vel hodie adhuc nimis frequenter inter Medicos æque ac Pharmacopæos obtinenti Botanices ignorantiæ, qua factum, ut genuina Cicuta adhibita non fuerit, partim Cicuta id commune habet cum præstantissimis quibusseunque medicamentis, quod non semper auxilium afferat, variis causis impedita, quæ nos latent.

Cum primum Cicutam intus dare cœperint, fuctum ex foliis expressum prudenter inspissatum & tantum foliorum in pulverem tritorum temperatum, ut humiditatem non ulterius ex aëre hauriret, ad duo grana, bis de die exhibere, & hanc dofin fequentibus diebus augere folebant, ad drachmas fex usque una vice quosdam Medicos ascendisse, apud STOERCK reperio; optima ratio videtur effe, quando primis diebus quatuor grana pro dosi dantur, aliquot granis dosis augetur & ita continuatur, usque dum evidens morbi levamen adeffe videamus, eadem tunc dosi per octiduum pergimus, denuo eandem aucturi, usque dum morbus totus fugatus fit. Cicutam præterea non male sub forma Infusi, sive succi expressi exhibitam fuiffe reperio, optimo confilio ufui interno, externus quoque jungitur.

Emplastrum de Cicuta CRESCENTIENSIS, addito Gummi Ammoniaco, efficacius reddere conatus est. Validum omnino resolvens, quod etiam cum successu hypochondriis imponitur, sub quibus viscera indurata jacent, ipsos pedum clavos inde curatos vidit HIL-

SOPIENTIA.

DANUS; * Oleum per infusionem & coctionem paratum. Paris.

CROCUS vid. Aromata.

CYNOGLOSSUM vid. Emollientia.

* HYOSCYAMUS, vorniam@, Jusquiamus Lat. Barb. Jusquiame, Bilsam. Folia & Semina folent recipere.

Folia oblonga funt, multis & magnis finibus excifa, lanugine alba obfeffa & odorem virulentum spirant.

Semina parva funt, rotunda, inodora, rugofa.

HroscrAMUS. Corolla irregulari quinquefida, calice quadrifido fustentata gaudet, pentanthera, monogyna, capfula cujus operculum horizontaliter dehiscit: Niger L. BLACWELL 550. foliis sinuatis seffilibus distinguitur. Diversum esse ab Hyoscyamo nigro Veterum, in Dissertat. de Plantis venenatis Alsatia ostendi.

Crefcit per omnem Europam.

Licet deliria, caliginem, affectus foporofos, convulfiones, mortem inde furrexisfe BORELLI, S. PAULI. SCHULZ, RYSER, HUNERWOLFF, ALBERFI, CA-MERARII, GASSENDI, CLAUDER, BUCHNER, PA-TOUILLART, GMELIN, LA SERRE, GRUNWALD, CHEVALIER, BERTRAND, A NAVIER, MATTHIOLI, ALEXANDRINI, FABRI, SLOANE, ERHARD, PLAN-CHON, HALLER, HAMILTON &c. obfervationibus conftet, ab omni tamen tempore extiterunt Medici, qui illum vel intus fcopo medicato exhibere ausi funt. SERAPION & HERACLIDES illum, teste CELIO AURELIANO, ægrotis dederunt deglutiendum, ASCLEPIADES & GALENUS ad medicamenta interna adhibuerunt, fuperiorum Seculorum Medicos, Illuftr. HALLER allegat, Illustris STOERCK in vario convultionis & epilepfiæ genere, diabete fpuria, melancholia, mania, hæmoptyfi, tuffi ficca, fe illud dediffe

512

dediffe dicit, Cl. COLLIN in convultionibus, GESNER in malo hyfterico, FOTHERGILL in ulcere viarum urinariarum. Datur fucci infpiffati granum unum & hæc dofis fequentibus diebus augetur; ad drachmam dimidiam ufque Cl. COLLIN afcendiffe reperio.

Folia extus, & refolvendi ergo, & fcopo anodyno applicantur, femina HIPPOCRATES ad linimentum contra tetanum recepit, peffime eorum fumum dentibus cariofis immittunt.

* Oleum per infusionem & costionem Parif. Oleum ex seminibus expressum DIOSCORID. hoc aliquid proprii anodyni habere, communis Auctorum confensus & genius seminum videntur suddere : Emplastrum de Hyoscyamo LUDOVICI multum laudatur ad resolvendos tumores glandularum & viscerum, ego ad rheumatismos, quibus semper unguinosa nocent, adhibere nollem : * Unguentum Wurtemb.

Parifini etiam Folia & Semina Hyofcyami albi L. foliis petiolatis, finuatis, minoribus, nulla lana gaudentibus diftincti, recipiunt, Europæ meridionalis civis, quorum autem effectus in corpus humanum a prioribus non diverfus eft.

MACIS vid. Aromata.

* MANDRAGORA, Marsega DIOSC. Allraun. Commendantur a quibusdam Radices, quæ crassæ funt, longæ, creberrime bifidæ, ex cinereo-ferrugineæ, eas, quæ magis nigricant, Faminas appellare solent, intus albent, sapore gaudent acri, amaricante, cui aliquid styptici accedit, & odore viroso.

Atropa Mandrogara L. BLACWELL 364. habitu. acauli diftinguitur.

Crefcit in Europa magis Meridionali & Occidentali, nostras hyemes impunis fert.

Medicamentis narcoticis vulgo folet adscribi, cum Veteres µavdgavogav THEOPHRASTI, cum ea, quam DIOSCORIDES habet, confuderint, nec mihi de istius

Kk

effectibus ulla, cui fidem habere poffim, obfervatio innotuerit, de ejus in corpus humanum viribus nihil audeo decidere; nolo adducere, quas de ejus ad Magiam præftantia, circumferre folent fabellas. HOFFBERG ab ea, extus applicata, egregios ad tumores glandularum vidit effectus.

* Oleum coctum Augustan. validum/medicamentum anodynum effe dicitur.

MELILOTUS vid. Aromata.

MOSCHATA NUX vid, Aromata.

PEONIA, Nonvoisn, maiuria, Pivoine, Gichtrosen. Radices, Flores, Semina officinas ingrediuntur.

Radices tuberofæ funt, aliquot pollices longæ, pollicem circiter craffæ, fub cuticula ferruginea, carnem albiffimam condunt, levi adftringente & naufeofo fapore, odore exiguo inftructam; exficcatæ, in taleolas fectæ & cuticula privatæ affervantur.

* Florum petala custodiuntur profunde rubra, odoris exigui, faporis nullius.

Semina fubrotunda funt, nigra & medullam albam, dulcem includunt.

PÆONIA. Corolla pentapetala, calice quinquefolio fustentata, polyanthera, tri-tetra-pentagyna & capsulis binis ad quinas usque gaudet: Officinalis L. BLACWELL 65, 245. foliorum laciniis latis distinguitur.

In Helvetia, Gallia meridionali & Italia fponte crefcit, apud nos multum in hortis colitur, & optime noftras hyemes fert.

Radicum Extractum aquofum infipidum fere & inodorum est, spirituosum amarum & adstringens, Florum Extractum aquofum, austerum, & cum quadam amaritie dulce, spirituosum grate olens & faccharina dulcedine instructum deprehendit LEWIS. Semina $\frac{1}{4}$ Extracti aquosi, dulciusculi, $\frac{1}{5}$ circiter fpirituofi, grato odore & fapore gaudentis, exhibuerunt NEUMANN, Radices autem ultra $\frac{1}{2}$ Extracti aquofi, & ultra $\frac{1}{4}$ Extracti fpirituofi.

HIPPOCRATES & radices & femina, tanquam medicamenta uterina, nec non ad referandas vifcerum obftructiones, adhibuit, GALENUS fabulam de radice, e collo fufpenfa, qua epilepfia curata fuit, recenfet, ficque occafionem dedit, ut hæc radix infequentibus feculis fpecificum antepilepticum effe fuerit reputata, hanc virtutem, ne unica quidem, cui fidere poffemus, confirmavit experientia; eam noctu effodiendam effe, jam THEOPHRASTUS præcepit, alia abfurda circa colligendi rationem addiderunt medio ævo Aftrologi; femina & flores ad radices accedere fibi perfuaferunt. Medicamentum, fuperflitione excitatum, Aftrologia fuffultum, evilefcere cœpit.

* Aqua destillata VAL. CORD. * Conserva EJUSD. * Extractum SCHROED. Syrupus EJUSD. vulgo in morbis convulsivis præscribitur : * Tabella fine igne Paris. funt trochisci ex pulvere radicis parati.

PAPAVER, μήπων. Ejus duæ species a Veterum temporibus in officinas recipiuntur; μήπων nimirum ήμες@, Papaver sativum, Pavot, Magsaamen & μήπων poias, Papaver Erraticum, Coquelicot, Klapprosen.

De priori & Capita & Semina adhibemus.

Capita majuscula sunt, rotunda, operculo rotundo tecta, sub quo multa foramina hiant, quæ in totidem septa aperiuntur, odore gaudent viroso, qui per exficcationem multum imminuitur.

Semina five alba funt, five nigra, vel potius cærulescentia, exigua, odore nullo, fapore dulci instructa.

PAPAVER. Corollam tetrapetalam regularem habet, calice diphyllo fuftentatam, polyantheram, monogynam & capfulam stigmate radiato coronatam, fub quo multa foramina hiant : Somniferum L. Kk 2 BLACWELL 482 & 483. foliis amplexicaulibus & incifis diftinguitur.

Colitur in Oriente & paffim per Europam.

Capita ¹/₅ Extracti aquofi largiuntur : Semen spiritum urinosum fundit.

Capita turgent fucco, qui ipfum opium constituit, hinc vires fopientes edunt, recentia autem præ exficcatis, magis funt efficacia, ficcorum unum, ex aqua coquendum, pro dofi præscribitur.

Semen ab HIPPOCRATE nutrientibus adfcribitur, & GALENI tempore vulgo in cibum recipiebatur, id quod etiam plures confirmant, inter quos vel PROSP. ALPINUM, DOERING, HERTODT, MATTHIOLUM, TRALLES allegaffe fufficiat, & vel inter noftrates pueri illud creberrime ob dulcedinem, qua fcatet, largis munipulis folent devorare, nullæ aliæ inde, quam quæ omnibus feminibus oleofis propriæ funt, vires funt expectandæ.

Maximam famam affecutum est ex Papavere præparatum.

Opium. Succus nimirum lacteus, quem capita Papaveris continent, infpiffatus, odore virofo, fapore acri & amaro inftructus, qui in panes, pugni quoque magnitudinem excedentes, formatus, ad nos adducitur; variis quifquiliis vegetabilibus hi panes tecti funt, quas determinare non poffum, id faltem moneo, quod non ad folia Papaveris, quibus opium involvi folet, pertineant.

In Natolia maxime, Perfia & Ægypto paratur.

Color, quo id, quod hodie inter nos obtinet, instructum est, illud ex decocto capitum Papaveris parari, probabile reddit, & hinc pursorior Veterum esse, id quod etiam Cel. CONDAMINE & GARCIN fide constat; Ex DILLENII & Ill. HALLER experimentis apparet, Opium, ex capitibus inter nos crescentibus paratum, æque esse esse ac illud, quod ex Oriente ad nos adducitur; Arabes Thebaicum commendarunt, quæ denominatio etiam hodie adhuc in officinis obtinet, licet prudentes non tam ad patriam, quam ad puritatem refpiciant.

ALSTON Extracti fpirituofi $\frac{1}{3}$, aquofi $\frac{2}{3}$, quod ipfum Opium fapore & odore refert, inde obtinuit, qui etiam fpiritum urinofum & falem volatilem, deftillationis ope, ex eo elicuit: BUCHNER & SCHWARZ Extracti aquofi $\frac{2}{3}$, fpirituofi ultra $\frac{1}{2}$ recenfent: NEU-MANN Extracti fpirituofi $\frac{5}{6}$ fere, aquofi ultra $\frac{5}{8}$. Aquam & fpiritum vini, fi ab Opio abftrahuntur, ejus odorem & faporem fervare, idem toftione & coctione multum debilitari, Illuftris TRALLES probat, nec non Extractum fpirituofum aquofo validius agere; fanguini admiftum eum attenuat.

Parciffimum fuisse apud HIPPOCRATEM Opii usum, & illum demum inter Empiricos frequentius obtinuisse LE CLERC docet. Illud fensuum & motus muscularis organa ita obtundere, ut eorum functiones imminuantur, imo aucta ejus dofi, fenfus internos turbari, mufculos refolvi, lethali fopore opprimi homines, per omnia Secula annotatum fuit, ipfa hilaritas & audacia, quas levior ejus quantitas affumta inducere folet, jam species delirii effe videtur. Hanc ejus vim omnis schola GALENI, non pauci quoque ex Recentioribus, a nescio qua virtute refrigerante, deduxerunt, quæ autem adeo non ipfi ineft, ut potius ejus usum femper motus cordis & arteriarum incitatos excipere, Illustris TRALLES experimentis evicerit; magis probabili ratione Opium fanguinem refolvendo, vafa hinc distendendo, encephalum & nervos premendo agere, egregii inter Recentiores, Auctores contendunt, fed cum vix mente concipere queam, unum aut alterum Opii granum omnem massam humorum ita posse attenuare, ut vafa adeo. distendantur, ut vicinam encephali medullam pre-

Kk 3-

mant, hinc ejus affectus a principio vaporolo, quod nares in eodem evidentiffime diftinguunt, immediate a nervis ad fenforium delato, derivare non dubito, maxime fi perpendo, quod hoc halituofo, five per toftionem, five per coctionem, abacto, opium iners evadat, quod spuma folutioni aquosa opii supernatans & vapores ex eodem eliciti, ipfo in fubstantia exhibito, vel validius agant : ab ufu Opii etiam venerem ftimulari, Egregius TRALLES observavit, id quod ab ejus vi in phantafiam agendi & a calore, quem excitat, videtur pendere; ejus virtus sudorem promovendi, cum reliquas excretiones fiftat, a relaxatione fphincterulorum, qui vasis cutaneis præfixi sunt, cum irritabilitate per experimenta Ill. HALLERI imminuta, unde & reliquorum viscerum excernentium functionem turbat, videtur deducenda effe.

Ex his in Opio eminentibus virtutibus patet, quanti usus fit in omnibus morbis, ubi dolores & spasmi urgent. Nemo accurate magis morbos, in quibus id cum fuccessu datur, quam Ill. TRALLES evicit, qui, propria & optimorum Auctorum experientia nifus, monet, illud cum egregio fuccessu addi Cortici Chinæ in curandis febribus intermittentibus; exhiberi in febre fecunda variolarum, dum dolores multum vexant; in morbillis, fi tuffis, motus convulfivi, dolores, diarrhœa premunt; in doloribus ventriculi, valde magnis & ad omne colicæ genus, præter flatulentam; porro ad inflammationem inteftinorum. ileum, herniam incarceratam, nephritidem calculofam, convultiones & epilepfiam fine materia; vomitum & fingultum fine materia; tuffim catarrhalem, metastaticam, convulfivam; afthma convulfivum; palpitationem cordis ab acri aut nimia mobilitate ; dyfenteriam, ubi dolores intenfe urgent; fluxum menfium dolorificum; metum abortus, antequam hæmorrhagia furrexerit, dolores partus spurios, lochia nimia a retenta portione

fecundinarum. In spasmo maxillæ inferioris, cynico & opifthotono, a largioribus ejus dofibus egregios effectus viderunt SYLVESTER, CLEPHANE MACAU-LAY, HUCK, FARR. Sed medicamentum fanguinem attenuans, motum humorum intendens, excretiones fistens, cerebrum maxime petens, multis etiam in morbis omnino exulare debet ; oftendit Illustris TRALLES, illo abstinendum effe in omni hæmorrhagia, in febribus continuis æque ac malignis, cephalalgia, dyfuria, rheumatismo, arthritide, odontalgia, otalgia, malo hypochondriaco, melancholia, mania, - tuffi chronica, graviditate, diarrhœa, hypercatharfi, phtifi & hydrope. Monet idem egregius Auctor, & quis non videt, quod egregie moneat, illud nunquam in usum trahendum, ubi patet, stimulum quendam evidentem fibras irritare, infantibus quoque illud nunquam effe exhibendum.

Dofis ejus inter nos vix granum fine noxa excedit, optime fingulis horis unum granum propinatur, uíque dum ejus effectus obfervamus.

Externum Opii usum Illustris TRALLES in universum rejicit, quia incerta est dosis, quæ de Opio, tali ratione applicato, corpus subit, id quod in medicamento summe heroico nequaquam negligendum est, & quia Opium evidenti, qua pollet, acrimonia, partes, quibus imponitur, irritat, & hinc dolores potius auget, quam sedat.

Proftant porro Oleum ex Seminibus MESUE, Parifini duplex habent, quorum unum ex feminibus albis, alterum ex nigris exprimitur, ultimum Huile d'Oeillet dicitur, adeo nihil hoc oleum fanitati contrarium habet, ut pueri, teste REICHARD, placentis ab expressione reliquis copiose vescantur, exdem ad faginanda animalia multum recipiuntur: Syrupus Papaveris albi, Diacodium Veterum, Parifini, præeunte GALENO, capita rejectis seminibus recipiunt, velisfime anodynus, ad unciam unam & ultra poteft exhiberi : * Syrupus Diacodii MONTAN. est præcedens, cui adhuc relaxantia adjiciuntur ; huic aliquid Croci addendo parant * Syrupum Diacodium crocatum Viennenf.

* Aqua Generalis Parif. ratione farraginis ingredientium, jure Theriaca liquida mereretur dici, * Aqua Hysterica: variæ ejus præscriptiones prostant, nulla placet, Wurtembergensis præ reliquis magis carminativa est & minus humores commovet : * Balfamum Hypnoticum MYNSICHT. correctum recipiunt Parif. * Balfamum Hystericum Parif. ex foetidis & Opio conftat, Nostratium potius unguentis, quam balfamisadscribendum: * Balfamum Odontalgicum compositioni JUNCKEN IT circiter Opii adjiciunt Wurt. Diascordium v. Scordium :* Emplastrum ad dolores dentium Noftr. * Emplastrum Odontalgicum Wurtemb. * Emplastrum Stomachale Parif. * Essentia Anodyna LUDOVIC. est Extractum Opii in octuplo menstrui spirituosi & acidi folutum ; illa omnino præstat Esfentia Anodyna Wurtemberg. & Noftr. quæ eft Opium novem partibus. aquæ cinamomi folutum : * Effent. Antarthrit. c. Opio. HOFFMANN W. * Effent. de scordio compos. * Extra-Stum Anodynum Wurtemb. 1 circiter Opii habet: * Extract. Bezoard. Camerar. W. Extractum Opii voce Paracelliftica Laudanum dicitur, Parifini Extractum vinofum, Noftrates & Wurtembergenfes aquofum recipiunt, hi etiam aliud ad mentem LANGE-LOTT parant, Opium cum aliquo liquore fermentante confermentando & infpissando & illud * Extra-Etum Opii dicunt : * Gutte Anglice Anodyne Parif. * Laudanum hystericum Wurtemb. 3 Extracti Opii habet : Laudanum liquidum SYDENHAM, dolendum, quod egregius auctor fe errore Veterum feduci paffus fuerit, & calida Opio junxerit, 1/6 circiter Opii vehit: * Laudanum Opiatum Wurtemb. * Laudanum Urinarium MICHAEL I Opii habet. GORIS, cui Illustr. TRALLES affentitur, rectiffime monet, opium omnibus ejus præparatis præferendum effe, quicquid ipfi corrigendi ergo adjicitur, vel iners est, vel perniciofum, rectiffime hinc omnia Laudana compofita exulare jubentur : Mithridatii compositiones, quæ hodie proftant, inter se differunt, omnes recedunt ab ea, quam nobis ex DAMOCRATE GALENUS reliquit, omnes vere theriacales, Parifinum I circiter, Wurtembergense & Argentoratense ¹/₃₀ Opii continet. * Opiata Salomonis JOUBERT inconcinnam compositionem ex aromatibus, quibus minima ratio Opii accedit, conftanten descripsit: * Orvietanum, BATEO ab Equite TALBOT communicatum, Wurtembergenfes recipiunt, Theriacam & Mithridatium & magnam adhuc alexipharmacis adfcriptorum farraginem recipit; Parifini duplicem habent præscriptionem, unam Prastantiorem dicunt, quæ altera fimplicior est; Electuaria, quæ veneno resistere credebantur, Recentes, monente PAULINI, ab Orvieto, urbe in Italiæ Romania fita, denominarunt : * PHI-LONIUM ROMANUM a PHILONE Tarfenfi, qui Au-GUSTI ævo floruit, propria elegia, ftylo figurato composita, quam nobis GALENUS confervavit & explicuit, descriptum, non ad præscriptum PHILONIS, fed ad formulam NICOLAI PRÆPOSITI parum mutatum recipitur, To circiter Opii & I feminibus hyofcyami habet : Pilulæ de Cynogloffo vid. Cynogloffum : * Pilale Solares WILDEGANSH, inconcinnæ compofitionis ultra dimidium ab Opio efformatur: * Pilula STARCKEY feu MATTHEI minus laudandæ, cum ex drasticis & calefaciente multum sapone terebinthinato. conftent, 1/2 fere Opin & totidem de utroque Helleboro habent : Pilule de Styrace vid. Styrax : * Requies NICOLAI differt ratione ingredientium pro variis Difpensatoriis, Wurtembergenses T, Opii, ultra Kks

To feminis Hyofcyami condunt : * Pulvis Abforbens WEDEL: * Pulvis Anodynus LUDOVICI eft Extractum Opii, cum duplo Coralliorum rubrorum mixtum; eidem Santalum rubrum adjiciendo, & Opium ad 1/2 deprimendo, * Pulvis Anodynus CAMERARII paratur: * Requies NICOLAI: * Syrupus de Karabe: Theriaca ANDROMACHI. Inconcinna, fi qua alia compositio, cujus encomia, a GALENO proprio tractatu celebrata, abfurdiffimis hypothefibus nituntur, quicquid virium habet, unice ab aromatibus & Opio, cujus $\frac{1}{10}$ circiter habet, pendet. Opprobrio artis omnino medicamentum contra omnes regulas bonæ compositionis impingens, a PLINIO jam reprehenfum, vel hodie adhuc imagno fastu adornatur, & medicina, quæ ad nullum venenum valet, pro polychresto antidoto, non modo ubi virus ingestum fuit, fed etiam in morbis, quos venenatis adferibunt, ab indocta plebe æque ac Medicis præscribitur : * Theriaca Calestis. Ejus primam ideam QUERCETANUS dedit, GREIFF Pharmacopola Tubingenfis auxit, inde non multum recedunt Nostrates, absurditate etiam priorem vincit; Parifini præscriptum HOFFMANN, paucis mutatis, sequuntur, I Opii habet : * Acetum Theriacale Parif. * Aqua theriacalis Bezoardica MINDERER vere theriacalis: * Aqua Theriacalis composita Parif. * Aqua theriacalis Simplex Wurtemb. fpiritus potius nomen meretur : * Spiritus theriacalis Wurtemberg. * Spiritus theriacalis camphoratus August. minus bene prolixisfimæ compositionis medicamento, plura adhuc ingredientia adjiciuntur : * Tinctura Bezoardica LUDOVICI. exæstuans medicamentum, $\frac{1}{2I}$ circiter Opii habet: * Tinctura Bezoardica MICHAELIS : * Tinctura Odontalgica HOFFMANN: * Trochisci Alkekengi vid. Alkekengi : * Trochisci de Karabe vid. Succinum. * Unguentum hamorrhoidale extemporaneum Parif.

De Papavere Rhoeade recipiuntur petala Florum,

522

quæ rubra funt, ovata, odore levi, fapore nullo inftructa, & quæ aquæ, cum qua infunduntur, evidentem mucilaginem affricant.

Papaver Rhœas L. BLACWELL 560. Capfulis glabris, globofis & habitu pilofo dignofcitur.

Crefcit ubique, præter Europam maxime Septentrionalem.

Hi flores demum Seculo XVI ad ufus medicatos videntur recepti fuiffe, demulcendo & relaxando potius, quam propria vi anodyna in doloribus pectoris & abdominis, & cum acrimonia obtinet, videntur agere,

* Aqua destillata VAL. CORD. * Acetum SCHROED. * Extractum QUERCET. * Conferva SCHROED. Syrupus QUERCET. * Tinctura aquofa cum spiritu vitrioli acuta.

SOLANUM, Σlgúχν@ unπaï@, Morelle, Nachtfchatten, Recipiuntur Folia, quæ rhomboidea funt, petiolata, dentato-angulata, odoris expertia, nec proprius in eis eminet fapor.

Solanum Nigrum L. BLACWELL 107. habitu inermi & glabro, nec non floribus in umbellam collectis distinguitur.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Plantam, quam Veteres oleribus adferibebant, & qua vel hodie adhuc Indos, tanquam olere, uti, SLOANE teftatur, primus ARDOINUS venenis adferipfit, ad quæ ipfam etiam poft ipfum vix non omnes Auctores referunt, fed vero valde fimile eft, obfervationes, quæ de noxis inde excitatis proftant, Atropæ potius, etiam Solanum dictæ, quam Solano noftro effe adferibendas, & infufum quindecim foliorum granorum fuccum, ad drachmas tres datum, duas drachmas fucci ex baccis expreffi, fine ullo incommodo, exhibitas adduxi in Differtatione de Venenatis Alfatiæ plantis. Folia difeutiendi ergo partibus inflammatis imponuntur, eadem egregie ad curationem mammarum induratarum facere, crebro expertus est WI-LUGBY apud RAJUM.

* Aqua Sol.ni VAL. CORD. Oleum Solani LE-MERY ad inflammationes maxime laudatur, egregie ad ambusta conducit : Unguentum de Solano Nostrat. egregium medicamentum ad ambusta & ulcera antiqua.

* STRAMONIUM Recent. Pomme épineuse, Stechapfel. Folia exhibet magna, viridia, angulosa, in lacinias latas divisa, odore viroso instructa.

DATURA. Corollam habet quinqueangularem, fimili calice fuftentatam, regularem, ifantheram, monogynam, capfulam quadrilocularem feminibus reniformibus fœtam: Strammonium L. BLACWELL 310 fructu erecto, fpinofo & foliis glaberrimis diftinguitur.

Americanæ originis planta, hodie vel nimis frequens per omnem Europam occurrit.

DOEDERLIN integram familiam a Strammonio, fub crambes forma affumto, narcofi & motibus convulfivis corripi vidit, a foliis ulcufculo ad oculum impositis, paralysin pupillæ notavit, a seminibus deliria, motus convulfivos, apoplexiam, paralyfin furrexisfe BUCHNER, KRAMER, SWAINE, Cel. LOBSTEIN viderunt. Sed etiam falutares ejus effectus observarunt Auctores : Illustris STOERCK mentem alienatam eo curatam aliquoties est expertus, plures & infignes effectus aliquis Medicus in Comment. Lipf. ODHELIUS plures observationes habet de epilepticis eo partim curatis, partim multum levaminis expertis, & BERGII observationes adducit de delirio, spasmis abdominalibus & convulsionibus inde curatis. Datur extractum ad granum unum pro dofi & hac fenfim afcendendo ad grana fex ufque extenditur.

* Oleum infusum Parif.

P. ANIMALIA.

* ALCE, and, Elan, Elend. Subministrat ungulas, bifidas, quemlibet animalis pedem terminantes, nigras, magnitudine & figura proxime ad bovinas accedentes, a quibus corneo, qui ad nigrum accedit, colore, & quod rafæ nullum fætorem spargunt, se distinguunt.

Cervus Alces L. Cornibus ad basin usque palmatis distinguitur.

In Polonia & reliqua Europa Septentrionali, nec non in Afia & America occurrit.

Extracti refinofi $\frac{1}{40}$, aquofi falini $\frac{1}{6}$ NEUMANN obtinuit.

Primus ERASMUS STELLA, qui vertente Seculo XV floruit, externum harum ungularum ufum contra morbos convulfivos commendavit, fequentes Medici eas ad eundem finem etiam interne dederunt; abfurdo commento nititur fabula, animal morbo comitiali fubjectum ejus infultus, ungulis fibi aures fcalpendo, arcere, docuit experientia, neque animal malo epileptico conflictari, neque ejus ungulas qualemcunque vim habere hoc malum curandi.

CASTOREUM, xaçóguov, Bibergeyl. Hoc nomine veniunt duo Folliculi, inferne nexi, deinde divergentes, oblongi, qui progrediendo ampliores & magis ventricofi evadunt, efformati a membrana tenaci & coriacea, quæ fubftantiam includit nigricantem, tenacem, proprio, qui caput obnubilat, odore & fapore amaricante præditam, inflammabilem, multis cellulis membranaceis diftinctam. Sacci majores, ventricofi, graves, fubftantiam ficcam quidem, fed non totam aridam, & fortiffimo odore inftructam continentes, reliquis præferendi; hi a Ruffia, Pruffia, Dantifco denominantur, nec cedunt iis, qui ab animali, ad Rhodanum degente, defumuntur, teftante GEOFFROI. Canadenfe, quod Anglicum quoque appellare folent, folliculos minores fiftit, fubftantiam aridam, minus odoram includentes. Non raro folliculis folent fanguinem infpiffatum committere, cui, quadam adjecta caftorei portione, odorem affricant.

CASTOR. Quadrupes, dentibus in utraque maxilla, inciforibus utrinque duobus, caninis nullis, cauda plana, fquammofa gaudet : Fiber L. caudam habet horizontalem.

Copiofiffime in Europa & America septentrionali & temperata ad fluviorum littora occurrit.

Sacci, qui fub nomine Caftorei proftant, ad utrumque urethræ latus, prope præputium hærent, & proprio orificio in urethram aperiuntur; ex animali defumti, infumando contra corruptionem defenduntur.

Tam aqua, quam fpiritus vini ejus principia activa extrahunt, fpiritus vini inde abstractus, leviffime odoratus fit. LEWIS; Extracti aquofi $\frac{1}{4}$ & totidem fpirituofi largitur. GMELIN; Salem volatilem destillationis ope obtinuit FASCH, nec non Cl. Mo-DEL, qui oleum quoque, quod bitumen redolet, ex eo destillare vidit; NEUMANN $\frac{7}{28}$ Extracti aquofi & totidem spirituofi accepit.

Sed proftat quoque Axungia Caftorei, quæ confiftentiam unguenti habet, & cujus odor caftoreum refert, fed mitior eft; defumitur ex fex glandulis conglomeratis, quarum tres ad utrumque latus urethræ, fub folliculis, quæ Caftoreum habent, occurrunt, & in urethram aperiuntur.

HIPPOCRATES Caftoreum in morbis uterinis & hyftericis adhibuit, integrum de eodem tractatum ARCHIGENEM fcripfiffe, GALENUS refert, ipfe illud ad fopiendos nervorum motus & cienda catamenia laudat, & in univerfum a Medicis ad morbos convulfivos æque ac illos, ubi dolores urgent, malum hypochondriacum maxime & hyftericum folet adhiberi, & tam extus quam intus præfcribi : SCHULTZ egregios ejus in colica effectus vidit. Datur ad grana octo, a duabus drachmis affumtis nec calorem multum nec numerum pulfuum mutatum fuiffe, vidit ALEXANDER : clyfteribus ejus drachma adjicitur.

Axungiam ad ufus externos modo adhibent & ad unguenta nervina, quæ partibus debilitatis roborandis dicata funt.

Effentia vel Tinctura SENNERT. correcta : * Oleum fiillatitium Parifini in Codicem receperunt. Oleum cotum fimplex FUCHS. * Oleum coctum compositum DE MANLIIS plura ingredientia aromatica & irritantia habet, ad paralyfin & tabem laudatur : Extractum QUERCETAN. Nostrates spirituosum, Wurtembergenses spirituosum & aquosum commixta habent : * Spiritus Castorei compositus Londin. est Sal volatile oleosum SYLVII, Castoreo ditatum, ad effectus hystericos adhibetur.

HIRUNDINES vid. Aves.

LUMBRICI, Erreza This 2715, Vers de Terre, Regenwürmer. Sunt Infecta, quæ mediocris calami craffitiem habent, quinque circiter pollices longa, coloris dilute rubicundi, habitant ut plurimum in cuniculis, quos fub terra fodiunt, ex iis autem tempore pluvio in diem prodire folent.

LUMBRICUS. Corpus teres habet, annulis efformatum, pone caput annulo eminente cinctum: Terrestris L. aculeis inter annulos prominentibus diftinguitur.

Occurrit ubique.

Ex Lumbricis $\frac{1}{72}$ gelatinæ ficcæ obtinui; NEU-MANN Extracti fpirituofi $\frac{3}{76}$, ultra $\frac{5}{76}$, Extracti aquofi, fpiritus urinofi $\frac{3}{7}$, Olei empyreumatici $\frac{1}{7}$, falis volatilis $\frac{1}{32}$.

GALENUS Lumbricos extus ad diffectos nervos, intus fumtos a vi diuretica laudari, dicit, ETTMÜLLER, STAHL, HOFFMANN eos antarthritico & antifpafmodico fine laudant, fed fine ratione, cum nulla exacta de his viribus obfervatio mihi innotuerit, non audeo, naufeofi omuino medicamenti ufum multis commendare. Succum expressium ad unciam unam solent cum jusculis appropriatis exhibere, exsiccati ad drachmam dimidiam usque præscribuntur.

Oleum per Infuf. VAL. CORD. ad affectus nervorum commendatur : Spiritus Lumbricorum abstractitius, ratione virtutis medicatæ, vix præ spiritu vini rectificato aliquid proprii videtur habere : * Spiritus Lumbricorum per se ETTMÜLLER non videtur ab aliis spiritibus urinosis, animalibus differre : * Essentia Arthritica MAURIT. HOFFMANN Gelatinam lumbricorum spiritu vini alcalisato receptam & sopientibus junctam vehit Datur ad guttas quinquaginta aliquoties de die : eadem etiam cum Opio prostat & ejus $\frac{1}{96}$ circiter vehit : * Essentia Lumbricorum Brandeburg. * Pulvis Antarthriticus WEPFER non placet : Sal Volatilis Wurtemb. nil proprii videtur habere.

* UNICORNU, perdeze@, Licorne, Einhorn. Eft Dens ex basi latiuscula diu cylindricus, tandem in angustum finem terminatus, fibris spiraliter intortis efformatus, variæ magnitudinis, octo pedum longitudinem non raro superans. Ejus cortex flavicat, reliqua substantia albissima est.

Primi BARTHOLINUS & WORMIUS, non cornu effe alicujus animalis quadrupedis, quod Auctores effinxerunt, fed dentem Ceti, oftenderunt.

Monobon L. fiftula in vertice, & dente prælongo, ex maxilla fuperiore exferto, gaudet.

Habitat in Mari Grœnlandico.

NEUMANN $\frac{7}{24}$ Extracti aquofi, $\frac{1}{4}$ fpiritus urinofi, $\frac{1}{32}$ olei, $\frac{1}{97}$ falis volatilis inde obtinuit; gelatinæ ficcæ $\frac{1}{15}$ mihi fubministravit.

528

Seculo

Seculo XV demum ad ufus medicatos cœpit recipi, & ipfi, maximæ contra epilepfiam & venena vires fuerunt adscriptæ, quas opinio vulgi, ea quæ magno pretio veneunt, etiam magnas ad morbos fugandos vires possidere, studium possidendi certum contra febrem petechialem, quam a veneno furgere reputabant, specificum, auri facra fames, & alia sustentarunt. Primus MARINI, illud nequaquam expectationi refpondere docuit, nec hodie alias inde, quam a ceteris dentibus vires sperare, fas est.

CAP. VI.

ATTENUANTIA.

\$. 43.

Medicamenta, quæ vitiis fluidorum medentur, five eorum qualitates vitiatas tollunt, Alterantia GALENI, five eadem e corpore eliminant, Evacuantia dicta. Alterantium ea quæ spissitudinem curant Agaiwlina, Attenuantia appellantur; huc pertinent 1) ea, quæ rationem aquæ in humoribus augent, & quæ recentior ætas Diluentia nominavit, 2) ea, quæ ipfum fpiffamentum folvendo, humores magis flexiles reddunt, Suapogelina, Refolventia Veterum.

\$. 44.

Diluentia indicantur in omni spissitudinis genere, qualecunque illud fuerit, eorum princeps eft AQUA, omnia reliqua, quæ huc referuntur, unice agunt ratione aquæ, quam vehunt.

\$. 45.

Refolventium illa, quæ faciunt, ut fordes, quæ ob pinguem & refinofam, qua gaudent, indolem LI

a nostris humoribus aut a diluentibus folvi & e corpore elui nequeunt, ex aqua se sufficiendi & eliminari patiantur, dicuntur $\Sigma \mu i \gamma \mu a \partial \alpha$, $\delta \nu \pi \partial \mu a \partial \alpha$, Detergentia, *Abstergentia*. Sed Resolventia etiam *Aperientium* nomine veniunt, dum, ut materies obstruens ex locis obstructis secdere queat, efficiunt. Quæ ex locis obstructis fecedere queat, efficiunt. Quæ ex Resolventibus falino sapore gaudent, $\tau \mu m \partial \mu a \dot{\alpha}$, *Incidentia* appellare, in more habent, reliquis *Resolventium* nomen relinquunt.

\$. 46.

Incidentia ratione mechanica videntur agere, dum rigidæ earum partes fefe craffamenti partibus interponunt, & istarum nimis fortem attractionem moderantur; eadem præterea vafa irritant, & his validius constrictis, ipfa altius inter spissamenti partes adiguntur, quo efficitur, ut partes aquosæ, crassamentum ab incidentibus laxatum fubire, & illud attenuare valeant. Indicantur Incidentia præcipue a spissitudine mucofa ; eorum abufus varium acrimoniæ genus caufatur. Refolventia non una ratione agere videntur, quædam eorum, tanquam menstrua operantur, alia vaforum contractionem ad certum gradum augendo, efficiunt, ut tenacitas vincatur & partibus craffamenti nimis cohærentibus, partes aquofæ, quæ illas diftentas tenent, interponantur, unum quoque ex refolventibus videtur evidenter ratione mechanica agere. Varia spissitudinis genera varia refolventia exigunt.

I. INCIDENTIA.

α) VEGETABILIA.

AROMATA (§. 25.) IRRITANTIA (Cap. IV.) ACETOSA vid. Olera.

531

* ACETOSELLA Recent. Oxys PLIN. Aleluja ab Italorum Lujula, Sauerklee. Exhibet Folia, quæ terna uni petiolo infident, obverfe cordata, hirfuta, firmula, fapore acido linguam feriunt; exficcata omnem faporem perdunt.

OXALIS. Corollam pentapetalam regularem habet, calice quinquefido fuftentatam, diplofantheram, pentagynam, capfulam pentagonam, polypyrenam: Acetofella L. foliis ternatis, fuperne cordatis diftinguitur.

Crefcit in omni Europa.

Salis effentialis $\frac{1}{85}$ circiter inde obtinuit CAR-THEUSER. $\frac{1}{320}$ falis effentialis SAVARY, qui præterea $\frac{1}{200}$ Extracti aquofi, $\frac{1}{343}$ refinofi feparavit. Adhibetur cum fucceffu ob acidum vegetabile, quo fcatet, ad attenuandos fpiffos humores, multum etiam conducit ad acrimoniam putridam corrigendam, ut FRANCUS in febre epidemica Ulmenfi vidit. Folia exficcata inertia funt; & fuccus expressions & folia jure infusa exhibentur.

* Conferva VAL. CORD. * Syrupus COSTEI, * Aqua destillata VAL. CORD. Sal Essentialis Collect. Chym. Leidens. Vulgo illum Pharmacopolæ ex Helvetia & Suecia fibi comparant. Differt a Tartaro crystallorum magnitudine & figura, paucioribus partibus oleosis, acido magis concentrato, & hinc cum Alcohole Naphtam efformante, & quod cum oleo unguinoso in faponem abeat. Circa vires medicatas conf. Inst. Chem.

ALLIUM vid. Olera.

ANGELICA Lat. Barb. Inde defumuntur Radices, quæ ex craffato capitulo dimittunt plurimas fibras, pedem dimidium circiter longitudine æquantes & angustas, rugosæ funt, extus ex gryfeo-nigricantes, intus albæ, odore forti proprio gaudent & fapore proprio aromatico, falino, cui aliquid amari accedit. ANGELICA. Floribus umbellatis, involucro utroque fustentatis, feminibus marginatis, tribus lineis eminentibus notatis gaudet : Archangelica L. BLAC-WELL 496. Folio impari lobato distinguitur.

In Pyrenæis & Alpibus feptentrionalibus fponte crefcit, apud nos in hortis colitur.

Sylvestrem præ hortensi duplo plus refinæ largiri, & eminentiore odore & fapore gaudere, observavit LINNÆUS.

Spiritum vini evidentius, quam aquam has radices extrahere, Oleum odoratum inde obtineri, quod linguam valide pungit, Extractum aquofum naufeofe dulce & fubacre effe, monet LEWIS. Olei odorati $\frac{1}{128}$, Extracti aquofi $\frac{3}{8}$, fpirituofi $\frac{1}{4}$ adducit CAR-THEUSER.

Humores potenter attenuat & folida stimulat, in affectibus frigidis & mucofis non male adhibentur, ad morbos malignos olim admodum fuit commendata : masticatorio quoque scopo recipitur.

* Aqua destillata ex herba S floribus Parif. * Aqua destillata ex seminibus Parif. * Aqua destillata ex Radice VAL. CORD. * Oleum destillatum VAL. CORD. * Conserva Parif. * Extractum VAL. CORD. Wurtembergenses, præcuntibus Brandeburgensibus, spirituosum recipiunt: * Spiritus abstractitius Wurtemb. * Essentia QUERCETAN.

APIUM vid. Olera. ARMORACIA vid. Olera. CALAMUS AROMATICUS vid. Aromata. CARLINA vid. Amara. CEPÆ vid. Olera.

COCHLEARIA Recent. Herbe aux Cuillerées, Löffelkraut. Recipiuntur Folia magnis petiolis innixa, fubrotunda, fapore falino, acri, proprio odore instructa, craffiuscula, cum recentia funt, facie prona depressa, exficcatione omnis odor & fapor proprius perit, remanente quadam amaritie.

Cochlearia Officinalis L. BLACWELL 227. foliis radicalibus, fubrotundis agnofeitur.

Crefcit copiofe ad littora Maris Europæ feptentrionalis, occurrit quoque in Corfica.

Aqua æque ac fpiritus vini inde odorata & fapida destillant, Oleum odoratum, quod obtinetur, in aqua fundum petit, Extractum aquosum æque ac spirituofum odore & fapore plantæ propriis carent.

Ipfo fapore tefte, Cochlearia egregias vires incidentes habet, & hinc a / variis Auctoribus multum ad referandas obftructiones vifcerum abdominalium laudatur, & hoc fcopo jufculis aut fuccis aperientibus adjicitur; maxime autem, ut ex EUGALENO patet, omni tempore ad fcorbutum fuit laudata, ubi autem probe ad variam hujus morbi periodum attendendum eft. Inter nos, ubi verus fcorbutus rariffime obtinet, ad cruentaciones & alia vitia gingivarum, externe præcipue, adhibetur.

Aqua FOREST. non male collutorio fcopo recipipitur : Spiritus MOLLENBROECK Parifini ad monitum Auctoris Armoraciam adjiciunt : * Spiritus Volatilis Parif. * Syrupus SENNERT. * Extractum Wurtemb. * Conferva August. recenti herbæ, quando ea haberi non potest, optime fubstituitur.

DAUCI SEMEN vid. Olera.

* ERUCA, edlouor, Roquette, Rauchen, weisser Senf. Semina fiftit, quæ parva funt, flava, rotunda, oleo turgent, fapore acri linguam afficiunt.

Brassica Eruca L. stylo fructui insidente longo, triangulari & foliis lyratis gaudet.

Habitat in Europa calida, in Helvetiam usque ascendit, apud nos in hortis colitur.

A GALENO oleribus adfcribitur, & a vi aphrodifiaca laudatur, finapis vires, fed remiffiores habet.

* ERYSIMUM, igioupor, Velarum Gallorum PLIN. Velar, Wegsenf. Recipiuntur Folia magnis pinnis incifa, extrema maxima, trifida, hirfuta, leviffimo fapore instructa.

ERTSIMUM. Corollam cruciformem, filiquam strictam, tetragonam habet: Officinalis L. BLACWELL 28.

Occurrit ubique.

Ab herba infipida, quæ, LOBELII maxime auctoritate, magnam famam affecuta eft, ego faltem vix vires incidentes expectarem, & nefcio an fides IIDEM habenda, dum plures raucedine laborantes, ea curatos fuiffe memorat, prudentiores Veteres femen potius adhibebant, quod evidentem acrimoniam habet. Medicamentis uterinis ab HIPPOCRATE adfcribitur.

* Syrupus fimplex GEOFFROI: Syrupus LOBELII, fi quas vires habet, illas aliis, quas præter Eryfimum recipit, ingredientibus debet; Parifini prolixam compofitionem, adhuc prolixiorem præferibunt noftrates.

HELENIUM, ἐλένιον, DIOSCORID. non THEOPHRAST. Inula, Enula campana Lat. Barb. Aunée, Alant. Largitur Radices craffas, multifidas, longas, extus fuscas, per exficcationem gryfeas, intus albas, fapore acri, amaricante, odore proprio non ingrato gaudentes.

INULA. Corollam compositam mixtam, calice imbricato suftentatam, stamina inferne bisida, receptaculum nudum, semina papposa habet: Helenium L. BLACWELL 473. soliis amplexicaulibus, omnibus ovatis gaudet.

Crefcit in Europa, præter maxime Meridionalem.

Olei odorati fpiffi $\frac{1}{240}$, Extracti fpirituofi $\frac{1}{15}$ aquofi $\frac{1}{2}$ LEWIS obtinuit; Extracti aquofi $\frac{7}{8}$ fere, refinofi ultra $\frac{1}{5}$, olei ceræformis $\frac{1}{192}$ fere NEUMANN; CARTHEUSER autem $\frac{1}{2}$ Extracti aquofi, refinofi $\frac{1}{12}$. Medicamentis uterinis ab HIPPOCRATE annumerantur hæ radices, auctore GALENO, ad affectus pectoris laudantur, quibus omnino egregie conducunt, mucum pulmonem attenuando, aut, fi fymptomatici fuerint, vifcera abdominalia aperiendo, humores refolvendo & folida ftimulando, fudorem quoque movent, hinc multum fuperioribus feculis ad morbos malignos, exanthematicos & ipfam peftem laudabantur. Extus multum ad fanandam fcabiem commendantur.

* Aqua destillata NIC. PRÆP. * Conditum VAL. CORD. * Conferva VAL. CORD. * Extractum VAL. CORD. * Oleum per Infusionem Paris. * Unguentum ad id nonnulli, præcunte SYLVIO, mercurium recipiunt, Wurtembergenses & Nostrates, præcipientibus Coloniensibus, eundem omittunt, cum fructu fcabiosis inungitur.

* IMPERATORIA Lat. Barb. Oftrutium EORUND. Meisterwurzel, fi non est $\Sigma_{\mu\nu}$ Veterum, proxime faltem ad illud accedit. Radices habet aliquot pollices longas, compress, rugofas, transversim quasi in articulos distinctas, extus cinereas, intus albas, fapore aromatico, acri amaro & odore proprio, ad angelicam accedente, instructas.

IMPERATORIA L. BLACWELL 279. Flores umbellatos habet, involucro partiali paucifolio fustentatos, & femina marginata, duobus fulcis exarata.

Crefcit in montibus Italiæ, Galliæ, Helvetiæ, Germaniæ, Daniæ & Sueciæ.

Largitur Extractum fpirituofum amarum & acre, aquofum autem vix odorum cum naufeofa amaritie. LEWIS. Ultra $\frac{1}{2}$ Extracti aquofi, $\frac{1}{5}$ fere fpirituofi accepit NEUMANN.

Humores valide refolvit, folida quoque stimulat, in colicis & flatuosis divinum remedium C. HOFF-MANN dicitur, nec sine successfu adhibetur in pectoris affectibus pituitosis, nec non in morbis, qui ab obstructis visceribus abdominalibus furgunt, alexipharmacæ, quæ ipsi adscribuntur, vires, debentur perniciosæ doctrinæ de morbis malignis fudoriferis tractandis. Radice masticata fusfocationem uterinam avertit FORESTUS, ulceribus inspersa, fordes eorum abstergit.

* LIGUSTICUM, Arguericov, Levisticum Barbar. Livéche, Liebstockel. Radices, Folia & Semina in officinas recipiuntur.

Radices semipedem circiter longæ, extus flavæ, intus albæ, fapore proprio acri, non ingrato gaudent, aromatico, cui aliquid dulcis accedit.

Folia pinnata, pinnæ ad ovatam figuram accedunt, fuperne profundioribus dentibus notatæ, fapore & odore remiffioribus, præ radicibus gaudent.

Semina flavicantia reliquis partibus magis odora & fapida funt.

LIGUSTICUM. Flores umbellatos habet, utroque involucro fuftentatos, femina oblonga, quinque striis elevatis notata : Levisticum L. BLACWELL 275, Foliis multiplicibus & superne incisis distinguitur.

In montibus Italiæ & ad Monfpelium crefcit, in Flora Danica quoque recenfetur, apud nos in hortis colitur, & impune noftras hyemes fert.

Radix aliquid Olei odorati fundit, & omnes fuas vires Extracto fpirituofo impertit. LEWIS. Olei odorati $\frac{1}{T28}$, Extracti aquofi dulciufculi $\frac{3}{8}$, fpirituofi ultra $\frac{1}{4}$ dedit CARTHEUSER.

Ratione virium, medium inter fœniculum & angelicam locum videtur tueri, ad morbos uterinos maxime laudatur, in quibus humores refolvendo & folida ftimulando operatur.

* Aqua destillata VAL. CORD. * Esfentia Wurtemb.

* MEUM, µñov, Barwurzel Radices nobis exhibet, aliquot pollices longas, calamum craffas, quædam filamenta capillaria emittentes, extus ex gryfeo fuscas, intus albas, odore proprio instructas, non ingrato fapore proprio, primum leviter dulci, quem autem falinus excipere folet, præditas.

Athamanta Meum L. BLACWELL 525. Foliis glabris distinguitur.

Crefcit in Europæ calidæ & temperatæ montibus, non videtur ultra Sylvam Martiam afcendere.

Ad provocandam urinam & ciendos menfes a GA-LENO commendatur, id quod vi fua acri videtur præstare, ratione vis resolventis ad Angelicam accedit, qua humores minus commovet.

* Aqua destillata Parif.

NAPUS vid. Olera.

NASTURTIUM vid. Olera.

NICOTIANA Rec. *Tabacum* Rec. *Tobac*. Recipiuntur Folia ex ovatis oblonga, quæ propria exficcationis ratione flava fiunt, proprio odore & fapore acri gaudent, qui per ipfum exficcationis modum adhuc intenduntur.

NICOTIANA. Corollam habet monopetalam, infundibuliformem, calice quinquefido fuftentatam, ifantheram, monogynam & capfulam ventricofam, bilocularem, quæ receptaculis ovatis, plura femina includit: Tabacum L. BLACWELL 146. Foliis lanceolatis gaudet.

Planta, Regno Peruviano indigena, a PHILIPPO HERNANDEZ DE TOLEDO, PHILIPPO II. Regi miffa, a NICOTIO legato Gallo in Lufitaniam, anno 1550 in Galliam, a Cardinale S. CRUCIS autem Romam allata, Anglis per DRACKE anno 1586 miffa, hodie per omnem Europam & in variis Afiæ & Americæ regionibus colitur, & vulgo ab aliqua Infularum Antillarum denominatur; Principibus æque ac pluribus civibus maximo quæftui, pauciffimis non in frequentiffimo ufu eft. Principia alcalina fundit, ultra $\frac{1}{3}$ Extracti amari, in receffu urentis, ingratum odorem fpirantis, $\frac{1}{6}$ Extracti fpirituofi amari & urentis fundit. BUCHNER & FRAUENKNECHT. Bruta, oleo tabaci interemta, fanguinem in corde fpumeum, floridum, attenuatum vehere, HARDER vidit.

Innumeræ varietates, quas varia ratio, qua Tabacum condire folent, produxit, ab ipfa quoque conditura dijudicandæ funt.

Vegetabile acre potenter omnino humores incidit, DODONÆUS hydropem inde curatum vidit, & MAGNE-NUS copiofas aquas evacuatas; ob eandem, qua pollet, acrimoniam & alvum ducere, & vomitum ciere observatur. Cum habeamus multa medicamenta, quæ eosdem effectus edunt, & multo minus nauseosa funt, hinc raro hodie intus adhibetur; rarius quoque ulceribus cacoëtheis abstergendis ulterius inspergitur, maxime cum FEHR observaverit, a pulvere Tabaci cum butyro capiti contra fcabiem illito, vertiginem, vomitus & tumores furrexisfe. Folia Tabaci cum Aceto in cataplasma redacta, tumores hypochondriorum curaffe, STEDMANN vidit, frequenter eadem, ad dimidiam unciam ufque, clyfmatibus immittuntur in pertinacioribus alvi obstructionibus, aut cum humores a fuperioribus revellendi nobis animus eft, Creberrime autem more, qui ab Americanis ad nos descendit, Nicotianæ fumus ore hauritur, aut pulvis naribus attrahitur, utramque rationem ad prophylaxin contra pestem fecisse, observationibus, a VAN SWIETEN collectis, elucefcit; fumum qui hauriunt, commoda & incommoda, apophlegmatizantibus. propria, solent experiri, & illis, qui iidem affueti non funt, caput evidenter obnubilatur, facile quoque largior apud teneros homines, & tales, qui modum exceduny, gravia omnino fymptomata inde poffe excitari, qualia PAULLINI & HELWIG adducunt ;

circa hujus fumi effectus dijudicandos ad variam rationem, qua Nicotiana condita fuit, attendendum effe, patet omnino. Fumum ano immittere primi Angli tentarunt, illum in pertinaciore alvi obftructione, ileo & hernia incarcerata egregiam operam præftitiffe, Obfervatores loquuntur, optimum inftrumentum ad hanc medendi rationem Illuftris GAUB exhibuit. Pulvis Tabaci naribus hauftus errhinorum rationem fequitur, varia, quæ ipfi commifcere folent, etiam, ut varios effectus producat, efficiunt. Mafticatio foliorum Tabaci, quæ hoc feculo in Anglia invaluit, ex eis, quæ de Mafticatoriis monentur, eft dijudicanda.

* Emplastrum LE MORT egregium refolvens, ad pertinaciores quoque obstructiones facit: * Extractum Wurtemb, tanquam validum refolvens in affectibus mucofis ad grana fex exhibetur: * Oleum destillatum EVERART. Varia de eo experimenta prostant, quod vulneribus brutorum inftillatum mox venenatos ediderit effectus, mox innocuum fuerit, oleo empyreumatico, naufeofo abstinemus: * Oleum per Infus. VAL. CORD. vires refolventes & detergentes edit: * Pulvis sternutatorius Wurtemb. * Pulvis sternutatorius variegatus Wurtemb. * Pulvis sternutatorius coloratus Nostrat. * Pulvis sternutatorius viridis Nostrat. Omnes a Nicotiana, cui varia aromata adjiciunt, efformantur : * Species tabaci pro fumo CAMERAR. * Species Tabaci pro fumo Wurtemberg. * Spiritus Arthriticus BOECLER: medicamentum omnino refolvens, ad fugandos rheumatifnios adhibetur: * Syrupus simplex EVERARTI inter nos obtinet: * Syrupum OUERCETANI correctum & efficaciorem Wurtemb. & Parif. habent, uterque cum fucceffu ad morbos, qui a pituita furgunt, adhibetur: Unguentum EvE-RART. * Unguentum compositum JOUBERT ad tumores fcrophulofos & affectus cutaneos laudatur.

NIGELLA vid. Aromata.

* PERSICARIA Lat. Barb. Flohkraut. Folia tam Mitis quam acris officinas ingrediuntur.

Mitis folia, funt ex ellipticis longe lanceolata, leviter hirfuta, non raro maculis notata, odore nullo, fapore leviffimo, acidulo & adstringente prædita.

Acris folia, prioribus fimilia, angustiora, nunquam maculata funt & evidenti acrimonia prædita.

Polygonum Perficaria L. BLACWELL 118. Corollis hexantheris, monogynis ciliatis gaudet. Polygonum Hydropiper L. BLACWELL 119. ab antecedente vaginis truncatis differt.

Crefcunt in omni Europa.

Mitis, extus applicata, a TOURNEFORT tanquam fummum remedium contra gangrænam laudatur, de Acris virtute ad œdemata, aut calculum, nullæ fidæ obfervationes proftant, nec vis lithontriptica, quam SCHULZ de Polygono Amphibio L. quod vulgo Perficariam acidam appellat, proprio tractatu evincere nititur, posterioribus observationibus est confirmata.

* Aqua destillata BOYLE: * Sal fixus per incinerationem paratus. Parif.

PETROSELINUM vid. Olera. RAPHANUS vid. Olera. SCILLA vid. Amara.

B) ANIMALIA.

MILLEPEDES, Orignos, Oros, Cloportes, Maueresel, Kelleresel. Sunt Insecta dimidium pollicem circiter longa, ad aliquot lineas lata, superne ex cineritio nigricantia, inferne alba, eorum corpus ex circellis est compositum, cute duriuscula tectum, fapore leniter falino linguam afficiunt.

Nigri & majores reliquis præferuntur, & cum, fi continguntur, fefe in glomum contrahere folent, hinc inter exficcatos eos rejicimus, qui in longum exteníi funt, quia illos non violenta, fed fpontanea morte interemtos esfe, suspicio est.

ONISCUS. Infectum alis carens, pedes in utroque latere feptem & antennas duas habet: Afellus L. corpore ovato & cauda bifida gaudet.

Occurrit per omnem Europam, in regionibus calidioribus major est & magis nigricat.

Largiuntur $\frac{1}{76}$ gelatinæ multum naufeofæ, dum deftillantur exhibent $\frac{1}{5}$ circiter fpiritus urinofi, $\frac{1}{16}$ Olei, $\frac{1}{77}$ falis volatilis, fal alcali ex eorum cineribus extractus, fuavem odorem fpirat. NEUMANN inde $\frac{1}{3}$ circiter fpiritus urinofi, $\frac{1}{77}$ Olei empyreumatici $\frac{1}{96}$ Salis volatilis, Extracti præterea fpirituofi $\frac{1}{10}$, aquofi $\frac{1}{5}$ obtinuit; CARTHEUSER Extracti aquofi $\frac{5}{12}$, fpirituofi fubacris $\frac{1}{7}$ fere.

Attenuandi ergo a GALENO laudantur, DIOSCO-RIDES obftructiones hepatis inde referari & urinam moveri obfervavit & variis exemplis ETTMÜLLER probare nititur; in comni fpiffitudine, mucofa æque ac melancholica cum fucceffu dantur, nec inefficaces in morbis arthriticis obfervantur, in ulceribus cacoëtheis & tumoribus mammarum etiam opem attuliffe, vidit RIVERIUS. Recentes exficcatis omnino præferendi, eorum centum & plures quoque pro dofi adhibentur, ita ut fuccus inde exprimatur & jufculo appropriato adjiciatur.

* Essentia Wurtemb. ipsi fucco postponenda esse videtur : * Conserva Wurtemb. videtur superstua esse, cum millepedes recentes per omnem annum possint haberi.

* SCINCUS, orign@. Hoc nomine proftat animal quatuor pedibus inftructum, fex pollices circiter longitudine æquans, vifceribus orbum, & ut hæc potuerint eximi, per omnem faciem corporis inferiorem plaga longitudinali apertum; tota cutis fquammofa & argentea eft, cum flavedinis vestigio, dorsum spina eminente distinctum & fasciis transversis cæruleis notatum, cauda ad latera contracta brevis, caput corpori immediate contiguum, conoideum, frons nullas squammas habet, maxilla inferior, superiore minor, exacte triangulum refert, pedes quatuor non magni, quinque digitis liberis, membranaceis instructi; odore nullo, sapore falino gaudet.

LACERTA. Scincus L. cauda apice compressa & digitis muticis, membranaceis distinguitur.

In Ægypto & Arabia Petræa occurrit.

Scincos vires aphrodifiacas poffidere, cum GALE-NO per omnem ætatem fuit affertum, id ipfum vel hodie adhuc in Oriente vulgo credi, HASSELQUIST teftatur, fed non perfpicio, unde hæ vires debeant furgere, nec ulla fida, quæ id confirmet obfervatio, nota mihi eft, a fale communi, quo conditi ad nos adducuntur, vires incidentes poffunt expectari.

2) FOSSILIA.

* BORAX Barb. Bogaz Græcor. Recent. a Baurach Arabum, qui hunc falem fpeciem Nitri feu Baurach effe reputarunt, Tincar Arab. Eft Sal, qui ex India fub forma cryftallorum variæ magnitudinis & figuræ ad nos vehitur, aliqua pinguedinis fpecie videntur effe inftructæ hæ cryftalli, fapori earum aliquid lixiviofi junctum eft, colorem habent virefcentem, & non raro cortice albo pulverulento obductæ confpiciuntur.

Borax olim ex Alexandria Venetias ducebatur, & ibi depuratus per Europam divehebatur, hinc ab hac urbe vulgo folet denominari, licet maxima boracis quantitas hodie in Belgio depuretur. Refert autem Borax depuratus cryftallos majores, pryfmaticas, multilateras, obtufas, pellucidas, quæ diffolvendæ ultra vigecuplam aquæ rationem exigunt, calore in pulverem album fatifcunt, fupra carbones fpumant, vitri fpeciem mentiuntur, foffilium fufionem promovent, præcipue pro ferruminando auro adhibentur, hinc gravi omnino errore non pauci Boracem *Chryfocollam* effe Veterum reputant; fuccos cæruleos viridi colore tingunt. Borax cum acidis non effervefcit, fed per illa in duo principia, Salem fedativum nimirum & Alcali foffile, difpefcitur, folutiones in acidis factas præcipitat.

De ratione, qua Indi Boracem parant, nihil certi conftat, in eo faltem plures, quæ ad nos pervenerunt relationes, conveniunt, illum parari ex aquis, ad fodinas cupri reperiundis, id quod & crudi color virefcens, viridis color, quem alterum ejus principium fpiritus vini flammæ affricat, & regulus cupri, quem Cl. CADET ex Borace non depurato feparavit, etiam confirmare videntur.

Continet $\frac{1}{2}$ aquæ POTT; falis fedativi $\frac{1}{2}$ KAAS; ejufdem $\frac{1}{3}$ BARON.

Tanquam fal vires incidentes edit, & quia oleofis junctus in faponem abit, abstergentes quoque exferere posse nulli dubitamus, cum autem varia falia habeamus, quæ has vires etiam evidentiores possident, hinc rariffime intus datur, virtutem, quam ipsi vulgo adscribere folent, partum pellendi, nulla justa observatio confirmavit; in casu, quem de Medico Hetrusco nobis FALLOPIUS confervavit, decoctorum pellentium potius, quam Boracis effectum demonstravit. Extus interdum scopo cosmetico adhibetur.

Sal sedativus Homber. vid. Instit. Chem. * Species Diaboracis MYNSICHT: compositio absurda.

Nitrum, vírgov, Salpetre, Salpeter. Eft Sal, qui in crystallos pryfmaticas concrescit, sapore amaricante gaudet, linguæ frigoris fenfum imprimit; & dum aqua diffolvitur thermometrum defcendere facit, fufum, fi principium inflammabile additur, vehementem & flammantem motum, quem *Detonationem* dicunt, fufcipit, ex proprio Acido & Alcali vegetabili conftat.

Nitrum Veterum a nostro omnino diversum est, quippe quod ex aquis lacuum & fluviorum coxerunt, in aere deliquium patiebatur, non detonabat & tostum nigrescebat. Primus ISAAC BEN ABRAM apud SERAPIONEM nostri Nitri videtur mentionem fecisse.

Veterum Aphronitrum, & Flos Nitri mox Salem mirabilem, mox Salem Ammoniacum fixum, mox Nitrum murarium denotant.

Nostrum Nitrum nobis in larga quantitate ex Oriente adducitur, ubi ex solo excoquitur, in Barbaria, teste SHAW, in Japan, ad Oram Africæ, in Tataria, Coromandel, Malabar, ad Gangem in Regno Mogolis. Conf. Histoire des Voyages.

In Europa non adeo copiofe reperitur, nec tale, quod non prævio quodam labore opus habeat, antequam in ufum trahi poffit. Paratur ex muris five terris, ad quas, five fub forma stalactitæ occurrit, & Aphronitrum dicitur, five sub albi tomenti specie excressit Halonitrum, Salpetre de Houssage, sive solo sapore & detonatione se prodit, Nitrum Embryonatum Alchymic.

Omnes terræ, quæ Nitrum fubministrant, laxiorem confistentiam habent, aeris actioni erant expositæ & vaporibus substantiarum putrescentium penetratæ, hinc fal, qui inde elixatur, non raro aliquid urinosi vehit, in pulchras crystallos reduci nequit, sed necesse est, ut alcali fixi ope, tam ab urinoso, quam a terra calcarea, liberetur. Videtur partes terrestres ad subeundam mixtionem falinam proprias, halitus aquosos ex aere resorbere, & cum eis acidum egormare, quod, dum sub ortu principium inflammabile ex substantiis Itantiis putrefcentibus exhalans, in fuam mixtionem recipit, propriam ab omni reliquo acido diverfam indolem acquirit, ortum hac ratione acidum, accrefcit terræ, in qua furrexit, tanquam matrici, modo, quem mox dixi, inde feparandum. Elucefcunt ex his principia, quibus nituntur artificia, quorum ope, ut hic fal largius in Europa obtineri poffit, tentant efficere, ea præcipue PIETSCH & SIMON exponunt.

Nitrum, quod creberrime in aqua puteali occurrit, ab ipfis cæmenti, quo receptacula eorum firmantur, partibus, vapores aquofos recipientíbus, & cum eis in acidum abeuntibus, videtur deducendum, $\varphi \lambda o \gamma \sigma v$, quod hic mixtionem fubit, five ex terra accedit, five a fordibus, quæ cafu in puteum ceciderunt, fubministratur. Num alcali vegetabile, alterum Nitri principium, etiam a fordibus derivare licebit?

Obtinetur Nitrum ex fuis matricibus, dum illæ labris committuntur, quorum fundus ad altitudinem aliquot pollicum stramen, quod fordes retineat, habet, adjicitur stramini, cinerum respectu terræ elixivandæ $\frac{1}{3}$ & calcis vivæ $\frac{1}{6}$, aquæ ope elixivatio perficitur, lixivium calore non nimis magno ad juftum terminum evaporatur, adjicitur aliquid lixivii caustici, ut omnes partes calcareæ fecedant, &, ut crystallos coëat, feponitur; id quod iterain tis crystallifationibus nullum ulterius Nitrum largitur, Lixivium Nitri, Eau Mere, Mutterlaug dicitur. Illud terris nitrariis iterum folent affundere, fed non adeo accurate omne Nitrum exinde feparatum eft, ut non aliquid adhuc vehat. Nitro, ratione quam dixi, parato, quod Crudum dicere folent, nunquam non fal communis adhuc folet immixtus effe, iteratis demum crystallifationibus ab eo feparandus.

Mm

Nitrum Veterum cum palam a nostro differat, nec vires medicatæ, de illo celebratæ, ad hoc referri poffunt. Noftrum cum sit fal medius, hinc jure incidentes effectus ab eo exspectantur, docuit autem experientia, istud propria quadam virtute fanguinem attenuandi gaudere, imo, phlogistica spissitudine laborantem, ab eo refolvi, & in crafin naturalem reduci, id quod facile in fanguine, e vena emiffo, experiri datur, & inter primos HOFFMANN annotavit. Idem, præ aliis falibus mediis, efficacius putredini refiftere, Illustris PRINGLE observavit. Celebratur præterea ejus vis refrigerans, quam multis experimentis in proprio corpore stabilivit Cl. ALEXANDER, qui fimul animadvertit, elapfis circiter duodecim, postquam affumtum fuit, minutis, pulsuum numerum ad priftinos rythmos redire, imo ad fefqui drachmam & ultra, si affumitur, varia incommoda excitari, & arteriæ ictus multiplicari. Vis refrigerans Nitri, unde pendeat, nondum liquet, ex eo faltem derivanda non est, quod Nitrum, in aqua si diffolvitur, thermometrum deprimat, quam primum enim folutio peracta eft, thermometrum ad priftinam altitudinem redit, nec integrum, fed folutum Nitrum fanguinem adit; præterea fal ammoniacus & fal communis, dum aquain fubeunt, etiam majus, quam nitrum, frigus producunt, sed neutiquam adeo evidenter, ut istud, corporis humani calorem minuunt, nec a fanguine attenuato hic effectus potest deduci, cum, quæ idem præstant, alcalina non evidenter refrigerent. Ob vim refrigerantem & fanguinem diffolventem in omni æstu fanguinis exhibetur, & præcipuis medicamentis antispasmodicis adfcribitur.

Dofis est ad drachmam dimidiam, in affectibus pectoris, & topicis primarum viarum vitiis, etiam imminuenda.

546

Aqua fortis, Aqua Regis, Liquor Nitri fixus, Magnesia alba, Nitrum antimoniatum, Nitrum depuratum, Nitrum fixum vid. Instit. Chem. * Nitrum perlatum in phlogofibus ab acrimonia acida conducit; * Nitrum Rofatum BARCHUSEN ad gargarismata recipitur: * Nitrum Saturninum JUNGKEN non male extus ad difcutiendas inflammationes adhibetur: Nitrum tabulatum est fal prunellæ in tabulas redactus : Pulvis Antispasmodicus Halens. Temperans STAHL Polychreftum remedium, quo vulgo ad omnem orgasmum fanguinis uti folent, folo Nitro non videtur præstare: Pulvis Antispasmodicus Offic. Nostrat. antecedenti medicamentum absorbens jungit: Sal Polychrestus vid. Instit. Chem. Sal Prunella QUERCETANI, Crystallus mineralis BEGUIN. primus BASILIUS VALENTIN. illud indicare videtur, eft Nitrum, cujus portio quædam in Salem polychrestum versa est, ego ipsi semper Nitrum præferrem, adhibetur ad morbos faucium : Spiritus Nitri vid. Inft. Chem. * Spiritus Nitri anticolicus Brandeburg. medicamentum inconcinnum : Spiritus Nitri dulcis vid. Instit. Chem. Trochisci ex Nitro & Cinnabari Noftr. Suave medicamentum, quod cum fucceffu ad fitim fedandam, mucum attenuandum & fanguinis æstum temperandum assumitur; iidem etiam non male parantur, cum loco cinnabaris fuccus Citri recipitur.

SAL AMMONIACUS. Is, qui nostro tempore in officinis prostat, Seculo XVI ad finem vergente, demum obtinuisse videtur.

Adducitur ad nos forma panum rotundorum, quorum diametri novem circiter pollices æquant, una facie concavorum, vertice craffo eminente inftructorum, altera facie convexorum, fub utraque fuperficie fordida, nigra, fubftantiam falinam pellucentem, fapore vivido falino linguam ferientem vehit: Paratur hic fal in Ægypto fublimationis ope ex fuligine excrementorum, quæ animantia, multo fale pafta, excludunt, notantibus LEMERY, GRANGER, HAS-SELQUIST, eundem eadem fere ratione in Imperio Indoftan parari, fidem facit Illuftris GAUB, qui etiam mentionem facit ejus, qui ab aliquot retro luftris Brunfvigæ paratur, albiffimus eft, formam panum, in quos faccharum formatur, habet, & quem Ægyptio, nonnifi minore alcali volatilis ratione, cedere, expertus fum.

Sal Ammoniacus nativus, quem, teste Cl. MODEL, Calmuccorum regio ad rupes crescentem largitur, gryfeis crystallis efformatus, & ille, qui substantiam laxiorem & flavam refert, copiose ad montes ignivomos & Solfataræ occurrens, in nostris regionibus mufea curiosorum, nequaquam officinas intrat.

Salem Ammoniacum ex Acido falis & Alcali urinofo constare, evici in Instit. Chem.

Hunc falem vires incidentes editurum, facile patet, & hinc ad omnes morbos, a fpiffitudine mucofa oriundos, cum fucceffu adhiberi poffe; eundem propria virtute febres intermittentes fugandi gaudere, Muys multis obfervationibus ad liquidum deducere conatus eft, quas fuis quoque WOLFF, LOESEKE & JACOBI confirmarunt; cum febres intermittentes femper ufum incidentium exigant, non male noftrum falem, quem fpecifice hic conducere fidi Auctores teftantur, aliis falibus mediis in hoc morborum genere præferimus: ejus dofis ad drachmam unam extenditur.

Extus, cum ejus vis antifeptica Ill. PRINGLE experimentis confirmata fit, non male ad medicamenta contra gangrænam recipitur; fpecifica virtute ad curandam fcabiem gaudere, Cl. PLENK eft expertus.

* Elixir Pectorale Regis Dania Wurtemb. Est spiritus falis ammoniaci vinofus a variis plantis, quæ autem carminativæ potius sunt, quam pectorales,

ATTENUANTIA.

abstractus & fucco liquiritiæ edulcoratus, in morbis a flatibus oriundis conducet, multo concinnius, & ad affectus pectoris mucofos aptiffimum eft * Elixir Pectorale RINGELMANN in Pharmacopæa Danica defcriptum : * Ens Veneris vid. Instit. Chem. * Esfentia Balsamica GMELIN, ad debilitatas fibras primarum viarum admodum utilis : * Flores Antimonii rubri BASIL. VALENT. admodum draftici funt: Flores falis Ammoniaci Martiales, qui a Parifinis fub titulo Florum falis Ammoniaci hamatiticorum repetuntur v. Inft. Chem. * Flores Salis Ammoniaci Simplices Wurtemb. non differunt a Sale Ammoniaco depurato SCHROEDER. Sal volatile aromaticum Parif. Sal Anglicum volatile Wurtemb. egregium medicamentum excitans: * Sal volatile oleosum BOERHAAVE a viribus Angelicæ laudatur: * Sal volatile oleojum Wurtemb. Liquor oleofus Sylvii: Sal vel Liquor oleofus Sylvii, Spiritus volatilis aromaticus oleosus Parif. Spiritus salis Ammoniaci Aromaticus Edinburg. Tinctura flomachica Lipf. funt spiritus falis Ammoniaci vinosi, oleo variorum aromatum fœti, in affectibus frigidis primarum viarum ad fcrupulum unum pro dofi exhibentur; extus vel naribus admoventur, vel illinuntur membris debilitatis: * Spiritus Bezoardicus Bussi, est alcali volatile oleo empyreumatico fœtum, fanguinem potenter refolvit & exagitat, excretiones aquofas auget: Spiritus Salis Ammoniaci anifatus: Spiritus Salis Ammoniaci cum calce viva seu volatilis urinosus Wurtemb. Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale Tartari : Spiritus Salis Ammoniaci vinosus seu Sal volatile Ammoniacum Parif. vid. Inflit. Chem.

SAL COMMUNIS. Sal Panis Arab. Eft fal medius in cryftallos cubicas concrefcens, proprio fapore præditus, fupra carbones decrepitans, ex proprio acido & alcali foffili conftans. Triplex ejus genus folet proftare : Foffilis nimirum, Marinus & Fontanus.

Mm 3

Sal fossilis, quem, fi in cryftallis pellucidis occurrit, Salem Gemmæ Latino-Barbari appellant, in montium vifceribus latet, & fatis copiofe in reliquis Orbis partibus æque ac in Europa occurrit, Tranfylvania, Hungaria, Polonia, Germania, Anglia, Hifpania &c. eo abundat. Eruitur e montibus, rationibus mechanicis, fordes, quæ ipfi adhærent, iterata folutione & cryftallifatione auferuntur.

Sal marinus hæret in omni aqua; quæ fub maris nomine globum nostrum ambit, & a Geographis variis nominibus, pro variis locis, quos alluit, infignitur; habet autem aqua marina co plus falis, quo calidius est clima, ubi occurrit, & quo major est profunditas, unde hauritur : obtinetur fal ex aqua marina, evaporationis ope, quæ in locis septentrionalibus per ignem promovetur, in meridionalibus autem aqua marina, supra magnas areas ducta, actioni folis & aëris exponitur; dum hæc aqua femper falem mirabilem & falem ammoniacum fixum vehit, hinc fal, evaporatione obtentus, demum purior evadit, quando per aliquot annos in acervos collectus, utrumque falem heterogeneum ad fundum dimifit. Sal marinus, qui evaporatione fupra areas obtinetur, a terra, quæ ipfi accrefcit, gryfeus & nigricans folet effe, iteratis demum folutionibus & crystallifationibus depurandus.

Sal fontanus, qui etiam Communis audit, paratur ex fontibus, quos Salinas dicere folent, per omnem orbem creberrime obviis, evaporatio falinarum in propriis labris, moderato igne inftituenda, ut falia heterogenea, una cum felenite, ad fundum colligantur, & jactura æque ac enervatio falis caveatur. Muriam debiliorem ope domuum gradatoriarum concentrare folent, ut alimento ignis fub evaporatione parcant, confilio forfan minus laudando. Conf. Illuftris HALLER. Omnem omnino attentionem meretur, quod ubi fal marinus occurrit, etiam vix non femper felenites, fal mirabilis, & fulphur inveniantur.

Ratio acidi in vario fale cibario varia eft, hinc illum ratione faporis & virtutis condientis multum differre obfervamus; id interim experientia docuit, ex aqua marina paratum, reliquos acrimonia fuperare.

Bonus fal cibarius debet effe albus, omnis peregrini faporis expers, nec in aëre humefcere.

Sal communis in modum reliquorum falium me--diorum vires incidentes habet, & hoc fcopo non male istorum in locum recipitur, eodem, cum carnes condire a longiffimo retro tempore receptum fit, hinc præeunte GALENO, tam extus quam intus ad arcendam putredinem adhiberi folet, immo cum Idem Medicinæ princeps ex carne falita, falis vim fibras rigidas reddendi, perspexerit, ideo vires exficcantes quoque ab eo in corpore furrecturas monuit. Illustris PRINGLE pulcherrimis experimentis evicit, falem cibarium corpus animale minus quam alia falia contra putredinem defendere, imo eundem, fi fubstantiis animalibus in ratione, quæ 1:8. minor eft, adjicitur, etiam corruptionem augere. Patet ex his, cur hunc falem optimo confilio cibis pro adjuvanda digestione adjiciamus, irritando enim fibras primarum viarum, eas ad vividiores contractiones compellit, viscidum & ciborum & humorum chylopoieticorum corrigit, & efficit præterea, ut ipfi cibi citius refolvantur, & partes nutritioni aptas dimittant. Extus ad fotus antifepticos & difcutientes recipitur, nec non ad enemata irritantia.

* Sal decrepitatus Parif. * Sal depuratus Parifinis, inter quos vulgo fal marinus gryfeus obtinet, neceffarius: * Sal febrifugus vel digestious SYLVII: Sal mirabilis GLAUBER: Spiritus Salis vid. Instit. Chem. * Spiritus Salis coagulatus MYNSICHT. est fal digestivus, in quo alcali excedit: * Spiritus Salis GLAUBER. Mm 4 * Spiritus Salis dulcis: * Spiritus Vitrioli philof. vid. Inst Chem.

SODA Recent. Alumen Catinum Lat. Barb. Hoc nomine prostat massa terreo falina, in diversæ magnitudinis glebas efformata, quæ duritie lapides æquat, colore gryseo cærulescente gaudet, miculis parvis albis, & magnis nigris distinguitur, plurimis foraminibus hiat, odorem spirat nec gravem nec ingratum, fapore gaudet falso & lixivioso.

Orientalis & Occidentalis occurrit, illa in Ægypto, Syria, Tripoli, Tuneti, Aftracani paratur, rariffime tabernas intrat, hanc in Hifpania, Italia, Anglia, Gallia, Germania conficiunt: Orientalis optima cenfetur & five ab Ægypto denominatur, five Rochetta Alexandrina dicitur; inter Occidentales Alonenfis præfertur, quam & Hifpanicam, Soude de Barille appellare folent, ea, quæ Carthagenæ conficitur, vilioris omnino conditionis eft.

Soda in aëre humefcens, quæ foluta fætet, eminentiori crufta viridi obducitur, fragilis, aut minoribus foraminibus pertufa, rejicienda eft.

Paratur foda ex plantis ad mare crefcentibus, quas in foffis comburunt, & cineres hac ratione ortos, continuato igne, in majores maffas conferruminant, illarum cum varia fint genera, hinc varium quoque Sodæ genus occurrit: Salicorniæ L. & Salfola L. præstantissimam Sodam largiri experientia evicit, optimam Alonenfem ex Mefembryanthemo Nodifloro L. parari, quod & in hunc fcopum ferere folent, testantur Cl. JUSSIEU & Cl. BASTER, Alexandrina ex Mesembryan bemo Coptico L. conficitur. Proprium est his plantis, ut salem marinum in suam fubstantiam recipiant, eundem guædam plane non mutant, ut de Salicornia Europaa L. Illustr. GAUB expertus eft, quædam iftum ita laxant, ut ignis plantam comburens acidum in aërem pellere queat, re-

ATTENUANTIA.

manente altero falis marini principio, alcali foffili nimirum, partibus terreftribus a planta refiduis, nexo. Vidit Illuftr. DU HAMEL Salfolam in horto a mari & falinis remotiffimo, falem, dum in cineres reducebatur, communem & fodam dediffe. Dum promifcue plantas ad mare crefcentes comburunt, accipiunt fodam cineribus clavellatis inquinatam.

In Soda, qualis vulgo proftat, alcali vegetabile, alcali foffile, falem marinum, fulphur & terram calcaream æque ac vitrefcentem obtinere, IMLIN vidit. Soda fimplex vitriariis maxime & faponariis in ufum cedit, ad fcopos medicatos non adhibetur. ENCKELMANN monet, SEIGNETTE Pharmacopœum Rupellenfem, qui labente Seculo fuperiore floruit, falem ex Soda cryftallifatum, fub nomine Salis Alcali, ad curandos morbos rheumaticos maxime adhibuiffe, & pro more eorum temporum laudes ejus propria fcheda ebuccinaffe. Alcali foffile refpectu effectus medicati, a vegetabili non differre, facile perfpicitur.

Sal polychrestus DE SEIGNETTE vid. Inst. Chem.

\$. 47.

II. RESOLVENTIA.

AMARA (§. 24.) RESINÆ (§. 26.) VOMITORIA (§. 56.) IRRITANTIA (§. 41.) SOPIENTIA (§. 42.)

ARNICA. Hac voce primus FEHR usus est, evidenter ex Ptarmica, qua GESNER, qui inter primos hujus plantæ meminit, eam denominavit formata, Betoine des montagnes, Wolverley. Folia æque ac Flores officinis subministrat.

Folia ex ovatis oblonga funt, utrinque tomentofa, fapore dulciufculo, cui vix diftinguenda amarities accedit, inftructa, aquam, cum qua coquuntur, fapore falino afficientia.

Mmr

Flores affervantur a calice evulfi, flavi, manifestius quam folia amari, aquæ faporem amaricantem & acrem communicant.

ARNICA. Flores compositos mixtos habet, calice imbricato, seminibus radii nudis distinguitur : Montana L. foliis ovatis integris agnoscitur; cum omnia semina papposa habeat, omnino Doronicis adscribenda.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Folia Extracti aquofi $\frac{1}{3}$, fpirituofi $\frac{1}{6}$ circiter largiuntur : Flores $\frac{5}{16}$ Extracti aquofi, $\frac{3}{16}$ fpirituofi. NEUMANN. Folia $\frac{5}{16}$ Extracti aquofi, ultra $\frac{1}{8}$ fpirituofi, Flores extracti fpirituofi nonnihil urentis $\frac{3}{16}$ & aquofi amari $\frac{1}{4}$ circiter CARTHEUSER. Oleum destillatum fundere in Chym. Journal. III. 100. observatur.

JOEL rufticos herbam cum floribus ad cafum ab alto haurire, monet, RENEALM urinam movere, habuit compertum. Primus FEHR ejus infignes vires in effusis aut stagnantibus humoribus non paucis observationibus probavit, quibus præter illas, quæ Actis Medicorum Berolinensium & Tentaminibus Vratislaviensibus infertæ funt, nec non eas, quas ALBERTI & DE LA MARCHE adducunt, GOHL, BRUCKNER, NEU-HOLD, CARL, Cl. DELIUS & PLENCK accedunt. Nulli igitur dubitamus, ut frequentius in usum ducatur, fuadere. Cum ejus hauftus non raro naufeas & cardialgias excitaffe observatus fuerit, hinc minores ejus doses prius tentandæ, & in delicatioribus herba potius, quam Hores, in ufum ducenda. Vulgari ratione æquæ herbæ ac florum partes ad drachmam unam, cum aquæ unciis tribus, pro una dofi, infunduntur.

BARDANA Barb. Lappa, Personata Lat. Barb. Agresiov, Agrilov, Glouteron, Kletten: Exhibet Radices craffas, foris nigricantes, fapore dulciusculo instructas.

554

ARCTIUM. Flores compositos tubulosos habet, calice, ex squammis, apice reflexo hamatis, imbricato sustratos, thalamo setaceo inhærentes, semina striata, brevi pappo sustentata: Lappa BLACWELL 117. soliis petiolatis distinguitur.

Crefcit in omni Europa.

Extractum aquofum, æque ac fpirituofum levi dulcedine gaudent, cum admixta amaritie & levi falfedine LEWIS. Extracti aquofi fere $\frac{1}{2}$, fpirituofi $\frac{1}{3}$ circiter NEUMANN obtinuit, illius ultra $\frac{1}{5}$, hujus $\frac{1}{9}$ circiter CARTHEUSER.

GALENO folia in ufu erant; radices a vi refolvente laudantur, FORESTO fuit relatum, decocto harum radicum gravem arthritidem curatam fuiffe; fimilis hiftoria apud ALSTON occurrit; FORMII obfervatio de HENRICO TERTIO Galliarum Rege per ecoctum hujus radicis a PENA curato, licet unde FORMIUS eam acceperit, lateat, licet PENA ejus non meminerit, & ipfa, quæ ibi defcribitur cura, præcipue balneo laconico adfcribenda effe videatur, multos impulit, ut lignis & radicibus refolventibus exoticis radices Bardanæ fubftituendas effe, crediderint.

* Aque a foliis abstracta Parif.

* BECCABUNGA Barb. Bachbungen. Dat folia ovata, ferrata, glabra, fucculenta, fapore aquofo inftructa.

Veronica Beccabunga BLACWELL 48. racemis lateralibus & foliis ovatis planis gaudet.

Crefcit in omni Europa.

MAURIT. HOFFMANN, fucci ex Beccabunga expreffi, efficaciam fe in fcorbuto expertum effe, teltatur, cum portulaca cæterum ratione virium medicatarum convenit; minus bene folia exficcata affervantur.

* Aqua destillata Paris. * Syrupus ex Succo Eorund. BETA vid. Olera. BRASSICA vid. Olera. *CALENDULA vid. Amara.

CAPPARIS CORTICES vid. Olera.

CARDUUS MARIÆ Barb. Chardon Marie, Frauendistel. Folia & Semina in indicibus medicamentorum occurrunt.

Folia magna funt & lata, pulchro reti albo picta, profundioribus & majoribus finibus laciniata, margine fpinofo inftructa, fapore falino, cui levis amarities juncta est.

Semina non minima, cylindroidea, utrinque leviter compressa, sub cortice susco, splendente, medullam albam & dulcem includunt.

CARDUUS. Flores compositos habet tubulos, calice squammis spinosis imbricato, & receptaculo spinoso sustentatos, nec non semina papposa: Marianus BLACWELL 79. soliis amplexicaulibus, pinnatifidis, sinuatis, squammis calicinis nudis, utrinque spinam canaliculatam educentibus, gaudet.

In Germaniam septentrionalem usque ascendit.

Folia olim refolvendi ergo contra viscera obstructa laudarunt: semina specifice pleuriticis commendarunt, sed non video, quid præ aliis demulcentibus præstare queant.

Aqua Cardui Maria SCHROEDER. iners.

*CHEIRI Lat. Barb. Aconoiov, zvine Veter Leucojum luteum vel Viole latea Veter. Keiri Arab. Girofflée, gelbe Violen, Nägelein. Flores affervantur, qui recentes gratum & fortem odorem fpirant, quem autem exficcati omnem deponunt, & fapore amaricante, cui aliquid falini junctum eft, gaudent, colore flavo inftructi.

CHEIRANTHUS. Corolla gaudet cruciformi, calice utrinque gibbofo inftructa, filiqua compressa, ad margines denticulo notata, stylo bissido coronata, femina marginata, compressa includente : Cheiri L. BLACWELL 179. folia lanceolata, acuta, glabra habet. Europæ calidiori propria planta, dum ubique in hortis culta fuit, femina fua fpargendo, nunc pluribus in regionibus fpontanea occurrit, in Boruffia adhuc obtinet.

Aqua destillata odorata est, Extractum aquosum evidenter falinum LEWIS.

Sapor vires attenuantes pollicetur, & hinc hi flores ad promovendum menfium fluxum facere poffe videntur, qui autem virtutem fœtum pellendi ipfis adfcribunt, hypothefi potius, quam experientia nituntur. REUSNER eos cum fucceffu ad prophylaxin contra apoplexiam & paralyfin ufurpatos refert.

*Aqua destillata SCHROED. *Conserva SCHROED. *Oleum per Infus. ÆGINETÆ.

CHELIDONIUM, XENISóniov, Chelidoine, Schoellkraut. Majus & Minus proftant.

Majus, 70 Méya, refreça Græc. Recent. Exhibet Radices, quæ exficcatæ digiti circiter craffitiem habent, in plures fibras terminantur, fufcæ, medulla gryfea, fapore, qui leviter linguam ferit, gaudent; recentes totæ croceæ croceum fuccum fundunt, evidenter acrem. * Folia glauca funt, hirfutie notata, femipinnata, pinnis in aliquot lobos fecedentibus, recentia fuccum fundunt, radicum fucco fimilem.

CHELIDONIUM. Corolla tetrapetala gaudet, calice diphyllo fuftentata, polyanthera, filiqua polyfperma: Majus BLACWELL 91. pedunculos umbellatos habet. Crefcit in omni Europa.

GALENUS radicem refolvendi ergo in ictero commendat, fuccum autem abstergendi fine ad vitia corneæ. Ab ejus attenuante virtute furgit effectus fudoriferus, quem Brunsvicenses ab eo experiri LANGE testatur, qui ab Extracto vinoso ad duos scrupulos in obstructionibus viscerum abdominalium & in farctibus pulmonum dato, egregios effectus vidit. CRAMER folia, sub forma infusi theæformis data, podagricis & calculosis multum solatii attulisse, refert.

Radix recens ad drachmas fex, exficcata ad drachmas duas in infuío aquofo datur.

*Aqua destillata NICOL. PRÆPOS. quicquid etiam non infini fubfellii Auctores in ejus laudem dixerint, præ fimplici aqua nihil proprii habet.

* Minus rò punçor. Folia exhibet reniformia, petiolata, glabra, leviffimo fapore, ad plantas nafturcinas accedente, inftructa.

RANUNCULUS Corollam habet pentapetalam, calice quinquefido fuftentatam, polyantheram, polygynam, femina nuda: *Ficaria* L. BLACWELL 51. Calice triphyllo, corolla polypetala gaudet, num Ranunculis relinquenda?

Crefcit in omni Europa.

Dum GALENUS, Chelidonium minus majore acrius effe, dicit, ejus radicem intelligit, quippe quam recentem cutim in veficam elevare, Cl. KRAPFF teftatur; folia adeo mitia funt, ut, teste Ill LINNÆO, variis in locis in acetaria recipiantur. Totius plantæ usus hodie eviluit.

CHINE RADIX Recent. Efquine. Geniculata eft, nodofa, tuberculis pluribus obfita, fub cuticula ex fufco-rufefcente medullam albam includit, cui aliquid rufi admixtum eft, fapore & odore caret. Rejicimus radices leviores, illas porro, quæ pauciorem aut fpongiofam medullam habent, eas præterea, quarum foramina a vermibus rofa, mercatores pafta ex terra rubra obduxerunt, notante jam VESALIO, nec non eas, quæ ex America ad nos adducuntur, & colore, five nigricante, five magis rufo diftinguuntur.

SMILAX. Planta relativa diphyta, corolla hexapetala nuda, in maribus ifanthera, in feminis trigyna & fructu bacca gaudet : China L. BLACWELL 433.

558

caule aculeato, tereti, foliis ovato-cordatis agnofcitur.

Crefcit copiofe in China, & teste BROWN in Jamaica.

Smilax Pfeudochina, unde viliores radices defumuntur caule inermi, tereti & foliis caulinis cordatis agnoscenda, Virginiæ & Jamaicæ civis est.

Extracti aquofi infipidi $\frac{1}{2}$, & fpirituofi leviffime fapidi $\frac{1}{4}$ largitur LEWIS. Extracti fpirituofi circiter $\frac{1}{9}$, aquofi ultra $\frac{1}{3}$. NEUMANN. Extracti fpirituofi leviter balfamici $\frac{1}{9}$, aquofi infipidi $\frac{1}{3}$ JUCH & ERMEL.

Hanc radicem a Lusitanis in Europam adductam fuisse, AMATUS refert, versus medium Seculi XVI Venetiis in usu effe coepisse, VESALIUS testatur, ad affectus nervorum, ad morbum articularem & ad labem siphyliticam, cum primum innotuerit, fuisse adhibitam VESALIUS quoque refert. Cl. BOEHM magnum auctorum numerum excitat, qui eam contra morbum venereum adhibuerunt, fed graves quoque Auctores subjicit, qui eandem inertem in hoc morbo funt experti, quibus ASTRUC & GEOFFROI addendi funt, cum mihi ne de ulla quidem fida obfervatione constet, ejus solius ope vel veneream vel aliam quamcunque acrimoniam fuisse curatam, fateor, me a medicamento insipido & inodoro non audere insignem efficaciam polliceri.

CICHORIUM vid. Olera. DAUCUS vid. Olera. EBULUS v. SAMBUCUS. ENDIVIA vid. Olera. EUPATORIUM vid. Amara.

*ERYNGIUM, Hgúyyuw, Chardon roland, Mannstreu. Radices largitur, quæ pollicis craffitiem habent. fibrofæ funt, extus nigræ & striis transversalibus notatæ, intus albæ, sapore dulciusculo instructæ. *ERTNGIUM.* Floribus pentaphyllis, fimilibus calicibus fustentatis, isantheris, digynis, fructu ovato, bifariam fecedente gaudet: *Campestre* L. BLACWELL 297. foliis amplexicaulibus, pinnato laciniatis distinguitur.

Crefcit in Europa temperata, in Saxoniam ulque ascendit.

GALENUS has radices ad movendam urinam commendat, S. PAULI ad ciendos menfes, non pauci ad fines aphrodifiacos, nulla exacta de earum efficacia obfervatio fefe nobis offert, fapor dulcis vires refolventes ipfis ineffe, fufpicionem movet, quinque radicibus aperientibus minoribus adfcribuntur.

*Conditum VAL. CORD. * Conferva Parif.

GALBANUM, Tan Barn. Est Gummi refina tenax, ductilis, ex rufo - flavescens, fapore amaricante, acriusculo, odore proprio gravi instructa.

Siccum in grana concretum, quæ ad avellanarum usque magnitudinem ascendunt, extus ferruginea, intus exacte ungues referentia, en Larmes dicitur, idem etiam interdum sub forma granorum minorum, flavicantium, semipellucidorum occurrit; huic cedit, id quod in maffas majores concretum eft, en Pains, & cujus varia genera prostant, quæ, quo plures ungues & pauciores fordes habent, & quo minus fusca sunt, aut nigra, eo reputantur meliora. Prostat etiam interdum Galbanum liquidum ex Persia, confiftentia terebinthinæ instructum, cui multæ fæces nigræ commixtæ funt, tempore ad fundum fecedentes, odorem refinæ, nequaquam Galbani, habet. Galbanum ex Bubonis specie defumi, Ill. LINNÆUS tradit, HERMANN plantæ Galbaniferæ femina alata, & quæ non villofa funt, adfcribit, temere hanc litem decidere nolo.

Crefcit in Africa.

Olei effentialis $\frac{1}{2\tau}$ circiter, $\frac{15}{32}$ refinæ infipidæ & inodoræ, $\frac{3}{16}$ Extracti aquofi, amari & acris NEU-MANN

560

MANN obtinuit; Extracti aquofi $\frac{1}{6}$, fpirituofi $\frac{3}{4}$, Olei effentialis $\frac{1}{21}$ CARTHEUSER. Ex aqua fe patitur fufpendi, quoad maximam partem in aqua folubile eft.

Ab HIPPOCRATE ad fuffitus uteri commendatur, calefacientes vires ipfi GALENUS adfcribit, cum Gummi Ammoniaco ratione virium videtur convenire, cui pro ufibus internis poltponitur ob gravem, quo gaudet, odorem, & vires calefacientes, quæ ab oleo ejus odorato pendent. Extus potentiflimum refolvens, ad omnes humores duriores cum fucceffu adhibetur, nec male umbilico hyftericarum imponitur.

*Spiritus Parif. *Oleum destillatum SCHROEDER. *Oleum per infusionem Parif. non spernendum, pro resolvendis tumoribus induratis : Emplastrum de Galbano crocato MYNSICHT : dimidiam modo Galbani rationem Wurtembergenses recipiunt, optimum medicamentum resolvens ad tumores scirrhoideos & ad mammas a lacte stagnante induratas; nec sine successe fu scopo anodyno applicatur : *Emplastrum ad clavos pedum Nostr. resolvendo, nomini respondere potest.

GRAMEN, Áygusus, Chiendent, Zwecken. Radices largitur prælongas, geniculatas, flavescentes, fapore dulci, odore nullo instructas.

Triticum repens L. BLACWELL 537. calicibus quadrifloris acutis diftinguitur.

Copiofe occurrit per omnem Europam.

Frigidis has radices GALENUS annumerat, ob vim aperientem, quam faponaceo fuo fucco præstant, a multis Auctoribus laudatæ, calculos biliarios ab iis folutos observavit LOESECKE, vulgatissimum apud nos ingrediens est decoctorum, quæ pro potu ordinario assumuntur.

*Aqua destillata NICOL. PRÆPOS.

GUAJACUM Lignum Rec. Lignum Sanctum Rec. Franzosenholz. Est ponderosum, valde durum, viridi nigricans, fapore amariusculo, cui aliquid acris accedit instructum; accensum odorem non ingratum spirat, alburno flavicante cingitur, quod cortex exvariis squammis efformatus tegit, colore ex buxeobadio gaudens, & cujus sapor præ ligno magis acris est; adducitur ad nos sub forma frustorum sectorum, aliquot pollices crafforum.

Lignum ponderofum, quod multum nigri habet, & cui cortex tenacius adhæret, pro optimo habetur.

* Refina Guajaci in majoribus frustis ad nos adducitur; compositis ex granis flavo-fuscis, pellucentibus, quibus variæ fordes commixtæ funt, inter dentes tenacibus, ad ignem liquescentibus & fumum, qui mihi faltem non fuavis videtur, emittentibus, fapore levissime amaro instructis.

GUAJACUM. Corollam pentapetalam, regularem, diplofantheram, monogynam & fructum compressium angulatum habet : Officinale L. BLACWELL 350. foliis bijugatis gaudet.

Habitat in America Meridionali.

Ligni species magis flavescens & minus nigra olim *L. Sancti* nomine distinguebatur, hodie non amplius dubium est, variam arboris ætatem differentis coloris causam esse.

Lignum Extracti aquofi, cui multum refinæ adhæret, & quod linguam pungit $\frac{1}{6}$, fpirituofi mitioris $\frac{1}{4}$ largitur. LEWIS. Extracti refinofi $\frac{7}{32}$, aquofi $\frac{3}{32}$. NEU-MANN. Extracti aquofi linguam urentis $\frac{1}{5}$, fpirituofi $\frac{1}{3}$ circiter. CARTHEUSER. Ego $\frac{1}{16}$ Extracti aquofi, quod odore & fapore ad Balfamum Peruvianum accedit, inde extraxi. Ex Cortice NEUMANN Extracti refinofi $\frac{1}{9}$, aquofi autem $\frac{1}{3}$, ex Refina autem $\frac{7}{12}$ Extracti refinofi & $\frac{1}{6}$ aquofi obtinuit.

Innotuit hoc Lignum in Hifpania anno 1508, in Italia 1517, ferius per reliquam Europam devectum fuit; Hifpani illud tanquam remedium antivenereum ab Americanis acceperunt. Quæ fuerint noftri Ligni circa curandos morbos venereos fata, large recenfet Cl. BOEHM: cum ratio, qua illud exhibebatur, non potuerit non humores' infigniter commovere & partibus fluidioribus privare, folida autem multum debilitare, certior vero & tutior fit horum morborum per hydrargyrum therapia, hinc eo folo fiphylitidis curam hodie Medici non fufcipiunt; cum autem aquæ, cum qua coquitur, & balfamicas & refolventes partes immifceat, hinc & ad alios morbos, ubi humores fpiffi & corrupti funt, cum fucceffu, jufta ratione fervata, præfcribitur. In phtifi egregios ejus effectus viderunt SYLVATICUS, RIVERIUS, SCHENCK, SCHULZ, CRUGER. In febre hectica LOESECKE. Sefqui uncia cum quatuor aquæ libris ad remanentiam unius coquitur.

Refinam ad eofdem ac lignum ufus adhibent, & illam ad drachmæ dimidiæ pondus præfcribunt. In liquore fpirituofo folutum Arthriticis multum commendatur.

* Oleum destillatum BRENDEL unquam paratum fuisse dubito : * Spiritus SCHROED. præ aliis spiritibus empyreumatibus nihil proprii habet : * Refina iners : * Extractum SCHROEDER. efficax omnino : * Oleum Empyreumaticum IDEM.

* HERNIARIA Barb. Tourquette, Herniole, Bruchkraut, Harnkraut. Plantæ minoris Cauliculi prostant teneri, geniculati, quibus folia ex ovatis acuminata adhærent, sive glabri sive hirsuti, sapore levi acrimonia linguam feriente instructi.

HERNIARIA. Corolla quinquefida, regulari, nuda, ifanthera, digyna, capfula monogyna gaudet: Glabra & Hirfuta L. BLACWELL Tab. 320. cauliculis herbaceis diftinguitur.

Crefcit ubique per Europam, præter maxime Septentrionalem, hirfuta in Europa temperata obtinet.

Seculo XVII demum innotuit, fine ulla genuina

obfervatione ad hernias laudatur, cum ejus fapor aliquid incidentis ipfi ineffe fufpicari faciat, hinc calculofis forfan aliquid folatii afferre poteft; cum autem & hic efficaciora & certiora habeamus medicamenta, ejus ufus hodie eviluit.

* Aqua destillata CAMERAR.

LACTUCA vid. Olera.

LAPATHUM, Ožvaázadov, Rumex, Patiene, Grindwurzel. Radices fubministrat fibrofas, pollicem crassas, extus nigras, intus lutescentes, fapore acriusculo cum aliqua adstrictione & levi amaritie instructas.

Rumex acutus L. BLACWELL 491. valvulis dentatis, graniferis & foliis lanceolatis, ferratis diftinguitur.

Crefcit in omni Europa.

Utrumque Extractum amarum & adstringens est. Lewis.

Has radices apud Veteres ad usus internos adhibitas fuisse non reperio, recentiore ætate aperiendi scopo in multo usu sunt, cum acri & amaro, quo pollent, principio spisso humores attenuent, & adstrictione, visceribus obstructis robur dent; alvum quoque ab iis cieri experientia probat. DIOSCORI-DES eas extus adhibitas contra morbos cutaneos commendat, & hac ratione cum successfu usurpari S. PAU-LI observatione evincit, sed nec male in iisdem morbis intus dantur.

Recentes ad unciam dimidiam in juscula recipiuntur; exficcatarum drachmæ duæ cum aquæ unciis fex ad remanentiam unciarum trium coquuntur, pro dofi.

* Extractum VAL. CORD.

Parifini quoque Rumicem Patientiam L. Sanguineum L. & Aquaticum L. præfcribunt, quorum tamen radices nec inter fe, nec ab acuto, respectu vis medicatæ, multum differre videntur. MANNA vid. Purgantia.

* MERCURIALIS, λινόζως ις, παρθένιον, έρμε βολάνιον, Bingelkraut, exhibet Folia oblonga, angusta, profundius crenata, inodora & insipida.

MERCURIALIS. Planta relativa, diphyta, corolla trifida, in maribus polyanthera, in feminis digyna inftructa, capfula didyma, biloculari, dipyrena prædita: Annua L. BLACWELL 162. Caulem brachiatum habet, folia glabra, flores fpicatos.

In Boruffia adhuc occurrit.

Ab HIPPOCRATE intus ad ducendam alvum & hydropem, extus relaxandi ergo laudatur; vires alvum laxandi, &, dum extus applicatur, digerentes inde pollicetur GALENUS, hos effectus folia recentia, faponaceo, quo fcatent, fucco, videntur præftare, eadem a Noftratibus, butyro frixa, herniis incarceratis folent imponi, ab exficcatis nullas vires fpero.

Mel Mercuriale August. ad clyfmata abstergentia recipitur: * Syrupus longæ Vitæ ZWINGER non fine fuccesfu refolvendi ergo exhibetur, & hinc varium morborum genus & curatur & præcavetur; tribunum militum autem, qui ZWINGER hunc fyrupum communicavit, & rusticum Calabrum quondam huic fyrupo debuisse, quod ultra centum annos vixerint, nondum confectum est.

NASTURTIUM PETRÆUM Noftr. Saxifraga Barb. Creffon de Roche, Steinkreffen. Recipiunt Cauliculos, qui recentes fucculenti funt, nonnifi fuperne divifi, teneri, parvis foliis obfeffi reniformibus, creberrime integerrimis, hirfutis, exiguis petiolis fuftentatis, leviter acri & leviter adftringente fapore gaudent.

CHRISOSPLENIUM. Corolla quadrifida vel quinquefida irregulari, diplofanthera, digyna, capfula biroftri, polyfperma gaudet: Alterni folia L. foliis alternis diftinguitur.

Crefcit per omnem Europam.

Destillatione principia alcalina fundit; Extracti aquosi $\frac{1}{2}$ fere, spirituosi $\frac{1}{5}$ largitur; dat etiam exiguam portionem Salis effentialis. PALLAS.

Nostra demum ætate officinas nostras intrare cæpit, & crebro contra tussim & asthma adhibetur, in quibus etiam ob vires resolventes, quas fapor & locus natalis, cum nonnisi ad loca aquosa occurrat, indicant, non male usurpatur; ab Auctoribus hinc inde ad aperiendas obstructiones viscerum abdominalium & abstergendos renes commendatur.

* ONONIS, Avoris, Öroris, Arrêt de bæuf, Hauhechel. Defumuntur Radices, quæ longæ funt, tenaces, extus fuscæ, intus albæ, sapore levissime acriusculo instructæ.

ONONIS. Corollam papilionaceam habet, calice, cujus quædam laciniæ ipfam longitudine æquant, fustentatam, legumina rhomboidea, turgida: Spinofa L. BLACWELL 301. floribus fubfessibus & caulibus femi erectis distinguitur.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Abstergens & incidens, diuretica & calculum comminuens a GALENO laudatur; multos reperio, qui hæc ex GALENO repetunt, nullum qui ea propria observatione confirmet; Ill. HAEN, se foliorum Ononidis decoctum cum successfu in nephritide fuisse usurgatum, refert.

* PARIETARIA Lat. Barb. ἐλξίνη, Helxine Veter. Casse pierre, Glaskraut, Tag-und Nacht-Kraut. Recipimus Folia ovato-oblonga, pilis sparsis obsessa, longis petiolis innixa, sapore levissime adstringente prædita.

PARIETARIA. Planta relativa, monophyta, floribus involucro communi fustentatis, corolla quadrifida, in maribus ifanthera, in feminis monogyna, fructu monospermo gaudet: Officinalis L. folia lanceolato-ovata, alterna habet.

Vulgaris in Europa temperata planta, non ultra Saxoniam afcendit.

Refrigerandi ergo a DIOSCORIDE laudatur, PA-RACELSI ævo ad comminuendum calculum cœpit laudari, ex imaginatione potius, cum inter medios lapides crefcat, quam ex obfervatione, ab herba infipida & inodora, ego faltem, non magnas vires expecto.

* PEUCEDANUM, π_{uvei} avor, Queue de Pourceau, Haarstrang. Radices exhibet, quæ fibrosæ funt, extus fuscæ, intus albæ, recentes succum album plorant, sapore ad aromaticum accedente, neutiquam amaro instructum; exsiccatæ proprium odorem spirant, non nauseosum, saporem dulciusculum habent, aquam, cum qua coquuntur, non sine amaritie acriusculam reddunt.

PEUCEDANUM. Flores umbellatos habet, utroque involucro inftructos, femina alata & ftriis eminentibus notata: Officinalis L. foliis aliquoties trifidis, capillaribus diftinguitur.

Crefcit in Europa temperata, non occurrit ultra Saxoniam.

Extractum spirituosum faporem adstringentem & odorem nauseosum habet. DELIUS & WAGNER.

Medicamentis uterinis ab HIPPOCRATE adfcribitur, GALENUS radicibus calefacientes & digerentes vires adfcribit, eas vi faponacea agere optime HIP-POCRATES dicit, leniter catharticas effe DELIUS & WAGNER propriis experimentis probant.

* PILE MARINE, opaígas Jahassías, Meerballen. Substantiæ flavæ, leves, rotundæ, ex recrementis radicum conglomeratis efformatæ, odore & fapore carentes.

Nn 4

Cl. PALLAS post KLEIN testatur, has pilas effe tubera radicum Zosteræ marinæ L. in Oceano & Mari Baltico occurrentis, maceratione resoluta & agitatione Maris conglomerata.

Liquorem urinofum & oleum nigrum inde obtinui.

Per se nunquam usurpantur, ustæ ad pulverem strumalem recipiuntur.

PIMPINELLA Lat. Barbar. Bourage, Bouquetine. Radices exhibet, quæ ad digiti craffitiem accedunt, fibrofæ funt, albæ, fapore evidenter acri & ad faponem accedente inftructæ: Pimpinella Saxifraga L. BLACWELL 472. foliis pinnatis, foliolis radicalibus fubrotundis, fummis linearibus gaudet.

Crefcit in omni Europa.

Oleum destillatum hæ radices fundunt, omnem fuam efficaciam spiritui vini, cum quo infunduntur, relinquunt, Extractum resinosum valde acre largiuntur. LEWIS. Extracti resinosi $\frac{1}{16}$, gummosi $\frac{1}{3}$ circiter exhibent. CARTHEUSER.

A radice, fapore evidenter acri & faponaceo inftructa, vires humores fpiffos refolvendi & vafa obftructa referandi jure expectamus, primi qui eam ad ufus medicatos adhibuerunt Auctores, contra calculum ufurpabant, ad menfes & lochia movenda in communi apud Norimbergenfes ufu effe, C. HOFF-MANN annotat, præcipue autem STAHLII auctoritate creberrime ad fanandos morbos adhibebatur, poftquam is ejus vires ad omnes ægritudines, ubi humores attenuandi & folida referanda funt, ftabilivit, egregie quoque ad incommoda a retento in corpore hydrargyro facere, & BORRICHIUS & omnis STAHLII fchola affeverant; in morbis mucofis maximo cum fucceffu datur.

Exhibetur ad drachmam dimidiam in substantia, ad sesqui drachmam in infuso. Estentia Brandeburg. licet ab omni Secta Stahliana maximi fiat, ego tamen spiritum vini, nunquam, ubi resolvendi animus est, vellem exhibere: * Extractum Brandeburg. iners est.

POLYPODIUM, πολυπόδιον, Engelſüſſ. Ejus Radices longæ funt, angustæ, variis articulis asperis distinctæ, sub cortice rusescente, medullam flavam, virescentem, includunt, sapore dulci, cui adstrictio juncta est, instructam.

Polypodium Vulgare BLACWELL 215. Foliis fimplicibus, pinnis oblongis, integris diftinguitur.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Polypodium quercubus innafcens præftare, eft commentum FALLOPII.

Extracti aquofi dulcis $\frac{1}{2}$ fere, fpirituofi naufeofi $\frac{3}{8}$ NEUMANN obtinuit; CARTHEUSER Extracti aquofi $\frac{3}{8}$, fpirituofi $\frac{1}{12}$.

Radices coctione amarefcunt.

GALENUS ex hypothefi his radicibus vires exficcantes adfcribit; DIOSCORIDES autem laxantes, fapor vires refolventes efficaces pollicetur. Non male infufis aperientibus & laxantibus adjiciuntur, Cl. POISSONNIER commendat maniacis, ut per quatuordecim dies quovis mane, decoctum ex Radicum Polypodii unciis duabus cum libris fex aquæ ad remanentiam librarum quatuor coctis hauriant, & fi nulla inde catharfis fequitur, eidem pulverem ex Radicis Polypodii drachma una & Nitri fcrupulo præmittant.

* Extractum VAL. CORD.

PORTULACA vid. Olera.

RAPA vid. Olera.

RUBIA, EgoSgóSavov, EgeoSóSavov, Garance, Röthe, Krapp. Radices exhibet fibrofas, calami craffitiem æquantes, totas rubras, fapore amaricante & adftringente præditas.

Nns

RUBIA. Corolla quinquefida, interdum quadrifida gaudet, fupera, rotata, isanthera, monogyna, baccis duabus coalitis, monopyrenis: *Tinctorum* BLACWELL 326. Foliis senis distinguitur.

In Europa temperata fponte crefcit, vix ultra Alfatiam afcendit; colitur paffim per Europam, etiam multum inter nos, cultura radices majores & magis rubras producit.

Extracti aquofi quod acidiufculum faporem habet $\frac{2}{3}$, refinofi aufteri $\frac{3}{8}$ fere largitur Cl. STEINMEYER. Extracti aquofi $\frac{1}{4}$, refinofi $\frac{1}{6}$. CARTHEUSER.

Urinam animalium his radicibus paftorum rubedine tingi, GALENUS observavit, sed eorundem offa quoque rubra evadere annotavit & uberius deduxit BOEHMER, cui circa curiosum omnino danoperor, Illustris HALLER quoque addendus est, notandum utique, fola offa, nequaquam cartilagines & ligamenta, inde tingi, colorari quoque materiem perspirabilem : observavi præterea cum Cl. STEINMEYER eundem quoque effectum præstari ab Asperula Cynanchica L. & Arvensi L. Galio vero L. Galio Mollugine L. Galio Aparine L. & Valantia Cruciata L. Cum itaque has radices evidenter ad offium usque substantiam penetrare certum fit, hinc cum fuccesfu eas adhiberi ad difficillimos morbos a spisso humore osfa obsidente. patet, primus GLISSONIUS eas ad rachitidem commendavit, plurimos graviffimo hoc affectu laborantes earum ope fanitati redditos fuisfe, testantur COSNIER & ROBERT, idem Cl. LEVRET vidiffe ROESNER testatur; easdem vires aperientes habere, GALENUS refert; earundem ad icterum curandum efficaciam HOFFMANN quoque confirmat, juniorem puellam earum ope a crusta lactea liberatam viderunt COSNIER Adscribuntur Radicibus quinque ape-& ROBERT. rientibus minoribus.

* Ruscus, Ožumugoim, BRUSCUS Latin. Barbar. Petit - houx, Mausdorn. Radices ejus funt fibrofæ, calamum craffæ, copiofiffimas fibras emittunt, albæ, fapore dulci gaudent, cui leniffima acrimonia accedit.

Ruscus. Planta relativa diphyta, corollam hexapetalam habet, nectario inftructam, mares triantheros, feminas monogynas, baccas difpermas: Aculeatus L. BLACWELL 155. foliis fupra floriferis nudis diftinguitur.

Crefcit in Europa Meridionali, in Helvetiam ulque alcendit, nostras hyemes fert.

A vi refolvente multum laudatur, diurefin maxime movere obfervatur, RIVERIUS hydropem inde curatum allegat. Annumeratur quinque Radicibus aperientibus majoribus.

SACCHARUM, Zán Xag, sán Xagov, Sal Indus Arab. Sucre, Zucker, Significat in universum omnem salem effentialem sapore dulci instructum, strictius autem & vulgo, denotat salem essentialem ex proprio plantarum genere desumtum, quod est:

SACCHARUM. Corolla glumofa bivalvi, lanugine inhærente gaudens, trianthera, digyna, monofperma : Officinarum L. floribus paniculatis diftinguitur.

Inter Tropicos antiqui & novi orbis fponte crefcit, inde in varias Afiæ, Africæ & Americæ regiones translatum, copiofiffime colitur; aliquid ejus quoque in Sicilia & Hifpaniæ Granada coli lego.

Ante medium superioris Seculi (Lusitanos omne Saccharum Europæ intulisse, eadem temporis periodo Anglos, anno 1716 demum Gallos illud advexisse, reperio.

Veteres receperunt falem, qui ex annofis plantis fub forma granorum exfudavit, & illum Salem Indum dixerunt : ratio eundem, modo hodie ufitato copiofe obtinendi, & ad varium puritatis gradum evehendi, ab Arabibus repetenda: confiftit autem in eo, ut fuccus ex planta exprimatur, is fub nomine Vefou venit, & ope lixivii cauftici, aquæ calcis & humorum feroforum ab excedente ratione partium gummofarum, quæ ipfi adhærent, liberetur, & ut in Salem concrefcere poffit, difponatur; hæc præparatio, quæ multas encheirefes exigit, egregie ab Ill. DU HAMEL defcripta eft.

Pro vario gradu, ad quem Saccharum fub depuratione perductum eft, varium colorem & variam confistentiam folet adipisci, id, quod nondum in formam cohærentem coiit, & nondum album evalit Moscovade, magis depuratum Cassonade & in officinis Germaniæ Saccharum Thomæ folet appellari, hoc ipfum pro diverfa plantæ ætate & pro diverfo folo, ubi crevit, variam omnino indolem habet, pro vario quoque depurationis modo, quod expertum eft, tam colore quam confistentia folet variare, quo magis brunum est, eo reputatur vilius, rejiciendum illud quoque eft, quod humidum digitis adhæret, & quod empyreumatico odore nares ferit; hoc Moscovatum iteratis depurationibus album redditum, & in panes cohærentes conoideos efformatum Miscellaneum, Farinaceum, Lumpenzucker dicitur; hoc, quo plures adhuc depurationes fubit, eo magis folidum, durum, album & splendens evadit; Belgis & Germanis in more eft, diverfas eius fpecies diverfis nominibus exprimere, quæ hic eo ordine appono, quo ad majorem puritatis gradum deductum faccharum denotant: Melisaum five Melis, paroum Melis, Rafinatum, Boyer - Brod & Canariense, hoc ultimum Gallorum Sucre Royal respondet: sub omnibus facchari depurationibus liquor obtinetur, qui fub formatione panum inde defluit, largiore ratione partium mucilaginofarum fartus, is Syrupi Saccharini, Molasse, Syrop nomine venit, colore nigricante,

572

fapore & odore minus fuavi gaudet, & fordidus eft, nec bene faccharo in compositionibus humidis substituitur: hic Syrupus, nec non spuma, quæ sub depurationibus surgit, cum aqua diluuntur & fermentationi vinosæ subjiciuntur, spiritus ardens destillatione obtentus Rum dicitur.

Saccharum frequentis & multifarii omnino ufus eft: tanquam fubstantia mucilaginofa, dulcis, evidenter ad nutritionem facit, PISO testatur, fæces a depuratione facchari reliquas mancipiis ad victum fufficere & eadem istis nutrita, per totum semestre æstivum duriffimos in molendinis labores perficere; idem, cum vi faponacea gaudeat, hinc princeps remedium eft in spissitudine humorum, & omni, qui ex ea surgit, morbo; cum etiam faccharum aqua dilutum facile acorem suscipiat, evidens fit, cur in omni morbo acuto cum fuccessu propinetur, ejusdem in his præstantia etiam ex efficacia, qua putredinem arcet, elucefcit, quippe quæ vulgatiffimis apud dulciarios experimentis conftat, & ab Illustri PRINGLE confirmata eft; egregius hic Vir frequenti facchari, qui increbuit, usui, minorem, quem hodie experimur, lepræ & morborum putridorum numerum adfcribit; eadem præterea fubstantia dulcis & mucilaginofa acrimoniam qualemcunque humorum etiam efficaciter obtundit, & strictas fibras relaxat, hinc cum maximo fuccessu ad pectoris affectus & ad phtifin quamcunque adhibetur; lumbricos quoque ab eo necari, REDI eft expertus. Qui a faccharo depurato fibi metuunt, quia ipfi fub depurationibus, quas fubiit, caufticum ex calce acceffisse sufpicantur, meminerint, aquæ calcis nihil caustici inhærere, & ne vestigium quidem calcis in faccharo detegi poffe.

Externe abstergendi scopo ulceribus fordidis carni fungofæ, maculis corneæ inspergitur, sub forma fuffimigii difcutiendi ergo adhibetur, clyfmatibus quoque pro fæcibus attenuandis adjicitur.

Dentes inde nigrescere & cariosos reddi, ex ejus indole viscida, quæ istis accrescit, & fermentationem acidam subit, liquet; quod hypochondriacis & fcorbuticis noceat, potius ex hypothesi, quam ex observatione dici puto, absurdissime etiam optimum muci dissolvens, pituitam gignere, asserere solent; ptarmicis quoque additur.

Saccharum Thomæ, cum multas partes mucidas habeat, hinc eccoproticis ad aliquot uncias adjicitur.

Hodie, præeunte inter primos MESUE, ubicunque fere Veteres mel adhibuerunt, ipfi viribus par, fed majori gratia pollens, faccharum fubstituimus.

Sacchari genera, quæ ex Arundine arbore L. Acere faccharino L. Acere rubro L. Acere Platonoide L. Betula nigra L. Juglande alba L. Gleditfia L. Zea L. Afclepiade nivea L. & variis radicibus indigenis parant, hujus loci non funt.

Saccharum copiofiffime in cibum recipitur, præterea omnium conditorum, confervarum, rotularum, trochifcorum, morfulorum & longe plurimorum fyruporum bafin conftituit.

Saccharum Candum MYREPS. quod a recentiorum Græcorum, værlær, qua figuram acutam feu angularem denotant, denominarunt: quo pulchrius eft faccharum, unde paratur, eo ipfum pulchrius evadit, id, quod ex faccharo nondum ad albedinem deducto, conficitur, conftituit Saccharum Candum rubrum: Saccharum Penidium Arab. gedrehter Windzucker Noftratibus, eft faccharum ad confiftentiam tabulandi coctum & perpetua, ufque dum refriguerit, tractione in fpeciem albam, non transparentem redactum, quam in gyros & panes formare folent, prioribus minus gratum, præ illis nihil proprii habet: Saccharum clarificatum eft faccharum aqua folutum & in confistentiam fyrupi reductum : * Essentia dulcis Wurtemb. inconcinna compositio : Globuli Moschati Wurtemb. cur medicamento ano intrudendo moschus & zibethum adjiciantur, non video.

SALSAPARILLA fub hoc nomine ad nos adducuntur Radices, quæ aliquot pepum longitudinem habent, flexiles, & hinc crebro in gyros flexæ occurrentes, varia craffitie inftructæ, quæ ad calamum anferinum ufque accedit, multas fibrillas capillares emittentes, fub cortice rufefcente, fubftantiam farinaceam, albam includunt, quæ medullam quoque albam ambit, nitidam, odore & fapore carent.

Afferuntur hæ Radices corbibus coërcitæ, ex aliquo radicum ferpentium genere, quod ab illis non multum videtur recedere, textis.

Radices graciles, extus nigras, intus non albiffimas, & quæ non facillime per longitudinem findi poffunt, rejicimus.

Smilax Sarsaparilla L. caule aculeato, angulari & foliis inermibus, ovatis, trinerviis distinguitur.

In China & America Meridionali occurrit.

Aqua cum his radicibus cocta, rubrum colorem & faporem, qui evidenter linguam afficit, affequitur. Extracti aquofi $\frac{3}{8}$ GMELIN & GÆRTNER inde obtinuerunt; Extracti aquofi falini, amaricantis $\frac{3}{8}$, fpirituofi $\frac{1}{4}$ NEUMANN; Extracti aquofi $\frac{1}{4}$, Extracti fpirituofi balfamici, fubacris $\frac{1}{12}$ CARTHEUSER.

Hæ radices fub initia Seculi XVI in Europam allatæ & tanquam eximium ad fugandam luem veneream medicamentum commendatæ fuerunt, auctores, qui earum laudes canunt, æque ac illos, qui stant a parte contraria, Cl. BOEHM collegit : morbum venereum, qui Mercurio non potuit fugari, Sarsaparilla curatum HUNTER vidit, & FORDYCE varias observationes ennarrat de hoc morbo, frustra hydrargyro & Ligno Guajaco oppugnato, Sarsaparilla demum victo, fimilem etiam experientiam apud Illustrem STOERCK reperio. Vires refolventes hanc Radicem edituram esse, nullus dubito, aquæ enim, quacum decoquitur, evidentem faporem conciliat, hinc non fine fuccessure in varia humorum spissfitudine, morbis cutaneis, arthriticis, catarrhalibus adhiberi poterit. Tumores duros continuato ejus usu curatos, SCULTETUS testatur. Ut omnes suas vires aquæ largiatur, diutius cum ea coquenda est.

* Extractum Wurtemb. non inefficax effe videtur.

SAMBUCUS, Azin, Sureau, Holder. Arboreum æque ac Herbaceum $\chi \alpha \mu \alpha i \alpha \pi$ nr, Ebulum, Yeble, Attich ad usus medicatos recipimus. De illo Folia, Flores, Cortex & Baccæ recipiuntur, de hoc Baccæ :

* Cortex est arboris liber extus viridis, intus albus, fapore adstringente & austero linguam ferit.

* Folia magna funt, pinnata, una impari, omnibus ovato - lanceolatis, ferrata, fapore herbaceo inftructa.

Flores affervantur cymofi, albi, fuavi odore & levi fapore inftructi.

* Baccæ proftant in officinis rotundæ, fapore proprio dulciusculo gaudentes, ad eas * Baccæ Ebuli proxime accedunt.

SAMBUCUS. Corollam monopetalam habet, quinquefidam, rotatam, calice quinquefido fustentatam, ifantheram, trigynam & baccam fubrotundam, dispermam: Nigra L. BLACWELL 115. floribus cymoss & caule arboreo gaudet: Ebulus L. BLACWELL 488. caule herbaceo distinguitur.

Crefcunt in Europa, præter maxime Septentrionalem.

Flores parum olei destillati butyracei fundunt. LEWIS.

Folia HIPPOCRATES hydropicis, & illis quibus lochia difficilius fluunt, commendat, alvum quoque inde

576

inde duci contendit, eorundem extus applicatorum usum in hæmorrhoidibus RUDOLPHUM II. expertum effe, WELSCH testatur; GUJOT, fe iteratis vicibus eorum non leves vires emollientes vidiffe, & recentia & calefacta fibi multo ufu fuiffe ad eryfipelas affeverat. Cortice mediano a vehementiffimis hæmorrhoidum doloribus pastorem convaluisse. REUS-NER refert, eundem hydropicos fanasfe, BRUCKMANN tradit, & Ill. HALLER plura loca Auctorum adducit, qui ab ejus uncia una alvum duci viderunt, ad hunc fcopum etiam a nostris rusticis non raro adhibetur. Flores, volatili, quo gaudent, principio, vafa leniter stimulant & humores attenuant, hine intus scopo fudorem movendi, extus discutiendi, in usum recipiuntur, eofdem ad lac augendum facere, WERL-HOFF eft expertus.

Baccæ exficcatæ, quæ vulgo Grana Ades folent appellari, ab HIPPOCRATE contra hydropem & morbos uteri præfcribuntur, eafdem CROLLIUS ob fignaturam, cum fimilitudinem inter eas & excrementa intercedere fibi perfuaferit, ad dyfenteriam laudat, & hinc vulgo adftringentibus folent annumerari, fed virtutem hanc neque ex fapore colligere poffumus, nec illam ulla fida obfervatio evincit.

Ebuli partes ratione virium ad Sambucum accedunt.

* Acetum QUERCETAN. a gratia commendatur : Aqua destillata suavis saporis & odoris est, non male ad mixturas diaphoreticas adhibetur : * Oleum coctume MESUE: Rob August. ob indolem saponaceam, quam cum pulpis fructuum communem habet, cui & aliquid acris accedere videtur, magnum in resolvenda humorum spissitudine medicamentum est, excretiones aquosas promovet, in morbis catarrhalibus, nec non quando viscera abdominalia obstructa funt ad dimidiam unciam cum successu

faccharo paratur æque ac Rob Ebuli August. quod ipfi viribus par eft : * Julepus Sambucinus Wurtemb. * Mel Sambuci Wurt. refolvendi ergo ad gargarifmata laudatur : Spiritus Florum per ferment. SCHROED. apud Parifinos per errorem typographicum baccæ loco florum præcipiuntur, efficax omnino medicamentum, ubi indicatio discussionem præcipit: * Spiritus baccarum Sambuci per fermentationem August. * Spiritus baccarum Ebuli per fermentationem August. dubito hos spiritus unquam fuisse in usum tractos: * Tragea granorum Actes WOLFF, a Parifinis fub fpecie & nomine Trochiscorum affervatur, qui, æque ac Nostrates, nucem moschatam omiserunt, earum rationem minorem, quam WOLFF, Wurtemb. præcipiunt, fed ab hac nuce ejus vires, ob quas contra fluxus alvi commendatur, præcipue videntur pendere : * Unguentum Sambucinum Noftrat. ad ambufta laudatur.

* SAPONARIA: hanc vocem a denominatione germanica Seiffenkraut furrexisse, testatur TRAGUS, Radices & Folia officinis relinquit.

Radices calamo anferino craffiores funt, fibrofæ, fub cuticula flavescente carnem albam condunt, sapore dulci gaudent.

Folia funt ovato-oblonga, viridia, nullo neque odore, neque fapore inftructa, aqua cum eis cocta faporem leviffime falinum acquirit, plane non amarum.

SAPONARIA. Corollam regularem pentapetalam habet, calice quinquefido fuftentatam, diplofantheram, digynam, capfulam unilocularem, polyfpermam: Officinalis L. BLACWELL 113. calice cylindraceo & foliis ovato-lanceolatis diftinguitur.

In omni Europa, præter magis Septentrionalem occurrit.

Radices Extracti aquofi $\frac{1}{16}$, fpirituofi $\frac{5}{16}$, quod utrumque dulce est, largiuntur. NEUMANN; Extracti aquofi acris $\frac{2}{5}$, spirituosi etiam fortius linguam ferientis $\frac{1}{7}$ circiter. CARTHEUSER. TRAGUS monachos mendicantes hac planta, loco faponis, uti afferit; folia cum aqua agitata ipfi aliquid vifciduli videntur impertire, &, quia aliqualem fpumam formant, non contemnenda effe in lue venerea, STAHL afferit, quod autem Idem radicem falfaparillæ prætulerit, vix credo NEUMANN.

SARCOCOLLA vid. Emollientia.

* SAXIFRAGA, Steinbrech. Radices in usum veniunt feu exigui bulbilli, qui fub involucro rufo, pilofo, paucifiimum carnis albæ, infipidæ & inodoræ continent.

SAXIFRAGA. Corolla gaudet pentapetala, regulari, calice quinquefido fuftentata, diplofanthera, digyna, capfula biroftri, polyfperma: Granulata L. BLACWELL 56. foliis caulinis reniformibus, & radice granulata diftinguitur.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Diversifimæ plantæ Saxifragarum nomine venerunt apud Veteres & Auctores feculorum fuperiorum, mox enim tales, quæ inter medios lapides crefcunt, mox tales, quæ calculum veficæ imminuere credebantur hac voce indigitabant; vel hodie adhuc Parifini *Peucedanum Silaum L. Gypfophylam Saxifragam L.* ad hunc titulum referunt. Omnes effectus, qui ab eis, quas defcripfi, radicibus promittitur, cum unice nitatur earum cum lapidibus fimilitudine, hinc jure eviluerunt.

* SCROPHULARIA Barbar. Kropf oder Braunwurzel. Ejus Radix tuberofa eft, extus gryfea, multis tuberculis obfeffa, odore caret, faporem dulcem habet, cui aliquid leviffime acris & amari accedit.

SCROPHULARIA. Corolla urceolata irregulariter quinquefida gaudet, lacinia infima reflexa, calice bilabiato fuftentata, capfula biloculari, polypyrena: Nodofa L. BLACWELL 87. folia cordata habet, caulem acutangulum & flores racemofos.

Crefcit in omni Europa.

Extracti aquofi $\frac{1}{16}$, fpirituofi $\frac{1}{2}$, quod utrumque dulce fuit, NEUMANN obtinuit: Extracti aquofi $\frac{1}{4}$ amaricantis, fpirituofi amarioris totidem CAR-THEUSER.

Ad fcrophulas facere dicitur, fed nullam fidam, quæ hanc virtutem probat reperio obfervationem, hinc valde metuo, ne illa ipfi ex fignatura adfcripta fit; æque ac quod contra hæmorrhoides faciat, ut ab HEUS, RIEDLIN &c. obfervationibus probare contendunt.

* Emplastrum de Scrophularia Wurtemb. ad ulcera fordida conducere dicitur.

* SEMPERVIVUM, A'Zwov, Joubarbe, Hauswurzel. Inde vulgo in ufum trahuntur Folia ex ovatis-oblonga, craffa, ciliata, hinc convexa, inde concava, fucco aquofo infipido inftructa, cui aliquid acerbi accedit.

SEMPERVIVUM. Corolla polypetala gaudet, calice inultifido fuftentata, ifanthera & capfulis pluribus: Tectorum L. BLACWELL 366. folia glabra habet & quæ rofulam ad terram faciunt.

Crefcit per omnem Europam.

Primus BURCKHARDT annotavit, fuccum Sempervivi cum alcohole in coagulum abire, idem CAR-THEUSER confirmat, qui eundem quoque ab utroque alcali, neutiquam autem ab acidis, cogi vidit.

Saponaceas, & hinc refolventes & detergentes vires habet, fed aufteriufculo, quo gaudet, principio, repellentem quoque virtutem exferit, hinc a GALENO extus ad eryfipelas & phlegmonem laudatur, RHO-DIUS clavum palpebræ inde curatum vidit, nubeculam oculis obverfantem *Vratislavienfes*, dolores ab hæmorrhoidibus cæcis excitatos, fopitos, & maculas faciei lenticulares abfterfas Cl. Scopoli obfervavit. Ruricolæ noftrates fuccum ex Sempervivo expressium febricitantibus propinant; folia clavis pedum impo-

580

nere, & ita eos extirpare, inter noftrates est receptum. Omnis plantæ vis cum a succo pendeat, & ea per omnem annum vigeat, hinc neutiquam exsiecata affervanda est.

* Syrupus Wurtemb.

Reliquæ Sedi & Sempervivi species ad hanc, ratione virium, accedunt, quædam etiam evidentiore acrimonia pollent.

* SENECKA RADIX Rec. Fibrofa est, digito minore, tam longitudine, quam craffitie cedit, ex capite craffiore plures fibras emittit, parum nodofas, sub cortice craffiore, sive fusco, sive ex cinereo flavo, medullam albam includit, odore nullo, sapore acri inter pimpinellam & pyrethrum medio gaudet.

POLIGALA. Corollam habet five tetra-five polypetalam, irregularem calice triphyllo fuftentatam, octo antheras, ftylum unicum, capfulam bilocularem: Senega L. floribus tetrapetalis, caule herbaceo fimpliciffimo, foliis lato-lanceolatis gaudet,

Crefcit in Virginia, Penfylvania, Marilandia.

Extracti aquofi valde acris $\frac{3}{8}$, refinofi mitis $\frac{1}{75}$ exhibet Cl. BURCKARD, CARTHEUSER illius $\frac{1}{6}$, hujus $\frac{1}{4}$ adducit.

Primus TENENT hujus radicis notitiam nobis dedit in tractatu anno 1736 edito: eandem ad ictum ferpentis crotalophori certum remedium effe Americani a longo retro tempore compertum habuerunt; & ex eo quod hic ictus homines peripneumonia perimat, radicem Seneoka quacunque ratione inflammatis pulmonibus medelam allaturam effe, fufpicarunt Mediei, nec eorum fpem vanam fuiffe TENENT, GRONO-WIUS, LEMERY, JUSSIEU, BOUVART experientiæ probant, fed eandem radicem etiam alias humorum fpiffitudines, præter phlogifticam, attenuare, BOU-VART obfervationibus patet, qui inde anafarcas curatas vidit, valide quoque urinam duci expertus eft. GRONOVIUS præterea ejus vires ad rheumatifmos, arthritides & febres intermittentes æque ac lentas celebrat. Optime ejus uncia una cum aquæ libris duabus ad remanentiam unius libræ coquitur, & fingulis horis unum decocti cochlear exhibetur.

Polygalas nostrates, ratione virium ad radices Senecka accedere primus Perillustris DU HAMEL evicit, & recentifima experimenta probant.

* VICTORIALIS Barb. Allermanns-Harnisch, Siegwurzel. Rotunda & Longa in officinis prostat.

Rotunda figuram fuperne contractam habet, fub involucro gryfeo, reticulari, fibrofo, bulbillos duos includit, concretos, quorum alter alteri infidet, inferior minor orbiculatus eft, utrinque compressus, alter ventricofus, uterque albus, in exficcatis fapor levisfime dulcis obtinet.

GLADIOLUS. Corollam habet hexapetalam, irregularem, spatha bivalvi sustentiatam, triantheram, monogynam, capsulam trigonam, trilocularem, polyspermam: Communis L. soliis ensisormibus & sloribus distantibus distinguitur.

Crefcit in Europa Meridionali, occurrit adhuc in Helvetia.

Longa ad quatuor pollicum magnitudinem accedit, oblonga est, superne parum contracta, sub reticulo priori simili, caulis rudimenta educit, nec bulbillos, neque saporem aut odorem alliaceum in exsiccata reperio.

Allium Victorialis L. BLACWELL 544. foliis caulinis latis, lanceolatis, staminibus simplicibus, umbella nuda distinguitur.

In Aquitania, Helvetia, Alfatia, Palatinatu, Auftria crefcit.

Reticula harum radicum tanquam thoracem confiderat fuperstitiofum vulgus, hinc eis fese contra vulnera immunes reddi posse, & alia adhuc miracula

582

expectant, quibus ingenium fatis imbecille eft, ut ad magiam confugiant.

VINCETOXICUM Barb. Hirundinaria Barb. Dompte-Venin, Schwalbenwurzel. Radices recipimus, quæ magnæ funt, ex uno capite plurimas tenues fibrillas emittunt, longas, multum flexiles & varie contortas, albas, odore evidente, fapore acriuículo & leviter amaro inftructas.

Asclepias. Corollam habet monopetalam, calice quinquefido fuftentatam, ifantheram, digynam, nectaria quinque, operculo tecta, folliculos duos longos, femina pappofa includentes: Vincetoxicum L. BLACWELL 96. foliis cordato-ovatis, planis, glabris, & caule erecto diftinguitur.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem, Angliam & Belgium.

Extracti aquofi $\frac{1}{7}$, spirituofi $\frac{1}{4}$ NEUMANN obtinuit, utrumque dulciusculum & suave esse affeverat, aquosum etiam præssi statistica magis statistica esse aquosum etiam præssi statistica magis statistica esse and statistica essential essentia

Odor æque ac fapor harum radicum efficaciam declarant, nec illas humores attenuare, folida ftimulare, obstructa referare, excretiones aquosas promovere dubitamus: DüRR plures hydropicos harum radicum usu curavit, & scrophulas iis fanatas ELS-NER vidit.

* Extractum SCHROED. * Esfentia Wurtemb.

β) ANIMALIA.

MEL, Mix, Miel, Honig. Est substantia, quæ mediam inter solidam & fluidam consistentiam habet, colore sive albo sive badio gaudet, sapore dulci, odore proprio, cui interdum alius a vegetabilibus, unde furrexit, solet accedere. Album, & quod ex granis quasi compositum esse videtur, reliquis præfertur.

Colligitur Mel ab Ape Mellifica L. ex nectariis varii generis florum, quorum fuccum dulcem probofcide fugit, primo ventriculo condit, inde evomit & partim pro nutritione adhibet, partim in favorum cellulas deponit, ut gens per illam anni partem, quæ nullos flores excludit, penum habeat, quo vitam fuftentet: hoc ipfum mel, favos diffringendo colligimus, id quod fponte deftillat Virgineum dicunt, & optimum eft, fequitur illud, quod ex favis torculari fubjectis exprimunt, femper cera inquinatum, & cum illud hac ratione eliquantes nunquam non favos prius aqua confpergant & igni exponant, hinc omnino alteratum reputandum eft.

Licet omnino confectum fit, Mel eo præftantius furgere, quo præftantiores funt flores, unde ab apibus hauritur, & hinc Narbonenfe albiffimum & Rorem marinum fapiens ad vicum Courbiere, qui tribus horis a Narbona diftat, collectum plurimi fiat, hodie tamen non ulterius obfervatur, quod venenatum quoque Mel ex virulentis plantis ab apibus hauriatur; quæ de talibus mellis generibus venenatis tradunt, non obfervatione, fed mera hypothefi nituntur.

Ubi Veteres mel adhibebant, Recentiores faccharum recipere folent, cum quo etiam omni omnino dote convenit, virtutes, cum ejus hiftoriam delineavimus, jam dictæ fuerunt, id tantum hic noto, quod faccharum variis depurationibus, quas, antequam in ufum trahatur, fubit, multa mucilagine, a qua tamen & demulcens & faponacea virtus pendet, privetur, & ideo pro medicato fcopo, Mel, faccharo præferendum effe videatur.

Mel nutrire, alvum ducere & abstergere GALE-NUS monet, HIPPOCRATES illud etiam extus abstergendi ergo commendavit. Extus ad digerendos &

ATTENUANTIA.

aperiendos absceffus egregie facit, coctione inspissatum, forma suppositorii, ano immittitur.

* Aqua Mellis HIERONYM. vix aliquid proprii videtur habere, nec cur incrementum capillorum promovere dicatur perfpicio: * Aqua Mellis odorata Regia Parif. omnem gratiam debet fuaveolentibus, a quibus spiritus vini abstrahitur, neutiquam melli : * Mel despumatum, Veteribus jam ulitatum medicamentum, cum Mel coctione multum gratia perdat, nec bonum mel depuratione opus habeat, hinc eviluita * Hydromel GALENUS Melicraton HIPPOCR. Aqua mulfa Melli 2 aquæ adjicit, Parifini 22plum; Wurtembergenfes 1 2plum, femper ufus modo tempore parandum : * Hydromel vinofum vid. Inft. Chem. * Oxymel fimplex GALEN. præftantiffimum medicamentum, in omni fpiffitudine humorum, præprimis in phlogiftica, aqua di-Jutum, largis haustibus bibenslum : * Spiritus Mellis præ aliis fpiritibus acidis empyreumaticis nil proprii habet.

SANGUIS HIRCI vid. Ovis.

SPONGIÆ, σπόγγοι, σπογγιαί, Eponges, Schwämme. Sunt fubftantiæ fibrofæ, multis foraminulis inftructæ, variæ magnitudinis, hæc foramina funt orificia canalium, qui liquorem, cui fpongia immittitur, hauriunt, & ipfam intumefcere faciunt, colore gaudent fpongiæ fufco, plus minus diluto, odor illis proprius eft, minus gratus & fapor nullus.

Quo molliores funt, quo minoribus poris, quo diluto magis colore gaudent, eo reputantur meliores, & tales Baadschwämme folent dicere, majoribus foraminibus pertuse, minus sequaces Rosschwämme appellantur, & harum minora frusta Fragmenta Spongiarum.

SPONGIA. Vermis gelatinofus est, textura cellulosa, cavernosa, fibrosa vestitus : Officinalis L. habitu molli, tenaci, plus minus lobato distinguitur.

In Mari Mediterraneo & Rubro copiofe occurrit.

Deftillatione largam quantitatem alcali volatilis fundit, in cinerem redacta, multum alcali foffilis largitur LEWIS: Extracti aquofi falini, fpongias redolentis $\frac{1}{8}$, fpirituofi etiam falini $\frac{1}{48}$ exhibuit NEU-MANN, qui etiam obfervavit, aquam ab ea abftractam odoram effe, eamque ab omnibus acidis diffolvi.

Ad fuffitus uterinos ab HIFPOCRATE adhibebantur fpongiæ; partibus vulneratis, ut fiftatur hæmorrhagia, applicantur, & tunc in modum agarici aut boviftæ agunt, hunc in finem quoque a GALENO laudantur, qui eafdem combuftas acres effe dicit. & digerendi facultate præditas, id quod etiam ex earum analyfi facile elucefcit. Primus ARNOLDUS DE VILLA NOVA eas intus contra ftrumas dedit, & hic omnino magni ufus effe, copiofiffimæ obfervationes omni die confirmant, num id ratione, alcali foffilis, quo fcatent, præftent, num fpecifice agant, ulteriora experimenta docebunt.

Dofis eft ad fcrupulos duos.

Spongiarum Lapidum nomine affervantur Lithophyta, diffractu facilia, afpera, quæ evidentia indicia præ fe ferunt, quod aliis corporibus adnata fuerint, non paucis variæ adhuc quifquiliæ adhærent, aliorum una facies concava eft, odore maris nares feriunt, cum acidis evidenter effervefcunt, & indolem calcaream produnt.

CELLEPORA. Lithophytum foraminulis urceolatis fubmembranaceis Spongites L. lamellis fimplicibus undulato turbinatis, cumulatis; cellulis foriatis: offulo marginato. Maris Mediterranei civis.

Ab his lapidibus calculum renalem diffolvi, quis credet GALENO? hodie, ufti fpongiis admifcentur, pro curandis ftrumis.

Pulvis strumalis ARNOLDI DE VILLA NOVA. Ab Augustanis correctus hodie prostat, omnino ulterius

ATTENUANTIA.

corrigendus. Datur ad drachmam unam, quæ circa ejus ufum ad phafes lunæ adcommodandum VILLA-NOVANUS præcipit, prudentes negligunt, nec cogunt ægrotantes eundem ficcum deglutire, ex eo Noftrates *Tabulas ftrumales* parant, in quibus vires ejus nimia facchari ratione fuffocantur: *Spongia præparata* Parif. egregium medicamentum ad dilatanda vulnerum & ulcerum orificia.

2. FOSSILIA.

Occurrit vulgo partibus terreftribus inquinatum, & Minera Antimonii dicitur, hæc five non radiata apparet, Solida WALLER, five radiis aut ftriis longitudinalibus percurfa, Stibium striatum L. feu in cryftallos efformata, Stibium crystallisatum L. feu in tenera fila efformatur, Minera Antimonii plumosa WALLER. eadem interdum aliquid arfenici recipit, & Stibium Rubrum L. conftituit, interdum flavum, interdum cæruleum colorem induit.

Occurrunt hæ glebæ paffim per Europam, Hungaricæ plerumque reliquis puriores funt, & magis nitent, quia Aurum vehere creduntur, ideo ab Alchemicis reliquis præferuntur.

Eliquatur Antimonium e fua minera ratione fimpliciffima, a CRAMER egregie defcripta, quod vulgo prostat, creberrime figuram conoideam habet. Cum nondum plane liqueat, num Veterum chapit, fit nostrum Antimonium, hinc de ejus apud Veteres usu nihil audeo decidere. Primus BASILIUS VALEN-

TINUS noftrum foffile ad usus medicatos fumfit. fed præparata modo ex eo adhibuit, crudum venenum effe pronuntians, omnis etiam Alchemicorum fecta, Chemiæ ope, nonnifi varia ratione tractatum Antimonium ad morbos laudavit, fed ipfis his præparationibus cum regulinam maxime partem, omnino virulentam acceperint, & hinc medicamenta ex Antimonio parata drafticas vires ediderint, ideo plurimi Medicorum, qui superioribus seculis floruerunt, id effe venenum, ex pharmacopoliis rejiciendum, statuerunt, & Parlamentum Parisinum anno 1566. publico Edicto ejus usum prohibuit, anno 1666 demum novo Edicto eundem iterum permisit. Inter primos KUNCKEL Antimonii crudi usum internum commendat, & aliquot observationes refert de graviffimis morbis arthriticis & rheumaticis eo curatis . has propriis experimentis dein confirmarunt PAULI-NUS, HOFFMANN, FURSTENAU & HEISSENIUS &c. ultimi etiam atrophiam & affectus epilepticos ejus usu curatos, adducunt. Pecudes, & porcos maxime, Antimonii ope faginari & a lepra curari, BASILIUS VALENTINUS & Philosophical Transactions moment, homines quoque inde pinguescere, apud PAULINUM memoratur, nec non luem veneream fuisse curatam, febrem quartanam pertinacem, aqua cum eodem decocta fugatam, de MURALTO refert. Qua ratione Antimonium ad fecundas vias poffit pervenire, me ignorare fateor, nec tamen audeo in dubium vocare observationes, ab Auctoribus gravifimis adductas, illud crebro ad drachmam unam, fine ullo incommodo fuisse usurpatum, vidi, sed vidi etiam, quod hominibus, quorum primæ viæ fordes habuerunt, cardialgiam & naufeam excitaverit, non male iph medicamentum abforbens adjicitur, ut acidum, in primis viis obtinens, infringatur.

Æthiops Antimonialis ELLER non male Æthiopi

minerali videtur anteponi: * Antihecticum POTER. Antimonium Diaphoreticum seu Diaphoreticum mine-" rale Parif. * Bezoard, minerale; Butyrum Antimonii, Chermes minerale: Cinabaris Antimonii : * Crocus Metallorum vid. Inft. Chem. * Decoctum Antivenereum laxans Parif. in nimis parca quantitate laxantia videtur recipere : * Diaphoreticum Martiale : * Flores Antimonii HELMONT. validiffimum emeticum, quod vix ad duo grana exhibere licet: * Flores Antimonii nivei & splendentes BASIL. VALENT. * Flores Antimonii rubri Ejuspem, hi non adeo fimplici ratione, qualis in Codice Parifino indicatur, obtineri poffunt, omnes cum unice a Regulo efformentur, multum drastici funt: * Hepar Antimonii: * Materia perlata: Mercurius Vita: vid. Inft. Chem. * Morful. Antimoniales KUNCKEL debent 1/2 Antimonii vehere, Auctor jubet eorum quatuor scrupulos ter de die assumere: Nitrum Antimoniatum vid. Inft. Chem * Panacea Antimonialis LEMERY validum drafticum, quod ad octo & viginti guttas exhibetur : * Regulus Antimonii : * Regulus Martialis: * Regulus Medicinalis: Sulphur auratum Antimonii vid. Instit. Chem. * Syrupus Emeticus seu Oxysaccharum vomitivum contra Pestem AN-GELI SALÆ: Syrupus Emeticus ZWOELFFER, uterque ad drachmas fex ufque præscribitur, prudentius dosis partitim per intervalla adhibetur, usque dum, quem intendimus, effectus obtineatur: Tartarus Emeticus: Tinctura Antimonii acris: Tinctura Antimonii Tartarisata: Tinctura Metallorum seu Lilium PARACELSI Parif. * Vitrum Antimonii: * Vitrum Antimonii Ceratum vid. Inft. Chem. * Vinum Emeticum LEMERY five Aqua benedicta RULAND. ad Vini libras duas Croci Metallorum uncias quatuor recipere Parifini fuadent, LE-MERY monet, non minores effe medicamenti vires ad quod unica modo uncia Croci metallorum recipitur; datur ad unciam unam pro dofi, quam quoque per vices exhibere fuaderem.

CINNABARIS vid. Mercurius.

MERCURIUS Barb. Sogagovo, Argentum vivum, Queckfilber. Est substantia suida, soli auro & platinæ gravitate cedens, calore etiam minore, quam quo aqua ebullit, volatilis, frigore valde intenso in consistentiam solidam abiens, solo calore in pulverem rubrum fatiscens, plurima corpora metallica dissolvens, ab omnibus falibus solvenda.

Occurrit five fub forma nativa Virgineus Auctorum, five ope fulphuris in formam mineræ redactus, hæc minera, pro varia ratione fulphuris ad mercurium, & pro varia terræ, cui inhæret ratione, five fimpliciter Mineræ Mercurii nomine venit, five Cinnabaris, quando nempe pulcherrima rubedine tincta eft & nulla terra inquinata.

In Suecia, Hifpania, Hungaria, Auftria, Hydria, in Foro Julio & Afia occurrit.

Hydrargyrum, cujus fuperficiem cuticula tegit, aut cujus globuli non liberrime fluunt, fed divifi caudam quafi trahunt, inquinatum eft; multæ licet illud depurandi laudentur rationes, quarum etiam plures non raro fuccedunt, optima tamen femper eft deftillatio, nec aliud ad ufus medicatos debet recipi, nifi quod prius ex retorta in vas recipiens fuit pulfum. Celerrime probitas hydrargyri tentatur, dum illud in cochleari ferreo carbonibus ignitis exponitur, fincerum enim totum in auras abit, & quicquid peregrini habuit, in cochleari relinquit.

Hydrargyrum vix non omnis Antiquitas venenis annumeravit, folus GALENUS fatetur, fe nullum cum eodem experimentum inftituisse, unde fibi de ejus virulentia constaret: inter Arabes demum ejus usus externus obtinuit, & feculo XVI intus usurpari cœpit, ut in Dissertatione de Hydrargyri praparatorum

590

internorum usu, comite Cl. EHRMANN defensa, fuit probatum.

De effectibus ejus medicatis acturus, primum eos, quos in primas vias edit, notabo, dein, quid ad fecundas vias delatum præftet, recenfebo. Mercurius, fi vivus deglutitur, totum canalem inteftinalem permeat, & talis, qualis ore affumtus fuit, ex ano elabitur, id quod AVICENNA jam annotavit & innumeris dehinc observationibus constat, eundem, suo pondere canalem intestinalem emetientem, tenacisfimas fæces expulisse, intus susceptiones aut alia intestinorum obstacula folvisse, gravissimos ileos & vomitus curaffe, ZWINGER, BUCHNER, RAU & præprimis Ill. DE HAEN observationibus probant, dum autem hoc fcopo exhibetur, ad tres & plures uncias pro dofi erit propinandus; nec dubito, quin hac ratione affumtus, etiam anthelminthicos effectus edere queat, licet eum pro hoc fcopo confultius, varia ratione præparatum, exhiberi putem. Quando autem Hydrargyrum in secundas vias recipitur, tunc fummos edit effectus refolventes, in minimos enim globulos dividendum minima etiam vafa fubit, ad quæ vix aliud. medicamentum penetrare valet, & ibi nata obstacula removet, præterea vi cordis & arteriarum cum humoribus agitatum, in illos eo validius impellitur, quo ipfum illis multo majore denfitate gaudet, quippe quæ fanguinem tredecies fuperat, observante Mu-SCHENBROECK, eos attenuat, modo evidenter mechanico, visciditatem tollit, imo fi ejus ratio modum excedit, ipfa etiam naturalis crafis humorum laxatur, qui tum vasa minora subeunt, & ex eis elabuntur, creberrime quidem ex vasis oris & faucium, unde Ptyalismus, non raro etiam per vasa intestinorum. Hæc agendi ratio Mercurii, inter eas que hactenus traditæ funt, maxima veri specie gaudet, licet non inficias eam, quod fuis omnino adhuc prematur diffi-

cultatibus, interim quocunque modo agat, id tamen certum est, quod eodem valentius medicamentum refolvens non habeamus, hinc in omni spissitudine cum summo successu exhibetur, si phlogisticam excipimus, cum calor excedens & fibræ per morbum tenfæ, medicamentum frictionem intendens non admittant. Ejus egregias vires ad morbos, qui offium fubstantiam afficiunt, MARTYN, SCHREIBER, BUCH-NER & NIEMANN adducunt, præftantiam ad ulcerum cacoëtheorum curam, longe plurimi medentium viderunt, inter quos VALLISNERIUM, TREW, AL-BERTI & HAVIGHORST fufficiat allegaffe, cancrum eo curatum Ill. SANCHEZ, Nova litteraria Maris Balthici, BORRICHIUS evincunt, quanti usus ad morbos oculorum, fuffusionem, cœcitatem sit, PE-TRONII, RHODII, BOYLE, BORRICHII, WEST-PHAL &c. fide conftat, præftantiffimum ad rheumaticos & arthriticos morbos medicamentum WEDEL. Löw, HUXHAM funt experti, ejus præstantia ad omne genus febrium ex WILLIS, BALLONIO, BOR-RICHIO, BENVENUTO, HUXHAM, MOREALI patet, WILLIS paralyfin eo curatam vidit, tumorem ftrumofum CLAUNIG, plurimum ad curandas variolas facere BOUCHART, GRASSIUS, Acta Medic. Berol. HUXHAM, SPIES, CATANEUS, GALE &c. probant; cum evidenti fuccessu contra hydropem adhibitum ERNIUS, DECKERS, SIMSON referent, fcorbutici curati apud WILLIS & LENTILIUM occurrunt, eximios ejus effectus in morbis capitis & encephali viderunt BERNITZ, ACOLUTHUS, BUDÆUS, ROL-FINCK, RIEDLIN, in diffolvendis calculis renum & veficæ MEAD, ad hydrophobiam curandam conducere, Cl. HAGG multis observationibus probavit, Mercurium denique præcipuum, fi non unicum morborum venereorum remedium effe, fida quatuor retro feculorum experientia probavit, & innumerorum Auctorum rum testimoniis constat, quæ, si hic vellem adducere, vix non omnes, qui de siphylitide scripferunt, Medentes essent allegandi.

Sed idem egregium medicamentum graviffima quoque mala excitat, quando minus prudenter exhibetur, vel ipfam nativam humorum noftrorum crafin diffolvit, vel tenerrimas in cellulas involucrorum, quæ medullam nervorum cingunt, aut in cellulas offium effusum, graviffimos nervorum & offium morbos producit; quantæ noxæ ex ptyalismo surrexerint, variis observatorum locis, in Dissertatione supra citata evictum eft, & evicerunt ingenui Auctores, qui contra perniciofam hanc medendi methodum, maximo ægrotantium damno nimis diu ulitatam, infurrexerunt, inter frequentes observationes de graviffimis morbis nervorum & offium, a mercurio, ipfis inhærente, excitatis, vel FERNELIUM modo, BORRI-CHIUM, RAMAZINUM, HOFFMANN, THILEMANN, LENTILIUM allegaffe fufficiat.

Quot rationibus Mercurius adaptari possit, ut fanguinem subeat, per principia Chemiæliquet, & in Dissertatione citata suit explicatum.

De Cinnabari, unváßagi, quæ Minii nomine apud Veteres veniebat, quod vix ad fanguinem venire poffit, in Instit. Chem. monui, eadem nunquam, nisi prius sublimatione depurata suerit, intus danda est, cum soffilibus creberrime heterogenea soleant accrescere.

Aethiops Antimonialis: Aethiops mineralis pro variis difpenfatoriis, variam mercurii ad fulphur rationem recipit: * Aqua Grysea GOHL est folutio mercurii in acido nitri, trigecuplo decocti traumatici diluta, tanquam mitius septicum ad ulcera phagedænica recipitur: * Aqua Mercurialis Wurtemberg. ad effectus cutaneos laudatur, sed ejus usus sumam prudentiam exigit: Aqua Phagedanica CHARAS.

Pp

Optime ex tempore a Chirurgis paratur, & recipitur ea mercurii sublimati ratio, quam indicatio exigit : * Arcanum Corallinum: Cinnabaris factitia: Cinnabaris Antimonii vid. Inft. Chemia : * Emplastrum Mercuriale Wurtemb. eafdem vires cum Emplastro de Ranis cum Mercurio habet, quod videatur fub Ranis: * Mercurius liquidus vel Aqua Mercurialis Parif. eft folutio mercurii in acido Nitri, trigecuplo aquæ diluta, datur ad guttas quindecim & ultra : Mercurius præcipitatus albus : flavus seu Turpetum minerale : per se vid. Inft. Chem. * Mercurius precipitatus viridis BEGUIN, ob æs, quød habet, nunquam in ufum trahendus : * Mercurius præcipitatus ruber : Mercurius sublimato corrosivus : Mercurius sublimatus dulcis vid. Instit Chem. * Mercurius violaceus Parif. Est cinnabaris factitia ob majorem, quam habet, fulphuris rationem nigrefcens : * Opiata Mesenterica Parif. non placet : Panacea Mercurialis vid. Instit. Chem. * Pastilli Mercuriales Parif. optimis ægrotantium rebus, omnes suffitus mercuriales eviluerunt : Pillula Mercuriales, BELLOSTE pillulis, in quibus mercurius vivus, variis purgantibus mixtus, obtinet, magnam famam conciliavit, plures tales compositiones paffim proftant, Parifinæ $\frac{3}{10}$ diagrydii, $\frac{1}{7}$ refinæ jalappæ, 3 mercurii vehunt, Nostrates diagrydii, mercurii, pulveris Jalappæ & trochifcorum alhandal de singulis : habent : Pillulas mercuriales e Mercurio dulci præcedentibus Germani fubstituerunt : * Rotulæ contra vermes ZWOELFFER correctæ, ad lumbricos dantur cum fucceifu : * Saccharum Vermifugum Parif. seu Mercurius saccharatus Edinburg. bonum omnino medicamentum, quod non folum ad vermes, fed etiam in aliis morbis, ubi mercurius indicatur, poteft exhiberi : * Trochisci Anthelmintici sive Hermetici SCRETE non fine fucceffu ad enecandos & ejiciendos vermes adhibentur, trochifcus continet mercurii dulcis

grana circiter quatuor, & diagrydii granum unum : * Trochifci Escharotici Parif. valde rodentes : * Trochisci Escharotici cum minio LEMERY; correctos Parifini recipiunt, prioribus multo mitiores : * Unguentum Mercuriale citrinum ad scabiem Parif. * Unguentum Mundificans STAHL vid. Plumbum : Unguentum Neapolitanum THEODORIC. Parifini axungiæ porcinæ æquas partes mercurii admifcent; idem, dum mercurium, terebinthina extinctum, axungiæ porcinæ adjiciunt, medicamentum formant, quod Unguentum gry feum mercuriale appellant, hoc ipfum est Unguentum Neapolitanum Nostratium & Wurtembergensium, formula Parifina 1/9, Wurtembergenfis 1/4, Noftra 1/8 Mercurii recepit; cum hodie prudentius, quam olim, Mercurius administretur, hoc ad frictiones in fiphyliticis inftituendas præfertur priori, ad pediculos fugandos quoque & ad curandam scabiem adhibetur : observavit Cl. BEAUMÉ, mercurium facere, ut axungia citius rancescat : Unguentum Pediculorum August. præter mercurium etiam varia acria recipit : * Unguentum ad Scabiem Wurtemb. non auderem medicamentum faturninum ad morbos cutañeos adhibere: * Unguentum ad Scabiem ZELLER non contemnendum.

CAP. VII.

INCRASSANTIA.

\$. 48.

Nimiæ tenuitati humorum Veteres per Inaxorlina, Incrassantia, obviam ire tentarunt, referebant eo Gummata, quæ pro ratione, qua aquam subeunt, eam viscidiorem, & hinc magis spissam reddunt, cum autem facile pateat, in magno illo, quod vasa nostra vehunt, humorum volumine, talem inspissationem locum habere non poffe, quæ, fi etiam obtineri poffet, non nativa, fed omnino morbofa effet; tenuitas quoque præternaturalis non aliter, quam ejus caufas tollendo poffit curari, hinc titulum hunc non male ex Therapia expungi poffe, evidens effe duco; nec a vi acidorum foffilium, qua liquores ferofos denfant, unde *Coagulantia* dicuntur, aliquid, quod huc faciat expecto, cum nunquam nifi valde diluta, quo ipfo ad hunc effectum ineptiora redduntur, intus ea dare liceat, fpiffitudo quoque, quæ inde induceretur, femper præternaturalis effet.

CAP. VIII.

ABSORBENTIA.

5. 49.

Medicamenta, quæ acrimoniam acidam corrigunt. Avanivovra, Absorbentia dicuntur, pertinere huc omnia alcalia, nec tyro Chemiæ ignorat. Pathologia acida. fub initium fuperioris Seculi ab HELMONTIO efficta. a TACHENIO diducta, a Medicis, qui Cartesium fecuti sunt, sustentata, a SYLVIO per Belgium, a BONTEKOE, WALDSCHMIDT, ETTMÜLLER &c. per Germaniam diffeminata, in caufa fuit, ut hoc medicamentorum genus, tanquam certifimum auxilium ad omnes febrium ordines, & ad omnem fanguinis æstum fuerit commendatum, & licet meliora nunc edocti Medici, falfam de acido, communi febrium caufa, hypothefin repudiaverint, in multis tamen, maxime Germaniæ locis, ad hæc medicamenta mox confugiunt, cum calor præternaturalis ægrotos invadit. Illi quoque Medici, qui febrem fub fermentationis idea fibi stiterunt, nostra medicamenta ad eas curandas multum facere, reputarunt, cum alcalia fermen-

ABSORBENTIA.

tationis progressus inhibere, constet; eadem etiam, Pracipitantia non pauci appellant.

5. 50.

Cum falia alcalia medicamentis incidentibus (§. 46.) adnumerare foleant, ad absorbentia nonnisi terras referunt, de his, si quid etiam in fanguinem irreperit, illud adeo exiguum est, ut de effectu plane desperandum fit, hinc maxime, cum etiam vix acrimonia acida in massa humorum obtinere posse videatur, medicamentorum nunc recenfendorum longe plurima, efficaciam fuam non ultra primas vias extendere & nonnisi ab acrimonta acida in primis viis obtinente indicari, elucefcit; iis autem, cum difficilius iter per canalem inteftinalem emetiantur, vulgo aliquem falem medium adjicere folent. qui præterea effervescentiam ex congressu absorbentis cum acido oriundam moderatur, & incommoda ab aëre impetuosius sub effervescentia secedente metuenda, avertit, Abufus Abforbentium non modo primas vias gravat, dum earum vires in promovendis fubstantiis duris, validius reliftentibus confumuntur, fed eadem quoque muco intestinali irretita, in speciem cæmenti abount, lateribus intestinorum accrescunt, indeazu, graviffimorum morborum caufam producunt, imo docentibus experimentis Illustris PRINGLE & Cl. MACBRIDE putrefactionem promovent; elucefcit hinc, quam perniciofam rationem fequantur, qui illa ægrotis, excedente calore æstuantibus, exhibent,

a. ANIMALIA.

CANCRORUM CHELÆ vid. Nutrientia. CONCHA, 26727, Coquille, Muschel. Hoc nomine in officinis veniunt domus testaceorum, faporis & odo-

Pp 2

ris expertes, cum acidis effervescentes & igne in calcem vivam abeuntes. Sine discrimine ex omni vermium testaceorum genere desumi possiunt, apud nos vulgo eas recipiunt a Mya Pictorum L. testa ovato-oblonga & dente crenulato instructa.

Copiofiffime in fluviis obtinet.

Primus CROLLIUS Conchas, tanquam certiffimum contra febres intermittentes remedium, laudavit, fi earum scrupuli duo instante paroxysmo assumutur, hinc quoque sub Specifici Antifebrilis CROLLII nomine, si in pulverem reductæ suerint, venire folent, præ reliquis absorbentibus nihil proprii habent.

* Concha Citrata Nostrat. conveniunt cum Oculis Cancrorum citratis.

CORALLIA ALBA Z vid. Roborantia specifica.

CORALLINA Barb. Corallen oder Meermoos, Coralline, Moussie marine. Prostant hoc nomine fragmenta ramosa, quorum teneris ramis soliola exigua & tenerrima pinnatim adhærent, colore albo, consistentia friabili, odore nauseoso, marino, sapore falino instructa.

CORALLINA. Stirps geniculata, filiformis, calcarea: Officinalis L. habitu pinnato gaudet.

In Oceano Europæo & Mari Mediterraneo frequens; recens variis coloribus ludit, quos autem in littore, foli & aëri exposita, deponit.

Cl. PALLAS rationibus non levibus Corallinam ordini vegetabilium reftituit, propria experientia deftitutus Ill, LINNÆI & ELLIS auctoritate nitor.

Calcinatione in calcem vivam abit. LEWIS: Extracti aquofi $\frac{1}{4}$ largitur, & cum destillationi subjicitur s spiritum urinosum fundit. NEUMANN. Medio ævo fama de ejus vi anthelmintica debetur, ea, cum nec ratione, nec ulla, quæ fidem meretur, obfervatione evinci queat, præter abforbentes, nullæ aliæ ipfi tribuendæ vires.

* JUDAICUS LAPIS, A/9@ IsSaïnós. Est Lapis albus olivæformis, totus striis longitudinalibus notatus, petiolo instructus, intus substantiam sistit, ex lamellis semipellucidis efformatam, quam ideo seleniticam appellare consueverunt, sed improprie omnino, quia evidenter cum acidis effervescit.

Helmintholithus Judaicus L. Efformatur ab aculeis echinorum in lapidem versis.

Paffim per Europam occurrit.

Ab omni retro tempore calculos diffolvere creditus est, hanc virtutem ad calculum renum GALENUS restringit; jure hodie eviluit.

LUCII PISCIS MANDIBULA vid. Nutrientia.

LYNCIS LAPIS Barb. Belemnites Barb. Alpschoz, Luxstein. Eft Lapis, qui ex basi lata, sensim in verticem angustum terminatur, intus ad aliquam altitudinem cavum conoideum continet, totus substantia splendente, quæ in strias ab axi ad peripheriam tendunt, ordinata est, efformatus, colore gaudet falerno, pro varia varietate magis aut minus diluto differt quoque multum longitudine æque ac crassitie; dum fricatur cornu odorem spirat.

Helmintholithus Belemnites L. Nondum confectum est, a quo animali in lapidem verso efformetur, Alcyonium Lyncurium effe Ill. LINNÆUS contendit.

Crebro per omnem Europam occurrit, vulgatiffimum Alfatiæ petrefactum.

Quidquid de ejus viribus narrant Auctores, five anilibus fabulis debetur, five fignaturæ commentis, five falfæ de ejus ortu opinioni, hinc ejus ufus inter Mediços naturam ac rationem duces fequentes exolevit.

ABSORBENTIA.

PERCARUM LAPIDES vid. Nutrientia. OSTREARUM TESTÆ vid. Nutrientia. OVORUM TESTÆ vid. Nutrientia.

B. FOSSILIA.

CALX, Tirar, Chaux, Kalch. Est substantia terrestris, quæ sive sub forma pulveris, sive lapidis friabilis, sive lapidis duri, qui autem nunquam adeo indurescit, ut chalybe percussus scintillas evomat, occurrit, in acidis cum effervescentia dissolvitur, sola nec maximo igne fundi potest.

Calx fub forma pulveris rimas montium occupans, Lac Lune GESN. Agaricus mineralis EJUSD. Cabe Gur L. in officinas recipitur, non raro pro Farina fossili, cœli donum credita, anonæ caritate in cibum recepta fuit, BRUCKMANN: lapidis friabilis specie occurrens, five partibus mollioribus, non afperis, digitos inquinantibus conftans Cret& nomine, Craie, Kreide, pharmacopolia intrat, magna terræ strata, longas montium catenas efformat, five asperior, figura, asperitate, colore multum varians Tophos, Stalactitas constituit; quæ in lapidem durum concrevit, dum ad eam duritiem pervenit, ut poliri poffit, Marmor dicitur, dum ex lamellis in varias figuras angulares ordinatis formatur, Spatum appellatur, Calcareus demum, dum massas difformes format, quæ non raro integros montes constituunt.

Dum calcarei justo igne uruntur, duritiem perdunt, friabiles fiunt & fimul acquirunt qualitatem, ut quando aqua ipfis affunditur, intenso exæstuent calore, & partes animales, quibus applicantur, in modum ignis destruant, veniunt tunc sub *Calcis viva*, $\tau \tilde{\epsilon} \ A \sigma \beta \epsilon \tau s$ nomine, hæc cum aquam accipit, sive illam ex aëre hauriat, sive illa ipsi affundatur, in pulverem

600

dilabitur & fuam causticitatem perdit, Extincta dicitur. Rationem ortus Calcis vivæ & qualitates ipfi proprias recenfet Chemia. Convenientia Calcarei cum testis conchyliorum, conchylia creberrime in Calcareo reperiunda, observatio DE LA FAILLE, qui in tractu Alnatenfi (pays d'Aunis) ex limo maris & conchyliis, pauco elapfo tempore, lapides furgere vidit, odor gravis fub Calcarei uftione nares feriens, terra calcarea ad Halam evidentifime ex teftis orta, annotante Cl. SCHREBER, vestigia falis marini, observante MEYER, in calcareo occurrentia, observatio de calcareo nunquam in montibus primitivis oriundo, valde probabilem reddunt conjecturam, omnem Calcem ex testis conchyliorum destructis esse ortam & montes calcareos, copiofiffime per orbem occurrentes, furrexisse cum mare a continente recessit & limum & conchylia reliquit, quæ labente tempore in lapidem concreverunt. Quia calcareo, tum sub prima ejus origine, quam per omne, quo formatus erat, tempus varia heterogenea potuerunt accrefcere, hinc, cur ratione coloris, confiftentiæ, bonitatis ad parandam inde calcem vivam differat, elucefcit; partes calcarei aquis abrafæ & tum depofitæ terras calcareas & stalactites constituunt, pro variis heterogeneis, quæ ipfis accreverunt, vario, quem fubierunt, tritu, & hinc oriunda attenuatione, vario colore, varia raritate, vario lævore gaudent.

Lapis Calcareus per fe ad ufus medicatos non recipitur, quæ de propriis Lactis lunæ viribus allegantur, vulgi commentis a fimilitudine ejus coloris cum lacte animali, aut ejufdem credulitati debentur: Calx viva cum aliis mixta, tanquam pfilothrum feu depilatorium adhibetur, intus fi daretur, omnino veneni rodentis effectus ederet, fed peffime id, quod foli calci vivæ, ob caufticitatem, qua pollet, proprium eft, omni calci attribuerunt, etiam illi, quam

Pps

omnis indolis caufticæ expertem effe, omnia loquuntur: Creta contra acrimoniam acidam intus datur, & datur cum fucceffu.

Aqua Calcis Viva, novía, est aqua, quæ ex Calce viva aliquid terræ recepit, quod naturæ falinæ proximum est, MEYER quo nemo majore cura experimenta circa calcem instituit, ad unam partem Calcis quinque & viginti partes aquæ jubet recipi, fed fimul monet, medicamentum earundem plane virium furrecturum, fi vel fexaginta aquæ partes adhiberentur; ALSTON, etiam fi bis centum aquæ partes, uni calcis affunduntur, aquam non debiliorem fieri annotavit, & fimul observavit, calcem vivam per annum quoque affervatam, æque efficacem aquam largiri, quam statim, postquam ex fornace extracta fuit, recepta, hæc aqua nisi in vasis probe clausis affervatur, substantiam, quam ex calce recepit, fub forma cuticularum fenfim. fenfimque in superficiem ascendentium, & dein ad fundum vasis descendentium, dimittit, & omni virtute propria, qua gaudebat, privatur. HIPPOCRATES hanc aquam extus contra vitiliginem commendat, primus BATEUS eam fub nomine Aque benedicte ad usus internos adhibuit, Ill. PRINGLE, Cl. MACBRIDE & Essais pour servir à l'histoire de la Putrefaction eam putredinem arcere experimentis evicerunt; ALSTON tentamina probant, vermes ab ea enecari, & calculum diffolvi, ultimum WHYTT, BARTHOLINUS, LUCAS & WALPOLE quoque confirmarunt: febres rheumaticas ea curatas, gravia a podagra retrograda mala & morbos cutaneos, observationibus quoque ALSTON probat, ultimus effectus etiam MACAULAY experientia confirmatur; viscera exulcerata, DETHARDING, aqua calcis intus affumta, reftituta probat, & MOLI-NARIUS eadem tam epota, quam injecta, ulcus veficæ vidit curatum; GRAINGER, eandem intestinis exulceratis opem afferre, est expertus: GABER denique annotat, fanguinem phlogistice fpissum inde attenuari : eandem itaque optime abstergendi, putredinem arcendi, acrimonias corrigendi, humores resolvendi ergo adhiberi, evidens est : Ejus aliquot libræ de die exhibentur; nec male ipsi lac, aut alia medicamenta, morbo appropriata adjiciuntur.

Extus ad abstergenda ulcera, discutienda œdemata, arcendum sphacelum in usum trahitur.

* Aqua Ophthalmica fapphirina SCHROED. * Collyrium exficcans Parif. ad ophthalmias difcutiendi ergo adhibetur: Aqua Phagedanica vid. Mercurius: * Species Diacreta MYNSICHT. Abfurda omnino compofitio, quam ad fodam maxime adhibere folent, datur ad drachmam dimidiam: * Species Diacreta CAMERA-RII prioribus adhuc lapides cancrorum adjiciunt.

* GYPSUM, rú40, Gyps. Est substantia terrea, quæ igne in pulverem, cum aqua autem in maffam solidam, sine effervescentia abit, ex calce & acido vitriolico composita est, & justa ratione calcinata phosphorescit.

Occurrit I. sub forma terræ Terra gypsea pulverulenta CRONST. II. sub forma lapidis a) cujus partes unum continuum efformant 1) quod polituram admittit Araßasseirns, Alabastrum, Alabaster, hoc ipfum coloribus & pelluciditate multum variat; 2) quod poliri nequit Gypsum argillosum L. ?) particulis micaceis exstructum Gypsum usuale L. ?) particulis fibrosis constans Gypsum striatum CRONST. Stirium L. Alabastrites WALLER. S) lamellas plus minus splendentes referens Selenites MATTHIOL. Lapis specularis PLIN. Glacies Marie AGRICOL. Spatum speculare L.

Omnes omnino Gypfi fpecies, cum neque a menftruis chylopoieticis poffint diffolvi, neque calore primarum viarum refolvi, nullas in corpus noftrum poffunt vires exfequi; fruftra etiam a lapidibus, qui cum acidis non effervescunt, virtus absorbens ex-

* Unguentum Alabastrinum FAVENTIN. ad mitigandos dolores capitis, non video quo jure, commendatur.

* OSTEOCOLLA. KENTMANN. Beinbruch. Hoe nomine veniunt concrementa calcarea, quæ figuram oblongam habent & fuperficiem albam, afperam, Sunt ea five stalactites, vulgari ratione orti, & tales, ut plurimum prostant in officinis, five stipites arborum in terra sterili relicti, labente tempore carie exesi & toti terra calcarea repleti, hi proprie nomen Ofteocollæ fibi vindicant, & multo fabulo turgere folent, observante Cl. GLEDITSCH, eodem tamen etiam comprehenduntur partium cylindracearum vegetabilium incrustationes calcareæ, vegetabili de. structo superstites, annotante Cl. GUETTARD. Ofteocollæ fecundum, quod recenfui, genus paffim in regionibus, ubi vaftiores campi fabulofi obtinent, fub folo fabulofo occurrit, quod folum stipites obruit & aquæ transitum conceffit, ut eos carie excedere, & sceleta terra calcarea potuerit replere.

Patet ex hac Ofteocollæ hiftoria, eam effe calcem, cui fabulum, interdum quoque alia heterogenea accreverunt, id quod etiam Illustris MARGGRAF analysis uberius confirmat.

Primus MATTHIOLUS Ofteocollæ vires ad offa diffracta confolidanda celebrat, prudens ERASTUS vulgi rumoribus fubfcribere dubitavit, ex rationali Medicina, medicamenta offa ferruminantia jam diu profcripta funt, nullæ aliæ itaque, ob quas Ofteocolla laudari poffet, præter abforbentes fuperfunt vires, & cum puriores fubftantias habeamus, quæ id abunde præftant, hinc heterogeneis vix non femper fcatente medicamento jure abftinemus.

EVACUANTIA.

CAP. IX.

EVACUANTIA.

§. 51.

Evacuantia, vadagtura appellamus illa medicamenta, quorum ope five humor inquilinus quantitate excedente peccans, five heterogeneus, morbi caufa, e corpore eliminatur, prior, ut plurimum per Chirurgiam, quæ hujus loci non eft, folet evocari, alter pro varia, qua pollet, indole, aut varia, cui inhæret, parte, varia ratione ejicitur; qui evocatur per aperturas, quas ars facit, denuo huc non pertinet; evacuantia, quæ per organa excretoria corpori nativa agunt, optime pro ratione ipforum emunctoriorum diftinguuntur, horum cum cutis fit maximum, & præ reliquis plura humorum heterogeneorum genera e corpore eliminet, hinc illud primum rimabor, reliqua eo ordine, quo fe in corpore excipiunt, dein tractaturus.

§. 52.

I. SUDORIFERA.

Medicamenta, quæ excretionet cutaneam promovent, Veteribus $I J_{QWTINA} & \Delta I A \varphi O QETINA$ dicebantur: Recentiores illa, quæ transpirationem infensibilem ita modice augent, ut non in sudorem erumpat, Diaphoretica vel Diapnoica solent appellare, Sudorifera autem ea, quæ sudorem exprimunt; hæcipsa, ex quo opinio invaluit, febres malignas a veneno originem sumere, quod per sudorem e corpore expellendum sit, Alexipharmaca quoque & Bezoardica solent dici. Agunt autem, quæ hujus loci sunt medicamenta,

1) motum humorum incitando, & huc præter gymnafticam, & calorem extus applicatum omnia medicamenta calefacientia pertinent, 2) habitum cutis debilitando, quo præter balnea, omnia Emollientia (Cap. III.) cuti applicata, nec non Sopientia (Cap.V.) validiora referenda funt, 3) rationem aquæ in massa humorum augendo, & hoc Attenuantia (Cap. VI.) præstant. Indicantur Arapogerina, 1) ab omni morbo, qui a transpiratione suppressa originem duxit 2) a qualicunque heterogeneo per massam humorum diffuso, 3) a congestione humorum ad viscera, 4) ab humoribus, qui in vasis cutaneis stagnant, 5) a crisi. Sustentatur actio horum medicamentorum, regimine non frigido & largo potu aquæ. Diaphoretica nunquam corpori nocent. Sudor largior vel diæta vel medicamentis expressus femper nocet, mala, quæ inde furgunt, Illustris GAUB graphice delineavit, præ reliquis læduntur, quibus temperies ficca & calida est, aut qui qualicunque humorum spissitudine laborant, debiles, & illi quos febris tenet.

\$. 53.

II. APOPHLEGMATIZANTIA.

Aποφλεγματισμές Veterum, Medici medii ævi Apophlegmatizantia dixerunt, medicamenta nimirum, quæ mucum in folliculis membranæ Schneiderianæ, aut viis aëreis hærentem eliciunt, &, ut vel per os, vel per nares eliminetur, efficiunt: pro varia ratione, qua adhibentur, & varia parte, unde mucum eliciunt, varias denominationes accipiunt, Epima dicuntur illa, quæ naribus excipiuntur, eadem Auctores fuperiorum Seculorum Nafalia, Ptarmica appellarunt; hæc ipfa ore committenda Mafticatoria, Sialogoga, Salivantia audiunt, pituitam in viis refpiratoriis hærentem

evocantia Bezina, Expectorantia vocantur. Agunt Apophlegmatizantia 1) mucum attenuando, huc itaque Attenuantia (Cap. VI.) pertinent 2) membranas relaxando & ita tam copiofiorem muci fecretionem, quam faciliorem ejus ex folliculis fecessum promovendo, præftant hoc Emollientia (Cap. III.) 3) hos ipfos folliculos irritando, id quod præftant Irritantia (Cap. IV.) 4) eofdem concutiendo five per sternutationem, five per folida ore agitata, 5) Hydrargyrum, quod justo majori dofi affumtum, humores in liquamen per vafa falivalia elabens fundit, hujus loci non eft, nec huc pertinet, aquæ in os nauseantium, & eorum, qui in apposita fercula magno appetitu feruntur, affluxus. Indicantur Apophlegmatizantia a muco, aut heterogeneo in membrana Schneideriana aut viis aëris incommoda causantibus, 2) quando congestiones serosa ad caput fiunt, 3) fi rheumatismus in dentibus aut auribus obtinet 4) prophylaxeos fcopo in morbis epidemicis aut contagiofis. Abufus fialogogorum producit mala ab Ill. GAUB recensita, Ptarmica irritantia ob magnas turbas, quas sternutatio in omnibus visceribus excitat, concussiones, quibus cunctos ventres agitat, & inde metuenda mala, apud Illustr. HALLER collecta, rariffime in usum trahuntur, nisi heterogeneum quid in finibus hæret, aut validus cordi suffocato stimulus dandus est.

S. 54.

III. VOMITORIA.

Medicamenta, quæ canalem intestinalem evacuant, Veteres strictiore sensu na Gaguna appellarunt, nec non págmana, & illa additis vocibus aroo vel na ta distinguebant, illa quæ efficiunt, ut contenta ventriculi per os rejiciantur Vomitaria, & Recentiores *Emetica* dixerunt. Surgere vomitum, dum ventriculus multum diftenditur, æque ac dum validiorem a qualicumque ftimulo irritationem patitur, Phyfiologi evincunt; iidem demonstrant, fub vomitu non modo ventriculum per fuas fibras contrahi, fed eundem quoque valide a diaphragmate & musculis abdominalibus comprimi, his itaque motibus respirationem turbari, resluxum humorum ex encephalo morari, vasa vertebralia æque ac arterias carotides & venas jugulares multo fanguine turgere, circulationem intendi, fystema nervosum agitari: hæc præmonenda esse duxi, ut tam indicantia, quam contra indicantia Vomitoriorum, clarius paterent.

5. 55.

Indicantur itaque Vomitoria, tam ab heterogeneis, quæ in ventriculo, aut intestino duodeno obtinent, quam ab humoribus tenacibus in triplici ventre cum difficultate motis, & varium morbi genus efformantibus, hinc magnis Practicis ad ægritudines a vitiata bilis elaboratione oriundas, laudantur, nec non ad pituitofos pectoris morbos; effufum in caput fanguinem inde reforptum BOUDU expertus eft, cæcitatem a presso nervo optico, & aliam a materie tineæ repulfa curatam, GEISLER vidit. Quia vomitus fine valida omnium corporis partium concuffione non potest fieri, hinc plethoricis, morbis inflammatoriis laborantibus aut qui ad illos proni funt, hæmorrhagiis fubjectis, cum fubstantia primarum viarum ulcus habet, aut ulcera viscera depascuntur, debilibus, hypochondriacis aut hystericis, in lipothymiam pronis, male configurato thorace aut cranio inftructis, Vomitoria nunquam, aut faltem nonnisi cum maxima circumspectione funt exhibenda, nec ob auctam inde diaphragmatis & musculorum abdominalium in viscera abdominis preffionem, gravidis, procidentiis aut herniis,

niis laborantibus, aut eis, qui calculum in fystemate biliario aut uropœo habent, ea dare licet; eos quoque, qui nonnisi validioribus nixibus vomunt, & quos ideo dysemetos appellare solent, ipsa Natura ab usu emeticorum excludere videtur; eadem denique etiam exulare debent, cum alvus pertinacius clausa, & hinc motus peristalticus vitiatus est.

\$. 56.

Ad duas claffes optime Emetica referuntur 1) ea, quæ ventriculum, eundem diftendendo, fubvertunt, 2) ea, quæ ventriculum evidenter irritando, ut præter modum naturalem ejus fibræ fe contrahant, efficiunt. Prima claffis aquam, lac, olea unguinofa comprehendit, & in ufum trahitur, quando venena acria ventriculum rodunt, ut ifta, & obtundantur, & fine augmento ftimuli eliminentur: ventriculum irritando, quæ vomere faciunt medicamenta, five mechanice agunt, eo agitatio faucium, ope inftrumenti folidi, pertinet, & excutia ventriculi, quæ exolevit, illam homines, cum naufea valde urget, digitis faucibus immiffis, interdum tentare folent, id quod Medici vix fuadent, five ftimuli phyfici funt, & hi denuo five evidenti, qua pollent, acrimonia agunt, five vi fpecifica.

Vomitoria, quæ irritando agunt, fi exhibentur dofi adeo parca, ut vomitum non excitent, fed ad vias fecundas tranfeant, validos effectus refolventes edunt, & in vario gravifimorum morborum genere cum magno fucceffu dantur.

I. ACRIA (§. 41.)

II. SPECIFICA.

* ASARUM, Asagov, Cabaret, Haselwurzel. Radices & Folia recipiuntur.

Radices ex uno capite, quod parvum est, aliquot fibrillas emittunt, extus subfuscæ sunt, intus albæ, proprio minus grato odore, qui ad Valerianam accedit, & fapore acri gaudent.

Folia reniformia funt, fuperne profunde viridia, inferne tenui lanugine pubefcunt, longis petiolis fustentantur, odore nullo, nec evidente fapore prædita.

ASARUM. Corollam trifidam, duodecim stamina, stylum unum, capsulam sexlocularem habet: Europaum BLACWELL 383. soliis reniformibus obtusis distinguitur.

Crefcit per omnem Europam.

Aqua a radicibus destillata odorata est, odorum quoque Extractum aquosum. SCHEFFLER.

Vi purgante illi, qua Helleborus albus gaudet, pari præditum effe, DIOSCORIDES monet, hujus virtutis non meminit GALENUS, FALLOPIUS lentiffimæ operationis effe dicit, MESUE in infuso ad unciam dimidiam, in fubstantia ad drachmas duas dedit, Recentiores vix ultra drachmam afcendunt: MATTHIO-Lus testatur, Germanos decocto Afari febres curare, id quod RULANDUS & LENTILIUS observationibus quoque confirmant, ALEXIUS specifice ad quartanum commendat, & ei plures affentiunt, ego vero, justa observatione hanc virtutem specificam stabiliente destitutus, illud præ aliis Emeticis in hoc morbo aliquid proprii habere, vix credo, minoribus dofibus datam radicem, aut longiore coctione debilitatam, egregie resolvere, observatum est; RULANDUS & SCHEFFLER hydropicos inde viderunt curatos; patet hinc, cur virtutes ejus diaphoreticas, diureticas, emenagogas celebrarint Auctores. Folia ad octo ufque ex aqua cocta & expressa post DODONÆUM ROL-FINCK commendat: eadem primus PITT Pharmacopœus Worcestriensis scopo errhino in usum traxit, tefte COLBATCH, eorum grana quatuor aut quinque haurienda fi dantur cubitum ituris, altero mane multum muci ex naribus effluxurum promittit, id ipfum fe fæpe expertum effe GEOFFROI teftatur, idem etiam hac ratione paralyfin oris & linguæ fe vidiffe fanatam perhibet, eodem medicamento DESMARS ulcus capitis per nares evacuatum obfervavit.

* Extractum Wurtemb. * Tinctura Parif.

* BRYONIA, βενώνια, Vitis alba, Couleuvrée, Zaunrübe. Ejus radices proftant, quæ ad bracchii imo femoris craffitiem accedunt, recentes proprio odore minus grato gaudent, qui autem exficcatione perit, fapore intenfius amaro cum quadam acrimonia, extus flavicant, ftriis longitudinalibus & circularibus afperæ, intus albæ, caro exficcata evidenter ftriis eminentibus ex medulla tanquam centro ad peripheriam ductis & variis circulis fectis composita est, laxior, fungofa.

BRTONIA. Habitu relativo mox monophyto, mox diphyto, corolla quinquepartita, fimili calice fuítentata, five ifanthera, five monogyna, bacca uniloculari gaudet : Alba L. BLACWELL 37 & 533. foliis palmatis, rigidis, undique pilis fcabris diftinguitur.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Extracti aquofi $\frac{5}{8}$, refinofi ultra $\frac{1}{6}$ NEUMANN inde obtinuit; CARTHEUSER illius etiam $\frac{5}{8}$, hujus $\frac{1}{16}$.

Veteres, turiones Bryoniæ in ulum cibarium receptos fuisse, perhibent, sed non veri specie caret Do-DONÆI conjectura, PLINIUM, GALENUM, DIO-SCORIDEM &c., Vitim albam cum Viti sylvesseri, quo nomine Tamus L. apud eos venit, confudisse. HIP-POCRATES, Bryoniam ad injectiones & suffitus uterinos adhibuit, GALENUS intus resolvendi ergo contra obstructiones viscerum abdominalium, extus abstregendi, fine in morbis cutaneis commendat; HERCU-LES SAXONIÆ radice, ad drachmam unam in substantia

Qq 2

data, deploratifimum hydropicum vidit curatum, AR-NOLDUS DE VILLA NOVA obfervationem habet de quodam epileptico, quam Bryonia fanavit, id quod etiam REUSNER circa aliquot pueros annotavit. Medicamento vehementi & naufeofo rarius hodie utimur, interdum refolvendi & abstergendi scopo, extus exhibetur.

* Facula ANGEL. SALÆ ipfa Bryonia integra reputatur mitior effe : * Extractum August. Syrupus Brandeburg. ad aliquot drachmas datus valide videtur refolvere.

* ELATERIUM, ¿λατήφων, Eselshürbsensaft. Eft fuccus, cujus nonnisi fæculam Veteres receperunt, & hinc virescentem habebant, is cum hodie, ad ductum MESUE, vulgari ratione inspissatus prostet, nigricat, & sapore amaro gaudet, in quo ego saltem insigniorem acrimoniam non potui detegere.

Momordica Elaterium L. BLACWELL 108. defectu cirrhorum agnofcitur.

Crefcit in Europa Meridionali, in nostris hortis, feminibus sponte sparsis sefe continuat.

HIPPOCRATES Elaterii tanquam medicamenti furfum & deorfum purgantis meminit, hæc ejus vis Veteribus adeo nota fuit, ut etiam omnia medicamenta, primas vias evacuantia, inaligua appellaverint, ad evacuandum uterum quoque ab HIPPOCRA-TE æque ac GALENO laudatur, hic illud quoque extus refolvendi ergo, nec non ptarmico fcopo, commendat; ejus infignem in hydrope curando efficaciam LISTER, REUSNER, EVERHARD, S. PAULI observationibus probare contendunt, sed hunc effectum cum omnibus validioribus evacuantibus videtur communem habere, & cum hodie evictum sit, hydropis curam minus bene drafticis tentari, hinc ad hunc morbum quoque, nonnisi in refracta valde dosi, refolvendi potius, quam evacuandi scopo adhibetur. Veteres larga quantitate illud exhibuerunt, EVERHARD,

ad drachmam dimidiam ufque fine noxa exhibitum fuisse, perhibet, vix ultra tria grana hodie ejus dosis extenditur.

* Mel Cucumerinum Parif.

* FRANGULA Recent. Bourgêne, Faulbaum, Zapfenholz. Recipiuntur ejus cortices mediani five libri, qui flavicantes funt, fapore non acri, fed leviter auftero inftructi, cui vestigium amari accedit.

Rhammus Frangula L. BLACWELL 152. Habitu -inermi & foliis integerrimis diftinguitur.

Habitat in omni Europa, præter maxime Meridionalem.

MATTHIOLUS corticem alvum ducere dicit, Do-DONÆUS vomitus & feceffus, fed nonnifi a recenti eieri affeverat. Dofin ad drachmas duas folent determinare. De medicamento, circa quod nulla jufta obfervatio mihi faltem nota est, nihil audeo decidere. Extus unguentis ad scabiem interdum adjicitur.

* GRATIOLA Rec. Gratia Dei Barb. Gottes Gnaden Kräutel. Folia exhibet oblonga, fenfina anguftata, uncielia, venofa, integerrima, amara.

GRATIOLA. Corolla monopetala gaudet, staminibus quatuor, quorum duo sterilia sunt, calice in plures lacinias secto, capsula biloculari: Officinalis L. BLACWELL 411. Floribus pedunculatis & foliis lanceolatis distinguitur.

Paffim in Europa temperata occurrit.

Extracti aquofi $\frac{5}{32}$, fpirituofi $\frac{1}{4}$ largitur. BOULDUC. Communis fere est Auctorum confensus circa validam, qua hæc planta gaudet, vim: GESNER in se ipfo expertus est, eam ad scrupulum unum in substantia assumeam, non sine molestia vomitu & alvo. purgare, ad vermes & asciten ejus efficaciam se expertum esse, testatur BOULDUC, ascitem ea curatam HELWICH adducit, hypercatharsin inde sussitatam Bürckel annotavit, antiquatam, inertem esse

Qq 3

LINNEUS tradit; radicem ad fcrupulos duos exhibitam in modum Ipecacuanhæ agere KRAMER affeverat.

* Extractum Parif.

GUMMI GUTTÆ Recent. Est gummiresina, quæ in magnis frustis ad nos adducitur, nitida, extus ex croceo flavescens, odore nullo, sapore leviter resinoso gaudet, dum mordetur dentibus aliquam tenacitatem sistit.

CAMBOGIA L. BLACWELL 392. Corollam tetrapetalam habet, fimili calice fustentatam, polyantheram, monogynam, pomum octoloculare.

Crefcit in China, Camboia & Ceylon.

Tam fpiritus vini, quam aqua, maximam ejus partem diffolvunt, fed aqua non parum ejus, quod diffolverat, denuo dimittit, alcali acuata hac menftrua, omne recipiunt & colore fanguineo inde tinguntur. LEWIS: Extracti fpirituofi $\frac{7}{3}$, aquofi $\frac{1}{13}$ obtinuit NEUMANN. Præter acidum etiam urinofum fpiritum fub ejus destillatione observavit CARTHEUSER.

Hoc medicamentum CLUSIO anno 1603 miffum, & Indos illo ad evacuandos aquofos humores uti, relatum fuit, LOTTICHIUS, qui anno 1626 proprium de eo tractatum edidit, plures fui ævi Medicos adducit, qui eodem cum fucceffu ad hydropem, arthritidem, afthma &c. fuerunt ufi. HOECHSTETTER, ejus virulentiam fpiritu vitrioli corrigi, contendit, Wurtembergenfes acetum adhibent, alia alcalia laudant, prudens administratio vel hic optimum corrigens est. CLUSIUS apud Indos quindecim ad viginti grana dari afferit, HOECHSTETTER vel pueris ad grana tria dedit, hodie adultis non ultra decem grana propinamus.

* HELLEBORUS ALBUS, ÉALésog Acondos, Veratrum, weise Nieswurzel. Adhibentur ejus Radices, quæ cylindroideæ funt, tuberculis obsesse, fibrillarum, quas dimiserant, reliquiis, oblongæ, fapore non multum acri, falino, cum vestigio amari instructæ, extus gryseæ, intus albissimæ.

614

VERATRUM. Corollam hexapetalam irregularem habet, ifantheram, trigynam, capfulam triplicem: Album L. BLACWELL 74. Racemo paniculato & floribus erectis agnofoitur.

Crefcit in Europa temperata, in Silesiam usque ascendit.

Extracti aquofi $\frac{7}{72}$, fpirituofi $\frac{7}{75}$ NEUMANN obtinuit; Extracti aquofi debilifima acrimonia acredine inftructi $\frac{1}{2}$ fere, fpirituofi $\frac{3}{5}$ fere CARTHEUSER.

Quoties Enligoev HIPPOCRATES fimpliciter præfcribit, femper album intelligendum effe, contendit GALENUS, eundem Melampodium Veterum effe, SCHULZ evincit. FUCHSII auctoritate, noftram plantam, pro Helleboro albo affumi, cum ex Veteribus non erui possit, qualem hoc nomine intellexerint, TREW monet. Has radices brutis venenum effe, WEPFER & HERISSANT experimenta probant, violentifimum vomitum inde motum FALLOPIUS vidit, hypercatharfes, affectus encephali, non raro mortem FORESTUS, DOBOLENSKY, GRASSUS, MURALTO, LEDELIUS, LENTILIUS, WINTER, REIMANN, BORRICHIUS, LORRY &c. plures adhuc, qui deleterios harum radicum effectus viderunt, Auctores, collegit Illustris HALLER: nullus itaque dubito cum eximio hoc Viro dicere : "in tanta copia tutiorum me-"dicamentorum nollem veneno uti," fi quis tamen illud adhibendi fat audaciæ haberet, nunquam forupuli dimidii dofin excedat; folet etiam ad pulveres fternutatorios a quibuídam recipi, fed illis nonnisi minima. ejus ratio admiscenda est, ne nimia sternutatio, &, quæ istam excipere folent, mala surgant; unguentis contra pediculos non male adjicitur.

IPECACUANHA. Eft Radix aliquot pollices longa, linea vix craffior, varie flexa, fubftantia extus nigricante gryfea, intus albiffima inftructa, in rugas circulares prominentes efformata, quæ nervum filiformem leviffimum luteum ambiunt, ad faporem falinum accedit, ego nec lentorem in fapore, nec amaritiem poffum diftinguere,

Viola Ipecacua L. foliis ovato oblongis, hirfutis distinguitur.

Crefcit in America Meridionali.

Num Ipecacuanha gryfea POMET, quæ craffitie duarum feu trium linearum, & colore dilute fufco gaudet, ab ea, quam defcripfi, quæ eft *Fufca* POMET, & quam cum LEMERY & LEIBNITIO optimam dicit effe, fola patria differt? hæc enim ex Brafilia, illa ex regno Peruviano ad nos adducitur, nil decidere aufus, id faltem monendum puto, *Ipecacuanham albam*, cujus apud Auctores mentio fit, radicem farmentofam effe, a genuina diverfiffimam.

 $\frac{5}{32}$ Extracti fpirituofi, $\frac{7}{16}$ Extracti aquofi GEOF-FROI inde feparavit; LEWIS Extracti aquofi $\frac{3}{8}$, fpirituofi $\frac{3}{16}$; NEUMANN Extracti fpirituofi $\frac{3}{16}$, Extracti aquofi $\frac{3}{8}$ fere; CARTHEUSER vero Extracti aquofi $\frac{3}{8}$, Extracti fpirituofi $\frac{1}{6}$.

Primus PISO hujus Radicis mentionem fecit. GRAS Medicus anno 1672 ejus aliguid in Europam adduxit, & alicui pharmacopolio Parifino intulit, anno 1684 paffim in tabernis Europæis obtinuit, teste scheda, quam seplasiarii divulgarunt, a WEDEL confervata. Circa annum 1690 quidam mercator magnam harum Radicum quantitatem cum Parifios advexisset, majorem quæstum ut faceret, socium fibi HELVETIUM junxit, qui LUDOVICO XIV perfuasit, ut juberet copiofe cum iifdem in nofocomiis fieri experimentum, inde cum fuerit relatum, eadem succesfisse indiscriminatim, in omnibus omnino agrotis diarrhæa, fluxu sanguinis & dysenteria laborantibus, cum præterea Comes Archiatrorum DAQUIN multa experimenta & sumserit ipse & per alios sumi curaverit, que omnia eundem prorsus successum habuerunt,

funt ipfa Edicti Regii verba, quod nobis LEIBNI-TIUS confervavit, una cum hiltoria, cujus fynopfin fifto: Rex, inquam, cui civium falus femper commendatiffima erat, HELVETIUM larga pecuniæ fumma donavit, & ut publice ægrotantibus hoc medicamentum venderet, juffit, mercator ægre ferens HEL-**VETII** remunerationem, Ipecacuanham aliis quoque Medicis æque ac Pharmacopolis conceffit, factum eft inde, ut vulgatum evaderet medicamentum, quod pro more Seculi fibi foli voluit refervare HELVE-TIUS, tefte GROSJEAN apud KOENIG; illo tempore dofis medicamenti Ludovico aureo vendebatur. TOUR-NEFORT apud POMET testatur, nullum prostare medicamentum tam certo & tam cito quam Ipecacuanha curans, & primus gryfeam tanquam mitiorem præferendam effe monet: WEDEL plures observationes adducit de egregio ejus in dyfenteria ufu, & multas addit, ubi vi fua emetica etiam in aliis morbis egregie profuit, GOHL, STOSCHIUS & BERG-MANN eandem multis dyfentericis cum fuccesfu fe dediffe perhibent, SCHEUCHZER in dyfenteria anni 1728 virtutem ejus expertus est laudatiffimam, nonnullos fola hac radice curavit BUCHNER, KRAMER in multis millibus militum ejus efficaciam eft expertus, mirabiles in dyfenteria Neomagiensi effectus edidit, DEGNER teste, incantamenti instar sæpe intra unius diei spatium dysenteriam curare, asseverat GEOFFROI. Evincunt hæ observationes, quibus vel plures adhuc potuissent adjici, Ipecacuanham eximium ad curandam dysenteriam medicamentum effe, num autem specifica quadam vi agat, ut vulgo folent credere, num illi modo opem ferat, quæ a fordibus fustentatur, & num illam unice curet, fordes, ejus caufam, e corpore eliminando, nondum confectum est, id autem constat omnino, alia emetica in alvi fluxibus tempestive exhibita magnæ virtutis effe,

Qqs

EVACUANTIA.

observationibus probante KRAMER, & in dysenteriis, a fordibus non excitatis, Ipecacuanham fine fuccesfu adhiberi, imo etiam in reliquis, eam folam ad curam crebro non fufficere, experientia creberrime evicit. Caveant faltem Medici, ne fe magnifico specifici titulo patiantur seduci, ut medicamentum vomitum excitans exhibeant, quando inflammatio inftat, five jam præfto eft, quicquid etiam de leni ejus indole venditent, ista tamen nunquam poterit impedire, quin fiant ea, quæ ratio mechanica vomitus non poteft non caufari GEOFFROI, grana sex perbelle vomitum excitare, monet, & grana decem non minus valide, quam quos scrupulos operare, Pye copiofiffimos cafus adducit, ubi duo grana in omni ætate aliquot vomitus excitarunt, ego creberrime etiam fum expertus, quod grana decem vel quindecim æque valide ventriculum subverterint, quam grana triginta. Illustris PRINGLE ratio optime mihi, vomitoria nunquam nisi partitis dosibus exhibenda esfe, reputanti, placet, qui fingulis horis Ipecacuanhæ grana quinque præbet, ulque dum vomitus furgat, & hunc ut plurimum post tertiam dosin secutum fuisse, monet. Cum magno fuccesfu exiguæ ejus doses contra Hæmorrhagiam Uteri dantur.

\$. 57.

IV. PURGANTIA Barb. 229227222 fenfu ftrictiffimo funt medicamenta, quæ excretionem alvinam crebriorem reddunt. Eorum ope eliminantur non modo fordes, quæ in primis viis hærent, fed etiam humores canali cibario inquilini, imo cum eidem tres magni Aortæ inferioris rami profpiciant; hinc hujus canalis excretione aucta, etiam fordes ipfi maffæ humorum inhærentes, five in eadem generatæ fuerint, five per vafa reforbentia eo delatæ, e corpore eliminantur. Quam fchola, præeuntibus HIPPO-CRATE & GALENO, de propriis fubftantiis, proprios

EVACUANTIA.

umores attrahentibus & per alvum ducentibus, colebat hypothesin & ortam inde distinctionem Purzantium in Hydragoga, Phlegmagoga, Melanogoga, quibus media ætas Panchymagoga adjecit, fanior Phyfiologia jam diu expunxit; fed majoris momenti eft distinctio in Cathartica Mitia, & Fortiora, illa GALENI ætate ERROMPOTIRa dicebantur, medio ævo Minorativa, Lenitiva, Benedicta appellata. Purgantia optime distingui videntur pro varia, qua in primas vias agunt, ratione: quædam vi, qua gaudent, faponacea, inquilina æque ac peregrina, in primis viis hærentia, diffolvunt, attenuant & leni stimulo canalem cibarium follicitant, hæc licebit Eccoprotica appellare; alia contenta primarum viarum attenuant, & eas evidentius, quam priora stimulant, hæc cum Recentioribus Digestiva nominamus; funt præterea alia, quæ alvum ducere experientia evincit, qua ratione agant nondum clare liquet, Specifica omnibus hactenus dictis fortius irritant alia, & id, ratione refinæ, quam vehunt, præstant, hæc Refinosorum nomine veniunt.

- 5 ni eine sen §. 58.

in the noten Rooming

Indicantur Purgantia, ab heterogeneis in primis viis hærentibus, ifta fi acria funt, præter Eccoprotica, non confultum eft alia purgantia exhibere, fi vifcidam indolem habent, Digeftiva funt exhibenda; fed purgantia quoque in ufum trahenda, cum heterogenea in maffa humorum obtinent, imo cum in remotioribus quoque a primis viis vifceribus, humores præter naturam collecti funt (§. 57.), pro hoc fcopo, fi per reliquasægroti circumftantias licet, validiora ut plurimum folent in ufum trahi; interdum etiam ufus catharticorum per aliquot dies continuandus, ut vitiofum paulatim educatur, & non una modo vice exhibitum purgans, five non fatis evacuet, five nimis debilitet, hanc evacuandi rationem, quæ fit per continuatum catharticorum ufum, præeunte GALENO, per $E\pi lagarow$ fieri, dicere folent; fed nec male purgantia adhibentur, quando impetum humorum a fuperioribus ad inferiora revellere confultum ducimus, & tunc illa frequentiffime fub forma Enematum ano injicimus, fed nec intus data. fpem fruftratura facile liquet.

5. 59.

Cum Purgantia fine discrimine quicquid in intestinis hæret, aut ad ea ex omni corpore confluit, ejiciant, hinc locum non habent, cum vires multum proftratæ funt, aut fluidorum ratio in maffa humorum deficit; nec ea quæ evidentius irritant exhibere licet, cum topicum quoddam in primis vits obtinet vitium, aut ex morbi, qui adeft, indole conftat, irritabilitatem fibrarum in universum auctam effe, nunquam ideo in febrium paroxyfmis eadem licet exhibere, hinc Græci & Romani, qui nostra Eccoprotica ignorarunt, non ausi fuerunt purgantia in febribus acutis exhibere; Refinofa,cum ftimulus, quem excitant, propius ad illum, quo vomitoria inteftina follicitant, accedat, hinc creberrime vomitum excitant, nec ea licet exhibere, cum vomitoria exulare jubentur (§. 55.), cum etiam circulationem fub. eorum usu intendi, compertum sit, hinc ab eis in febribus continuis omnino est abstinendum.

a. ECCOPROTICA.

CASSIA FISTULA Barb. Est Siliqua cylindroidea rectifima interdum, interdum incurva, quæ pedis circiter longitudinem æquat, unciam crassa, ex spadiceo

620

EVACUANTIA.

nigra, lignofa, fragilis, intus multis feptis transversalibus distincta, quæ in superficie externa tanquam totidem circelli eminent, inter septa hæret medulla nigra, ad mellis confiftentiam accedens, fapore dulci instructa, & cui semina subrotunda, dura, fulva, nitida innidulantur. Adducunt etiam non raro filiquas rugofas, craffiore putamine vestitas, medullam acriorem includentes, has Occidentales effe, GEOF-FROI tradit, fed MONARDES & RUMPH testantur, Americanas, ex Infulis fancti Dominici & S. Johannis de portu divite, Orientalibus præstare; Belgas nullam Caffiam ex India in Europam vehere, & omnem, quæ ab aliquot retro annis Massiliam venit, ex Infulz Martinica afferri, relatum accepi. In universum filiquas multum rugofas, acri aut qualicunque alieno fapore instructa medulla fœtas, nec non eas, quarum femina, dum concutiuntur, ob deficientem medullam, resonant, rejiciendas effe præcipiunt.

CASSIM. Corollam pentapetalam irregularem habet, calice quinquefolio fuftentatam, diplofantheram, monogynam, fructum oblongum, diffepimentis diffinctum.

Fistula BLACWELL 381. Foliis quinque vel septem jugatis, ovato-acuminatis & petiolis nudis distinguitur.

Crefcit in Æthiopia, Ægypto, India, China & infulis Philippinis, ab Hifpanis in Americam transplantatam fuisse, testatur MARTYR apud SLOANE.

Pulpa tam ab aqua, quam a spiritu Vini dissolvitur.

Primi Arabes noftrum medicamentum in usum traxerunt, ACTUARIUS primus illud Cassiam dixit, pulpa ex filiquis exemta & a seminibus liberata, tanquam mitissimum medicamentum, exhibetur, nec male in minori dosi illis datur, quibus alvus tarda est, eandem etiam specifice in reues agere, sunt qui contendunt ; urinam inde tingi experientia non confirmat. Dofis pulpæ eft ad uncias duas vel tres, ea cum majori aquæ quantitate diluenda eft, ne in primis viis fermentet & flatus excitet, illis, quibus modo animus eft, alvum apertum fervandi, ad unciam unam vel drachmas fex exhibetur.

* Electuarium Diacassia cum Manna Nostrat. Medicamentum eccoproticum, quod ad uncias duas & ultra potest exhiberi : Pulpa Cassia SCHROEDER ope facchari conditur, ut ætatem ferat, Parifini illam Cassiam coctam appellant, & ipsi varia adjiciunt.

MANNA ab Arabibus Man dicta, est Succus infpissatus albus, cujus frusta variæ figuræ & magnitudinis nobis afferuntur, evidenti dulcedine instructus, odoris expers, totus in aqua & spiritu Vini folubilis.

Varia ratione Mannam folent diftinguere, mitto distinctiones fecundum arborum, unde colligitur, genera; nec non illam, una in spontaneam & coactam, quam Forzata vel Forzatella appellant, folent dividere; porro eam, qua Mannam in foliis collectam, ab illa, quæ a truncis abraditur, diftinguunt, illam di Fronde, hanc di Corpo denominant; illam denique, qua pro varia quam habent figura, in grumosam, en Marons, bombycinam & granulatam folent diftinguere, hæ omnes enim diftinctiones hodie in commercio ignorantur. Solent autem hodie quatuor genera Mannæ in officinis affervare : Canellatam, Mannam longam Parif. quæ frustis purifimis aliquot pollices longis, unum circiter latis, una facie concavis & ita in figuram canalis actis, unde denominationis ratio furrexit, efformatur; Vulgarem, Mannam granulosam Parif. quam frusta variæ magnitudinis, figuræ, craffitiei constituunt, dimidium circiter pollicem craffa, plus minus fordibus inquinata, ea, quo minus humida, magis alba & pluribus granis cylindraceis

efformata eft, eo reputatur melior, hanc ipfam pro varia patria denuo distinguunt, optima habetur ad Giraci Calabrize ulterioris urbem lecta, hanc illa de Capachi, Siciliæ urbe, proveniens excipit, ad hanc proxime accedit Calabrina & ea, quæ in Neapolitana provincia Apulia colligitur, nec non a tractu Maremna in Ducatu Florentino defumta, minus alba eft a Ciaqui denominata, quæ a Sinesi nomen habet, fordida est & in majores massas concreta, ea autem, quam Romandiola Romagnæ largitur, facile acefcit: ex Manna vulgari grana magis alba & majora feligere, & fub nomine Manna Electa affervare folent: Mannam Craffam, Mannam spiffam & fordidam Parif. denique talem appellant, quæ magis ab albo colore recedit, evidentius fordida est, multum humet, ita, ut quoque interdum pastæ confistentiam habeat, furgit five ex antecedentibus fenio vel aliis rationibus corruptis, five evidenter ex faccharo vel melle, quibus aliquid Mannæ, non raro etiam Scammonei adjiciunt, arte parata est, hinc omnino ex officinis profcribenda.

Exfudat Manna ex variis *Fraxini* L. fpeciebus, fumma æftate, & inde deraditur, aëre pluviofo, vel paucam vel nullam arbores fundunt, hinc meffes pluviofo cœlo preffæ parcæ folent effe, ut Mannam Canellarum obtineant, ex arboris cortice folent frufta exfcindere, eorum locum fuccus exfudans occupat, & in vulneris figuram efformatur.

Aliæ quoque arbores fuccum dulcem, in grana alba concrefcentem, folent largiri, is quoque fub nomine Mannæ venit. Hedyfarum Alhagi, Perfiæ civis, Mannam Perficam largitur, valde fordidam, &, tefte TOURNEFORT, Fraxinea omnino inferiorem, Pinus Larix L. & aliæ arbores coniferæ ex foliis Mannam Lariceam, Briguntinam, de Briancon exfudant: Manna liquida, quam in Arabia & Syria obtinere Auctores SeculiXVI retuler unt, hodie ignoratur omnino.

Medicamentum non ingratum, quod primi Arabes arti noftræ intulerunt, cum fine irritatione agat, in omni morborum genere, in topicis quoque primarum viarum vitiis, cum catharfis indicatur, fine ullo periculo poteft dari, ejus ope in febribus acutiffimis, in ipfa quoque dyfenteria, corpus fordibus poffumus liberare, idem medicamentum, minori, quam qua alvum movet, dofi exhibitum, ad maffam humorum penetrat, vi fua faponacea fpiffos humores attenuat & acres demulcet, hinc in morbis pectoris cum fucceffu folet præfcribi.

Datur ad uncias tres ufque pro dofi, fed cum ex fuo genio facile fermentet, hinc multa aqua dilui debet, nec male ipfi aliquod medicamentum carminativum adjicitur, ut flatus præcaveantur. Id denique adhuc addo, Mannam cum aqua coctam, dum refrigeratur, confiftentiam folidam induere.

Electuarium feu Pulticula de Manna Nostrat. Infantibus pro educendo meconio exhibetur, Wurtembergenses eidem, non malo confilio radices ireos adjiciunt: Manna liquida SCHROEDER, non placet Mannam in fermentationem pronissimam, diutius solutam asservari : Syrupus de Manna ECKHOLZ a Wurtemberg. varia ratione mutatus, ob Folia Sennæ, quæ recipit, Manna validius, & non fine irritatione purgat, datur infantibus, in primo ætatis anno versantibus, ad unciam unam.

PASSULÆ vid. Fruct. horr.

PRUNA vid. Fruct. horr.

ROSARUM PALLIDARUM FLORES V. Roborantia. SACCHARUM THOMÆ vid. Resolventia.

TAMARINDI Rec. Hoc nomine ad nos adducitur Pulpa nigra, fapore acido instructa, cui varia filamenta & femina ex rotundo angulata, spadicea, nitida commixta sunt.

Reji-

Rejicitur exfucca, quæ fitum contraxit, carne prunorum adulterata.

Defumitur pulpa ex fructibus.

TAMARINDI L. BLACWELL 201. Corolla tripetala, calice tetraphyllo fustentata, ifanthera, monogyna, legumine oblongo, compresso, cum acumine obtuso, ad semina toroso, duplici cortice vestito, exteriore sicco, interiore membranaceo, inter utrumque pulpa molli instructo, gaudentis.

Indiæ, Ægypti, Arabiæ nec non Americæ, quo transplantata fuit, civis; pulpa ex America allata minus fordida & minus acida est.

Etiam hoc medicamentum Arabibus debemus, ob indolem, qua gaudet, faponaceam eccoproticis rectiflime adfcribitur, & ad tres ufque uncias exhibetur; ob evidentius, quo fcatet, acidum, in morbis acutis maxime & biliofis cum magno fructu datur, five aliis eccoproticis junctum, five largiori lactis quantitati adjectum, quod inde in Serum, his morbis maxime appropriatum, vertitur; Tamarindi mannæ adjecti ejus flatulentiam egregie moderantur, & efficiunt ut minus facile vomitum excitet.

* Electuarium Tamarindorum HORSTII, inconcinna compositio: Pulpa Tamarindorum SCHROEDER, non placet medicamentum coctione & faccharo debilitatum.

B. DIGESTIVA.

Huc pertinent Aquæ amaræ & Salia, quæ ex iie parantur (§. 21.) indicata.

2. SPECIFICA.

ALOE, Andm. Est Succus inspissatus niger, proprio & nauseoso odore instructus, sapore gaudens amaro, cum aliqua acrimonia: pro varia, qua gaudet, puritate varie denominatur, purior & propius ad rubedinem accedens, a Succotra sive Socotara, insula ad Arabiam felicem fita, nomen accepit; magis flavefcens Aloes Hepatica dicitur; carbonacea nigredine inftructa, arida, minus odorata Caballina vulgo appellatur: hanc Aloes diftinctionem Arabes invexerunt, cum apud Veteres duplex modo ejus genus, unum quod hepatis colorem habet, & alterum quod fæcem refert, occurrat.

ALOE. Corollam fexfidam habet, ifantheram, monogynam, capfulam triangularem & trilocularem: Perfoliata Vera L. BLACWELL 229. foliis fpinofis, maculatis, planis, & habitu caulefcente diftinguitur.

Crescit in Europa Meridionali, Asia & Africa.

Succus ex foliis expressus infpissatur, pro varia ejus depuratione, varia etiam ratione qua infpissatur, variam puritatem induit, & ita eundem fuccum plurimum differentes Aloes species posse exhibere, evidens est.

Vix non tota in aqua ebulliente diffolvitur, fed menstruo refrigerato, multum refinæ inde secedit. Succotrina $\frac{1}{4}$ refinæ, $\frac{3}{4}$ Extracti aquosi largitur; Hepatica $\frac{1}{3}$ refinæ, Extracti aquosi $\frac{2}{3}$; Caballiua refinæ $\frac{1}{6}$, Extracti aquosi $\frac{3}{4}$. LEWIS. NEUMANN ex Aloe $\frac{1}{16}$ Extracti refinosi, $\frac{7}{8}$ circiter Extracti aquosi obtinuit. Extracti aquosi fere $\frac{5}{8}$ CARTHEUSER.

Leniter ab Aloe ventrem duci, GALENUS docet, & ventriculum roborari addit, eandem vulnera & ulcera abstergere & ad cicatricem perducere; sed monet simul, eandem in temperie sicca & calida noxiam effe. Edit in universum validas vires resolventes, & in obstructionibus viscerum abdominalium cum successi usur, sed valide præterea in vasa fanguinea agit, ita ut BORRICHIUS mictum cruentum inde furrexisse viderit, maxime in hæmorrhoidalia, quæ, MESUE jam monente, & FALLOPIO plurimis exemplis confirmante, inde irritari, experientia evicit, qua teste etiam novimus, a principio resinoso maxime hunc effectum causari, hinc semper Extractum aquosum, ab omni resina liberum, loco integræ Aloes ad usus internos adhibendum est; medicamentum resolvens & amarum cum successu quoque vermibus opponi, ÆGINETÆ facile largimur; ejus vis antiseptica etiam a vetustissimis retro temporibus nota est.

Scopo purgandi ad duas drachmas, fcopo refolvendi autem ad fcrupulum unum præfcribitur.

Extus cum fuccessu ad arcendum sphacelum adhibetur, & observante FORESTO, ad lippitudinem,

* Aloes Infuccata Wurtemb. * Aloes lota Wurtemberg. * Aloes Rosata FALLOP. * Aloes Violata Wur-- temb. Hæc quatuor funt extracta aquofa Aloes, ubi per adjectos fuccos vegetabiles Aloes caliditatem corrigere tentarunt medii Ævi Auctores: * Aqua generalis Parif. ratione farraginis ingredientium, optime Theriaca liquida dicenda: * Aqua Ophthalmica Nostrat. ad lippitudinem conducit: Balfamum Commendatoris de PERNE polychreftum ad vulnera leviora medicamentum: * Balfamum FIORAVENTI vulnerario quoque scopo adhibetur: * Balfamum Viride Metens. vid. Cuprum : * Electuarium de Hierapicra a GA-LENO tanguam ab aliis usitatum describitur, ipfe vult. ut ad nonaginta partes Aloes quinque Croci & fex reliquorum aromatum recipiantur, a Veteribus crebro ad obstructa viscera abdominalia usurpabatur, hodie ad clyfmata interdum adhibetur: * Collyrium Roborans Parif. viribus ad aquam ophthalmicam accedit : * Elixir Proprietatis PARACELSUS describit, & pro more fuo extollit, fed reticet menstruum; CROLLIUS illud spiritum Vini & Acidum Vitrioli effe contendit. eum plures sequuntur, Parisini solum spiritum Vini recipiunt, & cum adjiciunt spiritum fulphuris, medicamentum * Elixir Proprietatis cum Acido appellant: Spiritus vini inde juxta HELMONT destillatus. * Elixir proprietatis album dicitur & fi ante destillationem varia aromata addita fuerunt, & spiritus destillatus edulcoratur, surgit claretum, quod * Elixir

Rr 2

de Garus Parifini appellant: BOERHAAVE loco acidi Vitriolici, five acetum recipit, five tartarum tartarifatum, furgunt ita * Elixir Proprietatis cum Acido BOERHAAVE & fine Acido EJUSDEM, fi oleum Tartari per deliquium adhibetur, ad præcepta MAETS, Elixir Proprietatis dulce exoritur; omnia hæc Elixiria refolvendi & roborandi ergo ad vitia digeftionis corrigenda commendantur, BOERHAVIO quoque laudata, cum autem multum calefaciant & maxime fanguinem hæmorrhoidalem commoveant, hinc inter nos faltem parcius cum eis erit mercandum: fi ingredientia Elixir Proprietatis cum aqua, fale alcali foeta, extrahuntur, Elixir Aperitivum CLAU-DER furgit, antecedentibus omnino præferendum, Hamburgenses principiis Elixir Proprietatis Rhabarbarum & Salem Tartari adjiciunt, Vinum generofum pro menstruo adhibent, & ita * Elixir Proprietatis Rhabarbarinum parant, in quo Wurtembergenses Alcali spiritum falis substituunt: Elixir Proprietatis HELVETII, tincturam Tartari pro menstruo, & aliquid olei Cinamomi recipit: * Emplastrum contra Vermes Wurtemb. validiora draftica habet, caute adhibendum: Extractum Aloes VAL. CORD. ut obtineatur ab omni refina plane liberum, nonnifi aqua frigida præparandum eft : * Extractum Catharticum Londin. multum refinofum, datur ad grana quindecim, ejus in locum inter nos propinare moris est Extractum Catholicum, quod 4 Aloes, + Extracti Hellebori nigri, I Colocynthid. i circiter refinæ Jalappæ & totidem refinæ scammonii vehit: * Extractum Marocostinum vid. Costus : Extractum Panchymagogum CROLLII correct. Wurtemb. propius ad Augustanos, Nostrates ad ZWOELFFER accedunt, ex purgantibus refinofis & specificis confarcinatum medicamentum ad forupulum unum pro dosi præscribitur, ex eodem in spiritu vini diffoluto furgit * Elixir Polychrestum Hallensium,

quod ego faltem noftris hominibus commendare nollem : * Flores Sulphuris compositi inconcinni : * Opiata Mefenterica Parif. inconcinna : * Pilula Aloëtica emollientes Parif. non placent : * Pilulæ Aloephanginæ earum dimidium Aloë, reliquum omne genus aromatum, Myrrha, Mastyx, Crocus &c. efformant: * Pilule Angelica seu Francofurtana, ad imitationem earum, quarum ope FABRICIUM AB AQUAPENDENTE vegeta fanitate usque ad octuagefimum fecundum ætatis an-- num pervenisse dicitur, & quarum parandi ratio in familia Zschorschanorum latuit, ab HARTMANN BAYER Medico Francofurtano concinnatæ, ad drachmam dimidiam pro dofi folent dari : * Pilule Aperientes STAHL limaturam Martis recipiunt, in affectibus hypochondriacis non fpernendæ, aperiendi ergo ad scrupulum unum poffunt exhiberi : Pilula de Ammoniaco vid. G. Ammoniacum : * Pilula Aurea NICOL. abfurda compositio, quæ Aloës & Diagrydii de fingulis 1/4, Trochife. Alhandal. 2 vehit, ad drachmam dimidiam ulque poffunt exhiberi : * Pilula Cachectica Wurtemberg. ad obstructiones viscerum abdominalium & menfium referandas proficuæ effe videntur : Pilula Cephalica KUFFER, & * illæ quas Wurtembergenfes habent, in affectibus capitis ferofis, evacuandi fine præscribuntur, neutræ placent, dantur ad drachmam dimidiam : * Pilulæ Chalybeatæ vid. Ferrum. * Pilula Cochia RHASIS, ipliffimis RHASIS verbis a Nostratibus receptæ, parum a Parifinis mutatæ, inconcinnæ omnino, ad drachmam dimidiam purgandi fine dantur : * Pilulæ Emanuelis August, formantur ex speciebus Elixir Proprietatis : * Pilula fætidæ majores Mesue absurda compositio circiter 1/4 radicum Efulæ, 1 Colocynthidis, 1 Euphorbii, 1 Diagrydii habent: * Pilulæ de Hiera cum Agarico JUNGKEN jure eviluerunt : * Pilulæ Hydropicæ BONITII 1 circiter G. Guttæ & 1 Diagrydii habent, exhibentur ad

Rr 3

drachmam dimidiam, magis placet præscriptio Parifiensium, quæ Gummi Guttæ 1/3 continet: * Pilulæ Lucis majoris, Wurtembergenfium compositio, compendiofior est illa, quam MESUE dedit, nec tamen ab ipfa aliquid proprii ad curandos oculorum morbos expecto : * Pilulæ Mastychinæ vid. Mastyx : Pilulæ Polychresta balfamica, pilulis obstructiones viscerum abdominalium aperientibus, & maxime menfium & hæmorrhoidum negotio prospicientibus, magnam famam comparavit BECCHER, plures dein Medici Germani, STAHL, HOFFMANN, RICHTER ejus vestigiis infistentes, talibus pilulis auctoritatem fecerunt, & fuo quæstui confuluerunt, earum compositionem arcanam fervando; variæ præscriptiones illis analogæ hodie prostant, Nostrates illam, quam BURGHARD publicavit, receperunt, reliquis omnino præferendam, Parifini & * Pilulas balfamicas STAHL, & * Pilulas balfamicas BECCHERI habent, Noftrates * Pilulas Polychreftas evidenter balfamicis inferiores adhuc retinuerunt : dantur Pilulæ polychreftæ balfamicæ ad grana quindecim pro dofi, & earum usus per septimanas continuatur : * Pilulæ feu Extractum Rudii proxime ad Extractum Panchymagogum accedunt : * Pilulæ RUF1, ab ÆGINETA, qui formulam RUFI describit, differunt Londinenses & Parifini, pilulas EMANUELIS hoc nomine tradunt : * Pilulæ sine quibus apud NICOLAUM occurrunt, abfurda compositio, fine qua omnino effe poffumus : * Pilulæ Solares WILDEGANS. vid. Opium : * Pilula Splenetica Wurtemb. non ineptæ ad vitia fystematis venæ portarum videntur effe: * Pilulæ stomachica MESUE : Pilula de succino vid. Succinum : * Suppositorium Brandeburg. Tinctura Aloës Viennenf. a Chirurgis scopo mundificandi adhibetur, ex ejus ufu interno facile diarrhœas excitari, Cl. PLENCK annotat : * Tinctura Proprietatis MYNSICHT inconcinna compositio: Unguentum de Arthanita vid. Cyclamen : * Unguentum ad Vermes Wurtemb. antecedente & emplastro cognomine mitius.

* CARTHAMUS Barb. win@, Cnicus Veterum, Safran batard, Safflor. Flores & Semina recipiuntur.

Flores affervantur calice exempti, tubulofi, rufi, eminente columna antherarum flava, odoris nullius, aquam, cum qua infunduntur, rubro colore tingunt, & ipfi faporem falinum conciliant.

Semina oblonga funt, uno extremo craffiore, rufescente, altero angustiore, quatuor angulis distincta, alba, splendentia, nucleum album dulcem, in quo ego saltem nil acris detegere possum, includunt.

CARTHAMUS. Florem compositum, tubulosum habet, calicem ex squammis foliaceo appendiculo acutis imbricatum, receptaculum pilosum, semina nuda: *Tinctorius* L. Foliis ovatis, margine serrato aculeatis distinguitur.

Sponte in Ægypto crefcit, hodie paffim per Europam colitur.

Color, quem aqua ex floribus extrahit, ope acidorum pulcherrime roseus fit, quo lintea tinguntur, qui autem injurias aëris non fert.

Cnicum Veteres purgandi ergo, tefte GALENO, adhibebant, multa etiam apud Arabes de feminum Carthami vi alvum ducendi mentio fit, eorum fucceffores ad unciam unam fub forma emulfionis illa exhibuerunt, hodie prorfus eviluerunt, nec perfpicio, quomodo medulla omnino dulcis alvum multum commovere queat, num planta in Oriente crefcens femina acriora fubminiftrat, quam illa, quæ in Europa colitur?

* Electuarium de Carthamo ARNOLDI DE VILLA-NOVA : * Extractum Diacarthami ANDERNACI, utrumque medicamentum inconcinnum eviluit.

COLOCYNTHIS, Rodonurdic. Prostat hoc nomine Pulpa rotunda, variæ magnitudinis, quæ non raro Rr 4 ad pugnum accedit, candida, ficca, fungofa, levis, ex multis cellulis efformata, quibus femina compresfa, oblonga, flavicantia, modice amara inhærent, fapore gaudet amarisfimo, acri, fauces adurente.

CUCUMIS Colocynthis BLACWELL 441. foliis multifidis & pomis globofis diftinguitur.

In Archipelago & Syria occurrit.

 $\frac{1}{2}$ Extracti aquofi viscidi largitur. LEWIS. $\frac{1}{16}$ Extracti spirituosi, $\frac{1}{17}$ circiter Extracti aquofi BOULDUC inde obtinuit: NEUMANN Extracti spirituosi $\frac{7}{32}$ & aquosi $\frac{1}{32}$; Extracti aquosi fere $\frac{1}{2}$ spirituosi $\frac{1}{6}$ CAR-THEUSER.

Pulpam Colocynthidis fortiter alvum ducere, & paulo majori dofi exhibitam adeo valide agere, ut graviffima tormina excitet, & ipfum fanguinem ex vafis inteftinalibus exprimat, HOYER, STALPART VAN DER WIEL, TULPII & PLATER obfervationibus patet. Græci & Arabes ad duos forupulos ufque ejus dofin extenderunt, hodie nonnifi ftimuli loco pilulis ad aliquot grana adjicitur; cum ejus virulentiam a tenacitate, qua gaudet, pendere creditum fuerit, hinc eandem cum mucilagine Tragacanthæ fubigi juffit MESUE, & in Trochifcos, quos Alhandal dixit, efformari, fub hoc nomine hodie adhuc ejus pulvis proftare folet.

Extus ab HIPPOCRATE utero ulcerato injiciebatur, convenienti vehiculo excepta a quibufdam, fcopo anthelmintico, umbilico infantum imponitur, aut ad drachmas tres, enematibus, quibus validius ftimulare volumus, adjicitur.

* Extractum aquofum ZWOELFFER : * Extractum ex aquofo & fpirituofo mixtum Wurtemberg. * Oleum compositum GRULING abdomini illinitur, cum vermes obtinent, aut in pertinaciore alvi obstructione : * Refina ZWOELFFER. * CUSCUTA Barb. ἐπίθυμον, καθύτας, Casuta Barb. Epithymum. Hoc nomine affervantur Filamenta longa, tenerrima, variis tuberculis obsessa, fapore lenissime acriusculo instructa.

CUSCUTA. Corolla quinquefida, fimili calice fuftentata, ifanthera, digyna, fructu carnofo, biloculari gaudet: Europæa L. BLACWELL 554. floribus feffilibus diftinguitur.

Planta parafitica, variis herbis adnafcens, unde olim varie denominata fuit, inter nos creberrime variis Euphorbiæ speciebus adhærens occurrit.

Vires purgantes, ipfi a Veteribus adfcriptæ, hodie negliguntur, cum certiora & efficaciora purgantia habemus.

* CYCLAMEN, RURAZ MING, Tuber Terra, Pain de pourceau, Schweinbrod. Radices fiftit tuberofas, fphæroideas, leviter depreffas, foris nigricantes, intus candidas, fibris nigris inftructas, inodoras, fapore in recentibus cum quadam acerbitate acri, in exficcatis fere nullo gaudentes.

CrCLAMEN. Corollam monopetalam quinquefidam, cujus limbus deorfum flexus est, isantheram, monogynam, & baccam globosam habet: Europæum L. BLACWELL 147. foliis cordatis distinguitur.

Crefcit in Europa Orientali & Meridionali.

HIPPOCRATES & GALENUS Cyclamen tam interne, quam externe, fcopo refolvendi exhibuerunt, radix a variis Auctoribus catharticis annumeratur, id quod quidem de recenti, vix de exficcata valet. Dofin in fubftantia ad drachmam unam, in infufo ad unciam dimidiam folent extendere, incertum medicamentum non amplius adhibetur.

* Unguentum de Arthanita MESUE. Plura medicamenta draftica recipit, umbilico illitum vermes necat & alvum ducit, medicamentum drafticum apud infantes maxime, quibus tamen præcipue commendatur, nonnifi maxima cum circumspectione auderem exhibere.

HELLEBORUS NIGER Mißog , fchwarze Nieswurzel Radices largitur, quæ ex craffo capitulo copiofiffimas fibrillas, aliquot pollices longas, emittunt, extus nigras, intus albas, nullo odore, fapore leniter acerbo inftructas; nec recenter ex terra effoffæ, multum odoris habent.

HELLEBORUS. Corolla pentapetala, polyanthera, nectariis multis, capfulis quinque aut fex gaudet: Nigra L. BLACWELL 506. scapum pauciflorum & folia pedata habet.

In Pyreneis & Apenninis crefcit, apud nos paffim in hortis colitur.

Extracti aquosi $\frac{1}{3}$, Extracti refinosi $\frac{1}{5}$ largitur. LEWIS: Extracti aquosi $\frac{3}{5}$, Extracti spirituosi $\frac{1}{5}$ NEU-MANN. Utraque adeo firmiter cohærent, ut semper conjuncta ab utroque menstruo extrahantur.

Veteribus Helleborum in frequenti ufu fuiffe, neminem latet & eos, quoque eundem tanquam medicamentum multum commovens adhibuiffe, fed Majorum monumenta circa Elleborum evolventi probe obfervandum eft, eos crebro non modo album intelligere, fed & diversifimarum plantarum radices fub nomine Hellebori nigri ipfis venire, cui addendum, ejusdem plantæ radices, ratione variæ patriæ, varium virium gradum habere, Helveticas radices hellebori nigri validiores effe, quam Anglicas, GEOE-FROI est expertus, easdem in Oriente cultas a nostris diversas & eis validiores effe TOURNEFORT testatur; hinc vix patrum obfervata de viribus Hellebori ad noftras radices licet applicare. Id autem, experientia teste, novimus, radices, quas descripfi, alvum ducere, & quidem cum quadam vehementia, gaudere præterea, fi minori dofi dantur, eminente vi resolvendi, MEAD, illas vix unquam spem

in referandis menstruis fefellisse, testatur, hodie solæ, aut in substantia, vix dantur, sed adjiciuntur stimuli loco infusis laxantibus.

Dantur in infuso ad drachmas tres.

Extractum VAL. CORD. datur fcopo purgandi ad drachmam dimidiam: * Syrupus de pomis helleboratus vid. Malum: * Tinctura Hellebori composita Wurtemb. est Tinctura Melampodii BATEI parum mutata, quæ ad drachmam unam pro dosi maniacis commendatur: * Tinctura Martis Helleborata WEDEL vid. Ferrum.

* HERMODACTYLUS, Equodarlux & ÆGINET. Hodie hoc nomine proftat Radix ad figuram triangularem accedens, utrinque contracta, una facie plana, fulco longitudinali notata, altera convexa, extus flavicans, intus alba, friabilis, odoris & faporis expers.

Affertur ex Turcia.

Nil certi de planta, unde defumitur, audeo proferre, cum Iris tuberofa L. quam MATTHIOLI fide plurimi huc referunt, radices digitatas a nostra diversififimas habeat, Colchici Illyrici autem character, unde a RAUWOLFF defumi dicitur, nondum determinatus sit.

Extracti refinosi $\frac{1}{11}$ circiter, ultra $\frac{1}{4}$ aquosi exhibuit NEUMANN.

Cum ipfa vox, qua Veteres fuas radices denominarunt, eas oblongas fuisfe denotet, noftræ autem potius rotundæ funt, nulla etiam fida obfervatio proftet, noftras radices alvum ducere, imo ALPINUS testetur, mulieres plures earum in modum castanearum, ut pingues evadant, comedere, fine ulla alvi perturbatione, hinc male vires, quæ Veteres Hermodactylis adscripferunt, a nostris radicibus expectamus, jure omnino ex indice medicamentorum delendis.

IRIS vid. Aromata.

LILIUM CONVALLIUM vid. Aromata.

EVACUANTIA.

PERSICI FLORES vid. Fructus horai. PEUCEDANI RADICES vid. Refolventia. POLYPODII RADICES vid. Refolventia.

* PSYLLIUM, 4000. Ejus recipimus Semina, quæ a figura Flohfaamen, Herbe aux puces, appellantur, funt enim oblonga, nigra, convexo-concava, præterea odoris & faporis expertia, fub dentibus lentefcunt.

Plantago Pfyllium L. BLACWELL 412. Caule ramoso, herbaceo & foliis dentatis distinguitur.

In Europa Meridionali sponte crescit.

Spiritum Vini, cum hoc femine infusum, acrem fieri, LEWIS tradit: Mucilaginis ficcæ $\frac{1}{8}$ inde obtinui.

Semen evidenter mucilaginofum, nounifi mucilaginofas & relaxantes videtur vires editurum, & tales quoque GALENUS inde pollicetur; Arabes demum & quidem ex theoria magis, quam ex obfervatione idem medicamentis purgantibus adfcripferunt, hinc jam FALLOPIUS affeverat: hoc femine nullum doctum virum ad lubricandam alvum ufum effe, & fi quis hodie ejus adhuc obtinet ufus, is unice circa mucilaginem demulcentem, relaxantem, refrigerantem verfatur.

* Electuarium de Psylio Mesue. Inconcinna compositio.

RHABARBARUM, phor, pà. Est Radix, quæ sub majorum srustorum forma ad nos adducitur, extus flava, intus in modum Nucis Myristicæ variegata, odore proprio & sapore amaro, cui aliquid austeri accedit, instructa.

Frusta, quorum flavedo vestigium rubri admittit, & quorum rubedo, qua intus variegantur, ad colorem roseum accedit, & quæ ponderosa sunt, reliquis præferuntur.

Rhabarbari & Rhapontici primus ÆGINETA meminit; post renatas in Europa litteras valde folliciti fuerunt Auctores in detegendo Rheo Veterum, sed omnes quas adduxerunt radices, evidenter a Rheo DIOSCORIDIS diverse funt, quippe quod nigrum, fungofum & inodorum fuit. Radices, fub nomine Rhabarbari ex Oriente allatas, defumi a planta, quam CRASSUS RAGUSINUS fub initia Seculi XVII ex Thracia accepit, fuerunt, qui contendebant; eft autem ea

Rнеим, Corolla fexfida irregulari inftructum, enneanthera, trigyna, femine nudo triquetro, marginato: *Rhaponticum* L. foliis integris & fubtus fulcatis gaudens.

Thraciæ civis, noftras hyemes optime ferens.

Cum autem has radices a vero Rhabarbaro, figura oblonga, lutefcente magis colore, nec non odore & fapore viderint differre, hinc eas *Rhaponticum* appellarunt; ipfis vulgo fubstituere folent radices.

Rumicis Obtufifolii L. foliis cordato-oblongis, crenatis & valvulis dentatis, graniferis instructi, in Europa minus frigida & in Borussia adhuc occurrentis:

Hujus plantæ in Sibiria crefcentis radices Rhaponticum Moscoviticum largiri, GMELIN testatur, sunt illæ Rhapontico vulgari crassiores, magis rotundæ, intus pulchrius variegatæ, extus minus luteæ.

Cum femel receptum fuit, radices extus flavicantes, intus rufefcentes, amaro & quodam auftero fapore inftructas, pro fuccedanis veri Rhabarbari habere, hinc monachi Carthufiani & Francifcani, TRAGI temporibus, radices *Rumicis Aquatici* L. BLACWELL 490. valvulis integerrimis nudis & foliis cordatis anguftis diftinguendi, vulgatiffimæ per Europam plantæ, pro *Rhabarbaro* adhibuerunt, hoc ut a reliquis diftingueretur, a *Monachis* denominarunt: alii eodem nomine, tefte LOBELIO, radices *Rumicis Patientiæ* L. BLACWELL 262 & 489. valvulis integerrimis, unica granifera, foliis cordatis inftructi, Italiæ indigeni, noftræ hyemis patientis, defignabant, fed eodem nomine etiam alii radices Rumicis Alpini L. valvulis integerrimis nudis & foliis cordatis obtufis diftincti, Galliæ & Helvetiæ indigeni, nec non Centaureæ Rhaponticæ L. calicibus ficcis inermibus, foliis ovato-oblongis, petiolatis, tomentofis gaudentis, Alpium Helvetiæ & Italiæ civis indigitarunt.

Varium hinc Rhapontici & Rhabarbari Monachorum nomine prostat plantarum genus, quarum radices colore extus sive nigricante, sive lutescente, figura oblonga, odore nullo, fapore evidenter alieno a Rhabarbaro vero differunt.

Cl. HOPE fide conftat, verum Rhabarbarum defumi a Rheo palmato L. quod foliis palmatis diftinguitur, & abhinc aliquot annos in Anglia & Palatinatu colitur. Ulteriora experimenta docebunt, num plantæ in Europa cultæ radices omni dote cum illis, quas Afia alit, conveniant. GMELIN teftis oculatus refert, Rhabarbarum verum nullum ad Wolgam fluvium aut ad murum, ut vulgo afferi folebat, crefcere; fed omne in China & ipfi vicina regione Tangutica, inter 26 & 39 gradum latitudinis borealis obtinere, inde per Calmuccos & Calmuccicos Bucharos, qui itinera, mercaturæ ergo, fecundum Wolgam fluvium instituunt, in Siberiam & Ruffiam duci, magnæ Buchariæ incolas illud per omnem Perfiam venale circumferre, unde ad portus Maris Mediterranei venit, Bucharos Sinenses autem idem per omnem Chinam, Cantonum usque ducere, patet hinc Chinenfe, Perficum & Rufficum Rhabarbarum femper idem effe.

Ex Rhabarbaro Extracti aquofi $\frac{1}{2}$ fere GMELIN obtinuit : Extracti fpirituofi $\frac{3}{8}$, aquofi $\frac{3}{7}$ NEUMANN, qui quoque optime annotat, a partibus volatilibus omnem virtutem catharticam pendere ; ultra $\frac{1}{2}$ Extracti aquofi adducit CARTHEUSER : Ego inde $\frac{1}{2}$ Extracti aquofi & totidem refinofi feparavi, quod autem tot adhuc mucilaginis habuit, ut aqua illud ex fpiritu Vini non dejecerit. Id præterea adhuc annotandum effe duco, Rhabarbarum, quo melioris notæ eft, eo minus coloratam tincturam cum aqua largiri, & eo minorem Extracti aquofi quantitatem.

Cum nostrum Rhabarbarum a Rheo Veterum omnino differat, hinc quæ Veteres de hoc annotarunt, illi minus bene adscribuntur; Primi Arabes nostrum Rhabarbarum ad usus medicatos adhibuerunt, & rectiffime illud omni ætati, in omni morbo, tanquam mite purgans exhiberi posse, asseruerunt; MESUE quoque jam observavit, hanc ejus vim catharticam a principio volatili pendere, & eam coctione refolvi; fed Rhabarbarum non modo alvum ducit, fed spiffos quoque humores chylopoieticos, bilem maxime, attenuat & primas vias roborat, hinc tam ad obstructiones abdominales referandas, quam ad vires digeftionis roborandas, & ad fiftendos nimios alvi fluxus cum fuccesfu adhibetur, cum autem ab eo, flavedine quoque urina tingi foleat, non raro etiam, observantibus MENZEL & TILLING, fudor & odoratus & coloratus sub ejus usu surgat, hinc, quod & ad secundas vias penetret, evidens fit, & ad affectus renum, præeunte PARACELSO, a multis commendatur.

Dosis est ad drachmam unam in substantia, ad drachmas duas in infuso.

* Extractum a MESUE fub titulo Trochifcorum defcriptum, vix alias quam roborantes vires habet : * Rhabarbarum tostum apud Arabes jam obtinuit, præparationem, qua Rhabarbarum vi purgante privatur & majori acrimonia instruitur, prudentiores hodie negligunt: Syrupus de Cichoreo cum Rhabarbaro vid. Cichoreum: * Syrupus de Rhabarbaro DEODAT. priori postponendus: * Tabellæ de Rhabarbaro Paris. Tinctura five Anima Rhabarbari MESUE ad libram aquæ Wurtembergenses unciam unam, Nostrates dimidiam recipiunt, falem Tartari fine neceffitate folent adjicere, medicamentum egregium, quod fcopo roborandi, vias biliarias aperiendi, alvum leviter ducendi, per cochlearia exhibetur: * Tinctura Rhabarbari composita Edinburg. inde frustra Rhabarbari vires expectantur.

SAMBUCUS vid. Resolventia.

* SPINA CERVINA Barb. Nerprun, Kreutzbeer. Exhibet baccas rotundas, quæ majorum piforum magnitudinem habent, nigræ funt, aliquot feminibus inftructæ & fuccum fovent cum quadam adstrictione acriufculum, naufeofum, colore lurido, nigro, cum vestigio viroris tinctum.

Rhamnus Catharticus L. BLACWELL 135. spinis terminalibus & floribus dioicis gaudet.

Occurrit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Baccæ exficcatæ ad ufus baphicos adhibentur, vix ad medicatos; fuccus inde expressus, alumine acuatus & infpissatus, modo ab Illustri DU HAMEL tradito, in pigmentum vertitur, quod Saftgrün, Verd de Vessie appellant.

Syrupus domesticus August. ad unciam unam datus alvum movet, hydropicis maxime, præeunte SYDENHAM, commendatus: * Rob Paris.

VIOLARUM FLORES vid. Fragrantia.

S. RESINOSA.

ACACIARUM FLORES vid. Adstringentia.

* AGARICUS, Araquedv, Lerchenschwamm. Eft fub-Rantia fungofa, non raro in varia tubera divifa, mox majore, mox minore volumine instructa, levis, nivea, digitorum affrictu friabilis & ipsi adhærens, fapore gaudet acri, amaro, naufeofo.

Reji-

640

Rejicimus massas ponderosiores & quæ non exquifita albedine gaudent, a Veteribus Mares apellatas.

Boletus fungus horizontalis, poris pertufus, Pini Laricis L. BLACWELL 477. habitu acauli, colore vario, poris difformibus gaudet.

Optimus ex Aleppo adducitur; ab eodem, officinis pharmaceuticis inferendo, cuticulam externam, diversi colorem auferre solent.

Exiguæ aquæ funt in Agaricum vires, fpiritus vini omnem ejus virtutem inde extrahit: Extracti Ipirituofi $\frac{3}{8}$ GEOFFROI accepit; $\frac{2}{3}$ Refinæ, Extracti aquofi ultra $\frac{5}{6}$ GMELIN; Extracti fpirituofi $\frac{3}{8}$, $\frac{1}{11}$ circiter aquofi NEUMANN; Extracti fpirituofi $\frac{1}{2}$ fere CARTHEUSER.

Purgantes vires Agarico effe GALENUS monet, & eum ad drachmam unam, tanquam eximium ad vifcerum obstructiones referandas medicamentum, commendat; vim purgantem tardam & debilem esse jam DIOSCORIDES annotavit, hodie solus nunquam datur, interdum stimuli loco aliis purgantibus adjicitur, cum alia cathartica habeamus certioris effectus, hinc eodem non male careremus.

Datur in fubstantia ad sesqui drachmam, in Infuso ad unciam dimidiam.

* Extractum aquofum VAL. CORD. * Extractum refinofum, præcuntibus Augustanis, Wurtembergenses recipiunt, & illud vi purgante admodum debili gaudere dicunt: * Trochisci de Agarico a MESUE, GA-LENO adscribuntur, sed jam MANARDUS locum reperire non potuit, cum nil proprii præ Agarico habeant, eviluerunt.

JALAPPA Recent. Hoc nomine ad nos adducuntur taleolæ, ut plurimum rotundæ, quæ thalerum circiter æquant, interdum etiam oblongæ, gryfeæ, cortice nigricante, rugofo, fubstantiam gryfeam, nigris ftriis variegatam cingentes, odore proprio naufeofo, fimilique fapore, cui evidens acrimonia jungitur, instructæ.

Quo graviores sunt, & quo plures strias nigras habent, eo meliores.

MIRABILIS. Corollam infundibuliformem, quinquefidam, plicatam, calice quinquefolio fustentatam, isantheram, monogynam habet, & nucem calici inhærentem: Jalapa BLACWELL 404. floribus congestis, erectis distinguitur.

Crefcit in Afia & America.

Primus CLOSSÆUS hanc ipfam effe genuinam Radicis Jalappæ plantam annotavit, id quod etiam eadem per aliquot annos inter nos culta evicit. MILLER propriam Convolvuli fpeciem adducit.

GMELIN $\frac{1}{5}$ refinæ, $\frac{1}{6}$ fere Extracti aquoli inde obtinuit; NEUMANN refinæ ultra $\frac{5}{76}$, Extracti aquoli vix $\frac{5}{76}$; CARTHEUSER refinæ $\frac{1}{12}$, Extracti aquoli $\frac{1}{2}$ circiter; Cl. SCHALLER refinæ ultra $\frac{1}{4}$, Extracti aquoli $\frac{1}{5}$, Ego refinæ $\frac{3}{76}$: cum taleolæ evidenter diversæ qualitatis fint, hinc analyses adeo inter fe differre, non miror.

Sub initium Seculi fuperioris hoc medicamentum ex Xalapa urbe Regni Mexicani, fedecim leucis a Vera Cruce distante, in Europam fuit allatum & tanquam eximium medicamentum purgans, frequentiffime a Medicis in usum tractum, a Facultate Lipfienfi apud AMMANN tanquam medicina tuta quoque commendatum. Evidenter effectum evacuantem ratione refinæ, quam fovet, edit, quæ cum evidenti acrimonia gaudet, ut WEPFER in canibus vidit, & BOERHAAVE ex faucibus ab ea exulceratis concludit, hinc recte medicamentis fortioribus adscribitur, cum autem taleolæ refinam in diverfa ratione vehant, hinc circa justam ejus dosin determinandam in diversas partes abeunt Auctores, & quæ a multis laudatur, ab aliis hypercatharfin excitaffe eft obfervata,

642

cautiores eam in fubstantia non ultra duos ferupulos exhibent, prudentiores plane non in ufum trahunt, fed ejus loco præferibunt, ob quam folam efficax eft,

Refinam : hæc mox, postquam ipfa radix in ufum trahi cœpit, parata fuisse videtur, cum Lipsienses anno 1634 de eadem, tanquam medicamento noto, loquantur. Evidenter irritando agit, hinc facile nauseam, vomitus, tormina excitat, nec convenit, ubi fibræ intestinorum strictæ funt, graves quoque femper noxas caufatur, nifi alicui faponi juncta, & ita aptata fuerit, ut a liquoribus inteffinalibus recipi, & justo tempore ex canali intestinali eliminari possit, parva enim etiam ejus portio, inter valvulas recepta, irritationem semper continuat, & ita non potest non hypercatharfin caufari, non paucæ obfervationes prostant de damnis ex ejus usu excitatis, quarum plures BUCHNER & COI collegerunt. Infantibus, pueris & omnibus, quorum primæ viæ five mucum spiffiorem, five torporem habent, cum fucceffu datur, nec imprudenti confilio purgantibus mitioribus, fi id ægroti rationes fuadent, parca dofi, ftimuli loco adjicitur. Infantibus a primo ad octavum ætatis annum tot grana dantur, quot annos habent, ab anno nono ad decimum quintum grana octo ad decem ufque exhibentur, apud adultos dosis nunquam ultra octodecim grana extendi debet. Id denique adhuc notandum effe duco, Pharmacopolas aditringendos effe, ut ipfi hanc refinam parent, cum ea, quæ apud feplasiarios prostat, creberrime five non rite ab extracto aquofo liberata, five Colophonio fophifticata occurrat.

* Extractum aquofum & refinofum commixta ZWOELFFER: * Morfuli purgantes Wurtemb. ¹/₇ circiter refinæ vehunt: Species Diajaluppæ MYNSICHT. * Specificum Jalappinum Hafnienf. nec hoc placet. Diarydonium Jalappinum VAL. CORD. Diarydonium lucidum Jalappinum Argent.

Ss 2

* MECHOACANNA Rec. Sub hoc nomine proffant taleolæ figura & craffitie ad illas, qua Jalappa adducitur, accedentes, illis etiam majores, ambit eas gryfeus cortex, ipfa autem fubftantia alba eft, folida potius, quam fungofa, non raro circulis diftincta ad quos ufque interdum gryfeus corticis color penetrat, odore nullo, fapore leviffime dulci gaudent.

MONARDES primus ejus mentionem facit, & eam medio Seculi XVI primum in Europam adductam fuisse, & a provincia Regni Mexicani denominatam, tradit.

Convolvulus. Corolla gaudet monopetala, campanulata, plicata, quinque dentata, calice quinquefido fustentata, isanthera, monogyna, capfula subrotunda: Mechoacanna L. BLACWELL 571.

Crefcit in America Meridionali.

Refina, quam vehit, vix ad fextam rationem ejus, quæ in Jalappa obtinet, accedere, teftatur Lewis. Extracti aquofi acris $\frac{3}{8}$, refinofi $\frac{1}{48}$ vehit. CARTHEUSER. Medicamento, quod tarde & fine ullo fere effectu agit, hodie vix ulterius utuntur Medici.

Dofis fecure ultra tres drachmas potest extendi.

* Extractum aquofum cum fpirituofo mixtum Wurtemberg.

PERSICORUM FLORES vid. Fructus Horai.

* SCAMMONEUM, onapporía. Est fuccus concretus, qui in majoribus massis ad nos adducitur, ex gryfeo nigricans in pulverem gryfeum reducendus, odoris valde naufeofi & faporis evidenter acris.

Duo ejus genera vulgo proftant, quæ pretio multum differunt: Aleppense nimirum & Smyrnæum, illud quod levius & magis gryseum est, ab hoc ponderosiore & multis striis nigris, latis, splendentibus distincto, differt: prostat etiam interdum Antiochenum totum nigricans, multis foraminibus quasi exessum, evidenter empyreuma redolens. Aleppense paratur ad Marasch, itinere quatuor dierum ab Aleppo distans, teste HASSELQUIST, SHERARD autem fidem facit, id, quod a Smyrna denominatur, ex Galatia & Cappadocia eo afferri.

Convolvulus Scammonea L. foliis fagittatis, pedunculis teretibus bi - vel trifloris distinguitur.

Crefcit in Afia Occidentali.

Autopta RUSSEL, quod hodie adhuc eadem, quam DIOSCORIDES narrat, ratione colligatur, refert: Junio nimirum menfe, caput radicis plaga obliqua vulneratur, fuccus ex vulnere defluens lacteus, conchis, five propriis vafis excipitur & fole exficcatur; fuccus per duodecim horas ftillat, & quælibet radix ejus vix aliquot drachmas largitur, eidem vix collecto, ruftici farinam, cineres, fabulum adjiciunt, idem Auctor autopta teftatur, falfam effe, quam non pauci, DIOSCORIDE duce, alunt fententiam, Euphorbium quoque addi.

Refinæ $\frac{5}{8}$, Extracti aquofi $\frac{1}{32}$ fere GMELIN inde obtinuit ; ex Smyrnæo NEUMANN Extracti aquofi $\frac{1}{2}$, fpirituofi $\frac{1}{3}$ feparavit.

Cum DIOSCORIDES, fcammoneum nitidum & colore glutini fimile effe, dicat & illud ad drachmam unam pro dofi præfcribat, MESUE in modum gemmæ clarum & boni odoris effe tradat, hinc valde metuo, noftrum ab eo,quo Veteres utebantur, diverfum effe; Arabes primi fcammoneum valide agere & facile turbas excitare annotarunt, hinc varia ratione ejus virulentiam corrigere tentarunt, eidem hodie prudenter minus naufeofam & mitiorem refinam Jalappæ fubftituimus.

* Diagrydium, voce qua CÆLIUS AURELIANUS ipfum fcammoneum denotat, labente ætate idem correctum, ut putarunt, indigitare in more habebant, Cydoniatum GALENI, Glyzyrrhizatum S. CLOSSÆI, Rofatum CROLLII, Sulphuratum COMITIS DE WAR-

Ss 3

WICH in Indicibus medicamentorum occurrunt, cum omnes hæ correctiones nullius ufus fint, hine non male ut plurimum Pharmacopolæ Scammoneum pulverifatum hoc nomine affervant : *Pulvis Cornachini* eft medicamentum COMITIS DE WARWICH, etiam *Pulvis de tribus* nec non *Cerberus triceps* folet appellari, a CORNACHINO proprio tractatu Florentiæ 1619 impresso defcriptus, Nostrates non male Diagrydio refinam Jalappæ fubstituerunt, frequentissimi olim ufus erat, datur ad drachmam dimidiam: * *Refina Scammonei* ANGEL. SALÆ, ipfo Scammoneo magis acris esse dicitur, hinc prudentes ab ejus ufu defistunt.

SENNA Recipiuntur Folia & Fructus, quos Folliculos dicunt.

Folia funt ex ovatis oblonga, nervo longitudinali diftincta, fine acuto terminata, læte viridia, cum vestigio flavedinis, proprio odore nares feriunt, fapore amaro, nauseoso, cui aliquid acris junctum est, gaudent, talia a Medicis Alexandrina, a Mercatoribus de la Palte dicuntur, a vectigalis genere, quod omnes merces Cairo illatæ, Præsecto urbis pendere tenentur, Apalto dicto.

Rejicienda funt Tripolitana, Alexandrinis majora, tota viridia, & obtufa, nec non Italica, obtufa & magnis venis distincta, Mochana quoque angustiora, longiora, acutiora, hæc tria genera Alexandrinis etiam minus odorata funt.

Folliculi funt Legumina ovata, compressa, viridia, plura femina oblonga includunt, odore nullo, sapore falino, levissime folia referente, amaritie nulla gaudent, hujus generis folliculi quoque de la Palze dicuntur, illis, quos a Tripoli denominant, omnino præferendi, qui minores, minus virides & multo nigro & ruso colore inquinati funt, Cassia Senna L. tribus vel quatuor paribus pinnarum subovatarum distinguitur.

Crefcit in India & Ægypto fuperiore.

Extracti fpirituofi $\frac{3}{10}$, aquofi ultra $\frac{1}{2}$ NEUMANN, CARTHEUSER Extracti aquofi $\frac{1}{4}$, refinofi $\frac{1}{8}$ fere ex foliis obtinuerunt.

Primus SERAPIO hujus medicamenti meminit, Arabes & non pauci Restauratorum Artis nostræ Folliculos Foliis præferendos effe fuaferunt, FRAN-CISCUS ALEXANDER crebrius observavit, Folliculos Foliis magis alvum fubduxiffe; MANARDUS Folia Folliculis præfert, & hunc plurimi funt fecuti, optime ALEXANDER & COSTÆUS rem videntur decidiffe, Folliculos nimirum rite collectos Foliis omnino præstare, istis autem utique inferiores esse, si vetustate fuerint exficcati & colore vivido privati; laudanda itaque Gallorum industria, qui Folliculorum usum denuo revocarunt, a foliorum naufeofo odore & fapore immunium, & multo minus quam folia tormina excitantium. Ex eo, quod folia tormina caufantur, ea ratione partium refinofarum agere colligimus, minus bene itaque vulgo medicamentis eccoproticis adícribuntur. Stipites illis intermixti infigniter torminales funt, hinc femper cautifime inde feparandi. Denique adhuc probe retinendum, nec Folia nec Folliculos coctionem ferre.

Folia æque ac Folliculi ab uncia dimidia ad drachmas fex pro dofi dantur, fub forma infufi aquofi, minus bene a quibufdam in fubftantia præfcribuntur.

*Extractum aquosum VAL. CORD. iners: * Species pro Ptisana Regia Argent. pro infuso per epicrafin laxante olim in multo usu erant.

*TURPETHUM Rec. Hoc nomine in officinis proftant Cortices digiti circiter longitudine & latitudine, lineam craffi, striis longitudinalibus nigris, refinosis notati, extus dilutius fusci, intus magis albicantes, striis nigris refinofis diftincti, fapore nullo præditi. Interdum ipfæ Radices proftant, feu fruita radicum, plures pollices longa, ex capite ad quatuor pollices craffo, in corpus cylindroideum pollicare terminata, rugis longitudinalibus notata, hinc inde fcrobibus excifa.

Convolvulus Turpethum L. Foliis cordatis, angulatis, caule alato & pedunculis multifloris diftinguitur.

Crescit in India.

Ultra $\frac{7}{16}$ Extracti aquofi, fpirituofi $\frac{1}{8}$ obtinuit inde NEUMANN; Extracti aquofi $\frac{1}{4}$, fpirituofi acris $\frac{1}{10}$ CARTHEUSER.

Primi Arabes hujus medicamenti mentionem fecerunt, fed eorum descriptiones adeo inter fe distant, adeo breves sunt, ut, quid eorum *Turbith* fuerit, neutiquam possit confici, radices hodie usitatæ demum a GARCIÆ AB ORTO tempore obtinent : medicamentum incertum, & de cujus effectibus nullæ fidæ observationes prostant, jure exfolevit. Dabatur in substantia ad drachmam unam, in Insuso ad unciam dimidiam.

* Extractum gummosum & spirituosum commixta Wurtemberg. * Refina SCHROEDER. * Species Diaturbith Hamburg. inconcinna compositione optime caremus.

5. 59.

V. DIURETICA.

Medicamenta, quæ efficiunt, ut excretio urinæ copiofior obtineat, Ausgerina, Diuretica appellantur, agunt illa, five rationem aquæ in massa humorum augendo, five propria fibi virtute efficiendo, ut sangus majori quantitate ad renes ruat, hoc cum fit, necessaria Naturæ lege, major quantitas humorum quoque vasa, quæ partibus genitalibus prospiciunt, subit & hinc hæc medicamenta aphrodisiacos quoque, emenagogos & aristolochicos edunt effectus. Primum genus Diureticorum indicatur ab omni heterogeneo, per humorum massam diffuso, hinc tam in acrimonia, quam ubi Natura crifin per urinam molitur, folet exhiberi : alterum genus, quod quoque Positivum dicunt, in usum trahitur, tam quando aqua in aliqua corporis parte præter naturam collecta hæret, quam quando renes fordes habent, nec non quando pectus affectum eft: dum hoc diureticorum genus peregrina, quæ viæ urinariæ habent, eliminet, hæc autem & originem & incrementum calculis foleant dare, hinc medicamenta, fub illo comprehensa, Lithontriptica quoque appellare, receptum eft, & hoc fenfu medicamenta contra calculum facientia statuere abfonum non eft, talia autem dari, quæ calculum jam induratum diffolvant, abfolute contrariatur naturæ calculorum, medicamentorum ipforum ad hunc fcopum laudatorum & partium, quibus calculus continetur. Diuretica politiva debent exulare in omni cafu, ubi viæ urinariæ nimis angustæ funt, pro emittendis eis quæ ad ipfas appellunt, five ubi fpafmo constrictæ funt, five qualicunque angustia laborant, five eorum diameter nativus minor est volumine transmittendo; exulare etiam debent hæc medicamenta, cum viæ urinæ inflammationem aut ulcus habent. Omnis generis Diureticorum abufus mala, quæ a renibus debilitatis oriri Pathologia evincit, producere certum eft.

§. 60,

Primum genus Diureticorum Attenuantia (Cap.VI.) constituunt.

Ad alterum pertinent

a. VEGETABILIA.

ADIANTUM vid. Subadstringentia. Ss s ALKEKENGI Arab. Annénaßor, Vesicaria, Coquerets, Judenkirschen. Baccæ rotundæ, rubræ, pulpam, cui levis sapor vinosus inest, non ingratam & plurima semina continentes.

PHISALIS. Corollam monopetalam quinquefidam, regularem habet, fimili calice fuftentatam, ifantheram monogynam & baccam intra calicem multum inflatum contentam, polypyrenam: Alkekengi BLAC-WELL 161. foliis conjugatis, cordatis, finuatis diftinguitur.

Crefcit in Europa temperata, in Saxoniam usque ascendit.

Dum baccæ e calice defumuntur, prope cavendum, ne ab eodem, amariffimo quippe, contingantur, inde enim naufeofam amaritiem contrahere folent.

GALENUS, has baccas ad ciendam urinam facere, tradit, id quod etiam omnes Medici per omnem ætatem affeverant, RAJUS obfervationes de hac earum virtute adducit, MARTIUS virum vidit per has baccas curatum, postquam fætentem multum urinam minxerat, frequenti in usu ad hydropem folent esse.

* Trochisci Alkehengi MESUE correcti Wurtemb. inconcinna compositio, qua olim ad dysuriam utebantur: * Aqua destillata NICOL. PREPOS.

ALLIUM vid. Olera.

AMMI SEMEN vid. Aromata. ANANAS vid. Fructus Horai.

APIUM vid. Olera.

ARMORACIA vid. Olera.

ARNICA vid. Refolventia.

ASARUM vid. Vomitoria.

Asparagus vid. Olera.

BALS. DE COPAIBA vid. Kefmofa.

* CALCITRAPPA Barb. Chausse trappe. Exhibet nobis radices digitum craffas, cylindroideas, fub cortice gryfeo substantiam albam, cui levissimus fapor, odor nullus est, includentes.

Centaurea Calcitrappa L. Calicibus pinnis spinosis instructis, foliis angustis pinnatis, pinnis distantibus agnoscitur.

Non ultra Saxoniam afcendit, varietas floribus albis copiofe apud nos occurrit.

Lego jam apud JOHANNEM BAUHINUM, hanc plantam contra calculum fuisse commendatam, maximam autem famam affecuta eft, cum D. DE LA-MOIGNON DE BAVILLE egregios ejus in affectibus renum effectus, quos in se expertus erat, publico foripto expoluit, unde TOURNEFORT sequentem remedium adhibendi modum nobis reliquit: cujuslibet menfis vigefima octava die lunari drachma una corticis radicis, Septembri menfe collectæ, affumitur, vini cyatho infufæ, fuperbibitur infufum ex Herbæ Parietariæ manipulo uno, Lıgni Saffafras & Seminis Anifi fingulorum drachma una, Cinamomi drachma dimidia cum aquæ unciis octo per noctem maceratis, & quæ altero mane parum ebulliverunt, Sacchari Candi unciis duabus edulcoratum. PORTALEZ & TEISONNIER annotarunt, Recentiores observasse, melius hoc medicamentum dari mane & versus vesperam, tribus ultimis cujuslibet menfis diebus; hodie multum de auctoritate, quam olim habebat, perdidit.

CARDAMOMUM vid. Aromata.

CARVI vid. Aromata.

CEPA vid. Olera.

CERA-SORUM NUCLEI vid. Fructus Horæi. CETERACH vid. Subadstringentia. CHÆROPHYLLUM vid. Olera. CICER vid. Legumina. CITRULLI vid. Fructus Horæi. CUCUMIS vid. Fructus Horæi. CYNOSBATI vid. Adstringentia.

CYPERI RAD. vid. Aromat. Daucus vid. Olera. EQUISETUM vid. Adstringentia. ERYNGIUM vid. Resolventia. FILIPENDULA vid. Aromata. FRAGA vid. Fructus Horai. FRAXINI SEMEN vid. Amara.

* GENISTA, Genét, Pfrimmen. Flores recipimus papilionaceos flavos, qui exficcati evidenti amaritie, odore nullo gaudent: Semen cylindroideum eft, fuperne levissime incifum, splendens flavum, includit medullam flavicantem, fapore dulci, ut alia femina leguminofa, instructum.

SPARTIUM. Florem papilionaceum habet, calice in duo segmenta abeunte sustentatum, quorum superius integrum est, inferius in quinque dentes fecedit, vexillum corollæ totum reflexum eft: legumen cylindraceum obtusum: Scoparia L. BLACWELL 244. foliis ternatis & folitariis, ramis angulatis, inermibus gaudet.

Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem, vulgare noftrorum montium ornamentum, verfus Helvetiam deficit.

Gemmas florum fale & aceto conditas in modum Capparum apud Germanos in usum tractas fuiffe. SCHROEDER monet & apud Brabantos & Anglos Lo-BEL, hic ipfe quoque, easdem Averniæ & Aquitaniæ populos copiofe ad acetaria recipere, nec inde incommoda sentire, testatur. Floribus hydropicum curatum, MEAD adducit. Cineres totius plantæ aperientes & hydragogos effe, ex indole cineri omni propria, evidens, & ODELIUS expertus est.

Semina LOBELII fide, dicuntur emetica effe, ignoro num recte.

* Conferva VAL. CORD. * Oleum coctum LEMERY. IRIS vid. Arom. JUNIPERUS vid. Aromata.

LAMIUM, razelo 416, Urtica, CORD. Ortie blanche, Nessel. Folia & Flores recipiuntur.

* Folia cordata funt, acute terminata, levi hirfutie obfessa, levi omnino odore & fapore instructa.

Flores labiati funt, albi, odoris & faporis expertes. LAMIUM. Corolla labiata, cujus labium fuperius integerrimum eft, inferius utrinque denticulo notatum, calice quinquefido fuftentata & feminibus nudis gaudet: Album L. folia habet petiolata, cordata,

acuminata & verticillos multifloros. Crefcit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem.

Proprias huic plantæ medicatas vires ineffe, hactenus non eft evictum, apud nos flores in frequenti ufu funt ad fines diureticos & emenagogos, nec non ad lochia promovenda; fi hic aliquid præftant, laxando agere videntur.

LAMIUM PLINII hoc nomen inter nos maxime obtinet, improprium valde, cum Lamium, a PLINIO ad morbos laudatum, fit Lamium Maculatum L. a nostra planta diversissimum, ista vulgo Melissophyllum, FUCHSIO præeunte, dicitur: Recipimus ejus Folia, quæ ex ovatis acuta sunt, petiolata, hirsuta, odore & sapore non ingratis, evidenter aromaticis instructa.

MELITIS L. Corolla labiata, labio fuperiore integro, inferiore trifido, lacinia media majore, calice campanulato fuftentata, evidenter bilabiato, feminibus nudis gaudet.

Crefcit per omnem Europam, ad Boruffiam ulque.

Cl. KOENIG, oleum destillatum & falem effentialem inde se obtinuisse, refert.

Jure vires plantarum aromaticarum inde expectantur, eam egregie ad purgandos a fabulo & muco renes facere, nec inertem in pellendis menfibus effe, iteratis inter nos maxime obfervationibus conftat. Datur fub forma Infusi Theæformis. LINARIA vid. Emollientia. LVCOPODIUM vid. Subadstringentia. MELO vid. Fructus Horæi. MENTHA vid. Aromata. MEU RADIX vid. Incidentia.

* MILIUM SOLIS Barb. AIGéomequov, Lithospermum, Gremil, Herbe aux Perles, Meer - Hirs. Exhibet nobis semina, quæ rotunda sunt, inferne contracta, alba, nitida, sub cortice crassiusculo includunt medullam suscam, odoris & saporis expertem, cum acidis effervescentem.

LITHOSPERMUM. Corolla gaudet infundibuliformi quinquefida, fimili calice fuftentata, ifanthera, monogyna & feminibus nudis, glabris: Officinale L. corollis, calicem vix fuperantibus, & foliis lanceolatis diftinguitur.

Crefcit per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem,

Vis lithontriptica ipfi a DIOSCORIDE & vulgo Medicorum adferipta, evidenter ejus fimilitudine cum lapillis nititur, nec ulla fida obfervatione confirmata eft, a Syrupo inde parato, cui a DIVO AMBROSIO nomen eft, egregias ad dyfenteriam vires KRAMER eft expertus.

NASTURTIUM vid. Olera.

* NEPHRITICUM LIGNUM Recent. In majoribus frustis ad nos adducitur, ex flavo-pallescens, extus dilute fuscum, meditullio spadiceo fusco instructum, odoris nullius, faporis leniter adstringentis, aquæ, cum qua infunditur, opalinum colorem conciliat, qui, fi lumini obvertitur vitrum, quod tincturam continet, aureus apparet, cæruleus autem, fi vitrum inter & lumen oculus collocatur.

A Guilandina Moringa fubministrari, Illustris LINNÆUS afferit, sed hæc arbor Orienti indigena est, nostrum autem Lignum ex Regno Peruviano ad nos mittitur, apud Auctores quoque, qui Afiaticam arborem defcribunt, nullam hujus Ligni reperio mentionem.

Extracti aquosi $\frac{1}{12}$ spirituosi $\frac{1}{5}$ circiter obtinuit CARTHEUSER.

MONARDES & HERNANDEZ hoc lignum præcipue ab ejus virtute organa uropœa fordibus depurandi laudant; hanc virtutem cum nulla fide digna inter Europæos obfervatio confirmaverit, hinc eviluit.

ONONIS vid. Refolventia. PAREIRA BRAVA vid. Amara. PERSICA vid. Fructus Horai. PETROSELINUM vid. Olera. PIPER vid. Aromata. POLIUM vid. Aromata. PORRUM vid. Olera. RAPA vid. Olera. RIBESIA NIGRA vid. Fructus Horai. Rosarum spongia vid. Adstringentia. Ruscus vid. Refolventia. RUTA vid. Aromata. SABINA vid. Aromata. SAXIFRAGA vid. Rejolventia. SCHOENANTHUM vid. Aromata. SENEKA vid. Resolventia. SESELI vid. Aromata. SPICA NARDI vid. Aromata. SQUILLA vid. Amara. TEREBINTHINA vid. Refina. VINUM vid. Uva. VIOLARUM Semen vid. Fragrantia.

B) ANIMALIA.

CANTHARIDES vid. Acria. COCCIONELLA vid. Roborantia. LUMBRICI vid. Sopientia. MILLEPEDES vid. Attenuantia.

OVORUM PUTAMEN vid. Nutrientia.

2) FOSSILIA.

* NEPHRITICUS LAPIS Recent. ex fquammis e nigro virefcentibus, fplendentibus compofitus, tornum admittens, ferri & cupri vestigia vehit, & aliquid quasi pinguis, digitis cum tangitur, fistit. Pro variis heterogeneis, quæ ipsi accreverunt, variæ puritatis est, & vario pretio venditur. America pulcherrimum dicitur largiri. Passim in Europa occurrit. Est Talcum Nephriticum L. proxime ad Serpentinum accedit, cum quo in eo etiam, quod magnesiam vehat, convenit, Acida ejus aliquid dissolvere, ipsum destillatione falem Ammoniacalem & oleum empyreumaticum fundere, NEUMANN annotavit.

Eum in America occurrere, primus est, qui tradit, MONARDES, illumque vel solummodo gestatum, multum ad affectus nephriticos facere monet, plures Auctores id ipsum quoque observationibus stabilire connati sunt, sed experientia constans eas sutiles & merum sigmentum esse demonstrat; unde recte eundem e syllabo medicamentorum expungi patet.

NITRUM vid. Incidentia.

§. 61.

Menfium & Lochiorum fluxus cum a diverfiffimis caufis ita imminuuntur, ut Medicina opus habeant, hinc abfoluta *Emenagoga & Aristolochica* non dantur; ea autem medicamenta, quæ fanguinis ad uterum impetum augent, passim & præcipue §vo antecedente recensita fuerunt.



LOCA

LOCA AUCTORUM.

A.

A BANUS Conciliator. Venet. 1565. fol.

Comit. 1660. 12.

ACOLUTHUS Joh. in Ephemerid. Naturæ Curiof. Dec. II. A. 9. 4.

- Joh. Carol. in Act. Academ. Natur. Curiof. Vol. X. 4.

ACRELL in Abhandl. der Schwed. Academie. 1754. 8. Acta Helvetica T. V. Bafil. 1762. 4.

ACTUARIUS cum Artis Medicæ Principibus. ÆGINETA cum Artis Medicæ Principibus. AETII Tetrabiblos cum Artis Medicæ Principibus. AGRICOLA de Re Metallica. Basil. 1657. fol. ALBERTI Systema Jurisprudentiæ Medicæ. Halæ 1725-

1742. Tomi VI. 4.

- - Observationes de Arnicæusu. Respond. DE LA MARCHE. Hala 1719.

- - de Belladonna. Respond. OETTINGER. Halæ 1739.

- - de fingulari Mercurii dulcis ufu in desperatis quibusdam morbis. *Respond*. HAVIGHORST. *Halæ* 1745.

- - de Valeriana. Resp. STANTKE. Halæ 1732. ALBERTINI in Commentar. Instituti Bononiens. T. I. 1731. 4.

ALBERTUS MAGNUS de Mineralibus & Rebus metallicis per JYFF. Argent. 1541. 8.

ALBRECHT Joh. Petr. in Ephemerid. Natur. Curiof. Dec. III. A. 5. & 6. 4.

- Joh. Sebast. in Commerc. litterar. Noric. 1734. 1735. 1738. 1740. 4.

ALEXANDER Benedictus apud SCHENCK Observat.

- - Francisc. Apollo. Venet. 1565. fol.

- - - Guilielm. Cantharidum historia & usus. Edinburg. 1769. 8.

ALEXANDRINUS apud SCHENCK observationes.

ALEXIUS Pedemontanus de Secretis per WECKER. Basil. 1603. 8.

ALLION de Origine Milliarium. Taurin. 1758. 8.

ALPINUS Prosper. de Medicina Ægyptiorum. Lugd. Bat. 1745. 4.

ALSTON Effais & Obfervations de Médecine de la Société d'Edinbourg. T. V. Paris 1743. 12.

- Differtation on Quick lime. Edinburgh. 1754. 1757. 8. 3 Vol.
- Lectures on Materia Medica. London 1770. 2 Vol. 4.

AMATUS LUSITANUS in DIOSCORIDEM. Argentor. 1554. 4.

AMMANN Medicina Critica. Stade 1677. 4.

AMOUREUX in JOURNAL de Medecine. 1760.

ANDOVILLE in Hift. de l'Académie Roïale de Chirurgie III. Paris 1757. 4.

Antidotarium Bononiense. 1615. 4.

APINUS Febris epidemica annorum 1694 & 1695. Norimb. 1697. 8.

APOLLODORI Bibliotheca per COMMELINUM. 1599. 8. d'APPLES in Act. Helvetic. T. III. Bafil. 1758. 4. ARCÆUS de recta curandorum vulnerum ratione.

Amftelod. 1658. 12.

ARDOYNUS de Venenis. Bafil 1562. fol. ARETÆI Opera per BOERHAAVE. Lugd. Bat. 1735. fol. ARISTOTELIS Opera per DU VAL. Parif. 1619. fol. 2 Vol.

^{- - -} William Experimental Effais. London 1770. 8.

Artis Medicæ Principes. 1565. fol.
Astruc de Morbis Venereis. Lutet. Parif. 1740. 4. 2 Vol.
Asverus apud Scharf de Junipero.
Athenæus per Casaubonum Lugd. 1657. fol.
Avicenna per Rinium. Venet. 1582 fol.
Aurelianus Calius de Morbis acutis & chronicis per Ammann. Amftel. 1755 4.
Aurelique in Journal de Medecine. 1762. 8.

B.

BADII Anastasis Corticis Peruviani. Genev. 1663. 4.
BAUMLIN in Commerc. litter. Noric. 1741.
BAGLIV Opera. Lugd. 1710. 4.
BAIER de Artemisia. Altdorf. 1720.
BAKER in Philosoph. Transact. 1748.
BALDINGER apud REISIG.
BALLONIUS Epidem & Ephemerid. Parif. 1640. 4.
BANCROFFT Naturgeschichte von Guiana. Leipzig

1769. 8.

BARBETTE Opera. Geneva 1688. 4.

BARBEYRAC Formulæ Medicamentor. Lugd. 1751. 12. BARCHUSEN Elementa Chymiæ. Lugd. Bat. 1718. 4. BARON in Memoires préfentés à l'Académie. Tom. I. Paris 1750. 4.

BARRY in Effais & Obfervations de Medecine de la Société d'Edinbourg. T. IV. Paris 1742. 12.

BARTHUS in Memoires préfentés à l'Acad. T. III. Paris 1760. 4.

BARTHOLD Terræ sigillatæ variæ. Francof. 1583. 8. BARTHOLETTUS Encyclopædia. Bonon. 1619. 4.

BARTHOLINUS Caspar. Exercitationes miscellanez. Leida 1675. 8.

Tt 2

BARTHOLINUS Thom. Dispensatorium Hafniense. 1658- 4.

- - - Epistolæ Medicinal. Hagæ Com. 1740. 4 Vol. 8.

- - - - Medicina Danorum domestica. Hafnia 1666. 8.

BASTER Opuscula. Harlem. 1762 & 1765. 4. BAUDERON Pharmacopée per VERNY. Lyon 1681. 4. BAUDRY Eaux de Bourbon. Dijon 1736. 8. BAUHINUS Caspar. de Lapide Bezoar. Basil. 1631. 8.

- - Joh. Historia Plantarum per CHABRÆUM. Ebrodun. 1650. 3 Vol. fol.

BAUMÉ Elemens de Pharmacie. Paris 1762. 8. BAVER Enchirid. de medendis humani corporis malis.

Lugd. 1565. 12.

le BEAU in Journal de Medecine. 1759.

BECCARIUS in Comment. Institut. Bononienf. T. II. P. I. 1745. 4.

BECHER vom Carlsbad. Prag 1772. 8.

van der BECK in Act. Acad. Nat. Curiof. Vol. I.

BEGUINUS Tyrocinium Chymicum. Amft. 1669. 8. BEHR Materia Medica. Strafsburg 1748. 4.

BEHRENS in Schlehlifch. Sammlung von Natur- und Kunftgeschichten. Leipz. u. Budissin 1724. 4.

BEIER in Schlefifch. Samml. von Natur- und Kunft.

geschicht. 1723. Leipz. und Budissin 1725.

BELLOSTE Traité du Mercure. Berne 1742. BENVENUTO Dissertat. ad BECCARIUM qua Epidemic.

Febris in Lucenfi Dominio &c. Lucca 1654. 8. BERCKLEY Recherches fur les vertus de l'Eau de Goudron. Amsterd. 1745. 8.

BERGMANN in Act. Medic. Berolinenf. Vol. VI.

BERGER Joh. Gothofr. Chinchina ab iniquis judiciis vindicata. Vitemb. 1711.

- Joh. Sam. in Commerc. litterar. Noric. 1735.

BERNITZ in Ephemerid. Nat. Curiof. A. 2. BERTRAND in Hift. de l'Académie Royale des Scienc. 1737. BETTUS apud GALLO. BIANCHI Il vitto Pittagorico di foli vegetabili. Venez. 1752. 8. BIESHAAR in Journal de Médecine. 1763. 8. BINET in Journal de Médecine. 1761. 8. BINNINGER apud KŒNIG Regn. Vegetabil. BLACWELL Herbarium emendatum & auctum. Norimb. 1740. – 1773. Centuriæ VI Tabularum coloribus expressarum cum explicatione. BLAIR Pharmaco-Botanologia. London 1723 - 1727. VI. Decad. 4. BLAU in Ephem. Nat. Curiof. Dec. III. A.7. BLEGNY Le remede anglois publié par ordre du Roi pour la guérifon des fievres. Paris 1682. 12. - - Zodiacus Medico-Gallicus ab anno 1674 ad 1683. Geneva 1680. 4. van den BLOCK in Journal de Médecine. 1761. BŒHM de variis Siphylidis therapiis. Argent. 1771. BEHMER Joh. Benjam. de Radicis Rubiæ tinctorum effectibus in corpore animali. Lipf. 1751. Philipp. Adolph. de falutari ufu Extracti - -Aconiti Refp. ANDREE. Lipf. 1768. BENNECKE Biga cafuum medicorum. Werth. 1744. 4. - - in Frænkifch. Sammlung. T. V. Närnb. 1760. 8. - - in Nov. Act. Nat. Curiof. Norimb. 1761. 8. BOERHAAVE Elementa Chemiæ. Lugd. Bat. 1732. 4. 2 Vol. - - de Morbis Nervorum per VAN EEMS. Lugd. Bat. 1761. 8. de Viribus Medicamentorum. Paris 1723. 12. BESSEL in Commerc. litterar. Noric. 1736. Tt 3

BOMARE, VALMONT DE, Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle. Iverdon 1768 & 1769. 8. 12. Vol.

BONNET Anatomia Practica. Genev. 1672. fol.

- - Medicina Septentrionalium. Genev. 1684 fol. Волтекое van The, Coffy und Chocolate. Haag 1685. 12.

BONTIUS Hiftoria naturalis & medica Indiæ Orientalis. Amstel. 1658. fol.

BORELLUS Historiæ & Observationes. Frf. 1670. 8. BORRICHIUS in BARTHOLINI Actis Hafniens.

- - - - apud - - - - Epistol. Medic.

BOSWEL apud CRANZ Mat. Med.

BOUCHARD in Ephem, Natur. Curiof. A. 2.

BOUDU in Mem. de l'Académ. de Chirurgie. T. I. Paris 1743. 4.

BOULDUC in Histoire de l'Académie Royale des Sciences 1705, 1719, 1734.

BOURDELIN in Mémoires de l'Académie depuis 1666 julqu'à 1699.

BOURDIER in Mémoires tirés des Lettres édifiantes. T. 1. Paris 1672. 12.

BOUVART in Hift. de l'Académ. Royale des Sciences. 1744.

BOYLE Opera omnia. Geneva 1714. 4. 3 Vol.

- - apud RAJUM,

BRASSAVOLA Examen omnium fimplicium. Lugd. 1556. 8.

- Ratio victus in morbis acutis. Venet. 1546. fol.

BRENDEL Chymia, Lugd. Bat. 1671. 12. BREYN in Ephem. Nat. Curiof. A. 3.

- - Plantarum Exoticarum Centuria. Gedan. 1678. fol.

BRIDAUT in RICHARD Recueil d'Observations de Médecine T. II. Paris 1772. 4.

BRISSON Ornithologie Paris 1756-1760. 4. 6 Vol.
Regne Animal. Paris 1756. 4.
BROGIANI de Veneno Animantium. Florent. 1752. 4.
BROSSARD in Journal des Scavans. 1751. 4.
BROUZET in Mem. préfentés à l'Académie des Sciences. T. II. Paris 1755. 4.
BROWN Hiftory of Jamaica. London 1756. fol.
BRUCH Carl Ludwig de Anagallide Argent. 1758.
Frid. Daniel Obfervationes quædam practicæ

de Radicis fruticis Juniperi decocto. Arg. 1736. BRÜCKMANN Epistolæ Itinerariæ. Wolfenbüttel S Brunsvig 1742-1752. 4. 3 Centuriæ.

BRUCKNER in Select. Medic. Francofurt. I. Francof. ad Viadr. 1739 8.

BRUNFELS Novum Herbarium. Argent. 1539. fol. 3 Vol.

à BRUNN in Act. Academ. Naturæ Curiof. Vol. I. BRUNNER in Ephemerid. Nat. Curiof. Dec. II. A.6. BRUNSVICENSIS Hieron. de Arte destillandi. Argent. 1512. fol.

BRUYERINUS de Re cibaria. Norimb. 1659. 8. BUCHNER apud SCHULZ Mater. Medic.

- - in Act. Acad. Nat. Curiof. Vol. V.

- - Mifcellanea Phyfico - Medico - Mathematica. Erford. 1727, 1728, 1729.

- - - de Curcuma Resp. LEBER. Halæ 1748.

- - de remediis Mercurialibus fpinæ ventofæ medicandæ interdum idoneis Resp. NIEMANN. Halæ 1754.

- - de genuinis Opii effectibus Resp. SCHWARZ. Halæ 1748.

- - de genuinis viribus Tabaci Resp. FRAUEN-KNECHT. Halæ 1745.

BUDÆUS in Ephem. Nat. Curiof. Dec. III. A. 7 & 8. du BUISSON apud DEGNER.

Tt4

de BUFFON Hiftoire naturelle générale & particuliere. Paris 1749 - 1771. 4. 17 Vol.
BURCKARD de Radice Senecka. Argent. 1750.
BURCKEL de Gratiola. Argent. 1738.
BURGGRAF in Act. Acad. Nat. Curiof Vol. V.
BURGHARD Deftillirkunft. Brefslau 1747. 8.
BULGMANN in Commerc. litterar. Noric. 1733.
BURMANN ad PLUMIER.
BUXBAUM Plantarum minus cognitarum Centuriæ V.

Petropol. 1728-1740. 4.

C. .

BRICKMANN

CADET Analyfe des Eaux minérales de Calfabigy. 8. - Hift. de l'Académie Royale des feiences. 1766. CÆSALPINUS de Plantis. Florent. 1583. 4. CAMERARIUS Joachim Hortus Medicus & Philosophi-

cus. Francof. 1588.

- - Joh. Rudolph. Sylloge Memorabilium Medicinæ. August. Trebocc. 1624. 12.

CAPPEL apud SPRINGSFELD Iter Medicum. CARL in Commerc litterar. Noric. 1736. CARTHEUSER Fundamenta Materiæ Medicæ. Francf.

1749 & 1750. 2 Vol. 8.

Resp. FALLEBORN. Francof. 1746.

a CASTRO Muliebrium morborum medicina. 1617. 4. CATO de Re Rustica in Scriptoribus Rei Rusticæ ed.

GESNER. Lipf. 1774. 4. 2 Vol. le CAT in Recueil Périodique. 1755. CELSUS de Re Medica per KRAUSE. Lipf. 1766. 8. CHABRON in Recueil Périodique. 1755. CHAMBERS de Ribes Arabum & Ligno Rhodio. Lugd. Bat. 1724.

CHARAS Opera. Genev. 1683. 4.

CHEMIN in Journal de Médecine. 1768.
du CHESNE Hiftoire des Fraisiers. Paris 1766. 12.
CHEVALIER in Hift. de l'Acad. Royale des sciences. 1709.
CHOMEL Dictionnaire Oeconomique. Commercy 1741. 2 Vol. fol.
CICERO Opera Epistolica. Berol. 1747. 8.

- - Opera Philosophica. Berol. 1747. 8. 2 Vol.

CLEPHANE Observations by a Society of Physicians. T. I. London 1763. 8.

CLAUDER Ephem. Natur. Curiof. D. II. A. 6 & 7.

le CLERC Histoire de Médecine. à la Haye 1729. 4. CLOSSÆUS apud HORST.

CLUSIUS Curæ posteriores. Antwerp. 1611. fol.

- - - Exotica. Antw. 1605. fol.

- - - Historia Plantarum rariorum. Antwerp. 1601. fol.

- - - Rariorum aliquot Stirpium per Hispaniam observatarum Historia. Antw. 1567. 8.

Codex Medicamentarius. Parif. 1758. 4.

COEURDOUX in Mém. tirés des Lettres édifiantes. T. I. Paris 1767. 12.

COHAUSEN in Act. Acad. Nat. Curiof. Vol. VII.

- - in Commerc. litterar. Noric. 1742.

- - in Act. Acad. Nat Curiof. Vol. VI.

COLBATSCH Collection of Traits chirurgical and medical. London 1719.

- - - Differtation concerning Misletoe. London 1719. 8.

Collignon in Journal de Médecine. 1761. Collin Nosocomii Annus Medicus tertius. Vindob.

1764. 8.

 - Obfervationes circa morbos acutos & chronicos. Vienna 1772. 8.

Cumanus in Ft St Mahus

COLUMELLA cum Scriptoribus Rei Rufticæ ed. GES-NER. Lipf. 1735. 2 Vol.

COLUMNA Fab. apud RAJUM.

DUTOBASANG per PLANCUM. Mediol. 1744. 4. de la CONDAMINE in Hift. de l'Acad. Royale des fciences. 1737, 1738.

CORDUS Valerius Annotationes in Diofcoridem & Historia stirpium cur GESNER 1561. fol.

- - - Difpenfatorium. Norimb. 1592. fol. COSNIER An Rachitidi Rubia tinctorum &c. Refp. Ro-BERT. Paris 1758.

- - in Recueil Périodique. 1755. COSTEUS in MESUEN.

COSTE in Journal de Médecine. 1764 & 1769. de COTES in Journal de Médecine. 1762.

COURTIVRON & BOUCHU Art des Forges & Fournaux dans la Description des Arts & Metiers.

CRAANEN Lumen rationale Medicum. Mediob. 1686.8. CRAMER Elementa Docimaliæ. Lugd. Bat. 1744. 8. 2 Vol.

CRANZ de duabus Draconis Arboribus. 1768. 4.

Materia Medica. Vienn. 1765. 8. 3 Vol. -

CRATCHOWILL de Radice Colchici Vulgaris. Francof. 1764.

CRATO Confilia & Epistolæ Medicinal. Francof. 1654. 8. 7 Vol.

CRELLIUS de Cortice Simaroubæ Resp. LEINCKER. Helmft. 1746.

CRESCENTIENSIS de omnibus agriculturæ partibus. Bafil. 1548. fol.

CROLLII Bafilica Chymica. Genev. 1631. 8.

CRUGER in Ephem. Nat. Curiof. Dec. 11. A.7. Dec. e0300 III. A 2. 3. 7.

CULLEN Lectures on Materia Medica. Lond. 1772. 4. CUMENIUS in Ephem. Nat. Curiof. A. 3.

D.

DARLUC in Journal de Médecine. 1759.

DECKER Exercitat. Practicæ. Lugd. Bat. & Amstel. 1673. 8.

DECKERS in Recueil Périodique. 1755.

DEGNER de Dyfenteria biliofa. Traject. ad Rhen. 1755. 8.

DELIUS Amanitates Medicæ. Lipf. 1-47. 8.

- - in Frænkifche Sammlungen. T. II. 1757.

- de Peucedano Resp. WAGNER. Erleng. 1753.
 - de Taraxaro Resp. Schroeder. Erl. 1744.
 DESMARS in Recueil Périodique. 1757.

DESMILLEVILLE in Journal de Médecine. 1761.

DETHARDING de Aquæ calcis vivæ ufu interno Kesp. KEMNA. Rostoch. 1746.

- - - in Ephem. Nat. Curiof. Dec. III A. 7&8.
 DICKSON in Observations by a Society of Phylicians.
 T. II. London 1762. 8.

DIEMERBROECK Opera Geneva 1688. 4.

DIETRICH Observat. de Usu Corticis Peruviani in cancro mammarum. Ratisb. 1746. 4.

DILLENIUS Joh. Jac. in Ephem. Nat Curiof. Cent. 111. & IV. & Act. Acad. Nat. Curiof. Vol. I.

- - - Just Frid. in Ephem. Nat. Curiof. Dec. III. A. 9 & 10.

DIOCLES upud MACRUM.

DIOSCORIDIS Opera per SARACENUM. 1598. fol. DIPPEL Christian. Democrit. Krankheit und Arzney

des menschl. Lebens Frf. u. Leipz. 1736. 8. Dispensatorium Brandeburgicum Berol. 1731. fol. Dispensatorium Noricum. 1666. fol.

DOBOLENSKY in Ephem. Nat. Curiof. A. 2.

DODONEI Stirpium Historiæ Pemptades. Antwerp. 1616 fol.

DOEDERLIN in Commerc. litterar. Noric. 1744.

DOERING Usus Opii. Jena 1620. 8.

van DOEVEREN de Vermibus Intestinalibus, Lugd. Bat 1753. 4.

DOLÆI Opera. Francof. 1703. fol.

DONDUS Promptuarium Medicinæ. Venet. 1576. fol. DORNCRELLIUS Empirica. Francof. 1601. 8.

DOUGLASS An Account of mortification and of the effect of the barck. London 1732. 8.

DUPUY de la Porcherie in Journal de Médecine. 1765. Dürk in Ephem. Nat. Curiof. Dec. II. A. 7.

ROAROS E.

EHRHARD in Commerc. litterar. Noric. 1736. EHRHART de Cicuta. Argent. 1763.

ELLER in Histoire de l'Académie R. des sciences de Berlin. 1753.

ELLIS Effais towards a natural hiftory of the Corallines. London 1755.

ELSHOLZ in Ephem. Nat. Curiof. A. 6. & 7.

ELSNER in Ephem. Nat. Curiof. A. I.

ENCKELMANN de Sale Alcali de Seignette. Arg. 1755. ERASISTRATUS apud PLUTARCHUM.

ERASTUS de Medicina nova Paracelfi. Bafil. 1572. 4. 2. Vol.

ENGELBERG apud STOERCK.

ERNDTEL Warfavia phyfice illustr. Drefd. 1730. 4. ERNIUS in Ephem. Nat. Curiof. Dec. II. A. 4.

ETTMÜLLER Michael Opera per WESTPHAL, Franc. 1697. fol. 3. Vol.

- - - Michael Ern. in Ephem. Natur. Curiof. Cent. III. & IV.

EVERARD Elaterium magnis mortalium ulibus &c. Altdorf. 1722.

Everardes de Herba Panacea. Antwerp. 1687. 12. EUGALENUS de Scorbuto. Amstel. 1720. 8.

F.

FABER Joh. Matth. Strychnomania. August. Vindel. 1677. 4. - M. Joh. apud SCHENCK. FABRICIUS de Ichthyocolla Resp. STOLZE Helmst. 1756. FABAS in Journal de Médecine. 1762. FAGOT in Philof. Transact. 1751. de la FAILLE apud GUETTARD Mémoires. FALLOPIUS Opera. Francof. 1584. fol. FARR in Observations by a Society of Physicians in London. T. IV. 1771. FASCH de Castoreo Resp. KRAUSOLDT. Jenæ 1677. FEHR in Ephem. Natur. Curiof. A. 9 & 10. & Dec. II. A. 4. FERBER Briefe per von Born. Prag. 1773. 8. FERGUSON apud HALLER Elem. Physiol. FERNELIUS Opera Medicinalia. Parif. 1638. 2 Vol. FERRARII Helperides. Roma 1646. fol. FINANT NEVEU in Journal de Médecine. 1764. FIORAVENTUS Chirurgia. Venet. 1679. 12. FISCHER apud BUCHNER Mifcell. Phyf. Medic. Mathem. 1730. FLOYER OUTOBasar . London 1687. 8. FLUDD Robert apud LANGELOTT. FORD in Philosoph. Transact. 1755. FORESTUS Observat. & Curationes. Rothomag. 1653. fol. 2 Vol. FORDYCELL in Observations by a Society of Physicians in London. T. I. FORMIUS apud RIVERIUM. FOTHERGILL in Observations by a Society of Physicians in London. T. I. II. & III. FOUGEROUX de BONDAROY in Hift. de l'Académie Royale des sciences. 1766. du Four du Caffé, du Thé & du Chocolat. Lyon 1668. 8.

FRACASTORIUS Opera. Genev. 1671. 8.

FRANCUS Joh. Vera Antiquorum herba Acetofella. August. Vindel. 1717. 12.

- - Defcriptio Momordicæ. Ulmæ 1720. 8.
- Georg. de Malo Citreo Resp. NEBEL Heid. 1686.

Dec. 11. A. 6.

FRASER in Observations of Physicians in London. T. II. 1762.

FRENCH in Obfervat by a Society of Phylicians in London. T. I.

FULLER Pharmacopœa extemporanea. Lond. 1714. 12. FURSTENAU de Antimonio crudo Resp. HEISENIUS. Rintel. 1748.

GABER in Miscellan. Taurin. T. III. 1766. GALE in Philosoph. Transact. 1765. GALLO dell'ufo di Latte. Parigi 1753. 8. GALEATI in Comment. Inft. Bononienf. Tom. III. Bonon. 1755. GALENI Opera. Venetiis 1625. fol. 8 Vol. de la GARAYE Chymie Hydraulique. Paris 1746. 8. GARCIN in SAVARY Dictionnaire de Commerce. GARIDEL Histoire des Plantes. Aix 1715. fol. GARCIAS ab Horto Aromatum hiftoria per CLU-SIUM. Antwerp. 1597. 8. GARMANN in Ephem. Natur. Curiof. A. I. GASER apud WELSCH GASSENDUS apud GARIDEL. GATAKER on the internal Use of Solanum. London 1633. 8. GATENARIA apud SEVERINUM. GAUB Adversaria varii Argumenti. Lugd. B. 1771. 8. GEBAUER apud SCHULZ Mater. Medic.

G.

GEISLER Animadversiones de Usu Vomitoriorum. Lips.
1746.
GEOFFROI Claud. Joseph. Hift. de l'Academ. Royale
des sciences. 1740.
Stephan. Francisc. Mem. de l'Academ. Royale
des sciences. 1715.
de Materia Medica. Paris
1741. 8. 3. Vol. Suite de la Matiere Medicale
par M*** 1750. 12. 3. Vol. Suite de la Ma-
tiere Médicale par Mffrs. ARNAULT DE NOBLE-
VILLE & SALERNE Regne Animal. Paris 1756.
& 1757. 12. 6. Vol. Les Figures des plantes &
animaux par Mr. de GARSAULT 4. 5. Vol.
GERBER in Ephem. Nat. Curiof. Dec. II. A. 9.
GESNER A. J. Beschreibung des Wildbads. Stuttg.
1745. 8.
Conrad apud J. B. Hiftoria Plantarum.
Epistolæ Medicinales. Tiguri 1577.4.
Historia Animalium. Francof. 1620.
fol. 4. Vol.
de omni Rerum fosfilium genere.
Tigur. 1565, 8.
Joh. Albert de ZINZIBERE. Altdorf 1723.
Joh. August. Phil. in Nov. Act. Natur. Cur.
T. IV.
in Frænkifch. Sammlung.
T. VII. Nürnb. 1765.
Sammlung von Beytrægen
aus der Arzneygelahrtheit u. Naturkund. Nördl.
1771. 8.
GIBSON in Medical Observations by a Society of Phy-
ficians in London. T. IV. 1771. 8.
GIRARDI de Uva Ursi Patav. 1764. 8.
GLAUBER Opera. Frankf. 1658. 2 Vol.
GLAUBRECHT Analecta de Odontalgia. Argentor.
1766.
Canon, regentrating to our manager and Grandward
12062 S. 10012

1.1.2

GLEDITSCH in Mem. de l'Acad. Royale des sciences de Berlin. 1748.

GLISSONIUS de Rachitide. Lugd. Bat. 1671. 12.

- - Joh. Georg. Flora Sibirica. T. I. Petropol. 1749. 4.
- & 1752. 8. 4 Vol.

BENGEL. Tubing. 1752.

- - Phil. Frider. specifica Methodus recentior Cancrum fanandi Resp. GERTNER. Tub. 1757.

GECHEL Eberhard Beschreibung des Anno 1694-1696. durch das Silberglætt verfüßsten Weins. Ulm 1697. 8.

GERITZ in BUCHNER Miscell. Physico-Medico-Mathemat. 1728.

GETZ Joh. Christian. de Glycyrrhiza. Altdorf. fine anno.

- Joh. Chriftoph. in Act. Nat. Curiof. Vol. II.

GOHL Acta Medicorum Berolinenf. 1715-1731. 8. 21 Vol.

GORIS Medicina contempta. Lugd. Bat. 1700. 4.

GOULARD Oeuvres de Chirurgie. Pezenas 1766. 12. 2 Vol.

GRAINGER in Effais read before a Society in Edinburgh. T. II. 1756. 8.

GRANGER in Hift. de l'Acad. Royale des Scienc. 1735. GRASHUYS in Act. Acad. Nat. Curiof. Vol. VIII. GRASSIUS in Ephem. Natur. Curiof. A. 3, 4 & 5. GREDING in Adverfariis Medico - Pract. Lipf. 1771. 8. GRONOVIUS Flora Virginica. Lugd. Bat. 1762. 4. - - - in Commerc. litterar. Noric. 1743. GRUBEL in Ephem. Nat. Curiof. Dec. III. A. 4. GRUNFIELD Safe internal use of Cantharides. Lond. 1706. 8. GRUN-

GMELIN Joh. Conrad in Commerc. litterar. Noric. 1733.

GRUNWALD in Ephem. Nat. Cur. Dec. III. A. 9 & 10. GUERIN apud EHRHART.

GUETTARD in Hift de l'Acad. Royale des Scienc. 1754.

ces & des Arts. Paris 1768-1770. 4. 3 Vol. GUIDO apud FORESTUM.

a GULDENKLÉE Epistolæ & Confilia. Lipf. 1655. 4.

- - - Refponsa Medicinalia. Lips. 1688. 4. GULLMANN in Act. Physico-Medic. Vol. VI.

GUVOT in Prix de l'Académie Royale de Chirurgie. T. 11. 157.

Η.

HAARTMANN in Abhandlungen der schwedischen Academie 1762. 8.

de HAEN Ratio medendi. Vind. 1757-74. XV. Vol. HÆNEL de Camphora. Lugd. Bat. 1739.

HAGENDORN in Ephemerid. Nat. Curiof. Dec. II. A. I. - - - de Catechu Jenæ 1673. 8.

HAGG de Usu Mercurii in Hydrophobia. Argent. 1761.

HALE le Gentilhomme Cultivateur par Dupuis Demporte. Paris & Bourd. 1761-1764. VIII Vol.

HALES Statique des Vegétaux. Paris 1735. 4.

de HALLER Beschreib. der Salzwerke. Bern 1765. 8.

- - Elementa Physiologiæ. Lausann. & Bern 1757-66 4: 8 Vol.
- - Hiftoria Stirpium Helvetiæ indigenarum. Bernæ 1768. fol. 3 Vol.

- - - in Commercio litterar. Noric. 1736.

- du HAMEL in Traité des Arbres fruitiers. Paris 1768. 4. 2 Vol.
 - - Art de rafiner le Sucre 1764 dans la Description des Arts & Metiers.

- - in Hiftoire de l'Académie Royale des Sciences. 1739, 1748 & 1767.

HAMILTON in Effais read before a Society in Edinburgh. II. 1756.

HANNÆUSIN Ephem. Nat. Curiof. Dec. II. A. 14&5. HANNEMANN in Ephem. Nat. Curiof. Dec. II. A. 1. HANNES de puero epileptico foliis Aurantiorum fa-

nato. Vefal. & Lipf. 1766. 8. HARDER Thefaurus Obfervationum. Bafil. 1736. 4. HARTMANN Joh. Opera. Francof. 1682. fol.

- - Peter Imman. Obfervationes ad Cicutæ, Mercurii fublimati & Phofphori historiam Resp. HUDEMANN. Helmst. 1763.

HASSELQUIST Reife nach Palæstina per LINNÆUM. Rostoch. 1762. 8.

- - - in Abhandl. der schwedisch. Academie. 1751. 8.

HAUSMANN de Acidulis Sulzbacenfibus. Arg. 1764. ab HEERS Observationes Medicæ. Lugd. Bat. 1685. 12.

HEIMREICH in Act Nat. Curiof. Vol. 11.

HEINZELMANN in LINNÆI Amœnit. Academ. T. VII. HEISENIUS in Act. Nat. Curiof. Vol. 1X.

HEISTER de Aurantiis Resp. WILBERDING. Helmst. 1741.

- - de Pipere Resp PFEFFER. Helmst. 1740.

van HELMONT Opera per VALENTINUM. Hafniæ 1707. 4.

HELVETIUS Traité des Maladies. Paris 1724. 8. 2 Vol.

HELWICH Christian. in Ephemer. Nat Curiof. Dec. III. A. 5 & 6.

HELWIG Christoph. Cafus & Observationes. Lips. 1711. 8.

de HELWIG in Ephem. Nat. Curiof. Cent. V. I. & X. HENCKEL in Act Natur. Curiof. Vol. II.

- - von der Bergfucht und Hüttenkatz. Freib. 1728. S.

HENCKEL Pyritologia. Leipz. 1725. 8.

HENNING apud BUCHNER in Mifcell. Phyfic. Medic. Mathemat. 1729.

HERACLIDES apud CÆLIUM AURELIANUM.

HERCULES SAXONIAE Prælectiones practicæ. Franc. 1610. fol.

HERISSANT in Philosoph. Transact. 1751 & 52.

HERMANN Benedict. in Ephemerid. Natur. Curiof. Dec. II A. 4.

- - - Gottl. Ephraim in Primitiis Phylico - Medicis ab iis, qui in Polonia Medicinam faciunt, collectis. Vol. III. Zullichau 1753. 8

- - Paul. in Cynofura Materiæ Medicæ, continuata per BECLER. Arg. 1726-31. 4. 3 Vol.
- - - Paradifus Batavus. Lugd. Bat. 1705. 4.

HERNANDEZ in Nova Plantarum, & Mineralium Mexicanorum Historia per RECCHUM. Romæ

1601. fol.

HERTODT Crocologia. Jena 1671. 8.

HESSE in Commerc. literar. Noric. 1737 & 39.

HEURNIUS in Aphorismos HIPPOCRATIS. Amstelod. 1688. 12.

- - - Praxis Medicinæ, Lugd. 1658. fol.

de HEYDE Centuria Observationum Medicarum. Amstel. 1686. 8

HILDANUS Opera. Francof 1646. fol.

HILLEFELD Experimenta circa Venena Gatt. 1760.

HIPPOCRATES Opera per FOESIUM. Francof. 1659. fol.

HIRSCHEL in Berlinisch. Sammlungen. T. III. 1771. Historia Morborum Vratislaviensium. Lausann. & Geneva 1746. 4.

HODGES Aumorczia. London 1672. 8.

HOECHSTETTER Observationes Medicæ. Francof. 1674. 8.

HOEFER Hercules Medicus. Vienna 1657. 4. V v 2

TY ' LO TY I . THAT D CI
HOFER in Act. Helvet. T. II. Bafil. 1755.
HOFFBERG in Schwedisch. Akademie. 1762 & 1765.
HOFFMANN Caspar Opuscula Medica. Frf. 1767. 4.
Frid. Clavis pharmaceutica SCHREDER.
Halæ 1675. 4.
Thefaur. pharmaceut. Hala 1675. 4.
de Chinæ modo operandi Resp.
SCHONDORFF. Halæ 1704.
Medicina Rationalis fystematica. Frf.
1737-1740 9 Vol
de Balfamo Peruviano Resp. LEH-
MANN. Hale 1703.
de Millefolio Resp. PEZSCHIUS. Halæ
1719.
de Infusi Veronicæ efficacia Resp.
SATTLER. Halæ 1694.
Note ad POTERIUM.
Obfervationes Phylico - Chymicæ.
Hale 1722. 4
Opuscula Medica varii argumenti.
Halæ 1739. 4.
Opuscula Medico - practica. Hala
1736. 4.
Opuscula Physico - Medica. Ulma
1736. 8.
Maurit. in Ephem. Nat. Curiof. Cent. V,
VI & X.
Syntagma pathologico-therapeu-
ticum. Altdorf 1719. 4.
apud GETZ de Glycyrrhiza.
HOMBERG in Hift. de l'Académie Royale des Scien-
ces. 1712.
HONESTUS ad MESUE.
HOPE in Philosophical Transact. 1765.
HOPPE in Mantiffa Exoticorum apud VALENTINII
Hiftor, fimpl.

HORNUNG Cifta Medica. Norimb. 1626. 4.

HORST Georg Opera. Norimb. 1660. fol.

HOYER in Ephemerid. Nat. Cur. Dec. III. A. 7 & 8. Cent. I. & II Cent. VI.

HUCK in Observations by a Society of Physicians in London T. III. 1763.

HULBER de ænea culinaria supellectile. Arg. 1766. HUNAULD in Hist, de l'Académie Royale des Sciences,

1737.

HUNERWOLFF in Ephemerid. Nat. Curiof. Dec. II. A. 5. & Dec. III A. 2.

HUNTER in Observations by a Society of Physicians in London. T. I.

HUXHAM Opera per REICHEL. Lipf. 1764. 8.

I.

JACOBI in Nov. Act. Nat. Curiof. Vol. I & II.

- - - in Act. Acad. Moguntin. T. I. Erf. & Goth. 1757. 8.

JACQUIN Selectarum stirpium American. Historia. Vindob. 1763. fol.

de JÆGER Herbert in Ephem. Natur. Curiof. Dec. II. A. 3.

---- apud VALENTINI Ooft-Indifch Schreiben.

- - de Cantharidibus Resp. KAISER. Tub 1769. JÆGERSCHMID der in denen durch Silberglætt bestrichenen Weinen verborgene Mercurius. Ulm 1699. 8.

IMLIN de Soda. Argent. 1760.

IMPERATI dell' Istoria Naturale. Napoli 1599 4.

JOEL Opera. Amstel. 1663. 4.

JOERDENS in Commerc. litterar. Noric. 1740.

JOUBERT Pharmacopœa. Lugd. 1579. 8.

Journal Oeconomique capit Parisiis 1751. singuli mensibus Volumen in 8. prodiit.

Vv3

JUCH de Radice Chinæ Resp. ERMEL. Erford. 1753. JUNCKER Conspectus Therapiæ generalis. Halæ 1736. JUNGKEN Corpus Pharmaceutico-Medicum. Francof. 1697. 4.

de Jussieu in Hift. de l'Académie Royale des Scienc. 1717, 1729 & 1740.

Parif. 1730. recufa a CAPET HUGO & FUMÉE. 1758.

JUSTI Grundrifs des gefammten Mineral-Reichs. Gættingen 1757. 8.

K.

KAAS Observationes de Borace. Traj. ad Rhen. 1769. KEMPFFER Amœnitates Exoticæ. Iemgov. 1712. 4. KEMPFF in Act. Societat. Hassiac. T I. Gissa 1771. 4. KALDE Dispensatorium Hamburgens. 1716. fol.

KALM Reife nach Nord-America. Gætting. 1754-1764. 8. 3 Vol.

KENTMANN Nomenclatura Foffilium in GESNER de omni rerum foffilium genere.

KERKRING Opera Anatomica. Lugd. Bat. 1729. 4. KERNER apud HASSELQUIST.

KESSELMEIER quorundam Vegetabilium principium nutriens. Argent. 1759.

KETELAER de Aphtis. Geneve 1727. 4. KHON in Ephemerid. Nat. Curiof. Dec. III. A. 5 & 6.

KHUNRATH in Medulla destillatoria. Hamb. 1405. 4. KINNEIR in Philosoph. Transact.

KLAUNIG in Ephem. Nat. Curiof. Cent. V. & VI. & in Act. Acad. Nat. Curiof. Vol. II.

- KLEIN Defcriptio tubulorum marinorum. Gedan. 1731. 4
- - Hiftoria Piscium, Gedan. 1740-1749- 4. 5 Vol.

- - Tentamen Herpetologiæ. Gætting. 1754. 4.

KLEINKNECHT de Scordio. Ulmæ 1720. 8. KOLHLER in Commerc. litterar. Noric. 1740. KOLNIG Emmanuel in Ephemer. Nat. Curiof. Dec. II. A. 10

- - - - - - Regnum Vegetabile. Bafil. 1708.4. - - Samuel Frid. de Lamio Plinii. Arg. 1742. KOELICHEN in Act. Hafnienf Vol. II.

KRAMER J. Geo. Heinr in Commerc. litterar. Noric. 1733, 1738, 1739.

- Theodor. Valent. in Act. medic. Berolinenf. Dec. II. Vol. VIII.

KRAPFF de nonnullorum Ranunculorum venenata indole Vienne 1766. 8.

KRIELE in Mém. de l'Acad. Royale des Sciences de Berlin 1763.

KUNCKEL Laboratorium Chymicum. Hamb. 1738. 8. KÜRSCHNER de Fonte medicato Caftanacenfi. Argent. 1760.

L.

LAMBERGEN Ephemerides persanati carcinomatis in

Gœttinger-Anzeigen von gelehrt. Sachen. 175 5. LANDEUTTE in Journal de Médecine 1761.

LANG Epistolæ medicæ. Hanov. 1605. 8.

LANGE Dubia Cicutæ vexata Respond. Müller. Helmst. 1764.

- - de Remediis domesticis Brunsvicensibus. Brunsv. 1765 8.

LANGELOTT in Ephem. Nat. Curiof. A. 5 & 6. LANZONUS in Ephem. Nat. Curiof Dec. II. A. 10.

Dec. III. A. 2 & 7. Act. Nat. Curiof Val. I.

- - - Opera. Laufann. 1738. 4. 3 Vol. LARROTURE in Journal de Médecine. 1764. LAUTH apud ERHART.

telle . 12212 . allet

LEBENWALD in Ephem. Nat. Curiof. Dec. II. A. 8. LEDEL in Ephem. Nat. Curiof. Dec. I. A. 9. Dec. II. A. 2. Dec. III. A. 1.

LEIBNITZ in Ephem. Nat. Curiof. Dec. III. A. 3.

LEMERY Louis in Hift. de l'Acad. Royale des Scienc. 1720 & 1739.

- - - in Traité des Alimens per BRUHIER. Paris 1755. 8.
- - Nicolas in Cours de Chymie per BARON. Paris 1756. 4.
- - - in Pharmacopée Univerfelle. Bruxell. 1689. 4.

- - - - in Traité de l'Antimoine. Paris 1707. 8.

LENTILIUS in Ephemerid. Nat. Curiof. Dec. II. A. 3. 9 & 10. Dec. III. A. 1, 3, 4, 5 & 6.

- - - Eteodromus Medico - Practic. Stuttg. 1711. 4.

- - - Miscellanea Practica. Ulm 1698. 4.

LESTOME in Natural. Hiftory of the Teatree. London 1772. 4.

LEUCHSENRING de Fonte Medicato Niederbronnensi. Argent. 1753.

Lewis in Experimental Hiftory of the Materia Med. London 1761. 4.

LIE in Drontheimer Gefellschaft Schriften. Tom. III. LINDERN apud ROUSSY.

LINNÆI Amænitates Academicæ. Holm. 1749-1769. 8. 7 Vol.

- - - Flora Suecica. Holm. 1755. 8.

- - Genera Plantarum. Holm. 1764. 8.
- - Mantiffa Plantarum altera. Holm. 1771. 8.
- - Materia Medica per SCHRBBER. Lipf. & Erl. 1772. 8.

Species Plantarum Holm. 1762. 8. 2 Vol.
 Syftema Naturæ, Holm. 1766-68. 8. 3 Vol.
 LISCHWITZ de ordinandis rectius Virgis aureis Resp.
 TETTELBACH. Lips. 1731.

LISTER Exercitat Medicinales Frf. & Lipf. 1696. 8. - - de Morbis chronicis. Genev. 1727. 4.

LOBE de Diffolventibus calculum. Bafil. 1742. 8. LOBEL Balfami, Opobalfami exploratio. Londin. 1698. 4.

 - & PENÆ Adverfaria stirpium. Antw. 1576. fol.
 LOBSTEIN apud SPIELMANN de Vegetabilibus venenatis Alfatiæ.

LOCHER Observat. Practic. Vienn. 1762. 8.

LOCHNER in Ephemer. Nat. Curiof. Cent. V. & VI.

- - de Pareira brava. Norimb. 1719. 4.

LOEFLING Reife per LINNÆUM. Berlin u. Stralfund 1766. 8.

LOESECKE in Abhandlung der auserlefensten Arzneymittel. Berlin 1773. 8.

LOEW in Ephemerid. Nat. Curiof. Dec. III. A. 5 & 6. LONICER Kræuterbuch per ERHARD. Ulm. 1737. fol. LORRY de Melancolia. Parif. 1765. 8. 2. Vol.

Loss de Nuce Vomica Resp. GEORGI. Witteb. 1683. LOTTINGER in Journal de Médecine. 1768.

LOWER, BEHR &c. vollftændige Haberbeschreibung. Beuthen 1755. 8.

LUCAS in Philof. Transact. 1746.

LUDOVICI Opera per MICHAEL. Francof. 1712. 4. LUDWIG Terræ Mufæi Regii Drefdenfis. Lipf. 1749. fol.

- - in Comment. Lipfienf. T. VIII & XI. 8.

LUISINUS Aloyf. de morbo gallico quæ extant omnia per BOERHAAVE. Lugd. Bat. 1728. fol.

Luminare majus. Venet. 1553. fol.

М.

MACBRIDE Experimental Effais. London 1764. 8. MACCAULEY in Observations by a Society of Phyficians in London. T. I.

MACER de Virtutibus Herbarum per RANZOVIUM. 1596. 8.

MAGNENUS de Tabaco. Amstel, 1669. 12.

MAINARDES apud BRUNFELS.

MALLEBRANCHE in Histoire de l'Académie Royale des Sciences. 1702.

MALOUIN in Hift. de l'Acad. Royale des Scienc. 1746. MANARDUS Epistolæ. Bafil. 1540. fol.

MACQUER Dictionnaire de Chymie. Paris 1756. 8. 2 Vol.

de MANLIIS Interpretatio Simplicium apud BRUNFELS. MAPPUS de Potu Caffée Resp. WENCKER. Arg. 1693. MARANTA Barthol. Methodus cognoscendi simplicia.

Venet. 1559. 4. MARCELLUS de medicam. fimplicibus. Bafil. 1536. fol. MARCHANT in Hift. de l'Acad. Royale des Scienc. 1706.

MARGGRAF in Hift. de l'Acad. Royale des Sciences de Berlin. 1747 & 48.

- - Chymifche Schriften. Berlin 1761 & 67.
8. 2 Vol.

Maris Baltici nova litteraria. Lubec. 1698-1708. 4. MAROLDUS Practica medica. Francof. 1650. 4. MARTEAU in Journal de Médecine. 1762.

MARTIALIS Opera. Paris 1754. 8.

MARTINI apud S. PAULI.

MARTIUS apud WELSCH Curat. Exotic.

MARTYN Philofoph. Transact abridged. Vol. VII.

MASSE apud TRONCHIN Traité d'Epilepfie.

MATTHIOLI Kræuterbuch per CAMERARIUM. 1600. fol.

---- Opera per C. B. 1698. fol. MAUCHART in Ephem. Nat. Curiof. Cent. I. & II. MAUPERTUIS in Hiftoire de l'Acad. Royale des Scienc.

1731.

MAUTT de Cortice Peruviano. Lugd. Bat. 1760.

MAZEAS in Journal des Scavans. 1769.

MAZARS DE CAZELLE in Journal de Médecine. 1770. Supplément.

MEAD Monita medica. Lond. 1751. 8.

MEAD Opera Gætting. 1748. 8. 2 Vol. MEDICUS in Bayrifch. Acad. T. II. Vol. II. Münch. 1764. 4.

MELCHIORIUS Joh. Odoric. apud MATTHIOLUM. MELICHIUS apud SCHENCK Observationes.

MENGHINI in Comment. Institut. Bononienf. T. II. P. III. 1747. & T IV. 1755. 4.

MESUE Opera. Venet. 1589. fol.

MENZEL in Ephemerid. Nat Curiof. A. 6. & 7.

MERCATI de Effentia, causis, signis & curatione febris malignæ. Valladol. 1574. 8.

MEYER Chymische Versuche. Hann. u. Leipz. 1764. 8. MICHAEL Opera. Norimb. 1688. 4.

MILLAR Observations on the Althm London 1767. 8. MILLER Gærdner Dictionnary. London 1759. fol.

MINDERER de Calcantho. August. Vindel. 1617. 4.

- - - Alædarium Marocoftin. August. Vindel. 1622. 12.

MISSA in Recueil Périodique. 1755.

M. M. L** Effais fur les effets de l'Écorce de Garou. Paris 1767. 8.

MODEL Fortsetzung feiner chymischen Nebenstunden. Petersburg 1768. 8.

- - Verfuch über einen natürlichen Salmiack. Leipzig 1758. 8.

MOEHRING in Commerc. litterar. Noric. 1735 & 36. MOELLENBROECK in Ephem. Natur. Curiof. A. 2.

- - - - - de Varis. Lips. 1663. 8.

MOLINARIS Epistola. Vindob. 1761. 8.

MOLINELLUS in Commentat. Institut. Bononienf. T. V. P. I. 1767. 4.

MOLITOR de Febre continua maligna & intermittente ad Rhenum. 1731 & 35. Epidemica. Heidelb. 1736.

MONARDES Simplicium Medicamentorum ex novo Orbe historia. Antw. 1682. 8.

MONTAGNANA Opera Selectiora. Norimb. 1652 fol. Montanus de terra figillata Strigonienfi. Vratislav. 1610. 8.

 Metamorphofis eorum quæ ad Medicamentorum doctrinam attinent. Patav. 1550. 8.
 MONTET in Hiftoire de l'Académie Royale des fciences.

1757 & 62.

MONTINUS apud HILLEFELD.

MORAND in Memoires de l'Académie de Chirurgie. T. II. Paris 1753. 4. J. B. Hiftoria botanicopractica. Mediol. 1744. fol.

MOREALI delle febri maligne & contagiofe. Mutin. 1739. 4.

MOREL Mineralwaffer zu Watweiller. Colm. 1765. 8. MORCY apud BIRCH Hiftory of the royal Society of

London. T. 11. & 111. 1756 & 57. 4. MORGAGNI de fedibus & caufis morborum. Venet.

1761. fol.

MORGENSTERN Nov. Act. Nat. Curiof. T. IV.

MORLEY Collectanea Chymica Leidenfia. Lugd. Bao. 1684. 4.

MORTON Opera Medica. Geneva 1727. 4.

Müller in Frænkisch. Sammlung. T. IV. Nuremb. 1759. 8.

MUNDIUS Comment. de Aëre, esculentis & potulentis. Frf. & Lipf. 1685. 8.

MUNTING Phytographia Refp. KIGGELAËR. Amstel. 1727. fol.

de MURALTO in Ephem. Nat. Curiof. Dec. II. A. 2 & 8. MURRAY de Arbuto Uva Ursi. Gætting. 1765. 4.

MUSCHEL de Moschau in Ephemerid. Natur. Curiof. Dec. II. A. 8.

MUSCHENBROECK Introductio ad Philosophiam Naturalem. Lugd. Bat. 1762. 4. 2. Vol.

MUTEAU DE ROQUEMONT in Journal de Medecine. 1766.

Muys Salis Ammoniaci usus ad Febres. Franecker. 1716. 4.

MylII Anatomia Auri. Francof. 1628. 4.

MYNSICHT Thefaurus & Armamentarium Medico-Chymicum. Genev. 1697. 8.

MYREPSUS Opus Medicament. Bafil. 1549. fol.

N.

NAVIER in Recueil Périodique. 1756.

NEBEL in Ephemerid. Nat. Curiof. Dec. III. A. 3. Cent. IX. & X & Act. Nat. Curiof. Vol. V.

NEUHOLD in Commerc. litterar. Noric 1734.

NEUFORN de Succino. Lugd. Bat. 1760.

NEUMANN Chymia Medico-dogmatico-Experimentalis per KESSEL. Zullichau 1749-55. 4. 10 Vol. NICANDER Alexipharmaca Parif. 1557. 4.

- - - Theriaca. Parif. 1557. 4.

NICOLAUS Prapofitus Difpenfatorium. Lugd. 1505. 4. NICOLSON Observations by a Society of Physicians in London. T. IV.

NIGRISOLIUS Febris China Chinæ expugnata. Jenæ 1704. 4.

NOLANUS Comment. de Cicuta. Neapel. 1767.

NONNE de Secalis tofto Decocto Resp. SCHWANECK, Erford 1767.

NORÆUS Abhandl. der fchwed. Acad. 1739.

0.

ODELIUS in fchwed. Academ. 1762 & 66.
OLIVER in Philosoph. Transact. 1755.
OLIVIER in Journal de Medecine. 1760.
OSBECK in Reise nach Ost-Indien per GEORGI. Rostock 1765. 8.
OTTMANN apud ERHART.

 OVELJAN Act. Acad. Nat. Curiof. Vol. I. & VII.
 OWEN Observations by a Society of Physicians in London. T. III.

P.

PAARMANN Ligni Quaffiæ examen. Argent. 1772. PALLADIUS cum Scriptorib. Rei Rufticæ ed. GESNER. PALLAS apud MURRAY.

- - Joh. Dietr. Diff. de Chryfofplenio. Argent. 1758.
- - P. S. Elenchus Zoophytorum. Hagæ Comit. 1766. 8.

PANCOVIUS Herbarium per ZORN. Calln an der Spree 1763. 8.

PARACELSI Opera. Genev. 1658. fol.

PARÉ Œuvres. 1 yon 1641. fol.

PARIS apud ERHART.

PARKINSON Theatrum Botanicum. Lond. 1640. fol. PARSON in Philof. Transact. 1745 & 55.

PASSERAT de la Chapelle in Recueil Périodique. 1757. PATOUILLART in Hilt. de l'Acad. Royale des Sciences. 1737.

PAULI Simon quadripartitum Botanicum. Argent. 1667. 4.

PAULINI de Theriaca cœlesti. Francof. 1701. 8.

PAULINUS Observat Medico-Physicæ. Lips. 1706. 8. - - - de Salvia. August. Vind. 1688. 8.

PECHLIN de purgantium medicamentorum facultatib. Amstel. 1702. 8.

PELET in Journal de Médecine 1761.

PENICHER Collectanea pharmaceutica. Parif. 1695. 4. PETIT in Hift. de l'Académie Royale des Sciences. 1732.

PETRONIUS de morbo Gallico apud LUISINUM. Pharmacopœa Argentorat. 1757. fol.

- - Augustana. 1622. fol. renov. 1710. fol.
 - - Bateana, Lovan. 1752. 8.
 - Edinburg. Bremæ & Lipf. 1758. 8.
 - Hagienfis. 1659. 4.
 - - Londinenfis. 1746. 8.

Pharmacopœa Lugdunenfis. 1674. 4.

- - - Wurtembergica. Stuttg. 1750. fol.

PIETSCH Erzeugung des Salpeters. Berlin 1750. 4.
 PISO Guilielm. de Aëre, aquis & locis &c. Indiæ Occidentalis. 1658. fol.

- Homobon. de regimine magnorum auxiliorum. Patav. 1735. 4.

PLANCHON in Journal. de Médecine. 1763.

PLATEARIUS Practica brevis morborum curandorum. Lugd. 1535. fol.

PLATER Observationes. Basil. 1680. 8.

PLAZA in Mifcell. Taurinenf T. I. 1759.

PLENCK Jof. Jacob Mater. Chirurgica. Wien 1771. 8. PLINII Hift. Naturalis. Parif. (Bafil.) 1731. 3 Vol. fol. PLUMIER Plantæ Americanæ per BURMANN. Amftel. 1755 - 60. Vol. X. fol.

PLUTARCHI Opera per XYLANDER Frf. 1620. fol. POERNER Verfuch zur Færbekunst. Leipz. 1772 & 73.3 Vol.

POISSONIER in Hift. de l'Académie Royale des Scienc. 1751.

POMET Histoire des Drogues. Paris 1735. 4.

PONTEDERA Anthologia. Patav. 1720 4.

PORPHYRIUS in BARTHOLINI Epiltolis.

PORTALEZ i 1 Confultations choisies de Montpellier. T. II. Paris 1748. 12

PORTE in Journal de Médecine. 1762.

PORZII Anatomia Vini Rhenani Heidelb. 1672. 12. POTERI Opera per HOFFMANN. Francof. 1698. 4.

POTT in Mém. de l'Académie Royale des Sciences de Berlin. 1753.

- Obfervat. & Animadverf. Chymicæ Collect. I. Berolin. 1739. 4.

POUTEAU Mélanges de Chirurgie. Paris 1760. 8. PRANGE Camphoræ virtus Anthelmint. Gætt. 1759. PRÆVOTII Remedia felectiora. Francof. 1659. 12.

PRINGLE in Effais read before a Society in Edinburgh II.

- Difeafes of the Army. London1764. 8.
 PYE in Medical Observations by a Society of Physicians in London I.

QUARIN de Cicuta. Vindob. 1761. 8. QUELMALZ de Hydrargyri viribus a Sulphure fußpenfis. Lipf. 1748.

QUER Observat. fur la Maladie Néphritique & fon spécifique le Raisin d'Ours. Strasb. 1762. 8.

QUERCETANUS apud ETTMÜLLER.

- - - Pharmacopœa Dogmaticorum. Francof. 1615. 4.

QUINCY in Philosoph. Transact. N. 365.

R.

RAHN de Aquis mineralibus Fabariensibus seu Piperinis Lugd. Bat. 1757.

- in Naturforsch. Gesellschaft in Zürch II. 1764. Raji Joh. Historia Plantarum. Lond. 1686. fol. 3 Vol. - Philosophical lettres. London 1718. 8.

RAISIN in Recueil Périodique. 1756.

RAMAZZINUS de Morbis Artificum. Venet. 1743. 8. RAMSAY in Effais & Obfervations de Medecine de la Société d'Edimbourg. T. V. Paris 1743. 12.

- - in Medical Observations by a Society of Physicians in London II. 1762.

RAMSPECK Biga Remediorum. Bafil. 1745.
RANSON in Recueil Périodique. 1760.
RAU in Nov. Act. Nat. Curiof. Vol. III.
RAULIN Obfervations de Médecine. Paris 1754. 12.
RAUWOLFF Reife. Frankf. 1582. 4.
RÉAUMUR in Hiftoire de l'Académie Royale des Scienc. de Paris. 1718.

RAYGER

Q.

RAYGER in Ephemerid. Natur. Curiof. Dec. I. A. 3. & Dec. III. A. 3. de REBECQUE Medicinæ Helvetiorum Prodromus, Genev. 1677. 12. REDI Opuscula. Amstelod. 1685. 12. 2 Vol. REICHARD Gartenschatz IV. Erford 1753. 8. REICHEL de Magnetismo in corpore humano Respe LUDWIG. Lipj. 1772. REIMANN tentam. Vratislaw. 1724. REINHOLD de Aconito Napello. Argentor. 1769. REISIG de Sulphuris crudi usu interno. Lipf. 1768. RENARD in Journal de Médecine. 1765. RENEALME in Hift. de l'Académie Royale des Scienc.' 1711. - hiftor. Plantar. Parif. 1611. 4. - - - apud HALLER. RENODEL Dispensatorium Medicum. Frf. 1631. 4. REUSNER apud WELSCH Obfervat. Exotic. RHAZES Opera per GERARDUM Tolutanum &c. Bafil. 1544. fol. van RHEDE Henric. Hortus Malabaricus per Com-MELINUM. Amftel. 1686. - 1703. XII. Vol. RHODIUS Observationes adjectæ BORELLO. Joh. Analecta & notæ in Lud. SEPTALIT animadversiones & cautelas Medicas. Patav. 1652. 8. RICHARD de HAUTESIERCK Recueil d'Obfervations de Médecine des hôpitaux militaires. Paris 1766, 1772. 2 Vol. 4. RIEDLIN Lineæ Medicæ. August. Vind. 1695-1700. 8. - - Obfervat. Medic. August. Vindel. 1691. 12. RIOLANUS Opera. Parif. 1610, fol. RISLER Differt. de Verbasco. Argentor. 1754. RITTER in Act. Natur. Curiof. Vol. X. & Nov. A. Vol. III. RIVERII Opera. Genev. 1737. fol. Xx

RIVINIUS Differt. Medic. Lipf. 1710. 4. ROCHARD in Recueil Périodique. 1755.

Rœsel von Rosenhoff monatlich herausgekommene Infecten-Beluftigung. Närnb. 1746-61. 4 Vol.

- - Historia naturalis Ranarum. Nürnb. 1758. fol. ROESZLER speculum Metallurgiæ. Dresd. 1700. fol. ROLFINCK Chymia in artis formam redacta. Genev.

1671. 4.

- Epitome methodi cognoscendi & curandi particulares corporis affectus. Jenæ 1655. 4.

Rose in Berliner Sammlungen I. Berlin 1768. 8.

ROSEN VON ROSENSTEIN Anweifung zu Kinder-Krankheiten per MURRAY. Gotha u. Gætting. 1766. 8.

ROSNER Dissert. qua nonnulla circa lactis vires notantur. Lugd. Bat. 1756.

Roussy de Fumaria vulgari. Argent. 1749.

RUELLIUS Joh. de Natura stirpium. Bafil. 1537. fol. RULAND Curationes Empyric. Budiff. 1679. 8.

RUMPEL Progr. de Cantharidibus. Erford. 1767.

RUMPH Herbarium Amboinense. Amstel. 1741-65. VII. Vol. fol.

RUSH in Observations by a Society of Physicians in London. T. IV. 1771.

Russel in Observations by a Society of Physicians in London I. & III.

RUTTY in Observations by a Society of Physicians in London III. 1769.

- - Methodica Synopfis of mineral Waters. London 1757. 4.

de RUUSCHER Naturlyke hiftorie van de Cochenille. Amstel. 1729. 8.

ten Ryne apud BREYN Centur, Plantar, Ryser apud WEPFER.

SACHS a LEWENHEIM in Ephem. Nat. Curiof. A. I. Philipp Ampelographia. Lipf. 1661. 8. SALA Angelus Opera Medico - Chymica. Frf. 1647. 4. de SALICETO Opus de Chirurgia. Venet. 1480, fol. SALMASII Exercitationes Plinianæ. Traject. 1689. fol. 2 Vol. SANCTORIUS Ars de statica Medicina per LISTER. Lugd. Bat. 1728. 8. SARTORIUS in Ephemerid. Natur. Curiof. Dec. II. A. I. SAUVAGES apud BENTHEL de animalibus venenatis Galliæ. Monspel. 1763. - Nofologia Method. Amstel. 1768. 4. 2 Vol. SAVARY Franc. Petr. de Sale effentiali Acetofell. Arg. 1773. - - Philemon. Louis in Dictionnaire de Commerce. Geneve 1759-1765. fol. SCHALLER de Jalappa. Argent. 1761. SCHARFF de Junipero. Jena 1679. 8. SCHEFFLER de Afaro. Altdorf. 1721. SCHELLHAMMER de Natura. Kiel 1697. 4. SCHENCK A GRAFFENBERG Observationes Medicæ. Francof. 1665. fol. SCHEUCHZER Hydrographia Helvetica. Zurich 1717. 4. - - Itinera. Lugd. Bat. 1723. 4. 4 Vol. SCHMID in Ephemerid. Natur. Curiof. Dec. II. A. 2. SCHLEGER in Berlinisch. Samml. II. 1770. 8. SCHLUTER Hüttenwerk und Probierbuch. Braunschm. 1738. fol. SCHOLZ Concilia Medicinalia. Hannov. 1610. SCHRADER in Berlinische Samml. T. II. 1770. SCHREBER Daniel Gottfried Sammlung verschiedener Schriften. Halle 1755-65. Part. XVI. 8. Xx2

SCHREBER Joh. Christian. Daniel Beschreibung der
Græfer. Leipzig 1769. SCHREIBER Observationes de Pestilentia Ucranize
Berl. 1744. 8.
SCHROECK in Ephemerid. Natur. Curiof. Dec. II. A. 3.
& 4. Norimb. 1705. Schrizer apud Hornung.
SCHROEDER Joh. Pharmacopœa Medico - Chymic,
Francof. 1668. 4.
SCHROER Scrutinium Trifol. fibrin. Gubin. 1700. 8.
SCHUCHMANN in Ephem. Nat. Curiof. Dec. III. A. 4. Lipf. & Francof. 1697.
SCHULTZ Simon in Ephem. Nat. Curiof. A. 3, 4&5.
Joh. Heinr. de Chamæmelo Resp. HERTOG.
Halæ 1739. de Helleboro.
de Fructibus horræis Resp
REDTEL. Hala 1737.
effectu Resp. LANGUTH. Halæ 1739.
Examen Chemicum Radicis feil-
læ marinæ Resp. MEDER. Hala 1734.
fcillæ fublevato Resp. SCHROEDER. Halæ 1745.
a de Viperarum usu Medico Resp.
MEYER. Altdorf 1727.
Mat. Medica. Norimb. 1746. 8. Prælectiones in Difpenf. Brande-
burg. Norimb. 1753. 8.
SCHUSTER in Nov. Act. Nat. Curiof. Vol. I.
SCHWENCK apud DEGNER.
Thom. Hæmatologia. Hag. Com. 1743. 8.' SCHWENCKFELD stirpium & fossilium Catalogus.
Lignit. 1700.
Scopoli Flora Carniolica. Vienn. 1772. 8. 2 Vol.
SCRIBONIUS Largus per RHODIUM. Patav. 1655. 4-

SEBA in Act. Nat. Curiof. IV. Norimb. 1737.

- locupletissimus rerum naturalium thefaurus. T. IV. Amstel. 1735.

SEBASTIANI in Act. Acad. Moguntin. Erf. 1761. 8. SEBIZIUS Melchior de Alimentorum facultatibus. Argent. 1650. 4.

SEIP Pyrmontifch Mineralwasser. Hann. u. Pyrmont 1750. 8.

SENNERT Practic. Medic. Witt. 1628-35. 4. VI. Vol. SERAPIO de fimplicibus Medicinis per BRUNFELS. Argent. 1531. fol.

SERAPION apud CÆLIUM AURELIANUM.

SERENUS SAMMONICUS de Medicina. Amstel. 1662. 8. la SERRE in Ephem. Nat. Curiof. Dec. II. A. 1.

SETHI Simeon Syntagma de Alimentorum facultate, 1561. 8.

SEVERINUS de Vipera pythia. Patav. 1651. 4.

SEUTER Diff. de Nuce Vomica. Lugd. Bat. 1691.

SHARP in Philosoph. Transact. XLVIII. 1752.

SHAW Travels. London 1757. 4.

SHERARD apud GEOFFROI Mat. Med.

SHORT in Hiftory of the mineralwaters. Lond. 1734. 1740. 2 Vol. 4.

SIMON Joh. Christ. Kunst Salpeter zu machen. Dresd. 1771. 8.

SIMSON in Recueil d'Observations de Medecine par la Société d'Edinbourg V. Paris 1743.

SLEVOGT Progr. de Arfenico. Jena 1719.

SLOANE an account of a most efficacious medicine for foreness, wickness and other distempers of the eye. London 1745. 4.

- - Voyage at Jamaica. London 1707. fol.

- - in Philosoph. Transact. N. 417.

SOLLENANDER Confilia Medica. Hanov. 1609. fol.

de SORBAIT Opera. Norimb. 1672. fol.

SPILENBERG in Ephem. Nat. Curiof. A. 1.

Xx3

SPIELMANN in Mem. de l'Académie Royale des Sciences de Berlin. 1758.

- - de Cardamomo Resp. Joh. HERMANN. 1762.

- - Diff. de fonte Rippelfaviensi Resp. BOE-CLER. Argent. 1762.

ulu Resp. EHRMANN Argent. 1761.

- - de venenatis Allatiæ plantis Resp. GUERIN. 1766.

- - - Instit. Chemiæ. Argent. 1766. 8. SPIES apud WERLHOFF.

SPRINGSFELD Iter Medicum. Lipf. 1748. 8.

- - - Abhandlung vom Carlsbad. Lpz. 1749. 8. SPROEGEL Experimenta circa venena. Gatting. 1753. STACHER in Naturforschende Gesellschaft in Zürch II.

. 1764.

STAHL G E. medicamenta composita ab eodem recepta Dispensatorium Brandeburgicum recenset.

- - Materia Medica. Dresden 1731. 8.

- - Opuscul. Chymico-Medic. Hal. 1715. 4.
- - Juon. Joh. Diff. de usu & effectibus potus

Caffé Resp. WOYWODE. Erford. 1731.

STECK de Sagu. Argent. 1757.

STEDMANN in Effais & Observations de Medecine de la Société d'Edinbourg. T. II. Paris 1742. 8.

STEINMEYER de Rubia tinctorum. Arg. 1762. STELLA Erasmus apud GESNER Historia Animal.

STENO apud BARTHOLINUM Epistol. Medic.

STISSER Joh. Andr. Act. Laborat. Chymic. Helmft. 1701. 4.

STOERCK Ant. Annus Medicus. Vind. 1759. fecundus 1761. 8.

Vindob. 1760. 8. libellus fecundus 1771. Supplementum neceffar. 1771.

- - - - libellus quo demonstraturStramonium, Hyoscyamum, Aconitum &c. Vindob. 1772.

STOERCK Ant. libellus quo demonstratur Colchici Autumnal. Radicem &c. Vindob. 1773.

 - - - libellus quo continuantur Obfervationes & Experimenta circa nova fua medic. Vind. 1765.

STOSCHIUS in Act. Med. Berol. Vol. 6.

STRUVE in Commerc. Noric. 1732.

STURM Roland. Corticis Chinæ Defer. Antw. 1659. 12. SULZER in Nov. Act. Nat. Curiof. Vol. 111. & IV.

SWAINE in Effays read before a Society in Edinburgh. 1756.

van SWIETEN Commentarii in Aphorifmos Boerhaave. Lugd Bat. 1741-72. 5 Vol.

SYDENHAM Opera Lugd. Bat. 1741. 8.

SYLVATICUS Benedict. Confilia & Refponsiones. Gen. 1662, fol.

- - - Matth. Opus Pandectarum Medicinal. Turin 1526. fol.

SYLVESTER in Obfervations by a Society of Phyfic. in London I.

SYLVIUS de le BOE Opera. Genev. 1681. fol.

SYLVII Jacob Opera per MOREAU. Col. Agr. 1630. fol. T.

TABERNÆMONTANUS Jac. Theod. Kræuterbuch per BAUHINUM. Bafel 1687. fol.

TACHENIUS Echo ad vindicias Chirosophi. Venet. 1656. 4.

- - Hippocrates Chymicus. Brunfv. 1668. 12. TACITUS de Moribus Germanorum per ERNESTI. Lipf. 1752. 12.

TARZAGUS apud LANZONIUM.

TAUBE apud MURRAY.

TEISONNIER in Confult. choisies de Montpellier. T. II. Paris 1748, 12.

TENENT Epistle concerning the efficacy of Seneca fnackervot Edinburg. 1742. 8.

Xx4

TESTI in Ephem. Nat Curiof. Cent. I. & II.
THALIUS Sylva Hercinia cum CAMERARII horto.
THEBESIUS in Nov. Act. Natur. Curiof. I.
THEODORICUS apud FORESTUM.
Chirurgia. Nenet. 1502. fol.
THEOPHRASTI Opera per HEINSIUM. Lugd. B. 1613.
fol.

THILEMANN Diff. de Abufu medicamentorum Mercurialium. Argent. 1715.

THORNHILL in Philof. Transact. 1755. TILING Rhabarbarologia. Francof. 1679. 4. TISSOT apud DEGNER.

- - Avis au peuple. Paris 1772. 12.

- fur la fanté des gens de lettres. Lauf. 1768.
 8.

- Traité de l'Epilepfie. Paris 1770. 12.

TORACEA specimen experimentorum quibus Corticis Peruviani vis antiseptica &c. comprobari viden-

tur. Roma 1765. 4.

TORTUS Franc. Therapeutica. Venet. 1743. 4.

TOURNEFORT in Hift. de l'Acad. Royale des Sciences depuis 1666 jusqu'à 1699. T. II. 4.

- - - Hiltoire des plantes qui naissent aux environs de Paris, 1725. 2 Vol. 12.

- - - Relation d'un voyage du Levant. Paris 1717. 2. Vol. 4.

TRAGUS de stirpibus. Argent. 1552. 4.

TRALLIANUS in Medicæ Artis Principibus. 1567. fol. TRALLES Examen rigorofius virium, quæ terreis medica-

montis tribuuntur. Vratisl. & Lipf. 1740. 4.

- - Ufus Opii. Vratisl. 1757-63. 4 Vol. 4. TRAMPEL in Berlinifch. Samml. I. 1768. TREW in Commerc. litter. Noric. 1734, 35, 43. TRIEWALD in fchwed. Acad Abhandl. 1744. TRILLER Difpenfatorium Pharmaceuticum univerfale.

Francof. 1764. 4.

TRILLER de Morte fubitanea ex nimio Violarum odore Resp. RENSCH. Witteb. 1763.

TRONCHIN de Colica Pictonum. Genev. 1757. 8. TULPIUS Observationes Medicæ. Amstel. 1672. 12.

V.

VALCARENGHI Medicina rationalis constitutionum, epidemic, Cremonæ 1737 & 1742. 4. 2 Vol.

VALENTINI Basil. Chymilche Schriften ed. PETRÆO. Hamb. 1740. 8.

- - - Michael Bernh. Hiftoria fimplicium per BECKER. Francof. 1716. fol,

- - - - - Oftindifche Sendfchreiben. Frf. 1705. fol.

VALISNERIUS apud LENTILIUM in Ephemerid. Nat. Curiof. Cent. III. & IV.

- - - - apud Piso Homobom.

- - - Opere Fisico-Mediche. Venet. 1733. fol. 3 Vol.

VALLERIOLA Obfervat. Medicæ. 1588. 8.

VATER Abrah. de Antidoto novo adversus viperarum morsum præstantissim. Resp. GENSTER. Vit. 1736.

VAUGHAN apud RAJI Philosoph. lettres.

VENEL in Memoires préfentés à l'Académie Royale des Sciences. T. II. Paris 1755.

VERATTI in Comm. Instit. Boniens. T. II. P. II. Bonon. 1746. 4.

du VERNEY in Hift. de l'Acad. Royale des Scienc. 1703. VERNY ad BAUDERON.

Versuch einer neuen Mineralogie. (CRONSTEDT.) Koppenhagen 1770. 8.

VESALII Epist. de Usu Radicis Chinæ. Basil. 1546. fol. VICARIUS in Ephem, Nat. Curiof. Dec. III.

VIGO Practica. Venet. 1561. 8.

VITALI Bonafede lettera e risposta sopra le maladie contagiose. Veron. 1743. 8.

Xxs

de VILLA NOVA Arnold. Opera per TAURELLUM. Basil. 1585.

UNZER de Renum Calculo. Magdeb. 1623. 4. VOGEL apud MURRAY.

- Programm. Dubia contra nocivum linimentorum fulphureorum usum in scabie. Gætt. 1765.
- de infigni quorundam venenorum virtute medica Resp. WICHMANN. Gætting. 1762.
- - Hiftoria Materiæ Medic. Lugd. Bat. & Lipf. 1758. 8.

VRATISLAVIENSIUM morb. Hift. Lauf. & Lpf. 1746. 4-W.

WAGNER in Commerc. litter. Noric. 1737.

- - Observat. Clinicæ. Lubec. 1737. 4. WAINEWRIGHT apud HALLER Elem. Physiol. T. III. WALDSCHMIDT Opera Lugd. 1736. 2 Vol. 4.

WALL in Philof. Tranfact. 1744.

WALLERII Mineralogie per DENSO. Berlin 1750. 8. WALPOLE in Philosoph. Transact. 1751.

WALTHER Progr. de Nitrofo plurium fontium Sale. Lipf. 1744.

WARNER Cafes in Surgery. London 1754.

WATSON in Philosoph. Transact. N. 437. & 1755. WECKER Antidotarium generale. Basil. 1585.

WEDEL G. W. Amoen. Mat. Med. Jene 1684. 4.

- - - - Compendium Chymiæ. 1715.4.

- - - de Allio Resp. EMHARD. Jenæ 1718.

- - - in Eph. N. Cur. D I.A. 2. & 3. D. II. A. 2.

- de Ipecacuanha Kesp. LEINCKER. Jens 1705.

- - de Medicament. facultat. Jenæ 1696. 4.

- - - Pharmacia in artis formam redacta. Jenæ 1693. 4.

CKEL. Jena 1710.

WEISMANN in Act. Nat. Curiof. Vol. I.

WEITBRECHT de febrili constitutione. Regiomont. WELSCH de Ægagropilis. August. Vind. 1668. 4. 1736. 4: - Curationum propriarum Decades. August. Vindel. 1680. 4. - Hecatostea. August. Vindel. 1675. 4. - - Mictomimeta. Lipf. 1676. 4. & in Ephem. Nat. Curiof. A. 4. & 5. - Sylloge Curationum & Obfervat. Medicin. Ulmæ 1667. 8. WEPFER Historia Cicutæ aquaticæ per ZWINGER. Bafil. 1716. 4. - - Obfervat. Medico-practicæ. Tigur. 1745. 4. - apud KOENIG Regnum Vegetabil. - - - - HALLER Hiftoria stirpium. - - - - SEVERINUM. WERLHOF Cautiones Medicæ. 1734. Hannover. - - - apud CRELL de Simarouba. MURRAY. - - - apud Vogel de infigni venenor. quorum dam virtute medica. - - Observat. de Febribus. Hann. 1745. - - - de Variolis & Anthracib. Hann. 1735. 4-WESTPHAL in Act. Phyf. Med. Vol. VIII. WHYTT in Effais on the virtue of Lime-Water. Edinburgh 1761. 8. - - apud PLENCK Mat. Med. van der WIEL Observationes. Lugd. Bat. 1687. 12. WILLIS Opera. Amstel. 1682. 4. WILLIUS in Acta Hafnienf. T. III. WINTER Tentam. Vratisl. 1724. WOLF Jac. in Ephem. Nat. Curiof. Dec. II. A. 8. - - Joh. in Comm. litter. Nor. 1740, 41 & 43. - - in Act. Nat. Curiof. Vol. V. VIII. & IX. WORMII Epistolæ. Hafniæ 1757. 8. 2 Vol. WURZ Felic. Practica der Wundarzney. Basil. 1687.8.

T.

X. XENOPHON Opera. Francof. 1596. fol.

YONGE Currus triumphalis e Terebintho. London. 1679. 8.

- - in Philosophical Transactions. N. 280.

Z.

ZACUTI LUSITANI Opera. Lugd. 1694. fol. ZANETTI in Nov. Act. Nat. Curiof. Vol. V. ZORN apud PANCOVIUM.

Zückert Beschreib. aller Gesundbrunnen Deutschlands. Berlin u. Leipzig 1768. 4.

ZWELFFER Discurfus Apologeticus. Norimb. 1668. fol. ZWINGER Theodor. in Ephemerid. Natur. Curiof. Dec. III. A. 2. 7. 8.

rum Resp. MIEG. Basil. 1714.

- Joh. Rud. in Act. Helvet. IV. Bafil. 1760. & V. 1762. 4.

Zwoelffer Animadverf. in Pharmacop. August. Norimb. 1661. Appendix 1667. Pharmacopæa. Regia. 1668.



Syllabus

A.

al 169 Acetum Theriacale 522 Abricots Tunicæ 79 349 ABROTAVOV apper 235 Ache 40 236 Achillea Inte 385 Nobilis L. Abrotanum ibid. 235 Abfinthe 195 AXINAE105 ibid. Abforbentia 596 Axeades 109 607 Acida Animalia 5 600 Acidulæ Foffilia 184 Abstergentia Alcali foffili fcaten-530 Abfynthium 195 tes 185 Martiales ibid, & 446 Acacia 413 Acanthe 450 Acini uvacei 97 Acanthus ibid. Acipenfer 164 & 473 Hufo Acenteta ibid. 367 Ruthenus ibid. Acer 574 Saccharinus ibid. Sturio ibid. Ruber ibid. Aconitum 503 Platonoides ibid. Acorus L. 242 veri Radices ibid. Acerba 5 36 Acria Acetaria 5 & 475 ib. AdiavTON Acetofa 37E Acetofella 531 Adiantum ibid. fq. Acetum Calendulæ Album 203 371 Destillatum Americanum 103 372 Dracunculi Aureum ibid. 55 Canadenfe Lavendulæ 275. ibid. Capillus Veneris 373 Lithargyrii 441 Papav. Rhoead. Nigrum 523 372 Ror. marini Pedatum 290 ibid. Rubrum Rofar. ibid. 429 Ruræ Verum 292 373 194 Adftringentia 104, 194 & 370 Salviæ Sambuci 577 Adurentia 475 Saturni 441 Ægagropylæ 357 Scilliticum 500 & 50E 229,把rugo Simplex Nativa IOI 500

Heuryion	559	Axopog	242
Æs	499	"Акти	576
		Alabaster	603
uftum 499 &	501	Alabastrites	ibid.
Æthiops Antimonialis 589.	593	'Arabaseitns	ibid.
		Alabastrum	ibid.
Mineralis		Alant	\$34
Arakozov	and the second se	Alauda	148
		Alaun	433
Agaricus		Album Græcum	136
Campeftris		Albumen Ovorum	152
		Alburnum	423
		Alce	525
	640	"Алки	ibid.
Agates Chelidonius Mine-	ah.	Alcea	419
		Alchemilla	374
		Alchymilla	ibid.
Agley		Alcyonium Lyncurium	599
"Ayzides		Άλεκτορίς	ISI
		Άλεπτορ	ibid.
		Aleluja	53E
			\$ & 235
			& 419
the second se		Αλικάκαβου	650
Agrefta			10 & 12
		Alkanna	375
		Alkekengi	650
		Allermanns-Harnisch	582
	a second s	Allium	38
	324	Cepa	49
	158	Fiftulofum	ib.
	374	Victorialis	582
Ail	38	Porrum	64
	141	Schænoprafum Allraun	ib.
and the second second as the second sec		Άλόη	513
		Aloë	625 ibid.
A/2 136&		Caballina	626
A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O	580	Hepatica	ibid.
	413	Infuccata	627
AND REAL ALL ALL ALL AND A MARKED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	149	Lota	ibid.
	450	Perfoliata Vera	626
	164	Rofata	627
ANÓVITOV	503		625
	1-1	Onegourne	~~)

AL - TT: - La ta	100	Wa	March 1
Aloë Violata		Αμωμον	237
Άλώπηξ		Amomum	ibid.
Alofa	164		245
Alouette	148		269
"A). \$170	19	Zinziber	304
Alpschoz,		Ampetitis	337
Αλσίνη		Amphibia	174
Alline		Amfel	156
Althæa Officin.		Άμύγδαλα	III
Ar. Jaia	ibid.	Amygdalæ III	& 308
AD Sea	ibid.	Amaræ	112
Alterantia	\$29	Barbaricæ	111
Alumen	433	Dulces	ibid.
the second s	48 552	Hifpanicæ	ibid.
Fiffile	434	Jordanicæ	ibid.
Gemma pretiofa	cæ.	Amygdalus communis	112
ruleum L.	369	Perfica	94
Liquidum		Άμυλον	28
Nativum	422	Amyris Elemifera	314
Petrofum	439	Opobalfamum	319
Plumofum		Anagallis	the lot light of the lot of the
Romanum		Άναλέπτικα	148
Rotundum	ibid.	Martial.	346
Saccharinum		Ananas	406
Tinctum	431	'Αναπίνοντα	78
Ofe Uftum Dah		Anas ananil monte	596
Alun		Anchois	14.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
Amandes	477	A 1 C D C 1 T	173
and a second sec	\$ & 195	Tinctoria	356
"Αμάρακον		Ancken	375
Amaranthus viridis	452	Anckentröfter	133
Ambra	477	Ancoline	132
Ambrofiaca	274	Andorn	452
Ambubeja	51	Andouilleres 141	219 & 143
Ameise		'Avoga zvn	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amentacea		Avoga Qažis	65
Amidon	7		44
		Andropogon	299
AMM		Anemone	381
Ammi	and the second sec	Anet	238
Creticum		Avn 900	ibid.
Ammlung		Anethum	ibid.
Ammoniacum Gummi	197	Fœniculum	267
Ammodytes	495	Graveolens	238
Amomo Cardamomum	245	Angelica	53I

			Contra State
Angelica Archangelica		Apophlegmatizantia	606
Anguilla		Apricosen	79
Anguille	ibid.	Ativgion	195
Anguriæ	82	Apyrenæ	97
Anima Rhabarbari	A REAL PROPERTY AND ADDRESS OF A DREAM AND ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDR	Aqua	180
Animelles	137	Aluminis	436
Aniimum	and the second se		86. 187
Anis	239		and the second second
"AV160V			187 ibid.
Anifum	ibid.		
	ibid.		602
Anis de la Chine	240	RULANI	
Anifum stellatum	ibid.	Bourbonnensis	187
	9 & 503		46. 500
Avwirs	566	Calcis vivæ	602
Anfer	148	Carolinenfes	188
Ferus	149	Caltonacenfes	ibid.
Anthelmintica	195	Aqua destillata	193
"Avgenis	207	Abfynthii	196
Anthemis Cotula	ibid.	Acaciæ	415
Pyrethrum	485	Acetofæ	38
"Avgos	290	Acori	243
Antihecticum Poterii	589	Alkekengi	650
Antimoine	587	Aloës ligni	307
Antimonium	ibid.	Anagallidis	199
	the state of the state of the state of the	Angelicæ	
Diaphoret.		Anili	532
Antirrhinum Linaria	460		239
Antifeptica	305	Apii	42
	19 & 503	Arctii	555
ANTIGMASINA	476	Armoraciæ	43
Antophylli	248	Artemiliæ	242
Aper	140	Aurant.	110
	30 & 449	Bardanæ	555
Apfel	76	Beccabungæ	ibid.
	94. 648	Bellidis	377
Aphronitrum	544	Bergamotte	76
"Απια	108	Betonicæ	378
Apiacon	46	Borraginis	355
Apiastrum	279	Bugloffæ	356
Apis	584	Bugulæ	203
Apium	40	Calendulæ	ibid.
Graveolens		Caponum	
Petrofelinum	41	Card. Bened.	153
	63	Mariæ	205
Apocyna			556
Αποφλεγματισμός	.606		247
		Aqua Car	minaciva

Aque del Corminative		Aque deft Himundinum mus	
Aqua deft. Carminativa		Aqua deft. Hirundinum cur & fine Caftoreo	and the second second
fpirit.	208		157
Caryophyllor.	249	Hyffopi Hyfterica	269
Cafcarillæ Cantour min	250	Ireos	520
Centaur. min.	206		271
Cerafor. nigr.	82	Juglandum	121
e corde Cervi	144	Juniperi baccar.	273
C. C. citrata	ibid.	Lactis alexiteria	132 ibid
e typhis Cervi	ibid.	Seri	ibid.
Chærophylli	50	Lactucæ	57
Chamæmeli	208	Lavendulæ	274
Chamomillæ	ibid.	Lauri	276
Cheiri	557	Lentifci fummit.	317
- Chelidonii	558	Lepidii	58
Cephalica	291	Leviftici	536
Cichorii	52	Liguítri	383
Cinamom.	257	Lilior.	460
Citri corticum	76	convall.	277
Citrullorum	83	Magnanimitatis	493
Cochleariæ	533	Majoranæ	278
Cochlearum	180	Marrubii	220
Confolid. regal.	211	Mattichina	318
Convallar.	466		220
Convallium Lilion	and the second second	Mei	537
Cordialis	257	Meliloti	279
Coriandri	260	24 114	279
Cornorum	104		585
Cucumer	84	odorata reg.	ibid.
Cumini	261	Melonum	93
Cyani	212	Menthæ	281
Cyperi	652	Millefolii	385
Endiviæ	55	Myrrhæ	222
Euphrafiæ	214	Myrti	284
Fabarum Fl.	30	Naphæ	81
Fœniculi	267	Nafturtii	61
Fragariæ	. 90	Nympheæ	462
Fragorum	ibid.	Oxal.	53I
Fumariæ	216	Pæoniæ	515
Galegæ	379	Panis	15
Graminis	561	Papav. Rhoead.	523
Hederæ terrestr.	381	Parietariæ -	567
Helenii	535		540
Hepaticæ nobilis	382		95
Herniariæ	564	l Petrofelini	63
A PARTICIPATION AND A PARTICIPATICATICATU AND A PARTICIPATICATU AND A PARTICIPATICIPATICATU AND A PARTICIP		U U	

Xy

The state of the second second second second	I Day	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O	The watch a st
Aqua dest. Plantaginis		Aqua Ferina	188
Portulacæ	65	Fluviatilis	182
Prunellæ	390		181
Pulegii	289		5.7
Querci fol.	423	Fundi	185
Ranar. Sperm.	175		\$20. 627
Raphani	67	Grandinis	183
Reginæ Hungar.	291	Gryfea	593
Rhodii ligni		Hyfterica	520
Roris marini	290		182
Rofarum	426	Marina	184.188
Rubi Idæi	96	Martialis	186
Sabinæ	293	Maftichina	317
Salviæ	294	Meliffæ compof.	279
Sambuci	577	cum vino	ibid.
Saniculæ	392	Antihyfter	ic. ibid.
Santali citrini	393	Mercurialis	594
Saffafras	295	ad ufus	ex-
Scabiofæ	395	ternos	593
Scordii	226	Mineralis 1	81 & 184
Scorzoneræ	69		188
Serpilli	298		183
Sigilli Salom.	466		627
Solani	524		
Symphyti	467	rina s	02 & 603
Tanaceti	231	Paluftris	182
Theriacalis Bezo-		Petrina	186
ardica	522	Phagedænica	593
Compofita	522	Piperina	188
Simplex	ibid,	Plumbaria	187
Trifolii	232	Pluvialis	182
Tunicæ	1349	Putealis	181
Tuffilaginis	468		186
Valerianæ	301	Rabelliana	448
Verbenæ	232	Regis	547
Veronicæ	395	Rippelfavienfis	186
Violarum	350	AND A REAL PROPERTY AND A REAL	183
WINTERANI		Salinæ	187
cort.	303	Schwalbacenfis	ibid.
Zedoariæ	304	Sedlicenfis	187
Aqua Anhaltina	331	Selterana	ibid.
	ibid.		ibid.
Cæmentatoria	500		182
Dulcis	181	Styptica	448
		Anna States	

Sulphurea186fabaceaibid.Tophacea184longa199Vegeto-mineral.442masibid.viva181piftoloch.ibid.Wadwilenfis187rotundaibid.Wisbadenfis188Agresologia Magaatirs;201Aquila Lignum307Agresologia Magaatirs;201Aquila Lignum307Agresologia Magaatirs;201Aquilina379 $590920M$ ibid.Arack24Arifolochica656"Apauorinad529'Apstiov554Aranza de Sina80"ApacoSo;271Arbutus Uva urfi433"AparoSo;271Arcana8Armeniaca Mala79Arcan. Corallin.594Armoria42Archiocco52"Arnica27. 553Ardea161Apricy Naworow388Areca Catechu217Aromata194. 235Arean ferrea403Aromatica5Argent363Apav477Album364Arreit de Bauff566Cinereumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche497Autonu363Apav477Argent363Apav477Ardu364Arreit de Bauff566Cinereumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche497<	A ave Sulabacan Ga	10-10-	Aristolochia cretica	201
Tophacea184longa199Vegeto-mineral.442masibid.viva181piftoloch.ibid.Wadwilenfis137rotundaibid.Wisbadenfis188ferpentaria297Aquilegia452 $\mu \alpha \kappa \rho a$ 200Aquilegia452 $\mu \alpha \kappa \rho a$ 200Aquilegia452 $\mu \alpha \kappa \rho a$ 656Aract24Ariftolochica656Aranza de Sina80"Apartov554Aracna80"Apartov554Arcana8Armeniaca Mala79Arcana8Armeniaca Mala79Arcana8Armeniaca Mala79Arcana8Armeniaca Mala79Archiocco52Arnica27.553Arctium Lappa555"Apres137Ardea161Apriz Aromatica5Arceca Catechu217Aromatica5Argent363"Apre Mareu497Album364Arreit de Bauf566Cinereumibid.Arreit de Bauf566Cinereumibid.Arreit de Bauf566Cinereumibid.Arreit de Bauf566Cinereumibid.Arreit de Bauf566Argent363Apre Wade497Argent363Apre Wade497Argent364Arreit de Bauf566Cinereumibid.Arreit de Bauf566 <td< td=""><td>Aqua Sulzbacenfis</td><td></td><td></td><td></td></td<>	Aqua Sulzbacenfis			
Vegeto-mineral, viva442 ititmasibid. piftoloch.ibid. ibid.Wadwilenfis181 rotundapiftoloch.ibid. ibid.Wadwilenfis188 ferpentaria297Aquila Lignum307 Apisobagla xhaartru;201 \muaxeja 200 sporythyAquilegia452 \muaxeja 200 sporythyAquilegia452 \muaxeja 200 sporythyAquilegia379 Arack520 sporythyArack24 Ariftolochica656Arganormad520 'Apacioy554 Aranza de SinaArcana80 'Apacoyac71 ApiriovArbutus Uva urfi433 'Apariov554 ArcanaArcana8 Armeniaca Mala79 ArcanArchim Lappa555 'Apres137 ArgentArdea161 Asporsov388 Arecca Catechu217 AromaticaArea ferrea403 Aromatica54 ArroiteArgent363 Aspor477 ArgentumAfgent363 Aspor477 ArgentumArgent363 Aspor477 ArgentumArgent363 Aspor497 RubrumArgent mineræ590 Nudum497 RubrumArgent mineræ590 Nudum497 RubrumArgent mineræ590 Nudum497 RubrumArgent mineræ590 Arifoloche longue200 ArtiffenArgent mineræ501 Artec de Bacuf516 AsporyevArgent363 AsporyevAgeronad Ageronad </td <td>Carlinates</td> <td>-0-1</td> <td></td> <td></td>	Carlinates	-0-1		
viva181 Wadwilenfispiftoloch.ibid.Wadwilenfis137 Totundarotundaibid.Mquilegia307Apisología xhykaríru;200Aquilegia452 $\mu \alpha x p d 2$ $\mu \alpha x p d 2$ 200Aquilegia452 $\mu \alpha x p d 2$ $\mu \alpha x p d 2$ 200Aquilegia452 $\mu \alpha x p d 2$ $\mu \alpha x p d 2$ 200Aquilegia452 $\mu \alpha x p d 2$ $\mu \alpha x p d 2$ 200Aquilegia452 $\mu \alpha x p d 2$ $\mu \alpha x p d 2$ 200Aquilina379 $\pi a c t 2$ $\pi c x p \alpha x p d 2$ 554Aract24Atiftolochica656"Apauorixed529 $A p x e t 0 \infty$ 554Aranza de Sina80 "Apresod 5271Arbutus Uva urfi433 "Apresod 5271Arciana8Armeniaca Mala79Arcana8Armeniaca Mala79Arcana94 $\Delta rmoife241duplic.448Armoracia42Archium Lappa555("Apres" 137317Ardea161(Apv(5) Aworov388Arecca Catechu217(Aromatica507Argent363("Apres" 200("Apres" 200477Argent363("Apres" 200("Apres" 200("Arten" 201477Argent363("Apres" 200("Arten" 201("Arten" 201$	a opinioon			
Wadwilenfis137rotundaibid.Wisbadenfis188ferpentaria297Aquilæ Lignum307'Agisslog/a klamatiri;201Aquilegia452 μ angid200Aquilegia452 μ angid200Aquilina379'Agisslog/a klamatiri;201Aracé24Arifolochica656'Agauorind529'Agisslog271Arbutus Uva urfi433"Agisslog554Arcana80"Agisslog271Arbutus Uva urfi433"Agino Soc271Arbutus Uva urfi433"Agino Soc271Arcana8Armeniaca Mala79Arcana8Armeniaca Mala79Arcana94Armoifé241Archiocco52Arnica27. 553Arctium Lappa555"Agies"137Ardea161Agio's homatica194. 235Arecca Catechu217Aromatica564Argentum363'Agiov477Argentum363Ajés199Corneumibid.Arrêt de Bæuf566Cinercumibid.Afreincum497Album364Arrêt de Bæuf566Cinercumibid.Afreincum497Argentum363Ajés199Corneumibid.Afreincum497Argentum364Arrêt de Bæuf566Cinercumibid.Afreincum <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
Wisbadenfis188ferpentaria297Aquilez Lignum307Apisologia $\lambda h mathematica$ 201Aquilegia452 $\mu x e p d$ 200Aquilegia452 $\mu x e p d$ 200Aquilina379 $\varsigma e g y y h m$ ibid.Arack24Atifolochica656"Apatorinad529'Apisolog271Arbutus Uva urfi433"Apisolog554Arcana8Armeniaca Mala79Arcana8Armeniaca Mala79Arcana8Armoracia42Archiocco52Arnica27.553Arctium Lappa555"Apisologia388Areca Catechu217Aromatica56Argent363Apisonatica56Argent363Apisonatica56Argent363Apisonatica56Corneumibid.Arreche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche497Argent mineræ590Nativum497Zincofum364Arreche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Arreche44Nigrumibid.Arreche44Nigrumibid.Arreche497Argentumibid.				
Aquilæ Lignum307Aptsología xhuaarírus201Aquilegia452 μ axepil200Aquilina379 $sgoyyiha$ ibid.Arack24Ariflolochica656Apauorinal629'Apacilov554Aranza de Sina80'Apacu9os271Arbutus Uva urfi433'Apacu9os554Arcana80'Apacu9os554Arcana8Armeniaca Mala79Arcana8Armeniaca Mala79Arcana94Armoife241duplic.448Armoracia42Archiocco52Arnica27.553Arctium Lappa555'Apves388Areca Catechu217Aromata194.235Arena ferrea403Aromatica5Argent363'Apov477Argent363'Apov477Argent363'Apov497Album364Arret de Bæuff566Cinereumibid.Arroche44Nigrumibid.Arlonium497Rubrumibid.Album403Vivum590Nativum497Rubrumibid.Album403Area436.437Rubrum497Argent363'Apov200Arteniaca403'AreacheeArgent363'Apov447Argentibid.Artenicum497Rubrum <td></td> <td></td> <td>a second s</td> <td></td>			a second s	
Aquilegia 452 $\mu \alpha \kappa \rho d$ 200 Aquilina 379 $\gamma \rho \rho \gamma \nu \lambda \eta$ ibid.Aract24Ariftolochica 656 "Apacuorizad 529 , 'Apaciov 554 Aranza de Sina80 "Apacuolog 271 Arbutus Uva urfi 433 , "Apartov 554 Arcana8Armeniaca Mala 79 Arcana8Armeniaca Mala 79 Arcana 8 Armeniaca Mala 79 Arcana 8 Armeniaca Mala 79 Arcana 8 Armeniaca Mala 79 Arcan. Corallin. 594 , Armoife 241 duplic. 448 Armoracia 42 Archiocco 52 Arnica 27 . 553 Arctium Lappa 555 , "Apres 137 Ardea 161 $Aporson388Arecca Catechu217Aromatica564Arena ferrea403Aromatica564Argent363Apov477Argent363Apov477Argent363Apov477Argent364Arrect de Bauff566Cinereumibid.Arfenicum497Aubrumibid.Artenicum497Aubrumibid.Arfenicum497Argenti mineræ590Nativum497Rubrumibid.Arfenicum497Rubrumibid.Argenuibid.Argenti mineræ590Nativum497Rubru$		and the second se		
Aquilina 379 5907000 ibid.Arack24Ariftolochica656"Apauorinad529"Apacitov554Aranza de Sina80"Apacitov554Aranza de Sina80"Apacitov554Arcana8Armeniaca Mala79Arcana8Armeniaca Mala79Arcan. Corallin.594Armoife241duplic.448Armoracia42Archiocco52Arnica27.553Arctium Lappa555"Apves"137Ardea161Apves"137Ardea161Apves"388Arecca Catechu217Aromata194.235Arena ferrea403Aromatica5Argent363"Apov477Argentum363Apiswaiv497Album364Arrêt de Bæuf566Cinereumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Arlenicum497Rubrumibid.Arlenicum497Rubrum363Apiswaiv497Rubrum363Apiswaiv497Rubrum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nud				
Arack24Ariftolochica656'Apauornad529'Apation554Aranza de Sina80< "Apation				
$^{\prime}Agaustrand520^{\prime}Agaziov554Aranza de Sina80^{\prime\prime}Agaziovoz271Arbutus Uva urfi433^{\prime\prime}Agaziovoz554Arcana8Armeniaca Mala79Arcana94\mathcal{A}rmoife241duplic.448Armoracia42Archiocco52\mathcal{A}rmoife241Archiocco52\mathcal{A}ricia27, 553Arctium Lappa555^{\prime\prime}Agvez137Ardea161Agvez/Awrov388Areca Catechu217Aromatica5Arena ferrea403Aromatica5Argent363Agov477Argent363Agov477Argent363Afov477Argent363Afov477Argent363Afov477Argent363Afov477Argent364Arrett de Bæuf566Cinereumibid.Arroche44Nigrumibid.Afroche44Nigrumibid.Arrett de Bæuf566Cincofum364Arrett de Bæuf566Cincofum364Arrett de Bæuf566Argenti mineræ590Nativum497Rubrumibid.Artenicum497Rubrum363AgretoxdoS2Argent363AgretoxdoS2Argent363Agretoxdo$	and the second se	379	Story ny	
Aranza de Sina80 "Apreso Soç271Arbutus Uva urli433 "Apreso Soç271Arbutus Uva urli433 "Apreso Soç554Arcana8 Armeniaca Mala79Arcan. Corallin.594 Armoife241duplic.448 Armoracia42Archiocco52 Arnica27. 553Arctium Lappa555 "Apres137Ardea161 Apréxtarov388Arecca Catechu217 Aromata194. 235Arena ferrea403 Aromatica5Argent363 "Apreso477Argent363 "Apreso477Argentum363 Apreso477Argentum363 Apreso477Argentum363 Apreso477Argentum364 Arrêt de Bæuf566Cinereumibid.ArrocheAlbum464 Arrêt de Bæuf566Cinereumibid.ArrocheAibum497XubrumNigrumibid.ArrocheArgenti mineræ590NativumYivum590NativumArgenti mineræ590Arifloloche longue200Maries137Artemilia54. 195. 200. 236.Arifloloche longue200Petiteibid.Artichaut52ronde200Artiffen70de vigne201Artiffen70				
Arbutus Uva urfi433"Aperiov554Arcana8Armeniaca Mala79Arcana94Armoife241duplic.448Armoracia42Archiocco52Arnica27.553Arctium Lappa555"Apvis"137Ardea161Apvérykarov388Arecca Catechu217Aromatica194.235Arena ferrea403Aromatica5Argent363"Apov477Argent363"Apov477Argent363"Apov477Argent363"Apov477Argent363"Apov477Argent363"Apov477Argent363"Apov477Argent363"Apov477Argent364Afreét de Bæuf566Cinereumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Artoche44Nigrumibid.Mulum497Rubrum590Nativum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ500Nudumibid.Argenti mineræ501Aprevue'v63Argenti363Aprevue'v363Argenti63				
Arcana8Armeniaca Mala79Arcan. Corallin.\$94Armoife241duplic.448Armoracia42Archiocco\$2Arnica27.553Arctium Lappa\$55"Agves137Ardea161'Agves/twoorov388Arecca Catechu217Aromata194.235Arena ferrea403Aromatica\$Argent363"Agov477Argent363"Afov497Album364Arrêt de Bæuf\$66Cinereumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Arfenicum497Rubrumibid.Arfenicum497Rubrumibid.Arfenicum497Rubrumibid.Arfenicum497Rubrum1bid.Arfenicum497Rubrum1bid.Arfenicum497Rubrum1bid.Arfenicum497Argenti mineræ\$90Nativum497Rubrica436.437Rubrum499Arifboloche longue200Xagresvicovibid.Arteriaca Becchica450Arteriaca Becchica450 <i>petite</i> ibid.Arteriaca Becchica450 <i>de vigne</i> 201Artififen70 <i>de vigne</i> 201Artififen70				
Arcan. Corallin. 594 Armoife 241 duplic. 448 Armoracia 42 Archiocco 52 Arnica 27.553 Arctium Lappa 555 "Apves 137 Ardea 161 'Apves 194.235 Arena ferrea 403 Aromatica 5 Argent 363 'Apov 477 Argent 363 'Apov 477 Argent 363 'Apov 477 Argent 164 Arrêt de Bæuf 566 Cinereumibid.Arreche 44 Nigrumibid.Arroche 44 Nigrumibid.Arfenicum 497 Rubrumibid.Artenicum 497 Rubrumibid.Artenicum 497 Rubrum 590 Nativum 497 Zincofum 364 Nigrumibid.Argenti mineræ 590 Nudumibid.Argenti mineræ 590 Nudumibid.Aries 137 Artemilia $54.195.200.236$	A REAL PROPERTY OF A REA			
duplic.448Armoracia42Archiocco52Armica27.553Arctium Lappa555"Apves137Ardea161'Apves137Ardea161'Apves137Ardea161'Apves388Arecca Catechu217Aromata194.235Arena ferrea403Aromatica5Argent363'Apv477Argent363'Apv477Argent363'Apv477Argent363'Apv497Album364Arrêt de Bæuf566Cinereumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Artroche44Nigrumibid.Artoche44Nigrumibid.Artoche44Nigrumibid.Artoche44Nigrumibid.Artoche497Rubrum590Nativum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Aries137Artemifia54.195.200.236.Arifloloche longue200& 241 <i>nenue</i> 201Arteriaca Becchica450 <i>petite</i> ibid.Artiffen70de vigne200Artiffen70				
Archiocco 52 Arnica 27.553 Arctium Lappa 555 "Apves137Ardea161Apves137Ardea161Apves137Ardea161Apves137Areca Catechu217Aromata194.235Arena ferrea403Aromatica5Argent363Åqov477Argent363Åqov477Argent363Åqov497Album364Arrêt de Bæuf566Cinereumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Artoche44Nigrumibid.Artoche497Rubrumibid.Citrinum499vivum590Nativum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argentia436.437Rubrum499Conclum363Åqoevueovibid.Aries137Artemifia54.195.200.236.Aries137Arteriaca Becchica450 <i>menue</i> 201Arteriaca Becchica450petiteibid.Artichaut52ronde200Artiffen70de vigne201Artiffen52				
Arctium Lappa555"Agves137Ardea161'Agves388Arecca Catechu217Aromata194. 235Arena ferrea403Aromatica5Argent363"Agov477Argent363Agov477Argent363Agov477Argent363Agov477Argent363Ajósvaðv497Album364Arret de Bæuf566Cinereumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Artenicum497Rubrumibid.Artenicum497Rubrumibid.Album403vivum590Nativum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Aries137Artemifia54. 195. 200. 236.Arifloloche longue200& 201Arteriaca Becchicamenue201Arteriaca Becchica450petiteibid.Artichaut52ronde200Artififen70de vigne201Artififen52				
Ardea161Αρνζολωσσου388Arecca Catechu217Aromata194.235Arena ferrea403Aromatica5Argent363Åρου477Argent363Åρου477Argent363Åρου477Argent363Åρου477Argent364Årrét de Bæuf566Cinereumibid.Årret de Bæuf566Cinereumibid.Årroche44Nigrumibid.Årroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Artenicum497Rubrumibid.Artenicum497Vivum590Nativum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argentia436.437Rubrum499Rubrica403Teftaceumibid."Aρτυζον363Åρσενικόνibid.Arifsoloche longue200& 241nenue201Arteriaca Becchica450petiteibid.Artichaut52ronde200Artififen70de vigne201Artififen70	The second se			27.553
Arecca Catechu217Aromata194.235Arena ferrea403Aromatica5Argent363Åçov477Argent363Åçov497Argent363Åçov497Album364Arrêt de Bæuf566Cinereumibid.Åçón199Corneumibid.Afrôn199Corneumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Arfenicum497Rubrumibid.Citrinum499vitreumibid.Citrinum499Vivum590Nativum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Kubrum499Rubrica436.437Rubrum499Aries137Artemifia54.195.200.236.Ariffoloche longue200				137
Arena ferrea403Aromatica5Argent363Åjøv477Argent363Åjøv497Album364Arrét de Bæuf566Cinereumibid.Åfret de Bæuf566Corneumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Arfenicum497Rubrumibid.Arfenicum497Rubrumibid.Citrinum499vitreumibid.Citrinum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nativum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti a436.437Rubrum499Kubrica403Teftaceumibid.Ariffoloche longue200& Arteriaca Becchica450 <i>petite</i> ibid.Artichaut52ronde200Artiffen70de vigne201Artiffchock52				388
Argent363Agov477Argentum363Appensedv497Album364Arrêt de Bæuf566Cinereumibid.Arrêt de Bæuf566Corneumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Arfenicum497Rubrumibid.Arfenicum497Rubrumibid.Album403vitreumibid.Citrinum499vivum590Nativum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti a436.437Rubrum499Kubrica403Teftaceumibid."Apyugov363Aperenxiovibid.Ariffoloche longue200& 200& 241menue201Arteriaca Becchica450petiteibid.Artichaut52ronde200Artiffen70de vigne201Artiffen52				194.235
Argentum363Ajjevuedv497Album364Arrêt de Bæuf566Cinereumibid.Ajjevuedv199Corneumibid.Arroche44Nigrumibid.Arroche44Nigrumibid.Arfenicum497Rubrumibid.Arfenicum497Rubrumibid.Album403vitreumibid.Citrinum499vivum590Nativum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argilla436. 437Rubrum499Rubrica403Teftaceumibid."Agrevogov363'Agrevuzo'vibid.Arifstoloche longue200& 241450petiteibid.Artichaut52ronde200Artiffen70de vigne201Artiffchock52	Arena ferrea			vinelal/S
Albumi 64Arrêt de Bæufi 666Cinereumibid.Aifén199Corneumibid.Arroche44Nigrumibid.Arfenicum497Rubrumibid.Album403vitreumibid.Citrinum499vivum590Nativum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argilla436.437Rubrum499Rubrica403Teftaceumibid."Apyupov363Aprevundvibid.Aries137Artemifia54.195.200.236.Ariftoloche longue200& 241petiteibid.Arteriaca Becchica450petiteibid.Artifhen70de vigne201Artiffen70de vigne201Artiffchock52	Argent			477
Cinereumibid.Afán199Corneumibid.Arroche44Nigrumibid.Arfenicum497Rubrumibid.Album403vitreumibid.Album403vitreumibid.Citrinum499vivum590Nativum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argilla436.437Rubrum499Rubrica403Teftaceumibid."Apyupov363'Apotund'sibid.Aries137Artemifia54.195.200.236.Ariftoloche longue200& 241menue201Arteriaca Becchica450petiteibid.Artichaut52ronde200Artififen70de vigne201Artifichock52	Argentum			497
Corneumibid.Arroche44Nigrumibid.Arfenicum497Rubrumibid.Album403vitreumibid.Album403vivum590Nativum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argilla436. 437Rubrum499Rubrica403Teftaceumibid."Apyrupov363Apoterunovibid.Aries137Artemifia54. 195. 200. 236.Ariftoloche longue200& 241petiteibid.Arteriaca Becchica450petiteibid.Artififen70de vigne201Artifichock52	and the second se			566
NigrumibidArfenicum497Rubrumibid.Album403vitreumibid.Citrinum499vivum590Nativum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argilla436.437Rubrum499Rubrica403Teftaceumibid."Apyugov363'Apotevuzo'vibid.Aries137Artemifia54.195.200.236.Ariftoloche longue200& 241petiteibid.Arteriaca Becchica450petiteibid.Artichaut52ronde200Artififen70de vigne201Artififen52				199
Rubrumibid.Album403vitreumibid.Citrinum499vivum590Nativum497Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argilla436.437Rubrum499Rubrica403Teftaceumibid."Apyugov363Agorevuxo'vibid.Aries137Artemifia54.195.200.236.Ariftoloche longue200& 241petiteibid.Arteriaca Becchica450petiteibid.Artififen52ronde200Artififen70de vigne201Artififen52				44
vitreum ibid. vivum 590 Zincofum 364 Argenti mineræ 590 Argilla 436.437 Rubrica 403 "Apyrugov 363 Aries 137 Ariftoloche longue 200 menue 201 petite ibid. ronde 200 de vigne 201 Artifichock 52	Nigrum	ibid	and the second product of the second s	497
vivum 590 Zincofum 364 Argenti mineræ 590 Argilla 436.437 Rubrica 436.437 Rubrica 403 "Agyeves" 363 Aries 137 Aries 137 Ariftoloche longue 200 menue 201 Artemifia 54.195.200.236. Artemifia 54.195.200.236. Arteriaca Becchica 450 Mativum 499 Teftaceum ibid. Artemifia 54.195.200.236. Arteriaca Becchica 450 Artififen 70 de vigne 201 Artififen 70	Rubrum			403
Zincofum364Nigrumibid.Argenti mineræ590Nudumibid.Argilla436.437Rubrum499Rubrica403Teftaceumibid."Apyupov363Aprevixovibid.Aries137Artemifia54.195.200.236.Ariftoloche longue200& 241menue201Arteriaca Becchica450petiteibid.Artififen70de vigne201Artififen52	vitreum	ibid.		499
Argenti mineræ590Nudumibid.Argilla436.437Rubrum499Rubrica403Teftaceumibid."Agyugav363Agrevindvibid.Aries137Artemifia54.195.200.236.Ariftoloche longue200& 241menue201Arteriaca Becchica450petiteibid.Artififen70de vigne201Artififen52		. 590		497
Argenti mineræ590Nudumibid.Argilla436.437Rubrum499Rubrica403Teftaceumibid."Apyupov363Aprevunovibid.Aries137Artemifia54.195.200.236.Ariftoloche longue200& 241menue201Arteriaca Becchica450petiteibid.Artichaut52ronde200Artififen70de vigne201Artififen52	Zincofum		Nigrum	ibid.
Rubrica403Teftaceumibid."Agyugov363'Agyugovibid.Aries137Artemifia54. 195. 200. 236.Ariftoloche longue200& 241menue201Arteriaca Becchica450petiteibid.Artichaut52ronde200Artififen70de vigne201Artifichock52		590	Nudum	ibid.
Rubrica403Teftaceumibid."Agyugov363'Agyugovibid.Aries137Artemifia54. 195. 200. 236.Ariftoloche longue200& 241menue201Arteriaca Becchica450petiteibid.Artichaut52ronde200Artififen70de vigne201Artifichock52			Rubrum	499
Aries137Artemilia54. 195. 200. 236.Ariftoloche longue200& 241menue201Arteriaca Becchica450petiteibid.Artichaut52ronde200Artififen70de vigne201Artifichock52			Teftaceum	
Aries137Artemilia54. 195. 200. 236.Ariftoloche longue200& 241menue201Arteriaca Becchica450petiteibid.Artichaut52ronde200Artififen70de vigne201Artifichock52	"Agyugon			ibid.
Aristoloche longue200& 241menue201Arteriaca Becchica450petiteibid.Artichaut52ronde200Artififen70de vigne201Artifchock52				
menue 201 Arteriaca Becchica 450 petite ibid. Artichaut 52 ronde 200 Artififen 70 de vigne 201 Artifichock 52	Aristoloche longue		hidi n	
petite ibid. Artichaut 52 ronde 200 Artififen 70 de vigne 201 Artifchock 52			Arteriaca Becchica	
ronde 200 Artififen 70 de vigne 201 Artifchock 52				
devigne 201 Artischock 52				
				a real and a second
Aristolochia 199 sq. Agros 14. 146	Ariftolochia	199 fa	Agros	14. 146
clematidis 201 Arum 477			Construction of the second	
Ху 2				

Arundo	574	Avena nuda	ibid.
arbor	ibid.		ibid.
Afa fœtida	505	Auerhahn	156
"Aragov	609	Aves	147
Afarum	ibid.	baccis aut granis o	
ArBigon	600	libus vescentes	1.48
Asche	168		161
Aschenræslein	109		156
Afclepias arvenfis	570	Augentroft	213
nivea	574	Aunée	534
vincetoxicum	583	Avoine	15
Afellus		Aurantia Amara	80.109.
Atpalathilignum	307	Auricula Judæ	376
Alparagus	43	Muris	376
Asperge	ibid.	Auripigmentum	497
Afperifolia	6	Aurone	235
Afperula odorata	382	Aurum	365 fq.
Cynanchica L.	\$70	mineralifatum	366
Afphaltum	336	Fulminans	ibid.
ArganJos	ibid.	Auster	180
Aspic	274	Auftera	5
Afplenium		Άυτόπυρος	14
Trichomanes	373	Axungia Anatis	161
Adiantum nigru	m	Anguillæ	169
L. tymid die	372	Anferina	149
Ceterach	378		136
Scolopendrium	384	Caftorei	526
Asterias	162	Cati	142
Aftragalus Tragacantha	467	Coturnicia	150
Athamanta Cretenfis	54	Cuniculi	145
Meum	537	Gallinæ	153
Atlas-Erzt	500		146
Atramentum futorium	445	Lunæ	437
Atriplex	44	Porci	139
Atropa Belladonna	507	Taxi	146
Mandragora	513	Thymalli	168
'A Tavãs	150	Viperæ	496
Attagen	ibid.	Urfi	146
Attenuantia	\$29	Azur.	367
Attich	570	B.	
Attrahentia	476	Babeur re	134
Avellanæ	113	Baccæ	75
Avena	IS	Juniperi	272
fatua	16	Bachbungen	555

1

Bach-Münze	280	Balf. Peruvian. Siccus	121
Bachstelze	157		292
Bachwaffer malling	182		442
Bacilli de Liquiritia	457		
Badiani Rufforum	241		um 244
Badschwamme	585		502
Buxina	449		
Brixion		Barbe manual and	165
Ber		Barbeau	i ibid.
Barlappe stands	384	D F	ibid.
Barbele		Bardana	\$54
Bærenklau		Barg	138
Berthel	454	Baroques	362
Barwurzel	\$36	Bartavelle	154
		Bafilic	285
Badavea Enga	and the second sec		ibid.
	and the second se	Barbundy aland evolo	ibid.
Βάλανοι μυρεψικοί		Βάτινα	96
Badaysia	. 90	Βάτραχος	300.174
Balaustia		Baurach	\$42
Baldrian		Bost ion	202
Balenæ	473	Bdellium	ibid.
Ballerus	105	Beaume d'aiguilles	405
Balnea Laconica		Beccabunga	100 \$55
Sicca	ihid	Beccafine	159
Sudatoria	ibid	Bedeguar	607
Balf. Arcæi		Bedezahar	425
Canada		Beifus	358 241
Chalybeatum		Beinbruch	604
Cinamomi		Belemnites	599
de Copaiba		Bélier	137
Commendatoris de		Belladonna	507
PERNE		Belle Dame	44
Fioraventi		Bellis	377
Hypnoticum		Benedicta	619
Hyftericum		Benedictenwurzel	247
Lavendulæ		Benoite	ibid.
Magicum Pforzh.	383	Benzoës	308
Majoranæ	278	Berberis	72
de Mecca		Berca	and the second se
Nucis mofchatæ	283	Bergamotte	75
Odontalgicum	520	Bergkork	365
Peruvian,	321	Bergkümmel	298
		Yy3	and the second

Bergmünzeld	242	Bitumen - &
Bernstein	228	Bitumen Judaicum 7 & 336 Bitumen Judaicum 337
Berfing	167	Suillum ibid.
Bertram telingen ing		BANXON MINING ab illi 289
Berus		BAN2000 111 10 1378
Beta Beta		Blaireau 911111145
Betoine	and the second second	The second s
	553	
	377	A STATE OF A
Betonica Betonien	ibid.	Blanc de Baleine 473
BETOVINA	ibid.	d'Espagne 408
		de Plomb 441
Beurre	132	Blé tontra 12
fondu		
Bezaar		d'espagne 21
Bezarahat 76		noir had sub. 17
	ibid.	
		Bleiche Rofen 424
		Blende 411
		Blête 453
		Bletzer 126
Bezoar Caman. de Goa		Bley 439 Bley-Schweif ibid.
Bezoar Occident.	358	
		Bliecken 165
Βήχιου		Βλίτον 453
Bibergeil		Blitum ibid.
Biberklee		Bluct 212
Biche		Blutstein 403
Bienenharz,	333	
Bieren	108	Bock 136
Bigarottes	81	Bockshorn 456
Bilfam	512	
Bimfenstein	409	Bohrerz 403
BinetJch	69	
Bingelkraut	565	Kraut 295
Birckhahn	156	
Birnen	108	de Garou 483
Bifam	352	-Gentil ibid.
Bifcuit	14	des Rofes 347
Bilmuthum	408	Bolchen 172
Biltorta Bitterang Con	and the second se	Boletus 415 & 641 Cervinus 416
Bitterwaffer	184	Cervinus 416

ų,

Bῶλος436Oleracea45Bolusibid.Rapa65alba436 & 437Braunwurzel579armena436Brebis137flavaibidBreitwegerich389rubra436Bréme165Bonette390Brefemibid.Bonus HENRICUS453Broccoli46Bógzξ542Brochet166Boraxibid.Brochetonibid.	Boll	27	Braffica Napus	66
Bolusibid.Rapa65alba436 & 437Braunwurzel579armena436Brebis137flavaibidBreitwegerich389rubra436Brême165Bonette390Brefemibid.Bonus HENRICUS453Broccoli46Bógzξ542Brochet166Boraxibid.Brochetonibid.	Βῶλος	A REAL PROPERTY OF A REAL PROPER	Oleracea	PLAN MARK MARKAN
alba436 & 437Braunwurzel579armena436Brebis137flavaibidBreitwegerich389rubra436Bréme165Bonette390Brefemibid.Bonus HENRICUS44Brocard vieux141Borus HENRICUS453Broccoli46Bógzξ542Brochet166Boraxibid.Brochetonibid.	and the set of the set		Rapa	
armena436Brebis137flavaibidBreitwegerich389rubra436Brême165Bonette390Brefemibid.Bonne Dame44Brocard vieux141Bonus HENRICUS453Broccoli46Bógzξ542Brochet166Boraxibid.Brochetonibid.	alba 431	5 & 437	Braunwurzel	
flava ibid Breitwegerich 389 rubra 436 Brême 165 Bonette 390 Brefem ibid. Bonne Dame 44 Brocard vieux 141 Bonus HENRICUS 453 Broccoli 46 Bógzž 542 Brochet 166 Borax ibid. Brocheton ibid.		436	Brebis	
rubra 436 Brême 165 Bonette 390 Brefem ibid. Bonne Dame 44 Brocard vieux 141 Bonus HENRICUS 453 Broccoli 46 Bégzž 542 Brochet 166 Borax ibid. Brocheton ibid.	flava		Breitwegerich	
Bonette390Brefemibid.Bonne Dame44Brocard vieux141Bonus HENRICUS453Broccoli46Bégzk542Brochet166Boraxibid.Brochetonibid.	rubra	436	Brême	
Bonne Dame44Brocard vieux141Bonus HENRICUS453Broccoli46Bégzk542Brochet166Boraxibid.Brochetonibid.	Bonette	390	Brefem	
Bonus HENRICUS453Broccoli46Bógag542Brochet166Boraxibid.Brochetonibid.	Bonne Dame	44	Brocard vieux	141
Bogaž 542 Brochet 166 Borax ibid. Brocheton ibid.	Bonus HENRICUS	453	Broccoli	
Borax ibid. Brocheton ibid.	Bogag	542	Brochet	
	Borax			ibid.
gemma viridis L. 369 Brod. 14	gemma viridis L.	369	Brod.	14
granatus 368 Brombeeren 96		368	Brombeeren	
Bordelure 165 Bromelia 78		165	Bromelia	78
Boretsch 354 Brojame 14	Boretsch	354	Brojame	
Borrago ibid Beaus 15				
Bos 125 Bewrov ibid.		125	Bewron	ibid.
Botaurus Stellaris 162 Broye 454	Botaurus Stellaris	162	Broye	454
Bouc " 136 Bruchkraut 563	Bouc	136	Bruchkraut	A REAL PROPERTY AND A REAL
Bouillon blanc 468 Brücke 171	Bouillon blanc .	468	Brücke	the second s
Bouquetine 568 Brugnon 94	Bouquetine	568	Brugnon	the second s
Bourage 354.568 Brunnkreffen 60		\$\$4.568	Brunnkreffen	
Bourgene 613 wasser 181	Bourgene	613	wasser.	181
Bourgeons de Peuplier. 314 Brufcus 571	Bourgeons de Peuplier.	314	Brufcus	57I
Boufferole 433 Bruftbeeren 91		433		91
Bovist 417 Leim 458			Area Area	458
Bovifta ibid. Brutorum Indicia 4			and the second	
Boyerbrod 572 Bevos 386		572	Bevor	
Brachvogel 158 Beverna 611		158	Beverrice	a support of the second second
Beagus _ 292 Bryonia ibid.				The second second
Brama 165 Bubenvift 417				CAR STRATES LAT.
Branca Urfina 453 Bubon Macedon. 63				A CALL AND A
Italic. 450 Buchweitzen 17				and the second se
Branche Urfine ibid. Bufo 175				
Brandmeise 158 Bufones exfice. 176		CONTRACTOR AND A REAL OF	The second s	ALL PROPERTY AND A REAL PR
Brandvogel 162 Bugle 202		States of Business States		MARCH AS A STOLEN OF
Braffica 45 Bugloffe 355				355
Arcinia 46 Bsylorrov ibid.		40	Baylogram	
Botrytis ibid. Bugloffum ibid.				
Capitata ibid. Bugula 202				A
Cumana ibid. Büking 173				A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OFTA CONTRACTOR O
Eruca 533.482 Benegas 455 Gongylod. 46 Bupleurum rotundi-folium 388	the set of	55.482	Rupleurum rotundi folim	and the second se
Gongylod. 46 Bupleurum rotundi-folium 388 Y y 4	Gongytou.	40		1 388

Burfera	227	Calx gur	600
Burzel	65	viva	ibid.
Bas	125	Cambogia	614
Butor		Cameel-Heu	296
Butten	425	Camellus	214
Butter	132	Camillen	207
Milch	134	Camomille	ibid.
Barugov	132	Camphora	309
Butyrum	127.132	Camphorabaros	309
Antimonii	589	Canard	161
Cacao	115	Cancer	177
Coctum	133	Pagur.	179
Saturni		Çanella alba	303
С.	and a man in the	Canelle gerofflée	250
Cabaret	609	Cane	161
Cabliau		Canis	135
Cacao nuces	114	vulpes	147
Cachalot.		Çannabis	454
Cachou		Cantharide	489
Cadmia	and the state of the second	Capaun	ISI
Caruleus		Capillaire	371
Çæruleum montan.		Capillus Veneris	ibid.
Caffea	115		The second se
Caille		Capito	166
Calabafe		Capo	ISI
Calambuc Lign.		Capparis	47
Calament		Cappus	46
Calamintha	ibid.	Capra	136
Calamita		Capra Bezoardica	359
Calamus Aromat.		Rupicapra	357
Calatrippa		Capreolus	140
Calcareorum qualitate			47
Calcareus		Capri	136
Calcitrappa		Caprificatio quid ?	87
Paldaunan	106	Capfic. annuum	288
Calecutifcher Hahz		Capucine	61
Calefacientia		Capucinerlein	ibid.
Calendula	203	Caput Mortuum Vitriol	
Callarias		Carabe	338
Callaris		Carannæ Gummi	312
Calmus		Cardamomum	243 fq.
Calva		Cardenbenedicten	204
Calx			4 8.203
Arfenici viva		Cardon	52
extincta	601		

and the second second		10 P	vidoomin C. Jas
Cardopatium		Caulis	45
Carduelis		Cauteria Actualia	476
Carduus Benedictus		Cedrinum	322
Mariæ		Celeri	40
Carenum		Cellepora	586
Caricæ	87	Centaurea Benedicta	204
Carlina	205	Calcitrappa	a 651
Carminativa	194	Cyanus	212
Carneolus	369		638
Caro		petite Centaurée	205
Carobes		Centaureum minus	ibid.
Carotta	53	Lepton	ibid.
Carottes		Centrifcus	169
Carouges		Centumnodia	390
Carpe		Серæ	48
Carpfe		Cephalica	194
Carthamus		Cera	332
Carum	246	the second se	334
Carvi	ibid.	alba	ibid.
Caryocoftinum BAYRI	212	A 111 A	ibid.
Caryophyllata	247		ibid.
Caryophylli		Cerafa Actiana	81
Cafcarilla	249		ibid.
	& 134		ibid.
Cassepierre		Cerafi	73
Caffia Caryophyllata		Cerat. amygdal.	113
Cocta		Ceratonia	465
Fiftula		Ceratum de Ammon.	198
Lignea		Cerberus triceps	646
Senna		Cerealia grana	16
Caffonade	572	Cerevifia	20
Caftanea	118	Cerf de dix cors	ibid-
Castanie	ibid.	Cerf	142
Caftor Fiber		Cerfeuil	49
Caftoreum		Cerifes	31 4 3 () 1 3 () 1 1 () 3 () 3 () A
Cafuta		Cerneaux	73 120
Catagamber		0 00	438 & 440
Cataputiæ Semen	479		
Cataria		Cerva	439
Cathartica		Cervus	ibid.
Mitia	ibid.		
fortiora	ibid.	Alces	140
Catus		Ceterach	525
Caviat		Cetus	378
Cantar.	204	Yy s	473
		433	

y s

Chanashallan		V.	(
Chærophyllum		XELOVA Chamin when in Mat 1	176
Χαλαξικά		Chemiæ ulus in Mat. I	
Chalcites		Chemicæ analyfis ufus	
Xarnavyov	445		and the second
Xadnos		Chêne	421
RENCUMÉNOS		Chenopod. bonus Hen	
Chalottes		Chermes	350
Chalybs		Cherm. mineralis	589
Sulphurepra			69
Chamædris		Chevalier rouge	160
Chamæmel.	207	Cheveau	136
Chamæpitys	204	Chevre	jbid.
Ханананти	576	Chevrette	141
Χαμαιδάφνη	396	Chevreuil	140
Xapaldovs	206	Chicon	57
Xanaidewy	ibid.	Chicorée	51
Χαμαίμηλου	207	blanche	55
Χαμαιπίτυς	209	Chien	135
Chamaras	226	Chiendent	561
Xaminew	205	Chinæ Cortex	252
Χαμελαία	483	Radix	558
Chamomilla	207	Xnu	148
Champignon	55	Xivov	316
Chanvre	454	Chocolata	115
Chapon		Chocolat de Santé	ibid.
Charadrius Pluvialis	158	Xoivs av Jos	296
Charbonniere	ibid.	Xolgos	138
Chardon benit	204	0228102	140
Marie	\$56	Xovgoov	27
Roland		Choux	45
Chardonneret	149	Choux fleurs	46
Χαρούβα	465	Choux de Milan	46
Chaffis	78	Choux raves	ibid.
Chat	141	Xeuros	365
Chataigne	118	Chryfocolla	500
d'eau	122	Vet.	543
Chauffe trappe	650	Xeurophitens	149
Chaux	. 600	Chryfofplenium	565
Cheiranthus	556	Χύλισμα γλυκυρρίζης	457
Cheiri		Χύλος της ύποκίσυδος	419
Chelidoine		Ciboule	64
Χελιδών		Cicatrifantia	413
XERISOVION		Cicera	28
Chelidonium		Cichorium	53
Les .	AUGUSE)	Carlos Frederica Carlos	THE REAL PROPERTY.

Cichorium Endivia	22	Cochon de Lait	138
Cico		Coffea	115 & 116
Cicuta		Coing	104
Cidre	77	Colchicum	481
Ciguë	508	Illyric.	635
Cinnabaris		Colcothar	448
Antim.		Colle de Poisson	472
factitia		Collyr. album	444
Cinæ femen	209	A TRACK STOLEN AND A CONTRACT OF A DOLLAR AND A CONTRACT OF A DOLLAR AND A	448
Cinamomum	256		603
Cinara	\$2	roborans	627
Cinchona Officin.		Colocynthis	631
Cineres bufon.		Colophonia	331
Cioutat		Colophonien-Erz	365
Cire		Colfat	66
Ciffampelos pareira		Coluber	494
Ciftus Cretica		Colubrin. Lign.	210
Citreum Malum		Columba	149
Citron		Colymbus	162
Citronade		Commisbrod	14
Citrulli		Composito flore inftr	
Citrus Aurantium		Concha	597
Citrus Medica	74	Citrata	698
Civette	252	Concombre	83
Cloporte	212	Condenfantia	412
Cloux de Geroffles	247	Condit. Acori	243
Clupea	173	Aurant.	110
Alofa	165	Berberid.	73
Encrafiolus	hat 1.73	Caryophyll.	249
Clyff. Antim.	589	220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	74
Cnicus	631	Rad. Cich.	52
Coagulantia	412. 596	Cortic, citri	76
Cobaltum teftaceum		Cydon.	105
Cobitis	170		560
Cochlea	179	Helenii	535
Cocci	350		121
Coccionella	398		78
Coccos nuces	119	Rub. Id.	96
Cocculi	480		465
Cochenille	3.98	C .	69
Cochlearia	532	Zinzib.	305
Armoracia	42	0 0 4 10	240
Coronopu		Cinam. Regia	257
Cochon	138		260
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Catholica (199	1068 10 10 1000 100	1

Conf. Cubeb.	262	Conferva Rofar. pallid.	428
Fœnic.	268	The second s	
de Hyacintho	370		ibid.
Rebeche	458		. 294
Sem. Cinæ	210		465
Sinapeos	488		395
Conium Maculatum	508	1	468
Conferva Abfynth.	196		395
Acetofæ	38		350
Acetofellæ	531		349
Angelicæ		Confolidantia	306
Apii	42	Confolida Major	466
Fl. aurant.	81		202
Bellid.	377	Minor.	390
Beton.	378	Regalis	211
Borrag.	355	Sarracenic.	396
Bugloff.		Contrajerva	, 258
Calendulæ	203	Convallaria Majalis	276
Cent. min.	206		466
Cheiri	557	Convolvulus Mechoac.	644
Fl. Cich.	52		645
ex Pulpa citri	76		648
Cochlear.		Copaifera	ibid.
Convall.		Copal Gummi	313
Cynarrhodon.		Coq	351
Eryng.		Coq de Bruyere	156
Euphraf.	214		
Fumar.	216	interaction of the second se	156
Geniftæ		Coq d'Inde	IŞI
Hed. terreftr.	381	Coquelicot	515
Helenii	535	Coquerets -	650
Lavend.	275	Coquille	597
Malvæ 275 &	402	Corallen	598
Meliff.	and the second sec	Corallia alba	360
Menthæ	281		ibid.
Millepedum	541	rubra Corallina	ibid. ibid.
Nafturt.		Coralline	ibid,
Nymph.		Cordia Myxa	and the second se
Oxal. Pæon.		Coriander	465
		Coriandre	259 ibid.
Papav. Ped. cati	244	Coriandrum	ibid.
Fl. perfic.	311	Corinthen	
Ror. Mar.		Cornaline	97 369
. TIOTO TITUTÓ	-901	COTTON FILM	303

Cornel		Crocus Veneris	SOL
Cornes	104 & 109	Croton Benzoë	308
Corni	104	The second s	249
Cornichons	84	Lacciferum	400
Cornouilles	104	Tiglium	489
Cornu cervi auratum	1 144	Crues	143
philof.	præp. ibid.	Croute	14
ultum	ibid.	Crufta	ibid.
Cornus Mas	104	Cryftallus	366
Coronariæ	362	Acenteta	367
Corpus pro balfamo	283	Lunæ	365
Corruda	43	Mediolan,	367
Cortex Peruvianus	252	Mineral.	\$47
Corylus Avellana	113	Montana	367
Coftus	24 & 211	Præpar,	ibid.
Cotignac	105	Cubebæ	261
Cotonea	104	Cucumer	83
Coturnix	150	Cucumis	ibid.
Chou-brun	46	Colocynthis	632
Couleuvrée	611	Melo	93
Courbaril arbor	308	Cucurbita	84
Courge	84		82
Craie	600		85
Crapaud	175	Pepo	ibid.
Craffifolia	1 7	Plebeja	ibid.
Crax		Cucurbitacea	7
Crecca		Cuiffot	141
Crême		Cuivre	499
d'orge		Cul blanc	160
Cremor Hordel		Culilawan. cort.	262
Lactis		Culiola	120
Tartari		Cumana Braff.	46
Crepitus Lupi		Cumin	262
Creffon d'Eau		Cuminum	ibid.
de Roche	A CONTRACTOR OF	Curticulus	144
Sauvage	61	albidum	500
Creta		Cunila bubila	285
Crocoma		Cupreffus	417
Crocus		Coprum	499
Æris	\$02		368
Martis	406		500
Metallor.	589		ibid.
Sativ. Offic,	260	and the second	ibid.
Solis	366	Lazulus	367

1

Cuprum nativum	500	Daguet 142
Nickleum	497	Δαμάλαι 125
Nicolai	ibid.	Δασύ πες 144
purpureum	500	Daphne Mezeræum 483
rubrum		Daphnoides Vet. ibid.
vitratum	ibid.	Δάφνη 175
Curaffavica	109	Dattes 85
Curcuma	263	Dattlen ibid.
Cufcuta	633	Datura Stramon. 524
Cyanus	212	Daucus 53
Cyca	35	Δαύκος ibid.
Cyclamen		Decoctum Album 144
Cydonia	104	
Cynara Dracunculus	52	
Scolymus	ibid.	
Cynips	422	
Rofæ	425	Défenses 140
Cynogloffum	455	Defensiva 413
Officinal.	ibid.	Defrutum 99
Cynorrhoda	425	Δελφίνιον 211
Cynosbatus		Delphinium Conf. ibid.
Cyperis Indica PLIN.	263	
Cyperus Longus	264	Dens Leonis 70
Rotundus		Dentes Apri 140
Cyprès		Dents du Cheval Marin 471
Cypreffen		Derivantia 449 & 476
Cyprinus	170	Δέςμα 3Ι
Ballerus		Detergentia 530
Barbus		Detonatio 544
Brama	ibid.	Diacodium 519
Carpio	170	Diacydon. 105
Dobula	166	Aromatifat. ibid.
Gobio	171	Jalappin. 106
Jefes	166	laxativ. pelluc. 105
Leucifcus	ibid.	fimpl, ibid.
Nafus	The second second second	Diagryd. 645
Rutilus	165	
Tinca	172	Glyzirr. ibid.
Cytinus	419	Rofat. ibid.
D.		Sulphur. ibid.
Dachs	146	Dianthus Caryoph. 349
Dactyli'		Diaphoretica 605
Dæmonum fuga		Dia Cogerina 605 & 529
Dagues		Diaphoreticum Martiale 589

Diaphoreticum Minerale		Durchwachs _	100
Diapnoica		Dyslyta Medic.	388
Diarydonium Jalappinum		Dyfpepta alimenta	ibid.
Diafcordium		Dyll	
FRACAST.	227		238
Liquid.	226	E.	
Diæta Lactea		Eau	180
Diatrion Santalon	393	aigre	184
Dictamnus	265	amere	ibid.
albus	212	des Carmes	279
Digerentia 305 &	2. C 1991 PC 1994	131 Y	183
Digeftiva	619		182
Δίχλαμνον	265	de Luce	341
Diluentia	\$29	de Marais	182
Dindon	ISI	de Mer	184
Dintenhölzel	383	Mere	\$45
Difcutientia	194	de Neige	183
Distelfink	ibid.	de Pluie	182
Diuretica	648		181
Dispetind	ibid.	de Rivieres	182
Διερητικά	449	de Roche	181
Δόλικοι	31		183
Dompte-venin	583	de Sources	181
Dognaidia.		Eber	138
Dognas		Ebertswurzel	205
Dornfchwamm		Ebulus	576
Doronicum		Ebuli Baccæ	ibid.
Pardalianches	1 1 1 2 3 1 1 3	Ebur	469
Dorstenia Contrajerva	258	foffile	470
Doften	285		ibid.
Draberen	99		ibid.
Dracæna Calamus		Ecarlatte des Grains	351
Draco		Eccoprotica	619
Pterocarpus Drachenblut		'Έχαεωτικά 'Έχιδνη	476
Dracunculus	- / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Exivos	494
		Ecorce de Canelle	399
Dragun		Ecreviffe	256
Dræfel Droffel		Edelkrebs	177 ibid.
Drofera Rotundifolia		"ΕΓχελυς	169
Divicia Rocanationa		Ehrenpreis	395
Ducia		Eiche	421
Dulcium Qualitator		Eichelhaber	16
Dünkel		Eicheln	425
	-1		

T: Jun		Flanhan	-1.1.3
Eidex		Elephas	ibid.
Einhorn	and the second second	Elixir antifebr.	256
Eisen	402		628
Eisenhütlein	503		
Eisenkraut	232		IIÖ
Eifenmann	403		627
Eifenrahm	ibid.		628
Endogia	475	Juniper. Malvat.	274
Еннотештина	619		
Elæofacch. Anifi	240		
Aurant.	110		
Cinam.	258		628
Citri	76		240
Fœnic.	268		627
Macis	283		ibid.
ELaids	107		H. ib.
Elan	525	fine acido	628
"Ελαφος	142	album	627
Elaterium	212	dulce	628
ELathera	612		ibid.
'ELarngion	ibid.	Rhabarb.	628
Elaterarium	ibid	Vitrioli	448
Electricæ Concuffiones	476	Elops	164
Electuarium de Acoro	243	Embrocatio	190
de Carthamo	631	Embroxn	ibid.
Cathol.	and the second se	Emeraude	369
Chalybeatum	406	Emery	403
de Citro		Emetica	608
Diacaff. c. Man	na 622	Emmenagoga 194 8	2 648
Diaphænic.	86		649
Diaprun	96	Emollientia	449
Diafatyrii	465	Animalia	469
de Hierapicra	627	Vegetab.	450
Lauri baccarum	1 276	Emplastr. album coctum	443
de Manna	624	de Ammon.	198
de Ovo	233	Antipodagric.	442
de Pfyllio	636	ex Argenti fpum	
de Succo Rofar		& Oxalæo	448
Tamarind.	625	Ceroneum	442
BALGOROS LEUNOS	614	de Cicuta	SIL
Elemi Gummi	314	Cittlnum	329
Elend	526	ad Clavos & veru	
"Exeras 469	and the second second	pedum	442
"Erepas õgurlõg	470		laftr.
	I read a spec	the second second of the second second	The second

Emplaftr.	ad Clav. pedum	561	Emplastr.	Panis		IS
	contra Vermes	628	*	de plumbo)	442
	Camini	263		de ranis c.		\$94
Contraction Section	Cuminum	442		V	IGON.	175
	Detenfiv. Fel.		1	de Sperm.	Ranar.	ib.
	WURZ	. 375		Refolvens	Sec. and	444
	rubr.	442	Contraction of the	Santalinun		393
	Diabotonon	443		Saponaceu		444
	Diachalcyteos 1			Saturni Go		442
	and the second	443	-	Saturnin. 1		442
	Diachylon	443		de Scroph		\$80
	c. Gumma			de Sperm.		474
	magnum			Sticticum	BLUE	444
	Diapomph. 412			Stomach.		\$20
	Diapalmæ 120 &			de Styrace	a Stephen	327
	Diafulphuris	345		Triapharm	hac.	444
	Divinum	443		Velicat.	Joch	492
	ad dol. dent.		Emulf. Vi		1. 20	350
	epifpaft.		Encens	a state and a second		318
	frigidum		Encrafiolu	IS	shirt	173
	de Galbano		Ende		141 &	
			Endivia	and a hear	\$5 &	
			Endivie		,,	55
- 12 -	de Hyofc.		Engelfüs		et an a	569
	Incognit.		"Είκραυλος			173
	Ifchiatic.			r Mangola	d	45
	de baccis Lauri		Ens Vener		502 &	
	de Linimento		Ente		A STORES	161
	Magnetic.		Έντερα τῆς	275		\$27
	Lumin. Maj.	378	Entrich	- Charles		161
	Mamillare	443	Entvogel	50	aul ;	bid.
	Manus Dei		Enula can	npana		\$34
and a solution	de Meliloto		Evudeis	· (in the mail		146
	fimpl.		Enzian			216
	Mercur.	The second se	Epautre			27
	de Minio		Épheu			379
	Miraculofum	444	Epidendro	n		302
	Nicotianæ		Epinars		O.R.	69
	Nigrum	444	Epine Vir	iette	the s	72
	Noricum		Eairaarin	the second se		476
	Odontalg.		Epithymu			633
1. S. S.	Opodeldoch.	444	Έσίθυμον	CORE COM		bid.
	Oxycrog.		Eponges			\$85
See .	and the state of t	1999	Epouvan	tail	521 - 193	163
	and the second se			z		

Provid	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Effort Porgoão como	C.
Eppich		Effent. Benzoës compo	
"Erfegon	. 99		ibid.
"Etnua	ibid.		and the second se
Epulotica	306		311
Easympting	413		246
Equifetum	418	1 1 1 11	205
Erbfen	32		250
EpéGiv9os	28		527
Erdäpfel	31		218
Erdbeeren	88	Cent. min.	206
'Egen Jodavov	\$69	Chinæ	256
Erinaceus	399	Dulcis	575
Έρίφος	136		216
Έεμοδάκλυλος	635	1	268
Equis Botavion	327		217
Erndtrofe	419		536
'Equidic's	161		528
Erpel	ibid.		283
Errhina	606	TO A CONTRACTOR OF A	406
"Εἰρίνα	ibid.	Menthæ	281
Eruca	481 & 533	Millefol.	381
Ęryngium	\$59		541
Equisimon	534		222
Eryfimum	ibid.	Alcalif.	ibid.
Eguggodavov	\$69	Pareir. Pravæ	224
Eschallottes	38	Pimpinell.	569
Ехаритина	476	Regia	336
Eschenbaum	1 214	Saffafr.	295
Efelkürbfenfaft	612	comp.	ibid.
Efox Lucius	166		230
Esquine	558	Scord.	226
Effent. Abfynth.	197	Comp. i	
Alexiph.	226	Serpent.	297
Aloes	307	Spic. Nardi	299
Ambræ	336	Succini	
Angelicæ	532	Trifol.	341
Anodyna	520	Vincetox.	232
Anodyna Arthrit.	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF	Effgrosen	583
Antarthrit. C.		Estragon	423
	nperat. 227		54
Aurant. ex co			164
	rt. ficcis ib.		409
		Etourneau	464
Balfam.		Elouncuu Elois	159
Peruv	. 321	make	137

Second for the second	F.	Trem	Chamædr,	INU
Etuves Roberto	190 E		Chinæ	207
Eufragia Eufragia	213 ibid.		Cichor.	256
Eufraise Eulyta Medic.	1010.		Ciffampel.	52
	ALL DESIGNATION	3 1	Cochlear.	223
Eupatoire 'Euwarúsion	213 ibid.		Colocynt.	\$33
A REAL PROPERTY OF A REAL PROPER	ibid.		Croci	632
Eupatorium Eupepta alimenta	10	100	Diacarthami	26
Euphorbia Lathyrus	111 Jan 2 4 10 1		Efulæ	631
Έυφόρδιον	480		Fumar.	483
Euphorbium	ibid.	and the second second	Gentian.	215
fucco Citri corr	1.		Gratiolæ	217
Euphrafia	1 P 10 10 10 10 10 10 10		Guajac.	614
Evacuantia 529 8	213		Hed. terr.	563
Apophlegmatiz	Contraction of the second s		Helenii	381
npopuleginaliz	606		Helleb.	535
Digeftiva	625		Hyperic.	635
Diuretica	648		Jalappæ	383 643
Purgantia	618		Irid.	
Refinofa	640	A	Juniperi bacc.	271
Specific. 609 8			Lapath.	564
Sudorifera	605		Liquir. gummof.	458
Vomitoria	607	tik	C .	ibid.
Exedentia	475		Lupuli	59
Expectorantia	607		Maracoftinum 212.	and the second se
Externa Med.	9		Martis pomatum	406
Extr. Abfynth.	197		Mechoac.	644
Acori	243		Nicotianæ	539
Agaric. aquof.	641		Opii	520
refinof.	ibid.		Pæoniæ	515
Aloës	628	1	Panchymag. CROLL.	
Angel.	\$32		Papav.	520
Anodyn.	520		Pimpin.	569
Ariftoloch. rot.	201	1	Plantag.	389
Artemif.	242		Polypod.	569
A fari	614]	Rhabarb.	639
Bezoard. Camerar.	520	1	Rudii	630
Bryon.	612]	Rutæ	292
Card. Ben.	205		Sabinæ	293
Cafcarill.	250		Salfaparil.	\$76
Caftor.	\$27		Saffafr.	295
Cathart.	628	T.	Saturni	442
	ibid	5	Scordii	226
Centaur. min.	206	5	Scorzon.	69
			222	1200

Extr. Senn.	647	Feige	86
Tanaceti		Feigbohnen	31
Tormentillæ		Fel Lucii Pifc.	167
Trifol.		Feldhuhn	154
Turpethi		Felis Catus	141
Valerian.		Feldkreffen	10
comp.		Feldlerche	148
Veronic.		Fel Tauri	127
Vincetox.	583		205
Zedoar. Aquof.		Fenchel	267
commixt	304	Fenouil	ibid.
"Ευζυμον	533	Fer	402
"Ευζωνις	481	Fera	139
Έυπατώριον	374	Ferklein	138
The second se	1.16	Ferrum	402
F.	-	Chalybeatum	ibid.
A COMPANY AND A COMPANY	1	Glomeratum	ibid.
Fabæ	29	Granofum	ibid.
St Ignatii	191.97	Hæmatites Nigrum	ibid.
Fæcula Ari	479	Nigricans	ibid.
Bryoniæ	612	Sidereum	ibid.
Fagopyrum	16	Spatofum	ibid.
Fagotriticum	ibid.	Talcofum	403
Fagus caftanea	118		ibid.
Fahlerzt		Ferula Afa fœtid.	506
Faifan		Feftuca	21
Fangzahne		Feves de marais	29
Faon		Ficedulæ	156
Faons		Ficus	86
Far	12		87
Farfara	468		87
Farfugium		Fieberrinde	253
Farina		Figue	86
Foffilis		Filet	141
Farine de blé	27	Filicum qualitates	6
de bourgeois		Filipendula	266
Farina Hordei	100 000	Filix Finis Mat Mad	378
Farren		Finis Mat. Med.	I
Fafan		Fischerlein Fischer	163
Faulbaum Faule Fuden		Fifitz, Flachs	160
Faule Fuden		Flachs Flavedo mali citrei	460
Febrifug. Anglic.		Flavedo mali citrei	75
Federer2t		Fleur de Farine	27
Federkohl	46	de Muscade	282

**** a .	Austalian	172 200 1	male 2
Fliegenstein		Frauendistel	\$56
Flohkraut			\$ 372
Flohfaame		Frauenmantel	374
Flores Ammon. fal. Hæm			2 623
Mart.		Frefa	28
Simpl.		Frefne	214
Flores Antim.		Fringillago	158
Nivei & Sp		Fringilla Carduelis	149
a hard a	ibid.	Domeftica	154
Rubri 549			\$49
Æris		Frischlinge	140
Balauftiorum		Fromage	127
Benzoës		Froment	26
Fabar.		Fröfche	174
Naphæ	So	Fructus Horæi Acidi 71.	2.78
Perfic.	94	Adftring.	104
Sulphur. compof.	629.	, Amari	109
Zinzi	411	Rofarum	425
Fluor fpatof.	369	Frumenta quid	12
Flußwaffer	182	Frumentum Saracenicum	17
Fœniculum	267	Turcicum	21
Fænugræcum 214	& 455	Fuchs	147
Fanugrec ~	and the second sec	Fulica	162
Folium	278	Fumaria 2018	215
Fonticilli	476	Fumeterre	215
Forelle	169	Fünffingerkraut	423
Formica	492	Fungus	55
Forzata	622	Rofarum	425
Foffilia Nutrientia	180	Fungi Sambuci	376
Fougere	378	Verni	55
Foulque	162	Furcarius	142
Fourmi	492	Furfures	12
Fraga	88	Fuftigationes	476
Fragaria Vefca	89	A COMPANY A COMMENT	a state
Fragm. Spong.	\$85	G.	1.22.2
Lapid. pretiof.	368	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
Fragrantia 194	& 475	Gabelhirsch	142
Fragrantium virtus		Garo Lign.	307
Fraises		Gadus Ægelfinus	172
Fraisier Ananas	89	Lota	171
Ecarlate	ibid.		172
Frefant		Γαγάτης	337
Frangula		Γάλα	127
Franzosenholz		Γαλάγγας	268
		Zzz	

Galanga	ibid.	Gelatum	Berber.	.73
Γαλαξίας	164		Malorum	77
Ταλβάνη	560		Viperarum	496
Galbanum		Γέλγες	17-12	38
Galbulus		Gclinotte		150
Galega	379	Gemeine	rofen	425
Tareiorlis		Gemfenk		357
Galena		Gemfenu	ourzel	266
Sterilis		Gemüs		36
Ταλεξία		Generofa	Med.	7
Galium Aparine		Genet	of an or a state	652
Mollugo		Genevre		271
Verum	ibid.	Genista		& 652
Galitzenstein	447		Canarienfis	347
Gallæ	421	Gentiana	a without	216
Gallin. Corylorum	150		Centaurium	206
Gallinula	162	Then the	Lutea	216
Minor	ibid.		Rubra	217
Gallmey		TENTIOUN	The second	216
Gallo Pavo		Germana	lrée	206
Gallus		Gerst		. 18
Domeft.		Gerællte		18
Gamænderlein		Gerstensc		ibid.
Gambetta		Gerst kle	ine	18
Gans		Getreide		12
Gansekothig - Erzt		Geum Un	banum	247
Garanze		Geweih	i was a second	143.
Garde - robe	5	Gichtrof	e	514
Garou		Γίγαρτα	A North March 1	97
Gartenwaar		Gilla TH		448
Gasterosteus Aculeat.		Gingemb		304
Gauchheil		Ginfingu	Jurzel	356
Gedrehter Windzucker		Girofflée		556
Geigenharz,	331.	Gith	. and we	284
Geis		Glac. Ma		603
Geisbæckgen			Communis	582
Geislein		Glandes	1 - I i inter	421
Geisrauthen		Glaser2t	. Briter or in	365
Gekærn		Glaskopf		403
Gelatina Cornu Cervi	143	Glaskæpj	ren	364
		Glaskrau		566
Citr		Glechoma	- PARTE THE PARTE	380
ta	1010.	Gleditfia		574

Glefum	338	Gratiola	ibid.
Τλεύκος	99	Graupen	409
Glob. Martiales	400	Grebe à Oreilles	162
Mofchati	\$75	Gremil	654
Glouteron	554	Grenouille	174
Glucklein	151	Gries	27
Glu	398	Grindwurzel	564
Gluten Pectorale	458	Grive	158
Glycyrrhiza Glabra	456	Groffeilles	72
Τλυκεία	ibid.		103
Τλυκύμη		Groffula	76
Γ λυκυδρίζα		Groffus .	87
TAURIOIDA		Grualdum	16
Gnaphal. Dioicum			2 8 25
Gnidium		Grünkraut	69
Gobio		Grünspan	502
Τογγύλη			8 27
Gold	-	Grundbieren	34
Goldengunfel		Grundel	170
Goldenwiederthon		Grundlein	ibid.
Gomme Adraganth		Grundwaffer	181
Lacque		Guajac. Off.	562
Seraphique	325		397
Turique	458	Guignette	160
Gottes Gnadenkræutel		Guilandina Moringa 463	
Goudron		Guimauve	451
Goujon		Guinetta	160
Gouffes		Gummi Anime	307
Graine de Paradis	268	Arabic.	458
Grains de l'Epurge	480		467
Gramen	561	Ceraforum	82
Graminum proprietates	6	Guttæ	614
Grofer Grametsvogel	155	Juniperi	272
Grana Actes	577	Loock	339
~	& 15	Senegal	458
	483.	Serapionis	ibid.
Paradifi	268	ex Ægypt. Spina	
Granatum	90	Tragacanthæ	467
Granatus 368&		Turis	458
Metallicus	and the second second	Gundelrebe	380
Grande Confoude		Guttæ Anglic. Anod.	520
Grande Hirondelle de Mer		Lavend.	275
Grasblume		Gypfophila faxifraga	579
Gratia Dei	613	Γύψον	603
		1.7. 1	

1

Gypfum	603	Heidelbeeren	106
Argill.	ibid.	Heidenkorn	17
Striatum	ibid.	Heidnisch Wundkraut	396
Ufuale	ibid.		138
Gyps	All the second s	EXENION	544
-51-		Helenium	ibid.
H.	2010-1	Helfenbein	469
	1	Helianthus tuberofus	33
Haarstrang	\$67	EXXE Bogog	634
Haas		Helleborus Albus	614
Habern	IS	Niger	634
Haberschlehen	05	Helminth. Belemn.	\$99
Haberwurzeln	70	Judaic .	ibid.
Hædus	126	้ Extinn	566
Hæmatites Flavus		Helxine	ibid.
Niger		Henne	ISI
Nigrescens		Hepar Anguillæ	169
Turritus	ibid.		589
Haring	173	Canis Rabidi	136
Hagelwaffer	182	Hepatica Fontana	381
Hagenbutten	425	Nobilis	ibid.
Hahn	151	Stell.	382
Halbewahr		Hepatique d'Eau	381
Αλμάδες		Heracleum Sphondyl.	453
Halonitrum		Herba Pedicularia	488
Hammel	127	Herbe aux Chats	252
Hanf	454		532
Hareng	173	D 1	654
**	& 164		636
Haricots	31	110 4	456
	& 563		36
Hartriegel	282	Hériffon	399
Harz	224	Έρμοδάκτυλος	635
Hafelhuhn		Hermodactyl.	ibid.
Hafelnüffe		Herinaceus	399
Hafelwurzel		EgusBoranon	565
Hauhechel		Herniaria	563
Hausblas	472	C1 1	ibid.
Hauswurzel	580	TTI C.	ibid.
Hechel		Herniole	ibid.
Hecht		Heroica Med.	7
Hedera		Herou	161
terreftris	280	Ερπυλλος & έςσυλλου	297
Hedyfar. Alhagi	622	Herzgespane	203
	023		

Heuerling164Albus 513 Hinnulus142Toradous; 512 Irrays;415Hypericum382Hipopotami dentes415Hypnotica 503 Hircus136Hypnum triquetrum L.387Hirs22Hypocificis fuccus419Hirondelle157Hypoleucos160Hirfch142Tise127HirfchkuhibidTorawae;ibid.Hirtundinaria183I.Hirundo157Jacobs - Zwiebel49Hiftchizunge383I.Hirundo157Jacobs - Zwiebel49Hiftchizunge383I.Hirundo157Jacobs - Zwiebel49Holdandifche Cichorien51Ibifch447Holder576Isirawibid.Holder576Isirawibid.Holder583Higdiržiw79Holder583Higdiržiw79Horgfen681Igel399Horda124Imber304Hordeum20Anifatum240Hordeum186Imperatoria535Huite d'Oeillet519Incidentia535Huite d'Oeillet519Ingafantia412Hordeum185Ingafantia412Hordeum185Higdiržiw79Hordeum185Ingafantia535Huite d'Oeillet519Ingafantia535 <th>Her2kirschen</th> <th>81</th> <th>Hyofciamus Niger</th> <th>512</th>	Her2kirschen	81	Hyofciamus Niger	512
$I\pi\pisps$ 418Hypericum382Hippopotami dentes471Hypnotica503Hircus136Hypnotica503Hirs22Hypocitidis fuccus419Hirs22Hypocitidis fuccus419Hirfch142Tijee127Hirfchkuh142Tijee269Hirfchkuh161Torwnes;160Hirfchkuh161Torwnes;161Hirfchkuh161Torwnes;161Hirfchkuh161Torwnes;161Hirfchkuh157Jacobs - Zwiebel49HiftoriæNaturalis utilitasJakelguth447Holder576Ibifch441Holder576Ibifch441Holder61165166Horder17Secsiza161Holzbieren100180190Hordeatum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeum18Inber304Huite180Foffilia535Huite190Ingaffantia412Hordeum18Ingeratia535Huite180Foffilia542Hund135Ingerafiantia412Holdon58Higerer304Holdon142Animalia540Huite180Foffilia542Huite180Foffilia542Huite180<		166	Albus	
Hippopotami dentes471Hypnotica503Hircus136Hypnum triquetrum L.387Hirs22Hypocifidis fuccus419Hirondelle157Hypoleucos160Hirfch142Tièse127Hirfchhrunft416Hyfope269Hirfchkalbibid.Torewresibid.Hirtochaunge383I.Hirtundo157Jacobs - Zwiebel49Hiftoriæ Naturalis utilitasJacbs - Zwiebel49Holdendifche Cichorien51Ibifch441Holder576Toirzewibid.Holder fchwæmmchen376Ichthyocolla472Holwurzel201Tyfweiskaibid.Hordeatum201Tyfweiska605Honig583Hiredrizias79Hordeatum20Anifatum240Hordeatum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeatum135Imperatoria335Huile d'Oeillet519Incidentia530Huindin142Animalia540Hund135Ingrafiantia412 & 595Hundszung465Ingrue304Hundszung368 & 360Infectorum qualitates7Hydragoga619Infiguiorum effectus5Typépayew590Intercipientia,413Typépayew590Intercipientia,413Hydromel585 <td>Hinnulus</td> <td>142</td> <td>Yoonvauss -</td> <td>512</td>	Hinnulus	142	Yoonvauss -	512
Hircus136Hypnum triquetrum L.387Hirs22Hypocilidis fuccus419Hirs22Hypoleucos160Hirfch142Tijoe120Hirfch142Tijoe269Hirfchkuhibid.Hyfope269Hirfchkuhibid.Hyfopusibid.Hirfchkuhibid.Hyfopusibid.Hirfchkuhibid.Hyflopusibid.Hirtoniaria585Jacobs - Zwiebel49Hintoria157Jacobs - Zwiebel49HiftoriaNaturalis utilitasJaketguth447in Mat. Med.IJalappa641Holder576Ichtyocolla472Holder576Ichtyocolla472Holder176Vesterial605Honig583Higderizico79Hopfen68Iget and240Hordeatum201Naifatum240Hordeatum202Anifatum241Hordeum-18Imperatoria535Huile d'Osillet519Incidentia530Hundin142Animalia540Hundszung463 & 369K 369Infectorum qualitatesTook135Ingraffantia412 & 595Hundszung458 & 369Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5Topiquese590Intercipientia413Topiquese590I				382
Hirs22Hypocifiidis fuccus419Hirondelle15Hypoleucos160Hirfch12Tiöx127Hirfch12Tiöx127Hirfch142Töxx20HirfchkalbibidTorxxibidHirfchkuhibidTorxxibidHirfchkuhibidTorxxibidHirfchkuhibidTorxxibidHirtundinaria583I.Hirtundi157Jacobs - Zwiebel49HiftoriæNaturalis utilitas1alappa641HollandifcheCichorien51Ibifch4447Holder576Isizxxx605Holder576Isizxxx605Holderfchwæmmechen376Isizxxx605Honig583Higdvržice79Hopfen68Igel399Hordæ18Imperatoria535Huile d'Oeillet519Incidentia535Huile d'Oeillet519Incidentia536Hundin142Animalia540Hundszung458Gorffilia535Hunds590Infectorum qualitates77Hydragoga6101111Hydragoga61011Hydragoga61011Hydragoga61011Hydromel585Sativus51Hydromel585Sativus51Hydromel585Sativus <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>503</td></t<>				503
Hirondelle 157 Hypoleucos 160 Hirfch 142 Tijor 127 Hirfchkulbibid.Hyfope 269 Hirfchkulbibid.Hyflopusibid.Hirfchkulbibid.Hyflopusibid.Hirfchkulbibid.Hyflopusibid.Hirfchkulbibid.Hyflopusibid.Hirtondinaria 583 I.Hirtundo 157 Jacobs - Zwiebel49HiftorizNaturalis utilitasJakelguth447in Mat. Med.1Jalappa641Holdandifche Cichorien1Ibifch441Holder fchwæmmchen376Ichthyocolla472Holvurzel201Yzbuzúžkæibid.Holzbieren109Ibjwatuæ605Honig583Hinder309Hordeatum20Anifatum240Hordeatum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeatum58Imperatoria535Huile d'Osillet519Incidentia535Huile d'Osillet519Ingrafiantia412 & 595Hund135Ingrafiantia412 & 595Hundszung455Ingrün396Hundszong186 & 569Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5Tojedsynew590Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5 <td></td> <td></td> <td></td> <td>387</td>				387
Hirfch142Tipoc127Hirfchbrunft416Hy fope269Hirfchkalbibid.Torawres,ibid.Hirfchkalbibid.Hyflopusibid.Hirfchkuhibid.Hyflopusibid.Hirundinaria583I.Hirundinaria583I.Hirundinaria583Jacobs - Zwiebel49Jakelguth447Jalappa641Hollandifche Cichorien51Ibifch441Holder576Isiawaibid.Holderfchwæmmechen376Isiawaibid.Holzbieren109Ibiwanal605Honig583Hiedarfie399Horda129Illicium240Hordeatum20Anifatum240Hordeatum20Anifatum240Houblon58Imperatoria535Huile d'Osillet519Incidentia536Huine d'Osillet519Ingraffantia412 & \$95Hundszung455Ingraffantia412 & \$95Hundsbrod145Ingraffantia412 & \$95Hundsbrod145Ingrün306Hydragoga619Infectorum qualitates7Hydragoga619Infectorum qualitates7Hydromel585Sativus51Hydromel585Sativus51Hydromel585Sativus51Hydromel585Sativus51Hydrome		and the second se		419
Hirfchbrunft416Hy fope269Hirfchkalbibid.Torwros,ibid.Hirfchkuhibid.Hyflopusibid.Hirfchkuhibid.Hyflopusibid.Hirndinaria\$83I.Hirundinaria\$85Hirundio\$15HiftoriæNaturalis utilitasJacobs - Zwiebelin Mat. Med.1HollandifcheCichorien\$1Ibifch441Holder\$76Holder\$76Holderfchwæmmechen\$76100'IswawHolgerta\$10Holderfchwæmmechen\$76100'IswawHolderfen\$10Holgerta\$10Horda\$12Horda\$12Horda\$12Horda\$12Horda\$12Hordeatum\$20Anifatum\$240Hordeatum\$18\$20Anifatum\$240Hordeatum\$12\$20Anifatum\$240Horda\$12Hundion\$18Inser\$30Hündin\$42Humerdarm\$450Hundsbrod\$14Ingwer\$04Hundsbrod\$14Ingwer\$04Hundsbrod\$14Ingwer\$04Hundssung\$45Hydragoga\$19Sativus\$19Sativus\$10Sativus\$12 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>160</td></t<>				160
Hirfchkalbibid.Torware;ibid.Hirfchkuhibid.Hyflopusibid.Hirfchkuhibid.Hyflopusibid.Hirundinaria\$83I.Hirundo157Jacobs - Zwiebel49HiftorizNaturalis utilitasJakelguth447Jalappa641Jalappa641Hollandifche Cichorien\$1Ibifch441Holder\$76Ibirowibid.Holderfchwæmmchen\$76Ibirowibid.Holderfchwæmmchen\$76Ibirowikaibid.Holzbieren109Ibjwarna'605Honig\$81Higdur Zue79Hopfen\$6Igel399Hordeatum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeatum18Imperatoria\$35Huile d'Osillet\$19Incidentia\$30Hündin142Animalia\$40Hündin142Animalia\$42Hund135Ingräfin396Hund135Ingrün396Hundsbrod14Ingwer304Hundsbrod14Ingrün396Hyazinthus368 & 360Infectorum qualitates7Towe18Sativus\$1Toke18Sativus\$2Hydromel\$85Sativus\$5Hydromel\$85Sativus\$6Hydromel\$85Sativus	Hirfch	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		and the second se
Hirfchkuhibid.Hyflopusibid.Hirfchzunge383I.Hirtondinaria583Hirtundo157Hiftoriæ Naturalis utilitasJacobs - Zwiebel49Hiftoriæ Naturalis utilitasJakelguth447in Mat. Med.1Jalappa641Holdandifche Cichorien511Ibifch441Holder576Ysirzewibid.Holder576Ysirzewibid.Holderfchwæmmchen376Ichthyocolla472Holwurzel201Ysyvarizæ605Honig583Higedrizæ79Hordæ125Ilicium240Hordeatum109Isgurizæ605Honig583Higedrizæ79Hordeatum109Inber304Hordeatum18Imber304Houblon58Imperatoria535Huile d'Osillet519Incidentia630Hümerdarm450Evacuantia625Huintre180Fofilia542Humdlus59Vegetabilia530Hundsbrod145Ingrün396Hydragoga619Infictorum qualitates7Tègégwew590Infectorum qualitates7Tègégwew590Intercipientia413Hydromel585Sativus55Hydromel585Sativus55Hydromel585Sativus55Hydromel <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
Hir Jehzunge383I.Hirundinaria583I.Hirundo157Hiftoriæ Naturalis utilitasJacobs - Zwiebel49Hiftoriæ Naturalis utilitasJakelguth447in Mat. Med.IJalappa641Hollandifche Cichorien51Ibifch441Holder576Iotrawibid.Holderfchwæmmchen576Iotrawibid.Holderfchwæmmchen576Iotrawibid.Holzbieren10918/2002/202'Ngburna'605Honig583Higderfzaw79Hopfen68Igel399Hordæ125Illicium240Hordætum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeatum142Incidentia535Huile d'Oeillet519Incidentia535Huile d'Oeillet519Incidentia536Hund135Ingraffantia412 & 595Hund135Ingruer304Hundsbrod14Ingwer304Hundsbrod14Ingwer304Hyazinthus368 & 369Infectorum qualitates7'Towe180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infigidorum effectus5Toyágyuga70Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula334				
Hirundinaria \$83 Hirundo '157 Jacobs - Zwiebel 49 Hiftoriæ Naturalis utilitas '157 in Mat. Med 1 Hollandifche Cichorien 51 Holder 576 Holder 576 Holder 576 Holder 620 Holder 620 Holder 620 Holder 620 Holder 620 Holder 620 Holder 620 Honig 583 Higdurža 605 Honig 583 Higdurža 605 Honig 583 Higdurža 605 Honig 583 Higdurža 605 Honig 583 Higdurža 79 Hopfen 58 Higdurža 79 Hordæ 125 Hordæ 125 Hordæ 125 Hordæ 125 Hordæ 125 Hordæ 125 Hordæ 125 Hordæ 125 Hordæ 125 Hordæ 125 Hordeatum 20 Hordæ 125 Higdurža 79 Hordæ 125 Hund 125 Hyazinthus 368 369 Infectorum qualitates 7 Hydragoga 619 Infectorum qualitates 7 Hydromel 585 Hymenæ 307 Inula 534 Hyofcyamus 512 Invifcantia 450				ibid.
Hirundo157Jacobs - Zwiebel49Hiftoriæ Naturalis utilitas $Jakelguth$ 447In Mat. Med.1Hollandifche Cichorien1Ibifch441Holder576Ibifch441Holder576Ibifch441Holder576Ibifch441Holder576Ibifch441Holder576Ibifch441Holder576Ibifch441Holder576Ibifch441Holwurzel201Horda109Honig583Higariza605Honig583Hordeatum200Hordeatum200Hordeatum200Hordeatum200Hordeatum200Hordeatum200Houblon58Huile d'Oeillet519Hündin142Hündin142Hundsbrod14Ingrün304Hundsbrod14Ingrün304Hundszung455Hydragoga619Infectorum qualitates7Hydragoga619Ingrün304Hydromel585Sativus55Hydromel585Sativus55Hydromel585Sativus55Hydromel585Invifcantia534		the second s	I.	
Hiftoriæ Naturalis utilitas in Mat. Med. 1 Hollandifche Cichorien 51 Holder 576 Holder 578 Holder 5				
in Mat. Med. 1 Hollandifche Cichorien 51 Holder 576 Holder 577 Holder 576 Holder 577 Holder 576 Holder 577 Holder 576 Holder 577 Holder 5777 Holder 57777 Holder 5777777 Holder 5777777777777777777777777777777777777				49
Hollandifche Cichorien51Ibifch441Holder576'Ιδίσκουibid,Holderfchwæmmchen376Ichthyocolla472Holwurzel201'Ιζυυκέλλαibid,Holzbieren109'Ιδισκουibid,Holzbieren109'Ιδισκου605Honig583'Hsparržico79Hopfen68Igel399Hordæ124Ullicium240Hordætum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeatum126Imber304Houblon58Imperatoria535Huile d'Oeillet519Incidentia536Huile d'Oeillet519Incidentia536Huitre180Foffilia542Humulus59Vegetabilia530Hund135Ingrün306Hundszung455Ingrün306Hyazinthus368 & 369Infectorum qualitates7'Töga Soga619Infipidorum effectus5'Töga Soga590Intercipientia413Töga Soga590Intercipientia51'Töga Soga590Intercipientia51Hydromel585Sativus55Hydromel585Sativus55Hydromel512Invifcantia450				
Holder576Ίβίτκουibid,Holderfehrowæmmehen376Ichthyocolla472Holvourzel201Ίχθυεκόλαibid,Holzbieren109Ίδματικά605Honig583Ήεράντζιω79Hopfen68Igel399Hordæ124Illicium240Hordæ124Illicium240Hordeatum20Anifatum241Hordeatum18Imber304Hordeum18Imperatoria535Huile d'Osillet519Incidentia530Hündin142Animalia540Hünerdarm450Evacuantia625Huitre180Foffilia542Hund135Ingraffantia412 & 595Hundsbrod14Ingroer304Hydragoga619Infectorum qualitates7Töøgépunow590Infectorum qualitates7Tögépunow771Intubus51Tögépunow771Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Holderfchuvæmmchen376Ichthyocolla472Holvourzel201I χ 9voniðaibid.Holzbieren109I g 9voniðaibid.Honig583Hspávriža605Honig581Igel399Hordæ124Illicium240Hordeatum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum244Hordeatum18Imperatoria535Huile d'Oeillet519Incidentia535Huinerdarm450Evacuantia625Huitre180Foffilia542Hund135Ingraffantia412 & 595Hund135Ingruer304Hundsbrod14Ingroer304Hydragoga619Infectorum qualitates7Töpápzopov590Intercipientia51Töpápzopov590Intercipientia51Hydromel585Sativus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Holwurzel201Ix Duckimaibid.Holzbieren109Igwrina605Honig583Hipdrizico79Hopfen68Igel309Horda124Illicium240Hordeatum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeatum10068Imperatoria535Huile d'Osillet519Incidentia530Hündin142Animalia540Hünerdarm450Evacuantia625Huitre180Foffilia542Humulus59Vegetabilia530Hund135Ingraffantia412 & 595Hundsbrod14Ingwer304Hydragoga455Infectorum qualitates7Towe180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5Topeipanar77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Holzbieren109'Iðgwrinzà605Honig583'Hspårržico79Hopfen68Igel309Hordaa124Illicium240Hordeatum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeatum20Anifatum241Hordeum-18Imber304Houblon68Imperatoria535Huile d'Osillet519Incidentia530Hündin142Animalia540Hünerdarm450Evacuantia625Huitre180Foffilia542Humulus59Vegetabilia530Hund135Ingrün306Hundsbrod14Ingrün306Hyazinthus368 & 369Infectorum qualitates7Töpelgrupen590Infectorum qualitates7Töpelgrupen590Intercipientia413Töpelgrupen590Intercipientia413Töpelgrupen590Intercipientia51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Honig 583 High right 79 Hopfen 68 Igel 399 Hordæ 124 Illicium 240 Hordeatum 20 Anifatum 240 Hordeatum 20 Anifatum 240 Hordeatum -18 Imber 304 Hordeum -18 Imperatoria 535 Huile d'Oeillet 519 Incidentia 535 Huile d'Oeillet 519 Incidentia 530 Hündin 142 Animalia 540 Hünerdarm 450 Evacuantia 625 Huitre 180 Foffilia 542 Humulus 59 Vegetabilia 530 Hund 135 Ingraffantia $412 & 595$ Hundsbrod 14 Ingrover 304 Hundszung 455 Infectorum qualitates 7 Hydragoga 619 Infipidorum effectus 5 Topderver 590 Intercipientia 413 Topderver 590 Intercipientia 413 Topderver 590 Intercipientia 51 Hydromel 585 Sativus 55 Hymenæa 307 Inula 534 Hyofcyamus 512 Invifcantia 450				
Hopfen58Igel399Hordæ125Illicium240Hordeatum20Anifatum241Hordeum-18Imber304Houblon58Imperatoria535Huile d'Osillet519Incidentia530Hündin142Animalia540Hünerdarm450Evacuantia625Huitre180Foffilia542Humulus59Vegetabilia530Hund135Ingraffantia412 & 595Hundsbrod14Ingwer304Hundszung455Infecta Nutrientia177Yõug180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5Yõgúşvugav590Intercipientia;413Yõgúsvugav590Intercipientia;413Yõgúsvugav590Intercipientia;51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Hordæ12Illicium240Hordeatum20Anifatum241Hordeum-18Imber304Houblon58Imperatoria535Huile d'Osillet519Incidentia530Hündin142Animalia540Hünerdarm450Evacuantia625Huitre180Foffilia542Humulus59Vegetabilia530Hund135Ingrafiantia412 & 595Hundsbrod14Ingwer304Hundszung455Infectorum qualitates7Hydragoga619Infectorum qualitates7Tõgaiçvugav590Intercipientia413Tõgaiçvugav77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Hordeatum20Anifatum24 tHordeum-18Imber304Houblon58Imperatoria535Huile d'Oeillet519Incidentia530Hündin142Animalia540Hünerdarm450Evacuantia625Huitre180Foffilia542Humulus59Vegetabilia530Hund135Ingraffantia412 & 595Hundsbrod14Ingruer304Hundsbrod14Ingruer304Hundsbrod14Ingrün396Hyazinthus368 & 369Infectorum qualitates7Töga gruppu590Infectorum qualitates7Töga gruppu590Intercipientia,413Töga gruppu590Sativus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450		58	1gel	
Hordeum-18Imber304Houblon58Imperatoria535Huile d'Osillet519Incidentia530Hündin142Animalia540Hünerdarm450Evacuantia625Huitre180Foffilia542Humulus59Vegetabilia530Hund135Ingraffantia412 & 595Hundsbrod14Ingwer304Hundsbrod14Ingwer304Hundszung455Infecta Nutrientia177Tõõg180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5Tõgégrugov590Intercipientia,413Tõgégrugov77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofoyamus512Invifcantia450				
Houblon58Imperatoria535Huile d'Osillet519Incidentia530Hündin142Animalia540Hünerdarm450Evacuantia625Huitre180Foffilia542Humulus59Vegetabilia530Hund135Ingraffantia412 & 595Hundsbrod14Ingwer304Hundszung455Ingrün396Hyazinthus368 & 369Infectorum qualitates7Tõug180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5Tõgagsvugav590Intercipientia,413Tõgagsvugav77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofoyamus512Invifcantia450		State Sec.		
Huile d'Osillet\$19Incidentia\$30Hündin142Animalia\$40Hünerdarm450Evacuantia625Huitre180Foffilia\$42Humulus59Vegetabilia\$30Hund135Ingraffantia412 & \$95Hundsbrod14Ingwer304Hundszung455Ingrün396Hyazinthus368 & 369Infecta Nutrientia177Tõwe180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus\$Tõedunhor77Intubus\$1Töedunhor75Sativus\$1Hydromel\$85Sativus\$5Hymenæa307Inula\$34Hyofcyamus\$12Invifcantia450				and the second se
Hündin142Animalia540Hünerdarm450Evacuantia625Huitre180Foffilia542Humulus59Vegetabilia530Hund135Ingraffantia412 & 595Hundsbrod14Ingwer304Hundszung455Ingrün396Hyazinthus368 & 369Infecta Nutrientia177Tõve180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5Tõvévantor77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Hünerdarm450Evacuantia625Huitre180Foffilia542Humulus59Vegetabilia530Hund135Ingraffantia412 & 595Hundsbrod14Ingwer304Hundszung455Ingrün396Hyazinthus368 & 369Infecta Nutrientia177Towe180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5Togeágyugov590Intercipientia,413Togeágyugov590Intercipientia,51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Huitre180Foffilia542Humulus59Vegetabilia530Hund135Ingraffantia412 & 595Hundsbrod14Ingwer304Hundszung455Ingrün396Hyazinthus368 & 369Infecta Nutrientia177Tõup180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5Tõpágyupov590Intercipientia,413Tõpágyupov77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Humulus59Vegetabilia530Hund135Ingraffantia412 & 595Hundsbrod14Ingwer304Hundszung455Ingrün396Hyazinthus368 & 369Infecta Nutrientia177Yowe180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5Ydedundar77Intercipientia,413Ydedundar77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Hund13 5Ingraffantia412 & 595Hundsbrod14Ingwer304Hundszung455Ingrün396Hyazinthus368 & 369Infecta Nutrientia177°Tõup180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5'Tõpágyupuv590Intercipientia,413Tõpáguntar77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Hundsbrod14Ingwer304Hundszung455Ingrün396Hyazinthus368 & 369Infecta Nutrientia177'Ydwp180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5Hydragoga619Infipidorum effectus5Ydwdyrugow590Intercipientia,413Ydedundar77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				0
Hundszung455Ingrün396Hyazinthus368 & 369Infecta Nutrientia177'Yõwe180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5'Yõedervoov590Intercipientia,413Yõedennav77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Hyazinthus368 & 369Infecta Nutrientia177"Yõup180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5"Yõpágyupov590Intercipientia,413Yõpágyupov77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Towe180Infectorum qualitates7Hydragoga619Infipidorum effectus5Togaderugov590Intercipientia413Togaderugov77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Hydragoga619Infipidorum effectus5Tópágyugov590Intercipientia,413Tópágyugov77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Υδράργυρου590Intercipientia;413Υδράμηλου77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450	Hydragoga			
Ydechunkov77Intubus51Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450				
Hydromel585Sativus55Hymenæa307Inula534Hyofcyamus512Invifcantia450	Yacanton			
Hymenæa 307 Inula 534 Hyofcyamus 512 Invifcantia 450				
Hyofcyamus 512 Invifcantia 450				
		612	Invifcantia	
			Zzs	4).

Johannisheeren	78	1 - C - Friday	ALL LAND
Johannisbrod	465		
Johanniskraut	382		alere N.F.
lov	349	Καδμεΐα	411
'Iwwid	209	Καδύτας	633
'Idç	SOI	Kæmpferia Rotunda	303
Joubarbe		Kas	127
Ipecacuanha 61		Karauivyn	242
Heurrion	559	Κάλυκες	423
Iris	270	Kalb	126
Florentina	ibid.	Kalch	600
Nobilis	360	Καλλίκερως	455
Noftras	270	Καλλίτειχου	371
Pfeudacor.		Καλλίφυλλον	ibid.
Tuberofa		Kaninichen	144
Irritantia		Κάνναβις	454
Animalia		Ko: Dagides	489
Foffilia		Κάντιον	474
Vegetabilia		Κάπνος	215
Ifis Nobilis		Ka'wwagis	47
1 fop		Kawpos	140
Judaicus Lap.		Karagni	13
Judenkirfchen		Kapdaminn	60
Juglandes nuces	120	Κάςδαμον	59
Juglans alba	574	Kaghamomon	243
Regio	120	Καρχίνος	177
Jujubæ	91	Kaleva	III
Jujubes	ibid.	Kagov	246
Julepus Rofar	427	Καεποβάλσαμον	320
de Rofis ficcis	428	Καρποί τῆς λαθυρίδης	480
Sambuc.	578	τέ βαλάνε μυρεψι	xñs 462
Violat.	350	Καςπός κνίδειος	483
Juncus Odor.	296	τη κρότωνος	479
Juniperus	271	Kinéws	ibid.
Lycia	318	Καβροωβία	465
Sabina	292	Kartoflen	34
Jus Carnium	124	Kagua	120
Viperar.	496	Busikina	ibid.
Jufquiame	512	ngandewrina	113
Julquiamus		Kápvos mugerlinds	281
Juvenci	125	Καιώται	85
Ivette	209	Κασσίτερος	409
Ivoire		Κατόριον	\$25
IElos	397	Kagaigerind	575
1505	398		

		a set wante the late a	
Kadaptina	449 605 & 607		597
Katze	the second se	Kohl	46
Katzendaplein		Kohlraben	ibid.
Katzenkraut	A REAL PROPERTY OF THE PROPERT	Конналы	121
Katzenwadel	and the second se	Кожков	324 & 350
Kaulbarsch	the state of the s	Коннорийла	95
Kausina		Κόππωνες	90
Kaifer - Sallat		Kolben	143
Κέγχεος		Konzinov	431
Keiri	A CONTRACTOR OF	Konoxov9is	631
Keller - Efel		Κολοκύντη	84
Kevraugiov Mingov	A 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Κολοφωνία	331
Κερατωνία		KonumBudes	107
Kegarou		Коми тё анаидя	458
Kern	27		ibid.
Kernel		Κόμωεβα -	261
Кизсс		Κώνειον	508
Kefte	the second s	Kovia	620
Kibitz		Kopf - Sallat	57
Kichererbsen		Kopp	166
Kixwen	\$1	Koppel	160
Kixogiov		Kopamia	360
Knuides		Koçiavdeov	259
Kinivor		Koçiavvov	ibid.
KivaBage		Korn	24
Kivvanwncy		Kornblumen	212
KuvzBage		Kornzapfen	26
Kirfchen		Κορωνόπες	10
Kissneis		Kogudos	148
Kirtos	379	Kosos	211
Kisos		Κοτίνες	90
Klapprofen		Κότευφος	- 156
Kletten		Krahenaugen	232
Kleyen		Кеймви	45
Kleyenbrod		Krammetsvogel	ISS
Кийкос		Recevera	104 :h:J
Kvinos Knit Coh		Kedvia	ibid.
Knitfch		Krapp Variable 10am	569
Knoblauch		Krausbalfam	280
Knæbel		Kraut	45
Κοχλίας		Krebs	177
Kodunaha		Krebsaugen	178
Kærbelkraut		Kreide	600
	all and the state	Kreffe	171

Kreffon	59	Lac Schiftum	134
Keivor	459	Vaccinum	127
Keide	137	Virgin.	09 & 442
Krifelbeeren		Lacca Gummi	400
Kgi9n	18		ibid.
Kreuzbeer	640	in tabulis	ibid.
Kröte	175	Lacerta	472
Reóxos	260		ibid.
Kropfwurzel	579	Scincus	542
Krott		Λάχανον	36
Krume	14	Lachenknoblauch	226
Kęviuma		Lachs	168
Keuranos		Lachsforelle	169
Kuh .		Lactefcentium effectu	
Κεμαέσερ		Lactuca	56
Kunigle	144		57
Kunnigundskraut	213	Aftylida	ibid.
Kupfer	499		ibid.
Kupfer - Kies	500		ibid.
Kupfernickel	497	Romana	ibid.
Kürbis	84	Rotundicaul.	ibid.
Kegahia	360	Sativa	ibid.
Kutt		Ladanum Gummi	315
Kuttelfleck	126	Barbar.	ibid.
Kúzua	29	Hifp.	ibid.
Kuavos	365	in tortis	ibid.
Rudóvia	104	Liquid.exCa	nad. ibid.
RUNDAMINOS	633		145
KUMIVOV 262		Lagopus	150
Kuvapa	52	Bonafia	151
Κυνόγλωσσου	455	Urogallus	156
Κυνόσβατο	425	Λάγως	145
Κυπάριστος	417	T .	127
Κύωειρον		Lait caillé	134
ไมอีเมอ์ม	263	coupé	120
Κύωερον	264	de Poule	153
Kumpivos		Laitue	65
Κύων	135	Pommée	57
		Lakritzenholz	456
L.	Sec. 4	Lamium	653
	13	Album	ibid.
Laberdan	172	Maculat.	ibid.
Lac Ebutyratum	134	PLINII	ibid.
Lunæ	600	Lamme	137

Township with Chills		IT annua Camabana	
Lampetra		Laurus Camphora	310
Lampret	ibid.		251
Lamproie	ibid.		2788 309
Lana Succida	138		262
Langue de Cerf	383	0 0 0	275
Chien	455		295
Lapathum		Lavande	274
Lapin		Lavatera Arborea	263
Lapis Armenus		Lavendel	274
Atrament.	446	Lavendula	ibid.
Bezoar	357	ftæchas	300
Calaminar. 41		Lawfonia Inermis	375
Carpion	170	Laye	140
Divinus	448	Lazulus	367
Judaicus	599	Leger	101
Magnes	418	Legumes	36
Manati	471		28
Medicamentof.			12 & 28
Hyftricis		Leguminof. Virtutes	7
Malacc.		Leibfarbene Rosen	424
Spurius	235	Lein	460
Zeilan		Λείωμα	28
Infern.		Lenientia	503
Lazuli		Lenitiva	619
Percar.		Lentes	30
Porcinus	233	Lentilles	ibid.
Specul.	603	Lentifci Lign.	316
Spong.		Leontodon Tarax.	70
Lappa		Leonurus Cardiaca	203
Lapraux		Λεπίδιον	58 & 59
Lard		Lepidium	58
Lardum		Lepus	
Lattich - Sallat	56		ibid.
Lauch		Lerche	148
Laucke	and the second	Lerchenschwamm	640
Laudanum		Leucifcus	166
Hyftericum		Leucojum Luteum	\$ 56
Liquidum	and the second se	Λευκόϊον	ibid.
Opiatum	A CONTRACTOR OF	Levat internet	66
Urinarium	A DESCRIPTION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	Levifticum	
Laureola		Levrauts	145
Laurier		Lezard	
Laurus		Λίβανος	472 318
Benzoin		ABOUNTIS SEQUINMATINE	290
Den Loine	3081	TENANAMANA PERSONAL PROPERTY OF	290

and the second month of the second second	anu da h	LTA STATISTICS STATE	an To
Lichen Caninus	387	Liquor Cornu Cervi Albi	15 342
Plicatus	386	Nitri fixus	\$47
Prunaftri	387		549
Pulmonarius	391		ar.
Pyxid.	387	The second s	103
Licorne	528	A REAL PROPERTY OF A REAL PROPER	
Lignum Gujacum	561		
Liebstöckel		Lis	the state of the second second
	A CONTRACTOR OF A	Call I and I	459
Lierre		Λιθάργορος ποροποιολ	441
terrestre		Litharge	ibid.
Lievre	145	Lithargyrium assimilae	ibid.
Lignum Copryl.		Lithontriptica doigned	649
Juniperi		Aidos Ishuinos - 2000vill	599
Sanctum		Λιθος στέρμον	654
Ligurinus '	145	Lithofpermum	ibid.
Liguíticum		Litourne	155
VILREINON	ibid.	Liveche	536
Liguftrum		Lixivium Nitri	545
Liliaceorum agendi mod		E TRANSPORTER AND A CONTRACT OF A DECISION OF A DECISIONO OF A	99
Lilie .		Λόβοι	28
Lilium		Loch ad Afthma	230
Convallium	276	The second second second second second second	468
PARAC.	589	A CONTRACTOR OF A CONTRACT OF	
Limaçon	179		153
Διμυαΐου		Loche	147
Limon	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Locufta	171
Lin			57
		Löffelkraut	532
Linaire combred and	a server see and	Lomentum	28
Linaria	ibid.		IOI
Lingua Avis	and the second se	Lorbeer	275
Bovis		Lothperlen	362
Cervina designo		Lotte	171
Awodeus		Loutre	146
Anoswers man selding		Lucius	166
Aitov	460	Lujula	535
Linsen .	30	Lumbrici	527
Linum		Lumpenzucker	572
Liquam. Verbafci		Lungenkraut	391
Liquidambar. Styracifl.		Lungenmoos	ibid.
Liquiritia		Lupini .	31
Liquiritiæ Succus		Lupins	ibid.
Liquor Anod. mineral	448	Lupulus Mefue	58
Cornu Cervi fuccit	12-	Lupus falictarius	ibid.
tus		Lutra	146
cus	341	Luna	140

Lutum	193	Malva Rotundifol.	461
Luxstein	599	Sylvestris	ibid.
Lycoperdon Bovista		Malvaceorum propriet	
Cervin,		Man	622
Tuber.		Mandibulæ Lucii Pifc	Construction and and the second second
Lycopodium		Mandlen	111
Lyncis Lap.	599	Mandragora	\$13
16	1 States		07&513
М.		Mangold	44
Mana	A 20 3	Μάννα	318
Macaroni	13	Manna	622 fq.
Mache	57	Berliner	21
Macis ,	282	Bombycina	622
Madrepora Oculata	361	Briguntina Cereale	623
Magifter. Corall.	ibid.		121
Marcafitæ	408	<i>di Corpo</i> Craffa	622
Margarit.	363 ibid.	Electa	62; ibid.
Matris perl. Ocul. cancros			
	Concentration of the second	Frankfurter di Fronde	121 622
Saturni	444	Granulata	622
Magnes	403	Granulofa	
Magnefia Alba	499	Laricea	623 ibid.
Magfaamen	547	Liquid.	624
Majalis	138	Longa	622
Majorana	\$77	Perfica	623
	76 8 92	Polnifche	21
Malabathrum	278	Spifla	623
Μαλαβάθεον, Φύλλον		Mannheimer Waffer	240
Μαλάχη		Mannstreu	559
Malachites		Marantha	268
Malagetta		Maga gov Mislani	267
Μαλάπτικά		Marcafins	140
Malicorium		Marcalita	408
	0 & 337	Marchantia Polymorp	
Malum		Marc	99
Dulce	92	Marga Lemnia	436
Medicum	the second se	Margaritæ	362
Punicum	90	Coronaria	
Terræ	200	Occid.	ibid.
Malva	461	Orient.	ibid.
Arborea 41	9 & 461	Μαργαρίται	ibid.
Rofea	419	Margalita Vet,	445
		and subult	

Marguerite	377	Meerhirs	654
Maria Magdalena Blum.	. 299	Meermoos	598
Mariolaine	27	Meerrettig	42
Marmelata		Meertrauben	98
Marmor	600	Meerzwiebel	228
Marons	119	Meger	453
Marrubium	219	Meise	158
Maruette	158	Meisterwurzel	535
Massa altheæ alba moll.	152	Mel	583
Liquir. alba	458		290
fuíc.	ibid	Cucumerin.	613
Mafticatoria	600		\$85
Masinn	316		565
Maltiche	ibid.		462
Maftyx	ibid.		428
Maßlieben	377	Laxativ.	429
Materia Medica quid?	I	Sambuc.	578
Mater Perlar.	363		230
Materies Perlata	589		584
Matricaire	220	Melampodium	615
Matricaria	ibid.		446
Chamomilla	207	Μελάνθιον	284
Parthenium	220		619
Matrifilva	382		\$72
Mattenkümmel		Meleagris	IŞI
Mauerefel		Meles	146
Mauer - Raute	371	Zivetta	357
Maulbeeren		Μέλι	583
Mausdorn		Μελία	214
Mauve		Μελίλωτος	278
Mauvis		Melilotus	ibid.
Mayenblümlein		Melis	\$72
Mayfifch	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Meliffa	279
Mays	21	Calamintha	242
Mechoacanna	644		ibid.
Medicamenta Alimentofa	2 ihid	Officin.	279
Interna		Meliffophyllum Μελισσόφυλλον	ibid.
	and the second s	Melitis	
Magnetica Mechanica		Meloe Veficat	653 489
Medicamentorum modus	4	Melo	409
agendi	22	Melon	ibid.
Medulla Caudicum		Melons d'Eau	83
Offium		Melone	92
Meerballen	567	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Melten
and yor creations	, ,		

			Min	- ina
	Melten		Mica	14
	Menifpermum Coculus	480		403
	Menning		Mie	14
	Mentha		Miel Phone	583
	Aquatica	the second s	Минши	515
	Crifpa	ibid.		ibid.
	Pulegium	289		ibid.
	Menyanthe		Миншинон	516
	Mercin	143	Milch	127
	Mercurialis		Milium	22
	Mercurius	590		654
	Liquid.		Millefeuille	385
-	Præc. albus		Millefolium	ibid.
-	Flavus	ibid.	Millepedes	540
	per 'fe	ibid.	Millepertuis	382
	Ruber.	ibid.	Millet	22
	Virid.	ibid.	Μήλον	76
	Sacchar.	ibid.		74
	Subl. Corof.	ibid.		ibid.
	dulc.	ibid.		ibid.
	Violaceus	ibid.		bid & 93.
	Virgin.		Μήλα Αςμενίακα	79
	Vitæ	589		92
	Meres de Gerofles	248		93
	Mere goutte	99	Milten	44
	Merifes	81		441
	Merlan		Milzkraut	378
	Merle		Mimolæ nicoticæ	414
	Merluche		Mimofa	217
	Mefange	158		458
	Mefembryanth Nodifl.	552	Senegal	ibid.
	Coptic. A		Μηλοπλακέντα	100
	Μέσπιλα		Mine en feves	403
	Mefpili andano I		Minera Alba	364
	Mefpilus German.	ibid.		, , , ,
		ibid.		ibid.
	Metram stal	220		ibid.
	Meule	143	Argenti	364
	Meum	536		497
	Meures	93	Auri	365
	de Renard	96		408
	Mexicanifcher Lausfaam			364
	Mezeræum	483	Cupri	500
	atalata a	10)	the state state	300
		and the second s	a state of the second state of the	

Aaa

Mineræ Ferri	100	Martin Dishali	. Shan
		Morfus Diaboli Morue	394
Hermaphroditæ Mercurii			172
Plumbi		Mofchata Nux	281
		Mofchus	352
Stanni	409		ibid.
Zinci		Moscovade	572
	& \$93		99
Minorativa		Motacille	156
Miv9n		Moucerons	- 15
Minus		Mouron	198
Mñov Mirabilia Ialanna	the second second second	Mou[Je Marine	386
Mirabilis Jalappa	642		\$98
Mifpel Mifpichel		Mouft 4	99
Mispickel		Moutarde Mouton	487
Mify		Moxa	137
Mithridatum			242
Miva		Muchæ Rofar. Damafc.	427
Mæures		Muguet de Pois	276
Möhren	53		382
Mohr Maineau franc		Mumia	438
Moineau franc		Mundatum (Hordeum)	18
Molaffe		Müntz Muria Chrufolamp	280
MohiBoos		Muria Chryfolamp.	369
Molken		Muræna Anguilla Mufc.	169
Mællelein			352
Μόλον	129	Mufcatblüthe Mufcatnuf	282
Molufcæ Molubdana fouma luni	120	Muscatnus Muschel	281
Molybdana fpuma lupi Momordica Balfam.		<i>Muschel</i> Musci	597
Elater.		Muícus Acaciæ	386 ibid.
	528		ibid.
Monodon	ibid.	Albus Quern. Arboreus	ibid.
Μονόκερος	386	Pyxidatus	
Moos		Terreftris	387 ibid.
Mogos	93 ibid.	Vulgar.	ibid.
Mora Moracillæ		Mustela Fluviatil.	
Morchel	56	Lutra	171
Morelle		Muftum	146
			99 ibid.
Morgeline Morille	450		
Mors de Diable	56	Tortivum	ibid.
Morful. Antimon.	394	Mutterkorn	26
contra Verm.	210	Mutterlaug	and the second second second
de Citro		Mutternægelein	545
Purgantes	642	Mutterzimmet	248
Turbances	43	and the statistics	251

Mya Margaritifera	262	Nasturtium Hortense	ibid.
Pictorum	598		ibid.
Μυελός	14		505
Muxn	55	Sylvestre	59
Μυός ώτα	376	Nafus	167
Mueinn	230		416
Mueuns	492		65
MUGMOS	ibid.		ibid.
Myriza cerifera	333	37 .	94
Myrobalani	420 & 463		106
Belliricæ	420	Nelke	348
Chebulæ	ibid.	Nenufar	462
Citrinæ		Nepeta	252
Emblicæ	ibid.	Nephrit. Lapis	656
Indæ	ibid.	Lign.	654
Nigræ		Nerprun	640
Μυρυβάλανοι		Nervina	194
Muppa		Neffel	652
Myrrha	ibid.	Neunauge	171
Muppinn	283	Nicotiana	537
Myrtilli	106	Nielle	284
Μύφτος	283	Nigella	ibid.
Myrtus	ibid.	Nihilum	412
Caryoph.	250	NII	411
Pimenta	238	Ninting	356
Myftus Mutil Morganitif	105	Nhora	161
Mytil. Margaritif.	302	Nírçov Nitrum	543 ibid.
Myxa	405	Antimoniat. 54	
N.		Crystalli Mont.	
11.	telle.	Crudum	545
Nachtschatten	523	Depurat.	547
Nacre de Perle	363	Embryonat.	544
	247 & 556	Fixum	547
Nagelein - Rinde	250		
Nanfa	81	fulv. L.	
Napellus	503	Perlat.	369
Naphta	336		547 ibid.
Napi Radices	66	Saturnin.	ibid.
Narcotica	503	Tabulat.	ibid.
Napoos Ivdinn		Noifette	113
ΝαεδοςΚελτική	ibid.		120
Nafalia	606	Muscade	281
Nafturtium	59 & 61	Vomique	232
Aquaticu	m ibid,	Aaa	

Nucesibid.Ourseibid.Nucesibid.Ourseibid.Græcæ111Olea Europæa107Græcæ111Oleæibid.Ind. Cond.283Oleta36Ponticæ113Oleum deft. Abfynth.197Vomicæ232Acori243Nuciperfica93Anethi239Nuclei111Angelic.532Nuclei111Angelic.532Nuclei111Angelic.532Nuclei111Angelic.532Nuclei111Artemifiæ242Perfic.94Aurant.110Pinei121Benzoes309Nudlen13Cajapœt.245Nille120Camom.209Numida152Camom.209Numida152Cardanomi246Nyapaïaibid.Got.CiraiNymphæa462Cardanomi246Nymphæa462Cardanomi258Ochra0.55Cubeb.263Ochra403Coriandri265Ochs125Cubeb.263Ochra374Galban.561Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam.1161Guajac.Viribus faciant57Levendulæ275Oignons48Lavendulæ275Oirow & sevresias101Lentifci317Oirow & sevresias <t< th=""><th>Noyau</th><th>TTT</th><th>יסאואסיין אייסאיאסיין אייסיין א</th><th>000</th></t<>	Noyau	TTT	יסאואסיין אייסאיאסיין אייסיין א	000
Behen463 GræcæOlea Europæa107 GleæGræcæ111 Ind. Cond.283 OleaOleaJóř OleaPonticæ113 OleaOleaJóř OleaJóř OleaPonticæ113 OleaOleaJóř OleaJóř OleaNuciperfica93 NucleiAcori243 AnethiNuciperfica93 Malor. Armeniac.Anii T Angelic.532 AnethiNuclei111 Angelic.Angelic.Nuclei111 Angelic.Angelic.Nuclei111 Angelic.Angelic.Nuclei111 Armeniac.Aniii 239 AnniiNucum111 Perfic.ArtemiliæParinei121 BenzoesBenzoesNudlen13 Cajapeet.209 Camon.Numida152 Nu¢açãaCardamomiNidje120 Camon.Camph. Bezoard.Nymphæa462 Nu¢açãa,ibid.Nymphæa462 CariaCariaNymphæa462 CohraCariaNymphæa462 CohraCariaNymphæa462 CohraCariaNymphæa462 CohraCariaNucha152 CohraCariaO.Cariadri260 Cuheb.Ochra255 CuminiCoimum258 Couli Cancror.178 Galban.Ocimum285 CuminiCuminiOcimum374 Uniperi bacc.273 Uniperi bacc.Odor & Sapor quid pro de- terminantis348<				
Græcæ111Oleæibid.Ind. Cond.283Oleta36Ponticæ113Oleum deft. Abfynth.197Vomicæ232Acori243Nuciperfica93Anethi239Nuclei111Angelic.532Nuclei Allii38Animale DIPP,144Ceraforum82Anifi239Malor. Armeniac.79Artnicæ554Nucum111Artemifiæ242Perfic.94Aurant.110Pinei121Benzoes309Nudlen13Cajapœt.245Nitifle120Camom.209Nutrimentum10ROLFINC ibid.Nymphæa462Cardanomi246Num¢añaibid.Cardanomi246Nymphæa462Cardanomi246Numéaña100ROLFINC ibid.60Nymphæa462Cardanomi246Numéaña152Coticum Citri76Ochra125Cubeb.262Ochrs125Cubeb.263Ochrs125Cubeb.263Ocinum285Foenic.268Ocinum285Foenic.268Ochrs137Elemi315Ocinum275Elemi316Ochrs137Laurin.276Oiro & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant57Laurin.Oiro & Sapo				and the second second
Ind. Cond.283 PonticæOleta36 Oleum deft. Abfynth.197 VomicæVomicæ232Acori243Nuciperfica93 Malor. Armeniac.Anethi239 AnethiNuclei111 ParticeAngelic.532Nuclei Allii38 Malor. Armeniac.Anili239 ArnicæMalor. Armeniac.79 NucumArticmifæ244 239 ArnicæNucum111 Perfic.94 Attemifæ243 239Nucum111 Perfic.Benzoes309 Camph. Bezoard.Nudlen13 Cajapæt.Cajapæt.244 244 Camom.Nugle120 Camph. Bezoard.Camom.209 20 Camph. Bezoard.Numida152 Nuµ@aña.Cardamomi246 CariNymphæa462 Vou@aña.Cardamomi246 CariNymphæa462 CariaCariadri260 Corticum CitriObjectum Mat. Med.1 CofraCortiandri263 Corticum CitriOchra355 rothe355 Cubeb.262 Cubeb.263 CodiandriOcinum285 Cenic.Feenic.268 Cubeb.Ocinum285 Cubel.Galban.661 Guajac.Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant374 Giapan.Heracleotic.Olive & Supor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant348 Laurin.276 Laurin.Oiver & Surreiras101 rCortiadii348 Laurin.Oiver & Surreiras101 r <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Ponticæ113 VomicæOleum deft. Abfynth.197 VomicæVomicæ232 AcoriAcori243 AnethiNuciperfica93 Malor. Armeniač.Angelic.532 AniliNuclei Allii38 CeraforumAnili239 AnniliMalor. Armeniač.79 Malor. Armeniač.Anili239 ArnicæMalor. Armeniač.79 MucumArticæ554 AniliPerfic.94 PineiAurant.110 BenzoesPinei121 Perfic.Benzoes309 Camom.Nudlen13 Cajapœt.Cajapœt.245 Camom.Numida152 Nuffe120 Camom.Camom.209Numida152 Nutrimentum10 ROLFINC ibid.ROLFINC ibid.Nymphæa462 CariCardamomi246 CariNumépaïaibidCarianomi246 Carianomi246 CariaNumépaïa100 CohraCorticum Citri76 Coricum CitriOchra403 Coricum Citri76 Coricum Citri76 Coricum CitriOchra255 Cumini263 Cupica.263 Coricum CitriOchra255 Cumini263 Cupica.264 CariandriOchra255 Cumini263 Cupica.264 Coricum CitriOchra483 Coricum Citri268 Coricum CitriOchra374 Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant374 Cafan.Olior & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant374 <td>Ind. Cond.</td> <td>283</td> <td>Olera</td> <td></td>	Ind. Cond.	283	Olera	
Vomicæ232Acori243Nuciperfica93Anethi239Nuclei111Angelic.532Nuclei Allii38Anili239Malor. Armeniac.79Arnicæ554Malor. Armeniac.79Arricæ554Nucum111Artemifiæ242Perfic.94Aurant.110Pinei121Benzoes309Nudlen13Caippot.209Nudlen13152Camom.209Numida152Camom.209Nurimentum10Rolfix1247Nymphæa462Cari 247Caftor \$27O.Charoph.50Cinamomi 258Objectum Mat. Med.1Corticum Citri 76Ochra403Corticum Citri 76Ochra403Corticum Citri 76Ochra355Cumini 263Colfenzunge355Cumini 263Colli Cancror.178Galban.Citr.ibid.Guajac.Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant374Olives deurglas101LentificiOlives deurglas101Igni 274Ladan.Jigni 274Ladan.Olives deurglas101Lentifici317Olives deurglas101Cirumas138Orizores138Olivers deurglas137Olivers deurglas137Olivers deurgl				and the second se
Nuciperfica93 NucleiAnethi239 Angelic.Nuclei111 Angelic. 532 Angelic. 532 Angelic.Nuclei Allii38 Ceraforum 38 Malor. Armeniac. 79 Arnicæ 554 ArtemifiæMalor. Armeniac. 79 Nucum 411 Artemifiæ 239 ArnicæNucum111 Perfic. 4121 Benzoes 309 Cajapæt.Nudlen13 Nille 239 Aurant. 110 BenzoesNudlen13 Nille 239 Aurant. 239 ArtemifiæNudlen13 Nille 239 Aurant. 239 ArtemifiæNudlen13 Nille 239 Aurant. 239 ArtemifiæNudlen13 Nille 239 Aurant. 239 Aurant.Nudlen132 Nugle 239 Aurant. 239 Aurant.Nudlen132 Camon. 209 Camon. 209 Camph. Bezoard.Nurimentum10 Nymphæa 462 Nupu¢aïa. $CardamomiNymphæa462Nupu¢aïa.Cardamomi246CariNymphæa462Nupu¢aïa.Cardamomi246CariOchra403Cohfenzunge355Corticum Citri76CoriandriOchra403Coriandri263Cumini263CuminiOchra235Corticum Citri76CoriandriOcinum285Couli Cancror.778Calban.561Galban.Oder & Sapor quid pro de-terminantis Medicam.viribus faciant57Lavend$	Vomicæ	a submission of the		
Nuclei111Angelic. 532 Nuclei Allii38Animale DIPP, 144Ceraforum82Animale DIPP, 144Malor. Armeniac.79Arnicæ 554 Nucum111Artemifiæ242Perfic.94Aurant.110Pinei121Benzoes309Nudlen13Cajapæt.245Nüffe120Camom.209Numida152Camom.209Nurimentum10ROLFINC ibid.Nym¢xãa,ibid.Cardamomi246Nym¢xãa,ibid.Cardamomi246Nym¢xãa,ibid.Cardamomi246Nym¢xãa,ibid.Corticum Citri76Ochra403Corticum Citri76Ochra403Cortiandri260Ochfenzunge355Cubeb.262Cohfenzunge355Cumini263Ocinum285Gealban.564Ocinum285Gaban.564Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant574Oirouras48Ladan.316Oirouras48Ladan.316Oirouras137Lign. Rhodii348Oirouras137Lign. Rhodii348Oirouras138Templin.323	Nuciperfica	and the second second		
Nuclei Allii38Animale DIPP, 144Ceraforum82Aniii239Malor. Armeniac.79Arricæ554Nucum111Artemifiæ242Perfic.94Aurant.110Pinei121Benzoes309Nudlen13Cajapœt.245Nille120Camom.209Numida152Camom.209Nutrimentum10ROLFINC ibid.Nymphæa462Cardamomi246Nymphæa462Cardamomi246Nymphæa462Cardamomi246Nymphæa462Corianomi258Objectum Mat. Med.1Coriandri260Ochra125Cubeb.262Ochfenzunge355Curicum Citri76Ocimum285Galban.561Ochrmenning374Heracleotic.114Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant374Ladan.316Oirozas48Ladan.316Carjac.269Juniperi bacc.273Laurin.276Juniperi bacc.273Oirozas48Ladan.316Carjaci317Oirozas137Lign. Rhodii348Lavendulæ276	Nuclei		Angelic.	and the second second
Malor. Armeniac.79Arnicæ 554 Nucum111Artemifiæ 242 Perfic.94Aurant.110Pinei121Benzoes 309 Nudlen13Cajapœt. 245 Nüffe120Camom. 209 Numida152Camom. 209 Nutrimentum10Rol FINCibid.Nymphæa462LEMERYibid.Nymphæa462Cardamomi 246 Nymphæa462Cardamomi 246 Nymphæa462Cardamomi 246 Nymphæa462Cardamomi 246 Nymphæa462Cardamomi 246 Nymphæa462Cardamomi 246 Nymphæa462Carianomi 246 Nymphæa462Carianomi 246 Nymphæa462Carianomi 246 Nymphæa462Carianomi 246 Nymphæa403Coriandri 260 Ochra403Coriandri 262 Ochra355Cubeb. 262 Ochra375Elemi 315 Ocimum285Foenic. 268 Oculi Cancror.178Galban. 561 Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant 57 LavendulæOlivos devresias101Lortifci 317 Olivos devresias101Lortifci 317 Olivos devresias138Templin. 323 </td <td></td> <td>38</td> <td>Animale DIPP,</td> <td>THE REPORT OF ALL OF</td>		38	Animale DIPP,	THE REPORT OF ALL OF
Nucum111Artemifiæ 242 Perfic.94Aurant.110Pinei121Benzoes309Nudlen13Cajapœt.245Nüffe120Camom.209Numida152Camom.209Nutrimentum10Rolfinc bid.Nymphæa462LEMERY ibid.Numøaïaibid.Caria 247O.Caftor527O.Charoph.50Objectum Mat. Med.1Coricum CitriOchra403Corticum CitriOchra355Cubeb.Ochra355Cubeb.Ochra355Cubeb.Ochra355Cubeb.Ochra374Ocinum285Ocinum285Ocinum374Odor & Sapor quid pro determinantis Medicam.16Viribus faciant57Oieillet348Oarons48Ladan.316Lavendulæ275Oignons48Laurin.276Olivos devresias101'Oís137Oirvaros138Oirvaros138Oirvaros138Oirvaros138Oirvaros138		82	A CARL ST A	239
Perfic.94 PineiAurant.110 BenzoesNudlen13 Nülje120 I20 Numida152 Camom.209 Camph. Bezoard.Numida152 Nédagev462 LEMERYLEMERYNédagev462 Nutrimentum10 ROLFINC ibid.Nymphæa462 NumçaïaROLFINC ibid. CariamomiNymphæa462 NumçaïaCardamomiO.Cardamomi246 CardamomiO.Cariamomi247 CaftorO.Cariamomi258 Corticum CitriOchra403 CoriandriCoriandriOchra403 CoriandriCoriandriOchra355 rotheCubeb.Coimum285 Cubil Cancror.CuminiOcimum285 Culi Cancror.Galban.Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant374 StateOdor & Sapor quid pro de- terminantis374 StateOlivos deuregias101 StarsOiros deuregias101 StarsOiros deuregias101 StarsOiros deuregias101 StarsOiros deuregias101 StarsOiros deuregias101 StarsOiros deuregias138 StarsOiros deuregias138 StarsOiros Stars138 Stars		79		554
Pinei121Benzoes 309 Nudlen13Cajapœt.245Nüffe120Camom.209Numida152Camom.209Nutrimentum10Rolfinc ibid.Rolfinc ibid.Nymphæa462LEMERY ibid.Rolfinc ibid.Nymphæa462Cardamomi246Nymphæa462Cari247O.Caftor527O.Charoph.50Objectum Mat. Med.1Corticum CitriOchra403Corticum CitriOchra403Corticum CitriOchra355Cubeb.Cothe375ElemiOcimum285Coubeb.Ocimum285Galban.Ocimum285Galban.Odor & Sapor quid pro determinantis Medicam.Juniperi bacc.Viribus faciant50Oiros deuregias48Olivos deuregias101Cirs138Olivos deuregias101Virs138Olivos deuregias101Virs138Olivos deuregias138	A CONTRACT OF A	111		242
Nudlen13Cajapæt.245Nüffe120Camom.209Numida152Camom.209Numida152Camph. Bezoard.312Né $\phi agov$ 462LEMERYibid.Nymphæa462Cardamomi246Nv $\mu \phi añaibid.Cardamomi246Nv\mu \phi añaibid.Cardamomi246Nv\mu \phi añaibid.Cardamomi246O.Cardamomi246O.Charoph.50Ochra403Corticum CitriOchra403Corticum CitriOchra403Corticum CitriOchra355Cubeb.ochre355Cubeb.rothe375ElemiOcimum285Foenic.Ocimum285Foenic.Ocimum285Foenic.Ocili Cancror.178Calaban.561Cuir.ibid.Odor & Sapor quid pro de-terminantis Medicam.viribus faciant374Oenothera biennis67Oivos devrisias101Oivos devrisias101'Oís137Oísos devrisias101'Oís137Oírozos138Templin.323$		94		
Nüffe120Camom.209Numida152Camph. Bezoard. 312 $Ne' \phi a \rho o v$ 462LEMERYNutrimentum10ROLFINCNymphæa462CardamomiNo $\mu \phi a \tilde{a} a$ ibid.CardamomiO.Cattor527O.Charoph.50Objectum Mat. Med.1Corticum CitriOchra403Corticum Citri76Ochra403Corticum Citri76Ochra355Cubeb.262Ochfenzunge355Cubeb.263Tothe375Elemi315Ocimum285Foenic.268Oculi Cancror.178Galban.56Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant374Heracleotic.Olivos deurusias48Ladan.316Oenothera biennis67Lavendulæ275Oiros deurusias137Lign. Rhodii348Oiros deurusias137Laurin.276Oiros deurusias137Laurin.276Oiros deurusias137Laurin.276Oiros deurusias137Laurin.276Oiros deurusias137Laurin.276Oiros deurusias138Templin.323	and the second	121		309
Numida 152 Camph. Bezoard. 312 Ne'dagov 462 LEMERY ibid.Nutrimentum10ROLFINC ibid.Nymphæa 462 Cardamomi 246Nvµapaïaibid.Cardamomi 246Nvµapaïaibid.Cardamomi 246Nvµapaïaibid.Cardamomi 246Nvµapaïaibid.Cardamomi 246Nvµapaïaibid.Cardamomi 246Nvµapaïaibid.Cardamomi 246Nvµapaïaibid.Cardamomi 246Nvµapaïaibid.Cardamomi 246Nvµapaïaibid.Cardamomi 246Ochra403Corticum Citri 76Ochra403Corticum Citri 76Ochra355Cubeb.Ochra355Cumini 263Ochfenzunge355Cumini 263Ochfenzunge355Galban.Citr.ibid.Galban.Ocimum285Galban.Ocimum374Galban.Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant16Uenothera biennis67LavendulæOlvos deurtelas101'Ols137Olvos deurtelas101'Ols138Templin. 323				
Né $dagov462LEMERYibid.Nutrimentum10ROLFINCibid.Nymphæa462Cardamomi246Numda aïaibid.Cardamomi246Numda aïaibid.Cari247O.Charoph.50Objectum Mat. Med.ICorticum CitriOchra403Corticum Citri76Ochra403Corticum Citri76Ochra403Corticum Citri76Ochra403Corticum Citri76Ochra355Cubeb.262Ochfenzunge355Cumini263Tothe375Elemi315Ocimum285Galban.561Ocinenning374Heracleotic.114Odor & Sapor quid pro determinantis Medicam.viribus faciant57Juniperi bacc.273Juniperi bacc.273ligni274Olivog deurtefas101Lavendulæ275Olivog deurtefas101Laurin.276Olivog deurtefas101Laurin.276Olivog deurtefas101Lentifci317Olign. Rhodiii348Templin.323$		10.0		
Nutrimentum10ROLFINCibid.Numphea462Cardamomi246Numpaiaibid.Cari247 $O.$ $O.$ Caftor527 $O.$ $O.$ Charoph.50Objectum Mat. Med.ICorticum Citri76Ochra403Corticum Citri76Ochra403Corticum Citri76Ochra403Corticum Citri76Ochra403Corticum Citri76Ochra355Cubeb.262Ochfenzunge355Cumini263Tothe375Elemi315Ocimum285Foenic.268Oculi Cancror.178Galban.561Oder & Sapor quid pro determinantis Medicam.Juniperi bacc.273Viribus faciant5Lavendulæ275Oignons48Ladan.316Olvog devrigias101Lentifci317Olys138Templin.323				
Nymphæa 462 Cardamomi 246 Nym ϕ añaibid.Cari 247 Nym ϕ añaibid.Cari 247 O.Caftor 527 O.Charoph. 50 Objectum Mat. Med.ICorticum CitriOchra 403 Corticum CitriOchra 403 Corticum CitriOchra 403 Corticum CitriOchra 403 Corticum CitriOchra 506 Ochra 506 Ocimum 2856 Cumini 2632 Ocimum 2867 Ocimum 2867 Ocimum 2867 Ocimum 2867 Ocimum 2867 Ocimum 2867 Ocimum 2632 Ocimum 374 Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant 507 Oignons 487 Olioof deurigias 101 Viribus faciant 507 Oisof deurigias 101 Vis 137 Olioof deurigias 101 Vis 1388 Templin. 323		the state of the		
Numpainibid.Cari 247 CaftorO.O.Cari 247 CaftorO.O.Caftor 527 Charoph.Objectum Mat. Med.ICorticum Citri76Ochra403 OchsCorticum Citri76Ochra403 OchsCorticum Citri76Ochra403 CotheCorticum Citri76Ochra403 CotheCorticum Citri76Ochra125 CubebCubeb.262Ochfenzunge355 rotheCubeb.262Ocimum285 Cutr.Cumini263Ocimum285 Citr.Foenic.268Oculi Cancror.178 Calban.Galban.561Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant57 LagentJuniperi bacc.273 LigniOlivos deuripias48 CoinosLadan.316 Lavendulæ276 Laurin.276 Laurin.276 Lign. Rhodii348 Templin.		and the second se		
O.Caftor 527 O.Charoph. 50 Objectum Mat. Med.ICorianomiOchra 403 Corticum CitriOchra 403 Corticum CitriOchra 403 Corticum CitriOchra 403 CoriandriOchra 403 Corticum CitriOchra 403 Corticum CitriOchra 403 Corticum CitriOchra 125 Cubeb.Ochfenzunge 355 Cuminirothe 375 ElemiOcimum 285 CuminiOcimum 285 Galban.Ocitr. 178 Galban.Citr.ibid.Guajac.Odor & Sapor quid pro de-Igniterminantis Medicam.Juniperi bacc.viribus faciant 50 Oenothera biennis 67 Oignons 48 Olvos deurteslas 101 'Ols 137 Olso 138			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
O.Charoph.50Objectum Mat. Med.ICorianomi258Ochra403Corticum Citri76Ochra403Coriandri260Ochra125Cubeb.262Ochfenzunge355Cumini263Ochfenzunge355Cumini263Ochfenzunge355Cumini263Ochfenzunge355Cumini263Ocinum285Coriandri263Ocinum285Galban.561Oculi Cancror.178Galban.561Odor & Sapor quid pro determinantis Medicam.Juniperi bacc.273Viribus faciant5Juniperi bacc.273Viribus faciant5Ladan.316Osog deurteslas101Lentifci317Olivog deurteslas101Lentifci317Olivog deurteslas101Lentifci317Olivog deurteslas138Templin.323	Νυμφαία	1D1d.		and the second
Objectum Mat. Med.ICinamomi258Ochra403Corticum Citri76Ochra403Coriandri260Ochs125Cubeb.262Ochfenzunge355Cumini263rothe375Elemi315Ocimum285Coriandri268Oculi Cancror.178Galban.561Citr.ibid.Guajac.563Odermenning374Heracleotic.114Odor & Sapor quid pro determinantis Medicam.Juniperi bacc.273Viribus faciant5Iigni274Oeillet348Ladan.316Oiros deuregías101Laurin.276Oiros deuregías101Lentifci317Oírouraos138Templin.323	0	K		and the second se
Objectum Mat. Med.ICorticum Citri76Ochra 403 Corticum Citri76Ochra 403 Coriandri260Ochs 125 Cubeb.262Ochfenzunge 355 Cumini263rothe 375 Elemi 315 Ocimum 285 Foenic.268Oculi Cancror. 178 Galban.561Otermenning 374 Guajac.563Oder & Sapor quid pro determinantis Medicam.ligni274Viribus faciant 57 Ladan.316Oenothera biennis 67 Lavendulæ275Oignons 48 Laurin.276Olvos deureplas 137 Lign. Rhodii348Olous deureplas 138 Templin. 323	0.	Lans V		
Ochra 403 Coriandri 260 Ochs 125 Cubeb. 262 Ochfenzunge 355 Cumini 263 Ochfenzunge 355 Cumini 263 Ocimum 285 Cumini 263 Oculi Cancror. 178 Galban. 561 Octr.ibid.Guajac. 563 Odermenning 374 Heracleotic. 114 Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant 57 Ladan. 316 Oeillet 348 Ladan. 316 Oenothera biennis 67 Lavendulæ 275 Oignons 48 Laurin. 276 Oivos deuresias 101 Lign. Rhodii 348 Oivos feuresias 138 Templin. 323	Objectum Mat. Med	-		
Ochs 125 Cubeb. 262 Ochfenzunge 355 Cumini 263 Ochfenzunge 355 Cumini 263 Tothe 375 Elemi 315 Ocimum 285 Foenic. 268 Oculi Cancror. 178 Galban. 566 Oculi Cancror. 178 Galban. 566 Odermenning 374 Heracleotic. 114 Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant 101 269 Juniperi bacc. 273 114 Oeillet 348 Ladan. 316 Oenothera biennis 67 Lavendulæ 275 Oignons 48 Laurin. 276 Oivos deureplas 101 Lign. Rhodii 348 Oivos $0ivos (138)$ 101 Lign. Rhodii 348 Oivos 138 138 Templin. 323		A CONTRACTOR OF THE OWNER OF THE		
Ochfenzunge 355 Cumini 263 rothe 375 Elemi 315 Ocimum 285 Fænic. 268 Oculi Cancror. 178 Galban. 561 Citr.ibid.Guajac. 563 Odermenning 374 Heracleotic. 114 Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant 114 149 Oenothera biennis 67 Ladan. 316 Oenothera biennis 67 Lavendulæ 275 Oignons 48 Laurin. 276 Oivos deurepías 101 Lentifci 317 'Oís 137 Lign. Rhodii 348 Oirowso 138 Templin. 323				
rothe375Elemi315Ocimum285Foenic.268Oculi Cancror.178Galban.561Citr.ibid.Guajac.563Odermenning374Heracleotic.114Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant114Heracleotic.114Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant114Juniperi bacc.273Oenothera biennis67Ladan.316Oenothera biennis67Lavendulæ275Oignons48Laurin.276Oivos deuresías101Lign. Rkodii348Oívos deuresías137Lign. Rkodii348Oíso137Lign. Rkodii348	The second			
Ocimum28ςFoenic.268Oculi Cancror.178Galban.561Citr.ibid.Guajac.563Odermenning374Heracleotic.114Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciant114Hyffopi269Juniperi bacc.273ligni274Oeillet348Ladan.316Oenothera biennis67Lavendulæ275Oignons48Laurin.276Oivos devrepíos101Lentifci317'Oís137Lign. Rkodii348Oírowaos138Templin.323				
Oculi Cancror.178Galban.561Citr.ibid.Guajac.563Odermenning374Heracleotic.114Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciantHyffepi269Juniperi bacc.273Juniperi bacc.273Igni274Oeillet348Ladan.Oenothera biennis67LavendulæOiros deurepías101'Oís137Lign. RhodiiOírowaos138Templin.				
Citr.ibid.Guajac.563Odermenning374Heracleotic.114Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciantHyffopi269Juniperi bacc.273ligni274Oeillet348Ladan.316Oenothera biennis67Lavendulæ275Oignons48Laurin.276Oivos devregías101Lentifci317'Oís137Lign. Rhodii348Oírozos138Templin.323	Oculi Cancror.	and the second se	Galban.	And the second se
Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciantHyffepi269Juniperi bacc.273Juniperi bacc.273ligni274Deillet348Ladan.Oenothera biennis67LavendulæOignons48Laurin.Oivos deuregías101Lentifci'Oís137Lign. RhodiiOísuwas138Templin.	Citr.		Guajac.	
Odor & Sapor quid pro de- terminantis Medicam. viribus faciantHyffepi Juniperi bacc.269 273 ligniViribus faciant\$Juniperi bacc.273 ligniOeillet348Ladan.316Oenothera biennis67Lavendulæ275Oignons48Laurin.276Oivos deuregías101Lentifci317'Oís137Lign. Rhodii348Oírowaos138Templin.323	Odermenning	374	Heracleotic.	114
viribus faciant 5 Oeillet 348 Oenothera biennis 67 Oignons 48 Oivos deuregías 101 'Oís 137 Oisouros 138 Ladan. 316 Ladan. 316 Lavendulæ 275 Laurin. 276 Lentifci 317 Lign. Rhodii 348 Templin. 323		-	Hyffepi	269
Oeillet348Ladan.316Oenothera biennis67Lavendulæ275Oignons48Laurin.276Oivog deuregíag101Lentifci317'Oíg137Lign. Rhodii348Oívogog138Templin.323				273
Oenothera biennis67Lavendulæ275Oignons48Laurin.276Olvos deuregiæs101Lentifci317'Ois137Lign. Rhodii348Olouwos138Templin.323				
Oignons 48 Laurin. 276 Olivos deuregias 101 Lentifci 317 'Ois 137 Lign. Rhodii 348 Olivosos 138 Templin. 323				
Οίνος δευτερίας 101 Lentifci 317 'Oíç 137 Lign. Rhodii 348 Οίσυπος 138 Templin. 323				and the second second
Olis 137 Lign. Rhodii 348 Olisuwos 138 Templin. 323		Contraction of the local distance of the loc		
Olovwos 138 Templin. 323		20151 10110 01		
				and the second se
1381 1112CIS 285				
P R a de	Deamers	1351	TUNCIS	405

Oleum deft. Majoranæ278Oleum Expr. Macis283Maftich317Napar.36Melifiæ280Olivar.107Menthæ284Ovorum153Millefolii385Palmarum120Mofch. nucis283Papav. ex Se-Myrthæ222min.519Neroli81Perfic. nucl.95Nicot.539Piftac.122Olibani219Ricini479Origani286Oleum inf. aut coct. Abrot.236Piperin.288Abfynth197Pulegii290Anagall.199Rofarum426Aneth.239Rutæ292Camon.209Sabinæ203Catlor. timpl.527Saponis108Charoph.50Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512Styracis327Coloc. compof.632Styracis327Coloinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar.305Formic.493Oleum Expr. Anygd. amar.305Formic.515Anifi240
Melifiæ280Olivar.107Menthæ284Ovorum153Millefolii385Palmarum120Mofch. nucis283Papav. ex Se-Myrnhæ222min.519Neroli81Perfic. nucl.95Nicot.539Piftac.122Olibani219Ricini479Origani286Piferin.479Origani219Ricini479Origani290Rofarum426Pulegii290Anagall.199Rofarum426Aneth.239Rutæ292Camom.209Sabinæ203Caftor. fimpl.527Saffafras295Comp.ibid.Saponis108Chæroph.50Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512Spicæ275Coloc. compof.632Spicæ275Coloc. compof.632Spicæ275Coloc. compof.632Spicæ275Coloc. compof.632Spicæ275Coloc. compof.632Spicæ305Coloc. compof.632Murale. ibid.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani561Anifi240Helenii535Anifi240Hyofc.515
Menthæ284 MillefoliiOvorum153 PalmarumMillefolii385 Mofch. nucis283 Papav. ex Se- min.Papav. ex Se- min.Myrzhæ222 Nicot.min.519 Papav. ex Se- min.Nicot.539 OlibaniPiftac.122 RiciniOlibani219 OriganiRicini479 Sem. 4. frigid.Origani286 Philofoph.Io8 Oleum inf. aut coct. Abrot.236 Piperin.Pulegii290 RofarumAbfynth197 Ammon. GummiRutæ292 SabinæCamom.209 Camom.Salvjæ294 SantaliCatellorum136 SaponisSaponis108 Chæroph.Chæroph.50 SaturejæSpicæ275 SerpilliColoc. compof.632 StyracisSpicæ275 Coloc. compof.632 Cydonior.106 RofarumZedoariæ304 Gulc. ibid.305 Golani561 GalbaniOleum Expr. Amygd. amar.305 Galbani535 Galbani535 GalbaniAneth.239 Helenii433 Galbani535 Gili
Millefolii385 Mofch. nucisPalmarum120 Papav. ex Se- min,Myrthæ222 Myrthæmin,519 Perfic. nucl.Neroli81 Perfic.Perfic. nucl.95 Piftac.Nicot.539 OriganiPiftac.122 RiciniOlibani219 OriganiRicini479 Sem. 4. frigid.Origani286 Philofoph.Sem. 4. frigid.Piperin.288 Philofoph.Abfynth197 PulegiiPulegii290 Roris mariniAneth.239 Ammon. Gummi 198 RofarumRofarum426 RofarumAneth.239 Camom.Rutæ292 SabinæCamom.209 Camom.Sabinæ293 Cattor. fimpl.527 Coloc. comp.Saffafras296 CheiriCheiri557 Coloc. compof.Saponis108 CheiriCheiri557 Coloc. compof.Spicæ275 Styracis327 Coloc. compof.632 CheiriSpicæ275 Coloc. compof.632 CheiriSpicæ275 Coloc. compof.632 CheiriSpicæ275 Coloc. compof.632 CheiriSpicæ275 Coloc. compof.632 CheiriSpicæ275 Coloc. compof.632 CheiriSpicæ275 Coloc. compof.632 CheiriSpicæ305 Cheiri651 CheiniOleum Expr. Amygd. amar. 113 dulc. ibid.GalbaniAnifi240Helenii535 Helenii
Mofch. nucis283Papav. ex Se-Myrthæ222min,519Neroli81Perfic. nucl.95Nicot.539Piftac.122Olibani219Ricini479Origani286Sem. 4. frigid.83Philofoph.108Oleum inf. aut coct. Abrot.236Piperin.288Abfynth197Pulegii290Anagall.199Rofarum426Aneth.239Rutæ292Camom.209Sabinæ293de Cappar.48Salvjæ294Cattor. timpl.527Saffafras295Comp.ibid.Saponis108Chæroph.50Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Coloc. compof.632Syracis327Colocinium212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani561Mulc. ibid.Geniftæ652Aneth.219Helenii535Anifi240Hyofc.515
Myrrhæ 222 min. 519 Neroli 81 Perfic. nucl. 95 Nicot. 539 Piftac. 122 Olibani 219 Ricini 479 Origani 286 Philofoph. 108 Sem. 4. frigid. 83 Philofoph. 108 Oleum inf. aut coct. Abrot. 236 Piperin. 288 Abfynth 197 Pulegii 290 Anmon. Gummi 198 Roris marini 290 Anagall. 199 Rofarum 426 Aneth. 239 Rutæ 292 Camom. 209 Sabinæ 293 de Cappar. 48 Salvjæ 294 Caftor. fimpl. 527 Saffafras 295 comp. ibid. Santali 393 Catellorum 136 Saponis 108 Cheiri 517 Spicæ 275 Coloc. compof. 632 Styracis 327 Coftinu
Neroli81Perfic. nucl.95Nicot.539Piftac.122Olibani219Ricini479Origani286Sem. 4. frigid.83Philofoph.108Oleum inf. aut coct. Abrot.236Piperin.288Abfynth197Pulegii290Anmon. Gummi198Roris marini290Anagall.199Rofarum426Aneth.239Rutæ292Camom.209Sabinæ293de Cappar.48Salvjæ294Caftor. fimpl.527Saffafras295comp.ibid.Santali393Catellorum136Saponis108Cheiri557Serpilli298Cicutæ512Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Coftinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar.13Galbani661Gulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Nicot.539Piftac.122Olibani219Ricini479Origani286Sem. 4. frigid.83Philofoph.108Oleum inf. aut coct. Abrot.236Piperin.288Abfynth197Pulegii290Anagall.199Rofarum426Aneth.239Rutæ292Camom.209Sabinæ293de Cappar.48Salvjæ294Caftor. fimpl.527Saffafras295comp.ibid.Santali393Catellorum136Saponis108Charoph.50Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Cotinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar.113Galbani561Gulc. ibid.Galbani561Mnifi240Hyofc.513
Olibani219 OriganiRicini479 Sem. 4. frigid.Origani286 Philofoph.Sem. 4. frigid.83Piperin.288 PulegiiOleum inf. aut coct. Abrot.236 Piperin.Pulegii290 Roris mariniAbfynth197 Ammon. GummiRoris marini290 RofarumAnagall.199 Anagall.Rofarum426 RutæAneth.239 Camom.Rofarum426 RutæCamom.209 Camom.Sabinæ293 Cattor. fimpl.527 Camp.Saffafras294 Cattor. fimpl.527 Comp.Santali393 SaponisCatellorumSaponis108 Charoph.50 CheiriSaturejæ296 CheiriCheiriSpicæ275 Coloc. compof.632 CoticutæSpicæ275 Coloc. compof.632 Cydonior.Spicæ275 Coloc. compof.632 Cydonior.Oleum Expr. Amygd. amar.113 Galbani641 GenitæMulc. ibid.305 Galbani561 GenitæAnifi240Hyofc.513
Origani286Sem. 4. frigid. 83Philofoph.108Oleum inf. aut coct. Abrot. 236Piperin.288Abfynth197Pulegii290Anagall.199Roris marini290Anagall.199Rofarum426Aneth.239Rutæ292Camom.209Sabinæ293de Cappar.48Salviæ294Caftor. fimpl.527Saffafras295comp.ibid.Santali393Catellorum136Saponis108Cheroph.50Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Coftinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani561dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.513
Philofoph.108 Piperin.Oleum inf. aut coct. Abrot. 236 Piperin.Pulegii290 Roris mariniAbfynth197 Ammon. GummiRoris marini290 RofarumAnagall.199 Anagall.Rofarum426 RutzAneth.239 Camom.Rutz292 SabinæCamom.209 de Cappar.Salviæ294 Caftor. fimpl.527 comp.Salfafras295 Comp.comp.Santali393 SantaliCatellorumSaponis108 Chæroph.507 CicutæSaturejæ296 CheiriCheiriSpicæ275 Coloc. compof.632 Coloc. compof.Styracis327 CoftinumCodinor.Tanaceti231 CrociCrociThymi301 Cydonior.Cydonior.Zedoariæ305 dulc. ibid.Formic.Aneth.239 Helenii535 S13
Piperin.288Abfynth197Pulegii290Anmon. Gummi198Roris marini290Anagall.199Rofarum426Aneth.239Rutæ292Camom.209Sabinæ293de Cappar.48Salvjæ294Caftor. fimpl.527Saffafras295comp.ibid.Santali393Catellorum136Saponis108Chæroph.50Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Coloc. compof.632Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani561Mneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.513
Pulegii290Ammon, Gummi 198Roris marini290Anagall.199Rofarum426Aneth.239Rutæ292Camom.209Sabinæ293de Cappar.48Salviæ294Caftor, fimpl.527Saffafras295comp.ibid.Santali393Catellorum136Saponis108Chæroph.50Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512*Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Cottinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani561Mneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Roris marini290Anagall.199Rofarum426Aneth.239Rutæ292Camom.209Sabinæ293de Cappar.48Salvjæ294Caftor. fimpl.527Saffafras295comp.ibid.Santali393Catellorum136Saponis108Charoph.50Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Coftinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar.113Galbani561dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Rofarum426Aneth.239Rutæ292Camom.209Sabinæ293de Cappar.48Salviæ294Caftor. fimpl.527Saffafras295comp.ibid.Santali393Catellorum136Saponis108Chæroph.50Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512*Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Coftinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar.113Galbani561dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Rutæ292Camom.209Sabinæ293de Cappar.48Salvjæ294Caftor. fimpl.527Saffafras295comp.ibid.Santali393Catellorum136Saponis108Chæroph.50Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512*Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Coftinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar.305Formic.493Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Sabinæ293de Cappar.48Salviæ294Caftor. fimpl.527Saflafras295comp.ibid.Santali393Catellorum136Saponis108Cheiri50Saturejæ296Cheiri57Serpilli298Cicutæ512Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Coloc. compof.632Styracis327Coloc. compof.632Styracis327Coloc. compof.632Styracis327Coloc. compof.632Styracis327Coloc. compof.632Styracis327Coloc. compof.632Styracis327Coloc. compof.632Styracis327Coloc. compof.632Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani661dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Salvjæ294Caftor, fimpl.527Saffafras295comp.ibid.Santali393Catellorum136Saponis108Chæroph.50Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512*Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Cotinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar.113Galbani561Mneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Saffafras295comp.ibid.Santali393Catellorum136Saponis108Chæroph.50Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512*Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Coftinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar.113Galbani561dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Santali393Catellorum136Saponis108Chæroph.50Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512*Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Coftinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani561dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Saponis108Chæroph.50Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Coloc. compof.632Styracis327Coloc. compof.632Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani561dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Saturejæ296Cheiri557Serpilli298Cicutæ512Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Coltinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani561dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Serpilli298Cicutæ\$12'Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Coftinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani561dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Spicæ275Coloc. compof.632Styracis327Coftinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani561dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Styracis327Coftinum212Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani561dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Tanaceti231Croci261Thymi301Cydonior.106Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd, amar.113Galbani561dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Thymi301Cydonior.106Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani561dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani561dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239Helenii535Anifi240Hyofc.515
Zedoariæ304Euphorbii483Zinzib.305Formic.493Oleum Expr. Amygd. amar. 113Galbani561dulc. ibid.Geniftæ652Aneth.239HeleniiAnifi240Hyofc.
Zinzib. 305 Oleum Expr. Amygd. amar. 113 dulc. ibid. Aneth. 239 Anifi 240 Hyofc. 513
Oleum Expr. Amygd. amar. 113 dulc. ibid. Aneth. 239 Anifi 240 Galbani 561 Geniftæ 652 Helenii 535 Hyofc. 515
Aneth. 239 Anifi 240 Helenii 535 Hyofc. 515
Aneth. 239 Helenii 535 Anifi 240 Hyofc. 515
Anifi 240 Hyofc. 513
Avenands. 14 nypenc. 385
BehenNucum 462 fimpl. ibid.
Cannabis 455 Irinum 271
Cari 247 Lacert. 473
Fœnic. 268 Laurin. 276
Hyofc. 513 Lentifei 317
Jugland 121 Liliorum 460
Laurinum 276 convall. 277
Lini 461 Lumbr. 528

Aaa 3

Oleum inf. Majoran		Onifcus Afellus	Routes-
Mandragoræ		Ονίσχοι	54T
Maftich.		"Ovor	540 ibid.
Melilot.		Ononis	
Menth.	279	"Ovoş	566
Momordicæ		"Ονωνις	172
			566
Myrti baccar. fol.	ibid	Opiata Mefenterica 594 Salomonis	
	ibid.		521
Nicot.		Opium	516
Nymph.		Οποβάλσαμου	319
Ranarum		Opobalfamum	ibid.
de Sperm.			222
Rofarum.		Opopanax	ibid.
Rutæ	291		365
Salviæ		Oranges	79
Sambuci		Orcanette	375
Scorpion. fimpl.		"OFXIS	464
		Orchis Satyr.	ibid.
Solani		Oreilles de Judas	376
Stramon.		Orge	18
Verbafci	469		ibid.
Viperar.	496		ibid.
Vulp. fimpl.	147		ibid.
Oleum		Orgeate	20
Myrrh. per deliq.		Ορίγανος	285
Tartari per deliq.	103		ibid.
Infuf. Violarum	350		ibid.
Empyreumaticum	563		& 285
Piffinum	323	Creticum	285
Terebinthinæ	330	Dictamnus	265
Oleraceorum vires	6	Hifpanicum	286
Olibanum	318	Majorana	277
Sylveftre	325	Marum	286
Olivæ	107	Vulgare	285
Oliven	ibid.	Orpiment	497
Olives	ibid.	Ortie blanche	653
Ολόχυρον	209	Ortygometra	159
	& 45	"Optuk	150
"Ozuv Dos Egivos		Orvietanum	521
		*Oguça	ibid.
Ombre		Oryza	213
оµwin		Os Sepiæ	401
Ouqueides	422	de Sêche	ibid.
Ou Querion	98		144
. (221			

		10 . 00 .	
Ofeille		Panis Cibarius	ibid.
Offeocolla	604		ibid.
Osterlucey runde	200		105
Ofterluceywurzel lang	e ibid.		14
Oftrea	180		ibid.
Oftrutium	535		19
"Oougis	460	Nauticus	14
Otis	153	Secundarius	ibid.
'Oris	ibid.	Sordidus	ibid.
Otter	146	Squarrofus	14
Ours	ibid.	Papaver	515
Outarde	153		ibid.
Ovis	137		523
Οξαλίς	36	Sativum	ibid.
Oxalis Acetofella	\$31	Somniferum	ibid.
Οξύγαλα	134		461
Οξυλάπαθον		Paradies - Holz	306
Oxymel fcillitic.	229		268
fimpl.	and the second	Парнуоріна 10	
OEunupoinn		Paragon	362
Oxys		Paralyfis	346
Oxyfacch. vom.contra			160
Oye	148	Pareira prava	223
Tuuouge	1497	ranetaria	500
Jauvage	149	Parietaria	566
wether and an	149	Παρθένιου	220 & 565
P.	149	Παρθένιου Parus	220 & 565 158
P.	Printerte Printerte	Παρθένιου Parus Pas d'Ane	220 & 565 158 468
Ρ. Παχουτικά	595	Παρθένιον Parus Pas d'Ane Pasfer	220 & 565 158 468 153
Ρ. Παχουτικά Ρωοnia	\$95 \$14	Παρθένιον Parus Pas d'Ane Passer Passer Passer	220 & 565 158 468 153 58
P. Παχουτικά Pæonia Pain de Munition	595 514 14	Παρθένιου Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ	220 & 565 158 468 153 58 624
P. Παχουτικά Pæonia Pain de Munition Pourceau	595 514 14 633	Παρθένιου Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ Laxativæ	220 & 565 158 468 153 58 624 98
P. Παχουτικά Pæonia Pain de Munition Pourceau Recoupe	595 514 14 633 14	Παρθένιου Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ Laxativæ Majores	220 & 565 158 468 153 58 624 98 98
P. Παχουτικά Pæonia Pain de Munition Pourceau Recoupe Παιωνία	595 514 14 633 14 514	Παρθένιον Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ Laxativæ Majores Minores	220 & 565 158 468 153 58 624 98 98 98 98
P. Παχουτικά Pæonia Pain de Munition Pourceau Recoupe Παιωνία Panacea	595 514 14 633 14 514 7	Παρθένιου Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ Laxativæ Majores Minores Pafta Altheæ	220 & 565 158 468 153 58 624 98 98 98 97 452
P. Maxovrazá Pæonia Pain de Munition Pourceau Recoupe Mauwia Panacea Panacea Panac. Antimon.	595 514 14 633 14 514 7 589	Παρθένωου Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ Laxativæ Majores Minores Pafta Altheæ Epifpaft.	220 & 565 158 468 153 58 624 98 98 98 97 452 492
P. Maxovrixá Pæonia Pain de Munition Pourceau Recoupe Maiovía Panacea Panacea Panacea Panac. Antimon. Mercurii	595 514 14 633 14 514 7 589 594	Παρθένιου Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ Laxativæ Majores Minores Pafta Altheæ Epifpaft. Liquiritiæ	220 & 565 158 468 153 58 624 98 98 98 97 452 492 458
P. Maxovrazá Pæonia Pain de Munition Pourceau Recoupe Manacea Panacea Panacea Panacea Panacea Panacea Panacea Panacea Panacea	595 514 14 633 14 514 7 589 594 62	Παρθένωου Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ Laxativæ Majores Minores Pafta Altheæ Epifpaft. Liquiritiæ Paftel d'Ecarlatte	220 & 565 158 468 153 58 624 98 98 98 97 452 492 458 351
P. Maxovrixá Pæonia Pain de Munition Pourceau Recoupe Maiwvía Panacea Panacea Panac. Antimon. Mercurii Panais Panax quinquefol.	595 514 14 633 14 514 7 589 594 62 357	Παρθένιου Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ Laxativæ Majores Minores Pafta Altheæ Epifpaft. Liquiritiæ Paftel d'Ecarlatte Paftill. Mercurial,	220 & 565 158 468 153 58 624 98 98 98 97 452 492 458 351 594
P. Maxovrazá Pazonia Pain de Munition Pourceau Recoupe Maxovía Panacea	595 514 14 633 14 514 7 589 594 62 357 619	Παρθένωου Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ Laxativæ Majores Minores Pafta Altheæ Epifpaft. Liquiritiæ Paftel d'Ecarlatte Paftill. Mercurial, Paftinaca	220 & 565 158 468 153 58 624 98 98 98 98 97 452 492 458 351 594 62
P. Maxovrazá Pæonia Pain de Munition Pourceau Recoupe Mauovía Panacea Panacea Panacea Panac. Antimon. Mercurii Panais Panax quinquefol. Panchymagoga Panicum Miliac.	595 514 14 633 14 514 7 589 594 62 357 619 22	Παρθένωου Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ Laxativæ Majores Minores Pafta Altheæ Epifpaft. Liquiritiæ Paftel d'Ecarlatte Paftill. Mercurial. Paftinaca Opoponax	220 & 565 158 468 153 58 624 98 98 98 97 452 492 458 351 594 62 223
P. Maxovrazi Pæonia Pain de Munition Pourceau Recoupe Maxovía Panacea	595 514 14 633 14 514 7 589 594 62 357 619 22 14	Παρθένωον Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ Laxativæ Majores Minores Pafta Altheæ Epifpaft. Liquiritiæ Paftel d'Ecarlatte Paftill. Mercurial. Paftinaca Opoponax Paters	220 & 565 158 468 153 58 624 98 98 97 452 492 452 492 458 351 594 62 223 13
P. Maxovrazá Pazonia Pain de Munition Pourceau Recoupe Marovía Panacea Panac	595 514 14 633 14 514 7 589 594 62 357 619 22 14 ibid.	Παρθένωου Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ Laxativæ Majores Minores Pafta Altheæ Epifpaft. Liquiritiæ Paftel d'Ecarlatte Paftel d'Ecarlatte Paftill. Mercurial. Paftinaca Opoponax Paters Pates d'amandes	220 & 565 158 468 153 58 624 98 98 97 452 492 458 351 594 62 223 13 113
P. Maxovrind Paonia Pain de Munition Pourceau Recoupe Maiovía Panace	595 514 14 633 14 514 7 589 594 62 357 619 22 14 ibid. ibid.	Παρθένωον Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ Laxativæ Majores Minores Pafta Altheæ Epifpaft. Liquiritiæ Paftel d'Ecarlatte Paftill. Mercurial. Paftinaca Opoponax Paters Pates d'amandes Patiene	220 & 565 158 468 153 58 624 98 98 97 452 492 452 492 458 351 594 62 223 13 113 564
P. Maxovrazá Pazonia Pain de Munition Pourceau Recoupe Marovía Panacea Panac	595 514 14 633 14 514 7 589 594 62 357 619 22 14 ibid. ibid.	Παρθένωου Parus Pas d'Ane Paffer Pafferage Paffulæ Laxativæ Majores Minores Pafta Altheæ Epifpaft. Liquiritiæ Paftel d'Ecarlatte Paftel d'Ecarlatte Paftill. Mercurial. Paftinaca Opoponax Paters Pates d'amandes	220 & 565 158 468 153 58 624 98 98 97 452 492 458 351 594 62 223 13 113

Aaa4

Pavot	CTC.	Pestilenzwurzel	224
Pech		Pefinagel	62
Pechblende	-	Πετασίτης	224
Peches		Petafites	ibid.
Pedro del Porco		Peterfilien	62
Peintade		Petit Houx	571
Penæa Sarcocolla	463		127
Πεντάζυλου		Petite Grive	155
Pentaphyllum ubibiod		Petite Sarcelle	161
Πέσερι		Petroleum	336
Pepo	and the second se	Petromyzon	171
Perca		Πετεοσέλινον	sh- 62
Perce - feuille		Petrofelinum	ibid.
Perce-mouffe		Peucedanum	567
	8 167		579
Percis		Πευκέδανον	567
IIéedig 51011-70	154	Peziza	376
Perdix		Pfaff	162
Græca	154	Pfaffenhütel	85
Gryfea		Pfaffenræhrlein	70
Rubra		Pfeffer	286
Perdrix	ibid.	Pfefferkraut	. doon't 58
Perce evant s	170	Pfenning Erzt	403
Perfoliata	388	Pfarsching	93
Hegisegod	149	nackete	ibid.
Negisegewu		Pfisterlein	106
Négun	167	Pflaumen	95
Perlæ	362	Pfrimmen]	652
Perthuha		Φάβαι	29
Perlen	143	Φάκοι	30
Perles à l'Once		Φαλαρίς	162
Perles de compte		Phallus Efculentus	56
Perlures		Pharmaca	Mindel 2
Perfica Mala		Pagmana DL C 1	2 & 607
Perficæ Nuces		Phafeoli	31
Perficaria		Φασίολοι	ibid.
Perfil		Φασιανός	155
Perfonata,		Phafianus	ibid.
Peruvianische Giftwurz	er 258	Phlama Cadrinary	265
Peruvianischer Balfam	320	Phlegma Cedrineum	322
Peruv. Cortex	252	Phlegmagoga	619
Bernenche	and the second sec	Φλογισθόμ	\$45
Pervenche Pos Cati		Φλόμος	468
Pes Cati	376	Contract and Contraction	

Diver ibid	1	Cochiæ 2 Lioni	ibid.
Phoenix supported 84		de Cynogloff. 52	and the second se
Φοινιγμοί 47	1		um
Φοίνικες 8		Croco & Caft	
Φοινοβαλανοι ibid		EMANUELIS	629
Φοινοκοβάλανοι 42	1. 2	Fœtid. Major.	ibid.
Φοίνικος έλάτης ! II		Francofurtanæ	ibid.
Φίλυρα 34	1 P. P. P	de Hiera c. Agar	and the second se
Phyllanthus Emblica 42	a contract of the second	Hydropicæ Boni	
Φυλίτις 38	Distance in the second second	Lucis maj.	630
Φύλου Ινδικόν 27	2 4 8 A A A A A A	Martiales more	
Phyfalis Alkekengi 65		Maftich. de ABA	
Phyfeter Macrocephal. 47	States and the second	MATTHÆI	521
Physiologiæ ufus in Mat.	ande	c. Mercurio vivo	and the second se
	1.2.2	dulo	
Phytheuma Spicat. 6	State of the second	Polychr.	630
Φεύνος 17	and the second second	Balfam.	ibid.
Πιάρ 12	10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	RUDII	ibid.
Pickling 17	and the second second	RUFI vor	
Pied d'Alouette 21		de Sagapeno	326
Pied de Chat		Sapon.	108
Pied de Lion 37	and the second second	Scillit. dinini om	230
de Loup 38	and the second se	Sine quibus	630
Pierre de Ponce 40	and the second second		21 & 630
Pigeon 14	and the second	C i ·	630
Pignons 12	the second se	SFARCKEY	521
d'Indes 48	and the second second	Stomachicæ	630
Hingis subourd 5	Contract of the second		27 & 521
Pierrures 14			42 & 630
Pilæ marinæ 56		Tartareæ	198
Pilulæ ad omn. morb. ca-		de Terebinthina	331
	s Pilof		376
Aloëtic. emollient. 62			63
Aloëphanginæ ibio			oid & 568
de Ammoniaco 198 & 62			239
Anglicæ 62		Saxifrag.	568
de Aquileg. 45	Pim	renelle	63
Aureæ 62	Pinea	e Nuces	121
Aperientes STAHL			489
		edinum propriet	ates 7
Balfamicæ BECCH 63	Pinie	en midth	
STAHL, ibit	Pinus	Lariv	29 & 623
Cachectica 406 & 62	9 bidi	Picea	329
Cephal. ibio	. bieł	Pinea Pinea I	121
Chalybeatæ 629 & 400		Aaagoid	
		a second s	

Pinus Liquid. S. navat.	322	Plumbum Spathofum	439
Strobili	321		ibid.
Sutoria	323	Uftum	444
Sylveftris	321		439
חוֹסא		Pluvialis	158
Πήγανον	291	Pluvier dore	ibid.
Piper	286	Poires	108
Album	ibid.	Poirée	44
Hufpan f. Ind.	287	Pois solding and	32
Longum	286		28
Nigrum	ibid.	Goulus	32
Piquette	101	Poivre	286
Pifa	32		261
Hira origination		Poix graffe	324
Hissa	322	de Rourgogne	ibid.
Πισσέλαιον	323		325
Πισσάνθος		Polenta	19
Πίττα			6 289
Πισάφαλτον		Πολιον	288
Pifces		Polium	ibid.
Fluviatiles norm	164		289
Limo inhab.	169		288
Marini	172	Pollen	27
Piffenlit	70	Polygala Senega	581
Piftaches		Πολύγονον	390
Piltacien Dia sin Nusar			& 390
Piftaciæ Nuces	ibid.		\$40
Pittacia Lentifc.	316		390
Terebinthus	329		416
Πισλάχια	121		540
Πίτυρα	28		ibid.
Pivoine		Πολυπυδιον	569
Πλάσλη		Polypodium	ibid.
Plantago	388 fq.	Filix mas	378
Coronopus Pfyllium	61	Fragile	372
Plantain		Polyrrhiza	201
Plomb		Πολύτριχου	371
A CALL AND		Polytricum Commune	372
Plumbago Plumbum	ibid.	Polytropha	10
Album	the second s	Poma	71
Bafalticum	409	Terræ	33
Cryftallifatum		Pomatium Fl Aurant	77
Pauperum	ibid. ibid.	Fl. Aurant. Fl. Lavend	18
Rhombeum		FI. Lavenu	275
monuteum	439	The second	

Pomeranzen	70	Prunus Spinofa	414
Pomiferarum proprietates		Ya's	159
Pomum		Pfeudacorus	270
Pomme		Pfeudo Adamantes	367
Epineufe		Pfidium	90
Pomme de Terre		YIMU SION	440
Pompejana Braff.		¥ 12 10 10	636
ΠόμΦολυξ		Pfyllium	636
Populi Oculi		Ptarmica 453 d	
Populus' arealooo		Πτερίς 473	378
balfamifera	228	Πτισσάνης χυλός	19
nigra		Πτιστάνη	18
Porcus			& 18
Porreau	64		
Porrum	ibid.		19
Portulaca		Pulegium	289
Potentilla Anferina		Pulmonaire	391
Reptans	ibid.		
Poterium Sanguiforba		Pulmonaria	
Poulardes	152		
Poule	151	· · · ·	
Poule d'Eau			and the second se
Poulets	102	Pulp. Caff.	147 622
Pouliot		Tamarind.	625
Pourpier noise		Pultic. de Manna	624
Pouffins		de Tragac.	
Præcipitantia		Pulvis abforbens WEDEL	522
Præneftinæ nuces		ad omnes ventric.	
Πρασιου 210/101		affect. mirabilis	479
Πράσον		Anodyn. LUDOV.	522
Prêle	418		528
Primula Veris	346		388
Πρόβατον	137		547
Propotis and the second	333		•479
Πεότεοωον	99		1 4/9
TIgou was	95	Zellenf.	258
	& 624		406
Laxativa	95	Cervinus	144
Prunella	390		407
Prunes	95	G 1.10	253
Prunus Armeniaca	79		259
Cerafus	73		210
Domefiica	95		646
Infitiya	ibid.	and the second	ibid.
all and a start a start a			

Pulvis Diaireos denied at	271	Quadrupeda Fera	140
e Chelis cancr.	179	Quarz. Cryftall. Quaffia Dioica	367
ore conine	Pfeud	Quaffia	225
compl.	179	Dioica	227
Eryfipeladotes My	N- 9	Quaffiæ Lign	224
SICHT Card	13	Queckfilber	590
Jefuit.	253	Quellwaffer Inter and and guendel	181
Lugos. Card.	ibid.	Quendel	297
and & Santal.	393	Quercus Robur	421
872 Scill. composit.	230	coccigera	128010351
Sternuc. Sternuc	539	Querquedula	191
Stomach. BIRCHM.	479	Queue de Cheval	418
Strumal	\$86	Pourceau	200000
Sympathet Temperans Viperar. Pumex Vulcani	448	Quinquefolium	423
Temperans AD	547	Quinte - feuille	ibid.
Viperar.	496	Quinquina	252
Pumex sabato.	409	Quitten sainolaA sl	104
Vulcani	ibid.	Quitten-Lattwerg	10.5
Funica Granarus	00		111 1 2 3 1 4 P 2 P 4
Purgantia alongera	618	FTT PR 23	Poular
Purgierkærner 479	\$ 488	Pri . Cremination	Shud 2 Dulle
Pusmoventia	449	Chartz Januaran	s should be
Purgantia Purgierkærner Pusmoventia Похумляд	412	Pa	636
Pyra terræ Nugn	34	Radices	Soilug3
Pyra terræ Nugh Pyrethrum Nugegeov	211	Salep	464
Pyrethrum	485	Radicula	67
Huge 9 gow Pyri	ibid.	Radis	67
Pyri Graney Estato Da	108	Radix ari c. aceto præp.	479
Pyrites Crystall. fig. ferri	402	dulcis	
443 COURS AND A COURS	× 446	Rahm	127
Cupri		Raifort	42
Albus Albus		Raiponce 2119	67
Auripigmentum	497	Raifin	97
Pyrola	392	Raifins aux Rubis	98
Hugos Anna Anna Anna A	26		97
Toimnviaios	ibid.	de Damas	98
σιτάνιος	1.	Ralius	158
Pyrus Communis	109	Aquaticus	ibid.
Cydonia	105	Porzana	ibid.
A THE COLOR OF MULTICAL		Rana	174
Q.	-	Bufo	175
and the second second		Efculenta	174
Quadrupeda	125	Temporaria	ibid.
Cicura	ibid.!	Ranunculus Ficaria	558

Rapa anduravita	65	Refina Coloc.	610
Raphanica	67		632
'Ραφανίς	ibid.		
ayeia	24		643
. Ραφανός	67		316
Rapum	65	Scammon.	325
Rapunculus	67	Turpethi	646
Rapunzel	ibid.		648 306
Rasle d' Eau	158	Vulgaris	324
de Genet		- 10	& 328
Rafura Cornu Cervi	143	TO C C	
Eboris	470		619
Rataffia	4/0	Animalia	
	867	Foffilia	583
Rauken 481			
Rauschgelb		Revellentia	67 476
Raute		Rhabarbar.	636
Rebhuhn	154	Monach.	638
Rebkreffen		Toftum	639
Rebs 66 Pa	2050	Rhamnus Cathart.	640
Recocta	134	The second	613
Refrigerantia	449	Zyziphus	19
Regenwaffer	182		638
Regenwürmer	527	Mofcov.	637
Regiæ Nuces		Rheinfarn	230
Regliffe 456 @		Rheum palmat.	638
Regolítia	456	Rhapontic.	637
Reg. Antim		Rhodium L.	347
Mart		Rhodomel PALLAD.	438
Medic.		Rhus	430
Reh	140	c · ·	430
Rehkitzlein	141	Copallinum	313.
Reib	454	Ribes	78
Reiger	161		ibid.
Reis Reidella	23	Rubes Rubrum	78
Reisgerst	18	Uva crifpa	104
Relaxantla	449	Ricinus Communis	479
Renard	147	Rinde	14
Renouée	390	Ringelblume	203
Repellentia 4188	2 476	Phoy	636
Requies NICOLAI 521 C	\$ \$22	Pnoivn 324	& 328
Refinæ 1948	2305	Ris	23
Refina Alba	324	Ritterspærnlein	211
Aloes might	307	Rob Corn.	104

Rob Cydon.	105	Sativa rubra	424
Cynosbat.	.429	Rofa Villofa	425
Ebuli	578	Roschgewächs	364
Jugland	121	Rofe	143
Juniperi baccar.	273	Rofen bleiche	154
Moror.	93	Rofenholz	347
Ribefior.		Rofe tremiere	419
Rub. Id.		Roses de Provins	423
Sambuci		Rofinlein	97
de Spin. Cerv.		Rofmarin	290
Uvarum	and the second se	Ροσμάρινον	ibid.
Roborantia		Rofmarinus	ibid.
Adstringentia		Rofshub	468
Amara		Rofsfchwamme	585
Animalia		Rothbeinel	160
Foffilia		Rother Steinbruch	266
Specifica		Rothgülden - Erzt	364
Subaditring.		Rottan	367
Rocca		Rottel	165
Rocambole		Rotulæ contra Vermes	594
Rochetta Alexandrina	552	Diaireos	271
Rodentia	475		76
Podov	423	man. Chrift.	427
Ræmifche Hafelnüffe	and the second second	Rouir	454
Römischer Kümmel	and the second second	Rübe	65 ihid
Mangold		Rüben franzöfische	ibid.
Ræfen Röthe		Rüben gelbe	53 66
	509	Rübsaamen Rubefacientia	
Roggen Rohrdommel		Rubeta	475
Rohrhühnlein		Rubi	175 96
Roi des Cailles		Rubia	569
Pon	90		570
Romarin .		Rubi mora	96
		Rubus Cæfius	ibid.
Ros Solis	486	Fruticofus	ibid.
Rofa	423	Idæus	ibid.
Alba		Rue	291
Canina		Ruffolk	171
Centifolia		Rum	573
Damafcena		Rumex	564
Gallica	424	Acetofæ	37
Pallida	ibid.	Acutus	564
Rubra	423	Alpin.	638

• • 14

		*C.1 A · · ·	1 martin
Rumex Aquat. 564	& 637	Sal Ammoniac depur.	547
Obtulifol.	637		\$49
	& 617		205
Sanguineus	564	and the second	206
Ruprechtsauer Kirschen		G	\$49
Puttina	530		361
'Pžs	430		551
Rufcus	\$71	Depurat.	ibid.
Rusicht Erzt	364		ibid.
Ruta Graveolens	291	Fabarum	30
Muraria	371	Febrifug	551
Puarina	530		550
Puth	291	Foffil.	ibid.
1 10 1 1 2 3 B	ANALAN	Gemmæ	ibid.
S.	10 133	Indus	571
the is a second	-series in	Lumbr. Volat.	528
Saane	127	Marinum	\$50
Saatperlen	362	Matris perlar.	363
Sabina	292	Mirab.	551
Sabadilli femen	486	Ocui. cancr.	178
Saccharum	571	Oleof. SYLV.	549
Candum	574	Panis Arab.	549
Hordei	20	Perla	363
Lactis	127	Perfic.	540
Officin,	571	Polychreft.	\$47
Perlatum	427	SEIGNET	TE
Rofat. 427	& 428	103	& \$ \$ 3
Rofatum	427	Prunellæ	547
Saturni	442	SaccuharumPenidiu	m 574
Thomæ	\$72	Clarificatur	n ibid.
Vermifug.	594	Sedat. HOMB.	543
Safflor	631	Tamarife.	210
Safran	260	Tartari .	103
Safran batard	631	Volat.	ibid
Saftgrün	64c	Vitrioli	448
Σαγάπηνου	325	Viper.	496
Sagapenum	325	Vol. Ammoniac.	549
Sago	35	Volat. Aromat.	549
Sain - bois	483	Oleof.	ibid.
Saindoux		Salbey	293
Σάκχαρ		Salep. Rad.	464
Σάκχαξον	ibid.	Salicornia	552
Sal Abfynth.		Salinæ	550
Acetof.		Salivantia	606
A COLOR	>>+	WHIT F WITCH	000

Salm	168	Sapo	goi a louit
Salmo	ibid.		331
Fario		Saponaria	578
Salar.	168	Sapor Medicam.	quid indi-
Thymallus	ibid.	and managerice in	cat 5
Trutta	169	Sarcelle	161
Salpeter	543	Sarcocolla	578
Salpetre	ibid.	Sarcotica	413
de Houffage	544	Sardelle	174
Salforum vires	5	Sardina	ibid.
Salfaparilla	575	Sardine	ibid.
Salfifi		Σαερδιον	369
Salfola	\$52		ibid.
Salvia	293	Sardus	368 8 369
Sambucus		Sariette 2	295
Sammet - Erzt		Σαεκοκόλλη	463
Edur vxov		Sarrafin	17
Sanctum		Saffafras Lign.	294
Sandarax f. Sandaracha		Satureja	295
Gummi		Satyrium	464
Sandracha		Saubohnen	29
Σανδράχη	497	a	36
Σανδύξη		Sauerklee	53E
Sang de Dracon	429	Sauerwaffer	184
Sanglier	140	Sauge	293
Sandstein	319	Saumon	168
Sanguinaria	390	Saumonnaux	168
Sanguinalis	390	Saurauch	72
Sanguine	403	Σαῦρος	472
Sanguis Draconis	429	Sauve vie	375
Hirci infpiff.		Saxifraga	565 & 579
Tauri Tauri	127	Scabiofa	394
Sanguiforba	63	Scaglia	434
Sanicula	392	Scajola	ibid.
Santalum		Scammoneum	644
Album and	ibid.	Scandix Cerefolium	m 49
Citrinum		Scarificationes	476
Rubrum		Scariola	55
Santolina Chamæcypar.	236	Schaaf	200. 137
Santonic. fem.	209	Schænoprafum	64
Sapa		Schafgarben	485
Σασφειρος		Schafkunzen	425
Sapphirus 368		Schalotten	38
	to Figures	The sales and the	Schellack

Schellack	400	Scincus	22.4
Schieferweis		Scolopax Rufficola	\$41
Schierling	608	Scolopendre	159
	2 8 22	Scolopendrium	383 ibids
geschrotene		Scordium	226 8 520
Schildkröte		Scorodoprafum alliun	
21505 C	124	Scorpius	493
Schiftum fiffile	434	Scorzonerà	68
Schlaffapfel		Scorzoneré	ibida
Schlagkrautlein		Scrofa	138
Schlangenholz		Scrophularia	\$79
Schlangemourzel		Seeblum	462
Schlegel		Sebesten	465
Schlehen		Sebum	127
Schley		Seeale	24
Schlug	339	2	26
Schlüffelblumen	346		ibid.
Schneck		Sedum	\$8t
Schneegans			182 8 184
Schneewaffer	183	Seichblumen	70.
Schnittlauch -	64	Seiffenkraut	\$78
Schnotfisch	. 166	Selenites	603
Zxolve avyos	296	Selenoides Vet.	46
Schoten		Σέλινον	5 ani: 40
Schællkraut	157	Semence de Chasse	taupe 479
Schænanthus Aëtii	290	de Perles	362
Shoerl		Semmel	27
Schotten	127	Semen Ricini	479
Schwalhen	497	Contra	209
Schwaden		Σεμίδαλις	27
Schwamme		Semoulles	adie 13
Schwalbe	and the second sec	Semoules	21 8 27
Schwalbenwurzel		Sempervivum	\$80
Shwamm		Senecka Rad.	\$81
Schwarze Brustbeeren	and the second se	Senf	487
Schwarzer Kümmel	284		\$13
Schwarze Nieswurzel		Sepiæ testum	401
Schmarzwurz		Sepium	ibid.
Schwefel		Seran	454
Schwein		Zépis nuepos	55
Schweinbrod		Serapin Gummi	325
Schwindelbeeren		Serpentaria Virginian	
Schwitzbader		Serpolet	297
Scilla	328	Serpyllum Bbb	\$97
		1000	

Bbb

Serfifi	70	Σιτίον	
Serum Lactis		Sium Ninfi	DI Much
dulce	132		356
Σέσελι		Σκαμμονία	69
Sefeli		Σκίγκος	644
Setacea		Drima	541
Sevenbaum		Σκοροδολάσαρου	228
Sevum Hircin		Σκολωπένδειον	505
Σήπιον		Σκόεδιον	383
		Σπόρεδον	226
Sialogoga Σίδα		Σκόρπιος	38
Zioneitic		Subinn piza	493
Diongos		Σκυθικόν ξύλον	496
Siefalbum	and the second se		ibid.
		Σμάγαγδος Smaragdus	369
Siegwurzel Sigillum SALOMONIS		Σμέγματα	368 & 369
		Smilax China	530
Signaturarum theoria			558
Dinuos Silhar	13 363		559
Silber		Salfaparilla Smiris	575
Silberglatt			403
Silbermulm		Smyrgel	ibid.
Silberschwærze Silex carneolus		Suugra	220
		Enviguion Soda	535
Siliginis clavi		Solanum Nigrum	552
Siliquæ dulc es	ibid	Tuberofum	523
græcæ Simarouba		Solidago Virgaurea Solutio Cancror. ocul	396
Similago	27 & 487		361
Sinapi 48ª alba		Matris perlar. Sommergerst	
		Son	18
nigra Sinau		Sonnenthau	12
Σίνησι		Sopientia	486
	396		502
Sinngrün Zíov	60	Vegetabilia	529
Enstrund	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sorba	503
	4/0	Sorbes	109
Sirigata Gamber.		Sorbus Domeftica	ibid.
		Sory	ibid.
Diraçov Sifarum	ibid	Souchet	446
Sifer		Soucy	264
Sifon Ammi		Soude de Barille	203
Sifymbrium Naft. aquat,		Soufre	952
Dirymonum Mais. ayuaq	001	ougre	. 344

.

Sparadrapus	444	ΣΦακός	293
Spargel		Σφονδύλιου	453
Spargelkohl		Spiauter	410
Spartium Scoparia		Spica	274
Spatum		Spicæ Allii	38
Spathum Plumbi		Spica Celtica	299
Specul.	603		ibid.
Spatze	193	Nardi 274 &	
Species Diaboracis		Spick	274
Diacinamomi	347	Spiese v. Hirsch	141
Diacretæ	602	Spiesglas	587
Diajalappæ		spieshir fch	142
Diajaiappe			640
Diamargarit. calid.		Spina Cervina	69
			266
		Spiræa Filipendula	196
de Hyacintho		Spiritus Abfynth.	436
de Gummis frigid. Dianifi	ib.	Aluminis Ammon. Gummi	198
Dianthos	240	Sal. Anifat	
	291		
Diatrag. frig.	467	Aromat cum Ca	
Diaturbith.	648		
pro decocto ad		ce viv. cum Sal	549
Gangr.	444		
pro ptifana Reg.	647		t. 549 ibid.
pro vino Abfynth.	197	Vinof.	ibiu.
Hippocr.	258	Volatil.	ibid.
Sant.	393	urinof.	
Tabac. pro fumo	1	Angelic.	532
CAMER.	539	Antifcorb.	448
Tartar.pharyng.	103	Anifi	240
Specifica	8	Aperitiv.	448
Antif. CROLLII	598	Arthr.	539
Jalappin.	643	Aurant.	110
Purgantia	619	Fk.	81
Roborantia	354	Balfami Peruv.	321
Speck	139	Bezoardic. Bussi.	549
Spelt	27	Caftor.	527
Sperling	153	Ceraforum	82
Sperma Ceti	473	Citri Cort.	76
Ranarum	175	Cochlear.	533
	ibid.	Convall.	277
Speyerlinge	109	Cornu Cervi ext.	144
Σφαίραι Θαλασσίαι	567	Spanferklein	138
		The second stands	

Bbb 2

Spiritus Cydon.	105	Viperar.	496
Ebuli	578	Vitrioli coagul.	
Formicar.	493	Phil.	552
Fragor.	90	TT 1	
Galban.		Spitzwegerich	389
Guajac,		Σωλάχνον Identifier	386
Junip.e baccis		Σπογγιαί	585
Lavend.		Sarryol	ibid.
Liquiritiæ		Swovdungs sigmade I	52
Lumbr.		Spongiæ	585
Maftich.	318		\$87
Matricar.	220	Spodium	470
Mellis		Spongiola	425
Meliff.	280	Spongites	586
Menth.		Springkærner	489
Myrrhæ		Sprædes Glas - Erzt	354
Nitri		Spires	163
Antucolic.		Spuma Argenti	441
dulcis	ibid.	Lupi	403
Roris Mar.		Squamma æris	499
Rofar.	428	Şquilla dida di la	228
Rub. Id.		Squinanthos cool out	396
Salis		Staar	159
Sal. Ammon. At			235
Ar	0-	ZTURTH COM COM	221
mat,		Stahlerzt	403
Sal. Ammon. c. c			4 & 600
viva observ	ibid.	Stange	143
	Sale	Stannum	409
Tartari	ibid.	Amorphum	ibid.
Salis coagul.	551	Cryftallinum	ibid.
dulc.	552	Spatofum	ibid.
Salviæ	294	Staphis agria	488
Samb. Baccar,		Σταφίς άγεία	ibid.
Florum		Σταφυλή	97
Serpilli	298	äex8	433
Theriacalis		Σταθυλίγος	62
	nph, ib.	270295	274
Thymi	301	vagos Stachanfel	299
Trifol.		Stechapfel	524
Veneris		Steckrüben	65
Vini		Stervatina Steinheer	412
Camphorat Redific		Steinheer Steinhei Per	433
Rectific.		Steinbeisser	170
Tartarif.	ibid.		

Steinbrech	579	Sturnus 159
Steingallel	160	Subadítringentia 371
Steinkrebs	177	Subjectum Mat. Med. 1
Steinkreffen		Subulo 142
Steinleber - Kraut	381	Succifa 394
ΣτελεΦέρος		Succinum 338
Στέμζυλα		Succus Acaciæ 413
Stendelwurzel	464	
Stercus Caninum	136	
Suillum	139	
Stern - Anis	240	and the second
Sterna Nigra	163	Sucre
- Στίβι	587	
Stibium		Sudorifera 605
Striatum		Süsholz 456
Cryftallifatum	ibid.	Sulphur stillatitium 342
Rubrum	ibid.	
Στιχάς, Στοιχάς	300	Sumach 430
Stichling	169	Sumpfwaffer 3000 182
Stiere	125	Suppurantia 449
Στίμμι	587	Suppolitorium Aloës 630
Stincus	541	Sureau 576
Stirium	603	Sus 138
Stockfisch		Συκάμινα 93
Stocklack		Σύκη 86
Stoechas		Σų̃κον ibid.
Stoer		Sympatetica Med. 8
Stomachica		Σύμφυτον 466
		Symphicum ibid.
Drugas	ibid.	Synople 403
Stramonium	524	Syrop de Sucre 572
Στροβιλα		Syrupus Abfynth, compof. 196
Strobili Lupuli	59	fimpl. 196
Strongylum	434	ex fucco Acetofæ 38
Eres Dos	123	
Strychnos Colubrina	210	Acetofit. citri 76
Στρίχνος κηπαΐος	523	
μανικός	507	
Strychnos Nux vomica	232	Alexandr. 427
Stuckelrüben	65	
Stufer2t Stunka	403	fimpl. ibid.
Stuphæ Στυπτηρία	190	de Ammon. 198
Στυστικά	433	
we var texte	412	
		Bbb 3

Syrupus	Artemif. fimpl.	ibid.	Syrupus	Hed. terreftr.	38x
aftert	Aurant.	110		Hordeatus	20
	Fl,	81		Hyperic.	383
~	Acaciæ	415	in the	Hyflopi compof.	270
ne	Balfam,	321	and the state of the		ibid.
	Beccabung. fucc	isss	1 Contract	de Jujubis	92
	Bellid.	377	Contraction of the	de Karabe	522
	Berber.	73	No. and a	Lavendul.	274
12 W	Borrag.	355		Limonum	76
	Irrafficæ	47	E.C.	Liquir.	457
turar	Bryon.	612	all all	Longæ Vitæ	565
	Bugloff.	356		Malorum	77
	de Calabasse	85		Compoli	and the second
100	Camom.	209	38 - 1	SAPOR Regis	
24	Capill. ven.	373		Hellebo	
	comp.		all mi	de Manna	624
ele in	Card. Bened.	205		Maftych.	318
Sile	Cafcarill.	250		Meliffæ	280
	Cent. min.	206	9.0	Menthæ	284
	Ceraforum	74		Millefol.	385
	Chinæ	256		Moror.	93
077	Cichor. compof.		1	a Mufco querno.	388
	c. Rhab.	639		Myrti	284
13.000	fimpl. BAU Citri Cortic.	76		Myrtill.	107
	e toto	ibid.		Myrtinus compo Napi	
	Cochlear.	533		e fucco Nafturtii	67
	Contrajervæ	259		Nuciftæ	283
	compof.	ibid.	Caler 1	Nicot. fimpl.	539
	Cinamom		Sel.	OUERCET.	
	Corall.	361		Nymph.	462
	Croci	261		Oxal.	531
Sal lin	e fucco Cucurbi		1.16 * 1510.1	Pæoniæ	515
22 31415	Cydon.	105	1.1.1.1.1.1	Papav.	520
	Cynogloff.	455	A PERSONAL	albi	519
	Diacod.	\$20	14 312 1 1 52	Plantag.	389
sos in	Crocat,	ibid.	141 10 3	Perfic. FL	95
	Domeft.	640	and the second	Polygon	390
TRA.	Emet.	589		Portulacæ	65
	de Eryf. fimpl.	534	and the second se	de Prasio	220
	LOBELII	ibid.	12 M 1.	de Rhabarb.	639
CBEF Y	Fragorum	90	AL SULLEY	Ribes	78
	Fumar.	216	Provide State	Roris folis comp.	
F2 - 100 -	Granat.	91		fimpl.	1010.

Comment	P . C		Teaunah	una a Catha
Syrupus e	Rofis pallidis		Tacumachaca	327
201	pallidis		Tascum Nephrit.	656
De De	nna & Agaric.			624
	ficcis		Tamaris	230
8741	folutiv.	and the second se	Tamarifcus	ibid.
	ofat.		Tamarisken	ibid.
	ub. Id.	96	and the second	ibid.
	ccharin.		Tamenstein	339
	flafr.		Tanacetum	230
	illiticus		Tanais	ibid.
	ordii	and the second se	Taraxacum	70
	mpervivi		Tarette	380
	lphuris		Tartarus Chalyb.	103 & 407
Sy	mphyt.	467		103 & 589
0.01	fimpl.			103
	uffilag.	468	Vitriolatus	448
	e Testud.		Tartufflen	34
	eronic.		Taube	419
S.S. V. CONV.	iolar.		Taubenkropf	215
. aren you		1. ib.	Tauche	172
	unicæ	349	Tauch - Entlein	162
Vi	perar.	496	Taureaux	129
2-10	Campa C		Tavyos	ibid.
	1 - C		Taurus	ibid.
a service state	T.		Taufend-Gulden-Bl	umen 205
OT OUT	A COUNTY		Taxus	146
Tabacum	Coralle	537		172
Tabellæ de			Tela GUALTIERI	444
. Lacit : 1 June	f. igne	452	Templinum	323
	chicæ	457	Terebinthina	328
	ancr. ocul.	179	TEPMINSin	ibid.
	halybe	407	Terra Arsenicalis	497
	ra Verm.	210		103
Cora		361	Gypf. pulver.	603
Diair	eos	271	Japonica	217
	Margar.	363	Lemnia	436
de I	Matre perlar.	ibid.	Merita	263
Man	us Ch.	427		439
Pæor	n.	515	Sigillata	437
de R	habarb.	639	Silefiaca	437
Strui	mal.	\$87		500
Sym		467	Vitrioli dulcis	448
Terr	æ Catech.	118		446
Tag- und N	lacht-Kraut	\$66	Teftaceorum agendi	
State Aller	STATISTICS	181	Bbb 4	

Teftæ ovorum	153	Thymus	Serpillum = 1012 297
Teltudo		OUMartos	
ad Tetradynamiam per	ti-	Θυμίαμα	a mmorranov 3 197
nentium effectus		Ounon	300
Tetrao Bonafia	ISI	Tiglia G	rana 488
Coturnix		Tinca	172 Infort
Perdix	154	Tincar	542
Rufa	ibid.	Tinctura	
or Tetrix	156	32.	Antim. acr. 589
Vrogallus	ibid.	14.4	Tartar. ibid.
Teucrium Chamædris	205	22	Antiphthifica 444
Chamæp.	209	131 66	Aquileg. 452
Ton & for Creticum	289	12	Afari 611
car to tot Polium al	ibid.	2 46	Aurant. Fl. 81
Scordium	226	hidi .lgm	Auri 366
Tcufels Abbifs	394	104	Balf. Peruv. albi 313
Teufelsdreck	595	77	Bellidis 377
Τευτλον	44	28	Benzoes 309
QINEYINGA GUARD	ibid.	128	Bezoard LUDOV. 522
Thapfus Barbatus	468	di .veun	Benzoard, MICH. ib,
Ox orat	111	本をいうんい	Canthar. 492
Thauwaffer	183	102	Caftor. \$27
Thea	430		Chinæ 256
Bill Viridis	ibid.	1.75.50	TALBOT ibid.
Boe	ibid.	Dates in	Cinam. 258
Theer	322	1 States	Contrajervæ 259
gelber	323	13	Corall. 361
Theobroma Cacao	114	129 10 10	Croci 261
Theriaca ANDROM. Cœleftis	s22 ibid.	100 10 21	Vinofa ibid.
	CONTRACTOR OF AN ADDRESS	129	G. Laccæ 401 Hæmatitæ 407
	& 187		
Θείqu	342		Hellebor. comp. 635 Hyperic. 383
Θηλεία	200		
Θμελαία	483		Junip. baccar. 274 Lavend. 275
Θύμβεα Θειδακίνη	295	3.2 10	Lavend. 275 Martis adftringens
Opioaziva Opioaž	ibid,	hills and	406 & 407
Ogioaz Ogiuma	1	a pro	aperiens 407
Thus	318		Çydoniat. ib.
Orobæum	ibid.		Pomata ibid.
Thym	300	20-1-	Cærulea ib.
Thymallus	168	and in the	Hellebor407& 635
Thymian	300	TT .	Melampod. 635
Thymus Vulg.	ibid.	to me	Metall. 589
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

The second s	81 . W.	Manual C.	100000
Tinctura Myrrhæ	222	Tragulus Moschus	ibiđ.
		Trainalle	390
		Trapa	122
Papav.	630	Trappe	153
Propr. Myns.		Traube	
			97 Thid
Rhabarb.		Trauben Spanische	ibid.
compof.			6 & 412
Ror. Mar.		Treberen	99
Rofarum		Tremella auricula	376
Rutæ		Teiboros Evudeos	122
Salviæ	294	Tribulus Aquat.	ibid.
Scordii	226	Terxas	156
- Stomach. 407 &	\$49	Trichechus Manatus	471
Sulphuris		Terxias	174
Tartari		Trichites	434
acris			1 & 372
Vitrioli martis		Trichomanes	
			372
Tiravos		Trifol, fibrin.	231
Titia	348	Melilotus	278
Типтина	530	Trigonella fœnugræc.	456
Tobac	537	Tringa Vanellus	160
Tolctanum Balfamum	331	Trippes	126
Tolvifera	332	Triticum	26
Tonnenstein	339	Æftivum	ibid.
Tonica	194	Hybernum	27
Tophi 184&		Repens	561
Topinambours	33	Spelta	27
Tormentilla	432	Trimeftre	26
Tordylium	208	Trochifci Actes	\$78
Tortue	176		641
Totanus ruber	160	Albi	
a provide a second of the second s			444
la Touche	189		2 & 650
Tourdelle, munda ?	155		534
Torquette	563		
Tearargeda	467		
Tragant	bid.		1 & 522
Tragea granor, Actes	578	Efchar.	595
Ophthalm.	214		
Tragemata	85	ex nitro & Cini	nab. \$47
Tragende Kühe	125	Hermet.	594
Τεαγόπωγου	70	de Myrrha	222
	bid.	Scillitici	230
	136	Terræ Catech.	
Traque internet	bid.		
	A STATISTICS	and There	496
Tragulus Moschif.	352		

The Contraction of Station		HInguant	E. Course	niT.
Troefne		Unguent.	ruicum	445
Tewy Asounting	221	and the second	Helennii	535
Tropæolum Minus	61	A REAL PROPERTY AND A REAL	ad Fiff. labior.	99
TeoOn	10	1.4. 7. 1. 1. 1.	Hæmorr. extemp	
Tropfbaad	190	1. 10. 19.	ć	× 522
Tropfschwefel	342		Hyofcyami	513
Truffe	56	a strang	de Linaria	460
Truie	138	and the second s	de Liquir. 445 &	\$ 458
Trutta	169		de Litharg.	445
Truite	ibid.		Majoranæ	278
Saumonée	ibid.		Malvæ	462
Tuber	56	and the second second	Mercuriale citr.	
Terræ	633		gryf.	
Türkifchkorn	21	and the second	deMinio Camph	
Turdus		A REAL PROPERTY AND A REAL	Mundificans	
Turiones Lupuli	155			595
	59		de Api	
Turpetum	647	and the second	Neapol.	5.95
Mineral. 4488			Nicot.	\$39
Turbith	648		compof.	
Tufficularis	468		Nihili	412
Tuffilago Petafites	224	A CONTRACT OF	Nutritum	445
Farfara	468	and the second	Ophthalmicum	412
Typhi	143		de Panno linteo	443
Tugos	127	10000	Pedic.	595
		· /	Pomatum 77 8	\$ 427
Ų.	FROM.	10000034	rubr.	78
	ALL I	Man International	Populeum	324
Oŭa	109	230.000	Potab. rubr.	133
Umbelliferæ quo modo	01.0	•	viride	ibid.
agant.	7	12.	Purpur.	502
Unguent. Ægypt.	\$02	a to the second	Rofat.	425
Alabaftr.	604		fimpl.	ibid.
Album	445	4. Si mont	Rubrum exficta	
Camphor.		Dy Haland	Rudrum ennoor	
de Alth.	100001 200	and the second	Sambuc.	445
Ad ambufta	452	Sat Chief	Santalin.	578
	445	and allows	the second secon	394
de Arthan	633		ad Scabiem	595 -
Aurant, Fl.	81		de Solano	\$24
Cardiac.	204		de Styrace	327
Deficcativ. rubr.	11111111111		de Thutia	412
Diapomphol.	445	Setting and	Tripharmac.	445
Digeftiv.	331		de Uvis	29
Epifpaft.	492		ad Vermes	631
alter	488	Ungues	1978	308
			A DEED TO THE RELEASE	A 24

Unicornu	528	Verst de Gris	505
Foffile	470	Verd de Veffie	640
Uniones	362	Verge d'or	396
Urogallus		Verjus	98
Urfus		Vermes Teftacei	179
Meles		Vermice li	13
Urtica		Veronica	395
Urticationes	476		555
Ufneæ		Veronique	395
Ufnea cranii humani	387	Verrat	138
Uftiones	476	Vertes	ibid.
Uterina		Vers de Terre	527
Uva		Verticillatorum virtutes	5
crifpa	IOI	Verveine	232
Taminea		Vervex	137
Urfi		Veficafitia	475
and and a straight of	477	Veficaria	650
and stranger	572.6	Vefou	572
V.	21 - 4	Vesse de Loup	417
a set and a set of the set of the	NHE !!!	Vicia Faba	29
Vacca	125	Victorialis	582
Vaccinum Myrtillus		Vieux Cerf	142
Vache			7 8 99
Valantia Cruciata		Vinca	396
Valeriana Celtica		Vincetoxicum	583
Officin.		Vin cuit	99
Olitoria	58	A REAL PROPERTY AND A REAL	119
Valerianella	57		99
Vandoife		Vini Jecchi	109
Vanellus		Vins de Liqueuts	ibid.
Vaniglia		Vinum Abfynth.	197
Vanneau	160	Cerafdrum	82
Veau	125	Chalybeatum	480
Vegetabilia	195	Cydon.	IOS
Velar	534	Emetic.	\$89
Velarum	Ibid.	Febrifug.	256
Venena	2	Granator.	20
Ventriculi Bovini	126	Hippocrat,	258
Gallinar.	152	Rub. Id.	97
Vera de Chio	328	Scilliticum	\$30
Verätrum	614	Viola	349
alb,	615	Ipecacua	616
Verbafcum	468	Ödorata	349
Verbena		Viöle	ibld.

Viole latea	34 350	Vulpes	147
Violette		Vulvæ Suillæ	139
Violen gelbe	550		13/1-39
Violwurzel	270		
Vipera	494		L rius
Virga Aurea		Wachholder	271
Viride Montan.		Wachs	332
Virulento odore prædit	orum	IV achtel	150
vis	• 6	Wachtelkænig	159
Vifceralia	194	Waitzen	26
Vifcum		Waldmeister	382
Album	ibid.	Wallrath	473
Coryl.		Wallroffzehne	475
Opobalfam.	320	Waffer	180
Vifcus	397 fq.	Wafferbresem	165
Vitellus ovorum	153	Wafferhühnlein	162
Vitex, agnus castus L:		Waffermelonen	82
Vitis alba		Waſſernüſſe	122
Apyrena	98	Wafferschnepfe	159
Laciniata	. 97	Weggerich	388
Vinifera		Weggras	390
Vitrescentium vires	2		\$34
Vitriolum		Wegweis	1
Album		Weihrauch	318
Atrament.		Weindroftel	145
Commune	447	Weinkernel	158
de Cypro	440	Weinmus Weice and	99
Martis 408	S∝ 448	Weiser Senf 481	8 533
Nativ.		Weiss Fischbein	401
Oleum	448	Weis forell	169
Phlegma	101d.	Weisguldig Erzt	364
Spiritus		Weiswurzel	466
Viride		Weiffe Nieswurzel	614
Vitrum Antim.		Welfche Bohnen	29
Cerat. Emetic.	ibid.	Welsche oder türkisch Bohnen	Contraction of the local section of the
Vitulus		Welscher Hahn	31
Viverra Zibetha		Welfche Kirfchen	İŞİ
Vogelkraut	353	Welfcher Sallat	104
Vogelleim	450	Werk	57
Vogelnest	398	Wermuth	454
Vomicæ nuces	010	Widder	199
Vomitoria		Wildschwein	137
Vorlauf	007	Winterania	140
	99	II	302

WT		7 1	
Winteranus Cort.		Zedoaria	303
Wintergerst		Zehen von Knoblauch	38
Wintergrün		Zeix dixonnos	29
Wirfing		Zeifig	149
Wismuthum	408	Zeitlosen	377
Wolfram		Zeolites cæruleus	367
Wolgemuth	285	Zerocarpus Calamus	429
Wollkraut	468	Zibebæ	. 98
Wollverley		Zibeben	ibid.
Wurmfaamen	209	Zibet	353
and the second second second second second second second second second second second second second second second		Zibethum	ibid.
Х.		Ziege	141
		Zieger	134
Χυλοβάλσαμον	320	Zickelchen	136
Χυλοκασσία	251	Ziemer	141
	1 in the second	Zimmet - Rinde	256
Constant of the second second second		Zina in Cina	209
		Zincum	410
		Calaminare	411
Tovov	56	Cryftallifatum	ibid.
Toparupor	590	Rapa	ibid.
Topomnhov	105	Swabii	ibid.
Υδρορόσχτου .ΟΙ	428	Zingiber	- 304
Yeble	\$70	ZorriBepes - Colle	304
Yeux d'Ecrevisses	178	Zinzib. coct.	305
The largine	1	Zinn	409
Υπέρικον	382	Zifel	149
Tavos	386	Zittwer	303
Ts .	183	Zostera Marina	568
		Zucker	\$75
Z.		Zucker - Rosen	425
		Zuckerwurzeln	69
Zahlperlen	362	Zwecken	561
Zapfenholz,		Zwetschen	95
Zaunrübe	611	Zwieback	14
Zea		Zwiebeln	48
Mavs		Zwitter	409
			4-9

Typis HEITZIANIS.

ERRATA.

380 Zuch

33 Calleran

18312.010072

260 Queek 2

611 Broch on

STA Zwichela

Lypis : Half zindis.

MAR EUSSILE

FRE L

and the second

L'ESTERA DATE

activitation

209 Z bee Zibechum Ziege

and Kallelan

va Zimort - longe

Vinteetanus ort.

Pinterger G

W ismuchtan

W of genucht-

if otherautry

W altaer leg

Kable C. Same

N. Manarowara

arey Sealgragey

KHAQTED THE

- gonijan

* Manual 1

a addining

· STUR

X

Intergrant

Pag. 27. l. 18. nyugu; lege nítuga. Pag. 298. l. 22. TORDYTIO lege TORDYLIO. ibid. l. 25. aquæ lege æquali.

Relen

Eucly want, ch

and Lightics enquieus

6.8%

249

195

172

23

107

24

623

