

Om tyoidfebern i Sverige. I. Historia, geografi och statistik / af Ernst Bolin.

Contributors

Bolin, Ernst.
Royal College of Physicians of Edinburgh

Publication/Creation

Stockholm : K.L. Beckman, 1893.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/j5xm45px>

Provider

Royal College of Physicians Edinburgh

License and attribution

This material has been provided by the Royal College of Physicians of Edinburgh. The original may be consulted at the Royal College of Physicians of Edinburgh, where the originals may be consulted.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Hb10.19

OM

TYFOIDFEBERN I SVERIGE

I.

HISTORIA, GEOGRAFI OCH STATISTIK

AFHANDLING,

SOM MED TILLSTÅND AF

MEDICINSKA FAKULTETEN VID UPSALA UNIVERSITET

FÖR VINNANDE AF MEDICINSK DOKTORSGRAD TILL OFFENTLIG
GRANSKNING FRAMSTÄLLS

AF

ERNST BOLIN,
MED. LICENTIAT

På kemiska lärosalen lördagen den 2 sept. 1893

kl. 10 f. m.



STOCKHOLM
TRYCKT HOS K. L. BECKMAN
1893.

R39367


INNEHÄLLSFÖRTECKNING.

	Sid
Inledning. Källor	1.
Nosologi. Nomenklatur	5.
Tyroidfeberns förekomst i Sverige från äldsta tider t. o. m. 1890	10.
Tyroidfeberns förhållande i Sveriges olika delar, på landsbygd och i städer. Tyroidfeberns frekvens under olika tidrymder	30.
Tyroidfeberns betydelse som dödsorsak. Relativ mortalitet	60.
Tyroidfeberns förhållande till olika årstider samt till de angripnes ålder och kön	67.

Tabeller I. 1—26. Tyroidfeberns förekomst i Sveriges län och läkaredistrikts 1861—1890 enligt läkarerapporter till Medicinalstyrelsen	73.
Tab. II. Dödsfall i tyroidfeber (närvfeber) på 10,000 invånare i Sveriges län jämt Stockholms stad samt hela riket hvarje år under perioden 1876—1890	107.

Grafisk tafla, utvisande antalet döde i tyroidfeber (närvfeber) i medeltal årligen 1876—1890 på 10,000 invånare. (Tillhör Tab. II.)

Grafisk karta, utvisande tyroidfeberns relativ frekvens i Sveriges läkaredistrikts åren 1875—1890.



Digitized by the Internet Archive
in 2015

<https://archive.org/details/b21949323>

Inledning. Källor.

Föreliggande afhandling är hufvudsakligen grundad på arkiv- och litteraturstudier och utgör en bearbetning af ett på sådant sätt samladt material. Att känna dessas beskaffenhet är sålunda af största vikt för att rätt kunna bedöma de vunna resultatens värde.

De källor, ur hvilka i fråga varande material är hemtadt, äro dels *läkarnes årliga embetsberättelser* till öfverstyrelsen för vårt medicinalvärk, dels vår *officiela statistik*. Dessa urkunders beskaffenhet har förut tämligen utförligt granskats af de föregående författare, som med stöd af dem genomfört arbeten af liknande art, som detta. Men ett upprepande af denna granskning är här så mycket mera af nöden, som de angifna källornas brister i fråga om tyroidfeberns studium göra sig på ett särskilt sätt känbara.

De svenska läkarnes åliggande att afgifva årliga embetsberättelser förskrifver sig från midten af förra århundradet. År 1749 anbefalte nämligen Collegium medicum rikets prov. medici att inkomma med redogörelser för det i medicinskt hänseende märkliga, som de inom sina värksamhetsområden iakttagit. Från nämnda århundrade föreligga endast fataliga och godtyckligt uppstälda berättelser. Under innevarande århundrade började väl läkarne mera regelbundet att inkomma med rapporter, men dessa voro, ehuru stundom ganska utförliga, likväl i början sines mellan särdeles olikformiga, då något bestämdt formulär ännu ej var uppgjordt för desamma. Ett sådant började egentligen först 1851 att tillämpas. Detta är alades därjämte läkarne, att så vidt möjligt uppgifva antalet insjuknade och döde i vissa allmänna förekommande sjukdomar, särskilt de epidemiska. Samma år började, som bekant, Sundhetscollegium utgifva sina tryckta årsberättelser, i hvilka det af läkarne lemnade materialet på ett högst förtjenstfullt sätt bearbetats. Hela denna betydande samling af läkarerapporter är i epidemiologiskt, medicinskt-historiskt, ja äfven i kulturhistoriskt hänseende af stort intresse. För statistiskt ändamål kunna dock dessa årsberättelser endast med största försiktighet an-

vändas. Det är tydligt, att de inträffade sjukdoms- och dödsfallen ej ens på längt när allesamman komma till vederbörande läkares kännedom; sådant anmärkes ock upphörligen i rapporterna. Såsom absoluta tal sakna läkarnes sifferuppgifter därfor så godt som allt värde. För en jämförelse emellan de olika läkaredistrikten eller emellan olika tidrymder inom samma distrikt äro de väl mera användbara, men ej heller i detta afseende äro de på längt när tillförlitliga, då allt efter det olika förtroende läkarne åtnjuta, och den olika benägenhet att söka läkare, allmänheten på skilda orter visar, sifferuppgifterna kunna i hög grad växla. Sålunda inträffar det t. ex. någon gång, att läkareoombyte åstadkommer en ganska frapperande ökning eller minskning af sjukdomsfrekvensen o. s. v. — Sedan kommunalnämnderna i riket år 1875 ålagts att till vederbörande läkare årligen inkomma med redogörelse för allmänna helsotillståndet inom de resp. kommunerna, hvilken redogörelse bland annat skulle innehålla uppgift på antalet sjuke och döde af smittosamma sjukdomar och farsoter, blefvo visserligen ofta nog ett större antal fall anmälda. Men läkarne synas i allmänhet ej ansett dessa uppgifter af något värde och hafva därfor vanligen föredragit att fortfarande anteckna blott de fall, som förekommit inom deras egen praktik. Då likväl en del läkare använder de af kommunalnämnderna uppgifna siffrorna, särskilt ofta nog i fråga om dödsfallen, under det att de upptaga sjukdomsfallen efter sina egna anteckningar, är det klart, att sifferuppgifternas värde som jämförelsetal härigenom ytterligare förringas.

Af de nu omordnade årsrapporterna föreligga de, som under förra århundradet ingåfvos, till större delen ganska fullständigt i tryck, nämligen i följande arbeten:

Bergius. Försök till de uti Sverige gångbara Sjukdomars utrönande, för åren 1754, 1755, 1756. Stockholm 1755, 1756, 1758.

Provincial-Doctorernes till Kongl. Colleg. Med. inlemnade Berättelser, rörande deras Åmbets förrättnings, desse senare åren, i synnerhet sedan siste Riksdag. Sthlm 1761.

Berättelser, inlemnade till Kongl. Colleg. Med. rörande Medicinal-Werkets Tilstånd i Riket; såsom en fortsättning af Provincial-Medicorum berättelser till Kongl. Coll. Med. Sthlm 1765.

Berättelser till Riksens Höglöf. Ständer rörande Medicinal-Werkets Tilstånd i Riket. Ingifne vid Riks-Dagen 1769 af Kongl. Coll. Med. Hvarjemte äro bifogade samtelige Prov. Medicorum till Collegium insände Berättelser. Upsala 1769.

Vecko-Skrift för Läkare och Naturforskare. Band. I—VII. Sthlm 1781—1786.

Läkaren och Naturforskaren (forts. af föreg. tidskr.). Band. VIII—XII. Sthlm 1787—1796. Band. XIII—XV. Strengnäs 1804—1807.

Af de under innevarande århundrade afgifna berättelserna finnas utdrag här och där införda i Svenska Läkaresällskapets tidskrifter, särskilt i

Sv. Läkaresällskapets Handlingar. Band I—XII. Sthlm 1813—1833.

Sv. Läkaresällskapets Nya handlingar. Band. I—IV. Sthlm 1837—1844.

Hygiea, Band. I— . Sthlm 1839.

Från och med år 1851 äro som nämndt läkarerapporterna bearbetade i Sundhets-Collegii, resp. Medicinalstyrelsens årsberättelser. De tidigare årgångarne af dessa innehålla ganska utförliga redogörelser för de olika sjukdomarnes uppträdande i skilda delar af riket, men efter hand hafva berättelserna inskränkts till det rent

statistiska och upptaga nu rörande infektionssjukdomarna endast summan af insjuknade och döde för hvarje månad, länsvis angifne, och sedan 1864 dessutom redogörelser för dödsorsakerna i rikets städer.¹⁾

Angående tyfoidfeberns statistiska behandling märkes, att denna sjukdom först 1874 erhöll egen rubrik i formuläret för läkarerapporterna och i Sundhets-Collegii berättelser, under det den förut jämte fläcktyfus och »gastrisk feber» upptagits under rubrikerna »gastriska och nervösa febrar» och »tyfosa och gastriska febrar».

Vid studiet af tyfoidfeberns förhållande i Sverige har jag i allmänhet vändt mig direkt till de i Medicinalstyrelsens arkiv förvarade originalrapporterna. Endast beträffande de tider, för hvilka någorlunda fullständiga sammandrag af rapporterna föreligga i tryck, har jag ansett det öfverflödigt att rädfråga de otryckta urkunderna.

Den andra huvudkällan för vår kunskap om Sveriges »folksjukdomar», den officiela statistiken, har för studiet af tyfoidfeberns förhållande ett relativt inskränkt värde. Någon egen rubrik bland dödsorsakerna har tyfoidfebern där aldrig haft. De äldre rubriker, under hvilka man har att söka densamma, äro åren 1774—1801 »hetsig feber och brännsjuka», 1802—1811 »febrar af alla slag», 1812—1820 »febrar af hetsigt och rötaktigt slag, skarlakensfeber och frisel», 1821—30 »närv- och rötfeber». Åren 1831—1860 finnes för de flesta epidemiska sjukdomarna ingen dödsstatistik. Sedan 1861 träffa vi rubriken närvfeber, under hvilken utom tyfoidfeber äfven fläcktyfus, gula febern och möjligen ännu flera sjukdomar inrymmas.²⁾

Som bekant inkomma primäruppgifterna till den officiela dödsstatistiken från presterskapet. Visserligen föreskrefs i den nya instruktion härom, som genom Kongl. Maj:ts Kungörelse af den 4 november 1859 meddelades presterna, att de borde grunda sina redogörelser för dödsfallen af gängse farsot och endemiska sjukdomar på upplysningar, som vederbörande läkare likaledes förpliktigades att meddela. Men i hvad mån en sådan samvärskan mellan presterskapet och läkarne verkligent ägt rum beträffande uppgifterna från landsbygden, är omöjligt att bestämma. Under loppet af en epidemi tillkallas väl i allmänhet läkaren, så att denne ställer diagnosen, om han oek ser alla de enskilda sjukdomsfallen eller attesteras dödsfallen. Men ofta härröra nog diagnoserna till största delen från icke fackmän, af hvilkas insikter i medicinen således dylika statistiska uppgifter äro mer eller mindre beroende. — Hvad åter städerna angår, äro uppgifterna däri från vida tillförlitligare, då de sedan 1861 väl till allra största delen stödja sig på läkareattester. Under de första åren efter det nyssnämnda, då den nya förordningen angående dödsattesterna började tillämpas, utgjorde dock de icke attesteras dödsfallen ofta nog en ej obetydlig procent af alla faktiskt inträffade; men efterhand förminskades denna procent till en obetydligé, och från 1870-talets början torde denna brist ej i nämnvärd mån invärka på ifrågavarande uppgifters tillförlitlighet.

¹⁾ Saknas för åren 1871—1874.

²⁾ Sedan 1881 äro närvfeber och hjärnfeber sammanslagna.

Af dessa den officiela statistikens siffror rörande dödsfall i närvfeber har jag endast använt de för tiden 1876—1890 angifna. Härom är nedan på sitt ställe ordadt. Berörda siffror äro att finna i

Bidrag till Sveriges officiela statistik. A) Befolkningsstatistik.

För öfrigt är den litteratur, som rör tyloidfebern i Sverige, ganska sparsam. Följande arbeten utom de förut omnämnda äro de viktigaste:

Zetzell: Amphimerina catarrhalis lenta & maligna etc. (Sv. V. Akad:s Handl. f. 1754. Sid. 306.) Febris Upsaliensis; sub. præs. *C. Linnæi*, pr. gr. d. A. Boström 1757.

Hedin: Upplysningar om Epidemiska och serdeles de Pestilentialiske Febrarne. (Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskärer. T. 7; 3, 4 h. Sthlm 1838.)

Huss: Om Sveriges endemiska sjukdomar. Sthlm 1852.

Huss: Om Typhus och tyloidfeberns statistiska förhållanden och behandling. Sthlm 1855.

Berg, F. Th. Bidrag till Sveriges medicinska topografi och statistik. Sthlm 1853. (Ingår äfven i Sundhets-Collegii årberättelse för 1851.)

Ilmoni: Bidrag till Nordens Sjukdomshistoria. Helsingfors 1846—1853.

Heyman: Tyloidfeberns frekvens och lokala utbredning i Stockholm under åren 1861—1881. (Hygia 1882.)

Linroth: Inverkar uppsjö menligt på Stockholms sundhet? (Helsovårdföreningens i Stockholm förhandlingar 1887.) Sthlm 1888.

Linroth: Dödsorsakerna och dödligheten i Stockholm 1871—1890. Sthlm 1892.

Almquist: Dödsorsakerna i Göteborg 1861—1885; I Göteborg gångbara sjukdomar 1756—1885. (Göteborgs helsovårdsnämndes årsber. 1888, 1889.) Göteb. 1889, 1890.

Dessutom åtskilliga uppsatser i *Eira* och *Hygiea* af olika författare, såsom *Neyber* och *Nauman*, *Eckerbom*, *Engdahl*, *Nilsson*, *Linroth*, *Almquist* m. fl.

Nosologi. Nomenklatur.

Tyroidfebern är för vårt land i viss mening ännu en »*morbus novus*», hvars historia ej sträcker sig längre än tvenne årtionden tillbaka, om man nämligen afser den tidrymd, under hvilken tyroidfebern inom nosologien intagit en fullt självständig plats.

Det torde vara lämpligt att, innan vi gå att betrakta tyroidfeberns förhållande i Sverige under olika tider och inom olika landsdelar, här i ett sammanhang redogöra för den svenska nosologien, så vidt den rör ifrågavarande sjukdom.

Gå vi så långt tillbaka som till senare hälften af förra århundradet, den äldsta tid, från hvilken vi äga i behåll en och annan sjukdomsbeskrifning, som gifver en om ock dunkel antydan om tyroidfeberns förekomst, så kunna vi ej med fog vänta att på detta område finna nosologien synnerligen utvecklad. Väl karaktäriseras denna tid i viss mån af bemödanden att differentiera eller så att säga individualisera sjukdomarne, bemödanden, som fingo sitt uttryck i en mängd mer eller mindre konstlade medicinska system (Sauvage, Cullen, Linné m. fl.), men å andra sidan betraktades sjukdomarne ännu gärna såsom föränderliga, såsom olika faser af en *genius epidemicus*, ett visst »sjukdomlynne», som på alla samtidigt uppträdande sjukdomar tryckte sin egendomliga prägel; och hvad särskildt tyroidfebern angår, kunde den med sina föga i ögonen fallande symptom icke vara egnad att för den tidens läkare erbjuda tillräckliga hällpunkter för en sådan differentiering från andra då förekommande febrar.

Vi finna därför ej heller från nämnda period någon nomenklatur, som kan leda en nutida forskare på spåren vid studiet af tyroidfeberns äldre historia i Sverige. Af då brukade namn på gängse febersjukdomar synas »fläckfeber» nästan uteslutande, och »rötfeber» med tillägget »elakartad» eller »med fläckar» öfvervägande hafva betecknat *typhus exanthematicus*. Men för öfrigt finnes knappast någon sådan öfverensstämmelse i användandet af benämningarne, att man på grund af dessa kan sluta till sjukdomarnes art. Allt efter olika *symptom* erhöllo »febrarne»

olika bestämningar, såsom »elakartade, putrida, gallaktiga, nervösa» o. s. v. Det namn, under hvilket man snarast kan vänta sig finna en beskrifning, som bäst passar in på tyfoidfebern, är »febris lenta nervosa» eller »långsam nervfeber», ett namn, upptaget efter den engelske författaren Huxham¹⁾ hvilken under detta lemnat en enligt Hirsch »mästerlig» skildring af nämnda sjukdom²⁾. Stundom betecknas likväl därmed fall, som att döma af sjukdomsbeskrifningen synas haft åtskilliga beröringspunkter med de då särdeles allmänna frossorna.

Den äldsta officiela statistiken, Tabellvärvkets, hvars rubriker förut äro omnämnda, lämnar för nu berörda tidrymd ingen upplysning i fråga om tyfoidfebern.

Under de första årtiondena af 1800-talet träffas i läkarerapporterna och den sparsamma tryckta litteraturen beskrifningar öfver tyfoidfeberliknande fall under många olika benämningar, såsom »gastrisk, gastrisk-nervös, tyfös, remittent feber», någon gång »slemfeber»(?) o. s. v., hvarjämte den nämnda f. lenta nervosa och den nedan omtalade »Upsalafebern» allt emellanåt förekomma. — Under några af de uppräknade namnen lemnas dock äfven skildringar, som tydligent mäste hänföras till typhus exanthematicus; härjämte finner man under samma momenklatur mycket ofta fall, som man utan tvifvel kan öfverföra till frossans område. Särskilt gäller detta senare om en mängd af de jämt och ständigt återkommande »remittenta febrarne». (Jämför härom Bergmans afhandling om Frossan³⁾).

Öfver hufvud taget synes frossan, som med sina mångfaldiga former intagit en så dominerande ställning i vårt land under förflutna och mer än hälften af innevarande århundrade, därigenom i viss mān undanskymma en del andra sjukdomar och sälunda försvåra studiet af dessas äldre historia. I sina mindre typiska former misskändes den ofta af läkarne och erhöll då hvarjehanda symptomatiskt bestämda namn, såsom gastrisk, biliös, remittent feber etc. Icke alltid är det numera möjligt att af sjukdomsbeskrifningarna bestämma de anförda sjukdomarnes natur. Särskilt blir tyfoidfebern härigenom svår att framleta; den drunknar nästan ibland massan af rötfebrar⁴⁾), frossor af olika slag och andra mångfaldiga »febrar».

Några uttalanden i nosologisk och systematiserande riktning förekomma knappast under nyss nämnda årtionden. Endast en antydan i denna riktning förekommer i en uppsats från år 1806 af den bekante läkaren, professor Trafvenfelt⁵⁾. Han indelar här »de vanligen gångbara, elaka, smittsamma febrarne, åtminstone i anseende till deras grad, i Rötfeber (*Synochus putris*) och maligna nervfebrar (*Typhus*

¹⁾ Se sid. 10, not. 2.

²⁾ Hirsch: Historisch-geographische Patologie, 2 Aufl. 1881—86, sid. 434. Hæser säger i sin Geschichte der Medicin u. d. epid. Krankh. (3:e uppl. B. III sid. 577), att Huxhams skildring drag för drag motsvarar tyfoidfebern.

³⁾ Bergman: Om Sveriges folksjukdomar, II, Frossan, sid. 208 o. f.

⁴⁾ De förmämsta fläckfeberåren sedan förra seklets midt hafva varit: 1772—73, 1788—89, 1808—09, 1828, (1838, 1846—47), 1868—70; (i Sthlm 1870—75).

⁵⁾ Vetenskapsjournal för Läkare och Fältskärer I, 1 sid. 10.

nervosa). Febrar utan malignitet, åtföljde af nervsymptomer, samt den så kallade Lenta nervosa, höra icke hit». De två förstnämnda skilja sig från hvarandra däri-genom, att »den förra har ett mera akut föllopp (död ofta på 7:de, 9:de dygnet), företer starkare närvsymptom och slutar genom kris, under det att den senare har en längsammare decursus (de, som dö, lefva öfver 14:de, 17:e, 21:a dygnet och ännu längre) och öfvergår till helsa genom en lysis. S. k. petechier visa sig egentligen i den förra. Båda förekomma allmännast i februari, mars och april, äro tydlichen smittosamma o. s. v.» Huruvida den senare af dessa båda former kan anses som indentisk med senare tiders tyroidfeber eller blott som en mildare form af fläcktyfus, torde väl ej på grund af ofvanstående beskrifning kunna af-göras. Icke heller blir det klart, hvad T. menar med lenta nervosa; blott att han, att döma af sammanhanget, synes fränkänna densamma malignitet och smittosam-het. T:s uttalande visar sälunda en differentiering af gängse »febrar», men om tyroidfeberns ställning lemnar den ingen upplysning.

En säker grundval för tyroidfeberns igenkännande och särskiljande från öfriga sjukdomar kunde först genom pávisandet af de för densamma karakteristiska patologiskt-anatomiska förändringarna vinnas.

Huruvida de svenska läkarne under de tre första årtiondena af detta århundrade haft någon kännedom om de af Pariserskolans män uppnådda resultaten i denna riktning, däröm lämnar den tryckta och otryckta litteraturen från nämnda tid ingen upplysning. För så vidt jag kunnat finna, var det först Ronander, som gjorde de utländska vetenskapsmännens forskningar härutinnan närmare kända af svenska läkare, då han under loppet af år 1832 inför Läkaresällskapet framlade flere iakttagelser rörande »febris nervosa enterica» och visade åtskilliga dit hörande patologiskt-anatomiska preparat. R., som äfven lämnat en på egen iakttagelse grundad beskrifning af sjukdomen¹⁾), säger i »årsberättelse om svenska läkaresällskapets ar-beten» för 1832: »denna feber, som i andra länder blifvit beskrifven under namn af febris nervosa abdominalis s. cum ileitide, febris gastrico-enterica s. intestinalis, Dothinenteritis o. s. v. och som ofta förväxlas med vanlig nervfeber, har, så vidt jag känner, icke förrut blifvit i Sverige observerad, men förtjenar likväl den största uppmärksamhet, emedan den äfven hos oss temligen ofta förekommer, i synnerhet under vintermånaderna» o. s. v.

Detta uttalande är af en viss betydelse, då det visar, dels att R., som ju bör hafva varit väl förtrogen med den inhemska medicinska litteraturen, för sin del ej kunnat i densamma finna någon tydlig beskrifning på sjukdomen i fråga, dels att han med »vanlig nervfeber» menade något annat än den af honom beskrifna febris n-enterica, säkerligen typhus exanthematicus.

Emellertid börjar man från den tiden i läkarerapporterna påträffa spår af läkarnes kännedom om en särskild form af »närvfeber» med anatomisk lokalisering i tunntarmarne.

¹⁾ Tidskrift för Läkare och Pharmaceuter B. I. h. 5, sid. 146.

Jämte de fortfarande vanligaste namnen gastriska och närvösa febrar uppträder nu någon gång det betecknande namnet ileotyphus, senare tyfoidfeber¹⁾ samt abdominaltyphus eller »den abdominela formen af typhus». Denna sista term antyder redan något, som äfven framgår af läkarnes egna uttalanden, nämligen att de i allmänhet ansett typhus exanthematicus eller petechialis och t. abdominalis, tyfus och tyfoidfeber såsom till sitt väsen identiska sjukdomsprocesser, hvarför också i st. f. de nyssnämda förekomma termerna typhus gravior och mitior, sälunda betecknande endast en gradskilnad med hänsyn till malignitet²⁾.

Sedan Huss i sitt år 1855 utgifna arbete »Typhus och Typhoidfeberns statistiska förhållanden och behandling» uttalat som sin bestämda åsigt, att »typhus och tyfoidfeber (typhus petechialis och typhus abdominalis), sådana de i nordens klimat förekomma, ej kunna eller böra betraktas såsom tvenne skilda sjukdomar, utan endast såsom tvenne formförändringar af en och samma sjukdomsprocess», blef denna åsigt så godt som allena härskande bland Sveriges läkare under två årtionden, ett förhållande, som är till stort förfang för studiet af de båda sjukdomarnes uppträdande under motsvarande tid, icke blott med hänsyn till den statistiska behandlingen utan äfven i epidemiologiskt afseende. Beträffande den statistiska sidan af saken är redan i inledningen ordadt. Hvad atter angår epidemiologien, så skulle identitesläran ej vara till något hinder, så framt man som regel finge hvardera »formen» särskilt nämd under sitt vedertagna namn; men helt naturligt är så ej förhållandet, utan alltför ofta träffar man blott genusorden »typhus» eller »typhosa febrar». Samma användning som gemensamt namn på två olika former finner ock nu den gamla termen »nervfeber».

Om också typhus exanthematicus under nämnda period kan antagas i det hela ej varit särdeles ofta förekommande, har den dock säkert varit det alldelvis tillräckligt för att åtminstone grumla uppfattningen af den med honom sammanblandade tyfoidfebern och många uppgifter, som skulle vara intressanta med hänsyn till den senare, förlora högst betydligt i värde därigenom, att tillblandning af fläcktyfusfall ej kan med säkerhet uteslutas.

Det var först i medlet af 1870-talet och fornämligast genom Warfvinges pårik erfarenhet från fläcktyfusepidemierna i Stockholm 1870—75 grundade offentliggöranden, dels i 1:e stadsläkarens i Stockholm årsberättelser, dels i afhandlingen »Typhus exanthematicus»³⁾, som tyfoidfeber allmänt blef erkänd såsom en från typhus exanthematicus specifikt skild sjukdom.

Från och med 1874 uppföras, såsom förut är sagdt, uti läkarnes årsberättelser nämnda sjukdomar under särskilda rubriker, hvarjämte de förut med de »tyfosa febrarne» sammanförda »gastriska febrarne» skildes från dessa och i stället

¹⁾ Namnet infördes, som bekant, af Louis i Frankrike 1829.

²⁾ En äfven förekommande indelning af »typhus» är den uti »cerebral» och »abdominal», om hvilka formers förh. t. de resp. »petechialis» och »abdominalis» vanligen inga antydningar finns.

³⁾ Stockholm, 1880.

erhöllo egen rubrik. Angående dessa »gastriska febrar» må här till sist sägas några ord.

Att i äldre tider, t. ex. på 1840—50-talen, namnet »gastrisk» eller »enkel gastrisk feber» af läkarne användes för att beteckna en lindrig form af tyfoidfebern eller den »gastriskt-nervösa» febern, synes otvifvelaktigt och utsäges af några läkare direkt. Men lika otvifvelaktigt är, att namnet nu, då det ännu förekommer, af de fleste brukas i en annan mening, nämligen liktydigt med akut gastro-intestinal-katarr¹⁾). Öfvergången mellan båda uppfattningarna af sakförhållandet eller af terminologien är naturligtvis omöjlig att följa. Men då hithörande sjukdomsfall i läkarerapporterna alltsedan slutet af 1850-talet i allmänhet uppförts särskildt under hvar sin af rubrikerna »gastrisk feber» och »nervfeber» eller »tyfoidfeber» etc. uppstår ingen annan oegentlighet än den, att möjligen en del lindriga fall af tyfoidfebern komma ur räkningen, ett förhållande, som dock i anseende till det i alla fall endast relativt värdet af dylika sifferuppgifter, är af föga betydelse.

¹⁾ Härörom har jag genom muntlig och skriftlig förfrågan hos en mängd läkare öfvertygat mig.

Tyfoidfeberns förekomst i Sverige från äldsta tider t. o. m. 1890.

De äldsta spåren af tyfoidfeberns förekomst i Sverige har man¹⁾ trott sig finna i den s. k. »Upsalafebern». Då detta namn af läkarne under slutet af förra och början af innevarande århundrade ofta anföres, och sjukdomen flere gånger uppgifves vara i landet mycket allmän och sedan länge bekant, torde det vara af intresse att närmare afhandla denna fråga för att söka utröna, i hvad mån man kan finna stöd för åsigten om »Upsalafeberns» identitet med tyfoidfebern.

Den första beskrifningen af densamma finna vi i Sv. Vetenskapsakademiens Handlingar för 1754. Författaren (P. Zetzell) titulerar den »amphimerina catarrhalis lenta & maligna; eller långsam, farlig Catarrhal-Feber». »Den är», heter det, »ingen ny feber, emedan de Gamle i afseende på vissa förefallande symptomer begripit den samma nu under deras Lipyria, nu Typhos, nu Epiala o. s. v. Den qvicke italienaren Bagliv hafver ock vackert skrifvit därom, då han afhandlar de Mesenteriska Febrar, och herr Huxham föreställer honom, som en käck observator, ganska tydeligen under namn af »Febris lenta nervosa» etc. Sjukdomen, som af förf. iakttagits »hos et märkeligt antal sjuka under den tid, den i sistlidne Sept., Octob., Nov. (1753) samt i innevarande December Månader, som en farsot gått i Upsala och därömkring», beskrifves nu ganska omständligt. Den indelas i fyra stadier, af hvilka det första utmärker sig genom hufvudvärk fram i pannan, kyla, gäspningar, belagd tunga, tyngd i kroppen (»och knäen liksom orkelöse un-

¹⁾ Se Berg, F. Th., anf. arb. sid. 73.

Huss: Om Sveriges endemiska sjukdomar sid. 32. I enlighet med sin uppfattning af förh. mell. t. exanth. och t. abd. säger Huss endast att Upsalafebern »var hvad nutiden med en gemensam benämning kallas nervfeber och hjernfeber».

der någon yrhet»), »vämjelse och rörelse i underlifvet med en slemaktig diarrhée, samt ljum ländvärk». »Efter en vecka ungefär (andra stadiet) blir änteligen någon eftermiddag kylen något långsam, hvarpå följer hetta och antingen mycken matthet och stark törst, båsk smak» etc.; eller starka svettbad, hosta och hufvudvärk etc.; eller »mätt och spändt underlif, ogienhet, yra och diarrhée om nättterne; eller också tjock, hvit, gul, ja midt på brun tunga med både kräkning och diarrhée». »Symptomerne blifva hvar aften, likt en dubbel annandagsfrossa svårare med lindring ungefär kl. 4 om mornarne. I detta stadium uppstår ibland ett utslag på munnen, hvilket tillskrifves en god betydelse.» I det tredje stadiet »är den sjuke bekymmerslös; hör, utan att vilja svara; sträcksenorna leka; händer och tunga darra; han slumrar; yrar, som dock upphörer vid främmandes åsyn, samt de sjelfvillige evacuationer hålla ännu uti; men där de äro, visa sig spasmer, sträplockning, oro och lemmryckningar» etc.; »ansiktet faller ihop, yran blir starkare och en blå ring märkes under ögonen, hvarpå detta elände antingen ändas med lifvet(!), eller (stad. 4) börjar en myckenhet seg och tjock slem lossna med hosta om mornarne och en jemn svettning». — — — »Tungan blir ren, och någon matlust infinner sig för middagarne, fast et illamående ännu något märkes mot aftnerne, som dock ändteligen småningom försvinner, då en stark matlust börjar återställa, hvad kroppen under hela 21 eller 30 dygn förlorat.» Af 200 sjuke dogo endast 2. — Sjukdomens orsak antogs vara »den omärkeliga utdunstningens förminskande» till följd af den töckniga, regnaktiga och tjocka väderlek, som rädde hela den tiden, farsoten gick i Upsala och däromkring. Smittosam antager förf. sjukdomen icke hafva varit på den grund, att de icke smittades, »som umgingo med dem, som hade fläckar och af hvilka en elak ånga geck». Slutligen tillägges att »de festa, som föllo i denna Feber, voro medelalders folk», inga barn eller gamla och få af de fornäma.

Som vi se, kan ofvanstående ganska väl gälla som en beskrifning på tyroidfebern, om den också kanske ej är fullt så typisk som Huxhams, hvilken den för öfrigt mycket liknar, i vissa delar så mycket, att man knappt kan värja sig för misstanken, att förf. delvis afskrifvit Huxhams skildring.

Emellertid är hänvisningen till Huxham och identifieringen af den af förf. observerade sjukdomen med Huxhams f. lenta nervosa af stort intresse, då den sistnämnda, såsom ofvan är nämndt, af Hirsch och även af Hæser¹⁾ och andra anses med säkerhet kunna tagas för tyroidfeber, en åsigt, hvilken man vid genomläsningen af Huxhams beskrifning ej kan annat än hylla²⁾.

Såvida Zetzell i sin skildring följt värkligheten och ej allt för mycket Huxham, torde man därför få anse som sannolikt, att den af honom observerade

¹⁾ Hæser, Geschichte der Medicin u. d. epid. Krankheiten Dritte. Bearb. Jena 1879—82 (III, sid. 577).

²⁾ Huxham. Opp. Lips. 1829. 8 sid. 134 följ. 405 följ. (I Ups. Univ. Bibl. finnes en tysk översättning.)

»farsoten» varit tyfoidfeber, helst som man på grund af åtskilligt tämligen säkert kan utesluta den eljest både i Upsala och på andra ställen då för tiden ganska vanliga, som elakartad och smittosam angifna »röt- eller fläckfebern».

En dylik febris lenta nervosa var enligt Bergius¹⁾ gängse hela hösten 1854 i Stockholm.

Mycket mera tvifvelaktig är den skildring, som förekommer i afhandlingen »Febris Upsaliensis»²⁾, under Linnés præsidium försvarad af A. Broström 1757. Den här omtalade sjukdomen säges »för 2 år sedan varit så allmän i Upsala och injagat en sådan skräck, att många af fruktan för sjukdomen tvekade att sända sina söner till akademien; men då den snart lika mycket iakttoqs på andra ställen, försvann denna fruktan hastigt». Vidare heter det, att den »ingalunda är ny i Upsala utan har härjat här så lång tid, som vi kunna erinra oss, om den också ej alla år förhållit sig lika». »Somliga år har den ändrat sin sjukdomsbild (typum suum), understundom har den varit elakartad med petechier, i hvilket fall den varit smittosam, och därav kallats febris petechizans, stundom har den mest angripit magen och kallats febris mesenterica; af några äfven febris nervosa, emedan den stundom öfverfallit med delirier och spasmer. *Stundom äfven, helst likväl på våren har den slutat i intermittens*, hvorför man tillagt den namnet quotidiana eller tertiana continua» etc.³⁾. Hvad beträffar självva sjukdomsförloppet säges typen vara sådan, att den hvarje dag, vanligen 3—4 timmar efter middagen exacerberar med oro, häftig puls o. s. v. men utan någon köld (»nisi levissimo digitorum & nasi interdum»); efter 3—4 timmar upphör den, så att febern knappt märkes, men mot midnatt inträder ett nytt anfall, som ändtligen mot morgonsidan upphör under svett, lämnande den sjuke mycket utmattad och kraftlös. — I andra fall åter är *hvarannan* dag svårare⁴⁾.

Det anförla torde vara mer än nog för att till fullo visa, att den sjukdom, som här beskrifves, varit en frossa under olika former, quotidiana och tertiana duplicata o. s. v. Olikheten med den af Zetzell beskrifna »farsoten», hvilken dock tydlichen afses, då det säges, att »den (»Upsalafebern») för 2 år sedan var så allmän etc.», är i ögonen fallande.

Ofvan nämnda förklaring, att den somliga år ändrat sin art, visar emellertid, att förf. till »Upsalafebern» under detta namn sammanfattat flere olika sjukdomar

¹⁾ Gångb. sj. 1754.

²⁾ Anledningen till namnet förklaras vara den, att den först närmare observerats i Upsala.

³⁾ Här tillägges, att sjukdomen är allmän nästan öfverallt, i synnerhet i södra Europa, och är den i Italien mellan Rom och Neapel så allmän, att våra landsmän frukta att resa dit. Äfven i Indien är den mycket allmän o. s. v.

⁴⁾ Orsaken till sjukdomen antages vara undertryckandet af perspiratio insensibilis samt luftens förpestning genom afdunstningen af »Kamhafvet» och »Stadsdiket» (»sentina, sordium plenissima dieta Kamhaf, ubi aqua ab antiquissimis temporibus stagnavit, ut prætermittem fossam Stadsdiket nominatam in altera parte urbis, sordibus etiam abundantem»). Sjukdomens smittosamhet förnekas.

(enligt vår uppfattning), af hvilka möjligent såväl den nämnda »f. mesenterica» som »f. nervosa» kan hafva motsvarat Zetzells »amphimerina», under det f. petechizans varit »fläckfeber», så framt icke alla tre tillika med ofvan beskrifna former kunna inrymmas i frossans att döma af andra beskrifningar den tiden i Sverige mångskiftande sjukdomsbild.

Uti en annan, senare uppsats, däri en antydan gifves om »Upsalafeberns» art (Hedins »Upplysningsar om Epidemiske och serdeles de Pestentialiske Febrarne» 1805¹⁾), säges, att under detta namn ännu då omtalades den Typhus, som i början af 1760 härjade i Upsala, och hvilken af H. räknas till samma grupp af sjukdomar som Fältfebrarne och Fängelsefebrarne.

Såsom ofvan är nämdt, förekommer namnet »Upsalafeber» ganska ofta i åtskilliga läkares rapporter och ej sällan tilläggas sådana epitet som »den af alla kända», »den nu så vanliga» o. s. v. Tyvärr äro dock de följande beskrifningarne på densamma merendels mycket knapphändiga, hvartill ofta just anföres som skäl, att »sjukdomen är förut så noga bekant, att jag icke vågar trötta Collegii tålamod med någon större vidlyftighet» o. d. Man stannar därför ofta i ovisshet, hvilken sjukdom egentligen menas. I de fall, där namnet »lenta nervosa» tillfogas, torde man med sannolikhet hafva för sig en tyfoidfeber, så framt man icke har skäl att misstänka en förväxling med remitterande frossa, säsom då det t. ex. heter, att sjukdomen mot slutet öfvergick till intermittens (hos en och samma individ).

»Upsalafeber» torde däremot på grund af det ofvan sagda böra anses som ett flera olika sjukdomar omfattande kollektivnamn, vid hvilket därför i allmänhet ej kan fästas alltför stor vikt, om man ej i sjukdomsbeskrifningen finner några hällpunkter för bedömande af sjukdomens art.

Utom den nämnda beskrifningen af Zetzell förekomma från förra århundradet endast helt få, som med någon sannolikhet kunna hämföras till tyfoidfebern. Några af dem må emellertid anföras.

1763. Upsala²⁾. »Om hösten började i och omkring staden en malign feber med fläckar. Diarré slog till hos somliga, hos andra näsblod. Här blef ingen märklig kris utan efter 14:de à 17:de dygnet, ja ännu längre kunde man först hos dem, som kommo sig före, börja smäningom märka någon liten ändring. I början höll den sig mest i Kungsängsroten. Många döde, mest fattigt folk. Ej en enda af professorsstaten eller de studerande hade denna feber.»

1784. Tierp³⁾. »På hösten en feber, som började med flera dagars hängsjuka, frysningar etc. Häufig diarré hade de meste, som påkom förr eller senare, Mycken matthet. Yrsel. Drog långt ut på tiden, ända till 4, 5, ja 9 veckor, innan de blefvo nägorlunda friska, och det utan några märkliga kriser. Då den kom in i ett hus, blef näppeligen någon skonad, och hvad har man stort annat

¹⁾ Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskärer T. VII. sid. 75.

²⁾ Berätt. t. Colleg. Med. f. 1763 (Halenius).

³⁾ Veckoskrift f. Läk. o. Naturforsk. VII (Halenius).

att vänta.» (Här följer en målande beskrifning af den stora osnyggheten och oförskiltigheten bland allmogen.)

1786. Eskilstuna d. ¹⁾. (I början af april en rötfeber med fläckar.) Den tycktes längre fram på våren gå öfver till en »lenta nervosa». »Inga märkliga kriser skedde, utan efter 3 à 4 veckor gick den per delitescentiam öfver.»

1797. Borås d. ²⁾. »I juli män. en smittsam nervfeber. Ingen dog. Varit gångbar på andra orter under namn af smygfeber.» (?) (Skiljes af läk. från rötfeber, som sedermera uppträddes.)

1798. Löfsta ³⁾. »I augusti en elakartad feber synochus putrida, dock utan fläckar. Prodromstadium af flere dagar. En del hade från början en elak stinkande diarré, andra hæmorrhagia narium. Brytning mest på 14:de dygnet, nästan alltid med svett, om den sjuke i tid påkallat läkaren, annars drog den ut hela 20 dygn och däröfver.» (?)

Då det visat sig omöjligt, att i det kaos af sjukdomsberättelser under växlande namn af »gastriska, nervösa, remitterande, tyfösa, maligna, rötade febrar, synochus, lenta nervosa, Upsalafeber» m. m., som uppfyller läkarerapporterna under de första decennierna af detta århundrade, i hvarje fall kunna bestämma, hvad som är tyfoidfeber eller ej, och då en genomgående textkritisk granskning af materialet endast skulle medföra en onödig och föga upplysande vidlyftighet, inskränkes framställningen i det följande till och med år 1850 därhän, att för hvarje årtionde anföres en eller annan af de för perioden mest typiska sjukdomsbeskrifningarna, som kunna hämföras till tyfoidfebern, och däröfter uppräknas de mest anmärkningsvärda epidemier af liknande art som de refererade, naturligtvis endast under sträng reservation med hänsyn till möjligheten af en tillblandning af fläktyfus, remitterande frossa m. m. För tiden fr. o. m. 1851 anförs inga sådana »typiska» sjukhistorier; de epidemier, som däröfter stå upptecknade, äro sådana, som, där intet annat särskildt utsäges, på grund af rapporternas text af mig ansetts säkert utgöras af tyfoidfeber.

1801—1810.

(Nomenkl.: gastr. f, gastr. nervf., f. lenta nerv., Upsalafeber, remitterande feber.)

Anm. De flesta berättelser från denna period äro ganska otydliga och tvekydiga. Åren 1808—09 omtalas nästan endast den s. k. fältsjukan eller landtvärnssjukan, som af läkarne »fans vara en vanlig rötfeber».

1806. Eksjö distr. (Olin.) »Från början af året till maj månads medium den s. k. Upsalafebern (febris lenta nervosa). — — — Den långsamma närvfebern börjar bli allt mera allmän i Göta rike. Uti denna orten eller delen af Jönk. län har den alla år grasserat och det alla årstider.» — 1807. Samma förf. »Den är en remittent feber, länge känd af våra läkare, bortrycker en myckenhet män-

¹⁾ L. o. N. VII (Tengmalm). ²⁾ L. o. N. VIII (Flodin). ³⁾ L. o. N. XIV (Malmberg).

niskor af alla åldrar. Jag tilltror mig icke kunna med visshet uppgifva orsaken till nämnda sjukdoms tilltagande hos alla folkklasser framför forna tider.»

1808. Densamme. Angriper besynnerligen starka, medelålders personer. »Oförmodligen känner man sig attackerad af en hemlig trötthet uti alla kroppens lemmar, besynnerligen i de nedre extremiteterna, af tryckande hufvudvärk, häftigt anfall af frossa och flera sypmtomer, som utmärka nervsystemets högre lidande.» Afmattnings. Slummer. »Som denna sjukdom under mångårig erfarenhet blifvit så grundligt känd, vågar jag nu härmed icke trötta Kungl. Collegii tålamod.»

1806. Lund. (Munck af Rosenschiöld.) »De senare åren har en epidemisk feber nästan beständigt grasserat i Malmöhus län, än i en än i en annan by, stad eller församling.» Likadan feber i Lund. »Naturen af sjukdomen har varit asthenisk. Formen varierande, än som nervfeber än som röt- och fläckfeber än som gallfeber och än som Cullens synochus. Diarré fans vara det farligaste symptomet.»

1803. Umeå d. — 1806 Söderhamns d. — 1806 — Wimmerby d. — 1807 Strömstad (?). — 1807—1808 Wadstena. — 1808 Westerås.

1811—1820.

(Nomenkl. = föregående årtionde.)

1811. Vexiö distr. (Hillers.) »Nervfeber, så enkel, osammansatt från gastriska, putrida eller andra tillfälligheter, har jag aldrig haft lägenhet observera, som innevarande år här i länet. Den var en ren »lenta nervosa». Började med små rysningar, tyngd i lederna och nedslagenhet. Vanligen inträffade hosta, stundom näsblod, stundom löst (som var ett godt tecken) och stundom hårdt lif. Tillfriskningen skedde ganska långsamt. Aldrig har jag med fördel kunnat begagna kina förrän sjukdomen gifvit anledning till säkert aftagande. Var icke mycket dödlig.»

1811. Gefle stad. Eksjö distr. Kalmar distr. Söderhamns dist. (?)—1813. Upsala län. — 1814. Vesterås län, Nyköpings, Filipstads, Enköpings, Jönköpings distr. — 1815. Stockholms län (»långsamma gastriska och slemfebrar eller ock continuerade, med täta stolgångar och magref förenade»). — 1816. Stockholms län (Sigtuna, Roslagen), Daga, Nyköpings, Eskilstuna, Söderhamns dist. — 1817. Stockholms län. Faluns, Borås, Söderhamns, Jönköpings, Umeå, Luleå, Eksjö Eskilstuna distr. — 1818. Stockholms län. Upsala, Nyköpings, Venersborgs, Visby, Luleå, Gefle, Örebro distr. — 1819. Stockholms st., Örebro d., Sundsvalls st. Malmöhus län, Jemtland, Gotland. — 1820. Upsala, Faluns, Gefle, Söderhamns, Örnsköldsviks, Uddevalla, Halmstads, Norrtelje m. fl. distr.

1821—1830.¹⁾

(Nomenkl. = föregående samt mera allmänt »styphösa febrar».)

1822 yppade sig i Karlstads distrikten en typhusartad feber, på olika tider och ställen med lika förhållande och utmärkt för den inskränkta lokal, inom hvilken

¹⁾ Under denna period likasom de föregående förekom med säkerhet fläcktyfus ganska frekvent. Särskilt märkes en stegring åren 1827—29 med maximum 1828. Jfr. sid. 6 not 4.

denna »febermiasma» agerat. Febern var en typhus med mättlig eretism och mer eller mindre gastricitet. Den har, äfven sig sjelf lemnad, icke varit serdeles dödande och slutat sig per lysin».

1824. I Hässjö socken af Sundsvalls distrikt var under Augusti och September Typhusfeber epidemiskt gängse med catarrhala, gastriska och slutligen putrida symptomer. Den började med olust och nedslagenhet samt matthet, hvilken fortfor för några dagar under det patienterna gingo uppe. Hufvudvärk, kräkningar, darrning, stark törst och omsider på andra eller tredje veckan yrsel, colliquativ diarrhé samt stor kraftlöshet». Sjukdomen fortfor 4 à 5 veckor. Slutade utan kriser. Utom 3, som afflidit före läkarens ankomst, dog ingen (antalet sjuke ej uppgifvet).

1821. Våren och sommaren närvfeber mer eller mindre smittsam och svår i Upsala; *därjämte* lenta nervosa, ofta smittsam, i U. och i Söderhamns distrikt. Närvfeber i Mariestads och Uddevalla d. våren och sommaren, Filipstads och Luleå d. mot slutet af året.

1822. Eskilstuna, Upsala, Filipstads d., Jönköpings och Vestmanlands län samt kring Vadstena. November—december allm. på Gotland. Allm. i södra delen af Norrbottens län.

1823. Mars i Kalmar d. Nov.—dec. i Söderhamns d. Slutet af året i Filipstads d., Halland. Våren och hösten i Mariestads d.

1824. Vintern i Norrtelje d., i Umeå, Hernösands, Gefle, Mariestads d. och i Blekinge. Våren i Umeå, Upsala, Jönköpings d. och Göteborgs län. Sommaren i Hernösands d., Vesterås' län, Örebro och Jönköpings d. Hösten i Upsala, Enköpings, Jönköpings och Venersborgs d., Halmstads län.

1825. Vintern i Norrbottens län, Stockholms och Engelholms d. Våren i Norrbottens län och Mariestads d. Sommaren i Jönköpings d. Hösten i Enköpings och Nyköpings d., omkring och i Vadstena, i Växiö och Vimmerby d.

1826. Vintern i Jemtlands län, Falu, Karlstads, Vesterås', Mariestads och Ljungby d. Våren i Norrtelje, Vadstena, Växiö, Malmö, Gefle och Uddevalla d. Hösten i Enköpings, Örebro, Jönköpings, Växiö, Ölands och Malmö d.

1827. Vintern i Karlstads d. Våren i Falu d. Sommaren i Vimmerby och Vesterås' d. Hösten i Mariestads d.

1828. Vintern i Luleå d. Sommaren i Karlstads d. Hösten i Falu d.

1829. Hösten i Falu d.

1830. Våren i Falu d. Sommaren i Enköpings och Mariestads d. Hösten i Strömstads, Filipstads och Hernösands d.

I Stockholm mer eller mindre gängse alla år, särdeles på hösten.

1831—1840.

(Nomenkl. = föregående period. Dessutom Ileotyphus, Tyfoidfeber, Enterisk närvfeber.)

Till denna period hör Ronanders ofvannämda¹⁾ beskrifning på »febris nervosa enterica», hvilken säges vara »en egen feber, förenad med en till ulceration öfvergående inflammation i en del af tarmkanalens slemhinna, i synnerhet i slutet af ileum, men någon gång äfven i större utsträckning och i mesenterialkörtlärne». Då beskrifningen noga öfverensstämmer med sjukdomsbilden af nutidens tyfoidfeber, torde den ej behöfva här närmare refereras, utan får jag hänvisa till originaluppsatsen²⁾.

Såsom prof på en dätida landsortsläkares framställning anföres följande beskrifning (som dock i tydlighet öfverträffar flertalet samtidiga). Den är författad af Platzman i Sundsvall 1838³⁾.

»Med oktober månad började denna stora Typhus-Epidemi, som nu hemsöker Skandinavien (se nedan år 1838!) att äfven härstädes allt mer utbredda sig. Redan under loppet af flera år har nervfeber stationärt inskränkt sig till smärre kretsar och enskilda fattiga torparehushåll, hvarifrån den oberoende af atmosferens vextlingar endast per seminium och ganska långsamt meddelat sig, till dess sistlidne oupphörligt regniga och kalla höst tillintetgjorde de förhoppningar, hvartill den gynsamma sommarväderleken efter 6 års missväxt och nöd tycktes berättiga, hvari genom friska sjukdomsorsaker yppades, som i förening med en sig allt mer utbildande epidemisk luftbeskaffenhet framkallade den mest allmänna och intensiva folksjukdom i sitt slag, hvarom ortens sjukanner från tider förvara minne. — Den bild, hvarunder sjukdomen epidemiskt framträdde, var en *lokaliseras* febris nervosa stupida, vars generella drag, som vanligt, utmärkte sjunken lifskraft och öfvervägande nervaffektioner, men *vars anatomiska karakter* uttryckte en mer eller mindre tydlig *inflammation på ludden och folliklarne af ilei slemhinna (ileo-typhus)*⁴⁾. — I flera fall af urgerande nervosité och utmärkt hjernlidande saknades den helt och hållet. Febern antog ingen tertiantyp eller gifven cyclus utan dess förlopp bestämdes ganska ofta efter hvarje organisms olika sätt att reagera, infektionsgrad, årstid, behandlingssätt etc. Någon gång genomlupos samma skiften på 9 dygn, som vid annat tillfälle fordrade 21, merendels voro 11:te och 14:de dygnet kritiska. Om sjukdomen ej genast anföll utan förebud, kunde dessa påga från en till 14 dagar, hvarunder etc. (vanl. prodr.). Efter omkring 14 dygn (sedan patienten måst intaga sängen) visade sig mera bestämda gastriska tecken och högre nervosité. Patienten ömmade vid tryck på scrobiculum cordis och i coecaltrakten. Näsan blödde. »Petechier» utslogo. Det fullbildade lidandet på tarmslemhinnan karakteriserade sig medelst hopskrumpen, färad tunga, ömt, uppdrifvet och brännande underif samt de egna profusa uttömningarne, stundom både upp och ner, af ett

¹⁾ Se sid. 7, not.

²⁾ Ronanders där uttalade mening, att den dittills ej blifvit i Sverige observerad, får väl tolkas så, att den förut ej blifvit medvetet uppfattad såsom en specifik sjukdom med en bestämd anatomisk lokalisering.

³⁾ I Med. Styr. Arkiv. (Embetsrapport.)

⁴⁾ I hvad mån detta uttalande stöddes på autopsi, framgår ej tydligt af sammanhanget. Sannolikt torde väl P. varit i tillfälle att göra åtminstone någon liköppning.

tunt, brunaktigt med blodklumper, tarmslamsor och albuminösa flockor (!) uppbländadt serum, hvars lukt var rå och fadd som af nyss slagtadt kött. Ibland förstopning. Kontagium genom flerfäldiga observationer satt utom allt tvifvel.

1831. Vintern i Enköpings d. Våren och sommaren i Eksjö d. Hösten i Karlstads och Alingsås' d.

1832. Sommaren och hösten i Jemtland (orsakad af fattigdom och nöd). Vidare i Luleå, Hedemora och Vingåkers d.

1833. Fortfor i Luleå. Yppades på hösten i Stockholms d. Förekom vidare i Upsala och Svegs d.

1834. Fortfor i Svegs d. På sommaren i Örnsköldsviks d. (en »typhus mitior»). Vidare i Gefle, Hedemora (lenta nervosa) och Ljungby d. (»icke sällan den af doktor Ronander beskrifna febris nervosa enterica»).

1835. I Sigtuna d., (febr. nervosa enterica) Linköpings, Vimmerby, Hedemora och Falu d. Fortfor i Örnsköldsviks d.

1836. Vintern—våren i Jemtland, Skellefteå, Hernösands och Stockholms d., Västernorrlands l. samt Skaraborgs, Lidköpings, Växiö, Ljungby, Nyköpings, Gotlands södra d. — Hösten i Jemtlands l., Hernösands d., Vestmanlands l., Norrtelje d.

1837. Vintern—våren i Norrbottens l., Hernösands, Stockholms, Ulricehamns, Mariestads, Lidköpings d. Sommaren—hösten i Filipstads, Karlstads, Stockholms Ulricehamns, Lidköpings, Nyköpings d.

1838. Västernorrlands län, särdeles Sundsvalls (se ofvan) och Örnsköldsviks d., Jemtlands och Norrbottens län. Från Åsele distrikt säges, att den (gastriska febern) på ett och annat ställe förekommit sporadiskt, »der ulcerationer i intestina tenuia vid liköppning af mig 2 gånger blifvit bemärkt». Vidare i Kopparbergs, Vermlands, Upsala, Stockholms och Skaraborgs, Malmöhus, Hallands och Göteborgs län. Att döma af beskrifningarna, torde dessa epidemier på de flesta orter varit en blandning af typhus exanth. och tyfoidfeber, dock öfvervägande den senare. Frekvensen af tyfoidfebern torde hafva varit rätt betydlig. Siffror föreligga ej. I öfriga län mindre utbredd.

1839. Norrbottens och Jemtlands län, Västernorrlands l. (från förra året), Rättviks (Leksands) d. Upsala d. Här hade den börjat i slutet af år 1838 men först under första kvartalet af 1839 utbildat sig till epidemi inom staden och de nordligaste socknarne. Bland symptomen nämns diarré och häftiga hjärnaffektioner, petechier. »Vid dödelig utgång i synnerhet hade sjukdomen merendels utseende af Typhus entericus (Enteritis folliculosa), constaterad af en och annan tillåten liköppning.» »Convalecensen erhölls vanligen per lysin med långsam decursus af flera veckors tid.» Vidare i Stockholms län. Från Sigtuna distrikt skrifves, att »de (typhus-febrarne) förekommo dels under form af närvfeber, ofta med petechialexanthem eller affectioner af underlivets slemhinnor, dels också såsom Lenta nervosa med status pituitosus.» Skaraborgs, Elfsborgs, Vesterås, Kronobergs län, Vimmerby och Sölvesborgs d. I Vimmerby var det en »Febris

continua putrida, dock icke af malign karaktär». Endast fa döde. Mattande diarré hos några. Långsamt tillfrisknande.

Äfven detta år synes tyfoidfebern varit uppbländad med fläcktyfus. Tyfoidfeberns frekvens sannolikt ännu större än 1838.

1840. I Norrbottens, Jemtlands, Vesterbottens, Västernorrlands, Gefleborgs, Kopparbergs, Skaraborgs, Elfsborgs, Kalmar och Gotlands län mest utbredd. I det hela mycket mindre frekvent än föregående året.

Från Stockholms stad omtalas alla år, särdeles på hösten, gastriska och nervösa febrar.

1841—50.

(Nomenkl. = föreg. utom »lenta nerv.» och »Upsalafebern», hvilka namn nu sällan påträffas. Uttrycken cerebral och abdominel typhus användas därjämte ofta.)

Självva sjukdomsbeskrifningarna börja nu blifva allt knapphändigare. I stället börja frågor, som röra etiologien, mera taga läkarnes uppmärksamhet i anspråk. — Exempelvis anföras följande utdrag ur rapporter.

1845. Norrtelje distrikt (Sommelius). »I början af året var en nervfeber med lokal affektion på bröstet och underlivvet, någon gång äfven på hjärnan, epidemisk uti Fasterna socken eller kanske rättare endemisk vid Ränäs bruk och dess närmaste omgivningar. Sådant inträder nästan årligen att en tyfusfeber med mer eller mindre intensitet därstädes uppträder, hvilket synes äga sin grund uti ställets sanka belägenhet emellan sjöar och lågländta kärrängar. S. å., Vester Bergslags (Grangärde) distrikt (Höijer). I Novemher uppstod i Grangärde en tyfysepidemi, som snart spridde sig öfver hela distriket och räckte som epidemi ända till mars 1846. Den visade tre hufvudformer. 1) Den cerebrala med trögt underliv, häftig hufvudvärk, yrsel eller coma. De flesta fallen förbättrades per lysin. I somliga fall kris, aldrig före 14:de sällan senare än 21 dygnet, merendels med sömn, stundom svettning och ökad urinafsöndring. Convalescensen efter denna form i allmänhet hastig. 2) Den abdominela med jämförelsevis lindrig hufvudvärk, ömmande underliv och diarré, någon gång blodig. Af denna form slutade alla per lysin, sällan före 28:de dygnet. 3) »Denna form, som jag för dess nära likhet med vanliga gastriska febrar vill kalla den gastriska, visade lindriga symptom», för öfright lika nummer 2. Dessutom flere öfvergångsformer». 6 dogo, af hvilka alla hade den cerebrala formen, 2 med blandning af den abdominela. — Epidemien utbredde sig ej öfver några större trakter af distriket utan inskränkte sig till vissa från hvarandra aflaggsna circumscripta ställen.»

1841. Mest frekvent i Vesterbottens l., Örnsköldsviks och Sollefteå d. af Västernorrlands län., Kopparbergs l. Eskilstuna d. af Nyköpings län, Elfsborgs län, Skaraborgs län (Björsäters socken) samt i Malmöhus län (Skytts härad).

1842. Sjukligheten större än näst föregående tvenne år. Epidemien inom Jemtlands, Gefleborgs, Kopparbergs, Örebro län, Karlstads distrikt, Enköpings och Norrtelje distr. Skaraborgs och Kalmar län, Malmöhus och en del af Kristian-

stads län (Järrestads härad). I Stockholm en epidemisk stegring af typhus och tyfoidfeber (enl. Huss).

1843. Jemtlands, Gefleborgs, Kopparbergs Örebro, Skaraborgs, Hallands, Kalmar och Gotlands län mest angripna. Sjukligheten dock mindre än 1842.

1844. Ytterligare minskning af sjukligheten. Endast i Kopparbergs (Leksands d.) Gefleborgs och Gotlands län mera anmärkningsvärda epidemier.

1845. Fortfar Vesternorrlands, Gefleborgs l., Kopparbergs l. (Söderhamns och Hudiksvalls d.) Leksands d., Grangärde¹⁾ d. Norrtelje och Mariestads d. hafva att uppvisa mera betydande epidemier.

1846. Epidemier af större betydenhet inom Vesternorrlands, Gefleborgs, Kopparbergs, Stockholms, Östergötlands, Skaraborgs, Elfsborgs och Jönköpings län. Ganska allmän på Gotland. (I Stockholm enl. Huss epidemi af typhus och tyfoidfeber.)

1847. Vesternorrlands, Stockholms, Skaraborgs, Elfsborgs, Jönköpings, Kalmar och Gotlands län komma i främsta rummet. Detta och föregående år härskade fläcktyfus temligen allmänt. Tyfoidfebern är därför dessa år svårare att följa än vanligt.

1848. Vesternorrlands, Stockholms, Skaraborgs, Kalmar, Gotlands, Blekinge och Hallands län.

1849. Endast i Vesternorrlands, Stockholms och Gotlands län mera utbredd.

1850. Vesternorrlands, Gefleborgs, Stockholms, Skaraborgs, Jönköpings län.

1851—1890.

(Nomenklatur under förra delen af denna period = föregående årtiondets. Såsom förut är nämdt, erhöllo typhus exanth. och febris typhoides först 1874 hvar sin kolumn i läkarerapporterna samt i Sundhetskollegiets årsber. Under tiden 1851—1873 äro de sammanslagna under gemensam rubrik: gastriska och nervösa eller tyfösa febrar.)

1851. Epidemier i Luleå d. Östersunds d. Kopparbergs l. (mest i Leksands d.), Västerås d., Ulricehamns d., Halmstads stad (Enteritis follicularis?). Allmän i Stockholms stad tillika med »typhus» (Huss).

1852. Epidemisk i Norrbottens län (alla 3 distr.), Västerbottens län (partiella epidemier inom alla d.), Jemtlands län (mycket utbredd epid.), Vesternorrlands län (part. ep. i flera d.), Söderhamns d. Kopparbergs län Grangärde, Faluns, Leksands d., Norrtelje d., Skaraborgs län (Lidköpings, Mariestads, och Hjo d.). Talrika fall i Lund. (I Vimmerby d. och Västerviks stad »remittenta febrar»; sannolikt frossa.) I Stockholm tyfösa febrar allmänna i okt.—nov. Dessutom äfven »remittenta febrar».

1853. Fortsättn. af epid. i Luleå d. samt i Nysätra d. Synnerligen anmärkningsvärd epidemi i Jemtland (fortsättn. från föreg. år.). I Vesternorrlands län (Sollefteå, Sundsvalls d.), Söderhamns d., mindre epidemier inom Kopparbergs

¹⁾ Distrikten anförs i allmänhet under sina nuvarande namn. Grangärde d. hette 1845 Väster-Bergslags, Leksands d. hette Rättviks, Örnsköldsviks Nätra o. s. v.

län, (Grangärde, Leksands d.) i Askersunds stad med omnejd, Uddevallatrakten, Vernamo d., några socknar af Stockholms, Skaraborgs och Malmöhus län. I Västerviks stad remittenta febrar, liknande föreg. årets. I Stockholm på hösten remittent feber.

Af dessa epidemier förtjenar den i Jemtland såsom fortsättning från 1852 pågående särskild uppmärksamhet. — De första fallen yppades redan på våren 1852¹⁾), såsom det antogs nägonstädies i landskapets södra del. På sommaren fick sjukdomen fart i Östersund och på Frösön, hvilka platser betraktades såsom den härd, hvarifrån sjukdomen, delvis genom hemvändande beväringssmanskap, spreds till alla håll. Då den inkommitt i ett hushåll angrep den ofta nog successivt alla dess medlemmar; i flera gårdar lågo alla sjuka, så att jordbruksarbetet måste skötas af främmande folk, stundom mycket svårt att anskaffa, och på flera ställen måste de friska i socknen turvis komma tillsammans för att inberga hö och säd at sina sjuka grannar, hvilka eljest vid höstens inbrott skulle nødgats finna sina lador och förrådshus tomma. — På somliga ställen kunde man tydligt spåra sjukdomens öfverförande från ett ställe till ett annat genom personlig beröring; på andra ställen däremot syntes densamma utveckla sig självständigt och utan att man kunde upptäcka någon öfverflyttning genom smitta. På sistnämda sätt uppgafs den hafva utbrutit i några långt norrut belägna socknar, där den dock ej blef synnerligen allmän, men envist höll i sig i de byar, där den en gång utbrutit. Hårdast angripna voro Brunflo, Ås, Rödön, Hackas och Frösön eller de närmast staden liggande orterna. »Eget nog förblefvo dock några alldelers intill dessa uppräknade socknar belägna, som dock med staden egde lika mycken kommunikation, alldelers fria.» Marieby, endast en mil från staden och gränsande till Brunflo, hade ingen enda sjuk. Aspås och Näskott blefvo likaledes nästan alldelers förskonade, churu genom den senare stora landsvägen från Östersund löper vesterut. Däremot var sjukdomen ganska allmän i de längre från staden belägna Undersäker, Åre, Kall och Offerdal; men Alsen, belägen intill Offerdal, gick fri. Med 1853 års slut ansågs epidemien hafva efter nära två års duration upphört. — Såsom orsaker till epidemien antagas de två föregående årens missväxt och däraf följande dåliga föda, som den fattigare befolkningen måste tillgripa, »hvarigenom småningom ett sjukdomsämne utbildades, som genom sommarens ihållande värme fätt näring och underhåll.» En så varm sommar (som 1852) hade nämligen ej i mannaminne funnits i orten. Därjämte var barometerståndet mest lägt och vädret lugnt. Hela antalet af läkarne kända sjukdomsfall var 2,069 med 157

¹⁾ Af embetsrapporterna för 1851 synes dock, att en »typhusfeber»-epidemi redan hösten detta år uppträdt i Östersunds distrikt. I sammanhang med denna epidemi nämner däv. prov.-l. Fornander, att »mycket ungt folk afgår årligen från de vestra socknarna till Lofoten för att delta i storfisket, och det är med dessa som sista nervfeberekspeditionen hemförs.» Att sådant införande af »nervfeber» skulle vara vanligt, förnekas dock af F:s efterträdare dr Grenholm.

dödsfall, därav i Östersunds stad med omkring 1,000 inv. över 400 sjuke, 17 döde, i Brunflo, 400 sj. 32 döde o. s. v.

Sjukdomens förhållande beskrifves (af dr Grenholm) på följande sätt.

Efter vanliga prodromer och ej konstant någon frysning började sjukdomen och visade sig under 3 former: 1) cerebral form, 2) abdominel form med »colliquativa diarréer», väderkolik med stark tryckning upp under bröstet, 3) den långsamma närvösa formen eller »febris lenta nervosa», utmärkt genom fränvaron af alla lokala lidanden.

»Den å huden i nervfeber förekommande egenartade eruptionen af erythem förekom äfven här, ehuru ej alltid; i lindrigare fall var detta af mera ljus färg, försvann under tryckning af fingret och upphörde snart, men då febern antog en mera svårartad och rötaktig karakter, voro dessa fläckar af en blåaktig och mörkare färg, försvunno icke för tryckning och öfvergingo till riktiga ecchymoser eller små blodblåsor (purpura buliosa), som antingen efter lång tid uttorkade eller ock öppnade sig, utgjutande en tjock, svart blod. — »Beträffande kriserna i denna sjukdom, så var det ett högst eget förhållande, att högst få, om ens någon enda riktig sådan inträffade, d. v. s. en på visst dygn inträffad vändning i sjukdomen med derefter följande förbättring, utan kunde jag ibland flere 100 sjuke, jag på landet besökte, icke påträffa någon riktig krisis och samma var förhållandet med sjuke, jag här (i Östersund) vårdade, utan öfvergick sjukdomen småningom i förbättring per lysin.» Enligt doktor Rissler i Ö. angrep den såväl barn som medelålders och äldre personer, berodde på ett contagium; »kriserna» skedde för det mesta »per lysin». Sjukdomen hade ett mycket långsamt förlopp, »varaude 5—6—8 veckor mången gång.»

Af hela denna beskrifning framgår, att man åtminstone icke kan utesluta möjligheten, att epidemien till större eller mindre del äfven omfattat fall af exanthematisk tyfus, hvarigenom också bäst förklaras den för tyroidfebern ovanliga utbredningen. Men i alla händelser torde tyroidfeber utgjort en ej ringa procent af hela sjukantalet (märk t. ex. fallens långa duration, uppgifterna, att smitta i många fall ej kunde spåras o. s. v.), och epidemien förtjenar derför uppmärksamhet.

1854. Epidemier af någon betydelse i Sundsvalls och Leksands distrikt.

1855. Mindre, partiella epidemier inom flera län. De viktigaste inom Faluns, Löfsta distr., Upsala st., Halmstads st. (här möjligen delvis epid. cerebrospinalmening.), Helsingborgs st.

(Detta är uppträdde den första större epidemien af cerebrospinalmeningit i Sverige. Företrädesvis hemsökte den de södra länen, särdeles Blekinge. Mängden städes förväxlades sjukdomen af läkarne med »typhus».)

1856. Partiel epidemi i Norrtelje distrikt (Lohärad; inom Länna och Bro på våren exanthematisk t.). I Eskilstuna st. tvifvelaktig »nervfeber» (frossa säges hafta föregått hos de fleste). (I Åtvidaberg och Vimmerby sannolikt meningit.) I Vesterviks st. remitt. gastr. feber. I Helsingborgs st. talrika fall.

1857. Torps distrikt. Söderhamns distrikt mest bland arbetspersonalen vid Askestads nya såg- och järnvägsanläggning. Af de 600 arbetare (mest norrmän och värmländer) sjuknade 126 och dugo 8. Spred sig äfven till Söderhamns stad. Sjukdomen ansågs hafva sin grund i frossan (Wikblad, som stöder sin åsigt bland annat på kinans goda verkan emot densamma). I Nyköpings distrikt såsom partiela epidemier och spridda fall synnerligen inom de intill Östersjön och dess många vikar belägna socknarne äfvensom i staden, såväl i 1:sta som i 3:dje och 4:de qvartalen, mest af abdominal form och långsamt förlopp med ringa dödligitet (Lundqvist, Martin). Daga distr., af samma natur som föreg. Uddevalla distr. och st. Lunds st. (den abdominala formen allmännast; förloppet ovanligt långsamt; obetydlig mortalitet). Åsums distr. Ystads och Helsingborgs st.

1858. I Östersunds distr. partiela epidemier. I Örnsköldsviks distrikt likaså. I Sollefteå distrikt talrika spridda fall, på våren af »cerebral» form. I Uddevalla distrikt epidemi i 3:dje qvartalet. Epidemisk i Visby stad. I Stockholms stad (bland de fattige) antalet sjuke och döde ovanligt stort, respektive 901 och 103.

1859.. I Undersåkers distrikt partiela epidemier. I Sollefteå distrikt partiela epidemier och talrika spridda fall. I Grangärde distrikt mindre epidemier af »typhus» samt spridda fall af enkla gastriska febrar. I Upsala distrikt talrika spridda fall. Partiela epidemier i Norrtelje distrikt (Röö, Fasterna, Lohärad, Ljusterö och Valö). Af de 1,415 sjukdomsfallen i Göteborgs stad voro en stor del enkel gastrisk feber. I Tjärs distrikts och Vesterviks stad talrika spridda fall. Epidemier i Ljungby distrikt. I Lunds stad talrika spridda fall. I Karlskrona distrikt tvifvelaktiga epidemier af remittent feber. Likaså i Karlshamns stad med omnejd, tillika med »cerebraltyphus».

1860. Fortfor i Grangärde distrikt. Talrika spridda fall i Norrköpings stad. För öfrigt mindre epidemier här och der.

Från och med år 1851 innehålla läkarerapporterna uppgift på antalet af de till läkaren kunskap komna sjukdoms- och dödsfallen.

Under den första tiden och i allmänhet under hela 1850-talet voro dock dessa sifferuppgifter mycket oregelbundna och hafva därför här ej upptagits för dessa år; men från 1860-talets början blifva de mera fullständiga och regelbundet förefintliga. — Då de med all sin bristfällighet dock torde kunna tagas för goda såsom mätare på tyfoidfeberns relativa frekvens är efter år i de olika distrikten, hänvisas för åren 1861—1890 till de med ledning af dem upprättade tab. I, 1—25. (De tabellerna föregående anmärkningarna torde beaktas; särskildt hvad där om den relativa frekvensen vissa år af tyfoidfeber och fläcktyfus är påpekad.)

Här göres nu blott på samma sätt som för den föregående tiden en enkel sammanställning af de viktigaste epidemierna för hvarje år i de olika länen och distrikten, hvarjämte på vederbörliga ställen de anmärkningar, som kunna vara af nöden, vidfogas.

1861. Partiela epidemier och spridda fall inom Örnsköldsviks distrikt, deribland en säkert uteslutande tyfoid-epidemi vid Husums lastageplats bland arbetspersonalen (49 sjuke, 1 död). Epidemien började i juli, nådde sin höjd i augusti och fortfor ännu, fastän i aftagande, vid årets slut. Betydande epidemi i Leksands distrikt (se nedan). Epidemi i St. Malms distrikt, i Venersborgs distrikt. Allmän i Norrköpings stad. Epidemi (partiel) i Ljungby distrikt. (I Orousts distrikt »petechialtyphus».)

Epidemien i Leksands distrikt yppades i februari i en af lägsen skogstrakt i Rättvik, där en mängd folk var samlad för timmerafvärkning och var trångt inhyst, samt utbredde sig genom de insjuknades hemförande till sina egentliga hemvist, där flera personer i deras omgivning därefter angreps, såsom i Boda, Ore, Orsa, Leksand och Mora, så att inalles 28 byar voro af sjukdomen angripne. Under vårmånaderna tilltog farsoten, ända till dess en mildare årstid medgaf, att de sjuke flyttades i uthus, då tillfrisknandet gick fortare och antalet insjuknade aftog; men på hösten tilltog farsoten åter samt visade sig då tydligt »smittosam». Epidemien var mot årets slut ännu i tilltagande. (Wettergren.) Sjukdomen torde så godt som uteslutande hafva varit tyfoidfeber (diarré med stor ömhet öfver buken; sällan kriser »genom allmän svettning eller ökad urinafsöndring», utan inträdde konvalescensen »per lysis»; petechier observerades aldrig af läkaren, »men väl på några les taches rosées lenticulaires»).

1862. Epidemien i Leksands distrikt fortfor. Talrika spridda fall i Kristinehamns stad med omnejd. Partiela epidemier i Göteborgs och Häby distrikter. Partiela epidemier i Venersborgs, Alingsås', Ulricehamns, Lidköpings, Hjo och Broby distrikter.

1863. Fortfor ännu i några socknar af Leksands distrikt. Partiela epidemier inom Filipstads distrikt och stad, Norrtelje, Uddevalla, Ronneby och Slite distrikt. I Nyköpings distrikt talrika spridda fall.

1864. Partiela epidemier i Gefle distrikt och i staden Gefle gängse hela året (ren tyfoidfeber, »endast i 2 fall antog febern tyfös form»). Epidemien i Filipstads distrikt och stad fortfor. Partiel epidemi samt talrika spridda fall i Kristinehamns stad med omnejd. Partiela epidemier i Norrtelje. Allmänt spridd i Nyköpings distrikt. Epidemi i Orousts distrikt. (Ingen antydan, att sjukdomen skulle varit »petechialtyphus» såsom år 1861.) Partiel epidemi inom Malmö distrikt, likaså i Brösarps distrikt. Partiela epidemier i Slite d. (I staden Ystad en epidemi på hösten, »mest af petechial form med långsamt förlopp».)

1865—1873. Beträffande de »tyfosa febrarnes» förhållande i Sverige från och med 1865 in på 1870-talet må följande anmärkas.

Såsom af tab. I, 26 framgår, inträdde år 1866 en ansenlig stegring af antalet uppgifna fall af tyfus och tyfoidfeber; först 1871 nedgår siffran till en höjd, som sedan en längre följd af är är ungefär medelhöjden.

Redan denna plötsliga och betydliga stegring, hvartill intet af de senare åren

har att uppvisa något motstycke, framkallar det spörsmalet, huruvida icke fläcktyfus med sitt kända epidemiska uppträdande härvidlag spelat en mer eller mindre betydande roll. — Undersöka vi nu förhållandet inom de olika länen, så finna vi, att stepringen först gör sig gällande i Göteborgs, Malmöhus och Kristianstads län, i hvilka siffrorna för 1864 och 1865, jämförda med hvarandra, visa en betydlig öfvervikt på det senare året. En tendens till stigning tyckes också redan från detta år förefinnas i Elfsborgs län. Därnäst komma Norrbottens och Västerbottnens län, i hvilka skilnaden mellan 1866 och 1867 års siffror äro högst betydande. 1868 komma först och främst Västernorrlands och Gefleborgs län med en höjning af sjukantalet från resp. 170 (1867) till 1,243 (1868) och 441 (1867) till 2,378 (1868). Vidare samma år Kopparbergs, Västerås, Kalmar, Kronobergs och Blekinge län med mera betydande stepringar. I de förstnämnda länen hade stigningen under tiden nästan jämt fortgått ar från år. Maximum uppnåddes för hela riket år 1868, hvilket år äfven de flesta nu ej uppräknade länen förete mer eller mindre höjda siffror. I Göteborgs, Elfsborgs, Kalmar, Kronobergs, Blekinge, Värmlands (och Hallands) län steg sjukantalet först 1869 eller 1870 till sin högsta höjd.

Men hvad säga oss läkarerapporterna från dessa år för öfritt?

Hvad först Göteborgs län angår, finnes redan år 1861 en epidemi inom Orousts distrikt uttryckligen angifven såsom »fläcktyphus» och samma år anmäles denna sjukdom från Göteborgs stad. För öfritt finnas fall af exanthematisk tyfus uppgifna åren 1867—1870 från Lysekil, 1869—1870 från Orousts och Mölndals distrikt samt Göteborgs stad, där den dessa år antog formen af en betydligare epidemi¹⁾. — År 1866 skrifver provinsialläkaren på Oroust: »anmärkningsvärdt är det särdeles betydliga exanthemet». Från Uddevalla distrikt rapporteras 1867: »den form, hvarunder sjukdomen mest uppträdde, var typhus petechialis eller exanthematicus, átminstone under större delen af året; exanthemet förefans öfver nästan hela kroppen». Från andra distrikt i länet åter uppgives, att den abdominala formen vore den, som uteslutande iakttagits (t. ex. Haby, Jörlanda, Tanum), ehuru å andra sidan vanligen anmärkes, att »smitta synes påtaglig» o. d.

Från de öfriga länen förekomma visserligen enstaka fall af »petechialtyfus» etc. uppgifna, t. ex. från Norrbottens (Piteå stad), Hernösands, Gefleborgs (Bollnäs distrikt), Kalmar, Blekinge m. fl. län, men för öfritt inga närmare meddelanden. Mycket ofta förekommer under denna tid den förut omnämnda indelningen af »typhus» i »cerebral» och »abdominal». Dessa symptomatiskt bestämda termer gifva dock ingen upplysning om förhållandet mellan fläcktyfus och tyfoidfeber, om det ock mången gång synes antagligt, att den »cerebrala formen» i det närmaste sammanfallit med fläcktyfus och den »abdominal» med tyfoidfeber.

Af det anförda framgår emellertid, att exanthematisk tyfus under nu afhand-

¹⁾ Se tab. I, 14, ävensom Hygiea 1870, sid. 441; Langell.

lade period faktiskt förekommit i olika delar af landet. (Samtidigt uppträdde den för öfrigt i Norge, såsom i Kristianiatrakten, Tromsö och Finmarkens amt¹⁾) Men i hvilken proportion den jemte tyfoidfebern förekommit, därom kan man endast undantagsvis bilda sig en föreställning. Att döma af flere uttalanden i läkare-rapporterna synes dock tyfoidfebern på många ställen varit öfvervägande, och osannolikt är därfor ej, att denna åren 1865—1871 uppträdt med ej obetydligt ökad frekvens.

För berörda period eller rättare ända till 1874, då tyfoidfebern som nämdt erhöll egen kolumn i rapporterna, måste epidemiuppgifterna emellertid mottagas med ännu starkare reservation än den förut genomgångna tiden sedan 1851.

1865. Partiela epidemier i Undersäkers distrikt (»så ofta, att jag nästan känner benägenhet antaga, att en längre vistelse här skall sätta mig i tillfälle att öfverflytta dem bland de endemiska sjukdomarna»; Christiernson). Partiela epidemier i Torps distrikt. Epidemien i Gefle stad fortfor. Epidemier inom Grangärde och Leksands distrikt. Likaså i Kristinehamnstrakten, Arvika och Gillberga distrikt. Fortfor i Filipstads distrikt. Partiela epidemier i Norrtelje distrikt. Allmän i Nyköpings distrikt och stad. Partiela epidemier i Orousts, Haby och Uddevalla distrikt samt Uddevalla stad. Vidare i Alingsås, Oskarshamns, Malmö distrikt, städerna Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Ystad (blott från Helsingborg uppgifves, att en del exanthematisk typhus förekom jämte tyfoidfeber), Kristianstads distrikt och stad.

1866. Partiela epidemier i Haparanda distrikt och stad. Talrika spridda fall i Östersunds distrikt. Partiela epidemier i Torps distrikt. Talrika fall i Kristinehamn med omnejd. Partiela epidemier i Norrtelje distrikt. Allmän i St. Malms distrikt. Tyfosa febrar allmänna i form af partiela epidemier inom hela Göteborgs län, Norra Dalslands, Ulricehamns och Alingsås distrikt samt Venersborgs stad. Epidemi i Hofva distrikt. Partiela epidemier i Linköpings distrikt. Epidemi i Vrigstads distrikt. Ljungby distrikt. I hela Malmöhus län större och mindre epidemier. Partiel epidemi i Klippans distrikt. Flera epidemier i Karlskrona distrikt.

1867. Partiela epidemier i Norrbottens län, Bollnäs och Hudiksvalls distrikt. Allmän i och kring Kristinehamn, likaså i Norrtelje och Nyköpings distrikt. Epidemier i hela Göteborgs län, i en del af Elfsborgs län, i Linköpings och Motala distrikt samt i Malmöhus län, ehuru här med mindre frekvens än 1866. Epidemi i Karlshamns stad.

1868. Partiela epidemier i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gefleborgs, Kopparbergs, delar af Värmlands, hela Göteborgs, delar af Elfsborgs och i mindre utsträckning Skaraborgs, en del af Kalmar, af Jönköpings och Krono-

¹⁾ Se Boeck, Norsk Magaz. f. Lægevidensk. 1874 sid. 241 och följ. — Till ett par ställen i södra Norge uppgifves sjukdomen t. o. m. hafva öfverförts från Sverige; å andra sidan ansågs »närvfeber« införd från Norge till Häby distrikt 1866.

bergs, större delen af Malmöhus och Kristianstads, i Blekinge och Gotlands län. För öfritt mindre epidemier i städerna Arboga och Västerås, Upsala, Linköping och Halmstad samt Tibble, Motala och Falkenbergs distrikt.

1869. Epidemier i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gefleborgs, Kopparbergs, Värmlands, Göteborgs, Elfsborgs, Kalmar, Kronobergs, Malmöhus och Blekinge län mera betydande.

1870. Allmän i Visnums distrikt och Karlshamns stad. Epidemier i Grangärde och Östhammars distrikt, Göteborgs län, delar af Elfsborgs, Kalmar och Kronobergs län samt Halmstads stad.

1871. Allmänt minskad. Ännu betydande epidemier i Göteborgs län. Epidemi i Trollhättans distrikt. Allmän i Karlskrona, Helsingborg m. fl. städer.

1872¹⁾. Fortfor i Grangärde distrikt. Uppträdde på hösten i Nora distrikt. Allmän i Norrtelje distrikt, Eskilstuna distrikt och stad, Häby, Tjärs, Ekeberga och Växiö distrikt. Epidemi vid Finspong. Epidemi i Helsingborgs stad, i Engelholms distrikt och stad(?). I Karlskrona distrikt och stad allmän.

1873. Allmän i Gefle stad och i Söderhamns distrikt. Fortfor i Grangärde distrikt. Epidemier i Leksands och Mora distrikt. Epidemier i Linde distrikt och stad (hade här börjat hösten 1872), fortsättning af epidemien i Nora distrikt. Epidemi i Ljusnarsbergs distrikt. Allmän i Norrtelje distrikt. Uppträdde med nya fall i Eskilstuna distrikt och fortfor i staden sedan förra året. Partiela epidemier i Göteborgs och Linköpings distrikt. Fortfor i Tjärs distrikt. Allmän i Helsingborgs distrikt och stad.

1874²⁾. Allmän i Gefle distrikt och stad, Söderhamns och Hudiksvalls distrikt. Fortfor i Leksands distrikt. Uppträdde äno i Ljusnarsbergs distrikt med hopade fall. Allmän i Norrtelje distrikt. Fortfor i Eskilstuna stad och distrikt. Epidemi i Sköfde stad (sedan 1873), äfven i Söderköpings stad, där den redan 1872 på hösten började blifva allmän. Epidemi i Karlskrona och Visby distrikt.

1875. Allmän i Gefle stad. Fortfor i Leksands distrikt. Allmän i Norrtelje distrikt. Fortfor i Eskilstuna stad. Epidemi i Trollhättans distrikt. Fortfor med ökad freqvens i Söderköpings stad. Partiela epidemier i Tjärs distrikt. Fortfor i Karlskrona distrikt. Talrika fall i Visby distrikt.

¹⁾ Detta är uppträdde i Jemtland och Herjedalen en sjukdom, som af allmogen kallades »lemmelfebern», enär den ansågs härleda sig från fjäll-lemlarne, hvilka detta år under sommaren och hösten i väldiga skaror översvämmade vissa trakter, där sedermera på marken och i brunnar etc. påträffades stora massor af de döda och i förruttnelse stadda djuren, som på ett vidrigt sätt förpestade luft och vatten. Sjukdomen identifierades af läkarne med tyfoidfeber, men torde väl hafva varit beroende på en intoxikation genom brunnsvattnet, som på antydt sätt förorenats. (Se Sundhets-Collegii Berättelse 1872.) Jfr angående »lemmelfebern» äfven *Johannesen*, Die epidemische Verbreitung des Scharlachfebers in Norwegen. Sid. 134.

²⁾ Först fr. o. m. detta år förekommer tyfoidfebern »ren». De första åren af perioden hafva dock ännu en del fall af exanth. tyfus måhända sammanförts med tyfoidfebern.

1876. Allmän i Gefle stad, Hedemora och Leksands distrikt, i Arboga stad. I Eskilstuna stad afslutades med detta år den epidemiföljd, som börjat 1871. Epidemi i Motala distrikt (mest bland värkstadens arbetare) och vid Finspongs bruk. Allmän i Tjärs, Tingsås och Karlskrona distrikt. Epidemi i Visby stad.

1877. Epidemier i städerna Åmål och Venersborg. Partiel epidemi i Kisa distrikt. Allmän i Oskarshamns stad och Tjärs, Växiö, Tingsås, Kungsbacka samt Karlskrona distrikt.

1878. Talrika hopade fall i Falu stad och Ramsbergs distrikt. Allmän i Orousts, Uddevalla och Häby distrikt. Epidemierna i Åmål och Venersborg fortfor. Epidemi i Mariestads stad. Talrika fall i Hjo distrikt. Epidemien i Kisa distrikt fortfor. Epidemi i Åtvidabergs och Linköpings distrikt. Betydlig epidemi i Tjärs distrikt (mest Gamleby köping). Särdeles betydande epidemi i Jönköpings stad. Talrika fall i Tingsås distrikt. Allmän i Landskrona stad. I Karlskrona stad en epidemi af tyfoidfeber, som dock ej fullt motsvarar, hvad man vanligen förstår med det namnet, alldenstund ett af de hufvudsakligaste tecknen, ulceration af tarmkörtlarna, så vidt mig är bekant, helt och hället saknades, och kan således namnet strängt taget endast så till vida försvaras, att med tyfoidfeber kan förstås en tyfusartad eller quasi-tyfös feber. Den har utgjorts af en remittent gastrisk feber eller akut magkatarr med mer eller mindre starkt utpräglad affektion af nervsystemet. Visade förkärlek för vissa, inskränkta lokaler, var smittosam, men svårt att säga till hvilken grad» (Carlsson).

1879. Epidemi i Eskilstuna stad. Allmän i Uddevalla och Hjo distrikt. Epidemi vid Finspong. Epidemien i Åtvidabergs distrikt fortfor. Partiel epidemi i Tjärs distrikt. Allmän i Anderslöfs distrikt. Den förutnämnda epidemien i Karlskrona fortfor. Inskränkta epidemi i Stockholm.

1880. Allmän i Norrtelje distrikt. I Stockholms distrikt en lokalepidemi sedan hösten 1879 (Årstadal). Allmän i Hjo distrikt. Epidemi vid Finspongs bruk fortfor i början af året och upphörde på våren; uppträdde åter häftigt i augusti och fortfor vid årets slut. Epidemi i Kalmar stad. Allmän i Tjärs distrikt. I städerna Malmö och Lund epidemi. Talrika fall i Karlskrona och Hemse distrikt.

1881. Allmän i Hjo och Tjärs distrikt. I Malmö stad två epidemiska stegringar.

1882. Epidemi i Haparanda och Neder-Kalix distrikt. Allmän i Gefle distrikt. Hopade fall i Kristinehamns stad. Epidemi i Köpings stad. Allmän i Norrtelje distrikt. Lokalepidemi i Stockholms distrikt (Årstaäng). Allmän i Hjo distrikt. Inom Linköpings distrikt en mängd smärre epidemi. Talrika fall i Växiö distrikt. Märklig epidemi i Ronneby distrikt. Många fall i Hemse distrikt.

1883. Talrika fall i Gefle, Västerås, Norrtelje och Hjo distrikt samt Helsingborgs stad.

1884. Epidemi i Över-Luleå distrikt. Några inskränkta epidemi i Örn-

sköldsviks distrikt. (I en by i Skarpeds socken höll den sig hela året och angrеп nästan alla invånare.) Talrika fall i Leksands distrikt. Epidemi i Sala stad. Partiela epidemier i Göteborgs distrikt. Talrika fall i Hjo distrikt. Epidemier i Kalmar distrikt och stad. Allmänt i städerna Jönköping och Malmö.

1885. Små epidemier i Eskilstuna distrikt. Talrika fall i Hjo distrikt. Partiela epidemier i Stranda distrikt. Lokalepidemi i Varbergs stad.

1886. Allmän i Gefle stad. Epidemier (partiela) i Leksands distrikt. Epidemi i Örebro stad. Epidemier inom Östhammars distrikt. Talrika fall i Uppsala stad, likaså i Nyköpings distrikt. Epidemi i Trollhättans distrikt. Talrika fall i Hjo och Falköpings distrikt. Epidemi i Vadstena. Talrika fall i Tjus distrikt.

1887. Partiela epidemier i Örnsköldsviks distrikt. Epidemierna i Leksands distrikt fortforo. Epidemien i Örebro stad fortfor likaledes. Partiel epidemi i Ljusnarsbergs distrikt. Epidemi i Eskilstuna. Ovanligt många fall i Göteborgs stad. Talrika fall i Hjo och Tingsås distrikt. Partiel epidemi i Ronneby distrikt.

1888. Partiela epidemier i Öfver-Luleå och Piteå distrikt. Fortfor i Ljusnarsbergs distrikt. Partiela epidemier i Naums distrikt. Epidemien i Ronneby distrikt fortfor.

1889. Märkliga epidemier i Pajala (hela Pajala socken), Haparanda och Neder-Kalix (Gellivara socken) distrikt. Talrika fall i Leksands och Silbodals distrikt. Betydande epidemi i Örebro stad, äfven inom Örebro distrikt. Svår epidemi på hösten i Köping. Partiel epidemi (svår) i Häby distrikt. Fortfor i Naums distrikt hela året. Epidemi i Skara stad och Ölands södra distrikt. Talrika fall i Växiö distrikt. Allvarsam lokalepidemi i Åsums distrikt.

1890. Partiela epidemier i Örnsköldsviks och Sundsvalls distrikt. Fortfor första halvåret i Häby distrikt. Epidemi inom Ödeshögs distrikt.

Tyfoidfeberns förhållande i Sveriges olika delar, på landsbygd och i städer. Tyfoidfeberns frekvens under olika tidrymder.

Den föregående framställningen har endast afsett att i grofva drag gifva en översikt öfver tyfoidfeberns förekomst i landets olika delar år från år, för så vidt denna framgått af läkarerapporternas uppgifter, för äldre tider i form af mera allmänna uttalanden men från och med 1851 äfven uttryckta i siffror, hvilkas ringa värde i detta afseende dock förut påpekats. Något exakt uttryck för tyfoidfeberns relativa frekvens, vare sig i olika delar af landet på samma tid eller i hela landet och dess olika områden under olika tider, hafva vi genom denna framställning naturligtvis ej kunnat finna. Dessa frågor äro dock af synnerligt stort intresse och fordra nu i främsta rummet en undersökning, hvarvid det synes lämpligt att delvis behandla båda i samband med hvarandra.

Såsom en historisk inledning utöfver det redan anförda till nedanstående statistiska utredning må i största korhet sammanställas de uppgifter, som i den tryckta litteraturen och läkarnes embetsrapporter finns angående »närvfeberns» älsklingstillhåll i Sverige. Det är förnämligast Bergs och Huss' ¹⁾ sammanställningar af de för olika landskap och län »endemiska» sjukdomarne, som här jämte uttalandena i en del senare läkarerapporter refereras. Vi genomforska landet från norr till söder.

Från de två nordligaste landskapen, *Vesterbotten* och *Lappland*, föreligga från äldre tider inga uttalanden, som antyda, att »närvfeber» där skulle varit någon vanlig gäst. I de föregående årsöfversikterna anträffas nog en och annan gång äfven dessa landsdelar, men om de rapporterade fallen varit tyfoidfeber eller exanthematisk tyfus, kan sällan afgöras; om frekvensen lämna dessa äldre uppgifter för öfright ingen föreställning. År 1838 omtalas från Åsele säker tyfoidfeber sporadiskt förekommande (Se ofvan).

Angående *Jemtland* anförf Berg ¹⁾ efter prov.-läk. Fornander (1851), att »närvfeber går mer eller mindre, mest hvarje år, är sällan dödlig, men har ofta den

¹⁾ Berg F. Th. anf. arb. Huss, Om Sveriges endemiska sjukdomar.

egenheten att gå huset runt och successivt nedlägga allt husfolket, innan den upphör». Fornander fortsätter i sin rapport: »*tyfusfebrar* äro icke så allmänna» etc. Häraf tyckes framgå, att den förstnämnda »närvfebern» måtte hafva varit tyfoidfeber, som sälunda den tiden skulle varit ganska vanlig i Jemtland. Angående den stora epidemien åren 1852—1853 är ofvan taladt. Jämför äfven öfversikten för 1865, Undersäkers d.

Från *Ångermanland* och *Medelpad* finnas i äldre tider flera »nervösa feberepidemier» omnämnda. (Se årsöfversikterna.) Då äfven i nyare tider tyfoidfeber faktiskt förekommit ganska frekvent i somliga distrikts, är det ej osannolikt att många äldre uppgifter verkligun kunna hämföras till tyfoidfebern.

Gestrikland och *Helsingland* påträffas ofta i årsöfversikterna men några direkta uttalanden om närvfeberns frekvens finnas ej.

I *Dalarne* äro i synnerhet Grangärde och Leksands distrikts de orter, hvarifrån närvfeber tids och ofta rapporteras. (Se årsöfversikterna). Att sjukdomen åtminstone i det sistnämnda distriktet öfvervägande varit tyfoidfeber torde vara visst.

Från *Värmland* finnas inga äldre uppgifter af vikt för bedömande af tyfoidfeberns frekvens därstädes. Af Tab. I, 7 synes, att siffrorna för Kristinehamn på 1860-talet äro anmärkningsvärdt höga; men dessa omfatta till och med 1873 staden *med omnejd*, och huru långt den senare sträckte sig, är naturligtvis ej angivet.

Vestmanland och *Nerike* intaga, för så vidt af äldre uppgifter kan dömas, ingen framstående plats såsom närvfeberorter.

Så mycket mera hafva vissa trakter af *Upland* i berörda hänseende lätit tala om sig. Om ryktet i allo varit berättigadt, är en annan sak. Med säkerhet torde detta vara förhållandet med Norrtelje distrikt. På 1840-talet uppgafs »närvfeber» (efter beskrifning med all säkerhet tyfoidfeber) sedan lång tid tillbaka vara en årlig gäst i distrikttet, i synnerhet uti de af en mängd sjöar, kärr och mossar uppfyllda socknarne Lohärad, Edsbro och Fasterna. Den nämdes också här uttryckligen såsom »endemisk». Af Tab. I, 11 synes, att förhållandet efter 1861 ingalunda vederlägger denna uppfattning.

Vidare nämnes närvfebern endemisk i Upsilontrakten. Huru mycket af den bekanta »Upsilonafebern» utgjordes af verklig tyfoidfeber, torde likväl såsom ofvan visats, vara ovisst. Säkert är, att tyfoidfebern omkring 1850 ej var vanligare i Upsilontrakten än på andra ställen, hvilket också anmärkes af Huss²⁾. Och från senare tider finnes intet, som tyder på, att nämnda trakt skulle vara något älsklingsställe för tyfoidfebern.

Af *Södermanlands* olika delar nämns Nyköpings och Eskilstuna distrikts såsom härdar för tyfoidfebern, som där förekommit i talrika spridda fall ungefär lika alla år och alla årstider.

¹⁾ Anf. arb. sid. 23.

²⁾ Sveriges End. sjukd. sid. 32.

Från *Bohuslän* och *Dalsland* finnas för äldre tider foga nämdt i detta afseende. (Jämför årsöversikterna!)

Beträffande *Västergötland* uppgafs på 1840-talet, att »gastriska närvfebrar» voro mycket vanliga i Kinds härad (Ulricehamns distr.).

I *Östergötland* synes icke »närvfebern» i äldre tider ådragit sig någon särskild uppmärksamhet från läkarnes sida.

Hvad *Småland* angår, må nämnas, att »gastriska och närvösa» febrar i äldre tider mycket ofta omtalas från större delen af Kalmar län. Det är dock svårt att bestämma, huru mycket häraf, som tillkommer tyroidfebern eller de där vanliga sommar- och höstfrossorna (Augustifebrar, remittenta gastriska febrar o. s. v.) För öfrigt härjade ofta »tyfösa febrar» i åtskilliga trakter af landskapets inre del, men om sjukdomens natur kan man ofta nog ingenting med säkerhet afgöra; sannolikt har det ganska ofta varit fläcktyfus.

Om *Halland* gifva äldre uppgifter intet anmärkningsvärdt vid handen.

Hvad *Skåne* beträffar, anföres af Berg¹⁾, att »gastriska och närvösa febrar hvarje år förekomma mer eller mindre talrikt i tvenne sumpiga dalsträckningar inom Söfde och Östraby socknar af Åsunds distrikt». Dessutom anmärkas särskilt epidemier af »närv- och rötfeber» i den del af Kristianstads distrikt, som gränsar mot Småland.

Om *Blekinge* finnas från äldre tider inga direkta uttalanden af vikt.

På *Gotland* skall enligt uppgifter från 1830- och 1840-talen sedan länge härskat en endemisk närvfeber, af prov.-läk. Fant kallad »den gotländska bondfebern». Den uppkom vanligen vår och höst, särdeles under den sistnämnda årstiden, efter höbergningen i träskan och myrarne i de trakter, hvilka voro belägna omkring dylika. Den beskrevs som en godartad närvfeber, »stundom uppträdande med öfvervägande symptom från hufvudet, stundom från de gastriska organen, stundom åtföljd af fläckar på huden, stundom utan dylika. De första fallen äro merendels svårast; men ju längre sjukdomen varat på ett ställe, desto mildare blir karakteren»²⁾. I början af sitt uppträdande visade den sig tydligt smittosam och spreds då ofta genom begravningar och dessa åtföljande kalas; men allt efter som den sedan fortplantades genom allt flera led, aftog denna dess egenskap mer och mer.

Men den verkliga inbördes ställningen af vårt lands olika delar med afseende på tyroidfeberns frekvens angifves som sagdt ej af dylika uppgifter. För de äldre tiderna torde dock äfven den ofvan gjorda sammanställningen af dessa uppgifter hafva något intresse. För senare år finnas för en jämförelse af olika landsdelar ett värdefullare, af sifferuppgifter bestående material. Att detta är långt ifran fullkomligt eller i vissa punkter tillfredsställande, är förut med tillräcklig tydlig-

¹⁾ Anf. arb. sid. 137.

²⁾ Se Huss. End. sjukd. sid. 78.

het framhället. Men utan tvifvel är det likväl värdt en bearbetning. Man må blott komma ihåg, att slutsatserna måste göras med stor försiktighet.

Angående de i detta och följande kapitel meddelade statistiska undersökningarna må en gång för alla framhållas, att de allesamman inskränkas till tiden från och med 1874 eller i många fall från och med 1876. Det är nämligen flera gånger påpekad, att tyloidfebern först 1874 i den medicinska (d. v. s. den af Med. Styrelsen) uppgjorda statistiken erhöll en självständig plats, uppträddé så att säga ren och oblandad. (Dessutom torde äfven de första åren efter den nya ordningens införande en del fall af typhus exanth. af läkarne sammanförts med tyloidfebern, men i väsentlig mån kan detta icke invärka på uppgifterna beträffande den senare för dessa år.)

Hvad åter angår hithörande uppgifter i den officiela döds-statistiken, har denna från och med 1861 till och med 1880 en rubrik för närvfeber och en för hjärnfeber; från och med 1881 äro närvfeber och hjärnfeber sammanslagna under en rubrik, hvarjämte i särskilda noter angivs alla de under densamma upptagna fallen af *epidemisk* hjärnfeber.

Under rubriken närvfeber rymmes sálunda under hela tiden från och med 1861 dödsfallen både i fläcktyfus och tyloidfeber (rubrik för »fläckfeber» finnes ej) samt från och med 1881 dödsfallen i epidemisk hjärnfeber, hvilka dock på grund af noterna kunna utgällras¹⁾.

Å andra sidan är det icke osannolikt, att åren 1861—1880 under rubriken hjärnfeber utom epidemisk hjärnfeber och möjligen ännu andra sjukdomar äfven upptagits åtskilliga dödsfall af tyloidfeber, då det är otvifvelaktigt, att icke alla dödsorsakerna konstaterats af läkare, och då tyloidfebern, särskilt hos barn, bland allmänheten mängen gång torde gå och gälla såsom »hjärnfeber». Den hastiga minskningen af antalet dödsfall i »hjärnfeber», om man jämför åren 1880 och 1881, ger åtminstone anledning att misstänka något dylikt. Detta skulle således åren 1861—1880 göra antalet dödsfall i fläcktyfus och tyloidfeber otillbörligt lågt i jämförelse med tiden från och med 1881. Detta förhållande bör här nedan uppmärksammas.

Hvad beträffar den störande invärkan, som sammanslagningen af fläcktyfus och tyloidfebern utöfvar på den senares statistik, är det att märka, att fläcktyfus sedan år 1875 förekommit i så ringa antal fall årligen jämfört med tyloidfebern, att det knappast har någon betydelse, åtminstone i stort sett. Att den däremot på 1860-talet och början af 1870-talet torde hafva varit mera frekvent, är förut antydt. Men från och med 1876, sedan den sista fläcktyfusepidemien i Stockholm upphört, har högst ett 50-tal dödsfall årligen af läkarne rapporterats²⁾.

¹⁾ Under »närvfeber» upptagas och de till högst några tiotal årligen uppgående dödsfallen af Gula febern utomlands. Äfven dessa äro särskilt anmärkta och kunna sálunda utgällras.

²⁾ I Blekinge län år 1877: 18 dödsf., 1879: 10 dödsf., 1880: 17 dödsf. I Stockholms stad 1876: 10 dödsf. s. å. i Göteborgs län 13 dödsf. Dessa tal torde böra tagas i betraktande vid bedömande af nedanstående tabell

Ett tredje slags numeriska uppgifter föreligga uti de sammandrag af dödsorsakerna i städerna, som allt sedan 1875 göras af vederbörande hälsovårdsnämder.

Här nedan jämföras nu med hvarandra dels de olika länen, dels läkaredistrikten, dels slutligen samtliga rikets städer.

För en jämförelse af länen kunde man använda antingen de af läkarne lämnade årliga uppgifterna på antalet sjuka och döde i resp. distrikt, eller dödssiffrorna i vår officiela statistik. Jag har för detta ändamål föredragit de senare, på den grund, att de utan tvifvel äro mera likformiga år efter år och för olika delar af landet samtidigt. För beskaffenheten af de förra torde vara tillräckligt redogjordt i inledningen. Vid dödssiffrorna läda visserligen utom osäkerheten i fallens diagnos äfven den ofullkomligheten, att de icke direkt angifva sjukdomens frekvens. Utan tvifvel företer tyfoidebern ej obetydliga växlingar i malignitet och relativ mortalitet, men sannolikt utjämnas dock olikheterna inom så stora områden som länen eller på en så lång tid som en 5-års-period, hvilka båda rumsp. tidsstorheter här äro använda. Man torde således härvidlag kunna anse dödstalen sásom tillfredsställande mätare af sjukdomsfrekvensen.

Å nästföljande tabell äro nu länen ordnade efter den relativa frekvensen af tyfoidebern inom de samma, för så vidt den kan representeras af *dödstalen* d. v. s. antalet döde årligen, här beräknadt på 10,000 lefvande. Ordningen är bestämd genom dödstalens storlek i genomsnitt årligen under hela perioden 1876—1890. I särskilda kolumner följa så dödstalen för de olika länen under hvar och en af 5-årsperioderna 1876—1880, 1881—1885, 1886—1890. Dödstalen för hvarje särskildt år äro upptagna å Tab. II. i bihanget och kunna äfven afläses på den dit-hörande grafiska taflan. Dödstalen för hela perioden 1876—1890 och för 5-års-perioderna äro uträknade sásom *medeltal* af de olika årens dödstal.

För att åskådliggöra proportionen mellan siffrorna har jag i enlighet med ett numera inom statistiken brukligt förfaringssätt uträknat storleken af dödstalen jämförda med det för perioden 1876—1880 angifna, om detta sättes lika med 100 (»dödstalens mätare»¹⁾).

De absoluta tal²⁾, genom hvilka dödstalen uträknats, äro å ena sidan som nämndt den officiela statistikens dödsfall af närvfeber, med fränräknande af gula febern och för 1881—1890 af epidemisk hjärnfeber, å andra sidan länens och rikets årliga medelfolkmängd, uträknad på grund af befolningsstatistikens uppgifter om folkmängden den 31 dec. hvarje år³⁾.

Städerna äro inräknade i länen med undantag af Stockholms stad, som behandlas särskilt i jämbredd med länen.

¹⁾ Se Linroth: Dödsorsakerna och Dödigheten i Sthlm 1871—1890, sid. 5.

²⁾ Dessa måste tyvärr för besparande af utrymme utlämnas.

³⁾ Dessa tal äro för likformighetens skull här äfven använda för Stockholms stad. Häraf den ringa olikhet, som förefinnas mellan siffrorna för Sthlm å nedanstående tabell å ena sidan och å den andra dels de siffror, som synas å den tabellariska jämförelsen mellan städerna i denna afhandling, dels Linroths siffror i hans nyssnämda arbete. L. använder nämligen dödssiffrorna i Sthlms sanitära stat. och den årliga *mantals-skrifna* medelfolkmängden.

(Det bör anmärkas, att i den officiela statistiken alla dödsfall äro hämförda till de resp. orter, där de döde varit kyrkoskrifna, oberoende af den ort, där dödsfallet inträffat. Denna oegentlighet i rent medicinskt-statistiskt hänseende torde dock i stort sedt ej betyda mycket, då sannolikt det ömsesidiga utbytet emellan länen af de på annan ort än kyrkoskrifningsorten inträffade dödsfallen ungefär återställer jämvikten, så att man kan betrakta de uppgifna dödsfallen såsom hafvande samtliga inträffat å kyrkoskrifningsorten.)

Döde af tyfoidfeber (»närvfeber«) i medeltal årligen på 10,000 invånare i Sveriges olika län samt hela riket åren 1876—1890:

		Dödstal åren				Om dödstalen för åren 1876—1880 = 100			
		1876— 1890	1876— 1880	1881— 1885	1886— 1890	1876— 1890	1876— 1880	1881— 1885	1886— 1890
Gefleborgs	län.....	3,9	3,3	3,9	4,5	118	100	118	136
Blekinge	”	3,8	5,2	3,6	2,6	73	100	69	50
Malmöhus	”	3,8	4,1	4,2	2,9	93	100	102	71
Kalmar	”	3,2	3,8	3,3	2,4	84	100	87	63
Vestmanlands	”	3,2	3,0	3,8	2,8	107	100	127	93
Upsala	”	3,1	2,7	3,2	3,5	115	100	119	130
Stockholms	”	2,9	3,8	2,9	2,1	76	100	76	55
Kopparbergs	”	2,9	2,7	2,7	3,3	107	100	100	122
Kristianstads	”	2,8	3,1	3,3	2,0	90	100	106	65
Örebro	”	2,7	3,0	2,5	2,5	90	100	83	83
Stockholms stad	2,6	4,1	2,3	1,6	63	100	56	39
Södermanlands	län.....	2,6	2,7	2,7	2,3	96	100	100	85
Östergötlands	”	2,5	2,8	2,6	2,2	89	100	93	78
Gotlands	”	2,5	2,8	3,3	1,5	89	100	118	54
Hallands	”	2,5	2,3	3,1	2,0	109	100	135	87
Kronebergs	”	2,3	2,7	2,4	1,8	85	100	89	67
Göteborgs	”	2,3	2,5	2,3	2,0	92	100	92	80
Skaraborgs	”	1,9	2,1	2,0	1,5	90	100	95	71
Jönköpings	”	1,8	2,4	1,8	1,3	75	100	75	54
Norrbottens	”	1,8	0,9	1,3	3,2	200	100	144	356
Elfsborgs	”	1,7	2,4	1,4	1,2	71	100	58	50
Värmlands	”	1,7	1,8	1,7	1,6	94	100	94	89
Vesternorrlands	”	1,6	1,0	1,8	2,1	160	100	180	210
Jemtlands	”	1,3	1,1	1,2	1,5	118	100	109	136
Vesterbottens	”	1,0	1,3	0,9	0,9	77	100	69	69
Hela riket	2,5	2,8	2,6	2,2	89	100	93	79

Af ofvanstående tabell framgår, att tyloidfebern, som på ofvan anförda grunder kan anses åtminstone i det närmaste ensamt representerad af de upptagna dödsiffrorna¹⁾, under perioden 1876—1890 inom de olika länen haft en ganska olika frekvens. Skilnaden mellan de län, som stå främst i ordningen, och de, som intaga de sista rummen, är allt för påtaglig för att kunna förklaras såsom till någon större del beroende på uppgifternas otillförlitlighet, olika relativ mortalitet eller tillfälliga omständigheter; utan tvifvel gifva siffrorna ett nägorlunda riktigt uttryck för den verkliga, relativa frekvensen af sjukdomen inom de olika länen.

Rörande frågan, i hvad män den ordning, i hvilka länen komma i förhållande till hvarandra, kan berättiga till några slutsatser angående *orsaken* till sjukdomens olika frekvens på de skilda områdena, må här blott några allmänna synpunkter framhållas, då det icke är min afsikt att i denna afdelning närmare ingå på det etiologiska områdets detaljer.

Från allmän geografisk synpunkt märkes, att de fyra nordligaste länen stå bland de allra sista i ordningen på tabellen. Huruvida det är det nordliga läget i och för sig, som härvidlag spelar fornämsta rollen, eller om några andra därmed förknippade omständigheter äro lika viktiga eller viktigare faktorer, är naturligtvis vansktigt att afgöra. Att man icke kan tillerkänna dessa trakter någon immunitet, synes bäst af de betydande epidemierna under 1880-talet inom Norrbottens och Västernorrlands län för att icke tala om tidigare mer eller mindre tvifvelaktiga närvfeberepidemier i dessa trakter.

Länens egenskap af kust- eller inlandskap kan icke sättas i något bestämdt samband med den olika tyloidfeberfrekvensen.

Lika litet kunna vi i fysiskt-geografiska eller geologiska olikheter finna någon anledning att mellan dessa och tyloidfeberns olika frekvens se något orsaksförhållande. Slättland och högland, skogiga och skogfattiga, bördiga och mera magra landskap omväxla på tabellen utan bestämd ordning. Härmed är ingalunda sagdt, att icke några af nämnda moment kunna i etiologiskt hänseende vara af betydelse beträffande tyloidfebern. Men den här anställda jämförelsen mellan länen gifver icke något sådant vid handen. För öfrigt torde länen vara för stora och inom sig olika beskaffade områden, för att en jämförelse dem emellan från ofvan berörda synpunkter skall kunna lämna något resultat. Med afseende på tyloidfeber äro, så att säga, de små, enskilda förhållandena vida mera bestämmande, och till dessa har man att hålla sig, om man skall kunna hoppas erhålla något svar på frågor, som röra betingelserna för tyloidfeberns uppkomst, utbredning o. s. v.

I stort sett synas länen under de olika 5-årsperioderna intaga ungefär samma plats, som bestämts genom medeltalen för hela perioden 1876—1890. De undan-

¹⁾ Om korrektion göres för Blekinge län för åren 1877—1880 och för Göteborgs län f. år 1876, hvilka år, såsom förut nämnts, i dessa län inträffade ett större antal dödsfall i typhus exanthematicus, så erhålls i st. f. talen 3,8 och 5,2 i de två första kolumnerna f. Blekinge l. resp. 3,6 och 4,7; och länet byter sålunda plats med Malmöhus l. Göteborgs län får i motsv. kolumner talen 2,2 och 2,4 och bibehåller sålunda sin plats.

tag, som förefinnas, bero naturligtvis på olikheter mellan länen i afseende på sjukdomens till- eller aftagande från en 5-årsperiod till en annan.

Inom de flesta länen har likasom i hela riket ett aftagande ägt rum¹⁾. Om man såsom mått på af- eller tilltagandet uppställer förhållandet mellan dödstalen för hela perioden 1876–1890 och för den *första* 5-årsperioden, så visa af de 25 länen (Stockholm medräknadt) 17 en minskning; de öfriga 8, nämligen Norrbottens, Västernorrlands, Jemtlands, Gefleborgs, Upsala, Hallands, Vestmanlands och Kopparbergs län visa deremot en ökning, Norrbottens den största, Vestmanlands och Kopparbergs den minsta. Om vi jämföra den första och den sista 5-årsperioden, så kommer för den senare en ökning blott på 6 af de nyss uppräknade länen, i det att Hallands och Vestmanlands län nu hafva att uppvisa en minskning i likhet med alla de öfriga 17. Dessa 6 län äro också de enda, der freqvensen ökats från den andra till den tredje 5-årsperioden. Deremot visar den andra 5-årsperioden, jämförd med den första, högre eller lika höga siffror för ej mindre än 12 län²⁾, däribland äfven de sistnämnda 6, nämligen Norrbottens, Västernorrlands, Jemtlands, Gefleborgs, Upsala och Kopparbergs län, inom hvilka sálunda enligt dessa siffror tyfoidfebrens frekvens (uttryckt genom dödstalen) skulle varit stadd i stigning genom alla tre 5-årsperioderna (i Kopparbergs dock blott från den andra till den tredje period, då första och andra perioden visa samma siffror). En särdeles betydlig höjning af siffrorna förete Norrbottens och Västernorrlands län. Af Tab. I, 1 och 4 synes också, att en del betydande epidemier uppträdt inom dessa län under motsvarande perioder.

För ett närmare studium af sjukdomens förhållande inom de olika länen är efter år under hela perioden 1876–1890 hänvisas till taflan i bihanget. En blick på de där uppgjorda kurvorna visar, att tyfoidfebern, såsom ju är att vänta, i allmänhet icke företer några särdeles plötsliga växlingar i frekvens från ett år till ett annat, sådana som t. ex. oftast utmärka skarlakansfebrens uppträdande. Dock visa de olika länen härutinnan ej oväsentliga skiljaktigheter. I somliga löper tyfoidfebrens »dödslinie», om jag så må säga, ganska lugnt, med jämförelsevis obetydliga höjningar och sänkningar, i andra åter gör den för vissa år anmärkningsvärt hastiga och höga stigningar. Såsom mest typiskt i det förra hänseendet framstår Göteborgs län, hit höra vidare t. ex. Värmlands och Kronobergs län.

¹⁾ Till jämförelse må här dödstalen %/ooo i »närvfeber» under de tre 5-årsperioderna 1861–74 anföras. De voro: 1861–65 = 2,9; 1866–70 = 7,4; 1871–75 = 4,2.

²⁾ Detta torde möjligen till någon del hafva sin grund i det påpekade förhållandet, att »hjärnfeber», som 1876–1880 hade särskild rubrik, måhända inrymmer en del tyfoiddödsfall, under det att för åren 1881–1885 likasom 1886–1890, då hjärn- och närvfeber voro sammanslagna, endast de relativt få fallen af »epidemisk hjärnfeber» fränräknats de för begge sjukdomarna gemensamma siffrorna. Till hvad förut anmärkts i fråga om »hjärnfeber» 1876–1880 må tilläggas, att skilnaden mellan de af läkare uppgifna och den officiella statistikens dödssiffror för hjärnfeber åren 1876–1880 är vida större än skilnaden mellan samma slags siffror för tyfoid- resp. närvfeber. Statistikens siffror äro naturligtvis i båda fallen de högsta.

Till den senare kategorien hör i främsta rummet Norrbottens län, vidare Gefleborgs och Vestmanlands län m. fl.

Af ännu större intresse är det att med afseende på tyfoidfeberns olika frekvens med hvarandra jämföra mindre områden såsom läkaredistrikten. Det är blott skada, att de siffror, som måste läggas till grund för en sådan jämförelse, nämligen läkarnes i rapporterna upptagna, äro så bristfälliga. Minst jämförliga torde de olika läkarnes uppgifter om antalet döde vara, alldenstund den ene lemnar sådana med ledning af kommunalnämndernas redogörelser, den andre åter uppger endast dödsfallen bland de sjuke, som varit under hans behandling o. s. v.

För i fråga varande jämförelse användas därför här de uppgifter, som finnas i läkarerapporterna angående antalet insjuknade. Att äfven dessa lemma mycket öfright att önska, är förut påpekad. Man kan näppeligen våga antaga, att de från olika distrikts uppgifna talen öfver hufvud taget utgöra någon viss konstant procent af det verkliga antalet sjuke. (Att detta senare så godt som utan undantag mer eller mindre öfverstiger det af läkaren kända och uppgifna, lider intet tvivel.) Olikheter med afseende på distrikts vidd och folkmängd, samfärdsmedlens beskaffenhet, befolkningens benägenhet att rådfråga läkare o. s. v. betinga härvidlag en växling af detta förhållande mellan de uppgifna och de verkliga talen.

Man måste därför betrakta de följande beräkningarne såsom endast approximativa och blott med stor försiktighet på grund af dessa draga sina slutsatser.

Af ofvan angifna skäl användas endast uppgifterna för åren 1875—1890. (År 1874 kunde möjligen medtagits, eftersom tyfoidfebern och fläcktyfus redan då voro »officiellt» åtskilda, men har uteslutits för att undvika den sammanblandning af båda sjukdomarne, som sannolikt för detta år ägt rum i många rapporter, där ännu den gamla rubriken »tyfosa febrar» eller dylikt användts.)

Från många distrikts äro dock uppgifterna äfven under denna period ett eller flera år ofullständiga eller saknas helt och hället. Därjämte hafva några distrikts behandlats särskilt, ehuru de först efter 1875 inrättats. Till följd häraf äro i åtskilliga fall ett mindre antal år än de nämnda sexton medräknade, hvilket naturligtvis också gör en inskränkning i jämförelsens tillförlitlighet.

För hvarje (provinsialläkare- och extra provinsialläkare-)distrikt är nu årliga medeltalet insjuknade uträknadt och jämfört med distrikts folkmängd år 1880¹⁾. Städerna, som här nedan särskilt behandlas, äro med några få undantag²⁾ icke inbegripna i distrikten.

¹⁾ Det enda året, för hvilket fullständiga och säkra uppgifter om folkmängden inom de olika distrikten finns angifna. Dessa uppgifter finns i *Provinsialläkarekomiténs underdåliga betänkande, afgivet den 5 april 1887*, Stockholm 1887.

²⁾ Dessa gälla några städer, från hvilka särskilda uppgifter helt och hället eller för en längre följd af års saknas, i det att de i rapporterna äro inberäknade i resp. distrikts; hit höra åtskilliga af de mindre och minsta städerna, nämligen Haparanda, Skellefteå, Hedemora, Säter, Öregrund, Östhammar, Sigtuna, Filipstad, Torshälla, Trosa, Skanör och Falsterbo, Simrishamn och Engelholm; för några år äfven Södertelje.

I följande tabell äro distrikten ordnade efter storleken af de på angifvet sätt funna talen, beräknade på 1,000 invånare. Tillika anföres folkmängdstätheten år 1880 i hvarje distrikt med fränräknande af städerna (utom några få af de minsta)¹⁾.

Den i slutet befintliga kartan gifver en grafisk framställning af det å tabellen angifna förhållandet mellan distrikten.

¹⁾ Dessa uppgifter finns likaledes i det i noten 1 föreg. sida anfördta arbetet.

Antal i tyfoidfeber insjuknade

af 1,000 invånare i Sveriges läkaredistrikts i medeltal årligen, åren 1875—1890.

Obs. Siffrorna efter distriktsnamn angifva de resp. antal år, för hvilka medeltalen uträknats.

Läkaredistrikt.	Antal invånare på 1 kv. kilometer.	Antal sjuka åringen.	Läkaredistrikt.	Antal invånare på 1 kv. åringen.	Antal invånare på 1 kv. kilometer.	Läkaredistrikt.	Antal sjuka åringen.	Antal invånare på 1 kv. kilometer.
(Trollhättan) (15)	13,0	336,4	Hemse (16).....	2,1	18,2	Klippan (15)	1,4	37,0
Lysekil (16).	5,0	65,9	Karlskrona (14)....	2,0	38,7	Tanum (15)	1,3	21,6
Skurup (11).....	5,0	90,3	Finspong (14).....	2,0	21,6	Örnsköldsvik (16)	1,3	5,4
Ramsberg (15)....	4,8	11,1	Kisa (16).....	2,0	15,9	Ulricehamn (15)...	1,3	19,3
Båstad (7).....	3,7	53,3	Hofors (16).....	1,9	15,9	Tierp (16)	1,3	15,6
Tjust (14)	3,4	18,7	Söderhamn (16)...	1,9	13,8	Enköping (15)....	1,2	24,9
Ronneby (16).....	3,4	37,9	Göteborg (15).....	1,8	48,1	Vexiö (14)	1,2	21,3
Pajala (16).....	3,3	0,3	Tingsås (15)	1,8	25,5	Tibble (16)	1,2	21,6
Österåker (16) ...	3,3	15,7	Naum (16)	1,8	36,1	Helsingborg (16)..	1,2	58,7
Ljusnarsberg (16)	3,1	15,5	(Venersborg med			Söderåkra (15)....	1,2	28,9
Haparanda (16)...	3,1	3,3	Trollhättan)(16)	1,7	33,7	Hedemora (16) ...	1,2	19,4
Öfver-Kalix (11)...	3,0	0,4	Nyköping (16)....	1,7	20,6	Östhammar (16)...	1,1	14,9
Hjo (16)	3,0	29,2	Gefle (16)	1,7	10,6	Stockholm (7).....	1,1	28,1
Neder-Kalix (13)..	2,9	5,6	Visnum (15)	1,7	19,5	Vermdö (15)	1,1	17,5
Ramnäs (16).....	2,8	13,2	Löfsta (16)	1,7	13,9	Torpa (11)	1,1	15
Botkyrka (16).....	2,7	21,9	Gillberga (13)....	1,7	16,1	Daga (16)	1,1	19,1
Södertelje (16) ...	2,7	18,2	Håby (15)	1,6	32,4	Brösarp (16)	1,1	36,8
Alfta (15)	2,5	4,9	Kalmar (16)	1,6	23,3	Stranda (15)	1,0	23,1
Valdemarsvik (15)	2,5	18,9	Jörlanda (16)	1,6	36,6	Kungsbacka (16) ..	1,0	35,8
Mölndal (14).....	2,5	136,6	Ytter-Länäs (16)	1,5	13,6	Ljungby (16)	1,0	17,1
Elfkärleö (16).....	2,5	22,2	Målilla (15)	1,5	14,2	Broby (16)	1,0	25,3
Uddevalla (16)	2,4	29,0	Slite (16)	1,5	12,4	Nora (15)	1,0	18,9
Lindesberg (12)...	2,4	20,4	Ölands södra (16)	1,5	24,4	Råneå (12)	1,0	3,5
Eskilstuna (15)....	2,3	22,2	Hernösand (16) ...	1,4	12,2	Silbodal (16)	1,0	12,8
Norrtelje (15).....	2,3	19,4	Trelleborg (16)...	1,4	74,7	Ölands norra (16) ..	1,0	31,0
Anderslöf (16).....	2,3	69,4	Oroust (15)	1,5	55,2	Svenljunga (14) ...	1,0	14,3
Sundsvall (14)....	2,3	9,0	Grythyttte (16) ...	1,4	11,9	Våla (15)	1,0	12,2
Gysinge (12).....	2,3	11,4	Hudiksvall (16)...	1,4	11,2	Delsbo (14)	1,0	7,5
Visby (16)	2,2	17,1	Jerfsö (16)	1,4	4,1			
Leksand (16)	2,1	10,0	Motala (16)	1,4	41,2	Stora Malm (16) ..	1,0	23,7

Läkaredistrikt.	Antal invånare på 1 kv. kilometer.	Antal sjuka % av årligen.	Läkaredistrikt.	Antal invånare på 1 kv. kilometer.	Läkaredistrikt.	Antal sjuka % av årligen.	Antal invånare på 1 kv. kilometer.	
Venersborg (16).....	0,9	31,6	Vernamo (16).....	0,7	14,8	Vingåker (15).....	0,4	24,0
(utom Trollhättan.)			Umeå (15).....	0,7	4,7	Vrigstad (15).....	0,4	17,5
Öfver-Luleå (15).....	0,9	1,0	Falkenberg (14).....	0,7	26,6	Arvika (16).....	0,4	13,5
Engelholm (13).....	0,9	34,1	Hede (14).....	0,7	0,6	Ragunda (15).....	0,4	2,8
Åsum (16).....	0,9	52,3	Linköping (16).....	0,7	28,7	Filipstad (16).....	0,4	13,5
Vifsta varf (16).....	0,9	21,3	Undersåker (14).....	0,6	1,4	Karlstad (10).....	0,4	24,4
Mora (14).....	0,9	2,2	Ödeshög (15).....	0,6	30,6	Näs (16).....	0,4	22,1
Hörby (16).....	0,8	39,9	Drottningholm (16).....	0,6	29,6	Eksjö (16).....	0,4	17,4
Sigtuna (16).....	0,8	20,9	Gislaved (16).....	0,6	13,5	Hvetlanda (16).....	0,4	18,7
Malmköping (15).....	0,8	20,7	Vimmerby (15).....	0,6	16,0	Edsberg (15).....	0,3	20,3
Falköping (16).....	0,8	28,0	Ö. Fryksdal (16).....	0,6	11,9	Eslöf (16).....	0,3	90,6
Högsby (15).....	0,8	14,9	Boxholm (16).....	0,6	17,1	Nordmaling (16).....	0,3	4,6
Dannemora (16).....	0,8	17,1	Mariestad (16).....	0,6	29,8	Kristianstad (15).....	0,3	39,1
N. Fryksdal (16).....	0,8	22,4	Sotholm (16).....	0,6	15,4	Grangärde (16).....	0,3	13,7
Bollnäs (11).....	0,8	10,4	Falun (16).....	0,5	13,2	Östersund (14).....	0,3	3,2
Trosa (16).....	0,8	17,9	Gunnarsnäs (15).....	0,5	24,4	Näs (11).....	0,3	5,6
Askersund (16).....	0,8	22,3	Simrishamn (15).....	0,5	68,3	Tjellmo (14).....	0,3	18,4
Örebro (16).....	0,8	25,2	Jemshög (11).....	0,5	39,8	Bodum (14).....	0,3	2,4
Rejmyre (16).....	0,8	14,2	Halmstad (13).....	0,5	20,5	Lima (11).....	0,2	1,8
Borås (14).....	0,8	23,4	Hofva (16).....	0,5	22,0	Sveg (15).....	0,2	1,6
Oskarshamn (14).....	0,8	17,5	Alingsås (16).....	0,5	25,5	Jönköping (13).....	0,2	19,6
Höganäs (16).....	0,8	74,0	Karlskoga (15).....	0,5	20,2	Åsele (16).....	0,1	0,7
Ätvidaberg (14).....	0,7	20,3	Malmö (16).....	0,5	65,8	Uddeholm (14).....	0,1	10,5
Norberg (14).....	0,7	16,4	Lycksele (16).....	0,5	0,6	Skellefteå (16).....	0,1	4,4
Ekeberga (16).....	0,7	13,0	Vesterås (15).....	0,5	18,8	Skog (14).....	0,1	13,3
Piteå (16).....	0,7	0,9	Lidköping (16).....	0,5	35,7	Ström (13).....	0,1	1,2
Hessleholmi (16).....	0,7	24,3	Upsala (16).....	0,5	16,8	Berg (13).....	0,04	2,6
Marks (14).....	0,7	29,1	Söllefteå (16).....	0,4	6,3	Dalby (16).....	0,02	3,6
Torp (15).....	0,7	5,0	Söderköping (16).....	0,4	22,2	Nysätra (16).....	0,003	4,8
N. Dalsland (14).....	0,7	17,2	Strengnäs (11).....	0,4	19,0			

Ehuru man beträffande de ofvan angifna siffrorna utan tvifvel i ännu högre grad än vid den förut anställda jämförelsen mellan länen bör taga hänsyn till bristerna hos de till grund för desamma liggande uppgifterna, torde man dock äfven här kunna säga, att skilnaden mellan de först och sist i ordningen kommande distrikten är allt för stor för att vara helt och hället utan betydelse vid bedömandet af tyloidfeberns relativ a frekvens inom de nämnda områdena.

Mellan de först och sist på tabellen stående distrikten förefinnes sälunda med all sannolikhet en ej oväsentlig skilnad i nu berörda hänseende. Däremot skulle nog, om man kände de verkliga siffrorna, talrika modifikationer i enskildheter komma att göras å den i fråga varande tabellen, så att ordningen i synnerhet mellan mera närliggande distrikt och i sammanhang härmed den grafiska kartans utseende komme att ej obetydligt ändras. Både tabellen och kartan hafva också endast i stort sett men ingalunda i enskildheter något att säga och måste i enlighet härmed rådfrågas.

Vi kunna emellertid säga, att tyloidfebern visserligen ej helt och hället saknas i något af de minsta områden, som här betraktas, nämligen läkaredistrikten, men likväl på skilda orter visar en ganska anmärkningsvärd olikhet i frekvens. Under det den i vissa distrikt årligen uppträder med ett rätt ansenitlant antal fall, har den på andra ställen i själfva värket länge varit så godt som okänd för vederbörande läkare. Så har t. ex. från Nysätra distrikt, som står sist på tabellen, under 17 års tid endast *ett* fall af tyloidfeber anmälts. I det därför i ordningen kommande Dalby distrikt hafva under en följd af 18 år blott 4 fall förekommit i läkarens praktik, i Bergs distrikt under 13 år 6 fall o. s. v.

I läkarerapporterna äro åtskilliga distrikt af vederbörande läkare särskilt angifna såsom orter, där tyloidfebern sedan en längre tid varit en ständig gäst, så att sjukdomen af dem anses böra kallas »endemisk», därstädes. Hit höra t. ex. åtskilliga trakter af Gefleborgs län såsom Söderhamns och Hofors' distrikt, Leksands, Norrtelje, Eskilstuna, Nyköpings distrikt, en stor del af Kalmar län, särskilt Tjästads distrikt, de flesta trakter af Blekinge, större delen af Bohuslän.

I hvad mån dessa orter äfven visa en i siffror uttryckt, relativt hög frekvens af sjukdomen, synes af den grafiska kartan.

En hög frekvens är för öfrigt ej det väsentligaste momentet i begreppet »endemisk», sådant det vanligen uppfattas; fastmera hör därtill det särskilda *sätt*, hvarpå sjukdomen i sådana trakter uppträder, såsom längre ned antydes.

I allmänhet kunna icke dylika uttalanden användas som grund för bedömandet af en sjukdoms relativ frekvens på skilda orter, då de alltid måste vara mer eller mindre beroende på subjektiv uppskattning.

Därför händer det, att ett distrikt, där tyloidfebern uppgives vara mycket allmän, vid uträknandet af frekvensen på grund af uppgifna siffror kommer ganska långt nedanför ett annat distrikt, där tyloidfebern säges icke särdeles trifvas,

eller »icke hafva någon lämplig jordmän» o. dyl. (Delvis kan detta naturligtvis bero på sifferuppgifternas olika relativa tillförlitlighet.)

Så anger t. ex. kartan för Ljusnarsbergs distrikt en relativt hög frekvens af tyfoidfebern; enligt vederbörande läkares enskilda meddelande »tyckes» däremot »tyfoidfebern ej trifvas inom detta distrikt». — I motsatt riktning skulle liknande exempel kunna framdragas. Den nämnda kartan kommer därfor möjligen att medföra åtskilliga öfverraskningar för flera läkare, i det den måhända åt vederbörande distrikt anvisar en helt annan plats med afseende på tyfoidfeberns relativa frekvens, än de hafva tänkt sig.

Men, som sagdt, kartan talar sanning »med modifikation» och bör därefter uppskattas.

(Angående ett af de å kartan intensivast färgade distrikten, nämligen Hjo distrikt, kan jag i detta sammanhang ej underlata att anmärka, att den stora frekvensen af tyfoidfeber därstades på ett frappant sätt till tiden sammanfaller med en och samma läkares värksamhet inom nämnda distrikt¹⁾).

Betraktandet af de omständigheter i stort sedt, som kunna tänkas stå i något orsaksförhållande till den olika frekvensen af tyfoidfeber inom distrikten, leder lika litet här som i fråga om länen till några positiva resultat.

Med afseende på distriktsens geografiska förhållande märkes, att likasom de fyra nordligaste länen enligt den förut anställda jämförelsen komma bland de sista på sin tabell, ett liknande förhållande äfven beträffande distrikten synes framgå af de nu i fråga varande siffrorna. Dock måste man härvidlag göra ett undantag för de 3 allra nordligaste distrikten, inom hvilka en del på sista åren af 1880-talet inträffade epidemier åstadkommit ett utslag, som betydligt invärkar på sjukdomsfrekvensen, uträknad för hela den behandlade perioden 1875—1890. Äfven flera af de vid kusten belägna nordliga distrikten kunna knappast sägas utmärkas genom något ovanlig låg frekvens af tyfoidfeber. Att flera andra, sydliga distrikt visa en lika obetydlig sjukdomsfrekvens, synes också af tabellen och kartan. För öfrigt bör man komma ihåg, att de nordligaste distrikten på samma gång äro de vidsträktaste och hafva de sämsta samfärdssmedlen, ett förhållande, som i och för sig kan tänkas åstadkomma, att en större andel af de faktiskt inträffade sjukdomsfallen går förlorad för läkarne här än i de sydligare, mindre distrikten, där läkare och allmänhet äro hvarandra närmare. Mindre bör denna synpunkt gälla beträffande de ofvan för jämförelse af länen begagnade uppgifterna, som ju härröra från presterskapet och tydlichen äro fullständigare och jämnare, om ock mera sällan grundade på en säker, vetenskaplig diagnos af de i fråga kommande fallen, än förhållandet är med motsvarande uppgifter i läkarerapporterna.

Distriktsens å tabellen angifna folktäthet synes icke stå i något bestämdt för-

¹⁾ Detta är antydt å Tab. I, 15 på sätt, som i de till Tab. hörande anmärkningarna påpekas. I fråga varande läkare skall i lifstiden enligt utsago »mycket hafva älskat embetsresor och stundom kanske väl haftigt dekreterat tyfoidfeber».

hållande till den olika frekvensen af tyfoidfebern inom de samma. Bland de i senare hänseendet främst stående distrikten finnas visserligen några, som även i afseende på folktätheten stå högst (Trollhättan torde såsom hafvande mera stads-natur böra fränräknas), och å andra sidan träffa vi den glesaste befolkning i de nyss nämnda för en låg tyfoidfeberfrekvens utmärkta nordliga distrikten; men vid närmare paseende finna vi så många olika kombinationer mellan de båda nämnda momenten (sjukdomsfrekvens och folktäthet), att någon lag eller något bestämdt förhållande i detta hänseende ieke kan uppstållas. För öfrigt kan den såsom förhållandet mellan folkmängden och *hela* ytinnehållet beräknade befolkningstätheten ingalunda tagas såsom verkligt mätt på den *täthet*, i hvilken befolkningen faktiskt på de bebodda områdena förekommer. I de stora nordliga distrikten med en enligt beräkning ringa folktäthet äro ofantliga vidder helt och hället obebodda, under det befolkningen bor sammantränd i en floddal eller omkring platsen för något industriellt företag etc.; i andra distrikt med en i ofvannämnda mening stor folktäthet kan befolkningen i själfva värket vara mindre sammantränd, då den är mera jämt spridd öfver hela ytområdet.

Denna omständighet bör tagas i betraktande, då det gäller att undersöka den olika lättheten för en epidemi att utbreda sig inom större områden med olika folktäthet i vanlig mening.

För öfrigt torde det knappast vara mödan värdt att försöka utforska något sammanhang emellan distriktsens anordning å tabellen eller dess olika färgning å kartan och geografiska, geologiska och andra dylika mera allmänna förhållanden. De uppgifter, hvarpa denna uppställning af distrikten är grundad, äro för detta ändamål allt för otillförlitliga.

Såsom flera gånger påpekats, hafva nog en mängd tillfälliga omständigheter invärkat härvidlag, och om man på grund af kartans utseende vägade sig något längre in på det etiologiska området, kunde man lätt raka vilse.

Det blefve för vidlyftigt, att här i detalj afhandla tyfoidfeberns förhållande inom de olika distrikten.

För ett nämre studium häraf måste därfore hänvisas dels till ofvan befintliga tabell med däremot svarande karta, hvilka gifva en orienterande öfverblick öfver det hela, dels rörande de enskilda distrikten är för år till Tab. I, 1—25.

I stort sedt kunna vi beträffande tyfoidfeberns förhållande inom enskilda distrikter under en längre följd af år urskilja samma typer, som anmärkts i fråga om länen.

I somliga distrikter uppträder sjukdomen årligen med ett mera eller mindre betydande antal fall, som dels föga växlar år från år, dels under de enskilda åren

ofta är mer eller mindre jämt fördeladt på de olika årstiderna med en eller ett par stegringar t. ex. vår och höst.

Ett sådant uppträdande visar sjukdomen särskildt i många af de distrikts, där den af läkarne kallas »endemisk», hvarvid detta förhållande ofta just plägar anföras såsom hörande till definitionen af nämnda begrepp; hit höra Hofors, Jerfsö, Nortelje, Nyköpings, Jörlanda, Uddevalla, Håby, Kalmar, Tjärs m. fl. distrikts.

Gent emot denna »endemiska» eller »kontinuerliga» typ. kunna vi uppställa en annan, som i motsats till den förra må kallas den »epidemiska» eller »remitterande» respektive »intermitterande», i det att sjukdomen under en följd af år förekommer med ett ringa antal fall eller helt och hället saknas men med vissa, ofta nog ganska regelbundna intervaller förete mer eller mindre betydande epidemiska stegringar.

Denna typ finna vi representerad exempelvis i några distrikts med större industriala anläggningar, såsom Motala, Finspongs, Trollhättans, vidare t. ex. i Örnsköldsviks, Leksands, Växjö m. fl. distrikts. — I några af dessa och åtskilliga andra distrikts är dock det arliga antalet fall mellan stegringarna rätt betydligt; vi finna med andra ord här en kombination af båda typerna.

Mellan dessa finnas naturligtvis äfven i öfrigt talrika öfvergångar, likasom båda förekomma inom samma distrikts under olika tidrymder.

Båda förekomma dels i distrikts med hög, dels i sådana med mindre betydande sjukdomsfrekvens, för en längre period räknadt; dock synes den största frekvensen oftast betingad af ett mera kontinuerligt uppträdande af sjukdomen.

Denna uppdelning af tyfoidfeberns förhållande synes mähända sökt och konstgjord, då man vid en blick på tabellerna finner en så stor variation och skenbar regellösitet i berörda hänseende.

Den gör emellertid icke ansprak på att vara uttryck för någon nyupptäckt hemlighet, något slags egendomlig »dualism» eller dylikt hos tyfoidfebern; den afser blott att lämna en antydan om de olika gynsamma vilkor för sjukdomens uppkomst och utveckling, som olika trakter erbjuda.

På de orter, där den första typen är förhärskande, synes sjukdomen sedan länge funnit gynsamma vilkor för handen och därfor blifvit bofast; på andra orter däremot synes jordmånen i allmänhet ej vara fullt så lämplig för hans tillvaro, men genom vissa emellanåt inträdande gynsamma omständigheter kan han taga fart och breda ut sig till en epidemi, som efter någon tid afstannar o. s. v.

Hvilka dessa gynsamma omständigheter äro, afhandlas lämpligast i samband med de redogörelser för enskilda epidemier, som jag hoppas sedermera kunna få lämna.

För besvarandet af frågan, huruvida tyfoidfebern i allmänhet till- eller aftagit inom de olika distrikten, måste äfvenledes hänvisas till tab. I, 1—25. I det stora flertalet af distrikten har säkert ett aftagande ägt rum. Anmärkningsvärda undantag finna vi i åtskilliga af de nordligare distrikten, där på senare åren be-

tydande epidemier uppträdt, såsom Pajala, Haparanda, Öfver-Kalix', Örnsköldsvik m. fl.

Af stort intresse vore att kunna mera detaljeradt undersöka tyfoidfeberns förhållande i ännu mindre områden, såsom enskilda socknar och byar. För en sådan undersökning lämnar dock mitt material inga tillräckliga hållpunkter, allra minst i statistiskt hänseende¹⁾.

Det återstår nu att anställa en jämförelse mellan städerna.

Jag har för detta ändamål använt de förut nämnda sammandragen angående dödsorsakerna i städerna, som sedan 1875 upprättats af vederbörlande helsovårdsnämder och finnas upptagna i Medicinalstyrelsens årsberättelser.

Redan för åren 1861—1863 finnas dylika översikter af dödsorsakerna i städerna, utarbetade af då varande chefen för Statistiska centralbyrån, d:r Fr. Th. Berg, med ledning af de anteckningar i dödbockerna, som i enlighet med förordningen år 1859 af presterskapet värkstälts efter läkarnes dödsattester. Dessa översikter upptog dödsfallen efter kyrkoskrifningsorten, oberoende af den ort, där dödsfallen ägt rum.

År 1864 öfvertogs detta arbete enligt överenskommelse med dåvarande Sundhetskollegiet af stadsläkarne, på grund af hvilkas efter ett bestämdt formulär upprättade tabeller kollegiet för åren 1864—1870 offentliggjorde statistiska översikter af dödsorsakerna i städerna.

År 1871 upphörde af obekant anledning dessa Sundhetskollegiets översikter, och för åren 1871—1874 finnas inga tryckta redogörelser för dödsorsakerna i städerna.

Sedan 1875 hafva, som nämndt, dylika redogörelser årligen lämnats af städernas helsovårdsnämder; dessa upptaga likasom de förut nämnda genom stadsläkarne upprättade i allmänhet blott de dödsfall, som faktiskt inträffat i de resp. städerna oberoende af de aflidnes kyrkoskrifningsort.

Det hade varit högeligen önskvärdt att kunna utsträcka denna undersökning angående städerna så långt tillbaka som till och med 1861. Man hade då fått två lika långa perioder, hvilkas gräns betecknades genom det betydelsefulla året 1875, då den nya helsovårdsstadgan för riket af den 25 sept. 1874 började tillämpas; och det hade naturligtvis varit af största intresse att undersöka, i hvad man tyfoidfeberns förhållande i städerna påvärkats af nämnda stadgas genomförande.

Jag hade också hoppats att genom forskningar i de i Statistiska centralbyrån förvarade dödboksutdragen erhålla material för en behandling af tyfoidfebern i

¹⁾ I läkarerapporterna nämns ej sällan vissa socknar och byar såsom »härdar» för tyfoidfeber, men ofta förklaras det omöjligt att finna någon orsak till detta förhållande. Att här helt enkelt *uppräkna* en mängd på sådant sätt utpekade ställen vore meninglöst. Det torde blifva tillfälle att återkomma till några af dessa härdar i den specielt etiologiska afdelningen.

städerna i nämnda utsträckning. Det visade sig likväl, att resultaten af dessa påbörjade forskningar voro alltför osäkra för att med fördel kunna användas för en statistisk behandling af tyfoidfebern.

Det är den beklagliga sammanblandningen af fläcktyfus och tyfoidfeber, som äfven här lägger de största hindren i vägen.

I dödboksutdragen 1861—1874 förekomma utom benämningarna tyfoidfeber, abdominaltyfus, ileotyfus etc., dessutom närvfeber, typhus, gastrisk feber och typhus exanthematicus, petechialis etc. Då det är omöjligt att i hvarje fall avgöra, huruvida med »närvfeber» och »typhus» menas tyfoidfeber eller fläcktyfus, kunna sällan några säkra siffror vinnas. — Såsom exempel härpå kan nämnas, att de siffror angående båda sjukdomarne, jag erhöll för Stockholm för åren 1871—1872, ingalunda stämma med de, som för samma år anföras af Heyman¹⁾, hvilken likaledes försökt utgallra fläckfebern i och för en behandling af tyfoidfeberns förhållande.

Nu är det visserligen möjligt, kanske till och med sannolikt, att, om man undantager Stockholm 1870—1875, Göteborg 1866—1870 och några andra städer för enstaka år, fläcktyfus icke spelat någon mera betydande rol såsom dödsorsak i städerna vid sidan af tyfoidfebern under den tid, då båda sjukdomarne ännu officielt sammanfördes. Men någon säkerhet härutinnan finnes icke; den ledning, man kunde hafva af stadsläkarnes årsrapporter, är icke heller osviklig, då de endast mera sällan skilja mellan nämnda sjukdomar.

Under sådana förhållanden synes det vara af föga värde att belamra dessa sidor med beräkningar på grund af siffror, för hvilkas tillförlitlighet ingen borgen finnes.

Undersökningen omfattar därför hufvudsakligen endast perioden 1876—1890²⁾.

På grund af helsovårdsnämndernas uppgifter är följande tabell upprättad.

För hvarje stad äro dödstalen, beräknade på 1,000 invånare, bestämda dels för hela perioden 1876—1890, dels för hvar och en af 5-årsperioderna 1876—1880, 1881—1885 och 1886—90.

De absoluta tal, som användts för beräkning af 5-årsperiodernas dödstal, äro dels, som nämndt, de af helsovårdsnämnderna uppgifna dödsfallen, dels medelfolkmängden för hvarje 5-årsperiod, uträknad på grund af den officiella statistikens uppgifter om folkmängden den 31 december hvarje år. Dödstalen för hela perioden 1876—1890 äro deremot beräknade såsom *medeltal* af de enskilda 5-års-periodernas.

(För Göteborg har Almqvist³⁾ genom revision af dödsattesterna erhållit siffror,

¹⁾ Anf. arb.

²⁾ 1875 har uteslutits, då de återstående bilda 3 jämna 5-årsperioder. Det förstnämnda årets uppgifter äro möjlichen också mindre säkra, då detta år var det första under hvilket helsovårdsförordningen ägde gällande kraft.

³⁾ Anf. arb. 1888, sid. 90—91.

något olika de af helsevårdsnämden uppgifna; dessa, som upptagits å tab. I, 14, hafva däremot för likformighetens skull här ej användts. De små olikheterna mellan mina dödstal för Stockholm och de af Linroth¹⁾ uppgifna bero på användandet af olika folkmängdssiffror: här den kyrkoskrifna, enligt L. den mantals-skrifna medelfolkmängden. Jfr äfven sid. 59, not. 3.)

Städerna äro ordnade efter storleken af dödstalen för hela perioden 1876—1890. I särskild kolumn upptages medelfolkmängden under den mellersta 5-års-perioden. De tal, som angifva en medelfolkmängd af minst 5,000 invånare, äro kursiverade.

Proportionen mellan de olika dödstalen för hvarje stad är åskådliggjord på samma sätt, som användts å tabellen sid. 35.

¹⁾ Dödlighet och dödsorsaker etc. sid. 28.

Döde af tyloidfeber i medeltal årligen på 1,000 invånare i Sveriges olika städer under åren 1876—1890.

S t a d .	Årlig medel- folk- mängd 1881— 1885	Dödstal åren					Om dödstalen för åren 1876—1880 = 100				
		1876— 1890	1876— 1880	1881— 1885	1886— 1890	1876— 1890	1876— 1880	1881— 1885	1886— 1890		
1. Torsås (13, 1, 4).....	1,039	1,20	0,84	1,92	0,83	143	100	229	99		
2. Åmål (1, 43, 75).....	2,564	1,12	3,06	0,31	0,00	36	100	10	0		
3. Köping (7, 9, 9).....	3,167	0,99	1,29	0,88	0,61	76	100	68	47		
4. Norrtelje (5, 3, 47).....	2,029	0,89	1,33	1,18	0,17	67	100	89	13		
5. Vadstena (23, 38, 1).....	2,358	0,82	0,66	0,34	1,45	124	100	52	220		
6. Skara (10, 13, 14).....	3,306	0,81	1,21	0,73	0,49	67	100	60	40		
7. Nyköping (16, 12, 6).....	5,086	0,75	0,77	0,75	0,73	96	100	96	94		
8. Visby (6, 10, 65).....	6,712	0,74	1,29	0,83	0,09	57	100	64	7		
9. Jönköping (9, 17, 17).....	18,002	0,73	1,27	0,56	0,36	57	100	44	28		
10. Växjö (15, 6, 16).....	5,460	0,71	0,79	0,92	0,41	90	100	116	52		
11. Gefle (17, 31, 5).....	19,449	0,66	0,75	0,40	0,82	88	100	53	109		
12. Varberg (67, 2, 21).....	3,334	0,66	0,21	1,50	0,32	314	100	714	152		
13. Linde (43, 21, 2).....	1,573	0,64	0,39	0,51	1,02	164	100	131	262		
14. Falköping (11, 34, 31).....	2,652	0,62	1,18	0,38	0,29	53	100	32	25		
15. Eksjö (2, 65, 26).....	2,938	0,60	1,36	0,14	0,31	44	100	10	23		

S t a d.	Årlig medel- folk- mängd 1881— 1885	Dödstal åren					Om dödstalen för åren 1876—1880 = 100				
		1876— 1890	1876— 1880	1881— 1885	1886— 1890		1876— 1890	1876— 1880	1881— 1885	1886— 1890	
16. Mariestad (3, 56, 43)	2,746	0,59	1,36	0,22	0,20		43	100	16	15	
17. Oskarshamn (8, 26, 71)	5,488	0,59	1,28	0,44	0,04		46	100	34	3	
18. Engelholm (33, 5, 28)	2,081	0,59	0,50	0,96	0,30		118	100	182	60	
19. Sigtuna (22, 4, 75)	576	0,57	0,67	1,04	0,00		86	100	155	0	
20. Linköping (50, 11, 11).....	9,874	0,55	0,37	0,77	0,52		149	100	208	141	
21. Sölvesborg (65, 8, 13)	1,576	0,55	0,25	0,89	0,51		220	100	356	204	
22. Borås (4, 72, 59)	5,208	0,52	1,35	0,11	0,11		39	100	81	81	
23. Örebro (18, 61, 8)	12,290	0,52	0,73	0,20	0,62		71	100	27	85	
24. Ronneby ¹⁾ (—, 15, 25).....	1,852	0,50	—	0,67	0,32		—	—	—	—	
25. Vaxholm (73, 29, 3).....	1,401	0,50	0,17	0,43	0,89		294	100	253	524	
26. Karlstad (14, 18, 58)	7,800	0,50	0,81	0,56	0,12		62	100	79	15	
27. Östhammar (56, 7, 30).....	665	0,50	0,31	0,99	0,29		161	100	293	94	
28. Sundsvall (31, 32, 15)	9,543	0,47	0,55	0,40	0,47		85	100	73	85	
29. Helsingborg (19, 36, 36)	13,134	0,44	0,73	0,35	0,24		60	100	48	33	
30. Upsala (29, 28, 32)	17,535	0,43	0,57	0,43	0,29		75	100	75	51	
31. Söderhamn (39, 24, 23)	8,495	0,41	0,45	0,47	0,32		91	100	104	71	
32. Sala (45, 14, 61)	4,905	0,41	0,38	0,73	0,11		108	100	192	29	
33. Eskilstuna (21, 48, 35).....	8,663	0,40	0,67	0,28	0,26		60	100	42	39	
34. Mariefred (61, 51, 7)	836	0,39	0,27	0,24	0,65		144	100	89	241	
35. Kalmar (35, 23, 46)	11,437	0,38	0,48	0,47	0,18		79	100	98	38	
36. Västerås (37, 35, 34)	6,398	0,37	0,47	0,38	0,27		79	100	81	57	
37. Enköping (20, 46, 56)	2,757	0,37	0,69	0,29	0,13		54	100	42	19	
38. Kristinehamn (30, 33, 73)	5,177	0,33	0,55	0,39	0,04		60	100	71	7	
39. Karlskrona (25, 44, 69)	19,771	0,33	0,64	0,30	0,06		52	100	47	9	
40. Öregrund (12, 83, 75)	847	0,33	0,99	0,00	0,00		33	100	0	0	
41. Sköfde (60, 16, 63)	3,666	0,32	0,27	0,60	0,10		118	100	222	37	
42. Hernösand (51, 55, 68).....	5,538	0,32	0,36	0,22	0,07		89	100	61	19	
43. Piteå (24, 77, 40)	2,460	0,32	0,65	0,08	0,23		46	100	12	35	
44. Norrköping (54, 41, 27)	27,684	0,31	0,32	0,31	0,31		97	100	97	97	
45. Lund (28, 69, 45)	14,462	0,31	0,60	0,14	0,19		52	100	23	32	
46. Ystad (70, 22, 44)	7,250	0,30	0,20	0,50	0,20		150	100	250	100	
47. Falun (36, 58, 39)	7,461	0,30	0,47	0,21	0,23		64	100	45	49	

¹⁾ Endast för åren 1882—1890.

S t a d.	Årlig medel- folk- mängd 1881— 1885	Dödstal åren					Om dödstalen för åren 1876—1880 = 100				
		1876— 1890	1876— 1880	1881— 1885	1886— 1890		1876— 1890	1876— 1880	1881— 1885	1886— 1890	
48. Hudiksvall (27, 68, 57)	4,325	0,29	0,61	0,14	0,12	48	100	23	20		
49. Kungelf (38, 59, 41).....	968	0,29	0,45	0,21	0,22	64	100	47	49		
50. Luleå (68, 40, 19).....	3,205	0,29	0,21	0,31	0,34	138	100	148	162		
51. Söderköping (79, 20, 42)	1,850	0,29	0,11	0,54	0,21	264	100	491	191		
52. Uddevalla (34, 57, 49)	7,194	0,29	0,49	0,22	0,16	59	100	45	33		
53. Kungsbacka (82, 45, 12)	668	0,27	0,00	0,30	0,51	∞	100	∞	∞		
54. Landskrona (46, 47, 53)	10,423	0,27	0,38	0,29	0,14	71	100	76	37		
55. Stockholm (41, 52, 50).....	190,780	0,27	0,41	0,24	0,15	66	100	59	41		
56. Västervik (48, 74, 18)	6,482	0,27	0,37	0,09	0,36	73	100	24	97		
57. Skene (44, 71, 33)	1,501	0,26	0,38	0,13	0,28	68	100	34	74		
58. Grenna (58, 25, 75)	1,316	0,25	0,29	0,46	0,00	86	100	159	0		
59. Malmö (40, 50, 70)	41,239	0,25	0,42	0,27	0,06	60	100	63	143		
60. Skanör o. Falsterbo (82, 63, 10)	1,106	0,24	0,00	0,18	0,55	∞	100	∞	∞		
61. Simrishamn (78, 42, 29)	1,959	0,24	0,11	0,31	0,30	218	100	282	273		
62. Venersborg (26, 80, 72)	5,363	0,24	0,63	0,04	0,04	38	100	6	6		
63. Borgholm (66, 54, 38)	908	0,23	0,23	0,22	0,23	100	100	96	100		
64. Karlshamn (47, 60, 69)	6,526	0,23	0,38	0,21	0,11	61	100	55	29		
65. Laholm (75, 19, 74)	1,487	0,23	0,14	0,54	0,00	164	100	386	0		
66. Trosa (82, 37, 22).....	579	0,22	0,00	0,35	0,32	∞	100	∞	∞		
67. Halmstad (77, 30, 62)	8,887	0,21	0,13	0,41	0,10	162	100	315	77		
68. Kristianstad (71, 39, 52)	9,450	0,21	0,18	0,32	0,14	117	100	178	78		
69. Arboga (32, 81, 75)	3,880	0,20	0,55	0,55	0,00	36	100	9	0		
70. Hedemora (74, 27, 75)	1,385	0,20	0,16	0,43	0,00	125	100	169	0		
71. Strengnäs (49, 83, 37)	1,599	0,20	0,37	0,00	0,24	54	100	0	65		
72. Göteborg (69, 62, 51)	82,193	0,18	0,20	0,19	0,15	90	100	95	75		
73. Södertelje (53, 79, 55)	3,638	0,17	0,32	0,05	0,14	53	100	16	44		
74. Alingsås (52, 76, 67)	2,468	0,17	0,35	0,09	0,08	49	100	26	23		
75. Falkenberg (63, 53, 75)	1,726	0,16	0,26	0,23	0,00	62	100	88	0		
76. Trelleborg (72, 64, 66).....	2,258	0,15	0,18	0,18	0,08	83	100	100	44		
77. Säter (42, 83, 75)	538	0,13	0,40	0,00	0,00	33	100	0	0		
78. Strömstad (82, 78, 24)	2,370	0,13	0,00	0,08	0,32	∞	100	∞	∞		
79. Nora (62, 83, 54)	1,482	0,13	0,26	0,00	0,14	50	100	0	54		
80. Umeå (81, 49, 75).....	2,841	0,13	0,08	0,28	0,00	150	100	350	0		
81. Haparanda (82, 83, 20)	1,141	0,11	0,00	0,00	0,32	∞	100	100	∞		

S t a d.	Årlig medel- folk- mängd 1881— 1885	Dödstal åren					Om dödstalen för åren 1876—1880 = 100				
		1876— 1890	1876— 1880	1881— 1885	1886— 1890	1876— 1890	1876— 1880	1881— 1885	1886— 1890	1876— 1890	1876— 1880
82. Hjo (59, 67, 75)	1,402	0,11	0,28	0,14	0,00	39	100	50	0		
83. Lidköping (55, 82, 75)	4,817	0,11	0,31	0,02	0,00	35	100	6	0		
84. Marstrand (57, 83, 75)	1,319	0,10	0,30	0,00	0,00	33	100	0	0		
85. Filipstad (76, 66, 75)	2,955	0,09	0,14	0,14	0,00	64	100	100	0		
86. Skellefteå (64, 83, 75)	965	0,08	0,25	0,00	0,00	32	100	0	0		
87. Ulricehamn (82, 83, 48)	1,195	0,06	0,00	0,00	0,17	∞	100	100	∞		
88. Motala ¹⁾ (—, 83, 64)	2,112	0,05	—	0,00	0,09	—	—	—	—		
89. Östersund (82, 73, 74)	3,632	0,05	0,00	0,11	0,04	∞	100	∞	∞		
90. Askersund (82, 70, 75)	1,571	0,04	0,00	0,13	0,00	∞	100	∞	100		
91. Vimmerby (80, 83, 75)	1,991	0,03	0,10	0,00	0,00	30	100	0	0		
Alla städerna	743,281	0,34	0,49	0,31	0,22	69	100	63	45		

¹⁾ Endast för åren 1882—1890.

Hvad ofvanstäände jämförelse i sin helhet angår, torde böra erinras där om, att de största och de minsta städerna knappast äro med hvarandra i allo jämförliga; vi måste beträffande de senare bortse från växlingar, som kunna vara mera tillfälliga, ehuru de på grund af de absoluta talens litenhet åstadkomma ett stort utslag, då dödstalen uträknas. Läatom oss taga ett exempel. Vi hafva två städer, en stor och en liten. I den förra inträffar något år 20 dödsfall, i den senare 1. Nästa år få vi i den förra 40, i den senare 2 dödsfall. Denna fördubbling af dödstalen (om folkmängden i hvardera staden tänkes oförändrad) torde vi väl knappast i de båda fallen kunna tillmäta samma betydelse.

Med afseende på dessa små städer, i hvilka kanske under en hel 5-årsperiod ett eller två dödsfall i tyfoidfeber inträffar, måste man också, då det gäller att af dödstalen bedöma sjukdomsfrekvensen, taga större hänsyn till växlingarne i den relativta mortaliteten (förhållandet mellan döde och insjuknade), än beträffande de större städerna, där förhållandena åtminstone om man räknar med så långa tiderymder som 5-årsperioder, torde utjämnas så mycket, att den relativta mortaliteten kan betraktas som konstant och dödstalen sälunda kunna tjena som mått på morbiditeten.

Med denna reservation erbjuder ofvanstående tabell åtskilligt af intresse.

Skilnaden mellan de främst och sist på tabellen stående städerna är allt för påtaglig för att vara endast tillfälligt.

Orsaker måste således finnas; och närmast till hands ligger naturligtvis att söka dessa i olikheter mellan städerna i hygieniskt afseende, en fråga på hvars närmare utredning jag dock för tillfället ej ingår.

Endast såsom en antydan i denna riktning må i förbigående nämnas, att t. ex. den andra staden i ordningen, Åmål, redan i de första berättelserna af helsovårds-nämnderna framstår såsom utmärkt genom i ögonen fallande sanitära missförhållanden. Så heter det t. ex. 1875: »vattnet i brunnarne är obrukbart, det egentliga vattenhemningsstället är vid ån, churu dess vatten förorenas genom hvarjehanda tillflöden; begravningsplatsen ligger högre än stadens nivå, dess vattenaflopp rinner genom staden till ån». 1877 skrifves: »Afloppen äro högst dåliga; i alla gårdar och rännstenar stå vattenpolar och, då nederbörd inträffar, sköljes all smutsen ned i ån; alla orenligheter utkastas på gårdar eller i rännstenar; då samlingen blir värd att afyttra, säljes den till någon landtbrukare för 80 à 90 öre lasset; marken insuper den flytande delen, så långt den förmår, resten nedrinner i ån; det händer, att man i trånga gårdar får se på ett ställe svinhus, på ett annat afträde, på ett tredje stallar och på ett fjärde sopor och smutsvatten; i *bästa* fall samlas allt afflödet i en gödselgrop». Och så vidare. Först 1879 skyntas en ljusning. Ett afloppsdike är nu gräfdt genom ett kvarter, och gödselstäderna äro i lagligt skick. 1884 äro rännstenar bygda i större delen af staden, vattensjuka platser dränerade. 1886 äro afloppen fullt reglerade i gårdarne; staden täckdikad. Dessa nu nämnda »epoker» i den lilla stadens sanitära utvecklingshistoria motsvaras, som å tabellen synes, af betydande sänkningar af dödstalen för tyfoidfebern.

På samma sätt kan man för en del andra städer få fram en parallelism mellan sanitära förbättringar och aftagande af dödligheten i tyfoidfeber. Dock må det anmärkas, att detta förhållande i det hela taget är svårt att ådagalägga genom exakta siffror, då dels de nämnda sanitära åtgärderna i allmänhet vidtagas successivt år efter år, dels dödstalen förete ganska stora växlingar, om man jämför enskilda år med hvarandra. För en hel del små städer torde knappast 5-årsperioderna vara tillräckligt långa tidrymder för att med hvarandra jämföras. Och hela den här behandlade perioden 1876—1890 är nog också för kort, för att man skall kunna anse de funna resultaten säkert bestående. Det måste öfverlemmas åt framtiden, att bekräfta eller vederlägga desamma.

Om emellertid tyfoidfeberns förhållande, såsom man sagt, kan tjena som mätstock för bedömande af en stads sanitära tillstånd, så torde ofvanstående tabell härutinnan vara af ett visst intresse och innehålla en del fingervisningar, som för vederbörande kunna blifva en sporre till »ädel täflan» i berörda hänseende. Så bör t. ex. Åmål kunna blifva ett föredöme för sin granne på tabellen, Torshälla, o. s. v.

Vi se vidare af tabellen, att städernas storlek icke står i något samband med deras plats å rangskalan, åtminstone icke i den riktningen, att de små städerna skulle utmärka sig genom någon särskildt låg frekvens af tyfoidfebern. Tvärtom intagas de främsta rummen af några bland de mindre och minsta städerna. Medeltalet för alla städerna under hela perioden 1876—1890 överskrider af flera af de minsta städerna. Hufvudstaden kommer ett godt stycke nedanför midten af rangskalan och likaledes under alla städernas medeldödstal. Ännu längre ned på listan finna vi Göteborg, rikets andra stad i folkmängd.

Under de olika 5-årsperioderna intaga städerna följande ordning från högsta till lägsta dödstal.

1876—1880. Åmål, Eksjö, Mariestad, Borås, Norrtelje, Visby, Köping, Oskars-hamn, Jönköping, Skara, Falköping, Öregrund, Torshälla, Karlstad, Vexiö, Nyköping, Gefle, Örebro, Helsingborg, Enköping, Eskilstuna, Sigtuna, Vadstena, Piteå, Karlskrona, Venersborg, Hudiksvall, Lund, Upsala, Kristinehamn, Sundsvall, Arboga, Engelholm, Uddevalla, Kalmar, Falun, Vesterås, Kungelf, Söderhamn, Malmö, Stockholm, Säter, Linde, Skeninge, Sala, Landskrona, Karlshamn, Vestervik, Strengnäs, Linköping, Hernösand, Alingsås, Södertelje, Norrköping, Lidköping, Östhammar, Marstrand, Grenna, Hjo, Sköfde, Mariefred, Nora, Falkenberg, Skellefteå, Sölvesborg, Borgholm, Varberg, Luleå, Göteborg, Ystad, Kristianstad, Trelleborg, Vaxholm, Hedemora, Laholm, Filipstad, Halmstad, Simrishamn, Söderköping, Vimmerby, Umeå, (Askersund, Skanör och Falsterbo, Haparanda, Kungsbacka, Strömstad, Trosa, Ulricehamn, Östersund).

1881—1885. Torshälla, Varberg, Norrtelje, Sigtuna, Engelholm, Vexiö, Östhammar, Sölvesborg, Köping, Visby, Linköping, Nyköping, Skara, Sala, Ronneby, Sköfde, Jönköping, Karlstad, Laholm, Söderköping, Linde, Ystad, Kalmar, Söderhamn, Grenna, Oskarshamn, Hedemora, Upsala, Vaxholm, Halmstad, Gefle, Sundsvall, Kristinehamn, Falköping, Vesterås, Helsingborg, Trosa, Vadstena, Kristianstad, Luleå, Norrköping, Simrishamn, Åmål, Karlskrona, Kungsbacka, Enköping, Landskrona, Eskilstuna, Umeå, Malmö, Mariefred, Stockholm, Falkenberg, Borgholm, Hernösand, Mariestad, Uddevalla, Falun, Kungelf, Karlshamn, Örebro, Göteborg, Skanör och Falsterbo, Trelleborg, Eksjö, Filipstad, Hjo, Hudiksvall, Lund, Askersund, Skeninge, Borås, Östersund, Vestervik, Alingsås, Piteå, Strömstad, Södertelje, Venersborg, Arboga, Lidköping (Haparanda, Marstrand, Motala, Nora, Skellefteå, Strengnäs, Säter, Ulricehamn, Vimmerby).

1886—1890. Vadstena, Linde, Vaxholm, Torshälla, Gefle, Nyköping, Mariefred, Örebro, Köping, Skanör och Falsterbo, Linköping, Kungsbacka, Sölvesborg, Skara, Sundsvall, Vexiö, Jönköping, Vestervik, Luleå, Haparanda, Varberg, Trosa, Söderhamn, Strömstad, Ronneby, Eksjö, Norrköping, Engelholm, Simrishamn, Östhammar, Falköping, Upsala, Skeninge, Vesterås, Eskilstuna, Helsingborg, Strengnäs, Borgholm, Falun, Piteå, Kungelf, Söderköping, Mariestad, Ystad, Lund, Kalmar, Norrtelje, Ulricehamn, Uddevalla, Stockholm, Göteborg, Kristianstad, Lands-

krona, Nora, Södertelje, Enköping, Hudiksvall, Karlstad, Borås, Karlshamn, Sala, Halmstad, Sköfde, Motala, Visby, Trelleborg, Alingsås, Hernösand, Karlskrona, Malmö, Oskarshamn, Venersborg, Kristinehamn, Östersund (Arboga, Askersund, Falkenberg, Filipstad, Grenna, Hedemora, Hjo, Laholm, Lidköping, Marstrand, Sigtuna, Skellefteå, Säter, Umeå, Vimmerby, Åmål, Öregrund)¹⁾.

Ordningen mellan städerna har sålunda varit ganska växlande; med andra ord, tyfoidfebern har med afseende på till- eller aftagandet från en period till en annan inom de skilda städerna förhållit sig ganska olika.

Om vi uppställa städerna efter den minskning, dödstalen för tyfoidfebern undergått, då vi jämföra den första och den sista 5-årsperioden, blir ordningen dem emellan följande (från största till minsta minskning, fr. o. m. Gefle från minsta till största förstoring).

Åmål, Sigtuna, Öregrund, Grenna, Laholm, Arboga, Hedemora, Falkenberg, Säter, Umeå, Hjo, Lidköping, Marstrand, Filipstad, Skellefteå, Vimmerby, Oskarshamn, Venersborg, Visby, Kristinehamn, Karlskrona, Norrtelje, Mariestad, Karlstad, Enköping, Hernösand, Hudiksvall, Eksjö, Alingsås, Falköping, Jönköping, Karlshamn, Sala, Lund, Helsingborg, Uddevalla, Piteå, Landskrona, Sköfde, Kalmar, Eskilstuna, Skara, Stockholm, Södertelje, Trelleborg, Köping, Falun, Kungälv, Upsala, Växiö, Nora, Vesterås, Engelholm, Strengnäs, Söderhamn, Skeninge, Göteborg, Halmstad, Kristianstad, Borås, Örebro, Sundsvall, Nyköping, Östhammar, Norrköping, Vestervik, Torshälla, Ystad, Borgholm, Askersund, — Gefle, Linköping, Malmö, Varberg, Luleå, Söderköping, Söderköping, Söderhamn, Vadstena, Mariefred, Linde, Simrishamn, Vaxholm (Kungsbacka, Skanör och Falsterbo, Trosa, Strömstad, Haparanda, Ulricehamn, Östersund).

I alla städerna tillsammantagna har, såsom synes, dödstalet från första till andra 5-årsperioden minskats med 37 proc., från första till tredje perioden med ej mindre än 55 proc.; häraf framgår således, att ett märkt aftagande af tyfoidfeberns frekvens eller absoluta betydelse såsom dödsorsak i städerna ägt rum under den gångna perioden 1876—1890. Aftagandet är störst från den första till den andra 5-årsperioden (37 proc.), något mindre från den andra till den tredje, nämligen ungefär 29 proc.²⁾.

¹⁾ Siffrorna inom parentes efter städernas namn å tabellen visa ordningsföljden för hvarje stad under de olika 5-årsperioderna.

²⁾ Till jämförelse anföras här dödstalen i närv- resp. tyfoidfeber för samtliga städerna under hvarje 5-årsperiod 1861—1890. De voro:

1861—65: 0,64 %	1871—75: 0,81 %	1881—85: 0,31 %
1866—70: 1,09 "	1876—80: 0,49 "	1886—90: 0,22 "

Häraf framgår en betydande ökning af dödligheten i »närvfeber« för perioden 1866—1875, hvilken kan misstänkas till stor del bero på uppträdandet af fläcktyfus. Äfven om Stockholm och Göteborg främräknas (beträffande Göteborg är detta utfört för år 1870, då tyfoidfeber och fläcktyfus uppgåfvos särskildt i stadsläkarens redogörelse), så återstår dock för de öfriga städerna en betydande ökning. Emellertid synes, att död-

För att de nu med stöd af olika slags sifferuppgifter anställda jämförelserna mellan länen, läkaredistrikten och städerna skola kunna anses nägorlunda tillförlitliga fordras tydlig, att de ej skola förete någon uppenbar motsägelse mot hvarandra, att således t. ex. den ordning, i hvilken länen komma i förhållande till hvarandra, ej märkbart bör rubbas genom den, som tillkommer de i vederbörliga län ingående distrikten och städerna. Om vi granska de olika tabellerna, så torde vi kunna säga, att denna fordran är något så när uppfylld.

Af de län, som stå främst på sin tabell, finna vi sälunda ett eller flera distrikt högt uppe på motsvarande tabell, och äfven städerna, där de äro af någon betydenhet, tyckas intaga en mot länets rang svarande plats. Se t. ex. Gefleborgs län jämte dit hörande distrikt och städer¹⁾. Detsamma kan sägas om de sistkommande länen o. s. v. Det synes därför, att de använda sifferuppgifterna, hvar i sitt slag, i relativt hänseende äro nägorlunda tillförlitliga. Såsom absoluta värden äro de, som förut är påpekadt, alla mer eller mindre bristfälliga. De pålitligaste siffrorna torde väl härvidlag helsovårdsnämndernas vara.

Beträffande tyfoidfeberns olika förhållande på landsbygd och i städer¹⁾ lämna redan siffrorna å tabellerna sid. 33 och 51 en antydan, då vi se att för hela perioden 1876—1890 dödstalet, uträknadt på 10,000 invånare, för samtliga städerna utgör 3,4 och motsvarande tal för hela riket, landsbygd och städer, är blott 2,5. Då uppgifterna för städerna af helsovårdsnämnderna ingalunda kunna anses fullständigare motsvara det verkliga antalet inträffade dödsfall än de senare enligt den officiella statistiken för hela riket angifna, torde den häraf framgående skillnaden ingalunda vara för stor utan snarare motsatsen. Vidare framgår af de båda sifferserierna, att minskningen af dödligheten i tyfoidfeber är mycket betydligare i städerna än i riket i sin helhet. Dödstalen för de olika 5-årsperioderna och deras »mätare», om första periodens = 100, är nämligen:

	för städerna:	för hela riket:
1876—80:	4,9 = 100;	2,8 = 100.
1881—85:	3,1 = 63;	2,6 = 93.
1886—96:	2,2 = 45;	2,2 = 79.

Ligheten i tyfoidfeber betydligt aftagit, äfven om man jämför perioderna 1876—1890 och 1861—1865. Under dessa sistnämnda år synes icke fläcktyfus spelat någon väsentlig rol. Minskningen är så mycket större, som dödssiffrorna för 1861—65 säkert mera understiga det verkliga antalet dödsfall än motsvarande siffror för 1876—90. Under hela 1860-talet plägade nämligen alltid dödsattester fattas för 14—15 proc. af samtliga dödsfallen, men denna brist har smäningom minskats, så att för dödsfallen i städerna t. ex. år 1882 attester fattades blott i 4,4 proc., år 1890 blott i 3 proc. af samtliga, faktiskt inträffade.

¹⁾ För en sådan jämförelse kunna läkarerapporternas uppgifter ej alls användas, då stadsläkarnes, så vidt det rör *antalet* insjuknade och döde, säkert äro långt fullständigare än landsbygdsläkarnes.

Dödigheten i tyfoidfeber har sälunda enligt denna jämförelse minskats så mycket mera i städerna än i hela riket, att dödstalet för de förra från att åren 1876—80 hafva varit ej långt från dubbelt så stort som dödstalet för hela riket nedgått till samma storlek som det senares för åren 1886—90.

Man kan nu invända, att siffrorna för städerna och hela riket, såsom härledande sig från olika källor, ej äro med hvarandra jämförliga. Särskilt bör det märkas, att för åren 1876—80, såsom förut är nämdt, möjligent en hel del dödsfall af tyfoidfeber i den officiella statistiken rubricerats såsom hjärnfeber, i synnerhet för landsbygden, där fallens diagnos varit mindre tillförlitlig än i städerna, hvarest den vida oftare stödts på läkares atester; från och med 1881 åro däremot, såsom ock papekats, närvfeber och hjärnfeber sammanslagna, och vid uträknandet af dödstalen för de följande åren hafva endast de fall af hjärnfeber frändragits, som särskilt uppgifvits såsom *epidemisk* hjärnfeber. Härutaf följer, att minskningen af dödigheten i tyfoidfeber (»närvfeber») för landsbygden från perioden 1876—80 till perioden 1881—86 möjligen synes obetydligare, än den i sjelfva värket varit.

För att eliminera de nu antydda oegentligheterna har jag här nedan för en jämförelse mellan städerna, landsbygden och hela riket dels använt *endast* den officiella statistikens siffror, dels gjort två olika sammanställningar, den ena uppstagande dödstalen för »närv- och hjärnfeber» tillsamman, den andra endast dödstalen för »närvfeber», ¹⁾ alla beräknade på 10,000 inv.

För *närv- och hjärnfeber* tillsammantagne voro dödstalen och deras »mätare» (om första 5-årsperiodens dödstal = 100)

	f. städerna dödstal »mätare»	f. landsbygden dödstal »mätare»	f. hela riket dödstal »mätare»
1876—80:	5,3 = 100;	3,1 = 100;	3,4 = 100.
1881—85:	3,4 = 64;	2,6 = 84;	2,7 = 79.
1886—90:	2,4 = 45;	2,2 = 71;	2,3 = 68.
1876—90:	3,6;	2,6;	2,8.

För *närvfeber* ensamt voro motsvarande tal

	f. städerna dödstal »mätare»	f. landsbygden dödstal »mätare»	f. hela riket ²⁾ dödstal »mätare»
1876—80:	5,2 = 100;	2,5 = 100;	2,9 = 100;
1881—85:	3,2 = 62;	2,5 = 100;	2,7 = 93.
1886—90:	2,3 = 44;	2,2 = 88;	2,2 = 76.
1876—90:	3,4;	2,4;	2,6.

¹⁾ »Gula febren» är här medräknad, hvilket dock ej märkbart invärkar på siffrorna.

²⁾ Olikheten mellan dessa och förut uppgifna dödstal för hela riket beror (frånsedt gula febrens med resp. fränräknade) därpå, att de här angifna talen uträknats *direkt* genom de absoluta talen för 5-årsperioderna, då de förra däremot äro *medeltal* af de särskilda årens dödstal.

Af ofvanstående små tabeller finna vi, att dödstalen för städerna, uträknade för hela perioden 1876—90, med omkring 40 % öfverstiga de för landsbygden angifna.

Vi se vidare, att dödstalen för hjärnfeber ensamt, beräknade såsom *skilnad* mellan båda tabellernas siffror icke öfverstiga 0,2 *med undantag för perioden 1876—80*, som visar ett dödstal af resp. 0,6 och 0,5 för landsbygden ensamt och för hela riket.

Detta åstadkommer, såsom nyss antyddes, att *minskningen* af de båda slagen dödstal, å ena sidan för närv- och hjärnfeber tillsammans, å andra sidan för närvfeber ensamt, beträffande landsbygden och riket i sin helhet i de båda fallen sines mellan visa en betydligt större skilnad än beträffande städerna, för hvilka dödstalen i båda fallen aftagit i nästan samma proportion.

Hvad nu den officiella statistikens »hjärnfeber» angår, finnes i de medicinska källorna, läkarerapporterna, intet, som antyder, att frekvensen af verklig, epidemisk hjärnfeber under perioden 1876—90 skulle varit större å landsbygden, jämfört med städerna under samma tid eller med landsbygden under de båda följande 5-årsperioderna.

Det ligger därför nära till hands att tillskrifva detta relativt höga dödstal för hjärnfeber å landsbygden under nämnda period en oriktig rubricering af tyoidfeberfall, beroende på bristfällig diagnos.

I alla händelser torde man, då det gäller att jämföra landsbygd och städer med afseende på tyoidfeberns *aftagande*, göra rättsvisast uti att därvidlag räkna med *närv- och hjärnfeber* tillsammantagna.

Äfven om vi tillämpa detta, finna vi emellertid, att minskningen af dödligheten i tyoidfeber¹⁾ gått ojämförligt mycket hastigare i städerna än på landsbygden, i det dödstalet för närv- och hjärnfeber för de förra, under perioden 1876—90 minskats från 5,3 till 2,4 eller med 55 %, för den senare från 3,1 till 2,2 eller med 29 %. *Minskningen för städerna är således nära dubbelt så stor som för landsbygden.*

Om vi taga närvfebern ensam, blir skilnaden, såsom synes, ännu betydligare. Minskningen är då för städerna 56 %, för landsbygden endast 12 %.

Enligt båda beräkningarna var *tyoidfeberns frekvens under den sista 5-års-perioden föga större i städerna än på landsbygden*, under det att den under den *första 5-årsperioden* enligt den ena beräkningen var rätt *nära dubbelt*, enligt den andra mera än dubbelt *så stor i städerna som på landsbygden*, allt under förutsättning, att hjärnfebern förhållit sig ungefär lika i städer och på landsbygd och

¹⁾ Vi få naturligtvis ihågkomma, att »närvfeber» i den officiella statistiken innefattar utom tyoidfeber, äfven fläcktyfus och möjigen andra, origtigt diagnosticerade sjukdomar. Tyoidfebern är dock under den tid, hvarmed vi här sysselsätta oss, så ofvervägande, att man bör vara berättigad att hänföra dylika beräkningar, som ofvanstående, till tyoidfebern ensam.

under olika perioder. (Äfven om härutinnan någon växling skulle förefinnas, betyder det föga i anseende till hjärnfeberns i jämförelse med tyloidfeberns så obetydliga frekvens.)

Att man här kan använda dödstalen säsom mätare af frekvensen, är väl knappast tvifvel underkastadt; ty någon olikhet i förhållandet mellan döde och sjuke, d. v. s. den relativa mortaliteten i städer och på landsbygd eller under de olika perioderna har man väl ej skäl att antaga, åtminstone ej i stort sedt.

Säson resultat af denna jämförelse mellan städer och landsbygd beträffande tyloidfeberns förhållande kunna vi således fastställa,

att tyloidfebern, för hela perioden 1876–90 räknadt, varit allmännare i städerna än på landsbygden (ungefär 40 %),

att tyloidfeberns frekvens under samma tid minskats i riket i sin helhet (med högst 32 %, minst 21 %),

att denna minskning varit vida betydligare i städerna än å landsbygden (minskningen i städerna högst 4,7 gånger, minst 1,9 gånger så stor, som å landsbygden).

En sådan olikhet mellan städerna och landsbygden med afseende på tyloidfeberns förhållande kan naturligtvis ej vara tillfällig.

Att sjukdomen för hela den nämnda perioden räknadt borde vara allmännare i städerna än på landsbygden, är ju a priori antagligt, då efter all erfarenhet städerna i synnerhet erbjuda en för tyloidfebern lämplig jordmån.

Att sjukdomen i dessa aftagit så mycket mera än på landsbygden, visar otvifvelaktigt, att de för tyloidfeberns uppkomst och utbredning gynsamma villkoren i städerna rönt en vida starkare inskränkning än å landsbygden.

Detta står åter säkerligen i samband med den olika effekt, som den sedan 1875 tillämpade helsovårdsstadgan haft på städernas och på landsbygdens sanitära utveckling.

För de förra har den sedan nämnda år gångna perioden i allmänhet varit en tid af raskt framåtskridande.

På landsbygden däremot torde hygienen i många hänseenden ännu stå på samma ståndpunkt som vid tiden för helsovårdsstadgans utfärdande. — Huru litet de första 10 åren af stadgans tillvaro lämnat i behållning för landsbygdens räkning, har visats af Selling¹⁾, som också anför en del tragiskomiska exemplen på

¹⁾) *Selling, A. M.* Om gällande Helsovårdsförfattingars betydelse och tillämpning i rikets landskommuner åren 1875–1884. Stockholm 1887.

det sätt, hvarpå en del kommunalnämder i början uppfattade sina nya, genom helsovårdsstadgan tillkomna åligganden¹⁾.

För öfrigt är det tydligt, att resultatet af sanitära åtgärder måste blifva mera påtagliga i samma mån missförhållandena från början varit svåra.

Redan häruti ligger väl till en del orsaken till tyfoidfeberns hastigare aftagande i städerna än på landsbygden.

Ty att de sanitära missförhållandena i städerna äro eller åtminstone från början varit större än på landsbygden, kan väl ej betviflas.

¹⁾ Anf. arb. sid. 75 o. följ.

Tyfoidfeberns betydelse som dödsorsak. Relativ mortalitet.

Om den absoluta dödligheten är redan i det föregående taladt, då vi hittills i allmänhet rört oss med *dödstal*, hvilka, då det gält jämförelser, äfven fått tjena såsom mått på sjukdomsfrekvensen.

För att här på sin plats upprepa det viktigaste, utgjorde *dödstalet för närvfeber* (med frånräknande af hjärnfeber och gula febern) enligt den officiela statistikens uppgifter under perioden 1876—1890 för hela riket 2,5, beräknadt på 10,000 invånare. Under de särskilda 5-årsperioderna: 2,8; 2,6; 2,2¹⁾.

Af skäl, som förut sidd. 33, 56 o. s. v. omnämnts, torde talet för 5-årsperioden 1876—80 och därigenom det för hela perioden 1876—90 kunna anses något för lägt. — Om vi sammanräkna alla uppgifna dödsfall af epidemisk hjärnfeber och gula febern under hvar och en af 5-årsperioderna 1881—85 och 1886—90 och under antagande, att ett lika stort eller något större antal dödsfall i nämnda sjukdomar ägt rum 1876—80, draga detta ifrån summan af dödsfall i närv- och hjärnfeber för sistnämnda period, så erhålla vi i stället för ofvanstående dödstal följande:

Dödstal.	Om dödst. 76—80 = 100
1876—80: 3,3	= 100
1881—85: 2,6	» 79
1886—90: 2,2	» 67
1876—90: 2,7.	

Dessa dödstal för 1876—80 och 1876—90 äro åter möjligent något för höga, relativt till de öfriga, då fläcktyfus (som ju ingår i *alla talen*), att döma af läkarerapporterna varit något mera frekvent 1876—80 än sedermera.

¹⁾ Uträknadt direkt medelst de absoluta talen för resp. perioder. Siffrorna blifva sälunda äfven på detta sätt de samma, som de på något olika sätt erhållna, å tab. sid. 35 angifna.

Sanningen ligger sålunda mellan dessa båda talserier, men säkerligen vida närmare den *sist angifna*, som sålunda bäst torde uttrycka den *absoluta mortaliteten för tyfoidfebern* under i fråga varande tidrymd.

Om förhållandet mellan städer och landsbygd i denna punkt se föregående kapitel.

Vi skola nu undersöka, hvilken rol tyfoidfebern spelat för den allmänna dödligheten och i förhållande till dödligheten i andra sjukdomar.

Enligt officiela statistiska uppgifter afledo under åren 1876—90 i närvfeber (med främräknande af hjärnfeber och gula febern) 17,524 personer, hvilket utgör 1,46 % af samtliga under dessa år inträffade dödsfall. Under de enskilda 5-års-perioderna voro de procentiska förhållandena följande:

$$1876-80 = 1,53 \%, \quad 1881-85 = 1,49 \%, \quad 1886-90 = 1,34 \%.$$

Om vi efter nyss nämnda grunder approximativt korrigera föregående tal, få vi som absolut antal dödsfall i tyfoidfeber 1876—90: 18,665.

I enlighet härförmed fa vi följande *procentförhållanden mellan dödsfall i tyfoidfeber och samtliga dödsfall* jämte motsvarande jämförelsetal, om det första af de nämnda förhållandena sättes lika med 100:

$$\begin{array}{rcl} 1876-80: & 1,81 & = 100, \\ 1881-85: & 1,49 & = 82, \\ 1886-90: & 1,34 & = 74, \\ \hline 1876-90: & 1,55. \end{array}$$

Vi se häraf, att *dödligheten i tyfoidfeber minskats* icke blott, såsom förut är visadt, i proportion till en gifven folkmängdssiffra utan äfven i *förhållande till den allmänna dödligheten*, som äfven under i fråga varande period visat ett aftagande, ehuru endast i förhållandet 100:96:89.

Aftagandet af dödligheten i tyfoidfeber kan därfor icke anses blott och bart såsom ett uttryck för denna minskning af dödligheten i allmänhet.

Man är med andra ord berättigad att säga, antingen att aftagandet af dödligheten i tyfoidfeber icke kan vara betingad ensamt af de omständigheter, som öfvat sitt inflytande på dödligheten i allmänhet, eller också, att tyfoidfebern visat sig på ett särskildt sätt känslig för dessa inflytelser.

Med afseende på förhållandet mellan städer och landsbygd härutinnan, visar sig samma skilnad, som beträffande den absoluta mortaliteten i föregående kapitel är påvisad, i det att städerna gå framför landsbygden å ena sidan med hänsyn till storleken af talet för hela perioden 1876–90, å andra sidan i fråga om minskningen från en 5-årsperiod till en annan.

Om vi nämligen efter samma korrektion af siffrorna för 1876–80 och följkartligen för hela tiden 1876–90, som här ofvan är gjord¹⁾, uträkna dödsfallen af närvfeber i procent af samtliga dödsfallen i städer och på landsbygd, få vi följande lilla tabell:

	Städer:		Landsbygd:	
	Dödsfall af närvf. i proc. af samtliga	Om talet f. 1876–80 = 100	Dödsfall af närvf. i proc. af samtliga	Om talet f. 1876–80 = 100
1876–80.....	2,31 proc.	100	1,72 proc.	100
1881–85.....	1,45 »	63	1,57 »	91
1886–90.....	1,22 »	53	1,40 »	81
1877–90.....	1,67 proc.	—	1,55 proc.	—

Dödigheten i tyfoidfeber har sálunda, likasom den i det hela är i förhållande till en viss folkmängdssiffra större i städerna än på landsbygden och har minskats mera i de förra än på den senare, äfvenledes företett samma förhållande relativt till den allmänna dödigheten, och detta, ehuru den senare i städerna rönt ett ansenligt starkare aftagande än på landsbygden. (Den var nämligen under våra tre 5-årsperioder i städerna resp. 22,7, 20,8 och 18,8 på 10,000 inv. och har sálunda minskats i proportion af 100:92:82; på landsbygden resp. 17,5, 16,9 och 15,8 med en minskning i proportion af 100:97:90, allt i runda tal såsom medeltal af de enskilda årens totala mortalitet.)

Det torde ej sakna sitt intresse att äfven undersöka tyfoidfeberns betydelse såsom dödsorsak i förhållande till öfriga infektionssjukdomar eller, såsom rubriken i den officiella statistiken lyder, farsoter. Hit räknas: smittkoppor, skarlakansfeber, elakartad halssjuka, strypsjuka, kikhusta, närvfeber (och) hjärnfeber, frossa, rödsot, diarré, inhemska kolera, dragsjuka, skörbjugg, passjuka.

I procent af samtliga dödsfall i »farsoter» utgjorde dödsfallen i »närvfeber» (hjärnfeber och gula febern frånräknade och korrektion i enlighet med föregående beräkningar) för hela riket:

1876–80.....	10,99 proc.	= 100
1881–85.....	9,96 »	= 99
1886–90.....	10,87 »	= 101
1876–90.....	10,21 proc.	—

¹⁾ Gula febern är dock ej frånräknad, då jag ej antecknat dödsfallen i denna särskilt för städer och landsbygd. De följande talen ärä därför såsom absoluta värden för tyfoidfebern möjligent en eller annan hundradedel för höga.

I detta afseende har saledes ingen minskning ägt rum; da, säsom ofvan är visadt, en minskning af dödligheten i tyfoidfeber i förhållande till en bestämd folkmängd och till den allmänna dödligheten försiggått, innehära de sista siffrorna ingenting annat, än att *äfven öfriga »farsoter»* förete en minskning af dödligheten i samma hänseenden och detta i ungefär samma proportion som tyfoidfebern.

Detta gäller emellertid endast riket i sin helhet. Mellan landsbygd och städer förefinnes äfven härvidlag en högst väsentlig skilnad. Detta framgår af nedanstående tabell, som anger det procentiska förhållandet mellan dödsfall i närvfeber och i samtliga »farsoter» för städer och landsbygd¹⁾.

Städer:

Landsbygd:

	Dödsfall i närvfeber i proc. af alla dödsf. i farsot	Om talet för 1876—80 = 100	Dödsfall i närvfeber i proc. af alla dödsf. i farsot	Om talet för 1876—80 = 100
1876—80.....	8,66 proc.	100	10,79 proc.	100
1881—85.....	6,48 "	75	11,68 "	108
1886—90....	5,73 "	66	13,63 "	126
1876—90.....	7,02 proc.	—	11,79 proc.	—

Den andel, »närvfebern» tager i dödsfallen af samtliga »farsoter», är sälunda större på landsbygden än i städerna och har å den förra under perioden något ökats, i de förra däremot aftagit. Med hävning till näst föregående jämförelse mellan städer och landsbygd beträffande dödligheten i närvfeber kunna vi alltså af den sista tabellen medelbart sluta, att »farsoterna» i sin helhet på landsbygden orsaka ett relativt mindre antal af samtliga dödsfall än i städerna, och att deras betydelse för den allmänna dödligheten på landet minskats något mera än enbart närvfeberns enligt tabellen sid. 62, under det att däremot i städerna farsoternas relativa betydelse säsom dödsorsak visserligen minskats men ej på långt när i lika hög grad som detta varit fallet beträffande närvfebern ensam.

Om vi med ledning af helsovårdsnämndernas uppgifter undersöka förhållandet mellan dödligheten i »tyfoidfeber» och alla »infektionssjukdomar» (hvar tillräknas den officiella statistikens »farsoter» utom diarré och strypsjuka, med tillägg i stället af varfeber, barnsängsfeber, syfilis och mjältbrand m. m.), så få vi procenten vida högre än den här ofvan anfördta för »närvfeber» och »farsoter», nämligen för de olika 5-års perioderna resp. 15,98, 11,86, 10,10 samt för hela perioden 1876—90: 12,68. Proportionen mellan de 3 förstnämnda talen är som 100:74:63, sälunda utvisande en minskning af den andel, tyfoidfebern tager bland alla dödsfall i infektionssjukdomar, som tämligen väl öfverensstämmmer med den å sista tabellen visade, som rör statistikens »närvfeber» och »farsoter».

Beträffande tyfoidfeberns förhållande till de enskilda akuta infektionssjukdomarne må nämnas, att enligt den officiella statistiken närvfebern (utan hjärn- och gula febern) med hänsyn till absolut mortalitet under åren 1876—85 var den

¹⁾ Äfven här är gula febern medräknad och gäller om talens *absoluta* värde hvad å sid. 62 not, är sagdt.

3:dje i ordningen. Bland samtliga dödsfall dessa är förorsakades: af difteri och strypsjuka 4,8 proc., af skarlakensfeber 4,7 proc., af närvfeber 1,7 proc., af kikhusta 1,1 proc., af mässling 1,0 proc. o. s. v.

Om vi nu i korthet sammanfatta, hvad vi funnit angående *tyoidfeberns relativa betydelse som dödsorsak* i vårt land, *för så vidt* man får antaga, att den officiela statistikens närvfeber efter främräkande af epidemisk hjärnfeber och gula febern huvudsakligen är *tyoidfeber*, så komma vi till följande resultat:

Tyoidfebern är i vårt land bland de akuta sjukdomarne såsom dödsorsak en af de främsta.

Tyoidfeberns betydelse i detta hänseende för riket i sin helhet har under perioden 1876—90 ej obetydligt minskats (med 26 proc.), mest i städerna (med i det närmaste 47 proc.) mindre på landsbygden (med blott omkring 19 proc.) och var under perioden 1886—90 mindre i städerna än på landsbygden.

Tyoidfeberns betydelse såsom dödsorsak i jämförelse med »farsoter» i allmänhet har icke minskats i riket i sin helhet, på landsbygden tvärtom ökats (med omkring 26 proc.), men ändemot minskats i städerna (med omkring 34 proc.).

Jag öfvergår nu till den relativta mortaliteten i inskränktaste mening d. v. s. *förhållandet mellan antalet i tyoidfeber döde och insjuknade.*

Härom kan den officiela statistiken, såsom innehållande endast dödssiffror, naturligtvis icke lämna någon upplysning.

Lika litet äro de i läkarerapporterna förefintliga siffrorna i allmänhet taget för detta ändamål användbara.

Ofta uppgifvas, såsom förut är nämndt, antalet sjuke enligt läkarens enskilda anteckningar, under det antalet döde anföras enligt helsovårds- resp. kommunalnämndernas redogörelser. Äfven om både sjukdoms- och dödsfallen tillhörta läkarens praktik, är det tydligt, att i synnerhet på landsbygden företrädesvis de svåra, dödligt förlöpande fallen komma under läkarens behandling eller till hans kännedom, under det att en mängd lindriga fall gå förlorade för statistiken.

Den relativta mortaliteten, sådan den skenbart framstår enligt Tab. I, 1—26, är därför nästan utan undantag mycket för hög.

Däremot finns i läkarnes årsberättelser en del specialrapporter öfver epidemier, hvilka rapporter, som det synes, i allmänhet på ett tillförlitligt sätt angifva antalet i de enskilda epidemierna inträffade sjukdoms- och dödsfallen, de förra fördelade efter ålder och kön, de senare i allmänhet blott efter kön.

Huruvida dessa uppgifter nu värligen gifva ett troget uttryck för den relativa mortaliteten, är naturligtvis omöjligt att säga. Man kunde möjligen invända, att sjukdomen kanske är mera dödande, då den uppträder som epidemi, än då den förekommer sporadiskt, att epidemirapporterna innehålla en allt för liten del af samtliga fall för att det i dem angifna förhållandet mellan döde och sjuke skall kunna vara det riktiga uttrycket för detta förhållande i stort sett o. s. v.

Emellertid äro dessa uppgifter enligt min tanke de i detta hänseende tillförlitligaste, som stå oss till buds, ja tillförlitligare än sådana, som härröra från de större sjukhusen och som för detta ändamål oftast användas.

Genom sammanräkning af uppgifterna för 94 större och mindre epidemier under åren 1874—1890 erhölls 4,309 sjuke och 385 döde, d. v. s. en *mortalitet af 8,9 proc.*

Å ömse sidor om detta tal finnas naturligtvis en mängd växlingar. För att sammanställa några ytterligheter må nämnas epidemien i Ronneby stad och socken 1882 med 269 sjuke, 9 döde eller en mortalitet af 3,3 proc. (om epidemien inom R. distrikt för öfrigt medräknas, 339 sjuke, 16 döde, mortalitet = 4,7 proc.), å andra sidan epidemien i Malmö stad 1881 med 151 sjuke, 19 döde eller en mortalitet af 12,6 proc. För *mindre* epidemier kunna naturligtvis ännu större växlingar i mortaliteten erhållas, från 0 till 20 proc. och däröfver.

För de olika könen ställer sig förhållandet på följande sätt:

män: 2,186 sjuke, 186 döde	8,5 proc.,
kvinnor: 2,123 sjuke, 199 döde	9,4 » .

I enlighet härmed skulle sjukdomen vara något mera dödande för kvinnor än för män. De absoluta talen äro dock mähända för små för att tillåta en generalisering af de funna procentförhållandena.

För de olika åldrarne finnas endast enstaka uppgifter, som därför icke kunna gifva något tillförlitligt uttryck för värliga förhållandet i stort sett!).

Den här funna mortalitetssiffran är något lägre än de flesta andra från olika håll anfördta. Bland äldre författare uppger t. ex. *Murchison*²⁾ för 23 år på London Fever Hospital en medelmortalitet af 16,7 proc. för män och 17,7 proc. för kvinnor; *Zuelzer*³⁾ fick som resultat af en sammanställning af material från tyska sjukhus åren 1872—74 11,8 proc. för män och 9,9 proc. för kvinnor. Enligt Warf-winges uppgift angående förhållandet på prov. sjukhuset vid Hornsgatan i Stockholm var mortaliteten där under förra hälften af 1870-talet 10,8 proc., för män 12 proc., för kvinnor 9 proc.

¹⁾ För något äldre tider (före 1874) finnas härom en stor mängd uppgifter, samlade i Sundhetskollegiets årsberättelser. Dessa äro dock af mestadels förut angifna skäl odugliga för vårt ändamål.

²⁾ *Murchison*, Die typhoiden Krankheiten. Deutsch herausgag. von Zuelzer. Braunschw. 1867.

³⁾ Zuelzer. Beitr. z. Aetiol. u. Path. d. typhoid. Krankheit. Berlin 1870.

Bland nyare, vanligast begagnade handböcker anger t. ex. *Srümpells* en medelmortalitet af 10 proc. (*Eichhorsts* 5—15—20 proc.) o. s. v.

Alla dessa och flera dylika uppgifter grunda sig likväl på sjukhusstatistiker och äro för den skull strängt taget ej jämförliga med de här framlagda siffrorna.

Rörande den relativas mortalitetens förhållande i vårt land under olika tider, förr och nu, kunna vi icke på grund af materialet komma till några slutsatser. I rapporterna före 1851 finna vi endast mera allmänna uttryck om sjukdomens beskaffenhet, att den visade sig »mild, föga dödande» eller »elakartad och mycket dödande» o. d., under det att vi för tiden efter 1851 äfven hafva de numeriska uppgifterna på antalet sjuke och döde att rätta oss efter, ehuru dessa beträffande tyfoidfebern blott för tiden efter 1874 kunna utan reservation användas.

För så vidt man af rapporterna kan döma, synes emellertid sjukdomen i allmänhet knappast hafva varit mera elakartad och dödande i äldre tider än i våra dagar. Mycket ofta påträffar man i äldre rapporter sådana uttalanden som t. ex., att »sjukdomen var mycket allmän oeh, då den väl inkommit i ett hus, gärna gick laget rundt bland dess invånare men däremot icke var mycket svår och dödande» o. s. v.

En mängd enstaka fall och epidemier af svårare art anföras naturligtvis emellanåt men, så vidt man kan se, icke just oftare än i rapporter från senare tider.

Till några säkra slutsatser härutinnan kan man emellertid som sagdt ej komma.

Tyfoidfeberns förhållande till olika årstider samt till de angripnes ålder och kön.

Att tyfoidfebern i sitt uppträdande är till viss grad beroende af årstiderna, är allmänt erkändt. Den årstid, på hvilken den största sjukdomsfrekvensen faller, är olika på olika ställen; men på det öfvervägande stora flertalet af iakttagelseorter inträffar maximum af sjukdomsfall under sensommaren och hösten.

Från Sverige föreligger angående denna fråga ett ganska storartadt material. Redan från 1850-talet äro de af läkarne uppgifna sjukdoms- och dödsfallen i allmänhet fördelade på de olika månaderna. Huru noggrann denna fördelning i de enskilda rapporterna är, kan ej med säkerhet afgöras. På senare tider — och man får väl antaga, att förhållandet varit det samma äfven något längre tillbaka — synas dock läkarne så vidt möjligt uppföra de enskilda fallen under de respektiva månader, då de verkligent *inträffat* och icke under den, då de *anmälades*, i hvilket senare fall statistiken naturligtvis skulle blifva af foga värde.

Af 83,188 under åren 1875—1890 rapporterade fall, för hvilka månaden (då de inträffat) finnes angifven, kommo på de olika månaderna följande antal:

Januari	8,035 fall eller	9,7 proc.
Februari	6,290 » »	7,6 »
Mars	5,921 » »	7,1 »
April	5,436 » »	6,5 »
Maj	5,125 » »	6,2 »
Juni	4,929 » »	5,9 »
Juli	5,661 » »	6,8 »
Augusti.....	7,766 » »	9,3 »
September	9,091 » »	10,9 »
Oktober	8,889 » »	10,7 »
November	8,584 » »	10,3 »
December	7,461 » »	9,0 »

Maximum faller således på September, minimum på Juni.

För de olika årstiderna vintern (Dec.—Febr.), våren (Mars—Maj), sommaren (Juni—Aug.) och hösten (Sept.—Nov.) blir förhållandet följande:

Vintern	26,2 proc.
Våren.....	19,8 »
Sommaren	22,1 »
Hösten	31,9 »

Hösten—vintern = 58,1 proc.; våren—sommaren = 41,9 proc.; oktober—mars = 54,3 proc.; april—september = 45,7 proc.

Dessa tal öfverensstämma i hufvudsak med flertalet sammanställningar i större skala, som af andra meddelats, och gifva icke något för vårt land egendomligt vid handen.

(Det förtjenar mähända anmärkas, att fördelningen af sjukdomsfallen af »tyfosa och gastriska febrar» åren 1868—1870 ej oväsentligt skiljer sig från den här för tyloidfebern visade. Förhållandet var nämnda år följande: vintern 26,4 proc., våren 26,9 proc., sommaren 21,8 proc., hösten 24,9 proc.

Skilnaden är i synnerhet beträffande våren anmärkningsvärd och talar ytterligare därför, att bland de »tyfosa febrarne» under dessa år ingått en ej ringa del fläcktyfus, hvilken som bekant vanligen har sin största frekvens under senvintern och våren.)

De af mig antecknade *epidemiernas* fördelning på olika årstider erbjuder icke något af särskildt intresse. Utom årstidens inflytande kan man för öfrigt härväldig urskilja så många andra samvärvkande omständigheter, att jag icke ansett den lika statistik, jag i detta afseende sammanbragt, på detta ställe böra anföras.

Beträffande tyloidfeberns förhållande till de olika åldersklasserna uppgifves med stor öfverensstämmelse ynglinga- och den tidigare mannaåldern såsom den för sjukdomen mest disponerande.

En undersökning på grund af de förut nämnda epidemirapporternas uppgifter lämnar ett liknande resultat. Af 4,597 ur dessa hemtade sjukdomsfall, för hvilka åldern finnes angiven, kommo på åldern

0—10 år.....	912 = 19,8 proc.	31—40 år.....	711 = 15,5 proc.
11—20 »	1,235 = 26,9 »	41—50 »	331 = 7,2 »
21—30 »	1,175 = 25,5 »	öfver 50 »	233 = 5,1 »

Enligt denna sammanställning träffar sålunda sjukdomen i absolut mening oftast personer mellan 10 och 20 år, minst ofta personer öfver 50 år gamla.

Tabellen uttrycker naturligtvis dock ej de olika aldrarnes morbiditet. Härför fördras ju, att man sätter antalet insjuknade i förhållande till den inom olika

åldrar befinnliga folkmängden. Då emellertid det på åldrar fördelade sjukantalet är en så ringa del af samtliga sjukdomsfallen under samma tid, är det icke möjligt att beräkna den verkliga morbiditeten för hvarje ålder för att sedan med hvarandra jämföra de så funna talen. Däremot kan man på en omväg finna ett under vissa förutsättningar i alla fall något så när tillförlitligt uttryck för åldrarne inbördes förhållande i detta hänseende. Förutsättningarna äro naturligtvis, att den fördelning af folkmängden på ålderklasser, hvilken man använder för sin beräkning, kan anses i stort sedt gällande för de tider och orter, från hvilka de på åldrar fördelade sjukdomsfallen äro hemtade, samt att dessa senare äro så pass många, att de kunna anses representera hela sjukantalet.

Om man dividerar sjukantalet för hvarje upptagen ålder eller den procent af samtliga åldrarnes sjukdomsfall, som det utgör, med det tal, som anger medelfolkmängden inom samma ålder eller den procent, denna utgör af samtliga medelfolkmängden, och uträknar förhållandet mellan de så erhållna kvoterna, får man naturligtvis ett uttryck för de olika åldrarnes relativia morbiditet.

Om vi för detta ändamål betjäna oss af den nyss anförda fördelningen af de 4,597 fallen på åldersklasser och liknande fördelning af rikets folkmängd, erhållen såsom medeltal af folkräkningarna 1870, 1888 och 1890,¹⁾ så få vi följande »mätare» af morbiditeten i tyfoidfebern för de olika åldrarne, om den för åldern 21—30 är funna sättes lika med 100:

0—10 år	11—20 år	21—30 år	31—40 år	41—50 år	öfver 50 år.
51	81	100	72	40	16

Enligt dessa siffror visar sälunda åldern 21—30 år den största, åldern öfver 50 år den minsta morbiditeten icke blott absolut taget, såsom den näst föregående lilla tabellen visar, utan även relativt till folkmängden inom de olika åldersklasserna. Åldern under 10 år har en morbiditet, som är ungefär hälften så stor som den för åldern 21—30 år men mera än 3 gånger så stor som den, åldern öfver 50 år visar.

De absoluta talen, som användts för beräkningen, äro dock mähända för små för att resultatet skall vara allmängiltigt. Men de äro de största, jag kunnat få, och torde såsom samlade från olika orter och tider till viss grad uttrycka det riktiga förhållandet härutinnan i stort sedt.

De enskilda epidemierna visa ganska stora olikheter med afseende på den andel, de särskilda åldrarne hafva i hela sjukantalet. Af särskildt intresse äro sådana epidemier, där *barnaåldern* lämnar en ovanligt stor kontingent.

Exempelvis må nämnas epidemien i Visby oktober—november 1876, under hvilken bland 125 insjuknade voro 53 barn under 10 år eller 42,4 proc. af sam-

¹⁾ Denna var följande: 0—10 år 23,16 %, 11—20 år 19,49 %, 21—30 år 15,07 %, 31—40 år 12,60 %, 41—50 år 10,99 %, öfver 50 år 18,69 %.

liga; mellan 11 och 20 år voro 44 eller 35,2 proc. och endast 28 eller 22,4 proc. vero öfver 20 år¹⁾.

I Oskarshamn voro under en epidemi 1878 bland 73 insjuknade 29 eller 38 proc. under 10 år, i Göteborg (Tjörbostaden) 1884 bland 158 sjuke 49 eller 31 proc. under 10 år (härav 15 proc. under 5 år), i Ronneby stad och socken 1882 af 269 sjuke 78 eller 29 proc. under 10 år o. s. v.

För undersökning af frågan angående tyfoidfeberns relativa frekvens under smärre perioder eller de enskilda åren af första decenniet föreligger endast ett ytterst ringa material, som icke kan berättiga till några allmängiltiga slutsatser.

Angaende den absoluta *dödigheten* inom de olika åldrarna lämna uppgifterna från helsovårdsnämnderna i städerna ett rätt ansenitgt material; det första aldersdecenniet är i dessa uppgifter deladt i tre perioder, 0—1 år, 2—5 år, 6—10 år.

Af 3,894 af tyfoidfeber affidne i Sveriges städer åren 1875—1890 voro i åldern

$$\begin{array}{ll} 0-10 \text{ år } & 649 = 16,7 \text{ proc., } \\ 11-20 \text{ } & 768 = 19,7 \text{ } \end{array} \quad \begin{array}{ll} 41-60 \text{ år } & 615 = 15,8 \text{ proc., } \\ \text{öfver } 60 \text{ } & 253 = 6,5 \text{ } \end{array}$$

$$21-40 \text{ } \end{array} \quad \begin{array}{ll} & 1,609 = 41,3 \text{ } \end{array}$$

Af de i åldern under 10 år affidne voro under 1 år 26 = 0,7 proc., 2—5 år 272 = 7,0 proc., 6—10 år 351 = 9,0 proc.

Då emellertid den relativta mortaliteten inom de olika åldrarna ej framgår af materialet, är man ej berättigad att använda de sista siffrorna som mått på den relativta frekvensen inom åldersklasserna. Däremot skulle man, om den ofvan anförrda fördelningen af de sjuke på åldersklasserna är giltig för städerna under berörda period, genom sammanställning af denna med fördelningen af dödsfallen kunna komma till en approximativ uppskattning af den relativta mortaliteten (förh. mellan döde och sjuke) inom åldersklasserna, jämförda med hvarandra. — Särlunda skulle den relativta mortaliteten vara minst i åldern 11—20 år, då antalet döde i denna ålder i procent af samtliga dödsfall *most understiger* antalet sjuke i samma ålder i procent af samtliga sjukdomsfallen.

Därnäst skulle åldern 0—10 år hafva den lägsta mortaliteten, så åldern 21—40 år, och åldern öfver 40 år den allra största.

Detta sätt att räkna är dock mähända allt för vanskligt för att lämna några pålitliga resultat.

Om vi i stället för dödsfallens fördelning på åldrarna enligt helsovårdsnämndernas sammandrag använda den i vår officiela statistik befintliga, blir resultatet af en dylik sammanställning också ett annat.

I vår officiela statistik äro de döde från och med 1874 fördelade i två ålders-

¹⁾ Orsaken till det öfvervägande antalet barn bland de insjuknade antogs vara, att barnen skulle fått nöja sig med det som anledning till epidemien misstänkta brunnsvattnet till dryck, under det de äldre drucko svagdricka.

perioder, barn och äldre; gränsen är 10 år. Under åren 1881—1890 voro af de 11,400 personer, som afflidit i »närvfeber» (jämte gula febern), 3,017 barn och 8,383 äldre; förhållandet mellan barn under 10 år och äldre utgjorde således 26,5 proc. och 73,5 proc. Om vi, i enlighet med hvad vi funnit sedan 68, antaga, att antalet insjuknade under 10 år utgör 19,8 proc. af samtliga insjuknade, så framgår af de nyss anfördta siffrorna, att den relativa dödigheten inom barnåldern skulle vara större än inom de öfriga åldrarna tillsammantagna.

Vi måste således lämna därhän frågan, huruvida tyfoidfebern inom olika åldrar är i någon nämnvärdt olika grad dödande.

Hvad de olika könens mottaglighet för tyfoidfeber beträffar, uppgifves i allmänhet, att någon tydlig skilnad i detta hänseende ej kan påvisas.

Enligt mitt material förefinnes i detta hänseende en liten öfvervikts på mankönets sida.

Af de ofvan nämnda, ur epidemirapporterna hemtade 4,597 fallen voro 2,326 män och 2,271 kvinnor, således 50,6 proc. af de förre, 49,4 proc. af de senare.

Om vi härjämte taga hänsyn till förhållandet mellan antalet män och kvinnor, hvilket under åren 1876—1890 var som 100 till 106, så fa vi enligt samma metod, som användts för bestämmande af åldrarnes relativa morbiditet, följande tal som uttryck för könens inbördes ställning härvidlag.

För mankönet.....	100.
» kvinkönnet	92.

Huruvida detta förhållande riktigt uttrycker könens olika mottaglighet *i stort sett*, vägar jag på grund af de kanske väl små absoluta talen icke afgöra.

Emellan mankön och kvinkön i de olika åldrarne är förhållandet enligt nämnda 4,597 fall ungefär det samma, som det nyss anfördta, om man undantar åldern öfver 50 år med 85 insjuknade män och 148 kvinnor.

I frågan om den individuela dispositionen för tyfoidfeber påträffas i läkarerapporterna en del uttalanden och uppgifter. Som dessa i statistiskt hänseende äro utan värde men ändemot höra nära tillsamman med etiologien, lämnas de här å sida.

I denna afhandlings plan ingick från början såsom ett väsentligt moment en historisk-kritisk framställning af frågor, som röra tyfoidfeberns etiologi, för så vidt dessa frågor i läkarnes embetsberättelser och den öfriga svenska litteraturen varit föremål för behandling. Yttre omständigheter hafva emellertid föranledt mig att för tillfället afbryta de redan påbörjade undersökningarna i denna riktning och att sälunda framlägga ett endast halfgjordt arbete, som, oaktadt det varit anseende tidsödande, icke förmått åstadkomma annat än hufvudsakligen negativa resultat för det syfte, som egentligen var mitt hufvudsakliga. Jag hoppas dock att inom en icke alltför långt aflagsen framtid kunna i den män, omständigheterna det medgifva, få fortsätta de antydda studierna och sälunda infria det löfte, som denna afhandlings titelblad indirekt uttalar.

Tabeller I. 1—26.

Tyfoidfeberns förekomst i Sveriges län och läkaredistrikts
enligt läkarerapporter till Medicinalstyrelsen.

Anmärkningar till tab. I. 1—25.

Tabellerna upptaga alla i läkarerapporterna till Medicinalstyrelsen angifna sjukdoms- och dödsfall af tyfoidfeber.

Härvid måste då först och främst ihägkommas, att tyfoidfebern, såsom flera gånger är påpekad, först 1874 förekommer under egen rubrik i rapporterna. Åren 1861—1873 sammanfördes den med fläcktyfus och »gastrisk feber» under rubriken »tyfosa och gastriska febrar». För sist nämnda är äro därfor tabellernas siffror resultat af en detaljerad textgranskning och äro därfor på grund af textens otydlighet mängen gång mer eller mindre osäkra. De tal, hvilka jag ansett sannolikt omfatta ett mera betydande antal fläcktyfusfall, äro satta inom parentes eller klammer. Då fläcktyfusfallen varit särskilt nämnda till antalet, hafva de å tabellerna antecknats genom små kursiverade siffror, som vanligen stå likasom »exponenter» till de tal, som utvisa tyfoidfeberfall. Hvad beträffar den »gastriska febern», hafva de för densamma angifna talen i allmänhet helt och hället uteslutsits, enär med »gastrisk feber», som i äldre tider ofta betecknade lindrig tyfoidfeber, på senare tider vanligen menats akut gastro-intestinalkatarr, och det är omöjligt att till tiden bestämma öfvergången från det ena till det andra uppfattningssättet.

Dock hafva på några ställen, i synnerhet i början af 1860-talet, en del fall af gastrisk feber, som af ett eller annat skäl ansetts som säker tyfoidfeber, inräknats i de för den senare angifna siffrorna¹⁾.

Fallens inrangering under de olika distrikten har på grund af dessas under tiden skedda förändringar i anseende till gränserna emellanåt varit förenad med svårigheter.

På tabellerna äro under särskilda kolumner i allmänhet alla de distrikter och städer upptagna, från hvilka rapporter för en längre följd af år förelegat. Några distrikter, som endast några få år funnits till och sedan upphört eller först på de

¹⁾ Den »gastriska febern» var på god väg att aldeles försvinna ur läkarerapporterna; men 1887 erhöll läkarne tryckta blanketter, på hvilka bland andra sjukdomar äfven den »enkla gastriska febern» ånyo förekom. Detta är utvisar också för den »gastriska febern» en *högst anmärkningsvärd* stegring. (»Språkets makt öfver tanken?»)

allra sista åren tillkommit, äro dock ej särskilt upptagna, utan äro uppgifterna från dessa, där sådana förelegat, sammanförla med uppgifterna från det provinsialläkaredistrikts, till hvilket distrikts i fråga hört. Vidare äro de distrikts (med samma namn som provinsialläkaredistrikts), där distriktsläkaren haft ungefär samma värksamhetsområde som provinsialläkaren, (sådana äro t. ex. Arvika, Karlskoga, Ronneby distrikts), ej särskilt upptagna, churu naturligtvis sifferuppgifterna från dem äro medräknade på behörigt ställe.

Några af de minsta städerna, nämligen Säter, Vaxholm, Öregrund, Torshälla, Kungelf, Borgholm, Skanör och Falsterbo, från hvilka rapporter icke alls eller blott tidtals ingivits, äro ej särskilt nämnda; uppgifterna därifrån, då sådana förefunnits, äro sammanräknade med uppgifterna från vederbörliga distrikts, där nämnda städer äro belägna.

Därjämte är ett mindre antal af de smärre städerna, från hvilka såsom saknande egen stadsläkare särskilda rapporter ej förr än på de sista åren finnas, sammanförla med de lika benämnda distrikten.

Hvad självva siffrornas tillförlitlighet angår, är härom på flere ställen förut ordadt.

Slutsummorna i de olika tabellerna stämma sällan, om ens nägonsin, med de siffror, hvilka finnas uppgifna i Medicinalstyrelsens tryckta årsberättelser. Detta beror för tiden före 1874 naturligtvis därför, att rubriken tyloidfeber då ännu icke förekom i dessa årsberättelser; för öfrigt har den granskning af texten i läkarerapporterna, som jag måst företaga, samt mängen gång obestämdheten och tvekydigheten af rapporternas uppgifter vällat denna skiljaktighet mellan mina och Medicinalstyrelsens siffror.

I tabellerna äro för de distrikts, som tillkommit efter 1861, det årtal angivet, då de inrättades.

En tom kolumn för dessa distrikts *utvisar*, att de ännu ej funnos till såsom sådana utan ingingo i något annat distrikts. Endast undantagsvis, då detta varit möjligt genom tillfälligtvis noggranna uppgifter om de ställen, där sjukdomen med ett gifvet antal fall förekommitt, hafva sjukdoms- eller dödsfall antecknats för ett distrikts *före* den tid, då det enligt tabellen inrättats.

Ett streck (—) i en kolumn *utvisar*, att, så vidt af rapporten framgår, *intet* sjukdoms- resp. dödsfall i fråga varande är förekom i distrikts.

Ett × betyder, att rapport för året saknas eller att, om rapport finnes, *sifferuppgift* för hela eller en del af året eller distrikts saknas.

Ett ! antyder, att siffrorna i några anmärkningsvärda fall enligt rapporten torde vara exakta.

Ett ? antyder i allmänhet tvekan med afseende på den omtalade sjukdomens riktiga diagnos.

() om ett tal *betyder*, att enligt *min* uppfattning talet omfattar både tyloidfeber och fläcktyfus, *men övervägande* tyloidfeber.

[] = föregående med undantag däraf, att *fläcktyfus* här ansetts *öfvervägande*.

*En ** hänvisar till texten i 2:a kap. för i fråga varande år och distrikt.

Ett — tvärs öfver kolumnen *antyder*, att distriktet bytt om läkare eller eljest undergått någon förändring, som synes stå i sammanhang med en ändring af sifferuppgifternas utseende.

p. d. betyder provinsialläkaredistrikt.

d. » distriktsläkaredistrikt.

st. » stad.

Sj. » sjuke.

D. » döde.

enst. » enstaka fall.

spr. » spridda fall.

allm. » allmän.

ep. » epidemi.

p. e. » partiell epidemi.

p. e. e. » partiella epidemier.

De små, kursiverade siffrorna betyda som nämdt *fläcktyfus*. Så vidt möjligt, äro alla såsom sådana *uppgifna* eller af mig *uppfattade*, till antalet bestämda fall å tabellerna utsatta (ej i slutsummorna).

Norr bottens län.

Folkmängd 1865: 74,576; 1890: 104,783.

Tab. I, 1.

År.	Pajala p. d. (1864).	Hapa- rande p. d. och st.	Öfver- Kalix' p. d. (1873).	Neder- Kalix' p. d.	Råneå p. d.	Luleå st.	Öfver- Luleå p. d.	Piteå p. d. (1861) och st.	Piteå st.	Summa sjuke.	Summa döde.
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.		
1861.....		x			9 1	x	8+ —			17	1
1862.....	3 —		2	22 3	x	x	— —			27	3
1863.....	13 4		10 2	— —	x	— —	1 —			24	6
1864.....	70 29		10 ² 1 ¹	— —	x	— —	16 1			96	31
1865.....	x spr. 2		8 —	x	x	13 3	10 1			31	6
1866.....	9 3 61 2		19 ¹⁵² 2 ³	53 5	x	2 —	29 5			173	17
1867.....	— — 213 1 26		357 43	9 x	x 1	15 2	27 3			(621	75)
1868.....	— 50 ² — ^g 172 39		476 62	64 6	12 2	227 20	30 ⁷⁹ 4 ⁵			(981	133)
1869.....	x 83 17		111 5	73 6	11 1	101 5	(455 21)			(834	55)
1870.....	50 9 47+ 9		28 5	3 —	9 —	42 5	60 3			239	31
1871.....	1 — 48 2		38 3	2 1	4 —	61 1	53 2			207	9
1872.....	x 23 2		18 2	14 x 3	1 —	5 1	48 4			109	12
1873.....	— — 33 1 2		38 8	2 1	— —	19 ² — ¹	15 2			107	13
1874.....	— — 23 5		18 3	10 x —	44 4	18 ¹ 4	31 1			144	17
1875.....	13 x 20 1		37 7	x	7 2	(37 9)	16 1			130	20
1876.....	36 x 19 —		5 x —	x	— —	13 ¹ 2	— x —	23 4		96	6
1877.....	— — 6 —		5 2	x	3 —	2 —	— —	25 3		41	5
1878.....	— — 12 —		3 x 1	9 x —	— —	— —	— —	4 —		28	1
1879.....	— — — —		10 1	11 1	— —	— —	— —			21	2
1880.....	— — 15 2	— —	4 —	— —	3 x	— —	11 1	— —		33	4
1881.....	— — 1 —	— —	13 —	— —	2 —	14 x	— —	1 —		31	—
1882.....	— — 111 9	15	115 9	12 2	x	9 2	8 1	— —		270	23
1883.....	1 — 44 3	45 5	30 4	— —	— —	6 1	21 2	1 1		148	16
1884.....	x 5 —	20 5	6 1	1 —	9 1	106 26	27 3	— —		174	36
1885.....	4 2 5 —	— —	— —	12 —	2 —	12 5	32 7	3 —		70	14
1886.....	— — 17 —	— —	39 x	10 1	1 1	36 1	26 4	— —		129	7
1887.....	18 1 10 —	10 —	10 x	16 —	2 —	24 2	19 3	— —		109	9
1888.....	6 — 35 4	20 —	33 x	2 —	16 2	43 5	49 5	15 3		219	19
1889.....	242 23 165 18	154 13	45 x	22 —	17 2	20 11	23 2	5 —		441	46
1890.....	33 3 63 1 7	29 9	15 —	1 —	15 —	4 3	13 4	10 1		183	27

Västerbottens län.

Folkmängd 1865: 88,763; 1890: 122,784.

Tab. I, 2.

År.	Skellefteå p. d. och st.		Nysätra p. d.		Umeå p. d.		Umeå st.		Nord- malings p. d. (1867).		Lycksele p. d.		Äsele p. d. (1871).		Summa sjuke.	Summa döde.	
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.			
1861.....	—	—	32	2	4	1	17	1	—	—	21	2	—	—	74	6	
1862.....	24	5	—	—	15	2	14	1	—	—	2	2	—	—	55	10	
1863.....	8	1	—	—	3	1	6	—	—	—	—	—	—	—	17	2	
1864.....	spr.	—	—	—	2	1	19	2	—	—	16	2	—	—	37	5	
1865.....	—	—	—	—	12	4	3	1	—	—	27	7	—	—	42	12	
1866.....	40	6	9	1	27	2	1	—	—	—	14	5	—	—	90	14	
1867.....	(106	14)	(663	72)	[193	22]	22	1	—	—	2	—	—	—	(986	109)	
1868.....	(1 000 ×)	(ep. 457)	577	38	96	9	[185	25]	—	—	—	—	—	—	(1,858	529)	
1869.....	[134 × 3]	74	9	[206	30]	50	5	[111	16]	(109	4)	—	—	—	—	351	67
1870.....	101	16	32	3	50	—	3	—	7	1	37	1	—	—	(1,230	21	
1871.....	7	1	20	3	118	7	11	×	2	—	28	1	—	—	186	12	
1872.....	10	×	4	1	42	4	—	—	—	—	10	—	—	—	66	5	
1873.....	24	1	14	2	53	2	15	1	—	—	23	2	—	—	129	8	
1874.....	—	—	—	—	22	—	5	—	17	3	10	1	—	—	54	2	
1875.....	—	—	—	—	17	1	—	—	11	2	6	—	—	—	34	3	
1876.....	2	—	—	—	41 ³	5 ²	8	—	5	—	16	4	20	6	92	15	
1877.....	—	—	—	—	57 ¹	4 ¹	—	—	12	2	—	—	—	—	69	6	
1878.....	5	—	1	1	33	5	—	—	6	—	—	—	1	—	46	6	
1879.....	1	—	—	—	3	—	—	—	1	1	1	1	—	—	6	2	
1880.....	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
1881.....	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	22	1	
1882.....	—	—	—	—	11	×	—	—	—	—	21	—	—	—	32	—	
1883.....	5	1	—	—	7	×	19	2	—	—	5	—	—	—	36	3	
1884.....	16	1	—	—	12	×	3	1	—	—	—	—	—	—	31	2	
1885.....	—	—	—	—	15	×	—	—	—	—	4	—	—	—	19	—	
1886.....	—	—	—	—	10	×	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	
1887.....	4	1	—	—	36	1	—	—	9	—	7	—	—	—	56	2	
1888.....	10	2	—	—	×	2	—	—	9	—	14	1	—	—	33	5	
1889.....	4	2	—	—	1	1	5	—	4	—	—	—	1	1	15	4	
1890.....	5	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	3	—	13	1	

Jemtlands län.

Folkmängd 1865: 68,071; 1890: 100,455.

Tab. I. 3.

År.	Ströms p. d. (1864).	Öster- sunds p. d.	Öster- sunds st.	Unders- åkers p. d.	Ragunda p. d. (1864).	Bergs p. d. (1873).	Svegs p. d.	Hede p. d. (1871).	Summa sjuke.	Summa döde.
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.		
1861.....		15 2		6 —			2		23	2
1862.....		21 4		2 —			— —		23	4
1863.....		12 —		15 3			29 —		56	3
1864.....		— —		27 —			— —		27	—
1865.....		spr. —	— 1	p. ee. ×	4 —		17 4		21	5
1866.....	4 ×	110 10	— 3	20 7	21 1		9 1		164	22
1867.....	12 ×	75 11	— —	13 4	27 —		8 ×		135	15
1868.....	32 —	spr. —	× 2	51 4	19 1		enst. —		102	7
1869.....	24 1	207 20	ep. 9	11 1	27 —		26 ×		295	31
1870.....	105 4	126 23	— —	9 2	22 3		5 1		267	33
1871.....	14 2	35 6	— —	8 1	1 —		35 2		92	11
1872.....	×	allm. ?*	— —	26?* —	1 —		65?* 4		91	5
1873.....	5 × 1	45 8	— —	11	59 6		21 1		141	16
1874.....	4 1	23 13	— —	8 × —	36 3		— × —	1 1	72	18
1875.....	— —	— × —	— —	×	4 —		— —	— × —	4	—
1876.....	×	2 1	3 —	— —	— —		— —	×	5	1
1877.....	×	— —	— —	×	×		— —	1 —	1	—
1878.....	×	— —	— —	3 1	2 2	1 —	4 —	2 —	12	3
1879.....	— —	3 —	— —	10 1	13 2	×	11 1	×	37	4
1880.....	— —	6 1	— —	25 6	15 3	— —	— —	— —	46	10
1881.....	— —	×	— —	7 —	— —	1 —	2 —	— —	10	—
1882.....	— —	4 —	1 1	11 4	12 2	— —	— —	— —	28	7
1883.....	2 —	— ?	— —	3 —	3 1	— —	— —	2 —	10	1
1884.....	— —	3 1	2 1	23 4	— —	— —	— —	— —	28	6
1885.....	— —	4 —	— —	20 —	— —	— —	— —	— —	24	—
1886.....	— —	34 7	3 1	17 2	— —	4 —	— —	— —	58	10
1887.....	1 —	17 3	2 —	1 —	2 —	— —	— —	1 —	24	3
1888.....	10 1	15 1	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	28	2
1889.....	— —	19 —	5 1	5 —	— —	— —	— —	20 3	49	4
1890.....	— —	20 —	1 —	1 —	10 2	— —	— —	9 1	41	3

Vesternorrlands län.

Folkmängd 1865: 127,524; 1890: 208,763.

Tab. I, 4.

År.	Örn-sköldsviks p. d.	Bodums p. d.		Sollefteå p. d.		Ytter-Länns' d. (1870)	Skogs p. d. (1861).	Hernö-sands p. d.	Hernö-sands st.	Vifsta-varfs d. (1870).	Sundsvalls p. d.	Sundsvalls st.	Torps p. d.	Summa sjuke.	Summa död.
		Sj.	D.	Sj.	D.										
1861...	108 7	—	—	9 2			— —	— —	16 2		26 3	— —	3 —	162	1
1862...	45 8	1	—	— —			x	9 3	— —		39 6	— —	4 ×	98	1
1863...	12 3	2	1	— —			— ¹⁰ — ¹	29 4	— ⁶³ — ³		20 5	— —	18 —	81	1
1864...	31 5	1	1	4 1			23 1	45 6	— ⁷ — ¹		10 1	spr. ×	8 —	122	1
1865 ...	ep. ×	4	1	13 1			6 —	27 3	13 1		11 1	spr. 3	57 6	131	1
1866...	17 2	7	1	6 —			— —	26 2	2 —		17 —	× 3	44 4	119	1
1867...	p.ee. ×	1 ¹² — ¹	19 —				13 1	85 4	10 1		20 2	10 2	12 ×	170	1
1868...	[575 125]	2	—	48 2			[51 8]	[123 17]	7 ⁶² ? 1 ³		[190 13]	[247 32]	32 —	[1,243	19
1869...	67 1	—	—	382 33			allm. ×	40 2	44 ⁴⁶ — ¹		[112 9]	79 14	29 —	753	5
1870...	41 ×	15	3	150 8	[36 × 3]	11 —	64 6	42 ²⁵ 4	8 —	5 3	spr. 3	5 1	377	3	
1871...	24 2	11	2	44 1	[41 2]	66 6	32 ⁸ 5 ³	5 —	8 2	enst. —	spr. 2	13 1	244	2	
1872...	18 —	1	1	15 —	24 —	14 1	22 2	— —	4 —	22 ⁵ 3 ²	×	37 3	157	1	
1873...	41 5	4	1	28 1	23 1	10 1	30 ⁵ 3 ³	8 2	20 2	29 ²⁸ 4 ⁷	10 —	2 × —	205	2	
1874...	19 —	3	—	17 1	24 —	13 2	47 ⁸ 4 ¹	5 1	20 —	29 ²¹ 5 ⁶	2 —	31 2	210	1	
1875...	9 2	×	4	—	20 —	15 1	29 ⁶ 4 ¹	15 1	29 3	25 ⁴ 4 ¹	23 1	8 1	177	1	
1876...	11 —	—	—	7 1	63 3	— —	34 ⁵ 6 ²	8 4	60 8	44 ⁵ 7 ²	7 2	4 —	238	3	
1877...	1 —	11	1	6 —	15 —	— —	35 3	6 —	30 1	×	6 —	— —	110		
1878...	21 1	2	—	2 ⁶ — ¹	15 5	— —	19 2	1 —	44 3	28 6	18 1	15 2	165	2	
1879...	2 —	—	—	2 ⁷ —	13 3	— —	13 2	5 1	16 —	19 1	4 —	14 —	88		
1880...	27 2	2	—	7 —	16 1	— —	7 1	1 —	— —	20 4	46 —	5 —	131		
1881...	66 6	1	—	— —	— —	×	12 3	2 —	1 —	7 1	— —	×	88	1	
1882...	49 2	1	—	— —	10 —	2 × —	25 9	9 —	14 1	— —	— —	22 1	132	1	
1883...	5 1	—	—	4 —	21 1	— —	22 4	35 5	17 2	27 × 1	32 9	23 3	186	2	
1884...	100 3	11	1	24 1	16 1	— —	30 7	5 1	6 1	51 2	7 ×	14 —	264	1	
1885 ...	28 1	×	13 2	10 —	— —		9 2	2 —	3 —	63 1	11 ×	5 —	141		
1886...	67 1	5	1	— —	6 —	— —	9 1	3 —	16 1	39 2	13 ×	8 2	166		
1887...	132 5	1	—	2 —	1 —	— —	11 2	5 2	2 —	44 6	9 2	18 2	225	1	
1888...	33 3	—	—	16 2	— —	8 —	9 1	6 —	6 —	39 1	5 —	9 2	131		
1889...	80 7	8	1	11 4	6 —	— —	4 —	3 —	8 —	80 8	44 6	16 4	260		
1890...	106 11	9	—	27 3	21 1	— —	16 4	1 1	2 —	196 14	63 7	15 —	456		

Gefleborgs län.

Folkmängd 1865: 147,793; 1890: 206,924.

Tab. I. 5.

	Gefle p. d.	Gefle st.	Gysinge d.	Hofors d. (1861).	Söder- hamns p. d.	Söder- hamns st.	Alfta p. d. (1861).	Bollnäs d.	Jerfsö p. d.	Hudiks- valls p. d.	Hudiks- valls st.	Delsbo d.	Summa sjuke.	Summa döde.									
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.									
...	61	16	22	1	x		26	2	6	—	x	p.e.	12	16	1	—	—	131	32				
...	46	10	18	3	x	—	10	5	17	4	—	8	6	80	13	80	x	4	—	263	41		
...	77	5	43	7	4	2	spr.	—	p.e.	11	4	1	2	—	17	11	p.e.e.	22	29	—	23	2	
...	106	8	354	18	3	1	60	6	9	—	22	5	—	—	8	5	83	30	45	3	15	1	
...	85	9	124	13	14	3	39	5	7	—	21	3	9	1	5	2	ep.	26	70	1	21	3	
...	61	6	22	—	8	2	31	4	39	12	13	4	8	—	7	4	spr.	17	60	3	7	—	
...	27	5	12	—	—	—	18	2	25	3	19	5	27	4	112 ²²	8 ⁷	62	10	106	5	33	3	
...	187	23	337	15	66	11	135	14	272 ⁸	36 ¹	135	19	230	21	499 ⁴³	47 ²¹	17	4	341	5	139	7	
...	209	29	160	13	70	5	119	16	66	5	22	4	62	7	145 ²²	11 ⁷⁸	229	2	186	3	51	5	
...	105	16	75	4	19	3	29	3	47	3	70	4	8	1	35 ⁵	4 ³	55	2	70	1	35	7	
...	32	7	51	2	12	2	17	3	3	—	8	1	9	1	31 ²	2 ³	50 ²	2	70	2	38	4	
...	21	1	35	3	17	1	43	4	66	5	32	2	14	1	57 ¹⁰	3 ⁵	79	3	90	4	47	4	
...	50	7	215	19	41	2	30	3	100	11	50	5	—	—	4	x	75	7	122	?	78	1	
...	101	16	108	13	6	1	74	7	146 ³	9	53	3	3	—	6	—	38	1	138 ⁵	3 ⁷	19 ⁶	3 ⁶	
...	48	9	130 ⁷	7	13	1	47	4	25	—	52	7	9	1	8	1	28	3	79	2	9 ¹	— ⁷	
...	17	5	148	12	44	4	64	2	50	2	x	8	2	—	4	—	44	6	73 ¹	—	2	1	
...	37	5	65	2	9	1	41	3	37	2	29	6	—	—	10	2	50	6	73	x	19 ³	3 ⁷	
...	13	1	19	2	4	1	33	3	64	10	20	1	1	—	10	—	35	x	58	1	17	5	
...	13	2	17	2	x		25	2	50	11	22	3	4x	—	—	—	34	x	32	—	1	—	—
...	9	2	54	11	x		41	2	38	6	7	1	35	2	4 ¹	— ¹	56	x	95	2	36	4	
...	3	—	7	4	x		30	3	33	11	47	4	23	4	6	—	49	x	12	1	13	2	
...	185	9	68	5	x	1	21	1	73	15	40	4	148	6	x		43	x	24	—	13	6	
...	106	5	53	4	1	1	24	2	83	14	45	3	43	4	x		26	x	48	x	—	—	
...	33	2	43	8	7	2	13	1	29	7	47	5	31	6	x		32	x	17	x	2	—	
...	38	—	58	12	9	—	15	1	34	5	27	4	12	3	x		20	x	12	x	3	—	
...	78	10	202	27	75	11	28	4	34	3	33	6	5	2	6x	1	28	x	11	x	2	—	
...	11	1	69	8	28	3	13	3	16	3	11	1	1	—	4	—	20	x	18	—	1	1	
...	40	4	125	9	18	3	9	1	11	2	5	2	2	—	—	—	25	x	6	x	5	1	
...	59	x	1	148	23	8	1	29	2	24	2	8	1	44	4	15	—	26	x	48	x	51	3
...	27	5	36	7	—	—	14	—	37	3	8	—	17	—	14	1	18	—	12	1	2	—	
																				3	—	188	17

Kopparbergs län.

Folkmängd 1865: 174,758; 1890: 197,449.

Tab. I, 6.

År.	Gran-		Hede-		Faluns		Faluns		Leksands		Mora		Lima		Näs'		Summa	Summa
	gärde	p. d.	mora	p. d.	och st.	p. d.	st.	p. d.	p. d.	p. d.	(1861).	d. (1880).	p. d.	p. d.	sjuke.	döde.		
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.		
1861.....	51	2	20	4	10	x	9	1	344	43					x		434	50
1862.....	116	4	25	—	46	3	25	1	119	27	spr.	x			16	1	347	36
1863.....	30	4	13	1	8	x	13	1	46	1	22	3			22	—	154	10
1864.....	59	6	17	x	40	1	39	2	3	—	—	—	—		17	5	145	14
1865.....	76	7	24	3	32	4	22	—	50	7	—	—	—		22	1	226	22
1866.....	95	6	43	5	19	1	25	3	33	2	24	3			10	3	249	22
1867.....	80	8	39	5	42	4	10	4	20	12	9	2			33	4	233	39
1868.....	93	10	231	29	193	8	59	11	351	67	65	5			61	x 7	(1,053)	137
1869.....	81	9	179	15	48	3	17	3	363	43	119	18			51	2	858	93
1870.....	64	4	9	—	22	4	7	x 3	41	x	16	1			—	—	159	12
1871.....	106	10	14	1	25	4	6	1	36	7	31	1			—	—	218	24
1872.....	110	12	141	16	37 ^{1/2}	4	101	13	43	4	—	—			33	3	465	52
1873.....	226	34	125	13	27	—	59	8	171	19	100	9			42	2	730	85
1874.....	21	3	104	x 10	22	2	26	4	209	23	15	2			27	3	424	47
1875.....	3	—	74	11	26	--	22	1	157	31	—	—			2	—	284	43
1876.....	2	—	178	18	40	1	15	5	153 ⁶	17 ¹	x				23	7	411	48
1877.....	—	—	23	2	10	1	4	1	43	5	2	1			x		82	10
1878.....	8	—	33	3	13	—	60	4	8	2	27	3			5	—	154	12
1879.....	—	—	22	2	8	1	10	2	54	9	9	1			20	2	123	17
1880.....	—	—	42	5	2	—	17	1	60	6	21	5	2	—	18	2	162	19
1881.....	—	—	34	3	5	1	2	—	58	2	9	1	1	—	6	1	115	8
1882.....	2	—	18	3	33	12	7	6	24	3	2	—	1	—	5	—	92	19
1883.....	2	—	14	3	49	9	51	5	42	2	—	—	—	—	12	—	170	19
1884.....	5	—	26	3	52	5	5	1	169	7	18	3	3	1	8	1	286	21
1885.....	—	—	14	1	37	2	2	—	61	5	13	6	2	—	2	2	131	16
1886.....	—	—	8	—	30	2	7	2	124	7	85	16	—	—	8	—	262	27
1887.....	14	2	4	—	14	—	6	1	118	12	17	14	—	—	—	—	173	29
1888.....	—	—	7	—	8	—	4	2	9	—	48	14	—	—	10	1	86	17
1889.....	47	3	3	—	23	—	9	3	113	x	46	5	—	—	6	—	247	11
1890.....	—	—	55	1	8	2	5	2	20	—	x	1	—	—	2	—	90	6

Värmlands län.

Folkmängd 1865: 259,612; 1890: 253,326.

ab. I, 7.

Filipstads p. d. och st.	Udde- holms d.	Visnums p. d.	Kristine- hamns st. *)	Karlstads p. d.	Karlstads st.	Näs' p. d.	Silbodals p. d.	Arvika p. d.	Gillberga d.	N. Fryks- dals d.	Ö. Fryks- dals d. (1865).	Dalby d. (1861).	Summa sjuk- e	Summa döde													
Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.												
27 ⁵	3 ¹	4	—	—	—	15	2	65	6	10	2	x	x	spr.	—	30	3	1	—	152	16						
3 ^{3?}	—	4	2	—	—	101	6	x	55	2	11	2	4	1	—	—	11	1	17	1	x	206	15				
81	7	3	—	spr.	—	89	1	?	?	spr.	—	5	2	10	2	—	—	3	—	14	1	—	205	13			
280	14	50	13	—	—	230	9	39	—	4	—	2	—	7	—	ep.	—	5	—	14	2	11	—	642	38		
86	7	30	6	63	x	160 ^{12?} 5 ²	10	4	24	7	6	—	43	3	44	7	42	8	12	1	—	—	520	48			
36	3	19	x	22	1	116 ²	5 ⁸	2	1	30	—	5	—	32	4	—	—	14	1	x	9	—	—	285	15		
30	2	13	1	57	—	161 ^{5?} 3 ³	—	—	4	1	14	2	43	6	40	x	11	1	21	5	26	5	6	1	426	27	
107 ⁷	5 ²	111	13	12	1	138 ¹	1	—	—	23	3	9	1	31	5	10	—	38	1	18 ²	3 ¹	6	2	—	—	503	35
127 ³	11 ¹	132	26	99	2	238 ²	5 ²	—	—	10	1	3	1	2	—	18	—	32	3	22	2	8	1	—	—	691	52
157	9	63	10	120 ^{6?}	9	158 ^{3?}	9 ²	1	—	3	—	x ³⁶	— ¹⁰	10	3	22 ¹	—	3	1	12	3	1	—	—	—	550	37
1	—	4	3	53 ³	—	42 ¹	1 ¹	—	—	—	—	—	—	5	1	3	—	7	—	19 ⁷	3	2	—	5	2	131	9
4 ²	—	6	2	63	3	30	x	— ³⁴	— ⁶	18 ⁸	1 ²	—	—	26	2	3x	—	6	1	2	1	11	1	1	1	170	12
7	—	22	—	69 ¹	—	33 ⁵	1 ³	3	1	48	5	—	—	2	—	6	—	14	2	14	3	—	—	—	218	12	
8 ¹	1	3	—	65	3	34	x	—	—	18	—	4 ²	1 ²	68	7	p. ee.	x	x	9	1	3	1	—	—	212	14	
31	6	—	x	88 ¹³	2	52 ²	2	—	—	x	— ⁶	— ²	52	5	78	x	x	10	3	2	1	2	—	315	19		
14 ¹	1 ¹	2	1	55 ¹	—	32	2	5	2	5	4	—	—	5	1	16	—	5x	—	4	—	2	—	—	145	11	
1	1	—	—	92	1	17	2	—	—	9	1	13	—	1	—	25	x	x	2	—	1 ¹	—	—	161	5		
20 ²	4 ¹	11	2	36	2	28 ¹	4 ¹	46	17	84	15	53	7	—	—	14	x	22	x	2	11	—	—	—	325	53	
22	5	2	—	20	4	51	3	16	4	22	3	5	1	26	2	15 ¹⁶	x ⁶	19	3	20	2	—	—	218	27		
46	11	—	—	21	—	17	1	x	17	13	3	4	—	26	4	15 ¹	? ¹	13	1	63	9	4	2	—	222	48	
13 x 4	5 ¹	2	—	—	8	—	x	2	3	—	6	1	13	—	33	5	3	—	19	4	30	3	—	—	133	21	
6	1	8	1	x	68	6	x	2	18	2	1	—	17 ¹	—	26	1	11	1	28	3	21	3	—	—	204	20	
1	1	—	—	x	1	x	— ²	—	75	8	4	—	3	1	10	x	3	1	20	2	19	1	1	—	137	14	
11	3	x	1	20	4	8	—	— ²	—	4	4	6	1	16	1	18	1	26	1	40	3	38	4	—	—	187	23
2	1	5	1	12	—	14	2	15	4	3	2	—	—	21	—	19	2	6	2	30	2	8	4	1	1	136	21
2	2	—	—	4	1	20	—	19	1	—	—	1	—	2	—	14	x	2	—	22	2	26	—	—	—	112	6
3	2	—	—	—	—	21	1	59	5	—	—	—	—	2	—	9	2	6	—	30	4	—	—	—	130	14	
—	—	—	—	—	—	6	—	14	2	11	1	—	—	34	3	6	—	17	5	16	1	—	—	—	104	12	
1	1	4	—	—	—	14	—	12	—	7	1	—	—	105	6	8	—	8	1	26	5	—	—	—	185	14	
5	3	2	—	—	—	4	—	7	1	13	1	—	—	55	—	6	—	3	—	2	—	—	—	—	97	5	

*) Uppgifterna under Kristinehamns stad omfatta t. o. m. 1873 äfven kringliggande socknar.

Örebro län.

Folkmängd 1865: 162,717; 1890: 182,557.

Tab. I. s.

År.	Rams-bergs d.		Lindes-bergs d. och st.		Nora p. d. och st.		Örebro p. d.		Örebro st.		Boo d.		Edsbergs d. (1868).		Asker-sunds p. d.		Asker-sunds st.		Ämme-bergs d. (1868).		Karlskoga p. d.		Grythytte p. d.		Ljusnars-bergs d. (1863).		Summa sj. & d.	
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.		
1861	4	1	—	—	11	4	7	—	4	3	48	—			6	2	—	—			6	1	—	—			86	
1862	11	1	—	—	6	—	2	—	—	—	62	2			enst.	—	1	1			—	—	8	—			90	
1863	1	×	—	—	5	—	—	—	—	—	53	2			—	—	—	—			22	2	—	—			81	
1864	13	1	1	1	7	2	7	—	—	—	17	2			—	—	—	—			48	×	4	26	7	×	119	
1865	10	3	—	—	5	—	—	—	4	1	83	5			—	—	—	—			×	1	—	2	—		105	
1866	8	3	27	3	8	4	—	—	—	—	48	4			5	—	×	1			5	—	4	—	4	1	109	
1867	9	1	9	1	17	4	6	2	×	4	20	3			—	—	—	—			—	—	5	1	7	—	73	
1868	17	4	2	1	69 ²	23 ²	14	1	×	10	27	4			8	—	8	2			—	—	43	8	— ^{6?}	—	169	
1869	24	1	39	6	106	67	44	6	40	5	22	2	65	×	38	18	26	1	5	1	25	2	5	2	10	—	449	
1870	10	2	spr.	1	9	5	25	3	(63 ¹) 4 ¹	12	1	14	—	×	9	12	2	—	—	11	1	(15	3)	16	—	187		
1871	10	1	7	2	12	4	—	—	2	×	9	1	12	—	×	3	5	—	—	22	1	9	2	17	—	105		
1872	16	1	30	3	89	7	4	—	2 ²	×	38	5	17	1	×	14	7	2	—	—	39	3	24	3	9	—	275	
1873	30	1	152	14	77	25	24	3	4	×	37	5	17	1	ep.	11	5	1	—	—	3	—	87	10	167	5	603	
1874	36	2	31	1	80	20	23	4	4	×	6	1	10	3	×	9 ² ⁵ 2 ⁵	—	—	—	9 ²	1 ¹	41	4	131 ⁸	3	380		
1875	53	1	×	9×10	25	4	30	1	8	—	3	2	16	2	—	—	—	—	—	10	—	14	2	17	1	603		
1876	2	—	×	20	3	18	1	28	2	8	—	6	—	48	7	—	—	—	—	6	1	18	3	27	2	181		
1877	93 ²	7	×	5	—	5	1	16	2	—	—	×	3	32	3	—	—	—	—	4	1	12	1	44	—	211		
1878	109	11	34	2	9	1	56	10	14	1	11	2	—	—	24	4	5	—	—	7	—	18	3	25	—	312		
1879	49	5	67	9	41	—	56	18	59	5	—	—	—	—	26	7	5	—	2	—	20	—	35	2	26	2	386	
1880	14	2	68	4	24	2	34	7	152	13	—	—	1	—	22	8	—	—	6	—	30	—	24	2	67	—	442	
1881	—	—	34	1	4	2	41	11	55	6	21	4	3	—	8	1	3	1	27	6	—	—	3	—	13	—	212	
1882	3	—	61	1	24	3	19	5	24	—	76	5	6	1	21	2	4	—	4	—	5	×	23	2	14	1	284	
1883	8	—	19	—	31	1	13	4	25	2	61	—	5	1	10	1	—	—	—	—	4	×	1	69	2	10	1	255
1884	13	—	49	4	3	—	27	16	16	—	4	—	—	—	14	3	—	—	—	—	3	1	47	2	30	—	206	
1885	3	—	11	—	1	—	14	9	17	2	2	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	19	1	72	
1886	1	—	4	—	25	2	85	15	66	8	1	—	17	3	13	2	11	—	—	—	6	2	—	—	28	1	257	
1887	—	—	×	10	—	18	17	112	8	3	2	4	—	17	3	2	—	—	—	3	—	—	—	74	2	263		
1888	3	—	12	1	1	1	15+5	26	3	—	—	—	—	8	2	1	—	4	1	5	1	3	2	33	3	111		
1889	enst.	—	22	2	1	—	155	15	406	3	4	—	17	1	2	1	4	—	1	1	16	—	1	1	32	1	664	
1890	5	1	14	3	1	—	35	2	17	—	1	—	3	—	1	1	5	—	1	—	4	—	—	7	—	94		

Vestmanlands län.

Folkmängd 1865: 108,859; 1890: 137,453.

Tab. I. 9.

År.	Västerås' p. d.		Västerås' st.		Ströms- holms d.		Köpings st.		Arboga st		Ramnäs' d.		Norbergs p. d.		Sala st.		Väla p. d. (1862)		Summa sjuke.	Summa döde.	
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.			
1861.....	6	—	8	—	45	7	25	2	13	—	7	2	3	1	14	5	—	121	17		
1862.....	—	—	7	—	23	1	21	1	4	1	2	—	12	—	—	—	—	69	3		
1863.....	—	—	8	—	32	3	—	x	4	—	9	2	21	—	1	—	x	75	5		
1864.....	—	—	7	—	18	—	—	x	2 ¹	— ¹	4	—	10	—	3	1	4 ⁵	—	48	1	
1865.....	—	—	20	—	13	4	17	2	11	3	—	x	14 ²	—	6	1	spr. ²	—	81	10	
1866.....	—	—	25	3	8	1	19	3	20	5	—	—	19	—	—	—	1	—	92	12	
1867.....	4	1	27	3	17	1	12	2	13	2	—	—	14	x	—	—	1	1	88	10	
1868.....	53	4	126	12	37	7	23	2	73	6	32	5	33	—	21	1	6	—	404	37	
1869.....	196	12	5	1	—	x	14	2	135	10	—	—	46	17	157	16	20	4	573	62	
1870.....	—	—	6	—	10	—	—	—	20	1	6	2	—	—	22	2	10	4	74	9	
1871.....	11	5	1	—	2	1	16	2	7	1	1	—	20	3	4	1	2	1	64	14	
1872.....	17	2	83 ¹	11	—	—	16	2	29	3	3	—	15	2	32	6	2	—	197	26	
1873.....	7	—	23	3	26	x	x	—	11	3	3	—	72	7	45	7	10	2	197	22	
1874.....	8	—	8	—	—	x	x	—	17	1	29	5	58	7	16 ²	1 ¹	18	2	154	16	
1875.....	—	—	6	1	37	x	x	—	6 ¹	2	—	—	13	3	31	5	2	—	95	11	
1876.....	36	5	9	4	6	—	x	—	48	2	—	—	29	9	31	3	—	—	159	23	
1877.....	5	2	2	—	14	—	x	—	14	—	3	1	17	3	18	2	5	—	78	8	
1878.....	7	3	—	—	—	—	x	—	48	2	4	1	10	2	x	—	14	1	83	9	
1879.....	14	—	7	—	7	—	—	—	28	4	2	—	13	2	—	—	13	1	84	7	
1880.....	72	—	2	1	—	—	2	1	11	2	—	—	24	5	14	x	3	—	128	9	
1881.....	77	—	14	2	—	—	2	—	2	—	4	2	9	—	19	x	—	—	127	4	
1882.....	84 ¹	—	20	3	—	—	124	5	21 ¹	1 ¹	8	—	35	7	21	x	3	—	316	16	
1883.....	115 ¹	x	12	2	—	—	22	6	13	—	10	—	enast.	—	50	x	1	—	223	8	
1884.....	63	x	26	—	—	—	13	—	19	1	84	11	16	x	106	x	38	11	365	23	
1885.....	x	12	6	1	—	—	4	—	5	—	25	3	x	—	24	x	7	1	71	17	
1886.....	—	—	12	—	—	—	6	2	11	—	10	—	3	—	15	x	16	2	73	4	
1887.....	21	5	23	1	—	—	13	1	1	—	19	4	—	—	12	x	6	—	89	17	
1888.....	3	—	1	—	—	—	4	—	2	—	15	—	1	—	4	—	—	—	30	—	
1889.....	36	—	82	2	—	svår epid.	—	—	18	—	—	—	32	—	4	1	—	—	172	3	
1890.....	6	2	6	3	—	—	46	—	2	—	6	3	—	—	2	1	9	1	77	10	

Upsala län.

Folkmängd 1865: 96,766; 1890: 121,091.

Tab. I, 10.

År.	Tierps p. d. (1868).		Elfkarleö d. (1873).		Löfsta d.		Danne- mora d.		Upsala p. d.		Upsala st.		Tibble p. d.		En- köpings p. d.		En- köpings st.		Summa sjuke.	Summa döde.
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.		
1861.....					14	—	14	—	spr.	x	spr.	12			?	—	—	—	40	12
1862.....					—	—	—	—	spr.	x		x			47	—	—	—	47	x
1863.....					—	—	—	—	spr.	x	spr.	x			11	—	6	1	17	1
1864.....					14	3	—	—	13	1	63	x			enst.	—	—	—	90	4
1865.....	4	1			21	5	—	—	18	4	115	13		x	—	—	5	—	159	22
1866.....	x				12	2	22	1	8	1	118	13	8	1	19	4	x		187	32
1867.....	—	—			55	12	3	1	126	13	x	7	6	—	57	3	x	1	247	37
1868.....	x				11	2	21	3	4	2	94	6	64	10	47	6	x	4	241	33
1869.....	x				27	4	32	2	97	3	x	6	18	2	12	2	6	1	192	18
1870.....	68	11			38	7	9	3	40	8	x		5	—	35	—	—	—	195	29
1871.....	5	3			13	3	1	—	4	—	35	x	7	2	25	—	6	—	96	8
1872.....	28	6			12	1	11	1	11	—	30	x	12	2	38	1	6	—	148	11
1873.....	16	2			27 ^I	4 ^I	1	—	7	2	77	x	21	2	12	1	13	—	174	11
1874.....	—	—	11	1	8	3	—	—	6	1	7 ^I	—	27	3	24	1	18	2	101	11
1875.....	22	1	25	1	13	1	9	2	5	1	23 ²	2	40 ² ? 4 ^I	44 ^I ^o	1	23	—		204	13
1876.....	2	—	9	2	5	—	5	1	7	1	32	7	5	—	10	—	11	1	86	12
1877.....	7	5	2	—	5	1	17	2	8	1	9 ^I	5 ^I	3	1	14	—	6	1	71	16
1878.....	6	—	7	—	27	4	12	1	25	10	34	7	25	2	46	3	13	1	189	28
1879.....	8	1	10 ^I	1	6	—	1	—	12	7	99 ^I	9 ^I	11 ²	—	11	2	—	—	158	20
1880.....	6	1	7	—	13	1	2	—	34	11	50	5	9	—	26	5	75	3	222	26
1881.....	5	3	2	—	24	—	1	—	6	2	16	5	4	2	23	9	18	—	99	21
1882.....	4	2	6	—	10	—	5	—	21	6	54	5	1	—	58	8	28	—	189	21
1883.....	41	3	4	—	14	1	1	—	5	—	34	3	2	—	33	6	2	1	136	14
1884.....	34	2	3	2	8	1	—	—	17	8	70	6	16	5	22	4	6	1	176	29
1885.....	48	8	3	—	1	—	—	—	35	6	49	10	4	—	4x	x	5	1	149	25
1886.....	13	6	109	3	33	8	—	—	16	2	105	6	6	2	12	2	9	1	303	30
1887.....	27	7	32	3	5	1	—	—	18	2	67	—	5	2	23	2	3	—	180	17
1888.....	7	—	6	—	1	—	—	—	19	2	79	9	7	3	19	2	2	—	140	16
1889.....	19	2	12	3	11	1	9	1	14	2	100	7	3	—	20	2	2	1	190	19
1890.....	7	2	14	2	—	—	—	—	14	2	75	5	2	1	15	2	1	—	128	14

Stockholms län.

Folkmängd 1865: 128,458; 1890: 152,715.

Tab. I. 11.

r.	Östhammars p. d. (1861) och st.		Norrtelje p. d. st.		Öster- åkers d. (1874).		Sigtuna p. d. och st.		Stock- holms p. d.		Vermdö d.		Drott- ning- holms d. (1871).		Botkyrka d.		Söder- telje d. och st.		Sötholms p. d. (1862).		Summa sjuke.		Summa döde.			
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.		
31...	x	28	9	—	—			?	?	?					?		67	—			95	9				
32...	enst.	—	29	6	4	2		spr.	x	6	1	—	—		13	2	spr.	x			52	11				
33...	7	2	126	24	—	—		—	—	16 ²⁶	2 ³	—	—		18	5	25	1	5	—	197	32				
34...	9	—	140	13	4	1		x	9	1	1				x		11	1	—	—	174	16				
35...	—	—	130	10	4	—		—	—	3	—	—	—		x		10	—	5	—	152	10				
36...	3	—	138	30	13	1	6	—	—	14	1	—	—		5	3	10	2	14	1	203	38				
37...	12	1	100	32	3	—	19	3	16	2	14	2	2	1		9 ²	1 ¹	10	—	22	3	207	45			
38...	26	3	88	11	2	—	10	1	—	—	3	—	1	—		13	2	53	4	19	1	215	22			
39...	35	8	155	23	5	2	8	1	4	1	14	3	21	5		13	2	x		27	2	282	47			
40...	136	26	89	8	6	2	6	—	11	4	9	—	x		10	1	spr.	x	24	4	291	45				
41...	9	1	102	16	2	—	x	21	5	11 ¹	—	17	1		7	1	x	1	23	3	193	28				
42...	17	4	165	14	12	2	1	—	18	2	5	—	—	—	24?	3	37	1	16	—	74	7	369	33		
43...	41	4	221	25	14	1	x	42	7	9	—	x	7	1	20	1	23	—	42	6	419	45				
44...	52	9	183	15	57 ²	4 ¹	1	—	41	8	16 ¹¹	1 ³	4	1	—	13	2	30	2	22	5	419	47			
45...	45	10	169 ²	20 ¹	10	1	27	6	6	2	5 ²	—	13	4	2 ³	—	8	1	68 ¹²	4 ¹²	39 ²	3 ¹	392	51		
46...	14	1	81	18	91	6	14	3	5	1	x	6	x	—	—	25	—	9 ³	—	23	2	268	37			
47...	9	3	52	11	20	4	17	1	16	2	x	9 ¹	1x	—	3	—	36	7!	72	5	14	1	249	43		
48...	38	4	spr.	x	17	2	3	—	31	9!	x	5 ²	17	2	—	—	12	—	25	2	31	1	179	25		
49...	48	7	59	12	18	—	9	—	10	3	x	4	55	1	21	2	11	1	—	—	6	1	241	31		
50...	33	—	103	10	24	2	32	2	17	3	75	14	9	—	10	1	6	—	40	3	2	—	346	35		
51...	21	5	27	3	10	—	11	1	3	2	2	—	3	—	3	1	11	—	16	1	—	—	107	13		
52...	29	4	101	3	55	5	6	1	8	1	48	21	2	1	3	1	4	—	23	—	—	—	279	37		
53...	28	6	120	4	19	1	2	—	11	4	x	8	16	2	2	1	2	—	64	4	—	—	272	30		
54...	28	1	14	6	25	3	5	1	15	5	x	6	—	—	2	2	4	—	23	6	4	1	126	31		
55...	28	3	30	6	26	2	11	1	13	6	27	6	3	—	3	—	2	1	13	3	2	—	158	28		
56...	122	9	94	13	32	1	4	—	51	8	x	4	10	5	6	1	2	—	12	2	—	—	337	43		
57...	11	—	36	8	9	—	3	—	2	—	x	4	—	—	4	1	4	—	5	—	—	—	78	13		
58...	18	—	20	2	2	—	16	1	6	3	x	2	2	1	—	—	2	—	2	—	3	—	83	9		
59...	3	—	37	4	4	—	3	2	5	1	35	7	7	1	1	—	—	18	2	2	—	115	17			
60...	18	3	12	4	—	—	23	2	40	2	18	7	17	—	—	5	1	5	—	—	—	136	18			

Stockholms stad.

Folkmängd: 1865: 133,361; 1890: 246,454.

Tab. I. 12.

	År.	Constit. epid.		Fattige.			År.	Constit. epid.		Fattige.	
		Sj.	D.	Sj.	D.			Sj.	D.	Sj.	D.
	1861			584	24	1876		420 ⁵⁹	74 ¹⁰	170 ⁷	7
	1862			116	18	1877		621 ¹⁷	78 ²	115 ⁸	8
	1863			128	17	1878		497 ¹	61	130	8
	1864	223 ⁸	91	95	21	1879		524 ¹¹	64 ²	156 ²	7
	1865	113 ⁴	82	76	17	1880		453 ¹⁴	62 ²	108 ¹	9
	1866	106 ²	92	110 ⁶	13 ³	1881		392 ⁷	40 ²	70	5
	1867	102 ¹	67	136	10	1882		705 ¹¹	66	135 ⁵	8
	1868	209 ⁶	75	366	18	1883		556 ²⁵	42 ¹	121 ⁶	4
	1869	143	86	179	10	1884		566 ¹	48	93	5
	1870	108	166	442	23	1885		443 ⁹	33 ¹	89 ²	4
	1871	151	137	216	11	1886		452 ²²	40 ⁴	107 ²	7
	1872	934	255	525	33	1887		443 ¹⁴	38	90 ³	5
	1873	1,258	224	559	29	1888		271 ⁸	34 ²	59 ²	—
	1874	917	139	553	18	1889		455 ²	23	79	1
	1875	786	139	477	17	1890		467	43	111	3

Obs. Sjukdomsfallen är upptagna under 2 olika rubriker: Constitutio epidemica och Fattige. Under den första är upptagna de af stadens läkare till Svenska läkarsällskapet uppgifna sjukdomsfallen samt dödsfallen i 1:e stadsläkaren årsberättelse. Under den senare är de af fattig- sedan distriktsläkarne anmälda sjukdoms- och dödsfallen upptagna. Huruvida det senare slaget uppgifter, hvad sjukdomsfallen beträffar, till någon del ingå i de förstnämnda, finnes aldrig angivet. De är derför här ställda jämsides.

Södermanlands län.

Folkmängd 1865: 133,900; 1890: 154,991.

Tab. I. 13.

	Ny-köpings p. d.	Ny-köpings st.	Stora Malm's p. d.	Vingåkers p. d.	Malm-köpings p. d.	Eskilstuna p. d.	Eskilstuna st.	Streng-näs' p. d. (1876)	Streng-näs' st.	Marie-freds st.	Daga p. d.	Trosa p. d. och st.	Summa sjuke.	Summa döde.	
	Sj. D.	Sj. D.	Sj. D.	Sj. D.	Sj. D.	Sj. D.	Sj. D.	Sj. D.	Sj. D.	Sj. D.	Sj. D.	Sj. D.	Sj. D.	Sj. D.	
81...	63	5	—	—	126	2	37	7	67	13	56	9	19	1	
82...	x	6	2	33	9	16	12	29	10	73	17	6	—		
83...	144	36	11	6	51	6	17	5	36	6	85	18	11	2	
84...	142	48	64	18	38 ¹²	4 ⁵	13	7	1 ⁶ — ⁶	85	16	9	—		
85...	143	28	66	11	79 ⁷	7 ²	13	7	—	97	13	46	6		
86...	91	25	11	2	127 ⁸	12 ⁷	10	7	24	8	78	13	7	3	
87...	128	27	19	5	101	11	57	16	x	14	51	8	12	—	
88...	92 ¹	17	51	10	21	3	158 ¹	18	x	6	66	11	20	x 10	
89...	47	11	13	3	30	6	42	7	5 ⁷	2 ⁴	56	9	18	4	
90...	89	25	12	1	14	—	36	11	15	7	35	7	14	1	
91...	82	20	19	5	53	1	19	2	18	1	52	10	25	1	
92...	77	12	17	3	13	1	24	9	10	1	108	17	145 ¹	13	
93...	99	20	17	2	17	2	16	2	10	2	101	16	83 ¹	4	
94...	96	19	— ¹	— ¹	32	5	x	5	22	3	114	21	73	10	
95...	72	21	2	1	x	20 ¹	8 ⁷	42	6	106	15	98 ⁵⁶	10 ^{II}		
96...	47	9	4	2	6	2	x	4	10	1	45	11	52	5	
97...	42	6	15	7	23	3	8	2	19	2	21	7	37 ³	1 ²	
98...	50	12	15	5	24	2	13	6	13	2	10	3	23 ²	4	
99...	49	5	21	3	18	1	7	6	2x 2	spr.	x	51	9	x	
100...	32	4	8	1	6	—	21	3	4	x	18	1	31 ²	2	
101...	28	3	19	5	27	4	8	2	4	2	25	1	38 ⁴	1 ⁷	
102...	30	3	30	8	26	7	17	6	34	8	77	1	36	2	
103...	36	5	5	—	23	3	8	3	5	2	91	8	72	1	
104...	22	2	13	2	spr.	6	3	—	—	—	29	2	47	1	
105...	38	x	42	4	x	12	1	2	1	126	5	94 ³	1 ⁷	7	
106...	120	x	35	9	x	2	1	—	—	45	3	49	1	9	
107...	42	x	14	2	x	3	1	8	1	41	1	110	4	7	
108...	65	2	12	3	2	2	—	—	—	15	1	20	—	4	
109...	31	x	15	3	3	1	10	4	—	—	42	8	26	1	
110...	17	3	31	4	1	—	5	2	5	2	11	1	18	3	

Göteborgs län.

Folkmängd 1865: 232,181; 1890: 297,824.

Tab. I. 14.

År.	Göteborgs p. d.		Göteborgs st.		Fässbergs d. (1862).	Mar-strands st.	Jörlanda p. d.	Orousts p. d.	Lysekils d. (1867).	Uddevalla p. d.	Uddevalla st.	Håby p. d.	Tannums p. d.	Ström-stads st.	Kungelfs st.	Summa sjuke.		
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.		
1861	26	—	120	¹⁷ 25 ⁵		3			? ² ? ²		50 10	24 3	58 5	×	6 6	8 —	339	
1862	108	8	128	24	—	—	1	—	34 2		43 9	4 1	94 8	×	1 1	4 —	417	
1863	p.ee.	21	152	24	19	1	—	—	45 2		138 13	11 —	72 4	3 1	4 1	15 2	480	
1864	spr.	18	130 ⁵	16 ²	29	1	—	—	208 8		51 10	2 —	27 5	14 8	1 1	6 —	488	
1865	x	10	216	33 ¹	74	3	13	—	350 27		138 12	118 4	36 2	17 2	9 —	4 —	985	
1866	x	29	220	52	26	1	15	2	230 17		128 13	28 1	270 20	133 19	— —	×	1,078	
1867	39	1	265	50	29	—	—	—	202 19	7 ³⁰ 3	303 48	11 —	524 20	456 31	— —	4 —	1,840	
1868	90	1	566 ⁷	92 ¹	226	16	[enst.]	[39 × 3]	115 × 9	117 ³⁰ — ⁴	[549 47]	30 1	199 4	×	— ^{35?} — ¹¹	— —	1,931	
1869	[132	9]	1624	85	81	4	[28 3]	583 105	218 19	35 — ³	145 25	51 6	248 6	125 7	[16 2] 7	1 1	3,293	
	2699	193	102	12											10 4	2 1	3,816	
1870	[84	8]	557	69	37	1	—	—	(349 71)	133 12	4 — ³	116 13	124 9	216 16	(124 7) 7	— ²⁰ 1	1,821	
	76	7															1	
1871	44	5	181	22	17	—	—	—	107 28	355 28	43 41	312 41	(107 11)	108 6	201 12	13 ⁵ —	5 —	1,493
1872	48	6	132 ⁴⁶⁶	14	83 ¹⁰ 6 ¹	2	—	—	33 9	—	49 4	53 enst.	5 6	— 100	3 63	4 8 2	1 —	578
1873	120	7	85 ³⁴ 14 ⁹	62	3	2	—	—	13 4	6 2	37 4	55 ² 5	30 2	82 7	12 2	— —	1	505
1874	72	4	93 ⁵⁸ 21 ¹³	15	1	—	—	—	3	7 2	17 1	65 ⁷⁸ 5 ⁷	22 2	66 1	84 7	— —	3 —	447
	119	26	1	1						42 2	1	11 2						
1875	7	—	117	18	18	1	1	1	29 7	48 3	43 3	58 9	8 —	82 4	37 5	3 —	1 —	452
1876	7 ²	—	71 ³⁸ 22 ¹³	6	—	—	—	—	41 9	68 1	33 3	49 ¹⁰ 5 ²	3 1	48 5	27 1	— —	— —	321
1877	25	7	91 ³⁹ 10 ⁵	—	—	1	1	—	22 3	31 5	47 2	65 8	6 1	45 2	40 5	— —	— —	352
1878	13	—	153 ⁷	19 ²	—	—	—	—	14 1	117 9	102 2	132 12	17 1	123 5	37 1	3 —	— —	674
1879	54	3	62 ⁵ 19 ⁴	1	—	1	1	16	—	53 2	47 1	108 12	9 —	75 4	26 9	5 2	— —	429
1880	7	2	119 ¹	21 ¹	41	2	—	—	23 2	—	42 8	76 10	9 1	23 2	35 4	2 1	1 —	347
1881	28	4	121 ³	18	13	3	—	—	42 3	42 2	11 5	86 10	48 2	51 1	× 4	6 1	4 —	413
1882	122	17	137 ⁶	22 ¹	—	—	1	—	82 7	15 2	64 3	93 ¹⁷ 7 ⁵	36 1	70 3	37 2	7 —	5 1	616
1883	20 ¹⁴	1	129 ¹⁹ 16 ¹	—	—	36	1	2	1	—	—	36 2	—	37 3	18 6	4 —	3 —	269
1884	253 ²⁶	22	141 ¹⁰ 20	49	6	—	—	—	28 1	15 1	4 —	30 2	13 1	33 1	35 4	1 —	1 —	590
1885	55	10	188	18	20	3	1	—	24 1	32 1	18 1	29 5	1 —	2 × 1	30 4	4 4	— 1	394
1886	41	2	179	18	4	2	—	—	36 2	37 1	21 ×	24 1	3 —	11 —	33 7	— —	1 —	390
1887	62	8	285	22	1	—	1	—	36 7	39 3	24 ×	29 1	4 2	6 2	19 1	16 3	— —	522
1888	41	9	107	10	3	—	3	—	31 1	49 —	3 —	18 1	2 1	9 2	16 —	4 —	— —	286
1889	64	10	199	10	53	7	—	—	53 5	68 2	5 —	39 3	8 —	156 16	57 —	9 —	1 —	712
1890	16	8	148	8	8	—	—	—	30 4	33 2	19 —	12 —	13 2	31 2	55 2	1 —	— —	366

Skaraborgs län.

Folkmängd 1865: 236,775; 1890: 247,074.

Tab. I. 15.

	Lidköping p. d.	Lidköping st.	Mariestads p. d.	Mariestads st.	Skara st.	Hovfa p. d.	Hjo p. d.	Sköfde st.	Falköping p. d.	Falköping st.	Naums p. d.	Hjo st.		Summa sjuke.	Summa döde.											
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.												
1.	21	11	—	—	11	—	—	—	38	4	—	—	9	2	10	1	89	18								
2.	117	26	3	—	—	—	—	4	2	3	1	79	15	2	—	alm.	9	×	52	6	6	1	266	60		
3.	76	19	7	—	7	1	6	1	—	3	—	14	2	13	—	spr.	2	—	17	1	5	1	143	27		
4.	enst.	—	5	1	16	2	7	2	—	1	—	11	1	18	—	20	4	—	27	2	—	—	105	12		
5.	spr.	—	5	—	4	—	13	3	—	69	17	23	4	—	—	13	8	—	—	—	1	1	128	33		
6.	x	10	3	—	—	21	3	6	2	39	13!	23	5	17	1	63	14	7	1	4	—	14	5	204	47	
7.	67	11	17	2	—	—	5	1	—	—	3	—	57	15	11	1	44	11	—	—	×	11	3	215	44	
8.	123	11	18	—	41	8	1	1	45	7	11	1	86	9	13	2	29	7	6	2	77 ³	7	36	9	486	64
9.	31	4	13	2	20	2	36	2	×	2	13	6	32	2	7	—	107	14	23	7	82 ¹⁶	3	16	8	380	52
10.	x	15	—	48	7	19	3	—	×	12	2	29	5	—	×	38	6	2	—	29 ⁷	5	5	1	197	29	
11.	69	8	23	4	38	3	38	4	×	35	2	11	—	1	—	23	4	7	1	6 ²	—	2	1	253	27	
12.	29	4	5	1	12	2	3	—	25	5	—	—	45	2	11	—	54	5	36	6	22 ⁸	4 ²	15	2	257	31
13.	10	2	4	4	19	—	3	—	—	—	1	—	50	6	45	1	28	3	11	2	13	1	12	2	193	24
14.	33	1	1	1	69	6	7 ¹	2 ¹	—	—	15 ¹	1	70	6	141	15	21	3	31	9	21 ²	1	9	2	419	47
15.	27	2	3	1	—	—	7	2	28	4	63	7	31	2	13	1	31	3	—	×	14 ²	—	6	2	223	24
16.	15	7	1	1	7	2	—	—	8	3	11	1	56	2	18	2	10	2	5	2	2	1	14	1	147	24
17.	63	6	4	1	p.e.	×	6	1	—	—	—	—	12	2	4	2	5	1	8	5	18	3	9	1	129	22
18.	36 ⁷	6 ¹	3	2	30	6	66	9	46	7	3	1	200 ⁵	10 ²	13	—	79	18	36	4	41	9	10	—	563	72
19.	7	—	—	—	1	—	30	6	16	1	3	—	107 ⁸	11 ²	17 ¹	—	14	3	2	1	56	7	—	—	253	29
20.	10	2	5	3	6 ²	2 ²	7	1	8	2	5	1	129	7	13	3	5	—	22	3	31 ¹	7 ¹	—	—	241	31
21.	71	10	—	—	33	5	4	—	22	4	22	2	262	21	11	4	26	—	36	3	42 ¹	5	—	—	529	54
22.	37	8	15	7	39	4	6	1	31	1	11	2	100	10	—	×	15	2	8	1	83	9	6	—	351	45
23.	33	2	—	—	27	2	4	2	14	3	6	5	167	11	3	—	32	4	3	—	91 ¹	7	3	—	383	36
24.	2	—	1	—	62	1	2	—	10	3	12	1	248	9	—	×	30	3	—	—	37	6	1	—	405	23
25.	3	—	—	—	30	2	8	—	10	1	18	2	193	12	—	×	16	2	7	—	54	4	—	—	339	23
26.	3	1	—	—	42	3	4	—	7	1	8	—	183	11	—	×	122	8	24	—	84	5	—	—	477	29
27.	10	4	—	—	29	3	4	1	5	—	16	2	102	8	—	×	80	15	3	1	41	4	—	—	290	38
28.	10	2	—	—	16	1	3	1	9	—	14	1	35	3	—	×	24	24	1	—	202	10	—	—	214	22
29.	22	—	5	—	6	—	2	—	117	16	18	1	19	2	—	×	60	11	11	—	379	23	—	—	639	53
30.	—	—	—	—	3	—	1	—	5	1	26	3	14	1	15	—	14	1	3	1	44	—	—	—	125	7

Elfsborgs län.

Folkmängd 1865: 279,159; 1890: 275,780.

Tab. I. 16.

År.	Norra Dalslands p. d.		Åmåls st.		Gunnars-näs' p. d. (1865).		Venersborgs p. d.		Venersborgs st.		Trollhättans d.		Alingsås' p. d.		Alingsås' st.	
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.
1861	32	3	4	—			127	19	8	4	2	—	39	5	24	3
1862	37	2	28	2			78	20	3	1	13	—	35	6	3	—
1863	spr.	x	1	—			27	1	10	2	—	—	15	1	15	1
1864	36	10	—	—			21	5	14	—	4	3	?		3	1
1865	11	1	1	—	3 × 1		38	2	28	6	—	—	203	28	spr.	2
1866	48	5	8	1	30	9	allm.	x	63	20!	16	2	p.ee.	54	36	—
1867	243	62	—	x	18 ²¹ — ⁶		37	13	12	1	168	9	76	16	17	2
1868	80	9	59 ²	13 ²	—	x	340	45	12	—	93	3	p.ee.	15	59	8
1869	p.e.	—	17	4	—	x	[649	83]	25	—	38	3	167	24	4	—
1870	39	7	5	3	—	x	[226	17]	—	x	70	2	[110	11]	— ¹⁰ — ²	
1871	15	3	—	—	34	8	28	—	28	3	104 ^{enst}	7	— ²⁴⁹ — ²⁸	14	—	
1872	40 ²	3 ¹	—	—	70	5	90	4	47	3	56	—	20	3	—	—
1873	10	—	1	—	—	—	58	4	21	1	85	3	[86	17]	3	—
1874	66	7	14	1	8 ¹⁴	2 ²	67	3	38	3	97	3	37	3	46	9!
1875	[56	7]	19	3	5 ³	— ²	44	3	33	1	194	2	26 ¹	4	9	—
1876	23	2	45	10	3	1	40	3	36	3	99	1!	29	3	6	1
1877	40	5	49	4	30	—	94	8	47	—	103	2	22	6	13	1
1878	76	8	153 ¹	21	53	3	160	10	220	9	82	1	51	7	5	1
1879	31	6	11	—	13	—	26	3	11	—	14 ¹	1 ¹	26	4	2	—
1880	16	1	9	1	3	—	59	2	5	2	4	—	15	—	2	—
1881	23	6	10	—	8+	6	54	3	12	—	12	1	16	—	6	—
1882	32	6	3	—	32	6	56	1	14	—	2×	1	35	—	2	—
1883	2	—	4	—	12	4	47	1	4	—	5	—	56	4	2	—
1884	21	9	20	3	—	x	58	—	7	—	13	—	33	2	2	—
1885	23	4	12	2	23	4	8	1	12	—	9	—	13	2	4	—
1886	2	1	1	—	3	1	3	?	6	1	112	5	21	x	2	—
1887	5	1	—	—	13	—	5	3	5	1	2	1	21	x	1	—
1888	5	—	—	—	1	—	20	2	4	—	3	—	10	x	4	—
1889	13	1	—	—	3	—	79	5	5	—	77	5	49	1	2	1
1890	x	6	3	—	—	—	26	1	2	—	15	3	—	—	—	—

Elfsborgs län.

Folkmängd 1865: 279,153; 1890: 275,780.

Tab. I. 16. (Forts.)

År.	Borås' p. d.		Borås' st.		Ulrice- hamns p. d.		Ulrice- hamns st.		Sven- ljunga p. d.		Marks p. d. (1862).		Summa sjuke.	Summa döde.
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.		
1861	9	1	—	—	4	—	3	—	10	1			262	36
1862	15	2	10	—	88	8	×		11	1			302	40
1863	8	1	3	—	14	4	—	—	5	—	6	5	104	16
1864	15	1	4	2	7	—	1	—	spr.	—	15	—	105	22
1865	49	4	6	3	14	—	1	—	spr.	—	15?	13	354	47
1866	35	4	10	5!	112	22	—	—	—	—	66 ²	23	424	145
1867	36	7	19	5	2	—	—	—	—	—	155	27	783	142
1868	60	3	16	3	47	4	1	—	24	5	86	48	877	156
1869	—	—	14	3	19	—	—	—	47	8	[204 109]		(1,159)	235
1870	70	17	3	—	60	9	—	—	21	5	[231 73]		(835)	145
1871	90	20	—	—	34	—	—	—	14	1	16 ⁹⁹	28	377	42
1872	68	8	6	1	—	x	—	x	7	2	(49	5)	453	34
1873	60	5	2	1	25	x 4	3	—	3	1	[34	2]	391	38
1874	—	—	x	x	10	x 2	3	—	1	x —	3 ²⁷	1 ²	390	33
1875	—	—	x	75	13	x	—	—	53	3	10 ¹⁵²	1 ³⁹	524	27
1876	x	x	4 ²	26	5	22	4	—	—	x	40 ⁵	6	369	43
1877	39	6	16	6	3	1	—	—	—	x	1 ¹	—	457	39
1878	65	4	56	9	62	5	—	—	12	2	34	6	1,029	86
1879	76	5	44	7	43	8	—	—	53	7	—	x	350	41
1880	41	3	49	4	40	3	—	—	35	6	26	3	304	25
1881	27	1	10	—	6	1	—	—	22	1	20	5	226	24
1882	52	1	22	2	14	2	—	—	50	4	51	3	365	26
1883	21	4	8	—	36	9	1	—	23	3	32	5	253	30
1884	8	1	7	1	65	4	—	—	6	2	24	6	264	28
1885	—	—	5	1	38	4	5	—	2	—	1	x —	155	18
1886	9	—	17	—	28	7	2	1	3	—	6	1	215	16
1887	5	1	6	—	34	9	—	—	9	3	7	3	113	22
1888	7	2	3	1	17	4	—	—	4	—	10	—	88	9
1889	7	2	9	1	62	8	1	—	18	5	29	—	354	29
1890	13	4	8	2	15	—	—	—	—	—	10	2	92	9

Östergötlands län.

Folkmängd: 1865: 253,148; 1890: 266,619.

Tab. I. 17.

Å r.	Tjellmo p. d. (1867).		Reijmyre d. (1860).		Finspongs d.		Norr- köpings st.		Söder- köpings p. d.		Söder- köpings st.		Valde- marsviks d.		Åtvida- bergs d.		Kisa p. d.	
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.
1861.....			—	—	x		297	4	—	—	—	—	x		—	—	17	5
1862.....			1	—	x		160	6	17	—	10	—	x		27	2	17	2
1863.....			4	—	—	—	138	21	9	—	13	—	x		9	3	13	—
1864.....			3	—	1. e.	—	16	7	29	1	21	1	x		26	5	4	—
1865.....			10	—	?		23	5	17	1	3	11	1	—	5	—	29	1
1866.....			6	—	—	—	56	11	18	1	19	1	20 ^{1/2}	1	6	—	66	4
1867.....			4	—	— ⁶	—	8	1	6	x	2	—	7	—	9	1	17	5
1868.....	9	1	13	2	—	—	61	11	24	4	9	—	29	2	—	—	14	2
1869.....	65	7	12	3	—	—	18	3	13	6	1	—	29	2	—	—	14	2
1870.....	11	—	40	6	—	—	7	1	5	—	4	1	35	1	2	—	17	2
1871.....	18	1	15	—	9	—	51	9	5	1	19	1	17	2	—	—	10	2
1872.....	21	1	23	1	150	18	137	20	69	1	71	5	25	1	1	—	45	6
1873.....	87	7	16	2	—	—	19	1	8	—	70	2	64 ^{1/2}	2	x		25	3
1874.....	34	2	—	—	—	—	11 ^{1/2}	1 ¹	17	—	106	11	24	—	5	—	4	1
1875.....	17 ^{1/2}	2 ¹	—	—	11	—	46	15	44	3	131	12	58	4	— ¹	—	1	—
1876.....	x	6	—	80	2	6	—	2	—	7	—	27	1	27	4	9	1	
1877.....	6	1	2	—	12	1	5	—	8	—	13	—	11	1	31	8	96	11
1878.....	5	1	2	—	61	6	25	5	2	—	18	2	13	—	22	1	116	22
1879.....	3	—	17	1	71	5	13	1	6	8	1	—	23	—	66	5	51	2
1880.....	3	1	—	—	115	16	18	3	—	—	3	—	26	3	x	1	36	3
1881.....	—	—	—	—	26	2	10	2	19	4	4	—	18	—	6	—	20	2
1882.....	18	2	—	—	9	—	12	2	43	5	1	—	3x	1	5	1	28	2
1883.....	1x	—	7	2	9	1	15	1	33	2	29	2	6	—	3	1	31	—
1884.....	—	—	12	—	29	3	12	1	12	1	5	2	3	—	26	1	18	1
1885.....	5	—	2	—	25	4	2	—	44	—	7	1	9	—	12	—	—	—
1886.....	—	—	1	—	21	1	9	2	38	11	12	—	15	x	8	3	9	1
1887.....	—	—	10	1	11	—	6	—	34	1	5	1	6	1	6	2	14	4
1888.....	—	—	—	—	2	—	5	—	3	—	1	—	20	1	13	5	—	—
1889.....	—	—	14	1	x		12x	7	9	6	5	1	4	—	6	—	7	3
1890.....	—	—	3	—	x		61	12	8	4	3	—	5	—	3	—	—	—

Östergötlands län.

Folkmängd: 1865: 253,148; 1890: 266,619.

Tab. I, 17. (Forts.)

Å r.	Boxholms p. d. (1861).	Skeninge st.	Ödeshögs p. d. (1862).	Vadstena st.	Motala d. o. st.	Lin- köpings p. d.	Lin- köpings st.	Summa sjuke.	Summa döde.
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.		
1861.....		30 2		— —	— —	spr.	spr. —	344	11
1862.....	13 8	5 1		— —	— —	9 2	11 3	109	18
1863.....	22 7	12 ×	spr —	spr —	— —	spr. 8	5 1	233	40
1864.....	20 12	2 —	— —	1 —	4 1	spr. 9	24 5	159	41
1865.....	21 6	1 1	— —	— —	60 3	50 3	6 1	226	22
1866.....	34 8	3 1	— —	ep. 6	61 9	150 24	5 1	450	67
1867.....	18 7	4 —	×	ep. 2	202 24	100 12	× 7	386	59
1868.....	29 1	— —	2 1	— —	129 16	100 15	18 4	495	69
1869.....	53 18	19 3	— —	2 —	50 6	200 2	26 2	502	56
1870.....	23 —	1 —	6 1	×	30 —	41 ⁵¹ 7 ⁵	×	222	19
1871.....	6 1	— —	19 2	1 —	6 —	100 ² 10	33 4	311	33
1872.....	— —	4 2	12 1	2 2	63 1	80 11	78 9	781	79
1873.....	— —	— —	— —	6 2	30 3	160 21	81 2	566	25
1874.....	— —	2 —	4 —	12 7	16 1	× ¹ 13 ¹	23 1	255	36
1875.....	— —	×	5 —	13 2	30 3	29 4	14 3	399	48
1876.....	3 ¹ ? 1	1 1	— —	11 2	171 23	15 2	23 2	388	39
1877.....	2 —	3 1	8 —	1 1	19 1	16 1	8 3	241	29
1878.....	10 2	— —	4 —	23 1	23 3	102 14	41 ² 8 ¹	467	65
1879.....	10 2	2 1	7 —	6 2	11 1	34 9	5 2	328	39
1880.....	18 2	1 1	3 1	16 3	7 —	7 2	5 3	259	39
1881.....	5 —	1 —	1 —	15 2	12 —	24 6	13 7	174	25
1882.....	7 + 1	— —	10 3	4 —	36 5	113 13	61 12	350	47
1883.....	10 4	5 1	1 —	1 1	11 1	43 12	69 9	274	27
1884.....	— —	2 —	12 1	— —	13+ —	78 8	85 7	307	25
1885.....	— —	— —	1 —	3 —	5 1	6 2	4 2	125	11
1886.....	34 —	4 1	11 3	118 14	15 —	7 —	— —	302	36
1887.....	9 3	2 1	6 2	36 1	8 1	67 5	43 2	263	25
1888.....	28 2	— —	2 × 2	30 3	1 —	10 1	17 5	132	19
1889.....	36 4	2 —	7 —	4 —	8 —	20 2	77 12	211	26
1890.....	30 1	— —	72 5	1 —	3 2	21 1	56 7	266	32

Kalmar län.

Folkmängd: 1865: 233,165; 1890: 232,847.

Tab. I. 18.

Å r.	Söderåkra p. d. (1864).		Kalmar p. d.		Kalmar st.		Stranda d.		Oskars- hamns p. d.		Oskars- hamns st.		Högsby p. d.
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.
1861			5	—	9	1	—	—	?	—	?	—	x
1862			41	1	5	—	—	—	12	1	12	—	x
1863			44	5	16	1	—	—	14	2	—	—	3 1
1864			—	—	62	10	33	7	— ⁹ — ²	16	1	11	4
1865			12	—	19	1	30	4	21	4	52	8	x 7 2
1866			61	6	58	2	37	4	8	4	65	6	x 2 15 1
1867			29	1	—	—	3	1	5	1	3	1	—
1868			69	4	58	11	6	—	15	2	28	—	— 1 55 5
1869			(234	30)	157	82	57	5	22	× 3	71	6	—
1870			(471	46)	63	29	26	9	— ⁷⁷ — ⁵	(58	31)	allm.	203 2 15
1871			[333	33]	79+40	19	5	— ²⁸ — ⁵	2	—	47	2 4	65 —
1872			[146	15]	44	14	29	5	11	2	—	—	31 3 27 —
1873			80	11	64	12	15	3	16	3	—	—	11 2 35 —
1874			28	1	x		10	3	—	—	—	—	6 — 11 1
1875			52	13	72	1	10	—	33	7	3	1	9 2 10 —
1876			56	10	81	4	8	—	18	1	13	2	40 ³ 5 ¹ 23 1
1877			69	7	18	3	4	—	26	4	p.ee.	x 152 ² 12 ¹ 19 6	
1878			13	2	34	2	5	1	5	× 1	54	5	74 7 29 4
1879			3	x —	14	—	17	1	4	—	7	1	14 2 8 —
1880			66	14	61	9	274	15	—x—	—	3	—	54 4 3 —
1881			37	3	27	5	8	1	—	—	10	1	11 1 32 5
1882			51	8	31	1	27	3	9	—	5	—	13 2 5 —
1883			23	x	41	8	11	3	19	4	18	1	41 3 17 —
1884			35	11	177	40	110	9	9	—	6	3	20 1 6 —
1885			24	x	80	25	52	7	84	12	x	3	21 5 8 —
1886			2	x	73	17	77	4	13	2	—	—	9 1 26 2
1887			3	—	67	11	12	1	10	2	—	—	— — —
1888			3	1	53	12	7	1	1	1	—	—	2 — 8 2
1889			14	2	53	14	30	5	3	2	1	1	6 — 16 1
1890			14	1	41	4	9	1	1	—	2	2	3 1 x

Kalmar län.

Folkmängd: 1865: 233,165; 1890: 232,847.

Tab. I, 18. (Forts.)

År.	Målilla p. d. (1868).	Vimmerby p. d. o. st.	Vesterviks st.	Tjysts p. d.	Ölands norra p. d.	Ölands södra p. d.	Summa sjuke.	Summa döde.
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.		
1861	— —	— —	— —	— —	10 1	5 —	29	2
1862	17 —	85 4	— —	— —	— —	2 —	174	6
1863	— —	65 1	8 2	— —	— —	2 —	152	12
1864	23 4	— —	11 9	13 1	— —	— —	172	37
1865	spr. 1	5 1	31 5	— —	— —	— —	178	26
1866	37 7	— —	29 9	12 1	6 ²⁸ 2	— —	330	42
1867	24 5	8 —	24 6	— —	7 1	— —	116	16
1868	213 7	122 4	80 3	195 34	40 13	— —	881	83
1869	54 × 6	174 15	89 10	39 23	157 29	39 14	1,248	231
1870	25 ? 4	285 25	77 8	206 34	211 27	218 24	(1,843)	252
1871	6 1	84 6	22 2	48 15	74 11	8 —	787	117
1872	15 1	39 —	39 6	102 19	— —	6 —	489	65
1873	18 2	45 4	4 3	138 26	18 1	2 —	446	67
1874	31 ¹ —1	39 —	15 1	32 2	6 3	17 2	195	14
1875	25 2	3 × 1	8 —	162 14	26 2	33 1	446	44
1876	45 ² 3	8 1	11 3	165 17	12 4	31 7	511	48
1877	×	16+15	7 2	164 37	12 6	8 1	495	93
1878	6 3	49 2	22 4	357 39	19 1	7 1	674	42
1879	25 × 2	6 1	10 1	137 31	17 6	6 1	268	46
1880	12 —	13 ×	5 —	111 6	57 11	6 1	665	60
1881	11 2	17 2	14 1	116 ¹ 13	41 9	6 —	330	43
1882	23 2	9 —	13 —	69 3	43 8	73 2	371	29
1883	13 1	12 1	14 —	18 1	10 1	71 7	308	30
1884	19 1	14 3	11 1	94 20	17 2	21 2	539	93
1885	24 3	7 2	6 1	47 4	20 1	10 —	386	63
1886	20 3	19 4	9 5	141 12	15 3	6 ×	410	53
1887	10 1	7 2	14 1	15 × 7	9 1	5 ×	152	26
1888	59 5	21 4	8 2	3 1	21 —	11 —	197	29
1889	17 2	33 2	10 1	24 6	7 3	72 ×	286	39
1890	11 2	10 1	6 2	×	8 4	37 —	142	18

Jönköpings län.

Folkmängd 1865: 183,851; 1890: 193,704.

Tab. I. 19.

År.	Jönköpings p. d.		Jönköpings st.		Grenna st.		Eksjö p. d.		Eksjö st.		Hvetlanda p. d.		Vrigstads p. d.		Vernamo p. d.		Gislaveds p. d. (1862).		Summa sjuke.	Summa döde.
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.		
1861.....	19	1	spr.	x			spr.	13	26	5	6	2	6	2	—	—			70	23
1862.....	27	6	45?	7			spr.	3	15	4	13	—	26	2	3	1			123	23
1863.....	9	1	25	3	—	—	spr.	5	3	1	40	x	x	—	12	2	x		94	12
1864.....	28	2	19	1	—	—	spr.	9	7	1	4	—	52	8	23	—	—		142	21
1865.....	spr.	x	60	10	enst.	1	5	—	14	3	—	—	spr.	x	19	3	16	1	115	18
1866.....	p.ee.	x	68	10	22	4	spr.	14	6	—	54+28	224 ¹	27	59 ¹	4	spr.	x		447	87
1867.....	34	9	13	—	—	—	3	—	21	1	x	p.ee.	21	25	3	31	3		148	37
1868.....	112	22	22	5	2	1	14	2	30	3	100	14	45	x	65	3	20	1	410	51
1869.....	17	4	26	2	—	—	59	10	18	2	49	5	37	5	26	1	28	3	260	32
1870.....	—	—	8	—	—	—	x	6	12	—	20	1	18	x	6	1	51	3	121	11
1871.....	—	—	—	—	—	—	x	13	8	1	8	—	24	11	—	—	20	2	73	37
1872.....	—	—	4	1	—	—	x	7	15	2	—	—	15	9	57	4	13	3	107	25
1873.....	15	1	4	1	13	4	x	12	17	2	5	1	43	14	42 ¹	6	9	—	160	41
1874.....	7	—	35	3	6	2	1	—	20	—	9	2	16	15	13	4	19	—	126	26
1875.....	1	1	65	6	7	—	6	1	12	2	4	1	13	10	12	2	9	—	129	23
1876.....	1	1	64	6	—	—	5	1	—	—	16	—	26	6	26 ¹	3	4	—	142	17
1877.....	—	—	71	3	—	—	18	6	13	5	4	—	13	3	8	—	10	—	137	17
1878.....	7	—	449	60	—	—	5	—	16	7	10	3	8	1	15	1	4	—	514	72
1879.....	5	—	65	10	—	—	10	—	x	19	2	8	6	13	—	13	—		133	18
1880.....	x	8	37	7	7	1	4	—	1	—	8	1	16	6	1	—	34	1	116	24
1881.....	3	—	31	4	4	3	—	—	2	—	1	—	28	1	—	—	22	2	91	10
1882.....	x	2	54	5	—	—	6	3	—	—	7	1	7	—	6	2	62	8	144	21
1883.....	—	—	90	9	—	—	9	1	10	—	5	—	13	—	43	5	11	—	181	15
1884.....	13	1	153	14	—	—	16	x	5	—	5	—	12	1	7	—	11	2	222	18
1885.....	27	2	49	6	—	—	10	x	4	—	1	—	x	—	20	2	6	—	117	10
1886.....	—	—	54	5	—	—	11	—	7	1	33	5	6	—	8	—	18	2	137	13
1887.....	spr.	x	48	2	1	—	14	1	4	—	3	—	16	—	—	—	39	1	135	4
1888.....	4	2	35	7	1	—	12	1	enst.	x	3	—	16	1	8	—	13	—	92	11
1889.....	7	1	66	5	—	—	42	2+	8	—	15	2	13	1	80	7	23	—	254	18
1890.....	5	3	30	—	5	—	34	1	1	—	6	—	10	1	41	3	8	1	140	9

Kronobergs län.

Folkmängd 1865: 162,553; 1890: 160,835.

Tab. I. 20.

År.	Vexiö p. d.	Vexiö st.	Ekeberga p. d.	Tingsås p. d. (1864).	Ljungby p. d.	Summa sjuke.	Summa döde.					
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.						
1861.....	26	6		4	3		121	38	151	47		
1862.....	17	2		9	2		13	—	29	4		
1863.....	23	—		5	1		10	2	38	3		
1864.....	23	—		9	1		22	3	54	4		
1865.....	44	5		—	—	35 ×	50	10	129	15		
1866.....	71	15		18	3	13 —	77	21	179	36		
1867.....	x	25		33	8	41 ×	32	5	131	38		
1868.....	301	62	× × 7 ^I	186	32	ep. ×	81	15	(575	116)		
1869.....	382	124	×	18	115	19	296 ×	170	18	(981	179)	
1870.....	55	24	×	57	11	34 ×	135	15	281	50		
1871.....	x	12	4	16	2	11 ×	76 ^I	12	115	18		
1872.....	107	26	10	5	116	16	48 ×	36	3	317	50	
1873.....	67	4	6	1	55	6	53 ×	35	5	216	15	
1874.....	84	5	26	—	29	5	51 ^I × ×	1	—	191	10	
1875.....	42	—	13	2	28	2	41 ⁹ × ×	43 ^I	4	147	8	
1876.....	59	8	12	1	26	8	124	20	17	1	238	38
1877.....	109	27	81	9	22	2	114	19	32	7	358	64
1878.....	94	3	15	—	10	4	110	11	63	8	292	26
1879.....	enst.	x	28	×	5	3	52	13	41	11	126	27
1880.....	43	3	2	2	41	2	38	7	43	6	167	20
1881.....	34	3	15	4	26	2	16	4	32	10	123	23
1882.....	124	14	13	3	21	7	7	—	92 ^I	11 ^I	257	35
1883.....	35 × ×	85	15	15	1	11	4	56	6		202	26
1884.....	95	10	8	2	54	4	×	3	62	13	222	32
1885.....	87	4	15	1	24	—	64	17	39	5	229	27
1886.....	84	17	34	2	22	1	12 ×	33	2		185	22
1887.....	59	5	35	4	6	—	106	18	27	2	233	29
1888.....	53	4	31	1	11	3	65	11	19 ¹⁰ — ^I		179	19
1889.....	119 ^I	7 ^I	27	2	14	—	15	4	56 ²	4	231	17
1890.....	62	5	6	2	13	2	30	3	77	5	188	17

Hallands län.

Folkmängd 1865: 126,060; 1890: 136,106.

Tab. I. 21.

År.	Laholms st.		Halm- stads p. d.		Halm- stads st.		Falken- bergs p. d (1862).		Falken- bergs st.		Varbergs st.		Kungs- backa p. d.		Kungs- backa st.		Summa sjuke.	Summa döde.
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.		
1861.....	2	—	33	3	15	2			—	—	19	3					69	8
1862.....	3	—	3	—	16	3			1	1	4 ¹	1	28	1			65	6
1863.....	15	—	—	—	13	2	11	3	—	—	2	—	10	1			51	6
1864.....	1 ²	— ²	—	—	11	1	x		2	1	3	—	3	2			21	4
1865.....	15	—	I. ee.	x	15	2	—	—	11	2	x	1	41	3			83	8
1866.....	9	3	8	—	11	1	—	—	—	—	2	2	12	1			32	7
1867.....	—	—	ep.	x	20	—	43	8	14	—	7	2	19	5			103	15
1868.....	10	4	p. ee.	x	94	5	100	17	—	—	17	5	22	2	x	1	243	33
1869.....	1	—	p. ee.	x	148	18	131	14	11	1	36	6	62	2	1	—	390	41
1870.....	8	3	(103	8)	243	31	(103	13)	5	3	17	2	6	—	—	—	(485	60)
1871.....	2	1	allm.	x	34	5	26	2	14	4	24	—	—	—	—	—	106	12
1872.....	6	3	p. ee.	x	17	2	14		5	—	33	—	44 ¹⁰	4 ²	6	—	149	9
1873.....	4	—	p. ee.	x	22	2	21	1	9	1	49	8	56	6	—	—	161	18
1874.....	3	—	11	—	26	2	19	1	5	—	6	1	2	—	—	—	72	4
1875.....	3	1	16	5	54	1	x		x		24	6	14 ⁸	2 ¹	—	—	111	15
1876.....	—	—	26	16	11	—	x		x		—	—	28	2	5	—	70	18
1877.....	—	—	x ⁹	5 ³	20	—	4	—	x		—	—	124	6	1	—	149	11
1878....	1	1	38	5	3	—	8	—	x		1	—	36	3	—	—	87	9
1879....	12	—	x	13	—	—	4	3	3	—	2	2	18	2	1	—	53	20
1880....	7	—	13	9	3	—	21	2	6	—	14	2	22	1	—	—	86	14
1881....	4	—	55	13	10	—	51	6	x	6	3	17	2	4	—	147	24	
1882....	5	1	34	5	—	—	39	4	1	—	51	10	21	2	—	—	151	22
1883....	2	—	5+7	16	1	24	1	x	1	35	4	44	2	—	—	129	16	
1884....	11	1	3	3	3	1	63	10	1	1	30	6	40	4	2	1	153	26
1885....	4	2	1	—	2	—	73	11	—	—	27	2	18	—	—	—	125	15
1886....	7	1	23	1	3	—	24	—	—	—	1	—	17	1	—	—	75	3
1887....	1	—	19	2	8	1	25	4	—	—	2	1	24	4	—	—	79	12
1888....	4	—	21	2	7	—	23	3	—	—	3	2	22	3	—	—	80	10
1889....	4	—	17	1	11	3	31	x	1	—	26	1	53	3	14	1	157	9
1890....	—	—	25	—	1	—	25	1	1	—	3	2	34	5	8	1	97	9

Kristianstads län.

Folkmängd: 1865: 222,235; 1890: 221,691.

Tab. I, 22.

Malmöhus län.

Folkmängd 1865: 305,261; 1890: 368,817.

Tab. I. 23.

År.	Malmö p. d.		Malmö st.		Lunds st.		Eslöfs d. (1866).		Skurups d. (1880).		Anders- löfs p. d. (1861).		Trelle- borgs d. och st.		Åsums p. d.					
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.				
1861	44	21	110	8	39	2									22	8	17	2		
1862	spr.	12	57	10	62	9									spr.	10	?	19	1	
1863	31	10	37	2	33	2									4	2	2	—	42	2
1864	p.e.	26	69	12	56	9									?	24	5	44	4	
1865		175	41	270	29	221	31	allm.	×						spr.	—	18	2	11	2
1866		135	34	313	52	186	30	93	13						125	22	85	10	37	4
1867		106	26	35	3	48	9	31	2						109	48	116	11	65	5
1868		412	38	375	77	126	15	45	3						93	23	180	18	115	14
1869		31	1	130	21	25	4	8	2						98	15	102	12	58	6
1870		45	1	75 ²	16	16	5	20	2						24	15	75	3	24	3
1871		19	3	94	6	16	2	25	4						50	15	31	2	9	—
1872		49	2	132	12	42	6	29	1						37	×2	42	1	22	—
1873		60	2	114	15	47	3	70	3						47	×2	11	2	36	3
1874		49	7	175	21	51	2	36	4						41	×2	42	1	48	3
1875		39	6	158	21	31	4	46	5						24	3	30	3	14	1
1876		18	9	105	8	21	2	11	—						56	10	38	6	13	1
1877		48	12	57	13	14	3	13	1						73	3	35	1	31	—
1878		39	22	150	16	98	9	23	2						87	6	43	6	25	—
1879		33	12	48	11	73	11	13	3						218	13	33	1	30	—
1880		125	48	274	26	171	17	22	4	101	5	42	9	59	1	25	—			
1881		31	9	151	19	21	—	25	1	31	2	41	17	48	8	50	1			
1882		26	8	42	9	37	1	5	—	54	1	71	14	38	3	29	—			
1883		43	19	24	4	26	6	12	1	23	2	24	3	18	5	57	3			
1884		47	14	125	14	38	—	27	2	28	4	42	15	20	4	16	1			
1885		14	5	19	5	29	3	97	8	24	1	15	4	3	—	4	—			
1886		16	4	24	2	25	5	37	3	35	1	12	3	2	—	87	—			
1887		17	8	33	6	14	4	17	—	32	1	12	1	7	1	76	1			
1888		7	7	18	1	1	—	13	1	14	1	7	3	13	3	39	1			
1889		42	10	54	5	16	5	16	2	40	1	25	4	14	—	76	6			
1890		20	1	13	1	8	1	27	3	12	3	7	4	17	—	39	2			

Malmöhus län.

Folkmängd 1865: 305,261; 1890: 368,817.

Tab. I, 23. (Forts.)

År.	Ystads st.		Hörby p. d. (1861).		Lands- krona st.		Helsing- borgs p. d.		Helsing- borgs st.		Höganäs d.		Summa sjuke.	Summa döde.
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.		
1861	17	2			8	2	11	—	22	1	40	9	330	55
1862	13	1	3	—	13	4	13	1	64	2	—	—	266	50
1863	9	—	—	—	44	6	14	—	39	—	—	—	225	25
1864	(198	6)	9	2	53	9	16	—	93	5	25	7	613	85
1865	681	31	59 ⁴	3 ¹	301	27	16	2	188	5	12	2	(1,952	148)
1866	81	7	103	13	122	14	9	1	308	15	35	3	(1,632	218)
1867	56	8	23 ²²	7	58	11	47	8	76	3	84	8	(854	142)
1868	117	12	42 ³⁶	4 ⁷	161	14	66	5	256	12	49	5	(2,037	240)
1869	79	5	10 ³	— ¹	48	8	66	7	(138	6)	44	4	(837	91)
1870	13	4	7 ¹	1 ¹	37	9	64	6	(99	6)	10	1	509	72
1871	—	—	5	—	35	3	47 ²	6 ¹	(133	7)	— ⁴⁷	— ⁷	464	48
1872	4	2	45 ³⁵	— ⁷	61	6	84	10	206 ^{inst}	13	24	5	777	60
1873	7	3	3 ⁶	— ¹	35	5	104	14	155	13	14	3	703	68
1874	8	1	16 ¹	— ¹	48	8	55 ³	6	95	9	31	4	695	68
1875	7	1	14 ²	3	45	5	69	8	78	3	23	1	578	64
1876	—	—	20	7	8	1	81	9	81	15	15	5	467	63
1877	1	—	13	3	17	—	44	6	36	8	10	3	392	53
1878	61	1	6	1	99	11	54	7	81	9	3	—	769	90
1879	4	—	14	—	28	3	57	5	46	7	9	1	592	67
1880	—	—	87	10	17	1	69	8	41×10	5	—	—	1,038	145
1881	—	—	26	8	19	5	32	4	44	6	3	—	522	80
1882	—	—	7	3	21	1	92	5	38	4	40	7	500	56
1883	43	3	63	10	33	1	144	6	52	4	11	1	573	68
1884	62	7	21	4	21	4	98	8	42	5	11	3	598	75
1885	—	—	16	1	20	3	82	×	37	3	16	3	376	36
1886	—	—	39	9	19	4	36	4	33	4	5	—	370	39
1887	5	1	24	2	35	2	51	29	22	5	6	2	351	63
1888	18	2	4	1	14	—	12	9	24	3	8	2	192	34
1889	4	1	7+	—	18	2	37	6	66	5	50	9	416	56
1890	12	4	9	3	13	—	38	13	41	6	10	—	266	41

Blekinge län.

Folkmängd 1865: 125,436; 1890: 142,602.

Tab. I, 24.

År.	Karlskrona p. d.		Karlskrona st.		Ronneby p. d. och st.	Jemshögs p. d.	Karls- hamns st.	Sölves- borgs st.	Summa sjuke.	Summa döde.				
	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.	Sj.	D.						
1861	36	2	5	—	?	spr.	—	44	4	85	6			
1862	2	—	spr.	6	37	20	spr.	—	30	4	75	30		
1863	5	—	spr.	—	64	26	—	—	94	11	163	37		
1864	22	7	2	—	18 ⁶	7 ⁵	2	1	89	8	133	23		
1865	26	3	16	—	30	3	7	1	77	8	4	2	160	17
1866	169	16	139	22	11	3	42	2	41	6	3	—	405	49
1867	55	× 7	×	— ⁵	10	1	17	1	107 ¹⁰	4	3	—	192	13
1868	200	5+	20	3	32	4	177	13	297	16	5	—	731	41
1869	300	18	46	13	(393	60)	70	6	83 ⁴	6 ¹	10	4	(922	107)
1870	(116	(14)	(65	(15)	(90	(21)	13	3	42 ²	7	—	—	(327	60)
1871	66 ³	5	166	16	52 [?]	10	12	2	71 ¹	3 ¹	5	—	372	36
1872	189	22	141	14	×	—	70	8	52 ¹³	9 ¹	7	1	459	54
1873	56	4	12	3	5	—	16	5	38 ³	2 ²	3	1	130	15
1874	147	25	17	5	6	2	43	6	75	5	×	—	288	33
1875	147	9	53	6	20	7	36	7	94	7	×	—	350	36
1876	101	23	49	14	16 ³	2	×	24	72	3	1	—	263	66
1877	116 ⁶	14 ¹	18	4	32 ³	×	4	—	13	2	11	1	194	21
1878	195	20	164 ¹	: 16 ¹	56	× 1	34	3	13 ¹	1 ¹	8	—	470	41
1879	65 ⁷	7 ²	139 ⁴	8	16 ⁸	96 ²	21	×	11	2	—	—	311	46
1880	394 ³⁷	153 ¹⁷	36	7	51	5	ep.	×	36	7	1	—	518	172
1881	×	—	52	3	32	5	47	13	52	3	5	1	188	25
1882	19	× 1	45	2	339	16	×	7	45	2	12	3	467	31
1883	23	5	28	1	74	2	13	3	28	1	1	—	167	12
1884	36	11	30	—	44	3	7	—	30	—	3	2	150	16
1885	32	4	18	—	34	2	16	1	18	—	3	—	121	7
1886	51	5	35	3	65	8	17	3	35	3	7	3	210	25
1887	13	—	20	—	109	17	30	1	20	—	11	1	203	19
1888	29	4	25	—	383	27	3	—	25	—	1	—	466	31
1889	35	× —	29	1	68	11	30	14	29	1	2	—	193	27
1890	9	—	43	—	27	6	×	13	43	—	—	—	135	19

Gotlands län.

Folkmängd 1865: 53,165; 1890: 51,337.

Tab. I. 25.

År.	Slite		Visby		Visby		Hemse		Summa sjuke.	Summa döde.
	p. d.	Sj.	p. d.	Sj.	st.	D.	p. d. (1861).	Sj.	D.	
1861.....	14	1	13	—	10	2			37	3
1862.....	enst.	2	17	—	17	2			36	4
1863.....	39	5	8		17	1			64	6
1864.....	62	4	53	—	33	3			148	7
1865.....	11	2	spr.	—	30	1	2	3	44	6
1866.....	14+	x	10	—	62	11	38	5	124	16
1867.....	13	—	—	—	73	3	27	2	113	5
1868.....	99	x	46	4	187	8	60	4	392	16
1869.....	88	x	15	—	46	5	17	1	166	6
1870.....	52	x	56	3	—	x	52	2	160	5
1871.....	29	x	56	4	ep.	x	57	3	142	7
1872.....	22	x	48	4	22	x 3	10	1	102	8
1873.....	60	x	39	3	30	1	22	2	151	6
1874.....	31	x	108	10	69 ⁷	3	50	4	258	17
1875.....	38	x	119	10	49	4	86	6	302	20
1876.....	20	2	60	5	169	15	39	4	288	26
1877.....	23	x	53	5	33	7	16	2	125	14
1878.....	16	x	22	1	33	5!	7	1	78	7
1879.....	14	x	14	1	34	4	p. ee.	x	62	1
1880.....	19+	6	12	—	33	1	108	7	172	14
1881.....	8	1	2	—	23	—	51	5	84	6
1882.....	85	7	8	—	31	2	141	3	65	12
1883.....	14	4	9	—	36	5	71	4	130	13
1884.....	9	2	21	x	20	3	41	3	91	8
1885.....	26	3	9	—	20	—	32	3	87	6
1886.....	43	1	19	1	17	—	27	—	106	2
1887.....	63	2	29	1	28	—	11	—	131	3
1888.....	20	—	5	—	40	—	14	—	79	—
1889.....	76	1	21	3	52	—	33	1	182	5
1890.....	64	3	19	1	52	2	87	1	222	7

Hela antalet

af läkare rapporterade fall af tyloidfeber i Sverige åren 1861—1890¹⁾.

(Summa summarum af Tab. I, 1—25.)

Tab. I, 26.

Å r.	Summa sjuke.	Summa döde.	Å r.	Summa sjuke.	Summa döde.
1861	4,274	524	1876	6,101	795
1862	3,488	537	1877	5,459	699
1863	3,481	537	1878	8,267	908
1864	5,175	781	1879	5,259	671
1865	(7,307	887)	1880	6,799	923
1866	(8,242	1,427)	1881	4,778	583
1867	(9,452	1,343)	1882	7,467	731
1868	(19,941	2,484)	1883	5,893	568
1869	(18,530	2,141)	1884	6,560	763
1870	(10,890	1,515)	1885	4,610	485
1871	(7,097	964)	1886	5,796	590
1872	(8,647	1,067)	1887	4,765	530
1873	(9,189	1,064)	1888	3,755	346
1874	7,866	882	1889	7,263	612
1875	7,767	896	1890	4,253	420

¹⁾ Säsom flera gånger är påpekad, är tyloidfebern först sedan 1874 i rapporterna skild från fläcktyfus. För åren 1861—1873 hafva, så godt sig göra lätit med ledning af texten i rapporterna, fläcktyfusfallen af mig utgallrats. De inom parentes satta talen omfatta ett större eller mindre antal fläcktyfusfall, som icke kunnat utgallras.

Dödsfall i tyfoidfeber

(närvfeber) på 10,000 invånare i Sveriges län jämt Stockholms stad samt hela riket hvarje år under perioden 1876—1890.

(Dödsfallen enl. den officiella statistiken.)

Tab. II.

Län.	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890
Norrbottens län.....	1,9	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	3,8	1,5	5,5	1,4	1,3	1,9	2,6	6,9	3,3
Västerbottens	2,1	3,0	0,6	0,5	0,2	0,6	1,3	1,4	0,8	0,4	0,3	1,0	1,4	0,8	1,0
Jemtlands	0,7	0,6	0,8	1,1	2,3	1,2	1,9	0,8	1,3	0,8	2,1	0,8	2,0	1,5	1,1
Vesternorrlands	1,2	0,6	1,8	0,6	0,7	1,4	1,4	2,4	2,2	1,5	1,8	2,0	1,4	2,5	2,8
Gefleborgs	4,6	3,7	3,3	2,5	2,5	3,5	5,1	3,6	3,7	3,4	8,2	2,8	3,0	4,4	4,1
Kopparbergs	5,0	2,3	2,5	1,9	1,8	2,2	2,0	2,9	3,4	3,2	3,2	4,1	3,3	4,0	2,0
Värmlands	1,3	1,0	2,6	1,7	2,3	1,6	1,9	1,6	1,9	1,3	2,0	1,7	1,4	1,3	1,5
Vestmanlands	4,1	2,8	2,8	2,5	2,6	1,6	4,7	5,6	4,8	2,2	2,2	3,2	2,1	4,0	2,5
Örebro	2,7	1,7	3,1	3,5	3,8	3,2	1,9	2,0	3,2	2,4	3,0	3,2	2,6	2,0	1,7
Upsala	2,0	1,7	3,7	3,3	2,8	3,0	3,6	2,1	3,3	4,1	3,8	3,3	2,7	3,8	3,9
Stockholms	4,8	3,6	3,9	3,3	3,6	2,6	3,5	3,3	2,4	2,6	4,1	2,0	1,4	1,1	1,9
Stockholms stad	4,7	4,7	3,8	3,6	3,5	2,4	3,1	2,4	2,3	1,2	2,1	1,6	1,6	1,0	1,7
Södermanlands län.....	3,0	2,8	3,3	2,7	1,6	2,2	2,9	2,8	2,0	3,6	3,7	2,9	1,1	3,1	1,9
Göteborgs	3,0	2,5	2,6	2,3	2,1	2,5	2,5	2,4	2,4	1,8	2,4	2,2	1,7	2,5	1,2
Elfsborgs	2,1	1,5	4,9	1,8	1,5	1,3	1,6	1,3	1,8	1,2	1,5	1,3	0,7	1,5	1,0
Skaraborgs	1,3	1,7	3,3	1,8	2,2	2,8	2,6	1,7	1,5	1,3	1,1	1,7	1,3	2,6	0,8
Östergötlands	3,0	2,2	3,9	2,6	2,2	2,3	3,1	2,8	2,9	1,8	3,1	2,5	1,6	1,7	2,1
Kalmar	3,6	4,9	4,1	2,9	3,4	3,1	2,3	2,8	4,8	3,7	2,9	1,8	2,2	2,9	2,0
Jönköpings	2,0	1,5	4,4	1,6	2,4	1,3	2,0	2,0	1,9	1,7	1,1	1,1	1,1	1,8	1,5
Kronobergs	3,0	4,1	2,7	1,9	1,9	2,1	2,2	2,7	2,7	2,4	1,9	2,5	1,7	1,7	1,3
Hallands	2,6	2,3	2,4	1,8	2,6	2,8	3,3	3,3	4,1	2,1	1,4	1,5	1,2	1,6	4,5
Malmöhus'	4,2	2,9	4,5	3,7	5,4	4,0	4,4	4,1	5,2	3,3	3,2	2,7	2,5	3,4	2,9
Kristianstads	2,1	3,5	3,5	3,5	3,1	3,0	3,9	3,5	3,3	2,7	2,8	1,6	1,6	2,1	1,7
Blekinge	6,7	5,2	5,2	5,7	3,4	5,1	4,6	3,7	2,5	2,2	3,3	2,8	2,4	2,9	1,6
Gotlands	6,4	1,8	2,4	1,4	2,2	2,6	4,3	3,0	3,8	2,8	1,3	1,7	1,5	1,5	1,4
Hela riket	3,1	2,5	3,3	2,5	2,6	2,5	2,9	2,6	2,9	2,2	2,5	2,2	1,8	2,5	2,0

Anmärkningar till den grafiska kartan.

Å kartan äro en del extra provinsialläkaredistrikts, som visa en frekvens af tyfoidfebern, olika den, som förefinnes inom det eller de provinsialläkaredistrikts, af hvilka de utgöra en del, markerats med vederbörlig färg, ehuru deras *namn* ej stå utsatta.

Dessa extra provinsialläkaredistrikts och resp. moderdistrikts äro:

Ytter-Länäs' extra p. d., utgör en del af Sollefteå och Hernösands p. d.

Vifstavarfs	»	»	»	Sundsvalls och	»	»
Delsbo	»	»	»	Hudiksvalls	»	»
Bollnäs'	»	»	»	Alfta	»	»
Gysinge	»	»	»	Gefle	»	»
Dannemora	»	»	»	Tierps	»	»
Elfkarleö	»	»	»	»	»	»
Österåkers	»	»	»	Norrtelje	»	»
Ramnäs'	»	»	»	Vesterås	»	»
Linde	»	»	»	Nora	»	»
Ramsbergs	»	»	»	»	»	»
Ljusnarsbergs	»	»	»	Grythytte	»	»
Edsbergs	»	»	»	Örebro	»	»
Gillberga	»	»	»	Arvika	»	»
Finspongs	»	»	»	Tjellmo	»	»
Reijmyre	»	»	»	»	»	»
Lysekils	»	»	»	Håby, Uddevalla o. Orousts	»	»
Båstads	»	»	»	Halmstads och Engelholms	»	»
Höganäs	»	»	»	Helsingborgs	»	»
Klippans	»	»	»	Engelholms	»	»
Skurups	»	»	»	Anderslöfs	»	»
Trelleborgs	»	»	»	»	»	»
Eslöfs	»	»	»	Helsingborgs, Malmö o. Hörby	»	»
Stranda	»	»	»	Oskarshamns och Kalmar	»	»
Valdemarsviks	»	»	»	Tjists och Söderköpings	»	»
Torpa	»	»	»	Boxholms	»	»
Motala	»	»	»	Linköpings	»	»


Obs.! Af förbiseende har beteckningen af frekvensen inom Hede distrikt kommit att intaga äfven en del af Svegs distrikt. Beteckningen för Motala d. felaktig. Se sid. 40.

Taflla, utvisande antalet döde af tyfoidfeber (mänsfeber) i medeltal årligen 1876-1890 på 10000 invånare i Sveriges olika län, Stockholms stad samt hela riket.
Absoluta tal: dödsofforna i den officiella statistiken samt den årliga medefolkmängden.




Amin 1. 2 feta rutor i vertikal riktning representera 1 dödfall på 10000 invånare.

Amin 2 De punkterade linerna för Göteborgs och Blekinge län angifra dödotalen som beräknats
göra på grund af det secpoktiva är inräffade betydligare antalet dödfall af tyfus
exanthematiscus enligt läkarrapporter.



R



Karta
utvisande
TYFOIDFEBERNS

relativa frekvens

i Sveriges

aredis

aren

Ann. Om åren 1889-90 från-
riknas, erhålla de 3 nordligaste
distrikten följande utscende:

Papula: **1000** - 0.8700

Ö Falix: - 1,4700

Hapurunda :  - 2,6700

 9000-92 inst. of 10000 inst. + modelled actions

 $t_2 - t_1 = \tau$

$\sigma_0 = \sigma_1 = \dots = \sigma_n$

 $\hat{S}_x = \hat{S}_y = 0$ $\Rightarrow \hat{S}^2 = 0$

