

[On the medicinal properties of bebeerine. Russian] / [by Douglas Maclagan].

Contributors

MacLagan, Douglas, Sir, 1812-1900.
Royal College of Physicians of Edinburgh

Publication/Creation

St Petersburg : [Dr Brown], 1845.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/gsndp5tt>

Provider

Royal College of Physicians Edinburgh

License and attribution

This material has been provided by the Royal College of Physicians of Edinburgh. The original may be consulted at the Royal College of Physicians of Edinburgh, where the originals may be consulted.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



О

ВРАЧЕБНЫХЪ СВОЙСТВАХЪ.

БЕБИРИНА.

• Douglas'a Maclagan'a, изъ «Edinburg Medical
and Surgical Journal. April, 1845».

Printed by J. F. Macfarlane Esq.
L. K. Ward

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

—
1845.

Изъ Военно-Медицинскаго Журнала,
Часть XLV, No. 3, 1845.

R38319

Въ Апрѣлѣ 1843 года Dr. Maclagan сообщилъ Единбургскому Королевскому обществоу свои наблюденія касательно химическихъ и фармацевтическихъ свойствъ растенія, получаемаго изъ Британской Гвіаны, называемаго *Beebeeri* или greenheart tree, въ которомъ D. Rodie, (въ Гвіанѣ), открылъ присутствіе растительной щелочи и полученный имъ алколопдъ, который онъ назвалъ Beebeerine, обладаетъ, по его мнѣнію, противулихорадочными дѣйствіями (*virtus antiperiodica*).

Въ Августѣ того же года Dr. Maclagan помѣстилъ статью въ Cornack's monthly Journal о врачебныхъ свойствахъ beebeerin'a, гдѣ онъ описываетъ нѣсколько случаевъ, изъ собственной практики и сообщенныхъ ему другими, доказывающихъ противулихорадочное и тоническое свойство бебиринна, сходное съ хинною солью въ общихъ дѣйствіяхъ, съ тѣмъ различіемъ, что бебиринъ не возбуждаетъ кровоносной системы и не производитъ общаго раздраженія въ организмѣ.

«Намѣреніе мое,» говоритъ Dr. Maclagan, «представить медицинскому сословію новыя доказательства целебныхъ свойствъ этого вещества,

чтобы оно могло войти въ общее употребление
вместо хинина, если только дальнѣйшіе опыты
оправдаютъ его дѣйствительность.»

«Не говоря о частныхъ случаяхъ, доказываю-
щихъ цѣлебное дѣйствіе бебиринъ, я считаю не
излишнимъ сообщить напередъ нѣкоторыя свѣде-
нія, касательно естественной истории растенія и
его фармацевтическихъ свойствъ, полученные мною въ послѣдствіи.»

«Въ отчетѣ, представленномъ Королевскому
обществу, я говорилъ, что растеніе это мнѣ бы-
ло извѣстно и хотя оно причислено Hookerомъ,
Lindleyмъ и Schomburgkомъ къ естествен-
ному разряду Lauraceae, по ничего положительного
объ немъ не было извѣстно. Послѣ того я полу-
чилъ отъ Dr. Wath'a изъ Demerara экземпляры
этого растенія въ цвету; D. Shomburgk раз-
смотрѣвъ ихъ, подтвердилъ естественное мѣсто
нихъ въ разрядѣ Lauraceae, родъ—Nectandriae и
далъ имъ видовое название N. Rodiei, въ честь
Dr. Rodie, открывшаго врачебныя его качества.»

«Касательно химическихъ свѣденій дѣйствую-
щаго начала въ этомъ растеніи, многие опыты
убѣдили меня, что почтаемый мною второй ал-
калоидъ, подъ названіемъ Sipeerine, и что иное,
какъ продуктъ окисленія бебиринъ, и что въ
корѣ растенія содержится одинъ только алко-
лоидъ—bebeerine. Другія мои занятія помѣшали

мнѣ окончательно изслѣдоватъ его химіческія составныя части, вмѣстѣ съ Профессоромъ Til-leu въ Бирмингамѣ; но я надѣюсь скоро получить результаты изслѣдованія его въ Гисенской лабараторіи отъ Профессора Liebig'a, которому я послалъ сѣрнокислую соль этого алкалоида.»

«Особенно важно для насъ то, что въ приготовленіи этого средства для врачебнаго употребленія сдѣланы большія усовершенствованія, и я не могу умолчать о неусыпныхъ трудахъ Г. J. F. Macfarlane'a и его лаборанта Г. Brown'a касательно усовершенствованія качества и наруженаго вида этой соли; послѣдніе образцы этой соли доказываютъ вполнѣ успѣхъ химическихъ занятій этихъ ученыхъ.»

Главное обстоятельство, почему соль послѣдняго приготовленія имѣтъ преимущество предъ прежнею, состоить въ томъ, что въ ней удержано иѣсколько больше основаніе, отъ чего она не такъ легко разлагается при высушкѣ, какъ средняя или совершенно неутральная соль. Такая соль, подобно *disulphati chinini*, требуетъ только прибавленія иѣсколькихъ капель сѣрной кислоты для совершенного своего растворенія.

Сравнивая эту соль съ совершенной неутральною, оказывается, что составныя части въ обѣихъ соляхъ, тщательно высушенныхъ, находятся въ слѣдующей пропорціи: въ первой соли беби-

рпна 86,39 и сърп. кисл. 13,61; въ послѣдней бебирпна 90,83, кисл. 9,17.

Объ соли безводны. Приготовленная Macfarlane'омъ (которую я получилъ въ бумагѣ, вмѣсто стеклянки съ притертой пробкой), содержала 0,11° гигрометрической влажности. Г. Macfarlane полагаетъ, что препарать этотъ можно имѣть за 6 шиллинговъ унцію, что составляетъ менѣе половины цѣны хинной соли, которой унція стоитъ $12\frac{1}{2}$ шиллинговъ.

Въ Майскихъ книжкахъ Журнала «The Lancet» 1845, о сравнительной цѣнѣ этихъ двухъ веществъ также сказано, что сърнокислая соль бебирпна, приготовляемая Единбургскимъ Химикомъ Г. Macfarlane'омъ, лучшей доброты, стоитъ 6 шиллинговъ (2 руб. сер.) 5j, между тѣмъ-какъ хинная соль стоитъ слишкомъ 12 шл. 5j (4 руб. 15 коп. сер.). Касательно врачебнаго дѣйствія бебирпна этотъ журналъ говоритъ, что сорокъ прмѣровъ, приведенныхъ въ доказательство его благотворныхъ дѣйствій, достаточно убѣждаютъ, что бебирпъ въ однаковыхъ приемахъ съ хинною солью равное ей оказываетъ дѣйствіе на болѣзнь; но въ иѣкоторыхъ случаяхъ замѣчено, что онъ не производитъ, подобно хинину, непріятныхъ послѣдствій, какъ-то прливовъ крови къ головѣ и проч. Вещество это безъ всякаго сомнѣнія по своей дешевизпѣ и

драгоценнымъ дѣйствіемъ заслуживаетъ випманія врачей особенно тѣхъ, которые часто имѣютъ дѣло съ перемѣжающеюся лихорадкой.

«Весьма замѣчательно, » говоритъ Dr. Th. George Tilley, «что бебирипъ, которой обладаетъ такими явными противулихорадочными свойствами, въ пропорціи атомовъ по своему составу почти равенъ съ морфиемъ, чистымъ оглушающимъ средствомъ. »

Бебирипъ пынѣ приготавляется для продажи Г. Macfarlane'омъ въ Единбургѣ; изъ сѣрнокислой соли, имъ приготовленной, также можно получить чистое основаніе; для сего пзъ раствора сѣрнокислой соли въ водѣ основаніе осаждается амміакомъ, осадокъ смѣшивается со вновь осажденнымъ воднымъ окисломъ свинца и прибавляется достаточное количество воды для составленія тѣста, которое потомъ высушивается и распускается въ чистомъ алкоголѣ. Бебирипъ въ алкоголѣ растворяется, но онъ еще не совершенно чистъ; полученный чрезъ выпаривание спиртного раствора бебирипъ растворяется въ эфирѣ и снова выпаривается. Приготовленный такимъ образомъ въ чистомъ видѣ бебирипъ, если

обожгать съ окисью мѣди, то формула его будетъ слѣдующая:

	C. 72.21 . . 35 . . 72.11	
по опыту	H. 6.62 . . 40 . . 6.77	по разчи-
найдено.	N. 4.30 . . 2 . . 4.82	сленію.
	O. 17.02 . . 6 . . 16.30	

Такимъ образомъ формула бебирпна равна формулѣ морфія, и атомической вѣсъ ея также равенъ атомическому вѣсу послѣдняго. Числа, найденные нами для атомического вѣса платинаго состава бебирпна = 6330.2; а такого же состава морфія (по исчислению) = 6255.7; раздельное сходство между двумя тѣлами по вѣсу ихъ атомовъ.

Изъ этого можно вывести заключеніе, что чи-
сло и свойство элементовъ, изъ которыхъ со-
ставляются органическія тѣла, не могутъ слу-
жить поясненіемъ физиологического ихъ дѣйствія
на организмъ; въ этомъ случаѣ разница дѣй-
ствія явно зависитъ отъ одного расположенія
ихъ атомовъ.

«Касательно врачебной силы бебирпна,» гово-
ритъ D. MacLagan, «я на первый разъ ограничи-
ваюсь свидѣтельствами о его достопріятіяхъ, со-
общенными мнѣ изъ разныхъ мѣстъ, и доволенъ

тѣмъ, что до сихъ поръ я не встрѣтилъ ни одного случая, который могъ бы поколебать мое обѣніе мнѣніе и я увѣренъ, что бебирина, по его целебной силѣ, какъ *remedium antiperigordicum et tonicum*, между врачебными средствами получитъ со временемъ перевѣсъ надъ сѣрнокислымъ хинномъ, по дороговизнѣ послѣдняго. »

« Прежде, » говоритъ Г. Maclagan, « я сообщу случаи, доказывающіе дѣйствіе бебирина въ послабляющихъ и перемѣжающихъ лихорадкахъ, съ таблицею всѣхъ случаевъ, миѣ известныхъ; а потомъ перейду къ употребленію его въ периодическихъ головныхъ болѣзняхъ, первыхъ страданіяхъ и проч. »

ПЕРЕМЕЖАЮЩІЯ И ПОСЛАБЛЯЮЩІЯ ЛИХОРАДКИ.

D. Watt въ Georgetown'ѣ въ Demerara, котораго первыя наблюденія сообщены мною въ 1843, доставилъ ко миѣ слѣдующія свои дальнѣйшія наблюденія.

Прильпъ 1. *F. quotidiana*. Josephina Pereira, урожденная изъ о. Мадеры, 38 лѣтъ, въ Demerara 4 года, съ пріѣзда своего въ эту страну имѣла часто припадки перемѣжающейся лихорадки. Она работаетъ на сахарныхъ план-

таціяхъ и кормилъ 4 мѣсячнаго, груднаго младенца.

27-го Ноября 1843. Она получила лихорадку 24-го числа въ 10 часу утромъ, которая возвращалась ежедневно въ томъ же часу, со рвотой. Прописано colomel et jalap. Желчи со рвотою сегодня не было; языкъ чистъ; пульсъ 116. Назначено 12 gr. бебирина вечеромъ и такой же приемъ въ 6 часовъ завтра утромъ.

28-го. Лекарство вечеромъ принято, но утромъ больная не успѣла принять его по случаю пароксизма; назначено 12 gr. бебирина вечеромъ и 12 gr. рано по утру.

29-го. Приняты оба приема, какъ сказано. Лихорадка сегодня въ обыкновенное время не возвращалась; больная пошла на рѣку мыть дѣтское бѣлье. Въ полдень опять лихорадка; больной вѣдьмо сидѣть дома и принимать по 12 gr. бебирина утромъ и вечеромъ.

1-го Декабря. Лихорадка не возвращалась ни вчера, ни сегодня; всего принята 3j бебирина; больная не чувствовала ни шуму въ ушахъ или въ головѣ, ни глухоты. Съ тѣхъ поръ лихорадки не было.

Примѣръ. II. *F. tertiana*. Maria de Jesus изъ

о. Мадеры, 4 года въ колоніяхъ, страдаетъ по временамъ перемѣжающеюся лихорадкой, которая возвращается обыкновенно черезъ день.

29-го Декабря 1843. Третьяго дня имѣла пароксизмъ перемѣжающейся лихорадки въ другой сегодня. Во время ознона вышло съ рвотою много желчи; пульсъ 120; кожа горяча и суха, назначено тотчасъ gr. x. colomel. съ xxv gr. jjalap. и потомъ 12 гранъ бебирина на ночь; на другой день по 12 гранъ бебирина утромъ и вечеромъ.

31-го. Больная приняла лекарство, какъ сказано; тридцать шесть гранъ бебирина не оказали никакого влияния на голову. Какъ сегодня день лихорадочный, то назначено опять принять тотчасъ 12 гранъ бебирина.

Лихорадка съ тѣхъ поръ болѣе не возвращалась.

Прилѣпъ III. *Hypertrophialienis et febris.*
Посѣда Brío, изъ о. Мадеры, около 3 лѣтъ въ колоніи; часто страдалъ перемѣжающимися лихорадками; лицо истощенное, блѣдное, селезенка чрезвычайно велика и простирается внизъ до праваго подвздоха.

3-го Генваря 1844. Въ 5 часовъ пополудни, третьаго дня, былъ лихорадочный пароксизмъ,

который продолжался всю ночь ; утромъ вчера прервался, но опять возвратился въ 5 часовъ вечера и продолжался во всю ночь. Кожа (10 ч. утра) влажная ; пульсъ 90, малъ и мягокъ; языкъ нечистый; желудокъ раздраженъ; назначено тотчасъ рвотное и calomel. gr. x на ночь; завтра утромъ Jalap. xxv gr.

5-го Генваря. Принялъ рвотное ; но какъ лихорадка только перемѣжалась и къ вечеру 3-го числа возвратилась съ большею силою, то больной не принялъ ни каломелю, ни ялапы. Вчера была перемѣжка до полдня, но къ вечеру опять пароксизмъ. Сегодня также перемѣжка къ утру; въ 1 часу по полудни кожа горяча и суха, пульсъ 116. Назначено opii gr. vj; tartari emeticici gr. j; calomel. gr. x. M. et divide in IV pilul. Одну пиллюю каждые 6 часовъ, пока продолжается лихорадка.

6-го Генваря. Лихорадка продолжается въ однаковой силѣ, кожа иногда влажна, иногда суха, всегда горяча; больной жалуется на боль при прижатіи селезенки. Назначенъ нарывной пластырь на селезенку ; остальную пиллюю принять теперь, а два часа послѣ — jalap. 3j, и къ ночи 12 гранъ бебирна.

7-го. Лихорадка продолжалась вчера до вечера, больной не позволилъ поставить мушку, но принялъ всѣ лекарства; вышло много желчи. Назначены 12 гранъ бебирина два раза въ день.

8-го. Лихорадка не возвращалась. Приняты только два пріема бебирина вчера и третій сего-дня рано утромъ. Больной спалъ не много ночью, чувствуетъ себя лучше, но очень слабъ. Назначены 12 гранъ бебирина въ полдень; позволено не много вина и супу.

10-го. Лихорадки небыло; языкъ очищается; селезенка мягче, меньше и не чувствительна, назначено jalap. xxxv gr. и 3j cметог. tartari. Принятое количество бебирина не оказалось никакого влиянія на голову, больной выздоровѣлъ.

Прилѣпъ IV. Julio de—, изъ о. Мадеры, 12 лѣтъ, страдалъ febri congestiva въ Августѣ и былъ въ безчувствіи два дня.

Въ Генварѣ 1844. Имѣлъ недавно febrem tertianam; получалъ бебиринъ въ тѣхъ же пріемахъ, какъ дается хининъ и лихорадка совершенно прошла. Замѣчанія и подробности этого случая не известны.

Прилѣпъ V. *F. intermitt. biliosa*. Г. William (С., уроженецъ изъ Шотландіи, 20 лѣтъ, около

четырехъ лѣтъ въ колоціп въ качествѣ надзирателя полевыхъ работъ, и потому постоянно подверженъ солнечному жару и непогодѣ, два года назадъ страдалъ желтою горячкою, въ сильной степени; но съ тѣхъ поръ совершенно здоровъ.

Апрѣля 15-го. Около половины 11 часа сего дня вдругъ на полѣ почувствовалъ лихорадку, съ желчною рвотой, но безъ явнаго озноба; въ 3 часа пополудни сильно потѣль; пульсъ 120, пурпурный; жестокая боль надъ лбомъ, моча сильно окрашена желчью; языкъ покрытъ корою. Назначены 4 пилюли ех massæ colocynth. gr. xvij, calomel. gr. xjj и на утро полный пріемъ sulphatis magnesiae.

16-го. Утромъ ни лихорадки, ни головной боли не было; испражненія сначала темно-зеленые, послѣ желтые; моча очень красная; лекарства еще дѣйствуютъ.

17-го. Вчера въ три часа по полудни лихорадка возвратилась безъ явнаго озноба; данъ опять пріемъ sulph. magnesiae; испражненія очень желчны, моча такая же. Въ 11 часовъ утромъ лихорадочный пароксизмъ продолжался почти часъ; въ это время съ рвотою вышло много желтой желчи. Въ 1 часу кожа горяча и суха;

пульсъ 120, полный; жестокая головная боль во лбу. Назначено примачивать голову чаще уксусомъ съ водою и надъ бровями мокрыя ветошки. Внутрь:

*Rp. Sulph. bieber. Эjj et gr. vjjj ; calomel.
gr. xxjv. Mucilag. g. arabic. q. s. ut. st.
massa, in pilul. xjj dividenda, Sr.*
принять три пилюли, спустя два часа послѣ лихорадки, три вечеромъ и три завтра утромъ.

18-го. Вчера потъ начался въ четыре часа, лихорадка прошла часовъ въ 7 по полудни. Больной принялъ, какъ предписано, всѣ 9 пилюль; почью спалъ хорошо; боли и тяжести въ головѣ не было, равно какъ и звону въ ушахъ, языкъ нечистъ; отъ пилюль три раза слабило, моча не такъ темна. Назначено 45 gr. jalap. cum cremenore tartari.

19-го, 7 часовъ утра. Лихорадки не было; слабительное мало дѣйствовало, отъ того, что спустя полчаса послѣ приему порошка, больного вырвало. Спалъ почью спокойно, показался appetitъ, пульсъ 80, натуральный; языкъ еще покрытъ зеленоватою слизью; цвѣтъ мочи теменъ, глаза желтоваты. Назначены три пилюли изъ бебрина и каломеля.

1 часъ по полудни. Послѣ завтрака, изъ двухъ яицъ, чаю и поджаренного хлѣба, больной почувствовалъ полноту и тягость въ желудкѣ, тошноту и спльное беспокойство.

5 часовъ по полудни. Скоро потомъ показалась рвота, съ которой вышли яйца и все прочее; въ 2 часа снова показалась лихорадка и вслѣдъ за тѣмъ обильная испарина. Пульсъ 84, полный; непріятное чувство полноты въ верхней части живота; глазные бѣлки желты, моча также окрашена желчью. Назначено промывательное, три пилюли изъ бебирона и каломеля на ночь, и три на другой день утромъ.

20-го. Больной въ 24 часа принялъ 36 гранъ бебирона. Звону въ ушахъ и глухоты небыло, равно какъ и непріятного чувства въ головѣ; пульсъ 80, мягкий; кожа влажная; сонъ хороший; промывательное осталось безъ дѣйствія и больной еще жалуется на полноту въ животѣ. Назначено sulph. magnesiae, по желанію самаго больнаго. Три пилюли бебирона съ каломелемъ вечеромъ и три на другой день утромъ.

22-го. Кромѣ назначенныхъ лекарствъ, утромъ еще приемъ sulph. magnesiae; глаза и моча не такъ желты; пульсъ и кожа въ есте-

ственномъ состояніи, десны чувствительны отъ каломеля; позывъ на пищу; съ 17-го числа не было лихорадки, за исключениемъ слабаго приступа послѣ погрѣшности въ діэтѣ 19-го числа.

23-го. Больной поправился и 29-го возвратился къ прежнимъ своимъ работамъ.

Мая 6-го больной былъ на полевыхъ работахъ, гдѣ отъ дождя промокъ до костей и почувствовалъ сильную боль въ головѣ. Въ полдень 7-го числа появилась лихорадка и повторялась въ тѣ же часы вчера и сегодня; приступы продолжались отъ двухъ до трехъ часовъ каждый разъ; языкъ блевоватъ.

Rp. Mass. pilul. coloc. compr. gr. xvij;
Colomelis gr. x; M. ft. pil. No. jv. dr. sr.
на одинъ приемъ, и на утро — приемъ *sulph. magnesiae.*

10-го. Пилюли и соль хорошо дѣйствовали; лихорадка возвратилась въ полдень четвертымъ, ежедневнымъ пароксизмомъ.

Rp. Sulph. bebeer. Эjj, Mus. gum. ar. q. s. ut fiat massa, in pil. No. xjj dividenda. sr.
три пилюли на ночь, три въ 6 часовъ и три въ 10 ч. утра слѣдующаго дня.

11-го. Больной принялъ двадцать пилюль;

лихорадка появилась въ полдень ; это былъ пятый пароксизмъ. Принять три оставыя пилюли рано утромъ, на слѣдующій день.

13-го. Лихорадки не было ни вчера ни сего-дня.

Іюля 1-го болѣй выздоровѣлъ.

Слугай VI. Докторъ F. въ Декабрѣ прошлаго года имѣлъ сочувственную лихорадку отъ парыва, противъ которой ему совѣтовали принимать хининъ, во время перемѣжекъ, что онъ и дѣлалъ три дня сряду; но послѣ каждого пріема, часа два спустя, все тѣло его покрывалось крапивною сыпью, продолжавшеюся 6 часовъ, съ не-сноснымъ зудомъ и беспокойствомъ.

Въ Генварѣ ему опять присовѣтовали принять полные пріемы хинина (10 гранъ), предполагая что появленіе крапивной сыпи, при прежнемъ употребленіи, могло зависѣть отъ не подлежащаго качества хинной соли, приготовленной въ Филаделфії; онъ обратился къ Французскому хинину разныхъ пріготовленій, но крапивная сыпь не переставала появляться за каждымъ пріемомъ, хотя послѣдній былъ не болѣе 6 гранъ. Это повторялось шесть или семь разъ.

4-го Февраля F. имѣя надобность въ подоб-

номъ лекарствѣ, рѣшился замѣнить его sulphuric acid, котораго онъ принялъ 10 гранъ, съ сахаромъ. Послѣ этого пріема крапивная сыпь не показывалась и бебирипъ оказалъ полное дѣйствіе, какое обыкновенно производилъ хининъ въ прежнихъ случаяхъ. Съ тѣхъ поръ онъ принималъ еще бебееринъ въ разныхъ промежуткахъ, три раза, и всегда съ полнымъ успѣхомъ и крапивной сыпи не было никакихъ слѣдовъ. Однажды онъ принялъ 14 гранъ бебирипа въ разъ и не почувствовалъ послѣ того ни звону въ ушахъ или въ головѣ, ни какого либо другаго непріятнаго чувства, какъ это всегда случается послѣ большихъ пріемовъ хинина.

Прилипаніе. Хининъ въ полныхъ пріемахъ обыкновенно производитъ непріятные припадки. Больной отъ него чувствуетъ какъ бы полноту въ головѣ, тупость въ понятіяхъ, звонъ въ ушахъ, глухоту; обнаруживается часто чувствительность во всей первной системѣ, конечности до того иногда дрожатъ, что больной не можетъ держать пера въ рукахъ. Припадки эти въ большей или меньшей силѣ обыкновенно являются послѣ полныхъ пріемовъ хинина, т. е. гранъ 20 или 30 въ сутки; а меньшимъ коли-

чествомъ едва ли можно остановить перемѣ-
жающуюся лихорадку. Хининъ такъ же сильное
оказываетъ вліяніе на кожу и на желчныя пути,
увеличивая отдѣленіе испарны и желчи; отъ
того небольшой излишекъ припятаго хинина ино-
гда производитъ холодный потъ, упадокъ пульса
и значительное раздраженіе въ желудкѣ. «Во
всѣхъ подобныхъ случаяхъ, которыя мнѣ слу-
чалось видеть,» говорить Dr. Watt, «больные
принимали хининъ безъ мѣры и потому не воз-
можно было опредѣлить его количества; но вѣ-
роятно все количество въ продолженіи двадцати
четырехъ часовъ не превышало 40—45 гранъ.
Впрочемъ въ желтой горячкѣ въ этой странѣ
(въ Индіи) D. Smith и многіе другіе врачи давали
съ большимъ успѣхомъ отъ 20 до 24 гранъ хи-
нина съ каломелемъ каждые четыре часа, пока
горячка не уступала, безъ всякихъ отъ того не-
пріятныхъ припадковъ. Кажется, хининъ дѣй-
ствуетъ по закону подобному кровопусканию, какъ
объясняетъ Dr. Marshall Hall: чѣмъ большая
потребность въ хининѣ, тѣмъ большее количе-
ство его организмъ въ состояніи выдерживать,
безъ всякаго нарушенія отправленія первой сис-
темы, и на оборотъ, чѣмъ меньше надобности

въ немъ, тѣмъ меньшее количество оказываетъ уже вліяніе. Шесть или семь гранъ, принятыхъ внутрь для предупрежденія лихорадочного пароксизма, большою частью причинять звонъ въ ушахъ; между тѣмъ какъ тройное количество потребуется для возбужденія такого пріпадка, если принять хининъ во время пароксизма. »

« Если дѣйствіе бебирина въ перемѣжающихся лихорадкахъ такое же, какъ и хинина, въ чёмъ, кажется, нельзя уже сомнѣваться; то бебиринъ на своей сторонѣ имѣетъ уже то преимущество, что онъ не тяготитъ головы и гораздо меньше раздражаетъ первую систему и, сколько до сихъ поръ известно, вовсе не раздражаетъ желудка и не производитъ холоднаго пота. Въ случаѣ V, где Г. С., принялъ 95 гранъ бебирина въ три дня съ половиною, я бы не рѣшился» говоритъ Dr. Watt «дать столько хинина, опасаясь холоднаго пота, упадка пульса и раздраженія въ желудкѣ, тѣмъ болѣе при скопленіи желчи, когда пріпадки эти скорѣе являются отъ приемовъ хинина.» Dr. Watt подозрѣваетъ, что противулихорадочное дѣйствіе бебирина нѣсколько медлѣюще, какъ видно изъ примѣра I, где лихорадка возвратилась тогда, когда при употребленіи хинина организмъ находился

бы еще подъ его вліяніемъ; также, въ примѣрѣ V, гдѣ лихорадка возвратилась, когда слѣдовало бы еще организму находиться подъ вліяніемъ бебирина; но въ обоихъ этихъ случаяхъ причина вторичной лихорадки могла зависѣть отъ самыхъ больныхъ; одинъ разъ вышелъ на воздухъ, другой погрѣшилъ въ діэтѣ. Если дальнѣйшія наблюденія подтвердятъ это подозрѣніе въ дѣйствіи бебирина, то не объясняется ли оно тѣмъ, что хининъ дѣйствуетъ прямо на первую систему, а бебиринъ посредствомъ кровоносной, и потому, быть можетъ, противулихорадочное дѣйствіе бебирина будетъ болѣе постоянное и гораздо надежнѣе? Мышьякъ, какъ известно, прекращаетъ лихорадку не ранѣе 10 или 12 дней, но онъ гораздо постояннѣе въ своемъ дѣйствіи, чѣмъ хина; не можно ли ожидать подобнаго явленія отъ бебирина?

Приимѣніе. Dr. Macfarlane замѣтилъ, что бебиринъ будучи принятъ на ночь, всегда оказываетъ слабительное дѣйствіе утромъ, что замѣтили и другіе практики, особенно въ значительномъ приемѣ, 12 или 15 gr., дѣйствуетъ одинъ разъ легко и безъ всякой боли. Дѣтямъ опь давали его, какъ remedium tonicum, въ малыхъ

пріемахъ. Когда хининъ даютъ противу лихорадки въ значительныхъ пріемахъ въ промежуткахъ, то рѣдко является другой пароксизмъ послѣ такихъ пріемовъ; но послѣ бебирна часто одинъ пароксизмъ повторяется, но другаго не бываетъ; это надобно помнить, ибо многіе не повѣрятъ его дѣйствительности.

Въ Августѣ 1843 года Г. Maclagan послалъ Dr. Nicolson'у, Инспектору госпиталей въ Мадрасѣ, нѣсколько упцій sulphatis bebeerinі и полу чилъ отъ него слѣдующіе результаты опытовъ, произведенныхъ врачами, принадлежащими колоніи.

ШЕСТЬ СЛУЧАЕВЪ ЛИХОРАДОКЪ, ВЫЛЕЧЕННЫХЪ
БЕБИРИНОМЪ.

Febris intermittens quotidiana. James Templeton, 25 лѣтъ, сангвническаго темперамента, бумажно-предпильникъ, проживающій въ Индіи четыре года и три мѣсяца, 20 Ноября 1843 прибылъ въ полдень; въ два предыдущіе дни имѣлъ лихорадочный пароксизмъ въ 10 часовъ утра; ознобъ былъ непродолжительный, съ послѣдующею головною болью и сильнымъ жаромъ, но умѣреннымъ потомъ. Больному дано рвотное, потомъ

дракма pulv. gr. jalappaе смт infuso sennae ʒjj; вечеромъ пожная ванна и черезъ 2 часа по ʒj mixt. diaphoret.; назначенъ легкий супъ.

21. Рвотное и слабительное хорошо действовали, ночь спалъ дурно, лихорадки пѣтъ, пульсъ спокойный, кожа мягка, языкъ чистъ, аппетиту пѣтъ. Больному назначено Sulph. bebeerinі gr. v. cum ext. gentian. и въ десятомъ часу такой же приемъ во второй разъ. Вечеромъ легонькая лихорадка въ 9 часовъ; пароксизмъ неправильный; испражненіе свободное; языкъ чистъ. Назначены еще двѣ пилюли.

22. Супъ хороший; лихорадки пѣтъ; языкъ чистъ; пульсъ правильный. Назначено припять то же число пилюль, какъ и вчера и легкая пища; вечеромъ лихорадки не было.

23. Пароксизмъ не возвращался, лекарства тѣ же и въ тѣхъ же самыхъ приемахъ.

24. Испражненія свободны; большой почтп здоровъ; бебринъ оставленъ; назначено три раза въ день припять по ʒjj inf. gentianae.

25. Большой выздоровѣлъ.

Febris remittens. James Barber, рядовой, 21 года, тѣлосложенія крѣпкаго, въ Индіи годъ

два мѣсяца. 24-го Ноября 1843 года, въ казармахъ почувствовалъ вдругъ болъ во всемъ тѣлѣ, съ лихорадочными пріпадками; пульсъ обыкновенный; кожа жесткая; языкъ нечистъ; худой аппетитъ и жажда. Назначено haust. emeticus, потомъ calomel gr. vj; pulv. jalap. ssom. 5j; и за тѣмъ mixt. diaphor. 5j каждые два часа; теплая ванна и легкая пища.

25. Больного слабило; послѣ ванны потѣль и спалъ покойно; аппетиту пѣтъ, пульсъ спокойный; кожа влажна, мягка, языкъ бѣловатъ. Назначено ssulph. bebeerini gr. v. cum extr. gentian. каждые три часа, продолжая, смотря по надобности, и mixt. diaphoret.

26. Лихорадки вчера не было, больной спалъ хорошо; свободно наизъ; аппетитъ поправился; пульсъ покойный; языкъ чистъ. Плюли и діэта тѣ же, какъ и вчера.

27. Лихорадки не было; испражненія жидкая; языкъ чистъ; сонъ хорошъ. Лекарства по прежнему.

28. Больной поправляется; назначено infus. gentianae.

29. Тоже.

30. Большой выздоровѣль.

Febris remittens. James Axford, рядовой, 23 лѣтъ, полнокровнаго сложенія, въ Индіи четыре года. 27-го Ноября 1843 года, жаловался на лихорадку, начавшуюся вчера вечеромъ; онъ спал на сквозномъ вѣтру въ казармахъ. Общее состояніе здоровья хорошое; послѣдній разъ былъ боленъ поносомъ въ Іюлѣ 1842. Пульсъ полный, крѣпкій, головная боль, жаръ, печистый языкъ, запорт на пизъ. Назначено кровопусканіе $\frac{3}{4}$ xxiv., haust. emeticus.; потомъ calom. gr. iv.; pulv. jalap. com. 3i; слабая діэта.

28. Головная боль легче; рвотное оказалось свое дѣйствіе, слабило на пизъ два раза, сонъ хорошъ и больной чувствуетъ себѣ лучше. Пульсъ 78, кожа мягка, языкъ блѣдъ, жажды. Назначена mist. sennae $\frac{3}{4}$ jv. и плюли ex sulphurbebeerrini. gr. v. cum extr. gentian. каждые четыре часа.

29. Лихорадки не было, испражненія свободны, пульсъ спокойный, кожа мягка, языкъ чистъ, аппетитъ хороший. Лекарства тѣ же; діэта слабая.

30. Больной совершенно выздоровѣлъ.

Febris intermittens quot. John Jerrold, рядовой,

23 лѣтъ, темперамента сангвинического, работникъ въ Индіи три года и три мѣсяца.

29-го Ноября 1843, въ 3 часа по-полудни почувствовалъ дрожь и жаръ, продолжавшіеся поочередно въ продолженіи почти трехъ часовъ, безъ всякой причины; пульсъ правильный; кожа мягкая, языкъ блевовать; подобные приступы болѣзни были у него въ прошломъ мѣсяцѣ. Назначенъ: haust. emeticus; потомъ calomel gr. v. c. pulv jalap. com. 5j. и пожная ванна.

30. Рвотное и слабительное дѣйствовали, какъ слѣдуетъ; большой спалъ крѣпко, лихорадки нѣтъ; пульсъ 76; кожа мягка; языкъ очищается. Назначено sulph. bebeerinі gr. v. каждые 4 часа и, смотря по надобности, mist. diaphor.; диэта слабая.

Декабря 1. Пароксизма не было, испражненія свободны, спалъ хорошо. Лекарства тѣ же.

2. Пароксизма не было, испражненія свободны, спалъ спокойно, языкъ чистъ, пульсъ правильный, кожа влажна, аппетитъ поправился. Лекарство по прежнему.

3. Лихорадки нѣтъ, испражненія свободны, языкъ чистъ, аппетитъ хороший. Бебринъ оставленъ и назначено infus. Gentian. 5ij, ter de die.

4. Больной поправляется, лекарство то же.

5. Больной изъ госпиталя выписанъ.

Febris intermittens quot. James M'Chrink, рядовой, 28 лѣтъ, флегматического темперамента, корабельный кузнецъ, въ Индіи три года и три мѣсяца. 22-го Ноября 1843, поступилъ въ 6 часовъ по-полудни съ блѣднымъ, изнуреннымъ видомъ; около 10 часовъ утромъ онъ имѣлъ сильный лихорадочный пароксизмъ. Полтора года назадъ, по его словамъ, онъ страдалъ перемѣжающейся лихорадкою, которая прошла послѣ употребленія рвотныхъ, слабительныхъ и пивницъ къ вискамъ.

Ему давали по 15 gr. sulph. bebeerini въ пипеткахъ, ежедневно, до 25-го Ноября; по послѣ того воспаленіе въ печени помѣшало въ теченіи трехъ дней употребленію этого средства.

28 Ноября лихорадка возвратилась безъ озно-
ба и опять 29-го.

Десны и полость рта сдѣлались чувствительны отъ принятыхъ средствъ противъ воспаленія печени. Бебиринъ онъ продолжалъ до 8 Декабря, потомъ выпущенъ изъ госпиталя, и съ тѣхъ поръ лихорадка не возвращалась.

Febris cont. Joshua Richards, рядовой, 24 лѣтъ, темперамента сангвинического, сапожникъ,

въ Индіи 4 годъ. 29-го Ноября 1843, поступилъ въ госпиталь въ 6 часовъ утра; вечеромъ на капунѣ почувствовалъ ознобъ, за пимъ головную боль, жаръ и жажду. Ему назначено по 15 gr. sulph. bebeerini въ день. 11 числа лихорадка возвращалась съ приливомъ къ головѣ, и потомъ опять 12-го числа. Этотъ приемъ бебрина онъ получалъ ежедневно въ то время, когда лихорадочные припадки утихали; 10 дней же возвращалась лихорадка. По возвращеніи къ занятіямъ она опять появилась, но какъ все количество бебрина было израсходовано, то принуждены были замѣнить ею хининомъ.

Ни въ одномъ изъ этихъ случаевъ бебрина не причинилъ шуму въ ушахъ.

Кампти, 19-го Генваря 1844 года.

Подписано: J. Dempster M. D. врачъ Н. М.
21-го Фузиллеровъ.

(Отзывъ J. Dorward'a, врача 13-го пехотнаго полка, къ Г. Секретарю Медицинскаго Совета въ Мадрасъ.

Употребивъ небольшое количество sulphatis bebeerini, присланное миъ для испытанія, въ лих-

радкахъ міазматического происхождения, я представляю краткий отчетъ тѣхъ случаевъ, гдѣ онъ былъ употребленъ.

Должно замѣтить: 1) что хотя бебиринъ больные принимали во время самой лихорадки, въ одномъ только случаѣ обнаружились головные припадки, и то на короткое время; 2) что онъ возбуждаетъ испарину, успокаиваетъ лихорадку и останавливаетъ лихорадочные движения (exacerbationes); 3) что онъ оказываетъ, по видимому, особенное влияніе на кишечные испражненія, перемѣня ихъ въ кирпично-красный цветъ. Впрочемъ цветъ этотъ въ испражненіяхъ рѣдко бываетъ при лихорадкахъ послабляющихъ, потому нельзя на всѣмъ утверждать, что онъ зависитъ отъ бебирина.

Не смотря на ограниченное число опытовъ, я совершенно убѣжденъ, что бебиринъ составляется превосходное лекарство въ перемѣжающихся лихорадкахъ и совершенно можетъ замѣнить хининъ.

Febris remittens. Veerasaumy, 24 лѣтъ, Серу, принадлежащей компаніи, художаваго тѣлесложенія, 12-го Декабря 1843 поступилъ въ госпиталь въ 6 часовъ утра, съ лихорадкою, кото-

рою боленъ два днѧ, съ частыми ознобами, головокружениемъ и большой слабостью, кожа горячая, пульсъ скорый, глаза красныя, языкъ красный. Назначено внутрь: pulv. r. iressae. Эj tartarat. stibii et potas. gr. j. M. f. pulv.; потомъ pulv. jalap. comp. 3j.

13. Вечера послѣ дѣйствія лекарства лихорадка была легче, но къ ночи сильный лихорадочный пароксизмъ, съ бредомъ послѣ озноба; кожа суха и горяча, пульсъ скорый, большая жажда, болей нигдѣ не чувствуетъ, попятія ясныя. Внутрь данъ порошокъ ялапы съ каломелемъ.

Rp. Liq. ammoniae. acet. 3j.

tartarat. stibii et potass gr. ij.;

mixturae camph. 3ij. M.

принимать по 3j каждые три часа.

14. По временамъ ознобъ, лихорадка и тихій бредъ ночью. Вчера сильно слабило на пизъ; головные и лихорадочные припадки успокаиваются. Назначено принимать сѣрнокислый хининъ, каждый часъ по два грана.

15. Спалъ спокойнѣе, безъ бреда; сухость и жаръ кожи продолжаются, съ ознобомъ; значительная слабость. Хинную соль назначено продолжать.

16. Ночью сильный лихорадочный пароксизмъ, съ бредомъ, который еще и утромъ продолжался, когда больной однѣ; жалуется на дрожь, кожа суха и горяча, губы сухія, языкъ сухъ, испражненія свободны. Назначена шпанская мушка на затылокъ и внутрь бебирина по 10 гранъ утромъ и послѣ обѣда.

17. Лихорадка легче. Чрезъ три часа послѣ первого приема бебирина, который сильное оказалъ вліяніе на мозгъ, наступилъ сильный приступъ, почему второй приемъ не данъ. Мушка хорошо дѣйствовала, больной спокойно спалъ и всталъ веселѣе. Назначены тѣ же два приема бебирина.

18. Лихорадки не было болѣе; кожа еще суха и горячка, съ чувствомъ озноба. Больной принялъ вчера оба приема бебирина, которые вызвали испарину; бреда не было. Назначены тѣ же приемы бебирина.

19. Кожа въ первый разъ влажна и мягка; больной имѣлъ обильное испражненіе ночью. Назначены тѣ же приемы бебирина.

20. Лихорадки не было; бебиринъ назначенъ по два грана утромъ и вечеромъ.

21. Жалуется на слабость; бебринъ оставленъ.

27. Больной выздоровѣлъ и выпущенъ изъ госпиталя.

Febris remittens. Soobroyah, 34 лѣтъ, Сероу компанейской №. 322, слабый и истощенный. Поступилъ 22-го Декабря 1843, въ 7 часовъ утромъ, жаловался на лихорадку въ продолженіи двухъ дній; приступы начинаются къ полдню, съ постояннымъ кружениемъ головы, кожа горяча и суха, пульсъ скорый, языкъ нечистъ. Былъ въ госпиталѣ отъ 16 Ноября по 19 Декабря съ послабляющею лихорадкою и съ тѣхъ поръ еще не оправился. Назначенъ внутрь pulv. gr. iressacs. Эj; потомъ pulv. jalap. comp. 3j.

Вечеромъ лихорадка сплыла, съ дрожью, кожа горяча и суха; испражненія свободны. Назначено принять 3 грана каломеля.

30. Ночь провелъ беспокойно, чувство дрожи продолжается, кожа суха и теплѣе натуральной; назначенъ бебринъ по 5 гр. утромъ и вечеромъ.

31. Потѣлъ сильно послѣ беброна; въ 2 ч. по-полудни была лихорадка, съ головокруженіемъ, ночь провелъ спокойнѣе. Лихорадочное со-

стояніе продолжается; бебиринъ назначено принять такъ же, какъ и вчера.

Генв. 1. Лихорадка прекратилась ночью; кожа прохладна, чувствуетъ ознобъ; имѣлъ нѣсколько кирнично-красныхъ испражненій. Бебиринъ назначенъ по прежнему.

2. Имѣлъ лихорадку, начавшуюся ознобомъ, отъ 3 часовъ до 6 утра. Пріемы бебирина назначены тѣ же.

3. Ни лихорадки, ни дрожи; бебиринъ назначено продолжать.

4. Лихорадки не было, чувствуетъ себя болѣе и лучше, бебиринъ продолжается.

6. Больной поправляется, бебиринъ оставленъ.

11. Выздоровѣлъ и выпущенъ изъ госпиталя.

Febris intermittens quot. Rammonah, 50 лѣтъ, Сироу компанейской №. 284. 23-го Марта 1844, поступилъ въ госпиталь въ 7 часовъ утра; страдаетъ ежедневною лихорадкой въ продолженіи двухъ дней, отъ полдня до вечера; пульсъ скользкій; кожа сухая; языкъ блѣдый. Назначено: pulv. ipecac. 3j, cum tartar. stibii et potass. gr. j; потомъ pulv. jalap. compr. 3j.

24. Лекарство произвело свое дѣйствіе; лихорадка возвратилась вечеромъ; больной припалъ

вечеромъ пилюли пзъ каломеля; почь провелъ въ жару, беспокойно; кожа влажная, по температура увеличена; жажда. Назначено pulv. jalap. сопр. 3j; et mist. salin. 3j. каждые два часа.

25. Къ почн лихорадка, безъ озноба, жалуется на сильный жаръ по всему тѣлу, пульсъ скорый, кожа сухая. Лекарства тѣ же.

26. Лихорадка во всю почь, но не такъ спльная; испражненія свободныя. Назначенъ бебиппъ по 5 гр. каждые три часа.

27-го. Лихорадки не было; вчера приняты двадцать гранъ бебирина.

28-го. Лихорадки нѣть; бебирипъ продолжается.

29-го. Одна слабость; бебирипъ оставленъ.

Апрѣля 5-го выпущенъ здоровымъ.

Пять слугаевъ употребленія sulphatis bebeerinii противъ перемѣжающиихся лихорадокъ въ госпитали 3-го баталіона артиллеріи въ Камптѣ.

Febris intermit. quot. T. G. Doyle, бомбардиръ, 30 лѣтъ, 10 лѣтъ въ Индіи, первнаго темперамента, поступилъ въ 6 ч. утра 26-го Ноября 1843 года; худощавъ, трезваго поведенія. Возвратился утромъ пзъ Nagroge, гдѣ онъ былъ

на службѣ послѣднія двѣ недѣлл. По словамъ его, въ послѣдніе девять дней ежедневно имѣлъ лихорадочный пароксизмъ, который начинался въ 9 часовъ утра и оканчивался въ 3 или 4 часа по полудни, безъ дрожи. Припадки были; головная боль, жаръ, жажда, тошнота, послѣ того обильный потъ; испражненія свободны, языкъ блѣдый. Въ госпиталѣ найдена кожа обыкновенной температуры, пульсъ натуральный, но больной жаловался на головную боль, которая не оставляетъ его и во время перемѣжекъ. Лечарствъ никакихъ непринималъ съ самаго начала болѣзни. Назначено *olei ricini* 5j и слабая діэта.

5 Часовъ по полудни. Лихорадка была въ 9 часовъ и еще продолжается; больной жалуется на жестокую головную боль, тошноту и жажду; кожа горяча и суха; пульсъ 104, полный, мягкий, 4 испражненія на пизъ, цвѣта оранжеваго, слизистыя, съ кусками. Поставлены піявицы, которые хотя хорошо тянули кровь, но не облегчили головной боли. Послѣ послѣдняго пароксизма назначена по временамъ слѣдующая микстура.

Rp. Tart. stibii et potass. gj.

Magnesiae sulphat. 3vj.

Acet. ammon. liq. ʒij.

Mist. camphor. ʒvijj. M.

Кромѣ того:

Rp. Colomel.; pulv. ipecac. comp. an. gr. vj;

Confect. aromat. q. s. ut ft. pil. v.

Принять къ почн.

27-го. Въ 10 часовъ вечера пароксизмъ прекратился, съ обильнымъ потомъ, и съ тѣхъ поръ головная боль уменьшалась постепенно. Кожа теперь прохладна, пульсъ 76, три испражненія темныя, слизистыя, животъ нечувствителенъ. Назначено по три грана sulphat. bebeergi, въ ʒj воды, въ 4, 5, 6, 7, 8 и 9 часовъ.

Вечеромъ. Принято все назначенное количествомъ бебирина (18 гранъ), лихорадка не возвращалась; кожа прохладна, пульсъ натуральный, головная боль еще несовершенно прошла. Единственное впечатлѣніе бебирина оказалось на органы вкуса; больной чувствуетъ смѣсь изъ сладкаго и горькаго. Четыре испражненія на пизъ зеленоватой слизи. Назначены слѣдующія пилули:

Rp. Massac pil. hydrarg. gr. vj;

Pil. rheī comp. gr. x.

M. ft. pilulae jjj.

28-го. Лихорадки нѣтъ, одно испражненіе; головная боль очень незначительная; языкъ блѣдъ на серединѣ; безъ лекарствъ. Вечеромъ лихорадка не возвращалась. Три испражненія жидкія. Назначено принять вчерашнія плюли.

29-го. Голова не болитъ, языкъ чистъ; два испражненія натуральныя; аппетитъ поправляется.

30-го. Больной поправляется.

2-го. Выпущенъ изъ госпиталя.

Febris interm. tertiana. Patrick Fitzpatrick, капитанъ 30 лѣтъ, 15 лѣтъ въ Индіи; сангвинического темперамента, крѣпкаго, мускулезнаго тѣлосложенія, поведенія трезваго. Поступилъ въ 11 часовъ утромъ 28-го Ноября 1843, во время озноба перемѣжающейся лихорадки, которая, говорить онъ, появилась 26-го сего мѣсяца, въ 11 же часовъ. Вскорѣ по поступленіи въ госпиталь кожа сдѣлалась горячею, пульсъ скорый. Больной жаловался на головную боль, тошноту, потерю аппетита, ломоту въ ногахъ, жажду, головокруженіе и упадокъ сильнъ; назначено gr. j tart. emeticici и Эј іресас.; это произвело обиль-

ную рвоту; послѣ того прописанъ порошокъ изъ gr. vj calomel. и Эjj рulv. г. jalap. сom. отъ чего четыре раза слабило его на низъ, лихорадка стала убывать, и показался потъ. Лекарства оставлены; слабая діета.

29-го. Жалуется на головную боль, но не жестокую; языкъ очень мало покрытъ слизью, влажный; пульсъ и кожа натуральны; два испражненія. Безъ лекарствъ.

30-го. Лихорадки не было, но больной ждетъ ее сегодня, на низъ не было въ послѣдніе 24 часа; назначенъ Iaust. purgans 7jv.

6 Часовъ по полудни. Въ половинѣ 10-го утромъ былъ ознобъ и дрожь; губы почти сплющія. Послѣ 10 часовъ кожа сдѣлалась горячою и сухою, больной беспокоенъ, жажды, тошнота, и головокруженіе, пульсъ частый. Какъ лекарство, принятое утромъ, слабило его нѣсколько разъ, то ничего болѣе не назначено. Въ 2 часа много потѣль, теперь жалуется только на головокруженіе и слабость; кожа прохладная, пульсъ обыкновенный.

1-го Декабря. Лихорадки нѣтъ; на низъ почью не было.

Rp. Tart. stibii et potass. gr. j;

Magnesiae sulph. 3v.; Mist. camphorat. 5v. M.
три раза въ день по 3j.

2. Отъ 4-хъ до 9-ти часовъ утра большой принималъ по gr. iiij sulphatis bebeerini каждый часъ, въ 5j воды.

Вечеромъ. Лихорадки не было; безъ лекарствъ.

3. Безъ лихорадки, испражненія на пизъ не было; данъ pulv. jalap. compr. 3j.

4. Выздоровѣлъ и выпущенъ изъ госпиталя.

Febris interm. tertiana. Charles Lowther, бомбардиръ, 29 лѣтъ, шесть лѣтъ и три мѣсяца въ Индіи; сангвинического темперамента, крѣпкаго тѣлосложенія, поведенія трезваго. Принятъ въ госпиталь 31 Марта 1844, въ 4 часа по-полудни, во время лихорадочнаго жару; жалуется на головную боль, жажду, потерю аппетита и слабость; пульсъ 108, полный; языкъ блѣдъ; запоръ на пизъ. По рассказамъ больнаго, лихорадка была 27 и 29-го этого мѣсяца, каждый разъ въ 2 часа по-полудни и оканчивалась обильнымъ потомъ въ пять часовъ вечера. Назначенъ порошокъ изъ gr. j. tart. emetic. et Эj jpresac.; послѣ—gr. iv. colomel. и gr. 50 pulv. jalap. compr.

1-го Апрѣля. Послѣ дѣйствія рвотнаго показался обильный потъ, съ облегченіемъ всѣхъ припадковъ, два испражненія па пизъ послѣ слабительнаго, больной чувствуетъ себя лучше, пульсъ натуральный; остался безъ лекарствъ.

2. Лихорадка не возвращалась, по утромъ жаловался на головную боль; па пизъ не было послѣ вечера 31-го Марта. Haust. purgant. ſiv.

5 часовъ вечера. Тотчасъ послѣ утренняго посѣщепія началась лихорадка озобомъ. Головная боль жестокая; нѣсколько обильныхъ испражненій.

Rp. Tart. stibii et potass. gr. j
Solve in aq. ſvj;
до $\frac{2}{3}j\beta$ каждый часъ; къ вискамъ 16 піявокъ.

3. Въ половинѣ шестаго часа лихорадка кончилась обильнымъ потомъ; головная боль послѣ явицъ прошла; больной спалъ покойно; утромъ кара не было, языкъ чистъ; испражненія свободны; безъ лекарствъ.

Вечеромъ. Послѣ полудня головная боль безъ кару и безъ лихорадочныхъ припадковъ; испражненія не было.

Rp. Calomelanos gr. ju;

Extr. colocynth. с. gr. vj; M. ft. pilulae ij;
принять въ разъ и къ вискамъ 12 піявцъ.

4. Лихорадки не было; послѣ піявцъ голова не болитъ; одно испражненіе; больной принялъ по gr. jjj. sulph. bebeerini въ 5j воды въ пять, шесть, семь, восемь, девять и десять часовъ.

6 часовъ вечеромъ. Послѣ бебирна (18 gr.) лихорадка возвратилась въ 11 часовъ. Ознобъ былъ незначительный; къ 3 часамъ показался потъ; кожа прохладна и влажна, жалуется, только на голову; испражненія не было. Лихорадка была гораздо легче; еще назначены 12 піявцъ къ вискамъ и прежнія пилюли.

5. Головная боль опять прошла, жалуется только на слабость; языкъ немного блѣдъ; нѣсколько испражненій со слизью; безъ лекарствъ.

6. Лихорадки нѣтъ; одно испражненіе, немногого слизи; пульсъ 84; бебирнъ снова данъ въ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 часовъ, и въ полдень — olei ricini 5j.

7. Лихорадки не было; больной принялъ 24 грана бебирна, безъ всякаго отъ того послѣдствія на мозгъ и на сосуды; пульсъ 80; испражненія свободны; оставленъ безъ лекарствъ.

8. Лихорадки нѣтъ.

11. Выздоровѣлъ и выпущенъ изъ госпиталя.

Febris interm. quotidiana. Daniel Murphy, капониръ, 30 лѣтъ, пять лѣтъ въ Индіи, темперамента сангвинического, крѣпкаго тѣлосложенія, поведенія трезваго. Поступилъ въ 6 часовъ утра 13 Мая 1844 въ госпиталь, съ потерей аппетита, головною болью, головокруженіемъ, жаждою; языкъ блѣдый, влажный; кожа прохладная, пульсъ обыкновенный, испражненія свободныя, 10, 11 и 12-го числа имѣлъ пароксизмы перемежающейся лихорадки, съ 3 часовъ по полудни, сперва ознобомъ, за ипмъ жаръ и головная боль и наконецъ потъ въ 6 часовъ вечера; причины болѣзни не знаетъ.

Rp. Tartari emeticі gr. j;

pulv r. ipecacuanhæ Эж. М. на приемъ.

Вечеромъ. Рвотное дѣйствовало хорошо; пароксизмъ возвратился сегодня въ десять часовъ. Озноба не было, но лицо сдѣлалось краснымъ; головная боль жестокая; больной жалуется на боль въ спинѣ и нижнихъ конечностяхъ, жажда, тошнота и большой упадокъ силъ; кожа горячая и сухая; пульсъ 104, полный; принималъ иѣ-

сколько разъ слѣдующую микстуру , которая тошила, но не слабила на низъ.

Rp. Mist. camphor. ʒjx;
tartari emetici gr. jβ;
magnes. sulph. ʒvj. M.

Назначенъ порошокъ:

Rp. Calomelani, gr. vj;
pulv. r. jalapaе comp. Эij. M. на пріемъ.

14. Потъ начался въ 6 часовъ по-полудни; сегодня утромъ температура обыкновенная, чувствуетъ небольшую головную боль , пульсъ 78, мягкий, испражненія были при помощи промывательного. Назначено принимать по gr. iiij sulph. bebeegiñ въ ʒj воды въ 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 часовъ.

Вечеромъ, отъ 21 грana sulph. bebeegiñ, не чувствовалъ никакихъ припадковъ головныхъ, даже пульсъ не измѣнился. Лихорадка возвратилась въ 3 часа по-полудни, по въ слабой степени. Теперь болѣй потѣтъ ; испражненія на низъ не было; потъ былъ весьма обильный во время принятія бебиприна , по это должно приписать пѣсколько жаркой погодѣ. Назначено внутрь:

Rp. Massae pil. hydrarg. gr. vj;
r. ipresacuanhæ gr. ij.

M. ft. pilulae ij; sr.

на приемъ.

15. Спалъ превосходно; пульсъ 78; кожа влажная, холодная, приемы бебрши тѣ же, какъ вчера.

6 часовъ вечера. Лихорадка возвратилась въ полдень; головная боль была сплыше, чѣмъ въ первыхъ пароксизмахъ; во время жара пульсъ 100, лицо красное; глаза палпты кровью; пшаршина началась; на низъ слабило; назначено принять прежнія пилюли.

16. Лихорадка прекратилась, какъ и прежде, обильнымъ потомъ; пульсъ 84; языкъ покрытъ блѣдой корою, влажный, одно испражненіе. Назначено принимать по три грана sulph. chinini въ 3j воды, въ тѣ же часы, какъ прежде бебрши.

6 часовъ вечера. Приняты 21 гр. хинина, лихорадка не возвращалась; большой слабъ, но спокоенъ; два испражненія на низъ; остался безъ лекарствъ.

17. Ночь провелъ хорошо; пульсъ 80; лихорадочныхъ припадковъ не было.

18. Большой поправляется; появился аппетитъ; испражненія свободны.

24. Больной выпущенъ изъ госпиталя.

Febris interm. tertiana. М-е Anna Dogherty, 28 лѣтъ, пять лѣтъ въ Индіи, слабаго тѣлосложенія. Принята въ госпиталь въ 6 часовъ пополудни 10-го Мая 1844 года, во время жара, въ пароксизмѣ перемежающейся лихорадки, которая началась ознобомъ за часъ до вступленія въ госпиталь. Больная жалуется на жестокую боль въ головѣ, въ спинѣ и нижнихъ конечностяхъ, жажду, тошноту, потерю аппетита. Кожа суха и горяча; пульсъ 106, полный, но не твердъ; языкъ покрытъ толстою корою, но влажный; испражненія свободны.

По ея словамъ, она имѣла лихорадку 6-го и 8-го числа, которая начиналась въ 4 часа пополудни и продолжалась нѣсколько часовъ. Причина болѣзни не известна.

Rp. Tart. emetici gr. j;
pulv. r. ipecac. Эj. M.
на приемъ.

Rp. Calomelis gr. v.;
pulv. r. Jalap. compr. Эj. M.
принять, спустя три часа.

11. Рвотное вызвало потъ, и большое количество зеленоватой жидкости; слабительное хо-

орошо действовало; головная боль, жажда и слабость, кожа прохладна, пульсъ 84, мягкий, языкъ чистый.

Rp. Tartari emetici gr j;
magnesiae sulph. ʒj.
aq. ʒvij. M.
принять три раза въ день по ʒjʒ.

12. Вчера не было лихорадки; чувствуетъ слабость, кружение головы, когда садится въ шостели, въ другихъ отношеніяхъ здорова, испражненія свободны. Въ 6 часовъ утра пароксизмъ возвратился въ 1 часъ, послѣ озноба былъ жаръ и потъ; послѣдній начался въ 5½ часовъ; при этомъ головная боль, пульсъ скорый, лицо красное и сильная жажда; приняла иѣсколько приемовъ микстуры, которая произвела рвоту и поносъ; испражненія водянисты, къ вискамъ 16 піявцъ.

13. Головная боль послѣ піавицъ прекратилась; но больная очень слаба и едва можетъ стоять на ногахъ отъ головокруженія.

14. Сегодня слѣдуетъ быть лихорадкѣ; испражненіе одно; пульсъ 64; назначены gr. jjj sulphat. bebeerini въ ʒj воды въ 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 часовъ.

Въ 6 часовъ утромъ. Больная приняла 21 гр.

бебиринъ, послѣдній пріемъ въ 11 часовъ, но лихорадка возвратилась въ полдень; озноба не было; кожа вдругъ сдѣлалась горячею и сухою. Опажаловалась на головную боль, жажду, была беспокойна, на низъ утромъ не было, почему дана $\frac{zj}{zj}$ olei ricini во время пароксизма. Послѣдній пароксизмъ, какъ полагаетъ больная, слабѣе другихъ; головная боль продолжается; начала потѣть въ 5 часовъ; пульсъ 98; масло еще не оказалось дѣйствія. Назначено опять 14 піявницъ къ вискамъ.

Rp. Massae pil. hydrarg. gr. vj;

pulv. ipecac. gr. jj. m.

flat pilulae ij; sr.

на пріемъ.

15. Головная боль отъ піявницъ легче; жалуется больная только на слабость; было нѣсколько испражненій. Пилули назначено повторить.

16. День лихорадочный; больная слаба, не имѣетъ аппетита; испражненія свободны; 3 гр. sulphatis chinini въ $\frac{zj}{zj}$ воды назначено пропи-мать въ тѣ самые часы, какъ бебиринъ.

6 часовъ утра. Имѣла слабый пароксизмъ лихорадки отъ 4-хъ до 5-ти часовъ; языкъ бѣлый, по-

влажный; слабая глухота от хинина, но безъ головной боли; пульсъ 96.

17. Языкъ нечистый, жажда, кожа прохладна, на изъ не было съ вчерашияго утра; дано olei ricini 3j.

18. Масло подействовало пѣсколько разъ, языкъ чистъ, хининъ назначенъ также, какъ и прежде.

19. Вчера не было ни малѣйшаго признака лихорадки; больная слаба, но появился аппетитъ; испражненія свободны.

20. Лихорадка не возвращалась; больная поправляется.

24. Выпущена совершенно здоровою.

Прилипканіе. Эти пять случаевъ, по наблюдениямъ въ госпиталѣ, были простыя, перемежающіяся лихорадки, и потому самые приличные для испытанія противолихорадочной силы стѣроптическаго бебрина. Во всѣхъ этихъ случаяхъ сначала отправленія желудка и кишокъ были приведены въ надлежащій порядокъ рвотными и легкими ртутными слабительными, и какъ время пароксизмовъ было известно, то sulph. bieberini назначалось по три грана каждый часъ, пока больной не принялъ отъ 18 до

24 гранъ, при томъ такъ, чтобы послѣдній приемъ былъ принятъ тотчасъ передъ пароксизмомъ. Въ двухъ случаяхъ, гдѣ бебиринъ не остановилъ лихорадки, онъ замѣненъ сѣрнокислымъ хининомъ, для сравненія дѣйствія двухъ этихъ лекарствъ.

Въ первыхъ двухъ случаяхъ 18 гранъ sulph. bebeergi*i* остановили лихорадочный пароксизмъ; въ третьемъ хотя то же количество не оказалось такого дѣйствія, однако жъ послѣдующіе пароксизмы являлись позже и были слабѣе, и отъ приема вновь 24 гранъ бебирина совершенно прекратились. Въ этихъ трехъ случаяхъ противулихорадочное дѣйствіе бебирина было точно такое, какъ и сѣрнокислаго хинина.

Въ четвертомъ случаѣ, 21 гранъ бебирина были недостаточны для прекращенія пароксизма, который впрочемъ былъ слабъ и оказался позже. То же самое количество бебирина было повторено передъ слѣдующимъ пароксизмомъ, по противъ ожиданія, онъ возвратился раньше и сплынилъ прежнихъ; послѣ чего бебиринъ замѣненъ хининомъ, котораго 21 гранъ совершенно прекратили лихорадку.

Женщина Dogherty 21 гранъ sulphat*i* bebe-

рині даны безъ видимаго вліянія на лихорадку; такое же количества хинина, данное послѣ, должно было повторить для прекращенія лихорадки.

Изъ этихъ случаевъ впрочемъ можно заключить, что бебирина имѣетъ значительную противолихорадочную силу, и хотя уступаетъ хинину, но можетъ замѣнить его во многихъ случаяхъ; и что онъ не возбуждалъ ни кровоносной системы, ни мозга.

Kamptee , 24-го Мая 1844 года.

Подписано: J. Anderson M. D. м. врачъ.

D. Falconer, исправляющій должностъ старшаго врача.

Слѣдующій примѣръ, гдѣ бебирина былъ испытанъ при сильномъ разстройствѣ организма отъ продолжительной, перемежающейся лихорадки, доставленъ Dr. Bennetтомъ.

Bronchitis , febris intermittens quartana въ продолженіи 32 лѣтъ, cum *Hypertrophia et induratione lienis*. — Alexander Murray , 56 лѣтъ, принятъ въ госпиталь 21-го Ноября 1844, жаловался на одышку и кашель, съ изверженіемъ большаго количества мокроты. При удареніи (percussio) въ грудь, звуки ясны на обѣихъ

сторонахъ, ясный дыхательный шумъ слышенъ по всей передней части груди. На бокахъ и на спинѣ, подъ конецъ каждого выдыханія, слышенъ слабый, мокротный шумъ; при кашлѣ обильная слизисто-гнойная мокрота, кусками; очень трудное дыханіе; спать можетъ только въ полуспящемъ положеніи; одышка периодическая усиливается движениемъ и холоднымъ вѣтромъ.

Sonus cardiacus занимаетъ два съ половиною дюйма въ поперечнике. Звуки сердца ясно слышны около двухъ дюймовъ ниже лѣваго соска. Въ этомъ мѣстѣ болѣй чувствуетъ боль, которая увеличивается отъ движенія. Легкій шумъ (тигмог) при второмъ звуки сердца; пульсъ 52 и довольно крѣпкій.

При ударахъ подъ ложечкой значительный глухой звукъ, который отзывается тотчасъ подъ ложными ребрами, болѣе къ наружнѣ и ниже положенія сердца, и продолжается до $4\frac{1}{2}$ дюймовъ винзъ и около 3 дюймовъ кзади. Когда больного спросили, страдалъ ли онъ когда нибудь перемежающеся лихорадкою, оказалось, что онъ страдаетъ ею тридцать два года. Онъ получилъ ее въ Мадрасѣ, где болѣзнь эта мучила его семь мѣсяцевъ безъ перемежки; съ тѣхъ поръ она

его не оставляла. Жалуется на головную боль, мушки предъ глазами, кружение головы и боль между лопатокъ. Языкъ нечистый, аппетитъ хороший, жажда, испражненія вчера были пять разъ отъ лекарства. Видъ и цвѣтъ лица показываютъ обыкновенное истощеніе отъ продолжительной лихорадки.

Rp. Tartari emetici gr. j;

Spir. nitr. dulcis 3is;

Mist. scillae 3vij;

Solutionis mur. morph. 3ij. M.

принимать по $\frac{3}{4}$ j каждые 4 часа.

Ноября 22-го. Ночь провелъ безъ сна отъ частыхъ припадковъ удушья и кашля; мокрота окрашена кровью; хрипѣніе по всей груди; жалуется на спильную головную боль и кружение. Изъ правой половины груди назначено вытянуть фунтъ крови кровососными банками.

26. Чувствуетъ большое облегченіе отъ кровопускания; дыханіе гораздо свободнѣе, мокрота съ кровяными полосками.

3-го Декабря. Припадки воспаленія дыхательного горла почти исчезли. Въ прошлую ночь имѣлъ пароксизмъ перемежающейся лихорадки;

по словамъ больнаго, она возвращается каждую третью ночь.

5. *Rp. Sulph. chinini 3j;*

Pulv. capsici gr. jx. M.

раздѣлить на три части и принять черезъ четыре часа.

6. Принялъ всѣ три порошка вчера до лихорадки, пароксизмъ былъ слабѣе предидущихъ.

8. Повторить порошки.

9. Пароксизмъ ночью, не смотря на порошки, былъ гораздо сильнѣе, чѣмъ 6-го числа. Головная боль, краснота глазъ, кажется, отъ сѣрпопислаго хинина.

12. Въ прошлую ночь другой пароксизмъ, очень жестокій. Порошки хинина нарочно были оставлены, чтобы сравнить продолжительность сплу пароксизма. Холодъ съ дрожью продолжался три четверти часа, потъ обильный и продолжался два или три часа:

Rp. Bebeerini sulph. gr. v.;

Pulv. capsici gr. iiij

M. ft. pulv. mitte tales vj; sr.

три раза въ день по порошку.

15. Пароксизмъ былъ ночью и продолжался

также, какъ и послѣдній; дрожь не такъ же-
стокая и потъ не такъ обильный.

23. Rp. Bebeerinii sulph. Эj;

Pulv. capsici, gr. jx.

M. ft. pulv. d. tales iiij.

Шипять каждые четыре часа по порошку.

24. Въ прошлую ночь во время пароксизма
ознобъ продолжался 20 минутъ.

27. Назначены порошки изъ бебиринна, по пяти
гранъ каждый, три раза въ день, во время пе-
ремежки, и три порошка по Эj въ день самаго
пароксизма. Прошедшую ночь ознобъ продол-
жался 20 минутъ и не такъ былъ жестокъ; го-
ловная боль.

30. Въ прошлую ночь ознобъ длился 16 ми-
нутъ, потъ былъ умѣренный; головная боль.

Генваря 2-го. Въ прошлую ночь ознобъ
длился 15 минутъ и былъ гораздо слабѣе преж-
няго; головная боль сплынѣе, значительная кра-
снота глазъ и головокруженіе. Назначено при-
нять Pil. col. com. ij, и на утро haust. cath. ȝiv.

5. Въ прошедшую ночь ознобъ продолжался
13 минутъ; головная боль значительно меньше.
Бебиринъ, назначенный въ день пароксизма,
уменьшенъ по 10 гр. въ каждомъ порошкѣ.

8. Озпобъ въ прошлую ночь продолжался 10 минутъ и очень слабый.

Больному позволено было вытти изъ госпиталя, для полученія пансіона; онъ возвратился въ 12 часу ночью, пьяный и въ такомъ видѣ, что нужно было отправить его въ полицію; послѣ чего обѣ немъ не было никакихъ извѣстій.

Прилиганіе. Человѣкъ этотъ поступилъ въ госпиталь cum asthmate et bronchitide. Легочныe припадки уступили expectorantibus, вмѣстѣ cum antispasmodicis, и мѣстнымъ кровопусканіямъ. Странно, что хотя онъ страдалъ жестокой перемежающеюся лихорадкою, но не жаловался на нее. Отвердѣніе и опухоль селезенки были поводомъ къ открытію ея. Когда воспаленіе горла и удушье миновались, начали лечить лихорадку большими приемами хинина, который хотя иоказалъ слабое дѣйствіе на жестокость и продолжительность первого пароксизма, но не оказалъ никакого дѣйствія на второй пароксизмъ. При каждомъ разѣ 3j хинина и 9 gr. pulv. capsici приняты были, въ теченіи 12 часовъ. Тогда рѣшились испытать бебиринъ, по прежде выждали день пароксизма, не давая никакого лекарства. При этомъ случай озпобъ былъ весьма

есленъ и продолжался три четверти часа; жаръ и потъ длились отъ двухъ до трехъ часовъ. 15 гр. бебрина назначено во время промежутковъ, въ три приема, и по 3j на третій день, когда ожидали пароксизма. Первый пароксизмъ, послѣ этого леченія, былъ одинаковъ съ прежними касательно времени, но слабѣе въ степени. Во второмъ пароксизмѣ ознобъ, вмѣсто 45 минутъ, продолжался только 25 минутъ; въ третьемъ только 20 минутъ; въ четвертомъ 16; въ пятомъ 15; въ шестомъ 13; въ седьмомъ 8 минутъ. Послѣ сего онъ оставилъ госпиталь и болѣе не возвращался; къ сожалѣнію состояніе скелезѣнки не было изслѣдовано до его ухода.

Дѣйствіе этого лекарства, казалось, во всѣхъ отношеніяхъ было сходно съ дѣйствіемъ хинина. Относительную силу каждого конечно можно опредѣлить только болѣе общирными наблюденіями. Но въ разсужденії дѣйствія противулиткорадочнаго и возбуждающаго они, кажется мнѣ, одинаковы; приливъ къ головному мозгу одинаковый замѣченъ былъ въ выше описанномъ случаѣ, послѣ принятія внутрь Эj того и другаго средства, и, сколько я могъ замѣтить о терапевтическихъ его дѣйствіяхъ въ этомъ случаѣ, все

убѣждаетъ меня, что дѣйствія бебирпна такія же точно, какъ и хинина, если даже не въ высшей степени.

J. H. Bennett. M. D.

Число лихорадокъ, лечимыхъ бебирпномъ, мнѣ известныхъ, простирается до 40; опѣ вѣсѣ помѣщены въ прилагаемой таблицѣ. Изъ нихъ можно видѣть, что бебирпнъ былъ испытанъ въ разныхъ климатахъ, включая Единбургъ, Канаду, Западную и Восточную Индію, во всѣхъ различныхъ видахъ послабляющей и перемежающейся лихорадки и во всѣхъ возрастахъ, отъ 12 до 74 лѣтъ. Во всѣхъ сихъ случаяхъ бебирпнъ оказалъ болѣе или менѣе противолихорадочное дѣйствіе (*virtus antiperiodica*). Въ 6-ти случаяхъ, или почти въ одномъ изъ семи, по видимому, онъ дѣйствовалъ неудовлетворительно. Изъ 26 случаевъ, описанныхъ подробно, только въ 5 замѣчены были нѣкоторыя непріятныя слѣдствія, но и то не болѣе, какъ незначительный шумъ въ ушахъ. Слѣдовательно, кажется, бебирпнъ заслуживаетъ испытанія, въ особенности въ большихъ госпиталяхъ, гдѣ только можно найти подлежащіе случаи и совершенно

наблюдать за ними, и гдѣ дешевизна его, въ
сравненіи съ хининомъ, также достойна вни-
манія.

Професоръ Simpson въ Единбургѣ, сдѣлавъ
довольно значительное число опытовъ надъ беби-
приномъ, по просьбѣ моей, доставилъ мнѣ резуль-
таты своихъ наблюдений въ слѣдующемъ письмѣ,
отъ 30-го Января 1845.

Милостивый Государь!

Позвольте мнѣ сообщить вамъ только общія
впечатлѣнія, которыя получилъ я при опытахъ
надъ бебприномъ, ибо я не имѣю времени
разходить въ подробности. Вамъ известно, что
многіе предостерегаютъ акушеровъ отъ упо-
требленія хинина во время беременности, пола-
гая, что онъ причиняетъ выкидыши и прежде-
временные роды. И мышьякъ такое средство,
котораго едва ли кто захочетъ дать беремен-
ной женщинѣ. Слѣдовательно мы не можемъ
такимъ образомъ приступить къ употребленію
двухъ превосходныхъ средствъ въ періоди-
ческихъ первыхъ боляхъ, которыя впрочемъ
перѣдки во время беременности.

Въ послѣднее время я употреблялъ вашъ sulph. bеbесiпi въ нѣкоторыхъ случаяхъ этого рода, съ совершеннымъ и удовлетворительнымъ успѣхомъ. Я прописалъ его, около двухъ мѣсяцевъ назадъ, дамѣ, которая мучилась жестокими нервными болями въ головѣ и въ лицѣ; онъ наступали къ полдню, больная теряла зрѣніе и въ ужасныхъ мученіяхъ оставалась довольно долго. Пользующій домашній врачъ ея ставилъ піявицы, и проч. безъ пользы; я присовѣтовалъ беборинъ въ пілюляхъ, по 2 гр. пѣсколько разъ въ промежуткахъ между пароксизмами. Какъ лекарство это, по видимому, не оказывало никакого дѣйствія, то пріемы постепенно увеличивали, и на третій день большая приняла около 53 sulph. bеbесiпi, въ продолженіи 14 или 16 часовъ, въ промежуткѣ между пароксизмами. Правду сказать, я уже начиналъ отчаяваться въ его дѣйствіи, и не видя конца страданіямъ больной, хотѣлъ на другой день перемѣнить его на другое лекарство, но въ этомъ не было надобности; послѣ упомянутаго большаго пріема слѣдующій припадокъ былъ гораздо слабѣе и для чрезъ два болѣзни совсѣмъ прошла. Больная сама,

въ послѣдствіи, при появленіи боли, прибѣгала къ бебрину и всегда съ отличнымъ успѣхомъ.

Въ прошломъ году я видѣлъ подобный случай періодической первной боли у беременной дамы. Болѣзнь далеко не была такъ сильна, какъ въ первомъ случаѣ, но довольно несносна. Она прошла скоро отъ употребленія одного бебринна.

Теперь у меня больная дама, которая имѣла два выкидыша въ деревнѣ, и нынѣ страдаетъ жестокими болями въ лицѣ, плечахъ и другихъ частяхъ тѣла. До моего посѣщенія она употребляла гиајасум, colchicum, и пр. въ томъ предположеніи, что болѣзнь ревматического свойства. Боли являются неправильными періодами, при томъ она страдаетъ еще тсппоглагия. Хининъ, мышьякъ и другія средства не принесли никакой пользы. Я наконецъ прибѣгнулъ къ сѣрно-кислому бебрину и, въ послѣднемъ моемъ посѣщеніи, она решительно объявила мнѣ, что ни одно изъ прежнихъ лекарствъ не доставляло ей такого облегченія; боли возвращаются по прежнему, но гораздо слабѣе.

Въ прошломъ году я видѣлъ два или три примѣра, гдѣ дамы, во время выздоровленія послѣ

родовъ, имѣли слабые періодическіе припадки озлоба, жара, и пр. подобно пароксизмамъ неправильной, перемежающейся лихорадки. У одной припадки были трехдневнаго типа и уступили употребленію хинны; у другой, гдѣ ходъ болѣзни былъ правильный, послѣ тщетнаго употребленія хинина, мышьяка, цинка, и пр., бебирина, кажется, принесъ пользу больше всѣхъ другихъ средствъ и больная чувствовала себя отъ него лучше.

Обѣ эти дамы, за два года назадъ, жили въ дальнихъ страхахъ, гдѣ онѣ вѣроятно получили болѣзнь отъ мѣстности.

Я имѣю другую болѣнную изъ Индіи, гдѣ она сильно страдала отъ лихорадки, и хининъ всегда оказывалъ непріятное дѣйствіе на желудокъ. Съ приѣзда своего въ Единбургъ она не разъ имѣла пароксизмы лихорадочныхъ припадковъ, и принимала sulph. bengalini, безъ всякаго непріятнаго дѣйствія на желудокъ и безъ головной боли, которую хининъ всегда производитъ.

Во всѣхъ другихъ случаяхъ, гдѣ я употреблялъ бебирина, какъ противулихорадочное или укрепляющее средство, раздражающее и возбуж-

дающее дѣйствіе его я впдѣлъ всегда гораздо слабѣе, чѣмъ отъ хинина.

Слѣдующій примѣръ доставилъ мнѣ пріятель мой, Dr. Macfarlan.

Перемежающаяся первная боль. Дама, 48 лѣтъ, 16 лѣтъ назадъ получила первую боль во лбу (*prosopalgia supra-orbitalis*) въ то время, когда она кормила пятаго ребенка. Припадокъ случился въ Ноябрѣ, во время спльныхъ сѣверо-восточныхъ, холодныхъ вѣтровъ. Страданія были весьма жестоки и продолжалась обыкновенно два часа, начиная съ четырехъ или пяти часовъ по-полудни; боли эти продолжались только двѣ недѣли и, какъ казалось, прошли отъ употребленія *tinct. chinini* Houxhami и питательной пищи. Болѣзнь возвратилась въ Маѣ, по не въ такой жестокой степени. Въ слѣдующую весну тѣлесныя силы такъ были истощены страданіемъ, заботою и продолжительнымъ кормлениемъ грудью шестаго ребенка, который также сильно истощалъ отъ кровопускания противъ жестокаго воспаленія дыхательного горла, что прежніе припадки явились снова въ ужасной степени; боль надъ лбомъ, раздирающая въ высшей степени; пароксизмы продолжалась нѣсколько часовъ,

начинались обыкновенно озабочомъ и уменьшались постепенно отъ употребленія хинина, въ большомъ количествѣ вина, водки и животной пищи во время перемежекъ; сила пищеварительныхъ органовъ, казалось, не ослабѣвала отъ разстройства первовъ чувствительныхъ. Пароксизмы эти возвращались почти одинаковыми явленіями каждую весну, нѣсколько лѣтъ, при наступлениі восточныхъ вѣтровъ. Перемѣна воздуха, въ защищеннѣ отъ вѣтровъ мѣстѣ, въ Stirlingshire'ѣ, доставляла замѣтное облегченіе. Въ 1842 году, отъ заботъ и попеченія о дѣтяхъ, лежавшихъ въ скарлатинѣ, здоровье ея совершенно разстроплось и она сильно исхудала. Въ Мартѣ того года, и при наступлениі восточныхъ вѣтровъ въ Апрѣлѣ, болѣзнь укоренилась въ жестокой степени и продолжительнѣе обыкновеннаго. Хининъ даваемъ былъ до 20 гр. въ день, даже до появленія тѣхъ непріятныхъ припадковъ, которые обыкновенно встрѣчаются при употребленіи хинина въ большихъ и продолжительныхъ пріемахъ, а именно: звонъ въ ушахъ, разстройство пищеварительныхъ органовъ и возбужденное состояніе всего организма. Когда больная удалялась въ Stirlingshire, то это опять

приносило замѣтное облегченіе, хотя слабость, при отъѣздѣ, была такъ велика, что врачъ боялся отпустить ее. Весна 1843 г. также привнесла свои страданія отъ болѣзни и отъ принятыхъ противъ нея средствъ. Въ 1844, по совѣту Dr. MacLagan'a, она, вместо sulph. chinini, начала принимать бебиринъ, и нѣсколько недѣль принимала его въ пилоляхъ, начиная рано по утру, чтобы предупредить пароксизмъ, по три грана, повторяя его каждые два часа, а иногда черезъ часъ, пока доходила до XV грань въ сутки; а среднимъ числомъ въ двѣ недѣли по их гр. въ сутки. Отъ этого леченія припадки начали постепенно уменьшаться, или по-крайней-мѣрѣ никогда не достигали до прежней степени. Изъ одного этого случая конечно не должно заключать о превосходствѣ бебирина надъ хининомъ въ подобныхъ періодическихъ болѣзняхъ; но вмѣстѣ я увѣренъ, что такое количество хинина, будучи принято внутрь, произвело бы весьма непріятныя послѣдствія на общее состояніе больной. Слѣдовательно въ этомъ случаѣ бебиринъ будетъ драгоценнымъ новымъ средствомъ во врачебной наукѣ.

Извлеченіе изъ письма Dr. Johnston'a.

Г-жа Д. въ послѣднее время часто страдала лицою болью, которая продолжается по двѣ и по три недѣли. Она не можетъ принимать хинина, ибо онъ каждый разъ раздражаетъ кровеносную и нервную систему. Въ послѣднемъ приступѣ мужъ ея далъ ей бебринъ въ тѣхъ же пропорціяхъ, какъ давали ей хининъ; боль скоро прошла и болѣе не возвращалась. Она продолжала принимать бебринъ нѣсколько времени безъ всякихъ непріятныхъ пріпадковъ.

Выше описанные случаи, говоритъ Dr. MacLagan, по моему мнѣнію, служатъ отличнымъ доказательствомъ пользы бебрина. Относительно противулхорадочной его спѣ, я ограничился свидѣтельствами другихъ, какъ онъ былъ мнѣ сообщены, изложивъ описание этихъ случаевъ во всей подробности, чтобы все могли видѣть ясно, на чёмъ основываю я свое мнѣніе. Объ укрѣпляющихъ его качествахъ я вполнѣ убѣжденъ многими опытами; но въ этомъ отношеніи его нельзя такъ скоро повѣрить, какъ въ періодическихъ болѣзняхъ.

Успѣхъ секретного средства, названаго Warburg's drops (капли), въ составѣ котораго, я думаю, входитъ бебринъ, не можетъ быть приве-

депъ въ доказательство пользы бебрипа; ибо изъ «Buchner's Repertorium» (vol. xxxv. ч. 3) видно, что Buchner и Winkler открыли въ этомъ средствѣ хининъ. Впрочемъ я пахожу, что Winkler согласенъ съ моимъ мнѣніемъ въ томъ, что въ составѣ его входитъ бебринъ.

Я прежде замѣтилъ, что бебринъ отличается отъ хинина тѣмъ, что онъ не столько возбуждаетъ кровоносную и первую систему, и это кажется оправдывается во всѣхъ вышеприведенныхъ случаяхъ, особенно въ примѣрахъ первыхъ болей. Кромѣ меня и другіе нашли его полезнымъ во многихъ другихъ случаяхъ, гдѣ возбуждающее дѣйствіе вредно, какъ напр. въ чахоткѣ, въ слабомъ пищевареніи (*dyspepsia atonica*).

Касательно способа употребленія бебрина, я обыкновенно даю его въ пілюляхъ, сим *conservum rosarium*, также и въ тѣхъ же приемахъ, какъ хининъ. Его можно удобно давать въ жидкому видѣ, съ прибавленіемъ пѣсколькихъ капель разведенной сѣрной кислоты, для совершенного его растворенія.

ТАБЛИЦА ПЕРЕМЕЖАЮЩИХСЯ И ПОСЛАБЛЯЮЩИХ ЛИХОРАДОКЪ, ЛЕЧЕННЫХЪ БЕБИРИНОМЪ.

Къ стр. 500.

No.	Имя.	Полъ.	Возрастъ.	Кто пользовалъ.	Гдѣ.	Типъ лихорадки.	Время продолженія болѣзни.	Количество бебрина.	Примѣчанія.
1	T. A.	М.	27	Dr. Douglas MacLagan.	Единбургъ.	Трехдневная.	5	—	Послѣ первого приема вырвало.
2	—	М.	25	—	—	—	—	40	Никакихъ непрѣятныхъ послѣдствій.
3	—	М.	72	—	—	—	7	45	Тоже.
4	J. M.	Ж.	—	Dr. Watt.	Демерара.	—	—	—	Хининъ и мышьякъ употребляли безъ пользы.
5	M. de J.	Ж.	38	—	—	—	не возвр.	20	Былъ шумъ въ ушахъ.
6	G. J.	Ж.	21	—	—	—	4	80	Спльно дѣйствовало на слухъ.
7	D. F.	М.	25	—	—	—	4	40	Никакихъ послѣдствій.
8	J. G.	М.	20	Dr. P. W. MacLagan.	Канада.	—	3	45	Больному показалось противнымъ.
9	J. F.	М.	22	Dr. Blair.	Демерара.	Желчн. горяч.	13	10 гр. на прием.	Хининъ былъ безуспешенъ.
10—14	—	—	—	Dr. Reddie.	—	—	—	—	Безъ всякихъ худыхъ дѣйствій.
15	J. P.	Ж.	38	Dr. Watt.	—	Ежедневная.	4	60	—
16	M. de J.	Ж.	40	—	—	Трехдневная.	3	48	—
17	Thorne.	М.	—	—	—	Ежедневная.	9	60	—
18	J. de B.	М.	—	—	—	Трехдневная.	—	—	Болѣзнь съ страданіемъ селезенки; дурныхъ послѣдствій не было.
19	W. S.	М.	20	—	—	Желчная посл.	14	84	История болѣзни неизвѣстна.
20	W. C.	М.	20	—	—	Ежедневная.	4	40	Болѣзнь возвратилась отъ погрѣшности въ дѣтѣ, безъ дурныхъ послѣдствій.
21	A. M.	М.	56	Dr. Rennett.	Единбургъ.	Трехдневная.	30	240	Никакихъ послѣдствій.
22	J. T.	М.	25	Dr. Dempster.	Нидерл.	Ежедневная.	5	—	Головой мозгъ, казалось, страдалъ отъ большихъ прiemовъ.
23	J. B.	М.	21	—	—	Послабляющая.	6	45	Никакихъ послѣдствій.
24	J. A.	М.	23	—	—	—	3	90	—
25	—	М.	23	—	—	Ежедневная.	9	120	—
26	J. M.	М.	26	—	—	—	16	120	Болѣзнь съ воспаленіемъ печени; никакихъ дурныхъ послѣдствій.
27	J. R.	М.	24	—	—	Feb. Cont.	23	240	Небыло дурныхъ слѣдствій; по недостатку бебрина употребленъ хининъ.
28	V.	М.	24	Dr. Dorward.	—	Послабляющая.	15	80	Головная боль, бредъ во время употребленія бебрина.
29	S.	М.	34	—	—	—	13	70	Небыло дурныхъ слѣдствій.
30	R.	М.	50	—	—	Ежедневная.	6	40	—
31	T. G. D.	М.	30	Dr. Anderson.	—	—	6	18	—
32	P. F.	М.	30	—	—	Трехдневная.	7	18	—
33	C. L.	М.	29	—	—	—	12	42	—
34	B. M.	М.	30	—	—	Ежедневная.	11	42	Безъ успѣха; бебринъ замѣнилъ хининъ съ успѣхомъ.
35	A. D.	Ж.	28	—	—	Трехдневная.	14	21	—
36—40	4 служа.	—	—	Dr. Godfrey.	—	—	—	—	Неудовлетворительно.

This should have been delivered
by Mr. Goodier when in Edinburgh
but he quite forgot

Any communication you may
have to give to Dr. Brown
at Petersburg who sends his
Please direct.

Dr. Brown

In his own House
Opposite the Castle &
Near the Lower Water Ga
Petersburg Side.

S. Petersburg

Russia

This is published
by Dr. Brown



