

**Systema vegetabilium florum Peruviana et Chilensis ... Tomus primus /
auctoribus Hippolyto Ruiz et Josepho Pavon.**

Contributors

Pavón, José, 1754-1840.

Ruiz, Hipólito, 1754-1816.

Royal College of Physicians of Edinburgh

Publication/Creation

[Madrid] : Typis Gabrielis de Sancha, 1798.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/cnwzeryu>

Provider

Royal College of Physicians Edinburgh

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by the Royal College of Physicians of Edinburgh. The original may be consulted at the Royal College of Physicians of Edinburgh. where the originals may be consulted.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>







P. c. 23.

6³/7

R21016

SYSTEMA VEGETABILIVM

FLORAE

PERUVIANAE ET CHILENSIS,

CHARACTERES PRODROMI

GENERICOS DIFFERENTIALES,

SPECIERUM OMNIUM DIFFERENTIAS,

DURATIONEM, LOCA NATALIA, TEMPUS FLORENDI,

NOMINA VERNACULA, VIRES ET USUS NONNULLIS

ILLUSTRATIONIBUS INTERSPERSIS

COMPLECTENS.

AUCTORIBUS

HIPPOLYTO RUIZ, ET JOSEPHO PAVON,

REG. ACAD. MEDIC. ET HORTI REG. BOTAN.

MATRIT. SOCIIS.

TOMUS PRIMUS.

SUPERIORUM PERMISSU.

TYPIS GABRIELIS DE SANCHA.

ANNO M. DCC. XCVIII.

SYSTEMA VEGETABILUM

FLORAE

PERUVIANAE ET CHILENSIS

CHARACTERES PROPRIOS

GENERICOS DIFFERENTIALES

SPECIES OMNIUM DIFFERENTIALIS

Nobis placeant ante omnia sylvae.

VIRG. Ecl. 2.

PERUVIA ET CHILE

ILLUSTRATIONES ICONOGRAPHICAE

COMPOSITAE

AUCTORIBUS

HISTORICO BOTANICO ET JOSEPHO RIVERO

REG. ACADEM. BOTANICAE VINDOB. NOTARI.

MASSIMO ALBERTO

TOMUS PRIMUS

SUPERIORUM PERMISSU

JOH. CAROLUS DE SANCHEZ

ALUM. REG. BOTAN.

PRAEFATIO.

Fidem nostram, quam in Botanices studiosorum commodum in Florae Peruvianaë primi Voluminis Praefatione obligamus, liberaturi *Compendium*, seu *Systema Vegetabilium* in eo comprehensorum separatim evulgare aggredimur. In his opportunum nobis visum est, differentialem novorum Generum Characterem variarum eorundem Specierum differentiis praemittere, ne Botanici, ad quorum manus nondum pervenerit Prodrômus, Characteres genericos naturales complectens, Matrîti primùm à nobismetipsis editus, deinde Romae à Clar. viro Casparo Xuarezio recusatus, hoc praesidio ad peruvianas plantas dignoscendas destituantur.

Definitiones specificas notitia conse-

quitur uniuscujusque stirpis durationis, an scilicet arbos, frutex, suffrutex, aut herba sit; regni, provinciae, loci solique, ubi spontè provenit; temporis, quo eamdem florentem observavimus; nominis vernaculi, virium et usuum, quos comperire licuit; quibus omnibus additur numerus paginarum, et iconum Generum et Specierum in Florae primo volumine contentarum: quod neutiquam fieri potuit in novorum Generum Speciebus ad quintam Classem et subsequentes spectantium, donec harum descriptiones in lucem suis locis deinceps prodeant.

In notorum verò Generum plantarum differentiis specificis Characterem genericum differentialem omittimus utpote quem facile consulere licet in Linnaei Systemate Vegetabilium.

Primi autem hujus Tomi initium à Prodromi Generum Speciebus ducimus,

eo consilio, ut pretiosissimarum plantarum ad illa nova Genera pertinentium aliquem gustum Botanici quamprimum percipiant; postea veterum Generum Species novas sistimus, et trium quoque novorum Generum *Jovellanae*, *Anthodon*. et *Ohigginsiae*, quae in primo Florae volumine nuperrimè evulgato addidimus: quod volumen CCLXVI descriptiones et CCXIX figuras in CVI iconibus comprehensas continet illarum Specierum, quæ ad quatuor priores Classes spectant.

Jam verò inter vetustorum Generum Species inseruntur, nonnullae à Botanicis cognitae, Europae simul aut aliis antiqui orbis regionibus, Regnisque Peruviano et Chilensi communes, sed earundem neque icones in Flora, neque absolutas omnium descriptiones proferre necesse habuimus: quod multo minus in hoc Compendio faciendum erat, adeoque loca na-

talia , nomen vernaculum et apud Indos
usum tantummodo commemoravimus.

In voluminibus Florae, quae posthac
edentur , plura nova Genera evulgabun-
tur , quae praesto ad manus sunt, quae-
que nondum erant, cùm Prodrômus pro-
diit: atque in hoc ipso Tomo tria nova
Genera *Alonsoam* , *Monninam* et *Phi-
teleph.* Lector inveniet.

Nonnullorum Prodrômi Generum,
quae ex ulterioribus penitioribusque plan-
tarum in hortis satarum et speciminum
exsiccatorum , aliorumque Botanicorum
Operum collationibus et observationibus,
Clar. Discipulo Joanni Tafalla à nobis
injunctis , corrigenda existimavimus, re-
formationes et additiones in hoc Tomo
includimus, quod etiam in reliquis sedu-
lò faciemus.

Majori autem Compendii hujus illus-
trationi et perfectioni inservientes, post

differentiales novorum Generum Characteres habitum eorum, quae quidem pluribus Speciebus constant, subjicimus. Post singulorum Generum americanorum jam notorum Species habitum quoque adjicere libuit, dummodò ex duabus saltem Speciebus conflata fuerint.

Quotiescumque Generum notorum nomini Generico Linnaeano ex Schreberi editione Florae Peruvianae citatio accedit; intelligat Lector, Genericum illius Generis Characterem in nostro Opere reformatum prostrare.

Denique quoniam citari nondum queunt, ut supra innuimus, descriptionum paginae et iconum novorum Generum Specierum, quae ad quintam et subsequentes Classes pertinent, donec in subsequentibus voluminibus publici juris fiant; Tabulam ad calcem postremi hujus Compendii Voluminis adjiciemus, quae des-

criptionum paginas et iconum singularum Specierum numerum exhibebit.

Absoluto hoc Compendio seu Systemate *Genera Plantarum* edemus hâc eâdem formâ, quae Characteres Genericos naturales tam Generum novorum in Flora nostra comprehensorum, quàm aliorum circiter CCC. americanorum jam Botanicis notorum, sed autopsia in locis natalibus reformatorum, complectentur.

P A R S P R I M A.

C L A S S I S I.

MONANDRIA MONOGYNIA.

A C O S T A.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 1. Icon. I.

CALYX subbilabiatus, contortus. *Nectarium* conico-carinatum, antheriferum. *Anthera* undulata. *Pomum* quinqueloculare.

A C O S T A A C U L E A T A.

1. A. ramis sarmentosis aculeatis, foliis oblongis, spicis congestis. *Flor. Per. et Chil.* tom. 1. pag. 5. Icon. VI. fig. a.

FRUTEX scandens.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Chinchao* vicum, et *Maychainio*, et *Macora* praedia.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE *Caimito de monte*.

USUS: Incolae avidè, utpote grati saporis, fructus edunt.

P A R S I.

A

DIGYNIA.

JARAVA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 2. ICON. I.

CALYX : *Gluma* uniflora, bivalvis. *Corolla* :
Gluma univalvis, papposa, aristata.

JARAVA ICHU.

✓ 1. J. foliis involutis subulatis, spicâ paniculâtâ. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 5. ICON. VI. fig. b.*

— PLANTA caespitosa, bipedalis.

HABITAT in alpibus (vernaculè *Punas de los Andes*) *Cantae*, *Huaroherí*, *Xauxae*, *Huancavelicae*, *Tarmae*, *Huanuci*, *Huamalies*, et aliarum Provinciarum Regni Peruviani.

VERNACULE *Ichu* et *Ocssa* nuncupatur.

VIRES ET USUS : In *Huancavelicae* fodinis hujus Graminis frequens usus est ad argenti vivi extractionem, et ex eo Indi storeas, aliaque texunt, domuumque et tuguriorum

culmina tegunt. Tenera herba in pabulum
valde nutriens venit bobus. Nos, ut ceteri
viatores, saepiùs eam adhibuimus ad cibo-
rum coctionem, et taedarum loco ad lu-
mina artificialia, per frigidissima et deser-
ta loca peregrinantes.

CLASSIS II.

DIANDRIA MONOGYNIA.

SANCHEZIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 5. Ic. XXXII.

COROLLA tubulosa, quinquefida, irregularis.
Filamentorum *Rudimenta* duo. *Antherae*
bifidae, calcaratae.

SANCHEZIA OBLONGA.

- ✓
+ 1. S. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis,
petiolis alatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1.*
pag. 7. Icon. VIII. fig. b.

PLANTA herbacea, orgyalis.

HABITAT in *Peruviae* stagnatis et umbrosis
ad *Cuchero*, *Pozuzo*, et *Pillao* juxta *Chahuassi* vicos.

FLORET ab Augusto ad Novembrem.

SANCHEZIA OVATA.

- + ✓ 2. S. foliis ovatis acuminatis, petiolis semi-

cylindricis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag.*

7. *ICON. VIII. fig. c.*

PLANTA herbacea, orgyalis.

HABITAT in *Peruviae* stagnatis et umbrosis
locis ad *Pozuzo*, *Cuchero* et *Pillao* prope
Chacahuassi nemora.

FLORET à Julio ad Decembrem.

SARMIENTA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 4.

COROLLA urceolata. *Rudimenta* staminum tria,
tertio breviori. *Capsula* unilocularis, cir-
cumscissa.

SARMIENTA REPENS.

1. *S. foliis ovatis carnosis utrinque punctatis.*

Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 8. ICON.

VII. *fig. b. URCEOLARIA. FEWILL. Pe-
ruv. tom. 3. pag. 69. planch. 43.*

PLANTA parasitica, scandens.

HABITAT copiosè in nemoribus *Conceptionis*
Chile, *Rere*, *Itatae* et *Puchacay* Provin-
ciarum.

FLORET Febuario, et Martio.

VIRES: Folia ad callos emolliendos, exstirpandosque inserviunt.

SCHIZANTHUS.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 6.

COROLLA irregularis: labio superiori quinquepartito. *Rudimenta* duorum filamentorum.

Capsula bilocularis.

SCHIZANTHUS PINNATUS.

+ *S.* foliis interruptè pinnatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 13. ICON. XVII.*

PLANTA herbacea.

HABITAT in agrorum versuris *Chile* ad *Esquadron*, et in *Araucanorum* tractu.

FLORET Febuario, et Martio.

JOVELLANA.

Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 12.

COROLLA cymbaeformis, resupinata, biloba.

Calyx quadripartitus.

JOVELLANA SCAPIFLORA.

1. J. foliis ovatis serratis, scapis inaequalibus unifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 13. ICON. XVIII. fig. b. CALCEOLARIA (plantaginea) SMITH. fasc. 1. pag. 2. tab. 2.*

PLANTA herbacea.

HABITAT in alpidibus Tarmae et Caxatambo ad Cheuchin.

FLORET Julio, et Augusto.

JOVELLANA PUNCTATA.

2. J. foliis ovato-oblongis duplicato-serratis, pedunculis multifloris cymosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 13. ICON. XVIII. fig. a. GESNERA. FEWILL. Per. tom. 3. pag. 21. planch. 16.*

PLANTA fruticosa, tripedalis.

HABITAT in silvis Arauco prope Piedra dorada, aliisque locis Provinciarum Conceptionis Chile et Puchacay.

FLORET Februario, et Martio.

VERNACULE Arguenilla.

VIRES ET USUS : Insigni vi depuratoriâ, teste P. Fewilleo, praestat; quamobrem in morbis venereis Indi plantae infusum quammaximè calidissimum fieri potest manè, non sine utilitate, ut ipsi asseverant, quotidie bibunt.

COLUMELLIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 3. ICON. I.

CALYX quinquepartitus. *Corolla* rotata. *Antherae* reniformes, plicatae. *Capsula* didyma; *valvulis* duplicatis.

COLUMELLIA OBLONGA.

✓
+
1. C. foliis oblongis supernè serratis, floribus corymbosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 28. ICON. VIII. fig. a.*

ARBOR quadriorgyalis, et ultra.

HABITAT in silvis *Pillao*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

VIRES ET USUS : Folia amarissima stomachicâ virtute pollent. Ad febres intermittentes depellendas foliorum decocto, aut infuso,

aut eisdem in pulverem redactis Indi utuntur. Ex ligno valde duro manubria, et alia utensilia faciunt.

COLUMELLIA OBOVATA.

2. C. foliis obovatis serrato-dentatis integrisque, pedunculis uni-trifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. I. ICON. XII. fig. b.*

FRUTEX octopedalis.

HABITAT copiosè in collibus aridis *Tarmae* oppidi.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

VERNACULE *Ulux.*

VIRES ET USUS: Sapore amarissimo tota planta gaudet. Indi infuso, decoctoquè foliorum ad febres intermittentes profligandas, stomachumque roborandum non sine fructu utuntur. Lignum ad cibos coquendos in culinis comburunt.

MARGYRICARPUS.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 7. Ic. XXXIII.

CALYX 4-5 partitus. Corolla nulla. Drupa monosperma.

PARS I.

B

MARGYRICARPUS SETOSUS.

- ✓ 1. M. foliis impari-pinnatis; foliolis lineari-
bus, floribus axillaribus sessilibus. *Flor.*
+ *Per. et Chil. tom. 1. pag. 28. ICON. VIII.*
fig. d.

PLANTA suffruticosa, procumbens, sesquipedalis.

HABITAT in collibus aridis et frigidis locis
Provinciarum *Tarmae, Xauxae, Huama-*
lies, Huarocherí, Conchucos, arenosisque
Regni Chilensis.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

VULGO *Yerba de la Perlilla* ob fructuum similitudinem cum margaritis.

VIRES ET USUS: Incolae ad sanguinis aestum coercendum decoctum et infusum adhibent. Pueri autem fructuum succum dulcem et gratum avidè exsugunt.

PEPEROMIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 8. ICON. II.

CALYX: *Squama* minima. *Corolla* nulla. *Stigma* punctum in apice germinis.

Obs. In *Peperomiae* Charactere Generico Prodrumi Florae Per. et Chil. squamam nullam Calycinam, nisi prominentiam sub singulis flosculis descripsimus. Nunc addimus squamam minimam, magis, minusve carnosam.

HABITUS.

Omnes hujus Generis Species herbaceae, carnosae, plus minusve fragrantēs. *Caules* aut *Scapi* enodes, erecti, scandentes aut repentes. *Folia* integerrima. *Spadices* axillares vel terminales, ad basim foliorum aut in scapo solitarii vel gemini, aggregati aut paniculati. *Color* ruber in omnibus Speciebus frequens; post exsiccationem roseo colore papyrum tingunt.

Obs. Habitus *Peperomiarum* *scutellaeifoliae*, *crystallinae*, *foliiflorae*, *umbilicatae*, *secundae*, et insertio flosculorum à reliquis Speciebus differunt.

PEPEROMIA SCUTELLAEFOLIA.

1. P. radice tuberosâ , foliis peltatis scutellaeformibus nervosis , scapo erecto. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 29. ICON. XLIV. fig. b.*

PLANTA sesquipalmaris.

HABITAT in *Peruviae* collibus ad *Atiquipa*, ubi Joannes Tafalla descripsit et delineavit.
FLORET Junio , et Julio.

PEPEROMIA UMBILICATA.

- ✓ 2. P. radice tuberosâ , foliis peltatis orbiculatis veniis umbilicatis , scapo laxo. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 30. ICON. XLV. fig. b.*

PLANTA herbacea , palmaris.

HABITAT in collibus *Limae*, *Chancay*, et *Huanuci* supra saxa.
FLORET Junio , Julio et Augusto.

PEPEROMIA SECUNDA.

- ✓ 3. P. foliis cordato-subrotundis , floribus paniculatis secundis. *Flor. Per. et Chil. tom.*

1. pag. 30. ICON. XLV. fig. a.

PLANTA pedalis.

HABITAT in montibus *Pillao* ad *Chacahuassi*
locis umbrosis.

FLORET mensibus Octobri, et Novembri.

PEPEROMIA FOLIIFLORA.

4. P. foliis umbellatis cordatis basi floriferis,
spicis aggregatis flexuosis. *Flor. Per. et*
Chil. tom. 1. p. 30. ICON. XLV. fig. c.

PLANTA semipedalis.

HABITAT in *Chinchao* montibus nemorosis su-
pra saxa et arbores.

FLORET mensibus Julio, et Augusto.

PEPEROMIA CRYSTALLINA.

5. P. foliis oblongis subtus punctato-excava-
tis, spicis oppositifoliis compressis. *Flor.*
Per. et Chil. tom. 1. pag. 30.

PLANTA pedalis.

HABITAT affatim in collibus *Limae*, locis
petrosis.

FLORET ab Aprili ad Septembrem.

VIRES ET USUS: Tota planta gaudet odore

fragrantissimo et suavissimo , *Aniso* valde simili, ideoque ad flatum expellendos summo opere infusum calidum inservit.

PEPEROMIA INAEQUALIFOLIA.

- ✓
+ 6. P. foliis verticillatis obovatis; floralibus majoribus , spicis terminalibus inaequalibus subquaternis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 30. Icon. XLVI. fig. a.*

PLANTA subpedalis.

HABITAT abunde in *Limae* , *Huanuci* , *Tarmae* et *Cantae* locis saxosis , et supra arbores.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE in *Lima Congona* et *Congonita cimarrona* , in *Huanuco Siempreviva* vulgò nōinant.

VIRES ET USUS : Succus hujus plantae doloribus auris et hemicrania sedandae valde opitulatur. Infusum calidè sumptum flatum discutit, ventriculum roborat, et digestionem juvat. Quibusdam etiam condimentis , saporis gratiâ , non infrequenter admiscetur.

PEPEROMIA RHOMBEA.

7. P. foliis quaternis oblongo-rhombeis, spicis terminalibus solitariis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 31. Icon. XLVI. fig. b.*

PLANTA bipalmaris.

HABITAT in silvis *Pillao* ad *Chacahuassi* supra arbores et saxa.

FLORET Octobri, et Novembri.

Obs. Folia post exsiccationem papyrum tingunt.

PEPEROMIA FILIFORMIS.

8. P. foliis verticillatis subrotundo-obovatis, spicis terminalibus oblongis brevibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 31. Ic. XLVII. fig. b.*

PLANTA scandens.

HABITAT in nemoribus *Chinchao* supra saxa, et arbores.

FLORET Julio, et Augusto.

PEPEROMIA CONCAVA.

- + 9. P. foliis oppositis verticillatisque ovalibus
subtus convexis quinquenervibus, spicis
solitariis terminalibus. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 1. pag. 31. Icon. XLVI. fig. c.

PLANTA bipalmaris.

HABITAT in nemoribus *Chinchao* et *Cuchero*
supra saxa.

FLORET Julio, et Augusto.

PEPEROMIA TETRAGONA.

- + 10. P. foliis oblongis quinquenervibus acutis,
spicis terminalibus geminis longissimis. *Fl.*
Per. et Chil. tom. 1. p. 31. Ic. XLVII.
fig. a.

PLANTA pedalis.

HABITAT in nemoribus *Chinchao*.

FLORET Junio, et Julio.

PEPEROMIA SEPTEMNERVIS.

- + 11. P. foliis lanceolatis septemnervibus coria-
ceis, spicis subulatis folio longioribus.

Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 31. Icon.

XLVII. fig. c.

PLANTA pedalis.

HABITAT in nemoribus Pozuzo supra saxa.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

PEPEROMIA PUBESCENS.

12. P. foliis obovatis trinerviis subtus pubescentibus, spicis ternis; intermediâ longissimâ. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 31.*

PLANTA bipedalis.

HABITAT in umbrosis montibus Huassahuasi supra saxa.

FLORET Octobri, et Novembri.

PEPEROMIA ALATA.

13. P. foliis lanceolatis quinquenerviis, caule alato, spicis subulatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 31. Ic. XLVIII. fig. b.*

PLANTA pedalis.

HABITAT in nemoribus Pozuzo, supra saxa.

FLORET Julio, et Augusto.

PARS I.

C

PEPEROMIA PURPUREA.

14. P. foliis ovatis acuminatis venosis, spicis
laxis dependentibus. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 1. pag. 32. Icon. XLIX. fig. b.

PLANTA subpedalis.

HABITAT in montibus *Chinchao*, umbrosis et
saxosis locis.

FLORET Julio, et Augusto.

PEPEROMIA PILOSA.

- + 15. P. foliis oblongo-lanceolatis acutis basi
inaequalibus, spicis axillaribus solitariis. *Fl.*
Per. et Chil. tom. 1. p. 32. Ic. L. fig. a.

PLANTA semipedalis.

HABITAT in nemoribus *Pozuzo*, locis um-
brosis.

FLORET Augusto, et Septembri.

PEPEROMIA TRINERVIS.

- ✓ 16. P. foliis ovalibus acutis trinerviis, spi-
cis axillaribus solitariis; terminalibus binis
erectis tenuibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1.*
pag. 32. Icon. L. fig. b.

PLANTA pedalis.

HABITAT in montibus *Chinchao*, umbrosis locis.

FLORET Julio, et Augusto.

PEPEROMIA OBLIQUA.

17. P. foliis oblongo-obovatis obliquis nervosis, spicis furcatis filiformibus. *Fl. Per.*

et Chil. tom. 1. pag. 32. ICON. LI. fig. c.

Piper (acuminatum) LINN. *Sp. pl. pag.*

42. Saururus alius humilis, folio carnosio

acuminato. PLUMIER. *Amer. p. 54. t. 71.*

PLANTA pedalis.

HABITAT in nemoribus *Cuchero*, *Pozuzo* et

Pillao.

FLORET Julio, et Augusto.

PEPEROMIA ACUMINATA.

18. P. foliis obovatis acuminatis, spicâ filiformi acutâ. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 32.*

ICON. LI. fig. a.

PLANTA pedalis.

HABITAT in nemoribus *Muña*, *Pillao* et *Macora.*

FLORET à Majo ad Novembrem.

PEPEROMIA STRIATA.

19. P. foliis oblongo-ovatis acutis utrinque pubescentibus, spicis compositis terminalibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 32.*

ICON. LII. *fig. b.*

PLANTA pedalis.

HABITAT in nemoribus *Cuchero* et *Chinchao*, umbrosis locis.

FLORET Augusto, et Septembri.

PEPEROMIA SCANDENS.

20. P. foliis cordato-subrotundis, caule scandente repente, spicis axillaribus solitariis.

Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 32.

ICON. LI. *fig. b.*

PLANTA scandens.

HABITAT in nemoribus *Chinchao*, *Cuchero*, *Pozuzo* et *Macora*.

FLORET à mense Augusto ad Novembrem.

PEPEROMIA DEPENDENS.

✓ 21. P. foliis cordatis 13nervibus dependentibus, spicis terminalibus subulatis. *Flor.*

4

*Per. et Chil. tom. 1. p. 33. Ic. XLVIII.
fig. a.*

PLANTA pedalis.

HABITAT in locis umbrosis Pozuzo.

FLORET Septembri, et Octobri.

PEPEROMIA EMARGINATA.

22. P. foliis obovatis emarginatis aveniis, pedunculis furcatis bispicatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 33. Ic. XLIX. fig. a.*

PLANTA repens.

HABITAT in silvis Pozuzo, locis umbrosis supra saxa.

FLORET Septembri, et Octobri.

PEPEROMIA VARIEGATA.

23. P. foliis cordato-ovatis peltatis, spicis geminis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 33. ICON. LII. fig. a. PIPER (maculosum). LINN. Sp. pl. pag. 42. PLUMIER. Amer. pag. 60. tab. 66.*

PLANTA repens.

HABITAT in montibus Pillao ad Chacahuassi, in locis umbrosis.

PEPEROMIA MONOSTACHYA.

24. P. foliis obovatis ovatisque, caule simplicissimo, spicâ unicâ terminali. *Flor.*

Per. et Chil. tom. 1. pag. 33.

PLANTA bipalmaris.

HABITAT in montibus *Chinchao*, supra arborum vetustarum truncos.

FLORET mensibus Augusto, et Septembri.



CLASSIS III.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

HETERANTHERA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 9. ICON II.

CALYX: *Spatha* univalvis, subquadriflora.
Corolla sexfida; inaequalis. *Filamenta* inaequalia. *Antherae* biformes. *Capsula* trilocularis, polysperma.

HETERANTHERA RENIFORMIS.

1. H. foliis reniformibus, caule repente. *Fl.*
Per. et Chil. tom. 1. p. 43. ICON. LXXI.
fig. a.

PLANTA herbacea, stolonifera.

HABITAT in Provincia Cercado, in paludibus et stagnatis *Lurin*, *Limae*, *Surco*, *Miraflores*, *Magdalena* et *Lurigancha*.

FLORET Decembri, et Januario.

II ANTHODON.

Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 45.

CALYX pentaphyllus. Cor. Petala quinque, inaequalia. Nect. Discus minimus, cyathiformis.

ANTHODON DECUSSATUM.

✓ 1. A. corymbis dichotomis, foliis oblongis
-obleviter serratis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1.*
+ *pag. 45. ICON. LXXIV. fig. b.*

FRUTEX volubili-scandens.

HABITAT in nemoribus Andium prope Pozuzo vicum.

✓ FLORET Augusto, et Septembri.

CALYXHYMENIA.

✓ *Ortega. Dec. 1. pag. 5. tab. 1.*

COROLLA monopetala. Calyx quinquefidus, pentagonus, in fructu membranaceus, ampliatus, expansus. *Nux. Decemb.*

CALYXHYMENIA EXPANSA.

1. C. floribus dichotomo-corymbosis, foliis ovatis subrepandis glabris, staminibus corollae longitudine. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 45. ICON. LXXV. fig. a.*

PLANTA perennis, sexpedalis.

HABITAT in collibus aridis *Chancay* et *Lima* ad *Amancaes*.

FLORET Augusto, et Septembri.

CALYXHYMENIA OVATA.

2. C. floribus dichotomo-corymbosis, foliis ovatis viscosis hirsutis, staminibus corollae ferè longitudine. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 45. ICON. LXXV. fig. b.*

PLANTA perennis, tripedalis.

HABITAT in collibus *Chancay* Provinciae ad *Huaura* oppidum et in montibus *Lachay*, *Pasamayo* et *Jequan*.

FLORET Majo, et Junio.

CALYXHYMENIA PROSTRATA.

3. C. floribus subcorymbosis, foliis cordatis
- PARS I. D

ovatisque , staminibus corollâ brevioribus.

Flor. Per. et Chil. tom. I. pag. 46. Icon.

LXXV. fig. c.

PLANTA herbacea, tripedalis.

HABITAT in collibus dictis *Lomas de Atiquipa* in *Camanae* Provincia.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VULGO *Pegapega*.

CALYXHYMENIA VISCOSA.

✓ 4. C. floribus paniculatis, foliis cordatis, staminibus corollâ duplò longioribus. *Flor.*

+ *Per. et Chil. tom. I. pag. 46. MIRABILIS*

(*viscosa*). CAVANILL. *Icon. vol. I. pag.*

13. n. 17. t. 19.

PLANTA perennis, orgyalis.

HABITAT affatim in versuris et plateis *Huanu*ci urbis.

FLORET per totum ferè annum. In Reg. Hort.

Matrit. floret à Julio ad Novembrem ex seminibus missis per nosmetipsos.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

PALTORIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 13.

ICON. XXXIII.

COROLLA rotata. *Calyx* minimus, quadrifidus. *Stigma* magnum, tetragonum. *Bacca* quadrilocularis. *Semina* solitaria.

PALTORIA ovalis.

I. P. foliis ovalibus crenatis, pedunculis subtrifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 54.*

ICON. LXXXIV. *fig. b.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* montibus altissimis, *Andium* dictis, Provinciae *Tarmae* ad *Churupallana* et *Siussa* tractus.

FLORET Novembri, et Decembri.

VERNACULE *Quinti*.

COCCOCIPSILUM.

BROWN. *Jam. pag. 144. tab. 6. fig. 1.*

CONDALIA. *Gen. pl. Fl. P. et C. p. 11. Ic. II.*

COROLLA infundibuliformis. *Calyx* quadridentatus. *Stamina* fauci inserta. *Stigmata* duo. *Bacca* bilocularis, cava, spongiosa. *Semina* lentiformia, libera.

Obs. Genus nostrum *Condaliae* ad *Coccocipsili* Genus redigi debere, novis observationibus persuasi, libenter fatemur.

COCCOCIPSILUM REPENS.

✓ 1. C. foliis ovatis acutis, caule repente, pedunculis tri-multifloris umbellatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 54. Icon. LXXXIV. fig. a.*

PLANTA herbacea, pedalis.

HABITAT in nemoribus *Panatahuarum* ad *Pillao*, *Cuchero* et *Chinchao* runcationes.

FLORET à Julio ad Octobrem.

COCCOCIPSILUM SESSILE.

✓ 2. C. foliis oblongis acutis, floribus sessilibus

congestis axillaribus. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 1. pag. 54.

PLANTA suffruticosa, tripedalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Chinchao* vicum, per runcationes et tramites.

FLORET Augusto, et Septembri.

COCCOCIPSILUM OBOVATUM.

3. C. foliis obovatis acuminatis, pedunculis
aggregatis, floribus racemosis. *Flor. Per.*
et Chil. tom. 1. pag. 54.

PLANTA suffruticosa, tripedalis.

HABITAT in nemoribus *Andium* ad *Chinchao*
montes.

FLORET Augusto, et Septembri.

COCCOCIPSILUM LANCEOLATUM.

4. C. foliis lanceolatis integerrimis, caule ra-
dicante, pedunculis multifloris. *Flor. Per. et*
Chil. tom. 1. pag. 54.

PLANTA herbacea.

HABITAT in nemoribus *Cuchero* et *Chinchao*,
locis umbrosis.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

OHIGGINSIA.

Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 55.

COROLLA infundibuliformis; limbo quadripartito. *Calyx* quadridentatus. *Bacca* bilocularis, bisulca, umbilicata, polysperma.

HABITUS.

Plantae fruticosae. *Caules* erecti, obtusè tetragoni. *Folia* opposita aut verticillata. *Petiolus* et *nervus* subtus utrinque sulcati. *Stipulae* interfoliaceae. *Pedunculi* axillares aggregati, aut solitarii multiflori.

OHIGGINSIA AGGREGATA.

✓ 1. O. foliis oppositis lanceolatis, pedunculis aggregatis verticillatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 55.* ICON. LXXXIII. fig. b.

PLANTA fruticosa, tripedalis.

HABITAT in nemoribus Cuchero, Chinchao et Muña.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

OHIGGINSIA VERTICILLATA.

2. O. foliis ternis lanceolatis, pedunculis solitariis dependentibus subquadrifloris. *Fl. Per. et Chil. tom. 1. p. 55. Ic. LXXXV. fig. a.*

PLANTA fruticosa, tripedalis.

HABITAT in *Muña* nemoribus per runcationes, vernaculè *Carpales* dictas.

FLORET Augusto, et Septembri.

OHIGGINSIA OBOVATA.

3. O. foliis oppositis obovatis acuminatis, pedunculis aggregatis multifloris inaequalibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 56.*

ICON. LXXXV. fig. b.

PLANTA fruticosa, quadripedalis.

HABITAT in umbrosis locis *Panatahuarum* Provinciae ad *Muña*.

FLORET Julio, et Augusto.

GONZALAGUNIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 12. Ic. III.

CALYX campanulatus, minimus, quadridentatus. *Pericarpium* baccatum, obsolete tetragonum, *Cocculas* quatuor, osseas, evalves, polyspermas includens.

GONZALAGUNIA *DEPENDENS*.

✓ I. G. foliis ovatis acutis, ramis dependentibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 56.*

+ ICON. LXXXVI. *fig. a.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus inter *Chincho* vicum et *Pati* praedium.

FLORET Augusto, et Septembri.

NERTERIA.

SMITH. *Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 17.*

ICON. XXXIII.

CALYX: *Margo* minimus. *Corolla* decidua.
Bacca disperma.

NERTERIA REPENS.

1. N. foliis ovatis subrotundisque, caule repente. *Flor. Per. et Chil. tom. I. pag. 60.*
ICON. XC. fig. b. NERTERIA (depressa).
GAERTNER. sem. pag. 124. tab. 26. SMITH.
fascic. 2. pag. 28. ICON. XXVIII. Go-
mozia (granadensis). LINN. fil. supp. pl.
pag. 129.

PLANTA herbacea, procumbens.
 HABITAT in scaturiginibus *Huassahuassi* et
Muñia inter muscos, et ad rivulorum mar-
 gines circa *Conceptionis* *Chile* urbem.

KRAMERIA.

LINN. *Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 14.*
ICON. III.

COROLLA tetrapetala. *Nectarium* tetraphyl-
 lum, biforme. *Antherae* biperforatae. *Dru-*
pa lappacea.

KRAMERIA TRIANDRA.

1. K. foliis oblongis obovatisque acuminatis,

PARS I.

E

floribus triandris , corollis tetrapetalis. *Fl.*
Per. et Chil. tom. 1. pag. 61. *Icon.*
XCIH. Mem. Reg. Acad. Matrit. vol. 1.
pag. 364.

PLANTA suffruticosa , ulnaris.

HABITAT in *Peruviae* declivibus montium
argillosis, arenosis et aridis, per *Huanuci*,
Tarmae, *Cantae*, *Xauxae*, *Huaroherí*,
Caxatambo et *Huamalies* Provincias, co-
piosè verò prope *Huanuci* urbem ad *Pue-*
lles collem.

FLORET per totum ferè annum, sed praeser-
tim Octobri, et Novembri.

VERNACULE *Ratanhia* in *Huanuco* dicitur.
Tarmenses *Pumacuchu*, id est, Calyp-
tram Leonis, et *Mapato*, id est, Plantam
tomentosam, nuncupant. Hispani tandem
Raiz para los dientes appellant.

VIRES ET USUS: Experientia in dies confirmat,
hujus plantae radicem specificum stipticum
esse ad sanguinis fluxus sistendos, et dy-
senterias corrigendas. Ad ulcera gingiva-
rum detergenda maximè opitulatur, ideo-
que dentes firmat, et ob suam amaritudi-

nem stomachum roborat. Extractum efficaciores vires habet, quàm infusum aut decoctum radicum, quibus Incolae ad dentes detergendos utuntur. Dosis Extracti Ratanhiae in adultis drachma una.

KRAMERIA PENTAPETALA.

2. K. foliis linearì-subulatis, floribus tetrandris, corollis pentapetalis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 62. Ic. XCIV. fig. a.*

PLANTA suffruticosa.

HABITAT in collibus argillosis ad Panathuarum Provinciam.

FLORET Novembri, et Decembri.

EMBOTHRUM.

LINN. Gen. pl. *Flor. Per. et Chil. pag. 15.*

ICON. III.

PETALA spathulata, revoluta, apice concava. *Antherae* cavitatibus petalorum insidentes. *Calyx*: Margo semicircularis. *Folliculus* oblongus. *Semina* compressa, alâ membranaceâ cincta.

EMBOTHRIMUM LANCEOLATUM.

✓ 1. E. foliis lanceolato-linearibus integerrimis.

+ Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 62. ICON.
XCVI.

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in Regni Chilensis collibus et montibus excelsis inter Conceptionis urbem, et Arauci Arcem, praesertim ad Villagra collem.

FLORET Septembri, et Novembri.

Obs. Anno M. DCC. LXIX. et M. DCC. LXX. quo tempore Indi Araucani adversus Hispanos rebellarunt, Hispani milites ab iisdem Indis in Villagra colle circumventi hujus plantae semina colligere, et placentis ex eorum farina paratis et cocctis vesci ob cibariorum inopiam coacti sunt.

EMBOTHRIMUM EMARGINATUM.

✓ 2. E. foliis oblongis emarginatis integerrimis. que. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 62.

+ ICON. XCV.

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in collibus frigidis Provinciarum *Tarmae*, *Huanuci*, *Panatahuarum* et *Huamalies*.

FLORET Septembri, et Octobri.

VERNACULE in *Tarma* dicitur *Catas* et *Marchinparrani*, in Huanuco *Picahuai*.

VIRES ET USUS. Folia contusa dolores dentium sedant. Indi ad Tempia et Simulacra diebus festis decoranda florum racemis utuntur.

EMBOTHRIUM DENTATUM.

3. E. foliis obovatis dentatis; marginibus revolutis. *Flor. Per. et Chil. tom. I. pag. 62. ICON. XCIV. fig. b.*

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in nemoribus et silvis *Regni Chiliensis* ad Provinciam *Rere*, aliàs *Estancia del Rey*.

FLORET Decembri, et Januario.

VERNACULE *Piñel* vocatur.

EMBOTHRIUM OBLIQUUM.

4. E. foliis ovatis serratis glabris, petalis api-

ce obliquis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 63. ICON. XCVII.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in *Conceptionis Chile* et *Puchacay* Provinciarum montibus ad *Nonguen* et *Carcamo* tractus.

FLORET à Majo ad Octobrem.

VERNACULE nomen *Raral* habet.

EMBOTHRIUM MONOSPERMUM.

- ✓ 5. E. foliis ovatis serratis lanuginosis, folliculis monospermis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 63. ICON. XCVIII.*

ARBOR triorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* montibus frigidis prope *Panao* vicum ad *Portachuelo* declivia.

FLORET Septembri, et Octobri.

VERNACULE *Pacopaco de la Sierra.*

EMBOTHRIUM PINNATUM.

- ✓ 6. E. foliis simplicibus pinnatisque. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 63. Ic. XCIX. fig. a.*

ARBOR quadriorgyalis.

HABITAT in *Muña* ruderatis et versuris.

FLORET Aprili, et Majo.

VERNACULE *Pacopaco* nuncupatur.

QUADRIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 16.

ICON. XXXIII.

CALYX nullus. *Corolla* tetrapetala, petalis
spathulatis apice concavis; tribus revolu-
tis; superiori erecto. *Stamina* brevissima
cavitatibus petalorum insidentia. *Drupa*
monosperma.

QUADRIA HETEROPHYLLA.

1. *Q. foliis pinnatis bipinnatisque, racemis*
longis simplicibus, pedunculis bifloris. Fl.
Per. et Chil. tom. 1. pag. 63. Ic. XCIX.
fig. b. NEB. FEWILL. tom. 3. pag. 46.
planch. 33. GUEVINA. Mol. Comp. Hist.
Chil. pag. 198?

ARBOR sexorgyalis.

HABITAT copiosè in silvis et collium radici-
bus *Conceptionis Chile, Itatae, Maule,*

Rere , *Puchacay* et *Arauco*.

FLORET Februario , et Martio.

VERNACULE ab Indis *Nebú*, vulgò *Avellano*
à reliquis Incolis nominatur.

VIRES ET USUS : Incolae fructus decerpunt,
atque per paucos dies sole aëreque siccatos
Peruvianis frequenter in ea loca affluentibus
magno lucro vendunt. *Nuclei* jucundi
sunt gratique saporis, quos etiam saccharo
incrustare solent. *Lignum* ob duritiem et
flexibilitatem optimum est ad asseres , re-
mos variaque alia utensilia formanda. Fructuum
Cortices ob suam adstringentiam loco
corticum Granatorum subrogari merentur.
Oleum per expressionem ex nucleis
extrahi potest.

TETRAGYNIA.

RIQUEURIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 18.

CALYX triplex. *Cor. Petala* quatuor , concava.
Filamenta compressa. *Capsula* quadrilocularis , stylis coronata.

RIQUEURIA AVENIA.

1. R. foliis oblongis aveniis, racemis terminalibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 70.*

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Chinshao* et *Cuchero* vicos, praesertim juxta *Cassape* et *Cassapillo* praedia.

FLORET Julio, et Augusto.



CLASSIS V.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

ALDEA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 19.

CAPSULA unilocularis, bivalvis, disperma,
calyce obvoluta. Corolla campanulata. Stylus bifidus.

ALDEA PINNATA.

✓ 1. A. foliis pinnatis, superioribus simplicibus.
Flor. Per. et Chil. tom. 2... ICON. CXIV.

+ PLANTA herbacea, pedalis.

HABITAT in arenosis Conceptionis Chile et in
Peruvia ad Cheuchin Provinciae Caxa-
tambo.

FLORET Novembri in Regno Chilensi, et in
Cheuchin mense Aprili.

VERNACULE in Chile Champa.

USUS : Folia ad atramentum conficiendum
valent.

NAVARRETIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 20.

CAPSULA unilocularis, bivalvis, membranacea. *Corolla* infundibuliformis. *Stigma* bifidum.

NAVARRETIA INVOLUCRATA.

1. N. foliis pinnato-multifidis; laciniis linearisubulatis, bracteis multifidis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

PLANTA herbacea, semipedalis.

HABITAT in *Chile* umbrosis et stagnatis ad *Guilquileumu* in Provincia *Rere*.

FLORET Decembri, et Januario.

SESSEA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 21.

ICON. XXXIII.

CAPSULA teres, curvata, unilocularis, bivalvis: *valvulis* bifidis. *Semina* imbricata, membranâ cincta. *Corolla* infundibuliformis. *Stigma* bilobum, altero breviori.

S E S S E A S T I P U L A T A .

- ✓ 1. *S. foliis lanceolatis cordatisque , racemis paniculatis. Flor. Per. et Chil. tom. 2. ICON. CXV.*

FRUTEX foetidus , orgyalis.

HABITAT in *Peruviae* montibus *Huanuci* locis frigidis ad *Nauyan* et *Rondos*.

FLORET Junio , et Julio.

S E S S E A D E P E N D E N S .

- ✕ 2. *S. foliis cordato-oblongis , racemis longissimis pendulis. Flor. Per. et Chil. tom. 2. ICON. CXVI.*

ARBOR quinqueorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* ripis ad *Huassahuassi* vicum in Provincia *Tarmae*.

FLORET Novembri , Decembri et Januario.

F A B I A N A .

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 22.

ICON. XXXIV.

CAPSULA bilocularis, bivalvis. *Corolla* infundibuliformis , limbo plicato , revoluto. Tu-

bus longissimus , infernè attenuatus. *Stamina* inaequalia. *Stigma* emarginatum.

FABIANA IMBRICATA.

1. *F. foliis imbricatis ovatis minimis. Flor.*

Per. et Chil. tom. 2. ICON. CXXII.

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in *Regni Chilensis* campis et ripis arenosis in Provinciis *Rere* et *Itatae*, et praesertim juxta fluvium *la Laxa*.

FLORET Decembri , et Januario.

VERNACULE *Pichi*.

VIRES ET USUS: Efficacissimum adversus *Pizguin* morbum, quo *Caprae* et *Arietes* laborant , praesidium est. Folia amaro sapore, *Canchalaguae* haud dissimili, gaudent.

NIEREMBERGIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 23.

CAPSULA bilocularis, bivalvis. *Corolla* subhypocrateriformis. *Faux* coarctata , plicata. *Stamina* inaequalia , supernè adpressa. *Stigma* bilobum.

NIEREMBERGIA REPENS.

1. N. caule repente, foliis oblongis. *Flor.*

Per. et Chil. tom. 2. ICON. CXXIII fig. c.

PLANTA herbacea, pedalis.

HABITAT in *Regni Chilensis* campis apricis
et pascuis arenosis *Conceptionis*.

FLORET Februario, Martio et Aprili.

XUAREZIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 24. Ic. IV.

CAPSULA bilocularis, bivalvis: *valvulis* bifidis. *Corolla* rotata. *Stigma* compressum.

XUAREZIA BIFLORA.

✓ 1. X. foliis lanceolatis supernè serratis, floribus geminis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

+ *ICON. CXXIII. fig. b. CAPRARIA (peruviana) FEWILL. tom. 2. pag. 764. planch. 48.*

PLANTA fruticosa, quadripedalis.

HABITAT in *Peruviae* arenosis ripis et argillosis *Limae*, *Lurini*, *Huanuci* et *Chancay*.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VERNACULE Thé del Perú.

Obs. De hoc Frutice agens P. Fewilleus asserit, ignotum in *Peruvia*, et neglectum fuisse ante annum M. DCCIX, quo tempore ejus vires easdem esse ac Theae orientalis primum innotuit usque adeo, ut Incolae illius usum, quem frequenter adhibent, hujus usui subrogaverint, neque *Limae* jam exterae Theae particulam invenire liceat.

GILIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 25. Ic. IV.

CAPSULA trilocularis, trigona, polysperma.

Corolla infundibuliformis. *Filamenta* aequalia, incisuris corollae inserta, prominula. *Stigmata* tria.

GILIA LACINIATA.

1. G. foliis pinnatifidis-laciniatis, floribus capitatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2. Icon. CXXIII. fig. b.*

PLANTA herbacea, pedalis.

HABITAT in *Peruviae* collibus arenosis *Li-*

mae, *Arnedo*, *Huaura* et *Huassahuassi*.
FLORET Junio, Julio et Augusto.

PERIPHHRAGMOS.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 26. Ic. IV.
CANTUA A. L. JUSSIEU. Gen. pl. p. 136.

CAPSULA trilocularis. *Corolla* hypocrateriformis. *Antherae* sagittatae. *Germen* corpori glanduloso pentagono insidens. *Semina* imbricata, margine membranaceo cincta. *Receptaculum* trigonum.

VI. *PERIPHHRAGMOS FLEXUOSUS.*

✓ 1. *P.* foliis lanceolatis acuminatis, floribus corymbosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

+ *ICON. CXXXI.*

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in versuris ad *Muña*, *Huanuci* et *Huariaca*.

FLORET á Majo ad Augustum.

VERNACULE in *Huariaca* nominatur *Turu*.

VIRES ES USUS. Cum substantia mucosa saponacea, quam folia in aqua manibus stricta emittunt, vestimenta Indi eluunt. Sapor

foliorum acidulus et amariusculus percipitur. Folia masticata colore luteo elegantissimo salivam imbuunt: quapropter ad lintea tingenda tam Folia quàm Lignum adhiberi posse censemus.

PERIPHRAGMOS FOETIDUS.

2. P. foliis lanceolatis glabris, pedunculis subtrifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*
ICON. CXXXII.

FRUTEX orgyalis, foetidus.

HABITAT in locis umbrosis et ruderatis prope Conceptionis Chile urbem ad Carcamo tractus.

FLORET Junio, et Julio.

VERNACULE Huevillhuevill.

VIRES ET USUS: Ad sanguinis ardores mitigandos Indi clysteres et decoctum usurpant. Febri tabificae Congo aut Chavalongo, et dysenteriae decoctum aut infusum opitulatur. Sapor foliorum amarus et acidulus. Lignum et Folia masticata luteum colorem praebent, et ad lintea imbuenda inserviunt.

PARS I.

G

PERIPHRAGMOS DEPENDENS.

- ✓ 3. P. foliis obovatis acuminatis aveniis, ramis
+ dependentibus, floribus corymbosis. *Flor.*
Per. et Chil. tom. 2. ICON. CXXXIII.

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* versuris et circuitu
Chacllae, Cantae et Tarmae.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE Ccantu nuncupatur.

Usus : Sapor foliorum praecedentibus amari-
rior : Lignum et folia masticata luteo co-
lore salivam imbuunt, ideoque ad lintea
inficienda utilia existimamus.

Obs. Ex eo quod ad vicos tantum aut in eo-
rum ruderatis hi Frutices passim inveniun-
tur, probabiliter inferri potest Indos Eth-
nicos aliquem ex eisdem usum factitasse;
quamquam in praesens nullum alium sci-
mus fieri praeter eum, quem flores ad tem-
plorum cultum praestant, et ornatum in die-
bus festis. Proditum quoque est à Societa-
tis Jesu Sacerdotibus, veteres Indos hunc
Fruticem *Arborem magicam* nuncupavisse,

quod nostram de ejusdem usu suspicionem quodammodo comprobat.

PERIPHRAGMOS UNIFLORUS.

4. P. foliis obovatis integris, nonnullis bi-quadrifido-dentatis, floribus solitariis. *Fl. Per. et Chil. tom. 2. CANTUA (ovata).* CAVANILL. *Icon. vol. 4. p. 43. n. 401. tab. 363.*

FRUTEX triulnaris.

HABITAT in *Peruviae* septis, per *Huarocharí*, *Tarmae* et *Cantae* Provincias.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VERNACULE *Ccantuttica*.

Obs. Hoc Genus *Periphragmos* graecè nominavimus, quia ejus Species circa sepes vicorum et ruderatorum crescere amant; neque *Cantua* nomen, quod A. L. Jussieus ei imposuit, adoptandum censemus, quoniam barbarum nomen *Ccantu*, unde id desumpsit haud omnibus Speciebus commune est, neque hoc ipso nomine *Ccantu Periphragmon* aliis provinciis designant.

VALLESIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 28. Ic. V.

DRUPAE duae, divergentes. *Nux* striato-reticulata. *Calyx* minimus. *Corolla* hypocrateriformis, fauce et basi globosa. *Stamina* faucibus inserta.

VALLESIA DICHOTOMA.

✓ 1. V. foliis ovatis acutis undulatis, racemis dichotomis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

+ FRUTEX triulnaris.

HABITAT in Peruviae ruderatis ad Icae Provinciam.

FLORET Octobri, et Novembri.

SARACHA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 31.

ICON. XXXIV.

BACCA unilocularis, ad medium ferè calyce involuta. *Calyx* quinqueangulatus. *Corolla* rotata. *Stamina* erecta, basi corollae inserta. *Semina* in cellulis totidem nidulantia. *Receptaculum* carnosum.

Obs. 1. Hoc Genus differt à *Physalidis* et *Nicandrae* Generibus *Corollâ* rotatâ, *Staminibus* erectis, *Baccâ* uniloculari, *Calyce* vix semicinctâ: ab *Atropa* Linnaei *Calyce* quinquefido; *Corollâ* rotatâ, *laciniis* aequalibus, reflexis; *Staminibus* erectis, internè dilatatis, basi corollae insertis; *Stylo* erecto; *Stigmate* truncato; *Baccâ* uniloculari; *Seminibus* compressis, nidulantibus in totidem cellulis.

Obs. 2. Huic Generi *Scopolia carniolica*.
JACQ. *Observ. Bot. part. 1. pag. 32.*
tab. 20. valde affinis videtur.

SARACHA PUNCTATA.

1. *S. foliis* ovato-oblongis solitariis, corollis punctatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

PLANTA suffruticosa, bi-tripedalis.

HABITAT in alpibus *Muña* ad *Tambo nuevo*,
et in *Canta* propè *Obragillo* vicum.

FLORET Augusto, et Septembri in *Muña*,
mensibus Martio, et Aprili in *Canta*.

VIRE ET USUS. Folia contusa anodynâ, depu-

ratoriâ et emollienti virtute gaudent.

Obs. Sapor foliorum amarissimus.

SARACHA BIFLORA.

- ✓ 2. S. foliis ovatis subgeminis, pedunculis bifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

✚ PLANTA perennis, bipedalis.

HABITAT in *Peruvia* ad *Huassahuassi* vicum inter segetes et sepes.

FLORET Novembri, et Decembri.

VERNACULE *Tomate Cimarron*, id est, *Pomum aureum silvestrem*.

VIRES ET USUS: Folia contusa, et axungia suillâ mixta emollienti et anodynâ vi pollent.

SARACHA CONTORTA.

- ✓ 3. S. foliis ovatis angulato-dentatis integrisque, pedunculis multifloris umbellatis. *Fl. Per. et Chil. tom. 2.*

✚ PLANTA herbacea, ulnaris.

HABITAT in praeruptis *Cantae* ad *Obragillo* vicum.

FLORET per totum ferè annum.

VIRES: Folia emollientia et anodyna sunt.

SARACHA PROCUMBENS.

4. *S. foliis geminis ovatis integerrimis, pedunculis subquadrifloris umbellatis. Flor. Per. et Chil. tom. 2. ATROPA (procumbens). CAVANILL. vol. 1. pag. 53. n. 80. tab. 72.*

PLANTA herbacea, tripedalis.

HABITAT in *Cantae* Provincia ad *S. Bonaventurae* vicum.

FLORET Januario, et Februario.

VIRES: Folia anodynam et depuratoriam virtutem habent.

SARACHA DENTATA.

5. *S. foliis geminis ovatis integris dentatisque, pedunculis subquadrifloris. Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

PLANTA herbacea, procumbens.

HABITAT in versuris *Cantae* ad *Obragillo* vicum.

FLORET Januario, et Februario.

VIRES: Folia cum axungia suilla cocta, et in cataplasmatibus formam contusa, ad tumores

emolliendos et illorum dolores sedandos.
adhibentur.

CERDANA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 37. Ic. VI.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* tubulatum, decemstria-
tum, quinquedentatum; inferum, persistens.

COR. infundibuliformis, marcescens, persis-
tens. *Tubus* longitudine calycis. *Limbus*
quinquepartitus: *laciniis* oblongis, paten-
tibus.

Nectar. minimum, cyathiforme, quinque-
crenatum, *germen* ambiens.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, fauci
corollae inserta, basi hirsuta, laciniarum
longitudine. *Antherae* oblongae, basi bifi-
dae, versatiles, biloculares.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis,
bifidus, staminibus brevior. *Stigmata* duo,
oblonga, bipartita.

PER. oblongum, striatum, calyce et corollâ
tectum, quadriloculare.

SEM. solitaria, oblonga.

Obs. Corolla germine adulto pentapetala apparet, et Germen ipsum loculamentum unum alterumve amittit.

CHARACTER DIFFERENTIALIS.

PERICARPIUM tetraspermum. *Calyx* tubulosus, decemstriatus. *Corolla* infundibuliformis; *limbo* quinquepartito. *Filamenta* faucis corollae inserta. *Nectarium* germen ambiens. *Stigmata* duo, bipartita.

CERDANA ALLIODORA.

1. C. foliis oblongis ovatisque, floribus paniculatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

ARBOR subquadragesimularis.

HABITAT in nemoribus Pozuzo et Muña in tractu de la Cormilla nuncupato, et ad Sancti Antonii de Playa grande vicum.

FLORET Julio, et Augusto.

VULGO Arbol del Ajo.

USUS : Indi corticibus et foliis ad cibos condiendos utuntur.

Obs. Cùm hujusmodi arbores secantur, odo-

PARS I.

H

rem gravissimum emittunt , et penetrantissimum , qui oculorum arcem perstringit. Cortices recenter evulsi odorem valde foetidum , vulpis urinae haud multum absimilem spirant; postea verò Folia uti etiam Cortex, allium maximè redolent, unde nomen ab Incolis Arbor accepit. Quaedam exiguae Formicae, quarum punctio acrem intolerabilemque pruriginem diù persistentem excitat , frequenter has arbores infestantes folia devorant , ita ut vix ulla inveniri possint integra.

JUANULLOA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 27. Ic. IV.

BACCA bilocularis , calyce obvoluta. *Calyx* magnus , ovatus , inflatus , quinquepartitus. *Corolla* tubulosa , gibba , ore angustato. *Stigma* oblongum. *Semina* reniformia, à pulpa libera.

JUANULLOA PARASITICA.

1. J. foliis oblongis acuminatis , racemis de-

pendentibus dichotomis. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 2.

PLANTA frutescens , parasitica.

HABITAT in nemoribus *Pozuzo* supra truncos
arborum.

FLORET Augusto , et Septembri.

Obs. Sapor foliorum asper et parum ad-
stringens est.

DESFONTAINIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 29. Ic. V.

BACCA quinquelocularis , polysperma. Coro-
lla tubuloso-campaniformis. Tubus penta-
gonus. Stamina fauci inserta , brevissima.
Antherae sagittatae.

DESFONTAINIA SPINOSA.

I. D. foliis ovatis dentato-spinosis , floribus
solitariis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Churu-*
pallana praedium in Provincia *Tarma* , et
ad *Pozuzo* vicum.

FLORET Octobri , et Novembri.

Obs. Sapor foliorum amarissimus, ad *Gentianam* accedens. Folia masticata papyrus luteo colore tingunt. Frutex ad sepes conficiendas perutilis, et ob florum pulchritudinem ad hortorum ornamentum adhiberi dignus est.

NYCTERISITION.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 30. Ic. V.

PERICARPIUM quinqueloculare, pentaspermum. *Semina* solitaria. *Calyx* pentaphyllus. *Corolla* campanulata. *Stamina* infra incisuras corollae. *Stigma* quinquedentatum.

NYCTERISITION FERRUGINEUM.

✓ 1. N. foliis oblongo-ovatis, floribus aggregatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

+ ARBOR quadragintaulnaris.

HABITAT in *Cuchero* et *Pillao* ad *Chacahuasi* nemoribus.

FLORET Octobri, et Novembri.

VERNACULE *Chichimicuna*, id est, vespertilionum cibus. Lignum durissimum et ful-

vi coloris est. Arbor incisa succum lacteum exsudat, qui aëri expositus sanguineum colorem acquirit. Sapor foliorum subadstringens est.

LYGODISODEA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 52. Ic. V.

CAPSULA unilocularis, compressa, membranacea, basi bivalvis, disperma. *Semina* orbiculata, compressa, membranâ cincta. *Receptaculum* filiforme. *Calyx* superus, quinquepartitus. *Corolla* infundibuliformis. *Stigmata* duo.

LYGODISODEA FOETIDA.

1. L. foliis cordatis acutissimis, caule volubili. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

PLANTA fruticosa, volubilis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Muña* et *Pozuzo* vicos.

FLORET Julio, et Augusto.

VERNACULE *Yurahuanium*, id est, *Bejuco blanco*.

Usus. Indi ad trabes loco funium hujus caule ligandas et ad alios usus utuntur.

HIPPOTIS.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 33.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* auriculaeforme, acutum, pentagonum, integerrimum, superum, coloratum, persistens.

COR. infundibuliformis. *Tubus* curvatus, calyce longior. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* obovatis, obtusis, integerrimis, reflexis.

Nectar. breve, cyathiforme, quinquecrenatum, germen ambiens.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, curvata, basi villosa, incrassata, infra medium tubi inserta, eoque breviora. *Antherae* ovatae, incumbentes.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, curvatus, longitudine tubi. *Stigma* oblongum, bifidum; *laciniis* adpressis.

PER. *Bacca* ovata, bilocularis, calyce coronata.

SEM. plurima, cuneiformia.

CHARACTER DIFFERENTIALIS.

BACCA bilocularis, calyce auriculaeformi coronata. *Corolla* infundibuliformis, curvata. *Nectarium* germen ambiens. *Stigma* bifidum; *laciniis* adpressis.

HIPPOTIS TRIFLORA.

1. H. foliis obovato-oblongis, acuminatis, pedunculis trifloris. *Flor. Per. et Chil.* tom. 2.

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Cuchero*, *Macora* et *Marimarchahua*.

FLORET à Majo ad Augustum.

HUERTEA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 34. Ic. VI.

CALYX quinquedentatus, inferus. *Petala* ovata, sessilia. *Stigma* bifidum, acutum. *Drupa*? obovata. *Nux*? unilocularis.

HUERTEA GLANDULOSA.

+ 1. *H.* foliis impari-pinnatis. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 2.

ARBOR trigintaulnaris, et ultra.

HABITAT in nemoribus *Muña* ad *Rinconada*
tractus.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE *Cedro macho.*

USUS: Ex ligno asseres optimos ad aedificia
construenda et ad alios usus peritiles In-
colae findunt.

Obs. Sapor foliorum subadstringens est.

VILLARESIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 35.

CAPSULA unilocularis, monosperma, cor-
tiosa, bivalvis. *Stigma* sessile. *Semen* uni-
loculare, tetragonum, arillo carnosio, bi-
lobo involutum.

VILLARESIA EMARGINATA.

+ 1. *V.* foliis oblongis emarginatisque, apice
sphacelatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

FRUTEX triulnaris.

HABITAT in Pillao nemoribus ad Chachuassi.

FLORET Octobri, et Novembri.

HAENKEA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 36. Ic. VI.

CALYX quinque-dentatus. Petala quinque.

Nectarium: Discus planus. Filamenta inter nectarium et petala. Germen disco semiimmersum. Stylus nullus. Capsula unilocularis, bivalvis, disperma. Semina arillata.

HAENKEA MULTIFLORA.

1. H. foliis oblongo-lanceolatis, floribus aggregatis. Flor. Per. et Chil. tom. 2.

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in nemoribus Muña.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Obs. Sapor foliorum acidus.

STEREOXYLON.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 38. Ic. VI.

CALYX quinquefidus. *Petala* lingulata, in urceolum conniventia. *Stigma* peltatum emarginato-bilobum. *Capsula* bilocularis, calyce coronata, per basim rimis 2-4 dehiscens. *Receptacula* duo in singulo loculo. *Dissepimentum* interruptum.

STEREOXYLON PATENS.

✓
+
1. S. foliis obovatis venosis denticulatis glandulosis, pedunculis unifloris, corollis urceolatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2. ESCALLONIA (myrthylloides). SMITH. Plant. ic. fasc. 2. pag. 30. ICON. XXX.*

FRUTEX quadriorgyalis.

HABITAT in alpidibus nemorosis *Muña et Pillao.*

FLORET Junio, et Julio.

VERNACULE *Tassta* nuncupatur.

VIRES ET USUS. Summitates ramulorum contusae ad rupturas consolidandas valent. Folia amarum saporem exhibent. Lignum du-

rissimum, et ad manubria aliaque utensilia conficienda perutile est.

STEREOXYLON CORYMBOSUM.

2. S. foliis oblongis aveniis serrulatis, pedunculis unifloris, petalis patenti-reflexis. *Fl.*

Per. et Chil. tom. 2.

ARBOR (*Myrthi* facie), corymbosa, quadriorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* alpibus *Andium* ad *Tambo nuevo*, circa *Muña* vicum.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE *Siuba*.

Obs. Lignum valde durum, accendi difficile et summopere fumosum. *Folia* amaro sapore praedita.

STEREOXYLON VIRGATUM.

3. S. foliis obovato-spathulatis serrulatis, pedunculis unifloris. *Flor. Per. et Chil. t. 2.*

FRUTEX biulnaris.

HABITAT in *Regni Chilensis* silvis umbrosis, locis humidis in Provincia *Rere* et prope *Nacimientto* Arcem.

FLORET Novembri, et Decembri.

STEREOXYLON RESINOSUM.

✓ 4. *S. foliis oblongo-obovatis serrulatis, pedunculis racemosis. Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

FRUTEX triorgyalis.

+ *HABITAT* in *Peruviae* collibus frigidis et praeruptis *Tarmae* ad *Rondos* et *Huariaca*, et in *Huanuco* ad *Nauyan*.

FLORET Januario, Febuario et Martio.

VERNACULE in *Huanuco* *Chachacoma* et *Chachas*.

VIRES ET USUS: Summitates ramorum contusae ob resinam grati odoris, quâ affluunt, ad partes laxatas roborandas inserviunt.

Lignum valde durum est, et ad varia utensilia conficienda optimum.

STEREOXYLON RUBRUM.

✓ 5. *S. foliis obovato-oblongis acuminatis serratis, pedunculis 2-7 floris. Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

FRUTEX biorgyalis.

+ *HABITAT* in *Regni Chilensis* montibus prae-

sertim ad *Colocolo* collem in saxorum fissuris.

FLORET Februario, et Martio.

VERNACULE *Nipa*.

VIRES: eadem ac in praecedentibus.

Obs. In hac Specie nectarium conicum, decamgulare, denticulatum, prominulum, basim styli vaginans, germen coronans observavimus.

STEREOXYLON REVOLUTUM.

6. *S.* foliis obovatis revolutis denticulatis, racemis thyrsoides. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 2.

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in Regni *Chilensis* umbrosis et scaturiginibus prope *Conceptionis* urbem, et ad littora *Coliumo* Portûs.

FLORET à Januario ad Majum.

VERNACULE *Lun* et *Liun*, et *Siete Camisas*, quia cortex in laminulas septem tenues solvitur.

STEREOXYLON PULVERULENTUM.

- ✓ 7. S. foliis oblongo-ellipticis serrulatis, pedunculis racemoso-spicatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

+ FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in *Regni Chilensis* silvis versùs *Conceptionis* urbem ad *Carcamo* tractum.

FLORET à Septembri ad Decembrem.

VERNACULE *Mardoño.*

Obs. Pulvis ramulorum et foliorum oculis noxius. Folia saporem amariuscule præferunt.

STEREOXYLON PENDULUM.

8. S. foliis lanceolatis acutissimis integris serrulatisque, racemis pendulis longissimis.

+ *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

ARBOR ferè vigintiulnaris.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Muña*, *Chinchao* et *Pillao* vicos.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE in *Muña Pumachillca*, id est, *Leonis Chillca.*

Obs. 1. Lignum rubrum durissimum ad varia utensilia valde utile est.

Obs. 2. Nectarium: Margo brevis, integra, interiùs calycem ambiens.

STEREOXYLON PANICULATUM.

9. S. foliis lanceolato-oblongis serrulatis, pedunculis racemoso-paniculatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus *Pillao* ad *Iscutinam*.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

Obs. 1. Lignum durissimum est.

Obs. 2. Nectarium: Margo minima, interius calycem circumdans.

CERVANTESIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 39. Ic. VII.

CALYX minimus, crescens. *Corolla* nulla.

Squamae nectariferae, quinque, medio laciniarum calycis insidentes. *Stamina* basi calycis inserta. *Nux* calyce carnosio, mag-

no , pentagono , colorato , infernè nuci
accreto , involuta.

CERVANTESIA TOMENTOSA.

† 1. C. foliis oblongis, floribus racemosis subsessilibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

ARBOR biorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* praeruptis circa *Acobamba* vicum in *Tarmae* Provincia.

FLORET Julio , et Augusto.

1. *Obs.* Nuclei grati saporis, Avellanarum haud absimilis, sunt.

ALZATEA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 40. Ic. VII.

CALYX quinquefidus , pentagonus. *Corolla* nulla. *Stamina* receptaculo inserta. *Capsula* bilocularis. *Dissepimentum* contrarium. *Semina* superimposita , membranâ cincta.

ALZATEA VERTICILLATA.

† 1. A. foliis obovatis emarginatis , floribus corymbosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

ARBOR excelsa.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Chin-
chao* praeruptum prope *Mesapata* prae-
dium.

FLORET Majo, Junio et Julio.

Obs. Arbor, quam in *Messapata* praedio
offendimus, sex truncis crassis, primum
divergentibus, postea ad quatuor ulnarum
altitudinem in unicum, teretem connexis,
constabat.

MYOSCHILOS.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 41.

ICON. XXXIV.

CALYX pentaphyllus, coloratus. Corolla nul-
la. Stamina receptaculo inserta. Stylus tri-
gonus. Drupa monosperma, calyce co-
ronata. Nux unilocularis.

MYOSCHILOS OBLONGA.

1. M. foliis oblongis acuminatis repandis,
floribus spicatis. Flor. Per. et Chil. tom. 2.

FRUTEX orgyalis, antequam folia flores pro-
ferens.

PARS I.

K

HABITAT in *Regni Chilensis* collibus et ripis arenosis prope *Conceptionis* urbem ad littora fluviorum *Biobio* et *Andalien*.

FLORET Augusto.

VERNACULE *Codocoypu*, id est, Fructus, cujusdam Animalis amphibii, *Coypu* dicti, quia ejus fructibus praesertim nutritur.

Usus: Chilenses foliorum infuso ad alvum extergendam frequenter utuntur, unde à quibusdam *Senna* appellatur.

DIGYNIA.

GUMILLEA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 42. Icon. VII.

CALYX campanulatus, 5 fidus. *Corolla* nulla. *Germen* semibifidum. *Capsula* bilocularis, polysperma, birostris; rostris reflexis.

GUMILLEA AURICULATA.

1. *G. foliis impari-pinnatis. Fl. Per. et Chil. tom. 2.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus juxta *Munae* vicum.

FLORET Augusto , et Septembri.

FRAGOSA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 43.

ICON. XXXIV.

FLORES radiati, fertiles. *Involucrum* octophyllum, flosculis 8-14. *Petala* inaequalia, integerrima. *Fructus* ovatus, dispermus. *Semina* extus striata.

HABITUS.

Plantae humiles , subacaules. *Proles* plures, aggregatae , in caespitis formam. *Folia* radicalia, imbricata, caules brevissimos petiolis latis obtegentia. *Umbella* breviter pedunculata. *Flosculi* radiati.

Obs. Genus inter *Bolacem* et *Azorellam* collocandum. Ex habitu quidem, quem A. L. Jussieus Generis utriusque characteribus subjicit, *Bolax* , *Azorella* et *Fragosa* unum idemque Genus constituere videntur : verum ex ipsius Jussieui characteri-

bus *Fragosa* à *Bolace* recedit umbellâ multiflorâ, involucro polyphylo, petalis integris, inaequalibus, fructu denique ovato: ab *Azorella* autem petalis inaequalibus, fructu ovato, didymo, dispermo, seminibus extus striatis. An tamen tria haec Genera in unum conjungenda? Ex collatione omnium Specierum patebit.

FRAGOSA RENIFORMIS.

1. F. foliis reniformibus crenatis pilosissimis.

Flor. Per. et Chil. tom. 2.

PLANTA herbacea, subacaulis.

HABITAT in Peruviae umbrosis ad *Huassahuassi*, *Tarmae* Provinciae arcem.

FLORET Novembri et Decembri.

VULGO *Frutilla de monte.*

FRAGOSA CRENATA.

✓ 2. F. foliis obovatis; laciniis acutè crenatis.

Flor. Per. et Chil. tom. 2.

+ PLANTA caespitosa.

HABITAT in Peruviae collibus frigidis *Huassahuassi* in Provincia *Tarmae*.

FLORET Octobri, et Novembri.

FRAGOSA MULTIFIDA.

3. *F.* foliis obovato-cuneiformibus multifidis. ✓

Flor. Per. et Chil. tom. 2. +

PLANTA caespitosa.

HABITAT in *Peruviae* alpibus *Andium* circa
Huassahuassi arcem.

FLORET Decembri.

FRAGOSA SPINOSA.

4. *F.* foliis cuneiformibus trifidis spinosis. *Fl.*

Per. et Chil. tom. 2. +

PLANTA caespitosa.

HABITAT in *Regni Chilensis* aridis et sub fruti-
cibus ad *Guilquilemu* Provinciae *Rere*
oppidum.

FLORET Novembri, et Decembri.

FRAGOSA CORYMBOSA.

5. *F.* foliis imbricatis cuneiformibus trifidis ✓

minimis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.* +

PLANTA caespitosa, (*Lycopodii* facie).

HABITAT in *Peruviae* alpibus humidis *Mu-*

nae ad Tambo nuevo.

FLORET Augusto, et Septembri.

BOWLESIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 44.

ICON. XXXIV.

UMBELLA triflora. *Flosculi* fertiles, paralleli.
Petala aequalia. *Fruotus* tetragonus, sub-
pyramidalis. *Semina* extus concava.

BOWLESIA PALMATA.

1. *B.* foliis palmatis multipartitis; lobis laci-
niatis, lateralibus bipartitis. *Flor. Per. et*
Chil. tom. 2.

PLANTA herbacea, procumbens.
HABITAT in *Peruviae* collibus arenosis in
Provincia *Chancay* ad *Torreblanca*, *Pasa-*
mayo et *Jequan* praedia.
FLORET à Majo ad Augustum.

BOWLESIA LOBATA.

2. *B.* foliis lobatis longè petiolatis. *Flor.*
Per. et Chil. tom. 2.

PLANTA herbacea, prostrata.

HABITAT in *Peruviae* alpibus *Andium* versus
Pillao vicum.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

TRIGYNIA.

MALESHERBIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 45.

CALYX coloratus. *Corolla* 5 petala. *Nectarium*: *Squamae* sex. *Stamina* inaequalia, receptaculo inserta. *Styli* tres ad basim germinis. *Capsula* unilocularis polysperma.

MALESHERBIA THYRSIFLORA.

1. *M.* foliis lineari-lanceolatis sinuatis dentatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2. GYNOPLEURA* (*tubulosa*). *CAVANILL. Icon. vol. 4. pag. 52. num. 413. tab. 375.*

PLANTA suffruticosa (*Lobeliae* habitu).

HABITAT in *Peruviae* aridis et saxorum fissuris Provinciarum *Cantae*, *Huarocherí* et *Caxatambo*, praesertim inter *Chacalamayo* et *S. Pedro de Máma*, et versus *Puruchucu* vicum.

FLORET Aprili et Majo.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA MONOGYNIA.

POURRETIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 44. ICON. VII.

CALYX inferus, triphyllus. *Corolla* tripetala, cum staminibus et stylo sub marcescentia, spiralis. *Filamenta* receptaculo inserta. *Antherae* sagittatae. *Stigma* trifidum. *Capsula* trigona, trilocularis, trivalvis. *Semina* numerosa, utrinque acutissima.

Obs. Pourretiae Genus à *Pitcairniae* Genere recedit, calyce infero, triphyлло; petalis ad basim nudis vel non squamatis. Planta, quae Chilenses *Chupon* appellant, et duae aliae affines, quae in *Peruvia* crescunt, quasque in 3. vol. inseremus, similitudinem congenerem cum *Pitcairnia* exhibent. *Renalmiam* FEWILL. aut *Puyam* MOLIN. inter *Pourretiae* Species annumerari debere existimamus.

POURRETIA LANUGINOSA.

1. P. scapo subspicato, foliis ensiformibus aculeatis subtus lanuginosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 2.*

PLANTA perennis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus *Pozuzo* inter saxa in runcationibus vulgò *Carpales* dictis.

FLORET Septembri, et Octobri.

POURRETIA PANICULATA.

2. P. scapo paniculato, foliis ensiformibus serrato-aculeatis pulverulentis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA perennis.

HABITAT in *Peruviae* montibus *Chinchao* ad *Macora* supra saxa in runcationibus vulgò *Carpales* nuncupatis.

FLORET Julio, et Augusto.

POURRETIA COARCTATA.

3. P. scapo spicato composito, foliis ensiformibus aculeatis glabris. *Flor. Per. et Chil.*

PARS I.

L

tom. 3. *RENEALMIA* vulgò *Puya*. FE-
WILL. tom. 1. pag. 59. *planch.* 39. *PUYA*.
MOL. *Comp. Hist. Chil.* pag. 170.

PLANTA perennis.

HABITAT in *Regni Chilensis* collibus aridis
per *Conceptionis*, *Puchacay*, *Itatae* Pro-
vincias, et passim in *Mochita* colle.

FLORET Septembri, et Octobri.

VERNACULE *Cardon* et *Puya*.

USUS: Chilenses scapo, cujus materia sube-
rosa et levissima est, ad obturamenta do-
liolorum, lagenarum et aliorum vasculo-
rum formanda, utuntur. Ex racemo flo-
rum quoddam extractum adversus ruptu-
ras praestantissimum conficiunt.

POURRETIA SYMPAGANTHERA.

4. *P.* scapo spicato tricolore, foliis ensiformi-
bus inermibus. *Flor. Per. et Chil.* tom. 3.

PLANTA perennis.

HABITAT in *Peruviae* montibus *Pillao* ad
Chacahuassi supra truncos arborum.

FLORET Octobri, et Novembri.

A E C H M E A.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 47.

ICON. LXXX.

CALYX duplex : *interior* superus : *exterioris* lacinia tertia mucronata. *Corolla* tripetala. *Squamae* duae ad basim singuli petali. *Stigma* tripartitum. *Capsula* trilocularis, trivalvis. *Semina* obovata.

A E C H M E A PANICULATA.

1. A. scapo racemoso-paniculato , foliis ensiformibus carinatis aculeatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA perennis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus Pozuzo supra arbores.

FLORET Septembri , et Octobri.

H E R R E R I A.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 48.

ICON. XXXV.

COROLLA infera , 6partita. *Stylus* triquetrus. *Stigma* trigonum. *Capsula* triquetro-alata,

trilocularis , trivalvis. *Semina* suborbiculata , compressa , margine membranaceo cincta.

HERRERIA STELLATA.

1. H. caule volubili aculeato , foliis radiatis lineari-ensiformibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 3. SALSA. FEWILL. tom. 2. p. 716. planch. 7.*


PLANTA frutescens , arundinacea.

HABITAT in Regni Chilensis silvis prope Conceptionis urbem et in aliis Provinciis.

FLORET Februario , et Martio.

VERNACULE Quila , vulgò Salsaparrilla et Zarzaparrilla.

Usus: Incolae radicibus ad eosdem usus ac Smilace asperâ utuntur.



CLASSIS VII.

HEPTANDRIA MONOGYNIA.

TOVARIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 49.

ICON. VIII.

CALYX heptaphyllus. *Corolla* heptapetala.
Discus planus, heptagonus, stellaeformis.
Stamina disco inserta. *Stigma* peltatum,
7-6fidum. *Bacca* unilocularis, pulposa.
Semina compressa.

TOVARIA PENDULA.

i. T. foliis ternatis, racemis longissimis, floribus secundis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*
Mem. Reg. Acad. Med. Matrit. t. 1.
pag. 192.

PLANTA herbacea, biulnaris.

HABITAT in *Peruviae* ripis inter *Chinchao*
et *Pati*, et in *Chacahuassi*.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

HEPTAGYNIA.

GILIBERTIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 50. Ic. VIII.

CALYX 7dentatus. *Corolla* heptapetala. *Stigmata* patentia, ovata. *Capsulae* loculamenta monosperma, in stellaeformam disposita. *Semina* oblonga.

Obs. 1. Numerus fructificationis partium frequentior septenarius, interdum 8-9-narius.

Obs. 2. Hoc Genus recedit à *Polysciae* Genere FORSTERI, cui valde affine, primum calycis exstructurâ et insertione, antherarum et seminum figurâ, loculis pericarpium in stellaeformam dispositis, et tandem foliis simplicibus.

GILIBERTIA UMBELLATA.

† 1. G. foliis oblongis obsoletè denticulatis. *Fl. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR trigintaularis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus *Muña*.

FLORET Augusto, et Septembri.

Obs. Capsularum et corticum odor et sapor Foeniculo non absimiles : capsularum autem sapor ad Macis potius accedit, et leniter acri-amarus est.

ACTINOPHYLLUM.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 51. Ic. VIII.

SCIODAPHYLLUM. BROWN. *pag. 190.*

tab. 19. fig. 1. 2.

CALYX : *Margo* integer. *Corolla* calyptraeformis, in erectione staminum dissiliens. *Germen* truncatum. *Bacca* 7angularis, 7locularis. *Semina* solitaria, semiossea.

ACTINOPHYLLUM ANGULATUM.

1. A. foliolis 7-11nis, racemis solitariis geminisque, corollis obovatis angulatis truncatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3. Mem. Reg. Academ. Med. Mat. tom. 1. pag. 194.*

ARBOR quadriorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* collibus frigidis nemorosis *Muña*, *Chaclla* et *Pillao*.

FLORET à Julio ad Octobrem.

Obs. Gummi crystallinum in aqua totum solubile ex hac plantâ exsudat.

ACTINOPHYLLUM PEDICELLATUM.

2. A. foliolis 9-13nis, racemis septenis, floribus pedicellatis umbellatis, corollis hemisphaericis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3. Mem. Reg. Acad. Med. Mat. t. 1. p. 195.*

FRUTEX scandens, radicans.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus *Muña*.

FLORET ab Augusto ad Novembrem.

Obs. Ex axillis ramorum, petiolorum, et pedunculorum Gummi crystallinum manat.

ACTINOPHYLLUM CONICUM.

3. A. foliolis 7-13nis, racemis ternis binisque, corollis conicis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3. Mem. Reg. Acad. Med. Mat. t. 1. pag. 195.*

FRUTEX scandens, radicans.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus *Pillao* ad *Iscutinam* et *Chacahuassi*.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

ACTINOPHYLLUM ACUMINATUM.

4. A. foliolis 7-11nis, racemis 2-5nis, corollis acuminatis acumine obliquo. *Flor. Per. et Chil. tom. 3. Mem. Reg. Acad. Med. Matrit. tom. 1. pag. 196.*

FRUTEX scandens, radicans.

HABITAT in Peruviae nemoribus Muña.

FLORET Augusto, et Septembri.

Obs. Gummi crystallinum in aqua omninò solubile ex axillis foliorum profluit.

ACTINOPHYLLUM PENTANDRUM.

5. A. foliolis 7-11nis, racemis solitariis ternisque, corollis conicis obtusis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3. Mem. Reg. Acad. Med. Matrit. tom. 1. pag. 197.*

FRUTEX erectus, triorgyalis.

HABITAT in Peruviae nemoribus versus Chinchao et Cuchero vicos.

FLORET Julio, et Augusto.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA MONOGYNIA.

NEEA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 52. Ic. IX.

CALYX nullus, nisi *Squamae* 2-3 sub flore.
Corolla tubulosa. *Stamina* corollâ breviora , quatuor alternantia longiora. *Drupa* monosperma , coronata. *Nucleus* tunicatus.

NEEA VERTICILLATA.

1. N. foliis quaternis lanceolatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus prope *Pozuzo* vicum.

FLORET Octobri, et Novembri.

Obs. Indi adversus culicum punctiones se muniendi causâ, purpureo fructuum succo manus , faciem , pedesque inficiunt.

NEEA OPPOSITIFOLIA.

2. N. foliis oblongo-ovalibus acuminatis. *Fl.*
Per. et Chil. tom. 3.

FRUTEX quadriorgyalis.

HABITAT in Peruviae silvis Pillao ad Chacahuassi.

FLORET Octobri, et Novembri.

TRIGYNIA.

CORNIDIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 53.

ICON. XXXV.

CALYX obtusè trigonus, integerrimus, semi-
 superus, germiini accretus. Corolla 4petala.
 Styli tres, divergentes. Capsula 3corni-
 culata, 3locularis, trivalvis. Semina nu-
 merosa.

CORNIDIA UMBELLATA.

1. C. foliis oblongis, floribus umbellatis. *Fl.*
Per. et Chil. tom. 3.

ARBOR excelsa et frondosa.

HABITAT copiosè in *Peruviae* nemoribus circa *Chinchao* et *Pozuzo* vicos.

FLORET Augusto, et Septembri.

Obs. Ex trunco trabes et asseres optimi extrahi possunt.

SEMARILLARIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 54. Ic. IX.

*CURURU. PLUMIER. Gen. pl. pag. 34.
tab. 35.*

CALYX tetraphyllus. *Petala* quatuor. *Capsula* unilocularis, trisperma. *Semina* arillata. *Receptaculum* centrale, trigonum.

Obs. Semarillariae Species differunt à *Paulinae* Speciebus in omnibus fructus partibus, quapropter ex illis Genus *Semarillariam* à seminibus semarillatis constituimus.

SEMARILLARIA SUBROTUNDA.

1. *S. foliis* pinnato-quinatis, foliolis oblongis supernè serratis, capsulis subrotundis. *Fl. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA scandens, fruticosa.

HABITAT affatim in *Peruviae* nemoribus versus *Chinchao*, *Cuchero* et *Pozuzo* vicos.

FLORET Martio, et Aprili.

VERNACULE *Lucumas de monte*.

USUS: Incolae Arillum carnosum dulcem edunt.

SEMARILLARIA ACUTANGULA.

2. *S. foliis pinnato-quinatis, foliolis oblongo-ovatis acuminatis dentato-serratis, capsulis obovatis, triangulato-alatis. Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA fruticosa, scandens.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus *Pozuzo* et *Muña*.

FLORET Februario, et Martio.

SEMARILLARIA OBOVATA.

3. *S. foliis pinnato quinatis; foliolis lanceolatis serratis, capsulis obovatis. Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA frutescens, scandens.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus *Pozuzo*.

FLORET Februario, et Martio.

TETRAGYNIA.

PORLIERIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 55. ICON. IX.

CALYX tetraphyllus, aequalis. *Petala* ob-
ovata, conniventia. *Nectarium*: *Squamae*
octo. *Stamina* aequalia, dorso nectarii
squamarum inserta. *Drupae* quatuor, con-
natae.

Obs. Differt *Porlieria* à *Guajaci* Genere,
cui valde affinis est, praeter fructificatio-
nis partium numerum, foliolis calycis ae-
qualibus; petalis conniventibus; stamini-
bus dorso nectarii squamarum insertis; ger-
mine non alato et pericarpio quadridru-
paceo.

PORLIERIA *HYGROMETRA.*

† **I.** *P.* foliis abruptè pinnatis, foliolis lineari-
bus. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

FRUTEX quadriulnaris.

HABITAT copiosè in *Peruviae* ruderatis, et
apricis ad *Huanuci* urbem, et in *Regno*

Chilensi urbem Coquimbensem versus.

FLORET per totum ferè annum in *Huanuco*.

VERNACULE in *Huanuco Turucasa*, id est,
Spina fragilis et non pungens. In *Chile*
Huayacan nominant.

Obs. Lignum, quod igni alendo optimum est, à Chilensibus eximium sudorificum, et antirheumaticum censetur. Tornatores Regni Chilensis, ubi trunci crassiores, quam in *Peruvia* proveniunt, scipiones, cylindros, columnellas, manubria, globulos lusorios, et crenatos tructiles, vasa, cochlearia, pectines, aliaque instrumenta ex hujus fruticis Ligno (Buxo venis colore et duritie satis simili) conficiunt. Frutex ramosissimus est, et sempervirens, ideoque perutilis ad sepes agrorum formandas. Folia die vigilant, noctu dormiunt, (ut pleraeque Plantae foliis pinnatis): tunc enim petiolis ramulisque ita firmiter contractae sibi invicem adhaerent, ut foliis nuda et veluti sicca appareat planta; serenitatem et tempestatem denuntiant; cum primum enim lucescit dies serenus, explicari

incipiunt , et post bihorium penitus evoluita apparent : vespere verò , dummodo sequens dies futurus sit sudus , dimidiâ ante solis occasum horâ contrahi incipiunt ; si autem subsequens dies nubilus procellosusque futurus fuerit , unâ jam ante solis occasum horâ se contrahendi initium faciunt, vixque alia dimidia elapsa est, cum jam sunt penitus ad somnum composita. Cùm verò dies praesens nubilus est et tempestuosus , tunc folia post solis ortum evolvi incipiunt et ante sesquihoram explicata sese ostendunt. Tandem si in vespera diei praesentis magna post meridiem pluvia acciderit et planta maduerit , folia ante vel paulo post solis occasum penitus clauduntur. Haec phaenomena , pluries in Huanuco primùm observata, in navigatione à Peruvia ad Gades et Madritum usque quotidie comprobata fuerunt.

GALVEZIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 56.

ICON. XXXV.

CALYX quadriphyllus. *Petala* sessilia. *Stamina* quatuor alternantia breviora. *Corpus* glandulosum sub germine. *Drupae* quatuor.

Observ. Galveziae Genus ab A. L. Jussieu *pag. 119. Gener. Plantar.* ex notis, quas sodalis noster Dombeyus è *Dodartiae* nostrae *fragilis* fructificatione desumpsit, constitutum recognovimus fuisse, atque adeo Genus *Galveziam* in Prodromo in Excell. D. Josephi de Galvez memoriam evulgatum retinemus.

GALVEZIA PUNCTATA.

1. G. foliis lanceolatis oblongisque serratis punctato-pellucidis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR sexorgyalis, sempervirens.

HABITAT in Regni Chilensis nemoribus per

PARS I.

N

Provinciam *Conceptionis* in stagnatis et ad
margines rivulorum.

FLORET Octobri, et Novembri.

VERNACULE Pitao.

Usus : Folia fragrantia et aromatica sunt, vir-
tutem carminativam, resolutivam, pellen-
tem et digestivam habent.



CLASSIS X.

DECANDRIA MONOGYNIA.

FOVEOLARIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 57. Ic. IX.

STRIGILIA. CAVANILL. Diss. 7. p. 358.

tab. 201?

CALYX campanulatus, inferus. *Petala* revoluta, punctata. *Nectarium* tubulosum, è filamentis usque ad medium connatis formatum. *Antherae* post dehiscentiam punctis setaceo-stellatis adpersae. *Drupa* obovata.

FOVEOLARIA CORDATA.

2. F. foliis cordato-ovatis, acutis subtus helvolis, foveolis glanduliferis, racemis 2-4dependentibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR procera.

HABITAT copiosè in *Peruviae* nemoribus versus *Pozuzo* et *Chinchao* vicos.

FLORET Augusto, et Septembri.

FOVEOLARIA ovata.

- + 2. F. foliis ovato-oblongis subtus argenteis, foveolis glanduliferis, racemis 2-3nis dependentibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR excelsa.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus *Pozuzo*, *Chinchao* et *Pillao*.

FLORET Augusto, et Septembri.

FOVEOLARIA oblonga.

- + 3. F. foliis oblongis acuminatis glabris, foveolis minimis glanduliferis, racemis 1-2nis erectis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR trigintaulnaris et ultra.

HABITAT in *Peruviae* silvis *Pillao* et *Chinchao*.

FLORET Augusto, et Septembri.

FOVEOLARIA ferruginea.

- + 4. F. foliis oblongis brevi acumine subtus lanuginosis eglandulatis, racemis solitariis erectis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus altis frigidis *Pillao*.

FLORET Augusto, et Septembri.

Obs. Lanugo duplex, in acervis stellato-penicilliformibus; exterior ferruginea decidua, interior verò alba persistens est.

GODOYA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 58. Ic. XI.

CALYX pentaphyllus, coloratus. *Nectarium*: *Cilia* in 5 series. *Antherae* poris duobus pollen effundentes. *Stigma* quinqueangulare. *Capsula* quinquelocularis. *Semina* imbricata, alata.

GODOYA OBOVATA.

1. *G. foliis obovatis crenatis. Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR vigintiulnaris et ultra, perpulchra.

HABITAT copiosè in *Peruviae* nemoribus *Mesapata*, *Macora*, *Cuchero* et *Iscutín*am.

FLORET Junio, Julio, Augusto et Septembri.

VERNACULE Laupe nominatur.

Usus: Lignum solidissimum est; et ideo ad fulcra, et ad sarculorum, malleorum, ligonum, et hastarum manubria eo Incolae utuntur.

Obs. In Prodrumi Flor. Per. et Chil. observatione loco *Godoyae oblongae* lege *Godoya obovata*.

GODOYA SPATHULATA.

2. G. foliis spathulatis crenatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR duodecimulnaris.

HABITAT in *Chinchao* et *Cuchero* nemoribus.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

VERNACULE Laupe.

Obs. Stamina in hac Specie plurima, quadraginta ferè.

Usus: Lignum durissimum est, et ad trabes, manubria et alia utensilia inservit.

CUELLARIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 59. Ic. X.

CALYX quinquepartitus. *Petala* quinque, aequalia. *Stylus* trigonus. *Stigma* trilobum. *Capsula* trigona, trilocularis. *Semina* imbricata, membranacea.

CUELLARIA REVOLUTA.

1. C. foliis oblongis denticulatis basi revolutis excavatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR sexorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus versùs *Pillao* vicum.

FLORET Julio, et Augusto.

CUELLARIA FERRUGINEA.

2. C. foliis oblongis integerrimis acuminatis basi leviter excavatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in *Panao*, *Pillao* et *Chinchao* montibus frigidis et nemorosis.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

CUELLARIA OBOVATA.

3. *C.* foliis obovatis rugosis denticulatis. *Flor.*

Per. et Chil. tom. 3.

ARBOR excelsa.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus circa *Cuchero* vicum.

FLORET Julio, et Augusto.

USUS : Lignum insigniter durum, ad trabes aliaque utensilia conficienda aptissimum est.

MICONIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 60.

CALYX quinquedentatus. *Petala* quinque.

Nectarium : *Squamae* quinque. *Stamina* declinata. *Antherae* plicatae, calcaratae.

Capsula quinquelocularis. *Semina* subsco-
biformia.

MICONIA PULVERULENTA.

1. *M.* foliis ovatis quinquenervibus crenatis, acumine obtuso. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

FRUTEX quadriorgyalis.

HABITAT in nemoribus *Chinchao* et *Cuchero*.

FLORET Julio , et Augusto.

Obs. In hac Specie plurimi flores hexapetali , nonnulli 7-8petali reperiuntur , quorum numerus numero denticulorum calycis et loculamentorum capsulae respondet, et pari ratione staminum numerus augetur.

MICONIA TRIPLINERVIS.

2. M. foliis oblongis triplinervibus acuminatis integerrimis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

FRUTEX quadriorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus versùs *Cuchero* vicum , et *Guayabal* tractum.

FLORET Julio , et Augusto.

MICONIA LANUGINOSA.

3. M. foliis oblongis quinquenervibus integerrimis obtusè acuminatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

FRUTEX triorgyalis.

PARS I.

o

HABITAT in *Cuchero* nemoribus prope *Cassape* et *Cassapillo* praedia.

FLORET Augusto, et Septembri.

MICONIA EMARGINATA.

4. *M. foliis cordatis emarginatis quinquenerviis. Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Chinchao* praeruptum versus *Bolson* et *Filipinas* praedia et prope *Iscutín* tractum.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

CHAETOCRATER.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 61.

ICON. XXXVI.

CALYX quinquepartitus. *Corolla* nulla. *Nectarium* crateriforme, setis decem distinctis, filiformibus, hirtis coronatum. *Stamina* decem ori nectarii inserta; alternis brevioribus. *Stigmata* tria. *Capsula*?

Obs. 1. Pericarpium non offendimus, et ideo quatenus *Species* pericarpium sit, deter-

minare nobis non licuit. *Germen* autem pericarpium uniloculare, exsuccum denotat.

Obs. 2. Hoc Genus à *Guidonia* PLUM. *Casearia* JACQ. *Samyda* LINN. et *Anavinga* RHED. et LAMARCK, quibus affine, differt *calyce* absque tubo; *Nectario* crateriformi, setis decem filiformibus, hirtis, distinctis coronato; *Filamentis* inaequalibus, filiformibus; *Stigmatibus* tribus; *Rudimento* pericarpium internè exsucco. *Pericarpium* maturum Genus elucidare poterit. A. L. Jussieus ipse, qui ad *Anavingae* Genus *Caseariae*, *Samydae* et *Guidoniae* Genera retulit, *Anavingae* Characterem in vivis iterum recognoscendum admonet.

CHAETOCRATER FASCICULATUM.

1. C. foliis oblongis serratis acuminatis, floribus fasciculatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR quadriorgyalis.

HABITAT in *Chinchao* nemoribus circa *Hualqui* praedium.

FLORET Augusto, et Septembri.

Obs. Folia amariusculo sapore praedita sunt,
et colorem ochraceum suppeditant.

CHAETOCRATER CAPITATUM.

2. *C.* foliis oblongis serratis acuminatis punctatis, floribus capitatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR triorgyalis.

HABITAT in nemoribus *Cuchero, Chinchao* et *Pozuzo.*

FLORET Septembri, et Octobri.

GOMORTEGA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 62. Ic. X.

COROLLA heptapetala. *Stamina* triplici serie, ab exteriori majori ad decimum interius gradatim minora. *Glandulae* duae ad basim singuli filamenti. *Stylus* sulcatus. *Stigmata* 2-3. *Drupa* unilocularis. *Nux* durissima, 2-3 locularis. *Nuclei* compressi.

GOMORTEGA NITIDA.

1. *G.* foliis oblongo-lanceolatis nitidis. *Flor.*

Per. et Chil. tom. 3. LUCUMA Keule MOLIN. Comp. Hist. Chil. pag. 202.

ARBOR procera, sexaginta et ultra ulnaris, sempervirens.

HABITAT in Regni Chilensis nemoribus per Conceptionis et alias Provincias.

FLORET praesertim in Martio, et per totum ferè annum flores vel fructus aut utrumque profert.


VERNACULE *Queule* et *Keule* nuncupatur.

USUS: Folia digitis fricata odorem resinosum fragrantem Lavandulae vel Rosmarini spirant, gustata verò saporem adstringentem et balsamicum praestant, et vel recentia facillè flammam concipiunt. Fructuum caro lutescens, quamvis vix succosa, valde grata et sapidissima est. Lignum solidum, ponderosum, diù durans, venis pulcherri-
mis variegatum. Chilenses tabulas ex eo et optimas trabes ad varia opera conficienda extrahunt.

Obs. 1. Ex incolarum narratione et ex nucibus, quas minores et acutiores possidemus, compertum est, aliam hujus Generis Spe-

ciem provenire in montibus Araucanis ad Valdiviam protensis.

Obs. 2. Quemadmodum clar. MOLINA sub *Peumi* Genere Species diversorum Generum consociavit, quarum prima *Peumo* vocata ad *Lauri* Genus pertinet, et quarta *Boldo* appellata ad *Ruiziae* Genus spectat; ita etiam Arborem *Keule* comprehendit sub Genere *Lucuma*, cujus generica descriptio omnino à *Gomortega* et Jussiei Genere *Lucuma* omnino discedit.



CLASSIS XI.

DODECANDRIA MONOGYNIA.

BAITARIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 63.

ICON. XXXVI.

CALYX tetraphyllus: foliolis duobus longioribus subulatis, à superioribus lanceolatis remotis. *Corolla* tubulosa, limbo 5 partito. *Stamina* alterna, paulò breviora. *Stigma* trifidum. *Capsula* triquetra, trilocularis. *Semina* plura. *Receptacula* valvularum parietibus adnata.

BAITARIA ACAULIS.

1. B. foliis lineari-lanceolatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA acaulis.

HABITAT in locis petrosis et arenosis ad vias et semitas *Cantae* Provinciae prope *Culluai* et *Obragillo* vicos, et juxta *Diezmo* praedium.

FLORET Januario , et Februario.

Obs. Planta post exsiccationem fusco colore papyrus tingit. Radix viscosa.

TRICUSPIDARIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 64.

ICON. XXXVI.

CALYX quinquedentatus. *Petala* quinque, tricuspidata, internè triplicata. *Nectarium* annulare , decagonum. *Stamina* 15 , receptaculo inter nectarium et germen inserta. *Antherae* tetragonae , apice biperforatae. *Capsula* trilocularis, trivalvis: valvulis septiferis. *Semina* pauca.

TRICUSPIDARIA DEPENDENS.

1. T. foliis ovatis oblongisque serratis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR quadriorgyalis.

HABITAT in nemoribus *Conceptionis*, *Puchacay*, *Itatae* et *Maule* Provinciis , locis stagnatis et inundatis *Regni Chilensis*.

FLORET Martio.

VERNACULE Patagua nominatur.

Obs. 1. Lignum ad varia opera utilissimum.

Obs. 2. Inter arbores quae in Regno Chilensi *Patagua* nomine indigitantur; *Patagua* Arbor recensetur, ex qua MOLINA *Crinodendrum* Genus constituit, cujus fructificatio à *Patagua* nostrâ differt cunctis notis, quibus constat Character hic differentialis; sed reliquis, quae tradit, omninò convenit, in eo scilicet, quod sint arbores semper virentes, ligno constantes albo, et facilè sectili foliorum insertionem et figurâ, florum colore et cum *Lilio* similitudine. Reliquae Arbores, quas in Regno Chilensi examinavimus atque ibidem *Patagua* nomine innotescunt ad *Myrti* Genus redigenda sunt.

TALINUM.

ADANSON. *Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 65.*

ICON. X.

CALYX diphyllus, inferus. *Petala* quinque.

Stamina ab uno ad plurima. *Stigmata*

PARS I.

P

tria. *Capsula* unilocularis, trivalvis. *Semina* plurima. *Receptaculum* lineare, liberum.

HABITUS.

Plantae herbaceae, carnosae. *Radices* fibrosae. *Caules* aut *Scapi* plures, erecti aut procumbentes. *Folia* alterna aut opposita. *Flores* paniculati, racemosi aut umbellati.

TALINUM PANICULATUM.

1. T. foliis obovato-oblongis acuminatis, floribus paniculatis. *Flor. Per. et Chil. t. 3.*

PLANTA herbacea, pedalis.

HABITAT in *Chancay* collibus arenosis, vulgò *Lomas*, et in *Atiquipae* Provincia ad *Pongo*.

FLORET à Julio ad Septembrem.

VULGO appellatur *Orejas de perro* et *Castañuelas*.

Obs. Incolae foliorum hujus plantae succo ad os detergendum utuntur. Folia pedum callos emolliunt. Reliquae Species ad eodem usus usurpantur.

TALINUM CRENATUM.

2. T. foliis subrotundo-obovatis acuminatis, floribus racemosis, petalis crenulatis, staminibus subviginti. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA herbacea, pedalis.

HABITAT cum praecedenti in *Pongo* collibus.

FLORET ab Aprili ad Septembrem.

VULGO *Lengua de Vaca*.

TALINUM POLYANDRUM.

3. T. foliis subrotundo-obovatis acuminatis, petalis obcordatis integris, floribus racemosis polyandris. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA herbacea, pedalis.

HABITAT in *Peruviae* collibus, *Lomas* vulgò dictis, versùs *Pongo* vicum.

FLORET ab Aprili ad Septembrem.

VULGO *Lengua de Vaca* nominatur.

Obs. Planta ex testimonio Incolarum, bobus et arietibus noxiâ est.

TALINUM LINGULATUM.

4. T. foliis linguaeformibus, floribus paniculatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA herbacea, bipalmaris.

HABITAT in arenosis *Chancay* ad *Jequan*.

FLORET à Majo ad Septembrem.

TALINUM CILIATUM.

5. T. foliis lineari-oblongis ciliatis, floribus solitariis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA herbacea, semipedalis.

HABITAT in *Huassahuassi* ruderatis et segetibus in Provincia *Tarmae*.

FLORET Novembri, et Decembri.

TALINUM ALBUM.

6. T. foliis spathulato-lanceolatis, floribus axillaribus solitariis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA herbacea, pedalis.

HABITAT in *Chancay* et *Limae* saxosis locis.

FLORET Septembri, et Octobri.

TALINUM UMBELLATUM.

7. T. foliis linearibus pilosis, scapis filiformibus, floribus corymbosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA herbacea, palmaris.

HABITAT in arenosis *Conceptionis Chile.*

FLORET Novembri, Decembri et Januario.

VULGO Flor de la Mistela, id est, mixturae spiritûs ardentis, aquae et sacchari.

Obs. Ad colorem *mistel* conciliandum Incolae floribus utuntur, unde nomen plantae venit: feminae eisdem floribus faciem fucant.

TALINUM NITIDUM.

8. T. foliis spathulatis, floribus axillaribus solitariis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA herbacea, semipedalis.

HABITAT in ruderatis et arvis *Conceptionis Chile*, ad *Hualpen* et *Mochita* tractus.

FLORET Octobri, et Novembri.

TALINUM MONANDRUM.

9. T. foliis spathulato-lanceolatis, floribus
spicatis secundis. *Flor. Per. et Chil. t. 3.*

PLANTA herbacea, sesquipalmaris.

HABITAT in collibus aridis *Conceptionis Chile* prope fluvium *Andalien.*

FLORET Augusto, et Septembri.

TALINUM DICHOTOMUM.

10. T. foliis oblongo-lanceolatis, paniculâ
pyramidali, pedunculis dichotomis. *Flor.*

Per. et Chil. tom. 3. TALINUM (reflexum).

CAVANILLES. *Icon. pl. vol. 1. p. 1. t. 1.*

PORTULACA (*paniculata*). JACQ. *Amer.*

pict. p. 73. t. 136. Hort. Vindobon. v. 2.

p. 71. t. 151. PORTULACA (patens).

LINN. *Syst. vegetabilium edit. 14. p. 446.*

num. 8.

PLANTA herbacea, bipedalis.

HABITAT in humidis et stagnatis *Limae,*

Chancay et *Huanuci.*

FLORET Novembri, Decembri et Januario, in

Hort. Reg. Matrit. à Julio ad Septembrem.

CUPHEA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 66. Ic. XI.

BROWN. Jamaic. p. 216. BALSAMONA. VAN-

DELL. Spec. Flor. Lusit. pag. 30. tab. 4.

CALYX 12dentatus, irregularis, inferus. *Corolla* hexapetala, irregularis. *Stamina* triplici serie. *Capsula* unilocularis, univalvis, supernè longitudinaliter una cum calyce dehiscens. *Semina* lentiformia, receptaculo centrali, subulato affixa.

CUPHEA CORDATA.

1. *C. foliis cordatis acutis, corollis inaequalibus. Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA suffruticosa, quadripedalis.

HABITAT in *Peruviae* collibus, et silvis *Huasahuassi*, *Chaclla*, *Acomayo* et *Huanuci*.

FLORET Novembri, et Decembri.

VIRES ET USUS: vi vulnerariâ, aperitivâ et desobstruente pollet. Folia floresque contusi ad partes luxatas roborandaserviunt. Flores antiepilectici sunt, saporem

parum viscosum, salino-dulcem, non ingratum habent.

CUPHEA CILIATA.

+ 2. *C.* foliis linearibus ciliatis, petalis subaequalibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

PLANTA suffruticosa (habitu *Hyssopi*), bipedalis.

HABITAT in *Huanuci* et *Panao* collibus frigidis.

FLORET Majo, et Junio.

VULGO *Yerba de la culebra* nominatur.

USUS: Infusum et decoctum, ad haemophthysim, contra luem veneream, tussim siccam, urinae obstructions, et ad defatigationem frequenter incolae usurpant.

VALDESIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 66. Ic. XI.

CALYX duplex: fructus tetraphyllus: floris sexpartitus. Corolla hexapetala. Nectarium tubulosum, 12 angulatum, sexdentatum; denticulis bifidis. Antherae trigo-

nae , orbiculatim adpressae , assurgentes.

Bacca sexlocularis , truncata , coronata.

Semina numerosa , ossea.

VALDESIA REPENS.

1. V. foliis oblongis quinquenervibus acuminatis , calyce inferiori tetraphyllo inflato , superiori sexdentato. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

FRUTEX scandens et radicans.

HABITAT in nemoribus *Chinchao*, versùs *Macapata* et *Macora* praedia.

FLORET Junio , et Julio.

VALDESIA OVALIS.

2. V. foliis ovalibus quinquenervibus acuminatis , calyce exteriori adpresso , interiori urceolato. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR octo-orgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus prope *Chinchao* vicum et *Macora* praedium.

FLORET Junio , Julio et Augusto.

AXINAEA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 68. Ic. XII.

CALYX cyathiformis, inferus. *Petala* 6 margini internè calycem ambienti insidentia. *Stamina* eidem margini inserta, sex alternis brevioribus. *Antherae* calcaratae, apice perforatae. *Stylus* incurvus. *Stigma* simplex, obtusum. *Capsula* sexlocularis, calyce ferè obvoluta, corniculata, sexvalvis, polysperma. *Receptacula* dissepimentis adnata.

AXINAEA LANCEOLATA.

1. A. foliis ovato-lanceolatis quinquenerviis dentatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR procera, et frondosa.

HABITAT in *Panao* et *Muña* silvis.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

AXINAEA PURPUREA.

2. A. foliis cordatis septemnerviis crenatodentatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

FRUTEX biorgyalis et ultra.

HABITAT in nemoribus altis *Muña*, versùs
Tambo nuevo hospitium.

FLORET à Junio ad Septembrem.

Obs. Numerus fructificationis partium qui-
narius et denarius frequentior est.

ACUNNA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 69. Ic. XII.

CALYX 7partitus; laciniis latere invicem in-
cumbentibus. *Petala* 7, magna. *Stamina*
septem, alternantia paulò breviora. *An-*
therae apice biperforatae. *Stylus* persistens.
Stigma 7striatum. *Capsula* orbicularis,
depressa, umbilicata, 7locularis, 7valvis:
valvulis patentissimis. *Semina* imbricata.
Receptacula septem, columnellae affixa.

ACUNNA OBLONGA.

1. A. foliis oblongis, marginibus revolutis,
floribus corymbosis, pedicellis longis. *Fl.*
Per. et Chil. tom. 3.

FRUTEX biorgyalis, elegans.

HABITAT in nemoribus *Tarmae* Provinciae
ad *Churupallana*, et *Panatahuarum* ad
Acomayo et *Macora* vicos.

FLORET Octobri, et Novembri.

VULGO *Rosa-rosa* propter copiosos flores rosa-
ceos, quos planta profert.

ACUNNA LANCEOLATA.

2. A. foliis ovato-lanceolatis, floribus corym-
bosis, pedicellis brevibus. *Flor. Per. et*
Chil. tom. 3.

FRUTEX biulnaris, ramosissimus.

HABITAT in collibus altis *Rondos*, *Pillao* et
Huassahuassi.

FLORET à Majo ad Augustum.

VULGO *Rosa-rosa* et *Rosa-Huaytta*, id est,
Fasciculus florum rosarum.

Obs. Utraque Species ad hortorum ornatum
pulcherrimus, praesertim in mensibus flo-
rescentiae, frutex est, quo tempore femi-
nae florum fasciculos magnos ad simulacra
decoranda colligunt.

TRIGYNIA.

ARISTOTELIA.

L'HERITIER. *Gen. pl. Flor. Per. et Chil.*
pag. 70. Icon. XII.

CALYX subcampanulatus, quinquefidus; basi concava, persistenti. *Corolla* pentapetala, basi calycis insidens. *Filamenta* 15, basi calycis inserta, 5 interiora, reliqua exteriora. *Antherae* apice biperforatae. *Stigmata* villosa. *Bacca* trilocularis. *Nuces* hinc convexae, inde planae.

Obs. Aliquando *Calyx* 6fidus, *Corolla* 6petala, *Stamina* tredecim. *Semina* frequenter duo, tria aut quatuor in singula bacca ad maturitatem perveniunt.

ARISTOTELIA GLANDULOSA.

1. A. foliis ovatis subcordatisque serratis. *Fl. Per. et Chil. tom. 3. ARISTOTELIA* (Macqui). L'HERITIER. *Stirp. fasc. 2. p. 31. Icon. 16. CORNUS* (Chilensis). MOLIN. *Comp. Hist. Regn. Chil. p. 185.*

FRUTEX tri-quadriulnaris.

HABITAT copiosè in *Regni Chilensis* nemoribus et collibus per *Conceptionis*, *Puchacay*, *Rere* et *Itatae* Provincias.

FLORET Septembri, et Octobri.

VERNACULE *Macqui*.

VIRES ET USUS. Chilenses saporis gratiâ fructibus maturis sacchari non nihil adhibent, et cochleatim avidè edunt. Ex eisdem fructibus aquâ confricatis quemdam acido-dulcem et gratum potum (vernaculè *Thecu* et *Chicha* ex *Macqui* nuncupatum) ad sanguinis aestum temperandum conficiunt. Surculos et folia contusa in cataplasmatism formam, ad febris ardores coercendos, renibus et dorso Incolae non sine fructu applicant.

PENTAGYNIA.

BRUNELLIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 71. Ic. XII.

CALYX quinquepartitus. Corolla nulla. Nectarium: Glandulae tot, quot stamina. An-

therae cordatae, quadrisulcae. *Germina* quinque. *Capsulae* quinque, stellatim positaе, dispermae, univalves, supernè longitudinaliter dehiscentes. *Semina* pedicellata, arillata.

BRUNELLIA INERMIS.

1. *B. foliis impari-pinnatis ternis simplicibusque; foliolis serratis. Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR procera, triginta ulnaris et ultra.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus versùs *Munã* vicum, passim ad *Tambo nuevo*.

FLORET Augusto, et Septembri.

BRUNELLIA ACULEATA.

2. *B. foliis abruptè pinnatis; foliolis integerimis. Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR triorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus inter *Munã* vicum, et *Tambo nuevo* hospitium.

FLORET Junio, et Julio.

CLASSIS XII.
ICOSANDRIA MONOGYNIA.

CAMPOMANESIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 72. Ic. XIII.

CALYX superus , quinquepartitus. *Petala* quinque. *Stigma* peltatum , umbilicatum. *Bacca* unilocularis. *Semina* duodecim, nidulantia, compressa, granulosa, unicâ serie orbiculatim *Receptaculo* carnosso affixa.

CAMPOMANESIA LINEATIFOLIA.

1. C. foliis ovalibus , pedunculis axillaribus unifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR duodecim ulnaris et ultra.

HABITAT in *Peruviae* hortis , et in nemoribus *Andium* calidissimis.

FLORET ab Augusto ad Decembrem.

VERNACULE *Palillo*, et Fructus *Palillos* appellant.

VIRES ET USUS : Fructus , quos peruvianae

feminae in florum *Mixtura* odoris suavitate frequenter apponunt, lutei, et edules sunt, et figuram mediocris mali pyri habent. Folia digitis confricata odorem *Myrto* simillimum spirant, et acri subadstringenti sapore gaudent. Tornatores et fabri tignarii lignum ad varia utensilia usurpant.

CALYPLECTUS.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 73. Ic. XIII.

CALYX inferus, 10-12 plicatus, 10-12 crenatus. *Petala* totidem, calyce insidentia. *Antherae* versatiles. *Capsula* corticosa, unilocularis, à medio ad apicem radiatim striata, inaequaliter disrumpens. *Semina* numerosissima, invicem adpressa, alata, fundo capsulae insidentia.

CALYPLECTUS ACUMINATUS.

1. C. foliis oblongis obtusè acuminatis, racemis magnis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

ARBOR procera, quadragintaulnaris et ultra.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus locis imis

PARS I.

R

calidis circa *Pozuzo* vicum.

FLORET Aprili, et Majo.

VULGO Cabeza de Monge ob fructuum figuram.

Obs. Folia amaro et viscoso sapore praedita sunt; tincturam luteo-sulphuream praestant.

CALYPTRANTHES.

SCHREBER. *Gen.* p. 334. *Flor. Per. et Chil.*

p. 74. *ICON.* XIII. *CHITRACULIA.* BROWN.

hist. Jam. pag. 239. t. 37. f. 2.

CALYX superus, truncatus, integer. *Corolla* calyptraeformis, caduca. *Stamina* numerosa, internè calyci ad marginem inserta. *Stylus* subulatus. *Stigma* simplex. *Bacca* urceolata, bilocularis, coronata. *Semina* nonnulla, sobrotundo-angulata.

Obs. 1. In eadem arbore *Baccas* 3-4loculares rubras offendimus.

Obs. 2. Ad Genus à nobis reformatum, referendum existimamus Genus *Eucalyptus* L'HERITIER. *Sert. Anglic. p. 18. tab. 20.* et omnes ejusdem Generis *Eucalypti* Spe-

cies à Cl. CAVANILL. evulgatas in *IV. vol. Icon. et Descript. pl. pag. 23. et 24.* Genus *Myrti* Generi affine.

CALYPTRANTHES PANICULATA.

1. C. foliis lanceolato-oblongis obtuse acuminatis, racemis paniculatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 3.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus prope *Pozuzo* vicum.

FLORET Septembri, et Octobri.

Obs. Flores fragrantissimum odorem spirant.

VALLA cordata.

1. V. foliis cordatis acutis, stipulis reniformibus.

peruviana. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

Arbor biorgyalis, frondosa.

HABITAT in *Peruviae* praeceptis circa *Lima*.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA MONOGYNIA.

VALLEA.

LINN. *supp.* pag. 42. *Gen. pl. Flor. Per. et Chil.* pag. 75. Ic. XIV.

CALYX 5 phyllus. *Petala* quinque, trifida. *Nectarium*: *Anulus* germen ambiens. *Squamae* 5, receptaculo sub unguibus petalorum adnatae. *Filamenta* inter squamas in anulum receptaculo inserta. *Antherae* biperforatae. *Stylus* 4-5 sulcatus. *Stigmata* 4-5, acuta. *Capsula* 4-5 locularis, muricata, 4-5 valvis: valvulis patentissimis. *Semina* bina, sulco exarata, gibba.

VALLEA CORDIFOLIA.

1. V. foliis cordatis acutis, stipulis reniformibus petiolatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*
ARBOR triorgyalis, frondosa.

HABITAT in *Peruviae* praeruptis circa *Hua-*

nucum, et in nemoribus *Andium* frigidis

Pillao, et versus *Huassahuassi* vicos.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE *Ccurhur*.

Obs. Folia colorem luteum praestant, quapropter ad tincturam utilia judicamus.

PINEDA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 76.

ICON. XIV.

CALYX 5partitus. *Petala* quinque, persistentia. *Nectarium*: *Glandulae* decem, geminae. *Filamenta* incurva. *Stigma* trigono-sulcatum. *Bacca* unilocularis. *Receptacula* tria, carnosae, cortici pericarpium longitudinaliter adnata. *Semina* plura, angulata.

PINEDA INCANA.

1. P. foliis oblongo-obovatis lanceolatisque supernè serratis. *Fl. Per. et Chil. tom. 4.*

FRUTEX biorgyalis, virgulatus.

HABITAT in *Peruviae* praeruptis versus *Hua-*

±

riaca, et *D. Raphaëlis* Tarmae Provinciae vicos.

FLORET Februario, et Martio.

VERNACULE Lloqui.

Usus: Lignum ad baculos conficiendos optimum. Folia post exsiccationem inter papyros asservata atro colore eas tingunt; ideoque ad tincturam et atramentum inservire posse existimamus.

LETTSOMIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 77.

ICON. XIV.

CALYX heptaphyllus. *Petala* internè equitantia: interioribus angustioribus. *Filamenta* incurva. *Stylus* brevissimus. *Stigmata* 3-5. *Bacca* 3-5 locularis. *Semina* numerosa, trigona. *Receptacula* angulis dissepimentorum adnata.

LETTSOMIA TOMENTOSA.

† 1. L. foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentoso-sericeis, baccis quinquelocularibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus copiose inter *Chinchao* vicum et *Pati* praedium.

FLORET Augusto, et Septembri.

LETTSOMIA LANATA.

2. L. foliis lanceolatis obsolete serrulatis lanatis, baccis trilocularibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus versus *Pati* praedium, et *Chinchao*, et *Pillao* vicos.

FLORET Augusto, et Septembri.

ABATIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 78. Ic. XIV.

CALYX 4partitus, coloratus. *Corolla* nulla.

Nectarium: *Fila* plurima, filamentiformia. *Stylus* cylindricus. *Stigma* simplex.

Capsula unilocularis, bivalvis, polysperma. *Semina* striata. *Receptaculum* lineare, per singulas valvulas excurrens.

ABATIA RUGOSA.

1. *A.* foliis oblongo-lanceolatis rugosis, racemis terminalibus. *Flor. Per. et Chil. t. 4.*

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* collibus frigidis ad *Rondos*, *Pillao* et *Nauyan* tractus.

FLORET à Majo ad Octobrem.

VERNACULE *Yoriturp*, *Galgaretama*, *Retama cimarrona*, et in *Pillao* *Taucca-Taucca*, id est, *Acervus-acervus*.

Obs. Folia post exsiccationem nigrescunt, et inter papyros asservata colore atro eas inficiunt.

ABATIA PARVIFLORA.

2. *A.* foliis lanceolato-oblongis acutis planis, racemis ex dichotomiis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* runcationibus (*Carpales* vulgò dictis) circa *Muña* vicum.

FLORET à Majo ad Augustum.

VERNACULE *Taucca-Taucca*.

Obs. Folia ut in praecedenti atrum colorem praestant.

AZARA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 79.

Icon. XXXVI.

CALYX 6-4-5 partitus. Corolla nulla. Nectarium: Fila plurima, capillaria. Stylus subulatus. Stigma obtusum. Bacca unilocularis, stylo terminata, polysperma. Receptaculum triplex, per parietes pericarpium decurrens.

AZARA SERRATA.

1. A. foliis geminis serratis; majori lanceolato; minori subrotundo, corymbis multifloris. Flor. Per. et Chil. tom. 4.

FRUTEX biorgyalis, comâ ferè globosa.

HABITAT in nemoribus Provinciarum Conceptionis Chile, Puchacay, Itatae, Cauquenes et Rere.

FLORET Septembri, et Octobri.

VERNACULE Corcolen nuncupatur.

Obs. Flores gratissimum odorem, *Mimosae farnesianae* florum non dissimilem, spargunt. Folia, uti etiam sequentium Specierum, post exsiccationem nigrescunt, et inter papyros asservata atro colore eas inficiunt. Saporem amaricantem non ingratum habent.

AZARA INTEGRIFOLIA.

2. A. foliis geminis integerrimis; majori obovato; minori subrotundo, floribus spicatis dependentibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

ARBOR triorgyalis.

HABITAT in nemoribus *Conceptionis Chile.*

FLORET Julio, et Augusto.

VERNACULE *Corcolen* nominatur.

Obs. Flores fragrantissimi sunt.

AZARA DENTATA.

3. A. foliis geminis dentatis; majori elliptico; minori subrotundo, floribus umbellatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in nemoribus *Conceptionis Chile.*

FLORET à Junio ad Septembrem.

VERNACULE *Corcolén* appellatur.

Obs. Folia amara, flores fragrantés sunt.

POLYLEPIS.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 34. Ic. XV.

CALYX 3-4phyllus. *Corolla* nulla. *Anthe-*

rae lanatae. *Stylus* filiformis. *Stigma* peni-

cilliforme. *Drupa* clavata, 3-4gona, an-

gulis inaequalibus totidem denticulis alter-

nantibus, calyce coronata, sicca.

POLYLEPIS RACEMOSA.

1. *P.* foliis impari-pinnatis, foliolis obovatis

oblongisque crenatis emarginatis, floribus

racemosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

ARBOR sexdecimularis et ultra.

HABITAT affatim in *Peruviae* praeruptis et

ripis versus *Quinua*, *Caxamarquilla* et

Pillao tractus.

FLORET ab Aprili ad Junium.

VERNACULE *Quinuar.*

Usus: Lignum, quod ad focum incolae frequenter usurpant, et ipsius cineres ad linthea detergenda et dealbanda ceteris cineribus praeferunt, valde solidum et diu durans est; quapropter Metallurgi ex truncis trabes optimas eliciunt ad mineralium argenti machinas molendarias conficiendas.

VERTICILLARIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 81. Ic. XV.

CALYX hexaphyllus, coloratus. *Corolla* nulla. *Stylus* nullus. *Stigma* concavum, trilobum. *Capsula* 3locularis, trisperma.

VERTICILLARIA ACUMINATA.

1. V. foliis oblongis acuminatis integerrimis, ramis quaternis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

ARBOR decemorgyalis et ultra.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus circa *Pozuzo* ad *Huancabamba* fluvium.

FLORET à Septembri ad Novembrem.

VULGO *Arbol del Aceyte de Maria.*

Obs. Arbor undequaque incisa virescentem

resinam, quam Incolae *Oleum* sive *Balsamum Mariae* nuncupant, abundè praebet, quam tempore pluviarum Indi colligunt. ; An verùm *Balsamum* sive *Oleum Mariae* officinarum nostrarum ?

Obs. Arbor ex qua in Insula Cuba *Resina Ocuje* profluit, cujusque Resina et folia insertionem, figurâ et texturâ verticillariam nostram aemulantur, huic arbori affinis esse nobis videtur.

PENTAGYNIA.

RHYNCHOTHECA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 82. Ic. XV.

CALYX pentaphyllus. *Corolla* nulla. *Stamina* decem. *Germina* quinque. *Styli* breves, adpressi. *Stigmata* longa, crassa, divergentia. *Capsula* pentacocca, stigmatibus coronata. *Semina* subcarinata. *Receptaculum* columnare, pentagonum.

RHYNCHOTHECA SPINOSA.

† I. R. foliis obovatis integris trifidisque, floribus nutantibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

FRUTEX biulnaris.

HABITAT in *Pillao* sepibus.

FLÖRET à Julio ad Septembrem.

USUS : Frutex ad agrorum sepes formandas perutilis.

POLYGYNIA.

MOLLINEDIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 83. Ic. XV.

CALYX turbinatus, ferè clausus, quadrifidus; in fructu dilaceratus. *Corolla* nulla. *Filamenta* nulla. *Antherae* cuneiformes. *Germina* numerosa. *Styli* nulli. *Stigmata* subulata. *Drupae* plurimae, sessiles. *Receptaculum* planum.

MOLLINEDIA REPANDA.

† I. M. foliis ovatis ellipticisque rugosis repandis.

dis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

ARBOR quadriorgyalis.

HABITAT in nemoribus *Chinchao* ad *Macora*
praedium.

FLORET à Majo ad Augustum.

Obs. Drupae maturae purpureo pulchro
colore manus et lintea tingunt.

MOLLINEDIA OVATA.

2. *M.* foliis ovatis nitidis supernè serratis. *Fl.*

Per. et Chil. t. 4.

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in nemoribus *Chinchao*.

FLORET à Majo ad Julium.

Obs. Drupae maturae, quas Passeres avidè
edunt, violaceum colorem praestant.

MOLLINEDIA LANCEOLATA.

3. *M.* foliis oppositis ternisque lanceolatis su-
pernè dentatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in nemoribus *Chinchao*.

FLORET à Majo ad Julium.

PORCELIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 84.

ICON. XVI.

CALYX triphyllus. Corolla hexapetala, *interiora* majora. Germina plurima. Styli nulli. Stigmata obtusa. Baccae longae, cylindricae, torulosae, polyspermae, Receptaculo plano insidentes. Semina gemino ordine superimposita, membranis tenuibus et pulpâ distincta.

PORCELIA NITIDIFOLIA.

1. P. foliis ovato-lanceolatis, floribus nutantibus, fructibus dependentibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

ARBOR satis procera, 40-ulnaris, pulcherrima. HABITAT in *Peruviae* nemoribus versus *Ghinchao* vicum et *Macora* praedium.

FLORET à Majo ad Augustum.

VULGO *Platano de monte* nominatur.

Obs. Folia luteum colorem suppeditant.

Fructus maturi edules et grati sunt. Ex ligno asseres et trabes optimas Indi extrahunt.

GUATTERIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 85.

ICON. XVII.

CALYX triphyllus. Corolla hexapetala. Antherae sessiles, cuneiformes. Styli brevissimi. Stigmata acuta. Drupae plurimae, pedunculatae, Receptaculo parum convexo insertae, monospermae. Semina coriaceo cortice tecta.

HABITUS.

Arbores aut Frutices. Rami expansi, teretes. Folia alterna, petiolata, integerrima. Pedunculi axillares, solitarii, 2-3ni, uniflori.

GUATTERIA GLAUCA.

1. G. foliis oblongis ovatisque acuminatis. Fl. Per. et Chil. tom. 4.

ARBOR triorgyalis.

HABITAT in Peruviae nemoribus versus Cuchero et Chinchao vicos.

FLORET à Junio ad Augustum.

PARS I.

T

GUATTERIA ovalis.

2. G. foliis oblongis ovalibusque. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

ARBOR quadriorgyalis.

HABITAT in Pozuzo nemoribus.

FLORET à Junio ad Augustum.

GUATTERIA PENDULA.

3. G. foliis lanceolatis alternis, pedunculis longissimis pendulis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in Chinchao et Pozuzo nemoribus.

FLORET à Majo ad Julium.

GUATTERIA HIRSUTA.

4. G. foliis lanceolatis acuminatis, floribus hirsutis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in Peruviae nemoribus versus Chinchao vicum.

FLORET à Junio ad Septembrem.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

GARDOQUIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 86. Ic. XVII.

CALYX cylindraceus, curvatus: denticulis tribus superioribus aequalibus; duobus inferioribus parum brevioribus. *Corolla* ringens: tubo recurvo, longo, supernè sensim ampliato; labio superiori recto, emarginato; inferiori trifido, laciniâ mediâ concavâ, rotundiori. *Antherae* per paria approximatae. *Semina* trigona.

HABITUS.

Plantae suffruticosae, valde fragrantès. *Caules* erecti, ramosissimi. *Rami* adpressi, tetragoni. *Folia* opposita, conferta, integerrima aut serrata. *Pedunculi* 1-2-3nque, 1-3-multiflori, bracteolis ad basim duabus. *Calyces* Thymis valde similes. *Corollae* Salviis non dissimiles, incarnatae.

GARDOQUIA INCANA.

1. *G.* foliis ovatis subtus incanis, pedunculis trifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA suffruticosa, quadripedalis, (odore *Pulegii*).

HABITAT copiosè in collibus altis *Huanuci* urbis et *Tarmae* oppidi.

FLORET à Majo ad Julium.

VERNACULE in *Tarma Socconche* fino et *Chesca-Socconche* in *Huanuco Pichuiquita* et *Socconche* dicitur.

Usus: Hujus plantae infusum contra cordis affectiones et pleuritidem incolae usurpant, quin etiam in condimento *Chupe* nuncupato, saporis gratiâ, frequenter adhibent.

GARDOQUIA STRIATA.

2. *G.* foliis ovatis striatis, pedunculis unifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA fruticosa, tripedalis.

HABITAT in *Peruviae* collibus aridis ad *Tarmae* et *Huanuci* Provincias.

FLORET à Julio ad Septembrem.

GARDOQUIA REVOLUTA.

3. G. foliis ovato-cordatis minimis ; marginibus revolutis , pedunculis unifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA suffruticosa , bipedalis.

HABITAT in *Peruviae* collibus, et in saxorum fissuris versus *Huassahuassi* , *Panao* et *Huariaca* vicos.

GARDOQUIA MULTIFLORA.

4. G. foliis ovatis serratis , pedunculis multifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA suffruticosa , biulnaris (odore *Pulegii*).

HABITAT in *Regni Chilensis* arvis et campis *Rere* et *Conceptionis* Provinciarum.

FLORET à Martio ad Julium.

GARDOQUIA ELLIPTICA.

5. G. foliis elliptico-ovatis serratis , pedunculis subternis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA suffruticosa.

HABITAT in *Peruviae* montibus versus *Cheu-*

150 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

chin et *Sayan* vicos.

FLORET Majo, Junio et Julio.

GARDOQUIA *OBOVATA*.

6. *G.* foliis obovatis integerrimis, pedunculis
3nis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA suffruticosa, tripedalis.

HABITAT in *Peruviae* praeruptis ad *Chen-*
chin vicum.

FLORET à Junio ad Augustum.

ANGIOSPERMIA.

ALONSOA.

Flor. Per. et Chil.

CHARACTER GENERICUS NATURALIS.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: *laciniis*
lanceolatis, striatis, patentibus: inferum,
persistens.

COR. resupinata, irregularis, supernè ad ba-
sim incisa. *Tubus* vix ullus. *Limbus* quin-
quepartitus, patens: *laciniis* subrotundis;
duabus superioribus minoribus, reflexis;
lateralibus duabus patulis, superioribus

triplò majoribus; *inferiori* reliquis multò majori, erectâ.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, basi corollae inserta, laciniarum lateralium longitudine, versus lacinias minores declinata, quorum duo longiora. *Antherae* cordatae: in coronulam adpressae, biloculares, apice bivalves.

PIST. *Germen* ovatum, apice compressum. *Stylus* subulatus, staminibus longior, declinatus, incurvus. *Stigma* bifidum.

PER. *Capsula* ovata, compressiuscula, torulosa, bisulca, bilocularis, bivalvis: *valvulis* bifidis, margine introflexo dissepimentum contrarium conficientibus, intus dehiscentibus.

SEM. plurima, parva, oblonga, angulata, scabra. *Receptaculum* oblongum, centrâle in singulo loculo.

CHARACTER DIFFERENTIALIS.

CALYX quinquepartitus. *Corolla* ferè rotata, resupinata, supernè usque ad basim incisa, patentissima: laciniâ infimâ maximâ. *Sta-*

mina declinata, basi corollae inserta. *Antherae* in coronulam adpressae. *Capsula* bilocularis, torulosa, intus dehiscens. *Semina* angulata.

HABITUS.

Plantae herbaceae aut suffruticosae. *Radix* ramosa, fibrillosa. *Caulis* infernè valde ramosus, tetragonus, aut hexagonus. *Rami* subvirgati. *Folia caulina* opposita, petiolata; *floralia* alterna, sessilia. *Racemi* longi, terminales. *Pedunculi* axillares, solitarii, uniflori, contorti, in fructu incurvati. Genus *Scrophulariae* affine.

Genus nuncupatum D. Zenoni Alonso, viro peraequè morum suavitate, et rerum naturalium novi orbis, in quo Regni Sanctaefidensis Proregi à secretis multa cum laude adfuit, peritiâ spectatissimo, ac strenuo hujus operis editionis Promotori.

ALONSOA CAULIALATA.

1. A. foliis ovatis acutis serratis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA tripedalis, herbacea.

HABITAT in *Peruviae* praeruptis, ruderatis et uliginosis locis ad *Tarmae*, *Huassahuassi*, *Surco*, *S. Mathaei* et *Cheuchin* vicos.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE *Huaccyanccacha*, id est, *Herba Sepulchralis*, quia supra *Huaccas*, scilicet Sepulchra laetè vegetat; et etiam *Herba Idolorum*, ob corollarum figuram, quae larvae figuram referunt.

VIRES. Stomachicà et anodinà vi pollet; ideoque infusum calidum ad stomachum roborandum commendatur, et in cataplasmatibus formam redactam ad tumorum dolores sedandos Indi adhibent.

ALONSOA ACUTIFOLIA.

2. A. foliis ovato-lanceolatis profundè serratis, serraturis recurvis. *Fl. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA ulnaris, perennis.

HABITAT in *Peruviae* collibus (vulgò *Lomas*) ad *Atiquipa*, ubi Joannes Tafalla eam descripsit et delineavit. Crescit quoque in *Pillao* et *Cheuchin* circuitu.

PARS I.

V

FLORET à Majo ad Septembrem.

ALONSOA INCISIFOLIA.

3. *A. foliis ovatis acutis inciso-serratis. Flor.*

Per. et Chil. tom. 4.

PLANTA sesquipedalis, herbacea.

HABITAT in versuris et ruderatis *Conceptionis*
Chile et Puchacay Provinciarum.

FLORET Augusto, et Septembri.

ALONSOA PROCUMBENS.

4. *A. foliis ovatis serratis, caulibus procum-*
bentibus. Flor. Per. et Chil. tom. 4.

PLANTA pedalis, herbacea.

HABITAT in *Peruviae* ruderatis et versuris ad
Pillao vicum.

FLORET à Junio ad Septembrem.

VERNACULE Ricaco et Rircaco, id est, Flos
respiciens.

ALONSOA LINEARIS.

5. *A. foliis ternis linearibus integerrimis ser-*
ratisque. Flor. Per. et Chil. tom. 4. CEL-
sia (linearis) JACQ. Collec. vol. 2. pag.

270. fasc. 1. tab. 13.

PLANTA suffruticosa, bipedalis.

HABITAT in versuris et ruderatis ad *Pillao*,
Panao, *Chaclla*, *Huassahuassi* et *Tar-*
mae vicos.

FLORET à Majo ad Septembrem.

VERNACULE *Ricaco* et *Ricarco*, id est, *Flos*
respiciens.

DOMBEYA.

L'HERIT. *Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 40.*
ICON. XVII.

CALYX tubulosus, bilabiatus: labio superio-
ri ad apicem dorsi corniculato; inferiori
latiori, emarginato. Corolla ringens: labio
superiori galeato, magno; inferiori biden-
tato, minimo. Nectarium anulare, sub-
quadrilobum. Stylus apice curvatus. Stig-
ma truncatum. Capsula 4locularis, mar-
ginibus valvularum introflexis, loculamen-
ta in duos loculos dividantibus. Dissep-
imentum tetrapterum. Semina imbricata,
cordata.

DOMBEYA LAPPACEA.

1. D. foliis bijugis; foliolis ternatis quinatisque cirrhiferis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4. DOMBEYA (lappacea). L'HERIT. Stirp. nov. fasc. 2. p. 33. tab. 17.*

PLANTA herbacea, scandens.

HABITAT in Peruviae praeruptis ad Limae colles Amancaes nuncupatos, et in Chancay Provincia.

FLORET Julio, et Augusto.

ECCREMOCARPUS.

Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 90.

ICON. XVIII.

CALYX tubulosus, membranaceus, 5fidus. Corolla tubulosa, supernè et infernè coarctata: limbo quinquefido, subrotundo, revoluto. Nectarium cyathiforme. Stigma bilobum. Capsula pedicellata, unilocularis, bivalvis. Semina imbricata, lentiformia, membranâ cincta. Receptaculum per singulas valvulas excurrens.

HABITUS.

Plantae suffruticosae, scandentes. *Caules* ramosissimi, angulosi, dichotomi aut brachiati. *Folia* opposita, bijugata, cirrhosa: pinnae oppositae, pinnatae, bipinnataeque: *foliola* alterna. *Cirrho* dichotomi, spirales. *Racemi* oppositifolii.

ECCREMOCARPUS VIRIDIS.

1. E. foliis bijugis bipinnatis cirrhiferis; foliolis ovatis integerrimis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA suffruticosa, scandens.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus prope *Mu-
ña* vicum.

FLORET Augusto, et Septembri.

ECCREMOCARPUS SCABER.

2. E. foliis bijugis pinnatis cirrhiferis; foliolis obliquè cordatis serratis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA suffruticosa, scandens.

HABITAT in *Regni Chilensis* segetibus et cam-

pis ad *Colchaguae*, *Rancaguae* et *Sancti Jacobi* Provincias.

FLORET Septembri, et Octobri.

MENDOZIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 36. Ic. XVII.

MENDOZIA. VANDELL. *Flor. Lusit. et Bras.*

Spec. pag. 43. f. 22.

CALYX diphyllus, latus. Corolla irregularis, tubo gibbo, fauce coarctata. Nectarium duplex, anulare. Drupa monosperma.

MENDOZIA ASPERA.

1. M. foliis ovatis acuminatis utrinque asperis, pedunculis unifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA suffruticosa, scandens.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus versus *Chincho* vicum et *Mesapata* praedium.

FLORET Augusto, et Septembri.

MENDOZIA RACEMOSA.

2. M. floribus racemosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA suffruticosa, scandens.

HABITAT in Peruviae nemoribus cum praecedenti.

FLORET Augusto, et Septembri.

ESCOBEDIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 91.

ICON. XVIII.

CALYX magnus, urceolatus, 10 angularis.

Corolla infundibuliformis, tubo curvato, contorto, limbo patentissimo, amplo, profundè 5 fido. Antherae sagittatae, angulis posticis, subulatis. Stigma lingulatum, rugoso-undulatum. Capsula bilocularis, bivalvis. Dissepimentum contrarium. Semina intra vesiculas.

ESCOBEDIA SCABRIFOLIA.

1. E. foliis ovato-cordatis scabris, pedunculis solitariis unifloris. Flor. Per. et Chil. tom. 4.

PLANTA herbacea, bipèdalis.

HABITAT in Peruviae montibus per runcationes, vernaculè *Carpales* dictas, versus

Chinchao, Cuchero, Chaclla et Muña vicos.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

VULGO *Azafran* et *Especeria de Montaña*.

Usus: Incolae hujus plantae radicibus ad lin-
tea et condimenta inficienda loco croci
utuntur. *Huancavelicani*, *Conchucani* et
Huaylenses ad montes *Huanuci* ad radices
decerpendas affatim accurrunt, et singu-
lam radicis libram in suis Provinciis regali-
bus quatuor venditant. Ex unaquaque plan-
ta radicum ferè semilibra extrahi potest.

VIRGULARIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 92. Ic. XIX.

CALYX campanulatus, quinquedentatus; den-
ticulis patentibus. *Corolla* irregularis, sub-
campanulata, recurva; fauce ventricosâ,
gibbâ; limbo quinquesido, laciniis con-
cavis. *Antherae* sagittatae. *Stigma* bifidum;
laciniâ superiori alteram semivaginantem.
Capsula bilocularis, bivalvis, polysper-
ma. *Dissepimentum* contrarium.

HABITUS.

Plantae suffruticosae. *Caules* erecti. *Rami* virgati, tetragoni. *Folia* opposita, subsessilia, integerrima. *Flores* axillares, solitarii.

VIRGULARIA LANCEOLATA.

1. *V.* foliis lanceolatis planis, calyce campanulato reflexo. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA suffruticosa, tripedalis.

HABITAT in *Peruviae* collibus frigidiusculis per *Tarmae*, *Huanuci* et *Panatahuarum* Provincias.

FLORET Octobri, et Novembri.

VERNACULE in *Pillao Mancapaqui* nuncupant.

VIRGULARIA REVOLUTA.

2. *V.* foliis oblongo-obovatis, marginibus revolutis, calyce tubuloso striato patenti. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA suffruticosa, ulnaris.

HABITAT in *Peruviae* collibus petrosis et

aridiusculis, passim versus *Huassahuassi*.
Pozuzo, *Muña*, *Chaclla* et *Chinchao*
 vicos.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VERNACULE Mancapaqui.

G O M A R A.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 45. Ic. XIX.

CALYX 4fidus. *Corolla* irregularis, tubo curvato, ad medium coarctato, basi dilatato.
Nectarium cyathiforme, membranaceum.
Stigma capitatum. *Capsula* bilocularis, bivalvis, polysperma.

G O M A R A R A C E M O S A.

1. *G.* foliis oblongo-lanceolatis supernè denticulatis, floribus racemosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus circa *Pozuzo* vicum.

FLORET Septembri, et Octobri.

SALPIGLOSIS.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 94. Ic. XIX.

CALYX 5 angularis, 5 fidus. *Corolla* infundibuliformis, magna; fauce plicatâ; limbo patentissimo. *Rudimentum* filamenti quinti inter stamina longiora. *Stylus* supernè ampliatus, lingulatus, planus, denticulo utrinque notatus. *Stigma* truncatum. *Capsula* bilocularis, bivalvis, polysperma.

SALPIGLOSIS SINUATA.

1. *S. foliis lanceolatis sinuato-dentatis. Flor. Per. et Chil. tom. 4. RAPUNTII* facie, foliis sinuatis, flore amplissimo sanguineo et striato. FEWILL. tom. 2. p. 729. pl. 2.

PLANTA herbacea, bipedalis.

HABITAT ad radices collium *Conceptionis Chile*, passim in *Mochita* tractu.

FLORET Novembri, et Decembri.

MECARDONIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 95.

CALYX heptaphyllus: foliolis tribus intermediis latioribus. *Corolla* irregularis; tubo ventricoso; labio superiori bifido, inferiori tripartito. *Stylus* apice compresso, incurvo. *Stigma* obtusum. *Capsula* unilocularis, bivalvis. *Semina* striata. *Receptaculum* teres.

MECARDONIA OVATA.

1. M. foliis ovatis serratis. *Flor. Per. et Chil. tom. 4.*

PLANTA herbacea.

HABITAT in *Peruviae* plateis ad *Chinchao* et *Cuchero* vicos.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

CALYTRIPLEX.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 96. Ic. XIX.

CALYX triplex; intermedius tripartitus, latior. *Corolla* irregularis: limbo 5 fido; la-

ciniis duabus superioribus latioribus. *Stigma* capitatum, emarginatum. *Capsula* bilocularis, bivalvis: valvulis bifidis. *Semina* plura, sulcata, transversim striata. *Receptaculum* dissepimento utrinque adnatum.

XX. *CALYTRIPLEX* OBOVATA.

1. *C.* foliis obovatis integerrimis aveniis. *Fl.*
Per. et Chil. tom. 4.

PLANTA herbacea.

HABITAT in *Peruviae* stagnatis per *Limae*,
Chancay et *Huanuci* Provincias, et in *Chilense* Regno.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

VIRES: Diureticâ vi pollet.

C L A S S I S XVI.

MONADELPHIA POLYANDRIA.

CAVANILLESIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 97. Ic. XX.

CALYX simplex, 5 partitus. *Petala* quinque. *Stylus* cylindricus. *Stigma* capitatum. *Pericarpium* maximum, membranaceum, pentapterum. *Semen* unicum, striatum.

CAVANILLESIA UMBELLATA.

1. C. foliis cordatis, floribus umbellatis. *Fl. Per. et Chil. tom. 5.*

ARBOR trigintaulnaris et ultra.

HABITAT in *Andium* nemoribus calidissimis, inter *Pozuzo* vicum, et *Huancabamba* flumen.

FLORET mense Augusto. *Folia* à Septembri ad Novembrem explicantur.

VERNACULE *Huancarssacha*, id est, *Arbol del Tambor*.

Obs. Incolae hanc arborem *Huancarssacha*, id est, *Tympani Arborem* appellant, quoniam crassus ejus cortex ad minorum tympanorum, quibus inter choreas utuntur, circulos conficiendos inservit. Truncus, qui infernè valde crassus est, et ad medium veluti tumefactus, ligno constat fungoso, quem facillimè penetrat bipennis, non secus ac cucurbitae pomum: quapropter nihil mirum si arbos, quam scindi jussimus, quamvis adeo crassam ut eam duo homines vix amplecti possent, citissimè eorum unus everterit. Lignum siccum levissimum est, et ad rates et alia corpora in aquae superficie sustinenda aptissimum. Ramificatio cymam frondosissimam et semiglobosam constituit. Rubri ejus Flores adeò fugaces sunt, ut intra octo aut decem dierum spatium, germina omnia maximum incrementum acquirant: Fructus autem cùm quinque, interdum quatuor insignibus alis praediti sint, arboris coma plurimis velu-

ti lanternis helvolis quadam arte et consilio respersa videtur. Haec arbos inter paucas enumeratur, quae in *Andium* montibus folia amittunt, et flores antequam folia explicant.



CLASSIS XVII.

DIADELPHIA OCTANDRIA.

MONNINA.

CHARACTER GENERICUS NATURALIS.

CAL. *Perianthium* triphyllum: *foliolis* parvis, ovatis, concavis, deciduis.

COR. subpapilionacea.

Vexillum nullum, nisi duo acumina appendicis carinae pro eo sumas.

Alae duae, obovatae, planae, deciduae.

Carina concava, compressa, versus apicem ventricosa, decidua.

Appendix carinae (sive vagina staminum) monophylla, subconvoluta, basi carinae inserta, latere utrinque acuminata, palato hirsuta, pistillum amplexans, decidua.

STAM. *Filamenta* octo, apici appendicis carinae inserta, subulata, hirsuta, quatuor ad singulum latus, alternantia paulò bre-

PARS I.

Y

viora. *Antherae* ovatae , biloculares, erectae , apice dehiscentes , ferè ringentes.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* simplex , incurvus , infernè attenuatus. *Stigma* simplex, compressum, truncatum, latiusculum.

PER. *Drupa* monosperma.

SEM. *Nux* unilocularis. *Nucleus* ejusdem figurae.

Obs. 1. In *M. crostachya* et *pterocarpa* *Drupae* margine membranaceo cinctae sunt. In *M. macrostachya*. *Drupae* sunt ovatae , in *M. pterocarpa* orbiculatae, et in reliquis *Speciebus* oblongae , apterae.

Obs. 2. Differt à *Polygalae* Genere , cui valde affine est , omnibus fructûs partibus , et floris partium decidentiâ. Ad hoc Genus referenda est *Polygala spinosa* (LINN. *Sp. pl.* vol. 2. p. 386?

CHARACTER DIFFERENTIALIS.

CALYX triphyllus. *Corolla* subpapilionacea. *Stamina* in duas fascies , quatuor alterna paulò breviora. *Antherae* apice dehiscentes , ferè ringentes. *Stylus* incurvus. *Stig-*

ma compressum, truncatum. *Drupa* monosperma. *Nux* unilocularis.

HABITUS.

Plantae fruticosae aut herbaceae. *Caules* subvirgati. *Folia* alterna, integerrima. *Flores* terminales, spicati aut paniculati, alterni, bracteolâ suffulti. *Drupae* dependentes.

Genus nuncupatum Ex.^{mo} D. D. Josepho Moñino, Comiti de Floridablanca, qui quo tempore exteriora Regni, aliaque gravissima negotia administrabat, ingenii sui, fragrantis in fructuosas scientias studii et patrocinii vires cum Ex.^{mo} D. D. Josepho Galvez, Indiarum Administro, sibi que amicissimo, ad expeditionis nostrae prosperitatem ultrò contulit.

MONNINA POLYSTACHYA.

1. *M.* foliis ovato-lanceolatis obovatisque, paniculis polystachyis, drupis apteris. *Flor.*

Per. et Chil. tom. 5.

FRUTEX orgyalis et ultra.

HABITAT affatim in *Pillao* silvaticis collibus frigidiusculis.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE *Masca* dicitur.

VIRES ET USUS. Radix ut tota planta, amarissima et valde saponacea est. Medicinae Professores praestantiores vires, quàm in *Quassia amara* LINN. in hac radice se expertos fuisse testantur.

MONNINA SALICIFOLIA.

2. M. foliis lanceolatis acumine minimo, spicis brevibus ferè pyramidalibus, drupis apteris. *Flor. Per. et Chil. tom. 5.*

PLANTA fruticosa, biulnaris.

HABITAT in *Peruviae* praeruptis per *Huaro-cherí*, *Tarmae* et *Panatahuarum* Provincias.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE *Hacchiquis*, et *Chissiphuinac*, id est, *Noctu crescens*.

VIRES ET USUS. Incolae asseverant, hanc plantam vim detergendi et capillos augendi

possidere ; quapropter foeminae infusione frigidâ ad hunc finem frequenter utuntur.

MONNINA CONFERTA.

3. M. foliis oblongis acumine minimo confertis, spicis brevibus, drupis apteris. *Flor. Per. et Chil. tom. 5.*

PLANTA fruticosa, biulnaris, corymbosa.

HABITAT in *Andium* nemoribus ad *Tambo nuevo* hospitium.

FLORET Augusto, et Septembri.

MONNINA LINEARIFOLIA.

4. M. foliis linearibus subsessilibus, spicis infernè nudis, drupis laevibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 5.*

PLANTA herbacea, pedalis.

HABITAT in *Regni Chilensis* subalpinis locis, versus *Nacimiento* arcem.

FLORET Decembri, et Januario.

MONNINA MACROSTACHYA.

5. M. foliis lanceolato-rhombeis, spicis longissimis, drupis membranâ brevi dentatâ

cinctis. *Flor. Per. et Chil. tom. 5.*

PLANTA herbacea, bipedalis.

HABITAT in *Peruviae* collibus passim ad *Cercado* et *Chancay* Provincias.

FLORET Augusto, et Septembri.

MONNINA PTEROCARPA.

6. M. foliis lanceolatis; inferioribus subovatis, spicis longissimis, drupis membranâ utrinque emarginatâ cinctis. *Flor. Per. et Chil. tom. 5.*

PLANTA herbacea, tripedalis, parum amara.

HABITAT in *Peruviae* versuris per *Chancay* et *Cercado* Provincias.

FLORET Julio, et Augusto.

OCTANDRIA.

NEGRETIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 98. Ic. XXI.

CALYX campanulatus, bilabiatus: labio superiori integro, erecto; inferiori trifido, laciniâ mediâ productioni. *Vexillum* sagit-

tato-ovatum , assurgens , integerrimum. *Alae* dolabraeformes, basi lunulatae, carinae longitudine. *Carina* falcata , ab apice ad gibbositatem bifida. *Antherae* bifformes, hirsutae. *Stylus* incurvus. *Stigma* pubescens. *Legumen* magnum, torosum, uniloculare, dissepimentis interceptum. *Semina* 2-4, orbicularia, hilo cristato ultra medium cincta.

Obs. Ad hoc Genus referri debent *PHASEOLUS* (*americanus*). *PLUKENET. phytog. 213. fig. 2.* *ZOOPHTHALMUM. BROWN. Jamaic. pag. 295.* *DOLICHOS* (*urens*) et (*altissimus*). *JACQ. stirp. select. amer. pag. 100. tab. 189. et 190.*

HABITUS.

Plantae fruticulosae , ad summitates arborum procerarum scandentes. *Caules* teretes , ramosissimi, longissimi. *Folia* ternata; lateralia magis minusve obliqua; intermedia ovali-oblonga. *Stipulae* caducae. *Pedunculi* longissimi. *Flores* umbellati aut racemosi. *Legumina* magna, urentia aut inermia.

NEGRETIA INFLEXA.

1. N. foliolis lateralibus cordatis, floribus umbellatis, pedicellis inflexis, leguminibus urentissimis, seminibus subglobosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 5.*

PLANTA fruticosa, volubili-scandens.

HABITAT in Andibus per Cuchero, Pozuzo et Muña nemora calida.

FLORET à Junio ad Augustum.

VERNACULE Llamapañauí, id est, Cameli Llamae, sive Arietis Peruviani, Oculi.

Obs. Pedunculi 2-4ulnares, penduli. Flores numerosi, umbellati, ita digesti ut fanale in araneae formam structum aemulentur.

NEGRETIA ELLIPTICA.

2. N. foliolis lateralibus ovatis, floribus umbellatis, leguminibus urentissimis dispermis, seminibus utrinque convexis. *Flor. Per. et Chil. tom. 5.*

PLANTA volubili-scandens.

HABITAT in Peruviae nemoribus Pozuzo, Cuchero et Muña.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

VERNACULE *Llamapañau*.

VIRES ET USUS. Produnt incolae pulverem
seminum omnium *Negretiae* Specierum,
quas *Llamapañau* seu *Cameli Llamae*
Oculos, aliisque in provinciis *Asini* aut
Bovis Oculos appellant, drachmae unius
pondere haustum, et insectorum reptilium-
que punctationibus exterius applicitum praes-
tantissimum antidotum esse; setasque uren-
tium leguminum *Picapica* à quibusdam,
ob pruritum, quem cuti inductae excitant,
vocatorum, tutum anthelminticum consti-
tuere, sive in chocolata, sive in lacte aut
melicrato ad semiscrupulum propinatas.

NEGRETIA MITIS.

3. N. foliolis obliquè ovatis, racemis longis-
simis; leguminibus inermibus, seminibus
compressiusculis. *Flor. Per. et Chil. t. 5.*

PLANTA volubili-scandens.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus *Chinchao*
ad *Macoram* et *Mesapata* praedia.

PARS I.

z

FLORET Majo, et Junio.

VERNACULE Llamapañau.

NEGRETIA PLATYCARPA.

4. *N.* foliolis cordato-ovatis; intermedio oblongo-lineari acuto, leguminibus compressis, seminibus planis. *Flor. Per. et Chil. tom. 5.*

PLANTA volubili-scandens

HABITAT in *Peruviae* nemoribus *Cuchero* et *Pueblo nuevo* ad *Chicoplaya*.

FLORET Junio, et Julio.

Obs. Semina duarum aliarum Specierum *Llamapañau* ab Indis obtinuimus, ipsarum verò plantas non offendimus.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA POLYANDRIA.

TERNSTROEMIA

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 99. Ic. XXI.

CALYX heptaphyllus: foliolis coriaceis: duobus exterioribus parvis. Corolla 5 partita patens, aut globosa 5 dentata. Stamina numerosa, basi corollae in 5 corpora coacta. Stylus subulatus. Stigma emarginatum. Capsula corticosa, acuminata, bilocularis, inaequaliter elasticè dehiscens. Semina bina, bilocularia.

TERNSTROEMIA GLOBIFLORA.

T. foliis oblongis integerrimis, corollis globosis quinquedentatis, calycinis foliolis eciliatis. Flor. Per. et Chil. tom. 5.

FRUTEX quadriulnaris, ramosissimus.

HABITAT in Andium silvaticis frigidis, versus Pillao vicum.

FLORET à Majo ad Augustum.

TERNSTROEMIA QUINQUEPARTITA.

2. T. foliis obovatis obsolete serrulatis, corollis quinquepartitis, calycinis foliolis exterioribus ciliatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 5.*

FRUTEX biorgyalis, frondosissimus.

HABITAT in Andium silvaticis et frigidis locis cum praecedenti.

FLORET à Majo ad Septembrem.

PALAUA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 100.

ICON. XXII.

CALYX pentaphyllus: foliolis margine membranaceis, duobus angustioribus. Petala 5, unguibus ciliata, basi connata. Stamina numerosa, subulata, unguibus petalorum in 5 congeries inserta. Antherae incumbentes, basi biperforatae. Styli 5. Stigmata reniformia. Capsula subglobosa, 5locularis, angulis dehiscens. Semina 4gona, truncata. Receptacula subrotunda, carnosa.

Obs. Genus *Hyperici* et *Vismiae* Generibus affine, sed diversissimum.

HABITUS.

Frutices erecti. *Caules* teretes. *Folia* alterna, petiolata, amplissima, serrata. *Racemi* axillares, compositi. *Pedicelli* bracteolis suffulti. *Bracteolae* 2-3 sub singulo calyce. *Corollae* albae. *Petala*, in corollam rotatam basi connexa, cum staminibus simul decidunt.

PALAUA LANCEOLATA.

1. *P.* foliis oblongo-lanceolatis serrulatis acuminatis, racemis compositis, pedicellis aggregatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 5.*

FRUTEX triorgyalis, hirsutissimus.

HABITAT in nemoribus Cuchero, Chinchao et Iscutinam.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

PALAUA BISERRATA.

2. *P.* foliis obovato oblongis acuminatis superne biserratis, racemis brachiatis, pedicellis trifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 5.*

FRUTEX biorgyalis, hirsutus.

HABITAT in *Muña* et *Chincho* nemoribus.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

PALAU A GLABRA.

3. P. foliis obovatis acuminatis serratis, racemis compositis laxis, pedicellis longis unifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 5.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in *Muña* runcationibus, vernaculè *Carpales* dictis.

FLORET Augusto, et Septembri.

VISMIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 101.

ICON. XXII.

CALYX 5partitus: *laciniis* in fructu dependentibus. *Corolla* 5petala, extus punctata, intus hirsutissima. *Nectarium* glandulis quinque. *Stamina* in 5 corpora linearia, plana, penicilli instar disposita, pilosa. *Antherae* secundae. *Styli* 5. *Stigmata* pel-tata, umbilicata. *Bacca* 5locularis, polysperma.

VISMIA GLABRA.

1. V. foliis lanceolatis glabris, racemis axillaribus terminalibusque. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 5.

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in *Andium* nemoribus ad *Cuchero*,
Chinchao et *Muña* tractus.

FLORET à Julio ad Septembrem.

Obs. Baccae hujus Speciei et sequentis sapore
satis acido et amariusculo praeditae sunt.

VISMIA TOMENTOSA.

2. V. foliis ovatis acutis subtus tomentosis,
racemis terminalibus. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 5.

ARBOR quadriorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus versus *Cuchero*,
Chinchao, *Muña*, *Pozuzo* et *Pillao* ad *Chacahuassi* tractus.

FLORET à Julio ad Octobrem.

Obs. 1. Ad hoc Genus referendae sunt *Hyperici*
Cayenensis et *bacciferi* LINNAEI, et
Hyperici Guyanensis AUBLET. tom. 2.

p. 784. t. 311. Species, quarum Corollae sunt barbatae, et *Pericarpia* baccata.

Obs. 2. Descriptio *Hyperici Cayenensis*

JACQUIN. *Americ. pag. 213.* cum *Vismia nostra tomentosa* omnino convenit, sed de foliorum tomento nihil auctor memorat.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

TRIPTILION.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 102.

ICON. XXII.

CALYX imbricatus : *Squamis* interioribus adpressis, exterioribus subsquarrosis. *Corolla* uniformis. *Corollulae* bilabiatae ; labio superiori reflexo , tridentato ; inferiori integro, revoluta. *Semina* trigona. *Pappus* plumulis tribus. *Receptaculum* planum, villosum.

TRIPTILION SPINOSUM.

1. T. foliis radicalibus pinnatifidis , caulinis laciniato-dentatis spinosis , floribus corymbosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA herbacea , pedalis.

HABITAT in Regni Chilensis campis et colli-

PARS I.

AA

bus , affatim circa *Conceptionis* urbem ad *Mochita*, *Hualpen* et *Hualqui* tractus.

FLORET à Januario ad Aprilem.

VULGO Siempreviva , à colore florum persistente tam in plantis vivis , quàm in siccis.

VIRES ET USUS. Incolae hujus plantae infuso et decocto ad urinae suppresionem , dolores nephriticos sedandos et luem veneream depellendam non infrequenter utuntur. Plantam in manipulos exsiccatam ad usum servant.

MOSCHARIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 103.

CALYX hexaphyllus , aequalis. *Corolla* uniformis. *Corollulae* ligulatae , tridentatae. *Semina* exteriora , pappo brevi , plumoso coronata ; centralia nuda. *Receptaculum* planum , paleaceum.

MOSCHARIA PINNATIFIDA.

1. M. foliis amplexicaulibus pinnatifidis laciniis profundè dentatis. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 6,

PLANTA herbacea, tripedalis.

HABITAT in *Regni Chilensis* aridis, arenosis et petrosis locis ad *Aconcaguae*, *Quillotae* et *Rancaguae* Provincias, et copiosè versus *S. Jacobi Chilensis* urbem.

FLORET Septembri, et Octobri.

VULGO *Almizclillo*.

PLAZIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 104.

CALYX imbricatus. **Corolla** subradiata. **Corollulae**: radii semitrifidae; laciniâ exteriori, amplissimâ, patenti, trifidâ; interioribus linearibus, revolutis: **disci** quinquefidae, revolutae. **Anthera** curvata. **Semina** linearia, angulata. **Pappus** pilosus. **Receptaculum** nudum, planum.

PLAZIA CONFERTA.

1. *P. foliis ovato-lanceolatis trinerviis. Flor.*

Per. et Chil. tom. 6.

PLANTA frutescens, resinosa, 7pedalis.

HABITAT in *Peruviae* praeruptis et sepibus

versus *Acobamba*, Provinciae *Tarmae*
vicum.

FLORET Augusto, et Septembri.

BACASIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 105.

ICON. XXII.

CALYX imbricatus, scariosus. *Corollula* unica in disco, tubulosa, 5 fida, amplissima, sterilis, calycis longitudine: *reliquae* ligulatae, 4 dentatae, calyce duplò longiores, setâ revolutâ, ori tubi insertâ. *Anthera disci* ovata, sessilis in corollulae fundo. *Filamenta* reliquorum flosculorum in cylindrum adpressa, tubo inserta. *Anthera* tubulosa, longitudine corollulae. *Germen: disci* magnum, effoetum. *Stigma* simplex, perforatum: *radii: Germen* angulatum. *Stigma* bifidum. *Semina radii* angulata, pappo plumoso. *Receptaculum* pilosum.

BACASIA SPINOSA.

1. B. foliis obovatis mucronatis cartilagineis,

floribus solitariis. *Flor. Per. et Chil. t. 6.*

PLANTA frutescens , bipedalis.

HABITAT in *Peruviae* subalpinis et praeruptis
frigidis ad *Huaroherí, Tarmae* et *Cantae*
Provincias.

FLORET à Majo ad Julium.

VULGO *Clavelon de Serranias.*

BACASIA CORYMBOSA.

2. B. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis
mucronatis , corymbis terminalibus. *Flor.*
Per. et Chil. tom. 6.

PLANTA frutescens , biorgyalis.

HABITAT in *Andium* nemoribus prope *Muña*
vicum.

FLORET Augusto, et Septembri.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

CHAETANTHERA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 106.

ICON. XXIII.

CALYX polyphyllus, ciliatus. *Corolla* radiata. *Corollulae disci* tubulosae, bifidae : *radii* lineares, tridentatae, laciniâ ad incisuram tenuissimâ, bifidâ, spirali. *Stamina radii* castrata. *Anthera disci* infernè setis decem. *Semina* obovata. *Pappus* pilosus. *Receptaculum* nudum, planum.

CHAETANTHERA CILIATA.

1. C. foliis lanceolatis ciliatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA herbacea, bipalmaris.

HABITAT copiosè in *Regni Chilensis* collibus et campis, versus *Huilquilemu* oppidum.

FLORET à Novembri ad Januarium.

CHAETANTHERA SERRATA.

2. C. foliis lineari-lanceolatis serratis carinatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA herbacea, semipedalis.

HABITAT in arenosis Conceptionis Chile et in Rere Provincia inter praecedentem.

FLORET à Novembri ad Decembrem.

MUTISIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 107.

ICON. XXIII.

CALYX cylindricus, imbricatus. *Corolla* radiata. *Flosculi hermaphroditi* tubulosi, semitrifidi; laciniis linearibus, revolutis; latiori tridentatâ. *Feminei* ligulati, tridentati; setâ brevi ad basim ligulae. *Anthera hermaph.* 5 sulcata, basi in setas 5 villosas desinens. *Femin. Rudimenta* filamentorum quinque. *Semina* linearia, tetragona. *Pappus* plumosus. *Receptaculum* nudum, punctis excavatum.

HABITUS.

Plantae suffruticosae, scandentes, tomentosae aut glabrae. *Caules* ramosissimi, angulati, striati, alati aut apteri. *Folia* alterna, sessilia, pinnata aut simplicia, cirrho simplici, 2-3 fido terminata, foliolis inferioribus stipulaeformibus. *Pedunculi* terminales, solitarii, uniflori. *Calycis Squamae* adpressae aut squarrosae, uncinatae, ultra medium coarctatae.

MUTISIA LANATA.

1. *M.* foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, caule tetragono alato dentato. *Fl. Per. et Chil.* t. 6.

PLANTA scandens, suffruticosa.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus prope *Munã* vicum in *Pozuzo* via.

FLORET à Julio ad Septembrem.

MUTISIA ACUMINATA.

2. *M.* foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis, caule subangulato. *Flor. Per. et Chil.* tom. 6.

PLANTA scandens, fruticosa, 2-3 orgyalis.

HABITAT in umbrosis et praeruptis Provinciarum *Tarmae*, *Huarochei* et *Qaxatambo* ad *Cheuchin* vicum.

FLORET à Majo ad Augustum.

VERNACULE *Chiucumpa* et *Huincus*, in *Tarmae* oppido *Chinchinculma* et *Chinchilculma*.

VIRES ET USUS. Ad pleuritidem infusum calidum propinatur.

MUTISIA SPINOSA.

3. M. foliis simplicibus sagittato-oblongis emarginatis dentato-spinosis, caule alato.

Flor. Per. et Chil. tom. 6.

PLANTA scandens, suffruticosa.

HABITAT in Regni *Chilensis* copiosè ad *Arauco* arcem supra *Colocolo* montem intra fossas.

FLORET Februario, et Martio.

MUTISIA SUBULATA.

4. M. foliis simplicibus lineari-subulatis reflexis, caule flexuoso. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PARS I.

BB

PLANTA scandens, suffruticosa.

HABITAT in Regni Chilensis aridis et arenosis campis, affatim inter Talcahuano Portum et Conceptionis urbem.

FLORET Februario, Martio et Aprili.

VULGO Claveles del Campo.

MUNNOZIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 108.

ICON. XXIII.

CALYX campanulatus, imbricatus; Squamis intimis angustissimis, trifidis. Corolla radiata. Flosculi disci infundibuliformes, limbo campanulato, 5 fido; radii ligulati, tridentati. Semina obovata, truncata, striata. Pappus pilosus. Receptaculum favosum, ciliatum.

HABITUS.

Plantae suffruticosae, tomentosae aut hirsutae. Caules erecti, ramosi, striati. Folia opposita, petiolata. Flores terminales, subcorymbosi, aut solitarii, axillares et terminales.

MUNNOZIA CORYMBOSA.

1. M. foliis cordato-triangularibus sagittatis-
que, floribus corymbosis. *Flor. Per. et*
Chil. tom. 6.

PLANTA suffruticosa, biorgyalis.

HABITAT in *Pillao* circuitu et versuris.

FLORET à Julio ad Septembrem.

MUNNOZIA TRINERVIS.

2. M. foliis hastatis auriculatis dentato-sub-
spinosus trinervibus, pedunculis ternis lon-
gis. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA suffruticosa, orgyalis.

HABITAT in *Peruviae* praeruptis et segetibus
versus *Picoy* et *Huassahuassi* vicos.

FLORET Novembri, et Decembri.

MUNNOZIA VENOSISSIMA.

3. M. foliis hastato-sagittatis auriculatis den-
ticulatis venosissimis, pedunculis ternis
longis. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA suffruticosa, biulnaris.

HABITAT in *Peruviae* montibus silvaticis ver-

sus *Pillao* vicum.

FLORET Augusto, et Septembri.

MUNNOZIA LANCEOLATA.

4. *M. foliis hastato-lanceolatis serrato-dentatis, pedunculis bifloris brevibus. Fl. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA suffruticosa, biulnatis.
HABITAT in altis frigidis *Muña*, ad *Tambo nuevo* et *Sarriapata* tractus.

FLORET á Junio ad Augustum.

SOBREYRA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 109.

ICON. XXIII.

CALYX magnus, tetragonus, tetraphyllus: *foliolis* patentibus; oppositis majoribus. *Corolla* radiata. *Flosculi* feminei hermaphroditi breviores. *Semina* obovata. *Pappus* nullus. *Receptaculum* paleaceum, convexum: paleis obovatis, tridentatis, ciliatis.

SOBREYRA SESSILIFOLIA.

1. *S. foliis lanceolato-sagittatis serratis. Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA repens, ferè tripedalis.

HABITAT in *Peruviae* stagnatis, et copiosè
erescit in circuitu *Limae, Lurigancho, Mi-
raflones, Surco, Magdalena, Lurin, Arne-
do, Laral* et *Huaura*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

SOBREYRA OBLONGA.

2. *S. foliis oblongis dentatis. Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA repens, bipedalis.

HABITAT in *Peruvia* cum praecedenti.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

GALINSOGA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 110.

ICON. XXIV.

CALYX hemisphaericus, imbricatus. Corolla
radiata. Flosculi disci numerosi. Flosculi

radii 4-12, truncati, trifidi. *Semina* obversè conica. *Pappus* radiatus, paleis ciliatis; alternis paulò brevioribus. *Receptaculum* conicum, paleaceum: paleis 2-4-fidis integrisque.

GALINSOGA QUINQUERADIATA.

1. *G.* foliis ovatis acutis serratis, pedunculis longis 1-3 floris, corollis 5 radiatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 6. GALINSOGA (parviflora). CAVAN. Ic. v. 3. pag. 41. t. 281.* PLANTA herbacea, bipedalis.

HABITAT in *Peruviae* uliginosis, versuris et ruderatis locis, et in segetibus *Limae*, *Chancay*, *Huanuci* et *Regni Chilensis*.

FLORET per totum annum.

VERNACULE *Pacoyuyu* fino nuncupatur.

VIRES ET USUS. Vulnerariâ, antiscorbuticâ, et deterisivâ vi pollet. Incolae ad hujusmodi morbos sanandos folia masticant, vel plantae succum adhibent.

GALINSOGA QUADRIRADIATA.

2. *G.* foliis ovatis acutis serratis rugosis, pe-

dunculis brevibus 1-3 floris , corollis 4radiatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA herbacea , sesquipedalis.

HABITAT in *Peruviae* versuris , ruderatis et segetibus ad *Limam* et *Chancay*.

FLORET toto anno.

VERNACULE *Pacoyuyu cimarron* appellatur.

VIRES ET USUS. Eisdem viribus ac praecedens gaudet , eademque ratione Incolae vel folia mandunt , vel plantae succum ad os mundificandum usurpant.

Obs. 1. Corollae radius aliquando 3 florus , rariùs biflorus. Corollulae femineae profundè trifidae , purpurascentes.

Obs. 2. *Galisonga trilobata*. CAVAN. *Ic. pl. vol. 3. p. 42. t. 281.* à 6 ad 12 flosculos femineos in Regio Horto Matritensi profert.

POLYGAMIA NECESSARIA.

MOLINA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. III.

ICON. XXIV.

CALYX *hermaphroditis* campanulatus, imbricatus: *Femineis* ovatus, imbricatus. *Corolla* *herm.* et *femin.* uniformis. *Corollulae* *hermaphrod.* infundibuliformes, 5 fidae: *Femineae* tubulosae, tenuissimae, 5 dentatae. *Semina* *hermaphrod.* nulla. *Pappus* calycis longitudine, pilosus; villis flexuosis, obsoletè plumosis. *Semina* *femin.* obovata. *Pappus* pilosus, calyce longior. *Receptaculum* convexum, nudum, punctatum.

Obs. Molinae Genus differt, ut ex Characterе generico Linnaeano patet, à *Baccharis* Genere, cui affine est, primùm quia omnes *Molinae* Species sunt Polygamae dioicae, et ad ordinem Polygamiam necessariam pertinent: praeterea *Baccharis* Cha-

racter genericus naturalis à Linnaeo traditus nostris Molinis non quadrat. *CONYZA* (*frutescens*). FEWILL. *Per. pag. 750. planch. 37.* quam LINNAEUS sub *Baccharis ivaefoliae* Specie inseruit, ad *Molinae* Genus redigenda est.

HABITUS.

Frutices aut *suffrutices* Polygami dioici, resiniferi, amari et balsamici. *Caules* erecti, aut procumbentes, aut scandentes, ramossissimi. *Ramuli* teretes, aut angulosi, aut striati. *Folia* sparsa aut imbricata, alterna aut opposita; in *M. reticulatâ* et *venosâ* nulla. *Flores* terminales corymbosi aut racemosi, vel axillares et laterales aggregati aut solitarii. *Calyces hermaphroditi* campanulati, breves: *Feminei* ovati, longiores. *Pappus* seminum femineorum simplicissimus; *flosculorum hermaphroditorum*, microscopio inspectus, plumosus, penicilli instar.

MOLINA EMARGINATA.

1. *M. foliis ovalibus emarginatis, floribus subcorymbosis. Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa.

HABITAT in *Peruviae* collibus, copiosè in *Tarmae* Provincia.

FLORET Octobri, et Novembri.

VIRES ET USUS. Vulnerarium et consolidans remedium est, uti omnes reliquae Species hujus Generis. Incolae folia ob gratum odorem ad cubilia fumiganda frequenter usurpant.

MOLINA DEPENDENS.

2. *M. foliis ovatis cordatisque cum acumine integerrimis subquinenervibus, floribus racemosis. Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa, scandens, triorgyalis.

HABITAT in *Andium* nemoribus ad *Cuchero Casape et Casapillo* tractus.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

MOLINA OBLONGIFOLIA.

3. M. foliis oblongis integerrimis , corymbis terminalibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa , biorgyalis.

HABITAT in Regni Chilensis silvis , versus Conceptionis urbem , et Hualpen tractus.

FLORET Majo , Junio et Julio.

MOLINA TOMENTOSA.

4. M. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis tomentosis , floribus subcorymbosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa , bipedalis.

HABITAT in Peruviae altis frigidis in Caxatambo Provincia versus Cheuchin.

FLORET à Majo ad Septembrem.

MOLINA CAESPITOSA.

5. M. foliis spathulatis integerrimis , floribus solitariis axillaribus terminalibusque. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA suffruticosa , caespitosa , repens.

HABITAT in Peruviae alpibus , Punas de

Bombom dictis in *Tarmae* Provincia.
FLORET ab Aprili ad Julium.

MOLINA *NITIDA*.

6. *M.* foliis oblongo-lanceolatis integerrimis
denticulatisque, floribus axillaribus corym-
boso-racemosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa , triulnaris.

HABITAT in *Peruviae* altis et silvaticis locis,
versus *Pillao* et *Panao* tractus.

FLORET à Julio ad Septembrem.

MOLINA *PROSTRATA*.

7. *M.* foliis obovatis denticulatis integrisque,
pedunculis axillaribus 1-2 floris. *Flor.*
Per. et Chil. tom. 6.

PLANTA fruticosa , prostrata , citriodora.

HABITAT in *Peruviae* alpibus ad *Bombom*,
Huamalies , *Cantae* et *Pillao*.

FLORET Junio , Julio et Augusto.

VERNACULE *Pachatacyá* , id est , *Tacya ten-*
dida en tierra.

VIRES ET USUS. In dysuria decoctum per ali-
quot dies propinatum maximè prodest.

MOLINA LINEARIS.

8. M. foliis linearibus dentatis integerrimis-
que, floribus subcorymbosis. *Flor. Per.*
et Chil. tom. 6.

PLANTA fruticosa, orgyalis.

HABITAT in *Regni Chilensis* locis arenosis,
per *Conceptionis*, *Puchaca y*, *Rere*, *Ita-*
tae, *Maule*, *Colchaguae*, *Rancaguae* et
Aconcaguae Provincias.

FLORET Febuario, et Martio.

VULGO *Romerillo*, propter odorem et saporem
Rosmarino similem, nuncupatur.

VIRES ET USUS. Chilenses ad luxationes fir-
mandas foliis contusis, non sine fructu,
utuntur.

MOLINA SCANDENS.

9. M. foliis ovato-lanceolatis dentatis biden-
tatisque triplinervibus, corymbis termina-
libus. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa, triorgyalis, scandens.

HABITAT in *Peruviae* versuris et aridis locis
per *Chancay* et *Cercado* Provincias.

FLORET toto anno.

VERNACULE Chilca appellatur.

VIRES ET USUS. Corporis partes nimis luxuriant folia contusa firmant et constringunt.

MOLINA obovata.

10. M. foliis obovatis supernè dentatis, floribus terminalibus congestis. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa, quadripedalis.

HABITAT in *Peruviae* collibus aridis, affatim ad *Tarmae* oppidum.

FLORET Novembri, et Decembri.

VERNACULE Tacya macho appellatur.

USUS: Ad cubicula suffumiganda incolae foliis frequenter utuntur.

MOLINA concava.

11. M. foliis cuneiformibus concavis supernè dentatis, floribus subcorymbosis. *Fl. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa, biorgyalis, subscandens.

HABITAT in silvis *Conceptionis Chile.*

FLORET Julio, et Augusto.

VERNACULE Gaultro.

Obs. Folia ad nigro colore tingendum inser-
viunt.

MOLINA STRIATA.

12. M. foliis lanceolatis dentato-serratis tri-
plinervibus nitidis, corymbis terminalibus.

Flor. Per. et Chil. tom. 6. BACCHARIS

(ivaefolia). LINN. Sp. plant. pag. 668.

CONYZA (frutescens). FEWILL. Peruv.

pag. 750. planch. 37.

PLANTA fruticosa, triorgyalis.

HABITAT in Peruviae ripis et arenosis locis

Limae, Chancay et Huanuci.

FLORET per totum annum, et praesertim à

Junio ad Septembrem.

VERNACULE Chilca appellatur.

VIRES ET USUS. Folia propter resinam ad con-
tusiones, luxationes et vulnera recentia
consolidanda maximi emolumenti sunt.

MOLINA VISCOSA.

13. M. foliis lanceolatis dentato-serratis, co-
rymbis terminalibus. *Fl. Per. et Chil. t. 6.*

PLANTA suffruticosa, bipedalis.

HABITAT in Regni *Chilensis* ruderatis et aridis locis ad *Conceptionis* et *Puchacay* Provincias.

FLORET Januario, et Febuario.

MOLINA UNIFLORA.

14. *M.* foliis lanceolatis serrato-dentatis confertis sessilibus, pedunculis terminalibus squamosis unifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa, quadripedalis.

HABITAT in collibus aridis *Tarmae* oppidi ad *Curis*, *Huichay* et *Tarmatambo* tractus.

FLORET Januario, et Febuario.

MOLINA LATIFOLIA.

15. *M.* foliis lanceolatis triplinerviis argutè serratis, corymbis terminalibus nudis. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa, orgyalis.

HABITAT in *Peruviae* ruderatis et campis prope *Muña* et *Rondos* vicos.

FLORET toto anno.

VERNACULE Chilca et Ancochuta, id est, *Estira nervios*, quia folia contusa ad luxationes et hernias roborandas maximè valent.

MOLINA PARVIFLORA.

16. M. foliis lanceolatis triplinerviis dentato-serratis, corymbis terminalibus foliosis *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa, subscandens.

HABITAT in versuris et ripis *Chancay* et *Cercado* Provinciarum.

FLORET per totum annum.

VERNACULE *Chilca* dicitur.

MOLINA RACEMOSA.

17. M. foliis ovato-lanceolatis trinervatis acutè serratis, racemis terminalibus. *Fl. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa, biorgyalis.

HABITAT in *Regni Chilensis* silvis et nemoribus ad *Nonguen*, *Carcamo*, *Palomares*, *Hualpen* et *Hualqui* tractus.

FLORET Februario, et Martio.

VERNACULE *Chilca* nuncupatur.

MOLINA SALICIFOLIA.

18. M. foliis lanceolato-linearibus triplinerviis serratis; serraturis remotis, corymbis terminalibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa, biorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* altis montibus, copiosè ad *Pillao* et *Acomayo* tractus.

FLORET à Majo ad Septembrem.

VERNACULE *Chilca* appellatur.

MOLINA CORYMBOSA.

19. M. foliis oppositis lanceolatis integerrimis, marginibus revolutis, floribus axillaribus solitariis. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa, biorgyalis, corymbosa.

HABITAT in *Peruviae* alpibus versus *Pillao*.

FLORET Septembri, et Octobri.

MOLINA SCABRA.

20. M. foliis oppositis ovato-lanceolatis acutis trinerviis serratis, corymbis terminalibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa, ramis scabris, 4pedalis.

HABITAT in *Tarmae* Provinciae montibus.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

MOLINA INCANA.

21. *M.* foliis bifariam imbricatis carinatis, ramis linearibus longis incurvis subsimplicibus, floribus axillaribus. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA fruticosa, bipedalis (*Lycopodii* facie).

HABITAT in *Peruviae* alpibus ad *Pillao* vicum versùs *Silcay* tractum.

FLORET à Novembri ad Aprilem.

VULGO *Palmito* nuncupatur.

MOLINA FERRUGINEA.

22. *M.* foliis bifariam imbricatis carinatis, ramis brevibus subdiviso-corymbosis, floribus terminalibus. *Flor. Per. et Chil. t. 6.*

PLANTA fruticosa, tripedalis (*Lycopodii* facie).

HABITAT in *Peruviae* alpibus, vulgò *Cordilleras* et *Punas*, per *Tarmae*, *Cantae* et *Huaroherí* Provincias.

FLORET à Decembri ad Majum.

VERNACULE *Matára* et *Palmito* appellatur.

VIRET ET USUS. Plantae fumum vermes in plagas contentos enecare Indi asserunt: quapropter pastores adversus arietum plagas plantam in villis assiduè comburunt.

MOLINA RETICULATA.

+ 23. *M.* caule aphylo trigono-alato, alis venoso-reticulatis, floribus congestis; acervis approximatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA tripedalis, suffruticosa (habitu *Genistae tridentatae*).

HABITAT in collibus aridis *Conceptionis Chile.*

FLORET à Majo ad Septembrem.

MOLINA VENOSA.

+ 24. *M.* caule aphylo trigono-alato; alis venosiusculis, floribus congestis; acervis distantibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA bipedalis, suffruticosa (*Genistae tridentatae*, vulgò in Hispania *Carqueixa*, habitu).

HABITAT in *Chinchao*, *Panao*, *Muña*, *Huanuci* et *Tarmae* argillosis collibus.

FLORET Augusto, et Septembri.

TESSARIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 112.

ICON. XXIV.

CALYX ovatus, imbricatus: squamis scariosis, supernè radiantibus. Corollula hermaphrodita unica in centro, magna, tubulosa, profundè 5 fida: reliquae femineae tenuissimae, 5 dentatae. Semina femineis oblonga: Pappus pilosus. Hermaphroditis nulla: Pappus pilosus. Receptaculum conicum, villosum.

TESSARIA INTEGRIFOLIA.

1. T. foliis oblongo-obovatis integris, corymbis terminalibus. Flor. Per. et Chil. t. 6.

FRUTEX biorgyalis, canescens.

HABITAT in Huanuci et Ambo ripis.

FLORET toto ferè anno.

VULGO Paxaro bobo appellatur.

TESSARIA DENTATA.

2. T. foliis oblongis dentatis, corymbis ter-

minalibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

FRUTEX biorgyalis et ultra, incanus.

HABITAT copiosè in ripis, pratis et pascuis

Limae et *Chancay* ad *Arnedo* et *Huaura*.

FLORET toto ferè anno.

VULGO Paxaro bobo nuncupatur.

Usus: Lignum, quamvis leve et in igne parum durabile, in Lima aliisque maritimis locis, ubi abundè hic frutex crescit, ad focum praesertim, quin etiam ad tuguria et domorum tecta conficienda, Incolae frequentissimè usurpant.

SOLIVA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 113.

ICON. XXIV.

CALYX heptaphyllus; *foliolis* marginibus imbricatis; tribus exterioribus majoribus. *Flosculi hermaphroditi* pauci in centro, infundibuliformes, quadridentati. *Feminei* numerosiores in ambitu, apetalii. *Semina femineis* obovata, compressa, membranâ cincta, aculeis duobus, styloque coronata. *Receptaculum* minimum, subvillosum.

SOLIVA SESSILIS.

1. S. foliis pinnatis; foliolis multifidis, floribus sessilibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 6.*

PLANTA herbacea, palmaris.

HABITAT in plateis et pratis *Conceptionis Chile*, praesertim ad *Mochita*, *Hualpen*, *Andalien* et *Gavilan* tractus.

FLORET Septembri, Octobri et Novembri.

SOLIVA PEDICELLATA.

2. S. foliis impari-pinnatis, floribus pedunculatis axillaribus. *Flor. Per. et Chil. t. 6.*

PLANTA herbacea, palmaris.

HABITAT in *Muña* humidis locis.

FLORET ab Augusto ad Novembrem.

POLYGAMIA SEGREGATA.

VERMIFUGA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 114.

ICON. XXIV.

CALYX communis, sive *Receptaculum florum*, imbricatus squamis secundis, inaequalibus:

Partialis 2-5 phyllus, 2-5 florus. *Corollulae hermaphroditae* 2-4, infundibuliformes, 5 fidae. *Feminea* unica, aut rarius nulla, ligulata, integerrima. *Semina hermaphroditis* et *femineis* obovato-cuneiformia, striata. *Pappus* nullus. *Receptaculum* nudum. *Polygamia superflua.*

Obs. Ad hoc Genus referendae sunt *Milleria contrayerba* et *angustifolia* CAVANILL. *Ic. pl. vol. 1. et 2. pag. 2. et 12. tab. 4. et 223.* *Vermifugae* Genus differt à *Milleriae* Genere, ut ex charactere generico Linnaeano et ex fructificatione *Milleriae quinqueflorae* LINN! *Sp. pl. t. 3. p. 918.* *dichotomae* CAVAN. *Ic. pl. vol. 3. p. 58.* patet, Ordine; Calyce communi seu Receptaculo florum squamoso; Calyce partiali polyphylo, flosculos hermaphroditos 2-4, femineum unicum aut rarius nullum amplexante, et tandem Flosculis omnibus seminiferis. VIXX

VERMIFUGA CORYMBOSA
 1. V. foliis lanceolatis serratis, corymbis ter-

minalibus axillaribusque. *Flor. Per. et Chil. tom. 6. EUPATORIOIDES* Salicis folio trinervi, flore luteo, vulgò *contrayerba*. FEWILL. *t. 2. p. 18. pl. 14. MILLERIA* (*contrayerba*). CAVANILL. *Icon. pl. t. 1. pag. 2. tab. 4.*

PLANTA herbacea, quadripedalis.

HABITAT in plateis, arvis et segetibus *Cercado, Chancay, Cantae, Huarocherí, Huanuci* et *Cuzco* Provinciarum.

FLORET in loco natali per totum ferè annum, in Hort. Reg. Matritensi, ubi alia nova Species praeter *angustifoliam* collitur, à Septembri ad Decembrem.

VULGO in Lima *Contrayerba* et *Matagusanos*, et in *Cuzco* Provincia *Chinapaya* dicitur.

VIRES ET USUS. Incolae cum sale muriatico hanc plantam contundunt et ulceribus putridis belluarum applicant ad vermes illic contentos enecandos.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA DIANDRIA.

RODRIGUEZIA.

Gen. pl. Flor. Pér. et Chil. pag. 115.

Icon. XXV.

COROLLA tetrapetala, resupinata: *Petala* aequalia, duo exteriora, concavo-carinata. *Nectarium*: *Labio superiori* quadridentato; *inferiori* infernè cornuto, trifido; lacinia intermediâ maximâ.

HABITUS.

Plantae perennes, plurimis prolibus aggregatis. *Bulbi* oblongi, folio unico terminati. *Folia reliqua* radicalia, lanceolato-ensiformia, nervoso-lineata. *Scapi* axillares, racemosi.

RODRIGUEZIA ENSIFORMIS.

1. R. bulbis oblongis, foliis ensiformibus li-

neatis, scapis racemosis erectis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in nemoribus *Pozuzo* supra saxa et arbores, versùs *Cheniço* et *Tramo* tractus. *FLORET* ab Augusto ad Octobrem.

RODRIGUEZIA LANCEOLATA.

2. R. bulbis obovatis, foliis lanceolatis striatis, scapis racemosis dependentibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Tarmae* Provinciae montibus, vulgò *Montañas de los Andes*, ad *Vitoc*, *Palca*, *Collac* et *Monobamba* vicos. *FLORET* Julio, et Augusto.

MAXILLARIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 116.
ICON. XXV.

COROLLA pentapetala; petalis subaequalibus, falcatis; supremo concavo. *Nectarium* maxillaeforme, incurvatum, subcalcaratum: *Labium inferius* infernè canaliculatum, superne latum, trifidum. *Antherae* bipartitae.

HABITUS.

Plantae perennes, numerosis prolibus coacervatis constantes. *Radices* fasciculatae, longae. *Bulbi* ovati, aut ovato-oblongi, solidi, striati aut sulcati, aut laeves, succosi, ferè insipidi. *Folia* radicalia, et unicum duove ex apice singuli bulbi, lanceolata aut oblonga, linearia aut ensiformia, striata aut nervosa. *Scapi* ex axillis foliorum radicalium, teretes aut articulati, infernè nudi aut undique spathacei, racemosi, paniculati, aut uniflori. *Flores* spathis totidem stipati.

MAXILLARIA LONGIPETALA.

1. *M.* bulbis ovatis, foliis oblongis enervibus apice tridentatis, scapo unifloro. *Flor.*
Per. et Chil. tom. 7.

HABITAT in nemoribus *Pillao*, *Acomayo* et *Pati* supra saxa et arbores.

FLORET Septembri, et Octobri.

MAXILLARIA PLATYPETALA.

2. *M. bulbis ovatis, foliis lanceolatis leviter nervosis integerrimis, scapo unifloro. Fl. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Peruviae* montibus nemorosis ad *Muña* et *Chacalla* vicos.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

MAXILLARIA CILIATA.

3. *M. bulbis ovatis subancipitibus, foliis lanceolatis 5-7 nervibus, scapo unifloro, nectario ciliato. Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Muña*, *Chinchao*, *Chanchamayo* et *Palca* saxosis locis.

FLORET ab Augusto ad Octobrem.

MAXILLARIA UNDULATA.

4. *M. bulbis ovato-oblongis striatis, foliis lanceolatis 5-7 nervibus, scapo brevi racemoso. Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in nemoribus *Chinchao* et *Muña* supra arbores et saxa.

FLORET Augusto, et Septembri.

MAXILLARIA VARIEGATA.

5. M. bulbis ovatis, foliis lanceolatis plicatis, scapo variegato racemoso. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Muña* nemoribus calidis.

FLORET à Junio ad Septembrem.

MAXILLARIA LIGULATA.

6. M. bulbis ovatis, foliis ensiformibus, scapo volubili, floribus paniculatis, nectarii labio ligulato. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Pillao* et *Acomayo* nemoribus.

FLORET Augusto, et Septembri.

MAXILLARIA HASTATA.

7. M. bulbis oblongis, foliis ensiformibus, scapo volubili, pedunculis distantibus racemosis, nectarii labio hastato. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Pillao* silvis supra saxa.

FLORET Augusto, et Septembri.

MAXILLARIA PANICULATA.

8. M. bulbis oblongo-ovatis, foliis ensiformibus plicatis, floribus paniculatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Pillao* montibus et petrosis locis.
FLORET Septembri, et Octobri.

MAXILLARIA CUNEIFORMIS.

9. M. bulbis ovatis, foliis ensiformibus canaliculatis, floribus racemosis, petalis cuneiformibus, nectario cordiformi. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Tarmae* Provinciae praeruptis versùs *Acobamba* et *Picoy* vicos.
FLORET Julio, et Augusto.

MAXILLARIA ALATA.

10. M. bulbis oblongis, foliis oblongo-linearibus; floribus racemosis, capsulis alatis.
Flor. Per. et Chil. tom. 7.

HABITAT in *Peruviae* praeruptis et calidissimis locis ad *Huassahuassi* supra saxa.
FLORET Octobri, et Novembri.

Usus: Incolae ad sitim mitigandam bulbos insipidos et succosos masticant et sugunt.

MAXILLARIA BICOLOR.

11. *M.* bulbis ovatis ancipitibus, foliis ensiformibus margine scabris, floribus racemosis, pedicellis subdichotomis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Huassahuassi* saxosis.

FLORET Novembri, et Decembri.

VERNACULE *çaca-çaca*, id est, *Empedrado desencaxado*, quia copiosissimi bulbi extra terram aggregati veluti pavementum lapidibus formatum referunt.

Usus: Incolae ad sitim mitigandam bulbos succosos subinsipidos frequenter masticant et sugunt.

MAXILLARIA TRICOLOR.

12. *M.* bulbis ovatis compressis, foliis ensiformibus striato-nervosis, floribus racemosis erectis tricoloribus. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in praeruptis et calidis locis *Huasahuassi* supra saxa.

FLORET Octobri, et Novembri.

MAXILLARIA TRIPHYLLA.

13. *M.* bulbis ovatis triphyllis, foliis ensiformibus carinatis, floribus racemosis, petalis nectarioque unguiculatis acutis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Tarmae* Provinciae nemoribus versùs *Vitoc* et *Collac* vicos, praesertim ad fluvii *Maraynioc* littora, ubi Joannes Tafalla eam delineavit.

FLORET Augusto, et Septembri.

MAXILLARIA UNDATIFLORA.

14. *M.* bulbis ovatis, foliis lanceolatis quinquenervibus, floribus paniculatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in nemoribus *Tarmae* ad *Vitoc* arcem, unde Joannes Tafalla ad nos iconem et descriptionem misit.

FLORET Aprili, et Majo.

MAXILLARIA PROLIFERA.

15. *M. bulbis oblongis sulcatis, foliis lanceolatis, scapo bulbifero foliiferoque, floribus axillaribus 2-4 ternis nutantibus. Flor.*

Per. et Chil. tom. 7.

HABITAT in *Huassahuassi* frigidis locis ubi cl. Tafalla plantam descripsit et delineavit.

FLORET Aprili, et Majo.

MAXILLARIA RAMOSA.

16. *M. bulbis fibrosis, caule radicante vaginato, floribus axillaribus solitariis. Flor.*

Per. et Chil. tom. 7.

HABITAT in nemoribus *Chinchao* supra arbores ad *Mesapata* et *Machaynio* praedia.

FLORET Junio, et Julio.

Obs. Habitu haec Species à reliquis Speciebus differt; attamen fructificatio sub eodem Genere eam inserere jubet.

GONGORA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 117.

ICON. XXV.

COROLLA pentapetala, resupinata: *Petala* duo interiora minima, linearia; tria exteriora ovata, concava, magna; horum duo remotiora. *Nectarium*: *Labium inferius* soccifforme, cornutum, marginibus dentatum: *superius* lineare, incurvum.

GONGORA QUINQUENERVIS.

1. G. bulbis oblongis angulatis, foliis lanceolatis quinquenervibus, scapo flexuoso. *Fl.* *Per. et Chil. tom. 7.*

PLANTA perennis, plurimis prolibus coacervatis. *Flores* luteo-purpurascens.

HABITAT in silvis Pozuzo supra arbores.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

ANGULO A.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 118.

ICON. XXVI.

COROLLA resupinata : *Petala* quinque, ovato-lanceolata, concava, ferè aequalia, conniventia. *Nectarium* chrysalidaeforme: *Labio inferiori* subdolioliformi, interius scisso, pone emarginaturam acumine reflexo: *superiori* clavato, tricuspidato.

ANGULO A UNIFLORA.

1. A. bulbis ovatis ancepsitibus, foliis lanceolatis septemnervibus plicatis, scapis unifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

PLANTA perennis, prolifera. *Flores* magni. HABITAT in *Muña* et *Chinchao* runcationibus, vernaculè *Carpales* dictis, et profusè in *Tarmae* nemoribus ad *Huayabal*, *Chanchamayo* et *Siusa* tractus.

FLORET Augusto, et Septembri.

VULGO *Flor del Espíritu Santo.*

BLETIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 119.

Icon. XXVI.

COROLLA resupinata. *Petala* quinque, patentia, oblongo-lanceolata, subaequalia; *duo interiora* latiora. *Nectarium* obversè conicū: *Labio inferiori* infernè carinato, trilobo; *lobo intermedio* magno: *superiori* oblongo-lineari. *Antherae* octo.

BLETIA CATENULATA.

1. B. bulbis catenulatis subrotundis, anulis concentricis coronatis, foliis lanceolatis striatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in montibus et runcationibus *Pazuzo* et *Chaclla* versùs *S. Domingo* et *Llamarcañani* tractus.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

BLETIA REPANDA.

2. B. bulbis subrotundis, foliis lanceolatis nervosis plicatis, scapo ex apice bulbi ra-

cemoso. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in arenosis petrosisque locis *Tarmae* Provinciae prope *Vitoc* vicum ad ora fluvii *Maraynioc* ubi cl. Tafalla eam delineavit et descripsit.

FLORET Augusto, et Septembri.

BLETIA ENSIFORMIS.

3. B. bulbis aggregatis subrotundis triphyllis, scapo et foliis ad apicem bulbi. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in nemoribus *Pozuzo* supra arbores et saxa versus *Chenigo* et *Tramo* tractus.

FLORET Augusto, et Septembri.

BLETIA UNIFLORA.

4. B. bulbis subrotundis compressiusculis, foliis linearibus carinatis, scapis radicalibus unifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Peruviae* silvis ad *Vitoc* Provinciae *Tarmae* vicum supra arbores.

FLORET Augusto, et Septembri.

BLETIA PARVIFLORA.

5. B. bulbis ovatis, foliis ensiformibus carinatis, scapis paniculatis.

HABITAT in *Peruviae* montibus ad *Palca* arcem, unde cl. Tafalla iconem misit.

FLORET Junio, et Julio.

SOBRALIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 120.

Icon. XXVI.

COROLLA resupinata: *Petala* quinque, oblonga, patentissima, subdeflexa, aequalia; *duo interiora* paulò angustiora. *Nectarii* *Labium* inferius obcordatum, fimbriatum; *superius* sublineare, trifidum, canaliculatum.

HABITUS.

Plantae perennes, paucis prolibus. *Radices* fasciculatae, longissimae, flexuosae, lanuginosae. *Caules* aut *Culmi* virgati, orgyales et ultra, simplicissimi. *Folia* vaginan-

tia, lata, nervosa. *Pedunculi* axillares, racemosi. *Flores* magni, fragrantissimi, purpureo-violacei.

Obs. In *Sobralia amplexicauli* Nectarium *Palatum* squamis linearibus, apice dilaceratis respersum. *Germen* calyculo 3dentato coronatum. *Folia* nervosa venosaque, evaginata.

SOBRALIA DICHOTOMA.

1. *S.* bulbis fasciculatis, foliis ovatis acutissimis, pedunculis dichotomis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT abundè in nemoribus *Muña*, *Pozuzo* et *Chinchao* per runcationes in locis calidis et saxosis.

FLORET à Junio ad Octobrem.

VERNACULE *Tahuetahue* nuncupatur.

SOBRALIA BIFLORA.

2. *S.* bulbis fasciculatis, foliis oblongo-lanceolatis acutissimis, culmis bifloris. *Flor.*

Per. et Chil. tom. 7.

HABITAT in *Pozuzo* runcationibus et calidis locis , versùs *Cheniço* et *Tramo* tractus.

FLORET à Majo ad Septembrem.

SOBRALIA AMPLEXICAULIS.

3. S. bulbis fasciculatis, foliis cordatis amplexicaulibus , racemo terminali. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT affatim in *Chinchao* runcationibus et locis meridionalibus.

FLORET à Majo ad Augustum.

HUMBOLDTIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 121.

ICON. XXVII.

COROLLA duplex : *interior* dipetala : petalis lunulatis , concavis , nectarium amplexantibus : *exterior* campanulata , profundè trifida aut tripartita : laciniis acutis. *Nectarium* minimum, subrotundum, concavum.

HABITUS.

Plantae humiles , acaules , numerosissimis

PARS I.

GG

prolibus. *Radices* fasciculatae, filiformes, flexuosae in verticillos magis minusve approximatos, aliquando fibrillosae. *Folia* plurima, radicalia, sparsa, coriacea, subcarinata, avenia, integerrima, emarginata cum denticulo acuto. *Petioles* longi, teretes, articulati, totidem vaginis membranaceis, striatis vaginati. *Spicae* aut *Pedunculi* ad basim foliorum. *Flores* alterni, secundi, breviter aut longè pedicellati, spathis sive vaginis totidem sustentati. *Capsulae* oblongae. Omnes ferè Species supra arbores et saxa vegetant.

HUMBOLDTIA CORDATA.

1. H. foliis cordatis acuminatis subtus punctatis, pedunculis aggregatis unifloris. *Fl. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in montibus *Muña* supra saxa et arbores, copiosè ad *Rinconada* tractum.

FLORET à Majo ad Julium.

HUMBOLDTIA POLYSTACHYA.

2. H. foliis cordato-oblongis acuminatis, spi-

cis aggregatis brevibus. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 7.

HABITAT in montibus *Chinchao* supra arbores.

FLORET à Junio ad Augustum.

HUMBOLDTIA REVOLUTA.

3. *H.* foliis lanceolatis extus punctatis, spicis
aggregatis folio longioribus. *Flor. Per. et*
Chil. tom. 7.

HABITAT in *Muña* supra arbores et saxa.

FLORET à Majo ad Julium.

HUMBOLDTIA PURPUREA.

4. *H.* foliis oblongo-lanceolatis, spicis gemi-
nis, alterâ breviori. *Fl. Per. et Chil. t. 7.*

HABITAT in *Muña* supra arbores et saxa.

FLORET à Junio ad Augustum.

HUMBOLDTIA CONTORTA.

5. *H.* foliis ovalibus acuminatis; acumine
contorto, floribus geminis. *Flor. Per. et*
Chil. tom. 7.

HABITAT in *Muña* supra arbores et saxa.

FLORET à Majo ad Julium.

HUMBOLDTIA PARVIFLORA.

6. H. foliis oblongo-lanceolatis, spicis geminis ternisque, floribus approximatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in montibus *Pozuzo*, *Chinchao* et *Muña* supra arbores et saxa.

FLORET à Martio ad Julium.

HUMBOLDTIA OBLONGA.

7. H. foliis oblongis, spicis solitariis 2-4ternis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in montibus *Muña* supra saxa.

FLORET à Majo ad Julium.

HUMBOLDTIA ACUTIFLORA.

8. H. foliis oblongis infernè attenuatis breviter petiolatis, corollis acutis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Pozuzo* supra arbores et saxa.

FLORET ab Augusto ad Octobrem.

HUMBOLDTIA ASPERA.

9. H. foliis cordato-lanceolatis supra asperis

dependentibus, floribus congestis. *Flor.*

Per. et Chil. tom. 7.

HABITAT in montibus *Churupallana*, Provinciae *Tarmae* tractibus supra saxa.

FLORET Octobri, et Novembri.

HUMBOLDTIA LANCEOLATA.

10. *H.* foliis lanceolatis, spicis solitariis apice nutantibus folio longioribus. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in montibus *Muña* et *Pillao* ad *Chacahuassi* supra arbores et saxa.

FLORET ab Augusto ad Octobrem.

HUMBOLDTIA SPIRALIS.

11. *H.* foliis oblongo-ovatis, spicis solitariis folio longioribus. *Flor. Per. et Chil. t. 7.*

HABITAT in *Huassahuassi* locis saxosis.

FLORET Novembri, et Decembri.

MASDEVALLIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 122.

ICON. XXVII.

COROLLA monopetala, campanulata, trifida: laciniis corniculatis. *Nectarium* tetraphyllum: foliolis lateralibus, maxillaeformibus; *inferiori* pedicellato, subtus ferè carinato; *superiori* lineari, brevi, canaliculato.

MASDEVALLIA UNIFLORA.

1. M. foliis oblongo-spathulatis, pedunculis unifloris longissimis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Huassahuassi* locis saxosis.

FLORET à Septembri ad Novembrem.

VERNACULE *Rima-rima* dicitur.

FERNANDEZIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 123.

ICON. XXVII.

COROLLA: *Petala* quinque, concava, aequalia, conniventia. *Nectarium Labium inferius* obovatum; *superius* breve, curvatum.

HABITUS.

Plantae perennes. *Radices* fasciculatae. *Caulis* ramosi. *Folia* imbricata, disticha, vaginantia. *Pedunculi* axillares, solitarii, 2-3 nique, 1-5 flori.

FERNANDEZIA PUNCTATA.

1. *F. foliis* linearibus inaequaliter emarginatis, ramis dichotomis, floribus axillaribus, nectarium labio prominentiâ notato. *Flor. Per. et Chil. t. 7.*

HABITAT in *Muña* supra arbores et saxa.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

FERNANDEZIA LAXA.

2. F. foliis lanceolatis acuminatis contortis, caule laxo, nectarii labio utrinque denticulo recurvo. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Muña* supra arbores et saxa.

FLORET Augusto, et Septembri.

FERNANDEZIA DENTICULATA.

3. F. foliis oblongis acuminatis carinatis denticulatis, caule nutante, pedunculis 3-5-floris. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Pillao* supra arbores et saxa.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

FERNANDEZIA SUBBIFLORA.

4. F. foliis ensiformibus carinatis, caulibus virgatis, pedunculis subbifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Muña* supra arbores et saxa.

FLORET Augusto, et Septembri.

FERNANDEZIA HAEMATODES.

5. F. foliis ovato-lanceolatis margine scabris,

caulibus erectis, floribus ternis, petalis interioribus brevioribus. *Flor. Per. et Chil.*

tom. 7.

HABITAT in *Muña* supra arbores et saxa.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

FERNANDEZIA GRAMINIFOLIA.

6. F. foliis linearibus emarginatis, caule radicante, ramis furcatis, floribus è furcaturis sessilibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT supra arbores et saxa in nemoribus *Pillao* ad *Chacahuassi* tractus.

FLORET Augusto, et Septembri.

FERNANDEZIA CONFERTA.

7. F. foliis linearibus integerrimis reflexis, caule radicante, ramis confertis, floribus axillaribus solitariis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT supra arbores et saxa in nemoribus *Muña* et *Pillao* ad *Chacahuassi* tractus.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

EPIDENDRUM.

LINN. *Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 124.*

ICON. XXVII.

COROLLA : *Petala* 5 , oblongo-obovata , longitudine aequalia ; *tria exteriora* latiora. *Nectarium* cristaeforme , variè laciniatum , stylo tubuloso , clavato insidens. *Filamentum* bifidum. *Antherae* quatuor.

HABITUS.

Plantae perennes. *Radices* fasciculatae , filiformes , flexuosae , albae , fibrillosae. *Caulles* plurimi , bipedales et ultra , articulati. *Folia* alterna , disticha , vaginantia. *Flores* terminales , racemosi , aut paniculati , aut corymbosi. In *Ep. equitante* *Folia* radicalia , distichè equitantia , in flabelli formam. *Flores* in totidem scapis axillariibus , quot folia.

EPIDENDRUM CORONATUM.

1. E. foliis ovato-lanceolatis , racemis depen-

dentibus, nectarii labio trilobo: laciniis bifidis, intermediâ minori. *Fl. Per. et Chil.* tom. 7.

HABITAT in *Pozuzo* supra arbores et saxa.

FLORET Septembri, et Octobri.

EPIDENDRUM MACULATUM.

2. E. foliis lanceolatis subtus lineatis, racemo longo, petalis maculatis, nectario subcristato. *Flor. Per. et Chil.* tom. 7.

HABITAT in *Huassahuassi* et *Palca* prae-ruptis saxosis et locis imis calidis.

FLORET Septembri, et Octobri.

EPIDENDRUM CRISTATUM.

3. E. foliis lanceolatis, racemo dependente, nectarii labio tripartito; laciniâ mediâ bifidâ, lateralibus tripartitis. *Flor. Per. et Chil.* tom. 7.

HABITAT supra arbores in nemoribus *Pozuzo*.

FLORET Septembri, et Octobri.

EPIDENDRUM PANICULATUM.

4. E. foliis oblongo-lanceolatis, floribus pa-

niculatis, nectarii laciniâ intermediâ bifidâ; lacinulis extrorsum flexis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT supra arbores et saxa in *Muña* nemoribus, et locis calidis.

FLORET à Junio ad Septembrem.

EPIDENDRUM CORDATUM.

5. E. foliis cordatis amplexicaulibus, paniculâ flexuosâ, nectarii labio bifido; laciniis acuminatis recurvis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Chinchao* montibus nemorosis et runcationibus supra arbores et saxa.

FLORET Junio, et Julio.

EPIDENDRUM VIRIDE.

6. E. foliis lanceolatis acutis, racemo terminali, nectarii labio trilobo; laciniis lateralibus obcordatis; intermediâ bifidâ. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Pozuzo* vicum supra arbores.

FLORET Septembri, et Octobri.

EPIDENDRUM PARVIFLORUM.

7. E. foliis lanceolato-linearibus, racemo brevi, nectarii labio trilobo; laciniis subrotundis: intermediâ bipartitâ acutâ. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Muña* et *Chaclla* montibus et runcationibus supra arbores et saxa.

FLORET Augusto, et Septembri.

EPIDENDRUM NUTANS.

8. E. foliis lanceolatis obtusis emarginatis, racemo composito nutante, nectarii labio trifido; laciniis crenulatis; intermediâ integrâ. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Peruvia* supra arbores et saxa ad *Muña* et *Chaclla* nemora.

FLORET Septembri, et Octobri.

EPIDENDRUM FERRUGINEUM.

9. E. foliis oblongo-lanceolatis emarginatis, racemo simplici erecto, nectarii labio acuminato integro. *Flor. Per. et Chil. t. 7.*

HABITAT in *Chinchao* montibus nemorosis
supra arbores et saxa, versùs *Macora*.

FLORET Junio, et Julio.

EPIDENDRUM CORYMBOSUM.

10. E. foliis ovato-oblongis emarginatis, floribus terminalibus subcorymbosis, nectario cristato. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Peruviae* montibus nudis et campis versùs *Muña*, *Chinchao*, *Pozuzo*, *Cuchero* vicos, et in *Tarmae* et *Huanuci* Provinciarum locis imis et calidis.

FLORET per totum annum.

VULGO Flor de todo el año nuncupatur.

EPIDENDRUM CROCEUM.

11. E. foliis oblongis, racemo terminali subspicato multifloro, nectario trilobo. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Peruviae* campis et collibus versùs *Huassahuassi* arcem supra saxa.

FLORET Decembri, et Januario.

EPIDENDRUM VOLUBILE.

12. E. foliis oblongo-obovatis, ramis volubilibus, nectarii labio bifido, laciniis lanceolatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in *Peruviae* praeruptis ad *Acobamba*, Provinciae *Tarmae* vicum.

FLORET Augusto, et Septembri.

EPIDENDRUM EMARGINATUM.

13. E. foliis ligulatis emarginatis crenulatis, racemo terminali, nectario integro. *Flor.*

Per. et Chil. tom. 7.

HABITAT in *Huassahuassi* montibus saxosis.

FLORET Octobri, et Novembri.

EPIDENDRUM BIFLORUM.

14. E. foliis oblongis emarginatis, ramis radicantibus, racemo terminali, pedunculis bifloris, nectario trilobo. *Flor. Per. et*

Chil. tom. 7.

HABITAT in *Tarmae* collibus saxosis.

FLORET Novembri, et Decembri.

EPIDENDRUM TRIFLORUM.

15. E. foliis lanceolatis tridentatis, pedunculis terminalibus trifloris, nectario trifido.

Flor. Per. et Chil. tom. 7.

HABITAT in *Tarmae* praeruptis ad *Curis*, *Huichay*, *Tarmatambo* et *Camcham* tractus.

FLORET Junio, et Julio.

EPIDENDRUM ACUMINATUM.

16. E. foliis lanceolato-linearibus, racemo terminali, nectarii labio subhastato acuminato, basi utrinque auriculato. *Flor. Per.*

et Chil. tom. 7.

HABITAT in *Huassahuassi* montibus supra saxa, versùs *Siusa* flumen.

FLORET Novembri, et Decembri.

EPIDENDRUM SCABRUM.

17. E. foliis ovato-lanceolatis, marginibus vaginisque scabris, racemo terminali, nectarii labio cruciformi. *Fl. Per. et Chil. t. 7.*

HABITAT in *Pillao* et *Muña* montibus saxosis.

FLORET Octobri, Novembri et Decembri.

EPIDENDRUM LINEARE.

18. E. foliis linearibus, racemo terminali sub-paniculato, nectarii labio obcordato-cuneiformi, basi utrinque dentato. *Fl. Per. et Chil. tom. 7.*

HABITAT in nemoribus *Chinchao*, *Muña* et *Huassahuassi* supra arbores et saxa.

FLORET Novembri, et Decembri.

EPIDENDRUM EQUITANS.

19. E. foliis acinaciformibus carinatis distichè equitantibus, scapis unifloris, nectarii labio maximo trilobo. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

PLANTA palmaris.

HABITAT in *Pozuzo* nemoribus supra arbores.

FLORET Septembri, et Octobri.

Obs. Orchideae in imis calidis et nemorosis *Andium* locis adeò abundant, ut vel ex iis tantum, quae in *Tarma*, *Huanuco* et *Xauxa* crescunt, decerpi possint supra

PARS I.

II

mille Species *Orchidis*, *Satyrii*, *Cypripedii*, *Limodori*, *Serap. Arethusae*, *Vanillae* ceterorumque Generum in hoc Opere comprehensorum. Reperiuntur praeterea alia ejusdem familiae Genera nova, quae in posterum evulgabimus. *Andes*, vulgò *Montañas de los Andes*, itaque *Orchidearum* patriam appellare hucusque possumus.



CLASSIS XXI.

MONOECIA TRIANDRIA.

TORRESIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 125.

CALYX: *Gluma communis* bivalvis, triflora; intermedio femineo: *valvulis* concavis, muticis, inequalibus. *Cal. masc. Gluma* nulla. *Corolla*: *Gluma* bivalvis; *valvulâ* exteriori aristatâ. *Antherae* lineares. *Cal. femin. Gluma* nulla. *Corolla*: *Gluma* bivalvis, mutica. *Stigmata* pilosa. *Semen* oblongum.

TORRESIA UTRICULATA.

I. T. radice utriculis minimis, spicâ longâ cylindricâ. *Flor. Per. et Chil. tom. 7.*

PLANTA graminea.

HABITAT in inundatis campis *Conceptionis Chile*, versùs *Biobio* et *Andalien* flumina.

FLORET Octobri, et Novembri.

Vulgo Ratonera dicitur, quia affatim inter
has plantas mures silvestres vitam degunt.

OCTANDRIA.

LLAGUNOA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 126.

ICON. XXVIII.

CALYX masc. quinquefidus, laciniâ inferiori
ad basim usque fissus. *Corolla* nulla. *Sta-*
mina declinata. *Calyx femin.* consimilis,
crescens. *Corolla* nulla. *Stam. Rudimenta*
octo. *Stylus* incurvus, trisulcus. *Capsula*
tricocca, inflata, trigona, triloba, trival-
vis. *Semina* globosa, nitida.

LLAGUNOA NITIDA.

1. L. foliis simplicibus ternisque ovatis acū-
tis serratis, petiolis utrinque incrassatis.
Flor. Per. et Chil. tom. 7.

ARBOR sexulnaris et ultra.

HABITAT in *Muña* silvis et in praeruptis
Cantae et *Caxatambo* Provinciarum.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Vulgo Arbol de Cuentas de Rosario, quia Incolae ex seminibus nigris, nitidis globulos precatorios formant.

ICOSANDRIA.

PAVONIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 127.

ICON. XXVIII.

CALYX masc. campanulatus, patens, multifidus. *Corolla* nulla. *Nectarium* squamis tribus. *Stamina* 7-14, ad basim biglandulosa. *Antherae* ad apicem filamentis utrinque adnatae, tectae valvulis obovatis, elasticè dehiscentibus, apici filament. affixis. *Calyx femin.* multifidus, crescens. *Cor.* nulla. *Nectarium* squamis plurimis. *Pistilla* numerosa. *Semina* pilosa intra calycem corticosum, conicum.

PAVONIA SEMPERVIRENS.

1. *P. foliis oblongis obovatisque serratis, ra-*

cemis subtripartitis. *Fl. Per. et Chil. t. 7.*

ARBOR quadraginta ulnaris et ultra.

HABITAT in *Regni Chilensis* per nemora
Provinciarum *Conceptionis, Puchacay, Itatæ*,
Rere et *Cauquenes*.

FLORET Octobri, Novembri et Decembri.

VULGO Laurel appellatur.

VIRES ET USUS. Hae arbores propter foliorum
virorem à ceteris è longinquo dignoscuntur.

Lignum albicans facilis excisionis, ex quo
asserres trabesque optimas ad diversa uten-
silia tignaria conficienda Chilenses extra-
hunt. *Folia* acri, aromatico et subdulci
sapore inter *Anisum* et *Foeniculum* gau-
dent; ideoque ad murias et salsamenta
varia condienda *Lauri nobilis* foliis praes-
tantiora sunt: in pulverem tandem redac-
ta, fluxionem et coryzam sanant. Odor
Ligni Lauri Sassafras valde similis.

CLASSIS XXII.

DIOECIA DIANDRIA.

CLARISIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 128.

ICON. XXVIII.

MASCULI FLORES in amentis geminis. *Amentum* filiforme, sulco subspirali. *Perianthium* squamâ minimâ. *Corolla* nulla. *Stamina* duo. *Feminei flores* bini. *Perianthium* proprium, 4-5-6 squamis peltatis. *Corolla* nulla. *Styli* duo, basi connati. *Drupa* monosperma.

CLARISIA RACEMOSA.

1. C. floribus femineis racemosis, foliis oblongis acuminatis venoso-lineatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

ARBOR quinquaginta ulnaris et ultra.

HABITAT in Chinchao et Pozuzo nemoribus.

FLORET Junio, et Julio.

VERNACULE Tulpay nuncupatur.

VIRES ET USUS. Ex Ligno, quod valde durum est, trabes asseresque optimas ad varia opera tignaria construenda Incolae extrahunt. Arbos undequaque incisa succum lacteum copiosissimum exsudat, qui aëri expositus in resinam solidam, albo fuscam, parum elasticam, inodoram, ad incerata formanda praestantissimam, condensatur. *Cortex* interius rubicundissimus, exterius cinereus.

CLARISIA BIFLORA.

2. C. floribus femineis geminis, foliis obovatis oblongisque venosis longo acumine.

Flor. Per. et Chil. tom. 8.

ARBOR quadraginta ferè ulnaris.

HABITAT in *Cuchero*, *Chinchao*, *Pozuzo* et *Pillao* ad *Chacahuassi* ripis.

FLORET Majo, et Junio.

VERNACULE Yasmich' et Piamich' appellatur.

VIRES ET USUS. Ex arbore undique secta succus albus abundè fluit, qui in resinam compactam, albo-fuscam, inodoram parum elas-

ticam spissescit. Ex trunco asseres trabesque optimae ad varia opera tignaria efficienda extrahi possunt. *Cortex* extus fuscus, interius albo-lutescens.

TETRANDRIA.

OLMEDIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 129.

ICON. XXVIII.

CALYX *communis masc.* patens, imbricatus, squamis plurimis. *Flosculi* totidem. *Corollulae* 2-4partitae. *Filamenta* plana, elasticitate se se expandentia. *Calyx femin.* connivens, imbricatus, squamis plurimis, uniflorus. *Corolla* ovata; ore angustissimo, quadridentato. *Drupa* monosperma è corollâ carnosâ formata. *Nux* acuminata.

OLMEDIA ASPERA.

1. O. foliis oblongis obliquis acuminatis dentatis crenatisque. *Flor. Per. et Chil. t. 8.*

ARBOR quadriorgyalis et ultra.

PARS I.

KK

HABITAT in nemoribus *Chinchao* et *Pozuzo*.

FLORET Julio, et Augusto.

Obs. Arbor undequaque excissa lac album copiosè expètit, quod in resinam elasticam rufescentem paucis diebus condensatur.

OLMEDIA LAEVIS.

+ 2. O. foliis oblongis acuminatis integerrimis.

Flor. Per. et Chil. tom. 8.

ARBOR ferè triginta ulnaris.

HABITAT in nemoribus *Pozuzo* versùs *Huancabamba* fluvium, et *Tramo* tractus.

FLORET Julio, et Augusto.

Usus : Truncus undique incisus lac album, quod aëri expositum in resinam rufescentem elasticam spissatur, affluenter exsudat, quin etiam ex eo trabes et asseres praestantissimae extrahi possunt.

PENTANDRIA.

DECOSTEA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 130.

CALYX *masc.* quinquedentatus. *Corolla* pentapetala. *Calyx femin.* 5 dentatus. *Corolla* nulla. *Styli* tres. *Drupa* monosperma, calyce stylisque coronata.

DECOSTEA SCANDENS.

1. D. foliis cordatis infernè dentato-spinosis
supernè integris. *Flor. Per. et Chil. t. 8.*

FRUTEX scandens, ramosissimus.

HABITAT in Regni Chilensis per silvas Conceptionis et aliarum Provinciarum.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VERNACULE *Yelmo* nuncupatur.

Obs. Drupae colore purpureo in caeruleum
vergenti tingunt.

AEXTOXICON.

+ *Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 131.*

ICON. XXIX.

CALYX *masc.* duplex; *exterior* globosus, lateraliter dehiscens, caducus: *interior* 5-phyllus, deciduus. *Corolla* pentapetala. *Nectarium* squamis quinque, obcordatis. *Calyx femin.* *Corolla* et *Nectarium* ut in mare. *Rudimenta* staminum quinque. *Stylus* unicus. *Stigma* bifidum. *Drupa* monosperma, acuminata.

AEXTOXICON PUNCTATUM.

1. A. foliis oblongis subtus punctatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

ARBOR procera, sempervirens.

+ HABITAT in Regni Chilensis ad silvas Conceptionis, Cauquenes, Puchacay, Rere et Itatae Provinciarum.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VULGO Aceytunillo et Olivilla appellatur.

USUS. Ex ligno Chilenses trabes et asseres op-

timas extrahunt. Drupae adversus capras efficacissimum toxicum sunt, unde nomen.

HEXANDRIA.

CHONDODENDRON.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 132.

CALYX *mas.* triphyllus. *Petala* sex, basi concava, supernè reflexa; *tria interiora* exterioribus alternantia. *Nectarium* squamis sex, stamina ambientibus. *Stamina* petalis breviora, receptaculo inserta. *Antherae* conniventes. *Calyx* *femin.*

CHONDODENDRON TOMENTOSUM.

1. C. foliis cordatis leviter crenatis cum acumine subtus tomentosis. *Fl. Per. et Chil. tom. 8.*

PLANTA fruticosa, scandens.

HABITAT in *Pillao* ad *Chacahuassi* nemoribus imis et calidis.

FLORET Octobri, et Novembri.

Obs. Cortex amarissimus. Flores feminei desiderantur.

OCTANDRIA.

ACLADODEA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 133.

ICON. XXIX.

CALYX *mas.* quinquefidus. *Petala* quinque, unguiculata, concava. *Nectarium* foliolis 5, petaliformibus, villosissimis, supra ungues petalorum insertis. *Glandulae* octo in receptaculo. *Stamina* receptaculo insidentia, nectario breviora. *Calyx femin.*...

ACLADODEA PINNATA.

1. A. foliis abruptè pinnatis, foliolis oblongo-linearibus acuminatis. *Fl. Per. et Chil. tom. 8.*

ARBOR decemulnaris.

HABITAT in *Pillao* nemoribus ad *Chacahuasi* tractus, in locis imis et umbrosis.

FLORET Octobri, et Novembri.

Obs. 1. Arbor certè singularis! quae unicum truncum absque ramis profert, terminatur unico florum candidorum racemo; et

praeterea folia in umbraculi formam instar Palmarum frondes expandit.

Obs. 2. Flores femineos non offendimus.

ICOSANDRIA.

CITROSM A.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 134. . 1

ICON. XXIX.

CALYX masc. urceolatus aut campanulatus, 4-8dentatus. Corolla nulla. Stamina 7-60, petaliformia, apice incrassata, angustata, lateribus compressa. Calyx et Corolla femin. ut in mare. Germina 3-10. Styli subulati. Bacca unilocularis, è tubo calycis formata, coronata. Semina totidem quot germina, ossea, punctata, supernè bisulca, arillo carnosio, cucullato semiinvoluta.

HABITUS.

Frutices 2-4orgyales, citriodori. Caules erecti, teretes. Rami patuli, supernè secundum articulationes compressiusculi. Folia verti-

cillata, 3-4terna, aut opposita. *Racemi* axillares, breves, subdichotomi, 2-5ni, pauciflori. *Flores* parvi. In omnibus Speciebus quidam humor salivae instar in florum racemis saepe observatur.

CITROSMA PYRICARPA.

1. C. foliis oblongo-obovatis acuminatis basi excavatis dentatis, staminibus 6-8. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in Cuchero, Chinchao, Pozuzo, Muña et Pillao nemoribus.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

CITROSMA DENTATA.

2. C. foliis obovato-ovalibus acuminatis basi excavatis duplicato-dentatis, staminibus 4-5. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

FRUTEX quadriulnaris.

HABITAT in Pillao et Chinchao nemoribus.

FLORET Augusto, et Septembri.

CITROSMA TOMENTOSA.

3. C. foliis oblongo-ovatis serrulatis tomentosis, staminibus 12. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

FRUTEX quadriulnaris.

HABITAT in Chinchao, Muña et Pillao versùs Chacahuassi nemoribus.

FLORET Augusto, et Septembri.

CITROSMA MURICATA.

4. C. foliis lanceolatis serrulatis, staminibus 60. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in Muña et Acomayo runcationibus.

FLORET à Majo ad Septembrem.

CITROSMA SUBINODORA.

5. C. foliis lanceolatis duplicato-dentatis, staminibus 7. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in Chacahuassi nemoribus.

FLORET Octobri, et Novembri.

CITROSMA ovalis.

6. C. foliis oblongo-ellipticis denticulatis, staminibus 11-13. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in Muña frigidis montibus ad Tambo nuevo, Sarriapata et Playa tractus.

FLORET Augusto, et Septembri.

CITROSMA OBLONGIFOLIA.

7. C. foliis oblongis acuminatis integerrimis, staminibus plurimis. *Fl. Per. et Ch. t. 8.*

FRUTEX triulnaris.

HABITAT in Chacahuassi nemoribus.

FLORET Septembri, et Octobri.

RUIZIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 135.

ICON. XXIX.

CALYX masc. campanulatus, 5fidus. Petala 5, calyci inserta, reflexa. Nectarium nullum. Stamina plurima, ferè 46, plana, per calycem sparsa, ad medium utrinque

glandulosas; interiora gradatim minora. *Antherae* apice utrinque adnatae. *Calyx* *femin.* et *Corolla* ut in mare. *Nectarium* squamis 5, subsagittatis, calyci insidentes. *Germina* 2-9. *Styli* nulli. *Stigmata* acuta. *Drupae* totidem, ovales, acuminate. *Nux* insculpta.

Obs. Hic animadvertere oportet, Ign. Molinam ex arbore à Chilensibus *Peumo* nuncupata *Peumus* Genus statuuisse; quin etiam ipse Molina ex arbore *Boldo* quartam sui *Peumi* Generis Speciem condidit. Illa prima Species sub nomine *Peumii rubrae* evulgata ad *Lauri* Genus amandari debet; quarta autem Species, ut ex fructificationis partibus patet, diversissimum Genus certè constituit. An reliquae duae Species *Peumi albae* et *mammosae* ad *Lauri* Genus sunt revocandae? Autoptae judicent.

RUIZIA FRAGRANS.

1. R. foliis ovato-oblongis punctato-papillo-sis, racemis brevibus multifidis. *Fl.* *Per.*

*et Chil. tom. 8. PEUMUS (Boldus). MOL.
 Hist. Chil. Comp. pag. 200. BOLDU ar-
 bor olivifera. FEWILL. Per. t. 3. p. 11.
 planch. 6.*

ARBOR quadriorgyalis et ultra, frondosa.

HABITAT in Regni Chilensis silvis et campis
 arenosis et maritimis, copiosè in Provinciis
*Maule, Itatae, Puchacay, Cauquenes,
 Conceptionis et Arauci.*

FLORET Julio, et Augusto.

VERNACULE *Boldu* et *Boldo* nuncupatur.

VIRE ET USUS. Hae arbores, quae perpetuò
 virent, praestantissimam et salutiferam um-
 bram, transeuntibus aestivo tempore se-
 cooperire invitantem, praestant. Leve fo-
 midiorum infusum ad indigestiones praecaven-
 das loco *Theae* vel *Coffeae* post cibum sac-
 charo edulcoratum propinari solet. De-
 coctum in vino aut aquâ factum, tempori-
 bus, stomacho aut alvo applicitum haemi-
 craniam et cephalalgicos dolores sedat, sto-
 machum roborat, flatus discutit, et nervos
 confortat. Cum una foliorum contusorum
 et tribus resinae *Pinûs Chilensis* partibus

feminae conficiunt remedium, quod umbilico impositum uterinas passiones dissipat. Foliorum pulvis, capitis purgandi causâ, naribus frequenter adhibetur. Ad salsamenta condienda folia praestantiora quàm *Lauri nobilis* folia sunt. Lignum fragrans ad varia opera tignaria et tornata perutile. Agricolae corticibus ad doliola, in quibus vina asservant, suffumiganda, assiduè utuntur. Druparum pulpa mollissima, dulcis et gratissima est. E nucibus, quae naturâ sunt elaboratae, globulos precatorios Incolae conficiunt.

MONADELPHIA.

TAFALLA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 136.

ICON. XXIX.

CALYX *masc. Amentum* ferè cylindricum, antheris numerosis, sessilibus, confertissimis, tetragonis obvallatum. *Perianthium* nullum. *Corolla* nulla. *Calyx femin. Amentum*

ovatum, carnosum, 2-4florum, 3-5fidum. *Perianthium* superum, tridentatum. *Corolla* nulla. *Strobilus* ovatus, carnosus, 3-5fidus. *Semina* solitaria, trigona.

HABITUS.

Arbores et *Frutices* fragrantēs, resiniferi, bi-quadriorgyales. *Rami* brachiati, articulati, tetragoni. *Folia* opposita. *Petoli* connati, vaginantes. *Stipulae* interfoliaceae. *Pedunculi* axillares. *Flores masculi* amentacei, *feminei* strobilacei.

Obs. Hae arbores odorem fragrantissimum ad *Mastichen* accedentem spirant. Calefacienti, pellenti, corroboranti et diureticā vi pollent. Folia et rami teneri contusi in cataplasmatidis formam appliciti stomachum confortant, flatūs expellunt et tumores frigidos resolvunt.

TAFALLA SCABRA.

1. T. foliis oblongo-lanceolatis serratis, amentis et strobilis ternis. *Flor. Per. et Chil.* tom. 8.

ARBOR quadriorgyalis.

HABITAT in *Pati* et *Muña* runcationibus.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

VERNACULE *Aytacupi* appellatur.

TAFALLA GLAUCA.

2. T. foliis oblongis acutè acuminatis serratis, pedunculis racemosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

ARBOR quinqueorgyalis.

HABITAT in *Cuchero* et *Acomayo* montibus.

FLORET Julio, et Augusto.

VERNACULE *Aytacupi* et *Almaciga* dicitur.

TAFALLA RACEMOSA.

3. T. foliis oblongis serratis breviter acuminatis, pedunculis femineis geminis racemosis flexuosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

ARBOR triorgyalis, resinam albam, pellucidam, odore *Anime* simili, fundens.

HABITAT in *Perú* ad *Cuchero* et *Pillao* nemora per runcationes, vulgò *Carpales* dictas.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE *Aytacupi*.

TAFALLA ANGUSTIFOLIA.

4. T. foliis sublanceolatis serratis acuminatis, articulationibus distantibus, amentis strobilisque 2-3nis. *Flor. Per. et Chil. t. 8.*
FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in *Chinchao* et *Pillao* nemoribus.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

VERNACULE *Aytacupi* appellatur.

TAFALLA LACINIATA.

5. T. foliis oblongis acuminatis serratis, amentis et strobilis 1-2-3nis. *Fl. Per. et Chil. tom. 8.*

ARBOR quadriorgyalis.

HABITAT in *Chinchao* et *Pati* nemoribus.

FLORET Julio, et Augusto.

VERNACULE *Aytacupi* dicitur.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA MONOECIA.

SYNZYGANTHERA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 136.

ICON. XXX.

CALYX: *Amentum commune cylindricum. Perianthium hermaphr. et femin. minimum, inferum, quadripartitum. Corolla 4fida. Stamen unicum, biantheriferum, infra germen anticè insertum. Antherae pedicellatae. Styli tres, brevissimi. Bacca pedicellata, trilocularis, internè exsucca, trisperma.*

SYNZYGANTHERA PURPUREA.

1. S. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis.

Flor. Per. et Chil. tom. 8.

ARBOR sexorgyalis.

HABITAT in nemoribus umbrosis *Muña* et *Pillao* versùs *Chacahuassi* tractus.

FLORET à Junio ad Septembrem.

PARS I.

MM

GIMBERNATIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 138.

ICON. XXXVI.

CALYX *hermaphr.* et *masc.* campanulatus, quinquefidus, superus, deciduus. Cor. nulla. *Stam.* 10, receptaculo inserta. *Stylus* unicus. *Fructus* monospermus, inaequaliter alatus, coriaceus.

Obs. Nomen *Chuncoae* sub quo A. L. de Jussieu hoc ipsum Genus evulgavit, non admittimus, quoniam *Chuncoa* aliud omninò ac *Chunchu*, quo nomine Indi alteram Speciem appellant, significat, ideoque nobis, ut hujus Generis detectoribus è re visum fuit aptius nomen imponere.

GIMBERNATIA OBOVATA.

1. G. foliis obovatis acuminatis, spicis dependentibus, capsulis pentapteris. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

ARBOR quadragintaulnaris.

HABITAT in *Cuchero* et *Macora* nemoribus.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VERNACULE Arbol del Chunchu dicitur.

USUS. Lignum durissimum, ex quo trabes et
asserres optimas ad aedificia construenda In-
colae extrahunt.

GIMBERNATIA OBLONGA.

21. *G.* foliis oblongis, spicis confertissimis,
capsulis dipteris. *Flor. Per. et Chil. t. 8.*

ARBOR quinquagintaularis.

HABITAT in Pozuzo nemoribus.

FLORET Majo, Junio et Julio.

CASTIGLIONIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 139.

ICON. XXXVII.

CALYX hermaphr. 5 phyllus. *Corolla* 5 petala. *Nectarium* squamis 5. *Stamina* 10,

libera, 5 alternantia longiora. *Antherae*
sagittatae. *Capsula* 3 locularis, 3 sperma.

Cal. Cor. et Nect. masc. ut in hermaphro-
ditis. *Stamina* 10; exteriora 5 libera,
5 interiora coalita. *Antherae* sagittatae.

Obs. Hoc loco animadvertere lubet, quemadmodum in *Rhamni* Genere Linnaeus aliique Botanici plures plantas conjunxerunt, quae quamvis in aliquibus fructificationis partibus conveniant, in aliis certè insigniter differunt, quibus eas ad diversa Genera redigi oportuisset; ita etiam *J. Manihot*, *urentem* et *Curcas*, quae non parum inter se differunt, atque adeo diversa Genera constituere debent, in illud coarctasse: in quo quidem non nisi Speciebus omnibus polypetalis, acalyculatis, staminibus supernè liberis, et quarum Capsulae lignosae in Isuturis foramina ostendunt, quae exteriori cortice spontè decedente apparent, uti in *J. Manihot*, *Jani-pha* et *paniculata* nostrae Florae contingit, locus relinquendus erit. *Jatropha urens* Linnaei et *J. Simajuca* nostrae Florae, ceteraeque Species, quae calyce carent et corollas masculas monopetalas et femineas polypetalas proferunt, aliud Genus à praecedentibus diversum formant; quin etiam nos è *J. Curcas*, cujus fructificationis par-

tes à praedictis recedunt, *Castiglionae* Genus statuimus, ad quod nonnullae *Jatrophae*, praesertim è calyculatis et polypetalis, staminibus masculis interioribus coalitis, ad nostrum *Castiglionae* Genus amandari debent. Unde Clar. Ortega in Decadibus plantarum, quas evulgare pergit, è tribus novis Speciebus *Jatrophae* et *Castiglionae* affinibus calyculatis, monopetalis, staminibus interioribus, coalitis, dicoccis, novum *Mozinnae* Genus rectè ut nobis videtur constituit.

CASTIGLIONIA LOBATA.

I. C. foliis cordatis repandis lobatisque, floribus corymbosis. *Flor. Per. et Chil. t. 8.*
JATROPHA (Curcas). LINN. Sp. pl. t. 4.
pag. 191. JACQ. Hort. Vindob. vol. 3.
p. 63. t. 63.

+

ARBOR quadriorgyalis. (Truncus et Rami defoliati *Plumierarum* facie).

HABITAT in *Surco*, et *Huaura* plateis.

FLORET à Januario ad Majum.

VULGO *Piñoncillos* appellatur.

Usus: Arbor undequaque incisa succum lutescentem valde causticum fundit. Incolae seminum nucleis alvum purgant, et aquâ frigidâ diarrhoeas sistunt.

Obs. Corollae masculae et hermaphroditae constanter pentapetae sunt, nec monopetae, ut Jacquin descripsit.

DIOECIA.

IZQUIERDIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 140.

ICON. XXX.

CALYX hermaphr. masc. et herm. femin. 4dentatus. *Corolla* 4petala. *Stamina* 4. *Stylus* nullus. *Stigma* 1. *Drupa* ? monosperma.

IZQUIERDIA AGGREGATA.

1. I. foliis ovatis acuminatis, pedunculis aggregatis, floribus umbellatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

ARBOR sexorgyalis.

HABITAT in *Macora* nemoribus.

FLORET Majo, Junio et Julio.

CABALLERIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 141.

ICON. XXX.

CALYX hermaphr. masc. et hermaph. femin.
5 fidus. Corolla rotata. Stamina 5. herm.
femin. sterilia. Pistillum herm. masc. sterile.
Stigma 1, pentagonum. Drupa monosperma, punctata.

HABITUS.

Arbores aut Frutices. Caules erecti, teretes.
Rami patentes aut dependentes. Folia
sparsa, petiolata, integerrima aut dentata,
punctata. Flores axillares, congesti aut
terminales, racemosi.

CABALLERIA LATIFOLIA.

1. C. foliis oblongis integerrimis utrinque
punctatis, floribus numerosis congestis. *Fl.*
Per. et Chil. tom. 8.

ARBOR sexorgyalis.

HABITAT in Muña et Pillao nemoribus.

FLORET à Julio ad Septembrem.

VERNACULE *Lucuma* nuncupatur.

CABALLERIA PELLUCIDA.

2. *C.* foliis oblongo-obovatis integerrimis, punctato-pellucidis ; punctis superis subrotundis, inferis linearibus, floribus congestis. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

ARBOR quadriorgyalis.

HABITAT in *Muña* montibus nemorosis.

FLORET à Junio ad Augustum.

VERNACULE *Manglillo* et *Lucuma* dicitur.

CABALLERIA FERRUGINEA.

3. *C.* foliis lanceolatis leviter punctatis , ramulis tomentosis , floribus congestis sessilibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

FRUTEX sexulnaris.

HABITAT in *Muña* montibus nemorosis.

FLORET Augusto , et Septembri.

CABALLERIA OBLONGA.

4. *C.* foliis oblongis subtus punctatis , flori-

bus congestis pedunculatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

FRUTEX triorgyalis.

HABITAT in *Limae* et *Chancay* ripis.

FLORET ab Augusto ad Novembrem.

VERNACULE *Manglillo* appellatur.

CABALLERIA DEPENDENS.

5. C. foliis ovatis ovalibus subcordatisque confertissimis, ramis dependentibus, floribus tetrandris. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

FRUTEX biorgyalis (*Myrti* facie).

HABITAT in subalpinis *Muña* et *Chaclla*.

FLORET à Julio ad Octobrem.

CABALLERIA DENTATA.

6. C. foliis obovatis oblongisque acuminatis punctatis supernè dentatis, floribus racemosis. *Flor. Per. et Chil. t. 8.*

ARBOR quadriorgyalis.

HABITAT in *Chaclla* et *Muña* montibus.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

Obs. Haec Species et sequens filamentis, stylo longo, et stigmate depresso gaudent.

PARS I.

NN

CABALLERIA VENOSISSIMA.

7. C. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis
pellucido-punctatis. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 8.

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in montibus *Pillao* et *Muña*.

FLORET à Julio ad Septembrem.

Obs. Differt à *Caballeria dentata* insertione
staminum altiori: in caeteris notis genericis
utraque convenit.

CLAVIJA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 142.

ICON. XXX.

CALYX *hermaphr. masc.* 5phyllus: foliolis
margine membranaceis. *Corolla* rotata, in
centro prominentiis 5 oblongis, quinque-
partita. *Nectarium*: *Urceolus* membra-
nceus, denticulis 10 bifidis, patentibus co-
ronatum. *Stamina* 5, basi corollae inserta,
in tubum urceolatum coalita. *Germen* ste-
rile. *Stylus* brevis. *Stigma* obtusum. *Cal.*
herm. femin. et *Cor.* ut in *hermaph. mas-*

culis. *Nectarium* nullum. *Stamina* libera, prominentiis corollae alternantia. *Germen* superum. *Stylus* nullus. *Stigma* subpeltatum, umbilicatum. *Bacca* unilocularis, corticosa. *Semina* reniformia, cornea, receptaculo fibroso, carnosio inserta.

HABITUS.

Frutices glabri, inermes. *Caules* simplices, tenues, erecti, teretes. *Folia* conferta, ferè verticillata, longa, ampla, coriacea, venoso-reticulata, integerrima, plana. *Racemi* conferti.

Obs. Similitudine ducti, quae inter nostrarum *Clavijae* Generis Specierum et *Eresiae* Plumier. ex qua Linnaeus *Theophrastae* Genus constituit, *Clavijae* Characteri Generico naturali sequentem observationem in Prodromo subjecimus: Ad hoc Genus referenda est *Eresia* foliis aquifolii longissimis. PLUM. nov. pl. Gener. pag. 8. tab. 25. *Theophrasta*. BURM. pag. 119. tab. 126? Sed cum posthac *Theophrastae* Characteris naturalis à Plumiero, Bur-

manno, Linnaeo et A. L. Jussieu elaborati notas cum *Clavijarum* nostrarum diligentias contulerimus; eas inter se non convenire deprehendimus. Quamobrem easdem plantas, etsi habitû et nonnullarum fructificationis notarum similitudine proximè accedant, diversa planè Genera constituere, aut Characteres qui è memoratis Auctoribus traduntur minus ritè concinnatos fuisse.

CLAVIJA MACROCARPA.

+ 1. C. foliis oblongo-cuneiformibus, racemis longissimis. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in Cuchero et Muña nemoribus.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE *Lucuma de monte* dicitur.

Obs. Flores post exsiccationem inter papyros illo asservati colore croceo eas inficiunt.

CLAVIJA LONGIFOLIA.

+ 2. C. foliis lanceolatis, racemis brevissimis, floribus congestis. *Flor. Per. et Chil. t. 8.*

FRUTEX octopedalis.

HABITAT in *Pati* et *Macora* runcationibus.

FLORET Augusto, et Septembri.

CLAVIJA SPATHULATA.

3. C. foliis spathulatis, racemis brevibus laxis

Flor. Per. et Chil. tom. 8.

FRUTEX triulnaris.

HABITAT in *Pozuzo* et *Muña* silvis.

FLORET Septembri, et Octobri.

CLAVIJA PENDULA.

4. C. foliis lanceolatis, racemis longis pendu-
lis. Flor. Per. et Chil. tom. 8.

FRUTEX quadripedalis et ultra.

HABITAT in *Pozuzo* nemoribus imis.

FLORET Septembri, et Octobri.

LARDIZABALA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 145.

ICON. XXXVII.

CALYX masc. nullus. Petala 6; tria exteriora
latiora. Nectarium hexaphyllum. Fila-

mentum unicum , columnare. *Antherae* 6, apice filamenti insidentes. *Cal. Cor.* et *Nect. hermaphrodit.* ut in mare. *Filamenta* 6 , brevissima. *Antherae* steriles. *Germina* 3-6. *Styli* nulli. *Stigmata* capitato-ovata. *Baccae* totidem , torulosae , 6loculares. *Semina* numerosa , angulata.

LARDIZABALA BITERNATA.

I. L. foliis biternatis , foliolis oblongis , lateralibus basi inaequalibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

PLANTA fruticosa , volubili-scandens.

HABITAT in Regni Chilensis silvis , ad Conceptionis , Rere et Itatae Provincias.

FLORET à Martio ad Julium.

VERNACULE *Coguill-Vochi* dicitur.

USUS : Pulpa fructuum , quos Incolae decerpunt et venditant , dulcis et grati saporis est.

Obs. Chilenses , aliquem susurronem aut assentatorem esse , et aliorum negotia , quibus se spontè implicat , insidiosè turbare significaturi , eum *Coguill-Vochi* appellant,

id est, plantam dulcem, jucundam et volubilem ob proprietatem scilicet, quâ praedita est, aliis corporibus se se irretiendi, necnon ob dulcem et gratam fructuum pulpam, quemadmodum susurriones blanditiis et delationibus suis jucundi quoque esse consueverunt.

LARDIZABALA TRITERNATA.

2. L. foliis triternatis, foliolis ovatis. *Flor.*

Per. et Chil. tom. 8.

PLANTA volubili-scandens.

HABITAT in *Conceptionis Chile* silvis.

FLORET ab Aprili ad Julium.

SMEGMADERMOS.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 144.

ICON. XXXI.

CALYX hermaph. femin. patentissimus, 5fidus, inferus, persistens. *Corolla* hexapetala. *Nectarium*: *Discus* planus, stellaeformis, coloratus. *Stamina* 10, quinque exteriora emarginaturis nectarii inserta, 5 in-

teriora infra discum affixa. *Germina* 5.
Styli 5, patentes. *Stigmata* capitata. *Cap-*
sulae 5 in stellae formam patentes, unilo-
 culares, supernè bivalves. *Semina* plura,
 alâ aucta. *Calyx* herm. mascul. *Cor.* *Nect.*
 et *Filam.* ut in herm. femin. *Antherae*
 fertiles. *Germina* 5, sterilia. *Styli* adpres-
 si. *Stigmata* simplicia.

SMEGMADERMOS EMARGINATUS.

1. S. foliis ovato-oblongis dentatis integrisque
 emarginatis. *Flor.* *Per.* et *Chil.* tom. 8.

QUILLAJA (*saponaria*). *MOLINA Hist.*
nat. Chil. comp. pag. 187.

ARBOR vigintiulnaris, frondosissima.

HABITAT in *Regni Chilensis* silvis, copiosè ad
Rere et *Puchacay* Provincias.

FLORET Decembri, Januario et Februario.

VERNACULE *Quillai* dicitur.

USUS: Cortice Saponis loco ad vestimenta la-
 nea mundificanda Incolae utuntur; et ex
 eodem contuso globulos magnos conficiunt
 et dimidio regali singulos venditant.

KAGENECKIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 145.

ICON. XXXVII.

CALYX masc. campanulatus, 5 fidus, inferus.

Corolla hexapetala. *Nectarium* nullum.

Stamina 16-20, ori tubi calycis unicâ serie inserta. *Calyx* et *Corolla* hermaph. ut in mare. *Stamina* brevissima. *Antherae* steriles. *Germina* 5. *Styli* 5, erecti. *Stigmata* peltata, lacera. *Capsulae* 5, calceiformes, radiatim patentes, uniloculares, supernè dehiscentes. *Semina* plura, alâ aucta.

Obs. Genus *Smegmadermo* valde affine, sed ab eo praeter habitum et sexum differt calyce campanulato, nectario, numero et insertione staminum, aliisque notis fructificationis minus insignibus, et tandem tempore florendi.

KAGENECKIA OBLONGA.

1. *K.* foliis oblongis obtusè serrulatis. *Flor.*

Per. et Chil. t. 8.

PARS I.

00

ARBOR sexorgyalis , parum frondosa.

HABITAT in *Conceptionis Chile* montibus.

FLORET Augusto, Novembri, et Decembri.

VERNACULE *Guayo colorado* appellatur.

VIRES ET USUS. Ex truncis optimae trabes ad aedificia construenda extrahuntur. Folia amarissima et ad febres intermittentes depellendas praescribi possunt , ad quem usum Speciem sequentem incolae peruviani adhibent.

KAGENECKIA LANCEOLATA.

+ 2. K. foliis lanceolatis acutè serratis. *Flor.*

Per. et Chil. tom. 8.

ARBOR triorgyalis , parum frondosa.

HABITAT in Provinciae *Cantae* collibus.

FLORET Novembri, et Decembri.

USUS: Folia, quae valde amara sunt, in decocto aut infuso in febribus intermittibus frequenter usurpantur.

PALMAE.

CARLUDOVICA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 146.

Icon. XXXI.

SPATHA universalis 4phylla. *Spadix* communis cylindricus. *Calyx* communis masc. si-
ve *Receptaculum* cubicum, 4florum: *Pro-*
prius multidentatus. *Stamina* plurima. *Ca-*
lyx *femin.* marginalis. *Germen* cubicum.
Styli 4, longissimi. *Stigmata* antheraeformia. *Bacca* tetragono-cubica, polysperma.
Semina oblonga, compressa. *Monoecia.*

HABITUS.

Palmae monoicae, polyandrae. *Caudices*
radicantes aut *Scapi*. *Frondes* flabelliformes aut furcatae. *Flores* in scapos radicales vel axillares.

CARLUDOVICA PALMATA.

1. *C. frondibus flabelliformibus, 3-5 partitis.*

Flor. Per. et Chil. tom. 8.

STIPITES orgyales, teretes.

HABITAT in Pozuzo et Cuchero nemoribus.

FLORET ab Octobri ad Decembrem.

Usus: Incolae ex stipitibus baculos leves et flexibiles conficiunt. Indi hujus Speciei et sequentium frondibus tuguria tegunt. E seminibus omnium Specierum oleum per expressionem elici potest.

CARLUDOVICA LATIFOLIA.

2. *C.* frondibus ultra medium furcatis, lacinii lanceolatis, stipitibus canaliculatis.

Flor. Per. et Chil. tom. 8.

CAUDEX ulnaris, radicans.

HABITAT in Chinchao, Muña, Pozuzo et Cuchero nemoribus calidissimis.

FLORET Aprili, Majo et Junio.

CARLUDOVICA ANGUSTIFOLIA.

3. *C.* frondibus ad basim ferè furcatis, lacinii ensiformibus angustis, stipitibus tere-
tibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

CAUDEX tripedalis, radicans.

HABITAT in Muña et Chinchao nemoribus.

FLORET Aprili, Majo et Junio.

CARLUDOVICA TRIGONA.

4. *C. frondibus ferè ad medium furcatis, stipitibus trigonis. Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

STIPITES pedales, trigoni.

HABITAT in *Muña* nemoribus calidis.

FLORET Aprili, Majo et Junio.

CARLUDOVICA ACUMINATA.

5. *C. frondibus ultra medium furcatis, lacinis lineari-lanceolatis acuminatis. Flor. Per. et Chil. t. 8.*

CAUDEX repens, flexuosus.

HABITAT in *Pozuzo* et *Muña* nemoribus.

FLORET Aprili, Majo et Junio.

NUNNEZHARIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 147.

ICON. XXXI.

CALYX : *Spatha* 4phylla. *Spadix* ramosus.

Perianthium hermaph. et femin. 3phyllum.

Corolla 3petala, calyce longior. *Stamina*

hermaphrod. 6. Pistillum herm. sterile. Germen femin. subrotundum. Stigma trifidum. Drupa monosperma. Polygamia dioecia.

Obs. Quamvis in nostrae Florae Prodromo hanc palmam ut hermaphroditam hexandram evulgavimus, ex posteriori descriptione in nostris MS. repertâ polygamam dioicam hexandram esse, et flores hermaphroditos femineos flores foecundare novimus.

NUNNEZHARIA FRAGRANS.

I. N. frondibus furcatis, laciniis acinaciformibus extrorsum serratis, serraturis distantibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

CAUDEX biorgyalis, articulatus.

HABITAT in Pozuzo et Cuchero nemoribus.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

VERNACULE *Chutasllium* nuncupatur.

Obs. Flores Iridis florentinae radice odorem simillimum, sed praestantiorum per Pozuzo nemora longè diffundunt.

MARTINEZIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 148.

ICON. XXXII.

CALYX: *Spatha* hexaphylla. *Spadix* ramosus.
Perianthium masc. triphyllum. *Corolla*
 3petala. *Stamina* 6. *Pistill.* *Rudimentum*
 minimum. *Per. et Cor. femin.* ut in mas-
 culis. *Stam. Rudimenta* 6. *Stylus* nullus.
Stigma 3partitum. *Drupa* monosperma.
Polygamia monoecia aut *dioecia*.

HABITUS.

Palmae procerae aut humiles, spinosae aut
 inermes. *Caudex* erectus, articulatus.
Frondes abruptè, interruptè aut impari-
 pinnatae. *Spadices* ramosi, magni.

MARTINEZIA CILIATA.

1. M. frondibus abruptè pinnatis, foliolis en-
 siformibus ciliatis, caudice stipitibusque
 spinosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

PALMA procera, frondosissima, monoica.

HABITAT in nemoribus *Pozuzo*, *Cuchero*,
Chanchamayo et *Huayabal*.

FLORET Septembri, Octobri et Novembri.

VERNACULE *Chonta* nuncupatur.

USUS : Incolae è meditullis, quae *Palmitos* nuncupant, Acetaria cocta incoctaque valde grata frequenter condiunt. Nos quoque in nostris excursionibus per deserta nemora peractis non parvum usum eorundem acetariorum fecimus. Lignum nigri coloris est, et quamvis compactum et ponderosum, in assulas facillè finditur. Ex eo baculos, sclopetarum virgulas, sagittas, arcus optimos aliaque perutilia instrumenta Indi fabrefaciunt.

MARTINEZIA INTERRUPTA.

2. *M.* frondibus interruptè-pinnatis, foliolis falcatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

PALMA sexorgyalis, monoica.

HABITAT in nemoribus *Pozuzo* et *Cuchero*.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE *Siasia* dicitur.

MARTINEZIA ENSIFORMIS.

3. M. frondibus impari-pinnatis, foliolis ensiformibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

PALMA sexorgyalis, monoica.

HABITAT in Pozuzo locis imis et umbrosis.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

VERNACULE Cuyol appellatur.

MARTINEZIA LINEARIS.

4. M. frondibus abruptè pinnatis, foliolis linearibus acutissimis, racemo composito, spicis incurvis recurvisque. *Fl. Per. et Ch. t. 8.*

PALMA triorgyalis, dioica.

HABITAT in Pozuzo nemoribus humidis.

FLORET Augusto, et Septembri.

MARTINEZIA LANCEOLATA.

5. M. frondibus abruptè-pinnatis, foliolis lanceolatis supernè incurvis, racemo composito, spicis laxis. *Flor. Per. et Chil. t. 8.*

PALMA triulnaris, dioica.

HABITAT in Chinchao et Cuchero nemoribus.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

IRIARTEA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 149.

ICON. XXXII.

CALYX: *Spatha* composita. *Perianthium* masc. triphyllum. *Corolla* tripetala. *Stamina* 15. *Per. et Cor. femin.* ut in mare. *Germen* 1. *Stigma* punctum minimum. *Drupa* monosperma. *Nux* striata. *Polygamia* monoecia.

IRIARTEA DELTOIDEA.

† I. I. frondibus impari-pinnatis deltoidibus erosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 8.*

CAUDEX trigintaulnaris, articulatus.

HABITAT in Pozuzo nemoribus imis.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

VERNACULE *Camona* appellatur.

MORENIA.

Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 150.

ICON. XXXII.

CALYX: *Spatha* tetraphylla. *Spadix* ramosus. *Perianthium* masc. monophyllum, trigonum, planum. *Corolla* 3 petala. *Stamina* 6.

Rudimentum germinis parvum. *Per. femin.*
trifidum. Corolla 3petala. *Stamina* nulla.
Germen 3fidum. *Stigmata* 3. *Drupae* 3,
monospermae. Dioecia.

MORENIA FRAGRANS.

1. *M. frondibus* abruptè pinnatis, foliolis
lanceolatis, spadibus masculis quaternis,
femineis solitariis. *Fl. Per. et Chil. t. 8.*

CAUDEX quadriorgyalis.

HABITAT in *Muña* nemoribus imis.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

VERNACULE *Siasia* nuncupatur.

PHYTELEPHAS.

Hermaph. masculi flores in distincta planta.

CAL. *Spatha* universalis, obtusè anceps, apice attenuata, compressiuscula, monophylla, univalvis. *Spadix* simplex, oblongus, subanceps, amentaceus, staminibus numerosis undique tectus, infernè squamis nonnullis cordatis, acuminatis obvallatus.

Perianthium nullum.

COROLLA nulla.

STAM. *Filamenta* confertissima , subulata.

Antherae lineari-subulatae , subspirales.

PIST. *Rudimentum* effoetum.

Hermaph. feminei flores in diversa planta.

CAL. *Spatha* universalis ut in hermaphroditis masculis. *Spadix* capitatus, flosculis tectus, imbricatus squamis totidem tenerrimis, basi ampliatis, compressis, è medio filiformi-subulatis , longitudine spadicis.

Perianthium nullum, nisi squamas dicas.

COROLLA nulla.

STAM. *Filamenta* plura , subulata , longa, germina ambientia. *Antherae* subulatae, steriles.

PIST. *Germina* nonnulla , subrotunda. *Stylus* filiformis , squamis longior , semiquinquefidus , rarò sexfidus ; laciniis subulatis. *Stigmata* simplicia.

PER. *Drupae* plures, in capitulū maximum, muricatum , coriaceum , durissimum aggregatae , obovatae, angulosae , quinqueloculares.

SEM. *Nux* oblongo-obovata, obsoletè trigona.

Nucleus ejusdem figurae, osseus.

Generis nomen ex plantae et eboris nominibus graecis conflatum.

PHYTELEPHAS MACROCARPA.

I. P. frondibus longissimis pinnatis, caudice humili, capitulis fructuum maximis. *Flor.*

Per. et Chil. tom. 8.

PALMA caudice humili. *Polygamia dioecia.*

HABITAT in *Andium* nemoribus imis et calidis, versùs *Chanchamayo*, *Vitoc*, *Cuchero* et *S. Antonium de Playa grande*.

FLORET Septembri, et Octobri.

VERNACULE ab Indis *Pullipuntu* et *Homero* dicitur, Hispani *Palma del Marfil* et *Marfil vegetal* ob nucleorum colorem et consistentiam nuncupant. *Fructus* proptersuam figuram et superficiem muricatam *Cabeza de Negro* appellatur.

VIRES ET USUS. Indi pulcherrimae hujus Palmae frondibus tuguria tegunt. *Fructus* initio liquorem crystallinum et insipidum includunt, cujus ope peregrinatores sitim

sedant: postea idem liquor lacteus, dulcis-
que evadit, et prout majorem consisten-
tiam acquirit, ad eboris soliditatem usque
accedentem, sapore variat. Fructibus te-
neris è planta excisis, et diù servatis liquor
acescit. Ex nucleis scipionum manubria,
Pirurus, id est, fusorum verticillos alia-
que speciosae formae corpora, ebore can-
didiora, Incolae construunt, cujus colorem
duritiemque retinent, dummodo diutius
sub aquâ non detineantur: exsiccata verò
rursus albescunt et indurantur. Ursi fruc-
tus teneros avidè edunt.

PHYTELEPHAS MICROCARPA.

2. P. frondibus longissimis pinnatis, caudice
nullo, capitulis fructuum parvis. *Fl. Per.*
et Chil. tom. 8.

PALMA acaulis. *Polygamia dioecia.*

HABITAT in Pozuzo et Pampahermosa silvis.

FLORET Septembri, et Octobri.

VERNACULE Pullipuntu et Marfil vegetal.

Obs. Indi ad eodem usus ac praecedentem
adhibent.

P A R S S E C U N D A.

C L A S S I S I.

M O N A N D R I A M O N O G Y N I A.

C A N N A.

LINN. *Gen. plant. pag. 2.*

C A N N A P A N I C U L A T A.

1. **C.** foliis ovatis subtus lanatis argenteis,
petalis interioribus brevioribus. *Flor. Per.*
et Chil. tom. 1. pag. 1. Icon. I. fig. a. ✓

PLANTA perennis, biorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* hortis et silvis versùs
Chinchao, *Hualqui* et *Macora*.

FLORET à Majo ad Augustum.

VERNACULE *Achira cimarrona*, id est, *Achi-*
ra silvestrem nuncupant.

Usus: Radices edules sunt, sed ferè insipidae.

C A N N A I N D I C A.

2. **C.** foliis ovato-oblongis, laciniis corollae

*W. This is a
new species.*

subaequalibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 1. LINN. Sp. plant. pag. 2. CANNACORUS. RUMPH. amb. 5. p. 1777. tab. 71. fig. 2. KATU BALA. RHEED. Mal. 11. pag. 85. tab. 43.*

PLANTA perennis.

COLITUR in *Peruviae* locis calidis.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE *Achira* nominatur.

USUS : Peruviani plantae radices diversimodè conditas frequenter edunt.

CANNA IRIDIFLORA.

VV 3. C. foliis ovatis acuminatis, laciniis tribus corollae interioribus majoribus. *Flor. Per.*

+ *et Chil. tom. 1. pag. 1.*

PLANTA perennis, triulnaris.

HABITAT in *Peruvia* ad vicum *Pillao*.

FLORET à Majo ad Octobrem.

VERNACULE *Sumac-Achira*, id est, *Achira formosa* nuncupatur.

USUS : Ad hortorum ornatum.

AMOMUM.

LINN. *Gen. pl. p. 3. Fl. Per. et Ch. t. 1. p. 1.*

AMOMUM RACEMOSUM.

1. A. scapo spathis oblongis tecto, racemo
composito oblongo. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 1. pag. 2. ICON. I. fig. b.

PLANTA perennis, biulnaris.

HABITAT copiosè in *Peruviae* silvis ad vicos
Cuchero, Chinchao, Muña et *Pillao* locis
umbrosis, et affatim ad *Macora* praedium.

FLORET Aprili, et Majo.

VERNACULE *Achira* de monte dicitur.

Obs. Semina aromatica valde oleosa sunt,
atque adeo in medicina pro seminibus Amo-
mi Cardamomi subrogari possunt.

AMOMUM THYRSOIDEUM.

2. A. scapo spathis oblongo-ovatis vestito, spi-
câ conico-thyrsoideâ. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 1. pag. 2. ICON. II.

PLANTA perennis, triulnaris.

PARS II.

QQ

HABITAT copiosè in *Peruviae* silvis ad vicos
Cuchero, *Chinchao* et *Pozuzo* locis umbro-
 sis, calidis humidisque.

FLORET Aprili, Majo et Junio.

Obs. Semina aromatica oleosa, in medicina
 etiam usurpari merentur.

COSTUS.

LINN. *Gen. pl. pag. 3. Flor. Per. et Chil.*
tom. 1. pag. 2.

COSTUS SCABER.

1. C. floribus in thyrso conico, bracteis ovatis
 adpressis, corollis semiclausis. *Flor. Per.*
et Chil. tom. 1. pag. 2. ICON. III.

PLANTA perennis, biulnaris.

HABITAT copiosè in silvis ad *Peruviae* vicos
Pillao, *Chinchao*, *Cuchero* et *Pozuzo*.

FLORET Septembri, et Octobri; Majo etiam
 et Junio floridam eam in *Cuchero* et *Ma-*
cora vidimus.

COSTUS LAEVIS.

2. *C. floribus in thyrso conico, bracteis lanceolatis apice incurvis, corollis patentibus, Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 3.*

PLANTA perennis, biorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad vicum *Pillao* juxta *Chacahuassi* et *Pampamarca* locis imis, umbrosis humidisque.

FLORET Septembri, et Octobri.

COSTUS ARGENTEUS.

3. *C. floribus in thyrso oblongo, bracteis dependentibus, corollis patentibus. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 3. ICON. IV.*

PLANTA perennis, biorgyalis.

HABITAT copiosè in *Peruviae* nemoribus ad vicos *Chinchao* et *Cuchero*, locis umbrosis et humidis.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

VERNACULE *Purum-piña*, id est, *Falsa Pinea* appellatur.

MARANTA.

LINN. *Gen. plant. pag. 4.*

MARANTA CAPITATA.

- ✓ 1. M. culmo simplici apice florifero, capitulo
+ globoso depresso. *Flor. Per. et Chil.*
tom. I. pag. 3. Icon. V.

PLANTA perennis, sesquiulnaris.

HABITAT in umbrosis et humidis versùs Cuchero et Pozuzo vicos.*FLORET* Julio, et Augusto.*VERNACULE* Achira de monte, id est, Achira montana nuncupatur.

MARANTA LATERALIS.

2. M. culmo simplici ad medium florifero,
capitulo globoso. *Flor. Per. et Chil. t. I.*
pag. 4.

HABITAT in Peruviae nemoribus ad Cuchero vicum locis humidis et umbrosis.*FLORET* Julio, et Augusto.

BOERHAAVIA.

LINN. *Gen. plant. pag. 7.**BOERHAAVIA SCANDENS.*

1. B. caule scandente, foliis cordatis, floribus umbellatis triandris, pedicellis longis apice incurvis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 4.* LINN. *Sp. plant. pag. 7.* JACQ. *Hort. Vind. tom. 1. pag. 2. tab. 4.*

PLANTA fruticosa, biorgyalis.

HABITAT in *Peruviae* sepibus et arvis ad
Huanuci, *Limae* et *Chancay* Provincias.

FLORET per totum ferè annum.*VULGO* *Yerba de la Purgacion.*

VIRES ET USUS. Peruviani decocto et infuso in gonorrhæa frequenter utuntur.

BOERHAAVIA HIRSUTA.


2. B. caule procumbente diffuso, foliis ovato-cordatis undulatis repandis, floribus triandris. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 4.* LINN. *Sp. pl. pag. 7.* JACQ. *Hort. Vind. tom. 1. pag. 3. tab. 7.*

PLANTA herbacea , bipedalis.

HABITAT in *Peruviae* arenosis, arvis, rud-
eratis et cultis affatim ad *Cercado*, *Cantae*,
Chancay et *Huanuci* Provincias.

FLORET per totum ferè annum. Collitur in
Hort. Reg. Matritensi, ubi floret mensibus
Augusto , et Septembri.

VULGO *Pegajosa* appellatur.



CLASSIS II.

DIANDRIA MONOGYNIA.

JASMINUM.

LINN. *Gen. plant. pag. 12.*

JASMINUM LANCEOLATUM.

1. J. foliis oppositis lanceolatis *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 6. Icon. VII. fig. a.*

PLANTA suffruticosa, ferè bipedalis.

HABITAT in silvis *Pozuzo* locis umbrosis.

FLORET Septembri, et Octobri.

JASMINUM GRANDIFLORUM.

2. J. foliis oppositis pinnatis: foliolis extimis confluentibus. LINN. *Sp. pl. pag. 15.*

COLLITUR in hortis peruvianis.

FLORET per totum ferè annum.

VULGO *Jazmin* appellatur.

USUS: Feminae floribus inapertis ad capitis ornatum et cultum vespere utuntur et cum

flores noctu explicantur, gratissimum odorem spirant. In *Mixtura* cum aliis floribus *Jasmini* flores adhibent.

VERONICA.

LINN. *Gen. plant. pag. 15.*

VERONICA SERPILLIFOLIA.

1. V. racemo terminali subspicato, foliis inferioribus oppositis subrotundis crenatis trinerviis, superioribus alternis ovatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 6. LINN. Sp. plant. pag. 29.*

PLANTA herbacea, repens, sesquipedalis.

HABITAT in ruderatis, versuris et humidis locis frigidis *Pillao*.

FLORET à Junio ad Septembrem.

VERONICA BECCABUNGA.

2. V. racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. LINN. *Sp. pl. pag. 30.*

HABITAT in humidis et scaturiginibus *Limae Arnedo, Huaura et Huanuci.*

FLORET per totum ferè annum.

VERONICA ROTUNDIFOLIA.

3. *V.* floribus solitariis, foliis orbiculato-reniformibus crenatis, caule filiformi repente.

Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 6.

PLANTA herbacea, repens.

HABITAT copiosè in *Peruviae* uliginosis ad *Pillao* et *Panao* vicos.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Obs. Flores nonnullos quinquefidos cum staminibus quatuor saepe offendimus: in corollis quadrifidis stamina tria semper adsunt.

VERONICA PEREGRINA.

4. *V.* floribus solitariis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis: inferioribus subserratis, caule erecto folioso et florifero. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 7. LINN Sp. plant. p. 38. MORIS. hist. 2. p. 322. sect. 3. tab. 34. fig. 19.*

PLANTA annua, uni-quadripalmaris.

HABITAT in *Peruviae* ruderatis et muris ad *Pillao* vicum, et in segetibus *Limae*.

PARS II.

RR

FLORET à Junio ad Septembrem.

Obs. Plantae, quae in aridis et ruderatis proveniunt, humiliores et foliis floribusque undique onustae sunt: quae autem in versuris et inter segetes vegetant, ramosiores ad pedis ferè altitudinem crescunt, foliaque inferiora remota proferunt.

GRATIOLA.

LINN. *Gen. plant. pag. 17.*

GRATIOLA PERUVIANA.

1. *G. foliis ovato-lanceolatis serratis, floribus breviter pedunculatis. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 7. LINN. Sp. plant. pag. 2. GRATIOLA latiore folio, flore albo. FEW. Peruv. tom. 3. pag. 23. planch. 17.*

PLANTA herbacea, saepe procumbens, amara.
HABITAT in *Limae* et *Conceptionis Chilensis* circuitu locis humidis.

FLORET Februario, Martio et Aprili.

Obs. *Stemodia maritima* à *Gratiolae* Genere nihil alio differt nisi staminibus om-

nibus fertilibus, ideoque ad hoc Genus
referri posse videtur.

JUSTICIA.

LINN. Gen. plant. pag. 17.

JUSTICIA SPICATA.

1. J. foliis lanceolato-oblongis, spicis oblongo-ovatis, bracteis inflexis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 8. Icon. IX. fig. a.*

PLANTA herbacea, perennis, orgyalis.

HABITAT in Pozuzo nemoribus.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

JUSTICIA MUCRONATA,

2. J. foliis oblongo-obovatis dentatis spinosis.

Fl. Per. et Ch. t. 1. pag. 8. Ic. X. fig. b.

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in Peruviae nemoribus ad Pati tractus, prope Chinchao vicum.

FLORET Majo, et Junio.

JUSTICIA LONGISTAMINEA.

- ✓ 3. J. foliis sessilibus oblongis utrinque acutis
subrepandis, pedunculis dichotomis. *Flor.*
+ *Per. et Chil. tom. 1. p. 8. Icon. X. fig. a.*

PLANTA herbacea, perennis, tripedalis.

HABITAT in nemoribus imis *Pillao* ad *Pam-*
pamarca tractus.

FLORET Octobri, et Novembri.

JUSTICIA SERICEA.

- ✓ 4. J. foliis lanceolatis sericeis, marginibus
reflexis, pedunculis axillaribus solitariis.
+ *Fl. Per. et Ch. t. 1. p. 9. Ic. IX. fig. b.*

PLANTA fruticosa, quadripedalis, sericea.

HABITAT in aridis et ad margines agrorum
Tarmae ad *Acobamba* et *Cheuchin*, ubi
Chucumpa nuncupant.

FLORET Aprili, et Majo.

VIRES. In pleuritide usurpatur.

JUSTICIA RACEMOSA.

- ✓ 5. J. foliis ovato-lanceolatis, pedunculis di-
+ chotomis, floribus racemosis. *Flor. Per. et*

Chil. tom. 1. pag. 9. Icon. XI. fig. b.

PLANTA tripedalis, herbacea, perennis.

HABITAT in *Muña* silvis.

FLORET Septembri, et Novembri.

JUSTICIA TENUIFLORA.

6. J. foliis lanceolatis, paniculâ terminali
brachiatâ dichotomâque, floribus sessili-
bus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 9.*

ICON. XII. fig. a.

PLANTA bipedalis, herbacea, perennis.

HABITAT in *Cuchero* nemoribus.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

JUSTICIA LINEOLATA.

7. J. foliis ovatis acutis, lineolis pellucidis,
pedunculis terminalibus paniculatis, flo-
ribus spicatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1.*
pag. 9. Icon. XIII. fig. a.

PLANTA bipedalis, herbacea, perennis.

HABITAT in *Cuchero* nemoribus.

FLORET Julio, et Augusto.

DIANTHERA.

LINN. *Gen. plant. pag. 17.*

DIANTHERA MULTIFLORA.

1. D. foliis oblongis, pedunculis 3nis 2-4-fidis, floribus 2-3 in singulis binis bracteis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 10.*

ICON. XIV. fig. b.

PLANTA sesquipedalis, herbacea, annua.

HABITAT in umbrosis. *Cheuchin.*

FLORET Majo, Junio et Julio.

VERNACULE *Caihua-caihua* nuncupatur.

VIRES ET USUS. Radix ad dentes mundificandos inservit. Folia edulia sunt.

DIANTHERA REPENS.

✓ 2. D. foliis ovatis acutis, pedunculis solitariis geminisque 4-5fidis, floribus 2-3 in singulis binis bracteis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 10.* ICON. XV. fig. b.

PLANTA suffruticosa, pedalis.

HABITAT in rupium fissuris *Limae*, *Lurin*,
Chancay et *Huanuci*.

FLORET Decembri, et Januario.

DIANTHERA ACUMINATA.

3. *D.* foliis oblongo-lanceolatis acuminatis,
verticillis subsessilibus multifloris, brac-
teis ciliatis. *Flor. Per. et Chil. tom. I.*
pag. 10. ICON. XVI. fig. b.

PLANTA bipedalis, herbacea, hirsuta.

HABITAT in *Huanuci*, *Huacho*, *Peralvillo*
et *Huaurae* circuitu ad margines segetum.

FLORET toto anno.

VERNACULE in Huanuco *Caihua-Caihua*.

USUS: Incolae Huanuci mucilaginem plan-
tae ad condiendum cibi genus, *Locro* no-
minatum, extrahunt.

DIANTHERA MUCRONATA.

4. *D.* foliis ovatis mucronatis, floribus ver-
ticillatis, bracteis ovatis ciliatis mucrona-
tis. *Flor. Per. et Chil. tom. I. pag. 11.*
ICON. XVI. fig. a.

PLANTA bipedalis, hirsuta, herbacea.

HABITAT in *Huanuci* et *Chancay* versuris.
FLORET Septembri, et Octobri.

DIANTHERA HIRSUTA.

- ✓ 5. *D.* foliis ovatis acutis, pedunculis geminis, floribus duobus in singulis binis bracteis. *Flor. Per. et Chil. tom. I. pag. II.*
+ *ICON. XIII. fig. b.*

PLANTA ferè bipedalis, herbacea.

HABITAT in *Pozuzo*, *Chinchao* et *Cuchero*.

FLORET Septembri, et Octobri.

Obs. Folia tincturam caeruleam, uti Indigofera Anil, praestant. Planta exsiccata aquâ respersa et papyri plagulis interposita caeruleo colore inficit.

DIANTHERA SECUNDIFLORA.

- ✓ 6. *D.* foliis lanceolato-oblongis obsolete crenatis, pedunculis solitariis polystachyis, floribus secundis. *Flor. Per. et Chil. t. I. pag. II.*
+ *ICON. XV. fig. a.*

PLANTA tripedalis, herbacea.

HABITAT in *Pozuzo* nemoribus imis.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE Pussca appellatur.

Usus: Incolae hâc plantâ colore rubro et caeruleo tingunt.

Obs. Differt à congeneribus *Antheris* caudatis. Convenit cum *Justiciae* Speciebus bracteâ communi unicâ. An genus novum constituendum ex hac Specie et duabus proximè sequentibus, quae omnes antheris caudatis gaudent?

DIANTHERA CILIATA.

7. *D.* foliis lanceolatis, floribus spicatis confertis, bracteis calycibusque ciliatis. *Flor.*

Per. et Ch. t. 1. p. 12. Ic. XIV. fig. a.

PLANTA bipedalis, herbacea.

HABITAT in *Pozuzo* nemoribus.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

DIANTHERA APPENDICULATA.

8. *D.* foliis lanceolatis undulatis basi appendiculatis, pedunculis solitariis ternisque

tri-quinquefidis parallelis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 12. ICON. XI. fig. a.*

PLANTA herbacea, glabra, orgyalis.

PARS II.

ss

Herb. Pavon
sp: 49
Just: et Deam

HABITAT in Pozuzo nemoribus.

FLORET Septembri, et Octobri.

HABITUS.

Plantae herbaceae. *Caules* sexangulares, geniculati. *Folia* opposita, petiolata. *Flores* axillares, verticillati; racemosi in *D. appendiculata*, spicati verò in *D. ciliata* et *polystachya*, in quibus tribus Speciebus bracteae communes solitariae, uniflorae ut in *Justiciis*. *Bracteae* binae in calycis formam, 1-2-3 florum, alterâ breviori. *Bracteolae* duae, oppositae sub singulo calyce.

CALCEOLARIA.

LINN. *Gen. pl. pag. 18. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 13.*

CALCEOLARIA PINNATA.

1. *C. foliis pinnatis, caule dichotomo radicante. Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 14. Icon. XIX. fig. a. CALCEOLARIA foliis Scabiosae vulgaris. FEWILL. Per. tom. 3.*

pag. 12. pl. 7. fig. 1. CALCEOLARIA
(pinnata). LINN. Sp. pl. tom. 1. p. 49.

PLANTA bipedalis, herbacea, succosa.

HABITAT copiosè in *Peruviae* humidis, stagnatis et aquaeductuum marginibus, in *Cercado, Chancay, Tarmae, Huarocherí, Cantae* et *Huanuci* Provinciis.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE *Mancapaqui*, vulgò *Yerba de la Bolsilla* nuncupatur.

Obs. Folia pro soli natura maximè variant. Plantae, quae in collibus altis arenosis tempore pluviarum crescunt, humiles gracilesque sunt, foliis superioribus magis fissis et obtusioribus.

CALCEOLARIA TRIPARTITA.

2. C. foliis tripartitis, lobis ovatis serratis. *Fl.*

Per. et Chil. t. 1. p. 14, Ic. XXII. f. a.

PLANTA herbacea, annua, hirsuta.

HABITAT in nemoribus *Panatahuarum*.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

CALCEOLARIA CORYMBOSA.

- + 3. *C. foliis radicalibus ovatis cordatisque petiolatis bicrenatis, caulinis cordatis semiamplexicaulibus. Fl. Per. et Chil. t. 1. pag. 14. ICON. XX. fig. b.*

PLANTA bipedalis, herbacea, hirsuta.

HABITAT in umbrosis Conceptionis Chile.

FLORET Septembri, et Octobri.

VERNACULE *Arguenita* dicitur.

CALCEOLARIA PERFOLIATA.

- + 4. *C. foliis sagittatis dentatis, petiolis alatis perfoliatis. Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 15. ICON. XXI. fig. a. CALCEOLARIA (perfoliata). LINN. suppl. pag. 86. SMITH. fasc. 1. pag. 4.*

PLANTA herbacea, sesquipedalis, hirsuta.

HABITAT in montibus lapidosis et aridis Chinchao, Muña et Chacilla.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

CALCEOLARIA TOMENTOSA.

- + 5. *C. foliis cordato-triangularibus duplicato-*

serratis, subtus tomentosis, petiolis connatis, pedunculis 6-8floris. *Flor. Per. et Chil. t. 1. pag. 15. Icon. XXII. fig. b.*

PLANTA herbacea, quadripedalis.

HABITAT in montibus umbrosis *Tarmae, Muña, Cuchero* et *Huassahuassi*.

FLORET à Novembri ad Februarium.

CALCEOLARIA BICRENATA.

6. C. foliis ovatis bicrenatis subtus tomentosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 15. Icon. XXIII. fig. b.*

PLANTA bipedalis, herbacea, annua.

HABITAT in *Cuchero* nemoribus.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

CALCEOLARIA INVOLUTA.

7. C. foliis ovatis acutis serratis, corollis involutis calycem semitegentibus. *Fl. Per. et Chil. tom. 1. p. 15. Ic. XXIII. fig. a.*

PLANTA suffruticosa, tripedalis, glabra.

HABITAT in *Panatahuarum* nemoribus.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

CALCEOLARIA PUNICEA.

8. C. caule repente , foliis ovalibus serratis, floribus puniceis. *Flor. Per. et Chil. t. 1. pag. 15, ICON. XXIV. fig. a.*

PLANTA herbacea, hirsuta.

HABITAT in *Panatahuarum* nemoribus ad *Chicoplaya* et *Monzon*, unde cl. Tafalla hujus Speciei et sequentis icones misit.

FLORET à Julio ad Septembrem.

CALCEOLARIA OBLONGA.

9. C. foliis oblongis serratis , pedunculis trifidis , corollis intus punctatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 15. Ic. XXIV. fig. b.*

PLANTA herbacea, annua , sesquipedalis.

HABITAT in *Panatahuarum* nemoribus.

FLORET Augusto , et Septembri.

CALCEOLARIA HETEROPHYLLA.

10. C. foliis ovatis ellipticis subcordatisque serratis ; pedunculis longissimis dichotomis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 16. ICON. XXI. fig. b.*

PLANTA herbacea , pedalis , hirsutissima.

HABITAT in *Muña* et *Chaclla* nemoribus.

FLORET Augusto , et Septembri.

CALCEOLARIA UNIFLORA.

11. C. foliis ovatis serratis , pedunculis longis filiformibus unifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 16. Icon. XX. fig. c.*

PLANTA suffruticosa , quadripedalis.

HABITAT in umbrosis *Tarmae* ad *Curis*, *Camcham* et *Huichay* tractus.

FLORET Junio , Julio et Augusto.

CALCEOLARIA BIFLORA.

12. C. foliis ovatis serratis crenatisque , pedunculis geminis filiformibus unifloris. *Fl. Per. et Chil. t. 1. p. 16. Ic. XX. f. a.*
C. (ovata). SMITH. fasc. 1. p. 3. t. 3.

PLANTA herbacea , semipedalis.

HABITAT in arenosis collibus *Chancay*, *Lurin* et *Limae* ad *Amancaes*.

FLORET Octobri , et Novembri.

CALCEOLARIA INFLEXA.

- + 13. *C. foliis ovatis acutis crenulatis, pedunculis inflexis 3-4floris. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 16. ICON. XXV. fig. a.*

PLANTA scandens, suffruticosa.

HABITAT in *Cantae* praeruptis.

FLORET Majo, Junio et Julio.

CALCEOLARIA BICOLOR.

- + 14. *C. foliis ovato-cordatis acutis venosissimis rugosis biserratis, pedunculis multifloris dichotomo-umbellatis. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 16. ICON. XXV. fig. b.*

PLANTA suffruticosa, biulnaris, incana.

HABITAT in *Cantae* praeruptis argillosis locis.

FLORET à Martio ad Julium.

CALCEOLARIA TRIFIDA.

15. *C. foliis cordatis ovatisque crenato-serratis, pedunculis trifidis multifloris umbellatis. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 17. ICON. XXVI. fig. b.*

PLANTA suffruticosa, bi-tripedalis.

HABITAT in *Cheuchin* locis umbrosis.

FLORET à Martio ad Junium.

VERNACULE *Tumpu* appellatur.

VIRES: Febrifuga et antiseptica est.

CALCEOLARIA FLEXUOSA.

16. *C.* foliis cordatis crenatis, pedunculis multifloris umbellatis. *Flor. Per. et Chil.* tom. I. pag. 17. *ICON.* XXVI. fig. a.

PLANTA frutescens, villosa.

HABITAT in *Cantae* Provinciae praeruptis.

FLORET Majo, Junio et Julio.

CALCEOLARIA VERTICILLATA.

17. *C.* foliis ternis cordatis acutis serratis, pedunculis quadrifloris. *Flor. Per. et Chil.* tom. I. pag. 17.

PLANTA suffruticosa, orgyalis.

HABITAT in *Cantae* praeruptis ad *Quive*.

FLORET à Decembri ad Martium.

CALCEOLARIA GLAUCA.

18. *C.* foliis lanceolatis serratis, pedunculis tri-quadrifloris, corollis maculatis. *Flor.*

PARS II.

TT

Per. et Ch. t. 1. p. 17. Ic. XXVII. f. c.

PLANTA suffruticosa , tripedalis.

HABITAT in *Cantae* circuitu, praesertim prope *Obragillo* et *S. Buenaventura* vicos.

FLORET per totum ferè annum.

CALCEOLARIA ANGUSTIFLORA.

19. C. foliis ovato-lanceolatis acutè serratis, pedunculis 4floris , corollis basi angustissimis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 17.*

ICON. XXVIII. fig. a.

PLANTA suffruticosa , bipedalis.

HABITAT in *Cantae* versuris circa *Obragillo*.

FLORET per totum ferè annum.

CALCEOLARIA DENTATA.

20. C. foliis ovatis argutè bidentatis , pedunculis corymbosis. *Flor. Per. et Chil. t. 1. pag. 18. ICON. XXIX. fig. b.*

PLANTA suffruticosa , ferè tripedalis.

HABITAT in *Conceptionis Chile* silvis.

FLORET Decembri , Januario et Februario.

CALCEOLARIA viscosa.

21. *C. foliis ovatis acutis serratis viscosissimis, calycibus tomentosis. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 18. Icon. XXX. f. a.*

PLANTA suffruticosa, bipedalis.

HABITAT in *Tarmae* et *Cantaë* alpibus.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Obs. Folia trita *Teucrium Marum* redolent, et amarissimo sapore sunt prædita.

CALCEOLARIA deflexa.

22. *C. foliis ovato-lanceolatis serrulatis, floribus terminalibus corymbosis, pedicellis 4-5 floris nutantibus. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 18. Icon. XXX. fig. b.*

PLANTA suffruticosa, biulnaris.

HABITAT in *Caxatambo* Provincia ad *Chenchin* vicum prope torrentes.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

CALCEOLARIA salicifolia.

23. *C. foliis lanceolatis serratis, pedunculis geminis terminalibus umbellatis dichoto-*

misque. *Flor. Per. et Chil. t. 1. pag. 18.*
ICON. XIX. fig. b.

PLANTA suffruticosa, sexpedalis.

HABITAT copiosè in *Peruviae* praeruptis ad
Huassahuassi, Huanucum et Pillao.

FLORET à Januario ad Augustum.

VERNACULE *Pachacça* dicitur.

CALCEOLARIA SESSILIS.

24. C. foliis lanceolatis serratis semiamplexi-
 caulibus rugosis canescentibus. *Flor. Per.*
et Chil. tom. 1. pag. 18.

PLANTA suffruticosa, bipedalis.

HABITAT in locis aridis *Conceptionis Chile.*

FLORET Febuario, et Martio.

VULGO *Arguenita* nuncupatur.

CALCEOLARIA RUGOSA.

25. C. foliis lanceolatis bidentatis, petiolis
 connatis alatis, pedunculis dichotomis mul-
 tifloris. *Flor. Per. et Chil. t. 1. pag. 19.*

ICON. XXVIII. fig. b. CALCEOLARIA
(integrifolia). LINN. Sp. pl. t. 1. p. 49.

CALCEOLARIA Salviae folio. FEW. *Per.*
t. 3. p. 13. planch. 7.

PLANTA herbacea (*Salviae officinalis* habitu).

HABITAT in *Conceptionis Chile* locis argillosis.

FLORET *Februario*, et *Martio*.

VERNACULE *Chachaul*, vulgò *Arguenita*.

CALCEOLARIA PULVERULENTA.

26. C. foliis oblongo-lanceolatis dentato-serratis albidis, ramis pulverulentis. *Flor.*

Per. et Chil. tom. 1. pag. 19.

PLANTA suffruticosa, orgyalis.

HABITAT in praeruptis *Cantae*.

FLORET à *Decembri* ad *Martium*.

CALCEOLARIA SCABRA.

27. C. foliis oblongis dentatis venoso-lineatis, caule aspero. *Fl. Per. et Ch. t. 1. p. 19.*

ICON. XXIX. fig. a.

PLANTA suffruticosa, tripedalis.

HABITAT in *Tarmae* et *Muñae* praeruptis.

FLORET à *Majo* ad *Augustum*.

CALCEOLARIA CUNEIFORMIS.

28. *C. foliis cuneiformibus ovatisque inciso-serratis. Flor. Per. et Chil. tom. I. p. 29.*

ICON. XXVII. *fig. b.*

PLANTA suffruticosa, bipedalis.

HABITAT in *Cantae* et *Tarmae* alpibus.

FLORET Majo, Junio et Julio.

CALCEOLARIA LINEARIS.

29. *C. foliis linearibus integerrimis subtus albidis; pedunculis unifloris. Flor. Per. et Chil. tom. I. pag 19.*

PLANTA suffruticosa, bipedalis.

HABITAT in Provincia *Xauxae* collium declivibus versùs *Ocopae Collegium*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

CALCEOLARIA ALBA.

30. *C. foliis linearibus denticulatis, racemis longis, floribus umbellatis, umbellis compositis. Flor. Per. et Chil. tom. I. p. 19.*

ICON. XXVII. *fig. a.*

PLANTA suffruticosa (*Rosmarini* odore).

HABITAT in collibus aridis *Rere* Provinciae

Regni Chilensis circa fluvium *Biobio*.

FLORET à Novembri ad Januarium.

CALCEOLARIA VIRGATA.

31. *C.* foliis ovatis obtusè serratis, pedunculis multifloris. *Fl. Per. et Chil. tom. 1.*

pag. 20. ICON. XXXI. fig. a.

PLANTA fruticosa, bipedalis (*Melissae Calaminthae* habitu).

HABITAT in *Cantae* circuitu.

FLORET toto ferè anno.

HABITUS.

Plantae herbaceae aut fruticosae, viscoso-resinosae, pubescentes vel hirsutae, aut villosae. *Villi* biformes; *longiores* setosi, articulati, flexuosi (*Conservae* instar); *bre-viores* glandulâ terminati. *Caules* fragiles. *Folia* opposita, saepe terna, simplicia, in *Calc. pinn.* pinnata. *Petioli* connati, aut perfoliati; in *Calc. perfol.* decurrentes. *Pedunculi* axillares terminalesque, solitarii, gemini, uniflori, vel dichotomo-co-

rymbosi, aut umbellati, multiflori. *Pedicelli* intermedii, uniflori: *laterales* 3-4-flori. *Foliola* duo ad pedicellorum insertionem.

Obs. Calceolariae omnes, quae plantae sunt magis minusve amarae, diureticâ virtute pollent, et luteam tincturam praebent.

PINGUICULA.

LINN. *Gen. plant. pag. 19.*

PINGUICULA INVOLUTA.

✓ 1. P. nectario conico longitudine petali, scapo unifloro villosa, foliis ovatis marginibus involutis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 20. ICON. XXXI. fig. c.*

PLANTA herbacea, annua, palmaris.

HABITAT in altis, frigidis et humidis *Pillao*, *Panao* et *Huassahuassi* inter muscos.

1 FLORET Octobri, Novembri et Decembri.

UTRICULARIA.

LINN. *Gen. plant. pag. 19.*

UTRICULARIA APHYLLA.

1. U. scapo 2-4floro, squamis totidem, apice
furcato. *Flor. Per. et Chil. t. 1. pag. 20.*

Icon. XXXI. fig. d.

PLANTA sesquipalmaris, annua, caespitosa.

HABITAT in locis humidis Surco et Limae.

FLORET Decembri, Januario et Februario.

UTRICULARIA UNIFOLIA.

2. U. scapo squamato unifloro, calyce maxi-
mo cordato. *Flor. Per. et Chil. tom. 1.*

pag. 20. Icon. XXXI. fig. b.

PLANTA pedalis, annua.

HABITAT in Panoa montibus altis.

FLORET Aprili, et Majo.

VERBENA.

LINN. *Gen. plant. pag. 20.*

VERBENA VIRGATA.

- ✓ 1. V. tetrandra, spicis axillaribus ternis gracilibus, floribus verticillatis, foliis ovatis acutis crenatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 20. ICON. XXXII. fig. b.*

PLANTA frutescens, biorgyalis, fragrans.

HABITAT in nemoribus Pozuzo.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

VERBENA MULTIFIDA.

- ✓ 2. V. tetrandra, floribus capitato-umbellatis, foliis semitrifidis, laciniis bi-trifidis. *Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 21. Ic. XXXIII. fig. c. LYCHNIDEA Verbenae tenuifoliae folio, vulgò Sandia-Laguen. FEWILL. Per. t. 3. p. 35. pl. 25. ERINUS (laciniatus) foliis laciniatis. LINN. Sp. plant. tom. 3. pag. 177.*

PLANTA herbacea, prostrata, semipedalis.

HABITAT in collibus aridis *Conceptionis Chile*.

FLORET Octobri, et Novembri.

VERNACULE *Sandia-Laguen* nuncupatur.

VIRES ET USUS. Incolae plantae infuso et decocto aquoso, tanquam efficacissimo diuretico et aperitivo remedio frequentissimè utuntur, et partum promovere atque urinae ardorem demulcere testantur.

VERBENA CLAVATA.

3. *V. tetrandra*, foliis senis quinisque bifor-
mibus, floribus capitato-umbellatis, an-
theris superioribus dorso clavatis. *Flor.*

Per. et Ch. tom. 1. p. 21. Ic. XXXIII. f. b.

PLANTA fruticosa, subpedalis, procumbens.

HABITAT in arenosis *Aricae* Provinciae, unde cl. Tafalla ad nos descriptionem et iconem transmisit.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERBENA CORYMBOSA.

4. *V. tetrandra*, floribus spicatis corymbosis,
foliis cordato-triangularibus rugosis pro-
fundè serratis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1.*

pag. 22. ICON. XXXIII. fig. a.

PLANTA herbacea, pedalis, hispida.

HABITAT in Conceptionis Chile ruderatis.

FLORET Novembri, et Decembri.

VERBENA NODIFLORA.

✓ 5. V. tetrandra, spicis capitato-conicis, foliis serratis, caule repente. LINN. *Sp. pl. t. 1.*

† pag. 54. *Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 22.*

HABITAT copiosè in arvis, cultis et plateis

Limae, Chancay et Huanuci.

FLORET per totum ferè annum.

VERBENA OFFICINALIS.

✓ 6. V. tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario.

† LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag. 55. Fl.*

Per. et Chil. tom. 1. pag. 22.

HABITAT in Cercado, Chancay et Huanuci Provinciis, in campis et arvis.

FLORET per totum ferè annum.

VULGO Verbena appellatur.

Usus: Ad mensium obstructions ciendas et

abortum promovendum ab incolis decoc-
tum commendatur.

VERBENA CUNEIFOLIA.

7. *V. tetrandra*, spicis ternis oblongis, foliis
trifidis, laciniis incisis. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 1. pag. 22. ICON. XXXII. fig. a. ✓
+

PLANTA herbacea, bipedalis, hispida.

HABITAT in arenosis locis *Huanuci* Provin-
ciae versus *Mayubamba* vicum.

FLORET Martio, Aprili et Majo.

VULGO Verbena dicitur.

VERBENA HISPIDA.

8. *V. tetrandra*, spicis ternis cylindricis, foliis
ovatis oblongisque integris et subtrifidis,
profundè serratis semiamplexicaulibus. *Fl.*
Per. et Ch. tom. 1. p. 22. Ic. XXXIV.
fig. a. ✓
+

PLANTA herbacea, perennis, pedalis.

HABITAT in arenosis locis *Huanuci*.

FLORET Martio, et Aprili.

VERBENA DICHOTOMA.

- ✓ 9. *V. diandra*, spicis longissimis terminalibus et ex dichotomiis, foliis ovatis oblongisque serratis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 23. Icon. XXXIV. fig. b.*

PLANTA suffruticosa, tripedalis.

HABITAT in Cuchero et Chinchao silvis.

FLORET Julio, et Augusto.

SALVIA.

LINN. Gen. plant. pag. 23.

SALVIA SAGITTATA.

- ✓ 1. *S. foliis sagittatis crenatis acutis. Fl. Per. et. Ch. t. 1. p. 23. Ic. XXXV. fig. a.*

PLANTA orgyalis, perennis, hirsuta.

HABITAT copiosè in hortis, versuris et ruderratis Tarmae, Huarocherí et Huanuci.

FLORET Majo, et Junio.

VULGO *Salvia Real* nuncupatur.

USUS: Incolae *Salviae officinalis* loco hanc Speciem substituunt.

SALVIA cuspidata.

2. S. foliis cordato-sagittatis inaequaliter serratis, spicis longis, verticillis multifloris remotis, calycibus cuspidatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 23. ICON. XL. fig. b.*

PLANTA suffruticosa, orgyalis.

HABITAT in *Cheuchin* collibus.

FLORET Aprili, et Majo.

SALVIA longiflora.

3. S. foliis cordatis acutissimis bicrenatis, spicis longis nutantibus, bracteis calycibus coloratis, corollis longissimis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 23. ICON. XL. fig. a.*

PLANTA suffruticosa, subtriorgyalis.

HABITAT in praeruptis *Tarmae* ad *Huichay* praedium, et versùs *Acobamba* vicum.

FLORET Januario, et Februario.

SALVIA incurvata.

4. S. foliis cordatis acutis serratis, labiis calycis incurvis, galeâ corollae bifidâ. *Flor. Per. et Ch. t. 1. p. 24. ICON. XLII. f. b.*

PLANTA herbacea , bipedalis,

HABITAT in *Muña* circuitu.

FLORET Julio , et Augusto.

Obs. Color foliorum seniorum lividus in plurimis Speciebus *Salviae* circa delapsum ipsorum frequenter observatur.

SALVIA ACUTIFOLIA.

5. S. foliis cordatis acutis obtusè serratis, spicis verticillatis. *Flor. Per. et Chil. t. 1. pag. 24.* *ICON. XXXVIII. fig. b.*

PLANTA fruticosa , orgyalis.

HABITAT copiosè in *Cheuchin* locis humidis.

FLORET Martio , et Aprili.

VERNACULE *Sacconcha* appellatur.

SALVIA BIFLORA.

6. S. foliis cordatis serratis tomentosis, spicis erectis , floribus secundis binis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 24.* *IC. XXXVIII. fig. a.* ; *SALVIA (tubiflora).* *SMITH. fasc. 2. pag. 26. Icon. 26 ?*

PLANTA suffruticosa , bipedalis , villosissima.

HABITAT in collibus arenosis *Huaurae*.

FLORET Septembri, et Octobri.

SALVIA ACUMINATA.

7. *S.* foliis cordatis serratis acuminatis, spicis terminalibus, floribus verticillatis, corolla calyce duplò longiori. *Flor. Per. et Chil.*

tom. 1. pag 24. ICON. XXXVII. fig. b.

PLANTA orgyalis, perennis, hirsuta.

HABITAT in praeruptis *Pillao* et *Cantae*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

SALVIA NODOSA.

8. *S.* foliis cordatis, superioribus ovatis delthoidibusque serratis, pedunculis axillaribus nodosis, galeâ hirsutâ. *Flor. Per.*

et Chil. t. 1. p. 24. ICON. XLI. fig. a.

SALVIA (formosa). L'HERIT. fasc. 3. pag. 24. t. 21.

PLANTA suborgyalis, frutescens, fragrans.

HABITAT in arenosis, argillaceis petrosisque locis *Huanuci* Provinciae.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE *Socconcha* appellatur.

VIRES ET USUS. Decoctum tepidum in nervorum laxitate mirificè prodest. Incolae ad dentium dolores sedandos folia mandunt.

Obs. Triviali nomine *formosae* nomen *nodosae* subrogavimus, quoniam illud pluribus Speciebus quadrat, hoc nulli praeter nostram.

SALVIA EXCISA.

- ✓ 9. S. foliis cordatis obtusis basi inaequalibus serratis, spicis nutantibus, floribus oppositis binis verticillatisque. *Flor. Per. et Chil. t. 1. pag. 25. Ic. XXXVI. fig. a.*

PLANTA bipedalis, herbacea, hirsuta.

HABITAT in *Peruviae* montibus arenosis, vulgò *Lomas*, in *Cañete* et *Camanae* Provinciis ad *Atiquipa* oppidum.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

SALVIA RACEMOSA.

10. S. foliis cordatis acutis sub lanceolatis serratis, racemis terminalibus compositis, bracteis ovatis acuminatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 25.*

PLANTA suffruticosa , hirsuta.

HABITAT in versuris et ruderatis *Huanuci*.

FLORET Decembri , Januario et Februario.

SALVIA RHOMBIFOLIA.

11. S. foliis rhombeis cordatisque serratis,
spicis terminalibus ternis , verticillis 4-8-
floris. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 26.*

ICON. XXXVI. *fig. b.*

PLANTA herbacea , pedalis , hirsuta.

HABITAT in *Peruviae* collibus arenosis (*Lomas de Atiquipa* et *Pongo* dictis) in *Camanae* Provincia , et *Chancay* altis.

FLORET Junio , Julio et Augusto.

SALVIA PLUMOSA.

12. S. foliis subcordatis acutis crenatis , pe-
dunculis 4-5 axillaribus unifloris , stylo
plumoso. *Flor. Per. et Ch. tom. 1. p. 26.*

ICON. XXXVII. *fig. a.*

PLANTA orgyalis , frutescens , subtomentosa.

HABITAT in *Tarmae* Provinciae praeruptis,
imis locis ad *Huassahuassi* arcem.

FLORET Octobri , et Novembri.

SALVIA INTEGRIFOLIA.

+ 13. S. foliis ovatis integerrimis, aveniis subrepandis, spicis brevibus, corollis longis, staminibus exsertis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 26. Icon. XXXV. fig. b.*

PLANTA fruticosa, bipedalis, glabra.

HABITAT in *Peruvia* ad *Caxatambo* Provinciam juxta aquas termales *Cheuchin*.

FLORET Junio, et Julio.

VERNACULE *Socconcha* nuncupatur.

VIRES ET USUS: Decoctum contra pleuritidem et haemopthisim specificum est.

SALVIA OPPOSITIFOLIA.

14. S. foliis ovatis crenatis rugosis, spicis terminalibus, floribus oppositis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 26. Ic. XLIII. fig. a.*

PLANTA bipedalis, suffruticosa, fragrans.

HABITAT in locis altis *Tarmae* oppidi.

FLORET Majo, et Junio.

VERNACULE *Chenichelcoma* dicitur.

SALVIA VIOLACEA.

15. *S. foliis ovatis crenatis, floribus spicatis, verticillis sexfloris, labio corollae dependente. Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 26.*

ICON. XLIII. fig. b.

PLANTA bipedalis, annua, hirsuta.

HABITAT in *Tarmae* praeruptis calidis.

FLORET Augusto, et Septembri.

SALVIA MITIS.

16. *S. foliis ovatis acutis serratis tomentosis, spicis terminalibus; intermediâ longiori aphyllâ, verticillis multifloris. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 27.*

PLANTA suffruticosa, bipedalis.

HABITAT in praeruptis calidis *Cantae*.

FLORET Januario, Februario et Martio.

SALVIA PROCUMBENS.

17. *S. foliis ovatis elliptico-lanceolatisque serratis, caule ramosissimo nodoso radicante, spicis gracilibus assurgentibus. Fl. Per. et Ch. t. 1. p. 27. Ic. XXXIX. f. a.*

PLANTA perennis , foetida.

HABITAT copiosè in versuris et ruderatis *Limae, Chancay et Huanuci.*

FLORET per totum annum.

VULGO *Moradilla et Yerba del Gallinazo.*

VIRES ET USUS. Peruviani infuso et decocto ad obstructions et icterum utuntur.

SALVIA PUNCTATA.

18. S. foliis ovato-oblongis serratis , spicis multifloris , calyce punctato , labio superiori tricuspidato. *Flor. Per. et Chil. t. 1. pag. 27. ICON. XXXIX. fig. b.*

PLANTA suffruticosa , tripedalis , foetida.

HABITAT in collibus altis *Huanuci.*

FLORET Majo , et Junio.

VERNACULE *Añasccachu* , id est , *Yerba Zorrina* seu *Herba vulpina.*

SALVIA GALEATA.

19. S. foliis ovalibus serratis , calyce labio superiori galeato , corollae labio superiori convoluto. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 27. ICON. XLII. fig. a.*

PLANTA fruticosa , tripedalis.

HABITAT in circuitu *Muñae* locis aridis.

FLORET Augusto , et Septembri.

SALVIA REVOLUTA.

20. S. foliis lineari-lanceolatis crenatis, floribus spicatis , verticillis secundis. *Fl. Per.*

et Ch. tom. 1. p. 28. ICON. XLI. fig. b.

PLANTA fruticosa , subtripedalis , tomentosa.

HABITAT in praeruptis *Cantae*.

FLORET Januario , et Febuario.

TRIGYNIA.

PIPER.

LINN. *Gen. pl. pag. 26. Flor. Per. et Chil.*

tom. 1. pag. 33.

PIPER CALLOSUM.

1. P. foliis ovalibus acuminatis basi callis duobus , spicis brevibus subechinatis , stigmatibus duobus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1.*

pag. 34. ICON. LIII. fig. a.

FRUTEX ulnaris, glaber.

HABITAT in nemoribus *Chacahuassi*.

FLORET Octobri, et Novembri.

PIPER EXCAVATUM.

2. P. foliis ovatis acuminatis leviter repandis,
spicis cylindricis folio duplò brevioribus.

Flor. Per. et Chil. tom. I. pag. 34.

ICON. LIV. fig. b.

FRUTEX biorgyalis, glaber.

HABITAT in *Cuchero* nemoribus.

FLORET Julio, et Augusto.

PIPER SCABRUM.

3. P. foliis ovatis acutis rugosissimis subtus
pubescentibus supra asperis, spicis erectis.

Flor. Per. et Chil. tom. I. pag. 34.

ICON. LV. fig. b.

FRUTEX ferè quadriorgyalis.

HABITAT in *Huassahuassi* nemoribus.

FLORET Octobri, et Novembri.

PIPER HETEROPHYLLUM.

4. P. foliis ovalibus acuminatis venosis utrin-

que punctatis, spicis curvatis. *Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 34.* ICON. LVI. *fig. a.*

FRUTEX duodecimipedalis, glaber.

HABITAT in nemoribus *Pillao* et *Chinchao*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

VERNACULE *Carpunya* nuncupatur.

VIREs: Folia vi digestivâ pollent.

PIPER UNGUICULATUM.

5. P. foliis subcordatis quinquenerviis, acumine unguiculato, basi utrinque revolutis, spicis erectis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 34.* ICON. LVII. *fig. b.*

FRUTEX biulnaris, odore et sapore *Piperi nigro* aliquantulum accedente.

HABITAT in *Pozuzo* et *Chinchao* nemoribus.

FLORET Septembri, et Octobri. Colitur in Hort. Reg. Matrit. ubi floret Majo, et Junio.

PIPER CHURUMAYU.

6. P. foliis ovatis acutis, spicis erectis. *Flor. Per. et Ch. t. 1. p. 35.* IC. LVIII. *fig. b.*

ARBOR triorgyalis, glabra.

PARS II.

YY

HABITAT in *Huassahuassi* nemoribus.

FLORET Novembri, et Decembri.

VERNACULE *Churumayu*, id est, *fluvii Flagellum*.

PIPER GRACILE.

7. *P.* foliis ovato-lanceolatis acutis rugosis, spicis gracilibus erectis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 35. ICON. LIX. fig. b.*

FRUTEX biulnaris.

HABITAT in *Cuchero* nemoribus.

FLORET Julio, et Augusto.

PIPER DICHOTOMUM.

- ✓ 8. *P.* foliis oblongo-lanceolatis, venis alternis, spicis cylindricis folio brevioribus. *Fl. Per. et Ch. t. 1. p. 35. Ic. LX. fig. b.*

FRUTEX triulnaris.

HABITAT in *Chinchao* et *Macora* silvis.

FLORET Julio, et Augusto.

VIRES ET USUS: Folia ob suam gratissimam fragrantiam et digestivam virtutem ad eodem usus ac *Pip. Carpunya* adhibentur.

PIPER LINEATUM.

9. P. foliis ovato-lanceolatis acutis lineatis subplicatis, spicis recurvatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 35. Ic. LX. fig. a.*

FRUTEX duodecimpedalis.

HABITAT ad margines fluviorum *Huanuci* et *Panao*, et in *Chinchao* runcationibus, vernaculè *Carpales* dictis.

FLORET Julio, et Augusto.

Obs. Folia luteum colorem praebent.

PIPER CROCATUM.

10. P. foliis ovato oblongis acutis acumina-
tisque utrinque rugosis supra asperis, spi-
cis erectis foliorum ferè longitudine. *Fl. Per. et Ch. t. 1. pag. 35. Ic. LV. fig. a.*

FRUTEX subtriulnaris.

HABITAT in *Chacahuassi* nemoribus.

FLORET Octobri, et Novembri.

VIREs: Folia spicaeque adhuc recentes sa-
porem habent et odorem, *Piperi nigro*
quodammodo similem, qui insigniores sunt
postquam spicae ad maturitatem perve-

niunt, et tunc colorem croceum praebent; quapropter ad cibos condiendos inservire possunt.

PIPER LANCEOLATUM.

11. P. foliis lanceolatis acutis, spicis brevibus erectis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 36. ICON. LXI. fig. b.*

FRUTEX biulnaris, glaber.

HABITAT in *Chacahuassi* nemoribus.

FLORET Septembri, et Octobri.

PIPER CURVATUM.

12. P. foliis oblongis acuminatis laevibus subtus punctatis nitidis, spicis brevibus curvatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 36. ICON. LXIV. fig. a.*

FRUTEX octopedalis, glaber.

HABITAT in *Cuchero* et *Chinchao* nemoribus.

FLORET Junio, et Julio.

PIPER OBOVATUM.

✓
13. P. foliis obovato-oblongis acuminatis utrinque attenuatis, spicis erectis; inferio-
+

ribus incrassatis, superioribus parvis tenuibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 36.*

ICON. LIII. *fig. b.*

FRUTEX triulnaris (*Betulae* facie).

HABITAT in *Chacahuassi* nemoribus.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

PIPER PUNCTATUM.

14. P. foliis oblongis acuminatis venosis utrinque punctatis, spicis folio duplò brevioribus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 36.*

ICON. LXII. *fig. a.*

FRUTEX quadripedalis, glaber.

HABITAT in nemoribus *Pillao* ad *Iscutínam*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

PIPER SECUNDUM.

15. P. foliis oblongis acuminatis glabris laevibus, spicis filiformibus erectis secundis.

Fl. Per. et Ch. t. 1. p. 36. Ic. LXII. f. b.

FRUTEX octopedalis, glaber.

HABITAT in nemoribus *Pillao* et *Chinchao*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

PIPER ASPERIFOLIUM.

- ✓ 16. P. foliis ovatis oblongisque acuminatis
+ asperis, spicis teneris curvatis; adultis
erectis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 37.*
ICON. LVI. *fig. b.*

FRUTEX triulnaris.

HABITAT in nemoribus *Pillao* et *Cuchero*.

FLORET Julio, et Augusto.

PIPER LONGIFOLIUM.

- ✓ 17. P. foliis oblongo-ovatis obovatisque acu-
+ minatis utrinque nitidis venosissimis, spicis
recurvatis. *Flor. Per. et Ch. t. 1. p. 37.*
ICON. LXI. *fig. a.*

FRUTEX biorgyalis, ferè insipidus.

HABITAT in nemoribus *Pillao* ad *Iscutínam*.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

PIPER MITE.

18. P. foliis cordatis acutis 15-19nervibus
reticulatis, spicis longioribus subulatis
erectis. *Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 37.*
ICON. LVIII. *fig. a.*

FRUTEX sexpedalis.

HABITAT in nemoribus et silvis *Cuchero*.

FLORET Julio, et Augusto.

PIPER CARPUNYA.

19. P. foliis cordatis acutis acuminatisque coriaceis, marginibus revolutis, spicis erectis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 37.*
ICON. LXIII. fig. b.

ARBOR triorgyalis, glaberrima.

HABITAT in nemoribus *Chinchao* et *Cuchero*.

FLORET Julio, et Augusto.

VERNACULE *Carpunya* appellatur.

VIRES ET USUS: Folia, praesertim sicca, fragrantissimum odorem emittunt. Incolae ad indigestiones eorum infusione in aqua calida aut fervente peractâ frequenter utuntur, et ob gratum saporem Coffeae aut Theae potioni praeferunt. Eadem etiam sicca et contusa blattas certissimè fugant, ideoque in nostris excursionibus per montes *Panatahuas* ad Animalia et Aves dissectas à blattis praeservandas ipsis non sine fructu semper usi sumus.

PIPER *OBLIQUUM*.

20. *P.* foliis obliquè cordatis obtusis, spicis longissimis dependentibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 37.* *ICON. LXIII. fig. a.*

FRUTEX biorgyalis, glaber, laevis.

HABITAT in silvis *Cuchero* ad *Cayumba*.

FLORET Julio, et Augusto.

PIPER *ACUTIFOLIUM*.

+ 21. *P.* foliis cordatis acutissimis, spicis erectis cylindricis brevibus. *Flor. Per. et Ch. tom. 1. pag. 38.* *ICON. LXIV. fig. a.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in *Cuchero* et *Pozuzo* silvis.

FLORET Julio, et Augusto.

PIPER *ANGUSTIFOLIUM*.

✓ 22. *P.* foliis cordato-lanceolatis acutis rugosis, spicis recurvis foliorum longitudine. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 38.*

+ *ICON. LVII. fig. a.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in silvis et ripis *Huanuci*, *Cuchero*,
Panao, *Chaclla* et *Muña*.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

VERNACULE *Moho-moho*, id est, *Nodus-nodus*.

VIRES ET USUS: Incolae ad gonorrhoeam et ul-
cera cancrosa à lue venerea orta extirpan-
da, decoctum affatim hauriunt.

PIPER GRANULOSUM.

23. P. foliis cordato-lanceolatis obliquis ru-
gosissimis supra scabris, nervis alternis,
spicis uncinatis. *Flor. Per. et Chil. tom. I.*

pag. 38. Icon. LXIV. fig. b.

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in *Pillao* nemoribus.

FLORET Augusto, et Septembri.

VIRES ET USUS: Folia et spicae manibus fri-
catae gratum et aromaticum odorem spi-
rant saporemque praebent, quamobrem ad
cibos condiendos inservire possunt. Infu-
sum etiam calidum ad indigestiones remo-
vendas propinatur.

PIPER FASCICULATUM.

- ✓ 24. P. foliis cordato-reniformibus acuminatis 19nervibus, pedunculis polystachyis, spicis fasciculatis inaequalibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 38. Ic. LIX. fig. a. PIPER (peltatum). LINN. Sp. plantar. p. 77. LOMBA. RUMPH. Amb. 6. p. 133. tab. 59. fig. 1.*

FRUTEX biorgyalis.

HABITAT in silvis Cuchero et Machaynio.

FLORET Julio, et Augusto.

Obs. In Prodrumi Florae Peruv. et Chil. observatione IV post characterem genericum *Peperomiae* hanc Speciem *Piper reniforme* appellavimus.

HABITUS.

Frutices aut *Arbusculae* aromaticae, rarissimè inodoraе. *Radices* ramosae, fibrillosae in verticillos. *Caules* erecti, teretes, articulati, nodosi. *Rami* subdivisi, plus minusve flexuosi. *Gemmae* ex spicarum axillis. *Folia* alterna, petiolata, aspera aut lae-

via, glabra aut pubescentia, vel hispida, venosa aut nervosa; nervis alternis, aliquando basi coeuntibus; basi saepius inaequalia, apice obliqua, acuminata, saepe acuta, integerrima, oculo armato pellucido-punctata: in nonnullis Speciebus utrinque punctis fuscis notata. *Petioli* subvaginantes. *Spathae* parvae, convolutae, caducae. *Spicae* pedunculatae, oppositifoliae, solitariae: in *Pip. polystachyo* numerosae, erectae aut dependentes, rectae aut recurvae, breves vel longissimae, cylindricae aut subulatae. *Flosculi* ferè anulatim dispositi. *Squamae* cuneiformes, coronatae margine orbiculari, ciliato, glabro aut villoso, sive denticulato, vel integerrimo: in *Pip. subulato* Squamae subrotundae: in *Pip. ovali* Squamae ovatae, acutae; *Stylus* unicuique; *Stigmata* tria, villosa, hispida aut glabra, brevia aut longa: In *Pip. ovali* Stigmata duo.

GUNNERA.

LINN. Gen. pl. p. 607. Flor. Per. et Chil.
tom. 1. pag. 29.

GUNNERA SCABRA.

1. G. foliis lobatis, petiolis granulosis, thyr-
sis magnis. Flor. Per. et Chil. tom. 1.
pag. 29. ICON. XLIV. fig. a. PANKE
Anapodophylli folio. FEWILL. Per. t. 2.
pag. 741. planch. 30. PANKE tinctoria.
MOLINA Comp. Hist. natur. Regn. Chil.
tom. 1. pag. 150.

PLANTA perennis, succosa, scabra.

HABITAT in stagnatis, scaturiginibus, palu-
dibus et uliginosis locis Conceptionis Chile
et in Muña vico Regni Peruviani versùs
Tambo nuevo viam.

FLORET Septembri, et Octobri.

VERNACULE Panke et Pangue. Petioli teneri
Nalcas; adulti verò Raguayes à Chilen-
sibus nuncupatur.

VIRES ET USUS; Incolae petiolos teneros à

cortice mundatos , jucundè comedunt.
Mucilago plantae tenerae dorso et renibus
 applicitus, febrium ardores compescit. *Ra-*
dicis decoctum interius propinatum diar-
 rhoeas et haemorrhagias sistit. Coriarii ad
 pelles concinnandas loco *Rhuis coriariae*
 radice utuntur, et tinctorum hac ipsa cocta
 cum terra nigra *Robo* nuncupata, illas ni-
 gro colore inficiunt.

Obs. *Gunnera* antequam *Piperes* post *Sal-*
vias in hoc Compendio collocanda est.

CLASSIS III.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

VALERIANA.

LINN. *Gen. plant. pag. 29.**VALERIANA RIGIDA.*

1. *V.* acaulis, floribus triandris, foliis linearilanceolatis coriaceis mucronatis, corollis trifidis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 39.*
ICON. LXV. fig. c.

PLANTA acaulis (*Valerianae tenuifoliae* valde affinis), in stellae formam patens.

HABITAT in alpibus *Tarmae* ad *Bombom*.

FLORET Octobri, et Novembri.

VALERIANA TENUIFOLIA.

2. *V.* acaulis, floribus triandris, foliis linearisubulatis gracilibus, corollis trifidis. *Fl. Per. et Chil. t. 1. p. 39.* *IC. LXV. fig. d.*

PLANTA acaulis, perennis.

HABITAT in alpibus *Tarmæ* ad *Huassahuasi*, et in Provincia *Huaroherí*.
FLORET Novembri, et Decembri.

VALERIANA PILOSA.

3. V. floribus triandris, foliis lineari-lanceolatis integerrimis, marginibus revolutis. *Fl. Per. et Chil. t. I. p. 39. Ic. LXVI. f. a.*
 PLANTA herbacea, tripalmaris, (*Plantaginis albicantis* habitu).

HABITAT in frigidis locis *Tarmæ* Provinciae.
FLORET à Majo ad Augustum.

VALERIANA CONNATA.

4. V. floribus triandris, foliis lanceolatis connatis integerrimis, spicis verticillatis.
Flor. Per. et Chil. tom. I. pag. 39. Icon. LXVII. fig. c.

PLANTA suffruticosa, bipedalis.
HABITAT in frigidis locis *Bombom* ad *Diezmo*.
FLORET Majo, et Junio.

VALERIANA COARCTATA.

5. V. floribus triandris, foliis lanceolato-

spathulatis integerrimis margine denticulatis ciliatis, spicâ conicâ coarctatâ. *Flor.*

Per. et Ch. t. 1. p. 40. Ic. LXVIII. f. a.

PLANTA herbacea, ferè pedalis.

HABITAT in altis frigidis *Huassahuassi*.

FLORET Novembri, et Decembri.

VERNACULE *Huarituru* dicitur.

VIRES: Ad fracturas specificum remedium perhibetur radix exactè contusa.

VALERIANA SERRATA.

6. V. floribus triandris, foliis lanceolato-spathulatis supernè serratis, spicis verticillatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 40.*

Icon. LXVIII. fig. c.

PLANTA caespitosa, palmaris.

HABITAT in locis frigidis *Caxatamba* ad *Cheuchin*, et in subalpinis *Tarmae*.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VALERIANA SPATHULATA.

7. V. floribus triandris, foliis spathulatis sublinearibusque obtusis, corollis trifidis, umbellâ sessili involucriatâ. *Flor. Per. et*

Chil. tom. I. pag. 40. Ic. LXVIII. f. b.

PLANTA caespitosa, ferè palmaris.

HABITAT in *Tarmae* alpibus versùs *Bombom*.

FLORET Januario, et Februario.

VALERIANA OBLONGIFOLIA.

8. V. floribus triandris, foliis oblongis dentatis, corymbo terminali. *Flor. Per. et*

Chil. t. I. pag. 40. Icon. LXV. fig. a.

PLANTA bipalmaris, herbacea, pilosa.

HABITAT in alpibus *Tarmae* versùs *Pasco*.

FLORET Aprili, et Majo.

VALERIANA PINNATIFIDA.

9. V. floribus triandris corymbosis, foliis infimis lanceolatis integerrimis; reliquis pinnatifidis laciniatis, paniculâ brachiatâ. *Fl.*

Per. et Ch. t. I. p. 40. Ic. LXIX. fig. b.

PLANTA herbacea, succosa, annua.

HABITAT in collibus altis *Limae* et *Chancay*.

FLORET Majo, et Junio.

VALERIANA OFFICINALIS.

10. V. floribus triandris, seminibus papposis,

PARS II.

aaa

foliis omnibus pinnatis. LINN. *Sp. plantar.*
pag. 45. Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 41.
HABITAT in collibus *Limae* et *Chancay*.
FLORET Majo, et Junio.

VALERIANA PHU.

11. V. floribus triandris, foliis caulinis pinnatis; radicalibus indivisis. LINN. *Sp. pl.*
pag. 45. Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 41.
HABITAT in *Peruviae* collibus ad *Cercado* et
Chancay Provincias et ad *S. Jacobi Chilensis* urbem.
FLORET Octobri, et Novembri.

VALERIANA HYALINORRHIZA.

12. V. floribus triandris, foliis radicalibus subrotundis crenatis, caulinis pinnatifido-dentatis, paniculâ terminali. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 41. Ic. LXVII. f. b.*
PLANTA herbacea, semipedalis, pubescens.
HABITAT in arenosis locis *Conceptionis Chile*.
FLORET Septembri, Octobri et Novembri.

VALERIANA CRISPA.

13. V. floribus triandris, foliis inferioribus ovato-oblongis serratis; caulinis subpinnatis: foliolis lanceolatis, racemis dichotomis.

Flor. Per. et Chil. tom. 1 pag. 41.

PLANTA herbacea, bipedalis, annua.

HABITAT in pratis et arvis *Conceptionis Chile.*

FLORET Octobri, et Novembri.

VALERIANA CORNUCOPIAE.

14. V. floribus diandris ringentibus, foliis ovatis sessilibus. LINN. *Sp. pl. t. 1. p. 44.*

HABITAT in Regni *Chilensis* locis arenosis.

FLORET Octobri, et Novembri.

VALERIANA PANICULATA.

15. V. floribus triandris, foliis radicalibus indivisis cordatis acutis; caulinis pinnatis, paniculâ diffusâ. *Flor. Per. et Chil. t. 1. pag. 41. ICON. LXX. fig. a.*

PLANTA herbacea, ferè bipedalis, villosa.

HABITAT in locis uliginosis et petrosis *Muña.*

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE Macaë nuncupatur.

VALERIANA LACINIATA.

16. V. floribus triandris, foliis radicalibus simplicibus; caulinis impari-pinnatis: foliolis laciniatis, pedunculis 5-12 floris. *Fl.*

Per. et Ch. tom. 1. p. 42. Icon. LXIX.

fig. a. VALERIANA (chaerophylloides).

SMITH. fasc. 3. pag. 55. Icon. 53.

PLANTA bipedalis, succosa, glabra, annua.

HABITAT in collibus *Limae* et *Chancay* inter rupes, affatim in nemoribus *Chinchao*,

Cuchero, *Pillao* et *Muña*.

FLORET à Majo ad Septembrem.

VULGO Arvegilla nuncupatur.

USUS: Incolae hanc Plantam in manipulos redactam, et inter calidos cineres leviter torrefactam, ad morbosa grana seu eruptiones cutaneas inflammatorias ab umbra arboris *Mayco* nuncupatae provenientes, extirpandas, partibus malè affectis non sine emolumento applicant, quod in nobismetipsis experti sumus.

VALERIANA INTERRUPTA.

17. V. floribus triandris, foliis pinnatifido-laciniatis interruptis; laciniis dentiformibus, corymbis terminalibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 42. ICON. LXVII. fig. a.*

PLANTA herbacea, pedalis, glabra.

HABITAT in *Tarmae* alpibus ad *Diezmo*.

FLORET Aprili, et Majo.

VALERIANA DECUSSATA.

18. V. floribus triandris, foliis impari-pinnatis: foliolis lanceolatis; intimis minimis, paniculâ decussatâ, pedunculis dichotomis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 42. ICON. LXX. fig. b.*

PLANTA herbacea, tripedalis, incana.

HABITAT in *Huanuci* petrosis locis.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VALERIANA VIRGATA.

19. V. floribus triandris, foliis pinnatis: foliolis bi-trifidis, laciniis linearibus, paniculâ subcorymbosâ. *Flor. Per. et Chil. t. 1.*

pag. 42. ICON. LXVI. fig. b.

PLANTA tripedalis, suffruticosa, glabra (*Tagetis minutae* habitu).

HABITAT in *Cantae* Provinciae praeruptis.

FLORET Martio, Aprili et Majo.

VALERIANA GLOBIFLORA.

20. V. floribus triandris, foliis pinnatis: foliolis sinuato-dentatis, bracteis spathulatis, capitulis globosis. *Flor. Per. et Chil. t. 1.*

pag. 43. ICON. LXV. fig. b.

PLANTA herbacea, pilosa, humilis.

HABITAT in alpihus *Cantae* et *Tarmae*.

FLORET Majo, et Junio.

COMMELINA.

LINN. *Gen. plant. pag. 38.*

COMMELINA HISPIDA.

1. C. corollis aequalibus, foliis ovato-lanceolatis obtusis hispidiusculis margine scabris, pedunculis subquinquefloris. *Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 43. ICON. LXXIII. fig. a.*

PLANTA herbacea , sesquiulnaris.

HABITAT in collibus arenosis *Atiquipae*, vulgò *Lomas* dictis.

FLORET Junio , Julio et Augusto.

COMMELINA FASCICULATA.

2. C. corollis aequalibus , foliis lanceolatis acutis , vaginis ciliatis , caule assurgenti , radice fasciculatâ. *Flor. Per. et Chil. t. 1. pag. 44. Icon. LXXII. fig. b.*

PLANTA herbacea , pedalis , perennis.

HABITAT in collibus *Chancay* et *Limae*.

FLORET Augusto , et Septembri.

COMMELINA GRACILIS.

3. C. corollis aequalibus , foliis ovatis acutis margine scabris , vaginis longis ciliatis , caule repente. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 44. Icon. LXXII. fig. a.*

PLANTA herbacea , bipedalis , glabra.

HABITAT in humidis locis *Huanuci* et *Limae*.

FLORET per totum annum.

COMMELINA NERVOSA.

4. *C. corollis subaequalibus, foliis lanceolatis 16nervibus, vaginis hirsutis, caule erecto. Flor. Per. et Chil. tom. 1.*

PLANTA herbacea, tripedalis, perennis.

HABITAT in Cuchero nemoribus umbrosis.

FLORET Julio, et Augusto.

HIPPOCRATEA.

LINN. Gen. plant. pag. 34. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 44.

HIPPOCRATEA VIRIDIS.

1. *H. corymbis dichotomis: foliis ovatis obtusè acuminatis. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 44. Icon. LXXIV. fig. a.*

FRUTEX scandens, triorgyalis, glaber.

HABITAT in Andium nemoribus ad Pozuzo.

FLORET Septembri, et Octobri.

CALLISIA.

LINN. Gen. plant. pag. 39.

CALLISIA REPENS.

1. C. foliis cordatis vaginantibus, vaginis subtrifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 45. ICON. LXXIII. fig. b. CALLISIA (repens). JACQ. Pict. p. 12. t. 14. LINN. Sp. pl. tom. 1. pag. 116.*
 PLANTA herbacea, pedalis, glabra, repens.
 HABITAT ad urbem Huanuci sub fruticibus.
 FLORET Majo, Junio et Julio.

XYRIS.

LINN. Gen. plant. pag. 39. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 46.*

XYRIS SUBULATA.

1. X. spica 2-3flora, scapo unifolio, foliis subulatis. *Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 46. ICON. LXXI. fig. b.*
 PARS II. bbb

PLANTA herbacea , caespitosa.

HABITAT in altis frigidis et humidis *Pillao*.

FLORET Augusto , et Septembri.

Obs. Scapus aliquando bifolius.

CYPERUS.

LINN. *Gen. plant. pag. 41.*

CYPERUS NIGER.

1. C. culmo triquetro nudo glabro , umbellâ foliosâ , pedunculis plurimis longis , spicis laxis nigricantibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 47.*

CYPERUS STRIATUS.

2. C. culmo tereti leviter striato retrorsum scabro , foliis subulatis canaliculatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 47.*

PLANTA herbacea.

HABITAT in collibus aridis *Tarmae*.

FLORET Februario , et Martio.

SCIRPUS.

LINN. *Gen. plantar. pag. 41.*

SCIRPUS FRAGRANS.

1. S. culmo tereti striato nudo, spicis ovatis pedunculatis inaequalibus; terminalibus umbellatis. *Fl. Per. et Chil. t. 1. p. 47.*

PLANTA herbacea, caespitosa.

HABITAT in montibus Pillao ad Iscutúnam.

FLORET Septembri, et Octobri.

DIGYNIA.

MILIUM.

LINN. *Gen. plant. pag. 47.*

MILIUM NIGRICANS.

1. M. floribus paniculatis confertis, valvulis calycinis nitidis nigrescentibus, foliis ensiformibus longissimis latis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 47.*

PLANTA herbacea , biorgyalis.

COLITUR in *Pillao* , *Cuchero* et *Vitoc* silvis.

FLORET Octobri, et Novembri.

VERNACULE *Maiz de Guinea* vocatur.

USUS: E seminibus torrefactis, quae Peruviani *Camcha* appellant, albissimam farinam praeparant, quâ potum *Ullpu* dictum, et cibum *Mazamorra* nuncupatum, conficiunt.

PASPALUM.

LINN. *Gen. plant.* pag. 46.

PASPALUM PURPUREUM.

1. P. culmis internè divisis, paniculâ oblongâ, spicis linearibus, floribus secundis bifariam imbricatis. *Flor. Per. et Chil. t. 1. pag. 47. MILIUM (latifolium). CAVAN. vol. 3. pag. 37. tab. 273.*

PLANTA herbacea, laevis, glabra.

HABITAT in *Peruviae* cultis, et in Hort.

Reg. Matritensi singulis annis colitur è seminibus missis per nosmetipsos.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE *Maizillo* dicitur.

USUS: Haec utilissima planta, quae praestantissimum pabulum belluis suppeditat, inter segetes *Limae*, *Chancay*, *Huanuci* caeterisque locis calidis et maritimis inter Medicam sativam copiosè crescit, ibique ter ad annum metitur; quapropter per Europam ad eosdem usus propagari meretur.

Obs. Hoc Genus *Milio* valde affine est atque adeò in unum idemque haec duo Genera redigi debere, existimat Jos. PAVON.

PANICUM.

LINN. *Gen. plant. pag. 46.*

PANICUM PURPUREUM.

1. *P. spicâ tereti, involucris 12setis inaequalibus flosculo majoribus unifloris, culmo tereti ramoso. Fl. Per. et Ch. t. 1. p. 48.*

PLANTA herbacea, quadripedalis.

HABITAT in praeruptis *Tarmae* ad *Acobamba*.

FLORET Majo, et Junio.

BRIZA.

LINN. *Gen. plantar. pag. 46.*

BRIZA MEDIA.

1. B. spiculis ovatis, calyce flosculis brevior.
 re. LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag. 103.*

HABITAT in campis *Tarmae* et *Chile*.

FLORET Aprili, et Majo.

TRIGYNIA.

MOLLUGO.

LINN. *Gen. plantar. pag. 58*

MOLLUGO RADIATA.

1. M. caulibus procumbentibus radiatis, foliis obovatis acuminatis. *Flor. Per. et Ch. tom. 1. pag. 48.*

PLANTA herbacea, spithamea.

HABITAT in inundatis locis *Conceptionis Chile* ad *Mochita* et *Carcamo* tractus.

FLORET Februario, et Martio.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

SCABIOSA.

LINN. *Gen. plantar. pag. 64.*

SCABIOSA SYMPAGANTHERA.

1. *S.* corollis quinquefidis, calyce proprio unico membranaceo, foliis inferioribus spatulato-cuneiformibus supernè laciniatis.

Flor. Per. et Chil. tom. I. pag. 49.

ICON. LXXVI. *fig. a.*

PLANTA herbacea, bipedalis.

HABITAT in arenosis *Conceptionis Chile* ad *Gavilan* tractum et *Penco el viejo* viam.

FLORET Novembri, et Decembri.

Obs. Calycem exteriorem proprium nullum offendimus.

ALLIONIA.

LINN. *Gen. plantar.* pag. 65.

ALLIONIA INCARNATA.

1. A. foliis obliquè ovato-cordatis; altero majori, calycibus triphyllis. *Flor. Per. et Ch. t. 1. pag. 49.* ALLIONIA (*incarnata*).

LINN. *Sp. plant. t. 1. p. 289.* L'HERIT. *fasc. 4. pag. 63. t. 31.* WEDELIA. LOEFLING. *it. 180.*

PLANTA herbacea, prostrata, diffusa.

HABITAT in arenosis ad Huanuci urbem.

FLORET Novembri, et Decembri.

CALLICARPA.

LINN. *Gen. plantar.* pag. 73.

CALLICARPA GLOBIFLORA.

✓ 1. C. foliis oblongo-lanceolatis dentato-serratis integerrimisque, cymis dichotomis. *Fl. Per. et Ch. t. 1. p. 49.* Ic. LXXVII. f. b.

FRUTEX triorgyalis, glaber.

HABITAT in Chinchao nemoribus.

FLORET Octobri, et Novembri.

CALLICARPA CORDIFOLIA.

2. C. foliis cordatis ovatisque acutis integer-
rimis, cymis brachiatis. Flor. Per. et Chil.

tom. I. pag. 50. ICON. LXXVII. fig. a.

FRUTEX triorgyalis, hirsutus.

HABITAT in Muña nemoribus.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Obs. Ad hoc Genus referendae sunt Mana-
bea villosa, arborescens et laevis. AUBLET.

pag. 61. 64. 66. planch. 23. 24. 25.

ÆGIPHILA.

LINN. Gen. plantar. pag. 73.

ÆGIPHILA MULTIFLORA.

1. Æ. foliis oblongis, floribus axillaribus
congestis. Flor. Per. et Chil. t. I. p. 50.

ICON. LXXVI. fig. b.

FRUTEX triorgyalis (Corni habitu).

PARS II. CCC

HABITAT in circumvicinia *Chaclla*, *Huasahuassi* et *Pillao* ad fluviorum margines.

FLORET Octobri et Novembri, quo tempore folia etiam explicantur.

VERNACULE *Utcus* nominatur.

USUS: Lignum durissimum, ex quo stapedae optimae conficiuntur.

SCOPARIA.

LINN. *Gen. plantar. pag. 77.*

SCOPARIA *DULCIS*.

- ✓ 1. S. foliis ternis lanceolato-linearibus supernè serratis deorsum attenuatis. *Flor. Per. et Chil. tom. I. p. 50. SCOPARIA (dulcis).*
 LINN. *Sp. pl. p. 116.*

PLANTA herbacea, tripedalis.

HABITAT in ripis et arenosis *Limae*, *Chancay* et *Cuchero*.

FLORET à Majo ad Augustum.

VULGO *Escobilla* appellatur.

PLANTAGO.

LINN. *Gen. plantar. pag. 77.*

PLANTAGO HIRSUTA.

1. P. foliis lanceolato-linearibus trinerviis,
denticulis rarissimis, spicâ ovato-cylindri-
câ. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 51.*
ICON. LXXVIII. *fig. a.*

PLANTA herbacea, densè hirsuta, incana.

HABITAT in collibus *Limae*, *Chancay* et
Tarmae.*FLORET* Septembri, et Octobri.*Obs.* Affinis *Plantagini albicanti*.

PLANTAGO HISPIDULA.

2. P. acaulis, foliis linearibus integerrimis,
scapis longissimis scabris, spicâ oblongâ.
Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 51.
ICON. LXXVIII. *fig. b.*

PLANTA herbacea, leviter pubescens.

HABITAT in *Chile* locis arenosis.*FLORET* Novembri, et Decembri.

PLANTAGO SERICEA.

- ✓ 3. P. caule decumbente suffruticoso, foliis lineari-subulatis incurvis sericeis, spicâ ovatâ. *Flor. Per. et Chil. tom. I. pag. 51.*
 + ICON. LXXIX. fig. b.

PLANTA caespitosa, tomentoso-sericea.

HABITAT in collibus altis aridis *Tarmæ.*

FLORET Majo, et Junio.

PLANTAGO CONGESTA.

4. P. caule suffruticoso patenti, foliis lineari-subulatis patulis villosis, spicâ ovato-oblongâ. *Flor. Per. et Chil. tom. I. p. 51.*
 ✓ ICON. LXXIX. fig. a.

PLANTA suffruticosa, caespitosa.

HABITAT in collibus aridis *Tarmæ.*

FLORET Majo, et Junio.

BUDDLEJA.

LINN. Gen. plantar. pag. 76. Flor. Per. et

Chil. tom. 1. pag. 52.

BUDDLEJA INCANA.

1. B. foliis oblongis lanceolatisque crenulatis,
stipulis marginalibus, pedunculis ternatim
divisis, floribus capitatis. *Fl. Per. et Chil.*

tom. 1. pag. 52. Icon. LXXX. fig. b.

ARBOR sexorgyalis.

HABITAT in Peruviae ripis Cantae, Huaro-
cherí, Tarmae et Huanuci.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VERNACULE Quisuar et Quisdar nuncupatur.

USUS: Lignum valde durum, et ad varia uten-
silia perutile.

BUDDLEJA GLOBOSA.

2. B. foliis lanceolato-ovatis acutissimis cre-
natis, stipulis marginalibus, capitulis glo-
bosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 52.*

Icon. LXXXIII. fig. a. BUDDLEJA (ca-

pitata). JACQ. *Collect. vol. 2. pag. 32.*
et Ic. rar. PALQUIN. FEWILL. Per. t. 3.
pag. 51. planch. 38.

FRUTEX biorgyalis, incanus.

HABITAT in umbrosis silvis Regni Chilensis
 et in hortis Conceptionis urbis.

FLORET Novembri, et Decembri. In Reg.
 Hort. Mat. ubi Semina perficere nequit,
 colitur sub dio et floret Majo et Junio.

VERNACULE *Pagnhin*, à Fewille *Palquin*.

Usus: Foliorum pulvis ad ulcera cicatrisan-
 da inservit.

BUDDEJA CONNATA.

3. B. foliis lanceolatis connatis crenatis, stipu-
 lis reniformibus, pedunculis solitariis ca-
 pitatis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 52.*

ICON. LXXXI. *fig. b.*

PLANTA frutescens, orgyalis.

HABITAT in *Chancay* segetibus et versuris.

FLORET Decembri, et Januario.

BUDDEJA DIFFUSA.

4. B. foliis ovatis subcordatisque acutis, sti-

pulis reniformibus reflexis , pedunculis
axillaribus , floribus capitatis. *Flor. Per.*
et Chil. tom. 1. p. 53. Ic. LXXX. fig. a.

PLANTA frutescens , subscandens.

HABITAT in circuitu *Huanuci* ad agrorum
margines.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE *Quisoar* appellatur.

BUDDLEJA AMERICANA.

5. B. foliis ovato-lanceolatis serratis stipula-
tis subreniformibus revolutis , racemis
compositis subpaniculatis. *Flor. Per. et*
Chil. tom. 1. pag. 53. Icon. LXXXII.
fig. b. LINN. Sp. pl. pag. 317. Verbasci
folio minore arbor, floribus spicatis luteis,
seminibus singulis oblongis in singulis vas-
culis siccis. SLOANE. *Jam. hist. 2. p. 29.*
t. 173. fig. 1.

PLANTA frutescens , ferè orgyalis , incana.

HABITAT in *Muña* runcationibus.

FLORET à Junio ad Septembrem.

BUDDLEJA OCCIDENTALIS.

- + 6. B. foliis lanceolatis acutis serratis integer-
rimisque, stipulis obsoletis, floribus pa-
niculatis, spicis verticillatis. *Flor. Per.*
et Chil. tom. 1. pag. 53. Ic. LXXXII.
fig. a. LINN. Sp. pl. tom. 1. pag. 317.

PLANTA frutescens, biorgyalis.

HABITAT in circuitu *Limae* et *Chancay*.

FLORET per totum ferè annum.

BUDDLEJA SPICATA.

- + 7. B. foliis ovatis utrinque acutis serratis, sti-
pulis marginalibus, spicis longissimis sim-
plicibus. *Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 53.*
Icon. LXXXI. fig. a.

PLANTA frutescens, triulnaris, albicans.

HABITAT in versuris et aridis locis *Muña*.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

OLDENLANDIA.

LINN. *Gen. plantar. pag. 83.*

OLDENLANDIA UNIFLORA.

1. O. fructibus hispidis, pedunculis unifloris,
caule repente, foliis ovatis. *Flor. Per. et
Chil. tom. 1. pag. 57. LINN. Sp. plant.
pag. 337.*

PLANTA herbacea, repens.

HABITAT in Regni Chilensis locis humidis et
scaturiginibus prope Conceptionis urbem
ad Nonguen, Andalien et Palomares
tractus.

FLORET Februario, et Martio.

MANETTIA.

LINN. *Gen. plant. pag. 75. Flor. Per. et
Chil. tom. 1. pag. 58.*

MANETTIA UMBELLATA.

1. M. foliis ovatis subcordatisque, stipulis
connatis acuminatis, pedunculis umbella-

PARS II.

ddd

✓
+

tis multifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 1.*
pag. 58. Icon. XC. fig. a.

PLANTA scandens, glabra, nitida.

HABITAT in *Muña* nemoribus.

FLORET Septembri, et Octobri.

MANETTIA RACEMOSA.

- ✓ 2. M. foliis ovatis oblongisque acuminatis,
 stipulis semicircularibus, pedunculis bi-
 multifloris. *Fl. Per. et Chil. t. 1. p. 58.*
 + *Icon. LXXXIX. fig. a.*

PLANTA volubilis, pubescens, 2-4ulnaris.

HABITAT in nemoribus *Cuchero* et *Chinchao*,
 ad *Casape*, *Macora*, *Marimarchahua* et
Hualqui praedia.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Obs. Calyx plerumque 4-5partitus, saepe
 8-10partitus: numerus frequens quinarius
 in calyce, corolla et staminibus.

MANETTIA ACUTIFOLIA.

- ✓ 3. M. foliis lanceolatis acutissimis, stipulis
 + connatis acuminatis, pedunculis 1-3floris.

Flor. Per. et Chil. tom. I. pag. 58.

ICON. LXXXIX. *fig. b.*

PLANTA volubilis, glabra.

HABITAT in nemoribus *Acomayo* et *Pati*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

HABITUS.

Plantae volubiles aut scandentes. *Caules* ramosissimi, teretes. *Folia* opposita, petiolata, integerrima. *Stipulae* interfoliaceae cum petiolis in vaginam connatae. *Pedunculi* axillares, solitarii, uni-multiflori, bracteati.

Obs. 1. *Plantae Portlandiis* valde affines; et praesertim calyce, pericarpio, seminibus et receptaculis. Differunt *Portlandiae* à *Manettiis* corollâ ad medium 5 partitâ, limbo magno, filamentis ad basim corollae insertis longitudine tubi, antheris longissimis exsertis, stigmate lineari, leviter bifido.

Ob. 2. Ad hoc Genus referenda est *Nacibea*. AUBLET. *Guyan. tab. 37.* quod jam fecit Schreberus in suis *Generibus Planta-*

rum. Nectarium *Manettiae*, sive Margo receptaculum ambiens, nihil aliud esse videtur, quàm vestigium corollae. Capsula verè bilocularis.

HEDYOTIS.

LINN. Gen. plantar. pag. 66. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 56.

HEDYOTIS THYMIFOLIA.

✓ 1. H. foliis linearibus, marginibus revolutis, floribus corymbosis. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 56. Ic. LXXXVIII. fig. a.
+ PLANTA fruticosa, bipedalis.
HABITAT in collibus altis *Tarmae* et *Cheuchin*.
FLORET Aprili, Majo et Junio.

HEDYOTIS SETOSA.

✓ 2. H. foliis ovatis acutis cum acumine petiolatis, floribus terminalibus ternis. Fl. Per. et. Ch. t. 1. p. 57. Ic. LXXXVIII. f. b.
+ PLANTA fruticosa, quadripedalis.
HABITAT in *Andium* montibus ad *Churupal*.

lana tractum in *Tarmae* Provincia.

FLORET Novembri, et Decembri.

HEDYOTIS FILIFORMIS.

3. *H.* foliis linearibus acuminatis, caule ramosissimo filiformi repente, floribus solitariis terminalibus. *Fl. Per. et Chil. t. 1. pag. 57. ICON. LXXXVII. fig. b.*

PLANTA herbacea, repens (habitu *Galii*).

HABITAT in *Andium* alpibus ad *Torrehuassi*, *Silcai*, *Saria* et *Achapatuman*.

FLORET Junio, et Julio.

HEDYOTIS CONFERTA.

4. *H.* foliis linearibus acuminatis, caule ramosissimo repente, floribus terminalibus solitariis. *Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 57. ICON. LXXXVII. fig. a.*

PLANTA suffruticosa, repens.

HABITAT in alpibus *Cantae* et *Tarmae* ad *Hacaybamba*, *Collquihirca* et *Colis fodina*, vulgò *Mineral del Cerro de Yauricocha*.

FLORET Aprili, et Majo.

HEDYOTIS JUNIPERIFOLIA.

✓ 5. H. foliis linearibus margine revolutis, caule ramosissimo, floribus terminalibus ternis.

✚ *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 57.*

ICON. LXXXVII. fig. c.

PLANTA suffruticosa, procumbens.

HABITAT in *Tarmae* et *Cantae* frigidis locis, vernaculè *Punas* dictis, versùs *Palcama-yo*, *Casacamcha* et *Lauricocha*, ex quo lacu *Marañon* fluvius originem ducit.

FLORET Martio, et Aprili.

HABITUS.

Plantae fruticosae aut herbaceae. *Caulis* erectus vel procumbens, ramosissimus, tetragonus aut teres. *Rami* confertissimi. *Folia* opposita. *Stipulae* interfoliaceae. *Pedunculi* terminales, solitarii, terni, quaterni; uni-quinqueflori.

GALIUM.

LINN. *Gen. plant. pag. 69.*

GALIUM HIRSUTUM.

1. G. foliis quaternis lanceolatis aequalibus, caule ramosissimo, pedunculis unifloris, fructibus scabris. *Flor. Per. et Chil. t. 1. pag. 59.*

PLANTA herbacea, pedalis, hirsuta, procumbens, annua.

HABITAT in *Cantae* umbrosis versùs *Culluay*, *S. Buenaventura* et *Obragillo* vicos.

FLORET Majo, Junio et Julio.

GALIUM CORYMBOSUM.

2. G. foliis quaternis lanceolato-oblongis ciliatis, ramulis corymbosis, pedunculis unifloris, fructibus glabris. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 59.*

PLANTA herbacea, repens, annua.

HABITAT in alpibus *Tarmae* ad *Bombom*, vel potius *Pumpum Pampas* ab Indis verna-

culè sic nominatum , id est, tractum planum extensissimum tempestatibus expositum.

FLORET Martio , et Aprili.

Obs. Radices et Caules post exsiccationem inter papyros adservati colore rubro eas tingunt.

GALIUM CILIATUM.

3. *G.* foliis quaternis lanceolatis ciliatis aequalibus reflexis , pedunculis tetraphyllis unifloris , fructibus glabris. *Flor. Per. et Chil. tom. I. pag. 59.*

PLANTA herbacea , glabra , procumbens.

HABITAT in collibus aridis et declivibus *Tarmae* , *Chancay* et *Cheuchin*.

FLORET Januario , Febuario et Martio.

GALIUM OVALE.

4. *G.* foliis quaternis oblongo-ovalibus acuminatis aequalibus , caule diffuso , pedunculis unifloris , fructibus glabris. *Fl. Per. et Chil. tom. I. pag. 59.*

PLANTA herbacea , scandens , hirsuta.

HABITAT in versuris et ruderatis *Chancay*,
Huanuci et *Limae* ad *Surco* viam.
FLORET Febuario, et Martio.

GALIUM LAPPACEUM.

5. *G.* foliis quaternis hispidis oblongis acumina-
 tis, pedunculis unifloris, fructibus lap-
 paceis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 59.*

PLANTA herbacea, subscandens.

HABITAT in circuitu *Huanuci* ad *Puelles*.

FLORET Aprili, et Majo.

GALIUM CROCEUM.

6. *G.* foliis quaternis linearibus ciliatis subtus
 scabriusculis, pedunculis unifloris, fructi-
 bus glabris rubris. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 1. pag. 59.

PLANTA herbacea, prostrata.

HABITAT in declivibus aridis *Tarmae* et
Huanuci, passim ad *Rondos* vicum.

FLORET Januario, et Febuario.

GALIUM MUCRONATUM.

7. *G.* foliis quaternis linearibus mucronatis

aequalibus, corollis quadrifidis, fructibus
glabris lacteis. *Fl. Per. et Ch. t. 1. p. 60.*

PLANTA herbacea, diffusa.

HABITAT in aridis *Tarmae* ad *Curis* tractus.

FLORET Februario, et Martio.

SPERMACOCE.

LINN. *Gen. plant. pag. 66. Flor. Per. et
Chil. tom. 1. pag. 60.*

SPERMACOCE CORYMBOSA.

✓ 1. S. foliis lanceolatis nervosis plicatis, flori-
bus dichotomo-corymbosis terminalibus.

+ *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 60.*

ICON. XCI. *fig. a.*

PLANTA suffruticosa, bipedalis.

HABITAT in *Muña* ruderatis ad *Rinconada*.

FLORET Julio, et Augusto.

SPERMACOCE ASSURGENS.

✓ 2. S. foliis lanceolatis lineatis margine sca-
bris, verticillis parvis. *Flor. Per. et Chil.*

+ *t. 1. p. 60. Ic. XCII. f. c. ANONYMOS*

(*americana*) foliis *Parietariae* scabris, floribus albis ad foliorum ortum vix conspicuis. PLUKEN. *Alm.* 53. t. 136. fig. 4.

PLANTA perennis, sesquipedalis.

HABITAT in ruderatis *Limae*, et *Huanuci*.

FLORET per totum annum.

VERNACULE in Huanuco *Uspica* appellatur.

Obs. *Anonymos americana* PLUKEN. potius cum hac planta convenit, quam cum *Spermacoce tenuiori* LINN. et cum *Spermacoce verticillis tenuioribus* DILLENII *Hort. Elth.* p. 370. t. 277. f. 359. ideoque cum *Sperm. nostra* conjungenda videtur.

SPERMACOCE CAPITATA.

3. S. foliis lanceolatis, verticillis globosis. ✓

Flor. Per. et Chil. tom. I. pag. 61.

ICON. XCI. fig. b. +

PLANTA suffruticosa, procumbens.

HABITAT in montibus *Pillao* ad *Iscutúnam*.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

SPERMACOCE GRACILIS.

4. S. foliis lanceolatis angustis, ramis inferio- +

ribus oppositis; superioribus dichotomis,
verticillis minimis. *Flor. Per. et Chil. t. 1.*
pag. 61. Icon. XCII. fig. a.

PLANTA herbacea, semipedalis, glabra.

HABITAT in *Huanuci* montium declivibus.

FLORET per totum annum.

HABITUS.

Plantae suffruticosae aut herbaceae. *Caules*
erecti aut procumbentes. *Rami* tetragoni.
Folia connato-vaginantia, nervoso-lineata,
plicata. *Vaginae* ciliatae. *Flores* axillares
terminalesque, verticillati, capitati, vel
corymbosi.

CISSUS.

LINN. *Gen. plant. pag. 79. Flor. Per. et*
Chil. tom. 1. pag. 64.

CISSUS STRIATA.

1. *C. foliis digitatis, foliolis oblongo-lanceo-*
latis serratis, caule striato flexuoso, cymis
coarctatis. Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 64.

Icon. *C. fig. b.*

PLANTA frutescens, scandens.

HABITAT in Regni Chilensis silvis.

FLORET Octobri, et Novembri.

VERNACULE Voqui dicitur.

Obs. Voqui aut Vochi nomen non solum omni plantae scandenti, sed metaphoricè etiam obtrectatoribus Chilenses applicant.

CISSUS GRANULOSA.

2. C. caule angulato granuloso, foliis quinatis; foliolis obovatis dentatis, cymis patentibus. *Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 64.*
ICON. CI. fig. a.

PLANTA frutescens, scandens, glabra.

HABITAT in praeruptis Huassahuassi.

FLORET Decembri, et Januario.

CISSUS COMPRESSICAULIS.

3. C. foliis cordatis acutè serratis, floribus umbellatis, pedunculis dichotomis. *Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 64.* ICON. C. fig. a.

PLANTA pubescens, scandens.

HABITAT in Chancay, Chacahuassi, Limae, Surco et Magdalena versuris.

FLORET à Junio ad Octobrem.

CISSUS OBLIQUA.

✓ 4. *C. foliis binatis ternatisque serratis, lateralibus cordatis obliquis, intermedio ovali, floribus umbellato-corymbosis. Flor. Per. et Chil. t. I. pag. 65. ICON. CI. fig. b.*

PLANTA scandens.

HABITAT in praeruptis *Tarmae* ad *Huariaca*, *Rondos*, *Chaulan* et *Chaucha*.

FLORET Majo, et Junio.

HABITUS.

Plantae fruticosae, scandentes. *Caules* ramississimi, angulati aut striati. *Folia* alterna, petiolata, simplicia, binata, ternata aut digitata. *Cirrhi* oppositifolii, simplices aut bifurcati. *Pedunculi* oppositifolii aut terminales. *Flores* umbellati aut cymosi, bracteis minimis stipati, involucrati. *Involucrum* polyphyllum. *Baccae* dispermae aut tetraspermae.

RIVINA.

LINN. *Gen. plant. pag. 87.*

RIVINA SECUNDA.

1. R. foliis ovatis acuminatis obsolete denticulatis ciliatis, racemis longis, calyce bipartito bilabiato. *Flor. Per. et Ch. tom. 1. pag. 65. ICON. CII. fig. a.*

PLANTA suffruticosa, bipedalis, glabra.

HABITAT in silvis Pozuzo et Chacahuassi.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

DORSTENIA.

LINN. *Gen. plant. pag. 84.*

DORSTENIA TUBICINA.

1. D. scapis radicalibus, foliis cordato-oblongis denticulatis, receptaculis ovalibus basi subcompressis. *Flor. Per. et Chil. t. 1. pag. 65. ICON. CII. fig. b.*

PLANTA acaulis, lactaria.

HABITAT in montibus Chinchao per Mesapata et Macora runcationes.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

USUS: Radix ob fragrantiam, quam post exsiccationem, spirat, loco *Dorsteniae Contrayerbae* radice adhiberi potest.

ISNARDIA.

LINN. *Gen. plant. pag. 84. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 66.*

ISNARDIA SUBHASTATA.

✓ 1. I. foliis semiamplexicaulibus hastato-lanceolatis, floribus axillaribus solitariis sessilibus. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 66.*

+ ICON. LXXXVI. fig. b.

PLANTA suffruticosa, bipedalis, glabra.

HABITAT in locis stagnatis et paludosis Arnedo, Torreblanca, Esquivel et Retes.

FLORET Junio, et Julio.

ALCHEMILLA.

LINN. Gen. plant. pag. 88.

ALCHEMILLA TRIPARTITA.

1. A. foliis tripartitis, laciniis cuneiformibus
multifidis. *Flor. Per. et Chil. t. 1. p. 68.*

PLANTA perennis, pedalis, villosa, repens.

HABITAT in montibus frigidis et scaturigini-

bus *Pillao* et *Tarmae* ad *Huassahuassi*.

FLORET per totum ferè annum.

ALCHEMILLA ORBICULATA.

2. A. foliis orbiculato-reniformibus lobatis
serratis, floribus spicato-corymbosis. *Flor.*

Per. et Chil. tom. 1. pag. 68.

PLANTA perennis, stolonifera, villosa.

HABITAT in montibus frigidis et humidis *Pa-*

nao, *Chaclla* et *Pillao*.

FLORET per totum ferè annum.

ALCHEMILLA PINNATA.

3. A. foliis pinnatis, pinnulis bi-trifidis. *Fl.*

PARS II.

fff

Per. et Chil. tom. 1. pag. 69.

PLANTA stolonifera, pilosa.

HABITAT in montibus frigidis et humidis
Huariaca, Payanchacra et Pillao.

FLORET Septembri, et Octobri.

Obs. Tres nostrae *Alch.* Species diandrae et digynae sunt. Quosdam etiam flores gemellos, et nonnullos monogynos monospermos in eisdem tribus Speciebus observavimus.

ACAENA.

LINN. *Gen. plant. pag. 87. Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 66.*

ACAENA LAPPACEA.

1. A. caule erecto, foliis impari-pinnatis, foliolis oblongis obovatisque serratis, racemis paucifloris. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 66. Icon. CIII. fig. a.*

PLANTA suffruticosa, repens, villosa.

HABITAT in locis calidis et praeruptis *Tarmae ad Curis, Acobamba, Picoy et Tapu.*

FLORET Junio et Julio, et in Reg. Hort.

Matritensi eisdem mensibus floridam observavimus.

ACAENA ARGENTEA.

2. A. caule repente, foliis impari-pinnatis; foliolis ovato-oblongis, spicis globosis. *Fl. Per. et Chil. t. 1. pag. 67. Icon. CIII. fig. b. PROQUIN FEWILL. t. 3. pag. 55. planch. 41.*

PLANTA perennis, repens, samentosa, sericea. *HABITAT* abunde in locis uliginosis et arvis *Conceptionis Chile, Itatae et Puchacay.*

FLORET à Majo ad Septembrem.

VERNACULE *Broquin* nuncupatur.

VIRES ET USUS : Decoctum à Chilensibus praestantissimum diureticum et aperiens reputatur. Hujus Plantae succo ad ulcera oris sananda utuntur. Pulvis ad ulcera exsiccanda valet. Decoctum aut infusio in lue venerea opem fert.

ACAENA OVALIFOLIA.

3. A. caule repente, foliis impari-pinnatis foliolis ovalibus profunde serratis lineatis,

spicis globosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 67. Icon. CIII. fig. c.*

PLANTA perennis, sarmentosa, repens, villosa.
HABITAT in locis umbrosis et humidis *Pillao*,
Acobamba, *Palca* et *Huassahuassi*.

FLORET Junio, et Julio.

ACAENA TRIFIDA.

4. A. caulibus erectis, foliis impari-pinnatis,
 foliolis cuneiformibus trifidis, spicis glo-
 bosis. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 67.*

Icon. CIV. fig. c.

PLANTA perennis, densè villosa, canescens.
HABITAT in *Regni Chilensis* pascuis, campis
 et collibus, praesertim per *Rere*, *Itatae*
 et *Conceptionis* Provincias.

FLORET Februario, Martio et Aprili.

VULGO *Amor seco* Incolae nuncupant, quo-
 niam fructus transeuntium vestibus ad-
 haerent.

ACAENA CYLINDRISTACHYA.

5. A. scapis prostratis, foliis impari-pinnatis,
 foliolis oblongis argutè serratis, spicis cy-

lindricis. *Flor. Per. et Chil. tom. I. p. 68.*

ICON. CIV. *fig. a.*

PLANTA perennis, prostrata, uni-tripalmaris.

HABITAT in collibus frigidis *Tarmae*, *Rondos* et *Chaclla*.

FLORET à Decembri ad Martium.

ACAENA PINNATIFIDA.

6. A. scapis erectis, foliis impari-pinnatis; foliolis obovatis pinnatifidis, spicis longis interruptis. *Flor. Per. et Chil. t. I. p. 68.*

ICON. CIV. *fig. b.*

PLANTA perennis, bipedalis, incana.

HABITAT in *Conceptionis Chile* collibus per *Puntilla*, *Hualpen* et *Gavilan* tractus.

FLORET Februario, et Martio.

VULGO *Pimpinela cimarrona* et *Amores secos*.

HABITUS.

Plantae suffruticosae aut perennes, villosae aut sericeae aut tomentosae. *Caules* plures, diffusi, ramosi, teretes; aut *Scapi* erecti vel procumbentes. *Folia* sparsa, impari-pinnata: *foliola* breviter petiolata

aut sessilia, basi inaequalia aut aequalia, serrata, 3-5 fida aut pinnatifida. *Petoli communes* semivaginantes, utrinque in membranam dilatati. *Pedunculi* axillares, longi aut *Scapi* longissimi. *Flores* capitati aut spicati, sive laxè racemosi, bracteis duabus parvis distincti. *Drupae* angulatae mucronibus 2-5 aut numerosis, glochidatis.

DIGYNIA.

CUSCUTA.

LINN. *Gen. plant. pag. 90.*

CUSCUTA ODORATA.

- ✓ I. C. floribus congestis sessilibus, corollis campanulatis patentibus pentandris, nectarii squamis fimbriatis. *Flor. Per. et Cu. tom. 1. pag. 69. Icon. CV. fig. a.*

PLANTA parasitica, aphylla, scandens.

HABITAT in *Limae* et *Pillao* segetibus.

FLORET per totum annum.

VULGO *Cabellos de Angel* appellatur.

CUSCUTA CORYMBOSA.

2. C. floribus pedunculatis corymbosis, corollis ovatis quadrifidis tetrandris, nectario nullo. *Flor. Per. et Chil. tom. 1. p. 69.*
 ICON. CV. *fig. b.*

PLANTA parasitica, aphylla, scandens.

HABITAT in Peruviae cultis.

FLORET per totum annum.

VULGO *Cabellos de Angel* nuncupatur.

VIRES ET USUS: Planta in cataplasmatibus formam redacta et in ustionibus applicita, ardores sedat, sanitatemque restituit.

TETRAGYNIA.

TILLAEA.

LINN. *Gen. plant. pag. 93.*

TILLAEA CONNATA.

1. T. caule erecto, foliis connatis linearibus carnosissimis, floribus tetrapetalis axillaribus.
Flor. Per. et Chil. tom. 1. pag. 70.
 ICON. CVI. *fig. a.*

PLANTA annua , palmaris , glabra.

HABITAT in collibus *Chancay* supra saxa.

FLORET Junio , et Julio.

Obs. Affinis Tillaeae perfoliatae Linnaei.

POTAMOGETON.

LINN. Gen. plant. pag. 92.

POTAMOGETON STRIATUM.

- ✓ 1. P. foliis linearibus striatis , caule compres-
+ so, floribus spicatis. *Flor. Per. et Chil.*
tom. 1. pag. 70. ICON. CVI. fig. b.

PLANTA fluitans.

HABITAT in aquis vivis *Chancay* et *Limae*,
abundè in *Lurin* lacubus et paludibus.

FLORET Augusto , Septembri et Octobri.



INDEX

GENERUM ET SPECIERUM.

A

	Pag.
ABATIA parviflora. }	136
rugosa. }	
ACAENA argentea. }	411
cylindristachya. }	412
lappacea. }	410
ovalifolia. }	411
pinnatifida. }	413
trifida. }	412
ACLADODEA pinnata. }	262
ACOSTA aculeata. }	1
ACTINOPHYLLUM acuminatum. }	89
angulatum. }	87
conicum. }	88
pedicellatum. }	
pentandrum. }	89
ACUNNA lanceolata. }	124
oblonga. }	123
AECHMEA paniculata. }	83

ggg

AEGIPHILA multiflora.	385
AEXTOXICON punctatum.	260
ALCHEMILLA orbiculata.	} 409
pinnata.	
tripartita.	
ALDEA pinnata.	42
ALLIONIA incarnata.	384
ALONSOA acutifolia.	153
caulialata.	152
incisifolia.	} 154
linearis.	
procumbens.	
ALZATEA verticillata.	72
AMOMUM racemosum.	} 305
thyrsoideum.	
ANGULOA uniflora.	228
ANTHODON decussatum.	24
ARISTOTELIA glandulosa.	125
AXINAEA lanceolata.	} 122
purpurea.	
AZARA dentata.	} 138
integrifolia.	
serrata.	

B

BACASIA corymbosa.	189
spinosa.	188
BAITARIA acaulis.	111
BLETIA catenulata.	229
ensiformis.	230
parviflora.	231
repanda.	229
uniflora.	230
BOERHAAVIA hirsuta.	} 309
scandens.	
BOWLESIA lobata.	} 78
palmata.	
BRIZA media.	382
BRUNELLIA aculeata.	} 127
inermis.	
BUDDLEJA americana.	391
connata.	} 390
diffusa.	
globosa.	} 389
incana.	
occidentalis.	} 392
spicata.	

C

CABALLERIA dentata.			
881	dependens.		281
111	ferruginea.		285
882	latifolia.		279
883	oblonga.		280
884	pellucida.		282
885	venosissima.		282
CALCEOLARIA alba.			334
886	angustiflora.		330
887	bicolor.		328
888	bicrenata.		325
889	biflora.		327
890	corymbosa.		324
891	cuneiformis.		334
892	deflexa.		331
893	dentata.		330
894	flexuosa.		329
895	glaucia.		326
896	heterophylla.		328
897	inflexa.		325
898	involuta.		334
899	linearis		

CALCEOLARIA oblonga.	326
perfoliata.	324
pinnata.	322
pulverulenta.	333
punicea.	326
rugosa.	332
salicifolia.	331
scabra.	333
sessilis.	332
tomentosa.	324
trifida.	328
tripartita.	323
uniflora.	327
verticillata.	329
virgata.	335
viscosa.	331
CALLICARPA cordifolia.	385
globiflora.	384
CALLISIA repens.	377
CALYPLECTUS acuminatus.	129
CALYPTRANTHES paniculata.	131
CALYTRIPLEX obovata.	165
CALYXHYMENIA expansa.	} 25
obovata.	

CALYXHYMENIA prostrata.	25
viscosa.	26
CAMPOMANESIA lineatifolia.	128
CANNA indica.	303
iridiflora.	304
paniculata.	303
CARLUDOVICA acuminata.	293
angustifolia.	} 292
latifolia.	
palmata.	291
trigona.	293
CASTIGLIONIA lobata.	277
CAVANILLESIA umbellata.	166
CERDANA alliiodora.	57
CERVANTESIA tomentosa.	72
CHAETANTHERA serrata.	191
CHAETOCRATER capitatum.	108
fasciculatum.	107
CHONDODENDRON tomentosum.	261
CISSUS compressicaulis.	} 405
granulosa.	
obliqua.	
striata.	406
CITROSMA dentata.	264

GENERUM ET SPECIERUM. 423

CITROSMA muricata.	265
oblongifolia.	} 266
ovalis.	
pyricarpa.	264
subinodora.	} 265
tomentosa.	
CLARISIA biflora.	256
racemosa.	255
CLAVIJA longifolia.	} 284
macrocarpa.	
pendula.	} 285
spathulata.	
COCCOCIPSILUM lanceolatum.	} 29
obovatum.	
repens.	} 28
sessile.	
COLUMELLIA oblonga.	8
obovata.	9
COMMELINA fasciculata.	} 375
gracilis.	
hispida.	374
nervosa.	376
CORNIDIA umbellata.	91
COSTUS argenteus.	307

COSTUS laevis.		307
scaber.		306
CUELLARIA ferruginea.		103
obovata.		104
revoluta.		103
CUPHEA ciliata.		120
cordata.		119
CUSCUTA corymbosa.		415
odorata.		414
CYPERUS niger.		} 378
striatus.		
D		
DECOSTEA scandens.		259
DESFONTAINIA spinosa.		59
DIANTHERA acuminata.		319
appendiculata.		} 321
ciliata.		
hirsuta.		320
mucronata.		319
multiflora.		} 318
repens.		
secundiflora.		320
DOMBEJA lappacea.		156
DORSTENIA tubicina.		407

E

ECCREMOCARPUS scaber.	}	157
viridis.		
EMBOTHRIUM dentatum.		37
emarginatum.	}	36
lanceolatum.		
monospermum.		38
obliquum.		37
pinnatum.		38
EPIDENDRUM acuminatum.		248
biflorum.		247
cordatum.		244
coronatum.		242
corymbosum.		246
cristatum.		243
croceum.		246
emarginatum.		247
equitans.		249
ferrugineum.		245
lineare.		249
maculatum.		243
nutans.		245
paniculatum.		243

EPIDENDRUM parviflorum.	245
scabrum.	} 248
triflorum.	
viride.	244
volubile.	247
ESCOBEDIA scabrifolia.	159

F

FABIANA imbricata.	45
FERNANDEZIA conferta.	241
denticulata.	240
graminifolia.	241
haematodes.	} 240
laxa.	
punctata.	239
subbiflora.	240
FOVEOLARIA cordata.	99
ferruginea.	} 100
oblonga.	
ovata.	
FRAGOSA corymbosa.	76
crenata.	} 77
multifida.	
reniformis.	76

FRAGOSA spinosa. 77

G

GALINSOGA quadriradiata. } 198
 quinqueneradiata. }

GALIUM ciliatum. 400

corymbosum. 399

croceum. 401

hirsutum. 399

lappaceum. } 401

mucronatum. }

ovale. 400

GALVEZIA punctata. 97

GARDOQUIA elliptica. 149

incana. 148

multiflora. 149

obovata. 150

revoluta. 149

striata. 148

GILIA laciniata. 47

GILIBERTIA umbellata. 86

GIMBERNATIA oblonga. 275

obovata. 274

GODOYA obovata. 101

GODOYA spathulata.	102
GOMARA racemosa.	162
GOMORTEGA nitida.	108
GONGORA quinquenervis.	227
GONZALAGUNIA dependens.	32
GRATIOLOA peruviana.	314
GUATTERIA glauca.	145
hirsuta.	} 146
ovalis.	
pendula.	
GUMILLEA auriculata.	74
GUNNERA scabra.	364
H	
HAENKEA multiflora.	65
HEDYOTIS conferta.	397
juniperifolia.	398
filiformis.	397
setosa.	} 396
thymifolia.	
HERRERIA stellata.	84
HETERANTHERA reniformis.	23
HIPPOCRATEA viridis.	376
HIPPOTIS triflora.	63
HUERTEA glandulosa.	64

GENERUM ET SPECIERUM. 429

HUMBOLDTIA acutiflora.		
aspera.		236
contorta.		235
cordata.		234
lanceolata.		237
oblonga.		236
parviflora.		
polystachya.		234
purpurea.		235
revoluta.		
spiralis.		237
I		
IRIARTEA deltoidea.		298
ISNARDIA subhastata.		408
IZQUIERDIA aggregata.		278
J		
JARAVA ichu.		2
JASMINUM grandiflorum.		311
lanceolatum.		
JOVELLANA punctata.		7
scapiflora.		
JUANULLOA parasitica.		58
JUSTICIA lineolata.		317

JUSTICIA longistaminea.	316
mucronata.	315
racemosa.	} 316
sericea.	
spicata.	
tenuiflora.	317

K

KAGENECKIA lanceolata.	290
oblonga.	289
KRAMERIA pentapetala.	35
triandra.	33

L

LARDIZABALA biternata.	286
triternata.	287
LETTESOMIA lanata.	135
tomentosa.	134
LLAGUNOA nitida.	252
LYGODISODEA foetida.	61

M

MALESHERBIA thyrsiflora.	79
MANETTIA acutifolia.	394

GENERUM ET SPECIERUM. 431

MANETTIA racemosa.	394
umbellata.	393
MARANTA capitata.	} 308
lateralis.	
MARGYRICARPUS setosus.	10
MARTINEZIA ciliata.	295
ensiformis.	297
interrupta.	296
lanceolata.	} 297
linearis.	
MASDEVALLIA uniflora.	238
MAXILLARIA alata.	223
bicolor.	224
ciliata.	221
cuneiformis.	223
hastata.	} 222
ligulata.	
longipetala.	220
paniculata.	223
platypetala.	221
prolifera.	} 226
ramosa.	
tricolor.	224
triphylla.	225

MAXILLARIA variegata.	222
undatiflora.	225
undulata.	221
MECARDONIA ovata.	164
MENDOZIA aspera.	} 158
racemosa.	
MICONIA emarginata.	106
lanuginosa.	105
pulverulenta.	104
triplinervis.	105
MILIUM nigricans.	379
MOLINA caespitosa.	203
concava.	206
corymbosa.	210
dependens.	} 202
emarginata.	
ferruginea.	} 211
incana.	
latifolia.	208
linearis.	205
nitida.	204
oblongifolia.	203
obovata.	206
parviflora.	209

GENERUM ET SPECIERUM. 433

MOLINA prostrata.	204
racemosa.	209
reticulata.	212
salicifolia.	} 210
scabra.	
scandens.	205
striata.	207
tomentosa.	203
venosa.	212
viscosa.	207
uniflora.	208
MOLLINEDIA lanceolata.	} 143
ovata.	
repanda.	142
MOLLUGO radiata.	382
MONNINA conferta.	} 173
linearifolia.	
macrostachya.	171
polystachya.	174
pterocarpa.	172
salicifolia.	172
MORENIA fragrans.	299
MOSCHARIA pinnatifida.	186
MUNNOZIA corymbosa.	195

MUNNOZIA lanceolata.	196
trinervis.	} 195
venosissima.	
MUTISIA acuminata.	} 192
lanata.	
spinosa.	} 193
subulata.	
MYOSCHILOS oblonga.	73
N	
NAVARRETIA involucrata.	43
NEEA oppositifolia.	91
verticillata.	90
NEGRETIA elliptica.	} 176
inflexa.	
mitis.	177
platycarpa.	178
NERTERIA repens.	33
NIEREMBERGIA repens.	46
NUNNEZHARIA fragrans.	294
NYCTERISITION ferrugineum.	60

O

OHIGGINSIA aggregata. 30

obovata. 31

verticillata. 31

OLDENLANDIA uniflora. 393

OLMEDIA aspera. 257

laevis. 258

P

PALAUA bisserrata. 181

glabra. 182

lanceolata. 181

PALTORIA ovalis. 27

PANICUM purpureum. 381

PASPALUM purpureum. 380

PAVONIA sempervirens. 253

PEPEROMIA acuminata. 19

alata. 17

concava. 16

crystallina. 13

dependens. 2

emarginata. 21

filiformis. 5

PEPEROMIA foliiflora.	13
inaequalifolia.	14
monostachya.	22
obliqua.	19
pilosa.	18
pubescens.	17
purpurea.	18
rhombea.	15
scandens.	20
scutellaeifolia.	} 12
secunda.	
septemnervis.	16
striata.	20
tetragona.	16
trinervis.	18
variegata.	21
umbilicata.	12
PERIPHRAGMOS dependens.	50
flexuosus.	48
foetidus.	49
uniflorus.	51
PHYTELEPHAS macrocarpa.	301
microcarpa.	302
PINEDA incana.	133

GENERUM ET SPECIERUM. 437

PINGUICULA involuta.	336
PIPER acutifolium.	} 360
angustifolium.	
asperifolium.	358
callosum.	351
carpunya.	359
churumayu.	353
crocatum.	355
curvatum.	356
dichotomum.	354
excavatum.	352
fasciculatum, lege peltatum.	362
gracile.	354
granulosum.	361
heterophyllum.	352
lanceolatum.	356
lineatum.	355
longifolium.	} 358
mite.	
obliquum.	360
obovatum.	356
punctatum.	357
scabrum.	352
secundum.	357

PIPER unguiculatum.	353
PLANTAGO congesta.	388
hirsuta.	} 387
hispida.	
sericea.	388
PLAZIA conferta.	187
POLYLEPIS racemosa.	139
PORCELIA nitidifolia.	144
PORLIERIA hygrometra.	94
POTAMOGETON striatum.	416
POURRETIA coarctata.	} 81
lanuginosa.	
paniculata.	
sympagantha.	82
Q	
QUADRIA heterophylla.	39
R	
RHYNCHOTHECA spinosa.	142
RIVINA secunda.	407
RIQUEURIA avenia.	41
RODRIGUEZIA ensiformis.	218
lanceolata.	219

RUIZIA fragrans. 267

S

SALPIGLOSIS sinuata. 163

SALVIA acuminata. 345

acutifolia. } 344

biflora. } 344

cuspidata. 343

excisa. 346

galeata. 350

incurvata. 343

integrifolia. 348

longiflora. 343

mitis. 349

nodosa. 345

oppositifolia. 348

plumosa. 347

procumbens. 349

punctata. 350

racemosa. 346

revoluta. 351

rhombifolia. 347

sagittata. 342

violacea. 349

SANCHEZIA oblonga.	
ovata.	4
SARACHA biflora.	
contorta.	54
dentata.	
procumbens.	55
punctata.	53
SARMIENTA repens.	5
SCABIOSA sympagantha.	383
SCHIZANTHUS pinnatus.	6
SCIRPUS fragrans.	379
SCOPARIA dulcis.	386
SEMARILLARIA acutangula.	
obovata.	93
subrotunda.	92
SESSEA dependens.	
stipulata.	44
SMEGMADERMOS emarginatus.	288
SOBRALIA amplexicaulis.	233
biflora.	
dichotoma.	232
SOBREYRA oblonga.	
sessilifolia.	197
SOLIVA pedicellata.	215

GENERUM ET SPECIERUM. 441

SOLIVA sessilis. 215

SPERMACOCE assurgens. 402

capitata. 403

corymbosa. 402

gracilis. 403

STEREOXYLON corymbosum. 67

paniculatum. 71

patens. 66

pendulum. 70

pulverulentum. 70

resinosum. 68

revolutum. 69

rubrum. 68

virgatum. 67

SYNZYGANTHERA purpurea. 273

T

TAFALLA angustifolia. 272

glauca. 271

laciniata. 272

racemosa. 271

scabra. 270

TALINUM album. 116

ciliatum. 116

TALINUM crenatum.	115
dichotomum.	118
lingulatum.	116
monandrum.	118
nitidum.	117
paniculatum.	114
polyandrum.	115
umbellatum.	117
TERNSTROEMIA globiflora.	179
quinquepartita.	180
TESSARIA dentata.	} 213
integrifolia.	
TILLAEA connata.	415
TORRESIA utriculata.	251
TOVARIA pendula.	85
TRICUSPIDARIA dependens.	112
TRIPTILION spinosum.	185

V

UTRICULARIA aphylla.	} 337
unifolia.	
VALDESIA ovalis.	} 121
repens.	
VALERIANA coarctata.	367

VALERIANA connata.	367
cornucopiae.	} 371
crispa.	
decussata.	373
globiflora.	374
hyalinorrhiza.	370
interrupta.	373
laciniata.	372
oblongifolia.	} 369
officinalis.	
paniculata.	371
phu.	370
pilosa.	367
pinnatifida.	369
rigida.	366
serrata.	} 368
spathulata.	
tenuifolia.	366
virgata.	373
VALLEA cordifolia.	132
VALLESIA dichotoma.	52
VERBENA clavata.	} 339
corymbosa.	
cuneifolia.	

VERBENA dichotoma.	342
hispida.	341
multifida.	338
nodiflora.	} 340
officinalis.	
virgata.	338
VERMIFUGA corymbosa.	216
VERONICA beccabunga.	312
peregrina.	} 313
rotundifolia.	
serpillifolia.	312
VERTICILLARIA acuminata.	140
VILLARESIA emarginata.	64
VIRGULARIA acuminata.	} 161
revoluta.	
VISMIA glabra.	} 183
tomentosa.	
X	
XUAREZIA biflora.	46
XYRIS subulata.	377

I N D E X

NOMINUM VERNACULORUM.

A

	Pag.
ACEYTUNILLO.	260
ACHIRA.	304
cimarróna.	303
de monte.	305, 308
ALMACIGA.	271
ALMIZCLILLO.	187
AMOR seco.	412
AMORES SECOS.	413
ANCOCHUTA.	209
AÑASCCACHU.	350
ARBOL de Cuentas de Rosario.	253
del Aceyte de Maria.	140
Ajo.	57
Chunchu.	275
Tambor.	167
ARGUENILLA.	7
ARGUENITA.	324, 332, 333
ARVEGILLA.	372

AVELLANO.	40
AYTACUPI.	271, 272
AZAFRAN.	160

B

BEJUCO blanco.	61
BOLDO.	} 268
BOLDU.	
BOLSILLA (Yerba de la).	323
BROQUIN.	411

C

CABELLOS de Angel.	414, 415
CABEZA de Monge.	130
Negro.	301
CAIHUA-CAIHUA.	318, 319
CAIMITO de monte.	1
CAMONA.	298
CARDON.	82
CARPUNYA.	353, 359
CASTAÑUELAS.	114
CATAS.	37
CCANTU.	50
CCANTUTTICA.	51

CCURHUR.	133
CEDRO macho.	64
CHACHACOMA.	} 68
CHACHAS.	
CHACHAUL.	333
CHAMPA.	42
CHECCA Socconche.	148
CHENCHELCOMA.	348
CHICHIMICUNA.	60
CHILCA.	206, 207, 209, 210
CHINAPAYA.	217
CHINCHILCULMA.	} 193
CHINCHINCULMA.	
CHISSIPHUINAC.	172
CHIUCUMPA.	193
CHONTA.	296
CHUCUMPA.	316
CHUNCHU (Arbol del).	275
CHURUMAYU.	354
CHUTASLLIUM.	294
CLAVELES del campo.	194
CLAVELON de Serranias.	189
CODOCOYPU.	74
COGUILL-VOCHI.	286

CONGONA.	14
CONGONITA cimarrona.	14
CONTRAYERBA.	217
CORCOLEN.	137, 138, 139
CUYOL.	297

E

ESCOBILLA.	386
ESPECERIA de montaña.	160
ESTIRA nervios.	209

F

FLOR de la Mistela.	117
del Espiritu Santo.	228
de todo el año.	246
FRUTILLA de monte.	76

G

GALGA-RETAMA.	136
GAULTRO.	207
GUAYO colorado.	290

H

HACHIQUIS.	172
HOMERO.	301
HUACCYANCCACHA.	153
HUANCARSSACHA.	167
HUARITURU.	368
HUAYACAN.	95
HUEVILL-HUEVILL.	49
HUINCUS.	193

I

ICHU.	2
-------	---

J

JAZMIN.	311
---------	-----

K

KEULE.	109
--------	-----

L

LAUPE.	101, 102
LAUREL.	254
LENGUA de Vaca.	115

LIUN.	69
LLAMAPANAUI.	176, 177, 178
LLOQUI.	134
LUCUMA.	280
de monte.	284
LUCUMAS de monte.	93
LUN.	69
M	
MACAE.	372
MACHINPARRANI.	37
MACQUI.	126
MAIZ de Guinea.	380
MAIZILLO.	381
MANCAPAQUI.	161, 162, 323
MANGLILLO.	280, 281
MAPATO.	34
MARDOÑO.	70
MARFIL (Palma del).	301
MARFIL vegetal.	301, 302
MASCA.	172
MATAGUSANOS.	217
MATARA.	211
MOHO-MOHO.	361
MORADILLA.	350

N

NALCAS.

364

NEBÚ.

40

Ñ

ÑIPA.

69

O

OCSSA.

2

OLIVILLA.

260

OREJAS de perro.

114

P

PACHACÇA.

332

PACHATACYA.

204

PACOPACO.

39

de la sierra.

38

PACUYUYU cimarron.

199

fino.

198

PAGNHIN.

390

PALILLO.

128

PALILLOS.

301

PALMA del Marfil.

PALMITO.	211
PALQUIN.	390
PANGUE.	} 364
PANKE.	
PATAGUA.	113
PAXARO bobo.	213, 214
PEGAJOSA.	310
PEGA-PEGA.	26
PERLILLA (Yerba de la).	10
PIAMICH'.	256
PICAHUAY.	37
PICHI.	45
PICHUIQUITA.	148
PIMPINELA cimarrona.	413
PIÑOL.	37
PIÑONCILLOS.	277
PITAO.	98
PLATANO de monte.	144
PULLIPUNTU.	301, 302
PUMACHILLCA.	70
PUMACUCHU.	34
PURUMPIÑA.	307
PUSSCA.	321
PUYA.	82

Q

QUEULE.	109
QUILA.	84
QUILLAI.	288
QUINTI.	27
QUINUAR.	139
QUISOAR.	389, 391
QUISUAR.	389

R

RAGUAYES.	364
RAIZ para los dientes.	34
RARAL.	38
RATANHIA.	34
RATONERA.	252
RETAMA cimarrona.	136
RICACO.	154, 155
RIMA-RIMA.	238
RIRCACO.	154, 155
ROMERILLO.	205
ROSA-HUAYTTA.	} 124
ROSA-ROSA.	

S

SALSAPARRILLA.	84
SALVIA Real.	342
SANDIA-LAGUEN.	339
SIA-SIA.	296, 299
SIEMPREVIVA.	186
SIETE CAMISAS.	69
SIUBA.	67
SOCCONCHA.	344, 345, 348
SOCCONCHE.	} 148
fino.	
SUMAC-ACHIRA.	304

T

TACYA macho.	206
tendida en tierra.	204
TAHUE-TAHUE.	232
TASSTA.	66
TAUCCA-TAUCCA.	136
THE del Perú.	47
TOMATE cimarron.	54
TULPAY.	256
TUMPU.	329
TURU.	48
TURUCASSA.	95

V

VERBENA.	340, 341
VOCHI.	} 405
VOQUI.	

U

ULUX.	9
USPICA.	403
UTCUS.	386

Y

YASMICH'.	256
YELMO.	259
YERBA de la Bolsilla.	323
Culebra.	120
del Gallinazo.	350
de la Perlilla.	10
purgacion.	309
Zorrina.	350
YORITURP.	136
YURAHUANUM.	61

Z

ZARZAPARRILLA.	84
ZACA-ZACA , ó çaca-çaca.	224

MENDA TYPOGRAPHICA.

<i>Pag.</i>	<i>Lin.</i>		<i>Lege</i>
67	8	Myrthi	Myrti
80	15	quae	quam
86	14	extructura . .	structura
170	10	crostachya . .	macrostachya
171	13	fragrantis . .	flagrantis
174	16	et pag. 175, 176, 177, 178, lin. 1.	
		OCTANDRIA .	DECANDRIA
256	19	ripis	ripas
267	8	insculpata . .	insculpta
362	2	fasciculatum	peltatum
363	11	polystachyo .	peltato
364	21	nuncupatur .	nuncupantur
378		post lin. 12 adde	HABITAT in inundatis et stagnatis Provinciae Chancay. FLORET Junio, et Julio.



