### Tableau des systemes de botanique, generaux et particuliers; ... / par le C. Mouton-Fontenille.

#### **Contributors**

Mouton-Fontenille, J. P. Royal College of Physicians of Edinburgh

#### **Publication/Creation**

Lyons: Brette, 1798.

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/ca6wssvq

#### **Provider**

Royal College of Physicians Edinburgh

#### License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by the Royal College of Physicians of Edinburgh. The original may be consulted at the Royal College of Physicians of Edinburgh. where the originals may be consulted.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



6 3/12







# TABLEAU

DES

SYSTÈMES DE BOTANIQUE.

# TABEAU

DES

SYSTÈMES DE BOTANIQUE.

De Libris Bibliotheca

TABLEAU

I. Regie DES Med. Edinb.

SYSTÊMES DE BOTANIQUE,

GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS;

Contenant

1.º Le plan de chaque Systême; 2.º Les Principes sur lesquels ils sont fondés; 3.º Leurs avantages et leurs désavantages; 4.º Spécialement le développement du Systême sexuel de Linnæus.

SUIVI DE DEUX MÉMOIRES,

Dont le premier a pour objet une suite d'observations et d'expériences sur la dessication des plantes, et leur conservation dans les Herbiers.

Le second renferme des observations sur les différentes especes de végetaux propres aux montagnes calcaires et granitiques des environs de Grenoble.

Par le C. MOUTON-FONTENILLE,
Membre de la Société de Médecine de Lyon.



#### A LYON,

Chez L'AUTEUR; rue du Pizai, n.º 115.

REYMANN, et C.º Libraires, rue S.-Dominique, n. 73.

FR. LECLERC, et C.º Libraires, place des Terreaux, maison des ci-devant Dames de S.-Pierre.

V.º BRETTE, libraire, rue Neuve, n.º 46.

AN VI, DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇOISE. (1798.)

# TABLEAU

# SYSTEMES DE BOTANIQUE, GENERAUX ET PARTICULIÈRS;

## Contenant

L'M.o plan de chaque Systême; n.º Les Principes sur lesquels ils sont condés; 3.º Leurs avantages et leurs désavantages; 4.º Spéci dement le dével que ment du Systême sexuel de London.

# SUITI DE DEUX MEMOTRES.

Cont le gremier a pour objet une miter d'observations et l'angel.
Lieure e sur la detaitation des plantes, et long Conservation dans

Le sacond conforme des ob avations sur les différentes especes de végy-jeux gropres aux neurongues calcaires et grantifques des environs de Grenoble.

Par le O. Moure de la Societé de Médecine de Lrow.



# A LYON,

Charles Lagrand et C. of Shraires, sue S.-Dominique, m. v3.

Charles Lagrand et C. of Shraires, place des Testeaux,

mairon des ci-devant Dances de S.-Pierre,

V. FRETTE, libraire, sue Reave, n. 6 (5).

AN VI, DE LA FÉRUSÉIQUE FRANÇOISE.

# PLAN GÉNÉRAL.

L'ouvrage que je présente au public, est en quelque sorte une traduction du Classes Plantarum de l'immortel Linné, auquel j'ai fait quelques changemens, et des additions considérables. Il est également le fruit des principes que j'ai reçus d'un célebre Botaniste, le professeur Gouan, qui joignant toutes les bontés d'un pere, aux leçons d'un grand maître, et aux talens qui caractérisent les vrais Botanistes, guida mes pas incertains et chancelans dans les sentiers de la Botanique, et augmenta en moi le goût que j'ai eu dès ma plus tendre enfance, pour une science utile et attrayante.

Instruit à une telle école, j'appris à discerner les ouvrages qui pouvoient rectifier mes idées. Ceux de Linné me parurent mériter la préférence Je lus avec avidité son Classes Plantarum, ouvrage profond, et frappé, comme tous ceux de ce grand homme, au coin du génie. J'admirai la clarté et la précision avec lesquels il y expose et développe chaque système. Je traduisis alors pour mon usage, les morceaux qui me flatterent le plus, et j'ajoutai les systèmes qui ont paru depuis la publication de cet ouvrage. Telle

fut la base de celui que je soumets aux lumieres et aux jugemens des Botanistes, et que je divise en deux parties.

La premiere, contiendra une analyse claire et succincte de cinquante-un systèmes généraux ou universels.

Dans la seconde, qui est la principale et à laquelle la précédente ne sert que de préparation, je présenterai 1°. le parallele de Tournefort et de Linné, et la comparaison de leurs systêmes ; 2°. je ferai sentir la nécessité absolue de se servir du Systema vegetabilium dans l'étude de la Botanique; 3°. j'offrirai une notice aussi exacte qu'il me sera possible des aberrations qui se ren-Contrent dans les différentes classes du système sexuel, afin d'éviter par ce travail, l'embarras où elles peuvent jeter; 4°. je donnerai une explication générale du système sexuel du célèbre Botaniste Suédois; 5°. je m'étendrai sur ses différentes classes, selon qu'elles seront plus ou moins intéressantes; 6°. je citerai les classes, ordres, familles qui se rapportent aux ordres naturels, qu'il est très-important de connoître; 7°. je présenterai la concordance des classes et des ordres de Linné avec ceux des autres systèmes les plus célebres, en comparant vingt-deux familles naturelles dans les différentes classes de son système,

et dans quarante-cinq systèmes universels, et six de ces familles dans dix-sept systèmes partiels; mais avec cette différence, que les familles des aggrégées, rubiacées, borraginées, liliacées, caryophyllées, icosandres, ranonculées, malvacées, orchidées, coniferes, cucurbitacées, fougeres, mousses, algues, champignons, étant moins nombreuses que celles des graminées, ombelliferes, labiées, personnées, cruciferes, légumineuses, composées, et n'offrant point de divisions, je me contenterai de citer les noms sous lesquels les auteurs les ont désignées, et les classes, ordres ou sections de leurs systèmes où elles se rapportent : dans les autres, au contraire, je désignerai les parties de la plante que les Botanistes auront employées pour établir leurs sousdivisions, et présenterai en raccourci, la maniere dont ils les auront sous-divisées; 8°. j'analyserai les systèmes partiels dans les différentes classes où se rapporteront les familles sur lesquelles ils sont érablis.

On trouvera à la fin de cette seconde partie, cent tables. La premiere, offrira le pland'après lequel sont rangés tous les systèmes, tant universels que partiels, dont je parle dans cet ouvrage. La seconde, présentera d'un coupd'œil, le nombre des classes, sections, ordres, séries, collections; fascicules, tribus, familles, centuries, genres et especes contenus dans les systêmes universels que je cite. La quatrieme, contiendra la clef du systême de Cæsalpin, que j'ai cru nécessaire pour faciliter l'intelligence de son système, comme l'ensemble de cette table deviendra plus facile à saisir, à la faveur de la description : dès-lors, la description et la clef du système sont liées l'une à l'autre. Dans la cinquieme, on trouvera les numéro des classes et sections du système de ce Botaniste, où se rapportent les vingt-deux familles dont je présente la concordance, et les noms sous lesquels cet auteur les désigne. Cette table est essentiellement liée à la seconde partie de cet ouvrage, et présente d'un coup-d'œil ce que je n'ai pu exprimer que par des phrases détachées et dans les différentes classes du systême sexuel.

Ce que je dis pour le système de Cæsalpin, s'applique à tous les autres systèmes universels, excepté à ceux de Duhamel, Gærtner, dont je ne rapporte pas la concordance, quoique je présente la clef de leurs systèmes, et à ceux d'Adanson, Guettard, Necker, Linné, Gerard, Wulf. Je n'offre que le tableau des tribus, familles, ordres, sections, genres de ces six Botanistes, auxquels se rapportent ces vingt-deux familles; mais je ne

donne pas la clef de leurs systèmes, parce qu'il étoit en quelque sorte impossible de la rédiger. Les tables 96, 97, 98, 99 présenteront la clef de quelques systèmes partiels. Enfin, la derniere offrira en différentes colonnes, 1°. le nom des auteurs dont j'ai occasion de parler, 2°. leurs patries, 3°. le temps de leur naissance, 4°. de leur mort, 5°. leur âge.

J'ai pensé que cet ouvrage, qui présente l'analyse d'un grand nombre de systèmes, pourroit accoutumer les jeunes Botanistes, 1°. à saisir les points fondamentaux sur lesquels ils sont établis, 2°. à connoître leur marche, 3°. à étudier leur développement, 4°. à choisir celui qu'ils trouveront le plus facile.

J'ai cru qu'il seroit avantageux de présenter les différentes manieres dont les auteurs ont dénommé, classé, divisé et sous-divisé les vingt-deux familles naturelles dont je rapporte la concordance, et d'offrir en peu de mots la synonymie de toutes ces familles dans les systèmes que j'analyse; 1°. parce que j'éviterai avec ce travail, la peine de parcourir les ouvrages d'un grand nombre d'auteurs, dont l'étude est en quelque sorte pénible et souvent désagréable; 2°. parce que je ferai connoître le rapport et les différences que présentent

tous ces systèmes, et qu'on saisira d'autant plus facilement, que j'ai eu soin d'observer dans leur exposition, les rapprochemens des dénominations et classifications.

L'ordre que j'ai suivi dans le rapprochement des concordances de chaque famille naturelle, a été 1°. la série des classes, ordres, sections; 2°. leurs dénominations; 3°. la combinaison de ces deux attributs. Dans le premier cas, je n'ai eu égard qu'à la série des classes, comme on peut s'en convaincre par l'exposition des différentes classes où se rapportent les graminées; dans le second, je ne me suis attaché qu'à la dénomination des familles, sans consulter la série des classes; dans le dernier, j'ai combiné en même temps la série et les dénominations.

Je préviens qu'obligé de répéter souvent la même chose, j'ai été forcé d'employer souvent les mêmes mots. Les lecteurs doivent se représenter que la concordance de chaque famille étant un petit traité particulier, et que rapportant la concordance de vingt-deux familles naturelles dans soixante-huit systèmes, tant universels que partiels, j'ai été forcé de combiner plus de quinze cents concordances particulieres, et de les présenter ensuite dans la totalité de leurs rapports pour chaque famille. Or, un pareil trayail a exigé néces-

sairement des répétitions dans les rapports et dans les concordances.

Je préviens qu'il existe dans les différens systêmes que j'analyse, des expressions tirées, soit du grec soit du latin, que j'ai été obligé de franciser, tant pour conserver le texte des auteurs que pour éviter la longueur des périphrases, avec le secours desquelles j'aurai quelquefois affoibli les idées que je voulois exprimer, mais qui à raison de leur nouveauté dans notre langue, pourroient ne pas plaire à tout le monde.

Je préviens enfin, qu'ennemi déclaré de toute discussion en fait de sciences, je ne me suis permis aucune observation critique sur les divers ouvrages dont j'ai occasion de parler; ma vénération pour les cendres des Botanistes qui ne sont plus, égalant le respect que m'ont inspiré les écrits de ceux que nous avons l'avantage de posséder parmi nous. Des raisons majeures m'ont déterminé à prendre ce parti, 1°. parce que j'ai toujours pensé que les critiques ont été, sinon plus nuisibles qu'utiles au progrès de la Botanique, du moins peu avantageuses à leurs auteurs. Je pourrois prouver cette triste vérité par des faits récens, mais en la prouvant je tomberois dans le défaut que je veux éviter. 2°. En m'érigeant en censeur, il n'est pas dit que ma façon de voir eût été celle

de mes lecteurs; dès-lors, en me contentant d'exposer seulement le plan des systèmes de Botanique que je cite dans cet ouvrage, j'ai laissé à chaqu'un la liberté de faire ses réflexions sur tel ou tel système. 3°. Connoissant toute mon incapacité, j'ai été bien aise de solliciter d'avance, des Botanistes qui me jugeront, la même indulgence dont je leur ai montré l'exemple, vis-à-vis de ceux dont j'ai analysé les systèmes.

J'ai joint à la fin de ce petit ouvrage, sous le titre d'Observations de Botanique, deux mémoires, dont le premier a pour objet une suite d'observations et d'expériences sur la dessication des plantes, et leur conservation dans les herbiers; le second, renferme des observations sur les différentes especes de végétaux propres aux montagnes calcaires et granitiques des environs de Grenoble.



### PREMIERE PARTIE.

LA BOTANIQUE que Jean-Jacques Rousseau appelle la plus riche, la plus aimable des trois parties de l'Histoire naturelle, fut cultivée avec soin dans les beaux siecles de la Grece et de Rome: Hypocrate, Aristote, Théophraste, Dioscorides, Pline en furent les peres; mais replongée dans la barbarie par la révolution qu'éprouverent les autres sciences dont elle partagea le sort, elle ne sortit que peu-à-peu de ce chaos épais, et ne commença à fleurir que vers le milieu du quinzieme siecle (1).

<sup>(1)</sup> Linné présente dans la préface de sa Bibliotheca botanica, une histoire très-ingénieuse de l'origine et des progrès de la Botanique. « La Botanique est une plante du genre de celle qui, comme les palmiers, sont quelquefois un siecle sans fleurir: elle poussa d'abord quelques feuilles séminales sous le regne d'Alexandre-le-Grand. Transportée à Rome après la guerre de Mithridate, ses feuilles radicales commencerent à paroître; mais comme on cessoit de la cultiver, la plante se flétrissoit et ne faisoit aucun progrès. Elle fut transportée en Asie, de là en Arabie, où elle végéta jusqu'au dou-

Ceux qui la guiderent dans ses premiers pas, furent Brunsfeld, Fuschs, Tragus, Mathiole, Lonicer, Dodoens, Gesner, Lobel, l'Ecluse, Daléchamp; ces Botanistes publierent divers ouvrages, dans lesquels on apperçoit déjà quelques traces de méthodes (2). Après ces auteurs, parurent les deux illustres freres Jean et Gaspard Bauhin, hommes rares, dit J. J. Rousseau, dont le savoir immense, et les solides travaux consacrés à la Botanique, les rendent dignes de l'immortalité qu'ils leur ont acquise. Car, tant que cette science naturelle ne tombera pas dans l'oubli, les noms de Jean et de Gaspard Bauhin vivront avec elle dans la mémoire des hommes (3).

zieme siecle: elle fut alors portée en France, où elle languit pendant trois siecles; les feuilles radicales nées à Rome se sechoient et alloient périr. Enfin, jusqu'au seizieme siecle elle ne donna qu'une seule fleur (Cæsalpin) petite et foible, et sur une tige courte et grêle, qu'un souffle agitoit et pouvoit abattre, et cette fleur ne fut suivie d'aucun fruit. Au dix-septieme siecle, cette tige superbe, si long-temps attendue commença à s'élever, mais elle ne portoit que quelques feuilles éparses, et ne donnoit aucun signe de floraison. Tout-à-coup, au premier printemps de cet âge d'or, à peine la neige étant dissipée, la tige donna une fleur, et cette fleur un fruit qui parvint jusqu'à sa maturité, (Gaspard Bauhin); ensuite la tige fut environnée de verdure, d'où sortirent plusieurs fleurs."

- (2) Voyez la table qui est à la fin de cet ouvrage, dans laquelle sont indiquées les années de la naissance, de la mort des auteurs dont j'ai occasion de parler.
- (3) Voyez Œuvres complettes de J. J. Rousseau, imprimées à Paris, 1793, le tome 28, ou le volume 7; des Mélanges, introduction, pag. 10.

Quoique les deux célebres Botanistes dont je viens de parler aient exposé chacun le plan sous lequel ils avoient rangé leurs plantes dans leurs herbiers, et présenté déjà la marche de la nature dans plusieurs familles, et que leur rapprochement des especes ressemble très-souvent à ceux des modernes, cependant il faut avouer que ni l'un ni l'autre n'avoient su profiter des grandes vues de Cæsalpin, et avoient évité, par une singuliere tournure d'esprit, de se laisser conduire au flambeau lumineux que ce grand homme avoit allumé. Cæsalpin, peut-être frappé d'une assertion qu'avoit avancée Gesner dans une de ses lettres, et que Columna avoit développée quelque temps après, reconnut que les caracteres les plus sûrs pour constituer les classes et le genre devoient être puisés dans les attributs des différentes parties de la fructification. Morison a été véritablement parmi les modernes, le premier qui, après Cæsalpin, zit fait l'application de ce principe dans le développement d'une méthode universelle.

Quelque temps après, Ray, saisissant ces mêmes principes, en sit l'application à toutes les plantes connues de son temps, avec une justesse d'esprit et une si grande sagacité, que sa méthode présente encore aujourd'hui la plupart des familles naturelles reconnues par les modernes, et un trèsgrand nombre de genres naturels, caractérisés par

des attributs très-faciles à saisir.

Les Botanistes contemporains ou successeurs de ces hommes célebres, convaincus de la nécessité d'une classification méthodique pour l'avancement et la perfection de la Botanique, observerent soigneusement les différentes parties des végétaux

qui leur parurent former des caracteres sensibles et essentiels. Quelques-uns n'employerent pour l'établissement de leurs méthodes qu'une seule partie de la fructification, telle que le calice, la corolle, les étamines, le fruit, etc.; d'autres préférerent l'ensemble de toutes les parties de la fructification. Ces différentes manieres d'envisager les végétaux, enfanterent les systèmes nombreux et variés que je vais analyser, et que je diviserai en six classes.

La premiere classe comprendra les systèmes universels artificiels, fondés sur une partie de la fructification exclusivement; la seconde, renfermera les systèmes universels artificiels, fondés sur toutes les parties de la fructification, (on les appelle mixtes;) la troisieme, nous offrira les systèmes universels artificiels par partition, avec opposition d'attributs; la quatrieme, les systèmes établis sur les feuilles; la cinquieme, nous présentera les systèmes universels naturels; la sixieme, les systèmes partiels, c'est-à-dire, qui ne traitent qu'une seule classe. (Voyez tab. 1 et 2.)

Les systèmes de la premiere classes, sont ceux de Cæsalpin, Morison, Christ. Knaut, Hermann, Boerrhaave, Fabricius, Duhamel, Gærtner, sur le fruit: de Rivin, Ruppius, Ludwig\*, Chret. Knaut, Haller\*, Ludwig\*\*, Boehmer, Gattenhof, Gouan, sur le nombre et la régularité des pétales; de Tournefort, Pontedera, Seguier, Bergen, Durande, sur la figure de la corolle: de Wernischeck, sur le nombre des divisions de la corolle: de Magnol, Linné\*, sur le calice: de Linné\*\*, Thunber, Gmelin, Villars, sur les étamines: de Gledistch, sur la situation des étamines.

Les systèmes de la seconde classe, sont ceux de Haller \*\*, Haller \*\*, Wachendorf, Allioni, Gilibert, Crantz, Hill.

Les systèmes de la troisieme classe, sont ceux de Ray, Lamarck.

Les systèmes de la quatrieme classe, sont ceux de Sauvages, Duhamel.

Les systèmes de la cinquieme classe, sont ceux de Van-Royen, Jussieu, Eder, Scopoli, Adanson, Guettard, Necker, Linné \*\*\*, Gerard, Wulf.

Enfin dans la sixieme classe, se trouvent les systèmes partiels de Ray, Scheuchzer, Michelli, Linné \*\*\*\*, sur les graminées; de Morison, Artedi, Crantz, Villars, sur les ombelliferes; de Pontedera, Vaillant, sur les fleurs composées; de Linné \*\*\*\*\*, sur les fougeres; de Dillen, Michelli, Seguier, sur les mousses; de Dillen, Michelli, Gledistch, sur les champignons.

Analysons actuellement ces différens systêmes.

Le premier est celui de CÆSALPIN, médecin à Pize, qui posa les vrais fondemens de la science des végétaux, en les classant d'après les principes de la fructification; il prit pour base de son système, le nombre et la distribution des semences sur le réceptacle. Il divisa les plantes, I.° en arbres et arbrisseaux; II.° en sous-arbrisseaux et herbes. Les premiers ont le cœurcelet, que l'auteur désigne sous le nom de (cor), placé A au sommet, B à la base de la semence; les seconds ont t.° les semences distribuées dans chaque fleur, d'après le

principe A simple, B double, C triple, D quadruples, E multiple, des semences, péricarpes, capsules, loges, etc.; 2.° sont privées de semences (4). (Voyez tab. 4 et 5.)

ROBERT MORISON, médecin Ecossais, fit revivre la distribution méthodique des plantes, qui, quoique présentée heureusement par son prédécesseur, avoit été négligée pendant près d'un siecle. Il établit son système sur le fruit, et non sur le germe de la semence ou sur le réceptacle. Il divisa les plantes, I.° en ligneuses, II.° en herbacées; mais il ne les sous-divisa pas. (Voyez tab. 6 et 7.)

CHRISTOPHE KNAUT, dans la distribution des différentes classes de son systême, met les herbes avant les arbres, et préfère les angiospermes (semences couvertes), aux gymnospermes (semences nues); sous-divise les premières par le nombre des pétales, et les autres par le nombre des semences. Selon cet auteur, les plantes sont I.º herbacées, II.º ligneuses. Les premières ont 1.º des pétales, 2.º n'ont point de pétales. Celles qui ont des pétales produisent des fleurs 1°. simples, dont le fruit est A revêtu d'un péricarpe a charnu, formant une baie ou succulent, b membraneux, \* simple et unicapsulaire \*\* composé, B nu, sans péricarpe; 2.º des fleurs composées, à semences \* sans aigrettes, \*\* aigrettées. Les plantes ligneuses sont divi-

<sup>(4)</sup> Ce Botaniste admit la distinction générale des arbres et des herbes, qui a été adoptée par Morison, Ray, Christ. Knaut, Hermann, Boerrhaave, Fabricius, Tournefort, Pontedera, Seguier, Magnol.

sées en arbres et en arbrisseaux. (Voyez tab. \$

et 9.)

PAUL HERMANN, professeur de Botanique à Leyde, divisa les plantes en gymnospermes et angiospermes, sous-divisa les premieres par le nombre des semences, et les autres par le nombre des loges. Il distingua les végétaux, I.º en herbes qui ont des fleurs A pétalées, B apétales, II.º en arbres qui ont des fleurs Aapétales, B pétalées; il divise les fleurs herbacées pétalées, 1.º en gymnospermes, c'est-à-dire, à semences A nues, sans péricarpe, à fleur solitaire, \* simple, \*\* composée, B à deux semences, avec une fleur \* monopétale, \*\* pentapétale, C à quatre semences, avec les feuilles \* alternes, \*\* opposées, D à plusieurs semences; 2.º en angiospermes, c'est-à-dire, à semences renfermées dans un péricarpe A membraneux, 1.° simple, c'est-à-dire, formé par une membrane commune, qui est a une capsule, avec une racine \* bulbeuse, \*\* non bulbeuse, le fruit divisé intérieurement en loges qui sont \* nulles, \*\* au nombre \*\* de deux, \*\*\* trois, \*\*\*\* quatre ou \*\*\*\*\* cinq, ou b une silique c une gousse; 2.º dans un péricarpe membraneux composé, B dans un péricarpe charnu. Les fleurs herbacées apétales sont divisées par le calice, qui est a un périanthe, b une balle, c nul. Les arbres ont une fleur A apétale, B pétalée, dont le fruit est a charnu, \* couronné \*\* soutenu par le calice, b un fruit sec. (Voyez tab. 10 et 11.)

HERMANN BOERRHAAVE, professeur de Botanique à Leyde, combina le système d'Hermann avec ceux de Ray et de Tournefort. Il adopta,

avec Ray, la division des plantes par les cotyledons, afin de conserver les classes naturelles, et classa, comme Tournefort, les arbres d'après leurs fleurs. Cet auteur tira ses caracteres du port des plantes, de toutes les parties de la fructification, et employa le premier le calice, les étamines, le pistil pour déterminer les genres. Il divisa les végétaux, I.º en plantes imparfaites, privées de cotyledons et de fleurs, ou en herbes pourvues de cotyledons et de fleurs, dont les semences 1.º dicotyledones ont deux feuilles séminales, et sont A pourvues de pétales et de semences 1.º nues, a en grand nombre, b au nombre de quatre, c de deux d solitaires, à fleur \* simple, \*\* composée; 2.° couvertes par une a capsule \* simple, à une, deux, trois, quatre, cinq ou plusieurs loges, \*\* composée, ou par une b silique, c gousse, d baie, e pomme, Bou sont dépourvues de pétales. Les herbacées à semences, 2.° monocotyledones, ont les feuilles séminales solitaires, et la fleur a pétalée, b apétale. IIº En arbres A monocotyledones, B dicotyledones. Ces derniers ont la fleur a apétale, avec le calice \* simple, \*\* imbriqué; b pétalée, \* monopétale, \*\* polypétale. (Voy. tab. 12 et 13.) (5).

<sup>(5)</sup> Hermann Boerhaave, regardé aujourd'hui comme le prince des médecins de son temps, se ménagea cependant assez de loisir pour approfondir tous les détails de la Chymie et de la Botanique. Il a publié sur cette dernière science deux ouvrages remarquables, dont le premier, intitulé: Index horti Lugduno Batavorum, un vol. in-8.°, est un simple catalogue des plantes qu'il faisoit cultiver dans ce jardin. Mais quelques années après, il publia le même ouvrage sous le même titre, en deux volumes in-4.°, dans lequel il proposa ses vues

PHILIPPE CONRARD FABRICIUS (6), a combiné les systèmes de Boerrhaave et d'Hermann, en cherchant les familles naturelles d'après le plan de Ray. Il divise les végétaux en deux séries principales, savoir, I°. en herbes ou arbrisseaux, II°. en arbres. Les premiers ont les fleurs et les fruits 1.° visibles, 2.° invisibles. Ceux dont les fleurs et les fruits sont visibles, sont A monocotyledones, B polycotyledones. Ceux qui ont les fleurs et les fruits invisibles, sont A acotyledones. Les arbres sont A monocotyledones, B polycotyledones. (Voy. tab. 14 et 15.)

DUHAMEL DU MONCEAU (7) a donné un

sur la science en général, et une Méthode analytique, dont les fondemens sont puisés dans la structure du fruit: mais ce qui rend cet ouvrage remarquable et précieux, c'est la maniere ingénieuse dont il a présenté les caractères génériques. Il ne se contente pas, comme ses prédécesseurs, d'énoncer les attributs de la corolle et du fruit, mais il a donné des détails très-exacts sur les étamines. Toutes les fois que le diagnostique du genre lui a paru obscur ou difficile dans les parties de la fructification, il ajoute un signalement précis, déduit du port ou des autres parties de la plante. Boerhaave a constitué plusieurs genres, qui ont été reconnus par Linné. Son ouvrage présente d'ailleurs des descriptions de plusieurs especes neuves, accompagnées de figures très-exactes.

(6) Le système de Fabricius est rédigé d'après celui d'Heister, que je n'ai pu citer, n'ayant pas sous les yeux l'ouvrage de ce Botaniste, qui est devenu très rare.

(7) Duhamel du Monceau, un des plus laborieux membre de l'académie de Paris, digne émule, dans ses travaux, de Réaumur, s'est rendu célebre par plusieurs grands ouvrages de Botanique, qui annoncent des connoissances profondes et le génie de l'observateur. Sans

système sur les arbres et arbustes, rangés suivant la forme de leurs fruits. Il les divise en sept familles, relativement à leurs fruits A secs,

parler de ses grands Traités sur l'exploitation, la plantation et l'usage des bois forestiers, nous ne pouvons nous dispenser d'indiquer 10. sa Physique des arbres; 2º. son Traité des arbres et arbustes de France qui croissent en pleine terre; 3º. son Histoire des arbres fruitiers. Dans le premier, il s'est proposé de vérifier toutes les observations de Grew, de Malpingi et de Hall. Après avoir déterminé le juste degré de confiance que chacune de ces observations méritoit, il en a ajouté un si grand nombre qui lui sont propres, que son ouvrage peut être regardé comme fondamental pour tout ce qui a rapport à l'anatomie et à la physique des végétaux. Dans son Traité des arbres et arbustes, il a proposé trois méthodes; l'une sur le fruit, l'autre sur les feuilles , dont j'ai donné l'analyse ; la troisieme, sur la corolle : cette derniere, n'est qu'une

combinaison de celle de Tournefort et de Linné.

Mais il a cru devoir exposer l'histoire de chaque arbre et arbuste, suivant l'ordre alphabétique. Les caracteres des genres sont rendus dans les vignettes placées à la tête de chaque article. Les especes sont traitées suivant le plan de Tournefort. Il a jugé à propos de traduire le synonyme latin de cet auteur, mais il s'est bien gardé de le supprimer, étant bien persuadé que s'il l'avoit fait pour ménager l'oreille délicate de ceux qui n'entendent pas la langue latine, il n'auroit point été compris par ceux qui auroient voulu consulter l'ouvrage original de Tournefort. Les figures des especes sont en bois, et ont servi anciennement pour les grandes éditions in-folio des Commentaires de Mathiole, publiés par Valgrise. Il en a ajouté plusieurs autres gravées sous ses yeux et bien exécutées. Son Traité des arbres fruitiers est recherché des amateurs pour la beauté des figures qui expriment chaque variété, et pour les détails très-intéressans et souvent neufs, relatifs à leur enlture et à leur amélioration.

B plus ou moins charnus, C à noyau, D à baies, ou qui portent leurs semences dans des C capsules, F siliques ou silicules, G nues, n'ayant pour enveloppe que le calice ou le pétale. Comme cet auteur n'a fait l'application de son système qu'aux arbres et arbustes, je ne rapporterai point sa concordance. J'en dis autant de son

système sur les feuilles. (Voyez tab. 16.)

JOSEPH GERTNER, dans un ouvrage intitulé: De fructibus et seminibus plantarum, a présenté le plan d'un système sur la situation, la forme, la consistance et le nombre des parties du fruit. Il divise les plantes, I.º en acotyledones, II.º monocotyledones, III.º dicotyledones, IV.º polycotyledones, et les sous-divise par le fruit supérieur ou inférieur, par l'embryon, et la radicule supérieure ou inférieure, centripete ou centrifuge, etc. Cet auteur n'ayant pas rangé les plantes contenues dans son ouvrage d'après ce système, mais les ayant seulement disposées par centuries, je ne rapporterai point sa concordance. (Voyez tab. 3.) (8).

<sup>(8)</sup> Joseph Gartner s'est frayé une nouvelle route dans son magnifique ouvrage, intitulé: De seminibus et fructibus plantarum. Indépendament de sa méthode, dont nous avons tracé le plan, il a présenté des caracteres d'environ mille genres, dans lesquels il a spécialement insisté sur la structure du fruit, la forme des semences et la manière dont elles adherent au placenta. Son ouvrage est d'autant plus précieux que l'on s'apperçoit en le vérifiant avec quelque attention, que toutes ses descriptions et ses annotations sont rédigées d'après nature. Ses dessins très-corrects expriment une multitude de détails sur les fruits et les semences, que l'on chercheroit inutilement dans les ouvrages de ses prédécesseurs. On peut même assurer que l'ouyrage de

RIVIN, professeur de Botanique à Leipsick, suivant une route bien différente de celle de ses prédécesseurs, employa le premier la régularité et le nombre des pétales pour former les classes de son système, et adopta la division reçue avant lui, des fruits gymnospermes et angiospermes pour en établir les ordres (9). Selon cet auteur, les fleurs sont I.° parfaites, II.° imparfaites. Ces dernières sont I.° parfaites, II.° imparfaites. Ces dernières sont I.° simples, 2.° composées; les simples, A régulières, B irrégulières, sous-divisées les unes et les autres par le nombre des pétales; les composées ont des fleurons A régulières, B régulières et irrégulièrs, C régulières. (Voyez tab. 18 et 19.)

BERNARD RUPPIUS, et Christophe Ludwig, ont suivi le système de Rivin. Le premier, divise les fleurs, I. en parfaites, II. imparfaites; les parfaites 1. en régulieres, 2. irrégulieres, les régulieres A en simples, B composées, et sous-divise les parfaites régulieres simples, et les parfaites irrégulieres, par le nombre des pétales; les

Gærtner est aussi nécessaire aux Botanistes qui veulent raviver leurs sensations, que les célebres Instituts de l'immortel Tournefort, sur-tout pour la partie des figures. Il est malheureux que le prix de cet ouvrage, qui a occasioné à son éditeur des frais très-considérables, ne le mette pas à la portée des éleves.

<sup>(9)</sup> Cet auteur rejeta avec raison la distinction des arbres et des herbes, comme n'étant pas fondée sur les principes de la fructification. Il a été imité par Rivin, Ruppius, Ludwig, Chret. Knaut, Gouan, Gattenhof, Bergen, Wernischeck, Linné, Thunberg, Gmelin, Villars, Gledistch, Haller, Allioni, Lamarck, Gilibert, Crantz, Hill, Van-Royen, Jussieu, Wachendorff, Adanson, Scopoli, Necker, Eder, Gerard, Wulf, etc.

imparfaites sont A à étamines, B conglomérées,

C sans fleur. (Voyez tab. 20 et 21.)

CHRISTOPHE LUDWIG, \* distribue les fleurs, I.° en parfaites, II.° en imparfaites. Les parfaites, 1.° en pétalées, 2.° apetales. Les pétalées A en régulieres, B irrégulieres. Les régulieres a en simples, b composées. Les fleurs parfaites pétalées régulieres simples, et les fleurs parfaites pétalées irrégulieres, sont divisées par le nombre des pétales. Les fleurs parfaites pétalées régulieres composées, ont des fleurons A réguliers, B réguliers et irréguliers, C irréguliers. Les fleurs imparfaites sont A à étamines, B amentacées, C pulvérulentes. (Voyez tab. 22 et 23.) (10).

CHRET. KNAUT adopta les principes de Rivin; mais en préférant le nombre des pétales à leur régularité, il a rendu son système très-différent de celui de cet auteur. Selon ce Botaniste, les fleurs ont I.º un seul pétale, II.º plusieurs pétales. Celles qui n'ont qu'un seul pétale, sont A monopétales \* uniformes, \*\* diformes, B aggrégées, \* uniformes, \*\* diformes, the uniformes et diformes. Celles qui ont plusieurs pétales sont A dipétales, B tripétales, C tétrapétales, D pentapétales, E hexapétales, F polypétales, \* uniformes ou \*\* diformes.

<sup>(10)</sup> Pour faciliter l'intelligence des concordances, je préviens que j'ai marqué d'une astérique le premier système de Ludwig, pour me conformer au Classes plantarum, et de deux, son second système. J'ai également marqué d'une astérique le système d'Haller, rédigé d'après celui de Ruppius; de deux astériques le système de son Enumeratio, et de trois, celui de son Historia. J'ai rapporté le système de Ludwig, dans l'ouvrage de Boëhmer pour en faire voir l'application à une flore particuliere.

Cet auteur appelle uniformes et diformes, les fleurs que Rivin désigne sous le nom de régulieres et irrégulieres. (Voyez tab. 24 et 25.)

LE CÉLEBRE HALLER, \* dans sa Flora jenensis, a suivi et perfectionné le système de Ruppius. Il divisa les végétaux par les fleurs, I.º visibles, II.º invisibles. Les fleurs visibles sont 1°. parfaites, 2.º imparfaites. Les parfaites sont 1.º régulieres, 2.° irrégulieres. Les régulieres sont A simples, a monopétales, b dipétales, c tripétales, d tétrapétales, e pentapétales, f hexapétales, g polypétales, et ont les semences 1°. nues, au nombre d'une, deux, trois, quatre ou plusieurs; 2.° couvertes par une A capsule \* simple \*\* divisée en deux, trois, quatre, cinq ou plusieurs parties, ou par une B baie à une, deux, trois, quatre ou plusieurs semences. Les fleurs parfaites régulieres B composées ont des fleurons a réguliers seulement, b réguliers et irréguliers, c irréguliers seulement. Les fleurs parfaites irrégulieres sont divisées comme les fleurs parfaites régulieres simples. Les fleurs imparfaites sont A coniferes, Bamentacées, C conglomérées, avec les semences 1.° aigrettées, 2.° couvertes par un cône, 3.° enfermées dans une baie, 4° membraneuses, ou sont D staminées, comme les graminées, les souchets, etc. Les végétaux dont les fleurs ne sont pas visibles, se rapportent aux mousses, champignons, etc. (Voyez tab. 26 et 27.)

LUDWIG, \*\* dans la seconde édition de ses Definitiones generum plantarum, publiée par Boehmer, a fait des changemens considérables à son premier système, qu'il a combiné avec le système sexuel. Dans celui-ci, il divise les plantes par

les fleurs I.° enveloppées, II.° nues. Les premieres sont 1.° parfaites, 2.° relatives. Les parfaites sont 1.° pétalées, 2.° apétales. Les pétalées sont A monopétales, a simples, \* régulieres, \*\* irrégulieres, b composées, \* tubulées, \*\* lingulées, \*\* mixtes, B dipétales, C tripétales, D tétrapétales, \* régulieres, \*\* irrégulieres, E pentapétales, \* régulieres, \*\* irrégulieres, \* pentapétales, \* régulieres, \* irrégulieres, \* ombellées, F hexapétales, G polypétales. Les fleurs parfaites apétales ne sont pas sous-divisées. Les fleurs relatives sont A monophytes, B diphytes. Les fleurs nues comprennent les cryptogames. (Voy. tab. 28 et 29.) (11).

<sup>(</sup>II) Ludwig, professeur de l'université de Leipsick, a été un des plus utiles professeurs de ce siecle. Mais ce qui le caractérise dans tous les ouvrages qu'il a publié, c'est une netteté et une clarté toujours soutenues. Il est connu comme Botaniste par deux excellens ouvrages, 1.º son Genera plantarum; 2.º ses Institutiones regni vegetabilis. On trouve dans le premier, la méthode de Rivin, perfectionnée et combinée avec celle de Linné. Ses descriptions des attributs des genres, sont énoncées avec élégance et précision. Mais ce qui rend cet ouvrage précieux et absolument nécessaire à tout Botaniste, c'est le pinax des noms génériques proposé par différens auteurs. Ludwig a exécuté le premier l'idée de Ray, d'ajouter fréquemment le caractere générique, déduit du port ou des autres attributs qui n'appartiennent pas à la fuctification. Dans ses Institutiones regni vegetabilis, on trouve une bonne logique Botanique pour la nomenclature, la formation des classes, des genres et des especes. Mais la seconde partie de cet ouvrage est plus précieuse, c'est un excellent traité de physiologie végétale, dans lequel l'auteur donne un résumé de ses observations, dont plusieurs sont neuves, sur-tout relativement au tissu cellulaire des végétaux et aux fonctions de cet important organe,

G. RUDOL. BOEHMER, dans sa Flora Lipsiæ indigena, a suivi le système de Ludwig, sans y rien changer, et l'a appliqué aux plantes de sa

flore. (Voyez tab. 30 et 31.)

G. M. GATTENHOF, qui a suivi le système de Ludwig, y a fait des changemens. Il divise les végétaux par les étamines I. visibles, II. invisibles. Ceux dont les étamines sont visibles, ont des fleurs 1. parfaites, 2. relatives. Les parfaites sont 1. pétalées, 2. apétales, etc. Le reste de ce système est le même que celui de Ludwig, excepté dans les apétales, dont il forme trois classes, et dans la derniere qu'il appelle cryptogamie, où se rapportent les végétaux dont les étamines ne sont pas visibles, et qui ne renferme que les fougeres. (Voyez tab. 32 et 33.)

ANTOINE GOUAN, dans sa Flore de Montpellier, a combiné le système de Rivin avec celui
de Linnœus. Il divise les fleurs, I.° en visibles,
II°. en invisibles. Les visibles, I.° en pétalées,
2.° apétales. Les pétalées, I.° en simples, 2°. composées. Les simples, en A monopétales, B dipétales,
C tripétales, D tétrapétales, E pentapétales, F hexapétales, G polypétales, \* régulieres, \*\* irrégulieres. Les composées ont des fleurons \* réguliers,
\*\* irréguliers, \*\*\* réguliers et irréguliers. Les
fleurs invisibles ou crypthanthemes, renferment la

cryptogamie. (Voyez tab. 34 et 35.)

JOSEPH PITTON. TOURNEFORT, professeur de Botanique à Paris, donna le premier un système sur la forme de la corolle, et le divisa en classes, ordres, genres et especes. Il établit ses classes sur la figure de la corolle, et forma la plupart de ses ordres, par la considération du germe inférieur

inférieur ou supérieur. Selon cet auteur, les plantes sont I.º herbacées, II.º ligneuses. Les herbacées ont des fleurs 1.º pétalées, 2.º apétales. Les pétalées sont 1.º simples, 2.º composées. Les simples, sont A monopétales, B polypétales, \* régulieres, \*\* irrégulieres. Les composées sont A flosculeuses, B semi-flosculeuses, C radiées. Les ligneuses sont également, A apétales, B pétalées. Ces dernieres, sont a monopétales, b polypétales; et les polypétales \* régulieres, \*\* irrégulieres. (Voy. tab. 36 et 37.)

JULIUS PONTÉDERA, professeur de Botanique à Padoue, entreprit de corriger le système de Tournefort, dont il s'écarta, en regardant comme absolus les principes qu'il avoit adopté, au lieu que le Botaniste Français sacrifia quelquefois les siens pour obtenir des classes naturelles. Cet auteur distingua les végétaux par les bourgeons, qui lui fournirent ses principales divisions; savoir, les fleurs à bourgeons, ou privées de bourgeons. Cet auteur appelle imparfaites, les plantes que Tournefort nomme apétales ; distribue les campaniformes en quatre ordres ; désigne les fleurs composées, sous le nom de conglobées; disperse dans différentes classes les liliacées de Tournefort, et commençant par les plantes imparfaites, il descend successivement jusques aux plantes parfaites, citant des-lors les apétales avant les pétalées, les irrégulieres avant les régulieres. En analysant son système, nous verrons que, selon cet auteur, les plantes sont I.º incertaines, II.º certaines; les premieres ne sont point sousdivisées. Les certaines sont 1.º privées de bourgeons, de fleurs, ou ont des fleurs A imparfaites, B parfaites, a monopétales \* simples, \*\* con-

globées, b polypétales : 2.° elles sont pourvues de bourgeons, et ont des fleurs A imparfaites, B parfaites, a monopétales, b polypétales. Il semble que cet auteur auroit pu réunir la 4º classe à la 22º, la 6º à la 23º, la 8º à la 24º, la 9º à la 25º, la 14º à la 26° et la 18° à la 27°. Comme il n'a point publié le plan général de son système qu'il avoit proposé dans ses dissertations de Botanique, je ne citerai point sa concordance. ( Voyez tab. 38 et 39.)

J.F. SEGUIER, dans un ouvrage intitulé: Plantæ Veronenses, a suivi le système de Tournefort; mais sa division méthodique differe de celle de ce célebre Botaniste, 1.º par la distribution, le nombre de ses classes, 2.° par le défaut de sousdivision dans la majeure partie de ses mêmes classes. Il distribue les plantes, I.º en herbes, H.º en arbres. Les herbes ont des fleurs 1.º simples, 2.° composées. Les simples sont A apétales, B pétalées; les pétalées, a monopétales, b polypétales. Les fleurs composées sont A flosculeuses, B semi-flosculeuses, C radiées. Les arbres ont des fleurs A apétales, B monopétales, C polypétales. ( Voyez tab. 40 et 41.) (12).

<sup>(12)</sup> J. François Seguier est un des savans de ce siecle qui a le plus honoré sa longue vie par ses vertus et par des travaux utiles. Mis au premier rang des antiquaires, il s'est fait un nom parmi les Botanistes, par deux ouvrages utiles. Dans l'un, il a présenté le catalogue de presque tous les auteurs de Botanique. Cet ouvrage, fruit de ses longs voyages en accompagnant le respectable de Mafei, est recommandable par l'exactitude des citations et par la connoissance qu'il procure aux amateurs, d'une multitude

C. AUG. BERGEN, dans sa Flora Francosurtana, a pareillement adopté le système de Tournesort, dont il s'éloigne beaucoup dans ses huit
dernieres classes, et sur-tout en ce qu'il réunit les
arbres avec les herbes. Selon cet auteur, les végétaux ont des fleurs I.º simples pétalées, A monopétales, B polypétales, \* régulières, \*\* irrégulières;
II°. composées, pétalées, A flosculeuses, B semiflosculeuses, C radiées; III.º apétales ou à étamines, IV.º des parties analogues aux fleurs, V.º n'ont
point de fleurs. (Voyez tab. 42 et 43.)

DURANDE, dans sa Flore de Bourgogne, divise les fleurs, L'en monopétales, II. polypétales, III. apétales. Ces trois sections primitives sont sous-divisées en dix-sept classes, prises de la forme des fleurs, 1. monopétales A régulières, B personnées, C labiées, D composées, E aggrégées; 2. polypétales, A malvacées, B cruciformes, C rosa-

d'ouvrages très-rares, qui ne se trouvent aujourd'hui que dans les grandes bibliotheques publiques. Le second ouvrage de Seguier présente l'énumération des plantes qui croissent dans le voisinage de Véronne, et sur le mont Baldi, déjà célebre parmi les Botanistes, par le catalogue qu'en avoit donné Pona. Seguier, attaché à la méthode de Tournefort, l'a présentée sous une nouv elle forme, en profitant des vues et des observations de son ami Pontedera. Sa Flore, indépendamment d'une multitude d'observations relatives à la station de chaque espece, présente plusieurs descriptions des plantes qui lui paroissoient nouvelles ou très-rares. Quelques - unes sont soutenues par des figures trèsexactes, dessinées par Seguier lui-même. Et ce qui prouve combien le coup-d'œil de cet observateur étoit sûr, c'est que la plupart des especes qu'il annonce comme neuves, ont été reconnues par Linné.

cées, D ranunculées, E caryophyllées, F ombelliferes, G légumineuses; 3.° apétales, A liliacées, B spadicées, C staminées, D graminées, E à fructification cachée. (Voyez tab. 44 et 45.) (13.)

VERNISCHECK, dans son Genera plantarum, a donné un système sur le nombre des divisions de la corolle. Il divise les fleurs, I.º en pétalées, A monopétales a simples, b composées, B polypétales, II.º en apétales. Les fleurs pétalées monopétales simples constituent cinq classes, les composées trois, les polypétales huit, et les apétales

quatre. ( Voyez tab. 46 et 47.)

Montpellier, a donné un système sur le calice. Il en distingue deux especes; savoir, I.º un externe, qu'il appelle périanthe; II.º un autre interne, qu'il nomme péricarpe. De là il déduit trois divisions essentielles; 1.º à calice externe seulement, lorsqu'il existe un périanthe et point de péricarpe; 2.º à calice interne seulement, lorsqu'il y a un péricarpe sans périanthe; 3.º à calice externe et

<sup>(13)</sup> Durande, professeur de Botanique à Dijon, et célebre médecin praticien, a publié un ouvrage intitulé: Flore de Bourgogne, 3 vol. in-8.º Dans le premier volume, il a exposé avec netteté et précision tous les dogmes de la philosophie Botanique les plus généralement avoués. Dans le second, on trouve l'énumération méthodique des plantes observées en Bourgogne, suivant une méthode mixte, très-analogue à celle de Tournefort et d'Allioni, comme on le verra par le développement que j'en ai donné. Dans le troisieme, qui est sans contredit le mieux rédigé et le plus utile, l'auteur a exposé briévement tous les usages des plantes, confirmés par l'observation et l'expérience.

interne en même temps, lorsqu'il y a un périanthe et un péricarpe. Pour obtenir la présence du calice que l'auteur recherche dans toutes les plantes, il dit que le calice externe renferme et soutient la fleur. Le calice qui la renferme est le périanthe, celui qui la soutient est le germe ou le sommet du germe. D'après ces données générales, il divise les plantes, I.º en herbes, II.º en arbres. Les herbes ont 1.º un calice externe seulement, A qui renferme une fleur a cachée, b à étamine, e monopétale, d polypétale, e composée, B qui soutient une fleur a monopétale, b polypétale; 2.° un calice interne seulement; 3.° un calice externe et interne en même temps, dont la fleur est a monopétale, b di ou tripétale, c tétrapétale, d polypétale. Les arbres ont un calice A externe seulement, B interne seulement, Cexterne et interne en même temps. Cet auteur a employé la corolle, le calice, le fruit pour établir ses ordres. (Voyez tab. 48 et 49.) (14.)

<sup>(14)</sup> Magnol, professeur de Botanique à Montpellier, digne coopérateur des travaux de Tournefort, a examiné avec sévérité les différentes especes de plantes que l'on observe dans la partie méridionale de la France, et les a fait connoître dans un ouvrage bien exécuté pour le temps, intitulé: Botanicon Monspeliense. Cette énumération est faite par ordre alphabétique. Dans un âge plus avancé, il entreprit de tirer parti de toutes ses observations, et de les coordonner dans un ordre systématique. Nous lui devons deux ouvrages rédigés d'après ses vues; mais celui qui a mérité de fixer le plus l'attention des Botanistes, c'est son Character novus plantarum, dans lequel il distribue les plantes d'après une méthode très-ingénieuse, en regardant comme calices le périanthe de Linné, et l'enve-

On trouve dans le Classes plantarum de Linné, le système que ce grand homme a publié sur les différentes especes de calices, dont il reconnoît six principales; savoir, 1.° le spathe, 2.° la balle, 3.° le chaton, 4.° l'involucre, 5.° le périanthe, 6°. la coiffe. Les plantes auxquelles appartiennent les quatre premieres especes de calices, sont A les spathacées, B les graminées, C les amentacées, D les ombellées. Le périanthe, qui est le calice le plus commun et le plus varié, est 1.º multiflore, lorsqu'il renferme plusieurs fleurs (dans les composées), 2. unissore, lorsqu'il ne contient qu'une seule sleur; des-lors il est A double (dans les malvacées) B simple. Lorsqu'il est simple, il produit A une fleur sur ses parois internes (dans les arbres fruitiers), ou il est Bassis sur le germe, en forme de couronne, et renferme le germe (dans les orchidées.) Le périanthe forme quelquefois un corps séparé de la corolle; dans ce cas, il est a d'une structure ou d'une forme différente de celle de la corolle (dans les anomales, ) ou il affecte b deux formes différentes dans les mêmes fleurs, ou il est c uniforme avec la corolle, et alors il \* tombe avec elle, s'il n'est pas tombé avant elle (dans les cruciferes, ) \*\* ou il persiste jusqu'à la maturité du fruit. Dans ce cas, ses bords sont a égaux,

loppe des semences qui est proprement le péricarpe du même auteur. On trouve dans le Botanicon Monspeliense, et dans l'Hortus regius Monspeliensis, une centaine d'especes qui avoient échappées aux recherches laborieuses des Pana, des Lobel, des Dalechamp et des Bauhin. Les descriptions qu'il en a donné sont exactes, et les figures qui les accompagnent, quoique mal gravées, rendent très-bien les especes qu'elles désignent.

et il soutient \* un \*\* plusieurs pétales, ou ses bords sont b inégaux, avec \* un \*\* plusieurs pétales. Le périanthe ou la corolle tombe a après la floraison (dans les liliacées,) b après la maturité du fruit (dans les apétales.) Le calice est rarement une coiffe dans les fleurs nues, c'està-dire, privées des différentes especes de calices et de corolles, désignés dans ce systême. (Voyez

tab. so et si.)

Le système sexuel, dont le développement fera le sujet de la seconde partie de cet ouvrage, porte sur deux attributs principaux; savoir, 1.º l'apparence des sexes dans les 23 premieres classes, fondées sur le nombre, la figure ou proportion, la situation et la connexion des étamines; 2.° sur le peu d'apparence des sexes dans la 24e classe. Les ordres sont pris du nombre des pistils ou des étamines, excepté dans la 14, 15, 19 et 24° classe. En analysant ce système, nous verrons que les noces des plantes sont I.º publiques et leurs fleurs visibles, II.º cachées et leurs fleurs à peine visibles. Les plantes dont les fleurs sont visibles, sont 1°. monoclines, 2.° diclines. Dans les monoclines, les maris et les femmes occupent un seul et même lit, c'est-à-dire, les fleurs hermaphrodites présentent des étamines et des pistils, et sont A sans affinité, c'est-à-dire, ne sont réunies par aucune de leurs parties, et sans a subordination ni affinité, n'offrant aucune proportion déterminée dans la monandrie, diandrie, etc., ou elles observent b une subordination, c'est-à-dire, offrent toujours deux étamines plus courtes dans la didynamie et tétradynamie, ou ont B de l'affinité et sont réunies entr'elles ou avec le pistil, dans la monadelphie, diadelphie, polyadelphie, syngénésie, gynandrie. Les fleurs visibles diclines sont celles dont les maris et les femmes occupent des lits différens, et qui présentent dans la même espece, des fleurs mâles et femelles dans la monoécie, dioécie, polygamie. Les plantes dont les noces sont cachées et les fleurs à peine visibles, constituent la cryptogamie. (Voyez tab. 52 et 53.)

CHARLES PIERRE THUNBERG, dans sa Flora Japonica, a suivi le systême sexuel, qu'il a réduit à vingt classes, par la suppression de la gynandrie, monoécie, dioécie et polygamie. Ce systême n'est fondé que sur le nombre, la figure ou proportion, et la connexion des étamines. (Voyez tab.

54 et 55.) (15.)

JOS. FRED. GMELIN, dans la derniere édition du Systema naturæ, a ajouté aux suppressions de Thunberg, celle de l'icosandrie, qu'il a réuni à la polyandrie. Son système ne renferme que dix-neuf classes. (Voyez tab. 56 et 57.) (16.)

a eu l'avantage sur son maître, de voir sur les lieux une multitude de plantes exotiques, que ce grand Botaniste n'avoit pu examiner que desséchées en herbier. Il en a découvert une foule d'autres absolument inconnues avant lui. Nous lui devons entr'autres ouvrages, plusieurs monographies rédigées dans le même esprit et avec la même sagacité que celles de Linné. Mais sa Flore du Japon annonce sur-tout ce qu'on doit attendre d'un Botaniste aussi consommé. Les caracteres naturels et essentiels des genres, les phrases caractéristiques des especes et leurs descriptions, nous prouvent que Thunberg peut seul achever le grand ouvrage conçu avec tant de génie par son immortel professeur.

<sup>(16)</sup> Gmelin, professeur à Goettingue, a osé reprendre le Systema natura de Linné, enchaîner à sa méthode VILLARS,

VILLARS, dans son Histoire des plantes du Dauphine (17), a suivi le système sexuel, qu'il a réduit à treize classes. Ce système porte sur trois points principaux; savoir, les étamines I.º déterminées, II.º indéterminées, III.º invisibles. Les premieres, offrent un nombre d'étamines correspondant au numéro de la classe, dans la monandrie, diandrie, triandrie, etc. Les secondes sont 1.º réunies par leurs filamens, dans l'heptandrie, mona-

et à son plan toutes les especes publiées depuis la mort de ce grand homme. Sans parler du travail étonnant sur les deux autres regnes de la nature, qui offre une multitude de faits et d'observations neuves, et quelquefois des distributions absolument nouvelles, comme dans sa Minéralogie, qui peut être regardée comme un ouvrage neuf, il a traité les végétaux d'après les vues et les réformes que Thunberg avoit projetées. en incorporant dans les classes analogues pour le nombre des étamines, quelques classes qui sont distinctes dans le systême de Linné: telles sont la Gygnandrie, monoécie, dioécie et polygamie. Mais ce qui rend cet ouvrage précieux pour tout amateur qui veut connoître l'étendue actuelle de la science, c'est l'énumération, d'après les principes de Linné, de près de huit mille especes nouvelles, qui toutes sont ramenées à leurs classes, à leurs ordres, et signalées par des caracteres essentiels, génériques et spécifiques.

Grenoble se glorifie de posséder dans son sein, est un de ces hommes rares, né avec le génie de la Botanique, et les talens nécessaires pour en répandre le goût et la connoissance. Pendant un séjour de près de trois ans à Grenoble, ayant eu occasion de parcourir avec lui les montagnes calcaires et granitiques du ci-devant Dauphiné, j'ai pu apprécier ses vastes connoissances. Sa réputation en Botanique me dispense des éloges auxquels sa modestie se refuseroit.

J. GOTTLIEB GLEDITSCH a établi son système, sur la situation des étamines. Il divise les végétaux d'après la fructification I.º apparente, II.º cachée, et ces deux considérations lui fournissent huit classes, dont les quatre premieres sont relatives à l'insertion des étamines; 1.º sur le réceptacle, 2.º sur la corolle, 3.º sur le calice, 4.º sur le pistil. Les quatre dernieres renferment la cryptogamie de Linné. (Voyez tab. 60 et 61.) (18).

En récapitulant tout ce que nous avons dit sur les systèmes universels artificiels fondés sur une partie de la fructification exclusivement, et qui constituent la premiere classe, il n'est personne qui n'ait vu que les auteurs qui ont donné les premiers un système sur le fruit, la corolle, les étamines, ont été en général imités ou suivis par les Botanistes qui après eux ont traité la même partie; ainsi, le système de Cæsalpin ayant été suivi en partie par Paul Hermann, celui-ci par

<sup>(18)</sup> Gleditsch, professeur de Botanique à Berlin, s'est rendu recommandable aux amateurs de cette science par quelques ouvrages intéressans, et par plusieurs mémoires insérés parmi ceux de l'académie de Berlin, dont quelques - uns exposent des observations neuves sur les rapports des plantes et leur utilité. Son système artificiel, dont le fondement est l'insertion des étamines sur les différentes parties de la fructification, est travaillé avec soin, et présente une multitude d'observations qui avoient échappées à Linné.

Chret. Knaut, et par Boerrhaave qui combina son système avec ceux de Ray et de Tournefort, ce chaînon conduit depuis Cæsalpin jusqu'à Boerrhaave.

Les systèmes suivans nous offrent encore la même uniformité. Rivin, qui le premier publia le sien sur la régularité et le nombre des pétales, fut imité par Ruppius, Haller, Ludwig, Chret. Knaut, Gattenhof, Gouan. Aussi Linné a-t-il dit avec raison : prima itaque gloria Rivino, quod à floribus classes condiderit primus. Pontedera, Seguier, Bergen, Durande ont adopté le système de Tournefort. Thunberg, Gmelin, Villars ont suivi le système de Linné avec des changemens. Magnol, Linné, Wernischeck, Gledistch ont donné des systèmes qui leur sont propres. Je vais examiner actuellement les systemes universels artificiels fondés sur toutes les parties de la fructification, qui forment la seconde classe.

Ces systèmes ont été appellés mixtes, parce qu'ils ne sont en effet qu'un mélange de plusieurs autres systèmes, de la combinaison desquels est résultée une nouvelle méthode, moins assujettie dans sa distribution ou sa marche à des principes fixes, et dont la latitude est bien plus grande. Les systèmes de la premiere classe ne sont établis que sur une seule base, ceux-ci au contraire en reconnoissent plusieurs, comme il sera facile d'en juger par leur analyse.

LE CÉLEBRE ALBERT DE HALLER, \*\* Suisse (19),

<sup>(19)</sup> Haller a été un des hommes les plus étonnans de ce siecle. On l'a comparé avec raison, par la variété

dans son Enumeratio méthodica stirpium Heltetiæ indigenarum, divise les plantes en quinze
classes, considérées relativement 1.° à l'absence ou
présence des étamines, du calice, de la corolle,
des semences; 2.° au nombre des étamines relativement à celui des divisions de la corolle; 3.° au
nombre des cotyledons; 4.° au nombre et à la
nudité des semences. Selon cet auteur, les plantes
ont des étamines et des fleurs I.° invisibles, II.° visibles. Les premieres, c'est-à-dire, celles qui ont
des étamines et des fleurs invisibles, se rapportent à la cryptogamie de Linné. Les secondes, à

et la profondeur de ses connoissances, au célebre philosophe Leibnitz. Non-seulement il avoit osé embrasser dans toute leur étendue, toutes les parties essentielles et accessoires de la médecine, mais encore toutes les branches de la littérature. Dans un âge peu avancé, il étoit déja regardé comme un des premiers anatomistes de ce siecle, et comme le prince des physiologistes. Dès qu'il daigna s'occuper d'Histoire naturelle et de Botanique, il enleva tous les suffrages. Son Enumeratio methodica stirpium Helvetia indigenarum, fut son principal titre à sa réputation comme Botaniste. Cet ouvrage publié en 1742, lui parut cependant bientôt après trèsdéfectueux. Il ne cessa de le corriger et de l'améliorer jusqu'en 1768, qu'il le publia sous un nouveau titre et sous une nouvelle forme; savoir, sous le titre d'Historia stirpium indigenarum Helvetiæ inchoata. Dans ce grand ouvrage, qu'on peut regarder comme un chefd'œuvre dans son genre, son système quoique compliqué annonce l'étendue du génie de l'auteur. Sa synonymie presque toujours sûre, prouve son étonnante érudition. Ses descriptions dont le plan lui appartient, sont peut-être, après les Linnéennes, les seules véritablement caractéristiques. On auroit seulement désiré que sa langue, plus constante et plus uniforme, eut été réformée d'après les principes adoptés par Linné.

étamines et fleurs visibles, sont 1.° apétales, 2.° pétalées. Les pétalées sont A monocotyledones, B di-

cotyledones. (Voyez tab. 62 et 63.)

Le même Botaniste, dans son Historia stirpum indigenarum Helvetiæ inchoata, a présenté à-peuprès le même systême, mais dans un sens inverse: car il commence ses divisions par les plantes à étamines et fleurs I.° visibles, A pétalées, B apétales, II.º invisibles. Ce système est établi 1°. sur la présence ou absence des étamines, du calice, de la corolle; 2.° sur la connexion, la proportion des étamines; 3.º leur nombre relativement à celui des divisions de la corolle; 4.° sur le nombre et la nudité des semences. (Voyez tab. 64 et 65.)

WACHENDORF, professeur de Botanique à Utrech, dans son catalogue, intitulé: Horti ultrajectini index, divise les végétaux en dix-neuf classes, en les considérant relativement 1°. à l'apparence ou occultation des fleurs; 2.º au nombre des cotyledons, des étamines relativement aux pétales ou divisions de la corolle; 3.° à la réunion ou liberté des étamines; 4.º à leur proportion relative; s. à la situation respective des fleurs mâles et femelles; 6.° à la figure du calice; 7.° à la perfection des fleurs plus ou moins completes. D'après cet exposé, nous verrons que les plantes ont des fleurs I.º apparentes ou visibles, II.º cachées ou invisibles. Les premieres sont 1.º polycotyledones, 2.° monocotyledones. Les polycotyledones sont A completes ou parfaites, B incompletes ou imparfaites. Les monocotyledones ont des fleurs à calice ou sans calice. Les plantes dont les fleurs sont cachées ou invisibles, forment la cryptogamie de Linné. (Voyez tab. 66 et 67.)

CHARLES ALLIONI, professeur de Botanique à Turin, (20) dans sa Flora Pedemontana, a donné un système où il divise les plantes en douze classes, considérées relativement 1.° à l'apparence ou occultation des fleurs; 2.° à la présence ou absence de la corolle; 3.° au nombre des pétales; 4.° à la forme de la corolle; 5.° à l'enveloppe ou nudité des graines. Selon ce Botaniste, les plantes ont des fleurs 1.° visibles, II.° invisibles. Les premieres sont 1.° pétalées, 2.° apétales. Les pétalées sont monopétales simples ou composées, di et tripétales, tétrapétales, pentapétales, etc. Les apétales sont non-graminées ou graminées. Les fleurs invisibles renferment la cryptogamie de Linné. (Voyez tab. 68 et 69.)

J. EMMANUEL GILIBERT, professeur de Botanique dans l'université de Vilna (21), distribue

de ce siecle. Il a eu le bon esprit de s'occuper spécialement des plantes indigenes de la partie septentrionale de l'Italie. Ses recherches nous ont valu plusieurs especes neuves, aussi bien décrites que figurées. Son systême, qui peut être regardé comme un perfectionnement de ceux de Tournefort et de Rivin, est précieux, parce qu'il l'a combiné avec tant de justesse, qu'il a conservé le plus grand nombre possible de familles naturelles.

<sup>(21)</sup> Actuellement professeur d'histoire naturelle à l'école centrale du département du Rhône, savant sans jalousie, éloquent sans vanité, passionné pour les sciences dans lesquelles il s'est acquis une réputation aussi célebre que bien méritée, tel est le docteur Gilibert. L'amitié qui m'unit à lui m'impose la douce obligation de lui témoigner publiquement ma reconnoissance, pour toutes les bontés dont il n'a cessé de me combler depuis que j'ai l'avantage de le connoître.

le regne végétal en quatre séries principales, relativement 1. à la présence ou occultation des étamines; 2.° à la figure de la corolle; 3.° au nombre des étamines ; 4.° à la perfection des fleurs plus ou moins completes; 5.º à la présence ou absence des pétales et du calice. Selon cet auteur, les plantes ont des fleurs I.º visibles, II.º invisibles. Celles dont les fleurs sont visibles, ont des corolles 1.º unipétales, A non-figurées, B figurées, C composées; 2.° polypétales A uniformes, B diformes, Cà peu d'étamines, D à étamines nombreuses; 3°. incompletes, A apétales calicinées à étamines, B pétalées sans calice, C pétalées et calicinées. Les plantes dont les fleurs ne sont pas visibles, se rapportent à la cryptogamie de Linné. (Voyez tab. 70 et 71.)

CRANTZ, dans ses Institutiones Rei herbariæ (22), propose cet axiome: La nature a donné

<sup>(22)</sup> Crantz, professeur de l'université de Vienne, s'est fait un nom en Botanique par deux ouvrages : 1.9 ses Institutiones Rei herbaria; 2.º ses Plantarum austriacarum fasciculi. Dans le premier, il a cherché à perfectionner la méthode naturelle de Ray. Il a surtout beaucoup insisté sur des rapports trop négligés; savoir, ceux qu'il appelle habitus absolutus, lorsque toutes les plantes d'une famille se ressemblent par un grand nombre d'attributs, et l'habitus deliquescens, lorsqu'elles ne sont liées que par un petit nombre. Cet ouvrage quoique considérable, n'est pas celui qui lui fait le plus d'honneur : car, après s'être emparé de toutes les observations de Linné, qui lui ont fourni tous les détails de ses institutions, il l'a critiqué avec une amertume et une dureté de style sans exemple. Son second ouvrage est beaucoup plus précieux, on y trouve les descriptions et les figures de plusieurs plantes des montagnes alpines et sub-alpines d'Autri-

un port aux choses qu'elle a créées, lui seul unit ou sépare les végétaux, approuve ou rejette les systèmes de Botanique: le port absolu est infaillible. Dès-lors, classant les végetaux par la florescence I.º cachée, II.º apparente, il divise ceux dont la florescence est cachée, par le port absolu, tels sont les cryptantheres, et ceux dont la florescence est visible, 1.º par le port absolu et d'affinité, qui comprend les fleurs incompletes; 2.º par le port absolu et déliquescent, sous lequel se trouvent rangées les composées, graminées, palmiers, liliacées, labiées, personnées, papillonacées, cruciferes, ombelliferes, columniferes; 3. par le port simple, auquel se rapportent les caliciflores, fructiflores; 4.° enfin, lorsqu'il ne peut plus recourir au port, il emploie la méthode artificielle, qui lui fournit deux divisions, dont l'une renferme les fleurs à peu d'étamines ; l'autre, les fleurs à étamines nombreuses. (Voyez tab. 72 et 73.)

JEAN HILL, dans son Herbarum Britanicum (23), a tracé le plan d'un système mixte,

che, qui avoient échappées aux recherches et à la sagacité de l'immortel l'Ecluse.

dres, a publié plusieurs grands ouvrages sur la Botanique, entr'autres un système général des végetaux en Anglais, en 22 vol. in-fol. Mais ce grand travail n'ayant pas été terminé, je ne présente que le plan de sa méthode, d'après la table qu'il en a tracé lui-même au commencement de son Herbarium Britanicum. J'observerai que dans ses premieres classes, savoir, les sleurs composées, il s'écarte beaucoup de la manière de philosopher de Linné, dans la formation de ses genres. Comme fondé

fondé 1.º sur les tiges ligneuses et herbacées, 2.° sur l'apparence ou occultation des fleurs; 3.° sur la disposition des fleurs; 4.° sur la perfection des fleurs; 5.° sur la presence ou absence de la corolle et du calice; 6.° sur la forme de la corolle; 7.º sur la réunion ou liberté des étamines. Selon le plan de son système, les herbes ont des fleurs I.º visibles, II.º invisibles. Les premieres, sont 1.° rapprochées, renfermées dans un calice commun, et ont les antheres A réunies, B libres; 2.º éloignées, situées séparément. Ces dernieres, sont A disposées circulairement au sommet de la tige, B éparses sans ordre sur les différentes parties de la tige. Dans ce dernier cas, elles sont An parfaites, les étamines et les pistils se trouvant dans la même fleur, As imparfaites, les étamines et les pistils se trouvant dans différentes fleurs. Les parfaites sont Aa complettes, ayant des pétales et un calice, Ab incomplettes, les pétales ou le calice manquant, et quelquefois tous les deux. Les complettes sont Aaa régulieres, également formées par un, deux ou plusieurs pétales, Abb irrégulieres, inégalement divisées par un, deux ou plusieurs pétales. Les incomplettes

cet auteur n'a pas développé sa méthode pour toutes les classes dont il avoit tracé le plan, la mort l'ayant surpris aux deux tiers de ses travaux, je ne rapporterai pas sa concordance. Cependant son ouvrage est précieux par la quantité de figures dessinées d'après nature, de plantes qui n'avoient jamais été gravées, même parmi les européennes. Non-seulement les planches de cet auteur présentent les attributs qui caractérisent les especes, mais encore ceux qui constituent les genres. On peut assurer que c'est la plus grande entreprise connue en Botanique.

ont Acc des pétales sans calice, Add un calice sans pétales, Aee n'ont ni pétales ni calice. Les herbes à fleurs invisibles, renferment la cryptogamie de

Linné. (Voyez tab. 74 et 75.)

La troisieme classe qui comprend les systèmes universels artificiels par partition avec opposition d'attributs, ne nous en offre que deux. Les systèmes de cette division sont faciles, parce que les caracteres qui constituent leur ensemble sont très-

prononcés.

Le premier est celui de J. RAY, ministre Anglais, qui, jaloux de conserver les classes naturelles, établit son système sur le nombre des cotyledons. Les semences nues ou couvertes lui fournirent la premiere distribution de ses plantes, qu'il sous-divisa par le nombre des semences. Cet auteur divise les plantes, I.º en herbes privées de bourgeons, II.º en arbres pourvus de bourgeons. Les herbes sont A imparfaites, B parfaites. Les parfaites sont 1.º dicotyledones, 2.º monocotyledones. Les dicotyledones ont des fleurs A apétales, B composées, C simples. Ces dernieres ont a une seule semence nue, b deux, c quatre, d plusieurs semences, aa enfermées dans une pulpe, v b dans une membrane \* composée, \*\* simple. Les arbres sont A monocotyledones, B dicotyledones. Dans ces derniers, la fleur est a séparée du fruit, b réunie au fruit, qui est \* ombiliqué, \*\* sans ombilic, \*\*\* sec, \*\*\*\* en silique, \*\*\*\*\* anomale. (Voyez rab. 76 et 77.)

LAMARCK, dans sa Flore Française (24),

<sup>(24)</sup> Lamarck, Botaniste Français, s'est rendu célebre par trois ouvrages d'une grande étendue et d'une

a disposé les végétaux d'après une nouvelle méthode d'analyse, relativement 1.° à la distinction ou non distinction des fleurs, 2.° à leur réunion ou séparation, 3.º au sexe des fleurs, 4.º à la situation du germe, s.º à la perfection des fleurs plus ou moins complettes, 6.° au nombre des étamines, 7.° à la forme de la corolle, 8.° à l'insertion des pétales. Selon cet auteur, les fleurs sont I.º distinctes, II.º indistinctes. Les fleurs distinctes renferment les fleurs 1.º conjointes, 2.º disjointes. Les fleurs conjointes (c'est-à-dire, composées.) ont des fleurettes A de même sorte, telles sont les flosculeuses et semi-flosculeuses, B de deux sortes, comme les fleurs radiées. Les fleurs disjointes, comprennent les fleurs A unisexuelles, (c'est-à-dire, monoïques et dioïques,) B bisexuelles, (c'est-à-dire, hermaphrodites.) Les fleurs bi-

exécution très-soignée, 1.º sa Flore française; 2º. son Dictionnaire de Botanique, dans l'Encyclopédie méthodique; 3.º ses Tableaux, qui accompagnent son Dictionnaire. Sa Flore française offre une distribution, méthodique qui s'éloigne considérablement des partitions adoptées par les Botanistes modernes, et qui rentrent dans la méthode de Ray, en analysant sans interruption les végétaux par bifurcation ou par opposition. Cette méthode bien saisie, peut certainement conduire un éleve au nom de la plante d'une maniere sure et même agréable. Mais si, dans le principe, la maniere de philosopher de Lamarck a quelques rapports avec celle de Ray, son exécution est absolument. différente, et appartient véritablement à l'auteur, comme on s'en assurera par l'analyse détaillée que j'en présente. La Flore française, outre le signalement. précis des genres et de chaque espece, offre des descriptions caractéristiques, aussi bien rédigées en françois que celles de Haller en latin.

sexuelles sont 1.° pétalées, 2.° non-pétalées. Les pétalées ont l'ovaire A dans la corolle, B sous la corolle. Les fleurs dont l'ovaire est dans la corolle, sont AA complettes, AB incomplettes. Les fleurs complettes ont Aa dix étamines ou moins, et une corolle a monopétale \* réguliere, \*\* irréguliere, b polypétale, ou Ab onze étamines ou plus, et les pétales \* insérés, \*\* non-insérés sur le calice. Les fleurs incomplettes ne sont pas sous-divisées. Les fleurs dont l'ovaire est sous la corolle, ont une corolle A monopétale, B polypétale. Les fleurs non-pétalées sont a nues, b glumacées. Les fleurs indistinctes, renferment les quatre familles de la cryptogamic. Voyez tab. 78 et 79.)

La quatrieme classe, renferme les systèmes établis sur les feuilles; savoir, ceux de Sauvages et

de Duhamel du Monceau.

FRANÇOIS BOISSIER DE SAUVAGES (25);

<sup>(25)</sup> Sauvages, professeur de médecine à l'université de Montpellier, a laissé un nom cher à une multitude de disciples, qui se glorifient de l'avoir eu pour maître. Son goût pour les différentes parties de l'histoire naturelle étoit bien prononcé; mais n'ayant enseigné la Botanique que par brevet temporaire, et devant une grande partie de son temps aux autres parties de la médecine, qu'il étoit obligé de développer habituellement par devoir, il n'a pas jeté autant de lumiere sur notre science, que sur la noosologie dont il s'occupoit spécialement. Cependant, nous lui devons deux mémoires précieux, insérés parmi ceux de l'académie des sciences de Paris. Il a constitué le premier quelques genres qu'on observe dans nos départemens méridionaux, comme le Bufonia, etc. Il a indiqué plusieurs especes spontanées autour de Montpellier, qui avoient échappées aux recherches de Magnot. Dans

dans un ouvrage intitulé: Methodus foliorum, a publié un système sur les feuilles considérées relativement 1.° à leur absence ou présence, 2.° leur forme, 3.º leur situation, 4.º leurs divisions. Cet auteur considere les plantes I.º dépourvues de feuilles (aphyllæ), II.º garnies de feuilles 1.º simples, 2.° composées. Les feuilles simples sont A entieres, B divisées. Les feuilles entieres sont a radicales, b étroites, c larges, d opposées, e en anneaux. Les feuilles divisées, sont a digitées, b palmées. Les feuilles composées, sont a pinnées, b décom-

posées, c laciniées. (Voyez tab. 80 et 81.)

DUHAMEL DU MONCEAU a donné un systême sur les arbres et arbustes rangés suivant la forme et la position de leurs feuilles. La distinction des classes générales est tirée de la forme des feuilles, et les sections ou subdivisions de ces classes sont tirées de la position des feuilles sur les branches. Cet auteur présente dans la table de son système, une division avantageuse des arbres qui conservent leurs feuilles pendant l'hiver, et de ceux qui s'en dépouillent. Il range dans la premiere classe, les arbres et arbustes qui ont leurs feuilles simples et entieres sans grande découpure : dans la seconde, ceux qui ont leurs feuilles simples, mais découpées assez profondément: dans la troisieme, ceux qui ont leurs feuilles

son ouvrage, intitulé: Methodus foliorum, il a donné une méthode fondée au moins pour les classes, sur ces seuls organes. Mais sa méthode peche comme tant d'autres, parce que ses grandes divisions et subdivisions ne sont pas déduites des feuilles, ayant eu recours aux corolles pour constituer la plupart de ses ordres.

composées et empanées ou conjuguées : dans la quatrieme, ceux qui ont leurs feuilles composées et palmées. La premiere classe offre quatre sections, qui présentent des sous-divisions. (Voyez tab. 17.)

Les systèmes universels naturels, qui forment la cinquieme classe, offrent trois sections. La premiere, comprend les systèmes dont les auteurs ont donné la clef des classes et des ordres qui y sont contenus, tels sont ceux de Van-Royen, Jussieu, Oeder, Scopoli. La seconde, renferme ceux dont les auteurs n'ont divisé que les familles, les ordres ou les genres de leurs systèmes, sans en avoir donné la clef générale, tels sont ceux d'Adanson, Guettard, Necker. La troisieme, embrasse les systèmes qui ne présentent aucune division. Ces derniers, sont ceux de Linné \*\*\*, Gerard, Wulf.

Le premier système universel naturel à analyser, est celui de Van ROYEN (26), qui, dans sa

J. George Gmelin, Allemand, dans sa Flora Sibirica. Ce savant, professeur de l'académie de Pétersbourg, fut envoyé en Sibérie, vers 1744. Après plusieurs années de séjour dans ce pays absolument inconnu aux Botanistes, et puissamment secondé dans ses recherches par Gerber, Steller et Hinzelmann, il rassembla un si grand nombre de plantes absolument nouvelles, qu'elles constituent près de la moitié de cette Flore. Il en publia, en 1747, les dessins et les descriptions d'une partie, dans les deux premiers volumes de sa Flora Sibirica, rédigée d'après la méthode naturelle de Van-Royen. Etant mort sans avoir pu achever cet ouvrage, son neveu Samuel Gottlieb Gmelin, qui avoit long-temps parcouru les mêmes contrées, publia, en

Floræ Leydensis prodomus, divise les plantes, I.º en monocotyledones, II.º polycotyledones. Les premieres ont un calice A en spathe, B nul, Cà balles. Les secondes ont un calice 1.º commun, 2.° propre. Dans les plantes qui ont un calice commun, le calice est A à chatons, B à involucre ombellifere, C à périanthe à antheres réunies, D à périanthe à antheres séparées. Dans celles qui ont un calice propre, le fruit est A à trois loges, à semences solitaires, B différent, et les étamines 1,0 visibles, 2.0 invisibles. Celles dont les étamines sont visibles, ont un calice et une corolle, A l'un ou l'autre manquant, B existant tous deux. Dans les plantes qui ont un calice et une corolle, les filamens des étamines sont AA proportionnés, A a a assis sur le germe, A a b sur le calice, AAc au nombre de deux plus longs, And de quatre plus longs, Ane réunis en un seul corps, AAf, en deux corps, BB libres. Ces derniers sont en nombre BBa égal, BBb double, BBc multiple de celui des pétales ou divisions de la corolle. Les plantes dont les étamines sont invisibles, sont d'une substance A herbacée, B pierreuse.

Le système d'ANTOINE-LAURENT DE JUS-SIEU (27), est établi sur le rapport des familles

1768, les deux autres volumes. Mais ayant lui-même succombé aux fatigues de ce voyage, le dernier volume, qui devoit contenir la cryptogamie, n'a jamais paru.

<sup>(27)</sup> Tous les Botanistes s'accordoient assez généralement, à regarder Bernard de Jussieu comme celui qui avoit le plus approfondi les rapports des végétaux entr'eux. D'après quelques apperçus de Vaillant, il avoit étudié pendant plus de cinquante ans les affinités naturelles. Prodigue de ses observations, tant dans ses

naturelles, considérées relativement 1.° à l'absence, 2.° à la présence, 3.° au nombre des cotyledons; 4.° à laprésence ou absence de la corolle, 5.° à la forme de la corolle, 6.° à l'insertion des étamines et de la corolle, 7.° à la réunion ou liberté des étamines. L'insertion des étamines est médiate ou immédiate. Dans le premier cas, les étamines sont insérées sur la corolle; dans le second, elles tiennent immédiatement au pistil, au calice ou à la corolle. L'insertion immédiate est absolue, lorsque la corolle n'existe pas (dans les apétales,) ou simple dans les sleurs pétalées, lorsque la corolle ne porte pas les étamines. Cet auteur divise les plantes, I.º en acotyledones, II.º monocotyledones, III.º dicotyledones. Les acotyledones, renferment la cryptogamie de Linné. Les monocotyledones, constituent trois classes prises de l'insertion des étamines A placées sous le pistil (hypogynes, ) B insérées sur le calice (pergiynes,) C portées sur le pistil (epigynes) (28). Les dico-tyledones, sont 1.° apétales, 2.° monopétales,

leçons que dans ses conversations privées, ses éleves, entr'autres Adanson et Gerard, avoient présenté dans leurs ouvrages une espece de canevas de sa méthode naturelle. Mais il étoit réservé à son neveu Antoine-Laurent de Jussieu de nous la faire connoître dans toute son étendue, et enrichie d'une foule d'observations qui lui sont propres. Il a publié, en 1789, son Genera plantarum, un vol. in-8.°, ouvrage qui réunit imminemment la clarté, la netteté et l'élégance, et qui présente une étonnante quantité d'observations absolument neuves, sur-tout sur les plantes exotiques.

dessous; peri, autour.

PARTIE.

3.° polypétales, 4.° diclines irrégulieres. Les apétales, forment trois classes établies sur l'insertion des étamines A portées sur le pistil (epigynes,) B insérées sur le calice (perigynes,) C placées sous le pistil (hypogynes). Les monopétales ont la corolle A placée sous le pistil (hypogyne,) B insérée sur le calice (perigine,) C portée sur le pistil (epigyne,) et les antheres \* réunies, \*\* distinctes. Dans les polypétales, les étamines sont A portées sur le pistil (epigynes,) B placées sous le pistil (hypogynes,) C insérées sur le calice (perigynes). Dans les diclines irrégulieres, les étamines sont idyogynes, c'est-à-dire, séparées du pistil. (Voyez tab. 84 et 85.)

GEORGE-CHRISTOPHE OEDER, dans ses Elementa Botanicæ (29), divise les plantes d'après la méthode naturelle, en huit classes, sous-divisées en trente-huit familles. Ses classes sont, les A cryptantheres, B monocotyledones, C amentacées, D incomplettes, E calycarpes, F calycanthemes, G monopétales, H polypétales. La

Haller, dans le beau temps de l'université de Goettingue, fit l'application des dogmes qu'il avoit puisé dans
les leçons de son maître, aux plantes du Danemarck.
Dans un ouvrage plein de vues neuves, et exempt de
tous préjugés, (Elementa Botanicæ,) il eut le courage
de s'abandonner à ses idées, soit pour les principes
philosophiques qui doivenr diriger le Botaniste, soit
dans la maniere d'envisager les rapports des végétaux
entr'eux. Ce qui nous a procuré un nouveau système
très-simple dans son développement, et qui rapproche
d'une maniere plus précise les petites familles naturelles. D'ailleurs, sa clef m'a paru d'un usage plus
universel que celle de ses prédécesseurs.

premiere classe, renferme quatre familles; savoir, les cryptantheres, AA filamenteuses, AB champignons, AC mousses, AD fougeres. La seconde classe comprend sept familles, qui sont les monocotyledones, BA graminées, BB graminoïdes amentacées, BC graminoïdes coralloïdes, BD tripétaloides, BE spathacées à massue, BF liliacées, BG orchidées. La troisieme classe contient deux familles; savoir, les amentacées, CA coniferes, CBà chatons. La quatrieme classe offre trois familles, qui sont les incomplettes, DA aquatiques, DB oléracées, DC à capsules et baies. La cinquieme classe présente six familles; savoir, les calycarpes 1.º à fructifications réunies dans un réceptacle commun, EA composées, EB aggrégées, EC ombelliferes, ED étoilées, EE à baie; 2.° les calycarpes EF à fructifications solitaires. Dans la sixieme classe, qui n'offre que deux familles, se trouvent les calycanthemes FA rosacées, FB calycanthemes de Linné. Dans la septieme classe, qui présente cinq familles, sont rangées les monopétales GA aspérifeuilles, GB verticillées, GC personnées, GD régulieres à capsules, GE bicornes de Linné. Enfin, dans la huitieme et derniere classe, qui contient neuf familles, sont ramenées les polypétales, HA monopétaloïdes, HB plantes grasses, HC plantes à bec; les polypétales à périanthe caduc, telles sont les HD multicapsulaires, HE papavérines, HF tétrapétales cruciferes, et les polypétales, HGà calice persistant, à une seule capsule, HH à réceptacle fongueux, HI papillonacées. (Voyez tab. 86 et 87.)

JEAN-ANTOINE SCOPOLI, dans un ouvrage intitulé: Introductio ad historiam natura-

lem (30), divise les végétaux d'après la méthode naturelle, en trente-six tribus, relativement 1.º A à l'occultation des fleurs; 2.º au nombre des enveloppes de la fleur; savoir, B à une seule enveloppe, lorsqu'il n'existe que le calice, C à deux enveloppes, lorsque le calice et la corolle existent; 3.° à la forme des enveloppes, D toutes deux monophylles, E l'extérieure monophylle, l'intérieure polypétale, F toutes les deux polyphylles; 4.° à l'insertion des étamines G sur la premiere enveloppe, c'est-à-dire, sur le calice; H sur la seconde enveloppe, c'est-à-dire, sur la corolle, I sur le réceptacle, K sur le germe; s.º L à la connexion ou réunion des étamines par quelques-unes de leurs parties; 6.º M à la situation du germe inférieur; 7.º N à la nudité des semences; 8.º O à la différence des sexes. (Voyez tab. 88 et 89.)

ADANSON, dans ses familles des plantes (31),

<sup>(30)</sup> Scopoli avoit, dans sa jeunesse, adopté la méthode naturelle. Il en avoit fait l'application aux plantes de Carniole, dans sa première édition du Flora Carniolica, mais il avoit abandonné cette méthode dans la seconde, pour suivre absolument le système sexuel. Plusieurs années après, dans un ouvrage particulier, intitulé: Introductio ad Historiam naturalem, il a repris la méthode naturelle, sous un point de vue qui differe assez de celui de ses contemporains pour en présenter l'analyse.

<sup>(31)</sup> Adanson a publié, en 1763, un ouvrage intitulé: Famille des plantes. Le premier volume, sous le titre de préface, est une espece de philosophie Botanique où l'érudition est prodiguée, et où les paradoxes ne sont pas rares. On y trouve sur-tout un tableau abrégé de toutes les méthodes publiées, et même un canevas de presque toutes les méthodes possibles. Le

distribue les végétaux en cinquante-huit familles,

d'après l'ordre naturel. (Voyez tab. 90.)

GUETTARD, dans un ouvrage intitulé: Observations sur les plantes, a suivi les ordres naturels de Linnæus (32). Ses recherches portent sur les glandes et les filets ou poils qu'on apperçoit sur les végétaux. Cet auteur s'est servi du terme de

second volume, qui annonce les connoissances les plus vastes et une pratique consommée, offre le système végétal distribué d'après les rapports qui ont paru les plus naturels à l'auteur. Plusieurs genres, sur-tout des exotiques, sont développés d'une maniere neuve. Plusieurs genres déjà connus, mais imparfaitement décrits, sont rectifiés. La nomenclature du plus grand nombre est changée, d'après le principe de l'auteur, qui veut que l'on conserve les noms indigenes. Tout lecteur impartial voit avec peine qu'Adanson ne laisse échapper aucune occasion de critiquer avec amertume les différens ouvrages de Linné, d'autant plus que presque toujours ses critiques portent à faux.

(32) Guettard, membre de l'académie des sciences de Paris, s'étoit d'abord beaucoup occupé de l'étude des végétaux, mais entraîné par goût vers la minéralogie, il n'a pas enrichi la Botanique de toutes les observations que ses premiers ouvrages faisoient espérer. Ses mémoires (insérés parmi ceux de l'académie,) sur les poils et les glandes des plantes, sont absolument neufs pour le fond des détails et pour les résultats. Ils s'est assuré que les especes des familles naturelles, offroient à l'observateur les organes d'une structure semblable dans toute la famille. Il a fait l'application du systême qu'il s'étoit formé d'après la contemplation de ces objets, dans ses observations sur les plantes des environs d'Etampes, publiées en 1747, 2 vol. in-12. Guettard, sous un extérieur sévere, cachoit un caractere sûr : sa probité a toujours été à l'épreuve.

glandes, pour désigner ces petits corps qui ne paroissent que des points ou des globules plus ou moins gros même à la louppe. Ces glandes sont ordinairement sans filets, mais il lui paroît qu'il y en a qui s'en chargent, et qu'alors la liqueur qui seroit immédiatement sortie de la glande monte dans le filet, ce qui semble prouver que tous les filets ne sont que les vaisseaux excrétoires de ces glandes, d'autant plus que tous les filets, quelqu'ils soient, lui paroissent portés sur une glande analogue à celles qui n'ont jamais de filets ou qui s'en chargent rarement, et qu'un grand nombre laisse évaporer une liqueur, qu'il est souvent aisé de distinguer lorsqu'elle est encore liquide, ou lorsqu'elle a pris par l'évaporation quelque consistance, et qu'elle a au bout du filet, formé un grain coloré ou sans couleur, ou un fil plus ou moins long. Ce Botaniste appelle ces filets, filets coniques simples ou à valvules, ou à articulations, à nœuds, en Y grec, en crochet, en plumes, en goupillons, etc. et profitant avec avantage de leur variété, de leur forme, de leur figure, de leur arrangement, de leur nombre, de leur couleur, etc., il s'est servi de ces différens attributs pour former les sections ou divisions de ses ordres. (Voy. tab. 91:)

NAT. JOSEPH NECKER, dans ses Elementa Botanica (33), arrangés et publiés selon le

<sup>(33)</sup> Necker, Flamand, de l'académie de Manheim, s'annonça comme Botaniste, par sa Flore flamande, intitulée: Deliciæ Gallo-Belgicæ, 2 vol. in-12, dans laquelle on trouve plusieurs especes décrites d'après nature. Il publia quelques années après, sa Methodus

le système omologique ou naturel, divise les plantes en cinquante-quatre genres principaux, sousdivisés en dix-huit cents quarante-deux genres secondaires. (Voyez tab. 92.)

LINNÉ publia en 1737, dans son Genera plantarum, les premiers fragmens de ses ordres

muscorum, dans laquelle il commença à déclamer avec beaucoup de vivacité contre les dogmes de Linné. En 1790, il publia ses Elementa Botanica. C'est principalement dans ce dernier ouvrage qu'il considere le regne végétal sous un point de vue différent de tous les autres Botanistes. Il s'étoit persuadé que la nature n'avoit procréé qu'un très-petit nombre de modules primitifs, qu'en combinant par la fécondation ou la propagation par œilleton, ces différens modules, il en résultoit un nombre déterminé de formes nouvelles , qui constituoient un nombre limité de formes fondamentales, qu'il appelle especes principales. Il regarde comme accidentelles, tout ce que les autres Botanistes regardent comme especes. On ne peut nier que cette maniere de considérer le regne végétal, n'en simplifie singuliérement la connoissance générale, mais il faut avouer que la plupart des principes que l'auteur regarde comme certains, sont à peine soupçonnés. Il faudra toujours revenir à la méthode de philosopher adoptée par Tournefort et Linné, qui étudioient les productions de la nature, telles qu'elles se montrent à nos yeux, et regardoient comme telles, toutes les formes constantes des végétaux bien avérées par les figures et les descriptions de nos anciens auteurs. Mais parmi les paradoxes de ce Botaniste, il en est un trèsspécieux, c'est son assertion sur l'impossibilité de distinguer le périanthe d'avec la corolle. Il a cru devoir, d'après la difficulté que l'on trouve à les distinguer dans un certain nombre de genres, supprimer ces deux noms techniques, et employer à leur place l'expression de perigynandra, ou ce qui entoure les organes de la génération.

naturels, au nombre de quarante-huit. L'année suivante parurent, dans son Classes plantarum, ses seconds fragmens au nombre de soixante-cinq. Il donna ses derniers, en 1751, dans sa Philosophia Botanica, et les porta jusqu'à soixantesept; mais nous ne voyons pas que dans cet intervalle, il ait pu faire entrer tous ses genres dans les fragmens de ses ordres naturels, puisqu'il en reste encore cent douze, auxquels il n'a pu assigner une place. Il dit lui-même : « J'ai travaillé long-temps à chercher la méthode naturelle, j'y zi fait quelques additions heureuses, mais n'ayant pu la conduire à sa perfection, je m'en occuperai toute ma vie. " Il ajoute : " que ceux qui s'en sentent la force, corrigent, augmentent, perfectionnent cette méthode; que ceux-là y renoncent, qui n'ont pas les talens nécessaires pour y réussir : ceux qui la perfectionneront, seront reconnus comme de grands maîtres. (Voyez tab. 93.) (34).

LOUIS GERARD, dans sa Flora Gallo-Provincialis (35), et JEAN-CHRIST. WULF, dans

<sup>(34)</sup> J'ai marqué d'une astérique le systême de Linné sur les calices; de deux, son systême sexuel; de trois, son systême sur la méthode naturelle; de quatre, son systême sur les graminées; de cinq, son systême sur les fougeres.

<sup>(35)</sup> Gerard, Botaniste Français, éleve de Sauvages et de Bernard de Jussieu, s'attacha, par les conseils
de ce dernier, à l'étude des plantes de la Provence.
Il découvrit plusieurs especes qui avoient échappées
à ses prédécesseurs, spécialement à Tournefort et à
Garidel. Sa méthode présente les fragmens de celle que
projettoit Bernard de Jussieu. En lisant sa préface, on
reconnoît facilement que ce savant, un des plus communicatifs, avoit revu tout l'ouvrage, et lui avoit pro-

56 PREMIERE PARTIE. sa Flora Borussica (35), ont suivi la méthode naturelle. (Voyez tab. 94 et 95.)

Les systèmes partiels, qui forment la sixieme et dernière classe, devroient trouver ici leur analyse, mais j'ai préféré les décrire dans la seconde partie de cet ouvrage, en traitant des classes où ils se rapportent. Ainsi, dans la triandrie se trouveront ramenés les systèmes sur les graminées; dans la pentandrie, les systèmes sur les ombelliferes; dans la syngénésie, ceux qui embrassent les composées; dans la cryptogamie, ceux qui ont pour objet les fougeres, les mousses et les champignons.

digué ses conseils. Les descriptions des nouvelles especes qu'il a proposées, sont toutes linnéennes, et les figures qui les accompagnent, dessinées par Martinet, sont excellentes.

(35) Wulf, en rédigeant le catalogue des plantes de la Prusse, a adopté la méthode de Gerard. Son ouvrage, qui n'est qu'une simple énumération dénuée d'observations et d'especes neuves, ne mérite l'attention des Botanistes, que par l'application qu'il a faite de la méthode de Bernard de Jussieu aux plantes septentrionales.

## SECONDE PARTIE.

Parmi les nombreux systèmes que nous venons d'analyser, deux sur-tout ont fait époque en Botanique; savoir, celui de Tournefort et de Linné. Ces deux grands hommes, dont les noms inspirent le respect, ont porté cette science à son plus haut degré de splendeur et de gloire.

Le premier, sans guide sûr, sans autre maître que son génie, observe, médite, étudie, joint à de profondes recherches, des voyages immenses, et propose le premier un système complet, capable de contenter les vrais connoisseurs. Ce système qui comprend toutes les plantes connues jusques alors, coordonné par une méthode aussi ingénieuse que simple dans son développement, présente au monde savant, un monument éternel de l'amour de ce grand homme pour cette partie des connoissances humaines qu'il avoit spécialement cultivées.

Le second, « né dans les climats glacés du nord, dans ce mois gracieux où la terre se pare de tous ses attraits, et pour ainsi dire au milieu des fleurs dont il devoit développer les mysteres avec tant de génie et de sagacité (1) ». Vrai philosophe, logicien sévere, génie profond, esprit vraiement systématique, il consacre tous ses momens à l'observation, et exécute à trente ans le projet

<sup>(1)</sup> Voyez l'éloge de Charles Linné, par M. de Saint-Amans, imprimé à Agen, en 1791.

d'une révolution dans la maniere d'étuder la nature. L'examen de vingt mille individus suffit à peine à son activité: il se sert pour les classer, des méthodes qu'il a inventées; pour les décrire, d'une langue qu'il a créée; pour les nommer, des mots qu'il a fait revivre ou que lui-même a formés (2). Mais ne pouvant, vu ses grands travaux, voyager comme son illustre prédécesseur, il sait enflammer de son zele l'esprit de ses disciples, qui à sa voix parcourent les terres et les mers, et portent leurs pas par-tout où l'ardeur des découvertes peut conduire des hommes.

Si nous comparons leurs systèmes, nous verrons que celui de Tournefort, simple, ingénieux, a l'avantage de conserver les familles naturelles, d'offrir des ordres sûrs, et des genres exacts, faciles, fondés sur la situation du germe, la corolle et le fruit.

Le système de Linné, plus savant, plus méthodique, mais plus difficile, rompt quelquefois les affinités naturelles, présente des aberrations dans le nombre des étamines et des pistils; mais ses genres plus perfectionnés sont établis sur le nombre, la figure ou proportion, la situation et la connexion de toutes les parties de la fructification.

Si Tournefort a eu la gloire de donner le premier un système sur la forme de la corolle, Linné a eu celle d'établir le premier un système sur les étamines et le pistil. Le génie du Botaniste François, toujours simple, facile, lumineux est

<sup>(2)</sup> Voyez l'éloge de Buffon, par M. Vicq-d'Azir.

à la portée de tout le monde; celui du Botaniste Suédois, clair, précis, méthodique, étonne toujours et embarrasse souvent ceux qui ne l'appro-

fondissent pas.

Linné, parvenu à une heureuse vieillesse, a eu le loisir de retoucher et de perfectionner ses ouvrages. Tournefort, enlevé par une mort prématurée, n'avoit pas eu le temps de mettre la derniere main à son système, susceptible de quelques changemens avantageux, comme l'avoient fait connoître Antoine de Jussieu, avec tous les égards qu'il devoit à son maître, et sur-tout Vaillant, avec une amertume de style qui ne

convenoit pas à un disciple (3).

Mais il étoit réservé au Naturaliste d'Upsal, d'établir un nouvel ordre de choses. Persuadé de l'existence du sexe dans les plantes, par des observations profondes appuyées sur des expériences qui ne laissoient plus aucun doute, ce savant n'hésita pas à publier des faits qui alloient changer l'étude de la Botanique. Il n'ignoroit pas la révolution que devoit opérer dans cette science une. découverte aussi importante, il connut la grandeur du péril, mais il n'en fut nullement effrayé. Il avoit à combattre les sentimens de tous les Botanistes qui l'avoient précédés, et les erreurs dans lesquelles ils avoient été plongés, erreurs d'autant plus dangereuses qu'elles s'étoient fortifiées par une longue suite d'années. Mais que pouvoient toutes ces raisons contre son génie!

Tournefortii. Rei herbariæ, judicium de methodo

Ce grand homme, joignant à une érudition prodigieuse, la connoissance de toutes les parties des plantes employées par les Botanistes pour la formation de leurs divers systèmes qu'il avoit tous étudiés, vit qu'elles ne sauroient lui fournir des ressources sûres pour l'établissement d'une méthode plus parfaite que celles qui avoient parues jusques alors. Il reconnut que l'essence de la fleur consistoit dans les parties sexuelles, c'est-à-dire, dans l'anthere et le stygmate, comme il le dit lui-même: Essentia floris in anthera et stygmate consistit (4): dès-lors, il les choisit pour la base de sa méthode (5).

En analysant le système sexuel, nous verrons qu'il n'en existe aucun qui soit travaillé avec autant de soin, dont la marche soit plus uniforme, et dont le mécanisme s'éloigne moins des principes adoptés par l'auteur. Les familles des plantes les plus difficiles, comme les graminées, les ombelliferes, les légumineuses, les cruciferes, les composées, etc. ont été présentées sous un nouvel aspect. Ce qui contribue à la perfection de ce sys-

<sup>(4)</sup> Phil. Bot. pag. 56, art. 88.

<sup>(5)</sup> Le savant professeur Gouan, dans son explication du système Botanique de Linné, a fort bien prouvé, que ce Botaniste, après avoir examiné toutes les parties des plantes, telles que le calice, la corolle, le fruit, a été forcé de donner la préférence aux étamines et aux pistils. Comme cet auteur s'est étendu sur les caracteres habituels, sur la placentation ou disposition des cotyledons, au moment de la germination de la semence, je crois ne pouvoir mieux faire, que de renvoyer à cet ouvrage ceux qui désireroient des éclaircissemens.

tême, ce sont les caracteres essentiels génériques et spécifiques que Linné a le premier rédigé, d'après les loix les plus séveres qu'il avoit lui-même proposées aux Botanistes, dans son Critica Botanica.

Pour établir cette nomenclature, dit J. J. Rousseau, il fallut créer, pour ainsi dire, à la Botanique une nouvelle langue, qui épargnât ce long circuit de paroles qu'on voit dans les anciennes descriptions: évitant par - là, lorsque quelqu'un vous demandoit les noms d'une herbe ou d'une fleur dans un jardin, la nécessité de cracher en réponse une longue enfilade de mots latins, qui ressembloient à des évocations magiques. C'est dans la pratique journaliere de l'art, ajoute le même auteur, qu'on sent tout l'avantage de cette nouvelle langue, aussi commode et nécessaire aux Botanistes, que l'est celle de l'algebre aux Géometres (6).

Le Systema vegetabilium nous offre l'idée de cette nomenclature. De tous les ouvrages de Linné, c'est celui qui a le plus facilité l'étude de la Botanique, et le seul qui puisse conduire d'une maniere sûre et prompte à déterminer les plantes, par la raison que cet ouvrage présente tous les caractères essentiels, génériques et spécifiques de tous les genres et de toutes les especes connus (7).

<sup>(6)</sup> Voy. œuv. compl. déjà citées, tom. 28. Introduction, pag. 16.

<sup>(7)</sup> Le citoyen Gouan, qui vante avec raison l'usage du Systema vegetabilium, cite les progrès qu'ont fait une foule de médecins de Montpellier, qui se sont tous rendu célebres par cette voie: Commerson, Dombey, Gilibert, Cusson, Villars, Broussonnet, Dorthes,

Quelques Botanistes ne se servent absolument que du Genera plantarum, mais ce livre ne doit être que l'accessoire et non le principal, dit le citoyen Gouan, c'est-à-dire, qu'on ne doit y avoir recours que pour dissiper les doutes, lorsqu'on est en balance entre deux genres voisins ; parce que ce livre, présentant tous les caracteres naturels, offre par conséquent dans chaque genre plusieurs attributs communs aux différens genres du même ordre et de la même classe. Il faut connoître, avant de recourir au Genera plantarum, les caracteres essentiels qui ne se trouvent que dans le Systema vegetabilium. Le caractere essentiel, comme dit Linné, donne au genre auquel on l'applique une note propre et particuliere, et distingue par une seule idée, un genre, de ses congénaires. Cet auteur ajoute : Facillima plantarum dignotio per caracteres essentiales acquiritur (8).

Le Systema vegetabilium présente les caractères essentiels de tous les genres, rapprochés suivant les rapports de leurs attributs caractéristiques, par ressemblance ou par opposition et différence. Ce livre a encore un autre avantage, en ce qu'il indique les aberrations marquées en lettres italiques, à la fin des divisions où elles doivent nécessairement se trouver; et sans cette distinction sagement établie par Linné, dit le célebre Botaniste de Montpellier, on seroit fort embarrassé

Amoreux, Gerard, etc. Et peut-on douter qu'elle ne soit la meilleure, puisqu'elle est si avantageusement suivie?

<sup>(8)</sup> Phil. Bot. pag. 128, art. 187.

de savoir à quel genre rapporter les especes aberrantes. Je m'étendrai même d'autant plus volontiers sur les aberrations, qu'elles ont fournies à plusieurs personnes occasion d'attaquer le système sexuel.

Linné, prévoyant les reproches qu'en pourroit lui faire, a dit que les principales fleurs déterminoient le nombre naturel, et que dans les plantes où le nombre des fleurs étoit différent, on devoit toujours considérer la principale : Flores autem numero in eadem planta diversi, secundum primarium considerandi (9). Cette loi est si sage, que dans plusieurs plantes, dans l'adoxa par exemple, où les fleurs latérales ont dix étamines et cinq pistils, et les supérieures ou terminales huit étamines et quatre pistils, on ne doit avoir égard qu'à celle qui est la principale. Pour nous avertir de nous tenir sur nos gardes, il ajoute: Raro observatur genus in quo pars aliqua fructificationis non aberrat (10) : et en cela, Linne n'est pas plus responsable que les autres méthodistes, des bizarreries de la nature.

Mais il est un autre cas où les aberrations peuvent induire en erreur : c'est lorsque dans un genre, (les lychnis par exemple,) il se rencontre une espece qui, par son aberration, se rapporte

<sup>(9)</sup> Phil. Bot. pag. 123, art. 178.

<sup>(10)</sup> Phil. Bot. pag. 120, art. 170. Les tiges de l'adoxa soutiennent cinq petites fleurs qui forment une espece de cube. Les quatre inférieures occupent les quatre faces latérales, et sont dans une situation verticale, celle qui termine est placée au-dessus des autres, et se trouve dans une situation horizontale.

à une autre classe. Il faut chercher dans la classe où l'on est renvoyé, et l'on y trouvera, comme nous l'avons déjà dit, l'espece aberrante marquée en lettres italiques. Linné lui-même nous apprend que le genre constitue le caractere, que ce dernier dérive du genre, sert à le faire connoître et non point à l'établir, et que si l'on ne suivoit pas une regle invariable, les genres deviendroient

aussi nombreux que les especes (11).

Il n'est aucune partie dans les fleurs qui ne soit sujette à des aberrations : les étamines, les pistils, la corolle, le calice et le fruit varient trèssouvent. Il y a même une raison qui donne lieu aux aberrations dans les corolles. On a remarqué que dans les corolles monopétales, les étamines étoient attachées à la corolle, (excepté dans celles qui ont des antheres à deux cornes, ) et que les fleurs polypétales avoient leurs filamens séparés de la corolle (12). Dès-lors il n'est pas étonnant que dans les corolles monopétales, sur lesquelles sont insérés les filamens des étamines, dont le nombre répond à celui des divisions de la corolle, comme dans les gentianes; il n'est pas étonnant, dis-je, que le nombre des étamines varie, lorsque celui des divisions de la corolle variera aussi, et qu'une corolle qui n'aura que quatre divisions au lieu de cinq, n'offre pareillement que quatre étamines : mais il ne faudroit pas trop généraliser cette regle.

Les aberrations ne se rencontrent pas dans toutes les classes, puisque la polyadelphie n'en offre

(12) Phil. Bot. pag. 72, art. 108.

<sup>(11)</sup> Phil. Bot. pag. 119 et 121, art. 169 et 170.

point. L'heptandrie, la didynamie n'en présentent qu'une seule; la diadelphie et gynandrie n'en renferment que deux; et dans les autres classes leur nombre est quelquefois assez considérable, comme dans la pentandrie, l'hexandrie, décandrie, polyandrie, etc. On doit distinguer soigneusement les classes où se rapportent les aberrations, d'avec celles qui les offrent. Afin que l'on pût connoître en même temps les classes qui offrent des aberrations et celles où elles se rapportent, on verra que lorsqu'un genre a des especes aberrantes, j'ai marqué au bas de la page, la classe où se rapportent ces especes. Les pistils offrent aussi des aberrations, mais avec cette différence qu'elles appartiennent dans la même classe à un ordre différent : j'aurai soin de les indiquer.

La division premiere et générale du système sexuel, porte sur deux considérations fondamentales: 1.° Les deux sexes sont visibles, leurs noces publiques, nuptiæ publicæ; 2.° les deux sexes sont peu apparens, leurs noces cachées, nuptiæ clandestinæ. La premiere de ces considérations renferme vingt classes, fondées sur un des quatre attributs suivans et principaux, qui sont le nombre, la figure ou la proportion, la situation et la connexion des étamines.

Le nombre, qui est le premier attribut, comprend les onze premieres classes; savoir, la monandrie, diandrie, triandrie, tétrandrie, pentandrie, hexandrie, heptandrie, octandrie, ennéandrie, décandrie et dodécandrie. La douzieme, icosandrie, et treizieme, polyandrie, consistent moins dans le nombre que dans l'insertion des étamines sur le calice pour la douzieme,

et sur le réceptacle pour la treizieme.

La quatorzieme, didynamie, et quinzieme, tétradynamie, sont fondées sur le second attribut; savoir, la figure ou proportion des étamines, tantôt deux longues et deux courtes dans la quatorzieme didynamie, et tantôt quatre longues et deux

courtes dans la quinzieme tétradynamie.

Les cinq suivantes; savoir, la monadelphie, diadelphie, polyadelphie, syngénésie et gynandrie, sont établies sur le troisieme attribut, la connexion des étamines (13), unies par leurs filamens en un, deux ou trois corps dans la monadelphie, diadelphie et polyadelphie, par leurs antheres ou sommets des étamines dans la syngénésie, et par leur adhérence au pistil dans la gynandrie.

Le quatrieme attribut, pris de la situation des fleurs, constitue la vingt-unieme et vingt-deuxieme classes, la monoécie et dioécie, qui comprennent les plantes unisexuelles, situées sur un ou deux individus; et la vingt-troisieme, polygamie, qui réunit en elle seule les avantages de toutes les classes précédentes, c'est-à-dire, des fleurs her-

maphrodites et unisexuelles.

Enfin, la vingt-quatrieme, cryptogamie, à laquelle se rapporte la seconde considération fonda-

<sup>(13)</sup> Quelques personnes, Haller est du nombre, emploient le caractere pris de la situation, pour l'appliquer à la gynandrie, qui, selon la méthode la plus usitée, appartient à la connexion, et font marcher de pair la gynandrie, la monoécie, dioécie et polygamie. Voyez Haller, bibliot. bot. tom. 2, pag. 246.

mentale, le peu d'apparence des sexes, renferme

les plantes qui ne sont pas visibles à l'œil nu.

Linné, ayant employé les étamines ou parties mâles pour la formation de ses classes, a fait servir les pistils ou parties femelles pour celle de ses ordres; mais dans les classes où les pistils ne pouvoient lui fournir cette ressource, il a pris ses ordres du fruit, pour deux classes seulement, (didynamie et tétradynamie,) et a ramené dans les autres, les classes précédentes pour l'établissement de ses ordres. Nous allons examiner chaque classe en particulier (14).

### CLASSE I.T. MONANDRIE.

La monandrie est une des plus courtes ; elle n'a que deux ordres. Le premier, renferme une famille naturelle, les cannæ (15). Le second, ne comprend que cinq genres. Les aberrations sont peu nombreuses dans cette classe (16).

Callitriche verna, monique.

Dans le corispermum, les fleurs inférieures ont sou-

vent deux, trois, quatre ou cinq étamines.

Dans le curcuma, sur cinq étamines, une seule est fertile. On trouve quelquefois dans une fleur plusieurs filamens dépourvus d'antheres, qui des-lors deviennent eunuques: mais ces étamines ainsi mutilées, ne sau-roient entrer dans la construction des genres. Phi. bot. pag. 128, art. 184.

<sup>(14)</sup> Voyez l'explication du systême botanique, pag. 20.

<sup>(15)</sup> Scitaminæ, ord. nat. 3. Voyez, pour les ordres naturels, le Philosophia botanica.

<sup>(16)</sup> Boerhaavia, à deux especes diandres.

# CLASSE II. DIANDRIE.

La diandrie n'a que trois ordres. Le premier, comprend la famille naturelle des jasmins (17), et une partie des labiées (18). Ses sous-divisions sont prises du caractere des quatre semences à nu au fond du calice, de la situation des fleurs supérieures ou inférieures (19), du nombre et de la régularité des pétales. Le second et le troisieme ordres, ne comprennent que deux genres. Cette classe offre peu d'aberrations (20).

#### CLASSE III. TRIANDRIE.

La triandrie renferme trois ordres. Dans le premier, les genres sont sous-divisés par la situation des fleurs supérieures ou inférieures. La premiere sous-division de cet ordre, contient la famille des

<sup>(17)</sup> Sepiariæ, ord. nat. 25.

<sup>(18)</sup> Verticillata, ord. nat. 58.

<sup>(19)</sup> On entend par fleurs supérieures, celles qui sont situées au-dessus du germe, et par fleurs inférieures, celles qui sont au-dessous du germe. Il en est de même des fruits supérieurs ou inférieurs. Le fruit n'est supérieur que lorsque la corolle est inférieure, et vice vers à. Cette division a lieu dans les six premieres classes.

<sup>(20)</sup> Le seul genre des verveines, sur dix-sept especes, en a dix de tétrandres.

Olea Americana, polygame. Chionanthus, est quelquefois triandre.

Dans les véroniques, le calice et le fruit varient.

La gratiole a quatre étamines, dont deux eunuques.

Monarda a pareillement deux étamines mutilées.

iris (21); le second ordre, offre une grande partie de la famille des graminées (22), sous-divisées par la forme et le nombre des fleurs; enfin, le troisieme, peu nombreux, est encore sous-divisé par la situation des fleurs inférieures ou supérieures.

Linné divise les graminées par le nombre des fleurs et la florescence; savoir, 1.° en graminées uniflores éparses, 2.° biflores éparses, 3.° multiflores éparses, 4.° en épi, à réceptacle en aleine.

Les Botanistes qui ont étudié les autres systèmes, n'ignorent pas que les graminées, comprises dans le second ordre de la troisieme classe du système sexuel, se rapportent au 3e ordre de la 1re classe de Gledistch, à la 4° section de la 2° classe de Magnol, aux 2e, 3e, 4e sections de la 2º classe de Linné\*, à la 5º section de la 3º classe de Cæsalpin, au 2e ordre de la 3e classe de Thunberg, Gmelin et Sauvage, à la 1re section de la 3e classe de Villars, au 2d fascicule de la 3e collection de la 3e série de Gilibert, à la 4e classe de Gouan, au 1er ordre de la 4e classe de Crantz, à la se classe d'Haller \*\*, à la 2e section de la 6º classe de Seguier, à la 11º classe de Morison, au 1er ordre de la 11e classe d'Allioni, à la 12e classe d'Haller \*\*\*, à la 3e section de la 13e classe de Christ. Knaut, à la 15e classe de Ruppius, Haller \*, Ludwig \*\*, Boëhmer, à la 3e section de la 15e classe de Tournefort, à la 16e classe de Gattenhof, Durande, à la 3e section de la

<sup>(21)</sup> Ensatæ, ord. nat. 3.

<sup>(22)</sup> Gramina, ord. nat. 14.

18° classe de Rivin, aux 3° et 4° sections de la 18° classe de Ludwig \*, à la 18° classe de Bergen, Wachendorf, à la 19° classe de Wernischeck, à la 11° section de la 21° classe d'Hermann, au 1er ordre de la 22° classe de la 2° collection de la 11° série de Fabricius, aux deux premieres sections de la 25° classe de Ray et de la 29° de Boerhaave, et à la 32° classe de Lamarck. Chret. Knaut ne les cite pas.

Dans les systèmes naturels, les graminées constituent la 1<sup>re</sup> famille de la 2<sup>e</sup> classe d'Œder, le 4<sup>e</sup> ordre de la 2<sup>e</sup> classe de Jussieu, la 3<sup>e</sup> classe de Van-Royen, la 1<sup>re</sup> famille de la 3<sup>e</sup> tribu de Scopoli, les 6<sup>emes</sup> ordres de Gerard et Wulf, la 7<sup>e</sup> famille d'Adanson, le S<sup>e</sup> ordre de Guettard, le 14<sup>e</sup> ordre de Linné \*\*\*, et le 45<sup>e</sup> genre

de Necker.

Si nous comparons actuellement les différentes dénominations que ces auteurs ont données aux plantes de cette famille, nous verrons que Gledistch les désigne sous le nom de plantes à fructification apparente, à étamines insérées sur le réceptacle à trois antheres. Wachendorf, sous le nome de plantes à fleurs apparentes, monocotyledones graminées. Crantz, sous le nom de plantes à florescence apparente, à port absolu et déliquescent, graminées. Haller, dans son Enumeratio et dans son Historia, les nomme, plantes à étamines et fleurs visibles apétales graminées. Gilibert, plantes à fleurs visibles, à corolles incomplettes pétalées et calycinées, graminées. Allioni, plantes à fleurs visibles apétales graminées. Thunberg, Gmelin, plantes à fleurs visibles, triandres, digynes graminées. Villars, plantes à étamines dé-

terminés, triandres, digynes graminées. Gouan, plantes à fleurs visibles pétalées simples, à deux pétales irrégulieres, triandres. Gattenhof, plantes à fleurs visibles parfaites apétales graminées, diandres et triandres digynes. Haller \*, plantes à fleurs visibles imparfaites, à étamines graminées. Ludwig \*\* , Boëhmer , plantes à fleurs enveloppées parfaites, apétales graminées, à deux et trois antheres et deux styles. Lamarck, plantes à fleurs distinctes disjointes bisexuelles non-pétalées glumacées graminées. Fabricius, plantes herbacées, à fleurs et fruits visibles polycotyledones apétales graminées. Boerhaave, plantes herbacées monocotyledones apétales, culmiferes. Ray, plantes herbacées, privées de bourgeons, parfaites monocotyledones, à étamines. Durande, plantes à fleurs apétales, graminées. Bergen, plantes à fleurs apétales à étamines, graminées. Tournefort, plantes herbacées à fleurs apétales à étamines, graminées. Wernischeck, plantes à fleurs apétales, à calice à balles. Seguier, plantes herbacées, à fleurs simples pétalées, à deux pétales, graminées. Rivin, Ruppius, Ludwig \*, plantes à fleurs imparfaites à étamines. Christ. Knaut et Hermann, plantes herbacées apétales à étamines, culmiferes. Magnol, plantes à calice externe seulement, renfermant une fleur à étamine. Linné \*, plantes à calice à balles. Morison, plantes herbacées culmiferes. Cæsalpin, plantes herbacées à semences solitaires. Sauvages, plantes garnies de feuilles simples entieres, étroites, graminées.

Dans les systèmes naturels, Linné \*\*\*, Gerard, Wulf, Scopoli, Guettard les désignent sous le

nom de graminées. Adanson, sous le nom de gramens. Eder, sous le nom de plantes monocotyledones graminées. Van-Royen, sous le nom de plantes monocotyledones à calice à balles. Jussieu, sous le nom de plantes monocotyledones, à étamines placées sous le pistil, graminées. Necker, sous le nom de plantes à fructifications à balles ou en écailles.

Si nous examinons avec soin la maniere dont ces auteurs ont divisé cette nombreuse famille, nous verrons 1.º que Morison, Ray, Boerhaave, Fabricius, Haller \*, Tournefort, Seguier les divisent par la florescence. 2.º Villars, par la florescence et la nature du calice. 3.° Sauvages, par la florescence et le sexe. 4.° Ludwig \*\*, Boëhmer, par le nombre des étamines. 5.º Bergen, par le nombre des étamines, la nature du calice et le sexe. 6.° Wernischeck, par le nombre des pistils. 7.º Haller \*\*, par la nature des épillets. 8.º Gattenhof, par la nature des épillets et la florescence. 9.º Durande, par le nombre des balles. 10.º Wachendorf, par la nature des balles, le nombre des étamines et le sexe. 11.º Linné \*, par la nature du calice. 12.º Haller \*\*\*, par l'absence, la présence et la nature du calice. 13.º Gouan , Gilibert , Allioni , Crantz , par le sexe. 14.º Gledisth, par la nature des fleurs et la situation des semences. 15.º Gmelin, suit les divisions du Systema vegetabilium. 16.º Lamarck a adopté l'ordre des classes du système sexuel. 17.º Enfin, Cæsalpin, Hermann, Christ. Knaut, Ruppius, Ludwig \*, Rivin, Magnol, Thunberg ne les divisent pas.

Morison forme sept divisions des graminées,

dont

dont les quatre premieres sont prises de la nature des semences et de la florescence. Ray en fait trois divisions, dont les deux premieres sont établies sur la grosseur des semences. Boerhaave, Fabricius, Haller \* les distinguent en culmiferes ou graminées, en épi et en panicule. Tournefort les divise en graminées 1.º loliacées (ou ivraies,) 2.º en épi, 3.º en digitation, 4.º en panicule, 5.° à ressemblance d'avoine. Seguier a suivi à-peuprès les mêmes divisions en graminées, 1.° à ressemblance d'ivraie, 2.º en panicule, 3.º en épi, 4.º à balles, 5.º en phalaroïdes, (comme les phalaris;) 6.° en panicule, 7.° en massette, 8.° à ressemblance de millet, 9.º d'avoine, 10.º de roseau, 11.º de seigle, 12.° en digitation, 13.° hérissonnées. Villars les divise par l'épi, 1.° simple, calice uni-flore, 2.° ramifié, calice uniflore, 3.° ramifié en panicule, balle uniflore, 4.° ramifié, balle biflore, 5.° calice multiflore. Sauvages les distingue en graminées, 1.º digynes simples, 2.º digynes composées, 3.º diclines ou monoïques.

Ludwig \*\* et Boëhmer les distinguent par le nombre des étamines et des pistils, en graminées à deux, trois, six antheres, à un, deux, trois styles. Bergen, en forme six ordres, pris du nombre des étamines des pistils, de la nature du calice uniflore, multiflore, de la situation des fleurs

mâles et femelles sur le même pied.

Wernischeck les divise par le nombre des pistils, et les sous-divise par la nature des épillets, uniflores, biflores, multiflores, par le nombre des étamines, la nature du calice, du réceptacle, le port, le sexe des fleurs. Haller \*\*, par la nature des épillets, 1.° à deux balles, avec le calice nul,

à une balle, à deux balles, à plusieurs balles,

2.º l'épillet à trois balles.

Gattenhof, ui les divise par la nature des épillets, unissores, bissores, multissores, et la slorescence en épi avec le réceptacle en aleine, les sous-divise par le nombre des étamines et des pistils. Durande, qui les distingue par le nombre des balles, en y comprenant les cypéracées, les sous-divise 1.° par les sleurs A en épi, B épi cylindrique, C épi d'un seul côté, D épi digité; 2.° par l'épi et panicule; 3.° par les sleurs en pani-

cule, et à panicules étagées.

Wachendorf les distingue par la nature des balles, 1.° uniflores, à deux, trois ou six étamines, 2.° biflores, 3.° multiflores, 4.° par la situation des fleurs mâles et femelles. Linné, par la nature du calice, 1.° à balles univalves imbriquées, 2.° bivalves simples, 3.° bivalves doubles, 4.° bivalves multiples. Haller, par l'absence, la présence et la nature du calice, 1.° nul, 2.° à une balle, 3.° à deux balles, 4.° à deux balles couronnées par des soies, 5.° calice à deux balles, à épillet à une balle, 6.° calice à trois balles, 7.° calice pinné.

Gouan les divise par le sexe, 1.° en hermaphrodites, 2.° polygames, et sous-divise les premieres, par le nombre des pistils et la nature des calices A uniflores, B biflores, C multiflores, D multiflores portées sur le racle. Gilibert, par le sexe, 1.° en hermaphrodites, 2.° monoïques, 3° polygames, et les sous-divise par le nombre des étamines et la florescence en épi, panicule, etc. Crantz, par le sexe, 1.° en monoclines ou hermaphrodites, 2.° diclines, monoïques ou polygames. Allioni, par le sexe, 1.° en graminées hermaphrodites, sous-divisées par le nombre des étamines, la nature des épillets, l'absence et la nature du calice; 2° en graminées à sexes séparés. Gledistch, par la nature des fleurs à balles, 1° hypocarpes, 2.° épicarpes. Les premieres, ont 1.° seulement une corolle, 2.° sont pourvues de calice et de corolle; dans ce dernier cas, les calices sont a multivalves, b bivalves, c bivalves uniflores,

d bivalves biflores, e bivalves multiflores.

Dans les systèmes naturels, Necker les divise par le sexe, 1.º en monogames, 2.º monoïques, 3.º monoico-polygames, et sous-divise seulement les monogames par le nombre des balles. Scopoli, en forme deux familles, dont la premiere, qui comprend les graminées légitimes à tige ou chaume à articulations, est sous-divisée par la nature des fleurs 1.º parfaites, à une, deux, trois ou six étamines; 2.° imparfaites. Van-Royen les distribue en quatre ordres, qu'il sous-divise par le nombre des pistils, la florescence et le sexe; savoir, en graminées 2.º digynes simples, 3°. digynes composées, 4.º diclines, c'est-à-dire, monoïques ou polygames: le premier ordre, renferme les cypéracées. Adanson, en forme neuf sections; savoir, 1.º les alpistes (phalarides, ) 2.º les avoines (avenæ,) 3.º I's poa (poæ,) 4.º les panics (panica,) 5. les froments (tritica,) 6. les riz (oryzæ,) 7.° les sorgho (sorga,) 8.° les mays (mays,) 9.º les souchets (cyperi). Jussieu, en forme treize divisions, prises du nombre des pistils, des étamines, des fleurs et du sexe. Guettard; leur donne pour caracteres, 1.º des filets cylindriques, 2.º des petites pointes ou filets très-courts et roides qui forment une espece de dentelure plus ou moins fine sur les nervures ou sur le bord des feuilles, sur le dos des glumes ou balles, sur les pédoncules, les tiges, vers le haut principalement, 3.° des petits points entre les nervures des tiges et des feuilles. Enfin Linné \*\*\*, Eder, Gerard, Wulf ne les divisent point.

Quatre Botanistes ont donné des systèmes sur cette famille; savoir, Ray, Scheuchzer, Michelli et Linné.

Ray, qui a examiné avec soin toutes les branches de la Botanique, a tenté de débrouiller la classe des graminées, et y a assez bien réussi, relativement au siecle où il vivoit. Il les distribua en trois sections, et adopta, comme les anciens, la division des graminées en épi et en panicule pour les deux premieres sections, et mit dans la troisieme, les plantes analogues aux graminées. Il sous-divise la premiere section, par la nature de l'épi simple ou à digitations, et la seconde, par la nature des épillets simples ou écailleux.

Le célebre Jean Scheuchzer, professeur de Botanique à Zurich (23), a développé avec une

Botanistes du commencement de ce siecle. Nous lui devons un ouvrage absolument neuf, et pour le fond et pour les détails. Son agrostographie, présente la distribution méthodique de près de six cents especes de graminées. Ses descriptions sont très-étendues, et portent sur les parties les plus subtiles. Mais comme l'auteur n'a point distingué les attributs communs à tous les genres, elles ne sont pas caractéristiques. Sa synonymie est incomplette. Mais ces deux défauts sont bien

sagacité, un travail et une constance vraiement étonnantes, la famille des graminées. Il les divise en cinq sections, relativement à la florescence en épi, en panicule simple ou composée. La premiere est sous divisée par le nombre des épis; la troisieme, par la nature du calice; la quatrieme, par la nature de la panicule et du calice. La second section, comprend les graminées anomales; et la cinquieme, les plantes analogues aux graminées.

Pierre-Antoine Michelli (24), donna, dans

rachetés par cette multitude d'especes que l'auteur a le premier décrites et rapprochées de leurs analogues. Les figures qui accompagnent cet ouvrage sont très-nombreuses et d'une grande vérité.

(24) Michelli, Italien, Botaniste du grand duc de Florence, peut être regardé comme un phénomene parmi les Botanistes. Homme sans lettres, guidé par le seul instinct, il étoit parvenu à connoître avec une rapidité étonnante, non-seulement toutes les plantes d'Italie, mais ayant entrevu de bonne heure, par ses recherches, les vides que présentoit la méthode de Tournefort, il est parvenu à les remplir, en décrivant, avec une exactitude rigoureuse, une multitude de plantes mêmes européennes, qui avoient échappées au grand Tournefort. Nous lui devons les détails les plus intéressans sur la plupart des cryptogames, spécialement sur la famille des champignons, et des détails plus utiles encore sur la famille des graminées, et spécialement sur le genre très-difficile et très-obscur des cypéroïdes, (carex de Linné.) Plusieurs genres parmi les grandes plantes parfaites ont été constituées par Michelli, d'après les principes de Tournefort. Nous lui devons encore la connoissance de quelques genres parmi les plantes aquatiques, qui exigeoient pour les reconnoître l'œil perçant de cet observateur, comme le Valisneria, lemna, etc.

la premiere partie de ses genres, un abrégé de son système sur les graminées, dont il promit une explication plus étendue. Il les divise en six ordres, dont les cinq premiers sont pris de la nature des épillets composés, simples, et de la considération des fleurs réunies avec les semences ou séparées des semences: le dernier, renferme les plantes analogues aux graminées.

Linné, dans ses Amænitates academicæ (25), a donnné un système sur les graminées. Il les divise par la florescence, en trois sections, 1.º en graminées en épi, 2.º en panicule, 3º. en cypéracées. La premiere section est divisée par la nature de l'épi, 1.º distique, à réceptacle denté, 2.º presque rond, à fleurs éparses, 3º. tourné d'un seul côté, 4.º à deux fleurs avec un spathe. La seconde section est divisée par l'absence, la présence et la nature du calice, 1.º nul, 2.º à une fleur, 3.º à deux ou trois fleurs, 4.º à plusieurs fleurs. La troisieme section, comprend les cypéracées.

Les Botanistes ne s'accordent point sur le caractere des graminées. Les uns disent que ces plantes n'ont ni calice ni corolle, mais seulement des

<sup>(25)</sup> Linné, connoissant toutes les dissicultés et les aberrations qu'offroit son système sexuel pour parvenir au diagnostic des graminées, a conçu sur la fin de sa vie le plan d'une nouvelle méthode très-simple, et qui se rapproche de la maniere d'envisager des anciens. Il a tiré parti de la situation des épillets assis ou pédonculés, ce qui lui a fourni les divisions en épi et en panicule. Cette méthode est d'autant plus intéressante, qu'il a fait graver les parties de la fructification pour chaque genre, et ses figures peuvent être regardées comme des chefs-d'œuyres.

balles et des écailles ou follicules qui leur en tiennent lieu: d'autres, leur donnent des fleurs apétales: quelques-uns, des fleurs pétalées, composées de balles qui se recouvrent mutuellement par leur base. Les deux inférieures et extérieures servent de calice, les autres supérieures et intérieures plus ou moins nombreuses, ordinairement transparentes, tiennent lieu de pétales, et enveloppent les étamines, les pistils et les semences.

Linné, d'après les loix de son système, a été forcé de séparer cette famille naturelle, et de la répartir dans la monandrie, diandrie, triandrie, hexandrie, monoécie et polygamie. La triandrie

offre quelques aberrations (26).

Polycnemum, a un, deux ou trois folioles au calice, une, deux, trois, cinq étamines, un ou deux pistils.

Commelina, varie par le nombre des pétales. Eryophorum, a quelques especes polygames.

Dans les graminées, le nombre des fleurs varie beaucoup. Le secale et l'elymus ont des especes triflores.
Le panicum, a cinq especes biflore, et l'avena, des
especes uniflores, quadriflores, multiflores. L'arundo,
offre des especes uniflores, biflores, triflores, multiflores; le dactylis, des especes quadriflores; le poa,
des especes biflores, quadriflores.

Dans le montia, le calice a quelquefois trois folioles,

et la corolle cinq étamines.

Lechea, a quatre étamines.

<sup>(26)</sup> Le genre des valérianes, a deux especes monandres, une diandre, trois tétrandres et une dioïque. Melothria, seule de son genre, est quelquefois polygame.

## CLASSE IV. TÉTRANDIE.

La tétrandrie a trois ordres. Le premier, contient la famille naturelle des rubiacées (27), et une partie de celle des aggrégées (28). Les sous-divisions de cet ordre, se prennent de la situation des fleurs supérieures ou inférieures, de la forme de la corolle, du nombre des pétales et des semences. Quelques genres offrent des aberiations (29).

Les scabieuses ont la corolle divisée en quatre ou cinq

parties.

Les rubia, crucianella ont quelquefois cinq divisions à la corolle, et deviennent pentandres.

L'asperula tinctoria et pyranaica ont trois divisions

à la corolle.

Petetia, présente des fleurs triandres, le calice et la corolle à trois divisions.

Dans les plantains, le calice est tantôt égal, tantôt

inégal.

Monetia a des fleurs à deux et trois divisions.

Camphorosma, offre quelquefois cinq étamines, et cinq dents au calice.

Busonia, a deux, trois et quatre étamines.
Hypecoum erectum, paroît tétradiname.
Sagina procumbens est quelquesois apétale.
Ilex aquisolium, pentandre.
Tillæa muscosa, triandre.
Fagara, octandre.
Rivina, octandre.

<sup>(27)</sup> Stellatæ, ord. nat. 44.

<sup>(28)</sup> Aggregatæ, ord. nat. 18.

<sup>(29)</sup> Ammania, offre une espece octandre. Ordinairement les pétales manquent, ce qui la renvoie dans le Systema vegetabilium, à deux divisions plus éloignées, celles des fleurs incomplettes.

Les rubiacées, comprises dans la sixieme sousdivision du premier ordre de cette classe, sous le nom de fleurs monopétales, à deux semences, supérieures, étoilées, se rapportent, dans les systèmes sur le fruit, à la 1re section de la 7e classe de Cæsalpin, sous le nom de plantes herbacées à deux conceptacles. A la 10e section de la 12e classe de Morison, sous le nom de plantes herbacées ombelliferes étoilées, tétrapétaloïdes. A la se classe d'Hermann, sous le nom de plantes herbacées pétalées, à deux semences nues, à fleur monopétale, étoilées. A la 3e section de la 9e classe de Christ Knaut, sous le nom de plantes herbacées, à fleurs pétalées simples, à deux semences nues, étoilées. A la 11 classe de Boerhaave, sous le nom de plantes herbacées dicotyledones pétalées, à deux semences nues ou gymnodispermes étoilées. Aux deux premiers ordres de la 2º classe de la 2º collection de la 1re série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées à fleurs et fruits visibles, polycotyledones à deux semences rubiacées ou étoilées.

Dans les systèmes sur la corolle, elles se rapportent à la 9° section de la 1<sup>re</sup> classe de Tournefort, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples monopétales régulieres campaniformes. A la 1<sup>re</sup> section de la 3<sup>e</sup> classe de Seguier, sous le nom de plantes herbacées à fleurs simples pétalées monopétales campaniformes. Au 8<sup>e</sup> ordre de la 1<sup>re</sup> classe de Bergen, sous le nom de plantes à fleurs simples pétalées monopétales régulieres campaniformes. A la 6<sup>e</sup> section de la 1<sup>re</sup> classe de Durande, sous le nom de plantes à fleurs monopétales régulieres, à germe inférieur, à deux

semences. Au 1er ordre de la 2e et 3e classes de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs pétalées monopétales simples, à limbe de la corolle divisé en quatre et cinq parties. A la 2e section de la 1re classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs parfaites simples régulieres monopétales à deux semences nues. A la 2º section de la 1º0 classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs parfaites régulieres simples monopétales à deux semences nues. A la 2º section de la 1re classe de Ludwig \*, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées régulieres simples monopétales à deux semences nues. A la 2º section de la 1re classe de Chret. Knaut, sous le nom de plantes à fleurs monopétales uniformes. Au 3° ordre de la 1re classe de Ludwig \*\* et Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales simples régulieres, à quatre antheres et un style. Au 2º ordre de la 1re classe d'Haller \*, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites régulieres simples monopétales, à deux semences. Au 3° ordre de la 1re classe de Gouan, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées simples monopétales régulieres tétrandres monogynes. Au-3° ordre de la 1re classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites pétalées monopétales simples régulieres tétrandres monogynes.

Dans les systèmes sur les calices, les rubiacées se rapportent à la 2° section de la 6° classe de Magnol, sous le nom de plantes herbacées, à calice externe seulement, soutenant une fleur monopétale. A la 5° section de la 8° classe de Linné \*, sous le nom de plantes à calice à périanthe uniflore simple à

couronne.

Dans les systêmes sur les étamines, les rubiacées se rapportent à la 3º section de la 4º classe de Villars, sous le nom de plantes à étamines déterminées tétrandres, rubiacées. Au 1er ordre de la 4e classe de Thunberg, sous le nom de plantes à fleurs visibles tétrandres monogynes. Au 1er ordre de la 4º classe de Gmelin, sous le nom de plantes à fleurs visibles tétrandres monogynes, monopétales supérieures à deux semences, étoilées. Au 4º ordre de la 2º classe de Gledistch, sous le nom de plantes à fructification apparente, à étamines insérées sur la corolle, à quatre antheres, à fleurs

simples égales, à deux semences réunies.

Dans les systèmes mixtes, elles se rapportent au 2d ordre de la 1re classe d'Allioni, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées monopétales simples, à deux semences nues. Au 2d fascicule de la 1re collection de la 1re série de Gilibert, sous le nom de plantes à étamines visibles, à corolles unipétales, à quatre étamines et un style, étoilées. Au 8º ordre de la 6º classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle, étoilées. A la 10º classe du systême d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones, à étamines en nombre égal. à celui des divisions de la corolle. A la 2e classe de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledones complettes ou parfaites, à divisions du calice et de la corolle, égales en nombre. Au 1er ordre de la 130 classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescence apparente, à port simple, fructiflores monopétales.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les rubiacées se rapportent à la 12º classe de Ray, sous le nom de plantes herbacées privées de bourgeons, parfaites dicotyledones à fleurs simples, à deux semences, étoilées. A la 27º classe de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire sous la corolle, monopétales, rubiacées.

Dans les systèmes sur les feuilles, elles se rapportent au 2<sup>d</sup> ordre de la 6° classe de Sauvages, sous le nom de plantes garnies de feuilles simples entieres en anneaux.

Dans les systèmes naturels, elles se rapportent à la 1re section de la 19e famille d'Adanson, au 210 ordre de Guettard, sous le nom d'apparines: ce dernier auteur leur donne pour caractère des filets coniques, simples, roides, terminés par une pointe très-aigue, ou filets en aiguille. A la 2e famille de la 10e tribu de Scopoli, sous le nom de plantes à étamines insérées sur la corolle, à germe inférieur, aparines. Au 19° ordre de Wulf, au 21e ordre de Gerard, sous le nom de rubiacées. Au 44e ordre de Linné \*\*\*, sous le nom d'étoilées. A la 4e famille de la 5e classe d' Eder, sous le nom de plantes calycarpes étoilées. Au 8e genre de Necker, sous le nom de plantes à feuilles réunies autour de la tige en forme d'étoiles. Au 7º ordre de la 10º classe de Van-Royen, sous le nom de plantes polycotyledones à calice propre, à fruit différent, à étamines visibles, à calice et corolle, à filamens proportionnés assis sur le germe, fructiflores. Au 2d ordre de la 11e classe de Jussieu, sous le nom de plantes dicotyledones monopétales, à corolle portée sur le pistil, à antheres

distinctes, rubiacées.

Les aggrégées comprises dans les deux premieres sous-divisions du premier ordre de la tétrandrie, sous le nom de fleurs monopétales, à une semence, inférieures et supérieures, aggrégées, constituent, dans les systèmes sur le fruit, la 50 section de la 9e classe, et la 4e section de la 10e classe de Morison, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées en corymbe, étoilées et à aigrettes, en tête. La 4e section de la 12e classe du système de Cæsalpin, sous le nom de plantes herbacées à plusieurs semences. La se classe d'Hermann, sous le nom de plantes herbacées pétalées à fleur solitaire composée à une semence nue. La 3e section de la 10e classe de Christ. Knaut, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées composées à semences solides ou sans aigrettes. La 110 section de la 10e classe de Boerhaave, sous le nom de plantes herbacées dicotyledones pétalées à une semence nue, à fleur composée en tête. Le 1er ordre de la 1; e classe de la 2e collection de la 1re série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées polycotyledones à semences nues, à fleur aggrégée.

Dans les systèmes sur la corolle, elles forment la 5° section de la 12° classe de Tournefort, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées composées flosculeuses. La 14° classe de Seguier, sous le nom de plantes herbacées à fleurs composées flosculeuses. Les 5° et 6° ordres de la 12° classe de Bergen, sous le nom de plantes à fleurs composées pétalées flosculeuses. La 2° section de la 5° classe de Durande, sous le nom de

plantes à fleurs monopétales aggrégées parfaites, à germe inférieur et supérieur. Le 1er ordre de la 2e et 3e classes de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs pétalées monopétales simples, à limbe de la corolle divisé en quatre et cinq parties. La 1re section de la 10e classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs parfaites composées à fleurons irréguliers. La 1re section de la 10e classe de Ludwig \*, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées composées, à fleurons irréguliers à semences solides. La 1re section de la 9e classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs parfaites irrégulieres simples monopétales à une semence nue. La 1re section de la 2e classe de Chret. Knaut, sous le nom de plantes à fleurs monopétales difformes, et la 2º section de la 4º classe du même auteur, sous le nom de plantes à fleurs. monopétales aggrégées difformes. Le 1er ordre de la 3e classe de Ludwig \*\* et de Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales composées tubulées, à fleurons à quatre antheres libres ou distinctes. Le 1er ordre de la 9º classe d'Haller \*, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites irrégulieres monopétales à une semence nue. Le 4e ordre de la 2e classe de Gouan, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées simples monopétales irrégulieres tétrandres monogynes. Le 1er ordre de la 3e classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites pétalées monopétales composées, à fleurons à quatre étamines distinctes.

Dans les systèmes sur le calice, elles forment la 4° section de la 5° classe de Magnol, sous le nom de plantes à calice externe seulement, renfermant une fleur composée. La se section de la 5e classe de Linné \*, sous le nom de plantes à calice à périanthe multiflore.

Dans les systèmes sur les étamines, les aggrégées forment la 1<sup>re</sup> section de la 4<sup>e</sup> classe de Villars, sous le nom de plantes à étamines déterminées tétrandres, dipsacées. Le 1<sup>er</sup> ordre de la 4<sup>e</sup> classe de Thunberg, sous le nom de plantes à fleurs visibles tétrandres monogynes. Le 1<sup>er</sup> ordre de la 4<sup>e</sup> classe de Gmelin, sous le nom de plantes à fleurs visibles tétrandres monogynes monopétales inférieures et supérieures à une semence, aggrégées. Le 4<sup>e</sup> ordre de la 2<sup>e</sup> classe de Gledistch, sous le nom de plantes à fructification apparente, à étamines insérées sur la corolle, à quatre antheres, à fleurs aggrégées.

Dans les systèmes mixtes, elles forment le 1er ordre de la 2º classe d'Allioni, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées monopétales composées à antheres séparées. Le 1er fascicule de la 3e collection de la 1re série de Gilibert, sous le nom de plantes à étamines visibles, à corolles unipétales à fleurs composées flosculeuses, à antheres libres. Le 5º ordre de la 11º classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées composées à étamines libres, dipsacées. La 15e classe d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones à une semence nue, dipsacées. La 10e classe de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledones, complettes ou parfaites, à antheres séparées. La 3e classe de Crantz, sous le nom de

plantes à florescence apparente, à port absolu et

déliquescent, composées.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les aggrégées forment la 2° section de la 9° classe de Ray, sous le nom de plantes herbacées privées de bourgeons, parfaites dicotyledones à fleur composée en tête. La 26° classe de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire sous la corolle, à corolle monopétale.

Dans les systèmes sur les feuilles, les aggrégées forment les 5°, 9° et 10° classes de Sauvages, sous le nom de plantes garnies de feuilles simples entières opposées, composées, pinnées et décom-

posées.

Dans les systèmes naturels, les aggrégées constituent le 18e ordre de Linné \*\*\*, qui les désigne sous le nom d'aggrégées. Le 180 ordre de Wulf, sous le nom de dipsacées. Le 20e ordre de Gerard, sous le nom de dipsacées aggrégées. La 1re section de la 20e famille d'Adanson, sous le nom de scabieuses. Le 26e ordre de Guettard, sous le nom de dipsacées, à filets 1.º coniques simples, 2.º coniques, à glandes vessiculaires, 3.º coniques, à glandes à cupule. La 2e famille de la se classe d'Oeder, sous le nom de plantes calycarpes aggrégées. La 1re famille de la 9e tribu de Scopoli. sous le nom de plantes à calice et corolle d'une seule piece, à étamines insérées sur la corolle, à germe inférieur, à fleurs composées, à filamens des étamines libres. Le 1er ordre de la 7º classe de Van-Royen, sous le nom de plantes polycotyledones à calice commun à périanthe, à antheres séparées. Le 1er ordre de la 11e classe de Jussieu,

Jussieu, sous le nom de plantes dicotyledones monopétales, à corolle portée sur le pistil, à antheres distinctes, dipsacées. Le 4° ordre de Necker, sous le nom de plantes dont les fleurons rassemblés offrent le coup-d'œil d'une fleur composée.

#### CLASSE V. PENTANDRIE.

La pentandrie est la plus nombreuse de toutes les classes. Elle renferme deux cents soixante-trois genres et six ordres. Le premier, est sous-divisé par la situation des fleurs supérieures ou inférieures; par la nature des fleurs monopétales, pentapétales, incomplettes; par la nudité et le nombre des semences ; par la considération des semences angiospermes (convertes). Cet ordre contient les familles des borraginées (30), primeveres (31), campanules (32) et solanacées (33). Le second ordre, qui est sous-divisé par la forme et la situation des fleurs inférieures ou supérieures, monopétales, pentapétales, incomplettes, renferme la nombreuse famille des ombelliferes (34). Le troisieme et cinquieme ordres, sont sous-divisés par la situation des fleurs supérieures ou inférieures. Le quatrieme et sixieme ordres, n'offrent point de sous-division.

<sup>(30)</sup> Asperifolia, ord. nat. 43.

<sup>(31)</sup> Campanacei, ord. nat. 32.

<sup>(32)</sup> Preciæ, ord. nat. 51.

<sup>(33)</sup> Luridæ, ord. nat. 35.

<sup>(34)</sup> Umbellatæ, ord. nat. 22.

Cette classe, présente un assez grand nombre d'aberrations (35).

(35) Swertia corniculata, dichotoma, tétrandres.

Portlandia, tetrandra, hexandra.

Conocarpus, erecta, pentandre apétale; racemosa, décandre.

Thesium alpinum, tétrandre.

Ribes alpinum, dioique.

Herniaria fruticosa, tétrandre.

Velezia, est quelquefois hexandre.

Tamarix germanica, décandre. Les étamines sont réunies à leur base.

Drosera luzitanica, décandre. Evonymus europæus, tétrandre.

Linum radiola, tétrandre tétragyne.

Staphylea pinnata, digyne. Sideroxylon decandrum.

Lycium tetrandrum.

Dans le myosurus, le nombre des étamines varie.

Rhamnus catharticus, insectorius, alpinus, alaternus,
dioïques; ignaneus, monoïque; zizyphus, didyne; alaternus, trigyne.

Quelques especes de lisymachia ont les étamines

réunies à la base.

Les azalea ont la corolle campanulée et infundibuliforme.

Quelques especes de convolvulus ont une corolle infundibuliforme.

Les campanules varient dans la forme du fruit et de

la corolle, de même que les chevrefeuilles.

Les gentianes varient dans la forme de la corolle et le nombre des étamines.

Les datura offrent une capsule lisse et épineuse.

Le fruit du chironia, est tantôt une capsule, tantôt une baie.

Le Chrysophyllum a la corolle fendue en cinq et dix parties.

Tectona, est quelquefois hexandre. Myrsine, est quelquefois tétrandre.

Diosma, varie prodigieusement dans la figure des

Les borraginées, comprises dans la seconde et troisieme divisions du premier ordre de la pentandrie, sous le nom de plantes pentendres monogynes à fleurs monopétales inférieures, à quatre semences nues, aspérifeuilles, se rapportent, dans les systèmes sur le fruit, à la 1re section de de la 10º classe de Cæsalpin, sous le nom de plantes herbacées à quatre semences nues dans un réceptacle commun. A la 6º section de la 14º classe de Morison, sous le nom de plantes herbacées. monopétales à quatre semences, aspérifeuilles. A la 6º classe d'Hermann, sous le nom de plantes herbacées pétalées, à quatre semences nues, à feuilles alternes, aspérifeuilles. A la 4e section de la 9º classe de Christ. Knaut, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples à quatre semences nues, aspérifeuilles. A la 13º classe de Boerhaave, sous le nom de plantes herbacées dicotyledones pétalées à quatre semences nues, aspérifeuilles. A la 6e classe de la 2e collection de

nectars, le nombre de capsules. Quelques especes sont hermaphrodites, d'autres, monoïques; quelques-unes ont dix étamines, dont cinq stériles.

Hovenia, est rarement tétrandre.

Calodendrum, varie dans le nombre des parties de la corolle, du nectar, des étamines.

Hirtella, a quelquefois trois étamines.

Dans que ques especes de gardenia, ont trouve neuf étamines et neuf divisions au calice et à la corolle.

Hydrolea, offre six étamines et six divisions au calice et à la corolle, dans quelques especes.

Salsola, a quelques especes trigynes.

Celosia, offre une espece trigyne.

Dans quelques especes de chenopium, le style est

la 1re série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées polycotyledones à quatre semences nues, à fleur monopétale, ordinairement divisée en cinq

parties, aspérifeuilles.

Dans les systêmes sur la corolle, les borraginées se rapportent à la 4º section de la 2º classe de Tournefort, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples monopétales régulieres infundibuliformes. A la 2º section de la 3º classe de Seguier, sous le nom de plantes herbacées à fleurs simples pétalées monopétales campaniformes. Au 4º ordre de la 2º classe de Bergen, sous le nom de plantes à fleurs simples pétalées monopétales régulieres campaniformes. Au 1er ordre de la 3e classe de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs pétalées monopétales simples, à limbe de la corolle divisé en cinq parties. A la 1re section de la 1re classe de Durande, sous le nom de plantes à fleurs monopétales régulieres, à germe supérieur à quatre semences. A la 3e section de la 1re classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs parfaites simples régulieres monopétales à quatre semences nues. A la 3º section de la 1re classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs parfaites régulieres simples monopétales à quatre semences. A la 3e section de la 1re classe de Ludwig\*, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées régulieres simples monopétales à quatre semences nues. A la 4º section de la 1re classe de Chret. Knaut, sous le nom de plantes à fleurs à cinq pétales uniformes. Au 4e ordre de la 1re classe de Ludwig \*\* et Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales simples régulieres à cinq antheres,

un style et quatre semences nues. Au 3e ordre de la 1re classe d'Haller +, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites régulieres simples monopétales à quatre semences nues. Au 4e ordre de la 1re classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites pétalées monopétales simples régulieres à cinq étamines et un pistil. Au 4e ordre de la 1re classe de Gouan, et au 5e ordre de sa 2e classe, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées simples monopétales régulieres et irrégulieres, à cinq étamines et un pistil.

Dans les systèmes sur le calice, les borraginées se rapportent à la 1re section de la 3e classe de Magnol, sous le nom de plantes herbacées à calice externe seulement, renfermant une fleur monopétale. A la 4e section de la 12e classe de Linné\*, sous le nom de plantes à calice à périanthe uniflore simple,

à fleurs égales monopétales.

Dans les systèmes sur les étamines, les borraginées se rapportent à la 1re section de la 5e classe
de Villars, qui les désigne sous le nom de plantes à étamines déterminées, à cinq étamines,
borraginées. Au 1er ordre de la 5e classe de Thunberg, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à
cinq étamines et un pistil. Au 1er ordre de la 5e
classe de Gmelin, sous le nom de plantes à fleurs
visibles, à cinq étamines et un pistil, monopétales supérieures, à quatre semences, aspérifeuilles.
Au 5e ordre de la 2e classe de Gledistch, sous le
nom de plantes à fructification apparente, à étamines insérées sur la corolle, à cinq antheres, à
fleurs simples complettes, à quatre semences nues,
aspérifeuilles,

Dans les systèmes mixtes, les borraginées se rapportent au 3º ordre de la 1re classe d'Allioni, qui les désigne sous le nom de plantes à fleurs. visibles pétalées monopétales simples à quatre semences nues. Au 2ª fascicule de la 12º collection de la 1re série de Gilibert, sous le nom de plantes à étamines visibles, à corolles unipétales nonfigurées, à cinq étamines un style, à quatre semences nues, aspérifeuilles. Au 50 ordre de la 60 classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle, aspérifeuilles. A la 10e classe d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones, à étamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle. Au 2d ordre de la 1re classe de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledones, complettes ou parfaites, à semences nues. Au 1er ordre de la 14º classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescence apparente, à classe artificielle, à peu d'étamines monopétales.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les borraginées se rapportent à la 13° classe de Ray, sous le nom de plantes herbacées privées de bourgeons, parfaites dicotyledones, à fleur simple à quatre semences, aspérifeuilles. A la 7° classe de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes à dix étamines ou moins, à corolle réguliere monopé-

tale, borraginées.

Dans les systèmes sur les feuilles, les borraginées se rapportent au 5° ordre de la 3° classe de Sau-

vages, et au 4º ordre de sa 4º classe, sous le nom de plantes garnies de feuilles simples entieres,

étroites et larges.

Dans les systèmes naturels, les borraginées se rapportent au 23e ordre de Wulf, au 26e ordre de Gerard, au 43° ordre de Linné \*\*\*, qui les désignent sous le nom d'aspérifeuilles. A la 20 section de la 24e famille d'Adanson, sous le nom de bourraches. Au 23º ordre de Guettard, sous le nom de borraginées, à filets en poinçons, c'est-à-dire roides, portés sur un mammelon gros, plus ou moins conique, et formé de plusieurs vessicules parenchymateuses. A la 1re famille de la 7e classe d'Oeder, sous le nom de plantes monopétales aspérifeuilles. A la 2º famille de la 13º tribu de Scopoli, sous le nom de plantes à calice et corolle d'une seule piece, à étamines insérées sur la corolle, aspérifeuilles. Au 12e genre de Necker, sous le nom de plantes à quatre semences réunies au fond du calice, aspérifeuilles. Au 9e ordre de la 8e classe de Jussieu, sous le nom de plantes dicotyledones monopétales, à corolle placée sous le pistil, borraginées. Au 4º ordre de la 16º classe de Van-Royen, sous le nom de plantes polycotyledones à calice propre à fruit différent, à étamines visibles, à calice et corolle, à filamens libres en nombre égal à celui des divisions de la corolle.

Je ne m'arrêterai point sur les familles des campanules, primeveres, solanacées, parce qu'elles ne forment, dans les systèmes dont je rapporte la concordance, aucune division digne d'être citée; je vais passer aux ombelliferes, qui méritent à

tous égards notre attention.

Les ombelliferes, comprises dans la cinquieme

division du second ordre de la pentandrie, sous le nom de plantes à fleurs pentandres digynes, pentapétales supérieures à deux semences, ombellées, forment, dans les systèmes sur le fruit, la re section de la 6e classe de Cæsalpin, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à deux semences. La 12e classe de Morison, sous le nom de plantes herbacées, ombelliferes. Les deux premieres sections de la 2º classe d'Hermann, sous le nom de plantes herbacées pétalées, à deux semences nues, à fleurs à cinq pétales ombellées. La 2º section de la 9º classe de Christ. Knaut, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples à deux semences nues ombellées. La 5º classe de Boerhaave, sous le nom de plantes herbacées dicotyledones pétalées à deux semences nues, ombelliferes. La 3º classe de la 2º collection de la 1re série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées polycotyledones à deux semences nues, ombelliferes.

Dans les systèmes sur la corolle, les ombelliferes forment la 7º classe de Tournefort, qui les désigne sous le nom de plantes à fleurs herbacées pétalées simples polypétales régulieres rosacées ombellées. La 10º classe de Seguier, sous le nom de plantes herbacées à fleurs simples pétalées, à cinq pétales ombellées. La 7º classe de Bergen, sous le nom de plantes à fleurs simples pétalées polypétales régulieres rosacées ombellées. La 11º classe de Durande, sous le nom de plantes à fleurs polypétales ombellées. La 13º classe de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs pétalées polypétales, à cinq pétales ombellées. La 15º classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleur parfaites

faites simples irrégulieres pentapétales. La 1re section de la 13e classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs parfaites irrégulieres pentapétales. La 1re section de la 1 se classe de Ludwig \*, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées irrégulieres à cinq pétales, à deux semences nues. La 2e et 3e sections de la 12e classe de Chret. Knaut, sous le nom de plantes à fleurs à cinq pétales uniformes. La 12e classe de Ludwig \*\* et Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à cinq pétales ombellées. La 12e classe d'Haller \*, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites irrégulieres à cinq pétales, à deux semences nues. La 12e classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites pétalées, à cinq pétales ombellées. Le 2d ordre de la 8e classe de Gouan, et le se ordre de sa 2º classe, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées simples à cinq pétales régulieres et irrégulieres, à cinq étamines et un pistil.

Dans les systèmes sur le calice, les ombelliferes forment la 7° classe de Magnol, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à calice externe seulement, soutenant une fleur polypétale. A la 4° classe de Linné\*, sous le nom de plantes à calice

à involucre, à fleurs ombellées.

Dans les systèmes sur les étamines, les ombelliferes forment la 11º section de la 5º classe de Villars, qui les désigne sous le nom de plantes à étamines déterminées, à cinq étamines, ombelliferes. Le 2d ordre de la 5º classe de Thunberg, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à cinq étamines et deux pistils. Le 2d ordre de la se classe de Gmelin, sous le nom de plantes à fleurs visibles à cinq étamines deux pistils, à cinq pétales supérieures, à deux semences, ombellées. Le 5e ordre de la 1re classe de Gledistch, sous le nom de plantes à fructification apparente, à étamines insérées sur le réceptacle, à cinq antheres, à fleurs ombellées.

Dans les systèmes mixtes, les ombelliferes forment la 6e classe d'Allioni, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées à cinq pétales, ombelliferes. Le 1er fascicule de la 1re collection de la 2º série de Gilibert, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à corolles polypétales uniformes, ombelliferes. Le 9º ordre de la 6º classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle, ombelliferes. Le 1er ordre de la 100 classe d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones, à étamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle. Le rer ordre de la 1re classe de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledones complettes ou parfaites à semences nues. La 10e classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescence apparente, à port absolu et déliquescent, ombelliferes.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les ombelliseres forment la 11e classe de Ray, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées privées de bourgeons, parfaites dicoty-ledones à fleur simple à deux semences, ombelliseres. La 29e classe de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes bisexuelles

pétalées à ovaire sous la corolle, à corolle poly-

pétale, ombelliferes.

Dans les systèmes sur les feuilles, les ombelliferes forment le 7° ordre de la 9° et 10° classes de Sauvages, sous le nom de plantes garnies de feuilles composées, pinnées et décomposées.

Dans les systèmes naturels, les ombelliferes forment la 15e famille d'Adanson, le 20e ordre de Wulf, le 220 ordre de Gerard, qui les désignent sous le nom d'ombelliferes. Le 220 ordre de Linné \*\*\*, sous le nom d'ombellées. Le 220 ordre de Guettard, sous le nom d'ombelliferes sans filets ou à filets coniques simples. La 3e famille de la se classe d'Oeder, sous le nom de plantes calycarpes ombelliferes. Aux deux familles de la 8º tribu de Scopoli, sous le nom de plantes à calice et corolle de plusieurs pieces, à étamines insérées sur le réceptacle, à germe inférieur, à semences nues, ombelliferes. Au septieme genre de Necker, sous le nom de plantes à fructification en ombelle, à fruit divisible en deux. Le 2d ordre de la 12º classe de Jussieu, sous le nom de plantes dicotyledones polypétales, à étamines portées sur le pistil, ombelliferes. La 50 classe de Van-Royen, sous le nom de plantes polycotyledones à calice commun, à involucre ombellifere.

Si nous examinons la maniere dont ces auteurs ont divisé la nombreuse famille des ombelliferes, nous verrons 1.º qu'Hermann, Morison, Rivin, Ray, Fabricius, Gattenhof, les
divisent par la forme des semences; 2.º Gledistch,
Allioni, Vernischeck, Gilibert, Linné\*, Gouan,
par la forme des ombelles; 3.º Tournefort, Durande, Lamarck, par la forme des fleurs; 4.º Chret.

Knaut, par la forme des pétales; 5.° Haller \*\*\*, par le réceptacle; 6.° Magnol, Wachendorf, Crantz, Bergen, Haller \*\*, par le port, en ombelliferes vraies ou fausses; 7.° Boerhaave, Sauvages, par les feuilles; 8.° Gmelin, suit les divisions de Linné; 9.° enfin, Cæsalpin, Christ. Knaut, Ruppius, Ludwig\*, Haller\*, Seguier, Ludwig \*\*, Boëhmer, Thunberg ne les divisent

point.

Hermann, divise les ombelliferes par la forme des semences, 1.° canaliculées ou en gouttieres, 2.° velues ou hérissées de piquans, 3.° larges comprimées. Morison, prend ses divisions de la forme des semences, 1.º fongueuses, 2.º rondes testiculées, 3.° striées courtes, 4.° à bec, 5.° velues, 6.° hérissées de piquans, 7.° presque rondes comprimées, 8.° à une ou plusieurs ailes foliacées. Rivin, les divise par la forme des semences, 1.º larges, 2.º longues, 3.º solides. Ray, par la forme des semences et des feuilles, 1.° comprimées foliacées, 2.° à ailes foliacées longitudinales, 3.° fongueuses presque rondes ou elliptiques, 4.° en globes simples ou à deux graines accolées, 5.° à bec, 6.° longues étroites, ressemblantes au bec d'un oiseau, 7.º longues grandes striées, 8.º striées d'une longueur et d'une grosseur médiocres, 9.° striées étroites petites, 10.° striées courtes latges assez grandes, 11.° striées courtes enflées trèspetites, 12.° velues, 13.° garnies de piquans, 14.º à feuilles simples. Fabricius, les divise en dix ordres, pris de la forme des semences, et les sous-divise par les feuilles; 1.º très-petites, à peine sillonnées, à feuilles a composées, b simples; 2.º petites, un peu plus longues que les précé-

dentes, à sillons mieux prononcés, à feuilles a simples, b composées à divisions presque capillaires ou sétacées, c à divisions un peu plus larges que les précédentes, d pinnées pour la plupart; 3.° velues, à feuilles a simples laciniées, b composées multifides ; 4.º hérissées ou garnies de piquans; 5.° ovales, garnies de tubercules; 6.° longues, pointues en aleine, semblables au bec d'un oiseau, à bec A lisse, court, a d'une seule couleur (ordinairement noire, ) b strié de deux couleurs, c rude ou velu, B à bec long, effilé, strié à la base ; 7.° grandes , longues , profondément sillonnées et anguleuses; 8.º applaties, ordinairement presque rondes, ovales, striées sur le dos, A grandes, B petites. 9.º grandes, ailées, revêtues de quelques membranes longitudinales, 10.º rondes ou presque rondes, A petites, à feuilles a composées, b simples, presque rondes, B très-grandes. Gattenhof, les divise par la forme des semences 1.° enflées striées, les pétales A égaux, l'involucre a nul, B inégaux, bà un ou deux involucres et les pétales inégaux; 2.° enflées striées, ailées, les ailes a au nombre de quatre ou plus dans chaque semence, b de deux latérales; 3.° applaties, ailées et renflées sur les bords; 4.º piquantes; 5.º velues, sans bec; 6.° à bec fort long.

Gledistch, prend ses divisions de la forme des ombelles 1.° simples, 2.° composées. Les premieres ne sont pas sous-divisées, mais dans les secondes, il suit la marche de Linné; savoir, A à involucres universels et partiels, B à involucres partiels, seulement, C sans involucres. Allioni, les divise par la forme des ombelles 1.° simples, 2.° composées. Les premieres n'offrent point de divisions; les

secondes sont sous-divisées par la forme des semences A échancrées, à ailes non-membraneuses, B non-échancrées, a les côtes presque ailées, b les côtes ou les stries nues, avec le fruit long ou rond, c longues, presque cylindriques. Wernischeck, par la forme des ombelles à involucres 1.º nuls, 2.° partiels, 3.° universels et partiels. Gilibert, en forme trois fascicules, relativement à la forme des ombelles à involucres 1.º universels et partiels, 2.° partiels seulement, 3.° sans involucres : il les sous-divise par la forme et le sexe des fleurs, en tête, presque ombellées, radiées, flosculeuses, stériles, fertiles; et la forme des semences, enflées, sillonnées, hérissées, lisses, membraneuses, etc. Linné \*, les divise par la forme des ombelles, 1.° simples, 2.° doubles : dans les ombelles doubles, l'involucre est a nul, b partiel seulement, c partiel et universel, \* divisé, \*\* entier. Gouan, qui distribue les ombelliseres en deux classes, divise celles de sa 8° classe, par la forme de l'ombelle, 1.º en subombellées, 2.º ombellées à involucre double, 3.° ombellées à involucre nul; et celles de sa 9º classe, 1.º en ombellées à involucre double, 2.° ombellées à involucre partiel seulement.

Tournefort, divise les ombelliferes en neuf sections, prises de la forme des fleurs A disposées en parasol, dans les huit premieres, avec les semences 1.° petites striées, 2.° épaisses, étroites, longues, 3.° un peu épaisses, presque rondes, 4.° applaties, ovales, assez larges, 5.° ovales, applaties, larges, 6.° larges, profondément sillonnées, 7.° à écorce fongueuse, 8.° terminées par une longue queue; B rassemblées en capitule, dans la neuvieme section. Durande, les divise par la forme

des fleurs 1.° régulieres en ombelle, soutenues par des rayons, A à deux enveloppes, B à une enveloppe, C point ou très-peu d'enveloppes; 2.° irrégulieres en ombelle, soutenues par des rayons, A à deux enveloppes, B à une enveloppe; 3.° sessiles, ramassées en tête. Lamarck, les divise par la forme des fleurs, 1.° sessiles et disposées sur un réceptacle commun, garni de paillettes; 2.° nondisposées sur un réceptacle commun, garni de paillettes : il les sous-divise par la forme des feuilles, fruits, collerettes, etc.

Chret. Knaut n'a égard, dans sa division des ombelliferes, qu'à la forme des pétales 1.º entiers, 2.º bissides, placés sur le fruit, dans l'une et l'autre

division.

Haller \*\*\*, les divise par 1°. le réceptacle commun, 2.° sans réceptacle commun, et les sousdivise par les semences à aiguillons, à bec, convexes, ovales ou pointues, ailées à cinq, quatre

ou deux ailes, applaties, lisses.

Magnol les divise par le port, 1.° en ombelliferes vraies, 2.° fausses, et sous-divise les premieres, par la forme des semences a striées, b larges,
c hérissonnées, e longues. Wachendorf les divise
par le port, en ombelliferes proprement dites;
2° en plantes analogues aux ombelliferes, et sousdivise les premieres, par l'involucre A nul, B partiel, seulement à fruit a rond, b ovale, c oblong,
C universel et partiel, à fruit a presque rond,
b oblong enflé, applati. Crantz, les divise par
le port 1.° absolu, 2.° déliquescent, et sous-divise
celles dont le port est absolu, par l'involucre A universel et partiel, B partiel, C nul. Bergen les
divise par le port, en ombelliferes 1.° vraies,

2.° fausses, et sous - divise les premieres en neuf ordres, pris de la forme des semences, de l'involucre et des pétales. Haller \*\* les divise par le port, en ombelliferes 1.° fausses, 2.° vraies, et sous-divise les dernieres, par la nature du réceptacle et la forme des semences, de l'involucre et des pétales.

Boerhaave n'a égard, dans ses divisions, qu'à la forme des feuilles 1.° composées, finement découpées, sans lobes, 2.° composées, lobées, 3.° tantôt lobées, tantôt divisées, lobées et divisées, 4.° simples, entieres, 5.° lobées. Sauvages, qui les distribue dans sa 9° et 10° classes, les divise

par la forme des feuilles et des folioles.

Dans les systèmes naturels , Linné \* , Gerard , Wulf, Oeder ne divisent point les ombelliferes. Van-Royen, les distingue 1.º par la forme de l'ombelle, 2.° de l'involucre A double, B simple, C nul. Scopoli, les divise par la forme des ombelles, 1.° composées, 2.° simples, et sous-divise les premieres, par la forme des semences 1.º velues, 2.º ailées glabres, 3.º échancrées, 3.º sillonnées ou striées, à involucre a double, b partiel, c nul, s.º lisses. Jussieu les distingue par le port, en ombelliferes 1.° vraies, 2.° anomales, et sous-divise les premieres, par la nature de l'ombelle et de l'ombellule, le plus souvent nues; 2.º de l'ombelle nue, l'ombellule ayant un petit involucre; 3.º l'ombelle et l'ombellule ayant chacune un involucre. Necker, les divise par la présence ou l'absence du calice et le sexe des fleurs; savoir, en ombelliseres A à calice, 1.º monogames, 2.º monoïco-polygames, B sans calice, 1.º monogames, 2.º monoïco - polygames, 3.º dioïco - polygames. Adanson ,

Adanson, les distribue en huit sections; savoir, 1.° les carvis (carea,) 2.° les cerfeuils (chœrophylla,) 4.° les ciguës (cicutæ,) 4.° les carrotes (dauci,) 5.° les berces (sphondylia,) 6.° les panais (pastinacæ,) 7.° les fenouils (fœnicula,) 8.° les ginsengs. Guettard, en forme deux sections; savoir, 1.° en ombelliferes qui n'ont point de filets, mais une fleur ou un pointillé, et souvent les feuilles et les tiges à crénelures épaisses; 2.° en ombelliferes qui ont des filets coniques, simples sur les graines, quelquefois recourbés ou découpés en plusieurs petites lanieres, crochues par le haut, ou qui n'ont que des vessicules membraneuses sur ces mêmes parties.

Il existe, comme nous l'avons vu, quatre systêmes partiels sux les ombelliseres: ceux d'Artedi, Morison, Crantz et Villars.

Pierre Artedi, médecin Suédois, avoit résolu de perfectionner la classe nombreuse des ombelliferes, mais surpris par une mort funeste et prématurée, il ne put achever son travail sur cette famille, dont il n'a donné que les genres. Il les divisoit en trois ordres, relativement à l'involucre, 1.º universel et partiel, 2.º partiel, 3.º nul (36).

<sup>(36)</sup> Un des traits qui fait le plus d'honneur à Linné, est sans doute la maniere noble et généreuse dont il se comporta envers son ami Artedi. Ayant eu soin de rassembler ses manuscrits, aussi-tôt après sa mort, quoique accablé par ses propres affaires, il retoucha le texte de l'auteur, rassembla ses notes éparses, corrigea celles qui étoient imparfaites, et peu de mois après, il fit imprimer les ouvrages d'Artedi, sous le

Morison sit ses premiers essais, en publiant un système sur les ombelliseres. Il les divise en huit tables, dont les deux dernieres renserment les ombelles improprement dites : et sous-divise les ombelliseres de la seconde et troisieme tables, par la grosseur des semences.

Crantz, dans un ouvrage, intitulé: Stirpium austriacarum pars prima, a donné un système sur les ombelliferes. Il les divise par le port, 1.º absolu, 2.º déliquescent. Celles dont le port est absolu, sont distribuées en deux ordres, pris de la nature des semences 1.º ailées, 2.º à côtes ou stries. Les premieres, ont les ailes situées A à la marge, B à la marge et sur le dos; les secondes, ont les semences 1.º nues, 2.º couvertes. Celles dont le port est déliquescent, ne comprennent qu'un seul genre.

Villars, dans son histoire des plantes du Dauphiné, a présenté une nouvelle distribution des plantes ombelliferes, qu'il divise par la forme des ombelles parfaites ou imparfaites. Celles dont l'ombelle est parfaite, sont sous-divisées par la nature des semences 1.° striées, A oblongues, B ovales, 2.° lisses, 3.° sillonnées, A plus alongées, B plus courtes, couronnées, 4.° ailées, A à quatre ailes, B à deux ailes a striées, b alongées, applaties,

nom de ce savant, acquérant par cette générosité si rare, un nom immortel à son ami, dont il auroit aisément anéanti la gloire, si la jalousie eût pu entrer dans son ame. De quel poids seront désormais les accusations de ses ennemis! Voyez la préface du Philosophia Botanica, pag. IX, edit. Coll. Allob. 1787.

c courtes, applaties, d crénelées sur le bord, 5.° trois ou quatre fois plus longues que larges, 6.° velues, 7.° hérissées, 8.° épineuses. Celles dont l'ombelle est imparfaite, n'offrent point de division. (Voy. tab. 96.)

Linné a sous-divisé les ombellifères, relativement à la figure du calice, en trois sections principales:

- 1.º Celles qui ont un grand et petit involucre;
- 2.º Celles qui n'ont que les petits involucres seulement;
- 3.° Celles qui n'ont ni grands ni petits involucres (37).

<sup>(37)</sup> Linné, dans le tableau des caracteres essentiels artificiels des ombelliferes, a présenté un rapprochement très-ingénieux, entre les ombelliferes et les composées. Après avoir décrit, en peu de mots, le caractère des ombelliferes, sous le nom de fleurs pentapétales, supérieures, à deux semences, il en présente les caracteres par opposition, et par rapprochement. Il a égard à la forme des fleurs, dispersées dans le phyllis, rassemblées en têtes dans l'eryngium, presque ombellées dans la sanicula, ombellées dans l'astrantia: ces caracteres opposés sont très-tranchans. Considérant ensuite la forme des pétales dans l'ensemble de la fleur, il appelle radiées, celles que les auteurs ont désignées sous le nom d'ombelliferes à cinq pétales irréguliers ; et flosculeuses, celles qu'ils ont citées sous le nom d'ombelliferes à cinq pétales réguliers. Portant ensuite ses regards observateurs sur le sexe de ces mêmes fleurs, il les appelle radiées ou flosculeuses, stériles ou fertiles, relativement aux phénomenes de leur fécondation. Il les nomme stériles, lorsqu'elles n'offrent des semences que dans les fleurs du rayon ou de la circonférence

Le caractere propre de la famille des ombelliferes, est une corolle supérieure à cinq pétales, cinq étamines, deux styles portés sur un fruit nu disperme, c'est-à-dire, composé de deux graines accolées. La corolle est à cinq pétales, appellés réguliers, quoique souvent les deux pétales qui sont tournés en dehors, dans les fleurs qui bordent l'ombelle, soient plus grands que les trois autres (38).

# CLASSE VI. HEXANDRIE.

L'hexandrie renferme cinq ordres, dont le premier est sous-divisé par la forme des fleurs, 1.° pourvues de corolle et de calice, 2.° de calice à spathe, 3.° nues, c'est-à-dire, à corolle seulement, 4.° incomplettes. Le troisieme ordre est sous-divisé par la situation des fleurs inférieures ou supérieures, les autres ne sont pas sous-divisés. Cette classe renferme les familles naturelles des

et que celles du centre en sont dépourvues ; et fertiles ; lorsque les fleurs du centre et de la circonférence sont également fécondées. Dès-lors , les ombelliferes stériles correspondent au quatrieme ordre de la syngénésie , qui renferme les composées , dont les fleurons du centre sont stériles , tandis que ceux de la circonférence sont fertiles ; et les ombelliferes fertiles , au premier ordre de la syngénésie , qui comprend les composées , dont les fleurons , soit du disque , soit du rayon , sont également féconds. Il se sert avantageusement de la forme de l'involucre des pétales et des semences , pour caractériser les genres de cette nombreuse famille.

<sup>(38)</sup> Voyez, Œuvres complettes de J. J., pag. 137 et suivantes.

liliacées (39) et des joncs (40): elle offre quelques

aberrations (41).

Les liliacées, comprises dans la seconde et troisieme divisions du 1er ordre de l'hexandrie, sous le nom de plantes à fleurs hexandres monogynes, à calice en spathe, ou nues, c'est-à-dire, à corolle seulement, se rapportent, dans le système sur le

Peplis tetrandra.

Convallaria bifolia, tétrandre.

Achras mamosa, pentandre.

Petiveria octandra.

Le genre des rumex, sur trente-une especes, en offre une monoïque, sept dioïques, une polygame et une digyne.

Le bromelia pinguin, a une capsule uniloculaire. Dans les tradescantia, la figure du style varie.

Dans les amaryllis, la courbe des pétales, des éta-

mines et des pistils varie beaucoup.

Dans les lys, le nectar est quelquefois barbu et quelquefois sans barbe; quelques especes ont les pétales tout-à-fait repliés en dessus.

Dans les ornithogales, les filamens des étamines va-

rient.

Dans les asparagi et les hyacinthi, la corolle varie beaucoup.

Richardia, offre quelquefois huit divisions au calice

et à la corolle, et huit étamines.

Gahnia, offre sept et huit étamines dans les fleurs

latérales, et six dans les supérieures.

Dans le scheuchzeria, le nombre des capsules varie de trois à six.

Medeola, virginiana, n'a que quatre pétales.

Loranthas, a une espece pentandre, et une dioïque.

<sup>(39)</sup> Spathaceæ, ord. nat. 8. Coronariæ, ord. nat. 9. Liliaceæ, ord. nat. 10.

<sup>5 (40)</sup> Calamaria, ord. nat. 13.

<sup>- (41)</sup> Narcissus triandrus.

fruit, à la 7º classe de Morison, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées hexapétales tricapsulaires. A la 9º classe de Cæsalpin, sous le nom de plantes herbacées, à triple principe, bulbeuses. A la 116 section de la 6º classe de Christ. Knaut, sous le nom de plantes herbacées, à fleurs pétalées simples, à péricarpe membraneux simple et unicapsulaire, à six pétales. A la 16º classe d'Hermann, sous le nom de plantes herbacées pétalées, à semences renfermées dans un péricarpe membraneux à capsule, à racine bulbeuse. A la 1re classe de la 1re collection de la 1re série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées monocotyledones, à semences couvertes, bulbeuses. A la 28º classe de Boerhaave, sous le nom de plantes herbacées monocotyledones pétalées, à bractées.

Dans les systèmes sur la corolle, les liliacées se rapportent à la 9° classe de Tournefort, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples polypétales régulieres, liliacées. A la 11º classe de Seguier, sous le nom de plantes herbacées à fleurs simples pétalées polypétales, liliacées. A la 9e classe de Bergen, sous le nom de plantes à fleurs simples vétalées polypétales régulieres, liliacées. A la 13° classe de Durande, sous le nom de plantes à fleurs apétales liliacées, à germe supérieur et inférieur. A la 4º et 11º classes de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs pétalées 1° monopétales simples, à limbe de la corolle, divisé en six parties, 2.º polypétales à six pétales. A la 4° section de la 6° classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs parfaites simples régulieres à six pétales, à péricarpe

tricapsulaire. A la 3e section de la 6e classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs parfaites régulieres simples à six pétales, à capsule à trois divisions. A la 4º section de la 6º classe de Ludwig \*, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées régulieres simples à six pétales, à capsule à trois divisions. A la 27e section de la tre classe de Chret. Knaut, sous le nom de plantes à fleurs monopétales uniformes à capsule à trois divisions membraneuses, à plusieurs semences, et à la 7e section de sa 14e classe, sous le nom de plantes à fleurs à six pétales uniformes, à capsules composées à trois divisions. Au 3° ordre de la 13e classe de Ludwig \*\* et Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées à six pétales, à six antheres et un style. À la 1re et 6e classes de Haller \*, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites régulieres simples monopétales et hexapétales, à semences renfermées dans une capsule à trois divisions. Au 1er ordre de la 10º classe de Gouan, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées simples à six pétales réguliers, à six étamines et un pistil. Au 3° ordre de la 13º classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites pétalées à six pétales, à six étamines et un pistil.

Dans les systèmes sur le calice, les liliacées se rapportent à la 8° classe de Magnol, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à calice interne seulement. A la 1re et 16° classe de Linné\*, sous le nom de plantes à calice à spathe, et de plantes privées de calice ou de corolle à fleurs

incomplettes.

Dans les systèmes sur les étamines, les liliacées

se rapportent à la 5° section de la 3° classe de Villars, qui les désigne sous le nom de plantés à étamines déterminées à six étamines, liliacées. Au 1er ordre de la 6° classe de Thunberg, sous le nom de plantes à fleurs visibles à six étamines et un pistil. Au 1er ordre de la 6° classe de Gmelin, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à six étamines, un pistil, à calice à spathe, et sans calice. Au 6° ordre de la 1re et 2° classes de Gledistch, sous le nom de plantes à fructification apparente, à étamines insérées 1.° sur le réceptacle à fleurs simples incomplettes, 2.° sur la corolle,

à fleurs incomplettes.

Dans les systèmes mixtes, les liliacées se rapportent au 2d ordre de la 8º classe d'Allioni, qui les désigne sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées à six pétales. Au 2d fascicule de la 2º collection de la 3° série de Gilibert, sous le nom de plantes à fleurs visibles à corolles incomplettes pétaloïdes sans calice, liliacées. A la 9° classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines au nombre de six inégales, liliacées. Au 2d ordre de la 7º classe d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées monocotyledones, liliacées. Aux 15e et 16e classes de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles, monocotyledones sans calice, et à calice en spathe. A la 16e classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescence apparente, à port absolu et déliquescent, liliacées.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les liliacées se rapportent à la 24° classe de Ray, qui les désigne sous le nom de plantes

plantes herbacées privées de bourgeons, parfaites dicotyledones à fleur simple, à semences renfermées dans une membrane simple à trois loges. A la 23<sup>e</sup> classe de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, incomplettes liliacées.

Dans les systèmes sur les feuilles, les liliacées se rapportent au 4° ordre de la 2° classe, et au 3° ordre de la 3° classe de Sauvages, qui les désigne sous le nom de plantes garnies de feuilles

simples entieres étroites et larges.

Dans les systèmes naturels, les liliacées se rapportent à la 8e famille d'Adanson, qui les désigne sous le nom de liliacées. Aux 8e, 9e et 10e ordres de Linné, sous le nom de spathacées, coronaires et liliacées. Aux 12e et 13e ordres de Wulf, sous le nom d'iris et coronaires. Aux 13e, 14° et 15° ordres de Gerard, sous le nom de narcisses, lys et coronaires. Au 7e ordre de Guettard, sous le nom de liliacées, sans filets et à. filets cylindriques simples, couchés irrégulièrement. A la 6º famille de la 2º classe d'Oeder, sous le nom de plantes monocotyledones liliacées. A la 4º tribu de Scopoli, sous le nom de plantes à calice seulement, à étamines insérées sur le calice, liliacées. A la 3e classe de Jussieu, sous le nom de plantes monocotyledones, à étamines insérées sur le calice, lys, asphodeles, narcisses. A la 2º classe de Van-Royen, sous le nom de plantes monocotyledones sans calice. Aux 43e et 44e genres de Necker, sous le nom de plantes à fructification enveloppée par une membrane à spathe, à fruit à trois loges; et plantes à six

étamines égales, souvent opposées aux pétales, à fruit anguleux sans spathe.

## CLASSE VII. HEPTANDRIE.

L'heptandrie ne renferme que quatre ordres et sept genres. Elle offre une aberration (42).

# CLASSE VIII. OCTANDRIE.

Les ordres de cette classe, sont au nombre de quatre : le premier, est sous-divisé par les fleurs complettes et incomplettes. Quelques genres offrent des aberrations (43).

### CLASSE IX. ENNÉANDRIE.

L'ennéandrie, qui est la moins nombreuse de routes les classes, n'offre que trois ordres, six genres, et une aberration (44).

<sup>(42)</sup> Esculus pavia, octandre.

<sup>(43)</sup> Stellera passerina, octandre; chamæjasme, décandre.

Chlora dodecandra.

Passerina capitata, offre seize étamines, dont huit sont dépourvues d'antheres.

Dans l'adoxa, les fleurs latérales ont dix étamines, et celles du sommet huit seulement.

Le genre des polygonum, sur trente-une especes, en a cinq pétandres et digynes, trois hexandres dont deux digynes, une heptandre et digyne, et neuf octandres.

Les genres des vaccinium, erica, varient dans le nombre des parties de la fructification.

<sup>(44)</sup> Laurus nobilis , dioique.

#### CLASSE X. DÉCANDRIE.

La décandrie renferme six ordres. Le premier, qui est sous-divisé par les fleurs 1.° polypétales irrégulieres et régulieres, 2.° monopétales régulieres, 3.° incomplettes ou apétales, comprend quelques genres de la famille des Lomentacées (45), Les second, troisieme et quatrieme ordres, qui ne sont pas sous-divisés, renferment les caryophyllées (46). Cette classe est une de celles qui offrent le plus grand nombre d'aberrations (47).

<sup>(45)</sup> Lomentaceæ, ord. nat. 56.

<sup>(46)</sup> Caryophyllei, ord. nat. 42.

<sup>(47)</sup> Casalpina crista, pentandre. Cassia serpens, nictitans, pentandres.

Spergula pentandra.

Trianthema pentandra.

Cerastium pentandrum, semidecandrum.

Melastoma octandra:

Dais octandra.

Ruta graveolens, octandre.

Samida nitida, spinosa, octandres.

Cotyledon laciniata, nudicaulis, octandres.

Monotropa hypopitys, a les fleurs latérales octandres.

Cucubalus otites, dioique.

Guilandina dioica.

Gypsophila paniculata, dioique.

Lychnis dioica, alpina et quadridentata, offrent trois on quatre styles.

Le jussieua, sur six especes, en a trois dont la fleur

est à quatre pétales et à huit étamines.

Le phitolaca, sur quatre especes, a la premioctandre, la seconde décandre, la troisieme icosandre, la derniere, dioïque.

Les bauhinia divaricate et accuminata, ont les fila-

Les caryophyllées, comprises dans le second, troisieme et quatrieme ordres de la décandrie, sous le nom de plantes décandres, digynes, trigynes et pentagynes, constituent, dans les systèmes sur le fruit, la 2° section de la 5° classe de Cœsalpin, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à capsules solitaires. La 7° section de la 8° classe de Morison, sous le nom de plantes herbacées émollientes unicapsulaires. La 2° section de la 5° classe de Christ. Knaut, sous le nom de plantes herbacées à fleur pétalées simples à péricarpe membraneux simple et unicapsulaire, pentapétales. La 1° section de la 8° classe d'Hermann,

mens réunis comme dans les diadelphes, mais leur situation est différente, l'étamine isolée occupant la partie supérieure.

Schreber a observé des fleurs mâles dans la guilan-

dina bonduc et bonducella.

Le zygophyllum album, a cinq stygmates.

L'helicteres, sur six especes, en a trois décandres, une pentandre, une dodécandre, une polyandre. Ce genre a été rapporté à la décandrie, dans la derniere édition du Genera plantarum de Schreber: il appartenoit à la gynandrie.

Cassia, a une espece pentandre et herbacée.

Dans les andromeda, la corolle et les étamines varient; andromeda daboecia, octandre.

Dans les pyrola, la figure du stygmate varie.

Dans les styrax, les arenaria, le nombre des étamines varie.

Les chrysosplenium, offrent huit étamines.

Dans les saponaria, la figure du calice varie.

Dans le stellaria radians, les pétales offrent cinq divisions.

Malpighia nitida, monoique. Oxalis corniculata, monadelphe. sous le nom de plantes herbacées pétalées, à semences renfermées dans une capsule sans loges, univasculaires. La 2º section de la 15º classe de Boerhaave, sous le nom de plantes herbacées à deux cotyledones pétalées, à semences renfermées dans une capsule simple à une loge. Le 7º ordre de la 14º classe de la 2º collection de la 1º série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées à fleurs et fruits visibles, à plusieurs cotyledons

à semences enfermées dans une capsule.

Dans les systèmes sur la corolle, les caryophyllées constituent la 8e classe de Tournefort, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples polypétales régulieres, caryophyllées. La 9e classe de Seguier, sous le nom de plantes herbacées à fleurs simples pétalées à cinq pétales. Le 1er ordre de la Se classe de Bergen, sous le nom de plantes à fleurs simples pétalées polypétales régulieres, caryophyllées. La 10e classe de Durande, sous le nom de plantes à fleurs polypétales, caryophyllées. La 12e classe de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs pétalées polypétales à cinq pétales. La 3º section de la 5º classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs parfaites simples régulieres à cinq pétales, à péricarpe à une capsule. La se classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs parfaites régulieres simples à cinq pétales à capsule simple. La 4º section de la se classe de Ludwig \*, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées régulieres simples à cinq pétales à capsule simple. La 8e section de la 12e classe de Chret. Knaut, sous le nom de plantes à fleurs à cinq pétales uniformes à capsule simple membraneuse à plusieurs semences. La 10e classe de Ludwig \*\* et Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées à cinq pétales régulieres, à dix antheres, à deux et trois styles. Le 4e ordre de la 5e classe d'Haller\*, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites régulieres simples à cinq pétales, à semences couvertes par une capsule simple, double et à cinq divisions. Le 4e ordre de la 8e classe de Gouan, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées simples, à cinq pétales régulieres, à dix antheres, à deux, trois et cinq pistils. Au 3e ordre de la 10e classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles, parfaites pétalées à cinq pétales régulieres, à dix étamines, à deux, trois et cinq pistils.

Dans les systèmes sur le calice, les caryophyllées constituent la 1<sup>re</sup> section de la 12<sup>e</sup> classe de Magnol, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à calice externe et interne, à fleur polypétale. La 7<sup>e</sup> classe de Linné \*, sous le nom de plantes à calice à périanthe uniflore simple à fleurs

égales polypétales.

Dans les systèmes sur les étamines, les caryophyllées constituent la 2º section de la 10º classe
de Villars, qui les désigne sous le nom de plantes à étamines déterminées, à dix étamines, caryophyllées. La 10º classe de Thunberg, sous le nom
de plantes à fleurs visibles à dix étamines, à deux,
trois et cinq pistils. Le 10º ordre de la 1º classe
de Gledistch, sous le nom de plantes à fructification apparente, à étamines insérées sur le réceptacle, à dix antheres, à fleurs à cinq pétales, à
capsule.

Dans les systèmes mixtes, les caryophyllées

constituent le 3º ordre de la 7º classe d'Allioni, qui les désigne sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées à cinq pétales, à étamines libres, à semences couvertes, à calice d'une seule piece. Le 2d fascicule de la 4e collection de la 2e série de Gilibert, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à corolles polypétales, à peu d'étamines, en nombre double de celui des pétales, caryophyllées. Le 1er ordre de la 7e classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines en nombre double de celui des pétales. La 9e classe d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées à deux cotyledons, à étamines en nombre double de celui des pétales. La 4e classe de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles à plusieurs cotyledons, complettes ou parfaites, à étamines plus nombreuses que les pétales. Le 2d ordre de la 14º classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescence apparente, à classe artificielle à peu d'étamines, à plusieurs pétales.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les caryophyllées constituent la 110 section de la 23° classe de Ray, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées privées de bourgeons, parfaites à deux cotyledons à fleur simple à cinq pétales, à capsule. La 13° classe de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées à ovaire dans la corolle, complettes à dix étamines ou moins, à corolle poly-

pétale.

Dans les systèmes sur le calice, les caryophyllées constituent le 5° ordre de la 5° classe de Sauvages, qui le désigne sous le nom de plantes garnies de feuilles simples entieres opposées.

Dans les systèmes naturels, les caryophyllées constituent le 36° ordre de Wulf, le 40° ordre de Gerard, le 420 ordre de Linné \*\*\*, qui les désignent sous le nom de caryophyllées. La 34° famille d'Adanson, sous le nom d'alsines. Le 36° ordre de Guettard, sous le nom de plantes à fleurs en œillet, 1.° sans filets, et qui sont grasses et épaisses, 2.° qui ont des filets coniques à valvule, 3.° des filets coniques à valvules, et des glandes à cupule qui jettent une liqueur gluante. La 1re famille de la 8e classe d'Oeder, sous le nom de plantes polypétales. La re famille de la 30e tribu de Scopoli, sous le nom de plantes à calice d'une seule piece, à corolle de plusieurs pieces, à étamines insérées sur le réceptacle, caryophyllées. Le 21e genre de Necker, sous le nom de plantes à peu d'étamines insérées en partie sur les onglets des pétales, en partie sur le réceptacle. Le 22° ordre de la 13e classe de Jussieu, sous le nom de plantes à deux cotyledons, à plusieurs pétales, à étamines placées sous le pistil, caryophyllées. Le 2d ordre de la 17e classe de Van-Royen, sous le nom de plantes à plusieurs cotyledons à calice propre à fruit différent, à étamines visibles, à calice et corolle, à filamens libres, en nombre double de celui des pétales.

## CLASSE XI. DODÉCANDRIE.

La dodécandrie présente six ordres, qui ne sont point sous-divisés. Cette classe offre peu d'aberrarations (48): elle renferme les plantes qui ont depuis douze jusqu'à vingt étamines.

## CLASSE XII. ICOSANDRIE.

L'icosandrie renferme cinq ordres, qui n'ont point de sous-divisions. La situation du calice supérieur ou inférieur, le nombre des divisions du calice et des pétales, la nature des fruits et le nombre des semences facilitent beaucoup la distinction des genres. Cette classe contient cinq ordres naturels (49). Elle offre aussi quelques aberrations (50).

(48) Lithrum parsonsia, lineare, hyssopifolia, hexandres; thymifolia, tétrapétales.

Agrimonia, agrimonioides, heptandres.

Reseda alba, fruticulosa, glauca, tétragynes; purpurascens, pentagyne. Dans ce genre, le nombre des étamines, des pétales et des divisions du calice varie beaucoup, de même que dans le zhiziphora.

Crateva gynandra.

(49) Senticosæ; ord. nat. 35. Comosæ, ord. nat. 36. Pomaceæ, ord. nat. 37. Drupaceæ, ord. nat. 38. Arbustiva, ord. nat. 39.

(50) Spiræa aruncus, dioïque et trigyne; opulifolia, trigyne.

Dans le cratægus, le nombre des pistils varie.

Le genre des mesembryanthemum, offre trois especes tétragynes, et six especes décagynes.

Le caractere classique et essentiel de l'icosandrie, qui sert à la faire distinguer de la polyandrie, consiste principalement dans l'insertion des étamines sur le calice. Le nombre des étamines varie de vingt à cinquante et plus, et il est moins sûr que l'insertion. Cette classe renferme la famille des arbres fruitiers, comprise dans les ordres naturels des pomacées et drupacées. On peut dire qu'avant Linné, cette famille avoit toujours été mal classée, et que lui seul y introduisit une réforme utile. «Ainsi, quand le savant Linnœus, dit J. J. Rousseau, divisant le genre dans ses especes, a dénommé la prune prune, la prune cerise, la prune abricot, les ignorans se sont moqué de lui, mais les observateurs ont admiré la justesse de ses réductions » (51).

Les arbres fruitiers se divisent en arbres à pepins et à noyau : les uns et les autres ont le même caractère dans la fleur, mais les premiers ont le germe inférieur, et pour fruit une pomme; dans les seconds, le germe est supérieur, et le fruit est une drupe. Quelques auteurs ont suivi cette division, d'autres n'y ont pas eu égard.

Les arbres fruitiers, compris dans les quatre premiers ordres de l'icosandrie, sous le nom de plantes à fleurs icosandres, à un, deux, trois et cinq pistils, se rapportent, dans les systèmes sur le fruit, à la 4° section de la 1re classe de Cæsalpin, qui les désigne sous le nom d'arbres à cœurcelet au sommet de la semence. Aux 4° et 5° sections de la 1re classe de Morison, sous le nom

<sup>(51)</sup> Voyez, Œuv. complettes de J. J. t. 28, p. 168.

d'arbres pruniferes et pomiferes. Aux deux premieres sections de la 16° classe de Christ. Knaut, sous le nom d'arbres pomiferes et bacciferes. A la 2° section de la 23° et 24° classes d'Hermann, sous le nom d'arbres à fleurs pétalées à fruit charnu couronné ou soutenu par le calice. Aux 6° et 7° sections de la 34° classe de Boerhaave, sous le nom d'arbres à deux cotyledons à fleur pétalée polypétale rosacée. A la 30° classe, et au 4° ordre de la 29° classe de la 2° série de Fabricius, sous le nom d'arbres à plusieurs cotyledons, bacciferes et

pomiferes.

Dans les systèmes sur la corolle, les arbres fruitiers se rapportent à la 20e classe de Seguier, qui les designe sous le nom d'arbres à fleurs à cinq pétales. A la 21º classe de Tournefort, sous le nom d'arbres à fleurs pétalées polypétales régulieres rosacées. A la 6e classe de Bergen, sous le nom de plantes à fleurs simples pétalées polypétales régulieres tosacées. A la 8º classe de Durande, sous le nom de plantes à fleurs polypétales rosacées à germe supérieur à fruit à noyau, à germe inférieur à baie. A la 15e classe de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs pétalées polypétales à plus de dix étamines. A la 5° classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs parfaites simples régulieres à cinq pétales, à péricarpe succulent charnu ou coriace. A la 5º classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs parfaites régulieres simples à cinq pétales, à péricarpe à baie ou à pomme, à une, trois, quatre ou plusieurs semences. A la 5º classe de Ludwig \*, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées régulieres simples à cinq pétales, à baie, à une et plusieurs

semences. A la 12º classe de Chret. Knaut, sous le nom de plantes à fleurs à cinq pétales uniformes. A la 10e classe de Ludwig \*\* et Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées à cinq pétales régulieres, à dix antheres à deux et trois styles. Au 5º ordre de la 5° classe d'Haller +, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites régulieres simples à cinq pétales à semences couvertes par une pomme à trois et plusieurs semences. Au 6º ordre de la 8º classe de Gouan, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées simples à cinq pétales régulieres icosandres, à un, deux, trois et cinq pistils. Au 4º ordre de la 10e classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites pétalées à cinq pétales régulieres, à plusieurs étamines, à un, deux, trois et cinq pistils.

Dans les systèmes sur le calice, les arbres fruitiers se rapportent à la 4° section de la 15° classe de Magnol, qui les désigne sous le nom d'arbres à calice externe et interne à fleur polypétale. A la 7° classe de Linné \*, sous le nom de plantes à calice à périanthe uniflore simple, produisant

une fleur sur ses parois internes.

Dans les sytèmes sur les étamines, les arbres fruitiers se rapportent à la 2° section de la 9° classe de Villars, qui les désigne sous le nom de plantes à étamines indéterminées au-dessus de douze insérées sur le calice, icosandres rosacées. A la 12° classe de Thunberg, sous le nom de plantes à fleurs visibles icosandres, à un, deux et cinq pistils. A la 12° classe de Gmelin, sous le nom de plantes à fleurs visibles polyandres, à un, deux, trois et cinq pistils, à étamines insérées sur le calice.

Au 7e ordre de la 3e classe de Gledistch, sous le nom de plantes à fructification apparente, à étamines insérées sur le calice, à plusieurs anthe-

res, à fleurs complettes.

Dans les systèmes mixtes, les arbres fruitiers se rapportent au 3º ordre de la 7º classe d'Allioni, qui les désigne sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées à cinq pétales à fruit pulpeux. Au 6º fascicule de la 5º collection de la 2º série de Gilibert, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à corolles polypétales, à étamines nombreuses insérées sur les parois internes du calice. Au 5º ordre de la 8e classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées à étamines nombreuses, à fruit à baie. Au 40 ordre de la 7e classe d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées à deux cotyledons, pomiferes. A la 40 classe de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles, à deux cotyledons, complettes ou parfaites, à étamines plus nombreuses que les pétales de la corolle. Au 3e ordre de la 12e classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescence apparente, à port simple, calyciflores à plusieurs pétales.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les arbres fruitiers se rapportent à la 1<sup>re</sup> section de la 29<sup>e</sup> et 30<sup>e</sup> classe de Ray, qui les désigne sous le nom d'arbres pourvus de bourgeons à deux cotyledons, à fleur réunie au fruit. A la 14<sup>e</sup> classe de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes à onze étamines ou plus, à

pétales insérés sur le calice.

Dans les systèmes sur les feuilles, les arbres fruitiers se rapportent à la 3°, 4°, 9° et 11° classes de Sauvages, qui les désigne sous le nom de plantes garnies de feuilles simples entieres, étroites et larges: composées, pinnées, laciniées.

Dans les systèmes naturels, les arbres fruitiers se rapportent au 17e ordre de Guettard, qui les désigne sous le nom de pomiferes 1.° à filets cylindriques et dentelures épaisses, 2.° à filets cylindriques, dentelures épaisses et glandes à godet. Au 56e ordre de Gerard, sous le nom de pomiferes. Au 49° ordre de Wulf, sous le nom de pomacées. Aux 37º et 38º ordres de Linné \*\*\*, sous le nom de pomacées et drupacées. Au 41e et 42e ordres d'Adanson, sous le nom de rosiers et jujubiers. A la 1re famille de la 8e classe d'Oeder, sous le nom de plantes à fleurs insérées sur le calice, rosacées. A la 1re famille de la 19e tribu de Scopoli, sous le nom de plantes à calice d'une seule piece, à corolle de plusieurs pieces, à étamines insérées sur le calice, à fleurs insérées sur le calice. Au 18e ordre de Necker, sous le nom de plantes à fruit le plus souvent succulent ou charnu, à étamines nombreuses insérées sur le calice. Au 100 ordre de la 14e classe de Jussieu, sous le nom de plantes à deux cotyledons à plusieurs pétales, à étamines insérées sur le calice, rosacées. Au 3e ordre de la 11º classe de Van-Royen, sous le nom de plantes à plusieurs cotyledons, à calice propre à fruit différent, à étamines visibles, à calice et corolle, à filamens proportionnés, insérés sur le calice.

### CLASSE XIII. POLYANDRIE.

La polyandrie renferme sept ordres, dont le premier est sous-divisé par la présence, l'absence et le nombre des pétales; les six autres, n'offrent point de sous-divisions. L'insertion des étamines sur le réceptacle, forme le caractere essentiel de cette classe, dont les aberrations sont assez nombreuses (52). La polyandrie contient la famille naturelle des ranonculées (53).

Les ranonculées, comprises dans les différens ordres de la polyandrie, se rapportent, dans les systèmes sur les feuilles, aux 13° et 14° classes de Cæsalpin, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à plusieurs semences nues, et à plusieurs capsules polyspermes. Aux 7° et 15° classes de Morison, sous le nom de plantes herbacées à six pétales à semences nues, et plantes

<sup>(52)</sup> Ranunculus hederaceus, pentandre. Dans le R. ficaria, le calice est à trois feuillets, et la corolle à 8 pétales. La forme des semences varie beaucoup dans ce genre.

Clematis flammula, octogyne; dioica et virginica, dioïques.

Thalictrum dioicum, tuberosum et cornutum, pentapétales.

Thea et mammea, sont quelquefois polygames.

Nigella hispanica, orientalis, décagynes.

Eleocarpus dicera, digyne.

Aconithum anthora, variegatum, cammarum, penta-

Cimifuga, varie dans le nombre des pistils, des pétales et des divisions du calice.

<sup>(53)</sup> Multisiliquæ, ord. nat. 23.

herbacées à plusieurs siliques. Aux 8° et 9° classes de Christ. Knaut, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples, à péricarpe membraneux composé à plusieurs capsules, et à semences nues. Aux 1<sup>re</sup> et 13° classes d'Hermann, sous le nom de plantes à plusieurs semences nues, et à semences renfermées dans un péricarpe composé. Aux 4° et 21° classes de Boerhaave, sous le nom de plantes herbacées à deux cotyledons pétalées à plusieurs semences nues, et à semences renfermées dans une capsule composée, multisiliqueuses. A la 9° classe de la 2° collection de la 1<sup>re</sup> série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées à fleurs et fruits visibles, à plusieurs coty-

ledons, à plusieurs semences nues.

Dans les systèmes sur la corolle, les ranonculées se rapportent à la 6º classe de Tournefort, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples à plusieurs pétales régulieres rosacées. A la 9º classe de Seguier, sous le nom de plantes herbacées à fleurs simples pétalées à cinq pétales. Aux 6e et 11e classes de Bergen, sous le nom de plantes à sleurs simples pétalées à plusieurs pétales régulieres, rosacées. A la 2e section de la 9e classe de Durande, sous le nom de plantes à fleurs polypétales ranonculées à plusieurs capsules. Au 6º ordre de la 15º classe de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs pétalées à plusieurs pétales, à plus de dix étamines. A la 7e classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs parfaites simples régulieres polypétales, à plusieurs semences nues, et à péricarpe tricapsulaire. A la 7e classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs parfaites régulieres simples polypétales à plusieurs semences

semences nues, et à plusieurs capsules. A la 7º classe de Ludwig \*, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées régulieres simples polypépétales, à plusieurs semences nues et à capsule. Aux 14e, 15e, 16e, 17e classes de Chret. Knaut, sous le nom de plantes à fleurs à six et plusieurs pétales uniformes et difformes. Aux 10e et 14e classes de Ludwig \*\* et Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées à cinq et plusieurs pétales régulieres, à plusieurs antheres et styles. Aux se et 7e classes d'Haller \*, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites régulieres simples à cinq et plusieurs pétales, à plusieurs semences nues. Aux 8e et 9e classes de Gouan, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées. simples à cinq pétales régulieres et irrégulieres, polyandres à plusieurs et à trois pistils. Au 4º ordre de la 10º classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites pétalées à cinq pétales régulieres, à plusieurs étamines et pistils.

Dans les systèmes sur le calice, les ranonculées se rapportent aux 4° et 8° classes de Magnol, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à calice externe seulement, renfermant une fleur polypétale, et plantes à calice interne seulement. A la 16° classe de Linné \*, sous le nom de plantes privées de calice ou de corolle, à fleur

incomplette.

Dans les systèmes sur les étamines, les ranonculées se rapportent à la 2° section de la 11° classe de Villars, qui les désigne sous le nom de plantes à étamines indéterminées, au-dessus de trente, insérées sur le réceptacle. Au 5° ordre de la 13° classe de Thunberg, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à plusieurs étamines et pistils. A la 12º classe de Gmelin, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à plusieurs étamines, à cinq et plusieurs pistils, à étamines insérées sur le réceptacle. Au 12º ordre de la 1re classe de Gledistch, sous le nom de plantes à fructification apparente, à étamines insérées sur le réceptacle, à plusieurs antheres, à fleurs complettes et incomplettes.

Dans les systèmes mixtes, les ranonculées se rapportent à la 9e classe d'Allioni, qui les désigne sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées à cinq pétales, à étamines libres, à semences couvertes sans calice. Au 8e fascicule de la se collection de la 3º série de Gilibert, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à corolle polypétales à étamines nombreuses, insérées sur le réceptacle. Au 7e ordre de la 8e classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées à étamines nombreuses, à fleurs insérées sur le réceptacle. A la 8º classe d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées à deux cotyledons multisiliqueuses, et à plusieurs semences nues. Aux se et 12e classes de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles, à plusieurs cotyledons, complettes ou parfaites, à étamines en nombre impair avec les pétales, et à calice ou corolle seulement. Au 2d ordre de la 15º classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescence apparente, à classe artificielle, à étamines nombreuses, à plusieurs pétales.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les ranonculées se rapportent à la 150

classe de Ray, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées privées de bourgeons parfaites à deux cotyledons, à fleur simple à plusieurs se, mences. Aux 20° et 24° classes de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes à onze étamines ou plus, à pétales non-insérées sur le calice: incomplettes anémones.

Dans les systèmes sur les feuilles, les ranonculées se rapportent aux 7°, 8°, et 10° classes de Sauvages, qui les désigne sous le nom de plantes garnies de feuilles 1.° simples divisées, digitées et palmées, 2.° composées et décom-

posées.

Dans les systèmes naturels, les ranonculées se rapportent au 15e ordre de Guettard, qui les désigne sous le nom d'anémones 1.º glabres et épaisses, 2°. à filets cylindriques simples, 3.° à filets cylindriques, à glandes, à cupule. Au 230 ordre de Linné \*\*\*, sous le nom de multisiliqueuses. Au 340 ordre de Wulf, et au 380 ordre de Gerard, sous le nom de ranonculacées. Au 550 ordre d'Adanson, sous le nom de renoncules. A la se famille de la 80 classe d'Oeder, sous le nom de plantes polypétales à plusieurs capsules. A la 220 tribu de Scopoli, sous le nom de plantes à calice et corolle de plusieurs pieces, à étamines insérées sur le réceptacle, à plusieurs semences. Aux 27° et 286 ordres de Necker. sous le nom de plantes à étamines nombreuses, à fruit 1.° aggrégés béans, 2.° entassés nonbéans, laissant appercevoir les semences. Au 1er ordre de la 13e classe de Jussieu, sous le nom de plantes à deux cotyledons, à plusieurs

132 pétales, à étamines placées sous le pistil, renonculacées. A la 18e classe de Van-Royen, sous le nom de plantes à plusieurs cotyledons, à calice propre, à fruit différent, à étamines visibles, à calice et corolle, à filamens libres, en nombre trois fois plus considérable que celui des pétales.

#### CLASSE XIV. DIDYNAMIE.

Les ordres de la didynamie ne pouvant se tirer comme ceux des classes précédentes du nombre des pistils, puisqu'il n'en existe qu'un seul dans les plantes qui constituent cette classe, Linné les a pris du nombre des semences nues, (gymnospermie,) ou couvertes, (angiospermie). Le premier ordre offre deux sous-divisions prises de la forme du calice ; le second en renferme sept, dont les six premieres sont fondées sur le nombre des divisions du calice, et la derniere sur le nombre des pétales. Cette classe ne présente qu'une seule aberration (54).

Le caractere commun à toutes les plantes de cette classe, est d'avoir quatre étamines presque sur un même rang, distinguées en deux paires, l'une plus longue et l'autre plus courte. Le premier ordre, (gymnospermie,) renferme les labiées ou fleurs en gueule (55), et le second,

<sup>(54)</sup> Bignonia, catalpa, diandre.

Dans quelques especes d'antirrhinum, et dans le chelone pentstemon, on trouve le filament d'une cinquieme étamine qui est stérile.

<sup>(55)</sup> Verticillatæ, ord. nat. 58.

(angiospermie,) les personnées ou fleurs en masque (56).

Le caractère des labiées, est d'avoir une corolle monopétale, fendue en deux levres, l'une supérieure appelée casque, l'autre inférieure appelée barbe et quatre graines nues, c'est-à-dire, sans aucune enveloppe, qui se détachent séparément, et tombent à terre quand les graines sont mûres.

Le caractere des personnées, est d'avoir une corolle, dont les deux levres ne sont pas ordinairement ouvertes et béantes, mais fermées et jointes, ce qui leur donne la forme d'un masque, nom dérivé du mot latin personna, qui signifie un masque. En outre elles ont toutes, non pas quatre graines nues au fond du calice, comme les précédentes, mais une capsule qui renferme les graines et ne s'ouvre qu'à leur maturité (57).

Le caractere des labiées souffre quelques exceptions, et n'est pas toujours constant. Dans les teucrium, la levre supérieure de la corolle est presque nulle; dans les menthes, le limbe de la corolle est divisé en quatre parties presques égales. Dans les personnées, la figure de la corolle varie également : elle est en masque, ou véritablement personnée, dans le genre nombreux des antirrhinum, (excepté dans quelques especes,) campanulée dans les digitales, les bignonia; en roue dans les celsia, en enton-

<sup>(56)</sup> Personnatæ, ord. nat. 59.

<sup>(57)</sup> Œuv. complettes de J. J. tom. 28, pag. 128.

noir dans les besleria, en soucoupe dans les gerardia, en casque dans les tourretia (58).

Les labiées et les personnées, comprises dans les deux ordres de la didynamie, sous le nom-

(58) Cette plante a été dédiée, en 1778, au citoyen Fleurieu de la Tourrette, par son ami Dombey. Elle offre à l'extrémité de ses feuilles, des vrilles bifurquées et terminées par des crochets. Sa capsule est composée de quatre loges, et hérissée de pointes ou de piquans, assez semblables à ceux de la bardane, (arctium lappa, L.) d'où lui est venu le nom de lappacea. Le citoyen Dombey la désigne par la phrase suivante: Tourretia lappacea, foliis ternatis quinatisve, floribus spicatis, caule cyrrhoso. Ce savant en a trouvé une seconde espece, dont la capsule est lisse, et qu'il a

appellé T. Levis.

Ces noms rappellent deux savans, également estimables par leur moralité et leurs profondes connoissances. L'un, après un voyage de dix ans au Pérou, victime de la jalousie des Espagnols, qui lui enleverent la moitié de ses collections, eut la douleur de ne pouvoir publier ses ouvrages. Retiré à Lyon, il y vécut jusqu'après le siege de cette ville. A cette époque, il se rendit à Paris, où il obtint une mission du gouvernement pour Philadelphie, mais n'ayant pu supporter les fatigues du voyage, il succomba pendant la traversée. Sa mort a été une grande perte pour les sciences et l'humanité. Le second, secrétaire perpétuel de l'académie des sciences de Lyon, un des premiers cryptogamistes de France, auteur de la Chloris Lugdunensis, se préparoit à publier une seconde édition de ce petit ouvrage, mais attaqué depuis long-temps d'une maladie de langueur, il périt pendant le siege. Ayant eu l'avantage de connoître ces deux hommes célebres, qui m'ont honoré de leur estime et de leur bienveillance, je saisis avec empressement cette occasion de payer le juste tribut d'éloges que je dois à leurs talens et à leurs vertus sociales.

de plantes à fleurs didynames, gynospermes et angiospermes, c'est-à-dire, de fleurs à quatre étamines, dont deux plus longues, à semences nues et couvertes, se rapportent, dans les systêmes sur le fruit; savoir, les labiées, à la 2º section de la 10º classe de Cæsalpin, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées, à quatre semences nues dans un réceptacle commun; et les personnées, à la 2e section de sa 7º classe, sous le nom de plantes herbacées, à deux conceptacles. Les labiées se rapportent aux trois premieres sections de la 14e classe de Morison, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées, à fleurs en casque et en verticilles, monopétales à quatre semences; et les personnées à ses 8º et 14e classes, sous le nom de plantes herbacées à trois et deux capsules, à fleurs monopétales et pentapétales, et à fleurs en casque à plusieurs semences. Les labiées, à la 5e section de la 9e classe de Christ. Knaut, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples, à quatre semences nues verticillées ; et les personnées, aux deux premieres sections de sa 2e classe, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples, à péricarpe membraneux simple et unicapsulaire, monopétales. Les labiées, à la 7º classe d'Hermann, sous le nom de plantes herbacées pétalées à quatre semences nues, à feuilles opposées verticillées; et les personnées, aux deux premieres sections de sa 9e classe, sous le nom de plantes herbacées pétalées, à semences renfermées dans une capsule à deux loges. Les labiées, à la 12º classe de Boerhaave, sous le nom de plantes herbacées à deux cotyledons pétalées, à quatre semences nues; et les personnées, à la 3° section de sa 16° classe, sous le nom de plantes herbacées à deux cotyledons pétalées, à semences renfermées dans une capsule simple à deux loges. Les labiées, à la 7° classe de la 2° collection de la 1° série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées à fleurs et fruits visibles à plusieurs cotyledons, à quatre semences nues labiées verticillées, à fleur en gueule ordinairement irréguliere; et les personnées, au 11° ordre de la 14° classe de la 2° collection de la 1° série du même auteur, sous le nom de plantes à fleurs et fruits visibles à plusieurs cotyledons à semences couvertes, à une capsule à deux loges, à fleur monopétale

irréguliere à quatre divisions.

Dans les systèmes sur la corolle, les labiées se rapportent à la 4e classe de Tournefort, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples monopétales irrégulieres labiées; et les personnées, à sa 3e classe, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples monopétales irrégulieres personnées. Les labiées, à la 5e classe de Seguier, sous le nom. de plantes herbacées à fleurs simples pétalées monopétales labiées; et les personnées, à sa 4e classe, sous le nom de plantes herbacées à fleurs simples pétalées monopétales anomales. Les labiées, à la 4e classe de Bergen, sous le nom de plantes à fleurs simples pétalées monopétales irrégulieres labiées; et les personnées, à sa 3º classe, sous le nom de plantes à sleurs simples pétalées monopétales irrégulieres anomales. Les labiées, à la 3º classe de Durande, sous le nom de

de plantes à fleurs monopétales labiées; et les personnées, à sa 2º classe, sous le nom de

plantes à fleurs monopétales personnées.

Dans les systèmes suivans, ces deux familles sont réunies dans une seule classe, et se rapportent, savoir : les labiées au 1er ordre, et les personnées au 2e ordre de la 1er classe de Wernischeck, qui les désigne sous le nom de plantes à fleurs pétalées monopétales simples à limbe de la corolle à deux levres. A la 11e classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs parfaires simples irrégulieres monopétales à quatre semences nues, et à péricarpe membraneux à deux et quatre loges, et coriace. A la 9e classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs parfaites irrégulieres monopétales à quatre semences nues, et à capsule simple à deux et quatre divisions. A la 11e classe de Ludwig\*, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées irrégulieres monopétales à quatre semences nues, et à capsule simple à deux, quatre ou six divisions. A la 2º classe de Chret. Knaut, sous le nom de plantes à fleurs monopétales difformes à quatre semences lisses, à capsule simple et à deux loges, membraneuse à une et plusieurs semences. A la 2e classe de Ludwig \*\* et Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales simples irrégulieres à quatre antheres et un style. A la 9e classe d'Haller +, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites irrégulieres monopétales à quatre semences nues et à semences renfermées dans une capsule. A la 2º classe de Gouan, sous le nom de plantes à fleurs

visibles pétalées simples monopétales irrégulieres à deux et quatre étamines, à un pistil, à semences nues et couvertes. A la 2° classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites pétalées monopétales simples irrégulieres, à deux et quatre étamines et un pistil, ou didynames à semences nues et couvertes.

Dans les systèmes sur le calice, les labiées se rapportent à la 3° classe de Magnol, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à calice externe seulement, renfermant une fleur monopétale; et les personnées, à la 6° section de sa 9° classe, sous le nom de plantes herbacées à calice externe et interne à fleur monopétale. Les labiées se rapportent au 1° ordre, et les personnées au 2° ordre de la 14° classe de Linné \*, sous le nom de plantes à calice à périanthe uniflore simple, à fleur irréguliere

monopétale.

Dans les systèmes sur les étamines, les labiées se rapportent au 6° ordre, et les personnées au 7° ordre de la 4° classe de Villars, qui les désigne sous le nom de plantes à étamines déterminées, à quatre étamines, labiées et personnées. Les labiées aux 1er ordre, et les personnées aux 2d ordre de la 13° classe de Gmelin, et de la 14° classe de Thunberg, sous le nom de plantes à fleurs visibles à quatre étamines, dont deux plus longues, à semences nues et couvertes. Les labiées et les personnées aux 2d et 4° ordres de la 2° classe de Gledistch, sous le nom de plantes à fructification apparente, à étamines insérées sur la corolle, à quatre antheres, à fleurs simples inégales ou en gueule, à quatre semences nues au fond du calice, et à semences

convertes par un péricarpe.

Dans les systèmes mixtes, les labiées se rapportent au 3º ordre, et les personnées au 4º ordre de la 1re classe d'Allioni, qui les désigne sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées monopétales simples à quatre semences nues à deux et quatre étamines, à semences couvertes, en masque. Les labiées au 1er fascicule, et les personnées au 2d fascicule de la 2e collection de la 1re série de Gilibert, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à corolles unipétales figurées, à deux ou quatre étamines inégales, à un style à quatre semences nues, et à semences renfermées dans une capsule. Les labiées au 1er ordre, et les personnées au 2d ordre de la 2e classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines au nombre de quatre inégales, didynames à fleur difforme, à quatre semences nues, et à semences couvertes. Les labiées au 3º ordre, et les personnées aux deux premiers ordres de la 14e classe d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées à deux cotyledons, à quatre étamines dont deux plus longues. Les labiées au 1er ordre, et les personnées au 2d ordre de la 7e classe de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles, à plusieurs cotyledons, complettes ou parfaites, à deux étamines plus longues. Les labiées au 1er ordre, et les personnées au 2d ordre de la 7º classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescence apparente, à port absolu et déliquescent, à fleur en gueule, à semences nues ou couvertes.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les labiées se rapportent à la 14° classe, et les personnées à la 19° classe de Ray, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées privées de bourgeons, parfaites à deux cotyledons à fleur simple, à quatre semences, verticillées, et à semences renfermées dans une membrane simple. Les labiées à la 10° classe, et les personnées à la 9° classe de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes à dix étamines ou moins, à corolle monopétale irréguliere, labiées et en masque.

Dans les systèmes sur les feuilles, ces deux familles se rapportent à différentes classes de Sauvages, qui désigne les labiées sous le nom de plantes garnies de feuilles 1.° simples, entieres, opposées, 2.° divisées, digitées et palmées; 3.° composées, décomposées et laciniées : et les personnées sous le nom de plantes garnies de feuilles 1.° simples, entieres, opposées et en anneaux, 2.° comples, entieres, opposées et en anneaux, 2.° com-

posées, décomposées et laciniées.

Dans les systèmes naturels, ces deux familles se rapportent aux 21° et 22° ordres de Wulf, aux 23° et 24° ordres de Guettard, aux 25°, 26° et 27° familles d'Adanson, sous le nom de labiées et personnées, aux 58° et 59° ordre de Linné \*\*\*, sous le nom de verticillées et personnées. Les labiées au 33° ordre de Guettard, qui les désigne sous le nom de labiées à filets coniques, et les personnées au 32° ordre du même auteur, sous le nom de plantes à fleurs en masque, à filets coniques articulés, à glandes à cupule, et glandes globulaires. Les labiées à la 2° famille,

et les personnées à la 3º famille de la 7º classe d'Oeder, sous le nom de plantes à fleurs monopétales verticillées et personnées. Les labiées à la 14º tribu, et les personnées à la 15e tribu de Scopoli, sous le nom de plantes à calice et corolle d'une seule piece, à étamines insérées sur la corolle, à semences nues, verticillées, personnées. Les labiées au 13e genre de Necker, sous le nom de plantes, dont la partie supérieure de la corolle, qui supporte les étamines, imite un casque; et les personnées aux 14e et 15e genres du même auteur, sous le nom de plantes à fleurs didynames irrégulieres ou anomales et régulieres, imitant une bouche ouverte : ces deux familles aux différens ordres de la 8e classe de Jussieu, sous le nom de plantes à deux cotyledons monopétales, à corolle placée sous le pistil, labiées, pédiculaires, etc. Les labiées au 2d ordre, et les personnées au 1er ordre de la 12e classe de Van-Royen, sous le nom de plantes à deux cotyledons, à calice propre, à fruit différent, à étamines visibles, à calice et corolle, à filamens proportionnés, dont deux plus longs.

Si nous examinons la maniere dont les auteurs ont divisé la famille des labiées, nous verrons 1.° que Morison, Hermann, Boerhaave, Fabricius, Tournefort, Bergen, Magnol, Rivin, Ludwig\*, Wachendorf, Haller, Lamarck, ont préféré la forme de la fleur; 2.° Wernischeck, Gouan, le nombre des divisions du calice; 3.° Linné\*, le nombre des étamines; 4.° Crantz, le nombre des étamines et la forme du calice; 5.° Gilibert, Allioni, Gattenhof, le nombre des étamines et la forme de la corolle; 6.° Du-

corolle et du calice; 7.° Ray, l'ensemble de toutes les parties; 8.° Sauvages, les feuilles; 9.° Gmelin, suit les divisions de Linné; 10.° Cæsalpin, Christ. et Chret. Knaut, Ruppius, Haller\*, Ludwig \*\*, Boëhmer, Gledistch, Seguier, Villars, Thunberg, ne les divisent

point.

Morison, divise les labiées par la forme des fleurs, 1.º en casque à épi, 2.º en casque à verticilles sessiles, 3.º en casque à verticilles à pétioles. Hermann, par les fleurs 1.º en casque et labiées, 2.° à peine en casque ou labiées, 3.° en casque à peine labiées, 4.° labiées à peine en casque. Boerhaave, par les sleurs 1.º bilabiées (à deux levres,) c'est-à-dire, ayant un casque et une barbe, 2.º barbues, ayant seulement la levre inférieure, 3.° simples, n'ayant ni casques ni levres. Fabricius, divise les labiées en trois ordres, pris de la forme de la fleur, 1.º unilabiée A à quatre divisions, B à cinq divisions, à tige a sous-ligneuse, b herbacée; 2.º bilabiées, à levre supérieure, A entiere, l'inférieure à deux divisions en forme de cœur, B entiere, l'inférieure à trois divisions, C le plus souvent entiere ( quelquefois biside, ) l'inférieure à quatre divisions, D biside, l'inférieure à trois divisions, E biside, l'inférieure à quatre divisions, Fà trois divisions, l'inférieure simple; 3.° à fleurons à peine en casque ou tubulés, A quatre divisions, B à cinq divisions à capitules a non-écailleux, b écailleux, à levre supérieure 1.º biside, l'inférieure à trois divisions, 2.° trifide, l'inférieure à deux divisions. Tournefort, par la fleur, dont la levre supérieure imite

1.º un casque ou une faulx, 2.º creusée en cuiller, 3.º droite, 4.º à une seule levre. Bergen, le divise en quatre ordres, pris de la forme du pétale supérieur, 1.° tronquée, 2.° en casque, 3.° creusée, 4.º droit. Magnol, d'après le limbe de la fleur labiée, dont la levre supérieure, 1.º n'est pas divisée, 2.° est divisée, 3.° à levre égale, 4°. à une seule levre. Rivin, les divise par la forme de la barbe ou levre inférieure ; et Ludwig \*, par le casque ou levre supérieure. Ainsi, selon Rivin, elles ont 1.° une barbe sans casque, 2.° une barbe simple, avec le casque divisé en quatre parties, 3.º une barbe divisée en trois parties, et le casque entier ou divisé, 4.° une barbe divisée en quatre parties, et le casque entier ou divisé. Selon Ludwig\*, celles 1.º qui n'ont pas de casque, ont la barbe divisée en quatre ou cinq parties; 2.º celles qui ont le casque entier, ont la barbe divisée en trois ou quatre parties; 3.º celles qui ont le casque divisé, ont la barbe également divisée en trois ou quatre parties ; 4.° celles dont le casque est divisé en quatre parties, ont la barbe entiere. Wachendorf, par la forme de la levre supérieure 1.° entière, 2.° échancrée, 3.° biside, 4.° triside. Haller, dans son Enumeratio, divise les labiées par la forme de la fleur, 1.º à une levre, 2.º à casque à trois divisions, 3.° à casque simple, 4.° à casque à deux divisions, 5.° à fleur à deux divisions peu prononcées; et dans son Historia, par la fleur 1.º peu difforme, 2.º à deux levres, à casque a échancré ou biside, b dentelé, c entier, 3.° sans casque. Lamarck, par la forme du limbe de la corolle, formant 1." deux levres bien distinctes, l'une supérieure et l'autre inférieure;

2.° ne formant pas deux levres bien distinctes; il n'en a qu'une seule ou est peu difforme. Il les sousdivise par la nature des filamens, du calice, etc.

Wernischeck et Gouan, les distinguent par le nombre des divisions du calice, 1.° bisside, 2° quinqueside, 3.° multisside, selon le premier; ou 1.° bilabiée, 2.° presque quinqueside, selon le second.

Linné, divise les labiées par le nombre des étamines, 1.° à deux, 2.° à quatre étamines. Crantz, par le nombre des étamines, 1.° à deux, 2.° à quatre étamines, à calice A quinqueside et multisse, B bilabié.

Gilibert, par le nombre des étamines; savoir, 1.° deux étamines à corolle peu difformes, 2.° à quatre étamines à corolle; A.° à deux levres, à casque échancré ou bifide, B.° à gorge dentée sur les bords, C.° à une levre. Allioni, par le nombre des étamines, savoir: 1.° deux, 2.° quatre étamines, à casque ou levre supérieure A unie, a peu divisée, b profondément divisée, B concave, C sans casque ou à fleur à une seule levre, D sans casque, à fleur presque divisée en cinq parties. Gattenhof, par le nombre des étamines, 1.° à deux, 2.° à quatre étamines: il sous-divise les labiées à deux étamines, par les filamens, la forme de la corolle et du calice; et les labiées à quatre étamines, par la forme de la corolle.

Durande, par le nombre des étamines, savoir: 1.° quatre, dont deux fertiles et deux autres stériles, 2° quatre fertiles, A à levre supérieure presque nulle, B à calice presque découpé en cinq parties, C à calice à deux levres. Ray, forme six sections des labiées, 1.° sousligneuses, 2.° à fleur presque sans casque, à segmens égaux, 3.° à capitules écailleux, 4.° à feuilles verticillées d'une maniere particuliere, 5.° à feuilles simplement verticillées, 6°. à fleur sans casque.

Sauvages, les divise par la forme des feuilles;

1.º étroites, 2.º longues.

Dans les systèmes naturels, Linné \*\*\*, Gerard, Wulf, Oeder, Van-Royen ne les divisent point. Adanson les divise en trois sections, prises de la forme et de la disposition des fleurs 1.° sans écailles, 2.° accompagnées d'écailles et distinctes les unes des autres, 3.º accompagnées d'écailles, et réunies plusieurs ensemble en corymbe, sur un ou plusieurs pédicules communs, sensibles. Guettard, forme six sections des labiées, 1.º à filets coniques articulés et à glandes globulaires, qui n'ont pour cavité que les pores même de la plante, placés dans des endroits pareils à ceux où les cavités s'observent dans les autres, et qui sont brillantes et sans couleur ; 2.º à filets coniques articulés, et à glandes globulaires renfermées dans une cavité, et qui sont sans couleur, ou qui n'ont que celle de la feuille; 3.º à filets coniques articulés et à glandes globulaires renfermées dans une cavité, et qui sont colorés; 4.º à filets coniques articulés, et à glandes globulaires renfermées dans une cavité, qui sont quelquefois colorés et en dessus et en dessous des feuilles; 5.º à filets coniques articulés, à glandes à cupule et à glandes globulaires élevées au-dessus de leurs cavités, et qui sont colorés; 6.° à filets coniques articulés, à glandes en houppe et à glandes globulaires renfermées dans une cavité, et qui sont colorées. Necker, divise les labiées par le nombre des étamines. Jussieu, par le nombre des étamines : savoir, 1.° deux fertiles et deux stériles, 2.° quatre fertiles, à corolle A à une levre, la supérieure nulle, B à deux levres, le calice a à cinq divisions, b à deux divisions. Scopoli, par le nombre des étamines : savoir, 1.° quatre étamines fertiles, à calice A labié, B non-labié, 2.° deux étamines fertiles.

Si nous examinons les différentes parties que les auteurs ont employées pour diviser les personnées, nous verrons i.º que Linné \*, Villars, Gilibert, Gledistch ont préféré le nombre des étamines; 2.° Ray, Bergen, Fabricius, la forme des fleurs; 3.° Gouan, Wernischeck, le nombre des divisions du calice ; 4.º Ruppius , Ludwig \* , Haller \* , le fruit ; 5.° Gattenhof , Haller \*\* , Durande , Haller \*\*\* , Allioni , le nombre des loges de la capsule ; 6.º Hermann , le nombre des semences; 7.º Sauvages, Lamarck, les feuilles; 8.º Crantz, Wachendorf, le port; 9.º Gmelin, suit les divisions de Linné; 10.º Cæsalpin, Morison, Christ. et Chret. Knaut, Boerhaave, Rivin, Tournefort, Magnol, Seguier, Ludwig \*\* , Boëhmer , Thunberg ne les divisent point.

Linné et Villars divisent les personnées par le nombre des étamines: savoir, 1.° deux, 2.° quatre étamines, selon le premier; 1.° quatre, 2° deux étamines, selon le second. Gilibert, les divise par le nombre des étamines: savoir, 1.° deux étamines, à semences renfermées dans une capsule;

2. quatre étamines, à corolles A cinq divisions, B à deux levres, à tige écailleuse, C personnées, à fleurs soutenues par des bractées, D labiées, à calice a ventru, b en crête, E en gueule à éperon; 3.° à deux étamines, à corolle à éperon. Gledistch, par le nombre des étamines, 1.° deux anthères, à fleurs monopétales irrégulieres, à semences renfermées dans une capsule; 2.° quatre anthères, à fleurs simples inégales ou en gueule, à semences renfermées dans un péricarpe.

Ray, divise les personnées par la forme de la fleur 1.º difforme, 2.º béante. Bergen, par la forme de la fleur anomale, 1.º à limbe également ouvert des deux côtés, 2.º tubulée personnée. Fabricius, par la forme de la fleur monopétale 1.º réguliere A à quatre, B à cinq divisions, 2.º irréguliere.

Gouan et Wernischeck, divisent les personnées par le nombre des divisions du calice A à deux, B à quatre, C à cinq divisions, selon le premier; A à deux, B à trois, C à quatre, D à cinq, E à plusieurs divisions, selon le second.

Ruppius, Ludwig \* et Haller \*, divisent les personnées par la capsule 1.° simple, 2.° composée, selon les deux premiers; 1.° simple, 2.° divisée en deux parties, selon le dernier.

Gattenhof et Haller \*\*, divisent les personnées par le nombre des loges de la capsule 1.° à une, 2.° à deux loges. Durande, par le nombre des loges de la capsule 1.° à une seule loge, 2.° à deux loges, A à cloison opposée, B parallele aux panneaux. Haller \*\*\* et Allioni, second.

Hermann, divise les personnées par le nombre des semences, 1.° à plusieurs semences, 2°. à deux semences.

Sauvages, divise les personnées par les feuilles A étroites, B larges. Lamarck, par les feuilles 1.° caulinaires nulles ou toutes alternes, 2.° caulinaires, la plupart opposées ou verticillées.

Crantz, divise les personnées par le port 1.º absolu, 2.º déliquescent. Celles dont le port est absolu, sont sous-divisées par le nombre des étamines; savoir, 1.º deux, 2.º quatre étamines, à fruit A à capsule, à calice, a à deux et quatre divisions, b à cinq et plusieurs divisions, B à baie et à noix, C à silique. Celles dont le port est déliquescent, ont les semences 1.º nues à deux ou quatre étamines, 2.° couvertes A par une capsule, à calice a à deux et quatre divisions, b à cinq divisions, B par une baie ou noix. Wachendorf les divise par le port, 1.º en personnées, 2.º en plantes analogues aux personnées. Il sousdivise les personnées par le fruit 1.° à capsule A à une loge, B à deux loges, à calice a à plusieurs divisions, b à cinq, c à quatre, d à deux divisions, C à trois, D à quatre loges, 2.° à silique, 3.° à baie, 4.° à noyau; et les plantes analogues aux personnées par le nombre des étamines, 1.° à cinq, 2.° à quatre, 3.° à deux étamines.

Dans les systèmes naturels, Linné \*\*\*,

Gerard , Wulf , Oeder , Van-Royen , ne divisent point les personnées. Adanson, qui forme deux familles des personnées sous le nom de verveines et de personnées, divise les premieres par le fruit i. qui se sépare en deux ou quatre graines, 2.º à baie ou en capsule; et les secondes par le fruit, 1.º à une seule loge, 2.º à plusieurs loges, A à deux, B à quatre, C à cinq étamines. Jussieu, en forme cinq divisions, sous le nom de pédiculaires, d'acanthes, gattiliers, scrophulaires et bignones. Guettard, les divise en quatre sections; savoir, à fleurs en masque, 1.° à glandes globulaires, 2.° à glandes à cupule, et dont quelques-unes ont des glandes globulaires ou des filets, 3.° à filets coniques articulés et glandes globulaires, ou qui ont quelques parties qui leur sont équivalentes, 4.° à filets articulés et glandes à cupule. Scopoli, les divise par les semences, 1.º nues, 2.º couvertes, et sousdivise les personnées à semences couvertes par le nombre des étamines, savoir : 1.º diandres à deux antheres fertiles, 2.º tétrandres ou à quatre antheres fertiles, à fruit, A à noyau ou à baie, B sec, a à une loge, b à deux loges à corolle, \* béante, \*\* non-béante. Necker en forme deux sections caractérisées, par le sexe, la premiere 1.º en monogames ou hermaphrodites, sous-divisées par les étamines au nombre A de deux fertiles, B de quatre, dont deux stériles, C de quatre fertiles; et la seconde en monogames ou hermaphrodites, sous-divisées par la forme de la corolle qui supporte les étamines, et qui est 1.° en forme de tube, 2.º en entonnoir, 3.º en soucoupe, 4.° en cloche, 5.° en roue.

## CLASSE XV. TÉTRADYNAMIE.

Linné a employé le fruit pour sous-diviser cette classe, et en former deux ordres sous le nom de tétradynamie siliculeuse et siliqueuse (59). Les silicules entieres ou échancrées, sous-divisent le premier ordre, et les calices fermés ou ouverts le second. La tétradynamie offre quelques aber-

rations (60).

Le caractere des plantes de cette classe, est d'avoir six étamines, dont deux sensiblement plus courtes que les quatre autres qui les séparent et qui sont aussi séparées de deux en deux, sont en opposition l'une de l'autre. Le premier ordre comprend les cruciferes à silicule, c'est-à-dire, dont la silique en diminutif est extrêmement courte, presque aussi large que longue, et n'est nullement séparée en dedans. Le second ordre comprend les cruciferes à silique. Dans ces plantes l'ovaire ou péricarpe, s'alonge beaucoup, s'é-largit peu-à-peu à mesure que le fruit mûrit, et devient une espece de gousse plate appelée silique.

Vella pseudo-cytisus, a quatre grands filamens eu-

nuques et unis de deux en deux.

<sup>(59)</sup> Les deux ordres de cette classe, sont compris dans les siliquosæ, ord. nat. 57.

<sup>(60)</sup> Cardamine hirsuta, tétrandre.

Lepidium ruderale, iberis, bonariense, diandres; nudicaule, alpinum, tétrandres; graminifolium, hexandre. Le L. ruderale est apétale.

Le genre des cleome, offre des especes hexandres, dodécandres, icosandres, polyandres, gynandres et polygames.

Cette silique est composée de deux valvules posées l'une sur l'autre, et séparées par une cloison fort mince.

Si l'on recherche, a dit après Linné J. J. Rousseau, pourquoi les deux étamines sont beaucoup plus courtes que les autres, on trouvera une petite glande implantée sur le réceptacle entre l'étamine et le germe, et c'est cette glande qui éloignant l'étamine, et la forçant à prendre le

contour, la racourcit nécessairement (61).

Les cruciferes, comprises dans les deux ordres de la tétradynamie, sous le nom de plantes à fleurs visibles tétradynames siliculeuses et siliqueuses, se rapportent dans les systèmes sur le fruit, à la 6º classe de Morison, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées siliqueuses tétrapétales bicapsulaires et bivalves. A la 7º classe de Cæsalpin, sous le nom de plantes herbacées à deux conceptacles. A la 3º classe de Christ. Knaut, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples, à péricarpe membraneux simple et unicapsulaire, tétrapétales régulieres. A la 14° classe d'Hermann, sous le nom de plantes herbacées à semences renfermées dans un péricarpe simple à silique. A la 23º classe de Boerhaave, sous le nom de plantes herbacées à deux cotyledons pétalées, à semences renfermées dans une silique, à quatre pétales cruciformes siliqueuses et siliculeuses. À la 16e classe de la 2e collection de la 1re série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées à fleurs et fruits visibles à plusieurs

<sup>(61)</sup> Œuv. complettes de J. J. Rousseau, tom. 28, pag. 126.

SECONDE cotyledons à quatre pétales siliqueuses ou cruciferes.

Dans les systèmes sur la corolle, les cruciferes se rapportent à la 5º classe de Tournefort, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples polypétales régulieres cruciformes. A la 8e classe de Seguier, sous le nom de plantes herbacées à fleurs simples pétalées à quatre pétales. A la se classe de Bergen, sous le nom de plantes à fleurs simples pétalées polypétales régulieres cruciformes. A la 7e classe de Durande, sous le nom de plantes à fleurs polypétales cruciformes. A la 10e classe de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs pétalées polypétales, à quatre pétales cruciformes. A la 4e classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs parfaites simples régulieres à quatre pétales. A la 4º classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs parfaites régulieres simples à quatre pétales. A la 4º classe de Ludwig \*, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées régulieres simples, à quatre pétales. A la 10e classe de Chret. Knaut, sous le nom de plantes à fleurs à quatre pétales uniformes. A la 8e classe de Ludwig \*\* et Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées à quatre pétales régulieres, à six antheres et un style. Au 4e ordre de la 4e classe d'Haller \*, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaires régulieres simples à quatre pétales, à semences couvertes par une silique ou silicule. Aux 6e et 7e classes de Gouan, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées simples à quatre pétales régulieres et irrégulieres, à deux, quatre et six étamines ou tétradynames. Au 2º ordre de la 8º classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites pétalées à quatre pétales régulieres, à six étamines et un pistil, ou tétra-

dynames.

Dans les systèmes sur les étamines, les cruciferes se rapportent à la 11e classe de Magnol, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à calice externe et interne, à fleur à quatre pétales. A la 3e section de la 11e classe de Linné +, sous le nom de plantes à calice à périanthe uniflore

simple caduc.

Dans les systèmes sur les étamines, les cruciferes se rapportent à la 3° section de la 6° classe
de Villars, qui les désigne sous le nom de plantes
à étamines déterminées, hexandres cruciformes.
A la 14° classe de Gmelin, et à la 15° classe de
Thunberg, sous le nom de plantes à fleurs visibles
tétradynames, siliculeuses et siliqueuses. Au 6°
ordre de la 1° classe de Gledistch, sous le nom
de plantes à fructification apparente, à étamines
insérées sur le réceptacle, à six antheres à fleurs
simples complettes, à quatre pétales, siliqueuses,
hypocarpes à un style.

Dans les systèmes mixtes, les cruciferes se rapportent au 2<sup>d</sup> ordre de la 4<sup>e</sup> classe d'Allioni, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées à quatre pétales cruciformes à six étamines siliqueuses et siliculeuses. Aux deux fascicules de la 2<sup>e</sup> collection de la 2<sup>e</sup> série de Gilibert, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à corolles polypétales uniformes cruciferes ou à quatre pétales. A la 4<sup>e</sup> classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées à six étamines, dont deux plus courtes, cruciferes

apparente à port absolu et déliquescent, cruci-

formes siliqueuses et siliculeuses.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les cruciferes se rapportent à la 21e classe de Ray, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées privées de bourgeons parfaites à deux cotyledons à fleurs simples, à semences renfermées dans une membrane simple, à quatre pétales siliculeuses et siliqueuses. A la 12e classe de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes, à dix étamines ou moins, à corolle polypétale, cruciformes.

Dans les systèmes sur les feuilles, les cruciferes se rapportent à diffé entes classes de Sauvages, qui les désigne sous le nom de plantes garnies de feuilles 1.° simples entieres, étroites et larges, 2.° composées, pinnées, décomposées laci-

niées.

Dans les systèmes naturels, les cruciferes se rapportent au 30e ordre de Wulf et au 33e ordre de Gerard, qui les désignent sous le nom de tétrapétales. Au 57e ordre de Linné, sous le nom de siliqueuses. Au 52e ordre d'Adanson, sous le nom de cruciferes. Au 28e ordre de Guettard,

ISS sous le nom de cruciferes sans filets ou à filets. A la 6º famille de la 8º classe d'Oeder, sous le nom de plantes polypétales, tétrapétales cruciferes. A la 28e tribu de Scopoli, sous le nom de plantes à calice et corolle de plusieurs pieces, à étamines insérées sur le réceptacle, anti-scorbutiques. Aux 37e et 38e ordres de Necker, sous le nom de plantes à fleurs disposées en croix, à fruit siliqueux, et plantes à petites fleurs à quatre pétales, à fruit court et siliculeux. Au 14º ordre de la 13e classe de Jussieu, sous le nom de plantes à deux cotyledons à plusieurs pétales, à étamines placées sous le pistil, cruciferes. A la 13e classe de Van-Royen, sous le nom de plantes à plusieurs cotyledons, à calice propre à fruit disférent, à étamines visibles, à calice et corolle, à filamens proportionnés, dont quatre plus longs.

Si nous examinons la maniere dont ces auteurs ont divisé la famille des cruciferes, nous verrons 1.º que Boerhaave, Gattenhof, Gouan, Allioni, Wernischeck les distinguent en siliculeuses et siliqueuses ; 2.° Christ. Knaut , Morison , Ray , Haller \*\*\*, en siliqueuses et siliculeuses; 3.º Haller \*\*, Durande, Villars, Haller \*, Lamarck les divisent par la longueur du fruit ; 4.º Hermann, Fabricius, Tournefort, Magnol, Rivin, Ruppius, Ludwig\*, Chret. Knaut, Bergen, par le fruit ; 5.° Crantz, par le port ; Wachendorf, par le style ; 6.° Gilibert et Gmelin suivent les divisions de Linné; 7.º Cæsalpin, Linné \*; Seguier, Sauvages, Ludwig \*\*, Boëhmer, Gledisth, Thunberg ne les divisent point.

Boerhaave, qui divise les cruciferes en siliculeuses et siliqueuses, sous-divise les siliculeuses. par le nombre des loges: savoir, 1.° à une loge, 2.° à deux loges à cloison A parallele, B oblique, 3.° à plusieurs loges; et les siliqueuses, 1.° en biloculaires, 2.° articulées. Gattenhof, sous-divise les siliculeuses par le nombre des semences, des loges et la situation de la cloison parallele ou transversale; et les siliqueuses, par le calice à feuillets rapprochés ou écartés. Gouan, Allioni, Wernischeck ne les sous-divisent point.

Christ. Knaut, qui divise les cruciferes en siliqueuses et siliculeuses, les sous-divise par le nombre des loges, 1.° à une loge, 2.° à deux loges. Morison, les sous-divise par le nombre des loges du fruit. Ray, sous-divise les siliqueuses par le nombre des valvules et des loges; et les siliculeuses, par la cloison parallele ou transversale, et le nombre des semences. Haller \*\*\* divise les cruciferes, 1.° en siliqueuses, 2.° siliculeuses A à cloison parallele, B à deux silicules, C à cloison transversale, D à fleur difforme, E à silique à une loge, F à silique irréguliere.

Haller \*\*, qui divise les cruciferes par la longueur du fruit à silique 1.° courte, 2.° longue, sous-divise seulement les premieres par le nombre des semences, des loges, par la situation de la cloison parallele ou transversale. Durande divise les cruciferes par le fruit, 1.° à petite silique A entiere, point échancrée à son sommet, B échancrée à son sommet; 2.° à silique A à calice fermé ou ses feuilles rapprochées, B à calice évasé ou ses feuilles écartées: (ces divisions sont celles de Linné.) Villars les divise 1.° en cruciformes siliculeuses, 2.° à siliques alongées. Haller \* les divise par le fruit à capsule à deux divisions,

157

1.° longue ou silique, 2.° courte ou silicule. Lamarck, par la silique, dont la longueur 1.° n'est jamais quatre fois plus grande que la largeur, 2.° surpasse quatre fois au moins la largeur.

Hermann, divise les cruciferes en siliqueuses bicapsulaires et fongueuses. Fabricius, divise les cruciferes en cinq ordres, pris de la forme de la silique, 1.º en uniloculaires; 2.º biloculaires, à siliques ou silicules à cloison opposée aux valves a à pétales entiers, b à deux divisions; 3.° à siliques à cloison parallele aux valves, a trèslarges, b en forme de cornes charnues, c presque rondes, d longues, à quatre angles, e en forme de fleche; 4.° à siliques articulées, a à fleur réguliere ou uniforme, b irréguliere ou disforme; 5.° à siliques difformes ou anguleuses. Tournefort, sous-divise les cruciferes par le fruit 1.º à une capsule, non-siliqueux; 2.° court, partagé en deux parties par une cloison A transversale, B parallele; 3.° à silique A à deux loges, B articulée; 4.º à silique à trois ou quatre loges. Bergen, suit les divisions de Tournefort. Magnol, les divise par le fruit, 1.º à capsule, 2.º à silique. Rivin, les divise par les semences et le péricarpe, savoir: 1.° à une semence nue, 2.° à péricarpe à deux loges, A long, B large, C court. Ruppius, par les semences et le fruit, 1.° à une semence nue, 2.° à capsule A simple, B à deux divisions, a siliqueuse, b siliculeuse, c large. Ludwig \*, par le fruit à capsule A simple, B à quatre divisions, C à deux divisions. Chret. Knaut, par le fruit à capsule 1.° simple membraneuse, A à une semence, B à deux semences, C à plusieurs semences; 2.º composée à deux loges membraneuse, A à une semence, B à plusieurs semences.

Crantz, divise les cruciferes par le port 1°. absolu, en A siliculeuses, B siliqueuses; 2.° par le port déliquescent, en siliqueuses, à calice caduc. Wachendorf, les divise 1.° par l'absence, 2.° par la présence et la forme du style, en A siliculeu-

ses, B siliqueuses.

Dans les systèmes naturels, Linné \*\*\*, Gerard, Wulf, Oeder ne divisent point les cruciferes. Scopoli, les distribue en deux familles, relativement au fruit, 1.º alongé, (siliqueuses,) 2.º court et large, (siliculeuses.) Jussieu, les divise par le fruit 1.º siliqueux, 2.º siliculeux. Van-Royen, par la forme de la silique 1.º presque ronde, 2.º très-longue. Necker, les divise par le fruit 1.º siliqueux, à fructification monogame ou hermaphrodite, à calice A épais, presque ouvert, B droit, rapproché; 2.º siliculeux, à fructification monogame ou hermaphrodite,, à deux, quatre étamines, à fleurs tétradynames. Adanson, les divise en quatre sections, savoir: 1°. les roquettes (erucæ,) 2.° les lunaires (lunariæ, ) 3.º les tlaspi (thlaspi, ) 4.º les raiforts (raphani.) Guettard, les distribue en cinq sections, savoir: en cruciferes, 1.º sans filets et àfleur, 2°: à filets coniques simples, 3°. à filets en Y grec horizontaux, 4° en filets en Y grec horizontaux et perpendiculaires, et à filets simples et coniques, 5°. à filets en Y grec horizontaux et perpendiculaires qui se ramifient, et à filets simples et coniques.

## CLASSE XVI. MONADELPHIE.

Les ordres de la monadelphie sont pris du nombre des étamines, de même que ceux de la diadelphie et polyadelphie. Ils sont, dans cette classe, au nombre de huit, et ne présentent aucune sous-division. La connexion des filamens des étamines en un corps, les antheres étant libres, forme le caractère essentiel de cette classe.

La monadelphie renferme la famille naturelle des malvacées (62). Quelques genres présentent

des aberrations (63).

Les malvacées, comprises dans le huitieme ordre de la monadelphie, sous le nom de plantes à fleurs visibles monadelphes polyandres, se rapportent, dans les systèmes sur le fruit, à la 6° classe de Morison, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées siliqueuses à quatre pétales, à deux capsules et deux valves. Aux 13° et 14° classes de Cæsalpin, sous le nom de plantes herbacées à plusieurs semences. À la 2° section de la 1re classe d'Hermann, sous le nom de plantes herbacées pétalées, à plusieurs semences nues. A la 6° section de la 9° classe de Christ. Knaut, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples, à semences nues. A la 1re section de la

<sup>(62)</sup> Columnifera, ord. nat. 34.

<sup>(63)</sup> Bombax pentandrum.

Les geranium, sur quatre-vingt-deux especes, en offrent trente-cinq à sept étamines, et dix à cinq. La corolle est tantôt réguliere, tantôt irréguliere.

classe de Boerhaave, sous le nom de plantes herbacées à deux cotyledons pétalées, à semences renfermées dans une capsule à plusieurs loges. Au 6° ordre de la 15° classe de la 2° collection de la 11° série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées à fleurs et fruits visibles,

à plusieurs cotyledons et capsules.

Dans les systèmes sur la corolle, les malvacées se rapportent à la 1re classe de Tournefort, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples monopétales régulieres, campaniformes. A la 3º classe de Seguier, sous le nom de plantes herbacées à fleurs simples pétalées monopétales, campaniformes. A la 5° section de la 1re classe de Bergen, sous le nom de plantes à fleurs simples pétalées monopétales régulieres, campaniformes. A la 1re section de la 6° classe de Durande, sous le nom de plantes à fleurs à plusieurs pétales, malvacées à étamines nombreuses. A la 16º classe de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs pétalées polypétales à cinq pétales, columniferes. A la 1re classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs parfaites simples régulieres monopétales, à plusieurs semences nues, et à péricarpe à quatre, cinq et plusieurs semences. A la 1re classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs parfaites régulieres simples monopétales à plusieurs semences nues, à capsules à cinq et plusieurs divisions. A la 4e section de la 1re classe de Ludwig \*, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées régulieres simples monopétales, à plusieurs semences nues. A la 11e section de la 1re classe de Chret. Knaut, sous le nom de plantes à fleurs monopétales uniformes,

à capsules simples membraneuses, à plusieurs semences. A la 11e classe de Ludwig \*\* et Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales simples régulieres, à plusieurs antheres et un style. Au 8e ordre de la 11e classe de Gouan, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées simples monopétales régulieres, monadelphes à plusieurs étamines. Au 9e ordre de la 11e classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites pétalées monopétales simples régulieres, à plusieurs étamines et un pistil.

Dans les systèmes sur le calice, les malvacées se rapportent à la 5° section de la 9° classe de Magnol, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à calice externe et interne, à fleur monopétale. A la 2° section de la 6° classe de Linné \*, sous le nom de plantes à calice, à périanthe uni-

flore double.

Dans les systèmes sur les étamines, les malvacées se rapportent à la 2° section de la 7° classe de Villars, qui les désigne sous le nom de plantes à étamines indéterminées, réunies par leurs filamens, heptandres monadelphes, malvacées. Au 8° ordre de la 16° classe de Thunberg, et au 13° ordre de la 5° classe de Gmelin, sous le nom de plantes à fleurs visibles, monadelphes polyandres. Au 13° ordre de la 2° classe de Gledistch, sous le nom de plantes à fructification apparente, à étamines insérées sur la corolle, à filamens réunis en forme de cylindre, columniferes.

Dans les systèmes mixtes, les malvacées se rapportent au 1er ordre de la 7e classe d'Allioni,

qui les désigne sous le nom de plantes à sleurs visibles pétalées à cinq pétales, qui ne sont pas à deux semences nues, à étamines réunies. Au 2d fascicule de la 2º collection de la 1re série de Gilibert, sous le nom de plantes à fleurs visibles à corolles unipétales non-figurées, à étamines nombreuses, réunies par leurs filamens engaînant le pistil, malvacées. Au 4e ordre de la 8e classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées, à étamines nombreuses, columniferes ou malvacées. A la 8º classe d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées à deux cotyledons, à étamines nombreuses. A la 6º classe de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles, à plusieurs cotyledons, complettes ou parfaites, à étamines réunies par leurs filamens en forme de cylindre. A la 11e classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescence apparente, à port absolu er déliquescent, columniferes.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les malvacées se rapportent à la s's section de la 19 classe de Ray, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées privées de bourgeons parfaites, à deux cotyledons à fleur simple, à semences renfermées dans une membrane simple, monopétales. A la 18 classe de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes à onze étamines ou plus, à pétales

non-insérées sur le calice, columniferes.

Dans les systèmes sur les feuilles, les malvacées se rapportent aux 4°, 8° et 11° classes de Sauvages, qui les désigne sous le nom de plantes garnies de

feuilles 1.° simples, entieres, larges; 2.° divisées,

palmées; 3.º composées, laciniées.

Dans les systèmes naturels, les malvacées se rapportent au 29e ordre de Guettard, qui les désigne sous le nom de malvacées, à glandes à houppes composées de plus ou moins de filets, répandues sur les deux surfaces des feuilles, les tiges, les calices et souvent sur les pétales, et à filets simples, coniques, longs, sur les principales nervures des feuilles. Au 50e ordre d'Adanson, sous le nom de malvacées. Au 34e ordre de Linné, au 50° ordre de Wulf, au 57° ordre de Gerard, sous le nom de columniferes. A la 3e famille de la 8e classe d'Oeder, sous le nom de plantes à plusieurs pétales, à bec. A la 11e famille de la 25e tribu de Scopoli, sous le nom de plantes à calice d'une seule piece, à corolle de plusieurs pieces, à étamines insérées sur le réceptacle, réunies par leurs filamens, columniferes. Au 33e genre de Necker, sous le nom de plantes à étamines nombreuses réunies, imitant une colonne. Au 14º ordre de la 13º classe de Jussieu, sous le nom de plantes à deux cotyledons à plusieurs pétales, à étamines placées sous le pistil, malvacées. A la 14º classe de Van-Royen, sous le nom de plantes à deux cotyledons, à calice propre, à fruit différent, à étamines visibles, à calice et corolle, à filamens proportionnés, réunis en un corps.

## CLASSE XVII. DIADELPHIB.

La diadelphie renferme les vraies légumineuses ou papillonacées (64). Elle a quatre ordres, dont les trois premiers ne sont point sous-divisés, et le dernier, qui est très-nombreux, présente six sous-divisions prises 1.° de la connexion des étamines en un corps, 2.° du stygmate duveté, 3.° de la gousse à deux loges, 4.° de la gousse à une semence, 5.° articulée, 6.° à une loge, à plusieurs semences. Cette classe n'offre que deux aberrations (65). La connexion des filamens des étamines en deux corps, en forme le caractère essentiel.

Les fleurs papillonacées ont un calice monophylle terminé en cinq pointes bien distinctes, dont deux un peu plus larges sont en haut, et les trois plus étroites en bas. La corolle est ordinairement polypétale et composée de quatre pièces. Le pétale qui occupe la partie supérieure s'appelle l'étendard. On trouve par dessous deux pièces latérales, auxquelles il est joint par les oreillettes. Ces pieces s'appellent les aîles. On a donné à la derniere piece, qui couvre et défend le centre de la fleur, le nom de nacelle ou de carene, à cause de sa ressemblance avec la carene d'un vaisseau. On trouve dessous ce dernier pétale une membrane cylindrique, terminée par dix filets

<sup>(64)</sup> Papillonaceæ, ord. nat. 55.

<sup>(65)</sup> Glycine monoica.

Arachis hypogæa, offre quelquefois des fleurs mâles, sans germe ni pistil.

bien distincts qui entourent l'oraire, c'est-à-dire, l'embrion de la gousse. Mais dans la partie supérieure de ce cylindre, parmi ces dix étamines, il y en a une qui paroît adhérente aux autres, mais qui à mesure que la fleur se fane, et que le fruit grossit, se détache et laisse une ouverture en dessus, par laquelle le fruit grossissant, peut s'étendre en s'entr'ouvrant, et en écartant de plus en plus le cylindre, qui sans cela le comprimant et l'étranglant tout au tour, l'empêcheroit de grossir et de profiter.

La gousse des légumineuses se distingue de la silique des cruciferes, en ce que dans les siliques les graines sont attachées alternativement aux deux sutures, au lieu que dans la gousse elles ne sont attachées que d'un seul côté, c'est-à-dire, à une seulement des deux sutures, tenant alternativement à la vérité aux deux valves qui la composent, mais toujours du même côté (66).

Le caractere de la connexion des filamens des étamines en deux corps, varie dans les diadelphes, comme il est facile de s'en convaincre dans la premiere division du quatrieme ordre de cette classe, qui renferme les légumineuses, dont les dix étamines sont unies entr'elles. La gousse, quoique ordinairement à une loge, est quelquefois à deux, (dans les astragales), elle est tantôt simple, tantôt articulée.

Les légumineuses, comprises dans cette classe, sous le nom de plantes à fleurs visibles monoclines diadelphes, se rapportent dans les systêmes sur le

<sup>(66)</sup> Voy. Œuv. compl. de J. J. Rousseau, tom. 28, pag. 115 et suiv.

fruit, aux 2º et 5º classes de Cæsalpin, qui les désigne sous le nom d'arbres à cœurcelet à la base de la semence, dont le fruit s'étend longitudinalement en forme de silique : et plantes herbacées à capsules solitaires, à fruit légumineux. Aux 2º et se classes de Morison, sous le nom d'arbrisseaux à fleurs légumineuses, et plantes herbacées siliqueuses papillonacées bivalves. A la 4e classe de Christ. Knaut, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples à péricarpe membraneux simple et unicapsulaire, à quatre pétales irrégulieres papillonacées. A la 15e classe d'Hermann, sous le nom de plantes herbacées pétalées, à semences renfermées dans un péricarpe simple, à gousse. A la 24e classe de Boerhaave, sous le nom de plantes herbacées à deux cotyledons pétalées, à semences renfermées dans une gousse, légumineuses. A la 17e classe de la 2e collection de la 1re série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées à fleurs et fruits visibles à plusieurs cotyledons légumineuses à fleurs papillonacées : et à la 31º classe de la 2º série du même auteur, sous le nom d'arbres à plusieurs cotyledons à fleurs à quatre pétales irrégulieres.

Dans les systèmes sur la corolle, les légumineuses se rapportent aux 10° et 22° classes de Tournefort, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples à plusieurs pétales irrégulières papillonacées, et d'arbres à fleurs pétalées à plusieurs pétales irrégulières papillonacées. Aux 12° et 21° classes de Seguier, sous le nom de plantes herbacées à fleurs simples pétalées à plusieurs pétales légumineuses, et d'arbres et arbrissieurs pétales légumineuses, et d'arbres et arbrisseaux à fleurs légumineuses. A la 10° classe de

Bergen, sous le nom de plantes à fleurs simples pétalées à plusieurs pétales irrégulieres papillonacées. A la 12e classe de Durande, sous le nom de plantes à plusieurs pétales légumineuses. A la 14e classe de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs pétalées polypétales à quatre ou cinq pétales papillonacées. A la 24e classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs parfaites simples irrégulieres à quatre pétales. A la 12e classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs parfaites irrégulieres, à quatre pétales. A la 14° classe de Ludwig \*, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées irrégulieres, à quatre pétales. A la 11º classe de Chret. Knaut, sous le nom de plantes à fleurs à quatre pétales difformes. A la 9° classe de Ludwig \*\* et Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à quatre pétales irrégulieres, à six et dix antheres et un style. A la 11º classe d'Haller \*, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites irrégulieres simples à quatre pétales, à semences couvertes par une capsule. Au 4º ordre de la 7º classe de Gouan, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées simples, à quatre pétales irrégulieres, diadelphes à huit et dix étamines. Au 3° ordre de la 9° classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites pétalées à quatre pétales irrégulieres, à six et dix étamines et un pistil.

Dans les systèmes sur le calice, les légumineuses se rapportent à la 4° section de la 12° classe de Magnol, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à calice externe et interne à fleur polypétale. A la 2° section de la 15° classe de Linne\*,

sous le nom de plantes à calice à périanthe unissore

simple, à fleurs inégales à plusieurs pétales.

Dans les systèmes sur les étamines, les légumineuses se rapportent à la 3° section de la 7° classe de Villars, qui les désigne sous le nom de plantes à étamines indéterminées, réunies par leurs filamens, diadelphes légumineuses. A la 16° classe de Gmelin, et à la 17° classe de Thunberg, sous le nom de plantes à fleurs visibles diadelphes. Au 13° ordre de la 1° classe de Gledistch, sous le nom de plantes à fructification apparente, à éta-

mines insérées sur le réceptacle.

Dans les systèmes mixtes, les légumineuses se rapportent à la 5e classe d'Allioni, qui les désigne sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées à quatre ou cinq pétales papillonacées. Aux trois fascicules de la 3° collection de la 2° série de Gilibert, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à corolles polypétales difformes papillonacées. A la 3° classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines inégales réunies, papillonacées. A la 13e classe d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées à deux cotyledons, à étamines plus nombreuses que les pétales. A la 9° classe de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles à plusieurs cotyledons, complettes ou parfaites, à antheres plus nombreuses que les filamens. A la 8e classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescence apparente, à port absolu et déliquescent, papillonacées.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les légumineuses se rapportent aux

le nom de plantes herbacées privées de bourgeons parfaites à deux cotyledons, à fleur simple, à semences renfermées dans une membrane simple, légumineuses: et d'arbres pourvus de bourgeons, à fleur réunie au fruit, à silique, papillonacées. A la 13° classe de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes à dix étamines ou moins, à corolle polypétale, papillonacées.

Dans les systèmes sur les feuilles, les légumineuses se rapportent, à différentes classes de Sauvages, qui les désigne sous le nom de plantes garnies de feuilles 1.° simples entieres, étroites, larges; 2.° divisées, digitées et palmées; 3.° com-

posées, pinnées.

Dans les systèmes naturels, les légumineuses se rapportent à la 43e famille d'Adanson, qui les désigne sous le nom de légumineuses. Au 51° ordre de Wulf, au 55° ordre de Linné \*\*\*, au 58° ordre de Gerard, sous le nom de papillonacées. Au 13e ordre de Guettard, sous le nom de papillonacées à filets cylindriques. A la 9e famille de la 8º classe d'Oeder, sous le nom de plantes à plusieurs pétales, papillonacées. A la 26e tribu de Scopoli, sous le nom de plantes à calice d'une seule piece, à étamines insérées sur le réceptacle, réunies par leurs filamens, légumineuses. Au 36e genre de Necker, sous le nom de plantes à fleurs irrégulieres, à pétale inférieur constamment carené, à étamines monadelphes et diadelphes. Au 11e ordre de la 14e classe de Jussieu, sous le nom de plantes à deux cotyledons à plusieurs pétales, à étamines insérées sur le calice, légumineuses. A la 15 classe de Van-Royen, sous le nom de plantes à plusieurs coty-ledons à calice propre à fruit différent, à étamines visibles, à calice et corolle, à filamens propor-

tionnés réunis en deux corps.

Si nous examinons les différentes parties que les botanistes ont employées pour diviser la famille des légumineuses, nous verrons 1.° qu'Hermann, Ruppius, Haller \*, Ludwig \*, Chret. Knaut, Rivin, Bergen, Durande, ont préféré le fruit; 2.° Christ. Knaut, Tournefort, Boerhaave, Fabricius, le fruit et les feuilles; 3.° Ludwig \*\*, Boëhmer, Gattenhof, Allioni, Wachendorf, Haller \*\*\*, le nombre des étamines; 4.° Villars, Gilibert, Haller \*\*, Crantz, Gledistch, le port; 5.° Sauvages, les feuilles; 6.° Wernischeck, le calice; 7.° Lamarck, les vrilles; 8.° Morison, Ray, l'ensemble des parties; 9.° Gmelin suit les divisions de Linné; 10.° Cæsalpin, Magnol, Seguier, Linné \*, Gouan, Thunberg, ne les divisent point.

Hermann divise les légumineuses par le fruit 1.° en unicapsulaires, 2.° bicapsulaires. Ruppius, Haller \*, par la capsule 1.° simple, 2.° divisée en deux parties. Ludwig \*, par la capsule 1.° simple à fleur A papillonacée, B non-papillonacée, 2.° divisée en deux parties. Chret. Knaut, par la capsule 1.° simple membraneuse A à une semence, B à deux semences, C à plusieurs semences, a à articulations, b sans articulations, 2.° composée à deux loges. Rivin, par le conceptacle 1.° court, 2.° alongé, 3.° double. Bergen les divise en quatre ordres, relativement à la forme de la gousse

1. simple à une ou deux semences, 2. à plusieurs semences, 3. à plusieurs semences à articulations, 4. composée à deux loges. Durande, les divise par le légume 1. à une loge à feuilles A simples ou ternées sans vrille, a à étamines en un seul paquet, b en deux paquets, B ailées sans vrille, étamines en deux paquets, C ailées terminées par une vrille, étamines en deux paquets; 2. articulé, 3. divisé dans sa longueur en deux loges.

Christ. Knaut, divise les légumineuses 1.° par le fruit A à deux battans, B à deux loges, C articulé, D hérissonné; 2.° par les feuilles, A à trois, B à cinq feuilles. Tournefort, 1.° par la silique à une loge A courte, B alongée, C articulée; 2° par le nombre des feuilles, à trois feuilles. Boerhaave, par le fruit et les feuilles en légumineuses, 1.° à fruit à une loge à feuilles A simples, B au nombre de trois, C de cinq; 2.° à plusieurs feuilles, à fruit A à une loge à deux battans, B articulé; 3.° à deux loges à siliques doubles. Fabricius, divise les légumineuses en douze ordres, relativement au nombre des loges du fruit, la forme et le nombre des feuilles.

Ludwig \*\*, divise les légumineuses par le nombre des étamines; savoir : 1.° à six, 2.° à dix étamines A à quatre pétales, à légume a à une loge, b à deux loges, B à cinq pétales, à fruit a à une loge, b à deux loges. Boëhmer, par le nombre des étamines 1.° à six, 2.° à dix étamines, à légume A à une loge, B à deux loges. Gattenhof, par le nombre des étamines 1.° à six; 2.° à dix étamines, à légume A à une loge, à étamines a réunies, b à stygmate duveté, c à légumes à une semence, d à légumes articulés, c à une loge à

plusieurs semences, Bà deux loges. Allioni, par le nombre des antheres 1.° à six, 2.° à huit, 3.° à dix antheres, A une loge, B à deux loges. Wachendorf, par le nombre des antheres 1.º à six, 2.° à huit, 3.° à dix antheres, A à légume à une loge, à fleurs a dépourvues d'ailes et de carene, b pourvues d'ailes et de carene, 1.º à ailes plus longues que l'étendard, 2.º de la longueur de l'étendard, 3.º plus courtes que l'étendard, à carene a plus longue que les ailes, b de la longueur des ailes, c plus courtes que les ailes, B à deux loges, Cà plusieurs loges. Haller \*\*\*, par le nombre des étamines; savoir: 1.° à huit, 2.° à six, 3.° à dix étamines, à feuilles A simples B au nombre de trois, C de cinq, D nombreuses ou pinnées, à tige a non-grimpante, b grimpante.

Villars, divise les légumineuses par le port 1.º en fausses légumineuses, 2.º en légumineuses proprement dites. Gilibert, les distingue 1.º en vraies légumineuses à feuilles A simples et ternées, B composées ; 2.º en plantes analogues aux légumineuses. Haller \*\*, les divise 1.º en vraies légumineuses, sous - divisées par la forme du fruit; 2.º en plantes en rapport avec les légumineuses et les didynames. Crantz, par le port 1.º absolu, à étamines A réunies, B libres à stygmate duveté, C à légume a à deux loges, b à une semence, c articulé, D à légume à une loge à plusieurs semences; 2.° à port déliquescent. Gledistch, par la forme des fleurs 1.° simples personnées, 2.° simples papillonacées, à étamines A réunies, à stygmate a sans duvet, b duveté, B à étamines en deux faisceaux; savoir : neuf inférieures réunies, la dixieme supérieure libre, à stygmate a duveté,

b sans duvet, à légumes \* à une loge, \*\* à deux

loges, \*\*\* articulés.

Sauvages, divise les légumineuses par les feuilles 1.° petites, 2.° d'une grandeur médiocre, 3.° au nombre de trois A à fleurs légumineuses,

B sans stipules.

Wernischeck, divise les légumineuses par le calice 1.° à deux, 2.° à trois, 3.° à quatre, 4.° à cinq divisions à étamines A réunies en un seul faisceau, B en deux faisceaux, à légume a à deux loges à stygmate duveté, b à une loge.

Lamarck, divise les légumineuses en plantes 1.° garnies de vrilles, ou dont les pétioles des feuilles sont terminés par un ou plusieurs filets; 2.° sans vrilles, et dont les pétioles des feuilles

ne sont pas terminés par des filets.

Morison et Ray, les divisent par l'ensemble de toutes les parties. Le premier les distingue 1.° en grimpantes A par des vrilles, B par la tige; 2.° en non-grimpantes, à siliques A pendantes, B droites; 3.° à silique A double, B articulée; 4.° à trois feuilles. Le second, les divise 1.° en grimpantes, 2.° non-grimpantes à feuilles A digitées, B pinnées, C simples; 3.° à siliques articulées, 4.° à trois feuilles.

Dans les systèmes naturel, Linné\*\*\*, Gerard, Wulf, Oeder, ne les divisent point. Scopoli, les distingue par le port 1.° en fausses légumineuses, 2.° en vraies légumineuses A sans veilles, à légume a à une loge, b divisé par une cloison longitudinale en deux loges, c par des cloisons transversales en plusieurs loges, à fruit \* à étranglement aux articulations, \*\* sans étranglement aux articulations, B à vrilles. Van-Royen, les

174

divise en deux ordres relativement à la forme de la gousse 1.º réguliere, 2.º irréguliere. Adanson, en forme six familles; savoir: 1.º les casses (cassiæ,) 2.º les genets (genistæ,) 3.º les astragales (astragali, ) 4.º les haricots (phaseoli, ) 5.º les coronilles (coronillæ,) 6.º les vesses (viciæ.) Guettard, les divise en deux sections; savoir : en plantes papillonnacées 1.° à filers cylindriques, qui ont de la fleur ou des corps en larmes bataviques, ou des grains, ou enfin les vessicules parenchymateuses ouvertes ; 2.° à filets cylindriques et glandes à cupule. Jussieu, distingue les légumineuses par le port 1.º en vraies légumineuses, sous-divisées par la forme du légume, des feuilles, etc.; 2.º en plantes analogues aux légumineuses. Necker, les divise par la forme de la fleur et du calice.

## CLASSE XVIII. POLYADELPHIE.

La polyadelphie est une des classes les moins nombreuses. La décandrie, dodécandrie, icosandrie et polyandrie qui s'y trouvent ramenées, en constituent les ordres, qui ne sont point sous-divisés. Le genre des millepertuis (hypericum,) offre des especes monogynes, digynes, trigynes, pentagynes. L'Hypericum Androsæmum, a pour fruit une baie.

## CLASSE XIX. SYNGÉNÉSIE.

Linné, dans la division des ordres de la syngénésie, qui est sans contredit le chef d'œuvre de ses classes, n'a eu égard qu'au sexe des fleurs et aux différences que lui présentoient ce même sexe, dans les individus de cette famille. Il a désigné ces ordres par des épithetes, qui découvrent au premier coup-d'œil le caractere particulier de chacun d'eux: ils sont au nombre de six.

Dans le premier ordre, polygamie égale, (polygamia equalis,) les fleurons ou demi-fleurons du disque ou centre du réceptacle, et ceux du bord ou rayon sont également hermaphrodites et fertiles; ainsi, il y a égalité partout.

Dans le second ordre, polygamie superflue, (polygamia superflua,) les fleurons du disque sont hermaphrodites et fertiles, et les demifleurons du bord, quoique unisexuels féminins, sont aussi fertiles; mais leur fécondation n'étant point nécessaire, il doit donc y avoir une superfluité, une surabondance dans les graines.

Dans le troisieme ordre, polygamie frustranée, l'polygamia frustranea, les fleurons du disque sont hermaphrodites et fertiles, et ceux du bord, qui sont unisexuels féminins, ayant leurs stygmates hors d'état d'être fécondés par les mâles des fleurons hermaphrodites, comme dans l'ordre précédent, ne peuvent donner des graines. Ainsi, c'est donc en vain, dit le professeur Gouan, qu'ils occupent une place dans le réceptacle, et l'épithete de frustranée désigne parfaitement leur inutilité.

Dans le quatrieme ordre, polygamie nécessaire, (polygamia necessaria,) les fleurons du disque sont hermaphrodites, mais leurs pistils n'ayant point de stygmates ne peuvent être fécondés. Ceux du bord, au contraire, quoique unisexuels féminins, sont fécondés par les étamines des fleu-

rons hermaphrodites du disque. Ainsi, le défaut de conformité des stygmates des fleurons du centre, est réparé par le bon état de ceux du bord, qui dès-lors deviennent nécessaires.

Dans le cinquieme ordre, polygamie séparée, (polygamia segregata,) les fleurons composans sont tous hermaphrodites, et divisés entr'eux, soit un à un, soit plusieurs ensemble, par autant de calices partiels, renfermés dans celui de toute la fleur.

Dans le sixieme ordre, monogamie, (monogamia,) les fleurs sont simples hermaphrodites, et ne sont point composées de fleurons, comme dans l'ordre précédent.

Pour distinguer facilement les plantes de cette classe, il faut se représenter les conditions prises des six ordres, et s'assurer auquel des six appartient la fleur que l'on veut déterminer; voir si le réceptacle est nu, garni d'écailles, de poils, etc.; si la semence a une aigrette, et la formt de cette aigrette; examiner la figure du calice: et on verra que quoique cette classe paroisse difficile, elle ne l'est pas autant que l'on se l'imagine.

La syngénésie renferme les fleurs composées (67), ainsi appelées, dit J. J. Rousseau (68), parce que d'une seule fleur résulte plusieurs fruits, et que cette pluralité n'a jamais lieu dans les fleurs qui n'ont qu'une corolle. Ainsi, toute fleur com-

<sup>(67)</sup> Compositi, ord. nat. 21.

pag. 150 et suiv.

posée a nécessairement, non-seulement plusieurs pétales, mais plusieurs corolles; et pour que la fleur soit réellement composée, il faut que quelqu'une des parties de la fructification soit commune à tous les fleurons composans, tels sont le réceptacle et le calice, et manque à chaqu'un en particulier. Les fleurons, dont l'assemblage forme une seur véritablement composée, sont de deux especes : les uns, qui sont réguliers et tubulés, s'appellent proprement fleurons; les autres, qui sont échancrées et ne présentent par le haut qu'une languette plate, et le plus souvent dentelée, s'appellent demi-fleurons : et des combinaisons de ces deux especes dans la fleur totale, résultent deux sortes principales de fleurs composées, savoir : celles qui ne sont garnies que de fleurons, celles qui ne sont garnies que de demi-fleurons, et celles qui sont mêlées des uns et des autres. Les fleurs à fleurons ou fleuronées se divisent encore en deux especes, relativement à leur forme extérieure. Les premieres, s'appellent fleurs en tête (capitati,) et les secondes, s'appellent fleurs en disque ou discoïdes (discoidei,) les fleurs à demi-fleurons, s'appellent demi-fleuronées; et à l'égard des fleurs mixtes, les fleurons occupent le centre du disque, et les demi-fleurons garnissent la circonférence.

La structure naturelle des fleurons composans, est d'avoir une corolle monopétale supérieure tubulée à cinq dents; un pistil alongé, terminé par deux stygmates réfléchis; cinq étamines, dont les filets sont séparés par le bas, mais formant, par l'adhérence de leurs antheres, un tube autour du pistil; une semence nue alongée, ayant pour base le réceptacle commun, et servant elle-même, par

son sommet, de réceptacle à la corolle; enfin, une aigrette de poils ou d'écailles, couronnant la semence: mais cette structure souffre des exceptions

dans plusieurs genres des composées.

Les composées, comprises dans les cinq premiers ordres de la syngénésie, sous le nom de plantes à fleurs visibles monoclines syngéneses polygames, se rapportent, dans les systèmes sur le fruit, aux 9e et 10e classes de Morison, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées, 1°. corymbiferes, 2.° laiteuses ou aigrettées. Aux 11e et 12e classes de Cæsalpin, sous le nom de plantes herbacées à plusieurs semences, 1.º anthémides, 2.º chicoracées ou acanacées. A la 4e classe d'Hermann, sous le nom de plantes herbacées pétalées à fleur solitaire composée, à une semence nue. Aux 10e et 11e classes de Christ. Knaut, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées composées, à semences solides sans aigrettes ou à aigrettes. Aux 7º, 8e, 9e et 10e classes de Boerhaave, sous le nom de plantes herbacées à deux cotyledons, pétalées à une semence nue, à fleur composée, 1.º planipétales, 2.º discistores radices, 3.º discistores nues, 4.º en tête. Aux 10e, 11e, 12e et 13e classes de la 2e collection de la 1re série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées à fleurs et fruits visibles à plusieurs cotyledons à semences nues, à fleurs composées, 1.° planipétales ou semi-flosculeuses, 2.° radiées, 3.° nues discoïdes ou flosculeuses, 4.° en tête.

Dans les systèmes sur la corolle, les composées se rapportent aux 12e, 13e et 14e classes de Tour-nesort, qui les désigne sous le nom de plantes

herbacées à fleurs pétalées composées, 1.º flosculeuses, 2.° semi-flosculeuses, 3.° radiées. Aux 140, 15º et 16º classes de Seguier, sous le nom de plantes herbacées à fleurs composées, 1.º flosculeuses, 2.° semi-flosculeuses, 3.° radiées. Aux 12e, 13º et 14º classes de Bergen, sous le nom de plantes à fleurs composées pétalées, 1.º flosculeuses, 2.º semi-flosculeuses, 3.º radiées. A la 4º classe de Durande, sous le nom de plantes à fleurs monopétales composées. Aux 60, 70 et 80 classes de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs pétalées monopétales composées, 1.º tubulées, 2.º lingulées, 3.º radiées. Aux 8e, 9e et 10e classes de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs parfaites composées, à fleurons r.º réguliers, 2.º réguliers et irréguliers, 3.º irréguliers. A la 8º classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs parfaites régulieres composées, à fleurons 1.º réguliers et irréguliers, 2.° réguliers, 3.° irréguliers, 4.° polypétales réguliers, s.º polypétales irréguliers. Aux 8º, 9º et 10º classes de Ludwig \*, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées régulieres composées, à fleurons 1.º réguliers, 2.º réguliers et irréguliers, 3. irréguliers. A la 110 classe de Chret. Knaut sous le nom de plantes à fleurs aggrégées, 1.º uniformes, 2.º difformes, 3.º uniformes et difformes. Aux 30, 40 et 50 classes de Ludwig \*\* et Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales composées, 1.º tubulées, 2.º lingulées, 3.º mixtes. A la 8º classe d'Haller \*, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites régulieres composées, à fleurons 1.º réguliers et irréguliers, 2.° réguliers, 3.° irréguliers. Aux 13°, 14e et 15e classes de Gouan, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées composées, à fleurons 1.° réguliers, 2.° irréguliers, 3.° réguliers et irréguliers, syngéneses. Aux 3°, 4° et 5° classes de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites pétalées monopétales composées, 1.° tubulées, 2.° lingulées, 3.° mixtes, syngéneses, à étamines réunies en forme de cylindre.

Dans les systèmes sur le calice, les composées se rapportent à la 5° classe de Magnol, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à calice externe seulement, renfermant une fleur composée. A la 5° classe de Linné \*, sous le nom de plantes à calice à périanthe multiflore commun.

Dans les systèmes sur les étamines, les composées se rapportent à la 13° section de la 5° classe de Villars, qui les désigne sous le nom de plantes à étamines déterminées, à antheres réunies, pentandres syngéneses, 1.° cynarocéphales ou flosculeuses, 2.° chicoracées ou semi-flosculeuses, 3.° corymbiferes ou radiées. A la 18° classe de Gmelin, et à la 19° classe de Thunberg, sous le nom de plantes à fleurs visibles syngéneses polygames. Au 14° ordre de la 2° classe de Gledistch, sous le nom de plantes à fructification apparente, à étamines insérées sur la corolle, à antheres formant un tube.

Dans les systèmes mixtes, les composées se rapportent au 1er ordre de la 2e classe d'Allioni, qui les désigne sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées monopétales composées, à antheres réunies. Aux trois fascicules de la 3e collection de la 1re série de Gilibert, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à corolles unipétales à fleurs composées, 1.º flosculeuses, 2.º radiées, 3.º lingulées. A la 11e classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées composées, à étamines réunies, à fleurons applatis, à fleurs radiées, flosculeuses, en tête. A la 15e classe d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées à deux cotyledons, à une semence nue, à fleur assise sur la semence. A la 11e classe de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles, à plusieurs cotyledons, complettes ou parfaites, à antheres réunies en cylindre. A la 3e classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescence apparente, à port absolu et déliquescent, 1.° composées, 2.° flosculeuses, 3.° en tête, discoïdes, 4.° radiées.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les composées se rapportent aux 6°, 7°, 8° et 9° classes de Ray, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées privées de bourgeons, parfaites, à deux cotyledons, à fleur composée, 1.° planipétales laiteuses, 2.° discoïdes, 3.° corymbiferes, 4.° en tête. Aux 1°e, 2° et 3° classes de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes conjointes, à fleurettes 1.° de même sorte, flosculeuses et semi-flosculeuses, 2°. de deux sor-

tes, radiées.

Dans les systèmes sur les feuilles, les composées se rapportent à différentes classes de Sauvages, qui les désigne sous le nom de plantes garnies de feuilles 1.° simples entieres, étroites, larges, opposées, 2.° composées pinnées, décomposées, laciniées.

Dans les systèmes naturels, les composées se rapportent à la 160 famille d'Adanson, et au 21° ordre de Linné \*\*\*, qui les désignent sous le

nom de composées. Aux 15e, 16e et 17e ordres de Wulf, et aux 17e, 18e et 19e ordres de Gerard, sous le nom 1.º de chicoracées, 2°. cynarocéphales, 3.° corymbiferes. Aux 38e, 39e, 40e et 41e ordres de Guettard, sous le nom 1.º de cynarocéphales, 2°. plantes à fleurons, 3.° radiées, 4.° à demi-fleurons. A la 1re famille de la 5º classe d'Oeder, sous le nom de plantes calycarpes, composées. A la 9e tribu de Scopoli, sous le nom de plantes à calice et corolle, à étamines insérées sur la corolle, à germe inférieur, composées. Aux trois premiers genres de Necker, sous le nom de plantes à fleurs composées, 1.º à fleurons du rayon lingulés, applatis, à fleurons du disque tubulés; 2.° à fleurons également lingulés, applatis; 3.° à fleurons également tubulés. A la 10e classe de Jussieu, sous le nom de plantes à deux cotyledons monopétales, à corolle portée sur le pistil, à antheres réunies, chicoracées, cynarocéphales, corymbiferes. A la 6º classe de Van-Royen, sous le nom de plantes à plusieurs cotyledons, à calice commun, à périanthe, à antheres réunies.

Si nous examinons les différentes manieres dont les auteurs ont divisé et sous-divisé la nombreuse famille des composées, nous verrons 1.° que Sauvages les a divisées en six classes; 2.° Ray, Boerhaave, Fabricius les ont divisées en quatre classes; 3.° Rivin, Ludwig\*, Chret. Knaut, Ludwig\*\*, Gattenhof, Tournefort, Bergen, Wernischeck, Lamarck, Gouan, Boëhmer, Seguier, en trois classes; 4.° Gilibert, en trois fascicules; 5.° Cæsalpin, Morison, Christ. Knaut, en deux classes; 6.° Hermann, Ruppius, Haller\*, Durande, Villars, Allioni, Gledistch, Wachendorf, Hal-

ler \*\*\*, Crantz, Haller \*\*, Magnol, Linné \*, Thunberg, Gmelin, les ont réunies dans une seule classe.

Sauvages, qui a divisé les composées en six classes, les sous-divise par la forme des fleurs,

flosculeuses, semi-flosculeuses et radiées.

Parmi les auteurs qui ont divisé les composées en quatre classes, Ray les sous-divise, 1.° par les semences A aigrettées, B sans aigrettes; 2.° par la fleur A radiée, B nue; 3.° par les fleurons A réguliers sans calice propre, B irréguliers à calice propre. Boerhaave, les sous-divise 1.° par les semences A aigrettées, B sans aigrettes, C à piquans, D simples, solides ou sans aigrettes; 2.° par le calice, A en non-écailleuses, à calice commun en capitule, B écailleuses, à calice ventru. Fabricius, les sous-divise 1.° par les semences A aigrettées, B sans aigrettes; 2.° par le calice, en composées à fleurs en tête, à calice A sans écailles, B écailleux.

Parmi les auteurs qui ont divisé les composées en trois classes, Rivin les sous-divise par les semences A solides ou sans aigrettes, B aigrettées; 2.° par les fleurons A de même sorte, B de deux sortes. Ludwig \* et Chret. Knaut, par les semences A solides ou sans aigrettes, B aigrettées. Ludwig \*\* et Gattenhof, par le réceptacle, 1°. nu, à semences A nues, B couronnées; 2.° garni de paillettes, à semences A aigrettées, B nues; 3.° nu, à semences A nues et couronnées, B couronnées; 4.° garni de poils ou de paillettes, à semences A nues, B couronnées. Tournefort sous-divise les flosculeuses, 1.° par les fleurons stériles, 2°. par les semences A aigrettées, B sans aigrettes, 3.° par les fleurons à segmens égaux et inégaux, à calice

propre; les semi-flosculeuses, par les semences 1.° aigrettées, 2.° sans aigrettes; et les radiées, par les semences A aigrettées, B à lames feuillées, C sans lames feuillées, D renfermées dans une capsule, E à fleurons étalés au disque. Bergen, sous-divise les composées par le réceptacle 1.º nu, à semences A aigrettées, B nues, Cà enveloppe; 2.º garni de paillettes, à semences A aigrettées, B nues, C en écailles, D enveloppées par le calice; 3.° garni de poils, à semences A nues, B aigrettées. Vernischeck, sous-divise les composées 1.º par le réceptacle A nu, B couvert ; 2.º par l'absence ou présence du calice A à écailles presque égales, B caliculé, C à écailles en recouvrement, D à écailles en recouvrement, inégales; 3.° par les semences A nues, B à aigrettes. Lamarck, sous-divise les composées 1°, par la nature du calice et des feuilles A à épines, B sans épines; 2.º par le réceptacle A nu ou un peu alvéolaire, ou légérement alvéolé, B chargé de poils ou de paillettes. Gouan, suit, dans la division des composées, les ordres de la syngénésie. Boëhmer et Seguier, qui divisent les composées par la forme des fleurs, ne les sous-divisent point. Gilibert, qui divise les composées en trois fascicules, les sous-divise par l'ensemble de toutes les parties.

Parmi les auteurs qui ont divisé les composées en deux classes, Cæsalpin les sous-divise 1.° par la couleurs des fleurs A blanches, B jaunes, C jaunes ou bleues à semences aigrettées; 2.° par le port, A à tête penchée, B droite. Morison, 1.° par la forme et la couleur des fleurs A nues de couleur d'or, B étoilées a jaunes, b blanches, c violettes;

2.

2.º par les semences A sans aigrettes, B aigrettées. Christ. Knaut, par les semences 1.º sans aigrettes, à fleurs A en étoiles, B non-étoilées; 2.º aigrettées, à fleurs A étoilées, B non-étoilées, C pleines naturellement.

Parmi les auteurs qui ont réuni les composées dans une seule classe, Hermann les divise par les semences 1.º aigrettées, 2.º sans aigrettes. Ruppius, Haller \*, les divisent par la forme des fleurons, et les sous-divisent par les semences A sans aigrettes, B aigrettées. Durande, les divise par la forme des fleurs, 1.° semi-flosculeuses à récep-tacle A nu, B garni, 2.° capitées, 3.° en corymbe, à réceptacle A nu, à semences nues, B à semences aigrettées, à réceptacle nu, C à réceptacle garni, à semences nues, à paillettes a peu nombreuses, b nombreuses. Villars, les divise par la forme des fleurs et le sexe. Allioni, qui divise les composées par la forme des fleurs, les sous-divise par les semences A sans aigrettes, B aigrettées, C dentées, et par le réceptacle a garni de paillettes, b sans paillettes, c nu, d garni de poils. Gledisch, divise les composées par les fleurons 1.° à calice commun et à périanthe propre, 2.° à calice commun seulement, à corollules A uniformes, a en languettes, b tubulées, B difformes a tubulées, b tubulées au disque, lingulées au rayon. Wachendorf, divise les composées par la forme des fleurs, et les sous-divise par la régularité et l'irrégularité des fleurons, la nature du réceptacle, garni A d'écailles, B de poils, C nu, et la forme des paillettes A soyeuses, B applaties, C concaves, D à trois dents. Haller \*\*\*, qui divise les composées par la forme des fleurs, les

sous-divise 1.º par le réceptacle A garni de paillettes, B nu; 2.º par les semences a nues, b aigrettées; 3.° par le calice A propre, B sans calice propre, à fleurons a androgynes, b stériles au rayon. Crantz, qui les divise par le port absolu et déliquescent, les sous-divise par la forme des fleurs et le réceptacle A nu , B garni. Haller \*\*, divise les composées par la forme des fleurs, et les sous-divise par le sexe, le réceptacle, les semences. Magnol, les divise par la forme des fleurs 1.° semi-flosculeuses, 2.° semi-flosculeuses et flosculeuses, 3.º flosculeuses, 4.º à rayon en forme de pétales. Linné \*, divise les composées par le calice 1.º très-simple à trois segmens, 2.º double, 3.º caliculé, 4.º à involucre, 5.º à écailles en recouvrement à réceptacle A garni de paillettes à corolles a en recouvrement, b radiées, c fistuleuses, B garni de poils, C d'alvéoles à corolles a en recouvrement, b fistuleuses, c mixtes. Thunberg et Gmelin suivent les ordres de la syngénésie.

Dans les systèmes naturels, Gerard, Wulf, divisent les composées en trois ordres relativement à la forme des fleurs, mais ils ne les sous-divisent point. Linné \*\*\*, les divise 1.° par la forme des fleurs A semi-flosculeuses, B en tête, C en corymbe; 2.° par les feuilles, opposées. Guettard, les divise par la forme des fleurs 1.° en cynaro-céphales, 2.° en plantes à fleurons, A qui jettent un duvet blanc en longs fils immédiatement de leurs surfaces, B qui n'ont pas de duvet, mais des grains brillans, solides, qui ont suinté immédiatement des surfaces; et des filets coniques à valvule, d'où il ne sort point de duvet, mais quel-

quefois une liqueur limpide sans couleur; 3.6 radiées A qui n'ont que du duvet, des grains brillans, solides et blancs sur les demi-fleurons, et qui manquent de filets à valvules ou qui n'en ont que très-peu, B qui ont des filets à valvules et du duvet, C qui ont des glandes à cupule et quelquefois du duvet et des filets à valvules; 4.6 à demi-fleurons A qui n'ont point de filets, mais un duvet blanc ou une fleur, B qui ont des filets à valvules, coniques, et du duvet ou une fleur, C qui ont des filets coniques à valvules et des tubercules qui laissent suinter une liqueur gluante et visqueuse, ou des glandes à cupule : ou des filets, des glandes à cupule et du duvet.

Scopoli, divise les composées en trois sections prises de la forme des fleurs 1.° semi-flosculeuses à réceptacle A nu, B presque nu, C garni de paillettes; 2.° flosculeuses A en tête à réceptacle garni a de poils, b de paillettes, B discoides, à réceptacle a presque nul, b nu; 3.° radiées à réceptacle A nu, à semences, a à aigrette \* simple \*\* composée, b à paillettes, à soies ou à écailles, c nues, B garni de paillettes, à semences à aigrette a simple, b terminée par des arêtes, c couronnée par le calice propre, ou par une ou plusieurs folioles, d composée, C garni de poils, de soies,

de duvet, D sans réceptacle.

Jussieu, divise les composées en trois ordres, pris de la forme des fleurs 1.° en chicoracées, à réceptacle A nu, à semences, a sans aigrette, b à aigrette, \* à poils, \*\* en plume, B garni de paillettes ou de poils, à aigrette a en plume ou à poils, b garni d'arêtes ou de dents, ou sans aigrette; 2.° en cynarocéphales, A à calices à écailles.

a épineuses, b sans épines, B enfermant une ou quelques fleurs aggrégées; 3.º en corymbiferes à réceptacle A nu, à semences a aigrettées, à fleurs \* flosculeuses, \*\* radiées, b nues ou sans aigrettes, à fleurs \* radiées, \*\* flosculeuses, B garni de paillettes, à semences a nues ou sans aigrettes, à fleurs le plus souvent radiées, rarement flosculeuses, b garnies à leur sommet de dents ou de paillettes, à fleurs radiées dans la plupart, flosculeuses dans un très-petit nombre, C à aigrettes en plumes, à poils ou à arêtes, à fleurs le plus souvent radiées.

Adanson, divise les composées I.° en demifleuronnées, qui renferment 1.° les laitues (lactucæ;) II.° en fleuronnées, qui comprennent
2.° les échinopes (echinopi,) 3.° les chardons
(cardui,) 4.° les immortelles (xeranthema,)
5.° les ambrosies (ambrosiæ,) 6.° les tanesies
(tanaceta,) 7.° les conises (conyzæ;) III.° en
radiées, qui contiennent 8.° les jacobées (jacobeæ,) 9.° les soucis (calthæ,) 10.° les bidens
(bidentes).

Necker, qui divise les composées en trois genres, les sous-divise par la forme de la fleur et du calice. Van-Royen, qui les divise en quatre ordres pris de la forme des fleurs 1.° semi-floscu-leuses, 2.° en tête, 3.° nues, 4.° radiées, ne les sous-divise point. Oeder ne les divise pas.

Pontedera a donné un système sur les fleurs composées, qu'il appelle conglobées. Il les divise en trois classes, prises de la forme des fleurs 1.º lingulées, à réceptacle nu, à semences a nues, b écailleuses, c aigrettées; 2.º flosculeuses à réceptacle A nu, à semences a nues,

b écailleuses, c aigrettées, B garni d'écailles à semences a nues, b écailleuses, c aigrettées, d enveloppées par le calice, C garni de poils, à semences a nues, b aigrettées; 3. radiées à réceptacle A nu, à semences a nues, b à enveloppe, c osseuses, d écailleuses, e aigrettées, B garni d'écailles, à semences a nues, b écailleuses, c aigrettées, C garni de poils, à semences a nues, b aigrettées, D à semences dans la fleur.

Sebastien le Vaillant (69), a donné un sys-

<sup>(69)</sup> Sebastien le Vaillant, démonstrateur des plantes, à Paris, s'est rendu célebre parmi les Botanistes, par ses mémoires insérés parmi ceux de l'académie. On distingue sur-tout celui qui constitue plusieurs genres, tant des plantes aquatiques, que des prétendues especes que Tournefort avoit ramenées au genre des renoncules. Ses trois mémoires sur les fleurs composées, présentent une multitude d'observations neuves. Il suffit de dire, pour en faire connoître la valeur, qu'elles ont excité l'enthousiasme de Linné. Mais l'ouvrage où Vaillant a développé toute sa sagacité, c'est le Botanicon Parisiense, publié par Boerhaave. Sans connoître les recherches de son contemporain Dillen, il a le premier débrouillé, décrit et fait graver une multitude de cryptogames très-obscures ou inconnues avant lui. Plusieurs especes rares ou nouvelles dans les autres familles, sont développées et dessinées avec la même sagacité. Ses discussions critiques sur la synonymie, peuvent être comparées à celles de son maître Tournefort. Le seul reproche que l'on puisse faire à Vaillant, c'est d'avoir critiqué avec tant d'amertume un homme à qui il devoit tout, l'immortel Tournefort. Vaillant s'étoit insensiblement attaché à saisir les affinités des végétaux, déduites de tous leurs attributs. Ses observations très-nombreuses lui avoient suggéré le plan d'une nouvelle méthode naturelle, qu'il a tracé dans des manuscrits qui sont entre les mains du professeur Gouan.

tême sur les fleurs composées, qu'il divise d'après la forme des fleurs en quatre classes, 1.º en cynarocéphales à calice A simple, B à écailles en recouvrement, à épines a simples, à semences \* à poils, \*\* en plumes, b très-fortes, c feuillées, d molles, e membraneuses; 2.º corymbiferes à fleur A en disque à réceptacle a nu, à ovaires \* nus, \*\* couronnés, b garni de paillettes ou de poils à semences nues, B radiées à réceptacle a nu, à ovaires \* nus, \*\* couronnés, C le plus souvent radiée à réceptacle A nu, à ovaires presque nus, D radiée à réceptacle garni de paillettes, à ovaires couronnés; 3.º chicoracées A à une fleur à tige simple, à réceptacle nu, B à tiges ramifiées à réceptacle a nu, à ovaires \* à poils, \*\* en plumes, \*\*\* nus, b garni de poils ou de paillettes ; 4.º la quatrieme classe renferme des plantes qui n'appartiennent point à la famille des composées.

La syngénésie offre quelques aberrations (70).

(70) Gnaphalium, dioicum.

Polymnia, a une espece qui appartient à la poly-

gamie superflue.

Arctotis, qui est de la polygamie nécessaire, offre quelques especes dont les fleurons femelles du rayon sont stériles, tandis que ceux du centre sont fertiles.

Erigeron, a quelquesois les sleurons du centre ou

disque, mâles.

Les composées varient beaucoup dans la forme du calice, des fleurons, du réceptacle, de la semence, de l'aigrette, etc.

## CLASSE XX. GYNANDRIE.

La gynandrie renferme neuf ordres peu nombreux, qui ne sont point sous-divisés. Linné a employé pour la distinction des genres du premier ordre, qui renferme la famille des orchidées (71), la forme du nectaire. L'adhérence des étamines au pistil, constitue le caractere essentiel de cette classe.

Les plantes de la gynandrie sont faciles à reconnoître, si l'on fait attention au caractere essentiel de cette classe, c'est-à-dire, à l'insertion des étamines sur le pistil. On peut se représenter les quatre parties principales qui constituent une fleur, savoir: le calice, la corolle, les étamines et le pistil; les trois premieres varient souvent, mais la place du pistil est invariablement fixe. Cela est si vrai, que dans les plantes qui ont plusieurs pistils, si par hasard on n'en trouve qu'un seul, celui qui existe n'est point situé au milieu du réceptacle, mais par côté, comme l'a très-bien observé le docteur Dorthes (72). Ce

<sup>(71)</sup> Orchideæ, ord. nat. 4.

<sup>(72)</sup> Ce savant, auteur de l'éloge historique de Richer de Belleval, couronné par l'académie des sciences de Montpellier, connu avantageusement par ses connoissances en Enthomologie et en Botanique, est mort à l'âge de trente-quatre ans, dans les hôpitaux de l'armée des Pyrénées orientales, où il servoit en qualité de médecin. Possesseur des manuscrits et de l'herbier du docteur Cusson pere, il se proposoit de publier le système de ce Botaniste sur les ombelliferes. Nous devons doublement regretter que sa perte nous ait privé

192 SECONDE

qui prouve évidemment que la place que doit occuper cette partie est invariable.

J'ai observé moi-même, dans plusieurs plantes monoiques, principalement dans le bouleau, que les étamines insérées à sa corolle monopétale divisée en quatre parties, n'en occupent que les extrémités, et que la place du milieu, celle qu'occuperoit le pistil si la fleur de cet arbre étoit hermaphrodite, est toujours vide. Le pistil occupant donc toujours le milieu du réceptacle dans les sleurs hermaphrodites, je cherche les étamines qui viennent immédiatement après, et ne les trouvant point insérées sur le réceptacle, la corolle ou le calice, mais attachées au pistil ou au réceptacle alongé en forme de style, je vois alors que ce caractere constitue essentiellement la gynandrie. Voilà pourquoi Linné recommande de faire attention premiérement au pistil, si l'on veut avoir une idée claire de la situation des étamines (73). Ainsi, il faut bien prendre garde que dans cette classe, comme l'a dit le professeur Gouan, toute partie du pistil qui occupe le centre du réceptacle, que ce soit le germe, le style ou le stigmate

de la publication de l'ouvrage du célebre Cusson, rédigé par un observateur du mérite du docteur Dorthes, et des productions dont il auroit enrichi l'histoire naturelle.

<sup>(73)</sup> Voyez Genera plantarum, pag. 459. La gynandrie a souffert de grands changemens dans la dernière édition du Genera de Schræber, qui ne conserve que quatre ordres, au lieu de neuf, et transporte la plupart des genres de cette classe, dans la pentandrie, l'heptandrie, polyandrie, manadelphie et dioécic.

ou même un pédoncule alongé qui porte le germe, cette partie quelconque représentant le pistil en entier, si l'étamine s'y insere, il y a vraiement

gynandrie.

Dans les deux classes suivantes, monoécie et dioécie, où la gynandrie se trouve ramenée, on a demandé comment il pouvoit y avoir gynandrie, puisque les étamines sont séparées du pistil? Le professeur Gouan satisfit pleinement à cette objection (74), en prouvant, dans sa réponse à l'abbé Rosier: " que le centre du réceptacle étant essentiellement destiné au pistil, si ce centre, dans l'absence même du pistil, est occupé par l'étamine, elle doit être regardée comme déplacée, et formant une vraie gynandrie; qu'elle est sensée attachée au pistil, des qu'elle est insérée au lieu qu'il occuperoit, s'il existoit. » Ainsi, on voit que la situation des étamines à la place que devroit occuper le pistil, constitue la gynandrie dans ces deux classes, et qu'elle peut exister sans que les étamines adherent au pistil.

Cette classe offre deux aberrations (75).

Les orchidées, comprises dans le premier ordre de la gynandrie, sous le nom de plantes à fleurs visibles monoclines gynandres diandres, se rapportent, dans les systèmes sur le fruit, à la 9º classe

<sup>(74)</sup> Voyez l'explication du systême de botanique, par le citoyen Gouan, pag. 35; et les démonstrations élémentaires de botanique, de Lyon, tom. 1, p. 89.

<sup>(75)</sup> Arum triphyllum, dioïque.

Ophrys corallorhiza, offre quatre étamines, deux dans chaque loge.

de Cæsalpin, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à triple principe, bulbeuses. A la 2º section de la 15º classe de Morison, sous le nom de plantes herbacées multicapsulaires. A la 2º section de la 6º classe de Christ. Knaut, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples, à péricarpe membraneux simple et unicapsulaire, à six pétales. A la 6º section de la 16º classe d'Hermann, sous le nom de plantes herbacées pétalées, à semences renfermées dans un péricarpe membraneux simple à capsule. A la 280 classe de Boerhaave, sous le nom de plantes herbacées monocotyledones à bractées. Au 6º ordre de la 1re classe de la 1re collection de la 1re série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées à fleurs et fruits visibles, à un seul cotyledon, à

semences couvertes, bulbeuses, orchidées.

Dans les systèmes sur la corolle, les orchidées se rapportent à la 3e section de la 11e classe de Tournefort, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples à plusieurs pétales, irrégulieres, anomales. A la 13º classe de Seguier, sous le nom de plantes herbacées à fleurs simples pétalées à plusieurs pétales, anomales. Au 4º ordre de la 11º classe de Bergen, sous le nom de plantes à fleurs simples pétalées à plusieurs pétales, irrégulieres, anomales. A la 3º section de la 14e classe de Durande, sous le nom de plantes à fleurs apétales spadicées. Au 1er ordre de la 11e classe de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs pétalées polypétales, à six pétales. A la 1re section de la 16e classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs parfaites simples irrégulieres à six pétales, à péricarpes à trois loges.

A la 14e classe de Ruppius, sous le nom de plantes à sleurs parfaites irrégulieres à six pétales. A la 16e classe de Ludwig +, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées irrégulieres à six pétales. A la 1re section de la 15e classe de Chret. Knaut, sous le nom de plantes à fleurs à six pétales difformes. Au 1er ordre de la 13e classe de Ludwig \* et Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à six pétales, à deux antheres et un style. A la 14e classe d'Haller, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites irrégulieres à six pétales. Au se ordre de la 9º classe de Gouan, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées simples à cinq pétales irrégulieres, gynandres et diandres. Au 1er ordre de la 13e classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites pétalées à six pétales, diandres.

Dans les systèmes sur le calice, les orchidées se rapportent à la 2° section de la 8° classe de Magnol, qui les désigne sous le nom de plantes à calice interne seulement, analogues aux liliacées. A la 3° section de la 8° classe de Linné \*, sous le nom de plantes à calice à périanthe uniflore simple à couronne.

Dans les systèmes sur les étamines, les orchidées se rapportent à la 4° section de la 2° classe de Villars, qui les désigne sous le nom de plantes à étamines déterminées gynandres diandres, orchidées. Au 1° ordre de la 2° classe de Thunberg et Gmelin, sous le nom de plantes à fleurs visibles diandres monogynes. Au 1° ordre de la 4° classe de Gledistch, sous le nom de plantes à fructifications apparente, à étamines insérées sur le pistil, à

deux antheres, orchidées.

Dans les systèmes mixtes, les orchidées se rapportent au 1er ordre de la 8e classe d'Allioni, qui les désigne sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées à six pétales à deux étamines. Au 3º fascicule de la 2º collection de la 1re série de Gilibert, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à corolles incomplettes pétaloïdes sans calice, analogues aux liliacées, orchidées. A la 10e classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées, à deux étamines, orchidées. Au 1er ordre de la 7e classe d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées, à un seul cotyledon. A la 17e classe de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles, à un seul cotyledon, à calice en spathe. Au 3º ordre de la 2º classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescençe apparente, à port absolu et déliquescent, orchidées.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les orchidées se rapportent à la 7° section de la 24° classe de Ray, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées privées de bourgeons parfaites à deux cotyledons, à fleur simple. A la 30° classe de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire sous la corolle, à corolle polypétale, orchidées.

Dans les systèmes sur les feuilles, les orchidées se rapportent au 5° ordre de la 2° classe de Sauvages, qui les désigne sous le nom de plantes garnies de feuilles, simples, entieres, radicales.

Dans les systèmes naturels, les orchidées se rapportent au 4º ordre de Linné \*\*\*, aux 8es ordres de Wulf et Gerard, qui les désignent sous le nom d'orchidées. A la 10e famille d'Adanson, sous le nom d'orchides. Au 6e ordre de Guettard, sous le nom d'orchis sans filets. A la 7º famille de la 2e classe d'Oeder, sous le nom de plantes à un seul cotyledon, orchidées. A la 1re famille de la 5e tribu de Scopoli, sous le nom de plantes à calice, à étamines insérées sur le germe, à germe inférieur, orchidées. Au 41° ordre de Necker, sous le nom de plantes à sexes posés l'un sur l'autre, à étamines cachées. Au 5° ordre de la 15° classe de Jussieu, sous le nom de plantes à un seul cotyledon, à étamines portées sur le pistil, orchidées. Au se ordre de la 1re classe de Van-Royen, sous le nom de plantes à un seul cotyledon à calice en spathe.

## CLASSE XXI. MONOÉCIE.

Le caractere essentiel de cette classe, se prend de la situation des fleurs mâles et femelles sur le même individu. On appelle les plantes de la monoécie, qui sont toutes unisexuelles, androgynes ou monoïques: "mots qui signifient absolument la même chose, dit J. J. Rousseau (76), excepté que, dans le premier, on fait plus d'attention au différent sexe des fleurs, et dans le second, à leur assemblage sur le même individu." Les classes précédentes ramenées dans celle-ci, en constituent

<sup>(76)</sup> Voy. Œuv. compl. de J. J. Rousseau, tom. 28, pag. 26.

les ordres qui sont au nombre de dix, sans aucune sous-division: le neuvieme, renferme en partie la famille des coniferes (77), et le dixieme, celle des cucurbitacées (78).

La monoécie présente quelques aberrations (79).

Les coniferes, comprises dans le neuvieme ordre de la monoécie, sous le nom de plantes à fleurs visibles diclynes monoïques monadelphes, se rapportent, dans les systèmes sur le fruit, à la 1re section de la 1re classe de Morison, et à la 3° section de la 16° classe de Christ. Knaut, qui les désignent sous le nom d'arbres coniferes. A la 8º section de la 2º classe de Cæsalpin, sous le nom d'arbres à cœurcelet à la base de la semence. A la 2º section de la 22º classe d'Hermann, sous le nom d'arbres à fleur apétale, à chatons, coniferes résineux. A la 3º section de la 32 classe de Boerhaave, sous le nom de plantes à deux cotyledons à fleur apétale à calice, à chatons, amentacées. A la 34e classe de la 2e série de Fabricius, sous le nom d'arbres à plusieurs cotyledons, à fleurs à étamines, coniferes.

Dans les systèmes sur la corolle, les coniferes se rapportent à la 3° section de la 19° classe de

<sup>(77)</sup> Coniferæ, ord. nat. 15.

<sup>(78)</sup> Cucurbitaceæ, ord. nat. 45.

<sup>(79)</sup> Bryonia dioica.

Urtica dioica.

Carex dioica, carex cyperoides, dioïques.
Myriophyllum verticillatum, hermaphrodite.
Tripsacum hermaphroditum.

Omphalea diandra.

Tournefort, et à la 18e classe de Seguier, qui les désignent sous le nom d'arbres à fleurs apétales, amentacées. A la 17e classe de Bergen, sous le nom de plantes à fleurs apétales à étamines, coniferes. A la 5° section de la 15° classe de Durande, sous le nom de plantes à fleurs apétales staminées. Au 1er ordre de la 18e classe de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs apétales, à calice rude ou nul. A la 2° section de la 18º classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs imparfaites, coniferes. A la 16e classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs imparfaites, conglomérées. A la 1re section de la 19 classe de Ludwig \*, sous le nom de plantes à fleurs imparfaites, amentacées. Au 6º ordre de la 16º classe de Ludwig \*\*, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées relatives monophytes apétales, à quatre et plusieurs antheres. Au 3e ordre de la 16e classe de Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées relatives monophytes apétales. A la 6º classe d'Haller \*, sous le nom de plantes à fleurs visibles imparfaites conglomérées. A la 16e classe de Gouan, sous le nom de plantes à fleurs visibles apétales, monoïques, dioïques monadelphes. Au 2º ordre de la 18º classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles relatives monophytes, monoïques apétales.

Dans les systèmes sur les calices, les coniferes se rapportent à la 3° section de la 13° classe de Magnol, qui les désigne sous le nom d'arbres à calice externe seulement, coniferes. A la 1<sup>re</sup> section de la 3° classe de Linné \*, sous le nom de

plantes à calice à chatons.

Dans les systèmes sur les étamines, les coniferes se rapportent à la 5° section de la 11° classe de Villars, qui les désigne sous le nom de plantes à étamines indéterminées, coniferes. A la 15° classe de Gmelin, et à la 16° classe de Thunberg, sous sous le nom de plantes à fleurs visibles monadelphes, triandres, tétrandres polyandres. Au 13° ordre de la 1° classe de Gledistch, sous le nom de plantes à fructification apparente, à étamines insérées sur le réceptacle, à filamens réunis à fleurs à chatons.

Dans les systèmes mixtes, les coniferes se rapportent au 1er ordre de la 10e classe d'Allioni, qui les désigne sous le nom de plantes à fleurs visibles apétales, à filamens réunis. Au 3e fascicule de la 1re collection de la 1re série de Gilibert, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à corolles incomplettes apétales calicinées, à étamines coniferes. Au 7º ordre de la 13º classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles apérales, à sexes séparés, coniferes. Au 3º ordre de la se classe d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fieurs visibles apétales, coniferes. A la 13e classe de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles, à plusieurs cotyledons, incomplettes ou imparfaites, à étamines et pistil séparés sur le même pied. Au 3º ordre de la 2º classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescence apparente, à port simple et d'affinité, incomplettes à étamines.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les coniferes se rapportent à la 1<sup>re</sup> section de la 28<sup>e</sup> classe de Ray, sous le nom d'arbres pourvus de bourgeons à deux cotyledons,

à fleur séparée du fruit ou apétale. Aux 4° et 5° classes de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes unisexuelles, monoïques et dioïques.

Dans les systèmes sur les feuilles, les coniferes se rapportent aux 3°, 5° et 6° classes de Magnol, qui les désigne sous le nom de plantes garnies de feuilles simples, entieres, étroites, opposées en

anneaux.

Dans les systèmes naturels, les coniferes se rapportent au 15e ordre de Linné \*\*\*, au 55e ordre de Wulf, au 63º ordre de Gerard, qui les désignent sous le nom de coniferes. Au 570 ordre d'Adanson, sous le nom de pins. A la re famille de la 3e classe d'Oeder, sous le nom de plantes amentacées coniferes. A la 34º classe de Scopoli, sous le nom de plantes à étamines réunies par leurs filamens, à sexes différens, coniferes. Au 10e ordre de Guettard, sous le nom de plantes à glandes miliaires. Au 48e genre de Necker, sous le nom de plantes à fruit conique, composé d'écailles en recouvrement. Au se ordre de la 15e classe de Jussieu, sous le nom de plantes à deux cotyledons apétales, à étamines idiogynes ou séparées du pistil. Au 20 ordre de la 4e classe de Van-Royen, sous le nom de plantes à plusieurs cotyledons à calice commun à chatons.

Les cucurbitacées, comprises dans le 10e ordre de la monoécie, sous le nom de plantes à fleurs visibles diclines, monoiques syngéneses, se rapportent dans les systèmes sur le fruit, à la 1re section de la 4e classe de Cæsalpin, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à péri-

carpes solitaires. A la 4e classe de Morison; sous le nom de plantes herbacées grimpantes bacciferes et pommiferes. A la 2º section de la 1re classe de Christ. Knaut, sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples à péricarpe charnu ou à baie. A la 1re section de la 18e classe d'Hermann, sous le nom de plantes herbacées pétalées à semences renfermées dans un péricarpe charnu. A la 1re section de la 26e classe de Boerhaave, sous le nom de plantes herbacées à deux cotyledons péralées, à semences renfermées dans une pomme. A la 20e classe de la 20 collection de la 1re série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées à fleurs et fruits visibles à plusieurs cotyledons cucuméracées ou cucurbiracées.

Dans les systèmes sur la corolle, les cucurbitacées se rapportent à la 7e section de la 1re classe de Tournefort, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à fleurs pétalées simples monopétales régulieres, campaniformes. A la 17e section de la 3º classe de Seguier, sous le nom de plantes herbacées à fleurs simples pétalées monopétales, campaniformes. Au 6e ordre de la 1re classe de Bergen, sous le nom de plantes à fleurs simples pétalées monopétales régulieres, campaniformes. A la 8º section de la 1re classe de Durande, sous le nom de plantes à fleurs monopétales régulieres, à germe inférieur à baie. Au 1er ordre de la 3e classe de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs pétalées monopétales simples, à limbe de la corolle divisé en cinq parties. A la 14º section de la 11º classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs parfaites simples

régulieres monopétales, à péricarpe charnu ou à pomme. A la 15e section de la 1re classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs parfaites régulieres simples monopétales, à baie à plusieurs semences. A la 12° section de la 1re classe de Ludwig \*, sous le nom de plantes à fleurs parfaites pétalées régulieres simples monopétales , à plusieurs semences. A la 11e classe de Chret. Knaut, sous le nom de plantes à fleurs monopétales uniformes. Au 1er ordre de la 16º classe de Ludwig \*\*, sous le nom de plantes à fars enveloppées relatives monophytes, monopétales à cinq antheres. Au 1er ordre de la 16e classe de Boehmer, sous le nom de plantes à fleurs enveloppées relatives monophytes, monopétales. Au 6º ordre de la 1re classe d'Haller \*, sous le nom de plantes à fleurs visibles parfaites régulieres simples monopétales, à plusieurs semences couvertes par une baie. Au 9° ordre de la 1re classe de Gouan, sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées simples monopétales régulieres, monoiques syngeneses. Au 1er ordre de la 18º classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs visibles relatives monophytes, monoiques.

Dans les systèmes sur le calice, les cucurbitacées se rapportent à la 1<sup>re</sup> section de la 9<sup>e</sup> classe de Magnol, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à calice externe et interne, à fleur monopétale. A la 4<sup>e</sup> section de la 8<sup>e</sup> classe de Linné \*, sous le nom de plantes à calice à

périanthe uniflore simple à couronne.

Dans les systèmes sur les étamines, les cucurbitacées se rapportent à la 12° section de la 5° classe de Villars, qui les désigne sous le nom204

de plantes à étamines déterminées pentandres, à fleurs simples à étamines réunies, en rapport par ce dernier attribut avec les syngéneses. Au 4° ordre de la 19° classe de Thunberg, sous le nom de plantes à fleurs visibles syngéneses monogames. Au 1er ordre de la 3° classe de Gmelin, sous le nom de plantes à fleurs visibles, triandres monogynes supérieures. Au 8° ordre de la 3° classe de Gledistch, sous le nom de plantes à fructification apparente à étamines insérées sur le calice, à anthères réunies.

Dans les systèmes mixtes, les cucurbitacées se rapportent au 6e ordre de la 1re classe d'Allioni, qui les désigne sous le nom de plantes à fleurs visibles pétalées monopétales simples, à fruit pulpeux, à trois étamines. Au 2º fascicule de la 1re collection de la 1re série de Gilibert, sous le nom de plantes à fleurs visibles, à corolles unipétales non-figurées, à cinq antheres réunies dans une seule fleur. Au 3° ordre de la 6° classe d'Haller \*\*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle, cucurbitacées. A la 10º classe d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs visibles pétalées à deux cotyledons, à étamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle, cucurbitacées. A la 13º classe de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs apparentes ou visibles à plusieurs cotyledons, incomplettes ou imparfaites, à étamines et pistils séparés sur le même pied. A la 2º classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescence apparente, à port simple et d'affinité, incomplettes sans étamines, cucuméracées.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les cucurbitacées se rapportent à la 16° classe de Ray, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées privées de bourgeons parfaites à deux cotyledons à fleur simple, à semences renfermées dans une pulpe. A la 4° classe de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs distinctes disjointes unisexuelles monoiques.

Dans les systèmes sur les feuilles, les cucurbitacées se rapportent aux 4° et 8° classe de Sauvages, qui les désigne sous le nom de plantes garnies de feuilles 1.° simples entières larges, 2.° divisées palmées.

Dans les systèmes naturels, les cucurbitacées se rapportent au 45e ordre de Linné et au 50e ordre de Gerard, qui les désignent sous le nom de cucurbitacées. Au 34º ordre de Guettard, sous le nom de cucurbitacées à filets à articulations roides portés sur un tubercule ou un mammelon. A la 18e famille d'Adanson, sous le nom de briones. A la 6º famille de la 5º classe d'Oeder, sous le nom de plantes calycarpes, à fructifications solitaires. A la 2e famille de la 11e tribu de Scopoli, sous le nom de plantes à calice et corolle d'une seule pièce, à étamines insérées sur la corolle, cucurbitacées. Au 10e genre de Necker, sous le nom de plantes à fleur tellement adhérente au fruit, qu'il ne peut en être séparé. Au 2º ordre de la 15º classe de Jussieu, sous le nomde plantes à deux cotyledons apétales, à étamines idiogynes ou séparées du pistil, cucurbitacées. Au 1er ordre de la 11e classe de Van-Royen, sous le nom de plantes à plusieurs cotyledons à calice

propre à fruit différent, à étamines visibles, à calice et corolle, à filamens proportionnés insérés sur le calice.

#### CLASSE XXII. DIOÉCIE.

Le nom seul de cette classe désigne parfaitement qu'elle renferme les plantes unisexuelles, dont les fleurs mâles et femelles sont situées sur deux pieds différens, c'est-à-dire, les étamines sur un individu, et les pistils sur un autre. Ses ordres, au nombre de quatorze, sont formés comme ceux de la monoécie: elle offre quelques aberrations (80).

#### CLASSE XXIII. POLYGAMIE.

Linné, ayant comparé la fécondation des plantes par la poussiere des étamines, à l'acte de la génération, a regardé comme polygames les plantes qui ont des fleurs hermaphrodites et des fleurs mâles et femelles en même temps, et a appellé polygamie, la classe qui les renferme. La polygamie a trois ordres.

La monoécie, qui constitue le premier, renferme les plantes qui portent sur le même pied, des fleurs hermaphrodites et des fleurs unisexuelles mâles et femelles.

<sup>(80)</sup> Mercurialis ambigua, afra, monoïques.
Osyris alba, polygame.
Coriaria myrtifolia, polygame.
Napæa levis, hermaphrodite.
Ruscus racemosus, hermaphrodite.
Clutia, offre une espece décandre et androgyne.
Les saules, offrent des especes triandres, pentandres.

La dioécie, qui forme le second, contient les plantes qui portent sur deux individus, des sleurs hermaphrodites et des sleurs unisexuelles.

La trioécie, qui est le dernier ordre, renferme les plantes qui ont des fleurs sur trois individus: des fleurs mâles, sur le premier; des fleurs femelles, sur le second; et des fleurs hermaphrodites, sur le troisieme.

Cette classe offre une aberration (81).

#### CLASSE XXIV. CRYPTOGAMIE.

La cryptogamie renferme quatre ordres, et quatre familles naturelles. Le premier ordre, comprend les fougeres (82); le second, les mousses (83); le troisieme, les algues (84); le quatrieme, les champignons (85). Cette classe est établie sur la seconde considération fondamentale du système sexuel, le peu d'apparence des sexes.

Schræber a suivi une route bien différente, et ajoute trois ordres de plus à la cryptogamie; il range dans le premier, les fougeres qui ont leurs fructifications en épis ou radicales, et les mousses qui n'ont point de coiffes ou d'opercules, et il les appelle miscellancæ; et forme deux ordres des algues, l'un sous le nom d'hepaticæ, et l'autre sous celui d'algæ.

<sup>(81)</sup> Acer rubrum, dioique.

<sup>(82)</sup> Filices, ord. nat. 64.

<sup>(83)</sup> Musci, ord. nat. 65.

<sup>(84)</sup> Algæ, ord. nat. 66.

<sup>(85)</sup> Fungi, ord. nat. 67.

Les familles naturelles, comprises dans les quatre ordres de la cryptogamie, sous le nom de plantes à fleurs invisibles ou cryptogames, fougeres, mousses, algues et champignons, se rapportent, dans les systèmes sur le fruit, à la 150 classe de Cæsalpin, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées privées de semences. Les fougeres, à la 17e famille de Morison, sous le nom de plantes herbacées capillaires, et les trois autres familles, à la 18e classe du même auteur, sous le nom de plantes herbacées hétéroclites. Ces quatre familles, aux 14e et 15e classes de Christ. Knaut, sous le nom de plantes herbacées, difficiles à distinguer et imparfaites. Ces fougeres, à la 20e classe d'Hermann, sous le nom de plantes herbacées apétales mousseuses. Ces quatre familles, aux quatre premieres classes de Boerhaave, sous le nom de plantes imparfaites privées de cotyledons et fleurs visibles, capillaires, terrestres et marines. Ces quatre familles, aux 23e, 24e, 25e et 26e classes de la 2e collection de la 1re série de Fabricius, sous le nom de plantes herbacées, à fleurs et fruits invisibles, acotyledones, fougeres, mousses, algues, champignons.

Dans les systèmes sur les corolles, les quatre familles de la cryptogamie se rapportent aux 160 et 170 classes de Tournefort, et à la 110 classe de Seguier, qui les désignent sous le nom de plantes herbacées apétales. Ces trois premieres familles, aux 190, 200 et 210 classes de Bergen, sous le nom de plantes ayant des parties analogues aux fleurs, et la dernière famille, à la 220 classe du même auteur, sous le nom de plantes sans fleurs. Les quatre familles, à la 170 classe de Durande, et

et à la 20° classe de Wernischeck, sous le nom de plantes à fleurs apétales, à fructification cachée. A la 18° classe de Rivin, sous le nom de plantes à fleurs imparfaites. A la 17° classe de Ruppius, sous le nom de plantes à fleurs imparfaites, privées de fleurs. A la 20° classe de Ludwig \*, sous le nom de plantes à fleurs imparfaites pulvérulentes. A la 18° classe de Ludwig \*\* et Boëhmer, sous le nom de plantes à fleurs nues. A la 17° classe d'Haller \*, sous le nom de plantes à fleurs invisibles ou cryptanthemes. Les fougeres, à la 20° classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs invisibles ou cryptanthemes. Les fougeres, à la 20° classe de Gattenhof, sous le nom de plantes à fleurs invisibles ou cryptogames.

Dans les systèmes sur le calice, les quatre familles de la cryptogamie se rapportent à la 1<sup>ro</sup> classe de Magnol, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées à calice externe, à fleur inconnue. A la 18° classe de Linné, sous le nom

de plantes à calice à coiffe, à fleurs nues.

Dans les systèmes sur les étamines, les quatre familles de la cryptogamie se rapportent à la 130 classe de Villars, qui les désigne sous le nom de plantes à étamines invisibles ou cryptogames. A la 190 classe de Gmelin, et à la 200 classe de Thunberg, sous le nom de plantes à fleurs invisibles ou cryptogames. Aux 50, 60, 70 et 80 classes de Gledistch, sous le nom de plantes à fructification cachée.

Dans les systèmes mixtes, les quatre familles de la cryptogamie se rapportent à la 12e classe d'Allioni, à la 4e série de Gilibert, qui les désignent sous le nom de plantes à fleurs invisibles ou

Dd

cryptogames. Aux six dernieres classes d'Haller\*\*\*, et aux trois premieres d'Haller \*\*, sous le nom de plantes à étamines et fleurs invisibles. A la 19° classe de Wachendorf, sous le nom de plantes à fleurs cachées ou invisibles. A la 11° classe de Crantz, sous le nom de plantes à florescence cachée.

Dans les systèmes par partition avec opposition d'attributs, les quatre familles de la cryptogamie se rapportent aux quatre premieres classes de Ray, qui les désigne sous le nom de plantes herbacées privées de bourgeons, parfaites et imparfaites. Aux 33°, 34°, 35° et 36° classes de Lamarck, sous le nom de plantes à fleurs indistinctes.

Dans les systèmes sur les feuilles, les quatre familles de la Cryptogamie se rapportent à différentes classes de Sauvages, qui les désigne sous le nom de plantes garnies de feuilles et dépourvues

de feuilles, etc.

Dans les systèmes naturels, les quatre familles de la cryptogamie se rapportent aux quatre premiers ordres de Gerard, Wulf et Guettard, aux quatre derniers ordres de Linné \*\*\*, qui les désignent sous le nom de fougeres, mousses, algues et champignons. Aux 2e, 3e, 4e, 5e et 58e familles d'Adanson, sous le nom de fougeres, mousses, fucus, hépatiques et champignons. Aux quatre familles de la 1re classe d'Oeder, sous le nom de plantes cryptantheres. Aux 2e, 35e et 36e classes de Scopoli, sous le nom de plantes privées de fleurs visibles. Aux 52e, 53e et 54e ordres de Necker, sous le nom de plantes à fructifications en globules, mousseuses et algues. A la 1re classe de Jussieu, sous le nom de plantes

sous le nom de plantes à étamines invisibles, à substance herbacée.

Il existe sept systèmes sur les différentes familles comprises dans la cryptogamie, savoir : 1.° celui de Linné, sur les fougeres; 2.° ceux de Dillen, Michelli, Seguier, sur les mousses; 3.° ceux de Dillen, Michelli, Gledistch, sur les champignons.

Linné divise les fougeres, 1.° par la forme, 2.° par la situation de la fructification, A en épi, B sur le dos des feuilles, C dans les racines.

Dillen divise les mousses par l'absence, la présence et la forme des têtes, de la coiffe, des fleurs, etc. Michelli, par la forme des fleurs, 1.° campaniformes éloignées du fruit, 2.° apétales nues, séparées du fruit. Seguier, divise les mousses, I.º en capitées, II.º non-capitées. Les capitées ont leurs semences 1.º rassemblées en têtes, A irrégulieres, molles et nues, B d'une seule piece, a à coiffe, b sans coiffe, aa assises, ab portées sur des pédicules naissant, \* aux aisselles des feuilles, \*\* au sommet des tiges, 2.° séparées des têtes; 1.º composées de quatre pieces A tubulées, B étalées, a velues, b non-velues, à semences cachées \* dans la partie externe des feuilles, \*\* dans les aisselles des écailles; 2.° d'une seule piece, A portées sur des pédicules, a à têtes à limbe très-découpé, b à têtes rassemblées en cônes, B sans pédicules, à têtes a à l'extrémité des feuilles, b aggrégées; 3.° à têtes terminées par une corne. Les mousses non-capitées ont les semences naissantes 1.° sur la superficie de la plante, telles sont les mousses A velues, B feuillées, C laciniées, 2.° sur les feuilles, A éparses, B réunies en forme de massue, a à une coque,

b à plusieurs coque. (Voyez tab. 97.)

Dillen divise les champignons 1.º en champignons pourvus de chapiteau et de pédicule, 2.º dépourvus de chapiteau et de pédicule. Les premiers, sont A lamelleux, B non-lamelleux, a à pores, b à piquans, c à fossettes; les seconds, sont Aà tiges, B sans tiges, a planes horizontaux, b concaves, c globuleux. (Voyez tab. 98.)

Michelli divise les champignons, 1.º en irréguliers à fleurs apétales à un seul filament séparé de la fleur, 2.º réguliers à un seul filament séparé de la fleur, 3.° à peine capités, à semences sur la superficie, 4.° très-simples, à semences

intérieures.

Gledistch divise les champignons par la fructification I°. apparente, II.º cachée. Dans les premiers, la fructification est 1.º dispersée et rassemblée à la superficie, dans les champignons A fibreux, B en massue, obtus, entiers, ou pointus et divisés, C plissés, concaves et de différente figure, 2° dans des réceptacles particuliers, dans les champignons en tête, A découpés supérieurement en réseaux, B inférieurement a tubulés, b lamelleux; dans ceux où la fructification n'est pas apparente, elle est 1.º cachée dans la cavité, 2.º dans la substance du corps de la plante, dans les champignons A campanulés, B en toupies, Carrondis. (Voyez tab. 99.)

## TABLE GÉNÉRALE

Des systèmes universels et partiels, rangés suivant l'ordre adopté dans cet Ouvrage.

			Sur	le fru	ait.	u »		ç	2		,		CASALPIN. MORTSON. CHRIST.KNAUT. HERMANN. BOERRHAVE. FABRICIUS. DUHAMEL. GERTNER.
								Sur	le no	mbre	des p	étales.	RIVIN. RUPPIUS. LUDWIG. * CHRET. KNAUT. HALLER. * LUDWIG. ** BOEHMER. GATTENHOF. GOUAN.
		Sur une seule partie de la fructification.	1	la co	rolle :			Sur	la fi	gute d	le la c	corolle	TOURNEFORT: PONTEDERA. SEGUIER. BERGEN. DURANDE.
	f	1.	1							mbre		livisio	WERNISCHER
	Artificiels.		Sur	le ca	lice.			ł.					SMAGNOL.
			Sur	les é	tamine	5.							LINNÉ.** THUNBERG! GMELIN. VILLARS.
Universels.		1	Sur	la s	ituation	a des	étam	ines.					GLEDITSCHI
		Sur toutes les parti de la fructificatio		*	•	:		:	:				HALLER. ** HALLER. ** WACHENDORF. ALLIONI. GILIBERT. CRANTZ. HILL.
		Par partition avec o	ppos	ition	d'attril	buts.	:					-	{RAY. LAMARCK:
		Sur les feuilles .		÷		,	7		*	,			SAUVAGES. DUHAMEL.
Systèmes	Naturels. 1	2 2 2 <b>5</b>	ī	111	7	ţ	*		c	7	ş		VAN-ROYEN. JUSSIEU. OEDER. SCOPOLI. ADANSON. GUETARD. NECKER. LINNE. ** GERARD. WULF.
		Sur les graminées.	:	2			;		*	:	:	ī	RAY. SCHEUCHZER. MICHELLI. LINNÉ.
		Sur les ombellifer	res.		2	;	i			Ť	-	:	MORISON. ARTEDI. CRANTZ. WILLARS.
Fartiels. 7	7 7 8 7 7	Sur les composées.			-		:		-	-	ř		PONTEDERA. VAILLANT.
		Sur les fougéres.				-		-				:	LINNÉ. ****
		Sur les mousses.						ï	100	-			DILLEN. MICHELLI SEGUIER.
		Sur les champigno	ns.	-	î	ž	141	ī	¥	160	*	3	DILLEN. MICHELLI, GLEDITSCH.



TABLE GÉNÉRALE du nombre des Classes, Sections, Ordres, Séries, Collections, Fascicules, Tribus, Familles, Centuries, Genres, et Especes, contenus dans les cinquante-un Systèmes universels, analysés dans cet Ouvrage.

cet Ouvra	80.										
N	omes	des Au	teurs.			Classes.	Sections.	Genres.	Especes		
DUHAMEL. VILLARS. CÆSALPIN. MAGNOL. CHRIST. KNAU	T.					4 13 15 15	27 44 47 55 60	195 551 595	eu variités. 1000 2700		
RUPPIUS. CHRET. KNAUT DURANDE. MORISON. RIVIN.	r				:	17 17 17 18 18	88 120 61 408 85	478 —	1984		
LINNÉ. * . LUDWIG. SEGUIER. TOURNEFORT HERMANN. PONTEDERA.						18 20 21 22 25 35	93 63 10 102 80	901 855 494 820 —	1200 11201 5600		
RAY. BOERRHAAVE.		:	:	:	:	37 33 34	123 99	795	18%5 6000		
						Classes.	Ordres.	Genres.	Especes.	- 1	
GLEDISTCH. SAUVAGES. ALLIONI. CRANTZ. JUSSIEU. HALLER. **						8 11 12 15 15 15	56 74 29 49 100 42	780 609 1212 1754 522	2619 2800 7440 2000		,
GOUAN. HALLER * LUDWIG. BOEHMER. HALLER * WACHENDORF						17 17 18 18 19	88 41 105 55 60 250	533 719 1288 372 506 1047	885 2486 3783		
GMELIN. GATTENHOF. WERNISCHECK THUNBERG. VAN-ROYEN. BERGEN. LINNÉ **						19 20 20 20 20 20 22 23	93 69 61 64 76 124 120	2039 636 1187 210 835 507 1450	16000 1709 810 2868 1174 9000		
						Classes.	Tribus.	Familles.	Ordres.	Genres.	Especes.
HILL. :	8	*			1	39	1 -	-	-	-	_
FABRICIUS.		,	,			Séries.	Collections.	Classes.	Ordres.	Genres. 851	Especes.
SCOPOLI				,		Tribus.	Familles.	Divisions.	Ordres.	Genres.	
						Stries.	Collections.	Fascicules.	Genres.	Especes.	
GILIBERT.	2	*	,			1 4	15	32	447	1207	
CUETTARD.	,		ž	7		Ordres.	Sections.	Genres. 278	Especes.		
LAMARCK			,			Classes.	Genres. 591	Especes.			
ADANSON. DUHAMEL	2 4	:	;	;		Familles.	Sections.	Genres. 1615 195			
9						Classes.	Familles.	Genres.			
OEDER	7	4	•	š	:	4	38	418			
GERARD. WULF.	1					Ordres. 63 55	Genres. 536 661	Especes. 1846 1219			
LINNÉ, *** ;	,	*	,	,	:	Ordress.	Genres. 936		1.		
NECKER. :	,	*	,			Getres principaux. 48	Genres secondaires. 1842				
GERTNER.	:					Centuries.	Genres.				



## CLEF du Système de Gærtner.

	Harly			6		HID
	1.º Acory- ledones.					
ı	1 1 1/4	N.	LRI	A 2 4	Située Levant l'embryon	
I	Part &	Fruit su-			derriere l'embryon	THE RESERVE OF THE PERSON AS A PROPERTY OF
H	II. & Mono- coryledo-	Embryon	Périphérique. Excentrique.	STEP SE	Située !	grantes (13
Ш	nes <		Central	. Radicule.		Learning
II	191 A	-	Supérieure.	NAME OF THE OWNER,	Supérieure.	The street but
H	NAME OF THE PARTY OF	férieur. <	Inférieure. Centripete.	Het place	Inférieure. Centripete,	ALDINA .
H	to Strong	Radicule	Centrifuge. Vague.		Centrifuge.	L'ADENT P
		- 10.00	ansar wou ha		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
Ш	T VILLE	Fruit in-	451013 611 61	C	dura salvania	
H		férieur.	Inférieure.	Uniloculaires.		
		Radicule	Descendante.	Exalbumineuses,		
li		A DACTOR	ner and b	Tri-multiloci	lairese	
П		Sec. And Sec.	Samuela v III		We are subject to	Maria P.
		0183	Supérieure.	Fruit divisé e	n deux parties, entier:	
ı	n Kerth	1	Ascendante.	Semences exc		
H	0 多的角	10000000	STE CITAT	Ambryon, dre	oit, courbé ou plissé.	
H	or a se		semences.	ruple à 4	hand of the	200
	III.º Dico-	Colones.	Constraint	Exalbumineus Embryon, dro		
1	tyledones.	Semicoco	Gentripete.	Albumineuses	, non ouvertes, divisées en un pore, coupées tout au t	deux parties.
		* CLASSON	Centrifuge.	o ourrain par	an pore, conpressions and	In action with
1	witness	parting 2	Vague.	ole, while	than HA Makes Le	-2000
	M Comple	in the party	Es anni Ce	Embryon droi	xalbumineuses. t, courbé.	
	sariskind.	Sinthera's	Inférieure. Descendante.	Di-poly carpes	, embryon droit , courbe.	droit , courbé.
		2	sapin	Albumineuses	, embryon droit , courbe.	Recines
						1.6
			1	Monocarpes	xalbumineuses, embryon, , embryon droit à semences	droit , courbé.
-			Supérieure.	drupe, à be	tie, ou courbé.	Brown and a state of the same
1			Ascendante.	stylifere , d	exalbumineuses, à récept semences nues, couvertes.	
	a isombin	Fruit su-	mea anh moi	Albumineuses ou plissé.	, embryon droit , de la longue	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
	in his	Radicule	aluse seule	sidmon:		sonsonid on 4
	d charge. I	3,461	I ab setus!	(	uniloculaires, albumijieuses	s we albumineuses
	te realist	b igo s	ال الله الح والما	Biloculaires ,	à réceptacle libre, sessile, droit, courbé:	
54	o kytinalo.	zun . o	Centripote. <	Tri-quadrilo	culaires, à embryon droit,	
H	o melesin	Whansh ;	Marylin alo		s'exalbuminenses, albuminer valves, à embryon, long,	
1	to top en	slo or g	sh temak	aus sim	ggat by elevation	Serie I a minoida
	10173	Unit of the	Gentrifuge		ues, couvertes, attachées au	dissepiment à la suture.
	STOKE LA		, numerinos	au des , au		A sement
1	IV. Poly-	dans etta	Vague,	nee stacks	legas decelo se al	Jasinisana lina
	coryledo	dants car	sulg no , or	the To cla	toom's Tup to liver	cont Si soi o mark
1	ngs.	di amah a	byoni face	inp .ors	sandilled all sure	I wil with an

## CLEF DU SYSTÊME DE CÆSALPIN.

		approximation		
7	1,70			Managed Contrasts - Managed
I.	Arbres			
	et		Vennske-7	
	Arbris-		à cœurcelet placé	A Ausommet de la semence. 1.
	seaux.		- Antigraph	B A la base de la semence. 2.
Plantes sont des	1.	Semences distribuées dans cha- que fleur, d'après le principe +	B Double	à une semence 3.  à un péricarpe charnu, renfermant plusieurs semences. 4.  à une capsule 5.  à deux semences 6.  à capsules à 2 loges 7.  à capsules à 3 loges non - bulbeuses 8.  bulbeuses 9.
Les			D Quadruple à 4	semences
II.	Sous-	en uhuleis Van toor uiv	E Multiple	à plusieurs semences nues sur le placenta 11, 12, à plusieurs semences nues
	seaux et Herbes	A large of the control of the contro	Allegan actions and a second action of a second act	dans chaque fleur 13.  à plusieurs capsules polysper- mes 14.
6 18	. Mains a tient	Privées	de semences.	

<sup>+</sup> Le principe simple n'est que la considération des semences, péricarpes et capsules solitaires, c'est-à-dire, au nombre d'une seule semence, d'un seul péricarpe, ou d'une seule capsule dans les plantes de la 3, 4 et 5 classe. Le principe double, s'applique aux plantes de la 6 et 7 classe qui ont deux semences ou une capsule à deux loges: le principe triple, aux plantes de la 8 et 9 classe dont les capsules offrent trois divisions dans l'intérieur du fruit. Le principe quadruple se rapporte aux plantes de la 10 classe qui onte 4 semences, telles sont les labiées: le principe multiple, à celles qui onte plusieurs semences nues dans un réceptacle commun, comme les composées qui constituent la 11 classe, ou plusieurs semences nues dans chaque fleur, comme les Ranonculées qui forment la 13 classe, ou plusieurs capsules polyspermes dans les Pavots, les hellébores, etc., qui sont rangés dans la 14 classe.

Des Classes, Sections de CÆSALPIN, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	FAMILLES.	CLASSES.	SECTIONS.	Noms sous lesquels cet auteur les
	1 Graminées.	3.	5.	a désignées.  Plantes herbacées à semences so-
	E Grammees.			litaires.
直	2 Rubiacées.	- 7 .	To be	Pl. herbacées à deux conceptacles.
	3 Aggrégées.	12	4	Pl. herbacées à plusieurs semences.
	4 Borraginées:	10	T	Pl. herbacées à quatre semences nues dans un réceptacle commun.
100	5 Ombelliferes.	6	Sous - Ath	Pl. herbacées à deux semences.
	6 Liliacées.	9	20	Pl. herbacées à triple principe,
				bulbeuses.
	7 Caryophyllees.		2	Pl. herbacées à capsules solitaires.
A	8 Arbres fruitiers	I .	Gristpance	Arbres à occurcelet au sommet de la semence.
100	9 Ranonculées.	13-14	J-1.2	Pl. herbacées à plusieurs semences
	y minority of the state of the		Tanta Same	à fleur commune 25 and
I	o Labiées.	10	Silipenses	Pl. herbacées à quatre semences
71	7	A Laboratory	1,2,3-	nues dans un réceptacle commun.
	I Personnées	7	day Soly y	Pl. herbacées à deux conceptacles.
	2 Cruciféres. 3 Malvacées.	13-14	3.	Pl. herbacées à deux conceptacles.
-	J. T.	10 14	2 1,2	Pl. herbacées à plusieurs se-
I	4 Légumineuses.	2-5	4-1	Arbres à cœurcelet à la base de la
	To the	cia di migreta	Laistinger	semence, dont le fruit s'étend
S.			Bill to N	longitudinalement en forme de
To the			22.5 Etuyar	silique: pl. herbacées à capsules
ĝ.		1 100	Ondellife	solitaires, dont le fruit est lé- gumineux.
I	5 Composées.	11: 12:	-	Pl. herbacées à plusieurs se-
	- Spaninensee	TOTAL STATE	DOS 310 11 11	mences, anthemides, chicora-
10	6 Orchidees.	פנ כים מווזכו	En casque	cées, acanacées.
1	o Oremdees.	9		Pl. herbacées à triple principe,
1	7 Coniféres.	2	8	Arbres à cœurcelet à la base de la
	B. Gridelike was	15	and the same	semence.
)I	8 Cucurhitacées	4	Total Tent	Pl. herbacées à péricarpes soli-
7	9 Fougéres.	1 1 -	and the same	taires.
	o Mousses.	15	1 2	DI La Caracteria
2	I Algues:	15	3 3	Pl. herbacées privées de se-
2	2 Champignons.	15.	4	The state of the s
	Contract Contract			

## CLEF DU SYSTÈME

# DE MORISON.

CLICARIA SECTIONS, NOMS sons lesquell out

ece o femencies in-	present spinsty	J Graminees. 3 5
deug conceptuation.	St. Reillacies	Arbres.
a dragge temendent	Ligneuses.	Arbrisseaux. 2
réceptacie commun.	pace dinie un Pl. herbegiens	Sous - Arbrisseaux. 3
in eriple principe's	Pl. herbuckes	to Lineocos, E. Company of the
gailatiles salusins	Pl. herbackerid	Caryophyllies. 5. 2
The state of the s	reansmore of	Grimpantes. 4
Les plantes sont	Pl. herbackesa a flew come	Légumineuses.
t queere emiraces	Pl. herhardes	Siliqueuses. or
con room optacles.	appeared that	à trois capsules. 7
de musicurs se	Ele herbacces	à plusieurs capsules 8
A Stationer de	mences.	Corymbiferes 9
on le fruit s'étend	A STANSON	Laiteuses ou à aigrettes 10
II.	Herbacées.	Culmiferes
alizer majalizaci	Annual Indiana	Ombelliferes
a pinglars se	Ti. nerometer	à trois coques
event on Name	Profess and	En casque et en anneau 14
edit grapares de la	chinostecano	à plusieurs siliques et capsules.
à portages sell-	semence.	Bacciferes.
The sale common a	. taires.	Capillaires: 17
griffes de se	PL Merbacies	Hétéroslites. 18

Des Classes, Sections de MORISON, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	portone	too your	o around	A ROBERT SHOP IN
	FAMILLES.	CLASSES.	SECTIONS	Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.
	I Graminées.	II	1,2,3,4,7	Plantes herbacées culmiferes.
	2 Rubiacées.	12	10	Pl. herbacées ombelliferes tetrape- taloides.
	3 Aggrégées.	9—10	5-4	Pl. herbacées corymbiféres étoilées et capitées.
	4 Borraginées.	14	6	Pl. herbacées monopétales à 4 se- mences, asperiseuilles.
	5 Ombelliferes.	12		Pl. herbacées ombelliferes.
	6 Liliacées.	7	- 7 / 7 -	Pl. herbacées hexapétales tricapsu- laires.
	7 Caryophyllées.	8	7	Pl. herbacées émollientes unicapsu- laires.
8	Arbres fruitiers.	1	4,5	Arbres pruniferes et pomiferes.
(	Ranonculées.	7-15	6—r	Pl. herbacées hexapétales à se-
	isterapotalis	9 .		mences nues, et pl. herbacées multisiliqueuses.
1	ro Labiées.	14	1,2,3—	Pl. herbacées à fleurs en casques et
0	Pentaph alex.			en verticilles, monopétales à 4 semences.
The same	11 Personnées.	8-14	1, 2, 3, 4	Pl. herbacées à trois et deux capsu-
	and the same of th		- 1 -	les à fleurs monopétales et pen- tapétales : pl. herbacées à fleurs
E	Topo Milato I			en casque à plusieurs semences.
1	12 Cruciferes.	6	1,3,7	Pl. herbacees siliqueuses, tetrapé- tales bicapsulaires et bivalves.
9	13 Malvacées.	8	_ 6	Pl. herbacées émollientes pentapé-
	a som			tales à plusieurs semences en roue.
	14 Légumineuses.	2-5	-4	Arbrisseaux à fleurs légumineuses,
ó	Radices, . 1	ai rettes	sure soon	et pl. herbacées siliqueuses papil- lonacées bivalves.
	15 Composées.	9,10	rgio-	Pl. herbacées corymbiferes, lai-
	16 Orchidées.	15	2	Pl. herbacées multicapsulaires.
	17 Coniferes.	I	1	Arbres coniferes.
	18 Cucurbitacées.	4	-	Pl. herbacées grimpantes bacciferes
i de	19 Fougéres.	17		et pomiferes. Pl. herbacées capillaires.
	20 Mousses.	17	8 6	1. herbaces capitalites.
	21 Algues.	18		Pl. herbacées hétéroclites,
	22 Champignons:	18	}	

## CLEF DU SYSTÈME

#### DE CHRIST. KNAUT.

-A	17.34	119	WO STILLOW THE SHIP	Des Classes, Notice							
I.	Herb	acées	t-dense Landles and								
tol	111101	acce.	The state of the s								
			alleb a								
-3-03	1.	Aya	Ayant des pétales, et produisant des fleurs,								
			. which is								
27	ghis as	I.	Simples dont le fruit est	5 Amrégées: 9-16							
			and the same of th								
		-11-11	A Revêtu d'un péricarpe	Borraginasis.							
			THE MINISTER STREET COME	Combelliforde '12							
			Change NA A	Davidone Davidone	1						
			b Membraneux (* Si	ucculent Bacciferes	E						
-11	min	10183	etu	nicapsulaire Monopétales.	2						
			C								
			The state of the s	tétrapétales rég	3						
ont			S. dan enmark	and the same	-						
S			And the state of t	tétrapétales	10						
nte	,		The state of the s	irrég	4						
Les Plantes sont	8		A STATE OF THE STA	Pentapétales.	5						
es ]	-	1100	TO SEA SEA AND LONG TO THE	Personnics. State	-						
H			and the state of the state of the	Héxapétales.	6						
7.00				Polypétales.	7						
- 30					-						
		1 43		Composé. Multicapsu- laires.	0						
-19			B Nu sans péricarpe.	laires Gymnodisper-	100						
		4	t	mes	91						
100	-	-			-						
-		2.	Composées à semences *sans	aigrettes. [Radiées	IO						
				ettées. \ Sémiflosculeu-							
			The second of th	e ses	II						
	2.	N'ay	ant point de pétales.	(Apétales	12						
				A étamines.	13						
199			. The second second	Invisibles.	14						
TI			to the state of the same	The Table of the Control of the Cont							
11.	Lign	euses			16.						
	- 3			Arbrisseaux.	17						

144		22	-	200
	A	B		E

Tab. 9.

Des Classes, Sections de CHRIST. KNAUT où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes. CLASSES. SECTIONS. NOMS sous lesquels cet auteur les a FAMILLES. désignées. Plantes herbacées apétales à éta-3 13 I Graminées. mines culmiferes. 3 Pl. herb. à fleurs pétalées simples 2 Rubiacées. 9 à deux semences nues, étoilées. 3 Aggrégées. 3 Pl. herb. afleurs pétalées composées IO a semenc. solides ou sans aigrettes. Pl. herb. à fleurs pétalées simples 4 Borraginées. 4 9 à 4 semences nues, aspérifeuilles. Pl. herb. à fleurs pétalées simples 5 Ombelliferes. 9 à 2 semences nues ombellées. 6 Liliacées. Pl. herb. à fleurs pétalées simples 6 I à péricarpemembraneux simple et unicapsulaire, hexapétales. 7 Caryophyllées. 5 Pl. herb. à fleurs pétalées simples à 2 péricarpe membraneux simple et unicapsulaire, pentapétales. 8 Arbres fruitiers. Arbres pomiféres et bacciferes. 16 I, 2 2, 4-6 Pl. herb. à fleurs pétalées simples, 9 Ranonculées. 8--9 à péricarpe membraneux composé, multicapsulaires, à semences nues, gymnospermes simples. to Labiées. Pl. herb. à fleurs pétalées simples 5 9 à 4 semences, nues, verticillées. II Personnées. Pl. herb. à fleurs pétalées simples, 2 1,2 à péricar pe membraneux simple et unicapsulaire, monopétales. 3 12 Cruciféres. 2, 3, 4 Pl.herb. àfleurs pétalées simples, à pericarpe membraneux simple et unicapsul. tetrapétales régulieres. 3 Malvacées. Pl. herb. à fleurs pétalées simples 9 6 à semences nues. Pl. herb. à fleurs pétalées simples à 14 Légumineuses. 4 1,2,3,4, péricarpe membraneux simple et 5,6 unicapsulaire, tetrapétales irrégulieres papillonacées. 5 Composées. 10-11 1,2-1,2,3 Pl. herb. à fleurs pétalées composées à semences solides ou sans aigrettes et à aigrettes. 66 Orchidées. Pl. herb. à fleurs pétalées simples, 6 à péricarpe membraneux simple et unicapsulaire, hexapétales. 7 Coniféres. 16 3 Arbres coniféres. 8 Cucurbitacées. Pl. herb. à fleurs pétalées simples 2 à péricarpe charnu ou à baie. 9 Fougéres. Pl.herb. apét. disficiles à distinguer. 14 o Mousses. 15 Pl. herb. apétales imparfaites. I Algues. 14 Pl.herb.apet.dissiciles à distinguer. 2 Champignons. CI Pl. herb. apétales imparfaites.

## CLEF DU SYSTEME

#### D'HERMANN.

T	CII.	Les	vés	étaux sont distingués en	Old Control		
1.	A	Pet	alée	portent des fleurs : elles sont, ou	6 - 400		
- 1		100	Gyi	mospermes, à semences A nues, se	sans péricarpe;		
			- AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PERSO	fleur solitaire * Simple Gyn	mnomono-spermes	simples composées .	3
		A PC BACKET	B	deux semences * Monopétale Eto	oilées .		5 2
1			C	4 semences avec les feuilles		-decorate	-
-				* alternes Bor	rraginnées		6
		20	DC	plusieurs semences Gyr iospermes lorsque les semences	mnopolyspermes .	A TANK	7
			SC	nt renfermées dans un péricarpe.	2000	шодовин	
			- 1	(Membraneux,			
				1. (Simple, formé par une			
				membrane commune, qui est une			
3	1			a Capsule, avec une ra-			
1				cine * (Bulbeuse Tri	icapsulaires.	Annous	16
				** Non-bulbeuse, le		application of	1
		and and		fruit intérieure-			
				Loges *(nulles. Uni	ivasculaires .	The state of	8
				Au nom- ** deux Biv	vasculaires.	No.	9
. 2		-		*** trois Tri	ivasculaires.		10
		3		cinq Qui	inquevasculaires.	The same of the sa	11
				b Silique Sili	iqueuses		
				c Gousse Lég 2. Composé Mu			13
			. 7	Land and a Colonia Colonia	Bacciféres		17
		2 11	1	# ( Parmii	Pomiferes	gsoriu ers	18
13	В	Apé	etale		étales :	. "	19
		1		be Une balle deto	amines ousses	The same	21
II.	Ar	bres,	qui	ont une fleur	ousses	2000	
		Apéta		ont le fruit est	chatons	Confedence	22
200	10/1	as	Cha	nu * Couronné par le calice d fr	ruit ombiliqué .	September 1	23
	516	2		** Soutenu par le calice. Non	n-ombiliqué .	emagnoti	20
18	1200	29	Sac	Af	fruit sec	acide malay	20

Des Classes, Sections du Système d'HERMANN, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

FAMILLES.	CLASSES.	SECTIONS.	Noms sous lesquels cet auteur les a
I Graminées.	21	emphalens T	Plantes herbacées apétales stami-
1 Grammees.	The state of the s		nées culmiferes.
2 Rubiacées.	5	5	Pl. herb. pétalées à 2 semences
F + 1'1'	,	des oh se a	nues, à fleur monopétale, étoilées.
3 Aggrégées.	4	-horse sells	Pl. herb. pétalées, à fleur solitaire composée, à une semence nue.
4 Borraginées.	6	-	Pl. herb. pétalées à 4 semenc. nues,
A Special of the tent	remepologomer	de de	à feuilles alternes, aspérifeuilles.
5 Ombelliferes.	2	1,.2	Pl. herb. pétalées à 2 semenc. nues,
6 Liliacées.	16	1, 2	à fleur pentapétale ombellée. Pl. herb. pétalées à semenc renfer-
C Printed and the control of the con	mesquis-mala	5	mées dans un péricarpe membra-
eropes singe le	TROPIC REPORTED	Simile	neux à capsule, à racine bulbeuse.
7 Garyophyllées.	8	oser]	Pl. herb. pétalées à semences ren-
e	Sections - Digital	Seed . G	fermées dans une capsule sans loges, univasculaires.
8 Arbres fruitiers	s. 23 — 24	2-2	Arbres à fleurs pétalées , à fruit
To	iangira	in a logos .	charnu couronné ou soutenu par
o Panahaulfor	13- 1	T des Tal	le calice.
9 Ranonculées.	13 - L	Parloges. T.	Pl. herb. pétalées à semenc. renfer- mées dans un péricarpe composé, à
Of the second second		A siogois P	plusieurs sentences nues.
to Labiées.	7	1,2,3,4	Pl. herb. pétalées à 4 semenc. nues ,
11 Personnées.	manpillaplic	to \$ gillon	à feuilles opposées verticillées.
11 Personnees.	9	1, 2	Pl. herb. pétalées à semenc. renfer- mées dans une capsule à 2 loges.
12 Cruciferes	14	4,5,6	Pl. herb. pétalées à semenc. ren-
EL	taturonili		fermées dans un péricarpe simple
13 Malvagées.		and and the	à silique.
13 Maryagees.	tra states or	Tain 2	Pl. herb. pétalées à plusieurs se-
14 Légumineuses.	15	1,2	Pl. herb. pétalées à semences ren-
As Criculture.	anger promise	AT THE	fermées dans un péricarpesimple,
15 Composées.		1.331	a gousse.
15 Composees.	4	5,6	Pl. herb. pétalées à fleur solitaire composée, à une semence nue.
16 Orchidées.	16	6	Pl. herb. pétalées, à semences ren-
Ke . Sammadae sa	countile one	107 012	fermées dans un péricarpe mem-
17 Coniféres.	22	2	braneux simple à capsule.
2) Commozon	to no other	4	Arbres coniféres résiniferes. Pl. herb. pétalées à semences ren-
18 Cucurbitacées	· 18	i	fermées dans un péricarpe charnu.
19 Fougéres.	20	1, 3	Pl. herb, apétales, mousseuses.
20 Mousses. 21 Algues.	Later Contract		on the property of the propert
22 Champignons		-	5

## CLEF du Système de BOERHAAVE.


0	Les vegetaux sont ou	
1.	Des plantes imparfaites, privées de cotyledons	
1	et de fleurs.	
	Lythophytes et algues	Y
2	Mousses et champignons Terrestres .	2
	Fougeres	3
-	Ou des herbes, pourvues de fleurs et de co-	
3	tyledons, dont les semences,	
	CDicotyledones, ont deux feuilles semi-	
	nales, et sont pourvues de	
7	A Pétales et de semences	
-	1 (Nues Ca En grand nombre. Gymnopolyspermes . : :	4
5	b Au nomb. de quatre Gymno-tetraspermes , verticillées.	12
	Gymno-tetraspermes aspérifeuilles.	
	Gymno-tetraspermes tetrapétales.	14
	De deux. Gymno-dispermes ombelliferes .	5
	Gymno-dispermes étoilées	11
	afleur * (Simple Gymno-monospermes simples .	6
	C d Solitaires ** Compo-Gymno-monospermes planipétales	1000
	see Gymno-monospermes radiees .	78
-	Gymno-monospermes nues	9
	Gymno-monospermes capitées .	10
- 1	2 Convertes (a Capsule (*Simple (à une toge. Monangies	75
ı,	C par une	
	à 2 loges. Diangies	16
- 8	3 a 3 loges. Triangies.	17
3	State Submissing the firmand on but the Franch Pro- Franch CT Senaturation and	5.77
1	à 4 loges. Tetrangies : .	18
	à 5 loges. Pentangies	19
		. 4
8	aplus.loges. Polyangies	20.
	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	
-1	** Composée Multisiliqueuses	21
- 1	Dans les plantes dont	
- 8	b Silique. la fleur n'est pas cru-	
- 8	ciforme.	
- 8	Siliqueuses	22
-1	4 300 000	
-	Dans les plantes dont	23
1	laffeur est cruciforme. Tetrapetales cruciformes	
9	Gousse Légumineuses	24
-	d Baie Bacciferes	25
ě	The state of the s	
100	Ce Pomme Pommiferes	26
- 1	. Be Ou dépourvues de pétales Apétales	27
3	Monocotyledones ont les Ca Pétalée Monocotyledones à bractées .	28
- 5	feuilles "	
- 4	Séminales solitaires, et S	00
- 1	la fleur bApetale Monocotyledones Apetales .	29
- 1		
0	Des arbres qui sont agalement	
10	Des arbres qui sont également	
	A ( Monocotyle- dones	30
	B Dicotyledo-Ca Apétale (* Simple. Arbres apétales	31
	nes à sleur   à calice   ** Imbrique. A minet ou à chatons. :	32
	b Pétalée (* Monopétale. Monopétales	33
	Cortained Monopetaie.	
	* Polypotale. Rosacies	34
	Tory bongree Treesman	1

Des Classes, Sections du Système de BOERHAAVE, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

ou se suppo		I O d A L A U
Familles.	Classes.	Sections. Noms sous lesquels cet Auteur les a désignées.
3 Graminées.	29	1, 2 Plantes herbacées monocotyledones apétales culmiféres.
2 Rubiacées.	11.	Pl. herb. dicotyledones à 2 semences nues, étoilées.
3 Aggrégées.	10	1 Pl. herb. dicotyledones pétalées, à une semence que à fleur composée en tête.
4 Borraginées.	13.	Pl. herb. dicotylédones pétalées à 4 semences nues aspé- rifeuilles.
5 Ombelliferes.	5	- Pl. herb. dicotyledones pétalées à a semences nues, om-
6 Liliacees.	28	1.2, 4, 5 Pl. herb. monocotyledones pétalées à bractées.
7 Caryophyllees.	15	2 Pl. herb. dicotyledones pétalées , à semences renfermées
observation of a transport		dans une capsule simple à une loge.
8 Arbres fruitiers.	34	6, 7 Arbres dicotyledones à fleur pétalée polypétale rosacée.
9 Ranonculées.	4, 21-	nues: à semences enfermées dans une capsule com-
		posée, multisiliqueuses
to Labiées.	13	1, 2, 3 Pl. herb. dicotyledones pétalées à 4 semences nues.
11 Personnées	16	3. Pl. herb. dicotyledones pétalées à semences renfermées
Pi I disonneces	400	dans une capsule simple à 2 loges.
12 Cruciféres.	23	1, 2, 3, 4, Pl. herb. dicotyledones pétalées, à semences renfermées
of spinites as a series		5, 6 dans une silique, sérrapétales cruciformes siliqueuses
13 Malvacées.	30	Pl. herb. dicotyledones pétalées à semences renfermées dans une capsule à plusieurs loges.
, 7	,	
r4 Légumineuses.	24	1, 2, 3, 4, Pl. herb. dieotyledones pétalées, à semences renfermées. 5, 6 dans une gousse, légumineuses.
16 Composées.	7, 8, 9, 10	Pl. herb. dicatyledones pétalées à une semunoe nue , & :
100	displayed to	fleur composée: 1.9 planipétales, 2.9 discissores ra- diées, 3.9 discissores nues, 4.9 en tête.
-(O-1111	-0	Pl. herb. monocotyledones pétalées à bractées.
16 Orchidées.	28	3. Arbres dicoryledones à fleurs apétales à calice à chatons
17 Coniféres.	32	amentacées.
18 Cucurbitacées.	26	Pl. herb. dicotyledones pétalées, à semences renfermées.
19 Fougéres	3	Pl. imparfaites privées de cotyledons et de fleurs visibles ;
20 Mousses.	2	3 Pl. imparfaites privées de cotyledones et de fleurs vi-
21 Algues	2-1	2-3 Pl. impurfuites privees de coryledons et de fleurs vi-
anguos.	A Start	sibles, marines et terrostres
22 Champignous:	2	Pl. imperfeiter privées de cotyleilons es de fleurs vin-
	4.	sibles , terrestres;_

### CLEF DU SYSTEME

#### DE FABRICIUS.



#### Tab. 15.

# TABLE des Séries, Collections, Classes, Ordres de Fabricius, où se rapportent les 22 Familles suivantes.

			,,			TELEVISION OF MARKA
	Familles.	Séries	Collections.	Classes.	Ordres.	Noms sous lesquels cet Auteur les a désignées.
2	1 Graminées.	1	2	22	1	Plantes herbacées à fleurs et fruits visibles po- lycosyledones graminées.
	a Rubiacées.	1	2	2	1, 2	Pl. herb. à fleurs et fruits visibles polycotyle- dones gymnodispermes rubiacées ou étoilées.
	3. Aggrégées.	1	2	13	1	Pl. herb. à fleurs et fruits visibles polycotyle- dones gymnospermes à fleurs aggrégées.
8	4 Borraginées.	1	2	6	-	Pl. herb. à fleurs et fruits visibles polycotyle- dones gymnotetraspermes à fleur monopé- tale, ordinairement à 5 divisions, aspéri-
	5 Ombelliferes.	1	2	3	(Fig.	feuilles. Pl. herb. à fleurs et fruits visibles polycotyle- dones gymnodispermes ombelliferes.
	6 Liliacées.	1	1	1	1,3,4	Pl. herb. à fleurs et fruits visibles monocotyle- dones angiospermes bulbeuses.
	7 Caryophillées.	r	2	14	7	Pl. herb. à fleurs et fruits visibles polycotyle- dones angiospermes vasculiferes séches.
	8 Arbres fruitiers.	2	-	29 30	4	Arbres polycotyledones bacciferes et pomi- feres.
	9 Ranoneulées.	1	2	9	_	Pl. herb. à fleurs et fruies visibles polycotyle- dones gymnopolyspermes.
1	ao Labiées.	1	2	7	100	Pl. herb. à fleurs et fruits visibles polycotyle- dones gymnotetraspermes labiées verticil- lées à fleur en gueule ordinairement irré-
1	ti Personnées.	1	4	14	11	gulière.  Pl. herb. à fleurs et fruits visibles polycotyle- dones angiospermes unicapsulaires, bilocu- laires à fleur monopétale irrégulière à 4
1	2 Cruciferes.	1	2 TP.	16 1,	2,3,4	divisions.  Pl. herb. à fleurs et fruits visibles polycosyle- dones tetrapétales siliqueuses ou cruciferes.
1	3 Malvacées.	1	2	15	6	Pl. herb. à fleurs et fruits visibles polycotyle- dones multicapsulaires.
1	4 Légumineuses.	12	4	17 — 31	2	Pl. herb. à fleurs et fruits visibles polycotyle- dones légumineuses à fleurs papillionacées :
1	5 Composées.	1	a 1	13	-	arbres polycotyledones à fleurs tetrapétales irrégulières.  Pl. herb. à fleurs et fruies visibles polycotyle-dones gymnospermes à fleurs composées planipétales ou semiflosculeuses, radiées, nues discoides ou flosculeuses, capitées.
2	6 Orchidées.	1	1	1	6	Pl. herb. à fleurs et fruits visibles monocotylé- dones angiospermes bulbeuses, orchidées.
3	7 Coniferes.	2	- 10 m	34	196976 196976	Arbres polycotyledones à fleurs staminées, coniféres.
1	8 Cucurbitacées.	1	2	20	-	Pl. herb. à fleurs et fruits visibles polycotyle- dones cucuméracées ou cucurbitacées.
1	Pougéres.	7	string of the	23	trick's	Plantes herbacees à fleurs et fruits invisibles acotyledones fougeres.
30	Mousses.	1	2	24	_	Pl. herb. à fleurs et fruits invisibles acotyle- dones, mousses.
31	Algues.	1	2	25		Pl. herb. à fleurs et fruits invisibles acotyle- dones, algues.
22	Champignons.	1	1 2	26		Pl. herb. à fleurs et fruits invisibles acotyles dones, champignons.

#### CLEF du Système de Duhamel.

I re

Arbres et Arbustes qui portent des fruits secs , et qui contiennent un nombre de se-Famille A. Imences sous des écailles, ou dans des alvéoles, ou ceux dont les semences nues sont rassemblées en masse.

SECTIONS.

1 Fruits écailleux qu'on nomme cônes.

a Fruits composés de capsules rassemblées en forme de cônes. 3 Fruits dontles semences sont reçues dans des alvéoles.

4 Fruits dont les semences rassemblées en masse, forment par leur extremite des écailles.

5 Fruits dont les semences rassemblées en masse forment des spheres.

Arbres et Arbustes qui portent des fruits plus ou moins charnus, Famille B. \ avec des semences recouvertes d'une enveloppe cuirassée, nommees pepins.

1 Fruits à pepin , qui ont beaucoup de chair succulente.

2 Fruits dont l'enveloppe est charme, mais peu succulente, presque seche, et qu'on nomme brou.

3 Fruits dont les pepins sont simplement enchasses dans le brou. 4 Fruits à pepin , succulents ou non , qui renferment beaucoup de semences dans une ou plusieurs cavités.

Famille C.

Arbres et Arbustes
qui portent des fruits i noyau qui sont charms et succulents.

à noyau ou dont l'a
a Fruits à noyau, et dont le noyau contient des amandes.

3 Fruits dont le noyau est simplement recouvert d'un brou.

4 Fruits dont le noyau est simplement enchassé dans le brou-(gneuse.

Famille D.

Arbres et Arbustes qui portent de petits fruits charnus, succulents ou non , que l'on nomme baies : suivant les genres elles renferment plus ou moins de semences.

1 Baies succulentes qui renferment une semence.

2 Baies succulentes dont le noyau est simplement enchassé dans la cheir. 3 Baies succulentes qui renfermeut un noyau et cinq amandes.

4 Baies seches ou peu charnues qui renferment une semence. 5 Baies succulentes charmes ou séches, qui renferment deux semences.

6 Baies charmes succulentes ou séches , qui renferment trois semences.

7 Baies charnues succulentes ou séches , quirenferment guatre semences.

8 Baies charnues succulentes ou séches, qui renferment cinq semences.

9 Baies charnues succulentes ou non , qui contiennent plus de cinq semenc.

Arbres et Arbustes qui portent leurs semences dans des capsules épaisses ou membraneuses , divisées suivant les genres en plus ou moins de ca-Cyités.

1 Capsule à une cavité, et une semence. 2 Capsule membreneuse à une cavité, et une semence. 3 Capsule à une cavité, avec quantité de semences.

4 Deux capsules reunies, une cavité, une semence dans chacune.

Deux capsules reunies, une cavité, plusieurs semences dans chacune.

6 Deux capsules à deux cavités, deux semences.

7 Capsules à trois cavités, trois semences.

8 Capsules à trois cavités, six semences.
9 Capsules à trois cavités, quantité de semences.

10 Capsules à quatre ou cinq cavités, quatre ou cinq semences.

11 Capsules à quatre cavités, beaucoup de semences.

12 Capsules à cinq cavités, une semence, parce que les autres avortent.

13 Capsules à cinq cavités, cinq semences. 14 Capsules à cinq cavités, quantité de semences.

15 Capsules à un nombre indéterminé de cavités , beaucoup de semences.

Famille F.

Arbres et Arbustes 1 Silicules sans claison, qui renferment une semence.
ni portent leurs se- 2 Silicules sans claison, qui renferment trois ou quatre semences.
nences dans des es- 3 Silicules sans cloison, et qui sont comprimées entre chaque semenc. qui portent leurs se-mences dans des es-peces de gaules qu'on nomme siliques : lorsqu'elles sont courtes ; on les nomme silicu-

4 Siliques sans cloison, et dans lesquelles il n'y a point de pulpes.

5 Siliques sans clotton , dont les semences sont retenues dans une pulpe. 6 Siliques qui ont une cloison qui les divise en deux suivant leur longueur\_

7 Fruits qui approchent de la forme des siliques , et qui n'en ont point exactement le caractere.

Arbres et Arbustes 1 Semences nues et sans aucune enveloppe.

qui postent leurs se- 2 Semences enveloppées par un calice particulier.

3 Quatre semences enveloppées par le calice com Famillo G. < mences nues, ou qui 3 Quatre semences enveloppées par le calice commun.

d'ont pour enveloppe 4 Cinq semences enveloppées par un calice commun.

d'une le calice ou le pe- 5 Nombre indéterminé de semences, enveloppées par un calice commun.

tale.

#### CLEF du Système de Duhamel.

Longues et étroites. Arbres et Arbustes qui ont leurs feuilles Courtes , étroites , piquantes , on non pifort etroites. . . quantes. Presque pas apparentes et comme articulées les unes avec les autres , ou areienlers sur les branches. 2. Arbres et Arbustes qui ont leurs feuilles Alongées, opposées non dentelées. ovales, et fort alon-Alongées, alsernes, non densclées. Arbres et Arbustes qui ont leurs Alongées, opposées, dentelees. Classe. feuilles simples et Alongées, alternes, dentelees. des découpures. 3. Arbres et Arbustes Ovales, opposées, point dentelées. qui ont leurs feuilles ovales et assez lar-Ovales alternes point dentelees. Ovales, opposées dentelées. Ovales , alternes , dentelees. Arbres et Arbustes qui ont leurs feuilles arrondies, larges du Opposées , point dentelées. côté de la queue, où elles forment une espece de cœur, et terminées en pointes. . Alternes non denteless. Alternes dentelées. 2.0 Découpées, opposées, non dentelees. Classe. Arbres et Arbustes qui ont leurs feuilles Découpées, alternes, non dentelers. simples et découpées assez profondément. Découpées, opposées, dentelées. Découpées, alternes dentelées. 30 Conjugées , opposées , folioles non dentelèer. Arbres et Arbustes qui ont leurs feuilles Conjugées, alternes, folioles non dencelées. composées et empanées, ou conjugées. Conjugées, opposées, folioles dentelees. Conjugées , alternes , folioles dentelées. Palmées, opposées point dentelées. (Classe. ) Arbres et Arbustes qui ont leurs feuilles Palmées, alternes, point dentelées. composées et palmées, ou en éventail. Palmées, opposées, dentelées. Patmées, alternes , dentelées. Lacinides et assez irrégulières.

## CLEF du Système de RIVIN.

	- Nilesalid (		1	Monopétales	-	1
10	The state of the s	The design of		Dipétales.	-	2
			Tuned A to and	Tripétales		3
	Albert season	A	Régulieres.	Tetrapétales.	3	4
		bupid, spen busin puttin		Pentapétales	5-5881	5
			Tomas corres	Hexapétales	1.	6
	of desider.	of treasprings	-sal state to a	Polypétales	1	7
	10	Simples.				
			Januari in ma	Monopétales.	-	11
			do segual acidade do la compania de	Dipétales		12
		innel one leven	de courr, er rece	Tripétales.		131
	1	В	Irréguliéres.	Tetrapétales.		14
Iol	Parfaites.	then handier	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Pentapétales		151
	and deather,			Hexapétales	3	16)
1	, an distribute			Polypétales.	3.	17
	donolder	angala - wingers				
Flettrs	Swille	Lungin States	4 - 35	A. Réguliers.	373	8
Fle	20	Composée	s, à fleurons,	B. Ré-et-irréguli	erse	9
	andares towards	Sio Shalls		C. Irréguliers.	1	10
	and the Name of Street	en mention		•	3	1
	Suttoner S		Applied a serial	the ten second in to so it	3.023	75
IIo	Imparfaites.	*		Imparfaites.		
(	- American Spice					

Tab. 19.

Des Classes, Sections du Système de Rivin, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

			A SOUTH TO THE STATE OF THE STA
FAMILLES.	CLASSES.	SECTION	s. Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.
1 Graminées.	18	3	Plantes à fleurs imparfaites à étamines.
2 Rubiacées.	1	2	Plantes à fleurs parfaites simples régulières monopétales, à deux semences nues.
3 Aggrégées.	10	1	Plantes à fleurs parfaites composées à fleurons irré- guliers.
4 Borraginées.	I Town	3	Plantes à fleurs parfaites simples régulieres monopé- tales à 4 semences nues.
5 Ombelliferes.	15	1, 2, 3	Plantes à fleurs parfaites simples irrégulieres penta- pétales.
6 Liliacées.	6	4	Plantes à fleurs parfaites simples régulières hexapétales à péricarpe tricapsulaire.
7 Caryophyllees.	5	3	Plantes à fleurs parfaites simples régulieres pentapétales à péricarpe à une capsule.
8 Arbresfruitiers	5	8, 9, 10	Plantes à fleurs parfaites simples régulieres pentapétales, à péricarpe succulent, charnu ou coriace.
9 Ranonculées.	7 .	2,3	Plantes à fleurs parfaites simples régulieres polypétales, à plusieurs semences nues et à péricarpe tricapsulaire.
10 Labiées.	11	(4, 5	Plantes à fleurs parfaites simples irrégulieres monopétales à 4 semences nues.
11 Personnées.	11		Plantes à fleurs parfaites simples irrégulieres monopé- tales, à péricarpe membraneux, bi-et-quadricapsulaire, et coriace.
12 Cruciferes.	4	1,5,6,7	Plantes à fleurs parfaites simples régulieres tétrapétales.
13 Malvacées.	I	4, 9, 10,	Plantes à fleurs parfaites simples régulieres monopétales, à plusieurs semences nues, à péricarpe à 4,5 et plu- sieurs semences.
14 Légumineuses.	24	1, 2, 3	Plantes à fleurs parfaites simples irrégulieres tétrapé- tales.
15 Composées.	8,9,10	-	Plantes à fleurs parfaites composées à fleurons, 1.º ré- guliers; 2.º réguliers et irréguliers; 3.º irréguliers.
16 Orchidées.	16	1	Plantes à fleurs parfaites simples irrégulieres à six pé ; tales à péricarpe tricapsulaire.
17 Coniferes.	18	2	Plantes à fleurs imparfaites coniferes.
18 Cucurbitacées.	1	14	Plantes à fleurs parfaites simples régulieres monopé- tales, à péricarpe charnu ou à pomme.
19 Fougéres.	18	5	
20 Mousses.	18	6	Plantes à fleurs imparfaites.
21 Algues.	18	6	
22 Champignons.	18	6	£ 3

## CLEF du Système de Ruppius.

				Monopétales.	100	2 .	1
				Dipétales			2
				Tripétales.			3
		A.	Simples.	Tétrapétales.			4
		-0.		Pentapétales.			5
	70	Régulieres.	- 1 P	Hexapétales.			6
				Polypétales			7
				a dille			
	,	B.	Composées.	Composées		1.	8
Id	Parfaites.			and the			
			-	The same			
and the same		a had	Section !	Monopétales.		•	9
			Maria Pia	Dipétales.			10
	20	Irrégulieres.	-	Tripétales			11
urs	make their			Tetrapétales.			12
Fle				Pentapétales.			13
				Pentapétales. Hexapétales.			14
	and the same						
	- Andread in		A.	à étamines  Conglomerées.  Sans fleurs	-	L.	15
IIo	Imparfaites.		В.	Conglomerées.			16
			c.	Sans fleurs			17
	A together						7

Des Classes, Sections du Système de RUPPIUS, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

33		1		
	Familles.	Classes.	Sections.	Noms sous lesquels cet Auteur les a désignées.
1.3	Graminées.	15	-	Plantes à fleurs imparfaites , à étamines.
. 2	Rubiacees.	1	2	Pl. à fleurs parfaites régulieres simples monopétales ;
: 3	Aggrégées.	9	,	Pl. à fleurs parfuites irrégulieres simples monopétales, à une semence.
14	Borraginées.	h	. 3	Pl. à fleurs parfaites régulieres simples monopétales, à quatre semences nues.
13	Ombelliferes.	13.	1-	Pl. à fleurs parfaites irrégulieres , à cinq pétales.
16	Liliacees.	6	3	Pl. à fleurs parfaites régulieres simples à six pétales;
: 7	Caryophyllées.	5	4,6	Pl. à fleurs parfaites régulières simples à cinq pétales à capsule simple, à trois et sinq divisions.
18	Arbres fruitiers.	5	10,11,12, 13, 14	Pl. à fleurs parfaites régulieres simples à cinq pétales à périoarpe à baie ou à pomme, à une, trois, quatre ou plusieurs semences.
!9	Ranonculées.	7	1, 2	Pl. à fleurs parfaites régulieres simples polypétales ; à plusieurs semences nues , à plusieurs capsules.
110	Labiées.	9:	2	Pl. à fleurs parfaites irrégulieres monopétales., à quatre semences nues.
111	Personnées.	9	3, 4, 6, 8	Pl. à fleurs parfaites irrégulières monopétales, à capsules simple à deux et quatre divisions.
112	Cruciféres.	4	1,4,5,6,	Pl. à fleurs parfaites régulieres simples , à quatra-
133	Malvacees.	L	4, 9, 10	Pt. à flèurs parfaiten régulieres simples monopétales à plusieurs semences nues , à capsules à cinq ou plusieurs divisions.
114	Légumineuses.	12	D, 2.	Pl. à fleurs parfaites irrégulieres , à quatre pétales.
135	Composées,	g.	_	Pl. à fleurs parfaites régulieres composées à fleurons 1.º réguliers et irréguliers ; 2.º réguliers ; 3.º irré- guliers , 4.º polypétales réguliens , 5.º polypétales
				irréguliers.
	Orchidées.	14	-	Pl. à fleurs parfaites régulieres, à six pétales.
	Coniféres.	.16	-	Pli à fleurs imparfaites conglomérées.
14	Cucurbitacées.	1	1.5	Pl. à fleurs parfaites régulieres simples monopétales, à baies à plusieurs semences.
	Fougeres.	17	1, 2	1
225	Mousses.	17	3	J DI S B S C S S S S S S S S S S S S S S S S
221	Algues.	187	3,4	Pl. à fleure imparfuites , privées de fleurs,
222	Champignons.	17		

## CLEF du Système de Ludwig. \*

	an and the same		Monopétales: 1
a commenter of the state			Dipétales 2
	ette tenorit		and the second
			Tripétales 3
		a Simples	Tetrapétales. 4
and the state of t	A SECTION OF THE PARTY OF THE P	1 100	Pentapétales. 5
		100	Hexapétales. 6
Α.	Régulieres	of the state of	Polypstales. 7
	reguneres		· ·
tipot pad inparimental	Manage W	b Compo-	A. Réguliers 8
where you is object to be a com-		chack	
the same of the same of		rons.	Re – et – irrégu– liers 9
1º Pétalées.		7 4,35	C. Irréguliers. 10
The state of the s	air air, s		and the day
			Monopétales. 11
			Dipétales 12
	O Allen	1 Z	Tripétales, 13
I° Parfaites.	Irrégulieres		2.
		170	Tetrapétales. 14
			Pentapétales: 15
LS			Hexapétales. 16
Apétales.			Douteuses. 17
2º Apétales,	iyant un pe	rianthe	Douteuses. 17
	V3 - 2-4-2	A	. Là étamines. 18
Tio Immorfaites			Amentacées. 19
II Imparfaites,	The Land S		
		C.	Pulvérulentes.20

## Des Classes, Sections du Système de Ludwig\*, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	FAMILLES.	CLASSES.	SECTION	s. Noms sous lesquels cet Auteur les a
	Graminées.	18	3,4	désignées. Plantes à fleurs imparfaites, a étamines culmiferes.
	2 Rubiacées.	1	2	Pl. à fleurs parfaites pétalées régulieres simples mono- pétales, à deux semences nues.
**	Aggrégées.	. 10	ı,	Pl. à fleurs parfaites pétalées composées à fleurons irré- guliers, à semences solides.
4	Borraginées.	T Comment	3	Pl. à fleurs parfaites pétalées, régulieres simples mono- pétales, à quatre semences nues.
5	Ombelliferes.	15	I	Pl. à fleurs parfaites pétalées irrégulieres à cinq pétales, à deux semences nues.
6	Liliacées.	6	4	Pl. à fleurs parfaites pétalées régulieres simples à six pétales, à capsule à trois divisions.
7	Caryophillées.	5	4	Pl. à sleurs parfaites pétalées régulieres simples à cinq pétales, à capsule simple.
8	Arbres fruitiers,	5	9	Pl. à fleurs parfaites pétalées régulieres simples à cinq pétales, à baie à une et plusieurs semences.
9	Ranonculées.	7	1, 2	Pl. à fleurs parfaites pétalées régulieres simples poly- pétales, à plusieurs semences nues et à capsules.
110	Labiées.	11	2	Pl. à sleurs parfaites pétalées irrégulieres monopétales, à quatre semences nues.
31	Personnées.	11	2, 4, 6, 8	Pl. à fleurs parfaites pétalées irrégulieres monopétales à capsule simple, à deux, quatre, et six divisions.
12	Cruciferes.	4	3,4	Pl. à sleurs parfaites pétalées régulieres simples, à quatre pétales.
13	Malvacées.	·S.M.	4	Pl. à fleurs parfaites pétalées régulieres simples mono- pétales, à plusieurs semences nues.
14	Légumineuses.	14	1,2	Pl. à fleurs parfaites pétalées irrégulieres, à quatre pétales.
15	Composées.	0		aleshaenned)), et
To Mark Com		8,9,10		Pl. à fleurs parfaites pétalées régulieres composées, à fleurons, 1.º réguliers, 2.º réguliers et irréguliers, 3º. irréguliers.
16	Orchidées.	16		Pl. à fleurs parfaites pétalées irrégulieres , à six pétales.
17	Coniferes.	19	1	Pl. à fleurs imparfaites amentacées.
18	Cucurbitacées,	1	12	Pl. à fleurs parfaites pétalées régulieres simples mo-
19	Fougéres.	20	2	nopétales, à plusieurs semences.
20	Mousses.	20	1	Pl. à fleurs imparfaites pulyérulentes.
21	Algues.	20	1,2	
22	Champignons.	20	a	·


## CLEF du Système de CHRET. KNAUT.

		Monopétales.	Uniformes.  Difformes.		1 2
I.º	Un seul pétale	Aggrégées. **	Uniformes.  Difformes.  Unifor. et difform	mes.	3 4 5
Les fleurs ont	Α.	Dipétales.	Uniformes. Difformes.		6
Les	В.	Tripétales.	Uniformes. Difformes.		. 8
11.0	C Plusieurs pétales	,	* Uniformes.  * Difformes.		. 10
	D	Pentapétales.			
		. Héxapétales. *			
	F	Polypétales.	* Uniformes.  * Difformes.	1	. 16

Des Classes, Sections du Système de Chret. Knaut, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

FAMILLES. CLASSES. SECTIONS. NOMS sous lesquels cet Auteur les a désignées.

		1	0201101	désignées.
	11 Graminées.	-	-	
	12 Rubiacées.	ı	a	Plantes à fleurs monopétales uniformes.
	33 Aggrégées.	2-4	1-2	Pl. à fleurs monopétales difformes et anniels
	4 Borraginées.	1	4	difformes à semences sans aigrettes.  PI. à fleurs monopétales uniformes.
	55 Ombelliferes.	12	2,3	Pl. à fleurs à cinq pétales uniformes,
	66 Liliacées.	1-14	27-7	Pl. à fleurs à six pétales uniformes , à capsules compo-
	77 Caryophillees.	12	8	Pl. à fleurs pentapétales uniformes à compules contra
١	Arbresfruitiers.		16, 20, 21,	membraneuses, à plusieurs semences.  Pl. à fleurs à cinq pétales uniformes.
	) Ranonculées.14	-15-1 17	6 1-2	Pl. à fleurs à six pétales et polypétales uniformes es difformes.
	) Labiées.	2	3	Pl. à fleurs monopétales difformes , à quatre semences
	Personnées.	a	4, 7, 8, 10,	Pl. à fleurs monopétales difformes . à concule concle
	Cruciferes.	10		bicapsulaire membraneuse, à une et plusieurs semences.  Pl. à fleurs à quatre pétales uniformes.
	Malvacées.	1	11	Pl. à fleurs monopétales uniformes à canques simples
	lLégumineuses.	.11	1, 2, 3, 4, 5	membraneuses, à plusieurs semences.  Pl. à fleurs à quatre pétales difformes.
	Composées. 3	, 4,5	-	Pl. à fleurs aggrégées , 1.9 uniformes , 2 9 difformes ;
	Orchidées.	15	1	3.º uniformes et difformes.  Pl. à fleurs à six pétales difformes.
	Coniferes	-	-	
	(Cucurbitacées.	1	18, 30, 32,	Pl. à fleurs monopétales uniformes;
	Fougéres.	-	33	C
	Mousses.	-	-	
	Algues.			
	Champignons.	-	_4	



Des Classes, Sections du Système d'HALLER, \*
où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

				0
	Familles.	Classes.	Section	s. Noms sous lesquels cet Auteur les a
	Graminées.	15	_	Plantes à fleurs visibles imparfaites et à étamines .
	2 Rubiacées.	X	2	graminées. Pl. à fleurs visibles parfaites régulieres simples mono-
	Ageriaina			petales, a deux semences nues.
	3 Aggrégées.	9	1	Pl. à fleurs visibles parfaites irrégulières monopétales , à une semence nue.
4	Borraginées.	T	3	Pl. à fleurs visibles parfaites régulieres simples mono-
0,	0 1 1110			pétales, à quatre semences nues.
	Ombelliferes.	12	-	Pl. à fleurs visibles parfaites irrégulières à cinq pétales, à deux semences nues.
16	Liliacées.	1-6	5,6-1	Pl. à fleurs visibles parfaites régulieres simples mono-
		78		pétules et hexapétales, à semences enfermées dans une capsule à trois divisions.
: 7	Caryophyllées.	5	4	Pl. à fleurs visibles parfaites régulières simples , à cinq
R				Printes 3 a semences convertes par une cappule cimple
18	Arbres fruitiers.	5	5	double, et à cinq divisions.  Pl. à fleurs visibles parfaites régulières simples, à cinq
11-				Petates, a semences couvertes par une ponime, à mois
10	Ranonculées.	5	2	et plusteurs semences.
17	Authorities.	5-7	3-1	Pl. à fleurs visibles parfaites régulieres simples, à cinq pétales, et plusieurs pétales, à plusieurs semences nues.
100	Labiées.	9	. 2.	Pl. à fleurs visibles parfaites irrégulières monopétales
	Personnées.			" quatre sentences nues.
1	r ersonnees.	9	. 3.	Pl. à fleurs visibles parfaites irrégulieres monopétales, à semences renfermées dans une capsule.
112	Cruciféres.	4	4	Pl. à fleurs visibles parfaites régulières simples
	The same of the sa			quatre pétales, à semences couvertes par une silique ou silique.
133	Malvacées.	1	4	Pl. à fleurs visibles parfaites régulieres simples mono-
				pétales. parfaites regulières simples mono-
144	Légumineuses.	II	-	Pl, à fleurs visibles parfaites régulieres simples, à
195	Composées.	8	_ :	quatre petates, a semences couvertes par une capille.
100				Pl. à fleurs visibles parfaites régulieres composées, à fleurons 1.º réguliers et irréguliers, 2.º réguliers,
1/16	Orchidées.	14		o. rreguliers.
	Coniféres.	16		Plà fleurs visibles parfaites irrégulieres, à six pételes.
	Cucurbitacées:	10		Pl. à fleurs visibles imparfaites conglomérées.
			6-	Pl. à fieurs visibles parfaiter régulteres simples mono- pétales, à plusieurs semences souvertes par une baie.
	Fougeres.	17	. 1.	C
	Mousses.	17	ב	
IBI	Algues.	17	2"	Pl. à fleurs invisibles.
132	Champignons.	17	2	D SELECT # 4, 40

Tab. 29

Des Classes, Sections du Système de Ludwig \*\*, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	i appo.	00120 00.	70.00	
	FAMILLES.	CLASSES.	SECTION	rs. Noms sous lesquels cet Auteur les a désignées.
,	Graminées.	15	444	Plantes à fleurs enveloppées parfaites apétales grami- nées, à deux et trois antheres et deux styles.
4	Rubiacées.	1	3.	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales simples régulieres, à quatre antheres et un style.
3	Aggrégées.	8	. I	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales composées tubulées , à fleurons à quatre antheres
P				libres.
4	Borraginées.	2	4	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales simples régulieres, à cinq antheres, un style et quatre semences nues.
5	Ombelliferes.	12:	-	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à cinq pé-
				tales ombellées.
16	Liliacées.	18	8	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à six pé- tales, à six antheres et un style.
: 7	Caryophillées.	10.	7	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à cinq pé- tales régulieres, à dix antheres, à deux et trois
	Arbres fruitiers.	Io.	8	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à cinq pé-
	TATOLOG MERICIA			tales régulieres, à plusieurs antheres, à un et cinq
	Ranonculées.	14	3	styles.
	The state of the s	-		Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées polypétales ; à plusieurs antheres et styles.
100	Labiées.	2	4	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales
K				simples irrégulieres, à quatre antheres, un siyle, à quatre semences nues.
M1	Personnées.	a. 9	4	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales
				simples irrégulieres, à quatre antheres, un style, à- semences couvertes.
112	Cruciferes.	8- 8	3	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à quatre pétales régulières, à six anthères et un style.
143	Malvacées.	4	Io	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales simples régulières y à plusieurs antheres y et un style
144	Légumineuses.	9.	3,4	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à quatre pétales irrégulières, à six et dix anthères, et un style.
5	Composées.	3, 4, 5.	-	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales composées, tubulées, lingulées, mixtes.
166	Orchidées.	13.	1	Et. à fleurs enxeloppées parfaites pétalees, à six pé- tales, à deux antheres et un style.
77	Coniferes.	16.	6.	PL à fleurs enveloppées rélatives monophytes apétales,
118	Cncurbitacées.	16	2	Pl. à fleurs enveloppées relatives monophytes, monopé-
11	Foundance	-0		tales à cinq antheres.
- 10	Fougéres. Monsses.	18		
	Algues.	18.	3,5,6	ZPI. a flaurs nues.
	Champignons,	38	4	-
		15 150 . 16	4	-

# CLEF SYSTEME

DE BOEHMER.

II.º	Les ve	egéta s fle	ux urs	4					2522	10
Nues.	Les ve		Physologophica	(Entrolor						
• 2			Toron	200	and the contract of			1		-15
*1	2 Relatives B Diphytes.			- Jaco Salamento	d)or			8		
41	elativ				Parfaites.		4			.00%
-1	B	A	20	7 m 200	· ·	HO				
•1	Diph	A Monophytes.	2º Apétalees.		Chalma	roc Pétalées.				D E
*1	ytes.	phyt	alees.					-		Ė
*1	130.00	es.		G []	H	D A	CHI	A (		6
- 1	7 16 h	Mary No.	10.11	fexap olypo	entaj	[etra]	Dipétales. Tripétales.	Tonol		(
tole Bag	- Andrews	elle in	· Andrews	F   Hexapétales. G (Polypétales.	Pentapétales.	Tetrapétales.	les. ales.	A (Monopétales. 6		D O E 11
daily or	on while	Sing an			San un	Pine.		6 ×	a Si	11 11
Andrew Control		Service of the last of the las	o tory	White it	NO CHARLE	Pice	. 4.	ompo	imples.	1
*3	a polici			plops.	man man	Pl. 2	. 4	omposées.		Tre
shall go		05.00	No.		* * *	* *		* * *	* *	
10 mg m			1		Régi Irrég Omb	Régu Irrég		Tubulées. Lingulées Mixtes.	Régu Irrég	
					Régulieres Irrégulieres Ombellées	Régulieres. Irrégulieres		Cubulées. Lingulées. Mixtes.	Régulieres. Irrégulieres	
100	nwi-		100			A.T.			1	
	, linking		white the same			1				
									. 40	
									01	
81	17	16	15	14	10	000	7 6	540	2. 1)	

Tab. 30.

Tab. 31.

Des Classes, Sections du Système de Boehmer, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

		7-11-5	tutta 1	Latitudes distributed to
	FAMILLES.	CLASSES.	SECTION	is. Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.
	1 Graminées.	15	-	Plantes à fleurs enveloppées parfaites apétales grami- nées, à deux et trois antheres, à deux styles.
	2 Rubiacées.	1	3	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées, monopétales simples régulieres, à quatre antheres et un style.
	3 Aggrégées.	3	I	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales composées tubulées à fleurons, à 4 antheres distinctes.
	4 Borraginées.	ı	4	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales simples régulières, à cinq antheres, un style et quatre semences nues.
	5 Ombelliferes.	12	-	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées pentapétales ombellées.
	6 Liliacées.	13	2	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées hexapétales, à six antheres et un style.
	7 Caryophyllées.	10	3	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées régulieres, à dix anthères, à deux et trois styles.
	8 Arbres fruitiers	10	4	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées pentapétales régulieres, à plusieurs aniheres, à un et trois styles.
1	9 Ranonculées.	10-14	4-3	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées pentapétales régulières, et polypétales à plusieurs antheres et styles.
I	o Labiées.	2	1,3	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales simples irrégulières, à quatre antheres, un style, à quatre semences nues.
I	r Personnées.	2	3	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales simples irrégulieres, à quatre antheres, un style, à semences couvertes.
I	2 Cruciferes.	8	2	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées tétrapétales
1	3 Malvacées.	1	9	régulieres, à six antheres et un style.  Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales simples régulieres, à plusieurs antheres et un style.
1	4 Légumineuses.	9	2, 3	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées tétrapétales irrégulières, à six et dix antheres et un style.
1	5 Composées.	3,4,5	7 91	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales composées tubulées, lingulées, mixtes.
1	6 Orchidées.	13	1	Pl. à fleurs enveloppées parfaites pétalées hexapétales, à deux antheres et un style.
	7 Coniferes.	16	3	Pl. à fleurs enveloppées relatives monophytes apétales.
	8 Cucurbitacées.	16	1	Pl. à fleurs enveloppées relatives monepétales.
	9 Fougéres.	18	2	{
	o Mousses.	18	3	Pl. à fleurs nues.
2	Algues.	18	5	A c. a from hars,
3	2 Champignons.	18	4	To or Standard Ha. W.

# CLEF DU SYSTÉM 口

# DE GATTENHOF.

II.º	Les végé ont des fi	taux jeurs.	10		of the	THE REAL PROPERTY.		
o Invisibles,	Liburata Angrobak	1 10100	I o Wisibles				Secre	
oles,							8	
-	20 R			Io(b				
	2º Relatives {Monophytes.	ARAC STATE		ro(Parfaites.				
e ba	38	20	mobile.	S	10	19.	-	
Criptogames.	Mono <sub>l</sub> Diphy	2º Apétales.			Petalé		*	
games	phytes tes.	les.	0 म	Ħ	es, D	C	d ;	A
		and a	Hexa Polyj	Penta	Tetra	Tripe		Mond
100	-	ins too	F Hexapétales. G Polypétales.	Pentapétales.	10 Petalées. D Tetrapétales.	Tripétales.		A (Mononétales
*17				S.	· S		31	D
	• • • •						Compo	Simples
***		- Probability			~		mposées.	3
union .	the second			* * *	* *		* * *	* *
1000	: : :			Régulieres. Irrégulieres.	Régulieres. Irrégulieres.		Tubulées. Lingulées. Mixtes.	Régulieres. Irrégulieres.
* 1	ring and	nial,		eres. lieres.	eres. lieres.	4	ees.	eres. lieres.
		diene	and the	-	and a	4	8	
		• 1			1		** *	11.
•	• • •			, ,	and the	1	8	
. 20.	18.	617.	13.	. 10:	. 9.	7.0	रू कर	12 1

Des Clas	ses, Section les	s du Sy	ystême de	GATTEN	HOF,	où se	rapportent
	les	vingt - c	deux Fan	illes suiv	antes.		

		tes At	ire - men	LL I tenteres out miles
	FAMILLES. C	LASSES.	SECTION	s. Noms sous lesquels cet Auteur les a désignées.
	1 Graminées.	16	-	Plantes à fleurs visibles parfaites apétales, graminées diandres et triandres digynes.
	2 Rubiacées.	. 1	3	Pl. à fleurs visibles parfaites pétalées monopétales simples régulieres tétrandres monogynes.
	3 Aggrégées.	3	1	Pl. à fleurs visibles parfaites pétalées monopétales com- posées à fleurons, à quatre étamines distinctes.
	4 Borraginées.	1	. 4	Pl. à fleurs visibles purfuites pétalées monopétales sim- ples régulieres, pentandres monogynes.
	5 Ombelliferes.	12		Pl. à fleurs visibles parfaites pétalées à cinq pétales ombellées.
	6 Liliacées.	13	3	Pl. à fleurs visibles parfaites pétalées, à six pétales, hexandres monogynes.
	7 Caryophillées.	10	3	Pl. à fleurs visibles parfaites pétalées, à cinq pétales régulieres, décandres digynes, trigynes, pentagynes.
	8 Arbresfruitiers.	10	4	Pl. à fleurs visibles parfaites pétalées, à cinq pétales régulieres polyandres monogynes, digynes, trigynes
	9 Ranonculées.	10	4	Pl. à sleurs visibles parfaites pétalées, à cinq pétales
	to Labiées.	2	a, 4	Pl. à fleurs visibles parfaites pétalées monopétales sim-
	110000	A		ples irrégulières diandres et tétrandres, ou didynames monogynes à semences nues.
1	11 Personnées.	2	4	Pl. à fleurs visibles parfaices pétalées monopétales sim- ples irrégulieres tétrandres ou didynames, monogynes, à semences couvertes.
ı	112 Cruciferes.	8	2	Pl. à fleurs visibles parfaites pétalées, à quatre pétales régulières, hexandres monogynes, ou tétradynames.
	3 Malvacées.	1	9	Pl. à fleurs visibles parfaites pétalées monopétales sim- ples régulieres, polyandres monogynes.
	4 Légumineuses.	9	3	Pl. à fleurs visibles parfaites pétalées à quatre pétales irrégulieres, hexandres et décandres monogynes.
	5 Composées.	3-4,5	2-	Pl. à fleurs visibles parfaites pétalées monopétales com-
				posées tubulées, lingulées, mixtes, syngenéses, à étamines réunies en forme de cylindre.
	6 Orchidées.	13	1 .	Pl. à fleurs visibles parfaites pétalées, à six pétales diandres.
	7 Coniferes	18		Pl. à fleurs visibles relatives monophytes, monoiques apétales.
	88 Cucurbitacées.	18	1	Pl. à fleurs visibles relatives monophytes, monoiques,
١	199 Fougéres.	'20	-	Pl. à fleurs invisibles ou eryptogames.
١	no Mousses.	-	-	
	Algues.	-	-	
	222 Champiguons.	-	-	经 14 中一日日日日 四日间 日日草

II. o Invisibles.	F	eurs	I.º (Visibles.			A Species Tions.			inter, S inter, S inter,
	20 AI		-		1° Pétalées	3		. 1	
-045	2º Apétales.				talées.	1		-6	asimi
To Sally	1 300	200						Joi	
2		2º Composées						rof Simples.	olettike.
		es			nagagir.			. 4	1
100	150	₽-	9	দ্য	H	7	0	. в	A
•	**	fleurons	G Polypétales.	Hexapétales.	Pentapétales.	Tetrapétales.	Tripétales.	Dipétales	Monopétales
	• 1	A COURSE OF	8.	es.	les.	es.			les.
0	-	* *		*	*	* =		* *	* *
Cryptanthemes.	Apétales.	* Réguliers. * Irréguliers. * Rég-Irréguliers.	* Régulieres.	* Régulieres. * Irrégulieres.	* Régulieres. * Irrégulieres.	* Régulieres. * Trrégulieres.	* Régulieres.	* Régulieres. * Irrégulieres.	* Régulieres. * Irrégulieres.
\$.		ers.	organi		Signa at			81	
targ		and the same			A Partie		•1		· • • r
1. 10	miny.	i negotiale	with the	N CAMALO	with this		• 1	1.81	debosid
		" 'mmeZi	4000					- 01	
*	•						*	-2	3
17.	16.	13. 14.	12.	10. 11.	9. 8.	7. 6.	5	4.33	2. 1.

CLEF du Système de GOUAN.

# TABLE

	1	TI	D L L
Des Classes,			me de GOUAN, où se rapportent Familles suivantes.
FAMILLES.	CLASSES.	ORDRES	. Noms sous lesquels cet auteur les
1 Graminées.	4	-	a désignées.  Plantes à fleurs visibles pétalées simples, à deux pétales irrégulieres, triandres digynes.
2 Rubiacées.	1	3	Pl. à fleurs visibles pétalées simples monopétales régu- lieres, tétrandres monogynes.
3 Aggrégées.	2	4	Pl. à fleurs visibles pétalées simples monopétales irré- gulières, tétandres monogynes.
4 Borraginées.	1-2	4-5	Pl. à fleurs visibles pétalées simples monopétales régu- lieres et irrégulieres, pentandres monogynes.
5 Ombelliferes.	8-9	2—1	Pl. à fleurs visibles pétalées simples, à cinq pétales régulieres et irrégulieres, pentandres digynes.
6 Liliacées.	10	M I	Pl. à fleurs visibles pétalées simples, à six pétales régulières, hexandres monogynes.
7 Caryophyllées.	8	3,4	Pl. à fleurs visibles pétalées simples, à cinq pétales régulières, pentandres et décandres digynes, trygynes
8 Arbres fruitiers	. 8	6	et pentagynes.  Pl. à fleurs visibles pétalées simples, à cinq pétales
o Mistes Hatters		100	régulieres, icosandres monogynes, digynes, trigynes, pentagynes.
9 Ranonculées.	8-9	7-3	Pl. à fleurs visibles pétalées simples, à cinq pétales régulières et irrégulières, polyandres, poligynes et
110 Labiées.		2.6	trigynes.
Lables.	1	2,0	Pl. à fleurs visibles pétalées simples monopétales irré- gulières, diandres monogynes, et didynames gymnos- permes.
111 Personnées.	2	2,6	Pl. à fleurs visibles pétalées simples monopétales irré- gulieres, diandres monogynes, et didynames angios-
112 Cruciferes.	6-7	1,2,3-3	Pl. à fleurs visibles pétalées simples, à quatre pétalés régulieres et irrégulieres, diandres, tétrandres, tetra-
234.1			dynames.
113 Malvacées.	1 9 9 9	, 8	Pl. à fleurs visibles pétalées simples monopétales régu- lieres, monadelphes, polyandres.
114 Légumineuses.	7	4	Pl, à fleurs visibles pétalées simples, à quatre pétales irrégulières, diadelphes, octandres et décandres.
115 Composées.	13, 14, 15	The state of	Pl. à fleurs visibles pétulées composées, à fleurons 1.º réguliers, 2.º irréguliers, 3.º réguliers et irré- guliers, syngenéses.
16 Orchidées.	9	5	Pl. à fleurs visibles pétalées simples pentapétales irré- gulières, gynandres et diandres.
117 Coniferes.	16	12, 13	Pl. à fleurs visibles apétales, monoiques, dioiques, mona- delphes.
18 Cucurbitacées.	I.	9	Pl. à fleurs visibles pétalées simples monopétales régu- lieres, monoiques syngenéses.
119 Fougeres.	17	1	
220 Mousses.	17	3	Pl. à fleurs invisibles, ou cryptanthémes.
22 Champiguons.	17	4	1
			3

# CLEF du Système de Tournerort.

	II.º	Fleurs	I.o.					
est aliago.	II.°CD'arbres		I.º (D'herbes					
8	<b>△</b>	100			TO			
B Pétalées. b Polypétales. * Régulieres. ** Irrégulieres.	A Apétales.	2º Apétales.	20		ro Pétalées.	JOI		e da de la companya d
Pol	•1	i kali	Co		- Harrison	Sin		
nopétal lypétale	- 1	•1	2º Composées.			Io Simples		
es.	•1	•1			8.		Þ	>
**.	,		+1		Pol	80	OTAL	
Réguli Irrégu	• 1	***			B. Polypétales		порегал	( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
eres		• 1		_	Name of the last o			- Common
en ·	4	•1	• 1	*	*		*	*
				Irré	Rég		rrég	Régi
1	, NL	• 1		guli	Régulieres.		gulie	* Régulieres.
)		• 1	C # A	Irrégulieres.	res.		** Irrégulieres.	in
Rosacées	Apétales	Sans fleurs ni fruits.	Semi-flosculeuses	Papillonacées	Ombellées	Cruciformes.	Personnées	Campaniformes.
	Sales!			Service Services	9			No.
		* ** *1		· Y		1		
				U+ 1.				- 10
22 21	19	16	12 13	II	9 807	00	10 4	2 1

Des Classes, Sections du Système de Tournerort, où se rapportent les vingt - deux Familles suivantes.

FAMILLES. CLASSES. SECTIONS. NOMS sous lesquels cet Auteur les a désignées.

ı					designees.
	1	Graminées.	15	3.	Plantes herbacées a fleurs apétales à étamines.
	. 2	Rubiacées.	I:	9.	Pl. herbacées à fleurs pésalées simples monopétales ré- gulieres, campaniformes.
ŀ	:3	Aggrégées.	12	5	Pl. herbacées à fleurs pétalées composées, flosculeuses.
	14	Borraginees.	2	4	Pl. herbacéees à fleurs pétalées simples monopétales ré- gulieres , infundibuliformes.
	15	Ombelliferes.	. 7	1,2,3,4,5, 6,7,8,9	Pl. herbacées à fleurs pétalées simples polypétales régu- lieres, rosacées, ombellées.
	66	Liliacées.	9	= -	Pl. herbacées à fleurs pétalées simples polypétales régu- lieres, liliacées.
	17	Caryophyllées.	8	la Leston	Pl. herbacées à fleurs pétalées simples polypétales régu- lieres, caryophyllées.
	18	Arbres fruitiers.	21	7,8	Arbres à fleurs pétalées polypétales régulières, rosacées.
The Person of th	19	Ranonculées.	6	6, 7	Pl. herbacees à fleurs pétalées simples polypétules régu- lieres, rosacées.
	100	Labiées.	4	1, 2, 3, 4	Pl. herbacées à fleurs pétalées simples monopétales irré- gulières, labiées.
	133	Personnées.	3	3, 4	Pl. herbacees à fleurs pétalées simples monopétales irré- gulières, personnées.
	112	Cruciféres.	5	1,2,3,4,5	Pl. herbacées à fleurs pétalées simples polypétales régu-
	183	Malvacées.	1.	6	Pl. herbacées à fleurs pétalées simples monopétales régu- lières, campaniformes:
	164	Lėgumineuses.	10-22	1,2,3,4,5	Pl. herbacées à sleurs pétalées simples polypétales irré- gulieres, papillonacées : Arbres à sleurs pétalées poly- pétales irrégulieres, papillonacées.
١	1	Composées.	12, 13, 14	Cro-Pol	Pl. herbacées à fleurs pétalées composées , flosculeuses , semi-flosculeuses , radiées.
		Orchidées.	11	3	Pl. herbacées à fleurs pétalées simples polypétales irré- gulieres, anomales.
١	1717	Coniféres.	19	3	Atbres à seurs apétales, amentacées.
	F.	Cucurbitacées.	1	7	Pl. herbacées à fleurs pétalées simples monopétales régip- lieres, campaniformes.
	13.3	Fongéres.	16	-	Pl. herbacées à sleurs apétales.
	120	Mousses.	17	L	Pl. herbacées à steurs apétales.
	221	Algues.	16-17	2-2	Pl. herbacées à fleurs apérales.
	32	Champignons.	EZ-	20.3516	Rt. herbacies à fleurs apétales.

#### CLEF du Système de PONTEDERA.

	CLEI au dysteme ae I on	EDERM.	
	LES PLANTES SONT	T. Amelikaan 13	ī
10 Inc	ertaines	Incertaines :	-
JI° [Cer	taines		
100	Privées de bourgeons		
	Sans fleurs . 7	Privées de fleurs.	2
See mind	Avec des fleurs		
	A (Imparfaites	Imparfaites	3
	B Parfaites		
	a (Monopétales		
- 11,00	of the property of the same of	Anomales. : : Labiées Campaniformes.	456
	*Simples.	En soucoupe.  En roue.	78
		Infundibuliformes.	91
- Long Marie	* * Conglobées.	{Flosculeuses Lingulées	II
sheet to be	care unamouse de la constant de la c	Radiées	121
	and the second of the second o	Anomales	13
		Papillonacées	14
	1 Delemétales	Caryophyllées.	16
	b (Polypétales.	Cruciformes	17
		Rosacées	
-0	Pourvues de bourgeons avec des fleurs	Rosacées ombellées	.19)
24	(Pourvues de nourgeons avec des neurs		
	A Imparfaites	Filamenteuses	201
	B Parfaites a Monopétales	Apétales	211
	Dianates	Anomales	22
		Campaniformes.	23
	3	Rosacées	24
	And the state of t	Infundibuliformes.	20
	attacks to the board of the same of the	Papillonacées.	26
	b Polypétales	Rosacées	27

# Des Classes, Sections du Système de Pontedera, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	A STATE OF THE STA			
	Familles.	Classes.	Sections.	Noms sous lesquels cet Auteur les a désignées.
	1 Graminėes.	3	-7	Plantes privées de bourgeons, à fleurs imparfaites.
	2 Rubiacees.	6	-	Pl. privées de bourgeons, à fleurs parfaites monopétales simples, campaniformes.
	3 Aggrégées.	10	-	Pl. privées de bourgeons, à fleurs parfaites monopéta- les, conglobées.
	4 Borraginées.	9	-	Pl. privées de bourgeons, à fleurs parfaites monopétales simples, infundibuliformes.
	5 Ombelliferes.	19		Pl. privées de bourgeons, à fleurs parfaites polypétales, rosacées ombelliferes.
	6 Liliacées.	15		Pl. privées de bourgeons, à fleurs parfaites polypétales, liliacées.
	7 Caryophyllées.	16	- 1	Pl. privées de bourgeons, à fleurs parfaites polypétales, caryophyllées.
	8 Arbres fruitiers	27	- 1	Pl. pourvues de bourgeons, à fleurs parfaites polypé- tales, rosacées.
	9 Ranonculées.	18	- 1	Pl. privées de bourgeons, à fleurs parfaites polypétales, rosacées.
13	o Labiées.	5	-	Pl. privées de bourgeons, à fleurs parfaites monopétales simples, labiées.
11	r Personnées.	4	- 1	Pl. privées de bourgeons, à fleurs parfaites monopétales simples, anomales.
11	2 Cruciferes.	17		Pt. privées de bourgeons, à fleurs parfaites polypétales, cruciformes.
12	3 Malvacées.	6	- 1	Pl. privées de bourgeons, à fleurs parfaites monopétales simples, campaniformes.
11	4 Légumineuses.	14, 26	- 1	Pl. privées de bourgeons, à fleurs parfaites polypétales, papillonacées : Pl. pourvues de bourgeons, à fleurs polypétales, papillonacées.
11	5 Composées.	10,11,12	_ 1	Pl. privées de bourgeons, à fleurs parfaites monopé- tales, conglobées, flosculeuses, linguiées, radiées.
1 1	6 Orchidées.	13	- 1	Pl. privées de bourgeons, à fleurs parfaites polypétales, anomales.
11	7 Coniferes.	21	_ 1	Pl. pourvues de bourgeons, à fleurs imparfaites apétales.
	8 Cucurbitacées.	6		Pl. privées de bourgeons, à fleurs parfaites monopétales simples, campaniformes.
11	9 Fougéres.	2		Pl. privees de bourgeons et de fleurs.
	Mousses.	1 1	-	
12	Algues.	1	- <	P1. incertaines.
12	2 Champignons.	.1	-	
			-	

# CLEF du Système de SEGUIER.

	A	Apétales		3	2
10	Simples:	a	Monopét les.	a- }	Campaniformes, Infundibulif. 3 Anomales. 4 Labiées. 5
I° D'herbes.	- В	Pétalées d	Polypéta	des.<	Dipétales 6 Tripétales 7 Tétrapétales. 8 Pentapétales. 9 Pentapétalesombellées 10 Liliacées 11 Légumineuses 12 Anomales 13
Fleurs	Composée	s . : :	:::	. B	Flosculeuses. 14 Semi-flosculeu- ses. 15 Radiées. 16
	Apétales		: : :		Apétales. 17 Amentacées. 18
II° D'arbres. B	Monopéta	les			Monopétales. 19
C	Polypétal	es :	:::		Pentapétales. 20 Légumineuses 21

Des Classes, Sections du Système de Seguier, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	FAMILLES.	CLASSES.	SECTION	vs. Noms sous lesquels cet auteur les a
	Graminées.	6	2 19	désignées.  Plantes herbacées à fleurs simples pétalées dipétales, graminées.
	Rubiacées.	3	1	Pl. herbacées à fleurs simples pétalées monopétales, campaniformes.
**	3 Aggrégées.	14	-	Pl. herbacées à fleurs composées, flosculeuses.
-	Borraginées.	3	2	Pl. herbacees à fleurs simples pétalées monopétales; campaniformes.
1	6 Ombelliferes.	10	da Tan	Pl. herbacées à fleurs simples pétalées, à cinq pétales;
	Liliacées.	11	-	Pl. herbacées à fleurs simples pétalées polypétales;
	Caryophillées.	9	-	Pl. herbacées à fleurs simples pétalées, à cinq pétales.
8	Arbresfruitiers.	20	To San San	Arbres à fleurs à cinq pétales.
5	Ranonculées.	9	2	Pl. herbacées à fleurs simples pétalées, à cinq pétales.
IC	Labiées.	5	T.	Pl. herbacées à fleurs simples pétalées monopétales, labiées.
11	Personnées.	4	-	Pl. herbacées à fleurs simples pétalées monopétales, anomales.
12	Cruciferes.	8	-	Pl. herbacécs à fleurs simples pétalées, à quatre pétaless
13	Malvacées.	3	-	Pl. herbacées à fleurs simples pétalées monopétales,
14	Légumineuses.	12,21	- Indiana	Pl. herbacées à fleurs simples pétalées polypétales , légumineuses : Arbres et arbrisseaux à fleurs légu-
15	Composées.	14	-	Pl. herbacées à fleurs composées, flosculeuses, semi- flosculeuses, radiées.
116	Orchidées.	13	-	Pl. herbacées à fleurs simples pétalées polypétales, anomales.
17	Coniferes	18		Arbres à fleurs apétales amentacées.
8	Cucurbitacées.	3	1	Pl. herbacées à fleurs simples pétalées monopétales
99	Fougéres.	1	3	campaniformes.
00	Mousses.	1	2	
BI	Algues.	1	2	Pl. herbacées apétales.
32	Champignons.	1	1	

# CLEF DU SYSTEME

DE BERGEN.

	A Monopétales	*Régulieres	I Campaniformes. 2 Infundibuliformes.
		**Irrégulieres	3 Monopétales ano- males. 4 Labiées.
-	I.º Simples pé- talées  B Polypétales	*Régulieres	lées. 8 Caryophyllées.
les fleurs		**Irrégulieres	9 Liliacées. 10 Papillonacées. 11 Anomales poly- pétales.
Les végétanx ont des fleurs	II.º Composées pétalées	B ?	12 Flosculeuses. 13 Semi-flosculeuses. 14 Radiées.
	III.º Apétales ou à étamines.		15 Non-amentacées: 16 Amentacées. 17 Coniferes. 18 Graminées.
	IV.º Des parties analogues aux	fleurs .	19Epiphyllospermes ou fougéres. 20 Mousses. 21 Algues.
	V.º N'ont point de fleurs .		22 Champignons.

Des Classes, Ordres du Système de BERGEN, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

1		Familles. Classes.	
1	1	Graminées. 18	désignées.  1, 3, 4, 5 Plantes à fleurs apétales à étamines, graminées.
	2	Rubiacées.	8 Pl. à fleurs simples pétalées monopétales régulières, campaniformes.
1	3	Aggrégées. 12	5, 6 Pl. à fleurs composées pétalées, flossuleuses.
	4	Borraginées. 2	4 Pl. à sleurs simples pétalées monopétules régulières, campaniformes.
	5	Ombelliferes. 7	1,2,3,4,5,6 Pl. à fleurs simples pétalées polypétales régulieres, 7,8,9, 10. rosacées, ombellées.
( )	6	Liliacées. 9	1,2,3,4,5 Pl. à fleurs simples pétalées polypétales régulieres, liliacées.
- 1	7	Caryophyllées. 8	P1. à fleurs simples pétalées polypétales régulières, caryophyllées.
-	8	Arbres fruitiers 6	8, 9 Pl. à fleurs simples pétalées polypétales régulieres, rosacées.
1	9	Ranonculées. 6-11	4, 5-3 Pl. à fleurs simples pétalées polypétales régulieres, rosacées.
11	0	Labiées. 4	1,2,3,4 Pl. à fleurs simples pétalées monopétales irrégulieres,
1	1	Personnées. 3	3, 4 Pl. à fieurs simples pétalées monopétales irrégulieres , anomales.
11	2	Cruciferes. 5	2, 3, 4, 5 Pl. à sleurs simples pétalées polypétales régulieres, cruciformes.
11	3	Malvacées. 1	5 Pl. à fleurs simples pétalées monopétales régulieres, campaniformes.
11	4	Légumineuses. 10	1, 2, 3, 4 Pl. à fleurs simples pétalées, polypétales irrégulieres, papillonacées.
11	5	Composées. 12, 13, 1	4 — Pl. à fleurs composées pétalées, flosculeuses, semi- flosculeuses, radiées.
11	6	Orchidées.	4 Pl. à fleurs simples pétalées polypétales irrégulieres, anomales.
l'I	7	Coniferes.	1, 2 Pl. à fleurs apétales à étamines, coniferes.
11	8	Cucurbitacées. 1	6 Pl. à fleurs simples pétalées monopétales régulieres,
11	9	Fougéres. 19	1, 2, 3 (campeniformes
22	10	Mousses. 20	1, 2 Pl. ayant des parties analogues aux fleurs.
22	1	Algues. 20-21	3-
12	12	Champignons, 22	1,2,3,4,5 Pl. sans fleurs.

# CLEF DU SYSTÊME


#### DE DURANDE.

- A 101 Electric Constitution, man 1966 hg	A.	1 Régulieres.
	В.	2 Personnées.
I.º (Monopétales	. C.	3 Labises.
, read of the second strike in the second se	D.	4 Composées.
Pl. a from participated pappings in several properties of the contract of the	E.	5 Aggrégées.
. The second property of the second second second second	\$10,E,0,0	R A Company of A
Part Spirit Chan papers where,		at a Change La
the second second second second second	A.	6 Malvacées.
complete state by taking alone and all	В.	7 Cruciformes.
and the state of t	C.	8 Rosacées.
Polypétales.	: D.	9 Ranunculées.
Pr. straine and the land of the land of the land of	E.	10 Caryophyllées.
The share the state of the same state of	F.	11 Ombelliferes.
-controlles duces	G.	12 Légumineuses.
in the state of th	Charles,	The state of
Pr. e from comming position, flaces medican-		The first of the second party of
P. & fines august propher polyposter inchesiales,	A.	13 Liliacées.
PL a flower ophique a changer , confere.	В.	14 Spadicées?
III. Apétales.	. C.	15 Staminées.
The speed desprivate englagers and flours.		16 Graminées.
	E.	17 à fructification cachée.
	Paris and a second	An Commission and

Des Classes, Sections du Système de DURANDE, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	FAMILLES.	CLASSES.	SECTIONS. NOMS sous lesquels cet auteur les a désignées.
I	Graminées.	16.	2 Pl. à fleurs apétales, graminées.
2	Rubiacées.	T.	6 Pl. à fleurs monopétales régulieres, à germe inférieur,
: 3	Aggrégées.	5	2 Pl. à fleurs monopétales aggrégées parfaites , à germe inférieur et supérieur.
1 6	Borraginées.	P	Pl. à fleurs monopétales régulieres pà germe supérieur, à quatre semences.
15	Ombelliferes.	II I	r, 2, 3 Pl. à fleurs polypétales, ombelliferes.
16	Liliacées.	13	1, 2, 3, 4Pl. à fleurs apétales liliacées, à germe supérieur ex inférieur.
17	Caryophyllées.	10	1, 2 Pl. à fleurs polypétales, caryophyllées.
18	Arbres fruitiers.	8.	4, 6. Pl. à fleurs polypétales, rosacées à germe supérieur; à fruit à noyau, à germe inférieur, à baie.
19	Ranonculées.	9	Pl. à fleurs polypétales, ranunoulées, à plusieurs capsules.
T-C	Labiées.	3	I, 2 Pl. à fleurs monopétales, labiées.
111	Personnées.	2.	1 , 2' , 3. Pl. à fleurs monopétales , personnées.
112	Cruciferes.	7	1, 2 Pl. à fleurs polypétales, oruciformes.
103	Malvacées.	6.	1. Pl. à fleurs polypétales, malvacées, à étamines nome- breuses.
104	Légumineuses.	12.	T, 2 Pl. à fleurs polypétales, légumineuses.
65	Composées.	4	1, 2, 3 Pl. à fleurs monopétales composées.
66	Orchidées.	- 14	3. Pl. à fleurs apétales spadicées.
7	Coniferes	.15	5 Pl. à fleurs apétales staminées.
88	Cucurbitacées.	1	8. Pl. à fleurs monopétales régulieres , à germe inférieur
199	Fougeres.	17	a baie.
100	Mousses.	17	2 002 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
1	Algues.	17	3 Pl. à fleurs apétales, à fructification cachée;
122	Champignons.	17	4

### CLEF du Système de WERNISCHECK.



Des Classes, Ordres du Système de Wernischeck, où se rapportent les vingt - deux Familles suivantes.

				-			STEEL STEEL STEEL			
	FAM	ILLES.	CLASSI	ES. (	ORDRI	ES.	Noms sous	lesquels désigné		teur les a
	1 Gram	inėes.	19		1,2	Plan	ntes à fleurs apét	ales, à ca	lice , à ba	lles.
	2 Rubia	acées.	2-3		1-1		à fleurs pétalécs corolle divisé en			, à limbe de
	3 Aggre	ėgėes.	2-3	٠٥.	1-1		à fleurs pétalées corolle divisé en		A Property of the Parket of th	
X.	4 Borra	ginées.	3	b	1		à fleurs pétalées corolle divisé en c	and the second		, à limbe de
-	5 Ombe	elliferes.	13	3	-		à fleurs pétalées ; lées.	polypétales	, à cinq p	étales, om-
-	6 Liliad	cées.	4-11	- 11	1-1	la	à fleurs pétalées corolle divisé en s ales.			
	7 Caryo	phyllées.	12	- 0	2,3	10.	fleurs pétalées	polypétales	, à cinq pe	itales.
11	8 Arbre	s fruitiers.	15	1,	2,5	Pl. à	fleurs pétalées nes.	polypétales	, à plus	de dix éta+
	Ranor	iculées.	15		6	Pt. à	i fleurs pétalées ies.	polypétales	, à plus	de dix éta-
Q C	o Labié	es.	ı		2		fleurs pétalées n corolle, à deux		simples,	à limbe de
F	Person	mées.	1		1		fleurs pétalées corolle à deux lev		s simples,	à levres de
	Crucif		10	1		стис	fleurs pétalées ciformes.			
	Malva	habovion	16		_		fleurs pétalées muniferes.	polypétale.	s, à cin	q pétales,
		ineuses.	14		_		fleurs pétalées des , papillonacée		', à quat	re ou cing
	Compo	-	6,7,8		daen		fleurs pétalées m ulées, radiées,	onopétales	composées	, tubulées,
	Orchid		. 11		1	Pl. à	fleurs pétalées po	olypétales,	à six péta	ales.
	Conifé		18	***	1	Pl. à	fleurs apétales,	à calice rue	de ou nul.	
		oitacées.	. 3		1		fleurs pétalées n orolle divisé en ci		simples,	à limbe de
	Fougér		20		1	1				
	Mouss		20		2	(P)	à fructification	cachée.		
1	Algues		20		3	THE CO.	- Janet greation	- HVIII-CE		
2	Champi	gnons,	20		4	(				

# CLEF DU SYSTÉME

#### DE MAGNOL.

A Renfermant une	
Calice externe seulement.	
B Soutenant a Fleur monopétale. : 6 une b Fleur polypétale 7	,
I.º Herbes 2º Calice interne seulement.	3
a Fleur monopétale. : 9  50 Calice externe b Fleur di-ou-tripétale. 10	
et interne c Fleur tétrapétale 1	
SS A GO	3
II.º Arbres B Calice interne seulement.	4 5

Des Classes, Sections du Système de MAGNOI, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	FAMILI	ES.	CLASSES.	SECTION	s. Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.
-	1 Gramin	nées.	2	4	Plantes herbacées à calice externe seulement, renfer- mant une fleur à étamine.
	a Rubiac	ées.	6	2	Pl. herbacées à calice externe seulement, soutenant une fleur monopétale.
	3 Aggrég	ées.	5	4	Pl. herbacées à calice externe seulement, renfermant une fleur composée.
-	4 Borrag	inées.	3	X .	Pl. herbacées à calice externe seulement, renfermant une fleur monopétale.
-	5 Ombel	liferes.	7	1,2,3,4,5	Pl. herbacées à calice externe seulement, soutenant une fleur polypétale.
1	6 Liliacé	es.	8	1,2	P1. herbacées à calice interne seulement.
	7 Caryon	hyllées.	12	a aloo Lop	Pl. herbacées à calice externe et interne, à fleur poly- pétale.
	8 Arbres	fruitiers.	15	4	Arbres à calice externe et interne , à fleur polypétale.
Carrie	9 Ranone	culées.	4-8	2—3	Pl. herbacées à calice externe senlement, renfermant une fleur polypétale : Plantes à calice interne seu- lement.
10	o Labiée	s.	_ 3	2, 3, 4, 5	Pl. herbacées à calice externe seulement, renfermant une fleur monopétale.
12	Person	nées.	9	6	Pl. herbacées à calice externe et interne, à fleur mono- pétale.
12	2 Crucif	eres.	11	1,2	Pl. herbacées à calice externe et interne, à fleur têtra- pétale.
11	3 Malvac	ées.	9	5	Pl. herbacées à calice externe et interne, à fleur mono- pétale.
L	4 Légum	ineuses.	12	4	Pl. herbacées à calice externe et interne, à fleur poly- pétale.
13	5 Compo	sées.	5	1,2,3	Pl. herbacées à calice externe seulement, renfermant une fleur composée.
10	6 Orchid	ées.	8	2	Pl. herbacées à calice interne seulement, analogues aux liliacées.
17	7 Conife	res.	13	300	Arbres à calice externe seulement , coniferes.
11	8 Cucurb	oitacées.	9	. 1	Pl. herbacées à calice externe et interne, à fleur mono- pétale
00	Fougéi Mousse Algues Champ	s.	I. I I	2 2 1, 2 2	Pl. herbacees à calice externe, à fleur inconnue.

# CLEF DU SYSTÊME

#### DE LINNÉ.\*

#### LE CALICE EST

(	Associated a		
10	Un spathe.	A Spathacees :	1
20	En balle.	B à balles	2
	En chatons.	C Amentacees	3
40	En involucre, soit qu'il existe ou non		
7	sa place est désignée.	D Ombellées	4
50	Un périanthe. Ce calice le plus général et diversifié, est		190
	106 Multiflore, lorsqu'un seul perianthe renferme plu-		
3	sieurs fleurs.	Communes	5
	20 Uniflore, lorsqu'il ne renferme qu'une seule fleur,		
-	et des lors il est	The state of the s	
1	C CC GCS TOTE IN COO		
-	B Double, ou	Doubles	5
7	A Simple, et	AMERICAL PROPERTY.	
	A simple, et		
	A (Produit une fleur sur ses parois internes,	à ombilic	7
	B \ Est assis sur le germe en forme de couronne et	à couronne	8
-	renferme le germe : lorsque cela a lieu	the second second	
	renterme te germe . forsque com a mon		
	Le périanthe forme un corps séparé de la		
	Le periantne forme un corps separe de la		
	corolle, et il est d'une		
	a Structure ou d'une forme différente de		
)	at Structure ou a une forme affected do	Anomales	9
	la corolle.		2
10.0	b. D'une forme double dans la même plante	A STREET OF THE PARTY OF THE PA	
	c'est-a dire d'une figure différente	Difformes	10
	dans les mêmes fleurs.	Digornics	-
- 9	c Uniforme avec la corolle, alors il		
	were the smalle of the processes		
	Tombe avec la corolle, s'il n'est pas	Caducs	11
	* * fombeavantelle:	Florestons s	-
	** Persiste jusqu'à la maturité du fruit		
- 19	S'il ne se flêtrit auparavant.		
	Un tel périanthe		
	on to person to the true to an out	Frales monanétales.	12
	a (A ses bords égaux, et soutient * un ou	Egales monopetates	13
			16
	b Inégaux, avec * un ou ** plusieurs pé-	Inégales polypétales.	1 2
	tales.	Thegutes potypetates.	100
	to the same		
	Le périanthe ou la corolle tombe	Incomplettes	16
	a après la floraison,		17
*	b après la maturité du fruit.	Apétales.	* 1
		Nues	18
60	Rarement une coeffe	71 11625	-
	1		

Des Classes, Sections du Système de LINNÉ \*, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	FAMILLES.	CLASSES.	SECTION	NS. Noms sous lesquels cet Auteur les a désignées.
11	Graminées	- 2	2,3,4	Plantes à calice , à balles , glumacées.
52	Rubiacées,	8	5	Pl. à calice, à périanthe uniflore simple, à couronne.
33	Aggrégées.	5	5	Pl. à calice, à périanthe multiflore commun.
44	Borraginées.	12	4	Pl. à calice, à périanthe uniflore simple, à fleurs égales monopétales.
55	Ombelliferes.	4	1,2,3,4,5	Pl. à calice, à involucre, à fleurs ombellées.
66	Liliacées.	1-16	3, 6-4	Pl. à calice, à spathe : Pl. privées de calice on de corolle, à fleurs incomplettes.
77	Caryophyllees.	13	5	Pl. à calice, à périanthe uniflore simple, à fleurs égales polypétales.
88	Arbres fruitiers.	7	t,3	Pl. à calice, à périanthe uniflore simple, produisant une fleur sur ses parois internes.
99	Ranonculées.	16	3,4	Pl. privées de calice ou de corolle, à fleurs incom- plettes.
co	Labiées.	14	1	Pl. à calice , à périanthe uniflore simple , à fleurs iné-
11	Personnées.	14	a	Pl. à calice, à périanthe uniflore simple, à fleurs iné-
22	Cruciféres.	11	3	Pl. à calice, à périanthe uniflore simple caduc.
33	Malvacées.	6		Pl. à onlice, à périanthe uniflore double.
41	Légumineuses.	15		Pl. à calice, à périanthe uniflore simple, à fleurs iné- gales polypétales.
55	Composées.	5 1	, 2,3,4,6, 7, 8	Pl. à calice à périanthe multiflore commun.
55	Orchidées.	8		Pl. à calice, à périanthe uniflore simple, à cou-
77	Coniféres.	3	i	Pl. à calice, à chatons.
811	Cucurbitacées.	8		Pl. à calice, à périanthe uniflore simple, à cou-
9)	Fougéres.	18	X	
0,1	Mousses,	18	2	
	Algues.	18	3	Pl. à calise, à coiffe, à fleurs nues.
21	Champignons.	18	4	

#### CLEF du Système de LINNÉ. \*\*

11	LES NOCES DES PLANTES SONT										
I	Publiques, et leurs fleurs visibles										
	Io	Monoclines , Maris et femmes dans un seul et même lit, Fleurs hermaphrodites : étamines et pistils dans la même fieur.									
		A	(Sans affinité Les maris n'étant point parents entre eux. Les étamines n'étant réunies par aucune de leurs parties								
			a	Les n	nari	ordination ni affinité s ne gardant entre eux au lines n'offrant aucune pro	ucune subordination. portion déterminée.				
				1	1	Monandrie.	7 Heptandrie.				
8.					2	Diandrie.	8 Oceandrie.				
					3	Triandrie	9 Ennéandrie.				
		إ			4	Tetrandrie.	10 Décandrie.				
					5	Pentandrie.	II Dodécandrie.				
1					6	Hexandrie.	12 Icosandrie.				
							13 Polyandrie.				
3			ъ	Avec	sub	ordination					
				Des 1	mari éta	s préférés aux autres. mines toujours plus cour	tes.				
-					14	Didynamie.	15 Tetradynamie.				
1		В	Av	ec affir	ité,						
			Les	maris Sétami	éta	nt parents entre eux. étant unies entr'elles, o	u avec le pistil.				
				1	16	Monadelphie.	19 Syngenesie.				
					17	Diadelphie.	20 Gynandrie.				
	18 Polyadelphie.						56				
	20	Die	cline	5		4,000					
-1	(	Ma Fle	ris e	et femt mâles	nes et f	dans des lits différents. emelles dans la même es	pece.				
	40			- 1	21	Monoecie.	23 Polygamie.				
	100					Diagria	113 17 400 21				

110 Cachées, et leurs fleurs à peine visibles.

1 24 Cryptogamie.

Des Classes, Ordres du Système de LINNÉ \*\*, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

1		2016	active Lamittes surventes.
Familles.	Classes.	Ordres	Noms sous lesquels cet Auteur les a désignées.
Graminées.	3	2	Plantes à fleurs visibles , monoclines , triandres digynes ,
Rubiacées.	4	I	Pl. à fleurs visibles, monoclines, tetrandres monogynes, monopétales à deux semences, supérieures, étoilées.
Aggrégées.	4	1	Pl. à fleurs visibles, monoclines, tétrandres monogynes, monopétales supérieures, aggrégées.
l Borraginées.	5	r	Pl. à fleurs visibles, monoclines, pentandres monogynes, monopétales inférieures à quatre semences, aspéri-
Ombelliferes.	5	2	feuilles.  Pl. à fleurs visibles, monoclines, pentandres digynes, pentapétales supérieures, à deux semences, om- bellées.
LLiliacées.	6	r	Pl. à fleurs visibles, monoclines, hexandres mono-
(Caryophyllees.	10	2, 3, 4	Pl. à fleurs visibles, monoclines, décandres digynes, trigynes, pentagynes.
Arbresfruitiers	12	1,2,3,4	Pl. à fleurs visibles , monoclines , icosandres mono-
Ranonculées.	13-	5	gynes, digynes, trigynes, pentagynes.  Pl. à fleurs visibles, monoclines, polyandres, poli- gynes.
LLabiées.	14	1	Pl. à fleurs visibles , monoclines , didynames , gymnos-
PPersonnées.	14	2	Pl. à fleurs visibles , monoclines , didynames , angios-
Cruciferes.	15	1,_2.	Pl. à fleurs visibles, monoclines, tétradynames, silicu-
Malvacées.	16	8	Pl. à fleurs visibles , monoclines , monadelphes.
L'égummeuses.	17	-	Pl. à fleurs visibles, monoclines, diadelphes.
Composées.	19	1,2,3,4,5	P. à fleurs visibles , monoclines , syngeneses polygames.
Odrchidées.	20	1.	Pl. à fleurs visibles, monoclines, gynandres diandres.
CConiferes	21	9	Pl. à fleurs visibles , diclines , monoiques mona-
Cucurbitacées.	21	10	Pl. à fleurs visibles, diclines, monoiques synge-
Fougéres.	2/4		(
Mousses.	24		Pro a comment
Algues.	2/4		Pl. à fleurs invisibles, ou cryptog ames.
CChampignons.	2/2		1

#### CLEF du Système de THUNBERG.

#### LES NOCES DES PLANTES SONT

I Publiques , et leurs fleurs visibles ,

A Sans affinité, Les maris n'étant point parents entre eux. Les étamines n'étant réunies par aucune de leurs parties.

a Sans subordination ni affinité Les maris ne gardant entre eux aueune subordination. Les étamines n'offrant aucune proportion déterminée

I Monandrie.

2 Diandrie.

3 Triandrie:

4 Tétrandrie.

5 Pentandrie.

6 Hexandrie.

7 Heptandrie.

8 Octandrie.

9 Ennéandrie.

10 Décandrie.

II Dodécandrie.

12 Icosandrie.

13 Polyandrie.

b Avec subordination

Des maris préférés aux autres. Deux étamines toujours plus courtes.

14 Didynamie.

1 15 Tétradynamie.

B Avec affinité

Les maris étant parents entre eux. Les étamines étant réunies par quelqu'une de leurs parties.

> 16 Monadelphie. 18 Polyadelphie. 17 Diadelphie. 19 Syngénésie. 16 Monadelphie.

Ho Cachées, et leurs fleurs invisibles.

1 20 Cryptogamie.

Des Classes, Ordres du Système de Thunberg, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

8			
	FAMILLES.	CLASSES.	ORDRES. Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.
,	Graminées.	3	2 Plantes à fleurs visibles triandres digynes.
12	Rubiacées.	4	1 Pl. à fleurs visibles tétrandres monogynes.
13	Aggrégées.	4	Pl. à fleurs visibles tétrandres monogynes.
44	Borraginées.	5	1 Pl. à fleurs visibles pentandres monogynes.
1 4	Ombelliferes.	5	2 Pl. à fleurs visibles pentandres digynes.
16	Liliacées.	6	1 Pl. à fleurs visibles hexandres monogynes.
:7	Caryophyllees.	10	2, 3, 4 Pl. à fleurs visibles décandres, digynes, trigynes, pentagynes.
18	Arbres fruitiers	. 12	1, 2, 3 Pl. à fleurs visibles icosandres, monogynes, digynes, pentagynes.
19	Ranonculées.	13	5 Pl. à fleurs visibles palyandres polygines.
aac	Labiées.	14	1 Pl. à fleurs visibles didynames gymnospermes.
111	Personnées.	14	2 Pl. à fleurs visibles didynames angiospermes.
112	Cruciferes.	15	Pl. à fleurs visibles tétradynames siliculeuses et sili- queuses.
133	Malvacées.	16	8 Pl. à fleurs visibles monadelphes polyandres.
144	Légumineuses.	17	- Pl. à fleurs visibles diadelphes.
13	Composées.	19	1, 2, 3 Pl. à fleurs visibles syngeneses polygames.
166	Orchidées.	2	1 Pl. à fleurs visibles diandres monogynes.
	Coniferes.	16	1, 2, 7 Pl. à fleurs visibles monadelphes triandres, tétrandres, polyandres.
188	Cucurbitacées.	19	4 Pl. à fleurs visibles syngéneses monogames.
199	Fougéres.	20	1 (
110	Mousses.	20	2 Pl. à fleurs invisibles, ou cryptogames.
	Algues.	20	3 g
-32	Champignons.	20	4

#### CLEF du Système de' GMELIN.

#### LES NOCES DES PLANTES SONT

Io Publiques, et leurs fleurs visibles.

A | Sans affinité

Les maris n'étant point parents entre eux.

Les étamines n'étant réunies par aucune de leurs parties.

a Sans subordination ni affinité

Les maris ne gardant entre eux aucune subordination. Les étamines n'offrant aucune proportion déterminée.

I Monandrie.

2 Diandrie.

3 Triandrie.

4 Tétrandrie.

5 Pentandrie.

6 Hexandrie.

7 Heptandrie.

8 Octandrie.

9 Ennéandrie.

10 Décandrie.

II Dadécandrie.

12 Polyandrie.

b Avec subordination

Des maris préférés aux autres. Deux étamines toujours plus courtes.

1 13 Didynamie.

14 Tetradynamie.

B Avec affinité

Les maris étant parents entre eux: Les étamines étant réunies par quelqu'une de leurs parties.

15 Monadelphie.

16 Diadelphie.

17 Polyadelphie.

18 Syngénésie.

110 Cachées, et leurs fleurs invisibles.

19 Cryptogamie.

Des Classes, Ordres du Système de GMEIIN, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

FAMILLES.	CLASSES.	ORDRES. NOMS sous lesquels cet auteur les a
Graminées.	3	2 Plantes à fleurs visibles, triandres digynes, grami-
22 Rubiacées.	4	Pl. à fleurs visibles, tétrandres monogynes monopétales supérieures, à deux semences, étoilées.
33 Aggrégées.	4	Pl. à fleurs visibles, tétrandres monogynes monopétales inférieures et supérieures à une semence, aggrégées.
Borraginées.	5	Pl. à fleurs visibles, pentandres monogynes monopétales supérieures, à quatre semences, aspérifeuilles.
5 Ombelliferes.	5	2 Pl. à fleurs visibles, pentandres digynes, pentapétales supérieures, à deux semences, ombellées.
5 Liliacées.	6	1 Pl. à fleurs visibles, hexandres monogynes, à calice à spathe et sans calice.
Caryophyllees.	10	2, 3, 4, 5 Pl. à fleurs visibles, décandres, digynes, trigynes,
Arbres fruitiers.	12	1,2,3,5 Pl. à fleurs visibles, polyandres monogynes, digynes, trigynes, pentagynes, à étamines insérées sur le calice.
Ranonculees.	12	5, 11 Pl. à fleurs visibles, polyandres, pentagynes, poli- gynes, à étamines insérées sur le réceptacle.
l Labiées.	13	1 Pl. à sleurs vigibles , didynames gymnospermes.
Personnées.	13	2 Pl. à fleurs visibles, didynames angiospermes.
Cruciferes.	14	1, 2 Pl. à sleurs visibles, tetradynames siliculeuses et sili-
lMalvacées.	15	13 Pl. à fleurs visibles , monadelphes polyandres.
L'égumineuses.	16	- Pl. à fleurs visibles , diadelphes.
(Composées.	18	1,2,3,4,5 Pl. à sleurs visibles, syngenéses polygames.
Orchidées.	2	I Pl. à fleurs visibles, diandres monogynes.
Coniferes	15	3, 4, 13 Pl. à fleurs visibles, monadelphes, triandres, tetran-
(Cucurbitacées.	3	I Pl. à fleurs visibles , triandres monogynes , qui
Fougéres.	19	rieures.
Mousses.	19	
AAlgues.	-19	3 Pl. à fleurs invisibles, ou cryptogames.
Champignons.	19	4 2

# CLEF DU SYSTÊME

#### DE VILLARS.

			Monandrie.	1
			Diandrie.	21
			Triandrie.	31
		The second of the control of	Tétrandrie.	4
1.0	Déterminées. 4 .		Pentandrie.	5
			Hexandrie.	6
3			Octandrie.	8
		A COLUMN TO SERVICE AND A SERV	Décandrie.	10
			Dodécandrie.	12
Etamines	10	Réunies par leurs filaments.	Heptandrie, N nadelphie, L delphie.	To- Dia
II.¢	Indéterminées.20	Au-dessus de douze insérées sur le calice	Ennéandrie et sandrie.	Ico
	3°	Au-dessus de 30 insérées sur le réceptacle.	Polyandrie.	11
III.º	Invisibles ? .		Cryptogamie.	

T	A	B	L	E	Ta	Ь.	5	9
---	---	---	---	---	----	----	---	---

Ves Classes, Sections du Système de VIIIARS, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

1	<b>原本国际的是一种企业</b>	-		damilles survantes.
1			SECTION	
P	It Graminées.	3	1	Plantes à étamines déterminées, triandres digynes,
ı				graminées.
	2 Rubiacées.	4	3	Pl. à écumines déterminées , tétrandres , rubiacées.
I				
	3 Aggrégées.	4	I	Pl. à étamines déterminées, tetrandres, dipsacées.
I.	( P	5		
ľ	4 Borraginées.	3	1	Pl. à étamines déterminées, pentundres, borraginées.
ŀ	5 Ombelliferes.	5	II	Pl. à étamines déterminées , pentandres , ombelli-
	o o mocimieres,			feres.
I,	er:11 /	-	-	A A A Same and A Same
0	5 Liliacées.	3	5	Pl. à étamines déterminées, hexandres, Illiacées.
1	7 Caryophyllées.	10	2	Pl. à étamines déterminées , décandres , caryo-
1	/ Caryophynees.	10		phyllees.
8	8 Arbres fruitiers.	9	2	Pl. à écamines indéterminées, au-dessus de douze
ı	A STATE OF THE PARTY OF			insérées sur le calice , icosandres , rosacées.
9	9 Ranonculées.	II	2	Pl. à étamines indéterminées , au-dessus de trente ,
	A second second			insérées sur le réceptacle, polyandres polygynes.
o	Labiées.	4	6	Pl. à étamines décerminées , tétrandres , lubiées.
ľ	A standard to	7		Pl. a etamines determinees, tetranges, tablees.
1	Personnées.	4	7	Pl. à étamines déterminées , tétrandres , personnées.
2:	2 Cruciféres.	6	3	Pl. à étamines déterminées , hexandres , cruciformes.
7	Maluandas	7		Pl. à étamines indéterminées , réunies par leurs filamens ,
3.	3 Malvacées.	1	2	heptandres, monadelphes, malvacées.
9	a condition of the same			
4	4 Légumineuses.	7	3	Pl. à étamines indéterminées, réunies par leurs filamens, diadelphes, légumineuses.
В				with the state of
5	Composées.	5	13	Pl. à étamines déferminées , à anthéres réunies , pen-
	le distributed	TO S		tandres syngeneses , cynarocephales ou flosculeuses ,
			5	chicoracées ou semi-flosculeuses, corymbiferes ou radiées.
100	10 1111			
D.	6 Orchidées.	2	4	Pl. à étamines déterminées, gynandres, diandres, orchidées.
	A COLUMN TO THE PARTY OF	1		
7	7 Coniféres.	11	5	Pl. à étamines indéterminées, conferes.
0	20 11 1	-		
195	3 Cucurbitacées.	5	12	Pl. à étamines déterminées , pentandres , à fleurs simples , à étamines réunies , en rapport par ce
				dernier attribut avec les syngeneses.
rec	Fougéres.	13	1,2	-
	Mousses.	13	3	Pl. à étamines invisibles ou orypeogames.
	Algues.	13	4	a control of clyptogameri
124	Champignons.	13	5	\$

# CLEF DU SYSTEME

#### DE GLEDISTCH.


'I.°	Apparente.	r. Etamines insérées dans le réceptacle.	Graminées. Ombelliferes. Cruciferes. Liliacées. Caryophyllées. Ranonculées. Légumineuses.
La fructification des végétaux est		2. Etamines insérées sur la corolle.	Aggrégées. Etoilées. Personnées. Labiées. Borraginées. Spathacées. Malvacées. Composées.
La fructificatio		4. Etamines insérées sur le	Icosandres. Cucurbitacées.
II.°	Cachée.	5	Fougéres: Mousses. Algues. Champignons.

MBLE des Classes, Ordres du Système de GIEDISTCH, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

, pui	tent tes	vingi-u	cut I unities surraines.
FAMILLES.	CLASSES.	ORDRES	. Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.
(Graminées.	I	3	Plantes à fructification apparente, à étamines insérées sur le réceptacle, à trois antheres, à fleurs glumacées.
Rubiacées.	2	4	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur la corolle, à quatre antheres, à fleurs simples égales, à deux semences réunies.
Aggrégées.	2	4	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur la corolle, à quatre antheres, à fieurs aggrégées.
Borraginées.	2	5	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur la corolle, à cinq antheres, à fleurs, simples com- plettes, à quatre semences nues, aspériféculles.
(Ombelliferes.	I	5	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur le receptuele, à cinq antheres, à fieurs ombellées.
ILiliacées.	1—2	6-6	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur le receptacle, à fleurs simples incomplettes : à étamines insérées sur la corolle, à fleurs incomplettes.
(Caryophyllées.	- 197 1000	10	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur le réceptacle, à dix anthères, à fleurs pentapétales, à une capsule.
Arbres fruitiers	s. 3	7	Pl., à fructification apparente, à étamines insérées sur le calice, à plusieurs authenes, à fleurs complettes.
Ranonculées.	I	12	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur le réceptacle, à plusieurs antheres, a fleurs complettes et incomplettes.
ILabiées.	2	2, 4	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur la corolle, à quatre antheres, à fleurs simples inégales ou en gueule, à quatre semences nues au fond du caline.
IPersonnées.	2:	2,4	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur la corolle, à quatre antheres, à fleurs samples iné- gales ou en gueule, a semences couvertes par un- péricarpe.
(Cruciferes.	I	6	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur le récepéacle, à six anthères, à fleurs simples com- plettes, tétrapetales siliqueuses.
Malvacées.	2	13	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur la corolle, à filamens réums en forme de cylindre, columniferes.
Légumineuses.	T	13	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur le réceptacle.
(Composées.	2	14	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur la corolle, à filament réunis, à fleurs simples papil-
(Orchidées.	4	L	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur le pistil, à deux antheres, orchidées.
(Coniferes.	I	13.	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur le receptacle, à filamens réunis, à fleurs à chatons.
(Cucurbitacées.	4	8.	Pl. à fructification apparente, à étamines insérées sur le colice.
Fougéres.	5	1,2,3,4	
Mousses.	6.	1,2,3	Pl. à fructification cashés.
Algues.	7 8		
Champignons	0_	1,2,3,4	

#### CLEF DU SYSTEME


#### D' H A L L E R. \*\*



Des Classes, Ordres du Système d'HALIER \*\*, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

ı				0	
I.		Graminées.	CLASSES 5	. ORDRE	Pl. à étamines et fleurs visibles apétales graminées.
Г		de la faille de la company	3	Y sea to	
1	2	Rubiacées.	10	3	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones, à étamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle.
643	3	Aggrégées.	15	I	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones, à une semence nue, à fleur assise sur la semence, dipsacées.
4	4	Borraginées.	10		Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones, à étamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle.
17.5	5	Ombelliferes.	10	I	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones, à étamines en nombre égal à celui des divisions de les corolle.
6	6	Liliacées.	7	2	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées monocotyledones, liliacées.
7	7	Caryophyllées.	9	-	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones; à étamines en nombre double de celui des pétales.
88	8.	Arbres fruitiers.	8		Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones, à étamines nombreuses, pommiferes.
a	91	Ranonculées.	8		Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones à étamines nombreuses, multisiliqueuses, et à plu- sieurs semences nues.
00	0]	Labiées.	14	3	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones, à quatre étamines dont deux plus longues.
L		Personnées.	14	1,2	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones , à quatre étamines dont deux plus longues.
122	2 (	Cruciferes.	12	1,2	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones, à étamines une fois et demie plus nombreuses que les
33	3 1	Malvagées.	8	d-	pétales.  Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones, à étamines nombreuses,
44	I	Légumineuses.	13	-	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones, à étamines plus nombreuses que les pétales.
55	6	Composées.	15	2	Pl. à éramines et fleurs visibles pétalées dicotyledones, à une semence nue, à fleur assise sur la semence.
66	6 (	Orchidées.	7	I	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées monocotyle- dones, orchidées.
		Coniféres.	5	3	Pl. à étamines et fleurs visibles apétales , coniferes.
35	3 (	Cucurbitacées.	10	-	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées dicotyledones ,
					à étamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle, cucurbitacées.
		ougéres.	3	-	(
		Mousses.	2		Pl. à étamines et fleurs invisibles
		Algues.	1,2	-	The state of the s
and a		Champignons.	de .		


#### CLEF du Système d'HALLER. \*\*\*



# ABLE des Classes, Ordres du Système d'HAIIER\*\*\*, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

100 Value per 13			The second secon
FAMILLES.	CLASSES.	ORDRES.	Noms sous lesquels cet Auteur les a désignées.
Graminées.	12	4	Plantes à étamines et fleurs visibles , apétales , gra- minées.
Rubiacées.	6	8	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle, étoilées.
Aggrégées.	1	6	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées composées, à étamines libres, dipsacces.
Borraginées.	6	6	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle, aspérifeuilles.
COmbelliferes.	6	9	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle, ombelliferes.
L'Illacées.	,	tos telepropia	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines au nombre de six inégales, illiacées.
Caryophyllees.	7	1	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines en nombre double de celui des pétales.
AArbres fruitiers.	8	6	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines nombreuses, baccifères.
RRanonculées.	8	7	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines nombreuses, à fleurs insérées sur le réceptacle.
lLabiées.	a		Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines au nombre de quatre inégales, didynames à fieur difforme, à quatre semences nues.
Personnées.	2	a	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines au nombre de quatre inégales, didynames à fleur difforme, à semences convertes.
CCruciferes,	4	-	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées, à six, éta- mines dont deux plus courtes, cruciferes siliqueuses et siliculeuses.
Malvacées.	8	4	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines nombreuses, columniferes ou malvacées.
Légumineuses.	3	1, 2, 3	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines inégales réunies, papillonacées.
CComposées.	d d amig	1, 1, 3, 4	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées composées, à étamines réunies, à fleurons applatis, à fieurs ra-diées, flosculeuses, en tête.
Odrchidées.	10	Angua Madays	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées, à deux éta-
CConiferes.	13	7	Pl. à étamines et fleurs visibles apétales , à sexes séparés ( conferes.
CCucurbitacées.	6.	3	Pl. à étamines et fleurs visibles pétalées, à étamines en nombre égal à celui des divisions de la corolle, cucurbitacées.
FFougéres.	14, 15	-	Pl. à étamines et fleurs invisibles, à tige à feuilles, à feuilles sans tige, fougeres.
MAousses.	16	-	Pl. à étamines et fleurs invisibles , mousses.
WAlgues.	17, 18		Pl à étamines et fleurs invisibles, lichens, filamen-
CChampignons.	19		Pl. à étamines et fleurs invisibles , champignons.

#### CLEF du Système de WACHENDORF.



les Classes, Ordres du Système de WACHENDORF, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	.1	OTILLO	
FFAMILLES.	CLASSES.	ORDRES. Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.	
Graminées.	18	Plantes à fleurs apparentes ou visibles, monocotyledone à calice à balles.	es,
Rubiacées.	2	<ul> <li>Pl. à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledones complettes ou parfaites à nombre égal de division au calice et à la corolle.</li> </ul>	s ,
Aggrégées.	10	Pl. à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledones complettes ou parfaites, à antheres distinctes.	,
Borraginées.	I	2 Pl. à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledone complettes ou parfaites, à semences nues.	5 ,
Ombelliferes.	1	Pl. à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledones complettes ou purfaites, à semences nues.	,
Liliacées.	15, 17	Pl. à fleurs apparentes ou visibles, monocotyledone sans calice, et à calice en spathe.	ıs,
Caryophyllees.	4	Pl. à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledone complettes ou parfaites, à étamines plus nombreu que les pétales.	233
Arbres fruitier	s. 4	Pl. à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledone complettes ou parfaites, à étamines plus nombreu que les pétales.	
Ranonculées.	5 , 12	Pl. à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledone complettes ou parfaites, à étamines en nombre impavec les pétales, et à calice ou corolle seulement.	air
Labiées.	7	1 Pl. à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledone complettes on parfaites, à deux étamines plongues.	
Personnées.	7	2 Pl. à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledone complettes ou parfaites, à deux étamines pi longues.	
Cruciferes.	. 8 .	Pl. à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledone, complettes ou parfaites, à quatre étamines p longues.	
Malvacées.	6	Pl. à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledone complettes ou parfaites, à étamines réunies par filamens en forme de cylindre.	
Legumineuses	9	Pl. à sleurs apparentes ou visibles, polycotyledone complettes ou parfaites, à antheres, plus not breuses que les silamens.	
Composées.	11	Pl. à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledone complettes ou parfaites, à antheres réunies en clindre.	
Orchidées.	17	- Pl. à fleurs apparentes ou visibles, monocotyledone à calice en spathe.	es,
Coniferes.	13	- Pl. à fleurs apparentes ou visibles, polycotyledone incomplettes ou imparfaites, à étamines et pist séparés sur le même pied.	ils.
Cucurbitacées.	13	Pl. à fleurs apparentes ou visibles, polycosyledone incomplettes ou imparfaites, à étamines et pist séparés sur le même pied.	
Fougéres.	19	1 (	
Mousses.	19	2 Pl. à fleurs cachées ou invisibles.	
Algues.	19	3 ) to a firm turner of manifest	
Champignous.	19	1	

# CLEF DU SYSTÊME

#### D'ALLIONI.

		(		
			Monopétales simples ? .	1
		Landolped of	Monopétales composées	21
		- sustain -	Di-et-Tripétales	03
		and the same	Tetrapétales cruciformes. :	4
	10	Pétalées.	Tetra-ou-Pentapétales papillonacées	21.5
, steel	arysaeram atti	a proper to the	Pentapétales ombelliferes	6
	manufactures	A THE TOTAL SE	Pentapétales non-gymnodispermes	71
I.º	Visibles.	- manual	Hexapétales	88
urs	Manager Color	er magaza	Polypétales	C
les fle		minuments.		
Les plantes ont des fleurs		Apétales.<	Apétales non-graminées	10
intes	20		Graminées	111
es pla	William States A	· material		
	Invisibles.	}	Cryptogames	121
(	Spring of W			E al

Classes, Ordres du Système d'Allioni, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

FFAMILLES. (	CLASSES.	ORDRES	s. Noms sous lesquels cet auteur les a
Graminees.	11	1	désignées.  Plantes à fleurs visibles apétales, graminées.
Rubiacées.	1	2	Ple à fleurs visibles pétalées monopétales simples à deux semences nues.
Aggrégées.	2	i	Pl. à fleurs visibles pétalées monopétales composées à antheres séparées.
Borraginées.	. 1	3	Pl. à fleurs visibles pétalées monopétales simples à quatre semences nues.
Ombelliferes.	6		Pl. à fleurs visibles pétalées gentapétales, ombelliferes.
Liliacées.	8	2	Pl. à fleurs visibles pétalées, hexapétales.
(Caryophyllees.	7	3	P1. à fleurs visibles pétalées pentapétales à étamines libres, à semences couvertes, à calice monophyle.
Arbresfruitiers	7	3	Pl. à fleurs visibles pétalées pentapétales à fruit pul- peux.
lRanonculées.	9		Pl. à fleurs visibles pétalées pentapétales, à étamines libres à semences couvertes, sans calice.
Labiées.	1 .	3	Pl., à fleurs, visibles pétalées monopétales simples, à quatre semences nues, à deux et quatre étamines.
l Personnées.	1	4	Pl. à fleurs visibles pétalées monopétales simples, à semences couvertes, en masque.
(Cruciferes.	4	2	Pl. à fleurs visibles pétalées tétrapétales cruciformes à à six étamines siliqueuses et siliculeuses.
l Malvacées.	7	I.	Pl. à fleurs visibles pétalées pentapétales, qui no sont pas à deux semences nues, à étamines réunies.
Légumineuses.	5.	-	Pl. à fleurs visibles pétalées à quatre ou cinq pétales ; papillonacées.
Composées.	.2	1	Pl. à fleurs visibles pétalées monopétales composées, à antheres véumes.
Orchidées.	. 8	I.	Pl. à fleurs visibles pétalées hexapétales à deum éta-
(Coniferes.	10	P	Pl. à fleurs visibles apétales , à filamens réunis.
Cucurbitacées.	1 .	6.	P. à fleurs visibles pétalées monopétales simples, à fruit pulpeux, à trois étamines.
Fougéres.	12	1	(
Mousses.	- 12 0	2	Jp. 3 Company
Algues.	12/	3.	Pl. à fleurs invisibles ou eryprogames.
Champignons.	12	4	•

# CLEF du Système de GILIBERT.

	intringual to	the execution of district of social	China China
1.0	Visibles	A. non - figurées.	Etoilées. Borraginées. Malvacées.
6.0	Unipétales	B. figurées.	Labiées. Personnées.
4	I.º	C. composées ī : .	Flosculeuses.
			Radiées. Lingulées.
-841	g,	A. uniformes: :	Ombelliferes. Cruciferes.
des fleurs	rolles Polypétales	B. difformes.	Papillonacées.
ont	des corolles	C. à peu d'étamines.	Caryophyllées.
Les plantes	et d	D. à étamines nombreuses	Ranonculacées. Icosandres.
Les	lettes	A. apétales calycinées à étamines.	Amentacées. Coniferes.
.6.10	5.º Incomplettes	B. pétalées sans calice.	Liliacées. Orchidées.
	634	C. pétalées et calycinées.	Jones. Graminées.
II.°	Invisibles	Cryptogames: 5 5	Fougéres. Mousses. Algues. Champignons!

#### Des Séries, Collections, Fascicules du Système de GILIBERT, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

		Po	recite tes	vingi-uca	LI Tuntites surventes.
	Familles.	Séries.	Collections.		désignées.
11 (	Graminées.	3	3	2 ]	Pl. à fleurs visibles, à corolles incomplettes pétalées et calycinées, graminées.
a i I	Rublacées.	1	1	2 I	etamines et un style, étoilées.
31 4	Aggrégées.	1	3	. 1 1	Pl. à fleurs visibles, à corolles unipétales à fleurs composées flosculeuses, à antheres libres.
T	Borraginées.	1		a I	l. à fleurs visibles, à corolles unipétales non-figurées à cinq étamines, un style, à quatre semences nues, aspérifeuilles.
510	Imbelliferes.	2		1 F	Pl. à fleurs visibles, à corolles polypétales uniformes, ombelliferes.
11	iliacées.	3	2	2 F	Pl. à fleurs visibles, à corolles incomplettes péta- loides sans calice, liliacées.
60	Caryophyllées.	3	4	a F	Il. à fleurs visibles, à corolles polypétales, à peu d'étamines, en nombre double de celui des pétales, caryophyllées.
1 A	rbres fruitiers.	2	5		l. à fleurs visibles, à corolles polypétales, à étamines nombreuses, insérées sur les parois internes du calice.
IR	anonculées.	3	5	8 P	l. à fleurs visibles, à corolles polypétales à étamines nombreuses, insérées sur le réceptacle.
H	ablées.	1 4	3		l. à fleurs visibles, à corolles unipétales figurées, à deux ou quatre étamines inégales, à un style, à quatre semences nues.
FP	ersonnées.	1	3		l. à fleurs visibles, à corolles unipétales figurées, à deux, trois ou quatre étamines inégales, à semences renfermées dans une capsule.
CC	ruciferes.	2	2.		. à fleurs visibles, à corolles polypétales uniformes, cruciferes ou tétrapétales.
MM	Ialyacees.	1	1		l. à fleurs visibles, à corolles unipétales non-figurées, à étamines nombreuses, réunies par leurs filamens, engainant le pistil, malvacées.
IL	égumineuses.	3	3 1	, 2, 3P	l. à fleurs visibles, à corolles polypétales difformes, papillonacées.
CC	omposées.	1	3 1	, 2, 3 P	l. à fleurs visibles, à corolles unipétales à fleurs composées, flosculeuses, radiées, lingulées.
CO	rchidées.	3		3 P	l. à fleurs visibles, à corolles incomplettes péta- loides sans calice, analogues aux liliacées, or- chidées.
CC	oniferes.	3	1	ı P	l. à fleurs visibles, à corolles incomplettes apétales calycinées à étamines, coniferes.
CC	ucurbitacées.	1	1	a P	l. à fleurs visibles, à corolles unipétales non-figurées, à cinq antheres réunies dans une seule fleur.
FF	ougéres.	4	r		
MM	lousses.	4	2 3	1	
AA	Igues.	4	3	- 3	Pl. à fleurs invisibles ou cryptogames.
CC	hampignons,	4	42	(	

# CLEF DU SYSTÈME

#### DE CRANTZ.

I. Cachée Absolu	Cryptanthemes : :	r
Absolu et d'affinité.	Incomplettes	2
Toute florescence est et son port	Composées. :	5
Toute	Graminées	4 5
II. Apparente. 2 Absolu et déliquescent.	Liliacées	6:
	Papillonacées	9)
To the Control of the	Ombelliferes	10)
	d a mending	
3° Simple.	Calyciflores. :	13.
	à peu d'étamines.	14
4° Classe artificielle.	à peu d'étamines.  à étamines nombreuses.	15

Tab. 73.

Des Classes, Ordres du Système de CRANTZ, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	FAMILLES.	CLASSES.	ORDR	ES. NOMS sous lesquels cet Auteur les a désignées.
11	Graminées.	4	1	Plantes à florescence apparente, à port absolu et déli- quescent, graminées.
22	Rubiacées.	13	1	Pl. à florescence apparente, à port simple, fructi- flores, monopétales étoilées.
33	Aggrégées.	3	-	Pl. à florescence apparente, à port absolu et déli- quescent, composées.
4+	Borraginées.	1/4	1	Pl. à florescence apparente, à classe artificielle, à peu d'étamines, monopétales.
51	Ombelliferes.	10	1, 2, 3	Pl. à florescence apparente, à port absolu et déliques- cent, ombelliferes.
	Liliacées.	6	1, 2	Pl. à florescence apparente, à port absolu et déliques- nent, liliacées.
10	Caryophyllées.	14	2	Pl. à florescence apparente, à classe artificielle, à pen d'étamines, polypétales.
2	Arbresfruitiers.	12	3	Pl. à florescence apparente, à port simple, calyci-
b	Ranonculées.	. 15	2	Pl. à florescence apparente, à classe artificielle, à étamines nombreuses, polypétales.
11	Labiées.	7	1	Pl. à florescence apparente, à port absolu et déliques- cent, à fleur en mussle, à semences nues.
I	Personnées.	7	2	Pl. à florescence apparente, à port absolu et déliques- cent, à fleur en muffle, à semences couvertes.
	Cruciferes.	9	1,2	Pl. à florescence apparente, à port absolu et déliques- cent, cruciformes siliqueuses et siliculeuses.
M	Malvacées.	11	1,2	Pl. à florescence apparente, à port absolu et déliques- cent, columniferes.
H	Légumineuses.	8	1,2	Pl. à florescence apparente, à port absolu et déliques- cent, papillonacées.
CC	Composées.	3	1,2,3	Pl. à florescence apparente, à port absolu et déliques- cent, composées, semi-flosculeuser, en tête, dis- coides, radiées.
α	Orchidées.	5	7	Pl. à florescence apparente, à port absolu et déliques- cent, orchidées.
1.3	Coniferes	2	3	Pl. à florescence apparente, à port simple et d'affinité, incomplettes sans étamines.
	Cucurbitacées. Cougéres.	2	-	Pl. à florescence apparente, à port simple et d'affinité, incomplettes sans étamines, cucuméracées.
	Mousses,	1	2	
	Algues,	ı	3,50	Pl. à florescence cachée, à port absolu.
C.	Champignons.	I	4	Example 1

Tab. 75.

ABLE	des	Classes da	Système de	HILL, ou	se rapportent	les
	1	vingt-	deux Famille	s suivantes.		

Maria Carlos Car	vingt-deux F	amilles suivantes.
FAMILLES.	CLASSES.	Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.
Graminées.	32	Plantes herbacées à fleurs visibles, éloignées, situées séparément sans ordre sur les différentes parties de la rige, parfaites incomplettes sans pétales et calice, pourvues de balles, glumacées.
Rubiacees	7	Pl. herb. à fleurs visibles, éloignées, situées réparément sans ordre sur les différentes parties de la tige, par- faites complettes, régulieres également formées par un seul pétale, monopétales.
Aggrégées.	5	Pl. herb. à fleurs visibles, à étamines rapprochées, renfermées dans un calice commun, à antheres libres, à fleurons caliculés, aggrégées.
Borraginées	7	Pl. herb. à fleurs visibles, éloignées, situées séparément sans ordre sur les différentes parties de la tige, par- faites complettes, régulières également formées par un seul pérale, monopétales.
Ombelliferes.	6	Pl. herb. à fleurs visibles, éloignées, situées séparément, circulairement au sommet de la tige, ombellées.
Liliacées.	a5	Pl. herb. à fleurs visibles, éloignées, situées séparément sans ordre sur les différentes parties de la tige, par- faites incomplettes, à pétales sans calice, à six pé-
(Caryophyllees,	II	Pl. herb. à fleurs visibles, éloignées, situées séparément sans ordre sur les différentes parties de la tige, par- faites complettes, régulières également formées par cinq pétales, pentapétales.
Arbres fruitiers.	· Tanomen	manuam i sellenti de di di
Ranonculées.	11 September	Pl. herb. à fleurs visibles, éloignées, situées séparément sans ordre sur les différentes parties de la tige, par- faites complettes, régulières également formées par
Labiées.	14	Pl, herb, à fleurs visibles, éloignées situées séparement sans ordre sur les différentes parties de la tige, par-
: Personnées.	14	faites complettes, trrégulieres inégalement divisées par un seul pétale, monopétales.  Pl. herb. à fleurs visibles, éloignées, situées séparément sans ordre sur les différentes parties de la tige, parfaites complettes, irrégulieres inégalement divisées par un seul pétale, monopétales,
Cruciféres.	10	Pl. herb, à fleurs visibles, éloignées, situées séparément sans ordre sur les différentes parties de la tige, par-faites complettes, régulières également formées par quatre pétales, tétrapétales.
Malvacées.	-	Pl. herb. à fleurs visibles, éloignées, situées séparément sans ordre sur les différentes parties de la tige, par- faites complettes, régulieres également formées par cinq pétales, pentapétales.
Légumineuses.	17	Pl. herb. à fleurs visibles, éloignées situées séparément sans ordre sur les différentes parties de la tige, par- faites complettes, irrégulieres inégalement divisées
Composées	1, 2, 3	par quatre pétales, tétrapétales.  Pl. herb. à fleurs visibles, rapprochées, renfermées dans un calice commun, à antheres réunies, à fleurons 1.º à deux divisions, 2.º concaves, 3.º applatis.
Orchidées.	18	Pl. herb. à fleurs visibles, éloignées, situées séparément sans ordre sur les différentes parties de la tige, par- faites complettes, irrégulieres inégalement divisées par cinq pétales, pentapétales.
Coniféres.	start too	A reacte and trait.
Cucurbitacées.	7	Pl. herb. à fleurs visibles, éloignées, situées séparément sans ordre sur les différentes parties de la tige, par- faites complettes, régulieres également formées par un seul pétale, monopétales.
Fougeres. Mousses.	. 36	
Algues.	37 39	Pl. herb. à fleurs invisibles,
Champignons.	38	Ł 10

# CLEF du Système de RAY.

LES VÉGÉTAUX SONT	143							
I. Des herbes privées de bourgeons	is Survey							
A Imparfaites	22							
Be Parfaites								
Mousses.								
1° (Dicotylédones Fougéres.	4							
	1170个1000							
A la fleur apétale Apétales.	. : 5							
	Sept.							
B à fleur composée.  C Fleur simple.  C Fleur simple.  Planipétales Discoïdes Corymbifere En tête.	6							
Discoides	?							
C Fleur simple Corymbigere	5 6							
En tete.	, , 50							
a à une seule semence nue. à semences	coli							
taires.								
b (à deux semences. Ombellifere	e. 11							
Etoilées	. Is							
c à quatre semences. Borraginées	13							
Verticillées.	. 14							
d'à plusieurs semences. Polysperme.	s 15							
The second secon	- 200							
aa à semences renfermées dans (Pommiferes	It							
une pulpe. : Bacciferes.	IT							
	-							
bb dans une mem- (*composée. Multisilique brane **simple. Monopétale.	uses. Il							
brane Simple. Monopétale.	s Ic							
	1. 01							
à 2 ou 3 péts								
Siliqueuses.								
Légumineus De martale	s 23							
Pentapétale.								
Floriferes. 2º (Monocotylédones. : à étamines.								
Difficiles à classer. Anomales.								
II. Des arbres pourvus de bourgeons								
11. ( Des arbres pour vus de Bourgeons								
A Monocotylédones Arundinacé	es 27							
B Dicotylédones à fleur	in the							
Vertical and the green transfer with the contract of the contr								
a(séparée du fruit Apétales!	7 1 20							
b réunie au fruit. Combiliqué. Fruit ombili	qué. 20							
** sans ombilie Fruitsanson	nbilic.30							
*** sec Fruit sec.	3							
**** en silique. Fruit à siliq	ие Э							
***** anomale. Arbres anon	Tales. Of							

ABLE Des Classes, Sections du Système de RAY, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

FAMILLES. GLASSES. SECTIONS Novembre de RAY, où se rapportent les Comment de RAY, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	vingi	-deux Fa	imilles suivantes.
The second of th	LASSES.	SECTIONS.	NOM8 sous lesquels cet auteur les a désignées.  Plantes herbacées privées de bourgeons, parfaites;
(Graminées.	25	1, 2	monocotyledones, à étamines.
Rubiacées	12	1	Pl. herb. privées de bourgeons, parfaites, divotyledones, à fleur simple, à deux semences étoilées.
Aggrégées.	9	2	Pl. herb. privées de bourgeons, parfaites, dicotyledones, à fleur composée, en tête.
Borraginées.	13		Pl. herb. privées de bourgeons, parfaites, dicotyledones, à fleur simple, à quatre semences, aspérifeuilles.
(Ombelliferes.	11	-	Pl. herb. privées de bourgeons, parfaires, dicotyledones, à fleur simple, à deux semences, ombelliferes.
1Liliacées.	24	1,2,4,5	Pl. herb. privées de bourgeons, parfaites, dicotyledones, à fleur simple, à semences renfermées dans une mem- brane simple, à trois loges.
(Caryophyllées.	23	1.	Pl. herb. privées de bourgeons, parfaites, dicotyledones, à fleur simple à cinq pétales, a capsule.
AArbresfruitiers.	29-30	1-1	Arbres pourvus de bourgeons dicotyledones, à fleur réunie au fruit.
BRanonculées.	15	3, 4, 5, 6	Pl. herb. privées de bourgeons, parfaites, dicotyledones, à fleue simple à plusieurs semences.
lLabiées,	14	1,2,3,4,5,	6 Pl. herb. privées de bourgeons, parfaites, dicotyledones, à fleur simple, à quatre semences, verticillées.
Personnées.	19	6,7	Pl. herb. privées de bourgeans, parfaites, dicotyledones, à fleur simple, à semences renfermées dans une mem- brane simple.
(Cruciferes.	31.	1,2,3,4,5,	6 Pl. herb. privées de bourgeons, parfaites, dicotyledones à fleur simple, à semences renfermées dans une mem- brane simple, tétrapétales, siliculeuses et sili- queuses.
Malvacées.	19	5.	Pl. herb. privées de bourgeons, parfaites, dicotyledones; à fleur simple, à semences renfermées dans une membrane simple, monopésales.
L'Égumineuses.		,2,3,4,5,6- -2,3,4	Pl. herb. privées de bourgeons, parfaites, dicotyledones, à fleur simple, à semences renfermées dans une membrane simple, légumineuses: Arbres pourvus de bourgeons, à fleur réunie nu fruit à silique.
(Composées.	6, 7, 8, 9	_	Pl. herb. privées de bourgeons, parfaites, dicosyledones, à fleur composée, 1.º planipétales laiteuses, 2.º discoides, 3.º corymbiferes, 4.º en tête.
Orchidées.	24	7	Pl. herb. privées de bourgeons, parfaites, dicotyledones, à fleur simple.
7 (Coniferes	28	1.	Arbres pourvus de bourgeons, dicotyledones, à fleur séparée du fruit, apésales.
CCucurbitacées.	16	1,2	Pl. herb, privées de bourgeons, parfaites, dicotyledones, à fleur simple, à semences renfermées dans une pulpe.
Fougeres.	4.	-	Pl. berb. privées de bourgeons, parfaites, capillaires.
Mousses.	3	.'—	Pl. herd. privées de bourgeons, parfaites, mousses_
AAlgues.	2, 3.	-	Pl. herb. privées de bourgeons, imparfaites, ou marines s parfaites mousses.
(Champignons,	n.	-	Bl. herb. privées de bourgeons, parfaites, champignons.

# DE LAMARCK

au. / 0.	H <sub>0</sub>	Ana	lyse.	to and seed	* ****
enperage p	Fleurs indistinctes.	parent son to	A N DOMESTIC	D.	tions
Amou.			C		
Algues. Champi	Fongeres.		2		Flu
Algues Champiguons.	res.	Carlon To	Fleurs sjointes.		Fleurs conjointes.
5		Comment.	P P	A===	Camp
	Sala Maria	Fleurs 1	Fleurs to sexuelles.	Fleurettes de deux sortes.	Fleurettes de même sorte.
36	34 33	Fleurs bi-	s uni-	es. ettes	ettes eme
22		-	Fleurs uni- (Fleurs monoiques. exuelles. (Fleurs dioïques A. O.	Pile	(Fie
Fleurs non- pétalée		Fleurs pétalées.	(Fleurs diorques.	Pieurs radiées.	Fleurs flosculeuses 1
- Cn	dalpare wil	es.	orques A	adiées	mi-fic
B (Ovaire sous la côrolle,  a (Fleurs núes,, b (Fleurs glumacées,	A STATE OF THE STA	II MILE WANTED	nes.	15 S. C.	uses.
aire :			Ovaire dans	100 C	nses.
sous l ides.	The state of the s		ans 5	> cu	и н.
a coro	-	7	<b>\_</b>	AAC	21
lie.	and the same of th	b Charte inportal attes		Fleurs	
	The state of the s			Fleurs	
	Park		A	A	
			0	NA PRINCESSOR	
NA STATE OF	with the same	THE REAL PROPERTY.	nze étamir ou plus,	ix étamin ou moins.	
	THE PARTY OF	and the	Onze étamines ou plus,	Dix étamines ou moins.	
331 8	a Comment		10101		
Coro	Land A. Co.	-	Pétal Pétal	Corol	Con
B Corolle polypétale. Orquides  etc.	4_		Pétales * insérés sur le calice. Tithymales. Rosiers. Rosiers sur le calice. Columniferes.	Fleurs labiées  Corolle polypérale  Fleurs papille	Corolle monopetale.
Lypet O	Ar A	E CI	nsérés Tit Ro non- Co	Ypéin Fle	-
Campanules. Campanules. Rubiacées. étale. Ombelliferes. Orquides.	Arroches, (etc. Liliacées, etc. Anémones.	Gistes	érés sur le cali Tithymales. Rosiers. Columniferes.	Fleurs labiées Fleurs cruciformes Fleurs papillonacée	Corolle Borra
nles. es iferes	s	les.	e cali	masquisées. ncifor	le rég
	: : :		Tithymales Rosiers non-insérés sur le calice Columniferes	Fleurs in inasque Fleurs in ines etale Fleurs cruciformes. Fleurs papillonacées.	* Corolle réguliere, : Borraginees etc.
		AND WA	ce.		
000000000000000000000000000000000000000	2 2 2	. 20	4222	13	0 70

T	A	B	L	E	Tab. 79.
---	---	---	---	---	----------

Des Classes du Système de LAMARCK, où se rapportent les vingt - deux Familles suivantes.

Familles suivantes.						
FAMILLES. CLASSE 3a	ES.	Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.  Plantes à fleurs distinctes disjointes bisenuelles non- pétalées, glumacées, graminées.				
Rubiacées. 27		Pl. à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire sous la corolle, monopétales, rubiacées.				
3 Aggrégées. 26		Pl. à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire sous la corolle, à corolle monopétale.				
, Borraginées, 7		Pl. à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes, à dix étamines ou moins, à corolle réguliere monopétale, borraginées.				
o Ombelliferes. a9		Pl. à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à oraire sous la corolle, à corolle polypétale, om- belliferes.				
Lillacées. 23		Pl. à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, incomplettes, liliacées.				
7. Caryophyllées. 13		Pl. à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à oxaire dans la corolle, complettes, à dix étamines ou moins, à corolle polypétale.				
Arbres fruitiers. 14	O CA	Pl. à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes, à onzé étamines ou plus, à pétales insérés sur le calice.				
h Ranonculées. 20, 24	9000	Pl. à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes, à onze étamines ou plus, à pétales non insérés sur le calice, incomplettes, anemones.				
10 Labiées.		Pl. à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes, à dix étamines ou moins, à corolle monopétale, irrégulière, labiées.				
Personnées. 9		Pl. à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes, à dix étamines ou moins, à corolle monopétale, irréguliere, en masque.				
Cruciferes. 12		Pl. à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes, à dix étaminés ou moins, à corolle polypétale, cruciformes.				
3; Malyacées. 18	3	Pl. à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes, à onze étamines ou plus, à pétales nou-insérés sur le calice, columniferes.				
Légumineuses.	Mos)	Pl. à fleurs distinctes disjointes bixexuelles pétalées, à ovaire dans la corolle, complettes, à dix étamines ou moins, à corolle polypétale, papillonacées.				
Composées. 1,2,3	a id	Pl. à fleurs distinctes conjointes 1.º à fleurettes de même sorte, flosculeuses et semi-flosculeuses, 2.º à fleurettes de deux sortes, radiées.				
Orchidées. 30		Pl. à fleurs distinctes disjointes bisexuelles pétalées, à ovaire sous la corolle, à corolle polypétale, or-chidées.				
Coniferes. 4,5		Pl. à fleurs distinctes disjointes unisexuelles monoiques et dioiques.				
Cucurbitacées. 4		Pl. à fleurs distinctes disjointes unisexuelles monoiques;				
Fougéres. 33	116.4	Pl. à fleurs indistinctes , fougeres.				
Mousses, 34		Pl. à fleurs indistinctes , mousses.				
Algues. 35		Pl. à fleurs indistinctes , algues.				
Champignons, 26		Pl. à fleurs indistinctes , champignous.				

# CLEF DU SYSTEME


#### DE SAUVAGES.

Ioc	Dépourvue	es		Sans feuilles.	1
	de feuilles.		The same	(aphylla.)	
	Teames.		and the second	a. Radicales	2
A			PER SE	b. Etroites	3:
Les plantes sont		A	Entiéres.	c. Larges	4
s plant				d. Opposées : (deux à deux.)	5.
Le	Io	Simples.		e. En anneaux	6
4.11			- A	S and a second	7.
II°	Garnies de	В	Divisées.	a. Digitées	7
11 (	feuilles.		the state of the s	b. Palmées	83
- 1111					
Vanda Vanda				a. Pinnées	5.)
4 4.0	20	Composées.	b. Décomposées	Id:	
*10				c. Laciniées	IX
			100	The second second	-

ABLE des Classes, Ordres du Système de SAUVAGES, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	portent te	s vingt-a	eux familles suivantes.
FAMILLES. Graminées.	CLASSES 3	ORDRES	s. Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.  Plantes garnies de feuilles simples entieres étroites.
Rubiacées.	6	2	Pl. garnies de feuilles simples entieres en anneaux.
Aggrégées.	5-9-10	7-6-8	P1. garnies de feuilles 1.º simples entieres opposées ; 2.º composées pinnées et décomposées.
Borraginées.	3-4	5-4	Pl. garnies de feuilles simples entieres , étroites et
Ombelliferes.	9-10	7-7	Pl. garnies de feuilles composées pinnées, décom-
I Liliacées.	2-3	4-3	Pl. garnies de feuilles simples entieres, étroites es
Caryophyllee	5. 5	5	Pl. garnies de feuilles simples entieres opposées.
Arbres fruitie	rs.3-4-9-11	5-2, 4-6-5	Pl. gernies de feuilles 1.9 simples entieres, étroites et larges; 2.9 composées, pinnées, laciniées.
I Ranonculées.	7-8-10	4-4, 5-6	Pl. garnies de feuilles 1.º simples divisées, digitées et palmées; 2.º composées, décomposées.
l Labiées.	5-7-8-10-11	4-3-3-5-4	Pl. garnies de feuilles 1.º simples entieres opposées; 2.º divisées, digitées et palmées; 3.º composées, décomposées et laciniées.
IPersonnées.	5-6-10-11	3-3-4, 5-4	Pl. garnies de feuilles 1.º simples entieres, opposées et en anneaux; 2.º composées, décomposées et laciniées.
(Cruciferes,	3-4-9-10-11		Pl. garnies de feuilles 1.º simples entieres, étroites te larges; 2.º composées, pinnées, décomposées, laciniées.
Malvacées.	4-8-11	3, 4-2-3	Pl. garnies de feuilles 1.º simples entieres larges; 2º. divisées palmées; 3.º composées laciniées.
Légumineuses	. 3-4-7-8-9	5-2-5-5-7	Pl. garnies de feuilles 1.9 simples entieres, étroites et larges; 2.9 divisées, digitées et palmées; 3.9 com- posées, pinnées.
Composées. 3-4	-5-9-10-11 4	,5-3,6-7-6-8	Pl. garnies de feuilles 1.8 simples entieres , étroites ,
	-6	5,7,8	larges, opposées; 2.8 composées, pinnées, décom- posées, laciniées.
Orchidées.	2	5	Pl. garnies de feuilles simples entieres tadicales.
Coniferes.	3-5-6	4-1-5	Pl. garnies de feuilles simples entieres, étroites, oppo- sées, en anneaux.
CCucurbitacées	. 4-8	4-2	Pl. garnies de feuilles simples entieres larges ; 2.º di- visées palmées.
Gougéres,	9-10	2-1	Pl. garnies de feuilles composées, pinnées décom- posées.
Mousses,	3-4	1-1	Pl. garnies de feuilles simples entieres, étroites et larges.
Allgues,	1-2-9	5-10-1	Pl. dépourvues de feuilles : Pl. garnies de feuilles 1.º simples entières radicales ; 2.º composées , pinnées.
Champignons.	1	1	Pl. dépourvues de feuilles.

# CLEF du Système de VAN-ROYEN.



Tab. 83.

**	'ABLE des Classes, Ordres du Système de VAN-ROYEN, où se rapportent				
	ज गा से	les ving	deux	Familles survantes.	
	FAMILLES.			Noms sous lesquels cet auteur les à désignées.  Plantes monocotyledones à calice à balles.	
	Graminees.	3	4, 5, 4		
2	Rubiacées.	L B U.	2 5	Pl. polycotyledones à calice propre à fruit différent, à étamines visibles, à calice et corolle, à filamens proportionnés assis sur le germe.	
33	Aggrégées.	7	ì	Pl. polycotyledones à calice commun à perianthe, à antheres séparées.	
61	Borraginées.	16	4	Pl. polycotyledones à calice propre à fruit différent ,	
1		conimum Head		à étamines visibles, à calice et corolle, à filamens libres, en nombre égal à celui des divisions de la	
2.5	Ombelliferes.	an good y	3.3%	Pl. polycotyledones à calice commun à involucre, om-	
	(pergynes.)	lice	, -, -, -,	belliferes.	
65	Liliacées.	201211,61	1,2,3	Pl. monocoryledones rans valice.	
27	Caryophyllees.	17	2	Pl. polycotyledones à calice propre à fruit différent ;	
				libres en nombre double de celui des pétales.	
8 8	Arbresfruitiers	it lie	3	Pl. polycotyledones à calice propre à fruit différent , à	
55		i aminos i	HE.	étamines visibles , à calice es corolle , à filamens pro- portionnes insérés sur le calice.	
03	Ranonculées.	18	2,3	Pl. polycotyledones à valice propre à fruit différent , à	
ľ		1 Sammon	113	étamines visibles, à calice et corolle, à filamens	
1.1	Carrie Act.			libres, en nombre trois fois plus considérable que velui des pétales.	
02	Labiées.	13	à	Pt. polycotyledones à Calice propre à fruit différent ,	
E		organie pa	310	à étamines visibles, à calice et corolle, à filamens proportionnés, dont deux plus longs.	
	Personnées.	12	Tic	Pl. polycotyledones à calice propre à fruit différent ;	
ľ	(pugging)	Hee.	3	à étamines visibles, à calice et corolle, à filament	
	C -: C	2	301	proportionnés, dont deux plus longs.	
2:	Cruciferes.	13	1, 2	Pl. polycotyledones à calice propre à fruit différent; à étamines visibles, à calice et corolle, à filament	
	entrition 17 (	(one	3	proportionne's , dont quatre plus longs.	
33	Malvacées.	14	-	Pl. polycotyledones à calice propre à fruit différent , à étamines visibles , à calice et vorolle , à filument	
				proportionnés réunis en un corps.	
4	Légumineuses.	15	1, 2		
ŀ				à étamines visibles , à calice et corolle , à filamens proportionnés réunis en deux corps.	
5	6 Composées.	6	1, 2, 3,	4 Pl. polycotyledones à valice commun à périanthe, à	
		mmines in	SIE	antheres réunies.	
10	6 Orchidées.	lice! e.	35	Pl. monocotyledones à valice en spathe,	
117	7 Coniferes.	4	. 2	Pl. polycotyledones à calice commun à chatonts	
000	8 Cucurbitacées.	a addiesas	in it	Pl. polycotyletlones à valice propre à fruit différent ; à étamines visibles , à calice et corolle , à filamens proportionnés insérés sur le calice;	
10	Fougéres.	ig	1	E	
10	o Mousses.	19	3	Pl. à étamines invisibles , à substânce herbaceles	
	2 Champignons.	19	4	t it	

# CLEF DU SYSTÊME

#### DE JUSSIEU.

1.00	Acotylédones.	andergraphic	Classe II
II.º	Monocotylédones.	Pl. pareodynamics and their second se	A (Etamines placées sous les pistil. (hypogynes.) 21 B Etamines placées sur le calice. (périgynes.) 3 C Etamines portées sur le pistil (epigynes) 4
	Too	Apétales	A Etamines portées sur le pis- til (epigynes.) 5 B Etamines insérées sur le ca- lice . (périgynes.) 6 C Etamines placées sous le pis- til (hypogynes.) 7
III.º	2° Dicotylédones	Monopétales.	A Corolle placée sous le pistil . (hypogyne.) 8 B Corolle insérée sur le calice (périgyne.) 9 C portée sur le (* antheres pistil (epi-gyne.) ** antheres sur le care réunies. 10 gyne.) ** antheres
A COLUMN	30	Polypétales.	A Etamines portées sur le pis- til (epigynes.) 12 B Etamines placées sur le pis- til . (hypogynes.) 13 C Etamines insérées sur le ca- lice (périgynes.) 14
	40	Diclines irré- gulieres.	Etamines séparées du pis- til (idiogynes.) 15

ABLE des Classes, Ordres du Système de Jussieu, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

Pol	telle tes	5 5 5 5	A 1 D
FAMILLES.	CLASSES.	ORDRES	. Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.
(Graminées.	Calse an	23 4 A	Plantes monocotyledones, à étamines placées sous le pistil, graminées.
l Rubiacées.	н	Va. F.	Pl. dicotyledones monopétales, à corolle portée sur le
Aggrégées	man old	7	Pl. dicotyledones monopétales, à corolle portée sur le pistil, à anthères distinctes, dipsacées.
1Borraginées.	S de plas	9	Pl. dicotyledones monopétales , à corolle placée sous le pistil , borraginées.
Ombelliferes.	12.	.8 2 3	Pl. dicotyledanes polypétales, à étamines portées sur le pistil, ombelliferes.
ILiliacées.	-3	46 =	
Emilies.	20 ED.	4,0,7	Pl. monocosyledones, à étamines insérées sur le calice, lis, asphodeles narcisses.
(Caryophyllees.	13: 10	22	Pl. dicotyledones polypésales, à étamines placées sous le pistil, caryophyllées.
Arbres fruitiers.	14		Pl. dicotyledones polypétales , à étamines insérées sur le calice , rosacées.
l Ranonculées.	-13 -A & &s	VI. I-	Pl. dicotyledones polypétales, à étamines placées sons le pistil, remonaulacées.
lLabiées.	. 81 10	- 6	Pi. dicotyledones monopétules, à corolle placée sous-
l Personnées.	-8 GA	2,3,5,7,12	Pl. dicotyledones monopétales , à corolle placée sous , le pistil, pédiculaires , acanthes , gattiliers , scrophu-
. Vorgroness.	-26 GB	2	laires , bignones. 1971 . Cla 8-1
(Cruciferes.	13	3.	Pl. dicotyledones polypétales , à étamines placées sous . le pistil , cruciferes.
Malvacées.	13 bs-	14	Pl. dicotyledones, polypétales, à étamines placées sous, le pistil, malvacées.
L'égumineuses.	14.	LINT	Pl. dicotyledones polypétales , à étamines insérées sur
Pl. prasses.	BH 18-		le salice, légumineuses.
Composées.	1000	1, 2, 3	Pl. dicotyledones monopétales, à corolle portée sur le pistil, à antheres réunies, chicoracées, cynarocéphales, corymbiferes.
Orchidées.	CH4EE-	3	Pl. monocotyledones, à étamines portées sur le pistil;
Coniferes.	15,	5	Pl. dicotyledones apétales, à étamines idiogynes on séparées du pistil, coniferes.
Cucurbitacées.	15.	2:	Pl. dicotyledones apétales, à étamines idiogynes est.
Fougéres.	uni e	5	Pl. acoeyledones ; fougeres.
Mousses.	HH TE	4	Pl. aposyledones, mousses.
Algues.	1013	2, 3	Pl. acotyledones, algues, hépatiques.
Champignons	TE POC-	-6 r	Pl. acotyledones, champignons,

#### CLEF du Système d'OEDER.

#### CLASSES.

I. A. Cryptantheres. à étamines invisibles.

H. B. Monocotylédones.

à une seule feuille seminale:

III. C. Amentacées.

à fleurs en chatons ou en minet.

IV. D. Incomplettes.

sans calice ou sans corolle.

V. E. Calycarpes.

à semences enveloppées par le calice

VI. F. Calycauthémes.

à fleurs insérées sur le calice.

VII. G. Monopétales.

à fleurs d'une seule piece.

VIII. H. Polypétales.

à fleurs de plusieurs pieces.

#### FAMILLES.

I. -I-I AA. Filamenteuses et crustacées.

2-2 AB. Champignons.

3—3 AC. Mousses.

4-4 AD. Fougéres.

3—19 EC. Ombelliferes.

4-20 ED. Etoilées.

5-21 EE. à baies.

6-22 EF. Fructifications 2º solitaires.

II. -1-5 BA. Graminées. VI. 1-23 FA. Rosacées.

amentacées.

3-7 BC. Graminoïdes co-

4-8 BD. Tripétaloïdes.

5-9 BE. Spathacees à massue.

6-10 BF. Liliacées.

7-11 BG. Orchidées.

2-6 BB. Graminoïdes -2-24 FB. Calycanthemes, de Linné.

rolloides. VII. -1-25 GA. Aspérifeuilles.

2-26 GB. Verticillées.

3-27 GC. Personnées.

4-28 GD. Régulieres à capsules.

5-29 GE. Bicornes, de

\_\_\_ Linné. 1-30HA.Monopétaloïdes

2-31 HB. Pl. grasses.

3-32 HB. Pl. à bec.

HD. HE. HF. Périanthe caduc.

4-33 HD. Multicapsu-

laires.

5-34 HE. Papaverines.

6-35 HF. Tetrapétales cruciferes.

IV. -1-14 DA. Pl. aquatiques. 2-15 DB. Oleracées.

2-13 CB. à chatons.

III. -1-12 CA. Coniferes.

3-16 DC. à capsules et. baies.

5— EA. EB. EC. ED. EE. fructifications 1º réunies dans un réceptacle commun.

> 1-17 EA. Composées. 2-18 EB. Aggrégées

7-36 HG. Calice persistant, une seule - capsule.

8-37 HH. Réceptacle fongueux.

9-38 HI. Papillonacées.

Des Classes, Familles du Système d'OEDER, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

IFAMILLES.	CLASSES.	FAMIL	LES. Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.
II Graminées.	2	1	Plantes monocotyledones, graminées.
2 Rubiacées.	5	4	Pl. calycarpes, étoilées.
33 Aggrégées.	sudju as	d sacr	Pl. calyearpes, aggrégées.
44 Borraginées.	7 well	of tre	Pl. monopétales ; aspérifeuilles.
5 Ombelliferes	. 15××	.173	Pl. calycarpes, ombelliferes.
63 Liliacées.	eur, c'est	on 6	Pl. monocotyledones , liliacées.
77 Caryophyllée	es. 8	JVX.	Pl. polypétales
83 Arbres fruitie	15 FILL	X	Pl. calycanthemes, rosacées,
9) Ranonculées.		095	Pl. polypétales , multicapsulaires.
o Labiées.	nt des pla	duld a	Pl. monopétales, verticillées.
Personnées.	urla prem	8 399711 3	1.9 G. Celles dont les étamines sont in
2: Cruciferes.	8 112		Pl. monopétales , personnées.
MX JX X X	ur la8seco		Pl. polypétales, tétrapétales cruciferes.
8i Malvacées.	8	3	Pt. polypetales , à bec.
4 Légumineuses	. 8	9	Pl. polypétales , papillonacées.
5i Composées.	5	1	Pl. calycarpes, composées.
6; Orchidées.	2	7	Pl. monocotyledones , orchidées.
Coniferes.	ap3 ap 11	q alim	Pl. amentacées , coniferes.
Cucurbitacées	5.111.	6	Pl. calycarpes , à fruesifications solitaires.
) Fougéres.	ry les tri	4	Pl. cryptantheres , fougeres.
Mousses.	in release	3	Pl. cryptantheres, mousses.
Algues.	ud <b>i</b> reelas	2	Pl. cryptuntheres , filamenteuses et crustacies;
: Champignons.	regulatel	I I	Pl. cryptaniheres, champignons.
1	T.		Coppendences , engingagaons.

# CLEF DU SYSTEME

#### DE SCOPOLI

Parmi les 36 tribus de cet Auteur, on remarque les plantes qui sont,

- 1.º A. Privées de fleurs visibles, telles sont les tribus I. II. 1. XXXV.
- 2.º B. Celles qui n'ent qu'une enveloppe à la fleur, c'est-à dire le calicer dans les tribus IV. V. VI., dans la plupart des plantes des tribus IX. XVIII. 2. XXIII. XXXII. XXXIII.
  - C. Celles qui ont deux enveloppes à la fleur, c'est-à-dire le calice et la corolle, 3.º D. l'une et l'autre monophylles dans les tribus IX. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI.
  - E. Celles dont l'enveloppe extérieure est monophylle, l'intérieure polypétale, dans les tribus VII. XVIII. XIX. XX. dans la plupart des plantes des tribus XXV. XXVI. XXX.
  - F. Celles qui ont les deux enveloppes polyphylles, dans les tribus.
    III VIII XVII. XXII. dans la plupart des plantes des tribus.
    XXIII. XXIV. XXVIII.
- 4.º G. Celles dont les étamines sont insérées sur la première enveloppe, c'est-à-dire sur le calice, dans les tribus IV. XVIII. XIX. XXXII. 2. XXXIII.

  - K. Celles dont les étamines sont insérées sur le germe, dans la tribu V.
- 5.º L. Celles dont les étamines sont réunies par quelques-unes de leurs parties, dans les tribus XIX. 2. XXIV. XXV. XXVI. XXVII. dans quelques plantes des tribus XXXIII. I. XXXIV.
- 6.º M. Celles dont le germe est inférieur, dans les tribus V. VI. dans la plupart des plantes des tribus VII. VIII. IX. X. XI.
- 7.º N. Celles dont les semences sont nues, dans les tribus III. VIII. IX. XIV. XV. 1. XVIII. 2.
- 8.º O. Celles dont les sexes sont différents, dans les tribus XXI. XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. 2. dans la plupart des plantes de la tribu II.

# ABLE des Tribus, Familles, Divisions, Ordres du Système de Scopoli, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	11	111	nevito	27111	300 1-5	ash areiv xst
	Familles	Tribus, I	Familles, 1	Divisions	. Ordres.	Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.
4:	Graminées.	19135	1	1,2	1,2,3,4	Plantes à semences nues , graminées.
9000	Rubiacées.	Yo	8,5,7,8	_	-	Pl. à étamines insérées sur la corolle, à germe inférieur, aparines.
	Aggrégées.	9	1	-	-	Pl. à codice et corolle d'une seule piece, à étamines insérées sur la corolle, a germe inférieur, à fleur composée, à filamens des étammer libres.
E	Borraginées.	13	2	1	2	Pl à calice et corolle d'une seule piece, à étamines insérées sur la corolle, aspéri- feuilles.
0	Ombelliferes.	8 India	1,21	5	1,2,3	Pl. à calice et corolle de plusieurs pieces , à étamines insérées sur le réceptuele, à germe inférieur, à semences nues , ombelliferes.
I	Liliacées.	4 Liller	1,2,3	18	-	Pl. à calice seulement, à étamines insérées sur le calice, liliacées.
C	Caryophyllees.	30	Y.	- 1	-	Pl. à calice d'une seule piece, à corolle de plusieurs pieces, à étamines insérées sur le réceptacle, caryophyllées.
A	Arbres fruitiers	s. 19	2	1, 2	· Fall	Pl. à calice d'une seule piece, à corolle de plusieurs pieces, à étamines insérées sur le calice, à fléurs insérées sur le calice.
R	Canonculées.	22 1	1,2	2	-	Pl. à calice et corolle de plusieurs pieces, à étamines insérées sur le réceptacle, à plusieurs semences.
1	Labiées.	14	1,2	1,2	-	Pl. à calice et corolle d'une seule piece, à éta- mines insérées sur la corolle, à semences nues, verticillées.
P	dersonnées.	15	1, 2	1, 2	1,2	Pl. à calice et corolle d'une seule piece, à étamines insérées sur la corolle, personnées.
	Cruciferes.	28	1,2,8	7	1 -	Pl. à calloe et corolle de plusieurs pieces, à étamines insérées sur le réceptacle, antis- corbutiques.
No. of Concession, Name of Street, or other Persons, or other Pers	Malvacées.	25	0.0	T S. de	2	Pl. à calice d'une seule piece, à corolle de plusieurs pieces, à étamines insérées sur le réceptacle, réunies par leurs filamens, columniferes.
	éégumineuses.	26	2	1, 2	1,2,3	Pl. à calice d'une seule piece, à étamines insérées sur le réceptacte, réunies par leurs filamens, légumineuses.
-	Composées.	9	2 1	2-3 1,	2,3-1,2- 1,2,3,4	Pl. à calice et corolle, à étamines insérées sur la corolle, à germe inféricur, composées.
44.	rrchidées.	5	1	_	-	Pl. à calice, à étamines insérées sur le germe, à germe inférieur, orchidées.
	oniferes	34	-	_	-	Pl. à étamines réunies par leurs filamens , à sexes différens , coniferes.
15	ucurbitacées.	II Foundar	2	-	7	Pl. à calice et corolle d'une seule piece, à étamines insérées sur la corolle, cucurbi-
1	oougéres.	2	1	1,2	-	no Monages, 58
11.	ligues.	35 2-35	2-3	T-	-	Pl. privées de fleurs vhibless
1	hampignons.	3613	1, 2	-	-	as Champignons a 3

			N, ou se rapporten
FAMILLES.	FAMILLES.	SECTIONS.	NOMS sous lesquels ce
1 Graminées:	7	1,2,3,4,5,6,7,8	Gramens.
2 Rubiacées.	19	- 4	Aparines.
3 Aggrégées.	20	1	Scabieuses.
4 Borraginées.	24	2	Bourraches.
5 Ombelliferes.	15	1,2,3,4,5,6,7	Ombelliferes.
6 Liliacées.	8	2, 3, 4, 6, 7	Liliacées.
7 Caryophyllées.	34	1,2	Alsines.
8 Arbres fruitiers.	41, 42	3, 2	Rosiers et jujubiersa
9 Ranonculées.	55	T, 2	Renoncules.
to Labiées.	25	- 1,2,3	Labiées.
11 Personnées.	26, 27	1,2,3,4	Personnées.
12 Cruciferes:	52	-1,2,3,4	Cruciferes.
13 Malvagées.	50	2, 3	Malvacées.
14 Légumineuses.	43	2,3,4,5,6	Légumineuses:
15 Composées.	16	1,2,3,4,6,7,8,9,	Composées
16 Orchidées.	10	THE PARTY OF	Orchidées.
17 Coniféres.	57		Pins.
18 Cucurbitacées.	18		Briones:
19 Fougéres.	5	1,2	Fougéress
20 Mousses.	58	1, 2	Mousses.
21 Algues.	3,4	-	Fucus, hépatiques:
22 Champignons,	2	- see 1,1	Champignons.

# TABLE des Ordres, Sections de Guettarn, oit se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

П	les vingt-deux Familles suivantes.					
1	FAMILLES.	ORDRES.	SECTION	s. Noms sous lesquels cet auteur les 2 désignées.		
17	Graminées.	8		Graminées.		
22	Rubiacées.	21	in the later and	Aparinées à filers coniques, simples, roides, terminés par une pointe très-aigue ou filets en aiguille.		
33	Aggrégées.	26	1,2,3	Dipsacées à filets 1.º coniques simples, 2.º coniques à glandes vessiculaires, 3.º coniques à glandes à cupule.		
4.L	Borraginées.	23	-	Borraginées à filets en poinçons, c'est-à-dire, roides, portés sur un mammelon gros plus ou moins conique, et formé de plusieurs vessicules parenchymateuses.		
55	Ombelliferes.	22	1 , 2	Ombelliferes sans filets ou à filets coniques simples.		
66	Liliacées.	7	-	Liliacées sans filets et à filets cylindriques simples ; couchés irrégulierement.		
77	Caryophyllèes.	36	1, 2, 3	Plantes à fleurs en œillet 1.9 sans filets et qui sont grasses et épaisses, 2.2 qui ont des filets coniques à val- vule, 3.0 des filets coniques à valvule, et des glandes à cupule, qui jettent une liqueur gluante.		
88	Arbres fruitiers.	17	1, 2	Pomiferes 1.º à filets cylindriques et dentelures épaisses, 2.º à filets cylindriques, dentelures épaisses et glandes à godet.		
97	Ranonculées.	15	1,2,3	Anemonées 1.º glabres et épaisses, 2.º à filets cylin- driques simples, 3.º à filets cylindriques, à glandes à cupule.		
00	Labiées.	33	1,2,3,4,5,6	Ladiées à filets contques.		
11	Personnées.	32	1,2,3,4	Plantes à fleurs en masque, à filets coniques articules, à glandes à cupule et glandes globulaires.		
21	Cruciferes.	28	1,2,3,4,5	Cruciferes sans filets ou à filets.		
3;	Malvacées.	29		Malvacées à glandes à houpes composées de plus on moins de filets, répandues sur les feuilles, les tiges, les calice et souvent sur les pétales, et à filets simples, coniques, longs, sur les principales nervures des feuilles.		
41	Légumineuses:	t3	1,2	Papillonacees à filets cylindriques.		
6	Composées. 38	,39,40,41	-	1.º cynarocephales, 2.º plantes à fleurons, 3.º radiées, 4.º à demi-fleurons.		
8;	Orchidées.	. 6	-	Orchis sans filets.		
77	Coniferes.	10	-	Plantes à glandes miliaires.		
3	Cucurbitacées.	34	-	Cucurbitacées à filets à articulations, roides, portés sur un tubercule ou mammelon.		
b	Fougeres.	3	-	Fougeres sans filets.		
1	Mousses.	4	-	Mousses à filets très-rares.		
1	Algues.	2	-	Algues sans filees.		
4:	Champignons.		-	Champignons sans filess,		

#### Tab. 92.

# TABLE des Genres de Necker, où se rapportent les vingt-deux. Familles suivantes.

FAMILLES.  r Graminées.	Genres.	Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.  Plantes à fructification à balles ou en écailles.
2 Rubiacées.	8	Pl. à feuilles réunies autour de la tige, en formes
3 Aggrégées.	4	Pl. dont les fleurons rassemblés offrent le coup-d'ail.
4 Borraginées.	TA .	Pl. à quatre semences réunies au fond du calice, aspé-
5 Ombelliferes.	7	Pl. à fructification en ombelle, à fruit divisible en deux.
6 Liliacées.	43, 44	Pl. à fructification enveloppée par une membrane, à spathe, à fruit à troit loges : Pl. à six étamines égales, souvent opposées aux pétales, à fruit anguleux, sans spathe.
7 Caryophyllées.	21	Pl. à peu d'étamines insérées en partie sur les onglets des pétales, en partie sur le réceptaele.
8 Arbres fruitiers.	18	Pl. à fruit le plus souvent succulent ou charnu, à éta-
9 Ranonculées.	27, 28	Pl. à étamines nombreuses, à fruits aggrégés béans : Pl. à étamines nombreuses, à fruits entassés non- béans, qui laissent appercevoir les semences.
10 Labiées.	13	Pl. dont la partie supérieure de la corolle qui supporta- les étamines, imite un casque.
11 Personnées.	14, 15	Pl. à fleurs didynames irrégulieres ou anomales, imitan- une bouche ouverte: Pl à fleurs didynames régulieres imitant une bouche ouverte.
12 Cruciféres.	37, 38	Pl. à fleurs disposées en croix, à fruit siliqueux Pl. à petites fleurs tétrapétales, à fruit court et villi- culeux.
13 Malvacées.	33	Pl. à étamines nombreuses réunies , imitant un l'
14 Légumineuses.	36	Pl. à fleurs irrégulieres, à pétale inférieur constamment l carené, à étamines monadelphes es diadelphes.
15 Composées.	1,2,3	Pl. à fleurs composées, 1.º à fleurons du rayon lingue les applatis, à fleurons du disque tubulées, 2.º fleurons également lingulés, applatis, 3.º à fleurons également tubulés.
16 Orchidées.	41	Pl. à sexes posés l'un sur l'autre, à étamines cachées!
17 Coniféres.	48	Pl. à fruit conique, composé d'écailles épaisses en recouvrement.
18 Cucurbitacées.	10	Pl. à fleur tellement adhérente au fruit, qu'il ne peu en être séparé.
19 Fougéres.	52	Pl. à fructification en globules, situées au sommet o
20 Mousses.	53	Pl. mousseuses en gazons.
21 Algues.	54	Algues ou plantes formées par un développement suc essif et continuel.
22 Champiguous.		

#### TABLE Tab. 93.

Des Ordres naturels de LINNE \*\*\*, où se rapportent les vingt-deux Familles suivantes.

	FAMILLES.	ORDRES.	Noms sous lesquels cet auteur les a désignées.
1	Graminées.	14	Graminées.
2	Rubiacées.	44	Étoilées.
3	Aggrégées.	18	Aggrégées:
4	Borraginées.	43	Aspérifeuilles.
5	Ombelliferes.	2.2	Ombellées.
6	Liliacées.	8,9,10	Spathacées, coronaires (à couronne) liliacées.
7	Caryophyllées:	42	Caryophyllées.
8	Arbres fruitiers	37, 38	Pomacées, drupacées.
9	Ranonculées.	23	Multisiliqueuses:
110	Labiées.	58	Verticillées!
III	Personnées:	59	Personnées.
112	Cruciféres:	57	Siliqueuses:
113	Malvacéès:	34	Columniferes:
114	Légumineuses	55.	Papillonacées:
115	Composées.	21	Composées:
116	Orchidées	4	Orchidées 2
117	Coniféres.	15	Coniferes.
118	Cucurbitacées.	45	Cucurbitacées.
119	Fougéres.	64	Fougéres.
220	Mousses.	65	Mousses.
121	Algues.	66	Algues.
122	2 Champignons.	67	Champignons:

# Tab. 94.

TABLE

Des Ordres naturels d	de GERARD, où se	rapportent les	vingt-deux
	Familles suivantes.	A Ton	

		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FAMILLES.	ORDRES.	Noms sous lesquels cet auteur
I Graminées.	6	Graminees.
2 Rubiacées.	21	Rubiacées.
3 Aggrégées.	20	Dipsacees, aggrégées.
4 Borraginées.	26	Aspériseuilles.
5 Ombelliferes.	22	Ombelliferes.
6 Liliacées.	13, 14, 15	Narcisses, lys, coronaires
7 Caryophyllées.	40	Caryophyllées.
8 Arbres fruitiers.	56	Pomiferes.
9 Ranonculées	38	Ranunculacées.
10 Labiées.	23	Labiées.
II Personnées.	24	Personnées.
12 Cruciferes.	33	Tétrapétales.
13 Malvacées.	57	Columniferes.
14 Légumineuses.	58	Papillonacées.
15 Composées.	17, 18, 19	Chicoracées, cynaroce- phales, corymbiferes.
16 Orchidées.	8	Orchidées.
17 Coniferes.	63	Coniferes.
18 Cucurbitacées.	50	Cucurbitacées.
19 Fougéres.	4	Fougéres.
20 Mousses.	3	Mousses.
21 Algues.	2	Algues.
22 Champignons.	N Zg	Champignons.

Des Ordres naturels de WUIF, où se rapportent les vingt-deux
Familles suivantes.

FAMILLES.	ORDRES.	Noms sous lesquels cet auteur
11 Graminées	6	Graminées.
2 Rubiacée	19	Rubiacées.
63 Aggrégées	18	Dipsacées.
4 Borraginées.	23	Aspérifeuilles.
ombelliferes.	20	Ombelliferes.
6 Liliacées.	12, 13	Iris et coronaires
· Caryophyllées.	36	Caryophyllées.
Arbres fruitiers	49	Pomacées.
Ranonculées.	34	Ranunculacées.
Labiées.	21	Labićes.
Personnées.	22	Personnées.
Cruciferes.	30	Tétrapétales.
Malvacées.	50	Columniferes.
Légumineuses.	5r	Papillonacées.
Composées.	15, 16, 17	Chicoracées , cynaroce-
1000		phales, corymbiferes.
Orchidées.	8	Orchidées.
Coniferes.	55	Coniferes.
Cucurbitacées.	-	_
Fougéres.	4	Fougéres.
l Mousses.	3	Mousses.
Algues.	2	Algues.
(Champignons.	3	Champignons.

# 09 UR H OMB H L H H R H S

	Ombelles parfaites.			
807 OD UT	Semences.	0.7	20	0,1
5º Trois ou quatre fois plus longues que larges. :	A à quatre ailes:  B à deux ailes a Striées.  b Alongées, applaties.  c Courtes applaties.  d Crenelées sur le bord.  Tordilium.  Laserpitium.  Angelica, Imperatoria, Carvifolia.  Allées.  Peucedanum.  Carvifolia.  Tordilium.	Sillonnées.  B Plus courtes couronnées	Lisses	Striées. B. Ovales
ndix.	ia, Carvifolia.	2 2		thusas


Tab. 96.

Ombelles imparfaites.

Astrantia, Sanicula, Hydrocotyle,

#### CLEF du Système de SEGUIER.

#### SUR LES MOUSSES!



## CLEF DU SYSTEME

DE DILLEN

Sur les Champignons.

ons of	Ont un chapi- A teau et un pédi-	Sont lamelleux.		. Amanita.
s champignons	cule B	Non-lamelleux. b<		. Erinaceus
II.	Sont dépourvus de chapiteau A	à tiges	à fossettes	. Morchelle.
	et de pédicu- le	The same of the sa	Planes horizon	
	* almainin		Globuleux.	Control of the last

# CLEF DU SYSTÊME

#### DE GLEDITSCH,

#### Sur les Champignons.

refructification des Champignons échappant à raison de son extrême petitesse, à nos yeux aidés d'une loupe, est

		1			
16	growt :	Tou Ends			Davie of the grant seems of the
Ш	Appa- rente				
Ш		Dispersée	A loss	loddi.	Bauern, (Gaseard) Diding
Ш		blee à la		A.	Fibreux Byssus.
Н	MAN.	superficie.		₿. <	En massue, obtus, entiers, ou pointus et divisés
Н	2	1		C.	Plisses concaves et de dit-
	00 14	37738		8991	ferente figure Elvela.
ļ	30	Dans des			A. ( Découpées
K	3234	recepta- cles par-		-	supérieurement Phallus.
Н	(	ticuliers.		3	En tête.
Н	W. Lind	- Pres	pulsa.		a (Tubulés , Boletus.
Ш					B. Linférieurement Lamelleux . Agaricus.
	13	Egási		etilt	b Lamelleux, Agaricus.
	1.	Dans Ia cavité		A.	Campanulés Peziza.
	13 1.		Ducorps	e A.	b Lamelleux, Agaricus.
T constraint and the pass	1° cachée		de la	A.	b Lamelleux, Agaricus.
Course Statement Statement	1° Cachée		Du corps de la plante.	AND II	Campanulés Peziza.
Commentation and the pass		cavité COOT	de la	AND II	Campanulés Peziza.  En touples Clathrus.  Stemonists
Township and the second	cachée		de la	AND II	Campanulés Peziza.  En touples Clathrus.
Constitution of the last		Dans la	de la	AND II	Campanulés. Peziza.  En touples Clathrus.  et Stemonitis. Lycoperdon.
Township of the Parket of the		Dans la	de la	AND II	Campanulés. Peziza.  En touples Clathrus.  et Stemonitis. Lycoperdon.
Township of the Parket of the		Dans la	de la	AND II	Campanulés. Peziza.  En touples Clathrus.  et Stemonitis. Lycoperdon.

Tab. 100.

Noms des Auteurs.	Leur Patrie.	Années de leur Naissance.	Années de leur Mort.	Durée o	
Adanson	François	Normal Par	2.		200
ALLIONI	Italien	and distributed	1797	Binna Bin	
ARTEDI	Suédois	Service a	petitusso		
BAUHIN. (Jean).	Suisse	1541	1613	72	
BAUHIN. (Gaspard)	Suisse	1560	1624	64	-
BERGEN	Allemand	131 3 111	atomery of a start		
BOERHAAVE.	Hollandois	1668	1738	70	-
BOEHMER	Allemand	A Property	- organia - organia - organia	. 7	Ì
Brunsfels	Allemand		1534		Ì
CÆSALPIN	Italien	1519	1603	84	I
COLUMNA	Italien	1567	1650	83	
CRANTZ	Allemand	(1) (1)	3		۱
Dalechamp	François	1513	1588	75	١
DILLEN	Allemand	1684	1747	63	
DODOENS	Flamand	1517	1585	68	
DUHAMEL. : .	François	1700	1782	82	
DURANDE	François				
FABRICIUS	Suédois				
Fuschs	Allemand	1510	1566	56	
GOERTNER	Allemand				
GATTENHOF	Allemand				
GERARD	François		1	1	

# (Suite de la Tab. 100.)

Noms	Markes	Leur	Années de	1	Années	Durée de
des Aute	urs.	Patrie.	leur Naissance.	le	de ur Mort.	leur Vie.
	-			-		
EESNER	.T. Al	lemand	1516	ini	1567	19 51 M
ILIBERT.	Fr.	ançois		1		vivant.
LEDITSCH.	. :   Al	lemand	a de la constante	1		MorraoM
MMELIN. (Je	an). Al	lemand	1709		1755	64
MELIN. (Jos	Fred) Al	lemand		1		vivant.
ODUAN	Fr.	ançois		1.03		vivant.
UJETTARD.	.do. Fra	ançois	1715	-N	1786	71
ALLER	: . Sui	sse	1708	000	1777	69
ERMANN.	. , Sac	con	1640		1695	55
ILL	. An	glois	1712		1780	68
sssieu. (Ant	coine). Fra	inçois	1686	Bre	1758	72
sssieu. (Ber	nard). Fra	ınçois	1699	1.2	1777	78
sssieu (Ant.	Laur) Fra	ınçois		1	:	vivant.
MAUT. (Chr	rist). San	con	1636		1694	58
WAUT. (Chr	et). Sax	con			FRANK ING	
MMARCK.	. Fra	nçois				vivant.
COLUSE	POS CALLED STOLE	COLD IN THE	Will be a server of	1 18	1609	83
WNÆUS.	OULD THE	The state of the state of	703,3 mai.	1777	,10 janv.	74
		mand	1538	27.4	1616	78
MNICER.:			1528	ela	1586	58
DDWIG	- 1		1709		1780	71
GNOL	. Fra	nçois	1638	3-	1715	77.

# (Suite de la Tab. 100.)

Noms	Leur	Années de	Années	Durée 1
des Auteurs.	Patrie.	leur Naissance.	de leur Mort.	leur Vie
<b>&gt;</b>				
Mathiole.	Italien	1500	1577.	77
MICHELLI	Italien	1659	1737	78
Morison	Ecossois	1620	1683	63
NECKER	Allemand	Lanning	ile signate	MIRRIN.
OEDER	Allemand	Amer	1776	моева
PONTEDERA	Italien	rgair.	A	.WAWO
RAY	Anglois	1628	1705	77
RIVIN	Saxon:.	1652	1723	. 71
ROYEN. (Adrien).		1704	all with	CHAIGHE
RUPPIUS		1686	1722	36
SAUVAGES	François	1706	1767	6t
SCHEUCHZER.	Suisse	1674	1738	64
SCOPOLI	Allemand	1732	1786	54
SEGUIER	François	1704	1780	76
THUNBERG	Suédois		2	vivante
Tournefort	François	1656	1708	52
TRAGUS	Allemand	1498	1554.	56
VAILLANT.	François	1669	17.22	53
VILLARS.	François			vivant
WACHENDORF	Hollandois.	1704	1758	54
WERNISCHECK.	20043	bnam	alk	.01769
WULFF	Allemand.	lois	la	IGIDA

#### POSTSCRIPTUM.

Mon travail sur le plan général des cinquante-un systêmes universels étant achevé, je me suis apperçu que mes observations ne présentant que des masses, il étoit important de donner un développement complet des systèmes les plus généralement adoptés. En conséquence, je me suis déterminé à présenter les tableaux 1.º de la méthode de Linné sur les étamines et les pistils. 2.º De celle de Ludwig sur la régularité ou l'irrégularité de la corolle, et le nombre des pétales. 3.º Pour donner un exemple d'un systême naturel, j'ai proposé le développement des ordres de Linné. Mais pour ne pas trop étendre ces tableaux, et pour me conformer aux véritables besoins des éleves, je n'ai énoncé que les genres européens, et parmi les exotiques, ceux qui sont ordinairement cultivés dans les jardins académiques. Comme les noms français des auteurs des démonstrations élémentaires de Botanique sont assez généralement adoptés, j'ai disposé la nomenclature des genres dans une table alphabétique sur deux colonnes. Dans la premiere, se trouve le nom latin de Linné, dans la seconde, le nom françois. Afin que mes tableaux fournissent une espece de clef pour les ouvrages de Linné, j'ai placé au dessus du nom latin du système de Ludwig le nom générique de Linné, lorsqu'il est différent de celui de cet auteur. Dans le cas où les noms de Linné et de Ludwig sont les mêmes, pour éviter le double emploi , j'ai accompagné le nom latin de Ludwig d'une astérique. Afin que les éleves en faveur desquels cet ouvrage a été entreptis, aient pour ainsi dire un avant-goût des caracteres essentiels des genres tracés par Linné, je les ai rendu en françois aussi briévement qu'il m'a été possible, d'après les tables synoptiques qui se trouvent à la tête de chaque classe de son systema vegetabilium, tables qui seront toujours regardées comme des chefs-d'œuvres d'analyse.

# TABLEAU

DU

## SYSTÉME SEXUEL DE LINNÉ.

#### CLASSE I. MONANDRIE.

## Monogynie.

\* Scitaminées, inférieures: fruit à capsule, inférieur.

1. CANNA. Corolle divisée en 6 parties, levre inférieure divisée en deux parties et roulée. Calice à 3 feuillets.

† Valeriana rubra , calcitrapa.

\* \* à une semence.

II. HIPPURIS. Sans calice et corolle.

70. SALICORNIA. Calice d'une seule piece sans co-rolle.

# Digynie.

\* Plantes.

12. Corispermum. Sans calice. Corolle à 2 pétales. Une semence.

33. CALLITRICHE. Sans calice. Corolle à 2 pétales. Capsule à 2 loges.

74. BLITUM. Calice à 3 segmens en baie. Sans corolle. Une semence.

#### CLASSE II. DIANDRIE.

## Monogynie.

- \* Fleurs inférieures, monopétales, régulieres.
- 20. OLEA. Corolle à 4 divisions. Fruit en brou.
- 19. PHYLLYREA. Corolle à 4 divisions. Baie à une semence.
- 18. LIGUSTRUM. Corolle à 4 divisions. Baie à 4 semences.

22. Syringa. Corolle à 4 divisions linaires. Capsule à 2 loges.

17. JASMINUM. Corolle à 5 divisions. Baie à 2 coques:

16. NYCTANTHES. Corolle à 8 divisions. Baie à 2 coques.

\*\* Fleurs inférieures, monopétales, irrégulieres. Fruit à capsules.

27. Pæderota. Corolle à 4 divisions. Calice à 5 segmens.

26. VERONICA. Limbe de la Corolle à 4 parties, l'inférieure plus étroite.

30. GRATIOLA. Cor. à quatre divisions, irrégulieres. 4 étamines, dont deux sans antheres.

28. JUSTICIA. Corolle béante. Capsule à onglet élas-

33. PINGUICULA. Corolle béante à éperon. Calice à 5 segmens.

34. UTRICULARIA. Corolle béante à éperon. Calice à 2 feuillets.

#### + Bignonia catalpa.

- \*\*\* Fleurs inférieures, monopétales irrégulieres. Fruits
- 35. VERBENA. Corolle à parties presque égales. Segment supérieur du calice plus court.

36. Lycopus. Corolle à divisions presque égales. Etamines écartées.

37. AMETHYSTEA. Corolle à divisions presque égales, l'inférieure concave.

39. ZIZIPHORA. Corolle béante, la levre supérieure renversée. Calice très-menu.

40. MONARDA. Corolle béante, la levre supérieure linaire, enveloppant les étamines et les pistils.

41. ROSMARINUS. Corolle béante, la levre supérieure en faucille. Etamines courbées.

42. SALVIA. Corolle béante. Filamens coupés vers leur base par un pédicule.

## \*\*\*\* Fleurs supérieures.

25. CIRCEA. Calice à deux feuillets, corolle à deux pétales, en cœur.

#### † Valeriana cornucopiæ.

## Digynie.

46. ANTHOXANTHUM. Calice à balle renfermant une fleur, oblongue. Corolle à balle en barbe.

## CLASSE III. TRIANDRIE.

## Monogynie.

#### \* Fleurs supérieures.

48. VALERIANA. Corolle à 5 divisions bossuée à sa base. Une semence nue.

55. MELOTHRIA. Corolle à 5 divisions en roue. Baie à 3 loges.

61. CROCUS. Corolle à 6 pétales ent'rouverte. Stygmates roulés sur eux-mêmes, colorés.

65. IRTS. Cor. à 6 pétales dont trois alternes renversés. Stygmate en lame.

63. GLADIOLUS. Cor. à 6 pétales dont 3 supérieurs rapprochés en voûte.

62. IXIA. Cor. Ouverte à 6 pétales. 3 stygmates simples.

\*\* Fleurs inférieures.

58. LŒFLINGIA. Cor. à 5 pétales. Calice à 5 feuillets. Capsule à une loge.

52. CNEORUM. Cor à 3 pétales. Calice à 3 dents. Baie à 3 coques.

57. ORTEGIA. Sans corolle. Calice à 5 feuillets. Capsule à une loge.

59. Polycnemum. Sans corolle. Calice à 5 feuillets inégaux. Une semence nue.

\*\*\* Graminées à fleurs formées par des écailles ou valves.

71. Schenus. Sans corolle. Calice à écailles en faisceaux. Semence presque ronde.

72. CYPERUS. Sans corolle. Calice à écailles distiques ou sur deux rangs. Semence nue.

73. Scirpus. Sans corolle, calice à écailles en re-

74. ERIOPHORUM. Sans corolle. Calice à écailles en recouvrement. Semences laineuses.

75. NARDUS. Corolle à 2 valves. Sans calice. Semences couvertes.

## Digynie.

#### \* Graminées à une fleur, éparses.

82. PANICUM. Calice à 3 valves, dont une dorsale plus petite.

84. ALOPECURUS. Calice à 2 valves. Corolle à une valve dont le sommet n'est pas divisé.

83. Phleum Calice à 2 valves tronqué, terminé par une pointe, assis.

80. Phalaris. Calice à 2 valves, en nacelle, égales renfermant la corolle.

85. MILIUM. Calice à 2 valves bossuées plus grandes que la corolle, presque égales.

86. AGROSTIS. Calice à 2 valves pointues, plus courtes que la corolle.

92. DACTYLIS. Calice à 2 valves, dont une plus grande creusée en nacelle.

96. STIPA. Calice à 2 valves. Corolle terminée par une arête très-longue articulée à sa base.

98. LAGURUS. Calice à 2 valves velu. Corolle à 2 barbes terminales, et à une dorsale.

79. SACCHARUM. Calice laineux extérieurement.

† Arundo epigeios, calamagrostis, arenaria. \*\* Graminées à deux fleurs éparses.

87. AIRA. Calice à 2 valves, renfermant deux fleurs sans rudiment d'une troisieme.

88. MELICA. Calice à 2 valves, le rudiment d'une troisieme fleur entre deux.

# \*\*\* Graminées à plusieurs fleurs éparses.

90. Briza. Calice à 2 valves. L'assemblage des corolles en cœur, à valves bossuées.

89. Poa. Calice à 2 valves, l'assemblage des corolles en ovale, à valves aignës.

94. FESTUCA. Calice à 2 valves. L'assemblage des

corolles de forme oblongue, à valves termi-

nées en pointes.

95. Bromus. Calice à 2 valves. L'assemblage des corolles de forme oblongue, à valves munies d'arêtes au dessous du sommet.

97. Avena. Calice à 2 valves. L'assemblage des corolles de forme oblongue, à valves portant sur

le dos une arête entortillée.

99. ARUNDO. Calice à 2 valves. Corolle sans arête laineuse à sa base.

#### + Dactylis Glomerata.

\*\*\*\* Graminées en épi, à réceptacle en aleine.

103. SECALE. Calice à 2 fleurs.

105. TRITICUM. Calice à plusieurs fleurs.

104. HORDEUM. Involucre à six feuillets à 3 fleurs. Fleur simple.

102. ELYMUS. Involucre à quatre feuillets, à 2

fleurs. Fleur composée.

fleur. Fleur composée.

93. Cynosurus. Involucre à un seul feuillet latéral. Fleur composée.

## Trigynie.

#### \* Fleurs inférieures.

110. Holosteum. Corolle à 5 pétales. Calice à 5 feuillets; Capsule s'ouvrant au sommet.

feuillets. Capsule à une loge à 3 battans.

107. MONTIA. Cor. à un seul pétale. Calice à 2 feuillets. Capsule à 3 battans, à 3 semences.

Capsule à une loge, à plusieurs semences.

115. QUERIA. Sans corolle. Calice à 5 feuillets. Capsule à une semence.

111. KŒNIGIA. Sans corolle. Calice à 3 feuillets.
Une semence oyale.

Toutes les autres graminées suivant la rigueur du système sexuel se trouvent reparties dans leurs classes respectives.

#### PAR EXEMPLE,

Dans la Diandrie.

ANTHOXANTHUM.

Dans l'Hexandrie.

ORYZA.

Dans la Monœcie.

COIX.

CAREX.

Dans la Polygamie.

ÆGYLOPS.

CENCHRUS.

ISCHÆMUM.

Holcus.

ANDROPOGON.

#### CLASSE IV. TETRANDRIE,

## Monogynie.

- \* Fleurs monopétales, à une semence, inférieures.
- 118. GLOBULARIA. Corolles monopétales irrégulieres. Semences nues.
- \*\* Fleurs monopétales, à une semence, supérieures. Aggrégées.
- Réceptacle conique garni de paillettes. Semences en colonne.
- plus ou moins garni de paillettes. Semences couronnées, enveloppées.
- 122. KNAUTIA. Calice commun oblong. Réceptacle applati, nu. Semences velues au sommet.
- \*\*\* Fleurs monopétales à un seul fruit, inférieures.
- 151. CENTUNCULUS. Corolle en roue. Calice à 4 segmens. Capsule à une loge s'ouvrant horizontalement.
- 148. Plantago. Corolle à segmens renversés. Ca-

lice à 4 segmens. Capsule à 2 loges s'ouvrant horizontalement.

+ Gentianæ quadrifidæ.

\*\*\*\* Fleurs monopétales, supérieures.

152. SANGUISORBA. Corolle applatie. Calice à 2 feuillets. Capsule à 4 coins, placée entre le calice et la corolle.

\*\*\*\*\* Fleurs monopétales à 2 coques supérieures.

Etoilées.

134. Rubia. Corolle en cloche. Fruit à 2 baies.

132. GALLIUM. Corolle applatie. Fruit à 2 semences arrondies.

128. ASPERULA. Cor. en entonnoir. Fruit à 2 semences arrondies.

127. SHERARCIA. Cor. en entonnoir. Fruit couronné. Semences à 3 dents.

133. CRUCIANELLA. Cor. en entonnoir, à segmens en arête. Fruit nu. Semences linaires.

\*\*\*\*\* Fleurs à 4 pétales, inférieures

154. EPIMEDIUM. Pétales inclinées sur les 4 nectaires. Calice à 4 feuillets. Silique à une loge.

+ Cardamine hirsuta.

+ Evonymus europeus.

\*\*\*\*\*\* Fleurs à 4 pétales supérieures.

165. TRAPA. Calice à 4 segmens. Fruit à noix garni de 4 épines coniques opposées.

155. Cornus. Calice à 4 dents caduc. Fruit à noyau à 2 loges.

\*\*\*\*\* Fleurs incomplettes inférieures.

174. RIVINA. Corolle à 4 pétales. Baie à une se-

176. CAMPHOROSMA. Calice à 4 segmens. Capsule à une semence.

177. Alchemilla. Calice à 8 segmens. Une semence rentermée dans le calice.

+ Convallaria bifolia.

\*\*\*\*\*\* Fleurs incomplettes, supérieures.

164. ISNARDIA. Calice en cloche, persistant. Capsule à 4 cloches.

168. ELEAGNUS. Calice en cloche, caduc. Fruit à brou.

+ Thesium alpinum.

## Digynie.

180. BUFONIA. Cor. à 4 pétales. Calice à 4 feuillets.
Capsule à une loge, à 2 battans, à 2 se-

183. Hypecoum. Corolle à 4 pétales inégaux. Calice à 2 feuillets. Fruit à Silique.

182. Cuscuta. Cor. à 4 divisions ovales. Calice à 4 segmens. Capsule à 2 loges, s'ouvrant horizontalement.

178. APHANES. Sans corolle. Calice à 8 segmens. 2 semences.

#### + Herniaria fructicosa.

+ Gentiana. + Swertia.

## Tétragynie.

184. ILEX. Corolle monopétale. Calice à 4 dents. Baie à 4 semences.

188. Sagina. Cor. à 4 pétales. Calice à 4 feuillets.
Capsule à 4 loges, à plusieurs semences.

189. TILLEA. Corolle à 3 ou 4 pétales. Calice à 3 ou 4 feuillets. Capsule à 3 ou 4 semences.

186. POTAMOGETON. Sans corolle. Calice à 4 feuillets. 4 semences assises.

187. RUPPIA. Sans corolle et calice. 4 semences portées sur un pédicille.

#### CLASSE V. PENTANDRIE.

#### Monogynie.

\* Fleurs monopétales, inférieures, à une semence. 259. MIRABILIS. Petite noix au-dessous de la corolle. Cor. en entonnoir. Stigmate globuleux. 227. Plumbago. Une semence. Etamines insérées sur les écailles du nectaire. Cor. en entonnoir. Stigmate fendu en cinq parties.

\*\* Fleurs monopétales, inférieures, à 2 semences.

Aspérifeuilles.

198. CERINTHE. Cor. Ventrue, à gorge nue. 2 semences osseuses, à 2 loges.

\*\*\* Fleurs monopétales, inférieures, à 4 semences.
Aspérifeuilles.

203. ECHIUM. Cor. en cloche irrégulière à gorge nue.

191. HELIOTROPIUM. Cor. en soucoupe à gorge nue, à une dent entre chaque division. 4. semences.

196. PULMONARIA. Cor. en entonnoir à gorge nue. Calice prismatique.

193. LITHOSPERMUM. Cor. en entonnoir à gorge nue. Calice à 5 segmens.

199. ONOSMA. Cor. ventrue à gorge nue, 4 semences.

197. SYMPHYTUM. Cor. ventrue à gorge dentée. 200. BORRAGO. Cor. en roue à gorge dentée.

202. Lycopsis. Cor. en entonnoir à gorge fermée par des écailles, à tuyau coudé.

201. ASPERUGO. Cor. en entonnoir à gorge fermée

par des écailles. Fruit comprimé.

195. CYNOGLOSSUM. Cor. en entonnoir à gorge fermée par des écailles, semences comprimées adhérentes par le bord à un pilier.

194. ANCHUSA. Cor. en entonnoir à gorge fermée par des écailles, à tube prismatique à la base.

192. Myosotis. Corolle en soucoupe à gorge fermée par des écailles à lobes échancrés.

\*\*\*\* Fleurs monopétales inférieures, à 5 semences.

206. NOLANA. Cor. Monopétale. 5 sem. en baie, à 2 ou 4 loges.

\*\*\*\*\* Fleurs monopétales, inférieures à semences couvertes.

260. Coris. Capsule à une loge, à 5 battans. Cor. irréguliere. Stigmate en tête.

211. CORTUSA. Capsule à une loge, oblongue. Cor.

en roue. Stigmate presque rond.

220. ANAGALLIS. Capsule à une loge, s'ouvrant horizontalement. Corolle en roue. Stigmate en

219. LYSIMACHIA. Capsule à une loge, à dix battans. Corolle en roue. Stigmate obtus.

214. CYCLAMEN. Capsule à une loge, pulpeuse en dedans. Corolle en roue, à segmens renverses en dehors. Stigmate aigu.

213. DODECATHEON. Capsule à une loge oblongue. Corolle à segmens renversés en dehors. Stig-

mate obtus.

212. SOLDANELLA. Capsule à une loge. Corolle frangée. Stigmate simple.

210. PRIMULA. Capsule à une loge. Corolle en entonnoir à gorge ouverte. Stigmate globuleux.

- 209. ANDROSACE. Capsule à une loge. Corolle en soucoupe, à gorge resserrée. Stigmate globuleux.
- 208. Aretia. Capsule à une loge. Cor. en soucoupe: Stigmate à tête comprimée.
- 216. HOTTONIA. Capsule à une loge. Tuyau de la corolle au dessous de l'insertion des étamines. Stigmate globuleux.

215. MENYANTHES. Capsule à une loge. Corolle ci-

liée. Stigmate fendu en deux.

222. SPIGELIA. Capsule à 2 loges, didyme. Corolle en entonnoir. Stigmate simple.

231. CONVOLVULUS. Capsule à 2 loges, à 2 semences. Corolle en cloche. Stigmate fendu en deux.

263. DATURA. Capsule à 2 loges, à 4 battans. Corolle en entonnoir. Calice caduc.

264. Hyoscyamus. Capsule à 2 loges, à couvercle. Corolle en entounoir. Stigmate en tête.

265. NICOTIANA. Capsule à 2 loges. Cor. en entonnoir. Stigmate échancré.

262. VERBASCUM. Capsule à 2 loges. Corolle en roue. Stigmate obtus. Etamines inclinées.

207. DIAPENSIA. Capsule à 3 loges. Cor. en soucoupe. Calice à 8 feuillets.

229. Phlox. Capsule à 3 loges. Corolle en soucoupe, à tuyau coudé. Stigmate fendu en trois.

233. Polæmonium. Capsule à 3 loges. Corolle à 5 divisions. Etamines insérées sur le tuyau de la Corolle.

232. IPOMŒA. Capsule à 3 loges. Cor. en entonnoir. Stigmate en tête.

226. AZALEA. Capsule à 5 loges. Cor. en cloche. Stigmate obtus.

323. NERIUM. 2 follicules droites. Gorge de la corolle couronnée. Semences aigrettées.

322. VINCA. 2 follicules droites. Corolle en soucoupe: Semences simples.

269. CAPSICUM. Baie à 2 loges, sèche. Antheres réunies.

268. SOLANUM. Baie à 2 loges. Antheres offrant 2 pores à leur sommet.

267. PHYSALIS. Baie à 2 loges. Calice boursouflé. Antheres comme réunies.

266. Atropa. Baie à 2 loges. Etamines écartées, courbées.

273. Lycium. Baie à 2 loges. Etamines fermant à leurs bases le tuyau de la corolle par des poils.

\*\*\*\*\* Fleurs monopétales supérieures.

238. Samolus. Capsule à une loge s'ouvrant au sommet en cinq battans. Cor. en soucoupe. Stigmate en tête.

236. Phyteuma. Capsule à 2 ou 3 loges latéralement perforée. Cor. en cloche. Stigmate fendu en 2 ou 3 parties.

234. CAMPANULA. Capsule à 3 ou 5 loges, latéralement perforée. Cor. à 5 divisions. Stigmate fendu en trois.

237. TRACHELIUM. Capsule à 3 loges. Cor. en entonnoir. Stigmate en tête.

250. LONICERA. Baie à 2 loges presque rondes. Cor. irréguliere. Stigmate en tête.

+ Rubia. + Crucianella.

\*\*\*\*\* Fleurs à cinq pétales, inférieures!

284. RHAMNUS. Baie à 3 loges, ronde. Calice tubulé portant la corolle. 5 écailles convergences situées à la gorge de la corolle.

291. EVONYMUS. Baie à capsule, à lobes saillans. Calice très-ouvert. Semences enveloppées par

une coëffe remplie de suc.

305. VITIS. Baie à 5 semences. Cor. à 5 pétales se détachant, souvent réunies. Germe sans style.

#### + Viola.

\*\*\*\*\*\* Fleurs à cinq pétales, supérieures.

301. RIBES. Baie à plusieurs semences. Calice supportant la corolle. Style divisé en deux.

304. HEDERA. Baie à 5 semences. Calice ceignant le

germe. Stigmate simple.

311. ACHYRANTHES. Une semence oblongue. Calice extérieur à 3 feuillets, nu.

312. CELOSIA. Capsule à 3 semences. Calice extérieur

à 3 feuillets, coloré.

313. ILLECEBRUM. Capsule à une semence à 5 battans. Calice simple, rude.

314. GLAUX. Capsule à 5 semences, à 5 battans. Calice simple, rude, en cloche.

+ Polygonum amphibium, lapathifolium.

\*\*\*\*\* Fleurs incomplettes, supérieures.

315. Thesium. Une semence couronnée. Calice portant les étamines.

#### Digynie.

\* Fleurs monopétales, inférieures.

334. STAPELIA. Fruit de 2 follicules. Cor. en roue. Nectaires en étoiles.

331. CYNANCHUM. Fruit de 2 follicules. Cor. en roue.

Nectaires cylindriques.

330. Peripolea. Fruit de 2 follicules. Cor. en roue. 5 nectaires filiformes.

332. APOCYNUM. Fruit de 2 follicules. Cor. en cloche.
5 nectaires glanduleux à cinq soies.

333. ASCLEPIAS. Fruit de 2 follicules. Cor. à segmens renversés. 5 nectaires en oreillettes à onglet.

351. SWERTIA. Capsule à une loge à 2 battans. Cor. en roue. 5 pores nectariferes.

352. GENTIANA. Capsule à une loge à 2 battans. Cor. tubulée de différente figure.

341. CRESSA. Capsule à une semence à 2 battans. Cor. en soucoupe. Limbe à segmens renversés.

\*\* Fleurs à 5 pétales inférieures.

350. VELEZIA. Capsule à une loge à un battant. Cor. à 5 pétales. Calice tubulé.

+ Staphylea pinnata.

\*\*\* Fleurs incomplettes.

339. Salsola. Une semence en coquille d'escargot, couverte. Calice à 5 feuillets.

337. Chenopodium. Une semence orbiculaire. Calice à 5 feuillets concaves.

338. BETA. Une semence en rein. Calice à 5 feuillets, à semence nidulée à sa base.

336. HERNIARIA. Une semence ovale enveloppée. Calice à 5 segmens. 5 filamens sans anthères.

343. GOMPHRENA. Capsule à une semence, s'ouvrant horizontalement. Calice à 2 feuillets, comprimé, coloré.

345. ULMUS. Baie sèche, comprimée. Calice d'une seule piece se desséchant.

\*\*\*\* Fleurs à cinq pétales, supérieures à 2 semences.
Ombellées.

#### A. Collerette universelle et partielle.

354. ERYNGIUM. Fleurs en tête. Réceptacle garni de paillettes.

355. HYDROCOTYLE. Fleurs comme en ombelles fertiles. Semences comprimées.

356. Sanicula. Fleurs comme en ombelles, dont quelques-unes avortent. Semences hérissonnées.

357. ASTRANTIA. Fleurs en ombelles, dont quelques-

unes avortent. Collerette colorée. Semences ridées.

375. HERACLEUM. Fleurs du rayon, irrégulieres avortantes. Collerette caduque. Semences membraneuses.

382. OENANTHE. Fleurs radiées avortantes au rayon. Collerette simple. Sem. assises, couronnées.

359. ECHINOPHORA. Fleurs radiées, celles du rayon avortantes. Collerette simple. Sem. assises.

362. CAUCALIS. Fleurs radiées. Collerette simple. Semences à tubercules rudes sur les bords.

364. Daucus. Fleurs radiées avortantes. Collerette pinnée. Sem. hérissées.

361. TORDILIUM. Fleurs radices fertiles. Collerette simple. Semences à marge crenelée.

374. LASERPITIUM. Fleurs flosculeuses avortantes. Pétales en cœur. Semences à 4 ailes.

370. PEUCEDANUM. Fleurs flosculeuses avortantes. Collerette simple. Semences striées, déprimées.

365. Amni. Fleurs flosculeuses fertiles. Collerette pinnée. Semences lisses, bossuées.

367. CONIUM. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales en cœur. Semences bossuées, sillonnées et à côtes. Involucelles d'un seul côté.

366. Bunium. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales en cœur. Involucelles sétacées.

369. ATHAMANTHA. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales en cœur. Semences convexes, striées.

358. BUPLEVRUM. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales roulés en dedans dans la plupart. Les feuilles entieres. Les feuillets des collerettes en forme de pétales.

378. Sium. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales en cœur. Semences comme ovales striées.

368. Selinum. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales en cœur. Semences striées, déprimées.

381. Cuminum. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales en cœur. Ombelle à 4 rayons. Collerette à feuillets sétacés très-longs.

373. FERULA. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales en cœur. Semences applaties.

371. CHRITMUM. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales étendus applatis. Collerettes horizontales.

380. Bubon. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales ap-

platis. Collerette de 5 feuillets.

372. CACHRYS. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales applatis. Semences à écorce sèche spongieuse comme du liege.

376. LIGUSTICUM. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales roulés en dedans. Collerette membraneuse.

377. ANGELICA. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales applatis. Ombelles arrondies.

379. Sison. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales applatis. L'ombelle dégarnie.

B. Collerette partielle seulement, sans collerette générale.

385. ÆTHUSA. Fleurs comme radiées fertiles. Collerettes d'un seul côté.

386. CORIANDRUM. Fleurs radiées avortantes. Fruit globuleux.

387. SCANDIX. Fleurs radiées avortantes. Fruit

388. CHEROPHYLLUM. Fleurs flosculeuses avortantes.
Collerettes de 5 feuillets.

383. PHELLANDRIUM. Fleurs flosculeuses fertiles. Fruit couronné.

389. IMPERATORIA. Fleurs flosculeuses fertiles. Ombellules développées sur un plan horizontal.

390. SESELI. Fleurs flosculeuses fertiles. Ombellules à pédoncules roides.

384. CICUTA. Fleurs flosculeuses fertiles. Pétales étalés, applatis.

+ Buplevrum rotundifolium.

+ Apium petroselinum et anisum.

C. Sans collerette générale et partielle.

393. SMYRNIUM. Fleurs flosculeuses avortantes. Semences en forme de reins, anguleuses.

395. CARUM. Fleurs flosculeuses avortantes. Semences bossuées, striées.

391. THAPSIA. Fleurs flosculeuses fertiles. Semences à ailes membraneuses, échanciées.

394. Anethum. Fleurs flosculeuses fertiles. Semences à bordure, striées.

398. ÆGOPODIUM. Fleurs flosculeuses fertiles. Semences bossuées, striées. Pétales en cœur.

397. APIUM. Fleurs flosculeuses fertiles. Semences menues striées. Pétales repliées.

396. PIMPINELLA. Fleurs flosculeuses fertiles. Les ombelles inclinées avant l'épanouissement. Pétales en cœur.

## Trigynie.

#### \* Fleurs supérieures:

400. VIBURNUM. Corolle à 5 divisions. Baie à une semence.

402. Sambucus. Cor. à 5 divisions. Baie à trois semences.

#### \*\* Fleurs inférieures.

399. Rhus. Cor. à cinq pétales. Baie à une semence. 404. STAPHYLEA. Cor. à 5 pétales. Capsule à 2 ou 3

divisions, boursouflée.

405. TAMARIX. Cor. à 5 pétales. Capsule à une loge. Semences aigrettées.

412. DRYPIS. Cor. à 5 pétales couronnées. Capsule à une semence s'ouvrant horizontalement.

411. Alsine. Cor. à 5 pétales. Capsule à une loge. Calice à 5 feuillets. Pétales divisés en deux.

408. Telephium. Cor. à 5 pétales. Capsule à une loge triangulaire. Calice à 5 feuillets.

409. CORRIGIOLA. Cor. à 5 pétales. Une semence triangulaire. Calice à 5 segmens.

410. PHARNACEUM. Sans corolle. Calice à 5 feuillets. Capsule à 3 loges.

413. BASELLA. Sans corolle. Calice à 6 segmens. Une semence globuleuse. Calice à baie.

#### + Rhamnus paliurus.

#### Tétragynie.

415. PARNASSIA. Cor. à 5 pétales. Capsule à 4 bat-

tans. 5 nectaires portant des cils terminés par des pélotes.

## Pentagynie.

#### \* Fleurs supérieures.

- 417. ARALIA. Cor. à 5 pétales. Baie à 5 semences.

  \*\* Fleurs inférieures.
- 423. CRASSULA. Cor. à 5 pétales. Capsule à plusieurs semences.
- 419. LINUM. Cor. à 5 pétales. Capsule à 10 loges, à 2 semences.
- 421. DROSERA. Cor. à 5 pétales. Capsule à une loge, s'ouvrant à son sommet.
- 425. SIBALDIA. Cor. à 5 pétales. 5 semences. Calice à 10 segmens.
- 418. STATICE. Cor. à 5 divisions. Une semence enveloppée par un calice en entonnoir.
  - † Cerastium pentandrum. † Spergula pentandra. † Gerania pentandra.

## Poligynie.

426. Myosurus. Cal. à 5 feuillets. 5 nectaires en languettes. Semences nombreuses.

+ Ranunculus hederaceus.

#### CLASSE VI. HEXANDRIE.

## Monogynie.

#### \* Fleurs à calice et corolle.

- 427. BROMELIA. Cor. à 3 divisions. Calice supérieur à 3 segmens. Fruit à baie.
- 430. TRADESCANTIA. Cor. à 3 pétales. Calice à 3 feuillets. Filamens barbus.
- 481. FRANKENIA. Cor. à 5 pétales. Calice inférieur d'une seule piece. Capsule à une loge, à plusieurs semences.

478. LORANTHUS. Sans calice. Cor. à 6 divisions repliées. Etamines insérées au sommet des pétales. Baie à une semence.

476. BERBERIS. Cor. à 6 pétales. Calice inférieur à 6

feuillets. Baie à 2 semences.

456. LEONTICE. Cor. à 6 pétales. Calice inférieur à 6 feuillets. Baie boursouflée.

\*\* Fleurs à calice en spathe ou en écailles.

434. LEUCOIUM. Cor. supérieure à 6 pétales, en cloche. Etamines égales.

433. GALANTHUS. Cor. supérieure à 6 pétales. 3 pétales intérieurs plus courts, échancrés.

436. NARCISSUS. Cor. supérieure à 6 pétales. Nectaire en cloche, débordant les étamines.

437. PANCRATIUM. Cor. supérieure à 6 pétales. Nectaire en cloche terminé par les étamines.

439. AMARYLLIS. Cor. supérieure à 6 pétales en cloche. Etamines inégales.

440. Bulbocodium. Cor. inférieure à 6 pétales, à onglets très-longs, portant les étamines.

442. ALLIUM. Cor. inférieure à 6 pétales. Pétales ovales, assis.

441. APHYLLANTHES. Cor. inférieure à 6 pétales: Spathe en écailles, séparant les corolles.

#### \*\*\* Fleurs nues.

467. HEMEROCALLIS. Cor. inférieure à 6 divisions. Etamines penchées.

465. AGAVE. Cor. supérieure à 6 divisions, à limbe droit, plus court que les filamens.

464. Alee. Cor. inférieure à 6 divisions. Filamens insérés sur le réceptacle.

460. POLYANTHES. Cor. inférieure à 6 divisions, à tuyau courbé.

459. CONVALLARIA. Cor. inférieure à 6 divisions. Baie à 3 semences.

461. HYACINTHUS. Cor. inférieure à 6 divisions. 3. pores nectariferes au sommet du germe.

454. ASPHODELUS. Cor. inférieure à six divisions.

Nectaires à 6 valvules supportant les étamines.

455. Anthericum. Cor. inférieure à 6 pétales, trèsétalées.

451. ORNITHOGALUM. Cor. inférieure à 6 pétales. Filamens alternes dilatés à leur base.

452. SCILLA. Cor. inférieure à 6 pétales caduques, filamens filiformes.

457. ASPARAGUS. Cor. inférieure à 6 pétales. Baie à 6 semences.

447. ERYTHRONIUM. Cor. inférieure, à 6 pétales renversés, dont 3 alternes offrent à leurs bases deux tubercules.

445. UVULARIA. Cor. inférieure à 6 pétales redressés offrant une fossette à leur base.

444. FRITILLARIA. Cor. inférieure à 6 pétales ovales, offrant une fossette à leur base.

443. LILIUM. Cor. inférieure à 6 pétales. Onglets des pétales repliés en demi-canal.

448. TULIPA. Cor. inférieure à 6 pétales, en cloche. Sans style.

463. Yucca. Cor. inférieure à 6 pétales étalés. Sans style.

#### \*\*\*\* Fleurs incomplettes.

468. Acorus. Spadice multiflore, ou fleurs ramassées en chatons, pyramidales. Capsule à 3 loges.

471. Juneus. Calice à 6 feuillets. Capsule à une loge.

482. PEPLIS. Cal. à 12 segmens. Caps. à 2 loges.

## Digynie.

483. ORYZA. Calice à balle à une fleur. Cor. à 2 balles. Une semence oblongue.

#### Trigynie.

#### \* Fleurs inférieures.

492. Colchicum. Calice en spathe. Cor. monopétale par le tuyau, hexapétale par le limbe.

488. TRIGLOCHIN. Cal. à 3 feuillets. Cor. à 3 pétales. Capsule s'ouvrant par la base.

485. Rumex. Cal. à 3 feuillets. Cor. à 3 pétales. Une

semence triangulaire.

487. SCHEUCHZERIA. Cal. à 6 feuillets. Sans corolle. 3 capsules à une semence.

## Tétragynie.

494. Petiveria. Cal. à 4 feuillets. Sans corolle. Une semence à arête en hameçon.

## Polyginie.

495. ALISMA. Cal. à 3 feuillets. Cor. à 3 pétales.
Plusieurs capsules.

#### CLASSE VII. HEPTANDRIE.

## Monogynie.

496. TRIENTALIS. Cal. à 7 feuillets. Cor. à 7 divisions planes. Baie seche, à une loge.

498. Æsculus. Cal. à 5 dents. Cor. à 5 pétales inégaux. Caps. à 3 loges, à 2 semences.

#### CLASSE VIII. OCTANDRIE.

## Monogynie.

#### \* Fleurs complettes.

502. Тпоржогим. Cor. à 5 pétales. Cal. inférieur à 5 segmens, à éperon.

507. EPILOBIUM. Cor. à 4 pétales. Cal. supérieur à 4 feuillets. Capsule à 4 loges. Semences aigrettées.

505. ENOTHERA. Cor. à 4 pétales. Cal. supérieur à 4 segmens. Caps. à 4 loges. Antheres linaires.

519. CHLORA. Cor. à 8 divisions. Cal. inférieur à 8 feuillets. Caps. à une loge, à 2 battans, à plusieurs semences.

523. VACCINIUM. Cor. monopétale. Cal. à 4 dents. Filamens insérés sur le réceptacle. Fruit à baie.

524. ERICA. Cor. monopétale. Calice inférieur à 4 feuillets. Filamens insérés sur le réceptacle. Fruit à capsule.

+ Æsculus pavia. + Monotropa hypopithys. + Ruta graveolens.

\*\* Fleurs incomplettes.

526. DAPHNE. Calice à 4 segmens, coloré, égal, renfermant les étamines. Baie pulpeuse.

530. PASSERINA. Calice à 4 segmens, coloré, égal. Etamines insérées sur le tube de la corolle.

529. STELLERA. Cal. à 4 segmens, coloré, égal, renfermant les étamines. Une semence.

## Digynie.

536. MOEHRINGIA. Cor. à 4 pétales. Cal. à 4 feuillets. Capsule à une loge.

+ Chrysosplenium.

## Trigynie.

537. POLYGONUM. Sans corolle. Cal. à 5 segmens. Une semence nue.

540. CARDIOSPERMUM. Cal. à 4 feuillets, 4 pétales Nectaire à 4 feuillets inégaux. 3 caps. réunies, boursouflées.

## Tétragynie.

543. ADOXA. Cor. supérieure, à 4 ou 5 divisions. Cal. à 2 feuillets. Baie à 4 ou 5 semences.

544. ELATINE. Cor. à 4 pétales. Cal. à 4 feuillets. Caps. à 4 loges.

542. Paris. Cor. à 4 pétales en aleine. Cal. à 4 feuillets. Baie à 4 loges.

† Myriophyllum verticillatum.

#### CLASSE IX. ENNÉANDRIE.

## Monogynie.

545. Laurus. Sans calice. Cor. à 6 pétales, servant de calice. Les glandes du nectaire surmontées de deux soies.

## Trigynie.

549. RHEUM. Sans calice. Cor. à 6 divisions. Une semence triangulaire.

## Hexagynie.

550. Butomus. Sans calice. Cor. à 6 pétales. Caps. à plusieurs semences.

#### CLASSE X. DECANDRIE.

## Monogynie.

## \* Fleurs polypétales, irrégulieres.

552. ANAGYRIS. Cor. papillonacée, à étendart court, droit. Carene plus longue que les ailes.

553. CERCIS. Cor. papillonacée. Ailes en forme d'étendart. Nectaire à glandes en filet sous le germe.

557. Cassia. Cor. irréguliere. Antheres à bec. Légume à étranglemens.

564. DICTAMNUS. Cor. ouverte. Filamens parsemés de points glanduleux. 5 capsules comme collées ensemble. Semences à écorce qui peut se

## \*\* Fleurs polypétales, régulieres.

détacher.

576. Melia. Nectaire tubulé à 10 dents. Fruit à noyau à 5 loges.

565. RUTA. Germe ceint de 10 pores melliferes. Caps. divisée en 5 parties, à 5 loges, à plusieurs semences.

580. TRIBULUS. Pistil sans style. 5 capsules adhéren-

tes, à plucieurs semences.

579. FAGONIA. Onglets de la corolle insérés sur le calice. Caps. à 5 loges à 10 battans, à une semence.

577. Zygophyllum. Nectaire formé par 10 écailles à la base du germe. Capsule à 5 loges, à plusieurs semences.

583. Monotropa. Calice coloré, bossué à la base. Caps. à 5 loges à plusieurs semences.

598. Pyrola. Anthères terminées par deux cornes. Caps. à 5 loges, à plusieurs semences.

591. LEDUM. Cor. applatie à 5 pétales adhérentes par l'onglet avant l'épanouissement. Caps. à 5 loges, à plusieurs semences.

#### \*\*\* Fleurs monopétales régulieres.

593. ANDROMEDA. Cor. en grelot. Caps. à 5 loges. 592. Rhododendron. Cor. en entonnoir. Etamines

inclinées. Caps. à 5 loges.

596. Arbutus. Cor. ovale, transparente à la base. Baie à 5 loges.

#### + Vaccinia nonnulla.

## Digynie.

611. Scleranthus. Sans corolle. Cal. supérieur à 5 segmens. 2 semences.

607. CHRYSOSPLENIUM. Sans corolle. Calice supérieur. Caps. à une loge, à 2 becs.

608. SAXIFRAGA. Cor. à 5 pétales. Cal. à 5 segmens. Caps. à une loge à 2 becs.

612. GYPSOPHILA. Cor. à 5 pétales. Cal. en cloche, à 5 segmens. Caps. globuleuse à une loge.

613. SAPONARIA. Cor. à 5 pétales. Cal. tubulé, sans écailles à la base. Capsule oblongue, à une loge.

614. DIANTHUS. Cor. à 5 pétales. Calice tubulé à écailles à la base. Capsule oblongue à une loge.

## Trigynie.

618. Arenaria. Caps. à une loge. Pétales entiers; étalés.

617. STELLARIA. Caps. à une loge. Pétales divisés en deux, étalés.

615. Cucubalus. Caps. à 3 loges. Pétales divisés en deux. Sans couronne autour de la gorge.

616. SILENE Caps. à 3 loges. Pétales divisés en deux. Gorge de la corolle conronnée.

619. CHERLERIA. Capsule à 3 loges. 5 nectaires en forme de pétales, plus petits que le calice.

620. GARIDELLA. 3 capsules distinctes. Pétales caly-

621. MALPIGHIA. Baie à 3 semences. 5 pétales à onglets. Calice glanduleux.

† Tamarix germanica.

a interieur a

Calice à 5 seg-

## Tétragynie.

+ Lychnis alpina, quadridentata.

565. AGRIMONIAL

## Pentagynie.

628. Cotyledon. 5 capsules, entourées par 5 nectaires en écailles. Corolle monopétale.

629. SEDUM. 5 capsules, entourées par 5 nectaires en écailles. Cor. à 5 pétales.

638. Spergula. Capsule à une loge. Pétales entiers. Calice à 5 feuillets.

637. CERASTIUM. Capsule à une loge. Pétales divisés en deux. Calice à 5 feuillets.

635. AGROSTEMA. Caps. oblongue à une loge. Calice tubulé, coriacé, ou sec comme du cuir.

636. LYCHNIS. Caps. oblongue à 3 loges. Calice tubulé, membraneux.

634. Oxalis. Caps. à 5 loges, anguleuse. Cor. à 5 pétales réunis à la base.

+ Adoxa. + Coriaria. + Gerania. + Drosera lusitanica. 641. PHYTOLACCA. Sans corolle. Calice à 5 feuillets; coloré. Baie à 10 coques.

#### CLASSE XI. DODÉCANDRIE.

#### Monogynie.

642. AZARUM. Sans corolle. Calice supérieur à 3 segmens. Caps. à 6 loges.

656. PEGANUM. Cor. à 5 pétales. Cal. inférieur à 5 feuillets. Caps. à 3 loges. 15 étamines.

659. PORTULACA. Cor. à 5 pétales. Calice inférieur à 2 segmens. Caps. à une loge s'ouvrant horizontalement.

660. LYTHRUM. Cor. à 6 pétales. Calice inférieur à 12 segmens. Caps. à 2 loges.

# Digynie.

663. AGRIMONIA. Cor. à 5 pétales. Calice à 5 segmens. Une ou deux semences.

## Sos. Corvinnos. 5 c. singgir Totourdes par 5 uso-

664. RESEDA. Cor. à pétales déchiquetés. Calice divisé en segmens. Caps. toujours béante au sommet, à 3 loges.

665. EUPHORBIA. Cor. à pétales en bouclier. Calice ventru. Caps. à 3 coques.

# esiles and Tétragynie.

Tormentilla erecta.

+ Resedæ aliquot.

## Dodécagynie.

667. Sempervivum. Corolle à 12 pétales. Calice à 12 segmens. 12 Capsules.

#### CLASSE XII. ICOSANDRIE.

#### Monogynie.

668. CACTUS. Cal. supérieur d'une seule piece. Cor. monopétale à segmens nombreux. Baie à une loge.

669. PHILADELPHUS. Calice supérieur à 5 on 4 segmens. Cor. à 5 ou 4 pétales. Capsule à 5 ou

4 loges, à plusieurs semences.

672. MYRTHUS. Calice supérieur à 5 segmens. Cor. le plus souvent à 5 pétales. Baie à 3 loges, chacune à une semence.

673. Punica. Calice supérieur à 5 segmens. Cor. à 5 pétales. Pomme à 10 loges, à plusieurs semences.

674. Amygdalus. Calice inférieur à 5 segmens. Cor. à 5 pétales. Broue sèche renfermant un noyau parsemé de petits trous.

675. PRUNUS. Calice inférieur à 5 segmens. Cor. à 5 pétales. Broue molle à noyau sans pores.

## Digynie.

678. CRATEGUS. Calice supérieur à 5 segmens. Cor. à 5 pétales. Baie à 2 semences.

# Trigynie.

679. Sorbus. Calice supérieur à 5 segmens. Cor. à 5 pétales. Baie à 3 semences.

## Pentagynie.

681. MESPILUS. Calice supérieur à 5 segmens. Cor. à 5 pétales. Baie à 5 semences.

682. Pyrus. Calice supérieur à 5 segmens. Cor. à 5 pétales. Pomme à 5 loges, à plusieurs semences.

685. Aizoon Calice inférieur à 5 segmens. Sans corolle. Caps. à 5 loges, à plusieurs semences.

684. MESEMBRYANTHEMUM. Calice supérieur à 5.

Segmens. Cor. monopétale à plusieurs segmens. Caps. charnue loculaire à plusieurs semences. 686. Spiræa. Calice inférieur à 5 segmens. Cor. à 5 pétales. Plusieurs capsules entassées.

## Polygnie.

687. Rosa. Calice à 5 segmens. Cor. à 5 pétales. Calice qui se change en baie, renfermant plusieurs semences.

688. Rubus. Calice à 5 segmens. Cor. à 5 pétales. Baie formée par plusieurs grains entassés.

691. TORMENTILLA. Calice à 8 segmens. Cor. à 4 pétales. 8 semences sans arête.

693. DRYAS. Calice à 8 segmens. Cor. à 8 pétales. Semences nombreuses, terminées par une longue arête duvetée.

689. FRAGARIA. Calice à 10 segmens. Cor. à 5 pétales. Plusieurs semences nidulées dans un réceptacle succulent ou en baie, et caduc.

690. POTENTILLA. Calice à 10 segmens. Cor. à 5 pétales. Semences nombreuses sans arête.

692. GEUM. Calice à 10 segmens. Cor. à 5 pétales. Semences nombreuses terminées par une arête genouillée ou recoudée.

694. COMARUM. Calice à 10 segmens. Cor. à 5 pétales. Semences nombreuses adhérentes à un réceptacle charnu.

> † Spiræa filipendula, ulmaria. † Phytolacca icosandra. † Mesembryanthema aliquot.

#### CLASSE XIII. POLYANDRIE.

## Monogynie.

## Fleurs à quatre pétales.

704. PAPAVER. Calice à 2 feuillets. Capsule à une loge couronnée.

703. CHELIDONIUM. Calice à 2 feuillets. Fruit à silique.

699. CAPPARIS. Calice à 4 feuillets. Baie pédicillée,

à écorce sèche.

700. Астжа. Calice à 4 feuillets. Baie à une loge. Semences disposées sur 2 rangs.

#### \*\* Fleurs à cinq pétales.

728. CISTUS. Caps. arrondie. Calice à 5 feuillets, dont 2 plus petits.

730. Corchorus. Caps. le plus souvent à 5 loges. Calice caduo, à 5 feuillets, de la longueur de la corolle.

717. TILIA. Caps. coriacée à 5 loges, à une semence. Calice caduc.

+ Delphinium consolida, Ajacis.

#### + Aconiti.

#### Fleurs à six pétales.

705. ARGEMONE. Calice à 3 feuillets. Caps. à une loge, à demi-valves.

\*\*\*\* Fleurs à plusieurs pétales.

709. NYMPHÆA. Baie à plusieurs loges à écorce sèche. Calice grand.

## Digynie.

732. PAONIA. Calice à 5 feuillets. Cor. à 5 pétales. Capsule à plusieurs semences colorées.

#### Trigynie.

736. DELPHINIUM. Sans calice. Cor. à 5 pétales, les supérieures ralongées en corne. Nectaires assis, fendus en deux.

737. ACONITUM. Sans calice. Cor. à 5 pétales, le supérieur en casque. 2 nectaires pédicillées,

ou portés sur un pied.

+ Reseda luteola.

## Pentagynie.

741. AQUILEGIA. Sans calice. Cor. à 5 pétales. 5 nectaires prolongés inférieurement en cornes.

742. NIGELLA. Sans calice. Cor. à 5 pétales. 8 nectaires terminés supérieurement en deux levres.

+ Aconita nonnulla.

## Hexagynie.

744. STRATIOTES. Calice à 3 segmens. Cor. à 3 pétales. Baie à 6 loges, renfermées dans un spathe.

Polyginie.

753. ATRAGENE. Sans calice. Cor. extérieure plus grande à 4 pétales, l'intérieure à plusieurs pétales. Plusieurs semences à arête.

754. CLEMATIS. Sans calice. Cor. à 4 pétales. Plu-

sieurs semences à arête.

755. THALICTRUM. Sans calice. Cor. à 4 ou 5 pétales. Plusieurs semences nues, le plus souvent sans arête.

759. ISOPYRUM. Sans calice Cor. caduque à 5 pétales. 5 nectaires. Caps. à plusieurs semences.

760. HELLEBORUS. Sans calice. Cor. à 5 pétales, persistante. Plusieurs nectaires. Caps. à plusieurs semences.

761. CALTHA. Sans calice. Cor. à 5 pétales, sans nec-

taires. Plusieurs capsules.

752. Anemone. Sans calice. Cor. à 6 pétales. Plusieurs semences.

758. TROLLIUS. Sans calice. Cor. à 14 pétales. Nectaires linaires. Caps. à plusieurs semences.

757. RANUNCULUS. Cal. à 5 feuillets. Cor. à 5 pétales. Plusieurs semences. Nectaire sur l'onglet des pétales.

756. Adonis. Cal. à 5 feuillets. Cor. à 5 ou 10 pétales. Plusieurs semences anguleuses, à écorce sèche.

+ Nigellæ nonnullæ.

## CLASSE XIV. DIDYNAMIE.

## Gymnospermie.

# \* Calices à cinq segmens.

- 780. LEONURUS. Antheres parsemées de grains brillans.
- 773. GLECHOMA. Chaque paire d'antheres en s'ados-
- 767. Hyssopus. Corolle béante. Filamens droits,
- 771. MENTHA. Corolle à peine labiée. Filamens droits,
- 770. SIDERITIS. Deux stygmates, dont le plus court sert de gaine à l'autre.
- 769. LAVENDULA. Corolle renversée.
- 764. TEUCRIUM. Levre supérieure de la corolle manquant. Une fente sur la partie supérieure du tuyau.
- 763. Aluga. Levre supérieure de la corolle, plus courte que les étamines.
- 781. Phiomis. Levre supérieure de la corolle, velue.
- 776. BETONICA. Levre supérieure de la corolle applatie, ascendante, à tuyau cylindrique. Etamines montant jusqu'à la gorge de la corolle.
- 774. LAMIUM. Levre inférieure de la corolle, dentée de chaque côté, à dents sétacées.
- 775. GALEOPSIS. Levre inférieure de la corolle à 2 dents.
- 777. STACHYS. Levre inférieure de la corolle renversée sur les côtés. Etamines après la fécondation, renversées sur les côtés.
- 768. NEPETA. Levre inférieure de la corolle, crenelée. La marge de la corolle repliée.
- 765. SATUREJA. Corolle à divisions presque égales. Etamines écartées.
- 778. BALLOTA. Calice à 10 stries. Levre supérieure de la corolle en cuiller.

779. MARRUBIUM. Cal. à 10 stries. Levre supérieure

de la corolle droite.

782. MOLUCELLA. Calice en cloche, beaucoup plus ample que la corolle, à segmens terminés par des épines.

- + Verbenæ species aliquot. + Monarda dydyma.
- Calices à deux segmens.

792. SCUTELLARIA. Calice du fruit à bouche fermée par un opercule.

785. THYMUS. Gorge du calice fermée par des

poils.

790. OCYMUM. Corolle renversée. Deux filamens garnis à la base d'un appendice.

793. PRUNELLA. Filamens fourchus à leur sommet. 787. Dracocephalum. Cor. très-enflée à la gorge ou 

784. ORIGANUM. Ecailles couvrant les calices, for-

ment une espece de chaton.

783. CLINOPODIUM. Collerette à filets sétacés sous les calices.

766. THYMBRA. Calice en carene marqué des deux côtés d'une ligne ciliée. Style divisé à moitié en deux. Levres de la corolle planes.

789. MELITIS. Calice plus ample que le tuyau de la corolle. Levre supérieure de la corolle applatie, entiere. Antheres en s'adossant, formant une croix.

786. MELISSA. Calice anguleux, aride, à levre supé-

rieure ascendante.

788. HORMINUM. Corolle offrant 4 divisions presque égales : la cinquieme plus grande échancrée.

795. Prasium. Semences en baie.

## Angyospermie.

#### Calices à deux segmens.

841. OROBANCHE. Caps. à une loge. Cor. a 4 divisions presque égales. Nectaire glanduleux à la base du germe.

857. Acanthus. Caps. à 2 loges. Cor. à une seule levre à 3 divisions. Antheres velues.

#### \*\*\* Calices à quatre segmens.

801. LATHRÆA. Caps. à une loge. Cor. en Masque. Une glande sous le germe.

797. BARTSIA. Caps. à 2 loges. Cor. en masque. Calice

coloré.

799. EUPHRASIA. Caps. à 2 loges. Cor. en masque. Antheres inférieures épineuses, d'un côté.

798. RHINANTHUS. Caps. à 2 loges. Cor. en masque. Capsule applatie.

800. MELAMPYRUM. Caps. à 2 loges. Cor. en masque. 2 semences bossuées.

824. Lantana. Fruit à noyau à 2 loges. Cor. en soucoupe. Stigmate en crochet.

## \*\*\* Calices à cinq segmens.

803. Tozzia. Caps. à une loge. Cor. en soucoupe. Une semence.

837. Limosella. Caps. à une loge. Cor. campanulée réguliere. Plusieurs semences.

834. BROVALLIA. Caps. à une loge. Cor. en soucoupe.

Semences nombreuses.

828. LINDERNIA. Caps. à une loge. Cor. labiée. 2 étamines plus courtes terminées par une dent.

814. SCROPHULARIA. Caps. à 2 loges. Cor. renversée. Segment intermédiaire de la levre inférieure, plaqué en dedans.

815. CELSIA. Caps. à 2 loges. Cor. en roue. Filamens

laineux.

827. CAPRARIA. Caps. à 2 loges. Cor. en cloche. Stigmate en cœur, ou formé par deux valves.

816. DIGITALIS. Caps. à 2 loges. Cor. en cloche, ventrue en dessous. Etamines inclinées.

817. BIGNONIA. Caps. à 2 loges. Cor. en cloche. Semences ailées, en recouvrement.

832. Entrus. Caps. à 2 loges. Cor. à 2 levres, levre supérieure très-courte, repliée.

808. Antirrhinum. Caps. à 2 loges. Cor. en mas-

e

que, terminée en dessous par un nectaire plus ou moins saillant.

804. PEDICULARIS. Caps. à 2 loges. Cor. en masque. Semences coiffées.

811. MARTYNIA. Caps. à 5 loges. Cor. en cloche. Rudiment d'un cinquieme filament.

835. LINNÆA. Baie à 3 loges, seche. Cor. en cloche. Calice supérieur, ou au dessus du germe.

853. VITEX. Baie à 4 semences. Cor. labiée. Levre supérieure à 3 divisions.

## \*\*\*\* Fleurs à plusieurs pétales.

859. MELIANTHUS. Caps. à 4 loges. Cor. à 4 pétales. Un nectaire entre les pétales inférieurs.

#### CLASSE XV. TÉTRADYNAMIE.

#### Siliculeuse.

- \* Silicule entiere, ou qui n'est pas échancrée au sommet.
- 864. DRABA. Silicule à valves applaties. Sans style.
- 873. LUNARIA. Silicule pédicillée à valves planes. Style saillant.

863. Subularia. Silicule à valves demi-ovales. Style plus court que la silicule.

860. Myagrum. Silicule à valves concaves, à style persistant.

261. Vella. Silicule à valves moitié plus courtes que la cloison.

#### \*\* Silicule échancrée au sommet.

868. IBERIS. Les deux pétales extérieurs plus grands.

869. ALYSSUM. Quelques filamens marqués d'une dent sur le côté intérieur. Silicule à 2 loges.

870. CLYPEOLA. Silicule ronde, applatie, caduque.

871. PELTARIA. Silicule ronde, applatie, comprimée à valves ne s'ouvrant pas.

867. Cochlearia. Silicule en cœur à valves obtuses bossuées.

865. LEPIDIUM. Silicule en cœur, à valve à carene tranchante.

866. The Silicule le plus souvent en cœur, à valves carenées, et à marge saillante.

872. BISCUTELLA. Silicule formant deux lobes, à marge carenée en dessus et en dessous.

862. Anastatica. Silicule mousse, à valves plus longues que la cloison qui est terminée en pointe.

## Siliqueuse.

- \* Calices fermés, à folioles s'abouchant sur leur longueur.
- 886. RAPHANUS. Silique articulée.

878. ERYSIMUM. Silique tetraëde, ou à 4 pans:

879. CHEIRANTHUS. Silique. Le germe flanqué de chaque côté par une glande.

881. HESPERIS. Des glandes entre les étamines les plus courtes. Pétales obliques.

882. ARABIS. Quatre glandes entre les folioles du calice. Stigmate simple.

884. Brassica. Deux glandes miellieres entre les étamines plus courtes, et deux autres en dehors des étamines les plus longues.

883. TURRITIS. Pétales droits.

875. DENTARIA. Valves de la silique se roulant en spirale.

874. RICOTIA. Silique à une loge.

- \*\* Calices béans, à folioles écartés à leur sommet.
- 889. CRAMBE. Silique caduque arrondie en baie dessechée. 4 filamens fourchus au sommet.

888. Isatis. Silique caduque, lingulée à une se-

887. Bunias. Silique caduque à 4 pans, courte, comme épineuse sur les angles.

890. CLEOME. Silique à une loge s'ouvrant par ressort.
Glande mielliere à la base des folioles du calice. Le plus souvent plus de 6 étamines.

876. CARDAMINE. Silique s'ouvrant par ressort, à valves roulés en spirale.

885. SINAPIS. Silique s'ouvrant par ressort, renslée vers le bas. Feuillets du calice très-étalés.

877. Sisymbrium. Silique s'ouvrant par ressort. Les valves restant droites, à feuillets du calice étalés.

## CLASSE XVI. MONADELPHIE.

#### Décandrie.

\$97. GERANIUM. Un seul style. Capsule à 5 coques, terminées par un long bec.

## Polyandrie.

con A pans

- 902. Sida. Le plus souvent un style. Calice simple à angles saillans. Caps. à loges, à une semence.
- 910. GOSSYPIUM. Un style. Calice extérieur à 3 segmens. Capsule à loges réunies à plusieurs semences.
- 907. LAVATERA. Plusieurs styles. Calice extérieur à 3 segmens. Capsules à une semence, réunies en anneau.
- 906. MALVA. Plusieurs styles. Calice extérieur à 3 feuillets. Plusieurs capsules à une semence, réunies en anneau.
- 908. MALOPE. Plusieurs styles. Calice extérieur à 3 feuillets. Capsules à une semence, conglo-mérées.
- 905. ALCEA. Plusieurs styles. Calice extérieur à 6 segmens. Plusieurs capsules à une semence.
- mens. Capsules à plusieurs loges réunies à plusieurs semences.
- 904. ALTHEA. Plusieurs styles. Calice extérieur à 9 segmens. Capsules à une semence, réunies en anneau.

use stay, salvines some and assure de

#### CLASSE XVII. DIADELPHIE.

#### Hexandrie.

920. FUMARIA. Calice à 2 feuillets. Cor. en muste, à miellier prolongé à la base. Filamens à 3 antheres.

#### Octandrie.

921. Polygala. Calice dont 2 segmens imitent les ailes des papillonacées. Cor. imitant un étendart cylindrique. Etamines réunies par les filamens. Caps. comme en cœur, à deux loges.

#### Décandrie.

#### \* Toutes les étamines réunies.

929. SPARTIUM. Filamens adhérens au germe. Stigmate velu, comme collé.

930. GENISTA. Pistil repoussant la carene. Stigmate

enveloppé.

939. LUPINUS. 5 antheres alternes arrondies, 5 autres oblongues. Légume coriace.

936. ANTHYLLIS. Calice renflé, enveloppant le légume.

932. ULEX. Calice à 2 feuillets. Légume à peine plus long que le calice.

935. Ononis. Légume rhomboïdal, assis. Etendart strié.

- \*\* Stigmates duvetés, (dans les genres qui n'ont point les caracteres des genres précédens.)
- 954. COLUTEA. Légume boursouflée, s'ouvrant un peu au dessus de la base.

940. Phaseolus. Carene et style offrant un contour d'une spirale.

945. OROBUS. Style linaire, cylindrique, velu en dessus.

944. PISUM. Style carené, velu en dessus.

946. LATHYRUS. Style applati, velu en dessus.

947. VICIA. Style barbu en dessous.

- \*\*\* Légumes divisés en deux loges à cloison entiere ou incomplette, (et n'offrant point les caracteres des genres précédens.)
- 965. ASTRAGALUS. Légume comme en deux loges, arrondi.
- 966. BISSERULA. Légume à 2 loges, applati, denté.
- 964. Phaca. Légume divisé en 2 loges par une demicloison.
- Légumes le plus souvent à une semence, (et n'offrant point le caractère des genres précédens.)
- 967. PSORALEA. Calice parsemé de points glanduleux.
- 968. Trifolium. Légume à peine plus long que le calice, à une ou deux semences. Fleurs rassemblées en tête, excepté dans les melilots.

955. GLYCYRRHIZA. Calice à 2 levres, la supérieure à 3 segmens.

- \*\*\*\* Légumes le plus sonvent articulés ou à nodosités.
- 961. HEDYSARUM. Légumes à articulations, comprimés, arrondis. Carene très-obtuse.

956. CORONILLA. Légume droit, à étranglemens peu marqués.

957. ORNITHOFUS. Légume articulé, recourbé en demi-arc.

959. Scorpiurus. Légume à étranglemens, interrompu par des sinuosités, roulé sur lui-même, le plus souvent arrondi.

958. HIPPOCREPIS. Légume membraneux, comprimé sur les faces, à plusieurs échancrures en fer à cheval sur une des sutures.

971. MEDICAGO. Légume membraneux, applati sur les faces, contourné en spirale, à pistil renversant la carene.

- "\*\*\*\*\* Légumes à une loge, à plusieurs semences, ( es n'offrant point le caractere des genres précédens. )
- 970. TRIGONELLA. L'étendart et les ailes étalés comme à trois pétales, la carene étant très-petite:
- 953. ROBINIA. L'étendart arrondi, renversé en dehors.
- 949. CICER. Les quatre segmens supérieurs du calice rabattus sur l'étendart.
- 948. ERVUM. Calice presque aussi long que la co-rolle, divisé en 5 segmens presque égaux.
- 951. CYTISUS. Légume supporté par un pédicile. Calice à deux levres.
- 963. GALEGA. Légume linaire, à stries tranversales obliques.
- 969. Lotus. Légume cylindrique, bourré de semences cylindriques.

#### CLASSE XVIII. POLYADELPHIE.

#### Icosandrie.

974. CITRUS. Calice à 5 dents. Cor. à 5 pétales. 20 étamines réunies souvent en cylindre. Un pistil. Baie loculaire à pulpe formé par des vessicules.

## Polyandrie.

981. HYPERICUM. Cal. inférieur à 5 segmens. Cor. à 5 pétales, 1, 3 ou 5 styles. Caps. loculaire.

#### CLASSE XIX. SYNGÉNÉSIE.

## Polygamie égale.

- \* Semi-flosculeuses de Tournefort à corolles en languette.
- 1001. SCOLYMUS. Réceptacle garni de paillettes. Semences sans aigrette. Calice épineux à feuillets en recouvrement.

Semences à aigrette à cinq dents. Calice caliculé, ou les écailles inférieures séparées, imitant un calice accessoire.

999. CATANANCHE. Récept. garni de paillettes. Semences à aigrette, assises, à 5 arêtes. Calice

à écailles desséchées en recouvrement.

996. Seriola. Récept. garni de paillettes. Semences à aigrette le plus souvent plumeuse. Calice simple.

997. HYPOCHERIS. Récept. garni de paillettes. Semences à aigrette le plus souvent plumeuse.

Calice à écailles en recouvrement.

983. GEROPOGON. Récept. garni de paillettes. Semences à aigrette plumeuse au disque, à 5 arêtes au rayon. Cal. simple.

994. Andryala. Récept. velu. Semences à aigrette assise à poil. Calice presque égal, arrondi.

984. TRAGOPOGON. Récept. nu. Semence à aigrette plumeuse, portée sur un pied. Calice simple.

986. Picris. Récept. nu. Semences à aigrette plumeuse, portée sur un pied. Calice caliculé.

991. LEONTODON. Récept. nu. Semences à aigrette plumeuse, portée sur un pied. Calice à écailles lâches, en recouvrement.

985. Scorzonera. Récept. nu. Semences à aigrette plumeuse portée sur un pied. Calice à écailles en recouvrement, membraneuses sur les bords.

993. CREPIS. Récept. nu. Semences à aigrette à poils. Calice caliculé à écailles difformes.

989. CHONDRILLA. Récept. nu. Semences à aigrette à poils, portée sur un pied. Calice caliculé à plusieurs demi-fleurons.

990. PRENANTHES. Récept. nu. Semences à aigrette à poils. Calice caliculé à 4 ou 5 demi-fleurons.

988. LACTUCA. Récept. nu. Semences à aigrette à poils, portée sur un pied. Calice à écailles en recouvrement, membraneuses sur les bords.

poils, assise. Calice ovale, à écailles en re-

987. Sonchus. Récept. nu. Semences à aigrette assise, à poil. Calice bossué à écailles en recouvrement.

998. LAPSANA. Récept. nu. Semences sans aigrette.

Calice caliculé.

995. Hyoseris. Récept. nu. Semences couronnées par un petit calice. Calice à écailles presque égales.

#### \*\* Flosculeuses à fleurons en tête.

1009. ATRACTYLIS. Corolle radiée.

1008. CARLINA. Calice radié, à rayons colorés. 1005. CNICUS. Calice enveloppé par des bractées.

1002. ARCTIUM. Calice à écailles recourbées à la

pointe en hamecon.

1010. CARTHAMUS. Cal. à écailles sèches en feuillets.

1007. CYNARA. Calice à écailles épineuses creusées en canal.

1004. CARDUUS. Calice ventru, à écailles épineuses. Récept, garni de poils.

1006: ONOPORDON. Calice ventru, à écailles épineu-

and povises. Récept. alvéolaire.

1003. SERRATULA. Calice comme cylindrique, à écailles mousses en recouvrement.

#### \*\*\* Discoides.

1013. CACALIA. Récept. nu. Semences à aigrette à poils. Calice caliculé.

1019. CHRYSOCOMA. Récept. nu. Semences à aigrette à poils. Calice à écailles en recouvrement.

Les pistils très-courts.

1015. EUPATORIUM. Récept. nu. Semences à aigrette plumeuse. Calice à écailles en recouvrement. Pistils très-longs.

1022. SANTOLINA. Récept. garni de paillettes. Semences sans aigrette. Calice hémisphérique,

à écailles en recouvrement.

1023. ATHANASIA. Récept. garni de paillettes. Semences à aigrette à paillettes. Calice à écailles en recouvrement.

à aigrette à arête. Calice à écailles en recouvrement.

1018. STÆHELINA. Récept. garni de paillettes. Semences à aigrette plumeuse, ramifiée. Antheres terminées par une queue.

## Polygamie superflue.

#### \* Discoides.

Semences sans aigrette, sans fleurons au rayon.

1028. CARPESIUM: Récept. nu. Semences sans aigrette. Fleurons du rayon à 5 segmens.

1024. TANACETUM. Récept. nu. Semences à aigrette le plus souvent échancrée. Fleurons du rayon à 3 segmens.

1050. COTULA. Récept. nu. Semences à aigrette échancrée. Fleurons du rayon à 4 segmens.

poils. Fleurons femelles mêlés avec les hermaphrodites.

1030. CONYZA. Récept. nu. Semences à aigrette à poils. Fleurons du rayon à 3 segmens.

1026. GNAPHALIUM. Récept. nu. Semences à aigrette plumeuse. Calice à écailles seches, concaves.

Semences à aigrette le plus souvent terminée par une soie. Calice à écailles sèches, roides. Celles du rayon applaties comme des pétales.

1051. ANACYCLUS. Récept. garni de paillettes. Semences sans aigrette, échancrées à la marge.

#### \*\* Fleurs radiées.

1042. Bellis. Récept. nu. Semences sans aigrette. Cal. simple à écailles égales.

1049. MATRICARIA. Récept. nu. Semences sans aigrette. Calice à écailles pointues en recouvrement.

aigrette. Calice à écailles intérieures seches au sommet.

1039. DORONICUM. Récept. nu. Semences à aigrette à poils, sans aigrette à celles du rayon.

poils. Etamines du rayon sans antheres.

1037. INULA. Récept. nu. Semences à aigrette à poils.
Antheres terminées à la base par deux soies.

1031. ERIGERON Récept. nu. Semences à aigrette à poils. Demi-fleurons du rayon capillaire.

poils. Demi fleurons du rayon à peu-près au nombre de six, écartés.

1036. CINERARIA. Récept. nu. Semences à aigrette à

poils. Calice simple, egal.

poils. Calice à écailles sphacelées au sommet, ou noirâtres desséchées.

2032. Tussilago. Récept. nu. Semences à aigrette à poils. Calice à écailles presque membra-

1034. ASTER. Récept. nu. Semences à aigrette à poils.

Calice à écailles assez seches.

1044. TAGETES. Récept. nu. Semences à aigrette à

arêtes. Calice d'une seule piece. Fleurons du rayon au nombre de cinq.

ces à aigrettes à 5 arêtes. Calice à plusieurs segmens. Fleurons du rayon à 3 divisions.

1057. SIEGESBECKIA. Récept. garni de paillettes. Semences sans aigrette. Les demi-fleurons du rayon d'un seul côté.

1052. ANTHEMIS. Récept, garni de paillettes. Semences sans aigrette. Calice hémisphérique.

ces sans aigrette. Les demi-fleurons du rayon au nombre de cinq. Calice oblong.

Semences à bordure. Stigmate des fleurons hermaphrodites, simple.

1058. VERBESINA. Récept. garni de paillettes. Semences à aigrette à arête. Fleurons du rayou à

peu-près au nombre de cinq.

1046. ZINNIA. Récept, garni de paillettes. Semences à aigrette à arête. Demi-fleurons du rayon au nombre de cinq, persistans. Calice à écailles en recouvrement.

## Polygamie frustranée.

a aigrette à poils. Fleurons du rayon en entonnoir, irréguliers.

1061. RUDBECKIA. Récept. garni de paillettes. Semences à bordure. Calice formé par deux

rangs d'écailles.

1062. COREOPSIS. Récept. garni de paillettes. Semences à aigrette à arête. Calice caliculé.

1060. HELIANTHUS. Récept. garni de paillettes. Semences à aigrette à arête. Calice à feuillets secs et roides.

## Polygamie nécessaire.

1079. FILAGO. Récept. nu. Semences sans aigrette. Fleurons femelles entre les écailles du calice.

1080. Micropus. Récept. nu. Semences sans aigrette.

Fleurons femelles enveloppés par les écailles
du calice.

1076. OTHONNA. Récept. nu. Semences à aigrette à poils. Calice d'une seule piece.

1073. CALENDULA. Récept. nu. Semences membra-,

neuses, sans aigrette.

1074. ARCTOTIS. Récept. un peu velu. Semences cotonneuses terminées par 5 feuillets.

## Polygamie séparée.

1084. ECHINOPS. Calice à périanthe uniflore. Extrémité des semences duvetée. Polygamie égale.

## Monogamie.

1090. JASIONE. Calice commun. Corolle réguliere à 5 pétales. Caps. inférieure à 2 loges.

1091. LOBELIA. Calice à 5 dents. Cor. monopétale irréguliere. Caps. inférieure à 2 loges.

1092. VIOLA. Calice à 5 fenillets. Cor. irréguliere à 5 pétales. Caps. supérieure à 3 valves.

liere à 5 pétales. Caps. supérieure à 3 valves.

#### CLASSE XX. GYNANDRIE.

#### Diandrie.

1094. ORCHIS. Nectaire prolongé en corne.

1095. SATYRIUM. Nectaire en bourse.

1096. OPHRYS. Nectaire le plus souvent en carene. 1097. SERAPIAS. Nectaire ovale, bossué en dessous. 1100. CYPRIPEDIUM. Nectaire boursouflé, ventru.

#### Triandrie.

pétales étalés. 3 stigmates. Caps. inférieure à 3 loges.

Pentandrie.

1110. PASSIFLORA. 3 styles. Calice à 5 segmens. Cor. à 5 pétales. Baie supportée par un pédicille.

#### Hexandrie.

monopétale. Caps. à 6 loges.

#### Dodécandrie.

corolle. Baie à 8 loges.

## Polyandrie.

1121. CALLA. Spathe. Sans calice et corolle. Etamines mêlées avec les pistils.

mines insérées sur le pistil.

Semences alternes, nues.

## CLASSE XXI. MONOECIE.

#### Monandrie.

Femelle. Calice à 4 feuillets. Sans corolle.

Stigmate fendu en trois parties. Une semence.

F. Calice d'une seule piece. Sans corolle. 4 pistils. 4 semences.

1125. CERATOCARPUS. M. Calice à 2 segmens. Sans corolle.

F. Calice à 2 feuillets. Sans corolle. 2 styles.

Une semence inférieure.

II26. CYNOMORIUM. M. Calices en chatons. Sans corolle.

F. Calices en chatons. Sans corolle. Un style.

Une semence arrondie.

#### + Calitriche verna.

#### Diandrie.

rolle.

F. Calice d'une seule piece. Sans corolle.

Un style. Caps. à une loge.

#### Triandrie.

1133. ZEA. M. Balle calicinale à 2 fleurs. Cor. Balle à 2 valves.

F. Balle calicinale à une fleur. Cor. Balle à 2 valves. Un style. Une semence, nue, arrondie.

\$055. Coix. M. Balle calicinale à 2 fleurs. Cor. Balle à 2 valves.

F. Balle calicinale à 2 fleurs. Cor. Balle à 2 valves. Style fendu en deux. Une semence couverte par une noix.

1137. CAREX. M. Calices à chatons à une fleur. Sans

corolle.

F. Calice à chatons à une fleur. Un style. Une semence enveloppée.

1132. SPARGANIUM. M. Fleurs à chatons. Calice à 3 feuillets. Sans corolle.

F. Calice à 3 feuillets. Sans corolle. 2 stig-

mates. Broue sèche à une semence.

F. Calice capillaire sans corolle. Un style Une semence à aigrette.

#### + Amaranthi varii.

#### Tétrandrie.

1149. URTICA. M. Calice à 4 feuillets. Sans corolle.
Nectaire en godet.

F. Calice à 2 valves. Sans corolle. Stigmate

velu. Une semence ovale.

F. Calice à 4 feuillets. Sans corolle.
Une semence nidulée dans une baie.

1148. Buxus. M. Calice à 3 feuillets. Cor. à 2 pétales. F. Calice à 4 feuillets. Cor. à 3 pétales. 3

stigmates. Caps. à 5 loges.

1147. BETULA. M. Calices à chatons à 3 fleurs. Cor. divisée en 4 parties.

F. Calice à 2 fleurs. Sans cor. 2 styles. Une

semence ovale.

4 segmens. Etamines très-longues.

F. Sans calice. Cor. à 4 segmens. Styles très-longs. Fruit, espece de noix.

#### Pentandrie.

feuillets. Corolle à 5 divisions. Filamens

F. Sans calice et sans cor. 2 styles. Broue

à 2 loges.

Sans cor. 3 ou 5 étamines.

F. Calice du mâle. Sans cor. 3 styles. Caps. s'ouvrant horizontalement.

#### Hexandrie.

+ Rumex spinosus, alpinus.

## Polyandrie. (Plus de 7 étamines.)

pétales. environ 24 étamines.

F. Calice et cor. du mâle. 100 pistils. Semences nombreuses.

1163. MYRIOPHYLLUM. M. Calice à 4 feuillets. Sans cor. 8 étamines.

F. Calice à 4 feuillets. Sans cor. 4 pistils.

4 semences.

1162. CERATOPHYLLUM. M. Calice le plus souvent à 5 segmens. Sans cor. environ 18 étamines. F. Calice à 7 segmens. Sans cor. Un pistil. Une semence.

1166. THELIGONUM. M. Calice à 2 segmens. Sans cor. environ 18 étamines.

F. Calice à 2 segmens. Sans cor. Un pistil. Une semence à écorce qui peut se détacher.

divisions. Environ 32 étamines.

F. Calice à 4 feuillets. Cor. à 4 pétales. 2 pistils. 2 semences enveloppées.

1170. FAGUS. M. Calice à 5 segmens. Sans cor. environ 12 étamines. F. Calice à 4 segmens. Sans corolle. 3 styles. Caps. à 2 semences.

1168. QUERCUS. M. Calice à 5 segmens. Sans corolle. Environ 10 étamines.

F. Calice entier, Sans corolle. 5 styles. Fruit noix seche comme du cuir.

1169. JUGLANS. M. Calice à chatons, à écailles en recouvrement. Cor. à 6 divisions. Environ 18 étamines.

> F. Calice à 4 segmens. Cor. à 4 pétales. 2 styles. Noix enveloppée d'une broue séche.

1172. CORYLUS. M. Calice à chatons, à écailles en recouvrement. Sans corolle. 8 étamines. F. Calice à 2 feuillets. Sans corolle. 2 styles.

Fruit, noix sans broue.

1171. CARPINUS. M. Calice à chatons à écailles en recouvrement. Sans corolle. 10 étamines. F. Calice à 6 segmens. Sans corolle. 2 pistils. Fruit, noix sans broue.

1173. PLATANUS. M. Calice à chatons globuleux. Cor. à peine sensible. Anthere entourant les fi-

> F. Calice à chatons globuleux. Cor. à 5 pétales. Un style. Une semence aigrettée.

## Monadelphie.

1175. PINUS. M. Calice à 4 feuillets. Sans corolle. Etamines nombreuses. F. Calice en cône. Sans corolle. 2 pistils. Noix

à 2 ailes.

1177. CUPRESSUS. M. Calice à chatons. Sans corolle. 4 antheres assises.

F. Calice en cône. Sans corolle. 2 stigmates. Noix anguleuse.

1176. THUJA. M. Calice à chatons. Sans corolle. 4 antheres. F. Calice en cône. Sans corolle. 2 pistils. Noix

ailée.

1181. CROTON. M. Calice à 5 feuillets. Cor. à 5 pétales. 15 étamines.

F. Calice à 5 feuillets. Sans corolle. 3 styles. Caps. à 3 coques.

1184. RICINUS. M. Calice à 5 segmens. Sans corolle. Etamines nombreuses.

F. Calice à 3 segmens. Sans corolle. 3 styles. Caps. à 3 coques.

## Syngénésie.

5 divisions. 3 filamens.

F. Calice à 5 segmens. Cor. à 5 divisions.

Style fendu en trois parties. Fruit, pomme élastique.

1193. Cucumis. M. Calice à 5 dents. Cor. à 5 di-

visions. 3 filamens.

F. Calice à 5 dents. Cor. à 5 divisions. Style fendu en 3 parties. Fruit, pomme à semences pointues.

1192. CUCURBITA. M. Calice à 5 dents. Cor. à 5 divisions. 3 filamens.

F. Calice à 5 dents. Cor. à 5 divisions. Style fendu en trois parties. Fruit, pomme à semences bordées.

3. filamens.

F. Cal. à 5 dents. Cor. à 5 divisions. Style fendu en 3 parties. Fruit, baie.

#### CLASSE XXII. DIOECIE.

#### Monandrie.

visions. Etamines sans filamens.

F. Sans calice et corolle. 3 pistils. Caps. à une loge.

+ Salix purpurea.

Diandrie.

Cal. à 2 segmens. Cor. à 3 divisions.

F. Spathe à une fleur. Cal. à 3 segmens.

Cor. à 3 pétales. Un pistil. Caps. à une loge.

1201. Salix. M. Calice à chatons en écailles. Sans corolle. 2. étamines, rarement 5.

F. Calice à chatons en écailles. Sans corolle.

2 stigmates. Caps. à 2 valves. Semences aigrettées.

Triandrie.

pétales.

F. Cal. à 3 segmens. Cor. à 3 pétales. 9 styles. Baie à 9 semences.

F. Calice à 2 segmens. Sans corolle. Germe sans style. Fruit, brone à une loge.

† Valeriana dioica. † Carex dioica.

+ Salix triandra.

#### Tetrandrie.

F. Calice à 2 segmens. Sans corolle. Baie à une semence, à pellicule tronquée.

F. Cal. à 4 feuillets. Sans corolle. Stigmate obtus. Baie inférieure à une semence.

1211. MYRICA. M. Calice à chatons en écailles. Sans corolle.

F. Calice à chatons en écailles. Sans corolles 2 styles. Baie à une semence.

† Urticæ variæ. † Morus nigra.

#### Pentandrie.

F. Calice d'une seule piece. Sans corolle.

F. Calice d'une seule piece. Sans corolle. 2

styles. Fruit espece de noix, ou une semence enveloppée par une écorce qui le sépare comme les deux valves d'une coque.

1221. HUMULUS. M. Calice à 5 feuillets. Sans corolle.

F. Calice d'une seule piece. Sans corolle. 2 styles. Sem. ailée par le calice qui la recouvre.

F. Calice à 3 segmens. Sans corolle. Fruit, broue seche.

F. Calice à 4 segmens. Sans corolle. 4 styles. Une semence coiffée par le calice.

+ Rhamnus alaternus. + Salix pentandra.

#### Hexandrie.

F. Calice à 6 feuillets. Sans corolle. F. Calice à 6 feuillets. Sans corolle. 3 styles. Baie supérieure à 3 loges.

F. Calice et corolle du mâle. Style divisé en 3 parties. Baie inférieure à 3 loges.

† Rumex acetosa, acetosella, aculeatus.

#### Octandrie.

1228. Populus. M. Calice en chatons à écailles déchirées. Sans corolle. Nectaire ovale. De 8 à 16 étamines.

F. Calice en chatons à écailles. Sans corolle. Stigmate fendu en 4 parties. Caps. à 2 valves. Semences aigrettées.

pétales.

F. Calice à 4 segmens. Sans corolle. 4 pistils.

4 capsules à plusieurs semences.

+ Laurus nobilis. + Acer rubrum.

#### Ennéandrie.

1230. MERCURIALIS. M. Calice à 3 feuillets. Sans corolle. De 9 à 12 étamines.

F. Calice à 3 feuillets. Sans corolle. 2 styles. Caps. à 2 coques.

i 231. Hydrocharis. M. Calice à 3 feuillets. Cor. à 3 pétales.

F. Calice à 3 feuillets. Cor. à 3 pétales. 6 styles. Caps. inférieure à 6 loges.

+ Laurus, an omnis?

#### Décandrie.

pétales.

F. Calice et corolle du mâle. 5 styles Baie à 5 semences, formée par 5 pétales charnus.

1234. Schinus. M. Calice à 4 segmens. Cor. à 5 pétales.

F. Calice à 5 segmens. Cor. à 5 pétales.

Baie à 3 coques.

† Lychnis dioica. † Cucubalus otites. † Gypsophyla paniculata.

## Dodécandrie.

1238. Menispermum. M. Calice à 2 feuillets. Cor. à 12 pétales.

F. Calice à 6 feuillets. Cor. à 6 pétales.

Baie à 3 coques.

#### Icosandrie.

† Spiraa aruncus. † Rubus chamamorus.

† Myrtus dioica.

## Polyandrie.

† Thalictrum Dioicum. † Stratiotes aloides.

## Monadelphie.

1240. JUNIPERUS. M. Calice à chatons en écailles.
Sans corolle. 3. étamines.

F. Calice à 3 segmens. Cor. à 3 pétales. 3 styles. Baie inférieure à 3 semences, formée par 3 segmens succulens du calice.

F. Calice à 4 feuillets. Sans corolle.

F. Calice à 4 feuillets. Sans corolle. Un stigmate. Baie à une semence, comme cernée vers le haut.

1242. EPHEDRA. M. Calice à chatons en écailles, à 2 segmens. Sans corolle. 7 étamines.

F. Calice à écailles en recouvrement. Sans corolle. Un pistil. Baie à 2 semences, enveloppée par le calice.

## Syngénésie.

1246. Ruscus. M. Calice à 6 feuillets. Sans cor. 5 étamines.

F. Calice à 6 feuillets. Sans corolle. Un pistil.

Baie à 3 loges, à 2 semences.

† Gnaphalium dioicum. † Bryonia dioica.

#### CLASSE XXIII. POLYGAMIE.

fleur. Cor. Balle à 2 valves. 3. étamines. 2 styles. Une semence.

Mâle. Balle calicinale à une fleur. Cor. Balle à 2 valves. 3 étamines.

Cor. Balle à 2 valves. 3 étamines. Style fendu en deux. Une semence.

M. Involucre comme dans l'hermaphrodite.

Cor. Balle à 2 valves. 3 étamines.

T254. ISCHÆMUM. Herm. Balle calicinale à 2 fleurs. Cor. Balle à 2 valves. 3 étamines. 2 styles. Une semence.

M. Balle calicinale à 2 fleurs. Cor. Balle à 2 valves. 3 étamines.

1256. ÆGILOPS. Herm. Balle calicinale à 3 fleurs.

Cor. Balle terminée par 3 arêtes. 3 étamines. 2 styles. Une semence.

M. Balle calicinale à 3 fleurs. Cor. Balle à 3 arêtes. 3 étamines.

- fleur. Cor. Balle offrant une arête à sa base.

  3 étamines. 2 styles. Une semence.

  M. Balle calicinale à une fleur. Cor. Balle
  à arête à la base. 3 étamines.
- 1258. VALANTIA: Herm. Sans calice. Cor. à 4 divisions. 4 étamines. Style fendu en deux. Une semence.

  M. Sans calice. Cor. à 5 ou 4 divisions. 3 ou 4 étamines.
- 5 étamines. 2 styles. Fruit à broue.

  M. Cal. à 6 segmens. Sans corolle. 6 étamines.
- tales. 6 étamines. 3 pistils. 3 capsules.

  M. Sans calice. Cor. à 6 pétales. 6 étamines.
- 1266. ACER. Calice à 5 segmens. Cor. à 5 pétales. 8 étamines. 2 styles. Caps. à 2 coques, ailée.

  M. Calice à 5 segmens. Cor. à 5 pétales. 8 étamines.
- 1259. PARIETARIA. Herm. Calice à 4 segmens. Sans corolle. 4 étamines. Un style. Une semence. F. Calice à 4 segmens. Sans corolle. Un style. Une semence.
- 1260. ATRIPLEX. Herm. Calice à 5 feuillets. Sans corolle. 5 étamines. Style fendu en deux. Une semence.

  F. Calice à 2 feuillets. Sans corolle. Style fendu en deux. Une semence.
- visions. De 4 à 100 étamines. Un pistil. Fruit à légume.

  M. Calice à 5 dents. Corolle à 5 divisions.

  De 4 à 100 étamines.

+ Asculus. + Fraxinus excelsior.

† Euphorbia. † Melothria. † Ilex. † Silene saxifraga.

#### Dioecie.

Cor. à 4 pétales. 6 étamines. Un pistil. Fruit à légume.

M. Cal. à 3 feuillets. Cor. à 3 pétales. 6 étamines.

B. F. Cal. à 5 feuillets. Cor. à 5 pétales. Un pistil. Fruit à légume.

segmens. Sans calice, ou à calice à 4 segmens. Sans corolle, ou à corolle à 4 pétales. 2 étamines. 2 pistils. Une semence.

F. Sans calice, ou à calice à 4 segmens.

Sans corolle, ou à corolle à 4 pétales. Un pistil. Une semence.

+ Ilex aquifolium.

+ Rhamnus alaternus?

#### Trioecie.

Sans cor. 5 étamines. Un style. Légume sec comme du cuir, à plusieurs semences.

B. M. Calice à 5 segmens. Sans corolle. 5 étamines.

F. Calice à 5 dents. Sans corolle. Un style.

Légume sec comme du cuir, à plusieurs semences.

1283. Ficus. Réceptacle commun en toupie, charnu, renfermant toutes les parties de la fructification.

A. F. Calice à 5 segmens. Sans corolle. Un pistil. Une semence. B. M. Calice à 3 segmens. Sans corolle. 3 étamines.

C. M. et F. dans le même récept. commun, chaque partie de la fructification étant distincte.

## CLASSE XXIV. CRYPTOGAMIE

## Fougeres.

## \* Fructifications en épi.

1284. EQUISETUM. Fructification en épi éparse, ou fructification isolée en bouclier, à valves à leur base.

1288. OPHIOGLOSSUM. Epi articulé, chaque fructification s'ouvrant transversalement.

1289. Osmunda. Epi ramifié. Fructification à deux valves.

- \*\* Fructifications sur la page inférieure, ou sur le dos des fenilles.
- 1299. ACROSTICUM. Fructification couvrant entiérement le dos des feuilles.
- 1296. POLYPODIUM. Fructification formée par de petits paquets arrondis sur le dos des feuilles.
- 1293. Hemionitis. Fructification en lignes, se croissant sur le disque.
- 1295. ASPLENIUM. Fructification distribuée en lignes presque paralleles, de différentes figures.
- 1294. LONCHITIS. Fructification en lignes qui suivent les sinus de la marge.
- 1291. PTERIS. Fructification comme en ourlet placé sur le bord postérieur des folioles.
- 1297. ADIANTHUM. Fructification sur le bord postérieur et terminal des feuilles, dont le sommet est replié en dessous et recouvre les paquets de la fructification.

1298. TRICHOMANES. Fructifications solitaires insé-

h

## Fructifications radicales.

1299. MARSILEA. Fructification à 4 capsules. 1300. PILULARIA. Fructification à 4 capsules. 1301. ISOETES. Fructification à 2 capsules.

#### Mousses.

## \* Sans coiffe.

1302. Lycopodium. Anthere à 2 valves, assise. 1304. Sphagnum. Anthere non ciliée sur les bords. 1305. Phagum. Anthere à bord cilié.

## \*\* Coiffées diclines.

1308. SPLACNUM. Anthere à apophyse très-grande.
1309. POLYTRICHUM. Anthere à apophyse très - petite, échancrée.
1310. MNIUM. Anthere sans apophyse.

## \*\*\* Coiffées , monoclines.

1311. BRYUM. Anthere à pédoncule terminal porté sur un tubercule.

1312. HYPNUM. Anthere à pédoncule latéral portée sur le perichetie, ou amas de petites feuilles.

dans le perichetie, ou amas de petites feuilles en recouvrement.

1307. BUXBAUMIA. Anthere pédonculée, membraneuse sur un des deux côtés.

## Algues.

#### \* Terrestres.

1315. MARCHANTIA. Fleur à calice commun en écusson, les fleurs en dessous.

1313. SUNGERMANIA. Fleur à calice simple à 4 valves.

1314. TARGIONIA. Fleur à calice à 2 valves.

1318. Anthoceros. Fleur à calice tubulé. Anthere en aleine, à 2 valves.

1316. BLASIA. Fructification en cylindre, tubulée.

1315. RICCIA. Fructification formée par de petits. grains sur la surface des feuilles.

1319. LICHEN. Fructification en réceptacle lisse, brillant.

1324. Byssus. Substance lanugineuse.

## \*\* Aquatiques.

1320. TREMELLA. Substance gélatineuse.

1322. ULVA. Substance membraneuse, transparente?

1321. Fucus. Substance seche comme du cuir.

1325. CONFERVA. Substance capillaire.

## Champignons.

## \* A chapeau.

1325. AGARICUS. Chapeau garni en dessous de lames.

1326. BOLETUS. Chapeau marqué en dessous de pores.

1327. HYDNUM. Chapeau hérissé en dessous de pointes.

1328. PHALLUS. Chapeau lisse en dessous.

## \*\* Sans chapeau.

1329. CLATHRUS. Champignon grillé.

1330. HELVELA. Champignon en toupie.

1331. PEZIZA. Champignon en cloche. 1332. CLAVARIA. Champignon alongé.

1333. LYCOPERBON. Champignon arrendi.

1334. Mucor. Champignon à vesicules portées sur un pédicule.

# TABLEAU

## DU SYSTÊME DE LUDWIG,

SUR la régularité et l'irrégularité de la corolle et. le nombre des pétales.

#### CLASSE I.

Plantes à fleurs enveloppées, parfaites pétalées monopétales simples régulieres.

. A Deux antheres.

Un style.				
r Lilac.	22	Syringa.		
2 Olea. *	20			
3 Phyllyrea. *	19	Ming-B		
5 Jasminum. *	17			
6 Ligustrum. *	18			
B Trois anthe	res.			
Un style.				
9 Crocus. *	61	DEBA 1		
to Bulbocodium.	61	Crocus.		
C Quatre anthe	res.			
	eres.			
C Quatre anthe Un style.	res.	e Min		
C Quatre antho Un style.	,			
C Quatre anthe Un style.	132	Crucia- nella.		
C Quatre antho Un style. 13 Galium. 14 Rubeola.	132 133			
C Quatre antho Un style.	132 133 128 151			
C Quatre anthe Un style.  13 Galium. 14 Rubeola.  15 Asperula. *	132 133 128 151 827			
C Quatre antho Un style. 13 Galium. 14 Rubeola. 15 Asperula. * 19 Centunculus. * 21 Capraria. * 22 Sanguisorba. *	132 133 128 151 827 152	nella.		
C Quatre antho Un style.  13 Galium. 14 Rubeola.  15 Asperula. * 19 Centunculus. * 21 Capraria. *	132 133 128 151 827	nella.		

134

42 Rubia \*

#### Deux styles.

49 Cuscuta. \* 18

Quatre styles.

50 Basella. \* 413 52 Aquifolium. \* 184 Ilex.

D Cinq antheres.

#### Un style.

1 1 10 10 10 10	
55 Mirabilis. *	259
56 Plumbage. *	227
57 Borrago. *	200
59 Buglossum.	194 Anchusa.
60 Cynoglossum.	195
61 Cerinthe. *	198
62 Symphytum. *	197
63 Lithospermum. *	193
64 Pulmonaria. *	196
65 Omphalodes.	195 Cynoglos-
	sum.
66 Heliotropium. *	191
67 Myosotis. *	192
68 Asperugo. *	201
69 Anagallis. *	220
70 Lysimachia. *	219
72 Samolus. *	238
73 Androsace. *	209
74 Aretia.	208
75 Hottonia. *	216
76 Glaux. *	314
77 Cortusa. *	211
- Cyclaman *	216

	(6	T. )	
79 Meadia.		169 Asphodelus. *	454
99 Meadia.	theon.	171 Hyacinthus. *	461
80 Hydrophyllum. *	217	172 Muscari.	461 Hyacin-
81 Primula. *	210	1/2 2/10/00/12	thus.
82 Menyanthes. *	215	173 Aletris. *	462
83 Soldanella. *	212	174 Polyanthes. *	460
87 Pervinca.	322 Vinca.	179 Convallaria: *	459
89 Stramonium.	263 Datura.	Trois style	
91 Nicotiana. *	265		
74 Spigelia. *	222	181 Colchicum. *	492
100 Campanula. *	234	F Sept anth	eres.
101 Jasione. *	1090	Un style.	
102 Trachelium. *	237	The same of the sa	AND THE PERSON NAMED IN
103 Polemonium. *	233	18 2 Trientalis. *	496
104 Diapensia. *	207	G Huit anth	eres.
105 Convolvulus. *	231 250 Lonicera	Un style	. To the second
108 Symphoricarpos.	236 Lonicera 226		
122 Alaternus.	284 Rhamnus	184 Ericoides.	52/ Erica.
127 Alkekengi.	267 Physalis.	186 Thymelea. 188 Laurus. *	526 Daphne.
128 Physalodes.	266 Atropa.	100 Laurus.	545 523
120 Solanum. *	268	189 Vaccinium. *	The state of the s
130 Capsicum. *	269	Leux styl	les.
131 Mandragora.	266 Atropa.	192 Moschatellina.	543 Adoxa.
132 Belladona.	266 Atropa.	H Neuf anti	
134 Cestrum. *	272		
		Trois style	65.
Deux styl	les.		
		194 Rheum. *	549
144 Gomphrena. *	343		549
144 Gomphrena. *	343 341	194 Rheum. * I Dix anth	5/19 eres.
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. *	343 341 352	194 Rheum. *  I Dix anth Un style	549 eres.
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium.	343 341 352 352 Gentiana	194 Rheum. *  I Dix anth Un style	549 eres.
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. *	343 341 352	194 Rheum. *  I Dix anth Un style	549 eres. 590 593 Andro-
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium.	343 341 352 352 Gentiana 332	194 Rheum. *  I Dix anth Un style 196 Kalmia. * 197 Erica.	549 eres. 590 593 Andro- meda.
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cynanchum. * 151 Stapelia. *	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334	194 Rheum. *  I Dix anth Un style 196 Kalmia. * 197 Erica. 209 Arbutus. *	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cynanchum. * 151 Stapelia. * 152 Periploca. *	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334 330	194 Rheum. *  I Dix anth Un style 196 Kalmia. * 197 Erica. 200 Arbutus. * Trois style	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cynanchum. * 151 Stapelia. *	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334	194 Rheum. *  I Dix anth Un style 196 Kalmia. * 197 Erica. 209 Arbutus. *  Trois style 203 Cotyledon. *	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596 les. 628
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cynanchum. * 151 Stapelia. * 152 Periploca. * 153 Nerium. *	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334 330 323	194 Rheum. *  I Dix anth Un style 196 Kalmia. * 197 Erica. 200 Arbutus. * Trois style	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596
144 Gomphrena. * 146 Cressa, * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cynanchum. * 151 Stapelia. * 152 Periploca. * 153 Nerium. *  Trois sty	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334 330 323 les.	194 Rheum. *  I Dix anth Un style 196 Kalmia. * 197 Erica. 209 Arbutus. *  Trois style 203 Cotyledon. *	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596 les. 628 634 Oxalis.
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cynanchum. * 151 Stapelia. * 152 Periploca. * 153 Nerium. *  Trois sty  157 Viburnum. *	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334 330 323 les.	194 Rheum. *  I Dix anth Un style 196 Kalmia. * 197 Erica. 200 Arbutus. *  Trois style 203 Cotyledon. * 204 Oxys.  K Plusieurs a	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596 les. 628 634 Oxalis. ntheres.
144 Gomphrena. * 146 Cressa, * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cynanchum. * 151 Stapelia. * 152 Periploca. * 153 Nerium. *  Trois sty	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334 330 323 les. 400 400 Vibur-	194 Rheum. *  I Dix anth Un style 196 Kalmia. * 197 Erica. 209 Arbutus. *  Trois style 203 Cotyledon. * 204 Oxys.  K Plusieurs a Un style	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596 les. 628 634 Oxalis. ntheres.
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cynanchum. * 151 Stapelia. * 152 Periploca. * 153 Nerium. *  Trois sty 157 Viburnum. * 158 Opulus.	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334 330 323 les. 400 400 Vibur- num.	194 Rheum. *  I Dix anth Un style 196 Kalmia. * 197 Erica. 200 Arbutus. *  Trois style 203 Cotyledon. * 204 Oxys.  K Plusieurs a Un style a Filamens des étam	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596 les. 628 634 Oxalis. ntheres. e.
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cynanchum. * 151 Stapelia. * 152 Periploca. * 153 Nerium. *  Trois sty 157 Viburnum. * 158 Opulus. 159 Sambucus. *	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334 330 323 les. 400 400 Vibur- num. 402	194 Rheum. *  I Dix anth Un style  196 Kalmia. * 197 Erica.  200 Arbutus. *  Trois style  203 Cotyledon. * 204 Oxys.  K Plusieurs a Un style a Filamens des étam cylindre	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596 les. 628 634 Oxalis. ntheres. e.
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cynanchum. * 151 Stapelia. * 152 Periploca. * 153 Nerium. *  Trois sty 157 Viburnum. * 158 Opulus.	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334 330 323 les. 400 400 Vibur- num. 402	194 Rheum. *  I Dix anth Un style  196 Kalmia. * 197 Erica.  200 Arbutus. *  Trois style  203 Cotyledon. * 204 Oxys.  K Plusieurs a Un style a Filamens des étam cylindre 207 Malva. *	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596 les. 628 634 Oxalis. ntheres. e. nines réunis en e. 906
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cynanchum. * 151 Stapelia. * 152 Periploca. * 153 Nerium. *  Trois sty  157 Viburnum. * 158 Opulus.  159 Sambucus. *  E Six anti-	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334 330 323 les. 400 Vibur- num. 402 heres.	194 Rheum. *  I Dix anth Un style  196 Kalmia. * 197 Erica.  200 Arbutus. *  Trois style  203 Cotyledon. * 204 Oxys.  K Plusieurs at Un style a Filamens des étam cylindre 207 Malva. * 208 Alcèa. *	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596 les. 628 634 Oxalis. ntheres. e. 1906 905
144 Gomphrena. * 146 Gressa, * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cynanchum. * 151 Stapelia. * 152 Periploca. * 153 Nerium. *  Trois sty  157 Viburnum. * 158 Opulus.  159 Sambucus. *  E Six anti- Un styl	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334 330 323 les. 400 400 Vibur- num. 402 heres.	194 Rheum. *  I Dix anth Un style  196 Kalmia. * 197 Erica.  200 Arbutus. *  Trois style  203 Cotyledon. * 204 Oxys.  K Plusieurs a Un style a Filamens des étam cylindre  207 Malva. * 208 Alcèa. * 209 Althæa *	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596 les. 628 634 Oxalis. ntheres. e. 906 905 904
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cynanchum. * 151 Stapelia. * 152 Periploca. * 153 Nerium. *  Trois sty  157 Viburnum. * 158 Opulus.  159 Sambucus. *  E Six anti- Un styl  164 Aloë. *	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334 330 323 les. 400 Vibur- num. 402 heres.	I Dix anth Un style  196 Kalmia. * 197 Erica.  200 Arbutus. * Trois style  203 Cotyledon. * 204 Oxys.  K Plusieurs a Un style a Filamens des étam cylindre 207 Malva. * 208 Alcèa. * 209 Althæa * 210 Lavatera. *	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596 les. 628 634 Oxalis. ntheres. e. 906 905 904
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cvnanchum. * 151 Stapelia. * 152 Periploca. * 153 Nerium. *  Trois sty  157 Viburnum. * 158 Opulus.  159 Sambucus. *  E Six anti  Un styl  164 Aloë. * 165 Yucca. *	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334 330 323  les.  400 400 Viburnum. 402  heres.	194 Rheum. *  I Dix anth Un style  196 Kalmia. * 197 Erica.  200 Arbutus. *  Trois style  203 Cotyledon. * 204 Oxys.  K Plusieurs at Un style a Filamens des étam cylindre  207 Malva. * 208 Alcèa. * 209 Althxa * 210 Lavatera. * 211 Malacoides.	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596 les. 628 634 Oxalis. ntheres. e. 1906 904 907 908 Malope.
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cvnanchum. * 151 Stapelia. * 152 Periploca. * 153 Nerium. *  Trois sty  157 Viburnum. * 158 Opulus.  159 Sambucus. *  E Six anti Un styl  164 Aloë. * 165 Yucca. * 167 Pancratium. *	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334 330 323  les.  400 400 Viburnum. 402  heres.  464 463 437	194 Rheum. *  I Dix anth Un style  196 Kalmia. * 197 Erica.  209 Arbutus. *  Trois style  203 Cotyledon. * 204 Oxys.  K Plusieurs at Un style  a Filamens des étam cylindre  207 Malva. * 208 Alcèa. * 209 Althæa * 210 Lavatera. * 211 Malacoides. 213 Abutilon.	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596 les. 628 634 Oxalis. ntheres. e. 1906 905 904 907 908 Malope. 902 Sida.
144 Gomphrena. * 145 Cressa. * 146 Gentiana. * 147 Centaurium. 148 Apocynum. * 149 Asclepias. * 150 Cvnanchum. * 151 Stapelia. * 152 Periploca. * 153 Nerium. *  Trois sty  157 Viburnum. * 158 Opulus.  159 Sambucus. *  E Six anti  Un styl  164 Aloë. * 165 Yucca. *	343 341 352 352 Gentiana 332 333 331 334 330 323  les.  400 400 Viburnum. 402  heres.	194 Rheum. *  I Dix anth Un style  196 Kalmia. * 197 Erica.  200 Arbutus. *  Trois style  203 Cotyledon. * 204 Oxys.  K Plusieurs at Un style a Filamens des étam cylindre  207 Malva. * 208 Alcèa. * 209 Althxa * 210 Lavatera. * 211 Malacoides.	549 eres. 590 593 Andro- meda. 596 les. 628 634 Oxalis. ntheres. e. 1906 904 907 908 Malope.

(6	2)
a22 Malvaviscus. 911 Hibiscus.	260 Antholyza. * 64 262 Iris. * 65
& Filamens des étamines distincts.	D
223 Mimosa. * 1271	Deux styles.
#29 Opuntia. * 668 Cactus.	264 Montia. * 107
Trois styles.	D Quatre antheres.
232 Euphorbia. * 665.	
	Un style.
Quatre ou plusieurs styles.	a Fruit nu.
a33 Ficoides. 684 Mesern-	269 Teucrium. * . 764
bryan-	270 Bugula. 763 Ajuga
themum.	271 Lamium. * 774 272 Galeopsis. * 775
CLASSE II.	2 Cr1 *
The second secon	274 Prasium. * 795
Plantes à fleurs enveloppées par-	275 Phlomis. * 781
faites pétalées monopétales sim-	276 Leonurus. * 780
ples irrégulieres.	277 Cardiaca. 780 Leonurus
	279 Dracocephalon. 787 Dracoce-
A Une anthere.	phalum.
Un style.	280 Moldavica. 787 Dracoce-
	281 Brunella. 793 Prunella
234 Canna. * r	282 Cassida. 792 Scutella.
B Deux antheres.	ria.
	283 Betonica. * 776
Un style.	284 Ballote. 778 Ballota.
242 Salvia. * 42	285 Cataria. 768 Nepeta.
243 Rosmarinus. * 41	288 Mentha. * 771 280 Pulegium. 771 Mentha.
244 Lycopus. * 36	289 Pulegium. 771 Mentha. 290 Satureja. * 765
245 Amethystina. 37 Amethys-	291 Thymus, * 785
ic no tea.	292 Thymbra. * 766
246 Monarda. * 40 247 Ziziphora. * 39	293 Molucca. 782 Molu-
249 Pinguicula. * 33	cella.
250 Lentiburaria. 34 Utricu-	29/4 Marrubium * 779
larid.	295 Pseudo-Dictamnus. 779 Marru-
a51 Gratiola. * 30	206 Melissa. * 786
252 Veronica. * 26	296 Melissa. * 786 297 Melittis. * 789
253 Pæderota. * 27	298 Clinopodium. * 783
254 Adhatoda. 28 Justicia.	299 Chamæclema. 773 Glecko-
C Trois antheres.	ma.
	300 Lavandula * 769
Un style.	301 Origanum. 784
aby Valeriana. * 48	303 Majorana. 784 Origa-
258 Valerianella. 48 Valeria-	304 Verbena. * 35
250 Gladiolus. * 63	305 Horminum. * 788
259 Gladiolus. * 63	

306 Hyssopus. *	767	CLASSE	777
307 Ocimum.	790 Ocymum.	CLASSE	111.
b Fruit cou	vert.	Plantes à fleurs en	
Zan Sauamaria	801 Lathræa.	faites pétalées mor	nopétales com-
309 Squamaria. 310 Clandestina.	801 Lathrea.	posées, tubulées.	
313 Orobanche. *	841	1. Fleurons à quatre c	ou cinq étamines
315 Tozzia. *	803	libres.	
317 Ruellia. *	847	376 Dipsacus. *	120
320 Limosella. *	837	377 Globularia. *	118
321 Acanthus. *	- 857	378 Scabiosa. *	121
323 Chelone. *	806	379 Asterocephalus.	
324 Pedicularis, *	804 798 Rhinan-	380 Knautia. *	122
326 Elephas	thus.	383 Parthenium. *	1154
327 Bartsia. *	797	2. Fleurons à étami	
328 Melampyrum. *	800	cylindr	e.
329 Odontites.	799 Euphra-	386 Cotula. *	1050
argie .	sia.	387 Tanacetum. *	1024
331 Anthirrhinum.		388 Carpesium, *	1028
332 Digitalis, *	816	389 Artemisia.	1025
333 Bignonia. *	817	390 Absinthium.	1025 Artemi-
337 Scrophularia. *	814 832 Erinus.	391 Filago. *	sia.
345 Martynia, *	811	396 Eupatorium. *	1079
346 Sesamum. *	845	398 Cacalia.	1032 Tussila-
347 Vitex. *	863	The Line of Court of	80.
351 Lantana. *	824	399 Tussilago. *	1032
E Cinq anti	have	403 Gnaphalium, *	1026
BURNING OF CH	A STATE OF THE	404 Conyza. *	1030
Un styl	legislamino) (8	405 Chrysocoma. *	1019
359 Echium. *	203	407 Echinopus.	1084 Echinops
360 Lycopsis. *	202	408 Onopordon. *	1006
361 Coris. *	260	410 Serratula.	1003
362 Lobelia. *	1091	Arr Stachelina *	1018. Jun
363 Diervilla.	250 Lonicera	412 Cynara. *	roo7 all
364 Verbascum. *	202	413 Cnicus. *	1005
365 Hyoscyamus. * 366 Rapunculus.	264 Photos	414 Lappa.	1002 Arctium.
Joo reapunculus.	236 Phyteu-	416 Atractylis:	1010 Cartha-
367 Lonicera. *	250	Van Carlina *	mus.
368 Caprifolium.	250 Lonicera	417 Carlina. * 428 Xeranthemum.	1008
A STATE OF THE STA		421 Santolina. *	
F Six ant	neres.	424 Micropus. *	1027
Un styl	e	The second second	
370 Aristolochia. *	Titte .	CLASS	E I V.
		Plantes à fleurs en	velonnées nos
G Disc ant	theres.	faites pétalées mo	nopetales com-
Un styl	le.	posées, lingulées.	Potatos coma
375 Amorpha, *	933	1	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	And Office of	1426 Lampsana. *	990

430 Swertia. 993 Crepis. 431 Tragopogon. \* 984

432 Chondrilla. \* 989 433 Picris. \*. 986 435 Prenanthes. \* 990 436 Hieracium. \*

992 437 Crepis. \* 993 438 Sonchus. \* 987

Leonto-439 Taraxacum. 991 don.

988 440 Lactuca. \* 441 Scorzonera. \* 985 4/4 Scolymus. \*
4/4 Andryala. \* IOOI 994 444 Catananche. \* 999 445 Cichorium. \* 1000 446 Hypochæris. \* 997

#### CLASSE

Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées monopétales composées, mixtes.

10/12 447 Bellis. \* 448 Calendula \* 1073 449 Matricaria. 1048 Chrysanthemum. 450 Osteospermum. \* 1075 454 Tagetes. \* 1044 457 Aster. \* 103/ 458 Enula. 1037 Inula. 459 Solidagoo\* 1035 460 Arnica. \* 1038 1076 Othona. 462 Senecio. 1052 Anthemis 464 Chamæmelum. 465 Achillea. \* 1053 A66 Helianthus. \* 1060 467 Rudbeckia. \* 468 Zinnia. \* 1061 1046 1059Buphthal-469 Buphthalmus. mum. 1012 472 Bidens. \*

474 Siegesbeckia. \* 1057 1063 475 Coreopsis. \* 1074 Atracty-473 Acarna. lis.

1066 479 Centaurea. \*

#### CLASSE VI.

Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées à deux pétales.

A Une anthere.

Deux styles.

480 Corispermum. \* 481 Stellaria. 12 Corisper-

B Deux antheres.

482 Circæa. \*

C Six antheres.

Deux styles.

484 Atraphaxis. \*

484

#### CLASSE VII.

Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées à trois pétales.

A Trois antheres.

Un style.

488 Chamælea. 52 Cneorum 489 Commelina. \* 68

Trois styles.

491 Tillea. \* -

B Six antheres.

Un style.

430 Trades-493 Ephemerum. \* cantia. 495 Ananas. 427 Bromelia 488 Triclo-499 Triglachim.

Plusieurs styles.

501 Alisma. \* 502 Damasonium. 495 Alisma.

C Plusieurs antheres.

Un style.

503 Polygala. \*

921

chin.

	4 7 7		
	(65		
p			866 Thlaspi
Deux styles.	SECTION STATE	446 Iberis. *	868
505 Butomus. *	550	547 Nasturtium.	865 Lepidium
	744	548 Lepidium. *	865
coo ottatioecs.	744	549 Coronopus.	867 Cochlean
CLASSE	VIII.	4 1 7 7 7 7 1	ria
+	Sand Line	550 Cochlearia. *	867
Plantes à fleurs enve	loppées par-	551 Anastatica: *	862
faites pétalées à qu	atre pétales	552 Vella. *	861
régulières.	A COLUMN TO A STATE OF THE PARTY OF THE PART	553 Draba.	864
10.50	spring attent	554 Alyssum. *	869
A Deux anthe	res.	555 Erucago. *	887 Bunias.
Deux styles	The latest	D Huit anthe	rec'
ACCOUNT AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART		2 Trutt unite	7634
508 Buffonia. *	180	Un style.	milliant e.g.
B Quatre anth	eres:	Control Commence of	505 Enother
		561 Onagra.	
Un style.		562 Gaura. *	506 ra.
510 Dodonæa.	159 Ptelea.	563 Chamænerion.	507 Epilo-
511 Epimedium. *	154	ooo Gaaamonor One	bium;
512 Trapa. *	165	564 Ruta. *	565
518 Unifolium:	459 Conval-	565 Hypopitys.	583 Mono-
* 0 10 +	laria:	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	tropa;
520 Cornus: *	155	568 Ocycoccus.	523 Vacci-
Trois styles		The Pullship of the	niuiti.
	186	Deux styles.	
The state of the s		1 12 1	
C Six anther	res:	573 Moehringia. *	536
Un style.	The state of the s	Trois style	S.
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	00.		
\$24 Crambe: *	889	576 Cardiospermum. *	5.10
525 Myagrum. *		B CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY
	860	Quatre styl	es.
516 Clypeola. *	870	Quatre styl	The state of the s
516 Clypeola. * 527 Isatis. *	879	578 Elating. *	544
526 Clypeola. * 527 Isatis: * 528 Raphanistrum;	870 888 886 Raphanus	578 Elatine. * 579 Paris. *	544 542
516 Clypeola. * 527 Isatis. * 528 Raphanistrum. 529 Cakile.	879 888 886 Raphanus 887 Bunids.	578 Elating. *	544 542
526 Clypeola. * 527 Isatis: * 528 Raphanistrum;	879 888 886 Raphanus 887 Bunids. 886	578 Elatine. * 579 Paris. * E Plusieurs an	544 542 theres;
5.16 Clypeola. * 5.27 Isatis: * 5.28 Raphanistrum: 5.29 Cakile: 5.30 Raphanus. *	879 888 886 Raphanus 887 Bunids. 886 884	578 Elatine. * 579 Paris. * E Plusieurs an Un style.	544 542 theres;
516 Clypeola. * 527 Isatis. * 528 Raphanistrum. 529 Cakile. 530 Raphanus. * 531 Brassica. * 532 Eruca. 533 Sinapi.	879 888 886 Raphanus 887 Bunids. 886	578 Elatine. * 579 Paris. *  E Plusieurs an  Un style. 581 Papaver. *	544 542 theres;
516 Clypeola. * 527 Isatis. * 528 Raphanistrum. 529 Cakile. 530 Raphanus. * 531 Brassica. * 532 Fruca. 533 Sinapi. 534 Erysimum. *	879 888 886 Raphanus 887 Bunids. 886 884 Brassica.	578 Elatine. * 579 Paris. *  E Plusieurs an  Un style. 581 Papaver. * 582 Argemone. *	544 542 theres; 704 705
5.16 Clypeola. * 5.27 Isatis. * 5.28 Raphanistrum. 5.29 Cakile: 5.30 Raphanus. * 5.31 Brassica. * 5.32 Fruca. 5.33 Sinapi. 5.34 Erysimum. * 5.35 Sisymbrium. *	879 888 886 Raphanus 887 Bunids. 886 884 Brassica. 885 Sinapis, 873 877	578 Elatine. * 579 Paris. *  E Plusieurs an  Un style. 581 Papaver. * 582 Argemone. * 585 Chelidonium. *	544 542 theres; 704 705 703
516 Clypeola. * 527 Isatis. * 528 Raphanistrum. 529 Cakile. 530 Raphanus. * 531 Brassica. * 532 Fruca. 533 Sinapi. 534 Erysimum. * 535 Sisymbrium. * 536 Hesperis. *	879 888 886 Raphanus 887 Bunids. 886 884 Brassica. 885 Sinapis, 873 877 881	578 Elatine. * 579 Paris. *  E Plusieurs an  Un style. 581 Papaver. * 582 Argemone. * 585 Chelidonium. * 586 Glaucium.	544 542 theres; 704 705 703 704 Papavet;
516 Clypeola. * 527 Isatis. * 528 Raphanistrum. 529 Cakile. 530 Raphanus. * 531 Brassica. * 532 Eruca. 533 Sinapi. 534 Erysimum. * 535 Sisymbrium. * 536 Hesperis. * 537 Cheiranthus. *	879 888 886 Raphanus 887 Bunids. 886 884 Brassica. 885 Sinapts, 873 877 881	578 Elatine. * 579 Paris. *  E Plusieurs an  Un style. 581 Papaver. * 582 Argemone. * 585 Chelidonium. * 586 Glaucium. 592 Chrystophoriana.	544 542 theres; 704 705 703 704 Papavet; 700 Action.
516 Clypeola. * 527 Isatis. * 528 Raphanistrum. 529 Cakile. 530 Raphanus. * 531 Brassica. * 532 Eruca. 533 Sinapi. 534 Erysimum. * 536 Hesperis. * 537 Cheiranthus. * 538 Turritis. *	879 888 886 Raphanus 887 Bunids. 886 884 Brassica. 885 Sinapis. 877 881 879 883	578 Elatine. * 579 Paris. *  E Plusieurs an  Un style. 581 Papaver. * 582 Argemone. * 585 Chelidonium. * 586 Glaucium. 592 Chrystophoriana. 593 Capparis. *	544 542 theres; 704 705 704 Papavet; 700 Activa.
5.16 Clypeola. * 5.27 Isatis. * 5.28 Raphanistrum. 5.29 Cakile. 5.30 Raphanus. * 5.31 Brassica. * 5.32 Eruca. 5.33 Sinapi. 5.34 Erysimum. * 5.35 Sisymbrium. * 5.36 Hesperis. * 5.37 Cheiranthus. * 5.38 Turritis. * 5.39 Arabis. *	879 888 886 Raphanus 887 Bunids. 886 884 Brassica. 885 Sinapls. 873 877 881 879 883 882	578 Elatine. * 579 Paris. *  E Plusieurs an  Un style. 581 Papaver. * 582 Argemone. * 585 Chelidonium. * 586 Glaucium. 592 Chrystophoriana. 593 Capparis. * 594 Bocconia. *	544 542 theres; 704 705 703 704 Papavet; 700 Action. 699 643
5.16 Clypeola. * 5.27 Isatis. * 5.28 Raphanistrum. 5.29 Cakile. 5.30 Raphanus. * 5.31 Brassica. * 5.32 Fruca. 5.33 Sinapi. 5.34 Erysimum. * 5.35 Sisymbrium. * 5.36 Hesperis. * 5.37 Cheiranthus. * 5.38 Turritis. * 5.39 Arabis. * 5.40 Cardamine. *	879 888 886 Raphanus 887 Bunids. 886 884 Brassica. 885 Sinapis, 873 877 881 879 883 882 876	578 Elatine. * 579 Paris. *  E Plusieurs an  Un style. 581 Papaver. * 582 Argemone. * 585 Chelidonium. * 586 Glaucium. 592 Chrystophoriana. 593 Capparis. *	544 542 theres; 704 705 703 704 Papavet; 700 Action. 699 643
5.16 Clypeola. * 5.27 Isatis. * 5.28 Raphanistrum. 5.29 Cakile. 5.30 Raphanus. * 5.31 Brassica. * 5.32 Fruca. 5.33 Sinapi. 5.34 Erysimum. * 5.35 Sisymbrium. * 5.36 Hesperis. * 5.37 Cheiranthus. * 5.38 Turritis. * 5.39 Arabis. * 5.40 Cardamine. * 5.41 Dentaria. *	879 888 886 Raphanus 887 Bunids. 886 884 Brassica. 885 Sinapis, 873 877 881 879 883 876 876	578 Elatine. * 579 Paris. *  E Plusieurs an  Un style. 581 Papaver. * 582 Argemone. * 586 Chelidonium. * 586 Glaucium. 592 Chrystophoriana. 593 Capparis. * 594 Bocconia. *  Trois style.	544 542 theres; 704 705 703 704 Papavet; 700 Action. 699 643 5.
5.16 Clypeola. * 5.27 Isatis. * 5.28 Raphanistrum. 5.29 Cakile. 5.30 Raphanus. * 5.31 Brassica. * 5.32 Fruca. 5.33 Sinapi. 5.34 Erysimum. * 5.35 Sisymbrium. * 5.36 Hesperis. * 5.37 Cheiranthus. * 5.38 Turritis. * 5.39 Arabis. * 5.40 Cardamine. * 5.41 Dentaria. * 5.42 Lunaria. *	879 888 886 Raphanus 887 Bunids. 886 884 Brassica. 885 Sinapis, 873 877 881 879 883 882 876	578 Elatine. * 579 Paris. *  E Plusieurs an  Un style. 581 Papaver. * 582 Argemone. * 585 Chelidonium. * 586 Glaucium. 592 Chrystophoriana. 593 Capparis. * 594 Bocconia. *	544 542 theres; 704 705 704 Papavet; 700 Activa. 699 643 5.
5.16 Clypeola. * 5.27 Isatis. * 5.28 Raphanistrum. 5.29 Cakile. 5.30 Raphanus. * 5.31 Brassica. * 5.32 Fruca. 5.33 Sinapi. 5.34 Erysimum. * 5.35 Sisymbrium. * 5.36 Hesperis. * 5.37 Cheiranthus. * 5.38 Turritis. * 5.39 Arabis. * 5.40 Cardamine. * 5.41 Dentaria. *	879 888 886 Raphanus 887 Bunids. 886 884 Brassica. 885 Sinapts, 877 881 879 883 876 875 875	578 Elatine. * 579 Paris. *  E Plusieurs an  Un style. 581 Papaver. * 582 Argemone. * 586 Chelidonium. * 586 Glaucium. 592 Chrystophoriana. 593 Capparis. * 594 Bocconia. *  Trois style.	544 542 theres; 704 705 703 704 Papavet; 700 Action. 699 643 5.

	(	66)	
Quatre styl	7.5	1627 Anonis.	35 Ononis.
602 Tormontill *		628 Vicia. *	947
602 Tormentilla. *	001	629 Faba.	947 Vicia.
6e3 Thalictrum. * 6o4 Clematis. *	755	630 Pisum. *	944
		631 Lathyrus. *	946
CLASSE	I I X.	632 Orobus. *	945
Diant. : 0		633 Lotus. *	969
Plantes a fleurs env	eloppees par	634 Phaseolus. *	940
faites pétalées à q	uatre pétales	635 Dolichos. *	941
irrégulieres.		636 Clitoria. *	943
A Quatre ant	Traves	637 Lupinus. * 638 Robinia. *	939
		639 Galega. *	953
Un style.		664 Coronilla. *	963 956
606 Malianthus *	0.5	6/15 Securidaca.	956 Coronil-
605 Melianthus. *			la.
Deux style	es.	646 Scorpiurus. *	959
606 Hypecoum. *	183	647 Ornithopodium.	957 Ornithe
			pus.
B Cinq anthe		648 Hippocrepis. *	958
Un style.		649 Hedysarum. *	961
607 Balsamina.	1003 Impatiens	650 Medicago. *	971
C Six anthe		651 Colutea. *	954
		b Légumes à de	ux loges.
Un style.	Dockton got		
608 Cleome. *	890	654 Pelecinus.	o66 Bisserula
609 Fumaria. *	920	653 Astragalus. * 654 Pelecinus. 655 Ap o	0/12 Glycines
D Dix anthe	war	2 Pentapéta	
A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Un style.		a Légumes à un	le loge.
1 Tétrapéta	les.	656 Glycyrrhiza. *	955
a Légumes à un		657 Genista.	929 Spar-
a Legumes a un	ie loge.	1 229	tium.
610 Onobrychis.	961 Hedysa-	658 Ulex. *	932 552
	rum,	659 Anagyris. *	
611 Fbenus. *	938	660 Psoralia.	967 Psoralea
612 Trifolium. *	968	661 Cracca.	963 Galega.
613 Melilotus.	963 Trifo	b Légumes à der	ix loges.
Con Francis Communication	lium.	667 Tragacantha.	965 Astraga-
614 Fænum-Græcum.	970 Trigo nella.	A Company of the Comp	lus
615 Dorycnium.	A THE PROPERTY OF THE REAL PRO	CLASSI	
6.6 Anthyllis. *	989 Lotus.		Industrial Vag
619 Spartium.	930 Genista.	Plantes à fleurs enve	
620 Cytisus. *	951	faites pétalées à	cinq pétales
621 Lens.	948 Ervum.	régulieres.	
622 Cicer. *		A Cinq anthe	res.
623 Ervum. *	919 948	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
624 Astragaloides.	964 Phaca.	Un style.	Allerance Control of
625 Arachidna.	937 Arachis.		306
626 Crotalaria. *	934	676 Celosia. *	312

pp

677 Achyranthes. * 311 678 Parnasia. * 415 679 Telephium. * 408 680 Tamariscus. 405 Tamaris. Gop Frangula. 284 Rhammus 691 Ziziphus. 284 Rhammus 691 Ziziphus. 284 Rhammus 692 Hedera. * 304 696 Evonymus. * 291  **Deux styles.**  698 Heuchera. * 309 699 Staphylodendron. 404 Staphylea.  701 Ribes. * 301  **Trois styles.**  702 Cotinus. 399 Rhus. 795 Cherleria. * 619 704 Corrigiola. * 409 709 Paliurus. 284 Rhammus 701 Granadilla. 1110 Passiflora.  **Quatre styles.**  712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 715 Rorella. 421 Drosera. 716 Aldrovanda. * 420 718 Diosma. * 292 718 Diosma. * 292 719 Linum. * 419 720 Aralia. * 419 720 Aralia. * 417 720 Aralia. * 417 720 Aralia. * 417 721 Styles.  **Prunus. * 675 722 Franca. 481 Franke nia.  **C Huit antheres.  **Deux styles.**  724 Tribulus. * 580 735 Fabago. * 577 Zygophyllum.  739 Agrimonia. * 629 740 Nigella. * 728 745 Ledum. * 529 746 Chedum. * 591 746 Saponaria. * 613 746 Saponaria. * 613 745 Carastium. * 637 746 Carastium. * 637 745 Cherleria. * 619 746 Cucubalus. * 615 747 Luchnis. * 636 748 Phytolacca. * 641  **E Plusieurs antheres:  **Un style.**  766 Tilia. * 717 767 Portulacca: * 659 768 Anacampseros. 629 Sedum. 728 769 Heitanthemum. 728 Cistus. * 728 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Aridonalum. * 683 779 Agrimonia. * 663 779 Agrimonia. * 663 779 Agrimonia. * 663 779 Androsæmum. 981 Hypericum. * 981 779 Androsæmum. 981 Hypericum. * 629 787 Tribulus. * 580 787 Fabago. * 577 Zygophyllum. * 742		(	67)	
749 Parnassia. * 415 679 Telephium, * 408 680 Tamariscus. 405 Tamarix 690 Frangula. 284 Rhamnus 691 Ziziphus. 284 Rhamnus 694 Vitis. * 305 695 Hedera. * 304 696 Evonymus. * 291  Deux styles.  698 Heuchera. * 349 699 Staphylodendron. 404 Staphy- lea.  701 Ribes. * 301  Trois styles.  702 Cotinus. 399 Rhus. 703 Rhus. * 399 704 Corrigiola. * 409 709 Paliurus. 284 Rhamnus 711 Granadilla. * 1110 Passiflo- 720 Rorella. 421 Drosera. 713 Limonium. 418 Statice. 714 Aldrovanda. * 420 715 Rorella. 421 Drosera. 716 Aldrovanda. * 420 717 Limum. * 419 718 Diosma. * 292 719 Linum. * 419 710 Linum. * 419 710 Linum. * 419 711 Citius. * 728 712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 714 Aldrovanda. * 420 715 Rorella. * 421 Drosera. 721 Aldrovanda. * 420 722 França. 481 Franke nia. C Huit antheres.  Un style.  722 França. 481 Franke nia. 724 Citrus. * 728 725 Hypericum. * 673 726 Acer. * 1266 D Dix antheres. Un style.  725 Tribulus. * 580 736 Fabago. 577 Zygophyl 737 Garidella. * 629  738 Fabago. 577 Zygophyl 745 Chedum. * 590 746 Saponaria. * 613 745 Saponaria. * 613 746 Saponaria. * 613 746 Cerastium. * 637 746 Cherleria. * 619 747 Cherleria. * 619 745 Cherleria. * 613 745 Cherleria. * 619 745 Cherleria. * 619 746 Cherleria. * 619 747 Phyloloca. * 641 747 Phyloloca. * 641 748 Plusieurs antheres: 748 Phyloloca. * 641 749 Phyloloca. * 641 749 Phyloloca. * 641 740 Phyloloca. * 641 740 Phyloloca. * 641 741 745 Phyloloca. * 641 747 Phyloloca. * 641 748 Phyloloca. * 642 748 Phyloloca. * 642 748 Phyloloca. * 642 749 Phyloloca. * 642 749 Phyloloca. * 642 749	677 Achyranthes. *	311	1739 Fagonia. *	570
679 Telephium.* 408 680 Tamariscus. 405 Tamarix 690 Frangula. 234 Rhamnus 691 Ziziphus. 284 Rhamnus 694 Vitis. * 305 694 Vitis. * 305 695 Hedera. * 304 696 Evonymus. * 291  Deux styles.  698 Heuchera. * 349 699 Staphylodendron. 404 Staphylea.  701 Ribes. * 301  Trois styles.  702 Cotinus. 309 Rhus. 705 Cherleria. * 619 704 Cotrigiola. * 409 704 Cotrigiola. * 409 709 Paliurus. 284 Rhamnus 711 Granadilla. 1110 Passiflora. 712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 767 Phytolacca. * 641 715 Rorella. 421 Drosera. 767 Portulacca: * 659 718 Diosma. * 202 719 Limum. * 419 720 Aralia. * 419 720 Aralia. * 417  B Six antheres.  Un style.  721 França. 481 Frankenia.  C Huit antheres.  Un style.  722 França. 481 Frankenia.  C Huit antheres.  Un style.  725 Tribulus. * 580 736 Fabago. 577 Zygophyl. 800 Sedum. * 629  800 Sedum. * 629  800 Sedum. * 629  800 Sedum. * 631 796 Androsæmum. 981 Hyperis.  Cing styles.  Cing styles.  614 Dianthus 746 Saponaria. * 613 746 Saponaria. * 613 746 Caponaria. * 613 746 Caponaria. * 613 746 Caponaria. * 613 746 Caponaria. * 613 747 Cherleria. * 619 747 Luchnis. * 636 748 Dlisantheres:  Un style.  763 Alsine. * 411 754 Cerastium. * 627 755 Cherleria. * 619 756 Cherleria. * 619 757 Luchnis. * 636 758 Drypis.  Plusieurs styles.  765 Phytolacca. * 641  E Plusieurs antheres:  Un style.  766 Tilia. * 717 767 Portulacca: * 659 768 Anacampseros. 629 Sedum. 769 769 Anacampseros. 629 Sedum. 760 769 Anacampseros. 629 Sedum. 760 760 Tilia. * 717 767 Portulacca: * 659 768 Anacampseros. 629 Sedum. 776 769 Angradus. * 674 776 Portulacca: * 659 777 Amygdalus. * 674 778 Pronus. * 675 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 675 779 Amygdalus. * 679 779 Androsæmum. 981	678 Parnassia. *	415	740 Ledum. *	591
Deux styles	679 Telephium. *	408	743 Azedarach.	576 Melia.
694 Vitis. * 306 695 Hedera. * 304 696 Evonymus. * 291  Deux styles.  698 Heuchera. * 349 699 Staphylodendron. 404 Staphylea.  701 Ribes. * 301  Trois styles.  702 Cotinus. 309 Rhus. 703 Rhus. * 309 704 Cotrigiola. * 409 709 Paliurus. 284 Rhammus 711 Granadilla. 1110 Passiflora. 712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 715 Rorella. 421 Drosera. 716 Aldrovanda. * 420 717 Linum. * 410 718 Diosma. * 202 719 Linum. * 410 710 Aralia. * 410 710 Aralia. * 411 710 Perside. * 728 711 Granadila. * 420 712 Origiola. * 420 713 Cotinus. 309 Rhus. 714 Cotrigiola. * 420 720 Paliurus. 284 Rhammus 721 Granadilla. 1110 Passiflora. 722 Statice. * 418 723 Limonium. 418 Statice. 724 Pronus. * 659 725 Pronus. * 659 726 Acer. * 410 720 Aralia. * 410 720 Aralia. * 417 720 Portulacca: * 659 728 Pronus. * 675 729 Amygdalus. * 674 720 Aralia. * 675 720 Myrthus. * 675 720 Myrthus. * 675 720 Citrus. * 974 720 Aralia. * 417 720 Aralia. * 417 720 Aralia. * 421 720 Aralia. * 672 720 Citrus. * 974 720 Aralia. * 673 720 Aralia. * 673 724 Sorbus. * 673 725 Hypericum. * 981 726 Addrosæmum. 981 727 Tribulus. * 580 728 Fabago. * 577 Zygophyl 720 Saxifraga. * 608 725 Alsine. * 411 726 Carastium. * 615 727 Cucusalus. * 615 727 Polereira. * 619 728 Aracampseros. 626 729 Citrus. * 717 720 Amygdalus. * 674 720 Amygdalus. * 674 720 Amygdalus. * 674 720 Citrus. * 974 720 Aralia. * 672 720 Aralia. * 672 721 Tribulus. * 580 725 Hypericum. * 981 726 Acer. * 1266 727 Tribulus. * 580 728 Fabago. * 577 Zygophyl 720 Saxifraga. * 608 725 Aralia. * 620 727 Tribulus. * 580 728 Fabago. * 577 Zygophyl 720 Saxifraga. * 608 725 Aralia. * 615 726 Cheratium. * 615 727 Tribulus. * 636 728 Aracampseros. 624 729 Amygdalus. * 674 720 Aralia. * 674 720 Aralia. * 674 720 Aralia. * 675 720 Aralia. * 674 720 Aralia. * 675 720 Aralia. * 675 720 Aralia. * 675 721 Aralia. * 675 722 Aralia. * 675 723				7
694 Vitis. * 306 695 Hedera. * 304 696 Evonymus. * 291  Deux styles.  698 Houchera. * 349 699 Staphylodendron. 404 Staphylea.  701 Ribes. * 301  Trois styles.  702 Cotinus. 399 Rhus. 795 Cherleria. * 619 704 Corrigiola. * 309 704 Corrigiola. * 309 709 Paliurus. 284 Rhamaus 711 Granadilla. 1110 Passiflora.  Quatre styles.  712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 765 Phytolacca. * 641 707 Portulacca. * 641  E Plusieurs antheres:  Un style.  766 Tilia. * 717 767 Portulacca. * 639 768 Anacampseros. 629 Sedum. 766 Tilia. * 728 Cistus. 776 Helianthemum. 728 Cistus. 776 Citus. * 728 778 Prunus. * 675 779 Amygdalus. * 674 780 Persica. 674 Amygdalus. * 674 780 Persica. 674 Amygdalus. * 674 792 Citrus. * 974 793 Agrimonia. * 663 794 Sorbus. * 679 795 Hypericum. * 981 796 Androsæmum. 981 Hypericum. * 981 797 Garidella. * 620 798 Trois styles.  799 Garidella. * 620 797 Garidella. * 620 797 Garidella. * 620 798 Trois styles.				vies.
## 18   Statice *   418   Trois styles *   Trois style *   Trois styles *   Tro			745 Tunica.	61/ Dianthus
## Deux styles.    Deux styles.		- 40.72		
## Deux styles.    Deux styles.			750 Saxifraga. *	608
698 Heuchera. * 349 699 Staphylodendron. 404 Staphy- lea. 754 Cerastium. * 637 755 Cherleria. * 619 756 Cucubalus. * 615 757 Lvchnis. * 636 758 Drypis. 412  702 Cotinus. 399 Rhus. 703 Rhus. * 399 704 Corrigiola. * 409 709 Paliurus. 711 Granadilla. 1110 Passiflora. 712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 715 Rorella. 421 Drosera. 716 Aldrovanda. * 420 717 Portulacca: * 659 718 Diosma. * 292 719 Linum. * 419 720 Aralia. * 417 780 Persida. * 728 Cistus. 770 Amygdalus. * 674 780 Persida. * 674 780 Pe	ogo Evoltymus.	291		The many and
698 Heuchera. * 349 699 Staphylodendron. 404 Staphylea. * 637 701 Ribes. * 301 Trois styles. * 301 Trois styles. * 399 702 Cotinus. 399 Rhus. 768 Drypis. * 615 703 Rhus. * 399 704 Corrigiola. * 409 709 Paliurus. 284 Rhamaus 711 Granadilla. 1110 Passiflora.  Ruatre styles. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 768 Anacampseros. 629 Sedum. 769 Heisenseros. 629 Sedum. 776 Aldrovanda. * 420 718 Diosma. * 292 718 Diosma. * 292 719 Linum. * 419 720 Aralia. * 417 Resident styles. * 790 Myrthus. * 674 Trois styles. * 792 Citrus. * 794 Trois styles. * 793 Agrimonia. * 663 Trois styles. * 795 Hypericum. * 981 Trois styles. * 797 Garidella. * 620 Trois styles. * 798 Fabago. * 797 Zygophyl * 800 Sedum. * 629	Deux st	les.	Trois sty	les.
699 Staphylodendron. 404 Staphylea.  701 Ribes. * 301  Trois styles.  702 Cotinus. 399 Rhus. 703 Rhus. * 399 704 Corrigiola. * 409 709 Paliurus. 284 Rhamnus 711 Granadilla. 1110 Passiflora. 712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 715 Rorella. 421 Drosera. 716 Aldrovanda. * 420 718 Diosma. * 292 719 Linum. * 419 710 Amygdalus. * 674 710 Linum. * 674 710 Linum. * 674 711 Trois styles.  To Myrthus. * 674 710 Linus. * 674 711 Trois styles.  Trois styles.  Trois styles.  722 Franca. 481 Franke nia. 733 Agrimonia. * 663 734 Sorbus. * 679 735 Hypericum. * 981 736 Androsæmum. 981 Hypericum. 737 Tribulus. * 580 738 Fabago. 577 Zygophyl 738 Fabago. 577 Zygophyl 730 Sedum. * 629		The state of the s	763 Alsine *	4.77
755 Cherleria. * 619 756 Cucubalus. * 615 757 Lychnis. * 636 758 Drypis.				
701 Ribes. * 301  Trois styles.  Trois styles.  702 Cotinus. 309 704 Corrigiola. * 409 709 Paliurus. 284 Rhamaus 711 Granadilla. 1110 Passiflora.  Quatre styles.  712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 715 Rorella. 420 716 Aldrovanda. * 420 717 Rorella. 420 718 Diosma. * 292 718 Diosma. * 292 719 Linum. * 419 720 Aralia. * 417 720 Aralia. * 417 720 Aralia. * 417 720 Aralia. * 417 721 Six antheres.  Un style.  722 Franca. 481 Franke nia.  C Huit antheres.  Deux styles.  726 Acer. * 1266 D Dix antheres.  Un style.  727 Tribulus. * 580 738 Fabago.  738 Fabago.  739 Citrus. * 629  740 Citrus. * 615 741 Luchnis. * 613 740 Dypis. * 641 740 Deux styles.  740 Portulacca. * 641 747 Portulacca: * 659 748 Anacampseros. 748 Prunus. * 643 749 Portulacca: * 644 747 748 Anacampseros. 749 Anacampseros. 748 Anacampseros. 748 Anacampseros. 749 Anacampseros. 748 Anacampseros. 749 Anacampseros. 749 Anacampseros. 749 Anacampseros. 749 Anacampseros. 740 Anacampseros.	ogg Staphytodendroi		755 Cherleria. *	
Trois styles.  Trois styles.  702 Cotinus. 703 Rhus. * 704 Corrigiola. * 705 Phytolacca. * 706 Phytolacca. * 707 Portulacca: * 708 Anacampseros. 709 Paliurus. 701 Airovanda. * 701 Airovanda. * 701 Airovanda. * 701 Linum. * 701 Linum. * 702 Aralia. * 703 Cotinus. 704 Portulacca: * 705 Phytolacca. * 707 Portulacca: * 707 Portulacca: * 708 Anacampseros. 709 Helianthemum. 708 Prunus. * 708 Prunus. * 709 Persica. 709 Portulacca: * 709 Helianthemum. 708 Prunus. * 709 Persica. 709 Portulacca: * 709 Helianthemum. 708 Prunus. * 709 Prunu	not Ribes *			
702 Cotinus. 399 Rhus. 703 Rhus. * 399 704 Corrigiola. * 409 709 Paliurus. 284 Rhamnus 711 Granadilla. 1110 Passiflora.  Quatre styles.  Quatre styles.  712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 716 Rorella. 421 Deosera. 716 Aldrovanda. * 420 718 Diosma. * 292 719 Linum. * 419 720 Aralia. * 417  B Six antheres.  Un style.  B Six antheres.  Un style.  722 Franca. 481 Franke nia.  C Huit antheres.  Deux styles.  726 Acer. * 1266  D Dix antheres.  Un style.  727 Tribulus. * 580 738 Fabago. 577 Zygophyl  80 Sedum. 765 Phytolacca. * 641  E Plusieurs antheres:  Un style.  765 Phytolacca. * 641  E Plusieurs antheres:  676 767 Portulacca: * 659 768 Anacampseros. 629 Sedum. 769 Helianthemum. 728 Cistus. 769 Helianthemum. 728 Cistus. 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Persica. 674 Amygdalus. 779 Persica. 674 Amygdalus. 779 Citrus. * 974  Trois styles.  793 Agrimonia. * 663 794 Sorbus. * 679  Trois styles.  795 Hypericum. * 981 796 Androsæmum. 981 Hypericum. 797 Garidella. * 620  Cinq styles.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago. 577 Zygophyl 798 Soo Sedum. * 629	Jor actions.	301		636
702 Cotinus. 399 Rhus. 703 Rhus. * 399 704 Corrigiola. * 409 709 Paliurus. 284 Rhamaus 711 Granadilla. 1110 Passiflora.  Quatre styles.  Quatre styles.  712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 768 Anacampseros. 629 Sedum. 716 Rorella. 421 Drosera. 769 Helianthemum. 728 Cistus. 728 718 Diosma. * 292 718 Diosma. * 292 719 Linum. * 419 720 Aralia. * 417  B Six antheres.  Un style.  722 Franca. 481 Franke nia.  C Huit antheres.  Deux styles.  726 Acer. * 1266  D Dix antheres.  Un style.  727 Tribulus. * 580 738 Fabago. 577 Zygophyl  80 Sedum. * 629  80 Sedum. 766 Tilia. * 717 767 Portulacca: * 659 768 Anacampseros. 629 Sedum. 769 Helianthemum. 728 Cistus. 769 Prunus. * 679 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Agrimonia. * 672 779 Citrus. * 974  780 Persica.  780 Persica.  780 Persica.  791 Tribulus. * 683 794 Androsæmum.  795 Hypericum. * 981 796 Androsæmum.  797 Garidella. * 620  Cinq styles.  780 Sedum. * 629	Trois sty	les.	758 Drypis.	412.
703 Rhus, * 704 Corrigiola. * 709 Paliurus. 701 Granadilla.  1110 Passiflora.  Quatre styles.  712 Statice. * 713 Limonium. 715 Rorella. 716 Aldrovanda. * 716 Aldrovanda. * 717 Portulacca: * 709 Pelium. * 709 Helianthemum. 709 Helianthemum. 709 Helianthemum. 709 Helianthemum. 709 Helianthemum. 709 Helianthemum. 709 Pronus. * 709 Persica. 700 Myrthus. * 7			707	The strain of the
704 Corrigiola. * 409 709 Paliurus. 284 Rhamnus 711 Granadilla. 1110 Passiflo- 72. Quatre styles.  Quatre styles.  712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 715 Rorella. 421 Drosera. 716 Aldrovanda. * 420 718 Diosma. * 202 719 Linum. * 419 719 Linum. * 419 719 Linum. * 419 720 Aralia. * 4217  To Portulacca: * 669 768 Anacampseros. 629 Sedum. 769 Helianthemum. 728 Cistus. 776 Cistus. * 728 778 Pronus * 675 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 792 Citrus. * 974  Deux styles.  722 Franca. 481 Franke nia. C Huit antheres.  Deux styles.  726 Acer. * 1266  D Dix antheres.  Un style.  727 Tribulus. * 580 738 Fabago. 577 Zygophyl 800 Sedum. * 629  To Styles.  768 Tilia. * 717 767 Portulacca: * 669 768 Anacampseros. 629 Sedum. 776 Cistus. * 728 778 Pronus * 675 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 792 Citrus. * 974  Trois styles.  793 Agrimonia. * 663 794 Sorbus. * 679  Trois styles.  795 Hypericum. * 981 796 Androsæmum. 981 Hypericum. 797 Garidella. * 620  Cinq styles.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago. 577 Zygophyl 800 Sedum. * 629			Plusieurs, s	tytes.
Tog Paliurus			765 Phytolacca. *	6/4
### Comparison of Comparison o	704 Corrigiona.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1
Quatre styles.  Quatre styles.  712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 715 Rorella. 421 Drosera. 716 Aldrovanda. * 420 718 Diosma. * 292 719 Linum. * 419 720 Aralia. * 417  B Six antheres. Un style.  722 Franca. 481 Franke nia. C Huit antheres.  Deux styles.  726 Acer. * 1266 D Dix antheres. Un style.  727 Tribulus. * 580 738 Fabago.  738 Fabago.  748 Tribulus. * 580 759 Aralia. * 717 767 Portulacca: * 659 769 Anacampseros. 790 Helianthemum. 728 Cistus. 778 Prunus. * 728 778 Prunus. * 675 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Citrus. * 974 779 Citrus. * 974 779 Citrus. * 673 779 Citrus. * 673 779 Citrus. * 663 7794 Sorbus. * 663 7794 Sorbus. * 663 7795 Hypericum. * 981 7796 Androsæmum. 981 Hypericum. 7797 Garidella. * 620 Cinq styles.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago.  738 Fabago.  748 Tribulus. * 629			E Plusieurs a	ntheres:
Quatre styles.  712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 715 Rorella. 421 Drosera. 716 Aldrovanda. * 420 718 Diosma. * 292 718 Diosma. * 292 719 Linum. * 419 720 Aralia. * 417  B Six antheres.  Un style.  722 Franca. 481 Franke nia.  C Huit antheres.  Deux styles.  726 Acer. * 1266  D Dix antheres.  Un style.  727 Tribulus. * 580 738 Fabago. 577 Zvgophyl 800 Sedum. * 629  768 Tilia. * 717 767 Portulacca: * 659 768 Anacampseros. 629 Sedum. 776 Cistus. * 728 778 Pronus. * 728 778 Pronus. * 728 778 Pronus. * 728 778 Pronus. * 675 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Cistus. * 974 780 Persica.  790 Myrthus. * 673 792 Citrus. * 974 793 Agrimonia. * 663 794 Sorbus. * 679 795 Hypericum. * 981 796 Androsæmum. 981 Hypericum. 797 Garidella. * 620  Cinq styles.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago. 577 Zvgophyl 800 Sedum. * 629	J. C.		77,7	
712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 715 Rorella. 421 Drosera. 716 Aldrovanda. * 420 718 Diosma. * 292 719 Linum. * 419 720 Aralia. * 417 780 Persica. 629 Sedum. 776 Cistus. * 728 778 Prunus. * 675 779 Amygdalus. * 674 780 Persica. 674 Amygdalus.  B Six antheres. 790 Myrthus. * 674 792 Citrus. * 974  The style. 793 Agrimonia. * 663 794 Sorbus. * 679  Deux styles. 795 Hypericum. * 981 796 Androsæmum. 981 Hypericum. 797 Garidella. * 620 797 Tribulus. * 580 798 Fabago. 577 Zygophyl 800 Sedum. * 629  Cinq styles. 797 Ciq styles. 797 Ciq styles. 797 Ciq styles. 798 799 Garidella. * 629	Quatro et	wlee .	On styli	
712 Statice. * 418 713 Limonium. 418 Statice. 715 Rorella. 421 Drosera. 716 Aldrovanda. * 420 718 Diosma. * 292 719 Linum. * 419 720 Aralia. * 417  The style.  722 Franca. 481 Franke nia.  C Huit antheres.  Deux styles.  726 Acer. * 1266  D Dix antheres.  Un style.  727 Tribulus. * 580 738 Fabago. 577 Zygophyl 800 Sedum. * 629  Circus. * 669 768 Anacampseros. 629 Sedum. 769 Helianthemum. 728 Cistus. * 728 779 Helianthemum. 728 Cistus. * 728 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Citrus. * 974 779 Amygdalus. * 674 779 Citrus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Citrus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Citrus. * 674 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdal	Caurie si	,	766 Tilia. *	717
713 Limonium. 715 Rorella. 716 Aldrovanda. * 420 718 Diosma. * 292 719 Linum. * 419 720 Aralia. * 417  The style.  721 Franca.  722 Franca.  723 Agrimonia. * 663 724 Amygdalus. * 674 725 Agrimonia. * 675 726 Acer. * 1266  727 Dix antheres.  728 Cistus. * 728 728 Prunus. * 674 729 Amygdalus. * 674 730 Myrthus. * 674 730 Myrthus. * 674 731 Agrimonia. * 663 733 Agrimonia. * 663 734 Sorbus. * 673 735 Hypericum. * 981 736 Anacampseros. 629 Sedum. * 629 737 Tribulus. * 674 738 Fabago.  738 Fabago.  748 Anacampseros. 629 Sedum. * 728 728 Anacampseros. 728 728 Anacampseros. 629 Sedum. * 728 728 Frunus. * 728 739 Prunus. * 674 739 Amygdalus. * 674 739 Myrthus. * 674 739 Agrimonia. * 663 739 Agrimonia. * 663 739 Agrimonia. * 663 739 Hypericum. * 981 730 Anadrosæmum. 981 731 Hypericum. * 620 733 Tribulus. * 580 733 Fabago. 577 Zygophyl 800 Sedum. * 629	712 Statice. *	418	767 Portulacca: *	
716 Aldrovanda. * 420 718 Diosma. * 292 719 Linum. * 419 720 Aralia. * 417  B Six antheres.  Un style.  722 Franca.  C Huit antheres.  Deux styles.  726 Acer. * 1266  D Dix antheres.  Un style.  727 Tribulus. * 580 738 Fabago.  738 Fabago.  740 Cistus. * 728 778 Prunus. * 675 779 Amygdalus. * 674 780 Persida.  780 Persida.  790 Myrthus. * 672 792 Citrus. * 974 793 Agrimonia. * 663 794 Sorbus. * 679  Trois styles.  795 Hypericum. * 981 796 Androsæmum. 981 Hypericum. 797 Garidella. * 620  Cinq styles.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago.  738 Fabago.  740 Cistus. * 728 740 Amygdalus. * 674 740 Amygdalus. 741 742 Citrus. * 974 744 745 Citrus. * 974 750 Persida. 750 Myrthus. * 672 750 Myrthus. * 673 750 Agrimonia. * 663 750 Androsæmum. 981 Hypericum. * 981 750 Garidella. * 620 750 Cinq styles. 750 Garidella. * 620		418 Statice.		629 Sedum.
718 Diosma. * 292 779 Linum. * 419 720 Aralia. * 417  B Six antheres.  Un style.  790 Myrthus. * 672 792 Citrus. * 974  Deux styles.  793 Agrimonia. * 663 794 Sorbus. * 679  Deux styles.  795 Hypericum. * 981 796 Androsæmum. 981 Hypericum.  Un style.  797 Garidella. * 620  Cinq styles.  798 Prunus. * 674 779 Amygdalus. * 672 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 672 779 Amygdalus. * 674 779 Amygdalus. * 672 779 Amygdalus. * 6		421 Drosera.		
719 Linum. * 419 720 Aralia. * 417  B Six antheres.  Un style.  722 Franca.  C Huit antheres.  Deux styles.  726 Acer. * 1266  D Dix antheres.  Un style.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago.  738 Fabago.  739 Amygdalus. * 674 780 Persica.  790 Myrthus. * 672 792 Citrus. * 974 792 Citrus. * 974 793 Agrimonia. * 663 794 Sorbus. * 679 795 Hypericum. * 981 796 Androsæmum. 981 Hypericum. * 620 Cinq styles.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago.  737 Zygophyl 800 Sedum. * 629				
### 120 Aralia. * 417				and the second s
B Six antheres.  Un style.  790 Myrthus. * 672 792 Citrus. * 974  Deux styles.  Deux styles.  793 Agrimonia. * 663 794 Sorbus. * 679  Deux styles.  Trois styles.  726 Acer. * 1266  D Dix antheres.  Un style.  795 Hypericum. * 981 796 Androsæmum. 981 Hypericum.  Cinq styles.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago.  577 Zygophyl 800 Sedum. * 629				
Un style.  790 Myrthus. * 672 792 Citrus. * 974  Total Styles.  793 Agrimonia. * 663 794 Sorbus. * 679  Deux styles.  794 Franke nia.  795 Hypericum. * 981 796 Androsæmum. 981 Hypericum.  796 Androsæmum. 981 Hypericum.  797 Garidella. * 620  Cinq styles.  798 Fabago.  799 Myrthus. * 672 792 Citrus. * 974 793 Agrimonia. * 663 794 Sorbus. * 679  Trois styles.  796 Androsæmum. 981 Hypericum.  797 Garidella. * 620  Cinq styles.	720 Arana.	417	700 Persica.	
Un style.  792 Citrus. * 974  Deux styles.  793 Agrimonia. * 663  794 Sorbus. * 679  Deux styles.  726 Acer. * 1266  D Dix antheres.  Un style.  795 Hypericum. * 981  796 Androsæmum. 981 Hypericum.  797 Garidella. * 620  Cinq styles.  737 Tribulus. * 580  738 Fabago.  797 Zygophyl 800 Sedum. * 629	B Six anth	eres.	700 Myrthus *	
Deux styles.  722 Franca.  481 Franke nia.  793 Agrimonia. * 663 794 Sorbus. * 679  Deux styles.  726 Acer. * 1266  D Dix antheres.  Un style.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago.  577 Zygophyl 800 Sedum. * 629			702 Citrus. *	
Trois styles.  793 Agrimonia. * 663 794 Sorbus. * 679  Deux styles.  726 Acer. * 1266  D Dix antheres.  Un style.  797 Garidella. * 620  Cinq styles.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago.  797 Zygophyl 800 Sedum. * 629	Un styl	f.	179- 0-14-16-1	9/4
Trois styles.  Trois styles.  796 Acer. * 1266  Dix antheres.  Un style.  797 Garidella. * 620  Cinq styles.  798 Fabago.  798 Agrimonia. * 663 794 Sorbus. * 679  Trois styles.  795 Hypericum. * 981 796 Audrosæmum. 981 Hypericum.  797 Garidella. * 620  Cinq styles.	gas Franca	18 Franke	Deux styl	les.
C Huit antheres. 794 Sorbus. * 679  Deux styles. Trois styles.  726 Acer. * 1266  D Dix antheres.  Un style. 795 Hypericum. * 981 Hyperi- 796 Androsæmum. 981 Hyperi- 797 Garidella. * 620  Cinq styles.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago. 577 Zygophyl 800 Sedum. * 629	/== x ranoas		mo2 Amimonia *	112
Deux styles.  726 Acer. * 1266  D Dix antheres.  Un style.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago.  Deux styles.  Trois styles.  795 Hypericum. * 981 Hypericum. 796 Audrosæmum. 981 Hypericum. 797 Garidella. * 620  Cinq styles.  Cinq styles.	CIL		795 Agrimonia.	THE PARTY OF THE P
726 Acer. * 1266 795 Hypericum. * 981 Hyperi- 726 D Dix antheres. 796 Androsæmum. 981 Hyperi- 727 Garidella. * 620 737 Tribulus. * 580 738 Fabago. 577 Zygophyl 800 Sedum. * 629	C Finit anti	ieres.	794 Joinus.	079
726 Acer. * 1266  D Dix antheres.  Un style.  795 Hypericum. * 981 796 Androsæmum. 981 Hyperi- cum.  797 Garidella. * 620  Cinq styles.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago. 577 Zygophyl 800 Sedum. * 629	Deux styl	les.	Trois styl	es.
D Dix antheres.  Un style.  796 Androsæmum.  797 Garidella. *  620  Cinq styles.  738 Fabago.  580  577 Zygophyl.  800 Sedum. *  629				ALC: UNITED BY
Un style.  737 Tribulus. * 580 738 Fabago.  5797 Garidella. * 620  Cinq styles.  5797 Zygophyl 800 Sedum. * 629	726 Acer. *	1266	795 Hypericum.	
Un style. 797 Garidella. * 620  737 Tribulus. * 580  738 Fabago. 577 Zygophyl 800 Sedum. * 629	D Dir ant	heres	/90 Androsæmum.	
737 Tribulus. * 580 738 Fabago. 577 Zygophyl 800 Sedum. * 629	- Dix anti		707 Garidella *	
737 Tribulus. * 580 Ginq styles. 738 Fabago. 577 Zygophyl 800 Sedum. * 629	Un style	and the same of	/d/ Cultudid.	020
738 Fabago. 577 Zygophyl 800 Sedum. * 629	The state of the s	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Cinq style	es.
1 0 - N: 11 +	738 Fabago	A CONTRACTOR WITH THE REAL PROPERTY.		
742 CES	you - would .	Jyzygopnyl	802 Nigolla *	at the same of the
		smile 1	Con Trigella,	747 589

(0	0)
803 Spirma. * 686	and the state of t
804 Pyrus. 68.	CLASSE XII.
	7 7 7 7 11
Plusieurs styles.	Plantes à fleurs enveloppées par-
	ciantos a neurs enveloppees pare
805 Myosurus. * 426	faites pétalées à cinq pétales,
806 Filipendula. 686 Spirma.	ombellées.
807 Potentilla. * 690	
808 Fragaria. * 689	83' Eryngium. * 354
809 Caryophyllata. 692 Geum.	835 Phyllis. * 353
	836 Hydrocotyle. * 355
810 Ranunculus. * 757	
811 Populago. 761 Caltha.	837 Astrantia. * 357
812 Helleborus. * 760	838 Pastinaca. * 392
814 Rubus. * 688	839 Anethum. * 394
815 Rosa. * 687	840 Podagraria. 398 Ægopo-
	dium.
CLASSE XI.	841 Thapsia. * 391
	842 Imperatoria. * 389
Plantes à fleurs enveloppées par-	843 Angelica. * 377
	844 Ferula * 373
faites pétalées a cinq pétales,	
irrégulieres.	845 Tordylium. * 361
	8,6 Caucalis. * 362
A Cinq antheres.	847 Selinum. * 368
	.848 Sphondylium. 375 Hera-
Un style.	cleum
0 471 1 4	849 Crithmum. * 371
817 Viola. * 1092	850 Artedia. * 363
D.C.	851 Peucedanum. * 370
B Sept antheres.	852 Foniculum. 394 Anethum
Un style.	853 Cuminum. * 381
On style.	854 Carum. * 395
818 Hypocastanum. 498 Æsculus	
010 11) postariamin 47	
C Huit antheres.	
	857 Myrrhis.
Un style.	858 Cherophyllum * 388
	859 Seseli. * 390
819 Acriviola. 502 Tropæo-	
lum.	861 Oenanthe. * 382
820 Pavia. 498 Æsculus	862 Sanicula. * 356
	863 Daucus. * 364
D Dix antheres.	864 Libanotis. 369 Atha-
	manta.
Un style.	865 Ligusticum. * 376
	866 Laserpitium. * 374
821 Geranium. * 897	867 Buplevrum. * 378
826 Siliquastrum. 553 Cercis.	
829 Fraxinella. 564 Dictam	E COO ESCHILLE
nus.	009 200011
830 Pyrola. * 598	870 Cachrys. * 372
	1871 Smyrnium. * 393
E Plusieurs antheres.	872 Coriandrum. * 386
m · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	873 Cicuta. 307 Contunt
Trois ou cinq styles.	1874 Æthusa. * 385
000 A	875 Sium. * 378
833 Aconitum. * 737	A STATE OF THE STA

876 Sison *  877 Phellandrium. *  383 378 Apium. *  387 387 Visnaga.  364 Daucus. 380 Ammi *  365  C L A S S E X I I I.  Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à six pétales,  A Deux antheres,  Un style.  882 Orchis. *  1094 883 Helleborine. 1097 Serapias. 884 Epipactis. 1096 Satyrium 885 Ophrys. *  1096 Satyrium 1096 886 Calceolus.  1110 Cypripedium. 887 Limodorum. 1094 Orchis.  B Trois antheres,  Un style.  890 Bermudiana. 1103 Sisyrinchium. 62  C Six antheres,  Un style.  891 Ixia. *  62  C Six antheres,  Un style.  893 Leontopetalon. 895 Peplis. *  486 Leontice. 482  791 Pæonia, *  792 Pesplis.  494 Pæonia, *  496 Salizaria  497 Asparagus. *  497  Deux styles.  926 Punica. *  673  Deux styles.  929 Reseda, *  664 930 Delphinium, *  736  Plusieurs styles,  931 Anemone. *  752  C L A S S E X I V.  Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à plusieurs pétales.  480 Nymphæa *  709  Deux styles.  941 Pæonia, *  732  Trois styles.	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	(6	9)	
\$77 Phellandrium. * 383 \$78 Apium. * 397 \$79 Visnaga. 364 Daucus. \$80 Ammi * 365  C L A S S E X I I I.  Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à six pétales.  A Deux antheres,  Un style.  \$82 Orchis. * 1094 \$83 Helleborine. 1097 Serapias. \$84 Epipactis. 1096 Satyrium 1096 \$86 Calceolus. 1110 Cypripedium. \$87 Limodorum. 1094 Orchis.  B Trois antheres,  Un style.  \$90 Bermudiana. 1103 Sisyrinchium.  \$91 Ixia. * 62  C Six antheres,  Un style.  \$93 Leontopetalon. 456 Leontice, 482  \$941 Pæonia, * 732  Trois styles.	8nf Sison *	70	101/4 Celsia.	Mo Bulhoca-
397 Apium. * 397 Visnaga. 365 Daucus. 365 Deiux styles.  C L A S S E X I I I.  Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées , à six pétales.  A Deux antheres, Un style.  \$82 Orchis. *  Un style.  \$83 Helleborine, 1097 Serapias. 384 Epipactis. 1096 Satyrium 1096 Satyrium 1096 Satyrium 1096 Satyrium 1096 Punica. *  1097 Reseda. *  1098 Veratrum. *  1149  Deiux styles.  926 Punica. *  929 Reseda. *  930 Delphinium. *  936 Plusieurs styles,  931 Anemone. *  931 Anemone. *  932 Limodorum. 1094 Orchis.  B Trois antheres, Un style.  S90 Bermudiana. 1103 Sisyrinchialis chium.  891 Ixia. *  62  C Six antheres, Un style.  940 Nymphæa *  940 Nymphæa *  941 Pæonia. *  941 Pæonia. *  732  Trois styles.		83	7-4	
879 Visnaga.  879 Visnaga.  364 Daucus. 365  C L A S S E X I I I.  Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à six pétales.  A Deux antheres, Un style.  882 Orchis. * 1094 883 Helleborine. 1097 Serapias. 884 Epipactis. 1096 Satyrium 1096 886 Calceolus. 1110 Cypripedium. 887 Limodorum. 1094 Orchis. B Trois antheres, Un style.  890 Bermudiana. 1103 Sisyrinechium. 891 Ixia. * 62  C Six antheres, Un style.  893 Leontopetalon. 456 Leontice, 895 Peplis. * 482  894 Pæonia. * 732  Trois styles.	378 Apium. *	07	or5 Berberis, *	
CLASSEXIII,  Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à six pétales,  A Deux antheres,  Un style.  Sea Orchis. * 1094 883 Helleborine. 1097 Serapias.  884 Epipactis. 1096 Satyrium 885 Ophrys. * 1096 886 Calceolus. 1110 Cypripedium.  887 Limodorum. 1094 Orchis.  B Trois antheres,  Un style.  Sea Bermudiana. 1103 Sisyrinechium.  Sea Orchis. * 1096 Satyrium 1096 Satyrium 1096 Satyrium 1096 Satyrium 1096 Satyrium 1097 Serapias.  Plusieurs styles.  Plusieurs styles,  OLASSEXIV.  Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à plusieurs pétales.  A Plusieurs antheres.  Un style.  Sea Orchis. * 1094 Orchis.  B Trois antheres,  Un style.  Sea Orchis. * 1095 Satyrium 1096 Satyrium 1096 Satyrium 1096 Plusieurs styles.  Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées , à plusieurs pétales.  A Plusieurs antheres.  Un style.  940 Nymphæa * 709  Deux styles.  941 Pæonia. * 732  Trois styles.	870 Visnaga.	6 Daucus.	017 Asparagus. *	
Plantes à fleurs enveloppées par- faites pétalées , à six pétales,  A Deux antheres, Un style,  Plantes à fleurs enveloppées par- faites pétalées , à six pétales,  A Deux antheres, Un style,  Plusieurs antheres, 296 Punica. * 673  Deux styles.  926 Punica. * 664 930 Delphinium. * 736  Plusieurs styles, 930 Delphinium. * 736  Plusieurs styles, 931 Anemone. * 752  C L A S S E X I V.  Plantes à fleurs enveloppées par- faites pétalées , à plusieurs pétales.  Un style.  Plantes à fleurs enveloppées par- faites pétalées , à plusieurs pétales.  A Plusieurs antheres, Un style.  940 Nymphæa * 709 Deux styles.  941 Pæonia. * 732 Trois styles.	880 Ammi *	65		
Plantes à fleurs enveloppées par- faites pétalées, à six pétales.  A Deux antheres,  Un style,  Plusieurs antheres.  Un style,  326 Punica. * 673  Deux styles.  329 Reseda, * 664  330 Delphinium, * 736  Plusieurs styles,  320 Punica. * 673  Deux styles.  321 Reseda, * 664  322 Plusieurs styles,  323 Anemone. * 752  C L A S S E X I V.  Plantes à fleurs enveloppées par- faites pétalées, à plusieurs pétales.  Un style,  Son Bermudiana.  1103 Sisyrin- chium.  Sol Ixia. * 62  C Six antheres,  Un style,  Son Leontopetalon.  456 Leontice,  482  Trois styles.  Trois styles.			Deux style	59
Plantes à fleurs enveloppées par- faites pétalées, à six pétales.  A Deux antheres,  Un style,  926 Punica. * 673  Un styles.  929 Reseda, * 664 930 Delphinium, * 736  Plusieurs styles,  920 Roseda, * 664 930 Delphinium, * 736  Plusieurs styles,  931 Anemone. * 752  C L A S S E X I V.  Plantes à fleurs enveloppées par- faites pétalées, à plusieurs pétales.  Un style.  931 Anemone. * 752  C L A S S E X I V.  Plantes à fleurs enveloppées par- faites pétalées, à plusieurs pétales.  A Plusieurs antheres.  Un style.  940 Nymphæa * 709  Deux styles.  941 Pæonia, * 732  Trois styles.  Trois styles.	CLASSE	III,	018 Veratrum. *	1240
faites pétalées, à six pétales,  A Deux antheres, Un style.  \$82 Orchis. * 1094 883 Helleborine. 1097 Serapias. 884 Epipactis. 1096 Satyrium 885 Ophrys. * 1096 886 Calceolus. 1110 Cypripedium. 887 Limodorum. 1094 Orchis. B Trois antheres, Un style.  \$90 Bermudiana. 1103 Sisyrinchia. \$91 Ixia. * 62 C Six antheres, Un style.  \$93 Leontopetalon. 456 Leontice, \$941 Pæonia. * 732 Trois styles.	DI 1 0 1	and the second	Parallel Andrews Control of the Control	
A Deux antheres,  Un style.  \$82 Orchis. * 1094 883 Helleborine. 1097 Serapias. \$84 Epipactis. 1096 Satyrium 885 Ophrys. * 1096 886 Calceolus. 1110 Cypripe- dium.  \$87 Limodorum. 1094 Orchis.  B Trois antheres.  Un style.  \$90 Bermudiana. 1103 Sisyrin- chium.  \$91 Ixia. * 62  C Six antheres,  Un style.  \$93 Leontopetalon. 456 Leontice, \$941 Pæonia. * 732  Trois styles.  \$941 Pæonia. * 732  Trois styles.			D Plusieurs an	ineres.
Wn style.  882 Orchis. * 1094 883 Helleborine. 1097 Serapias. 884 Epipactis. 1096 Satyrium 885 Ophrys. * 1096 886 Calceolus. 1110 Cypripe- dium. 887 Limodorum. 1094 Orchis. B Trois antheres. Un style.  \$90 Bermudiana. 1103 Sisyrin- chium.  \$91 Ixia. * 62  C Six antheres, Un style.  \$93 Leontopetalon. 456 Leontice. \$95 Peplis. * 482  Trois styles.  Deux styles.  929 Reseda, * 664 930 Delphinium, * 736  Plusieurs styles,  931 Anemone. * 752  C L A S S E X I V.  Plantes à fleurs enveloppées par- faites pétalées, à plusieurs pétales.  A Plusieurs antheres. Un style.  940 Nymphæa * 709 Deux styles.  941 Pæonia, * 732 Trois styles.	taites pétalées , à six	petales.	Un style,	indiana page
Wn style.  882 Orchis. * 1094 883 Helleborine. 1097 Serapias. 884 Epipactis. 1096 Satyrium 885 Ophrys. * 1096 886 Calceolus. 1110 Cypripe- dium. 887 Limodorum. 1094 Orchis. B Trois antheres. Un style.  \$90 Bermudiana. 1103 Sisyrin- chium.  \$91 Ixia. * 62  C Six antheres, Un style.  \$93 Leontopetalon. 456 Leontice. \$95 Peplis. * 482  Trois styles.  Deux styles.  929 Reseda, * 664 930 Delphinium, * 736  Plusieurs styles,  931 Anemone. * 752  C L A S S E X I V.  Plantes à fleurs enveloppées par- faites pétalées, à plusieurs pétales.  A Plusieurs antheres. Un style.  940 Nymphæa * 709 Deux styles.  941 Pæonia, * 732 Trois styles.	A Dour anthe		and Dumida *	602
882 Orchis. * 883 Helleborine. 884 Epipactis. 885 Ophrys. * 886 Calceolus. 887 Limodorum. 1094 Orchis.  B Trois antheres. Un style.  \$90 Bermudiana. 1103 Sisyrin- chium.  \$91 Ixia. *  C Six antheres. Un style.  \$93 Leontopetalon. 456 Leontice.  \$941 Pæonia. *  732		The same of the sa	920 Funica.	0/3
883 Helleborine.  884 Epipactis.  885 Ophrys. *  886 Calceolus.  887 Limodorum.  1094 Orchis.  B Trois antheres.  Un style.  890 Bermudiana.  1103 Sisyrinchium.  891 Ixia. *  C Six antheres.  Un style.  893 Leontopetalon.  456 Leontice.  895 Peplis. *  896 Calceolus.  1097 Serapias.  930 Delphinium. *  936  Plusieurs styles.  931 Anemone. *  752  C L A S S E X I V.  Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à plusieurs pétales.  A Plusieurs antheres.  Un style.  940 Nymphæa *  799  Deux styles.  941 Pæonia. *  732  Trois styles.	Un style.		Deux style	· s.
883 Helleborine.  884 Epipactis.  885 Ophrys. *  886 Calceolus.  887 Limodorum.  1094 Orchis.  B Trois antheres.  Un style.  890 Bermudiana.  1103 Sisyrinchium.  891 Ixia. *  C Six antheres.  Un style.  893 Leontopetalon.  456 Leontice.  895 Peplis. *  896 Calceolus.  1097 Serapias.  930 Delphinium. *  936  Plusieurs styles.  931 Anemone. *  752  C L A S S E X I V.  Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à plusieurs pétales.  A Plusieurs antheres.  Un style.  940 Nymphæa *  799  Deux styles.  941 Pæonia. *  732  Trois styles.	882 Orchie *	101	and Parada *	661
884 Epipactis. 885 Ophrys. * 1096 886 Calceolus. 1110 Cypripedium. 887 Limodorum. 1094 Orchis.  B Trois antheres. Un style.  S90 Bermudiana. 1103 Sisyrinchium. C Six antheres. Un style.  C Six antheres. Un style.  S91 Ixia. * 62  C Six antheres. Un style.  S93 Leontopetalon. 456 Leontice. 895 Peplis. * 482  Trois styles.  Plusieurs styles. 931 Anemone. * 752  C L A S S E X I V.  Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à plusieurs pétales.  A Plusieurs antheres. Un style.  940 Nymphæa * 709  Deux styles.  941 Pæonia. * 732  Trois styles.				
885 Ophrys. * 1096 886 Calceolus. 1110 Cypripe- dium. 887 Limodorum. 1094 Orchis.  B Trois antheres. Un style.  S90 Bermudiana. 1103 Sisyrin- chium. 891 Ixia. * 62 C Six antheres, Un style.  S93 Leontopetalon. 456 Leontice, 895 Peplis. * 482 Trois styles.  Plusieurs styles, 931 Anemone. * 752 C L A S S E X I V.  Plantes à fleurs enveloppées par- faites pétalées, à plusieurs pétales. A Plusieurs antheres. Un style. 940 Nymphæa * 709 Deux styles. 941 Pæonia. * 732 Trois styles.		ob Saturium		
886 Calceolus.  110 Cypripe-dium.  887 Limodorum.  1094 Orchis.  B Trois antheres.  Un style.  S90 Bermudiana.  1103 Sisyrin-chium.  891 Ixia. *  62  C Six antheres.  Un style.  931 Anemone. *  752  C L A S S E X I V.  Plantes à fleurs enveloppées parfaites pétalées, à plusieurs pétales.  A Plusieurs antheres.  Un style.  940 Nymphæa *  799  Deux styles.  941 Pæonia, *  732  Trois styles.		06	Plusieurs sty	les,
887 Limodorum. 1094 Orchis.  B Trois antheres.  Un style.  890 Bermudiana. 1103 Sisyrin- chium.  891 Ixia. * 62  C Six antheres, Un style.  893 Leontopetalon. 456 Leontice. 895 Peplis. * 482  896 Selicavia. * 732  Trois styles.	886 Calceolus.		o3: Anamona *	n52
B Trois antheres.  Un style.  Soo Bermudiana. 1103 Sisyrin- chium.  Soli Ixia. * 62  C Six antheres, Un style.  Soli Peplis. * 482  C Salizaria A Plusieurs antheres.  Un style.  940 Nymphæa * 709  Deux styles.  941 Pæonia. * 732  Trois styles.			Sharping a state of the state o	
B Trois antheres.  Un style.  Soo Bermudiana. 1103 Sisyrin- chium.  Sol Ixia. * 62  C Six antheres.  Un style.  Sol Leontopetalon. 456 Leontice.  Sol Peplis. * 482  C Saliennia. * 732  Trois styles.	887 Limodorum. 10	94 Orchis.	CLASSE	XIV.
Soo Bermudiana. 1103 Sisyrin- chium.  891 Ixia. * 62  C Six antheres, Un style.  893 Leontopetalon. 456 Leontice. 895 Peplis. * 482  C Salizaria			D1 > 0	1 /
\$90 Bermudiana. 1103 Sisyrin- chium.  891 Ixia. * 62  C Six antheres, Un style.  940 Nymphæa * 709 Deux styles.  941 Pæonia. * 732  732  732  733  734  735 Peplis. * 482  736 Selicaria. * 732  736 Selicaria. * 732	Di Trois anthei	es.		
891 Ixia. * 62  C Six antheres,  Un style,  1940 Nymphæa * 709  Deux styles.  1941 Pæonia. * 732  1941 Pæonia. * 732  Trois styles.	Un style.		faites petalees, a plus	ieurs petales.
891 Ixia. * 62  C Six antheres,  Un style,  1940 Nymphæa * 709  Deux styles.  1941 Pæonia. * 732  1941 Pæonia. * 732  Trois styles.	Soo Bormudiana	2 Ciennin	A Plusieurs an	theres.
891 Ixia. * 62 C Six antheres, Un style.  893 Leontopetalon. 456 Leontice. 895 Peplis. * 482 Trois styles.  Trois styles.	290 Dermudiana.			
C Six antheres,  Un style,  893 Leontopetalon. 456 Leontice, 895 Peplis. *  482  Trois styles.	801 Ixia. *		Un style.	time of the
Un style.  10 Six antheres,  Un style.  10 Deux styles.  10 Deux styles.  10 Page 11 Page 12 P	The state of the s	N. C.	940 Nymphæa *	700
893 Leontopetalon. 456 Leontice, 941 Pæonia. * 732 895 Peplis. * 482 Trois styles.	C Six anthere	9		and the second second
893 Leontopetalon. 456 Leontice, 941 Pæonia, * 732 895 Peplis. * 482 Trois styles.	Un style.	a grand	Deux style	5.
895 Peplis. * 482 Trois styles.			941 Pæonia. *	732
206 Caliannia (C. T. 1	295 Leontoperaion. 4	Do Leontice,		
				3.
897 Ornithogalum. * 451 942 Aquilegia. * 741	807 Ornithogalum *	50 Lytheum.	942 Aquilegia. *	741
oya Critical galding	808 Scilla *	52		
Seo Phalangium Asi Ornitho				tes.
galum, 1944 Adonis. * 756				
945 Hepatica, 752 Anemone,	900 Hemerocallis. * 4		945 Hepatica,	
gor Lilium. * 443 1940 Atragene. 753	gor Lilium. *			The same of the sa
go3 Tulipa. * 448 947 Lipidendrum, 747	go3 Tulipa. * 4	48	947 Liftodendrum,	747
904 Uvularia. * 445 CLASSEXV.	904 Uvularia. * 4	45	CLASSE	XV.
905 Fittilaria, 444				5 S . S . S . S . S . S . S . S . S . S
906 Petilium. 444 Fritilla- Plantes à fleurs enveloppées par-	900 Petilium.		Plantes à fleurs enve	loppées par-
faites apétales.	now Everthuewinen * /		faites apétal	os.
gey Erythromum. 447				
908 Leucoium. * 434 A Trois antheres. 909 Galanthus. * 433			A Trois unine	1634
911 Amaryllis. * 439 Deux styles.	A THE MAN		Deux styles	f.
are Allians *	A 111	ALC: NO.		
913 Aphyllanthes. * 441 956 Mollugo. * 114			o56 Mellugo *	TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE
	yay raphymanthes. 4		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	LT

B Quatre antheres.	G Douge antheres,	
Un style.	Un style.	
957 Parietania. * 1259	1001 Asarum. * 6/2	
958 Alchimilla. 177 Alche-		
milla.	H Plusieurs antheres.	
960 Camphorata. 176 Camphorosma.	Un style.	
of Dantia. 16/ Isnardia.	1009 Hypocistis. 1115 Cytinus.	
963 Æleagnus. * 168	Quatre styles.	
C Cinq antheres.	1014 Tetragonia. * 683	
Un style.	Cinq styles.	
967 Thesium. * 315	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
968 Kali. 339 Salsola. 313	1016 Aizoon. * 685	
Deux styles.	Plusieurs styles.	
971 Atriplex. * 1260	1018 Calycanthus. * 695	
orz Chenopodium. * 337	1019 Arum. * 1119 1020 Calla. * 1121	
973 Herniaria. * 336	TO A SECURE OF THE PARTY OF THE	
974 Beta. * 338 976 Ulmus. * 345	Graminées.	
978 Celtis. * 1267	A Deux antheres.	
D Six antheres.	Deux styles.	
Un style.	1023 Anthoxanthum. * 46	
983 Acorus. * 468	B Trois antheres.	
984 Ceratonia. * 1282	Un style.	
Deux styles.	1025 Nardus. * 75	
985 Rumex. * 485	Control of the Contro	
986 Juneus. * 471	Deux styles.	
E Huit antheres.	1026 Cornucopiæ. * 78	
Un style.	1027 Bobartia. * 77	
991 Passerina. * 530	1028 Saccharum. * 79 1030 Phalaris. * 80	
992 Stellera. * 529	1031 Phleum. * 83.	
Deux styles.	1032 Alopecurus. * 84	
993 Chrysosplenium, * 607	1033 Panicum. * 82 1034 Milium. * 85	
	1035 Agrostis. * 86	
Trois styles.	1036 Lagurus. 5 98	
995 Polygonum. * 537 Polygo-	1 1 1	
996 Fagopyrum. 537 Polygo- num.	pogon.	
F Dix antheres.	1039 Melica. * 88	
Deux styles.	1040 Dactylis. * 92 1041 Aira. * 87	
999 Scleranthus. * 611	1042 Secale. * 103	
add octormination		

(7	1)
	1077 Bryonia. * 1104
1044 Hordeum. * 104	1078 Sicyos. * 1105
1045 Arundo. * 99	1079 Ambrosia. * 1153
xo46 Avena. * 97	1080 Xanthium. * 1152
1047 Bromus. * 95	B Trois pétales.
1046 Avena. * 97 1047 Bromus. * 95 1048 Poa. * 89 1050 Cynosurus. * 93	1082 Sagittaria. * 1164
1051 Achyrodes. 93 Cynosu-	The state of the s
rus.	C Cinq pétales.
1052 Festuca. * 94	1086 Croton. * 1181
1053 Lolium. * 101	E Apétales.
1054 Briza. * 90	
1055 Elymus. * 102	1093 Ficus * 1283
C Six antheres.	1095 Carex. * 1137
White the San Control of the Control	1007 Tripsacum. * 1134 1000 Mays. 1133 Zea.
Deux styles.	1099 Mays. 1133 Zea. 1135
1057 Oryza. * 483	1101 Sparganium. * 1132
	1102 Typha. * 1131
Plantes analogues aux graminées.	1103 Urtica. * 1149
A Deux antheres.	1104 Cupressus. * 1177
1058 Mariscus. 71 Schænus.	1105 Thuya. * 1176
	1106 Viscum. * 1209
B Trois antheres.	1107 Alnus. * 1147 Betula:
Un style.	1108 Beluta. * 1147
	1109 Morus. * 1150 1110 Buxus. * 1148
1059 Cyperus. * 72 1060 Scirpus. * 73	1112 Amaranthus. * 1167
	111/4 Abies. 1175 Pinus.
1061 Linagrostis. 74 Eriopho-	1115 Pinus. * 1175
1062 Scheenus. * 71	1116 Myriophyllum. * 1163
1063 Cenchrus. * 1255	1117 Ceratophyllum.* 1162
1064 Lygeum. * # 76	1118 Theligonum. * 1166
Deux styles.	1120 Carpinus. * 1171
AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF	1121 Ouercus. * 1168
1065 Holcus. * 1252	1122 Corylus. * 1172 1123 Juglans. * 1169
1066 Audropogon. * 1251	1125 Fagus. * 1170
1067 Ægylops. * 1256	1126 Castanea. 1170 Fagus:
CLASSE XVI.	1127 Ricinus. * 1184
CLHOOL AVI.	1129 Acalypha. * 1180
Plantes à fleurs enveloppées rela-	1130 Platanus. * 1173
tives , monophytes.	1134 Zanichellia, * 1124
	CLASSE XVII.
A Monopétales.	OBIIOOB ALVA
1068 Najas. * 1198	Plantes a fleurs enveloppées rela-
1073 Momordica, * 1191	tives , diphytes.
1074 Elaterium. 1191 Momor-	A Monopétales.
dica.	THE RESERVE THE PARTY OF THE PARTY FOR A P
1075 Cucumis. * 1193	1135 Valisneria. * 1199
1076 Cucurbita, * 119a	1136 Ruseus. * 1246

. (7		
1140 Tamnus. 1224 Tamus.	1194 Lonchitis. * - 1294	
B Trois pétales	1195 Hemionitis. * 1293	
The state of the s	1196 Trichomanes. * 1298	
1141 Empetrum: * 1202	1197 Osmunda. * 1289	
1147 Hydrocharis. * 1231	1198 Onoclea. 1289 Osmunde	
C Quatre pétales.	1199 Ophioglossum. * 1288	
C Quatre Petates.	1200 Equisetum. * 1284	
1148 Fraxinus, * 1273	C Mousses.	
1150 Gledistchia. * 1272	2/10/13523	
D Cinq pétales.	1201 Conferva. * 1323	
	1202 Tremella. * 1320	
1154 Coriaria. * 1235	1205 Lichenoides. 1319 Lichen:	
E Six pétales.	1207 Lycopodium. * 1302	
and the same of th	1209 Lycopodioides. 1302 Lycopo-	
1156 Smilax: * 1225	diuni:	
F Apétales.	1211 Mnium, * 1310	
The state of the s	1212 Sphagnum. * 1304 1213 Fontinalis. * 1306	
1158 Salix. * 1201	1213 Fontinalis. * 1306 1214 Hypnum, * 1312	
1159 Juniperus. * 1240	1215 Bryum. * 1311	
\$160 Osyris. * 1203	1216 Polytrichum. * 1309	
1161 Hippophae. * 1210	1217 Splachnum. * 1308	
1163 Myrica. * 1211	1218 Anthoceros. * 1318	
1164 Lupulus. * 1221 1166 Cannabis. * 1220	(219 Jungermania. * 1313	
1166 Cannabis. * 1220 1167 Datisca. * 1237	1220 Marchantia. * 1315	
1169 Lentiscus. 1212 Pistacia.	1221 Targionia * 1314	
1172 Spinacia. * 1218	1222 Riccia. * 1317	
1174 Ephedra. * / 1242	D.Cl.	
1175 Populus. * 1228	D Champignons.	
1177 Mercurialis. * 1230	1123 Ammanita. 1325 Agaricus	
1180 Taxus. * 1241	1224 Boletus. * 1326	
0 1 1 0 0 0 11 11 11 1	1225 Hydna. 1327 Hydnum.	
CLASSE XVIII.	1227 Phallus. * 1328	
District Court and	1228 Clathrus. * 1329	
Plantes à fleurs nues.	1229 Stemonitis. 1329 Clarhrus.	
A Nues:	1230 Elvela. 1330 Helvella;	
The state of the s	1231 Peziza. * 1331	
1181 Salicornia. * 10	1232 Lycoperdon. * 1333	
1182 Limnopeuce. 11 Hippuris	1233 Tuber. 1333 Lycoper-	
1183 Chara. * 1127	don:	
1185 Ornus. 1273 Frax hus	1234 Clavaria. * 1332 1236 Mucor. * 1334	
1187 Ruppia. * 187	1236 Mucor. * 1334 1237 Byssus. * 1324	
B Fougeres.	120/ 13/3543.	
E Plantes douteuses.		
1188 Acrosticum, * 1290	ro28 I onticula	
1189 Asplenium. * 1295	1238 Lenticula 1130 Lemna.	
1180 Polypodium. * 1296	1239 Calamaria. 1201 Isoetes. 1241 Pilularia. * 1300	
1192 Adianthum. * 1297 1193 Pteris. * 1291	1242 Marsilea. * 1299	
1.90 1 10110,		
the second secon		

## TABLEAU

## DES ORDRES NATURELS DE LINNÉ.

### Observations sur les Ordres naturels.

r. A U commencement des choses, le Créateur de l'univers a formé le végétal de deux substances, l'une médullaire, l'autre corticale. En modifiant ces deux principes, il en est résulté autant de modules primitifs, que nous trouvons d'ordres naturels.

2. Le Tout-Puissant mélangeant entr'eux ces modules primitifs, il en est résulté autant de genres dans les ordres, que nous voyons de structures particulieres dans les organes de la fructification

3. La nature influant sur ces genres, il en est résulté autant d'especes qu'il en existe aujourd'hui.

4. Les accidents influant sur ces especes, il en résulte autant de variétés qu'on en peut observer aujourd'hui.

5. Ces quatre assertions sont établies par la loi générale du Créateur qui procede toujours du simple au composé.

Par la loi de la nature dans la génération des

hybrides.

Par les observations de l'homme, qui a vérifié les phénomenes.

6. Le botaniste observera autant qu'il lui sera

possible les loix suivantes.

Que l'éleve ramene les variétés aux especes; puisque la connoissance des especes est le fondement de toute connoissance réelle.

Que le botaniste ramene les especes aux genres,

pour pouvoir saisir leur rapport mutuel.

Que le botaniste exercé, tente de ramener les genres aux ordres naturels qui constituent le complément de la science des végétaux.

k

(74)

Mais, il est difficile d'établir ces ordres, vu que plusieurs genres sont encore inconnus.

Par exemple, qu'est-ce qui peut lier le Tamus et

le Cactus, si ce n'est la Reaumuria?

Qu'est-ce qui peut rapprocher l'Acta et le Paonia,

si ce n'est le Cimifuga?

9. Le grand nombre des genres est un fardeau pour la mémoire qu'il faut alléger par le secours d'une méthode bien coordonnée.

Par la force de cette méthode on peut parvenir à

connoître sans professeur la plante à déterminer.

Les ordres naturels ne sauroient constituer un systême

sans le secours d'une clef.

La méthode artificielle est seule bonne pour le diagnostique des plantes, puisque la clef de la méthode naturelle est en quelque sorte impossible.

10. Les ordres naturels sont très-utiles pour con-

noître les propriétés des plantes.

Mais les méthodes artificielles sont plus avanta-

geuses pour déterminer les plantes.

11. Que celui qui trace le plan des genres naturels, saisisse autant qu'il pourra ceux qui étant liés entre

eux, peuvent constituer des genres naturels.

Les botanistes qui croient avoir trouvé la méthode naturelle, n'en connoissant encore que quelques fragmens, et qui rejettent l'artificielle, peuvent être comparés à ces architectes, qui, ayant rasé une maison commode et surmontée de son toît, la remplacent par une autre plus magnifique, mais qu'ils ne peuvent jamais couvrir.

ies phénomenes.

6. Le betaviers observers autant qu'il lui sera possible les lois suivades. Le varietés aux especes de puisque le consonsance les varietés aux especes de puisque le consonsance des especes est le fondement

pure counci and l'alle de capetes est le longemen

pour pouvour suisir leur rappour munch.

Out le horaniste el free, rente de ramener les genres aux onires numeris qui duras ment le complément de

la science des Végotstinasses

## ÉNUMÉRATION

#### DES ORDRES NATURELS.

I. Palmiers.

2. Poivrées.

3. Chaumes.

4. Graminées.

5. Tripétaloïdes.

6. Gladiées.

7. Orchidées.

8. Scitaminées.

9. Spathacées.

10. Coronaires.

11. Sarmentacées.

12. Oléracées.

13. Succulentes.

14. A bec de grue.

15. Inondées.

16. Calyciflores.

17. Calycanthemes.

18. Bicornes.

19. Hespérides.

20. Rotacées.

21. Primevéres.

22. Caryophyliees.

23. Tribilées.

24. Corydales.

25. Putaminées.

26. Multisiliqueuses,

27. Papavérines.

28. Suspectes.

29. Campanulées.

30. Tordues.

31. Buissonieres.

32. Papillonacées.

33. Lomentacées.

34. Cucurbitacées.

35. Quintefeuilles.

36. Pomacées.

37. Columniferes.

38. Tricoques.

39. Siliqueuses.

40. Personnées.

41. Aspérifeuilles.

42. Verticillées.

43. Les Buissons.

44. Les Haies.

45. Ombelliferes.

46. Hédéracées.

47. Etoilées.

48. Aggrégées.

49. Composées.

50. Amentacées.

51. Coniferes.

52. Les réunies.

53. Rudes au toucher.

54. Mêlangées.

55. Fougéres.

56. Mousses.

57. Algues.

58. Champignons.

## SOUS-DIVISION

### DES ORDRES NATURELS.

Application of the second of t	Marie Williams World	
I. Palmæ. Palmiers.	Lolium.	ioi
	Anthoxantum	. 46
aPhœnix. 133		92
Chamærops. 133		1255
b Stratiotes. 74		93
Hydrocharis. 123		1251
Vallisneria.		79
2501100101	Arundo.	99
II. Piperita. Poivrées.	Lagurus.	98
Pursonvilles on activacers of	Stipa.	96
Arum.		
Calla.		97 95
	8 Festuca.	94
day linkranary and	Poa.	89
III. Calamaria. Chaumes.		90
The state of the s	Holcus.	1252
Sparganium. 113		88
Typha.		87
	4 Phalaris.	80
	3 Panicum.	. 82
Carex.		85
	2 Agrostis.	86
	Phleum.	83
	Alopecurus:	84
IV. Gramina. Graminées		To form one
Les remière	V. Tripétaloïdes.	Tripétales.
Coix.		24. Confedal
Zea.		441
Ægilops, 12		471
Ischæmum. 12		488
	5 Scheuchzeria.	487
	3 Butomus.	500
	Alisma.	495
	Sagittaria,	1164

4	77	,	
Myriophyllon, 116	11	Aloë.	464
VI. Ensatæ. Gladiées.		Yucca.	463
THE PARTY OF THE P		Agave.	465
Crocus.	ir	Bromelia.	427
	2	Hemerocallis.	467
Gladiolus. 6	3	Anthericum.	455
Iris. 6	5	Veratrum.	1249
Tradescantia. 43	io	Fritillaria.	444
Courtison sires.		Lilium.	443
VII. Orchideæ. Orchi-		Tulipa.	448
dées.	8		25
X ver Californian Co.	1000	II. Sarmentaceæ. Sarn	nen-
Orchis.		tacées.	
Satyrium. 109		T mummer of	11-
Serapias. 100		Erythronium.	447
Ophrys.		Uvularia.	445
Cypripedium. 110	00	Convallaria. Ruscus.	1246
VIII. Scitamineæ. Scitami-			457
nées, ou aromates.		Asparagus. Paris.	542
nees, ou aromates.	6	Smilax.	1225
Canna.	1	Tamus.	1224
Transenia.		Aristolochia.	IIII
IX Spathaceæ. Spathacees	000	Asarum.	642
ou à calice en spathe.	,	Cytinus.	1115
		and the same of the party	nine.
Allium. 44	42 1	KII. Holeracea. Holer	racées
		ou potageres.	100
Narcissus. 43		67080	118
Galanthus. 43	33 0	Blitum.	TE
	34	Spinacia.	1218
	40		1260
Colchicum. 49	)2	Chenopodium.	337
auturient .		Beta.	338
X. Coronaria. Coronaires	,	Salsola.	539
ou pl. à couronne.		Salicornia.	10
Dell's al		Basella.	413
		Rivina.	174
		Petiveria.	494
		Callitriche.	13
A CONTRACT OF THE PARTY OF THE		Illecebrum.	313
Hyacinthus, 46	, Ic	Herniaria.	336

	(78	3)	
Polycnemum.	59	Myriophyllum.	1163
Camphorosma.	176	Ceratophyllum.	1162
Rumex.	485	Elatine.	544
Rheum.	549	Hippuris.	II
Polygonum.	537	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
c Laurus.	545	XVI. Calyciflores.	Calyci-
Tinus.	547	flores, ou à cal	ice for-
*****		mant la fleur.	
XIII. Succulentæ. Suc		A STATE OF THE PARTY OF T	NELL .
tes, ou plantes gras	ses.	Osyris.	1203
	CCO	Hippophaë.	1210
a Cactus.	668		
Mesembryanthemu		XVII. Calycanthem	c. Ca-
Tamarix.	405	lycanthémes, à	germe
b Sempervivum.	667	au-dessous du ca	llice.
Sedum.	629	T 17 7 .	do Gr
Rhodiola.	1229	Epilobium.	507
Tillaea.	189	Enothera.	505
Crassula.	423	CONTRACTOR OF THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY	306
Cotyledon.	628	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	164
Portulaca.	659	Glaux.	314
c Adoxa.	543	Peplis.	482
Chrysosplenium.	603	Frankenia.	481
Saxifraga.	000	Lythrum.	660
XIV. Gruinales. A	Fruit 7	XVIII. Bicornes. Bic	ornes
alongé, ou à becde g		u à antheres à deux	
atonge, ou a becaes	ac. o	a a antheres a deax	COTHCO.
Linum, 3001 40	419	Ledum.	591
Drosera.	421	Azalea.	226
Oxalis.	634	Rhododendron.	592
Geranium.	897	Andromeda.	593
Zygophyllum.	577	Pyrola.	598
Tribulus.	580	Erica.	524
Fagonia.	579	Arbutus.	596
nig and		Vaccinium.	523
XV. Inundatæ. Les inc	ndées	Citrus.	974
ou aquatiques.		IV Hammila Too	
TV a real party		IX. Hesperidæ. Les	
Zannichellia.	1124	ides, ou arbres d'agi	
Ruppia.	187	Myrtus.	672
Potamogeton.	186	Philadelphus.	669.

	(7	9)	
inva.		Cerastium.	637
XX. Rotacea. Rotacées	s, ou	Arenaria.	618
à corolle en roue.	Maria.	Stellaria.	617
minim.		Alsine.	411
Trientalis.	496	Holosteum.	IIO
Centunculus.	151	Cherleria.	619
Anagallis.	220	Sagina.	188
Lysimachia.	219	The state of the s	536
Gentiana.	352	Bufonia.	180
Chlora.	519	b Pharnaceum.	410
Swertia.	351	Polycarpon.	112
Hypericum.	981	Minuartia.	114
Cistus.	728	Queria.	115
reuma.	(A)	Ortegia.	57
XXI. Precia. Primeve	res.	Læflingia.	58
ione.		c Scleranthus.	611
Primula.	210	borus. Curous	att-da
Androsace.	209	XXIII. Trihilata. I	ruits à
Diapensia.	207	trois taches, ou a troi	sailes.
Aretia.	208	SULUS.	DANA
Dodecatheon.	213	a Malpighia.	621
Cortusa.	.211	Acer.	1266
Soldanella.	212	Æsculus.	498
Cyclamen.	214	b Staphylea.	404
aLimosella.		Tropæolum.	502
b Menyanthes.	215		
Hottonia.	216	XXIV. Corydales. C	orolles
Samolus.	238	irrégulieres, fru	
pena.	F.J.G.	liques.	The second second
XXII. Caryophyllea. C	aryo-	menc.	STAR -
phyllées, ou plantes		Epimedium.	154
logues aux œillets.		Hypecoum.	183
card	ES.	Fumaria.	920
Dianthus.	614	Impatiens.	1093
Saponaria.	613	Utricularia, 099	34
Gypsophila.	612	Pinguicula.	33
Velezia.	350	2	izleD -
Silene.	616	XXV. Putaminea. I	fruit
Cucubalus.	615		By CL
Lychnis.	636		DUE
a Agrostema.	635	Cleome.	890
Spergula!	638		699

	(8		
Military		Datura.	263
XXVI. Multisiliqua.	Mul-	Physalis.	267
tisiliqueuses, ou fr	uits à	Capsicum.	209
plusieurs siliques.		Solanum.	268
CM musico	John L	Lycium.	273
&Pœonia.	732	19.1	Teo 3
Aquilegia.		XXIX. Campanacea.	Cam-
Aconitum.	737	panulées.	in with
Delphinium.	736	SEE	The little
& Dictammus.	564	Convolvulus.	231
Ruta.	565	Ipomæa.	232
Peganum.	656	Polemonium.	233
c Nigella.	742	Campanula.	234
Garidella!	620	Phyteuma.	236
asopyrum.	759		237
Trollius.	758		1090
Helleborus.	760		1091
Caltha.	761	Viola.	1092
Ranunculus.	757	noting the same	asit.
Myosurus.	426		orolles.
Adonis.	756	tordues.	Bott .
Anemone.	752	UC. Token	Control
Atragene.	753	Vinca.	322
Clematis.	754		323
Thalictrum.	755	Periploca.	330
		Apocinum.	332
XXVII. Rhaadea. Pap		Cynanchum.	331
rines, ou les pavot	S.	Asclepias.	333
The 1850		Stapelia.	334
Argemone.	705	XXXI. Veprecula. L	es buis
Chelidonium.	703	sonieres.	land
Papaver.	704	Danhas cellists and 20	526
PATHIN T. II. I.		Daphne.	530
XXVIII. Luridæ. les	sus-	Passerina. Stellera.	529
pectes.		Thesium.	315
Calculate valopius	815	and the second second	124
Celsia.	262	XXXII. Papillonacea	Pa-
Verbascum.	816	pillonacées.	10150
Digitalis.	265	Medicago.	971
Nicotiana.	266	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	970
Atropa.	264	Trifolium	968
Hyoscyamus.	20.10	in in it	Lotus.

	(8)	()	7.7
Lotus.	969	XXXIV. Cucurbitacea	Co
Anthyllis.	936	curbitacées.	·Cu·
Ononis.	935	curbitacces.	
Delichos.	941	Sicyos.	1195
Phaseolus.	940	Melothria.	55
Pisum.	944	Bryonia.	1194
Lathyrus.	946	Cucurbita.	1192
Orobus.	945	Cucumis.	1193
Vicia,	947	Momordica.	1191
Ervum.	948	Passiflora.	IIIO
Cicer.	949	XXXV. Senticosæ.	Too
Coronilla.	956		Les
Ornithopus.	957	Quinte-feuilles.	To and
Hippocrepis.	958	Alchemilla.	177
Scorpiurus.	959	Aphanes.	178
Bisserula.	966	Agrimonia.	663
Astragalus.	965	Dryas.	693
Phaca.	964	Geum.	692
Glycyrrhiza.	955	Sibbaldia.	425
Hedysarum.	961	Tormentilla.	691
Galega.	963	Potentilla.	690
Lupinus.	939		694
Psoralea.	967	Fragaria.	689
Colutea.	954	Rubus.	688
Cytisus.	951	Rosa.	687
Ulex.	932	VVVVI Damana D	
Spartium.	929	XXXVI. Pomacea. Po	oma-
Genista.	930	cées, ou fruits à pom	me.
Robinia.	953	Spiræa.	86
Anagyris.	552	Ribes.	311
Amorpha.		Sorbus.	679
19 100	Part !	Cratægus.	678
XXXIII. Lomentacea	. Lo-	Mespilus.	68r
mentacées, ou fa	usses	Pyrus.	682
légumineuses.		a Punica.	673
and the last of th		Prunus.	676
Polygala.	921	Amygdalus.	675
Cercis.	553		
Ceratonia.	1282	XXXVII. Columnifera	. Co.
Mimosa.	1271	lumniferes ou malvac	ees.
Gleditschia.	1272	Malva.	906
Cassia.	557	Alcea.	905

L

	18	2)	
Althæa.	904		882
Lavatera.	907	C1 1 1	879
Malope.	908		881
Melochia.	894		878
Sida.	902		877
Gossipium.	910		875
Hibiscus.	911		876
Cerchorus.	730	Crambe.	889
Ayenia.	1108	Isatis.	888
Tilia.	717	XL. Personata. Perso	nnées
XXXVIII. Tricocca.	Fruits	ou corolles en masq	
à trois coques,		Chelone.	806
Euphorbia.	665		808
Croton.	1181	Lindernia.	828
Ricinus.	The second second	Bartsia.	797
Mercurialis.	1230		798
Cneorum.	52	Pedicularis.	804
Buxus.	1148		799
V. STANDARD CO. AND DESCRIPTION OF THE PARTY	St. Control	Melampyrum.	800
XXXIX. Siliquosa.		Lathræa.	801
queuses, ou crucife	res.	Orobanche.	841
Draba.	864	Martynia.	811
Subularia,	863	Scrophularia.	814
Lepidium.	865	The state of the s	847
Peltaria.	871	Justicia.	28
Clypeola.	870	Bignonia.	817
Alyssum.	869	Vitex.	853
Iberis.	868	Capraria.	827
· Cochlearia.	867		30
Thlaspi.	866		149
Biscutella.	872	Veronica.	26
Lunaria.	873	Verbena.	35
Ricotia.	874	Tozzia.	803
Anastatica.	862		832
Vella.	861		824
Myagrum.	860	Acanthus.	857
Bunias.	887	XII. Asperifolia. Asp	éri-
Raphanus.	886	feuilles ou borraginé	
Sinapis.	885	and the second s	The same
Brassica.	884	Symphytum.	197
Turritis.	883	Onosma.	199

	(8	3)	
Cerinthe.	198		776
	200		777
Borrago.		Ballota.	778
	202	4	779
Lycopsis.	201		786
Asperugo. Pulmonaria.	196		78E
	193		782
Lithospermum.	195		793
Cynoglossum. Anchusa.	194		792
Myosotis.	192		795
Heliotropium.	191	Z THOILING	
a Nolana.		XLIII. Dumosæ. L	es Buis-
arvolana.	200	sons.	ab as elad;
XLII. Verticillatæ. Ve	rti-	The second of th	
cillées ou labiées.		Rhamnus.	284
Chices ou lunives.		Ilex.	184
Ziziphora,	36	Evonymus.	291
Thymus.		Viburnum.	400
Satnreja.		aSambucus.	402
Thymbra.		b Rhus.	399
Melissa.	786	and the state of the	23.
Clinopodium.		XLIV. Sepiaria. Le	Haies.
Origanum.	784		1 2
Hissopus.	767	Jasminum.	A17
Lavandula.	769		18
Salvia.	42		119
Rosmarinus.	41		20
Ocymum.	790		1273
Mentha.		Syringa,	22
Nepeta.	768		
Dracocephalum.		XLV. Umbellatæ. C	mbel-
Glechoma.	773		
Sideritis.	770		sarate A
Lycopus.	36-	Eryngium.	354
Amethystea.	34	Hydrocotyle.	355
Teucrium.	764	Sanicula.	356
Ajuga.		Astrantia.	357
Horminum.	- 00		359
Melittis.	789	Tordylium.	36 E
Monarda.	37	Daucus.	364
Lamium.	774	Artedia.	363
Calcopsis.	775	Caucalis.	362
	1		

	(84	)	
Cachrys.	372	in the same of	
Laserpitium.	374	XLVII. Stellatæ.	Etoilées.
Ferula.	373	ou rubiacé	
Ligusticum.	376		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Angelica.	377	Crucianella.	133
Imperatoria.	389	Sherardia.	127
Heracleum.	375	Asperula.	128
Pastinaca.	392		132
Thapsia.		Valantia.	1258
Smyrnium.		Rubia.	134
Ægopodium.	398		222
Ammi.	365		247
Bubon.	380	Cornus.	155
Phellandrium:	383	essicultana Versia	T. Haller
Sison.	379	XLVIII. Aggreg	atæ. Ag-
Sium.	378	grégées.	
Enanthe.	382		
Coriandrum.		aStatice.	418
Æthusa.		Globularia.	118
Cicuta.		Dispacus.	120
Scandix.		Scabiosa.	121
Chærophyllum.		Knautia.	122
Seseli.		b Valeriana.	48
Anethum.		Boerhaavia.	
Carum.		Circæa.	9 25
Pimpinella.		Lonicera.	250
Apium.	397		835
Cuminum.	381	Loranthus.	478
Crithmum.	371	Viscum.	1209
Bunium.	366		2 52 FF 1/5
Conium.	367	XLIX. Composita	. Compo-
Selinum.	368	sées.	Singling
Athamantha.	369	a En têt	e.
Peucedanum.	370		1084
Buplevrum.	358		1002
	Tables 1	Serratula.	1003
XLVI Hederacea.	Hedéra-	Carduus.	1004
cées, ou grimp		Cnicus.	1005
, on 8. m.F	WEND FITTE	Onopordum.	1006
Hedera.	304	Cynara.	1007
Vitis.	305	Carlina.	1008
	KONTO.	Atractylis,	1009

Carthamus.         1010         Arnica.         1038           Centaurea.         1066         Senecio.         1033           b Semi flosculeuses.         Chrysocomai.         1019           Aster.         1034           Scolymus.         1001         Santolina.         1022           Cichorium.         1000         Anthemis.         1052           Catananche.         999         Anacyclus.         1051           Lapsana.         998         Cotula.         1050           Hypochæris.         997         Athanasia.         1023           Seriola.         996         Achillea.         1053           Hypochæris.         997         Athanasia.         1023           Seriola.         996         Achillea.         1053           Hypochæris.         995         Cacadlia.         1013           Hypochæris.         995         Cacalia.         1013           Hypochæris.         995         Cacalia.         1013           Hypochæris.         995         Ageratum.         1016           Helenium.         1016         Helenium.         1041           Picranthes.         990         Othonna.         1076 <th></th> <th>( 85</th> <th>)</th> <th></th>		( 85	)	
Centaurea.         1066         Senecio.         1033           b Semi flosculeuses.         Chrysocomai         1019           Scolymus.         1001         Santolina.         1022           Cichorium.         1000         Anthemis.         1052           Catananche.         999         Anacyclus.         1051           Lapsana.         998         Cotula.         1050           Hypochæris.         997         Athanasia.         1023           Seriola.         996         Achillea.         1053           Hyoseris.         995         Cacalia.         1013           Andryala.         994         Bellis.         1042           Crepis.         993         Ageratum.         1016           Hieracium.         992         Eupatorium.         1016           Helenium.         1041         1041           Prenanthes.         990         Othonna.         1076           Chrondrilla.         989         Calendula.         1073           Lactuca.         988         Arctotis.         1074           Sonchus.         987         Picris.         986         E A feuilles opposées.           Scotzonera.         985	Carthamus.			1038
Solidago		1066	Senecio.	1033
Aster.   1034	100 Linkship at		Solidago:	1035
Aster.   1034	b Semi flosculeuse	5.	Chrysocomai	1019
Cichorium.         1000         Anthemis.         1052           Catananche.         999         Anacyclus.         1051           Lapsana.         998         Cotula.         1050           Hypochæris.         997         Athanasia.         1023           Seriola.         996         Achillea.         1053           Hyoseris.         995         Cacalia.         1013           Andryala.         994         Bellis.         1042           Crepis.         993         Ageratum.         1016           Hieracium.         992         Eupatorium.         1015           Leontodon.         991         Helenium.         1041           Prenanthes.         990         Othonna.         1076           Chrondrilla.         989         Calendula.         1073           Lactuca.         988         Arctotis.         1074           Socizonera.         985         Bidens.         1012           Geropogon.         984         Bidens.         1058           Sigesbeckia.         1058         Sigesbeckia.         1056           Kendbeckia.         1061         Buphthalmum.         1059           Keachelina.         101	XI .enim	Contract of		1034
Cichorium.         1000         Anthemis.         1052           Catananche.         999         Anacyclus.         1051           Lapsana.         998         Cotula.         1050           Hypochæris.         997         Athanasia.         1023           Seriola.         996         Achillea.         1053           Hyoseris.         995         Cacalia.         1013           Andryala.         994         Bellis.         1042           Crepis.         993         Ageratum.         1016           Hieracium.         992         Eupatorium.         1015           Leontodon.         991         Helenium.         1041           Prenanthes.         990         Othonna.         1076           Chrondrilla.         989         Calendula.         1073           Lactuca.         988         Arctotis.         1074           Sonchus.         987         Bidens.         1012           Greopogon.         984         Bidens.         1012           Geropogon.         984         Bidens.         1058           Sigesbeckia.         1058         Sigesbeckia.         1057           Endagram.         1024	Scolymus.	1001	Santolina.	1022
Catananche.         999         Anacyclus.         1051           Lapsana.         998         Cotula.         1050           Hypochæris.         997         Athanasia.         1023           Seriola.         996         Achillea.         1053           Hyoseris.         995         Cacalia.         1013           Andryala.         994         Bellis.         1042           Crepis.         993         Ageratum.         1016           Hieracium.         1992         Eupatorium.         1015           Leontodon.         991         Helenium.         1041           Prenanthes.         990         Othonna.         1076           Chrondrilla.         989         Calendula.         1073           Lactuca.         988         Arctotis.         1074           Sonchus.         987         e A feuilles opposées.           Picris.         986         e A feuilles opposées.           Scorzonera.         985         Verbesina.         1058           Grapopogon.         984         Bidens.         1012           Geropogon.         984         Bidens.         1057           Coreopsis.         1062         Rudbeckia. <td>Cichorium.</td> <td>1000</td> <td>Anthemis.</td> <td>1052</td>	Cichorium.	1000	Anthemis.	1052
Lapsana.       998       Cotula.       1050         Hypochæris.       997       Athanasia.       1023         Seriola.       996       Achillea.       1053         Hyoseris.       995       Cacalia.       1013         Andryala.       994       Bellis.       1042         Crepis.       993       Ageratum.       1016         Hieracium.       1992       Eupatorium.       1015         Leontodon.       991       Helenium.       1041         Prenanthes.       990       Othonna.       1076         Chrondrilla.       989       Calendula.       1073         Lactuca.       988       Arctotis.       1074         Sonchus.       987       e A feuilles opposées.         Scorzonera.       985       Verbesina.       1012         Gropogon.       984       Bidens.       1012         Geropogon.       984       Bidens.       1012         Groeopsis.       1062       Rudbeckia.       1061         Buphthalmum.       1059         Kzehelina.       1018       Amellus.       1055         Tanacetum.       1024       Cotoneuses ou soyeuses.         Carpesium		999		1051
Hypochæris.   997	Lapsana.			1050
Seriola.         996         Achillea.         1053           Hyoseris.         995         Cacalia.         1013           Andryala.         994         Bellis.         1042           Crepis.         993         Ageratum.         1016           Hieracium.         992         Eupatorium.         1015           Leontodon.         991         Helenium.         1041           Prenanthes.         990         Othonna.         1076           Chrondrilla.         988         Arctotis.         1074           Sonchus.         987         Picris.         986         e A feuilles opposées.           Scorzonera.         985         e A feuilles opposées.           Scorzonera.         983         Verbesina.         1058           Sigesbeckia.         1058         Sigesbeckia.         1057           Coreopsis.         1062         Rudbeckia.         1061           Rudbeckia.         1061         Buphthalmum.         1059           Stæhelina.         1018         Amellus.         1055           Tanacetum.         1024         Amellus.         1055           Carpesium.         1028         Taconanthus.         1020			Athanasia:	1023
Hyoseris.         995         Cacalia.         1013           Andryala.         994         Bellis.         1042           Crepis.         993         Ageratum.         1016           Hieracium.         992         Eupatorium.         1015           Leontodon.         991         Helenium.         1041           Prenanthes.         990         Othonna.         1076           Chrondrilla.         989         Calendula.         1073           Lactuca.         988         Arctotis.         1074           Sonchus.         987         Picris.         986         e A feuilles opposées.           Scorzonera.         985         Bidens.         1012           Grapogogon.         984         Bidens.         1012           Geropogon.         983         Verbesina.         1058           Sigesbeckia.         1057         Coreopsis.         1062           Rudbeckia.         1061         Buphthalmum.         1059           Keranthemum.         1024         Tagetes.         1044           Xeranthemum.         1024         Amellus.         1055           Tanacetum.         1024         Coreopsis.         1046		996	Achillea.	1053
Andry ala. 994 Bellis. 1042 Crepis. 993 Ageratum. 1016 Hieracium. 992 Eupatorium. 1015 Leontodon. 991 Helenium. 1041 Prenanthes. 990 Othonna. 1076 Chrondrilla. 989 Calendula. 1073 Lactuca. 988 Arctotis. 1074 Sonchus. 987 Picris. 986 e A feuilles opposées. Scorzonera. 985 Tragopogon. 984 Bidens. 1012 Geropogon. 984 Bidens. 1058 Sigesbeckia. 1057 c Discoïdes, ou en Coreopsis. 1062 Rudbeckia. 1061 Buphthalmum. 1059 Gnaphalium. 1026 Tagetes. 1044 Xeranthemum. 1027 Zinnia. 1046 Stæhelina. 1018 Amellus. 1055 Tanacetum. 1024 Matricaria. 1049 f Cotoneuses ou soyeuses. Carpesium. 1028 Chrysanthemum. 1048 Stoehe. 1086 Baccharis. 1029 Tarconanthus. 1020 Conyza. 1030 Artemisia. 1023 Inula. 1037 Seriphium. 1087 Erigeron. 1031 Eriocephalus, 1078 Cineraria. 1036 Filago. 1079 Tussilago. 1032 Micropus. 1080	Hyoseris.	the same of the sa	Cacalia.	1013
Crepis.         993         Ageratum.         1016           Hieracium.         992         Eupatorium.         1015           Leontodon.         991         Helenium.         1041           Prenanthes.         990         Othonna.         1076           Chrondrilla.         989         Calendula.         1073           Lactuca.         988         Arctotis.         1074           Sonchus.         987         Picris.         986         e A feuilles opposées.           Scorzonera.         985         E A feuilles opposées.         1074           Scorzonera.         985         E A feuilles opposées.           Scorzonera.         985         E A feuilles opposées.           Scorzonera.         985         Verbesina.         1012           Geropogon.         984         Bidens.         1012           Scorzonera.         985         Verbesina.         1058           Sigesbeckia.         1057         1062           Rudbeckia.         1062         Rudbeckia.         1064           Rudbeckia.         1044         1044         1044           Stehelina.         1046         1046           Stapelina.         1046         1	Andryala.		Bellis.	1042
Hieracium.	Crepis.		Ageratum.	1016
Prenanthes.         990 Othonna.         1076           Chrondrilla.         989 Calendula.         1073           Lactuca.         988 Arctotis.         1074           Sonchus.         987         Picris.         986 e A feuilles opposées.           Scorzonera.         985         Fidens.         1012           Geropogon.         984 Bidens.         1058           Geropogon.         983 Verbesina.         1058           Sigesbeckia.         1057           E Discoïdes, ou disque.         en Coreopsis.         1062           Rudbeckia.         1061         Buphthalmum.         1059           Gnaphalium.         1026 Tagetes.         1044           Xeranthemum.         1027 Zinnia.         1046           Stæhelina.         1018 Amellus.         1055           Tanacetum.         1024         Matricaria.         1049 f Cotoneuses ou soyeuses.           Carpesium.         1028         Tarconanthus.         1020           Chrysanthemum.         1048 Stoebe.         1086           Baccharis.         1029 Tarconanthus.         1020           Conyza.         1030 Artemisia.         1023           Inula.         1031 Eriocephalus.         1079	Hieracium.			1015
Prenanthes.         990         Othonna.         1076           Chrondrilla.         989         Calendula.         1073           Lactuca.         988         Arctotis.         1074           Sonchus.         987         Picris.         986         e A feuilles opposées.           Scorzonera.         985         Fidens.         1012           Geropogon.         984         Bidens.         1058           Sigesbeckia.         1057         602           Rudbeckia.         1061         802           Rudbeckia.         1061         802           Rudbeckia.         1061         802           Rudbeckia.         1061         802           Rudbeckia.         1064         1046           Stæhelina.         1018         Amellus.         1055           Tanacetum.         1024         Matricaria.         1049         f Cotoneuses ou soyeuses.           Carpesium.         1028         Tarconanthus.         1020           Chrysanthemum.         1048         Stoebe.         1086           Baccharis.         1029         Tarconanthus.         1020           Conyza.         1030         Artemisia.         1023 <t< td=""><td>Leontodon.</td><td></td><td>Helenium.</td><td>1041</td></t<>	Leontodon.		Helenium.	1041
Lactuca.         988         Arctotis.         1074           Sonchus.         987         Picris.         986         e A feuilles opposées.           Scorzonera.         985         ragopogon.         984         Bidens.         1012           Geropogon.         983         Verbesina.         1058           Sigesbeckia.         1057         Sigesbeckia.         1062           Rudbeckia.         1061         Buphthalmum.         1059           Gnaphalium.         1026         Tagetes.         1044           Xeranthemum.         1027         Zinnia.         1046           Stæhelina.         1018         Amellus.         1055           Tanacetum.         1024         Matricaria.         1049         f Cotoneuses ou soyeuses.           Carpesium.         1028         Chrysanthemum.         1048         Stoebe.         1086           Baccharis.         1029         Tarconanthus.         1020           Conyza.         1030         Artemisia.         1023           Inula.         1037         Seriphium.         1087           Erigeron.         1031         Eriocephalus.         1079           Tussilago.         1032         Micropus.	Prenanthes.		Othonna.	1076
Sonchus.         987         e         A feuilles opposées.           Scorzonera.         985         e         A feuilles opposées.           Scorzonera.         985         Io12           Tragopogon.         984         Bidens.         1058           Sigesbeckia.         1058         1057           E Discoïdes, ou en disque.         Coreopsis.         1062           Rudbeckia.         1061         Buphthalmum.         1059           Gnaphalium.         1026         Tagetes.         1044           Xeranthemum.         1027         Zinnia.         1046           Stæhelina.         1018         Amellus.         1055           Tanacetum.         1024         Matricaria.         1049         f Cotoneuses ou soyeuses.           Carpesium.         1028         Tarconanthus.         1020           Chrysanthemum.         1048         Stoebe.         1086           Baccharis.         1029         Tarconanthus.         1020           Conyza.         1030         Artemisia.         1023           Inula.         1037         Seriphium.         1087           Erigeron.         1031         Eriocephalus.         1079           Tussilag	Chrondrilla.		Calendula.	1073
Picris.         986         e A feuilles opposées.           Scorzonera.         985           Tragopogon.         984         Bidens.         1012           Geropogon.         983         Verbesina.         1058           Sigesbeckia.         1057         E           E Discoïdes, ou en Coreopsis.         1062         Rudbeckia.         1061           Buphthalmum.         1059         Buphthalmum.         1059           Gnaphalium.         1026         Tagetes.         1044           Xeranthemum.         1027         Zinnia.         1046           Stæhelina.         1018         Amellus.         1055           Tanacetum.         1024         Matricaria.         1049         f Cotoneuses ou soyeuses.           Carpesium.         1028         Stoebe.         1086           Baccharis.         1029         Tarconanthus.         1020           Conyza.         1030         Artemisia.         1023           Inula.         1037         Seriphium.         1087           Erigeron.         1031         Eriocephalus.         1078           Cineraria.         1032         Micropus.         1080	Lactuca.	988	Arctotis.	1074
Scorzonera.         985           Tragopogon.         984         Bidens.         1012           Geropogon.         983         Verbesina.         1058           Sigesbeckia.         1057         1062           e Discoïdes, ou en disque.         Coreopsis.         1062           Rudbeckia.         1061         Buphthalmum.         1059           Gnaphalium.         1026         Tagetes.         1044           Xeranthemum.         1027         Zinnia.         1046           Stæhelina.         1018         Amellus.         1055           Tanacetum.         1024         Matricaria.         1049         f Cotoneuses ou soyeuses.           Carpesium.         1028         Chrysanthemum.         1048         Stoebe.         1086           Baccharis.         1029         Tarconanthus.         1020           Conyza.         1030         Artemisia.         1023           Inula.         1037         Seriphium.         1087           Erigeron.         1031         Eriocephalus.         1078           Cineraria.         1032         Micropus.         1080	Sonchus.	987		204-1
Tragopogon. 984 Bidens. 1058 Geropogon. 983 Verbesina. 1058 Sigesbeckia. 1057 E Discoïdes, ou en Coreopsis. 1062 Rudbeckia. 1061 Buphthalmum. 1059 Gnaphalium. 1026 Tagetes. 1044 Xeranthemum. 1027 Zinnia. 1046 Stæhelina. 1018 Amellus. 1055 Tanacetum. 1024 Matricaria. 1049 f Cotoneuses ou soyeuses. Carpesium. 1028 Chrysanthemum. 1048 Stoebe. 1086 Baccharis. 1029 Tarconanthus. 1020 Conyza. 1030 Artemisia. 1023 Inula. 1037 Seriphium. 1087 Erigeron. 1031 Eriocephalus, 1078 Cineraria. 1036 Filago. 1079 Tussilago. 1032 Micropus. 1080	Picris.	986	e A feuilles oppos	ées.
Geropogon.  Geropo	Scorzonera.	985	tigits en cones.	HO
Sigesbeckia. 1057 Coreopsis. 1062 Rudbeckia. 1061 Buphthalmum. 1059 Gnaphalium. 1026 Tagetes. 1044 Xeranthemum. 1027 Zinnia. 1046 Stæhelina. 1018 Amellus. 1055 Tanacetum. 1024 Matricaria. 1049 f Cotoneuses ou soyeuses. Carpesium. 1028 Chrysanthemum. 1048 Stoebe. 1086 Baccharis. 1029 Tarconanthus. 1020 Conyza. 1030 Artemisia. 1023 Inula. 1037 Seriphium. 1087 Erigeron. 1031 Eriocephalus, 1078 Cineraria. 1036 Filago. 1079 Tussilago. 1032 Micropus. 1080	Tragopogon.	984	Bidens.	1013
Coreopsis.  Rudbeckia.  Rudbeckia.  Buphthalmum.  1059 Gnaphalium.  I026 Tagetes.  I044 Xeranthemum.  I027 Zinnia.  I046 Stæhelina.  I018 Amellus.  I055 Tanacetum.  I024 Matricaria.  I049 f Cotoneuses ou soyeuses.  Carpesium.  I028 Chrysanthemum.  I048 Stoebe.  I086 Baccharis.  I029 Tarconanthus.  I020 Conyza.  I030 Artemisia.  I023 Inula.  I037 Seriphium.  I048 Erigeron.  I031 Eriocephalus.  I078 Cineraria.  I036 Filago.  I039 Tussilago.  I032 Micropus.  I080	Geropogon.	983	Verbesina.	1058
Gnaphalium. 1026 Tagetes. 1044 Xeranthemum. 1027 Zinnia. 1046 Stæhelina. 1018 Amellus. 1055 Tanacetum. 1024 Matricaria. 1049 f Cotoneuses ou soyeuses. Carpesium. 1028 Chrysanthemum. 1048 Stoebe. 1086 Baccharis. 1029 Tarconanthus. 1020 Conyza. 1030 Artemisia. 1023 Inula. 1037 Seriphium. 1087 Erigeron. 1031 Eriocephalus. 1078 Cineraria. 1036 Filago. 1079 Tussilago. 1032 Micropus. 1080	" souther a vestification"	N. 2 + 1	Sigesbeckia.	1057
Gnaphalium. 1026 Tagetes. 1044 Xeranthemum. 1027 Zinnia. 1046 Stæhelina. 1018 Amellus. 1055 Tanacetum. 1024 Matricaria. 1049 f Cotoneuses ou soyeuses. Carpesium. 1028 Chrysanthemum. 1048 Stoebe. 1086 Baccharis. 1029 Tarconanthus. 1020 Conyza. 1030 Artemisia. 1023 Inula. 1037 Seriphium. 1087 Erigeron. 1031 Eriocephalus. 1078 Cineraria. 1036 Filago. 1079 Tussilago. 1032 Micropus. 1080	e Discoides, ou	en	Coreopsis.	1062
Gnaphalium. 1026 Tagetes. 1044 Xeranthemum. 1027 Zinnia. 1046 Stæhelina. 1018 Amellus. 1055 Tanacetum. 1024 Matricaria. 1049 f Cotoneuses ou soyeuses. Carpesium. 1028 Chrysanthemum. 1048 Stoebe. 1086 Baccharis. 1029 Tarconanthus. 1020 Conyza. 1030 Artemisia. 1023 Inula. 1037 Seriphium. 1087 Erigeron. 1031 Eriocephalus. 1078 Cineraria. 1036 Filago. 1079 Tussilago. 1032 Micropus. 1080	disque.	page		1061
Stæhelina. 1018 Amellus. 1055 Tanacetum. 1024 Matricaria. 1049 f Cotoneuses ou soyeuses. Carpesium. 1028 Chrysanthemum. 1048 Stoebe. 1086 Baccharis. 1029 Tarconanthus. 1020 Conyza. 1030 Artemisia. 1023 Inula. 1037 Seriphium. 1087 Erigeron. 1031 Eriocephalus. 1078 Cineraria. 1036 Filago. 1079 Tussilago. 1032 Micropus. 1080	.nonui		Buphthalmum.	1059
Stæhelina. 1018 Amellus. 1055 Tanacetum. 1024 Matricaria. 1049 f Cotoneuses ou soyeuses. Carpesium. 1028 Chrysanthemum. 1048 Stoebe. 1086 Baccharis. 1029 Tarconanthus. 1020 Conyza. 1030 Artemisia. 1023 Inula. 1037 Seriphium. 1087 Erigeron. 1031 Eriocephalus. 1078 Cineraria. 1036 Filago. 1079 Tussilago. 1032 Micropus. 1080		1026	Tagetes.	1044
Tanacetum.  Matricaria.  Carpesium.  Chrysanthemum.  Baccharis.  Conyza.  Io30  Inula.  Io37  Erigeron.  Cineraria.  Io36  Filago.  Tussilago.  Io49  f Cotoneuses ou soyeuses.  Io48  Stoebe.  Io86  Io86  Io86  Io87  Farconanthus.  Io23  Io87  Erigeron.  Io31  Eriocephalus.  Io78  Io79  Tussilago.  Io32  Micropus.		1027	Zinnia.	
Matricaria. 1049 f Cotoneuses ou soyeuses. Carpesium. 1028 Chrysanthemum. 1048 Stoebe. 1086 Baccharis. 1029 Tarconanthus. 1020 Conyza. 1030 Artemisia. 1023 Inula. 1037 Seriphium. 1087 Erigeron. 1031 Eriocephalus. 1078 Cineraria. 1036 Filago. 1079 Tussilago. 1032 Micropus. 1080		1018	Amellus.	1055
Carpesium.       1028         Chrysanthemum.       1048       Stoebe.       1086         Baccharis.       1029       Tarconanthus.       1020         Conyza.       1030       Artemisia.       1023         Inula.       1037       Seriphium.       1087         Erigeron.       1031       Eriocephalus.       1078         Cineraria.       1036       Filago.       1079         Tussilago.       1032       Micropus.       1080		1024	rengues.	
Chrysanthemum.       1048       Stoebe.       1086         Baccharis.       1029       Tarconanthus.       1020         Conyza.       1030       Artemisia.       1023         Inula.       1037       Seriphium.       1087         Erigeron.       1031       Eriocephalus.       1078         Cineraria.       1036       Filago.       1079         Tussilago.       1032       Micropus.       1080		1049	f Cotoneuses ou soye	euses.
Baccharis.       1029       Tarconanthus.       1020         Conyza.       1030       Artemisia.       1023         Inula.       1037       Seriphium.       1087         Erigeron.       1031       Eriocephalus.       1078         Cineraria.       1036       Filago.       1079         Tussilago.       1032       Micropus.       1080	Carpesium.	1028	THE PARTY.	gam.
Conyza.       1030       Artemisia.       1023         Inula.       1037       Seriphium.       1087         Erigeron.       1031       Eriocephalus.       1078         Cineraria.       1036       Filago.       1079         Tussilago.       1032       Micropus.       1080	Chrysanthemum.		Stoehe.	1086
Inula.       1037       Seriphium.       1087         Erigeron.       1031       Eriocephalus.       1078         Cineraria.       1036       Filago.       1079         Tussilago.       1032       Micropus.       1080	Baccharis.		Tarconanthus.	
Erigeron. 1031 Eriocephalus. 1078 Cineraria. 1036 Filago. 1079 Tussilago. 1032 Micropus. 1080		AL SURE CONTRACTOR OF THE PARTY		
Erigeron. 1031 Eriocephalus, 1078 Cineraria. 1036 Filago. 1079 Tussilago. 1032 Micropus. 1080				
Tussilago. 1036 Filago. 1079 Tussilago. 1032 Micropus. 1080	Erigeron.		Eriocephalus,	1078
Tussilago. 1032 Micropus. 1080	Cineraria.		Filago.	
Doronicum. 1039 Iva. 1155			Micropus.	1080
	Doronicum.	1039	Iva.	1155

	(8	6)	
Parthenium.		Ulmus.	345.
Ambrosia.	the second second second	Celtis.	1267
Xanthium.		Forskæhlea.	639
Strumpfia.		Cannabis.	1220
1 James of	Name And	Humulus.	1221
L. Amentacea. Ame	ntacées		
ou fleurs à chato		LIV. Miscellanea.	Les mé-
1001 perior	in Amin	langées.	THE PARTY OF
Salix.	1201	Service of the servic	
Populus.	1228	aReseda.	664
Platanus.	1173	b Poterium.	1167
Fagus.		Sanguisorha.	152
Juglans.		Lemna.	1130.
Quercus.	1168	c Coriaria.	1235
Corylus.	1172	d Empetrum.	1202
Carpinus.		e Achyranthes.	301
Betula.		Celosia.	312
Myrica.	1213	Amaranthus.	1157
Pistacia.	1212	Gomphrena.	343
A STATE OF THE STA		Phytolacca.	641
II. Conifera. Conif	eres,	f Nymphæa.	709
ou fruits en cône		g Telephium.	408
e for		Corrigiola,	409
Pinus.	1175	19	The state of the s
Cupressus.	1177	LV. Filices. Fou	géres.
Thuia.	1176		100 40
Juniperus.	1240	Ophioglossum.	1288
Taxus.	1241	Osmunda.	1289
? Equisetum.	1284	Trichomanes.	1298
0.001	Zion	Adiantum.	1297
LII. Coadunatæ. A ca	psules	Asplenium.	1295
réunies.	and and	Pteris.	1291
COMPLETE ON COUNTRIES.	10"3 3 C	Lonchitis.	1294
Magnolia.	748	Hemionitis.	1293
ager ad	Store	Polypodium.	1296
LIII. Scabridæ. Rude	s au	Acrosticum.	1290
toucher.		Marsilea.	1299
vear main		Pilularia.	1300.
Fieus.	1283	Isoetes.	1301
Parietaria.	1259	LVI. Musci. Mon	isses.
Urtica.	1149	EOL CONTRACTOR	
Morus.	1150	Lycopodium.	1302

	(87	7)	-
Fontinalis.	1306		1320
Sphagnum.	1304		1322
Phascum.	1305	Fucus.	1321
Mnium.	1310	Chara.	1127
Splachnum.	1308	Conferva.	1323
Polytrichum.	1309	Live menus	
Bryum.	13111	LVIII. Fungi. Cha	impignons.
Hypnum.	1312		
Buxbaumia.	1307	Agaricus.	1325
		Boletus.	1326
LVII. Alga. Algu	es.	Hydnum.	1327
TERRAL LINES OF	11	Phallus.	1328
Marchantia.	1315	Clathrus.	1329
Jungermannia.	1313	Elvela.	1330
Anthoceros.	1318.	Clavaria.	1332
Tragionia.	1314	Peziza.	1331
Lichen.	1319	Lycoperdon.	1333
Blasia.	1316	Byssus.	1324
Riccia.	1317	Mucor.	1334

Amirgonia .

ordinate Za

Appropriate Control of the Control o

# TABLE ALPHABÉTIQUE

Des noms latins et français.

A

Acanthus,
Acer,
Achillea,
Acorus,
Acrosticum,
Actæa,
Adianthum,
Adonis,
Adoxa,
Ægylops,
Ægopodium,
Æleagnus,
Æsculus,

Æthusa, Agaricus, Agave, Agrimonia, Agrostema, Agrostis, Aira, Ajuga, Alcea, Alchemilla, Aldrovanda, Alsima, Allium, Aloe, Alopecurus, Alsine, Althea, Alyssum, Amaranthus, Amaryllis, Ambrosia, Amethystea, Ammi, Amorpha, Amygdalus,

Acanthe. Erable. Achilliere. Acore. Acrosticum. Actée. Capillaire. Adonis. Moschatelline. Egylopes. Podagraire. Æleagne. Æscule ou Marronnier. Æthuses. Agaric. Agave. Aigremoine. Agrostême. Agrostis. Foin. Bugle. Alcee. Pied-de-Lion. Aldrovande. Fluteeu. Ail. Aloës. Vulpain. Alsîne. Guimauve. Alvsson. Amaranthe. Amarillide. Ambrosie. Amethyste. Ammi. Amorphe.

Amandier.

Anacyclus, Anagallis, Anagyris, Anastalica, Anchusa, Andromeda, Andropogon, Androsace, Andryala, Anemone, Anethum, Angelica, Anthemis, Anthericum, Anthoceros, Anthoxanthum, Anthyllis, Antirrhinum, Aphanes, Aretia, Argemone, Aristolochia, Arnica, Artemisia, Arum, Arndo, Asarum, Asclepias, Asparagus, Asperugo, Asperula, Asphodelus, Asplenium, Aster, Astragalus, Astrantia, Athamanta, Athanasia, Atractylis, Atragene, Atriplex,

Anacycle: Mouron. Anagyre. Anastatique: Buglosse. Andromede. Barbon. Androsace. Andryale. Anémone. Anet. Angélique. Camomille. Anthéric. Anthocere. Flouve. Vulnéraire. Mufflier. Perce-Pierre. Aretie. Argemone. Aristoloche. Arnique. Armoise. Gouet. Roseau. Cabaret. Asclepiade. Asperge. Rapette. Asperule. Asphodele. Doradille. Aster. Astragale. Radiaire. Athamanthe. Athanasie. Atractyle. Atragene. Arroche.

Atropa, Avena, Azalea,

Atrope. Avoine. Azalée.

Bacchante.

B

Baccharis, Ballota . Bartsia, Bellis . Bellium . Berberis, Beta, Betonica, Betula, Bidens, Bignonia, Biscutella, Bisserrula, Blasia, Blitum; Boletus, Borrago, Brassica, Briza, Bromelia. Bromus, Browallia, Bryonia. Bryum, Bubon, Bufonia. Bulbocodium, Bunias . Bunium . Bu phthalmum , Buplevrum, Butomus, Buxbaumia, Buxus, Byssus,

Ballote. Bartsie. Paquerette. Bellie. Epine-Vinette. Bette. Betoine. Bouleau. Bidens. Bignone. Lunetiere. Double-Scie. Blasie. Blitte. Bolet. Bourrache. Chou. Brize. Ananas. Brome. Browalle. Brione. Bri. Bubon. Bufone. Bulbocode. Massette. Terre-Noix. Buphthalme, Buplevre. Butome. Buxbaume. Buis. Bisse.

C

Cacalia . Cachrys, Cactus Calendula, Calla, Callitriche, Caltha, Campanula, Camphorosma, Cacalie. Amarinthe. Cacte. Souci. Calle. Callitric. Populage. Campapule. Camphrée.

(89) Canna, Cannabis, Capparis, Capraria, Capsicum, Cardamine, Cardiospermum,

Carduus, Carex, Carlina, Carpesium, Carpinus, Carthamus, Carum, Cassia, Catananche. Caucalis, Celosia, Celsia, Celtis, Cenchrus, Centaurea, Centunculus, Cerastium, Ceratonia, Ceratophyllum, Cercis, Cerinthe, Chærophillum, Chamærops, Chara, Cheiranthus . Chelidonium, Chenopodium, Cherleria, Chlora, Chondrilla, Chrysocoma, Chrysosplenium, Dorine. Cicer, Cichorium, Cicuta, Cineraria, Circæa, Cistus, Citrus, Clathrus. Clavaria,

Clematis,

Cleome,

Balissier. Chanvre. Caprier. Caprarie. Capsique. Cardamine. Pois - de - Merveille. Charden. Caret. Carline. Carpésie. Charme. Carthame. Carvi. Casse. Cupidone. Caucalier. Célosie. Celsie. Micocoulier. Racle. Centaurée. Centenille. Ceraiste. Caroubier. Cornifle. Guainier. Melinet. Cerfeuil. Chamærops. Charagne. Giroflier. Chelidoine. Patte d'Oie. Cherlerie. Chlore. Chondrille. Chrysanthemum, Chrysantheme. Chrysocome. Pesette. Chicorée. Ciguë. Cendriette. Circée. Ciste. Citronnier Clathre.

> Cléome. m

Clavaire.

Clématite.

(90)

Clinopedium, Clypeola, Cneorum, Cnicus, Cochlearia, Coix, Colchicum, Colutea, Comarum, Conferva, Conium ; Convallaria, Convolvulus, Coniza, Corchorus, Coreopsis, Coriandrum, Coriaria, Coris, Corispermum, Coronilla, Cornus, Corrigiola, Cortusa, Corylus, Cotula, Cotyledon, Crambe, Crassula, Cratægus, Crepis, Crithmum, Crocus, Crucianella, Croton, Cucubalus, Cucumis, Cucurbita, Cuminum, Cunilla, Cupressus, Cuscuta, Cyclamen,

Cynanchum,
Cynara,
Cynoglossum,
Cynosurus,
Cyperus,
Cypripedium,
Cytinus,
Cytisus,

Clinopode. Bouclier. Camelee. Cnique. Cochleare. Larme. Colchique. Baguenaudier. Comare. Conferve. Conie. Muguet. Liseron. Conize. Corchore. Coreopse. Coriandre. Corroyere. Corine. Corisperme. Coronille. Cornouiller. Corrigiole. Cortuse. Noisetier. Cotule. Cotilier. Crambe. Crassule. Aubepine. Crépide. Crithe. Safran. Crucianelle. Tournesol. Cucubale. Concombre. Courge. Cumin. Cunille. Cypres. Cuscute. Cyclameou Pain de Pourceau. Cynanque. Artichaud. Cynoglosse. Cynosure. Souchet. Sabot.

Hypociste.

Cytise.

Dactylis, Daphne, Datura, Daucus, Delphinium, Dentaria, Dianthus, Diapensia, Dictamnus, Digitalis, Dipsacus, Dodecatheon, Dolichos, Doronicum, Draba, Dracocephalum, Dracuntium, Drosera, Dryas, Drypis.

Dactyle. Garou. Endormie. Carotte. Dauphin. Dentaire. Œillet. Diapensie. Dictamne. Digitale. Cardere. Meade. Doliche. Doronic. Drave. Dracocephale. Dragonne. Rossolis. Dryade. Drepide.

Echinophore.

Boulette.

E

Echinophora, Echinops, Echium, Elatine, Elephantopus, Elymus, Empetrum, Ephedra, Epilobium, Epimedium, Equisetum, Erica, Erigeron, Erinus, Eriophorum, Ervum, Eryngium, Erysimum, Erythronium, Evonymus, Eupatorium, Euphorbia, Euphrasia,

Vipérine. Elatine. Pied d'Elephant. Elyme. Camarigue. Ephedre. Epilobe. Epimede. Prêle. Bruyere. Vergerette: Erine. Linaigrette. Lentille. Panicaut. Velar. Dent-de-Chien. Fusain. Eupatoire. Euphorbe. Eufraise.

F

Fagonia, Fagus, Fagone. Chataignier. Ferula;
Festuca,
Ficus,
Filago,
Fontinalis,
Fragaria,
Frankenia,
Fraxinus,
Fritillaria,
Fucus,
Fumaria,

Férule.
Fétuque.
Figuier.
Cotonnière.
Fontinale.
Fraisier.
Franquene.
Frene.
Fritillaire.
Varex.
Fumeterre.

G

Holosteum, Hordeum, Horminum, Hottonia, Humulus, Hyacinthus, Hydnum, Hydrocharis. Hydrocotyle, Hydrophyllum, Hyoscyamus, Hyoseris, Hypecoum, Hypericum, Hypnum, Hyppochæris, Hyppophae, Hyssopus,

(91)

Holoste. Orge. Hormin. Hottonie. Houblon. Hyacinthe. Hydne. Morene. Gobelet d'eau. Hydrophylle. Jusquiame. Hyosere. Siliquier. Millepertuis. Hypne. Porcelle. Griset. Hyssoge.

Galanthus, Galega, Galeopsis, Galium, Garidella .. Genista, Gentiana, Geropogon, Geum , Gladiolus . Glaux, Glechoma, Gleditschia, Clobularia, Glycyrrhiza; Gnaphalium, Gomphrena, Gossipium, Gratiola. Gypsophila,

Galanthe. Galega. Galéopse. Caille-Lait. Garidelle. Genet. Gentiane. Geropodon. Benoîte. Glayeul. Glauque. Lierret. Gledistchie. Globulaire. Reglisse. Perliere. Immortelle. Coton. Gratiole. Gypsophile.

H

Hedera, Hedysarum, Helenium . Helianthus. Helleborus . Heliotropium, Helvella, Hemerocallis, Heracleum. Herniaria. Hesperis, Hibiscus, Hieracium, Hippocrepis, Hippuris, Holcus,

Lierre. Sainfoin. Hélénie. Soleil. Hellebore. Heliotrope. Helvelle. Hemerocalle. Berce.. Herniaire. Juliene. Hibisque. Eperviere. Fer-a-Cheval. Pesse. Houque.

Jasione, Jasminum, lberis, Hex, Illecebrum, Impatiens, Imperatoria, Inula, Ipomœa . Iris, Isatis . Isnardia. Isoetes . Isopyrum Juglans .. Juneus, Jungermannia, Juniperus, Justicia, Ixia,

Knautia, Kœnigia,

Lactuca, Lagoecia, Lagurus, Lamium, Lantana, Jasione. Jasmin. Iberide. Floux. Paronique. Balsamine. Impératoire. Inule. Ipomée. Iris. Pastel. Isnarde. Isoete. Isopyre. Nover. Jone. Jungermanne, Génevrier. Justicie. Ixie.

Knauta Kœnigie

Laitue. Lagoecie. Lagurier. Lamion. Lantane. (92)

Lapsana . Laserpitium, Lathræa, Lathyrus , Lavandula. Lavatera. Laurus, Ledum, Liemna . Leontice, Leontodon . Leonurus, Lepidium, Leucoium, Lichen, Ligusticum, Ligustrum, Lilium-Limosella, Lindernia, Linnaa, Linum , Lithospermum. Littorella, Lobelia, Loeflingia, Lolium, Lonicera, Loranthus, Lotus, Lunaria . Lupinus, Lychnis, Lycium, Lycoperdon, Lycopodium, Lycopsis, Lycopus, Lysimachia, Lythrum,

Lampsane. Laser. Clandestine. Gesse. Lavande. Lavatere. Laurier. Ledier. Lemne. Leontice. Dent-de-lion Léonure. Cresson. Leucoie. Lichen. Livêche. Troêne. Lvs. Limoselle. Lindernie. Linnée. Lin. Gremil. Littorelle. Lobelie. Loeflinge. Ivraie. Chevre-feuille. Loranthe. Lotier. Lunaire. Lupin ... Lamprette. Lycie. Vesse-de-loup. Lycopode. Gripe. Lycope. Lysimachie.

#### M

Malope, Malva, Marchantia, Marrubium, Marsilea, Martynia, Matricaria, Medicago, Melampyrum, Malope. Mauve. Marchante. Marrube. Marsile. Martyne. Matricaire. Luzerne. Mélampire.

Salicaire.

Melia; Melianthus, Melica, Melissa, Melittis. Melothria. Menyanthes, Menispermum, Mentha, Mercurialis, mum, Mespilus, Micropus, Milium, Mimosa, Miyabilis, Minuartia. Mnium, Moehringia. Molucella, Momordica, Monarda, Monotropa. Montia. Morus, Mueor, Myagrum, Myosotis, Myosurus, Myrica, Myriophyllum, Myrtus,

Melique. Mélisse. Melite. Melothrie. Menyanthe. Menisperme. Menthe. Mercuriale. Mesembryanthe- Mesentbryanthame. Néfliers. Micrope. Millet. Sensitive. Jalap. Minuart. Mnie. Moehringe. Molucelle. Momordique. Monarde. Sucepin. Montie. Mûrier. Moisissure. Caméline. Scorpionne. Ratuncule. Piment. Volant-d'eau. Myrthe.

Melie.

Melianthe,

Najas , Narcissus . Nardus , Nepeta, Nerium, Nicotiana, Nigella, Nolana, Nyctanthes, Nymphæa,

Najade. Narcisse. Nard. Cataire. Nerion. Tabac. Nielle. Nolane. Nyctanthe. Nenuphar.

Ocymum, Enanthe, Enothera,

Basilic. (Enanthe. Onagre.

Olea, Ononis: Onopordon, Onosma, Ophioglossum, Ophrys, Orchis, Origanum, Ornithogalum, Ornithopus, Orobanche, Orobus, Ortegia, Oryza, Osmunda, Osyris,

Oxalis,

Olivier. Bugrane. Pet-d'ane. Onosme. Ophyoglosse. Ophris. Orchis. Origan. Ornithogale. Pied-d'oiseau. Orobanche. Orobe. Ortegie. Riz. Osmunde. Rouvet.

(93)

P

Surelle.

Pæderota, Pancratium, Panicum, Papaver, Parietaria, Paris, Parnassia, Passerina, Passiflora, Pastinaca. Pedicularis, Peganum, Peltaria, Peplis, Periploca, Petiveria, Peucedanum, Peziza; Phaca, Phalaris, Phallus , Pharnaceum, Phascum, Phaseolus, Phellandrium, Philadelphus, Phillyrea, Phleum, Phlomis, Phlox, Phænix . Physalis,

Poderotte. Pancrace. Panic. Pavot. Pariétaire. Parisette. Parnassie. Passerine. Passiflore. Panais. Pédiculaire. Pegane. Ecusson. Péplide. Périptoque. Pétiverie. Peucedan. Pezize. Phaque. Phalaris. Morille. Pharnace. Phasque. Haricot. Phellandre. Seringa. Filaria. Fléau. Phlomide. Phlox. Phænix. Coqueret.

Phyteuma, Phytolacca, Picris, Pilularia. Pimpinella, Pinguicula, Pinus, Pyrola, Pistacia, Pisum, Plantago, Platanus, Plumbago, Poa; Pæonia, Polemonium, Polianthes, Polycarpon, Polycnemum, Polygala, Polygonum, Polypodium, Polytrichum, Populus, Portulaca, Potamogeton, Potentilla, Poterium, Pothos, Prasium, Prenanthes, Primula, Prunella, Prunus, Psoralea, Pteris, Pulmonaria, Punica, Pyrus,

0

Quercus, Queria, Chêne. Quere.

R

Ranunculus, Raphanus, Reseda, Rhamnus, Rheum, Renoncule. Raifort. Gaude. Nerprun. Rhubarbe.

Raiponce. Phytolaque. Picride. Pilulaire. Boucage. Grassette. Pin. Pyrole. Pistachier. Pois. Plantain. Platane. Dentelaire. Paturin. Pivoine. Polémone. Tubéreuse. Polycarpe. Polycneme, Polygala. Persicaire. Polypode. Polytric. Peuplier. Pourpier. Potamogeton. Potentille. Poterie. Pothos. Prasie. Prenanthe. Primevere. Brunelle. Prunier. Psorale. Pteride. Pulmonaire. Grenadier. Poirier.

Rhinanthus , Rhodiola, Rhododendren. Rhus . Ribes, Riccia, Ricinus, Robinia, Rosa, Rosmarinus. Rubia, Rubus, Rudbeckia, Rumex, Ruppia, Ruscus .

Ruta,

Crête-de-coq. Rhodiole. Rhododendron. Sumac. Groselier. Riccie. Ricin. Robine. Rose. Romarin. Garance. Ronce. Rudbecke: Patience. Ruppie. Houx.

S

Rue.

Saccharum, Sagina, Sagittaria, Salicornia, Salix, Salsola, Salvia, Sambucus . Samolus, Sanguisorba, Sanicula, Santolina, Saponaria, Satureia, Satyrium, Saxifraga, Scabiosa, Scandix, Scheuchzeria, Schoenus; Scilla, Scirpus, Scleranthus, Scolymus, Scorpiurus, Scorzonera, Scrophularia, Scutellaria, Secale, Sedum , Selinum, Sempervivum,

Sucre. Sagine. Sagittaire. Salicor. Saule. Soude. Sauge. Sureau. Samole. Pimprenelle. Sanicle. Santoline. Saponaire. Sarriette. Satyrion. Saxifrage. Scabieuse: Scandise. Scheuchzere. Choin. Scille. Scirpe. Knavel. Scolime. Chenillette. Scorzonère. Scrophulaire. Toque, Seigle Orpin. Selin. Toujours-vive.

Serratula. Seseli, Sherardia. Sibbaldia, Sida, Sideritis . Siegeibeckia. Silene, Sinapis, Sison, Sisymbrium, Sisyrinchium, Sium, Smilax, Smyrnium, Solanum, Soldanella, Solidago, Sonchus . Sorbus , Sparganium, Spartium, Spergula, Sphagnum, Spigelia, Spinacia, Spiræa, Splachnum, Stachys, Stapelia, Stæhelina. Staphylæa, Statice, Stellaria, Stellera, Stipa, Stratiotes, Styrax , Subularia . Swertia, Symphitum, Syringa,

Senecio;

Serapias,

Seriola,

Tagetes, Tamarindus, Tamarix,

Senecon. Elleborine. Seriole. Sarrette. Seseli. Sherarde. Sibaldie. Side. Crapaudine. Siegebecke. Cornillet. Moutarde. Sison. Sisymbre. Bermudiane. Berle. Smiguet. Maceron. Morelle. Soldanelle. Verge-d'or. Laitron. Sorbier. Rubanier. Spartie. Spargoute. Sphaigne. Spigelie. Epinard. Spirée. Splanc. Stachide. Stapélie. Steheline. Staphylier. Statice. Stellaire. Stellere. Stipe. Stratiote. Storax. Subulaire. Swerse. Consoude Lilac.

T

Tagete.
Tamarin.
Tamarisc.

Tamus, Tanacetum, Targionia, Taxus , Telephium, Teucrium, Thalictrum, Thapsia, Theligonum, Thesium, Thlaspi, Thuia, Thymbra, Thymus, Tilia , Triglochin, Trigonella, Triticum, Trollius , Tropaolum, Tulipa , Turritis , Tussilago, Typha,

Vacinium,

Valentia,

Valeriana,

Veratrum,

Verbena,

Verbesina,

Verbascum,

Velezia,

Vella,

Vallisneria;

Tame. Tanaisie. Targione. If. Telephe. Germandree. Pigamon. Thapsie. Theligone. Thésie. Thlaspi. Arbre-de-vie. Thymbre. Thym. Tilleul. Troscart. Trigonelle. Froment. Trolle. Capucine. Tulipe. Tourrette. Tussilage. Massette.

Airelle.
Vaillant.
Valériane.
Vallisnérie.
Velesie.
Velle.
Veratre.
Bouillon,
Verveine.
Verbesine.

Veronica; Viburnum; Vicia, Vinca, Viola, Viscum, Vitex, Vitis,

Veronique.
Viorne.
Vesce.
Pervenche.
Violette.
Gui.
Vitet.
Vigne.

U

Ulex,
Ulmus,
Ulva,
Urena,
Urtica,
Utricularia,
Uvularia,

Ajonc.
Ormeau.
Ulve.
Urene.
Ortie.
Utriculaire.
Uvulaire.

X

Xanthium, Xeranthemum,

Glouteron. Xerantheme.

Y

Yucca;

Yuque.

Z

Zannichellia, Zea, Zinnia, Ziziphora, Zostera, Zygophillum,

Zannichellie;
Maïs.
Zinne.
Ziziphore.
Zostere.
Fevier.

PRESIDER MENORE

# OBSERVATIONS

DE

BOTANIQUE.

## PREMIER MÉMOIRE.

# OBSERVATIONS ETEXPÉRIENCES

Sur la dessication des Plantes, et leur conservation dans les Herbiers. \*

DE toutes les parties de la Botanique, celle qui a pour objet la dessication des plantes a été jusqu'à nos jours la plus négligée, quoiqu'elle ne soit pourtant pas la moins essentielle. Les Botanistes nous ont laissé de bonnes descriptions des plantes, d'excellentes figures, et des systèmes ingénieux qui ont perfectionné et abrégé l'étude de cette science. Des savans laborieux se sont occupés de la physiologie, de l'anatomie, et de la physique des végétaux. La grande découverte du sexe des plantes, sur lequel l'immortel Linné a établi son système sexuel, qui est sans contredit un chef-d'œuvre d'observation, a porté la Botanique au plus haut degré de gloire, où elle puisse parvenir.

A

<sup>\*</sup> Ce mémoire a été présenté et lu à la société de médecine de Lyon.

Mais presqu'aucun Botaniste n'a donné ses soins à la préparation des plantes, par conséquent à leur conservation, et très-peu ont laissé des herbiers qui leur aient survécu : la plupart même ont vu détruire dans un court espace de temps, les fruits de plus de quarante ans de fatigues et de recherches. Qu'elle perte pour leurs successeurs!

En effet, que présente l'aspect de la plus grande partie des herbiers, si ce n'est l'image effrayante de la désolation et du chaos. On n'apperçoit que des plantes sans racines, des tiges sans feuilles, des fleurs détachées de leurs pédoncules, et des légions innombrables d'insectes de toute espece, qui, acharnés avec fureur sur ces tristes débris, semblent avoir converti en un champ de bataille des recueils infiniment précieux, et ne permettent à l'œil exercé d'un Botaniste, de distinguer qu'avec peine des plantes ainsi défigurées. Tels à l'ouverture d'un tombeau, les yeux avides et inquiers, n'apperçoivent que des ossemens épars çà et là, sans pouvoir distinguer les traits de la créature qui les anima.

Les différentes expériences que m'a fourni une pratique de plusieurs années, m'ayant mis à même de parvenir à sécher toutes les plantes d'une maniere nouvelle et satisfaisante, j'ai cru qu'il seroit avantageux de publier, pour l'avencement et les progrès d'une science qui me sera toujours chere, mes expériences et les résultats que j'en ai obtenu. Mais pour procéder avec ordre, je diviserai en sept classes tous les végétaux qui demandent une dessication propre à

chacune d'elles.

Dans la premiere classe, je mettrai toutes les plantes qui séchent facilement et conservent la couleur de leurs feuilles; dans la seconde, je rangerai les liliacées; dans la troisieme, les orchidées; dans la quatrieme, les plantes grasses; dans la cinquieme, celles qui noircissent ou jaunissent par la dessication; dans la sixieme, les composées: enfin, dans la septieme, les plantes ligneuses, que la plupart des Botanistes négligent à raison de la grosseur de leurs rameaux.

Avant de parler de la dessication de ces différentes familles, je recommanderai instamment aux Botanistes d'arracher les plantes avec leurs racines. Sans parler de la grace que cette partie donne à une plante séche, je pourrois citer une foule d'observations fournies par les racines, qui démontrent la nécessité de les examiner attentivement. Quelques-unes offrent des caracteres saillans; telles sont celles de l'oxalis acetosella, du tozia alpina, de l'adoxa moschatellina er des dentaria. J'ai observé que les racines de presque toutes les légumineuses offroient dans leurs petits chevelus ou filamens, des tubercules ordinairement ronds dans les lotus, les anthyllis, ou palmés à trois griffes dans l'ornithopus scorpioides, l'ononis canisia, etc. Ces tubercules nous offrent en plus, des nodosités très-prononcées dans les orobus et lathyrus tuberosus , puisqu'elles ont fourni l'idée du nom spécifique de ces deux plantes. Les racines du lotus siliquosus répandent une odeur très-forte de truste noire mêlée avec l'ail; celles de l'orobus niger exhalent une odeur spermatique, parfaitement semblable à celle de l'épine-vinette ou du châtaigner. La

plupart des plantes alpines, telles que la soldanella alpina, fournissent dans leurs racines au moment où on les arrache, une odeur aromatique assez agréable, qui approche de celle du polypodium fragrans, mais qui se dissipe bientôt.

Analysons actuellement ces diverses classes.

Dans la premiere, qui sera la plus nombreuse, se trouveront toutes les plantes qui séchent facilement et qui se conservent presque toujours vertes dans les herbiers. Prenons pour exemple la verveine officinale, verbena officinalis, L. Après l'avoir arrachée avec sa racine, je rabats légérement avec un maillet de bois très-dur et rond par ses deux bouts, les côtes des tiges et des racines, je l'enferme dans plusieurs feuilles de papier, et ne la presse que très - légérement le premier jour, pour laisser évaporer son humidité. Je la change de papier au bout de vingt-quatre heures, j'applatis de nouveaux les racines et les tiges, je la comprime beaucoup plus fortement, et le troisieme jour je la mets seulement entre deux feuilles de papier, que j'enferme entre deux planches, et que j'expose à un degré de pression très-fort. En trois ou quatre jours, ma plante est parfaitement séche, et j'économise de la sorte mon temps et mes papiers, ce qui est très-précieux, sur-tout dans les Alpes.

Cette méthode d'applatir les racines et les tiges, présente l'avantage de diminuer le volume des herbiers, de conserver le papier et les plantes, de les rendre plus agréables au coup-d'œil, et plus faciles à manier. Cependant il existe des plantes, telles que l'hypericum quadrangulare, dont on détruiroit le caractere spécifique par ce procédé: il est utile d'y prendre garde, afin de n'y point recourir pour celles qui pourroient en souffrir.

Dans la seconde classe se présentent les liliacées, dont la préparation est plus difficile. Ces plantes, si on les séchoit comme celles dont je viens de parler, noirciroient ou prendroient une teinte très-forte de rouille. Pour les conserver avec leur couleur naturelle, il faut après les avoir étendues sur une feuille de papier, et recouvertes avec une seconde feuille, passer dessus les racines, les tiges et les feuilles, mais non sur les fleurs, un fer à repasser, suffisamment chaud, à l'aide duquel on enleve en peu de temps leur humidité, et lorsqu'on s'apperçoit qu'elles commencent à perdre une grande partie de leurs sucs aqueux, on les presse fortement, on les change deux ou trois fois par jour de papiers, et en peu de temps ces plantes sechent parfaitement en conservant leur couleur.

Le procédé que je viens d'indiquer pour les liliacées, convient parfaitement aux orchidées, qui constituent la troisieme classe; mais il est bon d'observer qu'il ne doit être employé que pour les orchis, les ophrys et les satyrium, et non pas pour les serapias, les cypripedium, dont il ne faut passer au fer que les racines. En jugeant par analogie, j'avois cru que les especes de ces deux derniers genres avoient besoin d'être séchées au fer; mais je m'apperçus que leurs feuilles noircissoient lorsque j'y avois passé le

fer dessus, et se conservoient au contraire trèsvertes lorsque je les laissois sécher d'elles-mêmes et sans son secours, ce qui est absolument le contraire pour les especes des trois premiers genres.

Dans la quatrieme classe, j'ai placé toutes les plantes grasses, dont la préparation a été jusqu'à ce moment l'écueil des Botanistes; telles que les sedum, les sempervivum, etc. et qui sont méconnoissables dans presque tous les herbiers. Il sussit pour les sécher sans craindre la chûte de leurs feuilles, de les laisser macérer pendant vingt-quatre heures dans l'eau-de-vie, de les retirer ensuite, de les essuyer et sécher avec un linge fin, de les changer très-souvent de papiers pendant deux ou trois jours, en les pressant graduellement jusqu'à leur entière dessication.

Ce procédé très-simple, qui est dû au docteur Pallas, n'est que l'effet d'un hasard heureux. Ce grand naturaliste, dans ses voyages en Russie, ayant trouvé le sempervivum arboreum, dont la floraison étoit peu avancée, recommanda à son domestique de le mettre dans l'eau pour avoir le loisir de l'examiner à son aise. Celui-ci mit la plante dans un verre rempli d'eau-de-vie, et le lendemain Pallas ayant voulu observer et décrire ce sempervivum, s'apperçut de la méprise de son domestique. Il craignit qu'elle ne nuisit à sa plante; mais l'ayant mise à sécher, il fut trèssurpris de voir qu'elle avoit conservé ses feuilles avec leur couleur naturelle : encouragé par cet heureux succès, il répéta l'expérience, qui lui of special fruit, me s réussit parfairement.

Ayant été instruit de cette anecdote par un

savant, le citoyen Patrin, qui avoit vu le docteur Pallas à Pétersbourg, je me hâtai de répéter cette expérience sur le même sempervivum arboreum que je cueillis dans le jardin de notre illustre compatriote, le citoyen Fleurieu de la Tourette. Satisfait de sa réussite, je la continuai sur les nombreuses especes de la famille des plantes grasses, avec un succès qui ne s'est

jamais démenti.

Le docteur Gilibert, dont la réputation en histoire naturelle est au-dessus de mes éloges, a pareillement découvert un procédé avantageux pour conserver la couleur des fleurs. Ce savant, qui ne peut donner à la Botanique que les momens de loisir que lui laissent ses grandes occupations, avoit coutume de dessécher ses plantes dans de vieux in-folio du quatorze et quinzieme siecle, dont le papier alunné conservoit parfaitement les nuances des corolles. Il fit part de cette observation au citoyen Patrin, qui imagina de plonger dans une forte dissolution d'alun, du papier bibule, de le laisser sécher au grand air, et de s'en servir ensuite pour conserver les différentes teintes des plantes. L'alun agissant comme mordant, sert à fixer et à aviver les couleurs. On peut avec ce procédé simple et facile à employer, empêcher les changemens de couleur qu'éprouvent par la dessication les campanules et quelques véroniques, qui passent facilement du bleu au blanc, les primeveres du jaune au verd; et pour donner encore plus d'éclat aux corolles qui se conservent sans souffrir aucune altération, comme le delphinium ajacis, l'Aconitum napellus, l'aquilegia vulgaris et alpina, semis

la nigella damascena, etc. et un grand nombre de Gentianes.

Les plantes de la cinquieme classe, qui noircissent presque toutes par la dessication, peuvent se sécher de deux manieres:

1.º En les exposant au grand air jusqu'à ce que leur humidité étant dissipée, les feuilles commencent à se crisper. Il faut alors les presser fortement pour faire perdre aux feuilles cette érispation, et en peu de jours, on a la satisfaction de les voir seches et parfaitement vertes.

2. On peut les exposer pendant quelques heures à l'ardeur des rayons du soleil, en ayant soin de couvrir et d'abriter leurs racines et leurs fleurs, les retirer lorsque les feuilles commencent à se crisper, laisser revenir un peu les feuilles de cette crispation forcée, et les comprimer ensuite ties-fortement. Par ce dernier procédé, j'ai séché très-promptement le bartzia alpina et l'orobus niger, qui en cette occasion a démenti son nom : ces deux plantes ont conservé la couleur de leurs feuilles. Ce dernier procédé n'est pas toujours praticable, principalement sur les montagnes dans les temps pluvieux ou nébuleux, ou lorsque le soleil ne donne pas dans un appartement où l'on seche ses plantes. On peut alors recourir au premier. (1)

La sixieme classe nous offre la nombreuse famille des fleurs composées. Pour sécher les

cissent ou jaunissent par la dessication interromproit le fil de ce discours, j'en présenterai à la fin le catalogue, suivant l'ordre du systême sexuel.

semi-flosculeuses et les radiées, il suffit de les presser fortement, en les changeant deux fois par jour de papiers, pour empêcher que l'humidité ne les fasse noircir. Cependant il y a dans ces deux séries des plantes dont il faut laisser évaporer l'humidité au grand air avant de les presser : je les désignerai dans le catalogue que

je place à la fin de ce mémoire.

Les flosculeuses méritent de fixer notre attention, d'autant plus justement, qu'elles deviennent dans les herbiers la pâture des insectes. La grosseur des fleurs de cette famille présente des inconvéniens fâcheux. 1.º Comme la plupart de ces plantes renferment une quantité considérable d'insectes et de vers, qui se logent dans le réceptacle, parmi les fleurons, ou entre les écailles du calice, et qu'on ne peut détruire que par une grande pression ; si on seche les flosculeuses sans les presser, ces animaux continuent à se nourrir aux dépens de ces fleurs, et détruisent en peu de temps l'espérance et les travaux d'un Botaniste. 2.º Ces fleurs conservant à une foible pression toute leur grosseur, dénaturent un herbier. 3.° Enfin, si on les coupe en deux parties, afin de diminuer leur volume, à mesure que le calice et le réceptacle se dessechent, les fleurons se détachent peu-à-peu, et par là on perd entiérement les fleurs.

Pour remédier à ces accidens, j'étends ma plante entre deux feuilles de papier, que je soumets entre deux planches à une pression très-forte, qui applatit considérablement la tête de ma fleur, et écrase les insectes qui se trouvent logés dans le réceptacle. L'humeur qui sort de leurs corps, mêlée avec l'humidité que la pression fait sortir du calice, forme une espece de gluten qui sert à coller les folioles du calice, et à empêcher que les fleurons ne puissent se détacher. Après avoir changé plusieurs fois par jour ma plante de papiers, je la laisse à la presse pendant six semaines ou deux mois,

jusqu'à ce qu'elle soit entiérement seche.

Quelquesois même au bout de ce temps, il est des plantes telles que les centaurées, dont les écailles du calice conservent une élasticité étonnante, qui s'écartent et abandonnent les sleurons, qui dès-lors tombent d'eux-mêmes. Il sussit, lorsqu'on s'apperçoit de cet accident, de passer légérement un peu de gomme arabique au-dessous des écailles du calice et de les presser de nouveau. Par ce moyen elles restent collées contre les sleurons, et la sleur se conserve par-faitement.

Cette méthode d'applatir les fleurs a le défaut à la vérité de dénaturer leur port ; mais cet inconvénient n'est-il pas préférable à celui qui en conservant leur forme, laisse vivre les insectes qui s'y sont logés, et occasionne en peu de temps la destruction totale de la plante?

On pourroit placer à côté des flosculeuses, les ombelliferes qui se conservent difficilement dans les herbiers; mais les procédés déjà cités pour les plantes de la premiere classe, peuvent convenir parfaitement à celles d'entr'elles qui ne demandent qu'une préparation ordinaire, et ceux de la cinquieme, à celles qui noircissent par une pression trop forte ou trop prématurée. La septieme et derniere classe présente toutes

les plantes ligneuses qu'on voit rarement dans les herbiers, et que j'avois négligé jusqu'au moment où j'ai cherché un moyen pour les préparer. Ce moyen consiste, après avoir coupé une branche qui présente tous les caracteres de la fructification, à fendre longitudinalement l'écorce, à la détacher du bois qu'on retranche comme superflu, et à la sécher comme les plantes ordinaires.

Telles sont les expériences et les observations relatives à la dessication des plantes; il me reste actuellement à parler de leur conservation dans les herbiers, qui en est une suite très-naturelle : car ne seroit-il pas extrraordinaire de s'occuper de la préparation des plantes, et de négliger leur conservation!

Le premier objet qui se présente est le choix de la grandeur d'un herbier. Si le format en est trop grand, il devient difficile à manier, et les petites plantes y figurent mal; s'il est trop petit, il est impossible d'y faire entrer la plupart des échantillons avec leurs racines, à moins de les choisir très-courts; mais alors on n'auroit jamais les plantes dans leur grandeur naturelle, mais seulement in minimis. J'ai donc cru que le format de seize à dix-sept pouces de hauteur, sur onze et demi à douze pouces de largeur, étoit le plus convenable, puisqu'il présente toutes les commodités et évite tous les inconvéniens que je viens d'exposer.

La couleur du papier n'est point à négliger; s'il est trop gris, il choque le coup-d'œil et ne fait nullement ressortir les plantes; s'il est trop blanc, il nuit à leur couleur et ne leur est pas

avantageux. J'ai donc pensé qu'un papier miblanc tenoit le juste milieu entre ces deux extrêmes.

La force du papier est avantageuse pour la conservation des plantes; car s'il est trop mince, elles se trouvent trop rapprochées les unes des autres, et se nuisent mutuellement.

Il est nécessaire que les feuilles de papier soient doubles; c'est un avantage précieux qui donne la facilité de parcourir un herbier sans craindre de déranger les plantes ou de les casser. Si les feuilles sont simples, on est obligé d'attacher ses échantillons avec de petites languettes de papier, ce qui devient désagréable et minutieux. La feuille double met les plantes à l'abri de tout accident fâcheux, et permet de les tourner en tout sens pour les examiner, ce qui arrive souvent, sur-tout lorsque leurs caracteres spécifiques consistent dans des poils, des glandes ou des nervures, situées souvent à la surface inférieure, et quelquefois sur les deux surfaces des feuilles.

J'ai vu des herbiers faits il y a tout au plus trente ans, dont toutes les plantes étoient collées dans leur longueur sur le papier avec de la colleforte. Cette méthode étoit défectueuse, en ce qu'elle ne laissoit appercevoir les plantes que dans leur partie supérieure, sans permettre de les détacher ou les renouveller, et en ce qu'elle attiroit les insectes, qui détruisoient en peu de temps les échantillons et le papier.

Il est nécessaire de conserver dans un herbier le niveau, et d'éviter la convexité que forment un certain nombre de plantes enfermées dans des feuilles de papiers. Il faut avoir soin d'applatir exactement les racines et les tiges, et de placer de distance en distance des quarrés de papier qui contribuent beaucoup à maintenir ce niveau. Ces quarrés sont composés de quatre bandes de papier, d'un pouce et demi de large sur deux lignes d'épaisseur, qui coupées sur les dimensions de l'herbier, tant en largeur qu'en longueur, sont collés aux quatre coins avec un mélange d'un tiers de gomme arabique et deux tiers de gomme adragant, qui a l'avantage de ne répandre aucune, mauvaise odeur, de ne point attirer les insectes, et d'être économique. Ce dernier article est important; la bourse des Botanistes étant ordinairement peu fournie, on doit leur éviter des frais : car, comme l'a trèsagréablement dit le docteur Gilibert, la Botanique est une coquette qui a presque toujours ruinée ses amans.

Tout étant ainsi disposé, il convient d'enfermer les feuilles de papier où sont contenues les plantes, entre deux forts cartons bordés de tous côtés d'une bande de parchemin de deux pouces de largeur, et de les lier avec le nœud d'emballeur. La force du carton empêche que les plantes ne bombent dans le milieu, sert à maintenir le niveau : le parchemin augmente la force des cartons, empêche que la ficelle ne morde dessus, et ne les déchire à la longue. Il faut placer chaque volume ainsi conditionné, et dont l'épaisseur ne doit être que de quatre pouces, autant que faire se pourra, dans une boîte de sapin, passée à une couleur à l'huile

14 PREMIER MÉMOIRE.

et qui ferme exactement, afin de les préserver

de la poussiere et des insectes.

Telles sont les observations et expériences d'après lesquelles j'ai séché les soixante volumes de plantes de mon herbier, et les quarante de celui que j'ai fait pour un de mes amis, le citoyen Henon, professeur à l'école nationale vétérinaire de Lyon, grand anatomiste et Botaniste éclairé. Les amateurs qui auront occasion de voir ces deux herbiers, connoîtront toute l'utilité de la méthode que j'ai employée, et que je conseille aux naturalistes qui voudront se former une collection de plantes, qui puisse résister à l'injure des temps, et aux ravages des insectes.

pouces de largeur control de l'accure

d'emballens la force du cocon con

the intenic le miveign et le consulternin avernouve

morde desus, erme les dellais la la comme la faut places change volume et de condiciones

potenes a autant que faire se pounta, dans une

boire de saping, parete à que couleur à l'huile

## LISTE DES PLANTES

Qui noircissent ou jaunissent par la dessication, rangées suivant le système sexuel de Linné.

DANS LA MONANDRIE. Salicornia Herbacea. L. Fruticulosa. L. Hippuris Vulgaris. L. DIANDRIE.

Syringa Vulgaris. L. Veronica Aphylla. L.

Alpina. L. Saxatilis. L. Fruticulosa. L. Beccabunga. L. Latifolia. L.

Toutes les especes de pinguicula et d'utricularia. Salvia Pratensis.

Glutinosa.

TRIANDRIE. Valeriana Officinalis. L.

Montana. L. Tripteris. L. Phu. L. Rubra. L. Saliunca. Allion.

Les iris, gladiolus. L. Montia fontana. L.

TETRANDRIE. Les globularia. L. Plantago Alpina. L.

Maritima. L. Les rubia etquelques galium. Asperula Odorata. L. Trapa Natans. L.

Alchemilla Pentaphylla.L. Potamogeton Natans. L.

Lucens. L.

PENTANDRIE. La plupart des Boraginées, entr'autres Lycopsis Arvensis. L. Anchusa Officinalis. L. Asperugo Procumbens. L.

Lithospermum Purpurocæruleum. L.

Menyanthes Nymphoides L. Datura Stramonium. L. Hyoscyamus Albus. L.

Niger. L. Nicotiana Tabacum. L. Convolvulus Soldanella. L. Atropa Mandragora. L. Les Vinca. L. Solanum Dulcamara.

Campanula Barbata. L. Lonicera Alpigena. L. Asclepias Nigra. L. Gentiana Lutea. L.

> Purpurea. L. Punctata. L. Cruciata L. Asclepiadea. L. Bavarica. .L.

Quelques especes de Cheno. podium L.

Les Salsola. L.

Sanicula Europea. L. Laserpitium Simplex. L.

Halleri. Vill. Latifolium. L.

Angustifolium. L. Peucedanum Officinale. L. Athamanta Cretensis. L.

Oreoselinum. L.

Sison Inundatum. L.

Æthusa Meum. L.

Chritmum Maritimum

Chritmum Maritimum. L. Imperatoria Osthrutium. L. Les Drosera. L.

La plupart des Statice. L.

HEXANDRIE.

Cette classe comprend les liliacées, qu'il convient de sécher au fer.

Telles sont:

Les Leucoium. L. Galanthus. L.

Narcissus. L. Pancratium. L.

Allium. L.

Convallaria. L.

Hyacinthus. L.

Asphodelus. L. \*

Ornithogalum. L.

Scilla. L.

Uvularia. L.

Fritillaria. L.

Colchicum. L.

Les Frankenia. L. Quelques Rumex. L.

OCTANDRIE. Epilobium Alpinum. L. Vaccinium Mirthyllus. L. Vitis-Idea. L. Occycocus. L.

La plupart des Daphne. L. Polygonum Amphybium. L.

Paris Quadrifolia. L.

ENNÉANDRIE.

Laurus Nobilis. L. Butomus Umbellatus. L.

DÉCANDRIE.

des Sedum, dont il faut sécher à l'eau-de-vie toutes

les especes, et y joindre

Les Crassula. L.

Sempervivum. L.

MesembryanthemumL.

Cotyledon. L.

Rhodiola Rosea. I.

Monotropa Hypopithys. L. Pyrola Rotundifolia. L.

Minor. L.

Uniflora. L.

Rhododendron Ferrugi-

neum. L.

Arbutus uva Ursi. L.

Saxifraga Rotundifolia. L.

Autumnalis. L.

Crassifolia. L.

Lychnis Alpina. L.

DODÉCANDRIE.

Asarum Europeum. L. Portulaca Oleracea. L.

Quelques especes d'Euphor-

bia. L.

ICOSANDRIE.

Spiræa Aruncus. L.

<sup>\*</sup> Excepté les Anthericum Calyaclatum et Serotinum.

Dryas Octopetala. L. Comarum Palustre. L.

POLYANDRIE.

La plupart des Papaver. L. Chelidonium Majus. L. Nymphæa Alba. L.

Pœonia Officinalis. L.
Aconitum Napellus. L.
Atragene Alpina. L.

Quelques especes de Clematis et de Thalictrum. L. Helleborus Niger. L. Caltha Palustris. L.

Anemone Pratensis. L. Vernalis. L.

Trollius Europeus. L. Ranunculus Aquatilis. L.

Sceleratus. L.
Aconitifolius. L.
Lingua. L.
Falcatus. L.
Repens. L.
Lanuginosus. L.
Hederaceus. L.

DIDYNAMIE.
Hyssopus officinalis. L.
Lamium Lævigatum. L.
Satureja Hortensis. L.
Marrubium Vulgare. L.
Glechoma, Hederacea. L.
Scutellaria Alpina. L.
Melitis Melyssophyllum. L.
Bartzia Alpina. L.
Lathræa Squamaria. L.
Tozia Alpina. L.
Euphrasia Lutea. L.

Linifolia. L. Officinalis. L.

Les Rhinanthus L. Melampyrum, L. Pedicularis. L.
Digitalis. L.
Erinus Alpinus. L.
Antirrhinum Majus.

Orontium. L. Alpinum. L. Origanifolium. L.

TETRADYNAMIE.
Iberis Rotundifolia. L.
Cochlearia Officinalis. L:
Armoracia. L.

Thlaspi Aryense. L.

Campestre. L.
Montanum. L.
Cheiranthus Alpinus. L.

Isatis Tinctoria. L.

MONADELPHIE. Geranium Lucidum. L.

Nodosum. L. Sanguineum. L. Pratense. L.

DIADELPHIE.
Fumaria Bulbosa. L.
Polygala Chamæbuxus. L.
Lupinus Sativus. L.
Vicia Faba. L.

Nabornensis. L.
Psoralea Bituminosa. L.
Orobus Niger. L.
Cytisus supinus. L.

SYNGENESIE.
Inula Maratima. L.
Hypochæris Pontana. L.
Maculata I

Maculata. L.
TragopogonDalechampiiL.
Sonchus Alpinus. L.
Cacalia Alpina. L.
ChrysanthemumAlpinumL.
Achillea Nana. L.

Filago Leontopodium. L.

c

PREMIER MÉMOIRE. Calendula Arvensis. L. Impatiens Noli Tangere. L.

GYNANDRIE.

Cette classe présente la famille des Orchidées, qui ne peuvent se sécher qu'en appliquant un fer sur leurs feuilles; tels sont les genres entiers des Orchis. L.

Ophrys. L. \*\* Satyrium. L.

Monoécie. Momordica Elaterium. L. Les Myriophyllum. L. Serratophyllum. L. Croton Tinctorium, L.

DIOÉCIE. Osyris Alba, L. Viscum Album. L. Mercurialis Perennis. L.

POLYGAMIE. Valantia Muralis. L.

Cruciata. L.

Aparine. L. Parietaria Officinalis. L. Veratrum Album. L. La plupart des Atriplex. L.

CRIPTOGAMIE.

Osmunda Lunaria.

Regalis. L. Ophyoglossum Vulgatum L. Isoetes Lacustris. L.

Les Champignons qui appartiennent à la criptogamie doivent être séchés comme les plantes de la cinquieme classe, ou lorsque on a laissé évaporer leur humidité, on peus hâter leur dessication en passant dessus un fer chaud.

<sup>\*\*</sup> Excepte l'Ophrys bifolia.

## SECOND MÉMOIRE.

## OBSERVATIONS

Sur les différentes especes de végétaux propres aux montagnes calcaires et granitiques des environs de Grenoble.

DE toutes les ci-devant provinces de France, le Dauphiné est une de celles qui mérite le plus de fixer l'attention du naturaliste. La Zoologie, la Minéralogie et la Botanique y ont attiré tour-à-tour des savans qui en ont fait connoître les recherches dans les trois regnes; et le célèbre Villars, dans son intéressante et judicieuse histoire des plantes du Dauphiné, ne nous a rien laissé à désirer dans la partie qu'il a traité.

Grenoble, qui en étoit la capitale, est une de ces villes heureusement situées pour la Botanique, se trouvant environnée au nord et au couchant par la chaîne des montagnes calcaires ou sub-alpines, qui s'étend depuis la Grande-Chartreuse jusques à Die : au levant, par les Hautes-Alpes granitiques, qui commençant à Charrousse, Taillefer, se continuent au-delà de Briançon : au midi, par une petite plaine.

Toutes ces montagnes offrant une différence sensible dans leur végétation, j'ai divisé en quatre classes toutes les plantes qui leur sont propres.

La premiere comprendra celles qui ne viennent que sur les montagnes calcaires : la seconde embrassera celles qui ne se plaisent que sur les montagnes granitiques : la troisieme offrira celles qui, sans affecter de préférence un site à un autre, croissent également sur les montagnes calcaires et granitiques : la quatrieme renfermera les plantes de la plaine qu'on trouve sur les Alpes.

Pour faire connoître toutes les plantes propres aux trois premieres classes, je présente à la fin de ce mémoire une table ou catalogue à trois colonnes, dont la premiere contiendra le nom des plantes que j'ai observées sur les Alpes, rangées suivant le système sexuel, et marquées du chiffre 1 pour celles de la premiere classe, c'est-à-dire, qui sont propres aux montagnes calcaires; du chiffre 2 pour celles de la seconde classe, c'est-à-dire, qui sont particulieres aux Alpes granitiques: enfin, du chiffre 3, celles de la troisieme classe, qui croissent également sur les unes et les autres. Ce catalogue peut servir de Flora Alpina.

Dans la seconde colonne, j'indique le nom des montagnes où se trouvent les plantes que je cite; et dans la derniere colonne, je donne l'élévation de ces mêmes montagnes. Quant aux plantes de la quatrieme classe, c'est-à-dire, celles de la plaine que l'on rencontre sur les Alpes, je n'en parlerái point, afin de ne pas présenter dans la liste des plantes alpines, celles qui viennent

par-tout.

Parmi les plantes des montagnes calcaires, s'offriront à nos regards la gigantesque scabieuse des Alpes, (Scabiosa Alpina. L.) l'humble et charmante tozie, (Tozia Alpina. L.) à corolle jaune, parsemée de petits points noirâtres, qui ne se plaît que dans les endroits touffus; l'éclatante rose des Alpes, (Rosa Alpina. L.) rose sans épine, et le superbe sabot de la Vierge, (Cypripedium Calceolus. L.) dont la forme, les couleurs et les parfums charment également les

yeux et l'odorat.

Parmi les plantes des Hautes-Alpes granitiques, qui pourroit décrire les nombreuses centaurées, saxifrages, renoncules, gentianes, campanules, primeveres, areties, et toutes ces jolies plantes qui plaisent autant par l'éclat de leurs brillantes couleurs, qu'elles étonnent par leur petitesse. Quel Botaniste assez éloquent pourroit exprimer les sensations et les jouissances qu'il a éprouvé en voyant pour la premiere fois les Eryngium Alpinum. L. et Spina alba, Vill. vis-à-vis desquels les autres plantes sont comme l'étain est à l'argent, le cuivre à l'or, le sombre pavot à la rose, le pâle saule au verd laurier. Il semble que la nature ait pris plaisir à les former, et qu'elle ait brisé elle-même le moule qui pouvoit en reproduite de semblables.

La localité des plantes est un des objets qui doit le plus nous intéresser; elle donne lieu à une foule d'observations curieuses et utiles sur l'élévation et la nature du climat, des lieux qu'elles habitent. En divisant en deux classes principales toutes les plantes alpines, relativement à leur élévation, nous verrons que les

unes ne viennent jamais à une élévation de plus de huit à neuf cents toises, et que les autres, destinées à habiter le sommet des Alpes. ne descendent jamais au-dessous de neuf cents à mille toises. Ces observations n'avoient pas échappées à la sagacité de Linnœus et d'Haller. (1) L'Erinus Alpinus nous offre une idée des premieres; l'Erigeron uniflorum, les Ranunculus glacialis parnassifolius, nous donnent une idées des secondes.

Les plantes indiquent d'une maniere sûre le climat et la température des lieux où elles croissent. Nous savons par le récit des savans qui ont long-temps habité dans le nord, (le citoyen Gilibert est de ce nombre ) que les plantes de nos Alpes se trouvent dans les plaines de Lithuanie et de Pologne. Dès lors on est autorisé à penser que le climat de ces pays est à-peu-près le même que celui de nos Alpes.

Les Botanistes se sont attachés à cultiver les plantes des pays chauds, qui ont très-bien réussi en Europe. Il est facile sans doute de produire artificiellement une température égale à celle du climat natal de certaines plantes, mais peu de personnes se sont occupées de la culture des plantes des climats du nord. Ce seroit pourtant un objet digne de l'attention des curieux. Dans le premier cas on n'a cherché qu'à imiter le degré de la température de 30 à 38 degrés; dans

<sup>(</sup>I) Voy. Amanitates Academica, tom. IV, pag. 414, dissertation 68, intitulée Flora Alpina. L. Voyez dans l'Historia d'Haller, tome I, page 282, n.º 656, et suiv. ses observations sur les Gentianes.

celui-ci, il faudroit imiter celle des pays froids et procurer aux plantes du nord le même climat qui est nécessaire à leur développement. On sait que tous les soins qu'on se donne pour cultiver les plantes des Alpes, ne sauroient les empêcher de périr la troisieme année. Il s'agiroit donc de trouver un terme moyen par lequel on pût faire végéter ces plantes et les élever de semences.

Il est des plantes dont les noms spécifiques se prennent des lieux qu'elles habitent, et qui sont appelées alpines ou pyrénéennes, selon qu'elles croissent dans les Alpes ou aux Pyrénées; mais ces noms triviaux ne sont pas toujours justes. L'Erigeron Alpinum, quoiqu'il porte le nom d'alpin, vient à des élévations bien moins considérables que l'Erigeron uniflorum. Ce dernier ne se trouve qu'au sommet des Alpes granitiques et à une élévation de plus de mille ou douze cents toises, l'autre vient à sept ou huit cents toises et habite également les montagnes calcaires et granitiques.

L'Erinus Alpinus se trouve dans les prairies de Sassenage, à Rabou, etc. la Soldanella Alpina, L. dans les prairies de Saint - Eynard, dans les forêts de Chamc-Chaude, et à des élévations souvent peu considérables. Dès lors l'on voit que certaines plantes, quoiqu'elles soient appelées alpines, viennent dans des terreins peu élevés et quelquefois dans la plaine, et que d'autres qu'on ne soupçonneroit pas habiter les Alpes, ne croissent que dans la région des glaces, et

au soumet des montagnes granitiques.

Le nom d'alpines donné à certaines plantes, ne signifie pas toujours que celles auxquelles on

l'a attribué, croissent sur les Alpes, puisque la plupart d'entr'elles se rencontrent fréquemment aux Pyrénées. On peut en juger par la Soldanella Alpina, très-commune aux Pyrénées, et le Ranunculus Pyræneus, qui n'est pas rare dans les Alpes. Mais ces noms spécifiques indiquent au moins que ces plantes sont propres aux monta-

gnes élevées.

Parmi les plantes des Alpes, il en est dont le nom est insignificatif quant à leur localité, et d'autres dont le nom détermine la localité d'une maniere plus satisfaisante. Le senecio doronicum, incana, L. primula farinosa, auricula, vitaillana, L. nous donnent une idée de celles dont le nom spécifique n'indique point la situation. Les ranunculus nivalis, L. glacialis, L. gentiana nivalis, L. glacialis, Hall. artemisia rupestris, glacialis, L. rentrent dans la classe de celles dont le nom trivial faci-

lite l'intelligence de leur localité.

Dans la localité générale, il faut encore observer la localité particuliere, c'est-à-dire, celle que les plantes affectent de préférence. La premiere est relative à la température du climat, à l'élévation des montagnes : celle-ci se rapporte à la nature du sol. Quelques plantes ne se plaisent que dans les terreins chisteux, comme la Berardia subacaulis, Vil. le Ranunculus parnassifolius, L. l'Hieracium taraxaci, L. prunellæfolium, Gouan, le Sysymbrium monense, L.: d'autres au sommet des Alpes, dans les endroits herbeux, comme le Ranunculus rutæfolius , L. l'Anemone baldensis et verna, L.: quelques-unes dans les terres limoneuses alpines, comme la Campanula cænisia, L. valeriana saliunca, All. Cette derniere présente dans ses fleurs et ses racines deux contrastes frappant pour les odeurs suaves et fétides. (2) Quelques autres, comme le Saxifraga umbrosa, L. ne se plaisent que sous l'ombre des sapins, ou dans les prairies marécageuse des Alpes, comme la swertia perennis, L. alium schænoprasum, L. ou sur les bords des ruisseaux provenans de la fonte des neiges, telles que les saxifraga stellaris, L. autumnalis, L.

gentiana bavarica , L.

Parmi les plantes des Alpes, il en est dont les torrens entraînent les semences, et qui s'aclimatent fort bien dans les plaines. C'est ainsi que l'antirrhinum alpinum, L. l'astragalus pilosus, L. l'achillea tomentosa, L. se trouvent dans les plaines du Drac, aux environs de Grenoble: la variété de l'astragalus tracaganta, L. l'ononis cænisia, L. bordent le chemin du Lautaret à Briançon, et que l'hieracium statice-folium, Vil. qui habitent les montagnes calcaires de Saint-Eynards, du Col-de-l'Arc, et qui se rencontre aussi dans les montagnes du Bugey, entraîné par les alluvions du Rhône, s'est fixé au-dessous du pont de la Guillotiere, où je l'ai cueilli le printemps dernier.

D'autres au contraire, constamment fixées aux lieux qui les ont vu naître, ne les abandonnent jamais; et transplantées dans les jardins, elles

<sup>(2)</sup> L'odeur de ses fleurs approche de celle de la vanille, et celle de ses racines se rapproche du cuir pourri. C'est de toutes les valérianes, celle dont l'odeur est la plus forte.

trompent les vœux et les espérances des Botanistes. C'est ce que l'on peut observer dans le ranunculus glacialis. L.

Si des plantes nous passons à l'examen des montagnes dans lesquelles elles se plaisent, nous verrons que les Alpes calcaires présentent des masses considérables, presque toutes taillées à pic, difficiles à escalader et à parcourir, souvent mêmes inaccessibles, (le Mont-Aiguille) et dont l'aspect fatigue bientôt les yeux et l'imagination.

Les Alpes granitiques, au contraire, réunissent la variété des formes à la beauté des sites. Elles affectent 1.º la forme d'un cône; 2.º celle d'un pain de sucre, tronqué à son sommet, ne présentant qu'une grande surface convexe, qu'on peut comparer au chapiteau d'un champignon.

Du sommet ou col du Golbier ou Galibier, anciennes limites de la Savoie et de la France, les yeux découvrent une pépiniere de montagnes. Il semble qu'on apperçoit un vaste camp rempli d'un nombre infini de tentes, qui auroient toutes été métamorphosées en montagnes. Le Mont-Blanc, qui les domine toutes, semble les avoir engendré, et on pourroit le comparer à Polypheme au milieu des autres cyclopes, qu'il surpasse par la hauteur démesurée de sa taille. Parmi tous ses enfans, qui ont hérité plus ou moins en partage de sa vaste étendue, les uns élevent vers le ciel leurs têtes chargées de neiges et de glaces éternelles : les autres, dépouillés de cet aspect sauvage, n'offrent au contraire que des gazons émaillés de fleurs.

Le naturaliste, sur le sommet des Alpes,

s'énorgueillit de s'élever au dessus de ses semblables, et de s'éloigner de ces villes en apparence si florisantes par leurs arts et leurs monumens; mais où les passions qui s'y entre-choquent sans cesse, remplissent de deuil et de chagrins leurs malheureux habitans. (3)

Ses yeux contemplent avec étonnement ces masses énormes, qui paroissant pour ainsi dire suspendues au milieu des airs, semblent prêtes à écraser de leurs poids, le naturaliste téméraire qui veut les observer de trop près. Ils se reposent avec admiration sur ces mers de glaces, qui établissent des communications entre le sommet de toutes ces vastes montagnes. Ils admirent ces majestueuses et murmurantes cascades, qui, affectant dans leurs chûtes un nombre infini et varié de formes, charment les yeux par la beauté et la nouveauté du spectacle, en même-temps qu'elles frappent les oreilles d'un bruit que les diverses influences des vents augmentent ou affoiblissent à chaque instant.

S'élevant ensuite des objets créés à l'auteur de leur création, il bénit la main puissante qui entretient dans toutes les différentes parties de ce vaste univers l'ordre et l'harmonie. Son imagination s'exaltant, ses réflexions se portent sur lui-même, et son étonnement augmente en considérant la facilité avec laquelle son corps se prête à tous les mouvemens dont les animaux sont capables; en voyant « comme il s'incline, s'agenouille, rampe, glisse, nage, marche

<sup>(3)</sup> Etudes de la Nature.

court, saute, s'élance, descend, monte, grimpe : enfin, comme il est également propre à gravir au sommet des rochers et à marcher sur la surface des neiges, à traverser les fleuves et les forêts, à respirer l'air au niveau des mers et au sommet des plus hautes montagnes, à cueillir la mousse des fontaines et des palmiers, à élever l'abeille et à demande l'élé le

l'abeille et à dompter l'éléphant. » (4)

Au milieu de ces réflexions, un spectacle imposant s'offre à ses regards. Tout-à-coup les vents impétueux soufflent avec fureur, les nuages, poussés avec la rapidité d'une flèche, obscurcissent totalement l'horison, la foudre gronde, les éclairs sillonnent les nues, l'athmosphere semble convertie en une mer de feu, et les éclats redoublés du tonnerre, répétés par mille et mille échos, portent la terreur et l'épouvante dans l'ame des animaux : déjà des torrens se précipitent en mugissant du sommet des montagnes et inondent la plaine; tous les météores aqueux et ignés, réunis et divisés, semblent présager la destruction du globe, tandis que le naturaliste, qui voit cette scene vraiment effrayante sous ses pieds, jouit d'un ciel pur et serein, et est seul tranquille au milieu de ces convulsions effroyables de la nature.

Mais bientôt les vents s'appaisent, les nuages se dissipent, l'horison s'éclaircit, la foudre ne se fait plus entendre que par intervalles et dans le lointain, le calme renaît, et le naturaliste, avorisé par les élémens, peut regagner en paix

<sup>(4)</sup> Etudes de la Nature.

sa chaumiere, l'ame émue du spectacle imposant

dont il vient de jouir.

Les mœurs des habitans des Alpes doivent nous intéresser. Humains, hospitaliers, accoutumés aux visites des Botanistes, ils nous ont toujours reçu avec bonté. Leur caractere ne se ressent en rien de la rigueur du pays qu'ils habitent. Leur vie est un contraste frappant de l'inertie la plus grande, aux travaux les plus rudes de l'agriculture. Ensevelis un tiers de l'année sous la neige, vivant pendant ce temps dans leurs écuries avec leurs bestiaux, ils n'ont d'autre occupation que celle de battre leur bled. La plupart d'entr'eux, obligés de s'exiler de leur pays pendant l'hiver, viennent au milieu de nous exercer leurs talens ou leur industrie.

Mais à l'époque de la moisson, ils sortent de cette espèce de stupeur et d'engourdissement, pour ne s'occuper entiérement que du soin de recueillir leur récolte. Obligés de semer avant de recueillir, ils passent des semences à la récolte du froment, et de cette dernière, à celle des foins. Rien de plus curieux que la manière dont ils disposent leurs gerbes dans les champs. (5)

Obligés par la rareté du bois à ne cuire qu'une fois l'année, ils mangent un pain qui ressemble au biscuit de mer, mais qu'il faut couper avec une hache ou faire macérer pendant vingt-quatre heures dans l'eau ou le lait. La même raison

<sup>(5)</sup> Ces gerbes réunies au nombre de vingt en un seul faisceau, et disposées symétriquement de distance en distance dans leurs champs en amphithéâtre, ressemblent à un vaste camp garni de tentes.

existant pour leur cuisine, ils se servent pour cuire leurs alimens de bouze de vache ou de tourbe, qui produisent dans le premier moment de leur ignition une fumée noire et épaisse, qui communique une odeur et un goût désagréables à tous les mets qu'on y expose.

L'imagination sans cesse frappée des objets qui se présentoient à nos regards, nous suggéroit des idées prises de la nature des lieux. C'est ainsi que nous avions surnommé le chemin du Lautaret à Briançon, la vallée des Clochers, et celui du bourg d'Oisans à la Grave, la vallée des Cascades.

Dans ces pays, il faut lever les yeux pour appercevoir des villages, situés à des élévations considérables, dont les maisons bâties solidement et recouvertes en ardoises, sont très-rapprochées les unes des autres pour la facilité des communications pendant l'hiver. Mais ces rapprochemens donnent lieu à des accidens fâcheux, sur-tout dans les incendies, comme il arriva au bourg d'Oisans, qui fut totalement consumé par les flammes le 12 janvier 1791, ainsi qu'on le voit par l'inscription mise sur une des principales maisons de la grande place. (6)

des révolutions terribles, telles que les avalanches de neige et de glaciers, à des écroulemens de rochers, à des inondations violentes, occasion-

<sup>(6)</sup> Ce bourg, qui portoit autrefois le nom de Saint-Laurent-du-Lac, étoit situé au-dessus d'un grand lac, qui, ayant rompu les digues que la nature lui avoit opposées jusqu'alors, s'écoula en 580 et causa des dégats affreux.

nées par les écoulemens des lacs. Il semble que les glaciers, à raison de leur étendue et de leur solidité, devroient perpétuellement rester fixés aux lieux où ils se sont formés: mais leurs masses

énormes ne sont pas à l'abri des chûtes.

Les glaciers, fondant toujours en dessous et jamais par dessus, il en résulte de là que leur base forme une concavité, qui, s'augmentant annuellement tant en hauteur qu'en largeur, c'est-à-dire dans toute l'étendue de leur surface inférieure, tandis que les parois latérales, à l'aide desquelles ils reposent sur les rochers, diminuant de force et d'épaisseur : il en résulte, dis-je, que lorsque ces piliers ou parois ne peuvent plus soutenir le poids qu'ils ont supporté, la totalité du glacier doit s'affaisser et se précipiter. (7)

Parmi les animaux qui habitent les Alpes des environs de Grenoble, on distingue l'ours, le

chamois, la marmotte et l'écureuil.

Le premier, (ursus arctos, L.) ordinairement pacifique et frugivore, devenu quelquefois cruel, exerce sa fureur sur les bœufs, les chêvres et les moutons, attaque les hommes et poursuit vivement les femmes, qu'il aime avec passion.

Le chamois, aux pieds légers, (antilope rupi capra, L.) relégué dans la région des frimats et des glaces, bondit, se précipite, paroît voltiger plutôt

<sup>(7)</sup> Les habitans du pays nous ont appris qu'il s'écroula, il y a déjà long-temps, un glacier situé au-dessus de la Magdeleine, qui resta deux ans à fondre, et qui couvrit toutes les terres ensemencées; mais au bout de ce temps la récolte fut très-abondante.

que courir sur les pointes des roches escarpés, avec une légéreté qui semble tenir plus de l'oiseau que du quadrupede. Mais sa vîtesse ne sauroit le soustraire au plomb meurtrier du chasseur, qui bravant la nature même, l'attend dans les passages où il est obligé de se rendre, et le prive de la vie, pour s'emparer de ses dépouilles.

Les premiers momens du réveil, qui succede au long assoupissement de la soporeuse marmotte, (arctomys marmotta, L.) s'annoncent par des sifflemens aigus et souvent réitérés, à l'aide desquels elles s'avertissent mutuellement de l'ap-

proche de l'ennemi.

L'écureuil, (sciurus vulgaris, L.) plus silencieux et moins sauvage, nous a souvent fait admirer la légéreté avec laquelle il grimpe sur les arbres, saute d'une branche à l'autre, et semblant en quelque sorte ne plus appartenir à la terre, établit son domaine au-dessus des hautes forêts, et pour ainsi dire au milieu des airs.

Parmi les oiseaux, le grand aigle ou aigle doré, (falco chrysœtos, L.) le pygargue ou l'aigle à queue blanche, (falco leucocephalus, L.) le choquard ou choucas des Alpes, (corvus pyrrhocorax, L.) le destructeur des sauterelles, le casse noix, (corvus caryocatactes, L.) le faisan, (phasianus colchicus, L.) le tetras ou grand coq de bruyere, (tetrao urogallus, L.) la gelinotte, (tetrao bonasia, L.) l'intéressant lagopede, (tetrao lagopus, L.) dont la blancheur ne le cede qu'à celle de la neige, la bartavelle, (tetrao rufus, L.) le merle solitaire, (turdus solitarius, L.) le pinson de neige ou la niverolle, (fringilla nivalis, L.) le grand martinet à ventre blanc,

blanc, (hirundo melba, L.) etc. sont ceux qu'on

y rencontre le plus fréquemment.

Les papillons, emblèmes de la légéreté et de l'inconstance, se plaisent dans les Alpes, dont la flore a pour eux des attraits. Ces charmans animaux, qui semblent être toujours en mouvement, et ne se reposent que par instant, jouent ainsi que les vents, au gré desquels ils voltigent sans cesse d'une plante à l'autre, un grand rôle dans la fécondation des végétaux. "Quand les poëtes, d'une touche délicate et gracieuse, nous ont peint les chastes amours du léger Zéphire et de la brillante Flore, s'imaginoient-ils, dit M. Bonnet, que cette charmante fiction fût la nature elle-même! "(8)

C'est ainsi que le Botaniste, sur les Alpes,

<sup>(8)</sup> Les papillons que l'on rencontre le plus fréquemment sur les Alpes, sont : l'apollon, (papillio apollo , L. ) le paon de jour , ( papillio io , L. ) l'alexis, ( papillio ligæa, L. ) l'actée, ( papillio actæa, L.) l'éthiopien, (papillio æthiops, L.) le paphia, ( papillio paphia, L. ) l'aglaja, ( papillio aglaja, L.) la phalene du plantain, (bombyx plantaginis, L.) la phaléne du pin, (phalena pini, L.) etc. Quant aux insectes, les bois de la Grande-Chartreuse nous en ont offert de très rares, qu'on ne rencontre que dans les pays du nord, mais dont l'énumération seroit ici déplacée. La conchyologie, dont je me suis un peu occupé sur les Alpes, m'a offert des especes rares. J'y ai observé deux variétés de la livrée (helix nemoralis, L.) toutes deux plus petites que l'espece ordinaire, dont l'une a les rubans constamment entrecoupés, et l'autre la levre blanche. J'y ai découvert deux especes de sebot et de bulime, dont la description se trouvera dans un ouvrage sur les coquilles de France, qui va paroître incessamment.

dévoue tous ses momens à l'observation. Mais bientôt les neiges qui couvrent le sommet des montagnes, forment un épais rideau, sous lequel on diroit que la nature veut cacher à ses yeux les plantes qu'elle lui avoit offerte auparavant.

Bientôt ces immenses glaciers ne paroissent plus qu'un vaste miroir également dangereux pour le curieux qui voudroit y fixer trop longtemps ses regards, et pour le naturaliste qui oseroit en parcourir la surface (9). Ces énormes masses granitiques n'offrent plus qu'une idée du désordre et du chaos, et l'esprit étonné de se retrouver sans cesse au milieu du silence de la nature, se livre alors à la mélancolie et à la tristesse.

Bientôt le désir de revoir ses parens et ses amis, qu'on avoit plus d'une fois oublié pendant son voyage, se fair sentir vivement. Bientôt ces majestueuses cascades, ne frappant plus les oreilles que d'un murmure monotone et perpétuel, le Botaniste obéit à ces impulsions secrettes, et se rend dans le sein de sa famille.

De retour dans sa demeure, il assemble ceux de ses collegues qui n'ont pu partager ses plaisirs

<sup>(9)</sup> Pour se garantir des effets dangereux de la reverbération du soleil sur la neige, et sur-tout sur la neige nouvellement tombée, il est à propos de porter avec soi des yeux de verre colorés en verd ou bleu, avec lesquels on peut fixer les neiges ou les glaciers, sans craindre aucun accident fâcheux. Ceux qui ignorent ces précautions, risquent de perdre la vue, ou au moins d'éprouver un grand affoiblissement dans cet organe.

et ses dangers, il leur étale ses trésors, et jouit intérieurement de la sensation que leur fait éprouver l'aspect des plantes rares qu'il leur met sous les yeux. A combien de désirs secrets cette vue ne donne-t-elle pas lieu! Mais passant ensuite à des sentimens plus généreux, il leur fait part de ses richesses, et ses dons établissent une lutte intéressante entre l'amitié qui offre, et la

reconnoissance qui accepte, et promet.

roman resident

S'occupant ensuite des travaux relatifs à son voyage, il observe et étudie ses plantes, envoie aux grands Botanistes des échantillons de celles qu'il regarde comme nouvelles ou rares, leur demande leurs avis, et s'aide de leurs conseils. C'est ainsi qu'en se ménageant dans la saison rigoureuse des frimats une occupation également instructive et satisfaisante, il attend dans le silence de son cabinet, et au milieu de ses précieuses collections, le renouvellement de la belle saison, qui doit le ramener, avec le soleil régénérateur, sur la scène de la nature.

## CATALOGUE DES PLANTES

OBSERVÉES sur les montagnes calcaires et granitiques des environs de Grenoble, rangées suivant le système sexuel.

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croissent.	Élévation de ces montagnes.
DIANDRIE.	THE COMPACT IN	Toises.
Monogynie.	ATTENDED BY THE	TOTAL TERM
2 Circæa Alpina. L.	Premol.	900
2 Veronica Allioni. Vil.	Lautaret.	1073
3 Aphylla. L.	Chame-Chaude.	1000
allegand of magnety Harris	Lautaret.	1000
2 Bellidioides. L.	Charrousse.	1200
3 Bellidioides, L. Fruticulosa, L.	Provésieux,	800
WHEN THE PROPERTY	Charrousse.	1200
3 Saxatilis. L.	idem.	idem.
2 Alpina. L.	Col-du-Galibier.	1400
I Pinguicula Alpina. L.	Saint-Nizier.	800
I Villosa. L.	Les prairies de	SINE CECK
divides tolkingtons and area	Chichiliane.	800
TRIANDRIE.	A Company	
Monogynie.		
3 Valeriana Rubra,	Chame-Chaude,	800
Var. Angustifolia. L.	Mont-de-Lans.	800
3 Dioica. L. Var.	Sapai,	518
the tender of the same	Lautaret.	1873
Tripteris, L.	Sassenage.	300
Montana. L.	Saint-Nizier.	800
	Montag. de Grece	900
The same of the sa	Galibier.	1400

Noms des plantes.	Noms des montagnés où elles croissent.	Élévation de ces montagnes.
Tourse Tourse		Toises.
2 Crocus Sativus. L.	Premol.	900
3 Nardus Stricta. L.	Premol ,	900
	Lautaret.	1073
Digynie.	Li .li V .saucar	
3 Phleum Alpinum. L.	Provésieux,	800
2 C701 P. Poznana Sama	Lautaret.	1073
3 Poa Alpina,	Saint-Nizier,	800
Var. Vivip. L.	Lautaret.	1073
2 Avena Setacea. Vil.	Provésieux.	800
3 Montana. Vil.	Chame-Chaude,	1073
3 . 888 . di . 394mana	Lautaret.	1073
2 Agrostis Setacea. Vil.	Lautaret.	1073
TETRANDRIE.	Harris	
I E I K A N D K I B.	Frimit Strampa	aben and s
Monogynie.	Alexander of	. d . street
2 Globularia Cordifolia.L.	Sassenage.	300
2 Nudicaulis, L.	Saint-Nizier.	800
2 Scabiosa Alpina. L.	Col-de-l' Arc.	800
2 Lucida, Vil.	Saint-Martin de	2
201 1 1000	Cornillon.	900
2 Galium Saxatile. L.	Saint-Nizier.	800
3 Plantago Alpina. L.	Lautaret,	1073
	Chame-Chaude.	1073
3 Alchemilla Alpina.	Saint-Nizier,	800
660	Lautaret.	1073
2 Var. Hybrida, L.	Charmanson.	700
2 Pentaphylla. L.	Rousses en Ot-	1000
PENTANDRIE.	sans.	1200
COMPANY TO THE PROPERTY	September 1	2 Condana
Monogynie.	by od statement	e e
2 Myosotis Nana. Vil.	Lautaret.	1073
2 Aretia Alpina L.	Lautaret.	1200
2 Vitaillana. L.	Galibier.	1400
I Androsace Villosa. L.	Col-de-l'Arc.	800

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croissent.	Élévation de ces montagnes.
Personal Property Section 2 was a second sec	-	-
AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	A	Toises.
2 Androsace Lactea, L.	Taillefer.	1073
2 Carnea. L.	Taillefer.	1073
2 Primula Farinosa. L.	Lautaret.	1073
2 Viscosa. Vil.	Mont-de-Lans.	666
I Lutea, Vil.	Saint-Nizier.	800
3 Soldanella Alpina. L.	Chame-Chaude,	1073
Citat 1 . Postan	Charrousse.	1200
2 Azalea Procumbens. L.	Charrousse.	1200
2 Campanula Cænisia. L.	Galibier.	1400
2 Cæspitosa, Vil.	Uriage.	The American
3 Rhomboidea. L.	Lautaret,	1073
Stat The Water	Sassenage.	388
3 Thyrsoidea. L.	Chame-Chaude,	1073
	Lautaret.	1073
2 Var. Pedunculatis flori-	Arment n.u.n	1.71
bus. L.	Mont-de-Lans.	1000
2 Var. Cæruleis floribus.L.	Lautaret.	1073.
2 · Barbata, L.	Lautaret.	1073
Allionii. Vil.	Mont-Eguille.	modern 2
2 Phyteuma Pauciflora. L.	Charrousse.	1200
2 Orbicularis. L.	Saint-Nizier.	800
I Lonicera Alpigena L.	Saint-Eynard.	696
I Rhamnus Alpinus. L.	Sassenage.	300
Thesium Alpinum. L.	Saint-Nizier.	800
I Evonymus Europeus,	The second of	I mailala
Var. latifolia. L.	Saint-Eynard.	696
I Ribes Alpinum. L.	Saint-Eynard.	696
nonum y	DI U SPINOVII	ET CONTRACT
Digynie.	ari or midning	1
2 Swertia Perennis. L.	Lautaret.	1073
C The T	Saint-Nizier.	800
Donatata T	Taillefer.	1073
A 1 -index T	The State of the S	1073
3 Acaulis, L.	Sassenage,	300
Oner Ziennie	Charrousse.	1000
2 Alpina. Vil.	Charrousse.	1200

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croissent.	Elévation de ces montagnes.
.2010		Toises.
3 Gentiana Verna. L.	Saint-Nizier ,	800
5 Gentiana Verna. E.	Lautaret.	1073
2 Bavarica, L.	Lautaret.	1073
Nivalis. L.	Lautaret.	1073
* Glacialis. Hall.	Lautaret.	1075
2 Eryngium Alpinum. L.	Dans le Queiras.	an ittel
3 Spina Alba. Vil	Saint-Nizier,	800
Deki 1/1 Lineausviji	Mont-de-Lans.	1000
3 Astrantia major. L.	Saint-Nizier,	800
	Mont-de-Lans.	666
2 Minor. L.	Taillefer.	1073
2 Buplevrum Stellatum.L.	Lautaret.	1073
2 Longifolium. L.	Lautaret.	1073
I Athamanta Cretensis. L.	Saint-Nizier.	800
2 Laserpitium Halleri. V.	Lautaret.	1073
Simplex. L.	Galibier.	1400
2 LigusticumGmelini.Vil. 3 Æthusa meum. L.	Lautaret. Gr. Chartreuse.	1073
3 Æthusa meum. L.	Lautaret.	1073
- Channel III Hisan	07	10/3
I Chærophyllum Hirsu- tum. L.	Sapey.	
I Alpinum. Vil.	Saint-Nizier.	800
Aureum. L.	Sur le chemin du	dayse by
2 Harcam. D.	Sapey.	400
I Cicutæfolium. Vil.		300
2 Imperatoria Osthru-		7
tium, L.	Premol.	900
	A WAR WAR	

<sup>(\*)</sup> Gentiana glacialis, Hall. Gentiane glaciale, à calice d'une seule piece à quatre segmens inégaux, lancéolés, à oreillettes à leur base, à corolle monopétale, à quatre ou cinq divisions, à tube renflé de la longueur du calice, à gorge de la corolle vélue, à quatre ou cinq étamines insérées sur la corolle, opposées à ses divisions, à antheres oblongues, à germe oblong. Cette charmante gentiane, que j'ai trouvée au Lautaret, se rapproche beaucoup du gentiana cam pestris. L. à côté de laquelle Haller l'a placée avec raison. Voyez son historia, n.º 652.

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croissent.	Elévation de ces montagnes.
Andrew Turns		Toises.
3 Statice Armeria,	Col-de-l'Arc ,	800
Var. Latifolia Alpi-		2000
na. L.	Lautaret.	1073
I Linum Angustifolium,	Markey A	
Var. Ramusculis per	Cal Ja 1: Aug	800
terram sparsis. T.  3 Alpinum. Vil.	Col-de-l'Arc.	800
J Alphidin. vii.	Charrousse.	1200
HEXANDRIE.	Citarrousse.	Marina E
SECTION OF THE PROPERTY AND ADDRESS.	- Inches	Can B
Monogynie.	Zi ciguilla	The c
I Narcissus Pseudo-nar-	atimists Perkins	3 Buplevi
cissus. L.	Seisseins.	130
2 AlliumSchænoprasumL.	Lautaret.	1073
2 Uvularia Amplexifo-	The Handert Value	Append a
lia. L.	Uriage.	700
I Tulipa Sylvestris. L.	Chichiliane.	800
2 Anthericum Seroti-	Man la Tana	1200
num. L. Calyculatum. L.	Mont-de-Lans.	1073
5 Caryculatum. L.	Lautaret, Saint-Nizier.	800
I Liliastrum. L.	Col-de-l'Arc.	300
I Convallaria Bifolia. L.	Saint-Nizier.	800
2 Juneus Trifidus. L.	Lautaret.	1073
2 Triglumis. L.	Lautaret.	1073
I Niveus. L.	Saint-Nizier.	800
2 Luteus. Vil.	Lautaret.	1073
2 Pediformis. Vil.	Charrousse.	1200
2 Scheuchzeria Palustris.L.	Premol.	900
OCTANDRIE.		model sime
1522 BEETO & PROPERTY TO AUTHOR	Market Market	it laur beer
Monogynie.	CONTRACTOR OF THE PARTY	The state of the s
I Epilobium Montanum,		a Managarana.
Var. Foliis Verticil-	Col-de-l' Arc.	800
latis.		1073
2 Alpinum, L.	Transfer 0012 0001	I Daphne

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croissent.	Élévation de ces montagnes.
Office and the second s	BECASOLIZATION OF THE PROPERTY	Toises.
- Doub. Alice T	C 37: .	
I Daphne Alpina. L. Cneorum. L.	Saint-Nizier. Saint-Eynard.	800 696
	Sucre Lighter w.	090
Digynie	A CONTRACTOR	
1 Moerrhingia Muscosa.L.	Sassenage.	130
Trigynie.		
2 Polygonum Bistorta. L.	Saint-Nizier.	800
Wiviparum. L.	Lautaret,	1073
	Saint-Martin de	411
DÉCANDRIE.	Cornillon.	800
Monogynie.	AND STABLES	140 TE
3 Rhododendron Ferrugi-	Col-de-l' Arc ,	800
neum. L.	Charrousse.	900
I Arbutus Alpina. L.	Chame-Chaude.	1073
2 Uva-Ursi. L.	Saint-Nizier.	800
I Pyrola Secunda, L.	Saint-Nizier.	800
3 Saxifraga Cotyledon. L.	Sassenage. Charrousse.	130
2 Androsacea. L.	The state of the s	900
	Lauraret.	1073
S Stellaris. L.	Lautaret.	1073
2 Umbrosa. L.	Premol.	900
3 Oppositifolia. L.		000
71.0	Galibier.	1400
2 Biflora. All.	Galibier.	1400
Aspera. L. Rotundifolia. L.	Charousse. Sassenage.	900
2 Autumnalis. L.		130
I Cœspitosa. L.	Saint-Nigier.	1073 800
I Gypsophylla Repeus. L.		800
2 Dianthus Alpinus. L.	Lautaret.	1073
I-Gratianopolitanus. Vil.	Col-de-l'Arc.	800
2 Silene Vallesia. L.	Le Dauphin.	Part Mile

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croïssent.	Élévation de ces montagnes.
THE REAL PROPERTY.		Toises.
I Silene Acaulis. L.	Col-de-l'Arc.	800
2 Arenaria Biflora. L.	Charrousse.	900
2 Ciliata. L.	Col-de-l' Arc.	800
I Verna. L.	Chame-Chaude.	1073
2 Laricifolia. L.	Charrousse.	900
2 Cherleria Sedoides. L.	Charrousse.	900
2 SedumAnacampseros.L.	Lautaret.	1073
3 Atratum. L.	Chame-Chaude,	1073
ATOT A PROPERTY	Charrousse.	900
I Lychnis Quadridenta-		
ta. L.	Saint-Nigier.	800
3 Alpina. L.	La Belle-Etoile,	1400
Salar Sa	Mont-de-Lans.	1000
2 * Cerastium Latifo-		
lium. L.	Galibier.	1400
2 Spergula Saginoides. L.	Lautaret.	1073
Dodécandrie.		
Dodécagynie.		
3 Sempervivum Monta-	Mont-Rachet	588
num. L.	Lautaret.	1073
2 Arachnoideum. L.		900
-		900

<sup>(\*)</sup> Dans les caryophyllées, la disposition des étamines mérite d'être observée avec soin. Les plantes de cette famille m'ont convaincu que les caracteres les plus sûrs pour la distinction des especes, devoient se prendre de l'insertion des étamines sur le réceptacle, le calice, la corolle, et sur-tout de leur opposition avec ces deux dernieres parties. Je n'en citerai que deux exemples. Le Cerastium aquaticum présente dix étamines disposées sur deux rangs de grandeur inégale, dont les cinq supérieures sont opposées aux folioles du calice, et les inférieures aux pétales. La même disposition s'observe dans le Cerastium aquaticum, qui présente en outre, cinq glandes situées à la base des onglets des pétales.

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croissent.	Élévation de ces montagnes.
ICOSANDRIE.		Toises.
Monogynie. 2 Prunus Padus. L.	Uriage.	700
Digynie.  1 Cratægus Aria. L.	Saint-Nizier.	800
Pentagynie.  1 Mespilus Amelanchier L.	Pont-de-Claix.	
Cotoneaster. L.  Spiræa Aruncus. L.	Saint-Nizier. Col-de-Lans.	800
Poligynie.  I Rosa Alpina. L.	Saint-Nizier.	800
I Rubus Saxatilis. L. I Potentilla Aurea. L. Nitida. L.	Saint-Nizier. Charmant-Som. Chame-Chaude.	800 700 1073
Valderia. L.  Geum Reptans. L.	Col-de l'Arc. Galibier.	1400
2 Montanum. L. 2 Dryas Octopetala. L.	Lautaret. Col-de-l'Arc.	800
Polyandrie.  3 Papaver Alpinum. L.	Moucherolle, Rousses.	1200
2 Aconitum Anthora. L. Lycoctonum. L.	Lautaret:	1200
Pensagynie.  2 Aquilegia Alpina. L.	Lautaret	1073
Polyginie.		
3 Anemone Baldensis. L.  Vernalis. L.  Alpina. L.	Mont-de-Lans, Galibier. Charrousse.	1400 1400 900
3 Alpina. L.	Col-de-l'Arc, Lautaret.	800

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croissent.	Elévation de ces montagnes.
Tours	The same of the sa	Toises.
3 Anemone Narcissiflo-		800
ra. L.	Lautaret.	1073
2 Atragene Alpina. L.	Lautaret.	1073
2 RanunculusPyreneus.L. 3 Parnassifolius I	· Control of the cont	800
3 Parnassifolius. L.	Mont-de-Lans,	1400
7 71 7	Belle-Etoile.	1400
Thora. L. Aconitifolius I	Saint-Nizier.	800
3 Aconitifolius. L.	Col-de-l'Arc,	800
~ 008 *D C.I. T	Lautaret.	1073
2 *Rutæfolius. L. 2 Glacialis. L.	Mont-de-Lans.	1400
O MOMENTO. E.	Galibier.	1400
	Col-de-l'Arc.	800
TAXDCOLLIO, ID.	Col-de-l'Arc.	800
3 Trollius Europæus. L.	Saint-Eynard,	696
I Isopyrum Thatictroi-	Lautaret.	1073
des. L.	Seisseins.	130
DIDYNAMIE.		
Gymnospermie.		
2 Ajuga Alpina. L.	Saint-Nizier,	800
I Sideritis Hyssopifolia.L.	Saint-Martin de	0-
- D	Cornillon.	800
2 Betonica Hirsuta. L.	Mont-de-Lans.	900
Carlotte and the second		

<sup>(\*)</sup> La forme du nectar ou mieller varie dans les Renoncules. J'ai observé 1.° que dans le R. Gramineus, L. le nectar forme un petit cornet très-ressemblant au nectar de l'Isopyrum thalictroides, L. mais beaucoup plus grand; 2.° dans les R. ficaria, L. repens, L. et falcatus. L. il consiste dans un petit onglet, le plus souvent bifide; 3.° dans le R. aconitifolius, L. il affecte la forme d'un tube, presque toujours bifide à son sommet; 4.° dans les R. rutæfolius, glacialis, alpestris, et dans les variétés du R. aquatilis, il consiste dans une petite cavité, ou un petit point; 5.° dans le R. nivalis, L. il imite une petite vessie percée à son sommet, etc.

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croissent.	Élévation de ces montagnes.
CHICAGO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP		Toises.
3 Thymus Alpinus. L.	Col-de-l' Arc ,	800
a Contellaria Alpina T	Mont-de-Lans.	1000
2 Scutellaria Alpina. L.	Mont-de-Lans.	1000
Angiospermie.	L. Lamine	usiott.
3 Bartzia Alpina. L.	Col-de-l' Arc ,	800
- TE : Al : T	Lautaret.	1073
I Tozia Alpina. L. 2 Pedicularis Rostrata. L.	Col-de-l'Arc.	800
I Foliosa. L.	Taillefer. Gr. Chartreuse.	621
2 Flammea. L.	Charrousse.	900
2 Verticillata. L.	Lautaret.	1073
2 Tuberosa. L.	Charrousse.	900
3 Antirrhinum Alpinum.L.		1073
- Frings Alpinus T	Galibier.	800
I Erinus Alpinus. L.	Col-de-l'Arc.	800
TÉTRADYNAMIE.	Adiy, state and	
Siliculeuse.		
1 Draba Pyrænaica. L.	Chame-Chaude.	1073
2 Incana. L.	Charrousse.	1000
3 Aizoides. L.	Saint-Nizier,	800
- T - T AV . T	Galibier.	1400
I Lepidium Alpinum. L.	Saint-Nizier.	800
I Thlapsi Montanum. L.  Alpestre. L.	Saint-Nizier. Saint-Nizier.	300 800
3 Iberis Rotundifolia. L.	Chichiliane,	800
STORES OF STREET	Charrousse.	1000
2 Alyssum Alpestre. L.	Lautaret.	1073
Montanum, L.	Saint-Nizier.	800
Siliculeuse.	The American Mark	CHANGE OF THE PARTY OF THE PART
1 Dentaria Pentaphyllos. L.	Gr. Chartreuse.	621
I Var. Heptaphyllos. L.	Gr. Chartreuse.	621
2 CardamineBellidifoliaL.	Manager and the second	1073
2 Trifolia, L.	1 attlefer.	1073

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croissent.	Élévation de ces montagnes.
and the		Toises.
2 Sisymbrium Strictissi- mum. L.	Mont-de-Lans.	666
2 Bursifolium, L.	Lautaret.	1073.
Monense. L.	Galibier.	1400
I Cheirantus Alpinus. L.	Col-de-l' Arc.	800
I Arabis Alpina. L.	Sassenage.	300
2 Bellidifolia. L.	Lautaret.	1073
I Brassica Alpina. L.	Provésieux.	800
2 Richeri. L.	Lautaret.	1073
F Synapis Pyrænaica. L.	Seisseins.	130
2 Isatis Tinctoria. L.	Briançon.	696
MONADELPHIE.	The second	
Décandrie.		This law
I Geranium Nodosum.	Ebeins_	130
I Lucidum. L.		130
Patulum.Vil.	Charmant-Som.	700
DIADELPHIE.		1072
Error Samuel and	sometime	Charles Co.
Octandrie.	A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	
Polygala Amara. L.	Saint-Eynard.	696
I Chamæbuxus.L.	Ebeins.	130
2 Ononis Cænisia. L.	Lautaret.	1073
r Rotundifolia, L.	Col-de-l' Arc.	800
I Anthyllis Montana. L.	Col-de-l'Arc.	800
2 Orobus Luteus. L.	Lautaret.	1073
2 Vicia Sylvatica. L.	Lautaret.	1073
I Cytisus Laburnum. L.	Saint-Nizier.	800
2 Phaea Alpina. L.	Lautaret.	1073
2 Astragalus Montanus L.	Galibier.	1400
1 Var. Foliis Hirsutis. L.	Col-de-l'Arc.	800
Depressus. L.	Saint-Eynard.	696
I Helmintocarpos. L.	Chichiliane.	800
Pilosus. L.	Plaines du Drac.	130.
2 Campestris. L.	Lautaret.	1 1073

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croissent.	Elévation de ces montagnes.
The same of the sa	CONTRACTOR OF MUSICALISMS	Toises.
2 Fœtidus. Vil.	Galibier.	1400
2 Tragacantha. L.	Lautaret.	1073
	Mont-de-Lans.	1000
2 Trifolium Alpinum. L. 3 Thalii. Vil.	Lautaret,	1073
	Provésieux.	1075
I Flexuosum, Vil.	Saint-Martin de	
	Cornillon.	800
2 Spadiceum. L.	Uringe.	700
POLYADELPHIE.	The April 1980.	
TOLYADELPHIE,		
Polyandrie.	A 42 331	
- Hamanian T 1: 77'1	Et alas	Carried Street
I Hypericum Liotardi. Vil.	Ebeins. Saint-Martin de	130
Nummularium. L.	Cornillon.	0
SYNGENÉSIE.	Corntition.	800
SNA		
Polygamie égale.		The state of
2 Sonchus Alpinus. L.	Lautaret.	1073
I Prenanthes Purpurea. L.	Saint-Martin-de	20/0
Brillian Street on Street, Street	Cornillon.	800
2 Hieracium Prunellæfo-		Party Set Land
lium. L.	Lautaret.	1073
3 Taraxaci. L.	Mont-Eguille,	1000
	Lautaret.	1073
2 Aurantiacum, L.	Lautaret.	1073
2 Paludosum. L.	Lautaret.	1073
2 Amplexicaule. L.	Lautaret.	1073
2 Var. Blatarioides. L.	Taillefer.	1073
Villosum. L. Piloselloides Vil.	Lautaret.	1073
	Saint-Nizier.	800
I Staticefolium.Vil.  Lawsonii. Vil.	Saint-Eynard.	696
I Pulmonarioides. Vil.	Col-de-l'Arc.	800
2 Pappoleucum. Vil.	Saint-Nizier. Lautaret.	800
2 Leontodon Aureum, L.	Lautaret.	1073
	Little et.	1073

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croissent.	Élévation de ces montagnes.
AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	DESCRIPTION OF SECURE	Toises.
I Hyoseris Fœtida, L.	Col-de l'Arc.	800
3 Hypochæris Pontana.L.	Lautaret,	1073
	Chichiliane.	1073
Maculata. L.	Mont-de-Lans.	1000
I Arctium Personnata. L.	Mont-Aiguille.	
2 Serratuta Alpina. L.	Galibier.	1073
2 Carduus Heterophyl-	7 7	
lus. L.	Lautaret.	1073
2 Lautareticus. Vil.	Lautaret.	1073
	Lautaret.	1073
I * Berardia Subacau-	11 1: 11	OF THE STATE OF
lis. Vil.	Mont-Aiguille.	
2 Cacalia Alpina, L.	T	7
2 Var. Tomentosa. L.	Lautaret.	1073
Polygamie superflue.	E BIRLY S	
2 Artemisia Rupestris. L.	Lautaret.	1073
2 Tanacetifolia. Vil.		1073
2 Gnaphalium Alpinum.L.	Charrousse.	1000
Dioicum. L.	Saint-Nizier.	800
3 Erigeron Alpinum. L.	Provésieux,	800
The state of the state of	Taillefer.	1000
2 Uniflorum. L.	Charrousse.	1000
COOK INC. THE LEVEL STATE		

<sup>(\*)</sup> Berardia sub-acaulis, Vil. Berarde sans tige, à calice ventru, à écailles en recouvrement, lancéolées, à fleur flosculeuse, à fleurons du rayon très-alongés, à cinq segmens égaux, petits, pointus, à fleurons du disque à tuyaux très-longs, renflés, à cinq ou six segmens, à filamens des étamines très-longs, à anthères garnies à leur base de deux filets soyeux, et à leur sommet d'un seul, à style très-long, à stygmate très-court, entier ou divisé en deux parties, à semences oblongues, à aigrette en plume de la longueur des fleurons, à réceptacle nu. Cette plante, à laquelle le docteur Villars à donné le nom d'un Botaniste de Grenoble, est très-commune au Mont-Aiguille en Dauphiné: elle fleurit vers le milieu de juillet.

Tussilago

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croissent.	Élévation de ces montagnes.
The state of the s	de grante.	Toises.
r Tussilago Alpina. L.	Saint-Nizier.	800
Petasites. L.	Gr. Chartreuse.	621
2 Senecio Incana. L.	Charrousse.	1000
3 Doronicum. L.	Col-de-l'Arc,	800
_ tends of the same and	Lautaret.	1073
3 Aster Alpinus.	Provésieux,	800
and the mounty	Lautaret.	1073
2 Solidago Minuta, L.	Lauraret.	1073
3 Arnica Montana. L.	Gr. Chartreuse,	621
(00 Late 10 10)	Lautaret.	1073
Var. 2, 3, 4, 5, Flori-		1073
bus. L.	Lautaret.	1073
2 Scorpioides. L.	Mont-Aiguille.	1400
3 Doronicum Bellidias-		621
trum. L.	Lautaret.	1073
	Sassenage.	130
2 Chrysanthemum Alpi-	C III. LEGIS	1 / 2
num. L.	Galibier.	1400
Achillea Tomentosa. L.	Plaines du Drac.	130
Macrophylla L. Nana. L.	Uriage.	800
	Galibier.	1400
Buphthalmum Salicifo-	T. TT	670
num. L.	L'Hermitage.	636
Polygamie frustranée.	al imanage	
	Mant Ja Toma	
2 Centaurea Phrygia. L.	Mont-de-Lans.	1000
Uniflora. L. Montana.	Lautaret.	1073
3. Montana.	Gr. Chartreuse, Mont-de-Lans.	621
P.Wamantina T.		1000
2 Rhapontica. L.	Taillefer. Lautaret.	1073
2 Filago Leontopodium.L.	Duntalche	1073
Monogynie.		
I Viola Calcarata. L.	Saint-Nizier.	800
I Biflora.	Saint-Nizier.	800
2 Impatiens Noli tangere.L.	Charrousse.	1000
		2

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croissent.	Élévation de ces montagnes.
GYNANDRIE.  Diandrie.	Alpinaetti kal	Toises.
3 Orchis Globosa. L.	Chame-Chande, Mont-de-Lans.	1073
3 Satyrium Nigrum. L.	Provésieux, Charrousse.	700
2 Var. Flore roseo. L. 1 Viride. L.	Mont-de-Lans. Provésieux.	1000 700
1 Ophrys Monorchis. L. 1 Cypripedium Calceo-	Col-de-l'Arc.	800
lus. L.	Col-de-l'Arc.	800
Monoécie.  I Carex Paniculata. L.	Saint-Nizier.	800
Monadelphie.	laraunding 181	1000 E
2 Pinus Abies. L. 2 Larix. L.	Charrousse. Briançon.	1000 696
DIOECIE.	J. cramanio I	eathdoA 3
Diandrie.		
2 Salix Retusa. L. 2 Herbacea. L.	Charrousse. Taillefer.	1000
2 Lapponum. L.	Lautaret.	1073
Octandrie.  1 Rhodiola Bosea. L.	Gr. Chartreuse.	621
Cryptogamie.		
I Osmunda Lunaria. L.	Provésieux. Montdes Rousses	700
I Crispa. L. I PolypodiumLonchytisL.	Chame-Chaude. Saint-Martin de	1073
I Fragrans. L.	Cornillon.	800
Dryopteris. L.	Charmant-Som.	700

Noms des plantes.	Noms des montagnes où elles croissent.	Elévation de ces montagnes.
A RELEGIES.	TA 81	Toises.
	Charmant-Som ,	700
2 Selago. L.	Lautaret. Uriage.	800
I Lichen Nivalis.  I Islandicus L.	Chame-Chaude.	1073
	Saint-Eynard. Gr. Chartreuse.	696 621
Floridus, L.	Gr. Chartreuse.	621

FIN.

antonian.

testimis to test

eb nulravill Leaguenone son smoll !

## AVIS AU RELIEUR,

pour la distribution de l'ouvrage.

Premiere et seconde partie, depuis A jusques et compris Cc; le carton Dd, se trouve attaché au n.º 13 des Tables.

Tables 1 et 2, qui se plient.

Tables 1 à 13, commençant par le n. 3

jusques et compris 100.

Postscriptum, a jusques et compris m.

Mémoires A jusques et compris G.











