

**Aphorismi, ad optimorum librorum fidem accurate editi : [by J.F.C. Hecker].
Cum indice Verhoofdiano. Locupletissimo. [In Greek and Latin] /
[Hippocrates].**

Contributors

Hippocrates.
Bosquillon, M. 1744-1816.
Verhoofd, Lucas.

Publication/Creation

Berolini : T.C.F. Enslin, 1822.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ubqq9dnx>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>







28,882 / A / 1



Hippocrates III

HIPPOCRATIS
APHORISMI.

AD OPTIMORUM LIBRORUM
FIDEM ACCURATE EDITI.

CUM INDICE VERIHOOEDIANO
LOCUPLETISSIMO.

BEROLINI MDCCCXXII.
SUMTIBUS THEOD. CHR. FRIDER. ENSLIN.
PARISIIS ET LONDINI,
APUD TRAUTTEL ET WÜRTZ.

95400



BIBLIOPOLA LECTORI.

Trado tibi L. B. splendidissimum
medicinae monumentum, nuperis
castigationibus eleganter expolitum.
Post praeclaram priorum editorum
operam nihil paene reliquum fuit,
quam ut Hippocratis aphorismi, lu-
centes litterarum medicarum veluti
stellae, ad Ionicae dialecti integri-
tatem restituerentur. Quod quidem
Bosquillonio optime contigisse
notum est, viro quondam pereru-
dito ac graecae antiquitatis gnaris-
simo, quem praematura mors reipu-
blicae litterariae eripuit. Ad huius

igitur viri editionem haec nostra maxime respondet adiunctis nonnullis tam in graeco textu, quam in versione emendationibus. Locos librorum Hippocraticorum parallelos a prioribus parum accurate collatos iure omisimus, quoniam erudito lectori nullam vel certe perexiguam utilitatem praestant. Ne quid autem temere praetermissum videatur, indicem Verhoofdianum quam exactissime excudendum curavimus.

Berolini Mense Maio A. MDCCCXXII.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

κώο γ

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ.

HIPPOCRATIS

COI

APHORISMI.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΩΟΥ

ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

Α.

Ὁ Βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πείρα σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή. δεῖ δὲ οὐ μόνον ἐωϊτὸν παρέχειν τὰ δέοντα ποιεῖντα, ἀλλὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ τοὺς παρεόντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

β'. Ἐν τῇσι ταραχῇσι τῆς κοιλίης, καὶ τοῖσιν ἐμέτοισι τοῖσιν αὐτομάτως γινομένοισιν, ἢν μὲν οἷα δεῖ καθαιρεσθαι καθαιρώνται, συμφέρει τε καὶ ἐνφόρως φέρουσι· ἢν δὲ μὴ, τούναντίον. οὕτω δὲ καὶ ἡ νεαγγηΐη, ἢ μὲν οἷη δεῖ γίνεσθαι, γίνηται, συμφέρει τε καὶ ἐνφόρως φέρουσι· ἢν δὲ μὴ, τούναντίον. ἐπιβλέπειν οὖν δεῖ καὶ χώ-

HIPPOCRATIS

COI

APHORISMI.

SECTIO PRIMA.

I.

Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experientia fallax, iudicium difficile. Neque vero seipsum tantum ad ea, quae facto opus sunt, praestare oportet, sed et aegrum, et praesentes, et externa.

2. In alvi perturbationibus, et vomitibus sponte evenientibus, si qualia oportet purgari, purgentur, conducit, et facile tolerant: sin minus, contra. Perinde vasorum inanitio si, qualis debet, fiat, conducit et facile tolerant: sin minus, contra. Considerare igitur oportet, et regionem, et tempestatem, et aetatem, et

ρην, καὶ ὥρην, καὶ ἡλικίην, καὶ νούσους ἐν
ῥῆσι δεῖ, ἢ οὐ.

γ'. Ἐν τοῖσι γυμναστικοῖσι αἱ ἐπ' ἄκρον
εὐεξίαί σφαλεραί, ἣν ἐν τῷ ἐσχάτῳ ἔωσι.
οὐ γὰρ δύνανται μένειν ἐν τῷ αὐτῷ, οὐδὲ
ἀτρεμέειν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀρτεμέουσιν, οὐδέ
τι δύνανται ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι, λεί-
πεται οὖν ἐπὶ τὸ χεῖρον. τουτέων οὖν εἵνε-
κεν τὴν εὐεξίην λύνειν συμφέρεει μὴ βραδέως,
ἵνα πάλιν ἀρχὴν ἀναθρέψεως λάβῃ τὸ σῶ-
μα. μηδὲ τὰς συμπτώσεας εἰς τὸ ἐσχατον
ἄγειν· σφαλερὸν γάρ· ἀλλὰ ὁκοίη ἂν ἡ φύ-
σις εἴη τοῦ μέλλοντος ὑπομένειν, εἰς τοῦτο
ἄγειν. ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ κενώσεις αἱ εἰς τὸ
ἐσχατον ἄγουσαι, σφαλεραί· καὶ πάλιν αἱ
ἀναθρέψεις αἱ ἐν τῷ ἐσχάτῳ ἐοῦσαι, σφα-
λεραί.

δ'. Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβέες δίαται, καὶ
ἐν τοῖσι μακροῖσιν σίει πάθει, καὶ ἐν τοῖ-
σιν ὀξέσι, οὐ μὴ ἐνδέχεται, σφαλεραί. αἱ
εἰς τὸ ἐσχατον λεπτότητος ἀπιγμέναι δίαται,
χαλεπαί. καὶ πάλιν αἱ πληρώσεις αἱ εἰς τὸ
ἐσχατον ἀπιγμέναι, χαλεπαί.

morbos in quibus haec fieri conveniat, nec ne.

3. Bona exercitantium valetudo ad summum progressa, periculosa est, si in extremo fuerit: non potest enim in eodem persistere, neque quiescere. Cum vero non quiescat, neque possit in melius proficere, reliquum est, ut in deterius labatur. His igitur de causis plenior corporis habitum haud cunctanter solve-
re expedit, quo corpus rursus refectionis initium sumat. Neque tamen extenuationes ad extremum perducendae, periculosum enim: sed qualis fuerit ejus qui sustinere debet natura, eo usque ducendae. Eadem vero ratione inanitiones ad extremum deductae periculosae; contraque refectiones ad summum progressae, periculosae.

4. Tenuis et exacta victus ratio, cum in morbis longis semper, tum in acutis, ubi non admittitur, parum tuta est. Victus qui ad summam pervenit tenuitatem, gravis; contraque repletiones ad extremum perductae, graves sunt.

ε'. Ἐν τῇσι λεπτῇσι διαίτησι ἁμαρτάνουσι οἱ νοσέοντες, διὸ μᾶλλον βλάπτονται. πᾶν γὰρ ὃ ἂν γίνηται, μέγα γίνεται μᾶλλον, ἢ ἐν τῇσιν ὀλίγον ἀδροτέρησι διαίτησι. διὰ τοῦτο καὶ τοῖσι ὑγιαίνουσι σφαλεραὶ αἱ πάνυ λεπταί, καὶ καθεστηκῦναι, καὶ ἀκριβέες δίδονται, ὅτι τὰ ἁμαρτανόμενα χαλεπώτερον φέρουσι. διὰ τοῦτο οὖν αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβέες δίδονται, σφαλεραὶ ἐς τὰ πλεῖστα τῶν σμικρὸν ἀδροτέρων.

ς'. Ἐς δὲ τὰ ἔσχατα νοσήματα, αἱ ἔσχαται θεραπήϊαι ἐς ἀκριβηῖν κράτισται.

ζ'. Ὅκου μὲν οὖν κάτοξιν τὸ νόσημα, αὐτίκα τοὺς ἐσχάτους πόνους ἔχει, καὶ τῇ ἐσχάτως λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρῆσθαι. ὅκου δὲ μὴ, ἀλλ' ἐνδέχεται ἀδροτέρας διαιτᾶν, τοσοῦτον ὑποκαταβαίνειν, ὅκωσον ἂν ἡ νοῦσος μαλθακωτέρῃ τῶν ἐσχάτων ἔῃ.

η'. Ὅκωσαν δὲ ἀκμάζει τὸ νόσημα, τότε καὶ τῇ λεπτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκαῖον χρῆσθαι.

θ'. Συντεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ καὶ τὸν νοσέοντα, εἰ ἐξαρκέσει τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν ἀκμὴν τῆς νοῦσου, καὶ πότερον ἐκεῖνος ἀ-

5. In tenui victus ratione delinquant aegri, ob quod magis laeduntur. Quidquid enim contingit, gravius his fit in tenui, quam in paulo pleniore victu. Idcirco etiam sanis periculosa est valde tenuis, et certo praescripta, ac exquisita victus ratio, quoniam errata gravius ferunt. Eam igitur ob causam tenuis et exquisitus victus paulo pleniore maxima ex parte periculosior est.

6. Ad summos morbos, summae ad unguem adhibitae curationes optime valent.

7. Cum ergo morbus est peracutus, extremos protinus obtinet labores, et extreme tenuissima victus ratione necessario utendum. Cum vero non est, sed plenorem victum habere concessum est, tam a tenui victu se subducere oportet, quantum morbus ab extremis recesserit.

8. Cum morbus in vigore fuerit, tum vel tenuissimo victu uti necesse est.

9. Considerare etiam oportet aegrotantem, an cum eo victu sufficiat ad morbi vigorem usque, an non prius ille deficiat,

πανδήσει πρότερος, καὶ οὐκ ἐξαρκέσει τῇ
διαίτῃ, ἢ ἡ νοῦσος πρότερον ἀπανδήσει, καὶ
ἀμβλυνεῖται.

ι'. Ὅκόσοισι μὲν οὖν αὐτίκα ἡ ἀκμὴ, αὐ-
τίκα λεπτῶς διαιτᾶν. ὁκόσοισι δὲ ἐς ὕστερον
ἡ ἀκμὴ, ἐς ἐκεῖνο καὶ πρὸ ἐκείνου, σμικρὸν
ἀφαιρετέον. ἔμπροσθεν δὲ πιωτέως διαι-
τᾶν, ὥς ἂν ἐξαρκέσῃ ὁ νοσέων.

ια'. Ἐν δὲ τοῖσι παροξυσμοῖσι ὑποστέλ-
λεσθαι χρή· τὸ προστιθέναι γὰρ βλάβη.
καὶ ὁκόσα κατὰ περιόδους παροξύνεται, ἐν
τοῖσι παροξυσμοῖσι ὑποστέλλεσθαι.

ιβ'. Τοὺς δὲ παροξυσμοὺς καὶ τὰς κατα-
στάσεις δηλώσουσι αἱ νοῦσοι, καὶ αἱ ὥραι
τοῦ ἔτεος, καὶ αἱ τῶν περιόδων πρὸς ἀλλή-
λας ἀντεπιδόσεις, ἥν τε κατὰ ἡμέρην, ἥν
τε παρὰ ἡμέρην, ἥν τε καὶ διὰ πλέονος χρό-
νου γίνωνται. ἀτὰρ καὶ τοῖσιν ἐπιφαινομέ-
νοισι, οἷον ἐν πλευριτικοῖσι πτύελον, ἥν αὐ-
τίκα ἐπιφαίνεται ἀρχομένου, βραχύνει· ἥν
δὲ ὕστερον ἐπιφαίνεται, μηκύνει. καὶ οὔρα,
καὶ ὑποχωρήματα, καὶ ἰδρῶτες, καὶ δύσκρι-

neque cum tali victu satis esse possit, vel prius morbus deficiat, et obtundatur.

10. Quibus igitur statim vigor adest, protinus tenuiter alendi. Quibus vero postea vigor futurus est, iis sub ipsum vigoris tempus et paulo ante, cibis subtrahendus. Antea vero uberius alendum, ut sufficiat aeger.

11. In exacerbationibus cibum subtrahere oportet: exhibere enim noxium. Et cum morbi per circuitus exacerbantur, in ipsis accessionibus cibum subtrahito.

12. Morbi, et anni tempestates, et periodorum collata inter se incrementa, sive quotidie, sive altero quoque die, sive etiam per majora intervalla fiant, paroxysmos et morborum constitutiones indicabunt. Quin etiam et ex iis quae superveniunt indicia sumuntur, velut in pleuritide laborantibus sputum, si statim circa initia, morbum brevem: si vero posterius appareat, longum futurum testatur. Urinae quoque, et alvi excrementa, et sudores, ubi apparuerint, iudicatu fa-

τα, καὶ εὐκρίτα, καὶ βραχέα, καὶ μακρὰ τὰ νοσήματα, ἐπιφαινόμενα δηλοῖ.

ιγ'. Γέροντες εὐφορώτατα νησθηῖν φέρουσι· δεύτερον, οἱ καθεστηκότες· ἥκιστα, μειράκια· πάντων δὲ μάλιστα παῖδια· τουτέων δὲ αὐτέων ἅ ἂν τύχῃ αὐτὰ ἐωυτέων προθυμότερα ἔοντα.

ιδ'. Τὰ αὐξανόμενα πλεῖστον ἔχει τὸ ἔμφυτον θερμόν, πλείστης οὖν δέεται τροφῆς· εἰ δὲ μὴ, τὸ σῶμα ἀναλίσκεται· γέρουσι δὲ ὀλίγον τὸ θερμόν· διὰ τοῦτο ἄρα ὀλίγων ὑπεκκαυμάτων δέονται· ὑπὸ πολλῶν γὰρ ἀποσβέννυνται. διὰ τοῦτο καὶ οἱ πυρετοὶ τοῖσι γέρουσιν οὐκ ὁμοίως ὀξέες· ψυχρὸν γὰρ τὸ σῶμα.

ιε'. Αἱ κοιλίαι χειμῶνος καὶ ἥρος, θερμότεραι φύσει, καὶ ὕπνοι μακρότατοι. ἐν ταύτησιν οὖν τῇσι ὥρησι καὶ τὰ προσάρματα πλέω δοτέον· καὶ γὰρ τὸ ἔμφυτον θερμόν πλέον ἔχει· τροφῆς οὖν πλέονος δέονται. σημήϊον, αἱ ἡλικίαι καὶ οἱ ἀθληταί.

ις'. Αἱ ὑγραὶ δίαται πᾶσι τοῖσι πυρεταίνουσι ξυμφέρουσι· μάλιστα δὲ παιδίοισι, καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τοῖσι οὕτω εἰθισμένοισι διαιτᾶσθαι.

ciles vel difficiles, et breves, vel longos fore morbos indicant.

13. Senes facillime jejunium ferunt: secundum eos aetate consistentes: minimum adolescentes: omnium vero minime pueri; atque inter ipsos qui alacriores sunt.

14. Qui crescunt plurimum habent calidi innati, plurimo igitur indigent alimento, alioqui corpus absumitur. Senibus vero paucus calor, idcirco sane paucis fomitibus indigent, a multis namque extinguitur. Eandem etiam ob causam neque senibus febres perinde acutae contingunt: fridigum enim est eorum corpus.

15. Ventres hyeme et vere, natura calidissimi, somnique longissimi. His igitur temporibus copiosiora cibaria exhibenda: siquidem plurimum inest calidi innati, ideoque copiosiore indigent alimento. Quod indicant aetates et athletae.

16. Victus humidus, omnibus febricitantibus, pueris vero maxime, atque aliis qui ita vivere consueverunt, confert.

ιζ'. Καὶ οἷσι ἅπαξ ἢ δις, καὶ πλέω ἢ ἐλάσσω, καὶ κατὰ μέρος· δοτέον δέ τι καὶ τῷ ἔθει, καὶ τῇ ὥρῃ, καὶ τῇ χώρῃ, καὶ τῇ ἡλικίῃ.

ιη'. Θέρους καὶ φθινοπώρου σιτία δυσφορώτατα φέρουσι· χειμῶνος, ῥήϊστα· ἥρος, δεύτερον.

ιθ'. Τοῖσιν ἐν τῇσὶ περιόδοις παροξυνόμενοισι μηδὲν διδόναι, μηδὲ ἀναγκάζειν, ἀλλὰ ἀφαιρέειν τῶν προσθέσεων πρὸ τῶν κρίσεων.

κ'. Τὰ κρινόμενα, καὶ τὰ κεκριμένα ἀρτίως, μὴ κινέειν, μηδὲ νεωτεροποιέειν, μήτε φαρμακίῃσι, μήτε ἄλλοις ἐρεθισμοῖσιν, ἀλλὰ ἐᾶν.

κα'. Ἄ δεῖ ἄγειν, ὅκου ἂν μάλιστα ῥέπῃ ἡ φύσις, ταύτῃ ἄγειν, διὰ τῶν συμφερόντων χωρίων.

κβ'. Πέπονα φαρμακεύειν καὶ κινέειν, μὴ ὥμᾱ, μηδὲ ἐν ἀρχῇσιν, ἢν μὴ ὀργᾶ· τὰ δὲ πολλὰ οὐκ ὀργᾶ.

κγ'. Τὰ χωρέοντα μὴ τῷ πλήθει τεκμαίρεσθαι, ἀλλὰ ὡς ἂν χωρέῃ οἷα δεῖ, καὶ φέρῃ εὐφόρως· καὶ ὅκου δεῖ μέχρι λειποθυμίας

17. Quibusdam semel aut bis, et aliis copiosior aut paucior, aut per partes cibus offerendus est. Aliquid autem et tempori, et regioni, et aetati, et consuetudini concedendum.

18. Aestate et autumnno cibos gravissime ferunt: hyeme facillime: deinde vere.

19. Quibus per circuitus accessiones contingunt, nihil dato, neque cogito, sed de cibus ante judicationes detrahito.

20. Quae judicantur, aut judicata sunt perfecte, ea neque moveto, neque medicamentis, neque aliis irritamentis innovato, sed sinito.

21. Quae educere oportet, quo maxime vergit natura, eo ducito, per loca convenientia.

22. Cocta medicamento educere et movere oportet, minime cruda, neque per initia, nisi turgeant, quod fere non accidit.

23. Quae prodeunt copia minime aestimanda, sed ut qualia expedit, prodeant, et aeger facile ferat. Atque ubi ad animi defectionem usque educere oportet,

ἀγειν, καὶ τοῦτο ποιεῖν, ἣν ἐξαρκέσῃ ὁ νο-
σέων.

κδ'. Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσιν ὀλιγάκις,
καὶ ἐν ὀρχήσιν, τῇσι φαρμακίῃσι χρέεσθαι,
καὶ τοῦτο προεξευκρινήσαντας ποιεῖν.

κε'. Ἦν, οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, καθαίρη-
ται, συμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρουσι· τὰ
δὲ ἐναντία, δυσχερῶς.

id etiam faciendum, si aeger sufficere queat.

24. In morbis acutis raro, et per initia medicamentis purgantibus utendum, idque diligenti ante adhibita circumspectione faciendum.

25. Si qualia purgari debent, purgantur, confert et facile tolerant, contra vero, difficile.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Α.

Ἐν ᾧ νοσήματι ὕπνος πόνον ποιεῖ, θανάσιμον· ἢν δὲ ὕπνος ὠφελήῃ, οὐ θανάσιμον.

β'. Ὁκου παραφροσύνην ὕπνος παύει, ἀγαθόν.

γ'. Ὑπνος, ἀγρυπνίη, ἀμφοτέρω μᾶλλον τοῦ μετρίου γενόμενα, κακόν.

δ'. Οὐ πλησμονή, οὐδὲ λιμός, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ἀγαθόν, ὅτι ἂν μᾶλλον τῆς φύσεως ἔη.

ε'. Κόποι αὐτόματοι φράζουσι νόσους.

ς'. Ὁκόσοι πονέοντες τι τοῦ σώματος, τὰ πολλὰ τῶν πόνων οὐκ αἰσθάνονται, τουτέστι οἱ ἢ γνώμῃ νοσέει.

ζ'. Τὰ ἐν πολλῷ λεπυνόμενα, νωθρῶς ἐπανατρέφειν· τὰ δὲ ἐν ὀλίγῳ, ὀλίγως.

η'. Ἦν ἐκ νόσου τροφήν λαμβάνων μὴ ἰσχύῃ, σημαίνει ὅτι πλέονι τροφῇ χρέεται.

SECTIO SECUNDA.

I.

Quo in morbo somnus laborem facit, lethale; quod si juvet somnus, lethale non est.

2. Ubi delirium somnus sedat, bonum.

3. Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, malum.

4. Neque satietas, neque fames, neque aliud quidquam bonum, quod naturae modum excesserit.

5. Lassitudines sponte obortae morbos praenunciant.

6. Quibus pars aliqua corporis dolet, neque omnino dolorem sentiunt, iis mens aegrotat.

7. Attenuata longo temporis intervallo corpora lente reficere oportet, at quae brevi, celeriter.

8. Si quis ex morbo cibum capiens vires non recipiat, eum copiosiore alimen-

ἤν δὲ τροφὴν μὴ λαμβάνοντος τοῦτο γίνηται, χρηρὲς εἶδέναι ὅτι κενώσεως δέεται.

θ'. Τὰ σώματα χρηρὲς, ὅκου τις βούλεται καθαίρειν, ἔνροα ποιεῖν.

ι'. Τὰ μὴ καθαρὰ τῶν σωμάτων ὁκόσων ἂν θρέψῃς, μᾶλλον βλάψεις.

ια'. Ῥᾶρον πληροῦσθαι ποτοῦ ἢ σιτίου.

ιβ'. Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα ἐν τῇσι νοῦσοις μετὰ κρίσιν, ὑποστροφώδεα.

ιγ'. Ὅκόσοις κρίσις γίνεται, τουτέοις ἢ νύξ δύσφορος, ἢ πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ· ἢ δὲ ἐπιούσα εὐφορωτέρη, ὥς ἐπὶ τὸ πούλυ.

ιδ'. Ἐν τῇσι τῆς κοιλίης ῥύσεσι, αἱ μεταβολαὶ τῶν διαχωρημάτων ὠφελέουσιν, ἤν μὴ ἐς τὰ πονηρὰ μεταβάλλῃ.

ιε'. Ὅκου φάρμακον γὰρ νοσέει, ἢ φύματα ἐν τῷ σώματι ἐκφύεται, σκέπτεσθαι τὰς ἐκκρίσεις· ἤν γὰρ χολώδεις ἔωσι, τὸ σῶμα ξυνοσέει· ἤν δὲ ὅμοιαι τοῖσι ὑγιαίνουσι γίνονται, ἀσφαλὲς τὸ σῶμα τρέφειν.

ις'. Ὅκου λιμὸς, οὐ δεῖ πονέειν.

ιζ'. Ὅκου ἂν τροφὴ πλέων παρὰ φύσιν ἐσέλθῃ, νοῦσον ποιεῖ· δηλοῖ δὲ ἡ ἵησις.

to uti significat. Quod si cibum non capiente istud contingat, inanitione indigere sciendum est.

9. Cum quis corpora purgare volet, ea ad fluxum comparata faciat oportet.

10. Impura corpora quo plus nutriveris, eo magis laedes.

11. Potu quam cibo repleri facilius est.

12. Quae in morbis post judicationem intus relinquuntur, recidivam faciunt.

13. Quibus judicatio instat, iis nox accessionem praecedens, gravis: quae vero sequitur, plerumque levior.

14. In alvi fluxionibus dejectionum mutationes, nisi in prava commutentur, juvant.

15. Cum fauces aegrotant, aut tubercula in corpore exoriuntur, excretiones inspicio; si namque biliosae sint, corpus simul aegrotat: at si sanorum similes extiterint, tutum est corpus nutrire.

16. Ubi fames, laborandum non est.

17. Ubi copiosior praeter naturam cibus ingestus fuerit, morbum creat; ostendit vero curatio.

ιη'. Τῶν τρεφομένων ἀθρόως καὶ ταχέως, ταχεῖαι καὶ αἱ διαχωρήσεις γίνονται.

ιβ'. Τῶν ὀξέων νοσημάτων οὐ πάνπαν ἀσφαλείες αἱ προδιαγορεύσεις, οὔτε τοῦ θανάτου, οὔτε τῆς ὑγίης.

κ'. Ὀκόσοισι νέοισιν ἐοῦσι αἱ κοιλίαι ὑγραὶ εἰσὶ, τουτέοισιν ἀπογηράσκουσι ξηραίνονται· Ὀκόσοισι δὲ νέοισιν ἐοῦσι ξηραὶ εἰσὶ, τουτέοισιν ἀπογηράσκουσι, ὑγραίνονται.

κα'. Λιμὸν θώρηξις λύει.

κβ'. Ἀπὸ πλησμονῆς ὀκόσα ἂν νοσήματα γίνηται, κένωσις ἰῆται, καὶ ὀκόσα ἀπὸ κενώσεως, πλησμονή· καὶ τῶν ἄλλων ἡ ὑπεναντίωσις.

κγ'. Τὰ ὀξέα τῶν νοσημάτων κρίνεται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι.

κδ'. Τῶν ἐπτὰ, ἡ τετάρτη ἐπίδηλος. ἐτέρης ἐβδομάδος ἡ ὀγδὴ ἀρχή. θεωρητὴ δὲ ἡ ἐνδεκάτη· αὕτη γάρ ἐστι τετάρτη ἀπὸ τῆς ἐτέρης ἐβδομάδος· θεωρητὴ δὲ πάλιν ἡ ἐπτακαιδεκάτη· αὕτη γάρ ἐστι τετάρτη μὲν ἀπὸ τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης, ἐβδόμη δὲ ἀπὸ τῆς ἐνδεκάτης.

κε'. Οἱ θερινοὶ τεταρταῖοι, τὰ πολλὰ γί-

18. Eorum quae confertim et celeriter alunt, celeres quoque fiunt excretiones.

19. Morborum acutorum non omnino tutae sunt praedictiones, neque salutis, neque mortis.

20. Quibus per juventutem alvi sunt humidae, iis senescentibus exsiccantur; quibus vero in juventute siccae sunt, iis senescentibus humectantur.

21. Famem vini meracioris potio solvit.

22. A repletionem quicumque fiunt morbi, eos inanitio curat: et quicumque ab inanitione, eos repletio: et in ceteris contrarium remedio est.

23. Morbi acuti intra quatuordecim dies judicantur.

24. Quartus septenariorum index est. Octavus alterius septimanae est principium. Undecimus etiam spectandus dies, ipse enim secundae septimanae quartus est. Rursus quoque spectandus decimus septimus, hic enim est quartus a decimo quarto, septimus vero ab undecimo.

25. Quartanae aestivae fere breves ex-

νονται βραχίεις, οἱ δὲ φθινοπωρινοὶ, μακροὶ, καὶ μάλιστα οἱ πρὸς τὸν χειμῶνα ξυνάπτοντες.

κς'. Πυρετὸν ἐπὶ σπασμῷ βέλτιον γενέσθαι, ἢ σπασμὸν ἐπὶ πυρετῷ.

κζ'. Τοῖσι μὴ κατὰ λόγον κουφίζουσιν, οὐδεῖ πιστεύειν, οὐδὲ φοβέεσθαι λίην τὰ μοχθηρὰ γινόμενα παρὰ λόγον. τὰ γὰρ πολλὰ τῶν τοιοντέων ἀβέβαια, καὶ οὐ πάνυ τι διαμένειν, οὐδὲ χρονίζειν εἰώθε.

κη'. Τῶν πυρεσσόντων μὴ παντάπασιν ἐπιπολαίως, τὸ διαμένειν, καὶ μηδὲν ἐνδιδόναι τὸ σῶμα, ἢ καὶ ξυντήκεσθαι μᾶλλον τοῦ κατὰ λόγον, μοχθηρόν· τὸ μὲν γὰρ μήκος νοσοῖ σημαίνει, τὸ δὲ ἀσθενήϊν.

κθ'. Ἀρχομένων τῶν νοῦσων, ἣν τι δοκέη κινέειν, κίνει· ἀκμαζουσῶν δὲ, ἡσυχίην ἔχειν βέλτιόν ἐστι.

λ'. Περὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλεια πάντα ἀσθενεστερα· περὶ δὲ τὰς ἀκμὰς, ἰσχυρότερα.

λα'. Τῷ ἐξ ἀρρώστιας εὐσιτεῦντι, μηδὲν ἐπιδιδόναι τῷ σῶματι, μοχθηρόν.

λβ'. Ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἱ φαύλως ἔχοντες, κατὰ ἀρχὰς μὲν εὐσιτεῦντες, καὶ μηδὲν

istunt, autumnales vero longae, praesertim vero quae hyemem attingunt.

26. Convulsioni febrem supervenire melius est. quam convulsionem feбри.

27. Iis quae non secundum rationem levant, fidere non oportet, neque admodum metuere mala quae praeter rationem eveniunt. Multa enim horum instabilia sunt, neque admodum permanere, neque perseverare consueverunt.

28. Corpus eorum qui non omnino leviter febricitant, in eodem consistere, et nihil concidere, vel etiam magis quam ratio postulat extenuari, grave est. Illud siquidem morbi diuturnitatem, hoc vero imbecillitatem significat.

29. Incipientibus morbis, si quid movendum videtur, moveto: vigentibus vero, quiescere praestat.

30. Circa initia et fines omnia sunt leviora, at circa vigores vehementiora.

31. Ex morbo belle comedenti corpus nihil proficere, malum.

32. Omnes fere male qui se habent, circa initia quidem cibum bene sumentes,

ἐπιδιδόντες, πρὸς τῷ τέλει πάλιν ἀσιτέουσι.
οἱ δὲ κατὰ ἀρχὰς μὲν ἀσιτεῦντες ἰσχυρῶς,
ὕστερον δὲ εὐσιτεῦντες, βέλτιον ἀπαλλάσ-
σουσι.

λγ'. Ἐν ἀπάσῃ νόσῳ τὸ ἐρῶσθαι τὴν
διάνοιαν, καὶ εὖ ἔχειν πρὸς τὰς προσφορὰς,
ἀγαθόν· τὸ δὲ ἐναντίον, κακόν.

λδ'. Ἐν τῇσι νόσοισι ἥσσον κινδυνεύουσι,
οἷσιν ἂν οἰκηῖν τῆς φύσεως, καὶ τῆς ἡλικίης,
καὶ τῆς ἔξεως, καὶ τῆς ὥρης ἢ νόσος ἔῃ, ἢ
οἷσιν ἂν μὴ οἰκηῖν κατὰ τι τουτέων.

λε'. Ἐν ἀπάσῃσι τῇσι νόσοισι, τὰ περὶ
τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἥτρον πάχος ἔχειν, βέλ-
τιόν ἐστι· τὸ δὲ σφόδρα λεπτὸν καὶ ἐκτετη-
κὸς, μοχθηρόν· ἐπισφαλές δὲ τὸ τοιοῦτον
πρὸς τὰς κάτω καθάρσεις.

λς'. Οἱ ὑγιεινῶς ἔχοντες τὰ σώματα, ἐν
τῇσι φαρμακῆῃσι καθαιρόμενοι, ἐκλύονται
ταχέως, καὶ οἱ πονηρῇ τροφῇ χρεόμενοι.

λζ'. Οἱ εὖ τὰ σώματα ἔχοντες, φαρμακεύ-
εσθαι ἐργώδεις.

λη'. Τὸ σμικρῷ χεῖρον καὶ πόμα καὶ σι-

neque quidquam proficientes, circa finem
rursus cibum non appetunt. At, qui
circa initia vehementer abstinent, postea
vero cibos probe appetunt, ii melius de-
gunt.

33. Mente constare, et bene habere ad
ea quae offeruntur, quovis in morbo bo-
num, contra vero, malum.

34. In morbis minus periclitantur ii,
quorum naturae, et aetati, et habitui, et
anni tempestati, morbus cognatus fuerit,
quam quibus in horum aliquo non cognatus
fuerit.

35. In omnibus morbis partes quae sunt
ad umbilicum et imum ventrem crassitu-
dinem habere praestat; valde autem te-
nues esse et tabefactas, pravum. Sed hoc
quoque ad inferiores purgationes pericu-
osum.

36. Qui sana habent corpora pharma-
cis purgati, cito exsolvuntur, atque etiam
qui pravo utuntur cibo.

37. Qui bene habito sunt corpore, ad
medicationes moleste se habent.

38. Cibus et potus paulo pejor, suavior

τίον, ἥδιον δὲ, τῶν βελτιόνων μὲν, ἀηδ-
στέρων δὲ, μᾶλλον αἰρετέον.

λθ'. Οἱ πρεσβύτεροι τῶν νέων, τὰ μὲν πολ-
λὰ νοσέουσιν ἤσσουν· ὅκῃσα δὲ ἂν αὐτέοισι
χρόνια νοσοήματα γένηται, τὰ πολλὰ ξυνα-
ποθνήσκει.

μ'. Βράγχοι καὶ κόρυζαι τοῖσι σφόδρα
πρεσβύτησιν οὐ πεπαίνονται.

μα'. Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὶ ἰσχυρῶς,
ἄνευ φανερῆς προφάσεως, ἐξαπίνης τελευ-
τῶσι.

μβ'. Λύειν ἀποπληξίην ἰσχυρὴν μὲν ἀ-
δύνατον, ἀσθενέα δὲ οὐ ῥῆϊδιον.

μγ'. Τῶν ἀπαγχομένων καὶ καταλυομέ-
νων, μήπω δὲ τεθνηκότων, οὐκ ἀναφέρου-
σι, οἷσιν ἂν ἀφρὸς ἔη περὶ τὸ στόμα.

μδ'. Οἱ παχέες σφόδρα κατὰ φύσιν, ταχυ-
θάνατοι γίνονται μᾶλλον τῶν ἰσχνῶν.

με'. Τῶν ἐπιληπτικῶν τοῖσι νέοισιν ἀ-
παλλαγὴν αἱ μεταβολαὶ μάλιστα τῆς ἡλικίης,
καὶ τῶν ὥρέων, καὶ τῶν τόπων, καὶ τῶν
βίων ποιοῦσι.

μς'. Δύο πόνοι ἅμα γινόμενων, μὴ κατὰ
τὸν αὐτὸν τόπον, ὁ σφοδρότερος ἀμεινότε-
ρον ἕτερον.

autem, melioribus quidem, sed insuavioribus, praeferendus.

59. Ut plurimum quidem senes juvenibus aegrotant minus: at, qui ipsis morbi diuturni contingunt, eos fere ad mortem comitari solent.

40. Raucedines et gravedines in decrepitis non coquuntur.

41. Qui crebro et vehementer citra manifestam causam anima deficiunt, repente moriuntur.

42. Valida apoplexia prorsus non sanatur, levis difficile.

43. Ex strangulatis et dissolutis, necdum tamen mortuis, ii non ad vitam redeunt, quibus spuma circa os fuerit.

44. Natura admodum crassi, celerius intereunt quam graciles.

45. Ex comitialibus, juvenes mutatione potissimum aetatis, et tempestatum, et regionum, et victuum, liberantur.

46. Duobus doloribus simul obortis, non in eodem loco, vehementior alterum obscurat.

μζ'. Περὶ τὰς γενέσεας τοῦ πυόου, οἱ πόνοι καὶ οἱ πυρετοὶ συμβαίνουνσι μᾶλλον, ἢ γενομένον.

μη'. Ἐν ἀπάσῃ κινήσει σώματος, ὁκόταν ἄρχηται πονεῖν, τὸ διαναπαύειν εὐθὺς ἀκοπον.

μθ'. Οἱ εἰθισμένοι τοὺς ξυνήθεας πόνους φέρειν, κῆν ἔωσιν ἀσθενέες, ἢ καὶ γέροντες, τῶν ἀξυνηθέων, ἰσχυρῶν τε καὶ νέων, ῥᾶον φέρουσι.

ν'. Τὰ ἐκ πολλοῦ χρόνου ξυνήθεα, κῆν ἔη χεῖρω, τῶν ἀξυνηθέων ἥσσον ἐνοχλᾶειν εἰωθε. δεῖ ἔν καὶ ἐς τὰ ἀξυνήθεα μεταβάλλειν.

να'. Τὸ κατὰ πέλν καὶ ἐξαπίνης κενοῦν, ἢ πληρεῖν, ἢ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως ὁκωσέν τὸ σῶμα κινεῖν, σφαλερόν· διότι πᾶν τὸ πέλν τῇ φύσει πολέμιον· τὸ δὲ κατὰ ὀλίγον, ἀσφαλές· καὶ ἄλλως ἢν ἐξ ἑτέρου μεταβαίνη ἐπὶ ἕτερον.

νβ'. Πάντα κατὰ λόγον ποιεῦντι, μὴ γινομένων τῶν κατὰ λόγον, μὴ μεταβαίνειν ἐπὶ ἕτερον, μένοντος τοῦ δόξαντος ἐξ ἀρχῆς.

νγ'. Ὀκόσοι τὰς κοιλίας ὑγρὰς ἔχουσι, νέοι μὲν ἐόντες βέλτιον ἀπαλλάσσει, τῶν τὰς ξηρὰς ἐχόντων· ἐς δὲ τὸ γῆρας χεῖρον ἀπαλ-

47. Dolores et febres contingunt magis circa puris generationem, quam eo confecto.

48. Quovis in corporis motu, simul ac fatigari coeperit, quies confestim lassitudinis est remedium.

49. Qui solitos labores ferre assueverunt quamvis invalidi sint, aut etiam senes, eos facilius ferunt, quam qui non assueti, quamvis robusti et juvenes.

50. Quae ex longo tempore assueta sunt, quamvis deteriora, insuetis minus molesta esse solent. Quare ad insolita etiam facienda mutatio.

51. Confertim et repente vacuare, vel implere, vel calefacere, vel refrigerare, vel utcumque aliter corpus movere, periculosum: siquidem omne nimium naturae est inimicum. Verum quod paulatim fit, securum est, tum vel maxime si ab uno ad alterum transitus fiat.

52. Qui omnia ex ratione facit, neque tamen successum pro ratione habet, non ad aliud transito, manente eo, quod ab initio visum est.

50 HIPPOCRATIS APHOR.

λάσσεσθε ξηραίνονται γὰρ, ὡς ἐπὶ τὸ πάλυ,
τοῖσιν ἀπογηράσκουσι.

νδ'. Μεγέθει δὲ σώματος, ἐννεᾶσαι μὲν,
ἐλευθέριον καὶ ἐκ ἀειδές· ἐγγηράσαι δὲ, δύσ-
χρηστον, καὶ χεῖρον τῶν ἐλασσόνων.

53. Quicumque alvos habent humidus, ii quidem dum juvenes sunt, melius degunt, quam qui siccas habent: at in senectute pejus degunt, ipsis enim senescentibus fere resiccantur.

54. Procero corpore, juventutem quidem degere, liberale nec indecorum; in senescere vero incommodum, et brevitate deterius.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

Α.

Α. **Α**ι μεταβολαὶ τῶν ὥρέων, μάλιστα τίκτεσι νουήματα, καὶ ἐν τῇσιν αὐτέησι ὥρησι αἱ μεγάλαι μεταλλαγαὶ ἢ ψύξος, ἢ θάλψεος, καὶ τᾶλλα κατὰ λόγον ἔτω.

β'. Τῶν φύσεων, αἱ μὲν πρὸς θέρος, αἱ δὲ πρὸς χειμῶνα, εὖ ἢ κακῶς πεφύκασιν.

γ'. Καὶ τῶν νέσων ἄλλαι πρὸς ἄλλας εὖ ἢ κακῶς πεφύκασιν καὶ ἡλικίαι τινὲς πρὸς ὥρας, καὶ χώρας, καὶ διαίτας.

δ'. Ἐν τῇσι ὥρησι, ὅταν τῆς αὐτέης ἡμέρης, ὅτε μὲν θαλπὸς, ὅτε δὲ ψύχος γίνηται, φθινοπωρινὰ τὰ νουήματα προσδέχεσθαι.

ε'. Νότοι βαρυνήκοι, ἀχλυώδεις, καρηβαρικοὶ, νωθροὶ, διαλυτικοί· ὁκόταν ἔτω δυνασεύῃ, τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσεισι πάσχουσιν ἢν δὲ βόρειον ἔῃ, βῆχες, φάρυγγες, κριλῖαι σκληραὶ, δυσερῖαι, φρικώδεις, ὀδυ-

SECTIO TERTIA.

I.

TEMPESTATUM anni mutationes potissimum morbos gignunt, et in ipsis anni tempestatibus magnaemutationes aut frigoris, aut caloris, aliaque pro ratione ad hunc modum.

2. Naturae hae quidem ad aestatem, aliae vero ad hyemem, bene vel male sunt constitutae.

3. Morbi quoque alii ad alias anni tempestates bene vel male habent: et aetates quaedam ad anni tempestates, et regiones, et victus rationes.

4. Per anni tempestates, quando eodem die, modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos expectato.

5. Austri auditionis hebetudinem, visionis caliginem, capitis gravitatem inducunt, corpus torpidum et languidum reddunt. Cum sic invaluerit tempestas,

ναι πλευρέων, σηθέων· όκόταν έτω δυνα-
 ξεύη, τοιαύτα προσδέχεσθαι.

ς'. Όκόταν θέρος γένηται ήρι όμοιον,
 ιδρωτας έν τοϊσι πυρετοϊσι πολλές προσδέ-
 χεσθαι.

ζ'. Έν τοϊσιν ανχημοϊσι πυρετοι όξείες γί-
 νονται· και ήν μέν επί πλέον έη τό έτος
 τοιστέον έν, όκοίην και τήν κατάξασιν
 έποίησε, ως επί τό πελν, και τά νεσήματα
 τοιαύτα δεϊ προσδέχεσθαι.

ή'. Έν τοϊσι καθεξεωσι καιροϊσιν, ήν
 ώραίως τά ώραϊα αποδιδωσιν, ευσαθέες και
 ευκρινέες αί νεσοι γίνονται· έν δε τοϊσιν
 ακαταστάτοισιν, ακατάστατοι τέ, και δύσ-
 κριτοι.

θ'. Έν φθινοπώρῳ όξύταται αί νεσοι,
 και θανατωδέσεται τέπιπαν· ήρ δε υγιεινό-
 τατον και ήκιστα θανατωδες.

ι. Τό φθινόπωρον τοϊσι φθίνουσι κακόν.

ια. Περὶ δε των ώρέων, ήν μέν ό χειμῶν
 ανχημηρός και βόρειος γένηται, τό δε έαρ έπ-
 ομβρον και νότιον, αναγκαίη τε θέρεος, πυ-
 ρετους όξείας, και οφθαλμίας, και δυσεντε-
 ρίας γίνεσθαι, μάλιστα δε τήσι γυναιξί,
 και ανδράσι τοϊσι υγροϊσι τας φύσεις.

ista in morbis patiuntur. Sin aquilonia fuerit, tusses, faucium asperitates, alvi durae, urinae difficultates, horrores, laterum et pectoris dolores fiunt. Cum sic invaluerit, talia expectato.

6. Cum aestas veri similis fuerit, in febribus copiosos sudores expecta.

7. Per siccitates febres acutae fiunt; et siquidem annus magna ex parte talis extiterit, qualem constitutionem effecerit, ut plurimum tales etiam morbos expectare oportet.

8. In constantibus temporibus, si tempestive tempestiva redduntur, constantes et iudicatu faciles fiunt morbi: in inconstantibus autem inconstantes et difficiles iudicatu.

9. Per autumnum morbi acutissimi, et exitiosissimi omnino. Ver autem saluberrimum, et minime exitiale.

10. Autumnus tabidis malus.

11. Quod autem ad anni tempestates attinet, si quidem hyems sicca et aquilonia fuerit, ver autem assidue pluviosum et austrinum, febres acutas, et ophthalmias, et

ιβ'. "Ἦν δὲ νότιος ὁ χειμὼν, καὶ ἔπομβρος, καὶ ἔυδιος γίνηται, τὸ δὲ ἔαρ ἀνχμηρόν καὶ βόρειον, αἱ μὲν γυναῖκες ἥσι οἱ τόκοι πρὸς τὸ ἦρ, ἐκ πάσης προφάσεως ἐκτιτρώσκουσι. αἱ δὲ ἂν τέκωσιν, ἀκρατέα καὶ νοσώδεα τὰ παιδιά τίκτουσι, ὥς τε ἢ παραντίκα ἀπόλλυσθαι, ἢ λεππὰ καὶ νοσώδεα ζῆν ἔόντα. τοῖσι δὲ ἄλλοισι βροτοῖσι δυσεντερίαι, καὶ ὀφθαλμῖαι ξηραὶ γίνονται· τοῖσι δὲ πρεσβυτέροισι κατάρροοι ξυντόμως ἀπολλύντες.

ιγ'. "Ἦν δὲ τὸ θέρος ἀνχμηρόν καὶ βόρειον γένηται, τὸ δὲ φθινόπωρον ἔπομβρον καὶ νότιον, κεφαλαλγίαι ἐς τὸν χειμῶνα γίνονται, καὶ βῆχες, καὶ βράγχοι, καὶ κόρυζα, ἐνίοισι δὲ καὶ φθίσεις.

ιδ'. "Ἦν δὲ βόρειον ἔη καὶ ἄνυδρον, τοῖσι μὲν ὑγροῖσιν ἔσσι τὰς φύσεας, καὶ τῆσι γυναιξὶ ξύμφορον· τοῖσι δὲ λοιποῖσιν ὀφθαλμῖαι ἔσονται ξηραὶ, καὶ πυρετοὶ ὀξέες, καὶ πολυχρόνιοι, ἐνίοισι δὲ καὶ μελαγχολίαι.

ιε'. Τῶν δὲ κατασάσεων τῶν ἐνιαυτῶν, τὸ μὲν ὅλον, οἱ αὖχμοι τῶν ἐπομβρίων εἰσὶ ὑγιεινότεροι, καὶ ἥσσον θανατώδεις.

ις'. Νοσήματα δὲ ἐν μὲν τῆσιν ἐπομβρίῃσι ὥς τὰ πολλὰ γίνεται, πυρετοὶ τε μακροί,

dysenterias aestate fieri necesse est, maxime mulieribus, et viris natura humidis.

12. At si hyems austrina, et assidue pluviosa et placida fuerit, ver autem siccum et aquilonium, mulieres quidem, quibus partus vere imminet, ex quavis causa abortiunt. Quae vero pepererint, imbecillos et morbosos infantes edunt, ita ut vel statim intereant, vel tenues et valetudinarii vivant. Caeteris autem mortalibus dysenteriae, et ophthalmiae aridae oriuntur: senioribus vero catarrhi brevi interficientes.

13. Si vero aestas sicca et aquilonia, autumnus vero pluvius et austrinus fuerit, capitis dolores hyeme oriuntur, et tusses, et raucitates, et gravedines, nonnullis etiam tabes.

14. Si vero aquilonius fuerit et sine pluviis autumnus, viris quidem qui natura sunt humidi, et mulieribus proderit: reliquis autem ophthalmiae erunt siccae, et febres acutae, et longae, nonnullis etiam melancholiae.

15. Ex anni vero constitutionibus, in

καὶ κοιλίης ῥύσεις, καὶ σηπεδύνες, καὶ ἐπι-
ληπτοι, καὶ ἀπόπληκτοι, καὶ κυνάγχαι· ἐν δὲ
τοῖσιν αὐχμοῖσι, φθινώδεις, ὀφθαλμῖαι,
ἀρθρίτιδες, σφαγγερίαι, καὶ δυσεντερῖαι.

ιζ. Αἱ δὲ καθ' ἡμέρην κατασάσεις, αἱ μὲν
βόρειοι, τὰ τε σώματα ξυνιζῶσι, καὶ εὐτο-
να, καὶ εὐκίνητα, καὶ εὐχρωώτερα, καὶ εὐη-
κοώτερα ποίεσι, καὶ τὰς κοιλίας ξηραίνουσι,
καὶ τὰ ὄμματα δάκνυσι, καὶ περὶ τὸν θώρακα
ἄλγημα, ἦν τι πρὸς πᾶρχη, μᾶλλον πονέουσι.
αἱ δὲ νότιοι διαλύει τὰ σώματα, καὶ ὑγραί-
νυσι, καὶ βαριηκοῖας, καὶ καρηβαρίας ποίε-
σι, καὶ ἰλίγγες ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι, καὶ
τοῖσι σώμασι δυσκινήσῃν, καὶ τὰς κοιλίας
ὑγραίνουσι.

ιη. Κατὰ δὲ τὰς ὥρας, τῷ μὲν ἥρος καὶ
ἄκρος τῷ θέρους οἱ παῖδες, καὶ οἱ τουτέων
ἐχόμενοι τῇσι ἡλικίῃσιν, ἄριστα τε διάγουσι,
καὶ ὑγιαίνουνσι μάλιστα· τῷ δὲ θέρους,
καὶ τῷ φθινοπώρῳ, μέχρι μὲν τινος, οἱ
γέροντες· τὸ δὲ λοιπὸν τῷ φθινοπώρῳ, καὶ
τῷ χειμῶνος, οἱ μέσοι τῇσι ἡλικίῃσι.

ιβ. Νουσήματα πάντα μὲν ἐν πάσῃσι
τῇσι ὥρῃσι γίνεται· μᾶλλον δὲ ἔνια κατὰ
ἐκίας αὐτέων καὶ γίνεται, καὶ παροξύνεται.

universum siccitates assiduīs imbribus sunt salubriores, minusque lethales.

16. Morbi autem in pluviōsis quidem plerumque fiunt, cum febres longae, tum alvi fluxiones, putredines, epilepsiae, apoplexiae, et anginae. Per siccitates autem, tabitudines, ophthalmiae, arthritides, urinae stillicidia, et dysenteriae.

17. Quotidianae autem constitutiones, aquiloniae quidem corpora compingunt, valentiora, expeditiora, coloratiora, et melius audientia reddunt, alvos etiam siccant, oculosque mordent, et si in pectore color aliquis prius extiterit, magis dolent aegri. Austrinae vero corpora exsolvunt et humectant, auditum obtundunt, caput gravant, vertigines oculis movent, corporibus difficilem motionem inducunt, et alvos humectant.

18. Per anni tempora autem, vere quidem et prima aestate pueri, et qui aetate his proximi sunt, optime degunt, et maxime valent: aestate vero, et quantenus autumnō senes; reliqua vero

κ'. Τῷ μὲν γὰρ ἥρος τὰ μανικά, καὶ τὰ μελαγχολικά, καὶ τὰ ἐπιληπτικά, καὶ αἵματος ῥύσεις, καὶ κυνάγχαι, καὶ κόρυζαι, καὶ βράγχοι, καὶ βῆχες, καὶ λέπραι, καὶ λειχήνες, καὶ ἄλφοι, καὶ ἔξανθήσεις ἐλκώδεις πλεῖσαι, καὶ φύματα, καὶ ἀρθριτικά.

κά. Τῷ δὲ θέρος ἐνιά τε τετέων, καὶ πυρετοὶ ξυνεχέες, καὶ καῦσοι, καὶ τριταῖοι πλεῖστοι, καὶ ἔμετοι, καὶ διάρροιαι, καὶ ὀφθαλμῖαι, καὶ ὄτων πόνοι, καὶ στομάτων ἐλκώσεις, καὶ σηπεδόνες αἰδοίων, καὶ ἴδρωα.

κβ'. Τῷ δὲ φθινοπώρῃ, καὶ τῶν θερινῶν τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ τεταρταῖοι, καὶ πλάνητες, καὶ σπληῆνες, καὶ ὕδρωπες, καὶ φθίσεις, καὶ σφαγγερίαι, καὶ λειεντερῖαι, καὶ δυσεντερῖαι, καὶ ἰσχυάδες, καὶ κυνάγχαι, καὶ ἄσθματα, καὶ εἰλσοὶ, καὶ ἐπιληψίαι, καὶ τὰ μανικά, καὶ τὰ μελαγχολικά.

κγ'. Τῷ δὲ χειμῶνος πλευρίτιδες, περιπνευμονίαι, κόρυζαι, βράγχοι, βῆχες, πόνοι στήθεων, καὶ πλευρέων, καὶ ὀσφύος, καὶ κεφαλαλγῖαι, ἱλιγγοὶ, καὶ ἀποπληξίαι.

κδ'. Ἐν δὲ τῇσι ἡλικίῃσι τοιάδε ξυμβαίνει τοῖσι μὲν σμικροῖσι καὶ νεογνοῖσι παι-

parte autumnii, et hyeme, qui media sunt aetate.

19. Morbi quidem omnes in quibusvis anni temporibus oriuntur, nonnulli tamen quibusdam temporibus magis fiunt, et exacerbantur.

20. Namque vere maniae, melancholiae, epilepsiae, sanguinis profluvia, anginae, gravedines, raucitates, tusses, leprae, impetigines, vitiliginis, et pustulae ulcerosae plurimae, et tubercula, et articulorum dolores.

21. Aestate autem horum nonnulli, ac febres continuae, et ardentes, et tertianae plurimae, vomitiones etiam, et alvi profluvia; ophthalmiae, aurium dolores, oris exulcerationes, genitalium putredines, et sudamina.

22. Autumno vero aestivorum plurimi, atque etiam quartanae febres et erraticae, lienes, hydropes, tabes, urinae stillicidia, lenteriae, et dysenteriae, coxendicum dolores, anginae, asthmata, volvuli, comitiales, furores, et melancholiae.

23. Hyeme vero pleuritides, peripneu-

δίοισιν ἄφθαι, ἔμετοι, βῆχες, ἀγρυπνίαι, φόβοι, ὀμφαλῆ φλεγμοναί, ὠτων ὑγρότητες.

κε'. Πρὸς δὲ τὸ ὀδοντοφυεῖν προσάγσιν, ἔλων ὀδαξισμοί, πυρετοί, σπασμοί, διάρροαι, καὶ μάλιστα ὅταν ἀνάγῃσι τὰς κυνόδοντας, καὶ τοῖσι παχυτάτοισι τῶν παιδίων, καὶ τοῖσι σκληρὰς τὰς κοιλίας ἔχσιν.

κε'. Πρεσβυτέροισι δὲ γενομένοισι, παρίσθμια, σπονδύλῃς τε κατὰ τὸ ἰνίον εἴσω ὥσες, ἄσθματα, λιθιάσεις, ἐλμίνθες εἰσρογύλαι, ἀσκαρίδες, ἀκροχορδόνες, σατυριασμοί, χοιράδες, καὶ τἄλλα φύματα.

κζ'. Τοῖσι δὲ ἔτι πρεσβυτέροισι, καὶ πρὸς τὴν ἥβην προσάγσιν, τστέων τὰ πολλὰ, καὶ πυρετοὶ χρόνιοι μᾶλλον, καὶ ἐκ ῥινῶν αἵματος ῥύσεις.

κη'. Τὰ δὲ πλεῖστα τοῖσι παιδίοισι πάθηα κρίνεται, τὰ μὲν ἐν τεσσαρῇκοντα ἡμέρησι, τὰ δὲ ἐν ἑπτὰ μηνσὶ, τὰ δὲ ἐν ἑπτὰ ἔτεσι, τὰ δὲ πρὸς τὴν ἥβην προσάγσιν. ὅσα δὲ ἂν διαμείνῃ τοῖσι παιδίοισι, καὶ μὴ ἀπολυθῇ περὶ τὸ ἡβάσκειν, ἢ τῇσι θήλεσι περὶ τὰς τῶν καταμηνίων ῥήξας, χρονίζειν εἴωθε.

moniae, gravedines, raucitates, tusses, dolores pectoris, laterum, lumborum et capitis, vertigines et apoplexiae.

24. Per aetates autem haec eveniunt: parvis et recens natis puerulis, oris ulcera, vomitiones, tusses, vigiliae, pavores, umbilici inflammationes, aurium humiditates.

25. Ad dentitionem vero progredientibus, gingivarum stimulantés prurigines, febres, convulsiones, alvi profluvia, maxime cum caninos dentes emittunt, et pueris crassissimis, et iis qui alvos habent adstrictas.

26. Adultioribus jam, tonsillarum inflammationes, vertebrae quae ad occipitium est interiorē in partē impulsiones, asthmata, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, verrucae pensiles, satyriasmī, strumae, et alia tubercula.

27. At aetate etiam provectioribus et ad pubertatem progressis, ex iis multa, et etiam febres diuturnae magis, et sanguinis ex naribus profluvia.

28. Plurimi autem morbi pueris judi-

κθ'. Τοῖσι δὲ νεηνίσκοισι αἵματος πτύσεις, φθίσεις, πυρετοὶ ὀξέες, ἐπιληψίαι, καὶ τᾶλλα νοσήματα, μάλιστα δὲ τὰ προειρημένα.

λ'. Τοῖσι δὲ ὑπὲρ τὴν ἡλικίην ταύτην, ἄσθματα, πλευρίτιδες, περιπνευμονίαι, λήθαργοι, φρενίτιδες, καῦσοι, διάρροιαί, χρόνιαι, χολέραι, δυσεντερίαι, λειεντερίαι, αἱμορροΐδες.

λα'. Τοῖσι δὲ πρεσβύτησι, δύσπνοιαί, κατάρροοι βηχώδεις, εἰσάγγεραί, δυσεραί, ἄρθρων πόνοι, νεφρίτιδες, ἱλιγγοί, ἀποπληξίαι, καχεξίαι, ξυσμοὶ τοῦ σώματος ὅλῃ, ἀγρυπνίαι, κοιλίης, ὀφθαλμῶν καὶ ῥινῶν ὑγρότητες, ἀμβλυωπίαι, γλαυκώσεις, καὶ βαρυηκοΐαι.

cantur, partim quidem intra quadraginta dies, partim vero intra septem menses, nonnulli intra annos septem, quidam etiam ad pubertatem progressis. Qui vero pueris perseverarint, neque circa pubertatem soluti fuerint, aut feminis circa mensium eruptionem, consenescere consueverunt.

29. Juvenibus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutae, comitiales, aliique morbi, praecipue tamen praedicti.

30. Ultra hanc aetatem vero progressis asthmata, pleuritides, peripneumoniae, lethargi, phrenitides, febres ardentes, diuturna alvi profluvia, cholerae, dysenteriae, lenteriae, haemorrhoides.

31. At senibus, spirandi difficultates, catarrhi tussiculosi, stranguriae, dysuriae, articulorum dolores, nephritides, vertigines, apoplexiae, cachexiae, totius corporis pruritus, vigiliae, alvi, oculorum et narium humiditates, visus hebetudines, glaucedines, auditus gravitates.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

Α.

ΤΑΣ νέσας φαρμακεύειν, ἣν ὄργᾱ, τε-
τράμηνα, καὶ ἄχρι ἐπτὰ μηνῶν· ἥσσον δὲ
ταύτας. τὰ δὲ νήπια καὶ πρεσβύτερα εὐλα-
βέεσθαι.

β'. Ἐν τῇσι φαρμακίῃσι τοιαῦτα ἄγειν ἐκ
τῆ σώματος, ὅποῖα καὶ αὐτόματα ἰόντα χρή-
σιμα· τὰ δὲ ἐναντίως ἰόντα παύειν.

γ'. Ἦν μὲν οἷα δεῖ καθαίρεσθαι, κα-
θαίρηται, συμφέρει τε καὶ εὐφόρως φέρει.
τὰ δὲ ἐναντία, δυσχερῶς.

δ'. Φαρμακεύειν θέρους μὲν μᾶλλον τὰς
ἄνω, χειμῶνος δὲ τὰς κάτω.

ε'. Ὑπὸ κύνα, καὶ πρὸ κυνὸς, ἐργώδεις
αἱ φαρμακίαι.

ς'. Τὰς ἰοχνῆς καὶ ἐνημέας ἄνω φαρμα-
κεύειν, ὑποσελλομένους χειμῶνα.

ζ'. Τὰς δὲ δυσημέας καὶ μέσως ἐυσάρκεις,
κάτω, ὑποσελλομένους θέρους.

SECTIO QUARTA.

I.

PRAEKNANTES purgandae, si materia turgat, quadrimestres et usque ad septimum mensem: hae vero minus. Minores autem et seniores foetus caute vitare oportet.

2. In purgantium usu, qualia et sponte prodeuntia utilia sunt, talia e corpore educenda; quae vero contrario modo prodeunt, cohibenda.

3. Si quae purgari decet, purgentur, confert et facile ferunt: contra vero, difficile.

4. Aestate quidem superiores ventres potius purgato, hyeme vero inferiores.

5. Sub cane, et ante canem, molestae sunt purgationes.

6. Graciles et facile vomentes, sursum purgandi, vitantes hyemem.

7. Difficile autem vomentes, et mediocriter carnosius, deorsum, vitantes aestatem.

ή. Τες δὲ φθινώδεις, ὑποσελλομένους τὰς ἄνω.

θ'. Τες δὲ μελαγχολικὲς ἀδροτέροις τὰς κάτω, τῷ ὕψι λογισμῷ τὰναντία προστιθείς.

ι. Φαρμακεύειν ἐν τοῖσι λίην ὀξέσιν, ἢν ὀργᾷ, αὐθημερόν· χρονίζειν γὰρ ἐν τοῖσι τοιςτοις κακόν.

ια. Ὀκόσοισι ξρόφοι, καὶ περὶ τὸν ὀμφαλὸν πόνοι, καὶ ὀσφύος ἄλγημα, μὴ λυόμενον μήτε ὑπὸ φαρμακίης, μήτε ἄλλως, εἰς ὕδρωπα ξηρόν ἰδρύνεται.

ιβ'. Ὀκόσοισι κοιλίαι λειεντεριώδεις, χειμῶνος φαρμακεύειν ἄνω, κακόν.

ιγ'. Πρὸς τες ἐλλεβόρους τοῖσι μὴ ῥηϊδίως ἄνω καθαιρομένοις, πρὸ τῆς πόσεως, πρὸ γράειν τὰ σώματα πλείονι τροφῇ καὶ ἀναπαύσει.

ιδ'. Ἐπὶ πῇ τις ἐλλέβορον, πρὸς μὲν τὰς κινήσεις τῶν σωμάτων μᾶλλον ἄγειν, πρὸς δὲ τες ὕπνους καὶ τὰς ἀκινήσεις ἥσσουν. δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ναυτιλίη ὅτι κίνησις τὰ σώματα ταρασσει.

ιε'. Ἐπεὰν βέλῃ μᾶλλον ἄγειν τὸν ἐλλέβορον, κίνει τὸ σῶμα· ἐπεὰν δὲ παῦσαι, ὕπνον ποίει, καὶ μὴ κίνει.

8. Tabidos vero, cave ne sursum purges.

9. At vero melancholicos largius deorsum, simili ratione contraria adhibens.

10. In valde acutis, si materia turgel, eodem die purgandum; morari enim in talibus malum.

11. Quibus tormina, et circa umbilicum dolores, atque lumborum dolor, qui neque medicamento purgante, neque aliter solvitur, in siccum hydropem firmatur.

12. Quorum alvi lienteria infestantur, eos hyberno tempore sursum purgare, malum.

13. Qui veratro sumto non facile sursum purgantur, iis ante potionem corpora copiosiore cibo et quiete prae humectato.

14. Ubi quis veratrum biberit, ad corporum motiones magis, ad somnos vero et quietem minus ducito. Nam etiam navigatio turbari motione corpora indicat.

15. Ubi veratrum magis ducere volueris, corpus moveto; ubi vero sistendum

ις'. Ἐλλέβορος ἐπικίνδυνος τοῖσι τὰς σάρ-
κας ὑγίαιας ἔχουσι σπασμὸς γὰρ ἐμποιέει.

ιζ'. Ἀπυρέτω ἐόντι, ἀποσιτίη, καὶ καρ-
διωγμὸς, καὶ σκοτόδινος, καὶ εἶμα ἐκπι-
κρέμενον, ἄνω φαρμακίης δέεσθαι σημαί-
νει.

ιη'. Τὰ ὑπὲρ τῶν φρενῶν ὀδυνήματα,
ἄνω φαρμακίην σημαίνει· ὁκόσα δὲ κάτω,
κάτω.

ιθ'. Ὅκοσοι ἐν τῇσι φαρμακοποσίησι μὴ
διψῶσι καθαιρόμενοι, ἐπαύονται πρὶν ἢ
διψήσωσι.

κ'. Ἀπυρέτοισιν ἔσθιν, ἣν γένηται εἰρό-
φος, καὶ γενάτων βάρος, καὶ ὀσφύος ἄλγη-
μα, κάτω φαρμακίης δέεσθαι σημαίνει.

κα'. Ὑποχωρήματα μέλανα, ὀκοῖον αἷμα
μέλαν, ἀπ' αὐτομάτε ἰόντα, καὶ ξὺν πυρε-
τῷ, καὶ ἄνευ πυρετοῦ, κάκις. καὶ ὁκόσω
ἂν τὰ χρώματα τῶν ὑποχωρημάτων πλέω
πονηρότερα ἔη, μᾶλλον κάκιον· ξὺν φαρ-
μάκῃ δὲ, ἄμεινον, καὶ ὁκόσω ἂν χρώματα
πλέω ἔη, ἐπονηρότερα.

censueris, somnum conciliato, neque moveto.

16. Veratrum iis qui sano sunt corpore periculosum, convulsiones enim inducit.

17. Non febricitanti appetitus dejectus, et oris ventriculi morsus, et tenebricosa vertigo, et os amarescens, sursum purgante opus esse indicant.

18. Dolores supra septum transversum, purgationem sursum, qui vero infra, deorsum requirunt.

19. Qui in medicamentorum potionibus, cum purgantur, non sitiunt, ii non desinunt priusquam sitiverint.

20. Si tormina adfuerint, non febricitanti, et genuum gravitas, et lumborum dolor, deorsum purgatione opus esse significant.

21. Nigrae dejectiones, qualis sanguis niger, sponte prodeunt, et cum febre, et citra febrem, pessimae: et quo plures colores dejectionum pravi fuerint, eo pejus. A medicamento autem melius, et, quanto plures colores fuerint, non pravi.

κβ'. Νεσημάτων όκόσων άρχομένων, ήν χολή μέλαινα ή άνω, ή κάτω επέλθη, θανάσιμον.

κγ'. Όκόσοισιν εκ νεσημάτων όξέων, ή πελυχρονίων, ή εκ τρωμάτων, ή άλλως λεπτυνομένοισι, χολή μέλαινα όκοϊον αίμα μέλαν υπέλθη, τη ύσεραίη αποθνήσκει.

κδ'. Δυσεντερία, ήν από χολής μελαίνης άρξεται, θανάσιμον.

κε'. Αίμα άνω μέν όκοϊον αν έη, κακόν· κάτω δέ, αγαθόν.

κς'. Ήν υπό δυσεντερίας έχομένων αίσάρκες υποχωρήσωσιν, ή τα μέλανα διαχωρήματα, θανάσιμον.

κζ'. Όκόσοισιν εν τοϊσι πυρετοϊσι αίμορραγεί πληθος όκοθενεν, εν τησιν αναλήψει, τστέοισι αί κοιλίαι καθυγραίνονται.

κη'. Όκόσοισι χολώδεα τα διαχωρήματα, κωφώσεος επιγενομένης παύεται, και όκόσοισι κώφωσις, χολωδέων επιγενομένων διαχωρημάτων, παύεται.

κθ'. Όκόσοισιν εν τοϊσι πυρετοϊσι εκταίοισιν έξι ρίγια γίνεται, δύσκριτα.

22. Quocunque morbo incipiente, bilem atram supra vel infra prodire, lethale.

23. Quibuscunque ex morbis acutis, aut diuturnis, aut a vulneribus, aut alio quovis modo extenuatis, bilis atra sanguini atro similis subierit, ii postridie moriuntur.

24. Dysenteria, si ab atra bile ortum duxerit, lethalis.

25. Sanguis, supra quidem, qualiscunque fuerit emissus, malus; infra autem bonus.

26. Dysenteria vexato, si carunculæ dejiciantur, aut dejectiones nigrae, lethale.

27. Quibus per febres sanguinis copia alicunde profluxerit, iis in refectionibus alvi humectantur.

28. Quibus biliosae sunt dejectiones, hae oborta surditate cessant; et quibus praecesserit surditas, exortis biliosis dejectionibus, desinit.

29. Quibus per febres rigores contingunt sexto die, difficulter judicantur.

λ'. Ὅκόσοισι παροξυσμοὶ γίνονται, ἣν ἂν ὥρην ἀφῇ ὁ πυρετὸς, ἐς τὴν αὖριον τὴν αὐτέην ὥρην ἣν λάβῃ, δύσκριτα.

λἀ. Τοῖσι κοπώδεσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐς ἄρθρα, καὶ παρὰ τὰς γνάθους μάλιστα, αἱ ἀποσάσεις γίνονται.

λβ'. Ὅκόσοισι δὲ ἀνισαμένοισιν ἐκ τῶν νέσων τι πονέει, ἐνταῦθα αἱ ἀποσάσεις γίνονται.

λγ'. Ἀτὰρ ἣν καὶ προπεπονηκὸς τι ἔη πρὸ τοῦ νοσέειν, ἐνταῦθα στηρίζει ἡ νοῦσος.

λδ'. Ἦν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ, οἰδήματος μὴ ἔόντος ἐν τῇ φάρυγγι, πνίξ ἐξαίφνης ἐπιστῇ, θανάσιμον.

λε'. Ἦν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ ὁ τράχηλος ἐπιστραφῇ, καὶ μόγις καταπίνειν δύνηται, οἰδήματος μὴ ἔόντος, θανάσιμον.

λς'. Ἰδρῶτες πυρεταίνουσιν ἣν ἄρξωνται, ἀγαθοὶ τριταῖοι, καὶ πεμπταῖοι, καὶ ἑβδομαῖοι, καὶ ἐνναταῖοι, καὶ ἐνδεκαταῖοι, καὶ τεσσαρεσκαίδεκαταῖοι, καὶ ἑπτακαίδεκαταῖοι, καὶ μίῃ καὶ εἰκοστῇ, καὶ ἑβδόμῃ καὶ εἰκοστῇ, καὶ τριηκοστῇ πρώτῃ, καὶ τριηκοστῇ τετάρτῃ· οὗτοι γὰρ οἱ ἰδρῶτες νοῦσους

30. Quibus paroxysmi fiunt, quanamcunque hora febris dimiserit, si hora eadem postero die etiam prehenderit, judicatio difficilis est.

31. Quibus per febres lassitudinis sensus inest, iis ad articulos, et circa maxillas potissimum, abscessus decumbunt.

32. Quibus vero convalescentibus ex quovis morbo, pars aliqua labore vexatur, illic abscessus fiunt.

33. Quin et si pars quaepiam ante morbum laboraverit, in eam se morbus obfirmat.

34. Si febre vexato, nullo existente in faucibus tumore, repentina accidat strangulatio, lethale.

35. Si febricitanti collum pervertitur, ac vix deglutire possit, nullo existente tumore, lethale.

36. Sudores febricitantibus boni, qui coeperint tertio die, quinto, septimo, nono, undecimo, decimo-quarto, decimo-septimo, vicesimo-primo, vicesimo-septimo, tricesimo-primo et tricesimo-quarto; ii enim sudores morbos

κρίνουσι. οἱ δὲ μὴ οὕτω γινόμενοι, θάνατον σημαίνουσι, καὶ πόνοὺς, καὶ μῆκος νόσου, καὶ ὑποτροπιασμούς.

λζ'. Οἱ ψυχροὶ ἰδρωῖτες ξὺν μὲν ὀξείῃ πυρετῷ γινόμενοι, θάνατον· ξὺν πρηϋτέρῳ δὲ, μῆκος νόσου σημαίνουσι.

λη'. Ὁκὸν ἐνι τοῦ σώματος ἰδρῶς, ἐνταῦθα φράζει τὴν νόσον.

λθ'. Καὶ ὅκον ἐνι τοῦ σώματος θερμὸν ἢ ψυχρὸν, ἐνταῦθα ἡ νόσος.

μ'. Ὁκὸν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, καὶ ἢν τὸ σῶμα ψύχεται, ἢ αὖτις θερμαίνεται, ἢ χρῶμα ἕτερον ἐξ ἑτέρου δέχεται, μῆκος νόσου σημαίνει.

μα'. Ἰδρῶς πουλὺς ἐξ ὕπνου ἄνευ τινὸς αἰτίας φανερῆς γινόμενος, τὸ σῶμα σημαίνει ὅτι πλέονι τροφῇ χρέεται. ἢν δὲ τροφήν μὴ λαμβάνοντι τοῦτο γίνηται, σημαίνει ὅτι κενώσεως δέεται.

μβ'. Ἰδρῶς πουλὺς, ψυχρὸς ἢ θερμὸς αἰεὶ ῥέων· ὁ ψυχρὸς μέζω, ὁ δὲ θερμὸς ἐλάσσω νόσον σημαίνει.

μγ'. Οἱ πυρετοὶ ὀκόσοι μὴ διαλείποντες διὰ τρίτης ἰσχυρότεροι γίνονται, ἐπικίνδυ-

judicant. Qui vero aliter contingunt, vel mortem, vel dolores, vel morbi longitudinem, vel recidivas significant.

37. Sudores frigidi cum febre quidem acuta oborti, mortem, cum mitiori autem, morbi longitudinem significant.

38. Qua parte corporis sudor inest, ibi morbum esse indicat.

39. Et qua corporis parte calor inest, aut frigus, ibi morbus est.

40. Ubi toto corpore mutationes contingunt, et corpus frigescit, rursumque calent, vel colorem alium ab alio recipit, morbi longitudinem significat.

41. Sudor multus a somno citra manifestam causam obortus, corpus copiosiore uti cibo significat. Quod si aegroto cibum non capienti istud contingat, evacuatione opus esse indicat.

42. Sudor copiosus, modo calidus, modo frigidus assidue fluens, frigidus majorem, calidus minorem morbum significat.

43. Febres quaecunque non intermittentes tertio die vehementiores redduntur, periculosiores. Quocunque autem

νοι. ὅτι ἐφ' ἃν τρόπον διαλείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀκίνδυνοι.

μδ'. Ὅκόσοισι πυρετοὶ μακροὶ, τουτέοισιν ἢ φύματα, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐγγίνονται.

μέ'. Ὅκόσοισιν ἢ φύματα, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐκ πυρετῶν μακρῶν γίνονται, οὗτοι σιτίοισι πλέοσι χρέονται.

μς'. Ἦν ῥίγος ἐμπίπτῃ, πυρετῷ μὴ διαλείποντι, ἤδη ἀσθενεῖς εἰσὶν, θανάσιμον.

μζ'. Αἱ ἀποχρέμψεις αἱ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι μὴ διαλείπουσι αἱ πελιδναί, καὶ αἵματώδεις, καὶ δυσώδεις, καὶ χολώδεις, ἅπασαι κακαί· ἀποχωρεῦσαι δὲ καλῶς, ἀγαθαί· οὕτω καὶ κατὰ τὰς διαχωρήσεις, καὶ κατὰ τὰ οὔρα. ἦν δὲ μή τι τῶν ξυμφερόντων ἐκκρίνηται διὰ τῶν τόπων τούτων, κακόν.

μη'. Ἐν τοῖσι μὴ διαλείπουσι πυρετοῖσιν, ἦν τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ εἴη, τὰ δὲ ἔνδον καίηται καὶ δίψην ἔχῃ, θανάσιμον.

μθ'. Ἐν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἦν χεῖλος, ἢ ὀφρύς, ἢ ὀφθαλμοί, ἢ ῥίς διαστραφῇ, ἦν μὴ βλέπῃ, ἦν μὴ ἀκούῃ, ἤδη εἰσὶν.

modo intermiserint, securitatem inesse significatur.

44. Quibus adsunt febres longae, iis vel abscessus, vel dolores ad articulos oriuntur.

45. Quibus aut abscessus, aut ad articulos dolores post febres longas oriuntur, ii copiosioribus cibis utuntur.

46. Si rigor, febre non intermittente, incidat, aegro jam debili, lethale est.

47. In febribus non intermittentibus excreationes lividae, aut cruentae, aut graveolentes, aut biliosae, omnes malae; bene autem si prodeant, bonae: eadem etiam ratione deiectiones et urinae juvant. At si nihil eorum quae juvant per haec loca excernatur, malum.

48. In febribus non intermittentibus, si partes externae sint frigidae, internae vero urantur et siti vexentur, lethale est.

49. In febre non intermittente, si labrum, aut supercilium, aut oculos, aut nasus pervertatur, si visus, si auditus defecerit, aegro jam debili, quid-

τος ἀσθενέος, ὅ τι ἂν τουτέων γένηται, ἐγγὺς ὁ θάνατος.

ν'. Ὁκου ἂν ἐν τῷ πυρετῷ μὴ διαλείποντι δύσπνοια γίνηται καὶ παραφροσύνη, θανάσιμον.

να'. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἀποστήματα, μὴ λύόμενα πρὸς τὰς πρώτας κρίσεας, μῆκος νόσου σημαίνει.

νβ'. Ὁκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, ἢ ἐν τῇσιν ἄλλησιν ἀρρώστίησι κατὰ προαίρεσιν οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύουσιν, οὐδὲν ἄτοπον. ὁκόσοισι δὲ μὴ κατὰ προαίρεσιν, ἄτοπώτερον.

νγ'. Ὁκόσοισιν ἐπὶ τῶν ὀδόντων ἐν τοῖσι πυρετοῖσι περίγλισχρα γίνεται, ἰσχυρότεροι γίνονται αὐτέων οἱ πυρετοί.

νδ'. Ὁκόσοισιν ἐπὶ πούλῃ βῆχες ξηραί, βραχέα ἐρεθίζουσαι, ἐν πυρετοῖσι καυσώδεσιν, οὐ πάνυ τοι διψώδεις εἰσὶ.

νε'. Οἱ ἐπὶ βουβῶσι πυρετοὶ, πάντες κακοὶ, πλὴν τῶν ἐφημέρων.

νς'. Πυρέσσοντι ἰδρὼς ἐπιγενόμενος, μὴ ἐκλείποντος τοῦ πυρετοῦ, κακόν. μηκύνει γὰρ ἢ νόσος, καὶ ὑγρασίην πλέει σημαίνει.

quid horum evenierit, in propinquo mors est.

50. Ubi in febre non intermittente difficultas spirandi cum delirio contingit, lethale.

51. In febribus abscessus, nisi primis judicationibus solvantur, morbi longitudinem significant.

52. Quibus in febribus, aut aliis morbis oculi ex voluntate illacrymantur, nihil insolens est. At quibus praeter voluntatem, periculosius est.

53. Quibus per febres ad dentes viscosa circumnascantur, iis vehementiores fiunt febres.

54. Quibus diu tusses siccae, paullulum irritantes, in febribus ardentibus, haud admodum siticulosi sunt.

55. Ex bubonibus febres omnes malae, praeter diarias.

56. Febricitanti si sudor contingat, febre non deficiente, malum. Prorogatur enim morbus, et multam significat humiditatem.

νζ'. Ὑπὸ σπασμοῦ ἢ τετάνου ἐχομένῳ, πυρετὸς ἐπιγενόμενος, λύει τὸ νόσημα.

νη'. Ὑπὸ καύσου ἐχομένῳ, ῥίγος ἐπιγενομένου, λύσις.

νθ'. Τριταῖος ἀκριβὴς κρίνεται ἐν ἑπτὰ περιόδοις, τὸ μακρότατον.

ξ'. Ὅσοις ἐν τοῖς πυρετοῖς τὰ ὦτα κωφωθῇ, αἷμα ἐκ ῥινῶν ῥυέν, ἢ κοιλίη ἐκταραχθεῖσα, λύει τὸ νόσημα.

ξα'. Ἦν μὴ ἐν κρισίμῳ ἀφῇ ὁ πυρετὸς, ὑποτροπιάζειν εἰώθε.

ξβ'. Ὅσοις ἐν τοῖς πυρετοῖς ἵκτεροι ἐπιγίνονται πρὸ τῶν ἑπτὰ ἡμερέων, κακόν.

ξγ'. Ὅσοις ἐν τοῖς πυρετοῖς καθ' ἡμέρην ῥίγος γίνεται, καθ' ἡμέρην οἱ πυρετοὶ λύονται.

ξδ'. Ὅσοις ἐν τοῖς πυρετοῖς τῇ ἑβδόμῃ, ἢ τῇ ἐννάτῃ, ἢ τῇ ἐνδεκάτῃ, ἢ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ, ἵκτεροι ἐπιγίνονται, ἀγαθόν, ἢν μὴ τὸ ὑποχόνδριον τὸ δεξιὸν σκληρὸν ἔῃ. ἢν δὲ μὴ, οὐκ ἀγαθόν.

ξε'. Ἐν τοῖς πυρετοῖς τοῖς ὀξέσι περὶ τὴν κοιλίην καῦμα ἰσχυρόν, καὶ καρδιωγμὸς, κακόν.

57. Convulsione aut distentione nervorum detento, febris superveniens morbum solvit.

58. Febre ardente detento, rigore superveniente, solutio contingit.

59. Tertiana exquisita septem ad summum circuitibus judicatur.

60. Quibus per febres aures obsurdue-
rint, his sanguis ex naribus profluens,
aut alvus exturbata, morbum solvit.

61. Febris, nisi die critico desierit, re-
verti solet.

62. Quibus per febres morbus regius
ante diem septimum accidit, malum.

63. Quibus per febres quotidie rigores
fiunt, quotidie febres solvuntur.

64. Quibus per febres die septimo, aut
nono, aut undecimo, aut decimo-quarto,
morbus regius supervenerit, bonum, nisi
hypochondrium dextrum obduruerit:
alioqui, non bonum.

65. In febribus acutis circa ventrem ae-
stus vehemens, et oris ventriculi morsus,
malum.

ξς'. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσιν ὀξέσι οἱ σπασμοὶ, καὶ οἱ περὶ τὰ σπλάγχνα πόνοι ἰσχυροὶ, κακόν.

ξζ'. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι οἱ ἐκ τῶν ὕπνων φόβοι ἢ σπασμοὶ, κακόν.

ξη'. Ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τὸ πνεῦμα προσκόπτον, κακόν· σπασμὸν γὰρ σημαίνει.

ξθ'. Ὀκόσοισιν οὔρα παχέα, θρομβώδεα, ὀλίγα, οὐκ ἀπυρέτοισι, πληθὺς ἐπελθὼν, ἐκ τουτέων, λεπτῶν, ὠφελέει· μάλιστα δὲ τὰ τοιαῦτα ἔρχεται, οἷσιν ἐξ ἀρχῆς, ἢ διὰ ταχέων ὑπόστασιν ἴσχει.

ο'. Ὀκόσοισι δὲ ἐν πυρετοῖσι τὰ οὔρα ἀνατεταραγμένα, οἷον ὑποζυγίων, τουτέοισι κεφαλαλγίαι πάρειςιν, ἢ παρέσονται.

οα'. Ὀκόσοισι ἐβδομαῖα κρίνεται, τουτέοισιν ἐπινέφελον ἴσχει τὸ οὔρον, τῇ τετάρτῃ, ἐρυθρόν, καὶ τὰ ἄλλα κατὰ λόγον.

οβ'. Ὀκόσοισιν οὔρα διαφανέα, λευκὰ, πονηρά· μάλιστα δὲ ἐν τοῖσι φρενιτικοῖσιν ἐπιφαίνεται.

ογ'. Ὀκόσοισι ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορβορίζοντα, ὁσφύος ἀλγήματος ἐπιγενομένου, αἱ κοιλίαι τουτέοισι καθυγραίνον-

66. In febribus acutis convulsiones, et circa viscera dolores vehementes, malum.

67. In febribus pavores ex somno aut convulsiones, malum.

68. In febribus spiritus offendens, malum, convulsionem enim significat.

69. Quibus non sine febre urinae sunt crassae, grumosae et paucae, si ab iis tenues copiose prodierint, juvant: praecipue vero tales exeunt iis quibus ab initio, vel non multo post, urina sedimentum obtinet.

70. Quibus vero per febres urinae sunt turbulentaе, quales jumentorum, iis capitis dolores adsunt, vel aderunt.

71. Quibus septimo die judicatur morbus, iis urina rubram die quarto nubeculam habet, aliaque signa pro ratione.

72. Quibus urinae pellucidae, albae, malae: praecipue vero in phreneticis apparent.

73. Quibus sublata hypochondria murrant, lumborum succedente dolore, iis alvi admodum humectantur, nisi fla-

ται, ἢν μὴ φύσαι καταρῥαγέωσιν, ἢ οὖρον πλήθος ἐπέλθῃ. ἐν πυρετοῖσι δὲ ταῦτα.

οδ'. Ὀκόσοισιν ἐλπίς ἐς ἄρθρα ἀφίστασθαι, ῥύεται τῆς ἀποστάσεως οὖρον πικρὸν, κάρτα παχὺ καὶ λευκὸν γινόμενον, οἷον ἐν τοῖσι κοπώδεσι πυρετοῖσι τεταρταίοισιν ἄρχεται ἐνίοισι γίνεσθαι. ἢν δὲ καὶ ἐκ τῶν ῥινῶν αἰμορῥαγήσῃ, καὶ πάνυ ταχὺ λύεται.

οε'. Ἦν αἷμα ἢ πῦον οὐρέῃ, τῶν νεφρῶν, ἢ τῆς κύστεως ἔλκωσιν σημαίνει.

ος'. Ὀκόσοισιν ἐν τῷ οὐρῳ παχέϊ ἐόντι σαρκία σμικρὰ, ἢ ὥσπερ τρίχες ξυνεξέρχονται, τουτέοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν ἐκκρίνεται.

οζ'. Ὀκόσοισιν ἐν τῷ οὐρῳ παχέϊ ἐόντι πιτυρώδεα ξυνεξουρέεται, τουτέοισι ἢ κύστις ψωριᾷ.

ση'. Ὀκόσοι ἀπὸ τὰντομάτου αἷμα οὐρέουσι, τουτέοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν φλεβίου ῥῆξιν σημαίνει.

οθ'. Ὀκόσοισιν ἐν τῷ οὐρῳ ψαμμώδεα ὑφίσταται, τουτέοισι ἢ κύστις λιθιᾷ, ἢ νεφροί.

π'. Ἦν αἷμα οὐρέῃ καὶ θρόμβους, καὶ στραγγουρίην ἔχῃ, καὶ ὀδύνη ἐμπίπτῃ ἐς

tus erumpant, aut urinae copia prodeat. Haec vero in febribus contingunt.

74. Quibus spes est ad articulos abscessurum, ab abscessu liberat urina copiosa, valde crassa, et alba reddita, qualis in febribus cum lassitudinis sensu quarto die quibusdam ferri incipit. Quod si ex naribus etiam sanguis effluxerit, tum brevi admodum levatur aeger.

75. Si quis sanguinem aut pus mingat, renum aut vesicae exulceratio significatur.

76. Quibus cum urina crassa, exiguae carunculae, aut veluti capilli una exeunt, iis a renibus excernuntur.

77. Quibus cum urina crassa, furfuracea quaedam exeunt, iis vesica scabie laborat.

78. Quicumque repente sanguinem mingunt, iis in renibus venulam ruptam esse significatur.

79. Quibus in urina subsident arenosa, iis vesica calculo laborat, vel renes.

80. Si quis sanguinem mingat et grumos, et stranguriam habeat, dolorque in

τὸ ὑπογάστριον καὶ ἐς τὸν κτένα, καὶ ἐς
τὸ πέριναιον, τὰ περὶ τὴν κύστιν πονέει.

πα'. Ἦν αἷμα, καὶ πῦον οὐρέη, καὶ λε-
πίδας, καὶ ὁσμὴ βαρέη ἔη, τῆς κύστεος
ἔλκωσιν σημαίνει.

πβ'. Ὀκόσοισιν ἐν τῇ οὐρήθρη φύματα
φύεται, τουτέοισι, διαπυήσαντος καὶ ἐκρα-
γέντος, λύσις.

πγ'. Οὔρησις νύκτωρ πολλὴ γινομένη,
σμικρὴν τὴν ὑποχώρησιν σημαίνει.

imum ventrem, et pectinem et perinaeum incidat, partes circa vesicam laborant.

81. Si quis sanguinem, aut pus aut squamas mingat, gravisque odor adsit, vesicae exulcerationem significat.

82. Quibus in meatu urinario nascitur tuberculum, iis, eo suppurato et rupto, solutio.

83. Urina copiose de noctu reddita, paucam alvi dejectionem significat.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ.

Α.

Σ Π Α Σ Μ Ο Σ ἐξ ἐλλεβόρου, θανάσιμος.
β'. Ἐπὶ τρώματι σπασμὸς ἐπιγενόμενος,
θανάσιμος.

γ'. Αἵματος πολλοῦ ῥυέντος, σπασμὸς,
ἢ λυγμὸς ἐπιγενόμενος, κακόν.

δ'. Ἐπὶ ὑπερκαθάρσει σπασμὸς, ἢ λυγ-
μὸς ἐπιγενόμενος, κακόν.

ε' Ἦν μεθύων ἐξαίφνης ἄφρονός τις γέ-
νηται, σπασθεὶς ἀποθνήσκει, ἢν μὴ πυ-
ρετὸς ἐπιλάβῃ, ἢ ἐς τὴν οἶρην ἐλθοὺν καθ'
ἣν αἱ κραιπάλαι λύονται, φθίγγεται.

ς'. Ὀκόσοι ὑπὸ τετάνου ἀλίσκονται, ἐν
τέσσαρσι ἡμέρησιν ἀπόλλυνται· ἢν δὲ ταυ-
τέας διαφύγοιεν, ὑγιέες γίνονται.

ζ' Τὰ ἐπιληπτικὰ ὀκόσοισι πρὸ τῆς ἥβης
γίνεται, μετὰστασιν ἴσχει· οἷσι δὲ πέντε

SECTIO QUINTA.

I.

CONVULSIO ex veratro, lethalis est.

2. Convulsio si superveniat vulnere, lethalis est.

3. Multo sanguine effuso, convulsio, aut singultus superveniens, malum.

4. Immodicae purgationi convulsio, aut singultus superveniens, malum.

5. Si ebrius quispiam subito obmutuerit, convulsus emoritur, nisi eum febris prehendat, aut cum ad horam pervenerit, qua crapulae solvuntur, vocem recuperet.

6. Qui tetano corripuntur, intra quatuor dies pereunt, si tamen hos effugerint, sanescunt.

7. Comitiales quibus ante pubertatem contingunt, mutationem recipiunt: at

καὶ εἴκοσιν ἔτέων, γίνεται, τουτέοισι τὰ πολλὰ ξυναποθνήσκει.

ή. Ὅκοσοι πλευριτικοὶ γενόμενοι οὐκ ἀνακαθαίρονται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι, τουτέοισιν ἐς ἔμπύημα μεθίσταται.

θ. Φθίσις γίνεται μάλιστα ἡλικίῃσι τῇσιν ἀπὸ ὀκτωκαίδεκα ἔτέων μέχρι πέντε καὶ τρήκοντα.

ι. Ὅκοσοις κυνάγχην διαφεύγουσιν ἐς τὸν πλεύμονα τρέπεται, ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν ἀποθνήσκουσι. ἣν δὲ ταυτέας διαφύγουσιν, ἔμπυοι γίνονται.

ια. Τοῖσι ὑπὸ τῶν φθισέων ἐνοχλουμένοις, ἣν τὸ πτύσμα ὅπερ ἂν ἀποβήσσωσι, βαρὺ ὄζη ἐπὶ τοὺς ἄνθρακας ἐπιχεόμενον, καὶ αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσι, θανατῶδες.

ιβ. Ὅκοσοισιν ἂν φθισιῶσι αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσι, οὗτοι, διάρροίης ἐπιγενομένης, ἀποθνήσκουσι.

ιγ. Ὅκοσοι αἷμα ἀφρῶδες ἀναπτύουσι, τουτέοισι ἡ ἀναγωγὴ ἐκ τοῦ πλεύμονος γίνεται.

ιδ. Ὑπὸ φθίσεως ἔχομένῳ, διάρροια ἐπιγενομένη, θανατῶδες.

quibus quinto et vicesimo anno fiunt, iis plerumque commoriuntur.

8. Qui pleuritici facti, intra dies quatuordecim per superiora non purgantur, iis in suppurationem malum vertitur.

9. Tabes maxime fit aetatibus ab anno decimo octavo ad tricesimum quintum.

10. Quibus ex angina liberatis, ad pulmonem malum vertitur, ii intra dies septem intereunt; si tamen hos dies evaserint, suppurati fiunt.

11. In tabe vexatis, si sputum, quod cussi rejiciunt carbonibus impositum, gravem odorem emittat, et capilli e capite defluant, lethale est.

12. Quibus tabe correptis capilli e capite defluunt, ii succedente alvi profluvio moriuntur.

13. Qui spumantem sanguinem expunt, iis ex pulmone educitur.

14. Tabes detento, succedens alvi profluvium, lethale.

ιε'. Ὅσοι ἐκ πλευρίτιδος ἔμπνοι γίνονται, ἢν ἀνακαθαρθέωσιν ἐν τεσσαρήκοντα ἡμέρησιν, ἀφ' ἧς ἂν ἡ ῥῆξις γένηται, παύονται, ἢν δὲ μὴ, ἐς φθίσιν μεθίστανται.

ις'. Τὸ θερμὸν βλάπτει ταῦτα πλεονάκεις χρεομένοισι· σαρκῶν ἐκθήλυνσιν, νεύρων ἀκράτειαν, γνώμης νάρκωσιν, αἱμορῥαγίας, λειποθυμίας. ταῦτα οἷσι θάνατος.

ιζ'. Τὸ δὲ ψυχρὸν, σπασμοὺς, τετάνους, μελασμοὺς, καὶ ῥίγεα πυρετώδεα ἐμποιέει.

ιη'. Τὸ ψυχρὸν πολέμιον ὀστέοισιν, ὀδοῦσι, νεύροισιν, ἐγκεφάλῳ, νωτιαίῳ μυελῷ, τὸ δὲ θερμὸν ὠφέλιμον.

ιθ'. Ὅσα κατέψυκται ἐκθερμαίνειν, πλὴν ὅσα αἱμορῥαγέει, ἢ μέλλει.

κ'. Ἐλκεσι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες, δέρμα περισκληρύνει, ὀδύνην ἀνεκπύητον ποιεῖ, μελαίνει, ῥίγεα πυρετώδεα, σπασμοὺς καὶ τετάνους ποιεῖ.

κα'. Ἔστι δὲ ὅκου ἐπὶ τετάνου ἄνευ ἔλκεος, νέψ ἐυσάρκῳ θέρεος μέσου, ψυχροῦ

15. Qui ex pleuritide suppurati fiunt, si intra dies quadraginta, ex quo ruptio facta est, per superiora purgentur, liberantur, alioqui in tabem transeunt.

16. Calidum eo frequentius utentibus, has affert noxas, carnum effeminationem, nervorum impotentiam, mentis stuporem, sanguinis profluvia, animi defectiones. Haec quibus accidunt mors.

17. Frigidum vero convulsiones, nervorum distentiones, livores, et rigores febriles infert.

18. Frigidum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medullae, inimicum, calidum vero utile.

19. Perfrigerata excalefacere oportet, praeter ea quae sanguinem effundunt, aut brevi effundent.

20. Frigidum ulcera mordet, cutem obdurat, dolorem insuppurabilem facit, denigrat, rigores febriles, convulsiones et tetanos inducit.

21. Est vero, ubi in tetano sine ulcere, in juvene mediocri corporis habitu praedito, aestate media, frigidae multae

πολλοῦ κατάρχουσιν, ἐπανάκλησιν θέρμης ποιεῖται. θέρμη δὲ ταῦτα ῥύεται.

ιβ'. Τὸ θερμὸν ἐκπυητικόν, ἐπὶ παντὶ ἔλκεϊ, πλην ἐπὶ νεαρῷ, μέγιστον σημήϊον ἐς ἀσφαληΐην, δέρμα μαλάσσει, ἰσχυαίνει, ἀνώδυνον, ῥιγέων, σπασμῶν, τετάνων παρηγορικόν· τὴν δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ καρηβαρηΐην λύει· πλεῖστον δὲ διαφέρει ὀστέων κατῆγμασι, μάλιστα δὲ τοῖσιν ἐπιλωμένοισι· τουτέων δὲ μάλιστα, τοῖσιν ἐν κεφαλῇ ἔλκεα ἔχουσι· καὶ ὅκον αὐτὰ ὑπὸ ψύξεως θνήσκει, ἢ ἐλκοῦται, καὶ ἔρπησιν ἐσθιομένοισι, ἔδρη, αἰδοίῳ, ὑστέρη, κνίστεϊ· τουτέοισι τὸ μὲν θερμὸν φίλον, καὶ κρίνον, τὸ δὲ ψυχρὸν πολέμιον, καὶ κτεῖνον.

ιγ'. Ἐν τουτέοισι δὲ δεῖ τῷ ψυχρῷ χρέεσθαι, ὅκον αἵμορροαγέειν μέλλει, μὴ ἐπὶ αὐτὰ, ἀλλὰ περὶ αὐτὰ ὅκον ἐπιρροεῖ· καὶ ὅκον φλεγμοναί, ἢ ἐπιφλογίσματα ἐς τὸ ἔρυθρον καὶ ὑφαιμον ῥέποντα νεαρῷ αἵματι· ἐπεὶ τάγε παλαιὰ μελαίνει· καὶ ἔρυσίπελας τὸ μὴ ἐλκούμενον ὠφελεῖ, ἐπεὶ τόγε ἐλκούμενον βλάπτει.

affusio caloris revocationem efficit. Calor autem haec sanat.

22. Calidum suppurationem movens, in omni vulnere, excepto vulnere recenti, maximum securitatis indicium exhibet, cutem emollit, attenuat, dolorem tollit, rigores, convulsiones, tetanos mitigat, capitis gravitatem solvit: ossium vero fracturis plurimum confert, sed praecipue his quae nudata sunt iisque maxime, qui in capite ulcera habent. His etiam quae a frigore emoriuntur, aut ulcerantur, et herpetibus exedentibus, sedi, pudendo, utero, vesicae; iis omnibus calidum gratum et judicatorium frigidum vero inimicum et interimens.

23. At frigido in his utendum, unde sanguis erumpit aut erupturus est, non supra ipsas partes, sed circa eas unde profluit: et etiam ubi inflammationes, aut incendiosa quaedam ad rubrum et subcruentum ex recenti sanguine vergentia: inveterata namque denigrat. Confert etiam ubi adest erysipelas non ulceratum, siquidem exulceratum laedit.

κδ'. Τὰ ψυχρὰ, οἷον χιὼν, ἢ κρύσταλλοι, στήθει πολέμια, βηχέων κινητικὰ, αἱμορροϊκὰ, καὶ καταρροϊκὰ.

κε'. Τὰ δὲ ἐν ἄρθροισιν οἰδήματα, καὶ ἀλγήματα, ἄτερ ἔλκεος, καὶ ποδαγρικὰ καὶ σπάσματα, τουτέων τὰ πλεῖστα ψυχρὸν πολλὸν καταχέομενον, ῥηΐζει τε, καὶ ἰσχναίνει, καὶ ὀδύνην λύει· νάρκη δὲ μετρίῃ ὀδύνης ληκτική.

κς'. Ὑδωρ τὸ ταχέως θερμαινόμενον, καὶ ταχέως ψυχόμενον, κουφότατον.

κζ'. Ὅκόσοισι δὲ πιεῖν ὄρεξις νύκτωρ, τοῖσι πάνυ διψῶσιν, ἢν ἐπικοιμηθέωσιν, ἀγαθόν.

κη'. Γυναικῶν ἀγωγὸν ἢ ἐν ἀρώμασι πυρίῃ· πολλαχοῦ δὲ καὶ ἐς ἄλλα χρησίμη ἂν ᾦν, εἰ μὴ καρηβαρίας ἐνεποιεῖ.

κθ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ ὑπὸ τινος τῶν ὀξέων νοσημάτων ληφθῆναι, θανατώδες.

λ'. Γυνὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσα φλεβοτομηθεῖσα ἐκτιτρώσκει, καὶ μᾶλλον εἰ μέζον εἶη τὸ ἔμβρυον.

24. Frigida, veluti nix, vel glacies, pectori sunt adversa, tusses movent, sanguinis eruptiones et destillationes efficiunt.

25. Articulorum tumores, et dolores absque ulcere, et podagricos dolores, et convulsa, magna ex parte frigida large affusa levat, et minuit, doloremque solvit. Moderatus namque torpor dolorem finit.

26. Aqua quae cito calescit et cito refrigeratur, levissima.

27. Haec vero confert quibus bibendi de nocte appetentia est, iis admodum sitientibus; et si postea dormierint, bonum.

28. Odoramentorum suffitus muliebria ducit: saepe vero ad alia etiam utilis esset, nisi capitis gravitatem inferret.

29. Mulierem utero gerentem morbo quopiam acuto corripi, lethale.

30. Mulier utero gerens vena secta abortit, idque potissimum, si fetus grandior fuerit.

λα'. Γυναικὶ αἷμα ἐμεούσῃ, τῶν κατα-
μηνίων ῥαγέντων, λύσις.

λβ'. Γυναικὶ τῶν καταμηνίων ἐκλειπόν-
των, αἷμα ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυῆναι, ἀγαθόν.

λγ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, ἣν ἡ
κοιλίη πολλὰ ῥυῆ, κίνδυνος ἐκτρώσαι.

λδ'. Γυναικὶ ὑπὸ ὕστερικῶν ἐνοχλεομένη,
ἢ δυστοκεούσῃ, πταρμὸς ἐπιγενόμενος,
ἀγαθόν.

λε'. Γυναικὶ τὰ καταμήνια ἄχροα, καὶ
μὴ κατὰ τὰ αὐτὰ αἰεὶ γινόμενα, καθάρ-
σεος δέεσθαι σημαίνει.

λς'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, ἣν οἱ
μασθοὶ ἐξαίφνης ἰσχνοὶ γένωνται, ἐκτι-
τρώσκει.

λζ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχοῦσῃ, ἣν ὁ
ἕτερος μασθὸς ἰσχνὸς γένηται, δίδυμα ἐχού-
σῃ, θάτερον ἐκτιτρώσκει· καὶ ἣν μὲν ὁ
δεξιὸς ἰσχνὸς γένηται, τὸ ἄρρὲν· ἣν δὲ
ὁ ἀριστερὸς, τὸ θῆλυ.

λη'. Ἦν γυνὴ μὴ κύουσα, μηδὲ τετο-
κυῖα γάλα ἔχῃ, ταυτέῃ τὰ καταμήνια
ἐκλέλοιπε.

λθ'. Γυναιξὶ ὀκόσησιν ἐς τοὺς τιτθοὺς
αἷμα ξυστρέφεται, μανίην σημαίνει.

SECTIO QUINTA. 81

31. Mulieri sanguinem evomenti, menstruis erumpentibus, solutio contingit.

32. Mulieri menstruis deficientibus sanguis ex naribus profluens, bono est.

33. Mulieri utero gerenti, si alvus multum profluat, abortionis periculum est.

34. Mulieri ab uterina passione vexatae, aut difficulter parienti, sternutatio superveniens bonum.

35. Mulieri menses decolores, neque semper eadem periodo prodeuntes, purgatione opus esse indicant.

36. Mulieri utero gerenti si mammae derepente gracilescent, abortit.

37. Mulieri utero gemellos gerenti, si altera mamma gracilis evadat, alterum abortu edit: et si quidem dextra mamma gracilescent, marem, si vero sinistra, feminam.

38. Si mulier non praegnans, neque puerpera lac habet, ei menstrua defecerunt.

39. Quibus mulieribus ad mammas sanguis colligitur, furorem indicat.

μ'. Γυναῖκα ἣν θέλῃς εἰδέναι εἰ κύει, ἐπὴν καθεύδειν μέλλῃ, μελίκρατον δοῦναι πειῖν· κῆν μὲν στρόφος αὐτέην ἔχῃ περὶ τὴν γαστέρα, κύει· ἣν δὲ μὴ, οὐ.

μα'. Γυνὴ ἔγκυος, ἣν μὲν ἄρῶεν κύη, εὐχρως ἐστὶ· ἣν δὲ θῆλυ, δύσχροος.

μβ'. Γυναικὶ κυοῦση ἣν ἐρυσίπελας ἐν τῇ ὑστέρῃ γένηται, θανατῶδες.

μγ'. Ὀκόσαι παρὰ φύσιν λεπταὶ ἐοῦσαι ἐκτιτρώσκουσιν, οὐ κύουσι πρὶν ἢ παχυνθῆναι.

μδ'. Ὀκόσαι δὲ μετρίως τὸ σῶμα ἔχουσαι ἐκτιτρώσκουσι δίμηνα καὶ τρίμηνα ἄτερ προφάσεως φανερῆς, ταυτέῃσι αἱ κοτυληδόνες μύξης μεσταὶ εἰσι, καὶ οὐ δύνανται κρατεῖν ὑπὸ τοῦ βάρους τὸ ἔμβρυον, ἀλλὰ ἀπορρήγνυνται.

με'. Ὀκόσαι παρὰ φύσιν παχεῖαι ἐοῦσαι μὴ ξυλλαμβάνουσιν ἐν γαστρὶ, ταυτέῃσι τὸ ἐπίπλοον τὸ στόμα τῶν ὑστερέων ἀποπιέζει, καὶ πρὶν ἢ λεπτυνθῆναι, οὐκ κύουσι.

μς'. Ἦν ὑστέρη ἐν τῷ ἰσχίῳ ἐγκειμένη ἔῃ, καὶ διαπυήσῃ, ἀνάγκη ἔμμοτον γενέσθαι.

40. Si nosse velis an mulier conceperit, ei dormiturae aquam mulsam propinato, et si ventris tormina eam corripuerint, concepit, sin minus, non concepit.

41. Mulier praegnans, si marem gestat, coloratior est, si feminam, minus colorata.

42. Si mulieri praegnanti erysipelas in utero fiat, lethale.

43. Quae praeter naturam tenues abortiunt, utero non gerunt priusquam crassescant.

44. Quae mediocri corporis habitu praeditae, fetus bimestres aut trimestres, absque causa manifesta, abortione excludunt, iis uteri acetabula mucoris plena sunt, neque prae pondere fetum continere possunt, sed abrumpuntur.

45. Quae praeter naturam crassae non concipiunt, iis omentum os uteri comprimit, neque priusquam extenuentur, praegnantess fiunt.

46. Si uterus ad coxam incumbat, et suppuratus fuerit, ulcus fistulosum fieri necesse est.

μζ'. "Εμβρυα τὰ μὲν ἄρσενα ἐν τοῖσι δεξιοῖσι, τὰ δὲ θήλεα ἐν τοῖσιν ἀριστεροῖσι μᾶλλον.

μη'. Ἐς ὑστέρων ἐκπτώσεας παρμικὸν προσθεῖς, ἐπιλαμβάνειν τοὺς μυκτιῆρας καὶ τὸ στόμα.

μθ'. Γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, τεινεσμὸς ἐπιγενόμενος ἔκτρωσιν ποιέει.

ν'. Γυναικὶ τὰ καταμήνια ἦν βούλῃ ἐπισχεῖν, σικυὴν ὡς μεγίστην πρὸς τοὺς τιτθοὺς πρόσβαλλε.

να'. Ὀκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσι, τουτέων τὸ στόμα τῶν ὑστερέων ζυμμένυκε.

νβ'. "Ην γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ γάλα πολὺ ἐκ τῶν μαζῶν ῥέῃ, ἀσθενέειν τὸ ἔμβρυον σημαίνει. ἦν δὲ στερεοὶ οἱ μαστοὶ ἔωσι, ὑγιεινότερον τὸ ἔμβρυον σημαίνει.

νγ'. Ὀκόσαι διαφθείρειν μέλλουσι, ταυτέησι οἱ τιτθοὶ ἰσχυροὶ γίνονται. ἦν δὲ πάλιν σκληροὶ γένωνται, ὀδύνη ἔσται, ἢ ἐν τοῖσι τιτθοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσιν ἰσχύοισιν, ἢ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν, ἢ ἐν τοῖσι γούνασι, καὶ οὐ διαφθείρει.

νδ'. Ὀκόσησι τὸ στόμα τῶν ὑστερέων

47. Mares fetus uteri dextra parte, feminae sinistra magis gestantur.

48. Ut secundae excidant, sternutatorio apposito, nares et os comprimito.

49. Mulieri in utero habenti, tenemus superveniens abortum facit.

50. Mulieri si voles menstrua sistere, cucurbitulam quam maximam ad mammas appone.

51. Quae utero gerunt, iis uteri os connivet.

52. Mulieri uterum gerenti, si lac copiosum e mammis effluat, fetum imbecillum esse indicat. Quod si solidae mammae fuerint, valentiorum fetum significant.

53. Quae abortum facturae sunt, iis mammae marcescunt. Quod si denuo durae evadant, dolor erit vel in mammis, vel in coxis, vel in oculis, vel in genibus, neque mulier abortit.

54. Quibus os uteri durum est, iis connivere os uteri necesse est.

σκληρόν ἐστι, ταυτέησιν ἀνάγκη τὸ στόμα τῶν ὑστερέων ξυμῦναι.

νε'. Ὀκίσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσαι ὑπὸ πυρετῶν λαμβάνονται, καὶ ἰσχυρῶς ἰσχυαίνονται ἄνευ προσφάσεως φανερῆς, τίκτουσι χαλεπῶς καὶ ἐπικινδύνως, ἢ ἐκτιτρώσκουσαι κινδυνεύουσι.

νε''. Ἐπὶ ῥύφῳ γυναικῆϊ σπασμός καὶ λειποθυμίῃ ἢ ἐπιγίνηται, κακόν.

νε'''. Καταμηνίων γινομένων πλεόνων, νοῦσοι ξυμβαίνουσι, καὶ μὴ γινομένων ἀπὸ τῆς ὑστέρης γίνονται νοῦσοι.

νη'. Ἐπὶ ἀρχῷ φλεγμαίνοντι, καὶ ἐπὶ ὑστέρῃ φλεγμαινούσῃ στραγγουρίῃ ἐπιγίνεται· καὶ ἐπὶ νεφροῖσιν ἐμπύοισι στραγγουρίῃ ἐπιγίνεται· ἐπὶ δὲ ἥπατι φλεγμαίνοντι, λύγξ ἐπιγίνεται.

νη''. Γυνή ἢν μὴ λαμβάνῃ ἐν γαστρὶ, βούλῃ δὲ εἰδέναι εἰ λήψεται, περικαλίψας ἱματίοισι, θυμῖα κάτωθεν· κῆν μὲν πορεύεσθαι σοι δοκέῃ ἢ ὁδμὴ διὰ τοῦ σώματος ἐς τὰς ῥῖνας καὶ ἐς τὸ στόμα, γίνωσκε ὅτι αὐτέῃ οὐ διὰ ἐωυτὴν ἄγονός ἐστι.

ξ'. Ἦν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ αἰ

55. Quae utero gerentes febribus corripuntur, et valde extenuantur, citra manifestam causam, eae difficulter et cum periculo pariunt, aut abortum facientes periclitantur.

56. Si profluvio muliebri convulsio et animi defectio supervenerit, malum.

57. Mensibus copiosioribus profluentibus, morbi contingunt, et non produntibus ab utero morbi eveniunt.

58. Recte intestino et utero inflammatione affectis, stranguria accidit: renibus etiam purulentis stranguria succedit: jecori vero inflammatione laboranti supervenit singultus.

59. Si mulier non concipiat, scire autem volueris, num conceptura sit, vestibis undique obvolutae per inferna suffitum apponito: et si odor quidem ad nares et os usque, per corpus tibi pervadere videatur, ipsam non ex sese infecundam esse scito.

60. Si mulieri utero gerenti purga-

καθάρσεις πορεύονται πολλαί, ἀδύνατον τὸ ἔμβρυον ὑγιαίνειν.

ξα'. Ἦν γυναικὶ αἱ καθάρσεις μὴ πορεύωνται, μήτε φρίκης, μήτε πυρετοῦ ἐπιγινόμενου, ἄσαι δὲ αὐτῇ προσπίπτωσι, λογίζου ταυτίην ἐν γαστρὶ ἔχειν.

ξβ'. Ὀκόσαι ψυχρὰς καὶ πυκνὰς τὰς μήτρας ἔχουσιν οὐ κινῶσιν, καὶ Ὀκόσαι καθύγρους αὐτὰς ἔχουσι, ὁμοίως, ἀποσβέννυται γὰρ αὐτῇσι ὁ γόνος· καὶ Ὀκόσαι ξηρὰς μᾶλλον καὶ περικεκαυμένας· ἐνδητῇ γὰρ τῆς τροφῆς φθείρεται τὸ σπέρμα. Ὀκόσαι δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τὴν κρῆσιν ἔχουσι ξύμμετρον, αἱ τοιαῦται ἐπίτεκνοι γίνονται.

ξγ'. Παραπλησίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρρένων· ἢ γὰρ διὰ τὴν ἀραιότητα τοῦ σώματος τὸ πνεῦμα ἔξω φέρεται, πρὸς τὸ μὴ παραπέμπειν τὸ σπέρμα, ἢ διὰ τὴν πυκνότητα τὸ ὑγρὸν οὐ διαχωρίζει ἔξω, ἢ διὰ τὴν ψυχρότητα οὐκ ἐκπυροῦται, ὥστε ἀθροίζεσθαι πρὸς τὸν τόπον τοῦτον ἢ διὰ τὴν θερμασίην, τοῦτο γίνεται.

ξδ'. Γάλα διδύναι κεφαλαλγέουσι, κακόν· κακὸν δὲ καὶ πυρεταίνουσι, καὶ οἷσι ὑπο-

tiones multae eant, fetus ut bene valeat fieri non potest.

61. Si mulieri purgationes non prod-eant, neque horrore, neque febre succedente, ciborumque fastidia ei accidant, gravidam esse existimato.

62. Quae frigidos et densos habent uteros, non concipiunt, neque quae prachumidos habent, siquidem in ipsis genitura extinguitur: et quae nimis siccos et immodice calidos habent, alimenti enim inopia semen corrumpitur. At quae ex utrisque moderatam nactae sunt temperiem, eae proliferae sunt.

63. Pari modo etiam maribus evenit: aut enim propter corporis raritatem spiritus extra fertur, ita ut semen non transmittat; aut propter densitatem humor foras non excernitur, aut ob frigiditatem non accenditur, ut ad eum locum coacervari possit: aut ob caliditatem hoc contingit.

64. Lac exhibere capite dolentibus, malum. Malum item et febricitantibus, et quibus praecordia sublata murmurant,

χόνδρια μετέωρα διαβορβορίζεται, καὶ τοῖσι διψώδεσι· κακὸν δὲ καὶ τοῖσι χολωδестέρας τὰς ὑποχωρήσεας ἐν ὀξέσι πυρετοῖσιν ἔχουσι, καὶ οἷσι αἵματος πολλοῦ διαχώρησις γίγονε. ἀρμόζει δὲ τοῖσι φθινώδεσι τὸ γάλα, ἀλλὰ μὴ τοῖσι λίην πολλῷ πυρέσσουσι· διδόναι δὲ γάλα καὶ ἐν πυρεστοῖσι μακροῖσι βηχικοῖσι, μηδενὸς ὁκόσιν προεیرهται σημηῶν παρεόντος· παρὰ λόγον δὲ ἐντετηκότων.

ξε'. Ὁκόσοισιν οἰδήματα ἐπὶ ἔλκεσι φαίνεται, οὐ μάλα σπῶνται, οὐδὲ μαίνονται. τουτέων δὲ ἀφανισθέντων ἐξαίφνης, τοῖσι μὲν ὀπισθεν, σπασμοὶ, τέτανοι· τοῖσι δὲ ἔμπροσθεν, μανίη, ὀδύνη πλευροῦ ὀξέη, ἢ ἐμπύησις, ἢ δυσεντερία, ἢ ἐρυθρὰ ἢ τὰ οἰδήματα.

ξε'. Ἦν τρωμάτων ἰσχυρῶν καὶ πονηρῶν ἐόντων, οἰδήμα μὴ φαίνεται, μέγα κακόν.

ξζ'. Τὰ χαῦνα, χρηστά, τὰ δὲ ὠμά, κακά.

ξη'. Τῷ τὰ ὀπισθεν τῆς κεφαλῆς ὀδυνωμένῳ, ἢ ἐν μετώπῳ ὀρθίῳ φλὲψ τμηθεῖσα, ὠφελείη.

et siticulosus. Malum quoque, quibus per febres acutas biliosiores sunt dejectiones, et quibus copiosa sanguinis dejectio facta est. Tabidis etiam lac convenit, sed non valde admodum febricitantibus. Dandum quoque lac in febribus longis et tussiculosus, si nullum ex supra commemoratis signis adsit, et praeter rationem extenuetur aeger.

65. Quibus a vulneribus tumores conspiciuntur, ii non maxime convelluntur, neque insaniunt. At iis derepente evanescentibus, iis quidem, quibus a tergo ulcera fuerint, convulsiones et tetani fiunt. Quibus vero in anteriori parte, insania, aut lateris dolor acutus, aut puris collectio accidet, aut dysenteria, si tumores fuerint rubri.

66. Si, magnis et pravis existentibus vulneribus, tumor non conspiciatur, ingens malum.

67. Molles tumores boni, at crudi mali.

68. Ei qui parte capitis posteriore dolet, recta in fronte incisa vena, prodest.

ξθ'. Ρίγησ ἀρχεται γυναιξὶ μὲν, ἐξ
ὄσφύος μᾶλλον, καὶ διὰ νώτου ἐς τὴν κε-
φαλὴν. ἀτὰρ καὶ ἀνδράσι μᾶλλον ὀπισθεν,
ἢ ἔμπροσθεν τοῦ σώματος, οἷον ἀπὸ πη-
χέων τε καὶ μηρῶν. ἀτὰρ καὶ τὸ δέρμα
ἀραιόν· δηλοῖ δὲ τοῦτο ἡ θρίξ.

ο'. Οἱ ὑπὸ τεταρταίων ἀλίσκόμενοι,
ὑπὸ σπασμοῦ οὐ πάντι ἀλίσκονται. ἢν
δὲ ἀλίσκονται πρότερον, καὶ ἐπιγένηται
τεταρταῖος, ῥύονται.

οα'. Ὅσοιοι δέρματα περιτείνεται
καρφαλέα, καὶ σκληρὰ, ἄνευ ἰδρωτός τε-
λειτῶσι. ὅσοισι δὲ χαλαρὰ καὶ ἀραιὰ,
ξὺν ἰδρωτί τελευτῶσι.

οβ'. Οἱ ἰκτεριώδεις, οὐ πάντι πνευ-
ματώδεις εἰσι.

69. Rigores mulieribus quidem initium ducunt ex lumbis magis, et per dorsum ad caput. Sed viris parte corporis posteriore magis, quam anteriore, veluti ex cubitis et femoribus. Sed et cutis iis rara est: id autem pilus indicat.

70. Qui quartanis corripuntur, haud admodum convulsione tentantur. Quod si prius corripiantur, et quartana succedat, liberantur.

71. Quibus cutis obtenditur, arida et dura, ii sine sudore moriuntur. At quibus laxa et rara, cum sudore ob-
eunt.

72. Qui flava bile abundant, non multum flatulenti sunt.

ΤΜΗΜΑ "ΕΚΤΟΝ.

Α.

Ἐν τῇσι χρονίῃσι λειεντερίῃσιν ὄξυρεγμὶς ἐπιγινόμενη, μὴ γινόμενη πρότερον, σημήϊον ἀγαθόν.

β'. Οἷσι ῥῖνες ὑγρότεραι φύσεϊ, καὶ ἡ γονὴ ὑγροτέρη, ὑγιαίνουνσι νοσηρότερον· οἷσι δὲ ὑπὸ νόσου τάναντία, ὑγεινότερον.

γ'. Ἐν τῇσι μακροῖσι δυσεντερίῃσι, αἱ ἀποσιτίαι κακόν, καὶ ξὺν πυρετῷ εἶναι, κάκιον.

δ'. Τὰ περιμάδηρα ἔλκεα, κακοήθεια.

ε'. Τῶν ὀδυνέων καὶ ἐν πλευρῇσι, καὶ ἐν στήθεσι, καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοις μέλεσιν, ἥν μέγα διαφέρωσι, καταμαθητέον.

ς'. Τὰ νεφριτικά, καὶ ὅσα κατὰ τὴν κύστιν ἐργαδέως ὑγιάζεται τοῖσι πρεσβύτησι.

SECTIO SEXTA.

I.

IN diuturnis intestinorum laevitatibus, si ructus acidus, qui antea non extitit, succedat, bonum est signum.

2. Quibus nares natura sunt humidiores, et genitura humidior est, sanis insalubre, quibus vero per morbum contra fit, salubrius.

3. In longis dysenteriis cibi fastidia malum denuntiant, et si accidunt cum febre, pejus.

4. Ulcera undiquaque glabra, maligna.

5. Dolores et in lateribus, et in pectore et in ceteris membris, cum multum infestent, animadvertendum.

6. Renum, et quaecunque vesicae vitia, in senibus aegre curantur.

ζ'. Τὰ ἀλγήματα καὶ οἰδήματα τὰ κατὰ τὴν κοιλίην γινόμενα, τὰ μὲν μετέωρα κουφότερα· τὰ δὲ μὴ μετέωρα ἰσχυρότερα.

η'. Τοῖσι ὑδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἔλκεα ἐν τῷ σώματι, οὐ ῥηϊδίως ὑγιάζεται.

θ'. Τὰ πλατεῖα ἔξανθήματα καὶ οὐ πάνυ τι κνησμοῦδεα, ἐργωδέως ὑγιάζεται.

ι'. Κεφαλὴν πονέοντι, καὶ περιωδυνέοντι, πῦον, ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα ῥυέν κατὰ τὰς ῥῖνας, ἢ κατὰ τὸ στόμα, ἢ κατὰ τὰ ὦτα, λύει τὸ νόσημα.

ια'. Τοῖσι μελαγχολικοῖσι, καὶ τοῖσι νεφριτικοῖσι, αἱμορροῖδες ἐπιγινόμεναι, ἀγαθόν.

ιβ'. Αἱμορροῖδας ἱηθέντι χρονίας, ἢν μὴ μίη φυλαχθῇ, κίνδυνος ὑδρωπα ἐπιγενέσθαι, ἢ φθίσιν, ἢ μανίην.

ιγ'. Ὑπὸ λυγμοῦ ἐχομένῳ, πταρμοὶ ἐπιγινόμενοι, λύουσι τὸν λυγμόν.

ιδ'. Ὑπὸ ὑδρωπος ἐχομένῳ, τοῦ κατὰ τὰς φλέβας ἐς τὴν κοιλίην ὕδατος ῥυέντος λύσις.

ιε'. Ὑπὸ διαρροΐης ἐχομένῳ μακρῆς,

7. Dolores et tumores ventris, sublimes quidem, leviores: non sublimes vero, vehementiores.

8. Hydropicis quae in corpore fiunt ulcera, haud facile sanantur.

9. Pustulae latae et quae non admodum pruriunt, difficulter sanantur.

10. Capite dolenti, ac vehementer laboranti, pus, aut aqua, aut sanguis, per nares, vel os, vel aures effluens, morbum tollit.

11. Melancholicis affectibus, et reum vitiis, succedentes haemorrhoides bono sunt.

12. A diuturnis haemorrhoidibus curato, nisi una servetur, periculum est, ne aqua inter cutem, aut tabes, aut inaniam succedat.

13. Singultu detento, si sternutamenta cecedant, singultum tollunt.

14. Hydrope detento, si aqua per enas in ventrem confluxerit, morbus solvitur.

15. Longo alvi profluvio detento,

ἀπὸ ταυτομάτου ἔμετος ἐπιγενόμενος, λύει
τὴν διάρροϊαν.

ιζ'. Ὑπὸ πλευρίτιδος ἢ ὑπὸ περιπλευ-
μονίης ἐχομένα, διάρροϊα ἐπιγενομένη,
κακόν.

ιζ'. Ὀφθαλμοῖντι ὑπὸ διάρροϊῆς κατα-
σχεθέντι, κάλον.

ιη'. Κύστιν διακοπέντι, ἢ ἐγκέφαλον, ἢ
καρδίην, ἢ φρένας, ἢ τῶν ἐντέρων τι
τῶν λεπτῶν, ἢ κοιλίην, ἢ ἥπαρ, θανα-
τώδες.

ιθ'. Ἐπὴν διακοπῇ ὀστέον, ἢ χονδρὸς,
ἢ νεῦρον, ἢ γνάθου τὸ λεπτόν, ἢ ἀκρο-
ποσθίην, οὔτε αὖξεται, οὔτε ξυμφύεται.

κ'. Ἦν ἐς τὴν κοιλίην αἷμα ἐκχυθῇ
παρὰ φύσιν, ἀναγκαίη ἐμπυηθῆναι.

κα'. Τοῖσι μαινομένοισι κισσῶν, ἢ αἰ-
μορροϊδῶν ἐπιγενομένων, τῆς μανίης
λύσις.

κβ'. Ὅκοντα ῥήγματα ἐκ τοῦ νώτου ἐς
τοὺς ἀγκῶνας καταβαίνει, φλεβοτομή
λύει.

κγ'. Ἦν φόβος καὶ δυσθυμίη πούλυν
χρόνον διατελέῃ, μελαγχολικὸν τὸ τοι-
οῦτον.

spontanea accedens vomitio, profluvium solvit.

16. Pleuritide aut peripneumonia vehementer detento, succedens alvi profluvium, malum.

17. Lippientem alvi profluvio corripere, bonum.

18. Cui vesica persecta fuerit, aut cerebrum, aut cor, aut diaphragma, aut tenue quoddam intestinum, aut ventriculus, aut jecur, lethale est.

19. Os cum persectum fuerit, aut cartilago, aut nervus, aut genae tenuis articula, aut praeputium, neque auctur, neque coalescit.

20. Si sanguis in cavitationem aliquam contra naturam effusus fuerit, ut in corpore vertatur necesse est.

21. Insanientibus si varices, aut haemorrhoides supervenerint, insaniae somnium fit.

22. Dolores qui ex dorso ad cubiti articulos descendunt, venae sectio solvit.

23. Metus et tristitia si diu perseverent, melancholiae istud indicium est.

κδ'. Ἐντέρων ἢν διακοπῇ τῶν λεπτῶν
τι, οὐ συμφύεται.

κε'. Ἐρυσίπελας ἔσωθεν καταχυθὲν, ἔσω
τρέπεται, οὐκ ἀγαθόν· ἔσωθεν δὲ ἔξω,
ἀγαθόν.

κς'. Ὀκόσοισιν ἐν τοῖσι καύσοισι τρό-
μοι γίνονται, παρακοπὴ λύει.

κζ'. Ὀκόσοι ἔμπυοι, ἢ ὑδρωπικοὶ τέ-
μνονται, ἢ καίονται, ἐκρύντος τοῦ πύου,
ἢ τοῦ ὕδατος ἀθρόου, πάντως ἀπόλ-
λυνται.

κη'. Εὐνοῦχοι οὐ ποδαγριῶσιν, οὐδὲ
φαλακροὶ γίνονται.

κθ'. Γυνὴ οὐ ποδαγριᾷ ἢν μὴ τὰ κα-
ταμήνια αὐτῇ ἐκλίπη.

λ'. Ηαῖς οὐ ποδαγριᾷ πρὸ τοῦ ἀφρο-
διάζειν.

λα'. Ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἢ ἀκρητοποσίη,
ἢ λουτρον, ἢ πυρίη, ἢ φλεβοτομίη ἰῆται,
ἢ φαρμακοποσίη.

λβ'. Τραυλοὶ ὑπὸ διαρροίης μάλιστα
ἀλίσκονται μακρῆς.

λγ'. Οἱ ὀξυρεγμιώδεις, οὐ πάντι πλευ-
ριτικοὶ γίνονται.

24. Ex tenuioribus intestinis si quid persectum fuerit, minime coalescit.

25. Erysipelas foras effusum introverti, minime bonum, at ab interioribus foras, bonum.

26. Quibus in febribus ardentibus tremores contingunt, his delirium solutionem affert.

27. Qui suppurati, aut hydropici uruntur, aut secantur, si pus, aut aqua confertim effluxerit, omnino intereunt.

28. Eunuchi neque podagra laborant, neque calvi fiunt.

29. Mulier podagra non laborat, nisi menstrua ipsi defecerint.

30. Puer podagra non tentatur ante venereorum usum.

31. Oculorum dolores aut meri potio aut balneum, aut fomentum, aut venae sectio, aut potio purgans sanat.

32. Balbi longo alvi profluvio maxime corripuntur.

33. Qui acidum eructant, haud admodum pleuritide tentantur.

λδ'. Ὅκосоι φαλακροὶ, τουτέοισι κίρσοι μεγάλοι οὐ γίνονται, ὁκόσοισι δὲ ἂν φαλακροῖσιν ἔοῦσι κίρσοι μεγάλοι ἐπιγένωνται, πάλιν οὗτοι γίνονται δασέες.

λέ'. Τοῖσι ὑδρωπικοῖσι βῆξ ἐπιγινόμενη, κακόν.

λς'. Δυσουρίην φλεβοτομίη λύει· τὰμνεν δὲ τὰς ἔσω.

λζ'. Ὑπὸ κινάγχης ἔχομένων, οἰδήματα γενέσθαι ἐν τῷ τραχήλῳ ἔξω, ἀγαθόν.

λη'. Ὅκосоισι κρυπτοὶ καρκῖνοι γίνονται, μὴ θεραπεύειν βέλτιον· θεραπευόμενοι γὰρ ἀπόλυνται ταχέως· μὴ θεραπευόμενοι δὲ πολλὸν χρόνον διατελείουσι.

λθ'. Σπασμοὶ γίνονται, ἢ ὑπὸ πληρώσεως, ἢ ὑπὸ κενώσεως. οὕτω δὲ γίνεται καὶ λυγμός.

μ'. Ὅκосоισι περὶ τὸ ὑποχόνδριον πόνος γίνεται ἄτερ φλεγμονῆς, τουτέοισι πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει τὸν πόνον.

μα'. Ὅκосоισι διάπνύν τι ἐν τῷ σώματι· ἔδὸν μὴ ἀποσημαίνει, τουτέοισι διὰ παχύτητα τοῦ πύου, ἢ τοῦ τόπου, οὐκ ἀποσημαίνει.

34. Qui capillorum defluvio laborant, iis varices magni non fiunt. At quibus capillorum defluvio laborantibus varices magni succedunt, iis rursus capillitium gignitur.

35. Hydropicis tussis superveniens malum.

36. Urinae difficultatem venae sectio solvit: secundae autem sunt interiores venae.

37. Angina detento, si tumor in collo extrorsum oriatur, bonum.

38. Quibus canceri occulti fiunt, eos non curare praestat. Qui enim curantur celeriter pereunt: qui vero non curantur, multum tempus perdurant.

39. Convulsio aut a repletionem, aut ab inanitione oritur, eodem modo etiam fit singultus.

40. Quibus ad hypochondrium dolor citra inflammationem oritur, iis febris succedens dolorem solvit.

41. Quibus suppuratum quid in corpore abditum non innotescit, iis ob puris, aut

μβ'. Ἐν τοῖσιν ἐντερικοῖσι τὸ ἥπαρ σκληρὸν γίνεσθαι, πονηρόν.

μγ'. Ὅσοι σπληνώδεις ὑπὸ δυσεντερίης ἀλίσκονται, τουτέοισι, γινομένης μακρῆς τῆς δυσεντερίης, ὕδρωψ ἐπιγίνεται, ἢ λειεντερίη, καὶ ἀπόλλυνται.

μδ'. Ὅσοισιν ἐκ στραγγουρίης εἴλεοι γίνονται, ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν ἀπόλλυνται, ἢν μὴ πυρετοῦ ἐπιγενομένου ἄλλῃς τὸ οὖρον ὄνῃ.

με'. Ἐλκεα ὅσα ἐνιαύσια γίνεται, ἢ μακρότερον χρόνον ἴσχει, ἀναγκαίη ὁστίον ἀφίστασθαι, καὶ τὰς οὐλὰς κοίλας γίνεσθαι.

μς'. Ὅσοι ὕβοι ἐξ ἄσθματος, ἢ βηχὸς γίνονται πρὸ τῆς ἥβης, ἀπόλλυνται.

μζ'. Ὅσοισι φλεβοτομίη, ἢ φαρμακίη ξυμφέρει, τουτέους τοῦ ἥρος φλεβοτομέειν, ἢ φαρμακεύειν.

μη'. Τοῖσι σπληνώδεσι δυσεντερίη ἐπιγενομένη ἀγαθόν.

μθ'. Ὅσα ποδαγρικὰ νοσήματα γίνεται, ταῦτα ἀποφλεγμῆναι ἐν τεσσαρῇ-κόντα ἡμέρησιν ἀποκαθίσταται.

ν'. Ὅσοισιν ἂν ὁ ἐγκέφαλος διακοπῇ,

loci crassitudinem, sui indicium non praebet.

42. Morbo regio laborantibus jecur durum fieri, malum.

43. Lienosis qui dysenteria corripuntur, si longius protrahatur dysenteria, hydrops, aut laeuitas intestinorum supervenit, et moriuntur.

44. Quibus ex stranguria volvulus accedit, intra diem septimum moriuntur, nisi febre accedente copiosa urina effluat.

45. Ulcera annua quaecunque fiunt, aut longius tempus detinent, in iis os abscedere est necesse, et cicatrices cavas fieri.

46. Qui gibbosi ex asthmate, aut tussi fiunt ante pubertatem, moriuntur.

47. Quibus venae sectio et medicamentum purgans confert, iis vere venam seca, aut medicamentum purgans exhibe.

48. Lienosis accedens dysenteria, bono est.

49. Podagrici morbi, intra diem quadragesimum, sedata inflammatione, subsidunt.

τουτέοισιν ἀναγκαίη πυρετὸν καὶ χολῆς ἔμε-
τον ἐπιγενέσθαι.

να'. Ὀκόσοισι ὑγιαίνουνσιν ἐξαίφνης ὀδί-
ναι γίνονται ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ παραχρῆ-
μα ἄφωνοι γίνονται, καὶ ῥέγκουσιν, ἀπόλ-
λυνται ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν, ἣν μὴ πυρετὸς
ἐπιλάβῃ.

νβ'. Σκοπέειν δὲ χρὴ καὶ τὰς ὑποφάσεας
τῶν ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσι ὕπνοισι· ἣν γάρ
τι ὑποφαίνεται τοῦ λευκοῦ, ξυμβαλλομέ-
νων τῶν βλεφάρων, μὴ ἐκ διαρροίης εἶναι,
ἢ ἐκ φαρμακοποσίης, φλαῦρον τὸ σημήϊον,
καὶ θανατῶδες σφόδρα.

νγ'. Αἱ παραφροσύναι, αἱ μὲν μετὰ γέ-
λωτος γινόμεναι, ἀσφαλέστεραι· αἱ δὲ με-
τὰ σπουδῆς, ἐπισφαλέστεραι.

νδ'. Ἐν τοῖσιν ὀξέσι πάθεσι τοῖσι μετὰ
πυρετοῦ, αἱ κλανθιμώδεις ἀναπνοαὶ, κακαί.

νε'. Τὰ ποδαγρικὰ πάθεα καὶ τὰ μανι-
κὰ, τοῦ ἥρος καὶ τοῦ φθινοπώρου κινέεται.

νς'. Τοῖσι μελαγχολικοῖσι νοσήμασιν ἐς
τάδε ἐπικίνδυνοι αἱ ἀποσκήψεις· ἢ ἀπό-
πληξιν τοῦ σώματος, ἢ σπασμὸν, ἢ μανίην,
ἢ τύφλωσιν σημαίνει.

νζ'. Ἀπόπληκτοι δὲ μάλιστα γίνονται,

50. Quibus persectum fuerit cerebrum, iis febrem et bilis vomitionem succedere necesse est.

51. Quibus bene valentibus capitis dolores derepente contingunt, statimque voce deficiunt, et stertunt, intra dies septem pereunt, nisi febris eosprehenderit.

52. Spectare vero oportet, quae etiam ex oculis per somnum subapparent. Etenim si quid ex albo, non exacte commissis palpebris, subappareat, neque id ex alvi profluvio, aut potione purgante contingat, pravum signum est, et lethale admodum.

53. Deliria quae cum risu fiunt, tutiora: at quae serio, periculosiora.

54. In morbis acutis qui cum febre sunt, gemebundae spirationes, malae.

55. Podagrici morbi et insaniae, vere et autumno moventur.

56. Morborum melancholicorum ad haec periculosi decubitus: aut paraplegiam, aut convulsionem, aut maniam, aut coecitatem denuntiant.

57. At apoplexiae contingunt maxime,

ἡλικίῃσι τῇσιν ἀπὸ τεσσαρῆκοντα ἐτέων
ἄχρι ἐξήκοντα.

νῆ'. Ἦν ἐπίπλοον ἐκπέση, ἀναγκαίη
ἀποσαπῆναι.

νθ'. Ὅκόσοισι ὑπὸ ἰσχυιάδος ἐνοχλεομέ-
νοισιν, ἐξίσταται τὸ ἰσχίον, καὶ πάλιν ἐμ-
πίπτει, τουτέοισι μύξαι ἐγγίνονται.

ξ'. Ὅκόσοισι ὑπὸ ἰσχυιάδος ἐχομένοις
χρονίης τὸ ἰσχίον ἐξίσταται, τουτέοισι φθί-
νει τὸ σκέλος, καὶ χωλοῦνται ἢν μὴ καυ-
θῶσι.

aetatibus iis quae sunt a quadragésimo anno ad sexagesimum.

58. Ubi omentum exciderit, computrescere necesse est.

59. Quibus coxendicis dolore conflictatis, femoris articulus suo loco excidit, ac rursus recipitur, iis mucosities in ea parte nascuntur.

60. Quibus a diuturno coxendicis dolore femoris caput suo loco excidit, iis crus tabescit, et claudicant nisi urantur.

ΤΜΗΜΑ ἑΒΔΟΜΟΝ.

Α.

ἘΝ τοῖσιν ὀξέσι νοσήμασι ψύξις τῶν ἀκρωτηρίων, κακόν.

β'. Ἐπὶ ὀστέῳ νοσήσαντι, σάρξ πελιδνή, κακόν.

γ'. Ἐπὶ ἐμέτῳ λυγξ καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροὶ, κακόν.

δ'. Ἐπὶ ἰδρῶτι γρίκη, οὐ χρηστόν.

ε'. Ἐπὶ μανίῃ δυσεντερίῃ, ἢ ὕδροψ, ἢ ἔκστασις, ἀγαθόν.

ς'. Ἐν νούσῳ πολυχρονίῃ, ἀποσιτίῃ, καὶ ἄκρητοι ἐμετοι, καὶ χολώδεις ὑποχωρήσεις, κακόν.

ζ'. Ἐκ πολυποσίης ῥίγος καὶ παραφροσύνη, κακόν.

η'. Ἐπὶ φύματος ἔσω ῥήξει, ἐκλυσίς, ἢ ἔμετος, ἢ λειποθυμία γίνεται.

SECTIO SEPTIMA.

I.

IN acutis morbis extremorum frigus malum.

2. Caro livida ex osse aegrotante, malum denuntiat.

3. Ex vomitione singultus et oculi rubentes, malo sunt.

4. Ex sudore horror minime bonus.

5. A furore dysenteria, aut hydrops, aut extasis bonum.

6. In morbo diuturno ciborum aversatio, et sinceri vomitus, et bibliosae dejectiones, malum.

7. Ex multo potu rigor et delirium, malum.

8. Ex rupto intus abscessu, exolutio vel vomitus, vel animi defectio contingit.

θ'. Ἐπὶ αἵματος ῥύσεϊ παραφροσύνη, ἢ σπασμὸς, κακόν.

ι'. Ἐπὶ εἰλεῶ ἔμετος, ἢ λῦγξ, ἢ σπασμὸς, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

ια'. Ἐπὶ πλευρίτιδι περιπλευμονίη, κακόν.

ιβ'. Ἐπὶ περιπλευμονίη φρενίτις, κακόν.

ιγ'. Ἐπὶ τρώμασιν ἰσχυροῖσι σπασμὸς, ἢ τέτανος, κακόν.

ιδ'. Ἐπὶ πληγῇ εἰς τὴν κεφαλὴν, ἐκπληξίς, ἢ παραφροσύνη, κακόν.

ιε'. Ἐπὶ αἵματος πτύσεϊ, πύου πτύσεις.

ις'. Ἐπὶ πύου πτύσεϊ φθίσις καὶ ῥύσις· ἐπὴν δὲ τὸ πτύελον ἰσχηται, ἀποθνήσκουσιν.

ιζ'. Ἐπὶ φλεγμονῇ τοῦ ἥπατος, λῦγξ.

ιη'. Ἐπὶ ἀγρυπνίῃ σπασμὸς καὶ παραφροσύνη, κακόν.

ιθ'. Ἐπὶ ὀστέου ψιλώσεϊ ἐρυσίπελας.

κ'. Ἐπὶ ἐρυσιπέλατι σηπεδὼν, ἢ ἐκπύσεις.

κα'. Ἐπὶ ἰσχυρῷ σφυγμῷ ἐν τοῖσι ἔλκεσι, αἰμορροαγίαί.

κβ'. Ἐπὶ ὀδύνῃ πολυχρονίῃ τῶν περὶ τὴν κοιλίην, ἐκπύσεις.

9. Ex sanguinis profluvio delirium, aut convulsio, malum.
10. Ab ileo vomitus, aut singultus, aut convulsio, aut delirium, malum.
11. Ex pleuritide peripneumonia, malo est.
12. Ex peripneumonia phrenitis, malum denuntiat.
13. Ex vehementibus vulneribus convulsio, aut tetanus, malum.
14. Ex ictu in capite accepto, stupor aut desipientia, malum.
15. Ex sanguinis sputo, puris sputum.
16. Ex puris sputo tabes et fluor, ubi vero sputum sistitur, moriuntur.
17. Ex jecoris inflammatione singultus.
18. Ex vigilia convulsio et delirium, malum.
19. Ex ossis nudatione erysipelas.
20. Ex erysipelate putredo, aut suppuratio.
21. Ex forti in ulceribus pulsu, copiosae sanguinis eruptiones fiunt.
22. Ex diuturno partium circa ventrem dolore, suppuratio.

κγ'. Ἐπὶ ἀκρότῳ ὑποχωρήσει, δυσεντερίη.

κδ'. Ἐπὶ ὀστέου διακοπῇ παραφροσύνη, ἢ ἐκπληξις, ἢν ἐς κενεὸν λάβῃ.

κε'. Ἐκ φαρμακοποσίης σπασμὸς θανατωδὲς.

κς'. Ἐπὶ ὀδύνῃ ἰσχυρῇ τῶν περὶ τὴν κοιλίην ἀκρωτηρίων ψύξις, κακόν.

κζ'. Ὁ τι ἂν ὀστέον, ἢ χόνδρος, ἢ νεῦρον ἀποκοπῇ ἐν τῷ σώματι, οὐκ ἰγιάζεται, οὔτε αὔξεται, οὔτε φύεται.

κη'. Ἦν ὑπὸ λευκοῦ φλέγματος ἐχομένῳ διάρροια ἐπιγένηται ἰσχυρῇ, λύει τὴν νόσον.

κθ'. Ὁκόσοισιν ἀγρώδεα τὰ διαχωρήματα ἐν τῇσι διάρροίῃσι, τουτέοισιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐπικαταρρέει.

λ'. Ὁκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, ἐν τοῖσιν οἵροις κριμνώδεις αἱ ὑποστάσεις γίνονται, μακρὴν τὴν ἀρρώστιν σημαίνουν.

λα'. Ὁκόσοισι χολώδεις αἱ ὑποστάσεις, ἄνωθεν δὲ λεπταὶ, ὀξέην τὴν ἀρρώστιν σημαίνει.

λβ'. Ὁκόσοισι δὲ διεστηκότα τὰ οἶρα

23. Ex sincera deiectione, dysenteria.

24. Ex osse capitis persecto delirium, aut stupor, si ad vacuum usque penetraverit.

25. Ex medicamento potione convulsio, lethalis.

26. Ex vehementi partium circa ventrem dolore, extremorum frigus malum.

27. Os quodcunque, vel cartilago, vel nervus in corpore praecisus fuerit, non in integrum restituitur, neque augetur, neque de novo crescit.

28. Leucophlegmatia detento si vehemens diarrhoea succedat, morbum solvit.

29. Quibus per alvi profluvia, spumosa sunt alvi excrementa, iis ex capite defluunt.

30. Quibus per febres sedimenta crassiori farinae similia in urinis contingunt, longam aegritudinem denuntiant.

31. Quibus biliosa sedimenta sunt, quae ab initio quidem tenuia fuerunt, acutum morbum significant.

32. Quibus inaequales sunt urinae, iis vehemens est in corpore perturbatio.

γίνεται, τουτέοισι ταραχή ἐν τῷ σώματι ἰσχυρὴ ἐστὶ.

λγ'. Ὀκόσοισι δὲ ἐπὶ τοῖσιν οὔροις ἐπί-
στανται πομφόλυγες, φρενιτικὰ σημαίνου-
σι, καὶ μακρὴν ἀρρώστίην ἐπιγενήσεσθαι.

λδ'. Ὀκόσοισι δὲ λιπαρὴ ἢ ὑπόστασις καὶ
ἀθρόη, τουτέοισι νεφριτικὰ, καὶ ὀξέα ση-
μαίνει.

λε'. Ὀκόσοισι δὲ νεφριτικοῖσιν ἰούσι, τὰ
προειρημένα συμβαίνει σημήϊα, πόνοι τε
ὀξέες περὶ τοὺς μύας τῆς ῥάχeos γίνονται·
ἢν μὲν περὶ τοὺς ἔξω τόπους γένωνται,
ἀπόστημα προσδέχου ἐσόμενον ἔξω· ἢν δὲ
μᾶλλον οἱ πόνοι πρὸς τοὺς ἔσω τόπους γί-
νονται, καὶ τὸ ἀπόστημα προσδέχου ἐσό-
μενον μᾶλλον ἔσω.

λς'. Ὀκόσοι αἷμα ἐμέουσιν, ἢν μὲν ἄνευ
πυρετοῦ, σωτήριον· ἢν δὲ ξὺν πυρετῷ, κα-
κόν. Θεραπεύειν δὲ τοῖσι ψυκτικοῖσι καὶ
τοῖσι στυπτικοῖσι.

λζ'. Κατὰ ῥόδοι ἐς τὴν ἄνω κοιλίην ἐκ-
πνοῦνται ἐν ἡμέρησιν εἴκοσιν.

λη'. Ἦν οὐρὴ αἷμα καὶ θρόμβους, καὶ
στραγγουρίην ἔχῃ, καὶ ὀδύνη ἐμπίπτῃ ἐς

33. Quibus vero in urinis supernatant bullae, phrenitidem ostendunt, et longam fore aegritudinem.

34. Quibus sedimentum crassum et confertum exit, his nephriticam, et acutam aegritudinem significat.

35. Quibus vero renum vitio affectis, praedicta signa contingunt, doloresque acuti circa spinae musculos fiunt: si quidem circa loca exteriora fiant, abscessum extra fore expecta. Quod si dolores ad loca interna magis vergant, abscessum quoque interius potius futurum expecta.

36. Qui sanguinem vomunt, si quidem sine febre contingat, salutare; cum febre vero, malum. Curandum vero refrigerantibus et adstringentibus.

37. Destillationes in superiorem ventrem, intra vigesimum diem in pus vertuntur.

38. Si quis sanguinem et grumos meiat, et stranguria laboret, dolorque ad interfoemineum, et pectinem pertingat,

τὸν περὶ ναιον, καὶ τὸν κτένα, τὰ περὶ τὴν
κύστιν νοσέειν σημαίνει.

λθ'. Ἦν γλωσσοῦσα ἐξαίφνης ἀκρατῆς γέ-
νηται, ἢ ἀπόπληκτὸν τι τοῦ σώματος, με-
λαγχολικὸν τὸ τοιοῦτον.

μ'. Ἦν ὑπερκαθαιρομένων τῶν πρεσβυ-
τέρων λυγξ ἐπιγένηται, οὐκ ἀγαθόν.

μα'. Ἦν πυρετὸς μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχῃ τὴν
γένεσιν, ὕδατος πολλοῦ καὶ θερμοῦ κατὰ
τῆς κεφαλῆς καταχεομένου, λύσις.

μβ'. Γυνὴ ἀμφιδέξιος οὐ γίνεται.

μγ'. Ὀκόσοι ἔμπνοι καίονται, ἢ τέμ-
νονται, ἢν μὲν τὸ πῦον καθαρὸν ῥυῆ καὶ
λευκὸν, περιγίνονται. ἢν δὲ βορβορῶδες,
καὶ δυσῶδες, ἀπόλλυνται.

μδ'. Ὀκύσοι τὸ ἥπαρ διάπνον καίονται,
ἢν μὲν τὸ πῦον καθαρὸν ῥυῆ καὶ λευκὸν,
περιγίνονται· ἐν χιτῶνι γὰρ τὸ πῦον του-
τέοισιν ἐστὶ· ἢν δὲ οἶον ἀμόργη ῥυῆ, ἀπόλ-
λυνται.

με'. Ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρητοποσίη,
ἢ λουτρον, ἢ πυρίη, ἢ φλεβοτομή λύει.

μς'. Ὑδρωπιῶντα ἢν βήξ ἔχῃ, ἀνέλπι-
στός ἐστι.

μζ'. Στραγγουρίην καὶ δυσουρίην θώ-

partium quae circa vesicam sunt morbus significatur.

39. Si lingua derepente infirma fiat, aut aliqua corporis pars resolvatur, id atram bilem indicat.

40. Si senioribus supra modum purgatis singultus accidat, non bonum.

41. Si febris non ex bile ortum ducat, aqua calida et copiosa capiti affusa, solutio fit.

42. Mulier ambidextra non fit.

43. Suppurati cum uruntur aut secantur, si pus purum et album effluat, evadunt. Quod si coenosum et graveolens fuerit, pereunt.

44. Qui ex purulento iecore aduruntur, ii, ubi pus purum fluxerit et album, supersunt, quod pus in tunica ipsis conclusum est. Si vero qualis amurca fluat, pereunt.

45. Oculorum dolores meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut venae sectio solvit.

46. Hydropicum si tussis detineat, desperatus est.

ρηξίς καὶ φλεβοτομή λύει· τὰ μνειν δὲ τὰς ἔσω.

μη'. Ὑπὸ κυνάγχης ἐχομένῳ οἴδημα, ἢ ἐρύθημα ἐν τῷ στήθεϊ ἐπιγενόμενον, ἀγαθόν· ἔξω γὰρ τρέπεται τὸ νόσημα.

μθ'. Ὅσοισιν ἂν σφακελισθῇ ὁ ἐγκεφαλος, ἐν τρισὶ ἡμέρησιν ἀπόλλυνται· ἢν δὲ ταύτας διαφύγῃσι, ὑγιέες γίνονται.

ν'. Ἰσταρμὸς γίνεται ἐκ τῆς κεφαλῆς, διαθερμαινομένου τοῦ ἐγκεφάλου, ἢ διυγραιομένου τοῦ ἐν τῇ κεφαλῇ κενοῦ. ὑπερφέεται γὰρ ὁ αἷρ ὁ ἐνεὼν ἔξω· ψοφείει δὲ, ὅτι διὰ στενοῦ αὐτέῳ ἡ διέξοδος ἐστί.

να'. Ὅσοι ἤπαρ περιωδυνέουσι, τουτέοισι πυρετὸς ἐπιγινόμενος λύει τὴν ὀδύνην.

νβ'. Ὅσοισι ξυμφέρει αἷμα ἀφαιρέειν ἀπὸ τῶν φλεβῶν, τουτέους ἥρος φλεβοτομέεσθαι.

νγ'. Ὅσοισι μεταξὺ τῶν φρενῶν καὶ τῆς γαστρὸς φλέγμα ἀπόκλειται, καὶ ὀδύνην παρέχει, οὐκ ἔχον διέξοδον, οὐδὲ ἐς ἑτέραν τῶν κοιλιῶν, τουτέοισι κατὰ τὰς φλέβας ἐς τὴν κύστιν ταπέντος τοῦ φλέγματος, λύσις γίνεται τῆς νόσου.

νδ'. Ὅσοισιν ἂν τὸ ἥπαρ ὕδατος ἐμ-

47. Stranguriam et dysuriam meri-
potio et venae sectio solvit. At secan-
dae sunt interiores.

48. Angina detento si tumor vel ru-
bor in pectore contingat, bonum; foras
enim morbus vertitur.

49. Quibus cerebrum sideratum est,
intra tres dies intereunt. Quod si hos ef-
fugerint, sani evadunt.

50. Sternutatio ex capite fit, concale-
facto cerebro, aut perhumectata capitis
inanitate. Aër enim intus contentus extra
effunditur. Strepitum autem edit, quod
ei per angustum est transitus.

51. Quibus iecur vehementer dolet,
iis succedens febris dolorem solvit.

52. Quibus sanguinem ex venis de-
trahere convenit, iis vere vena secan-
da est.

53. Quibus inter septum transversum
et ventrem pituita concluditur, et dolo-
rem exhibet, neque in alterutram cavi-
tatem viam habet, iis per venas in vesi-
cam pituita versa, morbi fit solutio.

54. Quibus iecur aqua plenum in

πλησθὲν ἐς τὸν ἐπίπλοον ῥαγῇ, τουτέοισι ἡ κοιλίη ὕδατος ἐμπιπλάται, καὶ ἀποθνήσκουσι.

νε'. Ἀλύκην, χάσμην, φρίκην, οἶνος ἴσος ἴσα πινόμενος, λύει.

νες'. Ὀκόσοισιν ἐν τῇ οὐρήθρῃ φύματα γίνεται, τουτέοισι διαπυήσαντος καὶ ἐκραγέντος, λύεται ὁ πόνος.

νεζ'. Ὀκόσοισιν ἂν ὁ ἐγκέφαλος σεισθῇ ὑπὸ τινος προφάσεως, ἀναγκαίη ἀφώνους γενέσθαι παραχρῆμα.

νη'. Τοῖσι σώμασι τοῖσι ὑγράς τὰς σάρκας ἔχουσι, λιμὸν ἐμποιέειν· λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ σώματα.

νηθ'. Ἦν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ, οἰδήματος μὴ ἔόντος ἐν τῇ φάρυγγι, πνίξ ἐξαίφνης ἐπιγένηται, καὶ καταπίνειν εὐκόλως μὴ δύνηται, ἀλλὰ μόλις, θάνασιμον.

ξ'. Ἦν ὑπὸ πυρετοῦ ἐχομένῳ ὁ τράχηλος ἐπιστραφῇ, καὶ καταπίνειν μὴ δύνηται, οἰδήματος μὴ ἔόντος ἐν τῷ τραχήλῳ, θανάσιμον.

ξα'. Ὅκον ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί, καὶ τὸ σῶμα καταψύχεται, καὶ πάλιν θερ-

omentum eruperit, iis venter aqua impletur, et moriuntur.

55. Anxietatem, oscitationem, horrorem, vinum aequali aqua temperatum epotum solvit.

56. Quibus in urethra tubercula fiunt, iis, suppuratione et eruptione factis, dolor levatur.

57. Quibus ex occasione aliqua cerebrum concussum fuerit, eos protinus mutos fieri necesse est.

58. Corporibus humida carne praeditis famem inducito, fames enim corpora exsiccat.

59. Si febre detento, nullo existente in faucibus tumore, derepente suffocatio succedat, nec nisi aegre devorare queat, lethale.

60. Si febre detento cervix pervertatur, neque devorare queat, nullo in cervice tumore existente, lethale.

61. Ubi toto corpore mutationes, et corpus universum perfrigeratur, rursusque incalescit, vel subinde colorem commutat, morbi longitudo denunciatur.

μαίνεται, ἢ χροῖμα ἕτερον ἐξ ἑτέρου μεταβάλλεται, μῆκος νόσου σημαίνει.

ξβ'. Ἰδρὼς πολλὴς, ἢ θερμὸς, ἢ ψυχρὸς ῥέων αἰεὶ, σημαίνει πλέον ὑγρόν. ὑπάγειν οὖν τῷ μὲν ἰσχυρῷ, ἀνωθεν, τῷ δὲ ἀσθενεῖ, κάτωθεν.

ξγ'. Ἰδρὼς πολλὴς χεόμενος, νόσον σημαίνει· ὁ ψυχρὸς πολλήν· ὁ θερμὸς ἐλάσσω.

ξδ'. Οἱ πυρετοὶ ὁκόσοι μὴ διαλείποντες ἰσχυρότεροι διὰ τρίτης γίνονται, ἐπικίνδυνοι. ὅτῳ δὲ ἂν τρόπῳ διαλείπωσιν, ἀκίνδυνοι ἔσονται.

ξε'. Ὀκόσοισι πυρετοὶ μακροὶ, τουτέοισι φύματα, ἢ πόνοι ἐς τὰ ἄρθρα ἐγγίνονται.

ξς'. Ὀκόσοισι φύματα μακρὰ, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐκ πυρετῶν γίνονται, οὗτοι σιτίοισι πλέοσι χρέονται.

ξζ'. Ἦν τις πυρέσσοντι τροφήν διδῶ τῷ μὲν ὑγιαίνουντι ἰσχύς· τῷ δὲ κάμνοντι, νοῦσος.

ξη'. Τὰ διὰ τῆς κύστεος διαχωρόντα ὑρέειν δεῖ, ἣν οἷα τοῖσι ὑγιαίνουνσι ὑποχω-

62. Sudor multus, vel calidus, vel frigidus semper fluens, multam humiditatem significat: deducere igitur oportet robusto quidem superne, debili vero inferne.

63. Sudor multus si fluat, morbum indicat: frigidus magnum, calidus minorem.

64. Febres quaecunque non intermittentes tertio die vehementiores evadunt, periculosae. Quoquo autem modo intermiserint, minus periculosae erunt.

65. Quos febres longae exercent, iis tubercula vel dolores in articulis innascuntur.

66. Quibus tubercula diutina, aut in articulis dolores ex febre fiunt, ii copiosioribus cibis utuntur.

67. Si febricitanti quis cibum exhibuerit, sano quidem robur, aegrotanti autem morbus.

68. Quae per vesicam excernuntur spectare oportet, an, qualia sanis subeant. Nam quae his minime sunt simi-

ρέηται. τὰ ἥκιστα οὖν ὅμοια τοῦτοις, ταῦτα νοσῶδέστερα· τὰ δὲ ὅμοια τοῖσι ὑγιαίνουσι, ἥκιστα νοσερά.

ξθ'. Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα, ἢν ἐάσῃς στῆναι, καὶ μὴ κινήσῃς, οἷον ἐὶ ὑφίσταται ξύσματα· ἢν ὀλίγα ἔῃ, ὀλίγη ἢ νοῦσος γίνεται· ἢν δὲ πολλὰ, πολλή· τοῦτοις συμφέρει ὑποκαθῆραι τὴν κοιλίην. ἢν δὲ μὴ καθαρὴν ποιήσας διδῶς τὰ ῥογήματα βλάβεις, καὶ ὁκόσῳ ἂν πλέω δώσῃς, μᾶλλον βλάβεις.

ο'. Ὅκ' οἷσιν ἂν κάτω ὡμὰ διαχωρήῃ, ἀπὸ χολῆς μελαίνης ἐστι· ἢν πλέω, πλέων, ἢν ἐλάσσω, ἐλάσσων ἢ νοῦσος.

σα'. Αἱ ἀποχρέμψεις αἱ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τοῖσι μὴ διαλείπουσι αἱ πελιδναί, καὶ αἱματώδεις, καὶ χολώδεις, καὶ δυσσί-
δεις, πᾶσαι κακαί. ἀποχωρέουσαι δὲ καλῶς ἀγαθαί, καὶ κατὰ κοιλίην καὶ κύστιν· καὶ ὅκου ἂν τι ἀποχωρέον στήμῃ μὴ κεκαθα-
μένον, κακόν.

οβ'. Τὰ σώματα χρὴ ὅκου ἂν τις βού-
ληται καθαίρεσθαι, εὖροα ποιεῖν· κἢν

lia, ea morbosiora. Quae vero sanis similia, minime morbosa.

69. Et quibus deiectiones, si residere permiseris, neque moveris, veluti strigmenta subsident, si pauca sunt, parvus est morbus, si vero multa, magnus: iis alvum purgari conducit. Quod si non purgata alvo sorbitiones exhibueris, nocebis, et quo plures dederis, eo magis nocebis.

70. Quibus cruda deorsum succedunt, ab atra bile sunt; si plura, maior, si pauciora, minor est morbus.

71. In febribus non intermittentibus excreationes lividae, cruentae, biliosae, et graveolentes, omnes malae. Cum vero probe secedunt bonae, et per alvum, et per vesicam; et ubicunque, quod secedit, substiterit minime purgatum, malum.

72. Corpora cum quis purgare volerit, fluxilia facere oportet. Quod si

μὲν ἄνω, στήσθαι τὴν κοιλίην· ἣν δὲ κάτω,
ὕγρῃναι τὴν κοιλίην.

ογ'. Ὕπνος, ἀγρυπνίη, ἀμφοτέρω μᾶλ-
λον τοῦ μετρίου γινόμενα, κακόν.

οδ'. Ἐν τοῖσι μὴ διαλείπουσι πυρετοῖ-
σιν, ἣν τὰ μὲν ἔξω ψυχρὰ ἔχῃ, τὰ δὲ ἔσω
καίηται, καὶ δίψη ἔχῃ, θανάσιμον.

οε'. Ἐν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἣν
χεῖλος, ἢ ῥίς, ἢ ὀφθαλμοί, ἢ ὕφρις δια-
στραφῇ, ἢ μὴ βλέπῃ, ἢ μὴ ἀκούῃ, ἤδη
ἀσθενέος εἶντος, ὅτι ἂν ἔχῃ, τουτέων τῶν
σημηϊῶν, θανάσιμον.

ος'. Ἐπὶ λευκῷ φλέγματι, ὕδρωψ ἐπιγί-
νεται.

οζ'. Ἐπὶ διάρροίῃ, δυσεντερίη.

οθ'. Ἐπὶ δυσεντερίῃ, λειεντερίη.

οη'. Ἐπὶ σφακελισμῷ, ἀπόστασις ὀστέου.

π'. Ἐπὶ αἵματος ἐμέτῳ φθόῃ, καὶ κά-
θαρσις ἄνω ἐπὶ φθόῃ, ρεῖμα ἐκ τῆς κεφα-
λῆς· ἐπὶ τῷ ρεύματι, διάρροια· ἐπὶ τῇ
διάρροίῃ, σχέσις τῆς ἄνω καθάρσεως· ἐπὶ
τῇ σχέσει θάνατος.

πα'. Ἐπὶ αἵματος πτύσει πύου πτύσις

supra, alvus sistenda est, si vero infra, humectanda.

73. Somnus, vigilia, utraque si modum excesserint malum.

74. In febribus non intermittentibus, si externa frigeant, interna vero urantur, et sitis detineat, lethale.

75. In febre non intermittente, si labrum, aut nasus, aut oculus, aut supercilium pervertatur, si visus, si auditus deficiat, aegro iam debili, horum quicquid acciderit, lethale.

76. Leucophlegmatiae hydrops succedit.

77. Ex alvi profluvio dysenteria.

78. Dysenteriae lienteria succedit.

79. Ex sideratione os abscedit.

80. Ex sanguinis vomitione tabes, et per superiora purgatio. Ex tabe fluxio ex capite, ex fluxione, alvi profluvium, ex alvi profluvio, purgationis per superiora retentio, ex qua mors.

81. Ex sanguinis sputo, puris spu-

καὶ ῥύσις· ἐπὴν δὲ σίαλον ἴσχηται, ἀπο-
θνήσκουσι.

πβ'. Ὁκοῖα καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὴν κύστιν,
καὶ τοῖσι κατὰ τὴν κοιλίην ὑποχωρήμασι,
καὶ ἐν τοῖσι κατὰ τὰς σάρκας, καὶ ἥν κου
ἄλλητῆς φύσεος τὸ σῶμα ἐκβαίνει, ἥν ὀλίγον,
ὀλίγη νόσος γίνεται· ἥν δὲ πούλῃ, πολλή·
ἥν πάνυ πολλή, θανάσιμον τὸ τοιοῦτον.

tum et fluor; ubi autem sputum retinetur, moriuntur.

82. Qualia etiam per vesicam, et alvum, et carnes excernuntur, et sicubi alias corpus a natura recesserit, inspicere oportet. Si parum, parvus est morbus: si multum, magnus; si admodum multum, lethale istud est.

ἈΦΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ,
ἢ
ΤΜΗΜΑ ὈΓΔΟΟΝ.

Α.

ὍΚΟΣΟΙ ὑπὲρ τὰ τεσσαρήκοντα ἔτεα
φρενιτικοὶ γίνονται, οὐ πάνυ τοι ὑγιάζον-
ται· ἥσπον γὰρ κινδυνεύουσι οἷσιν ἂν οἰκηῖη
τῆς φύσεος καὶ τῆς ἡλικίης ἢ τοῦσος ἔη.
β'. Ὅκόσοισιν ἐν τῇσιν ἀρρώσθησι οἱ
ὀφθαλμοὶ κατὰ προαίρεσιν δακρύουσιν,
ἀγαθόν· ὁκόσοισι δὲ ἄνευ προαιρέσεως,
κακόν.

γ'. Ὅκόσοισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τεταρ-

APHORISMI INTERIECTI,

SEU

SECTIO OCTAVA.

I.

Qui supra quadragesimum annum phrenitici evadunt, ii non admodum convalescunt. Minori namque periculo sunt obnoxii, quorum naturae et aetati morbus familiaris fuerit.

2. Quibus oculi in morbis ex proposito illacrymantur, bonum; contra, quibus sponte, malum.

3. Quibus per febres quarto die sanguis ex naribus fluxerit, malo est.

ταίοισιν ἐοῦσι αἷμα ἐκ τῶν ῥινῶν ῥυῆ, πο-
νηρόν.

δ'. Ἰδρωῖτες ἐν τῇσι κρισίμοισι ἡμέρησι
γινόμενοι σφοδροὶ καὶ παχέες, ἐπικίνδυνοι
οἱ ὠθούμενοι ἐκ τοῦ μετώπου, ὥσπερ στα-
λαγμοὶ καὶ κρουνοὶ, καὶ ψυχροὶ σφόδρα,
καὶ πολλοί. ἀναγκαίη γὰρ τὸν τοιοῦτον
ιδρωτα πορεύεσθαι μετὰ βίης, καὶ πόνου
ὑπερβολῆς, καὶ ἐκθλίψεος πολυχρονίου.

ε'. Ἐπὶ χρονίῳ νοσήματι κοιλίης κατα-
φορῇ, κακόν.

ς'. Ὅκοντα φάρμακα οὐκ ἰῆται, σίδη-
ρος ἰῆται· ὅσα σίδηρος οὐκ ἰῆται, πῦρ ἰῆ-
ται· ὅσα δὲ πῦρ οὐκ ἰῆται, ταῦτα χρηὴ νο-
μίζειν ἀνίατα.

ζ'. Φθίσεις μάλιστα γίνονται ἀπὸ
ὀκτωκαίδεκα ἐτέων μέχρι τριήκοντα καὶ
πέντε.

η'. Τὰ δὲ κατὰ φύσιν γινόμενα κατὰ
φθίσιν, ἅπαντα μὲν ἰσχυρά, τὰ δὲ καὶ θα-
νατώδεια· δεύτερον δὲ, ἣν μὲν ἐν τῇ ὥρῃ νο-
σέη, αὐτὴ ἡ ὥρῃ συμμαχέει τῇ νόσῳ, οἷον
καύσῳ θέρος, ὑδρωπικῷ χειμῶν. ὑπερ-
νικᾷ γὰρ τὸ φυσικόν, φοβερώτερον δὲ σπληνί.

θ'. Γλυῦσσι μέλαινα καὶ αἱματώδης, εἰ

4. Sudores diebus indicatoriis vehementes et spissi suborti, periculosi, et qui ex fronte guttarum et scaturiginum instar propelluntur, quique valde frigidi sunt, et copiosi. Eiusmodi namque sudorem cum vi, et summo dolore, expressioneque diuturna prodire necesse est.

5. Ex morbo diuturno alvi fluxus malum.

6. Quaecunque non sanant medicamenta, ea ferrum sanat: quae ferrum non sanat, ea ignis sanat: quae vero ignis non sanat, ea insanabilia existimare oportet.

7. Tabes iis maxime aetatibus fiunt, quae a decimo octavo anno sunt usque ad tricesimum quintum.

8. Quae secundum naturam ad tabem vergunt, omnia quidem vehementia, et etiam lethalia. Secundum autem, si in tempore aegrotet: nam tempus ipsum morbo opem fert, quemadmodum febris ardenti aestas, hydropico hiems. Natura enim superior est, at spleni plus affert timoris.

τι τῶν τοιούτων σημηίων ἄπεστι, μὴ σφόδρα κακόν· δηλοῖ γὰρ νοῦσον σμικροτέραν.

ι'. Ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ὀξέσι σημειοῦσθαι χρή, ὁκότε μέλλει ἀποθνήσκειν, καὶ ὁκότε σωθήσεται.

ια'. Ὅρχις δεξιὸς ψυχρὸς καὶ σπασμώδης, θανατώδης.

ιβ'. Ὅνυχες μέλανες, καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν χειρῶν καὶ ποδῶν ψυχροὶ, ξυνεσταλμένοι ἢ καθευμένοι, ἐγγὺς τὸν θάνατον δηλοῦσι.

ιγ'. Τὰ χεῖλεα πελιδνὰ, ἢ καὶ ἀπολελυμένα, καὶ ἐξεστραμμένα, καὶ ψυχρὰ, θανατώδεια.

ιδ'. Τὰ ὦτα ψυχρὰ, διαφανέα, ξυνεσταλμένα, θανατώδεά ἐστι.

ιε'. Καὶ σκοτοδινίων καὶ ἀποστρεφόμενος, τῇ τε ἡρεμίῃ ἡδόμενος καὶ ὕπνῳ καὶ καύματι πολλῷ κατεχόμενος, ἀνέλπιστος.

ισ'. Καὶ ὑπολυσσάων ἀτρέμα, καὶ ἀγνοίων, καὶ μηδὲ ἀκούων, μηδὲ ξυνιείς, θανατώδεις.

ιζ'. Μέλλονσί τε ἀποθνήσκειν ταῦτα σαφέστερα γίνεται, καὶ αἱ κοιλίαι ἐπαίρονται, καὶ φυσῶνται.

ιη'. Ὅρος δὲ τοῦ θανάτου, ἐπεὰν τὸ

9. Lingua nigra atque cruenta, cum quid horum signorum abest, haud adeo malum signum: morbum enim minorem significat.

10. Haec igitur in febribus acutis observare oportet, uti noscamus, quando quis moriturus sit, et quando evasurus.

11. Testis dexter frigidus convulsusque, mortiferum est.

12. Ungues nigri, et digitimanuum ac pedum frigidi, contracti vel remissi, mortem proximam esse significant.

13. Labra livida, aut etiam resoluta, et inversa, et frigida, mortifera.

14. Aures frigidae, pellucidae, contractae, lethales sunt.

15. Et tenebricosa vertigine laborans, et lucem timens et quiete gaudens, et somno ac ardore multo detentus, desperatus est.

16. Et qui paulatim rabie agitari incipit, et non agnoscit, neque audit, neque intelligit, exitio proximus est.

17. Morituris quidem signa haec magis fiunt manifesta, et venter attollitur, atque inflatur.

τῆς ψυχῆς θερμὸν ἐπανεέλθῃ ὑπὲρ τοῦ ὀμ-
 φαλοῦ, ἐς τὸν ἄνω τῶν φρενῶν τόπον, καὶ
 ξυγκανθῇ τὸ ὑγρὸν ἅπαν. ἐπειδὴν ὁ πλεύμων
 καὶ ἡ καρδίη τὴν ἰκμάδα ἀποβάλλωσι, τοῦ
 θερμοῦ ἀθροοῦντος ἐν τοῖσι θανατώδεσι
 τόποισιν, ἀποπνέει ἀθρόον τὸ πνεῦμα τοῦ
 θερμοῦ, ὅθεν περ ξυνέστη τὸ ὅλον ἐς τὸ
 ὅλον. πάλιν τὸ μὲν διὰ τῶν σαρκῶν, τὸ δὲ
 διὰ τῶν ἐν κεφαλῇ ἀναπνοῶν, ὅθεν τὸ ζῆν
 καλούμεν, ἀπολείπουσα ἡ ψυχὴ τὸ τοῦ σώ-
 ματος σκῆνος, καὶ τὸ θνητὸν εἶδωλον, ἅμα
 καὶ χολῇ, καὶ αἵματι, καὶ φλέγματι, καὶ
 σαρκὶ, παρέδωκε.

ΤΕΛΟΣ ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ.

18. Terminus vero mortis est, cum
 animae calor supra umbilicum ad locum
 septo transverso superiorem ascenderit,
 et omnis humor exustus fuerit. Cum
 autem pulmo et cor, calore in mortife-
 ris locis coacervato, humorem emiserint,
 caloris spiritus confertim exhalat, cuius
 ope totum cum toto compactum erat.
 Praeterea partim per carnes, partim per
 capitis spiracula, unde vivere dicimus,
 relinquens anima corporis domicilium,
 frigidum et mortale simulacrum, una
 cum bile, sanguine, pituita, et carne,
 deditione tradit.

FINIS APHORISMORUM.

I N D E X.

ABDOMEN.

Crassi et tenuis,
prog. ij. 35.

ABORTUS.

Tempus, *iiij*, 12.

Futuri signa a
mammis, *v.* 37,
 38, 53.

Causa V. S. *v.* 31.

Diarrhoea, *v.* 34.

Tenesmus, *vij.* 27.

Uteri mucus, *v.* 45.

Macies p. n. *v.* 44.

Extenuatio in fe-
bre, *v.* 55.

ABSCESSUS.

Futuri sign. *in feb.*,
iv. 31.

In morb. diuturno,
iv. 32.

Solutio, *iv.* 74.

Longi sign. *iv.* 51.

In articulis unde
post. febr., *iv.*
 31.

Praevertitur, *iv.*
 74.

In nephriticis sign.
vij. 36.

Abscess. ossis in
ulcere diuturno,
vj. 45.

A sphacelo, *vij.*
 77.

AETAS.

Temperamentum,
j. 14, 15.

Prog., *ij.* 34, 45.;
iiij. 24; *viiij.* 1.

Diaeta, *j.* 13, 14,
 15, 16.

Cautio in diaeta, *j.*
 17; *iiij.* 3.

In aliis, *j.* 3, 4.

- Nuper natus.
Morbi, iij, 24.
 Dentiens.
Morbi, iij, 25.
Morbor. crisis, iij, 28.
 Puer.
*Ver et aestas con-
 veniunt*, iij, 18.
Fames, j, 13, 14.
Morbi, iij, 26.
*Non laborat po-
 dagra*, vj, 30.
Morbor. progn. ij, 39; iij, 28.
Diaeta, j, 16.
 Puber.
*Ver et aestas con-
 ducunt.* iij, 18.
Morbi, iij, 27.
Morbor. progn. iij, 28.
 Adolescens.
Fames, j, 13.
Alvi prog. ij, 20, 53.
Morbi, iij, 29.
Morbor. progn. ij, 45; v, 7.
 Vir.
*Autumno et hie-
 me valet*, iij, 18.
- Fames*, j, 13.
Morbi, iij, 30; vj, 57.
 Senex.
Temperamentum, j, 14.
Aestate valet, iij, 18.
Fames, j, 13, 14.
Alvus, ij, 20, 53.
Morbi, j, 14; iij, 31.
Progn. ij, 39, 40, 49; iij, 12; vi, 6; viij, 1.
 ALPHI. *Tempus*, iij, 20.
 ALVI EXCRE-
 MENTA, ege-
 stiones.
Χωρόν, j, 23.
Ἀποχώρον, vij, 69.
Διαχώρημα, iv, 28; vij, 30.
Διαχώρησις, ij, 18; iv, 47; v, 64.
Ὑποχώρον, iv, 25, 26.
Ὑποχώρημα, j, 12; iv, 21; vij, 77, 79.

- Ὑποχώρησις, iv, 83;
 v, 64; vij, 6,
 23.
 Ἐκκρίσις, ij, 15.
 Ἐπελθόν iv, 22.
 Ὑπελθόν, iv, 23.
 Progn. j, 12; vij,
 79.
 In feb. continua,
 iv, 47; vij, 69.
Diaet. in sanis, ij,
 15.
In biliosis, ij, 15;
 v. 64.
Biliosorum solu-
tio, iv, 28.
Ab atra bile letha-
lia, iv, 22, 23,
 24.
Nigror. progn. iv,
 21.
Sanguis niger, bo-
nus, iv, 25.
Lethalis, iv, 23.
Spumosa unde, vij,
 30.
Sincera. Progn.
 vij, 23.
In morbo diuturn.
 vj, 6.
Celeria unde, ij,
 18.
- Pauca ubi,* iv, 83.
Carunculae, malae,
 iv, 26.
Ramentorum pro-
gnosis, vij, 67.
ALVI FLUXUS.
Διάρροια, iij, 21, 25,
 30; v, 12, 14;
 vj, 15, 16, 17,
 32; vij, 29, 30,
 75, 78.
Πύσις, ij, 14; iij,
 16; vij, 78.
Πύειν, v. 34.
Ταραχή, j, 2; iv,
 60.
Καταφορά, viij, 5.
Υγροτήτης, iij, 31.
Tempus iij, 16,
 21.
Aetas, iij, 25, 31.
A fluxione capitis,
 vij, 78.
Progn. ij, 14; vij,
 75.
Malus, v, 34; vj,
 16, viij, 5.
Lethalis, v, 12,
 14.
Solutio, vj, 15.
Morb. solvit, iv, 60,
 vj, 17; vij, 29.

- Spontanei *progn.*, j, 2.
 Spumous à capite, vij, 30.
 Longo *obnoxii*, ij, 20; vj, 32.
Aetas, iij, 30.
- ALVI MUTATIO
 naturalis, ij, 20, 53.
- ALVUS HUMIDA, SICCA.
Tempus, iij, 16, 17.
Progn., ij, 20, 53.
Humidae aetas, iij, 31.
Ubi fiat, iv, 27, 73.
- ANGINA.
Tempus, iij, 16, 20, 22.
Progn. bona, vj, 37; vij, 49.
Mala, v, 10.
- ANIMUS. Videatur Mens.
- ANXIETAS.
Vino solvitur, vij, 56.
- APHTHAE. *Aetas* vij, 24.
- APPETITUS. Vid. Fames.
A purgante, iv, 21.
- APOPLEXIA.
Tempus, iij, 16, 23.
Aetas, iij, 31; vj, 57.
In melancholicis unde, vj, 56.
Progn. vj, 51.
Curae, ij, 42.
Particularis, vij, 40.
- AQUA.
Levis sign. v, 26.
Calidae effectus, vij, 42, 46.
Frigidae effectus, v, 21.
- AROMATA. *Suffitus vis et noxae*, v, 28.
- ARS MEDICA longa, j, 1.
Requisita, j, 1.
- ARTICULORUM.
 Dolor Tubercula. Vid. Dolor. Tubercula.
- ARTUS, etc.

- Progn. mortis*, viij, 10 ad 18.
- ASTHMA.**
Tempus, iij, 22.
Aetas, iij, 26, 30.
Progn. vj, 46.
- AUDITUS.**
Progn. in febr. iv, 49; vij, 73.
Hebetis tempus, iij, 5, 17.
Aetas, iij, 31.
Acuti tempus, iij, 17.
- AURES.**
Progn. viij, 14.
Humidarum aetas, iij, 24, 31.
Doloris tempus, iij, 21.
- AUSTER.** Vid. Ventus.
- AUTUMNUS.** Vid. Tempestas.
- BALBUS.** *Progn.* vj, 32.
- BALNEUM.**
Dolores oculorum solvit, vj, 31; vij, 46.
- BILIS.**
Atrac sign. vij, 68.
- Lethalis ubi*, iv, 22, 23, 24.
- BOREAS.** Vid. Ventus.
- BUBO.** *Progn.* iv, 54.
- CACHEXIA.**
Aetas, iij, 31.
Diaeta, ij, 10; vij, 67.
Purgationis progn. ij, 36.
- CALCULUS.** Vid. Vesica.
- CALIDUM INNATUM.**
Majoris tempus, j, 15.
Aetas, j, 14.
- CALOR.**
Utilis ubi, v, 18, 22.
Magni progn. vij 13.
Frequentioris morbi, v, 16.
Mutati progn. iv, 40; vij, 60.
Particularis quid notet, iv, 39.
Ventris, quando major. j, 15.

- Progn.* iv, 48; vij,
^{72.}
CALVUS. Vid. Ca-
 pilli.
CANCER. *Occulti*
progn. vij, 38.
CAPILLI, PILUS.
Quid indicent. iv,
 69.
E renibus, iv, 76.
Defluxus in ta-
be lethalis, v,
 12, 14.
Calvi progn. vj, 34.
Eunuchus non fit,
 vj, 28.
CAPUT.
Doloris tempus,
 iij, 13, 23.
Sign. iv, 70.
Progn. vj, 51.
Diaeta, v, 64.
Cura, V. S. v, 68.
Solutio, vj, 10.
Gravitationis tempus,
 iij, 5, 17.
Causa, v, 28.
Cura, calor. v,
 22.
Vulneris progn.
 vij, 14.
- Ulcus, calor ju-*
vat. v, 22.
CARTILAGO. *Dis-*
secta non coa-
lescit, vj, 19; vij,
 28.
CATARRHUS.
Aetas, iij, 12, 31.
Sign. in diarrhoea,
 vij, 30.
Caus. frigus, v,
 24.
A tabe, vij, 78.
Lethalis ubi, iij,
 12.
In pectus ruentis,
progn. viij, 38.
CAUTIO GENE-
RALIS, 1, 2, 3,
 17.
CEREBRUM.
Frigus nocet, v,
 18.
Concussi sympto-
mata, vij, 58.
Vulneris sympto-
mata, vj, 50.
Progn. vij, 14.
Lethale est, v, 24.
Sphaceli progn.
 vij, 50.

- CHOLERA.** *Aetas,*
 iij, 30.
CIBUS, *Nutritio.*
Cautio, j, 17; ij,
 7, 51.
Progn. ij, 31, 32.
Concoction. *pro-*
gn. a tempore, j,
 18; iij, 18.
Differentia, ij, 18.
Tutus quando, ij,
 15; vij, 65.
Nocet, j, 11, 19;
 ij, 10; vij, 65,
 67.
Pauco ubi opus,
 j, 10, 14, 18.
Multo ubi opus, j,
 14, 15, 18.
Copiosi sign. ij, 8.
 17; iv, 41, 45;
 vij, 64.
Effectus, ij, 17.
Consuetus prae-
fertur, ij, 38.
Humidus quibus
utilis, j, 16.
Cito nutriens, ij,
 18.
Et lente ubi ne-
cesse, ij, 7.
- Mutatio ubi ju-*
vet, ij, 45.
Pravi progn. pur-
gante, ij, 36.
Vid. plura in Di-
aeta.
COLLIQUEFA-
CTIO.
Prog. in febr. ij,
 28.
In gravida, v, 45.
Diaeta, v, 64.
COLLUM. *Inversi*
progn. iv, 35;
 viij, 58.
COLOR. *Variantis*
progn. iv, 40;
 vij, 60.
CONCEPTUS.
Sign. v, 41, 51, 61.
Impedimentum, v,
 46, 62.
Maris locus, v,
 58, 48.
Sign. a colore, v,
 2.
CONCOCTA.
Movendo, non cru-
da, j, 22.
Cruda, a bile atra,
 vij, 68.

- CONSUETUDO.** iv, 51, 61, 62;
Vis, ij, 45.
Ejus habenda ratio, j, 16, 17;
 ij, 28, 49, 50.
- CONTRARIUM.** *Remedium est*, ij,
 17, 22, 48, 50;
 v, 19.
Paulatim adhibendum, ij, 51.
- CONVULSIO.** Vid. **Spasmus.**
- COR.** *Vulnus*, *lethale*, vj, 18.
- CORPUS.** *Praeparatio.* Vid.
 in *Purgatione.*
Statura, ij, 54.
- CRANIUM.** *Laesi symptomata*, vij,
 24.
- CRISIS.** *Futurae signa a nocte*, ij, 13.
Ab urina, iv, 71.
Critici dies. ij, 23,
 24; iv, 36, 61.
Progn. j, 12.
Non turbanda, j,
 19, 20.
Imperfecta, ij, 12; *Παραρροσύνη.*
- CUCURBITULAE.** *Ubi necesse*, v,
 50.
- CUTIS.** *Progn.* v, 61.
Rarae, v, 69.
- DEGLUTITIO.** *Progn.* iv, 34, 35;
 vij, 58.
- DELIQUIUM ANIMI.** *Causa calor frequens*, v, 16.
Atuberculo rupto,
 vij, 8.
Progn. ij, 41.
In fluore muliebri malum, v, 56.
Ubi opus, j, 23.
- DELIRIUM.** *Φρενitis.*
Aetas, iij, 30.
Signa ab urina, iv,
 72.
Progn. in senes,
 viij, 1.
Mala, ex peripneumonia, vij,
 12.

- In cranio fracto*, DENTES.
 vij, 24.
Progn. bona, a
 somno ij, 2.
A risu, vj, 53.
Mala in febr. iv,
 50.
Cum studio. vj,
 53.
Post modum, vij.
 7.
In haemorrhagia,
 vij, 9.
In ileo, vij, 10.
In vigiliis, vij,
 18.
In plaga capitis,
 vij, 14.
Παραπονή.
Ubi bona, vj, 26.
Mavia.
Tempus, iij, 20.
 22.
Ab ulcere, v, 65.
In melancholicis,
 vj, 56.
A mammis, v,
 40.
Progn. vij, 5.
Solutio, vj, 21.
Delirium, viij,
 16.
- Dentitionis aetas*
 et morbi, iij,
 25.
Frigus nocet, v,
 18.
Lentoris in feb.
progn. iv, 53.
 DESTILLATIO.
 Vid. Catarrhus.
 DIAETA.
Cautio, j, 9, 10,
 16; iij, 3.
Pleniori ubi opus,
 j, 4, 5, 7, 10.
Tenui ubi opus, j,
 7, 8, 10, 11.
Mutatio quos ju-
vet, ij, 45.
Erratum, j, 5.
 Vid. plura in
 Cibo.
 DIAPHRAGMA.
 Vid. septum trans-
 versum.
 DIARRHOEA. Vid.
 Alvi fluxus.
 DOLOR.
Progn. si non sen-
tiatur, ij, 6.
Si sint bini, ij, 46.
Calor lenit, v, 22.

- Torpor solvit*, v, 25.
In ulcere, v, 65.
Ab angina, v, 10.
Cautio, vj, 5, 66.
Lumborum.
Tempus, iij, 23.
Progn. iv, 11.
Purgatio, iv, 20.
Ventris.
Progn. iv, 11; vj, 7; vij, 22, 26.
Purgatio, iv, 20.
Viscerum. Progn. iv, 66.
Articulorum.
Tempus, iij, 16, 20.
Aetas, iij, 31.
Post febres longas, iv, 44; vij, 63.
Causa, cibus copiosior, iv, 45; vij, 64.
Frigida solvit, v, 25.
DYSENTERIA.
Tempus, iij, 11, 12, 16, 22.
Aetas, iij, 30.
- In ulcere*, v, 65.
Adiarrhoea, vij, 75.
Progn. vj, 3, 43; vij, 76.
Bona in lienosis, vj, 48.
In insania, vij, 5.
Mala, a sincera dejectione, vij, 23.
Lethalis ab atra bile, iv, 24.
Cum carunculis, iv, 26.
DYSPNOEA. Vid. *Respiratio*.
DYSURIA.
Tempus, iij, 5.
Aetas, iij, 31.
Cura V. S. vj, 36; vij, 48. *Vinum*, vij, 48.
EBRIUS. *Progn.* v, 5.
ELLEBORUS.
Praeparatio ad Elleborum, iv, 13.
Quomodo juvetur, et sistatur, iv, 14, 15.

- Sanis periculosus*,
iv, 16.
Progn. a spasma,
v, 1.
Vid. plura in pur-
gante.
EMPHYEMA.
Causa a sanguine
effuso, vi, 20.
A pleuritide, v,
8.
Quot diebus fiat.
Progn. v, 15.
In cura, vij, 34.
Cautio in cura,
vj, 27.
EPILEPSIA.
Tempus, iij, 16,
20, 22.
Aetas, iij, 29.
Progn. v, 7.
Cura, ij, 45.
ERYSIPELAS.
Ab osse nudato,
vij, 19.
Progn. vj, 25; vij,
20.
Lethalis in gravi-
dae utero, v, 43.
Cura non exul-
cerati, v, 23.
- EVACUATIO.**
Ubi opus, ij, 8;
iv, 41.
Cautio, j, 23; ij,
29.
Qua via, j, 21;
vij, 61.
Progn. j, 2, 23, 25.
Extrema pericu-
losa, j, 3; ij,
51.
Cura, ij, 22.
EUNUCHUS.
Progn. vj, 28.
EXCRETIO.
EXSOLUTIO.
Ἐκλύω, ij, 36, 41;
vij, 8.
Διαλύω, iij, 17.
Καταλύω, ij.
Tempus, iij, 17;
43.
Causa, ij, 36; vij,
8.
Progn. ij, 41, 43.
EXPERIENTIA.
Quoad brevitatem
vitae fallax, j, 1.
EXTENUATUS.
Progn. ij, 28, 58;
iv, 25.

Vid. plura in pin-
gui.

EXTREMARUM

frigus. Vid. Fri-
gus.

FAMES.

Variat cum aetate,
j, 13.

Progn. ij, 4.

Labor nocet, ij,
16.

Siccat corpus, vij,
59.

*Expletur diffici-
lius quam sitis,*
ij, 11.

Solvitur vino, ij,
21.

*Appetitus deie-
ctus.*

Progn. ij, 32.

Malus, vj, 3; vij,
6.

Curat purgatio, iv,
17.

*Fastidium cibi. In
muliere progn.*
v. 61.

FAUCES.

*Laborantium pro-
gn.* ij, 15.

*Asperarum tem-
pus,* iij, 5.
FEBRIS.

Aetas, iij, 25.

Progn. ij, 28.

A tempore, iij, 6.

A paroxysmo, iv,
30.

A somno, iv, 67.

A lacrymis, iv,
52; viij, 2.

A surditate, iv,
60.

A dentibus, iv,
53.

A collo, iv, 55;
vij, 58.

A respiratione,
iv, 68.

A suspiriis, vj,
54.

A suffocatione,
iv, 34.

*A vomitu sangui-
nis,* vij, 37.

A hypochondriis,
iv, 73.

Ab urina, iv, 69,
70; vij, 31.

*Ab alvi excremen-
tis,* iv, 21.

- A dysenteria*, vj, 3.
A calore, iv, 65.
A rigore, iv, 29.
A spasmo, ij, 26.
A bubone, iv, 55.
A lassitudine, iv, 51.
Ab abscessu, iv, 51.
Ab extenuatione, iv, 28, 23.
Ab haemorrhagia, iv, 27.
A diebus criticis, iv, 36, 61; ij, 23, 24.
Ab ictero, iv, 62, 64.
Sudoris in febris
bus tempus, ij, 6.
Diaeta, j, 16; v, 64.
Cibus cui noceat, vij, 65.
Nocet in paroxysmo, j, 19.
Cura febris, quae non est a bile, vi, 42.
Morbum solvit, ij, 26; iv, 57; v, 5; vj, 40, 44, 51 vij, 52.
Acuta.
Tempus, ij, 7; ij, 13.
Aetas, j, 14; ij, 29.
Progn. iv, 66, viij, 10.
A sudore, iv, 37.
Diaeta, v, 64.
Ardens.
Tempus, ij, 21.
Aetas, ij, 30.
Progn. iv, 54.
A tempore, viij, 8.
A tremore, vj, 26.
Cura. Rigor solvit, iv, 58.
Delirium, quando, vj, 26.
Continua.
Tempus, ij, 21.
Progn. a sudore, iv, 43, 56.
A rigore, iv, 46.
A sputo,
Urina et excrementis, iv, 47; vij, 69.
A spasmo, iv, 49; vij, 73.

- A delirio et Respiratione*, iv, 50.
 Leypiria.
Progn. iv, 48; vij, 72.
Crisis in xx diebus, ij, * 23.
 Ephemera.
Progn. iv, 55.
 Quotidiana.
Sign. iv, 63.
Quae sit difficilis, iv, 30.
 Tertiana.
Tempus, iiij, 21.
Crisis, iv, 59.
Tertiana continua, periculosa intermittens non, iv, 43; vij, 62.
 Quartana.
Tempus, iiij, 21, 22.
Sign. ab urina, iv, 74.
Progn. v, 70.
A tempore, ij, 25.
Ab haemorrhagia, viij, 3.
Symptomatica, ij, 47; vj, 60.
 Vaga.
Tempus, iiij, 22.
 Longa.
Tempus, iiij, 16; iv, 36.
Aetas, iiij, 27.
Unde, vj, 45; vij, 64.
Longae futurae sign.
A sudore, iv, 37.
Ab urinis, vij, 31.
Ab abscessu, iv, 51.
Progn. iv, 44; vij, 63.
Diaeta, v, 64.
 Lenta. *Diaeta*, v, 64.
 Cum lassitudine, quibusdam jam
 Lymphatica dicta. *Sign. ab urina*, iv, 31.
 Recidiva.
Causa, ij, 12.
Unde, iv, 36, 61.
 FERRUM. *In cura progn.* viij, 6.

- FLUOR MULIE-
BRIS.** *Progn.*
v, 56.
FOEMINA. *Vid.*
Mulier.
**FOTUS SUFFI-
TUS.**
Hvgia.
Menses movet, v,
28.
Oculorum dolores
solvit, vj, 31.
Ejus noxae, v, 28.
Goulaqua.
Experimentum
circa praegna-
tionem, v, 59.
FRIGUS.
Aetas, iij, 14.
Ubi juvet, v, 21,
23, 25.
Ubi noceat, v, 17,
18, 20, 22, 23,
24.
Morbi a frig. v,
17, 20, 24.
Particulare, quid
notet, iv, 39.
Progn. mala, viij,
11, 12, 14.
Extremarum, prog.
vij, 1, 26.
In febre progn. iv,
48; vij, 69.
Mutati. progn. iv,
40; vij, 60.
Mortis imago,
viij, 18.
Cura calor. v, 19,
22.
FUROR. *Vid. in De-*
lirio.
GEMELLI.
Alterutrius abor-
tus, v, 38.
GENA. *Tenuis par-*
ticula dissecta
non coalescit, vj,
19.
GENITALIUM pu-
tredines.
Tempus, iij, 21.
GENUUM gravitas.
Purgatio curat.
iv, 20.
GIBBUS. *Progn. vj,*
46.
GINGIVAE Pruri-
tus. *Vid. Pru-*
ritus.
GRACILIS. *Vid. in*
Pingui.
GRAVEDO.

- Tempus*, iij, 13,
20, 23,
Progn. in sene, ij,
40.
Diuturnae tempus,
iij, 14.
GRAVIDA.
Sign. v, 41, 51, 61.
Foetus locus, v, 38.
48.
Progn. a mammis.
v, 37, 38, 52, 53.
A menstruis, v,
60.
A colore, v, 42.
A V. S. v, 31.
A diarrhoea, v,
34.
A tenesmo, vij,
27.
Ab erysipellate, in
utero, v, 43.
A febre, v, 55.
A morbo acuto, v,
30.
Ab extenuatione
p. n. v, 44.
Purgatio, iv, 1;
v, 20.
HABITUS.
Progn. ij, 34.
Athleticus, j, 15.
Periculosus, j, 5.
HAEMOPTOE.
Vid. Sanguinis
sputum.
HAEMORRHA-
GIA. *Vid. San-*
guinis fluxus.
HAEMORRHOI-
DES.
Aetas, iij, 30.
Bonae, iv, 25; vj,
11.
Curae cautio, vj,
12.
Solvunt delirium,
vj, 21.
HEPAR.
Dolorem febris
solvit, vij, 52.
Inflammati sym-
ptomata, sive
sign. v, 58.
Progn. vij, 17.
Suppurati curae
progn. vij, 45.
Hydropis, progn.
vij, 55.
Vulnus, lethale,
vj, 18.
HERPES *exedens.*

- Juatur calore,*
v, 22.
- HORROR.**
Tempus, iij, 5.
A sudore malus,
vij, 4.
Vinum solvit, vij,
56.
- HUMIDA NATU-
RA,** sive Cor-
pus.
Aetas, iij, 31.
Sign. sudor. iv,
56; vij, 61.
Progn. vj, 2.
Cura famas, vij,
59.
Evacuatio, vij, 61.
Juvat siccitas, iij,
14.
Morbi, iij, 11.
- HUMORES ALII.**
Progn. vij, 69, 70.
- HYDROA.** *Tempus,*
iij, 21.
- HYDROPS.**
Tempus, iij, 22.
*Causa, ab haemor-
rhoidibus cura-
tis,* vj, 12.
A liene, vj, 43.
- Ab hepatis hydro-
pe,* vij, 55.
*A leucophlegma-
tia,* vij, 74.
Progn. a causis,
vj, 43; vij, 55.
A tempore, vij, 8.
*Tussis desperata
est,* vj, 35; vij,
47.
Bona in delirio,
vij, 5.
Curae cautio, vj,
27.
Solutio, vj, 14.
Ulcus difficile, vj,
8.
Sicca, unde, iv, 11.
- HYEMS.** Vid. Tem-
pestas.
- HYPERCATHAR-
SIS.** Vid. Pur-
gatio.
- HYPOCHON-
DRIA.**
Murmuris progn.
iv, 73.
Diaeta, v, 64.
Doloris progn. vj,
40.
Duritie in Ic-

- tero progn.* iv, 64.
- HYPOASTRIUM.** *Dolor, quid no-*
tet, iv, 80; vij, 39.
- HYSTERICA.** *Sternutatio juvat,* v, 35.
- ICTERUS.** *Non est flatulentus,* v, 72.
Progn. ab hepate, vj, 42; iv, 64.
Progn. quando noxius, iv, 62.
Utilis, iv, 64.
- JEJUNIUM.** *Vid. Fames.*
- IGNIS.** *Curae progn.* viij, 6.
- ILEUS.** *Tempus,* iij, 22.
Progn. a stranguria, vj, 44.
A variis, vij, 10.
- IMBECILLITAS.** *Sign.* ij, 28.
- IMPETIGINES.** *Tempus,* iij, 20.
- INFLAMMATIO.** *Recens, frigore curatur,* v, 23.
- INSANABILIA.** viij, 6.
- INSTABILIA.** *Quae,* ij, 27, 52.
- INTESTINUM.** *Tenuis vulnus lethale,* vj, 18.
Non coalescit, vj, 24.
Recti inflammati symptomata, v, 59.
- ISCHIADICUS DOLOR.** *Tempus,* iij, 22.
Progn. vj, 59, 60.
- JUDICIUM.** *Difficile,* j, 1.
- JUVANTIA, NOCENTIA,** ij, 27.
- LABIA.** *Progn.* viij, 13.
In febre continua, vj, 49; vij, 73.
- LAC.** *In menstruis deficientibus,* v, 39.
In gravida, progn. v, 52.

- Quibus conveniat.*
v, 64.
- LACRYMAE.**
Aetas, iij, 31.
Progn. in morbis,
iv, 52; viij, 2.
- LASSITUDO.**
Sign. ex urina, iv,
74.
Progn. in febre, iv,
31.
Cura quies, ij, 48.
Spontaneae prog.
ij, 5.
- LATUS, Dolor.** Vid.
Dolor.
- LEPRA.**
Tempus, iij, 20.
- LETHALE VUL-**
NUS. Vid. Vul-
nus.
- LETHARGUS.**
Tempus, iij, 23.
Aetas, iij, 30.
- LEUCOPHLEG-**
MATIA.
Progn. vij, 74.
Solvitur diar-
rhoea, vij, 29.
- LICHENES.** Tem-
pus, iij, 20.
- LIENOSUS.**
Tempus, iij, 22.
Progn. vj, 43; viij,
8.
Dysenteria utilis,
vj, 48.
- LIENTERIA.**
Tempus, iij, 22.
Aetas, iij, 30.
Causa in Lienosis,
vj, 43.
A dysenteria, vij,
76.
Progn. a ructu, vj,
1.
Cautio in purga-
tione, iv, 12.
- LINGUA.**
Progn. vij, 40; vij,
9.
- LOCUS.** Vid. Re-
gio.
- LUMBUS.** Dolor.
Vid. Dolor.
- MAMMAE.**
Progn. a lacte, v,
39.
A sanguine, v, 40.
In gravida, ab ex-
tenuatione, v, 57.
53.
A Lacte, v,
52.

- MANIA.** Vid. in *Cura suffitus*, vj, 28.
Delirio.
- MELANCHOLIA.** *Nimia.*
Tempus, iij, 14, *Progn.* v, 56.
 20, 22. *Cura*, v, 50.
- SIGNA** *Timor et* *Coloris vitiiati Cura*, v, 36.
moestitia, vj, 23.
Effectus, vij, 40. **MORBUS.**
Progn. vj, 11, 56. *Cautio in morbo*,
Purgatio, iv, 9. j, 2.
MENS. *Progn.* j, 12; ij, 32,
 33, 34, 35; iij, 3;
 16. viij, 1.
Laborantis sign. **MORBI SEDES**, si-
 ij, 6. ve *Focus*, iv, 33,
 38, 39.
- MENSTRUUA.** **MORBUS FU-**
Erumpentia, mor- **TURUS.**
bos pueritiae
solvunt, iij, 28. *Tempus*, iij, 1,
 19.
Vomitum sangui- *Sign.* ij, 5.
nis curant, v, *Causa.* *Cibi copia*,
 32. ij, 17.
- Sistuntur in gra-* **MORBI PRIN-**
vida, v, 61. **CIPIMUM.**
Fluentium progn. *Remissius est*, ij,
 v, 60. 30.
Deficientia. *Ab atra bile lethala*, iv, 22.
Sign. v, 57; vj, *Raro purgandum*,
 29. j, 22, 24.
Sanguis e naribus
juvat, v, 33.

- Si quid movendum statim move*, ij, 29; iv, 10.
- Morbi Vigor.**
Vehementior est, ij, 30.
Diaeta, tenuis, j, 8, 20.
Nil movendum, ij, 29.
- Morbi Finis.**
Remissior est, ij, 30.
- MORBUS ACUTUS.**
Tempus, iij, 9.
Sign. j, 7.
Ab urina, vij, 32, 35.
Praedictio incerta, ij, 29.
Progn. viij, 10.
Mala, a suspiriis, vj, 54.
Frigore extremarum, vij, 1.
Lethalis ab excrementis, iv, 23.
In gravida, v, 30.
Diaeta, j, 4, 7.
Purgatio, j, 24; iv, 10.
- Crisis in* xiv. diebus, vij, * 39.
- MORBUS LONGUS.**
Futuri sign. j, 12; ij, 28; iv, 40; vij, 60.
A sudore, iv, 36, 37, 56.
Ab urina, vij, 31, 34.
Ab abscessu, iv, 51.
- Existentis progn. ab appetitu prostrato*, vij, 6.
- Ab excrementis*, iv, 21; vij, 67.
- Ab alvi fluxu*, viij, 5.
- Diaeta tenuis periculosa*, j, 4.
- Crisis in* lx. diebus, vi, * 36.
- MORBUS PERICULOSUS.**
In genere, ij, 34; viij, 1, 8.
Remedium quale, viij, 6.

MORBUS.

Judicatu facilis, j,
12; iij, 8.

Difficilis, j, 12, iij,
8; iv, 29, 30.

MORBUS RECIDI-
VUS.

Causa, ij, 12.

Futuri sign. iv, 36,
61.

MORBUS INSA-
NABILIS, viij,
6.

MORS.

Propinqua.

Sign. a variis, vij,
16, 24, 25; viij,
11 *ad* 18.

Ab excrementis,
iv, 23.

In febr. contin. iv,
49; vij, 73.

Certa, vj, 27.

Subita. Sign. ij,
41, 44.

MORTIFERUM,

Lethale.

Θανάσιμον, Θανατώ-

δες, ij, 1; iij, 9;

iv, 22, 24, 26,

35, 37, 46, 48,

50; v, 1, 2, 11,

14, 22, 30, 43;

vj, 18, 27, 52;

vij, 25, 72, 73,

79; viij, 11, 13,

14, 15, 16, 17,

18.

MOTUS, QUIES.

Se invicem curant.

ij, 22, 48.

Effectus in purg.

iv, 14, 15.

Progn. ij, 49. 50.

MUIER.

Non est ambidex-
tra. vij, 43.

Faecundae tempe-
ramentum, v, 62.

Sign. v, 59.

Infœcunda, cras-
sa p. n. v. 46.

MUTATIONES.

Subitarum prog.
ij, 51.

Caloris, Coloris,
Tempestatis. Vid.

Calor, Color,
Tempestas, etc.

MUTUS.

Causa, vij, 58.

Progn. vj, 51.

Ab ebrietate, v,
5.

NARES.

Progn. in feb. contin. iv, 49; vij, 73.

Humidarum aetas, iii, 31.

Et Siccarum prog. vj, 2.

Haemorrhagiae in quartana progn. viij, 3.

Pus solvit dolorem capitis, vj, 10.

Compressarum vis, v, 49.

NATURA.

Inimicum. Vid. *Nimium.*

Differentia, iij, 1. *Progn.* ij, 34; vj, 2; viij, 1, 8.

NEPHRITIS.

Aetas, iij, 31.

Sign. ab urina, vij, 34, 35.

Progn. vj, 36.

In senibus, vj, 6.

Haemorrhoides utiles, vj, 11.

NERVUS.

Calor juvat, v, 18.

Frequentior debilitat, v, 16.

Resectus non coalescit, vj, 19; viij, 28.

NIGROR.

Causa frigus, v, 17. 20.

NIMIUM, Naturae est inimicum.

In omnibus, ij, 51.

In cibo, j, 4; ij, 4, 17.

In somno vig. ij, 3; viij, 71.

OCCASIO. Celeris, j, 1.

OCULI.

Progn. iv, 32; viij, 2.

In febre continua, iv, 49; vij, 73.

In vomitu, vj, 3.

In somno, vj, 52.

Ophthalmia.

Tempus, iij, 11, 14, 16, 21.

Solutio, vj, 17.

Doloris cura, vj, 31; vij, 46.

Tarditatis et Mor-
sus tempus, iij, 17.

- Hebetudinis,
 Glaucomatis *et*
 Humiditatis *ae-*
tas, iij, 31.
 Coecitas, *in me-*
lancholicis, vj,
 56.
 OFFICIUM medici,
 aegri, etc., j, 1.
 OMENTUM.
 Crassius, *infoe-*
cundam facit, v,
 46.
 Excidens *putre-*
scit, vj, 58.
 ORGASMUS. Vid.
 Turgens materia.
 OS.
 Ulcerationum.
 Tempus, iij, 21.
 Aetas, iij, 24.
 Amari cura, iv,
 17.
 OSCITATIO.
 Solvitur vino, vj,
 56.
 OSSA.
 Frigus laedit, v,
 18, 22.
 Laborantis *progn.*
 vj, 2.
 Nudati *progn.* vj,
 19.
 Cura, calor *juvat.*
 v, 22.
 Dissectum, *non*
cealescit, vj, 19;
 vj, 28.
 Fracta calor *ju-*
vat, v, 22.
 Abscessus, *in ul-*
cere diuturno,
 vj, 45.
 A sphacelo, vj,
 77.
 Παράνομη. vj, 26.
 PAROXYSMUS.
 Sign. j, 12; ij, 13.
 Progn. iv, 30.
 Cibus nocet, j, 11,
 9.
 PARTUS DIFFICI-
 LIS
 In tenuitate p. n.
 a feb. v, 55
 Sternutatio *juvat*,
 v, 35.
 PECTEN. Dolor
 quid notet, vj,
 39.
 PECTUS. Frigus
 laedit, v, 24.

- Dolor. Vid. Dolor.
PERINAEUM.
 Dolor quid notet,
 iv, 80; vij, 39.
PERIPNEUMONIA.
 Vid. in Pleuritide.
PERVERSA, sive
 Distorta pars.
Progn. in febre, iv,
 35, 49; vij, 58,
 73.
PHLEBOTOMIA.
 Vid. V. S.
PHRENITIS. Vid.
 Delirium.
PHTHISIS.
Tempus, iij, 13,
 16, 22.
Aetas, iij, 29; v,
 9; viij, 7.
Causa, a pleuriti-
de, v, 15.
A sputo sangui-
nis, vij, 15, 56,
 78.
Puris, vij, 16,
 78.
Ab haemorrhoidi-
bus, vj, 12.
Progn. lethalis.
- A tempore,* iij,
 10.
A natura, viij, 88.
A diarrhoea, vj,
 12, 14; vij, 78.
A sputo, v, 111.
 vij, 16, 78.
Puris purgatio
sursum, vij, 78.
Diaeta, v, 64.
Purgatio, iv, 8.
PINGUES, Crassi.
Progn. ij, 35.
Mortis, ij, 44.
Purgatio, ij, 35.
 iv, 7.
 Gracilis.
Purgatio, ij, 35.
 iv, 6.
Gravidae p. n.
progn. v, 44.
PITUITA.
 Conclusae solutio
 vij, 54.
 Fluxus a capite
 vij, 30.
PLEURITIS.
Tempus, iij, 23.
Aetas, iij, 30.
Qui minus obno-
xii, vj, 33.
Progn. vij, 11.

- A sputo, quoad*
tempus j, 12; v,
 8, 15.
Diarrhoea lethali-
lis, vj, 16.
Dolor vid. *Dolor*
Lateris.
Peripneumonia.
Tempus, iij, 23.
Aetas, iij, 30.
Progn. vj, 12.
Mala a pleuritide,
 vj, 11.
Diarrhoea lethali-
lis, vj, 16.
 PLUVIA. Vid. in
Tempestate.
 PODAGRA.
Tempus, iij, 16,
 20; vj, 55.
Aetas, iij, 31.
Causa, vj, 29, 30.
Qui non obnoxii,
 vj, 28, 29, 30.
Progn. vj, 49.
Dolorem frigida
solvit, v, 25.
 POTUS.
Consuetus prae-
fertur, ij, 38.
Effectus, ij, 11.
- Multi progn.* vj,
 7.
 PRAEDICTIO.
Acutorum incerta,
 ij, 19.
 PRAEIGNANS. Vid.
Gravida.
 PRAEPUTIUM.
Resectum non co-
alescit, vj, 19.
 PRURITUS.
Gingivarum, ae-
tas, iij, 25.
Corporis totius,
Aetas, iij, 31.
 PURGATIO PER
 ALVUM.
Purgandum.
Vere, vj, 47.
Hyeme, iv, 4.
Non purgandum.
Aestate, iv, 7.
Sub cane, etc. iv,
 5, 9.
In vigore morbi,
 ij, 29.
In extenuatis, ij,
 35; iv, 6.
Qui purgandi, ij,
 8; iv, 18, 20;
 vj, 67.

- Quae purgandae, v, 36.
 Purgandi.
 Difficulter vomentes, iv, 7.
 Melancholici, iv, 9.
 Tabidi, iv, 8.
 Oculis dolentes, vj, 31.
 Debilis sudans, vij, 61.
 Gravida, quando, iv, 1; v, 29.
 Purganda.
 Concocta, j, 22.
 Turgentia, iv, 1, 10; v, 29.
 Qua via purgandum, j, 21; vij, 61.
 Praeparatio ad purgationem, ij, 9; iv, 13; vij, 70.
 Quanta purgatione opus, j, 23.
 Iuvanda, aut Sistenda, quomodo, iv, 14, 15.
 Finis signa, iv, 12.
 Progn. ab excrementis, iv, 21.
 A spasmis, v, 1; vij, 25.
 Bonae purgationis signa, j, 2, 23, 25; iv, 2, 3.
 Noxia.
 In genere, j, 2, 25; iv, 2, 3.
 Sub cane, etc., iv, 5.
 In sanis, ij, 36, 37; iv, 16.
 In Crisi, j, 20.
 Spontaneae progn. j, 1, 2.
 Hypercatharsis.
 Progn. v, 4; vij, 41.
 PUS.
 Generationis signa, ij, 47.
 Calor juvat, v, 22.
 Frigus impedit, v, 20.
 Progn. vj, 41; vij, 8.
 Boni nota, vij, 44, 45.
 Curae cautio, vj, 27.

- Puris sputum.
Causa a sanguinis
sputo, vij, 15,
 78.
A vomitu sangui-
nis, vij, 78.
Progn. vij, 16,
 78.
 E capite effluens,
eius dolorem sol-
vit, vj, 10.
 In ventre, *Causa*,
 vj, 20; vij, 22.
 In urina, *quid no-*
tet, iv, 75, 81.
 In utero, *Cura*, v,
 47.
PUSTULAE.
Ulcerosae, Vere
fiunt, iij, 20.
Latae, quales sint,
 vj, 9.
PUTREDINES.
Tempus, iij, 16,
 21.
QUIES. Vid. in Mo-
 tu.
RABIES. Vid. in De-
 lirio.
RAUCEDO.
Tempus, iij, 13,
 20, 23.
Progn. in sene, ij,
 40.
RATIO. Vid. Mens.
Rationi fidendum,
 ij, 27, 52.
RECIDIVUS MOR-
BUS. Vid. Mor-
 bus recidivus.
REFECTIO. Vid.
 Cibus.
REGIO.
Cautio in Diaeta,
 j, 17.
In Medicamentis,
 j, 2.
Mutatio, quos ju-
vet, ij, 45.
REMEDIUM.
Quali opus, j, 6.
Gradus, viij, 6.
RENES.
Sanguinis proflu-
entis sign. iv,
 75, 78.
Suppuratorum
symptomata, vij,
 36.
Ulceris sign. iv,
 75.
Pili, et
Carunculæ, iv,
 76.

REPLETIO.

Differentia, ij,
11.

Extrema pericu-
losa, j, 3, 4; ij,
4, 17, 51; vj,
39.

Cura, ij, 22.

RESPIRATIO diffi-
cilis. Dyspnoea.

Aetas, iij, 31.

Progn. in febre,
iv, 68.

In feb. contin. iv,
50.

RIGOR.

Causa, frigus, v,
17, 20.

Focus, v, 62.

Signum est quoti-
dianae feb. iv, 63.

Solvit feb. arden-
tem, iv, 58.

Progn. in febre, iv,
29, 46.

Malus a multo po-
tu, vij, 7.

Cura. Calor miti-
gat, v, 22.

RUCTUS ACI-
DUS.

Progn. vj, 33.

Bonus in Liente-
ria, quando, vj,
1.

SANGUIS.

Collecti in mam-
mas progn. v,
40.

Fluxus tempus, iij,
20.

Causa, calor, j,
16.

Frigus, v, 24.

Progn. in feb. iv,
27.

A convulsione, etc.
v, 3, vij, 9.

Malus in ulcere,
vij, 21.

Diaeta, v, 64.

Cura, frigus, v,
19, 23.

E capite progn. vj
10.

Per nares.

Aetas, iij, 27.

Progn. in quarta-
na, viij, 3.

Bonus in men-
struis deficien-
tibus, v, 33.

Solvit surditatem,
vj, 60.

- Capitis dolorem*, vj, 10.
Abscessum, iv, 74.
In ventrem progn. vj, 20.
Sputum.
Aetas, iij, 29.
Progn. vij, 15, 78.
In febr. contin. iv, 27.
Spumans, e pulmone, v, 13.
Vomitus.
Progn. Bonus sine febre, vij, 37.
Malus, ij, 25.
Cum febre, vij, 37.
Tabes sequitur, vij, 78.
Cum urina, quid notet, iv, 78, 80, 31; vij, 39.
Per alvum.
Niger bonus, iv, 25.
Malus, iv, 21, 23.
SANITAS. Sign. vj, 2.
SATIETAS. Quae mala, ij, 4.
Vid. Repletio.
SATYRIASIS.
Aetas, iij, 26.
SECUNDAE.
Sternutatio expellit, v, 49.
SEMEN. *Progn.* vj, 2.
SENEX. *Vid. in Aetate.*
SEPTUM TRANSVERSUM.
Vulnus lethale, vj, 18.
SICCITAS. *Vid. in Tempestate.*
SIGNA. *Vid. Affectus, cuius sunt.*
SINGULTUS.
Causa, vj, 39.
Ab hepate inflammato, v, 58.
Progn. malus in haemorrhagia, v, 3.
In hypercatharsi, v, 4; vij, 41.
A vomitu, vij, 3.
Ab Ileo, vij, 10.
Ab hepate inflammato, vij, 17.

- Cura sternutatio,*
 vj, 13.
SITIS.
Non magna, ubi.
Progn. nocturna, v, 27.
In purgante, iv, 19.
In feb. Leipyria,
 iv, 48; vij, 72.
Diaeta, Lacnocet,
 v, 64.
Expletur citius,
quam fames, ij, 11.
SOMNUS VIGILIAE.
Mali, ij, 3; vij, 71.
Somnus.
Progn. ij, 1.
In febre, iv, 67.
In vertigine, viij, 15.
Bonus, in delirio,
 ij, 1, 2.
Post sitim, v, 27.
Effectus, iv, 14, 15.
Longi tempus, j, 15.
Vigiliae.
- Aetas,* iij, 24, 31.
Prognosis mala,
 vij, 71.
SPASMUS, Convulsio.
Aetas, iij, 25.
Causa, frigus, v, 17, 20.
Repletio aut
Inanitio, vj, 39.
In melancholicis,
 vj, 56.
In ulcere, quando.
 v. 65.
Futuri in feb. sign.
 iv, 68.
Progn. in febre,
 ij, 26.
Malus in febre, iv, 66, 67.
In vigiliis, vij, 18.
In ardore, vij, 13.
In haemorrhagia,
 v. 3; vij, 9.
In Ileo, vij, 10.
Ab Ellebor. iv, 16.
Ab hypercatharsi,
 v, 4.
In fluore muliebri,
 v, 56.

- Lethalis. In febre* SPIRITUS. Vid.
contin. iv, 40. Respiratio.
A purgante, vij, SPUMA.
25. Oris. *progn. ij,*
Ab Elleboro, v, 1. 43.
In ebrio, v, 5. In sputo sangui-
In teste dextro, nis, *unde, v, 13.*
vij, 11. In alvi excremen-
In vnlnerē, v, 2. tis, *unde vij, 30.*
Cura. Calor miti- Bullae in urina,
gat, v, 22. *quid notent, vij,*
Frigus levat, v, 54.
25. SPUTUM.
Solvitur a febre, *Progn. in febr.*
iv, 57. *contin. iv, 47;*
A quartana, v, *vij, 69.*
70. *In pleuritide, j,*
Tetanus. 12.
Causa, frigus, v, *In phthisi, v, 11;*
17, 20. *vij, 78.*
In ulcere, quando. Sanguinis. Vid.
v, 65. Sanguinis spu-
Progn., v. 6. tum.
Malus in ardore, Puris. Vid. Puris
vij, 13. sputum.
Cura, frigida, v, STATURA COR-
21. PORIS, *ij, 54.*
Calor mitigat, v, STERILIS.
22. Mas. v. 63.
Solvitur a febre, Mulier. Vid. Mu-
iv, 57. lier.

STERNUTATIO.

Causa, vij, 51.*Solvit singultum*,
vj, 13.*Iuvat partum dif-*
ficilem, v, 35.*Expellit secundas*,
v, 49.

STRANGULATIO.

Progn. ij, 43.

STRANGURIA.

Tempus, iij, 16,
20, 22.*Aetas*, iij, 31.*Symptomatica*, iv,
80; v, 58; vij,
39.*Progn. ab Ileo*, vj,
44.*Cura. V. S. et vi-*
num, vij, 48.*STRUMA. Aetas*,
iij, 26.

STUPOR.

Malus in vulnere
Capitis, vij, 14.

SUDOR.

In febre, tempus,
iij, 6.*In morte, cui*, v,
71.*Particularis, mor-**bi sedem notat*,
iv, 38.*Progn.* j, 12; vij,
79.*In febre*, iv, 36.*Malus in feb. con-*
tin. iv, 56.*In crisi, qualis*,
vij, 4.*Horror malus*, vij,
4.*Calidus, quid no-*
tet, iv, 42.*Frigidus malus*,
iv, 42; viij, 4.*Progn. in feb.*, iv,
37.*Multus et conti-*
nues, quid no-
tet, v, 42; vij,
61.*A somno, unde*,
iv, 41.*Ubi malus*, viij,
4.*Cura*, iv, 41; vij,
61.*Hydroa. Tempus*,
iij, 21.*SUFFITUS. Vid.*
*Fotus.**SUFFOCATIO.*

- Progn. in febre,*
iv, 34; vij, 58.
- SUPERCILIUM.**
Distorti, in febre,
contin. progn.
iv, 49; vij, 73.
- SURDITAS.**
In febre contin.
lethalis, iv, 49;
vij, 73.
Solutio, per al-
vum, iv, 28.
In febre, iv, 60.
- SUSPIRIA.**
In acutis, cum feb.
mala, vj, 54.
Vid. Respiratio.
- TABES.** *Vid. Phthi-*
sis.
- TEMPESTAS AN-**
NL.
Concedendum ei,
j, 2, 17.
Morbos indicat,
j, 12.
In alia alii morbi,
fiunt, iij, 19.
Prog. ij, 34, viij,
8.
Mutatio.
Morbi causa, iij,
1, 4, 8.
- Quos juvet,* ij, 45.
- Siccitas.**
Salubris, iij, 15.
Morbi, iij, 7, 16.
- Pluvia.**
Minus Salubris,
iij, 15.
Morbi, iij, 16.
- Ver.**
Salubris, iij, 9.
Pueris conducit,
iij, 18.
Diaeta, j, 15, 18.
Medicina facien-
da, vj, 47; vij,
53.
Morbi, iij, 20; vj,
55.
Progn. iij, 11, 12.
- Aestas.**
Senibus utilis, iij,
18.
Diaeta, j, 18.
Purgatio, iv, 4, 6.
Morbi, ij, 25; iij,
6, 21.
Progn. iij, 2, 6,
13, 14; viij, 8.
- Autumnus.**
Aetas media va-
let, iij, 18.
Diaeta, j, 18.

- Periculosus est*, *Inflammationis*
 iij, 9. *aetas*, iij, 26.
Malus tabi, iij, 10. **TORPOR.** *Effectus.*
Morbi, ij, 25; iij, v, 25.
 4, 22; vj, 55. **TRANSPIRATIO.**
Progn. iij, 4, 13, *Progn.* vij, 69,
 14. 79.
Hyems. *In Viro.* V. 63.
Mediae aetati com- **TREMOR.**
moda, iij, 18. *Solutio in feb. ar-*
Diaeta, j, 15, 18. *dente*, vj, 26.
Purgatio, iv, 4, **TRISTITIA.** *Lon-*
 7, 9, 12. *gae.*
Morb. ij, 25; iij, *Effectus*, vj, 25.
 23. **TUBERCULA,**
Progn. iij, 2; ij, *φύματα.*
 12; viij, 8. *Tempus*, iij, 20.
TENESMUS. *Aetas*, iij, 26.
Progn. in gravida, *Progn. a ruptione,*
 vij, 27. vij, 8.
TERROR. *Curae, Cautio*, ij,
Aetas, iij, 24. 15.
Malus in febre, iv, *In articulis in feb.*
 67. *lougis*, iv, 44;
TESTES. vij, 63.
Progn. a convul- *Causa, Cibi copia,*
sione, vij, 11. iv, 45, vij, 64.
TETANUS. *Vid. in* *Cura, frigida le-*
Spasmo. *vat*, v, 25.
TIMOR. *Longi ef-* *In urethra.*
fectus, vj, 23. *Solutio*, iv, 82;
TONSILLAE. vij, 57.

Εξανθήματα, vj, 9.

TUMOR.

Progn. mollis bonus, v, 67.

Evanescens progn. v, 65.

In ulcere progn. v, 66.

TURGENS materia.

Ubique et semper educenda, j, 22; iv, 1, 10; v, 29.

TUSSIS.

Tempus, iij, 5, 13, 20, 23.

Aetas, iij, 24, 31.

Causa frigus, v, 24.

Progn. in hydrope desperata, vj, 35; vij, 47.

Sicca in feb. ardente progn. iv, 54.

Gibbi a tussi, progn. vj, 46.

VARICES.

Calvis non fiunt. vj, 34.

Solunt delirium, vj, 21.

VENAE SECTIO.

Vere instituenda, vj, 47; vij, 53.

Quanta opus, j, 23, *juvat in Capitis dolore*, v, 68.

Solvit oculorum dolorem, vj, 31; vij, 46.

Dysuriam, vj, 36.

Stranguriam, vij, 48.

Fluxiones, vj, 22,

Nocet gravidæ, v, 31.

VENTRICULUS.

Austus et Dolor, in feb. malus, iv, 65.

Cura, Purgatio, iv, 17.

Vulnus, lethale, vj, 18.

VENTUS.

Auster. Morbi, iij, 5, 17.

Progn. iij, 12, r3,

Boreas. Morbi, iij, 5, 17.

Progn. ij, 11, 12, 13, 14.

- VENTRIS** Mutatio.
 Vid. Alvi Mu-
 tatio.
 Partes. Vid. Pin-
 guis.
 Dolor. Vid. Do-
 lor.
 Calor. Vid. Calor.
 Ventris turbatio.
Solvit surditatem,
 iv, 60.
 Spontaneae progn.
 j. 2.
VER. Vid. in Tem-
 pestate.
VERATRUM vid.
 Elleborus.
VERMES et
VERRUCAE. Aetas
 iij, 26.
VERTICULUM.
Luxationis aetas,
 iij, 26.
VERTIGO.
Tempus, iij, 17,
 25.
Aetas, iij, 31.
Tenebricosa, ma-
la, viij, 15.
Cura, Purgatio,
 iv, 17.
VESICA.
- Laborantis sign.,*
 iv, 80; vij, 39.
Progn. in sene, vj,
 6.
Color juvat, v, 22.
Calculi aetas, iij,
 26.
Sign. iv, 79.
Vulnus lethale,
 vj, 18.
Ulceris sign. iv,
 75. 81.
Scabiei sign. iv, 77.
VIGILIAE. Vid. in
 Somno.
VIGOR. Vid. Morbi
 Vigor.
VINUM. Curat.
Θώρηξ fames, ij,
 21.
Ἀκρον oculorum
dolores, vj, 31;
 vij, 46.
Ἰσχυρὰς affectus
varios sedat, vij,
 56.
VISCERA, Dolor.
 Vid. Dolor.
VISUS.
Progn. in febr.
contin. iv, 49;
 vij, 73.

- Hebetis tempus,*
 iij, 5.
Aetas, iij, 31.
VITA.
A calore est, viij,
 18.
Brevis est, j, 1.
ULCUS.
Tempus, iij, 20.
 21.
Progn. vj, 4.
A pulsu, vj, 21.
A tumore, v, 65.
In hydrope, vj, 8.
Iuvat calor, v, 22.
Nocet frigus, v,
 20, 22.
Diurni progn.
 vj, 45.
Oris. Vid. Oris ul-
ceratio.
UMBILICUS.
Inflammationis.
aetas, iij, 24.
Doloris progn. iv,
 11.
UNGUES.
Nigrorum progn.
 viij, 12.
VOMITUS.
Tempus, iij, 21.
Aetas, iij, 24.
A tuberculo rupto,
 vij, 8.
Ubi opus, iv, 17,
 18; vij, 61.
Aestate convenit,
 iv, 4, 6.
Praeparatio, vij,
 70.
Progn. j, 23; vij,
 3.
Malus in Ileo, vij,
 10.
In Lienteria hye-
me, iv, 12.
Spontaneus Progn.
 j, 2.
Solvit diarrhoeam,
 vj, 15.
Sanguinis.
Progn. vij, 78.
A febr. vij, 37.
Malus, iv, 25.
Cura, vij, 37.
Solutio, per men-
strua, v, 32.
Bilis in Cerebro di-
viso, vj, 50.
Ab atra bile, le-
thalis, iv, 22.
URETHRA.
Tuberculi solutio
 iv, 82; vij, 57.

URINA.

Alba, pellucida,
mala, iv, 72.
Alba, multa crassa,
abscessu liberat, iv, 74.
Crassae, grumosa-
e, paucae,
Progn. iv, 69.
Multa, *noctu quid
notet*, iv, 83.
Solvit morbum, vij,
44.
Nubeculae *progn.*
iv, 71.
Sedimentum.
Progn. iv, 69.
*Biliosum, quid no-
tet*, vij, 32.
Divulsa *quid notet*,
vij, 33.
Turbata, *quid no-
tet*, iv, 70.
Foetida, *quid notet*,
iv, 81.
Bullarum, *progn.*
vij, 34.
Pinguedo, *quid
notet*, vij, 35.
Sanguis, *e renibus
aut vesica*, iv, 75.
E renibus, iv, 78,

E vesica, iv, 80,
81, vij, 39.
Sanguis et grumi,
quid notent, iv,
80; vij, 39.
Grumosa *progn.*
iv, 69.
Pus, *unde*, iv, 75,
81.
Carunculae, *et
Pili, unde*, iv, 76.
Farinam crassio-
rem *referentis
progn. in feb.*
vij, 31.
Furfures, *quid
notent*, iv, 77.
Squamae, *quid
notent*, iv, 81.
Arena calculi
sign. iv, 79.
Progn. in genere,
j, 12; vij, 66, 79.
In feb. contin. iv,
47; vij, 69.

UTERUS.

Temperies, *mode-
rata foecundita-
tis causa*, v, 62.
Calor juvat, v, 22.
*Os durum, clau-
sum est*, v, 54.

In gravida clausum est, v, 51.

Inflammati sign.
v, 58.

Suppurati Cura,
v, 47.

Erysipelas in gravida lethale, v,
43.

VULNUS.

Progn. a tumore,
v, 65.


Spasmus lethalis,
v, 2.


Atra bilis per alvum lethalis, iv,
23.


Non coalescens, vj,
19, 24; vij, 28.

Lethale, vj, 18.

Cerebri. Vid. Cerebrum.







O 1140

(uu)

ATTN



