

**Disputatio medica inauguralis, de cynanche maligna ... / eruditorum
examini subjicit Christopherus Cooper.**

Contributors

Cooper, Christopher.
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Glasguae : Typis Jacobi Mundell, 1799.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/nqrya47k>

Provider

Royal College of Surgeons


License and attribution


This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>





To Dr. Long Esq^r.
of the Royal
Society
from his obliged friend
the author.

DISPUTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

CYNANCHE MALIGNA.

DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS,

DE
CYNANCHE MALIGNA;

QUAM,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE DIGNISSIMI VICE-CANCELLARII
ARCHIBALDI DAVIDSON, S. S. T. P. P.,
ET COLLEGII GLASG. PRÆFECTI;

NEC NON,
AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,
ET
NOBILISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ DECRETO;
PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS RITE ET
LEGITIME CONSEQUENDIS,

IN COMITIIS UNIVERSITATIS GLASGUENSIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT
CHRISTOPHERUS COOPER,
ANGLUS,

SOC. REG. MED. EDIN. SOC. ORDINAR.

AD DIEM XXX. MARTII, HORA ET LOCO SOLITIS.

GLASGUÆ:
TYPIS JACOBI MUNDELL, ACADEMIÆ TYPOGRAPHI.

1799.

DISPUTATIO MEDICA

INAGURALIS

55.

СИАНЕИ МАЛЕНІА

ОДНОГОМІСНІ АНІМІ

І ПРОДУКТИВНОСТЬ ІНДІВІДУАЛЬНОГО

ЯКИХ ДІАГНОСТИЧНИХ СИГНАЛІВ

І ВІДНОСИТЬСЯ КІМСКОМУ СИГНАЛІВ

І ОДНОГОМІСНІХ СИГНАЛІВ

І ВІДНОСИТЬСЯ КІМСКОМУ СИГНАЛІВ

GULIELMO KINNARD

LONDINIENSI,

ARMIGERO,

PACI

IN

MIDDLESEXIA

PRÆFECTORUM

UNI,

PEREXIGUUM

AMICITIÆ ET OBSERVANTIÆ

TESTIMONIUM,

HANC

DISPUTATIONEM,

GRATO ANIMO,

D. D. CQUE

CHRISTOPHERUS COOPER.

CULTUS ROMANUS

DISPUTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

CYNANCHE MALIGNA.

CHRISTOPHERO COOPER, AUCTORE.

PROÆMIUM.

§ I. CONSIDERANTI, de qua re, summos medicinæ honores petiturus, scribat, multi fanè morbi sese offerunt. Horum verò nulli sunt, quos magis oportet medicinalium honorum ambitiosum scire et scriptis tractare, quàm ii, qui, tabo pestilente orti, contagione vulgantur; quippe enim cùm frequentes sunt, tum, quo-
ties graffantur, plurimos rapiunt.

A

II. Morbus, de quo scribere nobis in animo
est, nulli eorum, qui contagione serpunt, gra-
vitate signorum et periculo secundus est. Per-
fæpe enim, medicinâ parùm valente, ægros ab-
sumit: semper à medicis præsentaneum deside-
rat efficacissimumque auxilium.

DEFINITIO.

III. CULLENUS ex ingenio clarus, quiue cæteris, qui in classes, ordines, et genera, morbos disposuerunt, palmam præripuit, *cynanchon malignam* optimè definivit. Quocirca, ad rem nostram satè erit ipsius verba citare.

“ *Cynanche tonsillas et membranam faucium mucosam afficiens tumore, rubore, et crustis mucosis, coloris albescens vel cineritii, serpentibus, et ulceris tegentibus ; cum febre typhode et exanthematis.*”

HISTORIA MORBI.

IV. IN australibus EUROPÆ partibus, *cynanche maligna*, anno hominum generis salutis millesimo sexcentesimo decimo, nota est; at maximè NEAPOLI, ubi, sicuti literis proditum est, vinti amplius annos graffata est.

V. Verùm non, ante annum, post CHRISTUM natum, millesimum septingentesimum quadragesimum octavum, in ANGLIA apparuit. Tunc verò temporis, adeò gravis erat et lethalis, ut in eam summam curam intenderent medici præclari haud pauci, præcipuè FOTHERGILIUS, qui, quantùm scimus, omnium nostratum primus accuratè descripsit.

VI. *Cynanche maligna* plerumque autumno primâve hieme invadit; præcipuè, si præterita æstas solito calidior fuerit.

VII. Infantes et impuberes, præ adultis, morbo, quem persequimur, opportuni sunt; puellæ, ut observârunt medici, præ pueris.

VIII. Quanquam nulli sunt hominum, qualis cunque iis corporis constitutio sit, quin hoc morbo corripiantur, dummodo tabo, quo concitatur, impleti sint; ii tamen, qui prægressis morbis, aliisve caufis, multùm debilitati sint, apti, præ cæteris, sunt, quos adoriatur.

IX. *Cynanche maligna* à vertigine incipit, et à horroribus, quos, haud multò post, calores excipiunt. Postea verò quām æger aliquandiu inhorruit vicissimque incaluit, calore intenso neque intermittente æstuat.

X. Simul atque eò per ventum fit, caput vehementissimè dolet: collum, contra confuetudinem, riget: sensus molestus in faucibus est: nauseat, haud rarò etiam contenta evomit, ven-

triculus; interdum etiam fluit alvus: inflammantur oculi et illachrymant.

XI. Internæ fauces introspicienti tumidæ apparent, et igneo rubore. At tumor tamen haud ita magnus est; nedum multùm impedit, quò minùs æger cùm cibos satis commodè devoret, tum spiritum hauriat et emittat. Haud multò pòst, maculæ plurimæ albescentes vel cinereæ in faucibus observantur; quæ membranâ, qua insident, vix eminentiores sunt, at singulæ circumfiniuntur interstitiis, quæ, pro morbi gravitate, colore variant à rubicundo ad subnigrum nigricantemve. Hæ maculæ magis latefcunt magisque, atque, quoties crustæ, quæ eas formant, resolvuntur et decidunt, ulcera conspi ciuntur.

XII. Humor acris et fœtidus naribus effunditur, qui non has modò ipsas exedit, sed labia quoque; neque profectò vero absimile est,

hunc humorem in stomachum et intestina de-
voratum, vomitum movere et diarrhoeam.

xiii. Febris interea continuat: pulsus arte-
riarum parvus est, frequens et inæqualis: æger
ægrè fert morbum; simulque anxius est, et
ad animi deliquium proclivis. Posteriora hæc
signa, vesperascente die, ingravescunt; neque
priùs levantur, quàm matutino somno brevi et
inquieto sudor in summo corpore oritur, et ali-
quantùm remittit febris.

xiv. Præ debilitate totius corporis, *animales*
quæ nominantur *functiones*, imbecillæ sunt.
Nonnunquam delirant ægri; nonnunquam so-
pore opprimuntur.

xv. Secundo ferè morbi die, facies, collum,
et pectus efflorescunt papulis, et nonnihil tu-
ment. Hæ papulæ interdum exiguæ et discre-
tæ sunt, sed plerumque confertæ, rubræ et con-

fluentes. Manus haud raro rubent usque ad digitorum summitates.

xvi. Papulæ neque certo tempore apparent, neque ad certum tempus perstant. Plerumque verò, quatuor ferè diebus, resolvuntur à cuticula, et squamatim decidunt. At neque papulis erumpentibus neque evanescentibus remittit semper morbus. Contrà, delirium cæteraque periculosa signa singulis sæpe horis ingravescunt, atque æger, quarto quintove morbi die, plerumque ante septimum, moritur.

xvii. Morbi mitioris, qualis mortem non denunciat, signa, quæ spem injiciunt aut securitatem pollicentur, tertio, quarto, quintove die sese ostendunt. Papulis evanescentibus, calor summæ cutis minuitur; pulsus ex celerrimo tardior fit; ulcera faucium internarum paulatim fanefcunt; atque, somno naturali et appetitu reduntibus, æger tandem ad salutem reddit.

DIAGNOSIS.

xviii. SOLI morbi, inter quos et *cynanche malignam* tanta signorum communitas est, quanta errorem creare possit, sunt *cynanche tonsillaris* et *scarlatina anginosa*. Quibus itaque notis hi morbi ab illo dignoscantur, hic loci paucis dicendum est.

xix. *Cynanche tonsillaris*—robustos et validos adoritur; eique tam impuberes quam adulti, tam mares quam foeminæ, opportuni sunt. Contrà, *cynanche maligna* infantes et pueros, potius quam puberes, invadit; foeminas, quam mares; atque naturâ imbecillos, et morbis debilitatos, quam constitutione corporis firmos, et prosperâ valetudine gaudentes.

xx. Quinetiam, *cynanche maligna* pestilens est, atque autumno præcipue et hieme graffatur.

Cynanche tonsillaris nunquam contagione vulgaratur, atque verno potissimum tempore fauces inflammatione afficit. Ille morborum pulsu arteriarum celeri, imbecillo et inaequali cognoscitur; hic, frequente, valido et duro. Ille duntaxat levem faucium dolorem movet; hic, contraria, gravissimum. Denique, nausea, vomitus, diarrhoea, ulcera faucium foetida, magna debilitas, perpetua anxietas et praecordiorum gravitas, delirium, et hebetes oculi, plus fatis ostendunt, ægrum *cynanche maligna* laborare.

xxi. *Scarlatinam anginosam*—à *cynanche maligna* distinguere, haud æquè facile est. Nullam inter eas differentiam, seu dissimilitudinem, esse, qua clarè dignoscantur, mihi videtur. Genere convenire, gradu differre, adductus propterea sum, ut credam, quod, ut saepe vidi, ex eodem tabo pestilente enascuntur.

xxii. Ejusdem generis varietates esse, opinantur multi auctores, clari in primis; præci-

puè WITHERINGIUS, qui in *scarlatinam anginosam*, summam diu curam intendit, eandemque accuratè et luculenter descripsit. Diu existimavit, *cynanchen malignam* et *scarlatinam anginosam* diversos genere esse morbos; sed longâ obseruatione et experientiâ inductus est, ut in contrariam iret opinionem. In re verò tantâ ipsius verba ponam.

xxiii. " Since the year 1778, an epidemic
" has frequently presented itself to my observa-
" tion, both in the town of BIRMINGHAM and
" its neighbourhood, as well as in several parts
" of the surrounding counties. From the most
" assiduous attention to the subject, ever since
" that time; from observing it, in every differ-
" ence of season, exposure, age, and tempera-
" ment; I am now persuaded, that the *scarlati-*
" *na anginosa* and the *angina gangrænosa* consti-
" tute but one species of disease; that they
" owe their existence to the same specific con-
" tagion; that the varieties, in their appear-

" ance, depend upon contingent circumstances ;
 " and that the greatest differences are not
 " greater than those of the distinct and con-
 " fluent small pox *."'

xxiv. Si omnia adducerem argumenta, quibus confirmaretur hæc (xxiii.) opinio, non solum tempus inutiliter consumerem ; sed etiam declinarem à proposito, atque fines hujusmodi disputationi concessos transgrederer. Nullâ igitur morâ, ad causas transfibo, ex quibus oritur morbus, quem persequor.

* Vid. WITHERING. *On Scarlet Fever and Sore Throat*, p. 8.

CAUSÆ REMOTÆ.

xxv. Hujus generis caufarum aliæ huma-
num corpus morbo opportunum faciunt, aliæ in
opportuno corpore morbum excitant. Illæ,
medicorum linguâ, *prædisponentes* nominantur;
hæ, *excitantes*. De utrisque ordine pauca di-
cenda sunt.

xxvi. *PRÆDISPONENTES*.—Ad caufas, quæ
nostra corpora in *cynanchen malignam* proclivia
reddunt, pertinet laxitas fibrarum, ex quibus
musculi constituuntur. Hinc patet ratio, quare
infantes, præ adultis, hic morbus adoriatur;
quare fœminas naturâ et sedentariâ vitâ delica-
tas et laxas, præ maribus robustis, laboriosis, et
musculis firmioribus: etenim corpora, uti ob-
servârunt medici, utcunque laxata, cæteris apti-
ora existunt, quæ periculoſo hoc morbo corri-
piantur.

xxvii. Eodem item genere comprehenditur debilitas. Effici autem hæc potest plurimis caufis, veluti fatigatione qualibet; diætâ tenui et parcâ; magnis profluviis seu sanguinis, seu alvi, seu mensium; animo seu timore, seu mœrore, seu aliâ qualibet ægritudine demisso; frigore et humore corpori diu admotis; ebriositate; et mulierositate: quæ sanè omnia, ut fatis supèrque constat, corpora hominum debilitando morbis pestilentibus opportuniora redundunt.

xxviii. *EXCITANTES.*—Ad hoc caufarum genus pertinet paludum anhelitus. Multi enim maligni morbi palustrium locorum exhalationibus enascuntur; præcipuè, si æstuante sole harum vis intendatur.

xxix. Quàm insalubres fint vapores paludum et palustrium locorum, EUROPEI, qui in BATAVIA INDIAE ORIENTALIS peregrinantur, nimis cognoscunt. Fortes ibi viri plurimi, æ-

tate florentes, quotannis humidi cœli gravitate pereunt; atque, uti semel observavi, morborum, quibus absumuntur, unus *cynanche maligna* est.

xxx. Ejusdem (xxviii.) generis sunt vapores, quos exhalant putrefcentia, seu excrementa cadaverave animalium, sive emortua ea quæ terrâ nascuntur. Hanc ob rem, carceres, naves, valetudinaria, castra, ubi magna vis hominum in arctum spatiū congregatur, hujus pestis fœcunda sunt; maximè, si idonea simul vestitus et munditiæ ratio non habeatur.

xxxI. Ortum pestilens his (xxviii.—xxx.) parentibus tabum, *cynanchen malignam* generat; lethalem sanè morbum, qui, primùm ut generatus, ministeriis in vicem, et contactu longè latèque graffatur.

CAUSA PROXIMA.

xxxii. NUNC inter omnes ferme auctores
convenit, proximam *cynanches malignæ* causam
esse tabum pestilens sui generis, quod aliquo
corpus modo penetravit.

xxxiii. "Causa," ait HOMIUS, "proxima
" hujus morbi est *miasma* quoddam sui generis
" corpori ab aëre vel corporibus antea affectis
" communicatum. Frequens morbi ad astan-
" tes et totam familiam, per spiritum vel fa-
" niem ore rejectam, transmissio, morbum con-
" tagiosum demonstrat."

xxxiv. At qua tamen naturâ sit hoc (xxxii.)
tabum, et quemadmodum in corporibus huma-
nis, quæ penetraverit, signa fibi propria con-
cit, prorsùs ignoratur, et diu forsitan igno-
rabitur. De re igitur ignota, filere satius vide-
tur, quam inania et fortasse falsa dicere.

PROGNOSIS.

xxxv. Quum, uti medici comperti sunt, *cynanche maligna* tam saepe in gangrenam transfeat, aut diarrhoea ægri vires exhauriat; æger multum periclitatur, præcipue si medicum non tempestivè advocaverit.

xxxvi. Ubi nausea, vomitus et purgatio vehementer urgent, ægrotus brevi plurimum debilitatur, neque cætera mala, quæ parit morbus, ferre potest. Mali igitur morbi testimonium est, si, unà cum his, febris nihil remittit. Neque verò bonum signum est, caput atque dorsum graviter dolere, simulque ægrum mente alienari. In summo periculo versatur, cui in fauibus ulcera livecunt aut nigricant; cui summa cutis inardescit; cujus ex ore halitus admodum fœtet; cuique lingua nigrâ crustâ ob-

tegitur. Denique, servari vix potest is, cuius ex naribus sanguis subinde profluit.

xxxvii. Contrà, scire licet, ægrum non periclitari, si ulcera rubescunt; si vomitus et diarrhœa vel non omnino, vel paulisper tantùm, urgent; si ægro mens constat, oculique, sicut fani, nitent; si, post papulas ortas, signa aliquantùm remittunt, et adhuc magis, quo tempore hæ à cute resolutæ squamatim decidunt.

xxxviii. Medicorum interest animadvertere, qualis tempestas fit; quid anni tempus; qualis ægri corporis habitus: sine enim horum notitia, non facilè quicquam in futurum præfagire poterunt.

xxxix. Verùm, etiam his (xxxvii. et xxxviii.) cognitis, caveant medici, ne, de *cynanches malignæ* eventu, quid temerè vel inconsideratè prædicant: nam fallax adeò morbus est, ut haud raro lætam salutis spem, quam injecerint, brevi vanam et irritam faciat.

CURATIO.

XL. NUNC ad longè utilissimam rei nostræ partem transeundum est; in qua quām paucifimis dicendum, qua ratione morbus periculosus, quem persequimur, ad sanitatem perducatur.

XLI. Hunc in finem, medici alia atque alia medicamenta experti sunt, pro opinione, quam de morbi natura tenuerunt. De horum præcipuis, pauca dicemus.

XLII. *SANGUINIS MISSIO.*—Medici olim, præfertim HISPANICI et ITALICI, præcipere, ut, ineunte *cynanche malignā*, mitteretur ex ægro sanguis, solebant. Atque, quum, apud medicos aliorum vestigiis inhærentes, potius quām rationi insistentes, diu morbi cognitio extra artem, medicina intra usum esset, mos sanguinem,

initio hujus morbi, incisâ venâ, mittendi, usque ad FOTHERGILII tempus inveteravit.

XLIII. Hic verò medicus, ex doctrina et ingenio clarus in primis, naturâ *cynanches malignæ* melius cognitâ atque intellectâ, non tanti putavit auctores, quanti ægros ; ideoque missione sanguinis, quæ, sicuti periculo compertus est, non modò non prodest, sed ægrum ferè jugulat, vehementer improbavit. Sed in re tanta auctorem ipsum pro me ponam,

XLIV. 1. " Bleeding in this disease, has, in general, been observed to be prejudicial : some indeed admit of it, at the first attack, without any sensible inconvenience ; but a repetition of it, even when the disease is mild and favourable, seldom fails to aggravate the symptoms, and in some cases it appears to have produced very fatal consequences.

2. " The heat, restlessness, delirium, and

“ difficulty of breathing, which this evacuation
“ commonly prevents or mitigates in other
“ cases, in this are increased by it, nor does
“ the swelling of the tonsils, fauces, &c. seem
“ to receive the least benefit from it; on the
“ contrary, though the fullness of these parts
“ decreases, yet the sloughs thicken, or change
“ to a livid or black colour, the external tu-
“ mor grows large, and the spitting continually
“ diminishes.”

3. In subnexus adjicit “ the heat, indeed, and
“ quicknes of the pulse, seem, at first, to be
“ affected by this evacuation; but they com-
“ monly return, after a fallacious respite, with
“ greater violence. The patient is seized with
“ difficulty of breathing, falls into cold sweats
“ and stupor, and dies suddenly *.”

XLV. FOTHERGILIO, hac de re, accedit

* Vid, FOTHERGIL. *On the Ulcerous Sore Throat.*

HUXHAMUS, auctor gravissimus, qui *cynanchen malignam* accuratè descripsit. Opinionem horum medicorum recentiores auctores confirmant; atque, nostris temporibus, sanguinem ex iis hoc morbo correptis mittendi usus, ex toto, exolevit.

XLVI. Namque, etiam si initio fauces inflammatione afficiantur, tamen, modò ex cæteris signis sit, quamobrem *cynanche malignâ* ægrum corripi suspicemur, satius erit permittere, ut inflammatio in suppurationem transeat, quàm sanguinem detrahendo vires dissipare, usque eò forsitan, ut æger vim reliqui morbi ferre nequeat; id sanè, quod cautissimè vitandum est.

XLVII. PURGATIO—vix minùs iis, qui *cynanche malignâ* laborant, nociva est, quàm missio sanguinis. Hujus morbi ratio tantùm postulat, ut alvus leniter solvatur; id, quod tutò fieri potest esculentis laxantibus, fructibus maturis,

aut emollientibus lenioribus ex inferiore parte infusis.

XLVIII. *VOMITIO*,—ineunte *cynanche malignā*, ægris haud parūm prodest; non solūm ventriculum sordibus liberando, sed etiam eas fau- cium partes detergendo quæ gargarizari ne- queunt.

XLIX. Quæ, hunc in (xlviii.) finem, vomitoria ab ægro assumenta sint, ex cognita morbi ratione judicandum est, et viribus, quæ ægro supersint. Plerumque tamen *ippecacuanæ* pri- mas concedunt medici, quia alvum minūs af- ficit, quām præparata vomitoria ex *antimonio*.

L. *EXULCERATIO*—externarum faucium, *cy- nanche malignā* laborantibus, initio, multūm o- pitulatur. Quinetiam, exulceratoria, ventriculi regioni imposita, haud rarò fistunt vomitum, quem alia medicamenta sedare nequîrunt.

LI. *ACIDA*,—vegetabilia seu mineralia, illa
verò præcipue, morbo, de quo disputatur, im-
plicitis non solùm grata in primis sunt, sed etiam
multùm proficiunt. Si verò, uti interdum,
alvum moveant, protinus intermittenda sunt.

LII. *GARGARIZATIONES*.—Maxima interea o-
ris et faucium cura habenda est, ne fordibus
turpiter squalent. Hoc consilio, gargarizanda
subinde sunt medicamentis, ex iis quæ putre-
dini obstant. Infantum, qui ipsi gargariza-
tione uti nequeunt, ora et fauces chirurgus
aut assidentes, ejusdemmodi medicamentis, cly-
steris ope immisis, gargarizare possunt.

LIII. Varia, quibus gargarizentur fauces, me-
dici experti sunt. Aqua verò, qua maceratæ
rosæ sint, aut aqua cocta ex *cinchonæ* cortice,
quam gratè acidulam additum *acidum sulphu-*
ricum reddiderit, cæteris fortasse anteponenda
est.

LIV. *CINCHONÆ CORTEX*.—Cæteris verò medicamentis, quibus *cynanche malignæ* subveniatur, primas *cinchonæ* cortici deferunt medici; qui, uti monet CULLENUS, ab initio morbi, usque ad finem, ægris parcâ haud manu porrigi debet. Quam optimè hoc medicamentum morbo conveniat, docet quotidiana medicorum experientia.

LV. Hujus corticis pulvis, dummodo ventriculo idoneus sit, præparatis ex eo anteferendus est. Si, quod interdum accidit, alvi profluviū movet, singulis dosibus paucas *tincturæ opii* guttulas addere oportet. Accidit interdum, ut infantes hoc medicamentū nequeant vel nolint assumere. Tunc ejusdem copia, à duabus drachmis ad semunciam, in alvum subter dari debet.

LVI. *VINUM*—medicamentorum, quæ *cardiacæ* nominantur, iis, qui *cynanche maligna* laborant, longè optimum est et jucundissimum.

Vel adhibeatur unà cum *cinchonæ* cortice, vel temperatum aquâ et faccharo in potum grātissimum, quem nostrates *negum* nominant. Quantum vini assumendum sit, judicabit medicus, considerando quæ sit ægroti ætas, et animadvertisendo ex illo, necne, commodum hic accipiat.

LVII. Vinum eâ copiâ assūptum, quam morbi ratiō requirat, ægris plērumque multimodis opitulatur. Namque delirium sedat; pulsus arteriarum tardiores, at validiores, reddit; calorem cutis minuit, et lenem haud rarò elicit sudorem; atque, mirum in modum, anxietatem et præcordiorum gravitatem levat, somnumque conciliat.

LVIII. *OPIUM*,—ad alvi profluviū, quo ægri vires sæpe admodum dissipantur, inhibendum plurimū pollet. Ni hoc profluviū opportunè fistatur, vel faltem tardetur, brevi ægrum in extreūm discrimen adducit. Ad

continendam quoque alvum, si quando nimis
fluit, vinum, in quo coctum cinnamomum sit,
efficacissimum est.

LIX. Simul ut *cynanche maligna* invasit, æger
in lectum se recipere debet; atque, si, post af-
sumptum vomitorium, nausea et vomitus justo
diutius vexant, ferme sedari possunt *citrata po-*
tassæ effervescente, cui viginti quinque seu tri-
ginta *tincturæ opii* guttulæ additæ sunt.

LX. *MUNDITIA.*—Maximi momenti est, cu-
biculum, ubi æger lecto tenetur, quām maxi-
mè purificare, et aëra in id per fenestras aper-
tas subinde intromittere; simulque ægrum ip-
sum stragulis non opprimere. Quantūm hoc
morbo ægris munditiæ ratio constans proficiat,
ipse, duos abhinc annos, compertus sum. Res,
utì erant, breviter narrabo.

LXI. 1. Puella decennis haud obscuro loco
nata, quæ maximâ vi *cynanches malignæ* labora-

bat, ad sanitatem perducta est multo usu *cinchonæ* corticis, et *vini rubri Lusitanii*. Præterea verò aëri frigido exposita est, atque spongiâ succidâ mixtis aquâ et aceto subinde extersa ; quibus minuebantur delirium et cutis calor, quæ utraque eam admodum vexabant.

2. Inductus sum, ut hanc (lxi. 1.) curationem experirer, magno levamine, quod accepit ex aqua frigida, quam ei roganti ut biberet permisum est.

3. Hæc ægra magnam vim humoris purulenti et acerrimi profudit ex naribus et auribus ; et, quod mirum, etiam si se cæteroquin confirmaverit, hactenus tamen surda est.

LXII. Lintea ægrorum vestimenta frequenter novanda sunt, et omnia excrementa quam primum ex cubiculo submoyenda. Lecto quoque, quo affiguntur, acetum aspergere utilissimum erit, et haud scio annon etiam cubiculum, modo

quem proposuit CARMICHAEL SMITHIUS, non-punquam fumigare.

LXXXIII. Haud rarò accidit, ut ii, qui hoc morbo defuncti sunt, tardissimè pristinum vigorem recuperent. Quò igitur citius confirmantur, debent cœlum aliquandiu mutare; se quotidie sub Jove sicco et puro leniter exercitare; diætâ nutriende, et concoctu facili vivere; et, quoties opus videatur, *cinchonæ* cortice et modico vini psu sibi indulgere.

FINIS.

ERRATUM.

Pag. 11. lin. 9. pro an lege our.

MUTA
MUTA

muta muta

