Die anorganischen Bestandtheile der Leber und Milz und der meisten anderen thierischen Drüsen: ein Beitrag zum physiologischen Zusammenhang zwischen Leben und Leiche: von der Universität Würzburg gekrönte Preisschrift / von Heinrich Oidtmann; mit einem Vorwort von Dr. Scherer.

Contributors

Oidtmann, Heinrich.
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Linnich: C. Quos, 1858.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/hcb9anzm

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. Where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org Die anorganischen Bestandtheile

der

LEBER UND MILZ

und

ler meisten anderen thierischen Drüsen.

Ein Beitrag

am physiologischen Zusammenhang zwischen Leben und Leiche.

Von der Universität Würzburg

gekrönte Preisschrift

von

Br. Heinrich Oidtmann.

Mit einem Vorwort

von

Dr. Scherer,

nigl. Bayer. ord. Professor der Chemie und Physiologie an der Universität Würzburg.

LINNICH 1858.

Druck und Verlag von C. Quos.

Die anorganischen Bestandtheile

LEBER UND MILZ

!rutsmirqmI schen Drüsen.

Dr. Rienecker,

h. t. decanus.

odsie Wirceburgi, 15. Juli 1858.

You day Universitie W agaburg

newlion al

gekräule Preisschrift

Motto: "— keine Vernichtung in der Natur: wir su und finden die Trümmer verwitterter Fels den rauebenden Ruinen des organischen Leb

MORAL CHARGE POLY

Br. Reherer,

CHANCH 1858.

franck and Verlag sen C. Owns.

Seinem

Königl. Bayrischen Regierungsrath. Herrn

verehrtesten Lehrer und Gönner, Herrn

Prof. Dr. SCHERER

Dem

Königl. Bayrischen Regierungsrath, Herrn

HENNER HENRY HERE

aus Hochachtung und Dankbarkeit gewidmet

von dem

Vorrede.

his auf die Art der Herrenaung der Resultates so genaus

Wie der Pflanzen- so ist auch der Thierorganismus der Qualität und Quantität nach an eine Reihe anorganischer, sogenannter Mineralstoffe gebunden, bei deren Fehlen er sich nicht entwickeln kann, deren etwaiges Uebermaass er entweder nicht aufnimmt, oder möglichst bald wieder ausscheidet. Die chemischen Untersuchungen der letzten zehn Jahre haben hierüber theilweise sehr merkwürdige Aufschlüsse geliefert und nachgewiesen, dass insbesondere gewisse Gewebe und Flüssigkeiten bezüglich des Vorkommens von Kali- und Natron-Verbindungen, von Chlormetallen und phosphorsauren Alkalien ganz bestimmte Verhältnisse darbieten. Als den organisch-chemischen Bestandtheilen der drüsigen Organe erst in der jüngsten Zeit mehr Aufmerksamkeit zugewendet wurde, musste sich bald auch das Bedürfniss rege machen, genauere Kenntniss von den anorganischen Bestandtheilen derselben sowohl in qualitativer als quantitativer Beziehung zu erhalten. Diese in der physiologischen Chemie vorhandene Lücke war es, die die medizinische Fakultät der Würzburger Universität veranlasste, für das Jahr 18⁵⁵/₅₆ eine Preisaufgabe aufzustellen, die von dem Verfasser dieser Schrift zu lösen unternommen wurde, welche Arbeit nach dem Urtheile dieser Fakultät auch als des Preises würdig erkannt worden ist.

Da der Verfasser die für diese Bearbeitung nöthigen chemischen Arbeiten fast sämmtlich in dem unter meiner Leitung stehenden Universitäts-Laboratorium ausgeführt hat, und ich daher den Fleiss und die Sorgfalt, welche derselbe dieser Arbeit widmete, täglich zu verfolgen Gelegenheit hatte, so entspreche ich um so lieber dem Wunsche desselben, diese Arbeit mit einem kleinen Vorworte zu begleiten.

Die angewendeten Methoden der Analyse sind sogar bis auf die Art der Berechnung der Resultate, so genau und deutlich von dem Verfasser beschrieben, dass vielleicht dieser Theil der Schrift manchem, der mit derartigen Versuchen sich zu beschäftigen anfängt, als ein nützlicher Leitfaden dienen kann. Jeder, der den Werth genauer Analysen für die Wissenschaft zu würdigen, aber auch die Zeit und Geduld, welche solche Arbeiten erheischen, zu beurtheilen weiss, wird es dem Verfasser Dank wissen mit solcher Ausdauer diese Arbeit durchgeführt zu haben. Dass auch hier noch Manches zu ergänzen und weiter zu verfolgen übrig bleiben musste, versteht sich von selbst. es ja doch eines der allgemeinsten Resultate wissenschaftlicher Untersuchungen, dass sich an die erfolgte Lösung und Beantwortung einer an die Natur gerichteten Frage stets wieder neue zu stellende Fragen anknüpfen, und dass ein Ende der Forschung gar nicht abzusehen ist.

Würzburg, im April 1858.

-vily rob at secial actifacto as Prof. Dr. Scherer.

Vorrede des Verfassers.

Durch die Analyse im weitesten Sinne des Wortes charakterisirt sich die Richtung der naturforschenden Wissenschaft unseres Jahrhunderts. Von der Isolirung der organischen Zellenkerne bei der embryonalen Entwicklung dieser Organisationskeime bis herab zur Elementaranalyse der pflanzlichen wie thierischen Leichentheile fusst heut zu Tage alle Diagnostik physiologischer und pathologischer Vorgänge auf Analyse. Während die graue Vorzeit die Asche ihrer Generationen in geheiligte Urnen füllte und in gewisser Scheu und Ehrfurcht mit Thränen netzte; während die christliche Religion ihr gläubiges Requiescat über die modernden Gebeine der Verstorbenen ruft und die Profanation des geweihten Leichenfeldes verpönt; trägt die fortschreitende Wissenschaft des neunzehnten Jahrhunderts keinen Augenblick Bedenken, die Vogelscheuche der Friedhöfe zu ignoriren und gleichsam die Deckel der Aschenkrüge zu lüften, vor denen die Alten nur trostlos zu jammern wussten; und vor ihrer entlarvenden Hand sind selbst die modernden Leichenreste in den Todtengrüften nicht mehr sicher. Dieses unbegrenzte rücksichtlose Forschen lehrt uns der Kreislauf des Naturlebens: aus dem sogen. Todtenreiche der Pflanzen- wie der Thierwelt müssen das Leben

und seine Gesetze in ununterbrochener Reihenfolge nicht nur wieder erzeugt, gleichsam umgeschaffen, sondern auch von der Wissenschaft im Interesse der Wissenschaft und des Lebens erkannt und studirt werden. — Möge vorliegendes Werkchen dazu beitragen, das sich in neuester Zeit in der jüngeren medizinischen resp. naturforschenden Welt so auffallend kundgebende Streben nach dieser Richtung der physiologischen Studien in etwa zu fördern und zur Erforschung von Thatsachen anzueifern, die eingreifendere und werthvollere physiologische Rückschlüsse auf die Lebensvorgänge erlauben, als es die vorliegenden beschränkten Untersuchungsresulte meiner Aschenanalysen vermochten.

tes

AT

m

T

日 5 日

charakterisitt sich alle Hightung der naturforschenden Wissenschaft ensores Ashrimaderis. Von der Isolieung der or-

dieser Organisationskelme bis harab zur Elementaranalyse

Tage alle Diagnestik ophysiologischen und pathologischer

Vorginge and Applyse. Withrend the grant vorsell did

contract School and Bindurcht mit Thiskon netzie; wäh-

rend die christliche Religion ibr gläubiges Requiescat über, die nodernden Sebeine der Verstorhenen zuft und die Pro-

famation des geweillten Leichenfeldes verpünte trügt die

fortschreilende Wissenschaft des neunzehnien annraquierts

hope an ignorisen and gleichenn die Dockel der Aschenkräge

yn litten, vor denen die Alten nur troetlos au jammern

modernden Leichenreste in den Todtengrüften nicht mehr

sieber. Dieses nebegrenzte rijeksichtlose i erschen tehrt aus

reiche der Pflanzen- wie der Thierwelt müssen das Leben

Die chemische Untersuchung der Organe und desjenigen Materials, welches als Substrat der Lebensprozesse die höchste Aufmerksamkeit des Naturforschers und Arztes auf sich ziehen muss, sind zwar erst seit verhältnissmässig kurzer Zeit betrieben worden; dennoch haben dieselben so riesige Fortschritte gemacht und eine Reihe so glänzender Resultate für die Kenntniss der organischen Verrichtungen geliefert, dass diese Art von Forschungen sich vollkommen in der medizinischen Wissenschaft eingebürgert hat und nicht wenige Coryphäen der neueren Medizin zu ihren genialen Vertretern zählt. Eine grosse Reihe neuer organischen Körper sind dadurch bekannt geworden, und der Stoffwechsel, als hauptsächlichster Vorgang für die individuelle Erhaltung hat dadurch eine vorher nie bekannte Beleuchtung erhalten.

Mit je grösserem Eifer sich nun die bedeutendsten Kräfte auf das Studium des organischen Materials und der aus ihm hervorgehenden Abnutzungsstoffe warfen, um so mehr wurden eigentlich die mineralischen Bestandtheile der Organismen in neuester Zeit vernachlässigt und als untergeordnet betrachtet. Nichts desto weniger wurde immer von Zeit zu Zeit von einzelnen Forschern auch auf die Wichtigkeit der unorganischen Substanzen in dieser Beziehung aufmerksam gemacht (Clamer, Lotze, Beneke, Gorup-Besanez). Einzelne Spezialuntersuchungen haben nun auch bereits die hohe Wichtigkeit, gewisser Mineralstoffe dargethan (Scherer, Beneke) oder interessante Wechselbeziehungen zwischen bestimmten unorganischen Substanzen nachgewiesen (Schmidt Kali und Natron-Serum und Blutkörperchen). Zudem kommt noch, dass das normale Vorkommen gewisser Körper z. B. gewisser Schwermetalle, wie Kupfer, Mangan, Blei, Arsen, immer noch nicht hinreichend festgestellt ist, um sie physiologisch oder selbst gerichtlich-medizinisch

zu verwerthen und endlich die in der Pathologie eine so grosse Rolle spielende Ablagerung mineralischer Körper in einzelnen Organen und Organsystemen, welche ebenfalls so lange nicht vollständig verstanden werden können, bis das Studium der physiologischen Vorkommnisse die nöthigen Vorarbeiten hiezu geliefert hat.

Aus diesem Gesichtspunkte ohne Zweifel hat die hiesige medizinische Fakultät sich bewogen gefunden, als Preis-Aufgabe für das Jahr 1856

- 1) eine genaue Bestimmung der anorganischen Bestandtheile in den wichtigsten Drüsen des Thierkörpers überhaupt;
- 2) wo möglich eine genaue quantitative Angabe der in der Mils und Leber vorhandenen einselnen anorganischen Stoffe

aufzustellen.

Soviel meine Kräfte und die verwendbare Zeit es erlaubten, habe ich die gestellte Doppeltaufgabe möglichst gedrängt zu lösen, und in vorliegender Schrift die Lösung derselben niederzulegen versucht. Bei der Beurtheilung dieser meiner Arbeit bitte ich zu berücksichtigen, dass bei der Kürze der Zeit es unmöglich in der Absicht der medizinischen Fakultät liegen konnte in der obigen Preisfrage das Resultat eines umfassenden comparativ statistischen Zahlentabellariums zu stellen, und ich daher manche Thierklasse leider ganz übergehen musste, andre nur annäherungsweise analysirte.

M

530

tu

Wenn oben behauptet worden ist, dass in den bisherigen chemischen Untersuchungen der Organismen das unorganische Material zu oberflächlich behandelt worden sei, so findet dieser Satz schon in der Thatsache seine Begründung, dass dasselbe meist nur in Totalität als "Asche im Allgemeinen" oder als "feuerfeste Bestandtheile" aufgeführt wurde. Wer in den chemischen Laboratorien den alltäglichen Gang der zoochemischen Analyse zu verfolgen Gelegenheit oder wohl selbst gar die chemisch physiologische Praxis in die Hand genommen hat, der wird nicht in Abrede stellen, dass sicherlich die Majorität der Forscher, gelockt durch die reichlichen Entdeckungen, welche die strebsame Neuzeit aus dem ergiebigen Terrain der organischen Chemie zu Tage gefördert, sowie durch den unbegrenzten Spielraum für weitere wissenschaftliche Materialent-

larvungen, Combinationen und Hypothesen sich einer einseitigen Neigung zu ergeben pflegt, ausschliesslich die organischen Thierstoffe auf ihre engere Zusammensetzung und physiologische Bedeutung zu untersuchen; während andererseits der Chemicophysiologe, abgeschreckt durch die freilich oft absolute Unzuverlässigkeit seiner gewonnenen Thatsachen häufig die in den Organismen vorkommenden anorganischen Salze gleichsam als Schlake von den verwertheten organischen Bestandtheilen abschlemmt und in wohlverschlossenen Gläschen zur »spätern Spezialanalyse« reservirt, welche jedoch selten realisirt, vielmehr in der Regel einer freiwilligen Vergessenheit preisgegeben wird. Wohl hat allerdings die Experimentalchemie aus den anorganischen Antheilen des animalischen Körpers bisher nur kärgliche Resultate zur Ausfüllung der Systemlücken für Physiologie und Pathologie eruiren können; doch berechtigt dieses noch keineswegs zu dem Vorurtheile die anorganischen Salze ignoriren, oder sie gar positiv mit einer Art ketzerischer Intoleranz von dem zu untersuchenden thierischen Materialchaos ausschliessen zu dürfen. Es darf uns daher gewiss nicht auffallend erscheinen, wenn in jüngster Zeit hervorragende Celebritäten der chemischen Wissenschaft, aufmerksam auf die schon erwähnten in der Zoochemie vorherrschenden einseitigen Ueberstürzungen, die jüngeren Kräfte zur Uebernahme des bisher vernachlässigten anorganischen Materials anzuspornen suchen; und dieser berechnenden Einsicht allein verdanken wir die dahin zweckende parallele Richtung, welche die medizinischen Preisfragen der münchener wie der würzburger Universität gleichzeitig erhalten haben.*) Um einen Massstab zur vergleichenden Berechnung aufzu-

Um einen Massstab zur vergleichenden Berechnung aufzustellen, wird ein einleitender Blick auf die Litteratur der zoochemischen Mineralanalyse überhaupt gerechtfertigt sein. Nur wenige Organsysteme, darunter aber besonders diejenigen, welche sich durch einen eminenten Gehalt an Mineralkörpern auszeichnen, zogen in diesem Betreff die Aufmerksamkeit der Chemiker so weit auf sich, dass einlässliche qualitative

^{*)} Anm. des Vorf. Während nämlich die würzburger Fakultät die Untersuchung der anorgan. Bestandtheile der Drüsen verlangte, stellte die münchener die Aufgabe, die anorganischen Bestandtheile der Fæces zu analysiren.

Prüfungen und Einzelbestimmungen der Mineralstoffe ausgeführt wurden. Vor allem waren es in dieser Beziehung die Knochen, welche schon bald, nachdem die Chemie eine hinreichende Ausbildung erlangt hatte, um Analysen so komplizirter Körper vornehmen zu können, solchen unterworfen wurden. Uebrigens hat man sich auch wohl zu hüten, den physiologischen Werth der zahllos existirenden vergleichenden Tabellen über den Salzgehalt des thierischen Skeletts zu hoch anzuschlagen, indem ja nicht immer physiologisches Interesse Motiv der Analyse war und daher auch weniger berücksichtigt wurde, sondern vielmehr materielle Ausbeutung z. B. von phosphorsaurem Kalk zu technischen Zwecken häufig die Analyse anregte mit Vernachlässigung der exact sondirenden Forschung nach *technisch nicht zu verwerthenden* noch unerwiesenen anorganischen Stoffen. Man begnügte sich im Anfang natürlicher Weise mit der qualitativen Untersuchung und musste deren Resultate schon als wichtige Fortschritte in der damals sich erst entwickelnden Thierchemie betrachten. Die Entdeckungen folgten sich jedoch rasch. Bald nachdem J. G. Gahn gefunden hatte, dass der Hauptbestandtheil der Knochenerde phosphorsaurer Kalk sei, erwiesen Fourcroy und Vauquelin die Gegenwart der phosphorsauren Magnesia in den Knochen. Natürlich war es, dass trotz des regen Eifers dieser Forscher gewisse in kleinen Quantitäten vorhandene und schwerer zu charakterisirende feuerfeste Bestandtheile sich den Wahrnehmungen eine Zeit lang entzogen, indem für sie schon eine Genauigkeit in der Unterscheidung, sowohl in qualitativer als in quantitativer Beziehung nöthig war, welche die Leistungsfähigkeit der damaligen Instrumente und Methoden überstieg. So taucht z. B. die Entdeckung Morichini's, dass sowohl fossiles Elfenbein, als auch der Schmelz der Zähne Fluorcalcium enthalte, um 30 Jahre später auf. Unverhältnissmässig rasch entwickelte sich inzwischen die Kunst der chemischen Untersuchung und mit ihr die Lehre von der Zusammensetzung thierischer Gebilde in den Händen des damals noch jungen Berzelius. Hatte auch er noch mit den Unvollkommenheiten der Technik und der Theorie zu kämpfen, lieferten auch ihm die erlernten Methoden der Analyse im Anfange noch unrichtige Resultate, so war er es doch selbst auch,

Bost

welcher jene Gebrechen verbesserte, so dass er bald im Stande war, die Quellen der fremden und eigenen Irrthümer anzugeben, früher gemachte Angaben zu corrigiren (Quantität der Flusssäure) und neue Wege zu lehren, auf welchen jene Irrthümer gemieden werden konnten. Ihm verdanken wir die ersten genauen Analysen der Knochen des Menschen und der höhern Thiere, ebenso des Zahnbeins und des Zahnschmelzes. Doch beschränkte er sich in seinen Untersuchungen vorzüglich auf den Menschen und den Ochsen. Unterdess hatte man auch in Frankreich, wo die Naturwissenschaften in relativ höher Blüthe standen, fortgefahren, die Zusammensetzung der Knochen und Zähne einlässlich zu studiren. Zwar legte man dort weniger Werth auf die durchgreifende, exacte Analyse, bezüglich der in den thierischen Organen schwach vertretenen Stoffe, als auf die vergleichende Bestimmung der hauptsächlichsten Materien in den verschiedenen Abtheilungen des Thierreichs, die man dagegen um so eifriger betrieb, und damit eine Art von vergleichender Chemie erhielt, welche durch beträchtliche Unterschiede in der quantitativen Zusammensetzung des Skeletts den Blick des Forschers z. B. in Bezug auf den Einfluss von Nahrung und Wohnung wesentlich erweiterte. So lieferte schon Lassaigne eine Tabelle über die Zusammensetsung der Zähne, in denen er allerdings nur organische Materie, durch Glühen phosphorsauren Kalk und kohlensauren Kalk bestimmt hatte, von 21 Thierarten. Für diese verhältnissmässig leicht auszuführende Bestimmungen mehrte sich bald das Interesse so zwar, dass die normal physiologische Zusammensetzung nicht nur des ganzen Skeletts für verschiedene Thier- und Altersklassen studirt wurde, sondern sogar alle einzelnen Knochen besondere vergleichende Prüfungen erlitten. So stellte z. B. Ries eine vergleichende Tabelle des Gehalts an organischer und unorganischer Materie auf für 14 verschiedene Knochen desselben Skeletts an Neugebornen und Erwachsenen. Als diese Vorstudien bereits eine erhebliche Ausdehnung gewonnen hatten, fing man auch allmälig an, die krankhaften Verhältnisse. welche in Bezug auf die quantitativen Vorkommnisse der unorganischen Stoffe beobachtet wurden, zu berücksichtigen. Eine der ersten Analysen osteomalazischer Knochen lieferte Bostock, welcher den phosphorsauren Kalk in einem osteomalazischen Rückenwirbel von dem für vormal angenommenen Gehalt von 53% auf 13% reduzirt fand. Ihm folgte Marchand mit der Analyse der Knochen eines rhachitischen Kindes, Sebastien mit derjenigen arthritischer, Lassaigne und andere, bis endlich von Bibra durch seine bekannten zahlreichen, chemischen Untersuchungen über die Knochen und Zähne des Menschen und der Wirbelthiere »Schweinfurt 1844« für die histologisch anatomische und chemisch physiologische Kenntniss des animalischen Skelettes eine breitere Grundlage bereitete. Obschon nun diese Untersuchungen bis in die neueste Zeit für verschiedene pathologische Zustände fortgesetzt wurden, wenn auch einzelne spezielle Arbeiten, wie diejenigen über die Phosphornekrose von Frhrn. v. Bibra mit Recht eine grosse Berühmtheit erlangt haben, so dass man bereits in den Lehrbüchern der physiologischen Chemie Tabellen der verschiedenen Abweichungen von der Zusammensetzung der Knochen findet, so bleibt dennoch dem Arbeiter auf diesem Gebiete ein grosser Spielraum für künftige verdienstvolle Forschungen offen.

Mit der Entwickelung der neuen physiologischen Anschauungen über die Ernährungs-Vorgänge und der Erkenntniss der allernährenden Bedeutung und hohen Wichtigkeit des Blutes als der gemeinschaftlichen Quelle alles Materials, welches in den Organismen zur Verwerthung gelangt, fingen auch die chemischen Untersuchungen dieser Flüssigkeit an fortzuschreiten, und es wäre wohl schwer zu sagen, ob die Physiologie in dieser Beziehung mehr der Chemie oder umgekehrt diese der ersteren werthvollere Vorarbeiten geliefert habe. Beide gingen Hand in Hand, und errangen durch ihre Verbindung in verhältnissmässig kurzer Zeit die werthvollsten Aufklärungen. Wohl lag es hier in der Natur der Sache, dass die Aufmerksamkeit aller Forscher lange fast ausschliesslich auf die organischen Bestandtheile der Flüssigkeit gerichtet blieb, dass vor Allem die morphotischen Elemente, die von Leuwenkoek entdeckten Blutkörperchen und dann die eigenthümlichen Phänomene des spontanen Gerinnens und der Farbenveränderungen Gegenstände eifriger Studien wurden. Die Summe aller vorhandenen unorganischen Substanzen wurde zwar schon von den ersten Untersuchern immer als Blutasche, als feuerfeste Be-

El St

96

de

Ei

das Bh

100

standtheile angeführt, einlässlichere analysirende Prüfungen derselben nahm man aber erst vor, nachdem Eiweiss und Faserstoff in allen ihren chemischen Verhältnissen der elementaren Zusammensetzung, Löslichkeit und Reaktionen mit allen denkbaren Substanzen erkannt waren, und man sich endlich mit dem rothen Farbstoff des Blutes speziell beschäftigen konnte. Auch für diesen Körper wurde nun in der bisherigen Weise prozedirt. Gmelin und Tiedemann bemerkten zuerst seine Löslichkeit in Alkohol und gründeten auf dieses Verhältniss seine Reindarstellung, Engelhart unterwarf ihn den Einflüssen aller Reagentien, die damals im Gebrauche waren, behandelte ihn successive mit Säuren, Alkalien, Schwefelverbindungen, Metallsalzen, Gasen, und stellte so ein Bild seines chemischen Verhaltens her, ohne dass man jedoch im Stande gewesen wäre, sich daraus physiologische Lehrsätze von einiger Bedeutung herzuleiten, indem jenes Bild durch den Umstand seiner innigen Mengung mit einer Proteinsubstanz sich jeden Augenblick vor den Forscherblicken der experimentirenden Zoochemiker zu verwirren drohte. Gerade für dieses Präparat wurde aber der Blick sehr bald auf eine überraschende Weise auch auf seine unorganischen Bestandtheile gelenkt, indem schon Michaelis angab, dass die relative Proportion der brennbaren Bestandtheile des Blutfarbstoffs fast ganz dieselbe, wie im Faserstoff sei, beide Stoffe sich aber wesentlich durch ihren summarischen Aschengehalt unterschieden, der für das Hämatin bedeutend überwiege und dass die Asche des letzeren im Verhältniss zu der des Fasertoffs stark eisenhaltig sei.

Der Eisengehalt des Blutes wurde schon von Lemery entdeckt, nach ihm suchte Menghini das Eisen mit dem Magnet
aus getrocknetem Blute auszuziehen. Nachdem man gefunden
hatte, dass die eisenhaltige Asche eigentlich vom Farbstoffe
herrühre, schloss man hieraus etwas voreilig, dass seine rothe
Farbe wesentlich auf diesem Eisengehalte beruhe, weil das
Eisen sowohl mit organischen als anorganischen Körpern rothe
Verbindungen häufig liefert. Dejean und Parmentier, welche
die erste etwas zuverlässliche analytische Untersuchung über
das Blut geliefert haben, vermutheten, es befinde sich in dem
Blute vermöge eines freien Alkalis Eisenoxyd, ungefähr auf
ähnliche Weise, wie in der sogenannten Stahl'schen Eisen-

tinktur aufgelöst. Fourcroy suchte noch weiter zu gehen und erklärte, die Farbe des Blutes rühre einfach von basisch phosphorsaurem Eisenoxyd her, welches in Eiweiss löslich sei, so dass sich auch auf diese Weise der Farbstoff künstlich nachmachen liess. Diese Angabe wurde aber von Berzelius, der sie auf ihre Richtigkeit prüfte, alsbald für falsch erklärt, indem er das basisch phosphorsaure Eisenoxyd im Blutserum oder Eiweiss mit oder ohne Zusatz von Alkali vollkommen unauflöslich fand. Diesen Resultaten fügte er noch hinzu, dass jedoch keines der gewöhnlichen und für die Eisenoxyde empfindlichsten Reagentien, wie Blutlaugensalz, Gerbstoff u. s. w. mit dem Farbstoff die geringste Reaktion, die einem Eisengehalt darin zugeschrieben werden könne, hervorbringe, ja dass die Bestandtheile der Asche sich aus dem Hämatin unter keiner Bedingung, selbst nicht durch Säuren, ja nicht einmal durch Königswasser ausziehen lassen.

die

to

K

阿回

Berzelius lieferte nun auch selbst zuerst eine detaillirte Aschenanalyse des Farbstoffs aus Menschen- und Ochsenblut und gab für die Bestandtheile ersterer an:

Kohlensaures Natron und Phosphors. Natron.	. 23,07
Phosphors. Kalk	. 7,69
Kalk a.b	. 15,38
basisch phosphors. Eisenoxyd	. 7,69
Eisenoxyd	. 38,45
Verlust und Kohlensäure	. 7,69
dass die Ascho des letzeren in Verhälleiss zu der	99,97

Als er nach verschiedenen Methoden der Analyse übereinstimmende Resultate erhalten hatte, folgerte er aus denselben, dass der Blutfarbstoff eine Quantität Eisen enthalte, die etwas mehr als ½ Prozent oder 0,00536 seines Gewichtes metallischem Eisen entspreche, in welcher Gestalt sich aber das Eisen darin befinde, meint er, wäre ein für jetzt noch nicht lösbares Problem, obschon mehre wichtige Daten in dieser Beziehung durch Engelhart bereits geliefert waren.

Nachdem man so grossentheils durch den Blutfarbstoff auf die Wichtigkeit unorganischer Bestandtheile geführt worden war, fing man theils aus rein chemischem Interesse, theils aus physiologischen Gründen an, den Salzen des Blutes und dessen Verbrennungsrückstände grössere Aufmerksamkeit zu schenken. Den hieher gehörigen Arbeiten von Berzelius folgten die von Marcet, Lecanu, Denis, Nasse und Enderlin. Sie bestehen theils in Bestimmungen der Mineralbestandtheile des Gesammtblutes (Denis 12 per Mille) theils in solchen des Serums allein, wofür die Angaben jedoch manchmal nicht unbedeutend differiren; so beträgt die Normalmenge der Salze nach Berzelius auf 1000 — 10, nach Lecanu 8, 6, nach Nasse 10, 5. Die Unterschiede in den Angaben verschiedener Forscher beziehen sich jedoch nicht allein auf die Quantitäten, sondern auch auf die Natur der Salze, wie aus folgender kurzen Zusammenstellung ersichtlich wird:

Nach Berzelius sind die Salze des Blutes: milchsaures Natron und freies Natron, Chlornatrium, Chlorkalium und phosphorsaures Natron. Marcet gibt folgende Salze an: Chlorkalium und Chlornatrium, kohlensaures Natron, schwefelsaures Kali, phosphorsaurer Kalk und phosphorsaure Magnesia. Nach Lecanu besteht die Blutasche aus Chlornatrium, und Chlorkalium, kohlensaurem, phosphorsaurem und schwefelsaurem Natron, phosphorsaurem Kalk und phosphorsaurer Magnesia.

Die Differenzen in Bezug auf das Vorhandensein von schwefelsauren und phosphorsauren Verbindungen, gehen, wie man
sieht, von den zwei verschiedenen Standpunkten der Beobachter aus, welche im einen Falle die Flüssigkeit nach Abscheidung der Eiweissstoffe untersuchten, in andern dagegen diese
mit zur Verbrennung verwendeten, wo dann deren Schwefelund Phosphorgehalt zur Entstehung der entsprechenden schwefelsauren und phosphorsauren Salze Veranlassung gab.

Die detaillirtesten Bestimmungen der einzelnen unorganischen Stoffe des Blutes sind von Enderlin in der neuesten Zeit, als man schon auf die später zu besprechenden Wechselverhältnisse zwischen einzelnen Thierkörpern aufmerksam geworden war, unternommen worden. Derselbe analysirte die Asche vom Menschen-, Ochsen-, Kalb-, Hammel- und Hasenblut.

Die Resultate dieser Analyse sind:

2 1 100	Blut vom				
Phosphorsaures Natron	Mensch. 22,100 54,769 4,416 2,416 3,636 0,769 10,770	Ochsen, 16,769 59,340 6,120 8,855 4,190 8,277	Kalb. 30,180 52,650 2,936 3,490 9,277	Hammel 13,296 66,570 5,385	Hasen. 28,655 50,324
Schwefelsaurer Kalk		1,449		0,829	

Die Reihe der bis jetzt bekannten geschichtlichen Data über Aschenanalysen der normalen menschlichen Blutflüssigkeit darf ich selbst auf die Gefahr hin, in der Einleitung etwas weitläufig zu werden, nicht zum Abschluss bringen, ohne eines epochemachenden Werkes der Neuzeit Erwähnung gethan zu haben, in welchem die physiologisch chemischen Untersuchungen über die Constitution des Blutes und seiner nächsten Derivirten von einem der emsigsten und scharfsinnigsten Chemicophysiologen unsrer Zeit niedergelegt sind. Ich meine die "Charakteristik der epidemischen Cholera" von Carl Schmitt. Leider gebietet mir der eingeschränkte Zweck meiner vorliegenden Arbeit, von den meisten als höchst interessant anerkannten Einzelheiten der genannten Schrift zu abstrahiren; ich werde mich desshalb damit begnügen müssen, hier eine seiner vielen Blutanalysen anzureihen, welche einerseits den mit ihr ziemlich übereinstimmenden vorausgenannten Resultaten der Enderlinschen Blutaschenuntersuchungen zur Vergleichung an die Seite gestellt werden kann, andererseits aber auch dazu dienen soll, bei der Beurtheilung und Verwerthung der aus gegenwärtiger Abhandlung sich ergebenden Quantitätsdifferenzen der Aschenbestandtheile der drüsigen Organe einen einheitlichen Anhaltspunkt, gleichsam einen gemeinschaftlichen Maassstab zu bilden, auf den sich die Drüsenaschen. als Derivate der Blutasche, annäherungsweise und zwar mehr als per hypothesin zurückbeziehen lassen.

Schmitt fand in dem Blut eines gesunden 25jährigen In-

dividuums auf 1000 Grm. Blut

dividualis adi 1000 orini 1210				
513,02 Blutzellen				
Wasser	n bespire		349,69	nut sh
bei 1200 nicht flüch	tige Stoffe	е.	163,33	
Hämatin	olloe analy	empl	7,70 (incl. 0,512 Ei	isen)
Blutcasein etc	Line - steel	·	151,89	ality.
unorgan. Bestandthe	ile	- pa	3,74 (excl. Eisen)	
Chlor	. 0,898	- (Chlorkalium	1,887
Schwefelsäure	. 0,031	15	schwefels. Kali	0,068
Phosphorsäure .	. 0,695	= \	Phosphors. Kali	1,202
Kalium	. 1,586	2	Phosphors. Natron .	0,325
Natrium	ALL ALL DISTRICT OF STREET	7K &	Natron	0,175

phosphors. Kalk	0,048	phosphors. Kalk	0,048
phosphors. Magnesia		phosphors. Magnesia	0,031
Sauerstoff	0,206	mollowood	
608,18		Summe	3,736
486,98 I	ntercellular	fluidum (Plasma)	
Wasser		439,02	
bei 1200 nicht flüchti	ge Stoffe .	47,96	
Fibrin		3,93	
Albumin etc		39,89	
unorgan. Bestandtheil	e	4,14	
Chlor.	1,722\	Schwefels. Kali	0,132
Schwefelsäure	The second secon	Chlorkalium	0,176
Phosphorsäure	The second second second	Chlornatrium	2,714
Kalium	0,153	phosphors. Natr	0,117
Natrium	1,661	Natrium	0,752
phosphors. Kalk		phosphors. Kalk	0,145
phosphors. Magnesia	0,106	phosphors. Magnesia	0,106
Sauerstoff	0,221	id onder fown film, film	omina
der Gewohe und Se-	numbers	Summe	4,142
hi eraus ergibt sich fü	ir das Blut	überhaupt	
auf 1	00 Theile	frische Subst.:	V1 1101)
Wasser		THE COURSE OF THE PARTY OF THE	
bei 1200 nicht flücht. B	estandtheil	21,129	stolle
auf 1	100 Thle. fi	rische Subst.:	THE LANK
unorgan. Material	A Billing 20	0,788 (excl. 0,0512	Eisen)
	off out of		Handard Bil
(1) 基本的资格基本。是在一个企业的资金的企业工程,但是为了作品。	AND THE RESERVE THE PARTY OF TH	O Thle. trockne Subst.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
The state of the s		3,944 (incl. Eisen)	Lister
organ. Subst		. 96,056	
Martin Land Res Albury Co.	-		
	uf 100 Th		
Chlor		31,44	
Schwefelsäure		1,128	
Phosphorsäure		9,192	
Kali und Natr		48,142	and the same of th
		2,310	
		1,644	
		6,144	and the same
		100,000	FARE CLEENER

May sandami oder:	
Schwefels. Kali	2,400
Chlorkalium	23,900
Chlornatrium	31,800
phosphors. Kali	16,700
phosphors. Natron	4,380
Natron	10,800
Phosphors. Kalk	2,310
Magnesia	1,644
Eisen	
STATE OF STA	100,008

Ein Vergleich mit der weiter vorn erwähnten Enderlin'schen Blutanalyse ergibt ziemlich konstante Verhältnisse in der Zusammensetzung der Blutasche. Sobald man nun eine Kenntniss des Normalblutes als des den ganzen Organismus durch seine Stoffabgabe und Wiederaufnahme ernährenden Fluidums bezüglich seiner anorganischen Bestandtheile erworben hatte, eröffneten sich zwei neue Gesichtspuncte für die chemische Forschung, nämlich die Untersuchung der Gewebe und Secrete und diejenige etwaiger pathologischer Abänderungen in den Normalvorkommnissen. Die ersteren betreffend liess sich schon a priori vermuthen, dass sich keine anderen Mineralstoffe darin finden könnten, als die im Blute bekannt geworden waren, und dass höchstens ihre Gruppirung unter dem Einflusse der vielfachen chemischen Vorgänge Veränderungen erlitten haben könnten. In der That wiess auch eine Analyse der Fleischasche durch Enderlin in 100 Theilen derselben nach:

bas	isch p	hosphors. Natron	=45,100
Chl	orcalc	ium und Chlornatrium =	= 45,936
Pp	osphor	s. Kalk	Lating .
	"	Magnesia	6,840
18	"	Eisenoxid	Chilor
1.1			97,876

woraus zu ersehen ist, dass die Fleischasche allerdings wesentlich verschieden ist von derjenigen des Fibrins, welches aus dem Blute erhalten wird, indem letzteres keine löslichen Salze enthält. Dagegen stimmt sie mit der Blutasche wesentlich überein. Aehnlich verhält es sich mit den Se- und Exkreten, welche ohnehin in ihrer Concentration so bedeutenden Schwan-

kungen unterworfen sind, dass die quantitativen Vorkommnisse in gegebenen Fällen wenigstens in Bezug auf prozentischen Gehalt fast gar keinen Werth besitzen, so dass man deren Studium in neuerer Zeit fast gänzlich verlassen hat. Im Gegensatze zu dem vorigen berechtigte zuerst der zweite auf die neuen Errungenschaften gegründete Gesichtspunkt, derjenige der pathologischen Veränderungen, zu den glänzendsten Erwartungen. Man hoffte nun ein neues Licht über die Pathologie aus der exakten Untersuchung des Blutes aufgehen zu sehen und eine Menge von Krankheiten mit deren Resultaten in ihrem innersten Wesen beleuchten zu können. Schon die ersten Versuche auf diesem Gebiete aber zeigten, dass die gehofften Ergebnisse nicht so leicht zu erringen seien, als es geschienen hatte; dass ihre Erlangung noch lange frommer Wunsch bleiben werde, wenn nicht gar Unmöglichkeit sei. Natürlich wandte man sich auch hier zuerst an die so wichtigen organischen Körper. Die Ersten, die sich bei ihren analytischen Untersuchungen über das Blut die Aufsuchung solcher Unterschiede in der Zusammensetzung zwischen normalem und krankhaftem Blute vorgesetzt hatten, Dejeux und Parmentier gelangten zu dem Resultate, dass im Allgemeinen genommen die chemische Analyse keine bemerkenswerthen Verschiedenheiten entdeckte. Später wurden solche allerdings aufgefunden: den Bemühungen von Andral und Gavaret, Becquerel und Rodier gelang es, manche nicht unwichtige Thatsachen zu konstatiren, welche von der sogenannten Krasenlehre mit Vortheil benutzt werden konnten. Im Ganzen wurden jedoch die früher gehegten allzu sanguinischen Hoffnungen immer noch nicht erfüllt. Vorzüglich wichtig ist nun für unsern speziellen Gesichtspunkt aber die Thatsache, dass bezüglich der pathologischen Veränderungen besonders das Studium der unorganischen Stoffe noch dankbar war, Abnormitäten des Eisen- und Kochsalzgehaltes im Sinne der Verminderung oder Vermehrung lieferten noch die schönsten und sichersten Anhaltspunkte, welche in mehreren Krankheitsformen selbst therapeutisch verwendet wurden. In neuester Zeit sind hiezu durch die Arbeiten Benekes noch Beobachtungen über den phosphorsauren Kalk gekommen, welche die Pathologie und Theraphie zu neuen Hoffnungen für die Zukunft berechtigen.

Wir haben es nun versucht, in kurzen Zügen ein möglichst vollständiges Bild von der Entwickelung der zoochemischen Forschung für das anorganische Material der Organismen zu entwerfen. Bis in die neueste Zeit blieben dieselben, wie im Eingange behauptet wurde, auf diese mehr oberflächliche Forschungen beschränkt. Erst der neuesten Zeit war es vorbehalten, durch sorgfältige Analyse der einzelnen Organe und Organsysteme neue wichtige Aufschlüsse für deren physiologische Bedeutung und die Art ihrer Funktion zu suchen. Da uns aber diese zoochemischen Leistungen als direkter Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit über die anorganischen Bestandtheile der Thier-Drüsen dienen, sind dieselben vor dem Uebergange zum speziellen Theile noch das Genaueste zu würdigen.

Die einlässlichsten Studien über die anorganischen Bestandtheile des Blutes und der Gewebe, vorzüglich des Muskelfleisches wurden in Deutschland wohl zuerst von Liebig unternommen, welcher über die Wechselbeziehungen unter denselben Sätze aufstellte, welche als hochwichtig für die Physiologie und Zoochemie eine bleibende Stelle in diesen Wissenschaften behalten werden. Besonders waren es die vor ihm so wenig berücksichtigten Abwechselungen in dem Kali- und Natrongehalt der Organismen, welche, zuerst und am Ausgesprochensten in den Pflanzen beobachtet, seine Aufmerksamkeit auch für die einzelnen Abtheilungen des Thierkörpers auf sich zogen. Für die Pflanzen war aus vielen Untersuchungen hervorgegangen, dass erhebliche Quantitäten von Natron nur in der Asche derjenigen aufgefunden wurden, die am Meeresufer oder in unmittelbarer Nähe desselben wachsen; die Gewächse aller übrigen Standorte dagegen entweder ausschliesslich Kalisalze enthalten, oder doch in so weit überwiegenden Verhältnissen, dass das Natron darin als bloss zufälliges Vorkommniss angesehen werden muss. Aus der vergleichenden Untersuchung des Salzgehaltes der Fleischflüssigkeit und des Blutes ergab sich nun die merkwürdige und bedeutsame Thatsache, dass die erstere als Basis ihrer Salze gerade in den hauptsächlichsten derselben immer Kali nachweisen lässt, während letzteres fast ausschliesslich die entsprechenden Natronverbindungen enthält.

Dieser Erfahrung folgten eine Menge von physiologischchemischen Schlüssen über die Bedeutung des Kochsalzes als Nahrungsmittel, eine Reihe von Versuchen über die Möglichkeit der Umsetzung desselben mit phosphorsauren Alkalien, kurz es ist diese Arbeit von unserm Gesichtspunkte aus eine so epochemachende, dass es unumgänglich nothwendig ist zur vollendeten Begründung unserer Arbeit einige Sätze daraus hier anzuführen. In dem Aufsatze über die Fleischflüssigkeit, erschienen in den Annalen der Chemie und Pharmazie 1847 lheisst es: "Das konstante Verhältniss des Kochsalzes und phosphorsauren Natrons im Blute und das des phosphorsauren Kali's und Chlorkaliums in der Fleischflüssigkeit rechtfertigt die Voraussetzung, dass beide für die Vorgänge im Blute und in der Muskelflüssigkeit durchaus nothwendig sind. Von dieser Voraussetzung ausgehend, erklärt sich für viele Thiere die Nothwendigkeit des Zusatzes von Kochsalz zu ihrer Nahrung und der Antheil, den dieses Salz an der Blutbildung und dem Respirationsprozess nimmt.

Nach Bezugnahme auf die oben erwähnten Befunde der Basen in den Pflanzenaschen knüpfen sich die Bemerkungen an: dass ein Thier, welches von Pflanzen lebt, die phosphorsauren Salze und ein Natronsalz enthalten, in seinem Leibe das zur Blutbildung unentbehrliche phosphorsaure Natron erzeugt; ein Thier aber, welches in den Binnenländern lebt, in den Pflanzentheilen, die es verzehrt, nur Kalisalze empfängt, durch Umsetzung mit den Erdphosphaten also nur phosphorsaures Kali erzeugen kann, während doch das entsprechende Natronsalz einen nie fehlenden Bestandtheil seines Blutes ausmacht. Die Beantwortung dieser Frage ergibt sich nach Liebig leicht aus dem Verhalten des phosphorsauren Kalis zu Kochsalz, welches durch folgenden Versuch bestimmt charakterisirtist.

Uebersättigt man Phosphorsäure mit Kali und dampft zur Krystallisation ab, so scheidet sich ein Salz aus, welches eine alkalische Reaktion besitzt. Es gibt kein Salz, welches die Hälfte Basis so leicht abgibt, wie das phosphorsaure Kali. Neutralisirt man Phosphorsäure mit Kali und setzt dieser Flüssigkeit Kochsalz zu und überlässt sie der freiwilligen Verdampfung, so scheidet sich ein phosphorsaures Salz ab, welches Kali und Natron enthält, in der Mutterlauge findet man Chlorkalium.

Es ist klar, dass das phosphorsaure Kali in Gegenwart von Chlornatrium sich umsetzt, ein Theil Kalium tritt an das Chlor, das Natrium nimmt seine Stelle in der phosphorsauren Verbindung ein, es entsteht phosphorsaures Natron. Man begreift sonach die Bildung des phosphorsauren Natrons im Leibe des Thieres, welches in seiner Nahrung neben phosphorsaurem Kali oder phosphorsauren Erdsalzen und Kalisalzen keine Natriumverbindungen ausser Kochsalz geniesst etc."

Diese wenigen Sätze, der oben citirten Liebig'schen Arbeit entnommen, mögen genügen, um einerseits die Gründlichkeit der Studien dieses Autors, andrerseits aber auch die Wichtigkeit der Forschungen auf diesem Gebiete darzuthun; es wurden von ihm durch eine verhältnissmässig kurze Reihe von Untersuchungen wichtige physiologische Probleme gelöst, welche vorher als undurchdringliche Räthsel dagestanden hatten. Es ist desshalb nicht auffallend, dass von diesem Zeitmomente an sich die allgemeine Aufmerksamkeit diesem Gegenstande mit besonderer Vorliebe zuwandte.

Den Verbesserungen der analytischen Methoden durch H Rose folgten zahlreiche Studien über den Salzgehalt des Blutes, welche bald ein dem oben auseinandergesetzten sehr ähnliches Verhältniss zwischen den Salzen des Serums und denen der Blutkörperchen auffinden liessen (Schmidt); kurz man fing von da an das Bedürfniss der genauen Kenntniss der Mineralsubstanzen der Organismen erst recht zu fühlen an. Dasselbe steigerte sich nun noch besonders durch die folgenreichen Untersuchungen über einzelne Organe; vor Allem ist hier hervorzuheben Scherers Arbeit über die Milz, wo ein alle anderen Organe weit übertreffender Eisengehalt viel bedeutendere Aufschlüsse über die Beziehungen dieses Gebildes zu den Umwandlungen des Blutes zu liefern versprach, als dies alle bisherigen physiologischen Experimente und Schlussfolgerungen im Stande gewesen waren. Wir wollen diese für die Lehre vom thierischen Blutkreislauf und den normalen wie pathologischen Nutritionsvorgang so wichtige Arbeit hier vorläufig nicht länger besprechen, weil wir ohnehin wegen ihrer Bezüge zu der vorliegenden Arbeit im speziellen Theile darauf zurückzukommen genöthigt sind.

Den Schluss unserer geschichtlichen Uebersicht über die bisherigen Leistungen in den zoochemischen Aschenanalysen bilden nun die Arbeiten des Freiherrn v. Bibra. Die Broschüre "Chemische Fragmente über die Leber und die Galle, Braunschweig 1849," enthält zahlreiche Untersuchungen der Leberasche, unter verschiedenen Gesichtspunkten vergleichend angestellt. Es finden sich darin vergleichende Angaben über die Verhältnisse in normalen und pathologischen Lebern, über diejenigen der verschiedensten Thierarten, die Relationen zwischen den einzelnen Basen und Säuren (Kali und Natron, Phosphorsäure und Schefelsäure) nach Liebig's Vorgange, Bestimmungen mehr zufälliger Mineralbestandtheile (Kupfer, Arsen) also eine grosse Reihe von Forschungen in demselben Sinne, in welchem wir den Gegenstand vorliegender Arbeit aufgefasst haben.

Vollkommen Analoges ist von der späteren Broschüre des Freih. v. Bibra "vergleichende Untersuchungen über das Gehirn des Menschen und der Wirbelthiere, Mannheim 1854", zu sagen. Auch in den Nervencentren hat der Verfasser die unorganischen Substanzen für alle oben genannten Verhältnisse mit der grössten Sorgfalt bestimmt. Leider haben diese Bemühungen für das Gehirn bisher noch nicht auf ähnliche Weise zu physiologischen Schlussfolgerungen benutzt werden können, wie die Liebig'schen Studien über den Muskelsaft oder die Scherer'schen über die Milz.

Bevor wir nun zur Auseinandersetzung unserer eigenen Untersuchungen schreiten können, bleibt uns noch ein Punkt zu besprechen übrig, dessen bisher nur im Vorübergehen mit einigen hinweisenden Worten gedacht werden konnte, und dessen Wichtigkeit oder Unwichtigkeit bis zum heutigen Tage noch nicht übereinstimmend festgestellt werden konnte. Es ist die Auffindung solcher Mineralbestandtheile, die sich nur in verschwindend kleiner Menge in den Organismen vorfinden, so dass häufige mehr oder weniger fruchtlose Debatten über ihr konstantes Vorkommen gepflogen werden konnten. Da die hierher gehörigen Stoffe mit Ausnahme etwa des Mangans sämmtlich vermöge ihrer chemischen Reaktionen auf thierische Gewebe deletäre Einflüsse auf das organische Leben besitzen, so kamen sie auch vorzüglich in toxikologischer und forensisch-chemischer Be-

ziehung in Betracht und wurde ihr Verhalten auch von den betreffenden Fachmännern am Eifrigsten studirt; es gilt dies besonders von Blei, Kupfer und Arsen. — Die Entdeckungen aller dieser Körper in menschlichen Organismen fallen in die Jahre 1830—1840 und wurden in den ersten Zeiten fast ausschiesslich in Frankreich kultivirt. Die erste Notiz von Kupfergehalt des menschlichen Körpers rührte von Sarzeau (1830) her, derselben folgten zahlreiche Untersuchungen von Orfila, Hervy und Devergie, Millon, Deschamps, Flaudin, Danger u. A.

Während nun die Einen das Metall aus dem Blute dargestellt hatten, und es folglich auch in allen Geweben und Organen auffanden, leugneten die Anderen dessen Vorkommen im Blute oder im Organismus überhaupt wieder gänzlich oder liessen dasselbe höchstens auf einzelne Organe (Leber) beschränkt sein. Während manche Kupfer in verschiedenen Vegetabilien nachwiesen (Gahn, Meiss'ner) und somit die Aufnahme desselben in den Organismus thatsächlich erklärten, bemühten sich andere umsonst, irgend ein vegetabilisches oder animalisches Nahrungsmittel kupferhaltig zu finden. Dieselben Namen sind für die Entdeckung des Blei, Mangan und Arsen zunennen; ziemlich dieselbe Art der Debatten schweben bekanntlich unentschieden bis in die neueste Zeit in diesen Stoffen über. Erst in der neueren Zeit haben sich deutsche Autoren an diese Fragen reger betheiligt; die bis jetzt bekannten Resultate der Untersuchungen von Wismar, Gorup-Besanez, Heller, v. Bibra, Lehmann und andere variiren übrigens in Bezug auf Kupfer und Arsen in ähnlicher Weise, so dass jede hieher gehörige Arbeit als weiterer Beitrag zur Entwickelung des Gegenstandes willkommen sein muss.

Dass das Mangan noch immer fort die Aufmerksamkeit der Chemicophysiologen auf sich ziehen muss, liegt sehr nahe, indem einerseits die bis zu den auffallendsten Extremen abweichenden Resultate der bisherigen Forschung nach diesem Metall, andererseits die verwandtschaftlichen Beziehungen und Verbindungen desselben mit dem physiologisch so stark und so vielfach verwertheten Eisen, unter den Chemikern und Physiologen ein gewisses Gleichgewicht unterhalten zwischen kühnen Muthmassungen über seine physiologische Bedeutsamkeit und Misstrauen in einen grossen Theil der statistischen Angaben.

- Im speziellen Theile werden wir uns auf die obschwebenden dessfallsigen Fragen weitläufiger einlassen.

Wenn nun auch die Ansichten über das physiologische Vorkommen dieser genannten Schwermetalle in den Thierorganismen bis zum heutigen Tage getheilt sind, so bestimmen dagegen eine grosse Reihe von älteren und neueren Erfahrungen zu der Annahme, dass gewisse Organe, wie die Drüsen durch ihren histologischen Bau und ihre chemische Zusammensetzung, so wie durch die stationirende kapilläre Gefässverzweigungen eine ganz besondere Befähigung und Neigung besitzen, diese den Organismen fremdartige Stoffe aus dem Blute abzuscheiden und in sich der Art anzuhäufen, dass sie zu wahren Depositorien derselben werden, und man in gegebenen Fällen der Aufsuchung von Metallen im thierischen Körper sein Hauptaugenmerk auf diese Stellen zu richten gewohnt ist. In dieser Beziehung ist bekanntlich die Leber besonders hervorzuheben, welche sowohl nach Einführung metallischer Arzneimittel, als nach akuter oder chronischer Vergiftung mit Metallen sich besonders reichlich mit denselben versehen findet. Schwierig und unsicher werden hier die Schlüsse, welche man aus dem chemischen Befunde ziehen will, durch den Umstand, dass man, selbst abgesehen von teleologischer Einseitigkeit, die gleichzeitig secernirte Galle zu berücksichtigen hat, über deren eigentliche Funktion und deren ausschliesslichen Zweck man noch nicht ganz in's Klare kommen kann. Wie nahe liegt bei der Untersuchung dieses Lebersekretes und des in ihm suspendirten theils amorphen theils organisirten organischen und anorganischen Materials resp. der Gallensteine die Hypothese, diese Conkretionen mit den aus der Lebersubstanz herausgeäscherten Salzen theilweise zu identifiziren. Ausführlicher wird über diesen Gegenstand noch weiter unten bei der genetischen Würdigung der anorganischen Ablagerungen die Rede sein.

Die Erscheinung der anorganischen Ablagerungen in der Leber gewährt kein geringeres Interesse, ob man sie von anatomischen Dispositionen (Gefässvertheilung etc.) ableitet, oder andere z. B. mehr chemische Erklärungsgründe dafür aufsucht; in jedem Falle bildet sie ein äusserst merkwürdiges Gegenstück zu der Scherer'schen Entdeckung der physiologischen Eisenanhäufung in der Milz und muss bei jeder Untersuchung des thierischen Organismus auf anorganische Bestandtheile speziell berücksichtigt werden.

Haben wir nun in dem Vorstehenden einen ziemlich vollständigen, wenn auch gedrängten Abriss der Entwickelung und des jetzigen Zustandes der Forschungen über das unorganische Material der Organismen gegeben, und ist aus einzelnen Daten desselben mit Sicherheit hervorgegangen, dass diese Stoffe mit den an sie gebundenen Prozessen einer höchst wichtigen, physiologischen Verwerthung fähig sind, so sei es nun erlaubt, auf diese Prämissen gestützt, durch unsre eigenen Untersuchungen in den folgenden Zeilen einen Beitrag zur Erweiterung des Gesichtsfeldes auf diesem Gebiete niederzulegen und das Interesse der Wissenschaft an dasselbe zu fesseln.

Methode der Wasserbestimmung.

Ohne auf eine Besprechung der längst obsoleten fehlervollen Methoden einzugehen, welcher sich Chossat u. A. zu Wasserbestimmungen resp. Austrocknung der Thierkörper bedienten, will ich unmittelbar zur ausführlichen Beschreibung des von meinem verehrten Lehrer Herrn Prof. Dr. Scherer vorgeschlagenen und von mir befolgten Verfahrens schreiten. Das zu untersuchende Organ wurde bei Menschen unmittelbar nach der Obduktion aus der Körperhöhle geschnitten, bei Thieren gleich nachdem sie getödtet, noch warm und rauchend zur Untersuchung gebracht. Zum Behufe dieser Untersuchung wurde es mit Stahlmessern rasch und fein zerhackt, seine Gesammtschwere nach dem Grammengewicht bestimmt, und von der möglichst gleichmässig gemischten Totalquantität eine kleinere Portion, etwa 8 Grm. zur Wasserbestimmung verwendet, während der bei weitem grössere übrige Theil zur Einäscherung bestimmt blieb. - Um nun bei etwaiger Gewichtsdifferenz durch Erlangung einer Durchschnittszahl dennoch möglichst exakte und zuverlässige Resultate zu erhalten, theilte ich die zur Wasserbestimmung zu verwendende Portion jedesmal wieder in 2 ungleiche Theile, den einen zu c. 2, den andern c. 6 Grm. - Zur Aufnahme dieser kleinen Quantitäten dienten möglichst flache Porzellanschälchen und Uhrgläser mit entsprechenden

hohlen Deckgläschen, welche, wiewohl stets ihr ursprüngliches eonstantes Gewicht genau bestimmt war, dennoch zur grösseren Vorsicht nach jeder Benutzung und vor jeder neuen Wasserbestimmung auch von Neuem im Luftbade bei 1500 C sorgfältig getrocknet, unter der Glasglocke neben Schwefelsäure abgekühlt und genau gewogen wurden. Hierauf wurden sie, mit der zu entwässernden frischen Substanz belastet, von Neuem auf die Wagschale gesetzt. Von dem jetzt erhaltenen Bruttogewicht wurde das Gewicht des Schälchens als Tara subtrahirt, und somit das restirende Netto als die zur Wasserbestimmung verwendete nasse Substanz notirt. Damit dieselbe nun der austrocknenden Luft hinreichende Oberfläche darböte, wurde sie mit einem feinen Glasstabe behutsam auf die ganze innere Schalenfläche ausgebreitet, und zur allmäligen langsamen Ausdünstung, damit nicht durch zu rasche Trocknung eine beschleunigte Incrustation und in Folge dessen mechanische Zurückhaltung der feuchten inneren Dämpfe veranlasst werde, zuerst drei Tage im Wasserbad einer Temperatur von 40-50° C. ausgesetzt, am dritten Tage das Wasserbad mit einem Sandbade von c. 80° vertauscht, bis endlich nach achttägiger Einwirkung dieses Wärmegrades die progressive Steigerung der Hitze durch Anwendung des Luftbades von 100, dann 110-1200 ihre Grenzen hatte. Erst nach mehrtägigem Contact mit dieser intensiven Temperatur des Luftbades suchte ich mich von dem Fortschreiten der Austrocknung zu überzeugen, indem ich die Schälchen sammt Inhalt und Deckgläschen über Schwefelsäure abkühlen liess und dem ersten Wägeversuche unterwarf. In der Regel stimmten die Gewichtsverhältnisse beider angewandten Portionen vollkommen überein; allenfallsige Differenzen waren so unbedeutend und auf der Wage so wenig bestimmbar, dass man sie nicht in Rechnung zu bringen brauchte.

Darauf wurden die Schälchen sofort wieder in's Luftbad zurückgestellt und von Zeit zu Zeit, etwa von 6 zu 6 Stunden auf dieselbe Weise, wie beim ersten Wägen zur Quantitativ-Probe gebracht, bis mehre aufeinander folgende Abwiegungen nicht die geringsten Gewichtsunterschiede mehr zeigten.

Das nun nach dem letzten Wägen sich herausstellende Bruttogewicht gab nach Abzug des Schalengewichtes natürlich die Schwere der trockenen oder festen Bestandtheile des verwendeten Materials. Der Gewichtsunterschied zwischen dieser entwässerten und der ursprünglichen nassen Substanz zeigt die in dem abgewogenen Organtheile enthaltene Wassermenge an. Auf diesem Wege nur konnte man, zumal wenn jede der beiden Abtheilungen denselben procentischen Wasserverlust anzeigte, mit objectiver Gewissheit den procentischen Wassergehalt des ganzen Organs berechnen, nach der Proportion:

Verwendete frische Substanz verhält sich zum Wasserverlust, wie sich verhält 100 zu x;

S : Aq. = 100 : x.

Aus dem gefundenen procentischen Wassergehalt wurde das procentische Gewicht der nicht flüchtigen Stoffe oder der trockenen Substanz durch Subtraction des Wassergehalts von 100 bestimmt.

Anmerkung. Um Weitläufigkeiten zu verhüten, habe ich bei den unten folgenden Wasserberechnungen der einzelnen Organe jedesmal nur eine von den beiden verwendeten Portionen angeführt, weil die Resultate beider übereingestimmt hatten.

Feuerfeste Bestandtheile (Aschenbestimmung, Salzgehalt) der Drüsen.

Möglichst bald nach Ablauf der Lebensprocesse wurden den für die Aschenuntersuchung gewählten Thierkörpern die einzelnen der Analyse zu unterwerfenden Organe entnommen, bei einigen Thieren (Hund, Katze und Fisch) sogar noch während der Functionsäusserungen. Die Manipulationen begannen sodann mit der Abwägung der Gesammtmasse der abgetrennten Organe. Hierauf wurden dieselben bis fast zur Breiconsistenz zerschnitten, und nachdem eine zur Wasserbestimmung separirte Portion von dem Gesammtgewichte abgezogen war, vertheilte man die Hauptmasse des Materials in grosse Porzellanschalen, um sie Anfangs (um die der Einäscherung hinderliche Coagulation des Albumins zu verhüten) bei 50° C sodann bei 800 und noch höher auf dem Sandbade bis zur Hornconsistenz auszutrocknen. Die so getrocknete Masse wurde sodann vorsichtig mittels eines Spatels von der Schale gelöst, die fester angeklebten Theile mit Ammoniak oder mit Aether in ein Glühschälchen ausgespühlt und getrocknet, die ganze gesammelte Masse über einer mit einem Bogen Glanzpapier bedeckten Tischplatte in der Reibschale grobkörnig pulverisirt, und das sorgfältig zusammengehaltene Pulver in geringen, je nach Umständen nur drei bis viergränigen Einzelquantitäten nach und nach in flache berliner Glühschälchen gebracht, die zuvor jedoch trocken tarirt worden waren.

Zum Verbrennen benutzte ich den vortrefflich construirten Muffelofen des chemischen Laboratoriums der würzburger Universität. Die 21/2 Fuss tiefe, 5" breite und 4 Zoll hohe, gusseiserne, von den Flammen rings umleckte Muffel vereinigt mit einer concentrirten, allseitig stechenden Hitze zugleich den vielfach erprobten Vorzug eines gleichmässig strömenden anhaltend oxydirenden Luftzuges, welcher dadurch erzielt wird, dass inmitten der Muffelwölbung eine perpendiculäre Röhrenöffnung die ununterbrochene Communication zwischen dem innern Muffelraum und dem durch die Feuerung modificirten Ofenluftzug unterhält, so dass bei passender Regulirung der Hitze leicht eine vollständige Verbrennung des organischen Materials bewirkt werden kann, und zwar, einerseits ohne Umwandlung leicht reducirbarer anorganischer Verbindungen andererseits auch mit ökonomischer Zurückhaltung jener Elementarbestandtheile der Asche, welche bei Weissglühhitze oder auch schon bei heftiger Rothglühhitse zur Verflüchtigung geneigt sind (Chlornatrium, Schwefelsäure). Durch diese, fast möchte ich sagen, respiratorische Muffelconstruction konnte vermittels des continuirlichen Luftstromes auf analogem Wege, wie bei der consumptiven Rauchtabak- und Cigarrenverbrennung eine durchaus kohlenfreie Asche erzielt werden, und so sah ich mich denn durch diese höchst praktische Vorrichtung so vielen Misständen überhoben, welche von jeher nicht wenig dazu beigetragen haben, bei den Chemicophysiologen die Detailbestimmungen der Aschenbestandtheile in Misscredit zu bringen, und die auch in der That zu den bedeutendsten Fehlerquellen der Aschenanalysen zu rechnen sind. Ich glaubte daher auch mit vollem Rechte, auf die Benutzug dieser und ähnlicher nicht minder bewährten Hülfsmittel und Analysirmethoden meines hoch vererhrten Lehrers, des Herrn Prof. Dr. Scherer mich stützend, insofern wenigstens die zeitgemässe Instrumentalausrüstung die technische Ausführbarkeit des vorgesteckten Zieles gestattete, für meine

vorliegenden Specialuntersuchungen der Drüsenaschen völliges Zutrauen beanspruchen zu können. — In der so eben beschriebenen Muffel wurde nun die Isolirung der Asche durch Glühen in zwei auf einander folgenden Verbrennungsstadien erzielt.

Der erste Verbrennungsact des Materials wurde auf folgende Weise eingeleitet. Die das Organpulver enthaltenden, im Sandbade vorerhitzten Schälchen wurden mittels einer geschnäbelten Feuerzange in das vordere, weniger glühende Dritttheil der Muffel gestellt, wo man den durch die rasche Gasentwickelung bewirkten Aufblähungsprocess sich ruhig beenden liess; während man ihn gleichzeitig mit Geruch- und Gesichtsorgan ziemlich genau beobachten konnte. Sodann wurde die inzwischen mehr oder weniger schwammig porös geblähte Kohle zur weitern Oxydation bis auf die Demarkationslinie der Rothglühhitze des Muffelbodens vorgeschoben, um daselbst die weitere Zerstörung der nicht an anorganische Theile chemisch gebundenen organischen Verbindungen abzuwarten. Als nach anderthalbstündigem Verweilen in dieser Temperaturzone der Muffel wohl keine in Wasser löslichen organischen Stoffe mehr zugegen sein mochten, und auch keine brenzlichen Oele mehr auftraten, was sich durch die blendende Reinheit der Anfangs schwarz und fettig angerusteten Schalenwandungen, sowie durch den gänzlichen Mangel rauchender, stinkender Zersetzungsprodukte kund gab, wurde die Einäscherung unterbrochen, indem die Substanz zum Zweck einer vorläufigen Wasserextraktion langsam aus der Muffel entfernt wurde, um einer nachfolgenden Portion zu derselben Procedur Platz zu machen. Hiermit war das erste Stadium der Verbrennung beendet.

Die nach dieser Operation zurückbleibende Kohle wurde unter Luftabschluss über Schwefelsäure abgekühlt, im bedeckten Schälchen als »Asche u. Kohle« gewogen und nach Abzug des nochmals bestimmten Schalen- und Deckelgewichts fein gepulvert, mehre Male mit destillirtem Wasser ausgekocht, durch ein trocken abgewogenes reines schwedisches Filtrirpapier abfiltrirt und mit heissem, zuletzt mit kaltem Wasser ausgewaschen. Das Filtrat, welches übrigens ganz hell und meist farblos war, und selbst nach stundenlangem Stehen keine Trübung zeigte, folglich als ganz frei von organischen Stoffen angenommen werden konnte, wurde in einem zugedeckten Becherglase als »erster wässeriger

Aschenauszug* zu den später zu beschreibenden Spezialanalysen reservirt. Die auf dem Filter zurückbleibende Kohle, welche schon nach Entfernung der in Wasser löslichen Salze bekanntlich der Feuerprobe keinen so hartnäckigen Widerstand entgegensetzt, wie die ursprüngliche Substanz, wurde jetzt in dem schon früher benutzten Schälchen sammt dem Filter auf dem Sandbade getrocknet, darauf mit den schon beschriebenen Præcautelen gewogen, und von dem erhaltenen Gewicht das Gewicht des Schälchens und des Filtrums abgezogen. Der durch Subtraktion vom ursprünglichen Aschengewicht sich ergebende Gewichtsverlust gab indireckt die Menge des Wasserauszugs, die ich zur sicheren Kontrollirung der später noch direkt zu bestimmenden Totalschwere der mit Wasser ausgezogenen Salze benutzte-

Dieser Gewichtsverlust wurde selbstverständlich auch von dem ersten Verbrennungsresultate (Totalasche) als *im Wasser löslicher Aschentheil« abgezogen, so dass der Rest als *Kieselsäure und in Säuren lösliche Asche und Kohle« bezeichnet werden konnte.

Hierauf konnte zum

Zweiten Verbrennungsstadium der Substanz geschritten werden. Mit der gewohnten Vorsicht wurde das nun bereits stark verkohlte Material bis hinter die obere perpendikuläre Oeffnung der Muffelwölbung vorgeschoben, wo dasselbe, von dem intensivsten rothglühenden Hitzgürtel umspannt wurde. Nach zweistündiger Einwirkung dieses Hitzgrades war in der Regel das beabsichtigte Weissbrennen der Kohle erfolgt, und der Rückstand konnte nun dreist zur weiteren Verarbeitung dem Muffelofen entzogen werden. Doch geschah mir's besonders Anfangs, dass bei stickstoffreichen Substanzen die leicht schmelzbaren mineralischen Bestandtheile um die Kohlenpartikeln zusammenschmolzen, und dieses gleichsam amalgamirte Produkt eine dermassen schlackenartige Modification annahm, dass es selbst im fein zerstossenen Zustande den stärksten Lösungsmitteln lange Widerstand leistete, so dass ich einige Male sogar genöthigt war, eine Aufschliessung vorzunehmen durch Zusammenschmelzen mit kohlensaurem Natron-Kali. Dass ich in solchen Fällen, wo eine derartige Aufschliessung erforderlich war, auf die Bestimmung der in dem sauren Auszug noch vorhandenen Alkalien verzichten musste, versteht sich von selbst. -Um jedoch diesen unangenehmen Zufällen mit Sicherheit vorzubeugen, gewöhnte ich mich später, zumal, wenn die zu verarbeitende Masse gross war, das zweite Verbrennungsstadium nach einer starken Viertelstunde zu unterbrechen, indem ich die Schälchen herausnahm und das Gewicht der langsam abgekühlten Kohle bestimmte, dieselbe sodann mit concentrirter Salzsäure 1/2 Stunde auskochte, filtrirte und mit destilirtem Wasser so lange auswusch, bis die durchfliessenden Tropfen blaues Lackmusspapier nicht mehr rötheten. Der wieder getrocknete und von dem Filter gewonnene Rückstand wurde dann wieder zur Fortsetzung der Einäscherung in die Muffel zurückgebracht. Nach 7-10stündigem Verweilen in der Muffel war die Kohle zu einer hellgrauen, manchmal unter gewissen Bedingungen - wenn Eisen oder Kupfer zugegen war - auch wohl röthlich, braun, bläulich oder grünlich gefärbten Asche geglüht. Dieselbe wurde jetzt einer weiteren Gewichtsbestimmung unterzogen, und der sich ergebende Verlust von der schon einmal reducirten Gesammtaschenmenge ebenfalls abgezogen als verbrannte Kohle. Durch diese verschiedenen Komplementirrechnungen vermittels Addition und Subtraktion gewann ich jedesmal bei Abschluss der einzelnen Analysen eine erfreuliche Approbation meiner Arbeit; w. z. B., indem die vergleichende Nebeneinanderstellung des Kohlen- und Aschengehalts eines Organs minus dem zweimaligen Kohlenverlust mit dem Gesammtresultate addirten der Einzelergebnisse der ausgezogenen anorganischen Stoffe die Korrektheit meiner Tabellen durch die Richtigkeit der Gleichung unfehlbar verbürgte. Im Verlaufe dieser Brochüre werde ich noch mehrmals Gelegenheit nehmen, die Vortheile einer derartigen Kontrolle zu veranschaulichen, welche man sich auch fast bei jedem Schritt der Spezial-Analyse aus dem bearbeiteten Material entwickeln lassen kann.

Nachdem also die Asche weiss geglüht war, wurde sie mit concentrirter Salzsäure wiederholt ausgekocht, der Auszug successive mit heissem destillirtem Wasser auf der Gasflamme verdünnt und noch 3/4 Stunde digerirt, worauf er filtrirt, das Filtrat aber sammt dem Waschwasser ungefähr zur Trockne eingedampft, und mit c. 30—40 Tropfen Salzsäure beträufelt wurde, wobei sich nach Zusatz von Wasser die vorhandene Kieselsäure als unlösliche weisse flockige Masse zu Boden

senkte. Sie wurde auf dem Filter gesammelt und zur weiteren Prüfung dem ersten Filterrückstande beigegeben. Das ungetrübte Filtrat jedoch wurde zur weiteren Behandlung als »salzsaurer Auszug der Asche« bezeichnet und zurückgestellt.

Bei der Prüfung der als Kieselsäure abgeschiedenen Rückstände ergab sich manchmal, dass Schwermetalle, durch die desoxydirende Eigenschaft der verbrennenden Kohle reducirt, mit der Kieselsäure in Salzsäure unlöslich blieben. Die Trennung wurde in diesem Falle vervollständigt durch anhaltendes Behandeln des Gemenges mit concentrirter kochender Salz-Salpetersäure. Die Flüssigkeit, von dem nunmehrigen Kieselsäurerückstande durch Filtration befreit, wurde dem salzsauren Auszuge beigefügt, die Glasetikette jedoch dahin berichtigt, dass statt »salzsaurer Auszug« »Königswasser Auszug« darauf geschrieben wurde.

Wenn nicht Heinr. Bose's Theorie tiber die teleoxydische anoxydische und meroxydische Körper, und die separirte Darstellung derselben aus den Geweben, so schön und vortrefflich im System, in der Praxis als unhaltbar fast der Geschichte anheimgefallen wäre, so könnte mich vielleicht der Vorwurf treffen, ich hätte nach diesem Prinzip von der bloss verkohlten Substanz vor der gänzlichen Verbrennung auch einen salzsauren Auszug nehmen sollen, um die in organischer Verbindung in der Substanz befindlichen anorganischen Körper (anoxydische) von denen zu trennen, welche in vollkommen oxydirtem Zustande (als sogen. teleoxydische) darin enthalten sind. Allein eine so feine und gezwungene Separirung der Aschenauszüge schien mir in der That zu wenig lohnend, als dass ich meine ohnehin beschränkte Zeit dadurch noch mehr hätte zersplittern sollen. Wohl würde ich es jedoch vorgezogen haben, wenn der Beendigung meiner Arbeit eine längere Frist gestellt worden wäre, nach der Verfahrungsweise des Freih. v. Bibra vorerst die verschiedenen Wasser-, Aether- und Alkaholextrakte der frischen Drüsen für sich auf ihre Aschenbestandtheile zu untersuchen und den Rückstand zuletzt einzuäschern; wodurch man sich wenigstens annäherungsweise Schlüsse auf die topische Vertheilung der Salze in die heterologen Gewebstheile hätte erlauben können; wiewohl auch die Zuverlässigkeit der aus diesen Ergebnissen gezogenen Schlüsse noch sehr problematisch wäre. Ich hielt mich daher stets an die oben beschriebene, von Scherer angerathene Methode der Aschenbestimmung. Einzelne auffallende und charakteristische Phänomene, welche mir beim Akt der Einäscherung der Organe hin und wieder aufgestossen sind, lassen sich füglich bei der Besprechung der verschiedenen Organe am Besten anführen, wesshalb ich denn auch weiter unten darauf zurückkommen werde.

Wir gehen nun über zur Beschreibung der

Analysirmethode der verschiedenen Aschenauszüge.

Wiewohl eigentlich ein vollständiges Paradigma wohl einen bequemeren Ueberblick über den analytischen Gang meiner Arbeiten gewähren würde, so konnte doch bei der vielseitigen Ausdehnung und Verzweigung der zoochemischen Detailoperationen eine bloss tabellarische Darstellung der analytischen Proceduren unmöglich auf eine gründliche Sondirung meiner Verfahrungsweise eingehen. Ich habe mir daher die Mühe nicht verdriessen lassen, den nachfolgenden Tabellen eine umfassende Beschreibung der befolgten Untersuchungsmethoden voranzuschicken, zumal ich es dem Zwecke dieser Abhandlung sowie der Rechtfertigung der gewonnenen Resultate schuldig zu sein glaubte, eine ausführliche Beleuchtung der von mir angewandten chemischen Operationen vorausgehen zu lassen.

Wir wenden uns nun zunächst zum

wässerigen Aschenauszug.

Wie schon oben angedeutet, wurde der gesammte wässerige Auszug auf dem Sandbade eingetrocknet, schwach geglüht und dem Gewichte nach bestimmt. Zur leichteren und zuverlässigeren Verarbeitung dieses Materials wurde gewöhnlich nur ein Theil der ganzen gewogenen Menge — bei sehr grossen Quantitäten pflegte ich zu decimiren — in Angriff genommen.

Dieser Theil wurde dann zuerst mit Wasser *) überbrüht, die nach längerem Stehen geklärte Flüssigkeit durch schwedisches Papier filtrirt, der rückbleibende Bodensatz mit Wasser

^{*)} Ich brauche wohl nicht erst zu erwähnen, dass, so oft in dieser Abhandlung der Ausdruck Wasser gebraucht wird, stets destillirtes Wasser zu verstehen ist.

Jalunde digerirt, und nach Absetzen der unlöslich bleibenden Salze die Lösung durch dasselbe Filter gegossen. Hierdurch erfiel schon der wässerige Auszug in zwei Abtheilungen, welche gesonderten Untersuchungen anheimfielen: eine Portion, welche ihre Löslichkeit in Wasser durch das Glühen nicht eingebüsst, eine andre, welche nach dem Glühen eine in Wasser unlösliche Modifikation erfahren hatte. Letztere wurde nach sorgfältigem Auswaschen mit dem Filter getrocknet und geglüht und ihr Gewicht von dem der in Wasser ursprünglich öslichen Salze abgezogen, um später nach gesonderter Spezialuntersuchung dem Gewichte der in Salzsäure oder in Salzetersäure löslichen Stoffe zugezählt zu werden.

T.

Der in Wasser löslich gebliebene, dem Gewicht nach berannte Theil des wässerigen Aschenauszuges wurde in einer graduirten (Mohrschen) Bürrette auf 200 Kubik cm. verdünnt, wohl geschüttelt und in 4—5 gesonderten gleichen Volumstheilen à 50 Kubik cm. resp. 40 Kubik cm. in Bechergläser abgezogen, welche beziehungsweise mit den Buchstaben

A = zur Chlorbestimmung,

R = zur Bestimmung der Schwefelsäure,

C = " " der Phosphorsäure,

D = , der Alkalien,

E = ,, von Kalk und Magnesia

bezeichnet wurden.

A.

Chlorbestimmung.

Die mit 20 Tropfen Salpetersäure angesäuerte Lösung wurde successive so lange mit Silbersolution versetzt, bis kein neuer Niederschlag mehr entstand. Darauf wurde das bedeckte Glas, im es der zersetzenden Wirkung des Sonnenlichtes zu entzienen, in eine möglichst finstere Ecke des Sandbades gesetzt, wo sich unter dem Einfluss der Wärme gar bald der weisse, zäsige Niederschlag von Chlorsilber vollständig bildete. Wenn sich nach 6 Stunden die überstehende klare Flüssigkeit von lem Niederschlag völlig abgegrenzt hatte, so wurden langsam

noch einige Tropfen salpetersauren Silberoxyds an einem Glasstabe hineingeleitet, um die Ueberzeugung von der vollständigen Sättigung der Flüssigkeit mit Silber zu gewinnen. Andern Tags wurde der Niederschlag nach mehrmaliger theilweisen Dekantation aufs Filter gebracht und mit demselben getrocknet; darauf, weil sonst beim Glühen das Papier unmöglich ohne unverbrannte Kohle zu hinterlassen, zerstört werden konnte, von dem Filter gelöst und geglüht, während zugleich das Filter mit den noch anhaftenden Partikeln von Chlorsilber separirt auf einem Schälchen eingeäschert, und die Asche dem geglühten Chlorsilber zugefügt wurde. Um den Verlust an Chlor auszugleichen, den das Zusammenglühen mit der Filterkohle durch Reduktion des Chlorsilbers herbeiführen konnte, wurde das etwa ausgeschiedene regulinische Silber nach dem Erkalten des Porzellantiegels durch Zusatz einiger Tropfen reiner Salpetersäure wieder in salpetersaures Silber verwandelt, worauf man es im Wasser trocknete, und durch Einträufeln von c. 10-12 Tropfen reiner Salzsäure als Chlorsilber wieder niederschlug. Um etwaigem Verluste durch Wegspritzen vorzubeugen, wurde auch jetzt wieder zur Trocknung die gelinde Wärme des Wasserbades benutzt, und erst nach vollständigem Trocknen das Chlorsilber über der Gasflamme als bräunliche, hornige Masse geschmolzen, aus welcher durch die bekannte stöchiometrische Proportion die Menge des Chlors bestimmt wurde.

Es verhält sich nämlich das Atomgewicht des Chlorsilbers (1792,21): Atomgewicht des Chlors (443,20) = die gefundene Menge Chlorsilber): x (gesuchte Menge Chlor); oder:

100,00 : 24,729 = Ag. Cl. : x. $x = 0,24729 \times Ag. Cl. = Chlor.$

Nach Entfernung des als Reagens überflüssig zugesetzten Silbers mittels Salzsäure diente das Filtrat noch zu verschiedenen analytischen Zwecken. Bald wurde, wie unter Port. D näher besprochen wird, eine ergänzende Kalibestimmung damit vorgenommen; bald machte ich eine kontrollirende Bestimmung der Schwefelsäure durch Eingiessen einer Barytlösung nach der unter Port. B zu beschreibenden Methode.

Wenn ich wegen der geringen Substanzmenge von dem wässerigen Auszug der Asche nur vier Volumsportionen gemacht atte, so benutzte ich obiges Filtrat zur Bestimmung des Kalks nittelst Schwefelsäure oder nach dem Verdampfen der Salzäure mittels oxalsaurem Ammoniak.

Am häufigsten jedoch wurde die vom Silber befreite salzaure Lösung der Port. A dazu benutzt, die Totalmenge des Kali- und Natrongehaltes als schwefelsaure Alkalien zu bestimnen. Ich entfernte zu diesem Zwecke folgendermassen die übrien Substanzen aus der Flüssigkeit. Nachdem ich durch Einampfen und Erhitzen die überschüssige Salzsäure verjagt und en Rückstand mit Wasser wieder gelöst hatte, wurde diese Lösung ltrirt, das Filtrat erhitzt, ammoniakalisch gemacht und unter jusatz von einigen Tropfen Salmiaklösung mit phosphoraurem Ammoniak gefällt. Der Niederschlag, aus den phoshorsauren alkalischen Erden (Kalk und Magnesia) bestehend, rurde nach einigen Stunden durch Filtration getrennt, in dem "iltrat sodann die überschüssige Phosphorsäure durch essigaures Bleioxyd gefällt und durch Filtriren und sorgfältiges uswaschen des schweren Niederschlages entfernt. Nachdem ierauf in dem Filtrat das überschüssige Bleioxyd mittels Amnoniak beseitigt war, wurde das ammoniakalische Filtrat einedampft, der Rückstand unter Zusatz von einigen Tropfen chwefelsäure langsam erhitzt, geglüht und als schwefelsaure Ikalien gewogen. Von der Summe des erhaltenen schwefelauren Natron-Kali's wurde dann das schwefelsaure Kali abezogen, welches ich aus dem in Port. E gefundene Chlorkalium erechnet hatte. Der Rest gab das schwefelsaure Natron. Diese rbeit war in sofern lohnend, als sie mir durch Uebereinstimnung der aus den schwefelsauren Salzen in Portion A und er aus den Chloralkalien in Portion E erhaltenen Gewichtahlen für Kali- und Natrongehalt die objektive Gewissheit und Jeberzeugung von der Richtigkeit meiner chemischen Operatioen und meines stöchiometrischen Kalkuls verschaffte.

B.

Bestimmung der Schwefelsäure,

Die mit wenig Salzsäure angesäuerte Lösung B wurde mit Chlorbaryum so lange versetzt, bis nach Absetzung des enttandenen feinen weissen, sandigen Niederschlags von schwefelsaurem Baryt in der überstehenden, ganz klaren Flüssigkeit auf weiteren Zusatz von der Chlorbaryumsolution keine Reaktion mehr entstand. Den anderen Tag wurde die vom Niederschlage deutlich abgegrenzte Flüssigkeit behutsam auf ein Filtrum abgegossen und die unlösliche Masse mit kochendem Wasser überbrüht. Nachdem die Flüssigkeit wieder vollständig hell war, dekantirte man auf dieselbe Weise wieder in's Filtrum ab und wiederholte zur grösseren Sicherheit die Operation der Uebergiessung mit heissem Wasser und der Dekantirung noch einmal, indem man zugleich jetzt auch den schwefelsauren Barytniederschlag selbst mit auf das Filtrum goss. Dieses wurde sodann ausgewaschen, sammt Inhalt langsam getrocknet, darauf der schwefelsaure Baryt vom Filtrum gelöst und in einem gewogenen Platintiegel geglüht während man gleichzeitig auf einem Platinblech das Filter mit den anhaftenden Salztheilchen vollkommen weiss brannte und die vom Filter erhaltene Asche dem geglühten schwefelsauren Baryt hinzufügte. Nachdem nun der schwefelsaure Baryt nach dem Erkalten zur Zerstörung eines etwaigen Antheils von Schwefelbaryum noch einmal mit einigen Tropfen einer Mischung aus Schwefelsäure und Salpetersäure befeuchtet und langsam erhitzt worden war, wurde derselbe noch einmal heftig geglüht, und der Platintiegel sammt Inhalt nach gänzlichem Erkalten gewogen. Nach Abzug des Gewichts des Platintiegels wurde aus der gewonnenen Gewichtsmenge des schwefelsauren Barytsalzes der Gehalt der Schwefelsäure berechnet nach der Formel:

Das Atomgewicht des schwefels. Baryts (1454,85) verhält sich zum Atomgewicht der Schwefelsäure (500,00) = die gefundene Menge schwefelsaur. Baryt zur gesuchten Menge Schwefelsäure; oder:

 $100,00 : 34,36 = (Ba S^{--}) : x.$ $x = 0,3436 \times Ba S^{--} = Schwefelsäure.$

In dem vom schwefelsauren Baryt getrennten Filtrat wurde nun der überschüssige Baryt zuweilen durch Zusatz von Schwefelsäure gefällt und von den übrigen alkalischen Erden und den Alkalien geschieden, hierauf die alkalischen Erden, nämlich Kalk und Magnesia, nach der unter Port. E noch zu beschreibenden Methode bestimmt, nachdem die Flüssigkeit zuvor zur Verjagung der überflüssigen Säure bis fast zur Trockne eingedampft und in Essigsäure gelöst war. Die Resultate dienten zum Vergleiche mit den sub E erzielten Ergebnissen. Je nach Umständen wurden auch statt der alkalischen Erden die Alkalien aus dieser Flüssigkeit bestimmt, indem nach dem Eindampfen und Wiederauflösen der Flüssigkeit der Baryt, der Kalk und die Magnesia, sowie die Säuren nach der unter Port. D befolgten Methode entfernt, der Rückstand eingedampft und in Toto als Chloralkalien bestimmt wurde.

der phosphersaur, Ammon.-Manesia die in dem Wasseraus-

Bestimmung der Phosphorsäure.

Nachdem der Flüssigkeit C eine ziemliche Quantität, etwa 8 [] Cm. Salmiak zugefügt waren, wurde sie mit Ammoniak stark alkalisch gemacht, und durch Zusatz von schwefelsaurer Magnesia die Phosphorsäure als phosphorsaure Ammoniak-Magnesia (sogen. Tripelphosphat) gefällt, während die Schwefelsäure mit den in Lösung befindlichen Alkalien schwefelsaures Natron und schwefelsaures Kali bildete. Nach 24stündigem Stehen wurde der weisse krystallinische Niederschlag abfiltrirt, mit ammoniak- und salmiakhaltigem Wasser ausgewaschen und bei 100° C. getrocknet. Dieses getrocknete Pulver hatte die Zusammensetzung PO₅, 2 MgO, NH₁O + 2 aq; 10 Aequivalente Wasser waren beim Trocknen entwichen, die 2 noch übrigen nebst dem Ammoniak verflüchtigten sich beim Glühen der getrockneten Masse. Die Einäscherung und Gewichtsbestimmung wurde nach derselben Methode bewerkstelligt, wie bei dem vorerwähnten schwefelsauren Baryt. Nur ist noch zu bemercken, dass ich die vollständige Verbrennung des Filtrums oft erst durch Anfeuchtung mit einigen Tropfen Salpetersäure erzielen konnte. — Das geglühte Produkt, eine gräulich-weisse Masse war pyrophosphorsaure Magnesia, von welchem Salz natürlich nur die Phosphorsäure in Rechnung zu bringen war. Die aus diesem Wasserauszuge gewonnene Phosphorsäure hatte sich in der Asche begreiflicher Weise nur als an Alkalien gebunden vorfinden können. Berechnet wurde sie aus der pyrophosphorsauren Magnesia nach der Gleichung:

Das Atomgewicht der pyrophosphorsauren Magnesia (1407,05) verhält sich zum Atomgewicht der Phosphorsäure (891,55) = Gewicht der gefundenen pyrophosphorsauren Magnesia zu dem gesuchten Gewicht der Phosphorsäure; oder:

 $100,00:63,36=(2 \text{ Mg PO}^5):x.$ $x=0,6337 \times \text{pyrophosphors. MgO}=\text{Phosphorsiure.}$

Bezüglich der Eigenschaften des Niederschlages, und der beim Behandeln desselben beobachteten Vorsicht verweise ich auf die unten folgende Port. E b., wo aus dem Niederschlag der phosphorsaur. Ammon.-Magnesia die in dem Wasserauszuge enthaltene Magnesia bestimmt wird.

Weber will die Erfahrung gemacht haben, dass pyrophosphorsaure Magnesia durch Ammoniak nicht vollständig gefällt werde und räth deshalb, durch Glühen der Asche mit kohlensaurem Natron-Kali die etwa vorhandenen pyrophosphorsauren Salze vorher in dreibasische Salze zu verwandeln. Diese Vorsicht wird aber bei längerem Stehen und Wiederabdampfen des wässerigen Auszuges, wobei die zweibasisch phosphors. Salze wieder zu dreibasischen werden, überflüssig. Seinem Rathe würde ich übrigens doch gefolgt sein, wenn mir die Versuche mit essigsaurem Natron und Eisenchlorid in dem Filtrat die Reaktion auf Phosphorsäure selbst nach 24stündigem Stehen nicht versagt hätten. In dem wässerigen Auszug der Kohle wenigstens war also die Phosphorsäure vollständig durch Magnesiasalz und Ammoniak gefällt worden; dass auch in dem salzsaurem Auszuge die Fällung vollständig wurde, dafür sorgte ich durch die später anzugebenden Massregeln. ist noch zu bemercken, dass ich die vollständige Verbrennung

des Filtrums oft erst durch deleuchtung mit einigen Tropfen Salpeterskure erzielen konnte. - Das geglühte Produkt, eine

Bestimmung der Alkalien.

Die Flüssigkeit D wurde zur Trockne verdampft, geglüht und in Wasser wieder gelöst, diese Lösung mit Barytwasser versetzt, so lange ein neuer Niederschlag entstand, und eine Zeit lang erwärmt. Durch den Baryt wurden Schwefelsäure und Phosphorsäure, sowie Magnesia als Hydrat gefällt. Die in der Lösung vorhandenen Alkalien, nebst überschüssigem Baryt und allenfalls vorhandenem Kalk wurden durch Filtration von dem Niederschlage befreit, Baryt und Kalk aus der Lösung durch kohlensaures Ammoniak entfernt., das Filtrat verdampft und nach Zusatz von etwas Salzsäure langsam erwärmt und in einem tarirten Schälchen geglüht.

Dieser geglühte Rückstand, welcher aus Chlorkalium und Chlornatrium bestand, wurde nach dem Erkalten in dem Schälchen gewogen und nach Abzug des Schälchengewichtes die Menge der Chloralkalien notirt.

Die Chloralkalien wurden hierauf in wenig warmem Wasser nebst etwas Salzsäure gelöst, eine weingeistige Lösung von Platinchlorid im Ueberschuss zugesetzt und die so behandelte Flüssigkeit langsam eingedampft; hierauf absoluter Alkohol zugegossen, worin sich nur das Natronsalz lös'te, das Kalium dagegen als Kaliumplatinchlorid als zitronengelber Niederschlag ungelöst blieb. Mittlerweile hatte ich ein kleines Filtrum bei 100° C. getrocknet und gewogen. Durch dasselbe wurde diese weingeistige Lösung abfiltrirt, der Rückstand mit Alkohol von 80°/0 ausgewaschen, während das Filtrat noch einmal eingedampft, wie zuvor gelöst und zu dem ersten Niederschlag mit denselben Vorsichtsmassregeln filtrirt und ausgewaschen wurde. Zum Abspühlen des Schälchens bediente ich mich eines Spritusfläschchens, welches mit Weingeist gefüllt war.

Der Rückstand wurde dann sammt dem Filter bei 100° C. im Luftbade getrocknet, über Schwefelsäure abgekühlt und gewogen. Nach Abzug des Filtergewichtes erhielt ich die Menge des gewonnenen Kaliumplatinchlorids. Aus demselben berechnete ich das Chlorkalium nach der Proportion.

Das Atomgewicht des Kaliumplatinchlorids (3052,04) verhält sich zum Atomgewicht des Chlorkaliums (932,14) = das gefundene Kaliumplatinchlorid zum gesuchten Chlorkalium, oder:

$$100,00 : 30,54 = (Pt Cl_2 + K Cl) : x.$$

 $x = 0,3054 \times (Pt Cl_2 + K Cl) = Chlorkalium.$

Das gefundene Chlorkalium wurde von dem oben bestimmten Totalgewichte der Chloralkalien subtrahirt; der Rest ergab das Chlornatrium. Aus dem Chlorkalium und Chlornatrium ergaben sich Kali und Natron durch folgende Berechnung:

Das Atomgewicht des Chlorkaliums (932,15) verhält sich zum Atomgewicht des Kaliums (488,95) = gefundenes Chlorkalium zu gesuchtem Kalium; oder:

100,00 : 52,45 = (K Cl) : x. $x = 0,5245 \times K Cl = Kalium.$

Hi eraus ergab sich:

488,94 : 588,94 = Kalium zu Kali; oder:

83,02:100,00=K:x.

 $x = \frac{100 \text{ Kalium}}{83,02} = \text{Kali}; \text{ oder}:$

Man multiplizirt das gefundene Chlorkalium mit 0,63182; das Produkt = Kali.

Das Natron wurde aus der gefundenen Menge Chlornatrium aus folgenden Proportionen berechnet:

Das Atomgewicht des Chlornatriums (730,37) verhält sich zum Atomgewicht des Natriums (287,17) = das gefundene Chlornatrium zum gesuchten Natrium; oder:

100,00 : 39,32 = (Na Cl) : x. $x = 0,3932 \times Na Cl = Natrium:$

hieraus berechnete sich:

287,17 387,17 (Atomgewicht des NaO) = Na: NaO oder:

 $x = \frac{100 \text{ Na}}{74,17} = \text{Natron; oder:}$

man multiplizirte das gefundene Gewicht des Chlornatriums mit 0,53010; das Produkt ergab die Menge des Natrons.

Um mich von der Genauigkeit dieser Methode zu überzeugen, habe ich einmal den schon gewogenen Kaliumplatinchloridniederschlag geglüht, mit Salzsäure gekocht und die salzsaure Lösung filtrirt. Das Chlorkalium nebst überschüssiger Salzsäure gingen natürlich durch's Filter; aus dem rückständigen Platin berechnete ich, nachdem ich dasselbe stark geglüht hatte, das Kalium, welches in seiner Verbindung gewesen war.

Eine vergleichende Zusammenstellung des in letzterer Weise erhaltenen Kalium mit dem aus dem getrockneten Kaliumplatinchlorid berechneten gab übereinstimmende Zahlen; die Methode erschien mir somit als vollkommen zuverlässig.

Ausnahmsweise habe ich auch einige Male in der zur Alkalienbestimmung zu verwendenden Flüssigkeit nach den oben geschilderten Manipulationen den zur Entfernung der Erden u. s. w. beigefügten überschüssigen Baryt statt durch kohlensaures Ammoniak durch Schwefelsäure gefällt und entfernt und die Alkalien als neutrale schwefelsaure Salze bestimmt, welche sich durch Glühen mit der überschüssigen Schwefelsäure unter Zusetzung von etwas kohlensaurem Ammoniak gebildet hatten. Das Kali wurde dann mittlerweile aus Port. A nach Entfernung des Silbers durch Salzsäure als Kaliumplatinchlorid bestimmt, aus diesem erst Kali, dann schwefelsaures Kali berechnet, und letzteres Salz von den aus Port. D erhaltenen schwefelsauren Alkalien abgezogen, worauf das schwefelsaure Natron restirte. Die Berechnung der Alkali-Basen aus ihren schwefelsauren Salzen war einfach und geschah nach den bekannten Formeln:

I.

Das Atomgewicht des schwefelsauren Kali (1088,94) verhält sich zum Atomgewicht des Kali (588,94) = das gefundene schwefelsaure Kali zum gesuchten Kali; oder:

 $100,00 : 54,08 \implies (KO SO^3) : x.$ $x. = 0,5408 \implies (KO SO^3) \implies Kali.$

II.

Das Atomgewicht des schwefelsauren Natron (887,17) verhält sich zum Atomgewicht des Natron (387,17) = das Gewicht des gefundenen schwefelsauren Natron zum Gewicht des gesuchten Natron; oder:

 $100,00 : 43,64 = (NaO SO^3) : x.$ $x = 0,4364 \times (NaO SO^3) = Natron.$

Der einzige Vorzug dieser in der Praxis sonst sehr selten angewandten Methode der Alkalienbestimmung war für mich der, dass ich gleichzeitig mit den Gesammtalkalien in der Portion D das Gewicht des Kali aus dem überschüssigen Material der Portion A (vergl. S. 29) bestimmen konnte, wodurch ich wenigstens häufig Zeit gewann.

Das Natron wurde bei einigen Versuchen der Kontrolle halber aus der vom Kaliumplatinchloridniederschlage abfiltrirten Lösung direkt bestimmt, indem ich nach Eindampfen und heftigem Durchglühen des Filtrats das Natron mit Wasser löste und durch Filtriren vom Platin trennte. Diese natronhaltige Flüssigkeit wurde dann langsam eingedampft, mit Salzsäure befeuchtet und, damit nicht durch dekrepitirende Entweichung des mechanisch eingeschlossenen Krystall-Wassers ein Verlust an Salzpartikeln entstehe, nach und nach erhitzt, darauf schwach geglüht, gewogen und als Chlornatrium bestimmt. Da ich jedoch jedesmal befriedigende Resultate erzielte, so wurde später, um Zeit zu ersparen, diese Kontrolloperation unterlassen.

E.

Bestimmung von Kalk und Magnesia.

a.

Bestimmung von Kalk.

Der mit Essigsäure versetzten Lösung E wurde oxalsaures Ammoniak zugesetzt, so lange noch ein Niederschlag von oxalsaurem Kalk entstand. Dieser Niederschlag wurde nach 24 Stunden filtrirt und zu einem feinen weissen Pulver getrocknet, dieses Pulver, welches aus CaO + C₂ O₃ + 1 aq. bestand, zur Verjagung des Wassers und Verwandlung der Oxalsäure in Kohlensäure bis zur schwachen Rothglühhitze im Platintiegel erhitzt, darauf vorsichtig mit einem Glasstäbchen einige Tropfen concentrirte hohlensaure Ammoniaklösung zugesetzt (um den durch Glühen entstehenden Aetz-Kalk wieder in kohlensauren zu verwandeln), der Tiegel dann schwach und allmälig noch einmal geglüht und der kohlensaure Kalk nach dem Erkalten gewogen. Der Kalk berechnete sich aus diesem kohlensauren Salz nach Abzug des Tiegelgewichts durch die Formel:

Das Atomgewicht des kohlensauren Kalks (625,00) verhält sich zum Atomgewicht des Kalks 350,00 = das gefundene

Gewicht des kohlensauren Kalks zum gesuchten Gewicht des Kalks; oder:

 $100,00 : 56,00 = (CaO CO^2) : x.$ $x = 0,5600 \times (CaO CO^2) = Kalk.$

b.

Magnesiabestimmung.

Das vom oxalsauren Kalk getrennte Filtrat liess, mit überschüssigem Ammoniak und Salmiak versetzt, alle Magnesia als basisch-phosphorsaure Ammoniak-Magnesia (PO₅, 2MgO, NH₄O + 12aq) zu Boden sinken, sobald man eine Lösung von phosphorsaurem Natron im Ueberschuss zugefügt und die Mischung mit einem Glasstabe hinlänglich gerührt hatte. Dieser Niederschlag blieb stehen bis zum folgenden Tage; dann wurde er auf ein Filtrum gebracht, und die am Glase anklebenden Krystalle mittels einer Federfahne auf das Filtrum hinzugespühlt. Nach vollständigem Ablaufen der Flüssigkeit wurde der Niederschlag mit ammoniakhaltigem Wasser 2 Stunden lang ausgewaschen, dann getroknet, vom Filter gelöst und in einem bedeckten Platintiegel erst gelinde, dann heftig geglüht. Das vom Niederschlag möglichst sorgfältig befreite Filtrum wurde auf einem Platinblech inzwischen langsam verbrannt, die Filterasche dem geglühten Niederschlage beigegeben, beides noch einmal zusammen stark geglüht, und dadurch das Ammoniak verjagt; darauf wurde die geglühte Masse zum Erkalten unter die Glasglocke gestellt und gewogen als pyrophosphorsaure Magnesia (PO₅ + 2MgO). Es verhält sich aber das Atomgewicht der pyrophosphorsauren Magnesia (1407,05) zum doppelten Atomgewicht der Magnesia (515,50) = die gefundene Menge pyrophosphorsaure Magnesia zur gesuchten Menge Magnesia; oder:

 $100,00 : 36,64 = (PO^5 + 2MgO) : x.$ $x = 0,3664 \times (PO^5 + 2MgO) = Magnesia.$

II.

Im Wasser unlöslicher Antheil des wässerigen Aschenauszugs.

Da die Untersuchung dieses Aschentheiles nach derselben

Methode ausgeführt wurde, wie die des ursprünglich durch Wasser nicht ausgezogenen Rückstandes, so erlaube ich mir, auf die sub III nachfolgende Analysirungsmethode zu verweisen. Nur sei noch bemerkt, dass ich, durch einige Vorversuche von der Abwesenheit der Schwermetalle in dem nach III behandelten, zu II gehörigen Material überzeugt, später zur Prüfung auf dieselben übergehen konnte. Nur auf Eisen und Mangan musste in II jedesmal besondere Rücksicht genommen werden.

HHH.

Die von dem wässerigen Auszug und der Kohle befreite rückständige Asche.

Die ganze gewogene Masse wurde erst mit Salpetersäure gelöst, und in dem löslichen filtrirten Antheil mit salpetersaurem Silber eine Reaktion auf Chlor gemacht. Da sich die Abwesenheit desselben in mehreren auf einander folgenden Fällen constatirte, so habe ich diese zeitraubende Probe in der Folge unterlassen. Nachdem ich das Silber durch Salzsäure herausgefällt, sorgfältig gewaschen und im Filtrat durch eine Probe mit Salzsäure mich von der Abwesenheit des Silbers überzeugt hatte, fügte ich die salpetersaure Lösung zu dem in Salpetersäure unlöslich gebliebenen Rückstande, goss concentrirte Salzsäure hinzu und digerirte mehrere Stunden lang auf dem Wasserbade; den hierbei unlöslich bleibenden Rückstand sammelte ich auf einem Filter und glühte ihn, nachdem er gehörig ausgewaschen und getrocknet war, heftig durch. Das Filtrat dampfte ich stark zur Trockne ein und übergoss es sodann mit wenig Salzsäure. Der gallertartige Niederschlag welcher sich in dieser Flüssigkeit nach Verdünnung mit Wasser deutlich abschied, wurde auf's Filter gebracht und nachdem er vollständig ausgewaschen war, getrocknet, geglüht und mit dem in Königswasser unlöslich gebliebenen Rückstande vereinigt, um als Kieselsäure gewogen zu werden. Zur Probe wurde diese gewogene Kieselsäure mit Soda zusammengeschmolzen, wobei sich in Wasser lösliches kieselsaures Alkali bildete. Auf Zusatz von Salzsäure schied sich dann die Kieselsäure wieder aus und fiel gallertartig nie-

der, während das Natron mit dem Chlor der Salzsäure in Verbindung trat. Das Gewicht der abgeschiedenen Kieselsäure ergab sich dem Gewicht derselbenbei der ersten Bestimmung in der Regel vollkommen gleich, was mir für die Korrektheit des eingeschlagenen Verfahrens bürgte. Die von der Kieselsäure getrennte saure Flüssigkeit wurde bis nahe zur Trockne eingedampft und kochendes Wasser zugesetzt bis sie nur schwach gelblich gefärbt, übrigens aber ganz hell und durchsichtig war. Hierauf wurde ein Strom Schwefelwasserstoffgas 2 Stunden lang hindurch geleitet, und der entstehende Niederschlag nach Farbe und Volumen beurtheilt. Nachdem sich dieser Niederschlag von Schwefelmetall hinlänglich gesenkt hatte, und die im Becherglase überstehende Flüssigkeit völlig hell geworden war, filtrirte ich ab und wusch den Rückstand mit Schwefelwasserstoff haltigem Wasser rein aus, worauf ich den Niederschlag von dem Filtrum mittels der Spritzflasche möglichst löste und nebst der Filterasche mit Salpetersäure kochte. Hierdurch wurden die Schwefelmetalle unter Bildung von salpetersauren und schwefelsauren Salzen gänzlich gelöst. Diese salpetersaure Lösung wurde dann etwas eingedampft, mit Wasser verdünnt und durch Filtration von dem darin suspendirten zusammengeballten Schwefelüberschuss befreit, in dem Filtrat darauf mit verdünnter Schwefelsäure das etwa vorhandene Blei gefällt; nach 48 Stunden wurde das entstandene schwefelsaure Bleioxyd auf ein kleines Filter gebracht und die letzten Spuren aus dem Becherglase sorgfältig nachgespühlt. Nur zweimal jedoch ist es mir gelungen, das Blei durch direkte Wägung zu bestimmen. Die Methode, der ich mich bei spurweise vorhandenem Blei bediente, wird unten bei den Einzelanalysen angeführt werden.

Die vom schwefelsauren Blei abfiltrirte, oder wenn keine Bleireaktion erfolgte, ursprüngliche salpetersaure Lösung wurde zur Untersuchung auf Kupfer verwendet. Zu diesem Zwecke wurde sie zur Verjagung der Säure eingedampft, und durch Zusatz von Wasser verdünnt; diese verdünnte Flüssigkeit wurde sodann über dem Wasserbade fast bis zum Kochen 10 Minuten lang erhitzt und inzwischen reine verdünnte Kalilauge zugesetzt, so lange noch ein Niederschlag entstand. Nachdem sich derselbe deutlich abgesetzt hatte, wurde zuerst die Flüs-

sigkeit auf ein Filtrum gebracht; sodann der Niederschlag mit heissem Wasser (zur vollständigen Lösung des Kali's) ebenfalls auf's Filtrum nachgespühlt und ausgewaschen. Der getrocknete Niederschlag wurde auf einem gewogenen kleinen Porzellanscherben über der durch Luftzug verstärkten Gasflamme heftig geglüht, die Filterasche hinzugefügt, nach einigem Abkühlen rasch unter die Glasglocke über Schwefelsäure gebracht und fast noch warm gewogen, weil sonst das Kupferoxyd wegen seiner hygroskopischen Eigenschaft leicht eine fehlerhafte Gewichtsvermehrung erlitten hätte.

Während die bis dahin abgehandelten Stoffe des in Wasser unlöslichen Aschenrückstandes jedesmal, wegen des seltenen Vorkommens derselben, nach und nach aus dem ganzen vorhandenen Aschen-Material bestimmt wurden, schlug ich bei der Analyse der noch übrigen Verbindungen der Phosphorsäure, des Eisenoxyds, des Kalks, der Magnesia, der Schwefelsäure und der allenfalls noch vorhandenen Alkalien, das schonbeim wässerigen Auszuge besprochene Verfahren ein, indem ich den gesammten sauren Aschenauszug, aus welchem die obengenannten drei Verbindungen: Kieselsäure, Blei- und Kupferoxyd bereits bestimmt waren, in 4 gleiche Volums-Portionen theilte und gleichzeitig nach folgender Methode behandelt.

Portion A.

Bestimmung des phosphorsauren Eisenoxyds, der phosphors. Erden.

Die schwefelsaure Flüssigkeit wurde mit Ammoniak übersättigt und der entstandene, von dem vorhandenen Eisen gewöhnlich röthlich-gelb gefärbte Niederschlag im bedeckter Becherglase einige Stunden stehen gelassen. Darauf wurde er auf einem Filter gesammelt, mit ammoniakhaltigem Wasserausgewaschen, sammt dem Filter in einer Porzellanschale aus gebreitet, mit einigen Tropfen Essigsäure beträufelt, das Filtrum sodann mittels der Spritzflasche von den anhängender Theilen des Niederschlages gründlich befreit, und das ganze mustellen des Niederschlages gründlich befreit, und das ganze mustellt. Hierdurch hatte das phosphorsaure Eisen, gewöhnlich abe auch ein Theil des pyrophosphorsauren Kalks (PO⁵ + ₂Cal + HO) welcher wahrscheinlich durch die Einwirkung der Einwirkung der Eisen,

nommen hatte, seine Löslichkeit nicht verloren; konnte demnach durch Filtration von dem grössten Theile des phosphorsauren Kalks und der pyrophosphorsauren Magnesia, so wie von der überschüssigen Phosphorsäure getrennt und auf dem Filtrum gesammelt werden. Nach dem Auswaschen dieses Filterinhaltes wurde derselbe mit dem Filter getrocknet, geglüht und gewogen. Hierdurch erhielt ich die Menge des phosphorsauren Eisenoxyds + pyrophosphorsauren Kalk.

1.

Bestimmung des phosphors. Eisens.

Diese gewogene Masse wurde nun wieder in wenig Salzsäure gelös't, eine zur Verdünnung hinreichende Quantität Wasser zugesetzt, das Ganze zu einem geringen Volumen eingedampft, und etwas verdünnte Schwefelsäure eingeträufelt, die Mischung hierauf in ein Medizinglas übergegossen. Auf Zusatz von dem dreifachen Volumen absoluten Alkohols fiel der in der Flüssigkeit enthaltene Kalk als schwefelsaurer Kalk nieder, den man sich in dem mit einem Korkstöpsel sorgfältig verschlossenen Glase 24 Stunden lang senken liess. Alsdann wurde dieser Niederschlag abfiltrirt, mit etwas verdünntem und zur grösseren Vorsicht schliesslich mit absolutem Alkohol ausgewaschen, getrocknet, geglüht und gewogen.

Die Differenz zwischen dem oben berührten Gesammtgewicht des in Essigsäure unlöslich gebliebenen Rückstandes und
dem Gewicht des aus dem schwefelsauren Kalk berechneten
phosphorsauren Kalkes war die Menge des vorhandenen phosphorsauren Eisenoxyds (3 PO⁵ + 2 F²O³). Von diesem Salze musste
sowohl die Säure, wie die Basis in Rechnung gebracht werden,

weil beide dem zu suchenden Material angehörten.

Da ich mit der Zeit ökonomisch zu Rath gehen musste, habe ich die zeitraubende direkte Bestimmung des Eisens etwa durch Fällung mit Schwefelammonium aus der neutralisirten Flüssigkeit unterlassen. Uebrigens waren die aus den verschiedenen Gewichtsberechnungen sich ergebenden Data so zuverlässig, dass sie wohl keiner Correktur durch direktere Anablyse bedurften.

Von dem nach dem obigen Verfahren erhaltenen schwefelsauren Kalk war natürlich die Schwefelsäure, welche als Reagens bloss hinzugefügt war, nicht den anorganischen Organbestandtheilen beizurechnen. Der Kalk wurde daher aus diesem schwefelsauren Salze nach folgender Formel berechnet.

Das Atomgewicht des schwefelsauren Kalks (850,00) verhält sich zum Atomgewicht des Kalkes (350,00) = die gefundene Menge schwefelsauren Kalks zu der gesuchten Menge Kalk; oder:

 $100,00 : 41,18 = (CaO + SO^3) : x.$ $x = 0,4118 \times (CaO + SO^3) = Kalk.$

Da übrigens dieser Kalk in der analysirten Aschenlösung als phosphorsaure Kalkerde zugegen gewesen war, und zwar in dem geglühten und nach dem Glühen gewogenen Niederschlage als pyrophosphorsaurer Kalk (PO⁵ ₂CaO), so musste nebst dem Kalk auch noch die zu demselben gehörige Phosphorsäure in Anschlag gebracht werden. Ich berechnete dieselbe nach der Proportion:

Es verhält sich das doppelte Atomgewicht des Kalks = 56 zum Atomgewicht der Phosphorsäure = 71,36 wie das Gewicht des gefundenen Kalks zum Gewicht der gesuchten Phosphorsäure (56: 71,36 = 2CaO: PO⁵) oder:

Ich multiplizirte den gefundenen Kalk mit 1,2743, um die Menge der Phosphorsäure zu finden, welche sich mit demselben zu PO⁵ + 2 CO verbunden hatte.

2. a.

Bestimmung des Kalks.

Das Filtrat von dem in Essigsäure ungelösten Niederschlage wurde während der eben beschriebenen Operation gleichzeitig, nachdem ich es zur Fällung der Kalkerde mit einer Lösung von oxalsaurem Ammoniak versetzt hatte, 24 Stunden lang in einem verkorkten Medizinglase zurückgestellt; hierauf der Niederschlag abfiltrirt, mit Wasser ausgewaschen und das Filtrat in einem Becherglase aufgefangen. Der Niederschlag selbst wurde bei mässigem Wärmegrade getrocknet, möglichst vollständig vom Filtrum abgelöst, und letzteres in einem gewogenen Platintiegel vollständig verbrannt. Die erkaltete Aschebeträufelte ich dann mit einigen Tropfen concentrirter Lösung

von kohlensaurem Ammoniumoxyd und liess es auf dem Sandbade langsam verdunsten, wodurch dann die etwa durch das Glühen entwichene Kohlensäure des am Filtrum zurückgebliebenen kohlensauren Kalks wieder ergänzt wurde. — Darauf wurde der oxalsaure Kalk der Filterasche im Platintiegel beigefügt und so lange mit derselben über der Gasflamme einer schwachen Rothglühhitze ausgesetzt, bis sämmtlicher oxalsaurer Kalk in kohlensauren verwandelt war, was man in 10—15 Minuten erzielt hatte.

Eine Prüfung mit einem befeuchteten Streisen Curcumapapier überzeugte mich, wenn es durch die Berührung mit der Asche nicht braun gefärbt wurde, von der Abwesenheit kaustischen Kalks.

Ich liess dann den gräulich-weissen kohlensauren Kalk über Schwefelsäure langsam erkalten, und bestimmte nach dem Wägen die Menge des Kalkes durch Multiplikation des kohlensauren Kalks mit 0,560; denn das Atomgewicht des kohlensauren Kalks verhält sich zum Atomgewicht des Kalks wie der gefundene kohlensaure Kalk zum gesuchten Kalk; oder:

x = 0.56 (CaO CO²) = Kalk.

Der gefundene Kalk konnte dem Kalke beigezählt werden, den ich schon früher aus dem schwefelsauren Kalk gewonnen hatte.

der gefundenen pyrophosphordergen Magnesia mit O,6408.

Bestimmung der phosphorsauren Bittererde.

Die von dem oxalsauren Kalk abfiltrirte Flüssigkeit wurde mit Ammoniak stark übersättigt, wodurch phosphorsaure Ammoniak-Magnesia gefällt wurde. Den andern Tag wurde dieser Niederschlag abfiltrirt, mit ammoniakhaltigem Wasser ausgewaschen und getrocknet. Die getrocknete phosphorsaure Ammoniak-Magnesia wurde vom Filtrum möglichst rein abgesondert und über der Gasflamme in einem gewogenen Platintiegel geglüht, während gleichzeitig das Filtrum, nachdem man es mit einigen Tropfen Salpetersäure befeuchtet und gelinde erwärmt hatte, über einer anderen Gasflamme eingeäschert und die Asche der Salzmasse hinzugefügt wurde. Durch das Flühen war das Ammoniak verflüchtigt und das Tripelphos-

phat in phosphorsaure Magnesia umgewandelt worden. Sowohl die Säure als die Basis dieses Salzes waren in dem zu untersuchenden Aschenmaterial ursprünglich enthalten; es mussten also auch beide in Rechnung gesetzt werden. Aus der nach dem Erkalten und Wägen erhaltenen Gewichtszahl berechnete sich demnach

a) Die Magnesia nach der Proportion:

Das Atomgewicht der pyrophosphorsauren Magnesia (1407,05) verhält sich zum doppelten Atomgewicht der Magnesia (515,05) = die gefundene Menge pyrophosphors. Magnesia zur gesuchten Menge Magnesia; oder:

 $100,00:36,64 = (2 \text{ MgO} + \text{PO}^5): x.$ $x = 0,3664 \times (2 \text{ MgO} + \text{PO}^5) = \text{Magnesia}$ erhält auch die Magnesia durch Multiplikation de

oder man erhält auch die Magnesia durch Multiplikation des gefundenen pyrophosphorsauren Salzes mit 0,3592.

b) Die Phosphorsäure-Menge ergibt sich aus der Proportion:

Das Atomgewicht der pyrophosphorsauren Magnesia (1407,05) verhält sich zum Atomgewicht der Phosphorsäure (891,55) = die gefundene Menge pyrophosphors. Magnesia zur gesuchten Menge Phosphorsäure; oder:

100,00 : 63,36 = (2 MgO PO⁵) : x x = 0,6336 × (2 MgO PO⁵) = Phosphorsäure oder man erhält die Phosphorsäure auch durch Multiplikation der gefundenen pyrophosphorsauren Magnesia mit 0,6408.

Die von dem oxalsauren 2.c. abfiltrirte Flüssigkeit wurde

Bestimmung der phosphorsauren Bittererde.

Bestimmung der Phosphorsäure.

Die von dem Kalkerdeniederschlag abfiltrirte ammoniakalische Flüssigkeit wurde (unter gleichzeitigem Zusatz von
Chlorammonium) mit einer Lösung von schwefelsaurer Magnesia versetzt. Hierdurch wurde die ganze Menge der in der
Flüssigkeit noch vorhandenen Phosphorsäure als phosphorsaure Ammoniak-Magnesia gefällt. Die Behandlung und Berechnung dieses Niederschlages geschah ganz in derselben Weise,
wie ich es (Seite 33) bei der Phosphorsäure-Bestimmung beschrieben habe.

3.

testimmung des Kalks und der Magnesia, die nicht an Phosphorsäure gebunden waren, sowie der Alkalien.

Während der unter 1 und 2 beschriebenen Manipulationen vurde die vom ersten Ammoniak-Niederschlag der Port. A abiltrirte Flüssigkeit zu gleicher Zeit auf diejenige Kalk- und lakerde geprüft, welche auf Zusatz von Ammoniak nicht geällt, folglich nicht als Phosphate in der Substanz zugegen waren.

3. a.

Bestimmung des Kalks.

Die Bestimmung des Kalks geschah nach folgendem Verihren: Die ammoniakalische Lösung wurde zur Verjagung des
rösseren Theils Ammoniak langsam bis zu einer mittelmässigen
bonsistenz verdampft; darauf mit Essigsäure schwach überättigt und mit Oxalsäure gefällt. Dieser Niederschlag von
xalsaurem Kalk wurde dann weiter behandelt und gewichtich bestimmt nach Port. A. 2. a.

3. h.

Verfahren die Menge der verhand

Bestimmung der Magnesia.

In dem vom oxalsauren Kalk geschiedenen Filtrat wurde ie Magnesia bestimmt durch Zusatz von Phosphorsäure, nachem vorher die essigsaure Flüssigkeit ammoniakalisch gemacht orden war. Die weitere Behandlung des entstandenen Tripelhosphatniederschlags geschah nach Port. A. 2. b. Dass die hosphorsäure, weil sie blos als Reagens zugefügt war, von em Gewicht der resultirenden pyrophosphorsauren Magnesia bgezogen wurde, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

Anmerkung zu Port. A. szemistoriasora

Die von dem zuletzt erwähnten Niederschlag abfiltrirte lüssigkeit benutzte ich noch zur vergleichenden Bestimmung er Alkalien, welche übrigens inzwischen auch schon aus Port. bestimmt worden waren. Zu diesem Behufe brauchte die ösung nur noch von der überschüssig zugesetzten Magnesia efreit zu werden. Dieses geschah durch überschüssiges Battwasser, welches die Magnesia als Hydrat fällte. In dem

von diesem Niederschlag befreiten Filtrat wurde der Baryt durch Uebersättigen mit verdünnter Schwefelsäure gefällt. Nachdem nun auch der schwefelsaure Baryt durch Filtriren und Auswaschen entfernt war, wurde die Flüssigkeit auf Kali und Natron geprüft, indem sie eingedampft, der Rückstand in einem Platintiegel mit der noch vorhandenen Schwefelsäure allenfalls unter Zusatz von einem kohlensauren Ammoniakkryställchen langsam erhitzt und endlich heftig geglüht wurde. Die Gegenwart des hohlensauren Ammoniak sollte nämlich dazu dienen, das saure schwefelsaure Salz leicht in das neutrale umzuwandeln.

Das übrige Verfahren war im Allgemeinen dasselbe, wie das bei dem in Wasser löslichen Aschenauszug (nach Seite 34 f.) eingeschlagen.

Portion B.

Bestimmung der Schwefelsäure.

Die saure Flüssigkeit wurde mit Chlorbaryum versetzt, und nach dem beim wässerigen Aschenauszug (Seite 31 f.) mitgetheilten Verfahren die Menge der vorhandenen Schwefelsäure bestimmt.

Portion C.

Bestimmung des Mangans.

Nachdem wie in Port. A sämmtliche Erdphosphate niedergeschlagen, und der ammoniakalische Niederschlag in Essigsäure theilweise wieder gelöst worden war, wurde in der essigsauren Lösung die Untersuchung auf Mangan vorgenommen. Mehrere Versuche hatten nämlich ergeben, dass die Organasche nie ein in der essigsauren Flüssigkeit unlössliches Mangansalz enthielt.

Um also das Mangan, welches in der essigsauren Lösung Phosphorsäuresalz enthalten war, zu finden, wurde vorerst der Kalk durch oxalsaures Ammoniak wie in Port. A gezeigt, gefällt und entfernt. Beim Behandeln des Filtrats mit Ammoniak fiel nun neben der phosphorsauren Ammoniak-Magnesia auch das Mangan als phoshorsaures Ammoniak-Manganoxydul nieder. Der so erhaltene Niederschlag wurde mit ammoniakhaltigem Wasser ausgewaschen, getrocknet, geglüht und gewogen; darauf wurde die gewogene Masse mit kohlensaurem

latron zusammengeschmolzen, wodurch die Phosphorsäure des lagnesia- und Mangansalzes mit dem Alkali in Wasser lösliche alzverbindungen einging, während die Magnesia und das Manan auf Behandlung mit Wasser ungelöst zurückblieben. Dieer Rückstand wurde auf ein Filtrum gebracht, ausgewaschen nd mit Salzsäure vollständig wieder gelöst. Nachdem diese alzsaure Lösung etwas verdampft und mit Ammoniak überättigt war, wurde das Mangan durch Schwefelammonium nach nd nach als fleischrother, blass opalisirender Niederschlag on Schwefelmangan erkannt. Dieser Niederschlag wurde nun benfalls nach 24 Stunden abfiltrirt, mit schwefelammoniumaltigem Wasser ausgewaschen, wiederum in Salzsäure gelöst nd mit kohlensaurem Natron digerirt, wobei das Mangan, wenn inreichende Spuren vorhanden waren, als Oxydulhydrat gefällt zurde. Dieser Niederschlag wurde nach einigen Stunden auf inem kleinen Filter gesammelt, ausgewaschen, getrocknet, gelüht und als Manganoxydoxydul gewogen. Da dieses Mangan a dem Ammoniakniederschlag der Phosphate als phosphoraures Oxydulsalz ähnlich wie das Eisen sich befand, und auch nit der Magnesia zugleich als Tripelphosphat gefällt wurde, o musste zur genauen Bestimmung folgende Berechnung vorrenommen werden:

Durch Multiplikation der gefundenen Menge Manganoxyduloxyd mit 0,721 erhielt ich die Menge des Mangans; das Manganoxydul erhielt ich, indem ich das Mangan mit 1,219 muliplizirte. Aus dem Manganoxydul berechnete ich sodann die Phosphorsäure nach der Proportion:

Das doppelte Atomgewicht des Manganoxyduls (888,88) vernält sich zum Atomgewicht der Phosphorsäure (891,55), wie sich verhält die gefundene Menge Manganoxydul zur gesuchen Menge Phosphorsäure; oder:

Ich multiplizirte das gefundene Manganoxydul mit 1,003.

Das phosphorsaure Manganoxydul erhielt ich durch die Proportion:

Das doppelte Atomgewicht des Manganoxyduls verhält sich zum Atomgewicht des phosphorsauren Manganoxyduls, wie die zefundene Menge Manganoxydul zur gesuchten Menge phosphorsaur. Manganoxydul; oder: 888,88:1780,43 = MnO: x.

x = MnO × 3,006 = phosphorsaures Manganoxydul. Das so gefundene phosphorsaure Manganoxydul musste, um das richtige Gewicht der in Port. A erhaltenen phosphorsauren Magnesia zu finden, von derselben in Abzug gebracht; die an das Mangan gebundene Phosphorsäure dafür der nach der Magnesiabestimmung noch erhaltenen Phosphorsäure zugezählt werden.

Die oben beschriebene Methode der unmittelbaren Gewichtsbestimmung des Mangans durch Wägung des geglühten Niederschlages von [2 (MnO, CO₂) + aq] = Manganoxyduloxyd konnte wohl in Anwendung bleiben, wenn die Quantität nur irgendwie wägbar schien. Allein wenn sich beim Kochen mit kohlensaurem Alkali nur kaum merkbare, hier und da in der Flüssigkeit zerstreute weissliche Flöckehen zeigten, so konnte von einer Wägung dieser Spuren nicht die Rede sein. Ich schug den unter diesen Umständen zuverlässigsten Weg ein, indem ich aus einer Pipette tropfenweise eine verdünnte Manganlösung, deren Gehalt an Manganoxyduloxyd ich vorher bestimmt hatte, zu einer Auflösung von kohlensaurem Natron setzte, bis durch Digeriren die in dieser Flüssigkeit entstehende Trübung derjenigen gleich war, welche ich in der zu untersuchenden Flüssigkeit bekommen hatte; hierauf zählte ich an der graduirten Pipette die verbrauchten Volumstheile der gleichmässig verdünnten Flüssigkeit nach Cub. Cm. ab, berechnete aus dem bekannten Gehalt der künstlich erhaltenen Totallösung an Mangan den Gehalt des angewandten Volumtheils an diesem Metall: 'die erhaltene Ziffer konnte ich wenigstens annährend als Gewichtsangabe für das in der Drüsenasche vorhandene Mangan aufstellen.

Einige Versuche zur qualitativen Nachweisung des Mangans bei geringen Aschenmengen, wie z. B. in den Lungen und Nieren eines Neugebornen, in Leber und Milz einer Katze und eines jungen Hundes, bald durch Zusammenglühen der Asche mit Soda auf Platinblech, um grünes, mangansaures Alkali zu erhalten, bald durch Erhitzen der Oxydullösung mit Mennige und Salpetersäure, um purpurrothe Färbung (durch Bildung von Uebermangansäure) zu erzielen, gaben negative Resultate

Nur zweimal: bei der Leber eines alten Hundes, und der Mieren einer Katze kochte ich die nach Fällung mit Schwefel

mmonium und Wiederlösen in Salzsäure erhaltene Manganrerbindung mit einer verdünnten Auflösung von unterchlorigsaurem Kali und erhielt eine deutlich rothe Färbung der Flüssigkeit, deren untere Schichte eine mehr dunkle Schattirung
annahm, was wohl durch Bildung von Superoxydhydrat bedingt
war, während in den oberen Schichten blass röthliches übermangansaures Kali sich zeigte.

Aus der Flüssigkeit, welche vom Schwefelammoniumniederschlag abfiltrirt war, habe ich in einigen Fällen noch die Magnesia durch phosphorsaures Natron bestimmt, um bei der etwas verwickelten Berechnung der aus der Port. A erhaltenen Magnesia eine vergleichende Probebestimmung zu bekommen. Da übrigens diese Versuche stets befriedigende Resultate gaben,

so konnte ich sie in der Folge unterlassen.

Portion D. Bestimmung der Alkalien.

Die Alkalien wurden bestimmt, indem man die Flüssigkeit zur Trockne eindampfte und glühte. Diese geglühte Masse wurde hierauf mit heissem Wasser vollständig ausgelaugt, die geklärte Flüssigkeit vom unlöslichen Rückstand durch Filtration getrennt, mit überschüssigem Barytwasser und etwas Ammoniak versetzt und einige Stunden stehen gelassen. Nachdem der Niederschlag abfiltrirt und ausgewaschen war, wurde im Filtrat der überschüssige Baryt und der Kalk mit kohlensaurem Ammoniak gefällt. Nachdem auch dieser Niederschlag der kohlensauren Erden durch Filtration entfernt und ausgewaschen war, goss ich die zu einem geringen Volumen eingedampfte, noch übrig gebliebene Flüssigkeit nach und nach in ein gewogenes Porzellanschälchen, liess zur Trockne eindampfen, spülte den Rest der Flüssigkeit mehre Male mit einigen Tropfen destillirten Wassers aus der Spritzflasche ebenfalls in das Schälchen nach und liess wieder auf dem Sandbade eintrocknen, so lange bis ich alle Spuren der die Alkalien enthaltenden Flüssigkeit zusammengebracht hatte. Hierauf wurden in das Schälchen einige Tropfen Salzsäure geträufelt, wodurch die im Schälchen befindlichen Alkalien nach gelindem Erhitzen und darauf folgendem stärkeren Glühen in Chlorkalium und Chlornatrium verwandelt wurden. In anderen Fällen hatte ich statt der Salzsäure Schwefelsäure zugegeben, um die Alkalien in schwefelsaure Salze zu verwandeln. Die weiteren Proceduren für beide Fälle habe ich bereits bei der Alkalien-Bestimmung im wässerigen Aschenauszug (Seite 34) abgehandelt. Ich erlaube mir daher, auf diese Stelle meiner Abhandlung zu verweisen.

Nachdem ich in den vorausgehenden Blättern den ausführlichen Plan dargelegt, nach welchem ich bei der Untersuchung der Drüsenaschen gearbeitet habe, glaube ich dieser Beschreibung des analytischen Ganges mit steter Berufung auf denselben die Untersuchungsresultate selbst unmittelbar anreihen zu dürfen. Ich beginne daher mit der

Leber eines Irren,

(männliches Individuum, 56 Jahre alt.)

Das Organ wurde nach der Obduktion der Leiche von Hrn. Prof. Virchow als normal bezeichnet.

Totalgewicht des Organs 1495 Grm.

Wasserbestimmung. (S. Seite 20)

Gewichtsverlust-Wasser

Hierzu wurden 2 Portionen verwendet:								
I. 8,314 Grm.								
II. 2,556 Grm.								
Summa der zur Wasserbestimmung ver-								
wendeten Substanzen 10,870 Grm.								
Die erstere Portion wog im frischen Zustande mit dem								
Schälchen								
Schälchen 19,711 Grm.								
nasse Substanz 8,314 Grm.								
nach der ersten Wägung 21,882 Grm.								
nach der letzten Wägung 21,870 Grm.								
Schälchen 19,711 Grm.								
getrocknete Substanz 2,159 Grm.								
Hieraus ergibt sich:								
nasse Substanz 8,314 Grm.								
trockne Substanz 2,159 Grm.								
Comish toward Wassey Cast Com								

6,155 Grm.

gibt auf 100 Theile Substanz nach der Proportion:

Das bekannte Gewicht der Substanz (1495 Grm.) verhält sich zum bekannten Gewicht des Wassers (1106,669 Grm.) = 100: x

x = 74,031 = prozentischen Wassergehalt; folglich hatte die Leber dieses Geisteskranken:

B.

Zur Einäscherung (S. Seite 22.)

vurden verwendet 1495 Grm. frische Substanz, indem die zur Vasserbestimmung genommene Quantität 10,870 Grm. schliessich noch dem verbrennenden Material zugegeben wurde. Beüglich der Prozedur des Verbrennens erlaube ich mir der Kürze halber auf die oben ausführlich besprochene Methode m Allgemeinen zurück zu verweisen. Einige Beachtung verienen noch folgende Phänomene.

Das Aufguellen der Substanz war so bedeutend und hefg, dass die Quantität in 1/2 Minute bis zu ihrem achtfachen Voluien ausgedehnt wurde. Die Kohle bildete eine schwammig poröse eichte Masse, welche täuschende Aehnlichkeit mit der Zuckerohle hatte. Diese morphotische Erscheinung, sowie auch der inverkennbare Geruch nach Syrup, welchen die langsam vercohlende Substanz verbreitete, deutet schon unzweifelhaft auf len beträchtlichen Zuckergehalt der Leber. Unter allen Drüen entwickelte die Lebersubstanz beim Verbrennen auch die neisten brennbaren Gase; trotzdem war die Kohle oft hartnäckiger ugegen als in der Milz oder anderen Drüsenaschen, unter Andeem wahrscheinlich wegen Bildung von Cyanverbindungen. Die sche dieser Leber war gräulich weiss, hin und wieder uneutlich grün und blau tingirt. (Deutet auf Eisen und Cyan.) Mit alzsäure übergossen, entwickelte sie keine Kohlensäure. Die keaktion vor dem Uebergiessen mit Salzsäure war neutral.

Der aus der Kohle mit Wasser ausgezogene
Salzgehalt betrug 10,986 Gr.
Aus der weissgebrannten Asche wurde mit
Wasser noch ausgezogen 3,026 Gr.
im Wasser lösliche Stoffe
Die noch übrig bleibende, in Wasser unlös-
liche Asche wog 2,489 Gr.
unverbrennliche Substanz für das ganze Organ 16,504 Gr.
Hieraus ergibt sich
auf 100 Theile trockne Substanz 4,247 Asche.
auf 100 Theile frische Substanz:
organische Substanz 24,866
Asche 1,103
Wasser
100,000

H.

In Wasser lösliche Salze.

Von den in Wasser unlöslichen geglühten Bestandtheilen (14,012 Grm.) wurde zur Spezialanalyse nur ¹/₁₀ abgewogen. Durch das Glühen waren sie in Wasser grossentheils unlöslich geworden. Ich dampfte noch einmal ein und beträufelte die Masse mit einigen Tropfen Salpetersäure, kochte, goss Wasser hinzu und digerirte noch ¹/₂ Stunde. Nach dem Erkalten goss ich die Flüssigkeit durch's Filtrum, wobei sich nach dem Trocknen und Glühen des Filtrums sammt Inhalt herausstellte, dass von den mit Wasser ausgezogenen Salzen unlöslich in Wasser geworden waren. . . 0,431 Grm.

Es blieben demnach noch lösliche Stoffe. . 0,9702 Grm.

Die in Wasser unlöslichen wurden separirt mit Säuren behandelt und später zum ursprünglich sauren Aschenauszug gerechnet,

A.

Die in Wasser löslichen Salze des geglühten wässerigen Auszuges = 1/10 des Totalauszuges:

0,9700 Grm.

Die auf 150 Cub. Cm. verdünnte Lösung wurde in 5 gleiche

ortionen à 30 Cub. Cm. getheilt und behandelt nach Seite 9 ff. Die Resultate waren folgende:

Portion A.

Mit	t Sa	almiak,	Ammo	niak	und	schwefelsaurer	Magnesia	ent-
tand	ein	Nieders	schlag	von				

phosphorsaurer Magnesia . . . 0,146 Grm. gab Phosphorsaure 0,08250878

0,41254390 Grm.

Hieraus berechnete sich	Y			Phosphorsäure
uf die ganze Lebersubstanz				4,1254 Grm.
uf 100 Theile feuchte Substanz				0,2759
twoolma				1.0690

Asche 24,997

Portion B.

Mit Chlorbaryum ergab sich ein Niederschlag von: schwefelsaurem Baryt = . . . 0,003 Grm. gab Schwefelsäure 0,0010308

33

0.0051540 Grm.

								_	JOOGLO TO CHAM	
	Hier	aus ber	echnete	sich				1	Schwefelsäure	3
									0,0515 Grm.	
uf	100	Theile	feuchte	Subs	tar	ız			0,0035	
"	"	"	trockne	,	7				0,0134	
"	"	17	Asche						0,03030	

Portion C.

 $0,00168 \\ \times 5$

0,00840 Grm.

0,50904

					0,00040 UIII.
	Hier	aus berechnete sich			Kalk
ıf	die	ganze Substanz			0,0840 Grm.
ıf	100	Theile feuchte Substanz			0,00562
,	>)	" trockne "			0,02163

Portion C 2.

Die vom oxalsauren	Kalk abfiltrirt	e Flüssigkeit	gab auf
Zusatz von phosphorsaur	rem Ammoniak	Spuren von p	hosphors.
Amm. Magnesia; also:			

Amm. Magnesia; also:	oparon ton phosphore
Magnesia	Spuren.
Portion	
Mit Silberlösung erhielt ich i	m Niederschlag:
Chlorsilber	The state of the s
	0,0085082
THE THE PORTERS	× 5
	0,0425410 Grm.
Hieraus berechnete sich	Chlor
auf die ganze Substanz	0,42541 Grm.
auf 100 Theile feuchte Substanz	
" " trockne "	0,10972
	2,57792
Portion	E.
Durch Bestimmung als Chlor	metalle erhielt ich:
	1,6747 Grm.
Kaliumplatinchlorid 3,665 Grm.	
	1,1178 Grm.
	0,5569 Grm.
gab	Whatedprives & John with he
Kah 0,07065	Natron 0,0295172
\times 5	× 5
0,35325 Grm.	0,1475860 Grm.
Hieraus berechnete sich:	(Val: 2 52050 C
für die ganze Substanz	Kali 3,53250 Grm.
mais the states states in since	(Natron 1,47586
	Alkalien 5,00836 Grm.
auf 100 Theile feuchte Substanz	(Kali 0,23671
	(Natron 0,09889
	Alkalien 0,33560
auf 100 Theile trockne Substanz	Kali 0,9113
	Natron 0,38073
	Alkalien 1,29203
auf 100 Theile Asche	Kali 21,4099
and 200 Inone Insone	Natron 8,9434
	Alkalien 30,3533

In dem löslichen Theile des geglühten Wasserauszugs fanden sich demnach:

7121.0	auf die ganze	auf 100 Theile	auf 100 Theile	auf 100 Theile
	Substanz.	frische Subst.	trockne Subst.	Asche.
Phosphorsäure Schwefelsäure	4,1254 Grm.	0,2759	1,0620	24,9999
	0,0515 ,,	0,0035	0,0134	0,8111
	0,4254 ,,	0,0285	0,1097	2,5779
	0,0840 ,,	0,0056	0,0216	0,5090
Magnesia	Spuren. 3,5325 ,, 1,4759 ,,	0,2367 0,0989	0,9102 0,3807	21,4099 8,9434
Summa der in Wasserlös- lichen anorgan. Stoffe.	9,6947	0,6491	2,4976	58,7512

I. B.

Der nach dem Glühen in Wasser nicht mehr lösliche Antheil des wässerigen Aschenauszuges wurde nach dem (S. 40) angegebenen Verfahren behandelt und ergab:

	-	***	1						0.000	~
		Kies	selsäure						0,003	Grm.
	Hier	aus ber	echnete	sic	h:				Kiesel	säure.
auf	die	ganze S	Substanz						0,030	Grm.
auf	100	Theile	feuchte	Su	bst	anz			0,0020)
"	22	"	trockne		- 29				0,0077	1001
"	"	22	Asche						0,1818	3

Aus dem Schwefelwasserstoffniederschlag erhielt ich keine Metallspuren.

Die saure Lösung wurde darauf zu 200 Cub. Cm. verdünnt, in 4 gleiche Portionen getheilt und gemäss Angabe analysirt. Ich erhielt aus der

Portion 1.

a. T.

a. 1.	
in der essigsauren Lösung des Ammo	niakniederschlages:
unlöslichen Rückstand =	
phosphors. Eisenoxyd	. 0,024 Grm.
	\times 4
and troop and the same	0,096 Grm.
Hieraus berechnete sich:	Eisenoxyd
auf die ganze Substanz	0,4108 Grm.
" 100 Theile feuchte do	0,0275
" " trockene do	1,0587
,, ,, Asche	2,4894

Common of the Co		Dhoanhamainma
ferner:		
auf die ganze Substanz		
auf 100 Theile feuchte Substanz		
" " trockne " · · ·		,
" " Asche		0,0201
a. 2.		
77 11	0	0043 Grm.
		0043 01111.
gab phosphors. Kalk		< 4
	-	
***		,016 Grm.
Hieraus berechnete sich		
auf die ganze Substanz		
auf 100 Theile feuchte Substanz		
" " trockne "		
" " Asche		0,4260
ferner:		Phosphorsäure
auf die ganze Substanz	old a	0,0897 Grm.
auf 100 Theile feuchte Substanz	par.	0,0056
" " trockne "		0,0216
" " " Asche "	# lots	0,5437
rade il.denf zu 200 Cab Car verdlinst,		
In der essigsauren Lösung auf Zusa	ıtz	
1.		
von Oxalsäure:		
kohlensauren Kalk		0,003 Grm.
gab Kalk		0,00168
Alama des Alamoniakoiselleredillages	l m	$\times 4$
		0,00672 Grm.
Triangle 1 and 1 a		CARLETT PRINCIPLE
Hieraus berechnete sich:		Kalk
für die ganze Substanz		
auf 100 Theile feuchte Substanz		
" " trockne "		
" " Asche		
Der sub b 1. erhaltene Kalk (0,067)		
an Phosphorsäure, welche sich folgende	rmas	sen ergab:

The property of the second sec	Phosphorsäure
auf die ganze Substanz ,	0,0856 Grm.
auf 100 Theile feuchte Substanz	0.0010
, , trockne ,	
Asche	0,4887
n n n Asone	THE PARTY OF THE PARTY OF
2.	
pyrophosphors. Magnesia nach Abzug	
gleichzeitig erhaltenen pyrophosphors. M	Ian-
ganoxydul	0,0005 Grm.
gab:	
Magn. 0,0001795 + Phosphors.	
$\times 4$	$\times 4$
0,0007180 Grm.	0,0012820 Grm.
Hieraus berechnete sich:	Magnesia
für die ganze Substanz	0,007180 Grm.
auf 100 Theile feuchte Substanz	0,0005
" " trockne "	0,0019
A 1	0,0030
ferner:	Phosphorsäure
ffiir die ganze Substanz	TO MATERIAL SECTION AND MAIN MATERIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY
auf 100 Theile feuchte Substanz	
" " trockne "	
" " Asche	0,0078
P. militarii	
b. 3.	
Auf Zusatz von Ammoniak + schw	efels. Magnesia:
pyrophosphors. Magnesia 0	The same of the sa
gab Phosphorsäure 0,066	
.0000 3.000,0	$\times 4$
0,267	59808 Grm.
Hieraus berechnete sich:	Phosphorsäure
auf die ganze Substanz	2,6760 Grm.
" 100 Theile feuchte do	. 0,1793
" " " trockne d ⁰	
" " Asche	. 16,2166
In der vom ersten Ammoniak-Nie	derschlage abfiltrirten
Flüssigkeit war enthalten:	

1.

kohlensaurer Kalk	0,0006
gab Kalk	0,000336
. and the same of	$\times 4$
	0,001344 Grm.
Hieraus berechnete sich:	
auf die ganze Substanz	
" 100 Theile feuchte do	
	0,0035
	0,0812
" " Asche	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2.
Magnesia	Spuren.
and the planting of the same o	-0 00170000
	on 2.
schwefelsaurer Baryt	0,006 Grm.
gab Schwefelsäure	0,002 Grm.
	\times 4
	0,008 Grm.
Hieraus berechnete sich:	Schwefelsäure
für die ganze Substanz	0,080 Grm.
" 100 Theile feuchte do	
" " trockene d ⁰	the safet and state the safety and t
" " Asche	
" "	e e succession of the second
Porti	on 3.
Chloralkalien	0,013 Grm.
Kaliumplatinchlorid 0,0128 Gr.	
hieraus Chlorkalium	0,0039 Grm.
Chlornatrium	0,0091 Grm.
gab:	
Kali 0,0025 Grm.;	Natron 0,0048 Grm.
× 4	× 4
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0,0100 Grm.	0,0192 Grm.
Hieraus berechnete sich:	-1: 0.1000 C
für die ganze Substanz	atron 0.1920 Grm.
All	talien 0,2920 Grm.

auf	100	Theile	feuchte	Substanz	Kali Natron	0,0067 0,0129
					Alkalien	0,0196
auf	100	Theile	trockene	Substanz	Kali Natron	0,0258 0,0496
					Alkalien	0,0754
auf	100	Theile	Asche	Kali Natro	0,606 on 1,163	5
				Alkalie	n 1,769	5

Portion 4.

1Ma	ngan	noxyduloxyd		0,0003 Grm.
				\times 4
				0,0012 Grm.
	Hier	raus berechnete sich:	1	Manganoxyduloxyd
aut	die	ganze Substanz		. 0,0120 Grm.
22	100	Theile feuchte do		. 0,0008
12	22	" trockene do		. 0,0031
"	"	" Asche		. 0,0767

In dem in Wasser unlöslichen Antheil des geglühten wässrigen Kohlen- und Aschenauszugs waren also vorhanden:

- emissedas	auf die ganze Subst.		auf 100 Theile trockene Subs.	
Kieselsäure Eisenoxyd Kalk Magnesia Phosphorsäure	0,0300 Grm. 0,4108 ,, 0,1509 ,, 0,0072 ,, 3,3277 ,,	0,0020 0,0275 0,0101 0,0005 0,2304 0,0054	0,0077 0,1058 0,0389 0,0019 0,8870 0,0208	0,1818 2,4894 0,9144 0,0426 20,0962 0,4848
Manganoxyduloxyd Kali	0,0120 ", 0,1000 ", 0,1920 ",	0,0008 0,0067 0,0129 0,2963	0,0031 0,0258 0,0496	0,0767 0,6060 1,1635 26,0554

II.

Die in Wasser unlösliche Asche gab nach Seite 40 behandelt:

			Kiesel	säure
auf	die	ganze	Substanz 0,015	Grm.
			feuchte do 0,0010	
77	79	"	trockene do 0,0038	
71	71	**	Asche 0,0909	

Aus dem Schwefelwasserstoffniede	rschlag erhielt ich:
AETO'D BOOUNT	Blei
für die ganze Substanz	0,002 Grm.
" 100 Theile feuchte do	0,0001
" " trockene do	
" " Asche	
(1360 0 31631)	Kupferoxyd
auf die ganze Substanz	
" 100 Theile feuchte d ⁰	
trackens do	
A asha I mallund	
Der saure Auszug enthielt ausser	
Portion $\Lambda = \frac{1}{1} \operatorname{des} \operatorname{ganz}$	en Auszugs.
areO £100,6 1.	
Phosphorsaures Eisenoxyd	. 0,025 Grm.
	\times 4
8000.0	0,100 Grm.
Hieraus berechnete sich:	
auf die ganze Substanz	
" 100 Theile feuchte do	A REPORT OF THE PROPERTY OF TH
" " trockene d ⁰	
" " Asche	
ferner:	
auf die ganze Substanz	0,0572 Grm.
100 701 -11 - 6 14 - 10	0.0000
4	0,0038
	0,3454
" " " Asche	0,5454
2.	
kohlensauren Kalk	0,098 Grm.
	\times 4
	0,392 Grm.
-od (a od e gab: .d. Ad.	Kalk
auf die ganze Substanz	0,2255 Grm.
" 100 Theile feuchte do	
" " trockene do	
" " Asche	
Mit diesem Kalk war in Verbindu	
auf die ganze Substanz	
Paris paristant	0,2100 GIM.

ferner:

Total :				
Phosphorsaure Magnesia 0,012 Grm.				
gab Magnesia 0,00439 Grm. + Phos				
$\times 4$	$\times 4$			
0,01756 Grm.	0,030432 Grm.			
	Magnesiau. Phosphorsäure			
auf 100 Theile feuchte Substanz .	0,0012 0,0020			
" " trockene d ⁰	0,0046 0,0077			
,, ,, Asche	0,1066 0,1842			
ferner				
Pyrophosphorsaure Magnesia	0,244 Grm.			
1 D1 1 "	0.1717001			
igao i nospiiorsaaro	$0,1545984 \times 4$			
	0,6183936 Grm.			
Hieraus berechnete sich:	Phosphorsäure			
auf 100 Theile feuchte Substanz .				
" " trockene d ⁰				
" " Asche				
Kohlensaurer Kalk				
gab Kalk				
Superior Cashin	$\times 4$			
	0,03808 Grm			
- Hieraus berechnete sich:				
auf 100 Theile feuchte Substanz .				
" " trockene d ⁰				
" " " Asche				
Pyrophosphorsaure Magnesia				
Magnesia				
	$\times 4$			
	0,007328 Grm.			
Hieraus berechnete sich:	Magnesia			
auf 100 Theile feuchte Substanz .				
" " trockene do				
" " " Asche	0,0442			
Alkalien . T423E				
Portion B.				
Schwefelsaurer Baryt	. 0,014 Grm.			

gab Schwefelsäure	0.0048118 Grm.							
But a series of the series of	× 4							
inti) 210,0	0,0192472 Grm.							
Hieraus berechnete sich:	Schwefelsäure							
auf 100 Theile feuchte Substanz	2 0,0013							
	0,0050							
" " Asche								
	and 109 Theile-feachte Substan							
Tygo, Deco, Portio								
Manganoxydoxydul								
	$\times 4$							
Linear Months of the State of t	0,004							
Hieraus berechnete sich:	Manganoxydoxydul							
auf 100 Theile feuchte Subst.								
" " " trockene d ^o								
" " Asche	0,0242							
Portio	Portion D.							
Chloralka	lien 0,546 Grm.							
Kaliumplatinchlorid 0,								
	um 0,2061 Grm.							
gab Chlornatrium	0,3399 Grm.							
Kali 0,13019								
$\times 4$	\times 4							
0,52076 Grm.	0,7208 Grm.							
oder:								
Alkalien	1,24156 Grm.							
Hieraus berechnete sich:	admik a							
	Kali 0,0349							
auf 100 Theile feuchte Subst.	Natron 0,0483							
	Alkalien 0,0832							
	(Kali 0,1344							
auf 100 Theile trockne Subst.	Natron 0,1859							
8000,0 1,000	Alkalien 0,3203							
\$100.0	Kali 3,1554							
auf 100 Theile Asche	Natron 4,3680							
	Alkalien 7,4234							
Folgende Tabelle gebe eine	Zusammenstellung der in Was-							

Folgende Tabelle gebe eine Zusammenstellung der in Wasser unlöslichen Salze der Leberasche:

Commence of the commence of th	-		A	
id,169 dan.	auf die ganze	auf 100 Theile	auf 100 Theile	auf 100 Theile
	Substanz.	feuchte Subst.	trockene Subs.	Asche
Phosphorsäure	0,7060	0,0472	0,1817	4,2771
	0,0192	0,0013	0,0050	0,1163
Kali	0,5207	0,0349	0,1844	3,1554
	0,7208	0,0483	0,1859	4,3680
Eisenoxyd	0,0428	0,0028	0,0108	0,2606
	0,0040	0,0003	0,0011	0,0242
	0,2635	0,0242	0,0931	1,5968
Magnesia	0,0248	0,0017	0,0060	0,1508
	0,0150	0,0010	0,0088	0,0909
Kupferoxyd	0,0080	0,0006	0,0023	0,0484 0,0121
TIASH	2,3268	0,1624	0,6245	14,1006

Um nun eine summarische Uebersicht sämmtlicher in der Leberasche gefundenen anorganischen Stoffe zu geben, füge ich folgende Tabelle der anorganischen Säuren und Basen der Lebersubstanz bei.

Courte Austande:			auf 100 Theile trockene Subs.	auf 100 Thle. Asche
Chlor	0,4254	,0285	0,1097	2,5779
Phosphorsäure	8,2591	,5535	2,1307	49,3732
Schwefelsäure	0,1507	0,0102	0,0392	10,9122
Kali	4,0533	0,2783	1,0704	25,1713
Natron	2,3887	0,1601	0,6172	14,4749
Eisenoxyd	0,4536	0,0303	0,1166	2,7500
Manganoxydul	0,0160	0,0011	0,0042	0,1009
Kalk	0,4984	0,0399	0,1536	3,0202
Magnesia	0,0321	0,0023	0,0080	0,1935
Kieselsäure	0.0450	0,0030	0,0115	0,2727
Kupferoxyd	0,0080	0,0006	0,0023	0,0484
Blei	0,0020	0,0001	0,0004	0,0121
Anorganische Stoffe	16,3323	1,1079	4,2638	98,9073

Milz

von demselben geisteskranken Individuum, wurde ebenfalls bei der Sektion als normal bezeichnet.

Totalgewicht des Organs 198 Grm.

000 003

A.

Wasserbestimmung.

Hierzu wurden 2 Portionen verwendet:

I. 4,868 Grm.
II. 3,542
Summa 8,410 Grm.

Die II. Portion wog in frischem Zustande mit dem Schälchen, 16,159 Grm. - Schälchen 12,617 3,542 Nach der ersten Wägung 13,435 Grm. - Schälchen 12,617 0,818 Grm. Nach der letzten Wägung 13,422 Grm. - Schälchen 12,617 getrocknete Substanz 0,805 Grm. Hieraus ergibt sich: nasse Substanz . . 3,542 Grm. trockne " . . — 0,805 Gewichtsverlust = Wasser 2,737 Die ganze Milz enthielt demnach im frischen Zustande: Wasser . . . 153,070 Grm. trockne Substanz. 44,930 Substanz 198,000 Grm. gibt auf 100 Theile Substanz nach der Proportion: Das bekannte Gewicht der Substanz (198 Grm.) verhält sich zum bekannten Gewicht des Wassers (153,070 Gr.) = 100 : x. x = 77,308.Folglich hatte die Milz dieses Geisteskranken:

Zur Einäscherung

100,000

wurde verwendet 198 Grm. frische Substanz.

Bei der Verbrennung zeigte sich bei Weitem nicht die Volumsvermehrung und Porösität der Kohle wie bei der Leber; auch waren keine spezifischen Gerüche wahrzunehmen, welche auf die Natur der verbrennenden Substanz charakteristische Schlüsse erlaubt hätten. Die Kohle gestaltete sich nach kurzem mässigen Glühen zu einem äusserst feinen spinngewebartigen Maschengefüge, welches beim heftigeren Glühen fast ganz reine Asche zurückliess. Die aus der Kohle und der rückbleibenden Asche erhaltenen wässerigen Salzauszüge rea-

girten ganz schwach alkalisch, waren röthlich gefärbt, im Uebrigen, gegen das Licht gehalten, ganz durchsichtig. Die Färbung rührte, wie ich mich später überzeugt habe, von der nicht unbedeutenden Quantität Eisensalz her, welches mit in den wässerigen Auszug gelangt war. Auf die möglichen und wahrscheinlichen Modifikationen, unter denen das Eisen mit Wasser ausziehbar wurde, werde ich weiter unten bei der Besprechung der einzelnen gefundenen Metalle mich näher einlassen. So löslich diese Eisensalze beim ersten Ausziehen mit Wasser gewesen sein mussten, so schwer löslich wurden sie nach dem Glühen des wässrigen Auszuges, so dass ich sie nur nach stundenlangem Behandeln mit conzentrirtem Königswasser wieder löslich machen konnte.

Die durch Wasser ausziehbaren Salze wogen nach schwachem Glühen: 0,836 Grm.; der Eisengehalt dieses Rückstandes gab sich schon durch die bräunliche Farbe kund.

Von diesen 0,836 Grm. wässerigen Auszug waren in kochendem Wasser lösliche

Stoffe 0,799 Grm. im Wasser unlösliche Stoffe 0,037 Grm.

Letztere wurden dem endlichen, ebenfalls stellenweise auffallend roth gefärbten Aschenrückstande beigefügt und mit demselben behandelt.

Der Aschenrückstand betrug nämlich:

						0,6225	Grm.
+ A	Aus	dem	Wasserauszug.			0,0370	Grm.
						0,6595	Grm.

Wir haben also nach den Löslichkeitsverhältnissen zusammengestellt, in der Milz des Geisteskranken an anorganischen Bestandtheilen:

in	Wasser	lösliche	Stoffe.							0,799	Grm.
iin	Wasser	unlöslich	e Stoffe							0,6595	Grm.
Su	mma de	r anorga	nischen	Ste	offe	1	in	0.19	nd	1,4585	Grm.

Hieraus ergibt sich:

auf 100 Theile trockne Substanz . . . 2,8363 Asche.

" " frische Substanz:

organische)	Su	bst	anz								24,5025
Asche		lon		1	157		100	U.S	.11	307		0,7365
Wasser .			b.			ILE.						74,0310
	1										FIE	100,0000

Die in Wasser unlöslich gebliebenen anorganische Verbindungen des wässerigen Auszuges behandelte ich successive mit conzentrirter; dann mit verdünnter Salzsäure; unlöslich blieben dabei vorwiegend die Eisensalze; darauf schmolz ich dieselben mit einigen Tropfen Salpetersäure zusammen, worauf sie sich dann endlich nach einigem Digeriren mit Königswasser lös'ten. Wie schon bemerkt, wurden diese Rückstände zu dem ursprünglichen Aschenrückstand zur gemeinsamen Behandlung gefügt.

Weil die aus der Milzsubstanz erhaltenen Aschenmengen von absolut geringer Quantität waren, und daher bequemer in Totalität untersucht werden konnten, als die abgehandelte Leberasche, so zog ich es vor, bei der Analyse derselben die Asche ungetheilt, sowohl mit Wasser, als mit Säuren auszuziehen und zu untersuchen.

Milz

des Geisteskranken.

In Wasser lösliche Salze des geglühten wässerigen Auszuges = 0,7975 Grm. 100 Cub. Cm. der Lösung wurden in 4 Portionen à 25 Cub. Cm. getheilt und behandelt nach Seite 54.

Portion A.

Nied	lerschla	g bestan	id aus:		Hann.	osia.		NEW -
pyropho	sphors.	Magnes	sia .	J wife	Mile	. 0,0	065 G	rm.
gab Pho	osphors	äure .				. 0,0	41652	Restaurid
	007	0 : 1				orbid	$\times 4$	and H and
		0				0,1	66608	0
Hier	aus ber	echnete	sich:			Pl	hospho	rsäure
auf 100	Theile	feuchte	Subst.				0,084	11
22 22	"	trockne	Subst.		, .		0,323	38
29 27	"	Asche			Suris	021 0	11,422	26

Portion B.

Niederschlag bestand aus:	
schwefelsaur. Baryt	. 0,015 Grm.
gab Schwefelsäure	. 0,00514845
A.Bustien 41,2580	$\times 4$
Mental State of the August of	0,02059380
Hieraus berechnete sich:	Schwefelsäure
THE STOCKEY DESIGNATION OF THE PRIMERY	0,0104
trockne do	
Accha	1,4124
n n ASCHO	RADICIOS DE M. MENDAL. TITA
Portion C.	
Niederschlag bestand aus:	Sobrafelskore
Chlorsilber	. 0,008 Grm.
gab Chlor	
	$\times 4$
L'este l'autres l'autre	0,00791136
Hieraus berechnete sich:	Chlor
auf 100 Theile feuchte Substanz	0,0040
" " trockne do	0,0154
" " Asche	0,5485
Portion D.	
ben (01 ofto?) dona dadeson outes mes	Die Behandlang di
Niederschlag bestand aus:	ich orbieit:
Chloralkalien	0,279 Grm.
Kaliumplatinchlorid 0,131	ant die come Salistan
Chlorkalium , .	0,039955
Chlornatrium	0,23945 Grm.
oder:	01000 0
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	on 0,1277 Grm.
× 4	$\times 4$
0,10112	0,5008
Hieraus berechnete sich:	auf die ganze Substat
(Kali	0,0510
uf 100 Theile feuchte Substanz Natro	ien 0,0510 n 0,2529
Alkal	ien 0,3039
Alkali	ien 0.3039
	1

auf 100 Theile trockne Substanz	Kali 0,1964 Natron 0,9740
	Alkalien 1,1704
auf 100 Theile Asche	Kali 6,9217 Natron 34,3363
	Alkalien 41,2580

Aus C

erhielt ich nach Entfernung des überschüssigen Silbers mit Salzsäure auf Zusatz von Schwefelsäure noch Spuren von: schwefelsaurem Kalk.

In dem wässerigen Auszuge der Milz wurde also gefunden:

	auf die ganze Substanz		auf 100 Theile trockne Subst.	
Phosphorsäure	0,1666080 0,0205938 0,00791136 0,10112000 0,50080000 Spuren dito	0,0841 0,0104 0,0040 0,0510 0,2529	0,3238 0,0400 0,0154 0,1964 0,9740	11,4226 1,4124 0,5485 6,9217 34,3363
anorg. Stoffe	0,79703316	0,4024	1,5486 -	54,6415

Die von den bisher genannten Stoffen befreite Flüssigkeit enthielt noch folgende Bestandtheile in

Portion A.

1.

1.	errorhosanosanos Marae
phosphors. Eisen	0,062 Grm.
	\times 4
800700,0 Phyline B.	0,248 Grm.
Hieraus berechnete sich:	Eisenoxyd
auf die ganze Substanz	0,1061 Grm.
" 100 Theile feuchte do	0,0536 Grm.
	0,2063 Grm,
" " " Asche	7,2745 Grm.
ferner:	Phosphorsäure
auf die ganze Substanz	0,1419 Grm.
" 100 Theile feuchte do	
" " , trockne d ⁰	
" " ,, Asche	
schwefelsaurer Kalk	
1 2 2	\times 4
	0,048 Grm.
Hieraus berechnete sich:	Kalk
auf die ganze Substanz	0,019776 Grm.
" 100 Theile feuchte do	0,00998
" " trockne do	0,03841
" " Asche	1,3575
Dieser Kalk war gebunden an:	Phosphorsäure
auf die ganze Substanz	. 0,0185328 Grm.
" 100 Theile feuchte do	. 0,0093
, " " trockne do	
" " Asche	. 1,2684
kohlensaurer Kalk	
gab Kalk	0,0168
BOLDA - THE RESERVE	$\times 4$
	0,0672 Grm.
	0,0012 01111.

Hieraus berechnete sich:	
auf die ganze Substanz	
" 100 Theile feuchte do	
	0,1305
	4,6074
pyrophosphorsaure Magnesia .	
gab Magnesia 0,001098 Grm. +	Phosphors. 0,001902 Grm.
$\times 4$	× 4
0,004392	0,007608
Hieraus berechnete sich:	Magnesia
auf die ganze Substanz	0,00439
" 100 Theile feuchte do	0,0022
" " trockne do	
" " Asche	
ferner:	Phosphorsäure
auf die ganze Substanz	0,0076 Grm.
" 100 Theile feuchte do	
" " " trockne do	0,0146
" " Asche	0,5211
pyrophosphors. Magnesia	0,024 Grm.
gab Phosphorsäure	0,015216
A 30.	\times 4
0,018 Gun.	0,060864 Grm.
Hieraus berechnete sich:	Phosphorsäure
auf die ganze Subst	0,06086 Grm.
" 100 Theile feuchte do	0,0307
" " trockne d ⁰	
,, ,, Asche	
kohlensaurer Kalk	0,010
gab Kalk	
Arri 82888100	xundadu? × 4 alb ha
	0,0224 Grm.
Hieraus berechnete sich:	
auf die ganze Substanz	
" 100 Theile feuchte do	
" " trockne d ⁰	
" " Asche	4 100 000000000000000000000000000000000
phosphors. Magnesia	
1	

b Magnesia	0,0007
b Magnesia	× 4
history and a model of the	0,0028 Grm.
Hieraus berechnete sich:	Magnesia
f die ganze Substanz	0,0028 Grm.
100 Theile feuchte do	0,0014
" " trockne do	
A Total Control of the Control of th	0,1920
Portion	The section of the se
wefelsaurer Baryt	
Schwefelsäure :	
	$\times 4$
OF ON her SENSE SERVICE THE SERVICE SE	0,016516 Grm.
Hieraus berechnete sich:	Schwefelsäure
die ganze Substanz	0,0165 Grm.
100 Theile feuchte do	
" " trockne d ⁰	0,0319
" " Asche	1,1313
Portion	Carrie
nganoxyduloxyd	0,0003 Grm.
0.0005 0.0003 0.0000	1000.0 × 4 mm/m
	0,0012 Grm.
Hieraus berechnete sich:	Manganoxyduloxyd
die ganze Substanz	0,0012 Grm.
100 Theile feuchte do	0,0006
" " trockne do	0,0024
" " Asche	0,0823
Portion	D. on a market design of the state of the st
Chloralkalien	0,0820 Grm.
Kaliumplatinchlorid	0,051
Chlorkalium	
Chlornatrium	
gab Kali 0,009796 Grm.;	
$\times 4$	$\times 4$
0,039184	0,145380
Summe der Alkalien 0,184564	Kapinozyd 0,0001
Hieraus berechnete sich:	(17-1: 0.0000
audie ganze Substanz	Kali 0,0392 Natron 0,1453
Santo Dansvalla	
	Alkalien 0,1845

auf 100 Theile frische Substanz	Kali 0,0197 Natron 0,0734
	Alkalien 0,0931
auf 100 Theile trockne Substanz	Natron 0,2826
	Alkalien 0,3584
auf 100 Theile Asche	Kali 2,2675 Natron 9,9622
.H nellre	Alkalien 12,2297

Die in der Milz vorhandenen, in Wasser unlöslichen feuerfeste Stoffe waren also:

into a la distri	auf die ganze Substanz.		auf 100 Theile trockne Subst.	auf 100 Theile Asche,
Phosphorsäure	0,2288	0,1154	0,4441	15,6872
Schwefelsäure.	0,0165	0,0083	0,0319	1,1313
Eisenoxyd	0,1061	0,0536	0,2063	7,2745
Kalk	0,1094	0,0551	0,2124	7,5007
Magnesia	0,0072	0,0036	0,0139	0,3937
Kali	0,0392	0,0197	0,0758	2,2675
Natron	0,1453	0,0734	0,2826	9,9622
Kieselsäure	0,0025	0,0013	0,0050	0,1714
Kupferoxyd	0,0001	0,0005	0,0002	0,0068
Manganoxyd-				
oxydul , , .	0,0012	0,0006	0,0024	0,0823
mile atono	0,6563	0,3315	1,2746	44,4776

Summe der anorgan. Stoffe der Milzasche:

8280,0		auf 100 Theile frische Subst.		auf 100 Theile Asche.
Phosphorsäure	0,3954	0,1995	0,7679	27,1089
Schwefelsäure.	0,0371	0,0187	0,0719	2,5437
Chlor	0,0079	0,0040	0,0154	0,5485
Kali	0,1403	0,0707	0,2722	9,1892
Natron	0,6461	0,3263	1,2566	43,2985
Kalk	0,1094	0,0551	0,2124	7,5007
Magnesia	0,0072	0,0036	0,0139	0,3937
Eisenoxyd	0,1061	0,0536	0,2063	7,2745
Kieselsäure	0,0025	0,0013	0,0050	0,1714
Kupferoxyd	0,0001	0,0005	0,0002	0,0068
Manganoxyd-		sich:	Steadnord	Heraus
oxydul ,	0,0012	0,0006	0,0024	0,0823
ECH1,0	1,4533	0,7339	2,8232	99,1191

Weibliches geisteskrankes Individuum.

Leider war die Leber dieses Individuums so bedeutend fettig entartet, dass ich sie als für die Rubrik der normalen Organe durchaus unbrauchbar, unberücksichtigt lassen musste.

Ich beschränkte mich daher auf die Untersuchung der Milz, welche, wenn auch etwas geschrumpft und weniger blutreich als gewöhnlich bei jugendlichen Personen, doch als ganz normal sowohl nach äusserer Formation als auch auf dem Durchschnitt erschien. Auch hatte die Frau nie an Intermittens oder sonstigen mit Funktions- oder Vegetationsstörungen der Milz verknüpfte Krankheiten gelitten.

Die Milz.

Totalgewicht 115 Grm.

Die zur Wasserbestimmung gebrauchten Portionen wurden der verkohlenden Masse während der Einäscherung beigefügt.

Wasserbestimmung.

	Die zur Wasserbestimmung verwendete Substanz wog in	n
l	frischen Zustand mit dem Schälchen 19,710 Grm.	
	- ,,	
	2,882 Grm.	
I	nach der ersten Wägung wog sie noch . 17,948 Grm.	
Š	nach der letzten Wägung , 17,477 Grm,	
	— Schälchen 16,828	
	trockne Substanz 0,649 Grm.	
	Hieraus ergab sich:	
ì	frische Substanz 2,882 Grm.	
i	— feste Stoffe 0,649 Grm.	
	Verlust = Wasser = 2,333 Grm.	
i	auf 100 Theile frische Substanz:	
	Wasser	
	feste Stoffe	
	100,000	
	auf das ganze Organ:	
	Wasser	
-	teste Stoffe	
	Substanz 115,000 Grm.	

Zur Einäscherung

wurde verwendet das ganze Organ = 115 Grm. frische Substanz. Das Organ bot dieselben Erscheinungen und Metamorphosen beim Verbrennen dar wie die oben beschriebene Milz des männlichen Irren. Auch die Verfahrungsweise war ganz dieselbe.

Durch Wasser zog ich aus der Kohle

0,9987 Grm., weniger roth als bei der vorigen Milz, aber doch eisenhaltig.

0,1075 Grm. Asche blieb unlöslisch.

1,1062 Grm. anorgan. Stoffe.

Die Auflösungsversuche mit dem im Wasser gelösten Theil der Salze, nachdem dieselben eingetrocknet und geglüht waren, änderten diese Zahlenverhältnisse folgender Massen.

in Wasser löslichen Salze	0,6992 Grm.
" " unlöslichen Salze	0,4070 Grm
	1,1062 Grm.
auf 100 Theile frische Subst.:	
organ. Subst	. 21,5698
anorgan. ,	. 0,9502
Wasser	77,4800
2,882 (116.	100,0000

I.

In	Wasser	lösliche	Salze			.50	1	1	0,6992	Grm.
----	--------	----------	-------	--	--	-----	---	---	--------	------

Portion A.

	Nied	erschlag	g mit Ma	agnes	siasa	lz	gab):.	. smaled		
Pyr	opho	sphors.	Magnes	ia					0,0480	Grm.	
									0,03072		
									×		10
auf	die	ganze S	Substanz						0,1536		207
			feuchte								
			trockne								
			Asche .								

Portion B.

Niederschlag mit Chlorbaryum

schwefelsaurer Baryt	0,0030 Grm.
Schwefelsäure	0,0010297
bestimmitues Spures von Kall	Idow adom vi× 5 mm)
auf die ganze Substanz	
auf 100 Theile frische Substanz	
,, ,, trockne do	
" " Asche	0,4590
Portion	C. C. Tonge wonder to the control of
the District STRACT TOD TOWNER, SOCKED	O. Torselve in them at
Niederschlag mit Salzsäure	0.0120 C
Chlorsilber	0,0120 Grm.
Chlor	
auf die ganze Substanz	
auf 100 Theile frische Subst	
" " " trockne do	
" " Asche	1,3050
oger.go page g Portion	D. 700.0
Chloralkalien	
Kaliumplatinchlorid 0,172 Grm.	0,1000 drm.
Chlorkalium	0.05246 Grm
Chlornatrium	
6701.0 gab:	odneA Jeilau Jonimeru
	Natron 0,0718 Grm.
× 5	× 5
0,1655	0,3590 Grm.
Alkalien	0,5246 Grm.
wie ich sie ober im allgemein	Kali 0,1655
auf die ganze Substanz	Natron 0,3590
	Alkalien 0,5245
samutiche Kieselszine aus flue	Kali 0,1423
auf 100 Theile frische Substanz	Natron 0,3087
	Alkalien 0,4510
	Kali 0,6460
uf 100 Theile trockne Substanz	Natron 1,4015
bo Babatana	Alkalien 2,0475
tuf 100 Theile Asche	Kali 14,8950 Natron 32,3100
THE THE PROME	
one the acted emitted and their in	Alkalien 47,2050

Portion E.

Quantitativ nicht wohl bestimmbare Spuren von . . Kalk. Die ursprünglich mit Wasser ausgezogenen alkal. Erden und Eisensalze waren nach dem Glühen unlöslich geworden Wir werden ihnen daher beim sauren Auszug der Milzasche in Gemeinschaft mit den in Wasser schon Anfangs unlöslichen Salzen wieder begegnen.

In dem in Wasser löslichen Theil der Asche haben wir demnach:

9,0029 Gra			auf 100 Theile trockne Subst.	auf 100 Theile Asche.
Phosphorsäure Schwefelsäure. Chlor Kali Natron	0,1536 0,00515 0,014 5 0,1655 0,3590	0,1321 0,0044 0,0125 0,1423 0,3087	0,5997 0,1997 0,0567 0,6460 1,4015	13,8240 0,4590 1,3050 14,8950 32,3100
	0,69775	0,6000	2,9036	62,7930

TT.

In Wasser unlöslicher Theil der Milzasche.

Die Quantität derselben war:

ursprüngl. unlösl. Asche .						0,1075
vom geglühten Wasserausz	ug				0	0,2995
		SI	mr	no		0.4070 Grm

Die successive Behandlung der Asche mit Salz- und Salpetersäure bis zur völligen Auflösung der unlöslichen Verbindungen war ganz dieselbe wie ich sie oben im allgemeinen Theile beschrieben und mit der Milzasche des männlichen Geisteskranken durchgeführt habe.

Zuerst wurde nämlich sämmtliche Kieselsäure aus ihren löslichen Verbindungen herausgefällt und auf die bekannte Weise nachgewiesen.

Ich erhielt dabei:

Kies	selsä	ure .	se Substant Links	olo	0,008 Grm.
auf	100	Theile	frische Substanz		0,0669
22	22	"	trockne "		0,0310
- 17	- 11	22	Asche		0,7200

Wegen der geringen Quantität der Auszüge habe ich auch

bei ich auch den Vortheil hatte, die lästigen Reduktionshnungen auf die ganze Masse zu ersparen.

Vor Allem wurde also jetzt der sauren Lösung Schwefelsserstoffgas zugeleitet, bis sich ein vollständiger Niederschlag gegrenzt hatte.

Derselbe war Anfangs gelb von ausgefälltem Schwefel. Nach Stunden jedoch hatte er sich deutlich braun gefärbt. Die Niederschlag wurde anf dem Filter gesammelt, mit schwetwasserstoffhaltigem Wasser gut ausgewaschen und in Salpetäure gelöst. Aus dieser Lösung fällte ich, nachdem sie gedampft und mit destillirtem Wasser hinreichend verdünnte, mittels Schwefelsäure deutliche Spuren von Blei. Die lige des Schwefelmetalls war jedoch so gering, dass selbst in 24stündigem Stehen die opalisirende Trübung sich in IFlüssigkeit noch nicht abgrenzte. Ich begnügte mich damit einer annähernden Bestimmung des Blei's nach folder vergleichenden Methode: 10 Kub. Cm. essigs. Bleioxyding theilte ich in zwei gleiche Portionen. Aus der einen zion bestimmte ich den Bleigehalt durch Eindampfen und zien als regulinisches Metall; er betrug 0,0015 Grm.

Von der andern Portion nahm ich 1 Kub. Cm. = 1/5, whes ich in der Pipette mit 50 Kub. Cm. destillirtem Waseverdünnte. Von dieser Verdünnung liess ich nach und so lange in ein mit schwefelsäurehaltigem Wasser gefülleßecherglas fliessen, bis die Opalisirung der entstehenden detion derjenigen gleich kam, welche das aus der Milzasche einene Blei gezeigt hatte. Zu diesem Grade bedurfte ich Cub. Cm. Bleilösung, in 50 Kub. Cm. waren aber meiner sechnung nach enthalten 0,0003 Grm. Blei, folglich enthielt Milzasche der Geisteskranken:

B.			1.		Verte.	. 0,0003 Grm.
w.00	Theile	frische Substanz		• **		0,00026
		trockne "				
12 11 22	11	Asche				0,0279

der Milzasche war also c. ¹/₄ pro Mille Blei vorhanden. ie salpetersaure Lösung, in welcher das schwefelsaure lein opalisirendem Aggregatzustand suspendirt war, wurde

jetzt zur Entfernung des Blei's filtrirt und das sorgsam au gewaschene Filtrat mit überschüssiger reiner Kalilauge ein Zeit lang digerirt, darauf noch mehr Kalilauge zugesetzt, bendlich eine deutliche blaugrüne Färbung entstand. Die Kunferreaktion war evident, nur wäre eine direkte Gewichtsbestimmung nicht wohl möglich gewesen. Ich verfuhr desshal analog dem Verfahren bei der Bleibestimmung, indem ich au einer Lösung essigsauren Kupferoxyds dieselbe Reaktionsinte sität erzeugte; und erhielt demnach für die Gesammtasche de Milz (= 1,1062 Grm.) 0,0005 Grm. Kupfer

oder:

auf	100	Theile	frische	Sub	stanz		6.	i.	0,00043
"	"	"	trockne	à d	37				0,0021
,,	11	"	Asche.	no.h	1. 11. 1	1.		1	0,0451

Nach der Filtration und sorgfältigem Waschen des Filtrun mit kalihaltigem Wasser zeigte das Filtrat nach dem Eindampfen und Wiederauflösen etwas angesäuert, mit Ferrocyankaliun nicht die geringste Reaktion mehr auf Kupfer. Auch gar Rhodankalium keine Eisenreaktion. Ich konnte daher zur Vonahme der vom Schwefelwasserstoffniederschlag abfiltrirte Flüssigkeit gehen.

Während Blei und Kupfer wegen ihrer voraussichtlich geringen Quantitäten aus der Totalmenge des sauren Aschen auszuges gesucht wurden, theilte ich auf ähnliche Weise wibei der Detailanalyse der in Wasser löslichen Salze das Filtrat zur Untersuchung der noch übrigen in Säuren lösliche anorganischen Verbindungen in gleiche Volumsabtheilunge und bestimmte in jeder Portion gesondert die einzelne Stoffe.

Portion A.

1.

		rsaures	ak-Niede Eisen		. Xun	edi	B.	60	risc	0,0	45 Grm.
										0,1	80 Grm.
auf 1	00	Theile	feuchte	Sub	stanz					OBST	0,1548
"	"	"	trockne	LITT.	dº						0,6966
			Asche .								

ı	kohlensaurer Kalk	. 0.024	Grm.
۱	Kalk cotopo	. 0.01344	Grm.
I		$\times 4$	
ł	uf die ganze Substanz	0.05376	Grm.
I	ouf 100 Theile frische Substanz	0.0461	dT 001 lne
١	" " trockne d ⁰	0.2047	P 11
۱	, , , Asche	4.8824	
ı			
	pyrophosphors. Magnesia		
	Magnesia:		Grm.
I	0.002686	$\times 4$	riislahenda?
	uf die ganze Substanz		
	uf 100 Theile frische Substanz	0.0061	
	" " " trockne do	11111/1	and die gan
ı	,, " "Asche	0,6329	auf 160 Th
ı	ferner: 0888,0	ordent e	11 11
	Phosphorsäure	0,003205	Grm.
	Portlon C.	$\times 4$	
-	uf die ganze Substanz	0,012820	Grm.
ł	uf 100 Theile frische Substanz	0,0102	Manganosy
ı	" " trockne do		
1	", "Asche		auf die gan
ģ	yrophosphors. Magnesia.		
0	hosphorsäure	. 0,01082	Grm.
١	0,0360	$\times 4$	
	uf die ganze Substanz	. 0,04328	Grm.
1	uf 100 Theile frische Substanz	. 0,0376	
	" trockne do	. 0,1669	Chloralkadie
	Asche	. 3,9150	14.45
September 1	In der vom Ammoniakniederschlag	abfiltrirten	Flüssigkeit
	and sich:		Chioradanni
1	ohlensaurer Kalk	. 0,0120	Grm.
4	ialk-mrs 8700,0 mortes	. 0,00672	Grm.
	0.0219 Com	$-\times 4$	5_1000
	uf die ganze Substanz	. 0,02688	Grm.
	uf 100 Theile frische Substanz	. 0,0234	
	", trockne do	. 0,1039	auf 100 Th
	", " Asche	. 2,4412	
			6 .

pyrophosphors. Magnesia	. 0,0030 Grm.
Magnesia	. 0,00105 Grm.
	$\times 4$
auf die ganze Substanz	. 0,00420 Grm.
auf 100 Theile frische Substanz	. 0,0037
" " trockne do	. 0,0164
" " Asche	. 0,3797
Portion B.	
schwefelsaurer Baryt	. 0.008 Grm
Schwefelsäure	
Element Osliteco	× 4
auf die ganze Substanz	
auf 100 Theile frische Substanz	
1 10	
Agoba	
" " ASCHE	. 0,3030
Portion C.	
The soul of stip and the second stip as	decided except off the
Manganoxyduloxyd	
- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	$\times 4$
auf die ganze Subst	
auf 100 Theile frische Substanz	The state of the s
" " trockne d ⁰	. 0,0015
" " " Asche	. 0,0360
-invo 88610.0 10	instantal Stang of Diagram
Portion D.	
Chloralkalien	0,02578 Grm.
Kaliumplatinchlorid	0,03627 Grm.
Chlorkalium	0,01107 Grm.
Chlornatrium	0,01471 Grm.
	Co. BISA 1919BHREEDE
Kali 0,007 Grm. Na × 4	tron 0,0078 Grm. × 4
0,028 Grm.	0,0312 Grm.
WIN COULDING	
auf 100 Theile frische Substanz Kali	on 0,0241
Alles	lien 0,0509
AIKA	пен О.0009

auf 100 Theile trockne Substanz	Kali	 0,1070 0,1189
(adlian eduta	Alkalien	 0,2259
	Kali	 2,5200
auf 100 Theile Asche	Natron	2,8080
erbestimmens.	Alkalien .	 5,3280

Die in Wasser unlöslichen anorganischen Salze dieses Organs summiren sich demnach:

2,032 Orm	auf das ganze Organ.		auf 100 Theile trockne Subst.	auf 100 Theile Asche.
Phosphorsäure	0,0561	0,0482	0,2178	5,0490
Schwefelsäure.	0,01074	0,0092	0,0041	0,9630
Kieselsäure	0,0080	0,0069	0,0310	0,7200
Phosphorsaur.	Live als			
Eisenoxyd	0,1800	0,1548	0,6966	16,2000
Kalk	0,08064	0,0693	0,3122	7,2540
Magnesia	0,0113	0,0097	0,0436	1,0170
Kali	0,0280	0,0241	0,1070	2,5200
Natron	0,0312	0,0268	0,1189	2,8080
Manganoxydul-	de Hadag	Ber Aschen	2009	
oxyd	0,0004	0,0003	0,0015	0,0360
Kupferoxyd	0,0005	0,0004	0,0018	0,0450
Blei	0,0003	0,00026	0,0012	0,0270
anorg. Stoffe .	0,4072	0,34996	1,5357	36,6390

denen anorganischen Stoffe.

O.600 Grateran	auf die ganze Substanz.		auf 100 Theile trockne Subst	auf 100 Theile Asche.
Chlor	0,0145	0,0125	0,0567	1,3050
Phosphorsäure	0,2097	0,1803	0,8113	18,8730
Schwefelsäure.	0,0159	0,0137	0,0616	1,4310
Kieselsäure	0,0080	0,0069	0,0310	0,7200
Phosphs. Eisen.	0,1800	0,1548	0,6966	16,2000
Kalk	0,0807	0,0694	0,3123	7,2630
Magnesia	0,0113	0,0097	0,0436	1,0170
Kali	0,1935	0,1664	0,7488	17,4150
Natron	0,3902	0,3356	1,5102	35,1180
Manganoxydul-	D BEEF ES	TO THE WORLD	The value of	and a second
oxyd	0,0004	0,0003	0,0013	0,0360
Kupferoxyd	0,0005	0,0004	0,0018	0,0450
Blei	0,0003	0,00026	0,0012	0,0270
Summa	1,1050	0,95016	4,2764	99,4500

58jähriger Mann.

(Marasmus senilis.)

Leber 470 Grm.

Wasserbestimmung.

Wesself Destination.									
Frische Substanz									
nach dem letzten Wägen 1,227 Grm.									
Verlust = Wasser									
auf 100 Theile frische Substanz									
Wasser									
feste Stoffe									
100,000									
auf das ganze Organ									
Wasser									
feste Substanz									
470,000 Grm.									
Der Aschengehalt									
betrug 5,080 Grm.									
auf 100 Theile trockne Substanz 2,7737									
auf 100 Theile frische Substanz:									
Marie Company of the									
A b - A b - A A A A A									
Waste madaginghanga gaman roa									
" " " Wasser									
auf das ganze Organ									
Wasser									
Was der Arche (5 000 Com) waren der Kahle er									
Von der Asche (5,080 Grm.) waren aus der Kohle m									
Wasser ausziehbar									

Nachdem das Gewicht dieser in Wasser löslichen Salze dadurch bestimmt worden war, dass man den wässerigen Auszug der Asche verdampfte und so lange gelinde erhitzte, bis nach mehrmals wiederholtem Wägen kein Gewichtsverlust mehr Statt fand, lös'te man denselben in etwas Salpetersäure, wobei sich nach 24stündigem ruhigem Stehen Spuren von Kie-

l	elsäure abso	chieden. In	der filt	rirten F	lüssigkeit-wu	rde durch
ŀ	alpetersaure	s Silberox	yd niede	rgeschla	igen:	or in H

I	Chl	orsill	er.	5,54					. 9	. 0,437	Grm.
				apit, ge						0,108	Grm.
	100			frische					A	. 0,0227	Chlor.
ł	110	"	old oil	trockne	do.	,019	hoti	HE	icu	0,0590	Chlor.
ı	"	17	b paum	Asche .	nne	786	0	dden	31	2,1254	Chlor.

Nachdem das Silber aus dem Filtrat durch Salzsäure enternt war, wurde die Flüssigkeit abermals eingedampft, mit venig Salzsäure eine Stunde lang stehen gelassen und darauf mit Wasser verdünnt. Auch jetzt schieden sich noch Spuren on Kieselsäure ab, welche durch Filtration entfernt wurden.

In dem Filtrat zeigte sich auf Zusatz von überschüssigem Ammoniak eine merckliche Trübung. Nach 24 Stunden haten sich die Erdphosphate abgesetzt und ich bestimmte dieelbe nach der Filtration, dem Trocknen und Glühen Erdphosphate 0,051 Grm.

uf 100 Theile frische Substanz . . . 0,0057 Phosphate.

" " trockne d⁰ 0,0148 Phosphate.

" Asche 1,0037 Phosphate.

Aus der von den Phosphaten abfiltrirten Flüssigkeit fällte ich, achdem ich zuvor etwas eingedampft und mit Salzsäure überättigthatte, durch Chlorbaryumlösung die Schwefelsäure heraus.

Der überschüssige Baryt wurde aus diesem salzsauren Filrat durch Schwefelsäure gefällt und durch Filtration als chwefelsaurer Baryt entfernt; der Flüssigkeit sodann etwas almiak, überschüssiges Ammoniak und schwefelsaure Manesia zugesetzt, wodurch basisch phosphorsaure Ammoniaklagnesia gefällt und nach dem Glühen als pyrophosphorsaure lagnesia gewogen wurde.

yrophosphors. Magnes. 0,4450 Grm. hosphorsäure 0,282 Grm.

auf 100 Theile frische Substanz.	0,0592 Phosphors.
" " trockne do	
" " " Asche	5,5497 Phosphors.
Das Filtrat wurde hierauf ein	ngedampft, geglüht und mit
Wasser wieder gelös't. Auf Zusatz	
die Magnesia als Hydrat zu Boden,	sobald man die Flüssigkeit
eine Zeit lang gekocht hatte. Der	nach Entfernung der Ma-
gnesia durch heisse Filtration, noch	n in der Flüssigkeit zurück-
bleibende Baryt wurde mittels Sch	wefelsäure entfernt, und die
vom schwefelsauren Baryt mehrmal	ls abfiltrirte Flüssigkeit ein-
gedampft, wodurch schliesslich nur	r noch Kali und Natron als
schwefelsaure Alkalien zurückbliebe	
Kaliumplatinchloryd	10,927 Grm.
Woraus sich berechnete	
Kali	2,109 Grm.
schwefelsaures Kali	3,9055 Grm.
schwefelsaures Kali shewefelsaur. Natron	2,3645 Grm.
schwefels. Alkalien	
Hieraus ergibt sich:	
Alabama of Thomas	(Kali 2,1090
auf die ganze Substanz	Kali 2,1090 Natron 1,0310 Alkalien 3,1400
The second secon	(Kali 0,4428
auf 100 Theile frische Substanz	Natron 0,2165
an gow g	Alkalien 0,6593
6 400 MI 1 4 5 1 5 1 4	Kali 1,1513 Natron 0,5630
auf 100 Theile trockne Substanz	
kun 0,0088 Behwelms-	Alkalien 1,7143
auf 100 Thaile Archa	Kali 41,5148 Natron 20,290
auf 100 Theile Asche	Natron 20,290
vorde and diesem salzemmen Fil-	Alkalien 61,8048

Tabelle der in Wasser löslichen anorgan. Stoffe.

sawie annies	auf das ganze Organ.	auf 100 frische Substanz,	auf 100 Theile trockne Subst.	
Phosphorsäure	0,2820	0,0592	0,1539	5,5497
Schwefelsäure	0,0180	0,0038	0,0104	0,3542
Chlor	0,1080 Spuren	0,0227	0,0590	2,1254
PO5 alk. Erden	0,0510	0,0057	0,0148	1,0037
Kali	2,1090	0,4428	1,1513	41,5148
Natron	1,0310	0,2165	0,5630	20,2900
DA DOWN BER	3,5990	0,7507	1,9514	70,8378

	Der in Wasser unlösliche Antheil der Milzasche gab
ı	Kieselsäure
1	Mit Schwefelwasserstoffgas erhielt ich keine Schwefelmetalle.
١	In der salzsauren Lösung erhielt ich ferner:
ı	in der salzsauren Losung ermeit ich lerheit.
ı	a. auf Zusatz von Ammoniak:
ı	
ì	Erdphosphate-phosphorsaurer Kalk +
ł	Phosphors. Magnesia + Phosphors.
å	Eisen 1,159 Grm.
	b. in der vom Ammoniakniederschlag abfiltrir-
	ten Flüssigkeit:
No.	kohlensaurer Kalk 0,3605 Grm.
Ì	Kontensaurer Raik
200	Kalk 0,1950 Grm.
	seed to the title and a decided by the thought
١	Erdphosphate
	auf 100 Theile frische Substanz 0,2434
Ī	trookno do 0.6328
ı	Asaha 22.8280
١	" " ASCHE
ì	b.
١	Kalk
ă	auf 100 Theile feuchte Subst 0,0409
١	" " trockne d ⁰ 0,1066
	" " Asche
	Ammani C. drizzavi
	Spuren von Magnesia
	nach dem letten Wagen . b
	Nach Entfernung der zugesetzten Reagentien dampfte ich
	die noch übrige Flüssigkeit ein, erhitzte den Rückstand in
	einem tarirten Porzelanschälchen, glühte und wog
	Alkalien 0,1110 Grm.
	auf 100 Theile frische Substanz 0,0233
	" " trockne d ⁰ 0,0606
	" " Asche 2,1845
	Wir haben also in dem in Wasser unlöslichen Aschen-
	antheil:
	WIAVAA VAA I

likasche gab 0,006 Grm:			auf 100 Theile trockne Subst.	
Kieselsäure	0,0060	0,0013	0,0032	0,1180 22,8280
phosphs. Erden Kalk + MgO.	0,1960	0,0412	0,1071	3,8572
Alkalien	0,1110	0,0233	0,0606	2,1845
no has a great	1,4720	0,3092	0,8037	28,9877

Tabelle sämmtlicher anorgan. Bestandtheile der Leber:

1,159 Grm.	auf die ganze Substanz.		auf 100 Theile trockne Subst.	
Chlor	0,1080	0,0227	0,0590	2,1254
Phosphors	0,2820	0,0592	0,1539	5,5497
Schwefels	0,0180	0,0038	0,0104	0,3542
Kieselsäure	0,0060	0,0013	0,0032	0,1180
Kali	3,2510	0,6826	1,7749	63,9893
Eisen + Phos.	Er			
Erden	1,2100	0,2491	0,6476	23,8317
Kalk + Mag	0,1960	0,0412	0,1071	3,8572
22,8280	5,0710	1,0599.	2,7565	99,8255

Milz

von demselben geisteskranken Individuum.

Totalgewicht 175 Grm.

Wasserbestimmung.

Frische Substanz 3,285 Grm.
nach dem letzten Wägen 1,006 Grm.
Gewichtsverlust = Wasser 2,279 Grm.
Hieraus ergibt sich für 100 Theile Substanz
Wasser now how offilly and distant 69,387 string m
feste Stoffe
100 The 000,000 Substanz 0,0238
auf das ganze Organ
Wasser
feste Stoffe . de la de la
175,000 Grm.

Anorgan. Stoffe.

Der Gehalt an Asche betrug	
auf 100 Theile trockne Subst	1,6160 Asche.
auf 100 Theile frische Substanz:	
organ. Materie	. 30,1188
Asche	. 0,4942
Wasser	69,3870
wasser Phosphoreimre	100,0000
The state of the s	2 77 12 1 377

Von den 0,864 Grm. Asche waren aus der Kohle mit Wasser ausziehbar, d. h.

der Ph

in Wasser 0,609 Grm.

Die Reaktion derselben war schwach alkalisch. Der eingedampfte gewogene Auszug wurde in kochendem Wasser wieder gelöst, auf dem Wasserbade eine Stunde kochend erhalten und hierauf mit salpetersaurer Silberlösung versetzt. Nach kurzem Digeriren brachte ich den Niederschlag, bestehend aus Chlorsilber und phosphorsaurem Silberoxyd, auf ein Filter, welches rein ausgewaschen wurde. Der Rückstand wurde mit verdünnter Salpetersäure behandelt, worauf er sich grossentheils lös'te. Nur das Chlorsilber blieb in der salpetersauren Flüssigkeit ungelös't. Dasselbe wurde auf einem Filtrum gesammelt und nach dem Trocknen und Glühen wie gewöhnlich sein Gewicht bestimmt.

Es betrug:

Chl	orsill	er .	ae man					0,0525	Grm.
								0,0130	
								0,0074	alela. B
1 22	22	22	trockne	do			da	0,0242	engraii
1 22	. 12	, D 11	Asche					1,4950	alchewr

Das Filtrat enthielt noch das phosphorsaure Silberoxyd n Lösung. Auf Zusatz von Chlorkalium fiel durch doppelte Vahlverwandtschaft das Chlorsilber zu Boden. Dasselbe wog ach dem Trocknen und Glühen . . . 0,180 Grm.

ilberoxyd 0,146 Grm. ag and

Da dieses Silberoxyd sämmtliche in der wässerigen Lösung orhandene Phosphorsäure gebunden hatte, so lässt sich aus der Menge desselben die Menge der Phosphorsäure leicht berechnen nach der Proportion:

Das dreifache Atomgewicht des Silberoxyds (4347,03) verhält sich zum Atomgewicht der Phosphorsäure (891,55) = gefundenes Gewicht des Silberoxyds zum gesuchten Gewicht der Phosphorsäure; oder

82,99:17,01 = 0,146:x.x = 0,176 = Phosphorsäure.

 Wir haben also:
 Phosphorsäure

 für die ganze Substanz
 0,030 Grm.

 auf 100 Theile frische
 0,0172

 , , , trockne
 0,0561

 , , , Asche
 3,4500

In der vom ersten Silberniederschlage abfiltrirten Flüssigkeit wurde nach Entfernung des Silbers mittels Salzsäure die
Schwefelsäure in getrennten Hälften, in der einen durch Barytwasser, in der anderen durch Chlorbaryum gefällt. Nach dem
Glühen und Wägen der Niederschläge ergab sich zwischen
den Gewichtsmengen derselben eine Differenz von c. 0,0001.
Ich vermuthete desshalb, mit dem durch Chlorsilber gefällten
schwefels. Baryt sei gleichzeitig ein kleiner Rückstand von
Chlorsilber niedergefallen, wesshalb ich denn auch bei der
Berechnung des schwefelsauren Baryts nur die mit Barytwasser gefällte Hälfte als massgebend betrachtete. Dieselbe
betrug nach sorgfältiger Wägung

In den von den schwefelsauren Barytniederschlägen abfiltrirten und wieder zusammengefügten Flüssigkeiten wurde der überschüssige Baryt durch Ammoniak und kohlensaures Ammoniak gefällt. Dabei sank jedoch auch zugleich mit dem Baryt der Kalk und zwar als kohlensaurer Kalk zu Boden. Der ganze Niederschlag wurde nun sorgfältig auf dem Filtrum gesammelt, mit kohlensaures ammoniakhaltigem Wasser ausgewaschen und in wenig Salzsäure gelös't. Aus dieser salz-

sauren Lösung wurde der Baryt durch sehr verdünnte Schwelelsäure gefällt und abfiltrirt; in dem Filtrat hierauf nach Abstumpfung der freien Säure mittels Ammoniak der Kalk durch Oxalsäure gefällt, durch Filtration als kleesaurer Kalk solirt und nach dem Glühen als kohlensaurer Kalk gewogen.

Es ergab sich hiebei:

30	hlensa	urer K	alk .					0,0071	Grm.
15	Hiera	aus ber	echnete	sic	h:				
								0,0040	Grm.
								0,0023	
								0,0075	
								0,4600	

Die noch rückständige Lösung enthielt ausser den Alkalien noch geringe Mengen von Magnesia. Sie wurde eingedampft und schwach geglüht, hierauf mit Wasser gelöst, und der Lösung Barytwasser in Ueberschuss zugesetzt. Nach einigem Erhitzen schied sich Magnesiahydrat in unbestimmbarer Menge b. Wir hatten demnach

Magnesia Spuren.

Aus der von der Magnesia befreiten Flüssigkeit wurde der überschüssige Baryt mit kohlensaurem Ammoniak und Aetzammonium entfernt, worauf nach dem Verdampfen der bfiltrirten Flüssigkeit die zurückbleibenden Alkalien noch inmal, und zwar nach Zusatz von einigen Tropfen Salzsäure bgedampft, geglüht und gewogen wurden als

Chloralkalien						0,979	Grm.
Kaliumplatinchlorid						1,321	
Uhlorkalium	•					0,403	Grm.
Chlornatrium							

Hieraus ergab sich weiter durch Berechnung:

Kali	0,255	Grm.;		Natron	0,305	Grm.
		olan.	TOTAL .		chhomes	

uf	die ganze Substanz	Kali 0,255 Grm. Natron 0,305 Grm.
		Alkalien . 0,555 Grm.
) Kali 0,1459
uf	100 Theile frische Substanz	Natron . 0,1745
	onna te	Alkalien . 0.3204

auf 100 Theile trockne Subst.	Kali 0,4765 Natron 0,5699
	Alkalien . 1,0464
di Pittattion als bleesaurer Kalk	Kali 29,325
auf 100 Theile Asche	Natron 35,075
auf 100 Theile Asche	Alkalien . 64,400

In Wasser lösliche anorgan. Stoffe.

0040 Grm. je	auf die ganze Substanz.	auf 100 Theile frische Subst-	auf 100 Theile trockne Subst.	auf 100 Theile Asche.
Phosphorsäure	0,0300	0,0172	0,0561	3,4500
Schwefelsäure.	Spuren		_ trockine	
Chlor	0,0130	0,0074	0,0242	1,4950
Kali	0,2550	0,1459	0,4765	29,3250
Natron	0,3050	0,1745	0,5699	35,0750
Kalk	0,0040	0,0023	0,0075	0,4600
Magnesia	Spuren	fim luste	geglübt, le	ad seliwach
Summa	0,6070	0,3473	1,1342	69,8050

Die in Wasser unlöslichen anorganischen Bestandtheile der Milzsubstanz resp. die nach gänzlicher Verbrennung der Kohle zurückbleibende Asche wog 0,255 Grm., war von allen organischen Beimengungen frei, deutlich roth gefärbt, und gab, mit Salzsäure übergossen, keine Reaktion auf Koklensäure.

Nach dem schon mehrfach erwähnten Verfahren erhielt ich Kieselsäure 0,0090 Grm. auf 100 Theile feuchte Substanz 0.0051 " trockne d⁰.... 0,0167 " " Asche 1,0350 Im Schwefelwasserstoffniederschlag war

Blei kaum merkbare Spuren.

Die von Blei befreite saure Flüssigkeit gab mit Blutlaugensalz unverkennbare braune Trübung; Reaktion auf . . Kupfer.

Zur Quantitativbestimmung der übrigen anorganischen Stoffe gebrauchte ich die vom Schwefelwasserstoffniederschlag abfiltrirte Lösung.

Der Niederschlag mit Ammoniak gab: phosphors. Eisen + phosphs. Erden . . 0,240 Grm. auf 100 Theile frische Substanz . . . 0.1373 trockne d⁰.... 0,4484

I	Das ammoniakalische Filtrat enthielt	
١	kohlensaurer Kalk 0,008	2 Grm.
l	Kalk 0,004	6 Grm.
ì	auf 100 Theile frische Substanz 0,0026	6 Kalk.
I	" " , trockne d ^o 0,008	5 Kalk.
l	" " Asche 0,529	0 Kalk.
١	Alkalien 0,000	5 Grm.
	auf 100 Theile frische Substanz 0,0003	
I	" " " trockne d ⁰ 0,0008	8, , , , , ,
I		
-		
-	auf 100 Theile frische Substanz. 0,0026 " " trockne do. 0,0086 " " Asche 0,5296 Alkalien 0,0008	6 Kalk. 5 Kalk. 0 Kalk. 5 Grm. 3

Die ganze Milzsubstanz enthielt in übersichtlicher Zusammenstellung:

	In der ganzen Substanz.	100 Theile frische Subst.	100 Theile trockne Subst.	100 Theile Asche.
Phosphorsäure	0,0300	0,0172	0,0561	3,4500
Schwefelsäure.	Spuren.	The state of the s	CAT .	THE STATE OF THE S
Chlor	0,0130	0,0074	0,0242	1,4950
Kieselsäure	0,0090	0,0051	0 0167	1,0350
Kali	0,5555	0,3207	1,0472	64,5150
Kalk	0,0086	0,0049	0,0160	0,9890
Magnesia	Spuren.	s Substanz	eile troclas	all that have
Phosphs. Erden		: 01	masse	
+ Eisen	0,2400	0,1373	0,4484	27,6000
Kupfer	Spuren.	F. OFFICE	adank	
Blei	schwache do.		ASCHO	W 2717
060,0	0,8561	0,4926	1,6086	99,0840

Neugeborner

aus der Poliklinik (einige Stunden alt.)

Leber.

25 C. Cm. gaben

Totalgewicht 150 Grm.

Die physikalische Beschaffenheit des Organs war der Inspektion nach zu urtheilen, normal, nur war die Consistenz etwas weicher und weniger elastisch als man es sonst zu finden pflegt.

Wasserbestimmung.

Verwendete frische Substanz	6,250 Grm.
wog als getrocknete Subst	1,084 Grm.
Gewichtsverlust = Wasser	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM
Hieraus berechnete sich:	Marie Land
	123,756
für das ganze Organ Wasser feste Sto	123,756 offe . 26,244
COOO.O	150,000
auf 100 Theile frische Substanz:	all a second
Wasser	82,504
feste Stoffe	
	100,000
	: and stenous
Zur Einäscherung	
	Com
wurde verwendet die ganze Leber = 150	
Sie gab an Asche :	
Hievon waren in Wasser auch nach dem	
Wasserauszuges löslich	
unlöslich	0,5120 Grm.
Hieraus ergibt sich:	Kalk
auf 100 Theile trockne Substanz	5,1881 Asche.
nasse do.:	Phospha.Endon
organ. Stoffe	16,5874
Asche	
Wasser	82,5040
1,8061 0,1926 1,6086 99,0810	00,000
To the Steward International Laboration was	1
TOUTO A. THO	
In Wasser lösliche Sa	lze.
And the Care partition and all the community	
Tollog	
25 C. Cm. gaben	
Chlorsilber	
$= 0.0115$ Grm. Chlor. $\times 5 = 0$	A TALK DE LIGHT OF HE CAN DESCRIPTION OF HEALTH AND A SHOP HE AND A SHOP
macht auf 100 Theile feuchte Substanz .	0,0380
" " trockne do	0,2169
" " Asche	

II.

l	pohwofole Barut	0,0060
1	Schwefels. Baryt	0,00204
1	BOHWOOD	× 5
3	auf die gauze Substanz	
1	auf 100 Theile frische Substanz	The second secon
Ī	tmaalma d0	
ı	Acobo	
	" " Asche III.	l oib ban leblop omiliemtur
		aktion should make se
1	byrophosphors. Magnesia	0.00015
3	Phosphorsäure	0,06045
l	C 1. C 1 4 enorisdite	× 5
1	uf die ganze Substanz	0,30225
ì	uf 100 Theile frische Substanz .	
	" " trockne do	
١	" " Asche	22,1513
	in.W. Henktion: Book seigte sich	
	Chlorkalien	0,20041
1	Kaliumplatin-Chlorid	0,51020
1	Chlorkalium	0,15561
	Chlornatrium	0,04480
	gab:	69
1	Kali 0,07251 ;	Natron 0,02374
	× 5	$\times 5$
Ì	0,36255 Grm.	0,11870
	(010,0	Kali 0,2392
*	auf 100 Theile frische Substanz	Natron 0,0783
	2846,0 a . ou ma	Kali 0,2392 Natron 0,0783 Alkalien 0,3175
		Kali 1,3658 Natron 0,4470 Alkalien 1,8128
	ouf 100 Theile trockne Substanz	Natron 0,4470
	0.0000.0	Alkalien 1,8128
	6,000,0	Kali 26,5713
	uf 100 Theile Asche	Kali 26,5713 Natron 8,7007 Alkalien 35,2720
	0.00180	Alkalien 35,2720
	a Dipper	

V.

Kalk und Magnesia waren nicht zugegen.

HB.

In Wasser unlösliche anorgan. Stoffe.

Kie	selsä	ure .							0,0024	Grm.
			frische							
"	"	,,	trockne	do	. 30	De la	adis.	odo	0,0091	
	"		Asche							

Nachdem ich den Schwefelwasserstoffniederschlag in Salpetersäure gelöst und die Lösung bis zur schwachsauren Reaktion abgedampft hatte, senkte ich ein fein geripptes reines Eisenstäbchen in die Flüssigkeit, um allenfallsige Spuren von Kupfer darauf niederzuschlagen. Nach mehrstündiger vergeblicher Einwirkung des Eisenstäbchens versetzte ich zur Reaktion auf Blei die Flüssigkeit mit Schwefelsäure, ohne jedoch nur eine Spur jenes Metalles zu entdecken. Nach dem theilweisen Verdampfen der klaren salpetersauren Flüssigkeit verdünnte ich dieselbe mit viel Wasser und übersättigte mit Kalilauge bis zur stark alkalischen Reaktion. Doch zeigte sich kein Schein einer blauen Färbung. Kupfer und Blei waren also trotz der sorgfältigsten Behandlung nicht zu finden.

Aus der vom Schwefelwasserstoffniederschlag abfiltrirten Flüssigkeit erhielt ich in

			_
D	A 141	LAN	I. a.
- 1	OF	114911	1. 4.

PO	ruon I. a.
Phosphorsaur. Eisen	0,0186
	$\ddot{o} \times \times 4$
0.11870	66286. 0,0744
auf 100 Theile feuchte Sub	ost 0,0490
	if 18872,0 allo frische. Substanz
, 6, 18.0 , Asche	5,4535
Mali	f 100 Theile trockne sII d noitr
04atron 0,4470	f 100 Thelle trockne all d noitr
kohlensauren Kalk	0,00080
gab Kalk	. , 0,00045
Natron 8,7007	f 140 Chelle Asche
Alkalien . : 35,2720	0,00180
auf 100 Theile frische Sub	st 0,0012
" " trockne do.	doin apiaw aisongal 0,0068
Asche	doll dollaw Elsongate 0.1319

	Magnesia			,00025	
gab Magnesia				$\times 4$	
- FEET			0	,00036	-
ouf 100 Theile	frische Substan	7		,0002	
The state of the s				,0011	
22 22 22	1 7			,0293	
ferner:		4 (14 0) 01	a feed a		
Phosphorsäure			. 0,0016	Grm.	
100 CO			$\times 4$	12. 11	
			0,0064	Grm.	
	frische Subst		. 0,0042		
22 22 22	trockne do		. 0,0240		
29 22 29	Asche		. 0,4691		
Pyrophosphors.	Magnesia		. 0,1055		
gab Phosphors	äure		. 0,0694		
The second second		*	$\times 4$		
0,073£	dank		0,2776	Grm.	
auf 100 Theile	frische Subst				
29 21 22	trockne do				
22 29 22	Asche				
	ersten Ammonia	akniedersc	hlag abfilt	rirten	Flüs-
sigkeit war no					
kohlensaurer K			0,0012	Grm.	
gab Kalk			0,00067	77	
Desire Contract Off			$\times 4$	~	
			0,00268	Grm.	
auf 100 Theile	feuchte Subst.	Marin Company	0,0017		
" " "	trockne do		0,0097		
21 21 21	Asche		0,1979	~	
Control of the contro	Magnesia	. 1000	0,0004	Grm.	
gab Magnesia	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		0,000146	Grm.	
TO CASE TO LAND			× 4	<u>C</u>	
£ 100 m n	6 11 6 1		0,00058	Grm.	
Contract of the second	feuchte Subst		0,0003		
22 22 22	trockne do		0,0022		
21 22 27	Asche		0,0424		

Portion	II. wishing who decorded
Schwefelsaur. Baryt	0,0016 Grm.
gab Schwefelsäure	0,00055
08000,0" Sales Enlesses	\times 4
1000,0 i	0,0022 Grm.
auf 100 Theile frische Subst	0,0014
troolmo do	The Country of the Co
Agaha	0,1613
	the same of the sa
Portion I	
Chloralkalien	0,0605 Grm.
Kaliumplatinchlorid	0,1460 "
Chlorkalium	0,0440 ,,
Chlornatrium	0,0165
Kali 0,0278	Natron 0,00874
	$\times 4$
0,1112 Grm.	0,03496 Grm.
Alkalien	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Kali 0,0734
auf 100 Theile frische Substanz	Natron . 0,0231
All deservations and the second	Alkalien . 0,0965
Planting to the state of the st	Kali 0,4191
auf 100 Theile trockne Subst	Natron . 0,1319
	Alkalien . 0,5510
	Kali 8,1509
auf 100 Theile Asche	Natron 2,5655
	Alkalien . 10,7164

Tabellarisch zusammengestellt, ist also in der Leber dieses Neugebornen enthalten:

T1002	auf das ganze Organ.		auf 100 Theile trockne Subst.	auf 100 Theile Asche.
Phosphorsäure	0,5862	0,3867	2,2071	42,7485
Schwefelsäure.	0,0124	0,0081	0,0463	0,9090
Kieselsäure	0,0024	0,0016	0,0091	0,1759
Chlor	0,0575	0,0380	0,2169	4,2147
Kali	0,4737	0,3126	1,7849	34,7222
Natron	0,1536	0,1014	0,5789	11,2662
Kalk	0,0044	0,0029	0,0165	0,3298
Magnesia	0,0009	0,0005	0,0033	0,0717
Phosph. Eisen	0,0744	0,0490	0,2798	5,4535
424	1,3655	0,9008	5,1428	99,8915

Von zwei Krähen

urden die	Lebern	verwendet	zur	zoochemischen A	nalyse.
-----------	--------	-----------	-----	-----------------	---------

Das Gesammtgewicht derselben war 110,45 Grm.

Sie bestanden aus

Wasser				75,200	
anorgan.	+ organ.	Materie		24,800	
4.56				100,000	

Zur Einäscherung

urde die Substanz in zwei Gewichtshälften getheilt: A und B.

Die eine Hälfte A wurde nach der Anleitung Strecker's mit arythydrat befeuchtet, nachdem sie zuvor bei langsamer Hitze hwach verkohlt war; hierauf wurde die wieder getrocknete ichle in der Muffel bei nicht zu heftiger Temperatur verbrannt ad mit Wasser mehre Male ausgekocht und filtrirt. Im Filtrat urde nun mittels salpetersaurer Silberlösung sämmtliches hlor gefällt und nach der üblichen Methode bestimmt, als:

hlorsilber							0,2340	Grm.
hlor					7		0,0580	22
							$\times 2$	

ıf	die	ganze S	Substanz					0,1160	Grm.
if	100	Theile	frische	Subs	tanz			0,1044	
		**	trockne	mer.				0.4176	

Die andere Hälfte B wurde auf gewöhnliche Weise verrannt und die Asche in 2 Portionen getheilt à 0,1790 Grm.

Die gesammte Aschenmenge der beiden Krähenlebern berug demnach 0,7160 Grm.; wir hatten demnach:

if die ganze Substanz = 110,440 Grm.

					1	110,4400
Wasser					:	82,7200
						0,7160
						27,0040

if 100 Theile frische Substanz:

THERE I				200			
organ.	M	ate	rie				24,1556
Asche							0,6444
							75,2000
							100,0000

auf 100 Theile trockne Substanz:
organ. Materie 97,1360
Asche
100,0000
Aus der einen Portion erhielt ich im wässerigen Auszug
Chlorsilber 0,1169 Grm.
Chlor 0,0290 ,,
× 4
auf die ganze Substanz 0,1160 Grm.
Aus der Zusammenstellung der analytischen Resultate, die
wir aus der auf dem gewöhnlichen Verbrennungswege erhal-
tenen Aschenhälfte Berzielt haben, mit denen, welche aus der
nach Strecker's Modifikation bereiteten Aschenhälfte A erbeu-
tet wurden, lässt sich mit ziemlicher Sicherheit schliessen, dass
die Befürchtung Strecker's betreffs des Chlorverlustes bei der
gewöhnlichen einfachen Verbrennungsprozedur, wenn auch ge-
rechtfertigt, gleichwohl durch Zusatz von Barythydrat zum
Verbrennungsmaterial nicht immer gänzlich gehoben ist.
Die andere Portion Asche wurde ohne Rücksicht auf Lös-
lichkeits- oder Unlöslichkeitsverhältnisse direkt mit kochender
Salzsäure behandelt, darauf, weil sich nicht Alles lösen wollte,
mit conzentrirtem Königswasser so lange digerirt, bis die Flüs-
sigkeit vollkommen klar wurde. Nach dem Abdampfen und
Verdünnen dieser Lösung wurde der ausgeschiedene Nieder-
schlag nach dem Filtriren bestimmt, als:
Kieselsäure 0,007 Grm.
\times 4
auf die ganze Substanz 0,0280
auf 100 Theile frische Substanz 0,0252
" " trockne " 0,1008 " Asche 3,9256
Die noch übrige salzsaure Lösung wurde nach nochmaliger
Verdünnung in vier gleiche Volumtheile getheilt und folgende
Stoffe ausgefällt:
I.
THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

im Ammoniakniederschlag:
Phorphors. Erden + phosphs. Eisen 0,0116
× 16

auf die ganze Substanz 0,1850 Grm.

	f 100	Theil	e frische	Substanz			0,1665	
	"	"		3 ,,			0,6660	
	77		Asche				25,9370	
	der .	von di	esem Nie	ederschlag	abfil	trirte	n Flüssig	keit
	del	Kall -	L Magne	sia	Mar	000	0,0002	alt
	10000	LECTIC	Integric		th us		\times 16	
	of die	ganza	Substan	z			0,0032	Grm.
Till Si				Substanz			0,0028	
	771179		trockne				0,0112	
	27	22	Asche	The state of the s		rich.	0,4386	
	"	"	Hocho			unit i	nkko das	
	india			II.			0.0000	Cum
î	kalien						$0,0220 \\ \times 16$	Grm.
ı	0.7:		011			-		Cum
ı				Z		l' mi	0,352	Grm.
H	f 100	Theile		Substanz.			0,3168	
	22	22	trockne	**			1,2672	
	"	"	Asche				49,2504	
				III.				
ŀ	hwefel	saurer	Baryt .				0,0052	Grm.
ŀ	hwefel	säure	THE RESIDENCE		100		0,0018	
ı							\times 16	nigdos
þ	f die	ganze	Substanz		ngils		0,0288	Grm.
ľ	f 100	Theile	frische	Substanz.		./ 1	0,0259	donni
	27	22	trockne				0,1036	
	11	22	Asche		i ixi		4,0378	
				IV.		ding	Jierneuiya	
				11.				

urde nachträchlich auf Blei und Kupfer geprüft, wovon aber ine Spur vorhanden war. Der eingedampfte Rückstand urde zur Prüfung auf Mangan mit Soda und etwas Salpeter sammen auf dem Platinblech geschmolzen; doch zeigte sich ebei keine Reaktion auf Mangan.

Anmerkungen zu den Tabellen.

Anmerk, zu IV.

Milz. Die Reaktion auf Kupfer stellte ich in dem in Wasser unlöslichen Aschenantheil nach der von Gorup'schen Methode an, indem ich nach Bestimmung der Kieselsäure in der bis zur schwach sauren Reaktion eingedampften salpetersauren Flüssigkeit eine kleine Döbereiner'sche, aus einem Zink- und einem Platindrahte konstruirte galvanische Kette, derart einsenkte, dass die freien Enden der beiden Drähte in einiger Entfernung von einander in der Flüssigkeit lagen, während die beiden andern Enden ausserhalb der Flüssigkeit mit einander vereinigt waren; doch konnte ich selbst mit der Loupe auf dem Platin keinen Kupferbeschlag entdecken.

Anmerk. zu VI.

Kaninchen. Die untersuchten Organe dieses Thieres verdienen wegen ihres überraschend niedrigen prozentischen Wassergehaltes spezielle Berücksichtigung. Ich erhielt die Objekte zur Untersuchung vom Anatomiediener als normal, wahrscheinlich hatte das Thier jedoch schon geraume Zeit zu physiologisch experimentellen Zwecken gedient. Doch konnte ich durch spätere Rückfrage nichts Sicheres mehr darüber vernehmen, weil ich die langsame Austrocknung die Osterferien hindurch fortgesetzt hatte, und somit eine zu bedeutende Zwischenzeit seit der physiologischen Verwendung des lebenden Thieres verstrichen war. Bei den Spezialanalysen der Asche dieser Organe konnte wegen der geringen Menge des gebotenen Materials nur auf einzelne wenige Bestandtheile derselben Rücksicht genommen werden.

Die Leberasche war roth tingirt, was auf Eisenreichthum deutet. Ebenso bekundet das zimmtartige Colorit der Milzasche den grossen Eisenreichthum dieses Organs; der Ammoniakniederschlag der sauren Lösung war sogar viel intensiver gelb gefärbt als der in der Leberaschenlösung.

Im Allgemeinen ersehen wir aus den so eben aufgeführten Daten, dass die untersuchten Organe des Kaninchens adäquat ihrem spärlichen Wassergehalt auch durchschnittlich verhältnissmässig wenig feuerbeständige Salze enthalten.

TABELLE

über die vorangehenden Analysen, sowie über die Wasser- und Aschenbestimmung der Drüsen einiger Menschen- und Thierindividuen, von denen der Kürze wegen hier nur die Resultate aufgezählt werden.

	I. Männl. Geisteskranker		II. Weibl. Geis- teskranke.	58jährige (Marasmu	r Mann.	Syphilitischer	V. Neugeborner, unden alt.	V. Krähen. Gesammtge- wicht zweier		VI. Kaninchen.				Niere.	17,010 1,353 81,637	XIII.	Milz.	16,017
Total Laboratory	Leber.	Milz.	Milz.	Leber.	Milz.	Leber.	Milz. Totalgewicht 89,550 Grm.	Lebern 110,45 Grm. Leber.	-	Milz.	Nieren.	XIII. Karpfen.	upfen.	Milz.	5,604 1,581 5,604	S. K	Leber.	16,968
organ. Stoffe	1,1030	0,7365 74,0310	0,9502 77,4800	36,3402 1,0668 62,5930 A s c h e n		16,5874 0,9086 82,5042 nthalt	80,0070	24,1556 0,6444 75,2000	43,1353 0,8127 56,0520	31,609 0,516 67,875	40,4038 0,5852 59,0110		K	Leber. N	20,370 10 1,342 1 78,288 10	0	re- Speichel a. druse.	81 20,456 58 0,514
Chlor	49,3732 0,9121 0,2727	27,1098 2,5437 0,0704	1,4310 0,7200	2,1254 5,5497 0,3542 0,1180	1,4950 3,4500 Spuren. 1,0350	42,7485 0,9090 0,1759	33,0259 9,5315 0,5016 0,9502	4,0378			Schwefels. 0,0658	XI.	Sunger Hund	Neben- nieren.	19,8820 0,0900 80,0280	hnin vergiftet	Pan- Thyre-	49,880 30,281 1,077 1,058
Kali Natron Kalk Magnesia Eisenoxyd Phosph, (Erden + Eisen Manganoxyd	14,4749 3,0202 0,1938 2,7500 0,1009	43,2980 7,5007 0,3937 7,2745 0,0813	1,0170 16,2000 0,0360	27,6889	64,5150 28,5890	34,7222 11,2662 0,3298 0,0717 5,4535		25,9370		3,1653	1,8161	X.	er Hund.	. Niere, Pan- creas	2 18,616 22,422 7 0,434 0,368 1 80,950 77,210	IX. Mee Hand, (mit Strychnin	Milz. Niere.	24,268 23,218 1,586 1,278
Kupferoxyd	0,012	1	0,0270	99,8255	99,0840	99,8915	99,8937	Alkalien. 49,2504 99,8526		0,1020 Spuren.	0,1579 0,0658		Jung	er. Milz.	829 14,942 896 0,597 275 84,461		Leber.	35,985
		Fage alt, (an	VII.					au, (Caries	III. des Sprung	Thuman	Inguinal-			Leber.	Substanz. 19, ne Subst. 0,			Substanz e Subtsanz
Leber 85,500Gra organ. Substanz 24,789 anorgan. Subst. 1,071 Wasser 74,140	21,4080 1,5090	21,4770	0,5760 0	,2740 22,3 ,0200 0,4	460 23,730 480 0,370	00 0,7180	18,3315	0,9900	Pancreas. 24,5770 0,9500	idea.	drüse. 28,4520 0,1160				organische Su anorganische Wasser			organische Su anorganische

TABELLE

über die vorangehenden Analysen, sowie über die Was

			m. Staffe .	
			ser	
081138				
08827				
	COTHER IN			
		200		
			I SALES OF IN	
			em Subarana	
			1 1988	

Unter den einzelnen mineralischen Bestandtheilen zeichnet h durch Quantität verhältnissmässig die Talkerde aus, benders in den Nieren; überhaupt haben die Nieren dieses tersuchten Thieres auch die meisten schwerlöslichen Aschenstandtheile, unter denen wiederum das Verhältniss der kohnsauren resp. organischsauren Erden zu den Erdphosphaten Gunsten der ersteren hervortritt, was bei den Pflanzenfresen ziemlich konstant vorkommen soll.

Auch die Schwefelsäure, in den beiden übrigen Organen t gar nicht vertreten, findet sich in den Nieren merkwür-

ger Weise in quantitativ bestimmbarer Menge.

Zur Sonderanalyse des Ammoniakniederschlags und der kalien sowie zur Prüfung auf Chlor und Schwermetalle chte theils die Zeit, theils das gebotene Aschenmaterial ht aus.

Anmerk, zu VIII.

Werfen wir einen vergleichenden Rückblick auf die so eben sprochenen analytischen Befunde der Drüsenaschen der alten au, so werden wir auf einige frappante Zahlenverhältnisse merksam. So finden wir z. B. durchgängig schon einen im rhältniss zum Alter des Individuums, und zu den Schlüssen, zu eine oberflächliche Autopsie der Leiche hätte verleiten nen, bedeutenden prozentischen Wassergehalt. Dies mag hil darin seinen Grund gehabt haben, dass, während die pennerischen Theile des Körpers anämisch und collabirt schien, die inneren Organe, zumal die Drüsen, hydropisch durchtakt waren, ohne dass übrigens die normale Struktur dersoen geändert gewesen wäre.

Leber.

Im Vergleich mit anderen Leberaschen bot sie schon dem asseren Ansehen nach (durch den Mangel der charakteristisen rostrothen Färbung) keinen bedeutenden Eisengehalt dar. Iser Umstand kann mit zu der Vermuthung berechtigen, grosse Wassergehalt der Leber sei nicht durch einen betenden Blutreichthum, sondern eher durch hydropische Tzesse bedingt gewesen.

Milz.

Hier konnte der Wassergehalt schon eher a priori von Ekt hydrämischer Blutkrase und lokaler Blutstauung abgeleitet werden, weil nach der angestellten Krankheitsdiagnose eine Stockung des Blutes in der Pfortader mit gleichzeitigem starken chronischen Milztumor schon im Leben bestanden hatte. Auffallend ist übrigens der bedeutende Aschenrückstand. da doch das dyskrasische Knochenleiden eher auf einen Mangel alkalischer Erden schliessen lässt. Doch ist zu berücksichtigen, dass, wie ich später aus der Krankengeschichte vernommen, die Frau an häufigem Intermittens gelitten, was bekanntlich zu erdigen Ablagerungen so gut wie zu fibrinösen Entartungen disponiren konnte. Ausserdem hat sich auch. besonders durch die bereits in der Einleitung angeführten werthvollen Untersuchungen Carl Schmitt's herausgestellt, dass nach den Gesetzen der Hydratationsverdichtung bei langdauernden Krankheiten, in denen der Eiweissgehalt der Intercellularflüssigkeit bedeutend sinkt, wie z. B. in dem vorliegenden Falle, der Gehalt an anorgan. Stoffen entsprechend steigt. Schmitt hat ja sogar dargethan, dass z. B. bei Wassersuchten für die ausgetretene Menge Eiweiss durchschnittlich 10 % Salz mehr, gleichsam vikarirend, (nach Schmitt Diffusionsäquivalent) im Kreislauf zurückgehalten wird.

Niere.

Der Salzreichthum der Niere kann uns nicht auffallend sein, wenn wir bedenken, dass Patientin lange Zeit viel phosphorsaure Erden therapeutisch zu sich genommen hatte, und da die Nieren die theilweise Entfernung des anorgan. wie des organischen Detritus zu besorgen haben, so ist eine Anhäufung der schwer löslichen anorganischen Stoffe theils im Parenchym, theils in den Nierenkelchen und Harnkanälchen nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar wegen des histologischen Baues dieses Organes fast unvermeidlich. Diese Annahme, dass die als Medikamente eingeführten Erd-Phosphate zum Theil die grosse Menge des anorgan. Gehalts der Nieren bedingt haben, wird noch unterstützt durch den analytischen Beleg des aus der Blase geschöpften Urin's, welcher nach Entfernung des gleichzeitig vorhandenen Eiweisses auf Zusatz von Ammoniak einen massenhaften Bodensatz von phosphorsauren alkalischen Erden zeigte. Auch die Nierenasche selbst gab, mittels Königswasser gelöst, auf Zusatz von Ammoniak 2,384 Grm. Erdphosphate.

Pancreas.

In dem Wassergehalt dieser Drüse tritt die mehrfache Beziehung des Wassers zum thierischen Stoffwechsel recht zu Tage. Wir sehen nämlich, dass bei einem Individuum, dessen assimilative Funktionen (Progressivmetamorphose) chronisch gehemmt waren, dessen Ausscheidungsbedürfniss depurativer Stoffe dagegen mit jedem Tage zunahm, dass bei diesem Individuum auch entsprechend z. B. die Bauchspeicheldrüse, als das Organ für ausschliessliche Verdauungsunterstützung während ihrer gehemmten Thätigkeit weniger starken Stoffumsatz, weniger Wasserbedürfniss hat; dagegen der se- und exkretorische Apparat, (Leber und Niere), anhaltender und stärker beansprucht durch die rasche Consumption der Organtheile und die dadurch gesetzten Produkte der regressiven Metamorphose, auch eine der Funktionsstärke adäquate Menge Wassers bedarf und verarbeitet.

Der verhältnissmässig bedeutende Aschengehalt hat ebenfalls seine vollkommen physiologische Begründung. Die Ablagerung anorganischer Stoffe überhaupt hat nämlich, wie ich
weiter unten noch ausführlich besprechen will, unter Anderm
ihre hauptsächlichste Veranlassung in einer langsamen Inspissation animalischer Flüssigkeiten, in einer Verödung der festen
Gebilde auf Kosten des Wassergehaltes. Alle diese Momente
waren aber in dem vorliegenden Falle vorhanden: spärlicher
Wassergehalt (74 %); Verdichtung des Gewebes (24 % organ.
Subst.) Versiechung der pankreatischen Gänge, was bei der
Inspektion der secirten Leiche und beim Untersuchen mit der
Sonde schon bemerkt wurde.

Thyreoidea

zeigte auf dem Durchschnitt weite, dicht konturirte Gefässlumina. Hinsichtlich des Volumens konnte man das Organ hypertrophisch nennen. Auffallend bleibt mir immer die bei der gleichzeitigen bindegewebigen Entartung so enorme Wassermenge, wenn auch die maschige Gefässverbreitung, welche zu einer förmlichen Teleangiektasie ausgeartet war, einige Anhaltspunkte zur Erklärung bietet. — Durch Grange's Kropfstudien (Cf. unten bei "Magnesia") aufmerksam gemacht, habe ich die Asche der etwas vergrösserten Thyreoidea auf ihren Gehalt an Magnesia untersucht. Nach Entfernung des oxal-

sauren Kalks und sorgfältiger Klärung der nochmals mit Oxalsaure versetzten essigsauren Lösung bekam ich auf Zusatz von Ammoniak und phosphorsaurem Natron nur schwache Spuren von Magnesia, während dagegen die Kalkerde in der That vorwiegend war. Es scheint also wenigstens dieses Strumatoid wohl nicht durch eine Art spezifischer Magnesia-Dyskrasie oder durch Praedisposition zur Ablagerung dieses Mineralstoffes bedingt gewesen zu sein.

Inguinaldrüse.

Das ganze Lymphdrüsensystem der Leiche schien eine Anlage zur bindegewebigen Entartung zu besitzen. Um wenigstens möglichts normales Gewebe zur Untersuchung zu haben. benutzte ich nur die Drüsen des rechten Schenkels, weil ich befürchtete, die linken Drüsenstränge könnten vielleicht von dem cariösen Knochen in Mitleidenschaft gezogen sein; da übrigens auch die rechte Drüse sehr stark entwickelt war, (ohne spezifische chronische Entartung), so hatte ich zur Analyse hinreichendes Material, so dass ich die der andern Seite unbehindert entbehren konnte. Die Asche dieser Drüse war ähnlich wie die Milzasche, rostrothfarbig vor den andern Aschen ausgezeichnet, ohne allen Zweifel von dem starken Eisengehalt herrührend. Dass eine Abnormität, etwa Hyperämie hier Veranlassung zu diesem Eisenreichthum sollte gewesen sein, möchte ich bezweifeln, indem weder auf der Oberfläche der Drüse, noch im Parenchym derselben eine aussergewöhnliche Injektion der Blutgefässe wahrzunehmen war. Diese Beobachtung führt zu Schlüssen, welche vielleicht chemisch physiologische Verwerthung verdienen, besonders bezüglich der chemischen Uebereinstimmung die in der Zusammensetzung zwischen Blut und Lymphe, zwischen rothen und weissen Blutkörperchen herrscht.

Auch Schwefelsäure fand sich in verhältnissmässig ansehnlicher Menge in der Asche; was ebenfalls ein Wink sein kann zu Muthmassungen über die Rolle welche das Lymphgefässsystem im thierischen Stoffwechsel übernimmt. Die Qualitativuntersuchung ergab bezüglich der sonstigen anorganischen Stoffe fast dieselben Resultate wie bei den anderen Drüsen. Nur rücksichtlich der Quantität mögen vielleicht Unterschiede bestehen, sowie in Hinsicht auf die Ablagerungsfähigkeit für

chwere Metalle und überhaupt für deletäre unassimilabele

Anmerk. zu lX. u. X.

Aus denselben Ursachen wie bei den vorausgehenden beiten alten marastischen menschlichen Individuen finden wir uch bei den wichtigeren Drüsen des alten Hundes durchtechnittlich entsprechend geringere Wassermengen vor, als bei ler Drüsensubstanz jugendlicher Geschöpfe. Nur die Speicheltrüse spricht scheinbar für das Gegentheil. Doch ist nicht anz aus dem Auge zu lassen, dass vielleicht der Giftreiz des Strychnins eine starke momentane Funktionserhöhung in den defässen und Canälen dieses Organs hervorgerufen und die ecernirte Flüssigkeitsmenge in dem Drüsengewebe vermehrt hat.

Dass das Pancreas so wenig Wasser-resp. Säftegehalt zeigt, auf uns nicht wundern, wenn wir bedenken, dass die Funkion des Verdauungsapparates fast total daniederlag, was schon araus hervorgeht, dass der Hund wegen Altersiechthums, weil r Nichts mehr verdauen konnte, dem Tode geweiht war. Der aft der Bauchspeicheldrüse sowie die Blutmenge innerhalb ieses Organs wird also ebenfalls nichts weniger als reichlich, blglich der Wassergehalt spärlich gewesen sein. Doch zeigt ie Niere im Verhältniss zu der des jungen Hundes, wenn auch bsolut weniger Wassergehalt, doch relativ höhere Prozente n Wasser, was wohl von der vermehrten Funktion der Niere eim erwachsenen Hunde herrühren mag, zumal wenn auch eim Hunde ein so inniger Connexus zwischen dem Urin- und renitalapparat obwaltet.

Der Wassergehalt der Drüsen beim jungen Hund ist durchhnittlich wie beim jungen Menschen stärker als bei älteren
hieren, der Aschengehalt geringer, was besonders bei Niere
nd Milz auffallend hervortritt. Der enorme Aschengehalt der
iere beim alten Hund lässt sich nicht wohl anders deuten,
s durch die vermehrte Ausscheidung von anorganischem Deitus durch dieses Organ, welches vikarirend für die Leber
nzutreten scheint; denn die Leber selbst hat verhältnissässig sehr geringe Aschenmenge; obwohl der übermässige
enuss erdiger Bestandtheile durch das Knochenfressen der
unde auf bedeutendere Ablagerungen in die Lebersubstanz
bilte schliessen lassen. Ob die Milz des alten Hundes bei

Vorkommmen des anorgan. Materials in den thierischen Geweben vermitteln, so erlaube ich mir mich in den nachfolgenden Blättern auf dem Gebiete des animalischen Stoffwechsels etwas weiter zu verbreiten.

Ueber Entstehung, physiolog. Bedeutung und Localisirung der anorgan. Stoffe im Thierorganismus überhaupt.

Es wäre fruchtlos, wollte man sämmtlichen im Organismus nachweisbaren anorganischen Stoffen eine ausschliessliche gemeinsame physiologische Rolle zuschreiben; sei es nun dass man diese Vorkommnisse teleoskopisch beurtheilt, oder ihner eine bloss zufällige abnormale Bedeutung überlassen will. Faktisch ist es, dass einerseits allerdings die Aufnahme unassimilirbarer anorganischen Stoffe in den Organismus in vielen Fällen durch eine Art physiologischen Usurpationsprozesses bedingt, somit als pathologisch zu bezeichnen ist; andererseits lässt sich jedoch auch nicht bestreiten, dass ein nicht geringer Theil derselben in bis jetzt noch nicht bestimmbaren quantitativen und qualitativen Verhältnissen einen wesentlichen je unumgänglich nothwendigen vitalen Einfluss auf den anima lischen Nutritionsvorgang ausübt; und es ist wohl vorauszusehen, dass die Gesetze des Proportionswechsels des anorganischen Materials im thierischen Haushalt durch den Fortschrit der Zoochemie in Kurzem als ein gewichtiges Moment des physiologischen wie pathologischen Assimilationsgeschäftes in der Physiologie und pathologischen Anatomie und der pathologie Chemie noch manche dunkle Lücke ausfüllen, manche bishe kaum gewagte pathogenetische Muthmassungen bestätigen wird Ich erinnere hier nur im Vorbeigehen an die sog. hypinoti schen und hyperinotischen Zustände, welche, verschiedentlich lokalisirt, bald im Brightschen Hydrops als Nierenaffektion bald im Scorbut und Typhus als Intestinalkrankheiten einre gistrirt werden. Ohne durch diese Andeutungen den ungreif vollen, lassen gleichwohl bei typhoiden Krankheiten die kontanten Wechselbeziehungen zwischen Kali- und Natrongehalt ezüglich der betroffenen Organe, z. B. die gesteigerte Alkascenz der pathologischen Sekretionsprodukte und im Zusamenhang damit die Löslichkeitsmodifikationen des im Blute usgeschiedenen Albumens der wissenschaftlichen Neugier des hemikophysiologen einen weiten Spielraum zur unterstützenen Forschung im Gebiete der anorganischen Chemicophysiologen einen weiten Spielraum zur unterstützenen Forschung im Gebiete der anorganischen Chemicophysiologen einen weiten Spielraum zur unterstützenen Forschung im Gebiete der anorganischen Chemicophysiologen einen weiten Spielraum zur unterstützenen Forschung im Gebiete der anorganischen Chemicophysiologen einen weiten Spielraum zur unterstützenen Forschung im Gebiete der anorganischen Chemicophysiologen einen weiten Spielraum zur unterstützenen Forschung im Gebiete der anorganischen Chemicophysiologen einen weiten Spielraum zur unterstützenen Forschung im Gebiete der anorganischen Chemicophysiologen einen weiten Spielraum zur unterstützenen Forschung im Gebiete der anorganischen Chemicophysiologen einen weiten Spielraum zur unterstützenen Forschung im Gebiete der anorganischen Chemicophysiologen einen weiten Spielraum zur unterstützenen Forschung im Gebiete der anorganischen Chemicophysiologen einen weiten Spielraum zur unterstützenen Forschung im Gebiete der anorganischen Chemicophysiologen einen Gebiete der a

Diese vorübergehende Würdigung des anorganischen Thieraterials wird die folgenden Andeutungen über ihre Wichtigit für den Stoffwechsel rechtfertigen und vielleicht etwas
zu beitragen, den Forscherblick der Zoochemiker auf das noch
nig bebaute Feld der im Organismus vorkommenden feuersten Salze zu lenken.

Nachdem die experimentirende Physiologie das Dasein der - und ex- dosmotischen Gesetze dargethan und dieselben als ementarbedingungen des Stoffwechsels bezeichnet hat, kennen : die den Stoffwechsel dominirende Rolle des Verdauungsparates als der ersten Stätte der Stoffaufnahme. Schon in · Pflanze beginnt die Metamorphosenreihe der Elementartandtheile durch die Endosmose, das physikalische Substrat Stoffwechsels. Das Diffusionsvermögen des auszutauschen-Materials ist daher neben der Elementarstruktur der Ortheile der Maassstab einerseits für die Verwerthbarkeit der ffe in der Thierökonomie, andrerseits für die Möglichkeit Il Ausdehnung der Aufnahme fremdartigen deleteren Mates in die thierischen Gewebe. "Corpora non agunt, nisi uta." Diese schon vielfach missverstandene Regel gilt unlingt für alle Normalstadien des physiologischen wie pathoischen Stoffaustausches; und wenn auch in neuester Zeit liker die Porösität aller Zellenmenbranen, also direkte offene Inmunikationswege zwischen den Organelementen, durch roskopische Beobachtungen an Amphibien und an einem r wahrscheinlich gemacht hat, so ist doch diese wenn auch mehr problematische Canalpassage so mikroskopisch enge, dass einen unmittelbaren Durchtritt ungelöster und selbst fein bendirter Substanzen durch dieselbe nicht zu denken ist.

Die erste Bedingung der Aufnahme in den Organismus ist also wie für die assimilabeln organischen Stoffe so auch für die mineralischen Bestandtheile des Thierkörpers ihr löslicher Zustand. Diese Bedingung wird, wie viele neuere Untersuchungen dargethan haben, in den verschiedenen parenchymatösen und Circulationsmedien der Organe mehrentheils durch die freien Säuren realisirt, woraus sich denn auch Grahams Erfahrung erklärt, dass saure Verbindungen ein bedeutendes Diffusionsvermögen besitzen, alkalische hingegen nur ein sehr geringes; so dass also aus diesem Verhalten schon für die einzelnen Sekretionsvorgänge sowie für den Stoffaustausch überhaupt allgemeine physikalische und chemische Schlüsse resultiren, da die Säuren eine mehr aktive, die Alkalien in diesem Verhältniss eine mehr regulatorische, nach Umständen neutralisirende Funktion zu erfüllen pflegen. Und wenn wir uns auch nicht unbedingt an Helmonts extremes pathologisches System, sämmtliche Krankheiten nach zwei Hauptgruppen: sauren und alkalischen Zersetzungen, zu klassifiziren, anschliessen wollen; so lässt sich doch der starke Einfluss dieser chemischen Reaktionen auf die meisten pathogenetischen Prozesse leicht nachweisen, und ich werde im Verlaufe dieser Abhandlung an geeigneter Stelle Gelegenheit haben, auf dieses Thema ausführlicher zurückzukommen. Ich erinnere vorläufig, um auf die Wichtigkeit der Säuren in ihrem Verhältniss zu den im Organismus verarbeiteten anorganischen Stoffen aufmerksam zu machen, nur an die Wirkung nothwendiger freier Säure bei Rhachitis und bei den osteomalazischen Vorgängen überhaupt, welche durch zwei Factoren bedingt sein können; einmal durch überwiegende Festbildung aus organischem Material in Folge übermässigen Vorraths an alkalischen Erden, (Vergl. d. Artikel alkal. Erden) woraus dann sekundär eine mehr mechanische Verdrängung des normalen anorganischen Knochenmaterials entsteht, was man füglich als eine homöopathische, oder wenn man lieber will, homöopathogenetische, also eigentlich mehr indirekt krank machende Wirkungsweise der anorgan. Materie bezeichnen könnte; dann aber auch durch die lösende Kraft freier Säuren und somit durch direkte theilweise Verflüssigung der normalen anorganischen Bestandtheile der Knochen. Ferner erinnere ich an

die Harnsäure-Diathese, an die Symptomenreihe des Diabetes mellitus, an die Aetiologie und die rationelle Therapie dieser Krankheiten.

Dieselben sich gegenüberstehenden Agentien, Säuren und Alkalien, welche mit den Kräften der lebenden thierischen Maschine fortwährend balanciren, fördern die ganze kreisende Bewegung, die ganze Metamorphosenreihe der anorganischen Salze in dem geschlossenen Ringe sämmtlicher Naturreiche, von der Verwitterung der Felsarten und Kiese durch den Kreislauf der Pflanzen und Thiere bis zum Verdampfen des Phosphorwasserstoffgases aus dem verwesenden Schädel des Denkers.

Næh H. Rose nimmt die Pflanze aus dem Boden nur vollkommen oxydirte Substanzen auf, zerlegt jedoch in ihrem Organismus die phosphorsauren und schwefelsauren Salze und bildet daraus einerseits combinirte schwefel- und phosphorhaltige Stoffe (Proteinstoffe), während andererseits auch die Basen deser Salze ganz analog theilweise in solche organische Verbindungen eintreten, wie man das z. B. von dem Eisen im Hämatir annehmen kann, ähnlich wie sich etwa das Schwefelcyan mit Kalium und andern Mineralien zu dem complizirten Rhodankalium u. s. w. venbindet.

Allein nicht nur die Aufnahme dieser durch Eingehen in Proteinerbindungen löslich gehaltenen Mineralstoffe ist physiologich möglich: auch die Resorption der in die ersten Wege gelangenden binären anorganischen Verbindungen ist durch hatsachen und Experimente an Thieren und ausserhalb des Organismus mehr als wahrscheinlich. Für viele Fälle genügt zur Erklärung dieser Thatsache die Zersetzung der Salze lurch die freie Säure des Magens, woran vor Allem die Milchsure sich betheiligt. Wenn wir jedoch bedenken, dass bei de Analyse organischer Stoffe nach Entfernung des Albumens die extractiven Materien stets phosphorsauren Kalk in Lösung erhalten, so muss man doch vorläufig noch an eine hypotletische Verbindung dieser Phosphate mit dem Albumen sowohl als mit anderen thierischen Flüssigkeiten festhalten.

Wihrend nun allerdings, wie eben erwähnt, die chemischen Unteruchungen für die wirkliche Existenz löslicher Kalkalbuminat und anderer Verbindungen der Erden mit Proteinstoffen sprechen. (Albumin und Albuminoide, Globulin, Chondrin, Pyin, selbst Hämatin u. s. w. haben in ihren Aschen vorwaltende Erdsalze), so hat doch ebenso die Ueberführung der fertigen unlöslichen Erdphosphate in den löslichen Zustand und somit ihre Resorptionsfähigkeit durch analoge Erscheinungen ausserhalb des Organismus mehre plausible Erklärungsarten gefunden. Die Resorption dieser unlöslichen Salze kann nämlich ermöglicht werden durch einen zweifachen chemischen Zersetzungsprozess. Dieselben werden nämlich zuerst gelöst durch die im Magen vorhandene freie Magensäure oder durch die Gegenwart von Milchsäure oder Chlornatrium. (Kochsalz vermag nämlich nach Lassaigne's Versuchen, in dem Verhältniss 1:12 in Wasser gelöst, in einem Litre der Mischung bei gewöhnlicher Temperatur 0,333 Grm. (63/5 Gran) basisch phosphorsaure Kalkerde zu lösen). Nachdem also de Erdsalze im Magen durch das eine oder das andere dieser prädisponirenden Medien zerlegt, und Säuren und Basis derselben separatim in den Kreislauf eingedrungen sind; könner sie sich allenthalben im Organismus auf dem Wege der En- und Exdosmose wieder begegnen und durch einen zweiten igentlich mehr synthetischen Prozess zu ihrer ursprünglicher binären Salzform verbinden und in das thierische Gewebe je iach Umständen sowohl normal als auch pathologisch ablagen.

Ebenso gegenüber den Erdsalzen wie das Chloratrium, wirken die Verbindungen des Chlor mit Ammonium und Kalium, indem sie vermöge doppelter Wahlverwandtschaft durch Bildung löslicher Erdhaloidsalze und phosphorsaurer alkalien die Aufnahme der Kalksalze in den Organismus vermitteln. Daher mag auch der zum volksthümlichen Bedürfniss gewordene diätetische Genuss des Kochsalzes zur täglichen Iahrung seinen Ursprung haben. Hier ist es auch am Platze, durch die eben genannte Wirkungsfähigkeit der Chloralkalien belehrt, auf die Zweckmässigkeit aufmerksam zu machen, lei der therapeutischen Anwendung des phosphorsauren Kalks in Knochen- oder Drüsenkrankheiten gleichzeitig auch die receptorische Verschreibung oder wenigstens den häufigen diätetischen Genuss der genannten Haloidsalze und zwar vozüglich des Kochsalzes dem Patienten als Adjuvans anzuordne.

Zwar soll nach Liebig auch das phosphorsaure Naton die

Eigenschaft besitzen, phosphorsaure alkalische Erden im Magen zu lösen und in den animalischen Stoffwechsel überführen zu können. Allein Versuche haben dargethan, dass eine gesättigte Lösung von phosphors. Natron bei zehnfacher Verdünnung weder in der Kälte noch bei Siedhitze irgend eine Modifikation der Kalkphosphate zu lösen vermag.

Die Möglichkeit, ja Nothwendigkeit, dass ein sehr grosser Theil der einmal in das Verdauungsapparat eingeführten anbrganischen Stoffe auf ganz normal physiologischen Wegen in die thierischen Gewebe übergeführt werde, ist aus dem Vorausgehenden wohl ziemlich ersichtlich. Von gleicher Wichtigkeit und nicht geringerer Schwierigkeit ist die Beantwortung der Fragen über die Lokalisirung derselben in den thierischen Geweben und Gewebselementen, sowie über den Antheil, welchen die Pathologie im Gegensatz zur Physiologie an der Verwerthung des anorganischen Materials für einzelne Krankheitsfälle zu beanspruchen hat.

Wenn wir das aus den zoochemischen Aschenanalysen bis jetzt angehäufte Material ein wenig sondiren, und z. B. bei einer vergleichenden Beurtheilung der Gallensteine und der Leberaschen, der Nierenkonkremente und der Gewebsasche lieser Drüse, der Speichelsteine und der normalen anorganischen Bestandtheile des Speichelsekrets, der Gichtkonkremente ınd der Aschenrückstände der Schweisdrüsen, u. s. w. eine gewisse Uebereinstimmung in der qualitativen und quantitatien Proportionalzusammensetzung zwischen den verwandten Organenaschen und den sekretartigen anorganischen Produkten lieser Organe nicht verkennen können; so dürfte uns, zumal venn wir von den Organaschen die beiläufigen feuerfesten stoffe des in den Geweben circulirenden Blutes subtrahirt lenken, die Analogie zwischen der chemischen Constitution ler Parenchymaschen und der anorganischen Bestandtheile ler stammverwandten Ablagerungen leicht zu dem Schlusse erleiten, die z. B. in der Gallenblase suspendirten oder conlomerirten anorganischen Stoffe, die sogen. Gallensteine seien owohl der Form als der chemischen Constitution nach, als nakroskopische Repräsentanten der milliarisch in die Gewebsheile eingesprengten und als Aschenbestandtheile zur Wahrehmung kommenden molekulären Salztheilchen, zu betrachten.

Somit wäre ein bedeutender Mengentheil der Organ- und speziell der Drüsenaschen als Sekretionsbestandtheil auf Rechnung der transsudirenden Nährungsflüssigkeit zu schreiben. Ohne Zweifel hat diese Ansicht für einen grossen Theil der Aschenbestandtheile ihre Richtigkeit; berücksichtigen wir jedoch etwas genauer einmal die ungeheuere Menge und Verschiedenartigkeit der im Thierkörper vorkommenden anorganischen Stoffe an und für sich, wenn wir uns teleogisch ausdrücken wollen, mit Bezug auf ihren physiologischen Zweck, dann aber auch die zusammenwirkenden Momente zur Vermittlung der Deponirung dieser Salze, sei dieselbe nun pathologisch (wie bei den Conkrementbildungen), oder normal wie z. B. bei den physiologischen Ossifikationen, oder bei dem Prozess der Zahnentwicklung; so erweiteren sich die vielen Möglichkeiten für anorganische Ablagerungen in unübersehbare Verzweigungen. Was erstens, abgesehen vom Modus des Ablagerungsprozesses, die Dignität und Bestimmung der abgelagerten Stoffe selbst anlangt, so glaube ich die deutlich und richtig aufgestellte Eintheilung Chevreul's zu Grunde legen zu müssen, welcher nach ihrem Einfluss auf den Organismus drei Klassen anorganischer Elemente im thierischen Körper unterschied: solche Stoffe, welche zum Leben absolut nothwendig und wesentlich sind; solche die zwar nothwendig, allein nöthigenfalls auch durch andere Stoffe zu ersetzen sind, dann endlich solche, welche, ohne die geringste Störung im Lebensprozess zu verursachen, durchaus fehlen können.

Zu der ersten Klasse gehören die Alkalien, ferner Kalk, Eisen u. s. w.; zu der zweiten wahrscheinlich Magnesia, zu der dritten zählt Chevreul Blei und Kupfer, natürlich auch alle anderen abnormalen anorganischen Befunde, welche auf nutritivem Wege in den Organismus gelangt sind; und ich möchte hinzufügen, ohne Ausnahme auch mehr oder weniger alle Stoffe aus den ersten zwei Klassen, insofern sie durch Qualität oder Quantität excessiv erscheinen.

Es ist nicht meine Sache die einzelnen anorganischen Stoffe nach ihrem physiologischen Werthe nach dieser Eintheilung zu klassifiziren; ich überlasse dieses den Autoritäten der Wissenschaft, während ich mich begnüge, blos Thatsachen aufzuführen, und Muthmassungen über die Quellen dieser Thatsachen daran anzuknüpfen.

Der Dispositionen und Ursachen zu anorganischen Ablagerungen gibt es so viele, dass ich, ohne den Zweck meiner Arbeit aus den Augen zu verlieren, unmöglich einen syngenetischen umfassenden Typus für alle dahin bezüglichen Prozesse entwerfen kann. Um die Vorgänge des anorganischen Stoffumsatzes nur einigermaassen genau zu beleuchten, wird es zweckmässig sein, sich aus den Breitegraden der Gesundheit ein wenig zu entfernen und einerseits die lokalen Möglichkeiten, durch anatomische oder vielmehr histologische Veränderungen der Organe herbeigeführt, zu studiren, andererseits auch den constitutionellen Veranlassungen, den Einflüssen der Blutmischung, der Assimilationsenergie und der Temperamente gehörige Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn wir z. B. durch E. H. Weber wissen, dass die subtilen Gallengänge in 1/200" grossen Zwischenräumen zwischen den Haargefässen der Leberverzweigungen des Pfortadersystems liegen, wer möchte dann noch zweifeln, dass oft die geringste Stauung in der Blutoder Gallenflüssigkeit, die leiseste ungewöhnliche Brechung der Wellenkraft des Cirkulationsstromes stellenweise mikrotomische Rupturen der betreffenden Organwandungen herbeiführen können, wodurch Extravasat und Ablagerung anorganischer Stoffe angebahnt wird? Wer möchte ferner, da wir die feinen chemischen Nüancen der sich so nahe berührenden verschiedenartigen thierischen Flüssigkeiten und den theils regulirenden, theils aber auch störenden subtilen Einfluss der zoochemischen Reaktionen auf die Strömungen und den wechselseitigen Umtausch derselben kennen, die Ursachen übersehen, welche zu Gunsten der Concrementbildung auf die schon secernirte Galle mischungsverändernd einwirken können? Doch sobald wir von dem verwandtschaftlichen Verhältniss, dem pathogenetischen Zusammenhang überzeugt sind, welcher, wie selbst Schönlein und Jahn angedeutet haben, zwischen Steinbildung, Hämorrhoiden, Gicht, Hypochondrie, Hysterie und mehren auderen unter vagen Bezeichnungen nur halb definirten Unterleibs- und Nervenleiden sich nachweissen lässt, so liegt die Annahme auf der Hand, dass allen diesen ausgesprochen pathologischen Störungen, vornehmlich der Produktivität der Organismen an anorganischen Ablagerungen ein bestimmtes Hauptleiden zu Grunde gelegt werden kann.

Dieses Grundleiden liegt zwischen zwei extremen Faktoren, von denen jeder einzelne zur Hervorbringung der genannten Krankheitsmodifikation genügt, jedoch in der Regel durch irgend eine Lokalaffektion unterstützt, zu den lokalen Krankheitsformen, welche man als error loci bezeichnen kann, prädisponirt. Diese beiden Hauptfaktoren der hypermineraloplastischen Erscheinungen im Organismus sind: Erstens erhöhte Sekretions und Resorptionsthätigkeit in den ersten Wegen, in Folge dessen Vermehrung der zur Assimilation dienenden Flüssigkeiten, Chylus, Blut. Diese erhöhte Resorptionskraft kann bedingt sein sowohl durch anatomische Struktur des Chylopöetischen Systems, als auch durch gesteigerte Reizempfänglichkeit des dem vegetativen Leben vorstehenden Gangliennervensystems. Dass sich übrigens diese beiden Bedingungen nicht gegenseitig ausschliessen, bedarf wohl keines weiteren Beweises. Der sweite Hauptfaktor ist Stockung des Blutstromes in der Pfortader und ihren Verzweigungen, entweder durch mechanische, oder dynamische Hemmnisse hervorgerufen; nebst gleichzeitiger Insufficienz der Sekretionsorgane zur normalen Ausgleichung der nutritiven Störungen. Aus diesen beiden, einem aktiven und einem passiven Faktor entwickelt sich der die somatische wie die psychische Sphäre beherrschende, in der Therapie immer noch nicht genug berücksichtigte Krankheitsstammbaum, welcher in der Abdominalplethora seine Wurzeln hat. Daher auch die schon vom Freih. von Bibra wahrgenommene Thatsache, dass die chronischen Geisteskrankheiten, besonders Depressionszustände wie Melancholie, mit dem Aschenreichthum der Unterleibsorgane und vornehmlich der Lebersubstanz in der Regel zuzammentreffen. Die ersten und nachhaltigsten Wirkungen dieser Stagnation des Pfortaderblutes haben unmittelbar die Hauptcirculationsstationen, wie Nieren, Milz, Leber, (Gallengänge und Gallenblase) Darmkanal zu erleiden, weil hier der gegenseitige en- und exdosmotische Wechselverkehr zwischen den thierischen Flüssigkeiten die Stauung und ihre schlimmen Folgen noch vermehrt und die Exsudation und Extravasation von Elementarstoffen erzwingen kann, für welche unter ganz normalen Bedingungen die Wände der secernirenden Apparate undurchdringlich wären. Dass eine solche Ueberladung

der Organe mit unzersetztem organischen und anorganischen Detritus in Folge zu reichlicher Nahrungsaufnahme und zu starker Verdauung bei Mangel energischer Verarbeitung des aufgenommenen Materials nicht nur unmittelbar, nämlich durch primäre Wirkung der abgelagerten Stoffe selbst, sondern auch und zwar häufig viel eingreifender noch durch Druck, mechanische Abnutzung und Verschleissung der Gewebselemente sekundär unheilbare chronische Uebel (z. B. Brightische Nierendegeneration) einleiten kann oder vielmehr muss, ist einfache physiologische Folgerung aus dem Zusammenhang der Systemfunktionen im Thierkörper. Woher sonst die so häufige Organenentartung bei Geisteskranken? Wahrscheinlich mehrentheils durch jahrelange unausgesetzte Störung des Gleichgewichts zwischen Materialzufuhr und Verarbeitungsfähigkeit der Organe ohne hinreichende Ausgleichung des Stoffübermaasses durch anderweitige sekretorische Thätigkeit.

Abhängig von dem Modus der Anhäufungs- und Ablagerungsvorgänge anorganischer Stoffe im thierischen Körper ist auch die Form der abgelagerten Produkte, der man eigentlich drei Modifikationen zuschreiben kann. Erstens der vorwaltende Zustand der Löslichkeit des anorgan. Materials in allen thierischen Säften; zweitens die bei der Festbildung des organischen Materials in den konsistenten Zustand mit übergeführte Constitution der Salze; drittens die förmlich isolirte, bald amorphe, bald krystallinische Form, als vorwiegend pseudoplastische Bildungen. Während die beiden ersten Formen nach allgemein gültigen physiologischen Gesetzen unter normalen Bedingungen entstehen und erhalten oder eben so leicht wegen ihrer grösseren Beweglichkeit metamorphosirt werden, gilt ein Gleiches nicht von der dritten Form der anorganischen Ansammlungen. Sie ist es, die wohl vornehmlich die extremen Schwankungen in dem Aschengehalt der drüsigen Organe veranlasst durch den Inhalt z. B. der Leber-, Milz- und Ovariencysten, durch tuberkulöse Entartungen und atheromatöse Prozesse. Als Veranlassung zu diesen pathologischen Produkten kennen wir vor Allem jede krankhafte Exsudation und Extravasation von bildungsfähigem Material mit unorganischen Bestandtheilen in organisirtes Gewebe; oder auch den Zerfall fertiger thierischen Gewebe, wobei der organische Antheil des Gewebes natürlich in die gewöhnlichen leicht resorbirbaren Endprodukte der Regressivmetamorphose übergeht, während sich der Aufsaugung der anorganischen Reste der Exsudattrümmer sowohl wie des zerstörten physiologischen Gewebes viel mehr mechanische und chemische Hemmnisse entgegenstellen. Dass sich zumal in den pseudoplastischen Gebilden nach dem Schmelzungsprozess der organischen Bildungsmittel die Massenanhäufung der erdigen Produkte steigert mit dem Gehalt des allnährenden Blutes und der übrigen den Assimilationsprozess bethätigenden Flüssigkeiten an erdigem Material, ergibt sich aus den Erscheinungen bei der sog. gichtischen Dyskrasie und der Steindiathese, Krankheitsformen, denen meist eine lange andauernde Unterdrückung normaler Haut- oder anderer Drüsensekretionen und der dadurch zu beschaffenden Reinigung der Körpersäfte von kohlenstoffigem und anorganischem Detritus vorangeht und zu Grunde liegt. Dass ein mit diesen Stoffen übermässig geschwängertes Blut, auf Entzündungsheerde congestionirt, oder bei Abdominalplethora in den Drüsenorganen stockend, in die Gewebe entschieden grössere und mehr conzentrirte Salzmassen ablagert, zeigen die chemischen Untersuchungsresultate der gichtisch oder anderweitig dyskrasisch betroffener Leichentheile, sowie auch schon die Krankheitserscheinungen und das subjektive Befinden während des Lebens. Der Tripelkrystalle auf den typhösen Darmgeschwüren, welche unter Anderem auch hieher gehören, werde ich unter dem Artikel Magnesia gedenken. Ganz anderer Art sind wieder die besonders bei Mastvieh so häufig wahrzunehmenden Venensteine und die steinigen Ablagerungen an die Herzklappen. Die Entstehungsweise der krystallinischen Aggregate, die ebenfalls sehr häufig in allen Theilen des thierischen Körpers sich vorfinden, erklärt Scherer klar und bündig mit folgenden Worten:

"Krystalbildung erfolgt stets dann, wenn gelöst gewesene, der Krystallisation fähige Körper aus diesem Zustande langsam in den festen übergehen, was durch Verlust von Feuchtigkeit oder durch chemische Metamorphose oder durch Hinzutritt von Substanzen erfolgt, die mit den früher leichter löslichen, nun allmälig schwer lösliche Verbindungen bilden, z. B. Harnsäure, harnsaures Natron und Kalk; phosphorsaure Magnesia durch Hinzutritt des sich entwickelnden Ammoniaks."

Ueber den Wassergehalt der Drüsen.

Wasser findet sich im thierischen Organismus einmal als Träger und Vermittler, dann aber auch zugleich als Endprodukt der Materienmetamorphose fertig gebildet in unbeständigen Prozenten vor. In letzter Eigenschaft begegnet es uns neben Kohlensäure als letztes Umwandlungsprodukt der Kohlenhydrate und Fette. Abgesehen von den in allen organischen Verbindungen des Thierkörpers allotropisch vorhandenen Elementen des Wassers, dem Wasserstoff und dem Sauerstoff, welche schon an und für sich als eine bis nach der Verwesung noch fortdauernde unversiegbare Quelle für Wasserbildung betrachtet werden können, ist die Zufuhr von Wasser in Form von Trank und Speise so überwiegend während des menschlichen Lebens, dass es uns nicht überraschen kann, bezüglich des Wassergehalts im Mikrokosmos ein ähnliches quantitatives Verhältniss zu den festen Stoffen anzutreffen, wie wir es vom Makrokosmos kennen. Die Vertheilung des Wassers auf die einzelnen Organsysteme ist selbst im Normalzustand äusserst variabel, was jedenfalls durch die wechselnde physiologische Bedeutung und den mannigfaltigen Einfluss desselben auf die Körperfunktionen bedingt ist. Nur die Sättigungscapazität des normalen Blutes für Wasser und daher auch der absolute Wassergehalt des Blutes selbst soll konstant sein. In welcher Eigenschaft und Form das Wasser im Thierkörper vorkommt, ist nicht für alle Fälle bestimmbar.

Uebrigens kommt es als solches fertig gebildet chemisch verbunden vor, sowohl als Krystallwasser, welches sich mit den Salzen vereinigt, ohne jedoch durch eine äquivalente Menge Basis oder Säure ersetzt werden zu können, als auch in salinischer Form, indem es für einen Theil einer Säure oder Basis substituirt ist, vorzüglich bei den Salzen solcher Säuren, von denen ein Atom nicht durch ein, sondern erst durch mehrere Atome Basis gesättigt wird, z. B. basisch phosphorsaure Magnesia (PO⁵ 3 MgO.) Als Hydratwasser (Aequivalent für eine Base oder Säure) ist es im Organismus wohl nicht vorhanden.

Eigentlich lässt sich das Wasser in den genannten Zuständen nur fast als an die anorganischen Salze gebunden annehmen. Als integrirender Theil der geformten organischen Substanzen kann man es nicht wohl betrachten, indem die Annahme, dass man sich Sauerstoff und Wasserstoff als eine Art Hydrat vorstellen müsse, sehr willkührlich ist. Die eigentliche quantitativ bestimmbare Wassermenge im Thierkörper, welche auf rein physikalischem Wege durch Temperaturerhöhung ausgetrieben werden kann, existirt in allen Körpertheilen als blosses Vehikel des organischen Materials in mechanischer Mengung mit demselben.

Der Zweck, oder vielmehr die Unentbehrlichkeit des Wassers für den Stoffwechsel geht schon aus dem Begriff des animalischen, wie überhaupt des organischen Lebens hervor. Kein Leben, keine organisirende Thätigkeit der Materie ist ohne Stoffumsatz denkbar. Wie können aber die einmal geformten Körpermaterialien nach dem abgeschlossenen Progressivprozess die physiologisch eben so wichtige, ja eben so zum Kreislauf nothwendige Regressivmetamorphose eingehen; ja wie kann überhaupt auch nur von irgend welchem organochemischen Stoffumsatz, von irgend einer produzirenden Activität der Materie die Rede sein, so lange der feste Cohäsionszustand der umzusetzenden Theile nicht durch Wasser verflüssigt wird? Wasser also bedingt die Vitalität sämmtlicher pflanzlichen und thierischen Organismen, und die Energie der Lebensprozesse hat an dem regulirenden Wassergehalt der einzelnen, besonders der drüsigen Organe, wie der Leber, Milz, Nieren, einen der wichtigsten Faktoren. Mehr für die Physiologie und physiologische und pathologische Chemie, als für die Anatomie ist seine Wichtigkeit bei der Untersuchung kadaveröser Gebilde in Anschlag zu bringen; wesshalb denn auch die Wasserbestimmungen mehr dem Zoochemiker als dem Zootomiker im engeren Sinne anheimfallen. Denn die einmal gesetzten plastischen Formenverhältnisse der thierischen Gebilde gehen ja z. B. bei dem absichtlichen oder auch unfreiwilligen Wasserverlust, wie durch Mumification der Leichen. nicht zu Grunde, im Gegentheil, sie erhalten dadurch Beständigkeit, werden fixirt gegenüber den zerstörenden Einflüssen der Verwesungsprozesse, wie denn auch ja im Pflanzenreich ganz physiologisch die reifen Blätter und übrigen Theile, wie die Holzrinde den endlichen Wasserverlust nicht zu ergänzen brauchen, weil in einem gewissen Stadium der Entwicklung alle

fernere Stoffmetamorphose bis nach dem Absterben sistirt ist, und die trockne Zellulose in ihrem festen Aggregatzustande, in der von ihr einmal angenommenen Form oft Jahrzehnte lang leblos oder vielmehr vegetationslos aufbewahrt werden kann.

Diese Betrachtungen über das Wasser stellen den hohen Werth einer vergleichenden Wasserbestimmung für die verschiedenen Organsysteme für die Beurtheilung ihrer physiologischen Funktionsfähigkeiten ausser Frage. Wir sehen z. B. in den Drüsen, deren Hauptfunktionsaufgabe in mehr oder weniger energischer secernirender Verarbeitung oder Verbreitung der Nährmaterialien durch den Organismus besteht, die Menge Wasser verhältnissmässig je nach der physiologischen oder pathologischen Intensität dieses Geschäftes mehr oder weniger gesteigert, während im Knochengerüste, welches eine mehr stationäre, dem Stoffwechsel nicht so bedeutend unterworfene Verfassung hat, die Wassermenge im Verhältniss zu den festen Stoffen stets auffallend zurücktritt.

Das Blutgefässsystem, der Herd aller chemischen und physikalischen Vorgänge, zeichnet sich daher stets durch hohe Wasserprozente vor allen übrigen Organsystemen aus, und die auffallende Wassermenge der Milzsubstanz bei Milztumor oder Stockungen in der Pfortader ist wohl mehrentheils auf Stauung des Blutstromes in diesem Organe zurückzuführen. Also weniger die Beschaffenheit oder die Menge der Parenchymflüssigkeit in dem Gewebe, in der Substanz der Milz selbst, als vielmehr die durchziehenden Blutgefässe erklären die im Verhältniss zur Leber vorwaltende Wassermenge. Hiefür spricht schon der durch Inspektion der obducirten Leiche wahrnehmbare Unterschied zwischen dem dunkelroth injicirten, auf dem Durchschnitt von Blut strotzenden Milzgewebe und der mehr fleischig gelappten, konsistenteren Lebersubstanz; dann steigt auch, wie aus den vorstehenden Tabellen ersichtlich ist, mit dem Wassergehalt der Milz beständig ihr Eisenreichthum, was wieder für die Zusammensetzung des Blutes spricht.

Am entschiedensten zeigt sich der Einfluss, den das Blut auf die chemische Zusammensetzung der Organasche hat durch vergleichende Analysen der Fötusorgane und der Organe der Neugeborenen mit denen Erwachsener.

Dass besonders Lungen und Gehirn des Fötus nach der Geburt resp. nach dem Eintreten des kleinen Kreislaufs rasch erfolgende gegenseitige Veränderungen erleiden, ist bekannt. Die Wissenschaft besitzt schon beträchtliche Zusammenstellungen der bezüglichen Gewichtsverhältnisse. Im Einklang mit diesen stehen die Unterschiede der betreffenden Organe an Wasser- resp. Blutgehalt. So finden wir, während bei Erwachsenen normal die Milz höhere Gewichtszahlen für Wasser ergibt, als die Leber, das Verhältniss umgekehrt beim Fötus und beim Neugeborenen. Hier rühren die Differenzen offenbar von dem Wechsel und der Theilung der Circulationsrichtung des Blutes her, und der Unterschied würde sicherlich noch beträchtlicher sein, wenn nicht der verstärkte Blutzufluss zur Leber durch den ductus venosus Arantii mit gleichzeitiger Hemmung des Abflusses den Blutinhalt der Leber noch ziemlich compensirte, zumal die Obliteration der durch die eingetretene Athmung obsolet gewordenen Gefässe grösstentheils erst 8-12 Tage nach der Geburt vollendet ist Auch wird nach Unterbindung des Nabelstrangs eine Zeit lang nach physicalischen Gesetzen noch eine Communikation zwischen der Vena cava inferior und der Leber durch den ductus venosus Arantii unterhalten.

Wenn demnach die vergleichende Bestimmung der Wassermengen für die relativ embryonalen, fötalen und ausgebildeten normalen thierischen Drüsen auch keine für physiologische oder embryologische Verwerthung bis auf die Dezimalstellen verwendbare Ziffern ergibt, so liefern die gefundenen Thatsachen doch hoffentlich nicht ganz zu verwerfende Beiträge zur Beantwortung von Fragen, welche in das Gebiet der forensischen Medizin hinüberstreifen. Und wenn sich's darum handelt, ob ein Kind kurz vor, während, oder nach der Geburt gelebt, oder in welchem Zeitraume der Gravidität der Mutter es gestorben sei, so verdient auch in gewissen Fällen die quantitative chemische Untersuchung der Drüsen mit besonderer Berücksichtigung des Wasser- und Eisengehalts und vergleichender proportionaler Angabe der Blutsalze einige Aufmerksamkeit. Im Interesse der gerichtlichen Medizin wäre demnach zu wünschen, dass ähnliche Analysen, wie ich sie mit den Organen weniger Neugeborenen angestellt habe und in

vorliegender Arbeit veröffentliche, auch für die verschiedenen, nach den Modifikationen des embryonalen Kreislaufs abgegrenzten Entwicklungsstadien des Kindes während des Intraunterinlebens ausgeführt und für die Entscheidung der gerichtlichen Streitfrage über Lebensfähigkeit geborener Früchte verarbeitet würden.

Wenn wir aus den bisherigen Forschungen über Wassergehalt der Organismen gesehen haben, dass bei jedem Pulsschlag von Sekunde zu Sekunde mit der kreisenden Blutmasse eine förmliche Ebbe und Fluth physiologisch zu verwerthenden Wassers bis in die feinsten Kapillarverzweigungen durch sämmtliche Organe zittert, und dass die hydrostatische Gleichmässigkeit dieser Wassermenge und Wasserbewegung das Gleichgewicht zwischen physiologischen und pathologischen Schwankungen zu erhalten vermag; so ist leicht einzusehen, wie wichtige Dienste zoochemische Wasserbestimmung der in neuester Zeit wegen ihrer rationellen Begründung so hochgeschätzten Hydropathie und Hydrotherapie zu leisten vermögen.

Chlor.

Ueber die Einführungsquelle des im thierischen Körper circulirenden Chlors können wir nicht in Zweifel sein, da wir ja fast in jedem vegetabilischen wie animalischen Nährstoff ein unversiegbares Depot von Kochsalz besitzen, und selbst die gewöhnlichen Quell- und Brunnenwässer einen mehr oder weniger ausgesprochenen salinischen Charakter haben. Nur über das metabolische Verhalten dieses Elementes im thierischen Haushalte ist man noch nicht so recht in's Klare gekommen, wesshalb ich denn auch die schon vielfach aufgeregte Frage über das Vorkommen der Salzsäure im Magensaft und die Ursprungsmöglichkeit derselben aus zerlegtem Chlornatrium vorläufig ganz übergehen will. Durch Induktion hat man sich, indem man bei Pflanzen und Thieren den relativen Gehalt der Produkte aus der Progressiv- und der Regressivmetamorphose an Chlornatrium sowie die Einwirkung dieses Salzes auf die sekretorischen Thätigkeiten studirte, zu der Hypothese verleiten lassen, die eigentliche Wirksamkeit der Chloride erstrecke sich ausschlieslich auf die regressiven Prozesse. Hiemit suchte man denn auch zugleich lie unbestimmte Wirkungsweise der Salzbäder und des medi-

kamentösen Salzgenusses in Einklang zu bringen. Allein einmal ist eine so engherzige Rollenvertheilung in der Thierökonomie viel zu spezifisch und gar zu wenig dem Sinne der physiologischen Verallgemeinerung entsprechend, als dass sie einige Wahrscheinlichkeit für sich haben könnte; zudem können auch die Resultate wenigstens meiner Analysen der thierischen Sekretorgane mich durchaus nicht überzeugen, dass irgendwo in einem Sekretionsprodukt ein in Beziehung auf die Einfuhr von Kochsalz unverhältnissmässig grosser Gehalt an Chlor deponirt sei. Im Gegentheil habe ich nicht selten gefunden, dass gerade in den Drüsenaschen eine verhältnissmässig gegen den Chlorgehalt des Blutes ziemlich geringe Chlormenge zugegen war. Wollte man auch trotz meiner im Eingange erwähnten Vorsichtsmassregeln meiner Analysirmethode die Möglichkeit einer Chlorverflüchtigung beim Glühen der Organe zur Last legen, so möge man berücksichtigen, dass ich nach derselben Methode verfahren bin, nach welcher anerkannte Autoren die meisten Blutaschenanalysen unternommen haben, und dennoch häufig so geringe Mengen Chlor gefunden habe, während jene in den Blutaschen durchschnittlich viel reichlichern Gehalt an Kochsalz resp. Chlor nachgewiesen haben. Die enge Beziehung des Chlors auf die blos regressiven Vorgänge im Organismus ist also nur unbegründete Hypothese; und sicherlich ist der Wirkungskreis dieses Minerals für die Thierchemie weit ausgedehnter und frühzeitiger in den physiologischen Stoffumsatz eingreifend. Von der allerdings noch nicht ganz entschiedenen auflösenden Wirkung der Salzsäure auf die Erdphosphate und kohlensauren Erden im Magen bis zur Abscheidung des Chlornatriums und Chlorammoniums in Harn, Schweiss und sonstigen Sekreten oder der Ablagerung depurativer Chloride in Gicht- und anderen Concrementen, kann das Chlor gemäss seiner chemischen Kräfte in den thierischen Funktionen so vielfache Zwecke erfüllen, dass es mit Recht zu der Klasse der für den Organismus unentbehrlichen Stoffe gezählt wird. Ob das Chlor im Blute eine ähnliche Wirkung entfalten könne, wie Mulder ausserhalb des Thierkörpers von demselben beobachtet hat, indem durch Einwirkung von Chlor und Wasser auf Hämatin diesem das Eisen entzogen, und ein rückbleibender weisser Körper von der Formel C41 H22 N3 O6 + 6 Cl O3

gebildet wurde, ist noch nicht zu ermitteln gewesen. Möglich wäre dieser Einfluss des Chlors auf das Hämatineisen, wenn, wie wir bei der Besprechung der Schwefelsäure sehen werden, während der respiratorischen Oxydation des Blutes und der Fibrinbildung die Chloralkalien zerlegt werden, somit das Chlor wenigstens momentan in statu nascenti sich in Freiheit befinden kann. Es ist dies eine Muthmassung, welche damit zusammenstimmt, dass das Chlor, wenn auch in geringer Menge, denn doch schon vielfach im Organismus in Verbindung mit Eisen beobachtet worden ist.

Die Beobachtung, welche besonders H. Nasse gemacht hat, dass Zellenwucherung und überhaupt Zellenbildung durch entsprechend reichliche Gegenwart von Kochsalz wenn auch nicht bedingt, so doch merklich gefördert wird, spricht mehr als jede andere Thatsache dafür, dass das Chlor nicht nur auf Betheiligung an regressive, sekretorische Prozesse beschränkt, sondern sogar vorwiegend der individualisirenden formgebenden Organbildung, der Progressivmetamorphose mit angehöre, somit an der ganzen normalen wie pathologischen Stufenreihe des thierischen so gut wie des pflanzlichen Stoffumsatzes wesentlichen und durch keinen anderen wenn auch noch so verwandten Stoff zu ersetzenden Antheil nimmt.

Schwefelsäure.

Weil meine Resultate über den Schwefelgehalt der untersuchten Organe nur aus der Asche gezogen sind, somit auch der ursprünglich unoxydirt in den Proteinverbindungen vorkommende Schwefel nur als Schwefelsäure bestimmbar war, habe ich kein Bedenken getragen, dieses Mineral in seiner elementaren und in seiner oxydirten Form unter einer und derselben Rubrik abzuhandeln.

Der Bedarf an Schwefel für den thierischen Organismus wird reichlich geboten in der täglichen Nahrung, in dem Thierund Pflanzenalbumen, wie in unzähligen andern mehr oder weniger verdaulichen Schwefelverbindungen. Nur in solcher complicirten Form mit Stickstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff wie im Kleber und im Fleisch kann die Aufnahme des Schwefels in den thierischen Organismus vermittelt werden. Hierdurch zeigt sich der Unterschied zwischen vegetabilischer

und animalischer Funktion. Während die Pflanze bekanntlich vorwiegend binäre Verbindungen zerlegt und sich aus der reduzirten Schwefelsäure der Sulphate den Schwefel aneignet und im Verlaufe des progressiven Vegetationsprozesses zu höheren Protein-Verbindungen heranbildet; vermag der thierische Organismus weder die Sulphate noch auch den Schwefelwasserstoff nach ihrem Schwefelgehalt zu physiologischer Verwerthung auszubeuten; beide gehen so gut wie die Cellulose unbenutzbar durch den Tractus und per anum verloren. Die therapeutische Applikation der Schwefelbäder z. B. bei Bleiintoxikationen bezweckt und bewirkt daher auch keine Assimilation des durch die Haut aufgenommenen Schwefels; die Wirkung besteht wahrscheinlich darin, dass sie das Bleialbuminat in unlösliches Schwefelblei verwandeln, welches als indifferenter Körper in den Geweben die allmälige Elimination ohne ergreifende Störung der Gewebe abwarten kann. Auch die, die Oxydation hemmende und dadurch giftig wirkende Einathmung von Schwefelwasserstoff, welcher sich in Kloaken, z. B. bei der Fäulniss schwefelhaltiger Thier- und Pflanzenstoffe entwickelt, hat keine direkte Betheiligung des Schwefels an den Stoffwechsel zur Folge, eben so wenig wie das zu Flatus Veranlassung gebende Schwefelwasserstoffgas in den Gedärmen bei unversehrtem Epithel die Wände des Darmkanals durchdringen und so eine Aufnahme ins Blut forciren kann. Und selbst wenn dieses Gas auf irgend eine Weise, sei es durch Injektion oder durch arrodirte Darmschleimhaut in den Kreislauf gelangt, so beschränkt sich seine chemische Einwirkung unmittelbar auf die bekannte Eisenreaktion, wodurch das Blut grünlich schwarz gefärbt wird (Schwefeleisen); an eine materielle organische Einverleibung des Schwefels ist jedoch nicht zu denken.

Die Absonderung des physiologisch verbrauchten Schwefels geschieht, wie die der übrigen durch den Lebensprozess gesetzten Zersetzungsprodukte normal stets in gebundener Formdurch Haut und Nieren und zwar einerseits in binärer oxydirter Verbindung als Schwefelsäure im Schweiss und Harn andererseits in complicirter inniger Verbindung als Keratin in den Haaren, der Epidermis und anderen Horngebilden. Es versteht sich von selbst, dass hierbei von dem Schwefel abstrahirt ist, welcher pathologisch bei der Albuminurie unverstrahirt ist, welcher pathologisch bei der Albuminurie unver-

ändert als Eiweissbestandtheil abgeschieden wird. Als ganz besonders thätig für die Schwefelabscheidung erweisen sich im physiologischen wie im pathologischen Verhalten die Nieren und zwar - was für die allgemeine Beurtheilung der im vitalen Chemismus vorgehenden Stoffmetamorphose von besonderer Wichtigkeit ist - in relativ ziemlich konstanten Formen, wie gesagt, normal meist als Schwefelsäure. Die secernirte Schwefelsäure ist desshalb auch vorzüglich geeignet, den im Kreislauf vor sich gehenden Verbrennungsprozess, also den Stoffaustausch überhaupt in Bezug auf Intensität und Qualität zu kontroliren und therapeutische Indikationen zu bieten, ob nämlich Respirations- oder Nutritions-Mittel anzuwenden, ob zur Herstellung des Gleichgewichts der physischen Kräfte die Oxydation zu unterstützen oder einzuschränken ist. Wenn es auch bis jetzt nicht gelungen ist, zu diagnostischen Zwecken aus dem Schwefelgehalt des Harns rach algebraischen Gesetzen den Zustand des innern Materialumsatzes zu entziffern, wenn wir auch noch keine geometrische Proportionen zwischen der sezernirten Schwefelsäure und dem jedesmaligen funktionellen Verhalten des Körpers besitzen, auch schwerlich jemals solche erzielen werden, so muss doch zugegeben werden, dass z. B. der Schwefelsäuregehalt des Harns in geradem Verhältniss steigt und fällt mit der schnellen oder langsamen Verbrennung des Lebensmaterials, beides eine Folge willkührlicher (körperliche Anstrengung) oder unwillkührlicher (inflammatorisches Fieber) Vermehrung oder Verminderung der Funktionen der Organe.

So willkommen es dem practischen Arzte wie dem Naturforscher sein müsste, in den im Harn vorkommenden, durch den
Lebensprozess verbrannten Schwefel einen unterstützenden Nosometer für die Diagnostik am Krankenbette zu erhalten, so
ist doch nicht zu widerlegen, dass, wenn es sich um Angabe
des ergriffenen Organs, um den Sits der mit Schwefelsäureerzeugung paralellgehenden Verarbeitung resp. Consumption der
Organtheile handelt, nur durch Coincidentien einigermassen
sichere Schlüsse zulässig sind, indem ja den Nieren aus dem
ganzen Kreislaufe oxydirte depurative Stoffe des Körpers zur
Secretion zugeführt werden. Die Mangelhaftigkeit, welche der
Verwerthung der Sekretanalyse anhaftet, einigermassen auszugleichen, steht der physiologischen und puthologischen Chemie

vorzüglich ein Mittel zu Gebote, ich meine die chemische Untersuchung der Drüsensubstanz selbst und zwar die Differentialuntersuchung auf Schwefel und Schwefelsäure für die Parenchymflüssigkeit, für die verchiedenen Extrakte und endlich für die Asche der Substanz. Der Schwefel, als Element in organischen Verbindungen ist nachweisbar, indem man demselben nach Bestimmung des Schwefels, welcher etwa als präexistirende Schwefelsäure in der Substanz vorkommt, durch kochende Substanz in Kalilauge in Schwefelkalium verwandelt. Auf Zusatz von essigsaurem Bleioxyd und durch mehrmalige Digestion der mit Essigsäure versetzten Flüssigkeit wird das Schwefelkalium zerlegt, es bildet sich lösliches essigsaures Kali, während das entstehende Schwefelblei als schwarzer Niederschlag sich absondert. Die weitere Quantitativbestimmung des so erhaltenen Schwefels geschieht nach der bekannten analytischen Methode 100 Theile Schwefelblei enthalten 86,55 Blei und 13,45 Schwefel.

Wenn auch die Schwefelsäure als solche präexistirend nicht nur in thierischen Se- und Exkretionen, sondern sogar im Blute (Heintz) nachgewiesen ist. Heintz hat nämlich das Eiweiss durch Kochen des verdünnten Blutes mit Quecksilberchlorid vorher gefällt und in der erst abgedampften und angesäuerten Flüssigkeit die Schwefelsäure mit Chlorbaryum nachgewiesen — so ist doch nicht alle in der Asche gefundene Schwefelsäure dahin zu verweisen, indem beim Einäschern schwefelhaltiger Substanzen, namentlich der wesentlichen Bestandtheile des Organismus, der Proteinverbindungen, schwefelsaure Salze produzirt werden.

Auffallend bleibt es, dass trotz wiederholten Versuchen weder Berzelius, noch Liebig, noch Heintz in der Fleischkeit schwefelsaure Salze entdecken konnten.

Sollte es vielleicht in der Eigenthümlichkeit des Stoffumsatzes liegen, dass die Schwefelsäure da wo sie durch die organisch saure Parenchymflüssigkeit ersetzbar ist, ihren Schwefel irgend einer organischen Verbindung einverleiben lässt?

Bisher hat man wohl angenommen, dass der Schwefelgehalt der Drüsen in elementarer Form an organische Substanz gebunden, fast nur als im Albumin, der Gallensäure und anderen bekannten organischen Stoffen enthalten zu betrachten sei.

Seitdem nun Scherer in neuester Zeit die Gegenwart des Cystins in der Leber nachgewiesen hat, lässt sich die bedeutende Einwirkung nicht in Abrede stellen welche dieser durch seinen enormen Schwefelgehalt (26 %) ausgezeichnete Körper auf die Erhöhung des prozentischen Schwefelgehalts der Leber haben muss. Das von Scherer auf Cystin untersuchte Objeckt war die Leber eines an Typhus Verstorbenen, sie enthielt bestimmbare Mengen dieser Substanz. Dieser Befund wirft vorläufig einiges Licht auf die Angabe v. Bibra's, bezüglich des Schwefelsäuregehalts der Leberasche, welcher für die Leiche Typhöser durchschnittlich vorwiegt. Weitere sorgfältige Forschung nach diesem Körper auch in den übrigen Drüsen wird hoffentlich zu einiger Aufklärung über sein physiologisches Verhalten führen. - Die inkonstanten Zahlenverhältnisse, welche aus der Analyse verschiedener Thierklassen und den v. Bibra'schen Untersuchungen pathologischer Lebern resultiren, erinnern jedenfalls an eingreifende Unterschiede des Stoffumtausches, welche sich an diese Differenzen anknüpfen. Um einen physiologischen Zusammenhang in diese Wechselbeziehungen zu bringen, erlaube ich mir, auf einige täglich zu beobachtende Phänomene des animalischen Stoffwechsels aufmerksam zu machen: So darf es uns z. B. nicht wundern, wenn die Vogellebern nur geringen oder auch gar keinen Schwefelgehalt aufzeigen, indem eine Ausgleichung der Einnahme vom schwefelhaltigen Albumem durch das reichliche sekretartige Produkt seiner Metamorphose, das schwefelhaltige Keratinin in dem Gefieder der Klauen und der Haut des Muskelmagens geboten ist. Dass übrigens bloss morphotische Unterschiede zwischen Eiweiss und Hornsubstanz bestehen, beweisst schon das albuminoide chemische Verhalten der Matrix jener Gebilde. Sehr natürlich ist daher auch die Vegetationsschwäche der Horngebilde, Ausfallen der Haare und dergleichen bei krankhaft albuminöser Blutmischung (wie Typhus, Scorbut,) indem durch profuse Absonderung des unmetamorphosirten Albumens der Hornsubstanz das Ernährungsmaterial entzogen wird; in ähnlichem Verhältniss mag exzessiver Saamenverlust zur Haarbildung stehen, wie ja auch die Castration beim Ochsen und Hahn zu üppiger Haar- und Federwucherung führt.

Der Schwefelreichthum der Leber bei Typhus, Marasmus, senilis und anderen Krankheitszuständen darf uns nicht wundern, indem ja das krankhaft alterirte Albumin (resp. Schwefel) eben so gut die nächsten Eliminationswege sucht, wie andere fremdartig gewordene Stoffe und der Schwefel des Albumims bei albuminöser Diathese so unfehlbar seine Ablagerungsstätten im Organismus findet, wie das d rch chlorotische oder pyämische Blutmischung unverwendbar gewordene Hämatineisen. Und sollte nicht vielleicht gerade das von Scherer in der thyphoiden Leber entdeckte Cystin als pathologisches metamorphosirtes Eiweiss das Vehikel des verbrauchten Schwefels sein? Anders verhält sich der Schwefel bei den normalen progressiven Prozessen des Eiweisses. Es ist nicht blosse Hypothese, dass sich bei der Respiration das Albumin des Blutserums durch Oxydation in Fibrin verwandelt. Die Oxydation erstreckt sich dabei natürlich vor Allem auch auf den Schwefel, welcher, in Schwefelsäure verwandelt sich mit den in Albumin vorherrschenden kohlensauren Alkalien zu schwefelsauren Alkalien verbindet. Während nun die entbundene Kohlensäure den Normalausweg durch die Lungen sucht, fällt die Ausscheidung der gebildeten schwefelsauren Alkalien andern Sekretionsorganen anheim. Daher kein Wunder, wenn wir in Leber und Nieren statt auf Schwefel fast stets auf Schwefelsäure stossen. Sie ist grösstentheils Produkt der Fibrinbildung bei welcher das Abumin, wie aus der chemischen Zusammensetzung hervorgeht, einen Theil Schwefel und Alkalien veliert.

Wenn ich auch aus wohlbekannten Gründen den SchwefelAnalysen für meine vorliegende Arbeit nicht so bedeutende
Ausdehnung geben konnte, wie sie im Interesse der Wissenschaft zu wünschen wäre, so habe ich durch die Bestimmung
des verbrannten Schwefels aus der Asche der Drüsen doch
wenigstens vorläufig Materialsummen erzielt, welche etwaigen
späteren Sonderungsanalysen für Schwefel und Schwefelsäure
zu vergleichenden Anhaltsmomenten dienen können.

Was etwa unter dieser Rubrik über Schwefelsäure nicht gesagt worden ist, findet seine theilweise Ergänzung unter den Artikeln, welche über die alkalischen und erdigen Basen handeln, die an Schwefelsäure gebunden im Organismus vorkommen.

Phosphorsäure.

Die aus dem Thierkörper theils aus den Sekreten, (Harn, Horngebilde, wie Nägel, Haare, Epidermis, Klauen u. s. w.), theils aus den Organaschen selbst so reichlich zu erbeutende Phosphorsäure hat eine doppelte Erzeugungsquelle: einmal haben wir die präformirt auf nutritivem Wege eingeführten Phosphate; ausserdem aber auch den durch den Respirations- d. h. thierischen Verbrennungsakt ähnlich wie bei der Schwefelsäurebildung oxydirten Phosphor der metamorphosirten Proteinverbindungen und anderer organischen Stoffe hierhin zu rechnen.

Die Schwierigkeit eine sichere Differentialbestimmung der verschiedenen Arten der Phosphorsäure auszuführen, lässt sich aus folgendem leicht anzustellendem Versuche ermessen. Verdampft und verkohlt man sauren Harn, in welchem z. B. das Vorkommen von zweibasisch phosphorsaurem Natron [PO⁵ + (2NåHO)] nach chemischen Gesetzen wahrscheinlich ist, so verwischt sich nach dem Glühen der verkohlten Masse das Bild der Phosphate in der Weise, dass das aus dem sauren Salz etwa erhaltene metaphosphorsaure Salz schon in statu nascenti durch das aus verbranntem harn- und hippursaurem Natron gebildete kohlensaure Natron in pyrophosphorsaures Natron umgewandelt und nur als solches den Reagentien zugänglich gemacht wird.

Bezüglich der Aufnahme der Phosphate in den Organismus durch die Nahrungsmittel gilt im Allgemeinen das bereits bei der Schwefelsäure Gesagte, nur dass die Phosphate noch in viel mehr ausgedehntem Massstabe und in mannichfacheren und wandelbareren Modifikationen geboten werden, als die Schwefelverbindungen. Besonders reich an Phosphor ist die Nahrung der Carnivoren, wodurch denn auch das charakteristische Vorwalten der Phosphate bei den Carnivoren gegenüber dem Karbonatenreichthum der meisten Organaschen von Herbivoren bedingt ist. Die durch Zersetzung dieser Proteinstoffe im Organismus producirte Phosphorsäure reisst die Basen der im Körper stets vorräthigen hohlensauren Salze an sich und bildet damit die Phosphorsäure-Salze, welche einen grossen Theil der durch die Drüsen abgeschiedenen anorganischen Stoffe ausmachen. Die höchst variabele Menge Phosphorsäure in den verschiedenen Sekretionsorganaschen sowohl, als auch

in denselben Drüsen verschiedener Individuen ist hieraus leicht erklärlich. Die Raschheit der Stoffmetamorphose, der innere Consum phosphorhaltiger Proteinverbindungen ist zu vielen Schwankungen unterworfen, als dass man bei der Untersuchung der Drüsenaschen ein auch nur einigermassen konstantes Zahlenverhältniss für Phosphorsäure erhalten könnte. Uebrigens da die Phosphorsäure ebenso wie die Schwefelsäure als Säure durchaus keinen normal physiologischen Eingriff in die thierische Maschine thut, sondern stets nur in Verbindung mit Alkalien und Erden ihre Wirkungen entfaltet, so werde ich bei Besprechung dieser Stoffe noch manchmal Gelegenheit haben, auf die Phosphorsäure zurückzukommen. Für jetzt nur noch Einiges über die Natur der im Thierkörper vorhandenen Phosphorsäure-Salze.

Eines der wichtigsten und häufigsten dieser wahrhaft proteischen Salze ist das phosphorsaure Natron, welches nach den bisherigen Untersuchungsresultaten wohl nur als zweibasisches Salz im Organismus mit Bestimmtheit nachzuweisen ist. Allenfalls wäre das Vorkommen des entsprechenden sauren Salzes (PO⁵ + NaO ₂HO) in den sauren thierischen Flüssigkeiten, etwa in saurem Harn denkbar; im Blut und den anderen alkalisch reagirenden Flüssigkeiten ist seine Existenz a priori mit Sicherheit zu negiren, weil dasselbe seiner Natur nach blos in sauren Flüssigkeiten existiren kann.

Ebenso spricht schon die Theorie gegen das Vorkommen des phosphorsauren Natrons mit 3 Atomen fixer Basis im Blut, weil die konstante Entwicklung freier Kohlensäure der Bildung dieses Salzes entgegen wirkt, indem die Kohlensäure das dritte Atom Natron des lockeren dreibasischen Salzes zur Bildung von kohlensaurem Natron an sich reissen würde.

Ueberhaupt lässt sich allgemein behaupten, dass das Vorwalten der Phosphate und gleichzeitig der Kalisalze in den sauren (den meisten Parenchymflüssigkeiten und dem Magensaft) Säften zu finden ist, während die alkalisch reagirenden Flüssigkeiten (Chylus, Blut, die Sekrete der Leber, des Pancreas und der Speicheldrüse) einen bedeutenderen Gehalt von Carbonaten und Natronverbindungen ergeben.

Die Wirksamkeit der phosphorsauren Alkalien in der Thierökonomie beruht, soviel wir durch Experimente wissen, auf ihrer Betheiligung an den Stoffwechsel vermöge ihrer lösenden Kraft. Ausserhalb des Organismus z. B. zersetzen und oxydiren sie ähnlich wie die kaustischen Alkalien die thierischen Flüssigkeiten. Im Organismus gibt ihr Vorwalten der Proteinmetamorphose eine eigenthümliche, mehr gelatinöse Richtung, während die erdigen Phosphate im graden Gegensatz mehr die Plastizitätsbildung vermitteln. In medikamentöser Form gereicht, unterstützen sie die Verseifung der thierischen Fette.

Die phosphorsauren Alkalien sind demnach als energisch lösende Agentien von unersetzbarer Wichtigkeit für den thierischen Stoffwechsel, weil, wie wir oben gesehen, Löslichkeit der Materie die Grundbedingung aller vegetativen wie animalischen Lebensthätigkeit ist. Ihre Wirksamkeit erstreckt sich also sowohl auf die Progressiv- als auch auf die Regressiv-Metamorphose.

Doch lässt sich auch nicht in Abrede stellen, dass die phosphors. Alkalien therapeutisch nicht selten auch entgegengesetzte Wirkungen zeigen und die Festbildungen, statt sie zu hemmen, unterstützen. Diese Wahrnehmung lässt sich aber nur machen bei lange fortgesetzter gleichzeitiger Verdauung vieler erdigen Bestandtheile; und die Wirkungsweise ist hier indirekt, gleichsam sekundär, weil die Alkali-Phosphate ganz vorzüglich die Eigenschaft besitzen, unlösliche Erdsalze in den löslichen, resorptionsfähigen Zustand überzuführen und darin zu erhalten, somit unter Aufgebung ihres direkten eigenthümlichen Einflusses auf die Lösung der organischen Substanzen, die alkalischen Erden zu ihrer physiologischen Rolle, Vermittlung der Festbildungen (Cf. alkal. Erden) qualifiziren. Auf dieses eigenthümlich täuschende Verhalten der alkal. und erdigen Phosphate ist bei therapeutischen Indicationen am Krankenbette einige Rücksicht zu nehmen.

Alkalische Erden.

Bezüglich der Formbildung der thierischen Körper stehen die alkalischen Erden zu den Alkalien in ähnlichem Gegensatz wie die Proteinsubstanzen zu den Kohlenhydraten. Die Erden sind vorwiegend passives Bildungsmaterial, während die Alkalien eine mehr aktive, bewegende, metamorphosirende Rolle zu erfüllen haben; beide Mineralgruppen, zweckmässig im Orga-

nismus vertheilt, halten den thierischen Stoffwechsel im Gleichgewicht.

Die Analysen der verschiedenen Quell- und Brunnenwässer lassen uns nicht lange in Zweifel über die Importationswege, welche den Bedarf an erdigem Material für den Thierkörper vermitteln.

Für die Knochen und Zähne sind, wie schon Eingangs erwähnt, bereits zahlreiche Forschungen über ihren Gehalt an erdigen Bestandtheilen und über die physische und chemische Verwerthbarkeit derselben für den Stoffwechsel im Allgemeinen wie speziell für die normale und pathologische Formbildung angestellt worden. Anders verhält es sich mit den weicheren Körpergebilden und den thierischen Flüssigkeiten. Hier hat der Physiologe einen ganz andern Gesichtspunkt für seine Untersuchungen festzuhalten, indem er sie hier gröstentheils auf dem Transportwege zu ihren physiologischen Bestimmungsplätzen, zu den festeren Gebilden antrifft. Und dennoch ist es für die rein wissenschaftlichen, wie für die praktischen Zweige der Medizin von unberechenbarem Nutzen, die Quantitäts- und Qualitätsverhältnisse der alkalischen Erden auch für die Weichgebilde zumal für die Drüsen zu erforschen. Letztere Organe, vermöge ihrer histologischen Struktur und der subtilen Differenzen der sie gesondert durchtränkenden Säfte von verschiedenem chemischen Verhalten und Diffusionsvermögen, ganz vorzüglich geeignet zu einem gegenseitigen Tauschverkehr zwischem den sich fortwährend begegnenden und durchdringenden Stoffen, machen schon hierdurch auf die Wichtigkeit einer genauen Kenntniss ihrer chemischen Constitution aufmerksam. Zudem ist auch den Chemico-Physiologen und Pathologen die symptomatische Bedeutung der erdigen Se- und exkretionsprodukte bei Krankheiten des thierichen Skeletts, bei Osteomalacie und andern Degenerationen mineralreicher fester Körpertheile nicht entgangen; sowie ganz vorzüglich der Causalnexus so mancher für idiopathisch gehaltener Störungen, z. B. der Gichtkonkrementbildung, der Harn-, Nieren- und Gallensteine, der krystallinischen Ablagerungen u. s. w. durch sorgsame vergleichende chemische Untersuchungen dieser erdigen Gebilde mit der jedesmaligen Verfassung des Circulationssystems und dem Gewebs- und Cohäsionszustand der Drüsenparenchyme bald seine vollste Bestätigung finden würde. Ich erinnere hier nur an einen Bericht Mulders aus Moleschotts "Physiologie der Nahrungsmittel 1850" wo von einer Disposition zu Knochenbrüchen die Rede ist, welche sich dadurch manifestirte, dass zu wiederholten Malen bei den Mitgliedern einer und derselben Familie fast spontane Frakturen entstanden. Dass Mangel an Erdphosphaten die einzige Ursache dieser Knochenkrankheit war, geht daraus hervor, dass diese Krankheitsanlage alsbald verschwand und die Unglücksfälle aufhörten, als die arme Haushaltung, welche fast ausschliesslich von Kartoffeln, die bekanntlich wenig anorganische Stoffe enthalten, gelebt hatte, auf Mulders Verordnung hin statt der Kartoffelnahrung Schwarzbrod und Fleischspeisen erhielt, in denen der phosphorsaure Kalk reichlich vorhanden ist.

Aehnliche günstige Erfolge berichtete Dr. Beneke von der therapeutischen Anwendung des phosphorsauren Kalks bei einigen Krankheitsformen, die grossentheils durch mangelhafte Zellenbildung bedingt sind. Er stützte seine Indikation auf die durch Liebig's und Schmitt's Untersuchungen bewiesene Nothwendigkeit des phosphorsauren Kalks zur Zellenbildung; und reichte desshalb bei skrophulöser Diathese, atonischen Geschwüren, Arthrokace, Atrophie u. s. w. innerlich phosphorsauren Kalk, den er theils durch Digestion des cornu cerv. ust. mit Phosphorsäure und nachheriges Trocknen des Präparates, theils durch Niederschlagen des Kalks aus der salzsauren Lösung mittels phosphorsauren Natrons bereitet hatte-Die Dispensationsformel war Pulver mit salch. alb. Durch diese rationelle Behandlung will Beneke in den genannten Fällen stets überraschend schnelle Verbesserung des Eiters und Vernarbung der Geschwüre mit dem hartnäckigsten Charakter erzielt haben. Beneke's Ansicht, dass auch bei Caries und verwandten Krankheiten des Skelettes obige Mittel indicirt seien, hat inzwischen durch vielfache Beobachtungen am Krankenbett ihre Bestätigung gefunden, (ich erwähne hier nur der Erfahrungen Fleterer's, welcher bereits bei mehren Frakturen von der Anwendung des phosphors. Kalks die glücklichsten Erfolge gesehen hat).

Nach diesen und ähnlichen praktischen Erfahrungen und

begründeten Theorieen brauchen wir auch für die Fragibilität des Knochengerüstes der Schwangeren und die damit in Zusammenhang stehenden Gelüste nach Kreide und erdigen Stoffen keine spezifisch krankhaft alienirte Thätigkeit des Nervensystems als Erklärungsgrund aufzustellen. Die zoochemischen Data beweisen die rein materiellen Ursachen dieser Gelüste ganz analog wie sich der Durst nach Wasser bei metamorphotischem erhöhtem Wasserkonsum in Fiebern und nach energischem Stoffumsatz überhaupt auf rein materielle Substrate zurückführen lässt. Das rein physikalische Phänomen der Gaseinströmung in einen luftleeren Raum, das Kiemenklaffen der Fische auf eingetrocknetem Teichboden, das Haschen der Amphibien nach der feuchten Gewitterluft und die krankhaften Gelüste der schwangeren Weiber sind nahe verwandte Erscheinungen, so gut wie die rasche Verschluckung des frisch gefallenen Regens von einem ausgedörrten Ackerboden. Bei den thierischen Organismen können wir sie im Allgemeinen bezeichnen als die Reaktion der sensibelen Sphäre gegen den Mangel an nothwendigem Material oder gegen den Zustand gehemmter weiterer Verarbeitung der rasch und einseitig verbrauchten Stoffe. Wo ein vermehrter Verbrauch an erdigem Material wie bei der Ausbildung des Fötus im schwangeren Körper auf Kosten der anorganischen Bestandtheile des mütterlichen Körpers Statt findet, ist eine directe Ergänzung dieser einseitig konsumirten Stoffe Bedürfniss, und die Befriedigung dieses Bedürfnisses ist demzufolge als Indication bei der Diätetik der Schwangerschaft stets zu respektiren.

Erwägen wir nun einerseits den prozentischen Gehalt des Knochengerüstes (über 30 % Erden auf die trockne Substanz) und der übrigen Organe an Kalk und Magnesia, andererseits den nothwendigen Bedarf an Nährungsmaterial zur Befriedigung der Sättigungskapazität des Körpers für diese Bestandtheile (Cerealien zu 0,48 % Kalkgehalt) so haben wir in der vergleichenden Analyse der Sekret- und Organaschen Fingerzeige genug, wenn es sich darum handelt, aus den Thierleichen eine physiologische Bilance abzuschliessen über die zoochemische Bedeutung und Verwerthbarkeit der fraglichen Substanzen für den thierischen Haushalt.

Man wird mir's nicht verargen, wenn ich es für jetzt un-

terlasse, statistische Zahlennotizen zur physiologischen Nutzanwendung dieser Zeilen anzufügen, weil ich in der kurzen, zur vorliegenden Untersuchung verwendbaren Zeit unmöglich soviel selbstständige Erfahrungen machen konnte, dass das gesammelte Material zu einer competenten Schlussfolgerung hätte dienen können.

Ueber die Alkalien.

Während die alkalischen Erden vorzüglich die organische Festbildung unterstützen: sind im Gegensatz zu ihnen die Alkalien unbedingt nothwendig für den Stoffwechsel durch ihre Eigenschaft, bei der Gegenwart von freiem Sauerstoff, welcher übrigens durch das arterielle Blutsystem in alle Organe reichlich übergeführt wird, Oxydationsprozesse fortwährend einzuleiten und zu unterhalten.

Diese Wahrnehmung hat denn auch die Indikationen zur therapeutischen Anwendung der Alkalien bei den Krankheiten hervorgerufen, deren Aetiologie in einer einseitig gehemmten Stoffmetamorphose su suchen ist. So z. B. gründet sich die Behandlung der Gallensteinkranken mittels alkalischer Mittel rationell auf diese Theorie, indem man von der richtigen Voraussetzung ausging diese Krankheit beruhe auf der Richtung des vegetativen Lebens zur luxuriösen Fettbildung oder auf Stockung des Fettzerlegungsgeschäftes. Diesen Missverhältnissen vermag aber neben der Diätetik nach den anerkannten Eigenschaften der Alkalien zu urtheilen, hauptsächlich der Genuss alkalischer Mittel abzuhelfen, indem durch ihre Vermittlung nicht nur die Zersetzung der Kohlenhydrate und organischen Säuren beschleunigt, sondern auch die gehemmte Fettsäurebildung wieder leicht regulirt wird.

Die prädisponirende Kraft der Alkalien bei der thierischen Oxydationsmetamorphose, durch die Oxydation und Entziehung des organisch gebundenen Schwefels der Proteinverbindungen die eiweissartigen Körper in fibrinöse zu verwandeln, haben wir bei der Besprechung des Schwefels bereits berührt.

Da übrigens die Alkalien im Organismus niemals kaustisch vorkommen, und ihre Wirkungen ohnehin auch durch die mit ihnen verbundenen Säuren wesentlich modifizirt werden, so kann hier Manches übergangen werden, was bereits bei den einzelnen Säuren besprochen worden ist. Nur einige der hauptsächlichsten Verbindungen, in denen uns die Alkalien im thierischen Chemismus begegnen, verlangen noch eine kurze Besprechung.

So z. B.

Das zweibasich phosphorsaure Kali (PO₅ 2 KO).

Dieses Salz erhielt seinen Platz in den zoochemischen Tabellen erst nach Liebigs berühmten Analysen der Fleischflüssigkeit. Seine Nachweisung in derselben bewerkstelligte Heintz, indem er eine hinreichende Quantität Fleischflüssigkeit eines Pferdes eindampfte, nachdem er zuvor die Kreatinkrystalle entfernt hatte, den Rückstand darauf mit Alkohol vollständig auszog und das in Alkohol Unlösliche, mit Wasser vermischt, sich selbst überliess. Nach einigen Wochen hatte sich das phosphorsaure Kali mit 1 At. fixer Basis [PO₅ + (KO+HO)] in grossen quadratischen Prismen, deren Enden durch die, Flächen eines stumpfen Quadratoktäeders zugespritzt waren, abgesondert.

Doppelt kohlensaures Natron.

Die Gegenwart dieses Salzes im Blute lässt sich aprioristisch annehmen, indem die alkalische Reaktion des Blutes zumal bei der fortwährenden Erzeugung von Kohlensäure nur von kohlensaurem Natron herrühren kann; dass dieses Salz wirklich als Bicarbonat vorhanden ist, hat Lehman dadurch bewiesen, dass er das eine Atom Kohlensäure aus frisch geschlagenem Rindsblut mittels Wasserstoffgases und der Luftpumpe vollständig austrieb, und darauf durch Zusatz von Essigsäure und Barytwasser noch den an eine Basis gebundenen Theil Kohlensäure erhielt. Auch Liebig, welcher zuerst darauf hinwies, dass das kohlensaure Natron als Bicarbonat im Blut enthalten sein müsse, weil neben dem einfachen keine freie Säure bestehen könne; sowie Marchand haben bestätigende Versuche angestellt.

In der Asche der von mir untersuchten Drüsen auf die Anwesenheit von Kohlensäure zu reagiren, hielt ich mehrentheils für überflüssig, weil die Menge derselben doch jedenfalls von der Intensität der Verbrennung abhängt, somit nie zuverlässig ist Behauptet ja selbst Enderlin, Blut-Asche mit saurer Reaktion gehabt zu haben, was immerhin möglich ist, ndem ja nach Verjagung der Kohlensäure eine Uebersättigung der Basen durch die aus dem reichlich vorhandenen Phosphor und Schwefel entstandenen Säuren denkbar ist. Doch ist damit das Vorkommen kohlensaurer Salze im Blut noch keineswegs negirt. Die Wichtigkeit des Natronbicarbonats für Respiration und Stoffwechsel lehrt uns die Physiologie.

Manilla.

Der Kalk, welcher dem Säugling als Phosphat im Casein, den Herbivoren in den Getraidearten und dem Heu, den Carnivoren in den Albuminaten reichlich geboten ist, durchwandert unausgesetzt die thierischen Organe theils um durch seine Vermittlung an organischen Stoffen Umänderungen einzuleiten (Cf. alk. Erden), theils auch um als bildsames Material verschiedene Modifikationen zu erleiden, Verbindungen einzugehen, und somit als integrirender Bestandtheil des Thierkörpers sich je nach den physiologischen Allgemein- oder Lokalbedürfnissen bald in löslicher Form mit dem Strom der thierischen Nährflüssigkeiten, Chylus, Blut, Lymphe fortzubewegen bald als Organtheil, wie vorzüglich in Knochen und Zähne abzulagern, bald als depuratives Produkt des thierischen Stoffumsatzes in den sauren Sekretflüssigkeiten (Harn, Schweiss) gelöst, sich wieder aus dem Lebenskreise, dem er gedient, zu entfernen. Da das Hauptsächlichste über den Kalk schon bei den Phosphaten behandelt worden ist, wollen wir hier nur noch Folgendes beifügen.

Der kohlensaure Kalk ist die Form in welcher besonders bei Pflanzenfressern die in organischer Verbindungen in den Körper aufgenommene und in ihm cursirende Kalkerde im Harn ausgeschieden wird. Da er beim Erhitzen mit kohlens. Talkerde gemengt niederfällt, so lässt sich schliessen, dass er durch freie Kohlensäure in Lösung erhalten wird.

Da bei zoochemischen Aschenanalysen die kohlensaure alkalischen Erden sehr häufig mit Erdphosphaten gemengt vorkommen, so hat man in einem solchen Falle nach den Gesetzen der chem. Verwandtschaft die Phosphorsäure vorerst dem Kalk, die Kohlensäure der Magnesia anzurechnen, indem

die Magnesia in der That bei Abwesenheit von Ammoniak viel geringere chemische Verwandtschaft zur Phosphorsäure zeigt als der Kalk. Denn fällt man z. B. eine Lösung von gleichen Theilen Chlorkalcium und Chlormagnesium mit so wenig phosphors. Natron, dass keine der Erden vollständig gesättigt werden kann, so sinkt nur phosphorsaurer Kalk nieder. Diess ist sehr zu berücksichtigen bei der Vertheilung der aus zoochemischen Analysen erhaltenen Säuren an die Basen nach den Gesetzen der chemischen Verwandtschaft.

Magnesia.

Die chemische Untersuchungen über die physiologische Rolle der Magnesia, so unwichtig sie bisher geschienen, möchte doch einer sorgfältigen Beachtung werth sein, wenn man das unter einzelnen Bedingungen vorwaltende Auftauchen dieser alkalischen Erde in dem thierischen Organismus berücksichtigt. Der Magnesia allein ist wohl kein mechanischer Dienst im Thierkörper zuzutrauen. Ihre normal physiologische Wirksamkeit beschränkt sich wohl auf eine ähnliche Unterstützung des Kalks, wie wir es vom Mangan gegenüber dem Eisen erörtern werden. Sowohl wegen ihres allgemeinen chemischen Verhaltens als wegen ihrer speziellen Attraktionsneigung zu der ihr verwandten Kalkerde zeigt ihr Auftreten allenthalben im Thierkörper entschiedene Aehnlichkeit mit dem Vorkommen des Mangans, zu welchem das Eisen eine ähnliche Patronatsstellung einnimmt, wie der Kalk zur Magnesia. Auch die Neigung zur Ablagerung, wie wir sie beim Mangan in der Leber resp. Galle finden werden, spricht sich, wenn auch allotopisch, bei der Magnesia durch Bildung von Harn- und Bezoarsteinen aus, welche letztere oft ausschliesslich, zumal bei Pferden, aus phosphorsaurer Ammoniak-Magnesia und 3basisch phosphorsaurer Magnesia bestehen. Diese Parallele zwischen beiden Mineralien, des Mangnan und der Magnesia, mag im thierischen Körper ausser der Lokalisirungsunterschiede, hauptsächlich dadurch auseinander gehen, dass die Magnesiasalze an der Grenzscheide zwischen physiologischem Verhalten und Abnormitäten, sowie als ausgesprochne pathologische Concretionen viel häufiger selbstständig abgelagert vorkommen, als die Mangansalze. So sollen ja nach Grange's entschiedener

Ansicht die Magnesiasalze durch ihr Vorwalten in Speisen und Getränken die nächste und unmittelbare Veranlassung zur Kropfbildung geben. Er will gefunden haben, dass in den Alpen das Struma in allen den Ortschaften zu Hause sei, welche einen talkerdereichen Boden kultiviren und benutzen, wogegen man auffallender Weise auf den ausschliesslich kreidigen Kalkstein z. B. auf der obern Formation des Jurakalks den Kropf vergebens suchen würde. Nebenbei gesagt, will Grange den Kropf durch diätetischen Genuss von Jodnatrium statt Kochsalzes geheilt haben.

Die chemischen Untersuchungen, welche ich mit der Thyreoidea angestellt habe, sprechen nicht für die ausschliessliche Giltigkeit der physiologischen Schlüsse, die man etwa aus diesen Angaben ziehen möchte; denn, wie aus der Zusammenstellung der Ergebnisse ersichtlich ist, weicht die anorganische Constitution der hypertrophirten Thyreoidea in Bezug auf Talkerdegehalt unmerklich von der normalen Drüse ab. Im Gegentheil finden wir auffallender Weise das Struma verhältnissmässig noch etwas ärmer an Salzgehalt überhaupt. als die normale Drüse. Dieser Befund könnte überraschen, wenn nicht die Hypertrophie der Thyreoidea durch rein bindegewebige Entartung bedingt gewesen wäre. Bekanntlich hinterlassen nämlich rein faserstoffige pathologische Gebilde, während ihrer Metamorphosen mit weniger anorganischen Rückstand, als die sogenannte plastische Lymphe (Exsudatfaserstoff), das Produkt entzündlicher Exsudation, wie ja überhaupt die Proteinverbindungen sich hauptsächlich durch den ihre Löslichkeit resp. Cohäsionszustand regulirenden Salzgehalt unterscheiden.

Das überwiegende Vorkommen der Magnesiasalze im Harn resp. der Nierensubstanz ist dadurch erklärlich, dass ihre Resorption fast ausschliesslich im Magen adäquat der wenig konzentrirten Flüssigkeiten wie Wasser u. s. w. bethätigt wird, demnach weniger mit dem Material des langsameren Stoff-umsatzes in Berührung tritt. Das Vorkommen fertig gebildeter Tripelkrystalle in der Nierensubstanz würde für die bestrittene Möglichkeit der krankhaften Zersetzung des Harnstoffes in den Nieren sprechen, indem sich durch die Bildung von Ammoniak allein diese Tripelphosphate ausscheiden konnten.

Wäre übrigens die Thierökonomie im Stande, die in den Nahrungsmitteln, vorzüglich den Cerealien gebotene Magnesia Allein die im Magen wegen der viel kleiner ausfallen. vorherrschenden Säuren allenfalls noch ungehemmte Absorption der Magnesiasalze erfährt hinter dem Pylorus eine plötzliche derartige Störung, dass man an eine fernere Aufnahme in den Organismus aus chemischen Gründen zweifeln muss. Das störende Moment liegt in dem chemischen Verhalten der Magnesia selbst, welche mit Alkalisalzen unlösliche Krystalle von Tripelsalzen bildet. Bei dem Vorwalten der Alkalien in den Darmsekreten liegt demnach die Resorptionshemmung der Magnesiasalze auf der Hand, was sich am deutlichsten bei den pathologischen Exzessen der Alkalessenz bewährt, z. B. bei Abdominaltyphus, in welchem das entschiedene und häufige Auftreten der charakteristischen Magnesiakryställchen mit der Intensität der alkalischen Reaktion der Darm- und Geschwürsekrete Hand in Hand geht, so zwar, dass man oft ohne Mikroskop die schichtweise Auflagerung dieser Krystallhäufchen auf den excoriirten Darmhäuten beobachten kann.

Ob die chemisch physiologische Einrichtung des Verdauungsapparates bei den Herbivoren zur Resorption der Magnesiasalze geeigneter ist, oder ob die reichlichere Zufuhr dieses Minerals allein schon auch eine vermehrte Aufnahme zur Folge hat, oder ob beide Momente an dem Ueberführungsprozess gleichen Theil haben, ist noch zu untersuchen. Für jetzt kann ich nur die Thatsache anführen, dass in sämmtlichen Drüsen der untersuchten Herbivoren verhältnissmässig stärkerer Magnesiagehalt vorhanden ist, als in denen der Omni- und Carnivoren. — Die Verbindungen, in denen die Magnesia im Organismus vorkommt, kann äusserst mannigfaltiger Natur sein. Wiewohl man dieselbe bei ihrer quantitativen Bestimmung bei gleichzeitiger Gegenwart von Phosphorsäure stets als basisch phosphorsaure Ammoniak-Magnesia erhält, so lässt sich doch das Vorhandensein eines fertigen phosphorsauren Magnesiasalzes in der ursprünglichen frischen Substanz nur dann mit Gewissheit annehmen, wenn (wie v. Bibra und Schlossberger gezeigt haben) die gefundene Menge Kohlensäure! zur Sättigung der Magnesia nicht hinreicht.

Zwar führt schon die Ausscheidung von Tripelphosphaten,

welche man beim Verwesungsprozess organischer Theile unter lem Mikroskope so genau selbst bei den geringsten Spuren von Magnesia beobachten kann, zu der Wahrscheinlichkeit, dass lie Magnesia als lösliches phosphorsaures Salz in der Substanz vorhanden war. Allein diese Erscheinung ist kein stichhaltiger Beweis, indem durch den Verwesungsprozess die an Alkalien gebundene Phosphorsäure zum Theil an die alkalischen Erden tritt, und ausserdem auch der aus den Proteinverbinllungen sich entwickelnde Phosphor- und Schwefelwasserstoff and noch viele andere Momente die Austreibung der Phosbhorsäure aus ihren Verbindungen unterstützen können. Ob ibrigens das zwei- oder dreibasische Salz vorkommt, lässt sich veder aus der Aschenanalyse, noch auch aus der Untersuhung der frischen Substanz erkennen. Vorherrschend ist aber edenfalls das in Wasser ziemlich lösliche zweibasische Salz ausser in den Organen, welche sich durch steinharte Festigkeit auszeichnen (Zähnen), wo sie nur als schwer lösliches dreibasisches Salz im Stande ist, den oft mit ihr in Berührung rommenden lösenden Agentien zu widerstehen.

Die Einführung und das normale Vorkommen der Magnesia als organischsaures und die Verwandlung desselben durch den Respirationsakt in kohlensaures Salz ist wohl ausser allem Zweiel. Abgesehen davon, dass Blei die neutrale kohlensaure Magnesia in Leberkonkrementen und in menschlichen Harnteinen nachgewiesen; ferner Lassaigne dasselbe in Harnteinen von Pferden, Ochsen und Kühen, Wackenroder in dem eines Pferdes gefunden hat, ist die Möglichkeit ihres Geöstseins in der thierischen Flüssigkeit leicht begreiflich, indem a aller Orten im Kreislauf soviel Kohlenstoff verbrannt wird lass der der Lungensekretion entgehende Theil der freien Kohensäure immer noch hinreicht, eine bedeutende Quantität neuraler kohlensauren Magnesia gelöst zu erhalten. Dass nun die reie Kohlensäure wirklich das lösende Medium für dieses Salz st, ergibt sich aus dem Experiment, dass beim Kochen des Harns der Herbivoren oder beim Versetzen desselben mit Salzsäure durch die Tilgung der freien Kohlensäure das neutrale kohlensaure Kalk- und Magnesiasalz zu Boden sinken.

Eisen.

Der längst konstatirte Eisenreichthum sämmtlicher thieri-

schen Gewebe beweist schon die hohe physiologische Bedeutung dieses Metalls. Weniger erforscht ist bis jetzt die Vertheilung des Eisens in den einzelnen Organen und Organsystemen. Und dennoch scheint eine exakte Analyse der Körpergebilde auf Eisen mit besonderer Rücksicht auf deren normale und pathologische funktionelle Bedeutung ganz vorzüglich geeignet, über viele und wichtige Vorgänge zoochemischer Natur im thierischen Haushalt ein helleres Licht zu werfen. könnte z. B. vielleicht die vielbesprochene Blutbildungsfrage sowie die damit zusammenhängende von der Metamorphose der weissen und rothen Blutkörperchen durch die völlige Kenntniss der Eisenfunktionen endlich ihre theilweise Erledigung finden. In dieser Hinsicht verdienen ganz besonders die Verhältnisse des Eisengehalts, welche zwischen Milz- und Leberasche obwalten, ein gründliches Studium zur physiologischen Verwerthung.

Wenn sich uns auch das Eisen bei seiner Fällung nach der gewöhnlichen Methode als phosphorsaures Salz präsentirt sowohl in den Organaschen der Herbivoren wie der Carnivoren, so spricht doch Vieles gegen die Annahme dieser präformirten Verbindung im Blut und in den Drüsen. Zwar lässt sich nicht wohl denken, dass dieses Metall bei seiner bekannten starken Verwandtschaft zum Sauerstoff, selbst in seiner Verbindung mit organischen Radikalen als regulinisches Element zugegen sei, viel wahrscheinlicher ist sein Vorkommen in einem mehr oder weniger durch Oxydation alterirten Zustande. Auch lässt sich wohl nicht in Abrede stellen, dass die durch Medikamente auch selbst auf gewöhnlichem, alimentären Wege in den Kreislauf übergehenden Eisenverbindungen, wie milchsaures, pflanzen- und phosphorsaures Eisen, ihre chemische Constitution noch geraume Zeit nach Umständen in den thierischen Flüssigkeiten beibehalten können; allein die eigentlich physiologische Form für das Eisen der Organe kann doch nicht wohl das lösliche phosphorsaure Salz sein, indem das constatirte gleichzeitige Vorkommen des phosphorsauren Natrons in fast sämmtlichen thierischen Flüssigkeiten, namentlich Blut, Galle, Milch, durch die zersetzende doppelte Wahlverwandtschaft diese phosphorsaure Salzform des Eisens alshald vernichten würde.

Die Einführung des Eisens in den thierischen Organismus t höchst vielfältig sowohl bezüglich der Form als des lösenen Mediums. Nach direkten Versuchen wissen wir, dass diees Metall im Magen als lösliches Haloidsalz vorhanden ist; asserdem enthalten aber auch die Pflanzen und Thierproteinerbindungen stets Eisen in bestimmten Verhältnissen, und so ringt denn auch jedenfalls eine nicht geringere Quantität esselben als lösliches Albuminat (lösliches Albumin verbindet ch mit Eisen in dem Verhältniss wie 100:5) durch die aufaugenden Gefässwände in den Körper ein. Die weiteren Umandlungen des circulirenden Eisens sind noch wenig erforscht. eber die Constitution seiner eigenthümlichen räthselhaften erbindungsform im Farbstoff des Blutes ist unsäglich viel thon experimentirt und theoretisirt worden. Zu einer reellen eurtheilung der meisten dieser Theorieen fehlt uns bis jetzt och leider jeder auf exakte Naturforschung gegründete Analtspunkt. Man sprach schon Vieles über eine Art Rhodanasserstoffverbindung, die sich während der thierischen Oxyation bildete und auf das Eisen unter Erzeugung der eigennümlichen Blutfarbe reagire. Die dahin bezüglichen Experiente unter dem Mikroskope bei verschiedenen Temperaturraden zur Hervorbringung von Hämatoidinkrystallen verfehln alle ihren Zweck, und der im Speichel nachgewiesene Rhoanwasserstoff konnte also nicht als blos überflüssig, durch en Mangel an freiem Eisen als solcher isolirt dastehender unebundener Bestandtheil des Blutfarbstoffs bezeichnet werden. Uebrigens haben wir an die Stelle der vielen negirten Hy-

Uebrigens haben wir an die Stelle der vielen negirten Hythesen über die Funktionsweise des Eisens (Oxydation und esoxydation) immer noch keine neuen begründeten Thatsachen

tzen können.

Alle die erwähnten Eisenverbindungen treten nach ihrem eils physiologischen Verbrauch, theils zufälligem nutzsen Lauf durch die Organe in den Se- und Exkreten als in anorganische oder auch als organisch saure Salze aus em Körper aus. Auf einer Uebergangsstufe zu dieser ressiven Zerlegung der schon in der Thierökonomie verwerten organischen Eisenverbindungen stehen wahrscheinlich e von Scherer in der Milzentdeckten kohlenreichen Farboffe, sowie das muthmasslich an Essigsäure und Milzsäure

gebundene Eisen und der ebenfalls von Scherer gefundene eiweissartige eisenreiche Stoff, dem derselbe eine enge Beziehung zum Hämatin zu geben geneigt ist. Ueber den aus den Untersuchungen Scherer's hervorgehenden im Verhältniss zu allen übrigen Parenchymflüssigkeiten unvergleichlichen Reichthum der Milz an freiem Eisen bei gleichzeitigem Vorkommen des an Kohlenstoff und Wasserstoff sehr reichen. an Stickstoffarmen Körpers, des Leucin, bemerkt Scherer. dass dadurch Kölliker's Annahme, die rothen Blutzellen gingen in der Milz zu Grunde, wahrscheinlich gemacht werde. Während jedoch das in der Milz in den genannten Verhältnissen vorhandene Eisen immer noch eine neue Funktion übernehmen, nämlich zur Neubildung von farblosen Blutzellen dienen kann, somit eine ähnliche Stellung zum Stoffwechsel einnehmen würde, wie das zweifach verwerthbare Pfortaderblut; lässt sich von dem durch die Nieren abgeschiedenen salzsauren und phosphorsauren Eisen mit Sicherheit behaupten, dass sie rein depurative Bedeutung haben. Sorgfältige und umfassende vergleichende Erörterungen über das Eisen der Milz und der Nieren wären im Interesse der Physiologie sehr zu wünschen. — Die zoochemischen Vorgänge im Körper bei Bildung der Endprodukte organischer Eisenverbindungen sind ziemlich einfach und einleuchtend bei den essigsauren und milchsauren Eisensalzen, welche wir in den Sekreten finden; eigenthümlicher mag dagegen die Bildung von Eisenchlorid im Blute von Statten gehen. Erklärlich scheint mir dieselbe durch die Wechselbeziehungen, welche zwischen Albumin und · Fibrin einerseits, und dem Hämatin andererseits obwalten. Während nämlich die Chloralkalien bekanntlich jene Blutstoffe in Lösung erhalten, bewirken sie für das Hämatin das gerade Gegentheil, indem sie hier die Einwirkung des Sauerstoffs auf das Hämatineisen beschränken, wodurch der Bestand des Hämatins natürlich mehr geschützt ist. Wenn nun bei der Zersetzung des schwefelhaltigen Albumens (vrgl. Schwefelsäure) der oxydirte Schwefel sich mit den zerlegten Chloralkalien des Blutes zu schwefelsauren Alkalien verbindet, kann der frei gewordene Chlorwasserstoff einen unbeschränkten Einfluss auf das eisenhaltige Hämatin ausüben und vermag dasselbe vielleicht durch Verbindung mit dem Hämatineisen zu lösen.

Wir sehen auf solche Weise durch Vermittlung der anorganischen Stoffe, des Schwefels, der Alkalien, des Chlors und Eisens gleichzeitig zwei extreme physiologische Prozesse eingeleitet und durchgeführt werden, auf der einen Seite Inspisation durch Oxydation des Albumens, auf der anderen Verlüssigung durch Umwandlung und Entziehung des Bluteisens.

Im Zusammenhang mit diesen Vorgängen steht eine schon ängst bekannte, allein bezüglich des kausalen Zusammenhanres noch nicht hinlänglich gewürdigte Thatsache. Man will hämlich beobachtet haben, dass bei Zunahme von Wasser und Salzen eine Verminderung der Blutkörperchen eintrete. Sollte es nicht vielmehr manchmal umgekehrt heissen müssen: Bei Verminderung der Blutscheiben id est des Eisens tritt Vernehrung von Wasser und Salzen ein? Sobald nämlich die Menge der Blutscheiben zu gering ist, bei der Umwandlung les venösen Blutes in arterielles, den durch die Lungen resbirirten Sauerstoff chemisch zu binden, fällt das Albumen der vermehrten Einwirkung dieses oxydirenden Elementes anheim ind muss bei gleichzeitiger Bildung von Faserstoff eine grössere Menge anorganischer Bestandtheile, welche dadurch in binäre Verbindungen zerlegt werden, abgeben, somit den Gehalt n anorganischen Salzen, nicht aber an anorganischen Betandtheilen überhaupt vermehren. Nur so erklären sich die ingaben Nasse's, welcher bei der Untersuchung von Thierlut durchgängig gefunden hat, dass die Menge der Alkalien m Serum in gradem Verhältnisse stehe zur Menge des Fibrins m Blut. Ebenso ist die Vermehrung des Wassers im Blut ei den auf den so eben genannten Missverhältnissen beruhenen anämischen, vorzüglich aber durch Eisenmangel bedingen und charakterisirten Zuständen nicht absolut, sondern, so ange wenigstens keine consekutiv hydrämischen krankhaften erscheinungen hinzutreten, nur relativ gegenüber der allgeneinen Cohäsionsveränderung des Blutgewebes. Der Vorgang st hier wesentlich derselbe wie bei der ausserhalb des Organisnus künstlich bewirkten Coagulation des Albumens thiericher Flüssigkeiten: Vermehrung der Consistenz dieses Stofes mit gleichzeitiger Abscheidung des flüssigen Mediums. n Einklang mit den eben genannten Erscheinungen stehen ie vitalen Störungen bei den durch diese Prozesse hervorgerufenen Krankheitsformen, wie z. B. bei Chlorose, Hydraemie, Scrophulosis, Tuberculosis; auf der einen Seite centrale Wasserergiessungen in die Körperhöhlen und peripherische in das Unterhauszellgewebe, auf der andern Seite Neigung zu Trombusbildung, Faserstoffgerinnungen, plastischen Wucherungen und Ablagerung von Proteinverbindungen, wozu freilicht auch die gesunkene Energie des Gefässsystems und die Laxität der Venenwände das Ihrige beitragen mögen.

Dass der Eisenmangel im Blute wirklich nicht bloss Folgezustand sondern vielmehr Ursache aller dieser Krankheitssymptome ist, beweisen einmal die chemisch-pathologischen Befunde besonders des Blutes und der drüsigen Organe, dann spricht aber auch und zwar hauptsächlich dafür der günstige Einfluss der Eisenpräparate, welche als Medikamente gegen die erwähnten Krankheitsformen verabreicht werden. Die günstige Wirkung derselben liesse sich folgender Weise erklären Das in den Blutstrom etwa therapeutisch eingeführte Eisen zieht nämlich als eine Art Sauerstoffableiter den durch die Lungen eingeathmeten Sauerstoff dergestalt an sich, dass dadurch die Zahl der Blutscheiben vermehrt (Hämatinbildung) und zugleich, wie aus den Beobachtungen Andral's und Gavarret's zu resultiren ist, das Albumen vor der fibrinbildenden, das Fett vor der schmelzenden, verseifenden Einwirkung des Sauerstoffs geschützt wird.

Ohne mich für jetzt auf das unerquickliche Studium und auf eine monographische Beschreibung der Rollen einzulassen welche das Eisen im Hämatin und den verwandten normaler pathologischen Farbstoffen einnimmt, erwähne ich im Vorbeigehen noch der exakten Experimente und klassischen Arbeiten Virchow's über dieses Thema, sowie der verdienstvollen Untersuchungen Mulder's, Scherer's, Sanson's und Lecanu's; und gehe schliesslich über zu einigen Eigenthümlichkeiten im Verhalten des Eisens bei seiner Analyse.

In fast allen Drüsenaschen fand ich im wässerigen Auszug, mochte er nun der bloss verkohlten Masse oder der weiss gebrannten Asche entzogen sein, stets eine mehr weniger bedeutende Menge Eisen, welches sich zuerst dadurch verrieth, dass nach dem Abdampfen die eingetrockneten Ringder Substanz gegen die weisse Lasur der Porzelanschälchen

auffallend rostfarbigen abstachen. Ich hielt die gefärbte Substanz anfänglich für unvollständig verbrannte organische Stoffe, glühte desshalb den abgedampften wässerigen Auszug heftig durch, ohne jedoch die rothe Färbung zum Verschwinden zu bringen; doch hatte mittlerweile durch dieses starke Glühen das Eisen seine Löslichkeit in Wasser verloren. In Salpetersäure gelöst gab es deutlich alle Reaktionen der Eisenoxydsalze. Durch diese Erscheinung aufmerksam gemacht, prüfte ich in der Folge jeden Wasserauszug auf Eisen. Merkwürdiger Weise reagirte dasselbe in der meist neutralen oder doch nur schwach alkalischen Flüssigkeit weder auf Ferrocyankalium noch auf Rhodankalium. Sobald ich jedoch die mit diesen Reagentien versetzte Lösung zum Zweck der Kieselsäureabscheidung mit Salpetersäure ansäuerte, trat die Eisenreaktion vollständig hervor. Durch diese Wahrnehmung liess ich mich einige Male veranlassen, das Eisen direkt mit Schwefelammonium zu fällen, nachdem ich zuvor die Flüssigkeit etwas angesäuert und wieder neutralisirt hatte. Die entstehende grüne Färbung brachte mich auf die Vermuthung, ein Mangansalz sei in dem Auszug maskirt vorhanden, was sich jedoch nur selten bestätigte. - Als endlich in der angesäuerten Lösung auf Zusatz von Schwefelwasserstoff sich eine deutlich rothe Färbung zeigte, eine gewiss ungewöhnliche Erscheinung bei Eisensalzen, dachte ich an die Möglichkeit einer Cyanverbin- . dung des Eisens um so mehr, da sich kein Schwefel auf der Oberfläche der Flüssigkeit oder auch als Niederschlag dabei abzuscheiden schien. Dass die Entstehung solcher Cyanverbindungen vorkommen kann und auch in der That vorkömmt, geht aus Liebig's Erfahrung hervor, dass sich beim Glühen der abgedampften Fleischflüssigkeit Cyansaures Kali und Cyankalium bildeten. Allein wir brauchen ja nicht ausschliessich eine Verbindungsart für diese lösliche Modifikation des Eisens anzunehmen. Bei stickstoffarmen Substanzen und bei solchen Organstoffen, welche reichlich Phosphorsäure liefern, lie ohnehin die Bildung von Cyanverbindungen beim Glüden hindern würde, müssen und können wir zu einer andern Erklärung Zuflucht nehmen.

Nach Persoz (Annal. d. Chem. u. Pharmac. Bd. 60 p. 163) gibt es eine Art Eisenalaun, welcher durch Zusammen-

glühen mit phosphorsauren Alkalien gebildet wird, sowohl aus phosphorsauren Eisenoxydsalzen als auch aus blossem Eisenoxyd. Diese in Wasser löslichen Eisenalaune zeigen auch in ihrem chemischen Verhalten so deutlich die oben berührten Eigenschaften, dass wir der Annahme von Cyanverbindungen zur Erklärung des abweichenden Verhaltens des in Wasser löslichen Eisensalzes leicht entbehren können; denn weder findet nach Persoz auf Zusatz von Schwefelwasserstoff eine theilweise Reduktion des Oxydes statt, wie das doch bei den einfachen Eisensalzen stets der Fall ist; noch bringt Schwefelammonium in der alkalischen Lösung einen Niederschlag von Schwefeleisen hervor. V. Bibra, welchem bei zoochemischen Aschenuntersuchungen wohl zum ersten Male dieses Verhalten des Eisens aufgestossen ist, macht auf dasselbe aufmerksam und ist ebenfalls nach Persoz der Ansicht, dass das Eisen als Oxydul mit einer Phosphorsäure und einem alkalischen Phosphate verbunden, dieses ungewöhnliche Verhalten zeige. Merkwürdig ist noch, wie v. Bibra angibt, dass weder schwefelsaure Alkalien noch auch Chlornatrium die Eigenschaft besitzen, mit den Oxyden des Eisens und Kupfers längere Zeit geglüht, solche lösliche Doppelsalze zu bilden. Auch das Zusammenbringen dieser Oxyde mit phosphorsaurem Natron auf nassem Wege, sei es nun dass dieses in concentrirter oder verdünnter Lösung angewendet werde, dass es bei kochender oder kalter Temperatur einwirke, hat keinen Einfluss auf die Löslichkeitsverhältnisse der genannten Metalle, so dass demnach die durch das Glühen der phosphorsäurehaltigen Asche gegebenen Bedingungen zur Bildung eines löslichen Doppelsalzes auch die einzigen sind. Gegen die Annahme, in der eisenhaltigen Lösung sei dieses Metall als eisensaures Salz enthalten, welches allerdings in Wasser löslich ist, spricht schon der Umstand, dass die unverbrannte Kohle durch ihre Reduktionskraft die allenfalsige Hyperoxydationsneigung des Eisens neutralisiren würde. Möglicherweise hätte Eisensäure in denjenigen Wasserauszügen enthalten sein können, welche ich aus der mit salpetersaurem Kali längere Zeit zusammengeschmolzenen Asche ausgezogen habe, weil hiebei einerseits die Bedingungen zur Bildung von Eisensäure geboten waren, andererseits aber auch die wässrige

Lösung selbst die charakteristische röthliche Färbung der Eisensäurelösungen besass, während dagegen die eisenhaltigen Wasserauszüge, in denen aus den oben aufgezählten Gründen ler Eisenalaun angenommen werden musste, in der Regel öllig farblos waren.

Mangan.

Wenn man auch Millon's Angabe, dass im Blute das fangan 1/10 der Asche bilde, ja, dass die Blutasche sogar 4,0 % Mangan enthalte, mit einem eingeklammerten Frageeichen zu begleiten pflegt, so habe ich mich doch bei meinen analysen der Drüsenaschen von dem fast konstanten Vorkomnen desselben in den Sekretionsapparaten hinlänglich übereugen können. Den Prozentgehalt wage ich jedoch nicht für lle Fälle apodiktisch anzugeben, weil häufig, wie aus den Taellen ersichtlich ist, die homöopatisch kleine Menge desselen eine direkte Wägung nicht verstattete, und das Mangan laher nur annäherungsweise bestimmt werden konnte. Trotzlem geht aus den Untersuchungsresultaten mit Gewissheit ervor, dass der proportionale Gehalt an Mangan im Vergleich um Eisen zwischen Leber- und Milzasche gewaltig differirt, nd zwar derart, dass die Leber, in welcher sich ein relativ iedriges Maximum an Eisen nachweisen lässt, doch durchchnittlich unverhältnissmässig hohe Gewichtszahlen für Mangan eansprucht, während die eisenreichere Milz nur bescheidene puren Mangan ergibt Weil man nun von jeher gewohnt ist, as Mangan als getreuen Begleiter des Eisens in fast allen einen Modifikationen anzutreffen, so könnte die angeführte, uf den ersten Blick vielleicht frappirende Thatsache geeignet rscheinen, die Gründlichkeit meiner Arbeit zu verdächtigen. enn nicht wiederholte Reaktionen übereinstimmende Fakta rgeben hätten.

Woher nun, wenn anders meine Angaben durch ferere Untersuchungen statistische Bestätigung erhalten — im rganismus diese scheinbare Abweichung von einem ausserhalb esselben so allgemein durchgreifenden Naturgesetz? Von iner absoluten Vermehrung des Mangans durch vermehrte Reporption dieses Metalls zwischen Milz und Leber durch das fortadergebiet oder direkt durch die Leberarterien kann wohl

keine Rede sein, indem ja selbst diese Zufuhr nur dem Eisen adäquat stattfinden könnte; ebenso wenig ist es nach bisher bekannten physiologischen Gesetzen wahrscheinlich, dass mitten im Kreislauf eine theilweise Substitution des etwa abgenützten Eisens durch das Mangan in den Blutkörperchen überhaupt oder gar in den Hämatoidinkrystallen stattfinde: eine Hypothese, welche, falls ich nicht irre, wenn auch nicht behauptet, so doch muthmasslich angenommen worden ist, wiewohl es meines Wissens bisher noch Niemanden gelang, das Mangan als Element in Verbindung mit organischen Radikalen ähnlich wie das Eisen im Blutroth nachzuweisen. Doch das ist denkbar und entbehrt auch der theoretischen Begründung nicht, dass durch eine Art Filtrationsvorgang das Mangan als Filtrat in der Lebersubstanz sich anhäuft, und gleichsam als fremder Körper durch die Gallengänge fortgedrängt wird, um als Exkretionsbestandtheil der secernirten Galle wieder aus dem Organismus entfernt zu werden.

Dieser Behauptung könnte ich einen Fall von analogem Vorgang im Tractus intestinalis zur Seite stellen, den mir mein verehrtester Lehrer Prof. Dr. Scherer mündlich mitgetheilt hat. Es wurde ihm nämlich vom Hofr. Dr. Marcus der Harn eines an Colica saturnina im Juliusspitale darniederliegenden Mannes zur chemischen Analyse überschickt. Er fand darin keine Spur von Blei, wohl aber deutliche nachweisbare Spuren von Chrom, wahrscheinlich als Chromoxyd zugegen; aus den Exkrementen desselben Patienten wurde gleichzeitig eine entsprechende Quantität Blei gewonnen, so dass für Scherer die Vermuthung nahe lag, die Bleiintoxikation sei von einer im Darme erfolgten Zersetzung eines Bleipräparates begleitet gewesen. Diese durch die analytischen Belege bestätigte Vermuthung stimmte mit der nachher angestellten genauen Anamnese des Kranken überein, welche ergab, dass der Patient, ein Tünchner, lange Zeit hindurch ausschliesslich Chromgelb gerieben und mit Chromgelb gearbeitet hatte. Bei diesem Falle von Bleiintoxikation war sicherlich das Chrom schon durch die Magensäure vom Blei getrennt und absorbirt worden, und die Absonderung desselben durch die Nieren wurde wohl erst durch die Alkaleszenz des Inhalts der Harnkanälchen veranlasst, welche das Chromoxyd in einen minder löslichen Zustand überführte, während dagegen das Blei, als minder löstich in der Magensäure, in so kurzer Zeit noch keine Aufnahme in den Kreislauf gefunden hatte oder wenigstens noch nicht zu den Sekretionsorganen hatte gelangen können. Wäre durch lethalen Ausgang der Krankheit Gelegenheit zur Obduktion geboten worden, so würden Nieren, Galle und Leber wohl einen ähnlichen Befund gegeben haben wie der Harn.

Wenn durch dieses authentische Faktum die energische analytische Einwirkung der Sekretions- und Parenchymflüssigkeiten auf die dem Verdauungsapparate übergebenen Substanzen zur Evidenz nachgewiesen ist, so habe ich Anhaltspunkt genug für die Hypothese, dass die Abscheidung des Mangans vom Eisen im Blute durch die entschieden sauer reagirende Parenchymflüssigkeit der Leber eingeleitet wird, welche bei einem Temperaturgrade des Körpers sogar ausserhalb des Organismus Mangansalze zu lösen vermag. Um so leichter wird also diese Säure die an dem Bluteisen haftenden, ursprünglich löslichen, durch einen funktionellen oder chemischen Vorgang, vielleicht durch blosse alkalische Blutreaktion weniger löslich gewordenen Manganmoleküle wieder in den öslichen Zustand überführen und so zur Imbibition disponiren können. Dass im weiteren Fortbewegen dieser in das Parenbhym gleichsam durchfiltrirten Manganlösung eine Exdosmose lerselben aus den Acinusräumen in die Verzweigungen der Ilkalisch gefüllten Gallengänge mit gleichzeitigem Niederschlagen des durch die Alkaleszenz unlöslich werdenden Mangansalzes stattfinden kann, dafür spricht das chemische Verhalten der verschiedenen organischen Flüssigkeiten. In wiefern der Elastizitätsköeffizient der verschiedenen Gefässwände in der Leber, der Seitendruck des Blutes auf die Wände der Kapilaren, die Heftigkeit des Blutstromes und andre physikalische und chemische Verhältnisse sich an diese und ähnliche Difusionsprozesse betheiligen, lässt sich freilich nach dem jetzigen Standpunkte der Physiologie noch nicht mit mathematicher Genauigkeit anführen. Einen ferneren Anhaltspunkt ür meine Ansicht glaube ich auch in dem Auspruche cherer's zu finden, dass der Uebergang von Erdphosbhaten in die mit Wasser ausgekochte Fleischflüssigkeit nicht ur auf der Gegenwart der phosphorsauren Alkalien sondern wohl auch auf der freien Säure der Muskelflüssigkeit beruhe.

Wenn die oben ausgesprochene Hypothese von dem Verhalten des Mangans im Organismus plausibel ist, so fällt auch der Grund weg, mit Heintz die Angabe Blei's in Zweifel zu ziehen, welcher aus einem eisenfreien menschlichen Gallensteine 3 p.C. Manganoxydoxydul dargestellt haben will. Wohl mag in Blei's Angabe die gänzliche Abwesenheit von Eisen etwas auffallend erscheinen. Allein einerseits ist das Eisen bei seinem Vorwalten im Organismus in seinen normalen Verbindungsformen grösstentheils in so inniger Verbindung mit organischen Elementartheilen vorhanden, andrerseits sind auch die Löslichkeitsverhältnisse des Eisens und des Mangans, besonders ihr Verhalten gegen organische Säuren so verschieden, dass ceteris paribus die Umwandlung des Aggregatzustandes des in seinen vielen Verbindungsübergängen so lockeren Mangans durch eine zoochemische Flüssigkeit noch keineswegs auch schon eine chemische Umsetzung in der molekulären Anordnung des Eisens bedingt. Und so kann denn immerhin Mangan in der alkalischen Galle niedergeschlagen sein, ohne dass die in der Galle etwa gelösten Eisenatome durch eine blosse Attraktion auf die mannigfaltigen Concretionen jedesmal adglomerirt werden müssen.

Fassen wir ein Resumé über die physiologische Bedeutung des Mangans im Organismus, so lässt sich Folgendes sagen: Das Mangan, in Frankreich von Fourcroy und Vauquelin zuerst als ein, wenn auch nur gleichsam parasitischer Bestandtheil des menschlichen Organismus nachgewiesen, und zwar Anfangs nur in den Nägeln und Haaren, erhielt durch die rasch folgenden beharrlichen Forschungen berühmter Chemiker alsobald eine allgemeinere physiologisch-chemische Bedeutung, bis endlich Millon 1847 und an ihn sich anreihend Burin de Buisson 1853 in der Gazette medicale in Lyon und Hannon in Belgien diesem Metall eine förmliche Emanzipation in die Reihe der nothwendigen physiologischen Bestandtheile des Organismus verschaffen wollten. Man behauptete, das Mangan finde sich im Blute nur in den rothen Blutkörperchen, stellte Proportionszahlen für Eisen und Mangan in den mannigfaltigen Krankheitszuständen von Anaemie und

Chlorose bis zur allgemeinen Plethora auf. Burin de Buisson fand: Mangan. Eisen.

im normalen Blut . . 0,060 1,220 im Blut bei Plethora . 0,071 1,360 proc. " " Chlorose . 0,025 0,500

und schien auf diese Entdeckungen hin eine fast spezifische Mangantherapie gründen zu wollen. Ich erinnere hier nur an die Beobachtungen, welche Petrequin in therapeutischer Hinsicht mit dem Mangan angestellt hat, sowie an die Rezepte Laurea's. Gestützt auf Hanno's Entdeckungen, welcher bei einem Skrophulösen, einem Tuberkulösen und mehreren Chlorotischen Verminderung des Mangans im Blute gefunden hatte, sowie auch frühere Versuche mit dem Paroxyd des Mangans, welche Gendrin, Brera und Jaques, wenn auch zur Zeit von ganz andern Hypothesen geleitet, angestellt hatten, zog derselbe bei den genannten Krankheiten Manganoxyde und Mangansalze in Gebrauch (S. Journ. des conn. med. chirurg. 1849). Die Erfolge dieser Therapie sind sicherlich noch problematisch. "Post hoc, ergo propter hoc!"?

Ueber den wirklichen Werth der Millon'schen Entdeckungen herrschen allenthalben Meinungsverschiedenheiten. Da übrigens die Ansichten Millon's, das Mangan sei ein beständiger integrirender Bestandtheil des thierischen Körpers, bis jetzt noch in keiner klassischen Physiologie ihre Vertretung gefunden haben, und selbst Robin und Verdeil dies Metallals zufälligen Körper im Blute aufführen, so scheint also diese physiologische Streitfrage ähnlich wie die über das normale Vorkommen von Kupfer und Blei immer noch vergebens auf

eine bestätigende Entscheidung zu warten.

Prof. Glénard in Lyon war es hauptsächlich, welcher nöchst sorgfältige Untersuchungen über diesen Gegenstand angestellt hat und fast durchaus zu negativen Resultaten gelangt st, die er in der Gazette medicale de Lyon für 1848 mitgetheilt hat.

Gegenüber Millon's extremster Angabe (24 p.C. Mangan n der Blutasche) scheinen die eben berührten Untersuchungen Glénards freilich sehr herabstimmend auf die Zahlenvernältnisse des Mangans einzuwirken. Allein auch Glénard bei all seiner Vorsicht mag vielleicht dennoch durch irgend

einen an sich unbedeutenden Missgriff eine Fehlerquelle in der Bestimmung des Mangans haben einschleichen lassen. Bekanntlich hat das Mangan grosse Neigung bei Zusammenglühen mit kohlensauren Alkalien übermangansaure Salze zu bilden, und so kann es denn leicht gekommen sein, dass in einer alkalischen Asche das Mangan diese leicht lösliche Verbindung eingegangen hat, und dadurch, wie es in der That dem Freiherrn v. Bibra mit dem Eisen und mir mit Eisen und Mangan ergangen ist, sich in dem wässerigen Auszug der Asche gelöst hat. Da nun Glénard, wie er in seinem Berichte ausdrücklich erwähnt, die geglühte Asche zuerst durch Waschen von dem löslichen Salze befreit und dann erst in dem unlöslichen Rückstande nach Mangan geforscht hat, so ist es leicht denkbar, dass er, wie man zu sagen pflegt, das Kind mit dem Bade verschüttet hat. - Wier stehen also hier immer noch auf dem alten Fleck; und nichts ist natürlicher wie dies; denn so gut wie beim Kupfer und Blei, so können auch beim Mangan die mannigfaltigsten Verhältnisse zu seiner Aufnahme in den Organismus prädisponiren, wie z. B. Lebensbeschäftigung, Beschaffenheit des Bodens und in Folge dessen hauptsächlich der Cerealien, und vor Allem gewiss eisenhaltiges Trinkwasser, wie z. B. das würzburger Brunnenwasser. Zudem ist auch nicht zu vergessen, dass, wie sich dies bei der Chlorose recht deutlich zu erkennen gibt, eine gewisse Idiosynkrasie des Lymphsystems gegen das Eisen, eine Disposition der resorbirenden Wandungen zur Aufnahme von fremden deletären Körpern überhaupt wie z.B. auch für Quecksilber, ein plus oder minus im Mangangehalt des Organismus herbeiführen kann. — Uebrigens gilt das beim Kupfer und Blei Gesagte der Hauptsache nach auch für das Mangan; und wenn ich auch im Ganzen durchaus nicht geneigt bin, amphibiotische Monopole für das Thier- und Pflanzenreich zu vindiziren, indem es ja auch unter den Mineralien Amphibien gibt, d. h. Stoffe, welche normal sowohl im animalischen wie im vegetativen Organismus vorkommen; so glaube ich denn doch aus den bis dato feststehenden Erfahrungen über das Mangan die wohl begründete Ansicht aussprechen zu können, dass das Mangan mehr zufälliger, durch das Eisen mit in den Blutstrom eingeschmuggelter fremder Körper ist, welcher unter

gegebenen Umständen auf dem kürzesten Wege eliminirt wird; und sollte es doch eine funktionelle Bedeutung für den Stoffwechsel haben, so möchte ich ihm durchaus keine stellvertretende Rolle für das Eisen zuschreiben. Als Trabant des Eisens könnte es allenfalls ein adjuvans zu demselben, nie aber ein corrigens bilden. Selbst therapeutische Erfolge bei seiner Anwendung in der Chlorose beweisen noch nichts für die surrogative Wirkungsweise des Mangans, indem ja in neuester Zeit vielfache Experimente am Krankenbette gezeigt haben, dass andere Metallpräparate die Dienste des Eisens versehen können, somit die günstigen therapeutischen Erfolge wohl weniger von einer direkten Aufnahme des medikamentösen Eisens in die assimilative Sphäre der Organe, als vielmehr von einer Umstimmung der krankhaft alienirten Intestinalwände herzuleiten sei, wodurch dieselben zur Aufnahme des bisher verweigerten Eisengehalts der Nahrungsmittel wieder tauglich werden. Von einer vikarirenden Funktion des Mangans bei der Clorose kann also um so weniger die Sprache sein. - Nachträglich erlaube ich mir noch im Interesse derjenigen, die sich mit der Aufsuchung des Mangans befassen wollen, auf eine neue von Crum entdeckte Reaktion aufmerksam zu machen. Mit dem 3-4fachen Volumen Wasser verdünnte Salpersäure wird mit einigen Körnchen braunes Bleisuperoxyd (Pb O2) bis nahe zum Sieden erhitzt. In diese heisse Flüssigkeit giesst man die vorher verdünnte, auf Mangan zu prüfende Lösung, die jedoch, wenn die Reaktion gelingen soll, vollkommen frei von Salzsäure sein muss. Die Entstehung einer intensiv purpurrothen Färbung zeigt die Gegenwart der geringsten Spuren von Mangan an. Dieses Phänomen beruht auf Bildung von Uebermangansäure. — Die weitere Verwerthung wie die meist salzsaure Beschaffenheit ller von mir auf Mangan geprüften Flüssigkeiten machte mir die Anwendung dieser Reaktionsmethode für die vorliegende Arbeit nicht wohl rathsam.

Silber.

Malagoti, Durochet und Sarzeau wollen selbst Spuren von Silber im Blut eines Ochsen gefunden haben. Ebenso haben sie Silber im Meersalze, in der Salzsäure, der Soda und verschiedenen Landpflanzen nachgewiesen. Dieser letztere Umstand könnte allerdings die Aufnahme von Silber in den Kreislauf durch die Nahrungsmittel erklären. Zugleich ist aber auch der Verdacht auf absolute Reinheit der angewandten Reagentien schwer zu unterdrücken. Näheres über diese Entdeckung s. Compt. rend. de l'Academie Tom. XXIX. 1850.

Diese Mittheilungen haben auch mich veranlasst, bei meinen Analysen der Drüsen einige Male in der durch Salzsäure niedergeschlagenen Kieselsäure auf Silber zu reagiren, indem ich den gesammten Niederschlag nach dem Verjagen der Salzsäure löste und mit Schwefelwasserstoff auf Silber prüfte. Selbst Härings-Eingeweide prüfte ich zwei Mal auf dieses Metall; erhielt jedoch stets negative Resultate.

Hampfer und Blei.

Die Kupferfrage in der Physiologie knüpft sich vorzüglich an den Namen Orfila, weil dieser im Jahre 1838 die kühne Behauptung aufstellte, Kupfer sei ein integrirender Bestandtheil des menschlichen Körpers, eine Behauptung, welche inzwischen häufige Vertheidigungen und noch häufigere Oppositionen hervorgerufen hat. Orfila stützte seine Ansicht auf die Resultate seiner zoochemischen Analysen, wobei er die frisch ausgepresste und ausgekochte Flüssigkeit der Organe und die Organasche gesondert behandelt hatte; indem er dem in der Asche gefundenen Kupferantheil eine engere, gleichsam organische Verbindung mit den Thierstoffen zuschrieb, von dem in der Parenchymflüssigkeit vorhandenen Antheil Kupfer dagegen eine bloss zufällige oder absichtliche anormale Aufnahme in den Organismus und Gegenwart in den Geweben annahm (Cf. H. Rose's Theorie über die teleoxydischen, anoxydischen und meroxydischen Körper). Erwägt: man nur, dass die im Verhältniss zu der verschwindend kleinen Quantität Kupfer so enorme Menge organischer Stoffe überhaupt und besonders solcher Gewebstheile, welche einen zur mechanischen Einhüllung geeigneten Cohäsionszustand besitzen, wie Casein, Fibrin und ähnliche Stoffe durch ihre Gerinnungsfähigkeit und Klebrigkeit trotz dem sorgfältigsten Auskochen und Auswaschen immer noch eine gewisse Portion

der Kupfer- und überhaupt Metallmoleküle zurückhalten können, so wird man die Haltlosigkeit der von Orfila aufgestellten Prinzipien anerkennen müssen.

Uebrigens ist durch zahlreiche Analysen berühmter Chemiker wie Sarceau, Hervy, Devergie, Lefortier, Millon das natürliche, nicht aber das normale Vorkommen des Kupfers im menschlichen Körper hinlänglich dargethan; die noch obschwebende Frage kann demzufolge dahin modifizirt werden, ob die Gegenwart von Kupfer in den verschiedenen Körpertheilen konstant und die Quantität desselben bestimmt proportionirt sei, ob Kupfer zu irgend einem physiologischen Prozess als nothwendig, oder vielmehr nicht nur als indifferent, sondern sogar als absolut deletär zu betrachten sei.

Wohl könnte der Parallelismus zwischen Kupfer und Eisengehalt verschiedener Thierklassen auf der einen, und der blauen oder rothen Blutfarbe auf der anderen Seite, sowie die hieran sich knüpfenden physiologischen Konsequenzen die Vermuthung aufkommen lassen, das Kupfer sei der Gewebs- und Organenformation auch im menschlichen Körper nicht so ganz fremd, sondern betheilige sich wahrscheinlich an irgend einen wenn auch noch so mikrochemischen Vorgang. Eine etwas starke Phantasie und hömoiopathische Starkgläubigkeit könnte sich freilich aus dem gleichzeitigen Vorkommen von Kupfer und Blei im Organismus eine Art elektrochemischer Batterie konstruiren, welche auf mikrodynamischem Wege wer weiss welchen Einfluss auf die thierische Stoffmetamorphose ausüben könnte; allein wie weit eine solche subtile Auffassungsweise des in neuester Zeit sprichwörtlich gewordenen ewigen Zusammenhanges zwischen Stoff und Kraft über den natürlichen Gesichtskreis einer rationellen Physiologie hinausliegen würde, braucht nicht erst erwiesen zu werden. Eine unersetzlich nothwendige Betheiligung an die Plastizitätsbildung wird man doch wohl auch dem nur so spärlich vorhandenen Metall nicht zuschreiben wollen, indem ja die Phosphate diese Rolle so vorherrschend erfüllen, dass die Wirkungsfähigkeit des Kupfers in den Hintergrund treten müsste, selbst wenn dasselbe einer physiologischen Rolle vermöge seiner chemischen Eigenschaften gewachsen wäre. Ein gewisser Antheil

an Pigmentbildung pathologischer Gebilde ist häufig unzweifelhaft, was ich ganz besonders durch die vergleichende Untersuchung verschiedenartig formirter und pigmentirter Gallensteine aus der Sammlung des Hrn. Prof. Virchow bestätigt gefunden habe; und dem Kupfer liesse sich sicherlich eine noch weiter ausgedehnte Wirksamkeit im Thierkörper zuschreiben, wenn sein Vorkommen wirklich konstant und massenhafter wäre. Allein die Thatsachen, dass Auktoritäten wie Melsens, Danger und Flandin durch zahlreiche Untersuchungen das beständige Vorkommen dieses Metalls im Organismus unwiderleglich negirt haben, dass ferner sein Vorhandensein sich häufig wenigstens vorwiegend auf die Sekretions- resp. theilweise Exkretionsorgane wie Leber beschränkt, dann dass das Kupfer in der Milz, welche doch stets mit dem Träger aller physiologischen Materialien, dem normalen Blute unverhältnissmässig stark durchtränkt ist, so äusserst selten, fast nie als Depositum, sondern höchstens vielleicht als Passant auf dem Wege zu den Sekretionsorganen nachgewiesen wurde; diese Thatsachen lassen gegründete Zweifel an die Wahrscheinlichkeit der diktatorischen Behauptung Orfila's, dass das Kupfer mit physiologischer Gleichmässigkeit, oder teleologisch gesprochen mit Rücksicht auf die Funktion der Organe in denselben vertheilt sei. Uebrigens beweis't das blosse Auffinden der Metalle, selbst wenn es konstant wäre, in den Organen für die Stellung derselben gegenüber den Organfunktionen noch sehr wenig; wenn nicht zugleich ihr physiologischer Zusammenhang auf dem Wege des Experiments oder wenigstens durch Induktion nachgewiesen ist. Wenn wir so z. B. die Knochen eines Vogels mit Färberöthe tingirt finden, so ist damit durchaus noch nicht die normale Existenz dieses Farbstoffes im Knochen dieses Thieres dargethan; wir wissen nur, dass ihnen dieser für die Thierphysiologie unverwerthbare Stoff absichtlich oder zufällig durch Vermittlung der Nahrungsstoffe einverleibt worden ist. Aehnlich ist das Verhältniss des Kupfers und sonstiger Schwermetalle zum Organismus wenigstens der höheren Thiere. Ihre Gegenwart im Thiergewebe beweis't eben nur, dass sie in gelös'tem, imbibitionsfähigen Zustande in's Bereich der aufsaugenden Gefässe des Nutritionskanals gelangt sind und auf natürlichem,

physiologischen, nicht aber auf normalem Wege in den Kreislauf mit hinübergerissen worden sind. Die Gelegenheit zu dieser fremdartigen Einwanderung heterogener Stoffe ist nun allerdings oft reichlich geboten sowohl gemeinsam für Menschen und Thiere je nach den Territorialverhältnissen eines Distriktes, als auch für Menschen und Hausthiere ausschliesslich in den häuslichen Einrichtungen durch metallene Küchengeräthschaften oder durch gewerbliche Beschäftigungen in Fabriken und Werkstätten. Für letztere Veranlassung sprechen die häufigen chronischen Kupfer- und Bleiintoxikationen, für erstere die Entdeckungen Deschamps', welcher in sehr vielen Gebirgsarten, in der Liasformation, im Ackerboden, den Pflanzen, sowie in thierischen Organismen, Kupfer nachgewiesen hat, sowie die Auffindung des Kupfers im Getraide durch Girardin. Deschamps ist der Ansicht, die Ueberführung des Kupfers aus dem Ackerboden in die Pflanzen geschehe durch Verwandlung des im verwitterten Schwefelkies gebotenen Kupfers in kohlensaures Oxyd, welches durch seine Löslichkeit in kohlens. Ammon., das im Ackerboden reichlich vorhanden ist, von den Vegetabilien mit Leichtigkeit absorbirt werden kann. - Die Präkautelen, welche Deschamps bei seinen Untersuchungen genommen, indem er sogar das Filtrirpapier und sämmtliche Reagentien und Geräthschaften zuvor auf Kupfer prüfte, sowie die von ihm befolgte Methode lassen keinen Zweifel über die Zuverlässigkeit seiner Mittheilungen.

Dieselben Autoritäten, welche das Kupfer in den thierischen Organismus eingebürgert wissen wollen, wünschen dem Blei eine ähnliche Stelle in organischen Geweben anweisen zu können. So Sarceau, Hervy, Devergi, Lefortier und Orfila, welche Blei sowohl wie Kupfer in verschiedenen Theilen des Körpers gefunden und als normale Bestandtheile aller Weichtheile und des Blutes angesehen haben wollen Auch Follin und Laneaux und M. I. Barse behaupten, in Spitalleichen Blei und Kupfer nachgewiesen zu haben. Aus all diesen Untersuchungen folgt übrigens soviel, als auch aus den Experimenten Phillips', welcher fand, Kupferoxyd, welches man an die Wurzeln einer jungen Pappel ge-

gossen, derart in die Substanz des Baumes aufgesogen wurde, dass sich beim Abschneiden eines Zweiges die Messerklinge in der Breite des Zweigsdurchschnitts mit Kupfer bedeckte. Aus beiden Thatsachen und Sausure's Versuchen geht hervor, dass sowohl thierische Organismen, denen man fremdartige Mineralsubstanzen zur Nahrung mischt, als auch Vegetabilien, die man mit Minerallösungen tränkt, diese giftigen Stoffe in ihre Gewebe aufnehmen und beherbergen können, ohne dass dadurch erhebliche Störungen der Lebensverrichtungen und der Vegetation hervorgerufen werden. Dass übrigens, wie Devergie im Journ. des conn. medic. 1844 Dcbr. richtig bemerkt, die Sättigungsfähigkeit der Organe für alle Giftstoffe ihre Grenzen habe, über welche hinaus der Proportionsgehalt an diesen Stoffen und sei er noch so klein, als pathologisch und nach Umständen als tödtlich zu betrachten sei, ergibt sich aus Devergie's und Guibourt's Untersuchungen von Leichenorganen, welche von den an chronischer Bleivergiftung Verstorbenen genommen wurden. Proportional den vitalen Störungen waren die materiellen Ablagerungen in den Leichen. Auch Cozzi fand Blei im Blutserum eines an Bleikolik verstorbenen, Heller und v. Gorup-Besanez in der Galle eines solchen Individuums. Der Einfluss der Bleiablagerungen auf den Vitalismus unterscheidet sich übrigens bloss durch den Grad der Heftigkeit; die corrodirende Wirkung dieses Metalls auf thierische Gewebe bleibt sich stets gleich, sei es dass dasselbe dem Fötus durch die Umbilicalgefäse oder dem Erwachsenen direkt durch den Verdauungsapparat zugeführt wird, sei es dass es beim Phthisiker als Plumbum aceticum sich in die Gewebe verliert, oder als organischsaures Bleipräparat beim Maler durch Vermittlung des Magensaftes den Weg zu den Organen und in die Sekrete findet. Wenn sich auch nicht in diesen Fällen ähnlich wie beim Durchschneiden des Pappelzweiges, bei einer Amputation das Messer mit Kupfer beschützen würde, so ist doch die wirkliche Anwesenheit des Bleies ausser Zweifel, und diese Gegenwart selbst ist stets anormal, sei es nun, dass das Metall in flüssiger Form die Gewebe durchtränkt, oder dass es als Musketkugel, eingehüllt in dem Schenkelgewebe eines Invaliden, seine corrodirende Wirkung entfaltet.

Inhalts-Verzeichniss.

201	old
Vorrede des Herrn Prof. Scherer	
Vorrede des Verfassers	
Einleitung über Aschenanalysen	1
Methode der Wasserbestimmung	20
Aschenbestimmung thierischer Organe	22
Analysirmethode der verschiedenen Aschenauszüge	28
Wässeriger Aschenauszug	28
I. In Wasser löslich bleibender Theil des wässerigen	
Auszuges	29
A. Chlorbestimmung	29
3. Bestimmung der Schwefelsäure	31
C. " Phosphorsäure	33
D. " Alkalien	34
E. " von Kalk und Magnesia	38
II. In Wasser unlöslicher Antheil des wässerigen Aschen-	
auszuges	39
Die von dem wässerigen Auszug und der Kohle be-	
freite rückständige Asche	40
A. Bestimmung des phosphorsauren Eisenoxyds und der	
phosphorsauren Erden	42
Bestimmung des Kalks und der Magnesia, die nicht an	
Phosphorsäure gebunden waren, und der Alkalien .	47
B. Bestimmung der Schwefelsäure	31
C. " des Mangans	48
D. Jan Allalian	51
Leber eines Irren	52
Milz desselben Individuums	65
Milz eines weiblichen geisteskranken Individuums	75
chics weighten gensteskianken munitudums	10

Leber eines 58jährigen Mannes	84
Milz desselben Individuums	88
Leber eines Neugebornen	93
Lebern zweier Krähen	99
Anmerkungen zu den Tabellen	102
Schlussfolgerungen aus der Tabelle	109
Ueber Entstehung, physiologische Bedeutung und Loka-	
lisirung der anorganischen Stoffe im Thierorganis-	
mus überhaupt	110
Ueber den Wassergehalt der Drüsen	121
Chlor	125
Schwefelsäure	127
Phosphorsäure	133
Alkalische Erden	135
Ueber die Alkalien	139
Doppelt kohlensaures Natron	140
Kalk	141
Magnesia	142
Eisen Eisen	145
Mangan	153
Silber	159
Kupfer + Blei	160

Druckfehler.

Seite 1 Zeile 10 von unten "Cramer" statt Clamer.

" 1 " 5 " "Natron — Serum" statt Natron-Serum; Seite 40 an der Ueberschrift streiche III.

