

Materialy k voprosu o vliianii voskhodiashchei (pochechuinoi) dushi : na chuvstvo miesta, silu verkhnikh i nizhnikh konechnostei, ischeznovenie otpechatkov na kozhie, refleksy, krovianoe davlenie, krivuiu pul'sa, temperaturu tiela i kozhi i vnutribriushnoe davlenie u zdorovago chelovieka : dissertatsiia na stepen' doktora meditsiny / Viktora Martynovicha Voronina ; tsenzorami dissertatsii, po porucheniiu Konferentsii, byli professory V.A. Manassein i privat-dotsenty V.I. Drozdov i S.A. Popov.

Contributors

Voronin, Viktor Martynovich, 1858-
Maxwell, Theodore, 1847-1914
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

S.-Peterburg : Tip. P. Voshchinskoi, 1889.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ayp2dzq2>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Серія диссертаций, допущенныхъ къ защитѣ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ
Военно-Медицинской Академіи въ 1888 — 1889 академическомъ году.

Voronin (Y. M.) Physiological effects of ascending or
hæmorrhoidal douche [in Russian], 8vo. 1889

МАТЕРІАЛЫ 6

КЪ ВОПРОСУ

О ВЛІЯНІИ

Ascending hæmorrhoidal
ВОСХОДЯЩЕЙ (ПОЧЕЧУЙНОЙ) ДУШИ


на чувство мѣста, силу верхнихъ и нижнихъ конечностей, исчезновеніе
отпечатковъ на ксжѣ, рефлексы, кровяное давленіе, кривую пульса,
температуру тѣла и кожи и внутрибрюшное давленіе у здороваго
человѣка.

ДИССЕРТАЦІЯ

НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ


ЛЕКАРЯ ВІКТОРА МАРТЫНОВИЧА ВОРОНИНА.

Цензорами диссертациі, по порученію конференціи, были: профессоръ
В. А. Манассеинъ и приватъ-доценты: В. И. Дроздовъ и В. А. Поповъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія П. Воицкой, Моховая улица, № 37.
1889.



Серія диссертаций, допущенныхъ къ защитѣ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ
Военно-Медицинской Академіи въ 1888—1889 академическомъ году.

№ 80.

МАТЕРІАЛЫ
КЪ ВОПРОСУ
О ВЛІЯНІИ
ВОСХОДЯЩЕЙ (ПОЧЕЧУЙНОЙ) ДУШИ

на чувство мѣста, силу верхнихъ и нижнихъ конечностей, исчезновеніе
отпечатковъ на кожѣ, рефлексы, кровяное давленіе, кривую пульса,
температуру тѣла и кожи и внутрибрюшное давленіе у здороваго
человѣка.


ДИССЕРТАЦІЯ
НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ
ВИКТОРА МАРТЫНОВИЧА ВЗРОНИНА.

Цензорами диссертации, по порученію конференціи, были: профессоръ
В. А. Манассеинъ и приватъ-доценты: В. И. Дроздовъ и С. А. Поповъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія П. Воицкой, Моховая улица, № 37.
1889.



Докторскую диссертацию лекаря Виктора Воронина подъ заглавіемъ «Матеріалы къ вопросу о вліяніи восходящей (почечуйной) души на чувство мьста, силу верхнихъ и нижнихъ конечностей, исчезновеніе отпечатковъ на кожу, рефлексы, кровяное давленіе, кривую пульса, температуру тыла и кожи, и внутрибрюшное давленіе у здороваго человека», Печатать разрѣшается съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи оной было представлено въ Конференцію Императорской Военно-Медицинской Академіи 500 экземпляровъ ея. С.-Петербургъ, апрѣля 22 дня 1889 года.

Ученый Секретарь В. Пашутинъ.

I

Мы не станемъ утомлять читателя ни историческими справками о древности гидротерапіи, ни приведеніемъ доказательствъ правъ ея на существованіе, какъ метода леченія: въ руководствахъ L. Fleury ¹⁾, W. Winternitz'a ² и ³⁾, P. Delmas ⁴⁾, E. Duval'a ⁵⁾, а также во многихъ русскихъ статьяхъ по гидротерапіи (назовемъ напр: Вороновскаго ⁶⁾, Гонадзе и Вацадзе ⁷⁾, Кручекъ—Голубова ⁸⁾, Благовѣщенскаго ⁹⁾), интересующіеся найдутъ и то и другое. Мы обратимъ вниманіе только на слѣдующее: водолечебные приемы, при отсутствіи эксплуатаціи со стороны владѣльцевъ водолечебницъ, представляются, пожалуй, болѣе доступными для массы больныхъ, чѣмъ другіе лечебные методы или лекарства, а подчасъ и незамѣтными по своему дѣйствию. Хорошей иллюстраціей для только что сказаннаго можетъ служить, такъ называемый, согрѣвающий компрессъ. Всѣмъ извѣстно незначительная стоимость его ^{*}), а также и блистательное дѣйствіе его напр. въ болѣзняхъ желудка и кишокъ (острый катарръ), мочевого пузыря, матки и ея придатковъ (хроническіе метриты и параметриты), миндалинъ и пр.

Но какъ бы ни было блистательно терапевтическое дѣйствіе согрѣвающего компресса, несомнѣнно и то, что кругъ дѣйствія его ограниченъ, другими словами, въ однихъ случаяхъ онъ полезенъ (напр.

^{*}) Почти тоже можно сказать о влажныхъ пеленаціяхъ, обтираніяхъ, обливаніяхъ и даже нисходящихъ душахъ и пр.

при *eczema chron.*), въ другихъ бесполезенъ (при *psoriasis*) и въ третьихъ, быть можетъ, вреденъ (при послѣродовыхъ маточныхъ кровотеченияхъ).

Отсюда является необходимость съ одной стороны въ клиническихъ наблюденіяхъ, съ другой въ изученіи вліянія различныхъ средствъ на здоровыхъ людяхъ, такъ какъ наблюдаемый въ клиникѣ эффектъ средства, очевидно, зависитъ отъ дѣйствія этого средства на отправления организма и такъ какъ этимъ путемъ только и можно избѣжать непріятныхъ побочныхъ и прямыхъ явленій, наблюдаемыхъ иногда при примѣненіи вновь вводимыхъ въ терапію средствъ, или даже старыхъ; напомнимъ исторію почти забытыхъ каиринъ (Мороховецъ и др. ⁴²) и кровопусканія (Ю. Т. Чудновскій) ⁴³). Изученія дѣйствія какого либо лечебнаго средства можетъ повести и къ новому примѣненію его. Итакъ всякое лечебное средство подлежитъ изученію, во первыхъ, въ томъ, дѣйствуетъ ли оно на организмъ и, во вторыхъ, какъ дѣйствуетъ.

Для насъ такое изученіе имѣетъ еще большее значеніе въ виду проскальзывающей у гидротерапевтовъ мысли, что различные водолечебные приемы не представляютъ чего либо специфическаго по достигаемому ими эффекту, но что одинаковый результатъ можетъ быть достигнутъ разными водолечебными приемами, т. е., напр. ванна температурою α градусовъ продолжительностью β минутъ равно по дѣйствию пеленанію температурою α' градусовъ, продолжительностью β' минутъ или душѣ температурою α'' градусовъ продолжительностью β'' минутъ и пр. (См. W. Winternitz ²) часть III. стр. 353, у Delemas ⁴) цитату изъ M. Scheufl'a стр. IX). Веѣмъ понятны послѣдствія такого равенства. Этихъ и нижеизложенныхъ причинъ было достаточно для того, чтобы мы принялись изслѣдовать вліяніе почечуиной души въ шкату и сидячей продолжительностью $1\frac{1}{2}$ и 3 минуты на температуру въ кишкѣ, подѣ мышкой и на кожѣ нижней части живота, ягодицъ и задней поверхности бедра, на кривую пульса, кровяное давленіе, мышечную силу верхнихъ и нижнихъ конечностей, чувство мѣста орошаемыхъ частей (и нижней части живота), исчезновеніе отпечатковъ на кожѣ, внутрибрюшное давленіе и рефлексы

(голенностопный, коленный, кремастера, брюшной и ягодичный) у здорового человека. Желание обосновывать выводы на большемъ числѣ однородныхъ наблюдений заставило насъ остановиться на температурѣ души 18—19° и 12—13° R (22,5—23,7° и 15—16,2° C.) *).

II.

Души, какъ лечебный приемъ, были известны ужь грекамъ и римлянамъ [по Winternitz'у ²)].

Что же касается въ частности восходящей души (*douche ascendante*, *douche anale*, *douche rectale*, *douche perinéale*, *pluie rectale* (?) французскихъ гидротерапевтовъ, *perinaeal-haemorrhoidal Douchen* — нѣмецкихъ), то, по Scouttetten'у, ^{**}) Barzizzi (1450 г.) впервые совѣтуетъ ихъ между прочими водолечебными приемами при страданіяхъ матки; далѣе мы не встрѣчаемъ указаній, кто и когда ихъ употреблялъ; у Priesnitz'а ихъ повидимому ^{***}) не было, а Fleury указывая (стр. 221), что мѣстные души на область печени, селезенки, нижней части живота впервые предложены имъ, категорически слѣдовательно утверждаетъ о названныхъ душахъ, какъ имъ введенныхъ въ терапію, о восходящей же говорить (стр. 213), что аппаратъ для нея устроенъ по его указаніямъ и какъ бы до него не существовалъ. Однако въ болѣе позднее время Tartivel (⁴⁵ стр. 438) беретъ на себя обязанность возстановить, что заслуга введенія въ терапію перечисленныхъ мѣстныхъ душъ и почечуйной, принадлежитъ Fleury.

*) Обстоятельства, о которыхъ говорить здѣсь не мѣсто, не позволили намъ произвести полного изслѣдованія вліянія души 12—13°R продолжительностью 1½ минуты на температуру тѣла и кожи и кровяное давленіе, но образчики возможнаго дѣйствія ихъ приведены въ особой таблицѣ № 64.

***) по Duval'ю (l. c. стр. 13). Изъ приведеннаго отрывка у Duval'я не видно, что это были за «восходящія» души; дѣло въ томъ, что одни влагалницы и души называютъ прямо восходящими (46), другіе *douche ascendante* (*intestinale*) называютъ орошеніе recti при посредствѣ вставляемой въ нее канюли (47), третьи этотъ приемъ называютъ *douche rectale* или просто *douche ascendante* (45).

***)/ Fleury (l. c. стр. 75).

Однимъ словомъ имя введеннаго этотъ пріемъ водолеченія остается неизвѣстнымъ.

Какъ бы то ни было приспособленія для этихъ душъ существуютъ въ водолечебницахъ и предлагаются эти души: Fleury при леченіи привычныхъ запоровъ (1. с. стр. 292), гастральгій при смѣщеніяхъ матки или смѣятеченіи, (стр. 735) хроническихъ воспалительныхъ процессовъ матки, (стр. 944), опущеній и наклоненій ея впередъ (стр. 986, 989, 996) и кромѣ того служатъ по его заявленію при леченіи различныхъ болѣзней предстательной железы, шейки мочевого пузыря и заднепроходнаго отверстія (стр. 213); Delmas — при леченіи острыхъ страданій мочеполовыхъ органовъ у мужчинъ, какъ средство второстепенное (1. с. стр. 174), кишечныхъ коликъ (стр. 500), хронической дизентеріи, запоровъ (стр. 502), запоровъ при отравленіи металлами (мѣдь, свинецъ, ртуть стр. 570), катарра и спазма шейки мочевого пузыря (стр. 509)], гипертрофіи предстательной железы (douche péginéale), смѣятеченія, полового безсилія (стр. 513, 515), приливовъ (хроническіе воспалительные процессы?) къ маткѣ (стр. 527). Tartivel'емъ (1. с. стр. 456) при геморройныхъ шишкахъ (но не при вздутыхъ и болѣзненныхъ, гдѣ показуется сидячая ванна (?) — bain de siège à eau dormante), простатопреѣ; Duval'емъ при запорахъ (1. с. стр. 401), половомъ безсиліи (стр. 600), смѣятеченіи (стр. 727). У Winternitz'a ¹ и ²) мы специальныхъ показаній для этихъ душъ не находимъ, большинство же перечисленныхъ болѣзней, какъ и нѣкоторыя другія, лечатся имъ сидячей (поясной — Sitzbad) ванной.

Въ подтвержденіе своихъ назначеній, Fleury, Delmas и Duval приводятъ описаніе излеченныхъ случаевъ, но останавливаться на нихъ мы не будемъ, отчасти оттого, что они собраны во времена нѣсколько отдаленныя, отчасти же въ виду заявленія Duval'я (1. с. стр. 855), онъ между прочимъ говоритъ: «если намъ дадутъ по 100 случаевъ смѣятеченія, диспенсіи и маляріи, мы можемъ сказать, что вылечимъ изъ нихъ большое число, можетъ быть всѣхъ, но мы не можемъ сказать какіе именно (въ первомъ случаѣ).»

Надо впрочемъ прибавить, что одновременно съ почечуйными душами употребляются при леченіи перечисленныхъ болѣзней и другіе

водолечебные приемы: общія души, сидячія ванны простыя и съ проточной водой, погруженія въ бассейнъ (piscine), рукавныя души и пр. Кромѣ того больные измѣняютъ образъ жизни согласно указаніямъ врача. Температура душъ $10-12^{\circ}\text{C}$. и ниже (Tortivel l. c.).

Fleury, подвергшійся жестокой критикѣ со стороны Duval'я (l. c.) почти за каждую написанную имъ строчку, пытается объяснить дѣйствіе почечуйной души при нѣкоторыхъ болѣзняхъ. Такъ исцѣленіе запоровъ Fleury приписываетъ возбуждающему дѣйствию холодной воды на кишечную мускулатуру, устраняющему атонію (l. c. стр. 292), излеченіе гастральгій — устраненіемъ смѣщеній матки или сѣмятеченія, въ другихъ случаяхъ онъ приписываетъ имъ разрѣшающее, (l. c. стр. 309) отвлекающее или укрѣпляющее дѣйствіе. Другіе авторы не даютъ и этого, а объясненіе дѣйствія почечуйныхъ душъ надо вывести изъ того, что приписывается общимъ душамъ: дѣйствіе возбуждающее, укрѣпляющее, успокоивающее, разрѣшающее и пр. напр. Delmas (l. c. стр. 123).

Мы тщетно искали того, что извѣстно о физиологическомъ дѣйствіи изучаемой души. Но такъ какъ почечуйная душа можетъ быть разсматриваема какъ часть общей души, или какъ аналогъ другихъ мѣстныхъ душъ (напр: шотландской), то мы въ небольшой таблицѣ сопоставимъ то, что извѣстно о вліяніи общихъ и мѣстной шотландской душъ на изучаемыя нами отравленія по изслѣдованіямъ Fleury Delmas, A. M. Могилянского ⁷⁾, Couette'a ¹⁵⁾, Горошко ¹²⁾, Гржибовскаго ¹³⁾, Вышегородскаго ¹⁴⁾, Гопадзе и Вацадзе (l. c.) и др. *), бѣльшею частью неоднократно цитированныхъ въ медицинской литературѣ. (См. стр. 8).

Кромѣ того по опытамъ Couette'a при холодныхъ душахъ передъ пониженіемъ температуры (во рту) замѣчается повышеніе ея [до $0,2^{\circ}\text{C}$ — это подтверждаетъ отчасти и Bottey ⁶⁾], а сила толчка воды (la percussion de l'eau) не играетъ роли при пониженіи температуры

*) Сочиненіе Johnson'a Н. упоминаемое Winternitz'омъ (2. ч. 2. стр. 167) намъ найти не удалось. Въ таблицу не входятъ положенія Winternitz'a, какъ слишкомъ общія. Фамиліи же авторовъ поставлены тамъ, гдѣ встрѣчаются разногласія.

При общихъ душахъ продолжительностью отъ 15-ти секундъ до 5-ти минутъ				При мѣстной шотландской душѣ продолжительностью отъ 1 до 3 минутъ. Температурою отъ +8 (10)° до +38 (35)°R и обратно.	
Отправленія.		безразличныхъ, температур. 26°R (33°С).	холодныхъ, температурою отъ +10° до +22°R.	горячихъ, температурою отъ 30° до 38°R.	
Пульсъ		неизмѣн. (Гржибовскій). учащается (Гопадзе). замедл. (Вышегородскій).	замедляется.	учащается.	замедляется.
Давленіе крови		повышается (Вышегородскій по Basch у и Гопадзе по кривой <i>Васаса</i>).	повышается.	повышается (Гопадзе по кривой пульса), пониж. (Вышегород. по Basch у).	повышается (по кривой пульса и аппарату Mosso).
Температура		зо рту	повышается. неизмѣняется.	понижается.	понижается. (въ кулакъ).
		подъ мышкой	неизмѣн. (Гржибовскій). повышается (Гопадзе). пониж. (Вышегородскій).	повышается.	мало измѣняется.
		прямой кишки	неизмѣняется.	понижается.	мало измѣняется.
		кожи	повышается.	понижается.	понижается.
Чувство мѣста			обостряется.	обостряется.	притупляется.
Мышечная сила		неизмѣняется.	повышается.	сначала не измѣняется, послѣ понижается.	—
Исчезновеніе кожныхъ отпечатковъ		—	—	—	ускоряется.
Кривая пульса		—	измѣняется (см. главу о кривой пульса).	измѣняется.	измѣняется.

т. е., погруженіе въ воду извѣстной температуры и душъ такой температуры одинаково понижаютъ температуру тѣла. Затѣмъ О. Pospischil¹⁶⁾ въ концѣ своей статьи ставитъ между прочимъ слѣдующія положенія:

П. 6. Теплая душъ, вызывая *cutis anserina*, можетъ уменьшить теплоотдачу до $38,5\%$.

П. 7. Влажнохолодное частичное обтираніе можетъ повысить теплоотдачу до 80% .

П. 8. Холодная душъ и послѣдующій покой вызываютъ послѣ преходящаго уменьшенія теплоотдачи увеличеніе ея на 23% .

П. 9. Холодная душъ съ послѣдующимъ движеніемъ повышаетъ теплоотдачу на $66,6\%$.

П. 10. Теплая душъ съ холодной вѣрообразной (шотландская)? и послѣдующій покой повышаетъ теплоотдачу на 16% .

И такъ въ общемъ изслѣдованія довольно согласны между собою и, не смотря на то, что опыты Fleury отвергаются Delmas, а Colette'омъ опыты Delmas, Duval'же относится скептически къ тѣмъ и другимъ, качества измѣненій, подмѣченные первыми двумя авторами (о пульсѣ, температурѣ тѣла, дыханіи, кривой пульса), остаются не опровергнутыми.

Тѣмъ не менѣе мы позволимъ себѣ (не для увеличенія своихъ заслугъ) подчеркнуть одинъ недостатокъ всѣхъ работъ (кроме развѣ О. Pospischil'я) перечисленныхъ выше — это отсутствіе строго контрольных опытовъ, они быть можетъ, уменьшили бы количество разногласій, видимыхъ въ таблицѣ, а съ другой показали бы болѣе точно эффектъ производимый только душами, а не душами ^{иначе} движеніе, обнаженіе, покой и пр.; въ дальнѣйшемъ изложеніи найдется достаточно подтвержденій для этой мысли.

III.

Для выполненія намѣченной задачи мы могли: 1) или изслѣдовать вліяніе душъ на каждое изъ выше перечисленныхъ отправленій отдѣльно, 2) или на нѣсколько отправленій вмѣстѣ, но такъ, чтобы изученіе

одного не мешало изученію другаго и 3) употребить и тотъ и другой путь, ибо если первый способъ представляетъ выгоду наибольшей чистоты опыта, то второй имѣетъ за себя совмѣстность явленій, а, можетъ быть, и болѣе пригоденъ для выясненія зависимости нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Volens-nolens намъ пришлось избрать по преимуществу второй путь, т. е., въ одномъ рядѣ опытовъ мы опредѣляли: 1) какъ скоро исчезаетъ отпечатокъ на кожѣ ягодицъ и заднебвнутренней поверхности бедра, 2) измѣненія въ чувствѣ мѣста, 3) силу верхнихъ и нижнихъ конечностей и 4) рефлексы (до души данныя отмѣчались въ такомъ порядкѣ, какъ выше написано, послѣ же души сначала отмѣчались рефлексы, затѣмъ накладывалась гирька для полученія отпечатка, далѣе опредѣлялось чувство мѣста и мышечная сила); въ другомъ рядѣ—мы опредѣляли температуру прямой кишки, подъ мышкой и кожи и кровяное давленіе; въ третьемъ внутрибрюшное давленіе и въ четвертомъ кривую пульса. Наблюденія производились *) надъ здоровыми служителями госпиталя, (съ ихъ, конечно, согласія) отправлявшими свои обязанности. Наблюдаемый субъектъ никакимъ предварительнымъ подготовленіемъ не подвергался; послѣ обычныхъ занятій онъ приходилъ въ назначенный часъ въ ванную комнату, гдѣ раздѣвался до рубахи и ложился въ требуемое положеніе на обыкновенную госпитальную кровать, стоявшую переднимъ концомъ у окна.

Послѣ того какъ опредѣлялись необходимыя данныя, наблюдаемый шелъ въ другую комнату къ душѣ, подвергался дѣйствію ея, затѣмъ шелъ обратно—осушивался самъ до суха простыней и опять ложился на кровать въ прежнее положеніе. Для первой серіи опытовъ наблюдаемый ложился на лѣвый бокъ; согнувъ правую ногу въ колѣнѣ и придвинувъ ее нѣсколько къ животу. Ноги отъ стопы до колѣнъ были прикрыты вдвое сложеннымъ шерстянымъ одѣяломъ. Для второй—онъ лежалъ на правомъ боку, нѣсколько откинувшись верхней частью туловища кзади, такъ что не сжималъ правой подкрыльцовой артеріи и свободно могъ протягивать руку для опредѣленія кровянаго давленія

*) въ гидротерапевтическомъ отдѣленіи клиническаго военнаго госпиталя.

въ лучевой артерій; прикрывался вдвое сложенной простыней. Положеніе наблюдаемаго въ третьей и четвертой серіяхъ опытовъ описаны особо. При контрольныхъ опытахъ, въ промежутокъ времени, соотвѣтствующій душѣ, подвергавшійся опыту медленно проходилъ въ ту комнату, гдѣ дѣлалась душъ и обратно.

Души примѣнялись въ двухъ видахъ. 1) Сидячая почечуиная душъ: наблюдаемый садился въ особую ванну, имѣвшую въ днѣ лейку съ выпуклою къ верху поверхностью, діаметръ этой лейки имѣлъ 9 сантиметровъ; отверстій въ лейкѣ около 70, расположенныхъ въ 4 круга. Отъ полукруга назначеннаго для сидѣнія лейка отстояла на 12 сантим., орошаемая части отъ лейки находились на нѣсколько меньшемъ или большемъ разстояніяхъ. Струйки воды имѣли расходящееся направленіе и достигали высоты 124 сантиметровъ отъ лейки, будучи предоставлены сами себѣ.

2) Почечуиная душъ въ шкапу: лейка, съ діаметромъ въ 14 сантиметровъ при 120 отверстіяхъ въ 6 кругахъ, направляла струю вертикально до высоты 115 сент. Она находилась въ шкапу для общей души и наблюдаемый становился надъ ней съ разведенными ногами и (при помощи рукъ) ягодицами. Отъ пола шкапа лейка отстояла книзу на 6 сантиметровъ; орошаемая части отъ лейки на разстояніи равномъ 6 сантиметрамъ + длина ногъ.

Температура душъ устанавливалась по вѣренному термометру. Она была $12-13^{\circ}\text{R}$ и $18-19^{\circ}\text{R}$. *) О продолжительности ихъ мы ужъ говорили. Продолжительность же опытовъ указано въ таблицахъ. Опыты начатые до 12 часовъ — опыты дообѣденные, опыты послѣ 12 часовъ — послѣобѣденные. Мы сдѣлали почти одинаковое число и тѣхъ и другихъ, но раздѣлили ихъ только тамъ, гдѣ можно было

*) $12-13^{\circ}\text{R}$ и $18-19^{\circ}\text{R}$ нужно понимать такъ, что температура воды, устанавливавшаяся на 18° или 12°R ., имѣла наклонность повышаться къ 19° и 13° , отсюда являлась необходимость уже во время души уменьшать притокъ теплой воды и тѣмъ не дать температурѣ воды подняться выше $13^{\circ}-19^{\circ}\text{R}$. Термометры вѣрялись въ физическомъ кабинетѣ Императорской Военно-Медицинской Академіи при любезныхъ указаніяхъ А. И. Лебедева.

ожидать разности въ результатахъ. Въ таблицахъ въ графѣ «время души» обозначено время о к о н ч а н і я души.

О субъективныхъ ощущеніяхъ мы можемъ сказать мало: наблюдаемые вообще относились безразлично къ нашимъ душамъ, изрѣдка выражая удовольствіе при душахъ $18-19^{\circ}\text{R}$ и жалуюсь только на холодъ при душахъ въ $12-13^{\circ}\text{R}$ какъ въ $1\frac{1}{2}$, такъ и въ 3 минуты продолжительностью. Мы лично при сидячихъ душахъ температурою $12-13^{\circ}\text{R}$ продолжительностью въ 3 минуты, кромѣ только что написаннаго испытывали ломоту въ промежности и яичкахъ и и нѣчто въ родѣ легкаго головокруженія. Въ таблицахъ кромѣ непосредственно къ изслѣдованію относящихся данныхъ, отмѣчены еще лѣта, ростъ, вѣсъ наблюдаемыхъ, а также температура внѣшняя по термометру у наружной рамы и температура ванной комнаты по термометру у окна, та и другая по R. Таблицы составлены такъ, что данныя опыта одной и той же температуры, продолжительности и души, стоящія подѣ извѣстнымъ N, соотвѣтствуетъ такому же N той таблицы серіи, гдѣ поставлена фамилія наблюдаемаго и слѣдовательно относятся къ нему. Такъ какъ большинство употребленныхъ мною методовъ общеизвѣстно, то въ дальнѣйшемъ изложеніи я ограничусь только самымъ необходимымъ. Этому же правилу я буду держаться въ приведеніи литературныхъ данныхъ.

IV.

Чувство мѣста.

Опредѣлялось по E. H. Weber'у ¹⁷⁾ циркулемъ съ черепаховыми ножками продольно оси тѣла въ трехъ отмѣченныхъ анилиновымъ карандашемъ мѣстахъ: 1) на лѣвой ягодицѣ *apud anum*; 2) на задне-внутренней поверхности бедра (вверху); 3) на кожѣ нижней части живота по срединной линіи ближе къ пупку. При этомъ: 1) ножки циркуля прикладывались одновременно, надавливались съ одинаковою (небольшою) силой [E. H. Weber, Czermak ¹⁸⁾], 2) избѣгалось растягиванія кожи (Czermak), 3) избѣгались излишнія прикоснове-

нія циркулемъ [A. W. Volkmann ¹⁸)], 4) ножки циркуля касались однородной кожи, 5) мы шли отъ малыхъ величинъ къ большимъ, т. е., раздвигали ножки циркуля, 6) въ таблицѣ вносились цифры послѣ провѣрки *).

Цифры въ таблицахъ обозначаютъ разстоянія ножекъ циркуля въ миллиметрахъ до души и въ началѣ перваго, втораго, третьяго и четвертаго $\frac{1}{2}$ часа послѣ души.

*) Методъ изслѣдованія подробно изложенъ въ русской литературѣ Стольниковымъ ²⁰).

Ч у в с т в о м ѣ с т а

Таблица № 1.

№ опыта.	Имя наблюдае- маго.	наблю- даемаго			Температура ван. комнаты.	Температура внѣшняя.	Мѣсяць и число.	Время начала опыта.	До перерыва.	Нижней		
		Лѣта	Ростъ	Вѣсъ						Послѣ перерыва		
										1-го	2-го	
										п о	л у	
									Р.	Р.		
1	Шишпаръ . . .	—	—	—	16	—2	10 нояб.	9 ч. 20'	—	41 40	—1 41	
2	Мануиловъ . . .	—	—	—	14	—0,5	10 »	12 ч. 27	—	51 51	0 51	
3	Алексѣевъ . . .	—	—	—	16	+0,75	11 »	12 ч. 30	—	54 54	0 54	
4	Шишпаръ . . .	—	—	—	17	+1	12 »	9 ч. 15	—	38 38	0 38	
5	Алексѣевъ . . .	—	—	—	15	+2	12 »	12 ч. 30	—	55 54	—1 55	
6	Григорьевъ . . .	—	—	—	14,5	—2,5	20 »	9 ч. 23	—	50 50	0 51	+
7	Панасовъ. . . .	—	—	—	14	+2	25 »	12 ч. 23	—	39 39	0 38	—
8	Тарасовъ. . . .	—	—	—	14	+1,5	26 »	12 ч. 30	—	38 38	0 37	—
9	Зуевъ	—	—	—	12	—17	12 дек.	9 ч. 29	—	47 47	0 46	—
10	Тарасовъ. . . .	—	—	—	16	—12	14 »	12 ч. 30	—	35 35	0 35	
11	Алексѣевъ . . .	—	—	—	15	—5,5	17 »	12 ч. 26	—	55 55	0 56	+
12	Александровъ . .	—	—	—	14	—1,25	18 »	12 ч. 23	—	42 43	+1 42	
13	Панасовъ. . . .	—	—	—	15	—10,5	21 »	9 ч. 20	—	35 35	0 35	
14	Алексѣевъ . . .	—	—	—	14	—5,5	22 »	9 ч. 30	—	55 58	+3 55	
15	Тарасовъ. . . .	—	—	—	13	—4	23 »	9 ч. 31	—	35 35	0 35	
	Въ среднемъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,13	—0,6	

Выводъ: При взятыхъ нами условіяхъ чувство мѣста въ областяхъ нижней част

няя часть живота) или третьяго $\frac{1}{2}$ часа наблюденія (бедро ягодицы).

Примѣчаніе: ростъ въ сантиметрахъ, вѣсъ килограммахъ.

Б О Б Л А С Т Я Х Ъ

При контрольных
опытахъ.

ти живота			Я г о д и ц ъ.								Задне-внутрен. пов. б.									
началѣ			До перерыва.	Послѣ перерыва въ началѣ								До перерыва.	Послѣ перерыва въ началѣ							
го	4-го	1-го		2-го	3-го	4-го	1-го	2-го	3-го	4-го										
с а.				п о л у ч а с а.									п о л у ч а с а.							
Р.		Р.		Р.	Р.		Р.		Р.		Р.		Р.	Р.		Р.				
20	41	0	18 18	0 18	0 18	0 18	0 18	0	35 35	0 36	+1	37	+2	37	+2					
+1	53	+2	32 32	0 32	0 33	+1 32	0	51 51	0 52	+1	53	+2	53	+2						
0	54	0	34 34	0 34	0 34	0 34	0	53 53	0 53	0	53	0	53	0						
0	38	0	19 19	0 19	0 19	0 20	0	38 39	+1 39	+1	39	+1	39	+1						
0	55	0	34 34	0 35	+1 34	0 35	+1	52 52	0 52	0	52	0	52	0						
+2	58	+8	32 32	0 32	0 35	+3 35	+3	46 47	+1 46	0	50	+4	54	+8						
0	38	-1	27 28	+1 30	+3 27	0 27	0	41 41	0 42	+1	41	0	41	0						
0	38	0	32 33	+1 31	-1 31	-1 32	0	38 38	0 39	+1	38	-0	38	0						
-1	47	0	29 28	-1 28	-1 28	-1 29	0	48 46	-2 47	-1	44	4	46	-2						
0	35	0	28 28	0 28	0 28	0 27	-1	35 35	0 35	0	35	+1	35	0						
0	55	0	35 35	0 35	0 36	+1 36	+1	51 51	0 52	+1	52	0	51	0						
0	42	0	24 23	-1 25	+2 24	0 24	0	43 43	0 43	0	43	0	43	0						
0	35	0	28 28	0 28	0 28	0 28	0	38 38	0 38	0	38	0	38	0						
0	56	+1	33 33	0 34	+1 33	0 34	+1	51 51	0 51	0	51	0	51	0						
0	35	0	30 30	0 30	0 30	0 30	0	34 34	0 34	0	34	0	34	0						
-0,13	—	+0,66	—	0	+0,33	+0,2	+0,4	—	0	+0,33	+0,4	+0,7								

ота, ягодицъ и задне-внутренней поверхности бедра притуплялось со стороны (ниж

Ч у в с т в о м ѣ с т

Таблица № 2.

№ опыта.	Имя наблюдаемого.	наблюдае- мого.			Температ. в. в. в. по R.	Температ. вып. н. по R.	Мѣсяцъ, число опыта.	Время начала опыта.	Время души.	Нижней		
		Лѣта	Ростъ	Вѣсъ						До души.	Послѣд.	
											1-го	
											п	о
											Р.	
1	М. Алексѣевъ . .	23	168	68,7	12,5	+7	2 Окт.	9 ч. 25'	9 ч. 55'	48	44	—4
2	Е. Лаврентьевъ . .	22	160	56,0	13	+8	2 "	12 ч. 25'	1 ч.	45	43	—2
3	Алексѣевъ . .	—	—	—	11,5	+4,5	3 "	9 ч. 20'	10 ч. 5'	58	55	—3
4	Алексѣевъ . .	—	—	—	11,75	+4,5	4 "	9 ч. 30'	10 ч. 10'	60	50	—10
5	Лаврентьевъ . .	—	—	—	11,5	+4,5	4 "	12 ч. 25'	1 ч. 5'	45	43	—2
6	М. Мануиловъ . .	24	165	62,0	12	+2	5 "	9 ч. 28'	10 ч. 5'	50	46	—4
7	Ф. Амбросовъ . .	24	159	58,5	11	+3	5 "	12 ч. 20'	1 ч.	44	41	—3
8	М. Мануиловъ . .	—	—	—	11	+1	6 "	9 ч. 15'	9 ч. 50'	47	45	—2
9	К. Григорьевъ . .	23	166	54,0	11	+2	6 "	12 ч. 25'	1 ч. 10'	56	46	—10
10	Алексѣевъ . .	—	—	—	13,5	+1	7 "	9 ч. 15'	9 ч. 55'	54	44	—10
11	Мануиловъ . .	—	—	—	14	+0,5	8 "	9 ч. 20'	10 ч.	52	49	—3
12	Амбросовъ *) . .	—	—	—	13	+1	8 "	12 ч. 30'	1 ч. 5'	45	43	—2
13	Алексѣевъ *). . .	—	—	—	13	+3	9 "	9 ч. 30'	10 ч. 10'	52	46	—6
14	Лаврентьевъ . .	—	—	—	11	+3	9 "	12 ч. 25'	1 ч.	44	39	—3
15	Мануиловъ. . .	—	—	—	11,5	+1,5	10 "	9 ч. 25'	10 ч. 5'	48	46	—2
	Въ среднемъ . .	—	—	—	—	—	—	—	=	—	—	—4,4

*) Темпер. души 18°R.

Выводъ: При сидячей почечуйн. душѣ температур. въ 18—19°R прод. 1½ мин. ч. ней части живота на 4,4 мм., бедра 3,9 мм. и ягодиць 5,2 мм. Это обостреніе исчезае

В О Б Л А С Т Я Х Ъ:

При сидячей почечуной
душѣ температурою въ
18—19°R прод. 1½ мин.

Внѣ живота.				Я г о д н и ц ъ.				Задне-внутренней поверхности бедра.					
Внѣ въ началѣ				До души.	Послѣ души въ началѣ				До души.	Послѣ души въ началѣ			
ч а с а.					п о л у ч а с а.					п о л у ч а с а.			
3-го		4-го			1-го		2-го			3-го		4-го	
Р.		Р.			Р.		Р.			Р.		Р.	
47	—1 48			0 29 27	—2 28	—1 29	0 30	+1 48 42	—6 47	—1 48		0 48 0	
45	0 45			0 22 17	—5 17	—5 20	—2 32	0 45 36	—9 40	—5 43		—3 46 0	
57	—1 58			0 34 32	—2 33	—1 34	0 34	0 59 50	—9 56	—3 57		—2 59 0	
59	—1 59	—1 35 32		—3 34		0 34	0 35	+1 59 50	—9 56	—3 59		0 59 0	
45	0 45			0 21 19	—2 20	—1 21	0 21	0 45 42	—3 42	—3 45		0 45 0	
49	—1 50			0 41 34	—7 39	—2 39	—2 41	0 50 44	—6 45	—5 48		—2 50 0	
43	—1 45	+1 21 19		—2 20	—1 21	0 21		0 45 39	—6 43	—2 45		0 45 0	
46	—1 47			0 31 22	—9 24	—7 27	—4 31	0 44 42	—2 43	—1 44		0 44 0	
52	—4 57	+1 31 27		—4 28	—3 31	0 31		0 55 52	—3 52	—3 53		—2 55 0	
53	—1 55	+1 34 27		—7 28	—6 30	—4 31		—3 50 46	—4 47	—3 49		—1 50 0	
52	0 52			0 36 30	—6 31	—5 34	—2 36	0 57 50	—7 51	—6 53		—4 57 0	
46	+1 45			0 23 21	—2 22	—1 23	0 23	0 47 42	—5 45	—2 45		—2 47 0	
49	—3 52			0 30 27	—3 29	—1 29	—1 31	+1 51 46	—5 47	—4 48		—3 51 0	
4	0 44			0 20 18	—2 19	—1 20	0 20	0 43 40	—3 41	—2 43		0 43 0	
48	0 48			0 28 25	—3 27	—1 27	—1 29	+1 47 45	—2 47	0 47		0 47 0	
2,5	—0,8	+0,1	—	—	—3,9	—2,4	—1	+0,06	—	—5,2	—2,8	—1,3	

Мѣсто обостряется непосредственно послѣ души въ среднемъ въ областяхъ: ниж-
нему началу 4 получаса послѣ души.

Ч У В С Т В О М

Таблица № 3.

№ опыта.	Имя наблюдае- маго.	наблюдае- маго.			Темпер. ванной к. по R°.	Темпер. вѣтшняя по R°.	о п ы т а.				Время души.	Нижней ча			
		Лѣта	Ростъ	Вѣсъ			Мѣсяцъ, число.	Время на- чала.	До души.	П о с л					
										1-го		2-го			
													п о л		
1	Григорьевъ. . .	—	—	—	12	+1	10	Окт.	12 ч. 39'	1 ч. 5'	51 50	—1 50	—		
2	Григорьевъ. . .	—	—	—	12	+1	11	"	9 ч. 29	10 ч.	53 49	—4 53	—		
3	Лаврентьевъ . .	—	—	—	10,5	+1,5	11	"	12 ч 17	1 ч.	39 23	—16 37	—		
4	Мануиловъ . . .	—	—	—	12	0	12	"	9 ч. 17	10 ч. 5	52 53	+1 52	—		
5	Алексѣевъ. . .	—	—	—	12,2	+3 5	13	"	9 ч. 23	10 ч 3	52 49	—3 52	—		
6	Мануиловъ. . .	—	—	—	12,0	+5	13	"	12 ч. 27	1 ч. 5	48 47	—1 48	—		
7	Алексѣевъ . . .	—	—	—	12,2	+1	14	"	12 ч. 23	12 ч. 58	50 48	—2 50	—		
8	Мануиловъ. . .	—	—	—	14,5	—2,5	17	"	9 ч. 25	10 ч. 5	49 49	0 48	—		
9	Д. Шишпаръ . 27	159	52,2	14	+0,5	17	"	12 ч 24	1 ч. 3	41 38	—3 40	—	—		
10	Шишпаръ . . .	—	—	—	13,75	+1,5	18	"	9 ч. 22	10 ч. 7	45 44	—1 45	—		
11	Мануиловъ. . .	—	—	—	12,75	+1	18	"	12 ч. 28	1 ч 8	45 43	—2 44	—		
12	Алексѣевъ . . .	—	—	—	13,75	—1,5	19	"	12 ч 28	1 ч. 6	53 52	—1 52	—		
13	Григорьевъ. . .	—	—	—	13,5	—4,5	20	"	9 ч. 30	10 ч. 15	53 52	—2 53	—		
14	Григорьевъ. . .	—	—	—	14	—2,5	21	"	9 ч. 30	10 ч 9	52 51	—1 53	—		
15	Шишпаръ. . .	—	—	—	12 75	—1	21	"	12 ч. 30	12 ч. 50	47 42	—5 45	—		
	Въ среднемъ . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—2,7	—5		

Выводъ: При сидячей почечуиной душѣ температурою 18—19° R. продолжительностью
 нижней части живота на 2,7 мм., ягодицъ 2 2 мм., бедра 2,7 мм., это обостреніе исчезаетъ.
 Примѣчаніе: въ опытахъ 1-мъ, 3-мъ, 7-мъ, 9-мъ, 11-мъ, 13-мъ, 15-мъ температур

ТА ВЪ ОБЛАСТЯХЪ:

При сидячей потечуной
душѣ температурою въ
18—19° въ прод. 3 мин.

и живота.			Я г о д и ц ъ.								Задне-внутр. пов. бедра.									
и въ началѣ			До души.	Послѣ души въ началѣ								До души.	Послѣ души въ началѣ							
го	4-го	ч а с а.		1-го	2-го	3-го	4-го	получаса.	1-го	2-го	3-го		4-го	получаса.						
															Р.	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.
Р.	Р.			Р.	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.		Р.	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.
-1	51	0	29 25	-4	28	-1	28	-1	29	0	50 45	-5	47	-3	49	-1	50	0		
-1	53	0	30 24	-6	25	-5	27	-3	30	0	50 44	-6	47	-3	50	0	51	+1		
-2	33	0	21 16	-5	17	-4	18	-3	21	0	48 45	-3	47	-1	47	-1	48	0		
0	50	-2	36 33	-3	32	-4	34	-2	36	0	51 49	-2	50	-1	50	-1	50	-1		
0	52	0	32 32	0	31	-1	32	0	32	0	54 51	-3	50	-4	53	-1	53	-1		
0	49	+1	30 26	-4	28	-2	30	0	30	0	44 42	-2	44	0	44	0	44	0		
0	50	0	31 31	0	31	0	31	0	31	0	48 48	0	47	-1	48	0	48	0		
+1	50	+1	31 30	-1	31	0	31	0	31	0	45 42	-3	43	-2	45	0	45	0		
0	41	0	23 19	-4	21	-2	21	-2	20	-1	41 40	-1	41	0	41	0	41	0		
0	45	0	24 23	-1	24	0	24	0	23	-1	45 44	-1	45	0	45	0	45	0		
0	45	0	31 31	0	31	0	31	0	31	0	42 38	-4	41	-1	42	0	42	0		
0	54	+1	33 33	0	33	0	33	0	33	0	53 48	-5	48	-5	52	-1	53	0		
0	53	0	35 33	-2	33	-2	33	-2	35	0	52 52	-0	52	0	52	0	52	0		
0	52	0	33 30	-3	32	-1	32	-1	33	0	52 47	-5	49	-3	51	-1	52	0		
-1	47	0	25 25	0	24	-1	25	0	25	0	46 43	-3	45	-1	42	-4	46	0		
-0,26	-	+0,06	-	-	-2,2	-	-1,5	-	-0,9	-	-0,06	-	-	-2,7	-	-1,6	-	-0,6	-	

м. чув. тво мѣста обостряется непосредственно послѣ души въ среднихъ въ областяхъ:
сепенно къ началу 4 получаса послѣ души.
у 18°R.

Ч у в с т в о м Ъ с т а

Таблица № 4.

№№ опыта.	Имя наблюдаемого	наблюдае маго:			Температ. ванной комнаты по R.	Температ. внешней по R.	Месяцъ и число опыта.	Время начала опыта.	Время души.	Нижней		
		Лѣта	Ростъ	Вѣсъ						До души.	Послѣ	
											1-го	п о
1	Алексѣевъ . .	—	—	—	14	— 4	22 окт.	9 ч. 25'	10 ч. 5'	52 50	— 2	
2	Мануиловъ . .	—	—	—	12,5	— 2	22 "	12 25	1 5	47 47	0	
3	Шишаръ . .	—	—	—	12,75	— 2,5	23 "	12 23	9 55	38 35	— 3	
4	В. Матвѣевъ .	23	168	60,0	14	— 3	23 "	12 30	1 3	54 50	— 4	
5	Алексѣевъ . .	—	—	—	14,5	— 3,5	24 "	9 25	10 1	57 55	— 2	
6	Григорьевъ . .	—	—	—	13	— 3	24 "	12 30	1 4	56 56	0	
7	Шишаръ . .	—	—	—	14	— 0,5	25 "	12 35	1 8	41 37	— 4	
8	Матвѣевъ . .	—	—	—	15	— 1,5	26 "	9 20	10 4	47 42	— 5	
9	Мануиловъ . .	—	—	—	13	— 1,5	26 "	12 25	1 5	47 46	— 1	
10	Алексѣевъ . .	—	—	—	15,5	0	27 "	9 20	9 57	58 56	— 2	
11	Григорьевъ . .	—	—	—	14,75	— 0,5	27 "	12 26	1 —	56 43	— 13	
12	Мануиловъ . .	—	—	—	16	— 2,75	28 "	9 25	10 10	50 50	0	
13	Шишаръ . .	—	—	—	14	— 2	28 "	12 30	1 3	40 38	— 2	
14	Григорьевъ . .	—	—	—	13,75	— 2,5	29 "	9 25	9 59	47 47	0	
15	Матвѣевъ . .	—	—	—	13,75	— 1,5	29 "	12 30	1 4	46 42	— 4	
	Въ среднемъ .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 2,7	

Выводъ: При почечуйной душѣ въ шкалу температур. 18—19°R прод. 1½ минутней части живота на 2,7 мм., ягодицъ на 4,2 мм. и бедра на 4,7 мм.; это обострен

В О Б Л А С Т Я Х Ъ:

При почечуивной душѣ въ шкапу температурою въ 18—19°R прод. 1½ мин.

В живота.				Я г о д и ц ъ.								Задневнутренней поверхности бедра.									
Въ началѣ				До души.	Послѣ души въ началѣ								До души.	Послѣ души въ началѣ							
у ч а с а.					1-го				2-го					3-го				4-го			
П. Р.					П. Р.				П. Р.					П. Р.				П. Р.			
П. Р.					П. Р.				П. Р.					П. Р.				П. Р.			
50	-1	52	0	32	28	-4	32	0	52	0	32	0	50	47	-3	47	-3	49	-1	50	0
48	+1	50	+3	31	30	-1	30	-1	31	0	31	0	47	45	-2	49	+2	49	+2	49	+2
37	-1	38	0	22	19	-2	20	-2	21	-1	22	0	38	35	-3	35	-3	38	0	38	0
53	-1	54	0	36	23	-13	25	-11	31	-5	36	0	55	48	-7	51	-4	52	-3	55	0
57	0	57	0	33	29	-4	31	-2	32	-2	33	0	59	54	-5	55	-4	56	-3	59	0
55	0	56	0	31	29	-2	29	-2	30	-1	31	0	46	42	-4	44	-2	45	-1	46	0
40	-1	41	0	21	19	-2	19	-2	20	-1	21	0	40	35	-5	36	-4	39	-1	40	0
45	-2	47	0	33	23	-10	24	-9	27	-6	33	0	49	42	-7	44	-5	47	-2	49	0
47	0	48	+1	29	23	-6	27	-2	28	-1	29	0	49	40	-9	43	-6	46	-3	49	0
58	0	59	+1	32	29	-3	29	-3	31	-1	32	0	59	50	-9	56	-3	58	-1	59	0
57	+1	56	0	31	30	-1	28	-3	31	0	31	0	47	43	-6	43	-4	47	0	47	0
50	0	50	0	29	25	-4	26	-3	29	0	29	0	54	51	-2	52	-2	54	0	54	0
39	-1	40	0	24	20	-4	22	-2	23	-1	24	0	43	39	-4	39	-4	41	-2	43	0
47	0	47	0	31	28	-3	31	0	31	0	31	0	49	47	-2	48	-1	48	-1	49	0
46	0	46	0	28	23	-5	26	-2	28	0	28	0	47	44	-3	45	-2	46	-1	47	0
1,	-0,3	+0,3	-	-	-4,2	-	-2,9	-	-1,3	-	0	-	-	-4,7	-	-3	-	-1,1	-	+0,1	-

Въ мѣста непосредственно послѣ души обостряется въ среднемъ въ областяхъ нижне-послѣднихъ исчезаетъ къ началу 4 получаса послѣ души.

Ч У В С Т В О М Ъ С Т

Таблица № 5.

№ опыта.	Имя наблюдае- маго.	наблю- дасмаго.			Температура ван- ной по К°.	Температ. внѣш- ная по К.	Опыта.		Время окончан. души.	Нижней			
		Лѣта	Ростъ	Вѣсъ въ килогр.			Мѣсяцъ, число.	Время на- чало.		До души.	Послѣ ду		П о л
											1 го	2-	
1	Мануиловъ .	—	—	—	14,2	—0,5	30 октяб.	9 ч. 30'	10 ч. 6"	58 56	—2 57		
2	Шишпаръ. .	—	—	—	13	—3	31 »	9 ч. 20	9 ч. 57	41 38	—3 38		
3	Алексѣевъ .	—	—	—	15,75	—1,5	31 »	12 ч. 25	1 ч. 7	57 57	0 57		
4	Матвѣевъ. .	—	—	—	16	—1,75	1 нояб.	9 ч. 35	10 ч. 8	47 12	—5 46		
5	Мануиловъ *)	—	—	—	14,5	—1,25	2 »	9 ч. 30	10 ч. 9	53 53	0 53		
6	Шишпаръ. .	—	—	—	14	—0,5	2 »	12 ч. 15	12 ч. 55	39 37	—2 37		
7	Григорьевъ .	—	—	—	14,75	+1,5	3 »	9 ч. 20	9 ч. 59	57 57	0 57		
8	Матвѣевъ. .	—	—	—	14	+1	3 »	12 ч. 30	1 ч. 5	48 42	—6 42		
9	Шишпаръ. **)	—	—	—	15,25	—3	4 »	9 ч. 25	10 ч. 3	38 37	—1 36		
10	Алексѣевъ .	—	—	—	16	—4	5 »	9 ч. 25	10 ч. 5	52 49	—3 50		
11	Мануиловъ .	—	—	—	14,5	+4,2	5 »	12 ч. 30	1 ч. 8	52 50	—2 52		
12	Григорьевъ .	—	—	—	13,5	+1,2	7 »	9 ч. 25	10 ч. 2	55 53	—2 55		
13	Шишпаръ. .	—	—	—	14	+4	8 »	12 ч. 23	1 ч. 2	39 38	—1 37		
14	Алексѣевъ .	—	—	—	16	0	9 »	9 ч. 20	10 ч. 2	51 51	0 51		
15	Григорьевъ .	—	—	—	15	0	9 »	12 ч. 31	1 ч. 6	55 53	—2 54		
	Въ среднемъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—1,9		

Выводъ: При плечевой душѣ въ шкапу температурою 18—19°R прод 3 мин. ч. на —1,9 мм., ягодичъ на 1,8 мм., задне-внутренней пов. бедра на 2,9; мм.; это обсе

*) Прерванная душъ, еще двѣ прерванныхъ мало отличаются.

ь о б л а с т я х ъ:

При почечуйной душѣ
въ шкапу температурою
18°—19° R прод. 3'

ти живота			Я г о д и ц ъ.								Задне внутрен. пов. б.										
началь			До души.	Послѣ души въ началѣ								До души.	Послѣ души въ началѣ								
го	4 го	1-го		2-го	3-го	4-го	1-го	2 го	3-го	4-го											
с а.				п о л у ч а с а.									п о л у ч а с а.								
Р.		Р.		Р.		Р.		Р.		Р.	Р.			Р.		Р.		Р.			
7	-1	58	0	30	28	-2	29	-1	29	-1	29	-1	57	54	-3	55	-2	57	0	57	0
6	-1	40	-1	22	20	2	21	-1	21	-1	22	0	41	40	-1	40	-1	41	0	41	0
7	0	57	0	35	33	-2	34	-1	34	-1	35	0	50	47	-3	48	-2	50	0	50	0
7	0	47	0	27	26	-1	27	0	27	0	27	0	47	44	-3	46	-1	47	0	47	0
3	0	54	+1	35	33	-2	33	-2	34	-1	35	0	54	49	-5	50	-4	53	-1	53	-1
7	-2	39	0	20	19	-1	20	0	20	0	20	0	38	34	-4	35	-3	36	-2	38	0
7	0	57	0	35	33	-2	33	-2	35	0	35	0	54	52	-2	54	0	54	0	54	0
5	-3	48	0	29	27	-2	28	-1	29	0	29	0	49	46	-3	48	-1	49	0	49	0
3	0	38	0	22	21	-1	21	-1	22	0	22	0	38	36	-2	36	-2	38	0	38	0
1	-1	52	0	31	30	-1	30	-1	30	-1	31	0	49	45	-4	47	-2	48	-1	49	0
2	0	52	0	31	29	-2	29	-2	30	-1	31	0	57	52	-5	54	-3	55	-2	59	+2
5	0	55	0	31	29	-2	31	0	31	0	31	0	50	48	-2	50	0	49	-1	50	0
3	-1	39	0	20	19	-1	19	-1	20	0	20	0	38	37	-1	38	0	38	0	38	0
1	0	51	0	35	30	-5	33	-2	34	-1	35	0	51	47	-4	49	-2	49	-2	50	1
5	0	55	0	28	26	-2	28	0	28	0	29	+1	49	47	-2	48	0	49	0	48	-1
	-0,6	—	0	—	—	-1,8	—	-1	—	-0,5	—	0	—	—	-2,9	—	-1,6	—	-0,6	—	-0,1

т о б о с т р я е т с я непосредственно послѣ души въ среднемъ въ области: н. ч. живота
е н н о и с ч е з а е т ъ къ началу 4 получаса послѣ души.
Erect. penis.

Ч у в с т в о м ѣ с т а

Таблица № 6.

№№ опыта.	Имя наблюдаемаго.	наблюдае- маго.			Температ. ванной комн. по R.	Температ. вый- ная по R.	Мѣсяцъ, число опыта.	Время начала опыта.	Время души.	Нижн		
		Лѣта	Ростъ	Вѣсъ						До души	Пос	
											1-го	п о
1	Алексѣевъ	—	—	—	16	0 30	Нояб.	9 ч. 30'	10 ч. 9'	52	52	
2	Буюкъ	24	172	76,0	14,5	+1 13	"	12 ч. 35'	1 ч. 13	35	35	
3	Буюкъ	—	—	—	15	—1 14	"	9 ч. 20'	10 ч.	36	36	
4	Панасовъ	28	154	57,5	13	—0,5 14	"	12 ч. 30'	1 ч. 6	43	43	
5	Панасовъ	—	—	—	16	+3 15	"	12 ч. 33'	1 ч. 9	40	42	+1
6	Алексѣевъ	—	—	—	14,5	—1,5 '6	"	9 ч. 20'	9 ч. 59	51	50	—
7	Тарасовъ	23	165	64,5	13	—0,5 16	"	12 ч. 20'	1 ч. 2	40	41	+3
8	Алексѣевъ	—	—	—	13	—0,5 17	"	12 ч. 30'	1 ч. 10	53	53	
9	Тарасовъ	—	—	—	15	+1 18	"	12 ч. 30'	1 ч. 6	35	35	
10	Тарасовъ	—	—	—	15	—0,75 19	"	9 ч. 20'	10 ч.	37	37	
11	Панасовъ	—	—	—	13	0 19	"	12 ч. 22'	1 ч. 3	39	41	+40
12	Алексѣевъ	—	—	—	15	—1 20	"	9 ч. 25'	10 ч. 2	51	52	+53
13	Тарасовъ	—	—	—	13	—0,75 20	"	12 ч. 22'	12 ч. 58	38	39	+38
14	Поносовъ	—	—	—	14,5	—1,5 23	"	9 ч. 20'	9 ч. 58	38	38	
15	Шиншаръ	—	—	—	15	—6 1	"	9 ч. 20'	9 ч. 57	43	43	
	Въ среднемъ	—	—	—	—	—	—	—	=	—	—	+0

Выводъ: При сидячей почечуи. душѣ температур. въ 12—13°R прод. 1½ мин и
ней части живота на 0,4 мм., ягодицъ—1,1 мм. и бедра —1 мм. Это притупленіе

исходя

о б л а с т я х ъ:

При сидячей почечуйной
души температурою въ
12—13°R прод. 1½ мин.

Въ животѣ.				Л г о д н и ц ъ.				Задне-внутренней поверхности бедра.					
Въ началѣ				До души.	Послѣ души въ началѣ				До души.	Послѣ души въ началѣ			
2-го	3-го	4-го	1-го		2-го	3-го	4-го	1-го		2-го	3-го	4-го	
у ч а с а.					п о л у ч а с а.					п о л у ч а с а.			
	Р.	Р.		Р.	Р.	Р.	Р.		Р.	Р.	Р.	Р.	
0 53	+1 52	0 33 33	0 36	+3 36	+3 33	0 48 48	0 48	0 50	+2 48	0			
1 37	+2 36	+1 23 23	0 24	+1 26	+3 24	+1 53 52	-1 53	0 53	0 53	0			
0 36	0 36	0 23 23	0 23	0 25	+2 24	+1 49 49	0 49	0 50	+1 50	+1			
1 43	0 43	0 24 25	+1 25	+1 24	0 24	0 44 43	-1 43	-1 44	0 44	0			
2 40	0 40	0 21 22	+1 23	+2 23	+2 23	+2 40 40	0 43	+3 43	+3 42	+2			
1 51	+1 51	0 34 35	+1 36	+2 35	+1 34	0 50 50	0 50	0 51	+1 51	+1			
1 40	0 40	0 27 28	+1 28	+1 27	0 27	0 39 42	+3 40	+1 39	0 39	0			
0 53	0 53	0 28 29	+1 30	+2 30	+2 28	0 50 51	+1 51	+1 50	0 50	0			
1 35	0 35	0 28 28	0 29	+1 28	0 28	0 36 37	+1 37	+1 36	0 36	0			
1 37	0 37	0 27 28	+1 28	+1 28	+1 27	0 37 38	+1 40	+3 37	0 37	0			
1 40	+1 38	-1 26 28	+2 29	+3 28	+2 26	0 41 44	+3 44	+3 41	0 41	0			
1 51	0 51	0 29 32	+3 30	+1 30	+1 28	-1 50 53	+3 52	+2 52	+2 50	0			
1 38	0 38	0 27 28	+1 29	+2 29	+2 27	0 38 38	0 39	+1 39	+1 38	0			
0 38	0 38	0 26 26	0 27	+1 29	+3 26	0 37 37	0 38	+1 38	+1 37	0			
0 43	0 43	0 21 25	+4 22	+1 21	0 21	0 43 48	+5 46	+3 44	+1 43	0			
0 6	+0,46	0	—	+1,1	+1,4	+1,4	-0,2	+1	+1,2	+0,8	+0,26		

мѣсто притупляется непосредственно послѣ души въ среднемъ въ областяхъ: ниж-
нему началу 4 получаса послѣ души.

Ч у в с т в о м ѣ с т

Таблица № 7.

№ опыта.	Имя наблюдае- маго.	наблю- даемаго.			Температура ван- ной по R°.	Температ. ванн по К.	опыта.		Время души.	До души.	Пижней		
		Лѣта	Ростъ	Вѣсъ			Мѣсяцъ, число	Время на- чало			Послѣ ду		
											1 го	2	
													п о
											Р.		
1	Панасовъ *) .	—	—	—	14	—2,5	21 нояб.	12 ч. 27'	1 ч. 6'	38 38	0 38		
2	Тарасовъ . .	—	—	—	13	—0,5	23 "	12 ч. 17	12 ч. 51	35 35	0 35		
3	Алексѣевъ . .	—	—	—	13,5	+2	24 "	12 ч. 24	1 ч. 3	50 51	+1 50		
4	Тарасовъ . .	—	—	—	15	2 5	25 "	9 ч. 25	10 ч. 2	38 38	0 38		
5	Панасовъ . .	—	—	—	14	+1,5	26 "	9 ч. 28	10 ч. 8	37 37	0 37		
6	Алексѣевъ . .	—	—	—	15,25	+2	27 "	9 ч. 25	10 ч. 5	52 52	0 52		
7	Тарасовъ . .	—	—	—	15	+2,5	27 "	12 ч. 22	12 ч.	37 37	0 37		
8	Алексѣевъ . .	—	—	—	15	+1	28 "	9 ч. 22	10 ч. 2	53 53	0 53		
9	Панасовъ . .	—	—	—	14,5	+1	28 "	12 ч. 25	1 ч. 11	34 34	0 34		
10	Шингаръ . .	—	—	—	16	+1	3 дек.	9 ч. 33	10 ч. 9	40 40	0 40		
	Въ среднемъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,1 —		

Выводъ: При сидячей почечушной душѣ въ 12—13°R прод. 3 м. чувство бо-
 бедра на 1,5 м., въ области нижней части живота остается безъ измѣненій. Это прѣ-

ь о б л а с т я х ь:

При сидячей почечуй-
ной душѣ температурою
12–13°R прод. 3'

сти живота				Я г о д и ц ь.								Задне внутрен. пов. б.									
началѣ				До души.	Послѣ души въ началѣ								До души.	Послѣ души въ началѣ							
-го		4 го			1-го		2-го		3-го		4-го			1-го		2 го		3 го		4-го	
а с а.					п о л у ч а с а.									п о л у ч а с а.							
Р.		Р.			Р.		Р.		Р.		Р.			Р.		Р.		Р.		Р.	
0	38	0		29	30	+1	29	0	29	0	29	0	35	37	+2	35	0	35	0	36	+1
0	35	0		28	33	+5	30	+2	28	0	28	0	42	43	+1	42	0	42	0	42	0
0	51	+1		32	38	+6	34	+2	33	-1	31	+1	49	50	+1	48	-1	49	0	49	0
0	33	0		28	33	+5	30	+2	30	+2	28	0	41	42	+1	43	+2	41	0	41	0
0	37	0		29	29	0	30	+1	30	+1	29	0	41	42	+1	43	+2	41	0	41	0
0	53	+1		31	36	+5	35	+4	33	+2	32	+1	49	49	0	50	+1	49	0	49	0
0	37	0		30	34	+4	33	+3	31	+1	30	0	38	41	+3	38	0	38	0	38	0
0	53	0		29	33	+4	33	+4	30	+1	29	0	46	47	+1	46	0	46	0	46	0
0	34	0		26	29	+3	26	0	26	0	26	0	36	39	+3	38	+2	36	0	36	0
0	40	0		22	22	0	23	+1	22	0	22	0	40	42	+2	41	+1	42	+2	40	0
0	-	+0,2	-	-	+3,3	-	+1,9	-	+0,8	-	-	0	-	-	+1,5	-	+0,7	-	+0,2	-	+0,1

Группируется непосредственно послѣ души въ среднѣмъ въ областяхъ: ягодицѣ на 3,3 м.
исчезаетъ къ началу 4 получаса послѣ души.

*) Красвота ягодицѣ.

Ч у в с т в о м

Таблица № 8.

№ опыта.	Имя наблю- даемого.	наблюдае- маго.			Темпер. ванной к. по R°.	Темпер. внѣшняя по R°.	о п ы т а.		Время души.	Нижней части									
		Лѣта	Ростъ	Вѣсъ			Мѣсяцъ, число.	Время на- чала.		До души.	П о с л ѣ души								
											1-го	2 го	3						
														п о л у ч					
1	Панасовъ .	—	—	—	15	—6	29 Нояб.	12 ч. 35	1 ч. 10	35 36	+1 35	0 35							
2	Онъ-же .	—	—	—	15	—9,5	30 "	9 ч. 20	9 ч. 57	35 35	0 35	0 35							
3	Тарасовъ .	—	—	—	13,5	—9,5	30 "	12 ч. 30	1 ч. 8	36 36	0 36	0 36							
4	Панасовъ .	—	—	—	13	—4,5	1 Дек.	12 ч. 24	1 ч. 2	36 36	0 36	0 36							
5	Тарасовъ .	—	—	—	16	+1,5	2 "	12 ч. 32	1 ч. 9	36 35	—1 36	0 36							
6	Алексѣевъ.	—	—	—	15	+1	3 "	12 ч. 23	1 ч. 2	50 50	0 51	+1 50							
7	Тарасовъ .	—	—	—	15	—3	4 "	9 ч. 33	10 ч. 15	33 33	0 33	0 33							
8	Алексѣевъ.	—	—	—	12	—9	5 "	9 ч. 12	9 ч. 52	45 47	+2 45	0 45							
9	Алексѣевъ.	—	—	—	15	—5,5	6 "	9 ч. 25	10 ч. 1	47 48	+1 49	+2 47							
10	Тарасовъ .	—	—	—	14	0	7 "	9 ч. 25	10 ч. 2	34 34	0 34	0 34							
11	Алексѣевъ.	—	—	—	13	—2,5	8 "	12 ч. 14	12 ч. 51	46 46	0 46	0 48							
12	Панасовъ .	—	—	—	13,5	—14	10 "	9 ч. 22	10 ч.	33 33	0 33	0 33							
13	С. Зуевъ. .	25	157	63,5	11	—10	11 "	12 ч. 25	1 ч. 5	47 47	0 47	0 47							
14	Манунловъ.	—	—	—	16	—16	13 "	12 ч. 35	1 ч. 6	48 48	0 48	0 48							
15	Зуевъ. . .	—	—	—	15	—14,5	19 "	9 ч. 30	9 ч. 58	44 44	0 44	0 44							
	Въ среднемъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,2	—	+0,2	—	—	—	—

Выводъ: При почечуиной душѣ въ шкапу температурою 12—19°R продолжительность ягодичъ на 2,3 мм., бедра на 1,5 мм. Притупленіе почти исчезаетъ къ началу 4 по.

ТА ВЪ ОБЛАСТЯХЪ:

При почечуйной душѣ въ шкапу температурою въ 12—13°R въ прод. 1 1/2 мин.

ота.	Я г о д и ц ъ.								Задне-внутр. пов. бедра.									
ачалѣ	До души.	Послѣ души въ началѣ								До души.	Послѣ души въ началѣ							
4-го		1-го		2-го		3-го		4-го			1-го		2-го		3-го		4-го	
а.		п о л у ч а с а.									п о л у ч а с а.							
р.		Р.	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.		Р.	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.
0 29 31	+2 29	0 29	0 29	0 38 41	+3 38	0 38	0 37	-1	0 27 30	+3 30	+3 27	0 27	0 35 36	+1 35	0 35	0 35	0	
0 27 31	+4 29	+2 27	0 27	0 36 40	+4 37	+1 36	0 36	0	0 29 30	+1 31	+2 30	+1 29	0 37 40	+3 37	0 37	0 37	0	
0 27 27	0 29	+2 29	+2 27	0 36 36	0 36	0 36	0 36	0	0 27 27	0 29	+2 29	+2 27	0 36 36	0 36	0 36	0 36	0	
+1 33 35	+2 31	+1 34	+1 33	0 48 52	+4 49	+1 49	+1 49	+1	+1 33 35	+2 31	+1 34	+1 33	0 48 52	+4 49	+1 49	+1 49	+1	
0 26 30	+4 30	+4 27	+1 28	+2 35 35	0 35	0 35	0 35	0	0 26 30	+4 30	+4 27	+1 28	+2 35 35	0 35	0 35	0 35	0	
0 33 33	0 35	+2 33	0 32	-1 45 46	+1 47	+2 45	0 45	0	0 33 33	0 35	+2 33	0 32	-1 45 46	+1 47	+2 45	0 45	0	
0 34 36	+2 35	+1 34	0 34	0 49 49	0 49	0 49	0 49	0	0 34 36	+2 35	+1 34	0 34	0 49 49	0 49	0 49	0 49	0	
0 28 31	+3 30	+2 28	0 28	0 35 36	+1 35	0 35	0 35	0	0 28 31	+3 30	+2 28	0 28	0 35 36	+1 35	0 35	0 35	0	
0 34 37	+3 35	+1 35	+1 34	0 46 46	0 46	0 47	+1 46	0	0 34 37	+3 35	+1 35	+1 34	0 46 46	0 46	0 47	+1 46	0	
0 26 28	+2 28	+2 28	+2 27	+1 38 40	+2 40	+2 39	+1 39	+1	0 26 28	+2 28	+2 28	+2 27	+1 38 40	+2 40	+2 39	+1 39	+1	
0 29 32	+3 30	+1 29	0 29	0 50 50	0 51	+1 50	0 50	0	0 29 32	+3 30	+1 29	0 29	0 50 50	0 51	+1 50	0 50	0	
0 28 30	+2 29	+1 29	+1 28	0 47 48	+1 48	+1 47	0 47	0	0 28 30	+2 29	+1 29	+1 28	0 47 48	+1 48	+1 47	0 47	0	
-1 24 27	+3 28	+4 26	+2 24	0 47 50	+3 52	+5 49	+2 47	0	-1 24 27	+3 28	+4 26	+2 24	0 47 50	+3 52	+5 49	+2 47	0	
-0,06	-	+2,3	-	+1,9	-	+0,7	-	+0,13	-	-0,06	-	+2,3	-	+1,9	-	+0,7	-	+0,13

1/2 м. чувство мѣста притупляется непосредственно послѣ души въ среднемъ въ областяхъ послѣ души.

Ч у в с т в о м ѣ с т а

Таблица № 9.

№ опыта.	Имя наблюдае- маго.	наблюдае маго:			Температ. ванной комнаты по R.	Температ. внутр- ная по R.	Мѣсяцъ и число опыта.	Время начала опыта.	Время души.	Нижней час			
		Лѣта	Ростъ	Вѣсъ						До души.	Послѣ души		2 г
											1-го		
											п о	л	
										Р.	Л		
1	Панасовъ . .	—	—	—	14	— 25	4 нояб.	12 ч. 30'	1 ч. 8'	37 37	0	35	—
2	Панасовъ . .	—	—	—	14	— 4	6 дек.	12 30	1 4	35 35	0	35	
3	Тарасовъ . .	—	—	—	14	— 10	9 "	12 45	1 15	35 35	0	35	
4	Алексѣевъ .	—	—	—	13	— 13	10 "	12 28	1 5	51 52	+ 1	52	+
5	Панасовъ. .	—	—	—	13,5	— 10	11 "	9 24	10 2	53 33	0	33	
6	Алексѣевъ . .	—	—	—	11	— 16	12 "	12 30	1 5	52 52	0	52	
7	Панасовъ. .	—	—	—	15	— 18	14 "	9 25	10 1	33 33	0	33	
8	Тарасовъ.. .	—	—	—	17	— 5,5	17 "	9 38	10 11	33 33	0	33	
9	Алексѣевъ. .	—	—	—	16	— 13	18 "	9 21	9 58	53 54	+ 1	53	
10	Зуевъ . . .	—	—	—	13	— 14	20 "	9 25	10 3	45 45	0	45	
	Въ среднемъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+ 0,2	—	— 1

Выводъ: При почечуйной душѣ въ шкалу температур. 12—13°R прод. 3 минуты въ среднемъ на 2,9 мм.; это притупленіе исчезаетъ почти совсѣмъ къ началу 4 полу са

ъ о б л а с т я х ъ:

При почечуиной души въ шкапу температурою въ 18—19°R прод. 3 мин.

ивота.			Я г о д и ц ъ.								Задневнутренней поверхности бедра.									
въ началѣ			До души.	Послѣ души въ началѣ								До души.	Послѣ души въ началѣ							
го	4 го	1-го		2-го	3-го	4-го	1-го	2-го	3 го	4-го										
а с а.				п о л у ч а с а.									п о л у ч а с а.							
Р.	Р.			Р.		Р.		Р.		Р.	Р.			Р.		Р.		Р.		
1	36	-1	27	31	+4	29	+2	28	+1	27	0	39	44	+5	42	+3	39	0	39	0
1	35	0	29	30	+1	31	+2	31	+2	30	+1	41	43	+2	41	0	41	0	41	0
0	35	0	26	28	+2	30	+4	26	0	28	+2	36	37	+1	37	+1	36	0	37	+1
0	51	0	34	39	+5	36	+2	35	+1	34	0	49	51	+2	49	0	49	0	49	0
0	33	0	28	30	+2	32	+4	31	+3	28	0	38	40	+2	40	+2	39	+1	39	+1
0	52	0	23	35	+2	37	+4	34	+1	33	0	47	50	+3	50	+3	48	+1	48	+1
0	33	0	29	32	+3	33	+4	29	0	29	0	38	42	+1	39	+1	39	+1	40	+2
0	33	0	29	35	+6	29	0	30	+1	29	0	35	35	0	35	0	35	0	35	0
0	56	+3	35	37	+2	38	+3	36	+1	35	0	52	55	+3	55	+3	52	0	52	0
1	45	0	29	31	+2	32	+3	30	+1	29	0	50	57	+7	57	+7	53	+3	50	0
0,3	-	+0,2	-	-	+2,9	-	-2,8	-	+1,1	-	+0,3	-	-	+2,9	-	+2	-	+0,6	-	+0,5

увего мѣста въ областяхъ ягодницъ и бедра притупляется непосредственно послѣ души ос. души.

V.

Исчезновение кожных отпечатковъ.

Для опредѣленія времени исчезновенія кожного отпечатка до и послѣ души, мы пользовались видоизмѣненнымъ способомъ A. Fleming'a ²⁵), *) принятымъ въ русской литературѣ (Костюринъ ²³), Стельмаховичъ ²⁴), Горошко I. с.) именно: гирька десятичнаго разнѣса въ 200 grm. надавливала на пластинку съ обращеннымъ къ кожѣ рельефомъ въ продолженіе $\frac{1}{2}$ минуты на очерченныхъ участкахъ кожи правой лѣгодицы, у большаго вертела, и на внутренней поверхности лѣваго бедра на 3 — 4 сент. книзу отъ *plica Maticum*.

Время, потребное для исчезновенія получавшагося отпечатка до и послѣ души, видно изъ прилагаемыхъ таблицъ.

*) A. Fleming рекомендуетъ особый аппаратъ, устроенный на подобіе русской мѣдной фунтовой гири, къ основанію которой приложена рельефная фигура, діаметромъ въ 1 дюймъ, а къ бокамъ лента съ пряжками для укрѣпленія аппарата. Всѣ надавливающей тяжести 1 фунтъ (англійскій), 8 унцій и 4 унца отдѣльно, или вмѣстѣ 1 фунтъ 12 унцій, время надавливанія 5 минутъ. Мы выбрали время $\frac{1}{2}$ минуты, а тяжесть 200 grm. послѣ предварительныхъ опытовъ, изъ которыхъ оказалось, что при этихъ условіяхъ получается явственный и обыкновенно ранѣе 25 минутъ исчезающій отпечатокъ; въ это время въ нашихъ опытахъ надо было измѣрять ужь силу конечностей.

Время исчезновения отпечатка на кожѣ

При контроль-
ныхъ опытахъ.

б е д р а.					я г о д и ц ѣ.				
в ѣ м н у т а х ѣ									
До пере- рыва.	послѣ перерыва				До пере- рыва.	послѣ перерыва			
	сейчасъ.	Р.	черезъ 1 часъ.	Р.		сейчасъ.	Р.	черезъ 1 часъ.	Р.
23	21	—2	18	—5	25	20	—5	19	—6
15	15	0	10	—5	25	25	0	25	0
7	10	+3	12	+5	19	19	+ 0	17	—2
13	25	+12	14	+1	10	21	+ 11	10	0
22	10	—12	10	—12	16	16	0	16	0
23	19	—4	15	—8	27	25	—2	26	—1
19	9	—10	17	—2	25	25	0	25	0
18	19	+1	19	+1	20	19	—1	21	+1
25	25	0	22	—3	25	25	0	25	0
25	25	0	25	0	25	25	0	25	0
11	13	+2	11	0	25	25	0	25	0
14	15	+1	14	0	25	19	—6	20	—5
15	15	0	15	0	25	25	0	25	0
25	25	0	23	—2	25	25	0	25	0
20	25	+5	20	0	25	25	0	25	0
в среднемъ		—0,26		—2			—0,2		—0,9

Примѣчаніе.

выводъ: При взятыхъ нами условіяхъ время, потребное для исчезанія отпечатка, укорачивается и притомъ какъ на бедрѣ, такъ и на плечѣ болѣе во второй часъ наблюденія, чѣмъ въ первый.

Время исчезновения отпечатка на кожѣ

При сид
почечуйн. д
температур
18—19°R
1 1/2 мин.

При сид

№.№. опыта.	б е д р а .					я г о д и ц ь .					
	в ъ м и н у т а х ъ										
	до души.	послѣ души				до души.	послѣ души				
	сейчасъ	р.	черезъ 1 часъ.	р.		сейчасъ	р.	черезъ 1 часъ.	р.		
1	17	18	+1	18	+1	18	18	0	18	0	
2	10	9	-1	9	-1	8	7	-1	7	-1	
3	25	24	-1	24	-1	31	31	0	31	0	
4	25	29	+4	11	-14	18	21	+3	25	+7	
5	11	11	0	7	-4	8-9	8	0	8	0	
6	6	10	+4	6	0	15	18	+3	7	-8	
7	12	14	+2	12	0	16	15	-1	19	+3	
8	7	20	+13	17	+10	16	15	-1	16	0	
9	12	14	-2	9	-3	22	22	0	22	0	
10	20	27	+7	25	+5	20	18	-2	20	0	
11	9	23	+14	8	-1	17	17	0	15	-2	
12	11	13	+2	10	-1	18	23	+5	23	+5	
13	13	30	+17	23	+10	17	23	+6	22	+5	
14	7	7	0	7	0	14	13	-1	11	-3	
15	7	17	+10	8	+1	22	19	-3	15	-7	
Въ среднемъ		+4,6		+0,1				+0,5		-0,1	

Выводъ: При сидячей почечуйной душѣ температурою 18—19°R прод 1 1/2 мин. время исчезновения кожного отпечатка *удлиняется* (послѣ души) на бедрахъ и въ первый часъ больше, чѣмъ во второй и на ягодицѣ.

При сид
почечуйн. д
температур
18—19°R
3 мин.

Таблица № 12.

1	7	7	0	5	-2	19	18	-1	20	+2
2	14	15	+1	10	-4	17	19	+2	15	-2
3	8	10	+2	5	-3	11	14	-3	11	0
4	17	17	0	9	-8	20	16	-4	19	-1
5	23	15	-8	20	-3	24	22	-2	21	-3
6	10	11	+1	10	0	21	19	-2	21	0
7	19	29	+10	19	0	21	26	+5	21	0
8	13	8	-5	12	-1	12	8	-4	12	0
9	17	19	+2	13	-4	5	7	+2	10	+5
10	21	22	+1	21	0	12	24	+12	25	+13
11	13	17	+4	7	-6	13	12	0	15	+2
12	13	17	+4	24	+11	22	23	+1	21	-1
13	9	9	0	5	-4	24	24	0	25	+1
14	6	6	0	5	-1	11	17	+6	20	+9
15	16	16	0	16	0	9	20	+11	10	+10
Въ среднемъ			+0,8		-1,6			+0,9		+2,3

Cutis anseri.

Отпеч. на го
стерть ру

Выводъ: При сидячей почечуйной душѣ температурою въ 18—19°R прод. 3 мин. время исчезновения кожного отпечатка *удлиняется* послѣ души на бедрахъ въ первый часъ болѣе, чѣмъ во второй, а на ягодицѣ наоборотъ.

Время исчезновения отпечатка на кожѣ

При почечуйн.
душѣ въ шкапу
температур. въ
18—19°R прод.
1½ мин.

№. № опыта.	б е д р а .					я г о д и ц ь .				
	в ѣ м н н у т а х ѣ									
	до души.	послѣ души				до души.	послѣ души			
		сейчасъ.	р.	черевъ 1 часъ.	р.		сейчасъ.	р.	черезъ 1 часъ.	р.
1	25	28	+3	19	—6	25	20	—5	22	—3
2	10	15	+5	17	+7	14	15	+1	13	—1
3	17	22	+5	22	+5	17	26	+9	14	—3
4	10	21	+11	13	+3	8	13	+5	8	0
5	16	28	+12	23	+7	20	26	+6	15	—5
6	8	13	+5	5	+3	13	23	+10	13	0
7	17	24	+7	16	+1	8	20	+12	14	+6
8	18	18	0	18	0	10	23	+13	10	0
9	8	13	+5	9	+1	12	12	0	12	0
10	15	25	+10	15	0	25	25	0	28	+3
11	7	14	+7	5	—2	19	26	+7	19	0
12	8	16	+8	7	—1	17	17	0	10	—7
13	16	25	+9	21	+5	6	12	+6	6	0
14	6	23	+17	16	+10	16	17	+1	17	0
15	6	12	+6	6	0	8	10	+2	11	+3
Въ среднемъ			+7,3		+2 5			+4,5		—0,5

Примѣчаніе.

Выводъ: При почечуйной душѣ въ шкапу температурою въ 18—19°R прод. 1½ м. время исчезновения каждаго отпечатка *удлиняется* болѣе на брѣ и въ первый часъ послѣ души, чѣмъ на ягодицахъ и во второй часъ.

Таблица № 14.

1	14	22	+8	14	0	24	24	0	26	+2
2	15	20	+5	17	+2	24	27	+3	23	—1
3	9	17	+8	15	+6	22	22	0	21	—1
4	10	14	+4	10	0	12	14	+2	10	—2
5	19	24	+5	16	—3	9	11	+2	19	+10
6	21	25	+4	20	—1	12	26	+14	16	+4
7	6	13	+7	6	0	25	26	+1	14	—11
8	10	16	+6	12	+2	5	8	+3	12	+7
9	20	20	0	20	0	11	25	+14	12	+1
10	13	13	0	18	+5	24	21	—3	24	0
11	7	13	+6	8	+1	19	23	+4	20	+1
12	11	16	+5	15	+4	21	19	—2	19	—2
13	14	24	+10	9	—5	15	23	+8	13	—2
14	13	20	+7	13	0	22	22	0	10	—12
15	10	20	+10	3	—7	14	19	+5	16	+2
Въ среднемъ			+5,6		+0,3			+3,4		—0,3

При почечуйн.
душѣ въ шкапу
температур. въ
18—19°R прод.
3 мин.

Cutis anserina.

Cutis anserina.

Выводъ: При почечуйной душѣ въ шкапу температурою въ 18—19°R прод. 3 мин. время исчезновения отпечатка *удлиняется* болѣе на брѣ и въ первый часъ послѣ души, чѣмъ на ягодицахъ и во второй часъ.

Время исчезновения отпечатка на кожѣ

При сидячей почечуйной температурѣ 12—13°R прод. 1½ мин.

Примѣча

№ опыта.	б е д р а					я г о д и ц ѣ				
	в ѣ м н н у т а х ѣ									
	до души.	п о с л ѣ д у ш и				до души.	п о с л ѣ д у ш и			
		сейчасъ	Р.	через 1 часъ.	Р.		сейчасъ	Р.	через 1 часъ.	Р.
1	14	17	+3	16	+2	23	25	+2	16	-6
2	20	24	+4	20	0	19	20	+1	19	0
3	19	19	0	9	-10	18	24	+6	17	-1
4	16	16	0	19	+3	18	17	-2	19	0
5	25	25	0	15	-10	21	14	-7	17	-4
6	8	22	+14	17	+9	47	23	+6	20	+3
7	20	16	-5	19	-1	22	24	+2	22	0
8	10	13	+3	23	+13	20	20	0	19	-1
9	18	15	-3	12	-6	20	20	0	25	+5
10	15	14	-1	12	-3	22	18	-4	23	+1
11	8	4	-3	8	0	20	14	-6	20	0
12	15	20	+5	15	0	20	20	0	17	-3
13	11	12	+1	9	-2	16	23	+7	23	+7
14	25	23	-2	20	-5	16	22	+3	19	0
15	24	25	+1	24	0	23	25	+2	17	-6
Въ среднемъ		+1,1		-0,66				+0,66		-0,3

Выводъ: При сидячей почечуйной душѣ температурою въ 12—12°R прод. ½ мин. время, потребное для исчезанія кожныхъ отпечатковъ, удлинняется послѣ души болѣе на бедрѣ и въ первый часъ, чѣмъ на ягодицѣ и во второй часъ.

Таблица № 16.

При сидячей почечуйной температурѣ 12—13°R прод. 3 мин.

1	20	20	0	13	-7	12	12	-0	12	0
2	13	5	-8	13	0	18	17	-1	24	+6
3	8	12	+4	13	+5	25	16	-9	25	0
4	15	10	-5	15	0	21	21	0	19	-2
5	25	13	-12	18	-7	20	20	0	10	-2
6	10	4	-6	11	+1	20	16	-4	20	0
7	13	13	0	13	0	22	23	+1	25	+3
8	22	22	+7	15	0	25	25	0	24	-1
9	17	17	-8	12	-13	15	11	-4	19	+4
10	15	15	-5	17	-3	20	20	0	25	+5
Въ среднемъ		-3,3		-2,4				-1,7		+1,3

Выводъ: Время, потребное для исчезанія кожного отпечатка, при сидячей почечуйной душѣ температурою въ 12—13°R прод. 3 мин. укорачивается на бедрѣ и въ первый (болѣе) и во второй (менѣе) часъ наблюденія; на ягодицѣ же въ первый только часъ, а во второй удлинняется.

Время исчезновения отпечатка на кожѣ

При почечуйн.
душѣ въ шкапу
температур. въ
12—13°R прод.
1½ мин.

б е д р а.						я г о д и ц ѣ.				
в ѣ м и н у т а х ѣ										
до души.	п о с л ѣ д у ш и					до души.	п о с л ѣ д у ш и			
	сейчасъ.	Р.	черезъ 1 часъ?	Р.	сейчасъ		Р.	черезъ 1 часъ	Р.	
1	12	16	+4	10	—2	24	20	—4	25	+1
2	25	25	0	20	—5	20	20	0	17	—3
3	19	23	+4	12	—7	23	14	—9	23	0
4	21	20	—1	15	—6	25	25	0	19	—6
5	20	11	—9	14	—6	25	25	0	25	0
6	22	5	—17	9	—13	25	25	0	25	0
7	18	23	+5	18	0	25	25	0	18	—7
8	9	25	+16	25	+16	25	25	0	25	0
9	10	7	—3	24	+14	24	24	0	24	0
10	25	17	—8	13	—12	25	25	0	22	—3
11	13	10	—3	7	—6	25	25	0	13	—12
12	25	18	—7	12	—13	25	21	—4	24	—1
13	20	13	—7	6	—14	13	25	+12	13	0
14	9	18	+9	9	0	17	17	0	17	0
15	17	25	+8	17	0	18	18	0	18	0
въ среднемъ		—0,6		—3,6				—0,33		—2,0

Примѣчаніе.

Выводъ: При почечуйной душѣ въ шкапу температурою въ 12—13°R в 1½ мин. время исчезновения кожного отпечатка послѣ души укорачивается болѣе на бедрѣ и во второй часъ, чѣмъ на ягодицѣ и въ первый

Таблица № 18.

При почечуйн.
душѣ въ шкапу
температур. въ
12—13°R прод.
3 мин.

6	19	+13	6	0	24	24	0	24	0
25	19	—6	11	—14	24	18	—6	10	—14
16	15	—1	15	—1	20	25	+5	25	+5
25	11	—14	10	—15	21	25	+4	21	0
12	12	0	12	0	25	25	0	25	0
15	15	0	14	—1	24	25	+1	25	+1
15	25	+10	21	+6	20	20	0	20	0
21	14	—7	10	—11	20	25	+5	21	+1
20	11	—9	12	—8	20	25	+5	21	+1
14	20	+6	9	—5	25	25	0	25	0
въ среднемъ		—0,8		—4,9		+1,4		—0,7	

Выводъ: При почечуйной душѣ въ шкапу температурою въ 12—13°R в 3 мин. время исчезанія кожного отпечатка на бедрѣ укорачивается во второй часъ, чѣмъ въ первый, — на ягодицѣ удлиняется.

Мышечная сила.

Мы измѣряли силу сжатія кисти каждой руки (дѣйствующія мышцы *flex. digit. subl. et prof., flex pollicis long., add pollic., lumbric. et interossei*) и силу выпрямленія каждой ноги отдѣльно (дѣйствующія мышцы: *ext. crur. quadric., glutaei, gemellus, soleus, отчасти tibialis post., peron. brevis, flex. dig. flex. halluc. longus (?)*).

Для первой цѣли служилъ динамометръ Collin'a съ одной стрѣлкой, для второй съ двумя стрѣлками. Сила сжатія кисти опредѣлялась при лежачемъ положеніи наблюдаемаго и при вытянутой вдоль туловища рукѣ, при чемъ динамометръ, взятый въ руку всегда одинаково симметрично, медленно сжимался поочередно правой и лѣвой рукой два раза; между сжатіемъ разноименныхъ рукъ, а также и ногъ проходило $1\frac{1}{2}$ минуты, а между первымъ и вторымъ сжатіемъ одной и той же руки (resp. ноги)—минута. Въ таблицы вносилась полусумма двухъ сжатій. При опредѣленіи силы выпрямленія ногъ мы пользовались особыми приспособленіями: *) первое служило для укрѣпленія динамометра и состояло изъ длинной, узкой четырехгранной призмы безъ передней и задней стѣнки, верхняя же стѣнка ея состояла изъ трехъ сколоченныхъ другъ надъ другомъ досокъ; средняя изъ нихъ имѣла углубленіе, въ которое и вкладывался динамометръ.

На выступающую часть его производилось надавливаніе стопой выпрямляемой ноги въ разстояніи 1 — $1\frac{1}{2}$ вершка отъ пятки на отмѣченномъ мѣстѣ; понятно, что эта призма длиною въ ширину кровати упиралась въ передній конецъ ея и притомъ устанавливалась такъ, что динамометръ приходился по срединѣ передней спинки кровати; второе служило для опоры крестцемъ и состояло изъ трехгранной призмы, къ основанію которой придѣланы были петли; назначеніе ихъ

*) Отступать отъ способа измѣренія силы ногъ, употребленнаго Zhasagne и Dally ²¹⁾, насъ заставляли нѣкоторыя техническія обстоятельства, въ остальномъ же мы неоднократно руководствовались ихъ прекрасной статьей, а также указаніями Якимова ²²⁾, Гржибовскаго (l. c.).

было удерживать призму въ одномъ положеніи при посредствѣ крѣпкихъ крючковъ, идущихъ отъ стержня сбоку изъ подъ кровати. Эта призма обыкновенно лежала на полу, а когда нужно было произвести измѣреніе наблюдаемый садился на кровати и сзади него укрѣплялась эта призма, покрытая вдвое сложеннымъ одѣяломъ. Упираясь крестцемъ въ призму, испытуемый всей силой надавливалъ на динамометръ въ промежутки времени, указанные выше, медленно и равномерно. Неудобство этого способа изслѣдованія силы ногъ сказалось лишь въ томъ, что дѣленій (95 kilgrm.), имѣющихся на обыкновенныхъ Collin'овскихъ динамометрахъ, оказывалось для нѣкоторыхъ субъектовъ мало, они могли бы надавить больше.

Не ручаясь за полную точность нашихъ инструментовъ; совершенно новыхъ и выписанныхъ отъ Collin'a *), мы должны однако замѣтить, что осторожное накладываніе гирь въ 5, 10, 15 килограммъ и въ 2 пуда вызывало перемѣщеніе стрѣлки динаметра на соответствующія цифры.

*) Paris, Rue de l'Ecole de Médecine, 6; стоятъ: динамометръ съ одной стрѣлкой 25 fr., — съ двумя стрѣлками 35 fr.

Таблица № 20.

При сидячей почечуной
душѣ температурою 18°—
19°R прод. 1¹/₂'.

Мышечная сила

конечностей въ килограммахъ.

Верхнихъ.

Нижнихъ.

До души.	Послѣ души въ концѣ						До души.	Послѣ души въ концѣ						П р а в о й
	1/2 часа.		1 часъ.		2 часа.			1/2 часа.		1 часъ.		2 часа.		
	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.	Р.		Р.	Р.	Р.	Р.	Р.		
36,5	-2,5	39	0	38,5	-0,5	41,5	43,5	+2	41,5	0	46	+4,5		
34	+1	34	+1	35,5	+2,5	33	38,5	+5,5	42,5	+9,5	50	+17		
36,5	-4	39,5	-1	39,5	-1	50	44	-6	51	+1	57	+7		
41	+2,5	39	+0,5	41,5	+3	51,5	47	-4,5	46,5	-5	45	-6,5		
37	+2	33	-2	34,5	-0,5	43,5	46,5	+3	43,5	0	53,5	+10		
38,2	-1,3	40,5	+1	41	+1,5	52,5	59,5	+7	52	-0,5	49,5	-3,5		
38,5	+0,5	42,5	+4,5	41	+3	47,5	49,5	+2	45	-2,5	47,5	0		
45	+1	37,5	-6,5	39,5	-4,5	55	65,5	+10,5	65,5	+10,5	52,5	-3,5		
39	-1,5	41	+0,5	40,7	+0,2	39	39	0	41,5	+2,5	43,5	+4,5		
36	+0,5	36,5	+1	37	+1,5	47,5	40	-7,5	42,5	-5	41,2	-6,3		
43,5	-3	41,5	-5	44	-2,5	71	69	-2	59,5	-11,5	63	-8		
42,5	-1	42,5	-1	42	-1,5	60,5	55,5	-5	44,5	-16	52,5	-8		
41,7	+3,2	43,5	+5,0	41	+2,5	58	57,5	-0,5	54,5	-3,5	56	-2		
36,5	+0,5	35	-1	37	+1	61	61,5	+0,5	62	+1	66	+5		
39,5	-5	42	-2,5	42,7	-1,8	50,5	51,5	+1	56	+5,5	50	+0,5		
еднемъ	-0,5	—	-0,4	—	+0,2	—	—	+0,4	—	-1,0	—	+0,8		
38	-2,5	40	-0,5	41	+0,5	45,5	44	-1,5	46,5	+1	48,5	+3		
32,5	-3	34,5	-1	31	-4,5	42,5	48,5	+6,5	55	+12,5	52,5	+10		
41	-1	40	-2	38	-4	51	48,5	-2,5	54	+3	51,5	+0,5		
42,7	+0,8	40,5	-1	42	+0,5	58	51,5	-6,5	50,5	-7,5	51,5	-6,5		
35	+3	34,5	+2,5	37	+5	53,5	56,5	+3,5	48,5	-5	57,5	+4		
38,2	+4,2	36,5	+2,5	35	+1	49,2	49,5	+0,3	43,5	-5,7	49	-0,2		
39,7	+1,7	41,5	+3,5	40	+2	46	51,5	-5,5	42,5	-3,5	47	+1		
40	+3,5	36	+0,5	35	+1,5	46,5	51	+4,5	47,7	+1,2	50	+3,5		
33,5	-1,7	35,5	-0,3	33,5	-1,7	46,5	41,5	-5,5	47,5	+1	53	+6,5		
38,7	-0,8	37	-2,5	38	-1,5	49	40,5	-8,5	47,5	-1,5	50	+1		
37,5	-5,5	37,5	-5,5	36	-7	71,5	64	-6,5	48,5	-23,5	53,5	-18,5		
41,5	+3,5	43	+5	36	-2	55	58	+3	44,5	-10,5	58,5	+0,5		
43	+1,5	43,2	+1,7	38,5	+0,3	59,5	58,5	-1	55,5	-4	54,5	-5		
35,5	+1	37	+2,5	35,5	+1	60	65,7	+5,7	68,7	+8,7	53,5	-6,5		
36,5	-2	36	-2,5	39	+0,5	47,5	50	+2,5	52	+4,5	49,5	+2		
еднемъ	+0,2	—	+0,2	—	-0,6	—	—	-0,7	—	-2,2	—	-0,3		

Выводъ см. ниже.

Таблица № 21.

При сидячей позе
душъ температурою
18—19°R прод. 3

Мышечная сила

конечностей въ килограммахъ

Верхнихъ.

Нижнихъ.

№ опыта.	До души.	Послѣ души въ концѣ						До души.	Послѣ души въ концѣ					
		1/2 часа.		1 часъ.		2 часа.			1/2 часа.		1 часъ.		2 часа.	
		Р.		Р.		Р.			Р.		Р.		Р.	
1	39,5	39	-0,5	39,5	-0	39,5	0	47	49,5	+2,5	49,7	+2,7	45	-
2	40,5	41	+0,5	40,5	0	41,5	+1	44	50,5	+6,6	46,5	+2,5	50,5	+6
3	38,5	37,5	-1	39	+0,5	37	-1,5	41	60,5	+19,5	57,4	+16,4	62	+19
4	47,2	44,5	-2,7	44,7	-2,5	43	-4,2	59	66	+7	66	+7	59,5	+7
5	36	35,5	-0,5	36,5	+0,5	39,5	+3,5	64	57,5	-6,5	58,5	-5,5	57,2	-6
6	46	47,5	+1,5	43	-3	43	-3	56,5	66,5	+10	44,5	-12	57,5	+10
7	39,5	37,5	-2	35,5	-4	37,5	-2	54,5	53,5	-1	48	-6,5	55	-1
8	47,5	42,5	-5	44,5	-3	43,5	-4	63,5	59	-4,5	63	-0,5	75	-4
9	43,5	44	+0,5	46,5	+3	44,5	+1	42,5	43,5	+1	40	-2,5	48	+1
10	45,5	44	+1,5	45,2	-0,3	42	+3,5	41	47	+6	45,5	+4,5	49	+6
11	46,2	45,7	-0,5	48,5	+2,3	43	-3,2	60	66,5	+6,5	59,5	-0,5	71	+6
12	39	39	0	39	0	41,2	+2,2	61	55	-9	55,5	-8,5	59,5	-9
13	42	44	+2	42	0	41,2	-0,8	52	52,5	+0,5	51,5	-0,5	47	-0,8
14	41,5	40	-1,5	41,5	0	39	-2,5	41	42	+1	42	+1	44	+1
15	43,5	41,5	-2	38	-5,5	40	-3,5	48	47,5	-0,5	45	-3	50,5	-3
Въ среднемъ		-0,65	-	-0,8	-	-0,9	-	-	-	+2,5	-	-0,3	-	-
1	34,5	36	+1,5	35,5	+1	36,2	+1,7	60	59,5	-0,5	53,5	-6,5	46,5	-0,5
2	35,2	37	+1,8	36,5	+1,3	37,5	+2,2	45	46,5	+1,5	50,5	+5,5	57,5	+1,5
3	37	34,5	-2,5	38,5	+1,5	37	0	51	68	+13	72	+2,1	63	+13
4	40,2	36,5	-3,7	37	-3,2	37	-3,2	62,5	67,4	+4,9	67	+4,5	66	+4,9
5	42,2	42,2	0	42,2	0	41,5	-0,7	68	60	-8	64,5	-3,5	56	-8
6	42	42,5	+0,5	39	-3	43,5	+1,5	59,5	71	-11,5	54	-5,5	55	-11,5
7	40,5	39	-1,5	38	-2,5	40	-0,5	62,5	61	-1,5	53,5	-9	68	-1,5
8	40,5	37,5	-3	37,5	-3	41,5	+1	62,5	65,5	+3	76,5	+14	86,5	+3
9	42,5	43,5	+1	42,2	-0,3	42,5	0	46	43	-3	47,5	+1,5	46	-3
10	43,5	41	+2,5	46,5	+3	42	-1,5	43,5	53,5	+10	48	+4,5	45,5	+10
11	41,5	43	+1,5	41	-0,5	39,5	-2	61	68	+7	59,5	-1,5	70	+7
12	42,5	40	-2,5	42,5	0	42	-0,5	61,5	61	-0,5	64,5	+3	66	-0,5
13	39	39,5	+0,5	37,5	-1,5	37	-2	55	55	0	56,5	+1,5	54,5	0
14	38,5	34,5	-4	34,5	-4	36	-2,5	45	46	+1	44,5	-0,5	53,5	+1
15	44	40	-4	39,5	-4,5	40	-4	65	60	-5	56,5	-9	66	-5
Въ среднемъ		-0,8	-	-1,5	-	-0,7	-	-	-	+0,7	-	+1,3	-	-
Выводъ см. ниже.														

Выводъ см. ниже.

При почечуйной душѣ въ шкапу температурою въ 18—19°R прод. 1½ мин.

Мышечная сила

конечностей въ киллограммахъ.

Верхнихъ.

Нижнихъ.

до души.	Послѣ души въ концѣ.						до перерыва.	Послѣ души въ концѣ.					
	1/2 часа.		1 ч.		2 ч.			1/2 часа.		1 ч.		2 ч.	
	Р.		Р.		Р.			Р.		Р.		Р.	
1,5	40	—1,5	39	—2,5	40	—1,5	59	57	—2	55,5	—4,5	57	—2
3	45,5	—7,5	46	—7	48,5	—4,5	73,5	69	—4,5	61,5	—12	63,5	—10
1	40,5	—0,5	41	0	42,5	+1,5	40	47,5	+7,5	42,5	+2,5	48,5	+8,5
0	44,5	+4,5	46	+6	46	+6	51,5	52,5	+1	49,5	—2	51,5	0
0,5	41	+0,5	40,2	—0,3	39,5	—1	61,5	56,5	—5	58	—3,5	55,5	—6
3	42	—1	42	—1	42	—1	62	53,5	—8,5	54,5	—7,5	52	—10
2,5	40,5	—2	38,5	—4	43	+0,5	58,5	55,5	—3	55	—3,5	53,5	—5
3	41,5	—6,5	42,5	—5,5	44,5	—3,5	52	59	+7	63,5	+11,5	57,5	+5,5
0	56	+7	55	+6	53,5	+4,5	76	75,5	—0,5	70	—6	69	—7
0,5	40	—0,5	39,2	—1,3	39,7	—0,8	56,5	59	+2,5	60	+3,5	56,5	0
0,5	40,5	+1	39,5	0	41	+1,5	46	52,5	+6,5	51,5	+5,5	50	+4
3	50,5	+2,5	51	+3	51,2	+3,2	69,5	71,5	+2	72,5	+3	71,5	+2
0,7	37,5	—3,2	41,5	+0,8	40,7	0	54	52	—2	57	+3	52,5	—1,5
2	41,5	—0,5	40	—2	40,7	—1,3	55	57,5	+2,5	53,5	—1,5	55	0
4	45	+1	44	0	46,5	+2,5	71	69	—2	65,5	—5,5	71,5	—0,5
среднемъ	—0,4	—	—0,5	—	—0,4	—	—	—	+0,1	—	—1,1	—	—1,5
1,5	43	+1,5	43	+1,5	42,5	+1	66	66,5	+0,5	66,5	+0,5	73,5	+7,5
3,5	41,5	—2	41	—2,5	40,2	—3,3	73,5	68	—5,5	66	—7,5	66,5	—7
0	40,2	+0,2	43,5	+3,5	43	+3	52,5	56	+3,5	54,5	+2	64	+11,5
3	43,5	+0,5	44,5	+1,5	42	+1	51,5	52	+0,5	54,5	+3	50,5	+1
2	44,5	+2,5	45	+3	42	0	67,5	65	—2,5	66	—1,5	61,5	—6
0	38,5	—1,5	37,5	—2,5	37,7	—2,3	59,7	59,5	—0,2	57,5	—1,8	57,5	—1,8
1	38	—3	39,5	—1,5	42,5	+1,5	59	53,5	—5,5	53	—6	54	—5
5	43,5	—1,5	43	—2	44,5	—0,5	49,5	58	+8,5	59	+9,5	54	+4,5
3,5	46	+2,5	45,5	+2	46	+2,5	76	65	—9	65	—9	59	—17
3,5	43	—0,5	43,5	0	43	—0,5	74	72,5	—2,0	68,5	—5,5	72	—2
6	35,5	—0,5	34,5	—1,5	35,5	—0,5	50	56,5	+6,5	58,5	+8,5	59	+9
2,7	42,7	0	42	—0,7	42,2	—0,5	65,5	63,5	—2	63	—2,5	68,5	+3
9,5	35,5	—4	39,5	0	39,5	0	54,5	53,5	—1	58,5	+4	59,5	+5
6,5	37,5	+1	37,2	+0,7	37,5	+1	63	66,5	+3,5	68,5	+5,5	62,5	—0,5
4	43,5	—0,5	43	—1	40,5	—3,5	69,5	65	+4,5	54	—15,5	67,5	—2
среднемъ	—0,3	—	+0,03	—	—0,1	—	—	—	—1,0	—	—1,1	—	+0,01

П р а в о й.

Л ѣ в о й.

Правой.

Лѣвой.

Выводъ см. ниже.

Таблица № 23.

При почечуйной душ-
кану температуровъ
18—19°R въ прод. 3

Мышечная сила

конечностей въ килограммахъ

В е р х н и х ъ.

Н и ж н и х ъ.

№№ опыта.	До души.	Послѣ души въ концѣ						До души.	Послѣ души въ концѣ					
		1/2 часа.		1 ч.		2 ч.			1/2 часа.		1 ч.		2 ч.	
			Р.		Р.		Р.			Р.		Р.		Р.
1	47,5	54	+6,5	53,5	+6	53	+5,5	72,5	68	-4,5	67	-5,5	70	-2
2	41	40	-1	44	+3	43	+2	53	57	+4	69	+16	62,5	+9,5
3	41	40	-1	39,5	-1,5	41,7	+0,7	58,7	56	-2,7	54,5	-4,2	54	-4,5
4	49,2	47	-2,2	43	-4	41	-8,2	63	72	+9	68	+5	69	+6
5	49,5	51	+1,5	52,5	+3	52,5	+3	71	68	-3	63	-8	72,5	+1,5
6	41	42	+1	42	+1	42	+1	62,5	56,5	-6	64,5	+2	65	+2,5
7	39	41,5	+2,5	41,5	+2,5	38,5	-0,5	57	58,5	+1,5	54,5	-2,5	53,5	-3,5
8	44	44,5	+0,5	42,5	-1,5	46,5	+2,5	72,5	72	-0,5	77	+4,5	73,5	+1,5
9	42,5	41,5	-1	41,5	-1	44,5	+2	57	59	+2	57,7	+0,7	59	+2
10	41	41,5	+0,5	39,5	-1,5	39,5	-1,5	61	50	-11	53	-8	52	-9
11	55	52	-3	52,5	-2,5	51,5	-3,5	79,5	64,5	-15	67	-12,5	66,5	-13
12	42	42,5	+0,5	41	-1	40,5	-1,5	54	56	-2	54,5	+0,5	54,5	+0,5
13	43,5	41	-2,5	42,5	-1	43	0	64,5	54,5	-10	56,5	-8	55,5	-9
14	43,5	45	+1,5	43,5	0	45	+1,5	55,5	64,5	+9	62	-6,5	56,5	+1
15	39,5	41,5	+2	41	+1,5	40,5	+1	56,5	53,5	-3	54	-2	55,5	+1
Въ среднемъ			+0,4	—	+0,2	—	+0,3	—	—	-2,2	—	-1,9	—	-1,5

1	43,7	43,5	-0,2	41,5	-2,2	43,5	-0,2	64,5	62	-2,5	61,5	-3	69	+4
2	40	37,5	-2,5	42	+2	42,5	+2,5	65,5	58	-7,5	70,5	+5	69,5	+4
3	42,5	43,7	+1,2	43	+0,5	44,5	+2	71	69	-2	65	-6	67	-4
4	43	43,5	+0,5	43	0	41,5	-1,5	64	61,2	-2,8	65	+1	68,5	+4
5	43,5	43	-0,5	43	-0,5	41,5	-2	63,7	66,5	+2,8	67	+3,3	74	+13
6	41	38,7	-2,3	39,5	-1,5	40,5	-0,5	57,5	63,5	+6	65,5	+8	71	+15
7	36,5	37,5	+1	37,5	+1	37	+0,5	53,5	52,5	-1	55,5	+2	55,5	+2
8	44	44,5	+0,5	44	0	42,5	-1,5	66	68,5	+2,5	73	+7	74,5	+8
9	41	39	-2	41,5	+0,5	41,5	+0,5	57	64	+7	60	+3	62,5	+5
10	43	41,5	+1,5	41,5	+1,5	43	0	74	69,5	-4,5	66	-8	68,5	-5
11	42	43	+1	43	+1	44	+2	69,5	58,5	-11	58,5	-11	55	-15
12	39	39	0	37	-2	39,5	+0,5	55,5	55,5	0	58,5	+3	57,5	+2
13	40,5	39	-1,5	40	-0,5	39,5	-1	69	63,5	-5,5	64	-5	58,5	-15
14	44	45,5	+1,5	45,5	+1,5	46	+2	75,5	67	-8,5	76	+0,5	68	-7
15	38	36	-2	36,5	-1,5	38,5	+0,5	60	57,5	-2,5	60	0	64	+4
Въ среднемъ			-0,2	—	-0,01	—	+0,2	—	—	-1,9	—	-0,01	—	+1

Выводъ см. ниже.

Таблица № 24.

При сидячей почечуйной
душѣ температурою въ
12—13°R прод. 1½'.

Мышечная сила

конечностей въ килограммахъ

Верхнихъ.

Нижнихъ.

До души.	Послѣ души въ концѣ						До души.	Послѣ души въ концѣ					
	1/2 часа.		1 часъ.		2 часа.			1/2 часа.		1 часъ.		2 часа.	
	Р.		Р.		Р.			Р.		Р.		Р.	
42,2	41,5	-0,7	41,2	-1	41	-1,2	62,5	62	-0,5	56,5	-6	55,5	-7
56,5	53,5	-3	55,5	-1	58,5	+2	71	69,5	-1,5	80,5	+9,5	86,5	+15,5
53	50,5	-2,5	50	-3	55	+2	84	83,5	-0,5	75	-9	79	-5
39	39	0	39	0	39,5	+0,5	50,5	52,5	+2	49,5	-1	50,5	0
38	39,5	+1,5	39	+1	40,5	+2,5	45	50,5	+5,5	51	+6	50	+5
39,5	41,5	+2	40,2	+0,7	41,5	+2	47	49,5	+2,5	48	+1	46	-1
40,5	39	-1,5	43	+2,5	43,5	+3	58	62,5	+4,5	60,5	+2,5	53,5	-5
41,5	43,5	+2	43,2	+1,7	42,7	+1,2	48,5	47,5	-1,0	48,5	0	46,5	-2
43,5	43,2	-0,3	41,5	+2	41	-2,5	53,5	53,5	0	58,5	+5,0	58,5	+5
42,7	42,5	-0,2	43,5	-0,8	42,2	-0,5	51	59,7	+8,7	53,5	+2,5	54	+3
41	42	+1	41,5	+0,5	41	0	67	67	0	57,5	-9,5	60,5	-6,5
41	43,7	+2,7	43	+2	41,5	-0,5	42,7	47	+4,3	47	+4,3	45,5	+2,8
45	45	0	44,5	+0,5	41,2	-3,8	55,5	65	+9,5	62,5	+7	60	+4,5
43,5	40,5	-3,6	42,2	-1,3	40,5	-3	49,5	60	+10,5	67	+17,5	63	+13,5
46	44,5	-1,5	45,5	+0,5	44,5	-1,5	66	67	+1	57,5	-8,5	69	+3
среднемъ	-0,2	-	+0,28	-	+0,01	-	-	-	+3	-	+1,4	-	+1,6
П р а в о й.													
2,5	43	+0,5	43	+0,5	42,5	0	72	66,5	-5,5	64,5	-7,5	63,5	-8,5
5	52	-3	45,5	-2,5	46	-9	79,5	75,7	-3,8	74	-5,5	87,5	+8
4	47,5	-6,5	52	-2	43	-11	87,5	84,5	-3	85,5	-2	93,5	+6
7	39,5	+2,5	36,5	-0,5	38,5	+1,5	61	65,5	+4,5	62	+1	56	-5
8	37,5	-0,5	37	-1	39	+1	47,5	51	+3,5	50	+2,5	49,5	+2,0
0,5	42	+1,5	42,7	+2,2	40	-0,5	59	65	+6	61	+2	63,5	+4,5
6	33	-3	33,5	+2,5	37,5	+1,5	67	59,5	-7,5	55	-12	57	-10
2,2	42	-0,2	43	+0,8	43	+0,8	66	60	-6	65	+1	59,5	-6,5
0,5	38	-2,5	39,7	-0,8	38	-2,5	50,5	53,5	+3	48	-2,5	51	-0,5
1,5	38,5	-3	36,5	+5	38,5	-3	58,5	58	+0,5	55	-3,5	55	-3,5
1,7	42	+0,3	42,2	+0,5	40	-1,7	74,5	72	-2,5	59	-15,5	61	-13,5
2,2	42,2	0	41	-1,2	41	-1,2	63,5	64,5	+1	63	-0,5	62,5	-1
9,5	41	-1,5	40,5	+1	38,5	-1	58	61	+3	56,5	-1,5	55	-3
9,5	41,7	-2,2	40,7	-1,2	42,5	-2,5	58	66,5	+2,5	68,5	+10,5	76,5	+18,5
2,5	42,7	-0,2	44,5	+2	45	+2,5	67,5	67,5	0	69	+1,5	73,5	+6
среднемъ	-1,2	-	+0,35	-	-1,6	-	-	-	-0,3	-	-1,5	-	-0,4
Л ѣ в о й.													

Выводъ см. ниже.

Таблица № 25.

При сидячей почечу
душѣ темпер. 12—
прод. 3 мин.

Мышечная сила

конечностей въ килограммахъ

В е р х н и х ъ.

Н и ж н и х ъ.

№№ опыта.	До души.	Послѣ души въ концѣ						До души.	Послѣ души въ концѣ					
		$\frac{1}{2}$ часа.		1 ч.		2 ч.			$\frac{1}{2}$ часа.		1 ч.		2 ч.	
		Р.		Р.		Р.			Р.		Р.		Р.	
1	39,5	45	+5,5	40,7	+1,2	42,5	+3	47,5	51,5	+4	52	+4,5	54,5	+7
2	47	44,5	-2,5	45,5	-1,5	43	-4	70,5	58,5	-12	69,2	-1,3	62	-8,5
3	40,5	41,5	+1	40,7	+0,2	42	+1,5	47,5	47,5	0	47,5	0	52	-4,5
4	43,5	49	+5,5	43	-0,3	44	-0,5	67,5	69	+1,5	74	-6,5	67	-0,5
5	39,5	40,5	+1	43,5	+4	42,5	+3	59	58,5	-0,5	53,5	-5,5	56,5	-2,5
6	41,7	42,5	+0,8	42,5	+0,8	41,7	0	41	45	+4	54	+13	54	+13
7	42	44,5	+2,5	43,2	+1,2	44	+2	70,5	75	+4,5	67,5	-3	70,5	0
8	42,2	42,7	+0,5	43,2	+1	41,5	-0,7	42,5	41,5	-1	49	+6,5	41,5	-1
9	43	43,7	+0,7	40,7	-2,3	40,5	-1,5	50	60	+10	60 5	+10,5	55	+5
10	41,7	42	+0,3	42	+0,3	44	+2,3	63	61	-2	55,5	-7,5	59,0	-4
Въ среднемъ		+1,02	—	+0,3	—	+0,3	—	—	—	+0,5	—	+0,6	—	+0,2

1	42,7	42,7	0	42,5	-0,2	38	-4,7	53	54,5	+1,5	54	+1	53	0
2	39,5	39,5	0	38,5	-1	39,5	0	63	67	+4	63	0	58,5	-4,5
3	42,7	40	-2,7	42,2	-0,5	40,5	-2,2	73	57	-16	61	-12	54	-19
4	41,5	42,5	+1	40	-1,5	39,5	-2	68	63,5	-4,5	67	-1	73,5	+5,5
5	39,5	41	+1,5	41	+1,5	39	+0,5	61	59	-2	63	+2	58,5	-2,5
6	44	44	0	41,5	-2,5	44	0	76,5	67	-9,5	68	-8,5	68,5	-8
7	41	39	-2	42	+1	38	-3	58,5	61	+2,5	62	+3,5	59,5	+1
8	43,5	42,2	-1,3	44,5	+1	44,5	+1	71	65,5	-5,5	62	+9	67,5	+3,5
9	40	41,5	+1,5	40	0	42,5	+2,5	66,5	66	-5	60	-6,5	58	-8,5
10	42	41,5	-0,5	40,5	-1,5	42,5	+0,5	67	66	-1	65,5	-1,5	63,5	-3,5
Въ среднемъ		-0,1	—	-0,2	—	-0,46	—	—	—	-2	—	-0,9	—	-2,4

Выводъ см. ниже.

Таблица № 26.

При почечуиной души въ шкапу температурою въ 12—13°R прод. 1½ мин.

Мышечная сила

конечностей въ килограммахъ.

Верхнихъ.

Нижнихъ.

Послѣ души въ концѣ.							До души.	Послѣ души въ концѣ.						
1/2 часа.		1 ч.		2 ч.				1/2 часа.		1 ч.		2 ч.		
Р.		Р.		Р.				Р.		Р.		Р.		
2	42,2	-0,8	42,5	-0,5	42,5	-0,5	70	59,5	-10,5	56	-14	62	-8	И В О Р Ф Д
7	43	-0,2	44	+0,7	40,5	-2,7	56,5	60,5	+4	70	+13,5	64	+7,5	
5	48,5	+2,8	45,5	-0,2	46	+0,3	72	83,5	+11,5	73,5	+1,5	73	+1	
5	43	-2,2	41,2	-4,3	41	-4,5	52,5	58	+5,5	76,5	+24	71,5	+19	
2	47,2	+0,7	45,5	-1	44,5	-2	73	72	-1	73	0	65	-8	
2	42	-0,2	43,2	+1	42	-0,2	44,5	39,5	-5	42,5	-2	44,5	0	
	45	-2	44,5	-2,5	47,7	+0,7	64,5	66	+1,5	78	+13,5	70	+5,5	
	43	0	43,5	+0,5	45	+2	44,5	42,5	-2	45	-0,5	43	-1,5	
5	42,5	-1	43,7	+0,2	43,7	+0,2	42,5	46	+3,5	44,2	+1,7	47	+4,5	
5	44,5	-3	46	-1,5	46,2	-1,3	77,5	74	-3,5	77	-0,5	84	+6,5	
5	44,5	+2	44	+1,5	42,2	-0,3	49	47,5	-1,5	49	0	45,5	-3,5	
	40,7	-1,3	40,5	-1,5	43	+1	52,5	68,5	+16	58,5	+6	76	+13,5	
	41,5	+1,5	42,7	-0,3	46	+3	65	64,5	-0,5	66	+1	60,5	-4,5	
5	50,5	+3	47	-6,5	55	+1,5	63,5	63	-0,5	74,5	-11	72,5	-9	
5	45,2	-0,3	42,2	-3,3	42	-3,5	79,5	75	-4,5	74,5	-5	71	-8,5	
днемъ	-0,06	—	-1,2	—	—	-0,4	—	—	+0,9	—	+1,9	—	+1,	
4	44,7	+1,7	43,5	+0,5	42,7	-0,3	68	67,5	-0,5	78	+10	69,5	+1,5	И В О Р Ф Д
2	41,7	-0,3	42,5	+0,5	39,5	-2,5	71,5	73,5	+2	79	+7,5	72,5	+1	
2	44	+1	44	+1	44	+1	71	80	+9	74	+3	66,5	-4,5	
2	42,5	-0,8	42,5	-0,8	40,2	-3	70	70	0	81,5	+11,5	68	-2	
7	43,5	-0,2	43,7	0	43,5	-0,2	65	63,5	-1,5	66,5	+1,5	65,5	+0,5	
5	43	-1,5	42	-2,5	44,5	0	70,5	63,5	-7	68	-2,5	65	-5,5	
5	41,7	-1,8	43,5	0	44	+0,5	63,5	73,5	+10	70	+6,5	78,5	+15,0	
7	45,5	+0,8	44,5	-0,2	49	+4,3	71	61	-10	62,5	-8,5	67,5	-3,5	
2	47,5	+2,3	45,5	+0,3	46,5	+1,3	64	61,5	-2,5	60,5	-3,5	64	0	
5	44	+0,5	43,7	+0,2	42,5	+1	81	72,5	-8,5	79,5	-1,5	77	-4	
4	47	+3	47,5	+3,5	49	+5	75,5	62,5	-13	62,5	-13	64	-11,5	
1	41,7	+0,2	42,7	+1,2	42,5	+1	64,5	61,5	-3	72	+7,5	80	+15,5	
2	43,5	+1,5	40	-2	39,5	-2,5	58	61,5	+3,5	54	-4	50,5	-7,5	
4	45,5	+1,5	44	0	46	+2	56,5	56,5	0	60	+3,5	57	-0,5	
1	42,7	+1	41,7	0	43	+1,3	70	66	-4	69,5	-0,5	64,5	-5,5	
времъ	+0,6	—	+0,1	—	—	+0,6	—	—	-1,6	—	+1,1	—	-0,7	

Вводъ общій для предыдущихъ и этой таблицы: Сидячія почечуиная души взятыхъ въ разнѣхъ продолжительности, а также души въ шкапу темпер. 18—19°R прод. 1½ и температурою 12—13°R прод. 1½ мин. не измѣняютъ правильно мышечной силы и огня.

Таблица № 27.

При почечуйной
въ шкапу температур
12 — 13°R прод. 3 м.

Мышечная сила

конечностей въ килограммахъ.

Верхнихъ.

Нижнихъ.

№ опыта.	До души.	Послѣ души въ концѣ						До души.	Послѣ души въ концѣ						
		1/2 часа.		1 часъ.		2 часа.			1/2 часа.		1 часъ.		2 часа.		
		Р.		Р.		Р.			Р.		Р.		Р.		
1	42,5	40,5	—2	42	—0,5	37	—5,5	63	58,5	—4,5	69	+6	61	—2	
2	42	43,2	+1,2	42	0	41,5	—0,5	58,5	59,5	+1	61,5	+3	67,5	+9	
3	45	45	0	45	0	45	0	77	78,5	+1,5	80	+3	76	—1	
4	41	42	+1	42,2	+1,2	42,2	+1,2	43	44,5	+1,5	43,5	+0,5	48,5	+1	
5	43,5	42,5	—1	44	+0,5	46,5	+3	63	59	—4	59,5	—3,5	61,5	—1	
6	40	41	+1	41,2	+1,2	40	0	47	45	—2	49	+2	50,5	+3	
7	42,2	45,5	+3,3	45	+2,8	44,5	+2,3	60	69	+9	70	+10	68	+8	
8	45	46,5	+1,5	46	+1	45	0	73	77	+4	69	—4	78,5	+1	
9	40	42,7	+2,7	41	+1	40	0	5,22	4,75	—4,7	45,5	—6,7	44,5	—	
10	43,5	45,7	+2,2	41	—2,5	43,5	0	83	82	—1	79	—4	83,5	+1	
Въ среднемъ		+0,6		+0,3		+0,03				+0,5		+0,4		+1	

1	42,5	40	—2	40	—2	36,5	—5,5	68,5	66,5	—2	72,5	+4	59	—	
2	40,5	40	0	38,5	—1,5	37	—3	67	61,5	—5,5	63,5	—3,5	63,5	—	
3	43	44	+1	43,2	+0,2	41,2	—1,8	68,5	75,5	+7	72	+3,5	70	+5	
4	43	44	+1	45	+2	45,5	+2,5	64,5	63,5	—1	61	—3,5	66	+5	
5	42	42	0	43,2	+1,2	44	+2	67	72,5	+5,5	71,5	+4,5	70,5	+5	
6	44	41,5	—2,5	44,5	+0,5	44	0	68	65	—3	65,5	—2,5	64,5	—5	
7	41,5	44	2,5	43,2	+1,7	42,7	+1,2	77,5	76	—1,5	71,5	—6	82,5	+1	
8	41,5	41,5	0	40	—1,5	41,7	+0,2	73,5	72	—1,5	74,5	+1	77	+5	
9	43,2	44	+0,8	42,7	—0,5	44	+0,8	74	71	—3	68	—6	73	—	
10	38,5	41	+2,5	41,5	+3	42,5	+4	60,5	69,5	+9	72	+11,5	63	+5	
Въ среднемъ		+0,2		+0,2		+0,2				+0,2		+0,2			

Выводъ: При почечуйной душѣ въ шкапу температурою 12—13°R прод. 3 м. мышечная сила рукъ и ногъ повышается.

Рефлексы.

Мы изслѣдовали вліяніе занимающей насъ души на голенно-стоппный (сокращеніе мышцъ разгибающихъ голень), колѣнный (сокращеніе мышцъ разгибающихъ бедро), мошоночный (сокращеніе *m. cremast.*), ягодичный (сокращеніе ягодичныхъ мышцъ) и брюшной (сокращеніе главнымъ образомъ *recti abdominis*) рефлексы.

Вызывались они: 1-й) съ лѣвой ноги обыкновеннымъ клиническимъ способомъ (см. у Gowers'a (²⁷) стр. 31), 2-й) ударомъ по отмѣченному мѣсту соотвѣтственно сухожилію лѣвой колѣнной чашки молоточкомъ прив. доцента С. Н. Данилло (³⁵), отводившемся каждый разъ на 10 дѣленій по дугѣ (наибольшая сила *), 3-й) поглаживаніемъ внутренней поверхности праваго бедра металлической головкой перкуторнаго молоточка, 4) легкимъ уколомъ одной силы на кожѣ лѣвой ягодицы маленькой булавкой и 5) проведеніемъ ручкой перкуторнаго молоточка по кожѣ лѣвой половины живота соотвѣтственно ходу волоконъ *m. m. obliqui abdomin. externi* (Landois ²⁶). Сила рефлексовъ кромѣ колѣннаго опредѣлялась на глазъ, колѣннаго же слѣдующимъ образомъ: наблюдаемый садился на особый табуретъ, стоявшій на краю возвышающейся надъ поломъ площадки и имѣвшій сбоку чегыреугольный подвижной экранъ. На этомъ экранѣ была нанесена дуга, раздѣленная на градусы радіусами (болѣе длинными, чѣмъ разстояніе отъ колѣна до подошвы), выходящими изъ центра, соотвѣтствующаго колѣнному сгибу; подвижность нашего экрана давала возможность всегда ставить центръ дуги соотвѣтственно сгибу, въ силу чего можно было отмѣчать число градусовъ, описываемыхъ по дугѣ какой нибудь точкой (у насъ передней поверхности *tibiae* у го-

*) Мы употребляли молоточекъ нѣсколько упрощенный (съ согласія и по указаніямъ многуважаемаго автора)—упрощеніе состояло въ отсутствіи приспособленій для электрическихъ проводовъ и въ неподвижности головки молоточка по верхней вѣтви, нижняя вѣтвь имѣла кромѣ того еще родъ наковальни, назначеніе которой удерживать обѣ вѣтви параллельными другъ другу. Дабы не стѣснять экскурсіи голени мы держали молоточекъ ручкой сверху.

ленно-стопного сгиба) передней поверхности голени съ точностью до $1/2$ градуса ^{*)},

Цифры въ графахъ колѣннаго рефлекса означаютъ эти градусы, для остальныхъ рефлексовъ мы взяли выраженія слабый, средній, сильный и знаки $>$ меньше предыдущаго, $<$ больше предыдущаго, $=$ равенъ предыдущему, 0 — нѣтъ рефлекса.

Понятно, что средній, слабый и сильный на нашъ взглядъ. Рефлексы изслѣдовались непосредственно передъ душой и въ первый разъ (въ началѣ 1-го получаса) непосредственно послѣ нея, кромѣ впрочемъ голенностопнаго, который въ первый разъ послѣ души изслѣдовался въ началѣ втораго получаса. Въ послѣдней таблицѣ записаны данныя опытовъ, при которыхъ изслѣдовался только колѣнный рефлексъ.

*) Мы остановились на такой комбинаціи опредѣленія колѣннаго рефлекса, игнорируя, такъ сказать, способы Heller'a ²⁸⁾ и Warren Lombard'a ²⁹⁾ (способъ Яковлева ³⁰⁾ опубликованъ послѣ окончанія этой части работы), въ виду ея удобоисполнимости: краткость времени и пр. по отношенію къ другимъ опредѣляемымъ величинамъ. Здѣсь же прибавимъ, что по нашимъ наблюденіямъ, даже избѣгая обстоятельствъ, измѣняющихъ колѣнный рефлексъ: поглаживанія у подколѣнной чашки, частыхъ (каждая 2—4 секунды) и сильныхъ ударовъ см. у Schreiber'a (31 и 32), не удастся получить рефлексовъ вполнѣ одинаковой силы, а только приблизительно одинаковой. Другими словами колѣнный рефлексъ явленіе непостоянное относительно силы, почему мы и воздержимся въ послѣдующемъ отъ сравненія результатовъ измѣненій его при душахъ различной температуры и продолжительности.

Рефлексы:

Таблица № 28.

№ опыта.	Голенност.				Колѣнный.				Кремастера.				Брюшной.				Ягодичный.				При контрольных опытахъ. Примѣчаніе.
	До перер.	послѣ пер.		черезъ	До перер.	послѣ пер.		черезъ	До перер.	послѣ пер.		черезъ	До перер.	послѣ пер.		черезъ	До перер.	послѣ пер.		черезъ	
		1/2	1 ч.			сейч.	1/2			1 ч.	сейч.			1/2	1 ч.			сейч.	1/2		
1	0	0	0	0	18	15	12	17	сл.	>	сл.	=	ср.	=	=	=	сл.	>	=	=	Мошонка не сморщилась.
2	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	>	сл.	=	0	0	0	0	ср.	=	=	=	
3	0	0	0	0	3	2	2	1	сл.	>	0	сл.	сл.	0	0	0	ср.	=	=	=	
4	0	0	0	0	17	13	17	8	сл.	<	=	=	ср.	=	=	=	сл.	=	=	=	
5	0	0	0	0	1	1	1	0	сл.	=	=	=	0	0	0	0	сл.	=	=	=	
6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	<	=	0	0	0	0	0	ср.	=	=	=	
7	0	0	0	0	8	2	0	1	сл.	>	=	=	0	0	0	0	ср.	=	=	=	
8	0	0	0	0	0	0	1	0	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	=	=	<	
9	0	0	0	0	4	4	2	5	сл.	=	>	=	0	0	0	0	ср.	=	>	=	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<	=	0	0	0	0	0	сл.	0	сл.	0	
11	0	0	0	0	2	2	0	0	0	сл.	=	0	0	0	0	0	ср.	=	=	>	
12	0	0	0	0	15	11	13	10	сл.	=	=	=	ср.	=	=	=	ср.	>	ср.	=	
13	0	0	0	0	3	2	2	2	сл.	=	0	0	сл.	0	0	0	ср.	=	=	=	
14	0	0	0	0	1	1	8	2	сл.	<	=	=	0	0	0	0	сл.	>	=	>	
15	0	0	0	0	0	4	4	8?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Въ среднемъ 4,7 3,7 4,1 3,8									=	=	=		=	=	=		=	=	=	=	Мошонка раслаб.

Выводъ: При контрольных опытахъ рефлексы: колѣнный слегка ослабляется, кремастера, брюшной и ягодичный — остаются почти безъ переменъ. Голеннотопный же не появляется ни до перерыва, ни послѣ него. Такъ какъ тоже замѣчено (о голеност рефл.) и при всѣхъ послѣдующихъ опытахъ (съ душами), то въ выводахъ онъ упоминаться не будетъ.

Таблица № 29.

Рефлексы:

№ опыта.	Голеност. послѣ души. черезъ				Колѣнный. послѣ души. черезъ				Кремастера. послѣ души. черезъ				Брюшной. послѣ души. черезъ				Ягодичный. послѣ души. черезъ				
	До души.		сейч.		До души.		сейч.		До души.		сейч.		До души.		сейч.		До души.		сейч.		
	1/2	1 ч.	1/2	1 ч.	1/2	1 ч.	1/2	1 ч.	1/2	1 ч.	1/2	1 ч.	1/2	1 ч.	1/2	1 ч.	1/2	1 ч.	1/2	1 ч.	
1	0	0	0	0	4	0	10	8	сл.	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
2	0	0	0	0	20	15	16	12	сл.	0	0	0	0	сл.	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	15	9	10	12	сл.	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
4	0	0	0	0	10	4	5	15	сл.	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
5	0	0	0	0	15	7	6	15	сл.	0	0	0	0	сл.	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	20	19	5	9	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	0	0	0
7	0	0	0	0	15	8	12	10	сл.	0	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	0	0	0
8	0	0	0	0	2	0	1	1	сл.	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
9	0	0	0	0	3	1	2	2	сл.	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
10	0	0	0	0	4	0	12	4	сл.	0	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	0	0	0
11	0	0	0	0	8	0	0	1	сл.	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
12	0	0	0	0	8	2	10	7	сл.	0	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	0	0	0
13	0	0	0	0	15	11	15	12	сл.	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
14	0	0	0	0	11	8	10	8	сл.	0	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	3	20?	сл.	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
Въ среднемъ:				10	5,5	7,8	9		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0

Выводъ: При сидячей почечуйной душѣ T°18—19°R. прод. 1½ мин. рефлексы: колѣнный, кремастера, брюшной и ягодичный ослабляются. Это ослабление длится не менѣе часа послѣ души, какъ и во всѣхъ послѣдующихъ опытахъ.

При сидячей почечуйной душѣ T°19°R. прод. 1½ мин. Примѣчаніе

Мошонка сморщена послѣ души какъ и во всѣхъ послѣдующихъ опытахъ.

Необыч. послѣ

Таблица № 30.

1	0	0	0	2	0	1	0	сл.	0	0	0	сл.	0	0	<	сл.	>	<	=
2	0	0	0	4	2	3	6	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	>	=	=
3	0	0	0	8	4	6	6	сл.	0	<	=	сл.	0	0	<	сл.	0	0	0
4	0	0	0	3	1	1	1	сл.	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	>	=	=
5	0	0	0	3	1	8	3	сл.	0	0	<	0	0	0	0	сл.	=	>	=
6	0	0	0	0	0	0	1	сл.	0	0	<	0	0	0	0	сл.	>	=	>
7	0	0	0	0	0	0	2	сл.	0	<	=	0	0	0	0	сл.	>	=	=
8	0	0	0	0	0	0	2	сл.	0	<	=	0	0	0	0	сл.	0	0	<
9	0	0	0	20	15	15	12	сл.	0	0	<	сл.	0	<	=	сл.	0	<	=
10	0	0	0	20	12	20	15	сл.	0	0	<	сл.	>	0	0	сл.	>	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	<	=
12	0	0	0	5	0	0	1	сл.	0	0	<	0	0	0	0	сл.	>	=	=
13	0	0	0	2	1	1	0	сл.	0	0	<	сл.	>	0	0	сл.	>	=	=
14	0	0	0	0	0	1	1	сл.	0	<	=	0	0	0	0	сл.	>	=	=
15	0	0	0	15	9	15	15	сл.	0	0	<	сл.	>	=	=	сл.	0	<	=
Въ среднемъ: 5,4 3 4,6 4,3				0 0 <				> 0 0				> = =							

Выводъ: При сидячей почечуйной T°18—19°R прод. 3 мин. рефлексы: колѣнный, кремастера брюшной и ягодичный ослабляются.

При сидячей почечуйной душѣ T°19°R прод. 3 мин. Примѣчаніе

Рефлексы:

При почечуйной
душѣ въ шкапу
темпер. 18°—19°R
прод. 1½'.

Примѣчаніе

Таблица № 31.

№ опыта.	Голенност. послѣ души. черезъ				Колѣнный. послѣ души. черезъ				Кремастера. послѣ души. черезъ				Брюшной. послѣ души. черезъ				Ягодичный. послѣ души. черезъ			
	До души.	сейчасъ.	½ ч.	1 ч.	До души.	сейчасъ.	½ ч.	1 ч.	До души.	сейчасъ.	½ ч.	1 ч.	До души.	сейчасъ.	½ ч.	1 ч.	До души.	сейчасъ.	½ ч.	1 ч.
1	0	0	0	0	4	2	7	6	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	>	=	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	>	0	0
3	0	0	0	0	20	5	12	13	сл.	0	0	<	сл.	0	0	<	сл.	>	0	0
4	0	0	0	0	15	11	4	15	сл.	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	0	0	0
5	0	0	0	0	5	3	15	7	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	>	0	<
6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	>	=	=
7	0	0	0	0	20	14	15	12	сл.	0	0	<	сл.	0	<	0	сл.	0	<	=
8	0	0	0	0	15	11	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	<	=	0	0	0	0	сл.	0	<	=
10	0	0	0	0	15	5	15	11	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	<	=
11	0	0	0	0	1	0	1	3	сл.	0	0	<	0	0	0	0	сл.	>	=	=
12	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
13	0	0	0	0	17	10	11	4	сл.	0	0	<	сл.	>	0	<	сл.	0	0	<
14	0	0	0	0	5	3	2	2	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	>	<	=
15	0	0	0	0	13	7	10	9	0	0	0	<	0	0	0	0	сл.	0	0	0
Въ среднемъ 8,6				4,6	7,1	6,3	0	0	<	0	0	<	0	0	<	>	<	=		

Выводъ: При почечуйной душѣ въ шкапу температура 18—19°R прод. 1½ рефлексъ: колѣнный, кремастера, брюшной и ягодичный ослабляются.

Таблица № 32.

1	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
2	0	0	0	14	5	4	15	сл.	0	0	0	сл.	>=	=	сл.	>	0	=		
3	0	0	0	5	0	3	7	сл.	0	0	0	0	0	0	сл.	0	<	=		
4	0	0	0	15	11	15	12	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0		
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	<		
6	0	0	9	16	7	15	6	сл.	0	0	0	сл.	0	<=	сл.	0	0	0		
7	0	0	0	0	0	1	1	сл.	0	0	0	0	0	0	сл.	>	<	=		
8	0	0	0	5	0	3	5	0	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	0	0	0	
9	0	0	0	7	7	7	7	сл.	0	0	<	сл.	0	<	<	сл.	0	0	0	
10	0	0	0	8	8	7	7	сл.	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	<		
11	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	<		
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	0	<	=	
13	0	0	0	15	6	10	15	сл.	0	>	=	сл.	=	=	<	сл.	0	0		
14	0	0	0	7	4	7	4	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0		
15	0	0	0	0	0	1	1	сл.	0	0	<	0	0	0	0	сл.	0	0	<	
Въ среднемъ				6,1	3,1	4,2	5,3	0	0	<					>	<	=	0	0	<

Выводъ: При почечуйной душѣ въ шкапу температурою 18—19°R прод. 3 мин. рефлексъ: колѣнный, кремастера, брюшной и ягодичный ослабляются.

При почечуйной
душѣ въ шкапу
темпер. 18—19°R
прод. 3 мин.
Примѣчаніе

Рефлексы:

При сидячей почечуной душъ температур. 12—13°R прод. 1½ мин.

Таблица № 33.

№ опыта.	Голенност. послѣ души.				Колѣнный. послѣ души.				Кремастера. послѣ души				Брюшной послѣ души				Ягодичный. послѣ души.				Примѣчаніе
	До души		чер.		До души.		чер.		До души.		чер.		До души.		чер.		До души.		чер.		
	сейчасъ.	1½ ч.	1 ч.		сейчасъ.	1½ ч.	1 ч.		сейчасъ.	1½ ч.	1 ч.		сейчасъ.	1½ ч.	1 ч.		сейчасъ.	1½ ч.	1 ч.		
1	0	0	0		8	3	1	2	сл.	0	0	<	0	0	0	0	сл.	0	<	=	
2	0	0	0		5	1	2	1	0	0	0	0	сл.	>	=	>	сл.	0	<	0	
3	0	0	0		3	0	0	1	сл.	0	0	0	сл.	=	>	=	сл.	0	0	<	
4	0	0	0		15	7	4	5	сл.	0	<	сл.	сл.	сл.	0	0	сл.	>	<	сл.	
5	0	0	0		5	3	2	2	сл.	0	0	<	сл.	0	0	0	сл.	>	сл.	=	
6	0	0	0		4	0	4	1	сл.	0	0	<	0	0	0	0	сл.	0	<	=	
7	0	0	0		0	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	>	<	=	сл.	0	<	сл.	
8	0	0	0		1	0	0	0	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	>	=	0	
9	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	<	сл.	0	0	0	
10	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	0	сл.	>	
11	0	0	0		12	7	5	3	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	=	>	=	
12	0	0	0		6	7	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	
13	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	0	0	0	
14	0	0	0		12	3	2	7	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	>	сл.	>	
15	0	0	0		24	12	14	17	сл.	0	<	=	сл.	0	<	=	сл.	0	0	>	
Въ среднемъ				6,3	2,8	2,4	3,0		0	0	<		>	0	0		0	<	>		

Выводъ: При сидячей почечуной душъ температурою 12—13°R прод. 1½ мин. рефлексы: колѣнный, кремастера и ягодичный ослабляются преимущественно непосредственно послѣ души, брюшной же дѣлается слабѣе въ послѣдующіе сроки наблюденія.

Таблица № 34.

прод., 3																				
Примѣчан																				
1	0	0	0	0	0	3	2	сл.	0	<	0	сл.	0	0	0	сл.	<	=	<	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	<	0	0	
3	0	0	0	1	0	0	0	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	<	сл.	0	0	0	сл.	0	0	0	
5	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	сл.	=	=	
6	0	0	0	2	0	6	1	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	сл.	
7	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	
8	0	0	0	4	4	3	6	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	<	0	
9	0	0	0	3	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	>	>	=	
10	0	0	0	12	8	9	3	сл.	0	0	<	сл.	0	0	<	сл.	сл.	0	0	
Въ среднемъ				3,5	1,4	2,5	1,8	0	0	<	0	0	0	>	=	=				

Выводъ: При сидячей почечуной душъ температурою 12—13°R прод. 3 мин. рефлексы: колѣнный, кремастера, брюшной и ягодичный ослабляются.

Рефлексы:

При почечуйной
душѣ въ шкапу
темпер 12—13°R
прод. 1½.

Таблица № 35.

Примѣчаніе

№ опыта.	Голенност.				Колѣнный.				Кремастера				Брюшной.				Ягодичный.			
	послѣ души.				послѣ души.				послѣ души.				послѣ души.				послѣ души.			
	До души.	1/2 ч.	1 ч.	чер.	До души.	сейчасъ.	1/2 ч.	1 ч.	До души.	сейчасъ.	1/2 ч.	1 ч.	До души.	сейчасъ.	1/2 ч.	1 ч.	До души.	сейчасъ.	1/2 ч.	1 ч.
1	0	0	0	0	11	1	6	3	сл.	0	0	<	0	0	0	0	сл.	>	=	сл.
2	0	0	0	0	3	1	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	<	=
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	4	4	0	4	сл.	0	<	0	0	0	0	0	сл.	сл.	=	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
6	0	0	0	0	4	1	0	1	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	<
7	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
8	0	0	0	0	3	2	4	6	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	сл.	=	0
9	0	0	0	0	8	2	6	12	сл.	0	0	<	0	0	0	0	сл.	<	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	0	0	<
11	0	0	0	0	3	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
12	0	0	0	0	3	1	4	5	сл.	0	0	0	сл.	0	0	0	сл.	0	<	0
13	0	0	0	0	5	4	2	4	сл.	0	0	<	0	0	0	0	сл.	>	=	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
15	0	0	0	0	7	6	2	5	сл.	0	<	0	0	0	0	0	сл.	0	<	=
Въ среднемъ					3,3	1,6	2	3,6	0	0	0		0	0	0		> = =			

Выводъ: При почечуйной душѣ въ шкапу температурою 12—13°R прод. 1½ рефлексы: колѣнный, кремастера, брюшной и ягодичный ослабляются.

Таблица № 36.

При почечуйной
душѣ въ шкапу
темпер. 12—13°
прод. 3 мин.
Примѣчаніе.

1	0	0	0	0	3	3	0	2	сл.	0	0	<	0	0	0	0	сл.	>	=	<
2	0	0	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	сл.	=	=
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	<
4	0	0	0	0	2	2	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
5	0	0	0	0	2	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	>	0	0
6	0	0	0	0	4	3	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
7	0	0	0	0	0	12	15	7	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0	0	сл.	0	0	0
9	0	0	0	0	5	2	10	5	сл.	0	0	0	0	0	0	0	сл.	0	0	0
10	0	0	0	0	8	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	сл.	>	<	=
Въ среднемъ					2,5	3,9	4,8	2,5	0	0	<		0	0	0	0	= = =			

Выводъ: При почечуйной душѣ въ шкапу температурою 12—13°R прод. 3 мин. рефлексы: колѣнный—усиливается, по крайней мѣрѣ, на первые полчаса послѣ души, кремастера и ягодичный ослабляются (брюшной до души не появлялся).

Таблица № 37,

№ опыта.	Фамилія.	Температура въ R	Температура въ R	Мѣсяцъ, число.	Часть дня.	Колѣнный рефлексъ при контрольныхъ опытахъ.						Души въ шкапъ. Примѣчаніе.
						Температура души.	Прод. души.	До души.	сейчасъ.	1/2 часа.	1 часъ.	
1	Панасовъ.	—	8 16,5	31 дек.	9 ч. 55'	—	—	3	2	0	2	
2	Шишпаръ	—	12 16	1 янв.	10 ч. 5	—	—	9	9	0	9	
3	Шишпаръ	—	11 15	2 »	10 ч. 13	18° 19°	3'	4	0	0	3	
4	Панасовъ.	—	11,5 13	3 »	10 ч. 5	12° 13°	3'	3	13	2	3	
5	Александровъ	—	4,5 14,2	6 »	9 ч. 51	12° 13°	3'	14	16	14	14	
6	Матвѣевъ.	—	4,5 14,2	6 »	10 ч.	—	—	9	7	6	6	
7	Александровъ	—	3 13,7	7 »	10 ч.	—	—	10	10	10	6	
8	Матвѣевъ.	—	3 13,7	7 »	9 ч. 46	18° 19°	3'	6	2	3	3	

Выводъ: При покойномъ положеніи наблюдаемаго колѣнный рефлексъ нѣсколько ослабляется. При почечуйной душѣ въ шкапу темпер. 18—19R° прод. 3 мин. колѣнный рефлексъ *ослабляется болѣе*. При тѣхъ же душахъ температурою 12—13°R онъ *усиливается*.

VIII.

Внутрибрюшное давленіе.

Мы опредѣляли измѣненіе относительнаго внутрибрюшнаго давленія по способу К. Э. Вагнера³³), т. е., вводили въ *ampullam recti* тонкостѣнный, наполненный водою и смазанный масломъ гуттаперчевый пузырь, находившійся въ соединеніи съ манометромъ, установленнымъ на опредѣленной высотѣ (см. ниже). Испытуемый для этихъ опытовъ ложился на кровати на спину, сложивъ на животѣ кисти рукъ и отчасти предлечья, плечи его покоились на тюфякѣ; ему при согнутыхъ, въ колѣняхъ, ногахъ вводился описанный выше пузырь, послѣ чего наблюдаемый, вытянувъ ноги, лежалъ спокойно до души. Отмѣтивъ стояніе ртути въ манометрѣ непосредственно послѣ введенія пузыря, приготовивъ душъ и вновь отмѣтивъ стояніе ртути послѣ $\frac{1}{4}$ часа спокойнаго положенія наблюдаемаго, мы вели его съ аппаратомъ къ душѣ, дѣлали душъ и затѣмъ снова отмѣчали стояніе ртути, послѣ того какъ наблюдаемый обсушившись, улегся въ прежнее положеніе. Кромѣ того черезъ $\frac{1}{4}$ часа, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ и 1 часъ послѣ души дѣлались такія же отмѣтки.

Послѣ первыхъ опытовъ выяснилось, что большихъ колебаній въ измѣненіи давленія ждать нельзя. Это заставило насъ позаботиться о возстановленіи возможно большаго постоянства въ отношеніи положенія манометра къ пузырю въ кишкѣ. Другими словами въ виду того, что уровень ртути въ манометрѣ зависитъ помимо внутрибрюшнаго давленія отъ отношенія пузыря къ манометру и, что возможны были ошибки отъ незамѣченной нетождественности установки манометра при перемѣщеніи наблюдаемаго къ души и обратно, мы ставили укрѣпленный на штативѣ манометръ еще на высокій табуретъ, уже не смѣщавшійся во время опыта, чѣмъ и избѣгали измѣненій въ стояніи ртути, сопряженныхъ съ незамѣтнымъ наклоненіемъ манометра, укрѣпленнаго только на штативѣ. Слѣдовательно у насъ получалось болѣе постоянное отношеніе между положеніемъ пузыря въ кишкѣ и манометра, отсюда болѣе постоянное стояніе ртути въ манометрѣ; понятно, что при такихъ условіяхъ оно было то $+$ (положи-

тельное), то — (отрицательное) иногда и 0 (нулевое), но сравненія стоянія послѣ души производилось съ этими ужь величинами.

Для удобства же обозрѣнія въ таблицахъ эти величины, какъ и давленіе непосредственно послѣ введенія пузыря, сведены къ 0 передъ самой душою *). Контрольныя опыты отличались тѣмъ, что не было души съ послѣдующимъ обсушиваніемъ.

*) Пользуемся здѣсь случаемъ: 1) подтвердить нѣкоторыя положенія К. Э. Вагнера, именно: а) введенія пузыря въ rectum безвредно, безболѣзненно (при навыкѣ наблюдателя) и только непріятно; б) ватуживанія, вдыхательныя движенія обыкновенныя и глубокія, кашель, побрякиваніе и зѣвота повышаютъ внутрибрюшное давленіе, 2) добавить, по устному указанію многоуважаемаго автора, что въ первый разъ наполненіе аппарата водой совершается до соединенія манометра съ толстостѣнной трубкой и пригомъ каждого (г. е., манометра и трубки) въ отдѣльности.

Внутрибрюшное давленіе.

(Относительное, какъ и въ слѣдующихъ таблицахъ).

№ опыта.	Имя наблю- даемаго.	Темпер. ванной комнаты.	Темпер. вѣш- ная.	Мѣсяцъ и число.	Время начала опыта. ч. м.	Время дѣш. ч. м.	Въ миллиметрахъ ртутнаго столба.					Примѣчаніе.
							До перерыва.	Слѣдъ.	Черезъ 15 м.	Слѣдъ.	Послѣ перерыва черезъ:	
							15 м.	30 м.	45 м.	1 ч.		
1	Шишпаръ . .	13	— 9	29 янв.	9 28	9 46	+2 0	+2 +2	— 2	0	— 1	
2	Тарасовъ . . .	14	— 8	29 »	11 15	11 33	+6 0	+2 0	0	+1	+2	
3	Зуевъ	16	— 7	30 »	9 40	9 58	+5 0	0 0	0	+1	0	
4	Лаврентьевъ .	13	— 6	30 »	12 —	12 18	0 0	0 0	0	— 1	— 1	
5	Мануиловъ . .	13	— 6	30 »	1 20	1 33	+5 0	— 1	— 1	0	— 2	
6	Тарасовъ . . .	14	— 12	31 »	9 15	9 33	+6 0	— 1	— 1	— 2	— 2	
Въ среднемъ							+0,7	0	— 0,7	0	— 0,7	Объядаль.

Выводъ: Внутрибрюшное давленіе при взятыхъ условіяхъ нѣсколько повышается непосредственно послѣ пере-
рыва, въ послѣдующіе же сроки наблюденія не измѣняется или нѣсколько понижается.

Таблица № 39.

При сидячей почечуйной ду-
шѣ температ. 18—19°R.

Внутрибрюшное давлёніе.

№ опыта.	Имя наблю- даемаго.	Темпер. въ ком- натѣ.	Темпер. въш- ная.	Мѣсяцъ и число.	Время начала опыта.		Время души.	До души.		Сейчасъ.	Послѣ души черезъ:				Примѣчаніе.
					ч.	м.	ч.	м.	ч.	м.	15 м.	30 м.	45 м.	1 ч.	
1	Тарасовъ . . .	12,7	—9	13 янв.	9	25	9	40	+2	0	0	0	0	+2	
2	Зуевъ	11	—4	13 »	11	15	11	30	+2	0	0	0	0	0	
3	Панасовъ . . .	11	—4	13 »	1	—	1	15	0	0	—2	0	0	0	
4	Шишаръ . . .	14	—10	22 »	9	45	10	1	+2	0	0	0	0	0	
5	Мануиловъ . .	13	—10,5	22 »	1	5	1	23	+2	0	+2	+2	+1	+1	
					Въ среднемъ						+0,4	+0,4	+0,2	+0,6	
1	Панасовъ . . .	11,5	—6,5	12 янв.	12	30	12	51	0	0	0	0			
2	Зуевъ	14	—7	14 »	9	20	9	40	0	0	0	+2	—2	0	
3	Мануиловъ . .	12	—7,0	14 »	11	5	11	23	0	0	0	0	0	0	
4	Лаврентьевъ .	13	—9,5	22 »	11	12	11	34	+1	0	0	0	0	—1	
5	Тарасовъ . . .	12	—1,8	24 »	9	22	9	41	0	0	—2	—2	—2	—2	
					Въ среднемъ						—0,4	0	—1	—0,8	

Продолжительность
1^{1/2}'

Внутрибрюшное давление.

при сдавленіи животнаго столба.
шѣ температур. 12—13° R.

№ опыта.	Имя наблю- даемаго.	Темпер. ванной комнаты.	Темпер. вѣш- ная.	Мѣсяцъ и число.	Время начала опыта.		Время души.	До души.		Сейчасъ.	Послѣ души черезъ:				Примѣчаніе.
					ч. м.	ч. м.		Сейчасъ.	15 м.		15 м.	30 м.	45 м.	1 ч.	
1	Тарасовъ . .	11	—9	16 янв.	9 40	9 57	—2 0	—2 0	0	0	—2	—4	—4	—4	
2	Мануиловъ .	12	—2	» 19	9 38	9 56	+8 0	+8 0	0	0	0	0	0	0	
3	Шишпаръ . .	13	—6,5	» 20	9 8	9 25	+2 0	+2 0	+4	0	+2	0	+2	+2	
4	Зуевъ	11,5	—5	» 20	1 13	1 31	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	
5	Лаврентьевъ	12,5	—8,5	» 21	11 15	11 33	+8 0	+8 0	0	0	0	0	0	0	
Въ среднемъ									+0,8	0	—0,8	—0,4	—0,4	—0,4	
1	Шишпаръ . .	12,5	—12,5	17 янв.	9 17	9 35	+2 0	+2 0	0	0	0	—2	—4	—4	
2	Тарасовъ . .	11	—8	» 18	12 50	1 9	0 0	0 0	+2	0	+2	+2	+2	+2	
3	Мануиловъ .	12	—7	» 21	12 3	1 43	+6 0	+6 0	0	0	—2	—1	0	0	
4	Зуевъ	13	—8	» 26	1 12	1 31	+6 0	+6 0	0	0	—2	—3	—4	—6	
5	Лаврентьевъ	14	—9	» 28	11 —	11 20	+4 0	+4 0	0	0	—4	—2	—2	—2	
Въ среднемъ									+0,4	—1,2	—1,2	—1,2	—1,6	—2	

Продолжительности
1 1/2'

Выводъ см. ниже.

Таблица № 41.

Внутрибрюшное давление.

При почечной душѣ въ шкалу температурю 18—19°R.

Имя наблю- даемаго.	Темпер. ваяной комнаты.	Темпер. вѣш- ная.	Мѣсяцъ и число.	Время начала опыта.		Время души. ч. м.	До души.		Сейчасъ.	Послѣ души черезъ:				Примѣчаніе.
				ч. м.	ч. м.		Сейчасъ.	Черезъ 15 м.		15 м.	30 м.	45 м.	1 ч.	
1 Тарасовъ . .	12	—6,5	14 янв.	1 5	1 24	0 0	0 0	0 0	0	0	+2	—2	—2	
2 Мануиловъ .	14	—11	27 »	1 12	1 23	+6 0	+6 0	0 0	0	0	0	0	—2	
3 Зуевъ . . .	12	—11	23 »	1 —	1 17	+1 0	+1 0	+1 0	+1	+1	0	+1	—1	
4 Шишаръ . .	12	—7	15 »	9 40	9 57	+2 0	+2 0	0 0	0	—2	—2	0	—2	
5 Лаврентьевъ	12	—7	15 »	11 5	11 26	—2 0	—2 0	0 0	0	—0	—2	0	0	
Въ среднемъ.							+0,2—0,2—0,4—0,2—1,4							
1 Тарасовъ . .	12,5	—8,5	12 янв.	9 45	10 10	0 0	0 0	0 0	0	0	+4	—	—	
2 Зуевъ	11	—8,5	—	1 5	1 26	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	
3 Лаврентьевъ	14	—9	26 »	11 10	11 29	0 0	0 0	0 0	0	0	0	—1	—1	
4 Шишаръ . .	13	—12	23 »	11 20	11 43	0 0	0 0	0 0	0	0	0	—2	0	
5 Мануиловъ .	11	—7,5	15 »	1 10	1 28	+2 0	+2 0	0 0	0	0	0	0	0	
Въ среднемъ.							0 0 +0,8—0,8—0,2							

Продолженіе таблицы.

Выводъ общій для 39, 40 и 41 таблицъ: При сидячихъ почечуныхъ душахъ темпер. 18—19°R и 12—13°R продол. 1¹/₂' и 3', а также при почечуной душѣ въ шкалу темпер. 18—19°R продолж. 1¹/₂' и 3' внутрибрюш-

Внутрибрюшное давление.

при почечуиной души въ шка-
пу температуру 12—13°R.

№ опыта	Имя наблю- даемаго.	Темпер. ванной комнаты.	Темпер. вѣш- ная.	Мѣсяцъ и число.	Время начала опыта.		Время души.		До души.		Въ миллиметрахъ ртутнаго столба.				Примѣчаніе.
					ч.	м.	ч.	м.	Сейчасъ	Черезъ 15 м.	15 м	30 м	45 м	ч 1	
1	Лаврентьевъ	12	—1	19 янв.	11	33	11	50	+4	0	0	0	0	0	
2	Тарасовъ . .	12	—1	19 »	1	5	1	20	+6	0	+4	+4	+4	+2	
3	Шишаръ . .	14	—9	26 »	9	15	9	34	0	0	+2	+2	0	0	
4	Мануиловъ .	14	—9	28 »	9	22	9	39	+8	0	—2	—2	—2	—2	
5	Зуевъ	13	—8,5	28 »	1	—	1	19	+6	0	—2	—3	—3	—2	
Въ среднемъ											+1,6	—0,4	+0,2	—0,2	—0,5
1	Тарасовъ . .	15	—10	21 янв.	10	8	10	26	+4	0	0	0	+2	—	
2	Зуевъ	14	—11,5	25 »	9	20	9	43	+2	0	0	0	0	0	
3	Лаврентьевъ	13	—10,5	25 »	11	10	11	29	0	0	0	0	—2	—2	
4	Шишаръ . .	12	—10	25 »	1	3	1	22	0	0	0	0	+1	+2	
5	Тарасовъ . .	14	—13,5	27 »	9	25	9	49	+4	0	0	0	0	0	
Въ среднемъ											+1,4	0	+0,2	0	

Выводъ: При почечуиныхъ душахъ въ шкапу темпер. 12—13°R продол. 1^{1/2}' и 3' внутрибрюшное давле-
ніе нѣсколько повышается (при 1^{1/2} минутныхъ рѣже, чѣмъ при 3-хъ минутныхъ).

Температура тѣла подъ мышкой и въ прямой кишкѣ.

Для измѣренія температуры тѣла въ прямой кишкѣ и подъ мышкой намъ служили обыкновенные вывѣренные термометры по С. (изъ Jenaer — Normalglas). Наблюдаемый долженъ былъ утромъ въ день опыта испражниться *), а отсутствіе кала въ кишкѣ константировалось введеніемъ пальца въ кишку. Термометръ вводился на глубину 5 сент. (до валика изъ резины на термометрѣ) и удерживался въ такомъ положеніи подложеннымъ подъ него комомъ полотна, съ тяжестью въ срединѣ, что при неподвижности наблюдаемаго вполне удавалось, а положеніе термометра легко контролировалось. Подмышковая впадина всегда до и послѣ души тщательно осушивалась передъ вкладываніемъ термометра на тоже мѣсто впадины. До опыта и тотъ и другой термометры считывались черезъ 20 минутъ послѣ введенія, непосредственно передъ душою, а послѣ души *in recto* черезъ 10, 20, 30 минутъ и т. д., *in axilla* черезъ 20, 30, 45 минутъ и т. д. Въ началѣ втораго $1\frac{1}{2}$ часа наблюдаемые въ этой серіи опытовъ обыкновенно начинали дремать, что позволялось имъ до начала 2-го часа.

*) При измѣреніяхъ внутрибрюшнаго давленія мы убѣдились, что при этихъ условіяхъ даже на глубинѣ 10 сент. рѣдко (въ одномъ случаѣ изъ 46) можно найти комочки твердаго кала.

IX b.

Температура кожи.

Кожную температуру мы измѣряли на нижней части живота по-срединной линіи, подѣ пупкомъ, на лѣвой ягодицѣ на 8—10 сент. отъ anus'a и plica patium и на задневнутренней поверхности бедра на 5 сент. книзу отъ plica patium вывѣренными термометрами O. Immisch'a (³⁴), имѣвшими дѣленія отъ 20° до 45° по С., одними и тѣми же для однихъ и тѣхъ же мѣстъ *). Принимая во вниманіе правила для измѣренія кожной температуры, даваемыя Redard'омъ (³⁷ стр. 367): умѣренно прижимать и не закрывать ватой, хлопчатой бумагой и повязками термометра, не тереть и не нагрѣвать мѣста приложенія и самого термометра, оставлять его на долгое время въ соприкосновеніи съ кожей, и обстоятельства, при которыхъ намъ приходилось работать (положеніе наблюдаемаго, обиліе термометровъ, округлость частей тѣла), мы устроились такъ. Три пояска, состоявшія изъ шелково-резиновой тесьмы ($\frac{1}{3}$ окружности) и тонкаго каленкора ($\frac{2}{3}$ окружности) шириною въ 2 $\frac{1}{2}$ —3 сент. надѣвались на туловище, тазъ и лѣвое бедро передъ началомъ опыта и при помощи булавокъ съуживались до желаемой величины, затѣмъ на кожѣ отмѣчались анилиновымъ карандашомъ мѣста стоянія лентъ и вставляемыхъ подѣ нихъ термометровъ. До опыта термометры считывались чрезъ 20 минутъ, а послѣ опыта черезъ 10—20—30 и т. д. минутъ.**) Если термометръ вываливался между сроками наблюденія, то цифра температуры въ послѣдующій срокъ не записывалась. Передъ душей пояски снимались съ невынутыми булавками, а послѣ души опять надѣвались на тѣ-же мѣста.

*) При паденія съ высоты около 2-хъ футовъ на асфальтовый полъ термометры Immisch'a не бьются, но неизвѣстно, портятся они при этомъ или нѣтъ. Для измѣренія же температуры кожи они имѣютъ большія преимущества.

**) По нашимъ наблюденіямъ истинная температура кожи при употребленіи термометровъ Immisch'a получается только черезъ 15 минутъ, по установкѣ термометровъ отмѣченная же черезъ 10 мин. на 0,2—0,3°С меньше истинной.

Т е м п е р

(п о Ц е

Таблица 43.

№ опыта.	Имя наблю- даемого.	Лѣта	Ростъ	Вѣсъ	Темпер. по R.		Мѣсяцъ число.	Время начало опыта.	Время души.	До перерыва.	и п а			
					ванной к.	внѣшняя.					п о с л ѣ п е			
											20 м.	30 м.	45 м.	
1	Малисевскій	—	—	—	14	—10	6 февр.	ч. м 9 26	ч. м 9 50	37,3	37	37	37	
2	Тарасовъ	—	—	—	1	—8	23 "	9 25	9 48	37,35	37,1	37,1	36,9	
3	Мануиловъ	—	—	—	13	—8	8 "	9 16	9 40	36,6	36,3	36,3	36,3	
4	Зуевъ	—	—	—	15	—1	1 март.	9 20	9 45	37,1	37,1	37,1	37,1	
5	Мануиловъ	—	—	—	14	—4,5	8 февр.	9 19	9 50	37,1	37	37	36,9	
Средн. разница											—	—0,2	—0,2	—0,2
1	Тарасовъ	—	—	—	14	—8,5	7 февр.	12 40	1 3	37,2	37,05	37,1	37	
2	Зуевъ	—	—	—	14	—6,5	8 "	12 40	1 14	37,4	37,4	37,4	37,35	
3	Мануиловъ	—	—	—	14	—5,5	16 "	12 20	12 44	36,9	36,85	36,85	36,85	
4	Малисевскій	—	—	—	13,5	—7,5	17 "	12 15	12 38	37,15	37,05	37,05	37	
5	Алексѣевъ	—	—	—	14	—3	27 "	12 35	1 2	37	36,95	37	37	
Средн. разница											—	—0,07	—0,05	—0,09

Выводъ: При взятыхъ нами условіяхъ температура тѣла in axilla et in recto па

у р а т ѣ л а.

10).

При контрольных
опытахъ.

а.				До перерыва.	i n g e s t o.									
а черезъ					п о с л ѣ п е р е р ы в а ч е р е з ъ									
1.	1½ ч.	1¾ ч.	2 ч.		10 м.	20 м.	30 м.	45 м.	1 ч.	1¼ ч.	1½ ч.	1¾ ч.	2 ч.	
8	36,7	33,6	36,7	37,35	37,2	37,2	37,2	37,1	37,1	37,1	37,1	37,0	36,8	
8	36,8	36,8	36,8	37,6	37,4	37,2	37	36,7	36,6	36,7	36,8	36,9	37	
2	36,3	36,4	36,5	37,3	37,1	37,2	37	36,8	36,8	36,7	—	36,7	367	
	36,9	36,9	36,9	37,5	37,3	37,2	37,2	37	36,95	36,8	368	36,8	36,8	
8	36,7	36,7	36,75	37,3	37,2	37,15	37,1	37	36,9	36,8	36,7	36,7	36,6	
8	-0,4	-0,4	-0,38	—	-0,16	-0,2	-0,3	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,63	
	36,95	36,95	36,95	37,3	37,2	37,1	37,1	36,9	36,8	36,8	36,7	36,9	37	
3	37,3	37,3	37,3	37,8	37,7	37,65	37,6	37,5	37,4	37,5	37,4	37,3	37,2	
5	36,85	36,8	36,8	37,4	37,2	37,15	37,05	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,15	
33	36,8	36,8	36,8	37,15	37	37	36,9	36,7	36,7	36,6	36,6	36,5	36,6	
65	36,95	36,9	36,9	37,6	37,45	37,4	37,3	37,15	37,1	37,1	37,05	37	36,95	
06	-0,15	-0,18	-0,18	—	-0,15	-0,18	-0,26	-0,36	-0,43	-0,43	-0,5	-0,5	-0,56	

и больше при утреннихъ опытахъ, чѣмъ при послѣ обѣденныхъ.

Т е м п е р а т у

П о Ц

Таблица № 44.

№ опыта.	Имя наблюдаемаго.	Лѣта.	Ростъ.	Вѣсъ.	Температура по R.		Мѣсяцъ, число.	Время опыта.	Время души.	До души.	послѣ души		
					в ванной к.	въ вѣннѣ.							
											20 м.	30 м.	45 м.
1	Шишпаръ.	—	—	—	13	—4	2 фев.	ч. м. 9 20	ч. м. 9 45	37	36,9	36,9	36,75
2	Тарасовъ.	—	—	—	15	—3	4 »	9 45	10 8	37,1	37,1	37,1	37,0
3	Зуевъ . .	—	—	—	16	—4	5 »	9 25	9 49	37	36,95	36,9	36,9
4	Тарасовъ.	—	—	—	14	—10	9 »	9 25	9 49	37,1	37,05	37	36,9
5	Малисевскій	23	166	51,65	15	—1,5	12 »	9 15	9 28	37,1	37,1	37,1	37
Средн. разн.								—		—	—0,04	—0,08	—0,13
1	Тарасовъ .	—	—	—	14	—3	2 фев.	ч. м. 12 40	ч. м. 1 4	37,3	37,05	37,05	37,05
2	Малисевскій	—	—	—	14	—6,5	3 »	12 40	1 3	37,3	37,2	37,1	37,1
3	Шишпаръ.	—	—	—	15,5	—2,5	4 »	12 25	12 52	36,9	36,8	36,8	36,7
4	Мануиловъ.	—	—	—	16	—3,5	5 »	12 23	12 46	36,9	36,85	36,9	36,85
5	Мануиловъ.	—	—	—	14	—8	9 »	12 15	12 28	36,9	36,7	36,7	36,7
Средн. разн.								—		—	—0,14	—9,15	—0,18

Таблица № 45.

1	Тарасовъ.	—	—	—	14	—11	11 фев.	9 23	9 48	37,2	37,1	37,1	37,05
2	Зуевъ . .	—	—	—	14	—4,5	16 »	9 20	9 41	37,25	37,1	37,05	37
3	Мануиловъ.	—	—	—	14	—9	17 »	9 15	9 41	37	36,9	36,8	36,9
4	Тарасовъ	—	—	—	13,5	—8	18 »	9 43	10 5	37,4	37,35	37,3	37
5	Малисевскій	—	—	—	12	—10	19 »	6 25	9 49	37,1	37,1	37,05	37
Средн. разн.										—	—0,08	—0,12	—0,19
1	Шишпаръ.	—	—	—	14,5	—7	10 фев.	12 45	1 9	37,1	37	36,9	36,85
2	Зуевъ . .	—	—	—	13	—7,5	11 »	12 33	12 56	37,2	37,1	37,1	37,05
3	Мануиловъ.	—	—	—	15	0	12 »	12 22	12 46	37,2	37,05	37,15	37
4	Зуевъ . .	—	—	—	15	—0,5	13 »	12 38	1 1	37,3	37,3	37,4	37,35
5	Малисевскій	—	—	—	14,5	—3	15 »	12 30	1	36,95	37,05	37,1	37
Средн. разн.										—	—0,05	—0,04	—0,1

Выводъ: При сидячей почечуиной душѣ температурою въ 18-19°R прод. 1' и понижаютъ незначительно (послѣоблѣненные), температура recti, понижаютъ: болѣе 1' ки наблюдения и постепенно увеличивается къ 1-1 1/2, часа послѣ души.

Б л а
с і ю).

При сидячей почечуной
душѣ темпер. 18—19°R
прод. 1¹/₂'.

l l a				До души.	i n r e c t o									
е р е з ъ					п о с л ѣ д у ш и ч е р е з ъ									
ч.	1 ¹ / ₂ ч.	1 ³ / ₄ ч.	2 ч.		10 м.	20 м.	30 м.	45 м.	1 ч.	1 ¹ / ₄ ч.	1 ¹ / ₂ ч.	1 ³ / ₄ ч.	2 ч	
7	36,65	36,7	36,7	37	36,7	36,4	36,5	36,4	36,5	—	36,7	36,6	36,7	
	37	—	37	37,3	36,8	36,6	36,6	36,5	36,6	36,7	36,9	—	37	
8	36,75	36,7	36,8	37,6	37,1	36,9	36,9	37	37	36,9	36,95	36,9	36,9	
8	36,8	36,8	36,85	37,2	36,9	36,6	36,5	36,5	36,5	36,8	36,7	36,7	36,7	
9	36,9	36,9	36,95	37,2	36,8	36,7	36,7	36,5	36,4	36,5	36,6	36,6	36,8	
0,2	—0,2	—0,2	—0,18		—0,4	—0,6	—0,6	—0,7	—0,65	—0,6	—0,5	—0,5	—0,4	
9	36,95	37	37,1	37,5	36,9	36,8	36,7	36,7	36,7	36,7	36,9	37	37,1	
9	36,8	36,7	36,8	37,3	36,9	36,8	36,8	36,8	36,7	36,6	36,5	36,7	36,7	
6	36,7	36,7	36,6	37	36,8	36,6	36,4	36,3	36,5	36,4	36,4	36,4	36,6	
75	36,7	36,8	36,75	37,3	37,1	37	36,8	36,75	36,7	36,7	36,8	36,85	36,9	
5	36,5	36,6	36,7	37,4	37,0	37,0	37	36,9	36,9	36,6	36,6	36,7	36,7	
0,3	—0,3	—0,3	—0,2		—0,35	—0,4	—0,6	—0,6	—0,7	—0,6	—0,6	—0,55	—0,5	

При сидячей почечуной
душѣ темпер. 18—19°R
прод. 3 м.

8	36,8	36,75	36,8	37,4	36,4	36,4	36,4	36,5	36,5	36,5	36,5	36,7	36,7
8	36,8	36,7	36,7	37,6	36,9	36,9	36,6	36,5	36,5	36,5	36,4	36,4	36,4
8	36,8	36,7	36,7	37,4	36,9	36,9	36,85	36,7	36,6	36,6	36,6	36,7	36,7
8	36,8	36,8	36,85	37,7	37	37	36,8	36,7	36,7	36,6	36,3	36,6	36,8
	36,8	36,8	36,8	37,3	36,6	36,7	36,6	36,6	36,6	36,5	36,3	36,6	36,3
0,8	—0,4	—0,4	—0,42		—0,7	—0,7	—0,8	—0,9	—0,9	—0,9	—0,6	—0,86	—0,8
7	36,6	36,6	36,6	37,25	36,4	36,3	36,3	36,3	36,3	36,4	36,4	36,4	36,4
	36,9	36,9	36,95	37,4	37,1	37,05	37	36,9	36,7	36,8	36,8	36,8	36,8
95	36,9	36,9	36,9	37,5	36,9	36,9	36,9	36,8	36,9	36,8	36,8	36,9	36,9
3	37,3	37,25	37,25	37,6	37,2	37,2	37,1	36,9	37	37	37	37	37
7	36,5	36,6	36,6	37,2	36,3	36,4	36,3	36,3	36,5	36,5	36,9	36,6	36,4
2	—0,3	—0,3	—0,3		—0,6	—0,6	—0,6	—0,7	—0,7	—0,6	—0,66	—0,6	—0,7

температура тѣла: in axilla 1) не измѣняютъ или задерживаютъ въ паденіи (утреннія) или 2/
3 м. чѣмъ послѣбѣденыя и 1¹/₂ м. Это пониженіе значительно уже въ первые хро-

Т е м п е р

(П о Ц е

Таблица № 46.

№. № опыта.	Имя наблюдаемого.	Лѣта.	Ростъ.	Вѣсъ.	Температ. ванной комнаты по R.	Темпер. вѣшная по R.	Мѣсяць и число	Время начала опыта.	Время души.	До души.	и			
											п о с л ѣ д			
											20 м.	30 м.	45 м.	
1	Тарасовъ .	—	—	—	14	—5	15 фев.	ч. м. 9 40	ч. м. 10 5	37,05	36,8	33,7	36,6	3
2	Зуевъ . .	—	—	—	13,5	—14	20 "	9 20	9 42	37,2	37,1	37	37	3
3	Мануиловъ	—	—	—	12,5	—12	22 "	9 20	9 46	36,85	36,7	36,7	36,6	3
4	Мануиловъ	—	—	—	13,5	—7	24 "	9 20	9 46	36,9	36,8	36,7	36,6	3
5	Малисевскій	—	—	—	14	—6,5	25 "	9 32	9 54	37,35	37,3	37,25	37,15	3
							Средн. разн.	—	—	—	—0,13	—0,2	—0,26	—
1	Зуевъ . .	—	—	—	14	—5,5	18 фев.	ч. м. 11 26	ч. м. 12 50	37,1	36,85	37	36,95	3
2	Тарасовъ .	—	—	—	13	—8	19 "	12 15	12 32	37	37,1	37	36,85	3
3	Мануиловъ.	—	—	—	13	—9	20 "	12 30	12 52	37,1	36,95	36,95	36,9	3
4	Зуевъ . .	—	—	—	13	—8	21 "	12 25	12 52	37,1	37,1	37,1	37	3
5	Малисевскій	—	—	—	13	—7	22 "	12 15	12 37	37,15	36,9	37	36,8	3
							Средн. разн.	—	—	—	—0,18	—0,08	—0,2	—

Выводъ см. на слѣд. таблицѣ.

Таблица № 47.

1	Тарасовъ .	—	—	—	13,5	—11	21 фев.	ч. м. 9 22	ч. м. 9 45	37,5	37,3	37,3	37,3	3
2	Зуевъ . .	—	—	—	14	—7	26 "	9 15	9 39	37,25	37,05	37	36,85	3
3	Малисевскій	—	—	—	13	—3,5	27 "	9 15	9 41	27,2	37,2	37	36,9	3
4	Тимофѣевъ	—	—	—	12	—11	4 мар.	9 15	9 40	37,2	37	37	37,05	8
5	Алексѣевъ.	—	—	—	12	—4	5 "	9 15	9 41	27,3	37,25	37,2	37,1	3
							Средн. разн.	—	—	—	—0,13	—0,2	—0,24	—
1	Зуевъ . .	—	—	—	12	—7	23 фев.	ч. м. 12 25	ч. м. 12 50	37	36,8	36,9	36,7	3
2	Малисевскій	—	—	—	13	—4	24 "	12 25	12 49	36,9	37,05	37	36,9	3
3	Малисевскій	—	—	—	14	—4	26 "	12 22	12 46	36,9	37,15	37,2	37,05	3
4	Мануиловъ	—	—	—	14	—2,5	27 "	12 35	1 2	37,1	36,95	36,65	36,7	3
5	Мануиловъ	—	—	—	15	0	2 мар.	12 30	12 56	36,8	36,9	36,9	36,7	3
							Средн. разн.	—	—	—	+0,02	+0,04	—0,13	—

Выводъ: При почечуйной душѣ въ шкапу температурою въ 18—19°K прод. 3 в. объѣда 1½ мин.), иногда послѣ незначительнаго повышенія (послѣоб. 3 м.), in recto чѣмъ при 3 мин. Пониженіе въ первые сроки наблюденія незначительно.

р а т ѣ л а
і ю).

При почечуйн. душѣ въ
шкапу температур. въ
18—19°R прод. 1½ мин

l a			До души.	i n r e c t o									
черезъ				п о с л ѣ д у ш и ч е р е з ъ									
1½ ч.	1¾ ч.	2 ч.		10 м.	20 м.	30 м.	45 м.	1 ч.	1¼ ч.	1½ ч.	1¾ ч.	2 ч.	
36,5	36,6	36,65	37,2	37	36,8	36,6	36,5	36,4	36,5	36,55	36,6	36,7	
36,9	36,7	36,7	37,6	37,3	37,2	37,05	36,9	36,7	36,6	36,5	36,5	36,6	
36,5	36,55	36,5	37,2	37,2	37	36,8	36,6	36,7	36,65	36,6	36,7	36,5	
36,55	36,55	36,55	37,2	36,9	36,9	36,8	36,6	36,5	36,4	36,4	36,4	36,5	
37,1	37	37,0	37,6	37,4	37,3	37,3	37,2	37,2	37,1	37,1	37	36,9	
-0,34	-0,36	-0,41	—	-0,2	-0,36	-0,44	-0,6	-0,66	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
36,8	36,7	36,65	37,9	37,65	37,5	37,1	36,9	36,7	36,6	36,5	36,3	36,4	
36,7	36,7	36,8	37,4	37,1	37	36,8	36,7	36,6	36,5	36,6	36,7	36,9	
36,6	36,4	36,5	37,6	37,5	37,2	37,1	37,0	36,9	36,9	36,7	36,7	36,8	
36,85	36,8	36,7	37,3	37,3	37,2	37,1	36,9	36,7	36,7	36,7	36,6	36,7	
36,6	36,55	36,6	37,5	37,2	37,1	36,9	36,9	36,8	36,7	36,6	36,5	36,6	
-0,4	-0,46	-0,44	—	-0,2	-0,3	-0,5	-0,6	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9	-0,86	

При почечуйн. душѣ въ
шкапу температурою въ
18—19°R прод. 3 мин.

37,1	37,05	37	37,6	37,45	37,25	37,1	36,9	36,8	36,7	36,7	36,7	36,7	
36,7	36,7	36,7	37,6	37,3	37,2	37	36,8	36,6	36,5	36,4	36,5	36,4	
36,7	36,7	36,7	37,5	37,1	37,1	37	37	37	36,8	36,8	36,8	36,8	
36,7	36,9	36,8	37,6	37,3	37,2	37	36,9	36,8	37	37	37	36,8	
36,9	36,85	—	37,7	37,5	37,3	37,2	37,1	37	36,8	36,8	36,8	—	
-0,4	-0,45	-0,5	—	-0,26	-0,4	-0,54	-0,6	-0,75	-0,8	-0,86	-0,8	-0,9	
36,85	36,7	36,7	37,3	37,2	37,1	37	36,8	36,6	36,5	36,4	36,4	36,3	
36,6	36,6	36,6	37,4	37,1	37	36,9	36,8	36,7	36,7	36,6	36,7	36,7	
36,8	36,75	36,7	37,5	37,2	37,05	36,9	36,8	36,8	36,6	36,6	36,6	36,7	
36,5	36,5	36,5	37,3	37,3	37,2	37,1	36,9	36,6	36,5	36,5	36,45	36,55	
36,65	36,6	36,7	37,3	37,1	37	36,9	36,8	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	
-0,26	-0,3	-0,3	—	-0,18	-0,3	-0,4	-0,54	-0,7	-0,75	-0,8	-0,8	-0,7	

температура тѣла подѣ мышкой не измѣняется (утренн.) или понижается (послѣ
утреннихъ 3 мин. болѣе, чѣмъ при 1½ мин., при послѣоб. 1½ мин болѣе,

Т е м п е р а т у

П о I

Таблица № 48.

№ опыта.	Имя наблю- даемого.	Лѣта.	Ростъ.	Вѣсъ.	Температ. по R.		Мѣсяцъ, число.	Время опыта.	Время души.	До души.	i n a		
					ванной к.	вѣшная.					послѣд		
											20 м.	30 м.	45 м.
1	Зуевъ . . .	—	—	—	13	—9	6 марта	ч. м. 9 15	ч. м. 9 39	37,05	37	36,95	36,9
2	Тимофѣевъ.	—	—	—	14	—6	8 „	9 15	9 38	37,1	36,9	36,9	36,9
3	Зуевъ . . .	—	—	—	15	—1,5	9 „	9 19	9 43	37,2	37,2	37,15	37,1
4	Тимофѣевъ.	—	—	—	15	—3	11 „	10 2	10 25	36,95	36,95	37	37
5	Свѣшниковъ	—	—	—	14,5	—0,5	13 „	9 19	9 43	37,2	37,1	37,1	37
Средн. разн.								—	—	—0,07	—0,07	—0,1	
1	Зуевъ . . .	—	—	—	13	—2,5	5 марта	ч. м. 12 25	ч. м. 12 50	37,2	37	37,05	37
2	Тимофѣевъ.	—	—	—	14,5	—8	6 „	12 25	12 49	37,3	37,1	37,1	37,1
3	Зуевъ . . .	—	—	—	14,5	—2,5	8 „	12 20	12 44	37,15	36,95	36,9	36,9
4	Повѣриновъ	22	166	67,20	13	+0,5	9 „	12 40	1 7	37,15	37	37	36,95
5	Свѣшниковъ	22	162	60,50	14,5	+2,5	10 „	12 25	12 49	37,4	37,2	37,15	37
Средн. разн.								—	—	—0,2	—0,2	—0,25	

Выводъ: Сидячія почечуйныя души температурою въ 12—13°R прод. 3 мин. in recto понижаютъ болѣе послѣобѣденныя, чѣмъ утреннія. Пониженіе рѣзко ужь в

Таблица № 49.

1	Зуевъ . . .	—	—	—	15	+2	10 мар.	9 15	9 45	37,2	37	36,95	36,85
2	Гарасовъ .	—	—	—	16	—1,5	13 фев.	9 25	9 49	37,5	37,55	37,55	37,55
3	Зуевъ . . .	—	—	—	14	—4	12 мар	9 10	9 33	37,2	37,15	37,1	36,95
4	Повѣриновъ	—	—	—	15	—0,5	14 »	9 5	9 28	37,3	37,1	37,1	37
5	Свѣшниковъ	—	—	—	15	+0,3	15 »	9 21	9 44	37,2	37,1	37,1	37
Средн. разн.										—	—0,1	—0,1	—0,2
1	Матвѣевъ .	—	—	—	15	—2	11 мар.	12 40	1 4	37,5	37,45	37,35	37,2
2	Тимофѣевъ.	—	—	—	14	—3,5	12 »	12 4	12 29	37,6	37,45	37,4	37,4
3	Зуевъ . . .	—	—	—	14	0	13 »	12 17	12 41	37,15	37,3	37,2	37,1
4	Повѣриновъ	—	—	—	15	+1	14 »	12 25	12 48	37,3	37,1	37,1	37,1
5	Свѣшниковъ	—	—	—	14	+5	15 »	12 15	12 39	37,05	36,95	36,9	36,8
Средн. разн.										—	—0,13	—0,14	—0,2

Выводъ: Почечуйныя души въ шкапу температур. въ 12—13°R прод. 3 мин. тельно (послѣ обѣд.), in recto болѣе понижаютъ послѣобѣденныя. Пониженіе въ

у р а т ѣ л а
і ю).

При сидячей почечуйн
душѣ температурою въ
12—13°R прод. 3 мин

l a				До души.	i n r e c t o									
ч е р е з ъ					п о с л ѣ д у ш и ч е р е з ъ									
ч.	1 ^{1/2} ч.	1 ^{3/4}	2 ч.		10 м.	20 м.	30 м.	45 м.	1 ч.	1 ^{1/4} ч.	1 ^{1/2} ч.	1 ^{3/4} .	2 ч.	
5	36,6	36,6	36,6	37,5	36,6	36,6	36,6	36,45	36,4	36,4	36,4	36,3	36,3	
	36,7	36,7	36,7	37,3	37,1	37	36,8	36,7	36,7	36,7	36,6	36,6	36,7	
	36,85	36,85	36,85	37,7	37,05	36,9	36,9	36,7	36,5	36,55	36,4	36,6	36,6	
	36,85	36,85	36,8	37,4	37,1	37	36,9	36,8	36,7	36,6	36,7	36,7	36,75	
	36,8	36,8	36,8	37,5	36,9	36,8	36,7	36,6	36,6	36,5	36,6	36,85	36,8	
25	-0,3	-0,3	-0,34	—	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,8	
5 5	36,8	36,8	36,7	37,7	36,9	37,1	37	36,9	36,7	36,7	36,7	36,6	36,6	
	37,05	36,95	36,9	37,7	36,9	36,9	36,8	36,85	36,7	36,7	36,85	36,9	36,9	
	36,8	36,8	36,8	37,6	37,1	36,9	36,8	36,75	36,6	36,6	36,6	36,6	36,7	
	36,7	36,6	36,65	37,6	37	36,9	36,9	36,7	36,6	36,85	36,85	36,9	36,95	
	37	37	37	37,6	36,9	36,75	36,7	36,6	36,6	36,6	36,8	37	37,2	
35	-0,35	-0,4	-0,4	—	-0,7	-0,73	-0,8	-0,9	-1,0	-0,9	-0,8	-0,9	-0,8	

ру тѣла: in axilla не измѣняютъ (утренн.) или незначит. понижаютъ (послѣ обѣда),
сроки наблюденія.

При почечуйн. душѣ въ
шкапу температурою въ
12—13°R прод. 3 мин.

8	36,7	36,7	—	37,35	37,1	36,7	36,6	36,6	36,4	36,4	36,45	36,4	—	8
3	37,3	37,3	37,35	37,7	37,6	37,2	37,15	37,05	37,05	37,2	37,3	37,4	37,5	
8	36,8	36,8	36,8	37,6	37,4	37,2	37,05	36,8,5	36,65	36,6	36,7	36,6	36,6	
9	36,85	36,7	36,7	37,6	37,2	37,1	36,8	36,8	36,7	36,7	36,7	36,6	36,6	
5	36,95	36,85	36,8	37,7	37,2	37,1	36,9	36,6	36,65	36,7	36,7	36,7	36,7	3
3	-0,36	-0,4	-0,4	—	-0,3	-0,5	-0,7	-0,8	-0,9	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	
1	37,1	37,05	37	37,7	37,4	37,2	36,9	36,7	36,6	36,6	36,6	36,5	36,7	4
4	37,35	37,3	37,3	38	37,65	37,4	37,4	37,25	37,35	37,35	37,3	37,35	37,3	
5	36,9	36,9	36,8	38	37,7	37,4	37,2	37	36,9	36,9	36,8	36,65	36,8	
9	36,8	36,8	—	37,6	37,3	37,2	37	36,8	36,7	36,7	36,7	36,8	37	
5	36,75	36,75	36,7	37,2	37	36,7	36,6	36,4	36,4	36,5	36,6	36,7	36,7	3
3	-0,3	-0,4	-0,3	—	-0,3	-0,5	-0,7	-0,86	-0,9	-0,86	-0,9	-0,9	-0,8	

ру тѣла: in axilla или задерживаютъ въ паденіи (утренн.) или понижаютъ незначи-
и наблюденія не особенно рѣзко.

Таблица № 50.

Температура кож

(по С

№ опыта.	До пер.	Н и ж н е й ч а с т и ж и в о т а									До пер.	П о с л е		
		П о с л е п е р е р ы в а ч е р е з ь										П о с л е		
		10'	20'	30'	45'	1 ч.	1¼ ч.	1½ ч.	1¾ ч.	2 ч.		10'	20'	30'
1	35,6	35	34,8	35	35,4	35,4	35,2	35,2	35	35,1	30,6	30,2	30,6	30,3
2	35,8	35	35,6	35,8	35,8	35,5	35,5	35,4	35,6	35,4	32,6	32,2	32,6	32,5
3	35,4	35	35,1	35,2	35,5	—	35,2	35	35	34,6	31,8	31	31,8	32
4	35,2	34,6	35,3	35,4	35,4	36	36	36	36,4	36,2	30	31	31,4	31,6
5	35,6	35,4	35,4	35,6	35,2	35,8	35,8	35,8	35,6	35,4	31,2	31	32,2	31,2
Ср.	разн.	-0,5	-0,3	-0,1	-0,2	+0,1	+0,02	-0,02	0	-0,18		-0,16	+0,5	+0,3
1	36	34,8	34,9	35,4	35,6	36	36,1	36,2	36,2	36	33,3	31,6	32,1	32,8
2	33,2	32,8	34	34,4	34,8	34,6	34,4	35	34,6	34,2	31,3	30,8	31,4	31,6
3	34,7	34,6	34,6	35,2	35,6	35,8	35,4	35,8	35,1	35,4	33,1	33,4	34,2	34,2
4	35	33,6	34,2	34,6	34,6	34,4	34,4	34,2	34,6	34,6	31,6	30,8	32	32
5	34,4	34,2	34,8	35	34,2	—	34	34,6	34,9	33,8	33,4	32	33,2	33,4
Ср.	разн	-0,6	-0,16	+0,2	+0,3	+0,4	+0,2	+0,5	+0,4	+0,15		-0,8	+0,05	+0,2

Выводъ: При взятыхъ нами условіяхъ температура ко
 сколько поднималась, то доходя до цифръ температуры до перер
 ягодицъ тоже *падала*, но вскорѣ поднималась и превосходила циф

При контрольныхъ опытахъ.

ВЪ ОБЛАСТЯХЪ.

И Ц Ъ					До пер.	Задне-внутренней поверхности бедра										Примѣчаніе.
ва черезъ						П о с л ѣ п е р е р ы в а ч е р е з ъ										
ч.	1¼ ч	1½ ч.	1¾ ч	2 ч.		10'	20'	30'	45'	1 ч.	1¼ ч.	1½ ч.	1¾ ч.	2 ч.		
1,2	30,8	32	31,8	32,2	33	32,2	32,4	33	33,2	32,8	32,8	31,8	31,8	31,6	До обѣденныхъ.	
3	34	33,2	33	32,4	33,2	32	32	32,8	32,4	33	33,0	33,2	33,2	32,6		
2,4	32,4	32,1	32,2	—	33	32,3	33	33,4	33,2	33,4	33,6	33,6	33,2	33,2		
2,8	32,2	32,3	33	33	33,6	31,8	31,8	32	32,2	32	32,2	32,2	32,2	32		
2,6	32,6	32,4	32,8	32	32,6	32	31,8	32,2	32,4	32,5	32,3	32,2	32	31,6		
1,16	+1,14	+1,16	+0,8	+1		-1	-0,8	-0,4	-0,36	-0,5	-0,3	-0,5	-0,6	-0,7	Послѣ обѣденныхъ.	
3,4	33,4	—	33,4	33,4	34,3	32,6	32,8	33,2	33	33	32,8	33	33	32,8		
-	32,2	31,8	33	31	31	30,7	31	31,6	31,6	32	32,7	32,4	32,2	31,8		
3,4	35,8	35,8	35,8	35,6	32,4	32,6	32,6	32,6	32,4	31,6	33,2	33,8	34,6	33,4		
3,8	33,2	33,2	32,2	33,4	30,4	30,6	31	30,8	30,6	30,8	31	30,8	30,4	30,8		
3,8	33,2	33,2	33,2	32,8	32,6	32,2	32,4	32,4	32,6	32,4	32,2	32,2	33,2	31,4		
3,8	+1	+1,15	+0,9	+0,7		-0,4	-0,19	-0,02	-0,1	-0,2	+0,02	+0,2	+0,5	-0,1		

ота и бедра послѣ перерыва незначительно *падала*, затѣмъ нѣ-
 , кожа живота), то превосходя ихъ (послѣоб., живота и бедро); —
 температуры до перерыва.

Таблица № 51.

Температура ко

(п

№ опыта.	До души.	Н и ж н е й ч а с т и ж и в о т а									До души.	Я з ы к			
		П о с л ь д у ш и ч е р е з ь										П о с л ь			
		10'	20'	30'	45'	1 ч.	1¼ ч.	1½ ч.	1¾ ч.	2 ч.		10'	20'	30'	
1	34,6	33,6	34,4	34,6	34,8	34,6	34,4	34,6	34,2	34,4	31,4	28,2	29,8	30,4	
2	35	34,5	35,2	35,4	35,6	35,8	—	36	—	36	33,1	30	31,7	32,1	
3	35,2	34	34,6	35,4	35,6	35,8	35,6	35,4	35,4	35,2	30,8	29,2	30	30,2	
4	35,6	34,2	35	35,4	35,7	35,8	35,8	36	—	35,4	32,2	31	33	33,3	
5	34,6	34,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35	35,1	31	29,6	30	30,6	
Ср.	р.	—0,8	—0,08	+0,2	+0,4	+0,5	+0,3	+0,5	+0,1	+0,02		—2,1	—0,8	—0,4	
1	35,2	34,2	35	34,9	35,4	35,6	36	35,9	35,6	35,5	32,4	30,6	31,8	32,2	
2	34,4	34,2	34,9	35,8	35,8	36,2	36,2	36,2	36	35,8	29,2	27,8	28,5	29,2	
3	36	34,8	35,2	35,2	35,4	35,6	35,8	35,7	35,6	35,6	34,6	31,8	32,4	33,4	
4	35,6	34,4	35	35	35,2	35,2	—	35,6	35,6	35,2	34	32,2	33	33,6	
5	35,4	33,8	35	35	35,4	35,4	35,4	—	35,2	35,4	31,9	29	30,4	31	
Ср.	р.	—1,04	—0,3	—0,1	+0,1	+0,3	+0,6	+0,5	+0,3	+0,2		—2,1	—1	—0,5	

Выводъ: При сидячихъ почечуныхъ душахъ, температурою сходилась цифры контрольныхъ опытовъ (утр.), — *модицъ* тоже падала, (послѣоб.), — *бедре* тоже падала, но вскорѣ

При свдѣчѣй почечуйной
душѣ температурою 18—
19° R прод. 1½.

областяхъ.

И щ ъ.					До души.	З а д н е в н у т р е н . п о в . б е д р о										Примѣчанія.
ч е р е з ъ				П о с л ѣ д у ш и ч е р е з ъ												
1¼ ч.	1½ ч.	1¾ ч.	2 ч.	10'		20'	30'	45'	1 ч.	1¼ ч.	1½ ч.	1¾ ч.	2 ч.			
8	31,8	31,4	32	32,4	32,2	30,3	31,4	32	32,2	—	32,6	33,2	33	33	Д о о б ѣ д а.	
4	33,4	34	—	34	34,4	32	33,1	34	34	34,3	34	34,4	—	34,6		
6	30,2	31,0	31,6	32	32,6	32,2	32,1	33	33,1	33,2	32,8	32,8	32,8	32,6		
6	34	34	34	34	32,6	31	32,2	31,7	31,8	31,6	31,8	31,6	32	31,8		
4	31,4	31,6	—	31,6	31,4	29,6	30,3	31,5	31,4	32	32,4	32,4	32,4	32		
2	+0,4	+0,7	+1	+1,1		-1,6	-0,8	-0,2	-0,15	+0,2	+0,08	+0,4	+0,3	+0,1	П о с л ѣ о б ѣ д а.	
2	34,6	34,2	34,2	34,6	33	31,2	32,4	32,6	33,4	33,1	33	33,2	—	32,8		
6	31,4	31	31,2	—	31,4	29,6	30,4	31,7	31,2	31,8	31,6	31,8	31,8	32		
6	34	34	—	34	34	31	32	32,2	32,8	33	33	—	34	34,6		
	35,3	34,8	35	34,8	34,2	33	34	34,2	34,8	34,7	34,8	35	34,6	34,6		
6	31,8	31,8	32,8	33	31,8	30,3	31,6	32,6	33	33,2	34	34	34	34		
6	+1	+0,7	+1,4	+0,9		-1,9	-0,8	-0,2	+0,2	+0,3	+0,4	+0,9	+0,8	+0,8		

19° R прод. 1½', температура кожи: живота падала, но вскорѣ превос-
медленно поднималась, превосходя даже цифры контрольныхъ опытовъ
сходила цифры контрольныхъ опытовъ.

Таблица № 52.

Температура кожи

(по С.)

№ опыта.	До души.	Н и ж н е й ч а с т и ж и в о т а .										До души.	Я н			
		П о с л ѣ д у ш и ч е р е з ъ											П о с л ѣ			
		10'	20'	30'	45'	1 ч.	1 1/4 ч.	1 1/2 ч.	1 3/4 ч.	2 ч.	10'		20'	30'	4	
1	35,4	35	35,2	35,8	36,2	36,4	36,2	36	35,8	35,8	32,2	29,8	31,5	32,2	32,8	
2	34,1	33,6	34,2	34,4	34,4	34,8	34,6	34,1	35,2	35	31,2	29,2	29,7	29,8	30,2	
3	35,4	34,8	35,4	35,8	35,6	35,8	36	35,6	35,4	35,2	31,9	28,6	29,7	30	30,2	
4	35	34,8	35,8	36	36,4	36,4	36,6	36,4	36,4	36,2	32,8	30,4	32,4	32,8	32,8	
5	34,5	34,8	35,4	35,8	35,8	35,4	35	35,2	35	34,6	28,6	28	28,4	28,6	28,6	
Ср.	р.	-0,3	+0,3	+0,68	+0,8	+0,7	+0,8	+0,78	+0,7	+0,5	—	-2,1	-1,0	-0,6	-0,6	
1	35,2	34,2	34,8	35	34,8	35,2	35,2	35,3	35,4	35,4	32,4	28,2	29,6	30,4	30,4	
2	33	33	34	34,4	35	35,2	34,8	35	34	34	30	28	29,2	30,2	30,2	
3	35,2	34	34,6	34,8	35	35,2	35,4	35,6	35,6	35,6	32	29,2	30,3	31,4	31,4	
4	35	34,2	34,8	35,4	35,8	36,2	36,2	36,4	36,2	36,2	31,6	30	31	32	32,8	
5	34,9	34	34,3	35,1	35,2	35,4	35,6	35,8	35,4	35,7	31,2	30	30,4	30,8	30,8	
Ср.	р.	-0,8	-0,2	-0,3	+0,5	+0,8	+0,8	+0,9	+0,6	+0,7	—	-2,3	-1,3	-0,5	-0,5	

Выводъ: При сидячихъ поч. д. темпер. 18—19° R пр. 3' темп. достигала цифръ болѣе высокихъ, чѣмъ при контрольныхъ опытахъ медленно (утр.), но при послѣобѣд. превзошла (?) даже цифры контрольныхъ опытовъ.

При сидячей почечуйной душѣ.

Т° 18 — 19° R прод. 3'

В областяхъ:

И щ ѣ.					До души.	Задне-внутренней поверхности бедра.										Примѣчаніе.
черезъ						Послѣ души черезъ.										
1 1/4 ч.	1 1/2 ч.	1 3/4 ч.	2 ч.			10'	20'	30'	45'	1 ч.	1 1/4 ч.	1 1/2 ч.	1 3/4 ч.	2 ч.		
2	33	—	33,2	33,4	32,5	30,6	31,8	32,3	32,4	32,4	32,8	32 8	32,6	32,6	До обѣда.	
	30,4	30,4	30	30	31,8	30	30,8	30,8	31	30,8	30	30,6	31	30,6		
	31,6	31,2	30,6	31	32	29,2	30,6	31	32	32,2	32,3	31,8	32	31		
6	33	33	33,4	33	32,8	31	32	32,7	32,8	33,4	33,6	33	33,2	33,6		
6	28,6	29,4	30	30,2	30,2	29,6	30,6	31	31	31,2	31	31,2	31,4	31,8	Послѣ обѣда.	
26	-0,02	-0,1	+0,2	+0,2	—	-1,8	-0,7	-0,5	-0,02	+0,15	+0,1	+0,05	+0,2	+0,06		
2	32	32,4	—	32,6	33,2	30	31,2	31,8	32,2	33	33	33	33,2	33,2		
3	30	30	—	31	32,2	31	31,4	31,8	32	32,4	32,2	31,2	31,8	32		
4	32,6	34	34,6	35	33	29,8	31,2	32	32,6	33	33,2	33,2	33,6	33,6		
	33,8	33,8	34,4	34,2	31,6	30,3	31,4	31,6	31,8	31,8	32	32,2	32,6	32,4		
3	32,2	31,8	32,4	33	32,6	30,3	30,6	31	31,3	31,6	31,6	32	31,8	32,2		
2	+0,6	+0,9	+2,2?	+1,6	—	-2,2	-1,2	-0,8	-0,5	-0,1	-0,1	+0,2	+0,2	+0,2		

на кожи: живота падала незначительно (утр. ?), а впоследствии ~~и~~ ^и падала значительно къ додушевымъ цифрамъ возвращалась
 бныхъ опытовъ бедра падала, но утромъ превзошла цифры кон-

Таблица № 53.

Температура кожи

(по С.

№ опыта.	До души.	Н и ж н е й ч а с т и ж и в о т а									До души.	Н		
		П о с л ъ д у ш и ч е р е з ъ										П о с л ъ		
		10'	20'	30'	45'	1 ч.	1 ¹ / ₄ ч.	1 ¹ / ₂ ч.	1 ³ / ₄ ч.	2 ч.		10'	20'	30'
1	35	32,6	34,2	34,8	35,2	—	35,4	35,2	35,6	35,4	32,5	28,6	30,2	30,4
2	34,6	34	34,8	35,2	35,2	35,2	35,2	35,4	35,2	35,3	31,2	29,2	29,8	30
3	36	34,2	35,2	35,4	35,2	35,4	35,4	35	35	35	30,6	29	30,8	31,5
4	35,2	34	34,8	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	34,8	34,1 ^b	31,2	28,4	29,6	30
5	35,4	34,3	35,4	36	35,8	36	35,6	35,4	35,2	35,1	29,8	28,6	29,8	30
Ср.	р.	-1,4	-0,3	+0,06	+0,08	0	+0,1	0	-0,8	-0,16	—	-2,3	-1	-0,7
1	35	32	33,7	34,4	34,2	34,4	34,4	—	34,2	33,4	31,6	27,2	29,2	30,2
2	—	34,2	34,6	35	35	35,4	35,4	35,4	35,4	35,6	33,4	29,4	31,6	32
3	35,8	34,8	35,4	35,6	35,8	35,4	35,4	35,8	35,8	35,7	32,6	28,4	30,8	31,2
4	35	32	34	34,2	34,6	34,8	35	35	35	35	30,6	28,6	29,6	30,4
5	34,9	32,3	33,8	34	34,2	33,8	34	34,2	34,4	34,4	31,8	28	29,4	29,8
Ср.	р.	-2,4	-1	-0,6	-0,5	-0,3	-0,5	-0,2	-0,3	-0,8	—	-3,7	-1,9	-1,2

В ы в о д ы: При почечуиныхъ душахъ въ шкапу темпер. 18—19° вратилась только при утреннихъ, при послѣоб. держалась ниже ихъ, шало^{сь} только при утреннихъ душахъ (на бедрѣ даже много превосхо^д

При почечуйной душѣ въ
шкапу темп. 18—19 R.
прод. 1½'

въ областяхъ.

И щ ъ					До души.	З а д н е - в н у т р . н о в . б е д р а .										Примѣчаніе.
ч е р е з ъ						П о с л ѣ д у ш и ч е р е з ъ										
ч.	1¼ ч.	1½ ч.	1¾ ч.	2 ч.		10'	20'	30'	45'	1 ч.	1¼ ч.	1½ ч.	1¾ ч.	2 ч.		
2,1	31,8	32	—	31,7	31,8	29,4	30,8	31,6	32	32,3	32,6	32,5	32,6	32,4	Д о о б ѣ д а .	
	31,6	31,3	31,3	31,2	30,8	30,2	30,6	31,2	31,2	30,8	31	30,8	30,6	31		
2,4	32,6	32	32,4	32,2	31	28,7	30,6	31,4	32,2	32,4	32,8	33	33	33		
0,8	31	30,9	30,8	31,4	31	28,6	30,4	31	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	32		
4	32,4	32,4	33,2	33,8	30,3	29	30,2	30,8	32	32,5	32,8	33	32,6	32,4		
5	+0,8	+0,7	+1,2	+1	—	-1,8	-0,4	+0,2	+0,8	+0,6	+0,8	+1,1	+1,1	+1,2	П о с л ѣ о б ѣ д а .	
8	31	31	32	31,4	31,4	28,2	29,8	30,2	31	30,6	31,2	31	30,6	30,4		
6	32	32	31,6	32	33,2	29,6	31,2	32	32	31,0	31,6	31,2	31	30		
	31,6	31,6	31,4	31,6	34,2	29,6	33	33,6	33,9	33,4	33,6	33,2	32	31,8		
8	30,8	30,8	30,8	30,8	31,6	28	29,6	30	30	30	30	29,8	30,6	29,8		
8	30,6	31,8	31,8	31,8	32,4	29	29,8	30	30,4	30,6	30,4	30,4	30,8	30,8		
	-0,8	-0,6	-0,5	-0,5	—	-3,7	-1,9	-1,4	-1,1	-1,4	-1,2	-1,4	-1,5	-2		

темп. кожи: живота падала и къ цифрамъ. контрольныхъ опытовъ воз-
и бедра (меньше). Тоже падала, къ цифрамъ- же к. опытовъ возр-
и

Таблица № 54.

Температура кожи

(по С.).

№ опыта.	До души.	Н и ж н е й ч а с т и ж и в о т а									До души.	А и			
		П о с л ѣ д у ш и ч е р е з ь										П о с л ѣ			
		10'	20'	30'	45'	1 ч.	1 1/4 ч.	1 1/2 ч.	1 3/4 ч	2 ч.		10'	20'	30'	4 ч.
1	35,2	33	34,2	34,8	35,6	35,4	35,8	36,2	36	36,2	32	28,6	30,1	30,7	
2	35,4	34,4	35,2	35,4	35,4	35,4	35,6	35,6	35,6	35,7	31,1	28,5	29,8	30,3	
3	35,6	32,6	33,6	34,6	35	34,8	34,2	34,4	34,8	33,7	29,8	28,3	29,8	29,3	
4	34,6	32,8	33,4	33,6	33,8	34	34,2	33,8	34,2	34,2	30,6	28,2	29,2	29,2	
5	32,8	30,8	32,2	33,2	33,2	—	35,2	35,4	35,4	—	31	28,6	29,2	29,6	
Ср.	р.	— 2	— 1	— 0,4	— 0,1	— 0,3	+ 0,2	+ 0,5	+ 0,5	— 0,2		— 2,5	— 1,3	— 1,1	—
1	35,2	31,4	32,8	34,4	34	34,4	34	34,4	34,4	34,2	30,6	27,6	28,2	28,6	
2	34,6	32	33,4	34	34,2	34,8	35	35,4	35,4	35,4	31	28	29,6	30,6	
3	35,2	33,4	34,8	35	35,2	35,2	35,4	35,4	35,4	35,3	30	28,4	29,4	30	
4	35,8	33	34,2	35	35	—	33,2	33	34,3	34,8	31,8	28	29,6	29,6	
5	35,4	34,2	34,9	35,4	—	35,4	35,8	35,8	35,6	35,2	32,4	28,6	30,3	30,2	
Ср.	р.	— 2,4	— 1,2	— 0,5	— 0,6	— 0,15	— 0,5	— 0,4	— 0,4	— 0,2		— 3,04	— 1,6	— 1,3	—

Выводы: При повыш. духахъ въ шкапу температур 18—19°

В ы в о д ь: При почеч. душахъ въ шкапу температур. 18—19° прѣдъ цифрамъ контрольныхъ опытовъ ужъ не возвращалась (исключая незначительное превосходство надъ ц. к. оп.).

При почечуиной душѣ въ шкапу.

Температурою 18—19° R. прод. 3'

в областяхъ.

И с ъ				До души.	Задней внутренности поверхности бедра										Примѣчан.
черезъ					П о с л ѣ д у ш и ч е р е з ѣ .										
1 ¹ / ₄ ч.	1 ¹ / ₂ ч.	1 ³ / ₄ ч.	2 ч.		10'	20'	30'	45'	1 ч.	1 ¹ / ₄ ч.	1 ¹ / ₂ ч.	1 ³ / ₄ ч.	2 ч.		
32,6	33	33	33,4	32	28,5	29,8	30,5	30,6	31	32	31,6	32,2	32	До обѣда.	
31,8	31,8	32	32	32,6	28,6	29,8	30	30,2	30,4	30,6	30,3	30,4	31		
31,4	32,2	32,4	32,4	30,6	28,3	30,4	30,8	30,6	31	30,6	31,4	31	32		
28,6	29,2	28,2	28,2	32,2	29,2	30	30	30,4	29,8	29,8	29,8	29,8	30,4		
29,6	29,6	30	—	30,6	28	29,6	30	30,4	29,8	30	30,4	30	—		
−0,1	+0,2	+0,2	+0,6		−3,08	−1,6	−1,4	−1,2	−1,2	−1	−0,9	−0,9	−0,5		
28,8	29,4	29,4	29,6	30,4	28	29,4	30	29,8	29,8	30	30	29,6	29,4	Послѣ обѣда.	
31,3	31,8	31,6	31,6	31,4	28,6	30,2	31,2	30,6	30,6	31	30,6	30,4	30,4		
31,6	32	32,4	32,4	31	28	30,2	31	31	31,6	31,4	31,6	31,6	31,6		
31	32	31,4	30,6	32,6	28,4	31,2	31,6	32	32	32,8	33	33	33		
31,4	32	32	32	33,4	29,6	30,6	31,2	31,2	32,0	32,6	32,8	31,8	31,6		
−0,5	+0,2	+0,2	+0,08		−3,2	−1,4	−0,7	−0,8	−0,56	−0,2	−0,16	−0,5	−0,56		

Температура кожи: живота, ягодицъ и бедра падала значительно и
 температуры кожи живота при утреннихъ, гдѣ къ концу опыта отмѣчено

Таблица № 55-й.

Температура ко

(по (

№ опыта.	Д души.	Нижней части живота.										До души.	Ягодицы.				
		После души через.											После души.				
		10'	20'	30'	45'	1 ч.	1 1/4 ч	1 1/2 ч.	1 3/4 ч.	2 ч.	10'		20'	30'	45'	1 ч.	
1	34,4	33,2	34	34,8	35	34,8	35	35,4	35,4	35,4	29	27,4	28,6	29,4	30,4		
2	35	34,2	35	35,4	35,4	35,4	35,6	35,6	35,6	35,6	31,6	28,8	29,3	—	31,2		
3	36,2	34,8	35,4	35,8	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	31	29,4	30,8	31,4	31,6		
4	35,6	35	35,8	36,2	36,4	36,6	36,6	36,4	36,0	35,8	32,2	30,3	31,8	32,2	32,3		
5	35,4	35,2	35	35,0	35,4	35,8	35,8	35,7	35,6	35,4	30,8	26,6	29,2	30,4	31,2		
Ср.	-0,8	-0,8	-0,2	+0,05	+0,2	+0,3	+0,3	+0,4	+0,2	+0,3	—	-2,4	-1	+0,1	+0,4		
1	35,6	35	35,6	35,8	36	36	36,2	36,4	36	36	29,7	28	29,8	30,1	30,2		
	35,4	34,9	35,4	35,4	35,2	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	32,3	28,6	29	29,4	30,6		
3	34,8	33,8	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	—	35,4	35,8	31,6	28,4	30,8	31	31,4		
4	34,3	32	33,8	34	34,9	34,8	34,2	34,4	33,4	33,4	33,3	29,8	31,8	33	33,8		
5	35	34,4	35,2	35,8	35,8	35,8	35,8	36,2	36,2	36,2	33,4	25,6	28,4	30,2	31		
Ср.	р.	-1	+0,06	+0,2	+0,4	+0,5	+0,5	+0,5	+0,4	+0,7	—	-4	-2,1	-1,3	-0,7		

Выводъ: При почечуиныхъ душ. сидячихъ температурою 12—13° R при контрольныхъ опытахъ и даже превосходила ихъ, ягодицы и бедра, пови

При сидячей почечуйной
душѣ температурою 12—
13° R прод. 3/-

областяхъ.

ц ѣ.				До души.	З а д н е - в н у т р . п о в . б е д р а .										Примѣчанія.
зъ					Послѣ души черезъ										
1.	1½ ч.	1¾ ч.	2 ч.		10'	20'	30'	45'	1 ч.	1¼ ч.	1½ ч.	1¾ ч.	2 ч.		
8	31,2	31	31,6	30,2	29,2	29,8	29,7	30,3	30	31	30,3	30,6	30,4	Ц о о б ѣ д а	
	—	31,4	31,4	32,4	29,6	30,4	30,7	30,6	30,6	30,6	31	31,6	32		
6	32	32	—	31,6	30,6	31,3	31,6	31,6	32	31,6	31,6	31,2	31,3		
	32	32,8	33,2	32,2	31,2	32,6	33	33	33	33	33	33	33,2		
	32,2	31,8	31,4	32,6	29,1	31	32	32,6	32,6	32,4	32,2	33	33		
5	+0,95	+0,9	+1	—	—1,8	—0,8	—0,4	—0,2	—0,16	—0,1	—0 16	+0,08	+0,18	Ц о о б ѣ д а интенз. красн. кожи ягодицъ. интенз. красн. кожи ягодицъ	
3	30,8	31	30,2	31,4	29,4	30,6	31	31,6	31,6	31,2	31	31	31,6		
2	31	32	32,2	33,2	31	31,8	32	32,4	32,6	32,3	32,4	32	31,8		
3	31,4	31,2	31,2	31,4	28,6	31	31	31	31,0	31,4	31,2	31,2	31,3		
	33,8	33,2	32,4	32,6	30,8	32,6	34	33,6	34	33	32,6	32,4	32,2		
	33,4	33,8	33,8	34	30,4	31,8	32,4	33	33,2	33	33,6	33,6	34		
	+0,02	+0,2	—0,1	—	—2,5	—0,9	—0,4	—0,6	—0,04	—0,26	—0,5	—0,6	—0,4		

температура кожи: *жизнотъ*, понизившись, быстро возвращалась къ цифрамъ
только при утр. на бедрѣ произошло цифры контрольных опытовъ.

Таблица № 56.

Температура кожи

(по

№ опыта.	До души.	Н и ж н е й ч а с т и ж и в о т а									До души.	Я		
		П о с л ѣ д у ш и ч е р е з ъ										П о с л ѣ		
		10'	20'	30'	45'	1 ч.	1 1/4 ч.	1 1/2 ч.	1 3/4 ч.	2 ч.		10'	20'	30'
1	36	33,6	—	34,7	35	35,4	35,6	35,8	35,7		32	28,6	29	30,2
2	36,2	34	35	35,4	35,2	—	36,4	36,4	36,4	36,6	33,8	27,2	30,4	31,2
3	35,4	31,6	33,4	34	35,0	35,0	35,4	35,6	35,6	35,6	30,2	28,4	30	30,6
4	34,8	32,6	34,4	34,6	35	35	35	35	35,4	35,4	32,6	30	31	31,2
5	35	34	34,8	35	35	34,8	35,6	35,4	35,4	35,4	33,2	28,8	30	30,4
Ср.	р.	—2,3	—0,9	—0,7	—0,4	—0,2	+0,12	+0,16	+0,2	+0,4		—3,8	—2,3	—2,05
1	35,4	33	34,8	35,2	35,6	35,4	35,3	35,6	35,8	35,8	33	28,6	29,6	30,6
2	35	35	35,8	36	36,2	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	33	28,2	30	31,4
3	35,4	31,2	33,4	34,2	—	35,8	35,4	35,4	35,4	35,4	32,2	28	30,4	—
4	35	34,4	35	35	35	35,4	35,6	35,4	35,4	—	34,6	29	32	33,2
5	35,4	31,2	35,2	35,4	35,6	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	33	26,8	29,3	30,5
Ср.	р.	—1,7	—0,5	—0,08	+0,4	+0,3	+0,4	+0,4	+0,4	+0,4		—5	—2,8	—2

Выводъ: При почечуиныхъ душахъ въ шкапу тѣ
 значительно и приходитъ къ цифрамъ контрольныхъ опытовъ тѣ
 сколько медленно возвращается къ цифрамъ контрольныхъ опы

ь областяхъ.

При почечуйной душѣ въ шкапу.
темпер. 12—13° R. прод. 3'.

и щ ъ				До души.	Задневнутренней поверхности бедра									Примѣчаніе.
а черезъ					П о с л ѣ д у ш и ч е р е з ъ									
1 1/4 ч.	1 1/2 ч.	1 3/4 ч.	2 ч.		10'	20'	30'	45'	1 ч.	1 1/4 ч.	1 1/2 ч.	1 3/4 ч.	2 ч.	
31,6	31,8	31,8	—	32	28,2	29,8	30,6	30,3	31	31	31	31	—	Д о о б ѣ д а.
34,2	34,6	34,8	34,8	34,6	29,3	31,8	32,6	33,4	33,2	33,6	34	34,8	35	
31,6	31	31,4	30,8	31,6	27,8	30,2	30,4	31,6	32	32,4	32,6	32	31,4	
31,4	31	31,4	31,2	32,8	27,6	29,6	30,4	30	30,2	30,4	30,6	30,6	30,4	
31,6	31,8	31,6	32	33,4	29,6	30,6	31	31	31,3	31,2	31,3	31,6	31,4	
—0,3	—0,3	—0,16	—0,25		—4	—2,4	—2,4	—2	—1,2	—1,4	—1,4	—1,3	—0,8	П о с л ѣ о б ѣ д а.
—	33,4	33,2	33	33,6	28,2	30,6	31,6	32,2	32,2	32	32,2	32,2	32	
33	34,6	35,8	35,6	33	28,2	30,6	32	32,8	33,2	33,5	34,5	35,2	35,6	
33	33	33,4	32,8	33	28	30,4	31,6	32,2	32,1	33	33	33,2	33,4	
34,8	35,4	35,8	35	32,6	26	29,4	30,6	31,2	31,4	32	32,6	33,4	33,6	
32,6	33,2	33,6	34	33,8	28	30,6	31,6	32	32,4	33	33,2	33,6	34,2	
+0,15	+0,9	+1,2	+0,8		—5,5	—2,8	—1,7	—1,4	—0,9	—0,26	—0,1	+0,3	+0,5	

° R прод. 3' температура кожи: бедра и ягодицъ падаетъ весьма
ослѣбѣжденныхъ (въ концѣ ихъ), — живота, понизившись въ-
нутрен. даже превосходитъ ихъ).

Давленіе крови.

Давленіе крови въ правой лучевой артеріи мы опредѣляли послѣднимъ видоизмѣненіемъ сфигмоманометра Basch'a *) (³⁸). Отсылая интересующихся устройствомъ аппарата и подробностями способа примѣненія его къ статьямъ Basch'a (^{38—39}) Zadeck'a (⁴⁰) и диссертациямъ Бабаянъ-Бабаева (³⁶) и Вышегородскаго (l. c.), мы скажемъ только, что при работѣ съ этимъ аппаратомъ обращали вниманіе на то, чтобы: 1) предлечье и сфигмоманометръ находились на одной плоскости 2) экстензія кисти была одинакова (Zadeck l. c. стр. 516), 3) наблюдаемый передъ измѣреніемъ не производилъ движеній (и не кашлялъ), 4) не смѣшать свой и возвратный пульсъ съ искомымъ 5) чтобы появленіе пульса послѣ максимальнаго сжатія улавливалось въ одинаковомъ разстояніи отъ пелота. Дѣлали мы измѣренія такъ: найдя артерію и убѣдившись, что пелоть на ней и надъ головкой луча, мы придавливали пелоть до давленія въ 200 и болѣе миллиметровъ и постепенно отпуская его, старались уловить моментъ появленія пульса и замѣтить въ тоже время дѣленіе на циферблатѣ сфигмоманометра. Цифры въ таблицахъ и обозначаютъ эти дѣленія, т. е., давленіе крови въ миллиметрахъ ртутнаго столба.

*) Мы употребляли аппаратъ не замѣняя присланной (Н. Windler Berlin, Dorotheenstrasse, 3. Стоимость аппарата 20 германскихъ марокъ) трубки французскимъ катетеромъ (Вышегородскій, Бабаевъ l. c.), въ виду неизвѣстности при какихъ условіяхъ калибруется аппаратъ (см. описаніе, приложенное къ аппар., за подписью проф. Basch'a).

Давленіе крови въ правой лучевой артеріи.

Таблица № 57.

При контрольных
опытахъ.

№ опыта.	До перер.		Послѣ перерыва черезъ										Примѣчаніе.
	по устан. терм.	за 5 м.	5 м.	10 м.	20 м.	30 м.	45 м.	1 ч.	1 1/4 ч.	1 1/2 ч.	1 3/4 ч.	2 ч.	
1	160	160	165	165	160	160	160	155	160	160	160	160	Добѣденныхъ.
2	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	
3	155	155	155	155	155	155	155	160	160	160	155	155	
4	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	
5	155	155	155	155	155	155	155	155	155	—	155	155	
Средняя разница.			+1	+1	0	0	0	0	+1	+1,2	0	0	

1	130	130	130	130	130	130	130	135	130	135	130	130	Послѣобѣденныхъ.
2	150	150	150	150	155	150	150	150	150	150	155	150	
3	150	150	150	155	150	150	150	150	160	150	150	150	
4	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	
5	160?	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	
Средняя разница.			0	+1	+1	0	0	+1	0	+1	+1	0	

Выводъ: При взятыхъ нами условіяхъ послѣ перерыва кровяное давленіе въ правой лучевой артеріи въ среднемъ незначительно повышается (одинаково въ опытахъ какъ до обѣда, такъ и послѣ обѣда). Повышеніе удерживается около 10—20 мин.

Давленіе крови **въ ПРАВОЙ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРІИ.**

Таблица № 58.

При сидяч
чужой ду
пературою
прод. 1 1/2

№ опыта.	До души.			П о с л ѣ д у ш и ч е р е з ъ										Примѣч.
	по устан. терм.	за 5 м.	5 м.	10 м.	20 м.	30 м.	45 м.	1 ч.	1 1/4 ч.	1 1/2 ч.	1 3/4 ч.	2 ч.		
1	160	160	160	155	155	155	160	150	160	160	155	160	До обѣд.	
2	145	140	135	130	130	130	130	135	135	140	—	140		
3	155	150	145	140	145	145	150	150	155	155	155	150		
4	135	130	125	125	120	125	130	130	130	130	135	135		
5	155	155	150	150	150	155	155	155	155	155	155	155		
Средняя разница.			—4	—7	—7	—5	—2	—3	0	+1	+1,2	+1		
1	150?	160	145	145	145	145	150	155	155	155	160	160	Послѣ обѣд.	
2	—	170	165	165	160	165	160	165	165	165	161	170		
3	160	150	155	150	150	150	150	145	145	145	150	150		
4	150	150	140	145	150	150	150	150	150	150	150	155		
5	155	155	150	150	150	150	155	155	150	155	155	155		
Средняя разница:			—6	—6	—6	—5	—4	—3	—4	—3	—1	+1		

Выводъ: При сидячихъ почечужныхъ душахъ температурою въ 18—19°R прод. 1 1/2 мин. кровяное давленіе падаетъ болѣе при послѣобѣденныхъ, чѣмъ при утреннихъ. Это паденіе удерживается 1—1 3/4 часа.

Таблица № 59.

При сидяч
чужой ду
пература 1
прод. 3

1	130	130	125	120	125	125	125	125	125	130	130	130	До обѣд.
2	145	145	135	140	145	145	145	145	145	145	145	145	
3	150	150	145	145	150	150	150	150	150	150	150	150	
4	140	135	130	125	130	135	135	135	135	135	135	135	
5	165	165	155	160	165	165	165	165	165	165	165	165	
Средняя разница.			—7	—7	—2	—1	—1	—1	—1	0	0	0	
1	150	150	150	140	140	140	140	145	145	145	150	150	Послѣ обѣд.
2	150	150	135	140	140	140	150	150	150	150	150	155	
3	160	155	145	145	145	150	150	155	155	155	155	160	
4	145	145	135	140	140	145	145	145	145	145	145	145	
5	155	155	150	150	150	155	150	155	155	155	155	155	
Средняя разница.			—8	—8	—8	—5	—3	—1	—1	—1	0	+2	

Выводъ: При сидячихъ почеч. душахъ температурою въ 18—19°R прод. 3 мин. кровяное давленіе падаетъ болѣе при послѣобѣденныхъ, чѣмъ при утреннихъ. Это паденіе удерживается около 1 1/4—1 1/2 часа.

Давленіе крови въ ПРАВОЙ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРІИ.

Таблица № 60.

При почечуіной
душѣ въ шкалу
темпер. 18—19°R.
прод. 1½ мин.

№ опыта.	До души.			Послѣ души черезъ										Примѣчаніе.
	по устан. терм.	за 5 м.	5 м.	10 м.	20 м.	30 м.	45 м.	1 ч.	1 1/4 ч.	1 1/2 ч.	1 3/4 ч.	2 ч.		
1	135	130	135	135	130	130	135	135	135	135	135	130	До обѣда.	
2	155	155	145	150	150	155	155	155	155	155	155	155		
3	155	155	145	150	150	155	155	155	155	155	155	155		
4	155	155	145	150	150	150	155	155	155	155	155	155		
5	165	165	160	165	165	165	165	165	165	165	165	165		
Средняя разница.			-6	-2	-3	-1	+1	+1	+1	+1	+1	0		

1	155	155	160	160	160	155	155	155	155	155	155	155	Послѣ обѣда.
2	140	135	140	135	135	135	135	135	135	135	135	135	
3	155	155	165	160	155	155	155	155	155	155	155	155	
4	155	155	145	145	150	150	155	155	155	155	155	155	
5	160	155	150	150	155	155	155	155	155	155	155	155	
Средняя разница.			+1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0	

Выводъ: При почечуіной душѣ въ шкалу температурою въ 18—19°R прод. 1½ мин. кровяное давленіе падаетъ при утреннихъ болѣе, при послѣобѣденныхъ менѣе и послѣ предварительнаго повышенія. Паденіе удерживается около ½ часа.

Таблица № 61.

При почечуіной
душѣ въ шкалу
темпер. 18—19°R.
прод. 3 мин.

1	135	135	125	135	130	135	135	135	135	135	135	135	До обѣда.
2	150	150	135	140	140	145	150	150	150	150	150	155	
3	165	165	150	150	155	160	165	165	165	165	165	165	
4	150	150	140	150	150	150	150	155	150	150	150	150	
5	165	165	160	160	165	165	165	165	165	165	165	165	
Средняя разница.			-11	-6	-5	-2	0	0	0	0	0	0	

1	155	155	145	145	150	155	155	155	155	155	155	155	Послѣ обѣда.
2	160	160	150	155	155	155	160	160	160	160	160	160	
3	165	165	155	165	165	165	165	165	165	165	165	165	
4	150	150	145	145	150	150	150	150	150	150	150	150	
5	155	150	145	145	150	150	150	150	150	150	150	150	
Средняя разница.			-8	-5	-2	-1	0	0	0	0	0	0	

Выводъ: При почечуіной душѣ въ шкалу температурою въ 18—19°R прод. 3 мин. кровяное давленіе падаетъ болѣе при утреннихъ, чѣмъ послѣобѣденныхъ. Паденіе удерживается ¾ часа.

Давленіе крови въ ПРАВОЙ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРІИ.

Таблица № 62.

При сидяч.
чуждой ду.
пература 1.
прод. 3

№ опыта.	До души.			Послѣ души черезъ									Примѣч.
	по устан. тери.	за 5 м.	5 м.	10 м.	20 м.	30 м.	45 м.	1 ч.	1 1/4 ч.	1 1/2 ч.	1 3/4 ч.	2 ч.	
1	150	150	140	150	150	150	150	150	150	150	150	150	До обѣда.
2	160	155	145	150	155	155	155	155	155	155	155	155	
3	155	155	145	150	155	155	155	155	155	155	155	155	
4	155	155	140	145	155	155	155	155	155	155	155	155	
5	145	145	135	140	145	145	145	145	145	145	145	145	
Средняя разниа.			-11	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	160	160	150	155	160	160	160	160	160	160	160	160	Послѣ обѣда.
2	160	155	150	155	155	155	155	155	155	155	155	155	
3	155	155	145	155	155	155	155	155	155	155	155	155	
4	160	165	160	160	165	165	165	165	165	165	165	165	
5	145	145	140	145	145	145	145	145	145	145	145	145	
Средняя разниа.			-7	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	

Выводъ: При сидячихъ почечуныхъ душахъ въ шкапу температурою въ 12—13°R прод. 3 мин. кровяное давленіе падаетъ болѣе при утреннихъ, чѣмъ послѣобѣденныхъ. Паденіе удерживается около 10 мин.

Таблица № 63.

При поче.
душѣ въ
темпер. 12
прод. 3

1	155	155	150	155	155	155	155	155	155	155	155	155	До обѣда.
2	135	135	145	140	135	135	135	130	135	135	135	135	
3	150	150	145	145	150	150	150	150	145	150	150	150	
4	—	155	145	150	150	155	155	155	155	155	155	155	
5	160	160	150	150	150	160	160	160	160	160	160	160	
Средняя разниа.			-4	-3	0	0	0	-1	0	0	0	0	
1	160	160	145	150	160	160	160	160	160	160	160	160	Послѣ обѣда.
2	160	155	155	150	155	155	155	155	155	155	155	155	
3	155	155	150	150	155	155	155	155	155	155	155	155	
4	165	165	155	160	165	165	165	165	165	165	165	165	
5	150	145	130	145	145	145	145	145	145	145	145	145	
Средняя разниа.			-9	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	

Выводъ: При почеч. душахъ въ шкапу температурою въ 12—13°R. прод. 3 мин. давленіе падаетъ болѣе при послѣобѣденныхъ, чѣмъ при утреннихъ. Паденіе удерживается около 10 мин.

XI.

Кривая пульса.

Кривую пульса съ правой лучевой артеріи мы снимали сфигмографомъ Dudgeon-Richardson'a (⁴⁴) въ отдѣльномъ рядѣ опытовъ и при измѣреніи температуры тѣла и давленія крови. Положеніе наблюдаемаго въ первомъ рядѣ опытовъ было такое же, какъ и во второмъ, т. е., наблюдаемый лежалъ на правомъ боку, слегка откинувшись кзади лѣвымъ плечомъ, чтобы не сдавливать правую подкрыльцевую артерію, часть предплечья и кисть свободно выдавались за край кровати. Приведя кисть съ согнутыми пальцами въ положеніе средняго разгибанія, мы находили на головкѣ луча наиболѣе сильно пульсирующее мѣсто лучевой артеріи и ставили пелоть сфигмографа соотвѣственно этому мѣсту. Затѣмъ стянувъ ленту, легкимъ передвиженіемъ аппарата кзади-кпереди и въ стороны убѣждались, что размахи рычажка здѣсь наибольшіе и тогда только (иногда придавивъ еще нѣсколько артерію при посредствѣ имѣющейся тяжести) пускали закованную бумажку между вальковъ часового механизма. До души кривая снималась послѣ $\frac{1}{4}$ часа покойнаго положенія, послѣ души непосредственно послѣ установки пелота *), слѣдовательно въ первыя пять минутъ, а затѣмъ черезъ 15, 30, 45 минутъ и черезъ 1 часъ. Это въ первомъ отдѣльномъ рядѣ опытовъ, при 2-мъ же въ первыя пять минутъ послѣ души, а затѣмъ то черезъ 45 минутъ, то черезъ 1 часъ и т. д.

Мы не можемъ привести здѣсь всѣхъ полученныхъ нами кривыхъ послѣ изучаемыхъ душъ, да едвали есть въ этомъ надобность. Всѣ онѣ носятъ одинъ и тотъ же характеръ, наименѣе (если принять за мѣрило, главнымъ образомъ, высоту восходящаго колѣна кривой) онъ выраженъ при душѣ температурою въ 18-19° R. сидячей продол-

*) Если употреблялась тяжесть, то послѣ души она ставилась на соотвѣствующее мѣсто рычажка. Обстоятельства, вліяющія на измѣненіе пульса кашель, икота, присутствіе постороннихъ (Ozanam (⁴¹) стр. 974), были приняты во вниманіе. Слабая сторона метода въ отсутствіи указателя, что снова попали на наиболѣе пульсирующее мѣсто артеріи.

жительностью 3 минуты, а наиболѣе при душѣ въ шкапу температурою въ $12-13^{\circ}$ R. продолжительностью тоже въ 3 минуты (см. 1-й и 2-й рядъ кривыхъ). Измѣненія кривой состоятъ: въ уменьшеніи высоты восходящей части волны, въ притупленіи вершины ея, въ приближеніи къ ней и уменьшеніи дикротической волны и въ уменьшеніи (до полнаго исчезанія) другихъ колебаній на нисходящей части кривой. Измѣненія эти постепенно исчезаютъ къ началу 2-го часа послѣ души, иногда же раньше. Намъ кажется, что полученные нами кривыя, соотвѣтствуютъ таковымъ же другихъ авторовъ (Delmas (1. с.), Winternitz'a (2 ч. I стр. 76 и слѣд. и ч. III стр. 324, Гопадзе и Вацадзе (1. с.), Вышегородскаго), примѣнявшихъ холодъ въ той или другой формѣ для изученія измѣненій пульса. Дающій такія кривыя пульсъ похожъ на пульсъ отъ суженія артеріи (*rétrécissement des artères*), Ozanam 1. с. стр. 833). Сопоставленіе же кривыхъ съ пониженіемъ кровяного давленія (по Basch'y), съ ошупываемой послѣ души шнуровидностью артеріи и съ набуханіемъ большихъ кожныхъ венъ нижнихъ конечностей, наблюдаемымъ у нѣкоторыхъ субъектовъ *), наводитъ на мысль, что въ данномъ случаѣ измѣненіе въ пульсѣ есть результатъ взаимодействія: повышенія сосудистаго тонуса, ослабленія сердечной дѣятельности и, быть можетъ, поступленія меньшаго количества крови въ артеріальную систему, крови, задержанной гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ.

3-й рядъ кривыхъ полученъ при опытѣ съ перерывомъ (раздѣваніе, одѣваніе, хожденіе и пр.), но безъ души.

*) При душахъ въ шкапу температурою $12-13^{\circ}$ R. продолжительностью 3 минуты (у Т-ва и М-ева).

I рядъ.


Кривыя пульса

Г-ва до и послѣ сидячей почечуйной души въ 18—19°R. продолжительностью въ 3 минуты. Температура ванной комнаты +13°R. Время души 1 ч. 20 м. дня.


До души.




Черезъ 5 минутъ.




Черезъ 15 минутъ.



Черезъ 30 минутъ.



Черезъ 45 минутъ. (?)



Черезъ 1 часъ.




До
души
послѣ

II-й рядъ.


Кривыя пульса

М-ева до и послѣ почечуйной души въ шкапу температу-
рою въ $12-13^{\circ}\text{R}$. продолжительностью въ 3 минуты. Темпе-
ратура ванной комнаты $+15^{\circ}\text{R}$.; время души 1 часъ 4 мин. дня.

До души.



Черезъ 5 минутъ.




Черезъ 15 минутъ.




Черезъ 30 минутъ.



Черезъ 45 минутъ.



Черезъ 1 часъ.



П о с л ѣ д у ш и .

III-й рядъ.

Кривыя пульса

М--ва при контрольномъ опытѣ. Температура ванной комнаты $+13^{\circ}\text{R}$. Время перерыва 12 час. 45 мин. дня.

Сейчасъ послѣ того, какъ легъ.



Послѣ 15 минутъ покойнаго положенія




Черезъ 5 минутъ.




Черезъ 20 минутъ.



Черезъ 30 минутъ.



Черезъ 45 минутъ.



До перерыва.

Послѣ перерыва.

XII.

Подводя итоги изложенному выше, мы видимъ, что на взятыхъ нами субъектахъ при описанныхъ условіяхъ изучаемыя восходящія (почечуйныя) души, въ сравненіи съ контрольными опытами:

1) Чувство мѣста обостряли (всѣ души температурою $18—19^{\circ}\text{R}$, $1\frac{1}{2}$ минутной продолжительности болѣе, чѣмъ 3 минутныя), или притупляли (всѣ души температурою $12—13^{\circ}\text{R}$, $1\frac{1}{2}$ минутныя менѣе, чѣмъ 3 минутныя). Эти измѣненія удерживались $1\frac{1}{2}$ часа послѣ души. (При контрольныхъ опытахъ чувство мѣста незначительно притуплялось).

2) Мышечную силу рукъ и ногъ неправильно измѣняли всѣ души, кромѣ душъ въ шкапу температурою $12—13^{\circ}\text{R}$ продолжительностью 3 минуты, которыя ее повышали (При контрольныхъ опытахъ мышечная сила ослабѣвала).

3) Время, необходимое для исчезновенія кожныхъ отпечатковъ, удлиняли (души температурою $18—19^{\circ}\text{R}$, болѣе $1\frac{1}{2}$ минутной продолжительности и на бедрѣ (орошаемая часть), чѣмъ 3 минутной продолжительности и на ягодицѣ (почти не орошаемая часть) и укорачивали (души температурою $12—13^{\circ}\text{R}$ болѣе 3 минутной продолжительности и на бедрѣ, чѣмъ $1\frac{1}{2}$ минутной и на ягодицѣ?). (При контрольныхъ опытахъ время, необходимое для исчезновенія отпечатковъ, укорачивалось).

4) Рефлексы: голеностопный не вызывали, кремастера брюшной и ягодичной ослабляли, колѣнный тоже ослабляли всѣ души, кромѣ душъ въ шкапу температурою $12—13^{\circ}\text{R}$, продолжительностью 3 минуты, которыя его усиливали. (При контрольныхъ опытахъ голеностопный рефлексъ не вызывался, колѣнный слегка ослаблялся — остальные не измѣнялись).

5) Внутривентриальное давленіе: не измѣняли (души температурою $18—19^{\circ}\text{R}$ и сидячія температурою $12—13^{\circ}\text{R}$) или незначительно повышали (души температурою $12—13^{\circ}\text{R}$ въ шкапу продолжительностью $1\frac{1}{2}$ и 3 минуты). (Изъ 6 контрольныхъ опытовъ въ 4-хъ внутривентриальное давленіе было безъ перемѣны, въ 2-хъ незначительно повышалось).

6) Температуру тѣла: *in axilla*—а) утреннія не измѣняли или задерживали въ паденіи и б) послѣобѣденныя понижали (иногда послѣ незначительнаго повышенія); *in recto* понижали всѣ души наименѣе температурою $18-19^{\circ}\text{R}$ въ шкапу продолжительностью $1\frac{1}{2}$ минуты, наиболѣе сидячія $12-13^{\circ}\text{R}$ продолжительностью 3 минуты. (При контрольныхъ опытахъ температура *axillae et recti* понижалась).

7) Температуру кожи понижали всѣ души менѣе на животѣ (случайно орошаемая часть), болѣе на бедрѣ и ягодицѣ; при чемъ наиболѣе падала температура кожи ягодицы и бедра при душахъ температурою $12-13^{\circ}\text{R}$, продолжительностью 3 минуты въ шкапу, а—живота одинаково и при душахъ $18-19^{\circ}\text{R}$ тоже въ шкапу при $1\frac{1}{2}$ и 3 минутной продолжительности,—наименѣе при сидячихъ душахъ температурою $18-19^{\circ}\text{R}$ (—живота 3 минутной, бедра $1\frac{1}{2}$ минутной, ягодицы утреннихъ $1\frac{1}{2}$ и 3 минутной, послѣобѣденныхъ $1\frac{1}{2}$ минутной продолжительности).

8) Давленіе крови въ правой лучевой артеріи понижали всѣ души: а) утреннія наиболѣе въ шкапу температурою $18-19^{\circ}\text{R}$ продолжительностью 3 минуты, наименѣе такія же температурою $12-13^{\circ}\text{R}$; б) послѣобѣденныя наиболѣе сидячія $18-19^{\circ}\text{R}$, продолжительностью 3 минуты, наименѣе души въ шкапу той же температуры $1\frac{1}{2}$ минутной продолжительности. (При контрольныхъ опытахъ давленіе почти не измѣнялось).

9) Кривую пульса измѣняли всѣ души (см. выше стр. 94 и слѣд.) (При контрольныхъ опытахъ кривая пульса почти не измѣнялась).

Такимъ образомъ качественная разница въ дѣйствіи холодныхъ

*) Наиболѣе быстрое приближеніе къ цифрамъ додушевымъ (и цифрамъ контрольныхъ опытовъ) и даже превосходство надъ ними отмѣчено для тѣхъ же душъ (на кожѣ живота, и бедра) или утреннихъ продолжительностью въ $1\frac{1}{2}$ минуты, послѣобѣденныхъ въ 3 минуты (на кожѣ ягодицы). (При контрольныхъ опытахъ температура кожи незначительно падала).

**) Давленіе падало на болѣе долгій срокъ при душахъ температурою $18-19^{\circ}\text{R}$, продолжительностью 3 минуты (утреннихъ) и тѣхъ же душахъ $1\frac{1}{2}$ минутной продолжительности (послѣобѣденныхъ),—на болѣе короткій при душахъ температурою $12-13^{\circ}\text{R}$ продолжительностью 3 минуты (въ шкапу и сидячихъ).

общихъ, мѣстныхъ шотландскихъ и почечуйныхъ душъ оказывается во вліяніи на кровяное давленіе, а количественная во вліяніи на температуру подмышки (общія души больше понижаютъ эту температуру), прямой кишки (мѣстная шотландская мало измѣняетъ эту температуру) и мышечную силу (общія души больше ее увеличиваютъ). Изъ сидячихъ же ваннъ, холодныя (температурою $11-18^{\circ}\text{C.}$) продолжительностью въ 30—60 минутъ, повидимому (Winterntz ³⁾ стр. 217), ²⁾ ч. I. стр. 282), наиболѣе подходятъ по дѣйствию къ изслѣдованнымъ нами душамъ, но отсутствіе указаній на производимыя ими измѣненія въ мышечной силѣ, исчезновеніе кожныхъ отпечатковъ, внутрибрюшное давленіе и пр. не позволяетъ утверждать этого.

Въ виду сложности раздражителя, представляемаго почечуйной душею (холодъ, механическое раздраженіе и пр.) температурою $12-13^{\circ}\text{R}$ и $18-19^{\circ}\text{R}$, а также существующихъ разногласій по вопросу о результатахъ дѣйствія кожныхъ раздраженій на различныя отправления организма (см. диссертациі П. С. Новицкаго ⁴⁸⁾, Н. П. Симановскаго ⁴⁹⁾, Истаманова ⁵⁰⁾), мы не будемъ останавливаться на объясненіи найденныхъ явленій, а позволимъ себѣ заключить такъ: намъ кажется, что приведенныя опыты 1) подтверждаютъ *) мнѣніе гидротерапевтовъ о мѣстномъ (покрайней мѣрѣ) и временномъ противовоспалительномъ (пониженіе температуры прямой кишки и кожи), успокоивающемъ (ослабленіе изслѣдованныхъ рефлексовъ), тоническомъ (повышеніе мышечной силы, ускореніе исчезновенія кожныхъ отпечатковъ) и возбуждающемъ (усиленіе колѣннаго рефлекса) дѣйствіяхъ душъ вообще;

2) оправдываютъ назначеніе почечуйныхъ душъ въ нѣкоторыхъ изъ перечисленныхъ выше болѣзненныхъ состояній (напр. привычныхъ запорахъ, кишечныхъ коликахъ на почвѣ привычныхъ запоровъ, почечуйныхъ шишкахъ, спазмѣ шейки мочевого пузыря и пр.);

3) даютъ основаніе испытать ихъ еще въ свѣжихъ случаяхъ varicoselle (устраненіе запоровъ, повышеніе тонуса ткани мошонки),

*) насколько, конечно, возможно переносить заключенія съ здоровыхъ на болѣвыхъ.

vaginismi (?) (успокоивающее дѣйствіе на рефлексы), выпаденій прямой кишки и матки, при вялости рукава (укрѣпляющее вліяніе на мышечный аппаратъ).

Въ заключеніе считаю долгомъ выразить глубокую благодарность частному преподавателю С. Н. Данило, А. М. Могилянскому и частному преподавателю П. Я. Розенбаху за помощь словомъ и дѣломъ при выполненіи этой работы.

Т е м п е р а т у р

Таблица № 64.

№ опыта.	Имя наблюд.	Темпер. по R.		Мѣс. число.	Время души.	in axilla.									До души.	Г
		Ванн. в.	Внѣшн.			До души.	Послѣ души черезъ									
							20'	30'	45'	1 ч.	1 ¹ / ₄ ч.	1 ¹ / ₂ ч.	1 ³ / ₄ ч.			
1	Повѣр	14	+ 1	19 Мар.	12 ч. 39'	37,15	36,95	37,1	37,1	37,05	37	37	36,9	37,7	37,	
2	Зуевъ.	13	— 6	20 Мар.	9 ч. 7'	37,25	37,1	37,05	37	36,8	36,8	36,7	36,7	37,6	36,	
3	Тим.	12,5	— 1	20 Мар	12 ч. 21'	37,2	37,05	37,05	37,1	37,15	37	37,05	37	37,9	37,	
4	Ман.	13	0	21 Мар.	9 ч. 37'	37,2	37,1	37	37	36,95	36,8	36,7	36,65	37,4	37,	

Т е м п е р а т у р

№ опыта.	До души.	Нижн. части живота.								До души.	Я г					
		Послѣ души черезъ									Послѣ ду					
		10'	20'	30'	45'	1 ч.	1 ¹ / ₄ ч.	1 ¹ / ₂ ч.	1 ³ / ₄ ч.		10'	20'	30'	45'	1 ч.	1 ¹ / ₄ ч.
1	34,6	32	33,2	33,8	34,4	34,8	34,8	35	35	33,4	29,4	31	32,6	32,8	33,6	33,
2	34	33,4	34,4	34,8	35,4	35,4	35,4	35,4	35,8	30,8	28,6	30,4	30,4	31,4	31,6	31
3	35	34,4	34,8	35	35,8	—	35,8	35,4	35,8	32,4	29	30,4	30,6	31	31,4	31
4	36,2?	34,8	35	35,2	35,4	35	35,4	35,4	35,4	32	28	29	30,2	30,2	30,4	31,

Примѣчаніе: Почечуйныя души въ шкапу и сидячія температурою въ 12—13° прямой кишки, кожи и кровяное давленіе въ томъ же направленіи, какъ тѣже ду

л а п о С.

При душахъ 12—13°R
прод. 1½ мин.

г е с т о.						До души.		Давленіе крови въ правой лучевой артеріи въ миллиметрахъ ртутнаго столба.									
лѣ души черезъ								п о с л ѣ д у ш у ч е р е з ъ									
30'	45'	1 ч.	1¼ ч.	1½ ч.	1½ ч.	По уст. терм.	За 5'	5'	10'	20'	30'	45'	1 ч.	1¼ ч.	1½ ч.	1¾ ч.	
36,95	36,8	36,7	36,7	36,7	36,8	165	165	165	160	165	165	165	165	165	165	165	
36,7	36,6	36,6	36,4	36,4	36,5	155	155	150	155	155	155	155	155	155	155	155	
36,9	36,8	36,9	36,9	36,9	36,9	160	155	150	155	155	155	155	155	155	155	155	
36,8	36,7	36,7	36,6	36,5	36,5	150	150	145	150	150	150	150	150	—	150	155	

жи [по С.] въ областяхъ:

д и ц ъ.			До души.	Задне—внутр. пов. бедра.								№ души.	Родъ души.
черезъ				Послѣ души черезъ									
1. 1 ¹ / ₂ ч.	1 ³ / ₄ ч.			10'	20'	30'	45'	1 ч.	1 ¹ / ₄ ч.	1 ¹ / ₂ ч.	1 ³ / ₄ ч.		
33,8	34,2	33,1	28,6	30,6	32	32,2	32	34	33,2	33,2	1	Въ шкапу.	
32	31,8	31	29,8	30,8	31	30,6	30,6	31	31,2	31,4	2	Сидячая.	
31,4	31,4	33	30,8	32	32,6	32,8	32,4	32,8	32,2	32	3	Сидячая.	
31,8	31,2?	33	27	28,6	29,8	30,2	30,6	31	30,4	31,2	4	Въ шкапу.	

ожительностью въ 1½ минуты, повидимому, измѣняютъ температуру подмышки, ожительностью въ три минуты.

Литературные источники.

1. Fleury L. Traité thérapeutique et clinique d'hydrothérapie 4-ème édition. Paris 1875.
- 2) W. Winternitz. Гидротерапія, построенная на физиологическихъ и клиническихъ основаніяхъ. Спб. 1878—1881 г., ч. I—III.
- 3) W. Winternitz. Гидротерапія. Спб. 1882 г., изъ руководства къ общей терапіи подъ редакціей Ziemssen'a, т. II ч. III.
- 4) Delmas. P. Manuel d'hydrothérapie Paris 1885 г.
- 5) Duval, E. Traité pratique et clinique d'hydrothérapie. Paris 1888 г.
- 6) Bottey. Action et réaction en hydrothérapie. *Annals de la Société d'hydrologie médicale de Paris* 1887 г. т. XXXII стр. 384.
7. А. Могилянскій. Къ ученію объ употребленіи холодныхъ душъ въ горячечныхъ болѣзняхъ. *Врачъ*, 1883, стр. 529.
- 8) Гопадзе и Вацадзе. Къ вопросу о физиологическомъ дѣйствиіи холодныхъ, безразличныхъ, горячихъ и шотландскихъ душъ на здороваго человѣка. *Врачъ*, 1888, № 25.
- 9) Вороновскій. Матеріалы къ вопросу о дѣйствиіи брюшнаго согрѣвающего компресса. Дисс. Спб., 1888.
- 10) Благовѣщенскій. О вліяніи холодныхъ обливаній на азотистый метаморфозъ и пр. Дисс. Спб., 1888.
- 11) Кручекъ-Голубовъ. О дѣйствиіи продолжительныхъ тепловатыхъ ваннъ на больныхъ брюшнымъ тифомъ. *В. М. Журналъ*, 1886 г., кн. XI.
- 12) Горошко. Къ ученію о дѣйствиіи мѣстной шотландской души. Дисс. Спб., 1887.
- 13) Гржибовскій. Къ вопросу о дѣйствиіи охлаждающихъ, безразличныхъ и согрѣвающихъ душъ на здороваго человѣка. Дисс. Спб., 1887 г.
- 14) Вышегородскій. О вліяніи общихъ душъ различной температуры на артеріальное кровяное давленіе и пр. Дисс. Спб. 1887.
- 15) Couette. Etude expérimentale sur l'action thermique de l'eau froide en applications hydrothérapiques. *Lyon médicale* 1886 г. № 24.
- 16) O. Pospischill. Calorimetrische Untersuchungen über die Grösse der Wärmeabgabe von der Körperoberfläche. *Klinische Studien*

Curriculum vitae.

Викторъ Мартыновичъ Воронинъ, вѣроисповѣданія православнаго, родился 30-го ноября 1858 года въ мѣщанской семьѣ города Одессы. По окончаніи курса въ Одесской Ришельевской Гимназіи въ 1876 году поступилъ на первый курсъ отдѣленія естественныхъ наукъ физико-математическаго факультета Императорскаго Новороссійскаго Университета. Въ 1877 году перешелъ на 2-й курсъ Императорской Медико-Хирургической Академіи, по окончаніи курса въ которой въ 1881 году опредѣленъ, какъ стипендіатъ военнаго вѣдомства, въ 72 пѣх. Тульскій полкъ. Въ началѣ 1882 года перемѣщенъ въ 86 пѣх. резервный батальонъ и Конференціей Императорской В.-М. Академіи награжденъ серебряной медалью за представленное при окончаніи курса сочиненіе (см. ниже подъ № 1). Въ 1883 году назначенъ младшимъ ординаторомъ Казанскаго Военнаго Госпиталя. Въ 1887 году прикомандированъ къ Академіи для усовершенствованія въ медицинскихъ наукахъ. Въ 1888 году окончилъ экзаменъ на степень доктора медицины и нынѣ представляетъ настоящую работу для полученія этой степени.

Кромѣ того имъ напечатаны:

1) Нѣсколько цифровыхъ данныхъ къ вопросу о вліяніи грязевыхъ ваннъ на обмѣнъ. («Врачъ», 1882 года, № 31).

2) О вліяніи сѣрныхъ и прѣсныхъ ваннъ на вѣсъ и температуру тѣла, пульсъ, дыханіе, чувство мѣста и тургоръ кожи у человека. (Труды общества охраненія народнаго здравія. Вып. III, 1885 г. Одѣл. бальнеологіи и кліматологіи, т. I).

3) Симуляція или болѣзнь (случай предполагаемаго новообразования средостѣнія). (Въ протоколахъ Казанскаго Военно-Санитарнаго общества. «Военно-Санитарное Дѣло», 1887 года № 49).

Важнѣйшія опечатки и редакціонныя промахи (въ текстѣ).

Стран.	строка сверху	напечатано:	слѣдуетъ:
2	1	подъ заглавіемъ	подъ заглавіемъ:
2	5	. Печатать	, печатать
3	14	такъ называемый	такъ называемый,
4	26	Deemas	Delmas
4	26	Scheur'a	Scheuer'a
5	26	приведеннаго	приведеннаго
6	22	У. Winternitz'a	У Winternitz'a
6	30	диспенсии	диспепсии
7	4	Tortivel	Tartivel
7	5	Dюval'я	Duval'я
8	4,11,12,15,18	неизмѣняется	не измѣняется
8	9	кривой	кривой пульса
9	16	Conette	Couette
9	19	температура	температуръ
9	»	дыханій	дыханіи
9	26	душами движеніе	душами плюсь движеніе
15	1	въ областяхъ	областяхъ:
19	3	18—19 ⁰ въ прод.	18—19 ⁰ прод. въ
24	2-я (въ выводѣ)	почти къ началу	почти исчезаетъ къ на- чалу
28	1 (въ выводѣ)	12—19 ⁰ R	12—13 ⁰ R
32	8	plica uatium	plica natium
38	26	; второе	. Второе
39	12	инструментовъ;	инструментовъ,
39	13	Collin'a *)	Collin'a *),
39	17	paris Rue de l'Ecoll	Paris, Rue de l'Ecole
39	15	динаметра	динамометра
56	2	Тадлица	таблица
65	30	Imnuch'a	Immisch'a
»	»	минуть,	минуть
»	31	термометровъ	термометровъ,
68—69 (въ выв.)	1	При сидячей поч. душъ.	Сидячія почеч. души
		температура	температуру
	2	или	или 2)

75	2	въ выводѣ	бедро	бедра
78	2		опытахъ	опытахъ,
79	3		опытовъ	опытовъ,
80	2		ихъ	ихъ,
81	2		. Тоже	тоже
81	»		возвращалось	возвращалась
83	2		кожи,	кожи
83	3		внутренности	внутренней
88	20		аппаратъ	аппаратъ,
88	20		Windler	Windler,
97	<i>3-й рисунокъ долженъ быть послѣднимъ 4-й—3-имъ, 5-й—4-мъ, 6-й—5-мъ.</i>			

Въ литературномъ перечнѣ неправильно напечатано clinique, annals и Flemming слѣдуетъ clinique, annals и Fleming.

Кромѣ того во многихъ мѣстахъ напечатано вмѣсто температура по R, температура по K, по R^o, по P.

- aus der Hydrotherapeutisch. Abtheil. d. Allgem. Poliklin. in Wien. Herausgeg. Von Dr. W. Winternitz H. III, 1888 г.
- 17) E. H. Weber. Tastsinn und Gemeingefühl. Handwörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf Phys. path. Von R. Wagner. 1846. стр. 481.
 - 18) A. W. Volkmann. Ueber den Einfluss der Uebung auf das Erkennen raumlichen Distanzen. Berichte über die Verhandl. der Königl Sächs. Gesellschaft der. Wissensch. zu Leipzig (Mathem. phys. classe) 1858. стр. 38.
 - 19) Czermack. Physiologische Studien Sitzungsberichte der Mathemat. Naturwiss. Klasse der Kaiserl. Akademie der Wissensch. zu Wien. 1885.
 - 20) Стольниковъ. Объ измѣненіи чувствительности у здороваго челоѣка подѣ вліяніемъ общихъ теплыхъ и холодн. ваннъ. В. М. Журн. 1878, кн. IV.
 - 21) Chassagne et Dally. Recherches anthropométriques sur les effets de la gymnastique d'entraînement. Revue d'anthropologie 1880 г. (2-me serie IIр. 230). Врачъ, 1880, стр. 402.
 - 22) Якимовъ. Къ ученію о теплыхъ ваннахъ. Дисс. Спб. 1883 г.
 - 23) Костюринъ. Матеріалы къ ученію о русской банѣ. В. М. Журн. 1879 г. Кн. XI.
 - 24) Стельмаховичъ. Матеріалы къ ученію о холодныхъ обертываніяхъ. В. М. Журн. 1882 г. Кн. V.
 - 25) A. Flemming. On the duration of an impression caused by pressure on the skin. The British Med. Journ. 1874 г. T. II, стр. 770.
 - 26) Landois. Учебникъ физиологіи челоѣка. Харьковъ. 1886 г.
 - 27) Gowers. Диагностика болѣзней спиннаго мозга. Спб. 1881 г.
 - 28) Heller. Zur diagnostischen Mess. des Kniephänomens. Berl. Klinisch. Wochenschr. 1886 г. № 52.
 - 29) Warren Lombard. American. journ. of psychology 1887 г. № 1. Nowembr, по реферату въ Вѣстникъ клинической и судебной психіатр. и пр. подѣ ред. проф. И. П. Мержевскаго 1888 г., ч. V, вып. II.
 - 30) Яковлевъ. О способахъ изслѣдованія колѣннаго рефлекса. Дневникъ 3-го съѣзда русскихъ врачей. Врачъ 1889 г. стр. 68.
 - 31) Schreiber. Untersuchungen ueber das Kniephänomen. Arch. f. exper. pathol. und. pharmacologie 1884 г. стр. 27.
 - 32) Schreiber. Ueber das Kniephänomen. Deutsche Archiv f. Klinische Med. 1884 г. стр. 254.
 - 33) Вагнеръ. Объ измѣненіяхъ внутрибрюшнаго давленія при различныхъ условіяхъ. Врачъ 1885 г. № 12 и слѣд.
 - 34) E. Thorner. Deutsche Mediz. Zeitung 1885 г., 24 авг. Врачъ 1885 г., № 34. Deutsche Mediz. Zeitung 1888 г., 24 мая.
 - 35) Данило, С. H. Réflexomètre pour les réflexes tendineux avec signal électrique. Comptes rendus de séances et mémoires de la société de Biologie 1882 г., стр. 595.

- 36) Бабаевъ-Бабаянъ. Матеріалы къ вопросу о вліяніи гидро-
электрич. ваннъ и проч. Дисс. Спб. 1887.
 - 37) Redard. Traité de thermométrie médicale et ct. Paris 1885 г.
 - 38) Basch. Der Sphygmomanometer und Seine Verwerthung in der
Praxis. Berl. Klinisch. Woch. 1887. № XI XII, XIII, XIV и XVI.
 - 39) Basch. Messung des Blutdrucks am Menschen. Zeitschrift für
Klinisch. Med. 1888. Вып. II стр. 79.
 - 40) Zadek. Die Messung des Blutdrucks am Menschen Zeitschr. f.
Klinisch. Med. 1880 г.
 - 41) Ozanam. La circulation et le pouls. et ct., Paris 1886 г.
 - 42) Рефератъ во Врачѣ за № 334, 1884 г. Мед. Обзорѣніе 1884 г.
стр. 328.
 - 43) Ю. Чудновскій. Матеріалы для клиническаго изученія дѣй-
ствія кровопусканія. Дисс. Спб. 1869.
 - 44) Schlier. Über d. Dudgeon'sche Sphygmogr. Berl. Klinische Wo-
chenschrift 1880 г. стр. 741. Asclepiades 1885 г. стр. 193—203,
гдѣ, повидимому, (Index Medicus) описанъ этотъ измѣненный
Ричардсономъ аппаратъ, намъ найти не удаюсь.
 - 45) Tartivel. Article «Douche» въ Dictionnaire encyclopédique des
sciences médicales. T. trentième. Paris. 1884.
 - 46) Bürkner. Die aufsteigende Douchen et cet. N. Z. f. Gebürts
K-de. 1837 V. H. 3.
 - 47) M. Coulet. De la douche ascendante (intestinale) et cet. An-
nals de la société Médic de Paris 1880—79 г. стр. 124.
 - 48) П. Новицкій. Объ отвлекающемъ дѣйствіи мѣстныхъ кожныхъ
раздр. Дисс. Спб. 1880.
 - 49) Симановскій. Къ вопросу о вліяніи раздраженія чувстви-
тельныхъ нервовъ на отправленіе и питаніе сердца. Спб. 1881 г.
 - 50) Истомановъ. О вліяніи раздр. чувствительныхъ нервовъ на
сосудистую систему у человѣка. Спб. 1885 (дисс.).
-

Положенія.

1) Почечуйная душа, температурою въ 18—19° и 12—13°R продолжительностью въ 1¹/₂ и 3 минуты есть дѣйствующее (главнымъ образомъ мѣстно) на организмъ здороваго человѣка средство.

2) Способъ изслѣдованія кожныхъ отпечатковъ А. Fleming'a долженъ быть разработанъ болѣе подробно.

3) Къ результатамъ изслѣдованій мышечной силы помощью динамометровъ, полученнымъ изъ немногихъ наблюденій, надо относиться весьма осторожно.

4) При острыхъ набуханіяхъ селезенки (при приступахъ возвратнаго тифа, перемежающейся лихорадки) въ задне-нижнихъ частяхъ груднаго ящика слѣва часто слышится при дыханіи шумъ, принимаемый то за *affricus pleuriticus*, то за симптоматическую для *pneumonia crouposa* крепитацию, происхожденіе-же его, съ большою вѣроятностью, надо отнести на счетъ преходящаго ателектаза въ данномъ участкѣ легкихъ.

5) Съ увеличеніемъ средствъ распознаванія болѣзней и съ учащеніемъ обычая посмертныхъ вскрытій кругъ «малярійныхъ заболѣваній, неуступающихъ леченію хининомъ» значительно сѣзится.

6) Условія службы военнаго врача (частыя передвиженія, ограниченное содержаніе, малость отпуска врачебнымъ учрежденіямъ на новѣйшія изобрѣтенія въ области медицины) обусловливаютъ для него скудость наблюденій въ области патологии и невозможность научныхъ изслѣдованій.

7) Ограниченіе права врачей относительно вскрытій (по соображеніямъ бытовымъ и т. д.) въ госпиталяхъ и лазаретахъ—можетъ только вредно отразиться на смертности въ арміи.

8) Шаблонность одежды военно-служащихъ нашего разнообразнаго по климату отечества играетъ видную роль въ болѣзненности ихъ.

Въ таблицахъ.

№ таблицы	строка	цифръ	графа	напечатано:	слѣдуетъ:
1	4	29	0	+1	
1	16	15	—0,60	—0,06	
3	16	37	0	—0,06	
8	16	33	—0,86	+0,86	
9	11	24	—2,8	+2,8	
9	11	35	— 0,6	+0,6	
10	3	9	+0	0	
10	4	9	11	+11	
11	5	7	9	8	
13	6	6	+8	—3	
13	7	6	+1	—1	
13	16	6	+2,5	+1,6	
15	11	3	4	5	
16	3,9,10	2	22,17,15	15,25,20	
17	8	7	20	25	
27	11	11	+00,5	+0,05	
36	27	18	=	>	
44	10	13	—9,15	—0,15	
45	17	16	—0,8	—0,3	
«	16	28	—09,6	—0,96	
«	16	20	37,8	37,3	
«	11	28	36,3	36,5	
«	11	30	36,3	36,6	
46	1	12	33,7	36,7	
	2	14	39,9	36,9	
	7	11	36,38	36,85	
47	5	10	27,3	37,3	
	10	11	35,95	36,95	
	12	27	—0,75	—0,76	
48	5	28	36,85	36,65	
53	4	11	34,1	34,6	
55	6	2	—0,8		
55	6	4	—0,2	—0,3	
55	11	18	32,2	33,2	
55	11	28	33	33,4	

Кромѣ того во многихъ таблицахъ о температурѣ напечатано вмѣсто 36,0—86,0, 96,0. или 39,0°C.

Р.В. ТАБЛИЦА

№ таблицы	срочная таблица	таблица	конверсионная	таблица
1	4	23	0	+1
1	10	16	-0.50	-0.08
2	10	27	0	-0.08
2	10	32	-0.88	+0.88
3	11	24	-2.8	+2.8
3	11	36	-0.8	+0.0
10	3	9	+0	0
10	4	9	11	+11
11	6	7	2	2
13	6	6	+2	-2
13	7	6	+1	-1
13	10	6	+2.5	+1.0
13	11	6	4	6
16	5.9 10	3	22.11.15	15.22.80
17	8	7	20	18
27	21	11	+0.05	+0.05
28	27	18	=	=
44	10	13	-0.10	-0.15
45	15	10	-0.2	-0.3
4	10	22	-0.0	-0.00
4	10	20	27.2	27.2
4	11	22	28.2	28.2
4	11	20	28.2	28.2
46	1	18	38.7	38.7
46	2	14	20.0	20.0
47	6	11	22.2	22.2
47	6	10	27.2	27.2
47	10	11	22.2	22.2
47	12	27	-0.75	-0.78
47	2	22	20.85	20.85
50	4	11	24.1	24.0
50	6	2	-0.2	-0.2
55	6	4	-0.3	-0.3
55	11	12	22.2	22.2
55	11	22	22.2	22.2

These are the numbers and units of temperature conversion tables
 20.0 - 20.0, 20.0, 20.0, 20.0

