

Committee-Beretning angaaende Syphilisationen / ved Steffens, Egeberg, Voss.

Contributors

Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

[Oslo] : [publisher not identified], [1863]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/bwgk2cky>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Stryer & Mich.
Præs.

Committee-Beretning

angaaende

Syphilisationen.


Ved

Steffens,
Stadsphysicus.

Egeberg,
Dr.

Voss,
Professor.

(Afttrykt af N. Magaz. 1. Lægevdsk. XVII Bd. 6 & 7 H.)



Committee-Beretning angaaende Syphilisationen.

(Ved Stadsphysicus *Steffens*, Dr. *Egeberg* og Professor *Voss*.)

(Oplæst i det medicinske Selskabs Møde den 22de April 1863.)

Undertegnede, som i sin Tid bleve anmodede af Professor *W. Boeck* om at træde sammen i en Committee for at følge hans Curforsøg med Syphilisation, i Særlighed for at constatere de ved denne Behandlingsmaade vundne Resultater, have fra Februar Maaned 1856 indtil Begyndelsen af 1859 røgtet dette Hverv, idet vi i denne Tid stadig have besøgt de Hospitalsafdelinger, hvor Forsøgene ere anstillede. Vi have noteret de sygelige Phænomener, som vare tilstede ved Behandlingens Begyndelse, de Forandringer med Hensyn til Sygdommens Gang og de Syges Befindende, som gjorde sig bemærkelige i Løbet af Curen, og den Tilstand, i hvilken Patienterne befandt sig paa den Tid, de forlode Hospitalet eller udgik af vor Observation. Vi have i Almindelighed seet og undersøgt hver enkelt Patient, medens han laae under Behandling, een Gang hver 3die Uge. Endelig har det været os magtpaaliggende at tilveiebringe saavidt muligt paalidelige Ef-

terretninger om Patienternes Befindende, efterat de havde forladt Hospitalerne. I dette Øiemed have vi deels tyet til vore Collegers Assistance, idet vi i Norsk Magazin for Lægevidenskaben have anmodet dem om at meddele os, hvad der i saa Henseende maatte være blevet dem bekjendt, deels søgt at skaffe os de fornødne Oplysninger ved mundtlige og skriftlige Efterspørgsler. Ihvorvel Antallet af de Personer, hvis Befindende vi saaledes have kunnet følge indtil den seneste Tid, desværre ikke er saa stort, som vi kunde ønske, troe vi dog, at der kan tillægges de vundne Resultater en ikke ringe Grad af Paalidelighed, da Sandsynligheden taler for, at de indtrufne Recidiver paa faae Undtagelser nær ere komne til vor Kundskab, hovedsagelig fordi den største Deel af de observerede Patienter ere nødsagede til ved Sygdommens fornyede Udbrud at tyе tilbage til de offentlige Sygehuse.

Da Brigadelæge *Hjort* samtidig paa sin Hospitalsafdeling behandlede enkelte Patienter med Syphilisation, have vi ogsaa udstrakt vore Observationer til disse, og da han, ledet af den Anskuelse, at Syphilisationens heldige Virkninger hovedsagelig maatte tilskrives den ved de kunstige Saar bevirkede Derivation, foretog en Række Curforsøg med Stibiatplastre, have vi troet ogsaa at burde drage disse ind i Rækken af vore Iagttagelser. Om Alt, hvad vi saaledes have observeret og samlet, give vi os herved den Ære at afgive Beretning. Denne Beretning fremkommer vistnok meget seent, og Committeeen faaer finde sig i herfor at høre ilde. Nogen Skade er imidlertid derved neppe afstedkommet; thi Resultaterne af enhver antisypilitisk Behandlingsmaade vinde i Paalidelighed, jo længere Tid der er forløben siden Curforsøgene institueredes.

Efter de førte Protokoller have vi udarbejdet medfølgende schematiske Lister, hvilke formeentlig give en saadan Oversigt over de observerede Sygdomstilfælde, at man uden Vanskelighed kan kontrollere, hvad Committeeen har troet at kunne opstille som Resultater af de her omhandlede Behandlingsmaader. Efter Professor *W. Boecks* derom yttrede Ønske har man i saa Henseende strængt holdt adskilte de fra hans og de fra Brigadelæge *Hjorts* Afdeling hentede Observationer angaaende Syphilisationen.

Committeeen gaaer nu over til særskilt at omtale de tvende antisypilitiske Behandlingsmaader, som der her er Spørgsmaal om, nemlig Syphilisation og Derivation.

Syphilisation.

(Prof. *W. Boecks* Patienter.)

Som bekjendt lægger Prof. *W. Boeck* stor Vægt paa, om en syphilitisk Patient, som underkastes Syphilisationen, tidligere er behandlet med Mercurialmidler eller ikke, idet efter hans Erfaring Udsigterne til Helbredelse i første Tilfælde ere langt mindre end i sidste. Committeeen har derfor strængt iagttaget en Sondring af Patienterne i saa Henseende.

I Alt har Committeeen observeret 165 syphilitiske Patienter, som have været behandlede af Prof. *W. Boeck* med Syphilisation, af hvilke 109 høre til dem, om hvem det ikke er oplyst, at de tidligere nogensinde ere blevne behandlede med Mercur.

I.

Disse 109 Patienter have samtlige lidt af constitutionel Syphilis, nemlig:

A. 106 (49 mandlige og 57 qvindelige) Patienter af

secundære Tilfælde, saasom Tubercula mucosa, Affectio faucium, Exanthemata varii generis, Alopecia, Iritis, Glandulæ nuchales tumefactae etc., hvilke Tilfælde ved Behandlingens Begyndelse have været tilstede i kortere eller længere Tid. 2 af disse have tidligere været behandlede med Syphilisation.

Med Hensyn til Alderen have været

| | |
|---|------|
| under $\frac{1}{2}$ Aar | 14 |
| mellem $\frac{1}{2}$ Aar og 1 Aar . . . | 3 |
| — 1 — 2 — . . . | 5 |
| — 2 — 5 — . . . | 3 |
| — 5 — 10 — . . . | „ |
| — 10 — 20 — . . . | 8 |
| — 20 — 30 — . . . | 53 |
| — 30 — 40 — . . . | 11 |
| — 40 — 50 — . . . | 4 |
| — 50 — 60 — . . . | 3 |
| — 60 — 70 — . . . | 1 |
| | 105, |

(om 1 Patient er Alder ikke noteret).

Hos 12 af disse Patienter, alle under $\frac{1}{2}$ Aar gamle, har Sygdommen antagelig været af hereditær Oprindelse.

Resultatet af Behandlingen*) har været:

1. Helbredelse uden Recidiv 74. (Liste Nr. 1.) Behandlingens Varighed for samtlige disse 74 Patienter har været 11,135 Dage, altsaa i Gjennemsnit for hver enkelt Patient 150,4 Dage. Den korteste Tid har været 87 (Protokol-Nr. 182), den længste 371 Dage (P.-Nr. 69).

*) Foruden Syphilisation er kun af og til benyttet Lapis infernalis til Touchering af overfladiske Saar og Solut. Atropini til Inddrypning ved Iritis. Dette Tilfælde er oftere forekommet og veg under Syphilisationen uden andre Midlers Anvendelse.

Herved bemærkes, at Behandlingens Varighed er regnet fra den Dag af, at Syphilisationen tog sin Begyndelse, indtil Patienten udskreves af Hospitalet, og at Opholdet paa Hospitalet oftere er blevet forlænget dels ved tilstødende ikke syphilitiske Sygdomstilfælde, dels derved, at Børn efter fuldendt Cur maatte oppebie paa Hospitalet deres Forældres Helbredelse og omvendt. Det kan saaledes med Sikkerhed antages, at Behandlingens Varighed i Virkeligheden har været ikke ubetydeligt mindre end angivet, men hvor meget kan Committeeen efter de optegnede Data ikke nøiagtig angive.

Siden Helbredelsen er indtil 1ste Juli 1862 forløben

fra 6 til $6\frac{1}{2}$ Aar for 6 Patienter

— $5\frac{1}{2}$ - 6 — — 14 —

— 5 - $5\frac{1}{2}$ — — 14 —

— $4\frac{1}{2}$ - 5 — — 12 —

— 4 - $4\frac{1}{2}$ — — 12 —

— $3\frac{1}{2}$ - 4 — — 11 —

— 3 - $3\frac{1}{2}$ — — 5 —

74 Patienter.

Om 13 af disse Patienter har Committeeen paalidelig Efterretning, at de senere have befundet sig fuldkommen vel og have været frie for ethvert syphilitisk Symptom.

Af 6 under $\frac{1}{2}$ Aar gamle Børn have 5 (P.-Nr. 14, 43, 111, 113, 196) antagelig lidt af hereditær Syphilis.

De Helbredede have samtlige ved Udskrivningen følt sig friske og ikke klaget over Mathed. De have i Almindelighed havt et sundt Udseende og have heller ikke senere, saavidt det er blevet Committeeen bekjendt, været sygelige eller havt Mindelser efter den overstaaede Cur.

2. Recidiver ere observerede hos 17 Patienter (Liste Nr. 2), af hvilke de tvende, som før bemærket, ikke have

været under Committeeens Observation, medens de tidligere bleve behandlede af Prof. *W. Boeck* med Syphilisation, og hvilke følgelig ikke kunne tages i Betragtning ved at opgjøre Forholdet mellem de Behandlede og Recidiverne. Af 104 Patienter have saaledes 15 faaet Recidiv, altsaa 1 af 6,93. Af disse 15 have 3 havt to Recidiver (P.-Nr. 151, 179, 189) og 1 tre Recidiver (P.-Nr. 23). Den korteste Tid, inden hvilken det første Recidiv viste sig, var 20 Dage, den længste Tid 3 Aar. Mellem andet og tredje Recidiv var Tiden mellem 3 og 10 Maaneder.

Prof. *W. Boeck* har gjort opmærksom paa, at de fleste efter Syphilisationen indtræffende Recidiver ere af en meget let Beskaffenhed, og at Tilfældene i Almindelighed svinde meget snart under en indifferent Behandling (indvendig Essent. gentianæ, for Syns Skyld, og udvendig Toucheren med Lapis infernalis).

Af de 15 Personer, som paa Hospitalet behandlede for Recidiver — 2 behandlede i deres Hjem — bleve 10 behandlede paa den saakaldte indifferente Maade, 2 tvende Gange. Den ene af disse 2 (P.-Nr. 151) laae anden Gang, 10 Maaneder efter første Recidiv, i 30 Dage paa Arendals Sygehuus, hvor Prof. *Boeck's* Forskrifter fulgtes, og er ifølge Skrivelse fra Districtslæge *Frisak* af 1⁸ 62 fuldkommen frisk.

Tiden for denne Behandlingsmaade varierede mellem 7 og 120 Dage (P.-Nr. 169 og 164) og var i Gjennemsnit 34,4 Dage.

7 Gange anvendtes ved Recidiv Syphilisation i Alt hos 6 Individuer, altsaa tvende Gange hos 1. Denne (P.-Nr. 23) gennemgik følgelig 3 Gange Syphilisationscuren, men har ikke desto mindre faaet et tredje Recidiv, da nemlig Vedkommende i 1859 led af tertiære Saar og behandlede

udeafor Hospitalet med Sol. iodeti kalici. Gjennemsnittiden for Behandlingen var 128 Dage. I et Tilfælde (P.-Nr. 85) anvendtes foruden Syphilisation Sol. iodeti kalici og Dampbade. Patienten skal nu være fuldkommen frisk.

Foruden den nys omtalte Patient (P.-Nr. 23), som muligens endnu ikke er restitueret, lider ogsaa en anden af de heromhandlede Patienter, nemlig P.-Nr. 64, fremdeles af et syphilitisk Symptom, nemlig Psoriasis syphilitica paa Fødderne. Han bemærkede Udslettet først 3 Aar efter endt Syphilisation og er nu næsten befriet for det, omendskjønt han Intet har anvendt derimod. Forøvrigt befinder han sig fuldkommen vel, har giftet sig og avlet 2 sunde og friske Børn. P.-Nr. 5, et 6 Maaneder gammelt Barn, som tvende Gange blev syphiliseret, er senere død af Pneumonie paa Børnehospitalet. Det var dengang frie for syphilitiske Tilfælde.

Om alle de øvrige Patienter, som have været hjem-søgte af Recidiv, er det at antage, at de fremdeles ere friske, siden man Intet har hørt om dem.

3. Hos 9 Patienter (Liste Nr. 3), som have været underkastede Syphilisation, have Forholdene været saadanne, at Committeen ikke har observeret eller kunnet observere noget bestemt Resultat. Om 5 af disse, som uhelbredede eller i Bedring forlode Hospitalet, har Committeen imidlertid Anledning til at antage, at de ere blevne restituerede alene ved Syphilisation, idet hos 3 (P.-Nr. 126, 136, 188) de ved Udskrivningen endnu tilstedeværende Symptomer senere uden al Behandling ere forsvundne, og hos de 2de andre (P.-Nr. 39, 75) Syphilisation af andre Læger er bleven fortsat til Sygdommens Forsvinden; hos den ene (P.-Nr. 39) rigtignok med et let for indifferent Behandling vigende Recidiv.

2 Individder, paa hvilke Inoculationerne viste ringe eller ingen Virkning, angrebes den ene (P.-Nr. 162) af Pleuritis, den anden (P.-Nr. 172)*) af Typhus, under hvilke Sygdomme de syphilitiske Tilfælde aldeles forsvandt. Committeeen har Intet senere hørt om disse Personer. — En Patient, hjemmehørende i Udlandet, rømte uhelbredet, og en anden (P.-Nr. 150), som udskreves i Bedring, begav sig til Gøtheborg, hvor han blev helbredet ved en Mercurialcur.

4. Døde ere 6 Børn (Liste Nr. 4), alle under $\frac{1}{2}$ Aar gamle og lidende af hereditær Syphilis. 2 døde af Erysipelas. Committeeen finder det lidet sandsynligt, at denne Sygdom var fremkaldt ved Inoculationssaarene, da den viste sig paa Steder, som laae fjernt fra disse, og da Inoculationens Virkning var ubetydelig, hvørimod de syphilitiske Tilfælde meget udbredte. 1 Barn døde af Pneumonie, de øvrige af Atrophie eller maaskee rettere sagt af Syphilis, mod hvilken Syphilisationen Intet udrettede; Inoculationerne bleve saa godt som uden Virkning.

Phagedænisme i Inoculationssaarene, dog ikke i meget betydelig Grad, observeredes hos 3 af de ikke før mercurialiserede Patienter (P.-Nr. 69, 116, 123).

B. 3 Patienter med tertiære Tilfælde, om hvilke det ikke kunde oplyses, at de nogensinde før havde brugt Mercurialmidler, underkastedes Syphilisation. Af disse helbrededes 1 (P.-Nr. 184, Liste Nr. 2) alene ved Syphilisation, men fik Recidiv og brugte da Solutio iodeti kali. Hos de 2de andre er intet bestemt Resultat op-

*) Denne Patient har efter senere Oplysning af *W. Boeck* tidligere brugt Mercur.

naet. (See Liste Nr. 3). Den ene (P.-Nr. 93) helbrededes fuldkommen for tuberculøse Syphilider og er fremdeles frisk, men da der samtidig blev brugt *Sol. iodeti kalici*, lader det sig ikke afgjøre, hvor megen Deel dette sidste Middel kan have havt i det heldige Resultat. Den anden (P.-Nr. 70) med *Exostosis tibiae*, sandsynligviis af hereditær Oprindelse, befriedes i Begyndelsen for Smerter og syntes ogsaa iøvrigt at bedres, men det varede kun kort, at der paafulgte nogen Virkning efter Inoculationen, og Patienten forlod i Bedring Hospitalet.

II.

56 Patienter (34 Fruentimmer og 22 Mænd), om hvilke det enten er oplyst, at de tidligere ere behandlede for Syphilis med Mercurialmidler, eller om hvilke det efter Omstændighederne er at antage, at saa har været Tilfældet, have været under Committeeens Observation, medens de for mere eller mindre udprægede syphilitiske Tilfælde underkastedes Syphilisation.

Om 49 kan det omtrent angives, hvor lang Tid der var forløben fra Sygdommens første Oprindelse, indtil Behandlingen paabegyndtes, nemlig

| | | | |
|------------|-------------|-----|----|
| | under 1 Aar | hos | 7 |
| mellem 1—2 | — | — | 4 |
| — 2—5 | — | — | 11 |
| — 5—10 | — | — | 15 |
| — 10—20 | — | — | 10 |
| over 20 | — | — | 1. |

Som heraf fremgaaer, var den største Deel invetererede syphilitiske Tilfælde.

De tilstedeværende Phænomener hørte kun hos 6 til de secundære; hos 41 manifesterede de sig som dybe

Ulcerationer og Beenaffectioner; 4 led af Paralysis, antagelig efter Syphilis og Mercur; hos 5 Fruentimmer var der intet syphilitisk Symptom at opdage; 4 af disse syphiliseredes, fordi de gjentagne Gange havde født syphilitiske Børn, den 5te for almindeligt Ildebefindende og vage Smerter, hvilke Tilfælde antoges at være af syphilitisk Oprindelse (*Hypochondria syphilitica*). De Fleste havde gennemgaaet mange og forskjellige Mercurialeure. I Gjennemsnit have disse Patienter — om 4 har Committeeen ikke noteret Tiden — ligget 151,6 Dage paa Hospitalet fra den Dag af, da Syphilisationen begyndte, indtil Udskrivningsdagen *).

Angaaende Resultatet af Behandlingen giver Liste Nr. 5 Oplysning for hver enkelt Patient. Hvor Udtrykket „helbredet“ er benyttet, betyder det, at Committeeen ved Udskrivningen har overbeviist sig om, at alle Tegn paa Sygdommen vare forsvundne; hvor derimod er tilføiet „udskreven helbredet,“ angiver dette at saaledes er anført i Hospitals-Protokollerne, uden at Committeeen selv har havt Anledning til paa Udskrivningsdagen at undersøge Tilstanden.

Som før antydet, anseer Prof. *W. Boeck* selv Virkningen af Syphilisationen i de her omhandlede Tilfælde for usikker. Han anvender derfor som oftest samtidig

*) Det vilde være urigtigt at lægge nogen Vægt paa denne gennemsnitlige Varighed af Curen, da denne ikke sjelden er bleven afbrudt paa Grund af andre tilstødende Sygdomstilfælde, og da den oftere sluttedes længe, forinden Patienten udskreves, dels fordi Inoculationerne bleve uden Virkning, dels fordi intet gunstigt Resultat opnaaedes. P.-Nr. 32 figurerer saaledes med 831 Dage, medens Patienten kun intercurrent syphiliseredes og aldeles ikke i det sidste halve Aar.

eller afvexlende med Syphilisationen Sol. iodeti kalici, hvilket Middel efter hans Formening understøtter Curen ikke alene ved dets antisypilitiske eller antimercurielle Virkning, men ogsaa derved, at Organismens Evne til at reagere mod den indpodede Gift forøges. Da saaledes i de allerfleste Tilfælde foruden Syphilisation tillige er benyttet et mod tertiær Syphilis særdeles virksomt Middel, er det vanskeligt, om ikke umuligt at dømme om, hvorvidt de opnaaede gunstige Resultater have været bevirkede af det ene eller det andet Middel, eller af begge tilsammen. Committeeen tør derfor ikke fordriste sig til at udtale nogen bestemt Formening om Syphilisation som Helbredelsesmiddel mod invetererede sypilitiske Tilfælde hos Personer, som tidligere ere behandlede med Mercur, saa meget mindre som ofte ikke uvæsentlige Forbedringer, især ved Saar paa Underextremiteterne, opnaaes alene ved et roligt Leie og en passende Diæt. Ihvorvel Antallet af de Personer, hvis Sygdom ikke var af gammel Oprindelse, og hos hvilke de tilstedeværende Symptomer manifesterede sig som secundære (Tubercula mucosa, Exanth. maculosum, papulosum), kun var ringe, nemlig 6, og ihvorvel af disse 2de fik Recidiv og 1 døde (et 12 Uger gammelt Barn med hereditær Syphilis og Hypertrophia lienis), forekom det dog Committeeen, som om i disse Tilfælde Curens Forløb og Resultat havde større Lighed med, hvad i saa Henseende observeredes hos de før ikke mercurialiserede Patienter med lignende Tilfælde, end hos de Patienter, som led af tertiære Tilfælde efter Brug af Mercur. Hos disse var Inoculationens Virkning ofte uregelmæssig; udviklede der sig Pustler, vare disse ikke sjelden smaae og efterfulgtes af Saar af ringe Omfang og Dybde, som snart tilhelede. Der hengik som oftest ikke lang Tid, forinden

den saakaldte Immunitet indtraadte, det vil sige, ingen synlig Virkning efter Inoculationerne gav sig tilkjende. I saa Fald brugtes i nogle Uger Sol. iodeti kalici, hvorefter da atter Inoculationerne foretoges med nogen, ihvørvelfølgelig ringe og kortvarig Virkning. Herved maa dog bemærkes, at de Patienter, hos hvilke Reactionen saaledes viste sig at være ringe, for den største Deel vare Personer, hvis Organisme ved langvarige Lidelser og mange forudgangne Cure var stærkt nedbrudt, og at, hvor dette ikke var Tilfældet, Inoculationssaarene havde et mere regelmæssigt Forløb.

Hvorvidt imidlertid den mindre constante og heldige Virkning af Syphilisationen hos den her omhandlede Classe af Patienter maa tilskrives den Omstændighed, at de tidligere ere behandlede med Mercur, eller meget mere Sygdommens invetererede Beskaffenhed, og den hermed i Forbindelse staaende, nys berørte cachectiske Tilstand, vover Committeeen ikke at afgjøre. De før omtalte Patienter med invetererede Tilfælde, hvilke tidligere ikke have været mercurialiserede, ere for faae til at en Sammenligning med dem i saa Henseende kan give nogen Oplysning. Ogsaa hos dem maatte Iodetum kalicum benyttes.

Hos de Patienter, som led af Paralysis, indtraadte ingen eller ringe Forbedring. Af de 4 Fruentimmer, som syphiliseredes i den Hensigt at gjøre dem skikkede til at føde friske Børn, har P.-Nr. 117 født et Barn, som led af Pemphigus og døde 3 Uger gammelt, og P.-Nr. 24, udskreven den 2^o 56, født et Barn den 21de Marts 1861, som ifølge Dr. Rønnes Beretning 11 Uger efter var friskt. Committeeen lægger ingen Vægt paa dette Tilfælde; thi selv om Barnet fremdeles skulde være frit for syphilitiske Tilfælde, hvorom man savner Underretning, vilde dog

dette ene Tilfælde ikke tale Syphilisationens Sag, da Erfaring lærer, at Mødre, som have født syphilitiske Børn, senere kunne føde friske Børn ogsaa uden at have undergaaet nogen Cur.

Sluttelig bemærkes, at Committeeen hos de her omhandlede Patienter heller ikke har observeret nogen skadelig Virkning af Syphilisationen.

Foruden de omhandlede Patienter har Committeeen ogsaa været Vidne til Curforsøg af Prof. *W. Boeck* med Syphilisation hos 10 Patienter, som led af forskjellige ikke syphilitiske Sygdomstilfælde, f. Ex. Cancer, Phthisis o. s. v. See schematisk Oversigt C. Committeeen vil med Hensyn til disse Patienter kun bemærke, at hos ingen af dem viste sig nogen syphilitisk Almeenaffectation, ihvorvel Syphilisationen i Almindelighed fortsattes med Virkning i længere Tid.

Brigadelæge *Hjort's* Curforsøg med Syphilisation.

Antallet af de Patienter, som af Brigadelæge *Hjort* ere blevne behandlede med Syphilisation, medens Committeeen anstillede sine Observationer, er for ringe til at der af disse Curforsøg kan vindes noget væsentligt Bidrag til Bedømmelsen af Syphilisationens Værd, saa meget mindre, som denne Curmethode i flere Tilfælde ikke udelukkende, det vil sige uden Anvendelse af andre Midler, har været benyttet. Af de 13 Patienter med constitutionel Syphilis, som ikke tidligere have undergaaet nogen Mercurialcur (see Liste Nr. 6), helbrededes alene ved Syphilisation 5 (i Gjennemsnit behandlede i 131 Dage), og ved Syphili-

sation og Sol. iodeti kalici 2, altsaa i Alt 7, om hvilke det ikke er bekjendt, at noget Recidiv er indtraadt. Hos 4 indfandt sig Recidiv, 1 udskreves efter eget Forlangende uhelbredet, og 1 — et 2 Maaneder gammelt Barn — underkastedes Mercurialbehandling, efterat det uden al Virkning var inoculeret nogen Tid. Hos den ene af de helbrede Patienter (P.-Nr. 95), antog Inoculationssaarene en phagedaenisk Charakter, og det i den Grad, at Livet i nogen Tid svævede i Fare. Saarene confluerede og bedækkede store Flader af Over- og Underextremiteterne. Det er det eneste Committeeen forekomne Tilfælde, i hvilket Phagedaenisme i Saarene har været af nogen særdeles Betydenhed. Ogsaa hos en anden Patient (P.-Nr. 114) viste enkelte Inoculationssaar sig phagedaeniske, dog kun en kort Tid, og uden at de naaede nogen videre Udbredning.

8 af Dr. *Hjorts* Patienter havde tidligere benyttet Mercurialmidler; Liste Nr. 7 viser Resultaterne. Hvad Committeeen har yttret om Prof. *W. Boecks* Patienter af lignende Categorie, gjælder ogsaa disse. Kun bemærkes, at blandt disse Patienter ogsaa findes 1 (P.-Nr. 92), hos hvem Inoculationssaarene en Tid viste sig phagedaeniske.

Derivation.

(Brigadelæge *Hjorts* Patienter.)

Committeeen har før antydnet den Tanke, som ledede Brigadelæge *Hjort* til at anstille en Deel Forsøg med den saakaldte Derivationscur. Angaaende den Maade, paa hvilken den er kommen til Anvendelse, tillader man sig at henvise til forhenværende Reservelæge *A. Holst's* Beretning i Norsk Magazin for Lægevidenskaben, XIII Bind, Side 779. Da Spørgsmaalet dreier sig om Ligheden eller

Forskjellen mellem Resultaterne af denne Methode og Syphilisationscuren, har Committeeen ogsaa her troet at burde iagttage en Sondring af Patienterne, eftersom de tidligere have været behandlede med Mercurialmidler eller ikke, og har man ogsaa forøvrigt classificeret dem paa samme Maade, som de med Syphilisation behandlede Patienter.

Af de 98 Patienter, som have været under Committeeens Observation, kunne 75 betegnes som ikke tidligere mercurialiserede.

A. Disse 75 Patienter (57 qvindelige og 18 mandlige) vare samtlige angrebne af de almindelige secundære syphilitiske Tilfælde.

Med Hensyn til Alderen har været:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| under $\frac{1}{2}$ Aar | 1 |
| mellem 1— 2 Aar | 1 |
| — 2— 5 — | 1 |
| — 5—10 — | 4 |
| — 10—20 — | 16 |
| — 20—30 — | 35 |
| — 30—40 — | 10 |
| — 40—50 — | 3 |
| — 50—60 — | 2 |
| — 60—70 — | 1 |
| — 70—80 — | 1 |
| | <hr/> 75. |

Det sees heraf at kun meget faae Børn have været underkastede denne Curmethode.

Behandlingens Resultat har været:

1. Helbredede uden Recidiv 43. (31 Fruentimmer, 12 Mænd). (Liste A.) Behandlingens Varighed for samtlige disse Patienter har været 6520 Dage, altsaa i Gjen-

nemsnit for hver enkelt Patient 151,6 Dage. Den korteste Tid har været 118 Dage (P.-Nr. 29), den længste 290 Dage (P.-Nr. 64). Hvad der er anført om de lignende Data ved den tilsvarende Classe af de med Syphilisation behandlede Patienter, gjælder ogsaa her. Dog maa bemærkes, at naar Curen ikke syntes at vise den forønskede Virkning, hyppigere tyedes til andre Midler, hvorved ogsaa en i Forhold større Deel af Dr. *Hjort's* ikke mercurialiserede Patienter maa henføres til Classen af de Intet re- leverende.

Siden Helbredelsen er indtil Juli 1862 forløben

| | | | |
|-------|------------|---------|----|
| fra 5 | Aar til 5½ | Aar hos | 1 |
| — 4½ | — - 5 | — — | 6 |
| — 4 | — - 4½ | — — | 11 |
| — 3½ | — - 4 | — — | 6 |
| — 3 | — - 3½ | — — | 16 |
| — 2½ | — - 3 | — — | 3 |
| <hr/> | | | |
| 43. | | | |

Om 4 af disse Patienter har Committee senere havt paalidelig Efterretning.

Nogen skadelig Virkning paa Patientens Helbred har Committee heller ikke ved denne Curmethode bemærket, og de Helbredede vare ved Udskrivningen i Almindelighed ved godt Huld. Dog syntes Curen at være forbunden med større Ubehageligheder for Patienterne, forsaavidt de ved Stibiatplastrene bevirkede Saar i enkelte Tilfælde foranledigede ikke ubetydelige Smerter. Phagedænisme observeredes ikke.

2. Recidiver observeredes hos 14 Patienter (Liste B.), altsaa hos 1 af 5,4. Af disse 14 have 2 havt tvende Recidiver og 1 tre Recidiver. 10 første Recidiver ere behandlede paa Hospitalet; kun hos en Patient (P.-Nr. 98)

anvendtes en indifferent Behandling, hos 6 Derivation
deels alene, deels med andre Midler, og hos de øvrige
forskjellige Cure. Den korteste Tid, inden hvilken det
første Recidiv viste sig, var 1 Maaned, den længste 1 Aar
og 8½ Maaneder. I begge Tilfælde af anden Gangs Recidiv
anvendtes kun indifferent Behandling, hos den ene Patient
(P.-Nr. 13) i 17 Dage, hos den anden (P.-Nr. 80) i 65
Dage. Den første af disse 2 Patienter fik efter 1 Aar
og ½ Maaned et tredje Recidiv, som behandledes med
Diæta parca.

Committeen har ikke erfaret, at Sygdommen frem-
deles vedvarer hos nogen af de her omhandlede Patienter.
En (P.-Nr. 28) er død af en Ovarialsvulst paa Rigshospi-
talet.

3. Til Classen af de med Hensyn til Curesultaterne
intet releverende Patienter har Committeeen troet at maatte
henføre 18 (Liste C.), hvilket Antal, som anført, forholds-
viis er meget større end Antallet af de Patienter, som ere
henførte til den tilsvarende Classe af de ved Prof. W. Boeck
med Syphilisation behandlede, ikke mercurialiserede, Syge.
For de Deriveredes Vedkommende bliver Forholdet 1 af
4,1, for de Syphiliseredes 1 af 11,5.

Hos 8 af disse Patienter anvendtes foruden Deriva-
tion andre Midler, saasom *Sol. iodeti kalici*, *Decoctum*
sarsaparillae, *Pulvis alterans*. Hos 1 af disse (P.-Nr. 61)
indtraf to Recidiver; om de Øvriges senere Befindende
har Committeeen ingen Oplysning.

Et 2 Maaneder gammelt Barn udgik af Committeeens
Observation, da Derivation seponeredes og Sublimatbade
anvendtes.

En Patient (P.-Nr. 38) er henført til denne Classe,
fordi man ansaae det for tvivlsomt, om ikke tidligere Mer-

curialmidler vare komne til Anvendelse; der bemærkedes nemlig Mercuriallugt ved Indlæggelsen. Af samme Grund har man ogsaa troet at maatte regne P.-Nr. 88 herhen, da det var tvivlsomt, om ikke de primære Saar udenfor Hospitalet vare behandlede med Mercurialmidler. Begge disse Patienter forlode imidlertid helbredede Hospitalet, hvor kun Derivation anvendtes, den første efter 75 Dages, den anden efter 122 Dages Behandling.

6 Patienter udskreves i Bedring eller ansaaes af Com-
mitteen ikke for helbredede ved Udskrivningen. Af disse
indkom Nr. 15 senere paa Hospitalet 2 Gange og be-
handles med Derivation, Sol. iodeti kalici og Diæta
stricta; Nr. 60 1 Gang og behandles med Sol. iodeti
kalici; Nr. 92 ligeledes 1 Gang. Denne Patient var under
det første Ophold paa Hospitalet behandlet med Deriva-
tion og Iodetum kalicum, og benyttede under det andet
de samme Midler.

P.-Nr. 85 blev under Curen angreben af Lungebe-
tændelse og indlagt paa Hospitalets medicinske Afdeling.
Tvende Recidiver bleve behandlede med andre Midler.

B. Hos 23 Patienter, som tidligere ere behandlede
med Mercurialmidler, er Derivationscuren kommen til
Anvendelse. Den omtrentlige Tid, som var forløben fra
Sygdommens første Oprindelse til Behandlingens Begyn-
delse, kan opgives for 21. Den var

| | |
|-------------------|-----|
| under 1 Aar hos 5 | |
| fra 1 — 2 — — 8 | |
| — 2 — 5 — — 7 | |
| — 5 — 10 — — 1 | |
| | 21. |

Det overveiende Antal af disse Patienter, omtrent to
Trediedele, have lidt af syphilitiske Tilfælde, som maae

henføres til den secundære Række. Hos Resten har Sygdommen rigtignok været invetereret, og Phænomenerne have hørt til den tredie Række; men ingen Beenaffectioner og Paralyser ere forekomne, og forholdsviis færre gamle og slemme Tilfælde end i den tilsvarende Classe af de ved Prof. W. Boeck Syphiliserede. Den medfølgende schematiske Liste D. angiver Resultatet for hver enkelt Patient. 16 bleve udelukkende behandlede med Derivation, indtil de som helbredede udskreves af Hospitalet. Gjennemsnitstiden for deres Ophold sammesteds var 111,3 Dage. Af disse 16 indkom senere 4 med Recidiver, ingen med mindre end tvende. Ved Recidiverne kom andre Midler til Anvendelse deels med, deels uden Derivation; kun hos een Patient, P.-Nr. 11, anvendtes ved første Recidiv udelukkende Derivation og ved andet Recidiv local Behandling.

Af de øvrige 7 Patienter døde 1, et 1½ Aar gammelt Barn, af Angina membranacea; 2 udskreves i Bedring, 3 ophørte med Derivationscuren og underkastedes anden Behandling, og 1 brugte samtidig med Derivation andre Midler. Tilsyneladende har Resultatet været bedre end hos de før mercurialiserede, med Syphilisation behandlede, Patienter, forsaavidt at af 23 de 12 ere udskrevne helbredede, uden at have benyttet andre Midler end Derivation, og uden at de, saavidt vides, have faaet Tilbagefald; dog derfor vover Committeeen ingeniunde at tilkjende den omhandlede Methode Prisen i Sammenligning med Syphilisationen; da de behandlede Tilfælde, som anført, ikke i Almindelighed have været af en saa slem og invetereret Beskaffenhed som hos de Syphiliserede.

Committeen har i det Foregaaende ved at meddele Resultaterne af de observerede Curforsøg kun leilighedsviis fremsat nogle forklarende Bemærkninger; den skal nu ved at sammenstille disse Resultater mere summarisk tillige korteligen berøre de Momenter, hvilke formeentlig komme i Betragtning ved Bedømmelsen af de omhandlede Methoders praktiske Værd.

Syphilisation.

Spørgsmaalet om den ved Syphilisation erhvervede Immunitet har været sat i nøie Forbindelse med Spørgsmaalet om Methodens Værd i curativ Henseende. Man har nemlig antaget, at saafremt det virkelig lykkedes ved fortsatte Inoculationer af det syphilitiske Gift ikke alene at bringe de tilstedeværende syphilitiske Tilfælde til at forsvinde, men ogsaa, uden forøvrigt at tilføie Organismen nogen Skade, at fremkalde fuldkommen Uimodtagelighed for ny Infection, derved en Analogie var godtgjort mellem dette Gift og Koppe-, Mesling- og Skarlagensfeber-Giftet, hvorved der ydedes den største Garantie for, at de ved Syphilisationen opnaaede Helbredelser virkelig vare radicale.

Ihvorvel Committeen vistnok ikke specielt har havt sin Opmærksomhed henvendt paa Immunitetsspørgsmaalet, vil den dog ikke tilbageholde den Anskuelse, hvortil den ved sine Iagttagelser i nysberørte Henseende er kommen. Committeen har havt tilstrækkelig Leilighed til at overbevise sig om, at Inoculationerne, i længere Tid fortsatte, i Regelen have en aftagende og endelig en forsvindende eller umærkelig Virkning. Ikke desto mindre tvivler man ikke om, at dette Phænomen, saa interessant det iøvrigt maa erkjendes at være i physiologisk Henseende, dog

ikke er analogt med den Immunitet, som bevirkes ved de nysnævnte acute Exanthemer, og saaledes neppe har den praktiske Betydning, som man kunde være tilbøielig at tillægge det. I saa Henseende bemærkes:

1. Naar fortsatte Inoculationer have frembragt Immunitet paa eet Sted af Legemet, f. Ex. Brystet, kan positivt Resultat som oftest erholdes paa andre Steder, f. Ex. Laarene. Da det er ugjærligt at prøve hele Legemets Overflade, er det saa godt som umuligt at tilvejebringe Beviis paa fuldkommen Immunitet.

2. Der kan opstaae Immunitet for syphilitisk Materie fra eet Individ, medens normal Reaction kan paafølge efter Inoculation med Materie fra et andet Individ. Saaledes kan Materie fra et Inoculationssaar, som paa den Inoculerede selv ikke længere viser sig virksom, hos et andet Individ fremkalde normale Pustler, medens paa den Første atter kan fremkaldes Chankre med Materie fra en tredie Person.

3. Immuniteten synes kun at være temporær. Det forekommer nemlig, at Personer, som en Tid have været inoculerede uden al Virkning, senere vise Modtagelighed for Smittestoffet; heller ikke ere de Tilfælde sjældne, hvor, efter opnaaet Immunitet og Helbredelse, Recidiver indtræffe, som atter kunne behandles med Syphilisation.

4. Immunitet kan være tilstede, omendskjønt syphilitiske Tilfælde fremdeles ere synlige, hvoraf formeentlig fremgaaer, at den ingenlunde er et Tegn paa, at den syphilitiske Dyskrasie er tilintetgjort.

Ligesaa lidt som det her Anførte taler til Fordeel for Syphilisationen som Curmethode, ligesaa lidt troer Committeeen, at deraf kan udtrages Noget, som svækker Methodens Værd. Sættes altsaa Immunitetsspørgsmaalet aldeles ud af Betragtning, saaledes som det formeentlig bør

være Tilfældet ved Bedømmelsen af Syphilisationen som et Middel til at helbrede Syphilis, bliver i saa Henseende som de vigtigste Spørgsmaal at besvare:

A. Helbredes Syphilis ved Syphilisation?

B. Hvilken Indflydelse yttre Syphilisationen paa de Personers Almeenbefindende, som underkaste sig den?

ad A. Committeeen indseer tilfulde, hvor vanskeligt dette Spørgsmaal er at besvare, og at de fremlagte Data ingenlunde ere tilstrækkelige til at støtte et fyldestgørende Svar. Den Tid, hvori Syphilisationen har været anvendt som Curmethode, er endnu for kort til at give sikker Garantie for, at de bevirkede Helbredelser ville være af Varighed, og man kan saaledes ikke benegte Muligheden af, at der med Tiden hos de Helbredede kan vise sig tertiære Phænomena. I saa Henseende kan Syphilisationen i det Mindste endnu ikke ansees for at have staaet sin Prøve. Dens Værd bør følgelig bedømmes i Sammenligning med, hvad der ved andre Midler kan udrettes mod den syphilitiske Dyskrasie. Men en saadan Bedømmelse vilde føre Committeeen for vidt og overskride dens Kræfter. Dens Maal har været, at lade de observerede Facta tale, og den maa saaledes indskrænke sig til at gøre Rede for, hvad der til det heromhandlede Spørgsmaals Besvarelse kan uddrages af de gjorte Iagttagelser.

Sammenfattes altsaa i Korthed Resultaterne af de observerede Curforsøg med Syphilisation, stille de sig som følger:

1. 92 Patienter i alle Aldre med secundære syphilitiske Tilfælde af *acquisit* Natur, hvilke Personer ikke tidligere have været underkastede nogen Mercurialbehandling for Syphilis, ere behandlede af Prof. *W. Boeck* med saadant Udfald:

a) Helbredede med en Gjennemsnitsvarighed af Behandlingen 150 Dage, uden at hidtil noget Recidiv er observeret, ere 69, altsaa 75 pCt.

b) Recidiver hos 14 Patienter, altsaa 15,2 pCt. (2 Recidiver hos 4, 3 hos 1 Patient).

c) Intet bestemt Resultat hos 9, altsaa 9,8 pCt.

Sættes disse 9 Patienter, af hvilke forøvrigt 5 antagelig alene ved Syphilisation ere helbredede, ud af Betragtning, bliver Forholdet af de Helbredede 83,1 pCt. og af Patienter med Recidiver 16,9 pCt.

2. Kun hos 1 Patient (P.-Nr. 23), som for secundære syphilitiske Tilfælde behandlede med Syphilisation, er der senere observeret tertiære Tilfælde. Vedkommende denne Patient kan det imidlertid ikke afgjøres, om Mercurialmidler have været benyttede udenfor Hospitalet.

3. Om 6 Fruentimmere med secundære syphilitiske Tilfælde, som uden tidligere at have været underkastede Mercurialbehandling, ere behandlede ved Prof. *W. Boeck*, vides, at de efter Helbredelsen have født Børn (8), af hvilke 6 angrebes af hereditær Syphilis.

1) P.-Nr. 12 (udskreven § 56) fødte den 1^o 57 et syphilitisk Barn, som har smittet flere Personer; og den 1^o 58 et Barn, som skal være friskt.

2) P.-Nr. 91 (udskreven § 57) fødte den 2^o 58 et Pigebarn, som døde af Atrophie 2 Maaneder gammelt.

3) P.-Nr. 158 har efter Prof. *W. Boecks* Opgivende født et Barn, som døde syphilitisk, og senere et Barn, som paa Grund af begyndende Syphilis blev syphiliseret og helbredet.

4) P.-Nr. 145 (udskreven § 57) fødte den 3^o 58 et fuldbaaret Barn, som blev syphilitisk og døde i Januar 1859.

5) P.-Nr. 147 (udskreven § 58) indkom paa Hospitalet 1^o 59 med et 3 Maaneder gammelt syphilitisk Barn.

6) P.-Nr. 189 (sidste Gang udskreven $\frac{7}{5}$ 59) fødte i December 1860 et Barn, som blev syphilitisk og døde 6 Uger gammelt.

Af de ved Brigadelæge *Hjort* Syphiliserede fødte P.-Nr. 56 (udskreven $\frac{20}{9}$ 56) den $\frac{7}{9}$ 59 et Barn, som blev syphilitisk, og P.-Nr. 58 (udskreven $\frac{20}{12}$ 56) den $\frac{13}{3}$ 58 et Barn, som døde næste Dag.

4. Om Virkningen af Syphilisation i tertiær Syphilis hos Personer, som ikke tidligere have været underkastede Mercurialbehandling, kan af de 3 observerede Tilfælde ikke uddrages noget Resultat.

5. Af 12 Børn med hereditær Syphilis ere 5 helbredede, 1 har faaet Recidiv og 6 ere døde.

6. Hos Personer med secundære eller tertiære Tilfælde, som tidligere have været underkastede Mercurialbehandling, har Syphilisation som oftest ikke været tilstrækkelig til at bevirke Helbredelse. Er denne opnaaet ved samtidig eller intercurrent Benyttelse af Iodetum kalium, har det været umuligt at afgjøre, om og hvormeget Syphilisationen har bidraget dertil. De Syge, hos hvilke Tilfældene vare af forholdsviis ny Oprindelse, helbrededes almindeligviis alene ved Syphilisation.

7. Mod Lidelser af Nervesystemet og dets Centralorganer efter Syphilis og Mercurialbehandling (4 Tilfælde) har Syphilisationen viist saa godt som ingen Virkning.

ad B. 1. Der forvoldes Patienterne ingen synderlig Smerte eller Uleilighed ved Inoculationerne. De behøvede ikke at holde Sengen og deres Kost var rigelig og nærende.

2. Kun i de sjeldne Tilfælde, hvor Inoculationssaa-rene udvidede sig betydelig, confluerede eller antog en phagedænik Charakteer, var Curen ikke uden Smerte og

yttrede temporært en skadelig Indflydelse paa Patienternes Almeenbefindende.

3. Efter endt Cur frembøde Patienterne næsten uden Undtagelse et sundt Udseende og følte sig friske og stærke.

4. Der paalagdes dem ikke at iagttage nogen særegen Forsigtighed efter Udskrivningen fra Hospitalet, og det vides ikke, at de senere have været mere udsatte for at angribes af andre Sygdomme end friske Personer i Almindelighed.

Derivation.

Da de af Brigadelæge *Hjort* anstillede Curforsøg med denne Methode væsentligt skulde bidrage til at klare det Spørgsmaal, om de ved Syphilisation bevirkede heldige Resultater skyldes Inoculationssaarenes specifikke Egenskab eller alene den ved Ulcerationsprocessen bevirkede Depuration, bliver ved Betragtning af de ved denne Behandlingsmaade vundne Resultater Hensyn at tage til det Særegne saavel ved Inoculationssaarene som ved de af Stibiatplastre bevirkede Hudaffectioner. I saa Henseende bemærkes:

Ved Anvendelsen af Stibiatplastre iagttoges ikke nogen Tilstand analog med den saakaldte Immunitet ved Syphilisationen. Methoden kan ikke godt benyttes hos mindre Børn paa Grund af den betydelige Reaction, som ofte paafølger hos disse efter den ydre Anvendelse af Tart. stibiatus, medens mærkeligt nok Inoculationssaarene næsten aldrig udbrede sig hos smaae Børn. Den foraarsager i Almindelighed mere Smerte og større Ulemper end Syphilisationen; i det Mindste hørtes oftere Klager og mærkedes Utilfredshed med Curen. Ved Saarene efter Stibiatplastre bevirkes en mindre rigelig

Secretion, idet de fleste Pustler, hvis Antal varierer meget betydelig, tørke bort, efterat have dannet Skorper. Kun enkelte Pustler forvandle sig til større smertelige, men i Forhold mindre afsondrende Saar. Ofte viser der sig paa Legemet udenfor de Steder, hvor Plastrene have ligget, et vesiculøst papuløst Exanthem, hvorved for en Tid lægges Hindring iveien for nye Plastres Anvendelse og hvorved det saaledes bliver vanskeligt at følge nogen Regel med Hensyn til Tid og Sted for Plastrenes Benyttelse.

I det Hele taget er det forekommet Committeeen, som om den her omhandlede Cur, naar alene Hensyn tages til begge Methoders deriverende eller depurerende Virkning, staaer tilbage for Syphilisationen, og at man ved fortsatte Forsøg i samme Retning burde være betænkt paa om muligt at udfinde andre og bedre Maader, paa hvilke Derivationen kunde iværksættes. En Række af Forsøg med ingen eller en aldeles indifferent Behandling af ikke tidligere mercurialiserede Patienter med secundær-syphilitiske Tilfælde af acquisit Natur vilde uden Tvivl ogsaa til Sammenligning være meget oplysende.

Phagedænisme har ikke været bemærket i Saarene. Forresten har denne Methode vistnok den Fordeel, at det benyttede Middel overalt staaer til Raadighed, medens inoculabel syphilitisk Materie paa mange Steder vil være vanskelig at erholde.

ad A. Resultaterne af de observerede Curforsøg have været:

1. 75 Patienter, af hvilke kun 3 under 5 Aar, med secundær-syphilitiske Tilfælde af acquisit Natur, hvilke Personer ikke tidligere have været underkastede nogen Mercurialeur for Syphilis, ere behandlede af Brigadelæge *Hjort* med saadant Udfald:

a) Helbredede med en Gjennemsnitsvarighed af Behandlingen 151 Dage, uden at hidtil noget Recidiv er bemærket 43, altsaa 57,3 pCt.

b) Recidiver hos 14, — 18,7 —
(to Recidiver hos 2 og tre hos 1 Patient).

c) Intet bestemt Resultat hos . 18, — 24,0 —

Sættes disse 18 Personer ud af Betragtning, bliver Forholdet af de Helbredede 75,4 —

2. Hos ingen af de for secundær-syphilitiske Tilfælde Behandlede (ikke mercurialiserede) er hidtil observeret tertiære Tilfælde.

3. Om 4 Fruentimmer med secundær-syphilitiske Tilfælde, hvilke, uden tidligere at have været underkastede Mercurialbehandling, ere behandlede med Derivation, vides, at de efter Helbredelsen have født Børn (4). 2 af disse kom for tidlig og vare dødfødte; et døde syphilitisk 6 Maaneder gammelt, og et skal have været fuldkommen friskt 1½ Aar gammelt og ikke have viist Tegn til Syphilis.

P.-Nr. 9 (udskreven 2^o 57) fødte 2^o 58 et 7 Maaneder gammelt forraadnet Foster.

P.-Nr. 36 (udskreven 2den Gang 1^o 58) fødte 2^o 59 paa Fødselsstiftelsen en Dreng, som veiede 8 P 16 Lod og som 1½ Aar gammel var frisk (*Keyser*).

P.-Nr. 86 (udskreven 2^o 59) fødte 4^o 59 6 Uger for tidlig et dødt Dregebarn.

P.-Nr. 100 (udskreven 4^o 59) fødte i 1861 et Barn, som 6 Maaneder gammelt viste syphilitiske Symptomer og døde af Kramper.

4. Om Virkningen af Derivationscuren i secundære og tertiære Tilfælde hos Patienter, som tidligere have været underkastede Mercurialbehandling, gjælder omtrent det Samme, som er anført om Syphilisationen under A. Nr. 6.

ad B. Patienterne have oftere klaget over, at Plastrene forvoldte dem Smerte og Uleilighed; forøvrigt gjælder ogsaa her omtrent det Samme, som er sagt om Syphilisationen under B. Nr. 1, 3 og 4.

Efter alt Anførte anseer Committeeen Syphilisationen for en bedre Curmethode end Derivationen, og omendskjønt den ikke kan erklære, at ved hiin Methode Syphilis altid og fuldstændig helbreedes, ere dens Medlemmer dog enige deri, at de ikke kjende nogen anden Behandlingsmaade, som udretter mere eller saa meget, som Syphilisationen udretter mod secundær-syphilitiske Tilfælde hos Personer, der ikke tidligere have været underkastede Mercurialbehandling.

Efterat Committeeen havde ophørt med sine Hospitalsbesøg, er der af Prof. *W. Boeck* gjort Forsøg med Inoculation af Materie fra indurerede Chankre, hvorved der forsaavidt skal være opnaaet bedre Resultater, som Behandlingstiden er afkortet og Phagedænisme i Saarene undgaaet. Da Committeeen imidlertid ikke har været Vidne til disse Forsøg, er den ikke istand til at fremkomme med speciellere Meddelelser i saa Henseende.

Idet Committeeen slutter dette Arbeide, kan den ikke undlade at yde Professor *W. Boeck* den fuldeste Anerkjendelse for den Dygtighed og Ihærdighed, han har lagt for Dagen i Granskningen af den gaadefulde syphilitiske Sygdoms Væsen og Behandling.

Vedlagt følger:

Liste Nr. 1. Syphilisation. Patienter, lidende af constitutionel Syphilis, som ikke tidligere have brugt Mercur, og som ere behandlede af Prof. *W. Boeck* med Sy-

philisation, uden at indtil 1ste Juli 1862 er observeret noget Recidiv.

Liste Nr. 2. Syphilisation (Prof. *W. Boeck*). Recidiver hos Personer, som ikke tidligere have brugt Mercur.

Liste Nr. 3. Syphilisation. Personer lidende af constitutionel Syphilis, som ikke vides tidligere at have brugt Mercur, og som ere syphiliserede af Prof. *W. Boeck*, uden at noget bestemt Resultat er observeret af Committeeen eller har kunnet observeres.

Liste Nr. 4. Syphilisation (Prof. *W. Boeck*). Personer, døde under Curen, som ikke tidligere have brugt Mercur.

Liste Nr. 5. Syphilisation (Prof. *W. Boeck*). Personer, lidende af constitutionel Syphilis, som tidligere ere behandlede med Mercur.

Liste Nr. 6. Syphilisation (Brigadelæge *Hjort*). Personer, lidende af constitutionel Syphilis, som ikke tidligere have været behandlede med Mercur.

Liste Nr. 7. Syphilisation (Brigadelæge *Hjort*). Personer, lidende af constitutionel Syphilis, som tidligere have været behandlede med Mercur.

Liste A. Derivation. Personer, lidende af constitutionel Syphilis, som ikke tidligere have brugt Mercur, og som ere behandlede af Brigadelæge *Hjort*, uden at indtil 1ste Juli 1862 noget Recidiv er observeret.

Liste B. Derivation (Brigadelæge *Hjort*). Recidiver hos Personer, som ikke tidligere have brugt Mercur.

Liste C. Derivation. Personer, lidende af constitutionel Syphilis, som ikke vides tidligere at have brugt Mercur, og som ere behandlede af Brigadelæge *Hjort* med Derivation, uden at noget bestemt Resultat af Committeeen er observeret eller har kunnet observeres.

Liste D. Derivation (Brigadelæge *Hjort*). Personer, lidende af constitutionel Syphilis, som tidligere ere behandlede med Mercur.

Schematiske Oversigter:

Syphilisation:

- a) Ikke tidligere behandlede med Mercur.
- b) Tidligere behandlede med Mercur.
- c) Personer, som aldrig have lidt af Syphilis eller hvis Sygdom antagelig ikke har sin Oprindelse fra Syphilis.

Derivation:

- d) Ikke tidligere behandlede med Mercur.
- e) Tidligere behandlede med Mercur.

Committeens Protokoller (3), indeholdende samtlige observerede Patienters Sygehistorier og Committeeens Iagttagelser.

Nr. 1.

Syphilisation.

Patienter, lidende af constitutionel Syphilis, som ikke tidligere have brugt Mercur, og som ere behandlede af Prof. W. Boeck med Syphilisation, uden at indtil 1ste Juli 1862 er observeret noget Recidiv.

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder. | Behandlings Varighed i Dage. | Den siden Helbredelsen forløbne Tid. | | | Naar udskreven af Hospitalet. | Anmærkninger. |
|----------|--------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | Aar. | Maa-neder. | Dage. | | |
| 1 | 1 | 20 A. | 113 | 6 | 2 | 20 | 1/2 56 | Frisk April 1863. |
| 2 | 4 | 16 M. | 146 | 6 | 2 | 16 | 1/2 56 | J. Vogt. |
| 3 | 7 | 25 A. | 160 | 6 | 2 | " | 1/2 56 | Frisk 1862. W. |
| 4 | 8 | 22 A. | 105 | 6 | " | " | 1/2 56 | Boeck. |
| 5 | 9 | 29 A. | 109 | 6 | " | " | 1/2 56 | |
| 6 | 12 | 24 A. | 129 | 6 | 2 | 16 | 1/2 56 | |
| 7 | 14 | 7 Ug. | 121 | 6 | " | 1 | 1/2 56 | |
| 8 | 21 | 56 A. | 113 | 5 | 11 | 28 | 1/2 56 | |
| 9 | 26 | 25 A. | 115 | 6 | 3 | 21 | 1/2 56 | |
| 10 | 29 | 23 A. | 122 | 5 | 10 | 14 | 1/2 56 | |
| 11 | 30 | 15 U. | 113 | 5 | 10 | 14 | 1/2 56 | |
| 12 | 33 | 35 A. | 213 | 5 | 10 | 9 | 1/2 56 | |
| 13 | 35 | 28 A. | 179 | 5 | 6 | 17 | 1/2 56 | |
| 14 | 42 | 24 A. | 197 | 5 | 5 | 26 | 1/2 56 | |
| 15 | 43 | 8 Ug. | 88 | 5 | 9 | 1 | 1/2 56 | |
| 16 | 46 | 27 A. | 105 | 5 | 7 | 20 | 1/2 56 | |
| 17 | 47 | 24 A. | 133 | 5 | 7 | 11 | 1/2 56 | |
| 18 | 49 | 24 A. | 153 | 5 | 6 | 7 | 1/2 56 | |
| 19 | 54 | 24 A. | 100 | 5 | 7 | 4 | 1/2 56 | Frisk April 1863. |
| 20 | 62 | 23 A. | 149 | 5 | 6 | 5 | 1/2 56 | J. Vogt. |
| 21 | 65 | 31 A. | 124 | 5 | 6 | 15 | 1/2 56 | |
| 22 | 67 | 36 A. | 157 | 5 | 4 | 15 | 1/2 57 | |
| 23 | 69 | 21 A. | 371 | 4 | 8 | 29 | 1/2 57 | |
| 24 | 81 | 18 A. | 125 | 5 | 4 | 14 | 1/2 57 | Frisk 1863. A. |
| 25 | 82 | 22 A. | 125 | 5 | 4 | 14 | 1/2 57 | Holst. |
| 26 | 84 | 46 A. | 151 | 5 | 3 | 14 | 1/2 57 | |
| 27 | 87 | 21 A. | 125 | 5 | 4 | 15 | 1/2 57 | |
| 28 | 89 | 2 A. | 139 | 5 | 3 | 16 | 1/2 57 | |
| 29 | 90 | 28 A. | 132 | 5 | 3 | 16 | 1/2 57 | |
| 30 | 91 | 19 A. | 190 | 5 | 1 | 24 | 1/2 57 | |
| 31 | 96 | | 135 | 5 | 2 | 21 | 1/2 57 | |
| 32 | 106 | 34 A. | 190 | 5 | " | 4 | 1/2 57 | |
| 33 | 107 | 11 A. | 190 | 5 | " | 4 | 1/2 57 | |
| 34 | 111 | 31 M. | 135 | 5 | 1 | " | 1/2 57 | |
| 35 | 116 | 22 A. | 145 | 5 | " | 4 | 1/2 57 | |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder. | Behandlings- Varighed i Dage. | Den siden Helbredel- sen forløbne Tid. | | | Naar udskre- ven af Hospi- talet. | Anmærkninger. |
|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------|-------|---|--|
| | | | | Aar. | Maa- neder. | Dage. | | |
| 36 | 123 | 23 A. | 239 | 4 | 7 | 19 | $\frac{1}{2}$ 57 | Frisk April 1863. <i>J. Vogt.</i> |
| 37 | 124 | 19 A. | 162 | 4 | 10 | 6 | $\frac{2}{3}$ 57 | |
| 38 | 125 | 23 A. | 139 | 4 | 10 | 16 | $\frac{1}{2}$ 57 | |
| 39 | 130 | 26 A. | 229 | 4 | 7 | 6 | $\frac{2}{3}$ 57 | Frisk $\frac{1}{10}$ 60. <i>Voss</i> |
| 40 | 133 | 20 A. | 92 | 4 | 11 | 5 | $\frac{2}{3}$ 57 | |
| 41 | 138 | 29 A. | 200 | 4 | 7 | 29 | $\frac{1}{2}$ 57 | |
| 42 | 139 | 1 $\frac{1}{2}$ A. | 200 | 4 | 7 | 29 | $\frac{1}{2}$ 57 | Frisk 1862. <i>W. Boeck.</i> |
| 43 | 140 | 28 A. | 255 | 4 | 4 | 25 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 44 | 142 | 33 A. | 194 | 4 | 6 | 13 | $\frac{1}{2}$ 57 | |
| 45 | 143 | 58 A. | 232 | 4 | 5 | 2 | $\frac{1}{2}$ 57 | Frisk 1862. <i>Steffens.</i> |
| 46 | 146 | 20 A. | 141 | 4 | 7 | 5 | $\frac{1}{2}$ 57 | |
| 47 | 147 | 22 A. | 188 | 4 | 4 | 25 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 48 | 148 | 11 M. | 182 | 4 | 4 | 25 | $\frac{1}{2}$ 58 | Frisk $\frac{1}{2}$ 62. Dr. <i>Frisak.</i> |
| 49 | 152 | 25 A. | 246 | 4 | 1 | 24 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 50 | 153 | 35 A. | 123 | 4 | 6 | 4 | $\frac{1}{2}$ 57 | |
| 51 | 154 | 3 A. | 123 | 4 | 6 | 4 | $\frac{1}{2}$ 57 | Frisk $\frac{1}{2}$ 62. Dr. <i>Frisak.</i> |
| 52 | 155 | 25 A. | 205 | 4 | 2 | " | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 53 | 156 | 18 A. | 140 | 4 | 3 | 22 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 54 | 158 | 37 A. | 139 | 4 | 3 | 4 | $\frac{1}{2}$ 58 | Frisk December 1860. <i>Homann.</i> |
| 55 | 159 | 29 A. | 98 | 4 | 4 | 2 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 56 | 161 | 25 A. | 129 | 4 | 2 | 1 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 57 | 165 | 23 A. | 120 | 4 | 1 | 3 | $\frac{1}{2}$ 58 | Frisk 1861. <i>A. Holst.</i> Senere reist til Ame- rika. |
| 58 | 166 | 24 A. | 125 | 4 | " | 7 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 59 | 167 | 19 A. | 155 | 3 | 10 | 25 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 60 | 168 | 18 A. | 177 | 3 | 11 | 9 | $\frac{1}{2}$ 58 | Frisk i Februar 1860. <i>Voss.</i> |
| 61 | 171 | 25 A. | 157 | 3 | 10 | 10 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 62 | 173 | 1 $\frac{1}{2}$ A. | 283 | 3 | 5 | 16 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 63 | 174 | 22 A. | 157 | 3 | 9 | 25 | $\frac{1}{2}$ 58 | Frisk 1861. <i>A. Holst.</i> Senere reist til Ame- rika. |
| 64 | 175 | 2 M. | 113 | 3 | 10 | 26 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 65 | 181 | 23 A. | 143 | 3 | 8 | 19 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 66 | 182 | 22 A. | 87 | 3 | 10 | 16 | $\frac{1}{2}$ 58 | Frisk 1861. <i>A. Holst.</i> Senere reist til Ame- rika. |
| 67 | 185 | 23 A. | 121 | 3 | 7 | 20 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 68 | 187 | 28 A. | 112 | 3 | 7 | 22 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 69 | 191 | 1 $\frac{1}{2}$ A. | 125 | 3 | 6 | 5 | $\frac{1}{2}$ 58 | Frisk i Februar 1860. <i>Voss.</i> |
| 70 | 192 | 21 A. | 100 | 3 | 6 | 21 | $\frac{1}{2}$ 58 | |
| 71 | 195 | 21 A. | 95 | 3 | 4 | 24 | $\frac{1}{2}$ 59 | |
| 72 | 196 | 2 M. | 92 | 3 | 5 | " | $\frac{1}{2}$ 58 | Frisk i Februar 1860. <i>Voss.</i> |
| 73 | 198 | 21 A. | 91 | 3 | 4 | 17 | $\frac{1}{2}$ 59 | |
| 74 | 200 | 21 A. | 129 | 3 | 3 | 7 | $\frac{1}{2}$ 59 | |

Liste Nr. 2.

Syphilisation.

Recidiver hos Personer, som ikke tidligere have brugt Mercur. (Professor W. Boecks Afdeling).

| Løbe-Nr. | Proto- kol- Nr. | Alder. | Behand- lingens Varighed i Dage. | 1ste Recidiv hvorlænge efter Curen. | Behandling. | Varighed i Dage. | 2det Recidiv hvorlænge efter. | Behandling. | Anmærkninger. |
|----------|-----------------------|--------|---|---|---|---------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 5 | 6 M. | 192 | circa 4 Maa- neder. | Syphilisation. | 153 | | | Død af Pneumonie paa Børne- hospitalet. |
| 2 | 19 | 25 A. | 160 | c. 2 Maa- neder. | Indifferent Be- handling. | 40 | | | |
| 3 | 23 | 46 A. | 118 | c. 6 Maa- neder. | Syphilisation. | 153 | circa 9 Maaned. | Syphilisation og Kali hydro- iodicum i 162 Dage. | Seet af <i>Egeberg</i> 459, tidligere Saar, imod hvilke brugtes Kali hydroiodic. Ikke observeret af Committeeen, medens hun første Gang laae paa Hospitalet. Har i det sidste Aar haft Pso- riasis syphilitica, behandlet hjemme. Alenebefindendet har hele Tiden været godt. Exanthemet næsten forsvun- det April 1863. <i>Steffens</i> . |
| 4 | 36 | 57 A. | 86 | c. 4 Maa- neder. | Indifferent Be- handling. | 28 | | | Ikke seet af Committeeen, me- dens han første Gang blev syphiliseret. |
| 5 | 64 | 26 A. | 113 | 3 Aar. | Indifferent Be- handling. | | | | |
| 6 | 85 | 21 A. | 209 | c. 9 Maa- neder. | Syphilisation, Kali hydroiod., Dampbade &c. | 166 | | | |

| Løbe-Nr. | Proto- kol- Nr. | Alder. | Behand- lingens Varighed i Dage. | 1ste Recidiv hvorlænge efter Curen. | Behandling. | Varighed i Dage. | 2det Reci- div hvor- længe efter. | Behandling. | Anmærkninger. |
|----------|-----------------------|----------|---|---|------------------------------|---------------------|--|---|---|
| 7 | 151 | 32 A. | 92 | 20 Dage. | Indifferent Be- handling. | 17 | 10 Maaneder. | Indifferent Be- handling i 30 Dage. | 2det Recidiv behandlet paa Arendals Sygehuus (Skrivelse fra Dr. Kittel af 4/4 58). Efter Skrivelse fra Dr. Frisak af 15/3 62 frisk. |
| 8 | 164 | 20 A. | 308 | c. 1 1/4 Maaned. | Indifferent Be- handling. | 120 | | | |
| 9 | 169 | 19 A. | 154 | 1 Aar 9 Mnd. | Indifferent Be- handling. | 7 | | | |
| 10 | 176 | 11 M. | 248 | c. 2 Maaneder. | Indifferent Be- handling. | 28 | | | |
| 11 | 179 | 5 1/2 M. | 288 | c. 10 Maaned. | Indifferent Be- handling. | 12 | circa 3 1/4 Maaned. | Syphilisation i 39 Dage. | |
| 12 | 183 | 40 A. | 236 | 1 Aar. | Indifferent Be- handling. | 12 | | | Tertiær Syphilis. |
| 13 | 184 | 20 A. | 128 | c. 3 Maaneder. | Kali hydroiodi- cum. | 38 | | | |
| 14 | 189 | 20 A. | 143 | c. 1 Maaned. | Indifferent Be- handling. | 15 | circa 3 Maaneder. | Indifferent Be- handling i 10 Dage. | Frisk i November 1861. Har født et Barn, som døde 2 Maaneder gammelt af Syphilis i Februar 1861. |
| 15 | 190 | 32 A. | 122 | c. 6 Maaneder. | Syphilisation. | 80 | | | |
| 16 | 194 | 40 A. | 98 | c. 8 Maaneder. | Syphilisation. | 151 | | | |

Har været behandlet af Dr. J.
 Vogt for et crustosyt-syphili-
 tisk Udslet.
 Forblev paa Hospitalet 2den
 Gang længe efterat Tilfæl-
 den vare svundne, fordi
 Moder og Søskennde vare
 under Behandling.

| | | | | | | |
|----|-----|--------|-----|---------------------------------|------------------------------|----|
| 17 | 53 | 19 A. | 198 | ? | Solutio iodet. kalici. | 94 |
| 18 | 170 | 11 Ug. | 234 | 1 Aar $8\frac{1}{2}$ Maaned. | Indifferent Be- handling. | |

Liste Nr. 3.

Syphilisation.

Personer, lidende af constitutionel Syphilis, som ikke vides tidligere have brugt Mercur, og som ere syphiliserede af Prof. *W. Boeck*, uden at noget bestemt Resultat af Com-
mitteen er observeret eller har kunnet observeres.

| Løbe-Nr. | Proto- kol- Nr. | Alder. | Behand- lings Varighed i Dage. | Anmærkninger. |
|----------|-----------------------|--------|---|---|
| 1 | 162 | 31 A. | | Alle syphilitiske Symptomer forsvandt efter en Pleuritis. Inoculationen uden Virkning. |
| 2 | 39 | 21 A. | 77 | Udskreven i Bedring; har senere været behandlet med Syphilisation fra 18de August til 23de November, altsaa i 98 Dage, af Dr. <i>Wildhagen</i> . I December Exanthem, ubetydelige Excoriationer i Mundvigen og paa Scrotum, hvilke Tilfælde forsvandt uden Behandling. Har senere forladt Landet. |
| 3 | 70 | 9½ A. | 110 | Hereditær Syphilis; Exostosis tibiæ ikke betydelig forandret ved Udskrivningen. Befindendet godt. |
| 4 | 75 | 23 A. | 48 | Udskreven uhelbredet efter Reqvirentens Forlangende; Syphilisationen fortsattes af Dr. <i>Heiberg</i> paa Moss. <i>W. Boeck</i> . 1862. |
| 5 | 93 | 20½ A. | 174 | Tertiær Syphilis, udskreven helbredet, men har foruden Syphilisation brugt Solutio iodeti kalici. Er efter Broderens Beretning fuldkommen frisk 1862. |
| 6 | 126 | 36 A. | 203 | Udskreven i Bedring ½ 57; seet af Com- mitteen ¼ 58, kun Spor af Exanthemet; skal senere uden videre Behandling være fuldkommen restitueret. |
| 7 | 136 | 28 A. | 201 | Var ikke restitueret ved Udskrivningen, led længere Tid bagefter af ubetydelige Tilfælde, som endelig ganske forsvandt. Befinder sig nu, uden, saavidt vides, at have brugt andre Midler, fuldkommen vel. |
| 8 | 150 | 69½ A. | 131 | Udskreven i Bedring efter Reqvirentens Forlangende; reiste senere til Gøtheborg, hvor han blev behandlet med Mercur, og er efter Dr. <i>Frisaks</i> Skrivelse af ½ 62 frisk. |

| Løbe-Nr. | Proto- kol- Nr. | Alder. | Behand- lings Varighed i Dage. | Anmærkninger. |
|----------|-----------------------|--------|---|---|
| 9 | 177 | 23 A. | 124 | Rømte fra Hospitalet uhelbredet. |
| 10 | 188 | 29 A. | 145 | Var ikke ganske restitueret ved Udskrivningen. Efter Skrivelse fra Dr. <i>Koht</i> af 15de Februar 1862 frisk. |
| 11 | 172 | 4½ A. | 226 | Inoculeredes med ringe eller ingen Virkning. Efter en Typhus forsvandt alle syphilitiske Symptomer. Efter senere Oplysning af Prof. <i>W. Boeck</i> har denne Patient tidligere brugt Mercur. |

Liste Nr. 4.

Syphilisation.

Personer, døde under Curen, som ikke tidligere have brugt Mercur. (Prof. *W. Boeck*).

| Løbe-Nr. | Proto- kol- Nr. | Behand- lings Varighed i Dage. | Anmærkninger. |
|----------|-----------------------|---|--|
| 1 | 25 | 20 | 1 Maaned gammelt Barn, hereditær Syphilis. |
| 2 | 52 | 135 | 3 Maaneder gammelt Barn, hereditær Syphilis. Død af Erysipelas partis capill. capitis. |
| 3 | 88 | 15 | 6 Uger gammelt Barn, hereditær Syphilis. Atrophic. |
| 4 | 113 | 33 | 4 Maaneder gammelt Barn, hereditær Syphilis. Død af Erysipelas ambulans. |
| 5 | 120 | 35 | 3 Maaneder gammelt Barn, hereditær Syphilis. Død af Pneumonie og Kramper. |
| 6 | 180 | 22 | 2 Maaneder gammelt Barn, hereditær Syphilis. Inoculation uden Virkning. |

Liste Nr. 5.

Syphilisation.

Personer, lidende af constitutionel Syphilis, som tidligere ere behandlede med Mercur. (Prof. W. Boeck).

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder. Aar. | Den syphili- tiske Sygdoms omtrentlige Varighed. | Sygdomsform. | Opholdet paa Hospitalet fra Syphilisationens Begyn- delse i Dage. | Resultat. | Anmærkninger. |
|----------|--------------|----------------|---|---|---|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 46 | 5 A. | Exanth. tuberculos. | 73 | Recidiv efter 10 Maa- neder. | Tidligere syphiliseret; samtidig lødum kalicum. |
| 2 | 3 | 26 | 18 A.? | Ulcera faucium et Rhupia. | 399 | Udskreven i Bedring. | 2 Gange for Syphilisation; sam- tidig lødum kalicum. Seet i 1861 af <i>Steffens</i> . Frisk. |
| 3 | 10 | 26 | 5 A.? | Ulcera syphilitica. | | | Syphiliseret nogle Gange uden Virkning; lødum kalicum. |
| 4 | 11 | 38 | 16 A. | Ulcera syphilitica og Beenaffection. | 249 | Recidiv. | Samtidig lødum kalicum; ud- skreven begge Gange i Bedring. |
| 5 | 13 | 23 | 2 A. | Exanthema tuberculos. et ulcera. | 149 | | Samtidig lødum kalicum. |
| 6 | 15 | 37 | 34 A. | Ulcera. | 121 | Udskreven i Bedring. | Død kort efter af Morbus Brightii. |
| 7 | 16 | 36 | 5½ A. | Paralysis extremit. inferior. | 328? | Udskreven uhelbredet. | Død kort efter af Pneumonie. |
| 8 | 17 | 28 | 4 A. | Ulcera cruris. | 150 | Helbredet. | Samtidig lødum kalicum. |
| 9 | 18 | 30 | 4 A. | Ulcera cruris. | 233 | Recidiv. | Samtidig lødum kalicum. |
| 10 | 20 | 34 | 3½ A. | Exanth. tuberculos. | 127 | Udskreven i Bedring. | Samtidig lødum kalicum. |

| | | | | | | | |
|----|----|--------|----------|----------------------------------|-----|--------------------------------------|--|
| 11 | 22 | 29 | 1 A. ? | Tubercula mucosa. Exanthem. | 119 | Recidiv. | Ligger for Tiden paa Chr. Byes Sygehuus med syphilitiske Tuberkler. |
| 12 | 24 | 30 | 7 A. | Intet syphilitisk Symptom. | 100 | | Syphileret for at kunne føde friske Børn. Forløst den 21de Marts 1861 med et Barn, som 11 Uger efter var friskt. |
| 13 | 27 | 23 | 10 A. | Ulceræ syphilitica. | 90 | Udskreven helbredet. | Samtidig lodetum kalicum; døde kort efter af Pneumonie. (4 Gange syphileret). |
| 14 | 28 | 29 | 7 A. | Paralysis. | 86 | Udskreven i Bedring. | Samtidig lodetum kalicum. |
| 15 | 31 | 12 Ug. | 12 Uger. | Exanthem. | 93 | Død af Kræmper. | Samtidig lodetum kalicum. Ved Obduction fandtes hypertrophiske Tuberkler. |
| 16 | 32 | 41 | ? | Paralysis. | 831 | Ingen Forbedring, død. | Samtidig lodetum kalicum. |
| 17 | 34 | 39 | ? | Ulceræ. | | Uhelbredet. | Længere Tids fortsat Syphilisation viste ingen Virkning paa Saarene. Syphilis tvivlsom. |
| 18 | 37 | 26½ | 2 A. | Exanth. tuberculos. Periostitis. | 93 | Udskreven helbredet. | Samtidig lodetum kalicum. |
| 19 | 38 | 1 | 1 A. | Tubercula mucosa. | 98 | Udskreven helbredet. | Barn af Nr. 37. |
| 20 | 40 | 25 | 1 A. | Tubercula mucosa, Exanthem. | 92 | Udskreven helbredet. | |
| 21 | 44 | 36 | 16 A. | Ulceræ crustosa. | 181 | Helbredet. | Samtidig lodetum kalicum. |
| 22 | 45 | 31 | 1 A. | Ulceræ faucium et Periostitis. | 94 | Udskreven i Bedring. | Samtidig lodetum kalicum. |
| 23 | 50 | 31 | 4 A. | Ulcus et Paresis. | 86 | Saaret tilhelet; Paresis uforandret. | Samtidig lodetum kalicum. |
| 24 | 51 | 25 | 5 A. | Hypochondria syphilit. | 165 | | Samtidig lodetum kalicum; følte sig noget bedre; er frisk nu. (Boeck). |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder. Aar. | Den syphilitiske Sygdoms omtrentlige Varighed. | Sygdomsform. | Opholdet paa Hospitalet fra Syphilisationens Begyndelse i Dage. | Resultat. | Anmærkninger. |
|----------|--------------|----------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 25 | 63 | 32 | 3 Maanedes. | Tubercula mucosa, Exanthem. | 111 | Helbredet. | Samtidig Iodetum kalicum. Er efter Beretning til <i>W. Boeck</i> frisk. |
| 26 | 66 | 31 | 10 A. | Ulcera cruris. | 151 | Saaret tilhelet. | Syphilis tvivlsom. Iodetum kalicum. Indvikling med Heftplaster. Syphiliseret 2—3 Maanedes. |
| 27 | 71 | 60 | ? | Ulcera cruris. | | Død efter Amputation. | |
| 28 | 80 | 48 | 17 A. | Ulcera et Exostosis. | 208 | Saarene tilhelede. | Har tillige brugt Bandage af Heftplaster. |
| 29 | 83 | 29 | 2½ A. | Ulcera nasi. | 133 | Helbredet. Recidiv. | Samtidig Iodetum kalicum. |
| 30 | 86 | 18 | 14 A. | Exostosis. | 264 | Udskreven i Bedring. | Samtidig Iodetum kalicum. |
| 31 | 97 | 21½ | 15 A.? | Exostosis tibiae. | 135 | Udskreven i Bedring. 2 Recidiver. | |
| 32 | 99 | 41 | 20 A. | Ulcera cruris. | 74 | Saarene tilhelede. | Inoculeredes i 3 Maanedes, derefter Pneumonie. 10 Maanedes efter Saarene fremdeles tilhelede. |
| 33 | 104 | 27 | 6 A. | Ulcera palati mollis. | 151 | Saarene tilhelede. | |
| 34 | 109 | 54 | ? | Ulcera cruris. | 174 | | Ossa nasi noget tumfierede. Død af Hydrops. Ikke syphiliseret i den sidste Maaned. |
| 35 | 110 | 35 | 4 A. | Intet syphilitisk Symptom. | 133 | | Syphiliseret, fordi hun har født syphilitiske Børn; frisk 1½ 60, har ikke siden havt Børn. (<i>Nygaard</i>). |

| | | | | | | | |
|----|-----|----|-----------|--|-----|---|---|
| 36 | 115 | 43 | 6 A. | Ulcersa syphilitica (Thæria). | ? | | Syphiliseret en kort Tid med ringe Virkning; død af Phthisis. |
| 37 | 117 | 23 | 6 A. | Intet syphilitisk Symp- tom. | 114 | | Syphiliseret, fordi hun har født syphilitiske Børn; skal senere være død af Pleuritis. |
| 38 | 118 | 24 | 2 A.? | Ulcersa cruris. | 129 | Helbredet. | Samtidig lodetum kalicum og Dampbade. |
| 39 | 122 | 38 | 3 A. | Ulcersa faucium og Beenaffection. | 144 | I Bedring. | |
| 40 | 128 | 17 | ? | Exostosis. | 145 | Tilstanden uforandret. | |
| 41 | 129 | 37 | 6—7 A. | Ulcersa faucium. | 37 | Saaret tilhelet. | Samtidig lodetum kalicum. Een Gang før behandlet med Syphi- lisation i 131 Dage. |
| 42 | 131 | 11 | ? | Beenaffection. | 136 | I Bedring. | Er efter Udskrivningen af Hospi- talet bleven værre og har brugt lodetum kalicum. Har senere været behandlet paa Børnehospi- talet. |
| 43 | 132 | 31 | 2 A.? | Ulcersa cruris. | 79 | Saarene tilhelede. | Syphiliseret, fordi hun har født syphilitiske Børn. |
| 44 | 134 | 24 | 3 A. | Intet syphilitisk Symp- tom. | 110 | | |
| 45 | 135 | 54 | 15 A. | Ulcersa syphilitica og Beenaffection. | 114 | Udskreven helbredet. | Samtidig lodetum kalicum; skal senere være død. |
| 46 | 137 | 21 | 12 A. | Ulcersa nasi et faucium. | 103 | Recidiv. | Samtidig lodetum kalicum. Blev 2den Gang behandlet med Sy- philisation i 54 Dage. |
| 47 | 141 | 20 | 9 A. | Ulcersa faucium. | 164 | Helbredet. | Samtidig lodetum kalicum. |
| 48 | 149 | 48 | 16—17 A. | Ulcersa cruris. | 112 | I Bedring. | Tvivlsomt, om hun har brugt Mer- cur. |
| 49 | 157 | 22 | 4 Maaned. | Tubercula mucosa. | 107 | Udskreven helbredet. Recidiv? Indifferent Behandling. | Fødte senere et Barn, som døde af Atrophie. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder. Aar. | Den syphili- tiske Sygdoms omtrentlige Varighed. | Sygdomsform. | Opholdet paa Hospitalet fra Syphilisationens Begyn- delse i Dage. | Resultat. | Anmærkninger. |
|----------|--------------|----------------|---|---|---|----------------------|--|
| 50 | 160 | 28 | 5½ A. | Ulcera syphilitica (Thæria) og Beenaffec- tion. | 139 | Udskreven helbredet. | Samtidig Iodetum kalicum; har brugt Syphilisation för i 111 Dage. |
| 51 | 163 | 43 | 17 A. | Ulcera nasi. | 71 | Udskreven helbredet. | Samtidig Iodetum kalicum; ind- kom senere med Epididymitis, Iodetum kalicum. |
| 52 | 178 | 15 | 10 A. | Ulcera cruris. | 69 | I Bedring. Recidiv. | Samtidig Iodetum kalicum. Brugte ogsaa anden Gang Iodetum ka- licum. Död. |
| 53 | 186 | 34 | 9 A. | Paralysis syphilitica. | 179 | Udskreven helbredet. | Indkom strax efter paa Rigshospi- talet med et Saar paa Crus, Iodetum kalicum. |
| 54 | 193 | 39 | 5 A. | Ulcera faucium. | 203 | Recidiv. | Behandlet för med Derivation, L.-Nr. 54. |
| 55 | 197 | 32 | 10 A. | Ulcera cruris. | 150 | Saaret tilhelet. | Samtidig Iodetum kalicum. |
| 56 | 199 | 28 | 4 A. | Ulcera nasi. | 84 | Helbredet. | |

Syphilisation.

Personer, lidende af constitutionel Syphilis, som ikke tidligere have været behandlede med Mercur.
(Brigadelæge *Hjort's* Afdeling.)

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder. Aar. | Opholdet paa Hospitalet fra Syphilisationens Begyndelse i Dage. | Naar udskre- ven af Hospi- talet. | Resultat. | Anmærkninger. |
|----------|--------------|----------------|--|---|----------------------|---|
| 1 | 56 | 18 | 149 | 7 $\frac{1}{2}$ 56 | Helbredet. | Den siden Helbredelsen forløbne Tid = 4 Aar, 10 Maaneder og 7 Dage. Fødte $\frac{1}{2}$ 59 et Barn, som døde syphilitisk. |
| 2 | 57 | 2 Mnd. | 23 | 7 $\frac{1}{2}$ 56 | | Inoculeredes uden Virkning, hvorfor ordineredes Calomel. Død af Kræmper. |
| 3 | 58 | 20 | 96 | 7 $\frac{1}{2}$ 56 | Helbredet. | Den siden Helbredelsen forløbne Tid = 5 Aar og 7 Dage. Fødte $\frac{1}{2}$ 58 et Barn, som døde føl- gende Dag. |
| 4 | 59 | 23 | 161 | 7 $\frac{1}{2}$ 56 | Recidiv? | Indkom $\frac{1}{2}$ 58 med Saar paa Crura, hvis syphilitiske Natur Committeeen ansaae for tvivlsom; syphili- seret igjen i 42 Dage, udskreven helbredet. |
| 5 | 60 | 20 | 123 | 7 $\frac{1}{2}$ 56 | Udskreven helbredet. | Den siden Helbredelsen forløbne Tid = 4 Aar, 11 Maaneder og 12 Dage. |
| 6 | 61 | 18 | 131 | 7 $\frac{1}{2}$ 56 | Helbredet. | Den siden Helbredelsen forløbne Tid = 4 Aar, 10 Maaneder og 24 Dage. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder. Aar. | Opholdet paa Hospitalet fra Syphilisationens Begyn- delse i Dage. | Naar udskre- ven af Hospi- talet. | Resultat. | Anmærkninger. |
|----------|--------------|----------------|---|---|-----------------------|--|
| 7 | 76 | 26 | 61 | 1 ^o 56 | Udskreven uhelbredet. | Efter eget Forlangende; senere behandlet med Syphilisation og Sol. iodeti kalici. |
| 8 | 94 | 24 | 203 | 2 ^o 57 | Helbredet. | Har brugt en Tid samtidig med Syphilisation Sol. iodeti kalici, og lidt af Hjernecongestion. |
| 9 | 95 | 23 | 190 | 2 ^o 57 | Helbredet. | Phagedæniske Inoculationssaar. Sol. iodeti kalici, Decoct. chinæ reg. |
| 10 | 100 | 29 | 256 | 2 ^o 59 | Recidiv. | Brugte Sol. iodeti kalici, Derivation; fødte i April 1858 et syphilitisk Barn; indkom 3 58 med syphilitisk Exanthem, brugte Calomel. |
| 11 | 101 | 21 | 156 | 2 ^o 57 | Helbredet. | Den siden Helbredelsen forløbne Tid = 4 Aar, 7 Maaneder og 2 Dage. |
| 12 | 114 | 28 | 126 | 1 ^o 57 | Recidiv. | Indkom igjen 2 ^o 57; atter Syphilisation, udskreven helbredet 3 57 (behandlet i 101 Dage). Enkelte phagedæniske Inoculationssaar. |
| 13 | 121 | 23 | 313 | 1 ^o 57 | Recidiv. | Tumor albus genu. Sol. iodeti kalici. Indkom igjen 2 58, Sol. iodeti kalici, Hæmatemesis, overflyttet til den medicinske Afdeling. — Har i de senere Aar oftere brugt Iod. kalic. for forskellige Tilfælde, antagelig af syphilitisk Oprindelse, saasom Saar ved Næsen i Mundhulheden, Hovedpine og Parese af venstre Side. <i>J. Vogt</i> 1863. |

Syphilisation.

Personer, lidende af constitutionel Syphilis, som tidligere have været behandlede med Mercur.
(Brigadelæge Hjort's Afdeling.)

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder. Aar. | Den syphili- tiske Sygdoms omtrentlige Varighed. | Opholdet paa Hospitalet fra Syphilisationens Begyn- delse i Dage. | Naar udskre- ven af Hospi- talet. | Resultat. | Anmærkninger. |
|----------|--------------|----------------|---|---|---|----------------------|--|
| 1 | 6 | 30 | 1½ A.? | 274 | 3 ^o 56 | | Exanthema papulosum. Sol. iodeti kalici; helbrededes ved Diata parca. |
| 2 | 55 | 29 | 1 A. | 84 | 3 ^o 56 | Udskreven helbredet. | Ulcera crustosa nasi. Solutio iodeti kalici; fødte i September 1859 et syphilitisk Barn. |
| 3 | 68 | 29 | 1½ A. | 103 | 3 ^o 57 | | Exanthema papulosum. Fra 1 ^o 56—3 ^o 56 Syphilisation, derefter Derivation. Recidiv 3 ^o 57, Solut. iodeti kalici. |
| 4 | 74 | 18 | 6 Mndr. | 162 | 3 ^o 57 | Helbredet. | Affectio faucium et ulcera ge- nitalium. |
| 5 | 92 | 28 | 8 Mndr. | 202 | 3 ^o 57 | Helbredet. | Samtidig Sol. iodeti kalici; phage- dæniske Inoculationsaar. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder. Aar. | Den syphili- tiske Sygdoms omtrentlige Varighed. | Opholdet paa Hospitalet fra Syphilisationens Begyn- delse i Dage. | Naar udskre- ven af Hospi- talet. | Resultat. | Anmærkninger. |
|----------|--------------|----------------|---|---|---|----------------------|--|
| 6 | 102 | 23 | 1 1/2 A. | 177 | § 57 | Udskreven helbredet. | Tubercula mucosa, Exanthem. Samtidig Sol. iodeti kalici; døde § 58 af Febris puerperalis. |
| 7 | 103 | 26 | 8 Mndr. | 102 | 2 1/2 57 | | Affectio oris, Tubercula mu- cosa. Kun syphiliseret en kort Tid, Underlivsbetændelse, behandlet med Calomel, udskreven helbredet. |
| 8 | 112 | 20 | 1 A. | 219 | 2 1/2 57 | Recidiv. | Tubercula mucosa, Exanthem. Samtidig Sol. iodeti kalici samt Decoct. sarsaparillæ. 2 Recidiver. |

Liste A.

Derivation.

Personer, lidende af constitutionel Syphilis, som ikke tidligere have brugt Mercur, og som ere behandlede af Brigadelæge *Hjort*, uden at der indtil 1ste Juli 1862 er observeret noget Recidiv.

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder. | Behandlings Varighed i Dage. | Den siden Helbredelsen forløbne Tid. | | | Naar udskreven af Hospitalet. | Anmærkninger. |
|----------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Aar. | Maaned. | Dage. | | |
| 1 | 1 | 18 A. | 101 | 5 | 2 | 20 | 1/2 57 | Frisk April 1863. <i>J. Vogt.</i> |
| 2 | 3 | 21 A. | 150 | 4 | 11 | 29 | 1/2 57 | |
| 3 | 12 | 22 A. | 138 | 4 | 10 | 16 | 1/2 57 | |
| 4 | 20 | 25 A. | 183 | 4 | 6 | 10 | 1/2 57 | |
| 5 | 23 | 25 A. | 122 | 4 | 8 | 23 | 1/2 57 | |
| 6 | 29 | 29 A. | 48 | 4 | 10 | 1 | 1/2 57 | |
| 7 | 30 | 27 A. | 170 | 4 | 5 | 16 | 1/2 57 | |
| 8 | 31 | 20 A. | 144 | 4 | 6 | 16 | 1/2 57 | |
| 9 | 32 | 29 A. | 280 | 4 | 4 | 18 | 1/2 58 | |
| 10 | 34 | 73 A. | 175 | 4 | 4 | 18 | 1/2 58 | |
| 11 | 35 | 20 A. | 143 | 4 | 5 | 8 | 1/2 57 | |
| 12 | 37 | 21 A. | 154 | 4 | 3 | 18 | 1/2 58 | |
| 13 | 39 | 20 A. | 77 | 4 | 5 | 8 | 1/2 57 | |
| 14 | 40 | 16 1/2 A. | 154 | 4 | 2 | 2 | 1/2 58 | |
| 15 | 41 | 21 A. | 106 | 4 | 3 | 10 | 1/2 58 | |
| 16 | 43 | 34 A. | 79 | 4 | 4 | 6 | 1/2 58 | |
| 17 | 45 | 19 A. | 225 | 3 | 10 | 30 | 1/2 58 | |
| 18 | 47 | 23 A. | 107 | 4 | 1 | 28 | 1/2 58 | |
| 19 | 48 | 20 A. | 59 | 4 | 2 | 23 | 1/2 58 | |
| 20 | 52 | 24 A. | 270 | 3 | 7 | 11 | 1/2 58 | |
| 21 | 53 | 19 A. | 202 | 3 | 8 | 3 | 1/2 58 | |
| 22 | 56 | 32 A. | 83 | 3 | 11 | 24 | 1/2 58 | |
| 23 | 58 | 23 A. | 105 | 3 | 10 | 28 | 1/2 58 | |
| 24 | 64 | 26 A. | 290 | 3 | 3 | 3 | 1/2 59 | |
| 25 | 67 | 40 A. | 195 | 3 | 5 | 30 | 1/2 58 | |
| 26 | 69 | 23 A. | 129 | 3 | 7 | 20 | 1/2 58 | |
| 27 | 70 | 48 A. | 214 | 3 | 2 | 19 | 1/2 59 | |
| 28 | 72 | 25 A. | 134 | 3 | 4 | 19 | 1/2 59 | |
| 29 | 75 | 9 A. | 157 | 3 | 3 | 19 | 1/2 59 | |
| 30 | 77 | 14 1/2 A. | 195 | 3 | 2 | 1 | 1/2 59 | |
| 31 | 78 | 56 A. | 123 | 3 | 4 | 13 | 1/2 59 | |
| 32 | 79 | 22 A. | 137 | 3 | 4 | 4 | 1/2 59 | Frisk April 1863. <i>J. Vogt.</i> |
| 33 | 81 | 33 A. | 194 | 3 | 1 | 17 | 1/2 59 | |
| 34 | 82 | 20 A. | 159 | 3 | 2 | 24 | 1/2 59 | |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder. | Behandlingens Varighed i Dage. | Den siden Helbredelsen forløbne Tid. | | | Naar udskrevet af Hospitalet. | Anmærkninger. |
|----------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Aar. | Maa-neder. | Dage. | | |
| 35 | 86 | 18 $\frac{1}{2}$ A. | 144 | 3 | 3 | 3 | $\frac{2}{2}$ 59 | Var frisk 1862. |
| 36 | 87 | 26 A. | 156 | 3 | 2 | " | $\frac{2}{2}$ 59 | Er senere død |
| 37 | 90 | 7 A. | 82 | 3 | 4 | 22 | $\frac{2}{2}$ 59 | af Forbrænding. |
| 38 | 91 | 9 A. | 164 | 3 | 1 | 29 | $\frac{2}{2}$ 59 | J. Vogt. |
| 39 | 93 | 22 A. | 149 | 3 | 2 | 13 | $\frac{2}{2}$ 59 | |
| 40 | 94 | 28 A. | 182 | 3 | 1 | 6 | $\frac{2}{2}$ 59 | |
| 41 | 96 | 22 $\frac{1}{2}$ A. | 179 | 2 | 11 | 23 | $\frac{2}{2}$ 59 | |
| 42 | 97 | 23 A. | 146 | 2 | 11 | 29 | $\frac{2}{2}$ 59 | |
| 43 | 100 | 24 A. | 116 | 2 | 11 | 26 | $\frac{2}{2}$ 59 | Frisk April 1863. J. Vogt. |

Liste B.

Derivation.

Recidiver hos Personer, som ikke tidligere have brugt Mercur. (Brigadelæge Hjort's Afdeling).

| Løbe-Nr. | Proto- kol- Nr. | Alder. | Behand- lingens Varighed i Dage. | 1ste Recidiv hvorlænge efter Curen. | Behandling. | Varighed i Dage. | 2det Recidiv hvorlænge efter. | Behandling. | Anmærkninger. |
|----------|-----------------------|--------|---|---|--|---------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 6 | 17½ A. | 145 | circa 1 Mnd. | Derivation. | 30 | | | Frisk April 1863. J. Vogt. |
| 2 | 13 | 39 A. | 85 | c. 2 Maa- neder. | Derivation, Kali hydroiod., Syphilisation. | 374 | 13 Dage. | Indifferent Be- handling i 19 Dage. | Fik 1 Aar og ½ Maaned senere et 3die Recidiv, som behand- ledes med Derivation og Dieta parca i 64 Dage. |
| 3 | 17 | 27 A. | 129 | c. 4½ Mnd. | Derivation. | 114 | | | Døde ½ 59 af en Ovarialsvulst paa Rigshospitalets medicin- ske Afdeling. |
| 4 | 19 | 67 A. | 239 | c. 4 Mnd. | Kali hydroiod., | 42 | | | Behandlet localt fra 1½ — 2½ 61 for Excoriationer ved Geni- talia. |
| 5 | 28 | 20 A. | 246 | c. 2½ Mnd. | Cura Dzondi. | 72 | | | Indkom paa Lillehammers Sy- gehuus i Aaret 1859 for Ul- cera faucium etc. |
| 6 | 36 | 23 A. | 175 | c. 1 Mnd. | Derivation og local Behand- ling. | 68 | | | Behandlet i Hjemmet for en Svulst i Clavicula med Sublimat af Dr. J. Vogt. Senere svagt Syn; lodet. kalic. Setaceum. |
| 7 | 55 | 36 A. | 125 | c. 9 Mnd. | ? | ? | | | |
| 8 | 63 | 24 A. | 138 | ? | ? | ? | | | |

| Løbe-Nr. | Proto- kol- Nr. | Alder. | Behand- lings- Varighed i Dage. | 1ste Recidiv hvorlænge efter Curen. | Behandling. | Varighed i Dage. | 2det Recidiv hvorlænge efter. | Behandling. | Anmærkninger. |
|----------|-----------------------|--------|--|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| 9 | 68 | 28 A. | 116 | c. 3 Maaned. | Derivation. | 178 | | | |
| 10 | 80 | 21 A. | 261 | c. 3 Maaned. | Diæta parca, Kali hydroiod. | 78 | 2 Maaned. | Local Behand- ling i 65 Dage. | Frisk November 1861; fødte den 9 61 et Drengbarn, som led af Ophthalmia neona- torum, men ikke af syphi- litiske Tilfælde. Det er se- nere død i Sverige. 1 Marts 1860 behandlede han af Dr. Holst for Ulcera fau- cium. |
| 11 | 89 | 30 A. | 203 | c. 1 Aar. | Kali hydroiod. | ? | | | Frisk November 1861; død paa Rigshospitalet af Feber 1863. |
| 12 | 98 | 21 A. | 121 | 1 Aar 8 Mnd. | Indifferent Be- handling. | 48 | | | Behandlet af Dr. Ønere. Frisk April 1863. J. Vogt. |
| 13 | 9 | 27 A. | 158 | ? | Kali hydroiod. | ? | | | |
| 14 | 50 | 25 A. | 155 | 1 Aar 8 1/4 Maaned. | Svedecur. | 58 | | | |

Liste C.

Derivation.

Personer, lidende af constitutionel Syphilis, som ikke vides tidligere at have brugt Mercur, og som ere behandlede med Derivation af Brigadelæge *Hjort*, uden at noget bestemt Resultat af Committeeen er observeret eller har kunnet observeres.

| Løbe-Nr. | Proto- kol- Nr. | Alder. | Behand- lings Varighed i Dage. | Anmærkninger. |
|----------|-----------------------|--------|---|--|
| 1 | 16 | 32 A. | 118 | Samtidig Solut. iodeti kalici. |
| 2 | 27 | 2 M. | 62 | Et 2 Maaneder gammelt Barn med hereditær Syphilis; udgik af Committeeens Observation, da Derivationscuren seponeredes og Sublimatbade anvendtes. |
| 3 | 38 | 23 A. | 75 | Committeeen ansaae det tvivlsomt, om ikke Mercurialia vare anvendte tidligere: Halitus mercurialis ved Indlæggelsen; udskreven helbredet, reist til Gøtheborg. |
| 4 | 57 | 48 A. | 128 | Committeeen ansaae hende ikke for helbredet ved Udskrivningen. |
| 5 | 59 | 32 A. | 138 | Udskreven i Bedring. |
| 6 | 60 | 19 A. | 101 | Udskreven $\frac{3}{4}$ 58, seet af Committeeen $\frac{3}{4}$ 58, ikke frisk; indkom atter $\frac{3}{4}$ 58, stærk Hovedpine: Sol. iodeti kalici. Frisk i November 1861, men har i Begyndelsen af dette Aar født et Barn, som døde 2 Maaneder gammelt paa Hudsygeafdelingen. Frisk April 1863. <i>J. Vogt</i> . |
| 7 | 61 | 20 A. | 283 | Brugte tillige Sol. iodeti kalici og Decoct. sarsaparillæ. Frisk i November 1861, har født et Barn i Begyndelsen af Aaret, som er død paa Hudsygeafdelingen. Recidiv fra $\frac{1}{4}$ 60 — $\frac{3}{4}$ 60. Solut. iodeti ammonici fra $\frac{1}{4}$ 60 — $\frac{3}{4}$ 61. Solut. iodeti kalici. Frisk April 1863. <i>J. Vogt</i> . |
| 8 | 62 | 22 A. | 84 | Committeeen ansaae hende ikke for helbredet ved Udskrivningen. (Recidiv efter Behandling med Decoct. sarsaparillæ). |
| 9 | 71 | 55 A. | 211 | Samtidig Sol. iodeti kalici. |
| 10 | 73 | 7 A. | 292 | Brugte en Tid Pulv. alterans. |
| 11 | 74 | 5 A. | 292 | Brugte ogsaa Syrupus sarsaparillæ og Pulv. alterans. |

| Løbe-Nr. | Proto- kol- Nr. | Alder. | Behand- lings Varighed i Dage. | Anmærkninger. |
|----------|-----------------------|--------|---|--|
| 12 | 83 | 33 A. | 40 | Var behandlet i Byen for Syphilis med Derivation; led paa Hospitalet af Øienbetændelse, kun et enkelt Stibiatplaster, Sol. iodeti ammoniaci. |
| 13 | 85 | 47 A. | 126 | Blev under Curen angreben af Lungebetændelse og indlagt paa den medicinske Afdeling. Indkom senere 2den Gang paa Hospitalet med syphilitiske Tilfælde og brugte Liquor Bellosti, Cura Dzondi, Solutio iodeti kalici. |
| 14 | 88 | 33 A. | 122 | Var behandlet for primære Saar, om med Mercur vides ikke; udskreven helbredet. |
| 15 | 92 | 30 A. | 200 | Udskreven i Bedring; har benyttet samtidig Sol. iodeti kalici; indkom senere og brugte atter Derivation og Sol. iodeti ammoniaci. |
| 16 | 99 | 2 A. | 178 | 2 Aar gammelt Barn, brugte en Tid Calomel. |
| 17 | 95 | 19½ A. | 54 | Brugte en Tid Solutio iodeti kalici. |
| 18 | 15 | 37 A. | 138 | Udskreven i Bedring, indkom efter 3½ Maaneder og behandlede i 163 Dage med Derivation og Iodet. kalic., indkom atter efter 1 Aar og behandlede med Diæta stricta i 46 Dage. |

Liste D.

Derivation.

Personer, lidende af constitutionel Syphilis, som tidligere ere behandlede med Mercur.
(Brigadelæge Hjørt's Afdeling.)

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder. Aar. | Den syphili- tiske Sygdoms omtrentlige Varighed. | Sygdomsform. | Opholdet paa Hospitalet fra Derivatio- nens Begyn- delse i Dage. | Resultat. | Anmærkninger. |
|----------|--------------|----------------|---|--|--|----------------------|--|
| 1 | 2 | 24 | 5 Maaned. | Exanth. papulos. | 258 | Udskreven helbredet. | Har samtidig brugt Decoct. stipit. dulcamaræ. |
| 2 | 4 | 24 | 2 A. | Ulcera genitalium et Exanthem. | 91 | Helbredet. | |
| 3 | 5 | 23 | 4 A. | Exanth. syphilit. | 52 | Helbredet. | Behandlede et Aar senere paa Chr. Byes Sygehus for Phthisis og er død. |
| 4 | 7 | 20 | 1 A. | Exanth. syphilit. | 142 | Helbredet. | |
| 5 | 8 | 22 | 1½ A. | Ulcera elevata geni- talia. | 51 | Helbredet. | |
| 6 | 10 | 35 | 4½ A. | Exanth. syphilit. Affectio faucium. | 137 | Helbredet. | |
| 7 | 11 | 27 | 5 Maaned. | Tubercula mucosa. | 155 | 2 Recidiver. | 1ste Recidiv: Derivation i 93 Dage; 2det Recidiv: local Behand- ling. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder. Aar. | Den syphili- tiske Sygdoms omtrentlige Varighed. | Sygdomsform. | Opholdet paa Hospitalet fra Derivatio- nens Begyn- delse i Dage. | Resultat. | Anmærkninger. |
|----------|--------------|----------------|---|---|--|----------------------|--|
| 8 | 14 | 34 | 6 Maaneder. | Exanth. papulos. Af- fectio faucium. | 144 | 3 Recidiver. | 1ste Recidiv: Dampbade i 78 Dage; 2det Recidiv: Sol. iodeti kalici i 14 Dage; 3die Recidiv: Deri- vation, Decoct. sarsaparillæ og Liquor Bellosi i 220 Dage. Brugte anden Gang Sol. iodeti kalici i 50 Dage, 3die Gang Derivation og lodkali i 19 Dage. Har senere udenfor Hospitalet ofte brugt Sol. iodeti kalici for Hovedpine. Derivation anvendt een Gang tidligere i 1856 i 64 Dage. |
| 9 | 18 | 28½ | 3 A. | Exanth. tuberculos. | 120 | Recidiver. | Har foruden Derivation brugt Sol. iodeti kalici, Diæta homogena, Decoctum sarsaparillæ. |
| 10 | 21 | 29 | 2 A. | Exanth. tuberculos. etc. | 500 | Udskreven i Bedring. | |
| 11 | 22 | 34 | 10 Mndr. | Affectio oris et faucium. | 213 | Helbredet. | |
| 12 | 24 | 25 | 1 A. | Exanth. papulos. | | | Udgaaet af Committeeens Obser- vation, da hun efterat have brugt Decoct i 165 Dage paa Hospitalet blev underkastet Mer- curialbehandling. |

| | | | | | | | |
|----|----|----|--------------|----------------------------------|-----|----------------------|--|
| 13 | 25 | 23 | 1 A. | Affectio oris, Tubercula mucosa. | 143 | Helbredet. | Har før været behandlet af Briggelæge Hjort med Sublimat, Sol. iodeti kalici og Syphilisation. |
| 14 | 26 | 27 | 1 A. | Tubercula mucosa. | 108 | Helbredet. | |
| 15 | 42 | 29 | 5 A. | Exanth. papulos. | 98 | Udskreven helbredet. | Ophørte med Derivation efter 12 Dages Behandling og brugte Sol. iodeti kalici. Gravida. |
| 16 | 44 | 22 | 4½ A. | Exanth. tuberculos. | 68 | Udskreven helbredet. | |
| 17 | 46 | 25 | ? | Ulceræ faucium et nasi. | | | |
| 18 | 49 | 29 | 8 A. | Psoriasis palmarum syphilitic. | 135 | Udskreven i Bedring. | Gravida i 5te Maaned. Tidligere behandlet foruden med Mercur med Syphilisation. |
| 19 | 51 | 23 | 2—3 A. | Tubercula mucosa. | 106 | Udskreven helbredet. | Blev paa Hospitalet forløst med et velskabt Barn, som var friskt 1 Maaned efter. |
| 20 | 54 | 28 | 2½ A. | Ulceræ faucium. | 101 | 2 Recidiver. | 1ste Recidiv: Syphilisation i 203 Dage; 2det Recidiv: Sol. iodeti kalici i 29 Dage. |
| 21 | 66 | 23 | ? | Ulceræ crustosa. | | Recidiv. | Ophørte med Derivation og brugte Sol. iodeti kalici; 2den Gang: Liquor Bellosii i 78 Dage. |
| 22 | 76 | 31 | 9 Mndr. | Tubercula mucosa, Exanthem. | 82 | Helbredet. | Død af Angina membranacea. |
| 23 | 84 | 1½ | 1 A. 4 Mndr. | Affectio oris. | 79 | | |

Schematisk

Syphili-

a. Ikke tidligere

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|
| | | | | Syphilitationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 1 | 1 | 20 Qd. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia; Ulcerationer i Fauces, paa Læberne og Gingiva, Papler paa Kroppen og Extremit.; svulne Nuchalglandler. | $\frac{1}{11}$ 55 | 113 | | |
| 2 | 4 | $1\frac{1}{2}$ Qd. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia og om Anus; Rubor faucium. | $\frac{2}{10}$ 55 | 146 | | |
| 3 | 5 | $\frac{1}{2}$ Qd. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia og om Anus. Ec- thyma i Hovedet. — $\frac{2}{2}$ 56. Hæshed; Ulcerationer paa Velum palat. | $\frac{2}{11}$ 55 | 192 | | $\frac{2}{10}$ 56 til $\frac{3}{8}$ 57. Paa Nates, omkring Anus, paa Labia maj. større og min- dre, rødbrune, ophøiede Plet- ter, tildeels besatte med fine Skjæl; hvidt Belæg paa Velum palat. $\frac{1}{10}$. Ex- coriat. paa Tungenoden. Beh. i 153 D. med Syphilsat., Infus. salab. c., Es. opii simp., Subnitr. bis- muth. c. opio, Decoct. alb., Inf. rheor. c. Æth. alcoh., Pingv. gador. |

Oversigt.

sation.

behandlede med Mercur.

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|---|
| <p>U⁵⁶. Paa Randen af Lab. majus 2 sammenhængende, røde, noget ophviiede, overhudede Pletter, som Residua efter Tuberc. mucosa. Forøvrigt Alt vel.</p> | <p>U⁵⁹ (behandlet for Urethrit i Hospit.) Intet syph. Sympt. Hun er flere Gange behandlet for Urethr., er fremdeles Puella publ. og frisk (<i>Holst</i>) i Mai 1860, liges. April 1863. <i>J. Vogt</i>.</p> | <p>Indk. $\frac{7}{8}$ 55, udskr. $\frac{1}{8}$ 56 = 132.</p> |
| <p>U⁵⁶. Tuberc. mucosa om Anus; Intet paa Lab. majora; hæs Stemme; hvidlige Excoriationer paa Crus ant. veli palat.; sundt Udseende.</p> | | <p>Indk. $\frac{7}{8}$ 55, udskr. $\frac{1}{8}$ 56, efter at have gennemgaaet en Pneumonie = 147 Dage.</p> |
| <p>U⁵⁶. Ingen Symptomer af Syphilis. Barnet har et sundt Udseende. — U⁵⁷. Intet syphilitisk Symptom. Befindendet godt; Abdomen expanderet. Afføringen jevnlig løs. Benytter fremdeles Tran.</p> | <p>Barnet døde i Børnehospitalet, uden Symptomer paa Syphilis, efter Sigende af Pneumonie, efter at være inoculeret med syphilitisk Materie af Prof. <i>Faye</i>.</p> | <p>Fra $\frac{7}{8}$ — $\frac{7}{8}$ 55 behandlet i Hospitalet for et Ulcus syph. paa Underlæben localt og med Bade. — Indk. $\frac{7}{8}$ 55, udskr. $\frac{7}{8}$ 56 = 194 Dage. — Recidiv $\frac{7}{8}$ 56, udskr. $\frac{7}{8}$ 57. = 153 Dage.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 4 | 7 | 25 Md. | Ulcerationes præputii & scroti; Tuberc. mucosa om Anus; Hudtuberkler ved Haarranden paa Hovedet; Ulcerationer paa Tonsillerne, hovne Nuchalglandler. $\frac{1}{2}$ 56. Ulcera crustosa i Pars capill. capitis. | $\frac{2}{10}$ 55 | 160 | | |
| 5 | 8 | 22 Md. | Ulcus præputii; Roseola syphilitica; hovne Inguinalglandler; Rubor pharyngis. $\frac{1}{2}$. Paa Penis et serpiginoest-crustøst Saar; paa Tonsillerne og Velum hvidligt Belæg. Scabies paa Extremiteterne. | $\frac{1}{1}$ 56 | 105 | | |
| 6 | 9 | 29 Md. | Ulcerationer paa Glans; Tuberc. mucosa paa Nates, Scrotum, i Perinæum, om Anus; i Panden et Par Pletter; graat Belæg paa begge Tonsiller. | $\frac{1}{1}$ 56 | 109 | | |
| 7 | 12 | 24 Qd. | Tuberc. mucosa paa Genitalia; et Saar paa Velum palat; Rubor og Svulst i Slimhinden. $\frac{1}{2}$. Alopecia. | $\frac{1}{1}$ 55 | 129 | | |
| 8 | 14 | 7 Ug. Md. | Papulo-pustuløst Exanthem. $\frac{1}{2}$. Paa Laarene, Nates, Scrotum og Anus eleverede, store runde Maculæ og superficielle Ulcera. $\frac{1}{3}$. En liden Excoriation paa Raphe (Scrotum). | $\frac{3}{1}$ 56 | 121 | | |

Patientens Tilstand paa den Dag, Committee's sidste Gang saae ham paa Hospitalet.

Senere Efterretnin-
ger om Patienten.

Anmærkninger.

§ 56. Ulcera paa Hovedet borte. Paa Scrotum et Par hovne Follikler, bedækkede med smaae Cruster. Hans Befindende forøvrigt godt.

Frisk 1862. (Prof. W. Boeck.)

Indk. § 55, udskr. § 56.
= 161.

§ 56. Arret efter Saaret paa Penis hypertrophisk, men blødt. Begge Tonsiller ujevne og belagte med et meget tyndt hvidligt Exsudat.

Indk. § 56, udskr. § 56.
= 107.

§ 56. Tomterne ved Anus fremdeles noget ophøiede. I Halsen intet hvidligt Belæg. Befinder sig vel.

Indk. § 56, udskr. § 56.
= 110.

§ 56. Haaret voxer rask frem. Hendes Udseende særdeles godt. Hovedpine i høire Tinding og i Tænderne. Ellers Intet.

§ 57. Hun er indlagt i Hospitalet med et Barn, 1 Maaned gammelt, der lider af Syphilis, og hvis Fader ikke skal have været syphilitisk. Hun er frisk. (§ 58 — § 58). Hun skal være frisk og frugtbar.

Indk. § 55, udskr. § 56.
= 130.

§ 56. Fremdeles nogen Bronchit. 2 smaa Excoriationer paa Palatum durum; paa Scrotum en farvet Flek efter det før omtalte Saar.

Indk. § 56, udskr. § 56.
= 121.

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syph- lisationens Begyndelse | Varighed i Dage. | | |
| 9 | 19 | 25 Md. | Tuberc. mucosa paa Scrotum og højre Laar; Exulceration paa Velum palat. $\frac{1}{2}$. Tuberc. mu- cosa om Anus. $\frac{3}{4}$. Paa Læben et lidet Saar. | $\frac{8}{11}$ 55 | 160 | Lapis infernalis, Fotus aqvosus. | $\frac{1}{8}$ 56 til $\frac{3}{7}$ 56. 2 tuberkellig- nende Eleva- tioner paa Palatum molle med Rødhed i Omkredsen. Beh. i 40 D. med Acetum aromat. og Ess. gentianæ. |
| 10 | 21 | 56 Md. | Svullen Præput., Phimo- sis. Tuberc. mucosa paa Scrotum; Roseola paa Ryggen. Hist og her paa Kroppen furunculose Cellevævsbetændelser. $\frac{1}{2}$. Begyndende lyst Overtræk paa begge Ton- siller. $\frac{1}{4}$. Tuberc. mu- cosa ved Anus. | $\frac{1}{2}$ 56 | 113 | Lapis infernalis, Fotus aqvosus, Solut. calcar. chlor. | |
| 11 | 23 | 46 Qv. | Rødhed, Svulst og over- fladiske Exulcerationer med graat Belæg i Svæl- get. $\frac{3}{4}$. Papler paa Læg- gene. $\frac{1}{2}$. Ved højre Næsebor et crustøst Saar. $\frac{3}{4}$. Superficielt Saar paa Underlæben og Tungens Underflade. | $\frac{4}{5}$ 56 | 118 | | 1ste Rec. $\frac{3}{8}$ 56 til $\frac{3}{8}$ 57. Paa Underlæbens Slimhinde en Ulceration med indureret Bund og Om- kreds; Tuberc. mucos. paa Lab. maj. dext. $\frac{1}{16}$. Exulcerat. paa Tungens Underflade. $\frac{1}{16}$. Papuløst Exanth. Beh. i 153 D. med Syphilisation, Infus. sennæ, Ol. ricini, Si- napismus, Lap. int., Sol. chlor. amm., Pulv. cinch. c. opio. Ungv. lap. inf. 2det Rec. $\frac{1}{16}$ 57 til $\frac{3}{8}$ 58. Syph. Exanth. paa |

Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet.

Senere Efterretnin-
ger om Patienten.

Anmærkninger.

1^o 56. Saaret paa Læben synes at være overhudet, men har endnu sin gamle Begrændsning.

2^o 56. Som i Journalen anført.

Indk. 1^o 55, udskr. 1^o 56.
= 162.

Recidiv. Indk. 1^o 56,
udskr. 2^o 56. = 40.

3^o 56. For 3 Uger siden opereredes han for Phimosis, Saaret ikke ganske tilhelet; haarde Armas-
ser i Omkredsen. Tyndt hvidligt Belæg paa Tun-
sillerne. Paa Scrotum ingen Tuberc. mucosa.

Indk. 3^o 56, udskr. 4^o 56.
= 117.

4^o 56. Saarene i Næsen tilhelede. Saaret under Tungen meget større; toucheres.

5^o 57. Et Par hvide Flek-
ker paa Tungen, hvor Ulcerationerne have væ-
ret, og see ud som Ar.

6^o 58. Endnu lysbrune
Flekke paa Extremitet-
terne og paa Hagen.
Saaret paa Benet gjen-
groet.

7^o 59. E. Tertier-
syphilitisk Exanthem
paa højre Side af
Ansigtet. Har i den
senere Tid brugt Kali
hydroiod.

Fra 1^o til 3^o 55 laae med
sit syphilitiske Barn i
Hospitalet, uden at være
syg; dengang dog et
Saar i højre Mundvinkel,
som helede ved local
Behandling.

Indk. 7^o 56, udskr. 8^o 56.
= 145.

Recidiv. Indk. 1^o 56,
udskr. 3^o 57. = 143.

Recidiv. Indk. 1^o 57,
udskr. 2^o 58. = 168.

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjønn. Aar. | Symptomer. | Behandling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|-------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 12 | 26 | 25 Qv. | Roseola syphilitica; Maculæ elevatae; Tuberc. mucosa paa Genitalia; superficielle Ulcerationer i Svælget. | 1855 | 115 | | |
| 13 | 29 | 23 Qv. | Tuberc. mucosa paa Lab. majora; maculo-papulöst Exanthem, et stort Saar paa højre Brystvorte; Ulcerationer paa Tonsillerne; crustøse Saar i Hovedet. $\frac{1}{4}$. Iritis dextra. | 2356 | 117 | | |
| 14 | 30 | 15 U. Qv. | Maculo-vesiculöst Exanthem; Tuberc. mucosum ved Anus. | 356 | 109 | | |
| 15 | 33 | 35 Qv. | Tuberc. mucosa paa Genitalia; papulöst Exanthem paa Legemet; hvidgraae Exsudater paa højre Tonsille. $\frac{2}{3}$. Iritis dextra. $\frac{3}{4}$. Paa Underlæbens Slimhinde en Ulceration; ligeledes paa Palatum durum. | 356 | 213 | | |
| 16 | 35 | 28 Qv. | Tuberc. mucosa paa Genitalia og ved Anus; graahvidt Exsudat paa Tonsillerne; Roseola; papulöst Exanthem paa Ryggen, i Nakken og ved Haarranden; i Hovedet crustøse Saar. | 2056 | 188 | | |
| 17 | 36 | 57 Qv. | Læberne hovne; i begge Mundvige luxurerende, overhuede Papiller, siddende paa en forhen ulcereret Bund; paa begge Læbers Slimhinde smaae Saar; Rødhed i Svælget. | | | Lapis infernalis. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|-------------------------------------|---|
| § 56. Helbredet. | | Indk. § 55, udskr. § 56. = 115. |
| ¶ 56. S. Exanthemet saagodtsom forsvundet, ubetydelige Tomter; temmelig betydelig Alopecia; Udseendet godt. Befinder sig særdeles vel. | | Indk. ¶ 56, udskr. ¶ 56. = 117. |
| ¶ 56. S. Excoriationerne tilhelede; kun Tomter tilbage. Barnet ellers fuldkommen friskt, men seer noget blegt ud. | | Indk. ¶ 56, udskr. ¶ 56. = 117. |
| ¶ 56. V. I den høire Iris's Pupillarrand endeel sorte Fryuder; seer godt paa dette Øie. Saaret paa Underlæben tilhelet. Et Par catarrhalske Excoriationer i Næsehorene; Intet ved Genitalia og Anus. | | Indk. § 56, udskr. ¶ 56. = 213. |
| ¶ 56. V. En hoven Nuchalglandel paa venstre Side. Intet Symptom i Fauces, Munden, ved Genitalia og Anus. | | Indk. ¶ 56, udskr. ¶ 56. = 189. |
| ¶ 56. I Mundvigen og paa Læberne, som anført. Tonsillerne og Uvula noget hovne, af blegrød Farve og belagte med et meget tyndt hvidt Exsudat. | | Fra § 55 til ¶ 56 behandlet med Syphilisation for secundær Syphilis. Indk. ¶ 56, udskr. § 56. = 28. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjønn. | Symptomer. | Behandling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------|---|---------------------------------|-----------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage | | |
| 18 | 39 | 21 Md. | Ulcus glandis; Phimosi med Excoriationer; i høire Inguen en Bubo, i den venstre en mindre; Roseola paa Legemet. $\frac{1}{7}$. Maculöst-desquame- rende Exanthem paa Kroppen; Ulceration paa høire Tonsille. | $\frac{2}{8}$ 56 | 77 | Chlorvand Ess. opii simplex. | |
| 19 | 42 | 24 Md. | Tuberc. mucosa paa Scrotum og ved Anus; hovne Glandler i høire Inguen; 3—4 overfla- diske Ulcerationer paa Brystet. $\frac{1}{8}$. Papulöst Exanthem paa Brystet; Excoriation paa Velum palat; hovne Nuchal- glandler; paa Glans og Præput. Excoriationer. | $\frac{2}{8}$ 56 | 192 | Lapis infernalis. | |
| 20 | 43 | 8 Ug. Md. | Maculo-papulöst Exan- them. | $\frac{5}{8}$ 56 | 85 | | |
| 21 | 46 | 27 Md. | Tuberc. mucosa paa Pe- nis, Scrotum og ved Anus; Induration i Præ- putium; Roseola. | $\frac{2}{8}$ 56 | 105 | | |
| 22 | 47 | 24 Md. | Ulceration paa Glans; Tubercula mucosa om Anus; hovne Inguinal- glandler; Exsudat paa Tonsillerne. | $\frac{1}{8}$ 56 | 133 | | |
| 23 | 49 | 24 Md. | Roseola syphilitica; Tu- berc. mucosa ved Anus; Exsudater paa begge Tonsiller; papulöst Ex- anthem i Pars capill. capitis. $\frac{1}{7}$. Tuberc. mu- cosa paa Scrotum. | $\frac{1}{8}$ 56 | 91 | | |
| 24 | 52 | $\frac{1}{4}$ Qv. | Crustöst Exanthem med Ulcerationer i Ansigtet, paa Laarene og Nates. Udflod af Næsen; Ema- ciation. | $\frac{2}{8}$ 56 | 135 | Bad, Solut. chlor. ferr. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeens sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|---|--|
| § 56. Saarene paa Penis næsten tilhelede; begyndende Ulcerationer paa Scrotum. Paa Kroppen, især Crura, og i Ansigtet et desquamerende Exanthem af brun Farve. Paa Uvula en Ulceration. | V. N. Magaz. f. Lægevidsk. 1860, Side 938 og 939. | Indk. $\frac{2}{8}$ 56, udskr. $\frac{1}{8}$ 56, efter eget Forlangende. = 77 Dage. Behandlingen fortsattes af Wildhagen i Drammen fra $\frac{1}{8}$ — $\frac{23}{11}$. Recidiv i December s. A. Indifferent Behandling. Har senere forladt Landet. |
| § 56. E. Ingen syphilitiske Phænomenener. Arrene paa Scrotum endnu noget haarde. | †† 60. E. Befinder sig vel. | Indk. $\frac{2}{8}$ 56, udskr. $\frac{1}{11}$ 56. = 192. |
| § 56. S. Fuldkommen frisk og i godt Huld. | | Indk. $\frac{1}{8}$ 56, udskr. $\frac{1}{8}$ 56. = 85. |
| § 56. Alle Symptomer svundne. | | Indk. $\frac{2}{8}$ 56, udskr. $\frac{1}{11}$ 56. = 106. |
| § 56. S. Glandulæ inguinalis noget hovne. Alle syphilitiske Symptomer forsvundne. Almeenbefindendet godt. | | Indk. $\frac{1}{8}$ 56, udskr. $\frac{1}{11}$ 56. = 134. |
| †† 56. S. Paa venstre Tonsille en hvid Plet. Befindendet godt. | § 57. E. og S. Intet syphilitisk Symptom. Han ligger i Hospitalet for en Gonorrhoe. | Indk. $\frac{1}{8}$ 56, udskr. $\frac{1}{11}$ 56. = 92. |
| †† 56. Almeenbefindendet bedre. Hæsheden ubetydelig eller næsten borte. | | Indk. $\frac{2}{8}$ 56, udskr. $\frac{1}{11}$ 56, da hun døde af Erysipelas faciei, der begyndte den $\frac{1}{11}$. = 136. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 25 | 53 | 19 Qv. | Tuberc. mucosa ved Anus og i Rima natium; graae Ulcerationer i Fauces; hovne Cervicalglandler. 2 ^o 57. En superficial Excoriation paa Under- læbens Slimhinde. | 2 ^o 56 | 198 | Lapis infernalis. | Recidiv, be- handlet af J. Vogt med Kali hydroiod. |
| 26 | 54 | 21 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia og ved Anus; hvide Exsudater paa Ton- sillerne; hovne Cervi- calglandler. | 2 ^o 56 | 100 | | |
| 27 | 56 | 18 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia; Exsudat paa Ton- sillerne; papuløst Exan- them; hovne Cervical- glandler. | 1 ^o 56 | 149 | | |
| 28 | 57 | 1 ^o Md. | Crustøst, squamøst, ex- ulcererende Exanth. paa Extremiteterne og i An- sigtet. Barnet magert og daarligt. | 1 ^o 56 | 23 | Calomel gr 1/8 m. & v. | |
| 29 | 58 | 20 Qv. | Tubercula mucosa ved Anus; Svulst og Exco- riationer omkring Orif. urethræ; Rubor faucium, smaa Excoriationer og Exsudater paa Tungen; hovne Cervicalglandler. | 2 ^o 56 | 96 | Lapis infernalis. | |
| 30 | 59 | 23 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia, ved Anus og paa Laarene; maculøst Ex- anthem paa Kroppen; graae Exsudater paa Tonsillerne; paa Benene crustøse Saar (ogsaa for de syphilitiske Sympto- mer begyndte). | 2 ^o 56 | 161 | Vesicator. Emulsio camphor. | 1 ^o 58 til 2 ^o 59. Større og mindre urene Saar paa begge Been, der ere blaa- lig-røde; op- staaede efter Contusion. Beh. i 42 D. m. Syphilisat. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|---|--|
| § 57. Exsudatet paa Underlæben borte. Intet syphilitisk Symptom at opdage. De artificielle Saar tilhelede. | Mai 1860. Har lidt af constitutionel syphil. Udslet (<i>Vogt</i>). | Indk. 3 ^o 56, udskr. 4 ^o 57, = 199. |
| § 56. V. Intet i Halsen, ved Genitalia, ved Anus. Inoculationssaarene ikke aldeles tilhelede. | I Slutningen af 1859 frisk; ligeledes April 1863. (<i>J. Vogt</i>). | Indk. 3 ^o 56, udskr. 4 ^o 56, = 101. |
| § 56. Alle syphil. Sympt. svundne; Pigmentpletterne i Huden, paa Ryggen og i Nakken mindre tydelige. Haaret holder fastere. | 159 fødte hun et Barn i Stiftelsen, som fik Syph. heredit. aperta, og døde i Børnehosp. 1 ^o . Faderenskal have haft Syphilis. | Indk. 4 ^o 56, udskr. 4 ^o 56, = 149. NB. Necrosis partialis tibiae dextræ. |
| 3 ^o 56. Kræfterne aftage. Barnet afmagres. Trøske i Munden. Raucedo. | | Indk. 3 ^o 56, udskr. 3 ^o 57, da det døde under Kramptilfælde. = 32. |
| 1 ^o 56. Inoculeres ikke mere. | 3 ^o 58. Hun fødte i Stiftelsen iforgaars et Barn, som døde igaar. Committeeen saae Liget idag: i Huden var smaae Blodextravasater. | Indk. 3 ^o 56, udskr. 4 ^o 56, = 96. |
| § 57. V. Alle syphilit. Symptomer svundne; kun Tomter efter Tuberc. mucosa ved Anus. Tonsillerne fremdeles hypertrophiske. Befindet det godt. | | Indk. 3 ^o 56, udskr. 4 ^o 57, = 165. |
| § 59. Saarene paa Benene tilhelede; Arrene blaalige. | | |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 31 | 60 | 20 Md. | Phimose; Induration i Præput.; i dets Rand Tuberc. mucosa. Tu- berc. mucosa paa Penis, Scrotum og ved Anus. Roseola. Hvidt Belæg paa Tonsillerne. Hovne Nuchalglandler. Papulo- pustuløst Exanthem paa Hovedet. | $2\frac{1}{2}$ 56 | 123 | | |
| 32 | 61 | 18 Md. | Røde Cicatricer paa Glans og Præputium; Roseola syphilitica; hovne In- guinalglandler; skjælbe- dækkede Maculæ i Pan- den og paa Scrotum; Ulcerationer paa Ton- sillerne. | $2\frac{1}{2}$ 56 | 131 | | |
| 33 | 62 | 23 Md. | Ulcera glandis; Belæg paa højre Tonsille; hovne Nuchalglandler; begyn- dende Alopecie. | $3\frac{1}{2}$ 56 | 149 | | |
| 34 | 64 | 26 Md. | Ulceration paa Velum palat.; Alopecie; cru- støse Saar i Hovedet; hovne Nuchalglandler; Tubercula mucosa ved Anus; Blennorrh. urethr. | $2\frac{3}{4}$ 56 | 113 | Solut. nitrat. argent. | |
| 35 | 65 | 31 Md. | Ulcera glandis & præ- putii; Tuberc. mucosa paa Penis, Scrotum, Laa- rene og ved Anus; Pso- riasis syphilitica; Corona syphilitica; Saar i Ho- vedet; hovne Inguinal- og Nuchalglandler, Ru- bor faucium. | $1\frac{1}{2}$ 56 | 124 | Lapis infernalis, Wiener- pasta. | |

Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet.

Senere Efterretnin-
ger om Patienten.

Anmærkninger.

156. En circular Ex-
coriation paa Velum pa-
latin. Forresten intet
Symptom.

Indk. 56, udskr. 56.
= 125.

156. S. Intet i Hal-
sen. Gland. nuchales &
inguinales ubetydeligt
hovne. Et enkelt lidet
crustöst Saar i Pars ca-
pill. capitis; Haaret fal-
der ikke af. Intet paa
Penis. Befindendet
godt.

Indk. 56, udskr. 56.
= 132.

156. Den høire Ton-
sille hypertrophisk; Nu-
chalglænderne paa ven-
stre Side fremdeles no-
get hovne. Intet syphi-
litisk Symptom forresten.
Befindendet godt.

Indk. 56, udskr. 56.
= 152.

156. S. Aldeles frisk.

159. S. Paa begge
Underextr. blaarøde,
desquamerende til-
deels ophøiede Plet-
ter; paa høire Arm
en liden rød Plet.

Indk. 56, udskr. 56.
= 114.
Exanthemet næsten for-
svundet i April 1863.
Steffens.

156. S. Omkring Anus
nogen Rødhed og en
enkelt rød Excoriation;
Pletter efter Exanthemet
paa Ryggen synlige;
Almeenbefindendet godt.

Indk. 56, udskr. 56.
= 127.

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 36 | 67 | 36 Md. | 2 Ulcera præputii. $\frac{1}{8}$. Papuløst Exanthem. $\frac{1}{9}$. Crustøse Saar i Ho- vedet; Tuberc. mucosa ved Anus. $\frac{1}{10}$. Ulcererende Flader paa den indvendige Side af Kinderne. $\frac{1}{11}$. Excoriation paa Pa- latum durum. | $\frac{1}{8}$ 56 | 157 | Vesic. nuchæ. | |
| 37 | 69 | 21 Qv. | Tuberc. mucos. geni- talium; hovne Tonsiller med hvidt Exsudat. $\frac{1}{11}$. Papuløst Exanthem i Ansigtet. $\frac{1}{12}$ 57. Superficielt Saar i høire Mundvinkel. $\frac{2}{8}$. Paa Membr. posterior pharyngis flere ophøiede, hvidbelagte Pletter. | $\frac{2}{8}$ 56 | 371 | Lapis infernalis. | |
| 38 | 70 | 9 $\frac{1}{2}$ Qv. | Paa Forfladen af venstre Tibia en rundagtig, smer- tefuld Hævelse; rhachi- tisk Krumning; ujevn Flade. | $\frac{1}{8}$ 56 | 110 | Heft- plaster. | |
| 39 | 75 | 23 Md. | Ulcererende Tuberc. mu- cosa paa Scrotum og ved Radix penis; paa venstre Overarm et Ul- cus; Haaret falder af. Medfødt Phimosis; Varus sinister; Atrophie af venstre Crus og Laar; flere Ar paa venstre Un- derextremitet efter Be- skadigelser. | $\frac{2}{8}$ 56 | 48 | Catapl. emoll., Solut. calcar. chlor. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|---|
| <p>§57. Et superficielt Saar paa Præputium og et paa Glans penis; et Tuberc. mucosum ved Anus; i Halsen Rødhed, superficielle Excoriationer med hvidligt Belæg.</p> | | <p>Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. $\frac{1}{2}$ 57. = 189.</p> |
| <p>§57. Pletterne, der nogle Gange ere blevne toucherede, ere neppe synlige. Ellers Alt vel.</p> | <p>I Mai 1860 frisk.</p> | <p>Indk. $\frac{2}{3}$ 56, udskr. $\frac{1}{4}$ 57. = 371. $\frac{1}{2}$g. Morbilli. Phagedænisme i Inoculationssaarene paa Laarene.</p> |
| <p>$\frac{2}{3}$ 56. Krumningen af Tibia som forhen. Hævelsen borte. Befindendet godt.</p> | <p>I Mai 1860 frisk.</p> | <p>Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. $\frac{1}{3}$ 56. = 126.</p> |
| <p>$\frac{1}{2}$ 56. St. Saaret paa Armen i god Tilheling; ved Siden af er en Incisionsaabning. Saarene ved Radix penis uforandrede. Paa begge Nates og i Rima vesiculöst Exanthem paa en rødbrunlig Bund. Befinder sig vel, men Udseendet cachectisk.</p> | <p>Mai 1860. Efter Beretning blev Syphilisationen fortsat i Hjemmet og Sygdommen derved helbredet. (W. Boeck.)</p> | <p>Indk. $\frac{2}{3}$ 56, udskr. $\frac{1}{2}$ 56, efter Forlangende. = 49.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 40 | 76 | 26 Md. | Tuberc. mucosa præputii; Ulcus glandis; Tuberc. mucosa scroti & ani; hovne Inguinalglandler; en suppurerende Bubo i venstre Inguen; tyndt Belæg i Fauces; hovne Nuchalglandler; Roseola syphilitica; crustøse Pap- ler i Hovedet; superfi- cielt Saar paa Overlæ- ben; crustøst Saar paa Septum nasi. | $\frac{1}{9}$ 56 | 61 | Solut. calcar. chlor. Ungu. ceræ | |
| 41 | 81 | 18 Qv. | Tuberc. mucosa paa La- bia majora og om Anus. | $\frac{1}{9}$ 56 | 125 | | |
| 42 | 82 | 22 Md. | Tubercula mucosa ved Anus; et Par Excoria- tioner ved Frenulum pe- nis; hvidt Belæg paa Tonsillerne; hovne Gland- ulæ cervicales; Haaret falder af; Blennorrhoea urethralis. $\frac{2}{3}$. I høire Inguen og i høire Axilla en Bubo. | $\frac{1}{9}$ 56 | 125 | Bals. co- paivæ, Morphium, Sinapisme, Catapl. emoll. | |
| 43 | 84 | 46 Md. | 2 overfladiske indure- rede Excoriationer paa Præputiums Slimhinde; i Analaabningen et Par overfladiske Ulceratio- ner; Gland. ingu. & cervical. hovne; Haaret falder af; Excoriation ved høire Mundvinkel, paa hver Side af Tun- gens Underflade. | $\frac{1}{9}$ 56 | 151 | | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin- ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|--|--|
| <p>U⁵⁶. Mange syphilitiske Symptomer fremdeles tilstede.</p> | <p>U⁵⁷. Har benyttet 7 Fl. Solut. iodeti kalici; inoculeres med god Virkning. Symptomerne have ikke undergaaet nogen væsentlig Forandring, dog er Exanthemet betydelig aftaget. Befindendet godt.</p> | <p>Indk. U⁵⁶ 56, udskr. U⁵⁶ 56, efter Forlangende. = 61. — Syphilisationen fortsattes af Dr. Heiberg i Moss. — Frisk 1862. W. Boeck.</p> |
| <p>U⁵⁷. V. Tomter efter Tubercula mucosa ved Anus og paa Labia majora. Frisk.</p> | <p>Frisk 1861. A. Holst.</p> | <p>Indk. U⁵⁶ 56, udskr. U⁵⁷ 57. = 125.</p> |
| <p>U⁵⁷. St. Intet ved Anus og paa Genitalia; Haaret noget tyndt, og falder noget af. Lidt Rødhed og Svulst paa Crus anter. dextr. veli. Befindendet godt.</p> | | <p>Indk. U⁵⁶ 56, udskr. U⁵⁷ 57. = 127.</p> |
| <p>U⁵⁷. S. Paa Tungens øvre Flade ved den venstre Rand en liden hvid Excoriation, og ligeledes en paa den tilsvarende indvendige Flade af venstre Kind. De øvrige syphilitiske Symptomer svundne. Almeenbefindendet godt.</p> | | <p>Indk. U⁵⁶ 56, udskr. U⁵⁷ 57. = 152.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilitationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 44 | 85 | 27 Md. | Desquamerende papulöst Exanthem paa Krop og Extremiteter og i An- sigtet; pigmenterede Pletter efter foregaaende Exanthem; hovne Gland- ler i Inguina, Nakken og langs den indre Rand af Musc. biceps paa begge Arme; Svulst i begge Fod- og Haand- led. | $\frac{2}{9}$ 56 | 166 | Ess. guaj. Ess. gent. Æth. alco- hol., Empl. conii, Balnea vaporosa, Vesicator., Sol. iodeti kalici. | |
| 45 | 87 | 21 Qv. | Flere smaae Ulceratio- ner paa den indvendige Side af begge Labia majora. $\frac{1}{9}$. Roseola syphilitica. $\frac{2}{9}$. Tuberc. mucosa paa Labia ma- jora; paa den venstre Tonsille Excoriation. $\frac{1}{11}$. I Analsaabningen et Ulcus. | $\frac{2}{9}$ 56 | 125 | Lap. inf. | |
| 46 | 89 | 2 Md. | Tubercula mucosa ved Anus; paa Underlæben og i den høire Mund- vinkel temmelig store Ulcerationer; Ulceratio- ner paa Tonsillerne. | $\frac{2}{9}$ 56 | 139 | Mucilag. orchid., Ess. opii simpl., Lap. inf., Inf. rheor. c. Æther alc., Solut. citr. kalici. | |
| 47 | 90 | 28 Qv. | Hvidt Exsudat paa den venstre Tonsille; om- kring venstre Papilla en blaarød Cicatrice efter et Saar. | $\frac{1}{10}$ 56 | 132 | Fotus fri- gidus, Si- napisme, Laxans, Morphium Chlorof., Hirud., Mucilag. orchid. c. Ess. opil. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin-ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|--|---|
| <p>1857. Hele Huden er rødligpigmenteret. Venstre Fodled noget hovent, og er ikke ganske smertefrit ved Gangen. Capselen fortykket i venstre Knæled. Befindendet godt.</p> | <p>1857. Pletterne fremdeles synlige, men maaskee mindre fremtrædende. Begge Fodled hovne og besværliggjøre Gangen. Udseendet taalelig friskt. Mai 1860 frisk. (W. Boeck.)</p> | <p>Fra 1855 til 1855 syphileret for primære og secundære Tilfælde. Indk. 1856, udskr. 1857. = 166.</p> |
| <p>1857. V. Haaret falder af. Intet i Munden og Fauces, ved Genitalia og Anus.</p> | <p>1857. Barnet er frisk og har ikke lidt af syphilitiske Phænomenen. Moderen ligger nu i Chr. Byes Sygehuus for Periostit i Maxilla infer. efter en cariøs Tand. Hun har været frisk.</p> | <p>Behandlet i 1855 for primær Syphilis. Indk. 1856, udskr. 1857. = 186. 1856 fødte hun et fuldb. Barn.</p> |
| <p>1857. V. Stemmen fremdeles hæs. Intet syphilitisk Symptom.</p> | | <p>Indk. 1856, udskr. 1857. = 139.</p> |
| <p>1857. V. Intet syphilitisk Symptom.</p> | | <p>Indk. 1856, udskr. 1857. = 139.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilitationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 48 | 91 | 19 Qv. | Tuberc. mucosa genital. † 57. Tuberc. mucosa ved Anus. | 29/56 | 190 | Acetas morph. | . |
| 49 | 93 | 20½ Md. | Næsten hele venstre Laar udgjør en Cicatrice, som egentlig er sammensat af flere mindre Ar. Inde i denne Cicatrice mang- foldige større og mindre Ulcera; paa højre Over- arm ligeledes Cicatricer og Ulcera; ligeledes paa højre Been; Ulceration paa Septum nasi og i Fauces. | 21/56 | 174 | Sol. iodeti kalici. | |
| 50 | 94 | 24 Md. | Svulne Inguinalglandler; hvidt Exsudat paa højre Tonsille; svulne Cervi- calglandler; crustøst Ex- anthem i Hovedet. ††. Fissurer i Analaab- ningen. | 10/56 | 203 | Lap. inf., Sol. calcis chlor., Ung. oxyd. hydrarg., Sol. Lap. inf., Bals. copaivæ, Sapo virid. Inf. salviæ, Sol. chlor. kal., Acid. nitric., Ve- næsectio, Fot. frigid., Calomel- laxans, Sol. nitr. kalici, Vesicat., Clyisma evac., Inf. sennæ, Sol. sulph. magnes., Sol. iodeti kalici. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin-ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|---|
| 157. V. Tomterne efter Tuberc. mucosa ved Genitalia noget ophøiede. | 158. S. Hun fødte 158 i Stiftelsen, og led af Inflammation i Underlivet. Barnet atrophisk med Ophth. neonator. paa begge Øine, men uden syphilitiske Symptomer. Det døde i Slutningen af August i Børnehospitalet. | Indk. 156, udskr. 157. = 192. I Slutn. af 1859 tjente hun i Bodsfængslet, og var frisk (Vogt). |
| 157. S. Alle Sår tilhelede. Cicatricerne paa enkelte Steder meget røde og infiltrerede, Almeenbefindendet godt. | | Indk. 156, udskr. 157. = 176. Er efter Broderens Beretning fuldkommen frisk 1862. |
| 157. S. Alle syphilitiske Symptomer forsvundne. Befinder sig fuldkommen vel. | | Indk. 156, udskr. 157. = 206. Phagedænisme i Saarene. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilisationens begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 51 | 95 | 23 Md. | Ved Corona glandis en indureret Cicatrice; cru- støst Exanthem i Hove- det; Haaret falder af; Roseola. $\frac{1}{11}$. Papler i Panden. $\frac{7}{11}$. De pha- gedæniske Saar have faaet Udseende af ser- piginøse. | $\frac{1}{10}$ 56 | 190 | Sol. calc. chlor., Fot. resolv., Ess. opii simpl., Decoct. chin. acid. Inf. saleb. c. Ess. opii simpl., Ungu. ceræ c. Opio, Fotos vini aromatic. Sol. iodeti kalici, Sol. nitrat. arg. Sulph. chinin. | |
| 52 | 96 | Md. | Et ikke tilhelet Saar ved Frenulum præputii; Tu- berci. mucosa paa Penis, Scrotum og i Perinæum; hovne Inguinalglandler; maculo-papuløst Exan- them paa Krop og Ex- tremiteter; pustuløst Ex- anthem i Panden; Cru- ster i Hovedet; dybe Ulcerationer paa Ton- sillerne. | $\frac{7}{10}$ 57 | 135 | | |
| 53 | 100 | 29 Qv. | Ved Basis af venstre Papilla mammæ et Saar, et mindre Saar paa Spid- sen af Papilla. $\frac{1}{11}$. Cru- støse Saar i Hovedet; Roseola. $\frac{1}{11}$. Ulceration paa Underlæben. $\frac{7}{11}$. Saar paa Overlæben, paa Palatum durum. $\frac{3}{11}$ 57. Hævelse i Haand- ledene. $\frac{5}{11}$. Papulo-ve- siculøst Exanthem i An- sigtet. | $\frac{1}{11}$ 56 | 256 | Lap. inf., Lap. cau- sticus, Sol. chlor. ferr. Sol. sulph. cupr., Inf. fol. hyosc. Sol. chlor. kal., Fetus resolv., Sol. iodeti kal., Liqv. Bellosti, Derivation | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|---|
| <p>2^o 57. S. Alle syphilitiske Symptomer svundne. Almeenbefindendet godt.</p> | | <p>Indk. 2^o 56, udskr. 2^o 57. = 201. Phagedænisme i Inoculationsaarene.</p> |
| <p>2^o 57. Paa den bagerste Side af højre Laar tæt ved Rima natium et lidet superficielt Saar, uden bestemt Charakter, og hvorom Patienten selv ikke veed Besked. Ellers Alt vel.</p> | | <p>Indk. 2^o 56, udskr. 2^o 57. = 138.</p> |
| <p>2^o 57. S. Intet i Fances. En rund, hvid Plet paa Slimhinden af Lab. inferioris, ikke excorieret. Befindendet godt.</p> | <p>2^o 58 indkom hun i Hospitalet med et 3 Uger gammelt syphilitisk Barn. Hun var frisk.</p> | <p>Indk. 2^o 56, udskr. 2^o 57. = 278. Phagedænisme i Saarene.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 54 | 101 | 21 Qv. | Den højre Nymfhe noget opsvulmet; paa dens Indside 2 Cicatricer. I den højre Laarbøining Spor efter et Tuberc. mucos. og paa flere Steder bruunfarvede Pletter. Paa Overlæbens Slimhinde et rundt Saar. $\frac{1}{2}$. Tuberc. mucosa ved Anus. | $\frac{2}{3}$ 56 | 156 | Lap. inf. | |
| 55 | 106 | 34 Qv. | Tuberc. mucosa paa Lab. majora; paa begge Papillæ mammar. smaae runde Ulcerationer; paa begge Tonsiller udbredte Ulcerationer; hist og her paa Huden rødgraae Pletter. $\frac{1}{2}$. Suppurerende Bubo i venstre Inguen. | $\frac{1}{2}$ 56 | 190 | Sol. chlor. ammoniac., Pulv. eccopr., Lap. inf., Alum. ust. | |
| 56 | 107 | 1 $\frac{1}{2}$ Qv. | I begge Mundvinkler Ulcerationer; begge Tonsiller svulne med Exsudater; svulne Nuchal- og Submaxillarglandler; paa Labia majora og ved Anus Ulcerationer; paa Pars capill. capitis temmelig store gulgraae Skorper og enkelte Pustler; pustuløst Udslag hist og her i Ansigtet. $\frac{2}{3}$. Absces under venstre Ang. maxillæ. | $\frac{1}{2}$ 56 | 190 | Inf. rheor. c. Æther alcohol., Ol. jecor. aselli, Mixt. alba, Ungu. nitr. argent. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|-------------------------------------|--|
| <p>37 57. V. Intet syphilitisk Symptom. En Excoriation paa høire Side af Gingiva superior ved en cariøs Tand, er rimeligviis en Fistel.</p> | | <p>Indk. 37 56, udskr. 37 57. = 156.</p> |
| <p>37 57. V. Intet ved Genitalia og Anus. Et Udslag over Øienbrynene og hist og her i Ansigtet af tvivlsom Charakter (maaskee Finner). Befindendet godt.</p> | | <p>Indk. 37 56, udskr. 37 57. = 190. Phagedænisme i Inoculationssaarene.</p> |
| <p>37 57. V. Udslaget i Ansigtet paa Siderne af Næsen er blegere.</p> | | <p>Indk. 37 56, udskr. 37 57. = 190.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 57 | 111 | 3½ Md. Md. | Papulo-maculöst Exan- them og enkelte over- fladiske smaae Ulcera- tioner paa begge Laar og paa Nates; Excoria- tioner i begge Mund- vinkler. ½ 57. Barnet næsten uden Haar; Hu- den paa Hovedet lys- braunlig, flækket. | ½ 56 | 135 | Mixt. alba. | |
| 58 | 113 | 4 Md. Qv. | Paa Nates større og mindre Ulcerationer; paa Kroppen, i Hovedet og Underextremiteterne temmelig talrige Hud- abscesser; paa Halsen, især i Hudfolderne, op- høiede aflange Pletter, deels ulcererede, deels bedækkede med Skjæl. | ½ 56 | 33 | Inf. rheor. c. Æther alcohol., Ungu. nitr. argent., Tinct. ferri muriat., Ol. olivar. til Indgnid. Moschus, Bad. | |
| 59 | 114 | 28 Md. | Paa Præputii ydre Flade 4 cirkelrunde Ulcera; i begge Inguina svulne Glandler. ¾ 57. Papulöst Exanthem paa Legemet. ¾ 57. Tuberc. mucosa paa Scrotum og ved Anus. ¾ 57. I venstre Mundvinkel overfladiske Exsudater. | ¾ 57 | 126 | Sol. calc. chlor., Vinum aromat. | ¾ 57 til ¾ 57. Rubor fauci- um & Tumor uvulæ; paa Tandkjødet og paa Underlæ- ben paa ven- stre Side flere smaae hvide Pletter; paa Scrotum flere smaae ulcere- rede Tuberc. mucosa; lige- ledes ved Anus; i Pan- den Eczem. Beh. i 101 D. med Syphili- sation, Fetus frigidus, De- coct. hb. jac. Lap. infern. |

Patientens Tilstand paa
den Dag, Committeeen
sidste Gang saae ham
paa Hospitalet.

Senere Efterretnin-
ger om Patienten.

Anmærkninger.

157. V. Intet syphilitisk
Symptom om Anus og i
Laarhøiningerne. Paa
Kroppens For- og Bag-
flade smaae røde Punk-
ter, maaskee Tomter
efter Papler. De lym-
phatiske Glandler i Reg.
submaxill. meget hovne.
Hovedet stort; Huden
tynd, blank, med store
Vener.

Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. $\frac{1}{2}$ 57.
= 136.

Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. $\frac{3}{4}$ 57,
da det døde af Erysi-
pelas. = 34 Dage.

157. S. I venstre Mund-
vinkel er Slimhinden
svullen og hvidlig; hovne
Cervicalglandler. I Pan-
den og paa højre Side
af Halsen Lichen, som
det synes ikke af syphi-
litisk Natur. Ved Anus
Tomter efter Tuberc.
mucosa. Befindendet
godt. 157. S. De om-
talte Excoriationer ere
nu tilhelede. Ellers Alt
vel.

Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. $\frac{1}{2}$ 57.
= 151.

Recidiv. $\frac{1}{2}$ 57 til $\frac{1}{2}$ 57.
= 101.

Phagedænisme i Inocula-
tionssaarene.

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 60 | 116 | 22 Qv. | Tuberc. mucosa paa La- bia majora og ved Anus; svulne Inguinalglandler; i Mundvinklerne næsten cicatricerede Ulceratio- ner; begge Tonsiller ul- cererede; hovne Nuchal- glandler; Haaret faldet af. $\frac{1}{2}$ 57. Scabies. | $\frac{1}{2}$ 57 | 145 | Ungu. Wiennens. Inf. rheor. c. Æth. alcohol. et Ess. opii simpl., Sol. chlor. ammonici, Hirudines, Cucurb. cruentæ. | |
| 61 | 120 | 3 Md. Md. | Ulcererende Tuberc. mu- cosa paa Scrotum; i begge Reg. submaxill. desquamerende Papler. | $\frac{2}{3}$ 57 | 35 | | |
| 62 | 121 | 23 Qv. | Ulcerationer paa venstre Lab. majus; begge Ton- siller hovne og ulcere- rede; paa Ryggen, Bry- stet og i Nakken papu- løst Exanthem; hovne Cervicalglandler. | $\frac{2}{3}$ 57 | 313 | Catapl. $\frac{1}{2}$ 58 til $\frac{2}{3}$ 58. emoll., Spec. re- solv., Ess. opii, Lin. volat., Tinct. iodii Ung. lapid. infern., Decoct. cinchonæ, Empl. adhæs., Sol. iodeti kalici. | I Ansigtet og paa begge Skuldre Ma- culæ elevatæ, tildeels med Cruster. Ton- sillerne noget hovne; paa den høire et lidet hvidt Ex- sudat. Beh. med Solut. iodeti kalici. |
| 63 | 123 | 23 Md. | Paa Glans og Præputi- um flere uregelmæssige sammenflydende Ulcera- tioner; paa Velum palat. og Tonsillerne fordybede Ulcerationer; Tubercula mucosa ved Anus; pa- puløst Exanthem paa Ryggen og Extremitete- terne. | $\frac{1}{2}$ 57 | 239 | Vesicator. Lap. inf. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|---|--|
| 2 ³ / ₈ 57. V. Intet Abnormt ved Genitalia. | | Indk. 2 ³ / ₈ 56, udskr. 2 ³ / ₈ 57. = 148. Phagedænisme i Inoculationssaarene. |
| A ¹ / ₁₂ 57. V. Intet ved Genitalia. Begge Tonsiller hypertrophiske; paa den venstre en liden superficial Excoriation med hvidgraae Bund. | Har i de senere Aar oftere brugt Iodet. kalic. for Saar ved Næsen, i Mundhulheden, Hovedpine og Parese i venstre Side. <i>J. Vogt</i> . 1863. | Indk. 2 ³ / ₈ 57, udskr. 2 ³ / ₈ 57, da det døde af Convulsioner, i Forløbet af en Pneumonie i venstre Lunge. = 36. Indk. 2 ³ / ₈ 57, udskr. A ¹ / ₁₂ 57. = 313. Recidiv 2 ³ / ₈ 58, udskr. 2 ³ / ₈ 58, og overflyttedes til den medicinske Afdeling lidende af Hæmatemesis. = 49. |
| 1 ² / ₁₀ 57. S. Alt vel. | 2 ³ / ₈ 58. Intet syphilitisk Symptom. | Indk. 1 ² / ₁₀ 57, udskr. 1 ² / ₁₀ 57. = 241. Phagedænisme i Saarene. Indk. 1 ² / ₁₀ 57 og udskreven 2 ³ / ₈ 58; haardt Ulcus glandis, hovne Inguinalglandler, Blennorrhoea urethr. 2 ³ / ₈ Epididymit. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 64 | 124 | 19 Qv. | Tuberc. mucosa genita- lium; i begge Mund- vinkler utydelige Spræk- ker i Huden. $\frac{2}{3}$. Pa- puløst Exanthem paa Kroppen. | $\frac{1}{4}$ 57 | 162 | Catapl. emoll. c. Hb. hyo- scyami, Pulv. Doveri, Lap. inf. | |
| 65 | 125 | 23 Md. | Papuløst Exanthem paa Legemet og Underextre- miteterne; paa Crura veli palatini graaligt Exsu- dat. Urethrit. $\frac{2}{8}$. Ex- coriationer paa Over- læben. | $\frac{2}{2}$ 57 | 139 | Lap. inf. | |
| 66 | 126 | 36 Md. | Paa Glans penis Ulcera- tioner; crustøse Saar i Hovedet; papuløst Ex- anthem i Ansigtet og paa Kroppen. $\frac{1}{3}$. Graa- ligt Exsudat paa Velum palat. $\frac{1}{8}$. Tuberc. mu- cosa ved Anus. $\frac{2}{8}$. Ex- coriationer paa Over- og Underlæben. | $\frac{2}{2}$ 57 | 203 | | |
| 67 | 130 | 26 Md. | Ulcus induratum glandis penis. $\frac{2}{3}$. Pustuløst Ex- anthem paa Hagen og ved Næsen. $\frac{1}{3}$. Exsu- dater paa Velum palat. $\frac{1}{9}$. Tuberc. mucosa ved Anus. | $\frac{1}{8}$ 57 | 229 | Solut. cal- cariae chlorat., Fotus aquos. | |
| 68 | 133 | 20 Qv. | Tuberc. mucosa geni- talium; paa Tonsillerne Ulcerationer; i Nakken tuberculøse Syphilider. | $\frac{2}{8}$ 57 | 92 | Vesicat. nuchæ. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|---|---|
| <p>¶ 57. S. Alle syphilitiske Symptomer ere forsvundne. Befindendet godt.</p> | <p>I Mai 1860 frisk. (J. Vogt). Ligeledes i April 1863. (J. Vogt).</p> | <p>Indk. ¶ 57, udskr. ¶ 57. = 162.</p> |
| <p>¶ 57. S. En liden ubetydelig Excoriation paa Frenulum labii superioris oris. Exanthemet paa den nedre Deel af Ryggen og paa Underextremiteterne meget synligt, men bestaaer nu kun af ikke ophoiede braunlige Pletter uden Desquamation. Befindendet godt.</p> | | <p>Indk. ¶ 57, udskr. ¶ 57. = 141.</p> |
| <p>¶ 57. Exanthemet nu kun som braunrøde Maculae, enkeltviis besatte med tynde Skorper. Smaae Excoriationer paa Collum glandis. En liden Excoriation ved Anus. Haaret falder fremdeles noget af. Befindendet og Udseendet bedre.</p> | <p>¶ 58. Kun Spor af Exanthemet paa Ryggen og Underextremiteternes Bagflade. Saaret paa Halsen tilhelet. Intet i Svælg. Befindendet godt.</p> | <p>Indk. ¶ 57, udskr. ¶ 57. = 203. NB. Denne Person er et Exempel paa, at Syphilisationen kan fortsættes, uagtet tilsyneladende slemme indtrædende Tilfælde; — fremdeles paa, at Syphilisationen efter lang Tid kan frembringe Helbredelse.</p> |
| <p>¶ 57. Intet syphilitisk Symptom. Befinder sig vel.</p> | <p>¶ 60. V. Han har befundet sig vel senere. Gift i 2½ Aar, men har ikke Børn. Functionerne i bedste Orden. Noget blegt Udseende. Arrene efter Inoculationssaarene meget utydelige.</p> | <p>Indk. ¶ 57, udskr. ¶ 57. = 292.</p> |
| <p>¶ 57. Alt vel.</p> | | <p>Indk. ¶ 57, udskr. ¶ 57. = 93.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 69 | 136 | 28 Md. | Ulcerationes glandis & præputii; hovne Inguinal- og Cervicalglandler; papuløst Exanthem; crustøse Saar i Hovedet. $\frac{21}{8}$. Tuberc. mucosa ved Anus. $\frac{7}{4}$. Ulceration paa Overlæben. $\frac{1}{2}$. Ulcerationer i Svælget. | $\frac{21}{4}$ 57 | 201 | Laxantia, Pilul. Doveri. | |
| 70 | 138 | 29 Qv. | Tuberc. mucosa paa Genitalia og ved Anus. Paa venstre Papilla mammae og i sammes Omkreds Ulcerationer. I Ansigtet brede Papler og Maculæ. Ulcerationer paa Velum palat $\frac{30}{8}$. Iritis sinistra. $\frac{21}{7}$. Iritis dextra. | $\frac{16}{8}$ 57 | 200 | Acetas morph., Pilul. Doveri, Sol. sulph. atrop. | |
| 71 | 139 | $1\frac{1}{2}$ Qv. | Paa Underlæben og Tungespidsen Ulcerationer. Tuberc. mucosa paa Genitalia, i Inguina og ved Anus. | $\frac{16}{3}$ 57 | 200 | Lap. inf. | |
| 72 | 140 | 28 Qv. | Tuberc. mucosa genitalium; Ulcerationes faucium; Fissurer paa Tungens høire Rand; papuløst Exanthem; hovne Nuchalglandler. $\frac{1}{12}$. Psoriasis palmaris. | $\frac{21}{4}$ 57 | 255 | Sol. chlor. ammonici. | |
| 73 | 142 | 33 Qv. | Tuberc. mucosa genital. & natium; papuløst Exanthem paa Kroppen og Extremiteterne; Ulcerationes veli palat.; hovne Inguinalglandler. $\frac{1}{2}$. Iritis dextra. $\frac{30}{8}$. Iritis sinistra. | $\frac{8}{5}$ 57 | 194 | Liqu. antisp. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeens sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|--|
| $\frac{7}{8}$ 57. Der er 3 smaae hvide Pletter paa Tungespidsens Underflade, en lignende paa Tungens høire Rand bagtil. Haaret falder fremdeles af. | $\frac{2}{8}$ 57. Excoriation i Analaabningen; en liden ophøiet Plet ved Anus; Erythem i Ansigtet. $\frac{1}{4}$ 60. V. Befinder sig vel. Kanden paa Spidsen af Næsen er en fortykket Follikel, hvis Aabning sees. Intet benyttet. | Indk. $\frac{2}{4}$ 57, udskr. $\frac{7}{8}$ 57. = 202. |
| $\frac{2}{8}$ 57. S. Pupillerne fremdeles fortrukne, klarere, Synet bedre. Af Exanthemet sees kun Tomter, nemlig brunrøde Pletter. Crus anter. vel senistr. noget takket og ikke ganske frit for hvidt Belæg. Befindendet godt. | | Indk. $\frac{1}{4}$ 57, udskr. $\frac{2}{8}$ 57. = 170. |
| $\frac{2}{8}$ 57. S. Alt vel. Befindendet meget godt. | Frisk 1862. (W. Boeck). | Indk. $\frac{1}{4}$ 57, udskr. $\frac{2}{8}$ 57. = 170. |
| $\frac{1}{4}$ 57. Affectionen af Svælget og Tungen formindsket. Psoriasis palmaris kun som Spor. | Frisk 1862. (Steffens.) | Indk. $\frac{2}{4}$ 57, udskr. $\frac{1}{4}$ 58. = 257. |
| $\frac{1}{4}$ 57. Intet ved Genitalia. Intet i Halsen. Tomter efter Exanthemet paa Crura. | | Indk. $\frac{1}{4}$ 57, udskr. $\frac{1}{4}$ 57 = 196. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 74 | 143 | 58 Qv. | Paa Membr. posterior pharyngis en dyb Ulce- ration; Spor efter Tu- berc. mucosa paa ven- stre Lab. majus. | $\frac{1}{8}$ 57 | 232 | Vesicat., Lap. inf. | |
| 75 | 146 | 20 Qv. | Tuberc. mucosa genita- lium; paa Kroppen og Laarene papuløst Exan- them; Rubor faucium. $\frac{2}{8}$. Hvidt Exsudat paa Tonsillerne. | $\frac{1}{8}$ 57 | 141 | Vesicat. | |
| 76 | 147 | 22 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia og ved Anus; Ulceration paa den ven- stre Tonsille. | $\frac{3}{8}$ 57 | 188 | | |
| 77 | 148 | $\frac{11}{2}$ Md. | Roseola paa Ryggen; enkeltstaaende Papler. $\frac{1}{2}$. Paa Pars capill. ca- pitis enkelte desqua- merende Pletter. | $\frac{8}{8}$ 57 | 182 | Subnitr. bismuth., Sol. nitrat. argent., Decoct. alb. c. Ess. Opii simpl., Lap. inf. | |
| 78 | 150 | 69 $\frac{1}{2}$ Md. | Roseola paa Underlivet; paa høire Tonsille en overfladisk Ulceration; ved Anus Tuberc. mu- cosa. | $\frac{2}{8}$ 57 | 121 | | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|---|---|
| <p>§§ 57. V. Ævula mindre hoven, er noget blegere og neppe ødematøs. Forresten Intet. Blegt Udseende.</p> | | <p>Indk. § 57, udskr. §§ 57. = 234.</p> |
| <p>§§ 57. V. De ophøiede Pletter paa Antibrachia sees fremdeles og kunne ogsaa føles. Intet syphilitisk Symptom at opdage. Tonsillerne hovne og røde, ligeledes Crura veli. Leucorrhoe.</p> | <p>§ 58 fødte hun i Stiftelsen et fuldbaaret Barn, hos hvilket i November viste sig tydeligt Maculæ syphiliticæ, hvorfor det underkastedes Syphilisation. Det døde i Begyndelsen af Januar 1859. Moderen havde intet syphilitisk Symptom.</p> | <p>Indk. § 57, udskr. §§ 57. = 142.</p> |
| <p>§§ 57. Intet i Halsen. Benytter Intet.</p> | <p>§ 59. Hun er indkommen i Hospitalet med et 3 Maaneder gl. Barn, der lider af maculöst-syphilitisk Exanthem. Moderen er og har været frisk.</p> | <p>Indk. § 57, udskr. § 58. = 190.</p> |
| <p>§§ 57. Intet i Halsen og Munden. Superficielle Saar paa begge Øienbryn, høire Kind, Hagen, ved Næseborene og bag Ørene, bedækkede med brune Cruster. Benytter Intet.</p> | | <p>Indk. § 57, udskr. § 58. = 190.</p> |
| <p>§§ 57. Saar paa venstre Side af Tungen. Saar og Cicatricer ved Anus.</p> | | <p>Indk. § 57, udskr. §§ 57. = 123.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 79 | 151 | 32 Md. | Et uregelmæssigt Saar paa Indsiden af venstre Kind og Ulcerationer paa begge Tonsiller; Tuberc. mucosa ved Anus; Ro- seola. | $\frac{2}{3}$ 57 | 92 | Pilul. Doveri. | $\frac{1}{1}$ 57 til $\frac{1}{1}$ 57. Overfladiske Ulcerationer paa Velum palat. og Ton- sillerne; de- squamerende Pletter paa Scrotum; en- kelte crustøse Saar i Hove- det; hovne Nuchalgland- ler. 1ste Reci- div 17 Dage, 2det Recidiv efter 10 Maa- neder 30 Dage. Indifferent Behandling. |
| 80 | 152 | 25 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia; papuløse Syphi- lider paa Legemet; Ul- cerationer paa begge Tonsiller. $\frac{2}{3}$. Iritis dextra. $\frac{1}{10}$. Iritis sinistra. | $\frac{4}{8}$ 57 | 246 | Pulv. Dov., Balnea tep., Lap. infern. | |
| 81 | 153 | 35 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia; Roseola paa Brystet; hvidt Belæg paa venstre Tonsille. | $\frac{2}{3}$ 57 | 123 | Lapis inf. | |
| 82 | 154 | 3 Qv. | Roseola paa Legemet; hvidt Belæg paa den venstre Tonsille. | $\frac{2}{3}$ 57 | 123 | Decoct. alb. | |
| 83 | 155 | 25 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia; papuløse Syphi- lider paa Laarene og Brystet; paa Velum pa- lat. og begge Tonsiller hvidgraat Belæg. | $\frac{8}{5}$ 57 | 205 | Liqu. antisp., Lapis inf. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin-ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|---|
| <p>§ 57. Paa den øverste Deel af højre St. cl.-mastoideus en hoven lymph. Glandel, som Patientten angiver at have været tilstede siden i Vinter. Forresten frisk § 57. S. Helbredet.</p> | | <p>Indk. § 57, udskr. § 57. = 94. 2det Recidiv behandlet in-different paa Arendals Sygehuus; frisk i 1862. (<i>Frisak</i>).</p> |
| <p>§ 58. En lidensuperficiel Ulceration paa Under-læbens Slimhinde. Venstre Tonsille noget rød; Exanthemet endnu tilstede paa Arme og Been. Farven i Ansigtet ureen.</p> | | <p>Indk. § 57, udskr. § 58. = 249.</p> |
| <p>§ 57. V. Paa højre Tonsille 2 smaa hvide Pleitter, der toucheres med Lap. infer. Haaret fælder noget af. Ellers Intet.</p> | <p>Frisk 15de Februar 1862. (<i>Frisak</i>).</p> | <p>Indk. § 57, udskr. § 57. = 123.</p> |
| <p>§ 57. Intet Syphilitisk. Nogen Rødhed i Svælg.</p> | <p>Frisk 15de Februar 1862. (<i>Frisak</i>).</p> | <p>Indk. § 57, udskr. § 57. = 123.</p> |
| <p>§ 58. Ikke inoculeret i de sidste 14 Dage. Er idag toucheret paa den venstre Tonsille. Menstrua ere tilstede.</p> | | <p>Indk. § 57, udskr. § 58. = 206.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 84 | 156 | 18 Qv. | Tubercula mucosa om Anus; Roseola paa Bry- stet; tyndt hvidt Belæg paa begge Tonsiller. Leucorrhoe og Urethrit. | $\frac{2}{9}$ 57 | 140 | Solut. lap. inf., Solut. oxydicalc. | |
| 85 | 158 | 37 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia; papulöst Exan- them paa Underliv og Bryst; hvidt Belæg paa Tonsillerne; et lidet cru- stöst Saar i venstre Mundvig; under den høire Mellemtaae en ulcereret Tuberkel. Panaritium paa den høire Pege- finger. | $\frac{1}{10}$ 57 | 134 | Ungu. lap. inf., Ca- tapl. emoll. | |
| 86 | 159 | 29 Md. | Et indureret, svullent Ar paa Præputii indvendige Flade; hovne Inguinal- glandler; crustøse Saar i Hovedet. $\frac{2}{10}$. Papler i Panden. $\frac{2}{11}$. Excoria- tioner paa Glans og Præ- putium; Tuberc. mucosa ved Anus. Corona venerea. | $\frac{2}{10}$ 57 | 98 | | |
| 87 | 161 | 25 Md. | Paa Glans penis et Ar med Excoriation; paa Scrotum, i Inguinalbøi- ningerne, i Perinæum og om Anus Tubercula mucosa; Ulcerationer paa Tonsillerne og Pa- latum durum; hovne Cervicalglandler; Rose- ola. $\frac{2}{58}$. Saar i ven- stre Mundvig og paa det høire Kind. | $\frac{2}{11}$ 57 | 129 | Lap. inf. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|-------------------------------------|--|
| § 58. V. Tonsillerne ere noget hovne og røde; Randene af Crura veli anteriora skarpe, lidt graae. Sundt Udseende. | | Indk. $\frac{1}{2}$ 57, udskr. $\frac{2}{3}$ 58. = 141. |
| $\frac{2}{3}$ 58. V. Intet abnormt at opdage. | | Indk. $\frac{1}{2}$ 57, udskr. $\frac{2}{3}$ 58. = 136. |
| $\frac{2}{3}$ 58. Kun Spor af Exanthemet i Panden. Ellers Intet. | | Indk. $\frac{1}{2}$ 57, udskr. $\frac{2}{3}$ 58. = 101. |
| $\frac{2}{3}$ 58. Saar paa Lab. superius og ved den høire Mundvig; en liden Polyp paa Uvula; paa den indvendige Side af venstre Kind er Saaret tilhelet; paa det høire Kind toucheret. | | Indk. $\frac{1}{2}$ 57, udskr. $\frac{2}{3}$ 58. = 130. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 88 | 162 | 31 Md. | Paa Ryggen af Penis noget bagenfor Midten et stort Ulcus; Tuberc. mucosa paa Underfladen; Excoriation paa Præ- putii indvendige Flade; Tubercula mucosa ved Anus. Roseola paa Krop- pen; Exsudat paa Velum palat. og højre Tonsille; hoven Cervicalglandel. | $\frac{3}{11}$ 57 | | | |
| 89 | 164 | 20 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia; tyndt hvidt Be- læg paa begge Tonsiller; $\frac{2}{3}$ 58. Papuløst Exanthem paa hele Legemet. | $\frac{1}{12}$ 57 | 308 | Hirudines, Subnitr. bismuth. c. Opio. | $\frac{6}{12}$ 58 til $\frac{4}{3}$ 59. Ulceration paa Underlæ- ben, venstre Tungerod, Crura veli palat. Beh. i 120 Dage med Lapis infernalis. |
| 90 | 165 | 23 Md. | Paa Penis og Scrotum et stort Ulcus; Tuberc. mucosa ved Anus. Hovne Nuchalglandler; hvidt Belæg paa højre Ton- sille. Roseola paa Bry- stet. | $\frac{2}{11}$ 57 | 120 | | |
| 91 | 166 | 29 Md. | Paa Corona glandis et indureret Ar; paa Præ- putium en større Indura- tion; Tuberc. mucosa ved Anus; Ulceration paa Velum palat.; macu- løst Exanthem paa Krop- pen; papuløst Exanthem i Panden. | $\frac{3}{11}$ 57 | 125 | | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|---|--|
| | $\frac{1}{2}$ 57. Alle syphilitiske Phænomener svandt under Udviklingen af en Pleurit (efter Schönbergs Opgivende). | Indk. $\frac{2}{3}$ 57, udskr. $\frac{1}{3}$ 57. = 24. |
| $\frac{1}{8}$ 58. V. Paa venstre Tungerand en Excoriation med hvid, noget fordybet Bund; paa høire Tungerand en hvid Plet. $\frac{1}{8}$ 59. Tungenanden næsten istand. Intet ved Genitalia. | | Indk. $\frac{1}{3}$ 57, udskr. $\frac{1}{8}$ 58. = 311. Recidiv. $\frac{1}{8}$ 58, udskr. $\frac{1}{3}$ 59. = 120. |
| $\frac{2}{3}$ 58. Intet ved Anus. Crus post. veli dextrum lidt svullent. Ellers Alt vel. | | Indk. $\frac{2}{3}$ 57, udskr. $\frac{2}{3}$ 58. = 121. |
| $\frac{1}{2}$ 58. Paa Overlæben og Underlæben og i høire Mundvig nogle infiltrerede hvide Pletter. Befindendet godt. | | Indk. $\frac{2}{3}$ 57, udskr. $\frac{1}{2}$ 58. = 126. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 92 | 167 | 19 Qv. | 2 Ulcera paa høire Lab. majus; hvidt Belæg paa Velum palat. $\frac{3}{4}$. Ro- seola paa Brystet. $\frac{3}{4}$. Ulcerationer paa Ton- sillerne. | $\frac{1}{2}$ 58 | 155 | Lap. inf. | |
| 93 | 168 | 18 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia, i Laarbøiningen og om Anus; hovne Inguinalglandler; Rose- ola paa Brystet; i An- sigtet Pustler og Macu- læ; i Nakken Maculæ elevatæ; i Hovedet gule Cruster; Belæg paa begge Tonsiller. | $\frac{3}{4}$ 57 | 177 | | |
| 94 | 169 | 19 Md. | Phimose og Svulst i Præ- putium, i hvilket føles en større Induration; Udflod. $\frac{1}{2}$ 58. Papuløst Exanthem paa Legemet. | $\frac{2}{3}$ 58 | 154 | Fotus re- solv., Ve- sicat., Cucurb. cruent. | $\frac{1}{4}$ 60 til $\frac{3}{4}$ 60. Behandlet in- different i 7 Dage. |
| 95 | 170 | 11 Ug. Qv. | Paa hele Legemet uden Undtagelse pustuløst Ex- anthem, hvorimellem Ul- cerationer; Exsudat paa begge Tonsiller; Stem- men snøvlede. Diar- rhoe. $\frac{1}{8}$. Tuberc. mu- cosa ved Anus og paa Genitalia. | $\frac{2}{3}$ 58 | 234 | Decoct. alb., Lap. infern. | Recidiv efter $20\frac{1}{2}$ Maaned. Behandlet in- different i 94 Dage. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|-------------------------------------|--|
| <p>458. V. Et lidet superficialt Saar paa Slimhinden af venstre Kind med rød Omkreds. Forresten intet syphilitisk Symptom, hverken i Svælget eller ved Genitalia og Anus.</p> | | <p>Indk. $\frac{7}{11}$ 57, udskr. $\frac{4}{7}$ 58. = 190.</p> |
| <p>$\frac{2}{3}$ 58. Spor efter Exanthemet i Ansigtet. Hvid Infiltration i den høire Tonsille omkring en Follikelaabning Intet ved Anus og Genitalia.</p> | | <p>Indk. $\frac{7}{11}$ 57, udskr. $\frac{2}{3}$ 58. = 179.</p> |
| <p>458. V. Lidt hvidgraat Exsudat paa begge Tonsiller; et lidet superficialt Saar paa Crus anter. veli palat. dextr. Intet ved Anus. Saarene paa Præputium tilhelede; endnu Infiltration i Præputium under Cicatricerne.</p> | | <p>Indk. $\frac{7}{11}$ 57, udskr. $\frac{4}{7}$ 58. = 226.</p> |
| <p>$\frac{2}{3}$ 58. V. Excoriation paa Overlæben og Tungespidsen, der ere toucherede. Blaae Flekker paa Nates.</p> | | <p>Indk. $\frac{8}{9}$ 58, udskr. $\frac{2}{3}$ 58. = 238. Forblev paa Hospitalet 2den Gang længe efter at Tilfældene vare svundne, fordi Moder og Søskende vare under Behandling.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 96 | 171 | 28 Md. | Ulcerationer paa begge Tonsiller; paa Midten af venstre Tungerand et fordybet Saar; Excoria- tioner paa Overlæbens Sliimhinde; Tuberc. mu- cosa ved Anus; papu- løst Exanthem i Ansigtet. | $\frac{1}{2}$ 58 | 157 | | |
| 97 | 172 | 41 Md. | Paa Velum palat. et Par Tuberc. mucosa. | $\frac{1}{2}$ 58 | 226 | | |
| 98 | 173 | 1 Qv. | Vesiculøst Exanthem i Cirkelform paa Kroppen, især paa Laarene og Ryggen; serpiginøse Saar paa Genitalia og ved Anus; Tuberc. mucosa paa Tungens Overflade; superficielle Saar paa Tonsillerne og Uvula. | $\frac{8}{8}$ 58 | 283 | Decoct. alb. | |
| 99 | 174 | 22 Md. | Paa Overlæbens Sliim- hinde et Ulcus; i Regio submaxill. sinistra en hoven Lympheglandel; hovne Nuchalglandler; graahvidt Belæg paa Velum palat. og Ton- sillerne; Roseola. | $\frac{3}{3}$ 58 | 157 | Baln. vapor. | |
| 100 | 175 | 2 Md. | Ved Anus, paa Scrotum, høire Laar og venstre Nates flere Ulcerationer; paa begge Fødder smaae brune Flekker; i Ansigtet flere smaae Ulcera- tioner; paa Hovedet pu- stuløst Exanthem. $\frac{1}{4}$. Keratit. $\frac{2}{4}$. Cornea per- foreret. $\frac{1}{8}$. Bulbus col- laberet. | $\frac{1}{8}$ 58 | 113 | Decoct. alb., Laud., Sol. lap. intern., Tannin. c. Vino. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|-------------------------------------|---|
| <p>3/4 58. S. Intet i Halsen. Paa den høire Rand af Tungen 2 å 3 smaae hvide Pletter og en liden Excoriation paa Underlæbens Slimhinde. Befindendet godt.</p> | | <p>Indk. 3/4 58, udskr. 3/4 58. = 159.</p> |
| <p>3/4 58. V. Intet syphilitisk Symptom.</p> | | <p>Indk. 3/4 58, udskr. 3/4 58. = 228. Under Opholdet i Hospitalet gennemgik han Typhus. Efter senere Oplysninger har denne Patient tidligere brugt Mercur. (W. Boeck.)</p> |
| <p>1/2 58. Excoriation paa Underlæbens Slimhinde. Der er Blepharoadenitis.</p> | | <p>Indk. 1/2 58, udskr. 1/2 58. = 285.</p> |
| <p>1/2 58. S. Saaret paa Overlæben er fuldkommen cicatriceret; Arret noget infiltreret og blaaagt. Ellers Alt vel.</p> | | <p>Indk. 1/2 58, udskr. 1/2 58. = 159.</p> |
| <p>1/2 58. V. Store Vener i Hovedhuden. Braunligt Secret i Næsehorene; aander besværligt igjennem Næsen. Intet i Svælget. Kun Tomter efter Saarene ved Genitalia og Anus. Barnet seer meget bedre ud; pletter og spiser godt.</p> | | <p>Indk. 1/2 58, udskr. 1/2 58. = 114.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 101 | 176 | 11 Md. Qv. | Paa Nates, øverste Deel af Laarene brunnrøde, ophøiede Flekker og nogle Ulcerationer; paa Halsen og Hagen lignende Affection; crustøse Saar i Hovedet; hvidt Belæg paa Tonsillerne. $\frac{2}{3}$. Saar i høire Mundvig. | $\frac{2}{3}$ 58 | 248 | Decoct. alb. | $\frac{1}{2}$ 59 til $\frac{1}{2}$ 59. Saar i høire Mundvig, hypertrophisk og strækkende sig ind paa Kindets Slimhinde. Beh. i 28 Dage med Lap. infern. |
| 102 | 177 | 23 Md. | Papulo-maculøst Exanthem; Tuberc. mucosa paa Genitalia, ved Anus og i Laarbøiningerne; graahvidt Belæg paa Velum palat. og Tonsillerne; hovne Nuchal- og Inguinalglandler; indureret Ulcus paa Glans penis; Excoriationer paa Glans og Præputim. | $\frac{2}{3}$ 58 | 124 | Pilul. Dov. | |
| 103 | 179 | 22 Ug. Qv. | Paa Nates flere runde, røde Pletter; paa Arme og Laar papuløst Exanthem; paa Hagen lignende; i høire Mundvig et crustøst Saar; i Næseborene tykke Skorper. $\frac{1}{6}$. Excoriationer paa Palat. durum. $\frac{2}{7}$. Maculo-papuløst Exanthem i Ansigtet. | $\frac{1}{4}$ 58 | 189 | Inf. rheor. c. Aqn. foeniculi et Bicarb. natr. | 1ste Recidiv $\frac{1}{3}$ 59 til $\frac{2}{3}$ 59. Ulcererende Tuberc. mucosa ved Anus; saare Mundvige. Beh. i 12 D. med Remedia externa. 2det Recidiv $\frac{1}{3}$ 60 til $\frac{2}{4}$ 60. Hovne og belagte Tonsiller; eleveret Ulcus i venstre Inguen. Beh. i 39 D. med Syphilisation. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin- ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|---|--|
| <p>¶ 58. I begge Inguina hovne Glandler; paa høire Crus flere røde ophøiede Flekker, bedækkede med gule Crustæ; crustøse Saar i Hovedet; superficielle Saar paa Glans penis, paa Penis's Hud, paa Scrotum; Tuberc. mucosa ved Anus; maculøst Exanthem paa Truncus; Saar paa Underlæben.</p> <p>¶ 59. Et lidet Saar paa venstre Nates efter en Bulla. Pletterne som forhen. Saar i venstre Mundvig. Intet i Halsen.</p> | <p>¶ 58. V. Intet ved Genitalia og Anus. Ikke Saar i Munden. Tonsillerne og Uvula noget hovne og røde.</p> <p>¶ 59. Nogle Maculæ i Ansigtet. Saaret i Mundvigen tilhelet.</p> | <p>Indk. ¶ 58, udskr. ¶ 58. = 249.</p> <p>Recidiv. Indk. ¶ 59, udskr. ¶ 59. = 27.</p> <p>Recidiv.</p> <p>Indk. ¶ 58, udskr. ¶ 58, da han rømte fra Hospitalet. = 125.</p> <p>Indk. ¶ 58, udskr. ¶ 59. = 199.</p> <p>Recidiv ¶ 59 til ¶ 59. = 12.</p> <p>Recidiv ¶ 59 til ¶ 60. = 39.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 104 | 180 | 2 Md Qv. | I Rima natium smaae Ulcerationer; paa Nates, Laarene, Crura og i Plant pedum en Mængde blaarøde, ophoiede Ma- culæ; paa Hagen flere smaae Ulcerationer; paa Kinderne blaarøde Pap- ler; begge Næsebor til- stoppede. | $\frac{2}{3}$ ² 58 | 22 | | |
| 105 | 181 | 23 Qv. | Tuberc. mucos. paa Lab. majora, overfladiske Ul- cerationer paa Lab. mi- nora; Tuberc. mucosa ved Anus; papuløst Ex- anthem, Leucorrhoe; hvidligt Belæg paa ven- stre Tonsille. | $\frac{2}{3}$ ² 58 | 143 | Lap. inf. | |
| 106 | 182 | 22 Md. | Paa Glans penis et in- dureret Ar; paa Præpu- tium en Ulceration; hovne Inguinalglandler; Tu- berc. mucosa om Anus; Ulcerationer paa Velum palat. og Tonsillerne; Excoriationer paa Læ- bernes og Kindernes Sliimhinde; tynd Haar- væxt. | $\frac{2}{3}$ ⁹ 58 | 87 | | |
| 107 | 183 | 40 Qv. | Ulcera omkring høire Brystvorte; hvidt Belæg paa Tonsillerne. $\frac{1}{8}$. Ro- seola. $\frac{2}{8}$. Tuberc. mu- cosa paa Genitalia. $\frac{1}{8}$. Saar i venstre Mundvig og paa Underlæbens Sliimhinde. | $\frac{4}{8}$ 58 | 236 | Lap. inf. | $\frac{1}{8}$ ⁴ 59 til $\frac{7}{8}$ ⁴ 59. Tuberc. mu- cos. paa Ge- nitalia. Beh. i 12 D. med Remedia ext. $\frac{1}{8}$ ² 60 til $\frac{2}{3}$ ⁰ 60. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkuinger. |
|---|-------------------------------------|--|
| | | Indk. $\frac{3}{4}$ 58, udskr. $\frac{1}{8}$ 58, da det døde. = 23. |
| <p>$\frac{1}{2}$ 58. V. Paa Palatum durum bagtil 4 runde Pletter af hvidlig rød Farve, der ere touche-rede med Lap. infern.; paa begge Tonsiller en dyb Follikelaabning, der synes at være besat med Ulcerationer; paa højre Side er den toucheret med Lap. infern. Ved Genitalia og Anus Intet.</p> | | Indk. $\frac{1}{4}$ 58, udskr. $\frac{1}{2}$ 58. = 146. |
| <p>$\frac{1}{2}$ 58. S. Intet i Halsen og ved Anus. Cicatriceerne paa Glans og Præputium endnu lidt infiltrerede og røde. Haaret tyndt. Befindendet godt.</p> | | Indk. $\frac{1}{4}$ 58, udskr. $\frac{1}{2}$ 58. = 88. |
| <p>$\frac{3}{4}$ 58. V. Hypertrophiske Mandler, uden Saar. Intet i Munden, ved Anus og Genitalia. Der er nogen Induration i Huden omkring venstre Papille; baade højre og venstre Papille bedækkede med enkelte Cruster.</p> | | <p>Indk. $\frac{3}{4}$ 58, udskr. $\frac{7}{8}$ 58. = 238. Recidiv $\frac{1}{4}$ 59 til $\frac{3}{4}$ 59. = 13.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | Syphilitationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 108 | 184 | 20 Qv. | Flere Ulcerationer paa Velum palat.; graashvidt Belæg paa Tonsillerne; Skorper i Næseborene. $\frac{8}{8}$. Partielle Destructioner af Velum palat. | $\frac{1}{8}$ 58 | 128 | | $\frac{1}{7}$ 58 til $\frac{1}{7}$ 59. Et stort Saar paa det høire Kind. Beh. i 38 D. m. Kali hydroiod. |
| 109 | 185 | 23 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia, ved Anus og i Laarbøiningerne; graa- hvide Pletter paa Velum palat. og Tonsillerne; hoven Nuchalglandel; tyndt Haar paa Issen. | $\frac{2}{8}$ 58 | 121 | | |
| 110 | 187 | 28 Qv. | Maculöst Exanthem paa Brystet og Underextre- miteterne; flugtende Smerter i flere Led. $\frac{1}{7}$. Excoriationer paa Kindernes Slimhinde. $\frac{3}{8}$. Overfladisk Saar paa Overlæben. $\frac{3}{8}$. Belæg paa høire Tonsille. | $\frac{2}{8}$ 58 | 112 | Lap. inf. | |
| 111 | 188 | 29 Md. | Excoriation paa Glans penis; Tuberc. mucosa paa Scrotum og ved Anus; en Excoriation paa høire Tonsille. $\frac{2}{8}$. Excoriationer paa Palat. molle., durum og Over- læben. | $\frac{3}{8}$ 58 | 145 | | |
| 112 | 189 | 20 Qv. | Tuberc. mucosa paa La- bia majora og ved Anus; Ulceration paa venstre Tungerand; Haaret fal- der af. | $\frac{2}{7}$ 58 | 143 | Lap. inf. | $\frac{1}{7}$ 59 til $\frac{2}{7}$ 59. Ulcus paa Randen af høire Lab. maj. Beh. i 15 D. med Remedia ext. 2det Rec. $\frac{2}{7}$ 59 til $\frac{1}{8}$ 59. Excoriationer paa Lab. maj. dextr. Beh. i 10 D. m. Re- media ext. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeens sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin- ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|--|--|
| <p>158. V. Saarene i Halsen synes at være tilhelede. Næsen uden Cruster. Intet ved Genitalia og Anus.</p> <p>159. Saaret tilhelet.</p> | | <p>Indk. 158, udskr. 158. = 128.</p> <p>Recidiv 158, udskr. 159. = 38.</p> |
| <p>158. E. Ingen Saar i Halsen, ei heller paa Genitalia. Alt vel.</p> | <p>Befinder sig vel; har ikke været frugt- sommelig senere. 160. (Homann).</p> | <p>Indk. 158, udskr. 158. = 121.</p> |
| <p>158. V. Et Saar i Randen af en stor Follikel- aabning i den høire Tonsille; et graat ex- corieret Partie paa den venstre Tonsille. Ellers intet.</p> | | <p>Indk. 158, udskr. 158. = 113.</p> |
| <p>158. S. Paa Glans penis flere mørkerøde Pletter; ved Anus en Excoriation; en Excoriation paa Palatum; paa høire Hofte en halv cirkelformig, rød, ophøiet, noget desquamierende Plet.</p> | | <p>Indk. 158, udskr. 158. = 145.</p> |
| <p>158. V. Intet i Munden, Svælget, ved Genitalia og Anus. De artificielle Saar paa høire Laar ikke ganske gjen- groede.</p> <p>159. V. Saaret paa Labium majus tilhelet; Tomten noget fast.</p> | <p>I Mai 1860 frisk (A. Holst). Frisk i Novb. 1861. Født et Barn, som døde 2 Maaned- er gammelt af Syphilis, Febr. 1861.</p> | <p>Indk. 158, udskr. 158. = 143.</p> <p>Recidiv 159, udskr. 159. = 16.</p> <p>Recidiv. Indk. 159, udskr. 159 = 10.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | Syphilitationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 113 | 190 | 32 Qv. | Paa den venstre Bryst- vorte en superficial Ul- ceration; Roseola; Tu- berc. mucosa paa Ge- nitalia; Excoriationer paa Tonsillerne. | $\frac{2}{3}$ 58 | 122 | Sol. oxyd. calc., Lap. infern. | $\frac{1}{8}$ 59 til $\frac{1}{8}$ 59. Serpiginöse Excoriationer paa Lab. ma- jora; Ulcera- tioner ved Anus; dybe Ulcerationer paa Tonsiller- ne. Beh. i 80 D. m. Syphi- lisation, Lap. infern. |
| 114 | 191 | $1\frac{1}{2}$ Md. | Tubercula mucosa ved Anus, paa Scrotum og i høire Laarbøining; Ul- cera i begge Mundvige; tyndt Belæg paa Ton- sillerne. | $\frac{2}{3}$ 58 | 122 | Lapis inf | |
| 115 | 192 | 21 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia; paa Over- og Underlæben overfladiske Ulcerationer; paa Tun- gens Overflade vorte- lignende Udvæxter; Ul- cerationer paa Velum palat. og Tonsillerne; Roseola. | $\frac{2}{8}$ 58 | 100 | Ungu. stibiat., Lapis inf. | |
| 116 | 194 | 40 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia; Ulcerationer i begge Mundvige, paa Velum palat. | $\frac{1}{9}$ 58 | 98 | | $\frac{2}{8}$ 59 til $\frac{1}{7}$ 60. Saar paa Tun- gen og Fau- ces. Beh. i 145 D. m. Syphi- lisation. |
| 117 | 195 | 21 Md. | Ulcera glandis; papulöst Exanthem; hovne Ingui- nalglandler, Submaxil- lar- & Nuchalglandler; Ulcerationer paa Ton- sillerne. | $\frac{2}{9}$ 58 | 102 | Lap. inf. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee's sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|---|
| <p>25 58. V. Tonsillerne hypertrophiske, ujevne, uden Saar. Intet i Munden, ved Anus og Genitalia.</p> <p>25 59. S. Alle syphilitiske Symptomer ere svundne. Befindendet godt.</p> | | <p>Indk. 25 58, udskr. 25 58. = 125.</p> <p>Recidiv 25 59, udskr. 25 59. = 80.</p> |
| <p>25 58. V. Paa Overlæbens Slimhinde en liden Excoriation med hvidt Belæg. Intet i Svælget. Intet ved Anus og Genitalia.</p> | | <p>Indk. 25 58, udskr. 25 58. = 125.</p> |
| <p>25 58. Saaret paa Overlæben tilhelet. Paa Velum palat. et let hvidt Belæg. Menstrua ere tilstede, hvorfor hun ikke kan undersøges.</p> | <p>Frisk 1861. (A. Holst). Senere reist til Amerika.</p> | <p>Indk. 25 58, udskr. 25 58. = 100.</p> |
| <p>25 58. V. Intet i Munden, Svælget, ved Genitalia og Anus. 2 artificielle Saar paa høire Laar.</p> | | <p>Indk. 25 58, udskr. 25 58. = 98.</p> <p>Recidiv 25 59 til 25 60. = 145. Laar i Barselseng i Hospitalet og havde Mania puerperalis.</p> |
| <p>25 59. S. Paa Scrotum et noget ophøiet Ar efter et Tuberc. mucosum. Crus anter. vel. palat. dextr. og Tonsillerne paa samme Side ere idag toucherede med Lap. inf. Ellers Alt vel.</p> | | <p>Indk. 25 58, udskr. 25 59. = 102.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syph lisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 118 | 196 | 9 Md. Qv. | Maculæ elevatæ og nogle Ulcerationer paa Nates; papuløst Exanthem paa hele Legemet. | $\frac{1}{10}$ 58 | 92 | | |
| 119 | 198 | 21 Md. | Ulcus glandis; Præpu- tium ødematøs; Blien- norrh urethralis; hovne Inguinalglandler. $\frac{1}{8}$. Ro- seola. $\frac{3}{4}$ 59. Scabies. | $\frac{1}{10}$ 58 | 91 | Sol. calc. chlor., Ungu. Wienn. | |
| 120 | 200 | 21 Md. | Membrum ødematøs; Phimosis; en Induration føles; Udflod af tykt, rigeligt Pus. $\frac{1}{10}$. Ro- seola. $\frac{3}{4}$. Chronisk Con- junctivis. $\frac{1}{8}$ 58. Bubo i høire Inguen. $\frac{3}{4}$. Saar paa Overlæben. $\frac{1}{4}$ 59 Saar paa Underlæben, i Mundvigen; Tubercula mucosa ved Anus. | $\frac{1}{10}$ 58 | 119 | Aqua frigid., Sol. biborat. natr., Ung. stibiat, Ung. oxyd. hydrarg., Hirud. | |
| 121 | 25 | 1 Md. Qv. | Maculæ og superficielle crustøse Saar paa Nates, Laarene og i Ansigtet. | $\frac{1}{8}$ 56 | 20 | | |
| 122 | 88 | 6 Ug. Qv. | Huden om Anus, paa Laarene og nedover Crura tynd, blank, skin- nende rød, rynket og besat med skiddenbrune tynde Skorper og for- dybede Ar, store brede, flade Pustler; Hudab- scesser; enkelte skidden- brune Skorper paa Ha- gen og Underlæben. Barnet er magert og vantrevent. | $\frac{7}{8}$ 56 | 13 | Ung. ceræ, Balneum, Pulv. in- fant, Es- sent. rheor. c. Ess. opii simpl. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeens sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|--------------------------------------|--|
| <p>$\frac{1}{2}$ 58. V. Kun Flekker paa Nates efter Saarene. Intet ved Genitalia. I Panden utydelige lysebrune Pletter. Over Fontanellamajor en gul Cruste af en Halvskillings Størrelse. Intet i Halsen.</p> | | <p>Indk. $\frac{1}{2}$ 58, udskr. $\frac{3}{4}$ 58. = 110.</p> |
| <p>$\frac{1}{4}$ 59. S. Intet syphilitisk Symptom synligt. Befindendet godt.</p> | | <p>Indk. $\frac{1}{2}$ 58, udskr. $\frac{1}{4}$ 59. = 122.</p> |
| <p>$\frac{3}{4}$ 59. S. En ubetydelig Excoriation paa Overlæben og den indvendige Flade af højre Kind; Arrer efter Saarene paa Over- og Underlæben bedækkede med tynd Hud. Intet i Halsen og ved Anus. Præputium fremdeles høvet og infiltreret; den lader sig nu trække tilbage, og hverken paa denne eller paa Glans sees noget Saar eller Excoriation.</p> | <p>I Februar 1860 frisk. (Voss).</p> | <p>Indk. $\frac{4}{5}$ 58, udskr. $\frac{3}{4}$ 59. = 141.</p> |
| | | <p>Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. $\frac{1}{2}$ 56, da det døde af Bronchit.</p> |
| | | <p>Indk. $\frac{1}{2}$ 56, døde $\frac{1}{4}$ 56 = 18.</p> |

Schematisk

Syphili-

b. Tidligere behand-

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage | | |
| 1 | 2 | 46 Qv. | Et stort serpiginöst Saar paa høire Laar, bruun- ligfarvede tyndhudede Cicatricer; gruppeviis situerede Hudtuberkler paa høire Scapula og andre Steder. | $\frac{1}{2}$ 55 | 73 | Solut. iodeti kal. | $2\frac{2}{3}$ 57 til $2\frac{8}{3}$ 57. Gruppeviis ci- tueret tuber- culöst Exaa- them i Ansigtet, paa Krop- pen og Over- extr., hvoraf flere Saar ere fremkomne. Beh. i 95 D. m. Syphilisat. Sol.iodet. kal. |
| 2 | 3 | 26 Qv. | Ulcus paa Palat. molle; ulcereret Hordeolum paa Palp. super. sinistra; crustöst Rhupiasaar imellem Mammæ; et stort Ulcus paa høire Laar. $\frac{1}{3}$ Superficielle Excoria- tioner paa Tandkjødet og Tungen. | $\frac{1}{2}$ 56 | 399 | Sol. iodeti kal., Tinct. iodii c. Sol. iodeti kal., Ferr. re- duct. | |
| 3 | 6 | 30 Qv. | Excoriat. genitalium, Ul- ceration paa Os uteri, paa Læberne og Ton- sillerne; papulöst Ex- anthem i Ansigtet og paa Extremit. | $\frac{3}{8}$ 55 | 274 | Solut. iodet. kal., Diæta parca. | |

Oversigt.

sation.

lede med Mercur.

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet: | Sedere Efterretnin- ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|---|--|
| <p>$\frac{1}{2}$ 56. Squamöst Exan- them i Panden; paa Ryg- gen rødbrune Pletter efter foregaaende Tu- berkler; Saaret paa Laa- ret tilhelet, men dets ene Rand bedækket med Skjæl.</p> <p>$\frac{3}{4}$ 57. V. Intet bestemt Tegn tilbage.</p> | | <p>Behandlet fra $\frac{1}{2}$ 51 til $\frac{1}{2}$ 54 for invetereret Sy- philis med alle mulige Curmethoder, tilsidst med Syphilisation fra $\frac{1}{2}$ 52 til $\frac{1}{2}$ 54.</p> <p>Indk. $\frac{1}{2}$ 55, udskr. $\frac{3}{4}$ 56. = 75.</p> <p>Recidiv. Indk. $\frac{3}{4}$ 57, udskr. $\frac{1}{4}$ 57. = 97.</p> |
| <p>$\frac{1}{2}$ 56. 5 Rhupiasaar paa Ryggen, Halsen og Bry- stet; tuberculöse Saar paa Tongen og det høi- re Kind; en fluctueren- de Svulst paa høire Ala nasi. Befindendet godt. Benytter kun Ferr. re- duct. $\frac{3}{4}$ 57. Et ernstøst Saar paa Ala nasi; Tom- terne efter Rhupia be- dækkede med tørre Skorper.</p> | <p>I 1859 om Høsten seet af Voss. Hun var i Tjeneste hos en Familie, og be- fandt sig da vel.</p> | <p>Mange Gange forhen be- handlet for invetereret Syphilis med alle mu- lige Curmethoder, ogsaa med Syphilisation.</p> <p>Indk. $\frac{1}{2}$ 56 og overflytte- des $\frac{1}{2}$ 56 til Chr. Byes Sygehuus, hvor hun be- handlede fra $\frac{1}{2}$ 56 til $\frac{1}{2}$ 57, da hun blev ud- skreven i Bedring, for i Drammens Sygehuus fremdeles at inoculeres. = 400.</p> <p>Staaer i W. Boecks Bog, 4de Observation, i Wild- hagens Beretning 9de Observation.</p> |
| <p>$\frac{3}{4}$ 56. S. Kun Tomterne af Exanthemet tilbage.</p> | | <p>Behandlet fra $\frac{1}{2}$ 54 til $\frac{3}{4}$ 55 med Cura Dzondi, Acid. nitr., Solut. iodei kal., Foniculus, Liqu. Dono- vani.</p> <p>Indk. $\frac{1}{2}$ 54, udskr. $\frac{3}{4}$ 56. = 536.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 4 | 10 | 26 Md. | 3 Ecthymapustler paa Præputium; paa Penis en Ulceration; paa ven- stre Tonsille hvidt Belæg. | $\frac{1}{1}$ ⁰ 56 | | Sol. iodeti kalici. | |
| 5 | 13 | 23 Qv. | Mange Ulcera paa begge Skinnebeen; næsten overalt paa Legemet brunlige med Squamæ bedækkede Tuberkler, hist og her staaende i klynger. | $\frac{1}{9}$ ⁸ 55 | 149 | Sol. iodeti kalici. | |
| 6 | 15 | 37 Qv. | 2 overfladiske Ulcera- tioner paa højre Smal- læg; paa flere Steder Ar efter foregaaende Ul- cerationer. | $\frac{2}{1}$ ² 56 | 121 | | |
| 7 | 16 | 36 Qv. | Paralyse i højre Arm og Been. | $\frac{7}{11}$ ⁸ 54 | | Sol. iodeti kalici. | |
| 8 | 17 | 28 Qv. | Eleverede Maculæ, til- deels ulcererende; Ar og Knuder i Periosteum paa Tibiæ. | $\frac{1}{17}$ ¹ 55 | 150 | Kali hy- droiod. | |
| 9 | 18 | 30 Md. | Ulcera paa det højre Been. | $\frac{2}{18}$ ⁴ 55 | 233 | Kali hy- droiod. | Senere Reci- div. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Sedere Efterretnin-ger om Patienten. | Anmærkuinger. |
|---|--|---|
| 1 ^o 56. Blaafarvede Ar efter Saarene paa Benene; ødematøs Hævelse omkring Smålæggene; paa begge Laars Yderflader og paa Nates spredte, ikke eleverede Tuberkler af blaabruun Farve. Befinder sig ellers vel. | | Salivationscur for 5 Aar siden. Indk. 1/2 56, udskr. 1/3 56. = 36. Behandlet for secundær Syphilis med mange Curmethoder (ogsaa Mercur). Indk. 1/2 55, udskr. 1/3 56. = 149. |
| 1 ^o 56. Over højre Tibia er der nylig brudt op et Saar. Lidt Ødem i Underextremiteterne. Almenbefindendet bedre. | Blev igjen indlagt 1/2 56 for Choleric og døde næste Dag. | I 3 Aars Alder Syphilis; siden den Tid underkastet forskellige Cure. Indk. 2/3 56, udskr. 1/8 56. = 123. |
| 1 ^o 56 (vide!). | I Marts 1856 død af Lungebetændelse i R.-H. med. Afd. Ved Obductionen fandtes ingen tydelige Forandringer i Hjernen. | Forskjellige Gange behandlet for secundær Syphilis med mange Midler. Indk. 1/4 52, udskr. 1/2 56. = 116. |
| 1 ^o 56. E. Saaret tilgroet. | Behandlet i R.-H. ch. Afd. for Saar med Syphilisation, Kali hydroiod. etc. (Steffens). | Behandlet for secundær Syphilis med forskjell. Midler (gjentagne Gange). Indk. 1/2 55, udskr. 2/3 56. = 473. |
| 1 ^o 56. Saaret holder sig tilgroet. Han er fuldkommen frisk. | | Behandlet forhen for Syphilis. Indk. 1/4 55, udskr. 1/8 56. = 254. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 10 | 11 | 38 Md. | Tertiære Ulcerationer paa Palatum durum, i Pharynx; Velum palat. næsten aldeles borte og Resterne sammenvoxede med Svælgets Vægge; paa Tungen Saar og tu- berculøse Svulster paa Halsen, i Nakken, paa Hovedet flere Ulcera- tioner etc. Patienten er mat og afmagret. Søv- nen ringe formedelst Dolores osteocopi. Paa Skinnebenene og Ulna Exostoser; deels Hyper- trophie, deels interstitiel Absorption af Ossa me- tacarpi i Phalanges di- gitorum. | 1/5 55 | 310 | Kali hy- droiod. | 1/5 56 til 2/5 57. Superficielle Excoriationer i Arvævet i Pharynx. Han befinder sig vel. Er mere smertefrie. Nattesøvnen noget urolig. Hans Udse- ende betyde- lig forbedret. Han har kun- net arbeide noget i Som- mer. Beh. i 249 Dage med Syphilisation, Kali hydro- iod., Lap. inf. |
| 11 | 20 | 34 Qv. | Tuberkler med Cruster ved venstre Næsevinge og nedad mod Mund- vinkelen. | 1/4 56 | 127 | Kali hy- droiod. | |
| 12 | 22 | 29 Md. | Paa Præput. ved Frenu- lum et Ulcus; paa Scro- tum Tubercula mucosa; i Panden Hudtuberkler; paa høire Tonsille et graahvidt Belæg; hovne Nuchalglandler. | 2/5 56 | 118 | | 2/5 57 til 2/6 57. Tuberc. mu- cosa paa Pe- nis og Scro- tum; i Ansigtet crustøse Saar; Svulst i høire Tibia; Haaret falder af. 2/6. Graat Belæg paa Ve- lum; Svulst i venstre Tibia; Affection af høire Albue- led. Beh. i 155 D m. Syphlsat. Decoct rad. sarsap. Essent gent. c. Aqu. rosar. Sol. iod. kal. Baln. vap. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|-------------------------------------|---|
| <p>2^o 56. Interstitiel Absorption i flere Phalanger. Forøvrigt Status omtrent den samme. Almeenbefindendet taaleligt. Søvnene daarlige.</p> <p>2^o 57. E. Hans Udseende godt.</p> | | <p>Behandlet for primær, secundær og tertiær Syphilis mange Gange med mange Slags Cure (ogsaa Mercur).</p> <p>Indk. 1^o 55, udskr. 2^o 56. = 340.</p> <p>Recidiv. Indk. 1^o 56, udskr. 2^o 57. = 249.</p> |
| <p>2^o 56. Huden paa Næsen holder sig fremdeles noget rødlig. Forøvrigt endnu nogle smaae Tuberkler paa Næsen og Overlæben.</p> <p>2^o 56. Exanthemet omtrent det samme. Større Saar paa begge Tonsiller og et ved Radix linguae.</p> <p>2^o 57. S. paa Præputium Spor efter de serpiginøse Saar. Intet paa Scrotum: I højre Supraorbitale-region Spor af smaae Tuberkler. Exostosen uforandret. Ingen Smerter. Befindendet godt.</p> | | <p>I 1853 og 1854 behandlet for secundær Syphil. med Cur. Dzondi og Kali hydr.</p> <p>Indk. 1^o 56, udskr. 2^o 56. = 127.</p> <p>Fra 1^o 55 til 2^o 55 behandlet for secundær Syphilis med Kali hydroiod.; for dette med Mercurialpulvere.</p> <p>Indk. 3^o 56, udskr. 2^o 56. = 119.</p> <p>Recidiv. Indk. 2^o 57, udskr. 2^o 57. = 155.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 13 | 24 | 30 Qv. | Intet syphilitisk Symp- tom. | $\frac{2}{2}$ 56 | | | |
| 14 | 27 | 23 Md. | Graalig - brune Cruster paa flere Steder af Le- gemet; store dybe Saar paa Memb. post. phar- yngis. | $\frac{1}{2}$ 56 | 90 | Kali hy- droiod. | |
| 15 | 28 | 29 Md. | Paralyse i høire Arm og Been etc. | $\frac{1}{8}$ 56 | 86 | Kali hy- droiod. | |
| 16 | 31 | 12 Ug. Md. | Papuløst Exanthem paa Legemet. $\frac{2}{6}$ Ulceratio- ner i Ansigtet, ved Anus og paa Laarenes Bag- flade. | $\frac{2}{8}$ 56 | 93 | Kali hy- droiod. | |
| 17 | 32 | 41 Qv. | Paralyse i den høire Side. Fatua. Epilepsie. | $\frac{2}{8}$ 56 | 831 | Kali hy- droiod. | |
| 18 | 34 | 39 Qv. | Store Ulcera paa høire Been og Fod. | $\frac{2}{4}$ 56 | | Kali hy- droiod. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|---|--|
| 1 ^o 56. Kun et crustøst Saar i Hovedet. Fremdeles cachectisk Udseende. Han befinder sig forøvrigt vel. | I Juni 1860 frisk. I Begyndelsen af 1858 født et Barn, som ogsaa er frisk, men skal have haft Syphilis, der er svunden uden Behandling. | Fra 1 ^o til 1 ^o 49 behandlet i Hospit. for secundær Syphilis med Cura Dzondi. Indk. 3 ^o 56, udskr. 1 ^o 56. = 121. |
| 3 ^o 56 (vide!). | 3 ^o 57 indlagdes han i det chroniske Sygehus, hvor han døde nogle Timer efter (bilateral Pneumonie). | Behandlet mange Gange forhen med forskjellige Midler, blandt andre ogsaa med Syphilisation et Par Gange. Indk. 1 ^o 56, udskr. 1 ^o 56. = 90. |
| 1 ^o 58. Status idem. | I Febr. 1854 behandlet for secundær Syphilis med Cura Dzondi. Indk. 1 ^o 56, udskr. 1 ^o 56 i Bedring. = 112. | I 3 Uger Calomel. Indk. 2 ^o 56, udskr. 2 ^o 56, da Barnet døde af Krampe. = 93. (Hypertrophia lienis; forstørrede Gland. mesentericæ, Lungerne propede med Tuberkler). |
| 1 ^o 58. Status idem. | Skal være behandlet for Syphilis med Mercurialia. Indk. 2 ^o 56, udskr. 1 ^o 58, da hun døde. = 831. | Har benyttet mod Saarene Mercurialmidler indvendigt og udvendigt; om Syphilis vides ingen Besked. Indk. 1 ^o 54, udskr. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 19 | 37 | 26 $\frac{1}{2}$ Qv. | Paa Halsen, i Nækken og i Ansigtet tuberculöst Exanthem; Svulst i ven- stre Tibia. $\frac{2}{3}$. Papulo- vesiculöst Exanthem i Ansigtet. $\frac{2}{5}$. Paa den høire Fods indvendige Rand en ophøiet rød Plet, desquamerende. | $\frac{2}{4}$ 56 | 98 | Kali hy- droiod. | |
| 20 | 38 | $\frac{3}{4}$ Md. | Tuberc. mucosum ved Anus; i venstre Mund- vinkel Exsudat; i Svæl- get Exsudater. | $\frac{2}{4}$ 56 | 98 | | |
| 21 | 40 | 25 Md. | Ulceræ glandis & præ- putii; hovne Inguinal- glandler; desquamerende Flekke i Panden. Go- norrhoe. $\frac{1}{2}$. Hvidt Be- læg paa Tonsillerne. | $\frac{2}{3}$ 56 | 92 | Thea del- mulcens., Pilul. cu- bebar. | |
| 22 | 45 | 31 Md. | Tibiæ, Radii & Ulnæ hovne og meget øm- findtlige; heftige natlige Smerter, Emaciation, Mæthed, alm. Ildebefin- dende. $\frac{1}{2}$. Ulcerationer paa Tonsillerne. | $\frac{1}{6}$ 56 | 94 | Sol. chlo- ret. amm., Kali hy- droiod., Acet. morph., Pulv. stib., Pil. cynogl. Dampbad. | |
| 23 | 50 | 31 Qv. | Paa venstre Læg en Mængde Ar. Et Gumma findes nu sammesteds. Parese i venstre Fods Tæer; Smerter i venstre Hofte. Tæerne og Fod- bladet noget anæsthe- tiske. | $\frac{2}{4}$ 56 | 86 | Kali hy- droiod. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet, | Senere Efterretnin-ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|---|---|
| <p>3⁴ 56. Paa høire Side af Halsen nogle faae Tuberkelknuder. Det acute Exanthem næsten svundet; Pletten paa høire Fod fremdeles tilstede; Ophovningen paa venstre Tibia smerter om Natten.</p> | <p>3⁴ 56. I Ansigtet fremdeles smaae ophøiede Pletter af suspect Udseende. Exostoser paa venstre Tibia fremdeles smertende Arret efter det serpigiøse Saar paa høire Fods indvendige Rand fremdeles besat med Skjæl i Peripherien.</p> | <p>For constitutionel Syphilis behandlet med forskjellige Mercurialpræparater. Indk. 3⁴ 56, udskr. 3⁴ 56. = 98.</p> |
| <p>3⁴ 56. De syphilitiske Symptomer svundne. Befinder sig vel.</p> | | <p>Fra 1^o 55 til 3^o 56 behandlet for Tuberc. mucosa med Calomel og Sublimatbade. Indk. 3⁴ 56, udskr. 3⁴ 56. = 98.</p> |
| <p>3⁴ 56. Udflødet ophørt. Et lidet Saar med hvid Bund i Frenulum. Noget hovne Inguinalglandler. Intet i Halsen. Befindendet godt.</p> | | <p>Behandlet 1/2 Aar iforveien for Saar paa Penis, Exanthem og Halssmerter med Diaphoretica, Chlorvand og hvide Pulvere. Indk. 3⁴ 56, udskr. 3⁴ 56. = 93.</p> |
| <p>3⁴ 56. S. Hævelsen i begge Tibiæ ubetydelig; paa Extr. inferior radii dextri en fremstaaende Beensvulst. Fri for alle Smerter. Befinder sig vel, men er meget mat. Seer medtaget ud.</p> | | <p>Har været 2 Gange behandlet i Hosp. for Syphilis med Sublimatpiller og Kali hydroiod. Indk. 3⁴ 56, udskr. 3⁴ 56. = 103.</p> |
| <p>3⁴ 56. S. Saaret tilhelet.</p> | | <p>Behandlet i Hosp. med Cura Dzondi og flere Gange med Kali hydroiod. Indk. 3⁴ 56, udskr. 3⁴ 56. = 91.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 24 | 51 | 25 Qv. | Syphilidophobie etc. | $1\frac{9}{10}$ 56 | 165 | Kali hy- droiod. | |
| 25 | 55 | 29 Qv. | Ulcerationer i begge Næsebor. Haaret næsten affaldet. | $\frac{2}{3}$ 56 | 84 | Kali hy- droiod., Vesicat. | |
| 26 | 63 | 32 Md. | Pustuløst Exanthem; hovne Nuchalglandler; Tubercula mucosa ved Anus; Halsaffection; Blennorrh. urethralis. | $2\frac{7}{8}$ 56 | 111 | Kali hy- droiod., Pulv. Dov., Vesicat., Lap. inf. | |
| 27 | 66 | 31 Md. | Flere store Ulcerationer paa venstre Læg. | $\frac{2}{3}$ 56 | 151 | Fotus aquosus. | |
| 28 | 68 | 29 Md. | Paa begge Underarme og paa begge Skuldre flade Tuberkler, tildeels bedækkede med Cruster; Corona venerea; papulo- pustuløst Exanthem i Nakken. Blennorrh. ure- thralis. $\frac{2}{3}$. Erysipelas pectoris. | $1\frac{3}{8}$ 56 | 103 | Bals. co- paivæ, Pulv. re- frig., Ung. lap. inf., $\frac{2}{3}$ Deri- vations- cur. | $\frac{4}{5}$ 57 til Exanthem paa Armene og Saar paa den indvendige Si- de af begge Laar. Beh. m. Kali hydro- iod., Empl. merc. |

| Patientens Tilstand paa den Dag. Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|---|---|
| 1 $\frac{1}{2}$ 56. E. Remitterende Smerter i den nederste Deel af Rygraden. | | Behandlet for 5 Aar siden i Hospitalet med Cura Dzondi. Indk. 1 $\frac{1}{2}$ 56, udskr. 1 $\frac{1}{2}$ 56. = 165. |
| 2 $\frac{1}{2}$ 56. Alle syphilitiske Symptomer svundne. | I September 1859 i Fødselsstiftelsen; Barnet skal have været syphilitisk. | Behandlet fra August 1855 til 27de Februar 1856 for constitutionel Syphilis med Cura Dzondi og Kali hydroiod. Indk. 1 $\frac{1}{2}$ 56, udskr. 2 $\frac{1}{2}$ 56. = 86. |
| 4 $\frac{1}{2}$ 56. S. Omkredsen om Orific. ani noget rød, og Tomterne efter Tuberc. mucosa paa enkelte Steder fremdeles noget prominierende. Almeenbefindendet godt. | | Behandlet i April for indureret Chancker paa Glans med Piller og Ungu. neapol., Pulv. alterans. Indk. 3 $\frac{1}{2}$ 56, udskr. 4 $\frac{1}{2}$ 56. = 112. Confluerende Inoculations-saar paa Laarene. |
| 4 $\frac{1}{2}$ 56. E. Ulcera tilhelede. En Cruste paa Fontanellesaaet. Men Benet er idag hovent og blaåt, da han har gaaet meget uden Expulsivbind. | | For 10 Aar siden behandlet i Hospitalet for Ulcera penis med Calomel. Indk. 4 $\frac{1}{2}$ 56, udskr. 4 $\frac{1}{2}$ 56. = 151. |
| 2 $\frac{1}{2}$ 57. S. I Panden kuns Tomter efter Exanthemet. Paa venstre Albue og paa begge Skulderblad nogle ophøiede, tildeels med Skjæl bedækkede Pletter. De crustøse Saar i Hovedet forsvundne. Befindendet godt. | | Behandlet fra 2 $\frac{1}{2}$ 55 til 4 $\frac{1}{2}$ 55 for secundær Syphilis med Cura Dzondi og Dieta parca. Indk. 1 $\frac{1}{2}$ 56, udskr. 2 $\frac{1}{2}$ 57. = 169. Recidiv indk. 4 $\frac{1}{2}$ 57 til |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 29 | 71 | 60 Qv. | Et større og mindre chronisk Saar paa høire Smallæg. Parese i høire Overextremitet. ¹ / ₈ 57. Gonarthrocace sinistra. | ¹ / ₈ 56 | | Æther sulphur. c. Tinct.iodii _{aa} , Hef- plaster. | |
| 30 | 74 | 18 Qv. | Ulcererende Tuberc. mu- cosa genitalium. Ton- sillerne opsvulmede. | ² / ₈ 56 | 162 | | |
| 31 | 80 | 48 Qv. | Ulcera chronica paa venstre Been; Cicatricer i Omfanget; ogsaa Ci- catricer paa begge Skin- nebeen; knudrede Ujevnheder paa begge Tibiæ; Næsen indsun- ken; i venstre Superci- lium et Ar og en For- dybning i Benet; ved venstre Haandled et stort dybt Ar; paa Skuldrene og venstre Mamma flere Ar. | ³ / ₉ 56 | 208 | Fotus aquosus, Hefpla- ster. | |
| 32 | 83 | 29 Md. | Tuberculöse Syphilider paa Næsen; hovne Nu- chalglandler. Paa Krop og Laar et papulo-vesi- culöst Exanthem af tem- melig intens Rødhed, uden syphilitisk Charak- ter. Belæg paa den høire Tonsille. I ven- stre Inguen store Ar efter Buboner. | ¹ / ₉ 56 | 133 | Sol. iodeti kalici. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeens sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|-------------------------------------|---|
| | | <p>For samme Affection behandlet flere Gange med forskjell. Midler, blandt andre med Cura Dzondi og Kali hydroiod. Syphilis benegtes.</p> <p>Indk. $\frac{3}{8}$ 56, udskr. $\frac{3}{8}$ 58. = 599.</p> <p>$\frac{3}{8}$ 58. Amputation af venstre Laar. Hun døde samme Dag.</p> |
| <p>457. V. Intet syphilitisk Symptom bemærkes.</p> | | <p>Behandlet fra $\frac{3}{8}$ til $\frac{3}{8}$ 56 for secundær Syphilis med Emulsio sublimat. og local Behandling.</p> <p>Indk. $\frac{3}{8}$ 56, udskr. $\frac{3}{8}$ 57. = 168.</p> |
| <p>$\frac{3}{8}$ 58. E. Saarene tilhelede; eet bedækket med Skorpe.</p> | | <p>Behandlet for 17 Aar siden for Saar paa forskjellige Steder med Mercur til Salivation.</p> <p>Indk. $\frac{3}{8}$ 56, udskr. $\frac{3}{8}$ 58. = 566.</p> |
| <p>$\frac{3}{8}$ 57. Arrene paa høire Side af Næsen reticulært fordybede, blege; paa venstre Side en Pustel med indureret Omfang. I Panden og paa begge Skulderblad Tomter efter Pustler. Befindendet godt.</p> | | <p>Behandlet i 1854 i Gøteborg med Piller for Chankre og Bubo.</p> <p>Indk. $\frac{3}{8}$ 56, udskr. $\frac{3}{8}$ 57. = 134.</p> <p>Reist til Gøteborg. Indkom i 1859 paa Sygehuset sammesteds, behandledes med Cura Dzondi og Diæta parca. Behandlet her fra $\frac{3}{8}$ til $\frac{3}{8}$ 61 for Ulcus nasi med Solut. iod. kal.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|
| | | | | Syphilitationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 33 | 86 | 18 Md. | Ostitis & Periostitis i venstre Crus, der er meget hovent; Coxitis sinistra. | 1 ⁸ ₉ 56 | 264 | | |
| 34 | 92 | 28 Qv. | Exsudater paa Tonsil- lerne $\frac{3}{4}$. Ulcerat. paa Palat. durum. | 2 ⁴ ₉ 56 | 202 | Ung. ceræ c. Op., Pulv. Dov., Inf. hb. hyosc., Sol. iodeti kal., Lap. infern. | |
| 35 | 97 | 21 $\frac{1}{2}$ Md. | Begge Tibiæ hovne; paa venstre Been en Gum- ma; paa det høire et Ulcus; Extremitas in- ferior humeri sinistri svullen; i Panden store superficielle Saar; min- dre Saar i Ansigtet og paa Kroppen; smaae Hudabscesser paa Ryg- gen; crustøse Saar i Hovedet; Proc. alveo- laris i begge Maxillæ hoven; cariøse Tænder. | 1 ¹ ₁₀ 57 | 135 | Decoct. chinæ acid., Catapl. emoll., Empl. ad- hæsiv., Sol. iodeti kalici. | 1ste Recidiv $\frac{1}{7}$ 58 til Exostoser i Tibiæ; Stiv- hed i Albue- ledene; Ex- coriat. paa Gingivæ og Tungen. Beh. med Balnea vaporosa. 2det Recidiv $\frac{3}{4}$ 59 til $\frac{1}{2}$ 59. Dybe Saar ved Ang.dext.oris, paa Tungen etc. Beh. i 157 D. med Piller og Decoct. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|-------------------------------------|--|
| <p>§ 57. E. Hævelsen i Tibia synes at være noget formindsket; paa Indsiden af Benet er Huden rødlig og øm. Hans Udseende er meget bedre end ved Indlæggelsen. Han føler sig vel.</p> | | <p>Behandlet for 14 Aar siden med Mercur for Syphilis. Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. § 57. = 264.</p> |
| <p>§ 57. V. Paa Kindet en liden hvid Ring efter en foregaaende Excoriation. Befindendet godt.</p> | | <p>Behandlet i Begyndelsen af Aaret i Bergens Sygehuus med Cura Dzondi mod constitutionel Syphilis. Indk. $\frac{2}{3}$ 56, udskr. $\frac{1}{4}$ 57. = 202 I 3 Uger før Indlæggelsen syphiliseret. Phagedænisme i Inoculationssaarene.</p> |
| <p>§ 57. Snaarene paa Benene tilbeledede; Exostoserne uforandrede. Kobberrode Hudtuberkler i Panden, exulcererende paa Spidsen. Befindendet godt.</p> | | <p>Efter Prof. W. Boecks Liste er han bleven behandlet med Mercur for 15 Aar siden. Indk. $\frac{7}{8}$ 56, udskr. § 57 til Tugthuset. = 137. Recidiv § 58 til Recidiv $\frac{1}{2}$ 59 til § 59.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syphilitationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 36 | 99 | 41 Qv. | Paa høire Læg en Mængde større og mindre Ulcera. Paa begge Been, paa Ryggen, Halsen og Brystet mange Ar efter Saar; i Svælget ligeledes Ar. | 156 | 74 | | |
| 37 | 102 | 23 Qv. | Tuberc. mucosa paa Labia majora; blaalig-brune Pletter hist og her paa Kroppen. Nedenfor venstre Albue paa Extensionssiden en uømfindtlig, jevn Knude af en Ærts Størrelse. 2 ^o 57. Paa høire Fodblad squamöse Maculæ; paa begge Ulnæ nær Olecranon en ærtstor Exostose. | 156 | 177 | Inf. hb. hyosc., Cuc. cruentæ, Sol. iodeti kal. | |
| 38 | 103 | 26 Qv. | Tubercula mucosa ved Anus, paa Laarenes indvendige Flade, paa Mons Veneris; i Nakken og paa Halsen papuløst Udslag; Ulcerationer paa Tonsillerne og Velum palat. 1 ^o . Crustøse Saar i Hovedet; Saar i høire Mundvinkel og paa Underlæben. | 156 | 102 | Emulsio Chloreti hydrarg. corros., Decoet. lig- nor., Sol. nitrat. kal., Liqu. Bel- losti, Sol. iodeti kal., Diæta par- ca., Venæ- sectio, Ess. op. simpl., Hirudin., Linim. re- solv., Ca- lomel, Acid. hy- drocyanic. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|---|--|
| <p>§ 57. E. Saarene tilhelede. Centralfladerne af blåelig Farve. Hun befinder sig vel.</p> | | <p>Fra § 38 til § 38 behandlet med Formeringscur for Saar ved Genitalia; 4 à 5 Maanedere samme Cur 4 Gange i Chr. Byes Sygehuus.</p> <p>Indk. § 56, udskr. § 57. = 82.</p> |
| <p>§ 57. E. Paa venstre Arm ved Albueledet en nært stor Knude i Huden. Ved Genitalia kun Tomter efter Tuberc. mucosa. Afskalling i Planta pedis dextr.</p> | <p>Den 8de Mai 1858 døde hun i Fødselsstiftelsen af Febris puerp., efter 8 Dage iforveien at have født et tilsyneladende friskt Barn.</p> | <p>Behandlet fra § 55 til § 56 for Tuberc. mucosa og papuløst Udslag med Cura Dzondi, Solut. nitrat. hydrargyr.; Sol. iodeti kalici, diæta parca og Sublimatemulsion.</p> <p>Indk. § 56, udskr. § 57. = 119.</p> |
| <p>§ 57. V. Intet syphilitisk Symptom. Noget anæmisk Udseende.</p> | | <p>Indk. § 56, udskr. § 57. = 292.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|---|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 39 | 104 | 27 Md. | Smerter i Hovedet, Susen for Ørene og Tunghø- righed; snøvlede Stem- me. Cicatriceret Aab- ning i Palatum durum af $\frac{1}{4}$ Tommes Diameter. | $1\frac{1}{2}$ 56 | 151 | | |
| 40 | 109 | 54 Md. | Et stort Ulcus paa For- fladen af højre Læg; et mindre ved Siden. | $1\frac{1}{2}$ 56 | 174 | Empl. adhæsiv. | |
| 41 | 110 | 35 Qv. | Forskjellige nervøse Symptomer. $\frac{2}{3}$ 57. Fissur ved Anns. $\frac{2}{3}$. Flug- tende Smerter i Hovedet. | $\frac{2}{3}$ 56 | 133 | Acid. nitr. fumans, Vesicat, Pilul. Dov. | |
| 42 | 112 | 20 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia, om Anus og paa den øverste Deel af Laa- rene; Ulcerationer paa Skamlæbernes indven- dige Flade; begge Ton- siller hovne og ulcere- rede; papuløst Exanthem paa Kroppen, især i Nakken. | $2\frac{1}{2}$ 56 | 219 | Sol. iodeti kalici, Hirudines, Inf. rheor. c. Æther. alcoh., Ess. opii simpl., Ess. ferulæ c. Liqu. antisp., Vesicat., Lap. inf. Decoct. sarsapar. | 1ste Recidiv $\frac{2}{3}$ 57 til $\frac{2}{3}$ 57. Tuberc. mu- cosa paa Lab. majora; Be- læg paa begge Tonsiller. Beh. i 53 D. med Diæta parca, Pilul. conii maculat. Decoct. sar- saparillæ. 2det Recidiv $\frac{1}{11}$ 59. Serpi- ginøse Saar paa Lab. ma- jora. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|--|--|
| <p>$\frac{3}{4}$ 57. Hosten ophørt. Hovedpine mindre.</p> | <p>$\frac{1}{2}$ 58. Aabningen i Palat. melle godt cicatriceret; Ossa nasi noget tumificerede. Befindendet er i det Hele taget godt; kun af og til Suse for Ørene og Hovedpine.</p> | <p>Behandlet 5 Gange for Syphilis med Calomel, Cura Dzondi, Kali hydroiod., Diæta parca etc.; tilsammen 2 Aar i Hospitalet. Indk. $\frac{7}{8}$ 56, udskr. $\frac{3}{4}$ 57. = 154. 1 Marts Pneumonie.</p> |
| <p>$\frac{1}{8}$ 57. Saarene tilhelede.</p> | | <p>Behandlet i de yngre Aar for constitutionel Syphilis med Mercur. Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. $\frac{7}{8}$ 57, da han døde. = 174.</p> |
| <p>$\frac{1}{8}$ 57. V. Hun lider for nærværende ikke af Flugt i Hovedet eller Legemet. Hun synes selv, at hun er bedre. Udseendet mindre cachectisk.</p> | | <p>Behandlet i 233 Dage i Aarene 1853 og 1854 for Syphilis med Protoioduret hydr., Kali hydroiod., Cura Dzondi og Diæta lactea. Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. $\frac{1}{2}$ 57. = 136.</p> |
| <p>$\frac{3}{4}$ 57. S. Alle syphilitiske Symptomer forsvundne. Befindendet godt.</p> | | <p>Behandlet over 1 Aar iforveien for constitutionel Syphilis med Cura Dzondi og Sarsaparillectort. Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. $\frac{3}{4}$ 57. = 221. Recidiv. Indk. $\frac{3}{4}$ 57, udskr. $\frac{2}{3}$ 57. = 53. Recidiv. Indk. $\frac{1}{2}$ 59, udskr.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilitationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 43 | 115 | 43 Qv. | I Panden og paa For- hovedet en Mængde overfladiske, rødlige, stribede Ar, paa enkelte Steder ulcererede og be- dækkede med tykke gule Skorper; Haaret borte paa disse Steder. Lig- nende Ar findes paa høire Forarm, venstre Overarm, i Nakken, paa begge Scapulæ; midt paa Korsryggen et stort Ar, der hist og her er ulcereret og besat med Skorper. Begge Knæ- led contracte i ret Vinkel. | $\frac{3}{12}$ 56 | | | |
| 44 | 117 | 23 Qv. | Intet syphilitisk Symp- tom. | $\frac{4}{1}$ 57 | 114 | | |
| 45 | 118 | 24 Qv. | Flere større og mindre Ulceræ paa høire Smal- læg. Paa Læggen, Læ- rene, i Nakken, paa Ryggen imellem Skul- drene og paa Underar- mene Ar efter tidligere Saar. | $\frac{8}{1}$ 57 | | | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|---|--|
| | | For 6 Aar siden behandlet med Mercur for Syphilis. Indk. 2 ^o 56, udskr. 1 ^o 58, da hun døde af Phthisis, = 467. |
| 3 ^o 57. V. De artificielle Saar tilhelede. Befinder sig vel. | 2 ^o 58 fødte hun et Barn, der led af Pemphigus og døde efter 3 Ugers Forløb. Konen behandles i Hudsygeafdelingen for Pleurit fra 1 ^o 58; 2 ^o overflyttedes hun til den medicinske Afdeling, hvor hun døde. | Behandlet i 1851 for secundær Syphilis med Cura Dzondi. Indk. 4 ^o 57, udskr. 2 ^o 57. = 114. 1ste Barn døde syphilitisk i Hospit. i 1851. 2det Barn behandlet for Syphilis. 3die Barn død syphilitisk i Hospit. i 1857. 4de Barn led af Pemphigus og døde i 1858. |
| 4 ^o 57. E. Saaret gjen-groet. Arret efter det sidste Saar er fast; Huden tynd. Hun er i alle Henseender frisk. | | I 1854 og 1855 behandlet for constitutionel Syphilis med Sublimat, Liq. Bellosti, Kali hydroiod. Indk. 2 ^o 57, udskr. 4 ^o 57. = 129. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 46 | 122 | 38 Md. | I Panden en Gumma; et Ulcus paa Membr. post pharyngis; paa forskjellige Steder af Legemet store Flekker, besatte med Cruster; begge Tibiæ ujevne. | $\frac{3}{4}$ 57 | 144 | Catapl. emoll. Ve- sicat., Sol. iodeti ka- lici, Baln. vaporosa. | |
| 48 | 128 | 17 Qv. | Begge Tibiæ opsvul- mede, især Extremitas inferior. Større og min- dre Ar paa venstre Læg, paa venstre Brystside, ved venstre Albue. | $\frac{4}{5}$ 57 | 145 | Sol. iodeti kalici. | |
| 49 | 129 | 34 Qv. | Et stort stort Ulcus paa Membrana posterior pharyngis. | $\frac{1}{8}$ 57 | 37 | Sol. iodeti kalici. | |
| 50 | 131 | 11 Md. | Hævelse i Extremitas superior tibiæ sinistræ. Et fordybet Ar i Palat. durum. Tuber frontale dextrum noget promi- nerende. | $\frac{4}{5}$ 57 | 136 | | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|---|
| <p>$\frac{2}{8}$ 57. S. Smerter fremdeles i Tibiæ; Superf. interna, især paa venstre Tibia knudet. Susen for Ørene borte. Der er betydelig Perforation af Septum nasi, som muligviis længe har været tilstede. Almeenbefindendet ret godt, og noget bedre end ved Indlæggelsen i Hospitalet.</p> | | <p>I 1854 og 1855 3 Gange behandlet for constitutionel Syphilis med Cura Dzondi, Iodmixture, Sarsaparilledecoct, Ungu. neapolit. Indk. $\frac{2}{8}$ 57, udskr. $\frac{2}{8}$ 57. = 145.</p> |
| <p>$\frac{2}{8}$ 57. Beensvulsten i Tibiæ omtrent uforandret. Forøvrigt er hun vel.</p> | | <p>Skal tidligere være behandlet med Mercur. (Boeck). Indk. $\frac{2}{8}$ 57, udskr. $\frac{2}{8}$ 57. = 152.</p> |
| <p>$\frac{1}{4}$ 57. Ingen syphilitiske Symptomer. Saaret i Svælget tilhelet. Begyndelsen af Oesophagus forsnevret. Befindendet godt.</p> | | <p>Behandlet fra $\frac{1}{1}$ 50 til $\frac{1}{2}$ 51 for secundær Syphilis med Cura Dzondi, fra $\frac{1}{2}$ 51 til $\frac{1}{8}$ 52 for serpiginoise Saar med Inunctiones mercuriales & Solut. iodeti kalici, fra $\frac{1}{4}$ 52 til $\frac{1}{1}$ 55 for Ulcerationer i Fauces med Syphilisation. Indk. $\frac{1}{2}$ 57, udskr. $\frac{1}{4}$ 57. = 38.</p> |
| <p>$\frac{1}{4}$ 57. E. Hævelsen ved Knæet mindre. Gaaer bedre. Hun spadserer daglig uden Krykke eller Stok.</p> | <p>Indkom med Recidiv paa Børnehospitalet. Frisk 1863.</p> | <p>Indk. $\frac{1}{4}$ 57, udskr. $\frac{1}{4}$ 57. = 136.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilitationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 51 | 132 | 31 Qv. | Et stort Ulcus paa ven- stre Skinnebeen. Ar paa begge Skinnebeen efter foregaaende Ulcera. | 1/4 57 | 79 | Fotus aquosus. | |
| 52 | 134 | 24 Qv. | Intet Tegn paa Syphilis. | 1/4 57 | 110 | Tinct. rheor. c. Liqu. anodyn. | |
| 53 | 135 | 54 Md. | Flere fistuløse Aabninger i Scrotum, der er bety- delig fortykket og sam- menskrumpet; omkring Penis i Regionen af Col- lum 2 store Ulcera; Phimose. Paa Forfladen af Brystet nedad flere større og mindre Ulcera. | 3/4 57 | 114 | Chlorvand Sol. iodeti kalici. | |
| 54 | 137 | 21 Qv. | Større og mindre Saar paa Overlæben og Basis nasi med Fortykkelse af de omgivende Dele; de- form Næse; perforeret Septum; Ulcera i Pala- tum durum. | 1/4 57 | 103 | Sol. iodeti kalici. | 2/8 58 til 7/11 58 Crustøse Saar ved venstre Ala nasi; Pa- latum durum gjennembrudt paa flere Ste- der med en sinuøs Ulce- rationsflade. Beh. i 33 D. med Syphili- sation. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patientens. | Anmærkninger. |
|---|--------------------------------------|--|
| <p>¶ 57. E. Saaret gjen-groet; paa det sidst til-groede Sted er Over-huden endnu tynd og lidt blaaagtig. Frisk forresten.</p> | | <p>For 2 Aar siden laae hun under Lægebehandling for Saar paa Genitalia; 1 Aar senere begyndte Saarene paa Læggene, og da Behandling med Mercur og Decort. sar-saparillæ.</p> <p>Indk. ¶ 57, udskr. ¶ 57. = 108.</p> |
| <p>¶ 57. Befindendet godt.</p> | | <p>2 Gange behandlet for constitutionel Syphilis med Protoioduret. hydr. og Iodkalium.</p> <p>Indk. ¶ 57, udskr. ¶ 57. = 112.</p> |
| <p>¶ 57. Saarene overalt i Tilheling; Præputium er ødematöst. Næsten ingen Smerter i Benene.</p> | | <p>For 15 Aar siden behandlet med Piller og blank Mixtur for Ulcera paa Penis.</p> <p>Indk. ¶ 57, udskr. ¶ 57. = 116.</p> |
| <p>¶ 57. Alle Saar tilhe-lede.</p> | | <p>Fra ¶ 13 til ¶ 44 behandlet for constitutionel Syphilis med Cura Dzondi; i 1855 Saar i Halsen, hvorimod an-vendtes Iodmixtur.</p> <p>Indk. ¶ 57, udskr. ¶ 57. = 103.</p> |
| <p>¶ 58. Alle Saar tilhe-lede. Mindre Hoved-pine.</p> | | <p>Recidiv ¶ 58 til ¶ 58. = 33.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 55 | 141 | 20 Md. | Perforerende Saar i Ve- lum palatinum; dybt Ul- cus i den venstre Ton- sille; foran Angulus dexter en Svulst i Max- illa inferior; nogen Svulst paa den indvendige Rand af begge Tibiæ henimod Extr. inferior. | $\frac{4}{3}$ 57 | 164 | Sol. iodeti kalici. | |
| 56 | 149 | 48 Qv. | Paa højre Crus flere ser- piginöse Saar, og oven- for samme glindsende Ar; paa begge Nates landkartlignende Ar; li- geledes paa den venstre Hofte, hvor der tillige er crustøse Saar; paa venstre Forarm lignende Ar og Ulcerationer; paa højre Arm Ar. | $\frac{1}{2}$ $\frac{8}{5}$ 57 | 112 | | |
| 57 | 157 | 22 Qv. | Tuberc. mucosa paa La- bia majora, ved Anus, under begge Mammæ, paa Tungen; Belæg paa Tonsillerne. | $\frac{2}{3}$ 57 | 107 | | |
| 58 | 160 | 28 Qv. | Serpiginöse Saar paa højre Brystside. I Om- kredsen store hvide Ar, ligeledes paa Hosten, Skuldrene og Ryggen. | $\frac{2}{10}$ 57 | 139 | | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|---|--|
| <p>† 57. S. Perforationen i Palatum molle er saaledes udfyldt, at Saar-randene ligge sammen; de ere overhudede. Svulsten paa Maxilla inferior paa det nærmeste forsvunden. Almeenbe-findendet godt.</p> | | <p>Behandlet fra $\frac{1}{11}$ 48 til $\frac{1}{2}$ 48 for secundær Syphi-lis med Cura Dzondi. Indk. $\frac{1}{8}$ 57, udskr. $\frac{1}{10}$ 57. = 164.</p> |
| <p>§ 58. V. Saaret paa høire Crus ikke aldeles til-groet, tildeels bedækket med Skorpe. Paa ven-stre Underarm fra Olecra-non nedover spredte Tuberkler, bedækkede med Cruster. Intet i Halsen.</p> | | <p>Indk. $\frac{1}{10}$ 57, udskr. $\frac{1}{8}$ 58. = 117.</p> |
| <p>† 57. Intet i Halsen og Munden. Intet ved Ge-nitalia. Tuberc. mucosa ved Anus.</p> | <p>I Octbr. 1858 fødte hun i Stiftelsen et Barn, der var for tidligt født og døde efter 8 Dage af Atro-phie. Moderen blev indlagt i Hudsygeafd $\frac{1}{10}$ fra Stiftelsen for Knuder i Labia ma-jora og ved Anus; men blev udskreven igjen $\frac{1}{11}$, uden at Noget var blevet anvendt.</p> | <p>Har været behandlet lo-calt og faaet et Pulver 2 Gange daglig. Indk. $\frac{1}{10}$ 57, udskr. $\frac{1}{8}$ 58. = 108.</p> |
| <p>§ 58. Ingen Hævelser mere. Af og til Smer-ter i Lemmerne og Sus-sen i Hovedet. NB. Det høire Kravebeens Ster-nalende lidt tykkere end det venstres. Forfladen af høire Tibia opad mere hvælvet end den venstre.</p> | | <p>Behandlet i 1852 for se-cundær Syphilis med Cura Dzondi og lodkali og i 1855 for Ulcera med Syphilisation. Indk. $\frac{1}{10}$ 57, udskr. $\frac{1}{8}$ 58. = 141.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--|---|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 59 | 163 | 43 Md. | Næseryggen noget de- primeret; den nederste Deel af Næsen rød og svullen; gullbrune Skor- per i begge Næsebor, hvoraffødt Lugt. Brun- lige Decolorationer af Huden paa begge Crura og paa det venstre des- uden en tyk brun Skor- pe. Udflod af Urethra. | $\frac{1}{2}$ ⁵⁷ | 71 | Sol. iodeti kalici. | |
| 60 | 178 | 15 Qv. | Større og mindre ure- gelmæssige Saar paa venstre Crus, Benet for- tykket. | $\frac{2}{8}$ ⁵⁸ | 69 | Sol. iodeti kalici, Fotus aquosus, Catapl. emoll., Lap. inf. | |
| 61 | 186 | 34 Qv. | Tabes dorsalis; Parese i Underextremiteterne; involuntær Afføring og Urinladning; Døvhed; Blindhed paa venstre Øie efter Irit. | $\frac{1}{8}$ ⁵⁸ | 179 | | |
| 62 | 195 | 29 Qv. | Perforerende Ulcus i Palatum molle, en Ul- ceration paa Palatum durum. | $\frac{1}{8}$ ⁵⁸ | 201 | | $\frac{2}{9}$ ⁵⁹ til $\frac{2}{10}$ ⁵⁹ . Et stort rundt Saar paa høire Laar. Beh. i 30 Dage med Solut. iodeti kalici. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|---|
| <p>2^o 58. Ingen Rødhed eller Svulst af Næsen; mindre Skorper i Næsen. Almeenbefindendet meget bedre.</p> | <p>2^o 58 indkom han i Hospitalet med Epithidymit og fik Sol. iodeti kalici.</p> | <p>Behandlet i 1840 for primær Syphilis med Oxydul i 1841 for secundær Syphilis med Salivationscur og Cura Dzondi; i 1846 for Ulcera crurum med Iodkali etc. Indk. 2^o 57, udskr. 2^o 58. = 94.</p> <p>I 1848 behandlet i 53 Dage for constitutionel Syphilis med Calomel. Indk. 2^o 58, udskr. 2^o 59. = 440.</p> <p>Behandlet fra 2^o 49 til 2^o 49 for Tuberc. mucos. genitalium med Cura Dzondi og Sarsaparille-decoct. Indk. 2^o 58, udskr. 2^o 58, da hun døde. = 181. Ved Obductionen fandtes plastisk temmelig fast Exsudat imellem Dura mater og Arachnoidea spinalis langs Bagfladen fra Halsregionen til Cauda equina.</p> <p>Behandlet i 1853 for Tuberc. mucos. og Exanthem med Cura Dzondi og Liquor Bellosti, i 1856 og ligeledes i 1857 været under Behandling, i 1858 faaet Derivationscur. Indk. 2^o 58, udskr. 2^o 59. = 203. Recidiv fra 2^o 59 til 2^o 59. = 30.</p> |
| <p>2^o 59. Fremdeles Saar paa Palatum durum, Hævelse i sammes forreste Omfang.</p> | | |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 63 | 197 | 32 Qv. | Et rundt Ulcus paa den høire Læg. | 1858 | 150 | Lap. inf. | |
| 64 | 199 | 28 Md. | Især høire Halvdeel af Næsen hoven, blaalig- rød, infiltreret med en- kelte ophøiede Knuder, besatte med Crustæ; paa Forfladen af høire Fod- led en lignende Affec- tion. | 2358 10 | 84 | Sol. iodeti kalici. | |
| 65 | 44 | 36 Qv. | Paa Pars capill. capitis større og mindre gule Crustæ, der sidde fast til Huden; mellem disse skaldede Pletter og Ci- catricer; Haarvæxten temmelig tynd. Paa flere Steder af Legemet Ar efter tidligere Saar. I Halsen flere mindre Ar. | 256 | 181 | Kali hy- droiod. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee's sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|-------------------------------------|--|
| <p>U⁴59. E. Saaret paa Benet gjengroet Forøvrigt vel.</p> | | <p>Har været behandlet 17 Gange for forskjellige syphilitiske og blennorrhøiske Ulcerationer, blandt andet med Mercur.</p> <p>Indk. 1⁸ 58, udskr. U⁴59. = 150.</p> |
| <p>U⁴59. S. Saaret paa Næsen aldeles tilhelet; Arrene røde. Af Saarene paa Vristen af Foden sees kun Pletter, tildeels bedækkede med Squamæ.</p> | | <p>Behandlet for 3 à 4 Aar siden for constitutionel Syphilis med Mercur.</p> <p>Indk. 7² 58, udskr. U⁴59. = 84.</p> |
| <p>U⁴56. E. Saarene i Hovedet tilgroede. Hun befinder sig vel, men seer noget svagelig ud.</p> | | <p>Behandlet i Filialafdelingen 2 Gange for 16 Aar siden.</p> <p>Indk. 1² 56, udskr. U⁴56. = 182.</p> |

Schematisk

Syphili-

c. Personer, som aldrig have lidt af Syphilis eller hvis

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Syphilisationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 1 | 72 | 70 Md. | Epithelialcancer i Ala- nasi sinistra og den til- grændsende Deel af Kindet. | $\frac{1}{8}$ 56 | 174 | Sol. kali hydroiod., Sol. Fow- leri til Pensling. | |
| 2 | 73 | 34 Md. | Et stort chronisk Saar paa Forfladen af venstre Smallæg. | $\frac{1}{8}$ 56 | 166 | Æther, Sol. iodi alcoh., Decoct. chin acid., Sulphas chinin., Heft- plaster. | |
| 3 | 77 | 33 Qv. | Phthisis. | $\frac{2}{8}$ 56 | | Sol. nitrat. argent. | |
| 4 | 78 | 55 Md. | Rheumatismus chronicus articularis. | $\frac{2}{8}$ 56 | 105 | | |
| 5 | 79 | 52 Qv. | Ulcera chronica crurum. | $\frac{1}{8}$ 56 | 130 | Heftpla- sterind- vikling. | |
| 6 | 98 | 42 Md. | Gastritis chronica. Bronchitis chronica. | $\frac{2}{11}$ 56 | 74 | Vesicator. | |

Oversigt.

sation.

Sygdom antagelig ikke har sin Oprindelse fra Syphilis.

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|---|
| §57. Saaret udvider sig. | | Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. $\frac{3}{4}$ 57. = 174. |
| §57. Saaret saabent fremdeles. Hans Almeenbefindende daarligt, lider af Gastritis chronica. | | Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. $\frac{1}{4}$ 57. = 166. |
| §57. E. Hæsheden den samme. Ingen Hoste fortiden. Føler sig bedre. | | Behandl. for 7 à 8 Aar siden for Syphilis med Mercur. Indk. $\frac{2}{8}$ 56, udskr. $\frac{1}{2}$ 57. = 137. |
| | §56. E. Han føler sig bedre og friskere i Kroppen, og kan gaa bedre. | Indk. $\frac{2}{8}$ 56, udskr. $\frac{1}{4}$ 56. = 105. |
| §56. E. Fremdeles 2 Saar paa høire Smallæg. Er fri for Smerter i Kroppen, sover godt og befinder sig vel. | | Indk. $\frac{1}{4}$ 56, udskr. $\frac{3}{4}$ 56 efter Forlangende. = 131. |
| §57. Symptomerne, hvorover han klager, noget aftagne. | | Fra $\frac{1}{4}$ til $\frac{2}{8}$ 1838 behandlet for constitutionel Syphilis med Cura Dzondi. Indk. $\frac{1}{8}$ 56, udskr. $\frac{1}{4}$ 57. = 104. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden Sy- philisa- tion. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Syphilitationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 7 | 105 | 69 Qv. | Carcinoma uteri. | 1 $\frac{1}{2}$ 56 | 87 | Tinct. the- baica. | |
| 8 | 108 | 41 Qv. | Cancer uteri. | 2 $\frac{1}{2}$ 56 | 190 | Iodetum kalic., Mor- phindraa- ber, Pulv. Doveri, Ferr. re- duct. | |
| 9 | 41 | 69 $\frac{1}{2}$ Md. | Epithelialcancer i Ala nasi dextra og Labium super. | 1 $\frac{1}{2}$ 56 | 84 | Ungv. ce- ræ c. Opio. | |

Schematisk

Deri-

d. Ikke tidligere

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 1 | 1 | 18 Qv. | Svulst i Lab. majus & minus sinistrum; et tom- melangt Saar paa den ydre Flade af Lab. maj.; Randen af Lab. minus overfladisk ulcereret; senere Tuberc. mucosa paa Randene af Lab. majora; graat Exsudat paa den høire Tonsille. | 1 $\frac{1}{2}$ 56 | 101 | Fotus aquæ calc. chloratæ. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|-------------------------------------|---|
| | | Indk. $\frac{1}{2}$ 56, døde $\frac{1}{2}$ 57. = 89. |
| | | Behandlet fra $\frac{1}{2}$ 1836 til $\frac{1}{2}$ 1837 for constitutionel Syphilis med Mercur. Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. $\frac{3}{8}$ 57, da hun døde. = 208. |
| $\frac{1}{2}$ 56 (vide!). | | Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. $\frac{1}{2}$ 56. = 87. |

Oversigt.

vation.

behandlede med Mercur.

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|-------------------------------------|--|
| $\frac{1}{2}$ 57. <i>V.</i> Intet syphilitisk Symptom. Lidt Rubor faucium. Haaret falder ikke af. | | Indk. $\frac{1}{2}$ 56, udskr. $\frac{1}{2}$ 57. = 118. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 2 | 3 | 21 Qv. | 2 smaae runde Ulcera- tioner paa Præput. cli- toridis og det venstre Lab. minus. Paa begge Tonsiller Ulcerationer. Svulne Nachalglandler. Fra $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{8}$ en Glandel- hævelse i den høire Ax- illa, der abscederede og blev fistuløs. | $\frac{1}{2}$ 57 | 150 | Ungu. lap. inf., Solut. iodi al- cohol., Pi- lul. Do- veri. | |
| 3 | 6 | 17 $\frac{1}{2}$ Qv. | Paa Lab. maj. dextr. 2 runde Saar, det omgi- vende Væv indureret; ved Commissura post. et lidet Saar. $\frac{1}{2}$. Tu- berc. mucosa ani & ge- nitalium. | $\frac{2}{1}$ 57 | 145 | | $\frac{1}{2}$ 57 til $\frac{1}{2}$ 57. Paa Randene af Lab. maj. flere runde ærtstore Saar, overfladiske tildeels røde og rene; Va- ginalflod. Be- handl. i 30 D. m. Derivation. |
| 4 | 9 | 27 Qv. | Paa Lab. maj. sinistrum et næsten tilhelet Saar med noget fordybet Bund. $\frac{2}{2}$. Ulcerationer paa Lab. minus dextrum; store, rødbrune spredte Pletter paa Kroppen. $\frac{2}{3}$. Ex- sudater paa begge Ton- siller. $\frac{1}{8}$. Overfladiske serpiginøse Ulcerationer paa Palatum. $\frac{2}{6}$. Tu- berc. mucosa paa Radix linguæ. | $\frac{2}{2}$ 57 | 158 | Solut. cal- cis chlor., Fotus af Liquor hy- drag. fla- vus, Mixt. acida; Cucurb. cruentæ, Sol. nitr. kalic., Liqu. an- tispast., Vesicat. nuchæ Pe- diluvium sinap. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|---|
| <p>§ 57. Voss. Intet syphilitisk Symptom. April 1863 frisk. <i>J. Vogt</i>.</p> | | <p>Fra 1^o—1^o 56 behandlet i Hospitalet for indureret Chancre og svulne Inguinalglandler med local Behandling. Indk. 1^o 56, udskr. 1^o 57. = 154. I Juni 1860 frisk. (<i>J. Vogt</i>).</p> |
| <p>§ 57. St. Paa Labia maj. enkelte røde Pletter, Tomter efter Tuberc. mucosa. § 57. De omtalte Saar ere tilhelede.</p> | <p>Frisk i April 1863. <i>J. Vogt</i>.</p> | <p>Indk. 1^o 57, udskr. 1^o 57. = 148. Recidiv. Indk. 1^o 57, udskr. 1^o 57. = 30. Frisk i Begyndelsen af Juni 1860. (<i>J. Vogt</i>).</p> |
| <p>§ 57. S. Intet syphilit. Symptom ved Genitalia og i Halsen. Paa Gingiva superior en liden Excoriation.</p> | | <p>Indk. 1^o 57, udskr. 1^o 57. = 180. 1^o 58 Pneumonie i den høire Lunge. 1^o 58 fødte hun et 7 Maaneder gl. forraadnet Foster. (<i>Boeck</i>). Hun har senere i Hjemmet benyttet Kali hydroiod. (<i>Öwre</i>). Frisk i Juni 1860. (<i>J. Vogt</i>). Frisk i 1863. (<i>J. Vogt</i>).</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 5 | 12 | 22 Md. | Excoriationer paa Glans og Præputium; paa Col- lum glandis en betydelig Induration. $\frac{1}{3}$. Crustøse Saar i Hovedet; ubety- delig Roseola; papuløse Syphilider paa Kroppen. $\frac{2}{5}$. Tuberc. mucosa ved Anus, hvidt Belæg paa den venstre Tonsille. | $\frac{2}{2}$ 57 | 138 | Fotus fri- gidus, Sol. cupri sulphur. | |
| 6 | 13 | 39 Md. | Paa Glans og Præputium talrige, smaae, rundag- tige, ikke indurerede Saar; Tuberc. mucosa ved Anus og paa Scro- tum, enkelte desqua- merende Papler i Nak- ken og Panden, Excoria- tioner paa Crura veli palatini. $\frac{2}{3}$. En Ul- ceration paa Overlæben. $\frac{1}{8}$. Fistula ani. | $\frac{2}{2}$ 57 | 85 | Sol. calc. chlor., Sinap. cardiæ. | 1ste Recidiv $\frac{1}{4}$ 57 til $\frac{2}{4}$ 58. Tuberc. muc. scroti. Ulcus labii inferior. Beh. 1 A. 9 D. med Derivat., Sol. iodeti ka- lici. $\frac{2}{2}$ 58. Sy- philisation. 2det Recidiv $\frac{2}{2}$ 58 til $\frac{2}{8}$ 58. Ulcersa serpi- ginosa præp. Beh. i 19 D. med Salmiak- mixtur, Mixt. acida. 3die Recidiv $\frac{2}{2}$ 59 til $\frac{2}{1}$ 59. Serpiginøse Saar paa Scro- tum. Beh. i 64 D. m. Solut. calc. chlorat., Derivation og Sultecur. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|--|--|
| <p>ψ 57. S. De syphilitiske Symptomer forsvundne.</p> | | <p>Indk. ψ 57, udskr. ψ 57. = 139.</p> |
| <p>ψ 57. S. Ingen syphilitiske Tilfælde. Befindendet godt.</p> <p>ψ 58. S. Paa Scrotum 3 runde overfladiske Saar af serpiginøs Charakter. Befindendet godt.</p> <p>ψ 58. S. Alle Saar paa Scrotum tilhelede.</p> | <p>ψ 59. Overfladiske Saar paa Penis og Scrotum; paa sidstnævnte Sted og paa den indvendige Side af venstre Laar enkelte Papler.</p> | <p>Indk. ψ 57, udskr. ψ 57. = 86.</p> <p>Recidiv. Indk. ψ 57, udskr. ψ 58. = 374.</p> <p>Recidiv. Indk. ψ 58, udskr. ψ 58. = 19.</p> <p>Recidiv. Indk. ψ 59, udskr. ψ 59. = 64. (Holst).</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 7 | 15 | 37 Md. | Ulcera præputii, Tuberc. mucosa scroti; paa Un- derliv, Ryg og Laar Papler, Exsudat paa høire Tonsille, crustøse Saar i Hovedet. $\frac{1}{8}$. Pustuløst Exanthem i Ansigtet. $\frac{2}{8}$. Ulcera- tioner i Halsen. | $\frac{2}{8}$ 57 | 138 | Sulph. magnes., Liqu. hy- drarg. fl., Decoct. hh. violar., Ung. ceræ c. Opio, Sol. nitrat. argent. | $\frac{2}{8}$ 57 til $\frac{4}{8}$ 58. Paa Scrot. og ved Anus ulce- rerende Tub. mucos.; tynd Haarvæxt; Blennorrh. urethr. $\frac{4}{8}$ 57. Saar ved beg- ge Rande af Tungen. $\frac{4}{8}$ 58. Exsudat paa høire Tonsille. Beh. i 163 D. m. Thea de- mule, Deriva- tion, Salmiak- mixtur, Vesi- cat. nuchæ, Hirudin, Ess. rheor. c. Æth. alcoh., Solut. iodeti kalici, Decoct. chin. acid., Empl. mercur. c. op., Ung. lap. inf. |
| 8 | 16 | 32 Md. | Tuberc. mucosa paa Pe- nis, Scrotum og om Anus; i Panden, paa Ryggen og Extremiteterne rød- brune Flekker, besatte med graalige Skjæl; næsten skaldet. $\frac{2}{8}$. Un- der venstre Knæ paa Tibia en valnødstor fluc- tuerende Svulst (4 Aar tilstede). | $\frac{2}{8}$ 57 | 118 | Æther alcohol. camph., Pilul. Do- veri, Ungn. alth., Sol. iodet. kal. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|-------------------------------------|---|
| <p>$\frac{1}{2}$ 57. S. Enkelte Excoriat. paa Scrotum, Spor efter Exanthemet i Ansigtet, i Nakken, ved Haarranden Papler, en ubetydelig hvid Plet paa Crus ant. sinistr. veli palat.</p> <p>$\frac{1}{4}$ 58. Intet syphilitisk Symptom. Slimhinden i Svælget rødfarvet. Fri for Hovedpine. Noget debilt Udseende.</p> | | <p>Indk. $\frac{2}{3}$ 57, udskr. $\frac{1}{9}$ 57. = 143.</p> <p>Recidiv. Indk. $\frac{2}{11}$ 57, udskr. $\frac{1}{8}$ 58. = 163.</p> <p>Recidiv. Indk. $\frac{2}{3}$ 59, udskr. $\frac{1}{8}$ 59. (Holst). Diæta stricta. (B.) = 46.</p> |
| <p>$\frac{3}{4}$ 57. S. En liden Excoriation imellem Plicæ ani. Hævelsen paa Crus ikke mere fluctuerende. Befindendet godt.</p> | | <p>Indk. $\frac{3}{4}$ 57, udskr. $\frac{1}{4}$ 57. = 121.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------|--|---|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 9 | 17 | 27 Qv. | Tuberc. mucosa om Anus. Paa Clitoris et noget haardt Ar. Glandulæ nuchales hovne. $\frac{1}{2}$. Ex- coriat. med graat Belæg paa den høire Tonsille. | $\frac{2}{3}$ 57 | 129 | Pediluv. sinapin. Cucurb. cruentæ, Hirud., Ung. nea- pol. c. Ess. opii croc., Acid. hy- drocyan., Fotus olei tereb., Sulph. magnes. | $\frac{1}{3}$ 58 til $\frac{1}{3}$ 58. Ulcererende Tub. mucosa paa Lab. maj. Etspredt, klø- ende Exanth. paa Skuldre og Been, uden bestemt Cha- rakter. Beh. i 114 D. m. Derivation, Liqu. antisp., Subnitr. bis- muth., Pulv. Dov., Solut. acetat. morph. Cucurb. |
| 10 | 19 | 67 Qv. | Tuberc. mucosa paa Lab. maj. og ved Anus; paa hele Legemet papulöse Syphilider; paa Under- læbens Slimhinde et uregelmæssigt hvidbe- lagt Saar; Ulcerationer paa Tonsillerne; paa den udvendige Side af ven- stre Fod 4 Saar af sus- pect Udseende. $\frac{2}{3}$. Irit paa høire Øie. | $\frac{2}{3}$ 57 | 239 | Sol. calc. chlorat., Cerat. simpl. c. Op., Sol. sulph. atrop., Hi- rud., Ung. neapol. c. Extr. bel- ladonnæ, Pulv. Dov., Empl. canth. perpet. Fonticuli, Salmiak- mixtur. | $\frac{1}{3}$ 59 til $\frac{2}{3}$ 59. Saar paa høire Skinnebeen. Beh. i 42 D. m. Ungu. ceræ og Iodkalium. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|-------------------------------------|--|
| <p>‡57. E. Intet syphilit. Phænomen. ‡58. Kuns Pletter paa Skuldrene; Intet i Halsen; intet Syphilitisk paa Genitalia.</p> | | <p>Indk. 3^o 57, udskr. ‡ 57. = 131. Recidiv. Indk. 1^o 58, udskr. 1^o 58. = 114.</p> |
| <p>‡‡57. V. I Munden af en stor Follikel paa venstre Tonsille synes at være et superficielt Saar. Stærk Pigmentafsætning, hvor Exanth. har været. Saaret paa høire Skinnebeen tilhelet; Arret blaaligt, tyndhudet. 1^o 59. Saaret paa det høire Skinnebeen næsten tilhelet med blaalig Omkreds. Intet forresten.</p> | | <p>Indk. 2^o 57, udskr. ‡‡ 57. = 241. Recidiv 1^o 59, udskr. 2^o 59.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 11 | 20 | 25 Qv. | Labia vulvæ oedematøse, paa Lab. minora overfladiske graahvide Saar. $\frac{2}{4}$. Excoriat. imellem Lab. maj. & minora; om Anus smaae papuløse Ophøininger; Ulceration paa Palat. molle. $\frac{1}{8}$. Roseola paa Kroppen. $\frac{1}{6}$. Excoriat. paa Læberne og Gingiva. $\frac{2}{7}$. Alopecia superciliarum $\frac{2}{9}$. En Glandelhævelse ved Ang. maxill. dextr., der abscederede, har aabnet sig. | $\frac{2}{8}$ 57 | 183 | Fotus resolv., Aqua saturn., Pilul. Dov., Sol. calc. chlorat., Sol. nitr. argent., Decoct. chinæ. | |
| 12 | 23 | 25 Qv. | Tuberc. mucosa paa Genitalia; Gland. inguinal. hovne; paa Bryst, Ryg, og Laar Roseola syphil. | $\frac{2}{8}$ 57 | 122 | | |
| 13 | 27 | 2 Md. Qv. | Paa Nates og begge Laar mange skidenbrune op- høiede Flekker, hvoraf en stor Deel ulcererede. $\frac{3}{4}$. Brune Pletter i Ansigtet. | $\frac{2}{8}$ 57 | 62 | Sublimatbad. | |
| 14 | 28 | 20 Qv. | Ved Commiss. labior. superior paa Lab. maj. sinistr. et stort indureret Ulcus; 3 lignende Ulcera paa Genitalia. $\frac{8}{8}$. Roseola syph. paa Ryg og Bryst; Tuberc. mucosa paa Lab. maj. $\frac{1}{8}$. Overfladiske Ulcerationer paa Velum palat. | $\frac{1}{6}$ 57 | 246 | Sol. calc. chlorat., Lap. inf., Electuarium flor. artemisiæ. | $\frac{1}{4}$ 58 til $\frac{2}{8}$ 58. Tub. mucosa genitalium, hvidt Belæg paa den høire Tonsille. Beh. i 73 D. m. Cura Dzondi, Decoct sarsapar. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin-ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--------------------------------------|---|
| <p>†† 57. Intet i Svælget og Munden. Haaret falder stærkt af. Hovue Glandler paa den høire St.-cl.-mastoid. Fremdeles sygeligt Udseende.</p> | | <p>Indk. $\frac{2}{3}$ 57, udskr. $\frac{1}{4}$ 57. = 268. Gravida i 7de Maaned, $\frac{2}{3}$ fødte hun et fuldbaaret Barn, der $\frac{2}{3}$ var syphilitisk.</p> |
| <p>‡ 57. S. Alle syphilitiske Symptomer forsvundne.</p> | | <p>Indk. $\frac{1}{2}$ 57, udskr. $\frac{1}{2}$ 57. = 124.</p> |
| <p>$\frac{2}{3}$ 57. Der er idag ordineret Sublimatbad. Udgaar af Observation.</p> | | <p>Begge Forældre have været behandlede i Hospit. for secundær Syphilis. Indk. $\frac{2}{3}$ 57, udskr.</p> |
| <p>$\frac{2}{3}$ 58. Intet i Svælget; Har været behandlet Intet ved Genitalia og i Rigshospit. med Anus; paa Indsiden af Afd. fra $\frac{1}{4}$ 58 til $\frac{1}{4}$ 59, begge Laar et papula-løst Exanthem.</p> | <p>da hun døde (Ovarialsvulst).</p> | <p>Indk. $\frac{2}{3}$ 57, udskr. $\frac{1}{4}$ 58. = 278. Recidiv. Indk. $\frac{1}{4}$ 58, udskr. $\frac{2}{3}$ 58.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 15 | 29 | 29 Md. | Tubercula mucosa om Anus; paa Glans penis en rød noget ophøiet Plet; paa Membr. post. pharyngis graalighvidt Belæg. | $\frac{1}{8}$ 57 | 48 | Liqu. hydrarg. flav. | |
| 16 | 30 | 27 Qv. | Paa Genitalia, i Laar- bøiningerne og om Anus Tubercula mucosa; paa Velum palat. overfladiske Ulcerationer; Roseola paa Bryst og Ryg. | $\frac{2}{6}$ 57 | 170 | Sol. calc. chlorat. | |
| 17 | 31 | 20 Qv. | Paa Lab. maj. dextr. et Par store ulcererende Tubercula mucosa; ved Introitus vaginæ mange, smaae, spidse Condyl- lomer; hvidt Belæg paa begge Tonsiller. | $\frac{2}{6}$ 57 | 144 | Vesicat. nuchæ. | |
| 18 | 32 | 29 Qv. | I Laarbøiningerne, paa Lab. maj. sinistr., paa høire Nates en Masse store Tuberc. mucosa; paa begge Tonsiller hvidt Belæg; paa Bryst og Ryg Roseola. $\frac{1}{8}$ 58. I ven- stre Mundvinkel og paa Tungespidsen superfici- elle Saar. | $\frac{3}{4}$ 57 | 280 | Tinct. iodi, Lap. infer., Vesicat. | |
| 19 | 34 | 73 Md. | Ulcus præput.; paa Krop, Arme og Been papuløse Syphilider; Tuberc. mu- cosa om Anus; høire Tonsille svullen. $\frac{2}{8}$ 58. Hvidt Belæg paa Ton- sillerne. | $\frac{2}{7}$ 57 | 175 | | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|--|
| ψ 57. Tuberc. mucosa betydelig formindskede. | | For 4 Aar siden behandlet localt for et Saar paa Penis. Indk. ψ 57, udskr. ψ 57. = 66. |
| †† 57. V. Den venstre Tonsille lidt hypertrophisk; ellers Intet. | | Indk. ψ 57, udskr. †† 57. = 173. |
| †† 57. V. Med Undtagelse af Hævelse og Rødhed i Tonsillerne intet Abnormt. | | Indk. ψ 57, udskr. †† 57. = 144. |
| ‡ 58. Mundvinkelen og Tungespidsen istand. Intet ved Genitalia og Anus. | | Indk. ‡ 57, udskr. ‡ 58. = 280. |
| ‡ 58. Intet Syphilitisk i Halsen; kun Spor af Exanthemets Tomter. Flugt i Nakken. | ψ 59 indk. i Chr. Byes Sygehuus for Svækkelse i Extremiteterne. (Boeck). | Indk. ψ 57, udskr. ψ 58. = 175. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 20 | 35 | 20 Qv. | Paa Lab. majora og ved Anus Tuberc. mucosa; ved Urethra en betydelig Ulceration; Spor af Ro- seola paa Kroppens For- flade. $\frac{2}{8}$. Overfladiske Excoriationer paa Velum palat. | $\frac{3}{8}$ 57 | 143 | | |
| 21 | 36 | 23 Qv. | I Rima narium og paa høire Lab. majus Tuberc. mucosa; ved Introitus vaginæ en overfladisk Excoriation. $\frac{2}{8}$. Tu- berc. mucosa om Anus. graalig-hvide Exsudater paa Tonsilleroe. $\frac{1}{8}$. Superficielt Saar paa Un- derlæbens Sliimhinde. $\frac{1}{8}$. Superficielt Saar paa Tungens Overflade. $\frac{2}{8}$ 58. Paa Overlæbens Sliim- hinde en stor, ophøiet Infiltration, paa Palatum durum et superf. Saar. | $\frac{2}{8}$ 57 | 175 | Sol. sulph. cuprici, Inf. salviæ c. Ess. op. simpl., Fo- tus hb. hy- oscyam., Sinapism. | $\frac{2}{8}$ 58 til $\frac{1}{8}$ 58. Overfladisk Ulceration i venstre Mund- vinkel; Excor. paa Tunge- spidsen; smaae Ophøininger, som begynd. Tub. mucos. paa Tungens Overflade; hvidt Belæg paa begge Tonsiller; pu- rulent Udflod fra Urethra og Vagina. Beh. i 68 D. m. Sol. lap. inf., Sol. oxyd. calc. Derivation. |
| 22 | 37 | 21 Md. | Paa Scrotum et aflangt Ulcus og flere mindre tuberkellignende Eleva- tioner, paa Præputium og Glans et Par smaae runde overfladiske Ul- cera, paa Kroppen Ro- seola, i Hovedet smaae Cruster. $\frac{1}{8}$. Paa Glans penis Tuberc. mucosa, ligeledes ved Anus, paa Tungen et overfladisk Saar, paa venstre Ton- sille hvidt Belæg. | $\frac{3}{8}$ 57 | 154 | Aqua pha- gedæn., Hirud. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|---|--|
| 1 ³ / ₇ 57. V. Intet syphilitisk Symptom. | | Indk. 1 ¹ / ₈ 57, udskr. 2 ³ / ₇ 57. = 145. |
| 1 ¹ / ₈ 58. V. Fremdeles Infiltration i Overlæben, hvor Saaret har været; fremdeles Saar paa Palat durum med noget ophøiet Bund. 1 ¹ / ₈ 58. V. Intet syphilitisk Symptom. | 1 ¹ / ₈ 59 har hun født i Stiftelsen et fuldbaaret sundt udseende Barn. (<i>Keyser</i>) | Indk. 1 ¹ / ₈ 57, udskr. 1 ¹ / ₈ 58. = 178. Recidiv. Indk. 2 ³ / ₇ 58, udskr. 1 ¹ / ₈ 58. = 68. Behandlet fra 1 ¹ / ₈ — 2 ³ / ₇ 61 localt for Excoriationer ved Genitalia. |
| 1 ¹ / ₈ 58. S. Intet i Halsen; ellers ogsaa Alt vel, kun lidt Rødhed paa den høire Ala nasi. | | Indk. 2 ³ / ₇ 57, udskr. 1 ¹ / ₈ 58. = 160. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 23 | 38 | 23 Qv. | Ved Rima natium, paa Labia majora Tuberc. mucosa; ved Introitus vaginæ en Ulceration; paa Indsiden af Kinderne og paa begge Tonsiller et tykt, hvidt Belæg. Haaret falder af. | $\frac{1}{9}$ 57 | 75 | Infus. salviæ. | |
| 24 | 39 | 20 Qv. | Paa begge Lab. majora et Par ærtstore Ophøi- ninger, der see ud som Levninger efter Tuberc. mucosa; ved Orific. ani en Plaque muqueuse; paa Brystet et Pityriasis lignende Udslet; i Hal- sen nogen blaalg Rød- hed. | $\frac{8}{10}$ 57 | 77 | | |
| 25 | 40 | $16\frac{1}{2}$ Md. | Store, lidt ophøiede blaa- lige, brune Pletter paa Krop og Extremiteter; i Svælget graaligt Belæg paa begge Tonsiller. $\frac{2}{11}$. Superf. Saar paa Palat. durum. $\frac{3}{11}$. Tuberc. mu- cosa paa Scrotum. $\frac{4}{58}$. Hvidt Exsudat paa Tun- gen. | $\frac{2}{10}$ 57 | 153 | | |
| 26 | 41 | 21 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia og ved Anus; tyndt hvidt Belæg paa Tonsillerne; Roseola paa Brystet. | $\frac{6}{11}$ 57 | 105 | | |
| 27 | 43 | 34 Qv. | Paa Randen af det høire Lab. majus en rund, ureen Ulceration, oven- for et Tuberkel; bety- delig Urethrit. $\frac{1}{11}$. Om Udlørselsgangen fra den venstre Gland. Bartho- lini et stort Saar. | $\frac{2}{11}$ 57 | 79 | Sol. lap. inf. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin- ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|--|
| §§ 57. V. Bleg Rødhed af Velum palat. For- resten Intet. | | Indk. $\frac{1}{2}$ 57, udskr. $\frac{2}{3}$ 57. = 77. $\frac{1}{2}$ 57. Affectionen af Mun- den ligner en Mercuri- alaffection. |
| §§ 57. V. Intet syphili- tisk Symptom. | | Indk. $\frac{1}{8}$ 57, udskr. $\frac{2}{3}$ 57. = 79. |
| § 58. S. Alt vel. | | Indk. $\frac{2}{3}$ 57, udskr. $\frac{2}{3}$ 58. = 153. |
| § 58. V. Alt vel. | | Indk. $\frac{1}{7}$ 57, udskr. $\frac{1}{2}$ 58. = 106. |
| §§ 57. Intet i Halsen; Intet ved Genitalia og Anus. | | Indk. $\frac{3}{7}$ 57, udskr. $\frac{2}{3}$ 58. = 81. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 28 | 45 | 19 Qv. | Paa Lab. majora, i Laar- bøiningerne, om Anus Tuberc. mucosa; Tungen betydelig hoven, hvid- belagt, besat med Tu- berc. mucosa; hvidt Be- læg paa Tonsillerne, paa Indsiden af Kinderne og i Mundmusklerne; Roseola paa Kroppen; i Nakken langs Haar- randen ringformig situ- erede Papler. | 1 ⁹ 57 | 225 | Linet. ad aphthas, Inf. salviæ, Ess. asæ- foetidæ, Sol. acetat. morph., Vesicat. | |
| 29 | 47 | 23 Md. | Paa Superf. interna præ- put. flere cleverede Ul- cerationer, ligeledes paa Glans; hvidt Belæg paa den venstre Tonsille; hovne Cervicalglandler. | 1 ⁷ 57 | 107 | Lapis caustic., Fotus re- solvens. | |
| 30 | 48 | 20 Qv. | Tuberc. mucosa paa Lab. majora. 1 ⁵ / ₂ . 2 Tuberc. mucosa i venstre Laar- bøining. | 2 ⁵ 58 | 59 | Sol. calc. chlorat. | |
| 31 | 50 | 25 Qv. | Paa Ryg, Bryst, Hals, i Knæhaserne store brune ophøiede runde Flekker, tildeels bedækkede med tykke brungule Crustæ; over Over- og Under- læben, i begge Mund- vinkler røde, ophøiede Flekker; paa Underlæ- bens Slimhinde en rund Ulceration; paa Pars capill. capitis enkelte småe Knopper. Haaret falder af; hovne Cervi- calglandler; Tubercula mucosa paa Lab. majora. | 1 ⁵ 58 | 155 | | 1 ⁶ 61 — 2 ⁷ 61. Papulöst Ex- anthem. Beh. m. Svedecur. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin-ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|--------------------------------------|--|
| 458. V. Et lidet Exsudat paa Velum palat.; store Papill. circumv. paa Tungen. Intet forresten. | | Indk. $\frac{1}{3}$ 57, udskr. $\frac{1}{3}$ 58. = 225. |
| 458. S. Alt vel. | | Indk. $\frac{1}{3}$ 57, udskr. $\frac{1}{3}$ 58. = 123. |
| 458. V. Intet syphilitisk Symptom. | | Indk. $\frac{1}{3}$ 58, udskr. $\frac{1}{3}$ 58. = 61. |
| 458. Intet i Svælget. Flekker i Albuebøiningerne. | | Indk. $\frac{1}{3}$ 58, udskr. $\frac{1}{3}$ 58. = 156. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 32 | 52 | 24 Qv. | Et fordybet Saar ved Urethra; flere urene Saar ved Anus. $\frac{2}{1}$. Roseola. $\frac{1}{2}$. Ulcerationer paa Velum palat. og Exsudater. $\frac{1}{4}$. Iritis dextra. $\frac{1}{7}$. Iritis sinistra. $\frac{1}{6}$. Exanthem paa Under- extremiteterne. | $\frac{2}{1}$ 58 | 270 | Wiener- pasta, Hi- rudines, Smørecur, Pulv. Do- veri, Pe- diluv. si- nap., Cu- curb. cru- entæ, Sol. atrop., Ungu. ne- apol., Lax- ans, Vesi- cator, Fot. frigid., Sol. calc. chlo- ratæ, Chlo- ras kal. | |
| 33 | 53 | 19 Qv. | Ulceration paa højre Tonsille. $\frac{3}{3}$. Tuberc. mucosa ved Anus. $\frac{3}{8}$. Tuberc. mucosa paa Lab. majora. $\frac{1}{7}$. Iritis dextra. | $\frac{2}{3}$ 58 | 202 | Inf. hb. salviæ, Sol. calc. chloratæ, Sol. atropi- ni, Hi- rudines. | |
| 34 | 55 | 26 Qv. | Paa Lab. majora smaae Ulcerationer og begyndende Tuberc. mucosa; høvne Tonsiller med betydeligt gult Belæg; Leucorrhoe. | $\frac{1}{8}$ 58 | 125 | Aqua calc., Pilul. Doveri. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|--|
| <p>$\frac{1}{2}$ 58. Saaret i Nakken tilhelet. Tomter efter Exanthemet.</p> | | <p>Flere Gange behandlet for primære Ulcera. Indk. $\frac{1}{2}$ 57, udskr. $\frac{1}{2}$ 58. = 309. $\frac{1}{2}$ 57. Pneumonie i høire Lunge. $\frac{1}{2}$ 58. Scabies. $\frac{1}{2}$ 58. Erysipelas faciei.</p> |
| <p>$\frac{2}{3}$ 58. V. Det høire Øie istand; en Macula paa den venstre Cornea; langs Randen af en Follikelaabning i den høire Tonsille hvidt Exsudat; paa Mons Veneris, langs Randen af Lab. majora spredte smaae Pustler, der tildeels ere indtørrede.</p> | | <p>Indk. $\frac{2}{3}$ 58, udskr. $\frac{2}{3}$ 58. = 215.</p> |
| <p>$\frac{2}{3}$ 58. Hvidt Belæg paa begge Tonsiller, der ere lidt hypertrophiske. Intet ved Genitalia og Anus.</p> | <p>Indkom i April 1859 i Lillehammers Sygehuus med Ulcera palati, uvulæ, angulor. oris & apicis nasi. (Boeck).</p> | <p>Indk. $\frac{1}{3}$ 58, udskr. $\frac{1}{3}$ 58 for at indlægges i Gaustads Asyl. $\frac{2}{3}$ 58 aborterede i 6te Maaned. = 126.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 35 | 56 | 32 Md. | Tuberc. mucosa penis, scroti, perinæi & ani; hvidt Belæg paa Velum palat.; hovne Nuchal- glandler; langs den ind- vendige Rand af høire Biceps brachii en perle- snorformig Række af op- svulmede indurerede, in- dolente Glandler; i begge Inguina indolente Gland- elhævelser. $\frac{2}{3}$. Hovne Glandler ovenfor venstre Cubitus. $\frac{1}{2}$. Haaret fal- der af. | $\frac{1}{3}$ 58 | | | |
| 36 | 57 | 48 Qv. | Ulcerationer paa Velum palat. $\frac{1}{2}$. Papuløst spredt Exanthem paa Halsen og Ryggen. | $\frac{2}{3}$ 58 | 128 | Pulv. Dov. | |
| 37 | 58 | 23 Qv. | Tubercula mucosa ved Anus; Ulceration og Ex- sudater paa Velum palat. og Tonsillerne. | $\frac{2}{3}$ 58 | 105 | | |
| 38 | 59 | 32 Md. | Større og mindre Ulcera paa Glans og Præput.; indolente Buboner i beg- ge Lysker. $\frac{1}{2}$. Paa Lab. super. og i venstre Mundvinkel Ulceration med hvidt Belæg. $\frac{1}{2}$. Tubercula mucosa paa Scrotum og Penis. $\frac{2}{3}$. Superf. Saar paa Velum palat. | $\frac{1}{2}$ 58 | 138 | Sol. calc. chlor., Lap. inf. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee's sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|-------------------------------------|--|
| <p>158. Glanderne ved Siden af Biceps paa begge Arme fremdeles tilstede. Ellers intet.</p> | | <p>Indk. 17 58, udskr.</p> |
| <p>158. V. Haaret er faldet meget af, saa at der er næsten Skaldethed paa Issen. Flere smaae Excoriationer paa Palatum med let rød Farve i Omfanget; betydeligt maculöst Exanthem paa Underlivet og Laarene.</p> | | <p>Indk. 17 58, udskr. 17 58. = 130.</p> |
| <p>158. V. Mistænkelig Halitus af Munden; opfløst Tandkjød. Intet Syphilitisk i Munden og Svælget, ved Genitalia og Anus.</p> | | <p>Indk. 17 58, udskr. 17 58. = 107.</p> |
| <p>158. En liden Excoriation under Tungen. Intet i Halsen og ved Angulus oris. En liden Excoriation under Penis og Fortykkelse af Præputium.</p> | | <p>Indk. 17 58, udskr. 17 58. = 183.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 39 | 60 | 19 Qv. | Et Saar paa høire Side af Frenulum, paa den indvendige Deel af høire Laar, paa venstre Lab. majus, der ligner et Tuberc. mucosum; purulent Udfloed fra Urethra og Vagina. $\frac{1}{4}$. Roseola. $\frac{1}{8}$. Excoriationer paa den høire Tonsille. $\frac{2}{8}$. Paa Slimhinden af høire Kind og paa Palat. durum superficielle Saar; i Ansigtet brune Pletter med Crustæ. | $\frac{1}{3}$ 58 | 101 | Sol. lap. inf., Aqua calcis. | |
| 40 | 61 | 20 Qv. | Purulent Udfloed fra Urethra; noget Uterinflod. $\frac{2}{8}$. Fissur i Analaabningen. $\frac{1}{8}$. Paa Krop og Lemmer enkeltstaaende Pustler, omgivne af blaa-lig-rød Halo. Blaalig Rødhed i Svælget. $\frac{4}{8}$. Exulcerationer med hvidt Belæg paa høire Tonsille. | $\frac{2}{8}$ 58 | 283 | Sol. lap. inf., Pilul. Dov., Sol. iodetikal., Decoct. sarsapar., Chlor. kal. | 1ste Recidiv $\frac{1}{8}$ 60 til $\frac{2}{8}$ 60. Beh. med Sol. iodetiammon. 2det Recidiv $\frac{1}{8}$ 60 til $\frac{2}{8}$ 61. Beh. med Sol. iod. kal. |
| 41 | 62 | 22 Qv. | Om Anus, paa Lab. majora og i høire Laar-bøining Tuberc. mucosa; ved Introitus vaginæ et indureret Ulcus. Paa Underliv og Bryst enkeltstaaende kobberrøde Pustler. Paa Palat. molle hvidt Belæg. Hovne Cervical- og Inguinalglandler. | $\frac{2}{8}$ 58 | 60 | Kolde Overgydninger, Ess. asæ foetidæ, Opium, Decoct. sarsapar. | $\frac{1}{8}$ 58 til $\frac{1}{8}$ 59. Tuberc. muc. paa Lab. majora og paa begge Laar. Beh. i 85 Dage m. Derivation. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin- ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|--|
| <p>2^o 58. Pletterne i Ansigtet svundne. En liden Plet paa Palat. durum Papill. circumv. lingvæ hypertrophiske og noget excorierede.</p> | <p>2^o 58. Hun indkom igjen i Hospit. 2^o 58 for Leucorrhoe. Under Opholdet i Hospitalet stærk Hovedpine, hvorfor blev givet Sol. iodeti kali. 2^o 59 — 1^o 59. Primære Saar — Localbehandling. (Boeck).</p> | <p>Indk. 2^o 58, udskr. 2^o 58. = 173. Frisk i Novbr. 1861 og April 1863. (J. Vogt). Fødte et Barn, som døde 2 Maaneder gammelt i 1861 paa Hudsygeafdelingen.</p> |
| <p>2^o 59. Fremdeles Maculæ paa Benene uden Skjæl, af mørk Farve; paa Ryggen ere Pletterne lysere. Intet i Halsen; Intet ved Genitalia.</p> | <p>Frisk i April 1863. (J. Vogt).</p> | <p>Behandlet for et primært Saar i Anus. Indk. 2^o 58, udskr. 2^o 59. = 323. Indk. 2^o 60 til 2^o 60. = 159.</p> |
| <p>2^o 59. V. Saar paa Underlæben, i venstre Mundvinkel, paa Crus ant. sinistr. veli palat.</p> | | <p>Indk. 2^o 58, udskr. 2^o 58. = 60. Paa Grund af hysteriske Kramper ophørtes snart med Derivationen. Recidiv. Indk. 2^o 58, udskr. 2^o 59. = 85.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|---|---|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 42 | 63 | 24 Qv. | Blaalig Rødhed i Svæl- get; hvidt Belæg paa begge Tonsiller; paa Overlæben en dyb, bøn- nestor Ulceration med indureret Omkreds; Ro- seola paa Brystet. | $\frac{1}{8}$ 58 | 138 | Salmiak mixtur, Ol. jecoris Aselli. | |
| 43 | 64 | 26 Qv. | Paa venstre Mamma ved Vorten et rundt, eleve- ret Ulcus af en Sölvorts Størrelse med ureen Bund og haarde Rande. Paa Bryst, Ryg, Ex- tremit. og Ansigt et ri- geligt kobherrødt Exan- them; i Halsen blaalig Rødhed, paa Tonsillerne hvidt Belæg. $\frac{2}{3}$. Hovne Nuchalglandler; Excori- ation paa Underlæben, i venstre Mundvinkel og i Næseborene. | $\frac{1}{5}$ 58 | 290 | Chloras kalicus. | |
| 44 | 67 | 40 Md. | Paa Scrotum og Penis Tuberc. mucosa; Ulcera paa Glans; Tuberc. mu- cosa om Anus; Roseola og Maculæ paa Under- extrem.; store, haarde, indolente Inguinalgland- ler; hovne Nuchalgland- ler; blaalig Rødhed i Fauces. | $\frac{2}{3}$ 58 | 195 | Fot. spec. resolv. | |
| 45 | 68 | 28 Qv. | Rundt Papillen paa ven- stre Mamma flere store ophøiede ulcererende Flader, der ligne Tu- berc. mucosa; Roseola paa Kroppen; blaalig Rødhed i Svælget. | $\frac{1}{5}$ 58 | 116 | Collodi- um, Pulv. Doveri, Grönsæbe, Inf. salvjæ. | $\frac{2}{7}$ 58 til $\frac{2}{6}$ 59. Tub. mucosa paa Lab. maj.; hvidt Belæg paa Palat. mølle og Ton- sillerne. Beh. i 178 D. m. Derivation. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin- ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|--|--|
| 2/5 59. Intet paa Tonsil- lerne og Velum palat. | Hun har senere lidt af en Betændelse i høire Clavicula, hvorfor hun brugte Sublimat i smaae Doser. Senere har hun lidt af svagt Syn, hvorfor har faaet Iodkali og Setaceum i Nakken. (J. Vogt). (Boeck). | Indk. 1/8 58, udskr. 2/9 58* = 138. |
| 2/5 59. V. Saar med Exsudat paa den høire Tonsille. Forresten Intet. | | Indk. 1/2 58, udskr. 2/5 59. = 290. |
| 2/9 58. Intet syphilitisk Symptom synligt. | | Indk. 2/8 58, udskr. 1/12 58. |
| 2/4 58. V. Intet Syphilitisk ved Brystvorten. Intet i Svælget; Intet paa Kroppen, ved Genitalia og Anus. 2/5 59. Rødhed af Velum Palat.; en liden Excoriation paa samme; Tandkjødet noget høvent og høirødt. | | Indk. 1/2 58, udskr. 2/9 58. 2/7 forløstes hun med et forraadnet Foster. Recidiv 2/2 58 til 2/8 59. I Slutningen af April 1859 fødte hun et forraadnet Foster i 6te Maaned. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 46 | 69 | 23 Qv. | Ved Udgangen af den venstre Ductus gland. Bartholini et stort Ulcus. Purulent Udflod fra Ure- thra. I Inguina høvne Glandler. $\frac{1}{8}$. Hvidt Ex- sudat paa Tonsillerne. $\frac{1}{8}$. Saar paa Tonsillerne. | $\frac{3}{8}$ 58 | 129 | Aqua calc. | |
| 47 | 70 | 48 Qv. | Ulcerationer og Rødhed paa begge Tonsiller; i venstre Mundvinkel en overfladisk Ulceration. I Nakken spredte, rød- brune Papler; paa Laa- rene rødbrune Pletter. $\frac{1}{16}$. Irit paa begge Øine. | $\frac{1}{8}$ 58 | 214 | Hirudines, Sol. sulph. atrop. | |
| 48 | 71 | 55 Qv. | Rubor faucium, Ulcera- tion paa Palat. molle; paa Legemet papuløse Syphilider. $\frac{2}{12}$. Erythe- ma nodosum paa Crura. | $\frac{1}{8}$ 58 | 211 | Sol. iodeti kal., Ve- sicat. na- chæ, Ho- stepiller, Salmiak- mixtur, Pulv.Dov., Liqu. ner- vinus, Sol. tart.silbiat. & Spirit. lavend. comp. | |
| 49 | 72 | 25 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia og ved Anus; paa Krop og Extremi- teterne papuløst Exan- them; enkelte Inguinal- glandler svulne; Exsu- dat paa venstre Tonsille. $\frac{3}{8}$. Scabies. | $\frac{3}{8}$ 58 | 134 | Decoct. sarsap., Fotus aqu. c. chlorat., Liqu. hy- drarg. flav., Ung. wienn. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin-ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--------------------------------------|--|
| † 58. V. Intet syphilitisk Tegn. | | Indk. † 58, udskr. † 58. = 194. |
| ‡ 59. V. Intet i Munden og Svælget; Intet ved Genitalia og Anus. | | Indk. ‡ 58, udskr. ‡ 59. = 218. |
| § 59. Intet syphilitisk Symptom. | | Indk. § 58, udskr. § 59. = 215. |
| ¶ 59. V. Intet syphilitisk Symptom noget Sted. | | Indk. ¶ 58, udskr. ¶ 59. = 180. Hendes Barn, født † 58, fik 2 Maanedes gam-melt Syphilis. (Boeck). |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 50 | 73 | 7 Qv. | Paa Krop og Underex- tremiteterne papuløst Ex- anthem; i Pars capill. capitis enkelte Cruster; i høire Mundvinkel en tynd goul Cruste. $\frac{1}{9}$. Saar paa Underlæbens Sliim- hinde. $\frac{1}{8}$. Excoriat. paa Velum palat. $\frac{1}{4}$. Tu- berc. mucosa genital. | $\frac{5}{9}$ 58 | 292 | Pulv. al- terans. | |
| 51 | 74 | 5 Qv. | Paa Krop og Underextr. papuløst Exanthem; i Ansigtet enkelte ophøi- ede brune Flekker, be- dækkede med tynde Cruster. $\frac{2}{9}$. Excoriat. paa Overlæben. $\frac{1}{8}$. Be- tydelige Saarflader paa Velum palat. $\frac{1}{4}$. Tu- berc. mucosa ved Anus. | $\frac{5}{9}$ 58 | 292 | Syrup. sarsap., Pulv. al- terans. | |
| 52 | 75 | 9 Qv. | Hævelse og Rødhed i Svælget; Ulceration paa Velum palat.; i Ansigtet brunrøde Maculæ; paa Brystet enkelte smaae brunrøde, ophøiede Flekker. $\frac{2}{9}$. Tuberc. mucosa paa Genitalia. | $\frac{5}{9}$ 58 | 157 | | |
| 53 | 77 | 14 $\frac{1}{2}$ Qv. | I høire Laarbøining Tu- berc. mucosa; Rødhed i Svælget; Tonsillerne hovne med hvidt Belæg. $\frac{1}{8}$. Saar paa Overlæ- ben; Ulcerationer paa Tonsillerne. $\frac{3}{4}$. Tuberc. mucosum paa Lab. maj. dextr. | $\frac{1}{9}$ 58 | 195 | Sol. nitrat. argent. | |
| 54 | 78 | 56 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia; i Ansigtet kob- berrøde Tuberkler. $\frac{1}{8}$. Saar og tykt Belæg paa Tonsillerne. | $\frac{2}{9}$ 58 | 119 | Sol. iodeti kalici, Ess. digit. comp. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Aamærkninger. |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| § 59. Intet i Svælget og Munden. Intet ved Genitalia og Anus. Macula paa venstre Cornea & Synechia. | | Indk. § 58, udskr. § 59. = 296. |
| § 59. Fremdeles Photophobie; Excoriat. ved Tarsalranden; Macula corneæ og nogen Injection. Rød og noget svullen i Halsen. Intet ved Genitalia og Anus. | | Indk. § 58, udskr. § 59. = 296. |
| § 59. V. Intet Syphilitisk ved Genitalia og Anus. Den øverste Extr. af venstre Tonsille takket og af et grauligt Udseende. Ellers Intet. | | Indk. § 58, udskr. § 59. = 160. |
| § 59. V. Tonsillerne store, ujevne paa Overfladen (see mistænkelige ud). Langs Randene af Lab. majora smaae Excoriationer, efter Kløe. | | Indk. § 58, udskr. § 59. = 196. |
| § 59. Intet i Halsen. Tomter efter Exanth. i Ansigtet, smaae Papler paa Hagen. Intet ved Genitalia. | | Indk. § 58, udskr. § 59. = 126. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 55 | 79 | 22 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia; Rødhed i Svæl- get; Roseola paa Krop og Lemmer. $\frac{28}{9}$. Ex- sudat paa den høire Tonsille. | $\frac{13}{9}$ 58 | 137 | | |
| 56 | 80 | 21 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia. Purulent Udflod fra Urethra og Vagina. $\frac{12}{10}$. Excoriation paa høire Tonsille. $\frac{7}{10}$. Eczem paa Arme og Bryst. $\frac{13}{11}$. Tu- berc. mucosa ved Anus $\frac{5}{4}$ 59. Ulcerationer paa Palatum molle & durum. | $\frac{8}{9}$ 58 * | 261 | Sapo vi- ridis, Sol. chlorat. kalici. | |
| 57 | 81 | 33 Md. | Paa Glans og Præputi- um Ulcera og Tuberc. mucosa; ved Anus Tu- berc. mucosa; paa Over- læben et Ulcus; Rødhed og Hævelse i Svælget; hovne Inguinal-, Nu- chal- og Submaxillar- glandler. $\frac{78}{11}$ 58. Belæg paa venstre Tonsille. $\frac{7}{12}$. Belæg paa høire Tonsille. $\frac{27}{1}$ 59. Iritis sinistra. Epididymitis dextra. | $\frac{10}{10}$ 58 | 194 | Hirud., Pilul. Do- veri, Ess. op. simpl. | |
| 58 | 82 | 20 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia; hovne Inguinal- glandler; paa begge Tonsiller hvidt Belæg. Purulent Udflod fra Ure- thra og Vagina. $\frac{12}{10}$. Ex- coriationer paa Tunge- randene. | $\frac{80}{9}$ 58 | 159 | | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|---|---|
| V ^o 59. Intet i Halsen. | Frisk April 1863. (J. Vogt). | Indk. 2 58, udskr. V ^o 59. = 210. |
| V ^o 59. V. Paa Overlæbens Slimhinde en opbøiet Plet efter et Saar. Intet ved Genitalia. | V ^o 59—V ^o 59. Serpiginöse Saar paa Genitalia og Halsaffection. Derivation. Diæta parca, Decoct, lodkalium. V ^o 60—V ^o 60 Ulcera genitalium — Remedia externa. (Boeck). | Indk. V ^o 58, udskr. V ^o 59. = 270. |
| V ^o 59. Alle syphilitiske Symptomer forsvundne. Den venstre Pupille lidt vinklet, og Synet ikke ganske saa godt som paa det høire Øie. Befindendet særdeles godt. | | Indk. V ^o 58, udskr. V ^o 59. = 195. |
| V ^o 59. V. Intet syphilitisk Symptom noget Sted. | | Indk. V ^o 58, udskr. V ^o 59. = 159. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|--|---|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 59 | 83 | 33 Qv. | Conjunctivitis sinistra; stærke bankende Smer- ter i og omkring Øiet. $\frac{1}{8}$. Intet Abnormt i Øiet; Intet ved Genitalia og Anus. | $\frac{1}{8}$ 58 | 36 | Sol. sulph. zincici c. Op., Pilul. Doveri. | |
| 60 | 85 | 47 Qv. | Paa Kroppen papulo- tuberculöst Exanthem; paa Genitalia Tuberc. mucosa; paa Velum pa- lat. hvidt Belæg; Smer- ter i Legemet og Ho- vedpine. $\frac{1}{8}$. Iritis sini- stra. $\frac{1}{8}$ 59. Psoriasis syph. i begge Plantæ pedum. | $\frac{1}{8}$ 58 | 126 | Sol atrop., Doverspil- ler, Solut. calcis chlor., Inf. sal- viæ. | 1ste Recidiv $\frac{1}{8}$ 59 til $\frac{1}{8}$ 59. Beh. i 56 D. m. Liqu. Bel- losti. 2det Recidiv $\frac{1}{8}$ 59 til $\frac{1}{8}$ 60. Beh. m. Cura Dzondi, Sol. iodeti kalici & ammonici, Diæta parca & Decoct. |
| 61 | 86 | 18 $\frac{1}{2}$ Qv. | $\frac{1}{8}$ 58. Purulent Udflod fra Urethra. $\frac{2}{3}$. Et rundt, indureret, stort Saar paa Lab. maj. sinistri Slim- hinde. $\frac{1}{8}$. Ulcerationer paa Tonsillerne; Tuberc. mucosa paa Genitalia. | $\frac{1}{8}$ 58 | 144 | Sol. lap. inf., Sol. chlorat. kalici. | |
| 62 | 87 | 26 Md. | Tubercula mucosa ved Anus og paa Scrotum; Saar paa Glans; hovne Inguinalglandler; Rød- hed i Svælget; Saar paa Velum palat.; Roscola. $\frac{1}{8}$. Corona venerea. | $\frac{1}{8}$ 58 | 156 | | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin-ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|--|
| †† 58. Intet i Halsen. | | I dette Foraar Roseola syphilitica og Tuberc. mucosa, da behandlet med Derivation. Indk. 2 ^o 58, udskr. †† 58. = 40. |
| <p>‡ 59. Ophøiede røde Pletter paa Palat. melle og Crura veli; Spor af Exanthem paa Arme og Been; Psoriasis syphil. i begge Plantæ pedum.</p> <p>‡ 59. V. Hun synes at være vel.</p> | | <p>Indk. 2^o 58, udskr. ‡ 59, (bragt over paa den medicinske Afdeling for Lungebetændelse.) = 128.</p> <p>Recidiv ‡ 59 til 2^o 59.</p> <p>Recidiv 2^o 59 til ‡ 60.</p> |
| ‡ 59. V. Intet syphilitisk Symptom noget Sted. | <p>‡ — ‡ 60. Ulcus lab. minoris. Remedia externa. Hun aborterede for 2 Aar siden og den 2^o 59 fødte hun 6 Uger for tidligt et dødt Dregebarn. Frisk i 1862. Senere død af Forbrænding. (J. Vogt).</p> | Indk. ‡ 58, udskr. 2 ^o 59. = 204. |
| ‡ 59. S. Intet paa Genitalia og ved Anus. Paa Nates en overfladisk Excoriation af Udseende, som om den var frembragt ved Rivning. Intet i Halsen. Haaret sidder fast. Befindendet godt. Tomter efter Exanthemet i Panden. | | Indk. ‡ 58, udskr. ‡ 59 = 157. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjønn. Aar. | Symptomer. | Behandling. | | Midler foruden Derivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlingens Varighed og Behandling. |
|----------|--------------|-------------------------|--|---------------------------|-----------------|---|---|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage | | |
| 63 | 88 | 33 Md. | Roseola; Rødhed i Svælget; hovne Inguinalglandler. $\frac{3}{4}$. En tvivlsom Saarflade paa Memb. post. pharyngis. | $\frac{2}{10}$ 58 | 122 | | |
| 64 | 89 | 30 Md. | Roseola; Tuberc. mucosa paa Scrotum og ved Anus; hovne Inguinal- og Nuchalglandler; Rødhed i Svælget; Exsudat paa høire Tonsille. $\frac{2}{12}$. Et squamöst-maculöst Exanthem paa Crura, om af syphilitisk Natur tvivlsomt. | $\frac{2}{10}$ 58 | 203 | Oleum tereb., Vesicat. perp. | |
| 65 | 90 | 7 Qv. | Tubercula mucosa ved Anus; Rødhed i Svælget; tyndt hvidt Belæg paa Velum palat. | $\frac{2}{10}$ 58 | 82 | | |
| 66 | 91 | 9 Qv. | Tuberc. mucosa paa Genitalia; i høire Mundvinkel en Ulceration; blaalig Rødhed i Svælget; paa Tonsillerne og Velum palat. hvidt Belæg. $\frac{2}{1}$ 59. Ophøiet Saar paa Tungen. | $\frac{2}{10}$ 58 | 164 | | |
| 67 | 92 | 30 Qv. | $\frac{3}{10}$. En liden Absces under venstre Papilla. $\frac{1}{10}$. Papulo - pustulöst Exanthem paa Krop og Extremiteter. $\frac{1}{6}$. Exsudat paa Tonsillerne. $\frac{2}{3}$. Iritis dextra. $\frac{1}{2}$. Iritis sinistra. $\frac{2}{1}$ 59. Dybt Saar midt paa Tungen. | $\frac{1}{10}$ 58 | 200 | Hirudines, Vesicat. perp., Sol. iodeti kal. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|---|--|
| <p>259. Intet Tydeligt i Halsen. Paa det høire Kinds Slimhinde lige ved den sidste Dens molaris inferior en hvid Flek, uden Fortykkelse af Slimhinden. Pityriasis versicolor paa Underlivet. Forresten Intet.</p> | | <p>For 1 Aar siden behandlet for en Chancre. Indk. 258, udskr. 259. = 122.</p> |
| <p>259. S. Intet syphilitisk Symptom tilstede. Befindendet godt.</p> | <p>I Vinteren 1860 behandlet for en syphilitisk Halsaffection med Iodkali. (Holst).</p> | <p>Indk. 258, udskr. 259. = 203.</p> |
| <p>259. V. Intet syphilitisk Symptom i Halsen, ved Genitalia og Anus.</p> | | <p>Indk. 258, udskr. 259. = 83.</p> |
| <p>259. V. Tonsillerne noget hovne og røde. Paa Overlæbens ydre Flade henimod Ang. dexter et squamöst Belæg, hvor Huden ved Stramning let blöder. Nogen Leucorrhoe.</p> | | <p>Indk. 258, udskr. 259. = 165.</p> |
| <p>259. Han har benyttet 7 Fl. Sol. iodeti kalici og skal vedblive dermed; men herom staaer Intet i Journalen. I Ansigtet smaa Pustler paa Hagen og Næsen; paa Crus veli dextr. anteriur et Saar med ureen Bund.</p> | <p>259—260. Derivation, Sol. iodeti ammon. (Boeck).</p> | <p>Indk. 258, udskr. 259, efter eget Forlangende. = 216.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 68 | 93 | 22 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia, ved Anus og i venstre Laarbøining; Roseola; hvidt Belæg paa Palat. molle. Be- tydelig Leucorrhoe. | $\frac{2}{10}$ 58 | 149 | | |
| 69 | 94 | 28 Qv. | Tuberc. mucosa paa Ge- nitalia; hvidt Belæg paa begge Tonsiller. Leu- corrhoe. | $\frac{2}{10}$ 58 | 182 | Aqua calc. | |
| 70 | 95 | 19 $\frac{1}{2}$ Qv. | Et bruunt papuløst Ex- anthem paa Laarene, Kroppen og i Panden; i Pars capill. capitis en Deel Knopper; Håret falder af. Rødhed i Svæl- get; hvidt Belæg paa Tonsillerne; Ulceration paa Velum palat; Tu- berc. mucosa ved Anus. | $\frac{2}{11}$ 58 | 54 | Sol. iodeti kalici. | |
| 71 | 96 | 22 $\frac{1}{2}$ Md. | Ulcus præput., et lig- nende paa den underste Flade af Penis. $\frac{2}{11}$. Ro- seola. $\frac{1}{2}$ 59. Tubercula mucosa ved Anus; 2 Saar paa Underlæben. $\frac{2}{2}$. Superficelle Saar paa Tungeranden; tyndt hvidt Belæg paa venstre Ton- sille. | $\frac{1}{2}$ 58 | 174 | Sol. calc. chlor., Pilul. Doveri. | |
| 72 | 97 | 23 Md. | Tubercula mucosa paa Scrotum, ved Anus og i Laarbøiningerne; Ro- seola; graahvide Exsu- dater i Svælget; paa Underlæbens Slimhinde større og mindre Ulcera- tioner; hovne Inguinal- og Cervicalglandler. | $\frac{1}{2}$ 59 | 146 | Chlor- vand. | |

Patientens Tilstand paa
den Dag, Committeeen
sidste Gang saae ham
paa Hospitalet.

Senere Efterretning-
ger om Patienten.

Anmærkninger.

159. V. Intet Abnormt
at iagttage.

Indk. $\frac{2}{1}$ 58, udskr. $\frac{1}{2}$ 59.
= 149.

159. V. Intet Syphili-
tisk i Munden og Halsen,
ei heller ved Genitalia
og Anus. Betydelig
Leucorrhoe.

Indk. $\frac{2}{1}$ 58, udskr. $\frac{1}{2}$ 59.
= 182.

159. V. Intet syphili-
tisk Symptom.

Indk. $\frac{2}{2}$ 58, udskr. $\frac{1}{2}$ 59.
= 149.

$\frac{1}{1}$ 58 forløstes hun med
et Drengbarn, som døde
den $\frac{2}{1}$ 58; Barnet havde
syphilit. Exanthem.

159. S. Alle syphilitiske
Symptomer forsvundne.
Befindendet og Udseen-
det godt.

Indk. $\frac{1}{1}$ 58, udskr. $\frac{1}{2}$ 59.
= 209.

159. Der er en ele-
veret hvid Plet med Ex-
coriation i Kanten paa
Underlæben. Forresten
Intet.

Indk. $\frac{1}{1}$ 59, udskr. $\frac{1}{2}$ 59.
= 146.

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 73 | 98 | 21 Qv. | I Ansigtet, i Pars capill. capitis, paa Brystet run- de ophøiede brune Plet- ter, tildeels bedækkede med fine Skjæl; paa Un- derlivet Roseola; Ul- cerationer paa Genitalia; Belæg paa Tonsillerne. Purulent Udflod fra Ure- thra og Vagina. | 31 | 59 121 | | |
| 74 | 99 | 2 Qv. | Ulcererende Tuberc. mu- cosa paa Genitalia og ved Anus; Vaginit; paa Overlæben en overfla- disk Ulceration; hvidt Belæg paa begge Ton- siller. | 28 1 | 58 178 | Sol. chlor. kalici, Calomel. | |
| 75 | 100 | 24 Qv. | Paa Lab. majora Tu- berc. mucosa og Ex- coriat; purulent Udflod fra Urethra og Vagina; paa Kroppen Roseola. I Ansigtet brune Papler; i Pars capill. capitis en- kelte smaae Ulcera. | 3 | 59 116 | Aqua calc. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|--|
| 159. Pletterne i Ansigtet som før. | I Mai 1860 frisk. (J. Vogt). | Er gjentagende behandlet i Hospitalet for Urethrit og engang i 1857 for et Saar ved Genitalia, som tilsyneladende var primært syphilitisk. Indk. $\frac{2}{3}$ 59, udskr. $\frac{1}{2}$ 59. = 130. $\frac{2}{3}$ 59 forlöstes med et fuldgaaet Barn, der levede 1 Time; dets Legeme besat med Pletter. Recidiv fra $\frac{2}{3}$ 61. Tuberc. mucosa. Indifferent Behandling Frisk Novbr. 1861. Død i 1863 paa R.-Hospit. af Feber. |
| 159. Excoriationer med hvidt Belæg paa Crura veli & Tonsillæ. | | Indk. $\frac{1}{2}$ 58, udskr. $\frac{1}{2}$ 59. = 178. |
| 159. Intet i Halsen. Nepe mere Roseola. Menstrua tilstede. | I Mai 1860 frisk. (J. Vogt). I April 1863 frisk. (J. Vogt). | Indk. $\frac{1}{2}$ 59, udskr. $\frac{1}{2}$ 59. = 118. |

Schematisk

Deri-

e. Tidligere be-

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 1 | 2 | 24 Qv. | Begge Lab. minora øde- matøse. Rigelig Leu- corrhoe. I den bagerste Kant af Orif. ani en Fissur af ikke syphilitisk Udsecnde. Over hele Legemet temmelig store ikke begrænsede røde Pletter. $\frac{1}{3}$ 56. Tuberc. mucosa i begge Axiller. $\frac{2}{8}$ 57. Papuløst rødt Ud- slag over hele Legemet. | $\frac{1}{2}$ 56 | 258 | Aqu. calc., Cura Dzondi i 3 Dage. Balnea te- pida. De- coct. sti- pit. Dul- camaræ & Infus. cas- siarum. | |
| 2 | 4 | 24 Qv. | Ulceration paa Lab. ma- jus dextrum; paa Bryst og Rygsprede, kløende Papler; hæst Stemme; Rubor faucium. Flug- tende Smerter i Hoved og Led. $\frac{1}{2}$. Hvidligt Exsudat paa den høire Tonsille. Tuberc. mu- cos. genital. | $\frac{1}{2}$ 57 | 91 | Vesicat. paa den venstre Hofte; en- dermatisk Acet. morph. | |
| 3 | 5 | 23 Qv. | Psoriasis lignende Ud- slag i Haandfladerne, paa Haandryggene og om Haandledene. | $\frac{1}{2}$ 57 | 52 | Sol. chlo- ret. am- monici, Cucurb. cruentæ. | |
| 4 | 7 | 20 Qv. | Over hele Legemet større og mindre, ikke over Huden ophøiede, rød- brune Pletter. Purulent Afsondring fra Urethra, Vagina og Uterus. $\frac{1}{2}$. Papler paa Kroppen. $\frac{2}{2}$. Tuberc. mucosum i venstre Inguen. $\frac{3}{8}$. Cru- støse Saar i Hovedet. $\frac{2}{8}$. Ulceration paa den venstre Tonsille. | $\frac{2}{2}$ 57 | 142 | Sol. nitrat. argent. til Pensling i Urethra og paa Col- lum uteri. | |

Oversigt.

vation.

handlede med Mercur.

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committee sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin- ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|---|
| §57. S. Der sees fremdeles smaae røde Pletter paa Brystet og Ryggen, men de have ikke nogen bestemt Charakteer. Paa Ryggen have Arrene efter Stibiatplastrene en blaarød Farve. | | Fra $\frac{3}{4}$ ^o — $\frac{1}{2}$ ^o 56 behandlet i Hospitalet for constitutionel Syphilis med Emulsio sublimati. Indk. $\frac{1}{2}$ ^o 56, udskr. $\frac{1}{2}$ 57. = 265. |
| §57. V. Intet syphilitisk Symptom. | | Fra $\frac{1}{2}$ ^o 55 — $\frac{1}{2}$ 56 og fra $\frac{3}{4}$ ^o 56 — $\frac{1}{2}$ ^o 56 behandlet i Hospitalet for Tuberc. mucosa ani & genitalium med Protoioduret. og Emulsio sublimati. Indk. $\frac{1}{2}$ 57, udskr. $\frac{1}{2}$ 57. = 95. |
| §57. Udslaget ved Haandledene borte. Intet syphilitisk Symptom. | §58. Ligger i Chr. Byes Sygehuus med i høi Grad udviklet Phthisis. | Fra $\frac{1}{2}$ ^o 53 — §54 behandlet i Hospitalet for Syphilis med Inunction, Cura Dzondi, Liquor Bellosti, Solut. iodeti kalici. Indk. $\frac{1}{2}$ 57, udskr. $\frac{3}{4}$ ^o 57. = 52. |
| §57. St. Alle syphilitiske Symptomer svundne. | | Fra $\frac{3}{4}$ ^o — $\frac{1}{2}$ ^o 56 behandlet i Hospitalet for Tuberc. mucosa og Halsaffection med Emulsio Sublimati. Indk. $\frac{1}{2}$ 57, udskr. $\frac{1}{2}$ ^o 57. = 157. |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 5 | 8 | 22 Qv. | Paa høire Lab. majus 2 ophøiede ærtstore Knu- der, ulcererede paa Spid- sen. | $\frac{1}{2}$ 57 | 51 | Sol. calc. chlorat. | |
| 6 | 10 | 35 Qv. | Tyk gaulgrøn Leucor- rhoe; paa Portio vagi- nalis uteri overfladiske let blødende Saar. Paa Nates og Laarene deels spredte, deels i Grupper staaende rødbrune til- deels med tynde Skjæl bedækkede Papler. $\frac{7}{8}$. Paa Arme og Laar Skab- vesikler. $\frac{1}{5}$. Paa ven- stre Lab. majus en ul- cereret Tuberkel; paa Membr. post. pharyngis svagt graaligt Belæg. | $\frac{3}{4}$ 57 | 137 | Ungu. wi- ennense. | |
| 7 | 11 | 27 Qv. | Paa Randene af Lab. maj. smaae ulcererede Tubercula mucosa. $\frac{5}{8}$. Haaret falder af. Facies lurida. $\frac{1}{4}$. Tubercula mucosa ved Anus. | $\frac{2}{2}$ 57 | 155 | Sol. calc. chlorat., Salmiak- mixtur, Jalap. sa- linum, Ve- sicat. pone aures, Si- nap. car- diæ, Lapis infern., Emuls. asæ foetidæ. | 1ste Recidiv $\frac{1}{8}$ 57 til $\frac{1}{4}$ 57. Tuberc. mu- cosa genital., Excoriationes superficiei in- ferior. linguæ. Beh. i 92 D. m. Derivation. 2det Recidiv. $\frac{1}{2}$ 58 til $\frac{1}{4}$ 58. Excoriatio la- bii majoris dextri. Beh. i 21 D. m. Tou- cheren. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeens sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|-------------------------------------|--|
| <p>‡ 57. V. Intet syphilitisk Symptom. Leucorrhoe.</p> | | <p>Fra ‡ 55—‡ 56 behandlet i Hospitalet for constitutionel Syphilis med Protoioduret. Indk. ‡ 57, udskr. ‡ 57. = 53.</p> |
| <p>‡ 57. S. Intet i Halsen og ved Genitalia. Arrene efter Stibiatplastre paa Laarene ere røde og ophøiede og tildeels bedækkede med Skjæl; i deres Omkreds endeel isolerede smaae røde Pletter.</p> | | <p>Fra ‡ 52—‡ 53 behandlet for constitutionel Syphilis med Cura Dzondi. Indk. ‡ 57, udskr. ‡ 57. = 143.</p> |
| <p>‡ 57. Intet i Halsen.</p> <p>‡ 57. Rødhed og lidt Svulst paa Crura anter. veli. Intet ved Genitalia og Anus.</p> <p>Ikke seet ved Udskrivningen.</p> | | <p>I Slutningen af Novbr. forlod hun Carlstad Curhaus, hvor hun var behandlet i 8 Uger for constitutionel Syphilis med Mercur til Salivation og Solut. iodetikalici. Indk. ‡ 57, udskr. ‡ 57. = 155. Recidiv. Indk. ‡ 57, udskr. ‡ 57. = 93. Recidiv. Indk. ‡ 58, udskr. ‡ 58. = 21.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|--|------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 8 | 14 | 34 Qv. | Paa Krop og Lemmer rødbrune Papler mesten- deels i ringformige Grup- per. | $\frac{1}{3}$ 57 | 144 | Ess. ferulæ c. Æther. alcohol., Inf. vale- rianæ, Salmiak- mixtur, Li- quor anti- spast. | 1ste Recidiv $\frac{1}{8}$ 57 til $\frac{7}{8}$ 57. Flugtende og rivende Smer- ter i hele Le- gemet, Mæthed etc. Paa begge Arme og højre Laar Spor af Exanthemet. Beh. i 79 D. m. Ess. cinch. comp. c. Ess. valerianæ, Dampbad. 2det Recidiv $\frac{2}{3}$ 57 til $\frac{1}{2}$ 58. I venstre Al- bue et Par store ophøi- ede kobber- røde Pletter med gule Cru- stæ; paa begge Forarme og begge Na- tes Papler. Beh. i 45 D. m. Sol. iod. kal. 3die Recidiv $\frac{2}{8}$ 58 til $\frac{4}{8}$ 59. Paa Rygfladen af højre Haand og paa den nederste Deel af Underlivet vesiculöst Ex- anthem; paa begge For- arme ophøi- ede, rødbrune, runde Flekker. Beh. i 221 D. med Decoct. sarsap., Deri- vat., Liq. Bell. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|---|--|
| <p>§ 57. Exanthem fremdeles paa begge Arme, tildeels paa høire Laar. Almeenbefindendet noget bedre. § 59. V. Kun Tomter efter Exanthemet.</p> | <p>Behandlet i den chirurgiske Afdeling fra $\frac{1}{9}$ 59 — $\frac{7}{8}$ 59 for en Absces i den høire Axilla med Catapl. og Solut. iodeti kali (Boeck).</p> | <p>Ifjor Høst behandlet i Hedemarkens Amtssygehuus for constitutionel Syphilis med Piller. Indk. $\frac{1}{8}$ 57, udskr. $\frac{3}{4}$ 57. = 145. Recidiv indk. $\frac{1}{8}$ 57, udskr. $\frac{7}{8}$ 57. = 79. Recidiv indk. $\frac{7}{8}$ 57, udskr. $\frac{1}{2}$ 58. = 45. Recidiv indk. $\frac{2}{8}$ 58, udskr. $\frac{4}{8}$ 59. = 221.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjønn. Aar. | Symptomer. | Behandling. | | Midler foruden Derivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlingens Varighed og Behandling. |
|----------|--------------|-------------------------|--|---------------------------|------------------|--|---|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 9 | 18 | 28½ Qv. | Paa Ryggen, Nates og Laarene større og mindre rødbrune, deels glatte, deels ophøiede med Skjæl bedækkede tuberculøse Afsætninger. | 3/3 57 | 120 | Sol. tartr. stibic. kal. alcohol. c. Æther alcohol. camph., Sol. nitrat. argent., Sol. oxydi calc., Sol. acidi tannici. | 3/2 58 til 3/1 59. Rhupia lig-nende Exanthem paa begge Crura. Beh. i 50 D. m. Sol. iodeti kalici. |
| 10 | 21 | 29 Md. | Høire Side af Scrotum rød og hoven med 3 fine Fistelaabninger; Epididymis noget opsvulmet; paa Kroppen og Extremiteterne deels enkeltstaaende, deels cirkelformigt grupperede Hud- og Cellevævstuberklær af violetrød Farve og bedækkede tildeels med graagrønne Cruster. 3/3. Ulcera paa Benene efter Skorpernes Separation. 1/2. Absces i lnguen, der incideredes, hvorefter Fistel. | 3/8 57 | 500 | Sol. iodeti kalici, Tinct. iodi til Inject., Diæta homogenea c. Pilul. conii maculati & Decoct. sarsaparillæ, Seta-ceum. | |
| 11 | 22 | 39 Md. | Graaligt Exsudat paa Velum palat. 3/3. Tuberc. mucosa paa Underfladen af Tungen. 2/6. Hvidlige Excoriationer i den høire Mundvinkel og paa Underlæben. 1/1. En superficial Fissur ved Anus. | 3/4 57 | 213 | Fonticuli, Acid. tannic. c. Pingvol. theobrom. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|---|--|
| <p>2^o 57. S. Det tuberculøse syphilitiske Exanthem er forsvundet. Arrene paa Laarene efter Stibioplastrene ligne noget syphilitiske Tuberkler.</p> | <p>1^o 60. S. I forrige Sommer en Tid paa Chra. Byes Sygehuus, hvor hun benyttede Solut. iodeti kalici. Intet Sygeligt er at opdage paa det ydre Legeme. Hun plages af Mæthed, Svindel, Smerter i Hoved og Lemmer. D. Solut. iodet. kal. 2^o 60. St. Omtrent som 1^o.</p> | <p>Fra 2^o — 1^o 55, fra 1^o 55 — 1^o 56 og fra 1^o — 1^o 56 behandlet i Rigshospit. for secundær Syphilis med Cura Dzondi, Sol. iodeti kalici, Balnea vapor., Sol. nitrat. hydrargyrosi, Derivation og Sol. iodeti kalici. Indk. 2^o 57, udskr. 2^o 57. = 120. Recidiv. Indk. 2^o 58, udskr. 2^o 59. = 50. 1^o 58 fødte hun et forraaduet Foster.</p> |
| <p>1^o 58. Fistelgangen er endnu ikke gjenne-skaaret af Setaceet. Paa høire Crus fremdeles enkelte crustøse Saar. Befindendet ellers godt.</p> | | <p>Fra 1^o — 2^o 55 behandlet i Rigshospit. for indureret Ulcus syphilit. med local Behandling; fra 2^o — 1^o 55 for Tuberc. mucosa med Cura Dzondi; fra 2^o — 2^o 56 for Epididym. med Absces og Fisteldannelse, Sol. iod. kal., Empl. adh. c. mercur., Inject. af Sol. iodeti kalici; fra 1^o — 2^o 56 for Impetigo med Sol. iodet. kalici og Ungu. lap. infern. Indk. 1^o 57, udskr. 1^o 58. = 516.</p> |
| <p>1^o 57. S. Intet paa Tungen; kun en ganske ubetydelig Sprække i Orific. ani; det saae næsten ud som om Sliimhinden var bleven indrevet noget, ved at den strammedes under Undersøgelsen.</p> | | <p>Fra 2^o — 1^o 56 behandlet i Hospit. for constitutionel Syphilis med Cura Dzondi og Solut. iodeti kalici. Indk. 2^o 57, udskr. 1^o 57. = 213.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 12 | 24 | 25 Qv. | Paa høire Skulder og Arm, paa Abdomen og begge Laar brunrøde, tildeels afskallende Sy- philider; i Halsen lidt Rødhed. | $\frac{1}{8}$ 57 | 167 | Infus sal- viæ, Sal- miakmix- tur, Sapo viridis, Liqu. Bel- losti. | |
| 13 | 25 | 23 Md. | Paa Tungen et stort Tuberc. mucosum; ved Anus ligeledes et stort Tuberc. mucosum. $\frac{1}{4}$. Tuberc. mucosa paa Scrotum. | $\frac{1}{8}$ 57 | 143 | | |
| 14 | 26 | 27 Qv. | Tuberc. mucosa paa Lab. majora og ved Anus; hvidt Belæg paa den venstre Tonsille. $\frac{3}{4}$. Paa Krop og Ex- tremitet. et Exanthem bestaaende af tætstaa- ende jævnt udbredte blegrøde Ophøininger af et lidet Knappenaals- hoveds Størrelse, stærkt kløende. | $\frac{1}{8}$ 57 | 108 | Essent. ferulæ, Balnea tepid. | |
| 15 | 42 | 29 Qv. | Paa høire Underarm flere brune, tildeels ophøiede Pletter, hvoraf nogle be- dækkede med tynde Cruster. | $\frac{1}{11}$ 57 | 98 | Subnitrat. bismuth c. Op., Magn. carbon. & Radice columbo. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeens sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|---|---|
| <p>21/8 57. Papulöst Exanthem paa Armene, Skuldrene og Laarene. Udgaaer af Committeeens Observation.</p> | <p>Fra 1/2 56—1/2 57 behandlet i Hospit. for Exsudater i Halsen, papulöse Syphilider og en Ulceration paa Clitoris med Liqu. Bellosti, Sultecur og Solut. Donovanii. Indk. 1/8 57, udskr. Udgaaet af Observation 21/8 57.</p> | <p>Fra 1/2 56—1/2 57 behandlet i Hospit. for Exsudater i Halsen, papulöse Syphilider og en Ulceration paa Clitoris med Liqu. Bellosti, Sultecur og Solut. Donovanii. Indk. 1/8 57, udskr. Udgaaet af Observation 21/8 57.</p> |
| <p>1/6 57. S. Intet at opdage. Befindendet godt.</p> | <p>For et Aar siden behandlet i Hospit. for secundær Syphilis med Sublimatopløsning, Iodkalium og Sultecur. Indk. 1/8 57, udskr. 1/6 57. = 143.</p> | <p>For et Aar siden behandlet i Hospit. for secundær Syphilis med Sublimatopløsning, Iodkalium og Sultecur. Indk. 1/8 57, udskr. 1/6 57. = 143.</p> |
| <p>1/5 57. Exanthemet forsvundet, ligeledes de syphilitiske Symptomer. Leucorrhoe.</p> | <p>Fra 1/5 56—1/5 57 behandlet for et papulöst syphilitisk Exanthem og Ulcera i Halsen med Bærensprungs Emulsion, Iodkali og Syphilisation. Indk. 1/5 57, udskr. 1/5 57. = 109.</p> | <p>Fra 1/5 56—1/5 57 behandlet for et papulöst syphilitisk Exanthem og Ulcera i Halsen med Bærensprungs Emulsion, Iodkali og Syphilisation. Indk. 1/5 57, udskr. 1/5 57. = 109.</p> |
| <p>1/5 58. Fremdeles nogle eleverede Pletter; Facies lurida.</p> | <p>I 1852 behandlet i Hospit. for et Exanthem i Panden med 16 Inunctioner, i 1853 for primær Syphilis. Indk. 1/1 57, udskr. 1/5 58. = 105.</p> | <p>I 1852 behandlet i Hospit. for et Exanthem i Panden med 16 Inunctioner, i 1853 for primær Syphilis. Indk. 1/1 57, udskr. 1/5 58. = 105.</p> |

| Löbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midlerfor- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 16 | 44 | 22 Qv. | Paa den høire Nates ringformig situerede Papler (serpiginöst); Haaret falder af. $\frac{1}{2}$. Paa den indvendige Side af det venstre Lab. majus en ærtstor Ulceration. | $\frac{1}{2}$ 57 | 68 | | |
| 17 | 46 | 25 Qv. | En Ulceration af en Bön- nes Størrelse paa Palat. durum; paa Næsen brune Crustæ, omgivne af en rød Halo; flugtende Smerter i Armene. | $\frac{3}{4}$ 57 | 43 | Pilul. Dov., Sol. iodeti kalici. | |
| 18 | 49 | 29 Qv. | Paa begge Forarme en- kelte kobberrøde, ært- store ophøiede Flekker, bedækkede med tynde hvide Skjæl; Psoriasis palmarum; flugtende Smerter i Ledene. | $\frac{3}{4}$ 57 | 135 | Sinapism. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|--|-------------------------------------|--|
| <p>77 58. Exanthemet i Aftagende; intet Saar paa Lab. majus.</p> | | <p>Fra 20 — 53 behandlet for secundær Syphilis med Cura Dzondi, i 1855 2 Gange for primære Tilfælde. Indk. 77 57, udskr. 20 58. = 69.</p> |
| <p>77 57. Status fere idem.</p> | | <p>Behandlet gjentagne Gange for secundær Syphilis med Liquor Bellosti, Solut. iodeti kalici og Protoioduret. Indk. 77 57, udskr. 11 58. = 44.</p> |
| <p>14 58. V. Udslettet paa Forarmene omtrent som før, tildeels skjællt; Volæ manuū frie.</p> | | <p>77 57. Gravida i 4de Maaned. Fra 12 48 til 22 49 behandlet med Calomel til Salivation, fra 11 52 til 22 53 med Cura Dzondi frem og tilbage fra 1 53 til 12 53 med Syphilisation til Immunitet, fra 10 53 til 22 54 med do., fra 1 54 til 12 54 med do. Indk. 77 57, udskr. 14 58 af Mangel paa Plads og for at ligge i Barselseng udenfor Hospitalet. = 137. 77 58. 1ste Barselseng for 9 Aar siden, fødte et Drengbarn, som lever og er rask. For 6 (?) Aar siden havde hun primær og secundær Affection paa Genitalia. For 5 Aar siden fødte hun et Barn, som levede i 2 Maaneder. For 3 Aar siden nedkom hun 2 Maaned. for tidligt. Ligeledes for 1 Aar siden. Nu er hun Gravida i 5te Maaned.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 19 | 51 | 23 Qv. | Store Tuberc. mucosa paa Lab. majora, bety- delig Leucorrhoe. | 1/2 58 | 106 | Ungv. nea- polit., Aqu. calcis. | |
| 20 | 54 | 28 Qv. | Paa Tonsillerne og Ve- lum palat. Ulceration og hvidt Belæg. 4/5. Crustøst Saar paa Næsespidsen. | 3/5 58 | 101 | Cataplas- ma emoll. | |
| 21 | 66 | 23 Qv. | Paa den indvendige Side af høire Laar en blaa- ligrød, infiltreret Flade, i hvis Rande Pustler og tykke Crustæ. 1/8. Pu- stuløst Exanthem paa begge Alæ nasi. | 1/8 58 | | Ungu. iod. kal. & Iodi puri. | 1/2 59 til 3/8 59. Paa den ind- vendige Side af høire Laar enkelte kob- berrøde Plet- ter, i hvis Om- kreds smaae Papler. Beh. i 79 Dage med Liqu. Bellosti. |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretnin-ger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|--|--|
| 1 ^o 58. Betydelig Leucorrhoe. Paa den indvendige Side af begge Lab. majora flere Ulcerationer. | | <p>For 3 og 2$\frac{1}{2}$ Aar siden behandlet i Drammens Sygehuus for en lignende Affection af nærværende, og fik da sandsynligviis Calomelpiller.</p> <p>Indk. 1^o 58, udskr. 2^o 58. = 107.</p> <p>2^o 58. Blev idagmorges forløst med et stort vel-skabt Pigebarn, der som friskt blev udskrevet samtidig med Moderen.</p> |
| 1 ^o 58. Saarret paa Næsespidsen tilhelet; Saarene i Svælget ligeledes. | <p>Fra 1^o 58 — 2^o 59 i Chra. Byes Sygehuus: Syphilisation. 2^o 59 til 2$\frac{1}{2}$ 59 i do.; — Ulcus serpig. femoris — Solut. iod. kal.</p> | <p>Fra 2^o 55 — 2^o 56 behandlet i Hospitalet for Tuberc. mucosa og papulöst Udslet med Cura Dzondi og Liqueur Bellosti, fra 2^o 56 — 2^o 56 for Ulcerationer i Svælget og Hovedsmerter med Sublimatemulsion og Iodkalium, fra 2^o 56 — 2^o 57 for papulöst-tuberculöst Exanthem og Hovedsmerter med Iodkalium og Sublimatemulsion.</p> <p>Indk. 2^o 58, udskr. 1^o 58. = 104.</p> |
| 1 ^o 58. Exanthemet i Af-tagende. | <p>2^o 59 til 2^o 60. Ulcus ad orific. urethræ; — Remedia externa. — (Boeck).</p> | <p>Er gjentagne Gange behandlet for secundær og tertiær Syphilis med Cura Dzondi, Sultecur, Sublimatemulsion og Iodkalium.</p> <p>Indk. 1^o 58, udskr. Recidiv indk. 2^o 59, udskr. 2^o 59.</p> |

| Løbe-Nr. | Protokol-Nr. | Alder og Kjøn. Aar. | Symptomer. | Behand- ling. | | Midler for- uden De- rivation. | Recidiv, Symptomer, Behandlin- gens Varighed og Behand- ling. |
|----------|--------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Derivationens Begyndelse. | Varighed i Dage. | | |
| 22 | 76 | 31 Qv. | Psoriasis paa Krop og Laar; i Panden og paa Underlæben et Par røde, runde Flekker; Rødhed i Halsen og overfladiske Exsudater; Tuberc. mu- cosa ved Anus. Puru- lent Udflod fra Urethra og Vagina. | $\frac{2}{8}$ 58 | 82 | | |
| 23 | 84 | $1\frac{1}{2}$ Qv. | I venstre Mundvinkel et Tuberc. mucos. med graahvidt Belæg. $\frac{3}{9}$ 1. I venstre Mundvinkel et dybt Ulcus; paa Ton- sillerne Belæg. | $\frac{3}{9}$ 58 | 79 | Sol. iodeti kalici, Decoct. album. | |

| Patientens Tilstand paa den Dag, Committeeen sidste Gang saae ham paa Hospitalet. | Senere Efterretninger om Patienten. | Anmærkninger. |
|---|-------------------------------------|---|
| ††58. Exanthemet svundet. Intet i Halsen. Intet ved Genitalia og Anus. | | Behandlet med Piller og Decoct forhen. Indk. $\frac{1}{8}$ 58, udskr. ††58. = 82. |
| ††58. Saar i venstre Mundvinkel. | | Er behandlet for hereditær Syphilis fra $\frac{1}{4}$ 57— $\frac{1}{2}$ 57, fra $\frac{1}{8}$ 57— $\frac{1}{4}$ 57 og fra $\frac{1}{8}$ 58— $\frac{1}{4}$ 58 med Sublimatbad og Calomel. Indk. $\frac{1}{8}$ 58, udskr. ††58, da hun døde af Strubehoste. = 135. |

THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., U.S.A.

Subscription price, Five Dollars Per Annum in Advance.
Single Copies, Fifteen Cents.
Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917.
Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in
Act of October 3, 1917, authorized on July 16, 1918.
Copyright, 1918, by American Medical Association

Published by the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.
Editorial and Business Communications to 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.
Subscription orders, notices of change of address, notices of discontinuance,
and all correspondence relating to this journal, to be sent to the
Subscription Department, American Medical Association, 535 North Dearborn Street,
Chicago, Ill.

Entered as Second-Class Matter, October 3, 1917.
Postage paid at Chicago, Ill., and at additional mailing offices.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in
Act of October 3, 1917, authorized on July 16, 1918.
Copyright, 1918, by American Medical Association