

**K voprosu o vliianii promyvaniia zheludka na usvoenie zhirov pishchi u zdorovykh liudei : dissertatsiia na stepen' doktora meditsiny / Meera Geselevicha ; tsenzorami dissertatsii, po porucheniiu Konferentsii, byli professora V.A. Manassein, Iu.T. Chudnovskii i priv.-dots. P.A. Val'ter.**

### **Contributors**

Geselevich, Meer Zel'manovich, 1864-  
Maxwell, Theodore, 1847-1914  
Royal College of Surgeons of England

### **Publication/Creation**

S.-Peterburg : Tip. Ettingera, 1891.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/u3d6phgb>

### **Provider**

Royal College of Surgeons

### **License and attribution**

This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>


Geselevich (M.) Effect of washing out the stomach on the assimilation of fat [in Russian], 8vo. St. P., 1891

№ 39.

КЪ ВОПРОСУ  
О ВЛІЯНІИ ПРОМЫВАНІЯ ЖЕЛУДКА  
на усвоеніе жировъ пищи у здоровыхъ людейъ.

ДИССЕРТАЦІЯ  
НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ  
ЛЕКАРЯ  
МЕЕРА ГЕСЕЛЕВИЧА.

Цензорами диссертациі, по порученію Конференції, были профессора:  
В. А. Манассеинъ, Ю. Т. Чудновскій и прив.-доц. П. А. Вальтеръ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Эттингера, Казанская, № 44.

1891.

НОНСОТАПИИИ да ғылым да мактаптарда. Ыралтасынц қызмет  
чыдат жылдарынан 1981-2001 да замандағы консистиңдер

№ 38.

АДАМДЫК ПИАДАМДЫК ПИАМДЫК

АДАМДЫК ПИАДАМДЫК ПИАМДЫК

АДАМДЫК ПИАДАМДЫК ПИАМДЫК

INCUBATION

АДАМДЫК ПИАДАМДЫК ПИАМДЫК

РЕАКЦИЯ

MEERA LEOGLURBNA

АДАМДЫК ПИАДАМДЫК ПИАМДЫК



ДРУЖБА НАРОДОВ

АДАМДЫК ПИАДАМДЫК ПИАМДЫК

1981

Серія диссертаций, допущенныхъ къ защитѣ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ  
Военно-Медицинской Академіи въ 1890—1891 академическомъ году.

№ 39.

КЪ ВОПРОСУ

# О ВЛІЯНІЇ ПРОМОВАНІЯ ЖЕЛУДКА

на усвоеніе жировъ пищи у здоровыхъ людей.


ДИССЕРТАЦІЯ

НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

ЛЕКАРЯ

МЕЕРА ГЕСЕЛЕВИЧА.

Цензорами диссертациі, по порученію Конференціи, были профессора:  
Б. А. Манассеинъ, Ю. Т. Чудновскій и прив.-доц. П. А. Вальтеръ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Эттингера, Казанская, № 44.

1891.

ПЕСОВАНИЕ  
ДОКТОРСКОГО ДИССЕРТАЦІИ  
ЛЕКАРЯ МЕЕРА ГЕСЕЛЕВИЧА  
ПОДЪ ЗАГЛАВІЕМЪ:  
«КЪ ВОПРОСУ О ВЛІЯНІЇ ПРОМЫВАНІЯ ЖЕЛУДКА НА УСВОЕНІЕ ЖИРОВЪ ПИЩИ  
У ЗДОРОВЫХЪ ЛЮДЕЙ»  
ПЕЧАТАТЬ ДОЗВОЛЯЕТСЯ СЪ ТѢМЪ, ЧТОБЫ ПО ОТПЕЧАТАНІІ ОНОЙ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВЪ КОНФЕРЕНЦІЮ ИМПЕРАТОРСКОЙ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМІИ 500 ЭКЗЕМПЛЯРОВЪ ЕЯ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ФЕВРАЛІ 16 ДНЯ, 1891 ГОДА.

Докторскую диссертацию лекаря Меера Геселевича подъ заглавиемъ:  
«Къ вопросу о вліянії промыванія желудка на усвоеніе жировъ пищи  
у здоровыхъ людей» печатать дозволяется съ тѣмъ, чтобы по отпечатанії  
оной было представлено въ Конференцію Императорской Военно-Медицинской Академіи 500 экземпляровъ ея. С.-Петербургъ, Феврали  
16 дня, 1891 года.

Ученый Секретарь *Насиловъ*.

Во второй половинѣ XIX в. замѣчается во внутренней медицинѣ стремлениѳ къ физическимъ способамъ леченія взамѣнъ средствъ аптечной кухни. За это время получили особенное распространеніе такие способы леченія, какъ водолеченіе, массажъ, электричество, врачебная гимнастика во всѣхъ ея видахъ и интересующее насъ въ данномъ случаѣ промываніе желудка.

Рядомъ съ клиническими наблюденіями надъ примѣнимостью и полезностью этихъ методовъ леченія при разнообразныхъ страданіяхъ человѣческаго организма идетъ изученіе ихъ физиологическаго дѣйствія. Въ особенности это замѣтно по отношенію къ водолечению и массажу, физиологическое дѣйствіе которыхъ, равно какъ ихъ терапевтическое примѣненіе имѣютъ обширнѣйшую литературу. Другое дѣло — промываніе желудка. Значеніе его, какъ чисто терапевтическаго спосoba, конечно, далеко уступаетъ остальнымъ вышеупомянутымъ физическимъ методамъ леченія по той простой причинѣ, что онъ обнимаетъ собою небольшой кругъ болѣзней, *желудочныя болѣзни* и отчасти кишечныя, тогда какъ послѣдніе обнимаютъ обширный кругъ болѣзней внутреннихъ, хирургическихъ, гинекологическихъ, нервныхъ и т. д. и т. д. Отсюда понятно, почему по вопросу о промываніи желудка имѣющаяся литература далеко не такъ обширна, какъ по массажу, водолечению и др., и заключаетъ въ себѣ исключительно только разработку технической и клинической сторонъ этого спосoba, ничуть не касаясь его физиологическаго дѣйствія хоть на тотъ же желудочно-кишечный каналъ, страданія котораго онъ назначенъ лечить. Вотъ почему я и принялъ на себя скромную задачу изучить на основаніи точно обставленныхъ наблюдений, какъ вліяетъ промываніе желудка на усвоеніе жировъ пищи у здоровыхъ людей.

Исторія промыванія желудка находится въ непосредственной связи съ его зондированіемъ. Если начало промыванія желудка относится къ двадцатымъ годамъ настоящаго столѣтія, то зондированіе его ведетъ свое начало со временъ древнихъ грековъ. Такъ, въ схоліяхъ Аристофана (род. около 444 г. и + между 387 — 380 гг. до Р. Хр.) встрѣчается слѣдующее мѣсто: *εἰώθασιν οἱ δυσεροῦτες πτερῷ χρῆσθαι πρὸς τὸ εὐχερῶς ἐμέσσαι*. Во времена римской имперіи, когда нравы римлянъ далеко уже не были столь чисты и просты, какъ во времена республики, и когда все время, свобод-

ное отъ государственныхъ занятій, знатные римляне вкушъ съ самими императорами проводили за пиршествами, отличавшимися изысканностью и обилиемъ блюдъ, былъ въ употреблении цѣлый рядъ инструментовъ для возбужденія рвоты. Римскіе обжоры отлично знали тотъ вредъ, который проистекаетъ для организма отъ неумѣренности въ ъѣдѣ и питьѣ, а потому старались избѣгнуть его тѣмъ, что сейчасъ же послѣ ъѣды рвотою удаляли изъ желудка принятую пищу. Съ этою цѣлью служили большою частью механическія средства, ибо дѣйствіе фармацевтическихъ средствъ было весьма ненадежно,—то послѣ рвотнаго средства рвота вовсе не слѣдовала, то она становилась неудержимой. Изъ механическихъ средствъ, конечно, самымъ простымъ является собственный палецъ, всунутый возможно глубже въ ротъ; но такая манипуляція была слишкомъ тягостна и непріятна изнѣженнымъ римлянамъ. Инструменты, придуманные для замѣны человѣческаго пальца, были: «pinna» (перо, Brechfeder нѣмецкихъ авторовъ), «digitale vomitorium» и «lorum vomitorium». По описанію *Oribasius'a*<sup>1)</sup>, pinna состояла ихъ пучка 8—10 гусиныхъ перьевъ, которыя намазывались масломъ и вводились въ зѣвъ, a digitale vomitorium представляло собою нѣчто вродѣ пальца отъ мягкой перчатки, тugo набитаго на дѣвъ трети своей длины шерстью; свободная третья надѣвалась на палецъ, и такимъ образомъ этотъ инструментъ, руководимый пальцемъ, вводился въ ротъ. Такою pinna обыкновенно вызывалъ у себя рвоту императоръ Клавдій; подобнымъ же перомъ, намазаннымъ ядомъ, онъ былъ отравленъ своимъ врачомъ по наущенію Агриппины. Lorum vomitorium относится къ первому вѣку послѣ Р. Хр.; его рекомендовалъ *Scribonius Largus*<sup>2)</sup> для вызова рвоты при отравленіи опіемъ. Хотя не существуетъ точнаго описанія этого инструмента, по по *W. O. Leube*<sup>3)</sup>, это, вѣроятно, былъ кожаный ремень, намазанный дубильнымъ веществомъ, тошнотворный вкусъ котораго при введеніи ремня въ ротъ вызывалъ рвоту. Впослѣдствіи этотъ инструментъ, совсѣмъ забытый, былъ опять предложенъ при отравленіяхъ *Hieronymus'omъ Mercurialis'омъ*<sup>4)</sup>. Понятно, что для той цѣли, къ которой всѣ эти инструменты предназначались, не требовалось, чтобы они были особенно длинны.

<sup>1)</sup> *Oribasius, Collecta medicalia*, lib. VIII, cap. 6. цвт. по *W. O. Leube. Die Magensonde. Die Geschichte ihrer Entwicklung und ihre Bedeutung in diagnostisch-therapeutischer Hinsicht*. Erlangen. 1879.

<sup>2)</sup> *Scribonii Largi, Compositiones medicae rec. Ioan. Rhodius. Patav. 1655. CLXXX*, cap. 48 ad. opium.

<sup>3)</sup> оп. с. стр. 6.

<sup>4)</sup> *Hieronymus Mercurialis, de morbis venenosis et venenis. Venetiis. 1583. Lib. I. Cap. 22.*

Они достигали только задней стѣнки зѣва, а можетъ быть и начала пищевода; поэтому они не подходятъ подъ понятіе собственно желудочного зонда.

Только въ концѣ XVII в. и въ началѣ XVIII в. появляется инструментъ, дѣйствительно заслуживающій названія перваго желудочного зонда. Это такъ наз. *excutia s. peniculus ventriculi*, желудочная щетка, *Magenbürste* нѣмецкихъ авторовъ, предложенная въ 1659 г. англичаниномъ *Rumsaeus*'омъ для лѣченія слизистой оболочки желудка, собственно для того, чтобы «вычищать» желудокъ. Сочиненіе, въ которомъ *Rumsaeus* опубликовалъ свой инструментъ, носить громкое заглавіе: «*Organum salutis, or an instrument to cleanse the stomach*». Этотъ «инструментъ жизни» состоялъ изъ гибкаго прута, сдѣланнаго изъ китового уса, длиною въ 2—3 фута; нижній конецъ его имѣлъ утолщеніе, къ которому прикрѣплена была большая кисть изъ шелковыхъ или простыхъ нитокъ<sup>5)</sup>.

Длина этого инструмента, равная 2—3 футамъ или 60—90 см., показываетъ, что надѣтая на нижній его конецъ кисть дѣйствительно достигала слизистой оболочки желудка и могла ее «вычищать». Этотъ способъ лѣчебного воздействиа на желудокъ, надѣлавшій въ свое время много шума въ Англіи, Франціи и Германіи, былъ однако скоро забытъ, и для насъ имѣть то историческое значеніе, что представляетъ собою, можетъ быть, первую попытку лѣчебного resp. хирургического леченія заболеваній органа, лежащаго внутри тѣла.

Но и этотъ инструментъ, какъ и другіе, служившіе или для изслѣдованія пищевода, или для того, чтобы проталкивать застрявшія въ пищеводѣ тѣла въ желудокъ (напр. въ случаѣ *Thomas Willis'a*<sup>6)</sup>) пациентъ, страдавшій параличемъ пищевода, впродолженіе 16 лѣтъ проталкивалъ себѣ пищу изъ пищевода въ желудокъ), или же для механическаго расширенія съуженій пищевода—всѣ эти инструменты не представляютъ собою еще прототипа того желудочного зонда, появленіе котораго требовалось для того, чтобы у врачей явилась мысль промывать желудокъ. Требовалось изобрѣтеніе полыхъ, трубкообразныхъ зондовъ. Такой инструментъ впервые былъ употребленъ *Hieronymus'omъ Capivaceus'омъ*<sup>7)</sup> для искусственного кормленія въ случаяхъ затрудненнаго глотанія. Впослѣдствіи *Fabricius ab Aquapendente* предложилъ для искусственного кормленія при судорожномъ сжатіи челюстей вводить черезъ носъ въ зѣвъ соотвѣтственнымъ образомъ изогну-

<sup>5)</sup> *W. O. Leube*, op. c. стр. 10.

<sup>6)</sup> *Th. Willis. Pharmaceutice rationalis*, Tom. I. Sect. II. Cap. I, XV, 1. 1673.

<sup>7)</sup> *Hieronymus Capivaceus, medic. practic. Lib. I. Cap. 53. Venedig 1598.*

тую серебряную трубочку, обтянутую тонкой кишкой теленка <sup>8)</sup>). Но и эти инструменты не были еще желудочными зондами, такъ какъ они были слишкомъ коротки и едва достигали начала пищевода.

Введеніемъ въ медицину настоящаго желудочнаго зонда мы обязаны знаменитому английскому хирургу *John'у Hunter'у*, который 21 мая 1776 г. въ своемъ докладѣ Королевскому Обществу Наукъ въ Лондонѣ о способахъ сживленія утопленниковъ предложилъ между прочимъ впрыскивать имъ въ желудокъ сильно раздражающія вещества, какъ оленорожный спиртъ, терпентинъ и др. Чтобы эти послѣднія однако не могли попасть въ легкія, *Hunter* рекомендовалъ дѣлать эти впрыскиванія черезъ *полые бужи или гибкіе катетеры* такой длины, чтобы они достигали желудка. Для впрыскиванія служилъ обыкновенный шприцъ <sup>9)</sup>).

Если *Hunter'a* нужно считать первымъ, изобрѣвшимъ желудочный зондъ, то *F. Bush'a* <sup>10)</sup>), тоже англійскаго хирурга, нужно считать первымъ, сдѣлавшимъ промываніе желудка. Этотъ хирургъ предложилъ при отравленіяхъ опіемъ вливать въ желудокъ воду при помощи обыкновенного шприца, соединеннаго съ гибкой каучуковой или кожаной трубкой, и высасывать ее изъ желудка тѣмъ же шприцемъ, т. е. предложилъ дѣлать то, что мы называемъ промываніемъ, или выкачиваніемъ желудка въ собственномъ смыслѣ этого слова, и что мы считаемъ въ настоящее время первымъ условиемъ лечения острыхъ отравленій, въ особенности алкалоидами. Тотчасъ же послѣ предложения *F. Bush'a* появилась масса различныхъ насосовъ, изобрѣтенныхъ для промыванія желудка *E. Jukes'омъ* <sup>11)</sup>, *Ward'омъ* <sup>12)</sup>, *Read'омъ* <sup>13)</sup>, *Weiss'омъ* <sup>14)</sup>, *Lafargue'омъ* <sup>15)</sup> и др.

Въ виду того, что показанія къ промыванію желудка были весьма узки и ограничивались исключительно случаями отравленія, этотъ способъ лечения былъ весьма мало распространенъ между врачами и даже почти забытъ. Великая заслуга проф. *A. Kussmaul'я* и заключается въ томъ, что онъ извлекъ промываніе желудка изъ забвенія и показалъ, что оно имѣетъ довольно обширное примѣненіе при цѣломъ рядѣ весьма тяжелыхъ страданій, из-

<sup>8)</sup> Fabricius ab Aquapendente, Chirurg. Schrift. Nürnberg 1716. Theil II. Cap. 33.

<sup>9)</sup> См. Leube, op. c. стр. 20.

<sup>10)</sup> London medical and physical Journal 1822.—Gräfe-Walther'sches Journal der Chir. Bd. IV. S. 734.

<sup>11)</sup> E. Jukes—New-York medical u. physical, Journal. Vol. VI. Nr. III—Sammlung auserles. Abhandl. 36. S. 11.

<sup>12)</sup> Ward—Ibid. S. 12.

<sup>13)</sup> Read—Ibid. S. 4 и Froriep's Atlas, таблица 175.

<sup>14)</sup> Weiss—Gräfe-Walther'sches Journal IX, стр. 166. Табл. II.

<sup>15)</sup> Lafargue—Bullet. de Thérap. Tom. XII. Livr. X и XI.

вѣстныхъ подъ названіемъ расширенія желудка. Послѣ того какъ проф. *A. Kussmaul* на 41-мъ съездѣ нѣмецкихъ естествоиспытателей и врачей, происходившемъ во Франкфуртѣ на Майнѣ въ 1867 г., сдѣлалъ докладъ о леченіи расширенія желудка желудочнымъ насосомъ<sup>16)</sup>, а въ 1869 г. напечаталъ статью<sup>17)</sup>, въ которой онъ подробно приводить 12 разнообразныхъ случаевъ расширенія желудка, пользованныхъ промываніемъ съ болѣе или менѣе благопріятнымъ результатомъ, способъ этотъ былъ принятъ всѣми выдающимися врачами Германіи, а потомъ и Франціи и Россіи. Аппаратъ, которымъ пользовался *Kussmaul*, состоялъ изъ бужа и *Wyman'овскаго* (вѣрнѣе *Weiss'овскаго*) насоса.

Въ первые десять лѣтъ послѣ открытия (если позволено будетъ такъ выразиться) *Kussmaul'*я употреблялись преимущественно двоякаго рода желудочные зонды—французские, черные и англійские, красные. Первые выдѣлываются изъ твердаго каучука, послѣдніе изъ шелковой ткани, пропитанной и покрытой смолистой массой. Какъ тѣ, такъ и другіе имѣютъ свои достоинства и свои недостатки. Черные зонды при своей гибкости и мягкости имѣютъ тотъ недостатокъ, что слишкомъ ломки и скоро портятся, причемъ на ихъ поверхности образуются трещины, дѣлающія введеніе зонда невозможнымъ. Красные при своей резистентности слишкомъ тверды и мало гибки, вслѣдствіе чего ими можно повредить слизистую оболочку пищевода и даже желудка, да и на ихъ поверхности часто образуются трещины, которыя препятствуютъ введенію зонда. Тѣмъ не менѣе красные зонды предпочтительнѣе употребляются, нежели черные.

Съ 1875 г. вошли въ употребленіе *мягкіе* желудочные зонды, впервые предложенные *Ewald'омъ*<sup>18)</sup>, а потомъ *Oser'омъ*<sup>19)</sup> и *Faucher*<sup>20)</sup>. *Ewald* предложилъ употреблять для промыванія желудка зонды, сдѣланные изъ того же материала, изъ которого выдѣлываются обыкновенныя газовые трубы (*Gummigasschlauch*). Чтобы такой зондъ могъ быть введенъ въ желудокъ безъ мандрина, онъ долженъ обладать достаточною толщиною и достаточно крѣпкими стѣнками.—Зондъ *Oser'a*<sup>21)</sup> представляетъ собою трубку, сдѣланную изъ вулканизированного каучука, длиною въ 2 метра, просвѣтъ ея въ диаметрѣ=9 mm., толщина стѣнокъ= $2\frac{1}{2}$  mm.—Зондъ *Faucher*<sup>22)</sup> сдѣланъ изъ гибкаго каучука, дли-

<sup>16)</sup> *A. Kussmaul*, in Bericht über die 41. Versamml. deut. Naturforscher und Aerzte zu Frankfurt a. M. 1867.—Schm. Jahrb. 136. стр. 386.

<sup>17)</sup> *A. Kussmaul*. Deutsch. Arch. f. Klin. Med. Bd. VI. 1869, стр. 455.

<sup>18)</sup> *Ewald*—Berl. Klin. Woch. 1875.

<sup>19)</sup> *Oser*—Wiener Klinik. 1875 и Wiener med. Presse 1877.

<sup>20)</sup> *Faucher*—Journal de Thérapeut. 1880.

<sup>21)</sup> *Oser*—Wiener Klinik. 1875.

<sup>22)</sup> Цит. по *Dujardin-Bcaumetz*—О промываніи желудка и насильственномъ кормлении, рус. пер. Сигриста, 1883 г.

ною въ  $1\frac{1}{2}$  метра; толщина трубки бываетъ троекая: № 1 имѣть въ диаметрѣ 8 mm., № 2 — 10 mm. и № 3 — 12 mm. Преимущества мягкихъ зондовъ передъ твердыми (черными и красными) заключаются въ томъ, что первые по своей мягкости и гибкости никоимъ образомъ не могутъ нанести поврежденія слизистой оболочки пищевода или желудка. Они никогда не могутъ вызвать прободенія стѣнки желудка, потому что въ тотъ моментъ, когда мягкий зондъ упирается въ нижнюю стѣнку желудка, нижний конецъ его загибается по большой кривизнѣ къ привратнику, а иногда даже проникаетъ за привратникъ въ 12-перстную кишку, какъ въ этомъ *L. Oser*<sup>23)</sup> во-очію убѣдался на трупѣ. Наконецъ, мягкие зонды не портятся отъ употребленія.

Употребляемые въ настоящее время зонды изъ мягкаго каучука представляютъ собою трубки различной длины (75 — 90 и болѣе см.), различной толщины и различнаго вида того конца ихъ, который вводится въ желудокъ. Одни зонды оканчиваются слѣпымъ концомъ, и тогда они имѣютъ 1 или 2 боковыхъ овальныхъ окошка, расположенныхыхъ на различной высотѣ другъ противъ друга; другіе оканчиваются открытымъ концомъ, и тогда имѣютъ одно боковое окошко. Одни авторы (*Oser, Ewald*) отдаютъ преимущество первого рода зондамъ, другіе (*Leube*) послѣднимъ. По нашему мнѣнію, совершенно безразлично, какіе-бы зонды ни употреблять, лишь-бы они были мягки и края ихъ окошечъ хорошо закруглены. При осторожномъ введеніи (стараясь по возможности меныше раздражать стѣнки желудка) ни тѣ, ни другіе не могутъ поранить слизистой оболочки пищевода и желудка; при тѣхъ и другихъ случается перерывъ вытекающей струи, если въ токъ жидкости попадаетъ болѣе крупный кусокъ желудочнаго содергимаго, который закупорить просвѣтъ трубки; тѣми и другими можно одинаково хорошо промыть желудокъ. При нашихъ наблюденіяхъ мы пользовались болѣе тонкимъ зондомъ съ нижнимъ круглымъ отверстиемъ и однимъ боковымъ окошкомъ, и болѣе толстымъ съ нижнимъ слѣпымъ концомъ и двумя боковыми окошками. Ни при томъ, ни при другомъ намъ не приходилось наблюдать никакихъ особыхъ осложненій при промываніяхъ.

Мы уже сказали, что *Kussmaul* употреблялъ для выкачиванія желудочнаго содергимаго насосъ. Лишь только промываніе желудка стало производиться въ обширныхъ размѣрахъ, стали наблюдаваться непріятныя осложненія отъ дѣйствія насосомъ, а именно кровотеченія и даже отрывы слизистой оболочки желудка. Такіе случаи

<sup>23)</sup> *L. Oser—Wiener Klinik*, 1875.

опубликованы *v. Ziemssen*'омъ<sup>24)</sup>, *Schliep*'омъ<sup>25)</sup>, *Leube*<sup>26)</sup>, *Huber*'омъ<sup>27)</sup>, *Wiesner*'омъ<sup>28)</sup> и *Oser*'омъ<sup>29)</sup>). Хотя во всѣхъ этихъ случаяхъ, весьма немногочисленныхъ сравнительно съ огромнымъ количествомъ промываній безъ всякихъ осложненій, никакихъ дурныхъ послѣдствій для больныхъ не послѣдовало, тѣмъ не менѣе такія осложненія не желательны и весьма непріятны какъ для больного, такъ и для врача. Кромѣ того, промываніе насосомъ представляетъ еще то неудобство, что насосъ не всегда находится подъ рукою, а потому и самый способъ является не общедоступнымъ. Съ примѣненіемъ къ промыванію желудка теоріи сифона [*Ploss*<sup>30)</sup>, *Th. Jürgensen*<sup>31)</sup>, *L. Rosenthal*<sup>32)</sup>, *Hodgen*<sup>33)</sup>, *Schiffer*<sup>34)</sup>] аппаратъ для промыванія сталъ прость и общедоступенъ, что лучшаго и желать нельзя. Онъ состоитъ изъ мягкаго желудочного зонда, соединенного посредствомъ стеклянной трубочки съ болѣе толстою, довольно длинною каучуковою трубкою, на которой насажена *Hegar*'овская воронка \*).

Это улучшеніе способа промыванія желудка не есть ничто совершенно новое, принадлежащее семидесятымъ годамъ нынѣшняго столѣтія. Еще въ 1823 г. *Sommerville*<sup>35)</sup> предложилъ промывать желудокъ аппаратомъ, состоящимъ изъ гибкой трубки, длиною въ 4 фута, одинъ конецъ которой вводился въ желудокъ, а на другой надѣвалась воронка. Промываніе производилось такимъ образомъ, что черезъ воронку и трубку желудокъ наполнялся водою, причемъ трубка и воронка тоже были полны водою, затѣмъ воронка опускалась какъ можно ниже, и вода изъ желудка вытекала назадъ, причемъ «die Röhre alsdann in einen Saugheber verwandelt ist» \*).

И при сифонномъ способѣ промыванія желудка описаны случаи кровотеченія и отрыва слизистой оболочки желудка [*Haenisch*<sup>36)</sup>, *Michaëlis*<sup>37)</sup>, *Malbranc*<sup>38)</sup>]. Въ этихъ случаяхъ, по на-

24) *Ziemssen*.—Deutsch. Arch. f. klin. Med. X. 1872, стр. 65.

25) *Schliep*.—ibidem XIII. 1874, стр. 455.

26) *Leube*—ibid. XVIII, стр. 496.

27) *Huber*—ibid. XXI. 1878, стр. 315.

28) *Wiesner*—Berl. klin. Woch. 1870. Nr. 1.

29) *Oser*—Wiener Klinik, 1875.

30) *Ploss*—Deutsch. Klinik. 1870, стр. 69.

31) *Th. Jürgensen*—Deutsch. Arch. f. kl. Med. VII. 1870, стр. 239.

32) *L. Rosenthal*—Berl. kl. Woch. 1870, стр. 287.

33) *Hodgen*—A simple cheap and sufficient substitute for the stomach pump. Extr. from St. Louis. Med. and Surg. Journal. Vol. VII. 1870, см. *W. O. Leube* op. c. стр. 53.

34) *Schiffer*—Berl. kl. Woch. 1870, стр. 324.

\*.) Весь аппаратъ обходится въ 3 р. 50 к.

35) *Sommerville*—American medical Recorder July 1823. Sammlung auserles. Abh. Bd. 36. S. 14.

\*) Цит. по *W. O. Leube* op. c. стр. 52.

36) *Haenisch*—Deutsch. Arch. f. kl. Med. XXIII, 1879, стр. 579.

37) *Michaëlis*—Berl. kl. Woch. 1884, стр. 393.

38) *Malbranc*—ibid. 1878. № 4, стр. 41.

шему глубокому убъжденію, нужно искать причину осложненій не въ способѣ производства самого промыванія, а въ ненормальномъ состояніи слизистой оболочки желудка. Такъ, въ случаѣ *Haenisch'a*<sup>38)</sup>, гдѣ оторванный кусокъ несомнѣнно принадлежалъ слизистой оболочкѣ желудка, что было подтверждено микроскопическимъ изслѣдованиемъ, авторъ объясняетъ отрывъ тѣмъ, что «раздраженіе, причиненное зондомъ совершенно пустому желудку, вызвало весьма энергичная сокращенія его, вслѣдствіе чего желудочная стѣнка пришла въ тѣсное соприкосновеніе съ отверстиемъ зонда (мягкій, эластическій зондъ имѣлъ слѣпой конецъ и одно боковое отверстіе); при этомъ часть очень разрыхленной и гиперемированной (курсивъ нашъ) слизистой оболочки застряла въ отверстіи и тамъ оторвалась». Кромѣ этихъ случаевъ былъ еще описанъ *Werner'омъ*<sup>39)</sup> случай разрыва желудка при промываніи по сифонному способу, окончившійся летально. Вскрытие показало, что у больнаго былъ ракъ (скирръ) привратника, отверстіе котораго было настолько съужено, что безъ насилия нельзѧ было черезъ него провести указательный палецъ. Разрывъ произошелъ недалеко отъ привратника на мѣстѣ, гдѣ желудочная стѣнка была сильно истончена и изѣдена (осталась только одна серозная оболочка) постоянно находившимся въ желудкѣ кислымъ содержимымъ. Понятно, что этого предвидѣть при жизни больнаго нельзѧ было, а потому авторъ утѣшаетъ себя тѣмъ, что и безъ промыванія черезъ нѣсколько дней, вѣроятно, произошла бы самопроизвольная перфорація, которая повела-бы къ тому-же летальному исходу.

Что касается до техники промыванія желудка по сифонному способу, то она такъ проста и общепрѣзѣстна, что мы не станемъ здѣсь обѣ ней распространяться. Скажемъ только, что при введеніи мягкаго желудочного зонда помошь больнаго, состоящая въ производствѣ имъ глотательныхъ движеній, необходима. Черезъ болѣе или менѣе короткій промежутокъ времени больные научаются сами «глотать» зондъ и не нуждаются въ помощи врача для того, чтобы производить себѣ промываніе. Въ этомъ заключается огромное преимущество промыванія по сифонному способу передъ промываніемъ насосомъ.

Со временъ *Kussmaul'* я показанія къ промыванію желудка весьма расширились. Кромѣ случаевъ *остраго отравленія*, когда можно думать, что ядъ еще находится въ желудкѣ, и *расширенія желудка*, промываніе показуется при *остромъ и хроническомъ катаррѣ*, при *кардіалгіяхъ* (*Malbranc*<sup>\*</sup>) и другихъ *нервныхъ*

<sup>38)</sup> I. c.

<sup>39)</sup> Werner—Würtemb. Corresp. Bl. 1885, стр. 60.

<sup>\*</sup>) *Malbranc*—оп. с.

*страданіяхъ желудка.* Кромѣ того, промываніе можетъ принести палліативную помощь при ракѣ желудка, въ особенности при ракѣ привратника, сопровождающемся расширениемъ и катарромъ слизистой желудка. Весьма обширное примѣненіе получило промываніе resp. выкачиваніе желудочного содержимаго для чисто диагностическихъ цѣлей. Можно сказать, что въ настоящее время большинство врачей лишь тогда решаются ставить полный диагнозъ желудочной болѣзни, когда дѣбто желудочное содержимое и сдѣлано всестороннее его изслѣдованіе. По этому вопросу существуетъ обширнѣйшая литература, которой мы здѣсь не будемъ касаться, такъ какъ это не входитъ въ нашу задачу.

Кромѣ собственно страданій желудка промываніе показуется еще при цѣломъ рядѣ страданій кишечника, во главѣ которыхъ стоитъ *непроходимость кишечка* (*ileus, miserere*). Въ настоящее время при всякомъ случаѣ непроходимости кишечка показуется сдѣлать промываніе желудка раньше, чѣмъ прибѣгнуть къ оперативному вмѣшательству, потому что многими авторами [*Cahn*<sup>40</sup>), *Iocquс*<sup>41</sup>), *Hasenclever*<sup>42</sup>), *Зисманъ*<sup>43</sup>), *Mahnert*<sup>44</sup>)] описаны случаи полнаго излеченія непроходимости кишечка промываніемъ желудка, которое сдѣлало не нужнымъ тяжелое оперативное вмѣшательство. Весьма интересно наблюденіе *Rehn'a*<sup>45</sup>), который, вскрывъ двумъ больнымъ, страдавшимъ непроходимостью кишечка, брюшная стѣнки, сдѣлалъ имъ промываніе желудка, причемъ онъ уѣдился, что промываніе при вскрытомъ животѣ освобождаетъ кишечки отъ содержимаго гораздо больше, чѣмъ при цѣломъ еще брюшномъ прессѣ. Это наблюденіе служитъ прямымъ доказательствомъ того, что промываніе желудка измѣняетъ перистальтику въ сторону, способствующую освобожденію кишечка отъ ихъ содержимаго. Благопріятное дѣйствіе промыванія желудка при непроходимости кишечка, вѣроятно, зависитъ отчасти отъ того, что оно освобождаетъ желудокъ отъ накопившагося въ немъ кала и предупреждаетъ появленіе рвоты, вредное вліяніе которой на общее состояніе организма, да еще болѣаго, врядъ-ли кто будетъ отрицать, отчасти же отъ того, что оно регулируетъ перистальтику, подобно опію.—Описаны еще случаи благопріятнаго дѣйствія промыванія при *ущемленныхъ грыжахъ* [*Вайнбаумъ*<sup>46</sup>]), *перитонитѣ* [*B. Lewin*<sup>47</sup>]), *желудочно-кишечной*

<sup>40</sup>) *Cahn*—Berl. kl. Woch. 1884, №№ 42 и 43.

<sup>41</sup>) *Iocquс*—La France m dical e 1887 реф. «Врачъ» № 2, 1887.

<sup>42</sup>) *Hasenclever*—Berl. Kl. Woch 1885, № 5, стр. 65.

<sup>43</sup>) *Зисманъ*—«Врачъ» 1886, № 52.

<sup>44</sup>) *Mahnert*—Memorabilien XXXIII. 1889.—Schm. Jahrb. 223, стр. 270.

<sup>45</sup>) *Rehn*—Centralblatt f. Chirurgie, 1887, стр. 553.

<sup>46</sup>) *Вайнбаумъ*—«Врачъ» 1887, стр. 314.

<sup>47</sup>) *B. Lewin*—Berl. Kl. Woch. 1886, № 23, стр. 763.

диспепсии у дѣтей (литературу см. у Путерена<sup>48</sup>), и, наконецъ, при злокачественномъ малокровіи [Sandoz<sup>49</sup>], Meyer<sup>50</sup>).

Промываніе желудка противопоказуется во всѣхъ тѣхъ слу-  
чаяхъ, когда введеніе зонда и часто зависящая отъ этого рвота  
могутъ принести вредъ организму. На первомъ планѣ стоитъ  
*аневризма аорты и большихъ сосудовъ*, которая абсолютно про-  
тивопоказуетъ зондированіе пищевода, слѣд. и промываніе желудка.  
Слѣдуетъ по возможности избѣгать дѣлать промываніе при общемъ  
склерозѣ сосудовъ (такіе люди часто склонны къ мозговымъ кро-  
воизлѣяніямъ), при порокахъ сердца съ разстроенной компенсаціей  
и у людей, страдающихъ кровохарканіемъ. Со стороны желудка  
противопоказаніемъ къ промыванію является круглая его язва, въ  
особенности, если она имѣеть прогрессивный характеръ. Такъ,  
Duguet<sup>51</sup>) сообщилъ въ Soci  t   m  dicale des h  pitaux случай, гдѣ  
промываніе желудка у больного, страдавшаго язвой желудка съ  
расширеніемъ, вызвало смертельное кровотеченіе.

Что касается вопроса, который насъ интересуетъ ближайшимъ  
образомъ, о вліяніи промыванія желудка на усвоеніе пищевыхъ  
веществъ, то никакихъ указаний на этотъ счетъ въ литературѣ  
мы не нашли, а потому мы прямо приступаемъ къ изложенію  
нашихъ наблюденій.

---

Мнѣ удалось провести 5 наблюденій надъ пятью совершенно  
здоровыми субъектами—тремя служителями при химической лабо-  
раторіи Лѣснаго Института и двумя студентами того же института.  
Каждый опытъ продолжался 18 дней и состоялъ изъ 3-хъ шести-  
дневныхъ періодовъ: первый періодъ—предварительный, второй—  
съ промываніемъ желудка и третій—послѣдовательный. Испытуе-  
мые вели свой обыкновенный образъ жизни, по возможности одинаковый  
во всѣ дни опыта.

Прежде чѣмъ приступить къ опыту, испытуемые пріучались  
глотать зондъ.

Суточные порціи пищи и количество вводимой жидкости въ  
видѣ слабаго чая оставались по возможности одинаковыми въ тек-  
ченіе всего опыта.

Количество сахара и соли для каждого испытуемаго было оди-  
наковымъ во всѣ періоды наблюденія.

Пища принималась три раза въ день: въ 8—9 ч. утра чай

<sup>48</sup>) Путеренъ—Дисс. 1889 г.

<sup>49</sup>) Sandoz—Corr. Blatt. f. Schweiz. Aerzte 1887, стр. 554.

<sup>50</sup>) Meyer—ibid. стр. 344.

<sup>51</sup>) Duguet — Gazette hebdomadaire de medecine et de chirurgie. 1884. № 18  
стр. 299.

съ бѣлымъ хлѣбомъ безъ масла, въ 1—2 ч. дня обѣдъ изъ мясной котлеты съ бѣлымъ хлѣбомъ и стаканъ молока, и въ 9 ч. вечера ужинъ изъ оставшагося бѣлаго хлѣба, сливочнаго масла и молока. Въ промежуткѣ между обѣдомъ и ужиномъ, около 5 ч. дня испытуемые пили еще чай. Только во второмъ періодѣ обѣдъ бывалъ на  $\frac{1}{2}$  ч. позже, потому что предварительно дѣлалось промываніе желудка.

Вода для промыванія бралась простая колодезная, подогрѣтая до 28—30° Ц., какъ это большею частью дѣлается при промываніяхъ у больныхъ. Промываніе производилось до тѣхъ поръ, пока вытекающая вода не была совершенно чистою. При каждомъ промываніи опредѣлялось, сколько воды влито и сколько вышло назадъ. Количество воды, употреблявшейся для каждого промыванія, колебалось между 600—1700 куб. см.; количество остававшейся въ желудкѣ воды колебалось между 50—200 куб. см. Всѣ промывныя воды за весь періодъ у каждого испытуемаго собирались въ отдѣльные сосуды для того, чтобы опредѣлить, сколько выводилось жира промываніями.

Пища состояла изъ бѣлаго хлѣба (ситнаго), мяса, молока и сливочнаго масла. Хлѣбъ, мясо, молоко заготовлялись на 3 дня, масло на 6 дней. Хлѣбъ брался изъ одной и той же пекарни и приготавлялся исключительно изъ муки и воды. Такъ какъ я производилъ единовременно всѣ 5 наблюденій, а хлѣбъ заготавлялся на 3 дня, то приходилось заказывать каждый разъ около 30 ф. хлѣба. Понятно, что такое количество не могло быть испечено въ видѣ одного хлѣба, а приходилось брать 5—6 хлѣбовъ. Для анализа бралась навѣска изъ приблизительно одинаковыхъ кусковъ каждого хлѣба (всѣ хлѣбовъ былъ приблизительно одинаковый).

Мясо (ссѣкъ) покупалось безъ жира и костей. Оно по возможности тщательно очищалось отъ видимаго жира, сухожилій и фасцій и проводилось черезъ котлетную машинку. Измельченная масса хорошо перемѣшивалась и развѣшивалась на отдѣльныя порціи; одновременно бралась изъ нея навѣска для анализа.

Молоко хранилось въ холодномъ мѣстѣ. Ежедневно отмѣривалась каждому испытуемому его суточная порція изъ общей массы предварительно хорошо взболтаннаго молока.

Масло бралось сливочное изъ фермы ветеринарнаго врача Харламова. Послѣ того какъ изъ общей массы взята была навѣска для анализа, масло развѣшивалось на отдѣльныя порціи.

Анализы пищевыхъ средствъ на жиры я производилъ по тому

же способу, который примѣняли Черновъ<sup>52)</sup>, Буржинский<sup>53)</sup>, Вальтеръ<sup>54)</sup>, Маковецкий<sup>55)</sup>, Васильевъ<sup>56)</sup>, Реформатский<sup>57)</sup>, Могилянский<sup>58)</sup>, Кіяновский<sup>59)</sup>, Губкинъ<sup>60)</sup>, Винокуровъ<sup>61)</sup>, Флеринъ<sup>62)</sup>, Еремьевъ<sup>63)</sup>, Стацкевичъ<sup>64)</sup>, Кравковъ<sup>65)</sup>, Случевский<sup>66)</sup>, Козловъ<sup>67)</sup>, Гольденбергъ<sup>68)</sup>.

Калъ одного периода отдѣлялся отъ другаго черникой, принятой утромъ на-тощакъ въ первый день каждого периода, собирался за весь периодъ въ одной и той же чашкѣ и сушился сперва на водяной банѣ, а потомъ въ духовомъ шкафу. Определеніе въ немъ жирныхъ кислотъ производилось по способу профессора П. А. Лачинова.

Кромѣ анализа пищевыхъ средствъ и кала мнѣ пришлось еще сдѣлать анализъ промывныхъ водъ на содержаніе въ нихъ жира. Это производилось слѣдующимъ образомъ. Въ предварительно взвѣшенной фарфоровой чашкѣ, въ которую насыпалось 10 граммъ высушенной чистой поваренной соли (соль прибавлялась для того, чтобы сухой остатокъ равномѣрно распредѣлился въ общей массѣ и чтобы легче было его собрать съ чашки), выпаривались на водяной банѣ промывныя воды за весь периодъ до суха; затѣмъ чашка сушилась въ духовомъ шкафу. Послѣ охлажденія она взвѣшивалась, и опредѣлялось количество сухаго остатка. Весь остатокъ собирался во взвѣшенный бумажный цилиндрикъ и обрабатывался эфиромъ въ аппаратѣ Soxhlet'a. Эфиръ изъ колбы от-

<sup>52)</sup> В. Е. Черноевъ—О всасываніи жира взрослыми и дѣтьми во время лихорадочныхъ заболѣваній и впѣхъ. Дисс. 1883.

<sup>53)</sup> П. В. Буржинский—Материалы къ діететикѣ острыхъ вкусовыхъ веществъ. Дисс. 1887.

<sup>54)</sup> П. А. Вальтеръ—«Врачъ» 1887, № 47.—Объ усвоенія жировъ у жалтушныхъ.

<sup>55)</sup> Н. Е. Маковецкий—Къ вопросу о вліяніи русской бани на азотистый обмѣнъ и усвоеніе азота и жировъ. Дисс. 1888.

<sup>56)</sup> Е. В. Васильевъ—О сравнительномъ усвоеніи азота и жира сыраго и кипяченаго молока. Дисс. 1889.

<sup>57)</sup> П. Д. Реформатский—О вліяніи мышечной работы на усвоеніе жировъ пищи у здоровыхъ. Дисс. 1889.

<sup>58)</sup> А. М. Могилянский—Материалы для діететики алкоголя. Дисс. 1889.

<sup>59)</sup> Б. И. Кіяновский—Вліяніе массажа живота на усвоеніе азота и жировъ пищи и на азотистый обмѣнъ у здоровыхъ людей. Дисс. 1889.

<sup>60)</sup> Г. И. Губкинъ—О сравнительномъ усвоеніи тресковаго жира, липанина и сливочного масла здоровыми людьми. Дисс. 1890.

<sup>61)</sup> И. Я. Винокуровъ—Къ вопросу о всасываніи жира подъ вліяніемъ сахарина здоровыми людьми. Дисс. 1890.

<sup>62)</sup> Н. Ф. Флеринъ—О сравнительномъ усвоеніи искусственного и натурального маселъ и топленаго говяжьяго сала здоров. людьми. Дисс. 1890.

<sup>63)</sup> И. В. Еремьевъ—О вліяніи влажно-холодныхъ обтираний на усвоеніе жировъ пищи у здоровыхъ и при атоніи кишечкъ. Дисс. 1890.

<sup>64)</sup> Стацкевичъ—О вліяніи общихъ холодныхъ душей на усвоеніе жировъ и азота пищи у здоровыхъ. Дисс. 1889.

<sup>65)</sup> А. П. Кравковъ—О вліяніи прѣсныхъ ваннъ на усвоеніе жировъ у здоровыхъ людей. Дисс. 1890.

<sup>66)</sup> А. Случевский—Предварительное сообщеніе. «Врачъ» 1890, № 40. О вліяніи соленыхъ ваннъ на усвоеніе жировъ пищи у здоровыхъ.

<sup>67)</sup> В. В. Козловъ—Къ вопросу объ относительномъ сухоядѣніи. Дисс. 1890.

<sup>68)</sup> Э. Гольденбергъ—О вліяніи обильнаго питья на усвоеніе жира у здоровыхъ людей. Дисс. 1890.

гонялся, остатокъ фильтровался во взвѣшеннуу Эрленмейеровскую колбочку; эфиръ изъ этой колбочки отгонялся, а жиръ доводился до постояннаго вѣса. Такимъ образомъ было опредѣлено, что выведено было жира промываніями:

въ наблюденіи № 1	— 0,0370 грам.
, , № 2	— 0,0320 ,
, , № 3	— 0,0530 ,
, , № 4	— 0,1920 ,
, , № 5	— 0,0385 ,

Эти числа весьма ничтожны въ сравненіи съ количествами жира, введенными за весь второй періодъ (см. таблицу результатовъ, стр. 28), а потому я и пренебрѣгъ ими при вычислениі % усвоенія. Если я и дѣлалъ этотъ анализъ, то исключительно только ради точности наблюденія.

Теперь перехожу къ изложенію тѣхъ выводовъ, которые можно сдѣлать на основаніи полученныхъ мною данныхъ.

Въ наблюденіи № 1 усвоеніе во второмъ періодѣ улучшилось на 0,350%, но въ третьемъ періодѣ оно ухудшилось на 0,704% сравнительно съ первымъ. Такъ какъ и улучшеніе во второмъ и ухудшеніе въ третьемъ періодахъ не особенно значительны, то можно сказать, что промываніе желудка въ этомъ случаѣ не дало опредѣленного результата. Въ наблюденіи № 2 усвоеніе во второмъ періодѣ улучшилось на 0,927%, а въ третьемъ на 1,819%, слѣд. улучшеніе усвоенія при промываніи не только продолжалось въ послѣдовательномъ періодѣ, но даже еще увеличилось (вдвое). Въ наблюденіи № 3 во второмъ періодѣ усвоеніе ухудшилось на 0,213%, но въ слѣдующемъ періодѣ оно улучшилось на 0,608%, слѣд. и въ этомъ случаѣ не можетъ быть рѣчи о вредномъ дѣйствіи промыванія на усвоеніе. Въ наблюденіяхъ №№ 4 и 5 какъ во второмъ, такъ и въ третьемъ періодахъ усвоеніе улучшилось почти на равныхъ величинахъ (въ № 4 — 0,725% и 0,777%, въ № 5 — 1,403% и 1,123%). Въ среднемъ — улучшеніе усвоенія въ періодѣ съ промываніемъ = 0,851%, а въ послѣдовательномъ періодѣ = 1,082%.

Не могу не обратить вниманія еще на то обстоятельство, что во всѣхъ пяти наблюденіяхъ замѣчается уменьшенное % содержаніе жирныхъ кислотъ въ калѣ за второй и третій періоды сравнительно съ первымъ.

Такимъ образомъ, на основаніи своихъ, правда, немногочисленныхъ наблюденій я прихожу къ тому заключенію, что непрерывное (6 дней) промываніе желудка не только не имѣтъ вреднаго вліянія на усвоеніе жировѣ пищи, но даже улучшаетъ его, хотя и незначительно.

Въ заключеніе я долженъ сказать, что я считаю эту работу лишь первымъ звѣномъ въ цѣломъ рядѣ другихъ работъ, которыхъ желательно было бы имѣть для всесторонняго разрѣшенія вопроса

о вліянні промыванія желудка на здоровий и больной организмы. Эти работы должны затронуть частные вопросы:

1) О вліянні промыванія желудка на *усвоеніе азота пищи*. Нужно полагать, что на усвоеніе азота промываніе желудка имѣть гораздо большее вліянніе, чѣмъ на усвоеніе жировъ пищи, такъ какъ въ перевариваніи и всасываніи жировъ желудокъ играетъ послѣднюю роль, тогда какъ въ перевариваніи и всасываніи бѣлковыхъ resp. азотистыхъ веществъ желудокъ стоитъ если не на первомъ, то ужъ во всякомъ случаѣ не на послѣднемъ мѣстѣ. 2) О вліянніи промыванія желудка на усвоеніе пищевыхъ веществъ у соответствующихъ *больныхъ*, — вопросъ весьма интересный и могущій дать весьма цѣнныя результаты. 3) О вліянніи *продолжительныхъ промываний*, такъ какъ, собственно говоря, на практикѣ мы почти всегда имѣемъ дѣло съ такими промываніями, а не съ непродолжительными (6 дней), вліяніе которыхъ я изучалъ.

При выборѣ лицъ для своихъ наблюдений я пропзвель полное субъективное и объективное изслѣдованіе ихъ, но при этомъ упустилъ изъ виду изслѣдовать каль. Въ первой же порціи кала, которую дали испытуемые, у одного изъ лицъ я замѣтилъ присутствіе членниковъ глисты, которая при подробномъ макроскопическомъ и микроскопическомъ изслѣдованіи оказалась невооруженнымъ цѣпенемъ (*taenia saginata*). Эта находка заставила меня уже изслѣдовать микроскопически каль остальныхъ лицъ, но у нихъ ничего ненормального не было найдено.

Конечно, субъекта, несущаго въ своемъ кишечнике глисту, нельзя считать здоровымъ, хотя-бы у него не было никакихъ разстройствъ пищеваренія. Поэтому я исключилъ его изъ числа лицъ, годныхъ для моихъ наблюдений надъ промываніемъ желудка, но воспользовался этимъ случаемъ, чтобы посмотретьъ, какъ совершается усвоеніе жира въ присутствіи глисты въ кишечнике. Какъ видно изъ прилагаемой таблицы *усвоеніе жировъ пищи въ присутствіи глисты не ухудшается*.

Считаю пріятнымъ долгомъ выразить здѣсь свою искреннюю благодарность проф. Лѣснаго Института *П. А. Лачинову* за любезное разрѣшеніе произвести эту работу въ его лабораторіи.

Прежде чѣмъ приступить къ опытамъ, я познакомился съ методомъ анализа пищевыхъ веществъ и кала на жиры подъ руководствомъ лаборанта *П. Г. Лосева*, которому и приношу здѣсь свою благодарность.

(*Taenia saginata*).

Таблица I.

№ 1. Служител

Дни опыта.	Число и месяц.	Весь тѣла въ граммахъ.	Хлѣбъ.		Мясо.		Молокъ	
			Количество въ грам-махъ.	Жира въ немъ.	Количество въ грам-махъ.	Жира въ немъ.	Количество въ грам-махъ.	Жира въ немъ.
	Декаб.							
1	4	64750	800	2,016	400	13,524	750	26,
2	5		800	2,016	400	13,524	750	26,
3	6		800	2,016	400	10,620	750	26,
4	7		800	1,3352	380	10,089	750	29,
5	8		800	1,3352	380	10,089	750	29,
6	9		800	1,3352	380	10,089	750	29,
Всего		65430	4800	10,0536	2340	67,935	4500	168,03
1	10		800	4,752	400	10,196	750	22,
2	11		800	4,752	400	10,196	750	22,
3	12		800	4,752	400	10,196	750	22,
4	13		800	2,880	400	10,556	750	32,8
5	14		800	2,880	400	10,556	750	32,8
6	15		800	2,880	400	10,556	750	32,8
Всего		66790	4800	22,896	2400	62,256	4500	167,03
1	16		800	1,912	400	9,772	750	24,
2	17		800	1,912	400	9,772	750	24,
3	18		800	1,912	400	9,772	750	24,
4	19		800	1,912	400	9,772	750	29,
5	20		800	1,256	400	6,988	750	29,
6	21		800	1,256	400	6,988	750	29,
Всего		66670	4800	10,160	2400	53,064	4500	161,03

асилій Ал—въ, 21 г.

а с л о.	Жира въ немъ.	Всего принято жира.	Количество абсолютно сухаго кала.	Количество жирныхъ кислотъ въ немъ.	Жирныхъ кислотъ въ %.	На 100 грам. принятаго жира выведено жирн. кислотъ въ калъ.	Итог общ.
	64,047	106,197					
	64,047	106,197					
	64,047	103,293					
	64,047	105,1112					
	64,047	105,1112					
	64,526	105,5902					
	384,761	631,4996	126,892	19,685	15,513	3,117	
390	64,526	102,304					
390	64,526	102,304					
390	64,526	102,304					
390	64,526	110,902					
390	64,526	110,902					
390	64,526	110,902					
387,156	639,618	127,357	17,447	13,7	2,727		
0	64,526	100,300					
0	66,4176	102,1916					
0	66,4176	102,1916					
0	66,4176	107,8616					
0	66,4176	104,4216					
0	66,4176	104,4216					
0	396,614	621,388	177,204	23,745	13,4	3,821	

Періодъ предварительный.

Періодъ съ промываніемъ желудка.

Періодъ послѣдовательный.

Таблица II.

№ 2. Служитель

Дни опыта.	Число и месяцъ.	Вѣсъ тѣла въ граммахъ.	Хлѣбъ.		Мясо.		Молокъ	
			Количество въ граммахъ.	Жира въ немъ.	Количество въ граммахъ.	Жира въ немъ.	Количество въ граммахъ.	Жира въ немъ.
	Декабр.							
1	4	67310	470	1,1845	350	11,8335	750	26,6
2	5		690	1,7348	350	11,8335	750	26,6
3	6		700	1,7640	350	11,8335	750	26,6
4	7		700	1,1683	380	10,0890	750	29,6
5	8		700	1,1683	380	10,0890	750	29,6
6	9		700	1,1683	380	10,0890	750	29,6
Всего		66190	3960	8,1881	2190	65,7675	4500	168,7
1	10		700	1,1683	400	10,1960	750	22,8
2	11		700	4,1580	400	10,1960	750	22,8
3	12		700	4,1580	400	10,1960	750	22,8
4	13		700	4,1580	400	10,5560	750	32,9
5	14		700	2,5200	400	10,5560	750	32,9
6	15		700	2,5200	400	10,5560	750	32,9
Всего		66790	4200	18,6823	2400	62,2560	4500	167,3
1	16		700	2,520	400	9,772	750	24,0
2	17		700	1,673	400	9,772	750	24,0
3	18		700	1,673	400	9,772	750	24,0
4	19		700	1,673	400	6,988	750	29,7
5	20		700	1,099	400	6,988	750	29,7
6	21		700	1,099	400	6,988	750	29,7
Всего		66790	4200	9,737	2400	50,280	4500	161,5

Иванъ Аи—въ, 28 л.

М а с л о .	Жира въ немъ.	Всего принято жира.	Количество абсо- лютно сухаго кала.	Количество жир- ныхъ кислотъ въ немъ.	Жирныхъ кислотъ въ %.	На 100 грам. вве- денаго жира вы- ведено жирн. кис- лотъ въ калѣ.	Приемъ и выделе- ние въ калѣ.	Часъ отбора
	64,047	103,6749						
	64,047	104,2253						
	64,047	104,2545						
	64,047	104,9443						
	64,047	104,9443						
	64,526	105,4233						
	384,761	627,4666	178,172	28,450	15,968	4,534		Періодъ предварительный.
	64,526	98,7203						
	64,526	101,7100						
	64,526	101,7100						
	64,526	112,1800						
	64,526	110,5420						
	64,526	110,5420						
	387,156	635,4043	158,669	22,921	14,446	3,607		Періодъ съ промываніемъ желудка.
	66,4176	102,7996						
	66,4176	101,9526						
	66,4176	101,9526						
	66,4176	104,8386						
	66,4176	104,2646						
	66,4176	104,2646						
	398,5056	620,0826	130,018	16,835	12,948	2,715		Періодъ послѣдовательныѣ.

Таблица III.

№ 3. Служитель

Дни опыта.	Число и месяц.	Весь тѣла въ граммахъ.	Хлѣбъ.		Мясо.		Молоко.	
			Количество въ граммахъ.	Жира въ немъ.	Количество въ граммахъ.	Жира въ немъ.	Количество въ граммахъ.	Жира въ немъ.
	Декаб.							
1	4	60145	675	1,7010	400	13,524	750	26,61
2	5		700	1,7640	400	13,524	750	26,61
3	6		700	1,5390	400	13,524	750	26,61
4	7		700	1,1683	380	10,089	750	29,64
5	8		700	1,1683	380	10,089	750	29,64
6	9		700	1,1683	380	10,089	750	29,64
Всего		61425	4175	8,5089	2340	70,839	4500	168,75
1	10		700	1,1683	400	10,196	750	22,83
2	11		700	4,1580	400	10,196	750	22,83
3	12		700	4,1580	400	10,196	750	22,83
4	13		700	4,1580	400	10,556	750	32,94
5	14		700	2,5200	400	10,556	750	32,94
6	15		700	2,5200	400	10,556	750	32,94
Всего		62150	4200	18,6823	2400	62,256	4500	167,31
1	16		700	2,520	400	9,772	750	24,09
2	17		700	1,673	400	9,772	750	24,09
3	18		700	1,673	400	9,772	750	24,09
4	19		700	1,673	400	6,988	750	29,76
5	20		700	1,099	400	6,988	750	29,76
6	21		700	1,099	400	6,988	750	29,76
Всего		62700	4200	9,737	2400	50,280	4500	161,55

Герентій Ла - въ, 42 л.

Номер пак.	Масло.	Жира въ немъ.	Всего принято жира.		Количество жир- ныхъ кислотъ въ немъ.	Жирныхъ кислотъ въ %.	На 100 грм. вве- денного жира вы- ведено жирн. кис- лотъ въ ка.в.	Периодъ предварительный.	Периодъ послѣдовательный.
			Количество абсолютно сухаго масла.	Количество жир- ныхъ кислотъ въ немъ.					
	64,047	105,8820	08	016,1	003	02882	1		
	64,047	105,9450	08	016,1	003	02882	1		
	64,047	105,7200	08	016,1	003	02882	1		
	64,047	104,9443	08	016,1	003	02882	1		
	64,047	104,9443	08	016,1	003	02882	1		
	64,526	105,4233	08	016,1	003	02882	1		
384,761	632,8589	139,273	29,233	20,990	4,619				
	64,526	98,7203	08	016,1	003	02882	1		
	64,526	101,7100	08	016,1	003	02882	1		
	64,526	101,7100	08	016,1	003	02882	1		
	64,526	112,1800	08	016,1	007	02882	1		
	64,525	110,5420	08	016,1	007	02882	1		
	64,526	110,5420	08	016,1	007	02882	1		
387,156	635,4043	246,850	30,708	12,44	4,832				
	64,5260	100,9080	08	016,1	007	02882	1		
	66,4176	101,9526	08	016,1	007	02882	1		
	66,4176	101,9526	08	016,1	007	02882	1		
	66,4176	104,8386	08	016,1	007	02882	1		
	66,4176	104,2646	08	016,1	007	02882	1		
	66,4176	104,2646	08	016,1	007	02882	1		
396,614	618,1810	192,414	24,796	12,887	4,011				

Таблица IV.

№ 4. Студентъ

Дни опыта.	Число и месяц.	Весь тѣла въ граммахъ.	Хлѣбъ.		Мясо.		Молоко	
			Количество въ граммахъ.	Жира въ немъ.	Количество въ граммахъ.	Жира въ немъ.	Количество въ граммахъ.	Жира въ немъ.
	Декабрь.							
1	4	59630	600	1,5120	300	10,143	750	26,615
2	5		600	1,5120	300	10,143	750	26,615
3	6		600	1,5120	300	7,965	750	26,615
4	7		600	1,0014	300	7,965	500	19,765
5	8		600	1,0014	300	7,965	500	19,765
6	9		600	1,0014	300	7,965	500	19,765
Всего		59250	3600	7,5402	1800	52,146	3750	139,115
1	10		600	3,564	300	7,647	750	22,825
2	11		600	3,564	300	7,647	750	22,825
3	12		600	3,564	300	7,647	750	32,945
4	13		700	2,520	300	7,917	750	32,945
5	14		700	2,520	300	7,917	750	32,945
6	15		700	2,520	300	7,917	750	32,945
Всего		60650	3900	18,252	1800	46,692	4500	177,425
1	16		700	1,673	300	7,329	750	24,09
2	17		700	1,673	300	7,329	750	24,09
3	18		700	1,673	300	7,329	750	24,09
4	19		700	1,099	300	5,241	750	29,76
5	20		700	1,099	300	5,241	750	29,76
6	21		700	1,099	300	5,241	750	29,76
Всего		62575	4200	8,316	1800	37,710	4500	161,55

В. То—въ, 21 г.

М а с л о .		Всего принят жира.	Количество абсо- лютно сухого жира.			На 100 грм. при- нятого жира выве- дено жирн. кис- лотъ въ калѣ.	Числ. опред.
Жира въ немъ.	Жира въ богатомъ		Количество жир- ныхъ кислотъ въ немъ.	Жирныхъ кислотъ въ %.	При- пари- тель- ный		
64,047	102,3120	102,3120	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
64,047	102,3120	102,3120	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
64,047	100,1340	100,1340	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
64,047	92,7734	92,7734	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
64,047	92,7734	92,7734	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
64,047	92,7734	92,7734	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
384,282	583,0782	142,531	14,798	10,382	2,537		
64,526	98,567	98,567	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
64,526	98,567	98,567	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
64,526	108,677	108,677	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
64,526	107,903	107,903	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
64,526	107,903	107,903	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
64,526	107,903	107,903	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
387,156	629,520	120,431	11,411	9,475	1,812		
66,4176	99,5096	99,5096	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
66,4176	99,5096	99,5096	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
66,4176	99,5096	99,5096	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
66,4176	102,5176	102,5176	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
66,4176	102,5176	102,5176	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
66,4176	102,5176	102,5176	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
398,5056	606,0816	118,729	10,668	8,985	1,760		

Периодъ предварительный.

Периодъ съ промываніемъ желудка.

Периодъ послѣдовательный.

Таблица V.

№ 5. Студентъ

Дни опыта.	Число и месяцъ.	Весь тѣла въ граммахъ.	Хлѣбъ.		Мясо.		Молоко.	
			Количество въ граммахъ.	Жира въ немъ.	Количество въ граммахъ.	Жира въ немъ.	Количество въ граммахъ.	Жира въ немъ.
	Декабрь							
1	5	62960	800	2,0160	400	13,524	750	26,610
2	6		800	1,7590	400	10,620	750	29,640
3	7		800	1,3352	380	10,089	750	29,640
4	8		800	1,3352	380	10,089	750	29,640
5	9		800	1,3352	380	10,089	750	29,640
6	10		800	4,7520	400	10,196	750	22,830
Всего		64490	4800	12,5326	2340	64,607	4500	168,000
	Январь							
1	11		800	4,752	400	10,196	750	22,830
2	12		800	4,752	400	10,196	750	32,940
3	13		800	2,880	400	10,556	750	32,940
4	14		800	2,880	400	10,556	750	32,940
5	15		800	2,880	400	10,556	750	32,940
6	16		800	1,912	400	10,556	750	24,090
Всего		65090	4800	20,056	2400	62,616	4500	178,680
	Февраль							
1	17		800	1,912	400	9,772	750	24,090
2	18		800	1,912	400	9,772	750	24,090
3	19		800	1,256	400	9,772	750	29,760
4	20		800	1,256	400	6,988	750	29,760
5	21		800	1,256	400	6,988	750	29,760
6	22		800	1,256	400	6,988	750	32,520
Всего		65990	4800	8,848	2400	50,280	4500	169,980

А. Ва—нъ, 22 л.

М а с л о .	Жира въ немъ.	Всего принято жира.		Количество жир- ныхъ кислотъ въ немъ.	Жирныхъ кислотъ въ %.	На 100 грам. вве- денного жира вы- ведено жирн. кис- лотъ въ калѣ.
		М а хъ.	Л и т.			
	64,047	106	,1970			
	64,047	106	,0660			
	64,047	105	,1112			
	64,047	105	,1112			
	64,047	105	,1112			
	64,526	102	,3040			
10	384,761	629	,9006	167,159	26,564	15,892
						4,233
	64,5260	102	,3040			
	64,5260	112	,4140			
	64,5260	110	,9020			
	64,5260	110	,90 0			
	64,5260	110	,9020			
	66,4176	102	,9756			
10	389,0476	650	,3996	149,435	18,406	12,317
						2,830
	66,4176	102	,1916			
	66,4176	102	,1916			
	66,4176	107	,2056			
	66,4176	104	,4216			
	66,4176	104	,4216			
	66,4176	107	,1816			
10	398,5056	627	,6136	182,020	19,518	10,723
						3,110

Періодъ предварительный.

Періодъ съ промываниемъ желудка.

Періодъ послѣдовательный.

## Общая таблица выводовъ.

№ 5. Студентъ А. Ва — нъ.	№ 4. Студентъ В. То — въ.	№ 3. Служитель Терентій Л — въ.	№ 2. Служитель Иванъ Аи — въ.	№ 1. Служитель Василій А — въ.	Періоды.	Фамилія и №№ опы- товъ.			РАЗНИЦА
						Введеніо жи- ровъ за пе- ріодъ.	Абсолютно сухаго кала за періодъ.	Выведеніо жирн. кисл. зі періодъ въ калѣ.	
1	583,0782	142,531	14,798	10,352	97,463	»			
2	629,5200	120,431	11,411	9,475	98,188	+ 0,725			
3	606,0816	118,729	10,668	8,985	98,240	+ 0,777			
1	629,9006	167,159	26,564	15,892	95,767	»			
2	650,3996	149,435	18,406	12,317	97,170	+ 1,403			
3	627,6136	182,020	19,518	10,723	96,890	+ 1,123			

## *Суточные нормы* **Положенія.**

---

1. Миѣніе иѣкоторыхъ авторовъ, будто промыванія желудка могутъ вести къ истощенію организма, на основаніи нашихъ наблюденій не подтверждается.
  2. Промываніе желудка можно назвать специфическимъ средствомъ при хроническомъ катаррѣ желудка, такъ какъ оно выводить болѣй органъ изъ того «порочного круга» (*circulus vitiosus*), въ которомъ онъ находится.
  3. Изслѣдованіе кала должно быть обязательнымъ у каждого больнаго наряду съ выстукиваніемъ, выслушиваніемъ, химическимъ и микроскопическимъ изслѣдованіемъ мочи и др. способами объективнаго изслѣдованія больнаго.
  4. При лѣченіи огромнаго большинства болѣзней, какъ острыхъ, такъ и хроническихъ, соотвѣтствующее питаніе и обстановка больнаго имѣютъ гораздо болѣе значенія, чѣмъ лѣченіе фармацевтическое.
  5. Промываніе желудка должно производиться непремѣнно мягкимъ зондомъ и по сифонному способу.
  6. Присутствіе глисты въ кишечникѣ человѣка, повидимому, не ухудшаетъ усвоеніе пищевыхъ веществъ.
-



## *Curriculum vitae.*

---

Лекарь Мееръ Зельмановичъ Геселевичъ, юдейского вѣроисповѣданія, сынъ мѣщанина, родился въ г. Вильнѣ, въ 1864 г. По окончаніи курса въ Шестой С.-Петербургской Гимназіи въ 1883 г. съ золотою медалью, поступилъ въ Императорскій С.-Петербургскій Университетъ на естественное отдѣленіе физико-математическаго факультета. Въ слѣдующемъ году перешелъ на второй курсъ въ Императорскую Военно-Медицинскую Академію, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1888 г. со званіемъ лекаря съ отличиемъ (*medicus cum eximia laude*). Съ октября 1889 г. состоитъ въ качествѣ экстерна при городской Петропавловской больницѣ. Въ теченіи 1889 г. сдалъ при Императорской Военно-Медицинской Академіи экзамены на степень доктора медицины, для полученія которой представляетъ настоящую работу подъ заглавиемъ: «Къ вопросу о вліяніи промыванія желудка на усвоеніе жировъ пищи у здоровыхъ людей». Предварительное сообщеніе настоящей работы было помѣщено во «Врачѣ», 1891. № 5.

---



16

8.

20