

Commentatio medico-chirurgica de cancro labii inferioris observationibus illustrato / Io. Christ. Stark.

Contributors

Stark, Johann Christian, 1769-1837.
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Ienae : In bibliopolio Goepferdtiana, 1812.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ya92kvn8>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



Digitized by the Internet Archive
in 2015

<https://archive.org/details/b22338718>

IO. CHRIST. STARK, M. D.

CONSILIAR. AULIC. SAXO - VINARIENS. PROF. PUBL. ORDIN. ETC.

7 u/10

COMMENTATIO MEDICO-CHIRURGICA

DE

CANCRO LABII INFERIORIS

OBSERVATIONIBUS ILLUSTRATO.



CUM TABULA AENEA.

IENAE

IN BIBLIOPOLIO GOEPFERDTIANA

MDCCLXII.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1900 год. № 17. КОМПЛЕКС

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

СОСТАВЛЕНА ВЫДАЮЩИМУЩИМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

СОСТАВЛЕНА ВЫДАЮЩИМУЩИМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

СОСТАВЛЕНА ВЫДАЮЩИМУЩИМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

СОСТАВЛЕНА ВЫДАЮЩИМУЩИМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

P r a e f a t i o .

Dirissimis malis, quibus corpus humanum obnoxium est, sine dubio ille morbus, quem *cancrum* appellamus, adnumerandus est. Naturam ejus hucusque non satis cognovimus, in quo etiam causa quaerenda est, quare tot homines morbo isto e medio crudelissime tolluntur. Varia quidem et multa ad hunc morbum compescendum, a medicis et chirurgis praecepta sunt, quae vero nonnisi raro exspectationi satisfecerunt. In cultro quidem nec minus in caustico, justo et maturo tempore adhibitis, interdum aegris paratur auxilium. Attamen vero plurimi sunt, qui, etiam his remediis destituti, morbo abripiuntur. Cuilibet igitur, omnes vires nervosque ut morbo isti atroci diminuendo et remediis etiam ancipitibus debellando intendat, curae cordique sit.

In hoc libello, pro muneric a Serenissimis hujus litterarum universitatis Nutritoribus mihi demandati opportunitate conscripto, *cancrum labii inferioris* tractandum mihi elegi. Inprimis vero, quid medico, quid chirurgo in malo contra remedia saepius laudata aliisque in morbis efficacia tam rebelli faciendum sit, exponere conatus sum. Itaque praecipue in indicationibus, vbi cultri vel caustici subsidio extirpatio et curatio per remedia interna et externa suscipienda est, constituendis operam navavi. Praeterea experientia edoctus attentionem medicorum et chirurgorum in arfenici usum, prioribus quidem temporibus interne et externe adhibiti, recentioribus vero, saltim hoc in malo pro usu interno non neglecti solum, sed a multis adeo repudiati, denuo dirigere studui. Expositioni vero ipsi quasdam observationes, non plane, ut equidem puto, memoratu indignas inferui. Aequi atque hujus rei satis compotes arbitri judicent, num ea, quae spectavi, affecutus sim.

§. 1.

De notionē cancri in genere, imprimis vero de notionē cancri labii magna inter medicos et chirurgos discordia fuit. Plurimi pathologorum et chirurgorum magni nominis carcinoma labii nominant quodque vlcus labii diuturnum, pertinax et malignum, cuius causa ignota¹⁾). Has vero notas ad characterem cancri distinctium constituendum minime sufficere, quisque facile intelliget. Ut in aliis locis sic in labiis etiam inveniuntur vlcera, quae per longum temporis spatium, aut culpa chirurgi aut pertinacitate mali non sanantur. Si igitur omnibus vlceribus, malum habitum externum prae se ferentibus, aut odorem foetidum spargentibus, aut pertinacitate medelae perspicuis, nomen cancri tribueremus, notio nimis late pateret, neque cancer ab aliis morbis ei similibus dignoscendus esset. Necessum igitur est, vt etiam huic morbo, ad omnem ambiguitatem evitandam, fines fixos indicemus. Neminem artis peritorum fugit, cancrum praesertim in glandulis aut partibus, glandulis structura et natura similibus, obvenire: vti in mammis, in testiculis, in labiis etc. Mea igitur sententia cancer in degeneratione et exulceratione partis glandulosae conficit.

Fuerunt quidem, qui sententiam, cancrum solis in glandulis sedem habere, eo refutare studuerunt, vt contenderent, cancrum etiam in partibus non glandulosis observari, quod accideret, quando cancer e verruca aut e pustula originem trahit. Tum vero aut vlcus naturae cancrofae non est, quamvis malignum habitum prae se ferre potest, aut verruca ex glandula exulcerata suborta est.

¹⁾ Vid. RICHTERI *Anfangsgründe der Wundarzneykunst*, Vol. II. p. 327.

—COLOC—

§. 2.

Itaque mihi verosimile est, nonnisi in glandulis talem degenerationem obvenire posse, qualem in cancro invenimus. Sine dubio energia glandularum vitali mutata et diminuta, succus glandularis operatione organico-chemica sensim alteratur illamque naturam tetricam foetoremque lentius aut citius adsumit. Ceterum cancer pro diversitate glandulae affectae semper diverse se ostendet. Cancer glandularum secernentium v. c. mammarum inter omnes malignissimus, ideoque, cultro excepto, nullo alio remedio hucusque medicabilis. Cancer e glandulis lymphaticis natus, vti glandularum in labiis profundius sitarum, non tam malignus quam cancer mammae, ideoque facilis sanationem admittit, attamen vero malignior est cancro e glandulis subcutaneis suborto, qui etiam potissimum sanatur, cum ex eo vlcera nonnisi superficialia nascuntur.

§. 3.

Morbus vero iste glandulosus hac ratione decurrere solet: Glandula affecta primum indurata minorem aut majorem tumorem praebet, quem scirrum vocamus. Forma tumoris externa in asperitudinem angulosam mutata, colore livido exorto, dolore pruriginoso, punctorio, ardente obveniente, cancer occultus dicitur. Denique exulceratione orta, sanie effluente foetorem specifcum expandente, labiis vleris inversis carcinoma nuncupatur. Hae mutationes aut cito aut lentius sequuntur.

§. 4.

Multi naturam viri cancrofi viam chemica investigare et eruere, saepius singulari consideratione inducti, studuerunt, sed id, quod ex illis experimentis non raro perversis prodiit, rem fere semper diversam monstravit, quo factum est, vt nonnulli saniem cancrofam acidam vt LE FEBURE¹⁾ alii alcalinam, alii gase hepatico impragnaetam vti CRAWFORD²⁾ invenerint, quod tum ex diversa constitutione tum ex diversa functione et natura glandularum affectarum explicari potest.

¹⁾ Vid. *Sammlungen auserlesener Abhandl. f. prakt. Aerzte.* B. II. St. 4. p. 170.

²⁾ Vid. ibid. B. XV. p. 344.

—○○○○—

§. 5.

Num ichor e carcinomate effluens contagione transplūtari possit, hucusque non satis liquet. Medici quidem et chirurgi fere omnes ichori vim, humores inficiendi eundemque morbum in corporibus sanis producendi tribuerunt. Experimenta vero ALIBERTI cum sanie cancrofa instituta, qui non canibus solum, sed etiam sibi ipsi et discipulis pluribus ichorem insevit cancrum deterrium, opinioni de contagione contradicere videntur, et si non satis, ut mihi videtur, rem probant¹⁾). Nam contagia non omnia, vulneri facto immisfa, corpus sanum inficiunt, vti experimenta, a DESGENETTE, in se ipso cum contagio pestilenti instituta sine subsequente infectione demonstrant. Deinde contagia majorem minoremve opportunitatem corporis, in quod agunt, requirunt, si infectio procedere debet. Denique constat, ichorem per vasā absorbentia in carcinomate resorptum et ad glandulas vicinas translatum, glandulas eodem contagio infici, quo carcinoma primarium adfectum erat²⁾). Nam carcinomate, cultro ablato, crebrius glandulae vicinae intumescunt, indurantur, rumpuntur et in vlcus carcinomatofum transmutantur, vtpote quod glandulae axillares, in quibus non raro, carcinomate mammae ablato, morbus recrudescit, nec minus glandulae sublinguales et submaxillares post carcinoma labii exscissum cancro affectae luculenter probant. Contagio igitur partis per alteram haudquam negari potest. Num vero contagio cancrofa individui per alterum fiat, dijudicare non audeo.


§. 6.

Labia oris prae ceteris multis gaudent glandulis, ideoque ad generandum cancrum tam prona sunt. Cancer vero multo frequentior in labio inferiori

A 2

¹⁾ Ichorem insitum in illis experimentis dolor punctorius, pustula rubra cum levi partis tumore in loco, vbi insitio facta erat, sequuta est; inflammatio pustulae in suppurationem transiit, quam crux tenuis sequuta est. Omnia haec phaenomena triduo elapsō, evanuerunt.

²⁾ Si quis forte dubitet, ichorem cancrum a vasī absorbentibus fuscipi, adeat SOEMMERRINGII librum *de morbis vasorum absorbentium*. Trajecti ad M. 1795. p. 107. qui vasā absorbentia ichore tenui ex atro livescenti turgida, varices fere mentientia, in pluribus partibus cancro adfectis vidit.



observatur, quam in superiori. Si vero augescit, ab inferiori ad labium superius interdum serpit. Ceterum cancer labii diversae formae et indolis se exferit:

- 1) Sub forma nodi majoris minorisue scirrhi dicti, parti labii rubrae inherenteris, cujus superficies aut plana, aut angulosa, aut disrupta est, vti in verrucis, quarum naturam tumor cancrofus interdum mentitur. Initio haud inducit dolorem aliamve molestiam, quare fit, vt auxilium ab aegro non quaeratur, qui vero postea aut pruritus aut lancingationis fugacis sensu admonetur, quid malum significet. Denique color tumoris nativus in coeruleum, lividum mutatur, interdum vasa vicina intumescunt varicosa.
- 2) Ocyus aut serius nodus exulceratur, quod cutis excoriatione, effluxu ichoris acris, vrentis, foetidi indicatur; exulceratione orta interdum tumor augescit ad magnitudinem nucis juglandis, imo pomi. Ulceris exorti basis dura, scirrhosa, ejusque labia tumida, reverfa, reterrita, interdum quasi exesa; dolor immanis, vrens, pungens, rodens, color cineritius, caeruleus, lividus. Vlcus latius serpens vasa nervosque destruit, indeque haemorrhagiae profusae et dolor intolerabilis.
- 3) Sub forma fungi. In margine labii surgit nodus durusculus, diuturno aut brevi clausus, tandem ruptus, e cuius superficie excrecentiae naturae fungosae insurgunt, quae satis cito increscunt et extenduntur, e quibus sanies sanguinolenta, acris et foetida exfudat. Cujus naturae fungus mihi obvenit, qui totum labium inferius ab angulo dextro ad angulum oris sinistrum infestaverat et ad arcum labii se incurvaverat, vti depictum conspicis in tabula adjecta fig. I. de quo infra fuis et uberioris tractabitur.
- 4) Sub forma vlceris excedentis. Plerumque haec carcinomatis species e nodulo in superficie labii suto exoritur, quo disrupto vlcus superficiale formatur, quod brevi tempore ambitum in majorem auctum totum labium inquinat, et sibi relictum ad genas ipsas extenditur. Plerumque quidem originem e parte labii rubra dicit, mox vero serpedit ad superficiem labii exteriorem. Margines vlceris sunt durae et inversae, fundus torpidus, ichor cadaveroli foetoris vrens, effusus sensum doloris vrentis et lancingantis proferens.

—OOOC—

§. 7.


Varia momenta causalia ad generationem cancri conferre possunt:

I. Praedisponentia s. interna, e quibus haec adducimus:

- 1) Cancer potissimum invadit *aetatem* proiectorem. Morbum ipsum in maribus annos quadraginta usque ad sexaginta natis saepissime obseruavimus, rarius in tricenariis aut septuagenariis.
- 2) Cancer labii multo frequentius in maribus obvius, sicut cancer mammae tantum feminis peculiaris est. Inter quadraginta duos labii cancros diversae formae nullus mihi obvenit in feminis; alia quidem ulcera, non vero cancrofa, in labiis seminarum observavi. Contra e triginta quinque cancris, quos in mammis tractavi, unum modo carcinoma in mamma maris et quidem olim judaei, tunc in christianos recepti, observare et extirpare mihi contigit.
- 3) Morbi, in systemate fecernenti residentes, ut scrophulae, lues venerea, arthritis, herpes etc. non raro dispositionem ad generationem cancri relinquunt.
- 4) Pathemata animi deprimentia ut moeror, tristitia, aegritudo etc. quae detrimentis aliis exceptis potissimum vires systematis lymphatici debilitant, stagnationem humorum et obstructionem producunt, ideoque ad hunc morbum maximopere corpus primum reddunt¹⁾.

II. Occasionalia s. externa, quibus imprimis adnumerandae sunt variae injuriae allatae v. c. contusiones, quibus singula labii loca, praecipue glandulae

¹⁾ Exemplum effectus pathematum animi triste ante oculos versatur. Vir quidam quinquagenarius, temperamento inde ab omni aetate melancholico et constitutione atrabiliaria praeditus, sensu doloris urens et prurientis in tota facie praesertim in labiis et naribus causa distincta non obvia comprehensus et admodum cruciatus est, cogitans, labia cancro affectum iri. Mirum profecto, perpetua animi agitatione nodulum pruriginosum in labio inferiori nactus, tantum in metum carcinomatis dejectus fuit, ut ad omnes meas exhortationes fudus et melancholia completa correptus glandis ictu cerebrum perculserit.



premuntur et energia vitali destituuntur, quo fit, vt humores aut stagnent et glandulae in tumorem intumescant, aut discrasia illorum suborta exulceratio subsequatur, sensimque vlcus formetur. Labium imprimis inferius, cum libere promineat, laesioribus externis subjectum est v. c. pressioni a fistula tabacina ortae¹⁾ et aliis. Viro saepius arthritide vexato carcinoma labii satis ingens, a ramulo arboris recellenti subortum, refecavi.

Vt vero plurimi morbi concursu momentorum praedisponentium et occasionalium nascuntur, sic etiam hoc fit in cancro generando. Injuriae externe allatae eo facilius in partibus glandulosis cancrum producunt, quo magis homines jam praedispositi sunt. Quandoque vero causae occasionales, quandoque causae praedisponentes, plus ad progignendum morbum conferunt. Itaque cancer mox vt malum topicum, mox vt malum vterius in corpore propagatum considerandum erit. His rite perpensis, assertum a LEURS²⁾ pronuntiatum, cancrum nunquam a degeneratione partium solidarum topica derivandum, sed solummodo depravationi partium fluidarum attribuendum esse, facile dijudicandum erit, cum theoriae et experientiae repugnet. Ex eadem ratione ad sententiam, ex isto asserto a LEURS³⁾ derivatam, cancrum neque medicaminibus neque extirpatione vñquam sanatum fuisse, cui nuper HIMLY⁴⁾ assentiri videtur, minime accedere possum. Experientia crebro repetita docet, cancrum in singulis casibus malum omnino locale esse, in quibus ab extirpatione auxilium tutum sperari potest. Praeter ista exempla, in decursu hujus libelli de cancro labii sanato adducta, etiam, si hic locus esset, de cancro mammae opercultri feliciter extirpato plura adjungere possem. In quo etiam alii chirurgi mecum consentiunt. Instar omnium HILL⁵⁾ nominare sat est.

¹⁾ SOEMMERINGIUS arbitratur carcinoma ibi frequentissimum, vbi homines fistulis tabacinis indulgent, quoniam labium inferius inter fistulam tabacinam et dentes comprimitur. vid. libr. citat. p. 109.

²⁾ Vid. *Sammlungen auserlesener Abhandlungen f. pr. Ärzte* B. XVIII. p. 319.

³⁾ Vid. ibid. p. 404. 405.

⁴⁾ *Hufelands Journal der practischen Heilkunde.* 1809. 12 St. p. 118.

⁵⁾ vid. ej. *chirurgische Beobachtungen, welche hauptsächlich den Krebs und die Kopfwunden betreffen a. d. Engl.* Leipzig 1777.

—OOOO—

§. 8.

Plures pathologi et chirurgi a causis variis, saepe singularibus, originem cancri derivarunt: JUSTAMOND¹⁾ ab infectis vel germinibus insectorum per vasa absorbentia ex aere arreptis, ADAMS²⁾ ab hydatibus, LEURS³⁾ a succo generationi in utroque sexu inservienti corrupto per nervos ad glandulam affectam translato. Fertilitatem in sexu sequiori cessantem et vim generandi in sexu potiori decrecentem in progignendo cancro multum conferre, negari nequit; res potius eo appareat, ut cancer ea aetate potissimum obveniat, in qua illae mutationes functionis sexualis subsequuntur. Rationi vero, rem demonstrandi, a LEURS prolatae minime assentiri possumus.

§. 9.

Morbi, scirrho et cancro labii similes dignoscendi, sunt sequentes:

- 1) *Scrophulae* in systemate lymphatico aequa obviae ac cancer, in tumorem glandulosum atque in vlcus transeuntes a cancro his notis distinguuntur:
 - a) Cancer unam solummodo glandulam infestat, et, si postea plures glandulae affectae conspicuntur, hae ichore resorpto demum afflictae sunt. In scrophulis totum sistema lymphaticum infestatum apparel, ideoque glandulae tumidae pluribus in locis conspicuae sunt.
 - b) Cancer, vti jam supra memoratum est, aetatem proiectorem, scrophulae vero plerumque aetatem infantilem et juvenilem invadunt.
 - c) Cancer occultus et apertus dolore insigni, pungente, vrente innotescit, in scrophulis plerumque dolores absunt.
 - d) Cancer apertus, notis peculiaribus, ichore foetido acri vrente, labiis

¹⁾ JUSTAMONDS Treatment of Cancerous and scirrhous disorders. London 1780.

²⁾ ADAMS ou cancerous breasts.

³⁾ Sammlungen auserlesener Abhandlungen B. XVIII. p. 357.

inversis, callofis etc. se manifestat, vlcera autem scrophulosa effundunt pus tenue caseofum, neque vero acre nec odore foetido insigne.

- 2) *Vlcus venereum*, quod non raro alterutrum oris angulum quandoque labium superius occupat. In femina quadam labium superius vlceri syphilitico abhorrendo ita inquinatum erat, ut totum fere labium exesum et medio in labio hiatus satis amplius subortus esset. Historia morbi solertissimo examine indagata, nec minus indoles vlceris, pure ichorofo, fundo impuro lardaceo, margine inaequali et quasi dentata manifesti, rem extra dubitacionem posuerunt. Vlcus vslu mercurii sublimati fine deformitatem sanatum est.
- 3) *Excoriatio labiorum* cum secrezione materiei puriformis, sensim in crustam spissatae post aliquot dies delapsae mox vero regeneratae, aucta plerumque metastatice orta. Malum diuturnum est et pertinax. Duo hujus mali casus mihi obvenerunt. Alter in juvene ab arthritide ortus per annum et quod excurrit juvenem vexavit, alter in femina juvenili ab herpete profectus post aliquot hebdomades, medicaminibus genio morbi adaptatis in primis vero vlceribus artificialibus in brachio excitatis cessit. Si rem accuratius inquiramus, natura mali potissimum absentia signorum in carcinomate obviorum facile cognoscitur.
- 4) *Ulcus* quoddam in variis faciei locis, in alis narium, in labio superiori, in genis, in temporibus sine causa nota obvium, a multis ob mali pertinacitatem et diuturnitatem pro cancro habetur, quod vero ab eo multum abludit, cum omnia figura cancri pathognomica absunt. Fundus hujus vlceris purus, rubicundus, margines aequales et planae sunt. Ulcus quidem ichorem tenuem, albicanem, minime foetidum effundens, sensim sensimque auctum per multos annos perstat neque unquam sanatur sed potius vterius ferpit. Cutis et tela cellulosa feliae affectae videntur.
- 5) Interdum in labio inferiori aut superiori *fissura* suboritur, quae praeter sensationem tensionis nulla alia incommoda adfert, vnguento emollienti plerumque sanabilis. Qua vero neglecta vlcus dolorosum cum intumescientia et habitu decolori nascitur. Quo in statu saepius cum cancro confusum est. Signa vero cancri pathognomica, orae inversae, ichor foetidus, dolor vrens et pungens desunt.

Prognosis cancri labii praecipue eoredit:

I. ut solertissimo inquiramus examine, num malum adhuc locale sit i. e. solo in labio, in quo incepit, residet, aut an indicia jam adfint, virus cancerum ulterius propagatum, fortasse per totum corpus dissipatum esse. In illo casu eventum omnino faustum ab extirpatione cancri expectare poteris, in hoc vero nullo modo. Cancrum vero non amplius morbum esse localem, ex sequentibus phaenomenis concludere licet:

- 1) Ex intumescientia et induratione glandularum vicinarum v. c. sublingualium aut submaxillarium.
- 2) Quoties aliae glandulae e. gr. in buccis litiae, intumidae aut durae inveniuntur.
- 3) Quando ipsae glandulae subcutaneae in superficie labii ceteroquin incolumis interiori cœu noduli duri largiter disseminatae apparent¹⁾.
- 4) Quando superficies labii interna multis valvis varicosis obsessa indeque livida est.
- 5) Quoties gingiva eandem induerit indolem et labio jam destructo ab ulcere adgressa aut maxilla ipsa a cancro infecta sit.
- 6) Ex meibomiarum glandularum suppuratione per longum temporis spatium jam continuata, ex rubore oculorum livido, ex colore faciei maculoso et rubicundo, ex habitu totius corporis cachectico.

II. Ut *forma* et *tumoris natura* indagetur. Quam diu malum formam scirrhi praef se fert, extirpatio multo laetiorem promittit exitum, quam ubi jam in-

¹⁾ Vir carcinomate margini labii inferioris inherente neque magno ambitu gaudente affectus, cuius vero tota superficies labii interna nodulis magnitudine grani milii multis occupata erat, extirpationem a me desideravit. Precibus illius invite obsecutus, totum carcinoma vlo sine residuo resecavi, vulnus brevi consolidatum sed mensibus vix decem prolapsis vlcus faciei deterrimae recrudescit, totum occupans labium, ex quo luculenter eluet, in glandulis illis minimis contagium fuisse disseminatum.

dolem carcinomatis induerit, in quo casu virus carcinomatofum facilius reforberi et ulterius mitti potest. Carcinoma superficiale subito se expandens et totum labium occupans neque minus carcinoma in basi scirrhosa relidens, cuius vero superficies, vti in verrucis, fissa et disrupta, maligni fere semper est ingenii. Ex frequentiori et vrente in vlcere dolore, ad partes serpente adjacentes, nec minus rheumatico aegrotos saepius invadente, propagationem virus ad glandulas vicinas imminentem suspicari poteris.

III. Ut mali *diuturnitas* spectetur. Quo recentius est, eo majorem fausti exitus spem alere possumus; quo vero diuturnius, eo verosimilius, virus ulterius esse propagatum. Quod vero praeceptum sine omni restrictione valere nequit, cum quandoque cancri occurruunt inveterati, qui prospero eventu et contra recentiores, qui fortuna adversa extirpata sunt¹⁾.

IV. Denique vt *aetatis* et *constitutionis* aegroti ratio habeatur. Cujus vires simulac aetate aut dyscrasia humorum vlla fractae sint, vix exitus laetus potest sperari. Cum vero functiones ejus illaesae inveniuntur, vires febre non labefactae, major eventus prosperi spes chirurgo arridet. Omnino vero negari nequit, quod jam plures observaverunt, extirpationem interdum infaustis auspiciis institutam feliciter concessam etj contra bonis auspiciis inchoatam eventum infelicem esse sequutum.

§. 11.

Cum scirrhus et cancer, vti jam supra demonstratum est, in degeneratione glandulae affectae et, si scirrhus in carcinoma transierit, in humorum in glandula secretorum decompositione consistat, quo fit, vt potentiae externae nimis praevalide agant et pars affecta ab illis magis magisque assimiletur et abripiatur, atque cum processum organico-chemicum, a quo ista degeneratio pendet, plane ignoremus neque actioni isti chemicae fines constituere, aut illam prorsus tollere possimus; vix fieri potest, vt aut partis scirrhosae, in qua degeneratio incipit, resolutio perfici, aut multo minus partis cancrosoae, in qua plenariam degenerationem invenimus, functio restitui queat. Vnica igitur ratio, de-

¹⁾ Carcinoma, quod jam annos sex et ultra duraverat, felici successu viro resecavi.

generationem in parte scirrhosa et cancrosa radicitus auferendi atque ita progressus actionis chemicae, a qua aberratio orta fuit, terminandi, consistit in parte glandulosa, in qua scirrus aut cancer refidet, penitus destruenda aut extirpanda. Rem vero solummodo ita tractare poteris, quum processus organico-chemicus, a quo degeneratio scirrhosa et cancrosa profecta est, sola in parte, a qua exiit, haereat. Qui vero processus simulatque ad organa vicina primo affectis similia jam transiverit et chirurgus persuasus sit, glandulas vicinas solas esse comprehensas, glandulae affectae proxime adjacentes simul ut destruantur necessum est; si vero glandulae plures et remotiores aut etiam alia organa non glandulosa affectae occurrant, ex quo patet, morbum non amplius localem esse, in partibus affectis singulis destruendis nulla salus, vti in lue venerea in aboliendo uno vlcere auxilium non paratum. Cum res ita se habent, remedia indicata essent, quae affectionem morbosam per plura variae indolis organa dispersam eadem ratione, qualues venerea mercurialibus extinguitur, auferre valerent. Cujus vero generis remedia ad scirrum aut cancrum debellandum hucusque nondum sunt cognita. Quare malum, eo deductum, aut immedicable judicandum; aut remedia naturae et genio mali tam rebellis adaptata invenienda. Multa quidem remedia tentata sunt, sed quod valde dolendum, sine eventu prospero. In rebus desperatis Celsus sua ore remedium anceps tandem. Itaque in tali cancri stadio usum arsenici internum pluribus ex causis, de quibus infra sermo erit, valde commendabile puto. Me quidem minime fugit, arsenicum contra cancrum a pluribus medicis iam commendatum et etiam tentatum fuisse. Nihil vero certi ex omnibus tentaminibus isto medicamine institutis prodiit, quod etiam aliter contingere non potuit, quum plurimi ad usum arsenici tum demum refugerent, quando, tota medicaminum farragine in usum ducta vires corporis omnes exhaustae et prostratae erant, quo factum est, ut plures aegrotorum, in quibus a medicis arsenicum adhibitum fuit, matruius e medio sublati sint, quam sine arsenici usu factum esset.

His expositis *cura* scirri et cancri labii dupli modo potest perfici:

I. Destructione et extirpatione partis affectae.

II. Usu medicamentorum interne et externe applicatorum.

— — — — —
§. 12.**I. De destructione et extirpatione partis cancrose affectae.**

Ad fines degenerationi in scirrho et cancro procedenti imponendos, in extirpatione partis scirrhosae et cancrosoe tutissimam et in plurimis casibus vnicam invenimus medelam. Extirpatio vero tum demum sub prosperi eventus spe instituatur, dum chirurgus persuasus est, scirrhum et cancrum in solo tantum labio inferiori sedem habere, aut miasmate carcinomatofo ulterius propagato partes scirrho aut labii cancro primario vicinas simul esse extirpandas. Ablatio igitur eo tutius succedet, quo inaurius instituitur, cum incertum est, quam diu cancer naturam morbi localis retineat. Quandoque enim citius, quandoque ocyus propagatur, quod a constitutione aegroti, ab ejus genere vitae, nec minus a variis potentissimis nocivis pendet. Sic propagatio mali refrigeratione, privatione ciborum, deperditione sanguinis animique affectibus aut injuriis externis, frictione, pressione etc. non raro acceleratur.

§. 13.

Extirpatio vero ipsa vario modo fuscipi potest:

1. Caustici ope. Generatim vero caustica indicata sunt, vbi carcinoma sub forma ulceris superficialis extat neque nimium attigit ambitum, praeceteris commendabilia, quando pars affecta in latere labii versus genas sita est, vbi usus cultri minus adaptatus. Evidem etiam in carcinomate in basi scirrhosa residente applicatur, neque vero massa scirrhosa gaudeat nimia crassitudine et duritie. Itaque in scirrho et cancro majoris voluminis neque minus in cancro fungoso, qualis tab. fig. I. pictus videndus est, non suppeditat. Caustici enim adminiculo omnia, quae abnormi vi vitali in ulcere nata sunt, destruenda, vclus cancrosum immutandum in vclus purum. Causticum ergo omnes partes morbosas usque ad ulceris fundum penetret necesse est, nisi aegrotus in morbum recidere debeat.

§. 14.

Varia caustica contra scirrhum et cancrum labii aboliendum in usum ducta sunt:

- a) ferrum candens modo prodest, vbi carcinoma, partem tantum minorem et quidem superficialem occupans, vnica applicatione extingui potest. Majoris vero momenti ejusdem usus est, quum post extirpationem, cultri operis institutam, locus quidam suspectus, qui auxilium cultri non admittit, in decursu sanationis ulceris detegatur.
- b) Alia quidem medicamenta caustica, uti Onopordon, sedum vermiculare et alia laudata sunt ad cancrum labii debellandum, vix vero credo, ulcera, in quibus ista medicamina adhibita sunt, naturae fuisse cancerosae. Eorum vis nimis exigua aestimanda, quam quod ulcus vere cancerosum extinguere valuerint.
- c) Efficacissimum ab antiquioribus jam temporibus auxilium caustica ex arsenico parata contra cancrum protulerunt. Quae vero non vi caustica solum operari, sed vim etiam virus cancerosum imminutantem et normalem partis affectae functionem restaurantem exferere mihi videntur, quod inde prodit, quod arsenico satis diluto et iterata vice adhibito ulcus cancerosum non raro sanetur. Medicamentum ex arsenico consectorum variisque formis in usum ductorum praecipua haec sunt:
- α) Arsenico f. q. aquae soluto ulcus lavatur aut linteum carptum eo imbutum carcinomati applicatur. Qua quidem ratione LE FEBURE¹⁾ novissimis vero temporibus FLEISCHMANN et alii usi sunt. Arsenicum solutum praesertim conductit in ulceribus cancerosis in partibus valde sensilibus obviis; vbi ab arsenico, alia et fortiori forma adhibito, symptoma nociva et periculosa metuenda sunt. Ceterum solutione arsenicali quotidie bis aut pluries applicata continuatur, donec ulcus detersum et ad consolidationem primum sit.
- β) PLUNKETI remedium, a GUY saepius adhibitum, constat ex arsenico, sulphure, cotulae foliis et ranunculo lylvestri²⁾.
- γ) Prae ceteris remedium Cosmicum³⁾, quamplurimis probatum expe-

¹⁾ Vid. ej. lib. *Remède éprouvé pour guérir radicalement le Cancer*. Paris 1775.

²⁾ Vid. RICHTERI chirurgische Bibliothek T. V. p. 152. et Tom. VIII. p. 76.

³⁾ Formula remedii cosmici haec est: Rx. Cinnaberis factit. drachmas duas, Cineris solearum

rimentis, laudandum est. Fuerunt quidem alii, qui illud remedium summae quidem omnino esse efficaciae in ulceribus in facie saepius obviis herpeticis et aliis, carcinomatis naturam mentientibus, minime vero in carcinomate ipso contenderent¹⁾). Huic sententiae accedere non possum. Concedo quidem, remedium saepius in ulceribus faciei nomen cancri haudquaquam vero ejus naturam prae se ferentibus adhibitum esse, e quo vero non sequitur, in cancro labii nunquam profecisse. Plurimae enim observationes de ejus eximia in carcinomatibus genuinis efficacia extant, quibus, si opus esset, egomet ipse plures adjungere possem. Remedium Cosmicum justo tempore et ratione administratum eadem, qua culrum, ratione effectum producere oportet, immo in nonnullis casibus cultro proferendum puto, cum caustico arsenicali omnia, quae corrupta sunt non solum destruantur, sed secretio ipsa in parte affecta perversa alteretur et virus cancerosum ipsum, quod certe mihi probabile, decomponatur; quod exstirpatione cultri ope minime perficitur. Simulatque vero chirurgus finem istum attingere velit, necesse est, ut virus carcinomatofum solae parti, in qua se exserit, inhaereat neque minus ut carcinoma ipsum ita comparatum sit, ut remedium causticum usque ad fundum ulceris penetrare possit, et omne morbosum diruat. Quare effectus caustici in eo carcinomate, in quo massa cancerosa nimis profunda est et crassa, cui penetranda causticum invalidum, minime sufficit. Itaque remedium Cosmi in carcinomate mammae, experientia duce, parum efficaciae praebet²⁾.

Ceterum remedium Cosmicum administrationi arsenici sub forma so-

vistar. grana octo, sanguinis Draconis grana duodecim, Arsenici albi grana quadraginta. M. F. P. subtil. D.


¹⁾ Hanc sententiam novissimis temporibus protulit MURSINNA, vir multis ex nominibus praesertim ob eximiam rebus in chirurgicis dexteritatem aestimandus. Vid. ej. *Journal für Chirurgie etc.* Vol. I. fasc. 5. p. 440.

²⁾ Hoc vero praeceptum non sine restrictione valet. Nuper admodum remedium cosmicum felici successu administravi in carcinomate mammae recidivo, non quidem magni ambitus, tamen vero satis profundo. Remedium in sufficiente quantitate et crassitie ulceri impositum omne corruptum penetravit et destruxit, quo factum est, ut paucis intra diebus ulcus consolidatum sit.

lutionis externae magnopere est proferenda, quoniam effectus arsenici in pulvere cosmico multo fortior et certior. Remedio cosmico vlceri illinito major humorum affluxus oritur, quibus arsenicum in eo contentum sensim sensimque solvitur, quo fit, ut multo magis et etiam profundius per massam cancrosum penetret eamque destruat, quod arsenico jam ante applicationem soluto non fit, cujus vis in superficie tantum vlceris peragitur. Rem ita se habere, ex eo patet, quod aegrotus non statim post applicationem medicaminis sed secunda demum die et sequentibus dolorem sentiat vehementiorem.

Applicatio vero remedii sic instituitur: Carcinomatis, lintei carpti ope exsiccati, superficies non solum, sed etiam ejus margines remedio sufficiente aquae quantitate in formam pultis spissioris redacto, subfido penecilli e crinibus confecti, satis largiter illinitur. Partes vero vlceris vicinas, ne caustico corrodantur, emplastro perforato tuearis, necesse est. Vlcus ipsum medicamento illinitum linamentis carptis obtegitur. Si fortasse in singulis vlceris locis medicamentum abstergeretur, statim denuo ista loca eodem sunt inducenda.

Symptomata, applicationem medicamenti cosmici sequentia tum ex discrimine partis, cui cancer inhaeret, tum ex indole carcinomatis nec minus ex ejusdem magnitudine et ambitu sunt diversa. In cancro labii inferioris aliquo ambitu gaudente et in ejus superficie refidente, ob eximiam papillarum nervearum copiam, mox post illinitionem medicaminis dolores infligentes nascuntur, ad cancrum vero, cujus massa majus volumen habet, dolor gravior paululum tardius accedit, secunda vero die admodum augetur et die tertia aut quarta sumnum fastigium attingit. In aegro, sensili praedito constitutione, totam faciem tumidam, edematosam atque rubore erysipelatode non raro ad partem capitis comatum diffuso inductam, nec minus febrem urgentem plerumque delirio junctam, interdum convulsiones, deglutitionem impeditam et alia symptomata spastica reperimus. Quinta vero die omnia symptomata et ipse dolor mitigata sunt. In carcinomate minoris ambitus, nec minus in aegris temperamento torpido praeditis, symptomata omnia multo minus gravia observantur; attamen dolor modicus cum faciei tumore accedit. Omnia symptomata fere semper vsu opii, camphorae interno et pulvinariis herbis aromaticis repletis externe impositis leniuntur et dissipantur.



Vlcus cancerorum crusta fusca et nitente obducitur, quae novem, septemdecim, viginti intra dies a partibus sanis solvi solet, vti partes sphacelo correptae a partibus vi vitali praeditis separantur. Viribus vero naturae solis separatio perficitur, et quam solertissime providendum est, ne ruditer abstracta aut avulsa eschara pars sana offendatur, ex quo facile nova virus propagatio ad partes incolumes nasci potest. Quod maximam in partem separatum atque singulis modo fibris adhaesum est, facile forcice potest absindiri. Similatque omne corruptum solutum est, fundus ulceris granulationibus carneis se obtegere incipit. Si vero loca singuladura aut decoloria observantur, medicamentum iterata vice ut imponatur necessum est. Vulnus linamentis carptis aut siccis aut vnguento digestivo, Balsamo locatelli, vnguento et plaga ipsa brevi cicatrice obducitur.

- δ) JUSTAMONDI¹⁾ vnguentum ex arsenici granis quinque, laudani pur. granis decem, Cérati drachma confectum, panno linteo tenuiter illinitum et iterata vice impositum. Idem etiam alia mixtura, ex arsenico et sulphure constante, ad mitigandum, in ulceribus canceris obium, foetorem abominabilem usus est.
- ε) Aliud Vnguentum contra cancrum ex arsenici, florum sulphuris, in drachma Aceti destillat. Vnguenti alb. aa vnciam j. ARNEMANN²⁾ praedicat.
- ζ) HARGENS³⁾ multo minori dosi arsenicum externe adhibuit in ulceribus canceris nimia sensibilitate praeditis: Rx. Arsenici albi grana quatuor, Butyr. rec. non salit. drachmas sex, Cer. alb. drachm. duas, exact. m. f. Vnguent.
- η) HARLES⁴⁾ vero, ubi ingens adsit ulceris sensibilitas dolorque, multumque simul feri ichorosi continuo exfudet, hoc vnguento usus est: Rx. Arsenici

¹⁾ JUSTAMONDS an account of the method pursued in the treatment of cancerous and scirrhouis disorders and other induration. London 1780.

²⁾ ARNEMANNI praktische Arzneymittellehre. Vol. 2. Göttingen 1795. p. 145.

³⁾ Vid. HUFELANDS Journal der praktischen Heilkunde. Tom. IX. fasc. II. p. 148.

⁴⁾ HARLES de Arsenici usu in medicina. Norimbergae 1811. p. 272.

senici alb. grana sex ad decem, opii puri grana duodecim ad viginti, Calcis Zinci drachmam dimidiam, Butyr. rec. vnciam vnam, Cerae flavae liquef. drachmam vnam et dimid., longa triturat. misc. exact. f. Vnguent. Hujus vnguenti partem circiter sextam qualibet vice cancri superficie diligenter et aequali strato illinire, coriique frusto operire HARLES jubet. Neque vero quotidie, sed singulis tantum ternis quater-nisve diebus repetatur vnguenti usus.

§) Quandoque arsenico externe adhibito extracta vegetabilia mundificantia, balsamica vel leniter adstringentia et siccantia admiscerit possunt, vti ALTHOF eximio cum successu praesertim in tumoribus fungofis sequenti mode fecit: Rx. Arsenici albi grana tria, solv. in Aquae stiftatit. drachm. tribus, adm. Extracti Cicutae, Extr. chiae off., Extr. Saturn. aa Unc. dimidiam. M. D. pr. usu externo. Hac mixtura ex crescentia fungosa ter quaterque quotidie illineatur.

In posterioribus casibus (δ. ε. ζ. γ. θ.) arsenicum, tam exigua dosi adhibitum, non tanquam causticum, sed potius vt remedium, virus cancrosum alterans, vim suam exferit. Itaque iterata vice applicetur et per longum temporis spatium continuetur, necesse est.

§. 15.

H. Extirpatio cultri ope indicata est:

- 1) Quando malum sub forma scirrhi aut cancri occulti exstat. In hoc casu a caustico vix quidquam sperandum, quoniam vitio penetrando et destruendo impar est.
- 2) In cancro aperto notabili basi scirrhosa residente, ad quam enecandam causticum haudquam aptum.
- 3) Quando carcinoma totum labium a superficie externa usque ad internam inquinavit, ita vt pars ipsa labii rubra a vitio affecta sit. In hocce casu causticum ad excidium partis corruptae minime sufficit, quo, si etiam sufficeret, totum tamen labium destrueretur, et deperditio partis foedaque deformitas oriretur.

- 4) Quando malum sub forma tumoris grandioris a labio dependentis se ostendit.

§. 16.

In extirpando cultri ope cancro a chirурgo admodum spectandum est:

- 1) *Vt nihil corrupti aut vitiosi remaneat. Neque enim solum, quae exulcerata, callosa et indurata, sed etiam quae decoloria aut alio modo suspecta sunt, auferantur. Itaque jam ante operationem diligentissimo examine superficies, et externa et interna, indaganda est. Multo salutarius est paulo majorem, quam opus est, partem abscindere, quam cuiquam parcere, ne aegrotus in periculum recrudescentis mali incidat. Non raro infastus excisionis eventus in eo quaerendus, quod chirurgus non satis accurate in vitioso abscindendo peregerit.*
- 2) *Vt excissio tempestivo tempore suscipiatur. Longe facilius succedet in tumore adhuc clauso, quam jam exulcerato. Incertior est eventus, cum cancer totum jam labium infestinavit aut ad genas se extendit. Immedicable certe cultri subfidio carcinoma judicandum, vbi gingiva decolor, varicibus nigricantibus obseffa, aut fortasse exulcerata et maxilla ipsa affecta, nec non glandulae vicinae tumidae et induratae sunt. In casu posteriori excisionem nonnulli instituerunt, et intumescensia glandularum vicinarum post ablationem cancrofi disparuit. Quo vero in casu tumores glandulosi vicini modo consensuales fuerunt, neque propagatione virus orti. Quodsi accidit, tumor glandularum vicinarum neque notabilis neque valde durus est. Simulatque aliqua glandula vicina tumida et indurata, corpus ceteroquin sanum neque alia res adversa adest, excissio carcinomatis institui potest, sed necesse est, vt glandulae vicinae induratae simul auferantur.*

§. 17.

Exstirpatio vero ipsa ex indole cancri, ejusdemque sede, gradu et ambitu vario modo perficitur.

- 1) Quando morbus formam scirrhi prae se fert, et tumor ad marginem labii

haerescit mobilis, vti in quacunque alia parte, enucleatur, in quo providendum, ne quidquam corrupti remaneat: summa diligentia omnes radices evellendae sunt. Hac encheiresi labium jacturam non facit. Quae vero methodus in tumore parvo neque nimis profunde penetrante, reliqua parte labii incolumi, modo congruit.

2) Quod si morbus jam in carcinoma degeneratus minorem majoremve labii partem occupet, omne corruptum binis incisionibus, ad latera tumoris aequalibus versus mentum in angulum ex ambitu vitiosi plus minus acutum coëuntibus includatur. Cum labia facillime protrahuntur, plus quam dodrans eorum excisi potest, et tamen reunio orarum plagae succedet.

§. 18.

Incisiones quam optime ope scalpelli perficiuntur, in hac operatione forfici longe praferendi. Forfice enim fere semper vulnus vexatur. Contusio vero eo major erit, quo fortius partes abscindendae repugnant. In adultis praesertim in maribus, vtpote in quibus cancer labii multo frequentior, propter barbam cutis valde solida non nisi compressione forficis ope solvi potest. In infantibus tenera cutis forfici multo minus repugnat, qua ex ratione in operatione labii leporini apud infantes instituenda forficem, in cancro labii scalpellum praferendum puto. Ad incisiones facilitandas easque rite aequales reddendas, labium sub lamella seu charta glutinata inter labium et gingivam interpolita rite tendatur primoque in uno tum altero latere tam oblique incindatur, quam pro ambitu et latitudine opus est. Binae incisiones accurate ejusdem longitudinis esse et in angulum coire debent. Haemorrhagia ex arteriis coronariis nata nunquam ligatura mihi opprimenda fuit. Aut sponte aut oris vulneris ad invicem adductis et compressis semper sedata est. Ligatura arteriarum reunioni vulneris obstaret. Quamvis in labio perfcindendo cuti omni modo parcendum sit, multo tamen majoris momenti est, ne quidquam corrupti aut suspecti remaneat, ex quo cancer facile resurgeret. Qua ex causa, carcinomate cum angulo oris ipso cohaerente, sectione transversa versus genas directa, angulus oris dilatetur, vt culter ad incisionem versus inferius perficiendam, qua cum incisione ab altero latere includatur, admoveri queat.

§. 19.

Vulneris orae futurae intortae post operationem labii leporini visitatae ope optime reuniuntur. Pro longitudine hiatus aut binae aut ternae acus trajiciuntur. In acubus transmittendis respiciatur, ut eae non per cutem solum, sed potius per totum labium trajiciantur, quod si negligitur, aut labia vulneris acu facile disrumpuntur, aut in superficie labii interiori non conglutinantur. Ceterum acus, praesertim majore labii parte excissa, sufficiente de margine vulneris distantia saltem trium linearum, perducantur. In adducendis vulneris oris animadvertisendum est, ut hae in suprema vulneris parte, nempe rubra, quam exactissime connectantur. Sutura nodosa ad conjungendas plagae oras a nonnullis commendata minus quam futura circumflexa adaptata est. Illa vero quandoque utaris, ubi acubus trajectis labia vulneris aut in prolabio aut in angulo inferiori non satis firmiter comprehenduntur. Multo etiam minus conjunctio fasciae quam dicunt reunientis ope succedit.

Vulneris labiis futurae circumflexae subfido connexis vix alio remedio, reunionem sustentante, opus est. Plurimis in casibus, quos tractavi, neque emplastra, neque fascias applicavi nisi cum orae plagae in interstitiis inter acus trajectas non satis coaptatae mihi viderentur, aut cum major labii pars excindi deberet. In illo inde casu interstitia nonnullis emplastris adhaesivi striis obtengenda, in hoc fasciam ad prolongandas et protrudendas genas applicandam putavi.

Acus ante sextum diem plerumque non educantur. Quas maturius aut tardius amovere rarissime conductit. In illo casu nondum vacillant, ideoque iis eductis aegroto absque necessitate dolor movetur; in hoc loca, in quibus acus repositae fuerunt, suppuratione nimis protracta deformantur et, quod etiam pejus, lacerantur atque cicatrice foeda obducuntur. Acubus justo tempore emissis, conglutinatio orarum vulneris striarum emplastris adhaesivi quarundam et fasciae reunientis ope sustentatur et facilitatur. Loca acubus afflita, si fortasse nimis diuturne suppurrant, balsamo peruviano aut balsamo commendatoris aut alio illitantur.

Conjunctione vulneris labiorum rite peracta, cicatrix vix notabilis neque vlla deformitas remanet. Haec igitur methodus, quantum res concedit, omni-

bus aliis anteponenda. Conglutationem orarum vulneris etiam tum succedere, quando labium in maximam partem abscissum fuerit, pluribus observationibus edoctus sum, e quibus sequentes, vt puto memoratu dignas, adjicio.

§. 20.

Medio in labio et quidem in ejusdem margine viri quinquagenarii sine causa cognita, tumor ab initio parvulus, durus, satis subito crescens, denique exulceratus et in tumorem fungosum et dolorificum immutatus natus erat, qui intra annum et dimidium eum ambitum idque volumen adsumferat, qualem in tabula adjecta Fig. I. depictum videmus. Tumor naturam cancri fungosi prorsus induerat, cuius superficies multis poris, e quibus ichor tenuis, acris, vrens, foetidissimus et fusci coloris transfudabat, obducta. In labii margine tumor sensim auctus se ita expanderat, vt non ab uno oris angulo ad alterum solum diffunderetur, sed etiam aliquot lineas ambos oris angulos excurreret, ita vt summa tumoris latitudo a-b duos pollices et decem lineas, minor amplitudo c-d totidem pollices et lineas quinque, summa vero altitudo e f pollicem et dimidium, maxima denique crassities pollicem et lineas quatuor in suprema parte, cui carcinoma labii adhaerebat, minima vero crassities in margine tumoris inferiori, qua cum labio non infidebat, quinque lineas aequaret. Ceterum superficies carcinomatis superabat ejusdem basin, cum tumor in toto suo ambitu labio non inhaereret, vti Fig. II. monstrat, quae superficiem carcinomatis interiorem, quacum modo in partem labio infidebat, adumbrat.

In utroque igitur latere nec minus in margine inferiori specilli ope subter tumore intrare eundemque attollere poteram. Qua in exploratione detegebatur, labium in oris angulo sinistro amplitudine linearum quatuor atque in dextro linearum fere trium adhuc incolume esse. Cum ex solertissimo examine prodiret, virum malo isto afflictum ceteroquin valetudine satis prospera gaudere, glandulas vicinas non tumidas, gingivam in maxilla inferiori integrum et coloris vegeti esse, spes mihi adfusfit, ope binarum incisionum in angulum coëuntium non solum carcinoma me ablaturum, sed etiam aegrotum absque deformitate salvum esse servaturum. Quod sic peregi.

Peripheria carcinomatis, specilli ope elevati, splenio oblongo circumdata, carcinoma ipsum, tum ad terminos corrupti exacte cognoscendas, tum ad locum,



cui culter admoveri possit, procreandum, de labio abduci jussi. Tunc in lamina e charta glutinosa confecta et oblonga, inter gingivam et labium inferius immissa, labio ab uno latere a ministro et ab altero latere a me ipso tenso, incisio obliqua defuper ad inferius in parte labii sana et quidem primo in sinistro latere perfecta est; id quod postmodum in latere dextro feci, ita, ut ambae incisiones in talem angulum, qualem Fig. II. a b c adumbratum conspicimus, coirent. Adspectu hiatus binis sectionibus suborti, negare non possum, me terrore percussum esse, dubitantem, fore, ut reunio vulneris orarum succedat. Vix enim quidquam de labio supererat. Sanguis ab utroque latere ex arteriis coronariis largiter profiluit. Genis a ministro ambabus manubus a tergo protrusis et oris vulneris a me ipso quam axactissime coaptatis, tres acus ad praecepta supra exposita trajeci, circa quas fila linea et cerata lege artis circumducta sunt. Sanguifluxus statim contactu vulneris labiorum cessavit. Tum vero ad evitandam rupturam vulnerum acubus natorum, ob nimiam tensionem labii valde metuendam, tum ad cutem magis magisque attrahendam, fasciam, emplastro inductam et a me in labio leporino commendatam¹⁾, nuchae imposui et extrema ejus in duas partes divisa et super vulnere decussata, attraxi. Os ita coarctatum fuit, ut prioribus diebus cibi et potus non nisi ope cochlearis minoris ingeri possent. In dies vero os magis dilatatum est. Aegrotus quidem dolorem tensivum sensit neque vero febris nec aliud symptoma notabile subsecuta est. Sexto die elapsi acus abstuli. Oris vulneribus satis firmiter conglutinatis emplastra et insuper fasciam reunientem ad sustentandam et promovendam conjunctionem per aliquot dies applicui. In abitu viri, die vigesimo primo infrequenti, vulnus prorsus cicatrice vix conspicua obductum fuit. Labium quidem ejusdem inferius paululum justo adstrictius maxillae inferiori innixum, sed os ita dilatatum erat, ut labium inferius illo tempore pollicem et quadrantem amplum esset. Eius et mandicatio absque ullo obstaculo procederunt. Pluribus mensibus praeterlapsis aegrotum denuo videre mihi contigit. Os ita amplificatum fuit, ut labii jacturam vix animadvertis.

§. 21.


Alteram observationem, pluribus ex nominibus, vti certe credo, memo-

¹⁾ Vid. libr.: *Anleitung zum chirurgischen Verbande* etc. p. 185.

ratu non indignam adjiciendam putavi, e qua item intelligitur, labium magnum substantiae suae jacturam facere posse et tamen conjunctionem vulneris feliciter succedere.

Mercenarius quidam ex oppido B. quadraginta novem annos natus, mensibus abhinc novem a tumore labii inferioris satis prope ab angulo oris dextro infestatus est. Nodus in dies ad magnitudinem juglandis auctus, dolorem acerbum, lacinantem et vrentem movit. A rustico quodam, chirurgiam faciente, varias jam res chirurgicas pessimas molito, inductus concederat, ut nodus excinderetur. Medicaster vero exscissionem tumoris novaculae ope anno millesimo septingentesimo nonagesimo octavo mense Januario perfecit, ita ut vulnus labii pollicem et dimidium dehisceret. Labia vulneris ter ope acus et fili linei consuere tentavit, sed semper vulneris labia mox post futuram factam disrupta et lacerata sunt. Tandem per oram vulneris sinistram filum robustius f. funiculum traduxit, ejusdemque extremum circa aurem dextram devincire studuit, quod, vti exspectandum erat, iterum successu caruit. Qui igitur cum nihil amplius sciret, quomodo vulneris labia reuniret, aegrotum cum responso dimisit, vulnus sponte sanatum iri. Aeger miserabilis orationi medicastrri etiam nunc confidens, per plures menses sanationem vulneris exspectavit. Tandem spe dejectus, labiis vulneris etiam magis diductis, saliva perpetuo effluente, deglutitione liquidorum aut impedita aut non nisi capite ad latus sinistrum inclinato possibili, me consulturus adiit. Hiatus labii inferioris non triangularis, sed semirotundus et tantae magnitudinis fuit, vt unciali (thalero) magno vix repletetur. Incisio lateris dextri in angulo oris ipso incepérat, ita, ut in hoc latere de labio nihil restaret. Margo hiatus inferior cum gingiva coaluerat et in toto marginis vulneris ambitu caro enata, cutis vero retracta fuit.

Malum igitur ipsum tanquam labium leporinum acquisitum confiderandum, eademque ratione tractandum nobis visum est. A. d. XI Maji ejusdem anni operationem sic institui: Primum labium a gingiva dissolvi. Deinde ad margines ipsas resecandas me accinxí. Quarum vero dextram, cum neque scalpellí, neque forfícis ope rescindere possem, dum nihil anguli oris dextri prominaret, in eo loco, quo angulus oris olim fuerat, genam tres quatuorve lineas in directione transversa incindere coactus sum. Quo facto forfícis curvatae adjumento oram hiatus dextram rescindere tentavi, quod vero nullo modo



propter solidiorem labii indolem successit. In lamina igitur e charta firma confecta, inter labium et gingivam subjecta, oram fissurae dextram resecavi. Quod lit argumento, cultrum in aetate provectionibus forfici longe esse praferendum. Oram hiatus sinistram eodem modo eodemque cultro abscedi. In oris vero hiatus resecandis provide curavi, ut binae sectiones quam exactissime in angulum coarent. Cum vero crura trianguli lateralia tatis longa essent, tres acus per oras vulneris trajiciendas putavi, quas filis lineis cera obductis solito more circumvolvi. Conjunction et conglutinatio vulneris labiorum eximie successit, quamvis labium propter jacturam ejus notabilem admodum tenderetur. Ut vero rapturna vulneris orarum evitaretur, ope fasciae emplastro obductae et supra jam memoratae genas antrorum propellere studui.

Aeger bene se habuit, nullumque aliud incommodum accusavit, quam quod tensionem quandam molestam sentiret. Triduo quidem febricula accessit, quae vero non nisi per aliquot horas duravit, et sudore miti finita est. Die sexto praeterlapso deligatione ablata acus eduxi. Labia vulneris egregie conglutinata et conjuncta fuerunt, non nisi ista loca, in quibus acus fitae fuerunt, et praesertim inferius, suppuraverunt. Vulnera rite pure purgato denuo strias emplastri adhaesivi et insuper fasciam reunientem applicui. In deligatione sequenti pus in dies diminutum, et sanatio intra dies duodecim peracta est. Omnis deformitas absuit, angulus oris dexter bene formatus. Pluries et etiam nuper mihi contigit videre virum narrantem, se semper bene habuisse.

§. 22.

5) In carcinomate non partem labii solum, sed etiam genas occupante extirpatio scalpelli ope etiam commendata est. Quo in casu ante omnia angulus oris in directione transversa eaque amplitudine, qua pro mali extensione opus sit, primo incindatur. Tum vero omni corrupto incisionibus binis, in angulum acutum coextintibus inclusa, vulneris labia, quantumcumque res concedat, suturae intortae ope reuniantur. Nisi vero in tali casu carcinoma basin nimis scirrhosam habet, applicatio remedii cosmici cultro omnino praferenda est.

§. 23.

4) Si vero totum labium ab uno oris angulo usque ad alterum et imprimis ejus

eius superficies interna carcinomate inquinata sit, nihil restat, quam ut chirurgus omne corruptum incisione arcuata auferat, spes vero reunionis abest. Labia vulneris splenio, spiritu vini diluto aut aqua saturnina imbuto obtegantur. Sanguifluxus ex arteriis coronariis spiritui vini imposito plerumque cedit, quod nisi fiat, arteriae majores diligandae sint. Si vero cultri subfido omne morbosum auferri nequeat, residua pars inquinata vel etiam suspecta ferro candente tangenda sit, aut medicamen causticum, ei destruendae par, adhibendum. Hac vero methodo foeda deformitas restat, dentes obtegi nequeunt, salivae effluxus, manducatio, deglutitio et loquela plus minusve impeditae remanebunt. Vulnus quidem satis subito quandoque consolidatur, remanente vero nonnunquam parte parva madida et decolori, quae applicationem aut remedii cosmici aut cultri poscit. Nonnulli quidem ad deformitatem minuendam fasciam reunientem, qua genae antrorum propellerentur, adhiberi praeceperunt, dubito autem, fore, ut fascia in hoc casu quidquam efficiatur. Haec igitur methodus quantumcunque res concedit ob varia incommoda in primis vero ob foedam deformitatem omittenda et aliis postponenda est.

§. 24.

Sequelae operationis variae sunt:

- 1) Labiis vulneris conjunctis et consolidatis homo per totam vitam incolmis evadit.
- 2) Vulnera cicatrice obducto post menses annosve morbus recrudescit et quidem vario modo. Plerumque aegroti aliquantis per dolorem vrentem in cicatrice sentiunt, brevi tunc in eadem indurationem quandam animadvertisentes, successive excoriatam et postea in vlcus immunitatam, quod naturam cancri induit. Interdum vlcéri aperiundo dolores dentium intollerabiles praeeunt. Nonnunquam quidem cicatrix non recrudescit, glandulae vero aut sublingualis aut submaxillares intumescunt et quidem ad magnitudinem notabilem, quibus in decursu mali varia incommoda, deglutitio impedita, respiratio difficultis et postremo febris lenta accedunt, quae aegrotum sensim sensimque consumit.
- 3) Vulneris quidem oris conjunctis pars vero cicatricis semper humida remanet, quae non coalescit, quocunque chirurgus agat. Postremo in

vclus cancrosum transit, quod quandoque medicamini **cosmico** cedit, quandoque vero et contra hoc remedium rebelle invenitur.

- 4) Aliquando in superficie labii interiori eo loco, vbi orae vulneris coiverunt aut etiam in loco paulo remotiori vulnus denuo dehiscit, quo vclus oritur, quod brevi iterum naturam carcinomatis adsumit.

Quandoque malum renascitur certis potentiis nocivis e. g. pressione, percussione, fricando et attactu dentis prominentis etc., interdum vero sine causa nota.

Nonnunquam apotherapia, constitutioni aegroti in universum, genio vero reproductionis, secretionis speciatim in cute adaptata, nec minus diaeta blanda et in carcinomate magnam sanie copiam profundaente, viceribus artificialibus in loco vicino aut jam ante aut post operationem excitatis et diu post excisionem servatis, impediri potest, quo minus morbus recrudescat.

§. 25.

II. *De vfu medicamentorum interne et externe applicandorum.*

Sicut plurima medicamina interna et externa ad debellandum cancrum in universum laudata sunt; ita etiam medicamenta non defuerunt, quae contra cancrum labii interne et externe commendata sunt. In quibus vero casibus cancer labii medicamentis internis et externis sanari possit, ex sequentibus apparebit:

- 1) Ante omnia diligentissimo examine indagandum est, num causa quaedam cognita ad cancri generationem quidquam contulerit; vti lues venerea, scrophulae, scorbutus, arthritis, exanthemata suppressa, perversa cutis secrecio etc. Si res ita se habet, remedia genio horum morborum adornata pro constitutione subjecti administrentur, necesse est. Experientia enim docuit, cancerum interdum vfu mercurialium, in aliis casibus vfu cicutae, digitalis purpureae, belladonnae etc. sanatum esse. Quandoque vero morbi dicti non vt momenta causalia accusandi, sed potius ceu diatheses, quae uno eodemque tempore cum cancro adsunt, existimandi sunt, quae eundem alunt, ejusque extirpationem impediunt. Hoc in casu morbi isti omnino, si fieri potest, removendi sunt. Quodsi vero his remotis, cancer immutabilis remaneat, extirpatio, constitutione ceteroquin fana, suscipi potest, quae non raro succedit.

2) Quando carcinoma longe progressum et tam late propagatum est, vt pro morbo locali haudquaquam judicandum sit; tum remedia localia ad malum debellandum minime sufficiunt, vtpote extirpatio cultri et caustici adjumento, sed potius remedia, interne et externe simul adhibenda, et procreationi miasmatis cancerosi compescendae et prorsus amovendae paria requiruntur. Remedia vero interna ea vi et virtute gaudere debent, vt, in totum systema lymphaticum et glandulosum praecipue agentia, aut decompositionem aut saltem alterationem miasmatis efficiant. Remedia externa, in carcinomate ipso collocata, corruptum et morbosum destruant, quod vi vitali, remediis internis aucta, non semper fieri potest. Sequentibus igitur in casibus in carcinomate labii sanando remedia interna et externa indicata mihi visa sunt:

- a) quando extirpatio opportuno tempore non suscepta et malum nimis diurne fibi relictum fuit, ita, vt virus cancerosum non solo in labio reideat, sed etiam ad glandulas vicinas transierit, e. gr. quando glandulae sublinguales et submaxillares aut etiam glandulae in genis aut in collo fitae tumidae et induratae sunt.
- b) Quando, carcinomate per cultrum aut causticum extirpato, morbus recrudescit atque signa, virus ultra locum affectum propagatum esse, se manifestant. Sane casus occurunt, vbi ferrum aut causticum non ea ratione et curā, qua par est, adhibitum fuit v. c. vbi cultro non omne corruptum vel etiam suspectum ablatum, aut vbi causticum non satis profunde in locum affectum penetravit neque omne morbosum destruxit, sed potius seminum morbi remansit. In hoc casu iteratus cultri aut caustici usus etiam nunc prodesse potest.
- c) Quando carcinoma eum ambitum attigit, vt chirurgus neque cultrum neque causticum ob gravia symptomata metuenda admovere audeat, v. c. cum non labium totum solum ab uno ad alterum angulum et ad mentum inquinatum, sed etiam in maximam genae partem extensem fit.
- d) Quando aeger ferrum et causticum recusat.

§. 26.

Multa *remedia interna* ad finem obtainendum laudata et adhibita sunt:

- 1) Mercurialia, in primis mercurius dulcis et sublimatus. Huncce MARRYAT¹⁾) hac ratione applicatum valde laudat: Rx Mercur. sublimat. corrosivi grana decem, spiritus salis guttas decem, solv. in Naphtha nitri vnc. j. M. D. S. matutino et vespertino tempore guttae viginti sumantur. Externe paululo mercurii sublimati ulceri insperso vnguentum ex pice liquida cum calomela mixtum imponatur. Praeterea mercurialia in cancro auferendo ab AKENSIKE, GOOCHE et aliis maximopere praedicata sunt.
- 2) Narcotica v. c. radix et herba belladonnae, herba cicutae, digitalis purpur. aconiti, aqua Lauro - Cerasi etc. Belladonnam in scirrho prae caeteris efficacem esse plures testati sunt. Radicis belladonnae granaria ad sex pro dosi, herbae vero ejusdem medicaminis grana quinque ad decem, extracti denique gr. vnum ad quatuor sumantur. Cicuta in scirrho et cancro potissimum a STOERK, deinde a LETTSOM, QUARIN etc. multis laudibus elata, ab aliis vero ejus efficacia denegata est v. c. a SCHMUCKER, DE HAEN etc. Herbae cicutae grana tria ad decem, extracti vero ex herba parati granum vnum ad grana tria porrigantur. Ex herba cicutae fomenta confecta ulceri imponuntur. Omnis cicutae efficacia minime negari potest, dolores ea mitigantur et suppuration melior redditur, quod vero ad sanationem mali plenariam minime sufficit. Maximam efficaciam tum cicuta tum digitalis purpurea pr. dosi granorum duorum ad quinque praebet, ubi diathesis scrophulosa adest.
- 3) Succus recenter expressus *Onopordi acanthii*²⁾ multis abhinc annis in labii cancro in usum ductus est interne ad cochleare cibarium sumtus, externe linamenta carpta eodem impregnata ulceri imposita. Recentioribus temporibus a RICHTER admodum laudatus.

Ex remediis contra cancerum, modo externe adhibitis, haec sunt praecipua :

- 1) *Sedum vermiculare* cum flore luteo multis probatum est. Herba hujus medicaminis ad pulverem contusa ulceris conspergatur; succus recenter expressus eodem modo applicari potest.
- 2) *Succus gastricus* animalium ruminantium ut in aliis ulceribus rebellibus

¹⁾ MARRYATS *Handbuch der praktischen Arzneykunst*. Leipzig 1793.

²⁾ Vid. GOELICKE diss. de onopordo carcinomatis averrunco Francof. ad Viadr. 1739.

sic etiam in cancrofis commendatus nec sine fruge in iisdem minoribus adhibitus.

- 3) *Pix liquida* in primis laudabilis ad mitigandos in vlceribus cancrofis dolores.
- 4) *Cataplasma e daucis Carottae paratum multum adfert ad vlcus purificandum, odoremque sanie corrigendum, nec non ad levandos dolores, neutquam vero ad vlcus radicitus sanandum.*
- 5) *Spiritus Salis ammoniaci causticus sufficiente aquae aut decocti chinae quantitate dilutus a MARTINET¹⁾ summis laudibus elatus est. VAN WY spiritum salis ammoniaci causticum cum melle rofarum mixtum in cancro labii fausto eventu expertus est.*
- 6) *BERNHARDT²⁾ spiritum nitri ita adhibuit, vt spiritui tantum aquae adfunderet, ne vllus acidi fapor supereffet.*
- 7) *Carbo pulverisatus vlceri inspersus a BEDDOES et aliis, nuperrime a RUST³⁾ ad mitigandos dolores commendatus hac praescriptione. Rx. Vnguenti de styrace, pulveris carbonum ligni tiliae alcoholisat. aa unciam j., Camphor. myrrhae aa drachmam vnam vel duas, olei terebinthin. q. s. vt fiat unguentum.*

§. 27.

Minime quidem negare velim, vnum alterumve horum medicaminum in singulis scirrhi et cancri casibus vim aliquam exferuisse, quamvis contendere possum, me de omnibus his medicamentis, iterata vice adhibitis et satis diu continuatis praecipuam utilitatem, dum cancer naturam vlceris induerat, non observasse. Itaque admodum optabile est, vt nobis remedium innotescat, quod carcinoma tutius et securius compescere valeat, quam remediis hucusque notis factum est. Arsenicum igitur, vti jam supra dictum est, vi et efficacia, miasma cancrosum decomponendi aut immutandi, simulatque virus ad plures glandulas propagatum sit, pollere putamus. Ut quaeque calx metallica, ita etiam Arsenicum vim praecipue in sytema vasorum et glandularum absorbentium

¹⁾ Vid. *Sammlungen auserlesener Abhandlungen zum Gebr. f. pr. Ärzte.* Vol. 6.

²⁾ Vid. ej. *chemische Versuche und Erfahrungen.*

³⁾ Vid. *Heilkologie oder über die Natur, Erkenntniss und Heilung der Geschwüre* 1811. Vol. II. p. 123.

et secernentium exferere mihi videtur. Arsenici vero effectus multo vehementiores et penetrabiliores sunt, quam aliarum calcium metallicarum, ideoque vi pollet, pertinacissimum omnium morborum in systemate glandulari obviorum, utpote cancrum, compescendi illamque actionem organico-chemicam, a qua cancer profectus est, tollendi. Non ignoro, minime novum et inauditum esse, arsenici virtutes in cancro laudare¹⁾). Nam me non fugit, illud quidem remedium in antiquioribus et recentioribus temporibus a permultis externe adhibitum, sed modo a paucis interne tentatum fuisse, ut a LE FEBURE²⁾, JUSTAMOND³⁾, ADAIR⁴⁾, et nuperrime a RUST⁵⁾). Tanta vero sunt, quae non solum proposita in re medica, sed etiam in singulis casibus adhibita sunt, e quibus vero nihil certi prodiit. Sic etiam de usu arsenici praesertim interno multum disputatum est. Plurimi enim fuerunt, qui hoc remedium in cancro plane repudiaverunt et illi effectus nocivos attribuerunt, ut THILENIUS⁶⁾, PYL⁷⁾, PEYRILHE⁸⁾ et alii. Operae igitur pretium est, ad illud denuo redire. Itaque artis peritos invitandos esse putamus, hoc remedium in cancro, contra omnia alia remedia hucusque cognita, quando propagatus et disseminatum est, rebelli, accurate et provide experiri. Duobus abhinc annis de vi et virtute Arsenici in cancro sanando pluribus in casibus periculum feci. Ex observatione in fine adjecta, ut puto, prodibit, efficaciam in carcinomate debellando non parvi aestimandam esse. Dubitatio, arsenicum, fortissimum venenum, minime in materia medica admittendum esse, nullius momenti amplius esse potest. Si hoc argumentum valeret, medicamina efficacissima releganda essent. Arsenicum autem multos osores et adversarios habuisse, facile explicari potest. Plurimi enim desideraverunt, ut illud in iis casibus opem ferat, in quibus omne au-

¹⁾ Prae ceteris summis laudibus tollendus est HARLES, qui in peculiari libri: de usu Arsenici in medicina. Norimberg. 1811. vires arsenici in morbis diversis, ea doctrina, qua pollere solet, exposuit.

²⁾ Vid. ej. lib.: Remède éprouvé pour guérir radicalement le cancer. Paris 1775.

³⁾ Vid. ej. libr. jam supra cit. et: Auserlesene Abhandl. für pr. Ärzte T. XII. p. 434.

⁴⁾ Vid. DUNCAN's medical Commentaries T. IX.

⁵⁾ Helkologie etc. T. II. p. 100.

⁶⁾ Vid. RICHTERI Chirurg. Bibliothek Tom. V. p. 538.

⁷⁾ Neues Magazin für die gerichtl. Arzneywissenschaft. V. I.

⁸⁾ Dissert. acad. sur le Cancer etc. Paris 1773.

xilium vanum et irritum est, ut in cachexia completa, in prostratione et exhaustione virium nimia etc. Quemadmodum mercurius, remedium contra luem venereum specificum cognitum, non omnes syphilide affectos sanat, ita arsenicum etiam non omnibus carcinomate inquinatis medebitur. Accedit, ut plures medici recentiores eo perperam et in dosi nimis larga usi sint. Egomet ipse vidi, arsenicum contra carcinoma mammae dosibus immensis ab aliis adhibitum non solum nullos, sed potius nocivos effectus profulisse. Luculenter vero apparuit, effectus nocivos a dosibus nimis largis subortas esse. Num arsenicum carcinomati mammae debellando par sit, mihi non videtur, sed multo magis mihi sit credibile, arsenicum nonnisi viribus ad carcinoma in glandulis lymphaticis et subcutaneis obuium compescendum pollere. Experimenta de hac re satis diu continuata rem dijudicabunt. Quod ad me attinet, arsenico non nisi in cancro labii, narium et faciei usus sum. Occasionem vero datam, hoc remedium in cancro utriusque tam frequenti experiundi non omittam.

§. 28.

Arsenicum ex supra dictis in cancro labii et faciei indicatum existim, quando malum non amplius locale suspicamur, ideoque ab extirpatione nihil sperari potest. Si vero arsenicum in cancro ut profit volumus, opus est:

- 1) Ut vires aegroti ita comparatae sint, ut constitutio hominis remedium, tali efficacia praeditum, possit perferre. Febris igitur lenta, praecipue vero omnes colliquationes ablint. Attamen vero solertissime inquirendum est, num forte febris non nisi symptoma ichoris resorpti fit, quo in casu arsenicum non contraindicatum est.
- 2) Ne cancer cum lue venerea aut scrophulis, scorbuto etc. complicatus sit, quod si accidit, morbi isti antea remediis adaptatis, quantum res concedit, removendi sint.
- 3) Vis reproductua ne nimis diminuta sit, habitus igitur cachecticus absit.
- 4) Sub usu arsenici interno unus ex externus non negligatur. Administratione enim externa omne morbosum et corruptum destrui, interna vero causa morbi ipsa, e qua carcinoma natum, aboliri debet. Vtraque remedium adhibendi methodus vicissim se tueatur necessum est.
- 5) Ab initio arsenicum dosi refracta porrigatur, quae modo sensim augeatur. In definienda tamen arsenici dosi respicienda est constitutio corporis in uni-

versum, tum vero singulorum organorum praefertim digestioni inservientium conditio, nec minus ferendi ejus facultas, in variis hominibus longe diversa. Quo irritabilior aegroti constitutio, eo cautor in stabilienda arsenici dosi fit medicus. A plurima hominum parte arsenicum perfertur in dosi partis grani decimae octavae usque ad sedecimam. Temporis decursu medicus ad maiores doses caute ascendere potest ad partem grani decimam quartam aut duodecimam aut decimam.

- 6) Uſus arſenici per ſatis longum temporis ſpatium continuatur. Praecepta in adminiſtrando arſenico fere eadem, quae in uſu mercurii in lue venerea refractaria ſequimur. Effectus hujus remedii ſalutares quandoque ſatis mature ſe maniſtant, ſed modo tardius augentur, ita, ut non raro plures menses ad fanationem plenariam requirantur.
- 7) In porrigendo arſenico imprimis virium vitalium ratio habenda eſt, ideoque per alia remedia congrua arſenici efficacia fuſtentetur. Plerumque arſenicum organis digestioni inservientibus aliquam infert moleſtiam, quod eluet ex appetitu languido, diminuto aut perdiſto. Quo in caſu juxta arſenicum medicamina amara, aromatica, ut Cortices aurantiorum, Quassia, China in uſum ducantur, ut organa digestionis excitentur earumque functio reſtituatur. In ſubjectis inſigni irritabilitate praeditis, admodum ſalutare eſt arſenico laudanum jungere, ſimulatque vero ſymptomata nociva ſe maniſtant utpote vomititio, vomitus, anorexia et dyspepsia etc., doſis di- minuatur aut uſus arſenici per aliquot dies omittatur. Interdum frugi eſt, remedium alvo ciendae interponere.
- 8) Ut viſ arſenici corroſiva, quantum res concedit, mitigetur recentioribus temporibus alcalina cum arſenico mixta adminiſtrata ſunt. BRERA nimirum arſenico cali carbonicum, hujus vero loco HARLES ſodam carbonicam, adjunxit hac ratione: B. Arſenici alb. drachmam dimidiā, Aquae comm. ſtillaticiae Uncias ſex. M. digerantur vase vitreo clauſo in balneo arenae justi caloris ope per horas ſex, tum adde Soda carbonicae purae drachmam dimidiā antea ſolutae in Aquae Cinamomi ſimpl. Unciis duabus, M. digerantur denuo per aliquot horas in loco temperato. Hac ſolutione bis ter- ve quotidie ad guttas 8 — 10 — 15 uſimur.

Dantur etiam aliae praefcriptiones et modi, arſenicum in corpus inge- rendi. Solutionem vero arſenicalē aliis formulis, ut pilulis, pulveri etc. longe proferendam atque multo tutiorem puto.

9) Ante omnia in vsu arsenici *victus* ratio habenda est. In vniversum ab aegroto in victu modus servetur. Tum omnia esculenta et potulenta, quae organis digestioni inservientibus molestiam possunt adferre, diligenter evitanda sunt. *Victus animalis* magis conducit, quam vegetabilis. Juscula e carne elixa, caro assata, lac etc. nec minus e vegetabilibus mucilaginosa et gelatinosa, vti oryza, lago, salep, hordeum decorticatum etc. prae ceteris commendabilia. Praesertim vero omnia acida, ne vis arsenici corrosiva acuatur, ex professo fugienda sunt.

§. 29.

Ex pluribus observationibus cum arsenico in cancro tractando a me institutis, tantum vnam, ne opusculum fines transgrediantur, adjiciendam putavi, quae, ni fallor, efficaciam arsenici in cancro labii sanando luculenter demonstrabit.

Vir quidam, quadraginta annos natus, caupo et lanius, constitutione satis robusta praeditus, valetudine semper prospera gavisus, nullo hucusque vexatus morbo, mense Mayo anni millesimi octingentesimi septimi, fine causa cognita, in margine labii inferioris nodulum magnitudinis grani milii, quatuor fere lineas ab angulo oris dextro remotum, coloris subrubicundi intra sex septimanas ad magnitudinem pisi auctum, duriusculum et lividum, minime dolorificum senxit. Versus finem Junii ejusdem anni nodulo ad magnitudinem fabae surrecto, a chirурgo quodam, naturam mali haudquaquam cognoscente, cataplasma e melle et farina confectum imponere jussus est. Triduo vix elapo superficies excoriata et postremo fissura tumoris, ad superficiem labii externam descendens, orta est. Deinde fissura crusta fusca, post aliquot dies resoluta, semper vero regenerata, obiecta est.

Variis remediis sine fruge adhibitis tumor exulceratus sensimque auctus et usque ad angulum oris extensus a. ~~cccccccix~~ mense Junio a chirурgo quodam ita abscissus est, vt terua vice intra triduum extirpationem suscipieret, cum post quamque excisionem noduli duri observarentur. Quotiescumque culter admotus fuit, vulnus, solutione caustica lavatum, aegroto dolorem acerbissimum movit. Septimanis quatuor praeterlapsis, vulnus tandem sanatum est. Per spatium trimestre aegrotus bene valuit. Ineunte vero mense Octobri aegrotus in superficie labii interna ope linguae tumorem parvum, brevi ad magnitudinem nucis avellanae auctum, nec minus paulo post in superficie labii exteriori conspicuum animadvertis. Denique tumor, dolore vrente et pungente orto, ver-




Ius finem ejusdem anni tres lineas a parte labii rubra remotus in eodem loco, quo fissura antea fuerat, apertus est. Ex ruptura materies spissior, miliaria, fere glareosa exiit. Ab hoc tempore, ulceratione in dies aucta, vleus indolem malignam induit, latius semper se extendens usque ad oris angulum, faniem tenuem, acrem fundens. Mense Januario a. ccccix. post pilulas, a vetula quadam ei ordinatas, sine dubio e draisticis purgantibus paratas, quindecies vomuit et tricies immani cum dolore et subsequente abdominalis inflatione alvum exoneravit, quo obstructio alvi per tredecim dies et ischuria per quinque dies continuata, dolores artuum inferiorum graves et tanta virium prostratio cum delirio sequuti sunt, ut ad corpus reficiendum sex hebdomadibus opus haberet. Vlcus labii ab angulo oris usque fere ad mentum et ad genam dextram propagatum erat. In eo loco, quo originem duxerat, labium ad longitudinem pollicis et quadrantis penitus destructum et laceratum fuit, ita, ut hiatus subortus esset. Margines hujus rimae excrescentiis nodosis in primis in vicinia anguli oris obseffae, inversae, inaequales ac quasi corrosae et lividae. In medio genae dextrae tumor notabilis, latus ulceris dextrum circumdans et praeterea induratio per totam genam dextram diffusa detegenda erat. Aeger dolore vrente, lancinante, saepius sensu formicationis alterante cum sensatione ac si acus candentes per vlcus trajicerentur, vexatus est. Sanies acris, sanguinolenta, foetoreque specifico intolerabilis effluxit. Ceterum vlcus tam dolorificum fuit, ut tactum lenissimum non perferret. Saliva continuo e rima profluit, atque maxilla inferior vix moveri potuit. Esculenta fluida et potulenta non nisi capite ad latus sinistrum inclinato, et quidem modo membratim haurire potuit, quod nisi observaret, omnia per os refluxerunt. Appetitus depravatus, vires diminutae et prostratae, corpus emaciatum. Glandula submaxillaris lateris dextri valde tumida et indurata.

Exeunte Majo a. ccccix. me consultum venit. E permultis cancris, quos, in variis corporis partibus obvios observare mihi contigit, vix ullus fuit, qui talem aspectum horrendum praebuisset. Hoc malum naturae cancerosae fuisse vix quispiam dubitabit. Sive mali ortum, sive ejus decursum, sive phænomena ulceris praesentia respicias, ex omnibus apparebit, quod malum istud carcinoma fuerit, quod equidem non amplius labio soli haerebat, sed cuius virus jam resorptum et ad glandulas vicinas translatum fuit. Ingenue confiteor, me ne minima quidem spe aegroti restituendi sustentatum fuisse. Spes hujus carcinomatis aut cultri aut caustici ope extirpandi vana fuisset. Cum aeger mi-

—oo—
 ferrimus me suppliciter rogaret, vt omnia, si vspiam fieri posset, tentarem, quaecunque ad restitutionem ipsius conferri possent, mihi in mentem venit, in hoc easu arsenico interne et externe vti, quod me neutiquam poenituit. Eventus enim exspectationem mean longe superavit. Nam speraveram, fore, vt quidem vsu arsenici carcinoma in melius mutaretur, nunquam vero putaveram, vlcus radicitus arsenico sanatum iri.

Cum vero aegrotus a Jena satis longinque habitaret, curam ejus medico aegroto vicino committendam putavi. Arsenicum vero sequenti modo praescripsi: interne solutionis antipyreticae ex praecriptione BRERAE supra memorata aegro quotidie ter sex guttas usque ad octo fumeret, et quotidie ad guttam unam dofin augeret, jussi. Externe carcinoma sequenti solutione: Rx. Arsenici albi gr. ij. solv. in ▽ stillatit. Unc. v. bis lavari, et hoc vnguentum: Rx. Vnguent. Pomat. vnciam j. & Cosmici scrupulum j. M. D. excrescentiis carneis imponi praecepi. Ceterum omnia praecepta de administratione arsenici interna et externa, de victus ratione, de regimine etc. necessaria cum medico communicavi. Cum dosis ad guttas sedecim aucta esset, aeger calorem auctum atque suavitatem quandam per totum corpus diffusam sensit. Cum vero dosis ulterius et quidem ad guttas viginti quatuor augeretur, debilitas notabilis aegrotum invasit, ita vt ad dofin gutterum sedecim, atque postea etiam ad minorem redire coactus esset. Diebus viginti elapfis e litteris a medico ad me datis compertus sum, quod malum in melius conspicuo immutatum se praeberet; nimirum induratio genae et tumor diminutus, excrescentiae in vlcere minores, foetor faniei, sensibilitas ideoque dolores imminuti se ostenderunt. Ex vlceris excrescentiis, inprimis in superficie labii interiori sitis, saepius sanguis cum emolumento profluit. Excrescentiae ipsae in continuato arsenici vsu et interno et externo in dies decrescebant, margines vero vlceris planiores et aequaliores. Vires sensim tenuissime auctae, appetitus ciborum reversus, et in universum omnia meliora se monstrarunt, ita vt exeunte Septembri color labii et vlceris lividus disparuerit, margines hiatus carne sana obductae, hiatusque ipse labii multo minor meliorisque indolis esset. Habitus corporis externus multo laetior, aeger ipse spei plenus fuit. Per autumnum et hiemem vfuscus arsenici, dolii vero ad guttas octo diminuta, quandoque per aliquod dies interruptus, usque ad ver a. ccccxxxi continuatus est. Ineunte mense Majo medicus hisce verbis mihi scripsit: „Carcinoma labii aegroti nostri ita imminutum est, vt jam septimanis abhinc aliquot fine tegumento labii in conspectu hominum versari queat. Etsi tumor



in gena dextra et induratio glandulae submaxillaris admodum diminutus est, tamen aegrotus de intumescientia harum partium continuata, caeteroquin sine villa molestia et dolore, pertimescit, ne morbus recrudefcat. Dofin guttarum octo solutionis arsenici superare illi non licuit. Ceterum valetudine prospera gaudet, omniaque, quae ei obsunt, alacritate peragit." — Itaque istas partes induratas, vt magis magisque resloverentur, solutione ex arsenico albo parata ter pro die lavare jussi, quo factum est, vt tumores pededentim diminuerentur, ita, vt, cum aegrotum exeunte Junio viderem, vix villa nodulorum vestigia detegi potuissent. Vlcus tam egregie consolidatum fuit, vt locus prope angulum oris dextrum, vbi hiatus carcinomate subortus fuerat, paulum depreffior conspiceretur. Aegrotum cum praescripto dimisi, vt per aliquot hebdomas arsenico vti pergeret. Serius compertus sum, quod omnes glandularum indurations penitus dispauiſſent et aeger bene se haberet. Itaque carcinoma intra menses quatuordecim sanatum est.

Ex morbi historia hic tradita luculenter patet, quod aegrotus carcinomate comprehensus solo arsenici vsu sanatus fuerit. Nullo enim remedio alio, a quo effectus salutares derivare potes, aeger vſus est. Itaque haec historia mea ex sententia pro documento efficaciae arsenici eximiae in cancro omnino censenda est. Arsenicum interne et externe simul adhibui. Vſus quidem externus administrationem arsenici internam fine dubio adjuvavit et in vlcere ipſo mutationes salutares protulit. Attamen vero in hoc carcinomate sanato maxima efficacia in vſu arsenici interno, vti mihi videtur, quaerenda est, cum omnia symptomata valetudinis adversae, vti prostratio virium, habitus cachecticus, appetitus imminutus etc. post administrationem arsenici senilim ablata sunt. Glandulae tumidae vſui remedii interno diutissime reluctantae sunt, quod inde profectum est, vt in illis glandulis tumidis virus carcinomatofum praeципue resideret, quod vi arsenici modo pededentim extinctum est. Itaque ſpatio temporis fatis longo ad sanationem cancri plenariam opus habes. Alia, quae adhuc consideranda et perpendenda nobis effent, ex industria omittimus. Nobis sufficit, demonstraviffe, in arsenico rite adhibito contra cancerum jam vterius in corpore propagatum auxilium tutum paratum esse.

Fig. I.




Fig. II.

