

**De fracto corpore humeri : theses anatomico-chirurgicae, quas, Deo  
juvante & praeside M. Carolo Devilliers ... / tueri conabitur Ludovicus  
Girard.**

### **Contributors**

Girard, Louis.  
Devilliers, Charles.  
Royal College of Surgeons of England

### **Publication/Creation**

Parisiis : Typis Lambert, 1782.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/krjmzeca>

### **Provider**

Royal College of Surgeons

### **License and attribution**

This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

DE  
FRACTO CORPORE HUMERI  
*THESES*  
ANATOMICO-CHIRURGICÆ,  
*Quas, Deo juvante & Præside M. CAROLO  
DEVILLIERS, Scholarum Moderatore, tueri  
conabitur LUDOVICUS GIRARD, Parisiensis,  
Artium Liberalium præclaræ Universitatis Parisiensis  
Magister, & AUGUSTISSIMI PRINCIPIS ATRE-  
BATUM COMITIS, FRATRIS REGIS, Chirurgus  
trimestris.*

*Die 24<sup>a</sup> Augusti, anno Salutis 1782, à sesqui-secundâ  
post meridiem ad septimam.*

IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS,  
PRO ACTU PUBLICO  
ET  
SOLEMNI COOPTATIONE.



*P A R I S I I S ,*

Typis LAMBERT, Regii Chirurgiæ Collegii necnon Academiæ  
Typographi, viâ Cithareâ.

---

*M D C C L X X X I I .*

DE

HRACTO CORPORE HUMERI

T E S S E

ANATOMICO-CHIRURGICAE

62, 1700 Januarii 8. Parisie M. Cakrozo  
Davitianus, Separatus Motiones, nisi  
conspicuum Tumoribus Girard, Parfet  
quidam Divisimam tumorem Viscerum Pancreatis  
M. 1700 Januarii 10. Parisie M. Cakrozo, Compt  
migrans

Dni 17. Aprilis, anno 1700, a 16.00-17.00  
hunc mortuum in Aula

IN RECIUS CHIRURGONIS SCHOLIS,  
PRO ACTU PUBLICO

ET

SOLEMNI CO-STATIO NI



PARISIENSIS

1700 Januarii 17. Leon Chirurgie Galliacoze Academia  
Tiboropoliensis Chirurgi

DECIMI



D. O. M.

DE

## FRACTO CORPORE HUMERI.

THESES

ANATOMICO-CHIRURGICÆ.

OSSA, et si cæteris partibus microcosmi solidiora, plurimis tamen morbis obnoxia sunt; queis solutâ eorum integritate, solvuntur etiam, aut quâm maximè læduntur variae functiones partium quibus fulcrum erant. Sic quidem evenit de Humeri fracturâ, de quâ privatim dicturi sumus in hoc Programmate; præmissis ex Anatomia quæcumque ad hanc quæstionem nobis spectare videntur.

A ij

## EX ANATOMIA.

## I.

**B R A C H I U M** pars ea est quæ scapulam & cubiti flexuram intercedit. Conflatur ex unico osse, multis musculis, nervis & vasibus sanguiferis, necnon variis membranis & ligamentis, quæ omnia multiplici textu cellulari adjecta, tegumentis communibus involvuntur.

## I I.

**H U M E R U S** vocatur os illud teres, brachii fulcimentum, quod cum scapulâ & ossibus cubiti connectitur. Substantia ejus, eadem ac in aliis ossibus teretibus, triplex occurrit; compacta scilicet, reticularis & spongiosa. In corpus & extrema dividitur.

## I I I.

**C O R P U S** intùs excavatum, ob medullam in ipso contentam, extùs non eamdem figuram refert. In ipso quidem distingui possunt duæ partes; una nempe superior, ferè cylindrica, plurimis asperitatibus hirsuta; alia inferior, tota levis, ad triangularem formam accedens, in quâ proindè tres facies, & totidem anguli conspici possunt.

## I V.

**E X** extremis Humeri aliud superius, aliud inferius est. Superior rotundum & inferiore crassius est. Tres in eo partes præcipuae considerantur; una nempē interna & duabus aliis excelsior, instar tridentis sphæræ, caput Humeri. Alia-externa, rudit, quæ a fulco quodam visibili dividitur in duas partes, quarum una major & exterior triplici facieculâ, alia verò minor & anterior, unicâ tantùm complanatur. Tertia tandem istis intermedia, quam collum dixerunt.

## V.

**I N F E R I U S** extremum Humeri superiore tenuius & complanatus est. Conformatur adinstar duplicitis trochleæ. In eo distinguenda sunt. 1°. Duo sulci triaque capitula, quorum ope cum ossibus cubiti convenit Humerus. 28. Duæ cavitates, quarum

posterior Olecraniū , & anterior Apophysim coronoïdem , ulnæ processus , excipit . 3° . Duo tubercula sive condyli , quorum internus eminentior flexoribus , externus verò minor extensoribus carpi musculis insertionem præbet . 4° . Duæ etiam lineæ , quæ spinæ seu cristæ dicuntur , ex utroque condylo ad medium usque partem faciei posterioris Humeri decurrentes .

## V I.

J U X T A condylos & lineas ex eis prodeuntes , necnon circā partes quas collum & tubercula diximus , variæ deprehenduntur parvulæ rimæ & asperitates , quibus inhærent membranæ & ligamenta utriusque articulationis . Inibi etiam sat manifestè patent plurima foraminula , quæ permeant nervi & vasa sanguifera , ad ossis & medullæ nutrimentum .

## V I I.

S I C disposita videtur ossea congeries Humeri , ut ipse contortus appareat in medio suī corporis , & ejus extremitates in inverso sensu converti dicerentur . Id etiam quoad perfectissimam illius ossis fracti conformationem restituendam sedulò animadvertemendum est , quòd sic inter se aduersentur eadem extremitates , ut condylus internus medio capitīs , & externus summo magni tuberculi directè submittatur .

Super Humerum expanduntur musculi *deltoides* , *biceps* , *coracobrachialis* , *triplex extensor* , & *brachialis internus* . In ipso tantum inseruntur , *magnus Pectoralis* , *latissimus dorsi* , *teres major* , *suprà spinatus* , *infrà spinatus* , *teres minor* & *sub scapularis* . His etiam addi possunt *supinatores longus* & *brevis* , *pronator rotundus* , *parvus Anconæus* , necnon *flexores* & *extensores carpi* ; isti verò nihil , aut parum faciunt quoad fracturam de qua nunc est .

## V I I I.

N E R V O S & vasa sanguifera toti Brachio suppeditat truncus axillaris , ex quo orditur arteria Brachialis ad latus internum , & partem usquè humeri propè inferiorem prorepens , unde fit anterior ut cubiti flexuram ineat .

## EX CHIRURGIA.

## I.

HUMERUS gracilior est in media corporis sui parte, & in inferiori complanatior. Nec mirum indè si facilius & frequentius ibi frangatur. Tot tamen in partibus fracturam experiri potest quot in omni ejus longitudine dantur. Hic verò, paginæ brevitatis causâ, non agitur nisi de illa quæ fit in ipso ejus corpore. Ad hoc autem nobis sufficiat exposuisse hujus morbi causas, species, accidentia, diagnosim, prognosim, & curationem.

## I I.

**C A U S E** vel internæ sunt vel externæ.

Internæ nonnisi tanquam prædisponentes habentur, sicque sunt caries in osse, siccitas ejus, mollities, intumescentia, &c.

Externæ verè sunt efficientes; veluti, lapsus, ictus, violenti nisus, & impulsio corporum e sclopetis.

## I I I.

**D I F F E R E N T I A E** recenseri possunt quoad situm, formam, essentiam, & extremitatum fractarum dimotionem.

1º. In parte media, superiore vel inferiore, frangi potest Humeri corpus.

2º. Hoc fit transversim vel oblique, vel in modum unguis aut tibiæ rostri, vel frustillatim.

3º. Simplex, sive composita, sive complicata dicitur. Simplex, si sola reperiatur, & nihil obstet ejus coalitioni. Composita, si duobus aut pluribus in locis osse fracto, nihil impediat quin coadunetur & coalescat. Complicata si ejusdem coalitioni datur obstaculum quodlibet sit. Hæc autem fractura ab ipsamet ejus causâ & corporibus extraneis cum illâ propulsis, vel aliquo morbo, vel accidentibus complicari potest.

4º. Aliquoties transversim ita frangitur Humeri corpus, ut nulla sit partium ejus dimotio, sæpè sæpius tamen illæ partes a se invicem disturbantur; idquè secundum ossis spissitudinem vel longitudinem.

7  
I V.

**ACCIDENTIA** in primitiva , subsecutiva , & remotiora distinguuntur. Ad prima referuntur partis deformitas , impossibilitas ad motum , dolor , hemorrhagia , aliaque. Ad secunda doloris perseverantia , aut ipsius incrementum , febris , motus convulsivi , convulsiones , partis inflammatio , ingurgitatio , gangræna. Ad tertia tandem membra deformitas , contortio scilicet , elongatio , contractio , vel curvatura , callus exuperans , succi ossi diffusio , partium molium compressio vel prava cohærentia , unde motus muscularum plus aut minus in posterum coeretur. Quandoque etiam nulla fit partium fractarum coalitio.

V.

**DIAGNOSIS** visu & tactu suscipitur. Nec quidem signis dubiis ; vel enim cute abscissâ per eam excedunt ossis fragmenta , aut tanta est partium fractarum dimotio , ut ipsi met oculis manifestè pateat ; vel manibus facilè deflectitur os ruptum , & digitis vel auditu persentitur crepitatio.

V I.

**PROGNOSIS** pro variâ specie differt. Complicata enim fractura compositâ deterior , & hæc simplice pejor. Quò plus etiam vicina sedet ossis extremitatibus , eò majoris est discriminis. Desumitur quoque prognosis ab humorum crassi , ægrotantis ætate vel habitu , lapsu temporis , anni temperie & aliis circumstantiis.

V I I.

**CURATIO** in eo consistit quod debellatis accidentibus , partes fractæ in situ naturali repositæ , in illo contineantur & coalescant.

V I I I.

**TRIBUS** præsertim mediis perficitur reposicio ; extensione scilicet , contra extensione & coadunatione. De modo extensionem & contra extensionem peragendi nihil nisi vivâ voce dicimus. De his tantum hic adnotare liceat , quod utraque semper celebranda sit in ossis loco a fractura remotiori , sensim sine sensu , multaque cum prudentiâ , cavendo ne partes molles ossis asperitatibus dilacerentur , vel nimiùm lœdantur.

## I X.

**E**T SI non difficilis ut plurimum fiat partium reductio, non ideo semper facilis obtinetur earumdem perfecta coadunatio. Dum enim pars valde tumescit, vel pinguedine crassior habetur, tunc ægrè persentitur os ipsum, & an aptè juxta ponantur ejus fragmenta difficulter judicari potest. Sedulò igitur attendendum ad ossis naturalem conformatiōnem & partium ejus peculiarem situm, ut exinde perfectior effici possit coadunatio. Quæ quidem nullo ferè cum negotio subveniet, si habitâ ratione longitudinis Humeri, condyli ejus revocantur ad respectum quem ipsis cum capite & magno tuberculo assignavimus.

## X.

**P**ERACTA coadunatione partes contineri debent idoneâ deligatione. In Humeri fracturis simplicibus ut plurimum convenit illa quæ constat spleniis, ferulis & fasciis, super impositâ mitellâ. At in complicatis satius est apponere fasciam octodecim capitum vel libri formem, aut aliam a Sculteto commendatam. Quâ quidem membrum omne ita contineatur, ut nullibi detur ingurgitationi locus.

## X I.

**Q**UANTUM autem temporis sic revinctum remanere debeat Brachium, ab ægrotantis statu vel ætate, specie fracturæ, & accidentibus deduces; nulla enim ratio de illius mensura datur, nisi illa per quam callus satis invaluerit. Hoc quidem plerumquè perficitur, quoad fracturas simplices & compositas, intrà quadraginta vel quinquaginta dies, tardius verò quoad complicatas.

## X I I.

**H**UMERI corporis, sicut & aliorum ossium consolidatio nulli artis molimini debetur. In hoc tantum versatur Chirurgia, ut quam aptè & sat diù contentis fragmentis, idoneâ tūm medicamentorum, tūm victūs ratione, penitus arceantur obstacula; naturaque possit erga eam muneribus suis opportunè & placidè fungi.

**F I N I S.**