

De labiorum cancro : theses anatomicae et chirurgicae, quas, Deo juvante & praeside M. Joanne-Baptista-Guillemo Ferrand ... / tueri conabitur Joannes-Josephus-Benedictus Monier.

Contributors

Monier, Jean Joseph Benoît.
Ferrand, Jean Baptiste Guillaume.
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Parisiis : Typis Michaelis Lambert, 1782.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/avtrcp6w>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

14.

DE LABIORUM CANCRO.

THÈSES ANATOMICÆ ET CHIRURGICÆ;

QUAS, Deo juvante & Præside M. JOANNE-BAPTISTA-GUILLELMO FERRAND, Facultatis Artium & Chirurgie Magistro, antiquo Collegii Præfecto, Regio Scholarum Professor, Regio Librorum Censore, Primario magni Nosocomii Parisiensis Chirurgo designato, Regiae Chirurgie Academie Consiliario, antiquo Anatomes & Chirurgie in Scholâ Præclicâ Professore, Imperialis Academie Florentinae Socio extraneo, Regiae Scientiarum, Humaniorum Litterarum & Artium Academie Rothomagensis Socio, necnon saluberrimæ Facultatis Medicinæ in Universitate Remensi Doctore, tueri conabitur JOANNES-JOSEPHUS-BENEDICTUS MONIER, è loco Sainte Jalle Sisteronensis, præclaræ Artium Facultatis in almâ Universitate Parisensi Magister, Regiae Galliarum Principis D.D. LUDOVICÆ in Monasterio San-Dionysiano Carmelite Chirurgus ordinarius, necnon primarii magni Nosocomii Parisiensis Chirurgi nuper præcipuus Adjutor.

Die Lunæ trigesimo mensis Septembris, anno R. S. H. 1782,
à sesqui-secundâ post meridiem ad septimam.

PARISIIS,
IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.
PRO ACTU PUBLICO
ET
SOLEMNI COOPTATIONE:



Typis MICHAELIS LAMBERT, Regii Chirurgie
Collegii necnon Academiæ Typographi, viâ Cithareâ.

M. DCC. LXXXII.

СЛОВА СМОЛЕНСКА



D. O. M.

DE LABIORUM CANCRO.

T H E S E S
ANATOMICÆ ET CHIRURGICÆ.

I.

VULTUS concinnâ & sublimi structurâ conspicuus, in quo
supremi Numinis sigillum elegantissimè appositum stupentes
miramur, almæ retum Parentis Naturæ, miraculum arguit.
Verùm enim verò, quām amico fœdere sociantur, arduæ frontis
dignitas, triste supercilium, genarum dulce decus, verecunda
oris venustas, oculorum blandè minacium flagrantia! Quām bēnè

A ij

4

conveniunt, vultu animæ theatro sedentes, majestas & amor! Labra roseo colore nitentia, ad oris ornamentum, ad blandam faciei venustatem, lepores ac elegantiam purpureo splendore conferunt; vario muscularum motu, varios animi affectus nervosè exprimunt; ad manducandum, bibendum, sughendum, loquendum, miram præstant opem. Sed eheu! nunc atrâ malorum serie inhonestè deturpantur, nunc indecorè dilacerantur, nunc fatalia mortis semina in rosis sanitatis occultata non raro maturant. Luctuosum istius veritatis testimonium, à *Cancro*, de quo, prælibatâ labrorum anatome, sumus dicturi, mutuamur.

I I..

Duo labra, muscularis potissimum corporata, spongioso quodam atque molliusculo textu, quod absque concursu actionis muscularis intumescit quandoquè atque detumescit, conflari videntur. Extùs tegumentis communibus, intùs membranâ oris, sub quâ breves ac exiles ductus, cryptæ aut glandulæ miliares & lenticulares sitæ sunt, obducuntur. Rubicundi labiorum margines, papillis nervosis longiusculis, sibique invicem arctissimè agglutinatis, componi videntur. Labra epidermide spoliata, & aquâ aliquandiù macerata, copiosissimas nervorum propagines exhibent, hinc mira eorum sensilitas; superius labrum sub septo nasi, inferius ad radices dentium incisorum, habenulâ quâdam, quam *frenulum* vocant, retinentur.

Varius est, juxta varios auctores, muscularum numerus. Litem dirimat lynceus anatomicus. Labra *orbicularis* constringit cajus fibræ quasi arciformes. Abducunt *Zygomaticus* & *Buccinator*, risores dicti; labra elevant vel *communes duo canini*, vel proprii *incisorum par*; deprimunt tandem *triangularis* & *quadatus*. Alii longè plures describunt. Ad labiorum musculos, *pyramidales nasi* & *platysmamyoïdes* meritò referendi videntur. Labiorum arteriæ, *coronariae* dictæ, à carotide externâ proce-

dunt; in jugularem externam venæ sese exonerant.

Nervi à maxillari tūm superiori, tūm inferiori & à portione durâ septimi paris originem mutuantur.

I I I.

Cancrum enodare, accuratam ac numeris omnibus absolu-
tam horrendi istius mali definitionem dare, res ardua. Allatas à
turbā auctorum definitiones brevitatis causā ex consulto omit-
tentis, Schirrum & Cancrum, unum eundemque quasi mor-
bum esse, cujus varia stadia, variæ conditiones, contendimus.

Diversā sub specie, multiplici sub formā, Cancer prodit.
Nunc unicum existit, nunc plura sororiantur instar uvæ tuber-
cula, dura, renitentia; sēpè dolorem afferunt, quandoquā nullo,
aut levissimo dolore stipantur.

Per non definitum temporis intervallum, quācumque de-
causā ingravescente morbo, crescit tumor, in apicem assurgit,
discretis in loculis emollitur. Jam cuti non concolor, ater-
fit, subrubet, lividus aut subviolaceus. Hinc & inde circum-
fusæ, varicosæ turgescunt venæ. In his rerum angustiis, velut
agmine factō, sēvissima ingruunt symptomata. Titillans,
trens, lacerans, pungens vigilat dolor. Orti motu sponte-
næ collectitia *ichoris* putridi illuvies, cutem arrodit ac
subindē, visu miserabile! ulcus patet asperū, oris tumenti-
bus, duris, inversis horridū; acre tabū eructans, irrepit
latiusque grassatur, ac fœtidissimā, tenui, fuscā, nigrā,
quam evomit, sanie, musculos, vasa, nervos, quodcumque
aculeo putrido obvium, pessimè irritando, vorat. Æquis passibus
læthifera contagio, rodentis veneni populabunda lues fœcunda
Cancrorum consequentium parens, chronicī dolores, acutissi-
ma tormenta, febris cancerosa, &c. sequuntur, quæ ægros,
nisi miserrimis illorum rebus succurratur, inimicos inter ignes
& asperrim o's cruciatus, conficiunt.

Hæc sunt præcipua Cancri, in occultum & in ulceratum vulgo bipartiti, phœnomena, cuius sedes ferè propria, partes glandulosæ, molles & laxæ, cuius causa materialis, lympha.

I V.

È variarum causarum coitu Cancrum sobolescere, infasta nimis testatur experientia. Hæmorrhoides suppressæ, imminuta vel abolita menstruatio, atra cura ejusque pedisequi melancholici affectus, lymphæ degeneris ac solito crassioris consistentia, solidorum eretismus, vel irritatio à morsu, contusione, puncturâ, laniatu, ab inclemtiâ frigoris, à temerariâ ac ineptâ causticorum aut medicamentorum pinguium applicatione, ab eluendæ fœditatis labiorum incuriâ, &c. pro causis tūm internis, tūm externis, promiscuè sumantur.

Fictitium virus ad fabulosam somniorum patriam relegandum, Cancro nascenti non præexistit, non est teterimi istius morbi causa. In ipsomet Cancri gremio, orto motu spontaneo, genitum, ipsiusmet tabis sobolem, istud, tanquam Cancrorum consequentium causam, solummodo reputandum censemus.

Cancro vitii causas altius indagari, de genuinâ ejus naturâ ac effectibus differere, extra pensi rationem positum. Qui plura de *Cancro* voluerit, adeat ille luculentam Dissertationem celeberrimi Doctoris *Peyrilhe*, hujusce Collegii Magistri, duplicita laureâ ab Academiâ Scientiarum, Humaniorum Litterarum & Artium Lugdunensi donatam anno 1773, illiusque iussu, publicâ juris factam.

V.

Nascens labiorum Cancer, nunc verruculam mentiens, nunc corneam naturam ac formam induens, tuberculum durum, renitens, quandoquè crustâ opertum, titillatione, uredine, aut mordaci yellicatu stipatum exhibit; quod si vetus & ulceratum, ex supra

allatâ descriptione diagnosis eruatur ; cave tamen ne allucinatio-
nis ; tumores enim alterius generis , fucum quandoquè faciunt.

VI.

Pessimi ominis malum tumor cancrosum ; attamen quod mi-
nor recentiorque morbus , eò tutius ac facilius curationem ad-
mittit. Rarò vetulus , latèque serpens , rarius ulceratus , rarissimè ulceris degeneris soboles Cancer curationi cedit. Qui re-
cens & qui à causis externis procedit , minùs importat periculi
cæteris paribus , minùs contra artis aculeos recalcitat , quam
cancer *per se* , seu à causis internis sponte suâ pullulans. Viri
boni habitus citius ac felicius quam seniores , cachectici , &c.
fanantur.

VII.

Ab omni ævo ad Cancri eradicationem nihil non fuit ex-
tinctum. Suppurantia , caustica , aliaque id genus totiès non
jejunè decantata medicamenta , totidem sunt arma debellandæ
hydræ imparia , quæ nedum cancrosum molem consumant ,
aut penitus evellant , è contrà res ægri in pejus præcipitant.

Idem esto judicium de ferro ignito ; nisi tamen unâ eâdem
que applicatione morbus evanescat. Sic pluriès fausto cum suc-
cessu , verruculas , parva tubercula cancrosa summam labiorum
membranulam lambentia , ferro carenti semel tantum cautif-
simè apposito , & etiam aquâ mercuriali semel aut bis folium
modò prudentissimè adhibitâ , consumpsimus. Si cancrosa me-
les latius aut profundiùs sit diffusa , ferri carentis vim elu-
dendo , cineri doloso suppositus , ipsimet igni pertinax , ferocius
ac truculentius sœviens Cancer renascetur. In tanto rerum
discrimine , aut *blandire* , aut posito possibili , *seca*.

Si cancrosum tumor non latius græsus , ferrum non respicit

ægri situ ad operationem accommodato , extentoque labio, ad sanum usque æquali tractu solerter secando , Cancrum scalpro absindat Chirurgus , ita ut si superiùs (1) , litteræ græcæ Λ , si verò inferiùs , V figuram sectio referat. Cruentas vulneris oras , Chirurgi minister adducat , & exule acuum acicularumque vanâ supellectile , incarnanti fasciatione (2) , curatio absolvenda.

Apparatus postridiè , sequentibusque diebus eluatur ; solidorum eduliorum abstinentiam , quietem ac silentium Chirurgus imperet. Quinto sextove die , prudenti manu deligatio solvenda.

Tutissimâ ac lenissimâ hâc methodo , quæ nunc viget , & nobis pluriès prosperè successit , brevi coalescunt vulneris oræ , brevi juxta naturæ artisque vota , morbus tollitur , nec fœdamentum cicatrix.

Quando Cancri amplitudo adunationis spem ademit , negligendo curiosiori elegantiæ studio , extirpationem (quoad fieri poterit) celebrandam esse , censemus.

Cùm eo miseriae res processerunt , ut morbus ferro evelli nequeat , tunc fonticulis , sedantibus medicamentis , anodynis , vaporationibus antisepticis , regimine congruo , &c. Cancer mitigetur.

(1) Karissimè , si unquam : hoc nondum nobis observare contigit.

(2) Sumitur fascia tres circiter ulnas longa, in duo capita , cujus unum diffindiatur , voluta , latitudine ad transversum digitum aut amplius pro re natâ , accedens. Fronti immediatè applicata , ad nucham pergit , ibique cruciatim disposita , versus nasum , cayendo ne lœdantur aures , reducitur. Ubi naribus responderet , spissis super genas spleniis propè aures appositis , duplii fissurâ tres circiter digitos longa scinditur fascia , ut capitum fissi extremitates , per duo hæc foramina trajectæ , genas adducere & coadunatas vulneris oras , sat firmiter stringere valeant. Tum sub utroque Zygomate , ad nucham redit fascia . ubi iterum formata cruce acubus fixâ , ad frontem pergens caput percurrit. Incorpans illa fasciatio , duobus firmatur linteis , quorum unum à fronte ad occiput , alterum verò ab auro dextrâ ad sinistram ducta , acubus vel filo fixa retinentur.