

De bubone venereo : theses anatomico-chirurgicae.

Contributors

Bonjour, Jean.

Auvity, Jean Abraham.

Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

[Paris] : [publisher not identified], [1785]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/h4cgvnvk>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



DE BUBONE VENEREO.

THESES ANATOMICO-CHIRURGICÆ.

I.

SYPHILIS saepius ex actu Venereo contrahitur, cum voluptate recipitur, at non sine dolore curatur. Pudendas partes ut plurimum adoritur & vitiat, etiamsi alio in loco in quem primùm irrepserit, appareat. Pars tacta contaminatur, dein virus ulterius pergens, per totum corpus spargitur, atque ita crescit, augeturque ut non humores tantum, sed carnes etiam partesque solidas penetret, quarum nimirum substantiam vorat.

A

I I.

BUBONES qui post concubitum cum impuriori lique Venereâ laboranti fœminâ celebratum exoriuntur , hujusce morbi rudimenta sunt & notæ. Hi tumores eas invadunt glandulas in quas desinunt vasa lymphatica quibus immediate haustum est virus ; scilicet inguinales, jugulares, axillares, prout pene, vulvâ, ore, mammis susceptum est. De his tantum tumoribus qui inguina inficiunt , utpotè frequentioribus , paucis de Anatomia præmissis , differere animus est.

I I I.

IN utroque inguine occurunt massulæ quædam molles , laxæ , spongiosæ , subrotundæ , ad vasa cruralia , fasciam latam inter & cutim collocatæ , ex congerie vasorum omnis generis constantes , propriâ membranulâ , in capsulæ formâ inclusæ , copiosissimâ telâ cellulari circumcinctæ , quarum aliæ sunt superiores & numero majores , aliæ inferiores & pauciores. Ab usu lymphaticæ , à situ inguinales dicuntur. Variis in morbis formam mutant , non raro intumescunt , inflammantur , & in abscessus , vel quandoque scirrhos pessimos tendunt.

Vasa rubra , nervea & lymphatica glandularum inguinalium substantiam permeant. Arteriæ à femorali ortæ , sanguinem advehunt ; venæ ad saphenam internam adeunt , nervuli cruralis soboles , sensum conciliant , tandemque vasa lymphatica è totâ extremitate inferiori prodeuntia , eas trajiciunt , cumque similibus genitalium junguntur.

I V.

TUMORES duri , renitentes , plûs minûsve dolentes , post

congressum cum impuriori fœminâ, vel in uno tantum, vel in utroque simul inguine orti, Bubones Venerei dicuntur.

V.

INTER se differunt Bubones, 1º. ratione habitâ circumstan-
tiarum; vel enim soli, sine aliis luis Venereæ symptomatibus
apparent, vel aliis quibusdam accidentibus, Gonorrhœâ, ulce-
ribus cancrofis, stipantur, &c. 2º. ratione habitâ speciei,
modò phlegmones, modò œdématis, modò tandem scirrhi in-
dolem æmulantur.

V I.

NUNC certius, nunc tardiùs suboriuntur, undè in essentiales
& consequentes dividuntur: essentiales paucis à contagio
diebus prodeunt; consequentes contrà ab inveteratâ lue,
absque recenti causâ, turgescunt; sunt etiam qui Gonorrhœâ
intempestivè cohabitâ, virulento humore suppresso, nascuntur
symptomaticique dicuntur.

V I I.

Aº perfectam Bubonum Venereorum diagnosim, non omit-
tenda signa commemorativa, si quidem morbi naturam plu-
fimùm elucidare valent, sicque certius discernitur tumor ab alio
qui Bubonem quandoque primâ facie mentitur. His conside-
ratis, visu necnon tactu tutior posteà statuitur Bubonum dia-
gnosis.

V I I I.

JAM verò dum locus magis quam naturaliter decet, in
inguine prominet, oculis dignoscitur tumoris moles, situs,
figura, &c. Si insuper tumor digitis pressus, renitatur, doleat
& inflammeretur, tunc ipsum à lymphâ in glandulis convectâ,
provenisse judicatur.



IX.

lors, valvulae osca ni lev. si aq. si hinc quiccumque in illius nos
distringit. V. venerei. quo strigat lumen sanguinis ni

PRÆTEREA tutissima erunt Bubonis Venerei indicia, si is
qui eo laborat, cum scorto rem habuerit; si Gonorrhœa intem-
pestivè cohibitâ, vel ulceribus syphiliticis, aut aliis ejusdem luis
accidentibus inveteratis laboraverit vel adhuc laboret; tunc
certissimum hujuscce fœdissimi morbi signum habebitur.

X.

ALIA etiam accedunt signa propria, pro quâcumque Bubonis
Venerei specie: rubor, calor atque dolor, immò etiam pul-
fatio in tumore phlegmonodem indicant Bubonem. Tumor
contrà frigidus & mollis, digitoque pressus, foveam reti-
nens, ut nec pulsus nec dolores, aut exiguos saltem sibi
adjunctos habeat, cœdematodes dicitur. Demùm scirrhosus vo-
catur Bubo, si nimiriū tactui durus responsat, absque ru-
bore & caloris & doloris sensu appetet.

XI.

BUBONUM prognosis ab eorum naturâ, & ab eorum specie
desumitur. Bubo essentialis recentem tantùm luem portendit,
symptomatico mitior, qui inveteratum virus prænuntiat. Con-
sequens demùm omnium vehementissimus, asperrimus, & acer-
rimus, universalem huc & illuc serpentem luem, testatur.

XII.

BUBO calidus & phlegmonodes tractabilius est, meliorisque
eventus, ad suppurationem vergit: pituitosus & frigidus
è contrà tardior ac difficilior, partim resolutione aut suppu-
ratione, partim induratione terminatur. Scirrhosus demùm

molestior & contumacior, curatuque difficilior; si exulceratur, tunc rupto tumore, ulcus continuatur cacoethes, humorque exit fætidus, qui esse inter saniem & pus videri potest.

X I I I.

SÆPE suppuratione, sæpè etiam resolutione, solvitur Bubo, nonnunquam tandem induratione detinetur.

X I V.

VARIIS ab auctoribus varia proponitur hujuscemodi curatio. Nonnulli statuunt alienam hinc esse resolutionem: copiosam contraria studiosè promovendam esse, ac diligentissimè accelerandam suppurationem, existimant: si quidem, istâ ratione, venereum virus impeditur quin intus remeet, infectoque sanguine luem universalem moveat: igitur & à medicamentis purgantibus, sanguinisque missionibus frequentioribus studiosè abstinentendum esse, opinantur.

X V.

Suppurationis via licet tutior, cum sæpè sæpiùs tarda ac diuturna sit, maximaque afferat ægrotanti tædia, hinc recentiorum plurimi huic intendere dedianuntur, sed ad devitandam eam omni opere enituntur; idcirco, ea quæ vehementiorem concitant inflammationem sedulò removere, victum tenuem, sanguinisque per venas detractiones, extrinsecus super tumorem emplastra digerentia, adhibitis deinceps medicamentis mercurialibus, suadent: sicque Bubones Venereo, quam commodissimè & sine periculo curari posse affirmant.

X V I.

QUÆNAM tutior via sit ineunda, difficiliter judicatur: observare tantum nobis liceat, Bubones inter tumores criticos annumerari debere; quibus suppuratis, virus susceptum eò magis eliminatur, quò pus copiosius ac diutiùs effluxerit.

X V I I.

VALENTISSIMA ergò, cùm jam adoleverint isti Bubones, ad concitandam suppurationem, ea adhibeantur medicamenta quæ sunt ex emollientibus, pinguibus, oleosis, glutinosis atque lubricis, tūm etiam ex subacribus aut stimulantibus, ad instar cataplasmati, aut emplastri.

X V I I I.

INGRAVESENTE autem inflammatione, cutoque cum dolore rubente, emplastra supra dentur maturantia, diachylum scilicet cum gummis aut illud Vigonis cum mercurio.

X I X.

Ad ultimum tandem finem cùm pervenerit inflamatio, & jam æger, absque magno incommodo, amplius incedere non potest, aptissima erunt ea cataplasma, quæ ex cepis sub cinere calido tostis, vel ex farinâ & melle, vel ex fermento, calida superinjiciuntur.

X X.

Pus ad maturitatem perductum, parvâ incisione, cautè factâ educendum est.

X X I.

QUONAM tempore, quonam modo, tumor sit aperiendus inter auctores ambigitur. Plerique tumoris maturitatem expectant : & hi quidem rationabiliter agunt. Si enim occlusus inciditur Bubo, pus fere nullum educitur, pars tenuior exspirat, crassior intus remanet; unde duriores, ut plurimum circumjecti tumores subnascuntur; immo orae incisi tumoris intumescent & inflammantur, ulcus continuatur, quod ægrius & nonnisi concoquentibus medicamentis & pus moventibus sanescit. Non minus est periculi à nimia cunctatione: nam pus quod matrum est, si non evocetur, diutius subfidens, non tantum in sanguinem vertitur tenuem, & acrem, quæ proxima, atque sana rodit, unde fiunt fistulæ, sed etiam sanguini mixta, totum corpus inficit, luemque universalem esse testatur.

X X I I.

PURE, ut supra dictum est, educto, ulcus unguento digestivo diligenter expurgetur quantum satis est, usque ad perfectam cicatricem.

X X I I I.

ALTER Eubonem aperiendi modus ponitur in causticis, qui optimus est, si tumor sit frigidus & indolens, aut ægrotans timidior scalpello nimis abhorrescat.

X X I V.

SUPPURATIO vix veneno planè exhaustiendo sufficit, nisi suppetias ars ferat. Vix enim fieri potest quin virus suscepti reliquæ supersint, quæ medicaminum antivenereum usu deleri

debent, eā lege ut horum tantò major copia exhibeatur ; quantò brevior ac parcior fuerit Bubonis suppuration.

X X V.

OBSERVANDUM porrò supereft 1°. delitescente tumorē , aut imminutā suppuratione , retenta morbi semina , certo certius in lueim universalem iri, igitur debitīs antivenereis ægrum esse committendum ; 2°. Bubonem contumacem , virūs superstitis , luisque confirmatæ indicem , ulteriori antivenereorum usu esse oppugnandum ; 3°. idem agendum , Bubone nimis indurato , resolutionem necnon suppurationem æqualiter respuente.

HAS THESES, Deo juvante & Præside M. JOANNE ABRAHAM AUVITY, Artium & Chirurgiae Magistro, necnon Nosocomii vulgò dicti des Enfans-trouvés, Chirurgo præcipuo, tueri conabitur JOANNES BONJOUR, Claromontanus, in alma Universitate parisiensi liberalium Artium Magister, theses auctor.

Die Sabbati 24^æ mensis Decembris, anno R. S. H. 1785,
à sesqui-secunda post meridiem ad septimam.

N I X X