

**Tentamen medicum inaugurale de stricturis in intestino recto ... /
eruditorum examini subjicit Jacobus Lee Brodbelt.**

Contributors

Brodbelt, James Lee.
Woodforde, James
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Edinburgi : Excudebat P. Neill, 1824.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/hh56v9eq>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>





(6.) 186

TENTAMEN MEDICUM
INAUGURALE
DE
STRICTURIS IN INTESTINO RECTO;

QUOD,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,
EX AUCTORITATE REVERENDI ADMODUM VIRI
D. GEORGII BAIRD, SS. T. P.
ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NECNON
AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU, ET
NOBILISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ DECRETO;

Pro Gradu Doctoris,
SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS:

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT
JACOBUS LEE BRODBELT,
Ex Insula Jamaica,
SOCIET. REG. MED. EDIN. SOCIUS.

IV. NON. AUGUSTI, HORA LOCOQUE SOLITIS.

Edidi quæ potui, non ut volui, sed ut me temporis angustia co-
egerunt. — CICERO.

EDINBURGI:
EXCUDEBAT P. NEILL.

MDCCCXXIV.

TESTAMEN ARABICUM
EXAMINATA

SAMUEL BEALEY, ARMIGERO,

CHIRURGO PERITISSIMO,

NON MINUS INSIGNI PROPTER SCIENTIAM

D. GEORGE HARRIS, ESQ. T. P.

IN REBUS SACRIS

QUAM

MORUM HUMANITATEM;

HOCCE OPUSCULUM GUALECUNQUE SIT,

PERTINEAT SINCERAE AMICITIAE TESTIMONIUM.

INSCRIPTIT

JACOBUS LEE BRODBELT.

JACOBUS LEE BRODBELT.

DISCIPULUS

IN NOB. AUGUSTO, HOC A JACOBUS LEE

EDINBURGH:

REPRINTAT P. KELL

MDCCLXXIV.

SAMUELI BEALEY, ARMIGERO,

CHIRURGO PERITISSIMO,

NON MINUS INSIGNI PROPTER SCIENTIAM

IN REBUS SACRIS,

QUAM

MORUM HUMANITATEM;

HOCCE OPUSCULUM QUALECUNQUE SIT,

PERTENUE SINCERÆ AMICITIÆ TESTIMONIUM,

INSCRIBIT

JACOBUS LEE BRODBELT,

DISCIPULUS.

Quid grandia molimur tenues et miseri mortales ! qui tot lethalibus morbis sumus obnoxii, ut nemo facile illos recensere posset. Nullibi tamen homines magis affligunt quam circa vias excretioni inservientes ; ubi, si altiores egerint radices, difficillime possunt eradicari. Quotidie ad vitam sustentandam nobis edendum, bibendum, et quod superfluum est, evacuandum. Si vero viæ, hisce operibus destinatæ male sint affectæ, mors vitæ sæpius anteponitur ab afflictis.

RUYSCH. Obs. 95. p. 121.

James Woodforde Esq^r
with the Authors Con^ts

TENTAMEN MEDICUM

INAUGURALE,

DE

STRICTURIS IN INTESTINO RECTO.

Auctore JACOBO LEE BRODBELT.

PROCEMIUM.

EX plurimis morbis, quibus genus humanum obnoxium est, Stricturæ in Intestino Recto (quod, ut Dr A. MONRO Tertius jure notavit, potius * Curvi nomen meretur), inter eos recenseri possunt, qui dira infandaque mala secum afferunt : hujus morbi quidem cruciatus usque adeo miseros affligunt, ut verbis exprimi nullo modo queant.

* Outlines of Anatomy, ad tom. ij. p. 140.

De Intestini Recti Situ.—Intestinum Rectum ad ultimam lumborum vertebra[m] incipit, ad anteriorem Ossis Sacri et Ossis Coccygis descendit, et paulo infra extremam Ossis Coccygis partem in Anum desinit. Intestinum Rectum in ejus cursu Ossium directionem sequitur, per quæ tendit primo deorsum, dein paulo retrorsum, tum antrorsum sese vertit, atque per meso-rectum his ossibus annexum est.

De Intestini Recti Tunicis.—Hæc intestinorum pars tunicâ ex peritonæo instructa est, quæ, quum ejus latera atque anteriorem partem contexisset, in posteriorem atque inferiorem vesicæ partem in maribus, et, in fœminis, in superiorem vaginæ posterioris superficiei partem, reflexum est. Idem intestinum fibris musculosis præditum est quæ longitudinales sunt atque circulares, validiores crassioresque quam in cæteris intestinorum partibus. Intus tunicâ obductum est quæ villosa nominatur, et musculosis fibris per telam cellulosa[m] commissa est. Tunica, quæ cellulosa est, et interna, tanto ampliores hic loci sunt quam in superioribus intestinis, ut in plieas transversas ca-

dant, quæ tamen evanescent pro eo ut intestinum rectum distendatur.

De Intestini Recti Vasis Sanguiferis.—BICHAT, in suo opere cui nomen est "Anatomie Descriptive," hæc scripsit : "Aucun intestin ne reçoit autant de vaisseaux que le Rectum, proportionnellement à son volume. Trois sources les lui fournissent. La première est l'artere mesenterique inferieure, terminée dans l'intervalle des feuillets du meso-rectum, sous le nom d'hémorrhoidale superieure. La seconde est l'artere hémorrhoidale moyenne propre au rectum, et naissant isolement du tronc hypogastrique. La troisième est l'artere honteuse interne, dont la branche inferieure ou perineale fournit au sphincter plusieurs rameaux, nommés hémorrhoidaux inferieurs."

De Intestini Recti Nervis.—Nervi qui ad hoc intestinum adeunt, a pare octavo et sympathetico magno exiguntur, et nonnulli ramuli etiam a nervis sacralibus ad idem perveniunt.

De Vasis Intestini Recti Absorbentibus.—

Absorbentia hujus intestini prorsus lymphatici generis sunt *; attamen eadem valent nutrimentum in corpus transmittere: enemata enim ex alimentis confecta, ut experientia docet, vitam per breve spatium sustinerint, cum nihil ore jam accipere queat.

De Intestini Recti Munere.—Hæc Intestini pars stercora excipit, quæ justum tempus retinet, donec eorum pondus atque acrimonia illud ita excitant, ut, adjuvantibus ani levatore musculisque abdominis, fæces dejiciantur.

I. Ea alimenti pars quæ solida est (nisi integra devoretur), primo in ore faucibusque conficitur et saliva commiscetur, dein hoc modo præparata ad ventriculum pervenit: ejus actione, atque succi gastrici potestate, in massam ubique partem, cui nomen impositum est Chymus, convertitur. Hæc massa jam pulpæ similis facta in duodenum descendit; ubi in humorem fere lac refe-

* “ They are furnished very scantily with Absorbents.”—PEMBERTON’S Treatise, &c. p. 85.

rentem (Chylum vocant) aliis viribus mutatur; is humor absorbetur, sive avide exhauritur per millia millibus adjecta vasculorum quæ tenuissimis ostiis alia cum aliis inosculant, et tandem in communem canalem (Ductum nempe Thoracicum) desinunt; qui rivulos sic in unum collectos ab intestinis usque ad genus sanguiferum convehit, ut actioni cordis pulmonisque materia nutriens tandem subigatur. Inutilis materia quæ in intestinis relinquitur, fibrarum eorum musculosarum actione deorsum propellitur, ut e corpore ejiciatur. Ex quo plane patet, siquando intestinum rectum contrahatur, stercora plus minusve in intestinis retentum iri, et post aliquod tempus, non posse non mala creare quæ plurimum terreant periculumque minitentur.

II. *De causis Stricturarum in Intestino Recto.*—Stricturæ in intestino recto, sub diversis rebus oriri possunt: aliqua fortuita irritationis causa in intestinis, aliquis humor acris in canalem alimentarium effusus, aut aliqua aliena substantia in inferiore intestini recti parte retenta, excitata inflammatione, hunc morbum afferre valet. Si quando inflammatio concitata est acribus in in-

testinis genitis, vehementior plerumque est et periculosior quam si aliena substantia ibi jacente mota fuerit. Quoties ex quavis harum causarum, inflammatio intestinum occupavit, quum textura naturalis mollis sit et vasculosa, fieri potest, ut ambitus canalis in affecta parte imminuatur, et parietes ejus crassiores reddantur. Quibusdam persuadetur luem veneream posse stricturam in intestino recto præstare. Celeber RICHERAND * hac de re ita dixit: “ Le retrecissement de l’extrémité inférieure du Rectum est quelquefois une vice de conformation, mais plus souvent l’effet de l’épaississement venerienne de ses parois. De tous les symptomes de l’affection syphilitique il n’en est point de plus grave.” Clarissimus DESAULT non modo luem veneream inter causas hujusmodi stricturæ recenset, sed hanc opinionem edidit, quam Professor MONTEGGIA † his verbis citavit: “ DESAULT ha descritti e curati varj casi di stringimento del retto ch’egli chiama scirroso, cioè fatto da ingrossamento e induramento delle sue tonache, non senza escrescenze dure ed

* Nosographie Chirurg. ad tom. iii. p. 418.

† Instituzioni Chirurgiche.

esulcerazione al di dentro. Dietro le sue osservazioni quest' affezione è ordinariamente conseguenza di mallattie veneree, qualche volta di emorroidi, di vizio reumatico, gottoso, scabioso erpetico, determinati all' intestino." Dr BAILLIE*, nunc merito desideratus, ita scripsit : " Every portion of the intestine is not equally liable to be affected by scirrhus; but it is to be found much more frequently at the sigmoid flexure of the Colon or in the Rectum, than any where else, which, perhaps may depend on the following circumstances. There is certainly more of glandular structure in the inner membrane of the great intestine towards its lower extremity, than in any other part of it; and this sort of structure has a greater tendency to be affected with scirrhus than the ordinary structures of the body : the gut, too, is narrower at the sigmoid flexure than at any other part, and therefore, will be more liable to be injured by the passage of hard bodies, which, by their irritation may excite the disease of scirrhus in a part that was predisposed to it." Uteri carcinoma

* Morbid Anat. ad pag. 182.

nonnunquam in intestino creat stricturam, tandem lethalem.

III. *De Stricturae speciebus.*—Quædam stricturae spasmodicæ, quædam permanentes, cognominatæ fuerunt. Strictura Permanens ea est quæ a vitio organico orta est. Musculosæ fibræ intestini recti contractioni præter naturam magnæ in aliqua parte obnoxia sunt; quod malum huic commune est cum aliis partibus musculosis, in quibus res pariter se habeant. Quoties ab aliqua causa hujusmodi contractio in nonnullis hujus fibris musculosis orta est, stercora prohibentur ne solito modo ejiciantur; et hoc malum Strictura Spasmodica nominatur. In hac intestini conditione, vitium recte pro spasmi genere habetur, quoniam a nimia fibrarum musculosarum actione pendet, neque omnino organicæ affectarum partium mutationi attribuendum est. Multa opinionem confirmant rem ita esse in plurimis exemplis. Primo causæ, quibus ea contractio inducitur, ejusmodi sunt, quæ in aliis fibris musculosis irritationem movere compertæ sunt; dein in nonnullis exemplis effectus causam admotam adeo celeriter consequitur, ut verisimillimum sit strictu-

ram prorsus spasmodicam esse: denique idem ex eo manifestum fit, quod quædam medicamenta statim levamen afferunt, quæ nullo alio modo nisi spasmodicam actionem solvendo prodesse queunt. Strictura vero spasmodica, irritatione iterum iterumque admota et inflammatione sæpius excitata, in stricturam permanentem converti potest. Interna Intestini membrana præter naturam emicans, vel cum tunicæ musculosæ contractione, vel citra eandem, descendentem stercori aliquando impedimentum objicit. Et, testantibus quibusdam haud parvi nominis auctoribus, filamenta membranosa interdum eidem moram creant. Præter has alia est stricturæ species, in qua pars affecta cartilaginosa fit; dein malum in scirrhum desinit. De ea specie* Professor MONRO dixit "it is of slow growth, appears only in persons who are far advanced in life, of a sallow complexion, and who are disposed to Cancer."

IV. *De notis Stricturæ in Intestino Recto.*—

Homo primo sentit se ægrotare ex alvo pertinaciter constricta, et ex molestia subinde eum affici-

* Outlines of Anatomy, ad Tom. ij. p. 184.

ente, cum plenitudinis sensu ad flexuram coli sigmoideam sese extendente. Labente tempore canalis usque ambitu imminuitur, nisus majores ad alvum dejectendam postulantur, et morbus usque ad summum pergit. Caloris sensus in contracta parte sæpe percipitur. Dejectiones, quæ jamdiu cum multo negotio excretæ fuerunt, nunc mole imminutæ sunt, quales puer dejicit, neque lumbricis absimiles: spiritus, qui in intestinis continetur, crebro emissus, et abdomen distentum, cum aliis symptomatibus, ægrum vexant, vitamque ejus miseram atque infelicem reddunt. Hæc pro indiciis stricturæ permanentis habeo, aliquando citra proclivitatem ad scirrhum; etiamsi causis excitantibus fieri potest ut in scirrhum, et tandem in Carcinoma, degeneret. Quoties strictura cum scirrho est conjuncta, non modo signa supra memorata incidunt, sed præterea miserum infestant dolor vehemens, sensus calor ardentis in affecta parte, dolores lancinantes in lumbo et osse sacro, alvus fusa, tenesmus, urina cum dolore reddita, tormina, et abdomen tensum a retento spiritu. Celeber. COPELAND, de hoc malo disserens, ita scripsit: "Abscesses very frequently form, in the neighbourhood of the anus, and sometimes

break into the vagina in the female, and the fæces are discharged through the fistulous orifice. In the male, an adhesion takes place with the bladder, and the abscess discharges itself with the urine, and sometimes fæces and wind are voided by the urethra. But, more frequently, the matter makes its way through the nates, as in cases of common fistula, for which disease it is not unfrequently treated. The patient often continues a long time in this distressing situation; for none of the vital organs are affected, till, at last, worn out by pain and the discharge, or, perhaps, the total obliteration of the rectum, he yields to his fate."

V. *De Diagnosi.*—Hic morbus ab aliis earumdem partium affectibus, imponendo in intestinum rectum digito vel virga, cerea internoscendus est. Haud raro fit ut æger, quum primum opem a medico petit, diarrhœa, dysenteria, colica, intestinorum inflammatione similibusvè malis laboret, quæ symptomata alia post alia a scirrho oriantur. Multum igitur interest, ut diagnosi accurata instituat. Interrogato ægro, si compertum ha-

beamus jam obstipationem pertinacem, et alio tempore alvum fusam, abdomen admodum distentum, dolorem in lumbis cum dejectionibus vermes referentibus, prius eum tentasse jure licebit partes affectas digito aut virga cerea scrutari, ex quo patebit an recte suspicati simus quomodo res sese habeant.

VI. *De Prognosi.*—Siquando, partibus diligenter investigatis, haud dubium erit intestinum non nisi simplice strictura, stricturisve occupari, ac si verisimile est vitium non ultra terminum sigmoideæ coli flexuræ pertinere, ægri valetudine simul parum imminuta sanitatem redituram promittere licet. Sin vero morbus diu infestavit; si intestinum multo crassius, et durius factum est, et ægri valetudo simul manifeste in pejus ruit, vultu subflavo, pulsu celeri aliisque indiciis febris hecticæ; judicandum est hominem in magno periculo versari. Sive vero mala quæ urgent a simplice strictura, sive a scirrho confirmato accesserunt, utrumque vitium, nulla medicinæ adhibita ope, æque lethale erit.

VII. *De Medendi Ratione.*—Quum jam

compertum esset stricturam urgere*, primum consilium ad sanandum malum est ut canalis iterum ampliatur. Hanc ad rem auctores diversa proposuerunt. WISEMAN, uti solitus est gentianæ radice adipeque cervino. Dr SHERWEN virgas e cornu, Dr DARWIN e ligno factas, laudat. Hæc, ut mihi videtur, nimium irritationis dolorisque nequeunt non creare. DESAULT curationem hoc modo præcipit†: “ Cette maladie fut traitée par la compression, que l’on fit au moyen d’une tente de charpie longue, nonée et repliée dans son milieu, enduite de cerat et portée dans le rectum, à l’aide d’un stylet fourchu. Quoique cette tente n’eût d’abord que la grosseur d’un tuyau de plume, on ne put cependant la faire pénétrer qu’à deux pouces de profondeur‡.” Cele-

* Partibus affectis non inflammatis, si partes sint inflammatae, quando æger opem petit; hirudines et laxantia lenia primum adhibeantur.

† Œuvres Chirurg. par. BICHAT.

‡ Operative Surgery, ad tom. i. p. 154.

berrimus C. BELL hanc medendi rationem adhibendam esse jubet:—"A flat piece of sponge is soaked in strong mucilage; then rolled up into the form of a bougie, and tied firmly with a cord; the cord should be oiled. When the sponge is dry, and fixed in its form, the cord is taken off, and it may then be rolled betwixt plates, polished, and made smooth, and a little conical; a string is tied to the greater end. This is a tent which, when introduced into the stricture in the rectum, will imbibe the heat and moisture, and gradually distend the contracted portion of the gut." WHITE curationem anteponit quam DESAULT proposuit, quippe quæ multo minus incommodi ægro facessat, quæque ex pressura levi perpetuo admota, melius absorptionem promoveat, præcipue in intestino tuberculis obsesso, quam si virga cerea, ut vulgo solet, usurpata sit, quæ non nisi per breve spatium in intestino retineri possit *. Celeber. HOWSHIP, in suo opere, ita scripsit: "I have tried both modes repeatedly, and certainly prefer the bougie; this instrument presents

* Practical Observations, ad pag. 24.

a more perfectly smooth surface, gives much less pain in the introduction, and, as far as my experience goes, has answered the purpose better than M. DESAULT'S."

Mea quidem opinione oportet primo alterum experiri modum, dein si molesta inde oriantur indicia, ad alterum confugere. Utrum vero ex his modis adhibere placebit, summa medici cura atque prudentia opus erit, semperque ad ægri sensus respiciendum. Crassiores virgæ cereæ usurpandæ magis minusve frequenter immittendæ sunt, prout res sese ferant. Hæ non tantummodo pro cuneo sunt; ut mihi enim videtur, partem premendo absorbentia vasa excitant, ex quo vitium vel sanatur vel haud parum sublevatur. Aliquando virga stricturam nihil afficit: si res ita se habet, licet tuto (ut WISEMAN monet) stricturam secare, nisi nimis late sese extendat. Neque WISEMAN solus id præcipit; COPELAND quoque suadet stricturam in posteriori ejus parte persequere, quoties neque aucta actio neque inflammatio urgeat. Hæc præterea Professor MONTeggia * tradidit: "Palletta trovo talvolta van-

* *Instituzioni Chirurgiche.*

taggioso il taglio della parte piu ristretta dell'intestino, ch'egli dovette fare in occasione di congiunta fistola, ed il propone anche per le sole briglie piu strette senza concomitanza di fistola." Virga caustico armata ad stricturæ medelam adjuvandam adhibita est, et, ut opinor, in nonnullis exemplis prodesse possit: præcipue in iis ubi virga simplex partem nihil afficit: sed nunquam obliviscendum est, eandem sæpe sanguinis profluvium terrens, horrores, dolorem ingentem, irritationemque nervosam afferre. Quoties strictura procul dubio scirrhum habet comitem, partemque affectam plurimum vitiavit, ad remedia quæ levamen præbeant, confugiendum est, quibus conemur quietem misero conciliare, per illud breve spatium, intra quod vita ejus nequit non contineri. Hyosciamus opiumve in exiguo enemate, quoties dolor vehemens sit, admodum convenit, aliaque medicamenta præcipienda sunt, prout res postulent. Hydrargyrus tentari debet usque ad ptyalismum leviozem inducendum, cujus curationis auctores sunt RUYSCH, MUNCKLEY*, atque alii. Si vi-

* Med. Trans. Ejus administratio nunc maxime dubitatur.

tium per introductam virgam et medicinam sanatum est, oportet per aliquod post spatium subinde eandem immittere, quoniam pars in priorem conditionem recidere prona est. Ad diætam maxima ægri attentio est adhibenda; ea cibi genera conveniunt quæ multum nutriunt, et parum residui post se relinquunt. Duo exempla stricturæ permanentis citra proclivitatem ad scirrhum a doctissimo J. M. GOOD, M. D., in suo opere summi meriti cui nomen est "Study of Medicine," narrantur; in quibus, quanquam homines nunc ad sanitatem redierunt, dejectiones adhuc vermiformes sunt, et opus est ut ad diætam regimenque attendant, atque, nisi fallor, ut virga cerea subinde usurpetur. In alvo movenda oleum ricini cæteris purgantibus anteponendum est, et ea, quæ in intestino recto effectum præstant, evitanda sunt. Enemata emollientia et laxantia admodum proderunt, quoniam stercora solvendo faciliorem reddunt eorum transitum per contractam partem. Cavendum autem est ne justo nimia sint, ne intestinum supra vitiatam partem distendant, ubi canalıs haud raro magnopere mole augetur.

VIII. *De Cadaveris Sectione.*—Æger extinguitur vel canali prorsus obstricto, vel dolore ingenti, et diarrhœa acri, vel tandem inflammatione intestina occupante. His respondent ea quæ, secto cadavere, in conspectum veniunt; in quibus proponendis verbis Doctoris MONRO utar*. “We meet with a constriction of an inch in length, of a cartilaginous consistence, and in which there is no appearance of the coats of the alimentary canal; all of these having been absorbed, and cartilaginous matter been deposited in their stead. This species of constriction generally terminates in the cancerous ulceration. It is very easy to discover the seat of the stricture; for that part of the alimentary canal, which is above the stricture, is much enlarged,—whereas that beneath it is much contracted; and by tracing either of the dilated or contracted portions, we soon discover a part of the canal, which seems much contracted as by a cord having been put round it, and which had left a purple mark; and upon pressing this part, it feels heavy and hard.”

* “Outlines,” &c.

Tumores præterea maligni generis diversæque magnitudinis conspiciuntur, et tunicae intestini in affecta parte multo crassiores solito inveniuntur. Aliquando,* ubi pars vitiata inciditur, prior ejus fabrica satis conspicua est, sed plurimum a naturali aspectu mutata; peritonæalis tunica multis partibus crassior justo, atque dura, cartilagini fere similis facta est. Musculosa quoque tunica admodum crassa, plurimis septis membranosis distincta reperitur. Hæc septa membranosa formari videntur, ex tela cellulosa inter fasciculos musculosos jacente, jam ex morbo insolitam adeptam crassitudinem. Intima etiam membrana dura admodumque crassa evasit, et haud raro tuberculis obessa, et præter solitum eminet. Quoties hæc pars elevata exulcerata est, vitium nominare Carcinoma jure licet. Intestini recti tunicae interdum crassiores tantummodo sunt, neque omnino scirrhi aspectum ostendunt; quod ipse vidi in exemplis, in quibus nulla scirrhi indicia sese ostenderunt.

* Vide "Morbid Anatomy of the Human Gullet," &c. opus eximium et præclarum.

“ GENTLEMEN !—I feel as if I had waded across a rapid and dangerous stream.—Whether I have gained the opposite shore with my head clean or covered with mud and weeds, I leave wholly to your determination.”

FINIS.



