

**Dissertatio medica, inauguralis, de asthmate spasmodico ... / eruditorum examini subjicit Jacobus Fenwick.**

**Contributors**

Fenwick, James.  
Lister, Dr  
Royal College of Surgeons of England

**Publication/Creation**

Edinburgi : Apud Balfour et Smellie, 1781.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/n958jupd>

**Provider**

Royal College of Surgeons

**License and attribution**

This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

for Mr Lister  
with prompts from  
the Author

---

D I S S E R T A T I O M E D I C A,

I N A U G U R A L I S,

D E

Asthmate Spasmodico.

---

Affumate Sbaffonico.

DISSERTATIO MEDICA,  
INAUGURALIS,  
DE

Asthmate Spasmodico.

Q U A M,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GULIELMI ROBERTSON, S. S. T. P.  
ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

N E C N O N

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,  
Et nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ decreto;


PRO GRADU DOCTORATUS,  
SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS  
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;  
Eruditorum examini subjicit

JACOBUS FENWICK,

ANGLUS,

Soc. Reg. Med. Edin. Soc.

Ad diem 25. Junii, hora locoque solitis.



EDINBURG:  
Apud BALFOUR et SMELLIE,  
Academiae Typographos.

M,DCC,LXXXI.

1650

АЭДАМ ОИТАТИИАДА

ЗИЛЯУОУАИ

АЭДАМ ОИТАТИИАДА  
ЗИЛЯУОУАИ  
АИФИИЕ ГБДМОДИО.

АЭДАМ ОИТАТИИАДА

ЗИЛЯУОУАИ

АИФИИЕ ГБДМОДИО.

АЭДАМ ОИТАТИИАДА  
ЗИЛЯУОУАИ

АИФИИЕ ГБДМОДИО.

АЭДАМ ОИТАТИИАДА  
ЗИЛЯУОУАИ

АИФИИЕ ГБДМОДИО.

АЭДАМ ОИТАТИИАДА  
ЗИЛЯУОУАИ

АИФИИЕ ГБДМОДИО.

АЭДАМ ОИТАТИИАДА  
ЗИЛЯУОУАИ

АИФИИЕ ГБДМОДИО.

АЭДАМ ОИТАТИИАДА  
ЗИЛЯУОУАИ

АИФИИЕ ГБДМОДИО.

АЭДАМ ОИТАТИИАДА  
ЗИЛЯУОУАИ

АИФИИЕ ГБДМОДИО.

АЭДАМ ОИТАТИИАДА  
ЗИЛЯУОУАИ

АИФИИЕ ГБДМОДИО.

АЭДАМ ОИТАТИИАДА  
ЗИЛЯУОУАИ

АИФИИЕ ГБДМОДИО.

АЭДАМ ОИТАТИИАДА  
ЗИЛЯУОУАИ

АИФИИЕ ГБДМОДИО.

АЭДАМ ОИТАТИИАДА  
ЗИЛЯУОУАИ

АИФИИЕ ГБДМОДИО.

АЭДАМ ОИТАТИИАДА  
ЗИЛЯУОУАИ

АИФИИЕ ГБДМОДИО.

АЭДАМ ОИТАТИИАДА  
ЗИЛЯУОУАИ

АИФИИЕ ГБДМОДИО.

XI A M I T S A 300

D I S S E R T A T I O M E D I C A,

I N A U G U R A L I S,

D E

## Asthmate Spasmodico.

**I**N hacce dissertatione inaugurali de Asth-  
mate, ut a celeb. viris Culleno et Flo-  
yero definito et descripto, tractare in pro-  
posito est. Praetermisso igitur procœmio,  
symptomatum historiam ex ipsis fere Flo-  
yeri verbis prosequemur. Nec enim quid  
aliud a tyrone, de morbo quovis tractante,  
expectari arbitror, nisi ut utilissima quae-  
que, et fide dignissima, ex virorum illustri-  
um scriptis feligat. Felicissimum me igitur  
fatebor si hoc praestiterim.

Per

Per diem ante paroxysmi aggressum, laffitudine, torpore generali, ad praecordia molestiae sensu, tentatur aeger ; caput etiam gravedine et dolore (levi forsan) afficitur. Circa horam quartam vespertinam, angustiae sensus ad scrobiculum cordis urget, et ventriculus ructibus et flatibus simul laborat. Capitis dolores, et gravedo intenduntur, quos simul pandiculatio, somnolentia, oscitatio comitantur ; pulmones rigent ; respiratio difficilior, tardior, et fibilans quodammodo fit ; vox simul irrauefit ; tussicula convulsiva adest ; sputa vero parce exscreantur ; urina palida et copiosa est ; calor obscurus, fitis, fauciumque siccitas, plus minusve ægrum semper urgent. Calor lecti, et stragula post decubitum in pectus gravitantia, symptomata augent. Sed per somnum plerumque dolores remittuntur.

Sub horam secundam, tertiam, vel quartam matutinam, subito e somno, cum intollerabili suffocationis, et ad thoracem constrictio-

strictionis sensu, aegri excitantur; respiratio tarda, laboriosa, difficillima, cum sibilis fit, nec nisi corpore erecto, aëreque frigido accedente, respirare queunt; hinc ad fenestras apertas, pro solatio, saepe confundunt; cervix erigitur; humeri costaeque elevantur; nares dilatantur, ad respirationem faciliorem reddendam; labia contractantur; tussis, exscreatio, loquela, iis per quam difficultia sunt; facies turgida et rubra, vel lurida, et tandem nigra devenit; oculi prominent, et lacrymas effundunt; ventriculus vehementius flatibus distenditur, et aliquando bilis flava vel viridis ejicitur; alvus plerumque semel bisve dejicit; interdum autem pertinaciter adstricta est; calor intensus et urens adeat; et sudores aliquando profluunt; pulsus parvus, simulque celer et inaequalis est; artus, maxime vero manus et pedes, pallent et frigent; musculi laxantur; omnis fere membrorum motus perit; vires prosteruntur; et, si omnia in pejus ruunt, sudores frigidi, palpitatio cordis vehemens, de-

lirium

lirium ferox, et deliquium animi, mortem afferunt. Plerumque vero, cum per aliquod temporis symptomata duraverint, sensim remittuntur; respiratio liberior fit; calor naturalis totum corpus pervadit; et denique sudor modicus profluit; sputa dulcia, vel subsalsa, plerumque cum filamentis sanguineis mixta, exscreantur; urina rubra fit, et sedimentum lateritium deponit. Haec omnia, in unoquoque paroxysmo, minime occurrunt; et raro quidem delirium ferox, deliquium animi, et alia illa signa adeo periculosa, observantur. Si alvus, sub paroxysmi initium, semel bisve dejicit, statim plerumque symptomata levantur, et breviore tempore paroxysmus solvit, vel subito nonnunquam decedet. Per aliquot horas paroxysmi durare solent; per dies tres, quatuor, vel quinque eorundem recursus. Intervallum vero ad dies plurimos, septimanas, vel menses protrahitur; sed in his variationes tam innumerabiles ac frequentes sunt, ut nihil certe neque de recursu, neque de duratione paroxysmorum dicendum est.

C A U S Æ

## CAUSÆ OCCASIONALES.

Cum cognitio causarum occasionalium ad praedisponentis investigationem utilis sit, de iis primum dicendum erit. Inter has, tempus humidum pluviosum, subitae mutationes a tempestate serena ad humidam, et calor intensus, maxime frequentes sunt. Frigus etiam inter causas occasioales ab Hoffmanno numeratur, ex eo quod asthmaticos nonnullos aestate, quam hyeme, saniiores observaverit: Detractio sanguinis copiosa et repetita; purgantia, et emetica fortiora; aliaeque evacuationes nimiae; ebrietas; crapula; venus nimis culta; potus tepidi; cibi omnes aëre fixo abundantes, vel qui difficiles concoctu sunt; aër vaporibus acribus, ut fumis tabacci, metallorum, sulphuris, aliorumque stimulantium, repletus; animi affectiones inordinatae, quales

B funt,

funt, timor, vel ira; nimia studiis applicatio, lucubrationesque nocturnae; exercitatio justo violentior; haemorrhoidum, mensium, aliarumque evacuationum suppressio; febres maxime intermittentes, hysteria, hypochondriasis, podagra retropulsiva, catarrhus, peripneumonia; haec omnia inter hujus morbi causas enumerantur; multaque aliae ab auctoribus numeratae sunt, quae hoc loco silentio praeteribimus.

### CAUSA PRÆDISPONENS.

Huic morbo maxime favet (testantibus fere omnibus) temperamentum sanguineum, irritabilitate simul et debilitate conjunctum. Sed sunt inter asthmaticos, qui corpore firmo et bene formato gaudent, qui nullis affectionibus aliis nervosi generis obnoxii sunt,

funt, et in quibus morbus omnino localis esse videtur. Ex hisce igitur observationibus, morbum pendere a textura vel fabrica quadam pulmonum crederem. Cum temperamento forsan haeredetarius est, sed aliquid simul et pulmonum compagi tribendum.

## CAUSA PROXIMA.

Multa suadent asthma ex colluvie serosa non orire. Asthmatis paroxysmus semper fere mitigatur, antequam mucus exscreatur; hinc mucum abundantem, potius effectum, quam causam, paroxysmi judicarem: Secretio muci ex quavis causa aucta, vasa bronchialia irritando, contractiōnem spasmodicam inducere potest; hinc potius pro causa occasionali, quam proxima, haberī

haberi debet. Eaedem fere asthmatis sicci, ac humidi, causae recensentur; eademque in utroque adhibentur medendi consilia: Sola muci secretione inter se discrepant; siccum porro in humidum haud raro immutatur; ad idem igitur morbi genus omnino referenda videntur. Omnes fere hujus morbi causae sunt, vel quae debilitatem simul et irritabilitatem inducere possint, quales sunt omnes evacuationes nimiae, vel quae in habitu debili ac irritabili morbum suo stimulo excitant, quales sunt fumi tabacci, sulphuris, levis mentis emotio, &c. Debiles spasmodis praे aliis hominibus obnoxii sunt. Eaedem fere sunt causae asthmatis ac aliorum morborum spasmodicorum. Asthma-tis paroxysmus subito invadit, et pariter subito decedere nonnunquam observatur. Ex cunctis proinde facile creditu est, asthma a constrictione spasmodica bronchiorum esse prognatum. Monebam supra, inter asthmaticos esse, qui corpore firme stabilique gauderent.

derent. Exinde quaeri ideo potest, an morbum in iis ex eadem causa produci crederem? Nonne morbosa sensibilitas vel irritabilitas in pulmone inesse potest, qua facilius in contractionem cieatur, dum in omnibus aliis partibus corpus firmum robustumque sit?

### D I A G N O S I S.

Definitio asthmatis, ni fallor, pro diagnosi haud inepte institui potest; nec certius, aut melius, quis morbus ab alio distinguitur, quam definitione symptomata ei peculiaria, et pathognomonica dicta, complectente. Verbis sequentibus cel. nostro Culleno definitur, " Spirandi difficultas per intervalla subiens; cum angustiae in pectore sensu, et respiratione cum sibilo strepente; tussis sub initio paroxysmi difficilis, vel nul-

la,

la, versus finem libera, cum sputo muci  
saepe copioso."

## PROGNOSIS.

Quanquam ex concursu symptomatum  
aegros summo in periculo versari judicare-  
mus, constitit tamen multos, per plures  
annos, hoc morbo laborasse; nonnullos eti-  
am ad vitae munera, sine ullo fere incom-  
modo, valuisse. Curatio tamen in juveni-  
bus perdifficilis, in senibus fere impossibilis  
esse, apud medicos huc usque habita est;  
neque profecto immerito: Quo recentior  
fuerit morbus, eo melior curationis spes,  
et vice versa. Si a labore haereditaria pende-  
at (testante Floyero) medelam non admittit.  
Quo frequentiores paroxysmi, et violentio-  
res, eo majus periculi adesse constat. Si  
a podagra retropulsa ortum fuerit asthma,  
idoneis remediis haec ad pedes iterum re-  
ducta,

ducta, paroxysmum asthmaticum haud raro solvit; cachexia, pedum tumores, hydrops pectoris, vel generalis, macies, phthisis, vertigo, lethargia, apoplexia, paralyfis, syncope frequens, et cordis palpitationes, delirium ferox, ac deliquium animi, pessimi sunt ominis, mortemque adesse demonstrant.

### METHODUS MEDENDI.

Indicationes curatoriae in hoc morbo sunt, 1mo, In paroxysmo spasmum tollere; 2do, Ipsius regressui obviam ire. De his ordine tractandum est.

Asthma nunquam (testante Floyero) sanguinis detractione sanatur; et si saepius educatur sanguis, metus haud inanis erit, ne per tabem, cachexiam, aliosve hujusmodi morbos, aegri miserrime pereant. Nunquam

quam igitur, nisi urgente suffocatione, fanguis detrahi debet. Epispastica thoraci applicata dyspnoeam in paroxysmo augent, quippe quae ipsius dilatationem impedian: Sed forsan epispastica inter scapulas applicata, isto incommodo carebunt. Cathartica fortiora semper nocent; mitiora, praeципue vero enemata, utilissima judicantur remedia. Emetica etiam leniora a Floyero aliisque multum laudantur. Si ex capitis quodam dolore, ex oppressione circa scrobiculum cordis, et aliis <sup>H</sup> hujusmodi symptomatis, paroxysmum nocte subsequente expectare liceat, optime adhibentur gr. vii. vel viii. ipec. insigne levamen haud raro allatura. Expectorantia oleosa et mucilaginosa ventriculum opprimunt; hinc malum potius augere, quam levare, crederem. Fugiendus est calor externus. Medicis celebrantur nitrum, sal ammon. multaque alia, tam acida, quam media, quae omnia silentio praeteribimus. Castor, sp. aether. vitr. opium, mosch. aliaque hujus generis  
*Natura*  
*dispar*

generis antispasmodica reliquis quibusvis medicamentis, mihi anteferenda videntur. Quibusdam forsan plethoricis nocerent ista; plerumque vero (si fides experimentis danda sit) periculo vacare certum est. Opium solutioni paroxysmi felicissime inservire, testatur Floyerus.

Nunc de iis quae ad secundam indicacionem pertinent. Cum morbus a debilitate, simul et irritabilitate, oriri videatur, nostrum erit ea adhibere remedia, quae ad vires restaurandas convenient. Inter haec praecipua sunt cort. Peruv. et metallica quaedam; quae omnia, quibusdam asthmaticis, plethoricis scilicet, nocere non ignoror. Cortex tamen, infusi vel decocti forma, simul additis aromaticis, vel acido vitriolico, ventriculo gratior, quam sub pulveris vel alii cujusvis solidi specie, fit; et tum in astmate spasmotico felicissime administratur. Balneum frigidum, ni vetet plethora, perutile est. Si unquam fonti-

culi vel setacea in hoc morbo juvent, plethoricis maxime, et iis qui evacuationibus suppressis laborant, convenient. Alvus laxa servanda est. Lucubrationes, praecipue nocturnae, violenti animi affectus, ceteraeque causae occasionales, sedulo vitandae sunt. Multum ab aëre pendet, qui, quo purior est, eo asthmaticis minus nocet; crassior vero quibusdam magis convenit. Asthmaticis nunquam contemnenda est exercitatio, sine qua omnia medicamenta erunt fere inutilia; exercitationibus autem strictius sic dictis, variae gestationes, veluti equitatio, navigatio, vectio in curru, fere anteponenda sunt. Cibus animalis semel de die sumendus, levis simul, et qui multum nutrimenti praebeat, impensis quaerendus: Fugienda omnia quae flatum procreant. Multum nocent potus tepidi, thea, coffea, &c. Utilissima erunt vinum rubrum, albumque Hispalense, parca quantitate, assumpta.

F I N I S.