

**De lactuca virosa et scariola : dissertatio inauguralis medica ... / auctor
Henricus Hirschfeld.**

Contributors

Hirschfeld, Heinrich.
Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin.
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Berolini : Typ. Nietackianis, 1833.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/m8mzdyd6>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DE
**LACTUCA VIROSA
ET SCARIOLA.**

DISSERTATIO

INAUGURALIS MEDICA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE

GRATIOSI MEDICORUM ORDINIS

IN

UNIVERSITATE LITERARIA

FRIDERICA GUILIELMA

PRO SUMMIS

IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS

RITE OBTINENDIS

DIE I. M. MARTII A. MDCCCXXXIII.

H. L. Q. S.

PUBLICICE DEFENDET

AUCTOR

HENRICUS HIRSCHFELD.

SILESIUS.

OPPONENTIBUS:

S. ELIASON, MED. ET CHIR. DR.

J. LOBETHAL, MED. ET CHIR. DR.

M. HEINERSDORFF, JUR. UTR. CAND.

BEROLINI,

TYPIS NIETACKIANIS.

O, mickle is the powerful grace, that lies
In herbs, plants, stones, and their true qualities;
For nought so vile, that on the earth doth live,
But to the earth some special good doth give;
Nor aught so good, but, strain'd from that fair use,
Revolts from true birth, stumbling on abuse:
Virtue itself turns vice, being misapplied;
And vice sometimes by action dignified.
Within the infant rind of this small flower
Poison hath residence, and medicine power;
For this, being smelt, with that part cheers each part;
Being tasted, slays all senses with the heart
Two such opposed foes encamp them still
In man as well as herbs, grace and rude will;
And, where the worser is predominant,
Full soon the canker death eats up that plant.

Shakespeare, Romeo and Juliet Act. II. Sc. III.

V I R O

ILLUSTRISSIMO

EXPERIENTISSIMO AMPLISSIMO

AEMILIO OSANN,

MEDICINAE ET CHIRURGIAE DOCTORI, PROFESSORI PUBLICO
ORDINARIO IN HAC UNIVERSITATE FRIDERICA GUILIELMA
NEC NON IN ACADEMIA MILITARI MEDICO-CHIRURGICA;
INSTITUTI REGII POLICLINICI CONDIRECTORI; MEDICO PRAC-
TICO APUD BEROLINENSES FELICISSIMO, COMPLURIUM SO-
CIIETATUM LITERARUM SODALI; EQUITI ORDINIS DE AQUILA
RUBRA IN TERTIA CLASSE

H. T. DECANO

PRAECEPTORI SUMME VENERANDO

V. I. R. O.

ILLUSTRATION

EXPERIMENTAL APPLIED

ARTS AND MANUFACTURES

NEC NON

DEPARTMENT OF SCIENCE AND ARTS
LONDON
PRINTED BY RICHARD CLAY AND COMPANY, LTD., BUNGAY, SUFFOLK

H. T. BRIDGE

FRANCIS AND TAYLOR, 11, SOUTH BURY STREET, LONDON, E.C. 4

V I R O

AMPLISSIMO EXPERIENTISSIMO

DOCTISSIMO

E. B E E R,

MEDICINAE ET CHIRURGIAE DOCTORI, MEDICO PRACTICO
APUD GLOGAVIENSES MERITISSIMO,

FAUTORI SUMME COLENDO,

SUMMA QUA PAR EST REVERENTIA

H A S C E

STUDIORUM SUORUM PRIMITIAS

D. D. D.

AUCTOR.

I. HISTORIA NATURALIS.

LACTUCA, θριδάξ **Dioscor.** θριδάξ s. θριδακίνη **Theophr.** et **Galen**i — Gallice: laitue — Anglice: lettuce. — Italice: lattuca — Hispanice: lectuga — Danice: laktuk — Polonice: loczyga — Germanice: Lattich, Salat.

Planta est classis Syngenesiae, ordinis Polygamiae aequalis L.; secundum systema naturale familiae Semiflosculosarum Tournef.; Ligularum Pontederiae; Planipetalorum Razi; Synantherarum Rich., trib. Cichoracearum Juss. et Vaillant; Lactucearum Cass.

Character genericus ab auctoribus ita statuitur: Receptaculum nudum. Calyx imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. Pappus simplex, stipitatus.

Nomen gerit a lacteo quem planta vulnerata fundit succo. Nonnulli ab ejus lac mulierum lactantium augendi vi derivant; quae vero quum admodum dubia sit, illa etymologia praefenda videtur.

Lactucae species in officinas receptae in sativas discedunt et sylvestres, quarum has et suspectarum vel narcoticarum nomine vocatas hic tractare mihi proposui.

I. LACTUCA VIROSA foliis aversis oblongo-lanceolatis denticulatis basi sagittatis carina aculeatis, infimis sinuatis.

Lactuca sinuata Forsk.

Giftiger, stinkender, starkkriechender, wilder Salat, Sausalat; — giftiger, stinkender, wilder Lattich, Gifflattich, Leberdistel.

Hayne, I. 47. — Ic. pl. offic. Dusseld. sect. IV. t. 22. Schk. 207.

Radix biennis, caudicalis, subperpendicularis, fibrillas plurimas exserens.

Caulis erectus, teres; primum solidus, tum fistulosus, ramosus, paniculatus; inferne rubellus, aculeis subulatis obsitus; superne ex albido virens, inermis; aequae ac tota planta succo albido lacteo scatens; bipedalis et altior.

Folia alterna sessilia, amplexicaulia, aversa; denticulata, carinata, carina aculeata; inferiora oblongo-lanceolata, sinuata, subundulata, basi sagittata; superiora integra, sagittato-lanceolata.

Flores compositi, paniculati — **Calyx** perianthium cylindraceum, squamulis imbricatis, membranaceis — **Corolla**: composita imbricata, uniformis, corollulis multis aequalibus; corollulae hermaphroditae, monopetalae, ligulatae, truncatae, quinquedentatae —

Stamina: Filamenta quinque capillaria, brevissima, antheris in tubum cylindraceum connatis. **Pistillum:** germen ovatum; stylus filiformis, staminibus aliquantulum longior, eminentibus duobus stigmatibus reflexis.

Pericarpium: Achenae solitaria, oblonga, simplex, compressa, acuminata, striata. **Pappus** plumosus, stipitatus. — Semen achenae cavitati respondens — **Receptaculum nudum.**

In Europae, praesertim terris meridionalibus, in Germaniae locis montosis, ruderatis; ad muros, sepes, aggeres. Floret Julio et Augusto mensibus.

II. LACTUCA SCARIOLOA. Lactuca sylvestris Lamarck. wilder Salat, Sausalat, Ackersalat; wilder Lattich, Waldlattich, Zaunlattich, Feldlattich, Scariol.

Hayne, I. 46.

priori ceterum simillima, hoc caractere specifico significatur:

Folia verticalia carina aculeata, apice acuta, basi sagittata runcinato-pinnatifida.

In Europa septentrionali frequens.

Genus Lactucae veteribus jam innotuisse, eorum scripta multis locis testantur. At nihil spinosius est, quam plantarum species in prisca historia naturali omnino nonnisi strictius et levius consignatas, certae recentiorum auctorum speciei adaptare, nihil haesitantius, ita ut multi jam naturae scrutatores, antiquarum simul linguarum peritissimi, frustraneam huic negotio operam navarint. Quod maximam par-

tem et in Lactucas supra allatas cadit, de quibus et inter nostros phytologos tam ambiguae exstant opiniones, ut alii, quorum sententiam et nos secuti sumus, eas diversas species, alii alteram alterius tantum varietatem accipiendam esse malint.

Theophrastus *), intelligens et scitus rerum naturae indagator, de planta nostra reliquit delineationem, quae, quod maxime dolendum est, in textu perquam corrupto quasi latet aperte. Duobus ille Lactucae significat nominibus, ita quidem, ut ejus *ῥηίδαξ* ad sativam et sylvestrem, *ῥηίδακίνη* ad hanc tantum referenda esse videatur, — discriminis vero inter scariolam et virosam plane ignarus. Quae enim de sylvestri tradit utrique communia sunt. — Caulem Lactucae hoc modo tangit**): »In quibusdam, ubi caulis enatus est, folia adnasci consentaneum est, ut lactucae, ocimi, apii et frumentorum. Horum nonnulla caulem primo laevem, postea vero horridulum et quasi spinosum gerunt, ut lactuca (*ῥηίδακίνη*) et plantae spinosae omnes etc.;» ubi Gaza simpliciter Lactucae interpretatus est, quod vero Sprengelius ad virosam referri vult. Alio loco***), quo de humore aquoso Lactucae ita disserit: „ὑγρότης ὑδαρώδης καὶ τῶν λαχανωδῶν δὲ, οἷον, σικύου κολοκύντης, ῥηίδακίνης.“ eadem intelligi videtur, quanquam inter

*) Theophrasti opera omnia ed. C. Theophil. Schneider. Lips. 1806.

***) Theophr. hist. nat. I. 10. 7.

***) ib. I. 12, 2.

olera est enumerata; nam domesticae (θριδακος) caules ὀκώδεις καὶ πικρούς tradit *). — De radice haec affert **): »Brevi radice haec constant: lactuca, portulaca, brevitatem dico et rectae et lateralium. Lactuca vero lateralibus caret, sed tenues tantum fibras habet, quamobrem maxime simplici radice niti videtur.» Et infra: »Lactuca translata radice brevior quam sata est; illa enim ex lateribus magis germinat, brevior etiam sylvestris quam domestica, et superne plures in caules spargitur.» — Semen lanuginem gerens describit ***) (κακκοσπέρματον). — Quid L. sylvestris a sativa differat, egregius hic locus exhibet †): τὸ δὲ φύλλον βραχύτερον τῆς ἡμέρου καὶ τελειούμενον ἀκανθοῦται, καὶ τὸν καύλον ὁμοιοῦς.

Succum acrem dicit et medicamentosum (δριμὺν καὶ φαρμακώδη). — Quae verba, etsi nec virosae, nec scariolae characterem specificum illustrent, illi tamen, in australibus regionibus frequentiori, magis consentanea duco. —

Dioscorides ††) duarum Lactucae specierum mentionem injicit, sativae et sylvestris (θριδαξ ἡμέρος καὶ ἄγρια). Cujus sat dilucidam descriptionem hisce verbis comprehendit: ἡ δὲ ἄγρια θριδαξ ἔοικε τῇ ἡμέρω καυλοδέστερα δὲ καὶ τοῖς φύλλοις λευκότερα καὶ ἰσ-

*) Theophr. hist. nat. VII. 2. 4.

***) ib. VII. 2. 9.

***) ib. VII. 3. 2,

†) ib. VII. 6. 2.

††) Dioscoridis, opera ed. et latine vertit C Sprengel. Lips. 1827. lib. II. c. 266.

χνότερα και τραχύτερα ὑπαρχοῦσα, πικρὰ δὲ πρὸς τὴν
 γέυσιν. Ομοιωται δὲ κατὰ πᾶσαν τὴν δύναμιν μήκωνι ὄθεν
 και τὸν ὄπον αὐτῆς ἐνιοι μισγοῦσι τῷ μηκωνεῖω etc. His
 multi, sed perperam, ut existimo, scariolam designari
 volunt. Contra amplius folium, caulis elatus, et laticis
 cum Meconio, cui miscbatur, affinitas non obscure in-
 nuunt, illa ad virosam potius spectare, quacum jam
 junxerunt Lobelius *) et Dalechampius **).

Plinius maximam partem Theophrastum
 et Dioscoridem secutus trifariam affert Luctucae
 specierum divisionem. Quarum prima ad Theo-
 phrasteam illam in laticaulem, rotundicaulem et
 sessilem plane quadrat. Secunda a colore satusque
 tempore desumpta. Tertia denique, vires plantae re-
 spiciens, speciem continet ad Lactucam virosam proxi-
 me accedentem. De qua hoc fere tenore loquitur ***):
 »Pessimum autem genus cum exprobratione amaritu-
 dinis appellavere picrida. Est etiamnum alia distinctio
 atrae, quae meconis vocatur, a copia lactis sopori-
 feri, quanquam omnes somnum parere creduntur. Apud
 antiquos Italiae hoc solum genus earum fuit, et ideo
 lactucae nomen adeptae.» — Huc etiam pertinere
 videtur alius locus †): »Lactucae sponte nascentis pri-
 mum est genus ejus, quam caprinam vocant, qua pi-

*) Lobelii, Adversaria p. 89.

***) Historia generalis plantarum t. II. p. 74. Lugd.
 1587.

***) Plinii secundi hist. natur. libri XXXVII. ex
 recensione Joannis Harduini, Biponti 1783. L. XIX.
 c. 38

†) ib. XX. 24.

sces in mare dejecta protinus necantur, qui sunt in promptu.» — Et infra*) characteres specierum sylvestrium notans: »Communia autem sponte nascentibus candor, caulis interdum cubitali longitudine et ipso et foliis scabritia. Succus omnibus candidus viribus quoque papaveri similis.»

Hactenus Veterum Lactucae sylvestris adumbrationes memoratu dignae. Quae enim Columella, Galenus, et post illos Aëtius, Oribasius, Paulus Aegineta medicique Arabes tradiderunt, a prioribus vix abhorrent, ita ut tibi facile in animum inducas, eos Lactucam scariolam vel prorsus ignorasse, vel cum virosa confundentes utrique idem sylvestris nomen indidisse. Inde a seculo demum decimo sexto a phytologis diversae Lactucae sylvestris species distinctius describi coeptae sunt.

Dodonaei, Fuchsii et Matthioli**) Lactucae sylvestris strictius quidem delineata, figuris tamen expressis illustratur, ut facile L. virosa cognoscatur, nisi quod folia plus justo sint conferta nec non inferiora integra desiderentur, quae vero forsan in planta adulta vix jam adsunt.

Dalechampius***) Lactucae sylvestris verae nomine scariolam nostram accuratissime hoc modo depingit: »Radice est digiti minimi crassitudine, candida, fere semper contorta, paucis fibris capillata, succi lactei plena. Folia circa radicem, antequam in

*) ib. XX. 26.

**) Hist. gen. plant. t. II, p. 76.

***) ib. p. 77.

caulem assurgat, humi jacent, Lactucae similia, in ambitu crenata, sed non sinuosa, dorso aculeato.» — »Folia caulina bifida in summo tripartita, figura nonnihil ad triphyllum accedente. Flos est luteus Lactucae. Totius plantae sapor insigniter amarus est.»

C. Bauhinus *) inter species sylvestres duas dignoscit, alteram costa spinosa (L. scariola) quam, perperam quidem, Theophrasti, Dioscoridis et Plinii sylvestrem ducit — alteram odore viroso (L. virosa).

Jam ad Linnaeum gradum faciam. Tantum vero abest, ut huic rei tenebris circumfusae lucem affunderet, ut novas potius difficultate sadderet, L. virosam et scariolam statuendo quidem, sed non apte inter eas distinguendo. Illius enim specificum characterem quum in foliis adversis s. horizontalibus, hujus vero in aversis s. verticalibus poneret, principiis philosophiae suae botanicae, quod valde mirandum est, parum constantem se praestitit, in qua vocularum illarum singulam quamque certa definiens notione characterem specificum a foliorum directione desumendum esse omnino negat.

Alb. de Haller **) Lactucae foliis semipinnatis nervo spinoso et foliis ovatis patulis nervo spinoso L. scariolae et virosae respondentes, amplius descri-

*) C. Bauhini, Pinax theatri botanici. Basil. 1623. pag. 124.

**) Alb. de Haller, hist. stirpium indigenarum Helvetiae. T. II. p. 7.

bit, veritus tamen, ut satis diversae sint. Eidem sententiae Gerardus *) insigniter favet. Quibus vero repugnat illud a Kochio Gnadoviensi **) observatum. Lactucae enim scariolae jam per duodecim annos in horto suo propagatae quum virosam intersevisset, utramque simul laete vigentem ac in typo suo permanentem vidit, et ne semel quidem evenit, ut alterius folium alterius formam indueret.

Utra Lactucae specie usus sit Collinus, proximi saeculi exeuntis medicus Vindobonensis, qui primus plantam nostram ab oblivione haud merita vindicavit, parum exploratum habemus. Ille enim vir libello cuidam de Lactucae sylvestris viribus conscripto ***) tabulam adjecit, quae plantam exhibet Lactucae virosae nomine designatam. Murray †) et Winterl ††) depictam quidem plantam pro L. virosa accipiunt, adhibitam vero fuisse a Collino L. scariolam putant. A quibus dissentit Hahnemann †††) virtutes therapeuticas a Collino allatas ad L. viro-

**) ib. p. 8.

*) Hayne, Beschreibung u. Abblidgn. der Arzneipflanzen. T. I. p. 47.

**) Henrici Josephi Collini, Lactucae sylvestris contra hydropem vires s. Observationes circa morbos acutos et chronicos factarum pars VI. Vindob. 1780. p. IX.

***) J. A. Murray, Apparatus medicaminum. Vol. VI. Gött. 1792. p. 13.

†) Winterl, Index horti botanici Pest. 1788.

††) Hahnemann, Apothekerlexicon. I. p. 360.

sam referens. Ac mihi quidem tabulam istam accuratius inspicienti folia runcinato-pinnatifida, quae Collinus sinuato-laciniata describit, tam manifesta apparuerunt, ut *L. scariolam* tam depictam, quam in usum vocatam esse mihi persuasum sit. Nec est, quod *L. scariolae*, quam vulgo nec immerito quoad vires alteri speciei inferiori esse dicunt, virtutibus medicis, morborum historiis adjectis luculentissime comprobatis, sententia nostra frangatur, si id tantum respiciatur, largissima drachmarum duarum triumve per diem dosi illas effectas esse, quum parem *L. virosae* dosin vix impune aegrotis propinare licuisset. Ceterum denique ipse Collinus in plantae specie definienda parum sibi consensisse videtur, quum in synonymis afferendis *L. sylvestrem* odore viroso Bauhini cum *L. foliis semipinnatis Halleri* et *scariola Linn.* comparans, narcotico praecipue odore se commotum pro virosa eam habuisse ingenue fateatur.

Postea quoque ad nostros usque dies harum specierum accuratior distinctio justo plus neglecta est, ac summo quidem medicinae practicae damno. Nam *Lactuca scariola* loco virosae adhibita quum saepe medicorum expectationem falleret, hujus quoque famae macula quaedam adpersa est.

II. DE EXTRACTO LACTUCAE VIROSAE ET SCARIOLAE.

Hoc vel Lactucarii nomine (quod alii vero Extracto Lactucæ sativæ soli vindicari volunt) significatur:

1. Succus lacteus, quo omnes utriusque speciei partes scatent, aëre, sole vel calore spissatus. (Succus Lactucæ exsiccatus *Duncan*). Quem ad finem iis præcipue utuntur plantis, quæ florescentes in locis arenosis et apricis crescunt. Notissimæ illius eliciendi methodi hæc sunt:

a) Alii caulem ad pedis circiter altitudinem evectum leviter incidi volunt.

b) Alii plantæ apicem pollicis longitudine rescari proponunt.

Succum ex ostiis vasorum lactiferorum prostilantem et planum vulneratum inducentem, gossypio spongiave recipiunt, ac vel receptum exprimunt, vel in quam postridie vertitur crustam cum exigua caulis parte sectionibus transversis abscindunt. Quod eadem in planta singulis quibusque diebus repetunt.

Quæ methodi jam Veteribus *) notæ et recentioribus temporibus a medicis Anglorum *Coxe*, *Duncan*, *Young* al. et Francogallorum *Probart*, *François*, *Lalande* al. ad Lactucarium e Lactuca sativa parandum in usum vocatæ, nunc ad nostras quoque species translatae sunt.

*) Theophr. hist. p. IX, 3, 2.

Schütz *) caulis magnam partem defoliati epidermidem cultri acuti multis punctationibus vulneravit succumque exsiccatum postridie leviter abstulit. Quo per biduum continuato, Extracti Lactucæ virosæ 56 gr. et scariolæ 23 gr. obtinuit. — Ceterum plantæ florere pergentes matura semina protulerunt.

Voget **) paullo ante florescentiam vel ejus tempore multis sectionibus transversis caulem incidit, ita ut succus in vitrum emarginatum vulnere submissum deflueret. Tali modo octo dierum spatio plures Extracti Lactucæ virosæ uncias acquisivit.

Recens ejusmodi succus est albidus, lentus; paululum causticus, ut levem in cute inflammationem efficiat; sapore acri-amaro; odore nauseoso - narcotico, praesertim in *L. virosa*. — Ad aërem siccatus mox flavo-fuscus, opacus, friabilis evadit: digitis tactus nigrescit. Humores attrahit ex aëre.

c) Alii, caule, cui medulla ablata est, et foliis, vel tota planta in mortario contusis succum exprimi, tum filtrari, filtratumque leni calore 28° haud excedente conspissari praescribunt.

Collinus ***) extractum suum ita paravit: Succus ex recenti planta, anthesi vicina, expressus et per nycthemerum loco frigido, ne fermentescat, servatus decantatur. Postquam ebullivit per aliquot momenta, colatur et ope albuminis ovorum et trajec-

*) Buchner Repertorium Bd. 15. St. 2, p. 273.

**) Geiger Magazin für Pharmacie Bd. 26. p. 320.

***) Collinus l. l. cf. Murray l. l.

tione per pannum laneum depuratur. Dein leni igne ad dimidium evaporatur, ab igne remotus et refrigeratus secunda vice albumine ovorum post brevem coctionem addito, per pannum trajicitur et clarior redditur; leni denique calore in extracti spissitudinem densatur. Ejusmodi extractum haud raro spiculis salinis micat. Ideo autem depuratio tam sollicite peragitur, ut particulae terreae salinas, in quibus summa vis, obvelantes, plurimam partem auferantur. — Succus tota ex planta expressus colorem praebet e viridi nigricantem, odorem magis herbaceum, quam narcoticum; saporem amarum.

2. Plerumque autem illo nomine comprehenditur spissatus succus lacteus in spiritu vini diluto solutus (*Tinctura Lactucae*) iterumque inspissatus (*Extract. succi Lactucae spirituosum Dunc.*) Huc praecipue pertinet *Extractum Lactucae virosae* secundum recentissimam *Pharmacopoeae Borussicae* editionem paratum, quod exclusis principiis omni vi destitutis, ut materia albuminosa et amylo, efficaciora tantum continet.

Succi recentis examen chemicum a Klink *) institutum haec docuit: Charta, lacca caerulea tinctorum, rubefacta reddebatur. Acidis et spiritu vini coagulatur. Aqua superinfusa primum lactea evadit, tum paulatim in solutionem ex rubro fuscam mutatur, sat magna parte praecipitata. Qua in solutione ferrum

*) Klink *Dissertatio sistens Lactucae sativae et virosae analysin chemicam.* Kiliae 1820.

muriaticum oxydatum praecipitatum deponit coloris viridescens, ferrum sulphuricum oxydatum e rubro fusci hydrargyrum nitricum oxydatum rubicundi largissimi, cuprum sulphuricum e nigrogrisei. Kali carbonicum turbationem quidem nullam effecit, sed colorem tantummodo paullo vegetiorem reddidit. — Succu lactei extractum aquosum concentratum fulvi coloris odorem suum virosu coquendo plane amisit. Perparum albuminis coagulabatur.

Aqua supra succu destillata odorem virosu, saporem ingratu exhibuit; sed acidi cujusdam nullu vestigiu prodidit.

Succu e tota planta expressus haec sub analysi chemica praebuit. Qui postquam plumbi acetici et cupri sulphurici ope praecipitatus erat, hac conjunctione aqua hydrosulphurata decomposita et ita metallis sulphuratis separatis, tum decantatus et ad crystallisationem usque evaporatus, exhibuit acidu quoddam peculiare, quod vocabatur lactucicu. Hoc acidu maximam quidem cum acido oxalico similitudinem exhibens, hoc valde ab illo differt, quod in solutione ferri muriatici oxydati liquore ammonii caustici quam maxime neutralisati sat largu praecipitatu viride efficeret, ejusque in cuprum sulphuricu reactio multo esset evidentior et coloris fusci, tandem cum magnesia sal formaret difficile solutu.

Octo grammata succi lactei inspissati continebant:

partium in aqua solubilium (materiae amarae, gummi, albuminis, acidi lactucici, calcariae et magnesia lactu- cicae, nitri)	4,1
cerae	0,7
resinae siccae (odoris in com- bustione suavis aromatici)	0,6
resinae elasticae	1,8
liquoris	0,8

Trommsdorff *) oleum foetidum ei inesse affirmat. A quonam principio Lactucae virosae vis narcotica pendeat et quaenam ejus cum scariola sit ratio, quum in illa ut narcoticum principium probeatur, nondum contigerit, haec vero analysi chemica hucusque omnino careat, certi nihil proferri potest. Quo fit, ut effectus causam materia extractiva peculiari modo mutata contineri judicent. Cui sententiae id maxime favet, quod illa demum aucta simulque planta ad maturitatem provecta, succus antea mucosus et dulcis, quo alia Lactucae species, nimirum sativa, alimentum gratissimum fit, pravam indolem acquirat. Peretti **) a gummi resina et saporem amarum, et narcoticam qualitatem derivari vult.

III. EXPERIMENTA QUAEDAM CIRCA LACTUCAE VIROSAE ET SCARIOLAE IN ANIMALIA VIM.

Priusquam vero ad ea proferenda accedamus, quae experimentis circa utramque Lactucae factis

*) Journal Bd. XVI. p. 361.

**) Vergl. Hünefeld Lehrbuch der polizeilich-gerichtlichen Chemie. Berl. 1832 p. 508.

cognita habeamus, pauca quaedam de modo ac ratione, quibus hic usi sumus, praemittere e re videtur, quum, nisi legibus, ad quas omnia infra exponenda pertineant, bene perspectis, verum iudicium ferri non possit. Quodque autem venenum corporis locum quemquam seu organon, seu systema laedere nobis persuasum est. Quodsi igitur affectionem generalem eam dicamus, in qua omnium organorum et systematum complexus via primaria actionem sequatur a norma alienam, morbum veneno productum primo localem tantum esse necesse est, quo vel organismi destructio efficiatur, vel affectione generali secundaria excitata, aut vita tollatur, aut noxio superato et crisi quadam remoto, sanus valetudinique aptus restituatur status. Jam vero a proVectis morborum, quorum fons venenum in corpus exceptum habendus est, stadiis recedamus, id tamen contendimus, in veneni virtute perpendenda primarium et localem effectum assidua diligentissimaque contemplatione et esse dignum, et inter omnes iudicari. Secundaria enim symptomata licet ad ipsam artem medicam magis redundant, tamen, quando integram veneni vim cognoscere interest, minoris sunt momenti. Huc accedit, quod in his indagandis tanta occurrat turba rerum alienarum, quas vix computes raroque investiges, ut ob has ipsas difficultates iudicium nostrum, cui in perscrutandis rerum naturalium effectibus prudentiam religiosissimam servare antiquissimum habere debemus, constantia atque veritate non mediocriter deficiat, ideoque quum rarissime et benignissima tantum fortuna ab omni parte probatum

se praebeat, literae majori aliquo profectu vix ornentur. Quis enim nostrum ea, quae ex ipso veneno sumto prodeunt, ab illis discernere poterit, quae ab aliis rationibus semper variis et mutabilibus ut indole, aetate, sexu, plethora, paraesthesi aliisque ejusmodi proficiscantur. Neque omittendum est, ejusmodi experimenta, quod mox ostendemus, in solis animalibus versari, nec, nisi rarissimis casibus et fortuna mire arridente, ut vel unum experimentum in hominibus fiat, contingere. Itaque eo cautius ratiocinandum erit, quo minore sollertia in ipsissimam animalium observationi nostrae propositorum naturam penetravimus. Quod vero in nostra, qualis adhuc fuit, toxicologia plane neglectum videmus. Quid demum comperimus, nisi ad summum, post quot horas veneno hausto animal mortuum sit? quomodo animam egerit quibusque angoribus cruciatum? Quod organon sanguine vacuum, quod refertum inveniatur? Quae profecto ei soli sufficiant, qui de singulis observationibus casu oblatis curet; scientiae vero legibus easdem cedere, minime vides. Ista enim aeternum postulat ac firmum principium, specie quidem, ut natura ipsa, mutabile, genere tamen unum idemque semper. At quanquam talis principii constituendi difficillimum est et arduum opus ut una sententia sexcentis experimentis tantum comprobetur, mortalium nemo Isidis velamen plane detrahare valet, nec mentitur fabula, cum mortem sortiri qui talia tentet, nimirum omni veritatis et sapientiae securitate amissa. Nonne igitur quemque Icarum fatalis dies manet, qui, nimis ardua hominique denegata consecutus, ad phantas-

matum aufertur domicilium; ingeniosus quidem, at nihil veram promovens scientiam.

Quare ut experimenta venenis ad artis doctrinaeque modum instituamus, necessarium nobis videtur, viam persequi hanc:

I. Animalis, de quo pericula facturi simus, naturam quam accuratissime cognoscamus, quod ita assequimur:

1. Classis, ad quam nostrum pertineat, proprietates perscrutemur et praesertim eas, quae ad rem nostram spectant, quocirca ad corporis systemata et reagendi facultatem animum advertamus.

2. Animalis ipsius singularem conditionem et habitum, quantopere possimus, exquirere conemur. Quod circa antequam ad experimenta aggrediaris, per aliquot dies animal observes oportet, ejusque mores tibi innotescant. Neque aetatem, morbos, quibus prius animal laborasset, partus etc. latere fas esse, neminem fugit.

II. Venenum quam purissimum ab animali sumatur et ita instruatur, ut diutissime cum viribus humoribusque simplicibus et organicis pugnet. Ideo praecepta observes haec:

I. Utaris semper praeparatis, qualia purissima inveniuntur vel proferuntur. Quamobrem plantas, quarum vis in animalium fabricam exploranda est, recentes adhibendas esse existimo. Quamquam autem eodem modo cum Lactuca agere in animo erat, tamen quum floris tempus prae-

terlapsum esset, succum plane purum et, ut infra describam, conspissatum adhibui.

2. Praebeas animali pridie paullum et quatuor vel quinque horis, antequam venenum offers, nihil alimenti. Qua re certus sis, quin venenum ventriculi contentis aliis secernatur.

3. Bibat aquam destillatam.

III. Venenum celerrime et rite infundatur.

Ad veneni vero effectus comperiendos et vivi animalis inservit observatio et mortui sectio. Utraque summi est momenti et sese invicem explet. Ne tamen hic inter symptomata primaria et secundaria differentiam negligas.

Mortem semper adduci secundariis symptomatibus mihi persuasum habeo, neque acidum borussicum, quod venenum maxime praesentaneum extemplo necat, excipio. Ubi enim antidotus existit, effectus secundarii ope vita servari posse debet. Neque Ammonium causticum hoc non praestare adversus illud acidum, satis probarunt exempla, quae de felibus instituebant. Nihilominus effectus primarii majoris sunt momenti et, quoniam integerrimi sunt, certissimi. Itaque eorum observationem magni me non sine jure meo aestimare puto, quin etiam, ut eorum cognitione toxicologia optime fundetur fore spero. Triplici vero modo illi explorari possunt:

1. Symptomatibus, quae vivum animal profert. De quibus mox infra.

2. Sectione animalium eorum, quae duobus, vel tribus et pluribus, secundum veneni diversitatem, ho-

ris, interdum etiam paullo post necata sunt. Ut vero celerrime interficiantur, neque agonia diutior observatio turbetur, hoc modo ago: animalis caput majore minoreve securi acutissima a trunco sejungo et filum ferreum candens per medullam spinalem extemplo perduco. Hac enim ratione omnes functiones et animales et vegetativae subito tolluntur, antequam mortis dimicatio aliquid perturbet et deforme reddat. Sectio statim instituitur.

3. Sectione animalis veneni effectum mortui. Quam primis post mortem horis, omnibus cautelis adhibitis, instituo.

Jam vero, quod ad symptomata in vivo animali apparentia attinet, omnia, vel quae levissimi videntur momenti ex anatomico quodam ordine statim notantur. Quo facto id protinus ago, ut ea ad physiologiae principia explorata referam, et, quae inde sequantur, colligam. Neque infitias ibo, hanc viam non sine magnis temporis atque operae sumtibus iniri posse. Omnes enim ad veritatem accessus sunt ardui gradumque velocem spinae retardant. Praestat vero vel unum verbum, veri adhuc ignoti aut reconditi signum atque interpretem protulisse, quam sexcenties usum esse vocabulis sonantibus quidem, quin interdum sonoris, at ineptis nilque valentibus, quae quasi vasa judices idearum, nulla experientia firmatarum.

Praecepta, quae modo nobis statuimus, quoad fieri potuit, in Lactucam quoque transferre conati sumus. Quam vero quum multifariam experiremur, ta-

men, quo minus fructus uberiores, qui desiderium nostrum explerent, caperemus, temporis angustiis impediti sumus.

Ut Lactucae praeparata quam purissima acciperemus, hac methodo usi sumus. Extractum secundum novissimam Pharmacopoeae borussicae editionem paratum quum liquidius sit, quam quod in pilularum formam redigi possit, in balneo arenae mediocriter calefacto inspissatum in pilulas grani unius conformandum curavi. Quas tamen primo integras adhibitas deinde ex causa infra afferenda pulvere radicis Althaeae obiter conspersi. Pilulae hac formula compositae sunt.

℞ Extr. Lactuc. viros. ʒj.

Pulv. hb. Lactuc. viros. ʒβ.

m. f. l. a. pil. num. LX.

D. ad Scat.

Pilularum intrudendarum ratio haec erat. In os animalis, maxillis per socium distentis, ope cochlearis lignei, instrumento illi a Daviele nomen ducenti similis, sed aliquantulum majoris pilulae ingerebantur. Quae quum primum ad imas fauces pervenisset, specillo ansato adhibito detrudebantur. Quo facto animal per aliquot sexagesimas horae partes sustinebatur, ut videremus, num nauseosum cibum vomeret. Tum animali rursus in caveam incluso, extemplo symptomatibus observandis me accingebam.

I. EXPERIMENTA CIRCA LACTUCAM SCARIOLAM INSTITUTA.

Experimentum primum.

Duae *Linariae virides* totidemque *Loxiae pyrrhulae* utriusque generis mas et femina, pullae et alacres, biduo ante experimentum in cavea vasta in cubiculo meo suspensa calore 10—15° R. observabantur. Alimentum e solito constabat pabulo et aqua destillata; excretiones alvinae plane normales. Hora quinta vespertina singulis Extracti *Lactucae scariolae* grana duo modo supra allato intrudebantur. Quod nisi violentia aliqua, sicut in talibus animalculis expectandum erat, adhibita fieri potuit, praesertim quum pilulae, mucosae immixtae, viscidae et glutinosae redderentur. Operatione absoluta animalcula, nimia credo vexatione fessa, quiete agunt; posthac vero alacriter et laete circumvolant, ita ut ne vestigium quidem effectus jam praesentis conspici possem. Corporis calor nequaquam auctus. Quo permotus, sub decimam horam vespertinam eandem dosin porrexi, sed iterum mihi, ultra duodecimam horam observationem continuanti, effectus conspicuo nullo. Postridie vero hora septima matutina, quum in eadem conditione versarentur, eadem dosis reiterata est. Simul cibus iis ademptus, potus permissus. Decima denique hora vivacitate manifeste imminuta sat quiete in caveae angulis consistunt. — Quod ambiguus pabuline inopiae, an *Lactucae* effectui tribuerem, pabulum iis objeci. Cujus quidem aliquantulo vescun-

tur, sed in eadem tranquillitate perseverantes, ac de se invicem et rebus externis parum vel nihil sollicitae. Sponte nullo modo moventur, nec si tangendo eas coëgeris. Talis rerum conditio usque ad vesperam, qua omnis motus expertes apparent. Neque iis pabulum quaerendi cupiditas inest. Hora octava vespertina *Linaria* f. sine ullo convulsionum signo placide expirat. *Loxiae* haud libero amplius gaudentes ingressu, vacillant leviterque in latus delabuntur. Tandem altera post horam octavam, altera hora nona et dimidia tranquille moritur. *Linariam* m. per noctem emortuum distortis pedibus lateri incumbentem prima luce inveni.

Cadavera haec nobis observanda tulerunt.

1. *Linaria* m. Musculi non nimis rigidi; sugillationes nullae. Intestina cibis faecibusque satis plena. In ventriculo non admodum rubro extracti duo fere grana supererant. In intestini tenuis duobus locis stricturae aliquot spasticae, de quarum vi ambiguus haereo. Pulmones pallidi, potius collapsi, quam nimis distenti. In saccis pleurae nihil abnorme. Cerebrum, praesertim pars ejus anterior, mirum in modum sanguine turgebat, ita ut vasis minutissimis rubre tincta appareret. Attamen major sanguinis extravasati locus mihi obviam non venit. Cerebellum et medulla spinalis a norma non recedunt, si exceperis, quod pars hujus sacralis rubore quodam sanguineo conspicua esset.

Linaria f. Corporis prorsus eadem conditio. Intestinum stricturam non exhibet. Ventriculo extracti granum fere integrum inest. Pulmones collap-

si; in saccis pleurae nihil, quod a norma abluderet. Cerebrum majore, quam in masculo, sanguinis copia refertum. Status congestivus in corporibus quadrigeminis manifestissimus. Plurimis medullae spinalis locis punctula sanguinea supra descripta, sed et hic sanguinis extravasati nullum vestigium. Ceterum, quod sit memoratu dignum non inveni.

L o x i a m. Intestini nulla strictura. Ventriculus sat exsanguis. Organa uropoëtica et genitalia morbose nihil praebent. Pulmones collapsi. Cor tamen dextrum multo sanguine atro distentum et aliquantulum prominens. Cerebrum rubore insigne; consistentia naturali submolli. Cerebellum sanguine carens potius quam abundans. Pari modo corpora quadrigemina, medulla oblongata et spinalis. Hujus in ganglio cervicali aliquantulum sanguinis extravasati detexi.

L o x i a f. In universum fere eadem. Sacci vero pleurae tumentiores. In intestino tenui duae stricturae. Hepar sat magnum, sanguine scatens. Intestino recto parum faecium aquosarum inerat.

Animalculorum musculi laete rubri. Venae atro-rubro sanguine turgidae.

In experimentis modo memoratis quum id neglexissemus, ut animalia secerneremus, quo singulorum excretiones alvinas observandi facilius fuisset copia, ad haecce pericula aggressi sumus.

Experimentum secundum.

Passerculi domestici quatuor per triduum mica panis albi et aqua destillata alebantur. Animalcula alacerrime, sed, ut fert eorum natura, sibi invicem

infestissime se gesserunt, ita ut alteri alteros morsibus vulnerarent. Quorum singulis hora octava matutina Extracti Lactucae Scariolae grana sex intrusa sunt. Ad meridiem usque alacritatem haudquaquam mittentes cibo vesci pergunt. Cognito autem, illorum societatem sejungendam esse, singulos sub singulis vasis vitreis amplis posui. Ex quibus unus hora praeterlapsa alvum subviridem satis liquidam non insigniter olentem deiecit. Reliquorum deinde excrementa aequae largae eundem quoque colorem et consistentiam praebuerunt. Usque ad vesperam vivide circumvolitant, nihil alieni prae se ferentes. Hora sexta vespertina avis supra commemorata imo vasi immota subsidet et exprompta parum resistit. Neque progredi, neque recedere valet. In terra posita vacillat et in dextrum latus declinat, ita ut extrema paralyti affecta videantur. Hora octava et dimidia quum denuo recognoscerem, exanimem reperi. Eodem modo ceterae se habuerunt. Sub septimam horam in tranquillum abeuntes statum, inde a decima hora, quum quominus diutius observarem impedirer, per noctem plane a me neglectae sunt, ita ut mihi postridie mane eas revisenti omnes emortuae apparent.

In singulorum animalculorum dissectione eadem fere obviam fuerunt. Singularem rigiditatem, nisi cuique cadaveri propriam animadvertere non potui, neque signa adfuerunt, e quibus convulsiones, mortis vel praenuntias vel comites, conjicere licuit. Intestina sana; e ventriculis nondum omnia veneni vestigia evanuerant; stricturae in duobus tantum conspi-

cuae. Quibus vero diffidendum esse reor, quippe in quas apud animalia quoque captiva incidimus, naturali morte extincta. Cor dextrum et hepar sanguine atro tumidum; pulmones collapsi, turgiduli, ceterum a norma non alieni. Vasa lymphatica non insigniter turgebant. Cerebro vidi insita vascula plurima sanguine repleta; passim extravasatum, semel prope ventriculos manifestum. Cerebellum integrum, item corpora et medulla oblongata. Medulla spinalis omnino non emollita, huc illuc punctulis rubris conspersa erat. — Jam vero ut videremus, an Lactucae solutio velociorem efficaciam exhiberet, hoc modo eam parandam curavimus:

℞ Aq. destill. simpl. ℥℞

Extr. Lactuc. scariol. ℥℞

M.

Quam sex passeribus intrusi. Eadem fere, ac priores, signa protulerunt, et vivi et mortui.

Itaque ad experimenta circa mammalia instituenta transii.

Exp. I. Hora secunda pomeridiana cuniculo praegnanti per biduum foeno arido et aqua destillata nutrito extracti ℥j immissum est. Extemplo omni effectu carere videbatur; animal enim in cavea quiete jacuit. Nec bihorio interposito ulla conditionis mutatio animadversa est. Pulsus solitos *) 120 per sexagesimam horae partem ictus non excessit; forsan

*) Cf. Burdach die Physiologie als Erfahrungswissenschaft 4. Thl. mit Zusätzen v. J. Müller 1832. p. 251.

duriusculus exstitit; respiratio expedita; pupilla regularis.

Post quatuor inde horas respiratio accelerata. Animalis in statu tanquam ebrio versantis motus liberi quidem sed inepti. Vacillat ac saepe in dextrum latus labitur. Faeces, ut in his animalibus fieri solet, globosae et durae. Calor corporis aliquantulum auctus; oculi splendent. Idem post bihorium rerum status, nisi quod respiratio tranquillior facta esset. Hora undecima vespertina crapula ista quodammodo adaucta videbatur. Animal omni in res externas reagendi facultate privatum et stupore oppressum in caveae angulo prosternitur. Respiratio lenta; calor cutis, praesertim in abdomine, eximius fere 35° aequat, quaemadmodum in praegnantibus animalibus semper obviam fit. Faeces non excernebantur. Pupilla coarctata, paullulum introrsum distorta, cereorum lucernaeque lumini oculis admoto segniter renitens. Talis fuit rerum conditio, quum nox jam provecta observationibus meis supervenit. Hora sexta matutina exanime reperi animal. Cadaver ex omni fere parte frigidum non ultra quartam horam matutinam vitam protraxisse me edocuit.

Sectionem statim aggressi haecce comperimus. Externus animalis habitus nil mutatus. Musculi neque nimis stricti, nec laxiores. Ac primum quidem in aperiendo abdomine animum intendi in foetus quatuordecim dierum utero inclusos. Quorum quinque deprehendi, tres in dextro cornu, in sinistro duos, justa tam magnitudine quam forma. Neque in ovi membranis alieni quid occurrit. Abdomen vero li-

quoris subflavi fere semiunciam continebat glutinosi et flocculis albidis immixti. Ventriculo nonnullae adhuc inerant reliquiae pilularum materiam solutam et pici liquidae haud dissimilem exhibentium. Tunica intima aliquantulum rubens. In intestino tenui huc illuc loca violacea apparuerunt ab iis non multum diversa, qualia in cadaveribus hominum typho peremptorum ulcusculis intestinalibus proxima inveniuntur. Omnibus quae horum locorum membranis continebantur ablutis nihil nisi ruborem sat conspicuum observare potui, ulcus vero nullum. Singulae passim stricturae mihi in conspectum veniebant, quas vero ne tantuli quidem facio, quum saepissime intestinum faeces globosas et duras complectendo angustum reddatur. Hepar penitus atro sanguine refertum, volumine adauctum, singulis locis tuberosum. Neque glandularum mesaraicarum plurimae tuberculis caruerunt, quo viso nequaquam perturbatus sum, haud immemor, tale quid ex animalis diuturna forsitan captivitate oriri potuisse.

Lien mollis et marcidus; pancreas paullulum turgescere visum; nimiam tamen liquorum praesertim mucosorum in intestino tenui accumulationem animadvertere non licuit. Renes integerrimi, aequae ac vesica urinaria et organa genitalia tam interna quam externa. Pulmones collapsi parum sanguinis continentes. Cor parvum, flaccidum; in pericardio liquoris aquosi dimidium fere cochlear. Cor dextrum atro sanguine coagulato refertum. Cranio aperto multum sanguinis effluebat. Neque minus membranae cerebri

abundant, quanquam ne accuratissima quidem investigatione extravasati locus deprehendi potuit.

Exp. II. Cuniculo, ut videbatur, prorsus sano, alacri jam ex triduo observato hora octava matutina grana quinque ingesta sunt. Paulo post herba laete vescitur. Post bihorium in eadem alacritate versatur. Quinque igitur grana addita sunt, nullo quidem prompto effectu. Hora interposita nauseae quid adest, colicis quoque doloribus affici videtur; animal enim expedito caveam percursitat, parietes morsu petit. Sat magnam foedi et peculiaris odoris urinae copiam mittit. Faeces non depositae. Ceterum hic status priori alacritati hora duodecima meridiana rursus cedit. Itaque dimidia hora post tertia vice quinque grana addita sunt. Sub vesperam stupor quidam oritur. Manet suo loco animal. Respiratio angustior, pupilla satis distorta. Motus quisque difficulter tentatus, rite perficitur. Faeces justam conditionem exhibent; urina largissima, lingua pura, humida. Pabulum repudiatur. In universum animal ita se gerit, ut se rebus externis affici patiatur et ebrium quasi statum prae se ferat. Certum motum, seu procedentem, seu recedentem, seu lateralem exercendi proclivitas nulla. In medio positum titubat, tum placide vel parieti caveae acclinatur vel humi recumbit. Tali modo usque ad duodecimam horam se habet. Hora quarta matutina animam agens reperi, omni resistendi facultate destitutum, convulsionibus omnino non correptum, languidum, ore arcte occluso. Sexta denique hora in conspectu meo exspirat. Hora nona cadaver dissectum haec ostendit:

Cerebrum, praesertim piaë matris vasa plurimo sanguine repleta. Membranae facili negotio disjungendae. Superficieï externae locis pluribus extravasatum conspicitur. In cerebello sanguis multo rarior; in cervicali medullae spinalis parte extravasata lentis fere magnitudine obvia. Pulmones collapsi. In corde nihil singulare. Ventriculi tunica mucosa modice rubra; hepar sanguine uberrimum; intestina aequae ac lien cum pancreate integra. Ipsi abdominis cavo liquoris rubecundi duo fere cochlearia minora insunt. Extremae partes non nimis rigidae.

Quae pericula similiter in tribus cuniculis repetita eadem fere nos docuerunt. Ne igitur longus sim in his denuo commemorandis, haec sufficiant, quae mox allaturus sum.

I. Quanta dosi effectum suum exserat *Lactuca*, eam constantem appellari non posse animadverti, incertus tamen, utrum animalis indoli, an dispositioni abnormi illud tribuerem, quum, alteri cuniculo grana quindecim, alteri vero drachmam demum extracti letalem esse cognoverim. Variam forsitan hujus parationem eo minus arguendam censemus, quo accuratius, ut eodem semper praeparato uteremur, provisum est.

II. In cuniculorum uno ventriculum in duas partes aequales constrictum et soluta demum ejus tunica musculari relaxatum vidi. Quod mihi ad Homii sententiam illam quadrare videtur in strenua digestionem — quam in venenis haustis semper statuendam judico — hanc constrictionem nunquam desiderari.

III. Stimulis acuum animalia tertium stadium ingressa vix movebantur.

Ex his quantuliscunque experimentis haec nobis liquere videntur:

I. Quodcunque venenum ad certum corporis systema spectare oportet. Lactuca systema nervosum potissimum afficere videtur.

II. In quo vero cerebrum praecipue tangitur, quod hisce probari videtur:

a. Cerebrum enim sanguine plurimo refertum esse, ad unam omnes animalium sectiones ostenderunt.

b. In hoc porro symptomata me adjuvant iis proxime accedentia, quae Florens in cerebro laeso semper sibi occurrisset contendit.

c. Cerebellum hujus affectionis expers esse ex eo concludimus, quod motus peculiare ejus vitia secundum ingeniosissimi Purkinje experimenta insequentes plane abfuerint.

III. Gastrica denique symptomata a nausea ingrato veneni sapore effecta proficiscuntur.

Unde haec tria intoxicationis stadia accurate discernenda puto.

I. Stadium primum nausea, subinde doloribus colicis et statu modice excitato insigne, a quadrante horae ad bihorium continuatur.

II. Stadio secundo omnia intoxicationis signa silere videntur. Quinque ad viginti horas complectitur.

III. Stadium stuporis vel potius ebrietatis horas tres ad decem perdurans.

Lactucae igitur scariolae cum Opio analogia cerebri potissimum affectione et peculiari ebrietate contineri videtur. In hisce vero differunt:

I. Opium primo stadio in nervosas cutis functiones agit *). Quod in Lactuca non observavi.

II. Opium statum vere inflammatorium cerebri efficit, quum Lactuca congestionem tantum gignat.

III. Soporis perfecti exemplum Lactuca non praebuit.

IV. Opium peculiari in tubum intestinalem vi Lactuca prorsus caret.

II. EXPERIMENTA CIRCA LACTUCAM VIROSAM.

Passeri biduo ante accurate observato hora sexta vespertina Extr. L. v. gr. ij. ingesta sunt. Intra horam solidam nihil notabile praebuit. Itaque hora septima dosis repetita est. Status hinc non mutatus; ac nona quoque hora pabuli appetentia adhuc viget. Decima igitur hora gr. ij. rursus adjecta. Necdum post mediam noctem effectus aliquis conspicuus. Sub quartam horam matutinam animal sensim quietius agit. Hora quinta fere immobile, quasi obstupefactum in caveae angulo subsidit. E loco motum, quo protruseris, eo permanet. Pupilla regularis, mem

*) Vogt, Pharmacodynamik. Th. I. §. 218.

brana nictitans paullulum demissa. Calor corporis satis adauctus. Faeces parcae, virides, aquosae. Hora septima in agone versatur, ne minime quidem convulsum maxillis arcte occlusit. Post dimidiam horam exanime reperi.

Extemplo facta est sectio non admodum rigidi cadaveris. Cranii substantia porosa multo sanguine rubefacta apparuit; nec non durae et piae matris vascula turgentia; extravasatum tamen nullum. In ipsa quoque cerebri compage sanguinis copia normam excedit. Ventriculis major justo copia liquoris cruenti inest. In cerebello sanguis insigniter rarior. Pulmones languidi et collapsi. In pleurae saccis nihil abnorme. Cor contractum, multoque sanguine coagulato refertum. Qui et in vena cava deprehenditur. Stricturee duae obviae, altera in duodeno, altera in intestino tenui. Ventriculus tertiam fere partem veneni hausti continebat. Organa uropoëtica et genitalia congestionum immunia.

Aliis numerosisque experimentis in avibus factis ea quae modo reperimus in universum comprobata sunt. Quamobrem ne molesta repetitione longus sim, insignia tantum corollario comprehendere haud absolum videbatur.

Congestiones cerebrum versus iu veneni ipsius indole positas existimo. Quarum autem varios gradus cadavera ostenderunt. Decem enim sectionibus nunc vasorum durae et piae matris nimiam repletionem, nunc locale in cerebri superficie extravasatum, modo substantiae griseae vasa turgentia, modo denique sanguinem in ventriculis depositum cognoscere

licuit. Quas vero gradus varietates ab ipsissima singulorum animalium percipiendi facultate, quo nitatur, incerta pendere arbitror. Quam prius in animalibus feminis excellere ratus, mox errore me captum fuisse intellexi, quum in pinguiissimis potissimum ceterumque sanis passeribus et linariis f. subinde nihil nisi vasorum illa turgescencia observaretur. --

Coagula sanguinis dextro cordi inclusa nunquam fere desiderabantur. — Saccos pleurae tribus casibus aëre distentos reperi, de cujus qualitate nihil habeo. Assula vero flagrans quum in eo non exstingueretur, nec non carbo candere pergeret, oxygenium non abesse interpretatus sum. — Stricturae tubi intestinalis licet saepius occurrebant, quam quas casui cuidam adscriberem, tamen multo minus mihi in rem facere videntur. Veneni reliquiae semper ventriculo vel duodeno inerant. Quod ad veneni dosin attinet, passeribus gr. v — vj., linariis gr. vj — viij., Loxiis gr. viij — x. immissa sunt.

E mammalibus cuniculos quatuor (unum marem, tres feminas), caviam cobayam f. duosque mures rattos m. in quibus periclitaremur, elegimus. Feminae ad unam omnes praegnantes. Cuniculi veneno maxime affecti. Extracti scrupulo duabus cuniculis f. et mari, granis viginti quatuor feminae tertiae; granis viginti duobus muribus rattis, granis denique triginta sex caviae mors parata est.

Venenum in omnibus experimentis haudquaquam praesentaneum, sed horis demum sex ad octodecim praeterlapsis prima effectus documenta edidit. Quae statu quodam inquieto, respiratione celeri et corporis

calore adaucto manifestabantur. His supervenit vacillatio et vertigo, ita ut conditionem prae se ferret crapulae spirituosae effectae haud dissimilem. Cerebelli affecti symptomata plane abfuerunt; nec non omnis organorum genitalium irritatio, cujus haud immerito cum illius functionibus connexum quendam statuunt. — Respiratio in omnibus animalibus pedetentim celerior et brevior evasit, ut per sexagesimam horae partem spiritum vicies triciesve solito saepius repetitum ducerent. Abdominis inflatio aliquoties observata e morbo scrophuloso potius, quam e veneno originem ducere videbatur. Faecium fluidarum in agone demum deprehenduntur secessus involuntarii. Animalia nunquam convulsa, saepius tamen nucae et extremitatum spasmis tonicis correpta animadverti.

Mortem ubique resistendi facultas amissa et status fere soporosus praecedebat. — Et hic quoque congestiones cerebrum versus symptoma sibi constantissimum exstiterunt. Sanguis in ventriculos laterales extravasatus semper fere conspicuus; vasorum sanguiferorum et diploës repletio nunquam desiderabatur. Pupilla dilatata, cerebri affectionibus adhuc latentibus, bis in promptu erat; ceteroquin illas insequi solebat. Cor dextrum nunquam non sanguine abundabat. Polypus s. d. spurios ei inclusos e diuturno agone ortos judicaverim.

Omniam illorum animalium ventriculis veneni reliquiae inerant. Intestinorum stricturae ter observatae. — Universalis eorum inflammatio nunquam; localis vero vestigia bis in duodeno, semel in colo

transverso, ter in colo dextro, semel in diverticulo sigmoideo.

In vena portae multum quidem sanguinis atri, sed minus unctuosi, quam post intoxicationem aliis narcoticis, praesertim acido borussico, effectam.

Inter venenum haustum et prima effectus indicia horae viginti duae ad quinquaginta quatuor intercessere.

IV. DE LACTUCA VIROSA ET SCARIOLA MEDICAMENTIS.

a. Lactucae usus in hydrope.

Salutari medicamentorum, quae cel. Stoerk in nosocomio Vindobonensi primum adhibuit, vi Collinus permotus, et ipse in hoc praxeos medicae campo versari sibi proposuit. Persuasum enim illi fuerat, vel intra Europae fines plantas officinales non desiderari, quibus exoticae pretiosissimae jure cederent. Quam sententiam fovens inprimis Veterum medicinam acri oculo percensendam judicavit. Ac profecto cognovit, in tanta farragine plantarum, antiquitati usitatissimarum haud paucas inveniri, quibus, injusta oblivione pressis, suus in materia medica locus restituatur dignissimas,

Quo consilio per plures deinceps annos variarum arborum, fruticum herbarumque cortices, folia et fructus multifariam examinavit. — Qua in re eos praesertim morbos spectabat, in quibus ars salutaris medicamentorum, quae adhuc valuerunt auctoritate, agmine de-

serta, ubi novum sibi exstet praesidium, circumspiciat. Ac in hydrope quidem curando, quantopere materia medica laboret remediorum praesentium satisque probatorum inopia, bene perspectum habuit **Collinus**. Nam **Colchicum autumnale**, cujus virtutes paullo ante **Stoerk** experimentis numerosis demonstraverat, licet efficax sit remedium, tamen, sicut alia medicamenta praestantissima, nec cuicunque aegro, nec quovis morbi die ob varia symptomata supervenientia convenire constat. Nec mirum, quod in hoc morbo, qui e multiplicibus diversissimisque causis ortus pro varia, quam induit, indole et diverso temperamenti, aetatis vitaeque genere variam saepe medelam requirat, antihydricum universale statui nequeat. Quo factum est, ut **Collinus** in **Lactucam**, jam prius viribus antihydricis notissimam, incideret. Summam vero observationum suarum in libello supra commemorato complexus est.

Initio **Collinus** **Lactucam** iis tantum propinavit, quorum morbus diuretica efficacissima e. g. **Scillam**, **Colchicum**, etc. pertinaciter aspernabatur; posthac vero quum e novo medicamento rem optime cedere vidisset, missis aliis remediis, ad **Lactucam** confugit primam. Ac sane prosperrimo cum eventu, ita ut antihydrici extractum cognomen a **Collino** ipsi tributum plerumque mereretur.

Hydropis vero diffusi, si causam respicis, speciebus primum **Lactucam** commendavit iis, quae anasarcae plerumque et ascitis formam prae se ferentes, cum ictero saepissime conjunctae e viscerum abdominalium proveniunt obstructionibus et indurationibus

febris intermittens diutissime protractae vel ineptis medicamentis s. d. arcanis repente suppressae assiduus fere comitibus. Nec est cur credas, sive recentibus tantum, sive levioribus in universum morbi casibus hanc medicinam admotam esse, sed persuasum tibi sit potius, hydropes Lactuca fugatos gravissimis et pertinacissimis accensendos esse.

Multorum ejusmodi aegrotorum conditio tam misera, ut de eorum salute plane desperari posset, hisce fere prodebatur symptomatibus:

Febris intermittens nunc quotidiana, nunc tertiana, nunc quartana, nunc irregularis per plures jam menses continuata vel jam evanuerat, vel adhuc simul cum hydrope vigeat. Totum corpus fusca flavedine tinctum anasarca occupabat; facies tumidissima livebat; oculi luridi; cutis sicca; abdomen aquis plenum valde protuberabat. Nonnunquam corpus durum et circumscriptum in alterutro vel utroque hypochondrio manifeste tangebatur. Respiratio crebra, brevis, laboriosa, anhelans; pulsus frequens, celer, debilis, haud raro inaequalis, intermittens, prae tumore vix tangendus; lingua flave vel fusce tecta; ciborum appetitus nullus; sitis vehemens, alvus tarda, grisea, rarius liquida, viridescens. Urinae fuscae guttatim expressae copia per nychthemeri spatium tres ad sex uncias aequans. Aegri somno vix ullo gaudentes summaque debilitate prostrati, quum ob respirationis molestias decubitum tam supinum, quam lateralem ferre nequirent, nonnunquam trunco erecto et antrosum incurvato in lecto sedentes inveniebantur.

Alteram Collinus *) aſſert hydropis ſpeciem, in qua Lactucae adest praesidium, a solidorum nimia laxitate et humorum dissolutione originem ducentem. Ubi nullum illa remedium securius, promptius et commodius efficere vidit. Hujusmodi hydrops post febres putridas in hominibus, corporis constitutione languida et debili praeditis, nec non animi curis et moerore valde exercitis frequentissime occurrit. In epidemia putrida annorum 1771, 1772 et 1773 numerosi fuere hydropici, quibus illud solum remedium auxilium tulit. Tali hydropi vulgo mox superveniebat diarrhoea adeo debilitans, ut aegrotus, dyspnoea simul admodum vexatus, quasi massa iners supine decumbens, urinam alvumque involuntariam dejiciens, mortem torpidus exspectaret.

Primum, quod Lactuca edidit laeti effectus indicium urina mirum in modum aucta continebatur, et ita quidem, ut quae antea parcissima et guttatim expressa erat, post aliquot jam dies dilutior, pellucida et flava, vel ad sedecim libras per nychthemera deflueret. Cui subinde jam ab initio diaphoresis largissima conjuncta erat; nonnunquam illa demum diminuta haec subsequebatur. Singulis casibus sola diaphoresi morbus sublatus. — Mox partium tumor collapsus, respiratio levata, expectoratio faciliior; somnus redibat placatus.

Pulsus nunquam citabatur. Alvi fluxus ad justum moderatus, appetitus resuscitatus.

Indurationum, si quae in visceribus abdominali-

*) l. c. p. 98.

bus adfuerunt, sub finem curae ne vestigium quidem digitorum tactui prodebatur.

Extractum a Collino usurpatum jam supra commemoravimus; quo in pilularum vel pulveris formam redacto saepissime uti solebat. Nonnunquam ad diarrhoeam sistendam cum Decoct. Salep conjunctum efficacissimum se praestitit. Sunt, qui credant, Collinum, ut remedii famam tueretur, alia diuretica admiscuisse. At vir fide dignissimus de hoc conubio silet, etsi sub usu ipso potum crebrum non negligendum contendat. Primo, quum Lactuae vim non sat exploratam habuisset Collinus, cautissima tantum manu eam porrigebat. Mox vero, quum inde notabilem effectum non proficisci animadvertisset, dosin multo augendam esse intellexit. Ne igitur mireris, quod dosin initio decem per diem grana vix aequantem, posteriore tempore vel tres drachmas excedentem inveneris. Quam ad varium morbi gradum moderandam censuit, et ita quidem, ut in hydrope a vitio dissolutionis et laxitatis recenter orto in minore granorum xvij., xx., xxx. per diem dosi acquiescere liceret, inveteratus autem vel cum viscerum obstructionibus conjunctus majorem ℥j — iij. sibi vindicaret. Si in augenda dosi pergebatur, nausea quidem mota est, levamen vero nullum allatum.

Hunc in modum adhibita Lactuea blandum sese et ventriculo amicissimum remedium praestitit, cuique aetati conveniens. Cujus nonnulla documenta breviter recensere mihi liceat.

Puella quaedam (v. Collini casum XVI) quatuor annorum post febrem intermittentem per quatuor

hebdomades protractam in hydropem anasarcam et ascitem incidit. Tumor totius corporis insignis, respiratio brevis, laboriosa; appetitus deletus, sitis multa, urinae fuscae et turbidae per nychthemera ζ ijj. mittebantur. Oxymel Colchici vomitu respuebatur. Nostrivero medicamento ζ ß per diem optime ferebatur. Postridie urinae excretio ad $1\frac{1}{2}$ libr. aucta per tres dies duravit. Extracti nunc scrupulis quatuor porrectis lotii copia ad 8 libras quotidie missas crevit, cutanea simul secretionem lacte procedente. Quatuor post hebdomadibus, hydrope plane sublato, aegrotula sana dimissa est.

Pari successu Lactuca iu vetula quadam 74 annorum gavisata est. (Cas. XXIV.) Hydrope anasarca et ascite, febris intermittens residua, jam per duos menses affecta in nosocomium recepta est. Extrema frigeant, cutis arida, respiratio difficillima, pulsus obtumorem non tangendus. Diarrhoea aegrotae debilissimae vires exhauriebat. Urinae e fusco nigrae e quinque jam septimanis guttatim expressae vix ζ ijj nychthemeri spatio mittebantur; lingua pallida, appetitus nullus. Extracti ζ ijß in Decoct. rad. Salep. jam insequente die alvum rariorem pultaceam effecerunt. Urinae fuscae $2\frac{1}{2}$ libr. missae; continuas mingendi molestiae. Diuresis in dies largior facta, ita ut librae iv, vi, xii ad xxiii quotidie excernerentur cum summo reliquorum symptomatum levamine. Post duos menses, valetudine recuperata, nosocomium reliquit.

Contra extractum nil prodesse cognovit Collinus, »si spissitudo humorum inflammatoria neglectis

diu remediis antiphlogisticis viscerum obstructions et hydropem produxit, vel illum comitatur.»

Quin idem, quantum ex nonnullis observationibus colligi potuit, pertinaci usu nocere posse judicavit.

Nonnunquam hydropis decursus novo febris intermittens paroxysmo interpellabatur. Tunc Lactuca interim seposita illam Cortice Peruviano fugare studuit. Quo facto ad Extractum rursus refugit.

Plurimus aegrotorum numerus sub finem curae tam bona virium conditione gavisus est, ut Collinus roborantibus medicamentis supersedere posset. Debita enim diaeta et Extracti usu diutius continuato corpus securius vidit roborari, quam usu remediorum adstringentium, quibus non radicitus forte sublata viscerum obstructions denuo saepe auctas observavit.

Qui post Collinum Lactuca virosa et scariola in anasarcam et ascitem utebantur, non una voce earum laudes praedicant.

Stoll *) ut Lactucae virosae virtutes medicas agnoscit, ita Squillae substitui posse negat, addens hanc in vias uriniferas specificè agere, illam vero solum solvendo obstructa.

Josephus de Plenciz **), cui mens fuit, in hydropico quodam tentandi, num Collini medicamen-

*) Max. Stoll, Praelectiones in diversos morbos chronicos. Vindob. 1780 p. 70.

***) Jos. de Plenciz, acta et observata medica, Pragae et Viennae. 1783. p. 107.

tum efficaciam suam, uti ipse auctor adfirmat, in parte sua salina, an potius in illo volatili, viroso et odore opio simillimo principio contineret, ipsi exhibuit conservam herbae recentis, sed sine effectu, quum contra extractum ejusdem plantae cito efficaciam suam proderet.

A Quarin *) Lactucam virosam saepe in hydrope frustra propinatam queritur, qui ei laudes tribuant, eos Squillae magnam dosin admiscuisse asserens.

Toël **) et **Comte** ***) et ipsi Extr. Lactuc. viros. cum Digitali conjunctum in ascite parum valuisse testantur.

Non video, quid sibi voluerit **Collinus**, iis tantum hydropis speciebus, de quibus supra locuti sumus, Lactucam convenire affirmans. Ac certe quidem cum illo facimus, in hydrope inflammatorio Lactucae adhibendae locum esse negante. Verum eam ut narcoticum frigidum quodam vasorum sanguiferorum erethismo non modo non vetari, sed potius requiri volumus. At suae ipsius experientiae **Collinus** repugnare videtur, quum inter hydropis casus ab ipso relatos nonnulli inveniantur (cf. cas. II., XIV. et al.) ad spasticum s. erethicum potius quam ad atonicum referendi. Illa sane rarius in ascite, nunquam non in hydrothorace et hydrope pericardii occurrit. Ne vero in opinionem adducaris, tibi saepe tam felici esse contingere,

*) **A Quarin**, Animadversiones practicae p. 188.

) **Horn, Arch. f. medicin. Erfahrung. Jahrg. 1824. 1r Bd. p. 370.

***) **Neue Samml. auserl. Abhandlgn. B. 7. p. 314.**

ut morbos hos atrocissimos *Lactuca* penitus exterminet. De hoc nemo cogitabit, nisi qui, quam variae existant illorum causae, toties vitiis pulmonum cordisve organicis inhaerentes, ignoret. Satis gloriae remedio tuo paraveris, si in eo acquiescas, ut dyspnoea vel orthopnoea quam citissime remotis, imminenti suffocationi aegrotum eripias.

Toël*) in hydrothorace, remediis alias efficacissimis incassum adhibitis, *Extr. Lactucae virosae* cum *Digitali* conjunctae saluberrimas vires cognovit.

Formula erat haecce:

℞ *Herb. Digital. purpur. gr. j.*
Extr. Lactuc. viros. gr. ij — iv.
Sach. alb. ℥j.

M. f. dos. xii D. S. Omni bi-vel trihorio pulvis sumendus.

Quas etsi *Lactucae* soli tribuere non liceat, tamen *Toël* incommoda, quae saepe post *Digitalis* usum in systema nervosum et vegetativum prodire solent, hac nonnisi temperatione tolli, post paucas jam doses diureticam hujus vim manifeste augeri, cutis transpirationem insignius promoveri, erethismum denique organorum respirationis celerius sedari expertus est. In hominibus torpidis purgans ex *Calomelane* et *Jalappa*, quo illarum effectus acceleraretur, praemittendum curavit.

Malignissimis sane hydrothoracis speciebus ea adnumeranda est, quam, ex aucta vasorum exhalan-

*) I. c.

tium actione ortam, febris scarlatina haud raro excipit. Cui spastica indole prae omnibus insignito, Toël, aliis medicamentis plane nihil valentibus, medicina ex Digitali, Calomelane et Lactuca virosa composita pluries medebatur.

Brosius *) ex duodecim aegrotis, morbo jam inveterato affectis, eadem medicina duos in integram valetudinem restituit; duobus nihil profuit; ceteris vero dyspnoeae vel orthopnoeae tam eximium fuit lenimentum, ut per plures saepe hebdomades placatissima gauderent conditione. Exemplum refert auctor, ubi quinquies per biennium hydrothoracem manifestissimum sustulit.

G. A. Richter **) Extracto Lact. viros. cum Digitali saepissime felicissimo cum eventu se usum esse narrat.

His morbi, cujus observandi in Instituto policlinico ab Ill. Hufeland et Cel. Osann moderato mihi copia fuit, historiunculam adjicere liceat. G. femina 58 annos nata, habitu plethorico, temperamento cholericum, a teneris inde sat bona valetudine viguisse contendit. Catameniorum fluxum decimo tertio aetatis suae anno intransiens congestiones caput versus et epistaxis praecedebant, nonnunquam tam vehementes, ut venaesectio institui deberet. Menstruis semper legitimis quadragesimo quinto anno cessantibus, aegra paullo post molimina haemorrhoidalia sensit, certum prodeundi typum non sequentia et post paucos dies

*) Hufeland's Journ. Bd. I. Hft. 4. p. 104.

***) Ausf. Arzneimittellehre. Berl. 1827. Bd. 2. p. 605.

rursus disparentia. Quae cum euphoria quadam per duodecim annos tolerabat. Mense Aprilis anni praeterlapsi, quum tempestati humidae frigidoque aëris afflatui se exposuisset, illis molestiis repente suppressis, insultu Asthmatis vehementissimo correpta est. Venaesectio aegrae tantum levaminis afferebat, ut post hebdomadem praeterlapsam denuo negotia aggredereetur. Remansit vero respiratio brevis, corporis quoque motu vehementiore intercepta aeque ac tussis, qua multa sputa mucosa ejiciebantur.

Die 20. Nov. iterum, refrigerio conscito, Asthmatis insultus aegram invasit. Accessit in magno suffocationis discrimine versantem eam inveni: Facie admodum rubente, trunco prono in lecto sedet; respiratio brevis, valde laboriosa. Tussis vehemens, quae inspiratione excitata, sputa puriformia copiosissima et soluta facillima profert. Pulsus aliquantum plenus, durus, non acceleratus. Aegra verbis abruptis de dolore queritur, totum sibi pectus constringente. Lingua muco subflavo leviter tecta, sapor amarus, ciborum appetitus nullus, sitis magna, alvus ex triduo adstricta; urina parca, pallida. — Venaesectio $\frac{z}{3}xvj$ instituta, interne purgans salinum porrectum.

D. 21. Nov. Conditio aegrotae multo melior. Asthma paullo post sanguinem detractum adeo mitigatum est, ut insequente nocte aegra per tres horas somno tussi solum interrupto gauderet. Materiae puriformis ejectae eadem copia. Alvum ter faeculentam deposuit.

Sensim appetitus reviviscit, somnus diuturnior; respiratio brevis quidem, nec situ impedita ullo. Per-

durat tussis aegram admodum vexans. Sputorum eadem conditio. Urinae pellucidae pallidae justa copia, alvus regularis. Sumit aegra:

℞ Extr. Dulcamarae ʒj

— Millefol. ʒij.

Aq. commun. ʒvj.

— Laurocer. ʒj.

Tart. emet. gr. β.

Succ. liquir. ʒβ.

MDS. Omni bihorio cochlear majus.

Pro potu ordinario Speciebus pectoralibus Ph.P. utitur.

Talis rerum status ad medium usque Decembrem continuabatur, quo aegrae prima febris hecticae signa supervenere. Respiratio brevis manet. Tussis vero adaucta et post cibum quemlibet potumve sumtum provocata sputa supra descripta facile promovet. Urina parum sedimenti puriformis deponens dimidio minore copia, quam prius, excernitur. — Dextro brachio vesicatorium perpetuum e Cort. Daphnis Meze-rei applicatum.

D. 21. Dec. sub meridiem aegram febricitantem inveni, genis circumscripse rubentibus, palmis sudantibus. Manus dextra nec non genitalia externa aliquantulum tument. Urina flava, pellucida, largo sedimento puriformi. Reliqua symptomata haud mutata. — Pulv. hb. Digital. gr.β ter per diem porrectum. Neque hac, neque duplicata dosi ullum levamen efficiebatur. Post decem dies quum aegra pulverem re-

spueret, Infusum hb. Digital. e ℥j paratum cum Spir. Nitri dulcis ℥ss praescriptum.

D. 2. Jan. Hydrops admodum crevit. Tument facies, manus, pedes; abdomen sat molle quidem, manifestissimam tamen fluctuationem praebet; spirandi difficultas summa, maxime quum supina cubaret. Urina, non obstante Digitalis usu, prodibat pauca fusca, turbida, sedimentum jam notatum gerens; pulsus frequens, duriusculus, parvus. Dosis Digitalis ad ℥ss aucta.

D. 3. Jan. Aegra per noctem valde irrequietam in lecto sedit, vehementi orthopnoea affecta. Et mane quoque difficillime spiritum ducit, dextrum praecipue pectoris latus quasi pondere sibi comprimi conquesta. Dextra manus insigniter tumet; ascites non adauctus; pulsus minus frequens, ceterum idem. Urinae ejusdem notae duplex hesternae quantitas.

D. 4. Jan. Orthopnoea ingravescit, ita ut manibus sellae proximae adpressis laboriose spiret. Capitis gravitatem et vertiginem accusat. Pulsus tardus (45 ictus in horae sexagesima parte perficiens), post decimum quemque ictum intermittens. Quae symptomata Digitalis usu effecta judicans, suadente Cel. Osann, hanc medicinam praescripsi:

℞ Extr. Lactuc. viros.

— Hyoscyami.

Pulv. Herb. Hyosc. aa. ℥ss.

M. f. pilulae num. XLV.

DS. ter quotidie pilula sumatur.

D. 6. Jan. Orthopnoea continua. In dextra thoracis parte, ceterum non elata, dolores punctorii vagantes. Abdominis moles paulo adaucta; fluctuatio percipitur. Manus dextra multo sinistra tumidior. Pulsus 55 per h. m. ictuum, non amplius intermittens, urinae eadem ac here copia. — Pilulae quatuor.

D. 7. Jan. Paulo melior aegrae conditio. Difficulus quidem, sed capite in pulvinar reclinato, spiritum ducit. Tussis perseverat. Sputa eadem. Dolores pectoris minuti. Pulsus ut pridie. Idem partium tumor. Urina aliquantulum copiosior. — Eadem pilularum dosis. — Sub vesperam inconsuetam hilaritatem prodit aegra. Expediior ei procedit respiratio, ut vel in dextrum latus decubitu non insigniter impediatur. Tussis aliquanto rarior. Urina per diem missa duplicem hesternae copiam excedit.

D. 8. Jan. Perbene se habet. Somno enim quinque horarum tussi parum interrupto non mediocriter restauratam se sentit. Quemque situm fert. Tussis quoque vehementia mitigata. Manus et abdomen admodum detumuerunt. Cibos appetit. Pulsus idem. — Urina flava, turbida, sedimentum continens puriforme largissimum, tria vasa majora explens. — Pilulae quinque.

D. 9. Jan. Dyspnoeae nullum fere vestigium. Madet cutis adhuc sicca. Urinae ejusdem qualitatis duplex fere hesternae copia.

Lactior in dies rerum mutatio observatur. Respirationis omnes molestiae absunt. Urina per diem excreta quinque vasa non excedit; a **D. XVIII. Jan.** ad justam copiam moderata. Inest ei parum illius

sedimenti. — Alternis diebus una pilula addebatur, et ita quidem, ut ad decem ascenderetur. Neque hac dosi aegrae incommodi quid paratum. Tum, hydrope omnino sublato, pari modo in dosi diminuenda agebatur. — Vires aegrae diaeta roborante adeo firmatae, ut a D. I. Febr. in cubiculo ambulare inciperet. Superstes tantum tussis sat vehemens. Nec sputorum copiosorum qualitas mutata.

D. 24. Febr. fenestra aperta quum aëri perflanti sese exponeret, sub vesperam insultum Asthmatis levio-rem perpessa est, bihorium perdurantem. Sed bi-duo post pedes et abdomen tumescunt, postridie dyspnoea accedit. Pilulis Extracti Lactucae virosae (gr. x. per diem) in usum vocatis post hebdomadem hydrops evanuit. Inde ab hoc tempore conditio aegrae tam emendata est, ut D. VI. ante Cal. April. dimissa, tussicula tantum vexata ad negotia domestica redire posset.

Pari fortuna in eodem policlinico alius hydrothoracis casus curatus est.

b) *Lactucae usus in Angina pectoris, Asthmate, Palpitatione cordis.*

Schlesinger *) sex morborum historias memoriae tradidit, qui, licet non ex omni parte Anginae pectoris denominatio in eos cadere videatur, medicaminis summam praestantiam novis documentis confirmant. Dirissimis enim morbi symptomatibus, mor-

1) Hufeland Journal 28, 1. p. 57.

tem suffocatoriam minantibus mirificum attulit lenimentum. Aegrotus, cujus prima historia memorat, in ipso insultu e lecto prosiliens fenestram petiit, ubi liberam animam quaereret. Alius casus cum hydrothorace conjunctus erat. Extracti Lact. viros. gr. ij. Hb. digital. gr. β addidit. Semper quatuor sexve dosibus tam prospere rem cedere vidit, ut proximus insultus vel minore vehementia conspicuus esset, vel plane sileret. Diuresis larga, diaphoresis modica observabatur. — Uno in casu, quum prima jam pulveris dosi aegroto nausea ciceretur, tincturam hoc modo parandam curavit:

℞ Fol. Lact. viros. ζ j.

Macid. ζ j.

Concis. minut. et add.

Alcohol. vini

Aq. destill. aa. ζ jv.

M. dig. p. aliquot dies, exprim. et filtr.

S. omni horae dimid. 15 guttae sumantur.

Ipsae affirmat auctor, pharmacopolam, quum Lactuca virosa non in promptu esset, L. scariolam adhibuisse. Nec efficaciam minorem inde proficisci vidit.

In Asthmate magnum sperandum esse a Lactuca adjuvamentum, ex iis, quae supra attulimus, liquet. Sed probe dignoscas, in Asthmate praesertim mere dynamico, quemadmodum ex affectionum animi intemperie

originem ducat, princeps et heroicum remedium, quod Opio substituatur, dignissimum, in Lactuca inveniri. Rarissime vero haec morbi species occurrit. Qui enim diversissimas causas agnoscens quum saepissime symptoma tantum aliorum morborum, vel in organis respirationis, vel in abdomine haerentium observetur, tum Lactucae nonnisi palliativi medicamenti vis eximia inerit. Wolff Varsoviensis *) bis sibi in Asthmate ex arthritide retrograda orto opem tulisse refert Extr. Lact. viros. in pulveris vel pilularum formam redactum, quarum praecipue cum Guajaco, Camphora et Oleo Sassaffr. compositionem laudat.

Eadem experti sunt Gumprecht **) (Extr. Lactuc. viros. gr. j. c. Morphii acet. gr. $\frac{1}{8}$ omni bihorio vel trihorio), Richter ***) et Toël †).

Medicus quidam Petropolitanus ††) palpitationem cordis vehementissimam, per plures annos stato tempore cum catameniis redeuntem et quodcunque anti-spasmodicum aspernantem quatuor granorum dosi bipartita ex toto cedere vidit.

Toël in morbis quoque organicis cordis suam medicinam saluberrimam praedicat. Insultus dys-

*) Hufel, Journ. Bd. 30. 1, 115.

**) Harless n. Jahrb. Bd. 4, St. 1. p. 205.

***) Richter Spez. Therapie Bd. 11, S. 355, — Ausführl. Arzneimittellehre Bd. 2. p. 606.

†) l. l.

††) Vermischte Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunde, herausg. von den Petersburger Aerzten Iste Samml. p. 228. Vgl. Rust Magazin Bd. 10, p. 358.

pnoeae ea minuti, transitus in hydrothoracem retardatus, vita miserrima sustentata.

c) **Lactucae usus in tussi convulsiva.**

Ex ipsa remedii indole patet, tum modo salutem allaturum expectari posse, quum, stadio catarrhali superato, morbus in stadium mere convulsivum transierit. Quid? quod non solum narcoticorum agmen hic commendatum vi aequiparet, sed etiam multis numeris superet. Quae enim jure illis vitio datur narcosis infantili, de qua hic potissimum agitur, aetati infestissima, in Lactucam non cadit. Quamobrem non nimis caute in ea porrigenda agere licet.

Gumprecht *) qui spastica quadam diaphragmatis affectione et nervi vagi phrenicique perversa sensibilitate morbi focum contineri vult, Lactucae virosae prae ceteris narcoticis palmam defert. Nec absolum ei videtur, si eximius, qui procul dubio systemati cutaneo cum organis respirationis et visceribus uropoëticis intercedit antagonismus respiciatur, diaphoresi et diuresi adaucta illorum nervorum sensibilitatis alterationem effici. — Extractum pulveris forma a $\text{gr. } \frac{1}{3}$ — β cum Saccharo lactis omni bihorio dedit. Tussis inde rarior multoque mitior, anxietas

*) Hufe Land Journ. B. 39. 4, p. 109. — Medical surgical transactions Vol. VI. p. 608. — Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauch für praktische Aerzte Bd. 26. S. 32.

minuta, constrictio circa regionem epigastricam sedata, sputa facillime soluta, urina copiose missa.

Chaufepié, Hempel et Jacobson*), medici Hamburgenses, cum successu admodum felici multos per annos se Lactucam usurpasse perhibent.

Osann**) Extractum Lactucæ scariolæ methodo Schuetziana paratum in duobus infantibus 4 et 6 annorum adhibuit. Eorum major, quum granum per diem parum proficeret, duplicatam dosin et manifestissimo quidem cum fructu sumsit. Tussis enim per plures jam hebdomades protracta, nec mediocrem vehementiam nacta, utrique intra decem dies adeo moderata est, ut brevi roborantium usu sanatio perficeretur. Non aequè bonus eventus neque usu Lactucarii Anglici e Lactuca fativa, neque Extracti Lactucæ virosæ et scariolæ eadem methodo in Germania parati in conspectum venit, quum inter sex infantes aliis quidem affectiones spasticas levarent, aliis vero, vel valida dosi adhibita, nihil fere prodessent.

Krukenberg***), licet remediorum antispasmodicorum in curanda tussi convulsiva parum certum effectum accusans, tamen Lactucæ virosæ meritas laudes non denegat. Qua enim, aliis narcoticis missis non solum tussis accessiones mitiores et rariores reddi, sed quandoque etiam morbi decursum præcidi

*) ib, p. 83.

**) Jahresbericht des Königl. Poliklinischen Instituts der Universität zu Berlin von 1820 — 22. p. 19.

***) Jahrbücher der ambulatorischen Klinik zu Halle herausg. v. P. Krukenberg. Halle 1824. p. 238.

observavit. Tenellis infantibus granum quadrantem aliquoties de die porrexit, dosi quotidiana sensim ad gr. ij—iij adaucta. Infans annum et dimidium agens quatuor quoque grana sine ullo incommodo tulit.

Haugk *) in epidemia tussis convulsivae quum omnia s. d. specifica futilia se praestitissent, Extractum Lactuae virosae cum Calomelane et Ipecacuanha conjunctum salutiferum testatur.

Nec minus equidem duabus puellis, alteri 6, alteri 7 annorum, sputis emetico elicitis, Extr. Lactuc. virosi. (dosi gr. β sexies de die) cum Saccharo Lactis morbum per mensem integrum productum, intra sex dies sublatum expertus sum.

Ac de his quidem hactenus. Quodsi igitur ea, quae adhuc de Lactuca virosa et scariola experti sumus nobiscum reputaverimus, haec fere inde colligemus:

- 1) Duplex iis inest vis: altera, ex indole narcotica profecta et primaria, sedans, anodyna, antispasmodica — altera et secundaria ad systema vegetativum spectans, resolvens, diuretica; ita ut medium quoddam inter narcotica pura, et acria tenere videantur.
- 2) Narcoticum principium admodum volatile, in recenti succo lacteo integerrimum, prout hic

*) Neue Zeitschrift für Natur und Heilkunde, herausg. von den Professoren der chirurg. mediz. Academie zu Dresden. — Dresd 1830. Bd. 1. p. 430.

chemico aliquo modo seu coquendo, seu colando mutetur, abolefcit.

3) *Lactuca virosa* ob majorem, quae ei inest succi lactei copiam vi narcotica *L. scariolam* superat.

4) In hac vero vis resolvens major, quam inprimis *Collini* observationes supra laudatae testantur. Summopere dolendum, quod hic effectus nostris diebus omnino in oblivionem adductus sit.

5) Quodsi igitur medicamina nostra contra illos pectoris morbos erethismum insigniter manifestantes efficacissima probata sint, arctioribus tantum finibus eorum usus circumscriptus esse videtur nec quidquam obstare existimo, quo minus et iis in universum morbis, in quibus aut systema nervosum nimiam prae se ferat sensibilitatem aut eadem ex causa systematis irritativi adsit erethismus; nimirum toto illi affectionum spasticarum et dolorificarum censui, ut nonnullas modo dicam, tussi vehementi siccae phthisicorum, cardialgiae, vomitui spastico, colicae hepaticae (*Durande*), spasmis vesicae urinariae, hypochondriasi etc. egregie coueniant.

V I T A.

Natus sum ego **Henricus Hirschfeld** patre optimo **Ludovico**, quem mihi fato ereptum lugeo, matre carissima **Augusta** e gente **Gabrielli**, qua superstite gaudeo, **Glogaviae**, **Silesiae inferioris** oppido anno nostri seculi octavo, fidei veteri addictus. Prima literarum rudimenta in ipsa patria urbe edoctum, avunculus benignissimus **Mauritius Gabrielli**, mercator **Vratislaviensis**, in domum suam recepit paternoque animo summis accumulavit beneficiis. Inde per septem annos in **Gymnasio Magdalenaeco** studiis, quae literis academicis viam sternunt, vacavi; ubi praeceptoribus usus sum eruditione et exemplo praestantissimis, **Beato Mansone** **Gymnasii Directore**, elegantia studiorum clarissimo, **Doct. Kluge**, cujus auspiciis nunc illud floret, **Beat. Wellauer**, praematura morte literis erepto; **Doctissimo Klossmann**, perennem antiquitatis fontem mihi aperiente; **Ill. Glocker** aliisque, quorum memoriam nullum tempus delebit. Testimonio maturitatis instructus anno **MDCCLXXVII** ab **Ill. Schulz t. t. Rectore** magnifico, civibus **Universatis** **literariae Vratislaviensis** et ab **Ill. Purkinje**, facultatis decano maxime spectabili, medicinae studiosis adscriptus sum. Per triennium clarissimorum virorum his scholis interfui: **Ill. Passow** de **Aristophanis Acharnensibus**, **Theocriti Idyllis**; **Ill. Schneider** de **Platonis Civitate**; **Ill. Wachler** de **Historia universali**, et civili et literaria; **Ill. Branis** de **Logica**; **Ill. Trevirani** de **Botanica plantarumque Physiologia**; **Ill. Goepfert** de officinarum plantis, de chemico **Formulari**, **Ill. Glocker** de **Mineralogia**; **Ill. Steffens** de **Physica**; **Ill. Fischer** de **Chemia** et anorganica et organica, quem universali, tum pharmaceutica, de mineralibus fontibus, de **Reagentibus**; **Ill. Frankenheim** de **Physica**

experimentali, Ill. Otto de anatomia et humana et animali tum physiologica tum pathologica; Ill. Purkinje de Physiologia et Pathologia, Ill. Wendt de Materia medica, de Therapia speciali; Ill. Remer patris de Therapia speciali, Cel. Hemprich de temperamentis. Nec non clinicum medicum ab Ill. Remer moderatum frequentavi.

Mense deinde Aprili anni MDCCCXXXI Universitatem literariam Berolinensem adii, ubi ab Ill. Boeckh t. t, Rectore magnifico, ab Ill. Fr. Hufeland t. t. medicorum decano maxime spectabili, in civium academicorum numerum receptus sum. Hac in alma literarum sede scholis clinicis interfui Perill. Hufeland, Ill. Osann, cujus in me benevolentiae semper memor ero, Ill. Busse, Barez, Bartels, Busch, a Graefe, Rust, Wolff.

Quibus p̄aeceptoribus, viris illustrissimis, doctissimis gratias quas habeo maximas refero. Jam vero rite tentatus et examinatus, dissertatione thesibusque defensis, spero, fore ut summi in medicina et chirurgia honores in me conferantur.

THESES.

- I. *Non sunt peculiare oculorum morbi.*
 - II. *Lactuca virosa multis in morbis Opio praeferenda.*
 - III. *In Mania venaesectiones plerumque nocent.*
 - IV. *In Diabete mellito mel chemice efficitur.*
 - V. *Sectioni forensi jurisconsultum adesse non oportet.*
-