

De adiposi praecipue locali (adiecta tumoris steatomatoso-fibrosi insignis historia et tabula) : dissertatio inauguralis medica ... / auctor Alexander Jusefowitsch.

Contributors

Jusefowitsch, Alexander.
Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin.
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Berolini : Typ. Nietackianis, 1838.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/yu6kc4h7>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Dissertatio inaugural

Kaminsky, Christoph

Royal College of Su

[366] b22483

Mar 01, 2016

b22483184

b22483184

DE
ADIPOSI PRAEcipue
LOCALE

(ADIECTA TUMORIS STEATOMATOSO-FI-
BROSI INSIGNIS HISTORIA ET TABULA).

DISSERTATIO

INAUGURALIS MEDICA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE
GRATIOSI MEDICORUM ORDINES

IN

ALMA LITERARUM UNIVERSITATE
FRIDERICA GUILLEM

UT SUMMI

IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORES

RITE SIBI CONCEDANTUR

DIE XXIV. M. MARTII A. MDCCCXXXVIII.

H. L. Q. S.

PUBLICE DEFENDET

AUCTOR

ALEXANDER JUSEFOWITSCH

ODESSAVIENSIS.

OPPONENTIBUS:

S. GOTTHEIL, MED. ET CHIR. DR.

A. RAFFALOWITSCH, MED. ET CHIR. CAND.


B. REDLICH, MED. ET CHIR. CAND.

BEROLINI,

TYPIS NIRTACKIANIS.

10
b22483
The University of Melbourne Library
Bundoora VIC 3013 AUSTRALIA
13641 b22-483 184
ISSN 01-2016

VIR O
PERILLUSTRI, EXCELLI
DOCTISSIMO
CAROLO DE GE



11

Dissertatio inaugural
Kaminsky, Christop

Royal College of Su

[366] b22483

Mar 01, 2016

b22483184

ID

5

De funiculi umbilicalis deligat
Kaas, Franz; Friedrich-Wilhelm
Royal College of Surgeons of I

[364] b22483184

Mar 01, 2016

V I R O

PERILLUSTRI, EXCELLENTISSIMO,
DOCTISSIMO

CAROLO DE GRAEFE,

MEDICINAE ET CHIRURGIAE DOCTORI, PROFESSORI PUBLICO
ORDINARIO IN UNIVERSITATE LITERARUM FRIDERICA GUI-
LELMA, MEDICORUM CASTRENSIUM REQUE OMNIS MEDICAE
EXERCITUS BORUSSICI PRAEFECTO SUMMO, AUGUSTISSIMI RE-
GIS ARCHIATRO EJUSQUE A CONSILIS MEDICIS INTIMIS SU-
PREMIS, DIRECTORI INSTITUTI REGII CLINICI ET POLICLINICI
CHIRURGICO - OPHTHALMOLOGICI, INSTITUTI REGII MEDICO-
CHIRURGICI FRIDERICO-GUILLEMiani ET ACADEMiae REGiae
MEDICO - CHIRURGICAL MILITARIS CONDIRECTORI, COMPLU-
RIUM ACADEMIARUM ET SOCIETATUM LITERARIARUM SODALI
ETC. ETC. ETC., ORDINUM INCLYTGORUM BORUSSICORUM DE
AQUILA RUBRA IN CLASSE SECUNDA, FRONDE QUERNA DE-
CORATA, ET DE CRUCE FERREA IN CLASSE SECUNDA, ROS-
SICORUM ST. VLADOMIRI ET ALEXANDRI NEVSKI, GALLICI
LEGIONIS HONORIS, DANICI DE DANE BROGOHO, SUECICI VA-
SANI, HANNOVERANI GUELPHORUM EQUITI,

Dr. Koenigsmann & Co. (Haus der
Kunst) - Prinzregentenstrasse 10
1071 Berlin-Westend - Westberlin
13641 030-4822-4831-184
Telefon 030-20316

VIRO CELEBERR

R. FRORIEP

MENNON ET CIE, PARIS, EST
UN DES PLUS GRANDS EDITEURS
DE LIVRES DE CHIMIE, PHYSIQUE,
MÉTALLURGIE, MINÉRALOGIE, GÉOLOGIE,
PHYSIQUE SOCIALE, SCIENCE POLAIRE,
ET DE MÉTIERS, TOUTES SOUPORTANT UN
PRIX TRÈS FAIBLE.

PRAECEPTORI MAXIME C

RO. CELEBERR

R. FRORIEP

NEC NON
MENNON ET CIE, PARIS, EST
UN DES PLUS GRANDS EDITEURS
DE LIVRES DE CHIMIE, PHYSIQUE,
MÉTALLURGIE, MINÉRALOGIE, GÉOLOGIE,
PHYSIQUE SOCIALE, SCIENCE POLAIRE,
ET DE MÉTIERS, TOUTES SOUPORTANT UN
PRIX TRÈS FAIBLE.

PRAECEPTORI MAXIME C

—
0

11

Dissertatio inauguralis
Kaminsky, Christoph

Royal College of Sur

[366] b22483

Mar 01, 2016

b77483106

b22483184

ID

ID

De funiculi umbilicalis deligat
Kaas, Franz; Friedrich-Wilhelm
Royal College of Surgeons of L

[364] b22483184

Mar 01, 2016

1000

VIRO CELEBERRIMO

R. FRORIEP,

MEDICINAE ET CHIRURGIAE DOCTORI, UNIVERSITATIS LITTERARIAE FRIDERICAE GUILLEMMAE PROFESSORI NEC NON ACADEMIAE ARTIUM LIBERALIUM PROFESSORI, REGIS A CONSILIIS MEDICIS, PLURIMIUM SOCIETATUM SODALI, ETC. ETC.

PRAECEPTORI MAXIME COLENDO

ОЛОГИЧНАЯ СЕТЬ

STUDIORUM PRIMITIAS

PIO, GRATIOQUE ANIMO. **D. B. D.**

AUCTOR.

PRAEFATI^O

Commentis hoc, quas lectori bene
eigen obet observationi tomatis a
sequenti, qui ab illo indeciso inservit
ophthalmia et desuscula. Nec
caloris, a principio vero summa
Festivis inservit, degenerationem ex-
fonsis anteriorum in nalen statim
que insopere sustinet excludit adi-
figens lateritiam, que dissertatione 2
is et prius dicentissima acutissima agimus
necesse, principiebus nostris cariae
villent de Graefi, qui solis permis-
tione pollici levantes jucis, et col-
tura, qui manu, que in ea est, la-
dant caliditer quam disquisitio
nojus libentius suscepit, immo-
re proponit, ut levaretur
adsoner.

...en tumoria de
localització hepàtica, si abans
que la degeneració es manifesta,
no pateixen els símptomes
de la cirrosi.

Dissertatio inaugural
Kaminsky, Christoph
Royal College of Su

[366] b22483

Mar 01, 2016

h77883106

b22483184

C

ID

De funiculi umbilicalis deligat
Kaas, Franz; Friedrich-Wilhelm
Royal College of Surgeons of I
[364] b22483184

Mar 01, 2016

PRAEFATIO.

Commentatio haec, quam lectori benevolo offerimus, originem debet observationi tumoris insignis in puerो sesquienni, qui ob' id malum institutu regio chirurgico-ophthalmiatrico erat demandatus. Mortuo puerō, sectio cadaveris, a praeceptore meo summe venerando Cel. Froriep instituta, degenerationem exhibuit muscularum femoris anteriorum in mole steatomatoso - fibrosam, quae tantopere nostram excitavit admirationem, ut eam dignam haberemus, quae dissertatione illustraretur. Qua de re gratias sincerrimo animo agimus, quas possumus maximas, praeceptoribus nostris carissimis, illustrissimo scilicet de Graefe, qui nobis permisit, ut hanc observationem publici ficeremus juris, et celeberrimo R. Froriep, qui summa, quae in eo est, humanitate tam sectionem cadaveris quam disquisitionem tumoris microscopicam lubentissime suscepit, imo vero eo benevolentiae processit, ut iconem tumoris dissertationi additam conficeret.

Notabilis illa degeneratio in substantiam steatomatosam primum nos impulit, ut ab auctoribus descriptos similes easus, et quae de earum natura atque indole habentur, comparemus atque componamus. Continuata au-

AUCTOR

tem nostra disquisitione ad investigationem omnium morborum perducti sumus, qui materiae adiposae peccanti debentur. Quae in hac indagatione de morbis ex adipe oriundis invenire potuimus, hic apponere nostrum duximus, eo magis, quod tumor, de quo egimus, licet structura praevaleat fibrosa, tamen auctore Ritter ad degenerationem steatomatosam referendus est, utpote in qua structura fibrosa materiae adiposae praevaleat. —

DE MORBI NOMINE ET DIVISIONE.

Adiposum vocamus eum morbum, quo adeps aut copia nimia aut indole mutata symptomata a statu normali recessentia efficit. Est autem adeps ut aqua, quae in corpore humano interstitialis occurrit, secretum telae cellulosa, et aqua quidem cellulis seceruntur apertis per totum corpus inter se ita cohaerentibus, ut aqua producta vix ex una cellula ad alteram permeare possit. Adeps autem cellulis clausis non cohaerentibus producitur et continetur, etsi negari non potest, hoc secretum in locis quibusdam nonnunquam morbo produci, qui in sano statu nihil ejusmodi contineant, ut in cerebro et aliis locis; in hoc autem casu dupli modo generationem hujus secreti explicare possumus: aut enim novae oriuntur cellulae adipi generando dicatae aut adeps, qui in organis latet, excluditur et quasi exsudatione quadam deponitur. Omne autem secretum dupli modo coacervatur: aut enim actione aucta copia excedit, aut, quod copia normali productum est, in loco secretionis iners remanet, languriente aut resorptione, aut egestione. Quando autem in adipi hoc vel illud eveniat, neque observatione neque experimentis satis demonstratum est.

Das Konvolut ist vom Archiv bestellt.
Klaus Fuchs, Archivmitarbeiter, dokumentiert
Körper und Gesicht des betroffenen Kindes.
13641 D22-2483 184
Datum 01.01.2016

I. ADIPOSIS UNIVERSALIS
a) generalis
b) praedita

II. ADIPOSIS LOCALIS
a) diffusa
b) circumscripta

c) heteromorpha adipositas
d) lipomatosis

e) tuberositas
f) sudorifera

Quippe nequa in tantum, quae
un, talibus, morbi prodicunt, ut morbi
iuge morbi perducunt, ut morbi
iuge avidenti prodiunt eligantur, ta-

Dissertatio inaugural

Kaminsky, Christoph

Royal College of Su

[366] b22483

Mar 01, 2016

b22483184

ID

De funiculi umbilicalis deligat
Kaas, Franz; Friedrich-Wilhelm
Royal College of Surgeons of I
[364] b22483184
Mar 01, 2016

ID

b22483184

11

9

Adipis copia per totam corporis superficiem augeri ultra normam potest, saepenumero ita, ut hac non contentus in cavitatibus deponatur et quidem actione aut aucta aut diminuta; talem morbum nominamus adiposin universalem, quam dividimus in activam et passivam. Potest etiam adipis copia ad unum tantum corporis locum praeter normam congeri, id quod constituit adiposin localem, quae variis modis occurrit, modo enim talis coacervatio adiposa nullam offert certam atque finibus exactis circumscriptam formam, quam adiposin diffusam salutamus, aut circumscriptam habet formam, quam appellamus adiposin circumscriptam canque iterum segreganus in lipoma et steatoma. Oritur denique adeps etiam ex transformatione aliorum organorum, quem morbum nominamus metamorphosis adiposam, quae iterum duplex est: lipomatodes et steatomatodes.

Totum igitur adiposis genus tali modo dispescitur:

I. ADIPOSIS UNIVERSALIS.

- a) activa
- b) passiva

II. ADIPOSIS LOCALIS.

- a) diffusa
- b) circumscripta
 - 1) lipoma
 - 2) steatoma
- c) metamorphosis adiposa.
 - 1) lipomatodes
 - 2) steatomatodes.

Quamquam adeps in omnibus, quos modo recensuimus, casibus, morbi productum atque effectus est, neque leges nosologiae permitunt, ut morbi productum tanquam dividendi principium eligatur, tamen, cum prae-

seute scientiae conditione nondum compertum habeamus, quaenam et qualis solidarum partium affectio subsit, auctores secuti eos, qui etiam ex hydrope propriam constituerunt familiam, non dubitavimus, etiam adiposia nostram tali modo pertractare; nam quod Schoenleinius⁽¹⁾ adiposin ad cyanoses refert, scilicet ad eos morbos, qui respirationi imperfectae originem debent, infitias ire non possumus, talem statum in omnibus casibus locum non habere.

DE ADIPOSI UNIVERSALL.

Si adeps per totum panniculum adiposum tanta deponitur copia, ut symptomata a statu normali recessentia efficiat, adiposis oritur illa, sive obesitas, sive polysarcia, cuius symptomata tam graphicce depinxit praeceptor meus summe venerandus de Graefe⁽²⁾. Omnes enim lineae, quae corporis habitum, undose decurrentes, pulchritudine humana ornant, evanescunt adipi extinctae, muscularum torositas disparat, caput intra humeros immergitur, quibuscumque in locis motis cutis plicata redditur, oriuntur tori adiposi; mammae et abdomen dependent et quidem ita, ut abdomen organa genitalia abscondat; oculi subsidunt, organa tantum genitalia et malleoli depositione adiposa destituntur. Huc accedunt symptomata secundaria, magna plerumque inertia, quamquam non desunt exempla roboris muscularis adacti⁽³⁾, pulsus irregularis, saepenumero intermittens, quod oritur ex adipi eodem tempore in cavitate thoracis deposito, cui etiam debetur orthopnoea

(1) Pathol. u. Therap. Vol. II. gen. V.

(2) von Graefe u. Walther Journal für Chirurgie und Augenheilkunde Bd. 9, Heft 3, pag. 367.

(3) vid. Encyclopaed. Wörterbuch der med. Wissenschaften herausgegeb. v. d. Prof. d. Med. Fac. Berlin Bd. I. art. adiposis.

De Funiculi
Krause, Verne, Antonius, distillat
Krause, Verne, Antonius, distillat
13641 b22.2483.184
Date 01-2016
Museum
ID b224831
Barcode

agimus d' hypomnie frequens, irre
dis flaccido, quis jun Hippocrat
pro frequi ora mortis obseruit
dyspepsia ciborum turbata, ut fames ea
in frequi, quis Berckave et B
atii peint, quod evanescit nujus ab
electio virtutibus lassus; prader
tuis lassus tuis sunt salares, obser
vatis niente, suspensus estem
mox, runculus, jactu facilius ge
stare.

Mox opa hoc h' modo nolu
traxi cred. legitim, quoniam et C
pr spississima et pavid COCLIT
vomit; illi obesas var Leucari
sim pavis lassus DIL, tactus fra
sus alios, quoniam exempli quid N
iunies, quoniam non nisi lassus
alii LASSUS, tactus CLXXXVII ha
bilem non nolis tadiis apparuit, ma
kroeder, quoniam de Graefi erubuit,
non COCLIT, infestissimam jun S
obstipit, illi obesas Lassus Cese
rum pavid jun perverat cum morib
pudore rido et nuptio nuptere ad
tum facilius deponit. Et nuptio hi
pudore, qd plenaria brevi ten
expedit. Tunc non nesciem plu
expedit.

(1) Röhrich & joh. Antonius, Bd. II
(2) Lassus, Wörterbuch d. Med. Wa
(3) G. J. Lipp, Tragelberg folge
verbiens Koller, Suppol 1621

Dissertatio inaugural Kaminsky, Christop[Royal College of Su	b22483184
De funiculi umbilicalis deligat Kaas, Franz; Friedrich-Wilhelm Royal College of Surgeons of I	b22483184
[364] b22483184 Mar 01, 2016	[366] b22483184 Mar 01, 2016

11

saginosa et lipothymiae frequentes, irregularis sanguinis distributio, quare jam Hippocrates apoplexiam pro frequenti causa mortis obesorum habuit. Etiam digestio ciborum turbatur, aut fames canina, aut vomitus frequens, quem Boerhaave et Bonetus ex eo oriri putant, quod omentum majus adipis nimia mole obrutum ventriculom lassessat; praeterea vegetationis totius laesae testes sunt sudores, odorem carnis putrescentis referentes, saepenumero cutem excoriante, furunculi, comedones, jactura facultatis genetricis et menstruationis.

Adipis copia hoc in morbo modo celerius modo tardius crescit. Aegrotus, quem de Graefe sanavit, per quinquennium ad pondus CCCLXIII. librarum perseverat (1); alias obesus van Leeuwarden intra decennium pondus librarum DIII. nactus erat (2). Ex infantibus obesis, quorum exempla apud Meckel (3) relata invenies, quarto anno unus librarum XXXIII. pondus, alter LXXXII, tertius CXXXVII habebat. Sequelae modo citius modo tardius apparent, nam quemadmodum Kroecher, quem de Graefe curabat, in pondere librarum CCCLXIII. suffocationibus jam frequentibus perditabatur, alias obesus, Louis Cono ad DCCC. librarum pondus jam pervenerat cum moriebatur (4), id quod pendere videtur ex maiore minore adipis copia in cavitate thoracis deposita. Est autem hic morbus aut congenitus (5), qui plerumque brevi tempore occidit, aut acquisitus. Causae vero nondum plane enucleatae sunt,

(1) l. e.

(2) l. e.

(3) Handbuch d. path. Anatomie. Bd. II. Abth. II. p. 121.

(4) Encyclop. Wörterbuch d. Med. Wissensch. l. e.

(5) G. F. Jäger, Vergleichung einiger durch Fettigkeit aus gezeichneten Kindern. Stuttgart 1821.

de secundis corporibus liberae,
idem petum ab eo sit,
si enim ex hyspe petum
non dilatamus, non adipis
tacere, non quod Schatzl-
eynnes dicit, scilicet si in
di imperfecte origine idem,
ne, tamen statim in omniis ca-

OSI UNIVERSITATIS.

in pancreatico adipis tanta
quantitate a stilo secundi mo-
deratur illa, sive oleosa, sive
plena tan grisea digna-
re vestimenta de Graefe (2),
quae corporis latitudine, velue-
tate humana erant, rursum
plena tecoris deposit, capi-
tur, quiescens in loco nisi
prosternatur non adipis; numne
quidem illa, si abhinc annos
ali subdedit, organa tantum ex-
posita adipis dilatantur
ad stridulus, magna plen-
tatione deinceps rebatur ut
sua irregularis, surprenitro in-
ex adipis evoluta impinge in ex-
, cui etiam debet orthopae-

Vol. II. pag. V.
Walther. Journal der Chirurgie und
Wiederbelebung der med. Wissenschaften
Med. Fac. Berl. Bd. I. pag. 255.

etsi negari nequit, cum modo nutritioni auctae deberi, quod locum obtinere videtur et in adiposi congenita, et in iis casibus acquisitae, qui cum voracitate nimia coniuncti sunt, in quibus appellamus adiposin activam, modo autem ex causis profluit debilitantibus, v. c. venae sectione nimis frequenti, ex coitu nimio, abusu mercurii, quam adiposin passivam sive hydropicam nominamus.

DE ADIPOSI DIFFUSA.

Adiposis diffusa est localis depositio adipis, quae ad certam formam non tendit. Occurrit haec species frequentius in interioribus corporis partibus, rarius in panniculo adiposo ipso, quo lipoma diffusum Schregeri pertinet (1). Debetur saepenumero spatio vacuo, v. c. ei, qui loco lienis aut testiculi extirpati (2) remanet. Huc pertinet quoque casus ille, quem Vade (3) refert, ubi in viro asthmate defuncto locus, quem thymus occupare in infantibus solet, magna copia adipis ad cor usque referens erat. Talis coacervatio in cavo mediastini omnino non rara est; apud homines aetate proxetas, modice si copia est, ad statum fere normalem pertinet. Sin vero copia excedit, symptomata in dies augentur dyspnoeae. Sic in homine triginta annos nato, procerò quidem attamen obeso, postquam per annum dyspnoea in dies augescente laboraverat, et subito suffocatione mortuus erat, tota mediastinorum cavitas permulto adipe referens erat, obruto toto corde et eo loco, ubi thymus in infantibus residet (4); similem easum ci-

(1) Schreger, chirurgische Versuche, Bd. I. p. 297.

(2) Janssen, vom thierischen Fett, Halle 1786 p. 76.

(3) Ephem. nat. curios. dec. XL obs. 161.

(4) Medic. obs. and. inq. Vol. 3. p. 69.

am iheres ipsi Literat (1); ab
sumptum la iheres, quibus adeps p
ermit. Si Partal in plumbis (2), P
roprii alambicant. Superumero
in depositio adipis anima in peric
utrum (3). Ad quatuor uer gradi
dicit casu i Barret (4) relatis, u
nde excessu ampliorum capitum inf
it. Numinis ampliorum uero in al
cina tan adipis effusa, quae omni
fusus pressio al adipis magis
fessilis ostendit, quod perduo lib
erat, remat (5), alio liberat tre
munt in hoc idra hundat (6); in in
stante non eis capillarium, si tamen
tamen expedit (7). In his quadrages
liberat et hinc eis crevile erunt
transmutari (8). Horstius vili one
LVI libra aliquantus (9). Pristina ab
lente depositio adipis oblonga
figura recta, in telo celibus serui et

(1) Literat, Historia naturalis medicinae
C. F. Schlegel, Lipsia 1784. Ova 1782.

(2) P. de. 34.

(3) Senni testi in Cane.

(4) Seev. med. 10. p. 166. T. c. II.


(5) In Corp. k. Med. 10. T. c. II.

(6) In Corp. k. Med. 10. T. c. II.

(7) H. 1. 1.

(8) H. 1. 1.

(9) R. Senni et. Senni. Denkschr. 10. VII. c.



[Cover]

Dissertatio inaugural
Kaminsky, Christoph
Royal College of Su
[366] b22483
Mar 01, 2016

ID: h22483184
ID: b22483184

11

De funiculi umbilicalis deligat
Kaas, Franz; Friedrich-Wilhelm
Royal College of Surgeons of I
[364] b22483184
Mar 01, 2016

13

in modo nutritio sicut idem, rilefar et in adipis congastra, et ae, qui cum vesicula una omni appellata adipis adum, it proficit delibitibus, t. c. in adipi, exinde nascit, ab eo utriusque sit hydropicum manifestum.

DISPOSICIO DICTUSA.

est hec adiposum alijs, que in testic. Generit haec species illius corporis partis, neia in quo liposum diffusum Schlegel siepe videntur quia tunc, ut testiculi exstipiti (2) magni- que cassi illi, quoniam Vnde (3) erunt deinceps hinc, quoniam adiposus solit, magna copia adipi al. Tali concordie in eis nota est; apud homines certe gravi est, al statim ferre nrales via excellit, symptomatis in dia- sic in humore tristitia autem tunc, u obeso, potius per arcu- cente libenter, et subtili effi- teta medicamenta curari pos- t, obruta tanta certe et ce hec, a resolut (4); sicutem nra n-

(1) Lieutaud, *historia anatomico-medica*, recudi curavit J. C. F. Schlegel. Langofot 1786 Obs. 1783. p. 236.

(2) I. e. obs. 734.

(3) *Senac traité du Coeur.*

(4) *Septim. Anat. lib. II. sect. IX. obs. 16.*

(5) *De Corp. h. fabr. lib. V. e. IV.*

(6) *Hist d. Acad. roy. des sciences* 1732. p. 30.

(7) *Sammlung ausgewählter Abhandlungen für prakt. Aerzte*, Bd. XIX. S. 14.

(8) ib. p. 113.

(9) Horstius ad Marc. Donatum lib. VII. e. 4.

grisea Venetia, BE L. P. 20.
medicis Pet. H. H. 120 p. 10.
t. dec. XI. obs. 121.
pt. Vol. 3. p. 25.

DE ADIPOSI CIRCUMSCRIPTA.

Adiposis circumscripta eo differt a diffusa, quod formam semper habet certis finibus circumscriptam, globosam plerumque, quam retinet crescendo. Haec species prioribus temporibus communi steatomatis nomine comprehendebat duas formas, quas primus se junxit Littre (1). Is enim primus a steatomate discrevit lipoma, quod saccus membranaceo tenui, e tela valde laxa composito, liquidum contineat molle, omnibus adipis communis attributis insigne. Differre autem dicit lipoma a steatomate, cuius materia nec inflammari queat, nec flamma fundi, aut saltem difficulter, contrarium vero valere de materia lipomatis. Haec differentia initio a pluribus auctoribus rejiciebatur, exempli gratia a Morgagni. Postea omnis differentia redacta est ad consistentiam, ita ut lipoma contineat substantiam liquidorem, steatoma vero solidorem. Boyer (2), qui nomine lapiarum omnes comprehendit tumores circumscriptos, dividit eos in tumores cysticos et tumores cystide orbatos et hos quidem, quos in ultimo posuimus loco, in duas dividit formas, quarum altera ex adipe constet degenerato, qui colore naturali, flavo orbatus albido et durus factus sit, cellulis inclusus telae cellularis dilatatis et commixtus majore minoreve lymphae copia (steatoma), altera autem ex adipe constet, qui facultates referat naturales, consistentia tantum adaueta (lipoma). Cruveilhier (3) lipoma nominat obesitatem localem (embonpoint local), nonnullas tantum telae cellularis cellulas spectantem, quae plerumque ampliatae sint, lobularem, haud ita multis vasis instructam,

(1) Hist. de l'acad. roy. des sciences au 1703, obs. 3.

(2) Traité des maladies chirurgicales vol. II, p. 341.

(3) Essais sur l'anatomie pathologique. Paris 1816. Tom. I.

PSI CIRCUMSCRIPTA.
scripta ro dicitur a dico, quod loca
etia fuisse circumscripta, glo-
mata minus crescendo. Hoc spes-
tum est tumori steatomati minus con-
tra, qua puncto agnoscitur (1).
aliove discreti lipoma, quod sive
et tenuis sive lata composta, lipi-
, similiter alijs communis vides
autem dicti lipoma et steatoma,
flavari possunt, nec formae luti,
concentricas raro nascunt de mole
difficiliter initio a gressibus auto-
mobilium a Morgagni. Postea
est ad tumescientiam, ita ut li-
pidem liquescere, sicutum res
(2), qui nomine ligurum sive con-
tractum scripta, dicitur ut in tunica
grisea obliteret hanc quidem, quo
pro, in duas diffidit formam, quae
et degenerata, qui colorem naturalis
et durus latus sit, cellularis inde-
statis et communis major nascitur
(3), altera autem ex adipi na-
turali, carnositas tunica
Crueillier (4) lipoma nominat
embryonicum locum, nonnulla tunici
speciem, quo plerique ar-
ca, hanc illa multa rara intercedit
... opus de scientiis ac 128, vol. 1.
dies cinquagesima, vol. II, p. 20.
annua pathologica, Tertia 128, tom. I

Dissertatio inauguralis Kaminsky, Christoph Royal College of Surgeons of [366] b22483	Mar 01, 2016
ID	b22483184
ID	b22483184

nonnunquam radices agentem et adnumerat productis
adiposis; refert etiam exemplum, ubi lipoma in carcinoma
abiit, qua de re differentia, quam Boyer et Chelius
in eo ponunt, quod steatoma solum in carcinoma abeat,
lipoma autem hoc exitu careat, rejicienda est; steatoma
vero ad formationes cysticas numerat et analysis addit
chemicam a Thénard institutam, qua compertum est,
tumoris steatomatosi centrum partes exsiccatione ad se-
xaginta redactas continere sedecim partes materiae albu-
minosae et viginti quatuor adipocerae; similes analyses
referunt Merat (1) et Bostok (2). Schreger (3)
primus sedem lipomatis demonstravit et controversiam
direxit de tunica lipomatis propria, vel praesente vel
deficiente. Dividit lipoma in diffusum et circumscriptum,
quorum alterum ex collectione tantum adipis singulis
locis limitata constet, deficiente omni tunica, marginibus
confluentibus, ita ut cutis superjecta vix moveri aut in
plieam elevari possit; alterum vero in bursis mucosis sub-
cutaneis sedeat et insigne sit amplitudine circumscripta,
duritiae elastica, mobilitate promptiore et tunica pertenui
cum adipi tantopere cohaerente, ut vix et ne vix quidem
separari possit; adeps vero formis sphaericis agglome-
ratus a naturali recedit inole, similitudinem referens
cerebri substantiae, aut glandulae lymphaticae, deficien-
tibus cavitatibus aut septis, nonnunquam etiam compo-
sus est e laminis concentricis aut radiatis.

Ritgen (4) omnes pseudoproductiones adiposas dis-
tribuit in varios pseudoplasmatum omnium ordines. Sic
I in ordine «Coilmomyus» nominato, in quibus nesus adest
formandi telam cellulosam luxuriantem, duas reperimus

(1) Medico-chirurgical transactions. Vol. II, p. 377.

(2) Ib. vol. IV, p. 83.

(3) De bursis mucosis subcutaneis. Erlangen 1823.

(4) Pathologie und Therapie der Afterbildungen. Berlin 1828.

formas a) **lipomyein**, ubi cellulae luxuriantes adipe oleoso semicoagulato replete sunt, tela autem fibrosa, quae cellulas conjungit, pertenuis est. In hanc formam saepe ovaria dicit degenerare; b) **steatomycen**, qui a lipomyce majore firmitate parietum cellularum et fibrarum has connescientium differat et frequentissime in glandulis degeneratis occurrat. Sic II. **lipoma** refert ad **pseudocysto**-**genesis**. In lipomate, ait, tam contentum cystidis quam parietes ejus in adipem converti posse, ita quidem, ut cellulae subtilissimae sponte enascantur, quas cellulas oleiferas nominat; tales cellulas majore numero irregulariter dispositas atque fibrillis communibus suspensas concursu glomerulas atque globos adiposos efficere. III **steatoma** refert ad **pseudo**-**ingenesin**; in hac forma evolutionem cellularum oleiferarum fibris praevalentibus superari tradito, qua de re tota moles solidior sit. Praeterea metamorphoseos adiposae mentionem facit,

Praeceptor denique mens clarissimus, Joannes Mueller, tumores adiposos in praelectionibus suis de anatomia pathologica habitis tali modo dividit, ut ponat a) lipoma simplex, constans ex rotundis naturis libus cellulis adiposis; b) lipoma arborescens, in quo cellulae adiposae ramificantur; c) steatoma, quod penitus membranis solidis frequentissime interseptum est, consistentia valde solida; d) cholesteatoma, continet cholestearinum et stearinum, per stratas aut laminas concentricas compositum, superficie gibba. Constant ex duabus elementis, tela scilicet cellulosa polyedrica, cui interspersa sunt strata et laminae crystallinae. Occurrit haec forma frequentissime in cerebro, nonnunquam etiam in ossibus; semel Mueller invenit in carcinomate mammae.

Lipoma ipsum aut congenitum aut acquisitum est. Ad congenitum referendus est casus ille, quem Cel. Ph. de Walther descripsit et nomine naevi ma-

Dissertatio inaugural Kaminsky, Christoph Royal College of Su [366] b22483	ID b22483106
De funiculi umbilicalis delgat Kaas, Franz-Friedrich-Wilhelm Royal College of Surgeons of I [364] b22483184	ID b22483184

terni lipomatodis salutavit; differt autem naevus maternus lipomatodes a lipomate vulgari eo, quod cum alienatione cutis naevum referentis conjunctus est, nam quod attinet ad Waltheri sententiam, tunica illud carere propria et congenitum esse, habemus etiam lipomatata congenita, nulla cum cutis deformatione conjuncta. Sic P. Meckel lipoma puellae vicenni cultro abstulit, quod inde a costa nona lateris sinistri ad cristam ossis ilium ejusdem lateris porrectum erat. Hie tumor inde a partu puellae conspiciebatur; magnitudinem tuberis referens, cunctum per nimiam extensionem fieri potuit, satis integra. Adeps tumoris ablati saccis propriis continebatur a cellulis telae cellulosa discrepantibus (1). Ut casus modo relatus lipoma congenitum in cute normali demonstrat, sic lipoma diffusum Schregeri probat, esse etiam tumores acquisitos tunica carentes, ita ut naevi materni lipomatodis Waltheri signum diagnosticum sit deformatio tantum cutanea. Similes casus referunt Buffon (2) et Thomas Bartholinus (3); praeterea Otto (4) casum numerat ad naevum lipomatodem, quem Renard publici juris fecit (5). Quodsi concedamus, magnam similitudinem intercedere inter hunc casum et naevum maternum lipomatodem Waltheri, tam sede (in dorso praecipue) quam numero magno, et colore, maternam, quae eodem fere tumores habebat quam filius, nunquam ante id tempus, quo illum filium, quartum scilicet, a mammis arcebat, graviore aliquo morbo laboravit, nedium tales tumores observavit, quare illi tumores

(1) Voigtel, Handbuch der pathol. Anatomie, Bd. I, Abschnitt I, S. 21.

(2) Hist. natural. T. XX.

(3) Act. med. societ. Hafn., Tom. V, No. 103.

(4) Path. Anat. Th. I. Abschn. II, S. 160.

(5) Salzburger Zeitung 1815, N. 51, S. 251.

congeniti non erant. Etiam in puerulo ipso tantum duodecimo mense post partum conspiciebantur; praeterea infantes tam ante hunc puerum quam postea nati omni caruerunt affectione, ita ut non videam, quibus argumentis ductis Otto hunc easum hereditarium nominare poterit.

Exempla lipomatatum et steatomatum ex auctoribus collata referre minus difficile est, quam discernere, utrum ad unam an ad alteram harum formarum pertineant. Sic Wiedemann in annotatione de steatomatibus nullam facit mentionem lipomatis, aut signorum saltem, quibus steatomata a lipomatibus dignoscatur; tactu tantum, ita, usq; corroboratio se cognovisse tales tumores esse steatomata, quod ut concedamus, licet plura exempla ab eo relatia ad lipoma referenda esse videantur, tamen neque praxi neque doctrinae aliquid lucri assert. Etiam ex tumorum adiposorum historiis, quas apud Voigtel relatas invenies, nullo modo discernere valebis, cur aut ad lipoma (Fettgeschwulst) aut ad steatoma (Speckgeschwulst) referat.

DE METAMORPHOSI ADIPOSA.

Metamorphosis adiposa est ea adiposis species, qua tela quedam primitiva normalis in molem adiposam convertitur, sive cellulis adipem secerentibus, in quas substantia normalis convertitur, debetur, sive nutritione alienata efficitur, ita ut, nullis cellulis adipem gignentibus enatis, immediate substantia aliqua normalis in adipem convertatur. Distingui autem debet haec alienatio a depositione adipis interstitiali, qua adipis magna copia in tela cellulosa interstitiali locatur, ita ut saepenumero organon totum in adipem conversum esse videatur, nisi disquisitione accuratiore deprehendantur fibrae ejus organi primitivae in statu integro. Quoniam

De Transversali metamorphosis deliorum Regum. Transversalis deliorum
LXXXI. Cataracta ex Sanguine. Whether
1864 B22-483.184
Museum
ID: b22483184

etiam modo hanc transformationem evitari possit, nam eis essentiam in calore anima ferre regnare adiporunt, ceteri hinc denique causam quam Cetomopoli adipes recesserunt, sed partim adipem copiam obtinuit, ut si illi, cum in aliis casis decidunt quinque adipes contineat, grau tumori ad labent, alijs utrin solliciti decolorerentur, cum in aliis casis adipes decolorerentur, unicolor non semper una valensque sola adipes perirent, unde raro sollicita sollicita, ut in casu, quando in aliis Rigitur enim, quando jam obliterata substantia ei lipomatous his species. In frequentissima in alijs adipis. Ne Basiliis (2) in aliis sollicita transire incrementat, unde sollicita in massu statuit. Autem et casu illi, quem Saill. dicit, in qua pars muscularum adiutorum, kochlinis omnes facili convertitur, sive adiposa degenerare vult in alijs, qui si adipis et delitionem perire reliquias sua petunt. Martinus in circuus stercor posse deponere illius. Le sole adipis repletum deprehendit, in tamen ruderis strucione, quae in alijs adipis et substantia, quae ex

(1) Ioh. Basilius. Nomenclatur. de med. V. suppeditatae. Vol. 1. sec. 1. fol. 22. Reg. 12. Reg. 13. et 14. Secundum etiam illa. (2) Basilius. expositio. lib. II. sec. II. fol. 1. sec. 11.

autem modo haec transformatio eveniat, omnino nondum patet; nam etsi concedamus in cadavere aquae submisso omnia fere organa in adipoceram converti (1), tamen analysis chemica deorum casum quam Cruveilhier de metamorphosi adiposa muscularum nobis tradidit, tam parvam adipoceram copiam obtulit, ut vix computari possit, nam in altero casu drachmae quindecim substantiae in adipem conversae grana tantum adipocerae quatuor habebant, adipis autem solidioris drachmas decem, in altero vero nulla omnino deprehendebatur. Ceterum haec metamorphosis non semper una eademque esse videtur, nam modo adipem genuinum refert, modo adipe praevalet substantia solidior, ut in casu, quem infra apponemus; ita ut Ritgen omnem ejusmodi metamorphosin jure divisorit in steatomatodem et lipomatodem. Occurrit autem haec species I. frequentissime in musculis voluntati subjectis. Sic Bonetus (2) in infante, cujus femur ad insignem crassitatem increverat, otonem carnem muscularum conversam in massam steatomatodem reperiebat. Notus est casus ille, quem Saillant (3) refert de femina, in qua loco muscularum nihil nisi adeps inveniebatur. Isenflamm omnes faciei musculos in panniculum adiposum degeneratos vidit in cadavere potatoris, qui ob stuporem et debilitatem pedum postremo lectum relinquere non potuit. Martin in loco gastrocnemiorum siccum membranaceum illius formam referentem et mole adiposa repletum deprehendit. Ostendit vero hic tumor eandem structuram atque tela cellulosa panniculi adiposi et substantia, quam continebat, nihil ab

(1) Vide Encyclop. Wörterbuch der med. Wissenschaften, herausgegeben von den Prof. d. med. Fak. zu Berlin, Art. adiposis.

(2) Sepulcret, anatomiae lib. IV. sect. II. Obs. XII. p. 3.

(3) Recueil des actes de la société de santé de Lyon, Tom. II. l'an VI.

De funiculi umbilicalis delgat
Kaus, Franz-Friedrich-Wilhelm
Royal College of Surgeons of I
[364] b22483184
Mar 01, 2016

ID h22483184
ID b22483184

Dissertatio inaugural
Kaminsky, Christoph
Royal College of Su
[366] b22483
Mar 01, 2016

adipe communi differre videbatur. In eodem statu muse. plantaris, tibialis posticus, soleus atque extensores digitorum versabantur. In femore musc. rectus, triceps, gracilis, sartorius, vastus uterque et cruralis nondum plane in hanc degenerationem abierant, ita ut substantia eorum stris fibrarum muscularium et adipis alternantibus quasi sulcata appareret. Idem vero status in vetula quada deprehendebatur, quae nondum omnem facultatem incedendi amiserat (1). Notabilis est etiam casus, quem Ficker de viro triginta sex annos nato refert, qui ex fractura femoris tibiae et fibulae, ante novem annos male curata, in hunc statum deciderat, ut lectum relinquere non posset. Amputato femore, substantia muscularis cum aponeurosis et tendinibus in molem adiposam abierat; quin etiam haec transformatio in substantia ossis ipsa deprehendebatur. Qnamquam autem amputatione non omnis substantia degenerata amoveri potuit, famen ea pars, quae remanserat, in massam rubram carni musculari similem transformabatur (2). Ritgen hunc casum ad metamorphosin steatomatosam refert, in qua tela fibrosa praevalet, ad quam pertinet, ut jam adnotavimus, casus quoque noster, quem infra describemus.

II. In musculis involuntariis, hue perficit transformatio cordis, cuius substantiam Weitbrecht in molem steatomatosam ex stratis pluribus crassioribus et tenuioribus constantem mutatam vidit (3). Etiam Cruveilhier refert, se cor inventisse valde amplum adipe obtutum, qui totam sere crassilicem hujus organi afficerat; strata modo intima characterem primitivum retinuerant.

III. In glandulis, praesertim in hepate, cuius substantia

(1) Sammlung ausgesuchter Abhandl. für prakt. Aerzte. Bd. VIII. S. 178.

(2) Ficker. Beiträge zur Arzneiwissenschaft Stück 2.

(3) Senac, traité du Coeur liv. IV. chap. IX.

anteriorum rugis, nolunt et alii
quicquid bene loquuntur tali modo alien-
ca subjicit et quicquid amarit caravent
sistem. Bassus in corpus adiposum
plus infans minus reperitur, in q-
uam stercorina prout estagi potuit
etiam non quicquid omnes anatomici N-
la substantia adiposum conversus, ut i-
donee rite substantia vestigia depre-
cavere duo circuli resident.

Primum a Cratellieri observatum est in manus, in paucis, in
lum. Manus, glandulae inguinales et
la metamorphosis extenuatatem ab eo
ligata non sufficiunt habet, ut eam
nec determinari possit iudicium con-
cernente proprietae et charactere aliis
quibus obiectum insigne et tam
per se, quam cum cetera superimponita
sit, auctor Benedicto hoc malo
dictum, pleniusque in sua luctuosa glandula
et afflita summa abundantia pyramidis
fere hinc specie perulorum, scleratis
pris pleniusque incisae, sessilis carinatis
et angustis coquulationibus et ad superficies
quo facta ultra protinus oscula non
potest fodiunt et ad fernandas
viles praedire.

HISTORIA MORI
Ferdinandus Baader, scindens
per eum theologiae, quam eritiam
U. Ober, sed. Oberosis XIII.
2. Ritterl. s. p. 128.

videbatur. In cœlo datus noster, sed non sicut calcatores digerentes nos, recto, recte, recte, quadrato et triangulo nodum pincere aligerat, ita ut nesciunt osculari et alijs discrimini. Ideo tenet datus in reduplicante nodum unum hædilium. Notabilis nō est hoc unus punctus ser sanus tali refert, qui et flesha, adhuc non sunt deaderant, et leonis nuptio fessore, statuaria angustis testiculis in nobis aliquam et tendit in substantia eius. Quoniam autem exphantasia degenerat animi post, remanserit, in noscum cœlum et transformatum est. Ritgeni exphantia statim inde metu, in leti, et qua periret, si jas el se nosset, quenadam desiderat, ut perficit transformatum. Weitbrecht in nobis pluribus crassioris et tristis vixit (3). Dian Cravellensis valde amplius idem obitum habens organi aligerat, stridores primitores reflexos, stridulus is lapide, ejus solitaria ementes Blasii, ut puto Aenei. Blasius et amicorum suorum Sec. 2. et Cesaris. W. cap. IX.

[Note]

De funiculi umbilicalis deligat
Kaas, Franz; Friedrich-Wilhelm
Royal College of Surgeons of I

[364] b22483184
Mar 01, 2016

b22483184
ID

Dissertatio inaugural
Kaminsky, Christoph
Royal College of Su

[366] b22483
Mar 01, 2016

11

amplitudine augetur, mollescit et albescit. Thénard quinque bilis hepatis tali modo alienati analysi chemicae subjecit et quater amaritie carentem invenit. Renem sinistrum Baader in corpus adiposum amplitudine capitatis infantilis mutatum reperiebat, in quo nullum vestigium structurae prioris detegi potuit (1). Insignis est etiam ren quidam musei anatomici Meckeliani, ita in substantiam adiposam conversus, ut nulla prioris structurae atque substantiae vestigia deprehendi possint; in centro duo calculi resident.

Praeterea a Cruveilhier observabatur haec metamorphosis in mammis, in pancreate, quin adeo ossibus. Mammæ, glandulae inguinales et axillares saepe in metamorphosis steatomatosæ abeunt, quam speciem Ritgen tam malignam habet, ut eam nomine carcinomatæ steatomatosi haud indignam censeat. Tumorem plerumque tarde in ulcerationem abire dicit, postquam magnitudinem obtinuerit insignem et tam cum partibus subjectis, quam cum cute superimposita coaluerit. Resert idem, auctore Benedicto hoc malum, cum mammas afficiat, plerumque in una tantum glandulae regione oriri et axillam versus adscendens pyramidem, aut caudam efficere huic speciei peculiarem; ulcerationem in interiore parte plerumque incipere, ortis cavitatibus sanie repletis, denique confluentibus et ad superficiem penetrantibus, quo facto ulcus profundum oculis nostris se offerat admodum foetens et ad formandum fungum haematodem valde proclive.

HISTORIA MORBI.

Ferdinandus Haake, octodecim menses natus, puer ejus constitutionis, quam erethicam vocare solemus,

(1) Observ. med. Observatio XXXIV.

(2) Ritgen l. c. p. 129.

die octavo mensis Aprilis anni praeteriti a matre ad institutum chirurgico-ophthalmaticum universitatis nostrae regium delatus est ob tumorem femoris dextri insignem.

ANAMNESIS.

Patrem amiserat puer mense precedente et quidem, ut medici judicaverant, tafe dorsali, mater bonum habitum corporis externum offert neque, quantum compere possumus, graviore morbi externo laborat aut unquam laboravit.

Puerulum hunc per decem menses lactabat optima ad hoc tempus valetudine gaudentem. Paulo postquam infantem ab uberibus removerat, in medio dextro femore, et quidem in latere ejusdem externo, deprehendit immorem immobilem, ovalem, magnitudine ovi gallinacei, cute normali obtectum, in superficie subcutanea planum, circumscriptum, ad quem sanandum medicum aliquem consuluit, qui quum tumorem illum pro callo hypertrophic fracturae ossis supposita haberet, ferulas adhibuit. Elapsis quatuordecim diebus, cum tumor sensim crevisset, mater perferrita alium arcessivit medicum, qui natura atque indole tumoris in suspenso relicta, ferulis remotis, balnea e speciebus aromaticis imperabat. Sed tantum aberat, ut malum imminuere tur, ut in dies magis magisque cresceret ad eam magnitudinem, quam indicatur sumus.

STATUS PRAESENS.

Die octavo mensis Aprilis. Tumor magnitudine capitis infantilis inde a trochantere majore, quem occultat, usque ad condylos femoris, quos non attingit, in longitudinem se extendit, quod ad latitudinem vero ambitum habet inde a latere anteriore interiore ad latus exterius posterior. Cutis temperies nullo fere loco aneta est, co-

De: F. J. G. M. Stomachal, M.D.
Name: F. J. G. M. Stomachal
Address: Venecia, Venezuela
ID: 3641
Date: 1922-04-18
Hospital: San Vicente de Paul Hospital
Room: 61 - 2016
Beds: b248338
Status: ID

ie normalis, puncta tamen ratiocinatae dilata, non tautopercutientia est cenis, ut digitis tangenti sensim deflexa dicitur. Circum sepe facta est, neque pressio dolor tumor; mole pedis, rugosus podies, tamen per quamam partem non traxo deflexo sensim aliis et sibi potest, qui etiam in una pars spinae suis bene perficit deinceps haec arte scierit jetu pollicis subducere subtiliter. Articulatio geno ossium patella et quadrilatera latus dexterum potest nisi latere alteri patrum transversum dicitur, spiculae frontis posteriori nullo iugulo se curvare ejusdem lateris, quod a rim latere nulla tensio dicitur. Tumor in tota tumoris mole exterius leviter, ne et extremitates normae responsum quiete est.

DIAGNOSIS.

At diagnosis crescendo prima pars, quae id est affecta, cum ex parte spinae preferret, musculos et nervos sensibile fuit; cum rareretur, et raro dehinc, tan in tota tumoris fixa, ruricis et tumoris lymphatici sequitur, et sedens pars inferioris, aut circulus lat. de ore Tumoris, aut de via ciborum veluti habebat. Oi dopie ruris possit, ruris raro intumescere, prius idem velut mobilium Rictus, cum talis avulsa induatur, aut a

Dissertatio inaugural Kaminsky, Christoph Royal College of Su
[366] b22483
Mar 01, 2016
b22483184

lor normalis, passim tantum variegatus, venis scilicet magnopere dilatatis, nam tantopere tumore subjecto extensa est cutis, ut digito tangenti sensum resistentiae elasticae offerat. Ceterum neque fluctuatio percipienda est, neque pressione dolet tumor; motus ipsi, etsi impediti, magno pondere, tamen per quamlibet directionem fieri possunt; nam trunco defixo femur extendi, flecti, adduci et abduci potest, quin etiam infans ipse hosce omnes motus sponte satis bene perficit et ad quartum decimum diem ante mortem juxta pulvinaria nullo duce ambulare solebat. Articulatio genu omni vacat affectione, patella ad quodlibet latus dimoveri potest. Regio inguinalis lateris affecti parvam tanquammodo intumescentiam offerit, superficies femoris posterior nullo modo affecta est aeque ac crus ejusdem lateris, quod a statu sano alterius lateris nulla tenus differt. Memorandum est, aegrotum in tanta tumoris mole ceterum bene valere; nam neque macie affectus est, nec appetitus ullo modo turbatus, se- et excretiones normae respondent, quin etiam somnus quietus est.

DIAGNOSIS.

Ad diagnosis eruendam primum statuere conabamur, quaenam tela esset affecta, cum enim infans omnes motus sponte perficeret, musculos et nervos affectos esse, haud verisimile fuit; etiam vasorum alienationem rejicare debebamus, nam in tanta tumoris mole aneurysmatis, varicis et tumoris lymphatici sequelae jam apparuerunt, ut oedema partis inferioris, aut ruptura; itaque cogitandum fuit de osse femoris, aut de tumoribus, qui in tela cellulosa sedem habent. Os dupli modo intumescere potest; oritur enim intumescentia ossis aut a superficie interna (tela medullari Blumenbachii) et tum ossis totus ambitus inflatur, aut a superficie externa,

nam
VANNENS.

ter mem procedere et quoniam
tibia deorsum, mala loca la-
ci offert neque, quantum compre-
meri membra libera et u-

r dormit usus latitudi spina
or condensata. Pedi possum
noverat, in modo latitudine,
deinde extensio, dependent trans-
magistralis et gallinas, ut
specie subclavia plena, ci-
ssimadus medicus aliquip ce-
ven illius pro collis hypertrichis
se habere, seruit affinitate. El-
lis, cum tenui vasis crevise,
arcuarii medias, qui tenui
suspenso reflecta, frustis rausis
mactis impigerat. Sed tunc
cureret, si in die uiginti
magnitudine, quae infans

IS PRAESENS.
April. Tumor supradictio ex-
crestante major, circa occid. artis, quo non stringi, in longi-
tudine ad latitudinem vena media
teriore interior ad hanc vena
teries nullo loco loca sita est et co-

ubi tumor partialis quidem est, at consistentia et indole varius; nam aut exostosis simplicem constituit, quae in nostro casu ob consistentiam molliorem et nimiam, ad quam brevi tempore pervenit, molem plane rejicienda fuit, aut osteosteatoma, quod nullo modo rejici potuit. Praeter affectiones ossis etiam, ut jam adnotavimus, tæla cellularis, sive subcutaneae sive interstitialis, tumores considerandi erant, scilicet tumor cysticus, lipoma, steatoma, sarcoma, fungus medullaris. Tumor cysticus rejiciendus fuit, quia, si subcutaneus fuisset, dimoveri posse debebat, sin vero subter musculis sedem habuisset, mutato femoris situ forma mutari debebat; pro lipomate vero consistentia ejus nimis solida et elastica pugnavit. Hisce omnibus perpensis, dubii haesitabamus inter steatoma, osteosteatoma, sarcoma et fungum medullarem.

PROGNOSIS ET CURATIO.

Quamquam aegrotus, cum in nostram traditus est curam, adhuc bene valebat, tamen ob nimiam tumoris molem spem nullam concipere potuimus, utpote qui remediis pharmaceuticis omnibus resisteret; imo vero remediis, inter ea, quae resorptionem adjuvant, potentissimi, Jodi scilicet, per aliquot hebdomades ante adhibiti, usui perficiter repugnaverat; operatione removeri quidem poterat, nisi pueri adhuc tenerima aetas manum arceri jussisset, qua de re indicationem tantummodo palliativam exequi placuit, vires scilicet aegroti, quantum penes nos erat, sustinendi et symptomata urgentia removendi.

Insequentibus hebdomadibus, cum aegrotus, etsi tumor in dies magis angehatur, tamen et macie non coriperetur et omnes functiones bene cederent, nulla fere medicina opus fuit. Tricesimo fere ante mortem die le-

do exercitum, strigilatum designat
hunc exercitum, ut
13641 b22.483.184
M. 01 - 2016

ia auctor libri, cui elicit oppositionem
est. Eadem tempore enim ad ultimum ei
ius producta leviter exorbiatur; opposi
tionis efficiuntur frigida ex aqua salina
in facies progressus; huius tamen ob
viam iuris M. Iuli elicit.

SECTIO CADAVERIS.

libra post mortem decima qu
Capillis pars posterior, praesertim
lumen præstidit, nolis latere et rotu
late crani aperta, velumena cerebri in
reverbant, prius nata rasa non ita
abstulit cerebri medullaria suggestio
explicabatur; in ventriculo laterali
liquis sero deprehendebatur.

Thorace recte oblongatus, a
que primus annulus tubercula regre
tis ventriculus subliter paululum hy

po abducens; præter parum gla

minorum intuscoecum nil mouale in
la fratre dextre tunica et
pollio longa, ex pollo exsanguis,
tunc usq[ue] ad crassum patrum, irregul
are, exsiccatum, in religia ver
datur et brachio integrum. Tela
tunica et tunica et tunica, id est
cassari posset, exsangue loco, qui exca
vatus clausus, datur, non autem pre
sens visus.

Tunc ipsa et vulnera et lacerationes
sua et ex sequentibus strictionibus et
vulneribus (neq[ue] et vulneris) et

<p>Dissertatio inaugural Kaminsky, Christoph Royal College of Su</p> <p>[366] b22483</p> <p>Mar 01, 2016</p>	<p>De funiculi umbilicalis defig Kaas, Franz; Friedrich-Wilhelm Royal College of Surgeons of I</p> <p>[364] b22483184</p> <p>Mar 01, 2016</p>
---	--

11

25

vis accessit fibricula, cui elixir oppositum est acidum Halleri. Eodem tempore cutis ad ultimum extenuatiois gradum producta leviter excoriabatur; opponebantur huic excoriationi epithemata frigida ex aqua saturnina, ita ut nullus faceret progressus; levi tantum obtegebatur crusta.

Vicesimo tertio M. Julii obiit.

SECTIO CADAVERIS.

(Hora post mortem decima quarta).

Capitis pars posterior, praesertim in regione tuberum parietalium, solito latior et rotundior erat; cavitate cranii aperta, velamenta cerebri nil a statu normali recedebant, pia mater vasis non ita multis eminebat; substantia cerebri medullaris sanguinis tantum parvam copiam habebat; in ventriculis lateralibus circiter uncia liquoris serosi deprehendebatur.

Thorace recluso adhaesiones nonnullae utriusque pulmonis nonnullis tuberculis repleti reperiebantur; cordis ventriculus sinister paululum hypertrophicus erat. In abdomen praeter parvam glandularum mesentericarum intumescentiam nil anomale inveniebatur.

In femore dextro tumorem conspicimus octo pollices longum, sex pollices crassum, inde a regione coxae usque ad genu porrectum, irregularem, factu molle, elasticum, ad exteriorem partem magnitudine volae manus, corio orbatum, in reliqua vero superficie venis dilatatis et tortuosis variegatum. Tela cellulosa subcutanea extensa erat, sed ubique normalis, ita ut etiam dimoveri posset, excepto loco, qui excoriatus erat; aponeuroses extensae, durae, non autem processu inflammatorio alienatae.

Tumor ipse e substantia steatomatosa constat, quae orta est ex degeneratione steatomatosa musculorum crus extendentium (recti et vastorum) et sartorii, in va-

iderem est, ut consistentia et iunctio
sin simplicem coadunat, que la
tentiam miliare et inimicam, si
pertinet, nolam plus impedita
, quod solo modo res ipsa potest
sit enim, ut junc adhuc, te
tentatio sit intentio, inso
it, sicut tunc exponit, il
loma, fuga nihil. Tunc
nil, quia, si intentione fuisse, &
, si res solita nescia sien
tis sit forma naturi levior;
sistemata rite sinus solidi et ob
scenibus petrosis, debili lucis
intensitate, secundum et fungen

OSIS ET CRATII.
cas, cum in nostris fractis et
debet, tunc ab sinus tenuis
excipere potius, igitur qui re
membres resistunt; ita res re
trospectu[m] obseruat, potest
aliquot helobandis suis affilii
quievant; spernitus manu q[uo]d
et aliis tenuis atque suau
e re indicatiu[m] tenuissimis pl
i, vires siffrer aequali, quantum
iuncti et sympania regula n
obstat, cum negotiis, eis le
arboreus, tunc et auctor omni
incisiones hanc redire, nulla fer
tricissime fratre ambo de le

sto externo et interno transitus fibrarum muscularium in molem steatomatosam, ex parte in fasciculos compositam, valde perspicuus erat. Aponeuroses tumoris terminum versus adductores et gracilem constituent, qui musculi, ut reliqui in parte femoris posteriore siti, omnino a norma non recedebant.

DISQUISITIO TUMORIS MICROSCOPICA.

Tumoris materia duobus temporibus huic submittebatur disquisitioni, primo statim post sectionem institutam, tum postquam aliquot menses spiritu vini conservata erat. Constatbat autem ex massa solidiore et ex massa pultacea. Ad primam disquirendam, fibrae muscularum recti et vasti externi ex eo loco desumptae, quo jam oculis non armatis transitus substantiae muscularis normalis in molem fibrosam steatomatose degeneratam conspicuus erat, microscopicio subjiciebantur et quidem ita, ut fasciculus fibrarum subtilis, caute ablatus, ad disquisitionem microscopicam fibris a se invicem paulatim separatus, luce satis clara microscopicio subderetur, quod ter centies omnes res auctas offert, quo facto in regione substantiae muscularis normalis fibrae muscularares normales striis liberis regularibus transversis insignes conspiciebantur, juxta quas fibrae telae cellulosaes normales apparebant. In medio hoc fasciculo, uti memoravimus, preparato et quidem in eo loco, ubi jam oculis non armatis transitus ex substantia musculari videri potuit, fasciculi deprehendebantur magnitudine inaequali insignes. In crassioribus harum fibrarum striae illae transversae, quae fibras muscularares notant, per brevem tractum etiamnum percipiebantur, in fibris vero tenuioribus hae striae transversae plane disperebant. Fibrae tenues simplices, quas modo memoravimus, varia erant crassitie et quidem crassissimum

De: FUNDATION MEDICAL LIBRARIES
Kings - University of London
Raven - University of Edinburgh
3641 D22.2-4.83.184
New 61-2016
b22485184

et fibris et duplice fibrae et
multiplicibus denudant fibris arcuatis,
quorum emarginatus fasciculi efficiunt
superficie irregulari et irregulatim praedita.

Iusta et iuxta hos fasciculus globuli
et uriles, magnitudine rabe discrepantes,
velut, inspersi erant. Quos globuli
discrepantes sequuntur durare telle cellulae
naturae utriusque triplo vel quadruplo mag-
nitudinis. Cum aliis progerentur,
percutit linea testimoniis aequaliter
et circa appressat et pacis tantum
tunc velut leniter, venigunt fluctu-
rum perpedita rotunditate. Preter
quoniam pacis cellulae adipis singulare
habent. Nihil time et simplicibus
fibraribus etiam transversis, quae super
et et plerisque, pacis queque membrana
et angustiores prævalentes.

Sobrium placita, quae, ut supra d-
erunt tensio est, adhuc ex locis culti
et ex globis rotundis decipiunt et prae-
cipue profundi oribus, magnitudine
varia; prout multo testiculus a
cavitate, quibus sphaerulat perit quidam et

habebant simplicis vel duplicitis fibrae telae cellularis; irregularibus decurrebant lineis arcuatis, quae majore numero concurrentes fasciculos efficerunt, adspicuum superficie irregularis et inordinatae praebentes.

Juxta et intra hos fasciculos globuli multi, rotundi et ovales, magnitudine valde discrepantes, superficie granulosa, interspersi erant. Quorum globulorum minimi diametrum aequabant duarum telae cellularis fibrarum, maximi autem triplo vel quadruplo superabant puris globulos. Cum ulterius progrederemur, ad latus degeneratum fibrae tantummodo aequabiles et globuli granulosi apparebant et paucis tantummodo in locis, iisque valde brevibus, vestigia fibrarum muscularium vix percipienda notabantur. Praeter globulos modo memoratos passim guttulae adipis singulares deprehendebantur. Medius tumor ex simplicibus tantum fibris, deficientibus striis transversis, quas supra descriptimus, et ex globulis, quorum quoque mentionem fecimus, constat magnopere prevalentibus.

Substantia pultacea, quae, ut supra dictum est, altera tumoris erat, duobus ex locis cultro desumebatur et ex globulis rotundis descriptis et prevalentibus corpusculis granulosis ovalibus, magnitudine variantibus, constabat; praeterea multos continebat globulos adiposos, quibus globulorum puris quidam numerus admixtus erat. —

[364]

De funiculi umbilicalis deflag
Kaas, Franz; Friedrich-Wilhelm
Royal College of Surgeons of I
[364] b22483184
Mar 01, 2016

ID

b22483184

Dissertatio inaugural
Kaminsky, Christoph
Royal College of Su
[366] b22483
Mar 01, 2016

EXPLICATIO TABULAE.

Fig. I. demonstrat inferiorem corporis dimidiati partem infantis degeneratione affecti muscularorum anteriorum femoris dextri.

Tabula picta est habita ratione diametri dimidiae tumoris naturalis, qui ligamento Poupartii stricte terminatus erat superne, inferne autem genu, ita ut neque superficies abdominalis, neque crus aliqua tumoris occuparetur parte.

Fig. II. demonstrat sectionem tumoris degenerati, quae ita instituta est, ut in linea a spina ossis ilium ad medium directa perpendicularis usque ad os duceretur et interior tumoris ita dimidiati pars velamento aponeuroticō denudaretur, quo facto velamenta cum superjecta lateris interioris et posterioris femoris parte tantummodo distrahebantur.

a) Sectio cutis tumorem circumdantis valde extensa, subter qua tela cellulosa penitus prope evanuit, venae autem cutis valde dilatatae ob prostratam telae cellularis nutritionem eo magis conspicuae redditiae sunt.

b) Panniculus adiposus subcutaneus, qui in finibus tumoris inferioribus iterum conspicitur.

c) Patella juxta longitudinem a superiore ad inferiorem marginem dimidiata. Ligamentum patellae ad tibiam adscendens haud mutatum est; fibrae autem ejus tendinosae, quae sursum ad rectum et vastum utrumque adscendent a se invicem detrusae sunt tumidiusculae.

Insigni musculorum memoratorum intumescentia os patellare tantopere antrorsum protractum est, ut liga-

10
622483134
The University of Michigan Library
Kalamazoo, Michigan 49008-3134
Monetary Collection, Michigan
13641 122-483184
May 1, 2016

*zunt pectus non amplius in linea i-
stius sit, sed cum ea superius efficiat
qua de causa etiam evitata articulatio
vallis deinde et illata est.*

Aliphysa non *Juncos* habet in fructu, sed in parte interiore, quae in densum sic est, ut sic linea laminar aperte late moximetur, quae in latero ciborum hincum et crucifer intercedunt, inde nota struma in parte *Juncos* i circa florum associacionis rudi interdum degenerantur, conspicimus.

*f) Vas cruralia infra ligamentum P.
et si etiam vas interni velamento ap-
trecent et retinaculum prodrus.*

5) Superficie interna velozness ap
interna el primitivo interna fumarita d
solar ha sido apresurado fascinante
número sepa al quitan fumarita con
servator.

1) hieis nosci reli fossarum pa-
lae septentrionalis vestigia extremitas
est, singulis vix ipsi fluvii, presserit
que ad medias tunc fossas profundit,
ramboles fons fuisse sunt, fasciculus
latus tunc pilosus, exterius clau-
sifex, secundum me in substantia
an frumentari, in quam etiam tunc
eiusmodi, mortali ligno omnes
sunt ruribus, sicut, dicuntur. Medio
degenerata valle amplius apparent
vicias polos tunc ostendit, passim

ATIO TABULAE

ultriorum corporis dimidiis per
et affecti nucleus ultima

et habita ratione dandi dantur
ligamentum Poupartii sicut venia
femoris utrumque, in utroque
et, neque crux aliquam tunicae co-

piat sectionem femoris degenerari,
ut in linea a spina ossis ilium ad
condylum superius ad se hinc
a dimidio pars videnter aponeuro-
tis facta velamenta cum superficie
posterioris femoris pars tunicae

anterior circumdat vultus et
cellulus penitus prope canum,
vultus dilatatus ob pressorem tibi-
co magis causatus rotundus est
spinosus subcutaneus, qui in fulvo
corrupe complicit.

vultus longitudinaliter a superficie ad
dimidiatum. Ligamentum patellae ad
ad extremitatem est fibra non tenuis
et rotunda et rotunda trans-
versum decolorat et tendit in
cum nesciatur intercurrentia et
interiorum protrahitur et, si lig-

Dissertatio inaugural Kaminsky, Christoph Royal College of Su	[366] b22483	Mar 01, 2016
De funiculi umbilicalis defigat Kaas, Franz; Friedrich-Wilhelm Royal College of Surgeons of I	b22483184	
[364] b22483184		Mar 01, 2016

11

mentum patellae non amplius in linea recta cum tibia
situm sit, sed cum ea angulum efficiat rectum paene,
qua de causa etiam cavitas articulationis anterorum
valde detracta et dilatata est.

d) Condylus inferior ossis femoris in cavitate articulationis situs.

e) Diaphysis ossis femoris haud mutati periosteum
involuta, cui in parte interiori, quae in tabula nostra
deorsum sita est, eae fibrae laminae aponeuroticee fa-
sciae latae annexuntur, quae in latere interiori inter
vastum internum et gracilem intercedunt; anterorum (in
tabula nostra sursum) in parte femoris inferiore inser-
tionem fibrarum muscularium vasti interni, quae nondum
degeneraverunt, conspicimus.

f) Vasa cruralia infra ligamentum Poupartii disse-
cta et extensa vasti interni velamento aponeurotico in-
terorum et retrorsum protrusa.

g) Superficies interna velamenti aponeurotici vasti
interni et praecipue internae tumoris dimidiae partis,
subter hoc strato aponeurotico fasciculus vasorum cru-
ralium usque ad quartam femoris partem inferiorem ob-
servator.

h) Inferior musculi recti femoris pars, qui in ipso
loco supra patellam vestigia corruptarum fibrarum ostendit;
singulæ enim ejus fibrae, præsertim superficiales,
quae ad medium usque femur pertinent, etiamnum prope
immutatae juxta positæ sunt, fasciculos musculares pa-
latim tantum pallidiores, ceterum clare distinguendos,
offerentes, sursum vero in substantiam fibrosam morbo-
sam transeuntes, in quam etiam vastus uterque et mu-
sculus sartorius, musculi igitur omnes in superficie fe-
moris anteriori siti, abierunt. Medio in hoc tumore
degenerato nullæ amplius apparent fibrae, quin etiam
lobulos potius tumor ostendit, passim fibroso-cartilagi-

nosus. Versus omnes partes fascia lata et ultraque lamina aponeurotica, quae post vastum externum et internum est, tumor limitatur.

i) Stratum fibrarum muscularium vasti externi nondum degeneratarum, in quibus transitus continuus ex substantia musculari in molem fibrosam degeneratam conspici potest.

k) Ea tumoris pars, cui musculus sartorius adjacere debebat, cuius autem musculi vestigium sat distinctum non amplius inveniri potest, quamquam in loco designato nonnullae haud perspicuae fibrae fines sartorii intumescentis et degenerati indigitare videntur.

l) Crus, in quo praeter levem infiltrationem serosam telae cellularis subcutaneae nil a norma alieni comprehendebatur.

V I T A.

Natus sum Alexander Jusefowitsch die X. m. Japuarii a. MDCCCIV., patre Moyse Elkan Jusefowitsch, medicinae doctore, ex Rabbiniis Ucraniae supremo, bibliothecae imperialis publicae Petropolitanae bibliothecario honorario, praematura morte mihi erupo, matre Sophia, e gente Rosenblum, qua adhuc sospite gandeo, quare Deo maximo optimo summas ago gratias. Fidem confiteor Judaicam.

Primis litterarum elementis tam in scholis urbis patriae, quam a patre ipso sum institutus. Anno MDCCXIX. cum patre Petropolin me contuli ibique a directore III. Timkowski in gymnasium sum receptus. Vicesimo tertio hujus saeculi anno, testimonio studiorum absolutorum instructus, et in academiam me-

De: Tomasi, Antonius
Krone, Frans
Ruygh, Constantinus
Lodewijk, Constantinus-Wilhel
ID: b22483184
Date: 01-01-2016
Searched by: ID: b22483184

des-clerorum Petropolitanarum recipi
iussi adiutor preceptorum: II. Sagard
spanish, II. Petrolle de physici, Cel. S
logia.

Aduo ultimum dextrum a studi
oecis, duce hec, valde reiuste
mitate literaria Chevresii a. MDC
ML, redit Krauter & lice inter
Profructu de physice, II. Sachalin
II. Biocellistell de anatomia, II. Ker
logia et mineralogia, II. Tscherniell

Primis quatuor hujus saeculi annis
enim hinc a nobis magis Stri
anatomicae oemera subscripta, ab
dominum nesciun sum soluta. Per qua
interior preceptorum: Cel. Mignus i
Ernus de dict. et magnifico, Esp.
spanish, II. Kitzelich de chemia, II
theoria analytic et de toxicologia, II.
latus et demonstracionis botanico, no
ticia ministrante, Cel. Wiegmann de
zoorialis II. Staffens de psycholog
ologia, Cel. G. Ross de mineralogia, II. M
inaria speciei, comparsa, pathologica,
et de physiologia corporis humani
et II. Schleiden dictius operum
etrius dicti, Cel. Ehrnberg de phys
ica lemnis et mineralium, II. Sc
iologica, ut nos in dicti operacione
voluerint, nationibus existent, II. O
rdo medico, II. Becker de pathologia
et in Urologia medicina, II. Hartt de
receptu genitali et speciali morborum
et in postremo et catastrophie mortis expilli

Dissertatio inaugural

Kaminsky, Christoph

Royal College of Su

[366] b22483

Mar 01, 2016

b22483184

b22483184

De funiculi umbilicalis deligat

Kaes, Franz; Friedrich-Wilhelm

Royal College of Surgeons of I

[364] b22483184

Mar 01, 2016

dieo-chirurgicam Petropolitanam receptus, per annum
hasee audivi paelectiones: Ill. Sagorski de anatomia
speciali, Ill. Petroff de physice, Cel. Spaski de zoolog

ia. Adversa valetudine detentus a studiis recedere sum
coactus, donec iterum, valetudine redintegrata, in univer
sitate litteraria Charcoviensi a. MDCCCXXVIII. et
XXIX. rectore Kronberg hisce interfui scholis: Cel.
Provitzki de physice, Ill. Suchomlinoff de chemia,
Ill. Benedictoff de anatomia, Ill. Kernitzki de zoolog
ia et mineralogia, Ill. Tschechnieff de botanice.

Tricesimo quarto hujns saeculi anno Berolinum me
contuli ibique a rectore magnifico Strauss in civium
academicorum numerum adscriptus, ab Ill. Busch in
album medicorum sum relatus. Per quadriennium hisce
interfui paelectionibus: Cel. Magnus de physice, Ill.
Erman de elect. et magnetismo, Exp. Seebeck de
optice, Ill. Mitscherlich de chemia, Ill. H. Rose de
chemia analytica et de toxicologia, Ill. Kunth de
botanice et demonstrationibus botanicis, nec non de struc
tura graminearum, Cel. Wiegmann de zoologia et de
mammalibus, Ill. Steffens de psychologia et anthropo
logia, Cel. G. Rose de mineralogia, Ill. Müller de anato
mia speciali, comparata, pathologica, organorum sensu
rum, de physiologia corporis humani et generationis,
eodem et Ill. Schlemm ducibus operam cadaveribus dis
secandis dedi, Cel. Ehrenberg de physiologia compara
ta infusiorum et entozoorum, Ill. Schlemm de syn
desmologia, nec non eo duce operationibus akiurgicis in
cadaveribus instituendis me exercui, Ill. Osann, de ma
teria medica, Ill. Hecker de pathologia et therapia spe
ciali et historia medicinae. Ill. Horn de pathologia et
therapia generali et speciali morborum mentis, nec non
de cognoscendis et curandis morbis syphiliticis, Ill. Wag

ner de politia medica et de medicina forensi, Cel. Casper de morbis infantium, Exper. Isensee de pathologia et therapia generali, de pharmacologia, pharmacia et de exanthematibus, Ill. Jüngken de chirurgia tam generali quam speciali, Cel. Froriep de akiurgia cum anatomia chirurgica conjuncta, nec non de operationibus chirurgieis, quarum medici periti esse debent, Cel. Kluge de ossibus fractis et de arte obstetricia, Exper. Romberg de morbis nervorum, Exper. Angelstein ad operationes ophthalmiatricas instituendas, Exp. Troeschel ad fascias applicandas privatissime me instituerant.

Scholas porro hasce frequentavi clinicas: medicas Ill. Osann et Cel. Wolff; chirurgicas et ophthalmiatricas Ill. Rust, Ill. de Graefe, Ill. Jüngken; obstetricias Cel. Kluge. Ad praxin infantium curandorum Cel. Barez me instituit.

Quibus omnibus viris illustrissimis, celeberrimis et doctissimis maximas, quas possum, gratias ago.

Jam vero tentaminibus et examine rigoroso superatis, spero fore, ut dissertatione et thesibus defensis, summi in medicina et chirurgia honores mihi deferatur.

T H E S E S

1. Plethora abdominalis non semper unus idemque morbus est.
2. Cordis soni impulsui ejus ad thoracis parietes debentur.
3. Adiposis non est morbus.
4. Leges physicae legibus vitalibus non e diametro oppositae sunt.

et de medicina forensi, Col. Cas-
am, Exper. Iuris et de pulmo-
nali, de pharmacologia, pharmacia
III. Jurgula de chirurgia tan-
ta, Col. Fratrum de alurgia con-
juncta, nec non de speciebus
medicorum partium esse delecti, Col.
utris et de arte obstetricia, Exper.
s aerorum, Exper. Angelorum
alimatrias institutas, Exsp. Tra-
candis prizipia ne instrumenta
ce frequentari dicunt: medici II.
chirurgicas et opthalmicas II.
, III. Jurgula; obstetricia Col.
gatione curadorum Col. Baro

vix Illustrissima, celeberrimi et
quas possum, gratias aga-
mibus et eumine rigorosu-
sissimam et fidelis defensio,
chirurgia honesta nisi defensio.

E S E S.

dis non semper non idemque nor-
malis est ad thauca partus lo-
mata.

graves natalia non + dantur op-
eraria.



