

Quaedam de morbis cerebri organicis et observatio steatomatis in cerebro certa : dissertatio inauguralis medica ... / auctor Car. Frid. Eduard Kramer.

Contributors

Kramer, Karl Friedrich Eduard.
Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin.
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Berolini : Typ. Ioannis Friderici Starckii, 1829.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/bq4kbazq>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
[E library@wellcomecollection.org](mailto:Elibrary@wellcomecollection.org)
<https://wellcomecollection.org>

QUAEDAM DE
MORBIS CEREBRI
ORGANICIS

ET
OBSERVATIO STEATOMATIS IN
CEREBRO CERTA.

DISSERTATIO
INAUGURALIS MEDICA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE
GRATIOSI MEDICORUM ORDINIS

IN

UNIVERSITATE LITTERARIA

FRIDERICA-GUILELMA BEROLINENSI

UT SUMMI

IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORES

RITE SIBI CONCEDANTUR

DIE XXVI. M. SEPTEMBRIS A. MDCCCXXIX.

H. L. Q. S.

PUBLICICE DEFENDET

A U C T O R

CAR. FRID. EDUARD KRAMER

BEROLINENSIS.

OPPONENTIBUS:

H. KNIPFER, MED. ET CHIR. DD.

F. HAUCK, MED. ET CHIR. DD.

E. SCHMIDT, MED. ET CHIR. CAND.

ACCEDUNT TAB. AENEAE II.

BEROLINI,

TYPIS IOANNIS FRIDERICI STARCKII.

12
MORBI CERE-
BRALIS

SYMPTOMATA ET
CURATIO

LIBER PRIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER SECUNDUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER TERTIUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER QUARTUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER QUINTUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER SEXTUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER SEPTIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER OCTAVUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER NONUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER DECIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER UNDICESIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER DUODECIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER TREDECIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER QUARTDECIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER QUINDECIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER SEXDECIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER SEPTDECIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER OCTIDECIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER DECIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER UNDICESIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER DUODECIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

LIBER TREDECIMUS
DE MORBIS CERE-
BRALIS

PATRI OPTIMO
FRIDERICO KRAMER
USQUE AD CINERES COLENDO

HASCE LITERARUM PRIMITIAS

PIO GRATOQUE ANIMO

D. D. D.

AUCTOR.

RUM PRIMITIAS

QUE ANIMO

D.

P r o o e m i u m.



Pluribus materiis, de quibus scriberem, electis et iterum rejectis, quia omnes prudenter tractatu et confectu difficillimas esse inveni: casus steatomatis in cerebro maxime memorabilis, qui in nosocomio caritatis Berolinensi, me in eo munere medico-chirurgi inferioris fungente, occurrit, dignus mihi visus est, quem quibusdam de morborum speciebus ad hunc pertinentibus praemissis enarrem. — Sin

AUCTOR.

vero his in paucis lectori non sufficiam, quo
magis, quum jam haec materia crebro tam
diligenter et accurate tractata sit: tamen spe-
ro fore ut mihi ignoscat, quod his in pagel-
lis studiorum meorum primitias ad lucem
proferre conatus sum.

ri non sufficiam, quo
materia crebro tam
actata sit: tamen spe-
t, quod his in paget
primitias ad lucem

Morbos cerebri organicos vocamus, qui aut cerebri ejusque integumentorum degenerationibus, aut materiis organicis in cerebro profundo vel in ejus superficie depositis, aut pseudoorganisationibus intra cranium oriuntur.

Desorganisationes illae aut in cerebro ipso aut in capitis ossibus et cerebri membranis existunt atque ratione quavis cerebro nocent. Exsudationes aut inter singulas membranarum cerebri lamellas, aut inter duram et piam matrem, aut inter integumenta cerebri membranacea et cerebrum, aut in substantia cerebri ipsa inveniuntur. Quibus praecipue fluida varia organismi extravasata, ut sanguis, lympa, serum adnumerantur, sed de his alio loco, quum et quod ad causas et quod ad morbos iis effectos maxime ab aliis cerebri morbis organicis distingui possint. Pseudoorganisationes deni-

que aut in cerebro superficiali locum tenent, ibique partim proximis ejus investmentis, partim cerebro ipsi affixae sunt, aut plane substantia cerebri ipsa circumdantur.

Quascunque vitia cerebri organica formas praebent, his classibus quatuor amplecti possumus.

I. Cranii formatio vitiosa, qua partim cranium in universum justo crassius redditur, partim excrescentiae osseae, quae in cerebrum porrigunt, nascuntur; in utroque autem casu nunc imprimendo, nunc irritando cerebrum offenditur.

II. Vitiosa membranarum cerebri formatio, et talis quidem, ut vel membranae ipsae crassiores fiant, vel massae, quae non raro admodum se extendunt, inter earum lamellas conditae sint.

III. Abnormis substantiae cerebralis qualitas.

1. Mollities cerebri totalis vel partialis, quaecum simul cerebri color non raro mutatur.
2. Induratio cerebri, quae aequae ac mollities aut totalis aut partialis esse potest, neque raro existit ac semper fere ex inflammatione cerebri chronica orta esse videtur.
3. Ossificationes, quae quum ex cranio originem non sumant ab illis, quas supra (ad I.) memoravi, distinguendae sunt, et cum in dura matre, tum in falce cerebelli, quam vocant, sitae sunt.

IV. Tumores in cerebro, quorum nonnullas species inter se varias distinguere possumus:

1. Tumores, qui massa exsudata, quae lucida aut semilucida, variaeque consistentiae, neque albumini dissimilis est, orti haud raro finibus non circumscripti sub membranis cerebri, praecipue sub pia matre occurrunt, crebro autem integumento proprio concluduntur.

2. Tumores consistentiae solidioris, quam priores, qui aut:

a) coloris albicantis seu subcani et albumini coagulato non dissimiles et vulgo durae matri adhaerent, neque integumento proprio conclusi sunt aut:

b) coloris rubelli seu russei, substantiae renum simillimi sunt et modo in hac modo in illa cerebri parte inveniuntur.

3. Steatomata, quae illis etiam solidiores, adipi indurato similia, ex albo flavescentia, magnitudinis variae sunt et ex variis cerebri partibus excrecere possunt. Qui tumores rariores, quam ii, quos sub. 2. a. et b. memoravi, partim membrana propria sacci-formi circumdati sunt, partim ope telae tantum cellulosa cum cerebro cohaerent.

4. Massae tuberculosae, quae magnitudinis admodum variae partim in substantia cerebrale, partim ejus membranis affixae sunt. Rarioribus quidem morborum speciebus hasce desorganisationes adnumerare debemus, a

Reil autem et Voigtel et Abercrombie observatae sunt.

5. Tumores cystici, qui magnitudine modo piso, modo ovo galli non impares, saepissime occurrunt. Ratione eorum, quae continent distinguendae sunt hae species:

a) Hydatides, quae fluidum sero simillimum continent, et plerumque saccum tam tenuem habent, ut saepe tactu levissimo corrumpantur.

b) Tumores cystici, qui pus vel fluidum ei simile continent, et certo ex inflammatione oriuntur.

c) Haematocystides, quae sanguinem aut sanguinis coagula in sacco continent neque raro nullis symptomatibus morbi gravioribus praegressis admodum magnae occurrunt.

Species gravissima morborum cerebri organicorum, quae nulli ordini, quos posui, adnumerari potest, hic pertinet:

Fungus medullaris, morbus gravissimus, qui crebro occurrit, celerrime plerumque latius atque altius serpit, mox eventum pessimum adducit. Quamvis temporibus his novissimis opera quam maxima huic morbo adhibita sit, tamen adhuc ne diligentissimo quidem studio virorum ingeniosissi-

morum contigit, ut progressibus hujus morbi finem certum proscribant.

A e t i o l o g i a.

Conjunctio causalis cerebri morborum organicorum in obscuro quam maxime relictæ est. Causam prædisponentem horum morborum nisum formativum generalem habere possumus, qui causa occasionali ut agat incitatur. Hoc igitur modo massæ organicæ in tela cellulosa deponuntur, hæc illas circumcludit, et sensim sensimque membrana secernens fit, cujus secreta aut fluida permanent aut sensim concresecunt; atque ita pro nisu formativo vario massæ illæ oriuntur, quibus illa varia corpora morbosa constant. In universum igitur formationes illæ recentissimæ sunt, quæ fluidæ, sero similes apparent; quo magis autem inveterascunt, eo solidiores fiunt. Neque raro tumores inveteratissimi tandem ulcerantur. — Aetas magis provecta (secundum Nasse ætas media) et sexus virilis organismum ad formationes illas propensum reddere videtur, desorganisationibus illis enim sæpius homines ætate provectiore, quam juvenili, sæpius viri quam feminae laborant. Præterea constitutio quædam apoplectica iis favere videtur.

Causæ occasionales morborum cerebri organi-

corum praecipue omnia, quae extrinsecus offendunt ictus, quassatio, contusio, vulnera esse videntur, omnes denique causae quae sanguinis ad caput congestionem efficiunt. Frigoris et caloris quoque commutationem subitam causam occasionalem nonnulli habent. Menstruatio suppressa, metastases exanthematicae: scabie, morbillis, scarlatina et cet. suppressis ortae, sicuti quoque dyscrasia serophulosa, syphilitica atque alia hujusmodi, puris denique aliorumque secretorum metastases morbos cerebri organicos quin afferant dubium fere esse non potest. Eodem modo tumores in cerebro [ex encephalitide acuta vel chronica] orti inveniuntur.

Symptomatologia.

Symptomata morbos illos comitantia minime tam certa sunt, ut ex iis formationum illarum abnormium speciem certam et definitam cognoscere possimus: saepe adeo difficillimum est dicere, an omnino morbus organicus adsit, necne. Quae difficultas etiam major fit, si ut non raro accidit, omnia symptomata praeperiodum quandam sequuntur, ita ut remissiones medicamentis adhibitis forte apparentes medico morbi sedem loco omnino alio investigandam esse persuadeant.

In universum vitia organica adesse haec symptomata indicant;

1. Dolores capitis permanentes et vehementes, qui sede, gradu, modoque variant, saepe periodum quandum tenent, ita ut paroxysmis vehementibus remissiones et intermissiones adeo interponantur. Interdum etiam hi dolores pungentes sunt. Saepissime hos dolores ex abdomine ortos putamus, quia saepe signa adsunt, quae ortum talem manifestare videntur, attamen hoc habent insigne, quod motus, strepitus, labores et cet., praecipue autem vini usus et aliorum systema vasorum incitantium dolores vehementiores reddunt, id quod in difficultatibus gastricis omnino non occurreret.
2. Congestiones sanguinis ad caput, quas adesse color faciei, calor oculorum, pulsus satis certo indicant.
3. Affectiones molestae, quae plane characterem gastricum prae se ferunt, dum alia signa saepe tam levia sunt, ut nihili aestimentur vel omnino non observari possint. Aegrotus male dormit, cibi taedium habet, frequenter vomitu nauseoso non antecedente laborat. Haec quoque symptomata periodice intrare solent.
4. Organorum sensuum perturbationes, visus, auditus, saporis, odoris, quae eo gravio-

res fieri solent, quo magis morbus inveterascit. Qua ratione coecitas completa non raro tumorem in cerebro adesse, et nervo optico insultare, nobis demonstrat. Pupillam utramque hoc in casu aequaliter dilatatam invenimus, tum vero etiam, dum altera ambitum normalem aut minorem praebet, alteram multo majorem videmus.

5. Perturbatio mentis, infirmitas memoriae, ingenii, stupor, amentia, furor transitorius et permanens.

6. Convulsiones, quae aut solae aut una cum symptomatibus jam supra descriptis junctae apparentes saepe epilepsiae paroxysmis simillimae sunt, crebro occurrunt aut in morbi exacerbationibus se ostendunt, neque levibus affectionibus apoplecticis vel tetano dissimiles sunt.

7. Affectiones paralyticae, quae partim paralysin partium singularum, vel systematum, partim hemiplegiam vel paraplegiam se praebere possunt, atque id insigne prae se ferunt, quod sensim sensimque, nec repente ut in aliis affectionibus paralyticis fieri solet, intrant et crescunt.

8. Affectiones apoplecticae, quae saepe facile evanescentes, non raro redeunt et periculum majus afferunt. In his aegrotis plerumque habitualis gravitatis sensus in capite inveni-

tur, saepe vertigine laborant, aut haec quoque est habitualis, ut in eundo semper sustentari debeant.

9. Pulsus denique nonnulla signa observatione non indigna praebet, quum saepe aliis symptomatibus medico cerebri morbum adesse non indicantibus, ad hunc medici animum advertant. Praecipue hac in re discrepantia pulsus ab aliis symptomatibus maximi momenti habetur. Saepe frequens, plenus, inaequalis, intermittens, saepe autem tardissimus et parvus, aut quamvis frequentissimus, maxime debilis, tremulus, tangenti vix percipiendus est.

P r o g n o s i s

in omnibus cerebri vitiis organicis mala esse debet, quod symptomata omnia in morbi initio, ubi medicus fortasse auxilium afferre posset, tam incerta sunt, ut morbus raro is habetur, qui re vera est. Si contra haec signa magis se manifestant, et molestiae augmentur, plerumque tempus sanandi praeterlapsedum est, aegrotus celerius vel tardius mortem occumbit. In degenerationibus cerebri superficialis tardior esse solet decursus, quam si illae in cerebro profundo inveniuntur. Forsitan situ quoque in

cerebro et organorum dignitate, quibus adjacent varius morbi decursus efficitur.

T h e r a p i a.

Quantam difficultatem medicum in morbis his organicis cerebri sanandis vincere oporteat, jam ex iis, quae supra in symptomatologia et prognosi proposuimus perspicuum est, sicuti etiam morbum jam plane evolutum medici vel maximam operam irritam reddere. Ne hoc quidem facile nobis contingit, ut morbus quominus altius serpat, prohibeamus, aut symptomata leviora reddamus. Prae omnibus igitur medicus, ne morbus talis oriatur caveat, congestiones igitur ad caput prohibeat, irritationi cerebri inflammatoriae accurate et diligenter et quidem ratione antiphlogistica medeatur, et ne recurrat curatione secunduria non minus diligenti evitet, exanthemata suppressa revocet, dyscrasias, quae materias ad caput aliquas pellere videntur, mature et apte tollat; si pars secretoria secernere desinit et metastases ad cerebrum timendae sunt, ut denuo secer-net operam det etc. Sin autem morbo organico jam plane evolutu irritatio inflammatoria occurrit, methodo antiphlogisticae venaesectione, hirudinibus, superinfusionibus frigidis aliisque medicamentis antiphlogisticis statim satisfaciendum est, sin autem mor-

morbus characterem magis chronicum praebet, methodus derivatoria et antagonistica medicamentis laxantibus, foniculis, setaceis, cauteriis (ferro candente ad nucham et ad brachium) maximam nobis sanandi spem dare potest, sed ne his quidem medicamentis semper morbo fines certos ponere possumus.

Historia morbi.

Julia Schlemmer, undeviginti annos Berolini natus, constitutione haud quidem firma, tamen morbis infantilibus superatis usque ad annum vigesimum semper valetudine imperturbata gavisata est, menstruatio ejus sola, quae in aetate ut solet incipit, semper fuit irregularis et jam novem ex mensibus plane non apparuit. Parentes semper fuisse sanos, et nominatim molestias ejus morbo similes nunquam pertulisse dixit. Aegrotata ipsa spasmodicis similibus epilepticis primum terrore vehementi ortis est tentata, qui praecipue extremitates superiores corripuerunt. Pollicibus firme compressis et sibi plane inscia manibus palpitavit. Nonnullis quidem momenti accessus transiit, tamen hoc ex tempore singulis diebus rediit, quam ob causam a propinquis nosocomio caritatis Berolinensi adducta est.

Hic in primis quattuor diebus affectionibus

gastricis exceptis, quae curae simplici mox cesserunt, nulla morbi alicujus symptomata se ostenderunt, et modo die quinto iterum spasmodum paroxysmus advenit, qui tum quoque se epilepticos esse docuerunt.

Hoc ex tempore accessus aliquantum frequentes, intervallis indefinitis redierunt, atque ita quidem ut in hebdomade duo vel tres paroxysmi animadverterentur, qui autem erant modice graves. Sed tempore, quo menstruatio accedere debebat, graviores fiebant. Simul aegrota inclinationem alvi adstrictae magnam et assiduam ostendebat, qua ex causa remedia dabantur, quae hanc removerent et menstruationem adducerent — Catameniorum restitutio tamen longius per tempus non contigit, usque tandem cura per octo hebdomades continuata (initio mensis Junii. 1828) nonnulli mensium prodromi apparuerunt, tunc post quatuor hebdomades fluor menstrualis modice copiosus sese ostendit.

Nihilominus spasmodum paroxysmi in hebdomade semel aut bis repetebantur, ita quidem, ut spasmi primum in brachio dextro oriri et ab hoc ad partes corporis ceteras promoveri solerent, quam ob causam (sub finem Mensis Julii) ad brachium dextrum moxa applicata et ejus suppuratio sustentata est. Quae quidem cura initio successum felicissimum habere videbatur. Valetudine universali optata, diutius, quam per tres hebdomadas nullum spasmodum habuit paroxysmum.

In altero autem Mensis Augusti dimidio intentionibus corporis iterum spasmi omnino tales, quales antea fuerunt, adducebantur, et nunc diversis temporibus quidemque sic repetebantur, ut brachium dextrum solum occuparent.

Mense sequente hoc in brachio spasmi persaepe conspecti sunt, et modo magis musculos extensores modo magis flexores corripientes brachium et manum circa axin verterunt. Impetus hujusmodi singuli mox transierunt, pluries autem singuli deinceps et saepe gravissimi redierunt. Sin etiam mentis potestas non plane omissa, tamen admodum fuit obnubilata.

Plura remedia, ut hunc spasmum partialem removerent adhibita, fuerunt frustranea. In medio mensi novo menstruationis molimina apparuerunt, pellentia iterum hanc ob causam data, menstruationem parcam protulerunt. Nonnullos dies postea paroxysmus epilepticus gravissimus occurrit, et nulla habita ratione curae diligentissimae per longius tempus in intervallis irregularibus pluries apparuit, quidem ita, ut spasmi nunc semper ad totum corpus, ad collum quoque et pectus pertinerent.

Initio Mensis Novembris spasmi capitis vehementes apparuerunt, inter quos mentis omnino non fuit compos, et qui semper mox spasmis in pectore et collo consociabantur, quibuscum conscientia sensim sensinque redibat.

Hoc modo status aegrotae per longius tempus idem erat, usque die XV. Mensis Januari 1829, spasmis in capite iterum vehementibus exortis, status soporosus remanebat, ex quo aegra sinapismis identidem applicatis modo per nonnulla momenta excitabatur, tamen modo verba pauca debili miseraque voce producebat, et tum, quamquam alta voce cum ea loquebantur, abdormiscebat. Hoc in statu cibos solidos sumere omnino non poterat, neque fluida quidem nutrimenta iustillari poterant. Pulsus erat minimus, debilissimus simulque paululum tardior quam esse solet. Omnia remedia plane erant frustranea, et quisque dies fidem reddidit majorem, hic vitium adesse organicum, quod diu timebant. Laxa et ulla sine firmitate in lecto jacebat, sine ullius partis motu. Tentamine eam vocando vel concutiendo e somno excitandi constituto oculos quidem plerumque recludit, nunquam autem quopiam direxit. Interdum quoque linguam mucro tenaci ex albo flavescente paululum obtectam ostendebat. Pupilla modo utroque in oculo aequae dilatata, modo altera contracta altera aequae erat dilatata.

(D. XX. Mens. Januarii) Aliquot post dies capitis temperies ad hoc usque tempus normalis, genis rubescentibus, aucta est. Pulsus antea tardus, parvus ac debilis, nunc frequentior factus modo octaginta modo nonaginta in sexagesima horae parte pulsationes habuit, semper tamen permansit debilis.

Cute vero calida et sicca, et aegrota perpauca edente, alvi ac urinae excretio parca et rara fuit. Nihil aegra conquesta est, nullo modo dolorem vel molestiam significavit nec vescam nec potum petiit, omnino nihil locuta est. Vires singulis diebus magis magisque collabi videbantur.

Aegrotae, ut nutriretur, interdum vinum, coffea, et jus carniū instillabantur et praeter remedia hucusque adhibita, calore ac rubore soporeque crescentibus, hirudines prope aures applicabantur et aequae superinfusiones frigidae capiti tepido in balneo instituebantur.

(D. XXVIII. Mensis Januarii) Status morbi sensim magis magisque pejor fiebat, aegra de somno plane non exitabatur, oculos quoque non recludebat, virium callapsus et corporis macies singulis diebus crescebant. Caput ardens, facies rubicunda, cutis sicca atque calida, pulsus parvus, debilis, frequens, lingua mucō denso, tenaci, ex albo flavescēte oblecta, os mucō impletum, respiratio tarda, gravis, saepe oppressa vel stertorosa.

(Die XXXI. Mens. Januarii) Cura maxima cum diligentia sine ulla in re ipsa mutatione continuabatur. Incitantibus extrinsecus adhibitis, praecipue sinapismis alternatim ad pedes, suras, latera femorum interna applicatis, aegra interdum quamquam modo per breve temporis spatium paululum vigiliior fieri videbatur. Praecipue notatu fuit dignum, quod aegra matutino tempore et ante me-

ridiem facilius suscitari et hoc in tempore quoque aliquot fluida sumere poterat, interdum adeo verba nonnulla faciebat, contra post horam duodecimam semper sopore altissimo tentabatur.

(Die VIII. Mens. Februarii). Nulla in re ipse mutatio. Singulis in casibus ante meridiem aliquot ex aegra de statu ejus morbozo experiri poterat. De doloribus colli levibus et gravitatis sensu in capite conquerebatur, et aliquot sumptis fluidis paulo post semper in priorem inscientiam incidebat. Collapsu virium crescente pulsus parvus ac debilis permanebat, semper autem frequentior fiebat; facies rubicunda, caput calidum, pupillae inaeque dilatatae, excretio alvi et urinae involuntoria. Remediis prius adhibitis fomenta capitis frigida pluries per diem adjecta sunt.

(Die XVI. Mens. Febr.). Morbus impeditus progrediebatur, aegrotā vix e somno excitari poterat, neque loquebatur. Nutrimentorum deglutitio instillatorum fiebat difficilior, pulsus multo frequentior, usque ad centum pulsationes in sexagesima horae parte augebatur, cutis calida ac sudore tenaci oblecta, facies rubicundior, caput ardens; et in collo anteriore subrubra intumescencia adspiciebatur, cujus tactus fortior aegrotae nonnullos dolores facere videbatur; itidem fauces rubescebant ac intumescabant, quodcirco hirudines ad collum et postero die quoque ad frontem applicabantur, quibus aegra

paululum sibi conscia fiebat, non tamen vocem edidit.

(Die XX. Mens. Febr.). Conscientia partim revocata mox iterum amittebatur, color capitis et rubor vicens faciei hirudinibus pluries ad frontem applicatis et fomentis frigidis vix paululum mitigabantur, sopor altior atque durior fiebat, quam antea, pulsus frequentior usque ad centum et viginti pulsationes, parvus et saepe intermittens. Totius corporis superficies sudore copioso et tenaci oblecta, nutrimenta et medicamina instillata minus glutiri quam quasi in ventriculum decidere videbantur, respiratio fiebat celerior, anxior, oppressior, et sono crepitante stepenteque erat comitata.

(Die XXIII. Mens. Febr.). Omnia morbi symptomata semper magis magisque ingravescebant, et sopor altus, quo aegra erat oppressa nullo quoque momento ne singula quidem voce est interpellatus, usque noctu demum (ad diem XXIII. Mens. Febr.) mors est consecuta.

Sectio cadaveris

a Cel. Schlemm, Illustr. Rudolphi praesente, constituta haec praebuit:

In cavo cranii dissecato tumor est adspectus, cujus diameter pollicem et supra, adaequavit qui profundam in cranium impressionem effecerat. Explora-

tio diligentior tumorem a superficie ad cerebri substantiam eo usque extendi docuit, quo cornu posterius et cornu laterale ventriculi cerebri sinistri conveniunt. Tumoris ipsius forma fuit oblonga, et ejus diameter a superficie anteriore ad posteriorem duos pollices et duas lineas, a superiore ad inferiorem pollicem et decem lineas et a latere dextro ad sinistrum itidem pollicem et decem lineas adaequavit. Tumor steatomatibus fuit adnumerandus, ejus substantia omnibus in partibus eadem, maxime similis, ut Illustr. Rudolphi dicit ovariorum steatomatibus albis sic dictis. Iuxta latus dextrum vesicula sero impleta sita est, quae tela cellulosa tumori est adjuncta. In cerebri ventriculis paululum fuit aquae. Partes cerebri ceterae, ut esse solent, repertae sunt. Extensio atque structura solida tumorem originis veteris esse docuerunt.

In ceteris corporis partibus omnia normalia adspecta sunt.

Steatomatis praeparatam in museo anatomico universitatis litterariae Reg. Fridericae Guilelmae est conservatum.

Libri, quibus in eleboranda dissertatione
usus sum.

J. Abercrombie's. Untersuchungen über die Krankheiten des Gehirns und Rückenmarks. Aus dem Engl. von Busch. Bremen 1829.

Baillie's Anatomie des krankhaften Baues etc. Aus dem Engl. von Soemmering. Berl. 1794.

Calow. De tumoribus cerebri. Diss. inaug. Berol. 1826.

Hammer. Observationes novae tumorum morbosorum in cerebo. Diss. inaug. Lips. 1818.

Hertel. De cerebri et meningum tumoribus. Diss. inaug. Berol. 1814.

J. F. Merckel. Handbuch der pathol. Anatomie.

Meyer. De cerebri tumoribus. Diss. inaug. Berol. 1829.

Morgagni. De sedibus et causis morborum. Lugd. Rat. 1767.

Otto. Handbuch der pathol. Anatomie. Breslau. 1813.

Otto. Neue seltene Beobachtungen zur Anatomie etc. Berl. 1824.

Reil. Memorab. clinic. medic. pract. Halle 1790 — 95.

Rhodius. De amaurosi cranii osteosteatomate effecta. Diss. inaug. Berol. 1829.

L. Rostan. Untersuchungen über Erweichung des Gehirns. Uebersetzt. von Fechner. Leipzig. 1824.

Soemmering. Zusätze zu Baillie's Anat. etc. Berlin. 1794.

Voigtel. Anhang über Geschwülste im Gehirn zu Abercrombie's Krankheiten des Gehirns etc.

Dess. Handbuch der pathologischen Anatomie. 3. Bände. 1804 — 5.

TABULARUM EXPLICATIO.

Tab. I. Cerebri integumentis liberati superficies superior.

A. Cerebri hemisphaeria.

B. Tumor steatomatosus.

a. Vesicula sero impleta prope tumorem sita.

Tab. II. Cerebrum longitudinale dissectum.

A. Corpus callosum dissectum.

B. Tumor dissectus.

a. Vesicula sero impleta prope tumorem.

b. Plexus choroid. lateralis.

C. Cerebellum.

VITAE CURRICULUM.

Ego, Carolus Fridericus Eduard Kramer, Berolini anno MDCCCVI die XIX mensis octobris natus a patre Friderico Kramer et a matre e gente Heidlantiana, cujus mortem praematuram jam annos quindecim lugeo, confessioni evangelicae addictus sum. Primis literarum elementis imbutus, Gymnasium Berolino-Coloniense et tunc Gymnasium Ioa-chimicum frequentavi, et hic literis, quae ad studia academica viam muniunt, incubui.

Anno MDCCCXXIV Mens. Octobris alumni instituti regii medico-chirurgici Friderico-Guilel-miani adscriptus sum et per quadriennium hisce Celeb. et Illustr. virorum praelectionibus interfui.

Cel. Wolff et Illustr. Hegel hodegeticen, logi-
cen et psychologiam, Illustr. Rudolphi encyclopaee-
diam medicam, Illustr. Link botanicen et historiam
naturalem mihi tradiderunt. De physico, chemia

et pharmacia Illustr. Hermbstaedt et Mitscherlich et Cel. Turte praelectionibus adfui. Anatomiam generalem et comparatam, nec minus osteologiam, splanchnologiam, anatomiam organorum sensuum et artem cadavera rite dissecandi Illustr. Knape et Rudolphi me docuerunt. De physiologia Illustr. Rudolphi et Cel. Eck, de pathologia generali et de semiotice Ill. Fr. Hufeland, de pathologica speciali, de morbis psychicis et de morbis syphiliticis Ill. Horn, de therapia generali et speciali Ill. W. Hufeland et Fr. Hufeland, de ophthalmiatrice Cel. Juengken, de fontibus medicatis et de auxiliis in subito vitae discriminibus Ill. Osann audiui. Celsi et Burserii Libros Cel. Hecker mihi interpretatus est. Materiam medicam Ill. Osann, toxicologiam Illustr. Link artem formulas medicas concinnandi Ill. Knape et Cel. Casper mihi explicaverunt. De chirurgia generali, arte obstetricia et ossium fractorum et luxatorum cognitione Ill. Kluge, de chirurgia speciali Ill. Rust, de akiurgia Illustr. de Graefe, Rust et Kluge et de medicina forensi Ill. Knape mihi fuerunt praeceptores. Fascias rite applicandi artem Ill. Kluge me docuit. Clinicum chirurgicum duce Illustr. Rust, Clinicum chirurgico-ophthalmiatricem duce Illustr. de Graefe et Clin. ophthalmiatricum duce Cel. Juengken, Clinicum medicum duce Cel. Neumann et duce Illustr. Bartels, Policlinicum duce Illustr. Hufeland et Osann et Cel. Busse frequentavi.

Hisce studiis peractis medico-chirurgi inferioris munere in nosocomio caritatis Berolinensi per annum functus sum.

Tentamine philosophico, tentaminibus medicis et examine rigoroso coram Gratoso medicorum ordine absolutis spero, fore ut dissertatione, quam conscripsi et thesibus rite defensis summi in medicina et chirurgia honores mihi concedantur. Quibus factis, ut medico-chirurgi inferioris munera apud milites suscipiam Potestampium me conferre jussus sum.

THESES DEFENDENDAE.

I.

*Inflammati sthenica pleonasmus, asthenica
contradictio.*

II.

Abscessus quisque magna incisione aperiendas.

III.

*Sententia: „post coenam stabis vel mille pas-
sus meabis” vera.*

IV.

Scirrhus mammae amputationem non indicat.

V.

*Inter amputationis contraindicationes non re-
ferenda est febris hectica.*

VI.

Neque medicamen, neque venenum absolutum.


EFENDENDAE.

I.
ica pleonasmus, asthenia

II.
magna incisione aperiendas.

III.
enam stabis vel mille par-

IV.
amputationem non indicat.



Tab. I.





Tab. II.







