

De talipedibus : dissertatio inauguralis chirurgica ... / auctor Carolus Mauritius Lewald.

Contributors

Lewald, Karl Moritz.
Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin.
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Berolini : Typ. Nietackianis, 1837.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/qhe6gebw>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DE
TALIPEDIBUS.

DISSERTATIO
INAUGURALIS CHIRURGICA
QUAM
CONSENSU ET AUCTORITATE
GRATIOSI MEDICORUM ORDINIS

IN
UNIVERSITATE LITERARIA
FRIDERICA GUILELMA
AD SUMMOS
IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORES

RITE IMPETRANDOS
DIE XVII. M. JULII A. MDCCCXXXVII.
H. L. Q. S.

PUBLICICE DEFENDET
AUCTOR
CAROLUS MAURITIUS LEWALD
REGIONTANUS.

OPPONENTIBUS:
L. MEYER, MED. ET CHIR. DR. PRACT.
E. CARP, MED. ET CHIR. CAND.
M. SIMON, JUR. UTR. STUD.

ADDITA EST TABULA LITHOGRAPHICA.

BEROLINI,
TYPIS NIETACKIANIS.

De nonnullis vulgi praeiud
Lichtenberg, Karl Friedric
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

De pneumonia in
Liman, Ferdinand
Royal College o
[420] b224
Mar 01, 2016

ie ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

11 newmusic online

18162248372x
Mar 01, 2016

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

INSTRUMENTAL ANALYSIS

BY J. H. HARRIS

LECTURES DELIVERED AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO

IN THE YEAR 1915

BY J. H. HARRIS

IN THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

1916

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

1916

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

1916

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

ILLUST
EXI

J.F.

MEDICINAE ET
P. E. IN UNIV
SOCORUM CARUT
COLLEGII EXAN
ORDINIS REGII
EQUITI, ORD.
RASSICI LUDOV
LEONINI E
LI

De pneumonia it
Liman, Ferdinand
Royal College o
[420] b224
Mar 01, 2016

De nonnullis vulgi praeiud
Lichtenberg, Karl Friedric
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

ie ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

11 tuenius daitcon

V I R O

ILLUSTRI, CELEBERRIMO,
EXPERIENTISSIMO

J. F. DIEFFENBACH,

MEDICINAE ET CHIRURGIAE DOCTORI, PROFESSORI
P. E. IN UNIVERSITATE FRIDERICA GUILIELMA, NO-
SOCOMII CARITATIS BEROLINENSIS MEDICO PRIMARIO,
COLLEGII EXAMINUM HABENDORUM SUPREMI MEMBRO,
ORDINIS REGII DE AQUILA RUBRA IN CLASSE QUARTA
EQUITI, ORD. SUECICI WASANI CENTURIONI, ORD.
HASSICI LUDOVIC., ORD. BADENSIS ZAEHRINGENSIS
LEONINI EQUITI, COMPLURIUM SOCIETATUM
LITERARIAR. SODALI ETC.

HASCE
STUDIORUM PRIMITIAS

SUMMA QUA PAR EST PIETATE

D. D. D.

AUCTOR.

Tres pedum
solent, pedem
fusi), pedem
dus deformitat
impeditur, qu
utitur, etenim
dus in terra
una cum ele
externo tantu
itaque si amb
pedis utriusq
ita deflexus e
sunt. Sed e
habet. Quoniam
cium dicta
nonnulla ha
Primum
progre- diar,
to anatomic

De pneumonia in
Limban, Ferdinand
Royal College of
[420] b224
Mar 01, 2016

De nonnullis vulgi praeciud
Lichtenberg, Karl Friedric
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

ie ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

11 tuemdius amrean

Tres pedum deformitates praecipue medici discernere solent, pedem equinum, (Spitzfufs), pedem varum (Klumpfufs), pedem valgum, (Plattfufs). Pedem equinum eam pedis deformitatem nominamus, qua, calce elevata, aeger impeditur, quominus tota planta pedis inter ambulandum utatur, etenim modo apicibus digitorum, aut dorso pedis in terra positus incedere potest: pedem varum, si una cum elevata calce pes ita dislocatus est, ut aeger externo tantum pedis margine terrae insistere possit, itaque si ambo pedes hominis hoc morbo laborent, planta pedis utriusque sibi opposita sit; pedem valgum, si pes ita deflexus est, ut aegrotus interno margine terrae insistat. Sed et inter se unaquaeque species tot tantaque habet discrimina, et vicissim tam multae varietates specierum dictarum inter se conjunctae sunt, ut alio loco nonnulla hac de re disserere in animo sit.

Priusquam vero ad anatomiam deformitatum pedis progrediar, non alienum a re esse videtur, si quaedam de anatomia pedis sani, haud dislocati, proferam et tibi,

AUCTOR.

L. B. in memoriam revocem. **Pes** pro articuli sui inter malleolos natura praesertim duos facere potest motus, flexionem et extensionem: os tali enim inter malleolos ligamentis, membrana capsulari diarthroseos tarsi, ligamento deltoideo, ligamento laterali externo (ligamento fibulari calcanei, lig. fibulari tali antico et postico) tam bene munitum est, ut paululum modo ad latus internum, nihil fere ad latus externum moveri possit ob magnam rigiditatem et brevitatem ligamentorum et majorem malleoli externi prominentiam, quibus fit, ut luxationes pedis ad latus externum multo rariores quam ad internum, et valgus nunquam cum in modum deformis sit, quomodo pes varus. Septem tarsi ossa inter se tot et tam rigidis ligamentis conjuncta sunt, ut unumquodque fere immobile reddatur, nec unquam singula luxentur, omnia vero, simul mota, majorem proferant flexionem, qua dorsum pedis elevatur, planta curvatur.

Ossa metatarsi, quamquam exigua mobilitate praedita, tamen triplicem motum subire possunt.

I. Moventur ad plantam, digitis valde flexis; moventur ad dorsum, digitis valde extensis, v. c. si quis apicibus digitorum insistit, quo motu bases primae phalangis digitorum circa capitula ossium tarsi ultro citroque labuntur.

II. Moventur aliquantum ad externum latus abducto, ad internum adducto pede.

III. Musculis interosseis agentibus, ossa haecce digitis extensis invicem diducuntur, digitis flexis alterum alteri appropinquantur.

Digitorum articulatio sat expedita, non magni mo-

menti est quod ad motum totius pedis, ni alia quoque ossicula consensu musculorum in actionem vocantur.

Sic, ut supra attulimus, satis magnam flexionem pedi instituere possumus, si musculos, tarsum et metatarsum et digitos ad internum latus ducentes, una excitamus, multo minor vero pedis motus ad latus externum conceditur, minime tamen ex toto deficit. Sed pes humanus omnino multo esset flexilior, nisi caligis pedem ab incunabulis inde coërcentibus muscoli prohiberentur, quominus bene excolantur, id quod gentes, quae caligis non utuntur, et saltatores probant; memini, me in nosocomio caritatis cadaver vidisse et digitos et pedem optime excultos admiratum ex custode quaesivisse, cui negotio homo ille addictus fuerit, et custodem respondisse »saltatorem fuisse regium;« ex sutore quoque, qui Napoleone imperatore in Hispania et Aegypto stipendia meruerat, me comperisse recordor, illarum gentium pedes et latiores et longiores et altiores fuisse, cujus rei ille sine dubio optimus erat iudex.

Priori aevo illa pedum deformitas, aequae ac caput obstipum et scoliosis, ex ossium mala configuratione oriri credebatur, nostris autem temporibus, quum anatomia pathologica maxima ceperit incrementa, musculos pro horum malorum causa habendos esse et modo si istae deformitates in longius protrahantur, cum ossibus morbum communicari, didicimus, quod e sceletis satis elucet, nam in uno tantum sceleto viri adulti ossa quoque pedis a normali forma discrepantia inveni, in sceletis puerorum contra, qui aut nihil, aut parum ambu-

laverant, ossicula omnino sana, situs modo eorum irregularis apparuit.

Hac deformitate gressus aegroti incertissimus redditur, nam planta minima, nonnunquam magnitudinem modo unius sestertii habet, interdum aliquantum major quidem est, sed nunquam amplitudinem normalis plantae adipiscitur et adipisci potest. Haec abnormis planta diuturno usu indurat et fere formam et structuram clavorum accipit, quo fit, ut gressus non modo incertus sed etiam dolorificus sit.

Hoc malo diu protracto articuli ancylotici fiunt, quod maxime est momenti ad prognosin augurandam, quum exorta ancylosi vera fere nihil spei supersit, si ancylosis spuria modo adest, prognosis multo melior, imo interdum bona effulget.

Quum per adversam fortunam et superstitionem hominum mihi non contingeret, ut cadaver infantis talipedibus varis affectum dissecarem, haecce institui experimenta: in extremitate inferiori cadaveris, cute reclinata musculisque singulis rite praeparatis, quoad hoc sine musculorum discisione fieri potuit, tam diu alteros musculos attraxi, alteros discidi, donec illas deformitates proferre possem. Non nescio autem, haec experimenta levioris esse momenti, quare ingenue fateor, me, ut aliquid novi instituisse viderer, ea perfecisse.

Sed jam progrediamur ad contemplandas deformitates, et incipiamus a pede equino, qui simplicissima pedis deformitas mihi videtur. Multas, ut supra diximus, habet varietates et gradus, quorum tres enumerabo: primus est gradus, si aegrotus capitulis ossium

De pneumonia in
Liman, Ferdinand
Royal College of
[420] b224
Mar 01, 2016

ie ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

De nonnullis vulgi praeiudiciis
Lichtenberg, Karl Friedrich
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

metatarsi insistit; hanc deformitatem sine discisione, sola gastrocnemicorum attractione effici; in secundo gradu aegrotus nititur digitis pedis; hanc deformitatem, qua aegrotus more avium salire cogitur, attractione tendinis Achillis sat valida inducere potui; in tertio gradu aegrotus incedere fere nequit, planta enim humum tangere non potest, sed pedis dorsum in terra ponitur; malum maxime dolorificum et propter magnam omnium extensorum tensionem et propter pressionem superficiei dorsalis pedis, quae minimo musculorum tegumento defenditur. Hoc malum in cadavere produxi maxima attractione tendinis Achillis et plantaris et flexoris longi digitorum pedis; musculos ad hunc scopum non incidi, cute enim reclinata musculi multo magis extendi possunt. Altera pedum deformitas, varus, plures habet varietates et Cel. Dieffenbach quinque enumerat; primus gradus, qui raro medicis, saepe sutoribus curandus venit, tunc existit, cum aegrotus non tota planta pedis, sed modo externo margine plantae humum ambulando tangit, quod malum aegroti attentione, sine machinis et fasciis, sanatur. Omnium neonatorum pedes ita sunt constructi, ut facile incedendo huic malo submittantur, et primis passibus infantis distinguitur, utrum pes fiat varus, an pes normalis. Quam deformitatem sine incisione vel discisione musculorum provocare licet. In secundo gradu aegroti pes prominentia capituli ossis metatarsi quinti nititur; ad hanc producendam deformitatem flexorem longum hallucis aliquantum contrahi, nihil autem discidi. Homo tertia hujus mali varietate affectus ossibus metatarsi quarto et quinto insistit; omnium fle-

xorum attractione et discisione tendinis extensoris digitorum communis longi procreavi hanc abnormitatem. Si ad quartum hujus morbi gradum aegrotus pervenit, malleolo externo nititur, ad quintum proventus, aut omnino ambulare nequit, aut maximo cum dolore in dorso pedis; quas duas deformitates, quod libenter confiteor, bene efficere non potui, nam fere omnibus pedis musculis discisis tamen mihi non contigit, ut illud malum perfecte construerem. Hoc vero vidi, gracilem et sartorium hujus mali esse participes, nam in talibus aegrotis patella semper introrsum dislocata erat.

Pedem valgum, quum nihil nisi majora itinera prohibeat, minus grave malum habeo, quod bene excultum modo semel proximis diebus in puero vidi, qui post fracturam cruris non rite sanatam interno pedis margine nititur.

Has deformitates pluribus modis exoriri videmus; aut adnatae sunt, aut, ut supra jam dixi, ambulando, non satis magna attentione adhibita, oriuntur, aut combustionibus, aut rhachitide aut, quod modo ad pedem valgum pertinet, debilitate. Si Rudolphi contendit, plurimos varos inveniri una cum deformitate capitis et cerebro morbo, assentiri non possum, nam illi homines, qui varis affecti Cel. Dieffenbach curandi tradebantur, optime formati et quod ad corpus et quod ad ingenium attinet apparuere. Negari quidem non potest, haud raro in foetibus hydrocephalo affectis varum inveniri, tamen illa sententia Rudolphi mihi nimis ampla esse videtur; equidem quoque varum apud infantem spina bifida laborantem vidi, et Cramer in Casperi diario

De pneumonia in
Liman, Ferdinand
Royal College of
[420] b224
Mar 01, 2016

De nonnullis vulgi praeciud
Lichtenberg, Karl Friedric
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

le ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

11 tendinus calcanei

pag. 186. similem adnotat casum; eodem in libro
pag. 801. Steinrück profert morbi historiam feminae
adultae, cujus pedes sphacelosi facti sunt, quum hydro-
rhachis exoriretur, ex quibus tribus casibus mihi elucere
videtur, medullae spinalis vim magni aestimandam esse
ad hoc malum producendum. Hereditatem quoque hujus
mali non omnino denegare possumus, nam in familia
quadam Berolinensi liberi sex ab eodem patre eadem-
que matre procreati partim pedibus equinis partim pe-
dibus varis affecti sunt, et nepos horum parentum eo-
dem laborat malo.

Varum primi gradus in omnibus neonatis inveniri
dixi; infante primos passus faciente discernitur, utrum
homunculus per vitam normali ratione ambulaturus sit,
nec ne; nam, ut theologi docent, quicumque uno gradu a
virtutis tramite discedat, eum esse Satanae, sic experien-
tia nos, medicos edocuit, quicumque paulatim corporis
curam et attentionem negligat, eum ad omnes curvatu-
ras et deformitates primum ferri. Ex multis hominibus,
in quibus Cel. Dieffenbach dissectionem tendinis
Achillis ob maximas pedis deformitates, quae ad quar-
tum vel quintum vari gradum numerandae erant, insti-
tuit, audiui, ipsos post partum omnino sanos fuisse,
nec quidquam anomali in pedibus observatum, sed pede-
tentim malum ad illud fastigium accrevisse. Hoc vero
non modo de pedibus dicendum est, sed etiam de cur-
vaturis columnae vertebralis, nam saepissime audivimus,
infantes antea omnino sanos malo corporis habitu et
mala consuetudine paulatim gibbosos evasisse. Altera
deformitatis pedum causa in combustionem cernitur, quam-

quam equidem hucusque id non vidi, tamen non raro legi et audiui, combustione gastrocnemiorum, tum sequente cicatrisatione musculos breviores fieri, eoque modo suram et calcem ad genu attrahi; quae causae ad pedem equinum formandum, ut supra adnotavi, satis sufficient, nam illic ostendi, pedem equinum sola musculorum gastrocnemiorum illorumque tendinis contractione oriri.

Rhachitidem sat gravem causam vari praebere jam in foetibus videmus, et Romberg in dissertatione sua inaugurali describit foetum, talipedibus varis affectum, in quo omnia aderant rhachitidis signa, et exempla hujus deformitatis in foetu ex rhachitide ortae multi alii scriptores adnotavere, ut Osiander et Meyer.

Si istam deformitatem adnatam invenimus, quid sit, an spasmus, an contractio praeternaturalis, an impedimentum fictionis, dijudicare non audeo; ceterum quod ad curationem hoc nullius est momenti, nam, quae causae hoc malum provocaverint, scire non refert, curatio semper ad contraextensionem refugere debet. Haec fere sunt, quae de anatomia et physiologia hujus mali proferre volui; nunc ad curationem progrediar, cujus descriptio majorem mei opusculi partem complebit.

CURATIO.

Malum tam grave, in oculos tam incurrens, tam ingratum hominibusque affectis tam molestum et vitam miserrimam reddens, quam talipes varus et pes equinus, medicorum attentionem mature excitavit, quam ob rem multas et diversissimas machinas in armamentariis chi-

De pneumonia in
Liman, Ferdinand
Royal College of
[420] b224
Mar 01, 2016

De nonnullis vulgi praeiud
Lichtenberg, Karl Friedrich
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

ie ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

11 newplus onipment

rurgicis invenimus, quatum enumeratio et descriptio mihi
supervacua videtur, quum fere omnes aut nullum aut
certe exiguum afferant usum, omnes enim id moliuntur,
ut extensione semper semperque accrescente spasmus
aut contractio aut brevis musculorum praeternaturalis
vincatur; chirurgi igitur sententiam professi esse viden-
tur, mala, quae paulatim oriantur, paulatim quoque de-
bellanda esse. At non modo machinas adhibuere chi-
rurgi, sed etiam balnea et unguenta et frictiones, quibus
omnibus per multos annos maxima diligentia adhibitis
interdum iis contigit, ut varum levioris gradus sanarent;
quartus et quintus vari gradus insanabilis habebatur, nec
quidquam ad illius sanationem in usum vocabatur. Del-
pech in opere suo »chirurgie clinique de Montpellier«
sex talipedum varorum curationes enumerat, sed, quam-
vis affectorum ne unus quidem primam juventutem ex-
cesserat, tamen maxima diligentia non omnes sanavit,
sed duos haud sanatos domum remisit: Cel. Dieffen-
bach ipse anno adhuc millesimo octingentesimo trice-
simo sexto in Casperi ephemeridibus talipedes non am-
plius tractari suadet fasciis, sed eodem more, quo in
nosocomio Caritatis Berolinensis fracturae tractentur;
talipedes, postquam in situm magis normalem sint re-
ducti, gypso liquefacto superfundi jubet, quo et excoria-
tiones et dolores, fasciarum usu semper orientes, impe-
diantur. Quamquam Delpech in libro supra citato
discisionem tendinis Achillis ad sanandum talipodem va-
rum proposuit, quam ipse satis bono eventu perfecerat,
tamen chirurgi omnium terrarum perhorrescebant hanc
operationem, pes enim non omnino normalem formam

receperat, et curatio diu perduraverat. Hoc modo instituerat operationem: scalpello post tendinem Achillis trajecto, cutem ad longitudinem phalangis digiti perscudit, tum scalpello retracto, cultro convexo tendinem dissecuit, cute superinjecta non amplius discissa. Qua operatione perfecta, pedem ad fere normalem reduxit formam, reductum fasciis retinuit. Sed, ut jam supra diximus, suppuratione intrante pars tendinis extrudebatur, et semper debilitas quaedam hujus pedis remanebat, ita ut aegrotus caliga artificiali uti cogeretur. Ludovicus Stromeyer, Hannoveranus, in Rustii promptuario pro medicina universa (Tom. XXXIX) duos casus talipedum discisione tendinum Achillis sanatorum apposit; operatio, quamquam Delpechianae similis, tamen ab illa discrepat, et curatio pedis post operationem omnino nova et ingeniosa est. Utramque nunc describam: acutum nempe et angustum cultellum, quo plerumque utimur ad fistulas aperiendas, horizontali directione, duos pollices supra insertionem tendinis Achillis ad calcaneum, trajicit, et tendinem persecat; cutis non amplius discinditur, ut vulnera ista prima intentione sanentur. Qua operatione peracta, pedem non reducit ad normalem situm, ne interstitium inter fines tendinis exoriatur, sed, ut tendo conglutinatione sanetur, pedem in perverso situ fasciis circumvolvitur et retinet. Eventus spem non fefellit. Vulneribus per primam intentionem celerrime sanatis, tendinis finibus per conglutinationem concretis, extensionem cicatricis tendinis tentavit, quæ tam bene ei cessit, ut pedes aegrotorum ad normalem longitudinem perducerentur. Ante operationem Stromeyer pe-

De pneumonia it
Limán, Ferdinand
Royal College o
[420] b224
Mar 01, 2016

De nonnullis vulgi praeiud
Lichtenberg, Karl Friedric
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

le ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

11 tuendius amreca

15

dem deformem per duos vel tres menses adhibitis fasciis et machinis magis normali positioni assuescere jubet. Plurimum interesse ei videtur, ut vulnera cutis quam minima sint, ne aëre accedente tendo inflammetur ejusque pars excutiat.

Nunc ad caput dissertationis meae propero, ad descriptionem et operationis talipedum et curationem operationi submissorum secundum Dieffenbach. Quum jam saepissime praeceptor nobilissimus et in nosocomio Caritatis coram magna auditorum corona hanc operationem instituerit et de illa disseruerit, mihi prae terea per maximam ejus benevolentiam data sit occasio, hanc operationem intuendi, spero, fore, ut, quae prolaturus sum, cum vero consentiant.

Aegroto in sella ad genua procumbente et a socio calce suraque firmatis, chirurgus pone aegrum in sella sedens, cultro, mox describendo, cutem juxta transversum axim cruris perfodit, minime vero in latere altero transfigit, sed cultrum perpendiculari directione inductum in vulnere ipso ad horizontalem vertit, ita ut acies cultri ad tendinem, dorsum ad tibiam spectet; tum nonnullis ductibus tendinem a socio tensum perscindit; socius signum bene perfectae discisionis, crepitationem, sentit; vulnus illud minimum quam celerrime clauditur; tum in planta pedis tendines, qui nimis tensi videntur, discinduntur, vulneraque eodem modo habenulis linteis, emplastro adhaesivo illitis, clauduntur, et pes in perverso situ fascia injecta retinetur. Qua operatione, parum dolorifica, et uno fere oculorum nutu perficienda, vix una sanguinis guttula profunditur. Culter fere eandem for-

6

7

mam et longitudinem habet, quam ii, quibus ad calamos scriptorios adaptandos utimur, nec nisi apice, more falcis curvato, ab illis discrepat.

Commoda hujus operationis methodi unicuique apparebunt; vulnus ad axim corporis penetrans celerius sanatur, quam vulnus fibras musculorum transversa directione perscindens. Cultro per oppositum latus non trajecto, unum modo vulnus efficitur, aërque eo facilius prohibetur, quominus vulnus intret. Aeger ipse multo tranquillior est, si in sella ad genua procumbit, quam si lectulus in conclave portatur, illeque pronus in ea locatur. In nosocomio Caritatis ipse vidi, teneras puellas tranquilla mente operationi se submisisse, quamvis ante illarum oculos jam in aliis aegrotis operatio haecce instituta esset; tam parum dolet, tam celeriter perficitur, tantillum sanguinis profluvium, quod maxime puellas terret, esse consuevit, ut aegrotantes animo vix moveantur.

Simplici vinculo, habenulis linteis emplastro adhaesivo illitis, spleniis linteis pluries compositis, quibus fascia circularis superinjicitur, vulnusculum operatione exortum plerumque celeriter et facile per primam intentionem sanatur. Raro tantum exoritur suppuratio, rarius inflammatio et suppuratio in profundiore tela ex affectione tendinum. Quae inflammatio et suppuratio in universum, ut supra diximus, raro intrat; cautela enim adhibetur, ne fasciis pes post operationem in normalem situm reducat, id quod raro et imperfecte tantum chirurgus contingeret, et praeterea supervacaneum foret, quum fines discissi tendinis non tam celeriter sanescant

De pneumonia in
Liman, Ferdinand
Royal College of
[420] b224
Mar 01, 2016

De nonnullis vulgi praeciud
Lichtenberg, Karl Friedric
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

le ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

11 pneumidius gniacov

et matura extensione et repositione deformis membri distentio perniciosissima provocaretur, quae conglutinationem prohiberet et eventum totius operationis perverteret.

Apparatus extensionis quinto vel sexto post operationem die plerumque adhibetur, nisi magna inflammatione et suppuratione vetatur. Hic apparatus aut Stromeyeri machina est, ab eo in Rustii promptuario (tom. XXXIX.) optime descripta et delineata, aut simplex excavata ferula, cujus inferiori parti apertura ad malleolum internum recipiendum incisa est; at haec tantum adhibetur, ubi varus quarti vel quinti gradus in Stromeyeriana machina nondum poni potest, quod planta pedis plantario machinae adaptari nequit. Fascia externo pedis lateri apposita cingulis inter se aliquantum distantibus firmatur, et pes ipse, praesertim apice introrsum et sursum verso, zonis et emuntoriis ad ferulam ligneam adaptatur. Hoc modo per varium temporis spatium pede reposito, quod modo intra nonnullos dies, modo intra tot hebdomades perficitur et apice pedis extrorsum et deorsum collocato, ut brevibus dicam, pede mobili restituto, ita ut certe planta in horizontali plano aliquantum poni possit, Stromeyeriana machina adhibetur; quae prima fasciarum applicatio hoc quoque praebet commodum, ut, diligenter et caute applicita, fere nunquam provocet excoriationes, quod ad curam bene ordiendam maximi momenti est, quum plurimum intersit, ut mox ab operatione instituta satis validam extensionem cicatricis tendinis proferre possimus. Aliis conditionibus, si enim deformitas minoris

gradus, quam quarta et quinta tali pedis vari species est, curanda nobis offertur, et in omnibus pedibus equinis jam quinto vel sexto die post tendinem dissectum Stromeyeriana applicatur machina. Qui apparatus egregius, una cum maxima simplicitate maximam praebens utilitatem, modo id habet incommodi, quod pressionem totius artus aequabilem exercens exoriationes provocat.

Quamvis negari nequit, has praecipue ex nimis firma fasciarum applicatione oriri, tamen non semper huic causae tribuendae sunt, praesertim illae exoriationes, quae in planta pedis et iis locis induratis, quae antea plantam, quamvis minimam, constituébant, inveniuntur. In pathologica hujus opusculi parte demonstravimus, aegrum partim dorso partim margine pedis terrae insistere pedemque inter ambulandum modo minima suae longitudinis parte humum tangere, minimam ergo et abnormem habere plantam. Haec igitur in modum clavorum degenerata planta fascia comprimitur. Quid autem inde fit? exoritur inflammatio subjectae tunicae cellularis, locali suppuratione epidermis dejicitur, exoritur ulcus, plerumque in recens formata, aliis hominibus normali planta, quod valde dolorificum applicationem fasciarum impedit et sanationem in longum protrahit. Idemque incommodum invenimus in altera exoriationum specie, jam saepius in talipedibus varis curandis observata; sine praegressis aegroti querelis cutem in vesiculam elatam videmus, non dissimilem iis vesiculis, quae combustionibus oriuntur. Si haec vesicula aut arte aut naturae conamine aperitur, reperimus locum ulceratum, dolorificum, sanationem prohibentem, quod maximo incommodo est, si ulcera illa cachexiae corpori

De pneumonia in
Limban, Ferdinand
Royal College of
[420] b224
Mar 01, 2016

De nonnullis vulgi praeciud
Lichtenberg, Karl Friedrich
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

ie ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

11 tuemius amica

insedentis characterem specificum adsciscunt. Sic maxima diligentia et attentione opus est, si tales excoriationes in ulcera scrophulosa mutantur; eadem in casu quodam, ubi scorbutica evaserunt, operatione scilicet in homine egeno, macilento, domicilium subterraneum habente instituta, fere impedivere sanationem. Cum ab idonea horum ulcerum curatione fere totus operationis eventus pendeat, disserere pergam, quo modo medicus recte curationem instituere debeat, ne negligentia sanationem prohibeat aut ex timore mali eventus spem omnem deperdat.

Ad impedienda illa incommoda opus esse videtur, ut fasciae saepe, alternis diebus, auferantur, ut quemque locum cruris denudati bene perquirere possimus, an forsitan affectus inveniatur; tum quoque experientia, quod contrarium est Stromeyeri sententiae, nos edocuit, usum fasciae saepe excoriationes inducentis, esse repudiandum, quam ob rem satis est, tibiali linteo pedem indui, ante omnia vero cavendum est, ne ferulae nimis arcte firmentur, ad quem errorem praecipue seducuntur, si inter primam applicationem Stromeyerianae machinae pes tam flexilis est, ut statim ad normalem situm reduci possit. Sed hoc conamen non bonum sortitur exitum; praeterea, si dummodo scopum consequamur, non multum interest, utrum curatio quinque, an sex hebdomades perduret.

Quam primum chirurgus excoriationes animadvertit et in locis invenit, quae ferulis applicatis necessario premuntur, hae omittantur oportet, pes foveatur aqua Goulardi, cui postea aequales infusi florum chamo-

millae partes admisceantur. Quae medicamenta tam diu in usum vocentur, donec loca excoriata characterem erythematicum omiserint; tum saepe si ulcera unguento saturnino obteguntur et gossypio carpto involvuntur, vinculum applicari potest, quod quotidie renovetur necesse est. Si ulcera specificum habent characterem, secundum hunc tractanda sunt.

In vinculo applicando harum cautelarum mentio facienda est: omnia loca, quae fasciis vel ferulis, vel loris maxime premuntur, gossypio carpto supposito a nimia pressione defendenda sunt. Lora circularia, quae pedem plantario affigunt, ita nectenda sunt, ut pes contrariam, id est normalem, accipiat directionem, lora in varo dextri lateris introrsum trahenda, a latere dextro igitur ad laevum, in varo sinistri lateris a laevo latere ad dextrum, quo fit, ut sensim sensimque naturalis pedis planta efformetur. Vinculum hoc modo adaptari convenit: aeger in mensa positus crus in machina Stromeyeriana collocare jubetur, ita ut sura in excavationem ferulae immittatur, calx, quantum fieri potest, plantarium tangat, tum lora hoc ordine attrahuntur: primum supremum lorum circulare ad crus firmandum, ut punctum fixum habeamus, tum pes plantario affigatur, postea ea lora, quae calcem deprimere debent, nectantur, denique cylindrus, quo totum plantarium sursum moveatur, rotetur. Cylindri quotidie duo vel tres dentes promoveantur, ita ut funiculi semper satis tensi sint. Primis curationis temporibus plantarium et ferula angulum obtusum exhibeant, pedetentim, curatione durante, angulus obtusus in rectum mutatur, et si angulus re-

De pneumonia in
Limban, Ferdinand
Royal College of
[420] b224
Mar 01, 2016

De nonnullis vulgi praeiudiciis
Lichtenberg, Karl Friedrich
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

ie ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

11
tnewidius onacov

et in acutum mutatus est, (calx plantarum firmiter tangere debet) pes sanatus est, et curatio fere completa. Qui bonus exitus secundum varios deformitatis gradus et forte supervenientes complicationes, (excoriationes) saepe jam post tres vel quatuor hebdomades, saepe demum post tot menses evenit. Sanatione tam feliciter peracta, aeger planta nova ad ambulandum uti incipiat, nam hoc modo sanatio completur. Saepenumero pes, si machina tollitur, adhuc deformis videtur, praecipue ob digitorum collocationem ad latus internum, simulac vero aeger incedit, pes normalem formam accipit. Quod interdum jam mature, jam secunda vel tertia post dissectionem tendinem Achillis hebdomade, observamus, si enim aegrotum incedere jubemus, etsi sanatio nondum sit perfecta et pes nondum angulum rectum cum crure formet, saepe tamen summo cum gaudio plantam optime excultam videmus et optimam augurari possumus prognosin quod ad perfectam pedis sanationem.

Simul atque aegrotus incedere conatur, caliga utatur Scarpaee, duplex commodum praebente, pedem enim fulcit et chalube elastico prohibet, quominus pes introrsum labatur. Interdum aeger satis magna instituat itinera hac caliga utens, quod laetatus artu diligenter facit, noctu per complures hebdomades adhibeatur Stromeyerianus apparatus, quem aeger ipse optime applicare potest. Non longo temporis spatio interposito aeger omnino sanatur et caliga vulgari uti potest.

Infantibus, secundum annum nondum egressis, plerumque Stromeyeriana machina supervacua est, et ferula e charta densata praeparata sufficit, cui diligen-

tissime gossypio carpto tectae et ad externum pedis latus positae, pedem fasciis et habenulis linteis emplastro adhaesivo oblitis affligimus, ut normalem positionem paulatim adipiscatur; caliga Scarpae hac de causa infantibus mox post operationem necessaria est.

In nonnullis casibus varorum summi gradus experimentum factum est, pedes semicupiis tepidis ad vinculum adhibendum aptiores reddendi, et sanationem maturandi, quod non faustum praebuit eventum, post quodque enim semicupium tendines iterum magis contracti apparuere. In singularibus casibus, in quibus sanatio pedis omnino erat perfecta, apex pedis, praecipue hallux, valde ad internum latus inclinabat, et gressus, quum magna tensio adesset, valde dolorificus reddebatur; quibus in casibus, tendine affecto iterum dissecto, ad externum latus firma lignea ferula applicabatur, qua pes extorsum trahebatur. Mirum est, longitudinem pedis quoque post sanationem perfectam omnino normalem reddi, nam pes antea sine dubio minor est sano; quo magis pedis sanatio progreditur, eo magis iniquitates, deformitatis sequelae, evanescent, et gressu continuo normalis forma et longitudo redit; atrophia, nam fere omnes majoris gradus talipedes atrophici sunt, quum musculi ob dolorem non satis excolantur, tollitur, et, ut brevibus dicam, pes alter alteri omnino similis fit. Utile igitur erit caligam Scarpae non minorem esse, quam caligam pedis sani, ut in illa aeger pedem bene excolere possit.

In omnibus casibus vero non eadem auguranda est prognosis, ut supra diximus, nam pedes equini etiam tertii gra-

De pneumonia in
Liman, Ferdinand
Royal College of
[420] b224
Mar 01, 2016

ie ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

De nonnullis vulgi praeiud
Lichtenberg, Karl Friedrich
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

11 newmpius 5M13C1V

pedes vari, quamquam non mala post tot exempla perfectae sanationis habenda videatur. Maximi vero momenti est, an cutis aegroti ad erythemata aliasque efflorescentias propensa sit nec ne, his enim sanatio valde impeditur. Aetas aegroti non impedit operationem, nam a Cel. Dieffenbach in aegrotis cujusvis aetatis optimo cum fructu instituta est. Sic tabulae lithographicae figura tertia ostendit varum infantis circiter duorum annorum, qui radicitus sanatus est, et spero, fore, ut, aliquot annis elapsis haud plures pedibus deformibus homines ambulare videamus, quam labiis leporinis affectis nunc nobis occurrunt.

Quod forte timendum est, ne dissectione tendinum trismus et tetanus oriantur, praecipue apud infantes, hoc nondum, quod scio, observatum est. Talipedes vari et pedes equini, quorum imaginem in tabula lithographica exhibui, omnes sanati sunt, et aegri optime iis utuntur; sperandum igitur est, fore, ut nunquam chirurgus aut operationem Choparti instituat, aut forte crus omnino amputet, ad gressum commodiorem reddendum, sed ut semper vel in casibus desperatis, qui videntur, ad dissectionem tendinis Achillis velut unicum optimumque huius deformitatis remedium, confugiat. — Nonnulla eorum, quae de talipedibus curandis protuli, debeo prae nobilissimo Dr. Behrend.

MORBI HISTORIAE.

Guilelmus Strumpf, XXVI annos natus, Saxo, ex infantia varo laborabat, qui demum ad tertium mali gradum pervenit. Aegrotus magnos sensit dolores ambulando et omnino modo pauca facere poterat itinera. Planta abnormis, praeternaturalis, minima firmum finge-
bat callum in externo medio pedis margine, in univer-
sum vero pes satis mobilis apparebat, et rotatione fere
ad normalem situm reduci poterat. Aeger bono exitu
multorum varorum sanatorum incitatus ad operationem
sese accinxit, quae die XV mensis Januarii instituta est.
Tendo Achillis et tendo flexoris hallucis sunt dissecti,
fasciaque simplex apposita; operatio omni morbosa rea-
ctione caruit; vulneribus duobus jam tertio die sanatis,
XX die Januarii Stromeyeriana applicita est machina,
qua diligentissime adhibita, locisque non nimis constri-
ctis, pedis sanatio optimos fecit progressus. II. Febr.
die duae vesiculae apparuere, altera in inferiori tertia
cruris parte ad latus externum, altera in planta pedis
prope articulationem digiti minimi; ambae in excoria-

De pneumonia in
Liman, Ferdinand
Royal College of
[420] b224
Mar 01, 2016

De nonnullis vulgi praeiud
Lichtenberg, Karl Friedrich
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

ie ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

11 tuusipmipent

tiones mutatae impedivere, quominus uti possemus Strome-
meyeriano apparatu. Favente autem fortuna pedis sa-
natio tam egregios fecerat progressus, ut aeger tota
planta humum tangere posset; quam ob rem pro Stro-
meyeriano apparatu ferula e charta densata confecta ad
latus externum pedis applicabatur, et pes fasciae ope ei
admovebatur, ita ut loca affecta ab omni pressione tuta
essent atque medicamina bene adhiberi possent. Exco-
riationes initio aqua Goulardi, tum aequalibus partibus
aquae Goulardi et infusi florum chamomillae fovebantur,
quibus pro loco plantae pedis affecto non sufficientibus,
ad cataplasmatum usum confugiebatur. Sub illorum usu
ulcus in planta pedis, in altum valde descendens,
paulatim sese explevit, magnus evanuit dolor, ita ut XX
die Februarii Strome-
meyer apparatus iterum adhiberi pos-
set; loca affecta unguento saturnino tegebantur. Per
proximas quatuor hebdomades machina fere continuo ad-
hibebatur, et modo erysipelas faciei, quod casu quo-
dam infausto aegrum affecit, per nonnullos dies appli-
cationem impedivit; attamen aegrotus VI Martis die au-
xilante Scarpae caliga in via publica obambulare po-
tuit. Pede omnino concinno plantaque optime exulta,
aegrotus satis magna instituere potuit itinera: quum au-
tem apex pedis, praesertim hallux, introrsum inclinarent
et in majoribus itineribus tensio quaedam in planta pe-
dis ab aegro sentiretur, quo dolore satis celeriter defa-
tigabatur, hoc quoque malum neque Strome-
meyeriano ap-
paratu adhuc per noctem semper adhibito, neque conti-
nua ambulatione tolleretur, Cel. Dieffenbach mense
Majo flexorem hallucis, qui hallucis moto tendebatur,

STORIAE

VI annos natus, Sato, et
demum ad tertium mali gra-
vum sensit dolores ambo-
rum facere poterat itinera.
aqua facere poterat itinera.
uralis, minima firmum finge-
io pedis margine, in univer-
apparet, et rotatione fere
poterat. Aeger bono exitu
um incitatus ad operationem
mensis Januarii instituta est.
exoris hallucis sunt dissecti,
operatio omni morbo re-
robis jam tertio die sanatis,
riana applicata est machina,
locisque non nimis contri-
fecit progressus. Il. Feb.
re, altera in inferiori ter-
rum, altera in planta pedis
i minimi, ambo in excoria-

iterum dissecuit. Post operationem aegrotus per decem dies sedere, nec obambulare jussus, et per fasciam horizontali lignae ferulae affixam, pes extrorsum tractus est, qua ratione tendo elongabatur et aegrotus mox incedere potuit, ita ut pede, antea valde deformi, nunc aequae ac sano bene utatur, et inter ambulandum nec claudicatio, nec pedis tractio observetur. Nunc neque interdum nec noctu ullam adhibet machinam.

SECUNDA HISTORIA.

Augustus Paetsch, Posthemi ante tredecim annos natus, puer satis validus e prima infantia varo tertii gradus, cujus specimen in tabula sub No. IV depictum est, laborabat; nitebatur parvo externi marginis loco, qui longioribus itineribus semper inflammatus medicorum auxilio indigebat. Quod parentes, quum jam complures vicini a Cel. Dieffenbach hoc damno liberati essent, movit, ut puerum huc deducerent operationi submittendum. Pes prima disquisitione satis rigidus apparuit, et extensione vix in meliorem situm redigi potuit, ita ut prognosis infausta videretur, sed alia nos docuit experientia. Operatio a Cel. Dieffenbach in domicilio suo instituta est coram multis Berolinensibus medicis, tendo Achilles nonnullique alii in planta pedis jacentes, qui valde tensi apparuere, dissecti, tum pes consueto more fascia involutus est. Operatione modo instituta, pes maxime mobilis exstitit, quod spem boni eventus nostram multo erigebat. Operationem nulla secuta est inflammatio; septimo die, vulneribus omnino clausis et cicatricibus parvis vix inveniendis, Stromeyeriana machina in usum

De pneumonia in
Liman, Ferdinand
Royal College of
[420] b224
Mar 01, 2016

De nonnullis vulgi praeiud
Lichtenberg, Karl Friedrich
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

ie ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

11 tumentius gnacon

vocata est, fasciae diligentissime applicabantur, ne incauta pressione inflammatio pedis exoriretur et mox egregius operationis eventus obtinebatur. Pes sensim ad normam reducebatur, ita ut, vix tribus hebdomadibus elapsis aeger tota planta terrae insistere posset. Post quinque hebdomades aegrotus, Scarpae caliga utens, iter ex suo domicilio ad domicilium Dieffenbachii fere milliariorum duorum, bene perficere potuit. Pedis quidem nonnulla loca excoriata fuerunt, sed unguento saturnino adhibito cautaque fasciarum attractione excoriationes sanatae sunt, apparatu non unquam remoto. Nunc pes antea deformis gracilem et venustam habet formam, et aeger maxima facere potest itinera.


HISTORIA.


themi ante tredecim annos natum, prima infantia varo tertii gradus sub No. IV depictum est, externi marginis loco, qui per inflammatus medicorum amentes, quum jam complures in hoc damno liberati essent, nocerent operationi submittione satis rigidus apparuit, et in situm redigi potuit, ita ut, sed alia nos docuit experientia Dieffenbach in domicilio suo Berolinensibus medicis, tendo lanta pedis jacentes, qui valde in pes consueti more fascia inodo instituta, pes maxime boni eventus nostram mala la secuta est inflammatio; se no clausis et cicatricibus par teyeriana machina in usum

EXPLICATIO TABULAE LITHOGRAPHICAE.

Fig. 1. Imago talipedis equini secundi gradus.

- 2. Imago talipedis tertii gradus.
- 3. Specimen vari secundi gradus.
- 4. Specimen pedis vari Augusti Paetsch tertii gradus.
- 5. Specimen vari quarti gradus.
- 6 a. et b. Imago varorum ultimi gradus. Omnes hae deformitates, ut supra dixi, sanatae sunt.





De pneumonia it
Limman, Ferdinand
Royal College o
[420] b224
Mar 01, 2016

De nonnullis vulgi praeiudi
Lichtenberg, Karl Friedrich
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

ne ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

11
mentum GNA3C0

VITAE CURRICULUM.

Ego Carolus Mauritius Lewald, parentibus Davide et Caecilia Lewald natus sum Regiomontii d. XXXI. m. Martis A.D. MDCCCXV, confessioni evangelicae addictus. Scholis privatis ab illustrissimo Ulrico, nunc Francofurti a consiliis regiis, per tres annos instructus, in collegium Friedericianum receptus sum. Quo Gymnasio relicto, Exc. Struve in Gymnasium Palaeopolitanum me recepit, cui perinde ac summe colendis Ellendt, Müttrich, Legiehn, Fatschek maximos habeo gratias. Testimonio maturitatis instructus vere anni MDCCCXXXIII. academiam Albertinam adii, ubi ab Ill. Schweikart, t. t. Prorectore Magnifico civibus academicis et ab Ill. Sachs t. t. decano maxime spectabili, albo medicorum adscriptus, prae-

lectionibus his interfui. Docuerunt me: Ill. Herbart logicen; Ill. Meyer botanicen generalem et specialem et physiologiam plantarum; Clar. Moser physicen; Clar. Dulk chemiam experimentalem, phytochemiam, zoochemiam et pharmaciam; Cel. Burdach jun. osteologiam, syndesmologiam, myologiam, angiologiam, artem hominum cadavera rite secandi; Ill. de Baer zoologiam, artem animalium cadavera rite secandi, organologiam, neurologiam; Cel. Burdach sen. physiologiam et anatomiam generalem; Beat. Dietz materiam medicam; Ill. Sachs hodegeticen, theoriam morbi, morbos syphiliticos, nosologiam et therapiam specialem et psychologiam; Beat. Unger chirurgiam generalem et specialem, Ill. Hayn artem obstetriciam et theoreticam et practicam; Ill. Seerig chirurgiam specialem, operativam et ophthalmologiam; Ill. Klose politiam medicam et medicinam forensem. Praeterea scholas clinicas et policlinicas chirurgicas Ill. Seerig, majocomium et policlinicum obstetricium Ill. Hayn, et policlinicum medicum Ill. Sachs per annum integrum frequentavi. Ad aliam Fridericam Guilelmam autumnus anni MDCCCXXXVI profectus ab Ill. Busch t. t. Rectore Magnifico receptus et ab Ill. Mueller, t. t. Decano spectatissimo, me-

De pneumonia in
Liman, Ferdinand
Royal College of
[420] b224
Mar 01, 2016

ne ID

b2248372x

TRACTS A430(6)

11 KSENGSHIPMENT

De nonnullis vulgi praeiud
Lichtenberg, Karl Friedrich
Royal College of Surgeons
[418] b2248372x
Mar 01, 2016

dicinae studiosis adscriptus exercitationibus clinicis
virorum illustrissimorum et celeberrimorum Barez,
Dieffenbach, Juengken, Rust, Truestedt,
Wolff interfui praelectionesque de anatomia or-
ganorum sensuum Ill. Mueller audiui.

Quibus omnibus viris summe venerandis gratias
maximas habeo semperque habeo.

Tentamine jam et examine rigoroso rite abso-
lutis, spero fore, ut hacce dissertatione publice
defensa, summi in medicina et chirurgia honores
mihi concedantur.

Docuerunt me: Ill. Her-
er botanicam generalem et
n plantarum; Clar. Moser
chemiam experimentalem,
niam et pharmaciam; Cel.
am, syndesmologiam, myolo-
tem hominum cadavera rite
oologiam, artem animalium
rganologiam, neurologiam;
hysiologiam et anatomiam
tz materiam medicam; Ill.
heoriam morbi, morbos sy-
et therapiam specialem et
Unger chirurgiam generalem
n artem obstetriciam et theo-
Ill. Seerig chirurgiam specia-
ophthalmologiam; Ill. Klose
medicinam forensam. Prae-
et polyclinicas chirurgias Ill.
et polyclinicum obstetricium Ill.
um medicum Ill. Sachs per-
uentavi. Ad aliam Fridericam
anni MDCCCXXXVI profectus
Rectore Magnifico receptus et
t. Decano spectatissimo, me-

T H E S E S.

1. Hippocraticum illud: Quod medicamenta non sanant, ferrum sanat, quod ferrum non sanat, ignis sanat: falsum est.
2. Vulnere et venena absolute letalia non existunt.
3. Puerpera, quae infantem suum interfecit, non punienda est.
4. Dissectio tendinis Achillis talipedibus optime medetur.