

**Dissertatio inauguralis anatomica : de lapillis vel prope vel intra glandulam pinealem sitis ... / publico eruditorum examini subiecit Nicolaus Lisignolo.**

**Contributors**

Lisignolo, Nicolaus.  
Johannes Gutenberg-Universität.  
Royal College of Surgeons of England

**Publication/Creation**

Moguntiae : Ioann. Ios. Als. Hered. Haeffner, 1785.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/va8xwf36>

**Provider**

Royal College of Surgeons

**License and attribution**

This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

/3.  
DISSERTATIO  
IN AVGVRALIS ANATOMICA  
DE  
**LAPILLIS**  
VEL PROPE VEL INTRA  
GLANDVLAM PINEALEM SITIS  
  
S I V E  
**DE ACERVVLO CEREBRI**  
  
Q V A M  
CONSENSV ORDINIS MEDICORVM  
MOGVNTINORVM  
  
P R A E S I D E  
**D. SAMVELE THOM.  
SOEMLMERRING**

PRO OBTINENDIS  
SVMMIS IN MEDICINA HONORIBVS  
  
I N  
**ACADEMIA MOGVNTINA**  
DIE XX OCTOBRIS MDCCCLXXXV.

*publico eruditorum examini  
subiecit*  
**NICOLAVS LISIGNOLO**  
MOGONVS.

**MOGVNTIAE,**  
Ex Typogr. Elect. Aul. Acad. priuil. apud Ioann. Ios. Alef.  
Hered. Haeffner.

DISSESTITO

INAGARVILS ANATOMICA

DE

LAPILLIS

VEL PROPE VEL INTIA  
GLANDULAM PINEALEM SITIS

1742

DE ACERVALE CEREBRI

60 AM

CONSERVA ORDINES MEDICORVM  
MOCANTINORVM

Digitized by the Internet Archive  
in 2016

MONTE SAN MELITO D.  
SOTTEMERKYLE

ANNUALIS IN MEDICINA NOVITIAS

ACADEMIA MOCANTINA

DE XX OCTOBRIIS MCCCLXXXV

anno habita maxima

tempore

NICOLAVAS LISIGNOLO

MODONIUS

MOGANTIA

<https://archive.org/details/b22483809>



ix vlla vnquam corporis nostri  
particula tantam famam inter  
eruditos non modo, sed etiam  
inter illiteratos nacta est, ac  
cerebri sic dicta *glandula pine-*  
*alis*; Etenim quum **CARTESIVS**, vir et ingenio  
et subtilitate philosophandi celeberrimus, ani-  
mi rationalis, vel sensorii communis sedem  
in ea, quod etiam Galenus suspicatus fuerat,  
collocaret, singularis quaedam praestantia  
prae caeteris encephali partibus ipsi vindica-  
batur. Quamuis vero speciosissimis argumen-  
tis suffulciebatur ista opinio, nihilominus mox  
derelicta iacebat, \*) quem viderent philo-

A 2 sophi

---

\*) Hypothesin Cartesii inter alios refutarunt Ioach.  
Targier in Medicina compendiaria. Leid. 1698.  
Nic. Stenonis Discours sur l'Anat. du Cerveau.  
Ant. Nuck epitaphium glandulae pineali posuit,  
ut ridiculam hanc opinionem redderet. G. A. Lang-  
guth communis sensorii historia Lips. 1738. p. 29.  
qui epitaphium illud resussum dedit. Item Steen-  
bergen

sophi ne probabili quidem coniectura ullum  
neruum ad illam vsque deduci posse; a)  
neque in hominis maximo encephalo satis  
insignem esse hanc particulam, sed in vitu-  
lorum aliorumque brutorum minori encepha-  
lo multo maiorem inueniri. Inclarescebat  
tamen nihilosecius adeo ista opinio, et id  
quidem iure quodam suo, vt vix alia sit no-  
tior. Quinimo nostra aetate CAMPERVS et  
dissectionum asfiduitate, et iudicii acritate  
aeque clarus, non adeo absurdam esse hanc  
scntentiam, ac multis videretur, publice pro-  
nuntiavit. b) Hinc Parisini aliique, rara op-  
portunitate vsi ex omnibus mundi regionibus  
ani-

bergen Disf. de cerebro p. 171. in collect. Cl.  
Oberkam p. A. E. Büchner de morbis ce-  
rebri ex structura eius anatomica deducendis. Erfor-  
diae 1741. p. 13. Günz de lapillis glandulae pi-  
nealis Progr. p. 19. V. Haller. de Corp. hum. fa-  
br. T. 8. p. 107.

a) Quod de le Bœ Syluius, Henr. Regius, Lu-  
douicus de la Forge, Lancisius Whar-  
ton aliique contenderant; neruos vero vinculos,  
quibus Iust. Schrader Obs. Anat. med. secunda,  
glandulam pinealem cerebro alligatam esse scripsit,  
hodie pedunculi medulloſi vocantur.

b) Kort berigt van de ontleiding eens iongen Elephants.  
in Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroeffeningen  
ann. 1774. vel versione germanica sämtliche kleinere  
Schriften. Erster Band. vtroque loco §. 21.

animalia incidendi, si quid de dissectione encephali annotarunt, in primis particulam hanc piniformem descripsere; hinc Physiologi in cerebris hominum mente captorum singulari prorsus diligentia eamdem particulam examinantes, quum viderent lapillos in illa reperi, vix aberat, quin etiam novissimis temporibus c) iisdem lapillis causam perturbacionum animi tribuerent.

*At, quantum equidem dissecando didici, semper adesse aceruulum, ita enim collectionem lapillorum dicere amo, saltem in cerebris mente et corpore sanissimorum hominum, in iuuenibus, adultis, et senibus, in viris et feminis, in Europaeis non modo, sed etiam Afris inueniri, perpetuo eiusdem indolis quoad colorem et substantiam esse, et, ni me omnia fallunt, ad naturalem cerebri in hoc loco structuram hunc aceruulum pertinere, parum vel omnino non constare videtur.*

Memoratu ergo dignum est de re, de qua iam alibi, d) sed obiter tantum dictum est, paulo fusius verba facere.

A 3

Sedes

c) V. Haller de corp. hum. fabr. 1778. Tom. 8. p. 108.

d) Ueber die körperliche Verschiedenheit der Negern von Europäern 1785. §. 64. pag. 70.

Sedes autem aceruuli siue mauis lapillorum, vel sabuli, melius innotescet, exposita prius ex propriis obseruationibus natura conarii, quod vulgo glandulam pinealem vocant. Describam vero, quo modo se habeat in corporibus hominum, qui ad ultimum usque vitac habitum mente compotes fuerant, non neglectis aliorum clarissimorum virorum sententiis. Sed per singula eundum.

### §. I.

#### *Descriptio glandulae pinealis siue conarii.*

**S**ita est particula conarion e) dicta, sub limite posteriori commissurae cerebri maxima (quam corpus callosum vocant) in superiori et media parte anteriorum corporum quadrigeminorum, ita ut cum illis communi plexus choroidei tela eiusque maioribus ramis venosis inuoluatur; f) magnitudine

e) Graecis *κωνάριον* dicebatur, Galeno *σωμα κενοτίδες*, Latinis *turbo* siue *corpus turbinatum*, *glandula turbinata*, *glandula piniformis*, *glandula conoides* vel *conarium*, vel spurco nomine *penis* siue *virga cerebri*, Nicolao vero Stenonis *glandula superior*, ut illam a *glandula pituitaria inferiori* distingueret.

f) Figuram dedi in disf. de *basi Encephali* Goett. 1778.  
Tab. 3. o. p. q. s. Nullibi situm glandulae pinealis  
rite

tudine g) et figura differt, modo enim ro-  
tunda, modo cordiformis, modo conica,  
facie anteriori et posteriori depressa, modo  
piniformis, i. e., aliquam figuram strobili pini  
vel nucis pineae gerit; construitur quoad  
maximam partem plerumque substantia cine-  
rea, paulo duriori tamen vel tenaciori, ac in  
reliquo encephalo, interdum quodammodo  
pellucida, mox rubicundior, mox pallidior,  
mox turgidior, mox minus turgida cernitur,  
quod a crassi sanguinis pendere videtur, pro-  
ut enim reliqua substantia cinerea encephali,  
in apoplexia sanguinea peremptis magis rube-  
scens vel fusca, in hydropicis pallidior ap-  
paret, sic et huius particulae color variare  
videtur. In cadaueribus infantum et iunio-  
rum hominum ~~et~~<sup>ut</sup> reliqua parte cinerea cere-

A 4 bri

rite pictum esse, iam annotat Nic. Stenonis  
Discours sur l'Anat. du Cerveau apud Winslow edit.

Amst. 1743. 8. Tom. 3. p. 220. Iusto longiore, grandiore, crassiore, et delineari curasse Meckeliūm Memoir. de l'Acad. de Sci. à Berlin 1765. annotauit Greding in Aduersariis medico-practicis Volum. II. p. 618. et addit, consuetam magnitudinem feminis citri mediocris esse.

II  
g) In ingeniosiori puero insigni magnitudine glandulam pinealem annotauit summus Morgagnius de sed. et cauf. morb. Epist. I. art. 2. Inter centum rabi-  
fos triginta septem glandulas pineales solito longe maiores vidi Greding Vermischte Schriften p. 179.

bri mollior ac in adultis; in aliis glabra, in aliis inaequalior appareat.

Basis autem conarii nunc magis, nunc minus medullaris in pedunculos abit, sensim sensimque cum stria medullari thalamos nervorum opticorum secundum longitudinem percurrente, et corporibus quadrigeminis mediante commisura cerebri posteriori confluentes, hinc basis siue stria medullaris modo crassior, modo subtilior, alteram, quasi trabeculam medullarem transuersam constituens cerebri posteriorem commissuram, duplicem reddit, transuersim igitur fissa cernitur basis medullaris, et recessulum quasi caui, quod ventriculum tertium appellant, in se recipit. Semel totam excauatam reperi, adeo, ut ostium caui alias fissura tantum dicendum, in ventriculum tertium pateret.

Haec conarii positura optime e sectione caput perpendiculariter bipertiente intelligitur.

Deficientem autem glandulam pinealem in octoginta septem a me ipso dissectorum hominum encephalis nunquam animaduerti. h)

## §. II.

•) Defuisse glandulam pincalem praeter A. H. Cum-mium et Cockium a Kerkwyck, quorum obser-

§. II.

*Situs et figura aceruuli.*

Circa basin huius conarii medullosam vel ipsi trabeculae transuersae medullari, quam commisuram posteriorem alteram siue superiorem vocauimus, sub plexu choroideo incubit vel insidet aceruulus siue lapillorum modo maior, modo minor quantitas. Plerumque ita comparatus esse folet aceruulus iste, ut euidenter in minora granula conformatus, maiora granula, siue maiores lapilli medium locum tenentes, a granulis minori-

A 5 bus

feruationes reiecit Günzius l. cit. p. 19., annotat Kerkringius Spicilegio anatomico Amst. 1670. Obs. 20. p. 77. sed recte Günzius p. 20. etiam hanc observationem non admisit, et iure monuit Hallerus de corp. hum. fabri. Tomo octavo p. 109. „*forsan cum velo aquilam evanuisse;*” quod mihi eo magis in hoc casu verosimile videtur, cum ipse Kerkringius fateatur substantiam cerebri flaccidam fuisse. In Hydrocephalo septemdecim annorum se glandulam pinealem non inuenisse tradit cl. Malacarne delle Osservazioni in Chirurgia Turin 1784. Parte secunda §. 29. p. 14. In hydrocephalicis autem difficilime reperiri iam annotauerat Greding, vermische te medic. und chirur. Schriften p. 179. Ergo etiam hoc in casu adesse potuit. Confer, quae infra §. 6. Num. IX. dicta sunt.

bus circumdentur; quocirca hoc loco nomen  
aceruuli fatis mereri videtur. i) (\*)

Saepe

i) Pari modo haec glandula pinealis in brutis distinete  
cernitur. Maxima autem attentione dignum, in aliis  
animalium generibus perpetuo maiorem, in aliis mi-  
norem, (adeo, vt nonnullis v. g. a Duverneyo in  
cane Zod. ann. 3. negaretur,) reperiri. Humana  
glandula maiorem vidi in bobus, asino, ouibus,  
ceruis, dama, capreolis, camelo gibbere simplici, in  
quo simul quasi quadripartita, licet tota encephali  
moles horum animalium, humana multo minor sit.  
Non contemnenda magnitudinis vidi illam in cri-  
ceto, sciuro. Paruam autem vel exiguum in cane,  
vulpe, mele, felibus, putorio, porcello. In tenellis vero  
embryonum equinorum cerebris bis hanc particulam  
magnitudine fatis notabilem rotundam & nigerrimam  
solito loco inueni. In dama semel ingentem turgi-  
dam & cauam, et in illa lapillos humanis simillimos  
inueni. Hisce nostris obseruationibus liceat alias ad-  
dere. Satis insignem in Orang Outango fuisse Ty-  
son p. 57 annotauit et fig. 14 reprezentauit. In  
simiis conicam esse Parisini habent. Maiorem in  
rangifero ac in vrso esse egregius incisor Nic.  
Stenonis annotauit, minorem in cane esse Har-  
der in apiario Obs. 20 & erronee de eius existentia  
dubitari ex Brunnero annotauit ibid. p. 86. hu-  
manae simillimam esse in elephanto Perill. Cam-  
per in kort berigt etc. et sämmtliche Schriften  
I Band utroque loco §. 21. In Ceruis cauam vi-  
dit, et e minutissimis glandulis conflatam, et in il-  
lis animalibus participare de natura conglomerata-  
rum Mangett. Theatro Anat. Tom. 2. p. 309.  
Hallerus de Corp. hum. fabr. Tom. octauo p.  
109 dicit, „non in omnibus quadrupedibus reperiri  
eius-

Saepc ad latera huius aceruuli alia adhuc granula, magnitudine et forma saepe ludentia, nunc magis nunc minus exstant. Si aceruulus medius minor, interdum lapilli laterales maiores esse solent, persaepe autem granula, siue lapilli laterales distincte ex minoribus fragmentulis conflantur.

In vniuersum autem multo minus aceruulus medius, quam granula lateralia ipsi substantiae medullari inhaerere videntur.

Saepe, sed non semper, praeter aceruulum istum extra glandulam pinealem in eius basi anteriori situm, et intra illam siue in substantia eius reperiuntur granula modo arenae

*eiusmodi glandulam,, immo in Epist. ad III.  
Bonnet (Oeuvres de Mr. Bonnet Tom. 5. part. 2.  
p. 389.) dicit, in multis quadrupedibus desiderari  
hanc particulam „une grande partie des quadrupedes  
en manquent „ Doiendum vero, Hallerum virtutem  
alias diligentissimum singula quadrupedja non nomi-  
nasce. Collins in vniuersum annotat in animali-  
bus recenter mortuis maiorem esse, ac in illis,  
quae post aliquod tempus praeterlapsum perquiruntur.*

\* ) Omnia optime hunc locum et aceruulum indicauit Morgagni de Sed. et Cauf. Morb. Epist. 8. Art. 15.  
„ad anteriorem pinealis glandulae basin corpuscula  
illa subdura, et Epist 5. Art. 12. „extra glandulam  
in anteriori eius facie, et praesertim ad basis an-  
teriora.

arenæ vel fabuli adinstar rotundiuscula et soluta, modo in frustula paulo maiora concreta, vel ex congerie minorum granulorum vel lapillorum in vnum coniunctorum et coagmentatorum constantia, hinc et eiusmodi lapilli plus minusue horridi scabrique apparent.

### §. III.

#### *Habitus aceruuli.*

**Q**uamuis vt ex parte conariæ ipsum aliaeque encephali partes, figura, multitudine, situ, et magnitudine vehementer varient, isti lapilli, et ex illis coagmentatus aceruulus, minus tamen quoad colorem, substantiam, et reliquum habitum differre videbantur. Semper animaduerti lapillos flauos, vel ad citrinum colorem accedere eo saturatiorem, quo plures lapilli minores in vnum quasi conflantur, pellucidos, duros, asperos, vt cultri apice tacti strepitu quodam prodantur.

**O**mnes, quos adhucdum legi, de habitu lapillorum conarii descriptiones curatores, adeo exacte inter se et cum meis conueniebant, vt consensus iste singularis primum me moueret, diligentius in hanc rem inquirere.

Adeo autem differunt ab omnibus aliis, quos noui, lapillis, concretionibus, incrustationibus tum calcariis, tum osfeis, quae in corpore humano brutorumque occurunt, ut facillime natura ipsis propria dignosci queant.

Quantopere enim praeter situm, multitudinem, figuram et magnitudinem differunt inter se, quoad substantiam calculi fellei? quantum calculi urinae? Mox duriores, mox friabiles, mox saxeos, mox molles, mox fuscos vel atros, mox albos, luteolos vel rufos, mox uniformi, mox multiplici substantia compositos inveni.

At in arena cerebri siue lapillis conarii, quantum equidem iudicare valeo, semper idem a natura tamen calculorum bilis, et vrinæ insigniter diuersus habitus locum tenebat.

## §. VI.

*An in omnibus hominibus adsit acervulus?*

In corporibus autem I, sanissimorum hominum, II, et fere omnium et III, iuuenilibus iamiam corporibus adesse calculos prope conarion, ante me idonei auctores memoriae prodiderunt. Quod ut eo magis elucescat, in medium proferam deinceps observationes, quas per quatuor abhinc annos ex-

industria omniq[ue] diligentia ad quaeſtionem hanc dirimendam institui.

### OBSERVATIO I.

D. 25 Aprilis 1780 in femina 34 annorum primum ſolito diligentius examinando conarion, granula inueni intra glandulam pinealem, quippe cum mihi relatum eſet, nonnunquam hanc mulierem delirafe.

### O B S. II.

D. 19 Martii 1782 in femina 26 annorum, quae cultro arteriam mammariam internam ſcidente ſibi vitam finierat, *primum* animaduerti aceruulum; caeterum conarion fanum.

### O B S. III.

D. 21 Martii 1782 exacte eodem modo ac in caſu antecedente, comparatum vidi aceruulum in adolescenti 16 annorum, qui ex phthifi pulmonum perierat; vndecim enim librae puris in cauo thoracis ſinistro, cuius pulmo fere omnis abſumtus erat, continebantur. Ad ultimum vsque vitae halitum puer egregius mente compos fuerat. Glandula pinealis ipsa autem paulo minor ac in caſu antecedente videbatur, licet encephalus multo maior eſet. Feminae enim encephalus 2 libr. 8 Vnc. adolescentis 3 libr. pendebat.

O B S.

## O B S. IV.

D. 9 Aprilis 1782 in virgine circiter 60 annorum, quae praeceps e fenestra perierat, et quam valde hystericas passionibus obnoxiam fuisse relatum est, aceruulus extra, et calculi intra conarion.

## O B S. V.

D. 2 Sept. 1782 in vetula 62 annorum cachexia peremta totum conarion calculis repletum.

## O B S. VI.

D. 11 Sept. 1782 pari modo granula in conario vetulae 60 annorum, quae cachexia obierat.

## O B S. VII.

D. 29 Nou. 1782 praesente Cl. Fischero Profesore Goettingensi in femina 26 annorum vlcere pulmonum mortua extra et intra conarion arena.

## O B S. VIII.

D. 11 Martii 1783 in femina 30 annorum calculi ut solent. Forsan ob detentionem in carcere perierat, corpus enim cachecticum.

## O B S. IX.

D. 8 Iunii 1783 in femina 24 annorum surdastra, morbo pulmonum confecta, interdum, ut ferebatur, maniaca, per omnem conarii substantiam disseminati lapilli.

O B S.

## OBS. X.

D. 28 Iunii 1783 in femina 29 annorum ingenter turgidum et cauum reperi conarion, granulis conspersum, et aceruolum solito more ante illud.

## OBS. XI.

D. 30 Aug. 1783 in femina 30 annorum icterica per tres menses, lapilli, ut solent, se gerebant.

## OBS. XII.

D. 23 Sept. 1783 pari modo in femina annorum circiter 40 hydropica.

## OBS. XIII.

D. 7 Dec. 1783 in vetula 72 annorum abscesu largo sphaceloso in dextro ileo laborauerat, arena in conario.

## OBS. XIV.

D. 26 Dec. 1783 in sene 80 annorum morbo pulmonum confecto aceruulus ante glandulam pinealem.

## OBS. XV.

D. 4 Ian. 1784 in viro 40 annorum hernioso et verminoso, subitanea morte perempto, aceruulus, ut solet, aderat.

OBS.

## OBS. XVI.

D. 15 Febr. 1784 in puerō Aethiōpico  
14 annorum, de cuius dissectione fusius iam  
alibi mentionem feci <sup>l)</sup> qui phthificus vitā  
decesferat, solito loco aceruulus reperiēt  
batur.

## OBS. XVII.

D. 24 Febr. 1784 in femina 40 annorum  
valde obesa conariō solito maius multis la-  
pillis refertum inueni.

## OBS. XVIII.

D. 7 Martii 1784 in femina 35 annorum  
cachectica aceruulus, ut solet, ante glandulam  
pinealem iacens.

## OBS. XIX.

D. 19 Mart. 1784 in viro adulto, qui  
aqua submersus periit, eodem modo consti-  
tutus aceruulus.

## OBS. XX.

D. 17 Febr. 1784 in Aethiope adulto an-  
norum circiter 20 tabe confecto <sup>m)</sup> lapilli  
eodem modo, ut in Europaeis, et aceruulus  
anteriora conarii tenebat.

## OBS.

<sup>l)</sup> Über die körperliche Verschiedenheit des Negers vom  
Europäer. Erste Beobachtung.

<sup>m)</sup> Fusius descriptam sectionem pathologicam vid. loco  
praecedente pagina citata. Zweyte Beobachtung.

## OBS. XXI.

D. 8 Aprilis 1784 Benevolentia Cl. Osann  
nimis praematro fato nobis erepto praesentibus amicissimo Profesore Blumenbach et  
Dn. Althaus secui Goettingae in nosodochio publico viri adulti corpus, et aceruulum ante glandulam pinealem distincte vidimus.

## OBS. XXII.

D. 9 Mart. 1785 Moguntiae in femina adulta.

## OBS. XXIII.

D. 10 Mart. 1785 ibidem in viro 25 annor.

## OBS. XXIV.

D. 15 Mart. 1785 in viro adulto.

## OBS. XXV. ET XXVI.

D. 16 Mart. in sene et vetula.

## OBS. XXVII. ET XXVIII.

D. 17 Mart. in duobus viris adultis lustraui cum praesentibus Cl. Dn. Tiel et discipulorum non ignobili corona, aceruulum prope conarion situm, et vidimus trabi medullari, siue basi ipsius insidentem, et praeter magnitudinem vel quantitatem granulorum vix aliud quoddam discriminem cernebatur.

OBS.

## OBS. XXIX.

D. 10 Apr. 1785 in vetula glandulam pinealem magnam, extra et ante illam aceruum, intra illam vero nulos lapillos inveni.

## OBS. XXX.

D. 12 Apr. 1785 in vetula conarium paruum, ante illud aceruulus solito minor, sed ad latera eius granula.

## OBS. XXXI.

D. 15 Apr. 1785 in femina iuniori aceruulus et ad latera eius granula aderant, conarion ipsum fere pellucidum paruum, reliqua substantia cinerea encephali multo fuscius.

## OBS. XXXII.

D. 17 Apr. 1785 in viro aceruulus et ad latera eius granula, quin imo in ipsa conarii substantia.

## OBS. XXXIII.

D. 28 Apr. 1785 in viro aceruulus maior, ad latera vero nulla granula, intra conarion autem arena grandiuscula.

## OBS. XXXIV.

D. 29 Apr. 1785 in vetula intra et extra conarion lapilli.

## OBS. XXXV.

Eodem die in viro 20 circiter annorum aceruulus, et intra substantiam conarii lapilli. Glandula pinealis circa basin non, ut solet, medullaris, sed taenia tantum quadam medullosa transuersim posita distinctus.

## OBS. XXXVI.

D. 13 Iul. 1785 in viro annorum circiter 50 in encephalo solito maiori quoad volumen et pondus, glandula pinealis siue conarion solitae magnitudinis, et aceruulus ante illam, et ipsius substantia fabulosa.

## §. V.

*Observationes lapillorum glandulae pinealis  
quae apud alios auctores occurrunt.*

Saepissime etiam ab aliis viris clarissimis annotatos invenies lapillos conarii. Verbi causa FRANCISCVS DE LE BOE SYLVIVS aliquoties vidit hosce lapillos. FLORENTIVS SCHVYL. HENR. MEIBOM decies, REGA DE GRAAF plus quam vigesies, CHR. DE COCK A KERKWICK, WEPFER, PAVLVS BARBETTE, STALPARTVS VAN DER WIEL, ANTONIVS NVCK saepius, BRVNNER, BARBECKIVS, A MEECK, REN bis, IVSTVS PESTI, EDMUND KIRG, BENI. BENED. PETER-

MANN bis, DIONIS aliquando, BARTHOL.  
KRVGER, BERLINGERIVS GIPSEVS, LAV-  
BIVS, QVINA, (apud RvYSCHIVM), MOR-  
GAGNI, SALTSMANN bis, MAVCHART,  
VIEVSENS saepissime, DE LA CHARRIERE,  
WINSLOW, LIETAVD. pluries. Hos casus iam  
a Gvnzio in *Prolufione egregia de lapillis glan-*  
*dulae pinealis in quinque partes alienatis* Lips.  
1753 collectos reperies, MORGAGNIVS, qui,  
vt folet, egregie et fusius de aceruulo egit, in-  
primis de sed. et cauf. morb. Epist. 5. art. 12  
MARTINETTVM inter illos nominauit, qui  
lapillos conarii viderunt. Nonnulla nomina ex  
his etiam apud HALLERVUM de corp. hum.  
fabr. Tom. 8. p. 108 not. m occurrunt, sed  
praeter ista etiam casus allegantur, quos de-  
scripserunt PIRIDET, PECHLIN, KITTER,  
FABRICIVS, LOESECKE, SARTORINVS, BAR-  
THOLINVS, MECKEL, PRINGLE, GREDING,  
COLONIS.

Nostris temporibus in Ill. BALDINGER  
Magazin für Aerzte 4 Band p. 101, et ex illo  
sine dubio in cel. ISENFLAMM präktischen Un-  
merkungen über die Eingeweide p. 25 annotatos  
lapillos conarii reperi, item in Medicæ com-  
municationis volumine primo, casum cel.  
WATSON retulit. Immo incisorum nostri aevi  
expertissimus WALTER MDCCCLXXXI Be-  
rolini mecum de lapillis conarii verba faciens

in omnibus adesse pronuntiabat, sed paulo  
fusius GREDINGII obseruationes posthumas  
perlustrabimus.

1. " *In viro 77 annorum glandulam pinealem*  
*rotundiorum plenam fabulo quinque vel sex*  
*granorum.*" Pondus mihi nimis ma-  
gnum videtur vermischte medizinische und  
chirurgische Schriften. Altenburg 1781  
P. II.

2. " *In femina 24 annorum epileptica et de-*  
*lirante glandula pinealis naturali modo*  
*constructa, nullis lapillis obsita.*" (L.  
c. p. 110.)

3. " *In femina 54 annorum melancholica in*  
*glandula pineali quoad reliqua naturali-*  
*ter constituta lapillus insignis.*" (L. c.  
p. 222.) Suspicio lapillum hunc acer-  
uuli fuisse extra conarion positum.

4. " *Viro 36 annorum epileptico - fatuo nulli*  
*lapilli in glandula pineali.*" (L. c. p.  
231.) Forsan ab aquis (qui in ven-  
triculis continebatur) aceruulus, suo  
loco inter secandum remouebatur, sic-  
que euanescebat, ut infra fusius vi-  
debimus.

5. "In femina 62 annorum melancholica glandula pinealis solito minor, sed quoad reliqua sana." (L. c. p. 236.) An sub sanitate conarii etiam defectum lapilorum conarii subintelleixerit, dijudicare nequeo.

6. "Sabulum glandulae pinealis in viro fatuo." (L. c. p. 241.)

7. "In femina epileptica 39 annorum et furore uterino laborante glandula pinealis mollis, nullis lapillis obsessa." (L. c. p. 246.) Cerebrum aqua suffusum fuisse annotat, minime ergo mirandum, aceruum euanuisfe.

8. "In viro furente 27 annorum in glandula pineali lapilli et sabulum." (L. c. p. 254.) Certe in hoc casu lapillos extra glandulam (i. c. aceruum) et intra illam animaduertit.

9. "Feminae 31 annorum epileptico-fureutis cerebrum, neque sabulum neque lapillos in glandula pineali monstrabat." (L. c. p. 257.) Forsan mollities cerebri, quam annotauit, causa erat, quominus acerulus oculos incurseret.

10. " *In femina 24 annorum hydropica epileptica furente in glandula pineali insig-  
nies lapilli.*" (L. c. p. 259.)

11. " *In viro 49 annorum cephalalgia laborante  
glandula pinealis naturali modo constituta.*"  
p. 278. Cum aqua suffusum fuisse ce-  
rebrum annoauerit, defectus aceryuli  
facile explicari potest. (q. o. A.)

12. " *In viro 26 annorum melancholico glan-  
dula pinealis maior et durior adeo, ut  
digito vix comprimi posset.*" p. 279.

13. " *In femina 35 annorum epileptico-furente  
glandula pinealis fabulosa.*" p. 283.

14. " *In femina 35 annorum epileptico-fatua,  
glandula pinealis minor, duobus lapillis  
obsessa.*" p. 296.

15. " *Feminae 41 annorum melancholicae,  
furentis glandula pinealis naturalis, vix  
aliquid duri continens.*" p. 304.

16. " *Viro melancholico glandula pinealis na-  
turalis cum lapillo exiguo erat.*" p. 311.

Liquet ergo ex hisce observationibus.  
1. Non in omnibus deliriis affici glandulam  
pinealem secundum casum 2. 4. 5. 7. 9. 11. 15.

2. In hisce septem casibus, bis tantum  
in viris deficere videbatur, quod, quomodo  
explicari queat, infra videbimus.

3. Förfan in iisdem casibus aceruulus  
ante glandulam pinealem reuera aderat, et  
tantummodo peculiarem administrationem  
anatomicam requirebat; ipse enim expertus  
sum singularem requiri attentionem non modo,  
sed etiam encheirēsin pro re nata diuersam.

Idem vir clar. GRE丁ING alibi (L. c. p.  
182.) annotaverat ex 100 maniacis 52, qui  
lapillos vel extra vel intra glandulam pinea-  
lem gerebant.

Ex 26 epileptico - maniacis - 12.

Ex 16 epileptico - fatuis - 3.

Ex 20 epilepticis - 7.

Ex 24 melancholicis - 13.

Ex 30 fatuis - 19.

In plerisque adeo corporibus reperit, sed  
cur non in omnibus, sponte ex ipsius verbis  
patet; ipse enim hoc ipso loco fatetur, se  
non omnes corporum sectiones ea, qua solent  
anatomie, diligentia instituere potuisse.

## §. VI.

*Conclusiones ex praedictis.*

**S**ed quorū haec omnia? scilicet ut demonstremus  
 I. Adesse vel aceruulum extra conarium,  
 vel granula intra illud, in iuuenibus iam a  
 decimo quarto vitae anno. n)

II. Adesse in feminis et viris adultis. o)

III. In senibus et vetulis. p)

**IV.**

n) Obseruatione nostra II. III. IX. XVI. XX. XXIII.  
 XXXI. XXXV. Obseruatione Gredingii e. 10. 12.  
 In cadauere iuuenili Bartholom. Kruger anato-  
 tom. curiosa p. 38. In virgine sedecim annorum  
 E. B. Petermann. Obs. med. Dec. 1. Obs. 1.  
 In virgine 20 annorum delineauit apud Mang et  
 Theatr. anat. Lib. 4. Cap. 2. p. 309. In puella 20  
 annorum Günz. l. c. p. 13.

o) Obsernationibus plerisque, verbi causa; ex nostris  
 I. VIII. X. XI. XII. XV. XVII. XVIII. XIX.  
 XXI. XXII. XXIII. XXXII. Ex Gredingii  
 obs. 4. 7. 8. 9. 13. 14. 15. aliisque permultis alio-  
 rum auctorum.

p) Obs. III. V. VI. XIII. XIV. XXV. XXVI. XXX.  
 XXXIV. apud Gredingium Obs. 1. 5.

IV. Adesse in omnibus fere Europae regionibus Anglia, q) Hollandia, r) Gallia, s) Helvetia, t) Italia, u) plurimis Germaniae regionibus x) Prusiae regno, y)

V.

q) Edm. King. Ph. Fr. n. 189 et ex illis act. erud. Lipf. ann. 1688 p. 234. Pringle teste Hallero de hum. corp. fabr. T. 8 p. 108. Watson account of a gouty body dissected. vide Medical communications Vol. I. ita enim intelligo verba The glandula pinealis changed into a chalky malter.

r) De le Boe Sylnius secundum varios autores v. c. Diemerbroeckium Anat. L. 3. c. 6. p. 313. Quina apud Ruy schium Thesauro anat. V. N. 63. figuræ, ex quibus saltim magnitudo lapillorum difficitur, addidit Tab. 2. fig 5. Rega. de Graaf de succo pancreatico Cap. 7. Opp. omn. edit. L. B. 1677. p. 587. Stalpartus van der Wiel in obseru. notisimis confer. Cock a Kerkwick Diss. anat. Ant. Nuck. Adenograph. aliisque.

s) Iam Rega de Graaf l. c. p. 587 annotauit frequentius in Gallia quam Hollandia occurrere lapilos glandulae pinealis Vieussens Neurographia Lib. I. Cap. XI. Winslow compendio usitatis simo Confer. Lorry Samml. für praktische Aerzte 6 Band. In primis autem Lieutaud Essays anatomiques vers. germ. Tom. 2. p. 43. item in précis de la medicine pratique.

t) Wepfer de cicuta aquatica p. 116.

u) Martinetti l. c. Santorini obs. anat. Morgagni l. c.

## V. Quinimo et in Afris. z)

VI. Adesse in hominibus ad ultimum usque vitae halitum mente sanis; quod quidem certe noui. aa)

## VII.

aa) Verbi causa Casellis, Goettingae, Moguntiae ipse obseruani, Berolini Meckel sen. Mem. de l'Acad. de sciencess de Berlin 1756. et ill. Walter in colloquio mecum habito, Lipsiae, Gunzius l. c. in Saxonia Greting l. c. Ienae, C. L. Loder in litteris ad me datis.

yy) Cl. Metzger Physiologia §. 373 in editione secunda,

zz) Obser. nostra XVI et XX.

aa) Sic ipse in duobus violenta morte extinctis Obf. II. et IV. et in primis puero egregio Obf. III. Sic Wepferus de Cicuta aquatica p. 116. in infanticida. Brunner in capite plexo de glandula pituitaria Cap. 3. Rega de Graaf in violenta morte extinctis, de succo pancreatico Cap. 7. Opp. omn. L. B. 1677. p. 587. Barbeckius in infanticida apud Herseltum in Philoso. homin. Cap. 16. §. 386. Ill. Schmucker in milite paucos post dies vulnera capitis mortuus. Chirurgische Wahrnehm. Band I p. 119. (non ut Hallerus citat 109.) In homine ingenioso Nuck, Bene etiam annotauit iam Diermerbroekius p. 313. "nusquam obseruatum legi, illis hominibus, in quorum cadaveribus tales calculi in hac glandula reperti sunt, in vita quidquam incommodi citra animales actiones contigisse." Nouies in non stultis vitia glandulae pinealis vidit Morgagnius Vir summus de Sed. et causis morb.

Epist.

VII. Adesse saepe etiam corpore sanis. bb)

VIII. Hinc non mirum, etiam in omnibus mente alienatis reperta fuisse granula circa conarion a GÜNZIO, GREILINGIO, aliisque; quoniam perpetuo adesse vidimus.

IX. In easibus, in quibus non inueniunt lapillos conarii, valde suspicor nihilo-  
seius reuera adfuisse, sed vel incuria ana-  
tomici, vel ob habitum cerebri flacceidio-  
rem non repertos fuisse; experientia enim  
edoctus noui, quanta saepe adhibenda sit cura  
et diligentia, ne cum plexu choroideo aufe-  
rantur lapilli, vel alio quoquis modo euane-  
scant. Recte hinc annotauit vir in dissec-  
tione capitis diligentissimus GREING (p.  
179 et pluries) in hydrocephalicis ob aquas  
ventriculorum prorumpentes saepe nonnisi  
difficillime reperiri posse glandulam pinealem,  
si autem tantus vir in cerebro *ne quidem glan-*  
*dulam pinealem* sine difficultate reperire potuit,  
profecto non mirandum, alias anatomicos in  
cepha-

Epist. 61. Art. 3. saepe cum viribus animi integris  
reperiri, eo etiam redit sententia Lieutaud,  
Meckelii, Walteri.

bb) Confer Observationes Wepferi, Brunneri,  
Barbeckii, nota antecedente citatas.

cephalotomia parum exercitatos latuisse non-nunquam, cum vel studio in hanc rem inquirerent, aceruulum vtpote magnitudine multo glandula pineali minorem. Ipse etiam Cl. GREDINGIVS, cui in his rebus fidem summam habemus, eodem loco (vt iam supra indicauimus) fatetur, se non omnes sectiones ea, qua solent anatomici, diligentia instituere potuisse.

Eo magis mihi monendi videntur anatomici, ne, si ad quaectionem hanc dirimendam accedant, obiter rem inquirant. Cerebrum enim, quantumlibet recentissimum, non putredine flaccidum, et id quidem summa cura perquirendum; saepe maximam cerebri partem ad vsque thalamos neruorum opticorum frustillatim abstuli, vt ad glandulam pinealem sine ipsius laesione accederem, saepe prius commisuram cerebri maximam corpus callosum alias dictam remoui, saepe ventriculos omnes aperui et aquaeductum praescidi, vt latex ventriculorum efflueret; semper autem processum falciformem durae membranae, quocum cohaeret conarion, non negligenter separaui, verbo, pro re nata varias encheires adhibui, facillime enim aceruulus, vel aqua ventriculorum abluitur, vel plexu choideo inuolutus perditur. Callide iam DIERBROEKIVS L. 3. c. 6 monuit «facile cum plexu

plexu choroideo auelli glandulam pinealem „ pari modo et WINSLOW annotauit dexteritatem adhibendam esse, ne cum plexu choroideo auferatur glandula pinealis. Si ergo tanta cura glandula pinealis ipsa seruanda, sponte patet, longe maiori cura ad detegendum aceruulum opus esse.

X. Mirum profecto esfet, nisi secundum naturam aceruulus adeset, me perpetuo in 36 cadaueribus, nullo excepto, illum inuenire potuisse.

XI. Nullo alio loco hucusque in encephalo similes lapillos inueni.

XII. Differunt autem quoad habitum externum lapilli glandulae pinealis ab osificationibus, quibuscumque concretionibus, et caeteris calculis in corpore humano reperiundi, adeo ut facile natura sua dignosci queant.

## §. VII.

*Quomodo aceruulus ab osibus dignoscatur.*

Aceruulum autem et lapillos humidos saepius microscopio lustrando vidi, constructos massa figuram irregularem gerente, asperula et quasi faxea, ubi autem siccii facti sunt, flavidu-

uedo et pelluciditas ipsorum evanescebat, et in albedinem opacam abibat, post immersiōnem in aqua autem flauedo et pelluciditas redibant. In aquam immisī velociter fundum petunt. Duritiem insigniorem cum quadam fragilitate posident. — **SEHRADER** Dis. de duobus osificulis in cærebro humano repertis Argent. 1687 quæst. 3. p. 17 substantiam horum lapillorum osseam declarauit, sed iure contra illum **MORGAGNIUS** de Sed. et Caus. morb. Epist. V. art. 12 monet « inter digitos compressa haec corpuscula in asperulas quasi arenulas saepius abisse, esseque friabilia, quod discrimen ad calculos ab osibus internoscendos primo loco affert **SCHEID** « hinc ab aliis iam non inepte *granula*, *arena*, vel *lapilli*, vel *fabulum* nominabantur.

Nihilo secius magnam cum osibus affinitatem habere lapillos vel nidor prodit, quem edunt igni expositi, ut etiam obseruavit summus Morgagnius l. c. Epist. 9. art. 17.

### §. VIII.

*Aceruuli analysis chemica, quam instituit*  
CL. MOLITOR.

**B**enevolentiae amicissimi Collegae Profess. MOLITOR debeo, quam hic trado, analysis chemicam.

Diffi-

„ Difficillime soluuntur lapilli ab acido  
„ dilutiori vitrioli, nitri et salis.

„ Acidum nitri reliquis velocius in illos  
„ agit, euoluuntur tunc bullulae rubrae, et  
„ residuum lapillorum paulatim in colorem  
„ rubrum immutatum acido innat. Hic  
„ color rufus nil aliud nisi aer nitrosus vide-  
„ tur, eius origo facile explicanda.

„ Acidum salis lentissime in illos agit, at  
„ minutissima granula adeo intumescebant, vt  
„ iam maxima in reliquo aceruulo volumine  
„ longe superarent. Memoratu dignum vide-  
„ tur, quod licet volumine tantopere cre-  
„ scerent, granula nihiloscius in fundo vasis  
„ remanerent.

„ Omne autem, quod terreum inerat la-  
„ pillis, reuera solutum fuisse ab acidis hisce,  
„ demonstratur praecipitatione per fal alkali  
„ facta, adeo vt praecipitatum rite exsicca-  
„ tum, pondere dimidiam lapillorum partem  
„ aequaret.

„ Pars lapillorum in balneo arenae sen-  
„ sim sensimque aucto igni destillatorio ad  
„ vsque excandescientiam exposita, prin-  
„ cipio guttulae phlegmatis odore animali  
„ praediti quaedam stillabant, has exciebat  
„ nidor volatilis alcalinus, donec in collo

" retortae guttulae olei empyreumatici pro-  
" dirent.

" Iam post exemptionem colorem fusco  
" atrum induerant, nil enim ulterius in illos  
" ignis efficere poterat.

" Tum igni fusorio exponebantur, usque  
" dum ad albedinem calcinati essent. Dimi-  
" diam iam ponderis partem amiserant, et  
" illico tunc ab acido nitri dilutiori cum ef-  
" feruescentia soluebantur.

" Haec terra per acida examinata cal-  
" caria videbatur.

" An etiam ut terra ossium (Knochenerde)  
" acido phosphoreo praedita sit, ob paruam  
" quantitatem determinari vix poterat."

## §. IX.

*Circa conarion et aceruulum adhuc perquirenda.*

Iam mihi et aliis perquirenda relinquo,

I. Quomodo in embryonibus sese gerat  
ista glandula?

II. Quonam vitae anno primum appa-  
reant lapilli, num iam anno 12 vel 13 repe-  
riantur in nostris regionibus, an serius? an  
matu-

maturius? mihi ipsi huc vsque occasio, quod doleo, oblata non erat, eius aetatis corpora hoc consilio secandi.

III. Cur hoc loco cerebri in primis inueniantur, non alibi, v. c. in ventriculis, certe si alio loco cerebri concretiones inueniuntur, alia, vt videtur, substantia construuntur; generationis calculorum vesicae felleae et vrinariae ratio quaedam plausibilis cogitari potest.

IV. An verosimilis MORGAGNI de Sed. et Caus. morb. Epist. 5 art. 12 conjectura, *Calculos esse, qui paulatim ex terreis materiae illius particulis, aqueis magis magisque absuntis, concreuerint?*



l'acide, celle-ci non c'est dans les sels de corps  
qui sont solubles dans l'eau.

III. Les sels peuvent être classés en deux classes  
selon leur solubilité dans l'eau, celle  
qui est dans l'eau soluble et celle qui est  
insoluble dans l'eau. Les sels  
insolubles dans l'eau sont solubles dans l'eau  
dans laquelle ils sont dissous.

IV. Au catalogue des molécules de sel  
et ceux qui sont solubles dans l'eau  
sont classés dans la partie de ce catalogue  
qui est dans l'eau soluble dans l'eau.

