

**De gastritide : dissertatio inauguralis medica ... / auctor Carol. Fried. Eduardus Malin.**

**Contributors**

Malin, Karl Friedrich Eduard.  
Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin.  
Royal College of Surgeons of England

**Publication/Creation**

Berolini : Form. Theophili Brüschcke, 1819.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/ds6vfprm>

**Provider**

Royal College of Surgeons

**License and attribution**

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

14  
DE  
GASTRITIDE.

---

DISSERTATIO  
INAUGURALIS-MEDICA

QUAM  
RATIOSI MEDICORUM ORDINIS CONSENSU  
ET AUCTORITATE

IN  
UNIVERSITATE LITTERARIA BEROLINENSI

PRO SUMMIS  
MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS  
LEGITIME IMPETRANDIS  
PUBLICE DEFENDET

AUCTOR  
CAROL. FRIED. EDUARDUS MALIN

LUBBENAVIA LUSATUS.

DIE XIV. M. APRIL. A. MDCCCXVIII.

---

BEROLINI.  
FORMIS THEOPHILI BRÜSCHKE.

H A S C E

S T U D I O R U M P R I M I T I A S

P I A G R A T A Q U E M E N T E

M I L L A M J . F . J .

D. D. D.

F I L I U S



## Prooemium.

---

Quaecunque morborum genus, in therapia speciali adumbratum animo attento perlustraverim, doctrina tamen de inflammationibus prae aliis diligenter et feliciter exposita mihi usque visa est. Pars quaedam inflammata audit si continuum impetum sanguinis cum functionibus laesis observamus. Attamen quivis sanguinis impetus appellari inflammatio nequit, eumque a congestione distinguere oportet. Ad externas inflammationis genuinas notas pertinent: rubor insolitus, dolor modo lancinans modo obtusus, nullo modo autem intermittens, denique tumor. Omnes inflammationes, secundum earum gradum febris modo vehementior modo lenior cum excretionibus et secretionibus alteratis comitatur. Facillima igitur inflammationis partis externae est Diagnos; quae quidem notae in internâ inflammatione fere omnes percipi nequeunt. Hic praeprimis confidendum est dolore fixo, interno aestu, functione partis laesa ac febre.

Inter se differunt vero diverso modo inflammationes, tum si partem affectam adspiciamus, tum naturam earum propriam. Exinde divisio existit in externas et internas, in synochicas erythicas et typhosas; prout vel primarium sistunt morbum, vel ab alio secundario pendent; in primarias et secundarias in benignas vel malignas, et si cursum earum respiciamus: vel acutas vel chronicas etc. Denique vero pro ipsius inflammationis sede vel erysipelatodes vel phlegmonodes sunt.

Nulli fere alii morbo medicus exactus et prudens aequae bono celerique successu mederi potest, ac inflammationibus, quae quidem neglectae, aliis morbis celerius etiam necant.

Omnium vero inflammationum prae aliis, gastritidem explicare, mihi arridet, quoniam ista, organon maximopere nobile, quod cum multis aliis visceribus intimo gaudet consensu, afficit; — et saepenummero morbos, difficillime curandos, relinquit, si forma chronica, interdum vel medicum haud ineptum fugiente, existens, negligitur.

---



## Diagnosis.

---

Gastritis modo facile modo vero difficulter dignoscitur. Symptomata, quae praecipue adsunt e functione ventriculi vel impedita vel suppressa existunt. Signa praecipua: Febris acuta vehemētissima, quam rigor antecessit, dolores fixi, vel altius paullo in praecordiis, vel paullo magis sinistrorsum percipiuntur. Hi dolores saepe atroces et lancinantes, tactu, respiratione et tussi augentur, et praecipue praecordia nec levissimum quidem tactum ferunt, tensa simul sunt et calidissima. Ventriculus nec cibum, nec potum, nec medicamina, nequidem blandissima sumere aut retinere potest, sed subito rejicit. Faciem, qua summa interna anxietas depingitur, pallidissimam extremitates miro semper rigore affectas videmus.

Haec signa praeterea cum aliis symptomatibus, praecipuis spasticis consociata sunt; nam motus iste antiperistalticus, quo stomachus convellitur, alia etiam organa corripit. — Quod genus: dolores sunt colici vehementes, anxietas maxima, sitis ardentissima, gula et oesophagus spastice contracti, ischuria, tenesmus, trismus, animi deliquia, aetus internus intestinorum cum pulsibus frequentissimis, celerrimis modo duris, modo vero parvis et irregularibus.

Descripta etiam ab Autoribus est gastritis occulta, quae modo post mortem possit dignosci e. g. in typho et in aliis morbis magni momenti, in quibus ob magnam affectionem universalem malum minus inflammatio localis medicum fugit nonnunquam haud ignarum.

### D i v i s i o.

Nonnulli Auctores e. g. P. Frank distinguunt ipsam inflammationem secundum gradum locum, et febrem comitantem. Frequens enim cadaverum perlustratio docuit: ventriculum vel totum, vel ex parte, nunc profunda satis et phlegmonosa inflammatione, nunc vero superficiali ac erysipelacea phlogosi laborare. Dividit dein etiam gastritidem in primariam et secundariam, quae quidem plerumque erysipelacea et occulta morborum sub fine nonnunquam accedit. In gastritide phlegmonosa



horrorem cum subsequenti aestu observamus, febris est inflammatoria, omnia jam prius signa allata adsunt; vomiturationis illa vel liquoris aquosi, vel aeruginosae bilis cum intolerabili dolore. Alvus saepius pertinaciter obstructa, vigiliae, jactatio, dyspnoea, facies collapsa; cum extremitatum frigore, summa virium prostratione, nonnunquam etiam signa ictericitiae inveniuntur, respirationes celerrimae, spasmis interceptae vox debilis et clangosa.

In gastritis vero erysipelatosa febris naturam inflammatoriam non induit et morbus plerumque, erysipellate vel alio exanthemate ab externis corporis partibus evanescente, insurgit, aut febrem nervosam vel gastricam praecedentem sequitur.

Quaerunt vero medicorum libri haec statuerunt, differentia tamen certa non liquet, quae difficultas vero in morbo curando damnum nullum affert, quia similis fere medela requiritur.

Differentia ab aliis morbis Morbi quibuscumque confundi potest gastritis sunt;

1) Cholera. Haec vero rarior et fere semper autumnalis morbus, et cum vomitionibus statim alvi excretionibus creberrimae adsunt. Copiosior hic vomitus urget, ardor in ventriculo non aequae magnus et febris deest.

2) Cardialgia. Tum febris, tum sitis majoris, tum signorum inflammationis absentia, denique medicamina, praecipue antispasmodica po-



tumque satis mitem assumendi potestate a gastritide differt.

3) Vomitus epilepticus. Febris et sitis desunt, urina pallida, et jam ex aegroti constitutione et antecedentibus, an epilepticus sit, concludere possumus. Praeterea morbi decursus, quam unquam gastritidis longior est.

4) Turgescentia biliosa cum gastrodynia febrique gastrica complicata. Dignoscitur tamen ex signis certis sordium sursus turgescentium et ex levamine, quod evacuationem excipit. Potu lenta, praecipue acidula vomitu non rejiciuntur.

5) Rheumatismus musculorum epigastrii acutus cum febre inflammatoria. In hoc stomachi functiones haud tantopere sunt laesae, tumor magis circumscriptus et calens, adest, nec quaecunque sumserit aeger, iterum evomit; morbus mitiora longe quam gastritis symptomata offert.

6) Diaphragmitis, hepatitis, enteritis. In diaphragmitide dolor transverse epigastrium et abdomen constringens, respiratio usque intercepta, et musculorum faciei convulsiones adsunt. Ab hepatitis et enteritide facilius distinguitur, quoniam illa plerumque signis ictericis, doloribus scapulae, brachii et regionis hypochondriacae dextrae; — haec vero inflatione abdominis dolentissima et ischuria perpetua juncta est.



## C a u s a e.

Omnes causae, quae alias inflammationes, gastritidem etiam inducere valent. Excepta constitutione aëris omnipotenti huc recensendae sunt: refrigerationes, praeprimis pedum, et omnia quae systema ventriculi vasculosum incitant, res deglutitae, tum vi mechanica, tum chemica ventriculum stimulant et erodentes; — ut vitrum, acida mineralia, venena corrosiva, imprimis Hydrarg: mur. corros: Arsenicum, emetica fortiora, cathartica, fungi, vegetabilia acria, ut hellebor. alb. et niger, cicuta, aconit etc.; potus glaciatus et glacies ipsa, cibus calidissimus, et plura alia. Dein vero etiam antagonismo et metastasi gastritis oriri potest, talis ex mensibus et haemorrhoidibus suppressis, contagio varioloso et morbilloso et quavis psorica acrimonia oritur. Acre quodcunque, vel in stomacho ipso, vel in alia corporis parte generatum, et ad illum depositum; quo spectant: bilis acris et degenerata, acre arthriticum a qualibet corporis parte ad ventriculum aberrans gastritidem non rarissime provocant. Tandem sunt adnumerandae causae mechanicae. ut: herniae, contusiones, vulnera etc.

## P r o g n o s i s.

Maxima, hunc morbum naturae ventriculi sensibilis et cum universo corpore consentientis



causa, pericula premunt; qua re nonnunquam celeri morte rapiuntur aegroti, vel convulsionibus, vel apoplexia; Saepius tamen morbo per paucos dies protracto sectio defuncti membranarum ventriculi gangraenam medico offerre solet. Periculum pendet: a gradu, sede, febre comitanti, constitutione et a causa occasionali. Gastritis venenis sumptis et podagra retrogressa orta, in subjectis jam provectioris aetatis celerrime decurrit; ut aegroti spatio viginti quatuor horarum praeterlapso et prius diem supremum interdum obeant, ubi causae autem minoris momenti subsunt, per tres, sex ad octo dies perdurat morbus.

## E x i t u s.

Ventriculi inflammatio modo in suppurationem scirrhum et gangraenam abit.

Resolutio. Quamquam hic exitus fere est rarissimus, eum tamen ex spectamus, si causae minoris momenti antecesserunt, et si morbum jam ab initio dignovimus; porro, si methodo antiphlogistica adhibita pulsus fit minus frequens et arteriae magis dilatantur, et omnia alia graviora symptomata cum extensive, tum intensive remittunt. Præprimis bonum signum esse dicitur, si portio deglutiti potus retineri potest, et alvus sponte reseratur. Praeterea etiam sudores, urina, imprimis



vero alvi excretiones, criticae benignius de morbo iudicium admittunt.

**Suppuratio.** Abitum gastritidis in suppurationem, partim ex decursu febris longiori, ex doloribus magis prementibus et remitteutibus, ex maxima anxietate cum nausea, ex ponderis ad praecordia sensu, denique ex communibus internarum suppurationum signis dignoscimus.

Vomica nunc in ventriculi cavum rumpitur, et pus vel vomitu vel alvi excretionibus ejicitur; — oritur exinde phthisis ventriculi vel intestinalis, quae aegrotum brevi tempore necat. Si vero ventriculus inflammatus cum vicinis organis concrevit, praecipue cum colo tranverso et peritoneo nonnunquam pus sacco quodam peritonei prope ventriculum colligitur. Hoc modo praecordiorum inflatio cum doloribus rodentibus oritur, hydropem saccatum aemulans, animi deliquia aliaque symptomata nervosa accedunt, tabe denique aeger consumitur.

Si vero abcessus in abdominis cavam rumpitur, ascites purulentus et mors certa cum doloribus atrocissimis et convulsionibus sequuntur.

**Indurationes:** Exsudationes et ventriculi membranarum crassities et indurationes non infrequentes oriuntur. Indurationes prope cardiam et pylorum imprimis magni momenti, ab initio dif-



facillime diagnosi percipiuntur. Eas tamen adesse statuimus, Si stomachus inflatus esse solet, tensus et turgidus; postquam aeger cibos sumserit si angores cum praecordiorum dolore ingravescent, ructus sequuntur acidi et vomitus aquosi. Quo facto levamen aliquod percipitur, donec iterum cibi assumuntur. Quo celerius post cibos sumptos vomitus oritur, eo propius cardiae sita est induratio.

Praeterea aeger ingentem totius corporis lassitudinem queritur, animus marcet, et spei expers est, facies pallet et livet; — dolores per totum abdomen, per dorsum et artus superiores, singultus et dolentissima vomituriatio aegrum cruciant etc. Laxato abdomine, si aeger supinus cubat, indurationes tactu percipi digitisque huc et illuc moveri possunt. Macies nunc cum febre hectica oritur, ungues curvantur, membra tumefiunt, aeger esurie, animi desponsione torquetur, et mors vitae miserrimae finem imponit.

Nonnunquam tunicae ventriculi internae inter se concrescunt et saccos quasi formant.

**Gangraena.** Gangraenam adesse, statuere licet si: Vomitus et dolores desinunt, aegri se bene valere dicunt, extremitates frigescunt, sudores intrans frigidi, vultus passionem indicans, collapsus faciei et oculorum, faciesque tota repraesentatur hypocratica, quae signa si adsunt mox placida morte brevi aegroti vitae miserrimae finis imponitur.



In Defunctorum cadaveribus lividae maculae, tum in cute, tum in ventriculi tunicis aliisque visceribus inveniuntur.

## C u r a.

Indicatio prima, causas remotās jubet percontari, easque tollere. Quod genus erit cura febris inflammatoriae, si qua inflammationem excitavit, si incitamenta sive externe sive interne ventriculo applicata, venena et alia ansam dederint gastritidi, ista cum mitiganda, tum removenda sunt. Huc vero plerumque medela nostra tunc modo aliquid praestabit, si satis mature advocati sumus. Pro natura incitamentorum cura varia erit; — Si venena hausta sunt corrosiva, ut arsenic: saponis solutio, natron et kali carbonicum solutum, olea pingua, mucilaginosa, potus calidi porrigantur etc. Summopere, quamquam imprimis in morbis secundariis hepar sulphur. alcalin: fini nostro respondet.

Si acria vegetabilia, q. g. cicuta, helleborus sumpta sunt — extemplo emeticum magna dosi porrigendum est; dein oleosa, lactea, — coffea et alia laudantur. Bilis acris, quā ventriculus corroditur, ingesta si inflammationem ventriculi excitarint, emetico quam celerrime eliminanda sunt, et si morbus jam majorem gradum attigit, mucilaginosa



et oleosa commode porriguntur. Ceterum inflammatio secundum ejus naturam curatur. Si morbis quibusdam suppressis orta est gastritis, illi reducendi sunt hirudinibus vesicatoriis, inunctionibus acris, frictionibus, balneis, interne volatilibus, diaphoreticis uti camphora, ammonii praeparatis; aut loco eorum antagonistice alia secretiones sunt provocandae.

Indicatio secunda, proximam gastritidis causam respicit, ideo adhibenda est methodus antiphlogistica, et omnium imprimis venaesectio est instituenda; (Quam tantum abest ut pulsus parvus contractus contraindicet, ut potius eam jubeat,) — Ad regionem epigastrii venaesectiones locales ope hirudinum et cucurbitularum instituendae, infrictiones linimentorum volatilium, q. g. liniment: ammon: camphor: c. opio, clysmata emollientia, et si sensibilitas aucta admittit, fomentationes ex herbis aromaticis cum herb: hyosc. et cicuta sunt adplicandae. Venaesectio facta, vesicantia a multis imponuntur, donec cutis rubefacta sit.

Quod ad remedia interna attinet — cura difficilis est, quia aeger quaecumque hauserit — evomit; Sitis vero quia tam ardentem vexat, ut aeger continuo bibere coactus sit; porrigendae sunt parvae doses potuum emollientium: Decoct: ex rad: Althaeae, Sago, Salep etc. P. Frank emulsionem lauda-



laudat e Gumm: arabic: cum duplo aq. fontan: mixtam. Vomitus si hisce lenibus tamen augetur clysmatibus corpus nutriendum est. Num in gastritide cum typho complicata venaesectio sit instituenda discrepat autorum sententia. — Ego quidem puto, quamvis venaesectio universalis forsitan non sit indicata locales tamen sanguinis missiones semper magno commodo fore. Huc etiam adhibenda sunt clysmata ex decoct: Chinae cum camphora, externe cucurbitulae siccae et vesicantia.

### Morborum, in quos exit gastritis curatio.

Si inflammatio transierit in suppurationem, naturae vis medicatrix plurima praestat. Medico nil restat, nisi hunc processum adjuvare. Si abscessus ad externas partes prodierit aperiendus est ex lege, quam Chirurgia praescribet. Simul emollientes, nutrientes et qui humores corrigunt, porrigantur potus, q. g. Decoct: orizae, althaeae, avenae, liquiritiae etc. imprimis vero lactea — et vitellum ovorum laudata sunt. Si omnis febris et inflammatio evanuerint, balsamica lenia, uti Extract: myrrh: aquos; c. mell: in aqua solutum, — aqua calcis c. lacte, juscula carnis adhibenda sunt. Si vomica rupta in abdominis cavum sese effudit — unde ascites purulentus oritur, medelae nullus locus relictus est. — Indurationes



raro a medico superantur — ideo plerumque cura indicata est palliativa, qua continetur praecipue gas carbonicum: (potio Riveri, Pulv: aeropher: aquae mineraliae etc. Praeterea etiam medicamina sunt laudata ad resolvendas indurationes, q. g. Digitalis, Cicuta, Belladonna, Aconitum, Aq. laurocerasi et plura alia.

Palliativa methodo et nutrientibus quae facile digeruntur, mitissimis blandissimisque per spatium temporis vita aegri misera adhuc trahitur. Serius ejus mortis imaginem jam supra depictam aegrotus nobis offert.

Alii morbi secundarii ut Gastrodynia, Cardialgiā, Hypochondria, vomitus chronicus et alia propriam sibi curam poscunt.

---

## VITAE CURRICULUM

EX DECRETO

GRATIOSAE FACULTATIS MEDICAE

BEROLINENSIS

ADJECTUM.

---

Ego Carolus Friedericus Eduardus Malin natus sum ad XIX Julii anni MDCCLXXXVII Lubbenaviae Lusatiae inferioris urbe. Parentes ambos, patrem Chirurgum urbis, matremque e gente Bie-



gott superstites Deus maximus mihi servavit, quos ad ultimum vitae terminum pio animo venerabor. Anno aetatis meae decimo Gymnasium Luccaviense frequentabam ad annum usque decimum quintum. Dein semestri aestivo anno MDCCCXII in Collegio medico chirurgico, quod Dresdae floret praelectionibus celeb: Tobiae in anatomiam et physiologiam sicuti praelectionibus chirurgicis Celeb: Ohle operam dabam: et auspiciis D. Pech cadavera dissecabam. Cum anno vero subsequente Dresda bello fere devastaretur Berolinum me contuli et anno MDCCCXIV mense Ianuarii Chirurgi nosocomialis officia suscepi. Gloriose finito bello MDCCCXV ut regaveram, dimissus; semestri aestivo a MDCCCVI Lipsiam migravi, ibique civibus universitatis, Rosenmüllero, t. t. rectore magnifico adscriptus sum. Logicas et metaphysicas scholas Platneri, zoologicas, botanicas, Schwaegricheni frequentavi. Physicen et chemiam Gilbertus me docuit, anatomicis lectionibus et demonstrationibus Rosenmülleri interfui. Pathologiam Platnerus et Pucheltus, materiam medicam Haaseus et pharmacologiam Eschenbachius me docuerunt. Annis abhinc fere duobus praeterlapsis Dresdae exercitationes clinicas dirigente Kreysig auscultabam.

Anno MDCCCXVIII semestri aestivo Berolinum veni, et a Venerando Marheinecke t. t. rectore magnifico in album civium academicorum sum



relatus. Illustres et celeberrimos viros, Hufelandium de institutionibus medicis, Hornium de pathologia speciali, Formey de inflammationibus, Klugium de morbis ossium mechanicis audiui. Praeteracto semestre scholae Clinicae Illustr: Hufelandii interfui et sub auspiciis illustrium virorum Rudolphi et Knapé cadavera dissecui.

Therapiam specialem Ill. Horn et cursum operationum Ill. Mursinna me docuerunt.

Peracto tantamine et examine rigoro, spero nihil fore obfuturum quominus disputatione more antiquo habita summi in medicina et chirurgia honores in me conferantur.

---

## *THESES DEFENDENDAE.*

---

### *I.*

Vulnera ventriculi non sunt absolute lethalia.

### *II.*

Materia critica morbi hujus est solummodo effectus.

### *III.*

Hypochondriasis et hysteria unus idemque est morbus.

### *IV.*

Febris neutrius generis non existit.

---