Tentamen medicum inaugurale, de inflammatione : quod annuente summo numine : ex auctoritate reverendi admodum viri, D. Gulielmi Robertson, S.S.T.P. Academiae Edinburgenae Praefecti : nec non amplissimi senatus academici consensu, et nobilissimae facultatis medicae decreto : pro gradu doctoratus, summisque in medicina honoribus ac privilegiis rite et legitime consequendis, eruditorum examini subjicit / Joannes Gahagan, Hibernus, Societ. Reg. Med. Edin. Soc. et Praes. Annuus. necnon Societ. Natur. Studios. Edin. Praeses Annuus.

Contributors

Gahagan, Joannes. University of Glasgow. Library

Publication/Creation

Edinburgh, 1790.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/dzhxzxcr

Provider

University of Glasgow

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The University of Glasgow Library. The original may be consulted at The University of Glasgow Library. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org TENTAMEN MEDICUM

INAUGURALE,

DE

INFLAMMATIONE.

1 6.



TENTAMEN MEDICUM INAUGURALE,

INFLAMMATIONE.

QUOD,

ANNUENTE SUMMO NUMINE, Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GULIELMI ROBERTSON, S.S. T.P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ Praefecti;

NECNON

Amplifimi SENATUS ACADEMICI confenfu, Et nobilifimae FACULTATIS MEDICÆ decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini fubjicit JOANNES GAHAGAN,

HIBERNUS,


Societ. Reg. Med. Edin. Soc. et Praef. Annuus. Necnon Societ. Natur. Studiof. Edin. Praefes Annuus.

Sunt delicta tamen, quibus ignovisse velimus. Nam neque chorda sonum reddit, quem vult manus et mens ; Poscentique gravem persaepe remittit acutum ; Nec semper feriet quodcunque minabitur arcus.

HORAT.

Ad diem 24. Junii, hora locoque solitis.





mnemque felicitate

https://archive.org/details/b24928884

Viro integerrimo JULIELMO POWER KEATING TRENCH,

A R M I G E R O; Incolarum agri Gallivicenfis nomine Ad auguftiffimum ordinum Hiberniae Conventum legato; Populi immunitatum cuftodi vigilantiffimo, Libertatis patriae vindici acerrimo; Qui

Omnem dignitatem, A munere ei concredito, patriaeque incolumitate Alienam, Perpetuo refpuit ; Quique Omnem virtutem

Quae homini veram dignitatem vel ornamentum

Afferre,

Omnemque felicitatem

Quae maritum amantifimum, patrem pium,


Amicum fincerum, virum probum,

Beare queat,

Jam poslidens,

Nullum fere dignitatis incrementum Ex aulicis honoribus et favore Regis

Capere poteft ; Propter innumera in fe collata beneficia ;



Necnon

Fratri fuo optimo et cariffimo

MATHIÆ GAHAGAN, M. D.

Soc. Reg. Phys. Edin. Olim Praefidi,

Et

Societ. Natur. Studiof. Edin.

Soc. Refp.

In Infula Grenzda

Artem Apollineam cum summo humani generis fructu

Exercenti;

Propter beneficia plurima

In fe collata,

Ex quibus spes feliciffimae


Sibi fuifque confirmantur;

Testimonium, utut parvum,

Grati tamen animi,

Fraternique amoris,

Nunquam non fovendi ;



Denique,

Amico suo eruditissimo,

EDVARDO ASH, A.M.

Æd. Chrifti apud Oxon. Alumno,

Et

Socio Ratcliffienfi nuper electo;

Olim

Soc. Reg. Med. Edin. Praefidi Digniffimo,

Cujus

Morum fuavitas,

Ingenii acumen,

Aliaeque dotes animi eximiae,

Nunquam fatis miranda:


Propter fumma commoda,

Ex jucundiffima fua confuetudine et amicitia

Accepta,

Has academicorum fuorum laborum primitias

D. D. CQUE AUCTOR.



TENTAMEN MEDICUM

INAUGURALE,

DE

INFLAMMATIONE.

HONORES medicinae fummos petentem, temeritatis et audaciae felegendo rem tenebris adhuc fpiffis involutam, jure accufandum haud mihi ignotum; fed folum cupidus prodeffe humano generi, mihi liceat morbum libere attingere, qui ob frequentiam et periculum poftulat et comprobat quodvis conamen ad effectus lethales praeveniendos.

A

Hoe

2

Hoc voto impulfus, et liberalitate profefforum illuftrium hujus almae academiae, ex quorum praeceptis totam medicinae fcientiam meam (qualifcunque fit) deduxi fretus; judicio eorum candido, ac erudito, ea quae, hac de re gravi, mihi in animum^rvenerint lubenter permittam.

Quoniam corpori universo inflammatio afficiat, plane apparebit, cam difficillimam tractatu fore, priusquam leges et quaedam phaenomena occonomiae breviter proponantur; quamobrem de his ante paucis differere, quam nos rei propriae accingamus, haud inutile effe videtur.

Syftema certa actionis vi praeditum effe debere, ut vita confervetur, et ut animalia muneribus fuis rite fungantur; necnon omnem corporis conditionem, ab hac debita actione infigniter difeedentem, morbum illaturam effe omnibus patet. Rebus ita fe habentibus, vix ullis argumentis opus erit, ad probandum, medici effe ftatuere a quibus corporis vigor pendet; qui enim corpus fanum ignorat, morbum pellere omnino crit inep-

tus.

tus. Sic ait Galen; " cujus morbi tanta magnitudo eft, " quantum a naturali ftatu recedit, quantum vero rece-" dat, is folus novit, qui naturalem habitum ad amuflim " tenuerit *."

Natura providentiffima nobis femper noftros habitus formavit, variis mutationibus iis imminentibus omnino aptos; fine equidem diferimine: A quibus valetudinis ftatus, vel feries illa perquam vitam degimus fine manifefto incommodo, punctum enim perfectae fanitatis haud facile notatu. " (Perfecti fanus nemo dici poteft, " fed fani dicuntur qui nulla corporis parte dolent, et " ad vitae munera haudquaquam funt impediti) magis " extenfus et permanens evadit +."

Ab hac verfatili corporis poteftate, medici minus accurate ad rem animum advertentes, fibi perfuaferunt leges a quibus natura machinam animalem regit, complices

* De Method. Medend, lib. 1. tom. 10. p. 345.

† Galen de Sanit. Tuend. lib, 4. cap. 5. tom. 6. p. 170.

4

plices effe et obfcuras; valde nimirum diverfas iis quae in caeteris fuis operationibus valent. Hac mente magna ex parte rem (maximi equidem momenti) inveftigare fere omnino neglexerunt; hinc ambiguitas et conjectura in arte medica exercenda.

Dicit illustris Bacon; " Natura rei in re ipfa " non poteft indagari +." Igitur leges machinae animalis ad illum ordinem, et fimplicitatem, quorum nostro judicio capaces esfe videntur, reducamus; paululum ultra ea quae animalium vita profert defpicere lubet, ut quid fit illud principium, et numnam alicubi, quam in animalium fabrica invenietur, statuamus. His incumbentibus nobis phaenomena plantarum confpicua talia effe videntur, qualia ne minimum locum dubitandi dant, quin potestatem vitalem possideant, principium hujusce vitalitatis idem effe in utrisque regnis manifeste videtur; unde autem hoc principium (quod postea irritabilitatem nominabimus) derivatur, nequaquam explicare poffumus. Nobis sufficiat

+ De Augmentis Scientiarum, vol. ii.

eiat effectus ejus stabilire, et ab his leges colligere, quibus in generatione vitae animalis vel vegetabilis regitur. Haller + vitam describit quasi in corpore tantum motum, fanitatem quandam effe variandi facultatem, illius motus cujus vel exceffus vel defectus, opportunitatem morbi mortemve infert, hanc definitionem vegetabilem aeque ac ad vitam animalem applicandam judicamus, quanquam modis longe diverfis ad phaenomena vitae exhibenda plantae, quam animalia, excitantur. In plantis hoc principium paucis et fimplicibus poteftatibus excitatur, et motus hinc orti aeque funt fimplices; in animalibus autem summa motuum varietas requiritur. Caufa hujufce diversitatis satis manifesta videtur. Plantae enim nutriuntur vitaque earum paucorum principiorum applicatione spontanea conservatur; sed animalibus plerifque varietatem alimenti majorem postulantibus, ad cam comparandam, vires et facultates, ex principio vitali. una cum quadam fabrica conjuncta, fuppeditantur. Haec motus varietas perpetuo augetur ordine animautium ab infimo ad fummum, nempe hominem; cui ut existet tanta rerum diversitas necessaria est, ut non modo

† Halleri Praclec. in Boerhaavii Inflitur.

6

do praestantiam structurae postulat, sed etiam intellectus, ut actiones ejus ad fines dignos dirigantur.

Tantum neceffarium praefari judicavi quantum ad connectionem refert ex qua principium vitae, et animalis et vegetabilis pendet, antequam illas caufas quae in animali aequilibrium turbat, inter principium paffivum (vel irritabilitatem) et agentes vel communes vitae vires excitantes, fanem actionem producendo neceffarias exponere aggredior. " Vis vitalis (inquit Gaubius) du-" plici modo peccare poteft, excessi puta, et defectu, " hunc torporem illum irritabilitatem vocabo †." Irritabilitatis principium fystema universaliter pervadit, et ubique partis muneribus idoneum; mutationibus duabus obnoxium, augmento scilicet et decremento, quae vel ab excessi vel defectu potestatum excitantium pendent. Confensus per totum corpus ope hujus principii confervetur, adeo ut nulla quantumvis pars ignobilis vehementer vel diuturne affici potest, quin totum turbatur, hinc verborum Hippocratis sapientia patet. " Principium corporis quidem nullum effe videtur, fed " partes

+ Gaub. Path.

" partes omnes peraeque principium omnesque fines " descripto, namque circulo principium nullum inveni-" tur †." Minime autem me intelligi volo dicere, principium vitale in omni corporis parte pariter mutationibus effe obnoxium; diversa enim structura varietatis causa effe potest quodammodo illi fimilis quam inter animalia et vegetabilia adeffe observamus, sanguinis qui in corde illud ad fanam actionem incitat applicatio fibris ftomachi et intestinorum abnormes effectus gignit. Per primos menses in utero, vita foetus motu illi fimillimo ac in vegetabilibus fustinetur. Hoc vitae principium nullum alium finem spectat, praeter corporis incrementum; jamjam nutrimentum adaptatum matre suppeditanti; hujusce motus exsuscitatio fimplex effe debet et vix observanda; haec eadem motus species in multis corporis officiis per totam vitam valet, veluti in capillis, unguibus; et priusquam ad hujus differtatiunculae finem perveniam, regenerationem carnis in vulneribus fimilem effe motum demonstrare conabor. Ut foetus ad maturitatem proveniat animales motus magis validi et varii fiunt, connectione inter matrem et foetum stabilita, novus stimulus scilicet sanguis suppeditatur, quo

† Charter, tom, viii p. 357.

7

vitale

8

vitale principium ad actionem excitatur, cor pulfat, nuncque inchoat vita animalis, quae cerebri et nervorum evolutione principium vitae afficienti, quafi nova praecipuaque vi, et fie musculari fibrae illam contractionis validitatem praebens, quam distinctionis causa vim tonicam vocamus, fustinetur et continuatur. Hic constat, me judice, maxima nervorum utilitas in motu animali promovendo; ab eorum enim firma et acquabili actione fana fibrae contractio pendet; quia vires aliae nequaquam dantur, quae hoc perenni munere fungantur. Argumentum adverfarium nostrae opinioni, scilicet nervos fenfu incitando et vi tonica, manifesta figna vitae animalis praebere, hujufmodi proponitur : Multa animalia fine cerebro vel nervis quibus vita perfectiffima inveniri; cui fatis erit respondere, ut ad parvam se movendi potestatem quae his animalibus inest, structura nervorum vel cerebri iis minime fit neceffaria : Nervofam autem vim quodammodo adeffe, ab horum animalium fenfu colligere licet.

A supra dictis videtur vim nervosam, inter primas causarum excitantium vitae principio adhibitarum, quae animalem

animalem actionem movent, existere. Nisi tamen aliquid motus prius adeflet, haec actio nervofae vis nunquam exercenda fuisset; cum ex aliquo motus genere necesse fit pendeat, in ipsa formatione et incremento organorum, quibus per totum fystema distribuitur, ut effectus antea memoratos edat. " In-" terea tamen non diffimulandum eft, partes quasdam, " musculosas perquam mature in soetu conspici, et in-" fignem vim et robur jam adeptas effe quam cere-" brum ipfum adhuc molle et fere fluidum reperitur, « earumque actionem ad hujus functionem et augmen " requiri ; et musculos semper partibus nervosis vere " multo firmiores effe, et vim propriam irritabilem, ni-" mirum quam nervi nunquam participant +." A vi nervorum excitatrici una cum fanguinis caeterorumque corporis fluidorum viribus; ea quorundam musculorum qui involuntarii audiunt promovetur et sustentatur; hinc actio quam maxime aequabilis fystematis vafcularis, a rata parte principii vitalis cum viribus collata B

pendet.

9

† Greg. Confpect. p. 63.

pendet. In musculis voluntati parentibus nervi foli caufae excitantes jure haberi debent; hic quoque ratio inter vires excitantes et excitatas, five inter nervorum potestates et vitae principium, summopere tenenda est. Haec vis nervorum ftimulatrix primo, ut mihi videtur, minime a voluntate pependit, ut nonnulli voluerunt. Hi enim museuli ad functiones suas peragendas a nonnulla alia causa praeter animi conatus excitati fuerunt. Haec eadem actio repetita tantum inter mentem et hunc motum confensim efficit, ut tandem mens ad arbitrium valuerit in iis musculis motum omnem quem in fanitate peragere possunt excitare. Argumentum est hos muículos minime fuo imperio noftro habendos effe vel nunc vel in principio; quia in quibusdam morbis vis voluntatis omnino amittitur.

Actio fanitati neceffaria variis vitae stadiis, quippe cum causae, longe aliter sefe habent invicem collatae. Infantia scilicet et juventute principium vitae majore gradu adest quam vires excitantes, unde varias et multas actiones juventutis inutiles facile perficere possumus. Cum validae actiones actatis virilis magis fint firmae

et

et aequabiles, principium vitae non permultum diftat ab aequipondio virium excitantium; hinc impetus potius quam varietas hujufce temporis fignum. In fenectute nequaquam aequipondium manet, evanefcente vel deficiente vitae principio; nec enim in hoc ftatu aut frequentia aut impetus adfunt; exhauftis corporis poteftatibus, ufque adeo ut fyftema renovationis capax a perpetua et diuturna virium excitantium actione effe nequit.

Ab his quae a nobis curfim de diverfis vitae temporibus propofita funt, patet, (diverfiffimae licet poteftates aliae aliis temporibus adfint) quendam modum rationemve inter vitae principium et poteftates excitantes, ut vita commode fuftineatur adeffe debere. Ineunte aetate, ea levitas, ea mobilitas, quae colligit ac ponit iram temere et mutatur in horas, forfan ex principio vitali minus exercitato, oriundae. Inde videmus hunc ftatum validae actioni imparem evadere, iifque morbis obnoxium qui nimia ab irritabilitate pendent.

Medio

Medio vitae curfu, ubi in fyftemate proportio principii excitantis, et excitati, fere par eft morbi proprii ii funt, qui ab aucto vigore proveniunt, feilicet qui vulgo inflammatorii nominantur. Morbi fenectutis, ab imminuta fyftematis actione, adeo exhaufto vitae principio, ut corpus novi fubfidii haud amplius effe capax evadit, manifefte exoriuntur. Hinc illa ad morbos proclivitas infanabiles qui in hoc vitae ftadio graffantur.

Cum igitur vitia cujufque vitae ftadii propria leviter perftrinximus, eorumque rationem a mutationibus quibus vitae principium natura fubit, reddere conati fumus; fortaffe haud abfurdum fit colligere morbos fimiles, a caufis flatus corporis fimiles inducentibus, quovis vitae ftadio oriri poffe. In florente aetate nempe ab accumulatione vel imminutione irritabilitatis vel mobilitatis omnes et juventutem et fenectutem morbos flipantes provenire videmus.

Huic mutabilitati varietas quae in remediorum actione confpicitur, etiamque in caufis morbos excitantibus attribuenda ;

attribuenda; opportunitas qua corpus praeditum fit, ut eadem medicinae fpecies, valde diverfos immo etiam contrarios effectus diverfis temporibus admota edat; verumenimvero idem cibus longe aliter afficit, diverfis temporibus intra corpus receptus,

Ea est igitur hujus vitae principii natura, ut sele aequabiliter per omnes corporis partes diffundat; et ubique aequipondium fervet; et in quacumque parteejusdem imminutio fiat, eo ad restaurandum ex reliquo. corpore celerrime confugit. Si illius partis stimulus agens diutius manserit, perinde hoc vitae principium dilabitur, ac fi caufa latiffime pateret. Unde actio totius corporis imminuta vel plures functiones laesae. Haec imminutio a quibuslibet causis inducta celerrime evenit in iis temperamentis quibus plus irritabilitatis, quam quae ad vitae perfecta munera fungenda fatis fit. Hinc pendent illae animalium vitae leges, viz. 1mo, Hoc principio fummopere accumulato, eæ potestates quae corporis sano statu minimum effectum ederent, citisfime universum exhauriunt.

hauriunt. 2do, Contra autem hoc principio fummos pere imminuto, eaedem potestates vi vitali renovandae restaurandaeque infigniter inferviunt.

Cum igitur totius fyftematis irritabilitas ftimulorum vi nimis vehementium in tantum exhauriatur, ut non modo fanitati impar evadet, verum etiam mors ipfa fubito inducatur: tum etiam partis cujuflibet irritabilitas eadem lege non modo celerius fubtrahatur, quam a reliquo corpore renovetur, fed tantopere exhauriatur ut renovando non amplius fit idonea, et mortem eam partem pati neceffe fit.

Inutile foret, ut credo, conjectura affequi fontem; (i modo poffim) unde hoc vitae principium derivatur; ne in hoc igitur verbis morar, hujufce differtatiunculae rem propriam, una tamen obfervatione praemiffa, profequar. Quanquam de origine irritabilitatis taceam, a fanguine tamen credibile est, id principium ad omnes corporis partes perduci et diffundi; in quo igitur adesse necesse

neceffe est, et iisdem legibus quibus in partibus solidis obnoxia.

Etfi haud me fugit, quibufdam fortaffe, haec quae fupra tractavimus, minus ad rem inchoatam pertinere, videri poffe; ratione tamen rerum varietatis habita, cum de omni inflammationis genere dicendum erit, haud fine caufa videbitur, quod haec praefanda effe judicavimus.

Omnigena inflammatio, me judice, in duo genera recte dividatur, nempe in activam et paffivam, quippe cum de conditionibus vaforum fibi invicem omnino diverfis pendeant. Hujufmodi diftinctio videtur in mente Galeni fuiffe cum dicit. "Humida quidem " quae ex calida fluxione partem obfedente fit; ficca " autem quando fine ulla fluxione conatum calorem " accendi contingit *." Hallerus etiam ad talem diftinctionem

* Gal. de Meth. Med. cap. 1. tom. 10. page 367.

tinctionem referre videtur, de fuffocata vel depressa inflammatione differens †.

Haec duo inflammationis genera a caufis vel parte vel generaliter agentibus oriantur; ab activa inflammatione ordiemur, et phaenomenorum propriorum rationem reddere conabimur.

Activa inflammatio, a quacunque caufa proveniat, in aucta folita fanitatis actione partis affectae conftat. Unde arteriarum vi mufculofa in; fanguinem inclufum validius exercitata; fecretio fluidi quod arteriae exhalantes a fanguine fecernere debent, aucta et in telam cellulofam effufa, tumorem in hac inflammationis fpecie notabilem efficit.

Si ex caufa generali inflammatio oriatur, in hac potius quam illa parte graffabitur, prae hujus partis opportunitate ex aucta irritabilitate feilicet profecta; veluti

† Praelectiones, in Boerhaave Ir ftitut.

luti in pneumonia phrenitide, &c. Quanquam enim inflammatio activa, cel. Hunterii judicio, tenuia vafa folummodo afficere videtur; credebile eft autem, ubi caufa vehemens agit, eandem actionem inflammatoriam per totum fyftema fanguiferum diffundi; paulo aliter tamen fignatur ac fi morbus localis effet. Quum enim ex caufa locali hujufmodi inflammatio proveniat, et fi fatis vehemens evaferit, diathefin phlogifticam vel fynocham ipfam in toto corpore excitabit: In hanc fententiam Celfus, " Si fanguis in eas venas quae fpiritui " accommodatae funt, transfunditur, et inflammatio-" nem, quam Graeci nominant, excitat, eaque inflam-" matio talem motum efficit, qualis in febre eft †."

Inflammatio activa ex effectibus in quatuor ftadia recte dividatur, fcilicet, exhalans, agglutinans, fuppurans, et ulcerans. In horum primo ftadio vafa exhalantia fluidi plus folito effundunt; quo magna ex parte onere gravante leventur, et morbus haud raro tollitur. Sin

autem

17

† Celf. Pracfat.

autem omine minus felici, caufa vehementior urgeat; horum vasorum lumina adeo minuuntur, ut amplius ejusdem fluidi effusio per illa intercludatur. Causa igitur stimulatrix intus retenta, adeo vehementer faevit, ut vitae principium citius ferius exhauriat. Ni autem maximum fiat difpendium (quod cum accidat, gangracnam partis mortemve adfert) hoc imprimis ad falutem fpectat. Vasa enim nimio labore defatigata, paululum fese remittunt; hinc stadium adhaesivum; sive quo lympha fanguinis coagulabilis praecipue effunditur. In hoc ftadio adhaefivo vaforum actio, quamvis paululum minor, quam stadio primo, longe tamen major illa, quam prospera valetudo postulat; qua glutinis fecretione, absque stadio suppuranti, saepe inflammatio ter-Sin minus, proximum eft ut fuppuratio minatur. fiat.

Priufquam autem ad hanc vim fuppurandi explicandam aggrediemur, hujufmodi quaeftioni refpondendum videtur. Quibufnam modis vis illa agglutinandi finem inflammationibus adfert ? Nos, ni fallimur, huic quaeftioni fatisfacere exiftimabimur, fi res duas propofuerimus,

in

in hunc effectum praecipue conducentes, aliam ortam, ex imminuta vi ftimulatrici, fcilicet, fubductione lymphae coagulabilis dum agglutinandi proceffus perficitur: aliam ex glutine in tela collulofa depofito, quo morbus latius graffari prohibeatur, et quafi fuis limitibus contineri videatur.

In stadio inflammationis activae nobis tertio propofito suppurandi, scilicet, vasorum actio aliquanto minor este videtur, quam in priore; justa tamen sive sana multo major: quanquam ex eo quod excernitur vasa potius glandularum vice quam quavis alia sungi videantur.

Cur pus fecernatur, et in quam finem, non nobis liquet, an fanitati reddendae partibus inflammationem paffis, magis quam lympha idoneum fit, non fatis conflat. Mihi probabile videtur (cum fanguinis gluten adeffe neceffe fit, ut in fanitatem evadat inflammatio in tribus ultimis illis decurfibus, horum primo videlicet, ut partes cohaerefcant; fecundo, ut parietibus ex hoc glutine effectis ferpenti et amplianti vomicae obftetur; et tertio

tertio ut novae carni faveatur), pus vicarium five fecundarium effe quoddam, ad vafa lympham effundentia excitanda quae inflammatione exhaufta et quafr fatigata deficerent, paratum. Vel forte, quod magis verifimile effe poffit, pus in vafa absorbentia effectum edit, quo excitentur ad ea reforbenda quae novae carni obftent, quaeque inflammationi faveant. Multae res ad. hanc fententiam stabiliendam eoncurrunt, praecipue eae quae in stadio quarto vel ulcerante observantur. Hoc enim stadio videre est partes solidas reforberi et ulcera magna formari, nunquam vero, pure absente, ideoque pus pro caufa haberi debet. Longe alio modo in alioi ulcerum genere, res sefe habere creditur; ubi enim ftimuli adeo validi vim fuam ediderunt ut principium illud vitale longe plus fatis exhaurirent, primum fecundum et tertium stadium subito praetermittuntur ; natura perturbatur quo minus folitis officiis fungatur, quorum ope inflammatio fenfim minueretur. Hujus fimile quoddam in totius fystematis magna incitatione, ut in febribus evenire folet, quum fefe natura perspiratione, diarrhoea, aliove quopiam evacuandi modo, exoneret.

Vafis

Vafis in tantum igitur exhauftis vix inflammationi lotus eft, et vis refiliendi tantopere imminuitur, ut pars fanguinis aquofior per aperta ora effunditur, five exfudatur, et inftar materiae mortuae (quinetiam et fanguis ipfe in hujufmodi ftatu, nonnihil " aura" fimplicis igni" fpoliatur) quae in tela cellulofa depofita abforbentia ftimulat, ut partes vicinas rodant et amoveant, quemadmodum in ulceribus fanatu difficilibus fieri videmus.

Saepius tamen tantum irritabilitatis difpendium, inflammationem activam vehementem fubfequitur, ut ea pars vita privatur, gangraenaque corripitur, et fi partes reliquae integrae validaeque manent, mortua a vivis abforbentibus feparantur, quae viva vicina affumunt, limitemque ftatuunt; dumque vita expertia feparantur et amoveantur, vafa partium vigentium vim agglutinandi exercent, qua finis morbo imponatur.

In caufis inflammationis activae ftatuendis, celeberrimum Boerhaavium, honoris caufa, nominabimus. " Quicquid (inquit) vaforum fines ita arctat in conicis cy-" lindrifve, ut diameter aperturae fiat diametro fphae-" rae

21

** rae fanguinis minor, inflammationis caufa effe poteft,
** five hoc fit premendo, diftrahendo, intorquendo,
** rumpendo, contundendo, urendo, vel irrodendo, hifce
** calor, motus vehemens, frigus acre infixa adnume** rantur."—Aph. § 375.

Sede vero inflammatio activa fatis dignofcitur, cum nunquam non in tela cellulofa, vel in membranis vafis exhalantibus fcatentibus, verfatur, ut in pleura, pericardio, peritonaeo, urethra, utero *. Signum fortaffe minus adhuc fallax petitur, ex eo proceffu quo pus formatur, quippe quod nunquam in eo laxo vaforum ftatu, qui in inflammatione paffiva obvenit, confpicitur; et nobis, ni multum fallimur, clariffime liquet, ftadium adhaefivum in hac fpecie nunquam adeffe.

In illa activa, calor, rubor, dolor acutiffimus adfunt; quorum illi a fanguine rubro vi vaforum attenuato †, et in arterias minores infinuato, a quibus fanitate excluíus fuit;

- * Callen's First Lines, CCLXXV.
- + Hewfon on the Blood.

fuit; hie ab incitatione partis, qua nervorum vis fentiendi adaugetur, pendet.

Ratio medendi in activa inflammatione, maxime petenda est ab imminuta vasorum actione remediis vel topicis, vel generalibus efficienda. Huic indicationi maxime confulitur, fanguinis detractione, qua impetus ejus retardatur, ne tantopere fines arteriarum arctatos ftimulet, quae haud raro fine ullo alio remedio morbum tollit : Saepius tamen, calor modicus, cataplasmate vel fotu adhibitus, praecipue in phlegmonibus, five in ca telae cellularis inflammatione, remedium optimum videtur; utpote quod de principio vitali tantum detrahit, ut arterias arctatas remittat, et sana exhalatio restituatur, qua celeriter se causis inflammationem excitantibus liberent, ut supra diximus. Hic finis resolutio vel discussio dicitur. Ubi vero causa morbi excitans minus fimplicia remedia postulat, vim agglutinandi suppurandive scilicet, calor non sine fructu adhibetur. Quanquam enim incitationem vasorum tam cito ad fanum gradum deducere, quam in fuperiore ftadio haud queat; vis tamen ftimulatrix ea eft

quae

quae exhalantia excitet, ad gluten puive effundendum, quorum alterutero opus est ut morbus tollatur, Hinc colligere licet, quinam fint ii frigoris effectus adeo exitiales in omni folutione continui confpicui. Frigus enim irritabilitatis adcumulationi quam maxime favet, vi caloris pro tempore intermiffa: unde incitatio ultra illam quae ad gluten pufve fecernendum idonea sit, oritur, quorum alterutrum ad omnem continui folutionem sanandam necesse esse, ostendimus. Hinc perspicuum est, cur adeo sollicite, et diligenter in eo curationis genere, quod prima intentione intelligitur, omnis aeris accessus praecluditur, ne incitatio vehementior quam quae agglutinationi conveniat, aleretur, chirurgi opera et cura luderetur, vel demum gangraena induceretur. Quandocunque novam carnem five granulationem incumbendum eft, ut promoveamus, a frigore non minus fedulo cavendum; aliter enim vis agglutinandi potius quam suppurandi, ex aeris et frigoris effectu, sustentabitur, hinc puris minus, carnis vero plus fatis obvenit.

Quae

Quae fupra de puris ufu in medium protulimus, hine verofimiliora reddi videntur, et etiam quae cel. Hunter, in hanc fententiam obfervavit, " Abforbentia " feilicet corporis effe formae decorifque artifices." Gluten enim fanguinis, ex quo nova caro, quafi proceffu quodam vegetabili formatur, in iis ulcerum inflammationibus, tanta copia effunditur, ut fungorum inflar granulae exoriuntur, dum abforbentia, puris ftimulo interclufo, ignavia et inertia torpent, nec vim decorandi exferunt. Hinc fere ulcus carne fungofa featet, quam, utpote ad partes vicinas conjungendas, cavumque complendum, minus aptam, exurere cogimur iis remediis quae fuppurationem reftituant, fanationemque rite promoveant.

Inflammatio activa ad terminationem funestam alia via pervenire potest, quam gangraena, ex vi aut diuturnitate causae excitantis, (quae huic cum inflammatione passiva communis est), hydrope scilicet, exemplo thoracis, abdominis, quae hanc terminationem subire haud raro observantur.

D

Secundum

25

Secundum ftadium (agglutinandi intelligi volo) inflammationis activae, faepius percurritur in variis corporis partibus, fine ullo infigni fyftematis incommodo; exempla funt, thorace, pleura pulmonaris cum coftale cohaerefcit; abdomine, peritonaeum fibimet agglutinatur; in aliis partibus novae membranae formantur. Annon colligere licet, membranam duplicatam, vi fimili uteri exhalantium formari? Foetum ftimulum fatis validum edere poffe credibile nobis videtur.

Iis, quae nobis de inflammatione activa tradenda praecipue videbantur, traditis, quibufque notis facillime dignofcatur; ad illam alteram, quae paffiva nuncupatur, veniemus; et quamquam fummis difficultatibus prematur, figna tamen plura et clariora, quibus inter fe hae duae dignofcantur, proferre conabimur.

Inflammatio paffiva, undecunque orta, a vi fana et folita partis affectae imminuta pendet ; adeo ut arteriarum vis mufcularis fanguinem influentem propellere, et promovere nequit ; unde remora, vaforum dilatatio, tumor, dolor, ardor, rubor, parti obfident. Si hujus inflammationis

27

tionis caufa latior pateat, fcilicet in corpore universo, fana vis et incitatio minuatur; morbi caufa, quamvis generalis in partem infirmiffimam, primum adorietur †. Quacunque corporis parte fanguis inest, ibi inflammatio paffiva adesse potest; cujus quippe caufa praedisponens, cum st longe ab activa diversa (etiam quum utraque caufa ab temperamento vel vitae genere oritur) tum etiam effectus longe diversos edere confuevit.

Ea in quibus maxime fimiles videri folent haec funt, calor, dolor, rubor, tumor; in paffiva vero calor potius frequentiae quam vi contractionis fibrarum mufculanium tribuendus; nam fibrae prius exhauftae, et quodammodo fatigatae, fanguini implenti tendentique cedunt, donec diftenfionis ftimulo incitantur ad contractiones illas debiles et frequentes, quae non folum caloris, verum etiam doloris hujus inflammationis, caufae funt. Si coacervatio five congeftio in vafis paululum faltem exhauftis obveniat, diftenfionis ftimulus fibram adeo valde excitabit, ut fanguinem tardantem propellat,

† Hunter, Surgical Lectures, MS.

propellat, caufamque nocivam brevi arceat. Sin autem caufa exhauftionis diu inveteraverit, caufa contrahendi in fibra tantopere minuitur, ut ad hanc operam impar evadit; hinc diuturnitas et periculum in inflammatione paffiva, quae haud raro obfervantur. Quanquam aliquoties, ut in ophthalmiae quibufdam varietatibus, vix periculum aut dolorem ullum, adferre obfervatur.

Tumor et rubor in inflammatione paffiva ex nimio fanguine in arteriis congesto oriuntur; sed hic rubor longe abhorret a rubore activae, quippe qui purpurafcit et livescit, ex illius auraï simplicis igni, vel irritabilitate sanguinis amissa, ut credere est +; et hinc ab illo activae inflammationis rubore facillime dignoscatur.

Ea quibus duo genera inflammationis inter fe conftantiffime differunt, ut nobis perfuafum eft, haec funt; ftadium fuppurandi femper, agglutinandi faepe, in paffiva abeffe obfervantur; quoniam exhalantia vafa ad gluten pufve effundendum inepta funt. Inde colligendum videtur,

† Vide Hewfon, Goodwin, et Crawford, on the Blood, on Refpiration, and on Animal Heat.

widetur, folam terminationem, cujus haec inflammatio paffiva capax effe credatur, refolutionem vel gangraenam videri; nifi his addere licet hydropem in partibus quibufdam, ut in ea effufione aquofa quae phymofin, paraphymofin, et caetera hujufinodi, generat.

Vafa fupra modum fanguine diftenta in inflammatione paffiva, faepius difrumpuntur, unde haemorrhagiae pro corporis parte periculofae. Phlogofis cerebri et pulmonum, quanquam plerumque ex prioris inflammationis genere, faepifiime tamen in hanc paffivam infeliciter ire contendit: quoniam vafa vi illa vitali celeriter amiffa, ex nimia incitatione, laxantur, et haemorrhagiae funeftae immiffis habenis inferuntur.

In omnibus aegrotis, quibus aetate, luxu, vel morbo corporis vigor adeo debilitatur, ut cor, arteriaeque non rite fanguinem propellere valeant; et in infirmioribus arteriarum fyftematis partibus fanguinem ceffare et accumulare, in extremitatibus, videlicet, utpote a centro curriculi longiffime remotis, faepius videre eft. Hinc pedis pollex major in podagra tentatur; hinc ulcera

30

ulcera in cruribus feniorum difficilius fanantur, nec ullum in his ulceribus fanandis praefentius remedium quam fafciae inventum, quod eodem pertinet; hinc glandularum inflammationes, diverfis corporis partibus ex languida circuitione fanguinis ortae. Haec omnia probabiliora redduntur, ex co quod omnes compertum habent, quo cordi propius hujufmodi ulcera, eo citius fananda †; hinc diu obfervatum eft, ulcera in femoribus facile, dum in iifdem aegris difficilius in cruribus, fanari.

Doloris caufa, in utroque genere, ratione fimili explicari poteft; vi nervofa, fcilicet, a morbi ftimulo in tantum aucta et excitata. Eadem ratione quoque partes, alias fenfu expertes, dum inflammantur, fenfu fummo praeditae inveniuntur, exemplo pleurae, ligamentorum, et tendinum. In his partibus, fanitate fruentibus, illum fenfum exquifitum, non modo inutilem, verum etiam fummo incommodo fore fatendum eft; et igitur, portio exigua vis nerveae, iis partibus impenditur, quae morbum

+ Hunter, Surg. Left. MS. Haller, Praeleft p. 441.

不害

morbum adeffe fignificare fufficiat, mentemque ad cavendum vel occurrendum remediis idoneis excitet.

Cum in doloris fenfus mentionem incidimus, haud abs re fore fperamus aliud de dignofcendi ratione fignum inter activam et paffivam inflammationem proferre. In illa dolor auctior, lente evanefcens; in hac fere obtufior, et haud raro, ut quibufdam exemplis, podagrae fugaciffimus.

Haec omnia paffivae inflammationis figna debilitate comitantur, five (ut fupra diximus) ex fenectute, luxu, vel morbo, illa debilitas oriatur.

Ratio igitur medendi maxima ex parte in vigore fibrae revocando, quo vi fanguinis diftendentis refiftat, five potius quo vim refiliendi exferat, ad fanguinem propellendum, fi ad congestum proclivis sit, constare videtur. Ad hanc indicationem satisfaciendam, primo, vasis laborantibus succurrendum, stimulis levioribus, ut se exonerare excitentur; vel fanguinis detractione moderata, ope hirudinum, vel cucurbitularum, cum dolor

vehemens

32

vehemens aut pertinax urgeat. Sed, ex noftro judicio, confilium optimum in hujufmodi inflammationibus, non ex evacuatione capiendum eft, fed ex iis omnibus rationibus, quibus vigor tonicus (me faltem judice) five ex diaeta five ex medicinis corpori reftauretur. Hoc enim recuperato, illud inter potestates excitantes et excitatas aequilibrium renovatur, et ex facultate vitalis principii recipiendi confirmata (fine qua, debilitati et penuriae irritabilitatis refistere nullo modo poffumus)perpetuatur. Hactenus de iis inflammationis paffivae morbis differuimus, qui ex universi corporis debilitate vel opportunitate, lentis et diuturnis passibus inducta, oriuntur; nunc ad ejusdem alios morbos veniemus, a causis minus late patentibus profectos, minuíque a corporis opportunitate, quam a partium structura*, quales sunt erysipelas, et ophthalmia, pendentibus; eryfipelas + enim statu usitato et fimplici, vafis cutis superficiei, vel retis mucofi, et in tubo intestinali, iisdem vasis in epethelio, cuticulam referenti obfidet. Cum haec vafa ad vaporem tenuiffimum, a fanguine fecernendum, comparantur tum propter

* Haller, Praelect. in Inflit. Boerh. p. 444-

† Vide Galen Definit. de Eryf. Rat. Medend.

propter corum exilitatem, tum propter cuticulae * conjunctionem; pars ea fanguinis denfior exhalare nullo modo potest. Et quandocunque causa aliqua inflammationis premit, ut in eryfipelate, gastritide, &c. cum nullam partem fluidi distendentis et supra modum ftimulantis, vasa deponere poffunt ; celeriter vi refiliendi et irritabilitate spoliantur, quibus amisfis, ad impetum fanguinis influentis refistendum omnino imparia evadere necesse est. Immo haec vafa principio vitali adeo privari posfunt, ut non folum fanguinem rubrum partim intromittant et recipiant ; verum etiam, quafi tubae mortuae, serum transfluere finant, quod inter cutem et cuticulam effusum, hanc vesicularum instar +, levat et distendat, ex hoc eventu gangraena metuenda 1. Haec eryfipelatis species fere aliquot suppurandi signa edit, quae in errorem gravissimum saepe medentes induxere; naturam scilicet effe hujus generis inflammationum suppurandi stadium percurrere; observatio autem accuratior, et experientia diuturnior, hanc opinionem fatis refellerunt. Vafa enim in hujufmodi mor-

E

bist

Cullen's First Lines, vol. 1. p. 257.
Syden. Opera Univ. p. 279.
Cullen's First Lines, p. 256. ib.

34

bis, pus effundentia (si revera pus unquam effunditur) minime ea funt eryfipelate affecta, fed ea in tela cellulofa cutis verae ferpentia; vel sero superincumbente excitata, vel caufa morbi generali, tantam potestatem exferente, ut in his valis activam, fuperioribus tamen paffivam inflammationem patientibus, induceret; vel forte, fi ita fefe res habet, et pus eryfipelate fecerni fatendum est, non alio modo, quam vesicatoria, quae cuticula amiffa ut corpora extranea agere videntur, et exhalantia cutis verae ad pus effundendum excitare observantur. Quae de eryfipelate propofuimus in corporis superficie, ad id haud minus pertinebunt, quod in ventriculo et inteftinis obvenire notatur; quod Cullenum fagacifimum non fugit, ipfe au tem erythematis nomine infignire maluit +. Nec minus hic valent, quae fupra de fuppurandi ftadio objecimus; periculum autem, his partibus interioribus, longe majus intentatur, utpote febri typhoidea, haec eryfipelatis species, nunquam non fripatur; ex intima, ut nobi videtur, conjunctione harum partium cum corpore uni verlo

† Cullen's First Lines, vol. 1. p. 357. view mag

verfo; unde earum irritabilitatis inanitio fractas vires totius corporis efficit, typhi fons et caput †. 'Typhus porro eryfipelas externum haud raro comitatur. (Vide Hoffman de Eryfipelat. Febr. ‡). Corpus equidem eryfipelate vexatum vel pluribus ex iis cel. Culleni morbis exanthematicis, obnoxium fit debilitati quae typhum comitatur. Ea igitur exanthemata minime antiphlogiftica ratione, quae remedium praefentiffimum in activa comprobatur, curanda effe videantur. Clariffimus Sydenhamius §, in eryfipelate curando, quod nunquam in fuppurationem devenire fe obfervaffe meminit ; ftimulis validiffimis, ut Sp. Vin. Theriac. And. piper long, fomentis, &c. externe, opiatis interne utebatur.

Haec altera inflammationis paffivae species supra notata, ophthalmia scilicet, a partium structura oriri videtur.

+ Cel. Collen pr. lin. p. 360. et Nofol. vol. a. p. 100.

‡ Certe non tam levis, innocens, et fimplex est, eryfipelacee febris at vulgo putatur, sed gravis saepe, periculosa, et non raro lethalis; quin multum affinitatis alit cum morbo omnium atrocissimo, ipsa sebre pettilentiali. Hoff. vol. 1. tom. 4. § 1. ch. 12.

9 Opera Univ. p. 586. et Haller, p. 440.

tur. Caulaeremotaeplerumquelocales funt, ex Hoffmanni fententia, vis externa, itudium exercitatiffimum, lux fplendida, vigilia et vapores acres, horum omnium effectus primarius stimulandi est, quo moles solita major sanguinis in vafa folicitatur, quae ut in eryfipelate irritabilitatem exhaurit. Unde fanguis ruber in eas arteriarum partes, ex quibus, fano corporis statu, exclusus fuit, transit; hinc dolor, rubor, calor. Quibuscunque partibus exhaustione, nocetur, totius corporis injuria femper, pro rata parte, irritabilitatis ex toto systemate suppeditandae, ad eas partes reficiendas aestimanda est: Hinc, ut in co morbo de quo hic agitur, et compluribus aliis eryfipelatis varietatibus, quibus paucis duntaxat vafis injuria fit; vis totius corporis nequaquam minuetur, fed potius quod ad partem laborantem augetur. Medicus itaque recte curationem, ab iis remediis quae ad impetum fanguinis minuendum apprime valent, auspicabitur; videlicet, evacuationibus moderatis, quales fiant laxantibus, cucurbitulis cum ferro, hirudinibus; vesicatoria etiam prope partem affectam, praecipue in ophthalmia, forte et ftimulando et evacuando profint.

Ad

Ad perfectam fanationem tamen, iis remediis quae tonum vafis laxatis reftituant maxime fidendum, quoniam fanguini irruenti et diftendenti refiftere et labor et opus medicorum effe videatur. In inflammationibus paffivis, ubi corporis vigor multum fractus eft, ex longa et perpetua virium fubminiftratione, partibus morbo exhauftis, ut in podagra, aliifque fimilibus, curatio ab evacuatione vel remediis debilitantibus, neutiquam petenda eft. Quanquam enim vigor corporis vigore partis laefae major fit ; fi tamen paululum minuatur, iis officiis fungendis, quibus vita falufque multo magis nituntur, quam quibus morbus obftat, haud par effe invenietur.

Eadem cautio adhibenda eft, in iis paffivae inflammationis morbis, quibus fyftema tam fubito, " auraï " fimplicis igni," fpoliatur ut typhi fuperveniant. In hujufmodi morbis, gaftritide, enteritide, fcilicet, ne quidem medicorum audaciffimus, evacuando, debilitando, ad falutem pervenire poffe fperat; cum morbus totius Ex corporis vigoris exhauftione et inanitione pendet.

54

Hoc

Hoc modo phaenomenis, quae praecipue ad haec duo genera inflammationis dignofcenda et diftinguenda conferre nobis videntur, propofitis; finem huic differtationi imponemus, animadvertendo, ad analogiam exactam, quae obtinere apparet, inter morbos utriufque generis generales et locales †.

In activa quantumvis locali, incitatio febrilis totius fyftematis femper adeffe, ad menfuram localis inflammationis obfervatur, *fynochae* nomine; in paffiva, fyftematis vigor imminutus, typhi; nonne haec inflammationum divifionem noftram demonftrare, et fummopere confirmare videntur? Nonne etiam inter duo genera recte diftinguere maximi effe momenti judicandum, cum hoc folo, ratio fana et frugifera inniti fatetur?

Non poffumus non faepius atque iterum inculcare, antequam ad finem ventum eft, nos in hanc medicinae partem inductos fuiffe, non tam nostro judicio aut experientia fretos, quam spe doctiores et perspicaciores excitandi, ad haec quae nobis magna videntur, accuratius adhuc

† Haller, Pracleck.

adhuc, et diligentius animum advertendum : notaeque hujus academiae professorum doctiffimorum, voluntate libera et benigna in omnes qui pro virili rem medicam promovere conantur nitentes, nos opellamque nostram eorum arbitrio libentissime permittimus.

FINIS.

et fuinmonere confirmare, videntui i

Baramananik obfervarur, fenechae nomine; in pais

ERRATA.

3.	1. 10. pro perfecti lege profecte
id.	del. « ante extenfus et post evadit
6.	pro turbat lege turbant
27.	del. in ante partim
33.	pro exhalare lege exhalari
39.	1. notaeque lege notaque.

diano hit hostis gling appringhout the diato obe actionies promite un interrespondence, galingide neleone et irritabiliane spolianter; conbus amilie, ad inpes norator manifesting for form funguinem running e monune, feituri transfluere finant, quoi inter celein diffendate, ex hos events 'sampraena, meraenda is m fatte referiences Vals en in- hundimode interes 7