

Formulario de la Facultad Médica Mexicana.

Contributors

Parra, Guillermo.

Publication/Creation

México : Manero y Nava, 1893.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/nd5257re>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>




A



22101990119

Med

K14670



FORMULARIO

DE LA

FACULTAD MEDICA MEXICANA,

FORMADO POR EL

DOCTOR GUILLERMO PARRA.


OBRA PRESENTADA

POR LOS DRES. GUILLERMO PARRA Y FERNANDO ORTEGA

AL PRIMER CONGRESO MÉDICO MEXICANO.

PRIMERA EDICION.

*Queda asegurada
la propiedad literaria
conforme á la Ley.*



MÉXICO.

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN DE MANERO Y NAVA.

Calle de Tiburcio núm. 18. 10ª Av. Oriente, 133.

1893.

14794043

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY	
Coll.	WelM ^o rec
Coll.	
No.	QV

EN los meses de Mayo y Junio pasé una circular á todos los médicos de la República cuyo nombre y domicilio pude conocer, invitándolos á contribuir con sus fórmulas y tratamientos más experimentados, para la formación del FORMULARIO DE LA FACULTAD MÉDICA MEXICANA: Las circulares fueron contestadas por un gran número de compañeros; y las fórmulas que se reunieron en dos meses, y que hoy publico, son más de mil quinientas, siendo de observar que muchos no han tenido tiempo de contestar y mandar sus fórmulas, ya por la distancia ó por estar preparando algún trabajo para los Congresos médicos de Diciembre; otros no recibieron mis circulares porque ignoraba su domicilio; y como no se disponía de más tiempo, porque este libro tiene tambien por objeto presentarse al CONGRESO MÉDICO MEXICANO, hubo necesidad de darlo á la imprenta, con lo que se había reunido hasta el 15 de Septiembre.

La idea de hacer una publicación anual que contenga todo lo que la práctica de la clase médica mexicana haya sancionado con su experimentación, la creo útil, porque trae un cambio de conocimientos entre los médicos. Cada uno sabe, y en su práctica ha podido observar, la acción más ó menos eficaz de sustancias

conocidas; pero la asociación con otras sustancias, las dosis y condiciones de aplicación, vienen á formar en cada médico un conocimiento especial, una terapéutica individual que en nada se parece á la de sus compañeros. Los que ejercen en el campo tienen ocasión de conocer y valorizar la aplicación médica de plantas indígenas, que una vez comprobada su utilidad, entrarán en la terapéutica: No es otra la historia del Pambotano y de la Contrayerba; y como éstas hay muchas otras plantas dignas de estudio y cuyas aplicaciones médicas no conocemos, porque no hay un cambio de ideas entre los miembros de nuestra clase, y el compañero que llega á adquirir un conocimiento importante no tiene medio de generalizarlo. Si los tratamientos y fórmulas que tan grande y merecida fama les dieron á Jiménez, á Lucio, á Ortega, á Vértiz, á Montes de Oca, y á tantas notabilidades como hemos tenido, hubieran quedado consignados en algún libro, cuánta enseñanza nos darían, qué útil nos sería consultar á cada momento su sabia experiencia, pero desgraciadamente son muy pocas las fórmulas que de ellos conocemos, porque las daban á conocer en un grupo reducido y no tenían la publicidad necesaria para que todo el cuerpo médico las utilizara.


Como el pensamiento de formar esta obra ha sido bien aceptado, me propongo aumentar el libro cada año, con lo que tengan á bien remitirme los compañeros.

Siendo la primera publicación, en su género, que se hace en México, he tropezado con muchas dificultades en esta primera edición, pero adquiridas ya relaciones con la mayor parte de los médicos del país,

disponiendo de más tiempo; y sobre todo fiado en la eficaz ayuda que cada uno me há ofrecido para las ediciones siguientes, creo que estas serán mayores que la presente, que á pesar del poco tiempo de que se disponía, contiene fórmulas muy importantes por su novedad y porque han sido comprobadas por la experiencia de respetables compañeros.

México, Diciembre de 1892.

Dr. Guillermo Parra.





FORMULARIO DE LA FACULTAD MEDICA MEXICANA.

Abcesos.

Dr. Emilio Polo.

Puebla.

Abceso mamario (mamitis.)

Tintura de phytolaca 8 gotas.

Agua.—gram. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Pomada de unguento doble y cataplasmas emolientes al pecho.

Abceso de hígado.

Dr. M. Mucél.

México.

Puncionar con el aspirador; pero solamente en caso que el abceso no se haya abierto espontáneamente por otra parte.

Aborto.

Dr. Demetrio Mejía.

México.

Aborto incompleto.

Siempre que la matriz no contenga grandes frag-

mentos y por cualesquiera causa no se pueda hacer la raspa, se emplearán inyecciones calientes de solución fenicada ó boricada, de tres á cuatro en las 24 horas.

Cada dos horas 20 gotas de solución de ergotina de Ivon; así no hay infección, ni calentura ni síntoma alguno alarmante.

Este tratamiento fué publicado y discutido en la Gaceta Médica y sostenido después por los parteros de Venezuela en la Unión Médica, año IV pág. 15 núm. 119.

Dr. F. Zárraga.	México.
Agua de azahar.....	gram. 100. 00
Tintura de vivurno prunifolio.....	„ 8. 00
Sulfato de morfina.....	„ 0. 05
Jarabe simple.....	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada sopera cada media hora. Esta fórmula ha dado muy buenos resultados, conteniendo el aborto, aún en los casos en que el cuello de la matriz estaba ya dilatado.

Dr. D. Molinar.	Parral.
Agua simple.....	gram. 120. 00
Clorato de potasa.....	„ 1. 00
Jarabe de cloral.....	„ 40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.
Lavativas laudanizadas.

Aceite de hígado de Bacalao.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.

En todos los casos en que hay que administrar el aceite de hígado de Bacalao ó sus emulsiones, usa con buen éxito el aceite de tortuga. Es más barato y abunda en la Baja California.

Acnea.

Dr. Aurelio Perez. La Piedad. (Michoacán.)

Sulfuro de calcio gm. 0. 30

Azúcar „ 4. 00

En 15 papeles.

Cuatro papeles repartidos en el día.

Dr. E. Lier. México.

En la acnea rosásea.

Sublimado de mercurio gm. 0. 50

Agua destilada „ 160. 00

Agua destilada de laurel cerezo. }
Alcohol diluido } de c. c. „ 20. 00

Esencia de menta *X gotas.*

Uso externo.

Locionar los lugares enfermos.

Dr. E. Gutierrez. Guadalupe de Zacatecas.

Agua gm. 200. 00

Subcarbonato de sosa „ 5. 00

Agua de rosas „ 25. 00

Lavatorio 4 ó 5 veces al día.

Vacelina gm. 20. 00

Resorsina.....	„	2. 00
Veratrina.....	„	0. 10

Pomada, ponerla después del lavatorio.

Dr. Salvador F. Alcalá.

Tecolotlán.

Azufre precipitado.....	gram.	10. 00
Glicerina pura.....	„	8. 00
Alcohol alcanforado.....	„	12. 00

Uso externo.

Aplicarlo todas las noches sobre la erupción.

Dr. Juan C. Villaseñor

Morelia.

Naftol (beta).....	gram.	10, 00
Alcanfor.....	„	10, 00
Vacelina.....	„	10, 00
Azufre.....	„	50, 00
Jabón negro.....	„	15, 00
Carbonato de cal.....	„	5, 00

Pasta.

Aplicar esta pasta por solo 15 minutos.

Otra

Resorsina.....	gram,	de 2 á 5, 00
Oxido de Zinc.....	„	5, 00
Almidon.....	„	5, 00
Vacelina amarilla.....	„	10, 00

Pomada.

Aplicarla dos veces al día.

Acnea sebácea.

Dr. Miguel Cordero. México.

Vacelina blanca.....	gram.	30. 00
Precipitado blanco.....	„	4. 00
Bisulfuro rojo de mercurio.....	„	1. 00

Pomada.

Untar la pomada dos veces al día en el lugar de la erupción después de lavar con jabón negro.

Adinamia.

EN LOS TIFOIDEOS.

Dr. L. Arroyo. San Angel.—Distrito Federal.

Fricciones violentas en todo el cuerpo, con un algodón mojado en vinagre aromático medicinal y envolviendo inmediatamente el cuerpo con una sábana.

Afecciones catarrales de las vías respiratorias.

Dr. Federico Cota. La Paz.—Baja California.

Hojas de jaborandi.....	gram.	4. 00
Agua.....	„	120. 00
Hágase cocimiento.		
Añádase: Cognac ó mexcal.	„	20. 00

*Una toma.***Aftas.**

Dr. D. Molinar. Parral.

Agua ó miel.....	gram.	60. 00
Borato de sosa.....	„	10. 00
Clorhidrato de cocaina.	„	0. 10

Toques.

Agalaccia.

Dr. Julio Córdova.

Encarnación.—(Jalisco.)

La agalaccia sea inmediata al parto ó algunos meses después, aun en mugeres que habían sufrido de falta de secreción láctea en sus partos anteriores:—20 gotas de extracto fluido de jaborandi cada dos horas, en un poco de leche ó de agua azucarada, hasta conseguir el efecto.

Alcoholismo.

Dr. M. Mucél.

México.

Para combatir la hipostenia que sobreviene cuando se ha suprimido el uso del alcohol, emplea además de la estriknina á dosis creciente, hasta sus efectos fisiológicos, las hojas de Damiana de California y la hidroterapia.

Algodoncillo.

Dr. José Luna.

Autlan.—(Jalisco.)

Naftol (beta).....	gram.	0. 15
Aceite de olivo.....	„	2. 00
Solución de goma.....	„	80. 00
Subnitrato de bismuto.....	„	2. 00
Laúdano Sydenham <i>de una á dos gotas.</i>		
Jarabe.....	„	20. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Alimento para niños.

Dr. Jesús Villagran.

México.

Usa con buen resultado el alimento de Wagner, en niños que por cualesquiera circunstancia no pueden alimentarse con nodriza, recomendando que no esté

adulterado; esto se conoce en la presencia de puntos negros y verdes, en la formación de masas compactas y no polvo fino y en la fetidez muy marcada.

Dr. Cárlos M. Garza.

 San Pedro de las Colonias.

Partes iguales de leche de vaca y atole de avena marca Scotch Rolled White Oats

Alopesia.

Dr. E. Lier.

México

Spray con:

Resorsina	5. 00
Acido salisilico	2. 00
Alcohol diluido	90. 00
Alcohol de menta	90. 00
Tintura de cantáridas..	10. 00

Dr. Aurelio Pérez.

 La Piedad, Michoacán.

Bálsamo Fioraventi	90. 00
Tintura de Baumé	5. 00
Idem. de cantáridas...	5. 00

Para fricciones en la cabeza previamente rasurada

Dr. Vicente Sierra.

Apam.

Cocimiento fuerte de capitaneja (*Bidens heterophylla*) prefiriendo la que se cosecha en Orizaba.

Locionar diariamente la cabeza.

Dr. David Peña.

Monterey.

Salol	1. 00
Acido gálico	1. 00
Vacelina aromatizada...	30. 00

Pomada

Una vez al día

Amenorrea.

Dr. M. Medal. Tacámbaro.—E. de Michoacan.

Infusión de tilia, borraja y raíces de apio.	grm. 250.	00
Borato de sosa de 4 á.....	„	8. 00
Jarabe de corteza de naranja.....	„	30. 00

Cucharadas.

Tres cucharadas cada hora, cuatro ó cinco dias antes de la menstruación.

Dr. José M^a Dávila. Mazatlán.

Tintura de ruda.....	grm. 4.	00
Idem. „ azafrán.....	„ 4.	00
Cocimiento de canela.....	„ 150.	00
Jarabe de opio.....	„ 30.	00

Cucharadas.

Para tomar una cucharada cada media hora:

Dr. Pablo Gama. México.

Ergontina de Bonjean.....	grm. 1.	00
Azafrán español.....	„ 0.	25
Podofilina.....	„ 0.	10

Conserva de rosas c. b.

En 20 píldoras

Cuatro días antes del probable reconocimiento menstrual empesar tomando tres píldoras repartidas en el día.

Baños de pies sinapisados y buena alimentación.

Dr. Desiderio G. Rosado. Comalcalco.

Bicromato de potasa.....	grm. 0.	10
--------------------------	---------	----

Percloruro de fierro líquido...	„	14. 00
Tintura de iodo.....	„	28. 00

Gotas.

De cinco á diez gotas cuatro veces al día en agua gomosa ó emulsión.

Amigdalitis crónica.

Dr. Pablo Amores.

Tabasco.

En los niños la amigdalotomía es de un uso corriente y puede considerarse como una operación casi inofensiva, bien sea con el bísturi ó con el amigdalotomo; pero no sucede lo mismo con el adulto en el que las cosas suelen pasar de una manera muy diferente. Con la cocaína y el termocauterio como se ha propuesto se facilita grandemente la operación.

El procedimiento que mejores resultados ha dado en manos del autor, es el siguiente: embrocaciones en las amígdalas tres veces con interválos de cinco minutos, de la siguiente solución:

Aceite de almendras dulces....	gram.	5. 00
Clorhidrato de cocaína.....	„	0. 05

Embrocaciones

Conseguida la anestesia, se toca cada glándula cuatro ó seis veces con el cuchillo agudo del termocauterio, al rojo vivo, de manera que éste penetre dos ó tres milímetros en el espesor de la glándula, por distintos lugares, resultando otras tantas escaritas que caen después de algunos días.

En los dos primeros días el enfermo debe gargarizar con algún líquido anticéptico.

Cada ocho ó doce días puede repetirse la cauterización, hasta que las amígdalas desaparezcan totalmente.

Este procedimiento es seguro é indoloro; pero debe obrarse con sumo cuidado por la proximidad de los gruesos vasos del cuello.

En los niños emplea como anestésico el cloroformo y opera durante el sueño.

Amputación de las falanges.

Dr. Guillermo R. Servín. Triunfo, Baja California.

Se hace una incisión en la cara dorsal, empezando exactamente en el punto donde debe cortarse el hueso, comprendiendo la piel, el tejido celular y parte de la capa muscular. Otra incisión en la cara palmar, partiendo del punto diametralmente opuesto y siguiendo ambas incisiones la dirección del eje del dedo. La longitud de estas incisiones será de poco más de un centímetro. A la extremidad de dichas incisiones se corta la piel circularmente; se retrae ésta como en el método circular, se profundizan las incisiones hasta el hueso y se disecan los colgajos en toda su extensión. Se pone la compresa y se asierra el hueso.

Ligaduras y suturas se harán con catgout.

La primera curación ligeramente húmeda y cubierta de algodón salicilado. Al tercer día se quitan las suturas y se continúan las curaciones por el método de Lister.

Los resultados obtenidos por éste método son superiores á los que han dado las desarticulaciones.

Anasarca.

Dr. Manuel Carmona y Valle.

México.

Por lesiones cardiacas

Agua.....	gram.	200.	00
Citrato de cafeina.....	„	1.	00
Benzoato de sosa.....	„	2.	00
Cognac de buena calidad.....	„	50.	00

Tres tomas

Repartidas en el día.

Suele aumentar la orina de una manera fabulosa.

Anemia.

TÓNICO RECONSTITUYENTE.

Dr. A. J. Carbajal.

México.

Prefiere á todas las preparaciones ferruginosas el jarabe de ioduro de fierro de la Farmacopéa Británica, una ó dos cucharadas en el día. Es muy eficaz y el estómago lo tolera muy bien.

Agua destilada.....	gram.	20	00
Salicilato de fierro.....	„	1.	00

Inyecciones

Una inyección cada tres ó cuatro dias, en los casos en que está indicado el uso de los ferruginos.

Tiene el inconveniente de ser dolorosa la inyección y dejar algunos endurecimientos subcutáneos.

Anemia.

Dr. Gárlos M. Garza:

San Pedro de las Colonias,
Coahuila.

Vino Jerez.....	gram.	300.	00
Tintura de quina roja.....	„	1.	50

Tintura de genciana.....	gram.	10. 00
Idem. de colombo.	„	10 00
Idem. de cardamomo.....	„	10. 00
Fosfato de fierro citroamoniacal	„	4. 00

Una copita licorera media hora ántes de cada alimento.

Dr. Enrique Herrera y Moreno.

Córdoba.

Anemia palustre.

En las riberas del río Blanco, especialmente se observa una forma de anemia con edemas, soplos suaves en los focos de auscultación del corazón, palidéz peculiar de los legumentos. Vaso crecido notablemente y un estado que no se domina con el tratamiento ordinario del paludismo, ni con el tratamiento de la anemia, si antes no se activa la circulación con la digital, esparteina ó alguno de sus sucedáneos.

Dr. D. Molinar.

Parral.

Protocloruro de fierro.....	gram.	1. 00
Conserva de rosas c. b.		

Para 20 píldoras

Dos ó tres píldoras diarias.

Dr. Ernesto Chávez.

Córdoba.

Fierro reducido.....	gram.	1. 00
Acido arcenioso.....	„	0. 03
Sulfato de estriquina.....	„	0. 03

En 30 píldoras

Una píldora despues de la comida y otra despues de la cena.

ANEMIA.

Dr. Lázaro Ortega. México.

Agua destilada..... grm. 120. 00

Citrato de fierro..... „ 4. 00

Cucharadas.

Una cucharada antes de las comidas.

Los niños la toleran muy bien.

Dr. Francisco de P. Crespo. Huamantla.

Tartrato férrico potásico..... grm. 10. 00

Solución arcenical de Fowler..... „ 10. 00

Disuélvase y filtrese.

Gotas

De 10 á 20 gotas por día.

Dr. R. Ruiz. Salvatierra.

Polvos de quina..... grm. 1. 00

Carbonato de fierro..... „ 1. 00

Arceniato de estricnina..... „ 0. 01

Sacasuso de canela, c. b.

Para 12 píldoras.

Una píldora después de comer.

Dr. Leandro Arroyo.—San Angel, Distrito Federal.

Masa de Blaud..... grm. 1. 20

Extracto genciana..... „ 1. 80

Idem valeriana..... „ 0. 60

Idem beleño..... „ 0. 40

En 24 píldoras.

Una píldora antes de cada alimento.—Tres en el día.

Otra.

Peróxido de manganeso.....	gram.	0. 60
Masa de Bland.....	„	1. 20
Extracto de genciana.....	„	4. 00

En 24 píldoras.

Una píldora antes de cada alimento.—Tres en el día.

Dr. Constancio Mota.

Puruándiro.

En la anemia por hemorragia, en la lipotimia y el síncope:

Solución oficinal de trinitrina al centésimo, IV gotas.
Nitrito de amila III gotas.

Para inyección hipodérmica en un gramo de agua, cognac ó éter sulfúrico, según la intensidad del caso.

Dr. Demetrio Mejía.

México

Sulfato de fierro.....	gram.	15. 00
Carbonato de potasa.....	„	15. 00

Goma tragacanto y glicerina de c. c.—c. b.

Para 100 píldoras.

Dos píldoras á media comida, por tres días; luego tres, por tres días; luego cuatro; y así se sigue aumentando de tres en tres días, hasta tomar ocho ó diez píldoras diarias.

El efecto no se hace esperar más de quince días.

Anestesia ocular.

Dr. Agustín Chacón.

México.

Agua destilada.....	gram.	10. 00
Muriato de cocaina de 0. 20 á..	„	0. 40

Colirio.

Otro.

Agua destilada.....	gram.	10. 00
Bicloruro de mercurio.....	„	0. 02
Clorhidrato de cocaina de 0, 20 á..	„	0. 40

Colirio.

Se pueden usar estos colirios para el exámen oftalmoscópico.

Angina catarral.

Dr. Angel Nieto.

Palmarejo.

Miel rosada.....	gram.	30. 00
Acido clorhídrico.	„	2. 00

Toques.

Dos ó tres toques en el día.

Pomada de iodo al exterior ó jabonadura; y gárgaras con agua de limón.

Dr. Eufemio Gutierrez. Guadalupe de Zacatecas.

Salicilato de sosa.....	gram.	4. 00
Clorato de potasa.....	„	8. 00
Nitrato de pilocarpina.	„	0. 05

En 12 obleas Limousin.

Una cada hora.

Cocimiento de cebada perla..	gram.	300. 00
Salol.....	„	6. 00
Bicarbonato de sosa.....	„	4. 00
Miel de moras.....	„	60. 00

Gárgaras cada 2 horas.

Dr. Manuel F. Ocampo,

Pinos.

Cocimiento de hojas de coca..	gram.	500. 00
-------------------------------	-------	---------

Clorato de potasa.....	gram.	10. 00
Láudano de Sydenham.....	„	2. 00

Gárgaras.

Dr. Juan Collantes y Buenrostro. México.

Agua simple....	gram.	120. 00
Polvo de borax..	„	2. 00
Tintura de árnica,	„	4. 00
Jarabe de azahar.	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. M. Mucél. México,

Antipirina.....	gram.	2. 00
-----------------	-------	-------

En 4 papeles ú obleas.

Una cada cuatro horas.

Toques con solución al 4 por ciento de clorhidrato de cocaina, agregado ó nó de biborato de sosa.

Dr. E. Gutierrez.—Guadalupe, Estado de Zacatecas

ANGINA CRÓNICA HIPERTROFIADA.

Glicerina.....	gram,	20. 00
Ergotina de Bonjean....	„	5. 00
Tintura de iodo.....	„	3. 00
Cocaina.....	„	0. 33

Toques,

Para dar tres toques diarios.

Dr. Ramón N. Prado,

México.

ANGINA GLANDULOSA.

Glicerina grm. 15. 00

Sulfato de cobre „ 3. 00

Toques.

Tres toques en el día.

Dr. David Peña,

Monterey,

ANGINA CATARRAL.

Fosfato de sosa grm. 10. 00

Salol „ 2. 00

Cocimiento de crameria „ 300. 00

Gárgaras.

Gargarizar frecuentemente durante el día.

Dr. Miguel Cordero.

México.

ANGINA TONSILAR.

Clorato de potasa grm. 20. 00

Bicarbonato de sosa „ 20. 00

En 20 papeles.

Un papel en 200 gramos de agua hervida, tibia para hacer gárgaras frecuentes con este líquido.

Dr. Manuel de Anaya.

Guanajuato.

Agua destilada grm. 40. 00

Acido clorhídrico „ 6. 00

Percloruro de fierro líquido. „ 8. 00

Toques.

Dos ó tres veces en el día.

Dr. Ciro M. Santelices.	Querétaro.
Acido fénico.....	gram. 2. 00
Alcanfór.....	„ 1. 00
Aceite de olivo.....	„ 8. 00
Glicerina.....	„ 8. 00
	<i>Toques.</i>

¶ Tres veces al día.

Angina crónica.

Dr. A. Aizpuru.	México.
Glicerina.....	gram. 50. 00
Solución oficial de percloruro de fierro.	gram. 50. 00
	<i>Toques.</i>

Angina cremosa.

Dr. E. Gutierrez.	Guadalupe, E. de Zacatecas.
Miel simple.....	gram. 20. 00
Acido bórico.....	„ 2. 00
Creolina.....	„ 0. 20
	<i>Toques.</i>

Para dar toques cada cuatro horas, previo lavado con solución fénica al $\frac{1}{2}$ %.

Angina ulcerosa.

Dr. M. Medal.	Tacámbaro, E. de Michoacán.
Antipirina.....	gram. 2. 00
Salicilato de sosa, de 2 á	„ 4. 00
Cocimiento de cebada.	„ 350. 00
Miel rosada.....	„ 30. 00
	<i>Gárgaras.</i>

Para hacer gárgaras varias veces al día.

Angina de pecho.

Dr. Francisco Montes de Oca.	México.
Usaba la fórmula siguiente:	

Extracto de belladona.... grm. 0. 15

Cianuro de potasio..... „ 0. 05

Para 15 píldoras.

Una ó dos por día en los días que no hay acceso y cuando este viene, una cada dos horas, y sobre la región precordial:

Bálsamo tranquilo.... grm. 100. 00

Cianuro de potasio.... „ 1. 00

Friega.

Dr. Francisco D. Maldonado. Aguascalientes

Para evitar la vuelta ó repetición del acceso, usa:

Sulfato de quinina.... grm. 2. 00

Acido arcenioso..... „ 0. 03

Para 30 píldoras.

Dos ó tres píldoras diarias.

Dr. Demetrio Molinar. Hidalgo del Parral.

Agua destilada.... grm. 50. 00

Ioduro de potasio.. „ 0. 50

Una toma.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

Tintura de Spigelia..... VIII gotas.

Bromuro de potasio..... grm. 1. 00

Agua endulzada..... „ 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra.

Tintura cactus grand..... X gotas.

Nitroglicerina al centésimo.. VI „

Agua..... grm. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra.

Anticamnia..... grm. 1. 00

En 10 papeles.

Un papel cada hora.

Angina de pecho (falsa).

Dr. Jesús Villagrán.

México.

Infusión de hojas de naranjo..... grm. 120, 00

Bromuros de potasio..... |

Idem | „ sodio..... } de c c, „ 2. 00

Idem „ amonio..... |

Hidrato de cloral..... „ 4. 00

Jarabe de corteza de naranja amarga.. „ 40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta el efecto.

Angina diftérica.

Dr. Manuel F. Ocampo.

Pinos, E. de Zacatecas.

Acido fénico puro..... grm. 1. 00

Alcanfór..... „ 2. 00

Solución de cocaina al 2 p.8 „ 5. 00

Glicerina..... „ 30. 00

Toques.

Para dar toques con un algodón cada dos horas

Dr. Juan N. Campos.

Toluca.

Glicerina..... grm. 20. 00

Borato de sosa... „ 1. 00

Acido salisílico.. „ 0. 30

Toques.

Tocar varias veces al día, cambiando en cada toque la esponja con que se toque.

Un centígramo de sulfuro de calcio cada hora.

Anorexia.

Dr. José Torres,

México.

La tintura de *Callea zacatechichi* (simonillo, zacatechichi) es aperitivo eficaz é inocente, que se emplea en casos de anorexia, no dependiente de lesión material grave del estómago, en dosis de 30 ó 40 gotas una hora antes de cada alimento.

Antrax.

Dr. M. Mucél.

México.

Prefiere la no intervención quirúrgica: usa cataplasmas ó defensivos resolutivos y antisépticos.

Hacer con las pinzas tracciones suaves hasta dejar limpio de colgajos purulentos y luego hacer una curación con vaselina, iodoformada al 10 %, unida á la vaselina con fenato de sosa al 5 %.

Dr. Federico Coto.

La Paz, Baja California.

Desde luego hacer una incisión que comprenda todo el espesor de la piel y en seguida un lavatorio (con jeringa) en el fondo de la incisión con el líquido siguiente:

Agua destilada.....	gram.	500.	00
Acido carbólico.....	„	10.	00
Extracto de Campeche..	„	15.	00
Alcohol alcanforado.....	„	60.	00
Tintura de iodo.....	„	15.	00

Lavatorio.

Cuando se han formado la serie de agujeritos que ordinariamente se ven en las antrax, se hará el lavatorio por todos estos trayectos,

Para disminuir la dureza se aplica un empaque de algodón empapado en alcohol alcanforado.

Dr. Pablo Amores,

Tabasco.

Inyecciones hipodérmicas de cocaina al rededor del tumor, no pasando de dos centígramos de sal en los tumores del cuello y cabeza, por temor á la proximidad del cerebro. Conseguida la anestesia se harán incisiones extensas en todo el tumor y luego una cauterización, sobre toda la parte gangrenada, con un pincel empapado en ácido fénico.

La curación debe consistir en una capa de polvo de alcanfor directamente en contacto con los tejidos, sobre el alcanfor una capa de algodón absorbente bien empapada en aceite de olivo fenicado al 5 %, esta capa debe cubrir el tumor y sobresalir en una extensión de tres á cuatro centímetros en su derredor, sobre el algodón se pone el protector de Lister, y sobre éste una gruesa capa de algodón salicilado ó iodoformado, su vendaje con vendas iodoformadas.

Este apósito debe cambiarse cada veinticuatro horas los primeros días, lavando muy bien las heridas con solución fenicada al 2 %.

Cuando toda la parte gangrenada ha caído y que todo queda reducido á una simple ulceración se continuará la curación de la misma manera, pero suprimiendo la capa de alcanfor y el algodón empapado

en aceite fenicado; poniendo en contacto con los tejidos el protector de Lister.

Artritis urica.

Dr. E. Lier, México.

Inyección hipodérmica de piperazidina 0, 10 por dosis y día.

Dr. Octaviano León Navarro. Tangantzícuaro,
E. de Michoacan.

ARTITIS CRÓNICO.

Alcohol á 80°	gram.	240.	00
Alcanfor	„	3.	00
Esencia de trementina	„	30.	00

Friega.

Fricciones en las articulaciones.

Ascarides lumbicoides en los niños.

Dr. Octaviano León Navarro. Tangantzícuaro,
E. de Michoacan.

TUBÉRCULOS DE LA JICAMA DE PUERCO.

Dolichos porcinis ó trifiolácea	gram.	120.	00
Jarabe simple	c. b.		

Para tomar.

Se hace una emulsión con los tubérculos desprovistos de su cubierta coriacea; desecha la pulpa en cocimiento de raíz de poleo (menta pulegium) se le agrega el jarabe y se toma media hora después una onza de aceite de recino.

Dr. José B. López. Campeche.

Cocimiento de spigelia	gram.	120.	00
Carbonato de sosa	„	0.	20

Jarabe de menta grm. 30. 00

Para 3 tomas.

Una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche y al día siguiente en ayunas un purgante de aceite de recino de 45 á 60 gramos.

PARA LOS NIÑOS DE 2 Á 5 AÑOS.

Santonato de sosa grm. 0. 05

Azúcar de leche „ 0. 20

En 3 papeles.

Uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche, y al día siguiente un purgante de maná.

Asficia.

POR LOS GASES QUE SE DESPRENDEN EN LA EXPLOSIÓN DE LA PÓLVORA GIGANTE.

Flagelaciones de agua fría al epigástrico, y desde que el enfermo pueda pasar la medicina; tintura de nuez vómica, diez gotas tres veces al día.

Aristolia cardiaca.

Dr. Francisco Blazquez.

México.

Tintura de estrofantus . . grm. 15. 00

Gotas.

Diez gotas en la mañana y diez en la tarde.

Dr. Francisco M. Arroyo.

Irapuato.

Infusión de digital . . . grm. 120. 00

Dusetino „ 2. 00

Jarabe simple „ 15. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Erasmo O. Romero.	Ozuloama,
Agua destilada	gram. 120. 00
Cafeina	„ 1. 50
Benzoato de sosa	„ 2. 00
Jarabe de cinco raíces.	„ 20. 00
	<i>Cucharadas.</i>

Una cucharada cada hora.

Dr. Manuel Uribe.	México.
Agua	gram. 120. 00
Polvos de hojas de digital.	„ 0. 25
Hágase maceración por 12 horas, fíltrese y añádase	
Oximel escilítico	gram. 30. 00
	<i>2 tomas.</i>

Una toma por la mañana y otra por la tarde. Se repite por cuatro días, se suspende por cuatro y se vuelve á tomar de la misma manera hasta obtener el efecto.

Dr. L. Arroyo.	San Angel, Distrito Federal,
	ASITIS.

La infusión de ortiga, que vulgarmente llaman «ortiga prieta:» un pozuelo en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche.

Asma.

Dr. Pablo Gama,	México.
Tintura de belladona	gram. 0. 25
Idem „ ipecacuana	„ 0. 80
Ioduro de potasio	„ 0. 60
Jarabe simple	„ 20. 00
Agua de lechuga	„ 90. 00
	<i>Cucharadas.</i>

Una cucharada cada dos ó tres horas.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacan.

SINTOMÁTICO DE PADECIMIENTOS PULMONARES.

Ioduro de etila. grm. 2. 00

En 5 cápsulas.

Para tomarlas en el día del acceso y durante los periodos de calma:

Ioduro de sodio. gram. 2. 00

Jarabe de corteza de cidra. „ 100. 00

Cucharadas.

Tres cucharadas en el día.

Dr. Arcadio T. Ojeda Veracruz.

Jarabe de cachimbo (1) gram. 120. 00

Bromuro de potasio. „ 2. 00

Idem. „ sodio. „ 2. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Pedro Acosta. Guadalajara.

Tricloruro de aldeida. grm. 2. 00

Bromuro de potasio químicamente puro 2. 00

Ioduro de potasio. „ 2. 00

Agua de azahar. „ 200. 00

Tintura de belladona. „ 3. 00

Cucharadas.

Cucharada cada media hora ó cada hora. Su autor recomienda esta fórmula como una especialidad

(1) El cachimbo es una planta que se da silvestre en el estado de Veracruz y de la que no se ha hecho la clasificación botánica.

Dr. Francisco D. Maldonado Aguascalientes.

Agua de azahar.....	gram. 130. 00
Ioduro de potasio.....	„ 0. 50
Tintura de lobelía.....	20 gotas.
Jarabe.....	c. b.

Cucharaditas.

Una cucharada cada media hora.

COMO ESPECTORANTE.

Oxido blanco de antimonio.....	gram. 0. 20
Jarabe balsámico.. .. .	„ 40. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

Durante el acceso, una ó dos inyecciones hipodérmicas de medio centígramo de clorhidrato de morfina.

Fuera del acceso; un gramo del ioduro de potasio en una tasa de cocimiento de hojas de naranjo, endulzado dos veces al día; una hora después del desayuno y al acostarse.

Dr. Antonio J. Carbajal. México.

ASMA BONQUICO.

Gránulos dosimétricos de morfina	4.
„ „ „ hiosiamina	1.
„ „ „ arceniato de estriçnina	2.

Una dosis

Repetirla cada media hora. Bastan dos ó tres tomas para calmar la dispnea. Hay que suspender obtenido el efecto. Seguir con los gránulos de estriçnina en las comidas y con los de hiosiamina en la noche al acostarse.

Dr. Enrique Herrera Moreno	Córdoba.
Iodoformo de 05 á.....	gram. 1. 00
Cafeina.....	„ 1. 00
Extracto de belladona de 0. 10 á	„ 0. 20
<i>En 20 píldoras.</i>	

Una píldora cada hora.

Cuando el ataque es muy brusco una inyección de morfina.

Astenia cardiovascular.

Dr. Miguel Cordero	México.
Infusión de folículos de sen.....	gram. 500. 00
Bitartrato de potasa.....	„ 32. 00
Tártaro emético	„ 0. 05
Jarabe de maná.....	„ 32. 00
<i>Pozuelos.</i>	

Un pozuelo cada hora en combinación con los tónicos cardiacos (Dr. M. Jiménez.)

Atonía cardiaca.

Dr. Jesús Villagrán.	México.
Vino de Lacto-fosfato de cal de Dusarte.	
Otra:	

Benzoato de cafeina.....	gram. 2. 00
Sulfato de estriquina.....	„ 0. 01

Para 20 cápsulas.

Una cápsula cada dos ó tres horas.

Otra.

Perlas de esparteína de Houdé.

Ataxia.

Dr. Emilio Polo.	Puebla
------------------	--------

DOLORES FULGURANTES EN LOS ATAXICOS.

Tintura de gelcemiun..... 20 gotas.

Agua..... grm. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Anticamnia..... grm. 1. 00

En 10 papeles.

Un papel cada hora.

Atrófias hepáticas.

Dr. Manuel Carmona y Valle.

México.

Se combaten los accidentes dispépticos con las siguientes píldoras:

Masa azul inglesa..... grm. 0. 50

Extracto de hiel de buey.... „ 2. 00

Extracto de opio..... „ 0. 20

En 20 píldoras

De tres á cuatro píldoras diarias, después de los alimentos.

Balanopostitis.

Dr. Miguel Cordero.

México.

Agua destilada..... grm. 200. 00

Nitrato de plata cristalizado „ 2. 00

Para la curación

Hacer cada cuatro horas una inyección entre el prepucio y el glande, terminando la curación con otra inyección de agua hervida.

Blefaritis.

Dr. E. Gutierrez.

Guadalupe de Zacatecas.

Vaselina..... grm. 10. 00

Lanolina..... „ 10. 00

Aristol de dos á.... „ 4. 00

Pomada para los párpados.

Dr. F. López.

México.

BLEFOSITIS CRONICA.

Vaselina blanca	gram.	5. 00
Lanolina	"	5. 00
Zozoyodol sódico	"	0. 02
Oxido amarillo de mercurio . .	"	0. 02

*Pomada para los párpados.***Blefarospasmo.**

Dr. Agustín Chacón.

México.

Agua destilada	gram.	5. 00
Muriato de cocaina	"	0. 20
Sulfato de atropina	"	0. 02

*Colirio.***Blenorragia.**

Dr. Pedro Peña.

Zamora. E. de Michoacán.

Glicerina	gram.	40. 00
Acido tánico	"	1. 00
Agua	"	40. 00

Inyecciones.

Se inyecta en la uretra una media geringa una vez al día, al acostarse el enfermo. Debe retener la inyección cinco minutos.

Dr. Rafael López.

México.

Agua destilada	gram.	500. 00
Bicloruro de mercurio	"	0. 05
Alcohol	c. b.	

Inyecciones.

Para inyectar la uretra con sonda de doble corriente y estando el líquido á una temperatura de 40°.

En la mujer:

Agua destilada.....	gram.	250.	00
Sulfato de zinc.....	„	2.	50
Clorhidrato de cocaina.....	„	1.	00

Inyecciones.

Dos veces al día.

Dr. Francisco D. Maldonado. Aguascalientes.

Sulfato de zinc.....	} de c. c. .	gram.	1. 00
„ „ fierro.....			
„ „ cobre... ..			

Agua de rosas.....	„	200.	00
--------------------	---	------	----

Inyecciones.

Una en la mañana y otra en la tarde.

Dr. Carlos M. Garza. S. Pedro de las Colonias. E. de Coahuila.

Agua destilada de rosas.....	gram.	300.	00
Bicloruro de mercurio.....	„	0.	15
Sulfato de zinc.....	„	0.	30
Alcohol.....	c. b.		

Inyecciones uretrales.

Tres veces al día.

Dr. Gabriel Chavez. Tasco.

Recina de copaiba.....	gram.	4.	00
Bromuro de alcanfor.....	„	0.	40
Extracto tebaico.....	„	0.	10
Polvo de orozus.....	c. b.		

Para 24 píldoras.

Una píldora cada tres ó cada cuatro horas.

Dr. Miguel Cordero.

México.

BLENORRAGIA URETRAL INSIPIENTE.

Vino rojo de suprema calidad grm. 200. 00

Tanino puro „ 2. 00

Inyecciones.

Una inyección uretral cada tres horas orinando previamente.

Dr. Enrique M. González.

Tequila.

Agua grm. 200. 00

Glicerina „ 60. 00

Tanino „ 2. 00

Resorsina „ 0. 50

Alcohol de Gaulteria „ 1. 00

Láudano Sydenham „ 3. 00

Inyecciones.

Una inyección tres veces al día, disminuyendo según el grado de la afección.

Dr. Juan C. Villaseñor.

Morelia

Piridina grm. 1. 20

Agua destilada „ 260. 00

Inyecciones.

Una inyección uretral en la mañana y otra en la tarde.

Otra:

Bálsamo de copaiba grm. 4. 00

Agua destilada „ 180. 00

Una yema de huevo

Emulsióñese y agréguese:

Extracto de belladona.....	gram.	0.50
Sulfato de zinc.....	„	0.50
Agua de laurel cerezo.....	„	4.00

Inyecciones.

Una inyección uretral cuatro veces al día.

Dr. Constancio Mota Puruándiro.

Permanganato de potasa.....	gram.	1.00
Agua.....	„	1000.00

Inyecciones.

Una inyección uretral nueve veces al día en el periodo agudo y una cada vez que haya escozor en el periodo crónico.

Dr. Manuel F. Ocampo. Pinos.

Agua destilada de lechuga.....	gram.	250.00
Sulfoictiolato de amonio :.....	„	10.00

Inyecciones.

Una inyección uretral cuatro veces al día

Al interior: un gramo de ictiol con otro de gen-
ciana cada 24 horas.

Dr. Federico Abrego México.

EN LA FORMA CRONICA.

Instilaciones uretrales tres veces al día con un gramo de la siguiente solución

Agua destilada.....	gram.	100.00
Acetato de plomo.....	„	4.00
„ „ zinc.....	„	4.00

Dr. M. Mucél

México.

En la forma crónica usa las inyecciones uretrales de óxido piroagálico, permanganáto de potasa y sulfato de zinc á dosis convenientes. Recomienda el susensorio y un buen régimen distético.

Dr. Francisco Hernández

Medellín.

En la forma crónica usa al interior como bebida el cocimiento de raíz rascapetate (30 para 1500) bejuco que se dá en los terrenos bajos de Medellín y del cual no se ha hecho la clasificación; y para inyecciones,

Agua destilada	gram.	60. 00
Sulfato de Zinc	,,	0. 04
Agua gomosa y agua de laurel cerezo de c c		15. 00
Tintura tebaica	,,	7. 00

Inyecciones

Tres inyecciones uretrales en el día.

Blenorragia crónica.

Dr. E. Lier.

México.

Lisol de grm. 0 05 á	gram.	0. 50
Extracto de hidrastis	,,	5. 00
Agua destilada	,,	100. 00

Inyecciones uretrales.

Dr. J López Tello

Amecameca E. de México.

Jarabe de pino	} de c. c.	gram. 30. 00
„ „ opio		
Bálsamo de copaiba	,,	4. 90

Cucharadas.

Tres ó cuatro repartidas en las 24 horas.

Agua destilada..... grm. 100. 00
 Nitrato de plata cristalizado.. „ 0. 05

Inyecciones.

Una inyección uretral, cada 24 horas.

Dr. Pedro Peña Zamora. E. de Michoacán.

Agua destilada..... grm. 100. 00
 Salicilato de mercurio..... „ 0. 05

Inyecciones.

Tres en el día.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Agua..... grm. 200. 00
 Sulfato de zinc..... „ 1. 00
 Bálsamo negro..... „ 4. 00

Inyecciones.

Una inyección uretral tres veces al día.

Otra:

Iodoformo..... grm. 2. 00
 Manteca de cacao. c. b.

Para 15 papeles.

Una candelilla en la uretra tres veces al día.

Dr. Desiderio G. Rosado. Comacalco, Tabasco.

Esencia de cubeba, 15 gotas.

Polvo fresco de mático de Tabasco.... grm. 3 75

En 15 cápsulas

De cuatro á ocho cápsulas por día.

Permanganato de potasa..... grm. 0. 20
 Sulfato de zinc..... „ 1. 00

Agua..... „ 345. 00

Inyecciones.

Cuatro inyecciones uretrales en el día, procurando que sea bañada toda la uretra.

Bromismo.

Dr. Francisco D. Maldonado. Aguascalientes.

Para evitar la erupción que produce el uso continuado del bromuro de potasio, dar el licor arsenial de Towler.

Bronconeumonía.

Dr. M. Mucel. México.

Medicina sintomática adecuada á la constitución del enfermo.—Tónicos del corazón.—Revulsivos cuando hay tendencia á la propagación del padecimiento ó á la no resolución franca.—Fosfuro de zinc con extracto de quina al fin del primer septenario.

Extracto de quina..... grm. 1. 50

Fosfuro de zinc..... „ 0. 75

En 15 píldoras.

Una píldora cada tres horas.

En la convalecencia vino de quina y colombo de Bellini.

En los niños cuando la bronquitis predomina: un milígramo de calomel cada dos horas y sudoríficos con pilocarpina, vigilando mucho sus efectos.

Dr. José Torres. México.

EN LOS NIÑOS.

Calomel..... grm. 0. 10

Fosfuro de zinc „ 0. 01
Azúcar ó Dower.

En 10 papeles.

Un papel cada dos ó tres horas. Dar siempre un tónico; de preferencia sulfato de estriquina en gránulos sellados ó la cafeina disuelta en benzoato de sosa. Casi nunca usar revulsivos y si se usan preferir á los vegigatorios el bioduro de mercurio.

Dr. Pedro Acosta.

Guadalajara.

EN LOS NIÑOS.

Polvos de ipecacuana grm. 1. 00
Tintura de Brionía 3 gotas
Idem de digital 3 „
Jarabe de lactucario grm. 60, 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cafetera cada hora.

Proporcionar las dosis á la edad del niño. Revulsivos locales con vegigatorios volantes ó colodión cantaridado ó emplasto de thapsia gargánica.

Bronquitis catarral.

Dr. Francisco Fernández.

Medellín.

Polvos de Dower grm. 2. 00
Idem eucaliptus „ 2. 00
Agua gomosa „ 125. 00
Jarabe tolú „ 20. 00
Idem codeina „ 20. 00

Cucharaditas.

Una cada dos horas.

Otra:

Iodo puro.....	gram.	1. 00
Creosota.....	,,	1. 00
Bálsamo de tolú.....	,,	3. 00
Masa de Synoglosa.....	,,	2. 00

En 50 píldoras.

Una cada dos horas.

En la convalecencia.

Arseniato de sosa.....	gram.	0. 10
Agua destilada.....	,,	140. 00

Cucharaditas.

Una antes de cada comida.

Dr. José María Dávila.

Mazatlán.

Antipirina.....	gram.	2. 00
Extracto fluido de jaborandi....	,,	4. 00
Polvos de Dower.....	,,	1. 00
Infusión de borraja.....	,,	100. 00
Jarabe de tolú.....	,,	40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Angel Nieto.

Palmarejo.

FORMA CONGESTIVA.

Infusión de hojas de eucaliptus..	gram.	300. 00
Kermes mineral.....	,,	0. 20
Jarabe de morfina.....	,,	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Manuel F. Ocampo.

Pinos.

Un gramo de eucaliptina de Lebrun en inyección hipodérmica cada veinticuatro horas. Se puede continuar el tratamiento por un mes sin inconveniente.

Dr. M. Mucel.

México.

En la forma crónica que producen los enfisemas.

Gránulos de iodoformo de un milígramo.

Idem de sulfuro de calcio.

Idem de sulfato de estricnina de $\frac{1}{2}$ milígramo.

Uno de cada clase cada dos horas.

Agua.....	gram.	100. 00
Extracto de polígala...	,,	1. 00
Benzoato de sosa.....	,,	4. 00
Alquitran de Guyot....	,,	5. 00
Jarabe codeina.....	,,	45. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora ó cada dos horas según lo abundante de la espectoración. Revulsivos de tela de thapsia gargánica ó de tela de cantaridato de sosa, si hay indicacion, cuidando los órganos urinarios. Al usar el parche de thapsia, no calentarlo, cubriéndolo con un pedazo de tela emplástica más grande para fijarla y limitar su acción; y al quitarlo poner cold-cream para calmar la comezón.

Cuando la bronquitis toma una forma asmática, añadir á las cucharadas agua de laurel cerezo y tintura de marihuana á dosis convenientes.

En la convalecencia dar ioduro de potasio.

Dr. Federico Abrego.

México.

BRONQUITIS CRONICA.

Goma amoniaco..... grm. 1. 00

Polvos de Dower..... „ 1. 00

En 15 píldoras.

Una píldora cada hora.

Dr. G. Chávez.

Tasco.

POCION ESPECTORANTE.

Cocimiento de yerba dulce y de

polígala..... grm. 125. 00

Aceite de almendras dulces.... „ 15. 00

Polvos de Dower..... „ 0. 25

Jarabe balsámico..... c. b.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Francisco D. Maldonado.

Aguascalientes.

PARA CALMAR LA TOS CUANDO ES MUY FUERTE.

Agua de laurel cerezo.. grm. 1. 00

Polvos de Dower..... „ 0. 40

Infusión de poligala.... „ 120. 00

Jarabe balsámico..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Carlos M. Garza. S. Pedro de las Colonias, Coahuila.

EN LOS NIÑOS.

Poción gomosa..... grm. 50. 00

Jarabe de tolú..... „ 50. 00

Extracto de belladona..	„	0.02
Tintura de ipeca.....	„	1.00
Elixir paregórico.....		5 gotas

Cucharaditas.

Una cucharadita cada dos horas para los niños menores de un año y doble cantidad para los mayores de uno.

Dr. Alfredo Higareda. Huexotzingo, Puebla.

Ha usado con brillante resultado un jarabe hecho con la corteza y madera de un árbol llamado Capulín Chataí (1). En los casos de bronquitis capilar ha obtenido también siempre brillantes resultados.

Dr. Francisco Fernandez. Medellín. E. de Veracruz.

Polvos de Dower y de euca-		
liptus.....	de c. c.....	gram. 2.00
Agua gomosa.....	„	125.00
Jarabe de Tolú y de codeina		
de c. c.....	„	20.00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada dos horas.

Otra,

Iodo puro y creosota....	de c. c....	gram. 1.00
Bálsamo de Tolú.....	„	3.00
Masa de sinoglosa.....	„	2.00

Para 50 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

(1) Este árbol se da silvestre en la tierra caliente y la gente dice que en sus hojas están muy marcadas sus virtudes medicinales.

EN LA CONVALECENCIA.

Arseniato de sosa	gram.	0. 10
Agua destilada	„	140. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita antes de cada comida.

Dr. Salvador F. Alcalá. Tecolotlán.

Terpina	gram.	2. 00
Sulfonal Bayer	„	2. 00
Coçimiento de raíz de polígala. „		100. 00
Jarabe de codeina	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Uno á dos gramos de fenacetina en las 24 horas para bajar la temperatura.

Dr. Jesús H. Treviño. Monterey.

Jarabe de goma	gram.	250. 00
Tintura alcohólica de flores de gordolobo	„	30. 00
Clorhidrato de amoniaco	„	2. 00
Elíxir paregórico	„	1. 00

Colórese con grana y fíltrese.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Bronquitis catarral.Dr. Jesús Villagrán. México.

Extracto de polígala	gram.	0. 30
Id. tebaico	„	0. 10
Kermes mineral	„	0. 10

Para 12 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Otra.

Dr. Enrique Hernández Moreno. Córdoba. Veracruz.

Infusión de polígala al 1%	gram.	120.	00
Alquitrán de Guyot	,,	10.	00
Carbonato de amoniaco	,,	1.	50
Extracto de opio	,,	0.	05
Jarabe de ipeca	,,	30.	00

Cucharadas.

Una cada hora.

Se puede sustituir el alquitrán por un gramo de eucaliptus, agregando goma c. b. para emulsionar.

En los niños es frecuente ver que el uso de los vomitivos de ipecacuana permanece sin resultado, y la conducta más prudente en este caso es cubrir la caja torácica con paños empapados en agua caliente hasta la rubefacción, y si es necesario, usar embrocaciones de tintura de iodo. El niño debe ser puesto en una pieza de temperamento libre y uniforme; ésto se consigue fácilmente usando el pulverizador y haciéndolo funcionar con agua alquitranada.

Bronquitis aguda.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

Polvos de Dower 0. 40 centígramos, en un pozuelo de cocimiento de flor de sauco endulzado. Tomar esta dosis en la mañana á las nueve y otra igual al acostarse.

Bronquitis crónica.

El mismo autor.

Infusión de hojas de digital gram. 120. 00

Kermes mineral	„	0. 30
Jarabe de clorhidrato de morfina	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Salvador F. Alcalá.		Tecolotlán.
Terpina	gram.	2. 00
Sulfonal Bayer	„	2. 00
Cocimiento de raíz de polígala.	„	100. 00
Jarabe de codeína	„	30. 00
Alcohol c. b.		

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Uno ó dos gramos de Fenacetina en las 24 horas para bajar la temperatura.

Dr. Demetrio Molinar.		Parral.
Infusión de polígala	gram.	120. 00
Kermes mineral	„	0. 10
Bálsamo de copaiba	„	0. 10
Jarabe de morfina	„	30. 00
id. de tolú	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.		Tehuacán.
En los niños:		
Infusión de raíz de polígala	gram.	100. 00
Sesquicarbonato de amoniaco.. . . .	„	0. 05
Jarabe de sábia de pino	„	40. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Cuando la tos es demasiado violenta ó produce gran excitación:

Lamedor blanco.....	gram.	100.	00
Extracto de beleño.....	„	0.	50
Agua de laurel cerezo.....	„	0.	50
Jarabe de sábia de pino.....	„	50.	00
Clorhidrato de narceina.....	„	0.	05

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Dr. Ernesto Chavez. Córdoba.

Infusión de polígala.....	gram.	40.	00
Jarabe de goma.....	„	40.	00
id. balsámico.....	„	40.	00
Polvos de Dower.....	„	2.	00
Agua de laurel cerezo.....	„	8.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Otra.

Kermes mineral.....	gram.	0.	40
Extracto de opio.....	„	0.	20
id. de belladona.....	„	0.	20

En 20 píldoras

Una píldora cada dos horas.

Otra.

Cuando se acompaña de asma.

Iodoformo.....	gram.	0.	40
Extracto de opio.....	„	0.	20
id. de belladona.....	„	0.	20

En 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. Miguel Cordero. México.

En la bronquitis seca.

Agua esterilizada..... grm. 200. 00

Clorhidrato de amoniaco..... „ 2. 00

Inhalaciones.

Con un pulverizador de vapor adecuado, haciendo cada inhalación por espacio de diez minutos tres veces al día.

Agua destilada..... grm. 100. 00

Clorhidrato de amoniaco..... „ 2. 00

Carbonato de sosa..... „ 2. 00

id. de amoniaco..... „ 2. 00

Jarabe simple..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora. (Dr. Liceaga.)

Dr. Manuel S. Soriano. México.

Infusión de polígala de virginia. grm. 125. 00

Goma arábica en polvo..... „ 4. 00

Salicilato de sosa..... „ 4. 00

Tintura de lobelia inflata..... „ 4. 00

Acetato de amoniaco..... „ 8. 00

Jarabe balsámico..... „ 30. 00

id. de morfina..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Dr. Juan C. Villaseñor. Morelia.

Sulfato de morfina..... grm. 0. 15

Extracto de beleño..... „ 0. 50

Terpina „ 1. 50

En 15 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Otra.

Agua de laurel cerezo grm. de 4 á 8. 00

Terpina ó terpinol „ de 1 á 2. 00

Bromuro de amonio „ 0. 50

Jarabe de morfina „ 30. 00

id. de hidrato de cloral „ 30. 00

Alcoholado de meliza „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora ó cada dos horas.

Dr. Juan José Ramírez de Arellano.

México.

BRONQUITIS CAPILAR EN LOS NIÑOS.

Vegigatorios precisamente en la cara antero-interna de los brazos.

Dr. Manuel de Anaya.

Guanajuato.

Oxido de Zinc grm. 0. 60

Extracto de orozús pulverizado . . „ 0. 50

id. de belladona „ 0. 05

id. de opio „ 0. 05

En 8 papeles

Un papel en la mañana y otro en la tarde en agua tibia con jarabe de tolú.

Dr. Benjamin Rosano.

Mineral del Monte.

BRONQUILLIS EN LOS NIÑOS.

Lamedor blanco grm. 60. 00

Citrato de potasa „ de 0. 30 á 2. 00

Vino de ipeca.....	„	de 1. 00 á 4. 00
Jarabe de tolú.....	„	20. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Dr. Erasmo O. Romero.

Ozuloama

BRONQUITIS EN LOS VIEJOS.

Bálsamo de tolú.....	gram.	5. 00
Alcohol á 90°.....	„	15. 00
Disuélvase y agréguese		
Jarabe de goma.....	„	60. 00
id. de morfina.....	„	30. 00
Kermes mineral.....	„	0. 15

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

BRONQUITIS EN LOS NIÑOS.

Agua hirviendo.....	gram.	100. 00
Polvo de raíz de ipeca.....	„	0. 50
Hágase infusión y agréguese		
Nitrato de potasa.....	„	1. 50
Jarabe de tolú.....	„	15. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Dr. Francisco de P. Crespo.

Huamantla.

Bronquitis crónica con hemoptisis.

Jarabe de hipofosfito de cal; una cucharada grande en un vaso de leche, todas las mañanas en ayunas.

Gránulos de arseniato de potasa de un milígramo.

de 3 á 10 por día, ó solución arsenical de Fowler, de 5 á 15 gotas diarias.

Si la tós es muy tenás:

Clorhidrato de morfina.....	gram.	0. 05
Bicarbonato de sosa.....	„	2. 00
Agua destilada.....	„	200. 00
Jarabe de orozús.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Juan C. Villaseñor.

Morelia.

BRONQUITIS CRÓNICA EN LOS ENFISEMATOSOS.

Ioduro de potasio....	gram.	de 0. 20 á	0. 40
Id. de amonio....	„	de 0. 10 á	0. 20
Tintura de beleño.....	„	de 1. 00 á	2. 00
Infusión pectoral.....	„	60. 00	
Jarabe de morfina....	„	30. 00	

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra,

Extracto de valeriana.....	gram.	0. 50
Id. de hojas acónito....	„	0. 05
Id. de belladona.....	„	0. 10

En 5 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Revulsivos cutáneos en la caja toráxica.

Una vez dominada la tós, se usará de los balsámicos y modificadores de la mucosa brónquica: terpinol, eucaliptus, etc.

Si hay disnea se emplearán las inhalaciones de piridina de 5 á 15 gotas.

Cuando domina el elemento nervioso, se empleará la fórmula siguiente:

Hidrolado de tilia.....	gram.	30.	00
Id. de lechuga.....	„	30.	00
Ioduro de sodio.....	;;	0.	40
Id. de potasio.....	„	0.	20
Id. de amonio.....	„	0.	15
Gránulos de hiosiamina de ½ milígramo.....	de „	4 á 8.	00
Jarabe de morfina.....	„	30.	00

Cucharadas

Una cucharada cada hora.

Calambres.

Dr. M. Mucél.			México.
Opodeldoc líquido.....	gram.	75.	00
Tintura de opio.....	„	20.	00
Cloroformo.....	„	5.	00

Friega.

Cálculos vesicales.

Dr. Alfredo Higareda. Huejotzingo, E. de Puebla.

Ha podido comprobar una vez la disolución de un cálculo de la vejiga, tratado por la infusión de un bejuco llamado, bejuco ala de murciélago, tomado al interior y en lavatorios vesicales.

La existencia de este cálculo se habia comprobado con la sonda y era de regular tamaño.

El bejuco ala de murciélago se da en la costa de Sotavento.

Callos.

Dr. Leonides E. Jonguitud. Tenancingo.

Colodión elástico gm. 2. 00

Acido salicílico „ 1. 00

Id. láctico „ 1. 00

Mésclese y rotúlese: *Uso indicado.*

Se aplica por cuatro ó seis días con una pluma lavada ó con un pincel por mañana y noche, sobre toda la superficie del callo, y para favorecer su desprendimiento, tomará el paciente un baño de piés.

Dr. E. Lier. México.

Ácido láctico y

Ácido salicílico de c. c. gm. 1. 00

Colodión „ 8. 00

Solución.

Dr. Federico Cota. La Paz, Baja California.

En los callos de las manos, en los obreros y en los panadizos, cuando se inflaman los trato por la inmersión de la mano en agua tibia saturada de sal. Después que la piel se arruga todo trabajo flegmático ha desaparecido.

Canalización.

Dr. M. Mucél. México.

Prefiere al tubo de canalización que lastima y se descompone en la herida, las mechas antiguas; pero hechas con la gasa fenicada ó iodoformada é impregnadas de vaselina boricada al 5% ó de cualesquiera otra pomada aséptica.

Cáncer.

TRATAMIENTO PALEATIVO LOCAL DEL CÁNCER UTERINO.

Dr. A. J. Carbajal.

México.

Polvo de hojas de tlalchichinoli:

Toumeforlie Mex..... grm. 90. 00

Salol..... „ 30. 00

Uso indicado.

Después de una inyección abundante (grm 500. 00) de solución fenicada al 1%, aplicar el polvo sobre la parte ulcerada precisamente secada con algodón salicilado.

Cubrir toda la superficie y poner un tapón del mismo algodón. Curación diaria.

Se modera notablemente el flujo y la hemorragia.

Cáncer del recto.

Dr. Demetrio Molinar.

Hidalgo del Parral.

Extracto de cicuta..... grm. 2. 50

Ioduro de potasio..... „ 5. 00

Polvo de altea c. b.

En 50 píldoras.

Tres píldoras repartidas en el día.

Agua destilada..... grm. 200. 00

Ácido salicílico..... „ 2. 00

Alcohol c. b.

Lavativa.

Una cada tercer día.

Cancroide.

Dr. Severo L. Guerrero.

Matamoros

Calamina..... }
 Mirra pulverizada..... } de c. c. partes iguales.

Para aplicar sobre la ulceración.

Dr. Alberto Aizpuru. México.

Aristol..... gm. 5. 00

Glicerina..... „ 50. 00

Para aplicarlo localmente.

Cancerosos.

Dr. Leonardo Gómez. Tenango, E. de México.

Curare..... gm. 0. 06

Agua destilada..... „ 5. 00

Acido clorhídrico..... 1 gota.

Inyección en el tumor, de dos gotas cada seis días, y exteriormente una partícula de potasa cáustica, del tamaño de la cabeza de un alfiler. Los dolores cesan y el tumor se funde.

Carie de las muelas.

Dr. Francisco M. Arroyo.—Irapuato, E. de Guanajto.

Alcohol nítrico..... gm. 10. 00

Antipirina..... „ 0. 05

Uso externo.

Un algodón empapado en el líquido y colocado en la picadura.

Caquexia palustre.

Dr. Ramón Velasco. Tequila.

Extracto de genciana..... gm. 1. 00

Ferrocitrato de quinina..... „ 1. 20

Acido arsenioso..... „ 0. 05

En 10 píldoras.

Una píldora diaria con la comida.

Catarro naso-faringeo, crónico.

Dr. J. Collantes y B.

México.

Gránulos de iodoformo de un milígramo.

Cuatro ó tres veces al día, durante varios dias.

Catarro laríngeo en los niños.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.

Tehuacán.

Acido fénico gm. 0. 60.

Agua destilada „ 300. 00

*Inhalaciones.***Catarro nasal.**

Dr. G. Parra.

Tacubaya.

Borax gm. 4. 00

Subnitrato de bismuto „ 4. 00

Mentol „ 0. 50

*Rapé.***Catarro pulmonar crónico.**

Dr. Carlos Santander.—Salamanca. E. de Guanajuato.

Carbonato de amoniaco gm. 1. 00

Goma amoniaco „ 1. 00

Polvo de ipecacuana . . de 0. 10 á „ 0. 20

Clorhidrato de morfina de 0. 05 á „ 0. 10

Para 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Catarro intestinal.

Dr. Leandro Arroyo.

San Angel.

Forma húmeda.

Fosfato de cal gm. 8. 00

Subnitrato de bismuto	„	8. 00
Extracto gomoso de opio	„	0. 05

En 8 papeles.

Docis: un papel cada dos horas.

Dr. Melesio Medal,

Tacámbaro.

Forma húmeda.

Goma asafétida	gram.	2. 00
Acido tánico	„	0. 15
Extracto de opio	„	0. 10

En 12 píldoras.

Docis: de cuatro á seis diarias.

Dr. Juan Collantes y Buenrostro.

México.

Agua simple	gram.	120. 00
Polvos de borax	„	2. 00
Glicerina neutra	„	30. 00
Jarabe simple	„	30. 00

Cucharadas.

Docis: una cucharada cada dos horas.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.

Tehuacán.

CATARRO INTESTINAL CRÓNICO EN LOS NIÑOS MAYORES
DE 3 AÑOS.

Tanato de quinina	gram.	0. 50
Alumbre	„	0. 50
Clorhidrato de narceina	„	0. 05
Polvo de azucar	„	2. 00

En 10 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. Miguel Cordero. México.

Aceite fresco de ricino grm. 32. 00

Jarabe corteza de cidra „ 16. 00

Esencia de menta *dos gotas.*

Purgante en ayunas.

Subnitrato de bismuto puro grm. 4. 00

Bicarbonato de sosa „ 2. 00

Pancreatina pura „ 1. 00

En 12 cápsulas.

Una cápsula con cada alimento y por alimento leche, carne y huevos.

CATARRO GASTRO--DUODENAL.

Dr. M. Mucél. México.

Vomipurgante al principio, después Sal de Vichy ó de Carlsbad en cocimiento de Simonillo. Sobre todo si la congestión hepática es manifiesta.

Para la anorexia, licor de Baumé, diez gotas antes de cada comida.

En la convalecencia y en el catarro de las vías biliares, baños de vapor, si no hay contra indicación por otra enfermedad.

CATARRO GÁSTRICO DOLOROSO.

Dr. Miguel Cordero. México.

Sal natural de las fuentes de Carlsbad grm. 30. 00

En 3 papeles.

Disuélvase un papel en 50 gramos de agua caliente que se tomará en ayunas con una hora de distancia del alimento.

Agua hervida	gram.	1000.	00
Bicarbonato de sosa.....	„		5. 00

Lavatorio.

Para hacer el lavado del estómago y en seguida introducir por la sonda un gramo de subnitrato de bismuto en un poco de agua.

CATARRO GASTRO--INTESTINAL EN LOS ANÉMICOS.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

Vino Jerez.....	gram.	150.	00
Jarabe de genciana.....	„		30. 00
Lactato de fierro.....	„		2. 00

Cucharadas.

Una cucharada media hora antes de comer.

Cefalalgia.

Dr. Manuel S. Iglesias. Veracruz.

Antipirina.....	gram.	2.	00
Bromuro de potasio.....	„		6. 00
Clorhidrato de morfina.....	„		0. 06

Para 6 píldoras ó cápsulas.

Una cada media hora, ó cada hora, según la intensidad del dolor.

Dr. Miguel Cordero México.

CEFALALGIA FRONTAL.

Aceite de almendras dulces....	gram.	30.	00
Eter acético.....	„		20. 00
Esencia de menta.....			4 gotas.

Defensivos.

Aplicar los defensivos sobre la frente cada dos horas hasta que se calme el dolor.

Cefalea

POR CATARRO NAZAL MAL CUIDADO.

Dr. M. Mucél México.

Los ha visto ceder por el uso del ioduro de potasio, hasta producir el catarro iódico.

Cirrosis hepática.

Dr. M. Mucél. México.

PARA LA ACITIS, USA:

Cocimiento de hojas de sen	gram.	300.	00
Crémor soluble	„	60.	00
Emético	„	0.	03

Para 3 tomas.

Una cada doce ó cada veinticuatro horas, según el efecto obtenido.

Repetidas punciones, si es necesario, y ayudarlas de los medios conocidos.

Dr. Antonio Carreon. Chalchicomula.

Tratándolas por el iodoformo al interior, ha visto desaparecer el derrame peritoneal y mejorarse los enfermos hasta salir del hospital como curados.

Cistitis.

CISTITIS BLENORRÁGICA.

Dr. M. Mucél. México.

Siempre que el enfermo la tolere, usa la poción de Chopart, con el mejor éxito, y la cree superior á todo lo conocido.

CISTITIS BLENORRÁGICA SUB-AGUDA.

Dr. Juan C. Villaseñor. Morelia.

Cocimiento de pingüica.....	gram.	180.	00
Cloral hidratado.....	„ de 1 á 2.		00
Antipirina de Knorr.....	„	2.	00
Jarabe de morfina.....	„	30.	00
Esencia de menta.....	„	3 gotas.	

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Para la misma enfermedad cuando hay CISTALGÍA.

Cloral hidratado.....	gram.	2.	00
Antipirina.....	„	2.	00
Bromuro de sodio.....	„	4.	00
Cocimiento de úera ursi.....	„	150.	00
Jarabe de morfina.....	„	30.	00
Agua de azahar.....	„	6.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Benjamin Treviño. S. Miguel Allende

Agua hervida.....	gram.	200.	00
Glicerina.....	„	50.	00
Goma tragacanto.....	„	1.	00
Iodoformo.....	„	5.	00

Inyecciones.

Una inyección intra-vesical cada tres días.

Dr. Guillermo R. Servín. Triunfo, Baja California

CISTITIS TRAUMÁTICA.

Salol.....	gram.	1	00
------------	-------	---	----

Resorsina.....	„	1. 00
Agua destilada.....	„	250. 00

Lavatorio.

Tibio y teniendo cuidado de hacer volver el líquido.

Bicarbonato de sosa..... grm. 5. 00

Salol..... „ 2. 00

En 12 papeles.

- Un papel cada tres horas disuelto en una tasa de agua de brea con unas gotas de esencia de sándalo.
Dieta láctea.

Con este método ha tratado su autor tres cistitis por herida de la vejiga, y en los tres casos se han curado los enfermos.

Dr. Alberto Aizpuru.

México.

CISTITIS CATARRAL CRÓNICA.

Polvo de goma c. b.

Glicerina c. b.

Trementina de Venecia cruda grm. 0. 30

En 12 píldoras

Que se tomarán en 24 horas.

Dr. Federico Cota.

La Paz. Baja California.

CISTITIS CRÓNICA CON HIPERTROFIA DE LA PRÓSTATA.

Cocimiento de papa *solanun tuberosa*; como agua de uso.

El tenesmo vesical desaparece y la orina vuelve á tomar sus caracteres normales.

La papa se pone sin mondar y diariamente se renueva el cocimiento.

Cloasma uterino y pigmentaciones anormales.

Dr. E. Lier.

México.

Óxido de mercurio	gram.	0. 50
Id. de zinc	,,	3. 00
Acido salicílico	,,	0. 25
Aceite de ricino y		
Manteca de cacao de c. c.	,,	25. 00
Esencia de rosas		10 gotas.

Pomada.

Cloro-anemia.

Dr. Ramón Ponce de León.—Culiacán. E. de Sinaloa.

Masa ferruginosa de Vallet	gram.	1. 20
Acido arsenioso	,,	0. 03

Para 12 píldoras.

Dos píldoras con cada comida.

Esta fórmula ha dado buen resultado, especialmente en la cloro-anemia que sucede al envenenamiento paludeano.

Dr. M. Mucél.

México.

Hidroterapia y ejercicio al aire libre con moderación porque no á todos los anémicos les da buen resultado.

Preparaciones ferruginosas especialmente el ioduro de fierro de Blancard, ó el protocloruro de fierro de Rabuteau.

Otra:

Vino Jerez (bueno)	gram.	700. 00
Agua de menta inglesa obteni-		
da por simple solución de la		

esencia piperita legítima.....	„	200. 00
Citrato de fierro amoniacoal....	„	3. 00
Licor arsenical de Valaugin...	„	50. 00

Cucharadas.

Una ó dos al día.

Dr. D. Molinar.

Hidalgo del Parral.

Salicilato de fierro inyectable de Roussell de $\frac{1}{4}$ de jeringa á una jeringa diaria. Se aumenta cada tres días por cuartos de jeringa.

Clorosis.

Dr. Enrique Herrera Moreno.—Córdoba. E. de Veracruz.

Extracto de quina.....	gram.	5. 00
Citrato ó carbonato de fierro....	„	5. 00
Extracto de belladona.....	„	0. 50
Acido arsenioso.....	„	0. 05

Para 100 píldoras.

Dos píldoras en cada comida, seis diarias.

El secreto para obtener éxito consiste en modificar las funciones digestivas administrando sobre todo el acido clorhídrico para combatir la hipoclorhidria.

La diarrea no contra indica el uso del fierro, bastando con sustituir la belladona con extracto de opio.

Dr. Desiderio G. Rosado.

Comalcalco, Tabasco.

Permanganato de potasa.....	gram.	0. 10
Sulfato de fierro cristalizado...	„	1. 00
Agua filtrada.....	„	316. 00

Acido clorhídrico	„	1. 00
Glicerina	„	28. 00

Cucharadas.

Cuatro cucharadas repartidas en el día, cada una en seis de agua ligeramente endulzada.

Otra:

Dr. Desiderio G. Rosado. Comalcalco, Tabasco.

Bicromato de potasa	gram.	0. 10
Percloruro de fierro líquido	„	14. 00
Tintura de iodo	„	28. 00

Gotas.

De cinco á diez gotas cuatro veces al día, en agua gomosa.

Cólera asiático.

Dr. Luis R. Ruiz. Texcoco, E. de México.

COMO PREVENTIVO.

Desayuno: Cocimiento de yerbabuena con una cucharada de anisete.

Comida: Arroz y carne asada.

Cena: Un poco de arroz y cocimiento de yerbabuena.

Ventilar las piezas y regarlas con tintura de eucaliptus. El agua que se tome, que sea hervida por dos veces.

MÉTODO CURATIVO.

Un posillo de aceite de olivo con una cucharada de vomí-purgante de Leroy, facilitando el vómito con agua tibia hasta que se devuelva el agua limpia, dando despues una taza de cocimiento de manzanilla y para los calambres una pomada de grasa y cal.

Cólera infantil.

Dr. Austasio Martinez, México.

Poción antiemética de Rivier.. grm. 120. 00

Subnitrato de bismuto..... „ 2. 00

Láudano de Sydenham 1 ó más
gotas según la edad.

Jarabe de corteza de cidra..... c. b.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Manuel Valdéz y Diaz.—Paso de Ovejas. E. de
Veracruz.

Infusión de manzanilla..... grm. 120. 00

Hidrato de magnesia..... „ 4. 00

Bicarbonato de sosa..... „ 2. 00

Láudano de Sydenham..... 8 gotas.

Cucharaditas.

Una cada media hora hasta contener la basca y con-
tinuar cada hora alternadas con papelitos de 0, 15 de
subnitrato de bismuto.

Cólera esporádico.

Dr. Austasio Martinez, México.

Cuando el pulso es pequeño y concentrado, que hay
enfriamientos y calambres muy dolorosos.

Poción antiemética de Rivier.. grm. 120. 00

Subnitrato de bismuto..... „ 4. 00

Láudano de Sydenham..... „ 1. 00

Tintura de nuez vómica..... 20 gotas.

Jarabe de éter sulfúrico gm. 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Tintura de drímis y de mostaza

de c. c gm. 30. 00

Tintura de núez vómica „ 15. 00

Amoniaco „ 4. 00

Láudano de Sydenham „ 8. 00

Friega.

Para friccionar los miembros.

Dr. Lázaro Ortega.

México.

Infusión de hinojo gm. 120. 00

Subnitrato de bismuto „ 4. 00

Fosfato de cal „ 4. 00

Jarabe de corteza de cidra „ 30. 00

Láudano de Sydenham 20 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Colerina.

Dr. A. Monsivais.

S. Luis Potosí.

Infusión de yerbabuena gm. 100. 00

Bicarbonato de sosa „ 2. 00

Láudano de Sydenham „ 1. 00

Jarabe de éter „ 30. 00

Subnitrato de bismuto „ 6. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada cinco minutos hasta que se calmen los síntomas; retirándolas después progresivamente.

La dosis de bicarbonato de sosa, debe estar en relación con la acidés de los vómitos.

Si hay gran postración, se agrega licor de Hoffman; y si persiste la diarrea, se añade salicilato de bismuto.

Dr. R. Ruiz. Salvatierra.

Poción blanca.....	gram.	120. 00
Subnitrato de bismuto.....	„	4. 00
Láudano de Sydenham.....	„	1. 00
Jarabe de crameria.....	„	30. 00

Cucharadas.

Dosis: una cucharada cada hora.

Dr. R. Ortega. Ciudad Porfirio Díaz.

Al principio, si la basca lo permite, un purgante de aceite de ricino con unas gotas de láudano, y en todo caso, las píldoras de la siguiente fórmula:

Salicilato de bismuto.....	gram.	5. 00
Naftol.....	de 1 á „	5. 00
Extracto de opio.....	de 1 á „	0. 20

En 20 píldoras.

Dosis: dos píldoras cada media hora hasta el efecto, suspendiendo ó alejando más las dosis según sea necesario.

Si hay basca, generalmente se suspende con trocitos de hielo, y si no dan resultado, se usa la fórmula siguiente:

Cocaina ó una de sus sales...de 1 á	gram.	0. 03
Extracto de opio.....de 2 á	„	0. 05

En 10 píldoras.

Dosis: una cada 15 minutos hasta el efecto, y después una diez minutos antes de cada dosis de píldoras ó de cada alimento. Hay veces que es necesario ocurrir á las inyecciones de morfina. Por alimentos, huevos frescos, leche etc., etc. Por bebida agua fresca en pequeñas cantidades con un poco de mezcal, ginebra ó cognac. Una vez que se consigue constipar al enfermo no se debe mover el intestino en dos días, y al hacerlo, usar de lavativas de agua fría, pero por ningún motivo de purgantes que traen la repetición de la enfermedad.

Cólico.

Dr. D. Molinar.

Parral.

CÓLICO UTERINO.

Infusión de hojas de naranjo . . .	gram.	120.	00
Licor de Hoffman	„	2.	00
Tintura de riubarbo	„	10.	00
Jarabe de morfina	„	30.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Manuel Alfaro.

México.

CÓLICO SATURNINO.

Inyección hipodérmica en las paredes del vientre, de un milígramo de atropina y repitiéndola cada cuatro horas, hasta dominar el dolor.

La regularización de las funciones del intestino es consecutiva.

Dr. Manuel Villaseñor.

Pénjamo.

CÓLICO HEPÁTICO.

Aceite de olivo..... grm. de 200 á 300. 00

Purgante.

Baño general lo más caliente que se pueda tolerar.

Agua destilada..... grm. 60. 00

Gránulos de aconitina de Chan-

teau..... núm. 10

Gránulos de codeina de Chan-

teau..... núm. 12

,, de hiosiamina de ,, núm. 8

Cucharaditas.

Una cucharadita cada cuarto de hora. Si no hay mejoría, se repite el baño.

Dr. Juan N. Campos.

Toluca.

CÓLICO INTESTINAL POR PARÁLISIS.

Se administran alternando cada media hora, medio milígramo de hiosiamina y la misma cantidad de sulfato de estriquina, hasta obtener una evacuación.

Dr. Guillermo R. Servín. Triunfo. Baja California.

Alcoholado de menta..... grm. 20. 00

Exalgina..... ,, 2. 00

Bromhidrato de cafeina..... ,, 0. 10

Alcoholado de aniz..... ,, 20. 00

Clorhidrato de cocaina..... ,, 0. 10

Alcohol para disolver la exalgina c. b.

Gotas.

Diez gotas en una cucharada de agua cada media hora hasta seis veces.

CÓLICO HEPÁTICO.

Dr. Federico Cota. La Paz, Baja California.

Glicerina neutra.....	gram.	30. 00
Esencia de menta....	15 gotas.	
Esencia de trementina	15 gotas.	
Cloroformo.....	„	4. 00
Bicarbonato de sosa.....	„	1. 00
Jarabe de éter.....	„	20. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora ó cada media hora, en una cucharada grande de atole ó de sagú.

Cocimiento de coca.....	gram.	150. 00
Aceite de olivo.....	„	60. 00
Esencia de trementina	40 gotas	
Láudano de Sydenham	15 gotas	
Una yema de huevo.		

3 lavativas

Repartidas en el día.

CÓLICO NEFRÍTICO.

Dr. Pablo Gama, México.

Agua de lechuga.....	gram.	150. 00
Agua de laurel cerezo.....	„	2. 00
Bálsamo de tolú.....	„	1. 00
Tintura de belladona.....	„	0. 50
Cloroformo.....	„	1. 00

Cucharadas.

Una cada media hora.

CÓLICO HEPÁTICO.

Dr. Emilio Polo, Puebla.

Sulfato de berberina.....	gram.	1. 00
---------------------------	-------	-------

Azúcar en polvo „ 100. 00

Mésclese.

Se toman de esta mezcla, grm. 0. 60 para 10 papeles.
Un papel cada hora.

Otra:

Gránulos de atropina de medio milígramo alternados con gránulos de podofilina de hora en hora.

El dolor cede con este tratamiento que descongestiona el hígado con las evacuaciones que produce.

Una vez dominado el ataque, se hará uso de los alcalinos.

CÓLICO NEFRÍTICO.

El mismo autor.

Tintura de berberis vulgaris . . . grm. 1. 00

Agua „ 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Si no se domina el dolor, se pone éter sulfúrico en la región venal y se dan al interior perlas de éter.

CÓLICO INTESTINAL.

Dr. M. Medal.

Tacámbaro. E. de Michoacán.

Infusión de manzanilla y tilia . . grm. 175. 00

Licor anodino de Hoffman „ 8. 00

Jarabe de azahar „ 25. 00

Tintura de castor de 10 á 20 gotas.

Láudaro de Sydenham de 12 á 15 gotas.

Cucharadas.

Dos cucharadas cada 10 minutos.

Dr. Antonio J. Carbajal.

México.

CÓLICOS DE TIERRA CALIENTE.

Infusión de valeriana of.	gram.	125. 00
Jarabe de naranja	„	15. 00
Láudano de Sydenham	10 gotas.	
Eter sulfúrico	25 gotas.	

Cucharadas.

Una cucharada cada cuarto de hora.

No es prudente usar los purgantes antes de calmar el dolor muy agudo y esto se consigue con las cucharadas.

Dr. Antonio Matienzo.

Tampico

Clorhidrato de morfina	gram.	0. 05
Clorhidrato de cocaina	„	0. 05
Jarabe	„	15. 00
Agua de menta	„	60. 00
id. cloroformada	„	60. 00

Cucharadas.

Una cada hora ó cada dos horas.

COLICOS EN LOS NIÑOS EN EL PERIODO DE LA LACTANCIA.

Dr. Antonio Carreón

Chalchicomula.

Jarabe de azahar	gram.	90. 00
Cloral	„	0. 20
Esencia de hinojo	5 gotas.	

Cucharaditas.

Media cucharadita cada hora y una cucharadita según la edad.

Colitis.

Dr. Juan N. Campos.

Toluca

COLITIS CATARRAL.

Agua destilada.....	gram.	100. 00
Borax.....	„	1. 00
Solución fenicada al 10%.....	„	0. 20

Lavativas.

La mitad en la mañana y la otra mitad en la noche.

Dr. Ciro M. Santelices.

Querétaro.

COLITIS ULCEROSA.

Cocimiento de saragatona.....	gram.	500. 00
Clorato de potasa.....	„	8. 00
Glicerina.....	„	8. 00
Tintura de iodo.....	„	4. 00
Láudano de Rousseau.....	„	5. 00

Lavativas.

Dos lavativas al día, cada lavativa de un pozuelo, precedida de una grande de agua caliente.

Dr. Federico Cota.

La Paz, Baja California.

COLITIS ULCEROSA.

Calomel.....	gram.	0. 20
Extracto de opio.....	„	0. 10
Extracto de crameria.....	„	0. 20
Ipeca.....	„	0. 20

En 10 píldoras.

Una píldora cada hora.

Cocimiento de manzanilla.....	gram.	120. 00
Almidon.....	„	6. 00

Aceite de linaza.....	„	15. 00
Láudano Sydenham.....		15 gotas.

Lavativas.

Dividir en tres ó cuatro lavativas bien tibias que se aplicarán más ó menos lejanas según el tenesmo.

Agua de goma zámota.....	gram.	500. 00
Albumina.....	„	60. 00

*Agua de uso.***Colitis aguda.**

Dr. Jesús Villagrán.		México.
Solución de goma arábica.....	gram.	120. 00
Tintura de ipeca.....	„	1. 00
Jarabe de opio.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Colitis ulcerosa.

Dr. Elias Gómez.		Cuernavaca.
Calomel.....	gram.	0. 20
Polvos de ipeca.....	„	0. 20
Extracto de belladona.....	„	0. 08

En 20 papeles.

Un papel cada hora hasta tocar la encía ó producir la enteritis calomelánica. Dieta láctea. Despues de tocar la encía:

Subnitrato de bismuto.....	gram.	6. 00
Clorato de potasa.....	„	5. 00
Polvo de ipeca.....	„	0. 15
Extracto de belladona.....	„	0. 08

En 12 papeles

Un papel cada dos horas.

Cuando las deposiciones han perdido su carácter disenteriforme.

Subnitrato de bismuto..... grm. 15. 00

Extracto de opio „ 0. 15

En 15 papeles,

Un papel despues de cada alimento (3 en el día.)

Si la enfermedad pasa al estado crónico:

Nitrato de plata cristalizado..... grm. 0. 15

En 15 píldoras.

Tres píldoras repartidas en el día lo mas lejos posible de los alimentos.

Diez gotas de tintura de amamelis virgínica tres veces al dia antes de cada alimento.

Colitis disentérica.

Dr. Antonio J. Carbajal,

México.

Tratamiento local.

Agua destilada grm. 500. 00

Sulfato de zinc de 1 á „ 4. 00

Una lavativa.

Agua destilada grm. 500. 00

Tintura de iodo „ 2. 00

Ioduro de potasio „ 3. 00

Lavativas.

Agua destilada grm. 500. 00

Creolina de 1 á... .. „ 2. 00

Lavativas.

Agua destilada grm. 500. 00

Nitrato de plata cristalizado de

0. 50 á „ 1. 00

Lavativas.

El modo de proceder es el secreto del éxito.

Acostar al enfermo del lado izquierdo con la pélvis levantada por una almohada no muy gruesa, inyectar con suavidad toda ó la mayor parte de la lavativa ligeramente tibia; terminado ponerlo en el decúbito supino por dos ó tres minutos y luego sobre el lado derecho.

No se necesita que permanezca la lavativa más de diez minutos.

La eficacia de las fórmulas está por órden.

En los casos de ulceración intestinal un poco antigua recurrir desde luego al nitrato de plata.

Dr. Miguel Cordero. México.

Clorato de potasa gm. 10. 00

Bicarbonato de sosa „ 10. 00

En 20 papeles.

Disuélvase un papel en 40 gramos de cocimiento de linaza espeso que se aplicará en lavativa después de cada evacuación sin contar la que sigue á la lavativa.

Condilomas puntiagudos.

Dr. E. Lier. México.

Polvos de sabina	}	de c. c. gm. 10. 00
Alumbre calcinado		
Sulfato de fierro		

Uso externo.

Conjuntivitis.

Dr. Agustín Chacón. México.

Agua destilada gm. 500. 00

Ácido bórico „ 15. 00

Lavatorio.

Otra,
 Agua destilada grm. 500. 00
 Bicloruro de mercurio „ 0. 20
Lavatorio.

Otra.
 Agua destilada grm. 500. 00
 Ácido salicílico de 1 á „ 2. 00
 Ácido bórico „ 15. 00
Lavatorio.

Otra.
 Agua destilada grm. 500. 00
 Acido fénico de 2. 50 á „ 5. 00
Lavatorio.

Otra.
 Agua destilada..... grm. 10. 00
 Nitrato de plata de 0. 05 á „ 0. 10
Colirio.

Otra.
 Agua destilada..... grm. 10. 00
 Sulfato de cobre de 0. 05 á „ 0. 10
Colirio.

Otra.
 Agua destilada grm. 10. 00
 Sulfato de zinc..... de 0. 05 á „ 0. 10
Colirio.

Otra.
 Agua destilada..... grm. 300. 00
 Sulfato de zinc..... de 0. 50 á „ 1. 00
Fomentos.

Otra.
 Agua destilada..... grm. 300. 00

Sulfato de cobre de 0.50 á „ 1.00

Fomentos.

Los fomentos fríos sobre los ojos y se aplican tres veces al día por 20 ó 30 minutos cada vez. Se tendrá cuidado de reemplazarlos por otras compresas frías antes de que se calienten.

Conjuntivitis Catarral,

Dr. F. López.

México

Agua destilada gm. 10.00

Zozoyodolato de zinc. de 0.01 á „ 0.02

Clorhidrato de cocaina „ 0.05

Gotas para los ojos.

Dr. E. Gutiérrez.

Guadalupe. E. de Zacatecas.

Agua destilada de rosas gm. 20.00

Acido bórico „ 1.00

Clorhidrato de morfina „ 0.25

Colirio.

Dos gotas tres veces al día.

Agua destilada gm. 300.00

Bórax „ 2.00

Bicarbonato de sosa „ 1.00

Lavatorio.

Para lavar los ojos después del colirio anterior.

Dr. Manuel de Anaya.

Guanajuato.

Nitrato de potasa 2 partes.

id. de plata criztalizada 1 parte.

Fúndase y hágase lápiz.

Tocar con el lápiz una vez al día la conjuntiva palpebral.

Dr. José M.^a Bandera.

México.

AGUA OFBÁLMICA

Agua destilada esterilizada.....	gram.	200.	00
Bórax.....	„	4.	00
Clorato de potasa.....	„	1.	00

Lavatorio.

Lavatorio caliente en los ojos, cuatro veces al día.

Dr. Fernando López.

México.

CONJUNTIVITIS CATARRALES LIJERAS.

Agua destilada.....	gram.	10.	00
Extracto fluido de amamelis virgínica de 5 á 10			
			<i>gotas.</i>

Fíltrese y rotúlese:

Gotas para los ojos.

Conjuntivitis flictenular.Dr. José M.^a Irys. S. Juan Bautista. E. de Tabasco.

Agua endulzada.....	gram.	120.	00
Cloruro de bario.....	„	0.	10

Cucharadas

Para consumir la dosis en 24 horas.

Cuando la fotofobia es muy intensa, se hace uso del colirio de Mojón.

Cloruro de bario.....	gram.	0.	60
Agua destilada.....	„	30.	00
Múcilago.....	„	8.	00
Láudano de Rousseau.....	„	2.	00

Colirio.

Conjuntivitis purulenta.

Dr. Francisco M. Arroyo.—Irapuato. E. de Guanajuato.

Agua destilada gm. 10. 00

Nitrato de plata cristalizado „ 0. 05

Colirio.

Calomel gm. 1. 00

Polvo fino de azúcar candi „ 0. 50

*Colirio.***Conjuntivitis en los escrofulosos.**

Dr. E. Gutiérrez.

Guadalupe. Zacatecas.

Aceite de olivo gm. 30. 00

Id. de cade „ 1. 00

Iodoformo „ 0. 30

Colirio.

Dos gotas al día.

Dr. L. Castro.

México.

Agua destilada gm. 15. 00

Nitrato de plata „ 0. 20

Uso indicado

Se empapa un pincel en esta solución para tocar las pústulas, con lo que se consigue hacerlas abortar ó cuando ménos apresurar su curación.

Conjuntivitis y Keratitis ulcerosa.

Dr. L. Arroyo.

San Angel, Distrito Federal.

Pomada de la viuda Farnier, untada en el borde de los párpados, una ó dos veces al día.

POMADA DE LA VIUDA FARNIER.

Mantequilla fresca gm. 18. 00

Alcanfór	„	0. 10
— Precipitado rojo	„	1. 00
Acetato de plomo	„	1. 00

Pomada.

Congestión cerebral.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

Pocion gomosa	gram.	180. 00
Licor amoniacal anizado	„	2. 00
Alcohol alcanforado	„	2. 00
Jarabe simple	„	18. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Lázaro Ortega. México.

Agua destilada	gram.	180. 00
Tartrato doble de potasa y sosa „	„	30. 00
Tártaro emético	„	0. 10
Jarabe de azahar	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Se puede usar también en los padecimientos inflamatorios del cerebro.

Congestión hepática.

Dr. M. Mucél. México.

Purgante drástico, revulsivo de tela de Albespeyes sobre la región hepática, y algunos días después Sal de Carlsbad en cocimiento de simonillo.

Dr. Francisco D. Maldonado. Aguascalientes.

En individuos no debilitados.

Calomel.....	gram.	2. 00
Ruibarbo.....	„	3. 00

En 2 papeles.

Dar el 2º papel tres horas después de dar el primero, si éste no ha hecho efecto purgante, y alimentar al enfermo con alimentos sin sal.

Congestion hepática pasiva acompañada de constipación.

Dr. Antonio J. Carbajal. México.

Podofilina.....	gram.	0. 10
Extracto de coloquintidas com- puesto.....	„	0. 20

En 10 píldoras.

Una píldora en la noche al acostarse.

Congestión pulmonar.

Dr. Juan José R. de Arellano. México.

Agua destilada.....	gram.	500. 00
Crémor.....	„	30. 00
Tártaro emético.....	„	0. 05
Jarabe simple c. b.		

Pozuelos. (Dr. M. Jiménez.)

Un pozuelo cada media hora.

En general, en todas las congestiones que tienen por causa una lesión orgánica del corazón, son aplicables con buen resultado los pozuelos tartarizados de D. Miguel Jiménez.

Congestión del útero y sus anexos.

(VULGARMENTE INFLAMACION).

Dr. M. Mucel. México.

Además de combatir la causa:

Inyecciones vaginales de sub-acetato de plomo líquido, dos cucharadas en grm. 500. 00 de agua. Lientos húmedos (una toalla empapada en agua fría y esprimida después) cubiertos de una tela impermeable ó de franela seca y renovados cada dos horas. Reposo en cama si es posible, ó muy necesario, y al interior una poción opiada ó mejor la anticamnia.

Conmoción cerebral.

Dr. D. Molinar.

Parral.

Agua destilada.....	grm.	150	00
Bromuro de potasio.....	„	2.	00
Id. de sodio.....	„	2.	00
Valerianato de amoniaco.....	„	0.	50

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Constipacion.

Dr. J. López Tello.

Amecameca. E. de México.

Combatir la causa y

Podofilina grm. 0. 10

Miel..... c. b.

Para 5 píldoras.

Una al acostarse.

Dr. M. Alfaro.

México.

Ha encontrado como signo de la sífilis latente, la constipación habitual. Dato muy importante y que ha comprobado por 30 años de práctica médica.

Dr. Jesús Villagrán,

México.

Sal de Vichy..... grm. 6. 00

Polvo de hojas de belladona..... „ 0. 30

Para 12 papeles.

Tres ó cuatro papeles repartidos en el día.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato

Podofilina..... grm 0. 50

Extracto de belladona..... „ 0. 05

Sulfato de estriquina..... „ 0. 02

En 10 píldoras.

Una píldora al acostarse todas las noches.

Se suspende su uso por algunos días cuando hayan producido su efecto.

Dr. Cárlos Amezcua. Tehuacán.

Extracto blando de ruibarbo..... grm. 4. 00

Polvo de hojas de belladona..... „ 0. 30

Podofilina..... „ 0. 10

Polvos de Dower..... „ 0. 50

En 20 píldoras.

De dos á cuatro píldoras á la hora de acostarse.

Después de usarlas algunos días basta tomar una ó dos para obtener una evacuación fácil á la mañana siguiente.

Constipación habitual.

Dr. Miguel Cordero. México.

Cuando tiene por causa una atonía de la mucosa intestinal:

Extracto fluido de cáscara sagrada.. grm. 10. 00

Gotas.

Dos gotas el primer día; aumentar igual cantidad los días siguientes hasta obtener el efecto.

Dr. Guillermo R. Servín.	Triunfo. Baja California.
Podofilina	gram. 0. 20
Extracto de belladona	„ 0. 03
Jabon Medicinal	„ 1. 00

En 10 píldoras.

Una píldora al acostarse; si no produce el resultado se toman dos.

Dr. Lázaro Ortega.	México.
Acíbar	gram. 0. 50
Calomel	„ 0. 50
Goma guta	„ 0. 50
Extracto de coloquintidas	„ 0. 50

En 10 píldoras

De una á cuatro al acostarse.

Dr. Manuel Uribe.	México.
Podofilina	gram. 0. 12
Extracto de belladona	„ 0. 12

En 12 píldoras.

De una á tres píldoras todas las noches al acostarse.

Contusiones.

Dr. Manuel de Anaya.	Guanajuato.
Cocimiento de hojas de nogal	gram. 500. 00
Alcohol alcanforado	„ 60. 00
Tintura de árnica	„ 60. 00
Extracto de Saturno líquido	„ 30. 00

Defensivos.

Que se deben cambiar con frecuencia.

Se pueden también aplicar en las fracturas mojan-
do las vendas.

Corazón, sus lesiones.

1er. PERIODO

Dr. E. Gutiérrez Guadalupe. E. de Zacatecas

POCION ANTIESPASMÓDICA.

Infusión de tilia.....	gram.	100.	00
Bromuro de sodio de 4 á.....	„	8.	00
Extracto fluido de convalaria...	„	2.	00
Jarabe de éter.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Gránulos de iodoformo de un centígramo, de 6 á diez diarios.

2.º PERIODO.

POCION CARDIOTÓNICA.

Infusión de hojas de digital, 2 para..	gram	120.	00
Bromuro de alcanfor.....	„	2.	00
Sulfato de esparteina de 5 á.....	„	0.	10
Acetato de amoniaco.....	„	10.	00
Jarabe de cafeina.....	„	20.	00

Cucharadas.

Una cada hora.

O bién, píldoras cardiacas.

Iodoformo.....	gram.	0.	20
Cafeina.....	„	0.	80
Tintura de estrofantus.....		15	gotas.

Para 10 píldoras.

Una cada hora.

INYECCIÓN HIPODÉRMICA DE CAFEINA,

Agua destilada.....	gram.	6.	00
Cafeina.....	„	1.	50
Salicilato de sosa.....	„	0.	50

Una ó dos jeringas diarias

INYECCION HIPODÉRMICA DE PILOCARPINA.

Agua destilada. : gm. 9, 85
 Clorhidrato de pilocarpina. „ 0. 15

Una ó dos jeringas por la noche.

Laxantes más ó menos frecuentes, de preferencia el calomel de 0. 40 á 0. 60

Régimen lácteo más ó menos riguroso, según el estado del riñon.

Corea.

Dr. Juan José Ramírez de Arellano. México.

COREA REUMATISMAL.

Ioduro de potasio á dosis fuertes según la edad del enfermo.

Dr. Lázaro Ortega. México.

Asafétida. }
 Extracto de genciana. } de c. c. partes iguales.
 Polvo de raíz de valeriana }

Para hacer píldoras de 15 centigramos cada una.

De seis á quince píldoras repartidas en tres tomas.

Dr. Francisco de P. Crespo. Huamantla.

Hidrato de cloral. gm. 4. 00

Bromuro de potasio. „ 8. 00

Jarabe de azahar. „ 180. 00

Cucharadas.

Una cucharada tres veces al día en medio vaso de agua endulzada, sobre los alimentos. Pulverizaciones de éter sulfúrico sobre la columna vertebral.

Corea sintomática del artritisismo.

Dr. E. Liceaga. México.

Usa la fórmula siguiente con excelentes resultados.

Infusión de epazote..	grm.	120.	00
Propilamina.....	1, 2 ó „	3.	00 según la edad.
Jarabe de canela.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cada hora, continuadas por muchos días.

Usadas al principio del mal, impide su desarrollo. Empleadas un poco más tarde abrevia la duración de la enfermedad.

Dr. M. Mucél.

México.

Pulverizaciones de éter sulfúrico en el trayecto de la columna vertebral.

Al interior.

Salicilato de sosa y ioduro de potasio sucesivamente y á dosis adecuadas á la edad del paciente, terminando por la hidroterapia.

Dr. J. López Tello.

Amecameca. E. de México.

Antipirina y bromuro de potasio mezclados en partes iguales y hacer papeles de 0. 30 cada uno; para dar un papel dos veces al día en infusión de hojas de naranjo.

Dr. Austasio Martínez.

México.

Bromuro de potasio.....	grm.	4.	00
id. de alcanfor.....	„	0.	20
Valerianato de zinc.....	„	0.	60

Para 24 papeles.

Para tomar de dos á tres papeles en el día.

Una cucharada de vino de Hidalgo Carpio al empezar á comer.

Baños de regadera. Ejercicio al aire libre.

Alimentación nutritiva.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

COREA EN LOS NIÑOS.

Agua destilada.....	gram.	10. 00
Licor arcenical de Fowler.....	„	10. 00
Clorhidrato de narceina.....	„	0. 05

Gotas.

Cinco á la hora de acostarse. Aumentar hasta ocho.

Creosotina iodada.

Dr. Manuel S. Soriano. México

Creosota.....	gram.	30. 00
Iodo sublimado.....	„	2. 50

Creosotina iodada.

Usos y dosis son conocidos de todo médico.

Crup.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

EN LOS NIÑOS DE 2 Á 4 AÑOS.

Clorhidrato de apomorfina....	gram.	0. 02
Agua destilada.....	„	100. 00

Inyecciones.

Divídase en cinco partes para poner una cada dos horas.

Dr. Eduardo Liceaga. México.

Agua destilada.....	gram.	100. 00
Clorhidrato de pilocarpina.....	„	0. 02
Papaina.....	„	0. 50
Jarabe de corteza de naranja..	„	20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora. Retardarlas si hay muchos vómitos, salivación excesiva ó sudores muy profusos.

Si el niño está muy débil, alternar las cucharadas con cucharadas de un vino generoso.

Glicerina grm. 10. 00

Iodoformo en polvo „ 1. 00

Toques.

Tocar frecuentemente hasta que caigan las falsas membranas.

Cuernecillo de centeno.

Dr. Antonio J. Carbajal. México.

Prefiere á todas las formas en que se administra esta sustancia, el extracto fluido que es cómodo para administrar y se conserva muy bien: 20 gotas representan un gramo de cuernecillo fresco.

Chancro blando.

Dr. Miguel Cordero México.

Sulfato de quinina grm. 1. 00

Salicilato de bismuto „ 4. 00

Para la curación.

Cubrir la úlcera con el polvo después de haberla lavado con agua hervida.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Agua grm. 500. 00

Permanganato de potasa „ 5. 00

Lavatorio.

Lavatorio dos veces al día y en seguida aplicar iodoformo en polvo fino.

Dr. Benito Soriano F. México.

CHANCRO BLANDO Y ULCERACIONES DE ASPECTO CHANCROSO.

Vacilina grm. 20. 00

Iodoformo.....	„	2. 00
Ácido tánico.....	„	2. 00
Esencia de menta.....	„	0. 50

Pomada.

Este modo de emplear el iodoformo asociado con el tanino, tiene la ventaja de quitar por completo el mal olor del iodoformo. Si la cantidad de iodoformo se aumenta, se hará otro tanto con la de ácido tánico, poniendo siempre iguales cantidades, salvo en el caso de poner un solo gramo de iodoformo, pues entonces se necesita uno y medio de tanino.

Chancro fagedénico.

Dr. Manuel Carmona y Valle, México.

Vacelina blanca.....	gram.	30. 00
Ácido tánico.....	„	4. 00

Pomada.

Para curar el chancro dos veces al día después de un lavatorio antiséptico.

Dacriosisitis.

Dr. Fernando López, México.

EN LA DACRIOSISTITIS CATARRAL Ó SUPURADA.

Glicerina neutra.....	gram.	5. 00
Agua destilada.....	„	5. 00
Cianuro de mercurio.. de 0. 02 á	„	0. 05

Para inyecciones en el saco lacrimal.

Deglución difícil.

Cuando la deglución se hace difícil ó imposible en los padecimientos inflamatorios de la garganta, el síntoma dolor, causa del espasmo, se suprime poniendo

en la raíz de la lengua del enfermo, un gránulo de un milígramo de aconitina, y que se repite cada diez minutos hasta que se obtenga el efecto, que se consigue á los tres ó cuatro gránulos. Si no es posible colocar el gránulo, se puede usar una solución para aplicar con pincel ó en pequeña cucharadida procurando que el líquido se ponga en contacto con las partes inflamadas.

Delirium tremens.

Dr. Aurelio Pérez. La Piedad. E. de Michoacán

Clorhidrato de amoniaco..... grm. 2. 00

Para 3 papeles.

Uno cada cuatro horas.

Delirio alcohólico.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

Valerianato de zinc..... grm. 1. 00

Alcanfor..... „ 0. 30

Morfina..... „ 0. 05

Para 8 píldoras.

Una en la mañana y otra en la tarde ó noche.

Dr. Miguel Cordero. México.

Jarabe de cloral de Foller..... grm. 60. 00

Bromuro de sodio..... „ 2. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta producir el sueño.

Dr. Francisco de P. Crespo. Huamantla.

Bromuro de potasio..... grm. 2. 00

Agua de azahar..... „ 150. 00

Jarabe de morfina „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Hidrato de cloral gm. 1. 00

Leche „ 180. 00

Una yema de huevo.

Lavativa.

Esta lavativa se repite á las 12 horas si hay necesidad.

Dentición en los niños, desórdenes nerviosos.

Dr. Ramón Martínez Carriedo. México.

Agua de yerba-buena gm. 30. 00

Bromuro de sodio „ 3. 00

Tintura de almizcle 6 gotas.

Gotas.

Diez gotas tres veces en el día en agua de azúcar.

DIABETIS AZUCARADA.

Dr. Juan N. Campos. Toluca.

Agua destilada gm. 10. 00

Clorhidrato de pilocarpina „ 0. 05

Gotas.

De diez á veinte gotas tres veces al día.

Diabetis.

Dr. E. Lier. México.

Codeina gm. 0. 03

Tres veces al día.

Despues de diez días gm. 0. 05

Tres veces al día.

Diabetis con accidentes cerebrales.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

Cocimiento de lúpulo grm. 120. 00

Jarabe de azahar „ 16. 00

Carbonato de amoniaco de 1 á „ 3. 00

3 tomas.

Una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche.

Diabetis azucarada.

Dr. Manuel Villaseñor. Pénjamo.

En tres casos de diabetis azucarada que habian sido tratados sin éxito por los medios conocidos, se ha visto bajar y despues desaparecer la azúcar, disminuir la cantidad de orina hasta la normal, desaparecer la sed y demás síntomas hasta recobrar el bienestar: usando á pasto y casi por único alimento y medicina la calabaza cocida ó azada. La sed es uno de los primeros síntomas que desaparecen. Solamente en caso necesario se ocurrirá á la estriquina, morfina, alcoholes etc., etc.

Diarrea.

Dr. Lázaro Ortega. México.

CON DISPEPSIA EN LOS NIÑOS.

Infusión de yerba del ángel em-

patosium colini grm. 50. 00

Aguardiente catalán „ 50. 00

Jarabe de corteza de cidra „ 50. 00

*Para tomar una copita, antes de las comidas.***Diarrea catarral de la dentición.**

Cocimiento de arroz grm. 120. 00

Subnitrato de bismuto.....	„	4. 00
Jarabe de goma.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. I. Martinez del Villar.

México.

DIARREA REBELDE.

Subnitrato de bismuto.....	gram.	6. 00
Carbonato de cal.....	„	6. 00
Ácido tánico.....	„	1. 00
Extracto tebaico.....	„	0. 10

En 6 papeles.

Uno ó dos papeles diarios.

Otra:

Bicarbonato de sosa.....	gram.	4. 00
Óxido de zinc.....	„	4. 00
Extracto alcohólico de nuez vó- mica.....	„	0. 06
Extracto tebaico.....	„	0. 06

En 6 papeles.

Dos papeles al día.

Diarrea.

Dr. Marcos Mazarí.—Mineral Huautla. E. de Morelos.

Infusión de crameria.....	gram.	125. 00
Subnitrato de bismuto.....	„	6. 00
Ácido tánico.....	„	1. 00
Láudano de Sydenham.....	„	2. 00
Jarabe simple.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Otra:

Subnitrato de bismuto	gram.	6. 00
Electuario de diascordio	,,	3. 00
Extracto de opio	,,	0. 10

En 12 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. Manuel de Anaya.

Guanajuato.

Cocimiento de lúpulo	gram.	120. 00
Jarabe de goma	,,	20. 00
Tanino	,,	0. 50
Láudano de Sydenham		8 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Otra:

Cocimiento blanco	gram.	150. 00
Jarabe de azahar	,,	30. 00
Carbonato de cal	,,	3. 00
Tintura de catecú	,,	3. 00
Láudano de Rousseau		10 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Pedro Acosta.

Guadalajara.

Óxido de zinc	gram.	0. 50
Carbonato de cal	,,	8. 00
Agua de azahar	,,	150. 00
Jarabe diacodion	,,	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Diarrea.

Otra:

Extracto de crameria	gram.	4.	00
Acetato de plomo cristalizado	„	0.	20
Opio	„	0.	15

En 20 píldoras.

Una píldora cada hora ó cada dos horas.

Otra:

Óxido de zinc	gram.	2.	00
Bicarbonato de sosa	„	2.	00
Extracto de crameria	„	2.	00
Opio	„	0.	10

En 4 papeles.

Un papel cada tres horas.

Otra:

Tanato de quinina	gram.	2.	00
id. de bismuto	„	2.	00

En 12 papeles.

Un papel cada tres horas.

Dr. Alberto B. Orduña.

Tehuacán.

Extracto de crameria	gram.	0.	50
Catecú	„	0.	50
Opio	„	0.	05

En 10 píldoras.

Una píldora cada hora en los dos ó tres primeros días y en los siguientes se tomarán cada dos horas.

Dr. Ciro M. Santelices.

Querétaro.

Subnitrate de bismuto	gram.	12.	00
---------------------------------	-------	-----	----

Salicilato de bismuto	gram.	2. 00
Salol	„	0. 35
Extracto de opio	„	0. 10

En 12 obleas.

Una oblea cada tres horas.

Otra:

Salicilato de bismuto	gram.	5. 00
Naftol (beta)	„	0. 30
Extracto de opio	„	0. 10

En 12 cápsulas.

Una cápsula cada dos horas.

DIARREA.

Dr. Gabriel J. Chávez. Tasco. E. de Guerrero.

Extracto de crameria	gram.	2. 00
Polvo de ipecacuana	„	1. 00
Id. de catecú	„	1. 00
Extracto de opio	„	0. 20

Para 40 píldoras.

Una cada tres horas.

—

Dr. C. Santander. Salamanca. E. de Guanajuato.

Agua de Canela	gram.	60. 00
Subnitrato de bismuto	„	10. 00
Jarabe de crameria	„	30. 00
Láudano de Sydenham...de 0.50 á	„	1. 00

Una toma.

—

Dr. Enrique Herrera Moreno.—Córdoba. E. de Veracruz.

Infusión de raíz de colombo 1% gram. 120. 00

Salicilato de bismuto.....	„	10. 00
Salol..... de 3 á	„	5. 00
Extracto de opio.....	„	0. 05
Jarabe simple.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Constancio Mota.		Puruándiro.
Vino rojo.....	gram.	30. 00
Bol de armenia.....	„	1. 50
Fosfato de cal puro.....	„	15. 00
Jarabe de opio.....	„	30. 00
Agua.....	„	120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Lacto-fosfato de cal.....	gram.	30. 00
Extracto de crameria.....	„	1. 50

Para 15 papeles.

Cuatro papeles en el día.

Dr. Salvador F. Alcalá.		Tecolotlán.
-------------------------	--	-------------

EN LA PRIMERA INFANCIA.

Calomel.....	gram.	0. 10
Polvo de ruibarbo.....	„	0. 05
Id. de Dower..... de 0. 05 á	„	0. 10
Carbonato de cal precipitado....	„	0. 60

En 6 papeles.

Empezar por un vomitivo de ipecacuana, y al día siguiente un papel cada tres horas. Regularizar los alimentos.

Dr. Antonio C. Guzmán. H. Matamoros.

Subnitrato de bismuto..... grm. 6. 00

Polvos de Dower..... „ 1. 00

En 12 papeles.

Un papel cada hora.

Dr. José María Benitez. Guadalajara.

Calomel..... grm. 0. 05

Ipecacuana..... „ 0. 05

Extracto de opio..... „ 0. 20

En 10 píldoras.

Una píldora cada dos horas. Usadas con muy buen éxito.

Dr. Severo L. Guerrero. Matamoros.

Óxido de zinc..... grm. 5. 00

Polvos de Dower..... „ 0. 50

Bicarbonato de sosa..... „ 0. 60

En 6 papeles.

Tres papeles repartidos en el día.

Diarrea.

Dr. Eufemio Gutiérrez. Guadalupe. Zacatecas.

EN LOS NIÑOS.

Agua destilada..... grm. 80. 00

Ácido láctico..... „ 1. 00

Elixir de M.^o Mun... *1 á 2 gotas.*

Lactopeprina..... „ 0. 30

Jarabe simple..... „ 20. 00

Cucharaditas.

Dosis: una cucharadita cada hora.

Dr. Federico Abrego. México.

DIARREA VERDE EN LOS NIÑOS.

Azúcar de leche.....	gram.	4. 00
Papaina.....	„	0. 50
Naftol (beta).....	„	0. 05

En 8 papeles.

Dosis: cuatro papeles repartidos en el día.

Dr. G. Parra. Tacubaya.

DIARREA DE LA DENTICIÓN.

Agua.....	gram.	100. 00
Elíxir paregórico <i>de 3 á 5 gotas.</i>		
Lisol puro <i>3 gotas.</i>		
Jarabe de canela.....	„	15. 00

Cucharaditas.

Dósis: una cucharadita cafetera cada hora.

Dr. M. Medal. Tacámbaro. E. de Michoacán.

Ácido tánico.....	gram.	0. 30
Extracto tebaico.....	„	0. 10

En 10 píldoras

Dósis: de cuatro á seis píldoras repartidas en el día.

EN LA FORMA CRÓNICA.

Subnitrato de bismuto.....	gram.	4. 00
Bolo de armenia.....	„	8. 00
Agua de lechuga.....	„	30. 00
Agua gomosa.....	„	160. 00

6 lavativas repartidas en el día.

Dr. M. Pérez Redondo. México.

DIARREA VERDE EN LOS NIÑOS.

Agua destilada.....	gram.	100. 00
---------------------	-------	---------

Ácido láctico „ 2. 00

Cucharaditas.

Dosis: una después de cada mamada.

Diarrea atónica.

Dr. A. J. Carbajal. México.

Extracto de monesia grm. 2. 00

„ de núez vómica „ 0. 10

„ tebaico „ 0 05

Para 12 píldoras.

Tres ó cuatro píldoras al día.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid. México.

Polvo de goma de Sonora grm. 2. 00

Id. de azúcar „ 2. 00

En 12 papeles.

Un papel cada dos horas.

Otra.

Salicilato de bismuto grm. 0. 50

Naftol „ 0. 50

En 6 obleas.

Dos ó tres obleas en el día.

Óxido de zinc puro grm. 1. 20

En 12 píldoras.

Una píldora cada dos horas alternadas con las obleas.

Inyección hipodérmica diaria de estriçnina, empezando por medio milígramo y llegando á tres milígramos y teniendo como rehículo cognac.

Por único alimento leche de burra.

Dr. José Luna. Autlán.

Alumbre.....	gram.	0. 20
Extracto de colombo.....	„	0. 30
Opio..... de 0. 05 á „	„	0. 10

En 8 píldoras.

Una píldora cada hora.

Diarrea crónica.

Dr. C. M. Garza.—S. Pedro de las Colonias. E. de Coahuila.

Salicilato de bismuto.....	gram.	10. 00
Naftol beta.....	„	10. 00

Para 20 obleas.

Una oblea cada dos ó tres horas.

Otra.

Salicilato de bismuto.....	gram.	5. 00
Extracto de crameria.....	„	1. 00
Tanino.....	„	1. 00
Extracto de opio.....	„	0. 10

Para 10 papeles.

Cuatro papeles en el día.

Dr. Pablo Gama, México.

Sulfato de alumina y potasa.....	gram.	0. 30
Extracto tebaico.....	„	0. 05
Catecú.....	„	0. 60

En 12 papeles.

Tres papeles repartidos en el día.

Dr. Manuel Gutierrez Zavala. México.

Extracto de crameria.....	gram.	1. 00
---------------------------	-------	-------

Extracto de colombo	gram.	1. 00
Id. tebaico	„	0. 10
Id. de nuez vómica	„	0. 10

En 10 píldoras.

Una píldora tres veces al día lejos de los alimentos.

Otra.

Óxido de zinc puro	gram.	4. 00
Bicarbonato de sosa	„	4. 00
Extracto de opio	„	0. 05
Id. nuez vómica	„	0. 05

En 8 papeles.

Uno, dos ó tres papeles al día.

Diarrea coleriforme.

Dr. J. M. Arroyo. Irapuato, E. de Guanajuato.

Infusión de manzanilla romana, gram.	120. 00
Bicarbonato de sosa	„ 4. 00
Tintura de nuez vómica	„ 2. 00
Láudano de Sydenham	„ 1. 20
Jarabe simple	„ 30. 00

Cucharadas.

Dos cada media hora.

Dr. Erasmo O. Romero. — Ozuloama.

ENTERITIS COLERIFORME, DE ORIGEN PALUSTRE.

Sulfato de sosa	gram.	1. 00
id. de quinina	„	1. 00
Subnitrato de bismuto	„	2. 00
Extracto de opio	„	0. 05

En 8 obleas.

Una oblea cada media hora.

Diarrea fétida.

Dr. E. Gutierrez. Guadalupe. E. de Zacatecas.

Infusión de raíz de colombo...	gram.	100.	00
Tanato de bismuto.....	„	8.	00
Naftol beta.....	„	2.	00
Creolina.....	„	0.	10
Jarabe de menta.....	„	50.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. J. López Tello. Amecameca.

Salicilato de bismuto.....	gram.	2.	00
Naftol (beta).....	„	2.	00

En 10 papeles.

Un papel despues de cada alimento.

Dr. R. Ortega. Ciudad Porfirio Díaz.

EN LA DENTICIÓN DE LOS NIÑOS.

Solución de goma.....	gram.	120.	00
Acido láctico.....	„	2.	00
Papaina.....	„	0.	50
Jarabe balsámico.....	„	30.	00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Diarreas palustres.

Dr. Angel Nieto. Palmarejo. E. de Chihuahua.

Usa con buen resultado el salol y recomienda igualmente la fórmula siguiente:

Subnitrato de bismuto.....	gram.	10.	00
----------------------------	-------	-----	----

Salicilato de sosa „ 5. 00

Para 10 papeles.

Tomar tres ó cuatro papeles al día.

Diarrea verde en los niños.

Dr. I. Martínez del Villar.

México.

Mercurio con creta grm. 0. 12

Salicilato de sosa „ 0. 12

En 12 papeles.

Un papel cada hora.

En dos casos en que había fallado el ácido láctico y el calomel, el resultado con esta medicina ha sido favorable.

Dr. Antonio J. Carbajal.

México.

Agua destilada grm. 60. 00

Pancreatina „ 2. 00

Acido láctico „ 0. 50

Cucharaditas.

Una cucharadita antes del alimento, En poco tiempo se modifica y queda diarrea simple.

Si hay tenesmo sectal:

Agua destilada grm. 60. 00

Creolina 3 gotas.

2 Lavativas.

La mitad en la mañana y la otra en la tarde.

Dr. J. López Tello.

Amecameca. E. de México.

Solución gomosa grm. 80. 00

Ácido láctico „ 2. 00

Jarabe simple..... „ 20. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita después de cada mamada.

Dr. D. Molinar. Parral.

Polvos de ruibarbo..... grm. 0. 30

Calomel..... „ 0. 15

Una toma.

Dr. José María Benítez. Guadalajara.

Calomel..... grm. 0. 05

Polvos de Dower..... de 0. 05 á „ 0. 10

Azúcar de leche..... „ 2. 00

En 20 papeles.

Un papel cada dos horas.

Otra:

Ácido láctico..... grm. 1. 00

Agua destilada de lechuga..... „ 100. 00

Jarabe..... „ 20. 00

Esencia de menta..... *Una gota.*

Cucharaditas.

Una cucharadita después de cada mamada.

Dr. Erasmo O. Romero, Ozuloama

Calomel al vapor..... grm. 0. 15

Azúcar de leche..... „ 0. 50

En 2 papeles

Un papel cada dos horas, una hora después de haber tomado el pecho.

Al día siguiente:

Subnitrato de bismuto.....	gram.	2. 00
Extracto de crameria.....	„	0. 50

En 8 papeles.

Un papel cada dos horas,
ó bien

Agua destilada.....	gram.	90. 00
Ácido láctico.....	„	2. 00
Jarabe de crameria.....	„	15. 00

Cucharadas.

Una cada hora.

Dr. Juan C. Villaseñor.

Morelia.

Hidrolado de azahar.....	gram. de	6. 00 á 20. 00
Ácido láctico puro.....	„ de	0. 40 á 1. 00
Extracto de crameria....	„ de	0. 50 á 2. 00
Salicilato de bismuto....	„ de	0. 50 á 2. 00
Jarabe de membrillo....	„ de	30. 00 á 80. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada media hora, haciéndolas preceder de una ó dos tomas de aceite de ricino de 4 ó 6 gramos. Reglamentar la alimentación.

Subnitrato de bismuto.....	gram.	1. 30
Salicilato de id.....	„	1. 30
Solución de goma.....	„	25. 00
Agua de lechuga.....	„	25. 00
Jarabe de crameria.....	„	20. 20
Id. de membrillo.....	„	15. 00

Cucharadas

Una cucharada cada hora.

Si hay moco en las deposiciones y tenesmo sectal se usarán las siguientes lavativas:

Cloruro de sodio.....	gram.	1. 00
Agua sulfocarbonada.....	„	100. 00

Lavativas.

Dos lavativas diarias cada una de 15 gramos.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Acido láctico.....	gram.	2. 00
Agua.....	„	120. 00
Jarabe de grosella.....	„	35. 00

[Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Diarrea infantil.

Dr. Antonio Butron. Acapulco.

Salicilato de bismuto.....	gram.	1. 00
Azúcar de leche.....	„	1. 50

En 10 papeles.

Un papel cada media hora, en leche.

Agua de cal.....	gram.	100. 00
Id. natural.....	„	100. 00

Cucharadas.

Dos cucharadas después de cada papel.

Dr. Benjamin Rosano. Mineral del Monte, (Hidalgo).

Mercurio con creta.....	gram.	0. 20
Salicilato de bismuto.....	„	0. 20

En 10 papeles.

Un papel cada hora, sobre todo cuando hay vómitos.

EN LA DIARREA CRÓNICA.

Solución de goma.....	gram.	100. 00
-----------------------	-------	---------

Ácido sulfúrico diluido 4 gotas.

Jarabe simple..... „ 15. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada dos horas.

Dr. Cárlos Amezcua. Tehuacán.

Jarabe simple..... grm. 75. 00

Polvo de ruibarbo..... „ 1. 00

Bicarbonato de sosa..... „ 8. 00

Cucharaditas.

Tres ó cuatro cucharaditas por día, durante seis ú ocho días.

Por alimento, leche, té con leche ó atole.

Cada tres horas una taza con pan.

Dr. Benjamín Treviño. S. Miguel Allende.

Agua hervida..... grm. 100. 00

Ácido láctico..... de 1 á „ 2. 00

Papaina..... „ 0. 15

Jarabe simple..... „ 20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora y antes del alimento.

Diarrea de la dentición.

Dr. Pedro Acosta. Guadalajara.

Elíxir digestivo del Profesor A. Herrera, una cucharadita con cada alimento.

En las diarreas que han agotado á los niños:

Corteza de nuez lisa..... grm. 60. 00

Vino tinto..... „ 300. 00

Dejarla macerar por algunos días.

Cucharaditas.

Una cucharadita en agua de azúcar cada media hora.

Otra.

Óxido de zinc gm. 0. 30

Bicarbonato de sosa „ 0. 30

En 4 papeles.

Un papel cada tres horas.

Proporcionar la dosis á la edad.

Otra.

Extracto de crameria gm. de 2 á 4. 00

Jarabe de genciana „ 60. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Lavativas con 200 gramos de agua y 10, 15 ó 20 centígramos de acetato de plomo.

En la diarrea producida por la ingestión de alimentos impropios; empezar por un purgante.

Indigo gm. 1. 00

Magnesia calcinada „ 2. 00

En 3 papeles.

Un papel cada ocho horas en chocolate hasta obtener cuatro ó cinco deposiciones. Esta dosis es para niños de 3 á 5 meses. Para niños menores de 7 años Indigo 3. y magnesia 5 gramos.

Se puede usar tambien el aceite de ricino proporcionando la dosis á la edad.

Diarrea serosa.

Dr. Lázaro Ortega.

México.

Tanino gm. 1. 00

Extracto de colombo.....	„	0. 50
Id. de opio.....	„	0. 20

En 20 píldoras.

Tres ó cuatro píldoras por día.

Dr. D. Molinar. Parral.

Agua destilada.....	gram.	200. 00
Subnitrato de bismuto.....	„	15. 00
Cotoina vera.....	„	0. 50

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Diarrea de los tuberculosos.

Dr. Ciro M. Santelices Querétaro.

Crema de fosfato de cal gelati- noso.....	gram.	120. 00
Subnitrato de bismuto.....	„	6. 00
Salicilato de bismuto.....	„	2. 00
Jarabe de opio.....	„	16. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Dr. Juan C. Villaseñor. Morelia.

Sulfato de zinc.....	gram.	0. 15
Extracto tebaico.....	„	0. 15

En 15 píldoras.

Una píldora cada hora ó cada dos horas.

Otra.

Vino rojo superior.....	gram.	45. 00
id. de tres quinas.....	„	45. 00
Extracto de crameria.....	„	1. 00

Acido tánico.....	„	1. 00
Fosfato de cal precipitado.....	„	6. 00
Carbonato de cal precipitado..	„	6. 00
Jarabe de quina.....	„	40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Disenteria.

Dr. Leonides E. Jonguitud.

Tenango.

DISENTERIA REBELDE DE LOS NIÑOS.

Fosfato de cal precipitado.....	gram.	3. 00
Extracto de crameria.....	„	6. 50
Láudano de Sydenham.....	2 gotas.	

En 12 papeles.

Un papel cada dos horas ó cada hora en cucharaditas de cocimiento de canela endulzado.

Dr. M. Pérez Redondo.

México.

Naftol.....	gram.	4. 00
Salicilato de bismuto.....	„	4. 00

En 6 ú 8 obleas para consumirse en el día.

Lavativas pequeñas astringentes y laudanizadas despues de cada deposición. ;

Dieta láctea.

Dr. Vicente Sierra.

Apam.

Polvos de ipecacuana.....	gram.	0. 40
Calomel.....	„	0. 20
Extracto de opio.....	„	0. 05

En 8 píldoras.

Una cada dos horas.

Dr. Melesio Medál. Tacámbaro.

Polvos de ipecacuana.....	gram.	1. 00
Protocloruro de mercurio.....	„	0. 12
Extracto de opio.....	„	0. 10

En 10 píldoras

Cinco repartidas en el día.

Alimentos sin sal.

Dr. Pedro Peña. Zamora.

Polvos de almidón.....	gram.	4. 00
Salicilato de sosa.....	„	4. 00
Polvos de goma arábica.....	„	8. 00

En 12 papeles.

Uno cada dos horas.

Dr. Leandro Arroyo. San Angel.

En las disenterias con deposiciones sanguineo-purulentas, lavativas pequeñas de cocimiento de quina y un poco de cloruro de sodio.

Disenteria.

Dr. José M. Robredo. Topia, E. de Durango.

FORMA BENIGNA.

Agua destilada azucarada....	gram.	120. 00
Magnesia calcinada.....	„	8. 00

Para tomar.

Para tomarla de una sola vez.

En seguida se hace uso de las fórmulas siguientes:

Agua hirviendo.....	gram.	120. 00
Ruibarbo.....	„	4. 00

Subnitrato de bismuto	„	3. 00
Múcilago	„	120. 00
Tintura de opio	„	1. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada tres ó cada seis horas.

Calomel	gram.	1. 00
Polvo de ipecacuana	„	0. 50
Polvo de Dower	„	1. 50

Para 10 papeles.

Uno cada tres ó seis horas.

Jarabe simple	gram.	120. 00
Ácido tánico	„	1. 00
Tintura de opio		25 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada tres ó seis horas.

En la disenteria aguda añade á este tratamiento.

Bálsamo tranquilo y

Pomada de belladona de c. c. gram. 15. 00

Friega.

Al vientre tres veces al día.

Con los alimentos una cucharadita de carbón de Belloc.

EN LA DISENTERIA CRÓNICA.

Extracto de opio	gram.	0. 30
Ácido pirogálico	„	0. 50
Id. salicílico	„	0. 25
Calomel	„	1. 00
Sulfato de zinc	„	0. 20

Para 12 papeles.

Uno cada tres ó cada seis horas.

Agua hervida.....	gram.	120.	00
Tintura de asafétida.....	„	3.	00
Id. de aloes.....	„	1.	00
Id. de opio.....		15	gotas.

Lavativa.

Para ponerla en una sola vez.

Vino de quina.....	gram.	120.	00
Tintura de catecú.....	} de c. c. „	5.	00
Id. de crameria.....			
Id. de colombo.....			
Sal de Epsom.....			

Cucharadas.

Una cucharada tres veces al día.

En las ulceraciones intestinales que deja la disenteria crónica.

Nitrato de plata cristalizado....	gram.	1.	00
Harina de trigo.....	} de c. c..... c. b.		
Goma arábica.....			
Jarabe simple.....			

Para hacer 50 píldoras.

Una cada tercer día aumentando progresivamente hasta cuatro cada tercer día.

Lavativas con nitrato de plata de 0. 50 á 1. 00, agua destilada 120. 00 cada cinco días.

Alimentos: leche con agua de cal, jaletina, jugo de carne, carne asada y por agua de uso, agua albuminosa.

Dr. Santos Medina.

Juchipila.

Agua destilada.....	gram.	150.	00
Cloral hidratado.....	„	2.	00
Ácido fénico alcoholizado.....	„	1.	00

Jarabe simple „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Dr. R. Ortega.

Ciudad Porfirio Diaz.

Salicilato de bismuto. gm. de 2 00 á 5. 00

Naftol (alfa) „ de 2 00 á 5. 00

Extracto de opio „ de 0 01 á 0. 20

En 20 obleas.

Dos obleas cada media hora.

Despues disminuir y retirar paulatinamente.

Si pasan dos días sin evacuar, usar lavativas de agua fría para conseguirlo.

Dr. M. Samaniego.

Ciudad Juarez.

Inmediatamente despues de una deposición se aplicará una lavativa de agua tibia con dos gotas de ácido fénico y al devolverse esto se aplicará la siguiente:

Agua de malvas gm. 120. 00

Almidón „ 20. 00

Extracto fluido de belladona. . . 3 gotas.

Lavativa.

Salicilato de bismuto gm. 2. 00

Polvos de ipeca „ 0. 30

Extracto alcohólico de opio „ 0. 20

En 10 cápsulas.

Una cada tres horas.

Dr. Ciro M. Santelices.

Querétaro.

Subnitrato de bismuto gm. 12. 00

Ipecacuana.....	„	2. 00
Cocaina.....	„	0. 15
Extracto de opio.....	„	0. 06

En 12 papeles.

Un papel cada hora en agua carbónica.

Agua de linaza.....	gram.	500. 00
Almidón.....	„	8. 00
Extracto de crameria.....	„	8. 00
Láudano de Sydenham.....	„	5. 00

Lavativas.

Tres lavativas al día, cada una de un pozuelo, precedidas de una grande de agua caliente.

Dr. Alberto B. Orduña. Tehuacán.

Raíz de ipecacuana machacada	gram.	4. 00
Agua hirviendo para infundir..	„	150. 00
Jarabe de morfina.....	„	20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora ó cada dos horas.

En 48 horas es casi seguro que se han mejorado la mayor parte de los síntomas.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

CONTRA EL TENESMO RECTAL.

Borato de sosa.....	gram.	2. 00
Iodoformo.....	„	0. 10
Clorhidrato de morfina.....	„	0. 05
Manteca de cacao c. b.		

Para 6 supositorios.

Un supositorio en la mañana y otro en la tarde.

Dr. Manuel F. Ocampo.	Pinos.
Calomel.....	gram. 0. 10
Polvos de ipecacuana.....	„ 0. 05
Extracto de opio.....	„ 0. 05
Azúcar.....	„ 2. 00

En 12 papeles.

Método: un papel cada hora. Dieta láctea.

Dr. L. Arroyo. San Angel, Distrito Federal.

Una píldora pacífica (1) en la mañana, y cuando el tenesmo es muy fuerte otra en la noche.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe. E. de Zacatecas.

Agua de hinojo.....	gram. 100, 00
Sulfato de sosa.....	„ 50. 00
Cloroformo.....	„ 1. 00
Jarabe tártrico.....	„ 50. 00

Purgante.

Después

Calomel.....	gram. 1. 00
Azúcar.....	„ 2. 00

En 12 papeles.

Uno cada dos horas.

(I) PÍLDORAS PACÍFICAS DE LA FARMÁCIA MEXICANA.

Polvo de opio, 30 gramos.
 Acido benzoico, 4 gramos.
 Nuez moscada, 6 gramos.
 Azafrán, 6 gramos.
 Esencia de hinojo, 60 centigramos.
 Esencia de nuez moscada, 60 centigramos.
 Miel, 20 gramos.

Para hacer píldoras de 5 centigramos cada una.

Agua albuminosa.....	gram.	100.	00
Nitrato de sosa.....	„	8.	00
Emetina.....	„	0.	02
Extracto de opio..... de 5 á	„	0.	10
Jarabe simple.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cada dos horas alternando con los papeles.

Infusión de raíz de colombo....	gram.	80.	00
Salicilato de bismuto.....	„	8.	00
Timol.....	„	0.	50
Cloroformo.....	„	1.	00
Jarabe diacodión.....	„	40.	00

Cucharadas.

Una cada dos horas.

Dr. R. López. México.

Infusion de ipecacuana...8 para	gram.	150.	00
Clorato de potasa.....	„	3.	00
Tintura de opio.....	„	1.	00
Jarabe de altea.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cada dos horas.

Dr. Francisco D. Maldonado. Aguascalientes.

EN LA DISENTERIA REBELDE.

Dos lavativas al día de infusión fuerte de ipecacuana.

Dr. Manuel Valdéz y Díaz. Paso de Ovejas, E. de Veracruz.

Subnitrato de bismuto.....	gram.	6.	00
----------------------------	-------	----	----

Goma tragacanto.....	„	2. 00
Infusión de colombo.....	„	120. 00
Láudano de Sydenham.....	30 gotas,	

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Subnitrato de bismuto.....	gram.	2. 00
Agua.....	„	240. 00
Láudano de Sydenham.....	10 gotas.	
Esencia de trementina.....	10 gotas.	
Almidón.....	c. b.	

Una lavativa.

Tres en el día,

Dr. Juan Pérez Espínola. Campeche.

Calomel al vapor.....	gram.	0. 10
Polvo de ipeca.....	„	0. 20
Extracto de opio.....	„	0. 10

En 12 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Esta fórmula la consideró su autor como un específico.

Disnea.

Dr. Francisco M. Arroyo.—Irapuato. E. de Guanajuato

Agua destilada de lechuga....	gram.	120. 00
Id. de laurel cerezo.....	„	5. 00
Jarabe de morfina.....	„	15. 00

Cucharaditas.

Una cada media hora.

Disenteria aguda.Dr. A. Martínez. México.

Aceite de ricino grm. 30. 00

Jarabé de limón „ 30. 00

Purgante.

Pomada de belladona grm. 30. 00

Láudano de Sydenham „ 8. 00

Pomada al vientre.

Carbonato de cal grm. 6. 00

Calomel „ 0. 10

Polvo de ipecacuana „ 0. 30

Extracto de opio „ 0. 05

Para 12 papeles.

Uno cada hora, al día siguiente de la purga.

DISENTERIA EN LOS NIÑOS.

Dr. Pedro Acosta. Guadalajara.

Polvos de ipecacuana grm. de 0. 50 á 1. 00

Nitrato de sosa „ de 1. 00 á 5. 00

Jarabe „ 60. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cafetera cada hora.

Dr. Miguel Cordero México.

Creolina grm. 0. 12

En 12 píldoras.

Una píldora cada hora.

Cocimiento de raíz de escobilla grm. 500. 00

Ácido láctico „ 8. 00

4 Lavativas.

En los niños:

Cocimiento lijero de escobilla....	gram.	125.	00
Ácido láctico.....	„		1. 00
Azúcar c. b.			

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Agua.....	gram.	200.	00
Creolina.....	„		2. 00

Lavativas.

Cada lavativa de 60 gramos. Baños tibios cuando no haya calentura.

Disenteria crónica.

Dr. F. D. Maldonado.

Aguascalientes.

Cuando el nitrato de plata no da resultado:

Agua.....	gram.	200.	00
Tintura de iodo.....	„		3. 00
Ioduro de potasio.....	„		0. 25

Lavativa.

Dr. Antonio J. Carbajal.

México.

En los casos rebeldes.

Infusión de cuasia simarruba..	gram.	500.	00
Subnitrato de bismuto... de 4 á	„		6. 00
Láudano de Sydenham.....			8 gotas.
Jarabe de corteza de naranja..	c. b.		

Bebida.

Disenteria en los niños.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.

Tehuacán.

Infusión concentrada de ipeca

del Brasil.....	gram.	100.	00
-----------------	-------	------	----

Clorato de potasa	„	1. 00
Jarabe de ipeca	„	10. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora ó cada media hora para sostener el estado nauseoso.

Infusión de ipeca	gram. 500.	00
Clorato de potasa	„	5. 00

Lavativas.

Este método puede aplicarse á los adultos aumentando la dosis y asociando preparaciones de opio.

Dr. Alberto B. Orduña. Tehuacán.

Raíz de ipeca	gram.	2. 00
Agua para infundirse	„	100. 00
Jarabe simple	„	16. 00

Cucharaditas.

Una cada hora ó cada dos horas.

Difteria.

Dr. M. Samaniego. Ciudad Juárez.

Infusión de polígala	gram.	120. 00
Sulfato de cobre	„	0. 20
Emético	„	0. 05
Jarabe de ipeca	„	30. 00

Vomitivo

Una cucharada grande cada 10 minutos para un adulto, cafetera para un niño.

Cocimiento de raíz de genciana	gram.	150. 00
Glicerina	„	10. 00
Extracto alcohólico de quina ..	„	4. 00
Ácido bórico	„	2. 00

Jarabe de limón „ 50. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas. Cucharaditas para niño.

Cocimiento de cáscara sagrada grm. 700. 00

Glicerina „ 30. 00

Alcohol alcanforado „ 10. 00

Ácido bórico „ 15. 00

Miel de rosas „ 60. 00

Gárgaras repetidas

Ácido fénico grm. 0. 20

Alcohol á 80° „ 10. 00

Jugo de limón „ 10. 00

Toques.

Tocar las falsas membranas repetidas veces en el día.

Friccionar exteriormente la región afectada con unguento doble y pomada de belladona.

Difteria en los niños.

Dr. Juan Collantes y Buenrostro. México.

Glicerina neutra grm. 30. 00

Salol alcanforado „ 4. 00

Toques.

Sobre las superficies afectadas tres ó cuatro veces al día.

Dr. J. López Tello. Amecameca.

Cocimiento de quina grm. 200. 00

Ácido fénico „ 2. 00

Lavatorio.

Lavatorio cada dos horas en la garganta y nariz.

Glicerina	gram. 25. 00
Ácido fénico	„ 5. 00

Toques.

Tocar las falsas membranas cada 4 horas.

Infusión de quina.....	gram. 125. 00
Extracto de quina.....	„ 4. 00
Jarabe de azahar.....	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Eduardo Liceaga. México.

Agua destilada.....	gram. 100. 00
Clorhidrato de pilocarpina....	„ 0. 02
Papaina.....	„ 0. 50
Jarabe de corteza de naranja..	„ 20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora, retardándolas si hay muchos vómitos, salivación excesiva ó sudores muy profusos. Si hay mucha debilidad en el niño se alternarán las cucharadas con otras de un vino generoso.

Glicerina.....	gram. 10. 00
Iodoformo pulverizado.....	„ 1. 00

Toques.

Tocar frecuentemente hasta que caigan las falsas membranas.

Dismenorrea.

Dr. M. Mucél. México.

DISMENORREA DOLOROSA.

Hacer la medicina causal y para el dolor usar.

Agua de menta.....	gram. 90. 00
--------------------	--------------

Antipirina	„	1. 00
Jarabe simple	„	40. 00

2 tomas con 2 ó 3 horas de distancia.

Para favorecer la bajada del periodo de 6 á 10 cápsulas de apio repartidas en el día.

Dr. Aurelio Pérez. La Piedad. E. de Michoacán.

Analguina	gram.	1. 00
Hidrato de cloral	„	1. 00
Agua	„	150. 00

Lavativa.

Para aplicarla en el momento en que aparece el dolor.

Dr. Miguel Cordero. México.

Tintura alcohólica de azafrán . . .	gram.	4. 00
Id. id. de canela	„	4. 00
Id. id. de opio	„	4. 00

Gotas.

Seis gotas cada hora hasta calmar el dolor.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

Tintura de gelcemiun	<i>10 gotas</i>
Id. de bibumium prunifolium . . .	<i>10 gotas.</i>
Agua	gram. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. José M^a Dávila. Mazatlán.

DISMENORREA DOLOROSA.

Tintura de ruda	gram.	4. 00
---------------------------	-------	-------

Id. de azafrán.....	„	4. 00
Cocimiento de canela.....	„	150. 00
Jarabe de opio.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Dismenorrea.

Dr. José M^a Irys. S. Juan Bautista. E. de Tabasco.

EN LAS CLORO--ANÉMICAS.

Extracto de aloes.....	gram.	0. 50
Id. de ruibarbo.....	„	2. 00

En 20 píldoras.

Una en la mañana y otra en la noche.

Dr. E. Liceaga. México.

En las dismenorreas que no reconocen una causa mecánica por lesiones uterinas.

En las que acompañan á la clorosis.

En las que preceden á la menopacesa.

Infusión de epazote chenopodii		
ambrosiodes.....	gram.	100. 00
Propilamina.....	„	3. 00
Jarabe de canela.....	„	20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora. Repetirlas muchos días

Dr. Guillermo R. Servín. Triunfo. Baja California

DISMENORREA DOLOROSA.

Exalgina.....	gram.	0. 20
Bromuro de potasio.....	„	2. 00

Láudano de Rousseau	10 gotas
Alcohol	c. b.
Acetato de amoniaco	„ 4. 00
Hidrolado de azahar	„ 120. 00
Jarabe	„ 30. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Extracto de valeriana	gram. 1. 00
Id. de asafétida	„ 1. 00
Polvo de castor	„ 0. 15

En 10 cápsulas.

Una cápsula cada hora alternando con las cucharaditas.

Dismenorrea nerviosa.

Dr. A. J. Carbajal. México.

Antipirina	gram. 4. 00
----------------------	-------------

En 8 papeles.

Uno cada media hora hasta quitar el dolor.

Gránulos dosimétricos de codeina . . .	núm. 4
Id. id. de hyosciamina „	1

Una toma.

Repítase cada media hora: con tres ó cuatro se puede calmar el dolor.

Es útil poner al vientre una embrocación de aceite caliente y lienzos tambien calientes.

Dr. I. Martinez del Villar. México.

En las niñas cuya dismenorrea había sido rebelde á los tratamientos usuales, se ha encontrado por el exámen un trabajo ulcerativo del cuello de la matriz

que tratado localmente ha traído la curación de la dismenorrea.

La curación ha sido lavar ampliamente con solución bórica y tocar el cuello con una solución de nitrato de plata tan concentrado como lo exija el caso y como la tolerancia de la enferma lo permita; secando luego con algodón salicilado y dejando un pequeño tapón del mismo algodón para extraerlo al día siguiente.

Las curaciones se hacen cada ocho días.

Mas tarde con tintura de iodo puro ó mezclado con glicerina.

Disodinia.

Dr. José M^a Dávila. Mazatlán. E. de Sinaloa.

Un gránulo de sulfato de estriknina al milígramo, cada hora, hasta diez. He encontrado éste tratamiento muy superior á la ergotina.

Dr. D. Molinar. Hidalgo del Parral.

Infusión de toronjil.....	gram.	120.	00
Tintura de canela.....	„	5.	00
Polvo de cuernecillo de centeno	„	0.	10
Jarabe de yerbabuena.....	„	30.	00

Bebida.

Dispepsia.

Dr. A. Aceves. Guadalajara.

Siendo la dispepsia un síntoma y nó una enfermedad, hay que atacar preferentemente la causa que la origina. Las dos fórmulas de píldoras digestivas y doble digestivas se elegiran según los casos.

Sin olvidar el régimen dietético y la buena higiene, deben preferirse las píldoras digestivas en los casos que predomina la diarrea y las dobles digestivas en los que predomina el estreñimiento

PÍLDORAS DIGESTIVAS.

Carbonato de bismuto.....	gram.	1. 00
Diascordio.....	„	1. 00
Pepsina pura.....	„	1. 00
Lactato de sosa.....	„	1. 00

Para 25 píldoras.

Usando polvo de canela como exipiente.

PÍLDORAS DOBLE DIGESTIVAS.

Pepsina.....	gram.	1. 00
Pancreatina.....	„	1. 00
Lactato de sosa.....	„	1. 00
Extracto de nuez vómica.....	„	0. 05

Para 25 píldoras.

Se toma una píldora antes y otra despues de cada una de las tres comidas usuales, ó solo una despues de cada comida según la intensidad del mal.

Cuando hay dolor y flatalencia se usará el muriato de morfina á la dosis de medio centígramo una hora antes de cada comida, prefiriendo la vía hipodérmica.

Si predomina la acidés, se usará el agua de Vichy y los alcalinos y unas cinco ó más gotas de ácido láctico ó muriático en el agua que se toma al fin de la comida, que debe ser una infusión caliente y lijera-mente aromática, como té limón, hojas de naranjo, azahar, etc. etc. En el intermedio de la comida no se

Debe tomar ningún alimento ni líquido alguno. Durante la digestión debe guardarse reposo completo.

Cuando la dispepsia es neutra, el exceso de dulce tiene buen efecto, sin dejar las píldoras digestivas ó dosis de digestivas según el estado y carácter de la enfermedad.

Deben usarse también los amargos puros sin olvidar la estriquina.

Cuando hay insomnio, cansancio neuromuscular y espasmo cerebral, indicando la desnutrición y la neuropatía, se debe usar la nuez Kola granulada de Aschbacher.

La hidroterapia exacerba el neurosismo y solo debe aconsejarse los baños de esponja violentos cuando la depresión nerviosa se marca.

Dispepsia.

C. M. Garza.—S. Pedro de las Colonias. E. de Coahuila.

Pepsina	gram.	2. 00
Pancreatina	”	1. 00
Maltina	”	0. 20
Ácido láctico ó clorhídrico		4 gotas.
Lactosa	gram.	2. 00

Para 20 cápsulas.

Una cápsula antes ó después de los alimentos.

Dispepsia flatulenta.

Ciro M. Santelices.

Querétaro.

Carbón de Belloc	gram.	4. 00
Pepsina	”	2. 00
Maltina	”	2. 00

Bicarbonato de sosa.....	„	12. 00
Extracto de nuez vómica.....	„	0. 05

En 12 obleas.

Una oblea después de cada comida.

Dispepsia ácida.

Carbonato de cal precipitado...	gram.	10. 00
Bicarbonato de sosa.....	„	10. 00
Cuasina.....	„	0. 04
Salol.....	„	0. 20

En 12 obleas.

Una en medio de cada comida.

Dispepsia pútrida.

Subnitrato de bismuto.....	gram.	10. 00
Carbonato de cal precipitado...	„	10. 00
Salol.....	„	0. 35
Extracto tebaico.....	„	0. 06
Cocaina.....	„	0. 06

En 12 obleas.

Una oblea cada dos horas.

Dispepsia ácida.

Dr. Francisco D. Maldonado. Aguascalientes

Subnitrato de bismuto.....	gram.	10. 00
Magnesia calcinada.....	„	10. 00
Bicarbonato de sosa.....	„	10. 00

Para 30 papeles.

Un papel en cada comida.

Dispepsia atónica.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México

Extracto de nuez vómica.....	gram.	0. 10
------------------------------	-------	-------

Polvo de raíz de genciana..... „ 0. 40

En 10 píldoras.

Una píldora minutos antes de comer.

Dispepsia flatulenta.

Pepsina neutra..... grm. 3. 00

Ácido clorhídrico medicinal..... 10 gotas.

En 6 papeles.

Un papel en la comida.

Dispepsia atónica.

r. Benjamin Cervantes. Rincon de Romos.

Tintura de ruibarbo..... grm. 4. 00

Id. de genciana..... „ 4. 00

Id. de cuasia..... „ 4. 00

Id. de quina..... „ 4. 00

Id. de colombo..... „ 4. 00

Gotas de Baumé..... „ 4. 00

Ácido clorhídrico..... „ 4. 00

Gotas.

De 10 á 12 gotas antes de comer y de cenar, en una opita de cognac.

Dispepsia ácida flatulenta.

r. Guillermo R. Servin. Triunfo. Baja California.

Bicarbonato de sosa..... grm. 10. 00

Óxido de magnesia..... „ 5 00

Polvo de quina..... „ 1. 00

Id. de nuez vómica..... „ 0. 30

Id. de ruibarbo..... „ 0. 50

En 12 papeles.

Un papel despues de cada alimento.

Dispepsia atónica.

Dr. Desiderio G. Rosado. Comalcalco. Tabasco

Bilis de buey 28 gramos para ponerse en digestivo en un litro de vino de Málaga y filtrarse despues.

Una cucharadita antes de los alimentos.

Dispepsia flatulenta dolorosa.

Dr. R. López. México

Asafétida grm. 1. 00

Extracto de valeriana „ 0. 50

Id. de belladona „ 0. 20

Para 20 cápsulas.

Una cápsula una hora despues de cada comida.

Dr. Desiderio G. Rosado. Comalcalco. Tabasco

Tintura de cocobá (Aristolochia) que no es el con durango ó Huaco, 28 gramos en un litro de Jeréz de Málaga para tomar una cucharada antes de las comidas.

Dispepsia gastrálgica.

Dr. J. M^a Dávila. Mazatlán

Pepsina grm. 1. 00

Pancreatina „ 0. 50

Ácido clorhídrico 2 gotas.

Para 10 píldoras.

Una píldora en cada comida.

Dispepsia pútrida y ácida.

Dr. Salvador F. Alcalá. Tecolotlán

Naftol grm. 0. 30

Salicilato de bismuto „ 0. 30

En una oblea.

Una oblea antes y otra despues de cada alimento acompañada esta última de una ó dos perlas de pepsina.

Dispepsia en los niños.

Dr. Ernesto Chavez. Córdoba.

Pancreatina gm. 5. 00

Fosfato de cal „ 5. 00

Bicarbonato de sosa „ 3. 00

En 12 papeles.

Un papel despues de cada mamada.

Dispepsia ácida.

Dr. Manuel S. Soriano. México.

Bicarbonato de sosa gm. 15. 00

Subnitrato de bismuto „ 2 00

Pepsina amilacea „ 2. 00

Magnesia calcinada „ 0. 50

Extracto tebaico „ 0. 05

Azucar en polvo „ 10. 00

Mésclese y aromatícese con esencia de limón.

En 10 papeles.

Un papel despues de cada comida.

Dispepsia gastro-intestinal.

Dr. Jesús Villagrán. México.

Papaina gm. 2. 00

Cuasina „ 0. 02

Arseniato de estriknina „ 0. 01

Para 20 cápsulas.

Una cápsula diez minutos antes de cada alimento.

Dispepsia intestinal.

Extracto fluido de bilis de buey . . . grm. 1. 00
 Salicilato de fierro „ 1. 20

En 14 píldoras.

Una píldora por la mañana y otra en la tarde con los alimentos. Tomadas por largo tiempo.

Dispepsia pútrida.

Dr. Aurelio Pérez. La Piedad, E. de Michoacán-

Salol }
 Salicilato de bismuto } de c. c. grm. 4. 00
 Magnesia inglesa }

Para 12 papeles.

Un papel sobre cada comida.

Eclamsia.

Dr. M. Valdéz y Díaz.—Paso de Ovejas. E. de Veracruz.

Infusión de raíz de valeriana . . . grm. 120. 00
 Bromuro de potasio „ 4. 00
 Jarabe de éter sulfúrico „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. J. Páramo Rangel. México.

Agua de goma grm. 200. 00
 Tintura de belladona 2 gotas.

Cucharaditas.

Una cucharadita cada media hora en los niños de dos años.

Dr. Federico Cota.

La Paz, Baja California.

En los últimos meses del embarazo y con edemas en los miembros inferiores y albúmina en la orina; ha tratado los casos que se le han presentado en su práctica, provocando el parto prematuro por la irrigación continua de agua tibia como la emplea el eminente tocólogo Dr. Juan M^a Rodríguez, y provocando abundantes sudores por el jaborandi á la dosis de cuatro gramos en infusion.

Eclamsia de los niños.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.

Tehuacán.

Calomel.....	gram.	0. 15
Óxido de zinc.....	„	0. 30
Almizcle.....	„	0. 30
Polvo de altea.....	„	2. 00

En 10 papeles.

Un papel cada hora.

Otra:

Atropina.....	gram.	0. 01
Polvo de azúcar.....	„	5. 00

En 20 papeles.

Dos papeles diarios.

Dr. D. Molinar.

Parral.

Infusión de valeriana..... gram. 100. 00

Tintura de almizcle... 20 gotas.

Id. de castor..... „ 2. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Infusión de valeriana..... grm. 30. 00
 Tintura de almizcle..... 20 gotas.
 Una yema de huevo.

Lavativa.

Fricciones con tintura de valeriana.

Dr. Emilio Polo.

Puebla.

Agua destilada..... grm. 120. 00
 Tintura de beleño..... 20 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada diez minutos,
 Vaciar el intestino con lavativa purgante.

Dr. Lázaro Ortega.

México.

ECLAMSA, TENIENDO POR CAUSA LA INDIGESTIÓN.*

Agua destilada..... grá. 120. 00
 Tartaro emético..... „ 0. 05
 Jarabe de goma..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Eclamsia puerperal.


Dr. Manuel Gutierrez Zavala.

México

Siendo múltiples las causas de la eclamsia, múltiples deben ser los medios para combatirla. La desocupación de la matriz como medio sistemático, no se puede aceptar. Hay observaciones en que la eclamsia ha venido durante el embarazo, y se ha combatido con resultado llegando el embarazo á feliz térmi-



Hicoma de puerco
Dolichos porcini o trifoliacea



no sin repetición de ataque alguno. En los casos en que viene la eclamsia durante el puerperio, no hay desocupación que hacer.

Se debe comenzar por hacer el diagnóstico entre la forma urémica y la no urémica.

Indicación patogénica: Vaciar el estómago, el intestino, la vejiga, quitar los coágulos detenidos en la vajina; y si es posible evitar las emociones morales.

Indicación sintomática: moderar la excitabilidad medular por medio de los bromuros y el cloroformo en inhalaciones, cloral, etc.; si el reflejo parte del útero, hay contracciones y lo anterior fracasa, hay indicaciones de provocar el trabajo.

Indicación patogénica: Disminuir la tensión aórtica por los purgantes drásticos, los diuréticos; en caso de plétora, sangría. Mientras estos medios obran, la indicación sintomática como en el caso anterior y solo en caso de no poder abatir la tensión arterial, desocupar el útero.

Las mismas indicaciones que en la forma no urémica, prefiriendo los drásticos á los diuréticos, por temor de aumentar con éstos la congestión renal.

Indicación patogénica. Expulsar los materiales tóxicos por los diaforéticos, purgantes, baños repetidos á 33° según el método de P. Bar.

Indicación sintomática: Inhalaciones de cloroformo, bromuros, cloral, etc., etc.

Reflejo por excitación de los vasos encefálicos ó de la protuberancia.

Mecánico. por edema y anemia cerebral debida á la hidrohemia y la compresión del útero.

Mecánica: (Edema y anemia cerebral por hidrohemia, oliguria ó anuria, desperdicio de albúmina) y aumento de la tensión vascular por plétora acuosa, compresión aórtica, lesiones renales é hipertrofia cardíaca.

Forma tóxica: Amoníemia y creatinemia etc.

FORMA NO URÉMICA.

FORMA URÉMICA.

Exema.

Dr. Aurelio Pérez. La Piedad. Michoacán.

Óxido de zinc.....	gram.	8. 00
Aceite de cade verdadero.....	,,	30. 00

Para untar dos veces al día en las partes afectadas.

Exema simple.

Dr. José M. Dávila Mazatlan.

Lavar con agua hervida las partes enfermas y poner el siguiente polvo.

Albayalde finamente pulverizado....	gram.	30. 00
Almidón en polvo fino.....	,,	30. 00
Ácido salicílico.....	,,	4. 00

Mézclese. Uso externo.

Poniendo después algodón y un bendaje lijeramente compresivo (1).

Dr. E. Lier México.

EXEMA AGUDO.

Óxido de Zinc	gram.	10. 00
Almidón.....	,,	10. 00
Acido salicílico.....	,,	0. 50
Dermatol.....	,,	2. 50
Vaselina } Lanolina }	de c. c.....	,, 12. 50

Pasta.

(1) Ha notado el Dr. Dávila que el tratamiento por el ácido fénico y bicloruro de mercurio prolongan la duración de esta enfermedad.

Exema crónico.

Resorsina	gram.	2. 50
Ácido salicílico	,,	1. 00
Cloruro de calcio	,,	0. 50
Vaselina	,,	46. 00

Ungüento.

Dr. Antonio Carreon. S. Andres Chalchicomula.

EXEMA CRÓNICO EN LOS NIÑOS.

Lanolina purísima	gram.	20. 00
Creolina	,,	1. 00

Pomada.

Aplicarse dos veces al día en las partes enfermas.

Dr. Jesús G. Ibarra. Etzatlan. E. de Jalisco.

Exema húmedo.

Manteca	gram.	30. 00
Aceite de cade	,,	3. 00
Óxido de zinc	,,	4. 00
Láudano de Sydenham	,,	1. 00

Pomada.

Lavar antes de poner la pomada con cocimientos emolientes.

Dr. Eduardo Lamicq. México.

Vaselina gram. 30 00

Bórax..... „ 15. 00

Pomada.

Dos veces al día.

Dr. Manuel de Anaya.

Guanajuato.

Exema del cuero cabelludo.

Vaselina alcanforada..... grm. 32. 00

Calomel..... „ 1. 00

Precipitado rojo..... „ 0. 50

Pomada.

Una curación diaria.

Dr. Juan C. Villaseñor.

Morelia

Bórax..... grm. 4. 00

Agua de colonia..... „ 30 00

Agua destilada..... „ 30. 00

Lavatorio.

Dos veces al día (tibio).

Acido crisofánico..... grm. 0. 30

Coldcream..... „ 10. 00

Biborato de sosa..... de 0. 30 á „ 0. 50

Pomada.

Después del lavatorio.

Al interior arcenicales ó sulfurosos según la constitución del enfermo.

Dr. E. Gutiérrez.

Guadalupe, E. de Zacatecas.

Agua..... grm. 300. 0 0

Salol.....	„	6. 00
Alcoholatura de acónito.....	„	15. 00

Lociones.

Lanolina.....	gram.	15. 00
Aceite alcanforado.....	„	15. 00
Sulfoictiolato de amoniaco.....	„	3. 00

Pomada.

Glicerolado de almidón.....	gram.	30. 00
Iodoformo.....	„	3. 00
Creolina.....	„	0. 60

Uso externo.

Cubrir con tela las partes afectadas

Dr. F. M. Arroyo. Irapuato, E. de Guanajuato.

Agua de Saturno.....	gram.	250. 00
Id. „ laurel cereso.....	„	15. 00
Bicloruro de mercurio.....	„	0. 15

Fomentos.

Dr. C. M. Garza. S. Pedro de las Colonias, E. de Coahuila.

Glicerina y agua de rosas de c. c....	gram.	40. 00
Ácido bórico y		
Óxido de zinc de c. c.....	„	4. 00
Clorhidrato de morfina.....	„	0. 10

Uso externo.

Untar con un pincel después de haber lavado con licor de Van-Swicton.

Dr. Juan N. Campos. Toluca.

Glicerolado de almidón.....	gram.	15. 00
Óxido de zinc.....	„	2. 00
Bicloruro de mercurio.....	„	0. 05

Pomada.

Después de lavar con jabón aplicar la pomada sobre los lugares enfermos.

Otra:

Alcohol á 80°.....	gram.	20. 00
Bicloruro de mercurio.....	„	0. 05
Solución fenicada al 10 por ciento	„	0. 50

Uso externo.

Para ponerla con pincel sobre las partes enfermas.

Dr. Antonio Butron. Acapulco.

EXEMA MARGINAL.

Ácido crisofánico.....	gram.	1. 00
Lanolina.....	„	30. 00

Pomada.

Dos veces al día untar la pomada.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.

EXEMA REBELDE.

Vaselina.....	gram	30. 00
Subnitrate de bismuto.....	„	3. 00
Óxido de zinc.....	„	2. 00
Fécula ó polvo de almidón.....	„	2. 00
Clorhidrato de cocaina.....	„	0. 05

Pomada.

Para aplicarla en los lugares afectados.

Efelides.

Dr. Francisco M. Arroyo.—Irapuato. E. de Guanajuato

Coldcream	gram.	15. 00
Bicloruro de mercurio	,,	0. 05
Agua de laurel cereso	,,	15. 00

*Uso externo.***Embriaguez.**

Dr. Adrian de Garay.

México.

Método para combatirla.

Suspender desde luego el uso de los alcoholes y permitir tomar en las comidas un poco de vino tinto ó de cerveza.

Poner diariamente una inyección subcutánea de dos miligramos ó mas si fuere preciso de sulfato de estri-
cina durante 20 dias más ó menos y tomando duran-
te el mismo tiempo una cucharada cada dos horas de
la siguiente fórmula:

Bromuro de potasio	gram.	3. 00
Bromuro de sodio	,,	3. 00
Cognac	,,	40. 00
Jarabe de quina c. b.		

Cucharadas.

Pasados los 20 días tomar durante ocho ó diez días
tres cucharadas al día de la fórmula siguiente:

Cafeina	gram.	2. 00
Cognac	,,	20. 00
Agua destilada	,,	100. 00

Cucharadas.

Después del tiempo señalado hacer tomar al enfermo diariamente y según la tolere por varios días una copita chica de cognac ó del alcohol ó bebida que use de preferencia. Para 500 gramos de bebida agréguese extracto alcohólico de ipeca (seco) 2 gramos 50 centígramos y 5 centígramos de cuasina.

Agréguese á este método baños frios de regadera y ducha, ejercicio, distracciones y el tratamiento moral correspondiente.

Endometritis.

Dr. Lier.

México.

Electricidad galvánica; Baños con 5 lbs. de sal y 1 lb. de cloruro de calcio.

Endometritis crónica.

Dr. M. Mucél.

México.

Modificaciones locales enérgicas con exclusión del nitrato de plata por los estrechamientos que provoca: Ácido piroleñoso, ácido crómico ó ictiolado de amoníaco principalmente.

Inyecciones diarias: primero ácidas, (tanino ó ácido bórico) y después alcalinas (bórax, subcarbonato de sosa etc.) todas ellas corrigen muy bien los flujos leucorreicos.

EN LAS CURACIONES TÓPICAS

Tapones hechos con algodón hidrófilo ó salicilado, embebido de glicerina y untado cuando es preciso del medicamento (polvos ó líquido) que se juzgue oportuno aplicar.

Cuando hay en él fragmentos, restos de antigua inflamación, como exudados, y adherencias no reabsorbidas, buscar destruirlos además de los medios locales, con los baños generales estimulantes de agua salada ($\frac{1}{2}$ lb. á 1 lb. de sal común para un baño) y también con los baños del Peñón.

Mientras no se modifica favorablemente *toda* la parte de mucosa enferma (sea del cuello ó del cuerpo del útero) la curación no es radical.

Endopericarditis.

Dr. R. Ruiz. Salvatierra, E. de Guanajuato.

Infusión de quina.....	gram.	120.	00
Ioduro de potasio.....	,,	1.	00
Tintura de estrofantus.....	,,	2.	00
Jarabe de morfina.....	,,	30.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Enfermedades oculares de origen estrumoso.

Dr. Manuel Carmona y Valle. México.

Como tratamiento general:

Jarabe de goma.....	gram.	120.	00
Solución de ioduro de fierro de			
Dupasquier.....	,,	4.	00
Protoioduro de arcénico de 0, 01 á...		0.	02

Cucharadas.

Una cucharada dos veces al día.

Enfisema pulmonar.

Dr. F. Páramo Rangel. México.

Para los accesos de tos:

Agua de laurel cereso.....	gram.	16. 00
Bromuro de amonio.....	„	1. 00
Id. de sodio.....	„	2. 00
Acetato de morfina.....	„	0. 05

Gotas.

Diez gotas tres veces al día.

Dr. Lázaro Ortega. México.

Como espectorante:

Goma amoniaco.....	gram.	1. 00
Carbonato de amoniaco.....	„	1. 00
Ipecacuana.....	„	0. 20
Acetato de morfina.....	„	0. 10

En 20 píldoras.

De dos á seis píldoras por día.

Enteritis catarral.

Dr. J. López Tello. Amecameca. E. de México.

Subnitrato de bismuto y

Fosfato de cal de c. c.....	gram.	5. 00
Extracto de opio.....	„	0. 05

Para 15 papeles.

Un papel cada hora en una cucharada de cocimiento de lechuga.

Dr. Ernesto Chavez. Córdova.

ENTERITIS CRÓNICA.

Polvos de Dower.....	gram.	1. 00
----------------------	-------	-------

Nitrato de plata „ 0. 10

En 20 píldoras.

Otra,

Tanino..... grm. 1. 00

Catecú..... „ 1. 00

Extracto de opio..... „ 0. 05

En 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Otra,

Cocimiento blanco..... grm. 700. 00

Subnitrato de bismuto..... „ 20. 00

Tintura de opio..... „ 4. 00

Ácido láctico..... „ 4. 00

Pozuelos.

Un pozuelo cada dos horas.

Dr. F. Blazquez.

Mexico.

En los niños:

Calomel..... grm. 0. 20

Azúcar blanca..... „ 2. 00

En 2 papeles

Un papel cada hora.

Enteritis atónica.

Dr. Jesús Villagrán,

México.

Infusión de colombo..... grm. 120. 00

Tintura de nuez vómica..... „ 2. 00

Jarabe de meconio..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharadita cada dos horas.

Enteritis epidémica.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.

De carácter miasmático:

Medias cucharaditas de aceite de ricino y uno ó dos centígramos de calomel, tres ó cuatro veces en el día.

Enteritis coleriforme.

En los adultos:

Dr. F. Blazquez. México.

Láudano de Sydenham y

Tintura de nuez vómica; de c. c. grm. 15. 00

Gotas.

Cinco gotas cada hora hasta modificar los síntomas alarmantes.

Enteritis y enterocolitis.

En los niños,

Dr. M. Mucél. México.

Cuando es provocada por vicios en la alimentación se empezará por un purgante de aceite de ricino, con ó sin calomel. Despues calomel en gránulos de un milígramo, uno cada dos horas.

Si predomina la colitis, una lavativa cada cuatro horas, de una cucharada cafetera de la siguiente mezcla:

Cocimiento de raíz de ipeca ó

de corazones de membrillo. . . grm. 100. 00

Láudano de Sydenham de 0.05 á „ 0. 10

Extracto de crameria. „ 0. 25

Clorato de potasa...de 0. 50 á „ 1. 00

Lavativa.

Exteriormente la siguiente untura con un redañó.

Aceite de manzanilla..... grm. 20. 00

Id. de extramonio compuesto „ 20. 00

Pomada de belladona..... „ 20. 00

Láudano de Rousseau..... „ 2. 00

Para untar.

En los adultos para dominar el tenismo, usa:

Agua..... grm. 120. 00

Chal de colmena (1)..... „ 2. 00

Jarabe de opio..... „ 40. 00

Cucharadas.

Una cada dos horas.

Enterocolitis.

Dr. R. Martínez Carriedo.

México.

ENTEROCOLITIS AGUDA.

Solución de goma..... grm. 120, 00

Láudano de Sydenham..... „ 2. 00

Jarabe de éter..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Mr. Marcos Mazarí.—Mineral de Huautla, Morelos.

ENTEROCOLITIS HEMORRÁGICA.

Calomel..... grm. 0. 20

(1) El Chal de colmena es un producto parecido á la crameria, se extrae del palo de campeche por incisiones en su corteza.

Polvos de ipecacuana.....	„	0. 20
Extracto de opio.....	„	0. 10
Polvos de azucar.....	„	2. 00

En 20 papeles.

Un papel cada media hora vigilando los efectos del calomel.

Una lavativa por la mañana y otra por la noche, cada una de un pozuelo de agua tibia y 8 ó 10 gotas de láudano.

Dr. Ernesto Chavez.

Córdoba.

ENTEROCOLITIS EN LOS NIÑOS.

Subnitrato de bismuto.....	gram.	16. 00
Electuario de diascordio.....	„	4. 00
Polvos de Dower.....	„	0. 20

En 20 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. A. Díaz.

S. Antonio Tejas.

ENTEROCOLITIS DE ORIGEN MELÁNICO.

Extracto tebaico.....	gram.	0. 05
Calomel.....	„	0. 20
Polvo de ipecacuana.....	„	0. 10
Sulfato de quinina.....	„	1. 25

En 5 cápsulas.

Una cápsula cada hora.

Enterocolitis crónica

DE ORIGEN SÉPTICO.

Dr. M. Mucél.

México.

Naftol Beta.....	}	de c. c.....	gram. 0. 12
Calomel.....			
Extracto de opio }			

Para 12 píldoras.

De tres á seis píldoras diarias.

Agua.....	gram. 500. 00
Permanganato de potasa.....	„ 2. 50

Lavativas.

Dos lavativas al día cada una de un pozuelo.

Envenenamiento

POR EL OPIO Y LA MORFINA.

Dr. M. Medal.

Tacámbaro. E. de Michoacán.

Infusión de raíz de valeriana (delgada).....	gram. 175. 00
Citrato de cafeína.....	„ 0. 20
Quinino.....	„ 0. 30
Jarabe simple.....	„ 15. 00

Cucharadas.

Dos cucharadas cada 15 minutos.

Epilepsia.

Dr. Manuel F. Ocampo.

Pinos. E. de Zacatecas.

Bromuro de potasio }	}	de c. c....	gram. 10. 00
Id. de sodio..			
Id. de amonio }			

Mézclese.

Para tomar de 1 á 8 gramos de esta mezcla, según las indicaciones, ya sea en agua de azahar endulzada ó en una poca de leche.

Se debe añadir la Picrotoxina en gránulos de medio milígramo, para tomar de uno á cuatro diarios.

Para obtener buenos resultados hay que usarlo algún tiempo.

Dr. M. Mucél.

México.

(1) Extracto acuoso de taray	gram.	10. 00
Añil	„	2. 50
Extracto de belladona	„	0. 10
Picrotoxina	„	0. 01
Bromuro de arsénico	„	0. 10

Para 100 píldoras.

De una á cinco diarias.

Aumentar lenta y progresivamente hasta tomar cinco diarias.

Epitilismo.

Dr. A. Gaviño Iglesias.

México.

Ácido nítrico monohidratado gram. 10. 00

Bicloruro de mercurio pulverizado „ 4. 00

Papel Berselius c. b. para formar una papilla.

Se aplica con la extremidad de un palito tal como los limpiadientes.

(1) El extracto acuoso de taray lo prepara, usando la corteza y leño, agotando en agua y al fuego dichas partes y evaporando después en B. de M. hasta la consistencia de extracto blando.

Dr. Guillermo Senisson, México.

(1) Elixir de tumba–vaquero.....	gram.	300.	00
Bromuro de estroncio.....	„	4.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada tres horas.

Para menores de 12 años, cucharadita cafetera.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre, Tehuacán.

Bromuro de sodio.....	gram.	6.	00
Id. de potasio.....	„	2.	00
Id. de amonio.....	„	1.	00
Agua de nafé.....	„	80.	00
Jarabe de morfina.....	„	20.	00

Cucharadas.

Una cucharada el primer día, dos el segundo, tres el tercero y así se va aumentando hasta tomar la dosis en un solo día.

Dr. Demetrio Molinar, Parral.

Extracto de haba de calabaz... gram.	0.	50
Licor de Hoffman.....	„	1. 00
Agua de menta piperita.....	„	20. 00

Gotas.

Cuatro gotas dos veces al día.

Agua destilada.....	gram.	200.	00
Bromuro de potasio.....	„	10.	00

(1) En la Farmacopea el Tumba–vaquero, tiene también el nombre de Tripa de Judas, pero no es esa la yerba á que se refiere el Sr. Senisson. El Tumba–vaquero es una yerba que se cosecha por Toluca en gran abundancia.

Id.	de sodio	„	10. 00
Id.	de amonio	„	10. 00

Cucharadas.

Una cucharada tres veces al día

Epilepsia.

Dr. Manuel Carmona y Valle.

México.

Para calmar la frecuencia de los ataques.

Agua destilada	gram.	30. 00
Sulfato de atropina	„	0. 02

Gotas.

Para tomar diez ó más gotas con los polibromuros dos veces al día.

No debe elevarse la dosis cuando se produzca la sequedad de boca.

Epistaxis.

Dr. M. Mucél.

México.

Algodón absorbente embebido en agua de Mentel.

Al interior, agua de limón á pasto y preparados de ergotina de Ivon ó de Bonjéan.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid.

México.

Maceración de goma de Sonora

30×1000	gram.	500. 00
Solución hemostática de Mentel	„	500. 00
Antipirina	„	4. 00

Geringatorios

y aplicar tapones de algodón empapados en el líquido del geringatorio.

Epitelioma superficial.

Dr. Miguel Cordero México.

Agua alcoholizada gm. 200. 00

Finol absoluto „ 2. 00

Pulverizaciones.

Con pulverizador de vapor aplicarlas cada 24 horas por espacio de 15 minutos en el lugar enfermo.

Erisipela.

Dr. M. F. Ocampo. Pinos. E. de Zacatecas.

Sublimado gm. 1. 00

Alcohol á 95° „ 200. 00

Agua destilada „ 300. 00

Lociones.

Para ponerlas sobre la placa erisipelatosa.

Dr. Aurelio Pérez. La Piedad, E. de Michoacán.

Pinceladas cada cuarto de hora con percloruro de fierro de Praváz.

Dr. Jesús Villagrán. México.

Vaselina blanca gm. 30. 00

Bicloruro de mercurio „ 1. 00

Pomada.

Úntese con un pincel dos ó tres veces al día en el lugar enfermo. Cura rápidamente. Es cáustico.

Dr. M. F. Ocampo. Pinos. E. de Zacatecas.

Glicerina gm. 60. 00

Ácido fénico „ 2. 00

Toques.

Toques en la placa erisipelatosa.

Otra.

Glicerina gm. 60. 00

Sulfoictiolato de amoniaco „ 10. 00

Toques.

Cuando la erisipela está en la cara, debe hacerse la antisepsia local usando los buches siguientes.

Cocimiento de coca gm. 500. 00

Clorato de potasa „ 10. 00

Láudano de Sydenham „ 2. 00

Buches.

Dr. E. Lier. México.

Ictiol } de c. c gm. 25. 00
Lanolina }

Pomada.

Otra.

Ictiol } de c. c gm. 25. 00
Éter sulfúrico }

Colodión „ 30. 00

Uso externo.

Dr. Juan Collantes y Buenrostro. México.

Vaselina neutra gm. 30. 00

Bioduro de mercurio „ 0. 05

Pomada

Para aplicarla con un pincel dos ó tres veces al día sobre la erisipela.

Dr. Eufemio Gutiérrez. Guadalupe. Zacatecas.

Infusión de té gm. 120. 00

Salol	de 4. 00 á	„	6. 00
Nitrato de sosa		„	8. 00
Tintura de cinamomo		„	10. 00
Jarabe grosella		„	40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Limonada tártrica	gram. 200. 00
Vino quina	„ 60. 00

Medio pocillo cada hora.

Colodión elástico	gram. 100. 00
Tintura de iodo	„ 20. 00

Para cubrir las partes afectadas.

Dr. M. Mucél.

México.

Colodión con bicloruro de mercurio al 1%

Otra.

Láudano y vaselina de c. c.	gram. 20. 00
Bicloruro de mercurio	„ 0. 20

Pomada.

En los niños: lociones con éter sulfúrico, con tanino y alcanfor, y al interior antipirina si la temperatura es muy alta, ó bien el ferrocitrato de quinina.

Erispelis.

Dr. Ciro M. Santelices.

Querétaro.

Vaselina	gram. 15. 00
Percloruro de fierro	„ 15. 00

Pomada.

Aplicar la pomada sobre la erisipela cada dos horas, y en las partes sanas y vecinas esencia de trementina rectificada.

Dr. Miguel Cordero.

México.

ERISPELA QUIRÚRGICA.

Agua esterilizada.....	gram.	200.	00
Percloruro de zinc.....	„	16.	00

Para curación.

Con un pincel sobre la superficie de las heridas operatorias, después de haber lavado antes con agua hervida.

Dr. D. Molinar.

Hidalgo del Parral.

ERISPELA DE LA CARA.

Vino de Hidalgo Carpio, una cucharada cada hora.
Colodión elástico con un pincel sobre los lugares afectados.

En la erisipela del cuerpo: el mismo vino y exteriormente percloruro de fierro.

Dr. Salvador F. Alcalá.

Tecolotlán.

Ácido fénico y alcohol de c. c....	gram.	1.	00
Esencia de trementina.....	„	2.	00
Tintura de iodo.....	„	1.	00
Glicerina.....	„	5.	00

Uso externo.

Aplíquese cada dos horas con un pincel sobre las partes afectadas.

Antipirina.....	gram.	5.	00
Agua de corteza de naranja agria.....	„	100.	00
Jarabe simple.....	„	10.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada tres ó cuatro horas.

Dr. Francisco D. Maldonado. Aguascalientes.

ERISIPELA DE LA CARA.

Éter sulfúrico.....	gram.	40. 00
Alcanfor.....	,,	8, 00
Acido tánico.....	,,	5. 00

Uso externo.

Ponerlo con un pincel sobre los lugares enfermos dos veces al día.

Dr. Manuel Carmona y Valle. México.

Manteca lavada.....	gram.	30. 00
Bicloruro de mercurio de 0. 30 á	,,	0. 60

Pomada.

Untar dos ó tres veces al día la placa erisipelatosa, pasando un poco sus límites de manera que el tejido sano que la circunda sea también untado de la pomada.

Picar las vesículas si se forman.

Dr. Lucas Castro. México.

ERISIPELA DE LA CARA.

Ferrocitrato de quinina.....	gram.	1. 00
Extracto tebaico.....	,,	0. 02

En 10 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Embrocaciones con percloruro de fierro de Praváz.

Escarlatina.

Dr. Lázaro Ortega. México.

ESCARLATINA CON FARINGITIS MEMBRANOSA.

Agua destilada.....	gram.	150. 00
---------------------	-------	---------

Bromuro de potasio „ 6. 00

Colutorios é inyecciones

por las fosas nasales.

Dr. Emilio Polo.

Puebla.

ESCARLATINA GRAVE.

Tintura de ailanthus glandulosa 6 gotas.

Agua destilada grm 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. D. Molinar.

Parral.

Cocimiento de quina grm. 120. 00

Carbonato de amoniaco „ 1. 00

Jarabe de guayacan „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Vaselina grm. 30. 00

Clorhidrato de amoniaco „ 4. 00

Alcanfor „ 1. 00

Ioduro de potasio „ 4. 00

Pomada.

La pomada en los ganglios enfartados y baselina en todo el cuerpo.

Dr. Constancio Mota.

Puruándiro.

Ácido salicílico grm. 1. 00

Agua destilada „ 70. 00

Jarabe simple „ 30. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Dr. E. Gutierrez. Guadalupe. E. de Zacatecas.

Infusión pectoral..	gram.	100. 00
Acetato de amoniaco de 4 á... ..	„	8. 00
Carbonato de amoniaco de 2 á.	„	4. 00
Nitrato de pilocarpina de 0. 01 á	„	0. 05
Jarabe de diacodion y		
Jarabe balsámico de c. c.	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Friegas estimulantes.

Poción salicilada.

Infusión de corteza de quina... .	gram.	120. 00
Ácido salicílico.	„	2. 00
Tintura de quina de 10 á.	„	20. 00
Id. de toiú.	„	8. 00
Jarabe alcalino.	„	40. 00

Cucharadas.

Una cada hora.

Escasez de leche en las nodrizas.

Dr. M. F. Ocampo. Pinos. E. de Zacatecas.

Usa con buen éxito el extracto de Capomo á la dosis de gram. 4. 00; pero puede elevarse hasta 6 ú 8. 00 por día.

En su práctica ha observado que no solamente aumenta la cantidad sino que tambien mejora la calidad despues de quince días de usarlo.

Dr. J. M^a Dávila. Mazatlán.

(1) Extracto fluido de Capomo. gram. 30. 00

Gotas.

20 gotas tres veces al día.

(1) El capomo es un árbol que vejeta en las costas del Pacífico y de cuyo fruto se extrae un extracto fluido, que es el que se usa en Medicina.—N. del A.

Escrofulosis.

Dr. M. Mucél.

México.

Iodoformo.....	gram.	1. 00
Extracto de cicuta.....	,,	0. 25
Id. de nogal.....	,,	3. 00

Para 50 píldoras.

Cinco píldoras al día.

Preparaciones ferruginosas adecuadas.

Dr. Cárlos Amezcuca.

Tehuacán.

Jarabe de zarzaparrilla.....	gram.	600. 00
Tartrato de potasa y fierro....	,,	25. 00
Tintura de zazafrás.....	,,	10. 00

Cucharaditas núm. 1.

Jarabe con menta.....	gram.	600. 00
Bicloruro de mercurio.....	,,	0. 60
Ioduro de potasio.....	,,	20. 00

Cucharaditas núm. 2.

Una cucharadita del núm. 1 al medio día y una del núm. 2 en la noche al acostarse. Se continúa este tratamiento por 20 días. Se suspende por 10 días y se vuelve á empezar. Continuando de la misma manera hasta la curación.

Ejercicio á pie. Baños tibios cada cinco días.

Buena alimentación. Abrigo y evitar enfriamientos.

Dr. Desiderio G. Rosado.

Comalcalco. Tabasco.

Bicromato de potasa.....	gram.	0. 10
Percloruro de fierro líquido....	,,	14. 00

Tintura de iodo..... „ 28. 00

Gotas.

De cinco á diez gotas cuatro veces en el día en agua gomosa

Espasmos.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre,

Tehuacán.

ESPASMO DE LA GLOTIS EN LOS NIÑOS.

Tintura de castor..... grm. 2. 00

Id. de almizcle..... „ 2. 00

Id. de valeriana..... „ 2. 00

Id. de ipecacuana..... „ 10. 00

Gotas.

Cuatro gotas cada tres horas.

Almizcle..... grm. 0. 05

Polvo de azúcar..... „ 1. 00

En 5 papeles núm. 1.

Óxido de zinc..... grm. 0. 25

Polvo de azúcar..... „ 1. 00

En 5 papeles núm. 2.

Un papel cada tres horas alternando el núm. 1 con el núm. 2, de modo que cada hora y media debe tomar papel.

Dr. Miguel Cordero,

México.

ESPASMO DOLOROSO DEL RECTO.

Subnitrato de bismuto puro..... grm. 4. 00

Polvo fino de iodoformo..... „ 0. 15

Esencia de menta..... *3 gotas.*

Manteca de cacao c. b.

Para 6 supositorios.

Un supositorio cada 12 horas antes de evacuar.

Dr. Emilio Polo.

Puebla

ESPASMO DEL CUELLO DE LA VEJIGA.

Tintura de gelcemiun..... 10 gotas.

Id. de viburniun prunifolia... 10 gotas.

Agua destilada..... grm. 120, 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Estomatitis.

Dr. M. Mucel.

México.

Para combatir el dolor, pastillas de cocaina de Houllé ó una solución al 4% de clorhidrato de cocaina.

Para la mercurial.

Tintura de iodo..... grm. 5. 00

Id. de mirto..... „ 10. 00

Toques.

Y como polvo dentrífico:

Carbón de Belloc..... grm. 10. 00

Polvo de quina..... „ 8. 00

Clorato de potasa..... „ 2. 00

Dentrífico.

Dr. Lázaro Ortega.

México.

Agua destilada..... grm. 120. 00

Extracto acuoso de opio..... „ 0. 50

Múcilago de goma..... „ 2. 00

Colutorios.

ESTOMATITIS MERCURIAL.

Agua rosada..... grm. 250. 00

Tanino.....	„	5. 00
Alumbre.....	„	10. 00

Buches.

Dr. A. Aceves.

Guadalajara.

Contra toda clase de dolor bucal.

Maceración en frío de ruibarbo	gram.	500. 00
Alcohol á 60°.....	„	30. 00
Éter sulfúrico.....	„	4. 00
Esencia de menta....	<i>5 gotas.</i>	

Buches.

Estrechese.

Dr. E. Lier.

México.

Tratamiento electrolytico.

Eupéptico.

Dr. Francisco Álvarez.

México.

Sulfato de estriquina.....	gram.	0. 04
Cuasina.....	„	0. 08
Papaina.....	„	2. 00

Para 20 píldoras.

Una píldora con cada alimento.

Faringitis.

Dr. Pedro Peña.

Zamora.

Ioduro de potasio.....	gram.	1. 50
------------------------	-------	-------

Para 3 papeles.

Dosis: uno cada ocho horas en un pozuelo de agua azucarada, tan caliente como se pueda tolerar.

Sus resultados son inmediatos.

Fiebres.

Dr. José B. López.

Campeche.

FIEBRE CATARRAL.

Cocimiento de flores pectorales.	gram.	300	00
Acetato de amoniaco líquido...	„	6.	00
Alcoholaduro de acónito.....	„	2.	00
Jarabe c. b.			

Cucharadas.

Tres cucharadas cada hora.

Dr. Arcadio F. Ojeda.

Veracruz.

FIEBRE AMARILLA.

Agua.....	gram.	1000.	00
Licor de Van Swieter.....	„	20.	00
Bicarbonato de sosa.....	„	10.	00

Cucharadas.

Tres cucharadas cada hora.

Agua.....	gram.	150.	00
Antifebrina.....	„	1.	00
Jarabe de codeina.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Reyes G. Flores.

Guadalajara.

FIEBRE TIFOIDEA.

Vino rojo doble.....	gram.	500.	00
Jarabe corteza de naranja.....	„	30.	00
Infusión (en frío) de quina.....	„	720.	00

Pozuelos.

Un pozuelo cada hora.

Dr. F. Alvarez.

México.

Previo tratamiento de la causa, como medicamento sintomático usa:

Sulfato de estricnina y	
Aconitina de c. c.	gram. 0. 01
Salicilato de quinina	„ 1. 00

Para 20 píldoras.

Una cada hora mientras haya calentura.

Dr. José Luna.

Autlán.

FIEBRES REMITENTES.

Trata las fiebres remitentes acompañadas de catarro gástrico, no como una manifestación del paludismo, sino como una autrinfección, y los resultados que ha obtenido han sido muy brillantes.

Polvo de ipecacuana	gram. 1. 50
Agua hirviendo	„ 200. 00
Sal de Vichy	de 3 á „ 4. 00
Jarabe de Melesa	„ 30. 00

4 tomas.

Una toma cada hora.

Agua saturada de sulfuro de carbono	gram. 80. 00
Extracto de ruibarbo	„ 0. 30
Id. de hojas de sen	„ 0. 30
Vino rojo	„ 60. 00
Jarabe	„ 30. 00

50 gramos cada 2 horas.

Naftol (beta)	gram. 1. 50
Aceite de ricino	„ 15. 00

Calomel..	„	0. 10
Solución de goma..	„	100. 00
Jarabe..	„	20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Fiebre-tifoidea.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe. E. de Zacatecas.

Infusión diaforética	gram.	120. 00
Salicilato de sosa de 4. 00 á	„	8. 00
Pilocarpina, de 0. 02 á	„	0. 05
Jarabe simple	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

PARA LA HIPERTERMIA.

Antipirina	gram.	8. 00
Cafeina	„	1. 00

Para 8 obleas Limousin.

Tomar una cada tres horas siempre que el termómetro marque más de 38° 5.

POCION TONICA ESTIMULANTE.

Infusión de lúpulo	gram.	80. 00
Tintura de quina de 20. 00 á	„	30. 00
„ „ digital	„	3. 00
„ „ nuez vómica	„	2. 00
Eter nítrico	„	3. 00
Vino cordial del Código		
de 80. 00 á	„	100. 00
Jarabe simple	„	60. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Purgante cuando haya indicación.—Bebida.—Limonada.—Tártrico.—Vinosa—Alimentación.—Leche con cognac.—Jugo de carne y huevos.

Dr. Z. Páramo Rangel. México.

EN LA FORMA ATAXO ADINÁMICA.

Vino de las tres quinas.....	gram.	120.	00
Tintura de nuez vómica.....	„	1.	00
Jarabe de tolú.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Fimosis.

Dr. Manuel Uribe. México.

Usa la anestesia local por la cocaina en solución al dos por ciento (el clorhidrato.) Empieza por poner media jeringa para observar la susceptibilidad del enfermo y pone varias inyecciones al rededor del lugar donde deben hacerse las incisiones hasta llegar á cuatro centígramos.

En lo general se forma un ligero edema que se reabsorbe poco á poco y permite operar sin dificultad y sin el menor dolor para el paciente.

El mismo procedimiento se puede emplear para todas las pequeñas operaciones.

Fístulas.

Dr. Francisco D. Maldonado. Aguascalientes.

En las fístulas que han resistido al nitrato de plata y tintura de iodo, han curado sin necesidad de debri-darlas, tratándolas por la glicerina fenicada.

Fotofobia.

Dr. Manuel Carmona y Valle.

México.

EN LAS OFTALMIAS ESTRUMOSAS.

Agua destilada.....	gram.	10. 00
Ácido bórico.....	„	0. 20
Clorhidrato de cocaína.....	„	0. 30

Gotas para los ojos.

Dos gotas cada tres horas.

Tener cuidado de no sustituir el ácido bórico por el borato de sosa; porque esta sal precipita á la de cocaína.

Fracturas conminutas

DE LA TIBIA Y PERONEO CON HERIDA.

Dr. M. F. Ocampo.

Pinos. E. de Zacatecas.

Reglas generales.

1ª Volver aséptica la herida en toda su extensión y profundidad, como también la pierna y muslo.

2ª Separar los fragmentos de hueso desprendidos y que se comprenda no puedan vivir á espensas del periostio que los une, procurando no desgarrar los tejidos.

3ª Poner los huesos y tejidos en una situación tan normal como sea posible por medio de suturas.

4ª Dejar libre escurrimiento á los líquidos de la herida por medio de la canalización con tubo de goma antiséptico.

5ª Poner en contacto con las heridas, polvo de iodoformo, protectivo de Lister, gaza iodoformada y maquintosch, todo bien humedecido, con la solución doble antiséptica.

6ª Rodear el miembro un poco más arriba de la rodilla, de un empaque algodónado, el que deberá ser sostenido por un bendaje de Scultet.

7ª Poner un aparato de cuero del Dr. Clement, con la modificación de poner el cuero antes de cortarle, durante dos horas, en la solución doble antiséptica.

SOLUCIÓN DOBLE ANTISÉPTICA.

Bicloruro de mercurio	gram.	1. 00
Acido fénico cristalizado	„	5. 00
„ tartrico	„	4. 00
Alcohol absoluto	„	10. 00
Agua hervida	„	1000. 00

Esta solución sirve para lavatorios y curaciones.

APARATO DE CUERO DEL DR. CLEMENT.

Con un lápiz serán trazados los puntos principales en la pierna, por su parte anterior, (después de hecho el bendaje y empaque algodónado); tírese una línea recta que divida al miembro en dos partes iguales, pasando por la rótula, la cresta de la tibia y el dorso del pié. Después dos líneas paralelas á ésta, y que limitarán los bordes del aparato; estas no son rectas enteramente, sino que siguen la forma del miembro.

Se trazan después las líneas transversales, una que limita el aparato, otra que pasa por la rótula, otras dos que limitan la pantorrilla y otra en la garganta del pie.

Se marcan además las eminencias que hacen los tobillos. Trazadas estas líneas se procura tomar dichos puntos para pasarlos al cuero y se obtiene un molde casi perfecto de la pierna; teniendo cuidado que en cualquier punto donde haya una eminencia, se haga

una incisión simple ó doble para que el cuero se amolde mejor á la pierna. Una vez trazado el miembro en el cuero y cortado éste, se sumerje en un baño caliente, teniendo bien disuelta una cantidad de bicarbonato de sosa, aproximadamente mayor que la mitad del peso del cuero ya cortado, y se deja unos dos ó cinco minutos: al fin de este tiempo la reacción ha terminado, se saca, se exprime fuertemente y está listo para aplicarse fijándolo con un bendaje.

Al cabo de diez horas está el cuero de buena consistencia y al cabo de veinte está como un carey.

Este aparato es bastante fijo, su presión es suficiente, se amolda perfectamente al miembro, es sencillo de hacer y se puede quitar y poner cuantas veces se quiera sin hacer sufrir al paciente y sin deformarse el aparato. Los niños lo soportan bien y sus materiales se encuentran en todas partes.

Se puede desinfectar fácilmente y se puede impregnar de glicerina fenicada ó iodoformada. Se le pueden hacer ventanas para la curación de las heridas sin quitar el aparato.

Para mayores explicaciones véase la tesis del Dr. Vidal Torres y Tapia de Guadalajara.

Fricciones.

Dr. Lázaro Ortega.

México.

FRICCION METÁLICA.

Agua de colonia.....	grm.	30. 00
Clorhidrato de morfina.....	„	0. 30
Eter acético.....	„	3. 00

Friega.

FRICCION ESTIMULANTE DURANTE LA EPIDEMIA DEL COLERA.

Alcohol	gram.	500. 00
Vinagre	„	500. 00
Alcanfor	„	20. 00
Harina de mostaza	„	20. 00
Pimienta en polvo	„	20. 00
Cantáridas en polvo	„	5. 00
Dos ajos machacados.		

*Friega.***Gastralgia.**

Dr. Federico Ábrego. México.

Licor de Tower	gram.	15. 00
Tintura de cuasia	„	14. 00
„ „ nuez vómica	„	10. 00

Gotas.

Diez gotas un cuarto de hora antes de la comida principal.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe, E. de Zacatecas.

LAXANTE.

Polvo de cáscara sagrada	gram.	5. 00
------------------------------------	-------	-------

Para 10 papeles.

Un papel todas las mañanas.

POCION CALMANTE.

Infusión de raíz de angélica	gram.	80. 00
Clorhidrato de cocaina	„	0. 10
Agua de laurel cerezo	„	15. 00
Jarabe de badiana	„	45. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Otra.

Agua de hinojo.....	grm.	120.	00
Carbonato de bismuto.....	„	4.	00
Extracto de belladona.....	„	0.	05
Clorhidrato de morfina.....	„	0.	05
Jarabe de menta.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Constancio Mota.	Puruándiro E. de Michoacán.
Sulfato de quinina.....	grm. 1. 00
Iodoformo.....	„ 0. 10
Narceina.....	„ 0. 10

Para 10 píldoras.

Dr. E. Gutiérrez.	Guadalupe E. de Zacatecas.
-------------------	----------------------------

INYECCION HIPODÉRMICA DE COCAINA.

Vaselina líquida.....	grm.	5.	00
Clorhidrato de cocaína.....	„	0.	10

Dosis: una jeringa durante el acceso.

Dr. Leandro Arroyo.	San Angel D. F.
Bicarbonato de sosa.....	grm. 4. 00
Subnitrato de bismuto.....	„ 4. 00
Extracto de belladona.....	„ 0. 10

Para 12 papeles.

Un papel antes de cada alimento.

Dr. A. Martínez.	México.
Agua de azahar.....	grm. 120. 00
Bromuro de sodio.....	„ 2. 00

Extracto de belladona	„	0. 06
Sulfato de morfina	„	0. 02
Jarabe de éter sulfúrico	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta quitar el dolor.

Bálsamo tranquilo y

Cloroformo de c. c. gm. 15. 00

Láudano de Rousseau „ 6. 00

Friega.

Para dar fricciones en el epigástrico.

Dr. Jesús Villagrán.

México.

Clorhidrato de cocaína gm. 0. 01

Azúcar de leche „ 2. 00

Para 12 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. E. Gutiérrez.

Guadalupe E. de Zacatecas.

PÍLDORAS EUPÉPTICAS

Papaina de Trouette Perrel gm. 1. 20

Lacto peptina „ 1. 80

Clorhidrato de cocaína „ 0. 12

Extracto de colombo „ 0, 48

Para 12 píldoras.

Una ó dos píldoras en cada comida.

Por bebida, infusión de polvo de condurango, 15. 00

—Régimen lácteo.

Dr. J. López Tello.

Amecameca. E. de México.

DURANTE EL ACCESO DOLOROSO.

Agua destilada gm. 5. 00

Clorhidrato de cocaina..... „ 0. 10

Gotas.

Diez gotas una ó dos veces en medio pozuelo de cocimiento tibio de lechuga.

Dr. F. M. Arroyo. Irapuato, E. de Guanajuato.

Sulfato de estriknina..... gm. 0 05

Cuasina..... „ 0. 05

En 25 píldoras.

Dos ó tres píldoras en el día.—Con las comidas.

Dr. Antonio Matienzo. Tampico.

Clorhidrato de morfina..... gm. 0. 05

„ „ cocainm..... „ 0. 05

Jarabe..... „ 15. 00

Agua de menta..... „ 60. 00

„ cloroformada..... „ 60. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora ó cada dos horas.

Dr. Pablo Gama. México.

Opio bruto en polvo..... gm. 0. 40

Magnesia de Henry..... „ 5. 00

Polvo de castoreos..... „ 0. 40

„ „ nuez vómica..... „ 0. 20

Para 20 obleas.

Una oblea con cada comida, tres por día.

Baño de agua fría: ejercicio al aire libre y bebidas aseosas.

Carbonato de bismuto..... gm. 4. 00

Polvo de ruibarbo..... „ 0. 08

Clorhidrato de morfina..... „ 10. 00

En 20 papeles.

De dos á cuatro diarios, después de las comidas.

Dr. David Peña. Monterey

Monobromuro de alcanfor..... grm. 1. 00

Mentol puro y alcohol á 85°.... „ 0. 50

Aconitina pura..... „ 1. 00.3 mlgs.

Hidrolado de canela..... „ 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada tres horas.

Dr. Manuel S. Soriano. México

Subnitrato de bismuto..... grm. 3. 00

Magnesia calcinada..... „ 5. 00

Polvos de ipecacuana..... „ 0. 40

Extracto de opio..... „ 0. 40

En 20 papeles.

Un papel cinco minutos antes de la comida.

Como las dosis de opio y de ipeca son muy fuertes, se debe graduar esto según la susceptibilidad del enfermo.

Dr. José M. Irys. S. Juan Bautista.—Tabasco.

GASTRALGÍA DE ORIGEN PALUSTRE.

Masa de Meglin..... grm. 1. 50

Bromhidrato de quinina..... „ 1. 50

En 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas, dando antes narcótico para calmar el dolor, y las píldoras servirán para evitar su repetición.

r. Francisco de P. Crespo.

Huamantla.

Gastralgía acompañada de constipación.

Magnesia calcinada..... grm. 15. 00

En 4 papeles

Un papel en la noche al acostarse, en medio vaso de agua azucarada.

Durante el acceso:

Clorhidrato de morfina..... grm. 0.05

Agua destilada de toronjil..... „ 150. 00

Jarabe de belladona..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada diez minutos.

Cuando el acceso es muy doloroso, se empieza por aplicar en inyección subcutánea el contenido de una jeringa, de la solución siguiente:

Sulfato de atropina..... grm. 0. 01

Clorhidrato de morfina..... „ 0. 10

Agua hervida..... „ 20. 00

Inyecciones.

Si la gastralgía es sintomática de úlcera del estómago:

Solución de percloruro de fierro

de Praváz..... grm. 1. 20

Agua destilada..... „ 150. 00

Jarabe de naranja..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. J. Villagrán.

Méx

GASTRALGÍA POR CATARRO GÁSTRICO.

Agua natural caliente, una taza ó pozuelo tomárla en ayunas, lo más caliente que se pueda tolerar.

Esta medicina tan sencilla y de tan buenos resultados, es conveniente acompañarla de una alimentación azoada.

Dr. Juan C. Villaseñor.

Moré

GASTRALGÍA EN LOS DISPÉPTICOS.

Exalgina.	gram.	0. 50
Antipirina.	„	0. 50
Valerianato de quinina.	„	0. 50
Masa de Meglin.	„	0. 30

En 5 píldoras.

Una píldora cada hora ó cada dos horas.

Otra:

Bicarbonato de sosa.	gram.	2. 00
Magnesia de Márquez.	„	2. 00
Pepsina ácida.	„	0. 50
Polvo de ruibarbo.	„	0. 15

En 4 papeles.

Un papel con la comida y otro con la cena.

Dr. Ciro M. Santelices.

Querét

Agua de laurel cerezo.	gram.	10. 00
Clorhidrato de cocaina.	„	0. 15
„ „ morfina.	„	0. 05

Gotas.

Diez gotas cada hora hasta quitar el dolor.

Otra.

Antipirina gm. 2. 00

Cocaina „ 0. 20

Clorhidrato de morfina „ 0. 05

En 12 cápsulas.

Una cápsula cada hora hasta quitar el dolor.

Dr. Benjamín Rosano.

Mineral del Monte.

Solución arcenical de Towler . . . gm. 10. 00

Gotas.

Dos gotas antes de comer y dos antes de cenar.

Dr. Juan José R. de Arellano.

México.

Cianuro de mercurio gm. 0. 10

Goma c. b.

Para 50 píldoras.

Cinco píldoras diarias

Dr. Ignacio Matínez del Villar

México.

En el mayor número de los enfermos de gastralgia el dolor es sintomático de una congestión del hígado y por consiguiente debe tratarse la causa por los medios apropiados.

Gastrorragia.

Dr. M. Mucél.

México.

Quando es sintomática de la úlcera del estómago, Hielo y ergotina de Bongeant al interior, después subnitrate de bismuto laudanizado y por último el nitrato de plata cristalizado en píldoras de un centígramo para dar de tres á cinco por día.

Gastro-enteritis.

Dr. Pedro Acosta,

Guadalajara.

EN LOS NIÑOS.

Carbonato de sosa...de 4. 00 á	8. 00
Agua.....	„ 100. 00
Lactucaris.....de 0. 05 á	„ 0. 03

Cucharaditas.

Una cucharadita cada cuarto de hora.

Otra:

Carbonato de cal precipitado....	4. 00
----------------------------------	-------

En 6 papeles.

Un papel cada hora.

Otra:

Subnitrato de carbonato de bismu-

to 6. 00 á.....	10. 00
-----------------	--------

Goma arábica en polvo....de 6. 00 á	„ 10. 00
-------------------------------------	----------

Agua.....	„ 6. 00
-----------	---------

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Gengivitis.

Dr. D. Molinar,

Parral. E. de Coahuila.

GENGIVITIS EN LOS NIÑOS.

Jarabe simple.....	10. 00
Clorhidrato de cocaína.....	„ 0. 10
Tintura de azafrán.....	„ X gotas.

Frotaciones.

Para frotar con ello las encías.

Dr. Miguel Cordero,

México.

Glicerina neutra.....	30. 00
-----------------------	--------

Tintura alcohólica de iodo..... grm. 15. 00

Toques.

Tocar con un pincel tres veces al día en toda la extensión de la encía, seguidos de enjuagatorios con agua hervida.

Dr. M. Medal

Tacámbaro.

GENGIVITES CON NEURALGIA DENTARIA.

Antipirina..... grm. 2. 00

Agua de colonia..... „ 2. 00

Agua destilada..... „ 125. 00

Buches.

Para hacer buches cada diez minutos.

Glaucoma.

Dr. Agustín Chacón

México.

Agua destilada..... grm. 10. 00

Salicilato ó sulfato de eserina de „ 0. 02 á 0. 05

Colirio

Otra

Vaselina..... grm. 5. 00

Sulfato neutro de eserina..... „ 0. 01

Pomada para los ojos

Otra

Vaselina..... grm. 12. 00

Bioduro de mercurio..... „ 0. 01

Sal de eserina..... „ 0. 03

Pomada para los ojos.

Estas pomadas se usan tambien en las gueratitis superficiales, hernias del iris y midriasis.

Otra

Agua destilada grm. 10. 00
 Clorhidrato ó salicilato de pilor-
 capina de „ 0. 10 á 0. 15

Colirio.

Se puede tambien usar en pomada á dosis tres veces mayor que la eserina.

Debe preferirse este colirio á los anteriores cuando el empleo de los mióticos ha de ser prolongado, porque no daña á la conjuntiva como la eserina. Se preferirá tambien cuando la eserina cause cefalalgia.

Gota.

Dr. M. Mucél.

México.

Además de los remedios conocidos de todos usa el café verde en infusión para tomar diariamente.

Grietas del pezón

Dr. Demetrio Mejía

México.

Lavar muy bien con solución de ácido bórico al 4 % enjugar, y tocar con un pincel empapado en solución concentrada de ácido fénico lavando inmediatamente despues y aplicando el siguiente tópico:

Glicerina pura grm. 40. 00
 Almidón „ 8. 00
 Tanino „ 5. 00

Póngase al fuego y agítese constantemente hasta formar una especie de engrudo. (*Glicerolado de almidón.*)

Dr. Salvador F. Alcalá

Tecolotlan

Para prevenirlas y para curarlas.

Subborato de sosa grm. 4. 00

Agua hirviendo..... „ 120. 00

Lavatorio.

Usarlo tibio para lavar todas las noches el pezon y la aureola, los dos meses últimos del embarazo.

Dr. D. Molinar.

Parral.

COLODION ELÁSTICO.

Dr. Jesús H. Treviño

Monterrey.

Agua destilada grm. 120. 00

Percloruro de fierro „ 15. 00

Lavatorio.

Cuatro ó seis veces al dia

Gusanos intestinales.

Dr. Octaviano Leon Navarro.

Tangantzicuaró
E. de Michoacán.

Para reconocer la existencia de estos gusanos, se le dá al enfermo á la hora de recogerse, un poco de éter sulfúrico en un terrón de azúcar, disuelto en una infusión de menta.

Al dia siguiente arrojan porciones de gusanos planos.

En veinte años de ejercer la medicina no ha visto faltar una sola vez las fórmulas siguientes que sufren variaciones en cada caso según las circunstancias de cada individuo y la apreciación que de ellas haga el médico.

FORMULA 1^ª

Simiente de calabaza (Cucurbita lagenaria)..... grm. 60. 00

Leche de vaca „ 180. 00

Se tritura la simiente, despegando la de su cubierta coriácea, con azucar candi: se mezcla con la leche tibia y se toma por la mañana, absteniéndose de cenar la víspera y observando el día de la medicina una dieta razonada.

FÓRMULA 2^ª

Ruibarbo en polvo (Rechun palmatum).....	gram.	30. 00
Agua destilada de yerba buena (Menta crispa).....	„	60. 00
Aguarraz (oleum esentialis terebentina).....	„	15. 00

Suspéndase la esencia de trementina en la infusión de ruibarbo y tómese á la hora de la primera fórmula. Si hay mucho meteorismo y vértigos póngase fomentos de infusión de sauco (flor) en el vientre.

FORMULA 3^ª

Jerez de la frontera (Vino Hispa)..	gram.	120. 00
Aceite de croton (croton tiglicem)....		1 gota

Tómese á la media hora de la fórmula 2^ª

Si dos horas despues no hace efecto el purgante, tómese la siguiente.

Aceite de ricino ingles.....	gram.	30.00
Jarabe de corteza de cidra.....	„	15. 00
Glicerina pura.....	„	15. 00

Una Toma.

Helmentiasis.

Dr. Bernardino Díaz

Sn. Andres Tuxtla

E. de Veracruz

Aceite de ricino.....	gram.	15. 00
-----------------------	-------	--------

Id de almendras dulces.....	„	10. 00
Esencia de quenopodio.....	„	1. 00

Purga.

Dr. Cárlos Amezcua.

Tehuacán.

PARA NIÑOS DE 1 A 7 AÑOS.

Calomel.....	gram.	0. 15
Santonino.....	„	1. 00
Azucar.....	„	4. 00

en 10 papeles

Un papel al levantarse y otro al acostarse.

Para mayores de 20 años un papel más en la tarde.

Dr. M. Mucél.

México.

Santonato de sosa de 0. 20 á.....	gram	0. 60
Calomel y Azucar de leche de c. c. „		0. 60.

Para 3 papeles.

Un papel cada media hora, siguiendo al último un purgante de aceite de ricino y jarabe de menta.

Dieta la víspera del día en que debe tomarse el medicamento y mientras obra éste, leche con té de yerbabuena.

Dr. Miguel Cordero.

México.

Pepita de calabaza de tierra caliente
mondada:..... gram. 190. 00

Agua c b. para hacer una emulsión que se tomará endulzada en ayunas y pasadas cuatro horas, un purgante de aceite de ricino (D. Lucio)

Hemicránea.

Dr. Guillermo R. Servin. Triunfo. Baja California.

Bromuro de potasio.....	..	gram.	5.00
Antipirina	2.00
Citrato de cafeina.....	0.15
Polvo de paulinia.....	4.00
Polvo de opio.....	0.05
Fenacetina.....	1.50

En 10 papeles impermeables.

Los dos primeros cada media hora y después cada hora. Las hemicráneas más rebeldes ceden á los cuatro ó cinco papeles.

Esta fórmula se aplica con éxito en todas las neuralgias cráneas. En las que son sintomáticas de la dismenorrea, se suprime la antipirina.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

Tintura de sanguinaria.....	3 gotas.
Agua.....	120 gramos.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra.

Anticamnia.....	..	gram.	1. 00
Azúcar.....	1. 00

En 10 papeles.

Un papel cada hora.

Dr. Octaviano León Navarro. Tangantzícuaro.

Alcoholadura de bálsamo del Perú..	..	gram.	30. 00
„ de nuez moscada.....	30. 00

Alcoholadura	de valeriana.....	gram.	60. 00
„	de limón compuesta...	„	60. 00

Friega.

Sobre la espina dorsal. Lavativas de agua fría.

Hemoptisis.

Dr. J. M. Trys. San Juan Bautista. E. de Tabasco

Ergotina.....	gram.	1. 00
Polvo de ipecacuana.....	„	0. 20
Extracto de opio.....	„	0. 05

Para 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Dr Benjamin Rosano Mineral del Monte.

Ergotina.....	gram.	1. 30
Polvo de ipeca.....	„	0. 60
Ácido gálico.....	„	1. 20

En 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Si la hemoptisis es muy abundante.

Extrato fluido de ergotina...	gram.	90. 00
Id. id de ipecacuana....	„	15. 00
Tintura de opio.....	„	15. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Hemorragias uterinas.

Durante el primer trimestre del embarazo.

Dr. Antonio J. Carbajal. México.

Extracto fluido de yerba del po- llo (tradescantatrop).....	gram.	4. 00
--	-------	-------

Infusión de hojas de naranjo . . . „	125. 00
Jarabe simple „	16. 00

Cucharadas.

- Una cucharada cada dos horas.

Hemorragias.

Dr. M. Medal. Tacámbaro. E. de Michoacán.

HEMORRAGIAS DESPUES DEL PARTO

Cuernecillo de centeno de 4. 00 á grm. 8, 00 para hacer cocimiento en grm. 250. 00 de agua.	
Agua de Rabel X	gotas.
Jarabe de opio grm. 30. 00	

Cucharadas.

Tres cucharadas cada media hora.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

HEMORRAGIAS DIATÉRICAS.

Agua destilada grm. 120. 00	
Tintura de acónito „	2. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Lázaro Ortega. México.

Comelina	2. 00
--------------------	-------

En 20 píldoras

Una píldora cada hora

Hemorragias en superficie

Agua destilada grm. 30. 00	
Comelina „	4. 00

Toques.

Para tocar con un pincel las hemorragias en *Napp*.

Hemorroides.

Dr. F. Abrego

México.

Régimen vegetal en su mayor parte y la pomada siguiente:

Pomada de belladona	gram.	15. 00
Calomel.....	„	2. 00
Resorsina.....	„	0. 50
Antipirina.....	„	2. 00

Pomada.

Dr. P. Gama

México.

Vaselina.....	gram.	40. 00
Ácido bórico.....	„	1. 00
Extrato de crameria.....	„	2. 00
Tintura tebaica.....	„	1. 00

Pomada.

No regir el cuerpo sin previa lavativa, haciéndolo despues en baño de asiento ligeramente tibio.

Alimentación de legumbres y frutas, baños tibios frecuentes, vida reposada y tranquila.

Purgante aceitoso semanario. No usar alcohólicos.

Dr. J. G. Ybarra

Etzatlán. E de Jalisco.

Manteca.....	gram.	30. 00
Extracto de crameria.....	„	4. 00
Láudano de Sydenham.....	„	1. 00

Pomada.

Usarla dos veces al dia.

Dr. Leonides E. Jonguitua—Tenancingo E. de México.

HERMERROIDES PEQUEÑAS

Agua destilada y Ácido crómico de c. c. grm 2. 00

Toques.

Para tocar la hemorroide una vez al dia.

Dr Manuel M. S. Soriano México.

Mantequilla fresca grm. 30. 00

Extracto de toloache „ 2. 00

Idem. amamelis virgínica „ 4. 00

Pomada.

Tres ó cuatro veces por dia lavando antes con agua rosada.

Dr. D. Molinar. Parral.

HEMORROIDES INFLAMADAS

Ungüento de populeon grm. 30. 00

Tanato de plomo „ 0. 50

Extracto de crameria „ 1. 00

Clorhidrato de cocaina „ 0. 05

Pomada.

HEMORROIDES CRÓNICAS

Cauterizaciones con nitrato ácido de mercurio.

Dr. Juan José R. de Arellano México.

Unguento populeon grm. 30. 00

Tanato de plomo „ 2. 00

Pomada.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid. México.

Manteca benzoada grm. 32. 00

Extracto fluido de amamelis....	„	2. 00
Tanino.....	„	1. 00
Extracto de opio.....	„	0. 10

Pomada.

Otra.

Aceite rosado.....	gram.	32. 00
Extracto fluido de amamelis....	„	2. 00
Tanino.....	„	1. 00
Extracto de opio.....	„	0. 10

Uso externo.

Dr. Juan N. Campos Toluca.

Pomada de hojas de estramonio....	„	15. 00
Extracto de crameria.....	„	2. 00
Acetato de plomo cristalizado.....	„	2. 00

Pomada.

Aplíquese en la mañana y en la tarde.

Dr Benjamin Rosano Mineral del Monte.

Manteca de cacao.....	c. b.	
Tintura de amamelis.....	30 gotas	

Para 6 supositorios.

Uno en la mañana

Al interior de 10 á 15 gotas de tintura de amamelis
tres veces al dia

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

Pomada de belladona.....	gram.	40. 00
Extracto de crameria.....	„	3. 00
Ioduro de plomo.....	„	2. 00

Pomada.

Se aplicados veces al dia por medio de un lechino introducido en el ano.

Dr. Eduardo Lamicq. México.

Cuando están inflamadas el método clásico y fuera de estos periodos 20 gotas diarias de extracto florido de amamelis virgínica.

Hepatalgia.

Dr. D. Molinar Parral.

Bromuro de potasio..... grm. 2. 00

Agua simple..... „ 200. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Heridas.

Dr. Francisco de P. Crespo Huamantla.

En los casos en que por cualesquiera motivo no puede emplearse la curación de Lister ha dado buen resultado la siguiente: Lavar las heridas con agua hervida y fenicada al 2% y cubrirlas con un lienzo picado en el que se pone la siguiente pomada.

Vaselina..... grm. 30. 00

Iodoformo..... „ 1. 00

Bálsamo negro..... „ 10. 00

Pomada.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.

En los casos en que no se tiene la curación de Lister.

Glicerina neutra..... grm. 30. 00

Iodoformo..... „ 1. 00

Vaselina..... „ 15. 00

Curación Tópica.

Vaselina.....	gram.	30. 00
Subnitrato de bismuto.....	„	3. 00

Curación Tópica.

Pomada alcanforada.....	gram.	30. 00
Balsamo de copaila.....	„	4. 00

*Curación Tópica.***Herpes.**

Dr. P. Gaama México.

Jugo de Tocuistles.....	gram.	125. 00
Jarabe comun.....	„	250. 00

Cucharadas.

Dos cucharadas tres veces al día.

Sanolina y vaselina de c. c.....	gram.	20. 00
Azufre sublimado	} de c. c... „	4. 00
Protocloruro de mercurio		
Aceite de cade verdadero		

Pomada.

Dos curaciones diarias, lavando antes las partes

Dr. E. Lier México.

HERPES DE LOS ÓRGANOS GENITALES.

Ácido de zinc.....	gram.	5. 00
Talco.....	„	5. 00
Flor de azufre.....	„	1. 00

*Uso indicado.***Hidropesía.**

Dr. Lázaro Ortega. México.

Extrictina.....	gram.	0. 05
Extracto de grama.....	„	1. 25

En 25 píldoras.

Dos ó tres píldoras repartidas en el día.

Hiperhidrosis.

DE LAS MANOS

Dr. E. Lier		México.
Ácido tánico.....	gram. 2.	00
Id. salicílico.....	„ 1.	00
Naftol B.....	„ 50.	00
Alcohol diluido y.....		
Alcohol de menta de c. c.....	„ 50.	00
Glicerina.....	„ 10.	00

Uso externo.

DE LOS PIES

Ácido crómico.....	gram. 5.	00
Alcohol diluido.....	„ 10.	00

*Solución para uso externo***Hipertermia.**

Dr. J. Villagrán		México.
Antipirina.....	gram. 4.	00

*Para 8 cápsulas.**Una cápsula cada hora hasta el efecto.*

Dr. Fernando López		México.
--------------------	--	---------

HIPERTERMIA DE LA CONJUNTIVA

Agua destilada.....	gram. 10.	00
Extracto fluido de amamelis virgínica		
de 5 á	10 gotas.	

*Filtrese y rotúlese.**Gotas para los ojos.*

Hipeselesia vulvar.

Dr. A. Díaz. S. Antonio Tejas.

Agua destilada..... grm. 20. 00

Nitrato de plata cristalizado.. „ 2. 00

Toques.

Esta solución se aplica sobre la mucosa vulvar después de haberla lavado con agua caliente betanaftalizada.

Combatir la lesión uterino concomitante

Hipo rebelde.

Dr. Ricardo Egea y Galindo México.

Una cucharadita cafetera de muy buen vinagre y otra de polvo de azucar, cada media hora por cuatro ó cinco veces. Suspendiendo cuando se suspenda el hipo y repitiendo si es necesario.

Histeralgia.

Dr. José B. López Campeche.

Poción Gomosa..... grm. 130. 00

Valerianatode amoniaco..... „ 2. 00

Jarabe c. b. •

Cucharadas.

Una cucharada cada hora

Histeria.

Dr. Guillermo Senisson. México.

Elixir de tumba-vaquero..... grm. 30. 00

Bromuro de estrancio..... „ 4. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada tres horas.

Para menores de 12 años, cucharaditas cafeteras.

Dr. J. Villagrán,	México
Infusión de hojas de naranjo . . .	gram. 120. 00
Bromuro de potasio } „ de sodio }	„ 2. 00
„ de amonio }	
Hidrato de clorol	„ 4. 00
Jarabe de corteza de naranja amarga	„ 40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta el efecto sedante.

Dr. Emilio Polo,	Puebla.
Agua destilada	gram. 120. 00
Tintura de gelcemiun	8 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora. Es superior á los bro-
muros.

Dr. Francisco de P. Crespo,	Huamantla.
DURANTE EL ACCESO.	

Valerianato de amoniaco	gram. 1. 00
Infusión de hojas de naranjo	„ 120. 00
Jarabe de éter	„ 30. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Histeroepilepsia.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre,	Tehuacán.
Un gramo de nitrato de amila para tomarlo en el dia.	

Icteria catarral.Dr. D. Molinar. Parral.

Polvo de ruibarbo..... grm. 12. 00

Bicarbonato de sosa..... „ 4. 00

En 6 papeles.

Uu papel tres veces al día.

Polvo de nuez vómica.. de 0. 30 á grm. 0. 40

Extracto de ruibarbo..... „ 4. 00

Corteza de naranja amarga..... „ 2. 00

En 20 obleas.

Una oblea antes de cada comida.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

Tintura de acónito..... grm. 1. 00

Bicarbonato de sosa..... „ 2. 00

Agua..... „ 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Sostener este tratamiento por 6 ú 8 días. Dieta y
leche.Dr. Benjamín Rosano. Mineral del Monte.

Aloina..... grm. 1. 00

Podofilina..... „ 0. 20

Extracto de belladona..... „ 0. 05

En 10 píldoras.

Dos píldoras en la noche cada tercer día.

Dr. Lázaro Ortega. México.

Subnitrato de bismuto..... grm. 4. 00

Bicarbonato de sosa..... „ 4. 00

Magnesia calcinada.....	„	4. 00
Extracto de belladona.....	„	0. 10

En 12 papeles.

Un papel antes de las comidas principales.

Ictiosis.

Dr. E. Lier.		México.
Azufre.....	gram.	10. 00
Ácido salicílico.....	„	2. 00
Vaselina.....	„	90. 00
Cloruro de calcio.....	„	0. 50

Uso externo.

Impétigo.

Dr. Eduardo Lamicq.		México.
Pomada benzoada.....	gram.	30. 00
Óxido de zinc.....	„	1. 00
Aceite de cade.....	„	1. 00

Pomada.

Tres veces al día después de quitar las costras. Si hubiese mucha comezón se le puede agregar un poco de extracto de opio.

Incontinencia de orina.

Dr. Emilio Polo.		Puebla.
Tintura de cicuta.....	3 gotas	
Agua.....	gram.	120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Santonino.....	gram.	0. 05
Azúcar.....	„	1. 00

En 10 papeles.

Un papel cada hora.

Gránulos de citrato de fierro y de estriçnina al medio milígramo.—Dos en el día.

Indigestión.

Dr. Antonio C. Guzmán. Matamoros.

Infusión de hojas de naranjo . . .	gram.	120. 00
Bicarbonato de sosa	,,	6. 00
Elixir paregórico	,,	2. 00
Jarabe de azahar	,,	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Bicarbonato de sosa	gram.	6. 00
Carbonato de magnesia	,,	6. 00
Sulfato de morfina	,,	0. 02

En 12 papeles.

Un papel despues de cada alimento.

Inflamaciones traumáticas.

Dr. Jesús H. Treviño. Monterrey.

Empacar la parte inflamada con una capa de ácido salcílico en polvo.

INYECCIONES DE MORFINA.

Dr. José María Benitez. Guadalajara.

Sulfato de morfina	gram.	0. 20
Acido fénico	,,	0. 08

Agua destilada	} doce partes iguales hasta completar 10 centímetros cúbicos.
Glicerina	

Disuélvase y filtrese.

Esta inyección se conserva inalterable por un tiempo indefinido.

Cada centímetro cúbico contiene dos centígramos de morfina,

INYECCIONES DE QUININA.

Clorhidrato de quinina	gram. 0. 50
Ácido clorhídrico puro	2 gotas.
Agua	{ partes iguales hasta comple-
Glicerina	
Ácido fénico	gram. 0. 03

Disuélvase y filtrese.

Esta inyección es inalterable, acéptica, poco dolorosa y no produce flemones ni escarifica.

Cada centímetro cúbico contiene $12\frac{1}{2}$ centigramos de clorhidrato de quinina.

INYECCIONES HIPODÉRMICAS DE QUININA.

Dr. T. Negrete.	Querétaro.
Agua destilada	gram. 1. 00
Clorhidrato de quinina	„ 0. 50
Antipirina	„ 0. 05

Inyección hipodérmica.

Esta inyección tiene la ventaja de permanecer líquida aun en frío, por consiguiente no se cristaliza la sal de quinina y no forma flemones ni escara y además no es dolorosa. Siempre debe aplicarse calentándola ligeramente.

Esta misma fórmula fué remitida por el Sr Dr. Ciro Santelices de Querétaro.

INFLAMACION DEL APARATO GÉNITO-URINARIO
DE LA MUJER.

Dr. F. Blazquez.	México.
------------------	---------

Cápsulas de gram. 0. 20 de ictio sulfato de amoniac. Dos en la mañana y dos en la tarde.

Aumentar una diaria hasta tomar dos en el día.

Influenza.

Dr. E. Gutierrez. Guadalupe. E. de Zacatecas.

FORMA CATARRAL FEBRIL.

Infusión de hojas de té.....	gram.	120.	00
Carbono de amoniaco de 4. 00 á	„	8.	00
Cognac.....	„	30.	00
Salicilato de sosa.....	„	4.	00
Jarabe de opio.....	„	40.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

FRIEGAS GENERALES DE LINIMENTO TREMENTINADO.

FORMA NEURÁLGICA.

Agua de azahar.....	gram.	30.	00
Antipirina.....	„	3.	00
Cafeina.....	„	0.	50
Jarabe de codeina.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

FORMA GÁSTRICA.

Agua destilada.....	gram.	100.	00
Apomorfina de 0. 02 á.....	„	0.	05
Ácido clorhídrico.....	<i>X gotas.</i>		

Cucharadas.

Una cucharada cada cuarto de hora hasta el efecto.

PURGANTE.

Agua de azahar.....	gram.	100.	00
Sulfato de sosa de 30. 00 á.....	„	45.	00
Alcohol.....	„	8.	00
Cloroformo.....	„	1.	00
Jarabe cítrico.....	„	50.	00

FORMA INTERMITENTE.

Grageas de bromhidrato de quinina de grm. 0. 10
Una cada dos horas.

EN LA DECLINACION. POCIÓN TÓNICA (VEASE NEUMONÍA.)

Dr J. M. Dávila. Mazatlán E. de Sinaloa.

Antipirina	grm.	2. 00
Extracto fluido de jaborandi	,,	4. 00
Polvo de Dower	,,	1. 00
Infusión de borraja	,,	100. 00
Jarabe de tolú	,,	40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Francisco Fernández. Medellín E. de Veracruz.

Infusión de canela	grm.	125. 00
Acetato de amoniaco	,,	8. 00
Tintura de ipecacuana	,,	1. 00
Cognac	,,	40. 00
Jarabe de éter	,,	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. R. López. México.

Infusión de jaborandi (grm. 4. 00 de polvo)	grm.	150. 00
Acetato de amoniaco	,,	10. 00
Tintura de ipeca	,,	1. 00
Alcohol y jarabe de éter de c. c.	,,	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. J. López Tello, Amecameca. E. de México.

FORMA CATARRAL.

Infusión de digital.....	gram.	120.	00
Antipirina.....	„	2.	00
Jarabe de opio.....	„	40.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Francisco de P. Crespo, Huamantla.

Infusión de borraja.....	gram.	500.	00
Acetato de amoniaco.....	„	8.	00
Cognac ó catalán.....	„	45.	00
Jarabe de opio.....	„	30.	00
Id. simple.....	„	15.	00

Pozuelos.

Un pozuelo cada dos horas.

Linimento amoniacal.....	gram.	60.	00
Bálsamo anodino.....	„	10.	00

Friega.

O bien,

Bálsamo tranquilo.....	gram.	60.	00
Láudano Sydenham.....	„	8.	00
Cloroformo.....	„	8.	00

Friega.

Si la temperatura llega ó pasa de 40° ó la cefalalgia es muy extensa:

Antipirina.....	gram.	0.	50
Bromhidrato de quinina.....	„	0.	20

[Para una oblea.

Dos ó tres obleas iguales repartidas en el día.

Dr. Guillermo R. Servín Triunfo Baja California.

FORMA CATARRAL.

Recina de benjuí pulverizada	gram.	2. 50
Azufre sublimado	„	1. 00
Oleosacaruro de hinojo	„	2. 50
Fenato de sosa	„	0. 10
Goma amoniaco	„	1. 00
Azufre dorado de antimonio	„	0. 10
Antipirina	„	1. 50
Malvavisco pulverizado	„	1. 00

En 35 píldoras.

Barnizadas con bálsamo de tolú disuelto en cloroforno.

Una píldora cada hora.

Cuando ya no haya calentura se suprime la antipirina, el azufre dorado de antimonio y el fenato de sosa y en su lugar se ponen 15 centígramos de kermes mineral.

Dr. D. Molinar, Parral,

Antipirina	gram.	2. 00
Azúcar	„	1. 00

En 4 papeles.

Un papel cada media hora.

Infusión de jaborandi	gram.	200. 00
Acetato de amoniaco		10 gotas.
Jarabe de guayacán	„	30. 00

Bebida.

La bebida se tomará en la noche.

FRICCIONES CON LINIMENTO AMONIACAL ALCANFORADO.

Dr. J. M. Garza.

San Pedro de las Colonias.

E. de Coahuila.

Salicilato de sosa.....	gram.	4. 00
Antipirina.....	,,	2. 00
Polvo de Dower.....	,,	1. 50

En 10 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. R. Ruiz.

Salvatierra.

FORMA NEURÁLGICA.

Antipirina.....	gram.	1. 00
Salicilato de sosa.....	,,	2. 00
Poción gomosa.....	,,	120. 00
Jarabe de morfina.....	,,	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Insomnio.

Dr. M. Valdéz y Diaz. Paso de Ovejas. E. de Veracruz.

Bromuro de potasio.....	gram.	2. 00
Antipirina.....	,,	1. 00
Agua endulzada.....	,,	120. 00
Láudano de Sydenham.....	X. V gotas.	

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Antonio Butrón.

Acapulco

EN LOS ALCOHÓLICOS.

Jarabe de cloral de Follet.....	gram.	80. 00
Bromuro de sodio.....	,,	10. 00
Agua destilada.....	,,	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta el efecto.

Otra.

Paraldeida.....	gram.	3. 00
Poción gomosa.....	,,	70. 00
Jarabe de azahar	,,	30. 00

2 tomas.

Con una hora de distancia una de otra.

Intértrigo.

Dr. Miguel Cordero. México.

Glicerina neutra.....	gram.	30. 00
Subnitrato de bismuto	,,	4. 00

Untura.

Dos veces al día previo lavado del lugar enfermo.

Dr. Francisco de P. Crespo. Huamantla.

Tanino.....	gram.	4. 00
Vaselina.....	,,	30. 00

Pomada.

Involución uterina en el puerperio.

Dr. D. Mejía. México.

Cuando la matriz por falta de involución retiene sus loquios y se inician los accidentes de infección, se usan inyecciones calientes de solución fenicada ó borizada, tres ó cuatro veces al día y veinte gotas cada dos horas de solución de ergotina de Ivon.

Ioduro.

SU ADMINISTRACION.

Dr. J. Blazquez. México.

ACONSEJA LA FÓRMULA SIGUIENTE.

Agua.....	gram.	20. 00
Ioduro de potasio	,,	10. 00

Tintura de beleño..... „ 5. 00
Gotas.

Tomar veinte gotas en la comida.

Aumentar diez gotas diarias, hasta producir el catarro iódico, nazal ó intestinal.

Irritación.

Dr. Octaviano León Navarro. Tangantzicuaró.

La enfermedad conocida vulgarmente con este nombre y caracterizada por una excitación de la piel acompañada de prurito.

Ácido arcénioso..... grm. 0 05
Azúcar..... „ 5. 00

Para 24 papeles.

Dos papeles diarios.

Protocloruro de mercurio..... grm. 0. 20
Recina de guayacán..... „ 1. 00
Extracto de opio..... „ 0. 10

En 20 píldoras.

Una píldora en la noche.

Iritis.

Dr. Agustín Chacón. México.

Agua destilada..... grm. 10. 00
Sulfato de atropina de 0. 02 á... „ 0. 05

Colirio.

Se usa también esta fórmula en las congestiones del iris, sinequias, espasmos del músculo ciliar, úlceras centrales de la cornea y blefarospasmo.

Otra.

Agua destilada..... grm. 10. 00

Dr. J. López Tello. Amecameca E. de México.

Antipirina..... :..... grm. 2. 00

Para 4 papeles.

Un papel cada dos horas.

Dr. J. Villagrán. México.

Infusión de tilia..... grm. 120. 00

Elixir de garuz..... :..... „ 40. 00

Antipirina..... „ 4. 00

Jarabe de azahar..... „ 15. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora hasta quitar el dolor; despues retárdese su empleo.

Dr. Juan N. Campos. Toluca.

JAQUECA REUMATISMAL.

Agua..... grm. 100. 00

Salicilato de sosa..... „ 1. 00

Valerianato de amoniaco de

Prilloot..... „ 2. 00

Jarabe c. b.

2 tomas.

Con media hora de distancia.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid. México.

Hidrolado de menta..... grm. 120. 00

Clorhidrato de amoniaco..... „ 0. 60

Licor de Hoffman..... „ 0. 50

Jarabe de azahar..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Jiotes.

Dr. C. M. Garza.—S. Pedro de las Colonias. E. de Coahuila.

LOCIONES REPETIDAS CON TINTURA DE SERPENTARIA.

Arsénico al interior.

Lavatorio antiséptico

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.

Agua destilada.....	gram.	500.	00
Ácido carbólico.....	„	5.	00
Alcohol alcanforado.....	„	20.	00
Sal común.....	„	15.	00

Lavatorio para las heridas. (1)

Laringitis catarral.

Dr. J. Villagrán México.

Biborato de sosa.....	gram.	1.	00
Azúcar en polvo.....	„	2.	00

En 12 papeles.

Un papel cada dos horas tomando los polvos en la lengua y disolviéndolos con la saliva.

Dr. José B. López. Campeche.

Extracto de belladona.....	gram.	0.	10
Id. de valeriana.....	„	0.	10
Id. de opio.....	„	0.	10

En 10 píldoras.

Una píldora cada hora.

(1) El autor cree que el cloruro de sodio además de su acción antiséptica, tiene la propiedad especial de activar la formación vegetativa de los nuevos tejidos cicatriciales. Usa la fórmula anterior para el tratamiento por inmersión de las heridas contusas en los miembros, diluido con un litro de agua hervida. La misma usa para la irrigación continua de las mismas heridas; particularmente en los meses de calor.

Dr. Miguel Cordero. México.

Agua de laurel [cerezo	gram.	16. 00
Bromuro de sodio	„	1. 00
Clorhidrato de morfina	„	0. 05

Gotas.

Diez gotas cada dos horas en un poco de agua azucarada. Dejar pasar igual tiempo después de los alimentos.

Dr. Manuel S. Soriano México.

Infusión de polígala de virginia	gram	125. 00
Goma arábica en polvo	„	4. 00
Salicilato de sosa	„	4. 00
Tintura de lobelia inflata	„	4. 00
Acetato de amoníaco	„	8. 00
Jarabe balsámico	„	30. 00
Id. de morfina	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Dr. M. Villaseñor. Pénjamo. E. de Guanajuato.

Se suprime el dolor por aplicaciones locales de aconitina en la raíz de la lengua. Un gránulo de milígramo cada diez minutos hasta obtener el efecto y la inflamación por la aplicación local de bicarbonato de sosa en polvo.

Dr. Pedro Peña. Zamora.

Ioduro de potasio	gram	1. 50
-----------------------------	------	-------

En 3 papeles.

Un papel cada ocho horas en un pozuelo de agua azucarada lo más caliente que se pueda tolerar. Sus resultados son inmediatos.

Dr. M. Mucél.

México.

LARINGITIS ESTRIDULOSA.

Flor de azufre	gram. 2. 50
Polvos de Dower	„ 1. 50
Azúcar de leche c. b.	

En 20 papeles

Un papel cada hora. Revulsivo de Thapsia en la región supraexternal.

Larvas de moscas.

Ó GUSANOS EN LAS FOSAS NASALES.

Dr. Elias A. Gómez.

Cuernavaca E. de Morelos.

Instilaciones de clcroformo puro en las fosas nasales repetidas varias veces en el día, mientras el enfermo experimente el cosquilleo de los animales vivos.

Extracción de las larvas muertas con pinzas de disección.

Irrigaciones con solución de bicloruro al medio por mil, todo el tiempo que tarde la cicatrización de las pérdidas de sustancia.

**Lesiones valvulares del corazón
no compensadas.**

Dr. Ciro M. Santelices.

Querétaro.

Cocimientos de estigmatos de maiz	gram. 500. 00
Acetato de sosa.....	„ 5. 00
Rom de Jamaica	„ 30. 00

Tintura reciente de digital..... „ 4. 00
 Jarabe de cinco raices..... „ 40. 00

Pozuelos.

Un pozuelo cada hora.

Otra,

Infusión de digital..... grm. 350. 00
 Tintura de estrofantus hispíduS „ 3. 00
 Jarabe de estriCnina..... „ 40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra.

Cafeína..... grm. 3. 00
 Benzoato de sosa..... „ 2. 00
 Sulfato de estriCnina..... „ 0. 01

En 12 cápsulas.

Tres diarias.

Leucorrea.

Dr. D. Molinar.

Parral.

Salicilato de sosa..... grm. 10. 00

En 20 papeles.

Tres papeles diarios.

Dr. José M^a Benítez.

Guadalajara.

Aristol de 3. 00 á..... grm. 6. 00

Grenetina..... }
 Glicerina..... } de c. c. cantidad suficiente.
 Agua..... }

Para hacer 6 pastillas.

Una pastilla todas las noches en la vagina. Se puede sustituir el aristol con iodoformo ó calomel á la misma dosis.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid.	México.
Goma de Sonora.....	gram. 30. 00
Agua.....	„ 1000. 00

Maceración para usarla en inyecciones vaginales dos veces al día.

Dr. Ricardo Egea y Galindo.	México.
Sulfato de fierro.....	gram. 20. 00
„ „ cobre.....	„ 20. 00
„ „ zinc.....	„ 10. 00
Alumbre.....	„ 20. 00

En 20 papeles.

Disolver un papel en un litro de agua clara y emplear la cantidad en una inyección al levantarse, repitiendo lo mismo al acostarse.

Dr. Juan Collantes y Buenrostro.	México.
Agua destilada.....	gram. 500. 00
Polvo de borax.....	„ 5. 00

Inyecciones.

La mitad en la mañana y la otra mitad en la tarde.

Linfatismo.

Dr. Alberto Aizpuru.	México.
El Binol, preparación de maltina y aceite de hígado de bacalao.	

Liquen.

Dr. E. Lier	México.
-------------	---------

ÁCIDO ARCENIOSO AL INTERIOR Y AL EXTERIOR.

Ácido fénico.....	gram. 1. 00
Sublimado de mercurio.....	„ 0. 25

Ácido salicílico	„	0. 50
Vaselina,	„	100. 00

Pomada.

Litiasis renal.

Dr. Salvador F. Alcalá. Tecolotlán.

Magnesia calcinada grm. 15. 00

Carbonato de cal „ 15. 00

Uso indicado.

Una cucharada cafetera en agua, sobre cada una de las comidas principales.

LITIASIS BILIAR.

Dr. M. Mucél. México.

Calmar el dolor con inyecciones de morfina ó con aspiraciones de cloroformo.

Dar cucharadas continuadas de aceite de almendras dulces, hasta la expulsión del cálculo y para evitar su repetición, el método del Dr. Rafael Lucio.

Cremor grm. 20. 00

Bicarbonato de sosa „ 10. 00

Ácido tártrico „ 2. 00

Para 10 papeles.

Dos al día en cocimiento de simonillo.

Dr. S. F. Alcalá. Tecolotlán.

Glicerina grm. 100. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita tres veces al día en agua de Vichy.

Las crisis se tratan con morfina y belladona asociadas por la vía gástrica si no hay vómitos, ó por la vía hipodérmica, si no se puede por el estómago.

Lúmbago.

Dr. Manuel Villaseñor.—Pénjamo, E. de Guanajuato.

Colodión elástico	gram.	30. 00
Tintura de iodo	,,	30. 00
Ámoniacó.	¶,,	8. 00

Uso externo.

Para aplicarlo violentamente con un pincel sobre la región enferma.

Lúpus eritematoso.Dr. E. Lier México.

Acido pirogálico	gram.	5. 00
Id. salicílico	,,	2. 00
Vaselina	,,	43. 00

Ungüento.

Ácido láctico y ácido salicílico de c.c.	gram.	2. 00
Resorsina	,,	3. 00
Ictiol	,,	2. 00
Óxido de zinc	,,	5. 00
Vaselina,	,,	36. 00

*Ungüento.***LÚPUS VULGAR.**Dr. E. Lier. México.

Ácido arsenioso	gram.	1. 00
Cinabrio	,,	3. 00
Ácido salicílico	,,	0. 30
Cocaina	,,	1. 00
Epidermina ó vaselina	,,	30. 00

Ungüento.

Para ponerlo por tres días; después:

Iodo puro	gram. 0. 50
Dermatol	„ 2. 50
Vaselina	„ 47. 00

Uso externo.

—

Dr. Miguel Cordero.	México.
Agua alcoholizada	gram. 200. 00
Fenol absoluto	„ 2. 00

Pulverizaciones.

Con pulverizador de vapor una vez cada 24 horas por 15 minutos sobre el lugar enfermo.

Mal de Bright.

Dr. M. Mucél.	México.
Dieta láctea.—Sudoríficos.—Limonadas minerales.	

—

Dr. Ciro M. Santelices.	Querétaro.
Ergotina de Bonjean	gram. 4. 00
Extracto de nuez vómica	„ 0. 10

Para 12 cápsulas.

Una cápsula cada dos horas.

Mal olor y sudor de los piés.

Dr. Manuel Carmona y Valle.	México.
Alumbre finamente pulverizado c. b.	

Para poner un poco de polvo dentro de las medias y del calzado.

Lavar los piés cada tres ó cuatro días.

El resultado es casi inmediato.

Mal del pinto.

Dr. Ramón Martínez Carriedo.	México.
Agua tibia	gram. 40,000. 00

Acido clorhídrico.....	„	30. 00
Tintura de canela.....	„	10. 00

Uso indicado.

Para darse baños cada tercer día, alternando con el siguiente:

Agua.....	gram.	40,000. 00
Ioduro de potasio.....	„	30. 00

Para un baño.

Al interior.

Clorhidrato de pilocarpina.....	gram.	0. 10
Iodoformo.....	„	0. 20

Para 20 píldoras.

Dos píldoras diarias al acostarse.

Baño de aseo cada ocho días, resguardar al enfermo del aire y de los rayos directos del sol.

Dr. J. M^a Irys. San Juan Bautista E. de Tabasco.

Proto-ioduro de mercurio.....	gram.	1. 00
Extracto de opio.....	„	0. 05

Para 40 píldoras.

Dos píldoras diarias.

Agua.....	gram.	400. 00
Bicloruro de mercurio.....	„	2. 00
Alcohol c. b. para disolverlo		
Sulfato de zinc.....	„	4. 00
Acetato de amoniaco.....	„	4. 00

Loción

Estas lociones se darán con lienzo fino en las partes manchadas y se deja que sequen espontáneamente. Agitando la botella antes de usarla.

Este tratamiento es muy conocido por sus buenos resultados en el Estado de Tabasco y en el de Chiapas.

Su autor aconseja usarlo hasta tocar la encía y emplear entónces además de los medios apropiados para curar la estomatitis, purgantes de sulfato de sosa ó de magnesia calcinada, dos ó tres. Si al aparecer la estomatitis no han desaparecido las manchas, se espera que cure la inflamación de la boca para repetir el mismo método.

Hay que recordar que las manchas blancas no se quitan y que sólomente se consigue que no aumenten más.

Mal de San Lázaro.

Dr. P. Gama

México.

FORMA TUBERCULOSA.

Cocimiento de madera de rascavieja por agua de uso.

Ioduro de potasio en dosis progresivas de 0. 05 á 1. 00 gramo diario.

Baños tibios, de solución al milésimo de cloruro de sodio y aplicación de la siguiente:

Bicarbonato de sosa.....	gram.	8. 00
Tintura de iodo.....	„	10. 00
Manteca.....	„	40. 00

Pomada.

Este tratamiento se debe continuar por dos ó tres meses administrando gránulos de arceniato de estricina.

Meningitis cerebral.

Dr Benjamín Rosano

Mineral del Monte.

De 30 á 40 centígramos diarios de ioduro de po-

tasio y una gota de tintura de gelcemiun cada hora los primeros días y después dos gotas cada hora.

Menorrágia.

Dr. M. Mucél.

México.

Extracto fluido de Hidrastis Canadensis: diez gotas cada dos horas al empezar el tratamiento, y desde el segundo día la misma dosis cada cuatro horas en vino jerez.

Dr. C. M. Garza.—S. Pedro de las Colonias, Coahuila.

Ergotina de Bonjean gm. 2. 00

Extracto de comelina „ 2. 00

Para 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid.

México.

Goma gm. 15. 00

Agua hervida „ 1000. 00

Maceración.

Para tomar un pozuelo diario.

O bien.

Polvo de goma de Sonora gm. 4. 00

„ „ azúcar „ 4. 00

En 16 papeles.

Un papel tres veces al día.

Metritis.

Dr. A. Diaz.

San Antonio Tejas.

Aristol gm. 2. 00

Iodol „ 2. 00

Ácido fénico „ 2. 00

Uso indicado.

Para hacer aplicaciones internas con algodón hidrófilo después de haber limpiado perfectamente el conducto cervical.

Si hay alguna escoriación en el cuello se cubrirá con el polvo y un tapón de algodón. Pasadas seis horas de la curación se pondrán inyecciones vaginales de 500 gramos de agua caliente y una cucharadita de la siguiente fórmula:

Naftol (beta).....	gram. 6. 00
Alcohol á 90°.....	„ 120. 00

Cucharaditas para las inyecciones.

Si la enferma necesita tratamiento general, se le administrará emulsión de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos y con fierro.

El lactofosfato de cal obra muy bien en las personas debilitadas.

Metritis crónica.

Dr. M. Mucél.

México.

En la forma más común que aquí se observa, la consecutiva á partos mal cuidados, detención de la metamórfosis segresiva del útero ó congestiones repetidas del mismo, ha usado con buen éxito el tratamiento de Schreder, por medio de escarificaciones locales en el cuello del útero, siguiendo todos los detalles que él aconsejâ. En los intervalos, inyecciones de iodo iodurado bien caliente.

Metritis del cuello.

CON EXULCERACIÓN Ó CON ULCERACIÓN Y CUANDO
EL CUELLO ESTÁ FUNGOSO Y SANGRANTE.

Dr. D. Mejía.

México.

Además del tratamiento general emplea como tópico

Vaselina.	gram.	50. 00
Ácido bórico.	„	4. 00
Bicarbonato de sosa.	„	6. 00

Pomada.

Pulverícese perfectamente antes de mezclar la vaselina y se incorpora perfectamente de manera que frotando la pomada entre los dedos no se perciba grano.

Un tapón de algodón salicilado bien empapado de la pomada.—Cada tercer noche.

Dr. Emilio Polo.

Puebla.

METRITIS ULCEROSA.

Agua destilada.	gram.	5. 00
Clorhidrato de hidrastina.	„	0. 10

Inyecciones.

Una inyección hipodérmica cada tres días hasta que se modifique la ulceración y cedan las hemorragias

Tónicos y tópicos desinfectantes.

Metrorragia.

Dn. Francisco Alvarez

México.

En la sala ginecológica "González Echeverría" usa con el nombre de píldoras hemostáticas y en general con muy buen resultado la fórmula siguiente:

Sulfato de estriquina.	gram	0. 01
Hidrastina.	„	0. 04
Ergotina de Bonjean.	„	2. 00

Para 26 píldoras.

Una cada hora mientras haya hemorragia.

Dr. Ricardo Egea y Galindo	México.
Sulfato de fierro.....	gram. 20. 00
Id de cobre.....	„ 20. 00
Alumbre.....	„ 20. 00
Sulfato de zinc.....	„ 10. 00

En 10 papeles.

Un papel en un litro de agua caliente, lo más caliente que pueda tolerarla la enferma, para inyección vaginal. Teniendo cuidado de untar la vulva de vaselina para evitar que se produzcan quemaduras si el agua está muy caliente.

Dr Benjamín Rosano	Mineral del Monte.
Ergotina de Bonjean.....	gram. 2. 00
Extracto de cannabis indica.....	„ 0. 10

En 20 píldoras

Una píldora cada hora

Inyecciones vaginales de agua caliente.

Mordeduras de vívora.

Dr. J. M. Irys.	San Juan Bautista. E. de Tabasco
Vino blanco.....	gram. 60. 00
Polvo de hojas de cedrón.....	„ 1. 00
Amoniaco	de 12 á 20 gotas.

Para 2 tomas.

Una distante de la otra, dos horas.

Incisiones en el lugar de la mordedura y cubrirlas con defensivos de solución de fenól.

Dr. Federico Cota.	La Paz. Baja California.
Impedir, si la región lo permite, por la ligadura la	

absorción del veneno. En los primeros momentos hacer una aspiración con una ventosa ó la succión con los labios. Cauterizar con ácido fénico. En el lugar de la mordedura se aplicarán cataplasmas de una planta que se dá silvestre en la Baja California y que se conoce con el nombre de golondrina; y como tratamiento interno:

Cognac..... grm. 100. 00

Tintura dn guayaco..... „ 6. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Agua hervida..... grm. 150. 00

Planta fresca de la golondrina

de 10. 00 á..... „ 15. 00

En 2 tomas.

Como la ponzoña se elimina por los salivares y sudoríparas ha dado buen resultado la poción siguiente:

Agua..... grm 120. 00

Hojas de jaborandi..... „ 5. 00

Cocimiento

Una Toma.

Nefritis.

Dr. M. Mucél.

México.

POR PROPAGACIÓN DEL CATARRO VECICAL.

Cocimiento de cebada perla... grm. 900. 00

Benzoato de sosa..... „ 5. 00

Éter nítrico..... „ 2. 50

Jarabe de grosella..... „ 100. 00

Pozuelos.

Un pozuelo cada dos ó cada cuatro horas.

Dr. Juan N. Campos	Toluca.
Agua destilada.....	gram. 10. 00
Clorhidrato de pilocarpina... „	0, 05
<i>Gotas.</i>	

De 10 á 20 gotas tres veces al día.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.	Tehuacán.
NEFRITIS PASENQUIMATOSO.	
Bromuro de estroncis.....	gram. 4. 00
Agua destilada..... „	100. 00
Jarabe simple..... „	10. 00
<i>Cucharadas.</i>	

Una cucharada cada hora.

Neumonía fibrinosa.

Dr. R. Martínez Carriedo.	México.
---------------------------	---------

Tres indicaciones hay que llenar principalmente limitando el camino trazado por la naturaleza:

1.^a Favorecer hasta cierto punto la elevación de la temperatura. Se sabe que los microbios que producen generalmente la enfermedad, mueren á una temperatura de 40°. Esto se consigue con los excitantes de la nutrición, y tónicos generales.

2.^a Favorecer la eliminación del exudado; respetando la tos y favoreciéndola cuando no 'sea suficiente: fluidificar el exudado para ser fácilmente eliminado y

3.^a Ayudar la acción del corazón, pues si éste se cansa los enfermos mueren por un síncope. Para esto tenemos la digital, la cafeína, la esparteína y la estronfantina, medicamentos heróicos en sus resultados, lo mismo que las sales de quinina á pequeñas dosis.

Para llenar las indicaciones, pueden usarse las siguientes fórmulas:

Nº 1	Vino de uva de primera clase..	gram.	150.	00
	Sulfato de estriquina.....	„	0.	04
	Sulfato de esparteina.....	„	0.	10
	Jarabe simple.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Nº 2	Cocimiento de hojas de naranjo..	gram.	100	00
	Benzoato de sosa.....	„	4.	00
	Ioduro de potasio.....	„	2.	00
	Jarabe simple.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cucharada tres veces al día y tres veces en la noche, si el enfermo no duerme.

Por agua á pasto, cocimiento de violetas y pasas terciado con cognac.

Dr. F. Blazquez.	México.
Calomel.....	gram. 0. 20
Fosfuro de zinc y	
Sulfato de estriquina de c. c.....	„ 0. 01

Para 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Esta fórmula sirve también en todas las afecciones inflamatorias de las vias respiratorias.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.	Tehuacán.
NEUMONIA CATARRAL EN LOS NIÑOS.	
Acido benzoico sublimado.....	gram. 0. 60
Almiscle.....	„ 0. 10

Polvo de altea..... „ 1. 00

En 10 papeles.

Un papel cada tres horas.

Dr. E. Gutierrez

Guadalupe E. de Zacatecas.

Agua de azahar..... grm. 120. 00

Salicilato de sosa..... „ 6. 00

Tartrato do potasa y antimonio. „ 0. 30

Jarabe gomoso... „ 45. 00

Láudano de Sydenham..... „ *XV gotas.*

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Goma amoniaco..... grm. 3. 00

Kermes mineral..... „ 1. 00

Codeina..... „ 0. 10

Para 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Fenacetina..... grm. 2. 00

Cafeina..... „ 1. 00

Para 10 obleas Limousin.

Una oblea cada dos horas.

Infusión de corteza de quina... grm. 120. 00

Extracto blando de quina roja. „ 4. 00

Cognac..... „ 40. 00

Vino cordial del Código..... „ 80. 00

Digitalina amorfa de 0. 05 á.. „ 0. 08

Jarabe de grosella..... „ 45. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Vegigatorio de cantaridato do sosa; dieta láctea, tisanas emolientas.

Dr. F. Abrego

México

El primer día 3. 00 grm. de ipeca en tres tomas,

Una cada diez minutos.

Dos horas después empezará á tomar el enfermo cada dos horas las píldoras siguientes:

Hidrastina..... grm. 0. 30

Extracto tebaico..... „ 0. 05

Para 6 píldoras.

Desde luego aplicar un amplio vegigatorio volante sobre la pared costal del lado de la inflamación.

Bebida á pasto

Agua de grama..... grm. 500. 00

Clorato de potasa..... „ 6. 00

Bebida.

Régimen lácteo.

Durante el periodo de estado.

Infusión de café..... grm. 120. 00

Cognac..... „ 30. 00

Licor de Hoffman..... „ 4. 00

Jarabe de éter..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

En el periodo de eliminación se limita á sostener las fuerzas del enfermo, y si la expectoración es difícil, pequeñas cantidades de ioduro de potasio.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.

Vegigatorio amplio supurado y al interior, (según el caso.)

Vino de quina..... grm. 20. 00

Cognac..... „ 60. 00

Cucharadas.

En la neumonia de los viejos.

Jarabe de ipeca..... grm. 20. 00

Jarabe de tolú..... „ 30. 00

Extracto de orozuz..... „ 4. 00

Tintura de nuez vómica..... „ 2. 00

Extracto de opio..... „ 0. 10

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Antonio Carreón. Chalchicomula.

POCIÓN ALCOHÓLICA.

Infusión de canela..... grm. 120. 00

Cognac..... „ 30. 00

Jarabe de naranja..... „ 30. 00

Cucharadas.

Dr. D. Molinar Parral.

Calomel, vegigatorios y alcohólicos.

Dr. José B. López Campeche.

Kermes mineral..... grm. 2. 00

Extracto de digital..... „ 0. 10

Jabón medicinal c. b.

En 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Dr. Miguel Cordero. México.

Fosforo de zinc puro..... grm. 0.12

Polvo fino de azúcar..... „ 6.00

En 12 papeles.

Dos papeles diarios.

Dr. Francisco de P. Crespo. Huamantla.

En los individuos vigorosos, empezar por prescribir la poción contraestimulante de Laennec por cucharadas dos cada dos horas, y cuando la frecuencia y plenitud del pulso, así como la temperatura han bajado, se darán los siguientes pozuelos.

Infusión de hojas de coca..... grm. 500.00

Acetato de amoniaco..... „ 8.00

Cognac ó catalán..... „ 45.00

Jarabe de opio..... „ 30.00

„ simple..... „ 15.00

Pozuelos.

Un pozuelo cada dos horas.

En los viejos se alternarán estos pozuelos, con la poción de digital de Jacoud ó con otro quermetizada.

Dr. Reyes G. Flores. Guadalajara.

Veratrina..... grm. 0.01

Goma c. b.

En 4 píldoras.

Una píldora cada tres horas.

Su aplicación tiene por objeto bajar el pulso y la temperatura.

Dr. Manuel de Anaya. Guanajuato.

Cocimiento de hojas de digital.	gram.	120.	00
Jarabe tebaico.....	„	20.	00
Vino de Málaga.....	„	40.	00
Acetato de amoniaco.....	„	4.	00
Ergotina.....	„	2.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. José M^a Bandera. México.

Cuando usa la poción de Todol, la modifica de la manera siguiente:

Mezcal de 80. 00 á.....	gram.	100.	00
Agua.....	„	120.	00
Jarabe simple.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Lázaro Ortega. México.

EN INDIVIDUOS ROBUSTOS.

Agua destilada.....	gram.	120.	00
Tártaro emético.....	„	0.	05
Jarabe de goma.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Ricardo Egea y Galindo México.

En los casos muy graves, cuando toda medicación fracasa y que la enfermedad avanza, se han tenido brillantes éxitos con la fórmula siguiente:

Hojas de digital.....	gram.	0, 50
Infúndase en agua.....	„	100. 00
Extracto de orozúz.....	„	4. 00
Acetato de plomo cristalizado..	„	0. 30
Jarabe de tolú.....	„	30. 00
Láudano Sydenham.....		20 gotas.

Cucharadas grandes.

Una cucharada cada hora, y aumentar diariamente 0. 10 de acetato de plomo hasta llegar á dar 0. 50 ó 0. 60 en el día. Empleando para sostener las fuerzas, inyecciones hipodérmicas de estriknina ó de cafeina.

Contra todo lo conocido *jamás* el acetato de plomo produce síntomas de intoxicación ni estreñimiento, por el contrario se produce diarrea; el pulso se hace duro y lleno, hay sudores *muy abundantes* y el enfermo acusa un apetito exagerado.

Dr. Ciro M. Santelices.

Querétaro.

Galomel.....	gram.	0. 30
Kermes.....	„	0. 30
Polvos de digital.....	„	0. 30

En 12 cápsulas

Una cápsula cada dos horas.

NEUMONÍA EN LOS ALCOHÓLICOS.

Infusión de polígala.....	gram.	120. 00
Carbonato de amoniaco.....	„	2. 00
Cognac.....	„	40. 00
Kermes.....	„	0. 30
Jarabe de estriknina.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Antonio Matienzo. Tampico E. de Tamaulipas.

SIN COMPLICACIÓN.

Dieta y leche.—Caldo si el enfermo es débil.—Limónada vinosa como bebida.

Si el dolor es muy intenso, un centígramo de morfina en inyección subcutánea, y dos ventosas escarificadas, si el enfermo es robusto.

Durante los tres ó cuatro primeros días.

Clorhidrato de amoniaco.....	gram.	1. 00
Jarabe de goma.....	,,	15. 00
„ „ diacodión.....	,,	10. 00
Infusión de polígala.....	,,	95. 00

Cucharadas.

Para consumir la dosis en veinticuatro horas.

Desde el cuarto día si hay indicios de una resolución lenta emplea la digital, siguiendo la práctica de Picot.

Agua hirviendo.....	gram.	120. 00
Polvo de hojas de digital.....	,,	0. 60
Hágase infusión durante media hora, fíltrese y agrégese Jarabe de azahar.....	,,	15. 00

Cucharadas.

Para consumir en veinticuatro horas.

Repítase la fórmula al día siguiente.

Desde el sexto día si la crisis no se presenta y si el pulso es irregular.

Cafeina.....	gram.	1. 50
Benzoato de sosa.....	,,	1. 50

Para 12 píldoras.

Consumirlas en el día. Al mismo tiempo cuatro mi-

lígramos de extricnina en el día, en gránulos y en inyecciones hipodérmicas.

Cognac en té.

El vegigatorio solamente del quinto al sexto día tiene efectos favorables.

Dr. R. López.

México.

PRIMER PERIODO.

Infusión de hojas de digital 1	
para 150.....	gram. 150. 00
Acetato de amoniaco.....	„ 10. 00
Alcohol.....	„ 40. 00
Jarabe de ipecacuana.....	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Vicente Sierra.

Apam, E. de Hidalgo.

El primer día de la enfermedad.

Agua hirviendo :..... gram. 150. 00

Una dosis de javorandi del Dr. Coutinho. (1)

Hágase infusión, endulcése y tómese en una sola vez.

El segundo y tercer día:

Infusión de flor de tilia.....	gram. 120. 00
Tártaro emético.....	„ 0. 15
Agua de laurel cerezo.....	„ 0. 60
Jarabe de diacodión.....	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

(1) La dosis que recomienda el , Coutinho, es de 5. 00 por 150.00 de agua hirviendo.

Los días siguientes infusión pectoral de liquen ó polígala y una que otra vez que el dolor moleste mucho al enfermo, un vegigatorio.

Dr. F. D. Maldonado. Aguascalientes.

En el primer periodo en individuos no debilitados.

Calomel..... grm. 2. 00

Azúcar..... „ 3. 00

Para 2 papeles.

Se dará el segundo papel á las tres horas despues del primero, si éste no produce efecto purgante.

Alimentación sin sal.

Dr. J. López Tello. Amecameca E. de México.

Calomel..... grm. 0. 15

Extracto de opio..... „ 0. 05

Polvo de azúcar..... „ 3. 00

Para 15 papeles.

Un papel cada hora, hasta tocar la encía. Vegigatorio en el lugar enfermo. Plan, tónico.

Dr. J. M. Arroyo. Irapuato E. de Guanajuato.

Infusión de hojas de naranjo... grm 120. 00

Alcoholado de raiz de acónito.. „ 2. 00

Jarabe de digital é

Id. „ codeina de c. c.... „ 15. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Dr. Antonio J. Carbajal. México.

En el periodo asfíxico ha obtenido buen resultado con la siguiente:

Infusión de café torreficado grm. 500. 00
 Valerianato de amoniaco „ 4. 00

Lavativas.

Una lavativa de medio pozuelo cada dos ó tres horas, ayudado de pequeñas dosis de café con coñac. Si el caso no es muy apremiante se reduce á gramos 2. 00, la cantidad de valerianato de amoniaco para evitar su efecto exitante sobre los intestinos.

Neuralgia.

Dr. Lorenzo Cantú. C. Porfirio Diaz E. de Coahuila.

NEURALGÍA CONGESTIVA.

Antipirina grm. 0. 60
 Cocaina „ 0. 03

En 3 papeles

Un papel cada hora.

Dr. Guillermo R. Servin. Triunfo. Baja California.

Alcoholado de menta grm. 20. 00
 Exalgina „ 2. 00
 Bromhidrato de cafeina „ 0. 10
 Alcoholado de anís „ 20. 00
 Clorhidrato de cocaina „ 0. 10
 Alcohol c. b.

Gotas.

Diez gotas en una cucharada de agua cada media hora, hasta seis veces.

Dr. Benjamín Rosano. Mineral del Monte.

Butilcloral grm. 1. 00

En 10 píldoras.

Una píldora cada hora.

Otra.

Antipirina.....	gram.	2. 00
Butilcloral.....	„	1. 00

Para 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Dr. *Ciro M. Santelices.* Querétaro.

Pomada de belladona.....	gram.	30. 00
Alcanfor.....	„	4. 00
Veratrina.....	„	0. 10
Cianuro de potasio.....	„	2. 00
Cloroformo.....	„	6. 00

Pomada.

Dos veces al día.

Dr. *Alberto B. Orduña,* Tehuacán.

Bromhidrato de quinina.....	gram.	0. 50
Masa de Meglin.....	„	0. 50

En 10 píldoras.

Una píldora cada hora, por dos ó tres días.

Dr. *Jesús H. Treviño,* Monterrey.

Cafeina.....	gram.	0. 50
Extracto acuoso de cólchico.....	„	0. 05
Narceina.....	„	0. 25
Alcanfor.....	„	0. 25

En 10 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. *Miguel Cordero.* México.

Extracto de beleño.....	gram.	0. 15
-------------------------	-------	-------

Id. de belladona	„	0. 15
Clorhidrato de morfina	„	0. 05

En 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Otra.

Valerianato de quinina	gram.	1. 00
Id. de zinc	„	1. 00
Extracto de belladona	0.	0. 10

Para 10 píldoras.

Cuatro píldoras repartidas en el día.

Aceite esencial de menta	gram,	0. 50
Agua alcoholizada c. b. para disolverla.		

Inyecciones hipodérmicas.

De uno á cinco miligramos locodolenti bastan para quitar el dolor cuando la neuralgía es periférica.

Dr. Jesús B. López. Campeche.

Sal de Pellétier	gram.	1. 20
Extracto de estramonio	„	0. 15

En 12 píldoras.

Una píldora cada hora.

Otra.

Sal de Pellétier	gram.	1. 20
Extracto de opio	„	0. 10

En 12 píldoras

Una píldora cada dos horas.

Aceite de olivo	gram.	250. 00
Esencia de trementina	„	90. 00
Láudano Sydenham	„	30. 00
Alcanfor	„	60. 00

Friega.

Dr. Alberto Aizpuru. México.

Amoniaco líquido á 25°	gram. 15. 00
Cloroformo	„ 10. 00
Tintura de opio	„ 5. 00
Alcohol á 90°	„ 75. 00

Uso externo.

Empátese un pedazo de franela en este líquido y aplíquese sobre el lugar doloroso y cúbrase con gutapercha laminada.

Dr. Fernández Ortega Tacubaya D. F.

Contra las neuralgías congestivas de cualquier origen, da un magnífico resultado, la tintura al quinto de Baptisia tintórea á la dosis de diez gotas tres veces al día, en el adulto.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe. E. de Zacatecas.

Agua destilada de azahar	gram. 80. 00
Bromuro de potasio	„ 4. 00
Cianuro de potasio	„ 0. 05
Jarabe simple	„ 20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta la sedación.

Otra.

Agua destilada	gram. 1. 00
Acido ósmico de 0. 005 á	„ 0. 01

Inyección.

Para una jeringa.

Al exterior:

Aceite alcanforado	gram. 20. 00
Lanolina	„ 20. 00

Mentol.....	„	5. 00
Cloroformo.....	„	4. 00
Tintura de castor.....	„	25. 00
Id. „ nuez vómica.....	„	8. 00
Éter acético.....	„	15. 00

Friega.

Dr. Guillermo Senisson.		México.
Sal de Pellétier.....	gram.	1. 00
Salipirina.....	„	2. 00
Aconitina.....	„	0. 03

Para 12 píldoras.

Una píldora cada tres ó cuatro horas, según la intensidad del dolor.

Dr. J. Villagrán.		México.
Valerianato de quinina.....	gram.	1. 00
Aconitina cristalizada.....	„	0. 01
Extracto de belladona.....	„	0. 40

Para 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas hasta calmar el dolor, retrazando su administración si hubiere mejoría.

Otra.

PRÉVIO TRATAMIENTO INTERIOR.

Bálsamo de opodeldoc.....	gram.	40. 00
Láudano de Rousseáu.....	„	4. 00
Cloroformo.....	„	4. 00

Friega.

Píldoras antineurálgicas de Moussette, dos ó tres en el día.

Dr J. López Tello, Amecameca. E. de México.

Antipirina..... grm. 2. 00

En 8 papeles.

Un papel cada hora.

Agua de laurel cerezo..... grm. 10. 00

Clorhidrato de morfina..... „ 0. 10

Sulfato de atropina..... „ 0. 01

Inyecciones.

Una inyección subcutánea de diez gotas y repetir-
las una hora después si es necesario. No pasar de es-
ta cantidad.

Dr. J. M. Arroyo, Irapuato E. de Guanajuato.

Extracto de beleño y extracto

tebaico de c. c..... grm. 0. 05

Valerianato de quinina..... „ 0. 25

Óxido de zinc..... „ 0. 30

Polvo de almizcle..... „ 0, 05

Para 10 píldoras.

Una píldora cada hora.

Alcohol..... }
Éter sulfúrico... } de c. c..... grm. 15. 00
Cloroformo..... }

Cianuro de potasio..... „ 0. 20

Uso externo.

Úsese en fomentos, en los lugares dolorosos.

Dr. J. M. Irys. San Juan Bautista E. de Tabasco.

Masa de Meglin..... grm. 1. 50

Bromhidrato de quinina.... „ 1. 50

Para 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. G. J. Chávez. Tasco.

Extracto de beleño..... grm. 0. 15

Valerianato de zinc..... „ 0. 60

Para 12 píldoras.

Una cada dos horas hasta calmar el dolor.

Dr. P. Gama. México.

Aceite morfinado..... grm. 30. 00

Jabón alcanforado..... „ 15. 00

Tintura de acónito..... „ 10. 00

Id. de opio..... „ 15. 00

Esencia de menta..... „ 10. 00

Cloroformo..... „ 10. 00

Friega.

Al lugar del dolor.

Dr. A. Higareda Huejotzingo E. de Puebla

Usa el bromuro de potasio á alta dosis asociado a almizcle.

Muchas veces ha visto ceder las neuralgías; sobre todo de los nervios raquidianos, con la friega siguiente:

Bálsamo tranquilo..... grm. 20. 00

Tintura de valeriana..... „ 20. 00

Éter acético... .. „ 20. 00

Alcanfor..... „ 4. 00

Extracto de estramonio..... „ 4. 00

Friega.

Se aplica en frio y si media hora después no se cal-

ma el dolor, se aplica caliente; es raro tener que usarla una tercera vez.

Dr. Salvador F. Alcalá Tecolotlán.

Extracto de opio	gram.	0. 10
„ „ belladona	„	0. 05
„ „ acónito	„	0. 05

Para 6 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. M. Villaseñor. Pénjamo. E. de Guanajuato.

NEURALGÍA INTERCOSTAL.

Pomada alcanforada	gram.	30. 00
Extracto de acónito	„	0. 10
Tintura de opio	„	5. 00

Pomada.

Para aplicarla frecuentemente.

Dr. J. López Tello. Amecameca E. de México.

NEURALGÍA INTERCOSTAL.

Bromhidrato de quinina y Anti- pirina de c. c.	gram.	2. 00
---	-------	-------

Para 4 cápsulas.

Una cápsula cada veinticuatro horas.

Dr. Alberto Aizpuru, México.

NEURALGIA POR CARIE DENTARIA.

Creosotina iodada	gram.	2. 00
Ácido fénico medicinal	„	2. 00
Clorhidrato de cocaina	„	0, 20

Uso indicado.

Para empapar pequeños algodones é introducirlos en la picadura, cubriéndolos con cera ó chicle.

Dr. C. M. Garza.—S. Pedro de las Colonias. E. de Coahuila.

NEURALGÍA DENTARIA.

Cloroformo.....	gram.	6. 00
Ácido fénico.....	„	2. 00
Esencia de menta é		
Id. „ clavo de c. c.....	„	II gotas.

Uso indicado.

Limpiar la picadura de la muela y poner un algodón empapado en el líquido, y si es posible una gota.

Dr. Joaquín L. Vallejo. México.

Idrato de cloral y		
Alcanfor de c. c.....	gram.	5. 00
Clorhidrato de cocaina.....	„	0. 05

Uso indicado.

Un algodón empapado en el líquido, é introducido en la carie dentaria hace desaparecer el dolor muy rápidamente.

Dr. Gonzalo Farías San Luis Potosí.

Alcohol.....	gram.	30. 00
Polvo de raiz de pelitre....	„	60. 00

Hágase macerar por 4 ó 6 días fíltrese y añádase:

Cloroformo.....	„	30. 00
-----------------	---	--------

Uso externo.

Para tocar el diente ó muela careado con un algodón mojado en el líquido.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.
 Polvo de simaba cedrón. gm. 30. 00
 Alcohol c. b. para hacer una pasta que se aplica-
 rá en la picadura.

—

Neuralgia facial y hemicránea.

Dr. A. Martínez. México.
 Bromuro de alcanfor gm. 0. 30
 Valerianato de zinc „ 0. 60
 Extracto de belladona „ 0. 10
 Sulfato de morfina „ 0. 05

Para 12 píldoras.

Una píldora cada tres horas hasta quitar el dolor.

Tintura de belladona y
 Éter acético de c. c. gm. 30. 00
 Cloroformo „ 15. 00
 Acetato de morfina „ 0. 10

Friega.

Para ponerla en las partes dolorosas.

— —

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.
 Bromhidrato de quinina gm. 1. 00
 Aconitina de Duquesnel „ 0. 0005

Para 10 píldoras.

Una píldora cada hora. Debe continuarse su uso
 por ocho días.

O bien
 Bromhidrato de quinina gm. 0. 25
 Cafeína „ 0. 15

Para 5 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. Francisco de P. Crespo. Huamantla.

Valerianato de zinc grm. 0. 60

Extracto de beleño „ 0. 30

Id. de ópio „ 0. 15

Para 12 píldoras.

Tres píldoras en el día.

Glicerina grm. 15. 00

Cloroformo „ 15. 00

Friega.

Al lugar del dolor.

NEURALGIAS DEL TRIGÉMINO.

Dr. Guillermo Parra. Tacubaya D. F.

Usa con buen resultado la fórmula siguiente:

Valerianato de quinina grm. 2. 00

Masa de meglín „ 1. 00

Picrato de amoniaco „ 0. 05

Para 12 píldoras.

Tomar tres píldoras repartidas en el día. (dosis para adulto.)

Dr. F. Fernández. Medellín E. de Veracruz.

Extracto de ópio grm. 0. 05

Id. „ estramonio „ 0. 10

Id. „ valeriana „ 0. 30

En 10 píldoras

Una píldora cada media hora.

Dr. M. Mucél. México.

NO SINTOMÁTICAS DE UN ESTADO GENERAL.

Croton-cloral grm. 1. 00

Clorhidrato de morfina „ 0. 03

Para 12 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. A. J. Carbajal. México.

Valerianato de quinina	gram.	0. 60
Id. „ zinc	„	0. 40
Extracto de beleño	„	0. 20
Acetato de morfina	„	0. 05

Para 12 píldoras.

Una píldora cada dos ó tres horas, hasta quitar el dolor; continuar una en la mañana y otra en la tarde, por cuatro ó cinco días.

Sulfato de cobre	gram.	0, 20
Subnitrato de bismuto	„	1. 00

Para 10 píldoras.

Una píldora cada cuatro horas [tres ó cuatro en el día] según la tolerancia gástrica.

Ha usado el Dr. Carbajal con buen éxito el tratamiento local siguiente: Aplicar un vegigatorio amoniacal en el lugar del dolor por medio de un dedal en cuyo fondo se pone una bolita de algodón, encima otra impregnada con amoniaco concentrado; bastan cinco minutos para obtener su efecto. Se frota la epidermis con un lienzo suave para desprenderlo y se ponen. 0. 005 ú 0. 008 miligramos de clorhidrato de morfina. Al otro día se repite igual operación; al tercero es inútil porque está muy seca la superficie. Pero basta con lo anterior en muchos casos.

Dr. M. Mucél. México.

NEURALGÍA INTERCOSTAL.

Los casos más rebeldes los ha visto dominarse con aplicación de sanguijuelas en el principal punto doloroso.

Dr. A. Matienzo

Tampico.

ESPECIALMENTE DE ORIGEN PALÚDICO.

Bromhidrato de quinina.....	gram.	1. 00
Clorhidrato de morfina.....	„	0. 05
Extracto de belladona.....	„	0. 05

Para 10 píldoras.

Una píldora cada hora ó cada dos horas.

Dr. David Peña.

Monterrey.

Antipirina de Knor.....	gram.	3. 00
Bromuro de sodio.....	„	5. 00
Agua destilada de laurel cerezo.	„	15. 00
Hidrolado de azahar.....	„	110. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. J. Páramo Rangél.

México.

Anticamnia.....	gram.	1. 00
-----------------	-------	-------

En 3 papeles.

Un papel diario.

Dr. Emilio Polo.

Puebla.

Tintura de spigelia.....	6 gotas.
Id. de aconitina.....	6 gotas.
Agua.....	gram. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra.

Tintura de gelcemiun.. 10 gotas.

Solución oficial de trinitrina al centésimo 8 gotas.

Agua grm. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Juan C. Villaseñor.

Morelia.

Sal de Knor grm. 2. 00

Bromuro de sodio „ 4. 00

Agua de Sedlz „ 125. 00

Elixir de Garuz „ 8. 00

Jarabe simple „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra.

Cafeina grm. 1. 30

Benzoato de sosa „ 1. 30

En 15 píldoras.

Una píldora cada dos ó tres horas.

Dr. Lázaro Ortega.

México.

Masa oficial de Meglin grm. 0. 50

Aconitina „ 0. 002

Clorhidrato de morfina „ 0. 02

En 10 píldoras.

Dos ó tres píldoras en el día.

NEURALGIAS DEL TRIGEMINO.

Dr. Federico Cota.

La Paz Baja California.

Aplica la electricidad haciendo pasar la corriente por la mano del operador y empleando á la vez la malaxación siguiendo el trayecto de las ramificaciones nerviosas.

Bromhidrato de quinina.....	gram.	1. 00
Clorhidrato de morfina.....	„	0. 05
Extracto de belladona.....	„	0. 10

En 10 píldoras.

Se distribuyen según el caso.

Agua destilada.....	gram.	1. 00
Analgesina.....	„	0. 50
Clorhidrato de morfina.....	„	0. 01

Una inyección hipodérmica.

NEURALGIA ESPECIALMENTE EN LA CIÁTICA.

Dr. F. Blazquez. México.

Trementina á alta dosis en los intervalos de los accesos. Doce perlas diarias repartidas en las principales comidas.

Dr. J. López Tello. Amecameca E. de México.

Aconitina criztalizada..... gram. 0. 002

Para 8 píldoras.

Dos ó tres píldoras en las veinticuatro horas.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

Valerianato de amoniaco.....	gram.	0. 60
Aconitina.....	„	0. 003
Extracto de belladona.....	„	0. 30
Valerianato de quinina.....	„	0. 60

En 6 píldoras.

De tres á seis píldoras en el día.

Vegigatorios en el tayecto del nervio, curadas con pomada de morfina.

Dr. D. Molinar. Parral.
 Salicilato de quinina..... grm. 2. 00
En 20 cápsulas.

Dos cápsulas tres veces al día.

Dr. M. Medal. Tacámbaro. E. de Michoacán.
 Tintura de iodo..... }
 " " cantáridas.. } de cc. grm. 10. 00
 Bálsamo anodino..... }
 Esencia de trementina.. }
 Morfina ó atropina..... „ 0. 05
Friega.

Para aplicarla sobre los puntos dolorosos cubriéndolos con algodón.

Neurastenia.

Dr. Federico Cota. La Paz, Baja California.
 En la neurastenia y debilidad genésica además de la hidroterapia y la electricidad.

Sulfato de estriknina..... grm. 0. 01
 Fosfuro de zinc..... „ 0. 01
 Tintura de jengibre..... 30 gotas.
 Extracto de genciana..... „ 1. 00

Para 30 píldoras.

Comenzar por una píldora diaria.

Oclusión intestinal.

Dr. Ricardo Egea y Galindo México.
 •Dar cada hora un centígramo de calomel y uno de belladona hasta producir los síntomas de la salutación de la belladona.

Una vejiga con hielo constantemente en el vientre.

Una pequeña taza de café bien concentrada cada tres horas.

Lavativas de solución de jabón.

Dieta absoluta.

Tan luego como venga escremento en pequeña cantidad con el uso de los lavatorios, administrar la fórmula siguiente:

Aceite de ricino.....	gram.	40.	00
Cognac supremo.....	„	10.	00
Glicerina.....	„	10.	00
Calomel.....	„	0.	30
Jarabe de limón.....	„	15.	00

Purgante.

Dr. Antonio Gómez Lamadrid.

México.

Obstrucción por invaginación.

Agua de azahar.....	gram.	120.	00
Valerianato de amoniaco.....	„	0.	60
Extracto de belladona.....	„	0.	05
Jarabe de éter.....	„	32.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora.

Dr. Leonardo Gómez V. Tenango E. de México,

Provenida por endurecimiento de las materias fecales, por cordones ó filamentos pseudomembranosos, por vólvulo ó por imbaginación.

(1) Raíz de pipiztráhuac de 4 á 8 y

(1) El pipiztráhuac (*Frixitis furticosa* compuestas) se da en el estado silvestre en el cerro de Tenango. El Dr. Gómez es el primero que le ha empleado en medicina con brillantes resultados.

El Sr. Profesor de Farmacia Don Severiano Perez extrajo de esta planta un ácido, el ácido pipitzahoicum, purgante activo á la dosis de 20 á 30 gramos.

hasta.....	gram. 16. 00
Agua hirviendo.....	„ 250. 00

Hágase infusión.

Lavativa.

Repítase la fórmula cuantas veces sea necesario.

Está contra indicada en los casos de peritonitis, hernia y parálisis intestinal de origen central.

Dr. M. Villaseñor. Pénjamo E. de Guanajuato.

Al interior 250. 00 grm. de aceite de olivo y otra cantidad igual en lavativas con sonda para ponerla lo más alta posible. Inmediatamente después se pone al enfermo en un baño de agua caliente, lo más que el enfermo lo pueda soportar, por espacio de quince á veinte minutos.

Para calmar los vómitos, dolor, etc. se usará de los medios aconsejados comunmente, usando de preferencia la aconitina, la hiosciamina y la codeina, ya sea al interior ó al exterior; excluyendo el opio y las sales de morfina.

Oftalmia.

Dr. P. Gama. México.

Agua de laurel cerezo.....	gram. 5. 00
Bórax y clorato de potasa de cc. „	0 50
Agua de rosas.....	„ 150. 00

Lavatorio.

Para usarlo tibio cada dos horas.

Purgante de aceite; evitar la luz y dieta moderada.

Dr. L. Castro.

México.

OFTALMÍA BLENORRÁGICA Ó LEUCORREICA.

Agua destilada.....	gram	30. 00
Nitrato de plata.....	„	0. 30

Gotas para los ojos.

De tres á cuatro gotas en los ojos enfermos previo lavado con solución bórica al 2 por ciento y anestesia por la cocaina para evitar el dolor.

OFTALMÍA PURULENTA.

Dr. Manuel Carmona y Valle.

México.

Despues que han pasado los 12 ó 14 días sin accidente por parte de la córnea ó cuando éstas han venido á pesar del tratamiento clásico y sigue un abundante escurrimiento pusulento.

Agua esterilizada.....	gram.	500. 00
Ácido bórico.....	„	2. 00

Lavatorio.

Labatorio intrapalpebral hecho con jeringa y cada dos horas cuando menos.

Agua destilada....	gram.	30. 00
Tanino c. b. hasta la saturación		

Gotas para los ojos.

Dos ó tres gotas en cada ojo despues de cada lavatorio,

OFTALMÍA PURULENTA.

Dr. E. Gutierrez

Guadalupe E. de Zacatecas.

Cocimiento de semillas de lino.	gram.	250. 00
Agua destilada de laurel cerezo	„	10. 00
Salol.....	„	5. 00

Lavatorio.

Agu de rosas.....	gram.	15. 00
Nitrato de plata cristalizado....	„	0. 15
Clorhidrato de cocaina.....	„	0. 10

Colirio.

Dos gotas tres veces al día.

Dr. Agustín Chacón. México.

Agua destilada.....	gram.	10. 00
Nitrato de plata de 0. 10 á.....	„	0. 20

Toques.

Lavar primero el ojo con el lavatorio de ácido bórico, voltear los párpados y tocar la conjuntiva por medio de un pincel. En seguida se neutraliza el exceso de nitrato de plata con el colirio de cloruro de sodio.

Agua destilada.....	gram.	10. 00
Cloruro de sodio.....	„	1. 00

Colirio.

Para neutralizar el exceso de nitrato de plata del anterior.

Opacidades de la córnea.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe E. de Zacatecas.

Calomel al vapor.....	gram.	15. 00
Azúcar finamente pulverizada..	„	15. 00
Sulfato de zinc.....	„	0. 15

Insuflaciones.

Para poner pequeñas insuflaciones:

Orquitis.

Dr. Eduardo Lamicq. México.

ORQUITIS SBLÉNORRÁGICA.

Además del tratamiento local clásico

Agua.....	gram.	120.	00
Extracto fluido de pulsatila		5	gotas
Jarabe simple.....	„	30.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. A. Diaz.

San Antonio Tejas.

ORQUITIS BLENORRÁGICA.

Nitrato de plata.....	gram.	4	00
Éter nítrico alcoholizado.....	„	30.	00

Uso externo.

Para aplicar con un pincel sobre el escróton del testículo enfermo. Cuando se ha secado la solución, se cubre de algodón hidrófilo y se pondrá el suspensorio.

En las personas delicadas debe usarse antes una solución de nitrato de cocaina para evitar el dolor.

Si 24 horas después la enfermedad no ha cedido, se hará una nueva curación.

Después que ha caído la piel:

Acetato de plomo líquido.....	gram.	30.	00
Láudano Sydenham.....	„	30.	00
Agua destilada.....	„	440.	00

Fomentos.

Estos fomentos se aplicarán con algodón hidrófilo, cuidando de no dejarlos secar.

Dr. Emilio Polo.

Puebla.

Tintura de gelcemiun.....	10	gotas
Id. de acónito.....	10	gotas

Id. de amamelis..... grm. 1. 00
 Agua..... „ 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora,

Otra.

Tintura de pulsatila..... 6 gotas.

Id. de anémona praten.... 6 gotas.

Agua..... grm. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otitis externa.

Dr. C. M. Garza.—S. Pedro de las Colonias, Coahuila.

OTITIS ULCEROSA.

Agua de alquitrán..... grm. 500. 00

Lavatorios.

Después insuflar polvos finos de ácido bórico.

Curación tres veces al día.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Agua..... grm. 200. 00

Sulfato de alumina..... „ 12. 00

Lavatorio.

Dr E. Gutiérrez. Guadalupe E. de Zacatcas.

Cocimiento de hojas de nogal. . grm. 250. 00

Ácido bórico..... „ 5. 00

Creolina..... „ 2. 50

Inyecciones.

Para poner inyecciones en la oreja.

Dr. Manuel Uribe

México.

FN LOS ESCROFULOSOS.

Agua destilada.....	gram.	10. 00
Ácido láctico.....	,,	1. 00

Gotas para los oídos.

Dos gotas por la mañana y dos por la tarde, previo lavado anticéptico.

Oxiuros.

Dr. Pablo Amoris.

Tabasco.

Con un tubo de goma de Foucher de los que se usan para el lavado del estómago, se introducen cuatro ó cinco centígramos por el ano del enfermito que debe estar acostado, y por el embudo se hace entrar la mayor cantidad posible de agua tibia, hasta que el enfermo sienta dolores y gran necesidad de evacuar. Como el recto y una parte del intestino grueso han sido distendidos de una manera exajerada; al venir la contracción muscular del intestino se hace de una manera violenta la expulsión del agua y con ella de una gran cantidad de oxiuros. A continuación se pone una lavativa con dos ó tres cucharadas de aceite de hígado de bacalao y por la noche un supositorio con dos y medio ó cinco centígramos de unguento doble.

El lavado intestinal así como los otros medios pueden repetirse diariamente hasta que no existan ya pavantos en el intestino. El resultado con este tratamiento ha sido siempre muy satisfactorio.

Dr. Carlos Amezcua,

Tehuacán.

EN NIÑOS DE 1 A 7 AÑOS.

Calomel.....	gram.	0. 15
Santonina.....	,,	1. 00
Azúcar.....	,,	4. 00

En 10 papeles.

Un papel al levantarse y otro al acostarse.

Para mayores de 20 años, un papel más en la tarde

Ozena.

Dr. Guillermo Parra,

Tacubaya D. F.

Losiodol sódico en insuflaciones en la nariz y ioduro de fierro al interior.

Dr. Santos Medina,

Juchipila E. de Jalisco.

Agua destilada.....	gram.	10. 00
Ioduro de potasio.....	,,	2. 00
Glicerina redestilada.....	,,	20. 00
Ácido fénico.....	,,	VI gotas.
Tintura de iodo.....	,,	V gotas.

Gotas para uso externo.

Aplíquese de tres á cinco gotas en cada fosa nasal, dos veces al día.

Dr. P. Gama

México.

Esperma de ballena.....	gram.	1. 00
Manteca de cacao.....	,,	4. 00
Óxido rojo y calomel de c. c.....	,,	1. 50
Aceite de cade verdadero.....	,,	0. 50

Pomada..

Esta pomada se hará en forma de barrâ y se forra de estaño.

Antes de usar esta pomada, se lavarán las fosas nasales con solución de permanganato de potasa al 1 por ,000.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Alcohol.....	gram.	100. 00
Ácido fénico.....	,,	5. 00
Naftol [beta].....	,,	5. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita en 500 gramos de agua para gerin-gatorios en las fosas nazales. Subiendo ó bajando la concentración del lavatorio según la tolerancia del enfermo.

Ácido bórico.....	gram.	3. 00
Polvo de café tostado.....	,,	3. 00
Cubeba.....	,,	3. 00
Alcanfor.....	,,	8. 00

Rapé.

Dr. Miguel Cordero. México.

Bisulfato de quinina.....	gram.	1. 00
Salisina.....	,,	1. 00

En 3 Cápsulas.

Una cápsula cada 24 horas después del acceso.

En los niños la mitad de la dosis, aplicada en lava-tiva, en medio pozuelo de agua que debe contenerse.

Dr. Alfredo Higareda. Huejotzingo Puebla.

Ha visto que en Huatusco y pueblos comarcanos, los habitantes se curan las intermitentes con una plan-ta llamada *Tlancuaya* y ha visto enfermos que habían

sido tratados por las sales de quinina y las arsenicales sin obtener resultados y que se han curado usando esta planta tomada en infusión ó cocimiento.

Dr. Luis L. Cordero. San Luis Potosí.

Infusión de té verde..... grm. 125. 00

Elixer de picosa..... „ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Tintura de quina..... grm. 30. 00

Vinagre aromático..... „ 30. 00

Lociones frescas después del sudor.

Dr. Reyes G. Flores. Guadalajara.

Bromhidrato de quinina..... grm. 0. 20

Ácido tártrico..... „ 0. 10

Agua destilada..... „ 0. 20

Disuélvase al calor. Inyección que se conserva inalterable.

Desinféctese la jeringa en solución de ácido bórico al 4 por ciento,

Una ó dos inyecciones diarias bastan para curar las intermitentes ordinarias.

En las formas perniciosas habrá que subir la dosis.

Dr. Cárlos Amezcua. Tehuacán.

En la forma intermitente durante el acceso y cuando la temperatura sube á 40° 40°5 y 41°

Agua simple..... grm. 600. 00

Bicarbonato de sosa..... „ 45. 00

Acido cítrico.....	„	30. 00
Jarabe de grosella c. b.		

Pozuelos.

Un pozuelo cada media hora.

Agua de colonia.....	gram.	60. 00
Alcohol alcanforado.....	„	60. 00
Tintura de mostaza.....	„	60. 00

Friega.

Friega en todo el cuerpo cada dos horas humedeciendo abundantemente todo el cuerpo con excepción de los órganos genitales y cubriendo al enfermo con cobertores de lana para provocar una sudación abundante que hace bajar la temperatura á 37°5 ó 37°

Dr. José Terrés.

México.

En las calenturas palustres, usa siempre el clorhidrato de quinina, en dosis de un gramo diario para los adultos dividido en dos cápsulas. Tomar una cápsula en la mañana y otra en la tarde, cualquiera que sea la hora del acceso.

Rara vez doy grm. 1. 50 en tres cápsulas.

En las fiebres continuas palustres (tifo, malaria de algunos autores) doy cada dos horas ó cada una, según el caso, una cápsula que contiene grm. 0. 25 de antipirina y grm. 0. 25 de clorhidrato de quinina.

Dr. Antonio Butrón.

Acapulco

En la combalecencia del paludismo.

Vino de genciana.....	gram.	150. 00
Extracto fluido de eucaliptus..	„	10. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada tres horas.

Extracto de genciana.....	gram.	1. 00
„ „ nuez vómica.....	„	0. 10

En 10 píldoras.

Dos píldoras antes de la comida y dos antes de la cena.

Dr. José Luna.

Autlán.

FORMA TERCIANO Y CUARTANO.

Sulfato de magnesia.....	gram.	40. 00
Ácido tártrico.....	„	0. 50
Sulfato de quinina.....	„	1. 00
Agua.....	„	350. 00
Jarabe de melizo.....	„	30. 00

100 gramos en ayunas.

Tintura de iodo.....	gram.	10. 00
Ioduro de potasio.....	„	0. 30
Agua.....	„	100. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita tres veces al día en cocimiento de corteza de naranja.

PARA LA HIPERtermIA.

Dr. Antonio Butrón.

Acapulco.

Antipirina.....	gram.	2. 00
Sulfato de quinina de Pelletier...	„	1. 20

En la forma eclámtica por hipertermia.

Jarabe de cloral de Follet.....	gram.	60. 00
Bromuro de potasio.....	„	6. 00
Agua destilada.....	„	6. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora en los adultos, cucharadita en los niños.

Dr. A. Matienzo. Tampico E. de Tamaulipas.

En los casos de impaludismo de forma intermitente normal, se siguen los preceptos de toda enfermedad aguda, reposo en la cama, bebidas aromáticas y dieta. Pero observa frecuentemente que el estado de calor se prolonga, que la piel permanece seca y el dolor de cabeza intenso; en este caso la intervención se hace necesaria y nada dá mejores resultados que los diaporéticos para favorecer el tercer periodo de sudor con que termina el acceso.

Acetato de amoniaco.....	gram. 1. 00
Jarabe de menta.....	„ 15. 00
Infusión de serpentaria.....	„ 60. 00
Láudano de Sidenham.....	XV gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora en una taza de té ó de borraja, con un poco de cognac.

Esta fórmula se puede emplear en todos los estados febriles donde se presenta la misma indicación.

Cuando el estado de calor se prolonga, se hace indispensable la administración de la quinina, que como mejores resultados dá, es asociada á la antipirina en esta forma.

Sulfato de quinina.....	gram. 1. 00
Antipirina.....	„ 0. 50
Dower (polvo de).....	„ 0. 30

Para 2 cápsulas.

Una cada hora sin parar de esta dosis en 24 horas. Repitiendo la fórmula al día siguiente si fuere necesario.

Dr. J. M. Irys. San Juan Bautista E. de Tabasco.

Agua.....	gram.	200.	00
Sulfato de quinina.....	„	2.	00
Ácido cítrico.....	„	2.	00
Ioduro de potasio.....	„	2.	00

Cucharadas.

Una cucharada tres veces al día.

Esta fórmula da muy buenos resultados en la forma crónica de impaludismo con infarto notable del vaso y del hígado.

Dr. Rafael Zapien.

Tonalá Chiapas.

FORMA REMITENTE.

Calomel al vapor.....	gram.	0.	10
Polvos de Dower.....	„	0.	50
Azúcar de leche.....	„	1.	00

En 10 papeles

Un papel cada hora.

En los niños se reduce á la mitad el calomel y el polvo de Dower según la edad.

Cuando hay hipertermia.

Ácido salicílico.....	gram.	3.	00
Antipirina.....	„	1.	00
Acetato de amoniaco líquido....	„	10.	00
Agua.....	„	75.	00
Jarabe.....	„	10.	00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada media hora y cuando la temperatura ha bajado á 38° se darán cada hora.

Vinagre.....	} de c. c. partes iguales.
Alcohol á 21°.....	
Agua.....	

Lociones calientes en todo el cuerpo hasta que baje la temperatura.

- Cuando toma la forma intermitente se darán las sales de quinina.

Dr. P. Peña.

Zamora E. de Michoacán.

EN LA FORMA REMITENTE.

Baños salados de 5 á 10 minutos de duración, y de 20° á 25° centígrados de temperatura diariamente. La cantidad de sal común (cloruro de sodio) por baño, es de 6 litros para la cantidad de agua que comunmente se usa para un baño.

Dr. M. J. Ocampo.

Pinos E. de Zacatecas.

FORMA INTERMITENTE.

Extracto fluido de pambotano. . . grm. 30. 00

Tres tomas.

La primera procurando que sea antes del acceso. Las tomas se darán en un poco de té limón.

Dr. F. Blazquez.

México.

Además de los medios conocidos, usa el pambotano en cocimiento: tres posillos en el día, ó en tintura, tres cucharadas en el día.

Dr. Manuel Valdés y Díaz.

Paso de Ovejas E. de
Veracruz.

TUMEFACIÓ DEL VASO.

Ferrocitrato de quinina. grm. 4. 00

Extracto de genciana. „ 4. 00

Para 60 píldoras.

Cuatro píldoras antes de las comidas.

Dr. Guillermo Parra. Tacubaya D. F.

Especialmente en las formas neurálgicas rebeldes á los otros tratamientos.

Agua grm. 250. 00

Extracto fluido de gelcemiún. . XV gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Otra.

Extracto fluido de contrayerba. . grm. 15. 00

Gotas.

Quince gotas tres veces al día.

Dr. R. Ruiz.

Salvatierra.

PORMA INTERMITENTE.

Clorhidrato ó sulfato de quinina

de 0. 80 á grm. 1. 00

Extracto tebaico. „ 0. 05

En 10 píldoras.

Una píldora cada hora durante el acceso y en sus intervalos.

CAQUEXIA PALÚDICA.

Clorhidrato ó sulfato de quinina. grm. 1. 00

Arceniato de sosa. „ 0. 003

Extracto de opio. „ 0. 05

Para 10 píldoras.

Una píldora cada hora.

Dr. R. Martínez Carriedo.

México.

FORMA INTERMITENTE.

Cocimiento de hojas de naranjo grm. 150. 00

Cognac. „ 20. 00

Sulfato de quinina	„	1. 00
Tintura de quina	„	2. 00
Láudano de Sydenham	X gotas.	
Jarabe de limón ó de naranja . .	grm.	30. 00
		<i>2 tomas.</i>

Una en ayunas y otra al acostarse.

Hágase vomitar antes al paciente.

Dr. F. M. Arroyo. Irapuato E. de Guanajuato.

REBELDE.

Agua destilada	grm.	100. 00
Arseniato de sosa	„	0. 05
		<i>Cucharadas.</i>

Dos á tres cucharadas en el día.

PALUDISMO.

Dr. Francisco Fernández.—Medellín E. de Veracruz.

Sulfato de quinina	grm.	2. 00
Polvo de ruibarbo	„	2. 00
Fierro reducido al hidrógeno	„	1. 00
Polvo de opio	„	0. 20

En 40 píldoras.

Dos píldoras en la mañana y dos en la tarde.

Dr. Ramón Ponce de León. Culiacán E. de Sinaloa.

FORMA INTERMITENTE COMÚN.

Clorhidrato de quinina	grm.	1. 20
Acido arsenioso	„	0. 003 ^{mligrs.}

Para 12 píldoras.

Cuatro píldoras despues del acceso y cuatro dos horas antes del nuevo.

Forma remitente ó intermitente de forma subintran-
te.

Se usa la misma fórmula y solamente se varía la forma de administrarla, dando dos píldoras cada tres horas hasta vencer la fiebre cualquiera que sea la duración de la enfermedad.

Dr. L. Arroyo.

San Angel D. F.

FORMA INTERMITENTE.

Cocimiento fuerte de fresno: medio pozuelo endulzado al empezar el acceso y otro medio pozuelo al terminar.

Sacar todos los días al enfermo al aire libre, con buen tiempo y á buena hora.

Para adultos, dosis doble.

Dr. M. Mucél.

México.

EN LOS NIÑOS.

Jarabe de diacodión de 5. 00 á. . grm. 10, 00

„ „ azahar de 10. 00 á. . . . „ 20. 00

Bromhidrato de quinina de 0. 20 „ 0, 60

3 tomas.

Para tomarlo en veinticuatro á treinta y seis horas. Cuando la quinina no es tolerada ó es infiel, dá el elixir de picosa del Sr. Lazo de la Vega, siguiendo las indicaciones de su autor.

Los pozuelos laxarán un poco el vientre.

Por alimento té con leche cada dos horas.

Reposo en la cama y abrigo.

Al día siguiente:

Floritzina	gram.	1. 00
Bromhidrato de quinina	,,	1. 20
Polvos de Dower	,,	1. 00

Para 12 píldoras.

Cuatro píldoras al levantarse, cuatro á las once de la mañana y cuatro á las cinco ú ocho de la noche.

Limonada vinosa á pasto.

Reposo en la cama.

El enfermo repetirá las píldoras dos ó tres días y si el acceso se repite, tomará á las once de la mañana ó á las cuatro de la tarde.

Agua	gram.	180. 00
Ácido cítrico	,,	15. 00
Bicarbonato de sosa	,,	25. 00
Jarabe de grosella	,,	60. 00

Bebida.

Para tomarla en una sola vez.

Cuando el enfermo está minado en su constitución por la repetición de los accesos y que sus funciones digestivas están debilitadas.

Sulfato de quinina	gram.	1. 00
Carbonato de fierro	,,	0. 50
Polvos de Dower	,,	0, 30
,, de ruibarbo	,,	0. 30

Para 20 píldoras.

Seis píldoras en el día.

En la combalecencia.

Vino de quina	gram.	90. 00
Tintura alcohólica de nuez vómica	,,	2. 00

Licor arcenial de Towler.....	„	2. 00
Tintura de canela.....	„	4. 00

Cucharaditas.

Dos ó tres cucharaditas repartidas en el día.

Cuando se asocian el paludismo y el alcoholismo.

Agua.....	gram.	400. 00
Sal de Seignette.....	„	45. 00
Bitartrato de potasa.....	„	35. 00
Jarabe c. b.		

2 tomas.

Una toma en la mañana y otra en la tarde. En las formas anómalas y rebeldes si no ceden con la florit-zina y sales de quinina asociadas con las laxantes y bebidas alcalinas. Sin dejar éstas se usará de la solu-ción arsenical de Towler 10 gotas una vez al día, au-mentando una gota cada día hasta llegar á 15 ó 20 gotas si el enfermo las tolera.

En la forma intermitente franca y que no ha cedido con los medios anteriores, ha dado buen resultado lo siguiente.

Jarabe de menta.....	gram.	90. 00
Extracto de ruibarbo.....	„	5. 00
Tintura de alves.....	„	10. 00
„ „ genciana.....	„	8. 00
„ „ cuasia.....	„	8. 00

Cucharaditas.

Tres cucharaditas en el día.

Agregando en algunos casos el licor de Towler. La alimentación debe reducirse en todo caso á dieta de

leche con té ó café, hojas de naranjo ó té limón. Se debe prohibir el uso de las grasas.

Dr. Manuel de Anaya.

Guanajuato.

FORMA INTERMITENTE.

Extracto de quina.....	gram.	0. 75
Sulfato de quinina.....	„	0. 60
Extracto de valeriana.....	„	0. 10
Alcanfor pulverizado.....	„	0. 65

Para 12 píldoras.

Una píldora cada dos horas con una cucharada de vino de Málaga.

Otra.

Cocimiento de hojas de euca-

liptus.....	gram.	150. 00
Jarabe de azahar.....	„	30. 00
Sulfato de quinina.....	„	1. 50
Ácido tártrico.....	„	0. 75

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Erasmo O. Romero.

Ozuloama.

FORMA PERNICIOSA ATAXODINÁMICA.

Agua destilada.....	gram.	3. 00
Clorhidrato de quinina.....	„	1. 20
Licor de Towler.....	„	0. 15

Una inyeccion hipodérmica.

Dr. Antonio G. Guzmán. H. Matamoros.

Sal de Pelletier	gram. 1. 00
Antipirina	„ 0. 50

Para 6 cápsulas.

Una cápsula cada hora.

Otra.

Sal de Pelletier	gram. 1. 00
Extracto de opio	„ 0. 02

En 4 cápsulas

Una cápsula cada media hora,

Dr. David Peña. Monterrey.

Cloruro de quinina	gram. 1. 00
Salicilato de cinconidina	„ 1. 00
Codeina	„ 0. 05

En 12 cápsulas.

Dr. José B. López. Campeche.

Sal de Pelletier	gram. 4. 00
Subcarbonato de fierro	„ 4. 00
Ruibarbo en polvo	„ 4. 00

En 40 píldoras.

Dos píldoras diarias.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

Polvo de simaba cedrón	gram. 1. 50
Vino jeréz	„ 40 00

2 tomas.

Una toma en la mañana y otra en la tarde.

Debe continuarse su uso por ocho días.

Es tan eficaz como la quinina si se tiene cuidado de usar semillas bien maduras. Si el enfermo es delicado

del estómago debe añadirse tres ó cuatro gotas de láudano.

Otra.

Cedrina..... grm. 0. 005

Extracto de opio..... „ 0. 01

En 5 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. Ramón Velasco.

Tequila.

FORMA CRÓNICA.

Extracto de genciana..... grm. 1. 00

Ferrocitrato de quinina..... „ 1. 20

Acido arsenioso..... „ 0. 015

En 10 píldoras.

Una píldora diaria en la comida.

Dr. E. M. González.

Tequila.

PRESERVATIVO.

Extracto fluido de quebracho... grm. 10. 00

„ „ „ quina..... „ 10. 00

Licor de Towler..... „ 10. 00

Gotas.

De 10 á 20 gotas diarias.

Dr. Arcadio F. Ojeda.

Veracruz.

FORMA PERNICIOSA.

Agua destilada..... grm. 2. 00

Clorhidrato de quinina..... „ 1. 00

Inyecciones hipodérmicas.

Disolverla por el calor en el momento de usarla, para consumirse en tres inyecciones que se reparten

en las 24 horas del día. Las inyecciones deben ser intramusculares.

EN LOS NIÑOS.

Agua	gram.	60.	00
Alcohol	,,	60.	00
Acido tártrico.....	,,	3.	00
Sulfato de quinina.....	,,	2.	00

Friega.

Friega cada cuatro horas.

Esta fórmula es útil hasta dónde lo permite la poca absorción de la piel.

En la forma remitente es útil desinfectar el intestino con purgante y lavativas.

Agua.....	gram.	120.	00
Creolina.....	,,	0.	20

Lavativa.

Palpitaciones.

Dr. Valdéz y Díaz.—Paso de Ovejas E. de Veracruz.

Polvo de digital.....	gram.	0.	60
Valerianato de cafeina.....	,,	1.	00
Extracto tebaico.....	,,	0.	05

En 12 píldoras

Tres píldoras en el día.

Dr. D. Molinar	Parral.
Agua de azahar.....	gram. 120. 00
Acetato de amoniaco.....	,, 4. 00
Láudano de Sydenham.....	20 gotas.
Jarabe de éter.....	gram. 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora:

Parálisis intestinal.Dr. F. Blasquez, México.

Podofilina..... grm. 0. 20

Extracto de nuez vómica..... „ 0. 20

„ „ belladona..... „ 0. 05

Para 20 píldoras.

Una píldora cada hora.

Papilomas corneas.

VULGARMENTE LLAMADOS MEZQUINOS.

Dr. Fernando Ortega Tacubaya D. F.

Las berrugas, los condilomas ó vegetaciones en general contra todas las afecciones neoplásicas que tienen su asiento anatómico en las capas superficiales de la piel, se obtienen los mejores resultados, usando bajo la forma de extracto fluido las semillas de estafragra, á la dosis de diez gotas tres veces al día en el adulto.

Dr. Leonardo Gómez. Tenango E. de México,

Agua..... grm, 500. 00

Semillas de estafragra..... „ 5. 00

Hacer un cocimiento hasta reducirlo á grm, 400. 00

Cucharadas.

(1) Una cucharada en la mañana y otra en la noche

Dr. L. Longitud. Tenancingo.

Agua destilada..... grm. 2. 00

Acido crómico..... „ 2. 00

Toques.

Un toque diario hasta que se convierta en escara.

(1) Esta formula la usó por primera vez el Dr. Ignacio Berrueco, y su eficacia la ha podido comprobar el Dr. Gómez en el pueblo de Jalapa en la que la mayor parte de sus habitantes tenían mezquinos.

Dr. Antonio J. Carbajal.

México.

Aceite de cade c. b.

Toques.

Un toque cada tercer día. Suele bastar con uno solo. Este medicamento es seguro y tiene las ventajas siguientes: es indoloro. No se reproducen las escresencias. Hay que estar seguro de la pureza del aceite para garantizar su éxito.

Parálisis agitante.

Dr. M. Mucél.

México.

Usa el hava del Calavar á dosis convenientes.

Parásitos.

Dr. Tobías Núñez.

México.

El alcanfor como parasitícida.

El alcanfor sin tener los inconvenientes de las preparaciones mercuriales, destruye eficazmente los parásitos que atacan al hombre y que se fijan de preferencia en los lugares en los que la piel está cubierta de polvo, tales como la piel de la cabellera, la del plubio y escroto, así como de las oxilas. Incorporado el alcanfor con un cuerpo graso, tal como la manteca lavada, la vaselina, la lanolina etc. en la proporción de diez partes de alcanfor por cien partes de grasa, se obtiene una preparación eficaz para destruir los parásitos. Para que el alcanfor obre con más prontitud se deberá recomendar que las personas se laven antes las partes en donde se vá á aplicar la medicina con agua tibia y jabón, dando la preferencia al jabón fenicado si les es fácil conseguirlo. El mudarse la ropa

interior es otra precaución que debe tomar la persona, para verse pronto libre de estos parásitos. Empleando este tratamiento en dos ó tres días queda la persona enteramente curada.

El unguento doble es una de las preparaciones mercuriales mas usadas como microbicida, no solo por el vulgo, sino aún muy frecuentemente recomendada por los médicos. Es un hecho que obra eficazmente destruyendo á los parásitos, pero al mismo tiempo tiene los inconvenientes de producir la hidrargiria, sobre todo en la piel fina del escroto y axilas, así como la estomatitis cuando se aplica en personas en las que con facilidad se hace la absorción del mercurio. Las preparaciones de alcanfor son muy útiles para emplearlas en los Hospitales, Asilos, Colegios, Cuarteles etc. para mantener á los asilados en un estado de aseo satisfactorio siendo al mismo tiempo estas preparaciones muy poco costosas, pudiendo ser hechas en los mismos establecimientos.

Parescias.

Dr. M. Mucél.

México.

Emplea con éxito la tintura alcohólica de polvo de palo del mulato al interior y al exterior. Aún en la parálisis de origen central, las ha visto mejorarse notablemente.

La tintura se prepara con el leño y su corteza en la proporción de 1 á 4.

Al interior de diez á ochenta gotas aumentando progresivamente, y al exterior en fricciones tres veces a día sobre las partes paralizadas.

Pediculi pubis.

Dr. M. Carmona y Valle, México.

Manteca lavada grm. 60. 00

Alcanfor „ 10. 00

Pomada.

Fricciones dos veces al día en los puntos invadidos y baño diario, cambiando la ropa. En uno ó dos días desaparecen los parásitos.

Pelagra.

Dr. F. Valdéz, Batopilas E. de Chihuahua.

Lociones al uno por mil de bicloruro de mercurio en alcohol y en seguida vaselina fenicada al 2%

Curación diaria.

Al interior medicación arsenical y tónica.

Peritonitis.

Dr. C. Mota, Puruándiro E. de Michoacán.

Embrocaciones en el vientre con ictiol á la dosis de grm. 30. 00 por embrocación.

Dr. M. Mucél, México.

Combatir la causa si es posible.

Al interior calomel á dosis refracta, unido al extracto de opio. Hielo al interior y al exterior sin suspenderlo para nada: pomada narcótica y en último extremo vegigatorio de cantaridato de sosa.

Dr. Jesús H. Treviño, Monterrey.

Empacar el vientre con una capa de ácido salicílico en polvo.

Piquete de alacranes y en general de todo animal ponzoñoso.

Dr. Francisco M. Palacios.—Bramador E. de Jalisco.

Agua destilada.....	gram.	150.	00
Ioduro de potasio.....	„	1.	00
Bromuro de potasio.....	„	4.	00
Licor de Vanswieten.....	„	20.	00

Tómese la mitad de una sola vez, ó en cucharadas continuadas y al cabo de quince minutos, si no hay mejoría notable, tómese un sudorífico de infusión de hojas de jaborandi. Terminando el sudor aplíquese la otra mitad de la poción de una vez ó en cucharadas continuadas.

Hay más de 300 casos en que se ha usado ésta fórmula, y la estadística dá el 1 % de mortalidad.

Hay que recordar que la estadística de los otros procedimientos, dá el 20 ó 25% de mortalidad.

En estos 300 casos, están comprendidos niños, algunos recién nacidos y otros menores de 7 años y las observaciones son tomadas en las costas del Pacífico, en donde abundan y son tan temibles los animales ponzoñosos.

Piquetes de alacran.

Dr. R. Ortega.

C. Porfirio Díaz.

Un centígramo de clorhidrato de pilocarpina en inyección hipodérmica.

Dr. Alfredo Higareda.

Huejotzingo Puebla.

Ha usado con éxito la fórmula del Dr. Isauro Guerrero.

Agua de azahar	gram.	120. 00
Bromuro de potasio y sodio de c. c.	„	4. 00
Almizcle.	„	0. 30
Morfina	„	0. 05

Cucharadas.

Una cucharada cada cuarto de hora, despues cada media hora y despues cada hora según vayan mejorando los síntomas.

Dr. Márcos Mozari. Mineral de Huautla E. de
Morelos.

Agua	gram.	120. 00
Bromuro de potasio	„	4. 00
Clorhidrato de morfina	„	0. 05
Jarabe de cloral	„	40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora hasta que el enfermo se duerma.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre. Tehuacán.

Polvo de simava cedrón	gram.	2. 00
Agua destilada	„	400. 00
Hágase infusión y añádase Jarabe simple	„	30. 00

Medios pozuelos.

Un medio pozuelo cada hora.

Pitiriaris.

PITIRIARIS DEL CUERO CABELLUDO.

Tirrol puro	gram.	1. 00
-----------------------	-------	-------

Biborato de sosa	„	6. 00
Agua de colonia	„	200. 00

Lociones.

Dos veces al día.

Dr. Emilio Polo.

Puebla.

PITIRIARIS VERSICOLOR.

Protoioduro de mercurio	gram.	0. 15
Extracto de guayacan	„	0. 30
Id. de opio	„	0. 05

Para 8 píldoras.

Una píldora tres veces al día.

Nitrato de potasa	gram.	8. 00
-----------------------------	-------	-------

En 8 papeles.

Un papel en la mañana y otro en la tarde.

Como tópico pomada de calomel.

Placas mucosas.

Dr. Eduardo Lamicq.

México.

Agua destilada	gram.	30. 00
Ácido crómico	„	1. 00

Toques,

Tres veces al día.

No causan dolor, se limpian y cicatrizan rápidamente las placas.

Aplicar el tratamiento interior antisifilítico.

Dr. Federico Cota.

La Paz Baja California.

Papaina	gram.	2. 00
Glicerina neutra	„	10. 00

Alcohol alcanforado	„	5. 00
Ácido fénico	„	3. 00

Toques.

Tocar las placas con un pincel.

Pleuresía.

Dr. Vicente Sierra. (1). Apam.

EL PRIMER DIA.

Agua hirviendo

gram.	150.	00
-------	------	----

Hojas de javorandi	„	5.	00
--------------------------	---	----	----

Hágase infusión, fíltrese y endúlcese para tomarla de una sola vez.

Si el enfermo suda abundantemente se puede asegurar que no había derrame en la pleura.

Si el dolor es muy agudo, sanguijuelas en el lugar del dolor y preparaciones opiadas al interior.

Dr. G. Chávez. Tasco.

Extracto de digital	gram.	0.	20
---------------------------	-------	----	----

Infusión de sauco y guayacan...	„	125.	00
---------------------------------	---	------	----

Jarabe de éter	„	30.	00
----------------------	---	-----	----

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Dr E. Gutiérrez. Guadalupe, E. de Zacatecas.

Para el dolor y accesos disneicos, inyecciones subcutáneas de morfina de 0. 01 á 0. 02 centígramos: vegetatorio de cantaridato de sosa. Purgante en la declinación de la enfermedad.

(1) El Doctor Sierra ejerce en un lugar en que la pleuresía es muy frecuente y en 31 años no ha visto formarse un derrame aplicando su tratamiento.

Dieta láctea.—Punción en los vastos derrames.

Infusión pectoral	grm. 120. 00
Acetato de potaza	„ 12. 00
Salipirina	„ 4. 00
Tintura de digital	„ 4. 00
Jarabe gomoso	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cada hora.

EN EL SEGUNDO PERIODO.

Infusión de polígala	grm. 100. 00
Ioduro de potasio	„ 3. 00
Jarabe de codeina	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. José B. López	Campeche.
Polvo de Dower	grm. 1. 20
Kermes mineral	„ 0. 30

En 12 papeles.

Un papel cada hora.

Dr. Emilio Polo,	Puebla.
------------------	---------

DOLOR PLEURAL.

Tintura de asclepias tuberosa	12 gotas
Agua	grm. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Dr. Federico Cota,	La Paz, Baja California.
--------------------	--------------------------

PLEURESÍA CON DERRAME.

Vegigatorio amplio.—Sudoríficos.—Dieta láctea.—
Ioduro de potasio y régimen tónico.

Pleuroneumonía.

Dr. M. Medal. Tacámbaro. E. de Michoacán.

Polvo de ipecacuana de 1. 30 á.. grm. 2 00

Agua..... „ 500. 00

En tres tomas

Una cada cinco minutos.

Cocimiento fuerte de tabachín y
tilia..... grm. 350. 00

Clorato de potasa de 0. 30 á... „ 1. 20

Jarabe tebaico..... „ 30. 00

Cucharadas.

Cuatro cucharadas cada media hora hasta la sudación y si es necesario ventosas escarificadas.

Pleurodinia.

Dr. E. Gutiérrez. Guadalupe. E. de Zacatecas.

Agua de azahar..... grm. 100. 00

Ioduro de potasio de 2, 00 á... „ 3. 00

Salicilato de sosa..... „ 5. 00

Jarabe de codeina..... „ 50. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Exteriormente friegas narcóticas.

Dr. David Peña. Monterrey.

Salicilato de sosa..... grm. 6. 00

Ioduro de sodio..... „ 4. 00

Tintura de hojas de jaborandi... „ 20. 00

Hidrolado de menta..... „ 100. 00

Cucharadas.

Tres cucharadas por día durante 8 ó 15 días á lo más.

Dr. Emilio Polo. Puebla.

Tintura de cemífuga recamosa.. grm. 0. 50

Id. ranúnculas vulbosus..... „ 050

Agua destilada..... „ 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Podredumbre de hospital.

Dr. Tobias Núñez. México.

Esta complicación de las heridas se presenta bajo dos formas: la pulposa y la ulcerosa; la primera es la más frecuente. Aun cuando varios factores contribuyen á su desarrollo, no cabe la menor duda que la falta de aseo en las curaciones, es el factor principal para su desarroyo. Antes de que se emplaran las curaciones anticépticas actualmente en uso, era en los servicios atendidos por malos practicantes y médicos abandonados en los que con más frecuencia se veía la podredumbre.

Esta complicación es fácil de diagnosticar: basta haberla visto una sola vez para no desconocerla.

El empleo de la anticéptica quirúrgica ha hecho desaparecer este complicario.

Entre los muchos agentes terapéuticos recomendados para combatir, tenemos tres muy eficaces, que siendo bien empleados curan prontamente esta complicación. Estos son: el aceite esencial de trementina, el nitrato ácido de mercurio y el cauterio actual.

El aceite esencial de trementina es el que debe emplearse generalmente, sobre todo cuando la podredumbre ha invadido el tejido celular subcutáneo é in-

termuscular, produciendo vastos desprendimientos de la piel, é infiltrándose en los interstisios musculares.

Debe cuidarse que el aceite se ponga en contacto con todos los tejidos atacados por la podredumbre, lavando bien la herida con este líquido y empapando en él las piezas de la curación que se han de aplicar inmediatamente sobre ella. Unas cuantas curaciones hechas con el aceite esencial de trementina, son suficientes en el mayor número de casos para que esta complicación desaparezca.

En los casos en que el aceite no diere resultado después de unas cuatro ó cinco aplicaciones, se podrá recurrir al nitrato ácido de mercurio que obra con más energía. Esta preparación tiene el inconveniente de absorverse con facilidad el mercurio y de producir la estomatites y otras manifestaciones de su absorción. Esto se obserba cuando el nitrato se aplica sobre superficies estensas que han sido invadidas por la podredumbre. En estos casos su empleo lo creo contraindicado debiendo emplearse el aceite esencial de trementina, ora solo ó bien ayudado del termocauterio.

En cuanto á este último agente raras veces está indicado, pues sólamente en los casos rebeldes que no cedan á los dos primeros medios recomendados, estará indicada su aplicación, ya sea solo ó bien ayudando con su empleo, la aplicación de cualquiera de los otros dos agentes terapéuticos.

El aceite esencial de trementina bien manejado, rara vez falla, por consiguiente el empleo de los otros dos agentes, tiene que ser excepcional.

Debe tenerse presente que para obtener el resultado favorable que se expresa de estos dos líquidos, es necesario separar primero las falsas membranas, lo que se consigue desprendiéndolas por medio de una espátula ó de una legra.

Polvos dentríficos.

Dr. Alberto Aizpuru. México.

Carbonato de magnesia	gram.	10. 00
Carbón porfirizado	,,	30. 00
Polvo de quina roja	,,	30. 00
Esencia de menta c. b.		

Polvos dentríficos.

En las enfermedades parasitarias de la boca.

Dr. Adrian de Garay. México.

Carbón de tortilla finamente pulverizado	gram.	10. 00
Quina roja pulverizada	,,	2. 00
Clorato de potasa en polvo	,,	2. 00
Carbonato de cal	,,	2. 00
Salol	,,	1. 00
Esencia de menta		6 gotas.

Polvos dentríficos.

Porriño de calvans.

Dr. Lázaro Ortega. México.

Vaselina	gram.	30. 00
Veratrina	,,	0. 10
Óxido rojo de mercurio	,,	1. 00

Pomada.

Postemillas.

Dr. M. Villaseñor. Pénjamo. E. de Guanajuato.

Se curan violentamente con aplicaciones locales de bicarbonato de sosa en polvo.

Pomada antioftálmica.

Dr. F. Zárraga México.

Pomada de nitrato de mercurio... grm. 30 00

Óxido rojo de mercurio

porfirizado..... „ 2. 00

Aceite de almendras dulces c. b. para mezclar.

Pomada.

Pociones.

Dr. F. Zárraga México.

POCIÓN GALACTÓGEGA.

Infusión de borraja..... grm. 300. 00

Extracto acuoso de galega

oficinal..... „ 2. 00

Jarabe simple..... „ 40. 00

Tres tomas.

Una toma en la mañana otra en la tarde y otra en la noche.

Preservativo.

Dr. Luis R. Ruiz. Texcoco. E. de México.

Recomienda como preservativo en general, para las enfermedades contagiosas, el extracto de cucalíptus en aspiraciones.

Pruritu.

GENERAL Y PARCIAL.

Dr. E. Lier. México.

Lanolina..... grm. 50. 00

Vaselina..... „ 20. 00

Agua..... :	„	30. 00
Mentol.....	„	5. 00

Pomada.

PRÚRITO DE LA VULVA.

Dr. Ciro M. Santelices.			Querétaro.
Bicloruro de mercurio.....	gram.	1. 00	
Agua.....	„	1000. 00	
Alcohol.....	„	40. 00	

Defensivos.

Dr. David Peña.			Monterrey.
Ácido salicílico.....	gram.	6. 00	
Carbonato de potasa.....	„	2. 00	
Agua de Florida.....	„	200. 00	

Fricciones.

Dr. Adrian de Garay.			México.
----------------------	--	--	---------

PRURITO DE LA VULVA Y EL ESCROTO.

Aceite de almendras dulces....	gram.	16. 00
Aceite de cade.....	„	4. 00
Clorhidrato de cocaina.....	„	0. 50

Uso externo.

Lavar dos veces al día las partes enfermas con agua y jabón de ictiol y después untarse el aceite marcado uso externo.

Prúrrigo.

Dr. E. Lier.			México.
Alquitrán y			
Espíritu de éter de c. c.....	gram.	25. 00	

Uso externo.

Baños con sal y al interior. Antipirina 0. 50 por día.

Pulmones débiles.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.

Tehuacán.

EN LAS PERSONAS PROPENSAS A LA TÍISIS,

Calomel. gm. 1. 00
 Polvol de azúcar c. b.

En 20 papeles.

Ioduro de sodio. gm. 5. 00
 Infusión de corteza de naranja. . . „ 500. 00
 Jarabe de id. id. „ 40. 00
 Láudano Sydenham. „ 1. 00

Cucharadas núm. 1

Jarabe de maguey manso. gm. 150. 00

Cucharadas núm. 2.

Tintura de iodo iodurada. gm. 100. 00

Uso externo.

Comenzar con los papeles uno todos los días hasta acabar los 20 ó hasta que se toquen las encías. Se dejan pasar tres ó cuatro días sin tomar medicina y el cuarto ó quinto día se empiezan á tomar las cucharadas marcadas con el núm. 1, cuatro cucharadas todos los días hasta terminar la dósís prescrita. Luego se comienzan las cucharadas marcadas con el núm. 2, una todas las noches á la hora de acostarse, hasta terminar la dósís. Se dejan cuatro ó cinco días de descanso y se vuelve á repetir el método.

Todo el tiempo del tratamiento debe aplicarse la fórmula. Uso externo en las partes déviles ó amenazadas.

Purgantes.

Dr. M. Alfaro

México.

PURGANTE PARA NIÑOS DE UN AÑO EN ADELANTE.

Emulsión de almendras dulces y

jarabe de azahar de c. c. grm. 40. 00

Aceite de cróton 1. gota.

Cucharaditas.

Cucharadita cafetera cada hora hasta obtener el efecto.

Dr. Emilio Polo.

Puebla.

PURGANTE PARA NIÑOS,

Aceite de ricino grm. 45. 00

Alcohol „ 15. 00

Glicerina neutra „ 10. 00

Esencia de menta 3 gotas.

Purgante.

Purgante para los Campesinos pobres.

Dr. Gonzálo Farias.

San Luis Potosí.

De 15 á 30 gramos de semillas de datil reducidas á polvo grueso para hacer un cocimiento que se filtra y endulza.

Púrpura.

Dr. M. Mucél.

México.

Cocimiento de hojas de nogal y cocimiento de quina. Estricnina y limonadas vegetales.

Pústula maligna.

Dr. D. Molinar.

Parral.

Cataplasmas de hojas de nogal, despues de haber cauterizado á la profundidad de uno y medio centímetros toda la pústula.

Dr. Octaviano León Navarro. Tangantzícuaró.

En cuanto el diagnóstico es posible, se hará la cauterización con una lente por medio de los rayos solares, dirigiendo el foco al centro gangrenoso hasta carbonizarlo y en seguida se aplicará:

Alcohol á 60°	gram. 120. 00
Alcanfor	„ 30. 00
Ácido fénico.....	„ 7. 00

Uso externo.

En lienzos de lino empapados en este líquido, se aplicarán directamente sobre la pústula y se cubre todo con cataplasmas de zanahoria ó de malva ó de yerba mora. La curación se repite varias veces al día.

Al siguiente día se repite la cauterización respetando los tejidos sanos. Lo mismo se hace el tercer día.

Como en estos días empiezan las manifestaciones generales, debe usarse la siguiente medicación interna.

Clorato de potasa.....	gram. 4. 00
Agua destilada.....	„ 100. 00
Jarabe de goma arábica.....	„ 20. 00
Jugo de limón.....	10 gotas.

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Aceite de olivo.....	gram. 30. 00
Bicloruro de estaño.....	„ 0. 05

Fricciones á los músculos.

Mejorados los fenómenos generales, se usará localmente el siguiente tratamiento:

Cocaina.....	„	1. 00
Manteca de cacao.....	„	44. 00

Pomada.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California

En las quemaduras en las manos ó en los piés, para calmar el dolor, provocar el enfriamiento por el hielo ó por el éter en el miembro opuesto.

Queratitis.

Dr. Agustín Chacón. México.

Agua destilada.....	gram.	500. 00
Bicloruro de mercurio.....	„	0. 20

Lavatorio.

Ó bien,

Agua destilada.....	gram.	300. 00
Licor de Van Swieter.....	„	200. 00

Lavatorio.

Vaselina.....	gram.	10. 00
Óxido rojo de mercurio de 0.10 á ..	„	0. 20

Pomada.

Dr. L. Castro. México.

QUERATITIS INTERSTICIAL DE ORIGEN SIFILÍTICO.

Agua destilada.....	gram.	30. 00
Bicloruro de mercurio.....	„	0. 03

Inyecciones subcutáneas.

Se inyecta un milígramo diario en la región interescapular, teniendo cuidado de suspender tan luego como aparesca la estomatitis.

QUERATITIS COPÉTICA.

Agua destilada de rosas.....	gram.	30. 00
Biborato de sosa.....	„	0. 60
Extracto de crameria de 0. 10 á ..	„	0. 15

Gotas para los ojos.

Seis gotas tres veces al día.

QUERATITIS CIRCUNFERENCIAL Y ÚLCERA ATÓNICA
DE LA CÓRNEA.

Agua destilada.....	gram.	30. 00
Bórax.....	„	1. 00
Sulfato de atropina.....	„	0. 02

Gotas para los ojos.

De dos á tres gotas tres veces al día en el ojo enfermo. Se suspende tan luego como haya dilatación del iris; de lo contrario se originan dolores intensos.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Aristol.....	gram.	1. 00
Sulfato de atropina.....	„	0. 05
Vaselina.....	„	20, 00

Pomada.

Curación ocluciba cada tres días.

Otra.

Agua destilada.....	gram.	10, 00
Sulfato de atropina.....	„	0. 05
Cocaina.....	„	0, 20

Colirio.

Dos gotas dos veces al día en el ojo enfermo.

NOTA.—Las soluciones de nitrato de plata *jamás* se deben aplicar cuando la córnea ha perdido siquiera el epitelis.

QUERATITIS ULCEROSA.

Dr. Manuel Carmona y Valle, México,

En las úlceras agudas, subagudas y crónicas en la
ftalmía estrumosa.

Aceite de bacalao claro grm. 28. 00

Calomel. „ 4. 80

Colirio núm. 1.

Aceite de bacalao claro grm. 28. 00

Calomel. „ 4 80

Precipitado rojo. „ 0, 40

Colirio núm. 2.

Aceite de bacalao claro grm. 28. 00

Aceite de cade. „ 7. 00

Calomel. „ 4. 80

Precipitado rojo. „ 0. 40

Colirio núm. 3.

Su aplicación como la de todos los colirios.

Queratitis flictenular.

Dr. A. Chacón, México.

Aceite de vaselina. grm. 10. 00

Calomel al vapor „ 1. 00

Gotas.

Dos gotas dos veces al día en el ojo enfermo. Agítase antes de usarlo.

Otra.

Vaselina grm. 10. 00

Óxido amarillo de mercurio de

0. 10 á „ 0. 20

Sublimado. „ 0. 002

Pomada.

Se coloca en la mucosa del párpado inferior, una cantidad igual en volúmen á un chicharito.

Esta fórmula se usa tambien en las úlceras de la córnea.

Dr. L. Castro.

México

EN LOS ESCROFULOSOS.

Aceite de almendras dulces le- gítimo.....	gram.	30. 00
Calomel al vapor.....	,,	1. 00
Bicloruro de mercurio.....	,,	0. 01
Láudano de Sydenham.....	,,	1. 00

Gotas para los ojos.

De cinco á seis gotas en el ojo enfermo acompañadas del tratamiento interno aconsejado en estos casos

Queratitis linfática.

Dr. A. Chacón.

México

Vaselina.....	gram.	10. 00
Óxido amarillo de mercurio de 0. 10 á.....	,,	0. 20
Bicloruro de mercurio.....	,,	0. 002

Pomada.

Con un papel se pone en el saco conjuntival una cantidad de pomada igual en volumen á un chicharito se cierra el ojo y se hace un ligero massage con objeto de repartir la pomada por toda la superficie del globo ocular.

Quinina.

Dr. E. Herrera Moreno. Córdoba E. de Veracruz

Las dosis de quinina que recomiendan los autores no hacen efecto en los climas cálidos; generalmente s

dá en estos lugares grm. 1. 50 por dosis y grm. 4. 00 por día en el adulto.

En los niños una dosis proporcionada á su edad.

Raquitismo.

Dr. M. Mucél.

México.

Fosfatina de Falieres.

Alimento Wagner.

Rectitis ulcerosa.

Dr. Ciro M. Santelices.

Querétaro.

Iodoformo..... grm. 2. 00

Extracto de crameria..... „ 6. 00

„ „ opio..... „ 0. 20

Manteca de cacao c. b.

Para 6 supositorios.

Tres supositorios en el día.

Reumatismo articular.

Dr. G. F. Chávez.

Tasco E. de Guerrero.

Cocimiento de zazafrás..... grm. 125. 00

Salicilato de sosa..... „ 4. 00

Sal de Pelletier..... „ 0. 30

Jarabe de cidra c. b.

Cucharadas.

Una cucharadada cada dos horas,

Dr. M. S. Iglesias.

Veracruz.

Prévio tratamiento general y solamente como calmante del dolor, usa la friega siguiente.

Bálsamo anodino y bálsamo Fioraventi partes iguales. Caliente en B de M, agítese y despues de friccio-arse cúbrase la parte dolorosa.

Dr. M. Mucél.

México.

El sifilítico con el ioduro de potasio y los sudoríficos de jaborandi ó pilocarpina.

EN EL INFLAMATORIO.

Agua	gram.	250.	00
Salicilato de sosa	„	15.	00
Jarabe de clorhidrato de morfina „	„	50.	00

Cucharadas.

De seis á ocho cucharadas diarias.

Dr. Valdéz y Díaz.—Paso de Ovejas E. de Veracruz.

Alcohol alcanforado	} de c. c. . .	gram.	30.	00
Bálsamo anodino é				
Id. de Guatemala.]				
Sulfato de atropina	„	0.	10	

Friega.

Dr. Z. Páramo Rangél.

México.

Pomada iodurada	gram.	30.	00
Extracto de cicuta	„	2.	00
Laúdano de Rousseau	„	4.	00

Pomada.

Dos veces al día en las articulaciones dolorosas.

Dr. Joaquín L. Vallejo.

México.

Prévio tratamiento interior y solamente para calmar el dolor usa la fórmula siguiente:

Bálsamo de Fioraventi	} de c. c. gram.	15.	00
Láudano de Russeau y			
Tintura de jabón alcanforado]			

Friega.

Dr. M. Medal. Tacámbaro E. de Michoacán.

Purgante de sulfato de magnesia con azufre y jarabe de ruibarbo, las cucharadas siguientes:

Infusión de tilia.....	gram.	250.	00
Ioduro de potasio de 2. 00 á...	„	4.	00
Salicilato de sosa.....	„	4.	00
Tintura de acónito de X á.....	XX	gotas.	
Jarabe de corteza de naranja...	gram.	30.	00
Esencia de limón.....	XX	gotas.	

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Sulfato de quinina.....	gram.	1.	00
Antipirina.....	„	0.	30
Azúcar.....	„	4.	00

En 3 papeles.

Para tomarlos en el día.

Dr. L. Longuitud. Tenancingo.

Asociada al tratamiento interior usa la siguiente friega, aplicando la tilia al B de M, en las articulaciones dolorosas, tres ó cuatro veces al día.

Manteca lavada y esencia de trementina de c. c.....	gram.	30.	00
Veratrina.....	„	0.	20

Friega.

Dr. E. Gutierrez Guadalupe E. de Zacatecas.

Agua destilada.....	gram.	120.	00
Nitrato de potasa.....	„	10.	00
Ioduro de potasio de 3. 00 á...	„	4.	00

Nitrato de pilocarpina de 0. 03á	„	0. 05
Jarabe depurativo.....	„	45. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Salipirina de 4. 00 á.....	gram.	6. 00
Cafeina.....	„	1. 00

En 12 cápsulas.

Una cápsula cada hora.

Dr. D. Molinar Parral.

Bromhidrato de quinina.	gram.	1. 00
Agua destilada.....	„	9. 00

Inyecciones.

Una inyección hipodérmica diaria de 10 á 20 gotas.

Tintura de iodo.....	gram.	60. 00
Láudano de Sydenham.....	„	20. 00

Uso externo.

Ponerlo en las articuaciones dolorosas. Vegigatorio á la región precordial.

Dr. J. M. Arroyo Irapuato E. de Guanajuato.

Colodión elástico....	} de c. c....	gram. 15. 00
Tintura de iodo y		
Amoniaco á 22°		

Uso externo

A los lugares doloros con un pincel.

Dr. G. J. Chávez. Tasco.

Cocimiento de zazafráz.....	gram.	125. 00
Ioduro de potasio.....	„	2. 00

Extracto de acónito „ 0. 05
 Jarabe de cidra c b.

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Ciro M Santelices.

Querétaro.

REUMATISMO POLIARTICULAR.

Salicilato de sosa grm. 8. 00
 Antipirina „ 4. 00
 Infusión de digital „ 180. 00
 Cognac „ 40. 00
 Jarabe de opio „ 40. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Otra.

Salicilato de sosa grm. 6. 00
 Antipirina „ 3. 00
 Sulfato de quinina „ 1, 50
 Extracto de opio „ 0. 06
 „ „ digital „ 0. 06

En 12 obleas.

Una oblea cada dos horas.

Dr. J. López Tello.

Amecameca. E. de México.

Salicilato de sosa grm. 10. 00

Para 10 papeles.

Un papel tres veces al día.

Antipirina grm. 2. 00

Para 4 cápsulas.

Una en la noche.

Bálsamo de opodeldoc grm. 40, 00

Cloroformo	„	10. 00
Láudano	„	10. 00

Friega.

En las articulaciones afectadas.

Dr. Lorenzo Cantú. C. Porfirio Diaz E. de Coahuila.

Cápsulas de salicilato de sosa de 0.50 centígramos. cada una y gránulos de Colchicina de Chanteaud de 0, 001 milígramo.

Una cápsula y un gránulo cada dos ó cada tres horas hasta el efecto.

Dr. Márcos Mazari Mineral de Huautla. E. de
Morelos

Salicilato de sosa.....	gram.	2. 00
Sulfato de quinina.....	„	1. 00
Clorhidrato de morfina.....	„	0. 05
Calomel.....	„	0. 20

En 12 papeles.

Un papel cada hora.

Tintura de iodo á las articulaciones dolorosas.

Dr. Bonifasio Carmona Querétaro.

Cocimiento de frutos de mezquite como agua de uso y fricciones con pomada de quina en las articulaciones.

Reumatismo articular agudo.

Dr. Benito Soriano F. México.

Cocimiento de tripa de Judas...	gram.	120. 00
Salicilato de sosa	„	4. 00
Tintura de colchico	„	4. 00

Ioduro de potasio	„	2. 00
Jarabe de opio	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora,

EN LA FORMA SUBAGUDA.

Cocimiento de tripa de Judas..	gram.	120. 00
Salicilato de sosa	„	2. 00
Tintura de colchico	„	4. 00
Ioduro de potasio	„	4. 00
Jarabe de opio	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Reumatismo crónico.

Dr. M. Mucél. México.

En la forma crónica, los baños del Peñón y el ioduro de potasio.

Dr. J. López Tello. Amecameca E. de México.

Jarabe de corteza de naranja

amarga..... gram. 60. 00

Ioduro de potasio

„ 2. 00

Cucharadas.

Una en la mañana.

Antipirina..... gram. 2. 00

En 4 cápsulas.

Una cápsula al acostarse.

Dr. L. Arroyo. San Angel D. F.

Baños repetidos con cocimiento de Chilillo, Polygonum hidropiper (Poligonaceas.)

Dr. Benito Soriano F.	México.
Cocimiento de tripa de Judas... grm.	120. 00
Ioduro de potasio	„ 4. 00
Tintura de colchico	„ 2. 00
Jarabe de opio	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Reumatismo muscular

Dr. Ciro M. Santelices.	Querétaro.
Pomada alcanforada	grm. 12. 00
Esencia de trementina	„ 12. 00
Tintura de mostaza	„ 12. 00
Amoniaco	„ 6. 00
Cloroformo	„ 6. 00

Una yema de huevo.

Fricciones.

Dos ó tres veces al día.

Dr. Rafael Zapien.	Tonalá Chiapas.
Ácido acético á 8°	grm. 30. 00
Bálsamo Opodeldoc	„ 30. 00
Láudano Sydenham	„ 4. 00

Friega.

En las partes dolorosas.

Reconocimiento oftalmoscópico.

Dr. Agustín Chacón	México.
Para hacerlo se usará	
Agua destilada	grm. 10. 00
Hermatropino hipobros- murado de 0.05 á.....	„ 0. 10

Colirio.

Su acción sobre el iris es muy pasajera.

Retención de orina.

Dr. José B. López.

Campeche.

POR ESPASMO DEL CUELLO.

Alcanfor gm. 0. 30

Extracto de beleño „ 0. 15

En 15 píldoras.

Una píldora cada hora.

Dr. Emilio Polo

Puebla.

POR ESPASMO DEL CUELLO Ó RELAJACIÓN
DEL CUERPO DE LA VEJIGA.

Tintura de gelcemiun 10 gotas.

Id. de acónito 10 gotas.

Agua gm. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Rinitis aguda.

Dr. Ramón Velasco.

Tequila.

MÉTODO ABORTIVO.

Salol gm. 1. 00

Clorato de potasa „ 1. 00

Alcanfor pulverizado „ 0. 50

Salicilato de cocaina „ 0. 30

Para insuflar.

MÉTODO CURATIVO: PERIODO AGUDO.

Vaselina líquida gm. 10. 00

Id. sólida „ 10. 00

Salicilato de cocaina „ 0. 25

Para sorbetorios.

PERIODO SUBAGUDO Y CRÓNICO.

Se agregará á la fórmula anterior biborato de sosa
12 centigramos ó más según el periodo de evolución.

Roseola.

Dr. Juan Villaseñor.

Morelia.

Agua de Goulad.....	gram.	60.	00
Alcohol alcanforado.....	,,	60.	00
Mentol.....	,,	1.	00

Uso externo.

Fricciones cada dos horas en los lugares afectados.

Ferrocitrato de quinina.....	gram,	1.	00
Extracto de beleño.....	,,	0.	05

En 10 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Si dos días después de tomar estas píldoras no hay mejoría, se usará de la antipirina teniendo cuidado de dar antes un purgante de sal de Seignette 30 gram.

Sarampión.

Dr. D. Molinar

Parral.

Infusión de borraja.....	gram.	120.	00
Acetato de amoniaco.....	<i>de 5 á 20 gotas</i>		
Jarabe de tolú.....	gram.	30.	00

Cucharaditas ó cucharadas.

Una cada hora.

Linimento amoniacal.....	gram,	50.	00
--------------------------	-------	-----	----

Fricción general.

EN LA COMBALENCENCIA.

Cocimiento de quina.....	gram.	120,	00
Extracto de quina de 0. 50 á..	gram.	4.	00
Jarabe de corteza de naranja..	,,	30.	00

Cucharaditas ó cucharadas.

Una cada hora.

Sarna.

Dr. Santos Medina Juchipila. E. de Zacatecas.

Vaselina blanca	gram.	30. 00
Ácido fénico alcoholizado	,,	1. 00
Iodoformo	,,	0. 50

Pomada.

Aplíquese dos veces al día sobre los lugares enfermos.

Dr. E. Gutiérrez Guadalupe. E. de Zacatecas.

Agua	gram.	300. 00
Ácido bórico	,,	6. 00
Agua de laurel cerezo	,,	30. 00

Lociones reiteradas.

Vaselina	gram.	40. 00
Salol	,,	1. 60
Ictiol	,,	4. 00

Pomada.

Coldcream	gram.	50. 00
Azufre	,,	8. 00
Clorato de potasa	,,	4. 00
Ácido salicílico	,,	1. 00

Pomada.

Unción después de las lociones teniendo cuidado de lavar y jabonar previamente.

Sicosis parasitaria.

Dr. E. Lier México.

Acido tánico	gram.	5. 00
Azufre	,,	10. 00

Acido salicílico.....	„	1, 00
Vaselina.....	„	80. 00

Ungüento.

Lociones de sublimado de mercurio 1. 00 para 100. 00 de alcohol.

Dr. Guillermo Parra.

Tacubaya D. F.

Hacer la epilación lo más pronto posible en todos los lugares afectados y cubrir la cara con una máscara de gutapercha humedecida interiormente con solución fenicada al tres por ciento.

Lavatorios tres veces al día con solución de bicloruro de mercurio al milésimo.

Sífiles.

Dr. Juan José R. de Arellano

México

Tanato de mercurio..... grm. 1. 00

Extracto de opio..... „ 0. 20

Para 20 píldoras.

Dos, tres ó cuatro píldoras diarias según la gravedad de las manifestaciones.

Rara vez producen estomatitis y trastornos gástricos.

Dr. Lázaro Ortega.

México.

ACCIDENTES SECUNDARIOS.

Alcohol..... grm, 500. 00

Ioduro de potasio..... „ 15. 00

Recina de Guayacan..... „ 30. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita tres veces al día en medio vaso de agua azucarada. Se aumenta una cucharadita ca-

da cinco días de modo que el décimo sexto se tomen dos cucharaditas tres veces al día.

Dr. Cárlos Amezcua,

Tehuacán.

EN EL 2º Y 3º PERIODO.

Jarabe de Zarzaparrilla.....	gram.	600.	00
Tartatro de potasa y fierro.....	„	25.	00
Tintura de Zazafrás.....	„	10.	00

Cucharaditas núm. 1.

Jarabe con menta.....	gram.	600.	00
Bicloruro de mercurio.....	„	0.	60
Ioduro de potasio.....	„	20.	00

Cucharaditas núm. 2.

Tomará el enfermo una cucharadita del núm. 1 al medio día y una cucharadita del núm. 2 en la tarde ó en la noche después del alimento. Continuará sin interrupción por 20 días. Suspenderá por 10 días para comenzar nuevamente y así en seguida hasta la curación. Buena higiene.

Dr. Agustín Chacón,

México.

SÍFILIS OCULAR.

Agua.....	gram.	100.	00
Ioduro de potasio.....	„	10.	00
Bi-ioduro de mercurio.....	„	0.	08
Clorhidrato de pilocarpina.....	„	0.	08
Jarabe de azahar.....	„	25.	00

Cucharaditas.

Una cucharadita al acostarse.

Dr. Desiderio G. Rosado Comalcalco. Tabasco.

SÍFILES CONSTITUCIONAL.

Bicromato de potasa.....	gram.	0. 10
Percloruro de fierro líquido.....	„	14. 00
Tintura de iodo.....	„	28. 00

Gotas.

De cinco á diez gotas cuatro veces al día en agua gomosa.

Dr. Federico Cota — La Paz Baja California.

DOLORES OSTEVERTOS.

Bálsamo de Fioraventi.....	gram.	60. 00
Cloroformo.....	„	6. 00
Alcohol alcanforado.....	„	30. 00
Láudano de Rousseau.....	„	4. 00
Mentol	„	1. 50

Uso externo.

Loco dolenti.

Dr. L. Castro.

México.

Segundo y tercer período.

Cocimiento de guayacán.....	gram.	150. 00
Ioduro de potasio.....	„	8. 00
Bicloruro de mercurio.....	„	0. 05
Elixir de javorandi.....	„	40. 00
Láudano de Sydenham.....	„	2. 00

Jarabe de goma ó de cinco raices c. b.

Cucharadas.

Se comienza por una cucharada sopera diaria, aumentándose progresivamente cada ocho días una cucharada, hasta llegar á cuatro, para suspender tan

luego como se manifieste la intolerancia por el mercurio ó el ioduro que contienen; procurando desde luego combatirla con el clorato de potasa *intus et extra*.

Aún en casos, en que no se tiene la evidencia de la sífilis, pero que haya sospechas aunque remotas, se obtienen curaciones verdaderamente sorprendentes.

Dr. Federico Cota. La Paz, Baja California.

Protoioduro de mercurio	gram. 0. 50
Extracto de genciana	„ 0. 80
Extracto tebaico	„ 0. 10

En 10 píldoras.

Comenzando por una diaria.

Agua destilada	gram. 300, 00
Ioduro de potasio	„ 10. 00
Tintura de corteza de naranja amarga	„ 20. 00
Tintura de beleño	„ 3, 00
Jarabe de zarzaparrilla c. b.	

Cucharadas.

Una cucharada diaria aumentando segun el caso

Dr. Constancio Mota. Puruándiro E. de Michoacán.

En todos los períodos y con especialidad en la sífilis visceral grave, así como en los casos, por esencia crónicos, en que el tratamiento específico no dá el resultado deseado, son de importantísima utilidad las inyecciones, de á un centígramo por inyección de bicloruro de mercurio disuelto en un gramo de glicerina por intermedio de la sal amoniaco; estas inyecciones hipodérmicas, se aplican en los glúteos cada tercer día.

Dr. E. Lier. México.

Tanato de mercurio.	gram.	2.	50
Extracto de opio	„	0.	50
„ „ genciana c. b.			

Para 50 píldoras.

Tres diarias (una después de las comidas.)

Inyecciones de			
Bicloruro de mercurio de 0. 20 á . .	gram.	0.	50
Cloruro de sodio	„	2.	00
Agua destilada	„	50.	00
Clorhidrato de cocaina	„	0.	50

Inyecciones.

Dr. C. M. Garza.—S. Pedro de las Colonias, Coahuila.

Jarabe de corteza de naranja

amarga	gram.	250.	00
Tintura de quina,	„	50.	00
Ioduro de potasio.	„	15.	00
Bi-ioduro de mercurio	„	0.	15
Arseniato de sosa.	„	0.	15
Agua para disolver el ioduro.	„	250.	00

Cucharadas.

Dos ó tres cucharadas en el día.

Dr. G. J. Chávez. Tasco.

Raíz de zarzaparrilla.	gram.	60.	00
„ „ guayacán.	„	16.	00
„ „ maguey meco	„	60.	00
Hojas de javorandi	„	1.	00

Hágase hervir en agua bastante para obtener grm. 500. 00 de cocimiento concentrado, cuélese con expresión y añádase

Extracto de acónito grm. 0. 05

Ioduro de potasio „ 2. 00

Para tomar en veinticuatro horas.

Protoioduro de mercurio grm. 1. 00

Extracto de raíz de maguey meco „ 1. 00

„ „ zarzaparrilla „ 1. 00

En 24 píldoras.

Una píldora por la mañana y otra por la noche, aumentando progresivamente hasta seis por día.

Dr. J. C. Villaseñor.

Morelia.

Sublimado grm. 1. 00

Extracto de guayacán „ 5. 00

„ tebaico „ 0. 25

En 100 píldoras

Dos píldoras diarias

Dr. D. Molinar.

Parral.

Agua destilada grm. 150. 00

Ioduro de potasio de 5. 00 á . . . „ 10. 00

Bi-ioduro de mercurio de 0. 05 á „ 0. 10

Cucharadas.

Tres cucharadas en el día.

ULCERACIONES DE LA FARINGE.

Dr. F. Valdéz.

Batopilas E. de Chihuahua.

Agua destilada grm. 50. 00

Solución alcoholizada de bicloru-

ro de mercurio al 1°/1000 „ 50. 00

Pulverizaciones.

Pulverizaciones con el atomizador de Richarson tres veces al día. Esta curación debe acompañarse del tratamiento general que el estado del individuo exija.

Dr. José M. Dávila.

Mazatlán.

ACCIDENTES SECUNDARIOS.

Protoioduro de mercurio.....	gram.	0. 30
Extracto de guayacán.....	„	1. 00
„ „ opio.....	„	0. 10

En 10 píldoras.

Una píldora diaria.

Dr. Juan C. Villaseñor.

Morelia.

Periodos secundario y terciario.

Bi-ioduro de mercurio.....	gram.	0. 40
Ioduro de potasio puro.....	„	0. 40
Polvo de altea.....	„	1. 00
Extracto de quina.....	„	1. 00
Bálsamo de tolú c. b. como mucilago.		

Para 23 píldoras.

De una á cuatro píldoras diarias

Otra.

Iodidrartrato de ioduro de potasio	gram.	1. 00
Iodo metálico.....	„	0. 50
Ioduro de sodio.....	„	20. 00
Jarabe de zarzaparrilla.....	„	480. 00

Cucharadas.

De dos á cuatro cucharadas diarias.

Soluciones desinfectantes.

Dr. Tobías Núñez.

México.

Para practicar la *anticepsia quirúrgica* contamos con un buen número de agentes terapéuticos. Los éxitos favorables que pueda obtener el práctico dependerán, no del número de anticépticos que pueda emplear, sino de la manera como los emplee según la poca ó mucha práctica que tenga de hacer la anticepsia.

Gerster con mucha razón dice: "que sería una maldad el emprender operaciones de cierta importancia, para aprender las primeras lecciones de la cirugía anticéptica, pues este aprendizaje se compraría con la vida del confiado paciente.

El emprender operaciones tales como la estirpación de un quiste del ovario, solo debería permitírseles á aquellas personas que han aprendido á curar las heridas recientes por primera intención, pues ésta es la única prueba de que poseen la habilidad necesaria para emprender tales operaciones." Los anticépticos más efectivos y sobre los que puede uno confiar son los siguientes:

Soluciones de ácido carbólico $2\frac{1}{2}$ al 3 y al 5 por ciento.

Soluciones de bicloruro de mercurio al uno por mil. A esta solución (si se conserva) se le debe añadir una cucharadita cafetera de sal común para evitar la separación del mercurio de la preparación.

En los casos en que se pueda producir un envenenamiento por el uso de las soluciones, por el ácido fé-nico ó por el mercurio, Thiersch recomienda el em-

pleo de la *solución borosalicilada* que él formula como sigue:

Agua caliente.....	gram.	1000.	00
Ácido salicílico.....	„	2.	00
Ácido bórico... ..	„	12.	00

Con esta solución se puede lavar impunemente el peritoneo, pues no es venenosa. Las heridas externas así como las vastas superficies de absorción que tengan que desinfectarse, como las cavidades pleurales en los empiemas, pueden lavarse con esta solución, cuyo empleo no presenta peligro alguno, obrando á la vez como un poderoso anticéptico.

La solución de creolina es quizá más conveniente que la solución de Thiersch. Esta es una solución de cloruro en agua en una proporción de medio á dos por ciento. Esta solución no es venenosa, no irrita la piel, ni ataca los instrumentos.

Podemos añadir á las soluciones anticépticas ya citadas, el agua hervida, sola ó con sal común disuelta en ella, el alcohol, el ácido acético ó á falta de él, el vinagre. Los primeros anticépticos son muy eficaces y puede uno confiar en ellos completamente; los últimos por estar al alcance del práctico en todas partes, tambien deben recomendarse, recurriendo á ellos cuando no se puedan obtener los primeros. El agua á la temperatura de la ebullición se emplea para obtener la acepsia de los instrumentos que se van á usar en las operaciones, se le puede añadir al agua una poca de sal común.

Las soluciones de ácido carbólico y las de bicloruro de mercurio, son las más usadas tanto por su acción anticéptica tan poderosa que hace se tenga confianza en ella, como porque las puede uno obtener en cualquiera parte.

Las soluciones de ácido carbólico aun muy deluido el ácido, son peligrosas en los niños y aun hay cirujanos que dicen: que nunca deben usarse en los niños de tierna edad. El sublimado corrosivo también es peligroso, puede causar la estomatitis, así como inflamaciones diftéricas del grueso intestino si se abusa de estas soluciones.

En el tratamiento de las heridas recientes, tales como las que practica el cirujano al hacer una operación, se debe dar la preferencia á las soluciones de bicloruro de mercurio, sobre las de ácido fénico, pues hay menos riesgo de envenenamiento cuando se tiene que lavar superficies extensas, á la vez que su poder anticéptico es muy grande aun empleado á la dosis de uno por mil. Además el bicloruro de mercurio tiene la gran ventaja sobre el ácido carbólico de que en heridas recientes, las lociones con el bicloruro de mercurio no hacen sangrar las heridas, ni éstas producen una secreción tan abundante como cuando son lavadas con la solución de ácido carbólico.

El ácido carbólico obra sobre los coágulos tiernos, disolviéndolos y por lo mismo las heridas sangran abundantemente al desprenderse los coágulos que tapan los orificios de los vasos sanguíneos divididos. Además el ácido fénico obra sobre los vasomotores excitándolos y dando lugar á una secreción más abun-

dante de la herida, lo que obliga á renovar con frecuencia las primeras curaciones, impidiendo que la herida tenga reposo que le es tan necesario para su curación.

El sublimado corrosivo no disuelve los coágulos recientes, por lo mismo no sangran las heridas después que se ha hecho la hemostasis espontánea; tampoco irrita los vasomotores, secretando muy poca cantidad de líquidos las heridas, lo que permite quitar pronto los tubos de canalización, ó no ponerlos desde un principio. Además, no habiendo sino muy poca secreción, las heridas se conservan limpias y por lo mismo se pueden dejar las curaciones por varios días, manteniéndolas por consiguiente en el reposo que les es tan necesario para activar el proceso cicatricial.

Soriacis.

Dr. E. Lier.

México.

Crisaobina	gram.	10. 00
Ácido salicílico	„	1. 00
Ictiol.....	„	5. 00
Vaselina	„	90. 00

Ungüento.

Sudores de los tísicos.

Dr. F. D. Maldonado

Aguascalientes.

El sulfato de esparteina á la dosis de 8 á 10 centigramos diarios, le ha dado mejores resultados que la atropina, agarico, tanino. etc.

Dr. Antonio J. Carbajal, México.

Sulfato de atropina grm. 0. 01

Extracto de orozúz c. b.

Para 60 píldoras.

Tres píldoras diarias.

Tabes dorsales.

Dr. C. Mota. Puruándiro E. de Michoacán.

Inyecciones hipodérmicas cotidianas de sulfato de estriknina, aumentando paulatinamente desde un milígramo hasta diez miligramos.

Tabes mesentérica.

Dr. S. Medina Juchipila. E. de Zacatecas.

Tintura de ruibarbo grm. 30. 00

Acetato de potasa líquido „ 8. 00

Vino estibiado „ 4. 00

Gotas.

De diez á 20 gotos por día.

Dr. Pedro Acosta Guadalajara.

Pomada de belladona grm. 30. 00

Aceite rojo de bacalao „ 30. 00

Ioduro de potasio „ 2 00

Tintura de iodo „ 10. 00

Friega.

Friccionar el vientre una vez al día con la octava parte de la pomada.

Hipofosfito de cal de 0. 50 á grm. 2. 00

Polvo de pelandris acuático

de 0. 50 á	„	2. 00
Carbonato de cal precipitado		
de 1. 00 á	„	2. 00

En 12 papeles.

Un papel cada dos horas.

Tenesmo.

Dr. D. Molinar.

Parral.

Polvo de ruibarbo	} de c. c.	gram. 1 00
Magnesia calcinada		
Canela en polvo		

Para 6 papeles.

Un papel cada dos horas.

Para los niños, en 15 papeles, uno cada dos horas.

Tómese en tres tomas con agua con una hora de intervalo.

Dieta de pan y leche la víspera de tomar la medicina.

Agua de coco	gram. 500. 00
Leche fresca	„ 250. 00

Una toma.

PARA NIÑOS.

Semillas de calabaza	gram. 60. 00
Polvo de Jalapa	„ 15. 00
Azúcar blanca	„ 60. 00

Hágase una emulsión.

Dos tomas con media hora de intervalo.

Dr. G. J. Chávez Tasco.

Extracto de kuzo grm. 1. 00

Id. etéreo de helecho macho. „ 1. 00

Goma c. b.

En 24 píldoras.

De dos á ocho píldoras por día.

Extracto de ruibarbo	}	de c. c. . . . grm. 1. 00
Musgo de Çórcega		
Aloes		

Jarabe de ajenjo c. b.

Para 36 píldoras.

De cuatro á seis píldoras por día.

Dr. Z. Páramo Rangél México.

Cloroformo grm. 4. 00

Emulsión de aceite de ricino „ 50. 00

Tres tomas

Una á las 7 de la mañana, á las 9 y á las 11 a. m.

Tenia.

Dr. J. L. Vallejo México.

Extracto etéreo de helecho

macho grm. 0. 20

Polvos de raiz de granado „ 0. 10

Escamonea „ 0. 25

En 11 cápsulas.

Tomar esta dosis tres días consecutivos.

Dr. Francisco Fernández.—Medellín E. de Veracruz.

Corteza de raiz de granado . . . grm. 125. 00

Raiz de Jalapa „ 30. 00

Agua „ 1,000. 00
 Hágase hervir hasta reducirlo á grm. 500. 00
 En la tarde purgante con grm. 40. 00 de aceite de ricino ingles.

Dr. Ciro M. Santelices. Querétaro.

Infusión de menta grm. 120. 00

Extracto etéreo de helecho

macho „ 6. 00

Goma arábica „ 4. 00

Jarabe de éter „ 30. 00

Una toma.

Dr. Alberto B. Orduña Tehuacan.

Extracto etéreo de helecho

macho grm. 5. 00

Kouseina „ 0. 30

Una toma.

A continuación un té aromático y 90 minutos después un purgante de aceite de ricino ó de aguardiente alemán. En 23 casos, solamente ha fallado una vez.

Dr. Demetrio Molinar Parral.

Corteza fresca de raiz de

granada grm. 120. 00

Agua simple „ 500. 00

Maceración por 24 horas, despues reducción por el calor á 400.

Divídase en tres partes y tómesese una parte cada media hora en ayunas y media hora después de la última un purgante de aceite de ricino. En 482 casos ha fallado en 2 solamente

Tensión ocular.

Dr. Fernando López

México.

PARA DISMINUIR LA TENSION OCULAR.

Agua destilada	gram.	10.	00
Clorhidrato de pilocarpina	„	0.	10
Id. de hidrastina	„	0.	02

*Gotas para los ojos.***Terrores nocturnos.**

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.

Tehuacán.

EN LOS NIÑOS.

Bromuro de sodio	gram.	2.	00
Id. de potasio	„	1.	00
Jarabe de cloral de Follet	„	10.	00
Agua de nafé	„	90.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada cuatro horas.

Tétanos.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre.

Tehuacán.

EN LOS NIÑOS.

Agua destilada	gram.	90.	00
Tintura de cannabis índico	„	6.	00
Sulfato de atropina	„	0.	001
Jarabe simple	„	10.	00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Dr. Enedino V. Gómez

Guadalupe de los Reyes.

Sinaloa.

EN LOS RECIEN NACIDOS.

En la ciudad donde ejerce, la mitad de los recién na-

cidos son atacados de tétanos y mueren un 75 por ciento de los atacados.

Leche.....	gram.	30.	00
Agua.....	„	10.	00
Cloral hidratado.....	„	0.	40
Azúcar.....	c. b.		

Cucharaditas.

Una cucharadita cada 15 minutos hasta conseguir el sueño.

Agua de azahar.....	gram.	30.	00
Bromuro de potasio.....	„	0.	50
Jarabe de éter.....	„	10.	00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada 15 minutos despues de despertado el niño.

Siempre que el trismus no es muy fuerte y el niño puede pasar las medicinas, estas cucharaditas han dado buen resultado.

Sifitis.

EN LOS NIÑOS.

Dr. R. N. Prado	México.
Calomel al vapor.....	gram. 0. 50
Polvos de ipeca.....	„ 0, 30

Un papel

Esta dosis puede variarse según la edad de los niños.

Tifo exantemático.

Dr. Constancio Mota Puruándiro. E. de Michoacán

Hace una solución de cuatro á seis gramos de ácido salicílico en alcohol, y da una cucharada cada hora de ésta solución en un vaso de naranjate. Admi.

nistra al mismo tiempo un baño tibio general cada cuatro horas.

El mismo tratamiento le ha dado magníficos resultados en toda clase de fiebres continuas y pseudo-continuas.

Dr. José Terrés.

México.

En el tifo es siempre útil sostener la temperatura en cifras poco elevadas.

La antipirina calma la cefalalgia, abate la temperatura y es un anticéptico; pero si se dá en dósis altas en esta enfermedad, se provocan sudores copiosos que debilitan al paciente, y, una de dos; ó se sube mucho la dósis cuotidiana ó se obtienen abatimientos marcados pero debilitantes y pasajeros; lo primero es perjudicial provablemente, y se ha dicho que dósis fuertes de antipirina en las fiebres esenciales, dificultan la eliminación de las toxinas por la orina. La experiencia me ha hecho aceptar el tratamiento siguiente para los tifoedeos:

1º. Se colocan en una pieza bastante amplia, que no contenga más muebles que la cama del enfermo, una mesita y una silla.

2º. Se procurará la renovación constante del aire de la pieza, con aire puro y se riega en ella de cuando en cuando, un poco de ácido fénico disuelto en alcohol *sin agua*.

3º. Se alimenta al enfermo según el estado de sus vias digestivas, con leche, huevos, aún carnes si es posible.

4.º Se vigila que evacue todos los días el vientre, poniéndole una lavativa cuando no lo haga y dándole al día siguiente un purgante de aceite de ricino, si la lavativa no produce resultado.

5.º En todo caso se le dan tónicos; uso casi siempre las fórmulas siguientes:

Agua ó vino de quina.....	gram.	100.	00
Cafeina de 1. 00 á.....	„	1.	50
Salicilato de sosa de 2. 00 á...	„	3.	00
Jarabe simple.....		c.	b.

Cucharadas.

Para tomar una cucharada, cada hora, cada dos ó tres, según el caso.

Agua destilada.....	gram.	10.	00
Sulfato de estriocnina.....	„	0.	05

Inyecciones.

Para inyectar uno ó dos gramos al día.

6.º Como agua de uso, toma el enfermo una mezcla de

Agua.....	gram.	500.	00
Cognac.....	„	20.	00
Clorato de potasa.....	„	1.	00
Jarabe.....		c.	b.

Bebida.

7.º Cada hora ó cada hora y media se toma la temperatura y si el termómetro marca más de 39,º5. se le dan gram. 0. 20 ó 0. 25 de antipirina disueltos en agua.

8.º Si el enfermo puede tomar las obleas de naftól. de Froutle. le doy cada dos ó tres días una oblea cada dos horas.

El salol no me ha prestado servicios en el tifo.

Dr. F. Abrego

México.

Empieza por administrar un purgante de aceite de ricino grm. 30. 00 y esencia de trementina grm. 1. 00 y las cucharadas siguientes:

Infusión débil de quina	grm. 200. 00
Cognac	„ 40. 00
Salicilato de sosa	„ 3. 00
Antipirina	„ 1. 00
Tintura de canela y acetato de amoníaco de c. c.	„ 4. 00
Jarabe de cloral	„ 40. 00

Cucharadas.

Si el delirio es marcado, agrega á todo esto un gramo de ergotina de Bonjeán.

Si hay tendencia á la postración, un gramo de tintura de nuez vómica.

La medicina debe terminarse en las veinticuatro horas.

Como bebida á pasto limonada clorhídrica.

Gomo régimen, leche y caldo

Si hay hipertemia, lociones de vinagre aromático, con agua.

Nunca ha visto temperaturas alarmantes usando la poción anterior.

Para mantener el vientre libre y á la vez para bajar la temperatura, lavativas de agua fria de gramos 500. 00 cada una. [1]

(1) El Dr. Abrego ha estado encargado por algún tiempo de los tifoideos de Churubusco y su opinión está basada en una larga experiencia.

Dr. M. Mucél.

México.

PARA CALMAR LA CEFALALGIA, USA LA ANTICAMNIA.

Lavativas evacuantes siempre que haya tendencia á la constipación.

Agua	gram.	60.	00
Buen cognac	„	80.	00
Extracto de quina	„	1.	00
Jarabe de corteza de naranja	„	40.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Antonio Carreón Chalchicomula, E. de Puebla.

POCIÓN ALCOHÓLICA PARA LOS TIFOEDEOS

Infusión de canela	gram.	120.	00
Cognac	„	30.	00
Jarabe de naranja	„	20.	00

Cucharadas.

Dr. G. Senisson

México.

Cocimiento de quina roja y

Cognac de c. c.	gram.	60.	00
Extracto de quina	„	4.	00
Acetato de amoniaco	„	6.	00
Tintura de acónito	„	1.	00
Id. „ canela	„	12.	00
Antipirina	„	1.	00
Jarabe de corteza de naranja	„	40.	00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Se puede añadir á ésta fórmula, bromuro de potasio ó tintura de nuez vómica según el caso lo exija.

Dr. Manuel de Anaya

Guanajuato.

COMO PROFILÁCTICO.

Extracto de cuasia amara	gram.	1. 00
Alcanfor pulverizado	,,	0. 20
Arseniato de estriqnina	,,	0. 02

En 20 píldoras.

Una píldora diaria antes de comer.

COMO MEDIO CURATIVO.

Agua	gram.	120. 00
Jarabe de zarzaparrilla	,,	20. 00
Clorato de potasa	,,	3. 00

Tres tomas.

Una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche desde el principio del 2.º periodo.

Dr. Luis L. Cordero

San Luis Potosí.

Infusión de té verde	gram.	125. 00
Extracto blando de quina	,,	3. 00
Cognac	,,	45. 00
Jarabe de naranjá	,,	45. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Vinagre aromático	gram.	200. 00
Ácido carbólico	,,	4. 00

Luciones.

Café con leche.—Agua vinosa.—Las lociones desde que la temperatura marca 39.

Si hay constipación lavativas de tianguis y si hay diarrea lavativas con salol.

Dr. Ciro M Santelices. Querétaro

Agua.....	gram.	1000.	00
Acido láctico.....	"	0.	50
Jarabe de grosella.....	"	150.	00

Bebida á pasto.

Dr. Manuel Gutiérrez Zavala México.

Buena alimentación en relación á la constitución y costumbres del enfermo.

Ventilación y aseo lo más perfecto posible.

Dos veces por día inyección subcutánea de una jeringa que contenga en solución de dos y medio á cinco miligramos de estriknina.

Infusión de quina.....	gram.	100.	00
Cognac de 30 á.....	"	60.	00
Tintura de canela.....	"	5.	00
Acetato de amoniaco.....	"	5.	00
Jarabe de corteza de naranja	c. b.		

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Si hay resequedad de las fauces añadir á la poción Sal de Bertholet.

Si hay fenómenos atáxicos los bromuros.

Si hay atascamiento pulmonar la solución de Ivon.

Tiña favas.

Dr. E. Lier México.

Ioduro puro.....	gram.	1.	00
Colodión.....	"	30.	00

Uso externo

Dr. Rafael Zapién.

Tonalá Chiapas.

Untar glicerina en la cabeza, lavarla bien con jabón, y empaparla con peróxido de hidrógeno.

TIÑA TONSURANTE Y DECALVANTE.

Dr. Federico Cota

La Paz Baja California

Agua destilada..... grm. 500. 00

Permanganato de potasa..... „ 10. 00

Lociones.

Si nó cede se empleará la fórmula siguiente:

Vaselina..... grm. 20. 00

Precipitado rojo..... „ 1. 50

Azufre sublimado..... „ 4. 00

Pomada.

Aplicarla á los lugares enfermos.

Tráqueo bronquitis crónica.

Dr. Miguel Cordero

Méxi co.

Aceite de hígado de bacalao

moreno..... grm. 200. 00

Polvo fino de iodoformo..... „ 0. 10

Cucharadas.

Una cucharada diaria con un alimento; en combinación con los baños frios y la aplicación de tintura de iodo en las diversas regiones del tórax.

Tós.

Dr. Alberto B. Orduña

Tehuacán.

AUN CUANDO SEA SINTOMÁTICA DE UN PADECIMIENTO

AGUDO Ó CRÓNICO DEL PULMÓN.

Polvos de Dower..... grm. 1. 00

Bálsamo de tolú	„	1. 00
Codeina	„	0. 10

En 10 píldoras.

Una píldora cada hora.

Tos ferina.

Dr. E. Gutierrez Guadalupe E. de Zacatecas.

Jarabe balsámico	gram.	60. 00
Id. de ipeca	„	20. 00
Id. „ sabia de pino	„	20. 00
Bromuro de amonio de 1. 00 á	„	2. 00
Extracto de belladona de 0. 01 á	„	0. 02

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Agua destilada	gram.	80. 00
Antipirina de 0. 50 á	„	1. 00
Jarabe de éter	„	20. 00
Bromoformo de X á	XV gotas.	

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Gránulos de Chanteaud de sulfuro de calcio de seis á ocho por día y gránulos de helenina de cuatro á seis por día, y en la noche gránulos de Sal de Gregory de dos á cuatro por día.

Vomitivos frecuentes, inhalaciones balsámicas. Alimentación reparadora; nieve al interior, baños frecuentes frios. Cambio de clima de rigor en los casos graves.

Dr. M. Mucél.

México.

Fumigaciones de ácido sulfuroso en la pieza que debe ocupar el enfermo, dejando en ella las ropas que usa.

Después de ventilada colocar en ella al enfermo.

Flor de azufre grm. 2. 00

Polvo de ojas de belladona

de 0. 01 á ; 0. 05

Id. de flor de yoloxochitl „ 0. 30

Para 15 papeles.

Un papel cada dos horas en un jarabe adecuado.
Cambio de temperamento.

Dr. C. M Garza

San Pedro de las Colonias E. de
Coahuila.

Infusión de polígala grm. 100. 00

Bromuro de sodio „ 4. 00

Benzoato de sosa „ 2. 00

Agua destilada de laurel cerezo „ 8. 00

Jarabe de tolú „ 30. 00

Id. de belladona „ 30. 00

Elixir paregórico „ 2. 00

Cucharadas.

Cucharadas, tres ó cuatro en el día.

En los niños chicos cucharadita.

Dr. P. Peña

Zamora. E. de Michoacán.

Clorhidrato de pilocarpina grm. 0. 25

Cognac „ 10. 00

Jarabe de corteza de naranja „ 30. 00

Agua destilada de tilia „ 60. 00

Cucharaditas.

Consumirlas en veinticuatro horas, dando una después de cada acceso.

Dr. Ranulfo B. Izaguirre Tehuacán.

Bromhidrato de quinina.....	gram.	1. 00
Agua destilada.....	„	60. 00
Jarabe simple.....	„	60. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada dos horas.

Bisulfato de quinina.....	gram.	1. 00
Agua destilada.....	„	100. 00

Toques.

Tocar varias veces al día la mucosa laringea y faringea.

Extracto de corteza de castaña.	gram.	0. 50
Agua destilada.....	„	50. 00
Jarabe balsámico.....	„	50. 00

Cucharaditas.

Una cucharadita cada dos horas.

Dr. Lázaro Ortega México.

Agua hirviendo.....	gram.	120. 00
Cochinilla en polvo.....	„	4. 00
Cuélese y añádase		
Bromuro de potasio.....	„	2. 00
Jarabe de éter.....	„	30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora, chica, mediana ó grande según la edad.

Dr. Benjamín Rosano Mineral del Monte.
 Lamedor blanco..... grm. 60. 00
 Bromoformo..... 5 gotas
 Tintura de belladona..... 10 gotas.
 Id. de drocera..... 4 gotas.
 Jarabe de tolú..... grm. 10. 00
Cucharaditas.

Una cucharadita cada dos horas.

Dr. Benjamín Treviño San Miguel Allende.
 Usa con buen resultado el sulfuro de calcio *recientemente preparado* y las curaciones son tanto más rápidas cuanto más pronto se instituye el tratamiento.
 La dosis es de 10 á 25 y hasta 50 centígramos por día.

D. Miguel Cordero México.
 Salicilato de bismuto..... grm. 4. 00
 Salicilato de quinina..... „ 1. 00
En 20 papeles para insuflaciones.

Un papel cada cuatro horas con un insuflador de bolo por las aberturas de la nariz.

Dr. D. Molinar Parral.
 Jarabe de Desessart..... grm. 120. 00
Cucharaditas.

Una cucharadita cada dos horas.

Tos ferina.

Dr. Federico Cota La Paz Baja California.
 Cree que hay alguna relación causal entre la aparición de la enfermedad que ataca á los perros y que

Tuberculosis.

Dr. Mucio Maycot. México.

Agua ó vino tónico del Dr.

Maycot.....	gram.	120.	00
Extracto fluido de nogal.....	,,	10.	00
Hipofosfito de sosa.....	,,	4.	00
Guayacol.....	,,	1.	00
Glicerina.....	,,	15.	00

Cucharadas.

De tres á cuatro cucharadas diarias.

Dr. A. Carreón. San Andrés Chalchicomula E. de
Puebla.

Iodoformo en gránulos de un centígramo, de uno á diez unidos al vino de Viviene.

Ha obtenido muy buenos resultados.

Dr. M. Mucél. México.

Emplea las inyecciones hipodérmicas de Guayacol y Eucaliptol, siguiendo el método de Roussel.

Si el mal se localiza en la laringe, agrega pulverizaciones de las soluciones siguientes:

Benzoato de sosa al 5%

Creosota disuelta en alcohol 5 ‰

Acido fénico al 1%

Alternando una ú otra de éstas soluciones según el estado de las ulceraciones laringéas.

En los enfermos agotados y en todo estado que pueda calificarse la estromosa, usa la Emulsión de Scott.

Dr. C. Mota, Puruándiro E. de Michoacán.

Uno á cinco centígramos de creosota, con un gramo de eucaliptina para una inyección hipodérmica, en la espalda todos los días.

Dr. José M. Bandera, México.

Iodoformo,	gram.	0. 20
Codeina,	,,	0. 10
Bálsamo de tolú,	,,	2. 00

En 20 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dr. D. Molinar, Parral.

Eucaliptol inyectable de Roussel, una jeringa diaria.

Dr. F. Blazquez, México.

Inyección subcutánea de Guayacol con iodoformo según la forma del Dr. Pignol aplicada en las regiones supraespinosa; comenzando por un gramo cada tercer día y aumentando medio gramo cada tres inyecciones, hasta llegar á tres ó cuatro gramos según la suceptibilidad del enfermo.

Dr. J. López Tello, Amecameca. E. de México.

Aceite de olivo esterilizado,	gram.	8. 00
Creosota de 0. 50 á,	,,	0. 80

Inyecciones.

Una inyección hipodérmica cada tercer día.

Dr. Estevan Calderón. México.

Ejerciendo en Oaxaca, ha tenido ocasión de usar con buen éxito el tratamiento siguiente:

Cápsulas de bálsamo de copaiba hasta producir la saturación, hasta que la orina y el sudor del enfermo presenten el olor del bálsamo. Absteniéndose cuando produzca un efecto purgante. La dosis es de tres á seis cápsulas diarias.

Vegigatorios en la región torásica y en la parte interna de los brazos.

Bebidas pectorales.—Alimentación suficiente con leche y caldos nutritivos.

Ha observado casos en que la consunción había hecho grandes progresos y que se han podido dominar por este método.

La duración del tratamiento ha sido de 40 á 45 días.

Dr. Luis R. Ruiz. Texcoco.

Emulsión de Scott, una cucharada tres veces al día.

Úlceras.

Dr. Eduardo Lamicq. México.

ÚLCERAS VARICOSAS DE LAS PIERNAS

Ergotina al interior y al exterior en pomada.

Dr. Manuel Uribe. México

ÚLCERAS REBELDES DE LAS PIERNAS.

Sulfato ó acetato de cobre... grm. 0. 12

Vaselina neutra... „ 25. 00

Pomada. (Dr. J. Vértiz.)

Esta fórmula se aplica con éxito á las ulceraciones en general y aún á las epitilomas ulceradas.

Dr. Manuel de Anaya Guanajuato

Agua destilada fenicada al 1% ..	gram.	64. 00
Alcohol alcanforado	„	30. 00
Tintura de iodo	„	30. 00
Id. „ árnica	„	30. 00

Lavatorio.

Esta fórmula se puede emplear para curar heridas, úlceras, etc., etc.

En seguida se aplicará la fórmula siguiente:

Cerato alcanforado	gram.	32. 00
Trementina blanca	„	20. 00
Tanino	„	3. 00

Pomada.

Dr. Emilio Polo Puebla.

ÚLCERAS CANCEROSAS.

El hidrastis como tópico, y al interior hidrastina en gránulos de un milígramo tres en el día.

Dr. Manuel S. Soriano. México.

Alcohol común	gram.	30. 00
Ácido fénico	„	1. 00
Tintura de iodo	„	2. 00

Tópico.

Ulceraciones simples,

Ó SIFILÍTICAS, VALVULARES Y VAGINALES.

Dr. J. Collantes y Buenrostro. México.

Vaselina neutra	gram.	30. 00
Aristol	„	1. 00

Pomada.

ÚLCERAS VARICOSAS.

Dr. Federico Cota. La Paz. Baja California.

ÚLCERAS VARICOSAS DE LAS PIERNAS.

Manteca de cacao.....	gram.	15. 00
Glicerina.....	,,	10. 00
Vaselina.....	,,	10. 00
Acetato de cobre.....	,,	3. 00

Pomada.

Hacer la curación con la pomada, é inmovilizar el miembro enfermo.

ÚLCERACIONES HIPITILIOMATOSAS.

Dr. Federico Cota. La Paz Baja California.

En la comisura de los labios en la nariz y en los párpados en los viejos. Cauterizaciones con lápiz de sulfato de cobre.

Úlceraciones del cuello de la matriz.

Dr. J. C. y Buenrostro. México

Aristol.....	gram.	1. 00
Manteca de cacao c. b.		

Para 10 pastillas iguales.

Aplicar una diaria á la hora de acostarse.

Dr. José M. Benítes. Guadalajara.

Aristol de 3. 00 á.....	gram.	6. 00
Grenetina.....	} de c. c. cantidad suficiente.	
Glicerina.....		
Agua.....		

Para 6 pastillas.

Una pastilla en la noche poniéndola en contacto con el cuello de la matriz.

Se puede sustituir el aristol por iodoformo ó calomel á la dosis de un gramo por pastilla.

Uña encarnada.

Dr. L. Gómez V. Tenango E. de México

Cuando no ha habido solución de continuidad.

Agua..... grm. 500. 00

Semillas de estafiragua..... „ 5. 00


Para hacer un cocimiento hasta reducirlo á grm. 400. 00

Cucharadas.

Tomar una cucharada en la mañana y otra en la noche.

Dr. Guillermo R. Servín. Triunfo Baja California

Después de hacer la anestesia local con la cocaina, con el éter ó con el bromuro de etila que es el mejor; se introduce la rama planoconvexa de las tijeras del Dr. Servín, entre la uña y la piel, y se corta la uña por el medio. Los fragmentos se quitan con las pinzas tomándolas por el lugar donde se hizo el corte. La curaciór se hace como en toda herida.



Tijeras del Dr. Guillermo R. Servín para la operación de la uña encarnada.

Uretrotomía.

Dr. J. C. Villaseñor.

Morelia.

Para anestesiar la uretra en la uretrotomía interna,

Cloroformo puro de Adrian.....	gram.	8. 00
Éter sulfúrico puro.....	„	8. 00
Antipirina de Knoro.....	„	2. 00
Aceite de almendras.....	„	10. 00
Agua destilada.....	„	30. 00
Emulsiones con goma.		

Uso indicado.

Una inyección uretral que debe permanecer en el caño de la uretra por tres ó cuatro minutos. Si no basta se repite dos ó tres veces de cinco en cinco minutos.

La anestesia que esta inyección produce, es completa y el autor ha podido operar en diez casos, en que la ha empleado, sin que el enfermo tenga el menor dolor.

Urticaria.

Dr. Juan C. Villaseñor.

Morelia.

Agua de Goulard.....	gram.	60. 00
Alcohol alcanforado.....	„	60. 00
Mentol.....	„	1. 30

Uso externo.

Fricciones sobre las placas de urticaria cada dos horas.

Ferrocitrato de quinina.....	gram.	1. 00
Extracto de beleño.....	„	0. 05

En 10 píldoras.

Una píldora cada dos horas.

Dos días después si no hay mejoría se usará la antipirina, dando antes un purgante de sal de Seignette 30 gramos.

Vacuna.

Dr. Federico Cota. La Paz Baja California.

Usa dos lancetas; con una toma la linfa y la coloca en la superficie de la piel en el lugar que debe hacerse el piquete, después con la otra lanceta hace varias picaduras en dirección perpendicular como si se practicara el *tatuage*.

De esta manera la vacunación es más segura, pues á la mayor parte de los vacunados les prende y no como pasa con la implantación oblicua de la linfa por procedimiento común.

Vaginitis.

Dr. Alberto Aizpuru. México.

Glicerina.....	gram.	100. 00
Ungüento napolitano.....	,,	1. 00
Iodol.....	,,	3. 00

Uso externo.

Para untar tapones de algodón hidrófilo que se ponen en la vagina.

Vaginitis aguda.

Dr. M. Mucél. México.

Inyecciones de ácido tánico al 4°/100.

Curación local con polvo del mismo ácido y tapón de algodón hidrófilo.

Pasado el periodo agudo, curación local con nitrato de plata.

Agua destilada.....	gram.	50.	00
Nitrato de plata cristalizado....	„	0.	50

Toques.

PARA EL DOLOR Ó PRURITO.

Glicerina.....	gram.	20.	00
Clorhidrato de cocaina.....	„	0.	20
Ácido bórico.....	„	1.	00

Toques.

En la forma crónica como modificador local el ictiol é inyecciones con sulfato de alumina y potasa.

Si el escurrimiento es muy abundante, polvos secantes y astringentes.

Dr. F. Blazquez.

México.

Tapón de algodón cada cuatro días embebido de ictiosulfato de amoniaco.

Dr. J. M. Benítez.

Guadalajara.

Aristol de 3 á.....	gram.	6.	00
---------------------	-------	----	----

Grenetina.....	} de c, c. cantidad suficiente.
Glicerina.....	
Agua.....	

Para 6 pastillas.

Una todas las noches en la vagina.

Se puede sustituir el aristol con el calomel ó con el iodoformo á la misma dosis.

Vaginismo.

Dr. J. Mejía

México.

Cree con Larvson Fail que no existe y que los dolores y la imposibilidad de las relaciones sexuales son debidas á algunas grietas, fisura ó solución de continuidad que es preciso curar. Aconseja usar de la len-

te si es necesario y con una sonda delgada de Hégar, tocar punto por punto; la enferma acusará el dolor al tocar el lugar enfermo. Emplea para su tratamiento; lavatorios de ácido bórico al 4°/o y toques con ácido fénico en solución concentrada, lavando inmediatamente y poniendo luego glicerolado de almidón con tanino, preparándolo de la manera siguiente:

Glicerina pura	gram.	40.	00
Almidón	„	8.	00
Tanino	„	4.	00

Póngase al fuego y agítese constantemente hasta que se haga como *engrudo*.

Glicerolado de almidón con tanino. •

Vegetaciones.

DE ORIGEN VENEREO.

Dr. P. Peña

Zamora, E. de Michoacán

Agua destilada	gram.	20.	00
Glicerina	„	20.	00
Agua de laurel cerezo	„	20.	00

Uso externo.

Se hace un lavatorio tres veces al día y se deja constantemente un lienzo mojado en la misma solución, sobre las vegetaciones. Este tratamiento en las pequeñas vegetaciones que es donde se ha experimentado y siempre ha dado buenos resultados.

Dr. Federico Cota.

La Paz, Baja California.

Papaina	gram.	2.	00
Glicerina neutra	„	10.	00

Alcohol alcanforado	„	5. 00
Ácido fénico	„	3. 00

Toques.

Tocar con un pincel las vegetaciones.

Viruelas.

Dr. E. Herrera Moreno. Córdoba E. de Veracruz.

Para evitar las cicatrices en la cara, usa un lavatorio de sublimado al 1 para 2,000 y cubre la cara con cauchou laminado untado con la siguiente pomada.

Vaselina blanca	gram.	25. 00
Óxido de zinc de 5. 00 á	„	10. 00
Iodoformo	„	2. 00

Pomada.

Dr. Luis R. Ruiz Texcoco. E. de México.

Linfa vacunal en su forma original, una gota en una onza de agua pura para tomar una cucharadita por tres días como preservativo y como remedio curativo una cada dos horas.

Dr. Ernesto Chávez Córdoba.

EN EL PERIODO CURATIVO.

Vaselina	gram.	30. 00
Calomel	„	3. 00
Ácido bórico	„	5. 00

Pomada.

Dr. Luis L. Cordero San Luis Potosí.

Agua	gram.	60. 00
Ácido crisofánico	„	0. 25

Toques.

Tocar con un pincel las vecículas.

Ungüento doble	gram.	15. 00
Esencia de trementina	„	15. 00

Pomada.

Poner la pomada sobre las pústulas.

Régimen lácteo.

Baños en el periodo de supuración.

Vómitos incoercibles.

Dr. C. Mota. Puruándiro E. de Michoacán.

Un gránulo todos los días de atropina al milígramo.

Mentol	gram.	1. 00
Alcohol	„	8. 00
Agua destilada	„	15. 00
Jarabe simple	„	30. 00
Tintura de iodo	III.	gotas

Cucharadas.

Para tomar una cucharada cada vez que haya vómito, muy particularmente en los de las mujeres embarazadas.

Dr. Lorenzo Cantú. C. Porfirio Diaz E. de Coahuila.

Antipirina	gram.	0. 60
Cocaina	„	0. 03

Para 3 papeles.

Un papel cada hora.

Dr. P. Peña Zamora, E. de Michoacán.

Agua destilada de tilia	gram.	70. 00
Alcoholado de menta	„	5. 00

Jarabe de canela	„	15. 00
Clorhidrato de cocaína	„	0. 10

Cucharaditas.

Una cucharadita cada hora.

Dr. Octaviano León Navarro.	Tangantzicuaró.
Tintura de nuez vómica	gram. 1. 00
Leche fresca	„ 120. 00

Cucharadas.

Cuatro cucharadas la 1.^a hora, tres la 2.^a, dos la 3.^a y en seguida una cada hora.

Dr. Emilio Polo	Puebla.
-----------------	---------

VÓMITOS PETUITOSOS EN LOS ALCOHÓLICOS.

Tintura de ipecacuana	6 gotas.
Agua	gram. 120. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.

Gránulos de sulfato de estriquina de un milígramo, tres en el día.

Dr. Francisco de P. Crespo	Huamantla.
----------------------------	------------

VÓMITOS NERVIOSOS.

La poción antiemética de Rivier añadiendo á la solución alcalina, dos gramos de bromuro de potasio.

Otra,

Solución de goma arábica	gram. 150. 00
Subnitrato de bismuto	„ 4. 00
Bromuro de potasio	„ 2. 00
Jarabe de morfina	„ 30. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada dos horas.

Dr. Ciro M. Santelices.	Querétaro.
Poción de Rivier	100. 00
Bromuro de potasio	2. 00
Cocaina	0. 10
Cognac	30. 00
Jarabe de éter	20. 00

Cucharadas.

Una cucharada cada media hora ó cada hora.

Dr. Ricardo Egea y Galindo.	México.
Poción de Rivier hecha con jugo de limón y no con ácido cítrico	200. 00
Clorhidrato de narceina	0. 10
Jarabe de limón c. b.	

Ponerla en Sifón y dar dos cucharadas grandes cada hora.

Dr. Páramo Rangél	México.
Cocimiento de crameria	120. 00
Salicilato de bismuto	4. 00
Extracto de monesia	0. 60
Jarabe de crameria c. b.	

Cucharadas.

Una cucharada cada hora.









