

Praxeos medicae universae praecepta. 1826-43 / auct. Iosepho Frank.

Contributors

Frank, Joseph, 1771-1842.
Royal College of Physicians of London

Publication/Creation

Lipsiae : Kuehn, 1826-1843.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/wzusgzrv>

Provider

Royal College of Physicians


License and attribution

This material has been provided by Royal College of Physicians, London. The original may be consulted at Royal College of Physicians, London.
This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



61 D2/69-b-12

61





✓ 73

i-1

ST. JOHN'S MEDICAL

INSTITUTION

ST. JOHN'S HALL

ST. JOHN'S HALL

ST. JOHN'S HALL

ST. JOHN'S HALL



Digitized by the Internet Archive
in 2016

PRAEIOS MEDICAE VNIVERSAE PRAECEPTA

AVCTORE

IOSEPHO FRANK

IOANNIS PETRI FILIO, AVGVSTISSIMO IMPERATORI ET TOTIVS
ROSSIAE AVTOCRATORI A CONSILIIIS STATVS, EQVITE ORDINIS
ST. ANNAE, ST. WLODIMIRI, THERAPIAE SPECIALIS ET CLI-
NICES IN CAESAREA VNIVERSITATE VILNENSI PROFESSORE
EMERITO, PLVRIMARVM ACADEMIARVM ET SOCIETATVM
MEDICARVM SODALI.

PARTIS PRIMAE

EDITIO ALTERA DENV0 ELABORATA.

VOLVMINIS PRIMI SECTIO PRIMA,

CONTINENS

CONSPECTVM HISTORIAE ET LITERATVRAE MEDI-
CINAE PRACTICAE, INTRODVCTIONEM AD STVDIVM
CLINICVM ET DOCTRINAM FEBRIVM INTERMITTEN-
TIVM.

L I P S I A E

SVMP TIBVS BIBLIOPOLII KUEHNIANI
C1010CCCXXVI.

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS LIBRARY	
CLASS	61
ACCN.	14088
SOURCE	
DATE	

ROYAL COLLEGE
OF
PHYSICIANS
OF
LONDON

PRAEFATIO.

Inter innumerabilia prorsus beneficia, quibus ALEXANDER PRIMUS, gloriosissimae et sempiternae memoriae, populos Rossiae cumulavit, eorumque felicitati consuluit, literarum universitates, sive recens fundatae, sive denuo instauratae, nequaquam sunt minima. Restauratis universitatibus adnumeranda quoque erat Vilnensis, utpote quae, praeter alia, clinico etiam instituto carebat, ad quod inaugurandum atque simul ad praxin medicam ibi docendam, parens meus, Joannes Petrus Frank, anno MDCCCIV. Vindobona Vilnam advocatus est. Qui autem quum paullo post academiam Lithuanicam cum aula Petropolitana commutare debuisset, contigit mihi, jam in eadem academia professoris pathologiae munere fungenti, ut in parentis vices ad profitendam therapiam specialem et artem clinicam succederem.

Licet equidem, juxta Hippocratis consilium, arti medicae a puero destinatus,

conformem huicce fini educationem nactus essem; licet ad studia physico-medica in R. Archigymnasio Ticinensi, quo tempore idem fastigium gloriae adscenderat, incubissem, atque magnis viris, inter quos (ne de patre ipso loquar), Alexandrum Volta et Antonium Scarpa nominasse sufficiat, praeceptoribus usus essem; licet academicos honores vix adeptus (a. MDCCXCI.) specimen praxeos medicae in eodem Archigymnasio docendae, non sine applausu dedissem (ab a. MDCCXCIV — VI.); licet deinde, bellorum vicissitudinibus Italiam, alteram mihi patriam, deserere coactus, nosocomii universalis civici, Vindobonae florentis, medicus primarius constitutus, occasionem habuissem, per duo fere lustra (ab a. MDCCXCVI — MDCCCIV.) millenos aegrorum curandi et anatomiam pathologicam excolendi; licet tandem itinere per Germaniam, Galliam, Angliam et Scotiam (a. MDCCCIII.) suscepto, facultas mihi concessa esset, peritiam linguarum magis magisque amplificandi, instituta medica diversi generis visitandi, alterum cum altero, sicut et receptas in plurimis eorundem docendi rationes inter se comparandi, doctorum societatibus interveniendi nec non medicorum aevo nostro celeberrimorum familiar-

liaritate utendi; — licet, inquam, tot tantisque commodis atque emolumentis fruerer, illud tamen munus gravissimum, docendae praxeos medicae in universitate Vilnensi, nonnisi summa cum verecundia suscepi.

Quippe quammaxime angebar, perpendens, a doctrina modo tradenda, vitam millenorum civium pendere, quum discipulorum meorum certe non paucissimi, absoluto curriculo academico, in regiones abituri essent, ab omni literarum commercio adeo sejunctas, ut illos quaeque occasio deficeret, errores, forte in schola susceptos, alio modo corrigendi, quam una experientia, proh! non unumquemque edocente. Ita igitur, quaecunque notiones levioris animi fuerint, consiliave temeraria (sic enim me ipse sum adloquutus) non fructus ferent salubres, quos maximum orbis terrarum imperium jure exspectat, sed semina generabunt pestifera, de quorum messe DEO justissimo rationem aliquando habebis reddendam.

Talia diu noctuque mente volutans, diffidebam prope viribus meis, atque magnum me tenebat desiderium *operis elementarii*, cui in praelectionibus academicis inniti, et in quod proinde partem tantae molestiae conjicere possem.

Ut

Ut vero opus illud desideratum, consilio meo omnino responderet, sequentibus idem dotibus instructum esse optabam. Videlicet:

Desiderabam *opus sermone latino exaratum*, ut Polonis, Russis et Germanis, universitatem Vilmensem adire solitis, aequo pacto prodesse posset. Simul vero, sermone doctorum in praelectionibus adoptato, tirones educatione literaria orbatos, quippe qui in medicina excolenda alioquin vix progrederentur, a schola remove plauit.

Desiderabam etiam *opus simpliciter et clare conscriptum*, ne doctrina, jam per se intellectu difficilis, sublimi stylo difficilior redderetur.

Desiderabam *opus quod universam materiam uberrime pertractaret*. Libri enim aphoristice conscripti ampla explanatione indigent, cui non solum rerum dicendarum copia, annique scholastici breuitas, si docentem respicias, sed etiam, difficultas, commentaria extemplo chartis mandandi, librosve, commentaria continentes, sibi comparandi, si discentes spectes, quam maxime obsunt. Contra alumni opere muniti, quod explanationem admittit

mittit quidem, at non exposcit, jam sine ulla difficultate domi vel praeparationi vel repetitioni vacare queunt, atque professor res suas alacriter, ut oratorem decet, ex tempore recitare potest.

Desiderabam *opus, quod de levioribus quoque malis dissereret.* Mos enim, morbos dumtaxat herculeos explanandi, mala vero minoris momenti silentio praetereundi, efficit, ut tirones, absoluto studiorum curriculo, perbelle quidem sciant, quo pacto apoplexiae, inflammationes laryngis, cholerae etc. curandae sint; sed modum, quo capitis dolori, raucedini, anorexiae etc. medeantur, vix aut ne vix quidem inveniant.

Desiderabam *opus, indicans quomodo regulae medendi generales peculiaribus aegrorum positionibus adaptandae sint.* Quamvis enim conamen hujusmodi maxime iudicio medicorum committi debeat; nihilominus therapiae specialis est, potissimas a regula exceptiones indicando, animos ad illud praeparare.

Desiderabam item *opus, quod etiam absoluto curriculo academico utile foret.* Etenim doctrina morborum, qui rarissime obveniunt, in memoria paucorum medicorum

rum praesto est. His igitur semper pergratum foret opus, quod conspectum omnium morborum exhibendo, illius defectui succurreret.

Desiderabam porro *opus, nulli systemati addictum*. Quamvis enim, monente BOERHAAVIO, systema nil aliud sit quam integra, digesta et ordinata cujusdam artis compages, in qua reperitur instructio omnium eorum, quae necessaria sunt, ut illa ars cognoscatur, “ ideoque per se nequitquam criminari possit; tamen experientia inde a temporibus Hippocratis ad hodiernum usque diem constanter docuit, systemata rebus medicis nequaquam accommodata esse. Efficiunt nimirum ut medici, tum ad lectos a morborum, tum in sectionibus pathologicis instituendae naturam non videant, qualis revera sit, sed quatenus hypothsesibus, a nullo systemate medico alienis, respondeat. intelligitur, cur eorum observationes perpetuo systema, cui favent, redoleant, atque inexhaustae naturae varietatis loco, uniformes commentationes circa unum alterumve cardinem systematis exhibeant. Inde quoque intelligitur, cur systematum asseclae, quum aliorum observationes offendunt, ea dumtaxat eligant, quae accepto systemati conveniunt, reli-

reliqua vero, tamquam falsa, cum contemptu rejiciant. Qualiscunque jam morbi, quem medici, systematum sectatores, curandum susceperunt, exitus fuerit, dummodo praeceptis systematis satisfecerint, meliora se impetrare haud potuisse existimant. Ita vero boni viri vel illo beneficio, utut tristissimo, privantur, ut errando discant. Imo, quo peior est curae exitus, eo magis methodum medendi per systema suggestam, nondum satis viriliter adhibitam fuisse putant. Proximam igitur occasionem, rem acrius pertractandi, anxie expectant. Crescit igitur malum eundo. — Praeterea systemata rempublicam medicam in partes dividunt, inanes rixas inter variarum scholarum discipulos excitant, atque quum aliud systema alii succedere soleat, curandi rationes, instar ornatus mulierularum, morem diei sequuntur.

Desiderabam *opus rationibus stabilibus innixum*. Aliud enim est, systemati adhaerere (quod alumni facile scientiam ipsam habent, quam eo magis ad unguem se tenere arbitrantur, quo majori, verbis systemati propriis blaterandi facultate polent); aliud est rationes stabilire, quae infirmioribus juvenilis ingenii viribus adminicula atque subsidia parant. Rationes vero, qui-

quibus opus praxeos medicae superstruitur, simplices, uniformes et stabiles sint, oportet. Stabiles, inquam, ne quodlibet operis volumen alios atque alios exhibeat doctrinae cardines.

Desiderabam *opus, quod speciali morborum doctrinae brevem pathologiae et therapiae generalis repetitionem praemitteret.* In scientiis enim *excolendis* a specialibus ad generalia adscendendum, in iis vero *docendis*, a generalibus ad specialia descendendum est.

Desiderabam *opus ordinis naturalis et severi.* Ordinis dico naturalis; nimirum morbi, in una eademque corporis humani parte contingentes sibique invicem succedentes, alter post alterum, non autem, prout aut inflammationem aut suppurationem, aut profluvium aut retentionem exhibent, in separatis libris distincti describantur oportet. Ordinis item severi, nempe ut partes doctrinae uniuscujusque morbi non promiscue, sed in singulis cancellis stricte separatis, exponantur. Has vero doctrinae partes ita comparatas esse volui.

Definitiones non nisi ex apparentibus morborum notis desumas, nullas hypotheses, quae ad perversam medendi methodum

dum viam sternere possent, continentes et diagnoseos elementa prae se ferentes.

Literaturam amplam chronologice dispositam, et passim sententiis principum medicorum ornatam. Ita enim alumni doctrinae ambitum mature cognoscere, antiquioribus auctoribus tributum grati animi persolvere, et sese a jactantia reformatorum, quippe qui scientias ante se vix existisse contendunt, munire addiscunt. Praeterea tirones in literatura, quae in opere elementari exposita est, in dissertationibus inauguralibus aliisque primitiis elaborandis filum habebunt. Postremo tiro per sententias a magistro cum industria excerptas, sensim sensimque difficilem illam discit artem cognoscendi, quae loca in libris maximi momenti sint.

Symptomatologiam, in qua phaenomena et decursus morborum sine fuco atque sine ulla interpretatione, sed tantummodo, ut natura ea exhibet, clare et plene describerentur.

Anatomiam pathologicam, quae observationes, quot quot exstant, tum vitiorum structurae, unicuique corporis humani parti propriorum, tum phaenomenorum post singulos morbos in cadaveribus reperiendorum, contineret.

Aetio-

Aetiologiam, in qua positiones rerum, quae morborum evolutioni favent, nudae enumerarentur, rejectis omnibus disquisitionibus circa illarum modum agendi; attamen opinionibus aliorum de caussis proximis morborum, historice enarratis.

Diagnosin, quae ex analogia symptomatum, atque ex comparatione eorundem tam cum phaenomenis sub simili rerum positione in cadaveribus quondam repertis, quam cum notionibus ab aetiologia suppletis, constructa esset; idque duce sana ratione, per inductionem, omnibus subtilioribus nosologorum divisionibus omissis.

Prognosin, quae interpretationes quidem singulorum symptomatum, quod spectat aegritudinis eventum, non negligeret, ast easdem diagnoseos imperio submitteret.

Prophylaxin, quae recapitulationi ex Hygieine et (quod ad morbos populares attinet) introductioni ad Politiam medicam inserviret.

Therapiam tandem, ab una experientia desumtam, mediumque tenentem inter methodum nimis activam et complicatam, nimisque segnem et simplicem, et quae indicationibus e diagnosi pullulantibus, quousque fieri licet, superstrueretur, formula-

mularum medicinalium cohortem excluderet, et potius diffidentiam pharmacorum (praecipue veneficorum, novorum et pro specificis decantatorum) inculcaret, atque regimini diaetetico eminentem locum concederet.

Desiderabam *opus, quod in limitibus inter morbos, qui longo usu moreque recepto ad praxeos medicae ambitum referuntur, eosque, qui ad praxin chirurgicam propius spectant, definiendis, potius medicinae confinia transiliret, quam coarctaret.* Id enim praecipue curandum puto, ne in ramis unius ejusdemque scientiae excolendis, illorum cum trunco nexus unquam negligatur.

Desiderabam *opus, quod non absconderet, sed imo patefaceret, quaecunque in arte nostra adhuc imperfecta sunt.* Ita enim tirones ad difficultates, quae eos in medicina exercenda manent, mature praeparantur. Praeterea lacunis scientiae a magistro candide indicatis, in discipulis, singulari ingenio praeditis, desiderium excitatur, easdem explendi.

Postremo desiderabam *opus, quod, quotiescunque medicinae nexus cum scientiis moralibus politicisve obveniret, semper*

per venerationem Religionis ordinisque civilis stabiliti inculcaret.

Jam vero opus, omnibus his dotibus instructum (quin minime clarorum de the-
rapia speciali scriptorum meritum dero-
gem), invenire haud potueram. Hinc erat,
ut ipsemet tale opus conscribere statue-
rim.

Multa quidem me ab hoc conamine ab-
sterrere debuissent. Nam praeter ingenii
mei tenuitatem, huic consilio tum bella,
literarum commercio mihique in remotiori
Europae parte scribenti quammaxime ad-
versa, tum multiplices, quibus ob dupli-
cem cathedram, ob praesidium seminarii
medici institutorumque philanthropicorum,
et ob praxin privatam distinebar, occupa-
tiones obstabant.

Altera vero ex parte non deerant ar-
gumenta conatum sustinentia, mihique
animum addentia. Primum praesto erat
conscientia diligentiae et perseverationis.
Porro opus hoc circa annum aetatis qua-
dragesimum suscipiens aequae alienum me
videbam tum ab animi juvenilis levitate et
temeritate, tum a decrepitae senectutis im-
becillitate et haesitatione. Tandem in arte
docendi a juventute versatus, probeque
memor

memor et difficultatum, quas tirones in praxi medica addiscenda experiri, et errorum, quorum facillime participes fieri solent, in spe eram, me dotibus ad tradenda praecepta medico-practica necessariis destitutum omnino non esse.

Totum hoc opus *quatuor* in *partes* divisi, quarum binas studiis curriculo unius anni absolvendis, binasque reliquas illis alterius dicavi. Praxi enim medicae in Caesarea literarum universitate Vlnensi docendae, duo anni scholastici, quivis decem mensium, inserviunt.

Pars operis *prima* *duo volumina* amplectebatur. Eorum alterum (a. MDCCCXI. typis vulgatum) prolegomena et doctrinam de febribus, alterum (a. MDCCCXV. editum) illam de morbis cutis continebat.

In nova, quae nunc prodit, denuo elaborata editione (ab aliena Taurini per typos repetita probe distinguenda) pars ista operis *prima* in *tria volumina* partita est, quovis volumine rursus in *duas sectiones* subdiviso. Voluminis primi *sectio prima* exhibet conspectum historiae et literaturae medicinae practicae, introductionem ad studium clinicum et doctrinam febrium intermittentium; *sectio altera* de febribus
con-

continuis, de morbis cutis in genere, deque peticulis, miliaribus, bullis, urticaria, erysipelate, furunculo, anthrace et carbunculo in specie tractabit. Voluminis secundi *sectio prima* doctrinam pestis et ephemeræ sudatoriae Anglicæ; *sectio altera* illam typhi et febris flavæ largietur. Voluminis tertii *sectio prima* scarlatinae, morbillorum, rubeolæ, variolarum, varicellæ, variolæ mitigatæ, zosteris et exanthematis mercurialis expositionem supeditabit; *sectio altera* de morbis cutis chronicis tractatum offeret.

Majorem huic operis parti extensionem conciliandam esse censui, ut ea, juxta conditionem hodiernam doctrinae febrium et morborum cutis, scopo præfixo melius responderet atque sequentibus voluminibus, jam pridem majori studio elaboratis, aptius quadraret. Praeterea subdivisionibus in *sectiones* usus sum, ne singula volumina mole excedant aut nimii pretii constent.

Tandem ut possessores primæ editionis nullum, quod evitari potuisset, detrimentum capiant, operis *partem secundam*, etiamsi rursus typis divulgandam, plane intactam relinquere et duntaxat supplemento

mento locupletare statui. Literatores non omnino inexorabiles medico, horas ad componendos libros furari coacto, atque quum se ad scribendum accingeret, jamjam defatigato, multisque curis obruto, condonabunt, si rebus magis quam verbis intentus, politiorem stylum quandoque neglexerit.

Notum est, operis illam partem duobus voluminibus, totidem in sectiones subdivisis, constare; *voluminis primi sectione primâ* (a. MDCCCXVIII. in lucem editâ) doctrinam generalem de morbis partium ad systema nervorum pertinentium et specialem de illis cerebri continente; *sectione secundâ* (a. MDCCCXXI. typis mandatâ) de morbis columnae vertebralis, singulorum nervorum, aliisque, ex variis systematis nervosi partibus ortum habentibus, nec non de morbis oculorum, aurium et narium pertractante.

Nec latet, *partis secundae voluminis secundae sectionem primam* (a. MDCCCXXIII. promulgatam) tradere doctrinam de morbis laryngis, tracheae et corporis thyreoidei, thecae thoracicae, pleurae, mediastini, thymi et pulmonum, *sectionemque secundam* (a. MDCCCXXIV. subsequutam) de

morbis diaphragmatis, pericardii, cordis, arteriarum et venarum nec non de animi deliquiis agere.

Restant adhuc elaborandae *pars tertia* de morbis oris, parotidis, oesophagi, ventriculi et intestinorum; porro de illis hepatis, lienis, pancreatis et peritonaei, nec non de scrophula, rhachitide, arthritide, carcinomate et scorbuto: et *pars quarta*, in qua de morbis renum, ureterum, vesicae urinariae, urethrae, prostatae, testiculorum et vesicularum seminalium; praeterea de morbis sexus sequioris, ac tandem de syphilide, de rabie canina et de aliis morbis, ex morsibus veneficis oriundis, disse-retur.

Quum perfuncto indefesse undeviginti annos munere professoris therapiae specialis et clinices in Caesarea universitate Vilnensi; quum institutis circiter mille medicis, a Polonia Germaniae confini ad Kamtschatkam usque dispersis, quorum nonnulli ipsimet professoris officio funguntur; quum facta Vilnae *societate medica*, serius pro laborum praemio epitheto *Caesareae* condecorata; quum fundata *classe medica societatis beneficorum Vilnensium*, qua aegrotorum milleni curati sunt, idque

idque solis redditibus, ex concentibus musicis uxoris meae carptis; quum proposito atque munificentia *Imperatoris* ALEXANDRI I. condito seminario medico, quo nunc centum alumni indigeni pro officio medico exercitus, classisque et status civici erudiuntur; quum tot tantisque, pro viribus, exantlatis laboribus, tandem in amblyopiam inciderim: eidem placuit clementissimo *Imperatori*, me ante terminum legibus praescriptum, emeritis professoribus adscribere (a. MDCCCXXIII.), cum venia, stipendium ubicunque voluerim, consumendi. Jam vero electo, post triennem Vindobonae moram, ad littora Larii domicilio, procul omnibus aliis negotiis, foveo spem, fore, ut quod restat operis dimidium (pro quo materiae tum a me collectae, tum a patre relictæ jam praesto sunt) sine interpellatione adjuvante DEO elaborem. Utut Coelum decreverit, operi dotem lego, illudque simul tutelae celeberrimae scientiarum academiae rogatu committo, ut unum doctissimorum aevi medicorum eligere olim dignetur, qui remuneratione ex fœnore dotis quotannis pullulante fruens, pro re nata, aut opus incompletum ad finem perducatur, aut illi ad finem jam perducto, *supplementa*, res

cum lucro pathologiae et therapiae specialis peractas continentia, ita perpetuo adjungat, ut inde posteris *corpus medicinae practicae* tradatur.

CON--

CONSPECTUS
HISTORIAE ET LITERATURAE
PRAXEOS MEDICAE.

COMPTON

HISTORICAL

TRAY

*Conspectus historiae et literaturae
praxeos medicae.*

§. I.

Doctrinae definitio, utilitas, difficultas et historia.

1. *P*raeox medicae doctrina morbos generis humani cognoscere, unum ab altero distinguere, eos avertere et curare docet: amplectitur hinc pathologiam et therapiam specialem. Doctrinae definitio.

2. Doctrina hujusmodi, quamvis limites suos partim in ipsis immutabilibus naturae legibus, interitum rerum creatarum imparantibus habeat; rei publicae tamen, quid quid obtrectatores¹⁾, quos medicina cum Altare et Throno communes habet, dictitent, maxime utilis, et ut divina²⁾ nuncupetur, vere digna³⁾. Doctrinae utilitas.

A 2 munus

1) TEMPLE *oeuvres mêlées*. Utrecht 1693. p. 246. J. J. ROUSSEAU *Emile, ou de l'éducation*. L. I. Auctor ARKESILASI in WIELAND's *neuem deutschen Mercur*. 1793. 8. St. p. 359.

2) „Homines ad Deos nulla re propius accedunt, quam salutem hominibus dando.“ CICERO *orat. pro Q. Ligario*. VII.

3) PLOUCQUET *Repertor. med. pract. artic. medicinae encomium*. WEDEKIND *über d. Werth der Heilkunde*. J. P. FRANK *System einer vollständigen med. Polizei*. 6. B. 1. Th. 1. Abschn. L. CHOULANT *Rede über den*

munus religiose administrans, laude merito celebratur⁴).

3) Vita

Einfluss der Medicin auf die Cultur des Menschengeschlechts. Leipz. 1823.

- 4) „C'est aux médecins en général qu'on doit les progrès de la physique générale, de la zoologie, de l'anatomie, de la botanique, de la chimie, de la minéralogie: ce sont eux qui ont d'abord peuplé les académies de l'Europe, qui ont même institué plusieurs d'entre elles, ou qui ont posé les premiers fondemens.“ FOURCROY la médecine éclairée par les sciences physiques. T. I. p. 3. PRUNELLE de l'influence exercée par la médecine sur la renaissance des lettres. Montpellier 1809. Legitur (Etudes de la nature par l'abbé ST. PIERRE): „J. J. ROUSSEAU me dit un jour, si je faisais une nouvelle édition de mes ouvrages, j'adoucirois ce que j'ai écrit sur les médecins. En tout pays ce sont les hommes le plus véritablement savans.“ Cfr. R. A. SCHIFERLI Erste Eröffnungsrede, gehalten bei der med. chir. Gesellschaft des Canton's Bern. 1810. Dr. MARTIN LUTHER und PHILIPP MELANCHTON über den Arzt u. seine Kunst. Von G. CHR. F. MOHNIKE. Stralsund 1823. Ast ait HIPPOCRATES: „Multi nomine medici inveniuntur, re ipsa admodum pauci sunt.“ (L. de Leg. No. 1.) „Cujus aphorismi rationem pulcherrime reddit LANCISIUS.“ Renuunt siquidem, inquit, in studiis patientia proficere; sed primum spes suas ambitione donant, aluntque avaritia; deinde cum ad vota properant, cruda adhuc studia ad aegrorum lectulos propellunt, artemque confingunt, quae cum recte non addiscitur, atque adhibetur, omnium est perniciosissima.“ (De recta medicorum studiorum ratione instituenda Dissertatio. v. Opp. varia. T. II.)

3) Vita quidem brevis, ars longa⁵⁾. Ne hoc <sup>Doctrinae
difficultas.</sup> vero effatum tirones vos terreat! Ordine enim et selectu in rebus addiscendis, *artem* breviorē; tempus vero omne, quantum fieri licet, studio et exercitio illius impendendo, vestram pro scientia *vitam* longiorem reddere poteritis⁶⁾. Medici (dummodo primo decennio resistere valeant), alioquin longaevitate frui solent⁷⁾, quod ex illorum, non ignorandis, biographiis⁸⁾, prodit.

4. Sed

5) HIPPOCRATES Aphor. Lib. I. No. 1. — Ajebat alter: Vita brevis, libri multi, nummi pauci, tempus arctum!

6) J. P. FRANK Oratio academica de vita brevi arte vero longa HIPPOCRATIS. v. opuscula posthuma. Vindob. 1824. p. 13.

7) BAIER Diss. de longaevitate medicorum. Altorf. 1705.

8) Exempla vobis sunt vitae medicorum quas describunt: ABU OSELBACH, vitae celebrium medicorum. v. REISKI et FABRI opusc. med. edit. GRUNER. Halae 1776. SYMPHORIAN. CAMPEGIUS de claris med. script. veter. et recentior. Lugd. 1531. OTHO BRUNFELS catalogus illustrium medicorum. Argent. 1530. REMACL. FUCHS illustrium medicorum, qui superiori saec. floruer. ac scripsere, vitae. Paris 1741. JO. SAMBUCUS icones veterum aliquot et recentior. medicor. et philologor. cum elogiis etc. Leid. 1603. PASCHALIS GALLUS bibliotheca medica, s. catalogus illorum qui ex professo artem medicam scriptis illustrarunt. Basil. 1590. PETR. CASTELLANI vitae illustr. medicorum. Antwerp. 1618. HENNING WITTEN memoriae medicor. nostri aevi clariss. Francf.

Doctrinae
historia.

4. Sed antequam ad ipsa praxeos medicae
ele-

1676. P. R. REDLICH *elogium et coemeterium medicorum*. Prag. 1688. J. H. FUERSTENAU *de fatis medicorum oratio*. Rinteln 1720. CH. W. KESTNER *med. Gelehrten-Lexicon*. Jen. 1740. FR. BÖRNER *Nachrichten von jetzt lebenden Aerzten*. Wolfenb. 1749. Compl. a E. G. BALDINGER ib. 1773. J. A. HAZON *notice des hommes les plus célèbres de la fac. de méd. en l'univ. de Paris*. 1750. G. SANDIFORT *diss. de viris de re medica optime merentibus*. L. 1757. G. MATTHIAE *conspectus hist. medic. chronologicus*. Goett. 1761. E. G. BALDINGER *Biographien jetzt lebender Aerzte u. Naturf. in und ausser Deutschl.* Jen. 1768. J. K. W. MÖHSEN *Beschreibung einer Berlin. Medaillensamml., die vorzüglich aus Gedächtnismünzen berühmter Aerzte besteht. Mit Kupfern*. 1. Th. Leipz. 1771. 2. Th. Berlin 1780. Ejusd. *Verzeichniss einer Samml. von Bildnissen grösstentheils berühmter Aerzte*. Berlin 1771. VAN EICKEN *Gedächtnissblätter, enthält Nachrichten vom Leben und Charakter verdienter Aerzte u. Naturf.* Leipzig 1796. ACREL *Tal om Läkare Vetenskapens grundläggning och tilväxt vid Ricketsälsta Lärosäte i Upsala*. Stockh. 1796. HUTCHINSON *biographia medica or historic and critical memoirs of the lives and writings of the most eminent medical characters*. Lond. 1799. 2 Vol. J. K. PH. ELWERT *Nachricht von dem Leben und den Schriften jetzt lebender Aerzte*. Hildesh. 1799. J. B. GEISSER *praes. SCHULTES Diss. de Helvetorum in medicina meritis ab inventa typographia ad finem seculi decimi octavi*. Landsh. 1816. VESSPREMY *succincta medicorum Hungariae et Transylvaniae biographia*. 4 Centuriae. Pest. 1774. — J. S. PETERKA *memoria virorum eruditorum*

elementa perscrutanda deveniatur, summatim hujus scientiae vicissitudines enarrare, ac nonnulla de auctoribus, quorum librorum in decursu hujus operis saepe mentio fiet, dicere juvabit⁹⁾. Formale autem historiae medicae studium, dumtaxat absoluto curriculo academico locum habere debet. Tunc legantur (ne de antiquioribus minorisve momenti loquamur¹⁰⁾)

LE

de re medica optime meritorum. Pest. 1810. — BRAMBILLA *Geschichte der, von d. berühmtesten Männern Italiens gemachten Entdeckungen in der Medicin. Wien 1789. 4. Abbildungen berühmter u. besonders um d. Arzneyk. verdient. Gelehrt. Augsb. 1805. — Dict. des sciences médic. Troisième partie. Biographie. Paris 1820. CHOU-LANT l. c. p. 49. Sveriges Läkare-Historia. Utgifen af J. F. SAKLÉE. 1. V. 1822. 2. V. 1823.*

9) „Nescire quid antea quam natus sis, acciderit, id est semper esse puerum. Quid enim est aetas hominis, nisi memoria rerum nostrarum cum superiorum aetate contextitur?“ (CICERO in orat. cap. 34.)

10) G. GRATAROLUS de laudibus medicinae, ejus origine, progressu etc. Argent. 1563. 8. GÜNTHER ANDERNACENSIS de veteri et nova med. Basil. 1571. fol. J. BOZERUS carmen de origine et progressu artis medicae. Viteb. 1577. J. HEURNIUS oratio de medicinae origine. Lugd. Bat. 1589. 4. JESSENIUS a JESSEN progr. de origine et progressu medicinae. Viteb. 1600. 8. M. DÖRING de medicina et medicis. Gies-sae 1611. 8. J. NEANDER, medicinae, artis antiquissimae et nobilissimae natalitia. Brem. 1623. J. B. v. HELMONT ortus medicinae. Amstel. 1648. 4. G. MÖBIUS de medicinae natalitiis. Jen. 1651. B. MOSER

LE CLERC¹¹⁾, FREIND¹²⁾, CH. G. GRUNER¹³⁾,
A. HAL-

quadrige medicinae triumphantis. Colon. 1645. 12.
J. MAYNWARING, *the rise and progress of physic historically-illustrated*. Lond. 1668. 8. LEONARDO DA
CAPOA, *otto ragionamenti, ne' quali narransi l'origine e'l progresso della medicina*. Napoli 1681. LAN-
GE historia medica in Ejusd. opp. omn. edit. Rivini, fol. 1704. J. H. SCHULZE historia medicinae a rerum initio ad annum urbis DXXXV. deducta. Lips. 1728.
4. Continuat. sub titulo: Compendium historiae medicinae ad excessum Hadriani Augusti. Hal. 1742. 8.
J. BERNIER *histoire chronologique de la médecine et des medecins*. Paris 1695. 4. A. ZIEGRA, *progr. de medicinae origine et progressu*. Torgav. 1693. J. P. BURGGRAV *libitina ovans fatis Hygieae*. Frcof. 1701.
B. ALBINUS *oratio de ortu et progressu medicinae*. Lugd./Bat. 1702. G. A. ZAHN *de ortu, progressu et dignitate medicinae*. Vesal. 1708. 12. J. SPINKE *London's medical informer etc.* Lond. 1710. J. C. BARCHUSEN *hist. medicinae*. Amst. 1710. 8. M. ALBERTI *progr. de fatis theoriae medicae*. Hal. 1711.
J. G. AST *succincta medicorum medicaeve historiae delineatio*. Lips. 1715. 4. G. L. GOLDNER *de med. origine*. Gera 1721. 4. L. H. RUNG *de fatis et mutationibus, quibus obnoxia fuit ars medica*. Brem. 1716. 4. A. O. GÖLICHE *historia medicinae universalis*. Frcof. ad Viadr. 1717—1720. 8. A. VATER, *de incrementis artis medicae*. Viteb. 1718. 4. G. STOLLE, *Anleitung zur Historie der med. Gelahrtheit*. Jen. 1731. 4. CH. KESTNER, *kurzer Begriff der Historie der Medic.* Halle 1743. P. C. FABRICIUS *scia-graphia hist. physico-medicae*. Wetzl. 1746. JAMES *discorso istorico sopra la medicina*. Venez. 1752. 8.

A. HALLER¹⁴), ELOY¹⁵), J. E. HEBENSTREIT¹⁶),
W. BLACK,

- (Vers. angl.). FR. BÖRNER progr. de vera medicinae origine. Viteb. 1754. 4. W. HILLARY *inquiry into the means of improving medical knowledge*. Lond. 1761. G. MATTHIAE conspectus historiae medicorum chronologicus. Goetting. 1762. 8. N. JADELOT de fatis medicinae. Pont-a-Mousson, 1766. 8. F. CARRÈRE *biblioth. littéraire hist.* Paris 1776. 4. G. B. SCHMIEDLEIN primae lin. hist. med. univers. Lips. 1777. J. C. LETTSOM *history of the origine of medecine*. Lond. 1779. 4. H. F. DELIUS synopsis introduction. in med. universam ejusq. hist. literar. Erlang. 1779. WITTEWER *Archiv f. die Geschichte der Arzneywissenschaft*. Nürnberg. 1790. S. TH. DE MEZA tentam. hist. med. Hafn. 1795. R. WALKER *memoirs of medec.* Lond. 1799. CH. FR. ELSNER oratio de medicinae per hoc seculum fati in opp. acad. Regiom. 1800. VAN ALSEN Diss. relatio brevis praecipuarum medicinae renovationum saeculi decimi octavi. Duisb. 1801. E. TOURTELLE *histoire philosophique de la medec.* Paris 1804. C. WINDISCHMANN *Versuch über den Gang der Bildung in der heilenden Kunst*. Frankf. a. M. 1809. DE MERCY *considérations sur la naissance des sectes dans les divers ages de la médecine*. Paris 1816.
- 11) *Histoire de la médecine où l'on voit l'origine et les progrès de cet art*. Genev. 1696. 12. Amsterd. 1723. 4. La Haye 1729. 4.
- 12) *Histoire de la médecine depuis Galien jusqu'au commencement du seizième siècle*. Trad. par Et. Coulet. Leid. 1727.
- 13) *Morborum antiquitates*. Vratisl. 1774. Et *Nosologia historica ex monumentis medii aevi*. Jen. 1794. Ejusdem *Almanach f. Aerzte u. Nichtärzte*. 1782—1797.

W. BLACK¹⁷⁾, BLUMENBACH¹⁸⁾, A. F. HECKER¹⁹⁾,
 ACKERMANN²⁰⁾, J. R. METZGER²¹⁾, C. SPRENGEL²²⁾,
 R. SCUDERI²³⁾, J. G. CABANIS²⁴⁾, KNEBEL²⁵⁾,
 F. L. AUGUSTIN²⁶⁾, P. A. O. MAHON²⁷⁾,
 K. A.

- 14) Bibliotheca medico-practica. Bern. 1776—1788. T. I—IV. 4.
- 15) *Dictionnaire historique de médec. ancienne et moderne.* Mons 1778. T. I—IV. 4.
- 16) *Palaeologia therapiae.* Hal. 1779.
- 17) *An historical sketch of medec. and surgery.* Lond. 1782.
- 18) *Historia medicinae literaria.* Goett. 1787.
- 19) *Praxeos medicinae omnis aev. fata tabulis exposuit.* Erf. 1790. 4. et *Allgem. Geschichte der Natur- u. Arzneykunde.* Leipz. 1793. Ejusd. *Die Heilkunde auf ihrem Wege zur Gewissheit; oder die Theorien, Systeme u. Heilmethoden der Aerzte seit Hippocrates bis auf unsere Zeiten.* Erfurt 1802. Editio 4. Erfurt 1819.
- 20) *Institutiones historiae med.* Norimb. 1792.
- 21) *Skizze einer pragmatischen Literärgeschichte der Med.* Königsb. 1792. 8. et *Zusätze u. Verbesserungen zu s. Skizze einer pragm. Literärg.* 1796.
- 22) *Versuch einer pragmatischen Geschichte d. Heilkunde.* Halle 1792. Th. I—V. 8. *Neue Aufl.* 1821—1823. *Beytrag zur Geschichte der Heilk.* 1794.
- 23) *Introduzione alla storia della medicina antica e moderna.* Napoli 1794.
- 24) *Coup-d'oeil sur les revolutions et sur la réforme de la méd.* Paris a. XII.
- 25) *Versuch einer chronologischen Uebersicht der Literaturgeschichte der Arzneywiss.* Breslau 1799.
- 26) *Vollständige Uebersicht der Geschichte der Medicin in tabellarischer Form.* Berlin 1801. *Zweite durchaus verbesserte u. verm. Ausgabe.* Berlin 1825.

K. A. KORTUM²⁸⁾, J. CH. NICOLAI²⁹⁾, K. FR. LUTHERITZ³⁰⁾, RICHTER³¹⁾, L. C. CHOULANT³²⁾ et J. F. HECKER³³⁾. Conspicuam auctorum laudatorum partem incusandam esse censemus, quod in historia medicinae elaboranda fundatores sectarum supra medicos naturae scrutatores extulerint, quodque plures longe paginas enumerationi hypothesis futilium ab illis excogitatarum, quam relationi praeceptorum practico- rum ab his exaratorum, dicaverint.

§. II.

Medicinae origo. Medicina Aegypti et Graeciae.

Hippocrates. Dogmatici. Empirici. Asclepiades.

1. Prima remediorum cognitio procul dubio, *Medicinae non origo.*

27) *Histoire de la médecine clinique. Paris 1804.*

28) *Skizze einer Zeit- u. Literargeschichte der Arzneykunst von ihrem Ursprunge bis Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. Unna 1807.*

29) *Das Merkwürdigste aus der Geschichte der Medicin. Rudolst. 1808.*

30) *Die Systeme der Aerzte von Hippocrates bis auf Brown. Th. 1 u. 2. Dresden 1810 — 11. (separatim) Hippocrates, Asclepiades u. Celsus Systeme der Medic. Dresd. 1810. — Aretaeus, Alex. Tralles u. Cael. Aurelianus Systeme der Med. Dresd. 1811. Neue, wohlfeile Aufl. 1818.*

31) *Geschichte der Medicin in Russland. Moskau 1813 bis 1815. Th. 1 — 3.*

32) *Tafeln zur Geschichte der Medicin, nach d. Ordnung ihrer Doctrinen. Leipz. 1822.*

33) *Geschichte d. Heilk., nach d. Quellen bearb. Berl. 1822.*

non ratiocinio, sed casui, experientiae, vel forsan et instinctui, debetur. Hinc medicinae pars, quae praxin et maxime diaeteticam¹⁾, respicit, theorià certe antiquior.

Medicina
Aegypti et
Graeciae.

2. Medicinam, ut doctrinam, jam Aegyptii²⁾, circiter MM annos ante aer. chr. excoluisse videntur. Tardius ad Graeciam ea migravit³⁾. Am-
babus

1) „Egli è certo che la dietetica dev' essere stata la prima parte della medicina di cui si sia fatto uso; poichè l'osservazione dei cibi e delle bevande nocive o giovevoli, ha dovuta essere quotidiana: e senza questa osservazione, gli uomini sarebbero caduti in malattie che gli avrebbero distrutti infallibilmente.“ (Della origine delle leggi, dell' arti e delle scienze e dei loro progressi presso gli antichi popoli. Lucca 1761. T. I. p. 153).

2) A. CALMET de medicis et re medica Hebraeorum. Paris 1714. M. ALBERTI de medicinae apud Ebraeos et Aegyptios conditione. Hal. 1742. FR. BÖRNER de statu medicinae apud veteres Ebraeos. Viteb. 1755. Ejusd. antiquitates medicinae Aegyptiorum. 1756. DE ALBERLITZ an etiam gens Hebraea olim medicinam de industria coluerit ac promoverit? Vindob. 1765. J. S. LINDINGER de Ebraeorum veterum arte medica. Viteb. 1774. J. A. LAUTENSCHLAGER de medicis veterum Hebraeorum eorumque methodo sanandi morbos. Schleiz. 1786. M. LEVIN diss. analecta historica ad medicinam Ebraeorum. Hal. 1798. D. CARCASSONE *essai historique sur la médecine des Hébreux anciens et modernes*. Paris 1816.

3) P. GERIKE diss. de scholis et institutis medicis in Graecia et Aegypto. Helmst. 1748. J. N. WEISS de

babus in regionibus primum sacerdotes hanc artem exercuere. Nec viri bello fortes, nec ipsi reges, exercitium illius spreverunt⁴⁾. In animi grati significationem templa iis erecta sunt⁵⁾. A sacerdotibus

re medica veterum Graecorum. Altorf. 1746. J. A. WOHLFAHRT *Biographien griech. Aerzte*. Hal. 1770. C. G. KÜHN programmata de medicis nonnullis Graecis in Caelii Aureliani de acutis morbis L. I. c. 12 — 17. occurrentibus. Lips. 1820.

4) J. G. HEYNE de medicis heroibus et heroibus medicis. Viteb. 1755.

5) J. T. MAYER de valetudinis Diis deabusque. Lips. 1670. EBERH. RUD. ROTH diss. de Osiride, Iside, Horo ac Typhone, Diis olim Egyptiis. Jen. 1671. HERM. CONRINGII de hermetica medicina Lib. II. ed. 2. Helmst. 1669. 4. OL. BORRICHII Hermetis Aegyptiorum et chemicorum sapientia a Herm. Conringii animadversionibus vindicata. Haf. 1674. C. F. HUNDETMARK exercit. de principib. Diis artis medicae tutelaribus apud veteres et Romanos. Lips. 1735. J. F. MEYER de valetudinis Diis deabusque veter. gentium medicis. Lubec. 1736. J. C. SCHLÄGER de Diis hominum servatoribus. Helmst. 1737. P. F. GORMANN de Diis medicis ad Ovid. metam. Misen. 1740. J. D. MAJOR serapis radiatus Deus Aegyptius. Kilon. 1685. J. A. SEBITZ diss. de Aesculapio inventore medicinae. Argent. 1669. J. LEONICENUS metamorphosis Aesculapii et Apollinis Pancreatici. Leid. 1673. J. G. SCHWANZ disp. de Aesculapio et Hygieia. Altorf. 1742. J. C. MESSERSCHMID Aesculapius Σωτήρ. Hal. 1752. F. C. L. SICKLER *die Hieroglyphen in dem Mythus des Aesculaps*. Meining. 1819. F. G. GEUCKE diss. de templis Aesculapii. Lips. 1790. J. G. GUENZ

dotibus medicina sensim sensimque ad philosophos seu potius ad sophistas transiit, qui eam gymnasticae, sophismatibus caeteris, meditationibus ideisque mysticis adjunxerunt⁶⁾.

Hippocra-
tes.

3. Sophistarum e manibus eam vir summus, HIPPOCRATES, ex insula Coe e stirpe Asclepiadarum, anno CDLVI ante aer. chr., quo tempore scientiae et artes in Graecia maxime florebant, ortus, liberavit. Optimo sane jure HIPPOCRATES pro fundatore medicinae habetur. Verum, ut rectum de divi hujus senis doctrina judicium feratur, opera

et J. F. G. RICHTER diss. de δαδουχίαις in sacris Aesculapii. Lips. 1737. Vide ACKERMANN opusc. ad med. hist. pert. G. CUPER Harpocrates. Amst. 1676. J. GRONOV de icuncula Smetiana, quam Harpocratem indigitarunt. Leid. 1693. CLAUDE BOZE *sur le culte que les anciens ont rendu à la Deesse Santé*. Paris 1705. G. MUSGRAVE diss. de Dea salute. Oxon. 1716. A. Q. RIVINUS de chirone Centauro, a patria Thessalo. Lips. 1694. H. CONRING de incubatione infantis deorum medicinae causa olim facta. Helmst. 1659. A. BRENDL *περὶ τὴν ἐγκοίμησιν*. Viteb. 1701. CHOULANT l. c. p. 50.

6) „*Les premiers philosophes firent bien du mal à la médecine. Ils l'arrachèrent à l'ignorance sans méthode, mais il la précipitèrent dans plusieurs hypothèses hasardées; ils la firent passer de l'empirisme aveugle au dogmatisme imprudent.*“ CABANIS l. c. p. 71. KÜHN de philosophis ante Hippocratem medicinae cultoribus. Lips. 1781. 4.

opera ejus⁷⁾ genuina a falsis distinguere oportet. Distinguuntur autem inter se peculiaribus characteribus non difficulter eruendis⁸⁾. HIPPOCRATES
in

7) Opera omnia. GRAEC. Ed. princ. Venet. (Ald.) 1526. f. Ed. JANUS CORNARUS. Basil. (Froben.) 1538. f. GRAEC. et LATIN. Ed. HIERON. MERCURIALIS. Venet. (Junt.) 1588. f. Ed. ANUT. FOËSIUS. Francf. 1595. f. ib. 1621. f. ib. 1624. f. ib. 1645. f. Genev. 1657. f. Ed. ANTONID. VAN DER LINDEN. Lugd. Bat. 1665. (Venet. 1757. 4. sine text. Graec.) Ed. RENAT. CHARTERIUS (una cum Galeno). Lutet. Paris. 1639—1679. f. Ed. STEPHAN. MACK. Vienn. Austr. 1743. 1749. f. (incomplet.). *Versiones Latinae*. Vert. FABIVS CALVVS. Rom. 1525. f. ib. 1549. f. ib. 1610. f. ib. 1619. f. Basil. 1526. f. Vert. JANUS CORNARUS (1500—1558). Venet. 1545. 8. Basil. 1546. f. ib. 1553. f. Lut. Par. 1546. 8. Lugd. 1553. 8. ib. 1562. 8. ib. 1564. f. et 8. ib. 1582. 8. Ed. Jo. CULMANN vers. Cornar. Basil. 1558. f. Ed. Jo. MARINELLI vers. Corn. Venet. 1575. f. ib. 1619. f. Vicent. 1610. f. (?) Vert. ANUT. FOËSIUS. Francof. 1596. 8. Ed. J. BAPT. PACTONUS vers. Cornar. c. indice Math. Pini. Venet. 1737. Ed. A. HALLER Lausanne 1769. 8. ib. 1784. 8. Ed. J. FR. PIERER vers. Foësii. Altenburgi 1806. 8. *Vers. Germanicae*. CH. G. GRÜNER *Bibliothek der alten Aerzte*. Leipz. 1780. 8. J. F. C. GRIMM. Altenb. 1781—1792. 8. (incomplet.). *Vers. Gallicae*. Lyon 1555. 8. CLAUDE TARDY. Paris 1667. 4. ANDR. DACIER. Paris 1697. 8.

8) HIER. MERCURIALIS censura et disposit. oper. Hippocrat. Venet. 1583. 4. L. LEMOS judicium operum magni Hippocr. lib. unus. Salamant. 1588. f. CHR.

in phaenomenis morboris accuratissime delineandis totus fuit. Similiter causas morborum praedisponentes et excitantes, praecipue vero quatenus ex positione locorum, natura aëris, aquarum etc. pullulant, indagavit. Vix autem ausus est, causas proximas morborum, utpote plerumque profundius latentes, quam quae oculo humano cerni queant, determinare. Eo accuratius signa, bona sive mala in morbis praesagientia, tradidit, exitumque morborum in aegrotis, quos curaverat, qualiscunque demum is fuerit, candide exposuit. In morborum curatione caute admodum et prudenter incedebat, multum regimini diaetetico tribuens, nunquam aegros farragine remediorum obruens, interdum forsitan plus aequo segnis, sed tamen a remediis activis non omnino abhorrens. Obiit tantus vir anno CCCLXVI a. aer. chr.⁹).

Dogmatici.

4. Defuncto HIPPOCRATE, sophistae iterum, licet modestius, caput extulerunt. Quamvis enim *schola dogmatica*, philosophiae Platonis et stoeae innixa, Hippocratis principia jactaverit, ab iis tamen toto coelo aberat. Vel in ipsa enim celeberrima schola, Alexandriae florente, medicina a dialectica peripateticorum inquinabatur.

5. Malo

G. GRUNER censura libr. Hippocraticorum. Vratisl. 1772. J. H. FISCHER diss. de Hippocrate, ejus scriptis eorumq. editionib. Coburg. 1777. C. SPRENGEL *Apologie des Hippocrates*. Leipz. 1789. 1792. 8.

9) MATH. GARBICIUS de vita, moribus, doctrina et professione Hippocratis. Tubing. 1564.

5. Malo huc *secta* quidem *empiricorum*, Empirici. haud omnino spernenda¹⁰⁾, annum CCL inter et CCLXXX a. Aer. chr. Romae vicens, frenum iniecit, medicinam intra confinia experientiae revocando. At, continuae disceptationes empiricos inter et dogmaticos progressui artis non solum obstiterunt, sed ipsius artis dignitatem denigrarunt.

6. Ex hujusmodi abiectione medicinam liberavit ASCLEPIADES, qui seculo primo a. Aer. chr. ^{Asclepiades.} medicinam Romae splendide exercuit¹¹⁾. Mediam viam inter dogmaticos et empiricos legens, Asclepiades novam medicinae doctrinam, duce philosophia Epicuri, excogitavit.

§. III.

Methodici. Pneumatici. Eclectici. Theosophi. Schola Alexandrina. Secula barbara.

1. Doctrina Asclepiadis *Themisoni* ad systema *Methodi-* *medi-*^{ci.}

10) G. G. RICHTER de veterum empiricorum ingenuitate. Goett. 1741. 4. M. A. KAISER de medicinae empiricae veteris atque hodiernae diversitate. Helmst. 1741. C. I. SCHULZE diss. de veteris empiricae scholae dignitate. Hal. 1800.

11) ASCLEPIADIS Bithini fragmenta curavit Gumpert. Vinar. 1794. 8. BLAS. CARIOPHILI diss. de icono Asclepiadis, in Ejusd. diss. miscellaneis. Rom. 1718. 4. p. 331 sqq. ANT. COCCHI discorso primo sopra Asclepiade. Flor. 1758. 4. La medicina d'Asclepiade raccolta di BIANCHINI. Venet. 1769. 8. BURDACH diss. sistens scriptorum de Asclepiade recensionem. Lips.

Frank Prax. I. 1. 1.

B

*medicinae methodicae*¹⁾ condendum auxilio fuit, quo morborum originem a solidorum stricta, laxa, sive mixta conditione explicare conatur. Asseclae memorabilis hujus systematis CAELIUS AURELIANUS²⁾ et quodammodo etiam CORNELIUS CELSUS³⁾ fuere.

2. Ve-

1800. ASCLEPIADES und JOHN BROWN, eine Parallele von BURDACH. Leipz. 1800.

- 1) SALMASII exercitt. Plin. in Solinum. T. II. p. 139. PROSP. ALPINI de method. medic. Venet. 1611. 4. P. G. WERLHOF de medic. method. sect. Helmst. 1723. ACKERMANN *Beyträge zur Geschichte der Secte der Empiriker in WITTWER's Archiv.* 1. Th. p. 36.
- 2) Acutarum passionum libri III. ed. princeps cura Guinth. Andernacensis. Paris. 1553. 8. Tardarum passionum l. V. ed. princeps cum Oribasii scriptis. Basil. 1529. fol. Conjunct. a Jo. CONR. AMMON. Amstel. 1709. 1722. 4. Item in collection. ALDIN., HALLER. et STEPHAN. C. G. KÜHN de mediois nonnullis in Caelii Aurel. de acutis morb. I. occurrentibus. Lips. 1820. Ejusd. in Cael. Aurelianus notae DAN. GUIL. TRILLERI mss. communicantur. Prog. I—IX. Lips. 1822. 4.
- 3) De medicina libri VIII. ed. princeps. Florent. 1478. fol. Mediol. 1481. 4. Venet. 1497. fol. Aldina 1528. 8maj. RUELLII. Paris. 1529. c. comment. BALD. ROUSSEI. L. B. 1592. 4. VAN DER LINDEN. L. B. Elzevir. 1657. 12. MORGAGNI. Patav. 1722. 8. VULPII. Patav. 1750. II. Vol. 8. ALMELOVEEN L. B. 1746. 8. KRAUSE. Lips. 1766. 8. TARGA. Pat. 1769. 4. VALART. Paris. 1772. 12. PARISSET. Paris. 1811. DICKINSON. Lond. 1813. 4. LUCHTMANS. Lugd. Bat. 1785. 4. NINNIN. Paris. 1821. P. FOUQUIER et F. S.

2. Verum non omnes, qui eodem aevo vix-^{Pneumati-}
runt, sectae methodicae adhaerebant. Nova enim^{ci.}
secta ex applicatione philosophiae Platonis et Ari-
stotelis prodiit, quae, quum phaenomena corporis
humani ex principio æeriformi explicaret, *pneu-*
matica dicta est 4).

3. Non defuere vero inter pneumaticos, qui, Eclectici.
haud neglecta Hippocratis doctrina, et ex reliquis
systematibus principia sua depromerent (*Eclectici*).
Inter hos dignissimi sunt, qui commemorantur,
ARETAEUS ex Cappadocia 5) et CLAUDIUS GALE-

B 2

NUS 6),

RATTIER. Paris. 1823. — De CELSI vita et scriptis
leg. Jo. RHODII vita Celsi ad calcem diss. de acia
pondere et mensuris Celsi. Lond. 1691. 4. G. MAT-
THIAE de Celsi medicina. Goetting. 1776. 4. Jo. FR.
CLOSSII spec. observationum criticarum in Celsum.
Ultraj. 1768. 4. BIANCONI *Lettere sopra Celso*. Rom.
1779. 8. germanice. Lips. 1781. 8. FABRIC. bibl. latin.
ed. Ernesti. Tom. II. p. 36. SAXE onomastic. litt.
Tom. I. p. 237. CH. GOTTF. GRUNER comm. in
locum Celsi de sectis medicorum. Jen. 1803. GIUS.
ANT. DE CHIAPPA *discorsi medico-philologici intorno*
alle opere ed alla condizione personale di A. C. Celso.
Milano 1819. M. G. SCHILLINGII quaestio de Corn.
Celsi vita. Lips. 1824. 8.

4) J. C. OSTERHAUSEN diss. exhib. sectae pneumatico-
rum med. histor. Alt. 1791. Analecta historico-critica
de ARCHIGENE medico et de Apolliniis medicis eorum-
que scriptis et fragmentis, auct. HARLES. Erlang. 1816.

5) De morbis acutis l. IV. et de morbis chronicis ed.
princeps cura JAC. GOUXYLI. Paris. 1554. gr. lat. c.
JOH. W. WIGGAN. Oxon. 1723. fol. c. not. TRILLERI

NUS⁶⁾, vir doctissimus et in rebus anatomicis versatis-

curante BOERHAAVIO. L. B. 1731. fol. lat. Venet. 1552. fol. Paris. 1554. 16. Venet. 1763. 8. Argent. 1768. 8. De vita Aretaei leg. WIGGAN's *Abhandl. über Zeitalter, Lebensgeschichte u. s. w. des Aretaeus* (in fronte editionis suae). Cfr. C. G. KÜHN de dubia Aretaei aetate disquis. Lips. 1779. 8.

- 6) Opp. omnia 1) *graec.* ed. princeps Aldina. Venet. 1521. V Vol. fol. Basil. cur. Joach. Camerarii et Leon. Fuchsii. 1538. V Vol. fol. 2) *Graeco-latin.* ed. Renatus Chartier cum Hippocrate. Paris. 1639 et 1679. XIII Vol. fol.; item C. G. KÜHN Vol. 1—11. Lips. 1823. 8. 3) *Latin.* Venetiis per Phil. Pintium de Caneto. 1490. fol. cum prolegomenis Conr. Gesneri et indicibus Grataroli et Pantaleonis. Basil. 1562. Venet. 1541. 1550. 1556. 1563. 1570. 1575. 1586. 1600. 1609. 1625. Venet. studio Rasarii 1562. V Vol. fol. ANDR. LAGUNAE epitome operum Galeni. Venet. 1541. 8. IV Vol. Basil. 1551. fol. De vita et scriptis Galeni leg. CONRAD. GESSNER in prolegomenis ad editionem citatam. PHIL. LABBE elogium chronologicum Galeni. Paris. 1660. 8. Ejusd. vita Galeni ex propriis scriptis collecta. Paris. 1660. SPRENGEL *Briefe über Galens philosoph. System* in Ejusd. *Beiträge zur Geschichte der Medicin.* I. B. 1. St. p. 117 seq. Ejusd. *Galens Fieberlehre.* Breslau 1785. 8. ACKERMANN in FABRICII bibl. graeca ed. Harles. lib. VI. cap. 19. Vol. V. SANDIFORT exercitatt. acad. lib. I. cap. 8. p. 113. HEYNE de alexandrina schola et medicinae in eadem summo flore ipsius Galeni studio impense aucto in Ej. opusc. Vol. I. J. E. HEBENSTREIT *Palaeologia Therapiae.* Ed. C. G. GRUNER. Hal. 1779. 8.

satissimus. Galeni doctrina per multa secula in scholis non sine veneratione tradita fuit.

4. Nihilominus Galeno adhuc vivente, ma-^{Theoso-}phiae atque theosophiae principia ex Persia, Chal-^{phi.}daea, Arabia et Aegypto, Romam advecta imperium in medicinam exercuere 7).

5. Hoc tamen non impedivit, quominus e Schola
schola Alexandrina 8) medici doctrina eximii ^{Alexan-}
prodirent, ex his ORIBASIUS 9), Imperatoris Ju-
liani archiater, qui circa seculi quinti dimidium
floruit; AETIUS 10), seculo sequenti in aula con-
stantinopolitana archiater; ALEXANDER TRALLIA-
NUS

7) *Notices sur quelques superstitions et cérémonies en usage chez les anciens dans l'art de guérir. Marseille 1820.*

8) *Essai sur l'école d'Alexandrie. Par JACQ. MATTER. Paris 1820.*

9) *Collectorum medicinalium quae extant. Paris 1555.*

8. vid. H. STEPHANI art. med. princip. *Medicinisch historische Abhandlung über Oribasius, den Leibarzt des Kaisers Julian, von J. F. C. HECKER, in Ejusd. Literarische Annalen der gesammten Heilkunde. 1. B. Berlin 1825.*

10) AETII AMIDENI 4 Tetrabibl. s. medicor. veter. synops. lib. XVI. Venet. apud Aldum lat. curante J. Cornario. Basil. 1535. 1542. 1549. fol. J. E. HEBENSTREIT tentamen philologicum medicum super Aetii Amideni synops. medicor. vet. libris octo. Lips. 1757.
4. WEIGEL exercitationum Aetianarum spec. Lips. 1791. 4.

NUS¹¹⁾ et PAULUS AEGINETA¹²⁾, in arte obstetricia et chirurgica versatissimus, qui initio *seculi septimi* Alexandriae vixit.

Secula
barbara.

6. Eodem hoc seculo ad finem vergente omnium scientiarum lumina in Oriente apud Christianos defecerunt, quemadmodum vel ab initio seculi quinti ob incursiones barbararum gentium in Occidente perierant. Usque ad seculum duodecimum medicina, aliarum scientiarum instar, monachorum coenobiis sepulta delituit.

§. IV.

Arabes. Schola salernitana.

Arabes.

1. *Seculo duodecimo ex Hispania*¹⁾ *nova medic-*

11) Libri medicinales XII. ed. princ. Paris. ap. Stephanum 1548. fol. gr. lat. Basil. 1556. 8. lat. per Torinum Basil. 1533. 1544. Argentorat. 1549.

12) De re medica libri VII. ed. princ. graec. Venet. apud Aldum 1528. fol. Basil. 1538. fol. lat. per Guinter Andernac. Colon. 1534. fol. Venet. 1591. 8. Argent. 1542. fol. per Alban. Torin. Basil. 1551. 8. per J. Cornar. Basil. 1556. fol. Lugd. 1598. 8. Item in collect. Stephani v. RUD. AUG. VOGEL de Pauli Aeginetae meritis in medicinam, imprimisque chirurgiam Prol. I. II. Götting. 1768.

1) Dr. Don GARCÍAS SUELTO's kurzer Abriss der Geschichte der Heilkunde in Spanien, seit der Vertreibung der Mauren. Aus den Decadas medico-chirurgicas in Magazin der ausländischen Literatur der gesammten Heilk. von GERSON und JULIUS. Hamb. 1824. Juli, August.

dicinae lux affulsit ob Saracenorum incursiones. Inter ipsos Arabas ²⁾, dum seculo septimo Aegyptum expugnarent, medicina scientiae formam acquisivit. Ea vero praecipue seculo nono inter eos florere coepit, quo tempore medici operibus graecorum scriptorum et praesertim Aristotelis evolendis insudabant. Celebriores Graecorum interpretes apud Arabas fuere HHONAIN EBN JSHAK, JOHIAH EBN MASAWAIH. Ambo Bagdadi vivebant, florentissima tunc temporis scientiarum sede. De medicina vero bene operibus propriis meruerunt RHAZES ³⁾, EBN SINA sive AVICENNA ⁴⁾, IBN ZOHR, sive AVENZOAR ⁵⁾ et ABU'L KASEM ⁶⁾, Cordubae natus. Haec scilicet urbs Arabibus, Hispaniam inhabitantibus, scientiarum veluti emporium fuit. Medici arabes simul poeticae, philosophiae et historiographiae operam navabant; in pharmacia et semio-

2) MATH. NORBERG diss. de medicina Arabum. Lond. Scand. 1791. *Essai historique et littéraire de la médecine des Arabes. Par AMOUREUX. Montpell. 1806.*

SIM. ARONSTEIN diss. quid Arabibus in arte medica et conservanda et excolenda debeatur. Berol. 1824. 4.

3) Opera: cont. libr. X. ad Almansorem; libr. divisionum: libr. de junctis aegritudinibus pueror.; libr. de secretis etc. Mediol. 1481. f.

4) Opera, c. explanatione JACOBI de partibus. Arab. et latin. Rom. 1593. f. Latin. Ven. 1608. f.

5) Taisir i. e. rectificationis et regiminis. Venet. 1553. f.

6) Compendium artis med. Aug. Vind. 1519. f. Method. medendi libr. III. Basil. 1544. f. De chirurgia, arab. et lat. Curav. JO. CHANNING. Oxon. 1778. Vol. II.

semiotice excolenda excelluerunt. Non idem de anatomia dicendum. Seculo decimo tertio scientiae inter Saracenos hispanos coli desierunt.

Schola salernitana.

2. Monachi, in Hispania literis studentes, Aristotelis doctrinam, saltem quae ab Arabibus docebatur, *seculo duodecimo* in Galliam et Italiam intulerunt. Ex his, qui ordini St. Benedicti nomen dederant, quique in montis cassini monasterio prope *Salernum*⁷⁾ commorabantur, magnam celebritatem in rebus medicis, inprimis *seculo decimo tertio*, sibi conciliarunt. Hoc ipso tempore lepra Europam vastabat.

§. V.

Seculum XIII. XIV. XV.

Seculum XIII.

1. Interea tamen plurimae doctrinarum universitates per Galliam et Italiam *seculo decimo tertio* constitutae fuerunt. In Anglia ROGERIUS BACO¹⁾ non parum ad praeconceptas opiniones eradicandas est operatus. At medicina nil aliud quam sophismatum ex astrologia utplurimum petitorum permixtionem exhibebat, testantibus id inter caeteros GILBERTO²⁾, PETRO AB ABA-
NO³⁾

7) A. MAZZA, urbis Salernitanae historia et antiquitates. Neap. 1681. 4.

1) Opus majus de utilitate scientiarum ex codice Dublinensi nunc primum edidit Sam. Jebb. Lond. 1733.

2) Compendium medicinae, tam morborum universalium, quam particularium, non solum medicis, sed et

no³⁾ etc. Pauci enim meliora docuerunt, inter quos non omittendi THADDAEUS FLORENTINUS⁴⁾ et JOAN. DE ST. AMAND⁵⁾. Verum chirurgia inter Italos praecipue inclarescebat.

2. Etsi *seculo decimo quarto*, quo pestis ad-^{Seculum XIV.} versus omne genus hominum per Europam grassabatur, scientiarum lumen, adjuvantibus praecipue DUNS SCOTO et PETRARCA⁶⁾, diffunderetur, medicina tamen nec hilum profecit. Adhuc enim astrologiae tyrannidi subiciebatur, ut ex operibus ARNOLDI BACHUONE DE VILLANOVA⁷⁾ eruitur.

3. *Seculo decimo quinto* studium graecae lin-^{Seculum XV,} guae operum genuinorum Aristotelis evolutio et instauratio philosophiae Platonicae Florentiae praesertim sub splendidissimis Principibus *de Medicis*, scientiarum progressibus multum profuerunt. Nil vero magis ad hunc scopum contulit, quam typographicae artis inventum. Medici hoc saeculo tum studio

cyrurgicis utilissimum. Ed. Michael de Capella. Venet. 1510. 4.

3) Conciliator differentiarum philosophicar. et medicar. Venet. 1565. f.

4) Professor Bononiae inde ab anno 1260. scripsit *Expositiones in Ipocratem et Joannitium*. Venet. 1527. fol.

5) *Expositio super antidotarium Nicolai*. Venet. 1562. fol.

6) *Mémoires sur la vie de Petrarque*, par l'abbé DE SADE. Amst. 1764—67. 3 Vol. 4.

7) Opp. cum annotation. NIC. TAURELLII ex edit. JOACH. BAUDISII. Basil. 1585. fol.

studio graecarum litterarum, tum prudentia et sagacitate praeclari, sunt: ANTONIUS BENIVIENTI⁸⁾, Florentinus; ALEXANDER BENEDETTI⁹⁾, Lombardus; NIC. LEONICENUS¹⁰⁾, Vicentinus; THOM. LINACER Anglus, insignes Hippocraticae doctrinae instauratores. Hoc ipsum seculum supervenientium nonnullorum morborum caussa, ex. gr. febris sudatoriae anglicae, scorbuti, plicae polonicae et luis venereae, medicorum attentionem ad se revocare maxime debet.

§. VI.

S e c u l u m X V I.

Scholae
Hippocraticae.

1. *Seculo decimo sexto et initio sequentis scientiae*, quae praeteritis seculis potissimum intra Galliae et Italiae limites floruerant, ad Germaniam et Angliam transierunt. Innumeri Hippocratis interpretes hoc seculum illustrarunt, inter quos JOAN. WINTHER AB ANDERNACH¹⁾, LUDOVICUS DURET²⁾,
JAC.

8) De abditis morborum caussis. Florent. 1507. 4. Basil. 1529. 8.

9) De omnium a vertice ad plantam morborum signis, causis, differentiis, indicationibus et remediis Lib. XXX. Ejusd. anat. s. historiae C. H. Lib. V. Venet. 1493. 8. ibid. 1502. 4. Colon. 1527. 8. Opp. Venet. 1533. fol. Basil. 1549. fol.

10) De Plinii et plurium aliorum medicorum in medicina erroribus liber. Ferrar. 1509. 4.

1) De medicina veteri et nova libr. II. Bas. 1571. fol. Vol. II.

JAC. HOULLIER³⁾ ex Delphinatu, MANARDUS⁴⁾,
HIERONYMUS MERCURIALIS⁵⁾ ex Foro Julii, JOAN.
BAPT. MONTANUS⁶⁾, professor Patavinus, et AN-
TONIUS FOES⁷⁾, Rivodurensis.

Medici, qui seculo decimo sexto et initio se-
quentis scripserunt, non solum in Hippocratis ope-
ribus interpretandis versati sunt, sed et novis pro-
priisque observationibus medicinam locupletarunt.
Exemplo sunt WILHELMUS BAILLOU⁸⁾ et CARO-
LUS LEPOIS⁹⁾. Non parum quoque debemus me-
dicis qui scripserunt de morbis, si non novis,
saltem a nemine antea descriptis, e. c. feбри pe-
ticulari, raphania, tussi convulsiva. Ex his
memo-

2) Interpretationes et enarrationes in coacas praeceptiones
magni Hippocratis. Lugd. 1784. fol.

3) J. HOLLERI epistol. medicinal. libri XX. Basil.
1549. fol.

4) Censura et dispositio operum Hippocratis. Venet.
1583. 4.

5) Commentarii in Aphor. Hipp. Genev. 1620. 8.

6) Idea doctrinae hippocraticae de gener. pituitae; de
melanchol. humore: de coctione et praepar. humor.
etc. ed. J. CRATON. Basil. 1555. 8.

7) Oeconomia Hippocratis alphabeti serie disposita. Ge-
nev. 1662. f.

8) BALLONIUS opera omnia. Genev. 1762.

9) PISO selectiorum observationum et consiliorum de
praetervisitis hactenus morbis adfectibusque praeter na-
turam ab aqua seu serosa colluvie ortis liber singula-
ris. Ponte ad Monticulum. 1618.

memoratu digni occurrunt JOAN. FERNELIUS¹⁰⁾, Ambianus; NICOLAUS MASSA¹¹⁾, Venetus; AMATUS LUSITANUS¹²⁾, professor Ferrariae; JOH. CRATO a KRAFTHEIM¹³⁾, Vratislaviensis; VICT. TRINCAVELLA¹⁴⁾, professor Patavinus; REMBERT DODOENS¹⁵⁾, JOAN. SCHENK¹⁶⁾, FEL. PLATER¹⁷⁾, Helvetus; PETRUS FOREEST¹⁸⁾, Batavus; PETRUS SALIUS DIVERSUS¹⁹⁾, qui Faentiae, et MARCELLUS DONATUS²⁰⁾, qui Mantuae medicinam exercuit.

Deni-

- 10) *Universa medicina* libr. XXIII. studio GUIL. PLANTII, Cenomani. Frft. 1574. 8. Vol. II.
- 11) *Epist. medicinal.* Venet. 1558. 4. Vol. II.
- 12) *Curat. medicinalium* Cent. VII. Venet. 1566. fol.
- 13) *Consilior. et epistol. medic. Cratonis ex Pt. Monavii* collectan. collector. libr. I. ed. LAUR. SCHOLZIUS. Francf. 1591. 8. Lib. II et III. ib. 1592. Lib. IV et V. 1593. Lib. VI et VII. Hanov. 1611. *Collectae prodiere* Francf. 1654. 8.
- 14) *Consilia medica* post editt. Ven. et Lugd. accessione CXXVIII. consiliorum locupletata etc. Basil. 1587. fol.
- 15) *Observ. medicinalium exempla rara.* Colon. 1581. 8.
- 16) *Observationum medicar. omnium novar. admirab. et monstros.* To. VII. ed. JO. GEORGIO filio. Francf. 1600. f.
- 17) *Observationum in hominis affectib.* lib. III. Basil. 1614. 8.
- 18) *Observat. et curat. medic.* libr. medicin. lib. XXX. Francf. 1602—7. fol.
- 19) *De febre pestilenti tractat. et cur. quorund. particul. morbor., quor. cur. ab ordin. pratic. non habetur etc.* Bonon. 1584. 4.
- 20) *De historia medica* libri VI. opus varia lectione re-

Denique non solum practicas observationes collegerunt, sed et semioticam excoluerunt PROSPER ALPINUS²¹⁾, propè Vicentiam natus, et JODOCUS LOMMIUS²²⁾, e Geldria oriundus. Omnem porro praxin medicam compendiis suis complexi sunt JOAN. RIOLAN pater²³⁾ et JACOB DU BOIS²⁴⁾, professores Parisienses, NICOLAUS PISO²⁵⁾, FELIX PLATER²⁶⁾, LUDOVICUS SETTALA²⁷⁾, Mediolanensis; HIERON. CARDANUS²⁸⁾, FRANCISCUS VALERIO-LA²⁹⁾, professor Taurinensis. — Inter omnes eminet HIERONYMUS FRACASTORI³⁰⁾.

2. De

fertum. Mant. 1586. 4. Cum GREG. HORSTII not. et addito libro VII. Frft. 1613. 8.

21) De praesag. vita et morte Lib. VII. Patav. 1601. 4. et c. praef. BOERHAAVII et ex emend. GAUBII. Lugd. Bat. 1733. 4.

22) Observ. medicinalium libr. III. Amst. 1715. 8.

23) Universae medicinae compend. Paris. 1598. 8.

24) Opera omnia med. jam demum in VI. part. digesta etc. stud. REN. MOREAU. Colon. Allobr. 1630. f.

25) De cognoscendis et curandis praecipue internis c. h. morbis libr. III. Francof. 1585. fol. Cum praef. H. BOERHAAVE. L. B. 1736. 4. Voll. II.

26) Praxis medica. Bas. 1625. 4.

27) Animadversionum et caut. medicar. libr. VII. Dordr. 1650. 8. Patav. 1659. 8.

28) Opp. edit. C. Spon. Lugd. 1663. X Vol. fol.

29) Loci medicinae communes III libri etc. Venet. 1562. Enarrationum libri VI. responsionum I. Lugd. 1564. fol. Observationum medicinalium libri IV. Lugd. 1573. fol.

30) Opera omnia philosophica et medica. Venet. 1555.

Restaura-
tio anato-
miae.

2. De anatomia, quae seculo decimo sexto opera praesertim VESALII, EUSTACHII, FALLOPII, VAROLII, BAUHINI, FABRICII *ex aquis taurinis* magis perficiebatur, utpote de alieno quodammo-
do argumento, non loquamur.

Concilia-
tores.

3. Non pauci inter medicos hujus aevi doctri-
nam Graecorum et Arabum inter se conciliare sate-
gerunt, uti Jo. BAPT. SYLVATICUS³¹⁾, professor Ti-
cini, et MICHAEL SERVETO³²⁾, Hispanus. At cum
fieri hoc semper non posset, inde innumerae dis-
ceptationes ortae sunt, inter quas eam non praeter-
ibo de loco, quo vena in morbis secanda sit, utrum
scilicet Graecorum more, suadente PETRO BRIS-
SOT³³⁾, in viciniis loci affecti, an Arabum, secun-
dum VICTORII TRINCAVELLI³⁴⁾ consilia, in loco
remoto, ut nempe revulsio fiat. Acerrime Galenum
aggressi sunt JOAN. ARGENTIER³⁵⁾, Pedemontanus,

LAU-

4. Lugd. 1591. II Vol. 8. Genev. 1671. 8. — FR.
OTTO MENKE de vita, moribus, scriptis meritisque
in omne literarum genus Hieronymi Fracastori. Lips.
1731. 4.

31) Controversiae med. centum. Francof. 1601. fol.

32) Syruporum universa ratio ad Galeni censur. dilig.
exposita. Ven. 1545. 8.

33) Apologetica disceptatio de vena secanda in pleuriti-
de. Basil. 1529. 8.

34) De vena secanda in pleuritide medica ratio. Ven. 1539.
8 et col. 985. ad calc. *consilior. med.* Basil. 1587. f.

35) Opera nunquam excusa. Venet. 1592. f.

LAURENT. JOUBERT³⁶⁾ et WILHEL. RONDELET³⁷⁾,
professores Montis-pessulani, nec non ANDREAS
DUDITH a HORKÓWICZ Hungarus.

§. VII.

S é c u l u m XVII.

1. Verum ne credamus, medicos omnes me-^{Paracel-}
morati aevi viam observationis inivisse, et com-^{sus.}
mentationibus valedixisse. Plurimi enim, ut seculi
mos ferebat, astrologiae, magiae, alchymiae ad-
haerebant, ac PARACELSO¹⁾, Helveto, viro acris
quidem ingenii, ast omni eruditione destituto et
Graecorum detrectatore, viam parasse videntur.
Vix enim aliud quid doctrina Paracelsi exhibet,
quam ingenii humani ob memoratas caussas a
recto tramite aberrationes. Interea huic doctrinae
multi se tradiderunt praesertim inter Germanos.
Vehementer autem oppugnata fuit a THOM. ERA-
STO²⁾, Helveto.

2. Se-

36) Paradoxorum decad. II. Lugd. 1566. 8.

37) Opera omnia medica, ab infinitis mendis repurgata
stud. J. CROQUERI. Genev. 1620. 8.

1) Opera omnia medico-chemico-chirurgica. Cura Jo.
HUSERI. Basil. 1589. 4. Voll. X. *Paracelsum* ad spa-
dones pertinuisse ac ejus cranium femineam exhibuisse
formam, OSIANDER, postquam illius sepulcrum Sa-
lisburgi visitaverit, contendit. V. *Göttingische Ge-
lehrten-Anzeigen*. 1817. No. 132.

2) Disputationum de medicina nova Phil. Paracelsi Part.
IV. Basil. 1572. 1573. 4.

Baco, Sy-
denham,
Baglivi
etc.

2. *Seculo decimo septimo* ineunte, vir immortalis FRANCISCUS BACO a VERULAMIO³⁾, sicuti ad caeteras scientias ita et ad medicinam excolendam regulas et praecepta optima, cum Hippocraticis omnino concordantia, tradidit. Ea secutus est THOMAS SYDENHAM⁴⁾, Angliae decus. Hic a doctrina iatro-chemicorum suo aevo vigente abhorrens, regulas eximias plurimis morbis mendi detexit. Illi aemulatus est, contemporaneus ac conspicuus quoque in praxi vir RICHARDUS MORTON⁵⁾. SYDENHAMI vestigia legit GEORGIUS BAGLIVIVS⁶⁾ Ragusanus, qui, etiamsi vix ad aetatis florem pervenerit, nobis primus post Hippocratem est⁷⁾. Praeterea *seculi decimi septimi medium finemque* versus, quo tempore non paucae doctrinarum universitates, academiae et societates literariae mirum in modum floruerunt, anatomia nec non physiologia magnis inventis (circulatio quippe

3) FRANCISCI BACONIS a VERULAMIO Sylva sylvarum s. historia naturalis centur. X. Lond. 1738. fol. Ejusd. de augmentis scientiarum. L. B. 1652. Ej. Historia vitae et mortis. Ej. Opera omnia ed. Th. Birsch. Lond. 1740. 4 Vol. fol.

4) *The entire Works.* 5. edit. By J. SWAN. Lond. 1769.

5) Opp. T. I. II. III.

6) Praxis medica. Antwerp. 1715.

7) DE BAGLIVIO dicere possum: „*Thou wast my Guide, Philosopher and Friend.*“ POPE's *Essay on man.* Ep. 4. vers. 390.

quippe sanguinis⁸⁾ et vasa lymphatica⁹⁾ reperta sunt) exornabantur, et Paracelsi doctrina ab erroribus, quoad fieri licebat, purgabatur. Praecipue eam cum praeceptis Graecorum componere conati sunt ANDREAS LIBAVIUS¹⁰⁾, DANIEL SENNERT¹¹⁾, RAIMUNDUS MINDERER¹²⁾, ADRIANUS MYNSICHT¹³⁾, LAZARUS LA RIVIERE¹⁴⁾. Maxime vero memorabilis est THEOPHILUS BONET¹⁵⁾, qui, quatenus anatomiam pathologicam excoluit, novum medicinae campum aperuit. Tandem medicinam magis magisque ad observationem et experientiam reduxerunt THOMAS BARTHOLIN¹⁶⁾, JO. JAC.

WE-

8) GUIL. HARVAEI Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis circulatione in animalibus. Francof. 1623. 4.

9) CASP. ASELLII de lactibus seu lacteis venis Diss. opus posthum. Mediol. 1627. 4.

10) Oeconomia animalis in transactiones divisa. Amst. 1741.

11) Practicae medicinae libri IV. Viteb. 1623 — 35. 4. Voll. I—IV. Opp. Lugd. 1676. fol. Voll. IV.

12) Medicina militaris, s. lib. castrensis euporista — continens. Aug. Vind. 1621. 8.

13) Thesaurus et armamentarium medico-chymicum. Hamb. 1631. 4.

14) Praxis medica cum theoria ed. XL. Hag. Com. 1658. 8. Observationes insignes. Cent. tres. Hag. Com. 1656. 8.

15) Sepulcretum anatomicum s. anatomia practica ex cadaveribus morbo denatis. Genevae 1679. Edit. auct. a Manget. Lugd. 1700.

16) Historiarum anatomicarum rariorum, Cent. VI. Hafn. 1654 — 1661. Vol. III. Epistolarum medicarum.

Frank Prax. I. 1. 1.

C

WEFFER¹⁷⁾, FABRICIUS HILDANUS¹⁸⁾, ZACUTUS LUSITANUS¹⁹⁾, THEODORUS KERKRING²⁰⁾, FRIDERICUS RUYSCH²¹⁾, NIC. TULPIUS²²⁾, GREGOR. HORST²³⁾, THOMAS WILLIS²⁴⁾, FRANCISCUS REDI²⁵⁾, STOLPERTUS VAN DER WIEL²⁶⁾, STEPH. BLANKART²⁷⁾ et NIC. PECHLIN²⁸⁾.

3. Quo

Cent. IV. Hafn. 1663—67. Vol. IV. Acta medica et philosophica Hafniensia. 1675—80. Vol. V.

17) Historiae apoplecticorum observationibus et scholiis anatomico-medici illustratae. Scaphus. 1658. — Observationes anatomicae ex cadaveribus eorum, quos sustulit apoplexia. Amst. 1681. — Observationes practicae de affectibus capitis externis et internis. Scaph. 1727.

18) Observationum chirurgicarum. Cent. VI. Basil. 1606. — Anatomiae praestantia et utilitas. Bern. 1624.

19) Praxis historiarum morborum. Lib. V. Amst. 1641. Praxeos medicae admirandae. Lib. III.

20) Spicilegium anatomicum. Amst. 1670.

21) Opp. Amstel. 1721—25. Vol. II.

22) Observationes medicae. Edit. quarta. Amstel. 1672.

23) Observationum medicinalium singularium. Libri IV. Acc. epistol. et consultat. liber. Ulm. 1625. Specimen anatomiae practicae. Francf. 1678.

24) Opp. omnia. Genevae 1680. 4.

25) *Lettere e consulti med.* Nap. 1778. Vol. VII. 8.

26) Observationes rariores anatomicae. Lugd. Bat. 1687. Vol. II.

27) Anatomia practica rationalis, s. variorum cadaverum morbis denatorum anatomica inspectio. Amst. 1688.

28) Observationum physico-medicarum. Lib. III. Hamb. 1691.

3. Quo tempore laudati viri in medicina ex-^{Van Hel-}
purganda incumbabant, JOA. BAPT. VAN HEL-^{mont.}
MONT²⁹⁾, vir quidem eruditione insignis, sed ima-
ginationis aestu non raro abreptus, super rudibus
doctrinae Paracelsi novum medicinae systema stru-
xit, sanitatis aequae ac aegritudinis phaenomena
ex spiritu quodam occulto, *archeo* nuncupato,
nunc propitio, nunc adverso, derivans.

4. Ex Helmontii doctrina simulque in auxi-^{Iatro-chemi-}
lium philosophia Cartesii petita FRANCISCUS SYLVIVS
DE LA BOE³⁰⁾ novum medicinae systema condidit,
in quo morborum origines ab effervescentia salium
variorum, in humoribus corporis humani praesen-
tium, et fermento morbozo inde nato, derivantur.
Huic *iatro-chemico systemati*, curam morborum
in expellendo fermento per remedia sic dicta alexi-
pharmaca quaerenti, adhaeserunt THOMAS WIL-
LIS³¹⁾, RAIMOND. VIEUSSENS³²⁾, JO. JAC. WALD-
SCHMIDT³³⁾, GEORG. WOLFGANG. WEDEL³⁴⁾, MI-

C 2

CHAEI.

29) Opera omnia, edid. fil. FRC. MERC. VAN HELMONT.
Amst. 1652. 4.

30) Opera medica. Edit. nova. Amst. 1679. 4. Ultraj.
et Amst. 1695. 4.

31) Opera omnia. Genev. 1680. 4.

32) *Histoire des maladies internes. à Toulouse* 1774. 4.

33) Institutiones medicinae rationalis. Marb. 1688. 3.
Opera omnia. Francf. 1695. 4. 1707. 8. Voll. II.

34) Physiologia medica. Jen. 1679. 4. Pathologia me-
dica. Ibid. 1692. 4. etc. Epitom. prax. clinicae. Jen.
1720. 4.

CHAEI. ETTMÜLLER³⁵⁾ etc.; in illius falsitate demonstranda praeter SYDENHAMUM ROBERT BOYLE³⁶⁾, frustra tamen, adlaboravit. Attamen inter ipsos vix allatos iatro-chemicos non defuere, qui medicinae progressibus prospexerunt. Sic TH. WILLIS³⁷⁾ anatomiam pathologicam locupletavit; sicque W. WEDELIi schola germina pretiosa includebat³⁸⁾. Haec quoque schola ob egregias quas edidit *dissertationes inaugurales* celebranda est. Illarum permultae quoque sedulitati MEIBOMII, VESTII, ETTMÜLLERI, VATERI, BOHNII etc. debentur.

Nova
schol Hip-
pocratica.

5. Praeterea *seculo decimo septimo in seculum decimum octavum* transeunte, medicinam iterum ad illam quam Hippocrates, Sydenham et Baglivi indicarunt viam magis magisque duxerunt *fautores anatomiae pathologicae* — JOANNES JACOBUS MANGET³⁹⁾, JOANNES MAURITIUS HOFFMANN⁴⁰⁾, J. M. LANCISIUS⁴¹⁾, *peregrinatores studio*

35) Opera omnia, stud. MICH. ERN. filii. Francf. ad Moen. 1708. Voll. III. Cum mult. additam, NIC. CERRILLI. Neap. 1728. f. Voll. V.

36) *Works.* Lond. 1744. 4. Vid. *Septical chymist*.

37) *Pathologia cerebri et nervosi generis.* Oxon. 1677.

38) Prodiere ex hac schola Jenensi FR. HOFFMANN et ERN. STAHL.

39) *Bibliotheca anatomica illustrata et aucta.* Genev. 1699. *Theatrum anatom.* Ibid. 1716. Vol. II.

40) *Disquisitio corporis humani anatomico-pathologica.* Alt. 1713.

studio climatum et morborum endemicorum intenti, idem LANCISIUS⁴²⁾, JACOBUS BONTIUS et WILHELMUS PISO⁴³⁾, ANDREAS CLEYER⁴⁴⁾, E. KÄMPFER⁴⁵⁾ etc.; *indagatores imperii quod diversa munera et opificia in morbos exercent* — DE SOTO⁴⁶⁾, MICHAELIS⁴⁷⁾, L. A. PORTIO⁴⁸⁾, W. COCBURN⁴⁹⁾, P. CHIRAC⁵⁰⁾, CHR. VATER⁵¹⁾, B. RAMAZZINI⁵²⁾, ASCHEBERG⁵³⁾, J. KUPFERSCHMIDT⁵⁴⁾, THOM⁵⁵⁾, HETZEL⁵⁶⁾, FÜRSTENAU⁵⁷⁾,
FR.

41) De mortibus subitaneis. Rom. 1707.

42) De nativis deque adventitiis Romani coeli qualitatibus. ib. 1717. Opp. Genev. 1718. Vol. II. s. Rom. 1745. Vol. IV.

43) Hist. natur. Indorum. Amst. 1658.

44) Specimen medicinae Sinicae. Francf. 1682.

45) Amoenitat. exoticæ. Lemgo 1712.

46) *Discurso de las enfermedades por que pueden los religiosos depor la clausura.* Madrit 1639.

47) Diss. de morbis metallicorum. Lips. 1652.

48) De militis in castris sanitate tuenda. 1683.

49) *Sea-diseases, or a treatise of their nature, causes and cure.* Lond. 1696.

50) *Observations sur les incommodités aux quelles sont sujets les équipages des vaisseaux.* Paris 1724.

51) De morb. classiariorum et navigantium. Witenb. 1715.

52) Opp. omn. Genev. 1717. (De morbis artificum).

53) Diss. de morbis religiosorum. Erf. 1720.

54) De morbis praeliantium quos quidem in victoriosa Bernatum expeditione Bellica a. 1712. passim inter milites praeliantes observavit J. KUPFERSCHMIDT. Basileae 1715.

55) Diss. de morbis Monachorum. Giess. 1728.

FR. HOFFMANN⁵⁸⁾; *scriptores monographiarum* — J. B. BIANCHI⁵⁹⁾, FR. TORTI⁶⁰⁾, M. SCHURIG⁶¹⁾ etc. Tandem multum lucri ab *academiis scientiarum et diariis literatis*, nunc primum stabilitis editisque obtinebatur⁶²⁾.

§. VIII.

- 56) Diss. de valetudine salis coctorum. Altd. 1731.
 57) Epistola ad C. UFFENBACH de morbis juris consultorum. Fr. ad M. 1721. — Diss. de morbis medicorum. Rintel. 1732.
 58) Diss. de morbis peregrinantium. Hal. 1734. Opp. Supplem. II. P. I.
 59) Histor. hepatica. Aug. Taur. 1710.
 60) Therapeutice specialis ad febres quasdam perniciosas inopinate ac repente letales, una vero china, peculiari modo administrata, sanabiles. Mutinae 1709. auct. ib. 1730.
 61) Decem monographias ab a. 1710 — ad — 1744. Dresdae conscripsit.
 62) *Philosophical transactions.* London 1665. — *Journal des sçavans.* Paris 1665. — *Miscellanea s. Ephemer. medico-phys. Academiae naturae curiosorum.* Decur. III. Francof. 1670. Ab a. 1712. sub titulo: *Ephem. s. observationes medico-physicae.* X. Centur. Ab a. 1727. sub titulo: *Acta physico-medica.* X. Vol. — ab a. 1757. *Acta nova physico-medica Acad. Caesar. Leopoldinae naturae curiosorum.* Bonn. — NIC. DE BLEIGNY *nouvelles découvertes sur toutes les parties de la médecine.* 1679. Lat. Jodaicus medico gallicus. Genev. 1680. ST. BLANCAART *collectanea medico-physica.* Amst. 1689. — *Acta eruditorum.* Lips. 1682. *Nova acta erudit.* ibid. 1732. — *Histoire de l'acad. R. des sciences de Paris avec les mémoires.* 1699. — *Miscellanea Berolinensia.* 1710. Ab a. 1744. sub titulo: *Histoire de l'a-*

§. VIII.

Seculi XVIII. Initium.

1. Ast medicina ad nova fata reservata erat. ^{Iatro-ma-}
 Incunte nempe *seculo decimo octavo* principia ^{thematici.}
 matheseos, mechanicae, et hydraulicae, illi applicata fuere, quod praesertim GALILEO GALILEI¹⁾ deberi videtur. Verum etsi extra dubitationis aleam positum sit, SANCTORIUM²⁾ fundamenta doctrinae *iatro-mathematicae* jecisse, atamen legitimus hujus systematis auctor Jo. STEPH. BORELLI³⁾, censetur, opera praesertim BERNOULLI⁴⁾. Asseclae doctrinae *iatro-mathematicae* numeran-

cadémie des sciences et des belles lettres, avec les mémoires. Ab a. 1770. sub titulo: Nouveaux Memoires. — Sammlung von Natur- und Medicin-, wie auch hierzu gehöriger Kunst- u. Literaturgeschichten. Breslau. 38. Vol. et 4. Suppl. — Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae 1726. Vol. XIV. Novi Commentarii. 1747. Vol. XX. Acta acad. 1770. — Commentarii Bononienses. 1731. — commercium literarium Noricum. 1731. Vol. XV. Commentarii Lipsienses. Vol. I—XXXV. c. supplem. Medical Essays and observations. Edinburgh 1733—42. Vol. VI. Essays and observations physical literary. ibid. 1754. Svenska Vetenskapacademiens Handlingar. Holm. 1739. Vol. 41. — Nya Handlingar. 1780.

1) SPRENGEL. Op. cit. IV. Vol. p. 473.

2) Ars de medicina statica section. aphorismor. VII. comprehensa. Venet. 1614. 12.

3) De motu animalium. Pars I et II. L. B. 1710. 4.

4) De musculorum motu. Groning. 1697. 4.

merantur FRANCISCUS BOISSIER DE SAUVAGES⁵⁾,
PITCARN⁶⁾, JACOB KEIL⁷⁾, LAUR. BELLINI⁸⁾,
PHIL. HECQUET⁹⁾ et quodammodo etiam GEORG.
CHEYNE¹⁰⁾.

Newtoni princip. med. applic. 2. Ipsa NEWTONI principia medicinae adaptarunt ROBINSON¹¹⁾, YVO GAUKES¹²⁾, PERRY¹³⁾, CLIFTON WINTRIGHAM¹⁴⁾, RICHARD MEAD¹⁵⁾; de quibus egregiis viris tamen notandum, eos principia matheseos potius ad phaenomena sanitatis et aegritudinis explicanda, quam ad ipsos morbos curan-

5) Nosologia methodica. Amst. 1768. 4. Castigav. emend. aux. icones etiam ad nat. pictas adjeo. C. F. DANIEL. Lips. 1798. 8. To. V.

6) Element. medicinae physico-mathemat. Neapol. 1721. 4. Ven. 1740. 4.

7) Tentamina medico-physica. Acc. med. statica Brit. L. B. 1725. 4.

8) Opuscula de motu cordis, bilis etc. L. B. 1714. 4. De struct. et usu ren. ut et de gust. organo. L. B. 1711. 4. De urinis et pulsib. etc. L. B. 1717. 4.

9) Médecine naturelle, vue dans la pathologie vivante. Ed. II. Paris 1738.

10) *A new Theory of acute and slow continued fevers.* London 1722. 8.

11) *New theory of physic and diseases.* London 1725.

12) Diss. de medicina ad certitudinem mathematicam evehenda. Amst. 1712. 8.

13) *Treatise of Diseases.* London 1741.

14) Tract. de podagra. Eborac. 1714. 8.

15) Opera medica. Ed. III. Gott. 1749. 8. Voll. II.

curandos applicasse, quo scilicet in opere experientiam sequebantur.

3. Idem de HERMANNO BOERHAAVIO¹⁶⁾, Lug-Boerhaave.
duni Batavorum praxin medicam summa cum
gloria docente¹⁷⁾, dicito, qui in theoria quidem
inter principia iatro-mathematica et iatro-chemica fluctuavit, in praxi vero naturam unice secutus est. Aemulum in discipulo, GERHARDO VAN SWIETEN¹⁸⁾ habuit.

4. Ejusdem *seculi decimi octavi initio*, vir <sup>Medicina
dynamica.</sup> ^{Stahl.}
subtilissimi ingenii, Wedelii discipulus, ERNESTUS STAHL¹⁹⁾, novam medicinae theori-
am excogitavit. Hujus doctrinae cardo in hoc consistit, quod humores et solida corpus humanum constituentia, instrumenta tantum sistant, quibus principium corporis expers, anima scilicet, ad varia phaenomena, tum secundae tum adversae valetudinis excitanda, utitur. Anima morbis sanandis intenta est, medicus ministerium suum eidem praebet. Semina doctrinae Stahlii jam apud SWAMMERDAM²⁰⁾, PER-
RAULT,

16) Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis. L. B. 1727. — Praxis medica s. commentarius in aphorismos. Patav. 1728.

17) „Adeo disertè, dilucidè, candidè, vir egregius sua praecepta dabat, ut pares in arte ipsâ habuisse possit, in arte docendi, neminem.“ (HALLER).

18) Commentarii in BOERHAAVII aphorismos. L. B. 1745 — 73.

19) Theoria medica vera. Hal. 1737. 4.

20) Bibel der Natur. 2. B. S. 844.

RAULT²¹⁾, MALEBRANCHE²²⁾ et in ipso demum Helmontii systemate inveniuntur. Ipsum autem Stahlii systema, aut saltem potiores ideas in eo contentas, plus minusve amplexi sunt JOANNES JUNKER²³⁾, JO. SAM. CARL²⁴⁾, JO. DAN. GOHL²⁵⁾, MICH. ALBERTI²⁶⁾, FRANC. NICHOLLS²⁷⁾, WILL. PORTERFIELD²⁸⁾, ROBERT WHYTT²⁹⁾, JO. AUG. UNZER³⁰⁾, CLAUD. NIC. LE CAT³¹⁾, BORDEU³²⁾, LUD. DE LA CAZE³³⁾, PAUL. JOS. BARTHEZ³⁴⁾, ERN. PLATNER³⁵⁾ etc.

5. Al-

21) *Oeuvres de physique et de mathématique. Amst. 1727.*

4. T. 2. p. 530 — 535.

22) *Entretien sur la métaphysique et sur la religion. Rotterdam 1688. p. 230 — 242.*

23) *Conspectus therapiæ generalis. Hal. 1725.*

24) *Synopsis medicinae Stahlianæ. Buding 1724. 8.*

25) *Gedanken über den von Vorurtheilen kranken Verstand in der Materie von Nervengeistern. Halle 1733. 8.*

26) *Introductio in universam medicinam. Halæ 1718. 4.*
Therapiæ medicæ praxis universalis et praxis extemporanea. Hal. 1721.

27) *De anima medica praelectio. London. 1748.*

28) *Medical essays and observations of Edinb. Voll. IV.*

29) *Works, published by his son. Edinb. 1768. 8.*

30) *Gedanken vom Einfluss der Seele in ihren Körper. Halle 1746. 8.*

31) *Traité des sensations et des passions. Paris 1767. 8.*

32) *Recherches sur le tissu muqueux et sur l'organe cellulaire. Paris 1766. 12.*

33) *Institutiones medicæ, e novo medicinae conspectu. Paris. 1754.*

5. Alter Wedelii discipulus, eximius vir, FRI-FR. HOFFMANN³⁶⁾, proprium condidit systema,^{mann.} vires duplicis generis in corpore humano statuens, materiales scilicet et spirituales, quarum primae legibus mechanicis generalibus, alterae legibus sui generis obtemperant. Morbi juxta Hoffmannum ex motus vel excessu (spasmo), vel defectu (atonía), nascuntur. Humorū vitia pro secundariis habentur. In morbis tractandis Hoffmannus magis experientiam, quam proprium systema secutus est: quamobrem facile intelligitur, cur eminentissimum suum opus³⁷⁾, ut praxis ad illius normam dirigatur, prae omni alio, inservire possit. Nemo ante FR. HOFFMANNUM, quid *fontes salutares* in morbis rebellibus sanandis valeant, satis intellexerat³⁸⁾. Illius doctrinae addicti fuere vel ad eam saltem accessere ANDR. EL. BÜCHNER³⁹⁾,

ADAM

34) *Nouveaux élémens de la science de l'homme*. Montpellier. 1778. 8.

35) *Neue Anthropologie für Aerzte und Weltweise*. Th. I. Leipzig 1790. 8.

36) *Opera omnia*. Genev. 1740. fol. Voll. XI. Ibid. 1761. f. Tom. VI. c. supplem. Tom. II.

37) *Medicina rationalis systematica*.

38) *Opp.* Vol. V. p. 153. FR. HOFFMANNI adversarii doctrinae istius partem aggressi sunt, uti videre est ex STAHLII et GARTNERI diss. de fontium salutarium usu et abusu. Hal. 1713.

39) *Fundamenta pathologiae specialis*. Halae 1747. 8. *Fundamenta therapiae generalis* 1747. 8.

ADAM NIETZKY⁴⁰⁾, JOH. PET. EBERHARD⁴¹⁾, JOSEPH REGA⁴²⁾, BROWNE LANGRISH⁴³⁾, JO. DE GORTER⁴⁴⁾, JOH. ANT. PUSATI⁴⁵⁾ etc.

Conciliatores.

6. Principia Hoffmanni iis revera non valde absimilibus H. Boerhaavii juncta fuere ab HEN. DAN. GAUBIO⁴⁶⁾, JO. OSTERDYK SCHACHT⁴⁷⁾, CHRIST. GOTTL. LUDWIG⁴⁸⁾, RUDOLPH AUCUSTIN VOGEL⁴⁹⁾, JOA. THEOD. ELLER⁵⁰⁾, JOH. DOM. SANTORINI⁵¹⁾, ANTONIO FRACASSINI⁵²⁾ etc.

7. De

40) *Elementa pathologiae universae.* Hal. 1766. 8.

41) *Conspectus medicinae theoreticae et hygienae.* Hal. 1757. 8.

42) *De sympathia, seu consensu partium corporis humani.* Harlem. 1721. 4.

43) *A new essay on muscular motion, founded on experiments and Newtonian philosophy.* Lond. 1733.

44) *Exercitationes medicae quatuor.* Amstel. 1737. 4.

45) *Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici.* T. I. p. 127 — 246.

46) *Institutiones pathologiae medicinalis.* Lugd. Batav. 1738. 8. Ed. alt. in Germania. Lips. 1781. 8.

47) *Institutiones medicinae practicae ad auditorum potissimum usus in epitomen redactae.* Traj. ad Rhen. 1767. 8.

48) *Institutiones pathologicae.* Lips. 1754. 8. *Institutiones therapiae generalis.* Lips. 1771. 8.

49) *Academicae praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani adfectibus.* Goetting. 1772. 8.

50) *Observationes de cognoscendis et curandis morbis, praesertim acutis.* Regiomont. 1762. 8.

51) *Istruzione intorno alle febbri.* Venez. 1734.

7. De initio seculi decimi octavi loqui non Vallisne-
cessabimus, quin summo viro, Italiae decori, in^{ri.}
physica et in historia naturali aequae ac in praxi
medica parem vix habenti, ANTONIO VALLISNERI
venerationis tributum persolvamus⁵³⁾.

§. IX.

Seculi XVIII. Medium.

1. Impulsio a REDIO, VALLISNERIO et LAN-
CISIO, aequae ac a triumviris FRIDERICO HOFF-
MANNO, ERNESTO STAHLIO et HERMANNO BOER-
HAAVIO medicinae conciliata, nec non progressus
scientiarum auxiliarium, *auream* ejus *epocham*,
seculi decimi octavi medium adornantem procrea-
vit. Epocha
aurea.

2. Physiologiam ab hypothesebus expurgavit, Physiolo-
giam et
principiis vere philosophicis superstruxit, invento ^{anatomia}
irritabilitatis locupletavit, ac opere, sine pari, ^{patholo-}
exornavit¹⁾, viro memoria stupenda aequae ac in-
genio sublimi praeditus, summus anatomicus²⁾
atque pathologus³⁾, nec non egregius botanicus
et

52) Tractatus theoretico-practicus de febribus. Veron.
1730.

53) *Opere fisico-mediche*. Venez. 1733. fol.

1) *Elementa physiologiae*. Lausan. 1757—66. Vol. VIII.

2) *De partium corporis humani fabrica et functionibus*.
Bern. 1777. Vol. VIII.

3) *Commentarii ad praelectiones Boerhaavii in institu-*
tiones proprias. Goetting. 1739—44. Vol. VI. —
Opuscula pathologica 1768. *Collectio disputationum*

et poeta, Helvetiae aeternâ gloriâ natus, ALBERTUS HALLER. Eodem aevo JOANNES BAPTISTA MORGAGNI, Forliensis, VALSALVAE⁴⁾ discipulus, in archigymnasio, quod Patavii floret, anatomiam tradidit, partemque illius pathologiam respicientem opere ingenioso et laborioso excoluit⁵⁾, itaque

ad morborum historiam et curationem facient. Laus. 1756. Vol. VII.

4) Professor anatomiae Bononiae.

5) De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis. Venet. 1761. — Sciendum praeterea, exstare manuscripta hucusque inedita MORGAGNII, tum ad praxin medicam (in qua, quod pauci norunt, excellerat), tum ad anatomiam spectantia. Quum nimirum autumnus a. 1824. Venetiis fuero, Dr. AGLIETTI, audiens me inde *Parmam* profecturum esse, me invitavit, ut in bibliotheca Ducali ibi exstante in manuscripta MORGAGNII inspicerem. Miratus quum interrogarem, quo pacto talia manuscripta, quae potius Patavii expectassem, Parmam pervenerint, AGLIETTI mihi rem sequenti modo explicavit. Defuncto a. 1771. MORGAGNIO, schedae a summo viro relictæ, manibus discipuli sui dilecti GIRARDI, Parmæ professoris munere fungentis, traditæ fuere. Quum vero et hic obiret, dictæ schedæ ad bibliothecam Ducalem translatae sunt, ubi revera hunc thesaurum reperi, et in quantum tempus admisit, lustravi. *Consilia medica*, idiomate partim latino, partim italico exarata, maximi videbantur mihi momenti. Sermone hac de re coram Sua Majestate MARIA LUDOVICA instituto, *Ipsa* mox, ut schedæ Morgagnianæ selectæ et in debitum ordinem redactæ, publici juris reddantur, jus-

que probans, nec ingenium labori, nec laborem Italis aliena esse. Lacunas a Morgagnio relictas, JOSEPHUS LIEUTAUD⁶⁾ adimplevit. Praeterea anatomiae pathologicae limites extenderunt PETRUS BARRÈRE⁷⁾, SAMUEL CLOSSI⁸⁾, JOSEPHUS BENVENUTI⁹⁾, FRANCISCUS BIUMI¹⁰⁾, CASPARUS FORLANI¹¹⁾, CHR. G. BÜTTNER¹²⁾, JAC. FRID. MECKEL¹³⁾, JOSEPH BAADER¹⁴⁾, CHR. GOTTL. LUDWIG¹⁵⁾,
PE-

sit. Seligendi negotium in archiatrum *Suum*, LUDOVICUM FRANK, collocatum est, qui vero quum paullo post fatum supremum subiret, quid dein contigerit, ignoro.

- 6) *Historia anatomico-medica, sistens numerosissima cadaverum humanorum extispicia, quibus in apricum venit genuina morborum sedes.* Par. 1767.
- 7) *Observations anatomiques tirées de l'ouverture des cadavres.* Perpign. 1751.
- 8) *Observations on some of the diseases of human body taken from the dissections of morbid bodies.* Lond. 1763.
- 9) *Observationum medicarum quae anatomiae superstructae sunt.* Lucae 1764.
- 10) *Observationes anatomicae scholiis illustratae.* Mediol. 1765.
- 11) *Rariores observationes medico-practicae et anatomicae.* Venet. 1769.
- 12) *Anatom. Wahrnehmungen.* Königsb. 1769.
- 13) *Physiologische u. anatom. Abhandlungen.* Berlin 1755.
Et *Mémoires de l'acad. des sciences de Berlin.* passim.
- 14) *Observationes medicae incisionibus cadaverum anatomicis illustratae.* Friburg. 1763.
- 15) *Adversaria medico-practica.* Lips. 1769—73.

PETRUS CAMPER¹⁶⁾, EDUARD SANDIFORT¹⁷⁾, RICHARD BROWNE CHESTON¹⁸⁾, WILHELMUS¹⁹⁾ et JOANNES HUNTER²⁰⁾, J. F. ISENFLAMM²¹⁾ et JOANNES ERNESTUS GREDING²²⁾.

Materia
medica.

3. Historia naturalis operâ praecipue CAROLI LINNAEI²³⁾, exulta, lucem super *materiam medicam* sparsit; quam praeterea labores medicorum adjuvarunt, qui ad remedia contra certos et determinatos morbos invenienda, nec non ad regulas illorum applicationem sub variis rerum positionibus spectantes, determinandas, accesserunt. Huc spectant: TENNENT²⁴⁾, ANTONIUS

STÖRK,

16) *Demonstrationes anatomicae-pathologicae*. Amstel. 1760 — 62.

17) *Oratio de circumspecto cadaverum examine, optimo practicae medicae adminiculo*. L. B. 1772. *Observat. anatomic. patholog.* L. B. 1777. *Museum anatomicum acad. Lugduno-Batavae*. — *Exercitationes academicae*. L. B. 1783.

18) *Pathological inquiries and observations in surgery from the dissections of morbid bodies*. Glocest. 1766.

19) W. HUNTER's *medizinische u. chirurgische Beobachtungen u. Heilungsmethoden*. A. d. E. von KÜHN. Leipzig 1784. 2. B.

20) *A treatise on venereal disease*. Lond. 1786.

21) *De difficili in observationibus anatomicis epicrisi*. Erl. 1771. (1793).

22) *Sämmtliche medicinische Schriften* (a filio edita). Greiz 1790.

23) *Amoenitates academicae*. Lips. 1749.

24) *Mémoires de l'académ. des sciences à Paris*. A. 1739 (Senega).

STÖRCK²⁵⁾, BALTH. LUDW. TRALLES²⁶⁾, FR. JOS. WILH. SCHROEDER²⁷⁾, AUENBRUGGER²⁸⁾ etc. *Electricitas* scopo therapeutico applicata est²⁹⁾; multumque de *variolarum insitione* disceptatum³⁰⁾.

4. Physica experimentalis studium *meteo-* Meteorolog. topo-
logiae et *topographiae*, hocque illud morborum graph.
epidemicorum et *endemicorum* maturavit, quod morb.
testantur conamina CHR. H. ERNDEL³¹⁾, GERARD epidem.
VAN SWIETEN³²⁾, P. VALCARENGHI³³⁾, GRIFFITH si. contagio-

HEI-

25) Libellus, quo demonstratur: cicutam non solum usui interno tutissime exhiberi etc. Vindob. 1760. Libellus secundus, quo confirmatur, cicutam etc. ibid. 1765. Libellus quo demonstratur: Stramonium, hyoscyamum, aconitum, non solum tuto posse exhiberi usui interno hominibus, verum et ea esse remedia in multis morbis salutifera. Ibid. 1762.

26) Usus opii salubr. et noxius in morb. medela. Edit. altera. Vratisl. 1774.

27) *Von den Wirkungen der Eichlen, Verstopfungen der Drüsen im menschlichen Körper aufzulösen.* Gött. 1774.

28) Experimentum nascens de remedio specifico sub signo specifico in mania virorum. Vindob. 1776.

29) K. SPRENGEL *Versuch einer pragm. Geschichte der Arzneyk.* Th. 5. Halle 1803. p. 412 sq.

30) Idem, ibidem. p. 573 sq.

31) *Warsavia physice illustrata.* Dresd. 1730.

32) *Constitut. epid. et morb. potiss.* Lugdun. Bat. obs. ex ejusdem adversariis ed. M. STOLL. Vindob. 1782.

33) *Medicina rationalis ad recentiorum mentem observat. adaucta.* Cremon. 1737. *Continuat. epidem. Cremonensium constitut.* 1737 — 40.

HEIGHES³⁴⁾, BURGGRAV³⁵⁾, SUTER³⁶⁾, J. J. HUBER³⁷⁾, J. P. SÜSSMILCH³⁸⁾, J. G. HASENÖHRL (LAGUSI)³⁹⁾, F. I. LAUTER⁴⁰⁾, POISSONNIER DESPERRIERES⁴¹⁾, HUXHAM⁴²⁾, PH. FERMIN⁴³⁾, J. H. RIEPENHAUSEN⁴⁴⁾, S. A. TISSOT⁴⁵⁾, C. STRACK⁴⁶⁾, J. F. K. GRIMM⁴⁷⁾, MARIKOWSKI⁴⁸⁾, M. SARCONI⁴⁹⁾, POUPPE DESPORTES⁵⁰⁾, F. I. ARAND,

- 34) *The natural history of Barbados.* Lond. 1750.
- 35) *De aere, aquis et locis urbis Francof. a. M.* 1751.
- 36) *Diss. de statu sano et morbo accolarum maris Baltici.* Lips. 1755.
- 37) *Obs. nonn. circa morbos nuperorum hinc aliquot annorum epidem.* Cassel. 1755.
- 38) *Gedanken v. d. epid. Krankheiten u. d. grössern Sterben im Jahre 1757.* Berlin 1758.
- 39) *Hist. morb. epid. s. febr. petechial. quae a. 1757. Vindob. grassata est.* Vindob. 1760.
- 40) *Hist. med. biennal. morb. ruralium qui ab a. 1759 — 1761. Luxemburgi et in viciniis domin. sunt* 1761.
- 41) *Traité des fièvres de St. Domingue.* Paris 1763.
- 42) *Opp. physico-med.* Edit. Reichel. Lips. 1764.
- 43) *Traité des maladies les plus fréquentes à Surinam.* Mastr. 1765.
- 44) *Morb. epidem. statim ab initio proxim. belli usque ad fin. 1757 — 62. Goetting. grassati.* Hal. 1766.
- 45) *Die Epidemie in Lausanne 1766.* A. d. Lat. Zürich 1767.
- 46) *Obs. med. de morb. cum petech.* Carlsr. 1766.
- 47) *Sendschr. a. v. HALLER v. d. Epidemie zu Eisenach im Jahre 1767.* Hildburgh. 1768.
- 48) *Ephemerides Syrmiones.* Vindob. 1767.
- 49) *Geschichte d. Krankh., die durch d. ganze Jahr 1764*

ARAND⁵¹), J. A. BEHREND⁵²), C. H. SCHOBELT⁵³),
M. A. WEICKARD⁵⁴), G. CLEGHORN⁵⁵), W. HIL-
LARY⁵⁶), FÜCKER⁵⁷), BAJON⁵⁸) et N. RIEGLER⁵⁹).
Nec defuere, qui praeceuntibus plurimis⁶⁰) in

D 2

morbos

in Neapel sind beobachtet worden. A. d. Ital. Zürich
1770—72. 3. Th.

50) *Hist. des maladies de St. Domingue. Paris* 1770.

51) *Abhandl. v. 3 Krankh. unter dem Volke in d. Jahren*
1771—72. Gött. 1773.

52) *Der Einwohner in Frankfurt a. M. in Absicht auf*
Fruchtbarkeit, Moralität u. Gesundh. geschildert. 1771.

53) *Beschreibung d. Epidemie in d. Altmark im J. 1772.*
Berlin 1773.

54) *Obs. med. Francf. a. M. 1775 (topogr. Fuldae).*

55) *Beob. über die epidem. Krankh. in Minorka. A. d. E.*
Goth. 1776.

56) *Beob. über die Krankh. in Barbados. A. d. E. Leip-*
zig 1776.

57) *De salubritate et morbis Hungariae, Schediasma.*
Presb. 1777.

58) *Mém. pour servir à l'histoire de Cayenne et de la Gui-*
ane Française. Paris 1777.

59) *Constitut. epidem. a. 1775—79. Vratisl.* 1780.

60) LE CONTE ergo absque praeparatione nullum conta-
gium. Paris. 1539. H. FRACASTORI de symp. et anti-
tipath. lib. unus de contagione et cont. morb. lib.
tres. Venet. 1546. PEUCER themata de morbis con-
tagiosis. Vit. 1574. PALMARIUS de morbis contagio-
sis. Paris 1578. J. DACIER an absque praeparatione
nullum contagium? Affirm. praes. J. le Conte. Pari-
siis 1579. ERASTUS epistol. de contagio. Tig. 1595.
A. CHIOCCUS de contagii natura carmen. Veron. 1597.
P. L'AFFILÉ an omni contagio utraque vacuatio? ne-

*morbos a contagiis inquisiverunt, nempe LIN-
NAEUS,*

gat. thes. inaug. resp. J. Bazin. Parisiis 1597. SCHA-
TO diss. de contagione. Viteb. 1601. VOITIUS diss.
de contagionis essentia. Basil. 1604. PIETRE ergo ex
contagio sanitas. Basil. 1607. H. PERTINI declama-
tiones adversus morborum contagionem hucusque au-
tores et fautores. Hanau 1613. BRENDL diss. de
contagio, et contagione pestilentiali. Jen. 1637. SE-
BIZ diss. de morbis contagiosis et contagio. Argent.
1650. LOTHUS diss. de contagio. Regiom. 1656.
A. CNOEFFELIUS de contagio in genere. Brem. 1658.
KOERBER resp. H. C. Alberti de contagiis malignis.
Erf. 1682. MOESER diss. de natura contagii ejusque
effectibus. Ultraj. 1682. DIMELIUS diss. de morbis
contagiosis. Bat. 1685. WEDEL diss. de contagio et
morbis contagiosis. Jen. 1689. E. CAMERARIUS *kurze
Anmerkung von ansteckenden Krankheit. Tübing.* 1712.
CRAUSSIUS diss. de contagio. Jen. 1712. VATER
(J. C. HOFFMANN) diss. de contagiis. Viteb. 1712.
C. WINTRINGHAM *an essay on contagious diseases*
1721 (*in the works. Lond. 1752. Vol. I. p. 177.*).
FISCHER diss. de contagio. Erf. 1724. MEUDER
diss. de contagiis. Seruest. 1725. LISCHWIZ diss.
damnum ex praejudiciis de contagio ac malignitate,
minus caute divulgatis. Kil. 1733. J. FUERSTENAU
diss. de contagio et morbis cont. Rintel. 1742. B.
MOREALI *delle febbri maligne e contagiose, nuovo si-
stema teorico-pratico. Venez. 1746.* — Patet ex hoc
literaturae conspectu, doctrinam contagiorum sat re-
centem esse, quod opinionem Dr. MACLEAN: conta-
gia medicis antiquis ignota fuisse contendit, probat
(*Medical repository* et FRORIEP *Notizen aus dem Ge-
biete der Natur- u. Heilkunde. No. 13. des 4. B. 1823.*).

NAEUS⁶¹⁾, JUNCKER⁶²⁾, BÜCHNER⁶³⁾, CRELL⁶⁴⁾, CLERC⁶⁵⁾, W. J. ULFERS⁶⁶⁾, J. C. GERICKE⁶⁷⁾, NUDOW⁶⁸⁾, F. L. BANG⁶⁹⁾, LASONNE⁷⁰⁾ et BOEHM⁷¹⁾.

5. *Morbi infantum*, ad exempla H. MERCURIALIS⁷²⁾ et G. HARRIS⁷³⁾, indagati fuere a Jo. STORCH⁷⁴⁾, alias PELARGUS dicto et a ROSEN ab ROSEN-^{aetatum.}

61) Diss. exanthemata viva. Upsal. 1751. V. Amoen. academ. T. V. No. 82.

62) Diss. de vano et vero morborum contagiosorum metu. Hal. 1757.

63) Diss. de natura morborum contagiosorum generatim. Hal. 1768.

64) Diss. contagium vivum lustrans. Helmst. 1768.

65) *De la contagion, de sa nature, de ses effets, de ses progrès etc.* Petersb. 1771.

66) Praesid. ACKERMANN diss. de miasmate contagioso. Kil. 1773.

67) Diss. miasmatologiam generalem sistens. Coetting. 1775.

68) Diss. sistens animadversiones de contagio. Lips. 1776.

69) De requisitis ad infectionem conditionibus. (Soc. med. Havn. Coll. I. p. 100. 132, 157.

70) *Histoire de divers accidens graves et maladies, occasionnés par les miasmes d'animaux etc.* (Hist. et mém. de la soc. méd. de Paris 1776. p. 97.).

71) Diss. de contagio. Viennae 1777.

72) De morbis puerorum tractatus. Venet. 1583.

73) Tractatus de morbis infantum acutis. Lond. 1689.

74) *Abhandl. von Kinderkrankheiten.* Eisenach 1750—71.

ROSENSTEIN⁷⁵⁾; illi *senum*, a JO. BERNH. DE FISCHER⁷⁶⁾.

Morbi sexuum, 6. *Virorum morbi* peculiari scripto expositi sunt a JO. JUNCKERO⁷⁷⁾. Doctrinam de *morbis sexus sequioris* magis magisque⁷⁸⁾ excoluere JO. STORCH⁷⁹⁾ et JO. ASTRUC⁸⁰⁾.

Morbi classium, exercituum, artificum etc. 7. Ulterius prosecuti sunt doctrinam de *morbis classium* LUDW. ROUPPE⁸¹⁾, POISSONNIER DES-PERRIERES⁸²⁾, LIND⁸³⁾, J. CLARK⁸⁴⁾, CALLISEN⁸⁵⁾,

75) *Anweisung zur Kenntniss und Kur der Kinderkrankheiten. A. d. Schwed. mit Anmerk. von J. A. MURRAY. Goth. u. Götting. 1765. Mit LODER's u. BUCHHOLZ's Anmerk. Gött. 1798.*

76) *De senio ejusque gradibus et morbis. Erf. 1754.*

77) *Diss. de morbis virorum. Hal. 1748.*

78) Praecesserunt: H. MERCURIALIS de morbis muliebribus, praelect. IV. libros digest. per M. COLUMBUM. Ven. 1601. J. VARANDAEUS de morbis mulierum libr. III. Mont. pes. 1620. G. BALLONIUS de virginum et mulierum morbis liber. Paris. 1645. JAC. PRIMEROSIUS de morbis mulierum. libr. V. Roterod. 1655 etc.

79) *Von den Krankh. der Weiber. Eisen. 1748 — 55.*

80) *Traité des maladies des femmes. Paris 1766.*

81) *De morbis navigantium. Lugd. Bat. 1764.*

82) *Traité des maladies des gens de mer. Paris 1767.*

83) *Essay on the most effectual means of preserving the health of seamen in the R. army. 1774.*

84) *Beobacht. über die Krank. auf langen Reisen nach heißen Gegenden. Kopenh. 1778.*

SEN⁸⁵⁾, PRINGLE⁸⁶⁾; de *morbis exercituum* idem⁸⁷⁾, S. SCHAARSCHMIDT⁸⁸⁾, DONALD MONRO⁸⁹⁾, E. G. BALDINGER⁹⁰⁾ aliique⁹¹⁾; de *morbis principum*, praeunte RAMAZZINI⁹²⁾, TRALLES⁹³⁾; de *morbis aulicis* LANGHANS⁹⁴⁾, TISSOT⁹⁵⁾; de *morbis literatorum* idem⁹⁶⁾, ACKERMANN⁹⁷⁾, FRANZ⁹⁸⁾; de *morbis pharmacopoeorum et chirurgorum* BÜCHNER⁹⁹⁾

85) *Ueber die Mittel, die Seefahrenden gesund zu erhalten.* Kopenh. 1778.

86) *Von der Verbesserung der Mittel, die Gesundheit der Seeleute zu erhalten.* Gött. 1777.

87) *Beobachtungen über die Krankheiten einer Armee.* Alt. 1772.

88) *Abhandl. v. Feldkrankh.* Berl. 1758.

89) *Ueber die Mittel, die Gesundheit der Soldaten zu erhalten.* Altenb. 1784.

90) *Von den Krankheiten einer Armee.* Langens. 1774.

91) *Kurze Beschreibung u. Heilungsart der Krankheiten, welche am öftersten in d. Feldlagern beobachtet werden.* Wien 1758.

92) *De principum valetudine tuenda commentatio.* Patav. 1719.

93) *Verum patrem patriae annuente divina clementia sanum et longaeuum praestandi methodus.* Vratisl. 1767.

94) *Von den Krankheiten des Hofes.* Bern. 1770.

95) *Essai sur les maladies des gens du monde. Oeuvres* T. IV.

96) *De la santé des gens des lettres.* l. c. T. VIII.

97) *Abhandl. von den Krankheiten der Gelehrten.* Nürnberg. 1777.

98) *Der Arzt der Gottesgelehrten.* Leipz. 1770. 2. Aufl.

NER⁹⁹); *artificum* HARTMANN¹⁰⁰); *metallorum* etc. SCHEFFLER¹⁰¹), ENGEL¹⁰²); *pauperum* — REITZ¹⁰³), et *judaeorum* — WOLFF¹⁰⁴).

Monographiac.

8. *Monographiarum* numerum operibus conspicuis adauxerunt PAUL. GOTTL. WERLHOFF¹⁰⁵), J. LIND¹⁰⁶), HUXHAM¹⁰⁷), DAN. WILH. TRILLER¹⁰⁸), J. FOTHERGILL¹⁰⁹), DOM. COTUNNI¹¹⁰), P. SENAC¹¹¹), TISSOT¹¹²), MICHAELIS¹¹³) et TRNKA DE KRZOWIZ¹¹⁴).

9. Stu-

99) *De morbis pharmacopoeorum et chirurgorum*. Hal. 1751.

100) *Diss. de opificum morbis*. Francf. ad Viadr. 1777.

101) *Abhandl. von der Gesundheit der Bergleute*. Chemnitz 1770.

102) *Diss. sist. generalissima quaedam circa gentis metallica morbos*. Hal. 1773.

103) *De morbis pauperum*. Ultraj. 1752.

104) *Abhandl. von d. Krankheiten der Juden*. Mannh. 1777.

105) *Observationes de febribus, praecipue intermittentibus*. Hanov. 1732. Opp. omn. edit. a WICHMANNO 1773.

106) *Treatise on the Scurvey*. Edinb. 1753.

107) *De febribus lentis et nervosis*. Opp. Lips. 1764.

108) *De pleuritide*. Vid. opusc. med. et medico-philologica. Lips. 1766.

109) *Works*, Lond. 1781. (*of a painful affection of the face*).

110) *De ischiade nervosa commentarius*. Viennae 1770.

111) *Traité de la structure du coeur, son action et ces maladies*. Paris 1774.

112) *Traité des nerfs et de leurs maladies*, Germanice Winterth. 1780.

9. Studium autem praxeos medicae maxime ^{Instituta clinica, et therapia specialis.} per *Instituta clinica*, quibus doctrinarum universitates antea caruere¹¹⁵⁾ atque per professores primum ibi docentium, firmatum est. Successerunt enim sibi, ut clinices magistri, *Vindobonae* — ANTONIUS DE HAEN¹¹⁶⁾, MAXIMILIANUS STOLL¹¹⁷⁾; *Ticini* — PAULUS VALCARENGHI¹¹⁸⁾, J. B. BORSIERI¹¹⁹⁾, TISSOT¹²⁰⁾ et I. P. FRANK¹²¹⁾; *Edin-*

113) De angina polyposa. Goett. 1778.

114) Duodecim monographiarum, debitis locis commemorandarum, auctor. Vindob. 1778 — 94.

115) Excipias quod MONTANUS a. 1543. Patavii quodque SYLVIVS DE LA BOË Lugduni Batavorum praxin ad lectos aegrorum docuerint (BRERA in notis ad opus Borsieri infra citand. p. 13.).

116) Ratio medendi in nosocomio Vindobonensi. Vind. 1757 — 73. Part. XV. Continuata 1773 — 79. ibid. Vol. III. Praelectiones in Boerhaavii institutiones pathologicas. Vindob. 1780.

117) Ratio medendi in nosocomio practico Vindobonensi. Vindob. 1777 — 84. Vol. III. Index ad primas has partes. Vind. 1787. Praelectiones in diversos morbos chronicos. Vind. 1788. Quatuor Vol. posthum. ab EYERELL edita.

118) Medicina rationalis. Cremon. 1737.

119) Institutiones medicinae practicae. Mediol. 1781. Vol. IV. Edit. II. Lips. 1786. Vol. IV. — *Istituzioni di medicina pratica dettate da G. B. BORSIERI proseccute da V. L. BRERA. Padova 1820.* — Op. posthuma a Dr. BERTI Institutiones medicinae pract. Ed. J. F. C. HECKER. IV. Vol. 8. Lips. 1825.

120) *Oeuvres. T. IX.*

Edinburghi — WILH. CULLEN¹²²⁾, JACOB GREGORY¹²³⁾, FRANCISCUS HOME¹²⁴⁾, ANDREAS DUNCAN¹²⁵⁾ etc. Simul magna cum laude *therapiam specialem* docuerunt illamque egregiis operibus locupletarunt CH. G. LUDWIG¹²⁶⁾, L. HEISTER¹²⁷⁾, J. TH. ELLER¹²⁸⁾, LIEUTAUD¹²⁹⁾, G. FORDYCE¹³⁰⁾, R. A. VOGEL¹³¹⁾, W. SAUNDERS¹³²⁾, VACCÀ BERLINGHIERI¹³³⁾, CHR. G. SELLE¹³⁴⁾, J. A. UNZER¹³⁵⁾, J. G. BRENDDEL¹³⁶⁾, G. BATTIE¹³⁷⁾.

10. Nec

121) *Epitome de curandis hominum morbis.* Mannh. 1799. — et opusc. posth. Vindob. 1824.

122) *First lines of practice.* Edinb. 1784.

123) *Conspectus medicinae theoreticae in usum academicum.* Edinb. 1782.

124) *Principia medicinae. Clinical experiments, histories and dissections.* Edinb. 1800.

125) *Heads of Lectures on the Theory and Practice of medicine.* Lond. 1787.

126) *Institutiones medico clinicae.* Lips. 1758.

127) *Compendium medicinae practicae.* Amst. 1762.

128) *Obs. de cognoscendis et curandis morbis, praesertim acutis.* Regiom. 1762.

129) *Synopsis universae medicinae practicae.* Amst. 1765.

130) *Grundsätze der ausübenden Arzneygelahrth.* Kopenh. 1769.

131) *Praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus.* Goett. 1772.

132) *Anfangsgründe der prakt. Arzneykunst.* 1782.

133) *Saggi intorno alle piu frequenti malattie del corpo umano.* Pisa 1787.

134) *Medicina Clinica.* Edit. nov. 1797.

135) *Medicinisches Handbuch.* Leipzig 1789.

10. Nec imperium quod laudati viri, prae-
euntibus FR. HOFFMANNO, COSCHWITZ, SCHULZE, <sup>Diss. in-
augurales.</sup>
ALBERTI, BÜCHNER, BOEHM, JUNCKER aliisque,
in *dissertationes inaugurales* exercuere silentio
praeteribimus. Hoc enim opusculorum genus,
hypothesium scholasticarum quondam horreum,
magis magisque observationibus practicis dicaba-
tur, uti videre est ex collectionibus dissertatio-
num inauguralium et programmatum quae de-
bentur sedulitati A. HALLERI¹³⁸⁾, E. SANDIFOR-
TI¹³⁹⁾, J. K. HEFFTERI¹⁴⁰⁾, K. L. NEUENHAH-
NI¹⁴¹⁾, E. G. BALDINGERI¹⁴²⁾, C. I. MELLINI¹⁴³⁾,
G. H.

136) Praelectiones academicae de cognosc. et curand.
morbis.

137) Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis.
Hal. 1780.

138) Disputat. ad morborum histor. et curat. facient.
Lausan. 1757. Vol. VII. 4.

139) Thesaurus dissertationum, programmatum aliorum-
que opusculorum selectiss. Rotterdam. 1768. Vol.
III. 4.

140) Museum disputatorium phys.-med. tripartit. Zit-
tau. 1756—66.

141) *Vermischte Bibliothek, oder Auszüge aus versch. zur
Arzneygelahrth., Chemie u. s. w. gehör. akad. Streit-
schrift, Braunschw.* 1758—60.

142) *Auszüge a. d. neuesten u. besten Dissertat. d. mehre-
sten Akad. d. zur Naturgesch., Arzneyw., Chemie u.
Physik gehören. Berl.* 1769—79.

143) *Auszüge a. d. besten med. Probeschr. des 16. u. 17.
Jahrh. Altenb.* 1771—78. 2 Th.

G. H. WEBER¹⁴⁴), F. I. OVERKAMP¹⁴⁵) F. X. WASSERBERG¹⁴⁶) aliorumque¹⁴⁷).

Observa-
tores.

11. Thesaurum *observationum* adauxerunt J. F. HENCKEL¹⁴⁸), G. TARGIONI TOZZETTI¹⁴⁹), L. HEISTER¹⁵⁰), J. GHERLI¹⁵¹), Z. VOGEL¹⁵²), R. MEAD¹⁵³), H. CH. SCHRADER¹⁵⁴), M. A. PLENCIZ¹⁵⁵), J. TH. ELLER¹⁵⁶), C. MEDICUS¹⁵⁷), C. WE-

144) *Vollständ. Auszüge a. neuern Disputat. physik-med. Inhalts. Bremen 1775—76.*

145) *Coll. diss. inaug. Lugdun. Batav. Francf. a. M. 1767.*

146) *Op. minor. et dissert. Vindob. 1775—76.*

147) *Gründl. Auszüge a. d. neuest. med. chir. Disputationen, welche auf den hohen Schulen in Deutschland gehalten worden. Stuttg. 1749—56.*

148) *Samml. med. u. chir. Anmerk. Berl. 1747—64. 8. B. 4. Neue Anmerk. 1769—72. 2. B. 8. med. chir. Beob. u. Abhandl. 1779.*

149) *Prima raccolta di osservazioni mediche. Firenze 1752.*

150) *Medic. chir. u. anatom. Wahrnehmungen. Rostock 1753.*

151) *Cent. I. II. di rare osservazioni di medicina curiosa. Venez. 1753.*

152) *Anat. chir. u. med. Beob. u. Untersuch. Rost. 1759.*

153) *Med. Erinner. u. Lehr. A. d. E. Frankf. a. M. 1759.*

154) *Obs. rar. ad rem med. et obstetr. Wolfenb. 1759.*

155) *Obs. phys. med. Vindob. 1762.*

156) *Obs. de cognosc. et cur. morb. praes. acutis. Regiom. 1762.*

157) *Samml. v. Beobachtungen a. der Arzneywissenschaft. Zürich 1764.*

WEBER¹⁵⁸), F. B. LENTIN¹⁵⁹), HEUERMANN¹⁶⁰),
 D. MACBRIDE¹⁶¹), TH. GEACH¹⁶²), J. A. UN-
 ZER¹⁶³), J. G. BRENDDEL¹⁶⁴), RICHARD DE HAU-
 TESIERK¹⁶⁵), J. L. L. LOESECKE¹⁶⁶), FR. HOME¹⁶⁷),
 R. A. VOGEL¹⁶⁸), C. A. MANGOLD¹⁶⁹), C. C. SIE-
 BOLD¹⁷⁰), J. A. P. GESNER¹⁷¹), CH. G. LUDWIG¹⁷²),
 J. C. A. THEDEN¹⁷³), J. D. GAUB¹⁷⁴), A. KLOECK-
 HOF¹⁷⁵), F. H. MUZELL¹⁷⁶), H. I. COLLIN¹⁷⁷),
 M. F.

158) Obs. med. Celle. 1764 — 65. fasc. 2.

159) Obs. med. Wolfenb. 1764 — 70. fasc. 2.

160) *Vermischte Bemerk. u. Untersuch. f. ausüb. Aerzte.*
Kopenhagen 1765.

161) *Durch Erfahrung erläut. Versuche. A. d. Englischen.*
Zürich 1766.

162) *Med. chir. Wahrnehm. A. d. E. Zittau 1768.*

163) *Samml. kleiner Schriften. Leipzig 1766.*

164) *Opusc. math. et med. argument. Goett. 1766 — 75.*
 3. Vol.

165) *Recueil d'observations de la médecine des hôpitaux*
militaires. Paris 1766.

166) *Med. Wahrnehmungen. Berlin 1767.*

167) *Med. Beob. u. Versuche. A. d. E. Altenb. 1767. —*
Klinische Versuche. Leipzig 1781.

168) *Opusc. med. select. Goett. 1768.*

169) *Opusc. med. physic. Altenb. 1769.*

170) *Coll. obs. med. Fasc. 1. 1769.*

171) *Samml. v. Beob. a. d. Arzneyk. Nördl. 1769.*

172) *Adversaria med. pract. Lips. 1769.*

173) *Neue Bemerk. u. Erfahrungen. Berlin 1771.*

174) *Adversaria varii argumente. Lugd. Bat. 1771.*

175) *Opuscula med. omnia. Hartung. 1772.*

176) *Med. chir. Wahrnehm. Berl. 1772.*

M. F. MARX ¹⁷⁸), A. G. RICHTER ¹⁷⁹), M. E. BLOCH ¹⁸⁰), J. D. METZGER ¹⁸¹), G. SCHUSTER ¹⁸²), J. C. TODE ¹⁸³), H. F. DELIUS ¹⁸⁴), J. BRISBAINE ¹⁸⁵), H. M. MARCARD ¹⁸⁶), F. CH. STOELLER ¹⁸⁷), S. G. VOGEL ¹⁸⁸), P. G. SCHROEDER ¹⁸⁹), TRÉCOURT ¹⁹⁰), M. HERZ ¹⁹¹), TH. THOMPSON ¹⁹²), A. DUNCAN ¹⁹³),
J. H.

177) *Observata circa morbos acut. et chron. Vindob. 1772.*

178) *Observata quaedam medica. Berol. 1772. — Obs. med. Hannov. 1774. — Vermischte Beob. 1786.*

179) *Med. chirurg. Bemerkungen. Gött. 1773.*

180) *Med. Bemerkungen. Berlin 1774.*

181) *Advers. med. fasc. 1. Traj. ad Mos. 1775. fasc. 2. 1778. Vermischte Schriften. Königsberg 1782.*

182) *Obs. therap. Chemn. 1775.*

183) *Advers. clinica. Hafn. 1775.*

184) *Advers. argument. phys.-med. Erlang. 1777—90. 6 fasc. 4.*

185) *Auserl. Fälle der ausüb. Arzneyk. A. d. E. Altenburg 1777.*

186) *Med. Versuche. Leipzig 1777.*

187) *Beob. u. Erfahr. aus der innern u. äussern Heilk. Goth. 1777.*

188) *Med. pr. Beobacht. Gött. 1777.*

189) *Opusc. med. Norimb. 1778—79. II. Vol.*

190) *Beob. über verschiedene Gegenstände der Arzneyk. A. d. Fr. Leipzig 1778.*

191) *Briefe an Aerzte. Mittau 1778.*

192) *Med. Rathschläge über mannichfache Krankh. A. d. E. Leipzig 1779.*

193) *Krankengeschichten, nebst einigen Bemerk. darüber. A. d. E. Leipzig 1779.*

J. H. RAHN¹⁹⁴), PH. R. VICAT¹⁹⁵), J. F. FRITZE¹⁹⁶),
 J. MOHRENHEIM¹⁹⁷), C. L. MURSINNA¹⁹⁸), CH. G.
 SELLE¹⁹⁹), CLIFTON WINTRINGHAM²⁰⁰), F. C. G.
 SCHEIDEMANTEL²⁰¹), J. P. L. BURGGRAB²⁰²), K.
 L. SCHMALZ²⁰³), J. L. SCHMUCKER²⁰⁴), W. HUN-
 TER²⁰⁵), C. MERTENS²⁰⁶), J. C. CREBS²⁰⁷), K.
 C. KRAUSE²⁰⁸), H. F. PAULITZKY²⁰⁹), J. QUARIN²¹⁰),
 A. I.

194) *Advers. med. pract.* Zür. 1779.

195) *Delect. observ. pract. ex Diario clinico deprompta-
 rum.* Vitodur. 1780.

196) *Med. Annalen.* Leipzig 1781.

197) *Wiener Beyträge zur pr. Arzneey - Wundarzneyk. u.
 Geburtshülfe.* Wien 1781.

198) *Med. chir. Beobacht.* Berlin 1782. — *Neue medi-
 cinisch - chirurg. Bemerk.* 1796.

199) *Neue Beyträge zur Natur - u. Arzneywissensch.* Ber-
 lin 1782.

200) *De morbis quibusdam Commentarii.* Lond. 1783.

201) *Fränkische Beyträge zur Arzneyselahrtheit durch
 Krankengeschichten.* Dessau 1783.

202) *Auserl. med. Fälle u. Gutacht.* Frankf. a. M. 1784.

203) *Seltene chir. u. med. Vorfälle, beobachtet u. s. w.*
 Leipzig 1784.

204) *Wahrnehmungen aus der Arzneyk.* 1784.

205) *Ausgesuchte med. u. chirurg. Beob.* A. d. E. Leip-
 zig 1784.

206) *Observata medica.* T. II. Vindob. 1784.

207) *Medicinische Beobacht.* Quedlinburg 1784.

208) *Opusc. acad. med. pract.* Lips. 1787.

209) *Med. prakt. Beobacht.* Frankfurt a. M. 1784.

210) *Animadv. pract. in divers. morbos.* Vindob. 1786.
 ed. auct. 1814.

A. I. EVERS ²¹¹), J. EYEREL ²¹²), A. AEPLI ²¹³), J. TH. TRAMPEL ²¹⁴), CH. J. A. ZIEGLER ²¹⁵), M. G. THILENIUS ²¹⁶), J. A. GARN ²¹⁷), J. J. WARBURG ²¹⁸), J. E. GILIBERT ²¹⁹) et G. BLACK ²²⁰). — Observationes alienas collegerunt plurimi inter medicos *Bataviae* ²²¹), *Germaniae* ²²²), *Gallicae* ²²³) et *Angliae* ²²⁴).

12. *Aca-*

- 211) *Neue vollständige Bemerkungen u. Erfahr. zur Bereicherung der Wund- u. Arzneyk. Gött. 1787.*
- 212) *Obs. med. varii argum. Vind. et Lips. 1786.*
- 213) *Eine med. polem. Probeschrift. Winterth. 1788.*
- 214) *Beob. u. Erfahrungen med. u. chirurgischen Inhalts. Lemgo 1788.*
- 215) *Beob. aus der Arzneyw., Chir. u. gerichtl. Arzneyk. Leipzig 1788.*
- 216) *Med. chir. Bemerk. Frankf.a.M. Neue Aufl. 1814.*
- 217) *Vermischte wichtige Krankenfälle. Zerbst 1789.*
- 218) *Med. Beobacht. Breslau 1789.*
- 219) *Advers. med. pract. Lugdun. 1791.*
- 220) *Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. Berlin 1791.*
- 221) *Recueil périodique d'observations de médecine par VAN DER MONDE. Paris 1754. Vol. 14.*
- 222) *Fränkische Sammlungen von Anmerkungen aus d. Naturlehre, Arzneygelahrtheit u. s. w. Nürnberg 1756. 8. B. — Sammlung auserlesener Abhandl. z. Gebrauche prakt. Aerzte. Leipzig 1785. 24. B. Neue Samml. 6. B. E. G. BALDINGER sylloge select. opusc. argument. med. pract. Goett. 1776 — 82.*
- 223) *Gazette salulaire. Bouillon 1761. — Neue Samml. auserlesener Wahrnehmungen aus allen Theilen der Arzneyw. A. d. Fr. Strasburg 1766.*
- 224) *Medical communications. Lond. 1781. — FOART*

12. *Academiae quoque scientiarum societates-* Academ. scientiarum et soc. med.
que medicae aevi anterioris ²²⁵⁾ in colligendis ob-
 servationibus sparsis perseverarunt, et nova hujus
 generis instituta prodierunt *Upsaliae* ²²⁶⁾, *Gottin-*
gae ²²⁷⁾, *Budissae* ²²⁸⁾, *Hassiae* ²²⁹⁾, *Hambur-*
gi ²³⁰⁾, *Mannheimii* ²³¹⁾, *Erfordi* ²³²⁾, *Harle-*
mi ²³³⁾, *Londini* ²³⁴⁾, *Vlissingeni* ²³⁵⁾, *Roteroda-*
mi ²³⁶⁾,

SIMMONS *Sammlungen der neuesten Beobacht. Engl. Aerzte. Für 1787.*

225) §. VII. 4 (36).

226) *Acta Upsaliensis societatis scientiarum. Vol. V. — Nova acta. 1773.*

227) *Commentarii societatis Goettingensis. Vol. IV. — Novi Commentarii. 1769 — 77. Vol. X. — Commem- tationes. 1778. Göttingische gelehrte Anzeigen.*

228) *Der med. Societät in Budissin Sammlungen u. Ab- handl. Altenburg 1757.*

229) *Act. philos. med. acad. scient. princ. Hass. Freft. 1771.*

230) *Abhandlungen u. Beob. aus d. Arzneygelahrtheit, von einer Gesellschaft von Aerzten in Hamburg. 1776.*

231) *Hist. et Commentat. Academ. Electoral. Scientiar. Theodoro-Palatinae. Mannh. 1766 — 70. Vol. I. II.*

232) *Acta Academiae Electoralis Moguntinae scientiarum. T. I et II. 1757.*

233) *Verhandlingen der Hollandschen Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem. 1754.*

234) *Medical observations and inquiries by a society of physicians. London 1757 — 84. Vol. VI. — Medica transactions published by the College of Physicians. London 1768.*

235) *Verhandeligen der Zeeuwsch Genootschap der We- tenschappen te Vlissingen 1769.*

Frank Praex. I. 1. 1.

E

*mi*²³⁶), *Edinburghi*²³⁷), *Hafniae*²³⁸), *Parisiis*²³⁹), *Divioni*²⁴⁰) et *Hagae*²⁴¹).

Diaria
medica.

13. Praeterea hoc aevo genus illud operum medicorum, non solum ad sparsas observationes colligendas, sed etiam ad rationem de libris novis reddendam, idoneum, sub nominibus *diariorum*, *bibliothecarum*²⁴²), *archivorum* etc. auctoribus R. A. VOGEL²⁴³), ROUX²⁴⁴), ORTESCHI²⁴⁵), J. G. SCHUSTER²⁴⁶), HALLER²⁴⁷), BAL-

DIN-

236) *Verhandeligen der Bataafsch Genootschap te Rotterdam* 1769.

237) *Medical and philosophical commentaries, by a society at Edinburgh.* Ed. DUNCAN. 1773.

238) *Collectanea Hafniensia.* Vol. II. 1774. — *Acta Hafniensia.* 1777.

239) *Histoire de la société de médecine, avec les mémoires.* Paris 1778.

240) *Mémoires de l'académie de Dijon* 1763. *Nouveaux mém.* 1783.

241) *Verhandeligen der Natuur- en Geneeskundigen Correspondentie in de vereenigte Nederlanden.* Haag 1780.

242) *Allgemeine deutsche Bibliothek.* Berlin u. Stettin. — *Neue allgemeine deutsche Bibliothek.* 1—110. Bd.

243) *Med. Bibliothek.* Erf. 1752. XX Bde. — *Neue med. Bibl.* Göttingen 1753. VIII Bde.

244) *Journal de médecine.* Paris 1762.

245) *Giornale di medicina.* Venezia 1763. XII Vol. — *Nuovo giornale di med.* 1781.

246) *Med. Journal.* Chemnitz 1767. *Vermischte Schriften als Fortsetzung d. Journals* 1775.

247) *Bibliotheca med. pract.* Basil. 1776.

DINGER²⁴⁸), SIMMONS²⁴⁹), J. J. REICHARD et J. V. MÜLLER²⁵⁰), AGLIETTI²⁵¹), J. C. T. SCHLEGEL²⁵²), BLUMENBACH²⁵³), MURRAY²⁵⁴), J. C. TODE²⁵⁵), K. G. T. KORTUM²⁵⁶), J. A. SCHMIDT et J. HUNCZOWSKI²⁵⁷) atque J. ARNEMANN²⁵⁸) magis divulgatum est.

14. Morborum doctrinam, infinitis sic ob-
 servationibus adauctam, faciliorem reddere cre-
 diderunt C. LINNAEUS²⁵⁹), R. A. VOGEL²⁶⁰), SAU-
 VAGES²⁶¹), CULLEN²⁶²), DANIEL²⁶³) et SAGAR²⁶⁴)

E 2

mor-

248) *Magazin für Aerzte. XII Hefte. — Neues Magazin.*

Leipzig 1779. XX P. Med. Journal. Göttingen 1784.

249) *The London medical journal. 1780.*

250) *Med. Wochenblatt f. Aerzte u. Wundärzte. 1780 —*
91. 22 Th.

251) *Giornale per servire alla storia ragionata della me-*
dicina di questo secolo. Venez. 1782.

252) *Med. Literatur für prakt. Aerzte. Leipzig 1781. 12*
Bde. Neue med. Liter. 1787. 4 Bde.

253) *Med. Biblioth. Göttingen 1783. 3 Bde.*

254) *Med. prakt. Bibliothek. Göttingen 1774. 8 Bde.*

255) *Med. chir. Bibliothek. Kopenhagen 1774. 10 Bde. —*
Arzneyk. Annalen. 1787. 13 Hefte. Med. Journal. 1793.

256) *Med. praktische Bibliothek. 1789. 3 Bde.*

257) *Bibliothek der newest. med. chir. Literat. 1789. 3 Bde.*

258) *Bibliothek für chir. u. prakt. Heilkunde. Göttingen*
1790 — 94. 1799 — 1800.

259) *Genera morborum. Lips. 1759.*

260) *Definitiones generum morborum. Goett. 1764.*

261) *Nosologia methodica. Amst. 1768.*

262) *Synopsis nosologiae methodicae. Edinb. 1769.*

263) *Systema aegritudinum. Lips. 1782.*

morbos, vegetabilium instar in classes, ordines, genera, species et varietates dividendo. Jam antea dictionarium medicum comparuerat ²⁶⁵⁾).

§. X.

Sæculi XVIII. Finis.

Cullen.
Brown.

1. W. CULLEN (cujus utpote egregii clinices magistri mentionem jam iniecimus¹⁾), ex doctrina FR. HOFFMANNI, E. STAHLII et A. HALLERI, novum systema, *solidi vivi* dictum, condidit idque potius ad distinendum discipulorum ardens ingenium²⁾, quam ut praxis ad illius normam dirigatur. Serius rem pertractavit auctor alterius systematis dynamici, simplicissimi aequae ac ingeniosissimi, JOANNES BROWN³⁾, qui cum morbos omnes, exceptis localibus, ex virium vitalium ex-

264) *Systema morbor. symptomaticum.* Vienn. 1783.

265) *Dictionnaire médicinal, contenant la methode sûre pour connoître, et guérir les maladies critiques et chroniques etc.* Paris 1757. Nouvelle édition.

1) §. IX. 9. p. 58.

2) *Additional memorial to the managers of the Royal Infirmary.* By JAMES GREGORY. Edinb. 1805. p. 182. (Dicere CULLENIIUS solebat: „There must be a tub to amuse the whale.“)

3) *Elementa medicinae.* Edinb. 1780. Edit. II. Lond. 1787. Cum praef. PETRI MOSCATI. Mediol. 1792. *The elements of medecine, transl. from the Latin with comments and illustrat. by the author.* With a biogr. preface by TH. BEDDOES. Lond. 1795.

excessu vel defectu derivasset, in eorum cura vires aut debilitandas aut excitandas esse, nunquam vero quiescendum, docuit. Principiis huiusmodi formam philosophicam conciliavit Brownii discipulus ROBERT JONES⁴⁾. A captiosis illorum operibus, medicinae legitimae interitum minitantibus⁵⁾, seducti fuimus⁶⁾ insimul cum G. RASORI⁷⁾, A. M. WEICKARD⁸⁾, A. RÖSCHLAUB⁹⁾,

A. F.

4) *An inquiry into the state of medecine on the principles of inductive Philosophy. Edinb. 1781.*

5) Optime id cognovit TISSOTUS ubi in epistola ad Patrem meum sic scripsit: „J'ai sous les yeux l'édition de Milan de Brunonis *elementa medicinae*; n'auriez vous point jugé utile d'employer deux ou trois leçons à démontrer la fausseté de ses principes et les suites fâcheuses qu'ils peuvent avoir en pratique? Les étudiants liront ces ouvrages pendant qu'ils sont à l'université, parce qu'ils y lisent, et s'ils en emportent ceux de ce mauvais système les trois quarts les garderont toute leur vie, parce qu'ils ne lisent presque plus rien dès qu'ils en sont dehors. Mr. votre fils, à qui nous faisons mille complimens, pourroit aussi vous épargner cette peine en faisant de cette refutation le sujet d'un petit pamphlet.“ Lausanne 27. Fevrier 1793. (Utinam tanti viri consilio aures praeberissem!).

6) *Erläuterungen der Erregungstheorie. Heilbr. 1803. 2. Aufl. Ratio instituti clinici Ticinensis. Vind. 1790.*

7) *Discorso preliminare al compendio della nuova dottrina di Brown. Pavia 1792.*

8) *Entwurf einer einfachern Arzneykunst. Frcft. 1795. Med. pr. Handbuch. 3 Th. Heilbr. 1796.*

9) *Untersuchungen über die Pathogenie. Frankf. 1798.*

A. F. MARCUS¹⁰⁾, VAN HOVEN¹¹⁾, E. HORN¹²⁾ aliisque multis. Nobiscum novi systematis adversarii, G. VILLA¹³⁾, VACCÀ BERLINGHIERI¹⁴⁾, HUFELAND¹⁵⁾, HECKER¹⁶⁾, GIRTANNER¹⁷⁾, W. CAPPEL¹⁸⁾, A. STIEGLITZ¹⁹⁾ plus minusve acriter quidem ast incassum dimicarunt. Licuerat enim asseclis Brunonis in celeberrimo artis magistro, amore paterno erga nos ducto²⁰⁾, fulcrum invenire. Accidit inde, ut Brownii principia per universam ferme Europam, non sine gravi

- 10) *Prüfung des Brownschen Systems durch Erfahrungen am Krankenbette. Weimar 1797—99. St. 1—4.*
- 11) *Handbuch der prakt. Heilkunde. Heilbr. 1807.*
- 12) *Beyträge zur medicinischen Klinik. Braunschw. 1800.*
- 13) *Lettera sopra la nuova dottrina di Brown.*
- 14) *Meditazioni sull' uomo malato e sulla nuova dottrina di Brown. Pisa 1795.*
- 15) *Journ. der prakt. Heilk. 4. B. p. 125. 318. 5. B. p. 206.*
- 16) *Journ. der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Arzneywissenschaft. 1. St. p. 24. 2. St. p. 98. 5. St. p. 109. 9. St. p. 1.*
- 17) *Ausführliche Darstellung des Brownschen Systems, nebst einer vollständigen Literatur und Kritik desselben. Göttingen 1797.*
- 18) *Beytrag zur Beurtheilung des Brownschen Systems. Göttingen 1797.*
- 19) *Allgemeine Literaturzeitung, 1799. 1. B. p. 377. 470.*
- 20) *Alio modo intelligere haud liceret, quo pacto JOANNES PETRUS FRANK, a recto tramite, quem per tot annos tanta cum gloria secutus est, vel per horulae momentum deflectere potuisset.*

gravi generis humani et scientiae jactura, divulgata fuerint.

2. Nec tandem praetereunda est ERASMI DARWINI²¹⁾ doctrina, medium fere inter systemata Stahlⁱⁱ et Brownⁱⁱ tenens, ideis luminosis non destituta, ast ita hypothesebus repleta, ut nec auctori nec caeteris in praxi exercenda inservire potuerit. Idem de doctrinis C. L. HOFFMANNI²²⁾ et P. J. BARTHEZI²³⁾, ingeniosissimis doctissimisque caeterum viris, contendere posset.

3. Securior viam ad medicinam excolendam in principiis *chemiae* a LAVOISIER, FOURCROY aliisque instauratae invenire crediderunt BEAUMES²⁴⁾, J. ROLLO²⁵⁾, REICH²⁶⁾, ACKERMANN²⁷⁾ etc. Nec defuere illis asseclae, ita ut hodie adhuc de morbis ex defectu vel excessu oxygenii, hydrogenii, carbonii etc. nec non de

21) *Zoonomia; or the laws of organic life.* London 1796.

22) WEDEKIND *allgemeine Theorie der Entzündungen und ihrer Ausgänge.* Leipzig 1791.

23) *Nouvelle mécanique des mouvemens de l'homme et des animaux.* Vers. germanica auctore K. SPRENGEL prodit. Hal. 1800.

24) *Essai d'un système chimique de la science de l'homme.* Paris 1798.

25) *Account of two cases of diabetes mellitus.* 2. edit. London 1797.

26) *Vom Fieber und dessen Behandlung.* Berlin 1800.

27) *De cognoscendis curandisque febribus epitome.* Heidelberg. 1809.

de indolationibus haec principia in morbis modo suppeditandi modo subtrahendi audire contingat! Ne quid ad absolutam confusionem statuendam deficeret E. PEART²⁸⁾, BEDDOES²⁹⁾ et GIRTANNER³⁰⁾ chemiae instauratae principia cum doctrina de solido vivo componere sategerunt!

Monitum. 4. Quodsi deterrima hac sub rerum positione medicina genuina cum seculo decimo octavo non evanuerit; id maxime iis debetur viris, qui, a disceptationibus tumultuosis alieni, experientiam placide secuti sunt. Spectant huc:

Anatomia
pathologica.
ca.

5. A) Cultores *anatomiae pathologicae* CH. F. LUDWIG³¹⁾, PHILIPPUS FRIDERICUS MECKEL³²⁾, J. P. PALLETTA³³⁾, JOANNES BAPTISTA MONTEGGIA³⁴⁾, NICOLAUS CHAMBON DE MONTAUX³⁵⁾, JACOBUS

28) *Physiology or an attempt to explain the functions and laws of the nervous system.* London 1798.

29) *Medical cases and speculations.* Lond. 1799. *Notice of some observations made — at the medical pneumatic institution.* London 1799.

30) *Journal de Rozier.*

31) *Primae lineae anatom. pathologicae.* Lips. 1785. — *De quarundam aegritud. humani corporis sedibus et causis advers. acad.* Lips. 1798.

32) Professor Hallensis, multarum dissertationum inauguralium a VOIGTELIO (*Handbuch der patholog. Anat.* 1. B. p. 47.) enumeratarum auctor.

33) Illius aliorumq. Ital. scripta, a Sandiforto edita, germ. vulgavit TABOR. Heidelb. 1791.

34) *Fasciculi pathologici.* Mediol. 1789.

35) *Observationes clinicae, curationes morborum peri-*

COBUS PENADA³⁶), MATHIAS BAILLIE³⁷), THOMAS SOEMMERRING³⁸), JUSTUS CHRISTIANUS LODER³⁹), JOANNES ABERNETHY⁴⁰), GEORGIUS CHRISTOPHORUS CONRADI⁴¹), AUGUSTUS FRIDERICUS HECKER⁴²), FRIDERICUS AUGUSTUS WALTER⁴³), HENRICUS AUGUSTUS WRISBERG⁴⁴), JOANNES PETRUS WEIDMANN⁴⁵),

culosorum et rariorum, aut phaenomena ipsorum in cadaveribus indagata referentes. Paris. 1789. Germanice. Leipzig 1791.

- 36) *Saggi d'osservazioni e memorie sopra alcuni casi singolari riscontrati nell'esercizio della medicina e dell'anatomia pratica.* Padova 1794.
- 37) *The morbid anatomy of some of the most important Parts of the human Body.* London 1793. Versio germanica SOEMMERRINGIO debetur cum egregiis notis. Nova edit. 1820. Altera Italica cum notis eximiis ZANNINIO. Venet. 1815.
- 38) *Vom Baue des menschlichen Körpers.* Frankf. 1791. et multa alia opera debitis locis commemoranda.
- 39) *KÖHLER Beschreibung der physiol. und pathologischen Präparata, welche in der Sammlung des H. H. LODER enthalten sind.* Jena 1795.
- 40) *Chir. u. physiol. Versuche.* A. d. E. von BRANDIS. Leipzig 1795.
- 41) *Handbuch der patholog. Anatomie.* Hannover 1796.
- 42) *Magazin für die pathologische Anatomie und Physiol.* Altona 1796. *Grundriss der physiol. pathologica.* Halle 1791—99.
- 43) *Anatom. Museum, gesammelt von J. G. WALTER, beschrieben von FR. A. WALTER.* Berlin 1796.
- 44) *Comment. Soc. R. Goetting. T. IX. aliaque opuscula passim commemoranda.*

MANN⁴⁵⁾, ALLEN SWAINSTON⁴⁶⁾, J. K. FLACHSLAND⁴⁷⁾.

Hist. natur. et mater. medica. 6. B) Qui medicinam labentem *historiae naturalis* ope sustinuerunt. Doctrina saltem vermium intestinalium, praeuntibus WERNER et BLOCH magis magisque exulta est a FISCHER, GOETZ et TREUTLER⁴⁸⁾. Materiam medicam W. WITHERING⁴⁹⁾, introducta digitali purpurea, revera locupletavit: pharmaca enim nova ab aliis jactata sat cito oblivioni tradita fuere. Usus *fontium salutarium* et *balneorum* extendebatur operâ H. M. MARCARD⁵⁰⁾, S. G. VOGEL⁵¹⁾, J. PASTA⁵²⁾, K. A. HOFFMANN⁵³⁾, TH. REID⁵⁴⁾ etc. Inclaruit praeterea *Galvanismi* inventum.

7. C) Me-

45) De necrosi ossium. Francof. 1793.

46) *Thoughts physiological, pathological and practical.* York 1796. et *Samml. auserl. Abhandl. für pr. Aerzte.* 17. B. p. 543.

47) *Obs. pathol. anat.* Rastadt. 1800.

48) *Opp. in tract. nostr. de vermib. intest. indicantur.*

49) *An account of the Foxglove.* Birmingham 1785.

50) *Ueber die Natur u. den Gebrauch der Bäder.* Hannover 1793.

51) *Ueber den Nutzen u. Gebrauch d. Seebäder.* Stendal 1794.

52) *Delle acque minerali del Bergamasco.* 1794.

53) *Jahrbücher für Aerzte, Physiker u. Brunnenfreunde.* Weimar 1798.

54) *Directions for warm and cold Sea-bathing.* London 1790.

7. C) Medici qui studium *topographiarum*, Topogr. morb. en-
morborum endemicorum et epidemicorum indefesse dem. epi-
 prosecuti sunt: B. LENTIN⁵⁵⁾, C. F. UDEN⁵⁶⁾, dem. con-
 K. BISSET⁵⁷⁾, J. P. RÜLING⁵⁸⁾, L. SCHÖLLER⁵⁹⁾, tagiosi.
 A. WILSON⁶⁰⁾, W. FALCONER⁶¹⁾, J. L. HAIDEN-
 REICH⁶²⁾, A. LE ROY⁶³⁾, J. J. PLANER⁶⁴⁾, J. C.
 SCHAEFFER⁶⁵⁾, L. CHALMERS⁶⁶⁾, LEPECQ DE LA
 CLOTURE⁶⁷⁾, J. A. WEBER⁶⁸⁾, B. MOSELEY⁶⁹⁾,
 S. HERZ⁷⁰⁾,

55) Memorabilia circa aërem, vitae genus, sanitatem et morbos Clausthaliensium. Goett. 1779. — Beob. d. epid. u. ein. sporad. Krankh. am Oberharze 1777.

56) Briefe u. Beobacht. aus d. pr. Arzneyw. Stendal 1779.

57) Versuch über die med. Constitution von Grossbritannien. A. d. E. Warschau 1779.

58) Phys. med. ökonom. Beschreibung der Stadt Northeim. Göttingen 1780.

59) Diss. de morbis Surinamensium. Goett. 1781.

60) Bemerk. über den Einfluss des Himmelsstrichs auf die Gesundheit. A. d. E. 1781.

61) Bemerk. über den Einfluss des Himmelsstrichs auf die Gesundheit. A. d. E. 1782.

62) Med. Aradensis, s. de morbis in Dacia frequentioribus. Presb. 1783.

63) Anleitung für Aerzte nach Hippocrat. Grundsätzen epidemische Krankheiten zu beob. A. d. Fr. Leipz. 1785.

64) Uebersicht der Krankheiten in Erfurt. 1786.

65) Versuch einer Ortsbeschreibung von Regensburg. 1787.

66) Nachrichten über die Witterung u. Krankheiten in Süd-Carolina. A. d. E. Stendal 1788.

67) Samml. von Beobacht. über epidem. Krankheiten in d. J. 1763 — 77. A. d. Fr. Alt. 1788.

68) Geschichte der Ruhr u. der Faulfieber, die am Rhein

S. HERZ ⁷⁰⁾, H. BLUHM ⁷¹⁾, CLIFTON WINTRING-
HAM ⁷²⁾, R. JACKSON ⁷³⁾, A. BEAUMES ⁷⁴⁾, L. L.
FINK ⁷⁵⁾, J. FERRO ⁷⁶⁾, F. L. DE LA FONTAINE ⁷⁷⁾,
L. MYE ⁷⁸⁾, G. W. C. CONSRUCH ⁷⁹⁾, S. R. WINK-
LER ⁸⁰⁾, S. BENKOE ⁸¹⁾, P. F. HOPFENGÄRTNER ⁸²⁾,

FR.

u. der Krankheiten, die in Schwaben geherrscht haben.
Tübingen 1789.

69) *Abhandl. von d. Krankheiten zwischen d. Wendezirkeln*
u. dem Klima in Westindien. Altd. 1790.

70) *Versuch einer med. Ortsbeschreibung d. Uckermärk.*
Hauptst. Prenzlau. 1790.

71) *Versuch einer Beschreibung d. in Reval herrschenden*
Krankh. Marburg 1790.

72) *Von den endem. u. epidem. Krankh. A. d. L. Leip-*
zig 1791.

73) *Treatise on the fever of Jamaica 1791. — Treat. on*
sol-lunar influence in fever. London 1795.

74) *Abhandl. . . . über d. Krankheiten, welche von der*
Ausdünstung stehender Gewässer . . entspringen. A. d.
Fr. Leipzig 1792.

75) *Versuch einer allgem. med. pr. Geograph. Leipz. 1792.*

76) *Ephem. med. Vindobonenses. 1792.*

77) *Chir. med. Abhandl. Pohlen betreffend. Leipzig und*
Breslau 1792.

78) *De morbis et sympt. popular. Bredanis tempore ob-*
sidionis etc. Jen. 1792.

79) *Med. Ephemer. nebst einer med. Topogr. d. Grafschaft*
Ravensberg. Chemnitz 1793.

80) *Von einer der gewöhnl. Krankheiten der Esthländ.*
Bauern. Reval 1793.

81) *Eph. meteor. medicae a. 1780 — 93. Vienn. 1794.*

82) *Beyträge zur allgem. u. besondern Theorie der epid.*
Krankheiten. Stuttg. 1794.

FR. THIERY ⁸³), A. H. JAWANDT ⁸⁴), W. HOWEN ⁸⁵), C. RODSCHEID ⁸⁶), J. L. FORMEY ⁸⁷), CH. F. FISCHER ⁸⁸), H. L. LEVELING ⁸⁹), MENEURET ⁹⁰), A. SEBALD ⁹¹), A. RUSSEL ⁹²), K. BRAUNE ⁹³), NEUHAUSER ⁹⁴), C. R. SCHLEIS ⁹⁵), ST. BENDITSCH ⁹⁶),
DESES-

83) *Phys. med. Beobacht. aus verschiedenen Orten in Spanien gesammelt. A. d. Fr. Heidelberg 1794.*

84) *Beobacht. einer Ruhrepidemie im Meiningischen. Riga 1794.*

85) *Geschichte eines epid. Fiebers, welches in den J. 1792 — 93 in Asperg geherrscht hat. Jena 1795.*

86) *Bemerk. v. d. Klima u. den Krankh. v. Rio Essequibo. Frankfurt 1796.*

87) *Versuch einer Topogr. von Berlin. 1796. Med. Ephem. von Berlin 1799 — 1800.*

88) *Med. u. chir. Bemerk. über London u. d. Englische Heilk. überhaupt. Göttingen 1796.*

89) *Med. Ortsbeschreibung von Ingolstadt. 1797.*

90) *Versuch über die Stadt Hamburg in Hinsicht auf Gesundheit. A. d. Fr. 1797.*

91) *Annalen zur Geschichte der Klinik nach dem Laufe der Jahre. Prag 1797.*

92) *Naturgeschichte von Aleppo u. der angränzenden Länder. A. d. E. Göttingen 1797 — 99.*

93) *Topogr. medica urbis Lipsiae. 1798.*

94) *Topograph. Cracoviensis. v. Medicinischer Nationalanzeiger. 1798. p. 372.*

95) *Med. Ortsbeschreibung d. Stadt Schwandorf im Nordgau. Sulz. 1799.*

96) *Ueber die herrschende Constitution u. einige Krankheiten, welche in den J. 1797. 1798. in Steyermark beob. worden sind. Grätz 1799.*

DESESSARZ⁹⁷⁾, M. J. DE MANN⁹⁸⁾, G. H. RITTER⁹⁹⁾, aliisque¹⁰⁰⁾. Contagiorum doctrinae sese dederunt J. A. UNZER¹⁰¹⁾, J. FORD¹⁰²⁾, J. G. GEBLER¹⁰³⁾, J. J. MENEURET¹⁰⁴⁾, M. ROSA¹⁰⁵⁾, KÖRBER¹⁰⁶⁾, P. J. FERRO¹⁰⁷⁾, H. OWEN¹⁰⁸⁾, O-
 RYAN¹⁰⁹⁾, E. G. BOSE¹¹⁰⁾, PICHLER¹¹¹⁾, F. MEZ-
 LER¹¹²⁾,

- 97) *Ueber eine Pocken-Epidemie. v. Samml. auserl. Abh. für pr. Aerzte. 19. B. p. 3.*
- 98) *Abhandl. über das böartige Faulfieber oder Beschreibung einer epid. Constit. in d. J. 1770—71. Leipzig 1800.*
- 99) *Denkwürdigkeiten der Stadt Wisbaden. 1800.*
- 100) PALLAS topogr. Tauridis in nov. act. Petropol. T. X. p. 257. S. G. GMELIN *Reise durch Russland zur Untersuchung der drei Naturreiche. Archiv für med. Länderkunde. Coburg 1800. Et passim in Act. acad.-soc. med. et diariis.*
- 101) *Ueber die Ansteckung, besonders der Pocken. Leipzig 1778. — Einleitung zur allgemeinen Pathologie der ansteckenden Krankheiten. Leipzig 1782.*
- 102) *De morbis contagiosis. Edinburghi 1779.*
- 103) *Diss. de migrationibus celebriorum morbor. contagiosor. Gotting. 1780.*
- 104) *Sur l'action de l'air dans les maladies contagieuses. Paris 1781.*
- 105) *De epidemicis et contagiosis acroasis. Neapoli 1782.*
- 106) *Diss. de contag. malignitat. Erf. 1782.*
- 107) *Ueber die Ansteckung der epidem. Krankheiten, besonders der Pest. Leipzig 1782.*
- 108) *Diss. de contagione. Edinb. 1783.*
- 109) *Dissertat. sur les fièvres infectueuses et contagieuses. Lyon 1785.*

LER¹¹²⁾, S. ALDERSON¹¹³⁾, TITIUS¹¹⁴⁾, REIL¹¹⁵⁾,
CUNITZ¹¹⁶⁾, BARFOTH¹¹⁷⁾, CROWTHER¹¹⁸⁾, MÜL-
LER¹¹⁹⁾, S. L. MITCHILL¹²⁰⁾, J. ADAMS¹²¹⁾, J. L.
DAVIS¹²²⁾ et E. P. POLEMAN¹²³⁾.

8. D) Qui *morbis aetatum et sexuum* ulte- Morb. ac-
rius eruendis intenti fuere TH. HOGVEEN¹²⁴⁾, tatum et
sexuum.

W. MOSS

- 110) Progr. de contagii natura animadversiones. Lips.
1786.
- 111) *Mémoires sur les maladies contagieuses*. Strasbourg
1786.
- 112) *Ueber die Wassersucht, nebst einem Anhang über
die Ansteckung*. Ulm 1787.
- 113) *On essay on the nature and origin of the contagion
of fevers*. Hull 1788.
- 114) Diss. de variis contagiorum modis. Lips. 1788.
- 115) Resp. A. Heydrich diss. sistens quaedam circa pa-
thologiam morborum cont. generalem. Halæ 1790.
- 116) Diss. sistens problemata quaedam de contagio. Jen.
1790.
- 117) Diss. in contagium epidemicum inquirens. Ludae
1791.
- 118) Diss. de contagione humana. Edinb. 1793.
- 119) Diss. de ortu morbor. contag. ex ferment. et
acrimon. specif. deducto. Jen. 1793.
- 120) *Remarks on the gaseous oxyd of azote, being an at-
tempt to ascertain the true nature of contagion*. New-
york 1795.
- 121) *Observations on morbid poisons, phagedaena and
cancer*. Lond. 1795.
- 122) Tentam. chem. med. de contagio. Edinb. 1797.
- 123) Diss. cogitata quaedam de contagiis. Jen. 1800.
- 124) *Tractatus de foetus humani morbis*. Lugd. Bat.
1784.

W. MOSS et M. UNTERWOOD ¹²⁵), J. C. G. SCHAEFER ¹²⁶), CPH. GIRTANNER ¹²⁷), CH. A. STRUVE ¹²⁸), N. CHAMBON ¹²⁹), J. H. F. AUTENRIETH ¹³⁰), DAIGNAN ¹³¹), D. G. TRILLER ¹³²); — J. LEAKE ¹³³), A. PASTA ¹³⁴), C. L. MURSINNA ¹³⁵), F. B. OSIANDER ¹³⁶),

125) *Der Englische Kinderarzt. Leipzig 1786. Traité des maladies des enfans, de M. UNTERWOOD entièrement refondu etc. par E. DE SALLE, avec des notes de Mr. JADELLOT. Paris 1823.*

126) *Ueber die gewöhnlichen Kinderkr. u. deren Behandl., nach ARMSTRONG neu bearbeitet. Regensb. 1792. 3. Edit. 1803.*

127) *Abhandlung über d. Krankh. d. Kinder u. ihre phys. Erziehung. Berlin 1794.*

128) *Neues Handb. d. Kinderkr., besonders zum Gebrauche für Eltern u. Erzieher. Breslau 1797.*

129) *Des maladies des enfans. Paris 1798.*

130) *Diss. continens observationes quasdam physiolog. pathologicas quae neonatorum morbos frequentiores spectant. Tüb. 1799.*

131) *Von den Krankh. d. männlichen Alters. A. d. Fr. Gera 1789.*

132) *De senilibus morbis diverso modo a Salomone et Hippocrate descriptis. Vitemb. 1781.*

133) *Medical instructions towards the prevention and cure of chronic or slow diseases peculiar to women. London 1777.*

134) *Dissertazioni mediche intorno alle diverse malattie delle donne. Napol. 1782.*

135) *Abhandl. von d. Krankh. der Schwangern, Gebärenden u. Wöchnerinnen. Berlin 1784.*

DER ¹³⁶), CHAMBON DE MONTAUX ¹³⁷) et HART-
MANN ¹³⁸).

9. E) Scriptores de *morbis exercituum, clas-* Morbi
sium, artificum, opificumque: J. PIDERIT ¹³⁹), ^{exercit.}
J. C. JÄGER ¹⁴⁰), J. C. G. ACKERMANN ¹⁴¹), F. W. ^{class. arti-}
VOSS ¹⁴²), G. WEDEKIND ¹⁴³), W. LINDEMANN ¹⁴⁴), ^{fic. etc.}
D. REID ¹⁴⁵), G. BLANE ¹⁴⁶), N. FONTANA ¹⁴⁷),

BA-

136) *Beobacht. von Krankh. d. Frauenzimmer u. Kinder.*
Tübingen 1787.

137) *Abhandl. von d. Krankh. unverheuratheter Frauen-*
zimmer. A. d. Fr. Nürnberg 1787. — Abhandl. von
d. Krankh. der Frauen. Erfurt 1789.

138) *Differentiae sexus utriusque pathologicae momenta.*
Goett. 1790.

139) *Prakt. Annalen vom militairischen Lazareth zu Cas-*
sel. 1794.

140) *Beyträge zur Kriegsarzneywissenschaft. Frankf. a.*
M. 1794.

141) *Handb. der Kriegsarzneykunde. Leipz. 1795. Handb.*
der ausübenden Arzneywissenschaft u. Wundarzneyk. bey Ar-
meen. Leipzig 1797. Med. prakt. Taschenb. für Feld-
ärzte. Leipzig 1800.

142) *Med. Beobacht. u. Erfahr. aus d. königl. Südpreussi-*
schen Feldlazarethen. Breslau 1796.

143) *Nachrichten über das Französ. Kriegsspitalwesen.*
Leipzig 1797.

144) *Entwurf die vorzüglichsten Krankheiten der Sol-*
daten im Felde schneller u. glücklicher zu heilen. Ber-
lin 1799.

145) *Uebersicht der Krankh. bey der königl. Armee in*
Grossbritannien vom Anfange des Amerikanischen Krie-
ges bis 1791. A. d. E. Breslau 1800.

BACHERAT¹⁴⁸), TH. TROTTER¹⁴⁹), WERNER¹⁵⁰), —
HECKER¹⁵¹), HUNNIUS¹⁵²), V. LORENZ¹⁵³), J. G.
HOFFINGER¹⁵⁴), KORTUM¹⁵⁵), BARTHOLDI¹⁵⁶),
VERHAGEN¹⁵⁷), WICHMANN¹⁵⁸), HEERKERS¹⁵⁹),
BOEHMER¹⁶⁰), MAI¹⁶¹) et LIDDERDALE¹⁶²).

10. F) Au-

146) *Beobacht. über d. Krankheiten d. Seeleute. A. d. E. Marburg 1788.*

147) *Bemerkungen über d. Krankheiten, womit Europäer in heissen Himmelsstrichen u. langen Seereisen befallen werden. A. d. E. Stendal 1790.*

148) *Von der Erhaltung d. Gesundheit d. Seeleute. St. Petersburg 1790.*

149) *Medicina nautica. Lond. 1797.*

150) *Versuch über d. Krankh. der Seeleute. A. d. E. mit Bemerkungen von HUFELAND. Erfurt 1798.*

151) *Beytrag zur Kenntniss d. Krankheiten d. Gelehrten. Erfurt 1791.*

152) *Arzt für Schauspieler u. Sänger. Weimar 1798.*

153) *Etwas über d. Krankheiten d. Lohgerber. Rostock 1798.*

154) *Sendschreiben über den Einfluss d. Anquick. d. Gold- u. Silberhaltigen Erze. Wien 1790.*

155) *Gesundheitsbüchlein für Bergleute. Dortmund 1800.*

156) *Diss. de morbis artificum et opificum, inprimis metalla deaurantium. Erlang. 1783.*

157) *Diss. de morbis ex nimia literatura sequi solitis. Lugd. Bat. 1788.*

158) *De morbis typographorum. Jen. 1792.*

159) *De valetudine literatorum. Groning. 1792.*

160) *De morbis nutricibus aliisque feminis, quae infan- tum curam gerunt, ad hos translatis. Vitemb. 1798.*

161) *De aulica humorum cacoehymia. Heidelb. 1799.*

162) *Diss. de morbis literatorum. Edinb. 1800.*

10. F) Auctores *monographiorum*¹⁶³⁾: scripse-
 runt enim de febribus intermittentibus COMPARETTI et HOVEN; de febribus continuis GRANT;
 de febre flava RUSH; de morbis cutis WILLAN;
 de lepra HENSLER; de pellagra STRAMBIO et FAN-
 ZAGO; de psora GULDNER; de maniis ARNOLD,
 CRICHTON et CHIARUGI; de hypochondriasi LU-
 CÉ; de laesa respiratione BREE; de phthisi et
 rhachitide PORTAL; de morbis viscerum abdomi-
 nalium KÄMPF; de vitiis hepatis SAUNDERS; de
 dysenteriâ J. PH. VOGLER et CHR. HUNNIUS; de
 morbis vasorum absorbentium SOEMMERRING; de
 scrophulis KORTUM et HUFELAND; de syphilide
 SWEDIAUR, J. HUNTER, NISBETT, GIRTANNER,
 deque rabie canina J. MEASE, J. HUNTER, HIL-
 DENBRAND et ROUGEMONT.

11. Praeterea *institutis clinicis* et cathedris *Inst. cli-*
therapiae specialis magna cum laude praefuere: *nica et*
 Hafniae — FR. L. BANG¹⁶⁴⁾ et J. C. TODE¹⁶⁵⁾; *therap.*
 Edinburgi — J. GREGORY, HAMILTON et DUNCAN
 senior; Parisiis — PH. PINEL¹⁶⁶⁾ et CORVISART;
 Patavii — COMPARETTI; Bononiae — TESTA;
 Ticini — V. L. BRERA¹⁶⁷⁾; Vindobonae — J. P.
 F 2 FRANK;

163) Debitis locis hae monographiae accuratius indica-
 buntur.

164) Select. diarior. nosocomii Hafniensis. 1789.

165) *Klinische Berichte. Kopenhag.* 1801.

166) *Philosophische Nosographie. A. d. Fr. Tüb.* 1799.

167) *Annotazioni medico-pratiche sulle diverse malattie*

FRANK¹⁶⁸); Erlangae — WENDT¹⁶⁹); Tübingae — J. H. F. AUTENRIETH¹⁷⁰); Würceburgi — THOMANN¹⁷¹); Halae — CHR. REIL¹⁷²); Gottingae — A. G. RICHTER¹⁷³) et J. ARNEMANN¹⁷⁴); Jenae — STARKE¹⁷⁵); Kilonii — BRANDIS; Gröningae — THOMASSEN a THUESSINK¹⁷⁶) etc.

Diss. inaug.
et
progr.

12. Porro *dissertationes inaugurales et program-*

trattate nella clinica medica della R. Università di Pavia negl' anni 1796. 97. 98.

168) Joannis Salamonis Frank observationes medicinales circa res gestas in instituto clinico nosocomii Vindobonensis, Viennae 1796.

169) *Annalen des klinischen Instituts auf der Akademie z. Erlangen.* 1788—89. Cont. 1808.

170) *Uebersicht der wichtigsten Vorfälle im Clinico ambulatorio. Tübingen* 1796. *Versuche für d. prakt. Heilk. aus der klin. Anstalt von Tübing.* 1807—1809.

171) *Annal. institut. medico-clinici Wurceburgens.* 1799. Contin. 1803. 5.

172) *Memorabilia clinico-medico practica.* Hal. 1790.—*Ueber die Erkenntniss u. Kur der Fieber.* Halle 1797.

173) *Med. chirurg. Bemerk. vorzügl. im öffentl. Academ. Hospital gesammelt.* Gött. 1793. *Die specielle Therapie. Nach den Papieren des Verstorbenen herausgegeben von G. A. RICHTER.* Berlin 1821. Etiam sub titulo: *Therapia specialis. opus posthum.* Berol. 1820.

174) *Handb. d. prakt. Medicin.* Götting. 1800.

175) *Handb. zur Kenntniss u. Heilung innerer Krankh. d. menschl. Körpers.* Jena 1800.

176) *Waarneemingen omtrent de Ziekten, welke in den Jaaren 1797 en 1798 in het nosocomium clinicum van — Groningen zyn handelt.* 1805.

grammata academica, optimis principiis innixa collegerunt edideruntque: J. T. KLINGKOSCH¹⁷⁷), L. WITTWER¹⁷⁸), CHR. G. GRUNER¹⁷⁹), J. L. DÖRING¹⁸⁰), J. P. FRANK¹⁸¹), J. D. METZGER¹⁸²), J. J. RÖMER¹⁸³), W. X. JANSEN¹⁸⁴), H. TABOR¹⁸⁵), J. G. REYHER¹⁸⁶), F. G. A. BOUCHHOLTZ¹⁸⁷) alii-que¹⁸⁸).

43. Tan-

- 177) Diss. med. select. Pragenses. 1775 — 93.
- 178) Delect. diss. med. Argentorat. Norimb. 1777 — 81.
- 179) Delect. diss. med. Jenensium. Altenb. 1779 — 83.
Kritische Nachrichten von kleinen med. Schriften in- u. ausländ. Akademien. Leipzig 1783.
- 180) *Kritisches Repertorium der auf in- u. ausländ. Lehranstalten v. d. J. 1781 — 1800 herausgekommenen Prob- u. Einladungsschr. aus d. Gebiete der Arzneygelahrtheit u. Naturk. Herborn 1781 — 90.*
- 181) Delect. opuscul. med. ante hac in Germ. div. acad. edit. Papiæ. 1785 — 91.
- 182) Opusc. acad. ad artem medic. spectant. in acad. Regiomontana edita. 1788.
- 183) Sylloge opusc. italic. Zür. 1790. — Delect. opusc. med. ital. Norimb. 1791. — Diss. med. ital. Ibid. 1797.
- 184) Coll. diss. select. in variis foederat. Belgii acad. ed. Düsseld. 1791 — 93.
- 185) *Auszüge aus d. besten u. neuesten Engl. med. Streitschrift. Heidelberg 1792.*
- 186) *Auszüge med. Probe- u. Einladungsschr. Schwerin 1790 — 91.*
- 187) *Auszüge aus den neuesten medicin. Probe- u. Einladungsschr. Altona 1796 — 97.*
- 188) Coll. dissertt. med. in acad. Goett. habit. 1790. — Coll. diss. med. Marburgensium. 1791 — 96. — Col-

Observat. 13. Tandem genuinae medicinae pro fulcro inservierunt *observationes* circa aegrorum lectulos collectae, quas interpretati sunt publicique juris reddiderunt J. C. T. SCHLEGEL¹⁸⁹), CH. G. ACKERMANN¹⁹⁰), J. F. BÖTTCHER¹⁹¹), G. WEDEKIND¹⁹²), J. A. H. ZELLER¹⁹³), J. E. GILIBERT¹⁹⁴), F. SCHRAUD¹⁹⁵), J. FERRIAR¹⁹⁶), B. OSIANDER¹⁹⁷), G. C. CONRADI¹⁹⁸), TH. KORTUM¹⁹⁹), T. V. SELIG²⁰⁰),

lect. diss. minus cognit. in acad. C. R. Leopold. Oenipont. 1793. — Coll. diss. med. in alma univ. Lovan. mult. ann. curricul. publ. defens. 1795—96. — Catalog. diss. inaugur. med. acad. Altd. ab a. 1628 ad hoc usque tempus concinn. 1797.

189) Thesaur. patholog. therap. Lips. 1789—93.

190) *Bemerkungen über d. Kenntniss u. Kur einiger Krankheiten. Altd. 1791.*

191) *Verm. med. Schriften. Königsberg 1791—92.*

192) *Aufsätze über versch. wicht. Gegenstände d. Arzneywiss. Leipzig 1791.*

193) *Aufsätze u. Bemerk. aus d. prakt. Arzneywiss. u. Geburtsh. Rost. 1791.*

194) *Samml. prakt. Beob. u. Krankengeschicht. A. d. L. Leipzig 1792.*

195) *Beobacht. aus d. Arzneykunde. Wien 1792.*

196) *Bemerk. über d. Wassersucht, Wasserscheu, ansteckenden u. andern Krankh. A. d. E. Leipzig 1792. Neue Bemerkungen 1801.*

197) *Das Neueste aus meiner Götting. Praxis. Göttingen 1793.*

198) *Auswahl aus dem Tageb. eines prakt. Arztes. Chemnitz 1794.*

199) *Beyträge zur prakt. Arzneywiss. Göttingen 1795.*

LIG²⁰⁰), J. H. JUGLER²⁰¹), B. SOMMER²⁰²), W. A. FICKER²⁰³), A. RAVE²⁰⁴), J. J. KAUSCH²⁰⁵), J. C. FAHNER²⁰⁶), J. G. KNEBEL²⁰⁷), G. THOM²⁰⁸), J. HAAR²⁰⁹), H. G. SPIERING²¹⁰), F. CHR. WENDELSTADT²¹¹) et DE FELICE²¹²).

14. Nec silentio praeteribimus A) *academias* Academ. scientiar. et societ. medic. *scientiarum societatesque medicas*, quae pullularunt in *Germania*²¹³), *Helvetia*²¹⁴), *Italia*²¹⁵), *Anglia*²¹⁶) etc.

15. B) *Dia-*

200) *Obs. med. de morbis quibusdam difficilioribus.*

Lips. 1795.

201) *Kleine Aufsätze med. Inhalts. Stendal* 1795.

202) *Observationes miscellan. med. chir. Rigae* 1796.

203) *Beyträge zur Arzneywiss., Wundarzney- u. Entbindungskunst. Münster* 1796.

204) *Beob. u. Schlüsse aus d. prakt. Arzneywiss. Münster* 1796.

205) *Med. u. chir. Erfahr. in Briefen an Girtanner, Hufeland u. s. w. Leipzig* 1798.

206) *Beyträge zur prakt. u. gerichtl. Arzneyk. Stendal* 1799.

207) *Materialien z. Arzneywiss. Breslau* 1799.

208) *Erfahr. u. Bemerkungen aus d. Arzney-, Wundarz- u. Entbindungsw. Frankf. a. M.* 1799.

209) *Auserl. med. chir. Abhandl. u. Beob. A. d. Holl. Leipzig* 1800.

210) *Med. Beob. u. Erfahrungen. Altona* 1800.

211) *Wahrnehm. am medic. u. chirurgischen Krankenbette. Osnabr.* 1800.

212) *Ratio medendi. Ticini* 1800.

213) *Abhandl. der k. k. med. chirurg. Josephs-Akademie zu Wien.* 1787—1801.

Diaria. 15. B) *Diaria*²¹⁷⁾ medica, quae multiplicarunt J. J. HARTENKEIL²¹⁸⁾, G. G. HOPF²¹⁹⁾, A. F. HECKER²²⁰⁾, K. WEIGEL²²¹⁾, ANDREAS DUNCAN²²²⁾ senior et junior, J. F. PIERER²²³⁾, C. W. HUFELAND²²⁴⁾, A. RÖSCHLAUB²²⁵⁾, A. ZADIG et F. G. FRIESE²²⁶⁾ atque K. G. KÜHN²²⁷⁾.

Nosologiae. 16. C) *Nosologias* quas elaborarunt W. G. PLOUC-

214) *Museum der Heilkunde h. v. d. Gesellschaft corresp. A. u. W. A. Zür.* 1792—97. — *Med. pr. Bibliothek.* 1795—96.

215) *Memorie dell' acad. delle scienze, lettere ed arti di Padova.* 1789.

216) *Records and Researches selected from the papers of a private medical association.* London 1798.

217) *Allgemeine Literatur-Zeitung.* Jena 1785.

218) *Medic. chirurg. Zeitung.* Salzburg 1790—1808.

219) *Commentarien der neuern Arzneykunde.* Tübingen 1793.

220) *Journ. d. Erfindungen, Theorien u. Widersprüche in d. Natur- u. Arzneywiss.* Götting. 1793.

221) *Italien. med. Biblioth.* Leipzig 1793.

222) *Annals of medecine.* Edinb. 1796.

223) *Med. Nationalzeit, für Deutschland.* Altenb. 1798—99. — *Allgem. med. Annal.* 1800.

224) *Journ. d. prakt. Arzneyk. u. Wundarzneyk.* Jena, Berlin 1795. — *Biblioth. d. pr. Heilk.* Berlin 1799.

225) *Magazin zur Vervollkommn. d. theor. u. pr. Heilk.* Frankf. a. M. 1799.

226) *Archiv für d. prakt. Heilkunde für Schlesien u. Süd-Preussen.* Breslau 1799.

227) *Phys. med. Journ.* Leipzig 1800.

Ploucquet²²⁸), J. Arnemann²²⁹), G. G. Gruner²³⁰), De Valenzi²³¹) et Munk²³²).

17. D) Encyclopaediae methodicae articulum Encyclop. ad medicinam spectantem, quem edidit Vicq-tor. et reper-
d'Azyr²³³); nec non opus continens collectanea, excerpta et indices totius literaturae medicae, ad partem eruditionis, quam quisque sibi colendam proposuit, pertinentia, quod concinnavit, nemini antecessorum²³⁴) aequiparandus, G. G. Ploucquet²³⁵).

18. Po-

228) Delineat. syst. nosol. natur. accomm. Tub. 1791 — 93.

229) Synopsis nosologiae; in us. praelect. acad. Goett. 1793.

230) Nosologia historica, ex monumentis medii aevi lecta, animadverss. histor. ac medicis illustr. Jena 1795.

231) Completum et methodo botanica propositum syst. morbor. Brünn. 1796.

232) Diss. sistens nonnullas circa nosolog. methodic. observat. 1796.

233) *Encyclopédie méthodique. Médecine. Paris et Liège* 1794.

234) Opera quodammodo similia sunt: Directorium med. pract. etc. a Matthia Morono confectum. Lugd. 1650. S. G. Walteri sylvia medica opulentissima etc. Budissae 1679. M. Lipenii Bibliotheca Realis medica. Frcf. a. M. 1679. J. Jac. Mangetti bibliotheca med. pract. Genev. 1695. Mich. Alberti tentamen Lexic. Realis observationum medicarum. Hal. 1727. G. H. Behr Lexicon physico - chymico medicum Reale. Argentor. 1738. J. C. Heffteri museum disputation.

Vaccina. 18. Postremo seculo decimo octavo coronam imposuit utilissimum generi humano inventum — *vaccina*, auctore EDUARDO JENNER.

§. XI.

Seculi XIX. Initium.

Doctrina
del contro
stimulo.

1. Quo tempore doctrina Brunonis adhuc in Italia vigeat, condiscipulus quondam noster, G. RASORI, cardinem praecipuum illius doctrinae, quod omnia in corpus humanum per stimulum agant, ita subvertit, ut potentias vim vitae *immediate* deprimentes statuerit. Potentiis ejusmodi (ad morbos ex stimulo curandos idoneis) adnumeravit acidum hydrocyanicum, aquam lau-
roce-

physico-medic. Zittaviae 1763. THEOPH. BONETI mercurius compilativus. Gen. 1682. Ejuſd. medicina septentrionalis collatitia. Genev. 1784. — CH. W. KESTENERI biblioth. med. Jen. 1746. PLANQUE (*bibliothèque choisie de médecine. T. VIII. Paris 1748.*

235) Initia bibliothecae medico-practicae et chirurgicae Realis, sive Repertorii medicinae practicae et chirurgiae T. VIII. Tubingae 1793—97. Successerunt dein annis 1799 et 1800 continuationum et supplementorum tomi duo, iterumque annis 1802 et 1803 horum tomi tertius et quartus. Cum continuationum et supplementorum Tomum V et VI. edere debuisset, maluit auctor universa ista penus in novum opus coadunare sub titulo: *Literatura medica digesta, sive Repertorium medicinae practicae, chirurgiae atque rei obstetriciae.* Tubingae 1808. Continuatio et supplementum. Tub. 1814.

rocerasi, digitalem purpuream, atropam belladonnâ, hyoscyamum nigrum, acida, nitrum et tartarum emeticum: perseveravit vero in tribuenda vi stimulante (ad morbos ex defectu stimuli sanandos opportunâ) opio, vino, alcoholi, aetheri, ammoniae, camphorae, moscho et aromatibus. *Rasorii* principiis sub nomine *dottrina del contro stimolo*, passim in variis ejus opusculis divulgatis¹⁾, seculo decimo nono ineunte, nonnulli Italiae medicorum²⁾, inter quos S. BORDA³⁾ et J. TOMMASINI⁴⁾ eminent, circiter⁵⁾ subscripserunt. Orta inde est secta, quae aliarum sectarum instar, propriam opinionem pro opinione universali obtrudendo, novae doctrinae nomen *medi-*

1) *Storia dell' epidemia Dr. Genova negl' anni 1799 e 1800. Milano 1801. Preteso genio d'Ippocrate. Ibid.* — In notis ad vers. ital. Operis Darwinii. *Prospetto dei risultati della clinica medica . . . nello spedale militare. Milano 1808.*

2) Enumerantur a cl. Renato Orrigoni in notis ad opusculum: *Stato della medicina nel decennio 1805—11. Venez. 1816. p. 263.*

3) *Primae lineae topographiae medicae agri Ticinensis. Papiæ. 1816.*

4) *Dissertazioni ed altri scritti del signor Dottore GIACOMO TOMMASINI professore di clinica medica nella Pontificia università di Bologna relativi alla nuova dottrina medica italiana. Bologna 1821. 4 Tomi.*

5) Morbis ex stimulo et ex defectu stimuli, tertia classis addita est, videlicet morborum ex irritatione locali, per eliminationem materiae irritantis curandorum.

medicinae Italicae imposuit. Patriam autem REDII, VALLISNERII, LANCISII, TORTII, RAMAZZINII, COCCHII, MORGAGNII, BURSERII etc., sicuti omnium scientiarum⁶⁾ ita et medicinae genuinae incunabula⁷⁾, novum vexillum neutiquam agnitionem

6) *D'ogni alta cosa insegnatrice altrui.*

7) Itali clinici, inquit BURSERIUS noster (op. c. §. L. nota **)), in Bononiensi in primis, Florentina, et Romana schola enutriti, atque instituti, nihil sibi antiquius esse putant, quam naturam contemplari, ejus motus cognoscere, salubribus obsequi, noxiis occurrere, deficientibus opem ferre, uno verbo naturae se ministros, non dominos gerere. Hinc plerique medendi ratione simplicissima utuntur. caventque a nimia medicamentorum copia, aut farragine, non quod *materiam medicam*, ut a quibusdam inique insimulantur, ignorant, nam cum simplicia, tum composita, eorumque facultates norunt et ipsi, sed quod nolint naturam morborum medicatricem perturbare, et probe sciant, plurima medicamenta, quae a quibusdam transalpinis mirifice extolluntur, plerumque periclitantium votis minime respondere. Fabulis, et prodigiis, quae passim narrantur, non facile credunt, a REDIO et VALLISNERIO viris sane sapientissimis, et prudentissimis admoniti, et cum de remediorum viribus periculum faciendum est, tantam circumspectionem diligentiamque adhibent, ut nullum errori, aut praejudicatae opinioni locum relinquant. Quare saepe aliorum periclitationibus decepti, suam propriam experientiam consulunt, et plerumque, licet inviti, ad pristinam medendi simplicitatem, qua summopere natura delectari consuevit, redire coguntur. Id in

turam fore, praevideri facile potuerat. Probat id revera, magnus adversariorum novae doctrinae numerus⁸⁾. Nec medici Italiae, qui tacent, ideo approbant⁹⁾. Sectarum enim coryphaei eo semper gaudent privilegio, quod homines a contentionibus alieni ac propria negotia placide exercentes, arenam fugiunt illisque campum liberum relinquunt. Interea dolendum est genus humanum tot periculis obnoxium fieri, quot ex systemate redundare debent, quod obscurissimam medicinae partem, notiones videlicet de intima morborum natura et de recondita medicamentorum actione, pro filo in praxi exercenda eligit, quod pharmaca heroica, pro usu quotidiano ad doses

primis animadvertant Tirones, ne credulitatis nimiae eos tandem poeniteat.“

- 8) Spectant praecipue huc: F. OZANAM *cenni sulla teorica e la pratica della dottrina medica del controstimolo*. Milano 1816. BUFALINI *memoria premiata*. G. B. SPALLANZANI *sulla nuova dottrina medica Italiana testè sviluppata dal sigr. prof. G. Tommasini, lettere medico critiche*. Reggio 1818. — G. A. AMORETTI *confutazione della dottrina medica Italiana*. Torino 1818. — G. BIANCHI *leggi sulla scienza di medicina*. Pisa 1822. FILIPPI V. *allgemeine med. Annalen*. 1823. September p. 84.

- 9) Mensibus septembri et octobri a. 1824. quum Regnum Lombardo-Venetum peragraverim, atque cum permultis hujus paradisi terrestres medicis usum familiarem habuerim, vix tres, qui doctrinae *del controstimolo* dictae subscriberent, inveni.

doses saepe enormes manibus vulgi medicorum tradit; pretiosissimum corporis humani liquidum, sanguinem videlicet, crudelissime profundit etc.

Xav. Bi-
chat.

2. Felicior videbatur *Gallia*, ubi seculi decimi noni scenam aperuit XAVERIUS BICHAT¹⁰⁾ cui breve vitae curriculum¹¹⁾ ad memorabilem historiae medicae epocham statuendam suffecit. Singula systemata, ex quorum diversis combinationibus organa corporis humani formantur¹²⁾, separatim considerando atque principia stabiliendo, quod morbi, partibus specialibus infensi¹³⁾, systemata, quae illos constituunt, separatim aggre-
diuntur; quod sympathiae non ex toto organo,
sed

10) *Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médecine. Paris 1801. 4. volumes. Habetur: Addition à l'anatomie générale de Bichat, pour servir de complément aux éditions en quatre volumes. Par P. A. BÉCLARD. Paris 1821.*

11) Natus a. 1771. Mortuus 02.

12) Nimirum systema cellulare, s. nervorum, s. vasorum sanguini rubro et nigro dicatorum atque capillarium nec non lymphaticorum, s. osseum, s. medullare, s. cartilagineum, s. fibrosum, s. fibroso-cartilagineum, s. musculare, s. mucosum, s. serosum, s. synoviale, s. glandularum, s. dermoideum, s. epidermidis et pilorum.

13) „ car les maladies qui, comme la plus-part des fièvres, frappent presque simultanément toutes nos parties, ne peuvent par beaucoup être éclairées par l'anatomie des systèmes.“ BICHAT l. c. Vol. I. p. LXXXV.

sed ex singulo illius systemate ortum trahunt; quodque inflammationes quovis in systemate peculiare notas habent, BICHAT pathologis campum, antea quidem non omnino ignotum¹⁴⁾, ast, dummodo rite excolatur¹⁵⁾, fertilissimum, indicavit.

3. Ac re quidem vera jam jam medici in Broussais. segete Bichatii colligenda intenti fuerant, cum fato adverso meteorum, illam destruens, adductum est. De F. J. V. BROUSSAIS, medico nosocomii militaris Parisiensis *Val de grace*, loquimur, bonorum quondam opusculorum auctore¹⁶⁾, qui vero nunc contendat¹⁷⁾: morborum maximam partem ex conditione inflammatoria membranae mucosae tubi intestinalis (gastro-enteritis) illiusque cum reliquis corporis partibus consensu pululare proponitque methodum medendi generalem,

14) Lege tractatus de cephalea in operibus F. PLATERI et FR. HOFFMANNI et videbis, hos auctores in sedem morbi secundum singula systemata encephalum efformantia, indagasse. Membranarum porro doctrinam, ducibus BOERHAAVE et MORGAGNI, LEIDENFROST exhibet in opusculis.

15) Id est quin nexus inter singula systemata praetervideatur.

16) *Recherches sur la fièvre hectique. Paris 1803. — Histoire des phlegmasies chroniques. Ibid. 1808.*

17) *Examen de la doctrine médicale. Paris 1816. — Examen des doctrines médicales et des systèmes de nosologie. Ibid. 1822.*

lem, quâ genus hirudinum periculum extinctionis incurrit, quâ emetica aliaque pharmaca heroica exsulantur, quâque totus fere apparatus medicaminum, seculorum industria collectus, ad mucilagines et potum subacidulum reducitur. Seductori isti, contradictoribus ubique non carenti¹⁸⁾, conspicua medicorum juniorum Parisiensium pars adhaeret. Interea epe non destituimur scholam medicam, quae Lutetiae Parisiorum floret atque per plura secula genuinam medicinam Hippocraticam incontaminatam servavit, modum huic quoque calamitati publicae frenum injiciendi, inventuram fore.

Philosoph.
transcend.
med. ap-
plic.

4. *Germanos* inter, seculo decimo nono in-
eunte SCHELLING et MARCUS¹⁹⁾, TROXLER²⁰⁾,
alii-

- 18) CHOMEL *sur les fièvres essentielles*. Paris 1821. —
M. FODERA *histoire de quelques doctrines médicales comparées à celle du Dr. Broussais*. Paris 1821.
Ejusd. *examen des observations critiques du Dr. Broussais sur les doctrines médicales analogues à la sienne*. Paris 1822. — *Le Docteur A***. Mr. Broussais réfuté par lui-même. Paris 1822. CASPER *Charakteristik d. Französ. Medicin, mit vergleichenden Hinblicken auf d. Englische*. — OTTO *Broussais og Broussaismen*. v. HUFELAND's Journ. d. prakt. Heilk. 1823. Mai p. 115. — *Danger et absurdité de la doctrine physiologique du Dr. Broussais*. Par A. L. LESAGE. Paris 1823. J. W. H. CONRADI *Kritik d. medic. Lehre des Dr. Broussais*. Heidelberg 1823. — *Réfutation de la doctrine de Broussais* par L. Castel. Paris 1824.

- 19) *Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft*. Tüb. 1805.

MALFATTI²¹⁾, aliique multi, sic dictam *philosophiam transcendentalem* seu *naturae KANTII* et *FICHTEI* medicinae adaptarunt²²⁾. Pullulavit inde secta domicilium in spatiis-imaginariis figens; sese ab omni alia per dictionem obscurissimam perque opera sensu adeo vacua, ut in alienum idioma verti haud possit, distinguens; secta linguam Germanicam vocabulis barbaris et extraneis defoedans; comparationes inter res plane dissimiles ad nauseam usque extollens; scientiam omnium gravissimam in poesiam convertens; animum ad errores omnis generis recipiendos praeparans; nationem Germanicam apud reliquos degradans et passim maniae vestigia exhibens.

5. Interea A. F. KLUGE²³⁾, K. CH. WOL-
FART²⁴⁾, K. L. BÄHRENS²⁵⁾, G. KIESER²⁶⁾, ^{Magnetis-}
^{mus ani-}
^{malis.}

J. K. PAS-

20) *Grundriss der Theorie der Medicin.* Wien 1805.

21) *Entwurf einer Pathogenie aus Evolutionen u. Revolutionen des Lebens.* Wien 1809. 8.

22) De hoc germanorum conamine Italii docte rationem reddidit C. CERESA *principii e leggi generali di filosofia e medicina speculativa.* Vienna 1817.

23) *Versuch einer Darstellung d. animal. Magnetismus als Heilmittel.* Berlin 1818. 3. Edit.

24) *Askläpieion.* Halle 1811. *Neues Askläpieion.* 1818.

25) *Merkwürdige Beobacht. über d. Heilkräfte d. Lebensmagnet., nebst Versuch. über die Analogie des Traumes u. Somnambulismus.* Essen u. Duisb. 1819.

26) *System des Tellurismus oder thierischen Magnetismus.* Leipzig 1821.

J. K. PASSAVANT²⁷⁾ aliique²⁸⁾ tum medicorum tum laicorum, mirum illud phaenomenon jam circa a. MDCCLXVI a MESMERO detectum atque sub nomine *magnetismi animalis* descriptum²⁹⁾, ut filum pro medicina exercenda proponunt. Hominibus enim, qui, aut ope tactus manuum, aut ope instrumenti (*baquet*), aut sponte, in statum somni imaginem referentem incidunt, facultatem tribuunt morbos reconditos proprii, non solum sed et alieni, dummodo conjuncti, corporis, cognoscendi, exitum illorum praesagiendi, auxiliaque adversus illos indicandi. — Quamvis libenter concedamus, statum exaltationis, quem, vigente somniatione in gradu *clair-voyance*, systema nervosum et sensus nonnulli exhibent, interdum lucem super diagnosin, prognosin et therapiam spargere; absit tamen ut credamus universam medicinam profectum inde accipere posse. Imo cum indignatione intuemur modum sese gerendi illorum, qui tempus pretiosum in deliriis puellarum hystericarum producendis terunt idque haud raro cum morum detrimento; qui effata delira ejusmodi aegrotarum pro veritatibus

27) *Untersuchungen über den Lebensmagnetismus u. d. Hellsehen. Frankf. a. M. 1821.*

28) *Archiv für d. thierischen Magnetismus. Von G. A. ESCHENMAYER u. s. w.*

29) *Schreiben über d. magnet. Cur. Augsburg 1776—78. Kurze Geschichte d. thier. Magnetismus bis April 1781. A. d. Fr. Carlsr. 1783.*

tatibus Evangelicis agnoscunt, qui in morbis gravissimis, ubi consilium in operibus principum medicorum expetere deberent, illud a puella, saepe cum astutia aliena loquente, implorant, quique aut semetipsos aut alios turpiter decipiunt.

6. Ex connubio philosophiae naturae et do-^{Med. my-}
ctrinae magnetismi animalis monstrum prodiit,^{stica et}
^{magica.}
videlicet *medicina mystica et magica seculi decimi noni*³⁰⁾. Asseclae hujus nobilissimae scientiae, globum nostrum terrestrem in mundum spiritua-
lem convertunt, fabulas aniles severe narrant, astrologos aemulantur. Paracelsum Hippocrati anteponunt, rusticis³¹⁾ aliisque, sibi potestatem,

G 2

aegros

30) LEUPOLT *ein Wort über den Mysticismus in der heutigen Medicin*. V. HUFELAND's Journ. d. pr. Heilk. 1821. März p. 81. — G. C. HORST *Zauber-Bibliothek*. Mainz 1821.

31) A. 1818. prope Vilnam duo rustici (ANTONI et ANTOSZEK) curas omnino mirabiles jactarunt. Omnium classium cives catervatim ad illos migrabant. Quodsi medicamenta nonnulla popularia ad promovendam pliacae evolutionem, plurimis aegrotis hoc morbo adhuc recondito laborantibus, revera proficuis excipiam, caeterum agyrtae hujusmodi res absurdas neminique opem ferentes, suadere solebant. Tandem magistratus tali scandalo, per se ipsum jam declinanti, brevissimo, ut decet, modo finem imposuit. Miror iterumque miror, rustico, ejusdem, nisi pejoris adhuc generis, nuper in perdocta Borussia, honorem examinis judicialis medicorum, impertitum fuisse! (*Der Wun-*

aegros verborum et attactus ope sanandi adrogantibus, fidem caecam tribuunt, paucis, secula barbara, aut saltem tempora GARMANNI³²⁾, PÂRIS³³⁾, GASSNER³⁴⁾ etc.³⁵⁾ revocare conantur.

Hahne-
mann,

7. Postremo apparuit inter Germanos SAMUEL HAHNEMANN, praxin, si fides habenda³⁶⁾, agyrtarum more exercens docensque³⁷⁾, cum peculiari magniloquentia, tutissimam medendi viam in eo consistere, ut adversus congeriem symptomatum, mor-

derthäter GRABE in seiner wahren Gestalt dargestellt; in dem officiellen Berichte der zu seiner Untersuchung ernannten Commission. V. HUFELAND's Journ. der pr. Heilkunde. December 1824. p. 47.). O tempora!

32) De miraculis mortuorum. Lips. 1670. Dresd. 1709.

33) *Vie de Mr. Paris. Utrecht 1732. — CARRÉ DE MONTGERON la vérité des miracles opérés par l'intercession de Mr. Paris et d'autres appellans. Cologne 1745 — 47. Cfr. Procès verbaux de plusieurs médecins et chirurgiens, dressés par ordre de S. M. Paris 1732.*

34) SEMLER Samml. v. Briefen u. Abhandl. über GASSNER u. SCHROEPFER. Halle 1775. — *Allgem. Deutsche Biblioth.* 22. B. J. P. FRANK Syst. einer vollst. med. Polizey. 4. B. p. 609. — J. C. H. SCHAEFFER in HUFELAND's Journ. d. prakt. Heilkunde 1824. December. p. 76.

35) SPIESS umständliche u. wahrhafte Nachricht von dem erstaunenswürdigen Kehrbergischen Wunderkinde. Berlin 1734.

36) JÖRG's kritische Hefte für Aerzte. Leipzig 1822. 2. Heft.

37) Organon der Heilkunst. Dresden 1819. 2. Aufl. — Reine Arzneimittellehre. 6 Bd. Dresden 1811 — 21.

morbum qualemcumque efficientium, illud adhibeatur pharmacum, in atomos subdivisum, quod alias facultate polleret, symptomata, illi morbo, de cuius agitur cura, similia, excitandi. Doctrina ejusmodi, *Homocopathia* dicta, re ipsa principio Brunonis superstructa est (videlicet in morbis asthenicis curandis eos eligendos esse stimulos, qui peculiarem in partem maxime affectam exercent vim) cujusque principii gratia et nos quondam mercurium contra salivationem spontaneam, digitalem contra diabetem etc. adhibuimus, adhibueruntque alii aphorismi, „similia similibus tolluntur,“ memores. Quomodo cunque vero se res habeat, HAHNEMANNO procul dubio id proprium est, quod symptomatum considerationi dumtaxat intentus, aetiologiam et diagnosin turpiter negligit, quodque pharmacis in minima dosi (quam, ut ita dicamus, pharmacopolia sponte exhalant) praescribendis, sensui communi petulanter irrideat. Quousque enim ad nutriendum hominem ciborum non pauca grana, sed unciae paene multae requiruntur, et quousque ad refo-cillandum virum laboribus confectum, vini non gutta una alterave, sed integri illius cyathi exposcuntur; eousque in ea adhuc perseverabimus opinione, etiam ad perficiendas salutare in corpore humano aegrotante mutationes florum chamomillae aliorumque pharmacorum non millesimas millesimi grani unius partes, sed tales earun-

rundem doses opus esse, quae per seculorum experientiam confirmatae sunt. Quodsi objiciatur, methodum Hahnemanni non paucis revera profuisse; haud arduum erit respondere: mirum non esse, si aegrotorum nonnulli forte a medicis, qui juxta temporis nostri morem, mercurio, auro, digitali, acido hydrocyanico abutuntur, curati, sepositis hujusmodi venenis, reapse melius se habuerint. Alioqui interdum, optima medicina, medicina nulla. Tandem, cujusnam sunt, quae-so, generis, qui salutares methodi Hahnemanni effectus jactant? Fors rustici in tuguriis, pauperesve in nosocomiis? — Neutiquam, sunt divites lauteque viventes, quibus sane diaeta tenuis et selecta, saltem pro tempore, conducit. Pro tempore, inquam, etenim spreta consuetudo graviora in posterum mala praeparat. Quibus malis si detrimentum addideris, quod in morbis acutis necessario oriri debet ex jactura temporis atque neglectu venae sectionum (quae utpote ad morbos inflammatorios producendos minime valent ideoque in systema Hahnemanni non quadrant, a sectatoribus³⁸⁾ illius flocci penduntur) nobiscum sane curam paternam supremi magistratus, adeo inutilis medendi methodo Hahnemanni flagello obviam euntis, iterum iterumque laudabis.

8. Quae

38) Cfr. *Archiv für die Homöopathische Heilkunst*, herausgeg. von einem Vereine Deutscher Aerzte. Leipzig 1821.

8. Quae singula dum colliguntur, manifestum est, Italiam, Galliam et maxime Germaniam, a seculi decimi noni initio ad hodiernam usque diem, *epocham anarchiae medicae* exhibere. Eo majore itaque laude ii medicorum celebrari merentur, qui flumine adverso incedere ausi sunt, quique Anglorum potissimum ad exemplum, medicinam plus minusve sub experientiae tutela excoluerunt. Spectant huc:

9. A) *Fautores anatomiae pathologicae*, vi-
delicet A. R. VETTER³⁹⁾, F. G. VOIGTEL⁴⁰⁾, A. ^{anat. pa-}tholog.
PORTAL⁴¹⁾, P. A. PROUST⁴²⁾, G. H. THILOW⁴³⁾,
C. I. KNEPPELHOUT⁴⁴⁾, J. C. A. CLARUS⁴⁵⁾, PH.
FR. MECKEL⁴⁶⁾, J. C. ROSENMÜLLER⁴⁷⁾, J. F.
ME-

39) *Aphorismen aus d. patholog. Anatomie. Wien* 1803.

40) *Handbuch d. pathologischen Anatomie. Halle* 1804.
3 Bde.

41) *Cours d'anatomie médicale. Paris* 1804. 5 Vol.

42) *Médecine éclairée par l'observation et l'ouverture des corps. Paris* 1804.

43) *Beschreib. anatom.-patholog. Gegenstände d. Wachspräparate u. Kupfer erläutert. Gotha* 1804.

44) *Sect. cadav. patholog. Lugd. Bat.* 1805.

45) *Pr. de partibus pseudoorganicis . . . obs. anat. pathog. illustratae. Lips.* 1805.

46) *Journ. f. feinere u. pathologische Anatomie. Halle* 1805.

47) *Chir. anatom. Abbild. f. Aerzte u. Wundärzte. Weimar* 1804—12. et *Archiv f. d. med. Erfahrung v. Horn* 1818. Mai. Juni.

MECKEL ⁴⁸⁾, C. BELL ⁴⁹⁾, W. G. KELCH ⁵⁰⁾, J. R. FARRE ⁵¹⁾, G. FLEISCHMANN ⁵²⁾, A. W. OTTO ⁵³⁾, L. BIERMAYER ⁵⁴⁾, J. HOWSHIP ⁵⁵⁾, SEIDEL ⁵⁶⁾, P. J. WASSERMANN ⁵⁷⁾, M. MANDRUZZATO ⁵⁸⁾, L. CERUTTI ⁵⁹⁾, L. F. FANZAGO ⁶⁰⁾, CONSBRUCH ⁶¹⁾, L. CHOULANT ⁶²⁾, F. NASSE ⁶³⁾, J. CRUVEILLER ⁶⁴⁾,

48) *Handb. d. patholog. Anatomie. Leipzig 1812. 2 Bde.*
— *Tab. anat. patholog. Lips. 1817—20.*

49) *Engravings from specimens of morbid parts. Lond. 1813.*

50) *Beyträge zur patholog. Anatomie. Berlin 1813.*

51) *Pathological Research. in med. and surgery. Lond. 1814.*

52) *Leichenöffnungen. Erlang. 1815.*

53) *Handb. der pathol. Anatomie der Menschen u. Thiere. Breslau 1816. Seltene Beobacht. zur Anat., Physiol. u. Patholog. gehörig. Ibid. 1816. 2. Samml. 1824.*

54) *Museum anatomico pathologicum nosocomii universalis Vindobonensis. Viennae 1816.*

55) *Pract. observ. in surgery and morbid anatom. Lond. 1816.*

56) *Index mus. anat. Kilon. 1818.*

57) *Diss. de mutationibus pathologicis primitivarum in organismo humano mutationum. 1819.*

58) *Osservazioni anatomico-pathologiche. V. Memor. dell' ateneo di Treviso. T. I. p. 190.*

59) *Beschr. d. patholog. Präparate d. anat. Theaters zu Leipzig 1819.*

60) *Memorie sopra alcuni pezzi morbosi conservati nel gabinetto patologico dell' Università di Padova. 1820.*

61) *Taschenbuch d. pathol. Anatomie. Leipzig 1820.*

62) *Allgemeine med. Annalen. 1821. 5. Heft.*

LER⁶⁴), ANDRAL junior⁶⁵), LOBSTEIN⁶⁶) et HESSELBACH⁶⁷).

10. B) Qui in *meteorologiis et topographiis* Auct. de
concinendis morbisque endemicis, epidemicis et meteorol.
constitutionalibus eruendis intenti fuere, nimi- topogr.
 rum J. PANZANI⁶⁸), J. RAMBACH⁶⁹), FR. SCHRAUD⁷⁰), morb. en-
 CH. F. ELSNER⁷¹), E. WICHELHAUSEN⁷²), UNVER- dem. et
 DORBEN⁷³), TH. WINTERBOTTOM⁷⁴), A. SEY- epidem.
 BERT⁷⁵),

63) *Leichenöffnungen zur diagnost. u. patholog. Anatom.*
Bonn 1821.

64) *Médecine éclairée et la physiolog. pathologique. Paris*
1822.

65) *In nouveau Journal de méd. chir. et pharmac. T. XV.*
Novembre. Paris 1822.

66) *In Journ. complément. du dict. des scienc. med. No. 5.*
 — *De nervi sympathici humani fabr., usu et morbis.*
Paris. 1823.

67) *Beschreibung der pathologischen Präparate, welche*
in der königl. anatom. Anstalt zu Würzburg aufbe-
wahrt werden. Giessen 1824.

68) *Beschreibung der Krankheiten, die 1786 in Istrien ge-*
herrscht haben. A. d. Ital. Lübben 1801.

69) *Versuch einer physisch-medic. Beschreibung v. Ham-*
burg. 1801.

70) *De eo quod est in morbis epidemicum. Pest. 1802.*

71) *Bericht über den Gesundheitszustand der königl. Pro-*
vinz Ostpreussen u. Litthauen im J. 1801. Königsb. 1802.

72) *Züge aus einem Gemälde von Moskau, in Hinsicht*
auf Klima, physische u. medicinische Verhältnisse. Ber-
lin 1803.

73) *De morbis in Curonia frequentissimis eorumque*
causis endemicis. Dorpat. 1803.

BERT ⁷⁵⁾, JAC. FACHERIS ⁷⁶⁾, J. A. MURAT ⁷⁷⁾, J. HORSCH ⁷⁸⁾, C. J. PIKHARD ⁷⁹⁾, MEMMINGER ⁸⁰⁾, MENURET ⁸¹⁾, BIGEON ⁸²⁾, CHAVASSIGN D'AUBERT ⁸³⁾, C. R. SCHLEIS ⁸⁴⁾, SCHNEIDER ⁸⁵⁾, THOUVENEL ⁸⁶⁾, A. HAIN ⁸⁷⁾, J. E. GILIBERT ⁸⁸⁾, J. H. KOPP ⁸⁹⁾,

74) *An account of the nativ Africans in the Neighbourhood of Sierra-Morena. London 1803.*

75) *In Neues Journal der ausländisch. med. chir. Literat. v. Harless u. Ritter. 4. B. 2. St. (Examen atmosphaerae paludum).*

76) *Delle malattie più comuni del dipartimento del Serio. Bergamo 1804.*

77) *Topographie physique et médicale du territoire d'Aubin. Paris 1805.*

78) *Versuch einer Topographie der Stadt Würzburg. Rudolstadt 1805. — Beobacht. über die Witterung u. d. Krankh. in Würzburg im Jahr 1807. Ibid. 1808.*

79) *Comment. de aëre, aquis et locis. Goetting. 1805.*

80) *Versuch einer Beschreibung der Stadt Reutlingen. 1805.*

81) *Essais sur l'histoire medico-topographique de Paris. 1805.*

82) *Reflexions sur les épidémies. Paris 1806.*

83) *Des inondations d'hiver et d'été. Paris 1806.*

84) *Med. Topographie v. Landgerichtsbezirke Sulzbach. Nürnberg 1806.*

85) *Versuch einer Topographie der Residenzstadt Fulda. 1806.*

86) *Mélange d'histoire naturelle, de physique et de chimie. Paris 1807.*

87) *Medic. Prager Ephemeriden. Prag 1807.*

88) *Der Arzt als Naturforscher. A. d. Fr. Leipzig 1807. (Topographia Lithuaniae).*

KOPP⁸⁹⁾, A. F. NOLDE⁹⁰⁾, J. STEINER⁹¹⁾, St. BENDITSCH⁹²⁾, J. CH. G. SCHAEFFER⁹³⁾, B. BOURIAT⁹⁴⁾, ROBERTON⁹⁵⁾, G. A. GRAMBERG⁹⁶⁾, WUNDERLICH⁹⁷⁾, M. E. OTTO⁹⁸⁾, S. HAEBERL⁹⁹⁾, Z. WERTHEIM¹⁰⁰⁾, T. BAUR¹⁰¹⁾, C. BOTTA¹⁰²⁾, J. CH. ROLLER¹⁰³⁾, CHAPOTIN¹⁰⁴⁾, TRAFVENFELD¹⁰⁵⁾, SAVA-

89) *Med. Topographie der Stadt Hanau.* 1807.

90) *Med. u. anthropologische Bemerkungen über Rostock u. seine Bewohner.* Erf. 1807. — 2. B. Halle 1812.

91) *Versuch einer Topographie von Parkenstein.* Salzb. 1808.

92) *Topographische Kunde der Hauptstadt Grätz.* 1808.

93) *Die Zeit u. Volkskrankheiten der Jahre 1806—7 in u. um Regensburg.* 1808.

94) *Précis de la constitution médicale observée dans le département de l'Indre et l'Oise.* Paris 1808.

95) *General view of the natural history of the atmosphere.* Edinb. 1808.

96) *Ueber die im Herzogthume Oldenburg bemerkten — häufigen Krankheiten u. Todesfälle.* Oldenburg 1808.

97) *Versuch einer med. Topographie der Stadt Sulz am Neckar.* Tübingen 1809.

98) *Descriptio morborum epidem. qui mens. decembr. 1808 et januar. 1809 Lipsiae grassati sunt.* 1810.

99) *Meteorologische Jahrbücher.* Weimar 1810.

100) *Versuch einer Topographie von Wien.* 1810.

101) *Topographia pagi Ergenzingen.* Tüb. 1810.

102) *Storia naturale e medica dell' isola di Corfu.* Milano 1810.

103) *Erster Versuch einer Beschreib. d. Stadt Pforzheim.* 1812.

104) *Topographie médicale de l'Isle de France.* Paris 1812.

SAVARESI ¹⁰⁶), L. FRANK ¹⁰⁷), J. A. W. KLINGE ¹⁰⁸),
 J. JOHNSON ¹⁰⁹), C. K. WEISS ¹¹⁰), G. EHRHARDT ¹¹¹),
 SCHNURRER ¹¹²), GUIGOU ¹¹³), G. A. BARRAY ¹¹⁴),
 R. REECE ¹¹⁵), W. YOURLY ¹¹⁶), L. CERUTTI ¹¹⁷),
 A. J. TILLAYE ¹¹⁸), C. E. BAER ¹¹⁹), BERNSTEIN ¹²⁰),

W. KNO-

105) In: *Svenska Läkare-Sällskapets Handlingar*. Stockholm 1812.

106) *Mémoire sur l'Égypte*.

107) *Collection d'opuscules de médecine pratique*. Paris 1812 (Obs. topogr. Aegypti).

108) *Fragmente aus d. Tagebuche eines Arztes am Oberharze*. Stendal 1812.

109) *The influence of tropical climates-on European constitutions*. Lond. 1813.

110) *Diss. climatologiae med. initia sist.* Lips. 1813.

111) *Phys. med. Topographie der königl. Baier. Stadt Memmingen*. Tübingen 1813.

112) *Materialien zur allgem. Naturl. d. Epid. u. Contagien*. Tüb. 1810. *Geographische Nosologie*. Stuttg. 1813. *Chronik der Seuchen*. Tübing. 1825.

113) *Mémoire sur la topographie de Livourne*. 1814.

114) *Mémoires sur les maladies épidémiques*. Besançon 1814.

115) *The medical guide for tropical climates*. Lond. 1814.

116) *On the natural history, climate and diseases of Madeira*. Lond. 1814.

117) *Collect. de telluris in organismum humanum ratione*. Lips. 1814. et: *Schriften d. naturforschenden Gesellschaft in Leipzig*. 1822.

118) *Diss. topographique*. Paris 1814.

119) *De morbis inter Esthenos endemicis*. Dorpat. 1814.

120) *Topographie von Neuwied*. Frankf. a. M. 1814.

W. KNOBLAUCH ¹²¹⁾, C. CLESS et G. SCHUBLER ¹²²⁾,
 N. T. MÜHLIBACH ¹²³⁾, J. KNIRSCH ¹²⁴⁾, G.
 STEMMLER ¹²⁵⁾, J. P. GRAFFENAUER ¹²⁶⁾, SCHÜB-
 LER ¹²⁷⁾, L. CAILLARD ¹²⁸⁾, C. P. NIEUWEN-
 HUYS ¹²⁹⁾, H. L. ATTENHOFFER ¹³⁰⁾, J. A. F. OZA-
 NAM ¹³¹⁾, J. F. KOREFF ¹³²⁾, H. EBHARDT ¹³³⁾,
 HEUSTIS ¹³⁴⁾, J. W. WILLIAMSON ¹³⁵⁾, N. FRIED-
 RICH ¹³⁶⁾,

121) *Epidemion*. Leipzig 1815.

122) *Versuch einer med. Topographie der königl. Haupt-
 u. Residenzstadt Stuttgart*. 1815.

123) *Wien von seiner übelsten Seite betrachtet*. 1815.

124) *Diss. sist. synops. climatologiae med.* Lips. 1815.

125) *Entwurf einer phys. med. Topographie von Zeulen-
 rode*. Altenb. 1816.

126) *Topograph. physic. médicale de la ville de Stras-
 bourg*. 1816.

127) *Recherches sur l'électricité atmosphérique*. Vid. Bi-
 bliothèque universelle 1816. Juin. p. 93.

128) *Mémoire sur les dangers des émanations maréca-
 geuses*. Paris 1816.

129) *Proeve eener geneeskundige Topographie de Stad Am-
 sterdam*. 1816.

130) *Med. Topographie von St. Petersburg*. Zürich 1817.

131) *Histoire médicale générale des maladies épidémiques,
 contagieuses et épizootiques qui on paru en Europe*,
 Paris 1817.

132) *De regionibus Italiae aëre pernicioso contaminatis
 observat.* Berol. 1817.

133) *Geschichte u. Beschreib. der Stadt Wiesbaden*. Gies-
 sen 1817.

134) *Physical observations and medical tracts on the topo-
 graphy and diseases of Louisiana*. New-York 1817.

RICH¹³⁶), J. P. SCHNEIDER¹³⁷), SWÄGRICHEN¹³⁸),
 TH. BATEMAN¹³⁹), J. C. L. ZIERMANN¹⁴⁰), J. B.
 TRAUNOY¹⁴¹), J. CLARK¹⁴²), J. DOUGLAS¹⁴³), W.
 VAUGHAN¹⁴⁴), W. SHECUT¹⁴⁵), GENSOLLEN¹⁴⁶),
 J. WEBSTER¹⁴⁷), CLEMENS¹⁴⁸), F. E. FODÉ-
 RÉ¹⁴⁹),

135) *Medical observations relatives to the West India Islands.* Edinb. 1817.

136) *Entzündung der endemische Charakter in Würzburg.* 1818.

137) *Versuch einer statistischen Topographie von Ettlingen.* Karlsruhe 1818.

138) *Topographia naturalis Lipsiae.* 1819.

139) *Reports on the diseases of London and of the state of Weather from 1804 — to 1816.* London 1819.

140) *Ueber die Krankheiten Siciliens.* Hann. 1819.

141) *Traité élémentaire sur les maladies épidémiques et populaires.* Paris 1819.

142) *Medical notes on climate, diseases . . . in France, Italy etc.* London 1819.

143) *Medical Topography of Upper Canada.* Lond. 1819.

144) *Account of the epidemic and sporadic disorders which prevailed in the Y. 1818 at Rochester and near London* 1819.

145) *Medical and physiological Essays containing topographical, historical and other sketches of the city of Charleston.* 1819.

146) *Essai historique, topographique et médical de la ville d'Hyerès.* Paris 1820.

147) *Observatio de aëre per Italiam insalubri.* Berol. 1820.

148) *Allgem. Betrachtungen über klimatische Einflüsse und Versuch einer allgem. Charakteristik der Gebirgsgegenden.* Frank. a. M. 1820.

RÉ¹⁴⁹), J. DAVY¹⁵⁰), DUBUN DE PEYRELOUVE¹⁵¹),
FR. BALFOUR¹⁵²), C. CHISHOLM¹⁵³), H. MAR-
SHALL¹⁵⁴), J. FR. ERDMANN¹⁵⁵), C. LACHAISE¹⁵⁶),
AUTENRIETH¹⁵⁷), F. J. WITTEMAN¹⁵⁸), J. S.
JULIA¹⁵⁹), W. GOODISSON¹⁶⁰), C. L. MORITZ¹⁶¹),
C. H.

- 149) *Voyage aux Alpes maritimes. Paris 1821* (Topogr. comitat. Nice). *Leçon sur les épidémies et sur l'hygiène publique faites à la faculté de Strasbourg. 1823.* Cfr. *Journal supplémentaire du dict. des sciences médicales. T. XII. 47. cah. 48. cah. T. XIII. 52. cah.*
- 150) *Account of the interior of Ceylon and of its inhabitants. London 1821.*
- 151) *De l'épidémie qui a spécialement régné pendant l'été 1821 dans une portion assez étendue du département de l'Oise. Paris 1822.*
- 152) *Observations respecting the remarkable effects of solar influence in the fevers of India. Vid. Asiatic Researches. Vol. 8.*
- 153) *Manual of the climate and diseases of tropical countries. London 1822.*
- 154) *Notes on the medical topography of Ceylon. London 1822.*
- 155) *Med. Topogr. d. Gouvernements u. der Stadt Kasan. Riga 1822.*
- 156) *Topographie médicale de Paris. 1822.*
- 157) *Uebersicht über die Volkskrankheiten in Grossbritannien. Tübing. 1823.*
- 158) *Ueber stehende Constitutionen. v. Rheinische Jahrbücher. 4. B. 2. St. p. 80. Supplement-Band der ersten 4 Bde. p. 33. 5. B. 3. St. p. 30.*
- 159) *Recherches historiques cliniques et médicales sur l'air marécageux. Paris 1823.*
- 160) *A historical and topographical essay upon the Island*

C. H. MACHARD¹⁶²), N. LECLERC¹⁶³), J. J. GUBLER¹⁶⁴), J. PENADA¹⁶⁵), J. J. REUSS¹⁶⁶), GÜNTHER¹⁶⁷), K. F. H. MARX¹⁶⁸), THYSSSEN¹⁶⁹), F. A. STELZIG¹⁷⁰) aliique¹⁷¹).

11. C) In-

of Corfu, Leucadia, Cephalonia, Ithaca and Zante.
London 1823.

161) Specimen topographiae medicae Dorpatensis. 1823.

162) *Essai sur la topographie médicale de la ville de Dôle.*
1823.

163) *Topographie médicale de l'arrondissement de Toule.*
Paris 1824.

164) *Beyträge zur med. Topographie v. Chur.* Tübingen
1824.

165) *Delle osservazioni medico-pratico-meteorologiche sulle costituzioni epidemiche di Padova. Quinquenni: dell' anno 1811. sino all' anno 1815.* Padova 1824.

166) *Vergleichende Blicke auf den Gang epidem. Krankheiten.* in *Journ. d. prakt. Heilk. von HUFELAND* 1824.
März. p. 43.

167) *Vorläufige Bemerk. über Köln u. seine Bewohner, in med. phys. Hinsicht.* Köln 1824.

168) *Göttingen in med., phys. u. historischer Hinsicht geschildert.* Göttingen 1824. 8.

169) *Geschiedkundige Beschouwing der Ziekten in de Nederlande.* Amsterd. 1824.

170) *Versuch einer medicin. Topographie von Prag.* Prag 1825.

171) DOUBLE, BAYLE, LAENNEC, SAVARY etc. in *Journ. de médecine, chir. et pharmacie.* Paris 1812. *Recueil périodique de la soc. de médecine par SEDILLOT.* Paris 1812. — *Recherches sur l'influence de l'air dans le développement, le caractère et le traitement des maladies.* Paris 1813. Cfr. *Diarium HUFELANDII* etc.

11. C) *Inquisitores contagiorum* (quorum <sup>Inquisito-
res conta-
giorum.</sup> tamen plurimi hypothesis valedicere debuis-
sent), videlicet J. BRESSY¹⁷²), G. WEDEKIND¹⁷³),
B. LAUBENDER¹⁷⁴), W. BLACKBURNE¹⁷⁵), CH.
MACLEAN¹⁷⁶), J. C. FLACHSLAND¹⁷⁷), A. H. F.
GUTFELDT¹⁷⁸), J. DÖMLING¹⁷⁹), BACH¹⁸⁰), J.
RYAN¹⁸¹), A. R. SUTHERLAND¹⁸²), A. G. BEYER¹⁸³),
GEBEL¹⁸⁴), W. HARTY¹⁸⁵), RUBINI¹⁸⁶), ROSSI¹⁸⁷),
L. CA-

172) *Théorie de la contagion. Paris 1802.*

173) *Abhandl. von den Kuhpocken mit einer Einleitung in
die Lehre von den ansteckenden Krankheiten. 1802.*

174) *Naturgeschichtliche Darstellung aller ansteckenden
Krankheiten bey Menschen u. Thieren. Leipzig 1803.*

175) *Facts and observations concerning the prevention and
cure of scarlet fever with some remarks on the origine
of acute contagions. London 1803.*

176) *Remarks on eontagion (Lond. medic. Repository.
Vol. XII.).*

177) *Fragmente über einige Ansteckungsstoffe. Stuttgart
1804.*

178) *Einleit. in die Lehre von den ansteckenden Krankh.
u. Seuchen. Posen 1804.*

179) *Ideen zu einer Theorie der ansteckenden Krankh. (in
Dömling's u. Horsch's Archiv für d. Theorie d. Heilk.
1. B.).*

180) *Specimen de morbis contagiosis. Hal. 1804.*

181) *Diss. de contagio. Edinb. 1804.*

182) *Disp. de contagione. Edinb. 1805.*

183) *Diss. momenta quaedam de contagio. Gott. 1805.*

184) *Bruchstücke über ansteckende Krankh. u. das gelbe
Fieber. Berlin 1805.*

185) *Observations on the dysentery and on investigation
Frank Prax. I. 1. 1.*

L. CASINELLI¹⁸⁸), B. OTTENDORF¹⁸⁹), LE FORT¹⁹⁰),
 M. G. JOUARD¹⁹¹), MEYN¹⁹²), FR. THOLOZAN¹⁹³),
 GUANI¹⁹⁴), F. REUSS¹⁹⁵), CATTET et GARDEL¹⁹⁶),
 BALME¹⁹⁷), F. G. BACH¹⁹⁸), F. SCHNURRER¹⁹⁹),
 J. BRETON²⁰⁰), G. BLANE²⁰¹), J. STRITCH²⁰²),

WIL-

into the source of contagion in that and in other diseases. London 1805.

186) *Riflessioni sulle febbri chiamate gialle e sui contagi in genere. Parma 1805.*

187) *Sur les différens miasmes contagieux (Mém. de Turin 1805. IX. Scienc. phys. et mathem. Hist. p. 92.).*

188) *Dell'azione dei veneni contagiosi sul corpo umano (Mem. della soc. med. di Bologna. Vol. I. p. 15.).*

189) *Diss. momenta quaedam generalia de morbis sic dictis contagiosis. Mannh. 1806.*

190) *Diss. sur les maladies contagieuses. Paris 1806.*

191) *Essai sur une nouvelle théorie de la contagion. Paris 1806.*

192) *Diss. sistens naturam et indolem contagii. Kilon. 1808.*

193) *De contagiis in universum. Taurini 1808.*

194) *Saggio teoretico-pratico sulle malattie contagiose. Genova 1808.*

195) *Theoremata de miasmatum contagiosorum origine, natura, proprietatibus et agendi modo. 1808. (Comment. soc. phys. med. Mosquens. Vol. I.).*

196) *Essai sur la contagion. Paris 1809.*

197) *De aetiologia generali contagii. Lugd. 1809.*

198) *Grundzüge zu einer Pathologie der ansteck. Krankh. Halle 1810.*

199) *Materialien zu einer allgem. Naturlehre d. Epidemien u. Contagien. Tüb. 1810.*

200) *Diss. sur la contagion. Paris 1810.*

WILHELMI²⁰³), E. BARTELS²⁰⁴), NACQUART²⁰⁵),
 G. F. BRODHAG²⁰⁶), C. G. BERNHARDUS²⁰⁷), D.
 HOSACK²⁰⁸), KAUSCH²⁰⁹), J. J. BERNHARDI²¹⁰),
 G. TOMMASSINI²¹¹), J. A. F. OZANAM²¹²), HAF-
 NER²¹³), FR. ROSSI²¹⁴), G. AMERI²¹⁵), W. STO-
 H 2 CKES²¹⁶),

- 201) *Some facts and observations respecting infection*
 (*Transact. for improv. Vol. III. p. 425.*) et *Select dis-*
sertations. London 1822. No. VII.
- 202) *Diss. de contagio. Edinb. 1810.*
- 203) *Diss. de contagiis juxta quasdam opiniones recen-*
tiores. Jen. 1810.
- 204) *Pathologische Untersuch. 1. B. . . . nebst Bemerk.*
über die Natur d. Ansteckungsstoffe. Marb. 1811.
- 205) *Dict. des sciences médicales. T. VI. Art. Contagion.*
- 206) *Diss. melemata quaedam de vita contagiorum. Tu-*
bing. 1813.
- 207) *Melemata quaedam de natura contagiorum. Lips.*
1814.
- 208) *Observations on contagion (In the Americ. med. and*
philos. Register. New-York 1814. Vol. II. p. 14.).
- 209) *Die auf Selbsterfahrung gegründete Ansicht der aku-*
ten Contagien (in HUFELAND's Journ. d. pr. Heilk.
1814. T. 32. p. 1.).
- 210) *Handbuch der allgem. u. besondern Contagienlehre.*
1. Th. Erfurt 1815.
- 211) *Delle febbri contagiose e delle epidemiche costituzioni.*
Bologna 1817.
- 212) *Histoire médicale générale et particulière des mala-*
dies épidémiques, contagieuses et epizootiques, qui ont
regné en Europe depuis les tems les plus reculés jusqu'à
nos jours. T. I—III. Paris 1817—23.
- 213) *Diss. de contagio. Berol. 1817.*

CKES ²¹⁶), P. JOHNSON ²¹⁷), R. JACKSON ²¹⁸), POT-
 TER ²¹⁹), G. H. RITTER ²²⁰), J. F. WITTMANN ²²¹),
 F. L. AMELUNG ²²²), V. L. BRERA ²²³), A. OMO-
 DEI ²²⁴), C. F. SPEYER ²²⁵), H. A. GÖDEN ²²⁶), L.
 GROSSI ²²⁷), F. PUCCINOTTI ²²⁸), BEGNI ²²⁹), J.
 TH. RICH-

214) *Essai sur les miasmes* (Mem. della R. Acad. delle
 scienze di Torino. T. XXIII.).

215) *Sulle malattie contagiose e miasmatiche* (Giornale della
 soc. med. di Torino. Vol. 6.).

216) *Observations on contagion*. Dublin 1818. 2 ed.

217) *Diss. de contagio*. Edinb. 1818.

218) *Analytical sketch of the history and cura of conta-
 gious fever*. London 1819.

219) *A memoir on contagion* (The Amer. med. Recorder.
 Vol. I. p. 516.).

220) *Abhandl. v. d. Ursachen ansteckender Krankh.* Leip-
 zig 1819.

221) *Erfahrungen über d. ansteckende Krankh. belagerter
 Festungen u. s. w.* Mainz 1819.

222) *De contagiorum natura*. Berol. 1819.

223) *De' contagj e della cura de' loro effetti*. Padova
 1819. Germ. a BLOCH. 1822.

224) *Cenni sull' ottalmia contagiosa d'Egitto e sulla sua
 propagazione in Italia*. Milano 1816. *Del Governo po-
 litico-medico del morbo petecchiale*. Milano 1822. T. I.
 cap. 4.

225) *Diss. quatenus organismus h. in morbis, praeser-
 tim contagiosis, a natura externa pendeat*. Marb.
 1820.

226) *Von dem Wesen der Contagien* (Isis von Oken. 1820.
 p. 429.).

227) *Sulle malattie contagiose e particolarmente sulla peste*.
 Genova 1820.

TH. RICHTER²³⁰), CL. BALME²³¹), K. H. DZONDI²³²), G. F. H. MARX²³³) et M. HASPER²³⁴).

12. D) Pathologi²³⁵) qui *morbos haereditarios*²³⁶), *congenitos*²³⁷) aliosque ex peculiari corporis

Scriptores
de morbis
haered.
congen.
etc.

228) *Dei contagi spontanei e delle potenze e mutazioni morbose credute atti a produrle ne' corpi umani. Roma 1820.*

229) *Riflessioni sui contagi (Nuovi commentarj di med. e chir. di Padova. T. 5. 1820.*

230) *Diss. de contagiis eorumque corpus humanum inficiendi ratione et via in genere. Lips. 1822.*

231) *Observations et reflections sur les causes, les symptômes et le traitement de la contagion dans les différentes maladies et spécialement dans la peste de l'orient et la fièvre jaune. Paris 1822.*

232) *Ueber Contagien, Miasmen und Gifte. Leipz. 1822.*

233) *Origines contagii. Caroliruhae et Badae 1824.*

234) *In: Neue Sammlung auserles. Abhandl. für prakt. Aerzte. 8. B. 2. St.*

235) Cum doctrina, de qua hic agitur, omnino ad pathologiam generalem spectet, pars literaturae, quae ad illam pertinet, dumtaxat per transennam indicatur.

236) ALBERTI diss. de morbis haereditariis. Erf. 1692.

— ZWINGER diss. de naturae humanae inclinatione et dispositione haereditaria. Basil. 1701. — STAHL

diss. de haereditaria dispositione ad varios affectus.

Hal. 1706. — A. BERGEN diss. de morum et morbo-

rum transplantatione. Fr. 1706. — R. J. CAMERA-

RIUS de haereditate morborum. Tüb. 1718. — TEUT-

SCHERUS diss. de eo, quod morbi chronici plerum-

que parentibus jure haereditario sint congeniti, vel in

poris humani conditione ²³⁸) pullulantes (non omissis doctrinis *evolutionis* ²³⁹) temperamento-
rum ²⁴⁰),

juventute acquisiti. Erf. 1720. — BÜTTNER diss. de qualitatibus corporis humani haereditariis. Goetting. 1757. — VOGEL diss. de nonnullis parentum deliciis in morbos infantum plerumque degenerantibus. Goett. 1767. — WICHMANN diss. de morbis haereditariis. Erf. 1788. — DAVIDS diss. de dispositione ad morbos haereditaria. Lugd. Bat. 1793. — J. C. ROUGE-MONT *Abhandlung über die erblichen Krankheiten. A. d. Fr. Frankf.* 1794. — GUITARD diss. *recherches sur les maladies héréditaires. Paris* 1803. — FORESTIER diss. de morbis aut noxis puerorum a vitiatis depravatione parentum humoribus. Paris. 1808. — PORTAL, *considérations sur la nature et le traitement de quelques maladies héréditaires. Paris* 1809. — M. GRUBER diss. sist. malorum haereditatorum enumerationem. Vindob. 1815.

237) WEDEL diss. IX. de causis morborum conformationis. Jen. 1691. — Cf. FLEISCHMANN de vitiis congenitis circa thoracem et abdomen. Erlang. 1810. Cfr. Auct. de monstribus, hermaphrodit. etc.

238) F. A. B. PUCHELT *Beyträge zur Medicin. 1. B. Ueber die individuelle Constitution und ihren Einfluss auf die Entstehung und den Charakter der Krankheiten. Leipzig* 1823.

239) PH. F. HOPFENGÄRTNER *einige Bemerk. über die menschliche Entwicklung und die mit derselben in Verbindung stehenden Krankheiten. Stuttg.* 1792. — A. HENKE *über die Entwicklungen u. Entwicklungskrankheiten. Nürnberg.* 1814. — F. B. OSIANDER *über die Entwicklungskrankheiten in d. Blüthenjahren des weibl. Geschlechts. Tübing.* 1817.

rum²⁴⁰⁾, idiosyncrasiae²⁴¹⁾ et consuetudinis²⁴²⁾) illustrarunt.

13. E) Scri-

240) HIPPOCRATES de natura hominis. — GALENUS de temperamentis Lib. III. Opp. Cl. I. — VAN HELMONT tr. complexionum atque mistionum elementarium figmentum. Amst. 1652. — VIEUSSSENS *traité nouveau des liqueurs du corps humain*. Toulouse 1715. — STAHL diss. qua temperamenta physiologico-physiognomico-pathologico-mechanice enucleantur. Halae 1698. — FR. HOFFMANN diss. de temperamento fundamento morum et morborum in genere. Hal. 1705. v. Opp. T. V. p. 103. — BOERHAAVE opp. omn. — A. HALLER de partium corporis humani fabrica et functionibus. T. III. Lib. V. Sect. IV. — J. KÄMPF *kurze Abhandl. von d. Temperamenten*. Frankf. 1762. — ERASMUS DARWIN *Zoonom. Vol. II. Sect. 31*. W. A. FICKER comment. de temperamentis hominum, quatenus ex fabrica corporis et structura pendent. Goett. 1791. H. W. DIRKSEN *die Lehre von den Temperamenten dargestellt*. Nürnberg. 1804. — HALLÉ in *Mém. de la société médicale d'émulation*. T. III. p. 342. — L. V. BRERA v. *Inst. di med. prat. dettate da Borsieri, proseguite etc. Vol. I. p. 121*.

241) DORÉ an praecellentia medicorum ab idiosyncrasiarum accuratiori notitia? Paris. 1716. — FR. HOFFMANN diss. de differenti medicamentorum operatione secundum diversam corporis humani idiosyncrasiam. Hal. 1731. — FRANK diss. de diversis idiosyncrasiis in curatione morborum rite observandis. Lugd. Bat. 1783. — ASCH diss. de aegri idiosyncrasia remedium in delectu admodum consideranda. Francf. 1809. — WAGNER, *ein Fragment über Idiosyncrasie*. v. HUELAND's *Journ. d. pr. Heilk.* 1811. Novemb. p. 55. —

Script. de morb. aetat. et sexuum. 13. E) Scriptores de *morbis aetatum et sexuum*, nimirum C. B. FLEISCH²⁴³), J. H. AUTENRIETH²⁴⁴), G. SEILER²⁴⁵), J. J. PLENCK²⁴⁶), G. MARUNCELLI²⁴⁷), AUVITY²⁴⁸), A. HENKE²⁴⁹), L.

FOR-

J. G. F. HENNING *Ideen über Idiosyncrasie, Antipathie, kränkliche Reizbarkeit. Stendal 1812.*

242) GALENUS de consuetudinibus Liber. V. Opp. — CELSUS de medic. Lib. I. c. 3. — MEIBOMIUS diss. de consuetudinis natura, vi et efficacia ad sanitatem et morbum ejusque in medendo observationis necessitate. Helmst. 1681. — STAHL diss. de consuetudinis efficacia. Hal. 1706. — ALBERTI diss. de consuetudine et insuetudine aegrotandi. Hal. 1733. — STENZEL de consuetudine altera natura. Witeb. 1737. — RICHTER pr. de lege consuetudinis concilianda cum legibus medicis. Goett. 1756. — JOERDENS diss. de consuetudinis efficacia in homine sano et morbo. Harderov. 1793. — SCHAEFFER diss. quaedam de influxu assuetudinis in corpus humanum. Stuttg. 1794. — ALIBERT *du pouvoir de l'habitude dans l'état de santé et de maladie. v. Mém. de la soc. méd. d'émulation à Paris. Vol. I. p. 396.* — NATORP diss. de vi consuetudinis. Goett. 1808. — KELZ *Versuch über d. Gewohnheiten des menschlichen Körpers. Frankf. 1809.*

243) *Handbuch über d. Krankheiten der Kinder. Leipzig 1803 — 7.*

244) *De ortu quorundam morborum aetatis provectoris. Tub. 1806.*

245) *Progr. de morbis senum. Vitemb. 1807.*

246) *Doctrina de cognoscendis et curandis morbis infantum. Vindob. 1807.*

247) *Compendio delle malattie dei bambini e delle donne.*

FORMEY ²⁵⁰), FR. NEUMANN ²⁵¹), ERHARD ²⁵²), LUF-
 FAGE ²⁵³), H. X. BOER ²⁵⁴), J. FEILER ²⁵⁵), J.
 CLARKE ²⁵⁶), F. E. OEHLER ²⁵⁷), L. A. GOELIS ²⁵⁸),
 A. GRUBER ²⁵⁹), TH. PROSCH ²⁶⁰), J. CAPURON ²⁶¹),
 J. WENDT ²⁶²),

Napoli 1808. *Doctrina de morbis sexus feminei*. Ibid.
 1808.

248) *Diss. considérations générales sur les maladies propres
 aux enfans dans les premiers momens de la vie*. Paris.

249) *Handbuch zur Erkenntniss u. Heilung d. Kinderkrank-
 heiten*. Frankf. 1809.

250) *Allgemeine Betrachtungen über d. Natur u. Behand-
 lung der Kinderkrankheiten*. Berlin 1811.

251) *Der praktische Kinderarzt*. Quedlinb. 1811.

252) *Diss. sistens foetus humani pathologiam*. Erf. 1812.

253) *Diss. sur les maladies des nouveaux nés*. Paris
 1812.

254) *Darstellung des kindlichen Organismus in physiol.,
 pathol. u. therapeutischer Hinsicht*. Wien 1813.

255) *Pädiatrik oder Einleitung zur Kenntniss u. Heilung
 d. Kinderkrankheiten*. Sulzb. 1814.

256) *Commentaries of some of the most important diseases
 of children*. Lond. 1815.

257) *Prolegom. in embryonis humani pathologiam*. Lips.
 1816.

258) *Prakt. Abhandlungen über d. vorzüglichsten Krank-
 heiten des kindlichen Alters*. Wien. 1. B. 1815. 2. B.
 1820.

259) *Der Kinderarzt nach den Grundsätzen v. Formey*.
 München 1820.

260) *Diss. de physiologia morborum ratione ad diversas
 vitae periodos*. Hal. 1820.

261) *Abhandl. über d. Krankh. d. Kinder. A. d. Fr. nach
 der 2. Aufl.* Leipzig 1821.

J. WENDT²⁶²), LUTHERITZ²⁶³), HEYFELDER²⁶⁴) —
 C. MELLIN²⁶⁵), VICAROUX²⁶⁶), ROUSSEL²⁶⁷), L.
 J. C. MENDE²⁶⁸), E. SIEBOLD²⁶⁹), CHR. JOERG²⁷⁰),
 F. R. NÄGELE²⁷¹), K. MANSFIELD CLARKE²⁷²),
 K. G. CARUS²⁷³) aliique²⁷⁴).

Script. de
 morb. ex-
 exercit. opi-
 fic. etc.

14. F) Qui versati sunt circa morbos exer-
 cituum, atque opificum videlicet F. STEEG-
 MAYER²⁷⁵),

262) *Die Kinderkrankheiten systematisch dargestellt.* Leip-
 zig 1822.

263) *Der Kinderarzt als freundschaftlicher Rathgeber bey
 allen Krankheiten der Kinder.* Meissen 1823.

264) *Beobachtungen über d. Krankheiten d. Neugeborenen.*
 Leipzig 1825.

265) *Der Frauenzimmer-Arzt.* Kempt. 1807.

266) *Cours élémentaire des maladies des femmes.* Paris
 1809.

267) *Système physique et moral de la femme.* Paris 1809.

268) *Die Krankheiten d. Weibes, nosolog. u. therapeutisch
 bearbeitet.* Leipzig 1810.

269) *Handb. zur Erkenntniss u. Heilung d. Frauenzimmer-
 Krankheiten.* Frankf. 1811. 2. Aufl. 1821.

270) *Handb. d. Krankheiten d. Weibes.* Leipzig 1809.
 2. Aufl. 1821. — *Schriften u. s. w.* Nürnberg. 1812.
 Leipzig 1818.

271) *Erfahr. u. Abhandl. aus d. Gebiete d. Krankh. des
 weiblichen Geschlechts.* Mannh. 1812.

272) *Beobacht. über d. Krankheit d. Weiber, welche von
 Ausflüssen begleitet sind.* A. d. E. Hann. 1818.

273) *Lehrbuch d. Gynäkologie.* Leipzig 1820.

274) *Das Weib im gesunden u. kranken Zustande, nach
 Virey u. Fournier, frey bearbeitet von Renard u. Witt-
 mann.* Leipz. 1821.

MAYER²⁷⁵), P. GILIBERT²⁷⁶), F. HECKER²⁷⁷), VANOTTI²⁷⁸), DAWSON²⁷⁹), W. BUSCH²⁸⁰), WILLAUME²⁸¹), R. DESGENETTES²⁸²), E. ENEHOLM²⁸³), D. J. LARREY²⁸⁴), J. P. ASSALINI²⁸⁵), RENEILLE-
PARI-

275) *Bemerkungen über d. Krankheiten, welche unter d. Garnison v. Mantua während der Blokade von 1796—97 geherrscht haben. Wien 1801.*

276) *Med. Geschichte d. Französischen Armee zu St. Domingo im J. 1803. A. d. Fr. Bresl. 1806. — Ueber d. Krankheiten, welche während des Preussisch-Polnischen Feldzugs b. d. grossen Franz. Armee herrschten. A. d. Fr. Erf. 1808.*

277) *Med. prakt. Taschenb. f. Feldärzte. Berl. 1806. 2. Aufl. 1814. — Vollständiges Handb. der Kriegsarzneykunde. Gotha 1816—17.*

278) *Handb. für d. angehenden Feldarzt mit besonderer Rücksicht auf Russland. Riga 1807.*

279) *Observations on the Walchern diseases which affected the British soldiers. Ypsw. 1810.*

280) *Anleitung die Krankheiten d. Feldhospitäler zu erkennen u. zu heilen. Marb. 1812. Cassel 1815.*

281) *Notice physique, médicale et historique sur le climat, le sol et les productions d'Espagne, considérés sous le rapport de leurs influence sur les armées étrangères. Paris 1812.*

282) *Geschichtliche Darstellung d. Krankheits-Ereignisse bey d. Franz. Armee im Orient. A. d. Fr. Prag 1812.*

283) *Handb. der Kriegshygieine. A. d. Russischen, mit Anmerk. v. H. F. KILIAN. Leipzig 1818.*

284) *Med. chir. Denkwürdigkeiten aus seinen Feldzügen. A. d. Fr. Leipz. 1813—19.*

285) *Taschenbuch für Wundärzte u. Aerzte b. Armeen. München 1816.*

PARISE ²⁸⁶), G. T. RUDOLPH ²⁸⁷), W. SPRENGEL ²⁸⁸), BIRON et FOURNIER ²⁸⁹), G. THOMSON ²⁹⁰), LEMAZURIER ²⁹¹), U. COSTE ²⁹²) — WAGNER ²⁹³), G. ADELMANN ²⁹⁴), BERTRAND ²⁹⁵), J. JOHNSON ²⁹⁶), PATISSIER ²⁹⁷).

Script. 15. G) Scriptores innumerabiles monogra-
monogra-
phiarum. phiarum tum morborum, tum pharmacorum;
quo-

286) *Relation médicale du siège de Saragossa. Paris 1816.*

287) *Anatom. med. chir. Taschenbuch für Feld- u. Wund-ärzte Deutscher Armeen. Berlin 1816.*

288) *Diss. animadversiones castrenses. Hal. 1817.*

289) *Recueil des mémoires de médecine, chir. et pharm. militaires. Paris 1817 — 22. Vol. IX.*

290) *Beobacht. in d. Brittischen Militairspitälern in Belgien nach d. Schlacht von Waterloo. A. d. E. Halle 1820.*

291) *Medicinische Geschichte des Russischen Feldzuges. 1812. A. d. Fr. von C. F. Heusinger. Jena 1823.*

292) *Observ. sur la campagne d'Espagne en 1823, pour servir à l'histoire de la médecine militaire. Paris 1825.*

293) *Ueber d. Krankheiten der Künstler u. Handwerker. V. Taschenbuch v. einer Gesellschaft Wiener Aerzte für das J. 1802.*

294) *Von d. Krankheiten d. Künstler u. Handwerker. Würzb. 1803.*

295) *Essai médical sur les professions et métiers. Paris 1805.*

296) *Abhandlung über d. Einfluss des bürgerlichen Lebens, des häufigen Sitzens u. Geistesverfeinerung auf d. Gesundheit u. d. Wohl d. Menschen. A. d. E. Breslau 1820.*

297) *Traité des maladies des artisans et de celles qui résultent de diverses professions. Paris 1822.*

quorum illi in capitibus hujus operis specialibus celebrabuntur, hi autem a tempore judicabuntur, quod nimirum docebit, num genus humanum revera lucrum facturum sit nec ne ex conaminibus chemicorum aevi nostri, quippe qui pharmaca pretiosa secundum pondera centenaria, scopo ut in iis drachmas aliquot principii activi (mox syllabis *inin* salutandi), inveniant, destruunt?

16. H) Auctores qui in *therapia speciali* elaboranda plus experientiae quam hypothesebus tribuerunt S. G. VOGEL²⁹⁸), PH. PINEL²⁹⁹), C. W. HUFELAND³⁰⁰), ODIER³⁰¹), F. HECKER³⁰²), HIMLY³⁰³), E. G. CLARKE³⁰⁴), YPEY³⁰⁵), W. H. CONRAD³⁰⁶), A. SPEDALIERI³⁰⁷), V. J. HILDEBRAND³⁰⁸),

Auctor.
therapiae
specialis.

298) *Handbuch d. prakt. Arzneywissenschaft z. Gebrauche für angehende Aerzte. Stendal 1781—1816.*

299) *La médecine rendue plus précise, par l'application de l'analyse. Paris 1801.*

300) *System d. prakt. Heilk. Neue Ausg. Frankf. 1818.*

301) *Manuel de médecine pratique. Genève 1803.*

302) *Kunst die Krankheiten des Menschen zu heilen. Erlang. 1804. 5. Aufl. 1818.*

303) *Lehrbuch d. prakt. Heilk. z. Behufe sein. Vorlesungen entworfen. Göttingen 1807.*

304) *Medicinae practicae compendium. 1809. 4. edit.*

305) *Elementa praxeos clinicae. Amstel. 1810.*

306) *Grundr. d. Pathologie u. Therapie. Marb. 1811—16. 2. Aufl. 1817—20.*

307) *Medic. prax. compend. ad menten. cl. E. G. Clarke. Ticini 1815—16. Vol. 2.*

BRAND³⁰⁸) et egregius filius³⁰⁹), patris vestigia legens, J. N. RAIMANN³¹⁰), UDEN³¹¹), R. THOMAS³¹²), LYNMAN SPALDING³¹³), F. L. KREYSIG³¹⁴), P. J. HORSCH³¹⁵), BARZELOTTI³¹⁶), J. MANTOVANI³¹⁷), L. W. SACHS³¹⁸), J. MASON GOOD³¹⁹), J. R. BISCHOFF³²⁰), UWINS³²¹), HARLESS³²²) et FR. nobilis ab HILDENBRAND³²³).

17. I) Pro-

308) Institut. pract. med. Vindob. 1816.

309) Institutiones practico medicae, Rudimenta nosologiae et therapiae specialis complectentes. T. I. Viennae 1816. 8. Edidit, redegit, ac propriis lectionibus adcommodavit filius Franciscus nobilis ab Hildenbrand. T. II. ibid. 1821. T. III. 1822 et IV. 1825.

310) *Handb. d. speciellen med. Pathologie u. Therapie.* Wien 1816 — 17. 2. Aufl. 1823.

311) In opere sermone Rossico Petropoli edito tribusque, ni fallor, voluminibus comprehenso.

312) *Nouveau traité de la médecine pratique.* Trad. de l'Angl. Paris 1817.

313) *Institutions of practice of medicine.* New-York 1817.

314) *System d. prakt. Heilkunde auf Erfahrung . . . gegründet.* Leipzig 1816 — 19.

315) *Handbuch d. besondern Krankheitslehre.* Frankf. a. M. 1819.

316) *Elementi di medicina pratica.* Pisa 1819.

317) *Lezioni di terapia speciale e rendiconto clinico.* Vicenza 1820.

318) *Grundlinien zu einem natürlichen dynamischen Systeme der prakt. Medicin.* Königsb. 1821.

319) *Study of med.* Vol. I—IV. Lond. 1823.

320) *Praktische Heilkunde durch Krankheitsfälle erläutert.* Prag 1823.

17. I) Professores qui *scholas clinicas* ad ex-Professor.
perientiam dirigunt, uti videre est ex actis in-clinic.
stitutorum clinicorum, quae florent (ne dicamus
Vilnae ³²⁴) *Helmstadii* ³²⁵), *Jenae* ³²⁶), *Tübingae* ³²⁷), *Vindobonae* ³²⁸), *Würzburgi* ³²⁹), *Lipsiae* ³³⁰), *Berolini* ³³¹), *Patavii* ³³²), *Romae* ³³³),

Luc-

321) *A compendium of theoretical and practical medicine.*
London 1825.

322) *Handb. d. ärztlichen Klinik.* *Coblenz* 1824.

323) Valent. nob. a Hildenbrand institutiones practico-
medicae. Ed. ac propr. lectionib. adcommodavit filius.
T. II. *Vien.* 1821. T. III. *ib.* 1822. T. IV. *ib.* 1825.

324) J. FRANK acta instituti clinici Vilmensis. 1804—12.

325) W. H. G. REMER *Annalen der klinischen Anstalt zu*
Helmstädt. 1805.

326) J. F. ACKERMANN u. CH. E. FISCHER *klinische An-*
nnalen der med. chir. Krankenanstalt in Jena. 1805.

327) *Versuche für d. prakt. Heilk. aus dem klinischen In-*
stitute zu Tübingen. 1807—8.

328) J. MAYER *Samml. med. prakt. Beobacht. aus d. Kli-*
nik zu Wien. 1808. — V. J. HILDENBRAND ratio
medendi in schola pract. Vindobonensi 1809—13.

329) P. J. HORSCH *Annalen der klin.-techn. Schule (zu*
Würzburg). *Rudolstadt* 1809—10.

330) J. CH. A. CLARUS *Annalen des klinischen Institutes*
vom St. Jacobsspitale in Leipzig. 1810.

331) C. W. HUFELAND *neunter Jahresbericht d. königl.*
Poliklinischen Instituts der Universität Berlin 1811—19.
Zehnter Jahresbericht 1820—22. *Berlin* 1824. — E.
HORN *summarischer Generalbericht über das königl.*
Charitékrankenhaus v. J. 1816. *Berlin* 1817. Ejusdem:
öffentliche Rechenschaft über meine zwölfjährige Dienst-
leistung. *Ibid.* 1818.

*Luccae*³³⁴), *Edinburghi*³³⁵), *Dorpatii*³³⁶), *Hallae*³³⁷), *Havniae*³³⁸), *Parisiis*³³⁹), *Heidelbergae*³⁴⁰), *Regiomonti*³⁴¹), *Parmae*³⁴²) et *Praegae*³⁴³).

18. K) Me-

332) L. V. BRERA *prospetti dei risultamenti ottenuti nella R. I. università di Padova nel corso dell' anno scuolastico 1811—12. — Memorie medico cliniche per servire d'interpretazione ai prospetti clinici. Padova 1816. — Prospetti dei risultamenti ottenuti nella clinica medica di Padova nell' an. 1817—18. compilati dal Dr. DALL' OSTE; item dell' an 1819—20. del Dr. TENANI.*

333) *Ratio instituti clinici Romani, auct. J. MATTHEIS. 1816.*

334) *Annali di medicina pratica compilati nell' istituto clinico del Real Liceo Lucchese da G. FRANCESCHI. 1821.*

335) *Reports of the practice in the clinical Wards of R. Infirmary of Edinburgh. By ANDR. DUNCAN. 1818.*

336) *Annales scholae clinicae medicae Dorpatensis. a. 1818—20. auct. ERDMANN. 1821.*

337) *Jahrbücher der ambulatorischen Klinik zu Halle. V. P. KRUCKENBERG 1820. 2. Bd. 1824.*

338) O. L. BANG *observationes medicae in praxi privata collectae. Havn. 1822.*

339) *Clinique médicale, ou choix d'observations recueillies à la clinique de M. LERMINIER, et publiées par G. ANDRAL fils. Paris 1823.*

340) *Puchelt, Chelius u. Nägele, Heidelberger klinische Annalen. Heidelb. 1825.*

341) C. UNGER *Nachrichten über das ärztlich-wundärztliche u. augenheilkundige Clinicum der Universität Königsberg. 1823.*

18. K) Medici, qui *observationes practicas* Observatores, conscripserunt collegeruntque: W. HEBERDEN³⁴⁴⁾, G. ORTEL³⁴⁵⁾, B. CH. VOGEL³⁴⁶⁾, A. H. HINZE³⁴⁷⁾, T. PERCEVAL³⁴⁸⁾, J. ABERNETHY³⁴⁹⁾, H. WOLFF³⁵⁰⁾, J. P. VOGLER³⁵¹⁾, K. G. NEUMANN³⁵²⁾, J. G. F. HENNING³⁵³⁾, J. W. BENEDICT³⁵⁴⁾, J. P. FRANK³⁵⁵⁾,

342) *Anno clinico-medico compilato dal Dr. CARLO SPERANZA. Parma 1824.*

343) J. R. BISCHOFF, *Darstellung d. Heilungsmethode in d. medicinischen Klinik f. Wundärzte in d. k. k. allgem. Krankenhause in Prag im J. 1823. Prag 1825. — Klinisches Jahrb. über das Heilverfahren in d. med. prakt. Schule für Wundärzte in d. k. k. allgem. Krankenh. zu Prag. Im J. 1824. Prag 1825.*

344) *Comment. de morbor. hist. et curat. rec. cur. Soemmerring. Francf. a. M. 1804.*

345) *Medicinisches praktische Beobachtungen. Leipz. 1804.*

346) *Sammlung schwieriger medicinisch-chirurgischer Fälle. Altd. 1805.*

347) *Kleine Schriften medic. chir. Inhalts. Liegnitz 1805. Item: Kleine Aufsätze. Breslau 1806.*

348) *Mélange de médecine. Tr. d. l'Angl. p. Odier. Genève 1808.*

349) *Medic. chirurg. Beobachtungen. A. d. E. Halle 1809*

350) *Prakt. Bemerkungen u. Krankengeschichten. Hamb. 1811.*

351) *Erfahrungen u. Bemerkungen aus d. Gebiete d. med. Praxis. Marb. 1811.*

352) *Beyträge zur Arzneywissenschaft. Leipzig 1811.*

353) *Medic. Abhandlungen u. Wahrnehmungen aus d. Gebiete der Erfahrung. Stendal 1812.*

354) *Beyträge für prakt. Heilkunde u. Ophthalmiatrik. Leipzig 1812.*

Frank Prax. I. 1. 1.

FRANK³⁵⁵), T. W. BERNSTEIN³⁵⁶), J. KAUSCH³⁵⁷),
 K. H. DZONDI³⁵⁸), J. SCHALLGRUBER³⁵⁹), C. E.
 FABRICE³⁶⁰), L. FRANK³⁶¹), BARKER³⁶²), L. J.
 SCHMIDTMANN³⁶³), F. E. ACERBI³⁶⁴), J. L. FOR-
 MEY³⁶⁵), J. H. KOPP³⁶⁶), P. S. SCHNEIDER³⁶⁷),
 DUCASSE³⁶⁸), W. WITHERING³⁶⁹), G. BLANE³⁷⁰),
 STIE-

355) Interpretationes clinicae observationum selectarum,
 quas ex diariis suis academicis ad propriam epitomen
 de curandis homin. morbis illustrandam collegit. Tüb.
 1812. Et opusc. posthum. Vind. 1824.

356) *Kleine medic. Aufsätze.* Frankf. a. M. 1814.

357) *Memorabilien der Heilkunde.* Züllichau 1816.

358) *Beyträge zur Vervollkommnung d. Heilkunde.* Halle
 1816.

359) *Aufsätze u. Beobacht. im Gebiete der Heilkunde.*
 Grätz 1816.

360) *Med. chir. Bemerk. u. Erfahrungen.* Nürnberg. 1816.

361) *Samml. kleiner Schriften med. prakt. Inhalts.* A. d.
 Fr. Brünn 1817.

362) *Medical report of the house of Recovery and fever
 hospital at Corkstreet.* Dublin 1818.

363) *Summa observationum ex praxi clinica triginta an-
 norum deprompta.* Berol. 1819.

364) *Annotazioni di medicina pratica.* Milano 1819.

365) *Vermischte Schriften.* Berlin 1821.

366) *Beobachtungen im Gebiete der ausübenden Heilkunde.*
 Frankf. a. M. 1821.

367) *Med. prakt. Adversarien am Krankenbette.* Tüb. 1821.

368) *Mémoires et observations de médecine et de chirurgie.* Paris 1821.

369) *Miscell. tracts.* Lond. 1822.

370) *Select dissertations on several subjects of medical
 science.* London 1822.

STIEBEL³⁷¹), PUJOL³⁷²) — F. L. AUGUSTIN³⁷³), A. F. LOEFFLER³⁷⁴), A. CRICHTON, J. REHMANN et K. F. BURDACH³⁷⁵), RENARD et WITTMANN³⁷⁶) aliique³⁷⁷).

19. Praeterea genuinam medicinam plus Academ. minusve foverunt *academiae scientiarum* et so-^{scient. so-} *cietates medicae*, quarum acta simul ac dia-^{ciet. med.} *ria praesertim medica*, sibi invicem successerunt³⁷⁸) et eduntur in *Italia*³⁷⁹), *Hispania*³⁸⁰),

I 2

371) *Kleine Beyträge zur Heilwissenschaft. Frankf. a. M.* 1823.

372) *Oeuvres de médecine pratique. Paris* 1823.

373) *Die neuesten Entdeckungen u. Erläuterungen aus d. Arzneykunde. Berlin* 1799—1805.

374) *Die neuesten u. nützlichsten prakt. Wahrnehmungen u. Erfahr. f. Aerzte u. Wundärzte. Erfurt* 1803—9. 6 Thle.

375) *Russische Samml. für Naturwissenschaft u. Heilk. Riga* 1815—16. 2. B. 1817—18.

376) *Auserl. med. prakt. Abhandl. d. neuesten Franz. Literatur. 1817.*

377) *Beobacht. u. Abhandlungen aus d. Gebiete der gesamt. prakt. Heilkunde, von Oesterreichischen Aerzten. Wien* 1819. *Vermischte Abhandl. aus d. Gebiete der Heilkunde, von einer Gesellschaft prakt. Aerzte zu St. Petersburg. Halle* 1821.

378) Cfr. §. IX. 12. (226—241.) 13. (243—258.).

379) *Memorie dell' istituto nazionale Italiano. Class. fisica e matematica. Mémoires de Turin. Sciences physiques et mathématiques. Memorie della società Italiana. — Giornale della società medico-chirurgica di Parma. Memorie della società medica di Bologna. — Biblioteca*

nia ³⁸⁰), Gallia ³⁸¹), Batavia ³⁸²), Britan-
nia ³⁸³),

Italiana. *Iride Giornale di scienze, lettere ed arti per la Sicilia.* Nuovo giornale dei letterati. Pisa. — *Annali universali di medicina*, compilati da OMODEI. Milano. — *Giornale di medicina pratica* di BRERA. Padova. — *Repertorio medico chirurgico* di Torino. *Giornale di osservazioni medico-pratiche* compilate nello spedale grande e nuovo di Palermo, dal Sr. ANTONIO LONGO 1822. — *L'osservatore medico giornale di medicina e delle scienze, che vi hanno rapporto.* Compilato da una società di medici. Napoli. — *Mercurio delle scienze mediche.* Livorno 1823. — *Archivio di medicina pratica universale* compilato dal Dottore SCHINA. Torino 1824. — *Repertorio medico-chirurgico*, opera periodica compilata da alcuni professori della Pontificia università di Perugia membri della facoltà di medicina. Perugia 1824.

380) *Mémor. acad. de la R. soc. de Sevilla.* — *Decádas medico-quirurgicas.* Madrid. — *Periódico de la Sociedad medico-quirurgica.* Cadix.

381) *Mémoires de l'institut national de France.* — *Mém. de l'académie.* — *Classe physique et mathématique.* — *Mémoires de Montpellier.* *Mémoires de Toulouse.* *Actes de la société de médecine pratique de Montpellier.* *Recueil des actes de la société de santé de Lyon.* CAPELLE *journal de la société de santé et d'histoire naturelle de Bordeaux.* — *Gazette de santé.* *Annales de littérature médicale étrangère* redigés par KLINGSKIN. *Journ. d'observations de médecine* continué par DENIS. *Journ. complémentaire du dictionnaire des sciences médicales,* *Nouvelles medico-chirurgicales.* — *Journ. de médecine, chirurgie et pharmacie* par CORVISART, LE ROUX et BOYER. — *Nouveau journ. de médecine, chirurgie et pharmacie.* *Journ. de médecine*

nia ³⁸³), *America* ³⁸⁴), *Dania* ³⁸⁵), *Suecia* ³⁸⁶),

Ros-

Françoise et étrangère. Nouvelle bibliothèque germanique medico-chirurgicale par BREWER et HUET. *Recueil périodique de la société de médecine de Paris* par SEDILLOT. — *Bulletin de l'école de médecine et de la société etc. de Paris. Bulletin de la faculté de médecine et de la société de Paris.* — *Mémoires de la société de médecine d'émulation de Paris. Bibliothèque médicale. Indicateur médical.* — *Annales du cercle médical. Revue médical historique et philosophique. L'observateur provençal des sciences médicales.* *Marseille. Tablettes medico-chirurgicales. Journ. général de médecine. Archives générales de médecine.* — *TARTAGLIA bulletin des sciences médicales. Bulletin des sciences médicales publié par Mr. FÉRUSAC. Nouveau bulletin de la société philomatique. GRAPÉRON bulletin des sciences médicales.* — *Annuaire des hôpitaux civils de Paris.* — *Journ. de physiologie expérimentale* par F. MAGENDIEZ. — *Revue encyclopédique.* — *Bulletin général et universel des annonces et nouvelles scientifiques.* — *Journ. médical de la Gironde. Bordeaux 1824.*

382) *Verhandel. van het Utrechtsch Genootsch.* — *Nieuwe Verhandel. van het Genootsch. ter Bevordering der Heelk. te Amsterdam. Handel. van het Genootsch. ; servandis civibus. Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haaren omvang. Actes de la société de médecine de Bruxelles. Actes de la société libre des sciences physiques et médicales de Liège.* — *Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haaren omvang. Gorinchem 1822.*

383) *Transactions of the Linnean society.* — *Transactions of the R. humane society.* — *Medical observations by a society of physicians in London.* — *Medical communications.* — *Memoirs of the medical society of Lon-*

Rossia ³⁸⁷), *Polonia* ³⁸⁸), *Germania et Helvetia* ³⁸⁹).

20. Po-

don. Medico-chirurgical transactions. Transactions of a society for the improvement of medical and surgical knowledge. — Essays and observations physic. and litter. The quarterly journal of British and Foreign medecine and surgery. London. — Memoirs of the society of Manchester. — The medical and physical journal conducted by BRODY and ADAMS. — The London medical, surgical and pharmaceutical repository. By BURROW. The Monthly Gazette of Health. By R. REECE. London. — Medical and philosophical commentaries by a society in Edinburgh. Medical essays and observations by a society in Edinburgh. — The Edinburgh review. The Edinburgh medical and surgical journal. By A. DUCAN. — The transactions of the R. Irish academ. — Transact. of the medico-chirurgical society of Edinburgh instituted August 2d. 1821.

384) *Memoirs of the American academy. — Transactions of the American society. American medical recorder. — Transactions of the college of physicians of Philadelphia. — Journal of the academy of natural science of Philadelphia. — Eclectic repertory and analytical review by a society of physicians of Philadelphia. — The medical repository. CHOPMAN's Philadelphia. journal. — Transactions of the literary and philosophical society of New-York. — New-York medical and surgical journal by FRANCIS, DYCKMAN and BECK. — The Western quarterley reporter of medical, surgical and natural science. — Medical papers communicated to the Massachussets medical society. — Anales de la academia de medicina de Buenos Ayres. Buenos Ayres 1823. — The medical review and analytical journal by J. EBERLE and G. M. CLETTAN 1824.*

20. Postremo seculi decimi noni initium
 etiam ^{Nosologi-}
^{ae, dictio-}
^{naria, en-}

385) *Bibliothek for Laegar. Kiobenhaven. Archiv for Lægevidenskabens Historie i Danmark. Udgivet af J. D. HERHOLDT. 1823.*

286) *Acta literaria Sueciae. — Neue Schwedisch akadem. Abhandlungen. — Vetensk. Acad. Nya Handl. — Svenska Läkare-Sällsk. Handl. Ars-Berättelse om Svenska Läkare-Sällskapets arbeten. Stockh. 1821.*

387) *Comment. soc. phys. med. Mosquensis. Et diarium quod Caesarea academia medico-chirurgica Petropolitana sermone Rossico publici juris reddit.*

388) *Dziennik Wilenski — Pamiętnikow Towarzystwa Imperatorskiego Wilenskiego. — Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farmacyi.*

389) *Abhandl. d. Bairischen Akademie. Archiv der prakt. Heilkunde f. Schlesien u. Südpreussen. 1799. — Neue Schriften der naturforschenden Freunde in Westphalen. — Abhandl. einer Gesellschaft Aerzte in Hamburg. — Arbeiten einer Gesellschaft der Oberlausitz. — Denkwürdigkeiten der vaterländischen Gesellschaft der Aerzte Schwabens. — Annalen der Wetterauischen Gesellschaft f. die gesammte Naturkunde. — Abhandl. d. physikalisch-med. Societät in Erlangen. Museum d. Heilkunde. — Archiv der medic. chir. u. pharmac. Gesellschaft Schweizerischer Aerzte in Aarau. — Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaft zu Marburg. 1823. — Neues Journ. für die chirurg. Arzneykunde u. Geburtshülfe. Berl. 1803. — STERNBERG Literaturzeitung für die Med. u. Chir. nebst ihren Hülfswissenschaften. Gosl. 1804. — Allgem. Literaturzeitung von Halle. Allgem. Literaturzeit. von Leipzig. — J. F. PIERER allgem. med. Annalen d. 19. Jahrhunderts. 1801—20. Ejusd. et CHOULANT kritisch. Annalen d. Med. als Wissenschaft u. Kunst. — HORN'S*

cyclopæ- etiam ob id celebrandum est, quod cohortes tum
 diae, re-
 pertoria. morbo-

Arch. f. d. med. Erfahrung. Ejusd. *neues Archiv. Neue Folge.* Ejusd. et NASSE, HENKE etc. *Archiv f. med. Erfahr.* J. NEP. EHRHART EDLEN VON EHRHARTSTEIN, *med. chir. Zeitung. Inspruck.* — *Med. Archiv von Wien u. Oest. unter der Enns vom J. 1800—1801.* — *Medicin. Jahrb. des k. k. Oesterreich. Staates.* Bibliotheca medico-chirurgica pharmaceutico-chemica. Berolini. J. N. RUST *Magazin d. gesammten Heilkunde, mit besonderer Beziehung auf d. Militairsanitätswesen in d. königl. Preuss. Staaten.* — Ejusd. *kritisches Repertorium f. d. Heilk.* — *Neues Journ. d. ausländischen med. chir. Literatur* von HARLESS u. RITTER. J. J. GUMPRECHT u. H. G. GERSON *Magazin d. ausländ. Liter. d. gesammt. Heilkunde.* — Cont. G. H. GERSON u. N. H. JULIUS *Magazin d. ausländ. Lit. d. gesammt. Heilkunde u. Arbeiten d. ärztlichen Vereins in Hamburg.* — K. H. DZONDI *Aesculap, eine Zeitschrift . . . f. ausüb. Aerzte u. Wundärzte.* — J. CH. HARLESS *Jahrb. d. Deutschen Med. u. Chir.* — Cont. *Rheinische Jahrbücher d. Med. u. Chir.* *Deutsches Archiv f. Physiologie* von J. F. MECKEL. — FROBIEP *Notizen aus d. Gebiete d. Natur- u. Heilkunde.* F. STRANSKY v. GREIFFENFELS *hist. kritische Zeitschrift d. neuesten Deutschen Med. u. Chirurgie.* — Continuator Diar. Hufelandi, v. 5. X. 15 (224). *Kritische Hefte f. Aerzte u. Wundärzte.* Von Dr. J. CH. G. JÖRG. Leipz. — *Annalen der gesammt. Heilkunde unter der Redaction der Mitglieder d. grossherzogl. Badischen Sanitäts-Commission.* Carlsruhe 1824. — *Literarische Annalen der gesammten Heilkunde.* Herausgeg. von F. C. HECKER. Berlin 1825. *Annal. f. d. gesammt. Heilk. unter d. Redact. d. Mitglieder d. Grossherzogl. Badischen Sanitäts-*

morborum genus humanum excruciantium, tum librorum ad cognitionem et curam illorum spectantium, debitum magis magisque in ordinem compositae fuere, tam a *nosologiis*³⁹⁰⁾, quam a *dictionaryis*³⁹¹⁾, *encyclopaediis*³⁹²⁾, *repertoriis*³⁹³⁾, aliisque operibus³⁹⁴⁾.

Commiss. 1. Bd. 1. Hft. Carlsruhe 1824. 1. Bd. 2. Hft. Ibid. 1825.

390) SWEDIAUR novum nosologiae methodicae systema. Hal. 1812. — FERCOQ *la synonymie ou concordance de la nomenclature de la nosographie philosophique du prof. Pinel, avec les anciennes nosologies.* Orléans 1813. ALIBERT *nosologie naturelle, ou les maladies du corps humain distribuées par familles.* Paris 1817. J. MASON GOAD *a philosophical system of nosology with a correct and simplified nomenclature.* Lond. 1817. — D. HOSACK *system of practical nosology.* New-York. 2. edit. 1821. — C. G. G. CREUTZWIESER *diss. de variis tentaminibus nosologicis.* Hal. 1821. *The study of medicine.* Lond. 1822. 4. Vol. — TH. YOUNG *an introduct. in medic. literature, including a system of pract. nosology.* Lond. 1823. 2. edit.

391) F. J. ZIMMERMANN *philosoph. medic. Wörterbuch zur Erleicht. d. höhern med. Studiums.* Wien 1803. 2. Aufl. 1810. — *Dictionnaire des sciences médicales.* Paris 1813. (Ipsis a Gallis definitur hoc opus ut „Barathrum où se trouvent pêle mêle, et souvent côté à côté, le bon, le mauvais, l'excellent, l'absurde et le pitoyable; espèce de tour de Babel, où l'on parle toutes les langues, où l'on enseigne toutes les doctrines.“ V. Journ. général de médecine françoise et étrangère. T. LXXXII— XXI. de la seconde série. No. 314. Janvier 1823. p. 93.). *Dictionnaire abrégé des sciences médicales*

- dicales. *Dictionnaire de médecine en 18 volumes. Paris 1821.* — DREYSSIO *Handwörterbuch der medicinischen Klinik. Erf. 1812. Continuat. ab J. H. G. SCHLEGEL. Ibid. 1824.* — A. F. HECKER *lexicon med. theoret. pract. reale. Gothae 1816—20. Fortgesetzt von H. A. ERHARD. 1824. 4 Bde.* — J. F. PIERER *med. Realwörterbuch. Altenb. 1816—21.* — H. BRANDELS *med. Wörterbuch. Gött. 1820.* — PARR *the London medical dictionary. 1820.* — A. BALLARO *diccionario de medicina. Madrid 1821.* — *Dizionario periodico di medicina, esteso dei profess. L. MARTINI e L. ROLANDO. Torino 1824.*
- 392) J. D. METZGER *Skizze einer med. Encyclopädie vom Anfang d. 19. Jahrhunderts. Königsb. 1804.* C. CONBRUCH *allgem. Encyclopädie f. pr. Aerzte u. Wundärzte. Leipzig 1802—21.* — J. W. H. CONRADI *Grundriss d. med. Encyclopädie u. Methodologie. Marb. 1815.*
- 393) J. L. DÖMLING *kritisches Repertorium. Herborn 1803.* IM. MEYER *Repertorium d. gesamt. Heilkunde. Berlin 1809.* — REUSS *repertorium commentationum a societatibus litterariis editarum. Scientia et ars medica et chirurgica. Goett. 1813—18.*
- 394) A. F. LOEFFLER *Handbuch des Wissenswürdigsten aus d. med. chir. Praxis. 1803.* — C. F. LUDWIG *Einleitung in die Bücherkunde der prakt. Medicin. Leipzig 1806.* — F. BURDACH *die Literatur der Heilwissenschaft. Gotha 1810—11.* Ejusdem: *Handbuch der neuesten in- u. ausländischen Literatur der gesammten Naturwissenschaften u. der Medicin u. Chirurgie. Gotha 1822.* — VILLARS *essai de la littérature médicale. Strasb. 1811.* — J. S. ERSCH *Literatur der Medicin seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, neue fortgesetzte Ausgabe von F. A. B. PUCHELT. Leipz. 1822.*

INTRODUCTIO
AD
STUDIIUM CLINICUM.

INTRODUCTION

CHAPTER I

Introductio ad studium clinicum.

§. XII.

Quaenam a nobis praxin medicam tractandi via ineunda sit.

1. **C**onspectus historiae et literaturae praxeos medicae docet, varias vias ad istam excolendam exercendamque tentatas fuisse. Filum enim Ariadnaeum expetierunt alii a *philosophia*, alii a *chemia*, alii a *mathesi*, alii a *doctrina solidi vivi*, alii ab una *experientia*, alii demum e plurimis fontibus simul. Superest nunc ut stabiliamus, *quaenam a nobis praxin medicam tractandi, ineunda sit via?*

2. *Philosophia* sicuti aliis disciplinis, ita et medicinae instar luminis est. Loquimur vero hinc de *genuina philosophia*, cujus elementa in operibus FR. BACONIS ¹⁾, TH. REIDII ²⁾, J. SENEBIERI ³⁾, A. M. WEIKARDI ⁴⁾, W. ZIMMERMANNI ⁵⁾,
J. LO-

Genera-
tim.

Quid phi-
losophia?

1) *Novum organon scientiarum.* In Opp.

2) *Inquiry into the human mind, on the principle of common sense.* London 1769.

3) *L'art d'observer.* Genève 1775.

4) *Der philosophische Arzt.* Frankf. 1775.

5) *Von der Erfahrung in der Arzneykunst.* Zürich 1787.

J. LOCKE⁶⁾, N. P. GILBERT⁷⁾, CLERC⁸⁾, St. TOURTELLE⁹⁾, K. SPRENGELII¹⁰⁾, PH. PINELII¹¹⁾, ROULLIERI¹²⁾, GILBERTI BLANE¹³⁾ inveniuntur, quaeque toto caelo a *sophistica*, alterius nomen usurpante, differt. Enim vero *philosophia genuina* contentionibus inimica est, naturali hominis judicio innititur, ingenium acuit, imaginationi frenum injicit, vanas ideas respuit, sensuum limites non transgreditur, facta in ordinem disponere, comparare, ex iis caute observationes, regulasque generales deducere docet, verbo, quomodo scientiae excolendae sint, tradit. *Sophistica* contra delectatur contentionibus, ideas abstrusas in idiomate barbaro complectitur, ac, ut vidi-

6) *Essay on human understanding*. London 1788.

7) *Les théories médicales modernes comparées entre elles et rapprochées de la médecine d'observation*. Paris a. VII.

8) *Histoire naturelle de l'homme considérée dans l'état de maladie, ou la médecine rappelée à sa première simplicité*. Montpellier. a. VII.

9) *Elémens de médecine, théorique et pratique*. Strasbourg. a. VII.

10) *Handbuch der Pathologie*. 3. Aufl. Leipz. 1802—10.

11) *Nosographie philosophique*. T. II. p. 520.

12) *Essai sur la philosophie médicale, contenant l'examen des principes qui servent de base aux diverses théories et leur application à la pratique*. Paris 1815.

13) *Elements of medical logick, illustrated by practical proofs and examples*. Lond. 1818. Vers. Germanica cum praef. Blumenbachi exstat. Goett. 1820.

vidimus¹⁴⁾, anguis instar in scientiarum contextum dolose sese insinuat¹⁵⁾.

3. *Chemiae*, antiquitus medicinae adoptatae, ^{Quid chemia?} exemplum¹⁶⁾ nos terret. Nec recentius ejusdem generis tentamen¹⁷⁾, animum addit. Quamobrem eo magis chemiae facem ad medicinam excolendam rejicimus, cum illa ipsa aevo nostro chaos exhibeat.

4. Quamvis exempla *matheseos et mechanices* ^{Quid mathesis?} medicinae applicitae¹⁸⁾, minus nos terreant, attamen illa non sumus secuturi, propterea quod medicina evidentiam, qua illae gaudent scientiae, neutiquam admittit, atque leges quibus corpora inanimata gubernantur, valde ab illis, quae corpus humanum vivum regunt, differre solent.

5. Legum quae corpus humanum vivum ^{Quid solidum vivum?} gubernant, plurimae in doctrina *solidi vivi* seu *dynamicæ* exponuntur. At cum opus illas stabilendi necdum absolutum sit, cumque ipsae quae jam stabilitae sunt leges multis adhuc premantur dubiis; quisnam prudens atque conscientia praeditus, fundamento tam infirmo, praxin medicam,

a cu-

14) §. II. 3. — 4. — §. XI. 4.

15) De sectatoribus hujus philosophiae spuriae valent verba ALGAROTTI: „furono a ragione paragonati co' ballerini, i quali dopo lor volte, riprese, aggiramenti e scambietti si trovano alla fine del ballo nello stesso sito, nè più nè meno, che il cominciarono.“

16) §. VII. 1. 4. 17) §. X. 3.

18) §. VIII. 1. 2.

a cujus praeceptis salus generis humani pendet, superstrueret?

Quid observatio?

6. Ejusmodi conamen eo magis improbandum foret, cum via longe tutior ad praxin medicam tractandam, pateat. Loquimur de via, quam, praeceunte HIPPOCRATE, et suadente BACONE, secuti sunt SYDENHAM, BAGLIVIVS atque medici omnes, quorum memoria generi humano carissima est, quorumque opera literaria seculorum imperio resistere potuerunt: loquimur de via, quam medicorum quivis, etiamsi primum studiis erroneis corruptus, dummodo plus judicii quam vanitatis habeat, ocyus serius ipse initurus est; verbo, loquimur de casta naturae *observatione*, de methodo videlicet, morborum phaenomena, quotquot sunt, accuratissime observandi, eaque cum phaenomenis, ex sectione cadaverum emergentibus, sedulo, comparandi; rerum positiones omnes, quae, aut evolutionem morbi praegressae sunt, aut eam comitatae, attente eruendi; tandem de forma, sede, indole et exitu morbi, omni mentis contentione adhibita, caute judicandi; postremo ea auxilia, quae alias sub similibus circumstantiis ad morbum sive tollendum, sive sublevandum, sive ad vitam aegri prolongandam utilia, aut saltem innocua detecta fuere, prudenter in usum deducendi; quin tempus investigatione intimae naturae morbi, aut modus agendi pharmacorum, teratur.

7. Eri-

7. Erimusne igitur sola observatione contenti, ^{Erimusne empirici?} a qualibet theoria alieni, aut aliis verbis, erimusne potius *empirici* quam *dogmatici*? — Cum de bono aut malo vino judicare non possis, nisi gustaveris; etiam de morbis judicare non poteris, nisi illos observaveris. Absurda hinc est Arabum illa medicinae divisio, in theoriam et practicam, neque ejus unquam apud Graecos mentio fit. Si enim theoria ratiocinium aliquod significat, — quum hoc in medicina non nisi ex observatione deduci possit, — nemo, nisi practicus, sive observator, theoriam acquirere valet. Quodsi pro theoria imaginationis partus obtrudatur, ac praxis secundum ejusmodi fictionem ordinetur, id rudissimam aequae ac periculosissimam empiriam sistere contendimus.

8. Cum empirica morborum observatio, ^{ra-Monitum.} ratiocinium dogmaticum non excludat, nil sane obstat, quominus *eclecticorum*¹⁹⁾ more, ex diversis systematibus unum alterumve principium, experientiae consonum, eligamus. „Ex quovis quidem flore, mellis quidquam apum industria sugit; et latet in quovis systemate nectaris humor, qui colligi et quoscunque demum in usus converti mereatur“²⁰⁾. Quae sententia inprimis de modo varia phaenomena morbosa explicandi, valet. Sic *chemia* pulchre de origine diabetis, calculorum, morbi caerulei, asphyxiae, ex suspensio opere

19) §. III. 3. 20) J. P. FRANK opusc. posthum. p. 45.

Frank Prax. I. 1. 1.

opere respirationis, rationem reddit. Sic *mechanica* et *hydraulica* praeclare symptomata obstructionem viscerum et haemorrhagias concomitantia explicant; sicque *doctrina solidi vivi* bene interpretatur plura phaenomena morbis nervorum addicta. — Praeterea cum naturae observatio haud raro ideas novas suggerat, quae digestae ac experientiae crucibulo submissae, medicam locupletant praxin; talia sane conamina, quatenus non temere a tironibus imberbibus, sed religiose a viris expertis suscipiuntur, absit ut improbemus.

Definita sic via, quam ad praxin medicam in genere tradendam elegimus, restat ut modum *partes hujus doctrinae* in specie excolendi, tradamus. Ordimur a *symptomatologia*.

§. XIII.

Quomodo symptomatologia excolenda sit.

De facultate observandi.

1. Quemadmodum facultas quocunque in conamine excellendi naturae dono innititur; sic quoque facultas phaenomena morbosa rite observandi. Hac facultate maxime gaudere solent homines, fronte spatiosa, convexa, prominentiis conspicuis ossium frontaliū et potissimum sensibus exquisitis, instructi. Oportet vero istud naturae donum ab infantia usque excolatur; quod fit inprimis per consuetudinem, adtentionem in objecta sensibus obvia modo debito figendi.

Prae-

Praeterea nil magis facultatem observandi acuit, quam exercitium in arte delineandi et pingendi¹⁾. Accedit studium historiae naturalis, praesertim excursiones, ut vocant, botanicae et entomologicae. Porro ad phaenomena morborum rite observanda requiritur mens a praeconceptis opinionibus et systematum fascinatione libera²⁾. Ab initio pauci aegroti, sed hi accuratissime observandi sunt³⁾. A morbis simplicissimis ad complicatos sensim sensimque procedendum⁴⁾. Juvat simul munus aegrotis noctu ministrandi⁵⁾. Interea illis *continuo* adstare, debitam potius impedit observationem, quum mutationes, quae gradatim

K 2

datim

- 1) Sic BEERIUS exiguas illas notas, quae ophthalmiarum varias species inter se distinguunt, vix absque arte delineandi et pingendi, in qua excellebat, eruere potuisset.
- 2) Legantur BAGLIVI de praxi medica ad priscam observandi rationem revocanda. Romae 1796, cujus versio germanica habetur in *Allgem. med. Annalen* 1815. p. 243. et Jos. SCHNEIDER *über Systemsucht, Mode u. Sectengeist unter den Aerzten. Fulda* 1823.
- 3) Pro instituto clinico medico lecti duodecim sufficientes sunt.
- 4) Ars professoris clinices, aegros facultatibus et necessitatibus discipulorum accommodatos eligendi, magni facienda est.
- 5) In clinico Vilmensi, quaque nocte, duo inter alumnos aegrotis ministrare debuerant. Sic etiam medici consuetudinem vigilias nocturnas, occupationibus diurnis jungendi, acquirunt.

datim in morbo contingunt, difficulter tunc animadvertantur. Facultate morbos observandi jam exercitio firmatâ, tironibus in arte medendi, magna nosocomia praesto sunt. Quodsi hîc mos aegros festinanter obiterque visitandi vigeret⁶⁾; ne ille exemplo sit, cavendum. Generatim nil magis ad phaenomena morbosa rite observanda impellit, quam animi tranquillitas (ne scilicet medicus a negotiis alienis, delectatione et voluptate distineatur) et misericordia erga aegrotos⁷⁾.

Divisio
sympto-
matum.

2. Phaenomena morborum (*symptomata*) aut in sensus medici cadunt (*symptomata objectiva*), aut ex aegrorum relatione cognoscuntur (*symptomata subjectiva*).

Sympto-
mata ob-
jectiva.

3. *Symptomata objectiva*, in neonatis aliisque aegrotis loquela aut iudicio destitutis, maxime valent. Quamobrem ne quid, quod aut ad primitivam corporis structuram aut ad morbum acquisitum spectat, praetervideatur, ejusmodi aegroti, in loco lucido, vestibisque exuti exami-
nandi

6) EDUARD MEISSNER *Bemerkungen aus d. Taschenbuche eines Arztes während einer Reise von Odessa u. s. w. Halle 1819. p. 122.*

7) Medicorum ista dos per animalium vivorum sectiones, nunc temporis usitatissimas, necessario pessumdari debet; ac lucro quod physiologia, pathologia et materia medica ex horrendo isto fonte haurit, pretiosissimae illius dotis jacturam compensare unquam posse, valde dubito.

nandi sunt. Quod praeceptum plus minusve in omni aegro sequi debemus. Medicus enim illud negligens vultumque dumtaxat aegri sui noscens, duci supremo exercituum, qui, sine praevia campi totius exploratione, pericula praeliorum iniret, aequiparare potest. Praeterea quum plurima symptomata aegro quiete decumbente non appareant, appareant vero illico, dum ille surgit, deambulat, scalas ascendit etc.; si vires aegri id permittant, veterinariorum exemplum (quatenus equos de morbis suspectos ad varia gressus genera impellere solent) imitari juvat. Multum quoque ex conspectu aegrotorum dormientium atque sub actu evigilationis constitutorum addiscitur. Generatim respicienda sunt corporis habitus, color, temperatura, positio; conditio cutis, carniū subjacentium, unguium, capillorum, transspirationis, faciei, praesertim palpebrarum, oculorum, frontis, aurium et earum ceruminis, nasi, oris, labiorum, dentium, gingivarum, linguae, halitus, salivae, faucium, colli, deglutitionis, vocis, loquelaē; inspiratio, exspiratio; tussis, sputa, sternutatio, oscitatio et singultus; cordis arteriarumque motus, status regionis epigastricae, hypochondriorum et reliqui abdominis; vomitus, faeces, urina, menstrua, lochia, lac et excretio spermatis.

4. *Symptomata subjectiva* circa molestias, Symptomata sub-
adpetitus, sensuum laesiones, conditionem animi ^{mata sub-}jectiva.

versan-

versantur; aegroti querelas de morbo optime linguâ vernaculâ exprimere solent⁸⁾, quam non minus quam et dialectum unicuique regioni propriam, medicus probe noscat oportet⁹⁾. Ne aegrotum, dum historiam morbi narrat, intempestivis quaestionibus interrumpas¹⁰⁾.

Examen
aegrorum.

5. Ars enim aegrotos rite examinandi¹¹⁾ neutiquam

8) Plurimi extraneorum, qui caeterum egregie idiomate Gallico loquuntur, dum de morbis quaestio est, verba rebus minime accommoda adhibent. Sic Germanus dolorem ad cor percipiens facile loquitur *d'un mal au coeur*, quod revera conatum vomendi significat. Sic Polonus sub nomine *une colique*, dolorem qualemcumque pungentem, non illum dumtaxat abdominis, designare solet; ne de erroribus loquar, quibus conversio vocabuli variola, in *vérole*, jam pluries ansam dedit.

9) *O fam* dixit quondam aeger rusticus patri meo in clinico Ticinensi, qui, illum de uxore (*femme*) conqueri existimavit. Ast aeger de *fame* loquebatur. — Quisne dialectus Austriacae ignarus crederet, *das Schnakerl*, singultum, *die Fraisen*, convulsiones, *das Blutbrechen*, haemoptoen, significare? — Ex lingua hebraica, germanica et polonica composita est singularis judaeorum Lithuanicorum dialectus, quam Vilnae addiscere coactus fui.

10) Tirones medici a prava hac consuetudine vix arceri possunt; culpam tum in impatientiam aetati juvenili propriam, tum in praecepta erronea, quae circa examen aegrorum tradi solent, rejicio.

11) M. ALBERTI diss. de aegrorum examinis methodo. Hal. 1731. — EYEREL obs. med. varii argument.

tiquam in serie quaestionum, ordine modo physiologico modo anatomico instituendarum, consistit. Qui enim aut functiones vitales, naturales, animales et sexuales, aut partes a capite ad calcem percurrit, aequiparari potest alicui, qui cupiens patriam advenae noscendi, illi e quo loco profectus sit dicere non concederet, sed ad scopum suum attingendum, quaestionibus innumeris provincias quot quot inter polum arcticum et antarcticum sitae sunt, singillatim ad trutinam vocaret. Suademus igitur, ut medicus aegro suo silens adstet, utque narrationi historiae morbi attentissimas praebeat aures. Ex ista, etiamsi rudi narratione, nec non ex conspectu aegri, aliter fieri nequit, quam ut medicus saltem *supicionem* de praesentia unius alteriusve aegritudinis

praemitt. method. examinandi aegros. Vindob. 1786. — A. W. SMITH *Entwurf eines methodisch-systematischen Krankenexamens. Wien 1787 (1796).* F. DE STAHL diss. de examine aegri rite instituendo. Wirceb. 1791. — M. STOLL *allgem. Anleitung Kranke zu examiniren. Marb. 1792.* — J. F. GOTTHARD *Leitfaden für angehende Aerzte, Kranke zu prüfen. Erlang. 1793.* — S. G. VOGEL *Krankenexamen, Stendal 1796. et allgem. medicinisch-diagnostische Untersuchungen zur Erweiterung u. Vervollkommnung seines Krankenexamens. I. Th. Stendal 1824.* CHR. A. STRUVE *tabellarische Uebersicht zum Behuf des Krankenexamens. Hannov. 1800.* — HILDENBRAND prolegom. in praxin clinicam. Vindob. 1807. p. 221. GUITON *diss. sémiologique à l'art d'observer et d'interroger les malades. Paris 1809.*

dinis acquirat. Nunc solum tempus opportunum est quaestiones instituendi, ast non vagas, sed ita constitutas, ut ad conceptam de morbo latente suspicionem, aut confirmandam, aut infringendam inservire possint. Quaestiones hujusmodi placide et formâ colloquii instituendae sunt: illarum nulla, nisi consulto, bis locum obtinere debet. Immo quaestiones, in quantum fieri licet, tali modo instituendae sunt, ut aeger illas affirmare possit: saltem evitandae sunt quaestiones, quibus aeger verisimiliter negando respondebit, e. c. num (sub febre magna cum lingua spurca) ciborum desiderium vigeat etc.?

Exploratio aegrorum.

6. Ad symptomata toto in ambitu eruenda, saepe *aegri exploratione* opus est; quae exploratio nisi secundum artis praecepta fiat¹²⁾, lucrum non portendit, atque medici ignorantiam patefacit. Peculiares explorandi rationes ad tractatus morborum speciales remittendo, hîc dumtaxat de *exploratione pulsuum, caloris corporis, linguae et abdominis*, quippe communissimis, locu-

12) A. PLATNER methodus investigandi locos adfectos. Tub. 1579. — S. H. SLEVOOT pr. de mediis morbos explorandi naturalibus. Jen. 1721. — J. J. SCHARANDAGI modus et ratio visendi aegros. Erf. 1749. — J. P. FRANK oratio academica, de signis morborum, ex corporis situ partiumque positione petendis, habita Ticini Reg. die 24. Maji 1788. Contin. in volumine VI. Delectus opuscul. medic. antehac in Germaniae diversis academiis editorum. Ticini. a. 1789.

locuturi sumus. — *Pulsus* non nisi compositis, ab adspectu medici, ab actu evigilationis aut quacunque demum alia caussa ortis turbis, explorari debet. Pulsum tangendo caveat medicus ne aegroto tergum vertat, aut cubitu suo faciem illius allidat. Evitet quoque negotium huiusmodi manibus frigidis, sudore irroratis, immundis, uncinatis, suave olentibus (et annulis pretiosis ornatis?) suscipere. Brachium pulsum explorationis caussa ab aegro conscio expetitur, et, nisi sudor aut frigus impediunt, stragulis superimponitur, idque ab omni compressione immune leniterque ad interiora versus flexum. Explorari solet arteria in carpo decurrens, propterea, quod conspicua, superficialis, longa et ex opposita parte a corpore duro subfulta est. Quum vero haec arteria plurimis anomaliis (quas inter decursus super dorsum radii communissimus est), alterutro plerumque in brachio obnoxia sit; pulsus vicissim in utroque, aut ad arterias carotides et temporales tangendus. Nisi medici vultus satisfactionem in pulsu explorando ostendere valeat; maneat physiognomia saltem immobilis, ne aeger, ad minimos gestus in malam partem interpretandos pronus, terre fiat. Sileat simul uterque! aeger scilicet, ne pulsus a sermone concitetur; et medicus, ne adtentio distineatur. Quum tirones cunctas pulsum qualitates uno eodemque temporis puncto simul animadvertere vix

vix possint, ut arteriarum illarum *frequentiam*, *vim*, *constantiam* et *rhythmum* vicissim explorent, suademus. *Pulsuum frequentia* exactissime ope horologii, minutis, sic dictis, secundis instructi, determinatur¹³⁾. *Pulsuum vis* apicibus digitorum trium (pollice semper excepto ne propria arteriola ibi pulsans fallat) longitudini arteriae admotis, vicissim modo plus modo minus comprimendo, exploratur. *Pulsuum constantia* et *rhythmus* explorationem saltem ad sexagesimam horae partem protrahendo, illamque concessis nonnullis intervallis reiterando, cognoscuntur. Quid de *motu laterali arteriarum*¹⁴⁾ respectu pathologico sentiendum sit, tempus docebit. — Opportunitate qua pulsum tangimus, ad *calorem quoque cutis* et conditionem carnium subjacentium explorandam, fruimur. Hoc sub opere, inprimis apud feminas, ne brachium indecore palpemus monendum.

13) JO. VAL. HILDENBRAND (Prolegom. in prax. clin. p. 120.) paucis casibus exceptis, hanc ceremoniam *medicastrois* relinquit! Declarationem hanc alia sequitur, qua distinctiones pulsus in vermicularem, myurum, formicantem, serratum, caprizantem etc. pro subtilitatibus nullum in praxi fructum habentibus, definiuntur!

14) BICHAT *anatomie générale*. T. I. p. 289. — PARRY *an experimental inquiry into the nature, cause and varieties of arterial Pulse*. Lond. 1816. — J. F. G. HECKER in HUFELAND'S *Journ. d. prakt. Heilkunde* 1824. August. p. 23.

dum. Liceret et thermometrum in usum deducere. — *Lingua* potius inspicienda quam tangenda. Ut aegroti, animi haud compotes, linguam exerant (excitatâ prius illorum adtentione exemplum medici eundem actum peragentis, plus valet quam jussio. In neonatis lingua durante vagitu inspicienda est. Infantes, nisi jussui obtemperant, donis et ludis¹⁵⁾ ad hanc actionem adiguntur. Instrumentum (*Katagloss*) nuper ad linguam deprimendam detectum, nondum vidimus. — *Exploratio abdominis*, aegro supine decumbente, cruribus ventri attractis, genibus flexis, musculisque colli per congruam capitis positionem relaxatis, instituitur. Manus medici explorantis, intuitu in aegri faciem defixo, variis abdominis regionibus admovetur, idque sine vi, ne fortiori apicibus digitorum illatâ compressione, tactus organon torpescat, aut in regione explorata dolor relinquatur.

7. Quoties excretiones morbosae aliique morborum fructus quid peculiare exhibent, *examini physico-chemico* submitti deberent. Caeterum medici prudentis est, notiones ex ambiguo chemiae fonte petitas caute dijudicare. Analysis
chemica.

8. Phaenomena morborum usui tum proprio tum aliorum *chartis committenda* sunt. Hoc negotium, exemplo HIPPOCRATIS, ARETAEI, BAL- Symptomatum
descriptio.

LONII,

15) Infantes obstinatissimi obtemperare solent, dum illis dicitur: ah linguam non exeris, quoniam illâ cares.

LONII, C. PISONIS, PLATERI, FORESTI, FR. HOFFMANNI, MORGAGNII, J. P. FRANK aliorumque¹⁶⁾, simpliciter, breviter, omissis circumstantiis adventitiis¹⁷⁾ et interpretationibus¹⁸⁾, sineque flosculis orationis, et fuco, absolvendum est¹⁹⁾. Quousque fieri licet, verba aegrotorum retinenda sunt,

16) Praecepta observationes conscribendi tradiderunt: E. STAHL Pr. de hist. morbor. criterio. Hal. 1707. — FR. HOFFMANN diss. de modo hist. morbor. recte consignandi. Hal. 1721. — DETHARDING hist. morbor. conscrib. fida methodus. Rost. 1734. — ROSEN diss. de hist. morbor. conscribendis. — J. P. FRANK de circumscribendis morborum historiis v. delect. opuscul. medicor. Vol. X.

17) Stomachor historiam morbi perlegendo, quae e. c. incipit: „optimo somno fruebar, quum noctu a famulo meo derepente excitabar, ut sub tempestate tristissima, viis a pluviis pessimis redditis, aegrum divitem, uxoris meae avunculum, adirem. Surrexi hinc, vestes citissime indui, currui me commisi etc.“

18) Cur scribere? alvum aeger hodie non deposuit, *quoniam* desiderio ciborum destitutus, alimenta recusavit. Nonne potius scribendum fuisset, cibi recusantur, alvus clausa?

19) Quoties in clinicis meis occupationibus observabam, alumnum in morbi historia conscribenda, potius propriae gloriae fuisse petitem, quam modestum narratorem, toties a laude consulto abstinui. Porro discipulos, qui dumtaxat historias illorum aegrorum, quorum curam peculiarem habebant, conscribere erant soliti, reliquas vero negligebant, torvis oculis spectando, ad majorem excitabam diligentiam.

sunt, etiamsi enim rudia videantur, verum tamen morborum idioma sistunt. Regiones corporis humani affectae terminate indicari debent²⁰). Quodsi symptoma, alias in quodam morbo commune (puta sitim vigente febre), peculiari aliquo in casu deficiat; illius absentiae mentio instituenda. Symptomata, quae facilius cernuntur quam describuntur, (non excepta quibusdam in morbis peculiari aegrorum physiognomia²¹)), tabulis delineatis, pictis, aeri aut lapidibus incisis, illustrentur oportet²²). Diarium morbi eadem ratione eademque diligentia, ac initium historiae, continuandum est²³).

§. XIV.

20) Hoc sub respectu commendari meretur A. C. BOCKII opusculum: *Die Eintheilung und die Regionen d. menschlichen Körpers. Leipzig 1824.*

21) Quaevis schola medico-practica museo pathologico-physiognomico instructa esse deberet.

22) HEBENSTREIT diss. de pathologia artis pictoriae plasticisque auxilio illustranda. Lips. 1801.

23) Pars conspicua historiarum morborum, quae in clinicis institutis colligitur, ob id quod *diaria* discipulis conscribenda relictæ sunt, adeo imperfecta est, ut vix in usum deduci possit. Qua de caussa statui ut in clinico instituto Vilmensi, quotidie diarium diei antecedentis, ab alumno aegrotum curante, publice perlegeretur, utque mutatis mutandis in librum, uniusque lecto annexum inscriberetur. Discipulis testimonium diligentiae non aliter impertiebatur, quam praevio examine, num historiae morbi cum epicrisi libris, quo decet modo, traditæ fuerint. Hujusmodi

§. XIV.

Quomodo anatomia pathologica excolenda sit.

Anat. pa-
tholog.
utilitas.

1. Morborum phaenomena in cadaveribus quoque prosequi oportet. Est enim *anatomia pathologica* unum ex potissimis medicinae fulcris, quod jam dudum PEYERUS¹⁾, F. HOFFMANNUS²⁾, BOERHAAVIUS³⁾ (ne dicamus de J. B. MORGAGNIO⁴⁾, legitimo hujus scientiae fundatore) intellexerunt, et FR. NASSE nuper pulcherrime demonstravit⁵⁾. Praeterquam quod anatomia patholo-

libri id quoque commodi habent, ut professor ad finem anni scolastici historias morborum a discipulis suis, ut ita dicam, mendicare non sit coactus.

1) Medic. hist. anat. medica. cap. 4. „Bonum esse, ait, omni aegritudinum genere defunctorum cadavera, quorum haberi copia potest, dissecari atque describi.“

2) Proem. ad dissertat. de pancreatis morbis. „Optandum fore, inquit, ut cadaverum, quocunque etiam morbo perierint, sectiones essent frequentiores.“

3) Method. studii medici. Part. 14. Statuit „omnium optimum inter eos, qui observaverunt ea quae in vita contingunt, fuisse Hippocratem; sed qui examinaverunt cadavera post mortem *hos optime de arte meruisse.*“

4) De sedibus et caus. morbor. Lib. IV. ad Screiberum; „nulla autem est alia, inquit, pro certo noscendi via, nisi quam plurimas et morborum, et dissectionum historias, tum aliorum, tum proprias, collectas habere et inter se comparare.“

5) *Leichenöffnungen zur Diagnostik und pathologischen Anatomie. Erste Reihe. Bonn 1821. 8.*

thologica iis dumtaxat hominibus, qui totius scientiae fundamento, videlicet anatomia corporis humani, gaudent, aditum ad res medicas concedit, illos vero vanos et effeminatos homunculos, qui libenter quidem in artis exercitio ex uno ad alterum gynaecium volitarent, ast sese aegre studiis seriis submitterent, excludit; nil magis illâ idoneum ad temperandam medicorum imaginationem, ad praepediendas hypotheses et ad arcendum imperium systematum. Porro medicus anatomiae pathologicae ope facultatem acquirit sibi veras de morborum sede et forma imagines formandi, corpus aegroti, ac si diaphanum esset, saepe perspiciendi, limites therapiae determinandi, ideoque in morbis conclamatis inanes artis conatus (quibus aegri haud raro magis quam ipso a morbo excruciantur) arcendi et in reliquis stupendas interdum curationes impetrandi. In ea adeo versamur opinione, principatum medicinae aevi nostri, unice notionibus ex anatomia pathologica pullulantibus, adscribendum esse. Interea ne quid nimis! Qui enim contendunt totum medicinae aedificium anatomiae pathologicae superstrui posse ⁶⁾, hi sane obliti sunt, exstare morbos, qui in cadaveribus nulla plane vestigia evidentia relinquunt. Nec morborum reliquiae dum-

6) „La véritable médecine n'est en effet que de l'anatomie pathologique.“ BRESCHET in dictionnaire de médecine. T. 2. p. 216.

dumtaxat in partibus corporis humani solidis (circa quas anatomia pathologica caeteris exceptis, versatur) quaeri debent! Quodsi tandem de *ab-
usu* hujus scientiae loqui vellemus (praeter neglectum cautelarum de quibus infra), praecipue animadvertendum foret, illum efficere ut medici continuo de vitiis organicis somnient, utque illorum praesentiam toties praepostere admittant, quoties illis morbus plus solito rebellis obvenit, quo semet ipsos et alios turpiter fallunt⁷⁾.

Obstacula. 2. Quum anatomia pathologica unum ex potissimis praxeos medicae adminiculis sit; progressus hujus scientiae neutiquam illas inter gentes expectamus, apud quas aut religionis praecepta, aut opiniones praeconceptae⁸⁾ sectionibus cadaverum invincibiliter obstant. Invincibiliter, inquam, nam obstacula huc spectantia, a medicis scientiam cum amore excolentibus, saepe licito, id est, quin crimen sepulcra profanandi committatur, vinci possunt. Apud homines alto loco natos et opulentos, actus cadavera pollingendi⁹⁾, occasiones ad observationes anatomico-patho-

7) Cfr. S. G. VOGEL (*allgem. med. diagnostische Untersuchungen* p. 46.) de dysphagia narrat, quae pro effectu vitii organici in oesophago habebatur, ac dein herbae scabiosae ope citra omnem expectationem sanata est.

8) Lege de hoc argumento: *anthropology or dissertations on Man, philosophical, physiological and political*. By J. JURROLD. 1809.

9) SEBEZIUS diss. de conditura s. balsamatione cada-

pathologicas instituendas, largitur. Hominibus scientia gravibus et misericordiae laude conspicuis probatur, cadaveris sectione, tum convictio quod aeger salvari haud potuerit, tum emolumentum pro miseris similibus morbis laborantibus¹⁰⁾, obtineri. Multum porro valere solet argumentum, quod cadavera parentum et affinium secundo lustrata, plurimum ad morbos, qui jure haereditario in superstites ejusdem familiae trans-eunt, propius cognoscendos, contribuant. Nil vero magis populum pro admittendis cadaverum sectionibus disponit, quam decentia in illis absolvendis, ne scilicet tale opus lanionum aut anthropophagorum more suscipiatur,

3. Praecepta optima sectiones cadaverum pa- Praecepta. tholo-

verum. Argentor. 1649. — GUYBERT ars condendi corpora mortua. Paris. 1649. — CLAUDERUS method. balsamandi corpora humana. Altenb. 1679. — VATER progr. de balsamatione cadaver. Witteb. 1693. — VESTI diss. de pollinctura. Erf. 1695. — LANZONI de balsam. cadav. Genev. 1696. — BLANCARD *neue Manier mit wenigen Unkosten zu balsamiren*. Hannov. 1705. — BERGEN de conditura mortuorum. Francoft. a. V. 1712. — KRATZENSTEIN progr. de pollinctura. Hafn. 1772. — SPRENGEL op. c. 1. Th. p. 60. — C. NEICHEL diss. sistens pollincturam cadaverum humanorum, juxta antiquos et recentes. Pestini 1821.
10) „Indignum puto, ait WEPFER, hominum commodo invidere, quod vermibus denegari non potest.“ (SCHLACHER panegy. medic.).

thologicas instituendi verbo necroscopiae¹¹⁾ indulgendi C. BELL¹²⁾, A. OECHY¹³⁾ et SHAW¹⁴⁾ tradiderunt. Maxime vero hîc innata dexteritas atque exercitium in rebus anatomicis prosunt. Juvat praeterea regularum pro sectionibus cadaverum forensibus traditarum¹⁵⁾ memores esse.

Pars

11) Α νεκρός cadaver et σκοπέω examino.

12) *Zergliederung des menschl. Körpers zum Behufe der Kenntnisse seiner Theile, ihrer Zergliederungsmethode u. ihrer krankhaften Veränderungen. A. d. E. Leipzig 1800.*

13) *Anweisung zu zweckmässigen u. zierlichen Leichenöffnungen u. Untersuchungen. Prag 1802.*

14) *Anleitung zur Anatomie, nebst deren Anwendung auf Pathologie u. Chirurgie. A. d. E. nach der 3. Ausgabe. Weimar 1823.*

15) C. G. BÜTTNER *Unterricht, wie man sich vor, in u. nach legalen Besichtigungen todter Körper zu verhalten habe. Königsb. 1776. 2. Aufl. — J. K. H. ACKERMANN tabell. Uebersicht bey gesetzmäss. Leichenöffnungen. Leipz. 1800. TH. G. A. ROOSE Taschenbuch . . . bey gesetzmäss. Leichenöffnungen. 5te Ausg. mit Zusatz. von K. HIMLY. Frankf. a. M. 1819. — L. A. KRAUS tabell. Anleit. zu gerichtl. Leichen-Untersuch. Braunschweig 1804. — Anat. pathol. Anweis. . . . legale Leichenöffnungen zu verrichten. Stendal 1804. — G. H. CP. CRUSIUS vollständ. Anweisung zu gerichtl. Leichen-Untersuch. Gött. 1806. — GF. FLEISCHMANN Anleit. zur forens. u. polizeyl. Untersuch. der Menschen- u. Thierleichname. Erlang. 1811. — A. K. HESSELBACH vollständ. Anleit. zu gesetzmäss. Leichenöffnungen. Gießen. 2. Aufl. 1819. — CH. F. L. WILDBERG Anweisung zu gerichtl. Zergliederungen, Berlin 1817. — F.*

Pars, in qua sedem esse morbi suspicamur, primum inquirenda est: deinde ad organa cum parte affecta maximum consensum habentia procedendum, e. c. laborante hepate ad cerebrum et vice versa. Quamvis caussa mortis quadam in parte detecta videatur, nihilominus examen reliquarum continuari debet. Examen autem non solum ad cavitates encephali, specus vertebralis, pectoris, abdominis et pelvis circumscribendum est: oportet enim quoque curriculum arteriarum, venarum, vasorum lymphaticorum et nervorum prosequi: idque in superficie harum partium tam externa quam interna. Partes morbosae cum annexis extrahendae et in museis pathologicis conservandae sunt¹⁶⁾. Quae inter illas maxime memorabiles cernuntur, delineandae, pingendae¹⁷⁾, aeri et lapidibus incidendae, vel cera effingendae.

4. Summa vero difficultas in determinando partium dissectionum statu morbo et in construenda inde epicrisi consistit, quod argumen-

Monita et
cautelae.

L 2

tum

A. RITGEN *Handb. bey gesetzmäss. Leichenöffnungen.*
Giesen 1819.

16) C. H. DZONDI de colligendo, conservando, disponendo et incipiendo museo anatomico-pathologico.
Hal. 1825.

17) Non puduit pictores celeberrimos, uti TIZIANO, LEONARDO DA VINCI, MICHEL ANGIOLO BUONAROTTI etc. rebus anatomicis operam navare. Vide SPRENGEL *Op. c.* 3. Th. p. 511.

tum CRELLIUS¹⁸⁾, GIANELLA¹⁹⁾, J. F. ISENFLAMM²⁰⁾, E. SANDIFORT²¹⁾, SCHINZ²²⁾, LOBSTEIN²³⁾, J. F. E. LADEVÈZE²⁴⁾, S. G. VOGEL²⁵⁾ et L. MARTINET²⁶⁾ perbelle illustrarunt. Res omnium maxima est, ut nos ad sectionem cadaveris, sine praeconcepta opinione accingamus, utque de phaenomenis observatis cum fide rationem reddamus. Utrumque a sectatoribus systematicum vix aut ne vix quidem expectari potest. Cavendum praeterea, ne phaenomena, quae putredi-

18) Diss. observationes in partibus morbidis factas, ad illustrandam corporis sani oeconomiam temere non esse applicandas. Witeb. 1737.

19) Oratio, non tuto semper ex cadaverum sectione colligi posse morborum causas.

20) De difficili in observationibus anatomicis epicrisi. Erlang. 1771.

21) Oratio de circumspecto cadaverum examine optimo practicae medicae adminiculo. Lugd. Bat. 1772.

22) De cauto sectionum cadaverum usu ad dijudicandas morborum causas. Gottingae 1786.

23) *Vues générales sur l'anatomie pathologique (Journal complémentaire du dictionnaire des sciences médicales. T. II.)*.

24) *Mémoire sur la question: déterminer l'influence de l'anatomie pathologique sur les progrès de la médecine en général et en particulier sur le diagnostic et le traitement des maladies internes (Ibid. T. XIV. XV.)*.

25) Op. c. I. Kap.

26) *Manuel de clinique, ou des méthodes d'exploration en médecine et des signes diagnostiques des maladies, contenant un précis d'anatomie patholog. Paris 1825.*

tredini²⁷⁾, peculiari cadaveris positioni aliisque rerum circumstantiis accidentalibus adscribenda sunt, pro effectibus morbi habeantur; qua de caussa morem, temporis spatium, quod obitum inter et sectionem cadaveris locum obtinuit, in historiis anatomico-pathologicis, indicandi, laudamus. Sicuti in morbis nulla dantur symptomata pathognomonica, ita etiam in cadaveribus nulla dantur signa, quae per se et speciatim sumta, certam et determinatam conditionem morbosam indicarent. Maxime ambiguum est iudicium, quod ex partium demortuarum *colore* fertur. Sic valdopere ille erraret, qui ob solum *ruborem* superficiei visceris cujusdam, praesentiam inflammationis determinaret; docet enim experientia, omnes cadaverum partes, quae (ut maxime in aetate infantili contingit²⁸⁾) cruore abundant et accessui aeris diutius exponuntur, rubedinem acquirere. Contra partes vigente vita coccineae, ea cessante interdum pallent, quod plus vice simplici in cute e scarlatina et erysipelate defunctorum conspeximus. *Nigredo*, praeter gangraenam, ecchymoses comitatur. Nil porro
magis

27) Cfr. *Osservazioni sui cangiamenti cui soggiace il corpo animale ne' climi caldi dopo la morte*, di GIO. DAVY in *Annali di medicina d'Omoei*. Vol. 26. p. 118.

28) Qui adsuetus non est cadavera infantum secare, ubique inflammationis inveniet vestigia. Vasa enim hic longe magis quam in adultis patula sunt, unde partium rubor.

magis in modum, quo sanguis post mortem distributus invenitur, influit, quam agonia plus minus protracta²⁹). Ex hoc quoque fonte, copia major minorve liquoris, in varias corporis humani cavitates extravasati, pullulare solet; qua de caussa praesentia *hydropis acuti* non praepostere admitenda est. Nec illa *abscessus* statui debet, priusquam comprobatum sit, materiam puri similem non ex superficie viscerum, sed jactura substantiae ortum trahere. In *exulcerationibus* admitendis, memores esse juvat, membranas internas cadaverum non aliter quam tegumenta illorum externa, sine ulla praevia inflammatione, loca erosa et epidermide spoliata exhibere, inprimis post morbos a venenis narcoticis et a contagiis. Inter *volumen viscerum capacitatemque cavitarum*, tanta animadvertitur differentia variis in hominibus, caeterum sanissimis, quanta relate ad illorum nasos et ora; quamobrem de hypertrophia et atrophia, deque amplitudine et angustia partium morborum, cautissime judicandum est. Idem de determinanda *duritie et mollitie* viscerum, objecto admodum relativo, valet. Porro partibus cadaverum, a praegresso morbo laesis, nomina e comparatione cum aliis rebus petita (e. c. materia cerebriiformis, encephaloidea etc.) nonnisi

29) DAVID WILLIAMS *on the state of arteries after death* in THOMSONS *annales of philosophy*. 1823. Septembr.

nonnisi caute imponenda sunt atque cogitandum, MORGAGNIUM aliosque summos viros, sine istis potius ab imaginatione quam a iudicio suggestis vocabulis, anatomiam pathologicam graphice pertractasse. Errant tandem qui dumtaxat cadavera post morbos raros secant, alia autem cum contemptu pretereunt³⁰⁾. Caeterum in utrisque dijudicandis semper morborum praegressorum historiae in memoriam revocandae sunt; illis enim ignoratis, sectio cadaveris parvi admodum momenti evadit. Debent etiam phaenomena in cadaveribus reperta, quae ad ultimum morbum spectant, ab illis phaenomenis, quae antiquiorum morborum sunt effectus, distingui.

§. XV.

Quomodo aetiologia excolenda sit.

1. Labor injucundus passiones hominum ob-
servandi, illorumque cadavera secandi, compen-
sationem amplam in investigatione caussarum,
quae

Doctrinae
momen-
tum.

30) HALLERUS majus pretium in observationibus vulgatorum morborum, quam illorum qui raro occurrunt, quaerit (Praefat. ad opuscula pathologica). „Observationes enim rarae, ait, quod admirationem movent, eo ipso minus utiles sunt“ (ad Boerhaavii med. stud. medic. part. 9.). Atque MORGAGNI: „Tam patet, igitur, maxime communium morborum observationes longe esse utiliores, quam rariorum“ (de sed. et caus. morbor. Lib. IV. Epist. ad Schreibernum).

quae morbis ansam porrigunt, nanscicitur. *Aetiologia* enim, quippe nexum arctissimum cum historia naturali, physica, metaphysica, legislatione aliisque doctrinis moralibus alens; medicorum ingenio campum vastum aequae ac amoenum aperit, quem illi praesertim excolere sciunt, qui non solum multas orbis terrarum partes permigrarunt, sed etiam diu varios inter populos praxin exercuerunt¹⁾. Ast in nullo medicinae ramo excolendo, logica magis necessaria est, quam in aetiologia. Oportet enim aequae alienos nos esse a credulitate, quam ab incredulitate. „Veritatis studiosus, inquit GALENUS, omne debet, quod conspicit, etiamsi eum angat causa, sedulo exponere“²⁾ et neutiquam ad illos spectare, „qui rerum, quae manifeste videntur, causam reddere nequeunt, eas esse, omnino negant“³⁾. Labor, caussis morborum eruendis impensus, raro lucro caret, quod MORGAGNIUS perbelle intexuerat, ubi ait: „Ars certe tanto longius aberit a facultate bene curandi, quanto pauciores cognoverit

1) „Verum juvat quidem artis studiosos diversas mundi plagas, in libris ac tabulis perlustrare, longe tamen utilius esse duco easdem sedulo peragraré summorum virorum exemplo, DEMOCRITI nimirum, HERODOTI, PLATONIS, PYTHAGORAE, ac praesertim medicinae principum, HIPPOCRATIS et GALENI.“ LANCISIUS l. c.

2) De locis affectis. Lib. V. c. 2.

3) De caus. puls. Lib. II. c. 13.

verit differentiarum caussas, et caussarum notas. Contra vero propius, quoad ejus fieri potest, accedet, si noverit plures⁴⁾.

2. Morborum caussas dum ad aegrorum le- Caussar.
examen.
ctos inquiris, cave quaestiones instar magistri disciplinae publicae instituas, aut hominis, rerum, quas alii agunt, curiosi, speciem praebens, aut aegrotum, novas illi curas suggerendo, angas⁵⁾. Ubi symptomata morbi caussas sponte indicant, ipse medicus illas aegroto proponere potest: sic enim quammaxime illius obtinetur fiducia. Generatim tutissima examinis aetiologici via ea est, ut res, quae morbis ansam porrexerunt, ope placidi colloquii, sensim sensimque eruantur. Apud aegrotos, qui fari nequeunt (et apud permultos alios), notiones circa morborum caussas optime a parentibus, amicis (inimicis), ac famulis (ne dicamus de vulgi garritu) accipiuntur.

3. Historiae morbi pars, aetiologiam respi- Causs. de-
scriptio.
ciens, alteram, quae ad symptomata spectat, pro re nata, modo antecedit, modo sequatur oportet. Maxime vero interest ut cunctae rerum positiones, quae in corpus humanum tam ante morbum, quam sub illius decursu, imperium exer-

4) De sed. et caus. morbor. Lib. IV. Introduct.

5) e. c. dum medicus adtentionem aegrorum ad vitia haereditaria dirigit, sicque illis timorem maniae, phthiseos, canceri etc. incutit.

exercere potuerunt, candide et sine fuko, nulla-
que addita interpretatione, enarrentur. Quodsi
inter illas quaedam foret, quae aut aegroto aut
aliis injuriam inferre posset; praestat medicum
adnotare se tantum relata referre.

Causs.
praedispo-
nentes.

4. *Caussas morborum praedisponentes* ad
trutinam vocanti respiciendum est: A) ad *aegroti
patriam*, quatenus in ea forte malum endemicum,
rationem morbi continens, grassatur⁶⁾; B) ad
dispositionem haereditariam, quae efficit, ut
morbi modo a parentibus ad prolem descendant;
modo ab avis ad nepotes, filiis veluti per saltum
parcendo, transeant; modo sexum alium prae
alio, aut determinatum vitae periodum sibi eli-
gant; modo spontaneam evolutionem habeant;
modo accessionem caussarum occasionalium ex-
spectent; et modo, stirpes permiscendo, eva-
nescant; C) ad *labem congenitam*, quam proles,
etiamsi a parentibus sanis orta, acquirit ob res
vel actum conceptionis circumdantes, e. c. ebrie-
tas, terror, aversatio aut effrenis libido conju-
gum; vel in evolutionem embryonis agentes, e.
c. animi pathemata⁷⁾, imaginatio, violentiae
exter-

6) Permultos novi Polonos, qui ob morbos rebelles,
quibus laborabant, medicos totius fere Europae in
auxilium vocarunt, idque incassum, donec tandem in
patriam reduces, trichoma (de quo nullus medicorum
extraneorum cogitaverat) in conspectum veniret.

7) Me non solum non pudet, *naevis maternis* debitos in-
tra limites fidem tribuere, sed in ea quoque versor

externae, morbi febriles, chronici matris gravidae; vel partum circumdantes, e. c. immaturitas recens nati, gemelli, difficulter in lucem editi; D) ad *idiosyncrasiam* qua fit, ut res, vulgo hominum innocuae, nocivae evadant; E) ad *habitus corporis*, cujus quivis, nec athletico excepto, peculiaria morborum germina continere solet; F) ad *temperamenta*, in quibus definiendis antiquissimum morem sequimur; G) ad *aetatem*⁸⁾. Atque primum se exhibet *infantia*, quae vitae filo, non minus imbecilli, alligata est, quam fructus immaturi pedunculis tenuibus adhaerent, ideoque (inprimis accedentibus prava nutrice, cura incongrua, primaque dentitione) ad recipienda omnium injuriarum genera dispositionum agnoscit. Sequitur *pueritia*, quae, quamvis firmior, attamen aegre fert defectum aëris liberi, vitam sedentariam, studia praecocia et animi pathemata, atque maxime idonea est tum ad recipienda plurima contagia, tum ad fovendos vermes. Accedit *pubertas*, quae, tam ob rapidum corporis incrementum, quam ob evolutionem partium genitalium, novas malorum portas, praesertim inter urbium incolas, aperit. *Aetas quidem*

suspicione, illos, sicuti in superficie externa corporis, ita etiam in interna locum invenire.

8) De *annorum climactericorum* in corpus humanum imperio, quippe omni fundamento destituto, non loquor.

dem virilis facultate caussis morborum obstandi, quammaxime fruitur; ast naturae istud donum, saepe a societatis, praesertim semi-disciplinatae⁹⁾ vinculis frustratur. Senium consuetudinis legibus gubernatur, quarum nulla impune laedi potest: praeterea illud proximae destructionis germen includit; H) ad sexum praecipue sequiorem, cujus functiones peculiare, praeterquam per se speciem morbi exhibeant, aliis adhuc caussis morborum extrinsecis aditum concedunt; I) ad conditionem et opificium, „varia enim hominum opificia non tantum ad varios saepe morbos praedisponunt, quatenus diversa organa corporis sub diverso labore exercent, aut adficient; sed et caussas morborum ipsas occasionales multiplices offerunt;“ K) ad peculiarem positionem domesticam et connexiones; L) ad morbos praegressos utpote qui praedispositionem novas ad aegritudines aut relinquunt (febres intermittentes, inflammationes, haemorrhagiae), aut tollunt (variolae, morbilli, scarlatina) et M) ad constitutionem annuam seu epidemicam.

CAUSS. EX-
CITANTES.

5. *Caussas morborum excitantes perscrutanti ratio habenda est: A) Atmosphaerae. Quamvis enim meteorologia hucusque fructus, qui expectari potuissent, medicinae minime attulit, ita ut*

9) Nil magis sanitati civium adversum est, quam conditio illa reipublicae, quae medium tenet inter statum naturae illumque exquisitae culturae.

ut constitutionis annuae et epidemicae in corpus humanum imperium explicari vix possit; attamen de feliciori in posterum eventu minime desperandum ac interea aëris atmosphaerici pondus, puritas, temperatura, motus, humiditas et electricitas, deductis in auxilium barometro, eudiometro, thermometro, anemometro, hygrometro et electrometro, probe determinanda est. B) *Siderum*. Evitando nempe astrologorum exemplum, utpote qui cuivis astrorum in peculiarem corporis nostri partem influxum adscripserunt, atque ex cometarum apparitione pestem praesagierunt, et oppositus error, quo vis, quae ab aequinoctiis, solstitiis, et phasium lunae in genus humanum exercetur, negari, et non solum astronomiae elementaris studium, sed et simplex calendariorum consideratio a medicis negligi solet, fugiatur oportet. C) *Telluris*. Absit, ut rhabdomantiae, seu metallorum et aquarum, quae in terrae visceribus latitant, per baculum divinationi subscribamus; absit vero similes, ut, quatenus magnetismi et electricitatis memores, illorum in corpus humanum effectus omnino negemus. Examini autem rerum reconditarum illud obviarum praecedat, oportet. Loquimur de indagatone, quid in morbis excitandis valeant solum, montes, valles, sylvae, campi, horti; mare, flumina, rivi, lacus, piscinae, paludes, aquaeductus, fontes et putei. D) *Vegetabilium*. Praeter

ter generalem nempe regni vegetabilis considerationem et alimenta ex illo petita; plantae singillatim tum ob venenum, quod includunt, tum ob aroma, quod exhalant, tum ob acredinem, quam possident, respectu pathologico ad trutinam vocandae sunt. E) *Animalium* et quidem tum propter alimenta et vestes quae ab illis petuntur; tum propter morbos qui ex animalibus domesticis ad genus humanum propagantur; tumque propter insidias, quas illi insecta, vermes et serpentes struunt. F) *Domiciliorum*, inprimis quatenus aut recenter constructa et calce obducta, aut alio pacto humida, aut accessu aëris et lucis destituta, aut in urbibus constituta sunt, maxime si hae fuerint conspicuae, domibus altissimis, plateis angustis instructae; incolis numerosissimis, nosocomiis, castris, fabricis, refertae; coemeteriis, macellis, stabulis neglectis, et latrinis difficulter removendis, inquinatae. G) *Aedificiorum publicorum*, videlicet ecclesiarum, curiarum, scholarum, theatrorumque, incolarum numero haud accommodatorum, aut alio modo nocuorum. H) *Institutorum beneficorum*, praeprimis nosodochiorum, orphanotropheorum, hospitiorum infantum expositorum, quae, nisi rite omnino disciplinata sint, potius malefica evadunt. I) *Domuum recludendis hominibus, criminum aut convictis aut de iisdem suspectis atque debitoribus dicatarum*, carcerum videlicet et ergastulorum, multo-

multorum morborum veluti emporiorum. K) *Navium*, quatenus aut incongrue constructae, aut male disciplinatae nautis, aut merces, contagio infectas, importando, reipublicae infensae sunt. L) *Peregrinatorum*, maxime erronum, per terras vagantium et emigrantium, quippe qui multorum morborum, interdum antehac minime notorum, semina adferre solent. M) *Delectamentorum publicorum*, ut bacchanalium, larvarum, chorearum, tragoediarum, illuminationum, ignium artificiosorum; ambulationum per funem, cursum tum equestrium tum per aërem quorum sub curriculo millenorum morborum caussae praesto sunt. N) *Encaeniarum templorum, mercatum, cauponarum*, quae propagationi aegritudinum popularium saepe ansam praebent. O) *Calamitatum publicarum*, quae ut docent bella, seditiones, incendia, inundationes, terraemotus, eruptiones montium ignivomorum, tempestates cum tonitru, rei frumentariae inopia, longe lateque civium valetudinem pessumdant. P) *Esculentorum*, quo sub respectu sese exhibent primum *carnes* ab animalibus, morbis contagiosis correptis, desumptae, putrescentes, salitae, fumo induratae; porro *pisces* morbis epidemicis correpti, ope rerum narcoticarum capti, ex aquis praesertim a maceratione cannabis inquinatis tracti, corrupti, sale conditi; *mytili, ostreae, cancri*; denique panis vel e secali aut cornuto, aut ustilagine aut rubigine

gine corrupto, vel e farina malae indolis, res alienas, ut calcem, semina venefica, continente, confectus; tandem solanum tuberosum, zea mays, oryza sativa, avena, hordeum, castaneae, fungi, fructus horaei, dum aut immaturi, aut insectis inquinati, aut alio demum modo depravati sunt.

Q) *Potulentorum*, tum simplicium tum fermentatorum, modos ad memoriam revocando, quibus vinum, crematum, hydromel, cerevisia, thea, coffea, cioccolata inquinari et adulterari possunt.

R) *Condimentorum*, praecipue salis culinaris, sacchari, sinapis, aromatum, quorum interdum defectus, longe autem saepius abusus morbos provocat.

S) *Excretionum*: licet enim illae sudoris, ceruminis aurium, lacrymarum, salivae, bilis, succi pancreatici, alvi, urinae, seminis, menstruorum, lochiorum, lactis, nec non haemorrhoides, fonticuli aliaeque evacuationes habituales dum a norma consueta deflectunt, ut plurimum culpam in morbo jam praesente agnoscant, nil tamen impedit, quominus copia excedendo vel deficiendo, aut qualitate peccando, rursus noceant; novaque symptomata excitent.

T) *Vestium et ornatus*, quae quoties aut corpus humanum plus aut minus, quam par est, obtegunt, aut illud adstringendo functionum libero exercitio obstant, toties morbis viam sternunt.

U) *Motus et quietis*. Quamvis enim in ea semper versati simus opinione, pathologos doctrinae

mecha-

mechanicae addictos, effectus salutes motus illosque perniciosos quietis corporis humani nimis jactasse, et quamvis nationes orientales decumbendo et sedendo vitam incolumen transigere videamus, attamen libenter concedimus, inertiam aequae ac motum, dum aut limites excedunt, aut consuetudini adversantur, aut sese invicem nimis cito sequuntur, morbis ortum praebere.

V) *Somni et vigiliarum* inprimis si debita illi inter et has ratio desideretur, sique noctes vigilando, diesque dormiendo transigantur. W) *Mentis intentionis*, potissimum dum imaginatio plus, quam iudicium intenditur, dumque lucubrationes illico post pastum et ultra debitum tempus locum obtinent. X) *Pathematum* ita ut, si dicere liceat, animae pulsum tangendo, effectus gaudii, superbiae, invidiae, irae, amoris, zelotypiae, pudoris, taedii, moeroris, nostalgiae, morsus conscientiae, desperationis, timoris, terrorisque palam fiant. Y) *Nisus imitandi*, quo saepe homo in morbum, quem in aliis adspicit, ipse conicitur. Z) *Voluptatum et dolorum*, quibus corpus humanum diu resistere nequit. AA) *Morum*, qui vix unquam sine sanitatis jactura, ocyus serius observanda, laeduntur. BB) *Consuetudinis* nicotianae fumum sugendi, illius pulverem naribus attrahendi, aut folia masticandi. CC) *Opinionum praconceptarum*, quarum culpa serae ineptiae homines interdum ita angunt, ut gravissimi inde generentur morbi. DD) *Religionum*.

Atque hîc fateamur oportet, non solum Religio-
nem Christianam, sed et Mosaicam et Muhamme-
danam (nobis quippe praxin diu inter Judaeos
et Tartaros exercentibus probe notas) ita consti-
tutas esse, ut morbos multo magis arceant, quam
provocent, quamobrem caussae morborum potius
in neglectione et abusu religionum quam in illa-
rum praeceptis, quaerendae sunt. EE) *Legum*,
in quibus respectu medico dijudicandis, nun-
quam obliviscendum, homines dum in societatem
convenerunt civicam, nonnullis status naturalis
beneficiis valedicere debuisse, quorum defectum,
si medicus, rem ab una dumtaxat parte perpen-
dens, alte accusare vellet, reipublicae fundamenti
subversor atque malorum longe majorum, quam
eradicare proposuerat, auctor evaderet. FF) *Mu-
nerum et officiorum*, quorum unum quodvis pe-
culiâres morborum caussas includit; ad quas ex-
actissime eruendas, opus est, ut medicus am-
plam qua fruitur occasionem, modum vivendi
eorundem civium quot quot sunt classes obser-
vandi, opificumque et artificum officinas visitandi
non negligat. GG) *Contagiorum et miasmatum*,
quarum facultatum occultarum praesentia, sicuti,
dum caussae obviae de morbi origine abunde
testantur, nunquam admitti debet; ita nunquam,
in casu contrario, neganda est. Pro contagio
praesertim loquuntur morbi peculiaris forma, de-
terminatusque decursus, nec non illius in via,
quam

quam aut aegrotus, aut illius vestes et supellex, aut merces epistolaeque suspectae legerunt, propagatio. HH) *Venenorum*, quorum late extenditur imperium, quod palam fit, respiciendo ad opifices venena ex officio pertractantes, ad interfectores sui aliosque homicidas, ad casus fortuitos (praecipue culpâ pharmacopolarum), ad ollas et dolia. II) *Auxiliorum therapeuticorum*. Fateri enim adigimur, causas morborum excitantes saepe iis ipsis in rebus, quae scopo medendi adhibentur, quaerendas esse; quamobrem aegrotos, qui jam pharmaca, aquas minerales etc. adhibuerunt, dijudicanti, cavendum, ne, quod illis auxiliis tribuendum est, morbo adscribatur. Potest quidem morbus artificialis ad graviora mala abigenda, interdum consulto excitari; ast in genere, arma, morbis dicata, contra aegros dirigere, mala malis addere, sicque miseras generis humani adaugere, imperitiae, levitati, audaciae et stultitiae tribuendum est. KK) *Violentiarumque*, rerum videlicet, quae corpori humano, aut extus aut intus, modo sive mechanico, sive chemico, sive mixto vim inferunt. Haec, amici, aetiologiae pars est, cui, in morbis abstrusis, maxime insudandum¹⁰⁾.

M 2

6. Ex-

10) VATER diss. qua, quid in judicio et prognosi de morbis magnis ex parvis initiis observari debet, exemplo viri antegresso lapsu in genu lenta febre extincti docetur. Witteb. 1744.

Caussae
proximae.

6. Examinatis omnibus rerum positionibus, quae morbis ansam praebere valent, desiderium ulterius progrediendi, atque *morborum essentiam*, seu *causam proximam* eruendi, sese obtrudit. Ast, jam non plus ultra¹¹⁾. Est enim indagatio essentiae maximae partis morborum objectum, quod, quippe profundius quam oculo humano cerni possit, latens¹²⁾; limites mentis nostrae plane excedit¹³⁾. Cuncta saltem conamina, quae a remotissimis temporibus ad praesens aevum usque in caussis proximis febrium, inflammationum, exanthematum etc. eruendis locum obtinuerunt, nil nisi mera figmenta meraque somnia exhibent. Figmenta et somnia hujuscemodi, novitatis praestigiis adornata, imaginationi adulantur, aucto-

11) „Praestat in morborum caussis indagandis progredi tantum, quousque per fidelia observata, et cognitam humani corporis fabricam licet; et in reliquis ignorantiam fateri, quam fictis hypothesibus quantum libet etiam ingeniosis ludere.“ SWIETEN comm. in Boerhaave. T. III. P. I. §. 755. — Jam HIPPOCRATES edixerat (aph. I. No. 16.): „Certitudinem non reperiri aliam, quam corporis sensu.“

12) HIPPOCRATES jam docuit (aph. I. No. 16.): „certitudinem exactam non reperiri aliam, quam *corporis sensum*.“

13) „*Ins Inn're der Natur*

*Dringt kein erschaff'ner Geist,
Genug, wenn sie uns nur
Die äuss're Schaale weist.*“

HALLER.

auctoribusque famam conciliant; quam primum vero obsolescunt, nauseam movent atque medicorum opera, etiamsi caeterum egregia, defoedant. Praeterea hypotheses, de quibus quaestio est, controversiis fine carentibus, et, quod maxime dolendum, rationibus medendi, raro experientiae consonis, originem praebent. Eruntne igitur illae prorsus ignorandae? Minime! Primum enim ut historice notae sint, medicum decet. Porro viri prudentis est, nil, quod prius non noverat, damnare. Quodsi quis quaereret, quo pacto morbi, quin illorum essentia indagetur, cognosci possint; talis problematis solutionem ad sequentem paragraphum remittimus.

§. XVI.

Quomodo diagnosis excolenda sit.

1. *Diagnosis* iudicium de morborum *forma*, Doctr. K-
sede et indole amplectitur. mites.

2. *Diagnosis formae* a symptomatibus de- Diagn.
sumitur. Plerumque illorum syndrome ad mor- formae.
bum constituendum requiritur. Alias unicum
dumtaxat symptoma pro morbo valet. Phaeno-
mena vero, quae aut coacervatim aut singillatim
pro morbis definiuntur (e. c. diarrhoea, icterus,
ascites), re ipsa nil aliud sunt, quam morborum
effectus (e. c. status inflammatorii intestinorum,
calculi biliosi, scirrhi mesenterii). Placuit itaque
scriptoribus nonnullis diagnosin formae plane
omit-

omittere, atque directe symptomatum fontem definire. Sic tractatus e. c. de diarrhoea, de ictero et de ascite e libris eliminati fuere, facta solummodo de illis morbis passim quaestione in tractatibus de enteritide, de secretione bilis vitiosa et de scirrho mesenterii. Hujusmodi rerum ordinem pathologiae *generali*, neutiquam vero *speciali*, accommodum esse credimus. Haec enim quatenus ad medendum viam sternere debet, latus morborum maxime obvium, symptomata scilicet sine ambagine arripiat atque in fulcrum convertat, oportet. Definitâ sic morbi formâ, filum ad aegritudinis naturam ulterius indagandam habetur. Hoc sub respectu *nosologiae* commendari merentur. Sistunt nimirum artis adminicula, quae medicus, aequè ac botanicus systemata plantarum, adhibet. Sicuti vero systemata plantarum botanicam non constituunt, ita nosologiae non constituunt pathologiam.

Diagnos.
sedis.

3. Illius fundamentum est *diagnosis de morbi sede*. Duplicem doctrinae ista pars agnoscit fontem, videlicet *autopsiam vulnerum et cadaverum*. Dum enim vides e. c. per fracturam vertebrarum lumbalium resolutionem crurum et retentionem urinae gigni et alias in originem paralysis extremitatum inferiorum et enuresin inquirens, nunquam obliviscaris illos morbos ex specu vertebrali ortum trahere posse. Item: si vigente morbo quodam certa et determinata symptomata

ptomata constanter praecedant, dum post mortem certa et determinata vitia in cadaveribus inveniuntur; ex illis ad haec justo concludes. Interea cum ob consensus leges contingere possit ut pars quaedam signa morbi patefaciat, cum tamen morbi focus alium dissitumque locum detineat; intelligitur, notionibus ex autopsia vulnerum et cadaverum petitis, coecamtribuendam non esse fidem. In genere nil magis facultatem de sede morborum judicandi firmat, quam *occasiones errandi* penitus nosse. Quamobrem nobis *tabulae diagnosticae*¹⁾, quae morbos quoad aspectum similes, quoad sedem vero diversos, una cum characteribus, quibus a se invicem distinguuntur, exhibent, valdopere arrident. Quemadmodum enim homines, qui, dum separatim considerantur, similitudinem saepe patefaciunt, hanc juxta se positi amittunt, ita etiam de morbis id ipsum valet.

4. Summa autem diagnoseos difficultas, non tam in varia morborum forma et sede determinanda, quam in illorum diversa *indole* eruenda, locata est. Sunt enim morbi ad aspectum et sedem iidem, qui pro varia annua, epidemica ac aegrorum

Diagn.
indolis.

1) G. G. SCHMALZ *Versuch einer medicinisch-chirurgischen Diagnostik in Tabellen*. 4. Aufl. Dresd. 1825. — J. R. BISCHOFF *die Fieber in einer Tabelle dargestellt*. Prag 1816. — Ejusd. *die chronischen Krankheiten im weiteren Sinne. Eine Tabelle*. Ibid. 1816.

rum constitutione indolem adeo diversam habent, ut curandi ratio, quae alio tempore conducatur, alio adventante noceat. Quomodo autem haec diversa morborum indoles a *nobis*, utpote qui fassi sumus, a hypothesebus circa causas proximas aegritudinum abstinendum esse, definienda erit? Respondemus, inter definitiones, quae solummodo characteres obvios objecti *designant*, atque illas, quae naturam intimam objecti *explicant*, magnum intercedere discrimen. Systematum asseclae secundi generis definitiones tradunt; nos primis illis acquiescimus. Dum illi tempus in explicanda origine morborum ex vitiis humorum, solidorum, viriumque vitalium terunt; nos istis explicationibus valedicendo, characteres obvios morborum designamus. Conamen istud minus arduum est, quam primo intuitu apparet. Quamvis enim morbi quoad formam et sedem infiniti sint, quoad indolem ad pauca genera reduci possunt; quod HIPPOCRATES jam intellexerat, ubi ait²⁾: „Morborum omnium unum eundemque esse modum, *locum* vero ipsum eorum differentiam facere.“ Diuturna praxi edocti sumus, aegritudines quot quot genus humanum affligunt, ad sequentes circiter *conditiones morbosas*, seu *diatheses*³⁾, nec non ad illarum, causarum-

2) Opp. edit. VAN DER LIND. de flatibus. N. 14.

3) Bifariam hoc vocabulum sumitur; nunc enim *dispositionem* ad morbum, nunc *conditionem* corporis, ex quo

sarumque traumaticarum, *effectus*, nimirum ad *diathesim inflammatoriam, rheumaticam, gastricam, arthriticam, scorbuticam, nerveam, atonicam, scrophulosam, rhachiticam, carcinomaticam*, illasque, quibus *contagia specifica* ansam porrigunt, revocari posse. Quarum diathesium notas, characteres, reliquias, complicationes⁴⁾ reales et apparentes⁵⁾, atque therapiam, quum aliunde in
hujus

morbis oritur, significat. Illud sensu hoc lato adhibemus.

4) Cum homines *sanitate absolutâ* gaudentes, saltem inter urbium incolas, rari sint; fit etiam, ut morbi, qui illos invadunt, raro complicatione expertes maneant. Hoc in casu morbus acquisitus, a forma et a decursu consuetis recedere solet. Idem accidit, dum morbi fortuito societatem ineunt. Utroque in casu medicus nondum satis expertus et dumtaxat doctrinae academicae (quae omnes complicationes, quippe combinationibus literarum alphabeti plures, exponere nequit), memor, summas experitur difficultates. Illis in clinicis occupationibus obviam ire solebam, ab alumnis exposcendo, ut, postquam praesentiam cujusdam morbi determinaverint, determinent quoque, num talis morbus (simplex aut complicatus), in corpore alioquin sano, vel corpore labe quadam imbuto, locum obtinuerit nec ne? Cfr. LEIDENFROST de morborum complicationibus rite dijudicandis. In opuscul. physico-mediciis. Lemgoviae 1798. No. 2.

5) Quum quaevis fere diathesium cum peculiari quadam corporis humani parte nexum alere soleat (e. c. diathesis rheumatica cum musculis, diathesis scrophulosa cum glandulis etc.) facile contingit, ut dum una ea-

hujus operis curriculo obveniant, hîc silentio praeterimus.

§. XVII.

Quomodo prognosis excolenda sit.

Genera-
tim.

1. Definitâ morbi formâ, sede et indole, superest, ut de illius *exitu* judicetur, haec medicinae pars, videlicet *prognosis*, divinum quidpiam sapit, atque vulgus eam haud immerito admiratur. Et sane nil magis medicum, morbum cognovisse, ideoque opportuna remedia porrexisse, testatur, quam eventus mali, praesagio respondens. At quam difficilis est ars, prognostica rite instituendi!

Progn.
fontes.

2. Potest quidem prognosis, quatenus ad praesagium de vita et morte spectat, ex unis morbi symptomatibus institui. Ita mirum nonnunquam in modum sacerdotes, aegrorum custodes alique infirmorum lectulis adstare soliti, ex unis eorundem signis, praesagiunt. Eo majori jure hac in arte excellere queunt, qui illam praeterea ex operibus HIPPOCRATIS¹⁾, GALENI²⁾, CELSI³⁾, BAGLIVI⁴⁾, L. G. KLEINI⁵⁾, PROSPE-

RIS

demque diathesis (e. c. rheumatica) plurimas partes (e. c. musculos et glandulas) simul aggreditur, complicatio immerito arguatur.

1) Prognost. Lib. I. II.

2) Ars medica. v. Opp. T. I. fol. 61.

3) Lib. II. c. 7. 8.

4) De praxi medica. L. I. cap. 9.

RIS ALPINII⁶⁾, CH. G. GRUNERI⁷⁾, PEZOLDII⁸⁾, C. SPRENGELII⁹⁾, BROUSSONETI¹⁰⁾, G. W. DANZ¹¹⁾, DOUBLEI¹²⁾, K. CH. WOLFARTI¹³⁾ et J. F. CH. SEBASTIANI¹⁴⁾ didicerunt. Caeterum a semiotica tunc solum lucrum expectamus, dum illa diagnoseos imperio omnino submittitur. Diagnosi praesertim ea prognoseos pars, quae circa conversionem unius morbi in alterum versatur, cujusque fundamenta HIPPOCRATES¹⁵⁾ et BAGLIVIVS¹⁶⁾ posuerunt, innititur. Ipsa vero diagnosis notiones ad istam prognoseos partem spectantes ex anatomia patho-

5) *Interpres clinicus.* Francf. et Lips. 1753. Noviss. edit. paravit DOUBLE. Parisiis 1809.

6) *De praesagienda vita et morte aegrotorum.* Francf. et Lips. 1754.

7) *Semiotica physiologiam et pathologiam generalem complexa.* Hal. et Magdeb. 1775. Versio german. Jen. 1794.

8) *De progn. in febr. acut.* Lips. 1777. — *Von d. Vorhersagung in hitzigen Krankheiten.* Hamb. 1795.

9) *Handbuch der Semiotik.* Halle 1801.

10) *Tableau élémentaire de la sémiotique.*

11) *Semiotik.* Leipz. 1793. Neu bearbeitet von HEINROTH. Leipz. 1812.

12) *Séméiologie générale.* Paris 1812.

13) *Grundsätze der Semiotik.* Berlin 1817.

14) *Grundsätze der allg. patholog. Zeichenlehre.* Darmst. 1819.

15) *De morbis mulierum.* Lib. I. No. 45. 46. 62. 87. 92.

16) *Op. c. specimen trium reliquiorum morborum de fibra motrice et morbosa.* Cap. I. De morborum successionibus.

pathologica depromit. Huic enim scientiae debentur notiones de morborum reliquiis, praecipue de exitibus febrium et inflammationum, nimirum de metastasibus¹⁷⁾, de origine lymphae coagulabilis, aliorumque humorum in cava corporis humani extravasatorum, de pseudomembranis, adhaesionibus morborum partium, de angustatione canalium, de lithiasi vasorum, de induratione et mollitie viscerum, de abscessibus, de erosione solidorum, de ulceribus, deque gangraena.

Cautelae. 3. Prognosin dum instituis, caveas ne temperamentum et aetas tua in hoc opus imperium exerceant¹⁸⁾. Porro respicias oportet: A) Ad *stirpem aegrorum*. Sunt enim familiae, quae longaevitatis privilegio fruuntur, quum aliae morti praematurae damnatae sint. B) Ad *conditionem corporis aegroti*. Sicuti enim incendium in domo rite constructa facillime extingui solet; ita morbus in corpore rite formato, dummodo non athleticus sit¹⁹⁾. C) Ad *aetatem*. Summa sane

17) REIL *Journ. der Erfindungen*. 9. St. p. 78. — BRANDIS *Versuch über die Metastasen*. — BICHAT *anatomie générale*. Paris 1801. p. 83. H. K. A. PAGENSTECHER diss. de metastasi. Heidelb. 1819.

18) In millenis, quos ad lectum aegrorum duxi discipulis, constanter observavi, hilares ad bona, tristes ad mala praesagienda pronos fuisse.

19) FRIESE diss. de vehementia aegrotandi et facilitate

sane pericula in periodis extremis et in pubertate locata sunt. D) Ad *sexum*. Menstruatio nimirum, graviditas, partus, puerperium, lactatio, non solum propria pericula agnoscunt, sed etiam morbos qualescunque accidentales aggravant. E) Ad *clima*. Quum nempe in diversis Europae regionibus praxin medicam exercuerimus, propriâ experientia aliorum observationes confirmare possumus, quatenus docent, eundem morbum, sub vario caelo, vario stipari periculo; indigenas a morbis solo propriis, minus quam advenas pati; inque regionibus meridionalibus, morbos acutos, in regionibus autem septentrionalibus, morbos chronicos majus periculum portendere. F) Ad *constitutionem annuam et epidemicam*. Interdum enim signa quae nunc lethalia sunt, alio adventante anno boni augurii cernuntur. G) Ad *modum vivendi*. Gravissime scilicet morbis laborant, qui crapulae et ebrietati dediti sunt, qui venere abutuntur, qui animi pathematibus vexantur, qui a consueto vivendi modo deflexerunt, quique in aëre recluso et humido degunt. Et H) ad *decursum morbi*. Quoties morbus, praesertim acutus et contagiosus, a consueto suo decursu deflectit, periculum arguendum est. Maxime porro timendum, quanto symptomata, quae alias versus finem morborum cum levamine contingere solent

(e. c.

moriendi hominum robustiorum imbecillioribus. Regiom. 1723.

(e. c. sudor universalis, urina cum sedimento, sputa cocta etc.) jam ab illorum initio observantur.

Crises. 4. Ex veterum enim *criseos doctrina* ²⁰⁾, haec, quippe cum nostra experientia consentiunt, retinemus: morbos acutos (maxime in hominibus vitam simplicem ducentibus ²¹⁾ et pharmacis intempestivis non curatis) praescriptum curriculum plerumque absolvere, et determinatis fere diebus (*dies critici*), quarta scilicet, septima, undecima, decima quarta, et vigesima prima, vel sanitate, vel morte terminari, vel in alium morbum transire; — exitum felicem illorum morborum, saepissime evacuationem unam vel alteram, aut saltem phaenomenon aliquod extraordinarium (e. c. convulsiones, animi deliquium) socium habere (*crisis*); — varias crises, per varia et propria phaenomena (*signa critica*) adnuntiari; e. c. *sudorem criticum* per cutim mollem, prurientem, cum pulsu undoso, quaque fere pulsatione crescente et alvo clausa urinaque pauca; *urinam criticam*, per ventrem constipatum, sudorem nullum aut exiguum, deponendi lotium frequentem stimulum et ardorem in mingendo; *diarrhoeam criticam*, per borborygmos, dolores abdominis intercurrentes, frequentes ventris crepitus, cum pulsu

20) K. SPRENGEL *Versuch einer pragm. Geschichte*. 3. Thl. p. 187.

21) Inter nullas gentes *criseos negotium* tam regulariter contigisse vidi, quam inter Judaeos Lithuaniae.

pulsu tam quoad vim quam rhythmum inaequali; *epistaxin criticam*, per pruritus narium, pulsum dicrotum, faciem rubram alternatim pallidam; *somnum criticum*, per imminutionem inquietudinis, respirationem lentiolem, profundiolem, desiderium obscuritatis, silentii; — majus periculum imminere, si morbo, fortiores exacerbationes alternis diebus exhibente, fortior exacerbatio eam in diem incidat, qua morbus solvi debet et vice versa. Altera vero ex parte fate-mur quoque, initia morborum saepe valde obscura esse, et ad amussim illa determinare ut-plurimum a medici arbitrio pendere; — pulsum doctrinam, a NIHEL²²⁾, BORDEU²³⁾, FOUCQUET²⁴⁾, SOLANO²⁵⁾ etc. traditam, vix locum invenire, at-que morem, gravissimos morbos, ob timorem, ne auxilia, utut aliunde indicata, crisi adversari possent, naturae committendi, fatalem esse.

§. XVIII.

*Quomodo prophylaxis et therapia specialis excolen-
dae sint.*

1. Jam vero ad unicum laborum hucusque Genera-
susce-^{tim.}

22) *Novae observationes circa crisis praedictiones ex pulsu.* Vindob. 1753.

23) *Recherches sur les pouls par rapport aux crises.* Pa-
ris 1772.

24) *Essai sur les pouls par rapport aux affections des prin-
cipaux organes.* Paris 1767.

25) *Idioma della natura lesa.*

susceptorum scopum, ad artem videlicet morbos generis humani praecavendi (*prophylaxis*) et curandi (*therapia*) pervenimus.

Prophy-
laxis.

2. Dignitatem officii medici nil magis extollit, quam ipsa medicorum conamina, morbos praepediendi, hincque saluti publicae propriam utilitatem postponendi. Est autem *prophylaxis* aut *publica*, quatenus populum integrum, incolas provinciae, urbis, pagi, ab imminetibus morbis defendere satagit; vel *privata*, quatenus idem periculum vel ab una alterave familia, vel a singulis hominibus avertere studet. *Prophylaxis publica*, politiam medicam constituit: illam in hujus operis decursu, solummodo ab rerum nexum, paucis verbis attingimus. *Prophylaxis privata* a therapia speciali separari nequit. Omni oblata occasione eam exemplis PLANERI¹⁾, BACKMEISTERI²⁾, COUSINOTI³⁾, VATERI⁴⁾, MUHLIUSI⁵⁾, BARONI⁶⁾, PLATZII⁷⁾, LENTINII⁸⁾, OTTOI⁹⁾, VOSI¹⁰⁾,

1) Diss. de prophylactica medicinae parte. Tub. 1585.

2) Diss. de praeservatione. Rost. 1614.

3) Possunt adeo morbi arte medica praecaveri. Paris. 1631.

4) Diss. de medicina praeservatrice. Witeb. 1727.

5) Vernunftmässige und durch Erfahrung bestätigte Praeservativkur. Lemgo 1743.

6) Ergo ab hygieine sola repetenda morborum prophylaxis. Paris. 1757.

7) Pr. de medicae vitae commodis et incommodis. Lips. 1781.

Vos¹⁰⁾, aliorumque adducemus. Qui prophylaxeos utilitatem in dubium vocant¹¹⁾, potius de illius *abusu* loquuntur. Errant vero, si ad abusum *curas vernaes*, quippe ut plurimum salutare, revocant¹²⁾.

3. Quemadmodum dux supremus exercituum bellum gerens, ante omnia vires imperio suo subditas, cum illis, quas hostis opponere potest, metitur, ac dein pro re nata, aut praelium sine mora init, et adversarium vel fulminat, vel saltem innocuum reddit, aut illum prius itineribus iisque multis et decussatis defatigat ac sensim sensim- Cura morbi.

8) *Beobacht. der epidem. Krankh.* p. 118. *Beyträge.* 2. B. p. 9.

9) Diss. de prophylaxi morborum ex victu. Frcfr. 1796.

10) Diss. de prophylaxi quam curam prophylacticam vocant. Jenae 1805.

11) SCHUMANN epist. de fugienda micrologia diaetetica. Viteb. 1786. — GEHLER Pr. de nimio sanitatis studio saepe sanitatem vel optimam frangente. Lips. 1790. OEGGL et RÖSCHLAUB *Hygieine.* 1. B. 2. St.

12) KAUSCH *Memorabilien der Heilkunde, Staatsarzneywissenschaft u. Thierheilkunst.* 1. B. Züllichau 1813. — JÓZEF FRANK in: *Dziennik medycyny, chirurgji y Farmacyi.* I. Vol. No. III. Vilno 1823. (Nullibi curae vernaes magis necessariae sunt, quam in regionibus septentrionalibus, ubi incolae per totam hyemem vegetabilibus fermentatis, acidis, piscibus salitis, carnibus fumo induratis vescuntur, in atmosphaera exhalationibus fornacum inquinata degunt, vitam sedentariam ducunt etc.).

sensimque ad locum pro praelio committendo sibi opportunum adducit, aut plane dimicationem universalem evitat et defensione separata, quousque licet, rem publicam labentem, quae impetu praepostere facto extemplo corrueret, sustinet; ita oportet medicus in morbis curandis ante omnia potentiam artis suae cum mali magnitudine metiatur, ac dein pro varia rerum positione, aut aegritudinem auxiliis heroicis illico aggrediat, nisi jugulet, saltem mitiget, aut illam prius longo curriculo deflagrare sinat atque ad conditionem, quae sanationem admittit, perducatur, aut a methodo activa plane abstineat, sicque corpus humanum labens, quod pharmaca fortiora illico praecipitarent, quatenus fieri licet, auxiliis lenientibus, servet.

Methodus
activa.

4. Febres intermittentes perniciosas, inflammationes viscerum, ingruentem apoplexiam aliosque morbos, quippe qui, dum sibi ipsis relinquuntur, certissime mortem properant, et dum mature curantur, ut plurimum jugulari possunt, sine temporis jactura idque viriliter aggredimur. Eadem ratione aggredimur morbos exanthematicos, febres aliosque haud paucos, qui, etiamsi debellari illico nequeant, attamen propterea, quod aut complicationem cum aliis malis iniverunt, aut peculiari vi saeviunt, aut alienum aliquod symptoma socium habent, ut sine mora mitigentur atque ad consuetam formam reducantur, necesse

cesse est. Occasio hîc succurrendi fugax est, atque medicus segniter agens, aegrotum, quem alii salvassent, indirecte interficit, hominique, qui etiamsi in arte natandi versatus, miserum contra undas luctantem, brachiis decussatis adspiceret, aequiparandus foret.

5. Sunt autem morbi, inprimis ex classe febrium et exanthematum, qui dum secundum ^{Methodus expectatrix.} propriam indolem decurrunt, non solum nulla pharmaca exposcunt, sed ab illorum administratione mox in pejus ruunt. Morbi ejusmodi *methodo* sic dicta *expectativâ*, non immerito laudatâ ¹³⁾, curandi sunt. Eritne igitur medici praesentia hisce in morbis supervacanea? Sane non; medici enim est praecepta diaetetica, quibus res, quae morbi decursum pervertere possent, arcentur, praescribere, symptomata molesta modo insonte mitigare, atque ne aliena mala superveniant, invigilare.

6. Dum morbus sanationem certissime non ^{Methodus leniens.} admittit, a curae conaminibus supervacaneis abstinendum est. Praeceptum hujusmodi praesertim de auxiliis ingratis et dolorificis valet. Medicus illis indulgens morbo longe pejor est et carnifex. Omne studium ad lenienda, quousque licet, mala et praesertim ad sopiendos dolores, impendendum. Simul consolatio et bona officia largiri debent. Quodsi quis effatum: „melius
N 2 est

13) *Médecine expectante* par C. VITET. Lyon 1803.

est remedio ancipiti, quam nullo uti“ jactaret; illi non indiscriminatim subscribendum foret. Malimus enim aegrotum potius a morbo, quam a therapia trucidari. Caeterum et hic Religionis Christianae praeceptum, quo duce aegrotis nil praescribimus, quod in nobis ipsis eadem sub rerum positione non adhiberemus, applicari meretur¹⁴).

Conclusio. 7. Ex quibus singulis colligitur, nos mediam tenere viam inter medicos, qui in morbis curandis aut nimis activi sunt, aut nimis segnes. Praeterea nil adversus morbos praescribimus, quin scopus, quem per praescripta attingere nobis proponimus, prius determinatus, aut aliis verbis quin *indictio* stabilita sit.

Fontes indicationum.

8. Purissima sane indicationum scaturigo *diagnosis* est. Cognita enim morbi forma, sede et indole, methodus illum, nisi *sanandi*, saltem *curandi*¹⁵), sponte fluit¹⁶). Accedit indicatio, quae

14) Exemplo esto SYDENHAMUS qui (op. c. Sect. II. cap. 1. p. 97.) ait: „And, in truth, when I come to die, I trust I shall have the satisfaction of being inwardly assured that I have not only endeavoured, with the utmost diligence and integrity, to recover the health of all those who have been my patients, of whatever rank or condition they were, none of whom have been otherwise treated by me, than I desire to be, if I should be seized with the same distemper.“

15) Lege de istiusmodi vocabulorum vera significatione

quae ex *juvantibus* et *nocentibus* petitur; quaeque diagnoseos verum lapidem lydium praebet. Quodsi ambo hucusque memorati fontes indicationum arescerent, morbusque aliunde non fuerit plane conclamatus, *auxiliis empiricis* aditus concedendus. Non enim obliviscendum, potiora remedia non ratiocinio, sed casui deberi. „Multa homines in museis excogitant, quae rationi consona, ac prorsus certa existimant, sed quando ad usum descendunt, non solum absurda, sed pene impossibilia deprehendunt. Contra quamplurima (praecipue si de curationibus et remediis loquamur), dum primo proponuntur, inutilia, rationique omnino contraria judicantur; vel quia hypothesis nostrae ad amussim non quadrant, vel quia probabilem illorum rationem reddere nescimus: si tamen ad praxin et experientiam revo-centur, utilia et certa experimur“¹⁷⁾. Caeterum ad *remedia popularia* et *domestica* quod spectat, in ea versamur opinione, illa utplurimum ab ipsis medicis ad vulgum transivisse, hicque sese conservasse, quum interea scholae medicae novas hypotheses adoptando, etiam nova pharmaca ad-optaverint.

9. Am-

ADAM SCHMIDT *über Heilen u. Kuriren. v. Gesundheitstaschenbuch von einer Gesellschaft Wiener Aerzte auf das Jahr 1801.*

16) „Medicus ad *cognoscendum* sufficiens, ad *sanandum* quoque sufficit.“ HIPPOCRATES lib. de arte.

17) BAGLIVI l. c. Lib. I. cap. XI. §. 7.

Therapiae
fontes.

9. Amplectitur autem therapia tres fontes, *fontem* scilicet *pharmaceuticum*, *chirurgicum* et *diaeteticum*.

Fons
pharma-
ceuticus.

10. In usurpando *fonte pharmaceutico*, cave a nimia pyxidum pharmacopolearum veneratione. Illa enim raro pharmaca, quae absque respectu ad indicationes generales, cum fructu praescribi possent, continere solent. Cave praesertim a *novis remediis* pro *specificis* decantatis. Maledicendum est diariis medicis, quae illa indiscriminatim propagant! Etiam atque etiam maledicendum, si de pharmacis veneficis quaestio sit. Non equidem censemus, pharmaca e classe venenorum desumta e praxi medica eliminanda esse; sed putamus pharmaca, venefica, quemadmodum fructus bromeliae ananatis neutiquam pro cibo ordinario inservit, itidem neutiquam pro praxi communi inservire posse. Huic, pharmaca dicenda sunt, longo usu confirmata et tutissima. Quaecunque autem pharmacum praescribatur, debet id facultatibus aegroti accommodum esse¹⁸⁾. Oportet igitur medicum singulorum pharmacorum pretium non ignorare¹⁹⁾. Pharmaca vero, quantum fieri potest, sensibus grata praescribi debent. Raro illorum plurima conjungimus, ab
arto-

18) *Bitte an Deutsche Aerzte, ihre Kranken nicht arm zu machen. Halle 1810.*

19) Quamobrem in clinicis institutis curandum est, ut omnia pharmaca pretium adscriptum habeant.

artocreatibus medicinalibus abhorrentes. Praeterea a continua pharmacorum mutatione et crebra exhibitione abstinendum. Sufficit ut plurimum, si illa bis, ter, quaterve de die exhibentur. In modo, quo pharmaca adhibenda sunt, designando, nil arbitrio relinquendum. Nec tempus in recondito pharmacorum agendi modo eruendo terendum est. Actio enim remediorum, quae sensuum aciem effugit, non minus, quam caussae proximae morborum nos latet²⁰⁾. Futilis ille labor disceptationibus innumeris, sine ullo aegrorum emolumento, locum dedit. Potius est ad effectus pharmacorum visibiles attentionem omnem dirigere, praecipue pro determinandis tum rerum positionibus, sub quibus ea in variis morbis conducunt vel nocent, tum pro cautelis detegendis, quae sub eorum usu necessariae sunt.

11. Venaesectiones, hirudines, clysteres, cucurbitulae tum scarificantes tum siccae, sinapismi, vesicatoria, fonticuli, setacea, moxa, caustica, auxilia e *fonte chirurgico* petita sistunt, quae cum cautelis, misericordia, et non sine respectu ad formositatem cutis, praesertim in feminis, adhiberi debent.

12. *Regimen diaeteticum* securissimum et amplis.
Fons diaceticus.

20) „Quid scammoniae radix ad purgandum, quid aristolochia ad morsus serpentum possit, video; quod satis est; cur possit, nescio.“ CICERO de divinatione. Lib. I.

amplissimum therapiae fontem constituit: multi enim morbi longe certius ciborum et potus delectu, mutatione aëris, rusticatione, venatione, navigatione, equitatione, saltatione, musica, moderamine mentis animique pathematum, nec non aquis soteriis, quam pharmacorum acervo, sanantur.

Cura con-
valescen-
tiae.

13. Morbo fugato, ne navis in portu periclitetur, *convalescentia* curam medici exposcit; quam veritatem illustrarunt DOUTE²¹⁾, DEPRÉ²²⁾, ADOLPH²³⁾, FR. HOFFMANN²⁴⁾, STRUVE²⁵⁾, SANTEUL²⁶⁾, DIEST²⁷⁾, HILSCHER²⁸⁾, JUNKER²⁹⁾, QUELMALZ³⁰⁾, ROTHE³¹⁾, DELIUS³²⁾, PESCHEL³³⁾,

BIDI-

- 21) An lac convalescentibus? Paris 1710.
- 22) Diss. de cibatione convalescentium. Erf. 1724.
- 23) Diss. de statu convalescentiae. Lips. 1732. — Diss. de morbis convalescentium. Lips. 1747.
- 24) Diss. de convalescentiae statu, ejusque impedimentis et praesidiis. Halae 1734.
- 25) Diss. de convalescentiae statu, ejus impedimentis et praesidiis. Halae 1735.
- 26) An a legitima curatione convalescentiae securitas? Paris 1737.
- 27) An redeunte vere cito redeat convalescenti sanitas? Paris 1741.
- 28) Pr. de primo post exantlatos graves morbos in publicum progressu. Jen. 1741.
- 29) Diss. de virium in et a morbis instauratione. Hal. 1745.
- 30) Diss. de convalescentium cura. Lips. 1749.
- 31) Diss. de diaeta convalescentium. Alt. 1750.
- 32) Diss. de convalescentia vera et spuria. Erl. 1773.

BIDISCHINI³⁴), SOEMMERRING³⁵), J. P. FRANK³⁶), SCHAEFFER³⁷), LETOCHA³⁸), J. Malfatti³⁹), CAILLIOT⁴⁰), BERNARD⁴¹) et FERNAULT⁴²). Quivis sane morbus proprium convalescentiae genus, plus minusve propriis periculis stipatum, habet. Saepe eadem, quae morbum constituebat, diathesis ad convalescentiam usque protrahitur. Aliquando autem, praesertim ex abusu remediorum, diathesis convalescentiae ab ea morbi plane diversa. Quibusdam in convalescentiis usus pharmacorum ad omnibus numeris absolutam sanitatem usque requiritur; alias vix convalescente aegro, pharmaca quot quot sunt, supervacanea, imo nociva.

14. Cum praeceptis, ad scientiam spectanti-Monitum. bus, regulae, prudentiam et officia medicorum respicientes, jungendae sunt. Quod argumentum quum

33) Diss. de cura convalescentium ex febribus acutis. Lips. 1775.

34) Diss. de reconvalescentia. Viennae 1783.

35) Diss. de functionum in convalescentibus restitutione. Mogunt. 1786.

36) Orat. acad. de convalescentium tuenda valetudine. v. delect. opusc. med. T. XII. p. 303.

37) Diss. de cura convalescentium, maxime a morbis acutis. Francf. 1795.

38) Diss. de adhibendo sub aegrotantium convalescentia regimine. Francf. 1797.

39) RÖSCHLAUB's *Magazin*. 3. B. 3. St. No. 14.

40) *Diss. de la convalescence, qui succède aux maladies fébriles*. Strasbourg 1802.

41) *Diss. sur la convalescence*. Paris 1812.

42) *Diss. sur la convalescence*. Paris 1812.

quum operis nostri scopo alienum sit, lectores ad alios remittimus auctores⁴³⁾. DE

- 43) CH. H. AYRER methodica et succincta informatio medici, practicam aggredientis. Francf. 1594. — A CASTRO medicus politicus. Hamb. 1662. — J. M. TRILLER tract. de officio medici. Jen. 1701. — COSCHWIZ diss. de requisitis medico ad praxin felicem summe necessariis. Hal. 1718. — BRISBANE diss. de iis, quae a medico ad artem bene exercendam abesse debent. Edinb. 1750. — AEPLI *Abbildung des wahren Arztes, nebst der vertheidigten Religion des Arztes*. Schaffh. 1773. — J. GREGORY über d. Pflichten u. Eigenschaften des Arztes. A. d. E. Leipz. 1778. — K. F. UDEN *medizinische Politik*. Leipz. 1783. — J. CH. STARK *Versuch einer wahren u. falschen Politik d. Aerzte*. Jen. 1784. — SANDIFORT oratio de officio medici perquam difficili, a multis pessime neglecto. Lugd. Bat. 1785. — J. P. FRANK sermo academicus de civis medici in republica conditione atque officiis ex lege praecipue erutis. Ticin. 1785. — R. BATH *essay on the medical character*. Lond. 1786. — G. WEDEKIND über das Betragen des Arztes u. s. w. Maynz 1789. — W. GF. PLOUCQUET *der Arzt*. Tüb. 1797. — BOHN diss. V. de officio medici. Lips. 1797. — A. THUESSINK oratio de eo, quod medicus in arte facienda imprimis agat. Groning. 1798. — A. F. METTERNICH über einige Pflichten der Aerzte. Frankf. a. M. 1803. — J. L. KÖNIG *der Arzt wie er ist u. wie er seyn sollte*. Zürich 1806. — CP. W. HUFELAND *die Verhältnisse des Arztes*. Berl. 1806. — PH. JOS. HORSCH über die Bildung des Arztes als Kliniker und Staatsdiener. Würzb. 1807. — FR. A. MAY *Stolpertus ein junger Arzt am Krankenbette*. Mannh. 1777 — 1807. — J. T. SCHINKO *systemat. officior. medici conspectus*. Vindob. 1817. — W. WAGNER *de medicorum juribus atque officiis*. Berol. 1819. — L. LEBRECHT *der Arzt im Verhältniss zur Natur, zur Menschheit u. Kunst*. Maynz 1821. — L. ANGELI *der junge Arzt am Krankenbette. Nach d. Italien. f. Deutsche Aerzte bearbeitet von L. CHOULANT*. Leipzig 1823.

DE
F E B R I B U S.

DE
FEBRUARY

CAPUT I.

De febris in genere.

§. XIX.

Conspectus doctrinae.

1. **P**riusquam ad specialem febrium doctrinam deveniamus, ex pathologia generali in memoriam revocare juvabit: *febris*, quondam, ut Dea, spectatae¹⁾, vocabulum²⁾, vel a *ferveo* (incalescere), vel a *februo* (expurgare) derivandum esse; — a medicis *febris praesentiam* communi consensu admitti, dum calor animalis et articularum ictus, laesa simul una alterave corporis humani functione, a recto tramite deflectunt; — talem vero deflexionem in morbis indole admodum diversis in conspectum venire; — *definitionem* hinc logicam, quae cunctos hujusmodi morbos

1) Febris sancta, diva, magna, v. PLIN. Lib. II. c. VII. — VALER. MAXIM. Lib. II. c. 5. Exempl. VI. 3. — CICER. de nat. 3. de lege 2. *Sul culto, reso dagli antichi Romani alla Dea febbre, dissertazione del Dr. G. DE MATTHEIS. Roma 1814.*

2) GRAEC. Πυρετός. ITAL. Febbre. GALL. Fièvre. GERM. Fieber. ANGL. Fever. DAN. et SUEC. Feber. HISPAN. Fiebre calentura. BATAV. Koorts. POLON. Gorączka. Ross. горячка.

morbos febriles, amplecteretur, quaeque feбри, ut generi et singulis illius speciebus, quadraret, neutiquam expectandam esse; — defectum autem hujusmet definitionis, quo minus febrium doctrina (*Pyretologia*) excoli possit³⁾, minime impedire; imo nullam jam pathologiae partem illâ pyretologiae magis excultam exstare; — id conaminibus tum illorum, qui universam praxin medicam amplexi sunt⁴⁾, tum scriptorum peculiarium de febribus⁵⁾, deberi, *pyretologiam* esse funda-

3) „De multis rebus nil aliud constat, quam quaedam phaenomena. Cur ergo his non erimus contenti de febre?“ GORTERUS compend. med. tract. 52. §. 1.

4) §. IX. 9. §. X. 11. §. XI. 16. Maxime in tractatibus de febribus elaborandis excelluere J. B. BORSIERI, J. P. FRANK, S. G. VOGEL, CP. W. HUFELAND, J. CH. REIL, VAL. AB HILDENBRAND et J. N. RAIMANN.

5) Medici antiqui Graeci, Latini atque Arabes, qui de febribus scripserunt. Venet. 1594. — L. RIVERIUS methodus curandarum febrium. Paris. 1648. — TH. SYDENHAM obs. circ. morb. acut. hist. et curat. seu methodus curandi febres. Amst. 1666. — R. MORTON pyretologia seu exercitationes de morb. universal. acut. Lond. 1692. — J. HUXHAM *essay on fevers*. Lond. 1730. (vers. German. *Frankf.* 1756). — TH. GLASS commentarii XII. de febribus ad Hippocratis disciplinam accommodati. Amstel. 1743. — SENAC de recondita febrium interm. tum remitt. natura et de earum curat. Amstel. 1759. — E. A. NICOLAI *Vers. eines Lehrgeb. v. d. Fiebern überh.* Halle 1752. — A. DE HAEN theses sist. febrium divisionem. Vindob.

fundamentum totius praxeos medicae, non solum,

1760. (vers. Germ. *Kopenh.* 1763. *Dresd.* 1777). — L. CHALMERS *Versuche über die Fieb. A. d. Engl.* (1768) *Riga* 1773. — P. G. WERLHOF *obs. de febribus v. Opp.* Vol. I. (Germ. *Kopenh.* 1775). — W. GRANTS *Beob. über die Natur u. Heil. der Fieber. A. d. Engl.* (1772). *Leipz.* 1775—91. — J. QUARIN *meth. med. febrium.* Vind. 1772. Nov. edit. de cur. febr. et inflamm. 1781. (vers. Germ. *Kopenh.* 1776). — CH. GL. SELLE *rudimenta pyretologiae method.* Berol. 1773. (vers. Germ. *Tüb.* 1791). — CP. F. ELSNER *Beyträge zur Fieberlehre.* Königsb. 1782. — CH. F. RICHTERS *Bemerk. über d. Entstehung u. Behandl. verschied. Art. v. Fiebern.* Halle 1785. Ejusd. *Beyträge z. einer prakt. Fieberlehre.* Berlin 1795. — MX. STOLL *aphor. de cognosc. et cur. febribus.* Vindob. 1786. (vers. Germ. 1787). — J. C. TODE *prakt. Fieberlehre.* *Kopenh.* 1786. — FR. SCHRAUD *de febribus tentam. duo.* Vindob. 1791. — F. SAALMANN *Fieberlehre.* Bresl. 1793. — CH. KRAMP *Fieberlehre nach mechan. Grundsätzen.* Heidelb. 1794. — G. FORDYCE *pr. Abhandl. über die Fieber. A. d. Engl.* (1794). *Zitt.* 1797—99. — PH. WILSON *a treatise on febrile diseases.* *Winchest.* 1799. (vers. Germ. *Leipz.* 1804). 4. edit. *Lond.* 1820. — J. CH. F. HARLESS *neue Untersuch. über die Fieber überh. u. die Typhusfieber insbesondere.* *Leipz.* 1803. — GF. CH. REICH *Erläuterungen der Fieberlehre.* Berlin 1805—6. — G. GIANNINI *della natura delle febbri e del miglior metodo di curarle.* Milano 1805 (vers. Gallic. *Paris* 1808). — PETIT-RADEL *pyretologia medica.* Paris. 1808. — J. F. ACKERMANN *de construendis, cognosc. et cur. febrib. epitome.* Heidelb. 1809 (hypoth. chemicæ). — HEUR-

lum, quia febres morborum classem, longe lateque extensam, nemini, nec foetu in utero materno excepto, parcentem sistunt, sed etiam propte-

TELOUP *de la nature des fièvres et de la meilleure méthode de les traiter.* Berlin et Paris 1810. F. W. HOVEN *Versuch einer pr. Fieberlehre.* Nürnberg. 1810. — F. K. LOE *de cognosc. et cur. febribus.* Monac. 1811. — F. A. WALCH *Unters. über die Natur u. Heil. d. Fiebers.* Leipzig 1813. J. H. RAHNS *Fieberlehre.* Zür. 1814. — G. VON WEDEKIND *einige Blicke in d. Lehre d. Entz. u. v. d. Fiebern.* Darmst. 1814. — F. A. B. PUCHELT *pr. exhib. febr. notion. febriumque distinctionem.* Lips. 1814. — G. GRIMAUD *cours des fièvres.* Montpellier 1815. — FOURNIER et VAIDY *sur la fièvre.* v. *Diction. des sciences médicales.* T. XV. Paris 1816. — A. C. FAGES *recherches pour servir à l'histoire critique et apologétique de la fièvre.* Montpell. 1820. — C. F. SPEYER *über d. Heilverfahren in fieberhaften u. entzündl. Krankh.* Bamb. 1820. — A. F. CHOMEL *des fièvres et des maladies pestilentiellen.* Paris 1821. J. B. C. BARBIER *reflexions sur les fièvres.* Paris 1821. — J. R. PARK *the pathology of fever being the subject of the gulstonian lecture.* Lond. 1822. J. C. COLLINEAU *peut-on mettre en doute l'existence des fièvres essentielles?* Paris 1823. (Contra BROUSSAIS). — A. N. GENDRIN *recherches sur la nature et cause prochaines des fièvres* 1823. (item). — F. G. BOISSEAU *pyrétologie physiologique, ou traité des fièvres considérées dans l'esprit de la nouvelle doctrine médicale.* Paris 1823. — A. DUGÉS *essay physiologico-pathologique sur la nature de la fièvre etc.* Paris 1823. (Contra BROUSSAIS). — J. H. G. SCHLEGEL's *Fieberlehre.* Erfurt 1824.

propterea, quod exanthemata et inflammationes ut plurimum juxta indolem febris, quam sociam agnoscunt, curari debent, atque tandem maxima morborum chronicorum pars ex febribus originem trahit; — febres plerumque *symptomata prodroma* agnoscere, videlicet lassitudinem sponte natam, dolores vagos artuum et lumborum, oscitationes, animi inconsuetam irritabilitatem et imbecillitatem, physiognomiam a statu sano recedentem, oculorum splendorem imminutum, auctum, halitum foetentem, anorexiam, somnum haud recreantem, ulcerum habitualium ariditatem, secretiones sive auctas, sive imminutas, sive alienatas; — inter *symptomata febrium constitutiva calorem animale*m, modo teste thermometro, modo ad aegroti dumtaxat sensum, nunc in universo corpore, nunc in ejus tantum parte, aut decrescere (*frigus febrile*, secundum variam vim, *algoris*, *horroris* et *rigoris* nominibus insignitum), aut invalescere (*calor febrilis*, pro re nata, constans, fugax, humidus, amoenus, siccus, mordax, urens), aut e cute evanescere et viscera aggredi (*febris typhica*), aut vice versa (*febris epiala*); — *pulsum* plerumque velocitate peccare, interdum vero sano lentiores esse, utroque autem in casu tam vi, quam rhythmo a normali conditione deflectere posse; — *functiones laesas* potissimum in perversitate appetituum, deleta scilicet ciborum desiderio, aucto-

que illo potulentorum (*sitis febrilis*), in commutato sensu valetudinis cum illo morbi, in perturbato opere secretionum, maxime salivae, transpirationis cutaneae, exhalationis pulmonum, bilis, urinae et faecum, inque deletio nutritionis processu consistere; — febres agnoscere *causas*, alias *praedisponentes*, alias *excitantes*, in corporis humani peculiari conditione, in annua seu epidemica constitutione, in modo vivendi, in contagiis, miasmatibus et venenis, inque rebus, corpus humanum mechanice aut chemice laedentibus, quaerendas; — febrium *causam proximam* latere, innumerasque hoc sub respectu jactatas fuisse hypotheses⁶⁾; — febrium *diagnosin* non ex uno dumtaxat symptomate, sed ex plurimis simul sumtis instituendam et maxime ad symptomatum constantiam et successionem, ad stadia nimirum opportunitatis, invasionis, incrementi, acmes, criseos, decrementi et convalescentiae, nec non ad typum nunc regularem, nunc irregularem respiciendum esse; febres vario pacto

6) Praecipue a BURSERIO Inst. T. I. §. 24. J. P. FRANK epit. T. I. p. 10. REIL Fieberlehre. 1. Th. p. 41. HILDENBRAND institut. Vol. I. p. 87—96. 101—117. referuntur. Pulchre sane juvenis medicus ex Croatia oriundus lib. Bar. STÖRK in examine rigoroso quaerenti, *quid febris sit?* respondit: „febris est, quod neque tu scis, neque ego, neque quisquam medicorum“ (Salzb. med. chir. Zeitung, 15. Ergänzungsband. p. 50.).

pacto *divisas* fuisse⁷⁾, nempe in acutas et chronicas, in continuas, remittentes et intermittentes, in benignas et malignas, in epidemicas, sporadicas, endemicas, stationarias, annuas, intercurrentes, in primarias et secundarias, in simplices et compositas, in regulares et irregulares, in cephalicas, stomachicas, mesentericas, in synocham, synochum et typhum, in inflammatorias, gastricas, nervosas, putridas, catarrhales, rheumaticas etc.; — febres, determinatis, circiter temporibus⁸⁾ praevisque indiciis modo

O 2 pro-

- 7) GALENUS de febrium differentiis. Libr. II. GALENS *Fieberlehre von K. SPRENGEL. Breslau u. Leipz. 1788.*
BALDINGER de febrium acutarum differentiis. Jenae 1770.

- 8) De variis febrium judicationibus ait HIPPOCRATES: „febres mitissimae, et securissimae die 4to aut ante desinunt; maxime vero malignae et gravissimae die 4. vel prius interficiunt. *Praenot. 122.* Primus febrium insultus ad dies quatuor, secundus ad 7, tertius ad 11, quartus ad 14, quintus ad 17, sextus ad 20 dies excurrit. *Praenot. 122.* Quibus per febres sexta die rigores fiunt, difficulter judicantur. *Sect. IV. Aph. 29.* Febricitare incipientibus sanguinis stillationes cum sternutatione adcedentes, et quod in urina desidet album, quarto visum, septimo solutionem adfore denunciant. *Coac. 149.* Urina, in febre album et leve depositum habens sedimentum, celerem liberationem denunciat; celerem quoque, quae diluta indiscretam quandam habet pinguedinem. *Coac. 575.* Quae aliquantulum rubet, subrubrum habet sedimentum et leve, siquidem ante diem septimum appareat; septi-

propitiis⁹⁾, modo funestis¹⁰⁾, aut in sanitatem,
quam

mo die solutionem fore designat; post septimam autem tardio rem, aut plane diuturnam. *Coac.* 575. Quae quarto die subrubram nubeculam capit, septimo die liberat, dum reliqua pro ratione habeant. *Ibid.* Febricitantium non omnino leviter, permanere corpus, et nihil minui; vel etiam plus quam ratio postulat, contabescere, malum. Illud enim morbi longitudinem; hoc vero aegri imbecillitatem significat. *Aph.* 28. *Sect. II.* In febribus abscessus, qui ad primas judicationes (*id est evacuationes*), non solvuntur, morbi longitudinem significat. *Aph.* 51. *Sect. IV.* Sudores febricitantium, extra dies criticos orti, laborem significant, et morbi longitudinem, et recidivas. *Aph.* 36. *Sect. IV.* Febricitanti sudor superveniens, febre non remittente, malum. Prolongatur enim morbus et copiosorem humiditatem indicat. *Aph.* 56. *Sect. IV.* Quibus febricitantibus in urinis subsidentiae fiunt crassiori farinae similes, longam infirmitatem significant. *Aph.* 31. *Sect. VII.*

9) De *notis salutaribus* consuli possunt Aphorismi 26. *Sect. II.* 43. *Sect. IV.* 62. *Sect. VII.* 36. *Sect. IV.* 69. *Sect. IV.* Qui ex morbo superfuturi sunt, facile spirant, dolore vacant, noctu dormiunt, aliaque securissima signa habent. *Praenot.* 126. Quibus in febre die 7. aut 9. aut 11. aut 14. morbus regius supervenit, bonum est: nisi dextrum hypochondrium durum sit, alioqui non bonum. *Aph.* 64. *Sect. IV.* Quibus ex febre aures obsurduerint, his sanguis e naribus effluens, aut alvus exturbata, morbum solvit. *Aph.* 60. *Sect. IV.*

10) Saltem *periculum* significatur in sequentibus: „Dejectiones nigrae, qualis sanguis niger, sponte prode-

quam haud raro provocant¹¹⁾, nunc cum, nunc
sine

unt, male. *Aph.* 21. *Sect.* IV. In febribus circa ventrem aestus vehemens, et oris ventriculi dolor, malum. *Aph.* 65. *Sect.* IV. In febribus ex somnis pavores, aut convulsiones, malum. *Aph.* 67. *Sect.* IV. In febribus spiritus offendens (*id est intercisis*) malum; convulsionem enim significat. *Aph.* 68. *Sect.* IV. Videantur etiam *Praedict.* I. 56. 74. *Coac.* 31. II. 30. 34. 42. 44. 55. 78. 145. 242. Perniciem et mortem ex his, quae modo adducam, conjicere possumus. „Si a febre detento, tumore in faucibus non existente, suffocatio ex improvise superveniat, lethale. *Aph.* 34. *Sect.* IV. Si a febre detento, collum derepente inversum fuerit, et vix deglutire possit, tumore non existente, lethale. *Aph.* 35. *Sect.* IV. 58. *Sect.* VII. *Coac.* 277. Ubi livores in febre fiunt, prope adfore mors significatur. *Coac.* 66. Febrium initio si atra bilis sursum, aut deorsum prodeat, lethale est. *Coac.* 68. Quibus per febres assiduas pustulae toto corpore enascuntur, lethale est, nisi quid purulentum abscedat. In his vero praecipue adnasci ad aures tubercula solent. *Coac.* 114. Vocis defectiones in febre, quae convulsionis speciem prae se ferunt, et in mentis emotionem cum silentio desinunt, perniciem ostendant. *Coac.* 248.

- 11) „Si ebrius, inquit HIPPOCRATES, repente obmutuerit, convulsus moritur, nisi febre corripiatur, aut ubi ad horam pervenerit, qua solvuntur crapulae, vocem recuperet. *Aph.* *Sect.* V. 5. Qui a distensione, aut rigore nervorum tenetur, febre superveniente liberatur. *Sect.* IV. 57. Quicumque sani dolore capitis repente capiuntur, et statim muti fiunt, et stertunt, in septem dies pereunt, nisi febris apprehenderit. *Sect.* VI. 51.

sine recidivae periculo ¹²⁾, aut in alios morbos ¹³⁾, aut in mortem ¹⁴⁾ transire; cadavera tandem

Quibus hepar circumcirca dolet, his febris superveniens dolorem solvit. *Sect. VII. 52.* Sed dolor sine inflammatione esse debet. *Sect. VI. 40.* Cfr. FR. HOFFMANN diss. de salubritate febrium. Hal. 1702. Opp. T. VI. — E. STAHL diss. de febre per se nunquam mortifera. Hal. 1714. — GOELICKE diss. de laude febris falso suspecta. Fr. 1733. — BOEHMER diss. de febre, remedio. Vitemb. 1754. et diss. de virtute febris in sanandis spasmodis. Ibid. 1754. — H. F. VAN DER STADT tractatus de salubritate febris. Gand. 1768. — FINCKE diss. de febrium salubritate in morbis chronicis. Hal. 1772. — METZLER über d. Vortheile d. Fieber bey langwierigen Krankheiten. Ulm 1790. — BERENDS diss. de febre spontaneo atque haud infrequente aliorum morborum auxilio. Francf. 1805. LECOMTE de la fièvre médicatrice et de la réalité des crises et des jours critiques. v. Journ. général de médecine. 1824.

12) „Febricitanti, nisi in diebus imparibus dimiserit febris, reverti solet. *Aph. 61. Sect. IV. Coac. 80.* Quibus febres cessant neque apparentibus solutionis signis, neque diebus judicatoriis, iis recidiva expectanda est. *Praenot. 138. Coac. 146.*“

13) Signa abscessus superventuri vid. in *Coac. 143. Praenot. 139. Coac. 422. 141. Aph. 31. IV. — Convulsio- nis in praenot. I. 115. Doloris capitis Aph. 70. Sect. IV. Doloris ad coxas, Coac. 297. Diarrhoeae Aph. 73. IV. Coac. 291. Aph. 27. IV. Coac. 153. 142. Dysenteriae Coac. 124. Erysipelatis in facie. Coac. 200. Haemorrhagiae. Coac. 108. 149. 142. 555. Praedict. I.*

dem febre peremtorum modo praegressi morbi vestigia, modo nihil plane morborum exhibere¹⁵⁾.

2. Nec supervacaneum esse putamus, ex <sup>Pars the-
rapeutica.</sup> *therapia generali* meminisse, methodum universalem febribus medendi, quum febrem inter et febrem maximum saepe vigeat discrimen, haud dari; praeceptaque hinc generalia in eo solum consistere: ut causae febrium manifestae, quousque fieri licet, illico removeantur; ut effectus causarum rebellium prudenter et opportune temperentur, id est „ut solum symptomata gravia et urgentia mitigentur, aut tollantur, non vero
ea,

142. Coac. 298. *Phrenitidis* Coac. 79. 95. 226. *Vomit* Coac. 142.

14) Febres in tabulis mortuariis haud infimum locum occupare elucet ex BUCHAN *médecine domestique* T. 2. ch. 2. p. 14. J. P. SÜSMILCH *göttliche Ordnung*. 4te Ausgabe. Berlin 1775. W. BLACK *an arithmetical and medical analysis of the diseases and mortality of the human species*. Lond. 1789. chap. 4. p. 43. Apparet igitur febris laudes non immerito circumscriptas fuisse a BERGERO in diss. de laude febris merito suspecta. Witeb. 1730. et a WERLHOFIO de limitanda febris laude. v. Opp. Vol. II. p. 389.

15) SENAC (l. c. lib. 4. cap. 3.) monet in malignis febribus et pestilentialibus, veneni illius subtilissimi, e quo praecipites mortes sunt, in nonnullis quidem casibus visibilem effectum in visceribus occurrere; at saepius nullum, quod sub sensus cadat, ejus vestigium apparere. — Haec *verissime* dicta esse ait MORGAGNI. De sed. et caus. morb. T. II. ad SENAC epistol.

ea, quae a febris peculiari natura sejungi nec possunt, nec debent, et quae salubres naturae motus esse consueverunt¹⁶⁾; ut curetur, „ne motus febrilis aut nimis excedat, aut justo citius languescat, aut deficiat“¹⁷⁾; ut febres, ubi res naturae committenda est, ab illis, in quibus arti agere expedit, discernantur¹⁸⁾; ut hoc in opere non hypotheses, quas mos temporis fert, sed seculorum experientia pro norma inserviat; ut tamen experientia in remotis regionibus interque gentes, quarum vivendi ratio a nostra valde differt, capta, non indiscriminatim in usum deducatur; ut febrium neglectarum aut incongrue tractatarum curam suscipientes, non indicationes, quae alias stadiis morbi quadrarent, sed potius illas, quae praesenti rerum statui accommodae sunt, sequamur; utque febricitantium curae intenti, morbum a sanis avertere non negligamus.

§. XX.

*O r d o n o s t e r.*Genera-
tim.

1. Ut morbos multifarios, qui febrium classi adnumerantur, *quatenus peculiarem medendi rationem exposcunt*, inter se invicem probe distin-

16) BURSERIUS l. c. §. XLVIII.

17) Idem, ibid. §. XLII.

18) Lectu dignissima est dissertatio PLANCHONII *le naturalisme, ou la nature considérée dans les maladies et leur traitement conforme à la doctrine, et à la pratique d'Hippocrate, et de ses sectateurs.*

stinguere et exacte designare valeamus, ad artificiale illud nosologorum adminiculum, quo morbi in ordines, genera, et species distribuuntur, confugere coacti fuimus. Distribuendi rationem simplicissimam aequae ac vulgatissimam, quaeque ad aegrorum lectos optimum in medendo filum largitur, omni alii speciosae et inflatae antepondere placuit.

2. Dividimus igitur febres primum in illas, Ordines. quae morbum per se constituunt (*Febres idiopathicae, primariae, essentielles, febris morbus*) et in illas, quae aliorum morborum sistunt symptoma (*Febres symptomatice, secundariae*). Has vel illas negare velle, absurdum foret¹⁾.

3. Fe-

- 1) BROUSSAIS, quippe qui febres, quot quot sunt, pro symptomate gastro-enteritidis habet, existentiam febrium primarum seu essentialium necessario negare debet. Si opus conscriberem polemicum, illi objicerem: 1° quod, quum maxima pars caussarum, quae febribus ansam porrigit, in totum corpus humanum agat, etiam effectus universalis expectandus sit; 2° quod symptomata prodroma febrium plurimarum revera morbum totius corporis designent; 3° quod, si febris unum prae alio locum afficiat, inde concludi haud possit, talem locum morbi focum constituere; 4° quod ipsa variolarum, morbillorum et scarlatinae contagia, primum universum corpus et serius tantum cutem aggrediantur; 5° quod vigente una eademque febre, modo haec, modo illa corporis humani pars peculiariter laboret, quin morbi indoles vel minime mutetur; 6° quod saepe affectionem spe-

Genera. 3. Febres primarias, de quibus hic unice disserimus, prout libera intervalla habent, aut continuo decurrunt, in *febres intermittentes et continuas*, subdividimus. Primum de illis.

CAPUT

cialem partis maxime affectae debellare liceat, febre nihilominus relictâ propriumque decursum absolvente; 7° quod crisis, quae sola febribus terminum imponere solet, negotium totius corporis sit; 8° quod essentia febrium non solum in partibus corporis humani solidis, sed quoque in fluidis, quaeri debeat, ut inter alia febres post gravem sanguinis jacturam ortae doceant; 9° quodque febres graviores curam generalem exposcant, qua neglectâ, auxilia localia circa partem maxime laesam, malum potius aggravent, ut pluries vidi, dum cura a hirudinibus, nulla praemissa venae-sectione, inchoabatur. Caeterum ex BROUSSAISEI errore id boni pullulat, ut ii medicorum, qui antea febres secundarias praetervidebant, nunc magis ad irritamenta localia, utpote febrium symptomaticarum causam, respiciant. Tale vero bonum sine tot clamoribus obtineri potuisset!

CAPUT II.

De febribus intermittentibus.

§. XXI.

Introductio. Definitio. Literatura. Divisio.

1. **F**ebrium tractatus speciales ab illo, sat ^{Introductio.} neglecto¹⁾, febrium intermittantium incipimus, non quod earum doctrina, ut contendunt²⁾, facilius sit (est enim difficillima³⁾); sed quia illa optime

1) „In cujus quidem argumenti peruestigatione tanto magis omnis industria necessaria est, quanta plus in febrium intermittantium curatione *neglecta omnis fere observatio est.* A quo enim tempore cortex peruvianus tanquam certum atque expertum auxilium invaluit, plurimi medicorum hoc contenti sine consideratione et dempta rationali medicina omnem imposterum febrem intermittentem eadem tanquam Herculis clava percutere volebant.“ STRACK observat. de febribus intermitt. Cap. I. p. 3.

2) HILDENBRAND institut. practico medicae T. II. §. 1. „... *harum (febrium intermittantium) notio facilius est.*“

3) „Via igitur, quae ad febrium intermittantium curationem ducit, *non ita expedita, sed è contra valde lubrica;* quo major videtur remediorum suppellex, eo facilius est in eorum delectu errare.“ SENAC de recondita febr. interm. tum remitt. natura. Lib. II. cap. 1.

optime ad studium febrium continuarum prae-
parat. Sistit enim quivis febrium intermitten-
tium paroxysmus „febrim continuam in compen-
dium contractam“ 4).

Definitio. 2. *Febris intermittens* 5) est febris primaria,
ex insultibus 6) et liberis intervallis 7) composita,
cum peculiari ad relapsum proclivitate.

Literatura. 3. Hujus morbi, generi humano coaevi,
doctrinam, exposuerunt alii in operibus, quae
praxin medicam universam amplectuntur 8), alii
in pyretologiis 9), alii in commentationibus, a
societatibus literariis editis 10), alii in dissertatio-
nibus

4) Sunt SYDENHAMI verba.

5) *Synon.* Anetas. GERM. *Wechsel-Fieber, kaltes Fieber, Kaltweh, Absatz-Fieber, das Kalte.* ITAL. *Febbre; febbre intermittente, febbre periodica.* GALL. *Fièvre, fièvre froide.* ANGLIC. *Seasoning fever, intermitting fever, shivering fever, a cold fit, ague.* ROSS. *Лихорадка.* POLON. *Febra.* DAN. et SUEC. *Vexelfeber.* HISP. *Calentura, fiebre fria.* LUSIT. *Maleitas, febre de Sezão.*

6) *Syn.* Accessio. Invasio. GRAEC. Paroxysmus. GERM. *Anfall.* GALL. *Accès.* ANGL. *Fit.*

7) *Syn.* Intermissio, integritas, infeblicatio. GRAEC. *Apyrexia.*

8) §. IX. 9. §. X. 11. §. XI. 16.

9) §. XIX. 1. (5).

10) J. B. GRÜNDEL febres intermittentes epidemicae in Styria, a. 1687. *Miscell. acad. nat. curios.* Dec. II. a. 6. 1687. p. 309. — CHR. HELWICH de febribus intermittensibus malignis. *Eph. acad. nat. cur.* Cent. I et II. p. 330. — CHR. FR. JOERDENS de febribus

nibus inauguralibus¹¹⁾, alii demum in monographiis

intermittentibus malignis et periculosis. Acta acad. nat. cur. Vol. X. p. 48. — J. PH. BERCHELMANN bigae febrium intermittendum a. 1761. Giessae epidemicorum. Acta Hassiaca. a. 1771. p. 165. — J. HAARTMANN über d. Ursachen der heftigen Wechselfieber, welche in den Jahren 1774—1777 um Åbo und anderwärts grassirten. Neue Schwedische Abhandl. J. 1781. p. 29. — E. F. LIST de epidemica et maligna febre intermittente, plurimis annis et inprimis anno 1779 civitatem Campensem devastante. Verhandel. van de Correspondentie Soc. — in's Hage. Deel. I. 2. Afdeel. A. Bl. 248. CAILLE mémoires sur les fièvres remittentes et intermittentes, qui ont régné en 1780 et 1781 (en France). Hist. et mém. de la soc. R. de médec. a. 1786. Mém. p. 24. — Px observation de la fièvre endémique à Narbonne, devenue épidémique. SEDILLOT rec. périod. de la soc. de médec. de Paris. T. 12. p. 255. — L. A. GAILLARD observation d'une fièvre intermittente maligne. Ibid. p. 264. — CHR. J. TH. DE MEZA relatio febris tertianae intermittens epidemice mensibus Martio, Aprili, Majo, Junio etc. anni 1784 grassantis. Acta reg. soc. med. Havniensis Vol. 2. p. 197. — B. RUSH an enquiry into the cause of the increase of bilious and intermitting fevers in Pennsylvania; with hints for preventing them. Transact. of the American soc. Vol. 2. p. 206. — DURET mémoire sur les maladies (fièvres intermittentes) qui ont régné dans la Valoire (an. XI) suivi de la statistique de cette contrée. Annales de la soc. de médec. de Montpellier. T. I. P. I. p. 266. — P. J. BOUCHER observation sur un cas peu commun de fièvre intermittente pernicieuse. Ibid. T. I. P. I. p. 86. — CH. A. BARREX rapport sur une épi-

phiis inque variis hujus generis opusculis praesertim

démie de fièvres intermittentes, qui ont existé dans le village de St. Vil (au S. O. de Besançon) pendant les mois de Vendémiaire et Brumaire an. XIV. Ibid. T. 9. p. 385. — COLOMBOT observation sur une fièvre intermittente pernicieuse, qu'on pourroit appeller ophthalmique; extraite d'un mémoire de COLOMBOT sur une épidémie des fièvres de cette nature, qui a régné dans plusieurs communes du depart. de la Haute Saone, en 1806, vers la fin de l'été. Bulletin de l'Ecole de médecine et de la soc. de Paris (année 3.) a. 1807. p. 82. — F. J. DOUBLE sur les fièvres intermittentes pernicieuses (à Paris 1807). SEDILLOT rec. périod. de la soc. de méd. de Paris. T. 31. p. 180. — AUDOUARD sur les fièvres intermittentes et remittentes pernicieuses, recueillies à l'hôpital militaire Français à Rome pendant les mois de Juillet et Août 1807. Annales de la soc. de méd. de Montpellier. T. 11. p. 5. 169. — LORENTZ aperçu sur les fièvres intermittentes, qui ont régné depuis la fin du mois de Février jusqu'à la fin de Juin 1808, parmi les militaires Français en garnison à Potsdam et cantonnés dans les environs. SEDILLOT rec. périod. de la soc. de méd. de Paris. T. 33. p. 361. — GOLFIN observation d'une fièvre pernicieuse intermittente. Avec rapport sur cette observation par CHAPOTIN. Ibid. T. 55. p. 145. 155. — T. BUSCALIONI sulle febbri intermittenti. Giornale della soc. med. chirurg. di Parma. Vol. 9. p. 153. JÓZEF FRANK o własnościach febr pannaiających w Litwie, Pamiętnikow towarzystwa Lekarskiego Wileńskiego. T. II.

- 11) SENNERT diss. VIII. de febribus intermittent. in genere. Vitenb. 1628. — Diss. IX. de febribus in specie. Ibid. 1628. — ROEDERER de febrib. inter-

sertim ad febres intermittentes epidemicas et endemicas

mitt. in genere at in specie. Jen. 1638. — CROSS diss. de febre intermittente. Leid. 1664. — GRAEMBERG diss. de febribus intermitt. Leid. 1666. — FUTZIUS diss. de febrib. intermitt. Lugd. Bat. 1676. — HAPPEL diss. de febr. intermitt. Marp. 1677. — MEIBOMIUS diss. de febribus intermittibus epidemicis. Helmstadiæ 1678. — CRAMER diss. Archeus faber febrium intermittentium. Erf. 1679. — RIVINUS diss. de febr. interm. Lips. 1683. — WEDEL diss. de febre intermittente in genere. Jen. 1690. Ejusd. de febrib. intermitt. Jen. 1692. — ENGEL diss. de febrib. intermitt. Leid. 1700. — BOETTIGER diss. de febr. interm. Lipsiæ 1721. SPIES diss. de febrium intermittentium theoria et therapia. Helmst. 1721. TETTENBORN diss. de febr. intermittentibus cognoscendis et curandis. Hal. 1726. — LUTHER diss. de febrib. intermitt. Erf. 1737. — DETHARDING diss. de caussa et indole febr. intermitt. Rost. 1748. — CARTHEUSER diss. de febrium intermittentium vulgarium et epidemicarum differentia. Francf. ad Viadr. 1751. — RAYMOND diss. de febribus intermittentibus autumnalibus Mittelburgi quotannis grassante. v. Balding. Sylloge. T. I. — NONNE diss. de febrib. interm. Erf. 1754. — KALTSCHMID diss. de febrib. interm. et speciatim tertiana duplici. Jen. 1756. — BÜCHNER de febris intermittentis complicatione cum maligna casu quodam illustrata. Hal. 1757. — RIEDHAMMER diss. de febre intermittente. Viennæ 1757. — NIETZKI diss. de motibus febrilibus, febrium intermittentium indoli analogis. Hal. 1763. — Ejusdem diss. de febrium intermittentium symptomatibus quibusdam acutis. Hal. 1763. — SMITH diss. de febrib. intermitt. Lugd.

demicas spectantibus. Quibus ultimis adnumerantur:

Bat. 1764. — KOCH diss. sistens considerationem pathologico practicam febrium intermittantium. Hal. 1764. — STEINBRENNER diss. de febrib. intermitt. Argent. 1764. — MÜLLER diss. de febrib. intermitt. Viennae 1765. — KOREFF diss. de caussis febris intermittantis autumnalis irregularis, Hal. 1769. — BROTHERTON diss. de febrium intermitt. natura et indole. Edinb. 1776. — DE MEZA diss. sistens animadversiones febrium intermittantium therapiam concernentes. Bützow. 1777. — VAN DER BELEN diss. de febrib. intermitt. compositis. v. collect. diss. Lovaniensium. — CASSEL diss. de febr. intermitt. Giessae 1781. — VAN ROSSUM diss. de febrib. intermitt. in genere. Lovan. 1781. — MAYER diss. de febrib. intermitt. Giessae 1781. — HEINRICI diss. de natura febris intermitt. in genere. Argent. 1783. — TRITSCHLER diss. generalia quaedam circa febres intermitt. Erf. 1783. — BUCHANAN diss. de febrib. intermitt. Edinb. 1783. — PAULI diss. de febrib. intermitt. Mogunt. 1784. — NAUHEIMER diss. de febrib. intermitt. Mogunt. 1784. — COLLIER diss. quaedam de febrib. intermitt. Edinb. 1784. — VAN HINTE diss. de febrib. nervos. et intermitt. Hal. 1786. — RAMSAY diss. de febrib. intermitt. Edinb. 1786. — OBERKAMP diss. febres intermittentes. Heidelb. 1786. — SUTTON diss. de febrib. intermitt. Lugd. Bat. 1787. — VAN ELSWYK diss. de febrib. intermitt. tam manifestis quam larvatis. Lugd. Bat. 1788. — MUTENBACHER diss. historia febris intermitt. Kilon. 1788. — SPRATT diss. de febre intermitt. Edinb. 1793. — MAKLENNAN diss. de febre intermitt. Edinb. 1793. — FOWLER diss. de febrib. intermitt. Edinb. 1794. —

tur: VELIUS¹²), FR. PORELLUS¹³), G. DRAGEUS¹⁴), J. JONES¹⁵), J. H. BOLMANN¹⁶), G. COLE¹⁷), FR. TORTI¹⁸), JAC. DRACKE¹⁹), D. S. MADAI²⁰), O. GESE-

G. FORDYCE *second dissertation on fever, containing the history and method of treatment of a regular tertian intermittent. Lond. 1795.* — FINCK diss. de febre intermitt. Bromberg. 1798. — BARON diss. de febre intermitt. Edinb. 1799. — J. L. ALIBERT *dissertation sur les fièvres pernicieuses ou ataxiques intermittentes. Paris an. VIII.* — LAWLOR diss. de febr. intermitt. Edinb. 1801. — HALPIN diss. de febre intermitt. Edinb. 1802. — HARTE diss. de febre intermitt. Edinb. 1802. — WERNER diss. de febr. interm. perniciosus. Francf. 1804. — RUTETSKI diss. de febre intermitt. Erf. 1806. — SABAUX *diss. sur les fièvres pernicieuses intermittentes épidémiques. Paris 1812.* — LEGIER *diss. sur les fièvres intermittentes. Paris 1812.* — MICHAL *diss. sur la fièvre intermittente adynamique. Paris 1812.* — S. SCHWALT diss. de febr. intermitt. Vindob. 1814. — E. F. TH. FUNK de febre intermittente. Hal. 1822. — SCHREM de febribus intermitt. Patav. 1823.

12) Theses de febr. intermitt. Patav. 1595.

13) De febr. intermitt. earumque causis. 1597.

14) Observat. de febr. intermitt. Lond. 1668.

15) De febribus intermitt. Hagae 1684.

16) De febre intermittente ejusque explicatione et curatione. Marb. 1695.

17) Hypotyposis super febres intermittentes. Amst. 1698.

18) Therapeutica specialis ad febres periodicas perniciosas. Mutin. 1709. Edit. nova c. vita auctor. Francf. et Leipz. 1756. Altera nov. cur. C. C. J. TOMBEUR et O. BRIKBE. Bonn. 1821.

GESENIUS²¹⁾, W. COLEY²²⁾, MOSCA²³⁾, E. A. NIKOLAI²⁴⁾, COLINY²⁵⁾, M. DURAND²⁶⁾, RAYNAL²⁷⁾, F. C. MEDICUS²⁸⁾, TRNKA DE KRZOWITZ²⁹⁾, SANTARELLI³⁰⁾, J. C. FIDLER³¹⁾, GRAINGER³²⁾, VOULLONE³³⁾, GRAUMANN³⁴⁾, THOMPSON³⁵⁾, C. STRACK³⁶⁾,

19) *Orationes tres de febr. intermitt.* Lond. 1742.

20) *Abhandl. von den sogenannten Wechselfiebern.* Halle 1747.

21) *Beobachtungen der Wechselfieber und ihrer Wirkung in die Gesundheit.* Helmst. 1752.

22) *Account of the late epidemical ague.* Lond. 1755.

23) *Sulle febbri di mutazione d'aria.* Napoli 1756.

24) *Abhandlung von den kalten Fiebern.* Kopenh. 1758.

25) *De febribus intermitt. cognoscendis et curandis.* Argent. 1760.

26) *Sur les fièvres intermittentes.*

27) *Essai sur la méthode de guérir les fièvres malignes intermittentes.* Paris 1763.

28) *Geschichte periodischer Krankheiten.* Karlsruhe 1764.

29) *Historia febrium intermittentium.* Vindob. 1775.
(Versione Germanica Viennae a. 1781. edita uti coactus sum).

30) *Ricerche intorno alle cause della febbre perniciosa dominante nello stato Romano.*

31) *De febre intermittente.* Prag. et Vindob. 1784.

32) *Praktische Bemerkungen über die Behandlung des kalten Fiebers.* Leipz. 1785.

33) *Mémoire sur la question: Déterminer le caractère des fièvres intermittentes.* Avignon 1786.

34) *Meletemata ad febres intermittentes spectantia.* Buzow. 1787.

35) *Treatise on the febris intermittens.* Lond. 1787.

STRACK³⁶⁾, NOTARJANNI³⁷⁾, F. W. VON HOVEN³⁸⁾,
 F. SAALMANN³⁹⁾, A. COMPARETTI⁴⁰⁾, WENDT⁴¹⁾,
 FR. SCHRAUD⁴²⁾, F. D. A. BOUFFEY⁴³⁾, FROM-
 ENT⁴⁴⁾, MOREAU⁴⁵⁾, KORTUM⁴⁶⁾, SPANGEN-
 BERG⁴⁷⁾, FIZEAU⁴⁸⁾, COUTANCEAU⁴⁹⁾, JAC. RI-
 CHARD⁵⁰⁾,

P 2
 36) *Observationes medicinales de febr. intermitt. Offenbach. 1787.*

37) *Osservazioni sulle febbri di mutazione. Napoli 1788.*

38) *Versuche über das Wechselfieber. Winterthur 1789.*

39) *Descriptio febris intermittens in genere et speciatim febris interm. quotidianae, tertianae et quartanae. Münster 1791.*

40) *Riscontri medici delle febbri larvate periodiche perniciose. Padova 1795.*

41) *Commentatio de febris intermittentibus semestris hiberni anni 1795—96. Erlang. 1796.*

42) *De febris periodum habentibus observationes novae. Vindob. 1797.*

43) *Essai sur les fièvres intermittentes. Paris l'an. VI.*

44) *Mémoire sur les maladies en Italie, ou observations sur les fièvres intermittentes des marais. Pavie 1798.*

45) *Observations et réflexions sur les fièvres intermittentes et remittentes malignes de l'automne. Vitry l'an. VI.*

46) *Bemerkungen über das Wechselfieber, mit Hinsicht auf Herrn Hofrath MARCUS Abhandlung über diesen Gegenstand, in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 15. B. 3. St. p. 1. Idem: Zusatz zu meinen Bemerkungen über das Wechselfieber. 20. B. 3. St. p. 21.*

47) *Commentatio medica sistens historiam febris intermittens malignae quae a. 1800 Philippsburgi saeviit. Würceb. 1801.*

48) *Recherches et observations pour servir à l'histoire des fièvres intermittentes. Paris 1803.*

CHARD ⁵⁰), J. L. ALIBERT ⁵¹), P. A. COLOMBAT ⁵²), H. FR. TRUMPH ⁵³), AUDOUARD ⁵⁴), F. J. C. SEBASTIAN ⁵⁵), J. B. MEGE ⁵⁶), J. B. TH. BAUMES ⁵⁷), FR. PUCCINOTTI ⁵⁸), BUSCAGLIONI ⁵⁹) et J. R. L. KIRKHOFF ⁶⁰). De auctoribus, qui singulas doctrinae febrium intermittantium partes illustrarunt, debitis locis sermo fiet.

Divisio. 4. Ut vero doctrina haec debito ordine exponi queat, oportet febres intermittentes dividere:

49) *Notice sur les fièvres pernicieuses, qui ont regné épidémiquement à Bordeaux en 1805. Paris 1805.*

50) *De insidiosa quarundam febrium intermittantium natura et de illarum curatione variis experimentis illustrata. Lugd. Bat. 1807.*

51) *Traité des fièvres pernicieuses intermittentes. Paris 1809.*

52) *Mémoire sur une épidémie des fièvres intermittentes adynamiques. Paris 1809.*

53) *Ueber die Wechselfieber und ihre Heilart. Wien 1810.*

54) *Nouvelle thérapeutique des fièvres intermittentes. Paris 1812.*

55) *Ueber die Sumpfwchselfieber, im Allgemeinen und vorzüglich diejenigen, welche in Holland epidemisch herrschen. Karlsruhe 1815.*

56) *Description d'une fièvre intermitt. épidémique. Paris 1822.*

57) *Traité des fièvres intermitt. et des indications qu'elles fournissent pour l'usage du quinquina. Montpell. 1823.*

58) *Storia delle febbri intermittenti di Roma. Urbino 1824. 2 Vol.*

59) *Saggio sulle febbri intermittenti. Torino 1824.*

60) *Considérations pratiques sur les fièvres intermittentes avec des avis sur les moyens de s'en préserver dans les localités humides et marécageuses. Amsterd. 1825. 8.*

dere: 1° in *manifestas* et *larvatas*; 2° in *benignas* et *perniciosas*; et 3° in *regulares* et *irregulares*.

§. XXII.

Febres intermittentes manifestae.

1. *Febres intermittentes*, quae *evidenter* propria febrium intermittentium symptomata prae se ferunt, *manifestae* dicuntur. Febres hujusmodi paroxysmum exhibent raro¹⁾ ultra duodecim horarum curriculum protractum, compositumque ex *stadiis*: *frigoris*, *caloris* et *sudoris*; quod ultimum stadium *apyrexia* excipit.

Definitio.
Stadia.

2. Praegressis nempe aut desideratis symptomatibus prodromis febrium (inter quae febres intermittentes hinc inde peculiariora prorsus exhibent²⁾), aeger magis magisque languet, pallescit, solem

Stadium
frigoris.

1) Vidi tamen plus vice simplici fere ad *nychthemera* protractos. Paroxysmum *septuaginta duarum horarum* conspexit VELSEN (HORN'S *Archiv f. med. Erfahr.* 1811. Nov. p. 447). ALLEN (*Kurzer Inbegriff der ganzen Medicin.* 1. Kap. 31. Artic.) febrem intermittentem observavit, cujus paroxysmi per *integram hebdomadem* durarunt, hebdomade altera *apyrexiae* concessa, et sic alternatim. Morbus hic *cinchonae* ope sanatus fuit. BENIVIENUS (*De abditis morbor. causis.* Cap. 81.) de febre intermittente narrat, quae paroxysmos ad *quindecim dies* prolatos habebat.

2) E. c. digitos et metacarpum manus dextrae flavo colore notatos (STRACK referente TRNKA l. c. §. 46.); — perceptionem frigoris circa umbilicum (COLINX l.

solem aut ignem quaerit. Mutatur faciei forma. Accedunt oscitationes, capitis ac saepe lumborum vel artuum dolores, patiturque aeger ac si ipsius membra, quotquot sunt, fracta essent. Ungues et labia, nonnunquam nasus³⁾ quoque, livent, cutis anserina fit, et maculis interdum caeruleis, peticulis haud absimilibus⁴⁾, notatur. Sed en jam *frigus*⁵⁾ (thermometro, quandoque calorem auctum indicante⁶⁾, raro confirmatum), a lumbis per spinam assurgens, pectus circumdans, totumque tandem corpus complectens. Imminuitur corporis volumen, ita ut annuli de digitis cadant. Aeger tunc lecto se committit, seque stragulis etiam ultra caput circumtegit. Concutitur tota machina, idque, praesertim in infantibus, aliquando convulsive⁷⁾. Strident dentes, imo apud senes unus alterve eorum interdum expellitur⁸⁾. Sitis ita aegrotum excruciare solet, ut
remo-

c. §. 22.), dolorem oculi dextri (RIEDLIN Lin. med. ann. VI. Mart. obs. 22.); — alvi profluvium (J. A. LIMPRECT in act. Acad. Nat. Cur. Vol. II. p. 313.) etc.

3) SENAC referente TRNKA l. c. 3. Kap. §. 20. p. 40.

4) STÖRK Ann. med. p. 167.

5) WALTHER diss. de frigore et febris intermittens accessione. Lips. 1740.

6) HAEN ratio medendi P. II. c. 10. p. 163. P. IX. c. 1. §. 3.

7) Ephem. Nat. Cur. Dec. II. a. 10. obs. 199.

8) WILSON Op. cit. V. I. p. 81. Not.

remotum vix ab ore poculum jam iterum expostulet. Qui potum avide nimis ingurgitat, vomit. At *vomitus*⁹⁾ etiam sine hac caussa apparet. Res ejectae nunc bile, nunc fluido diaphano insipidoque constant. Emesin anxietas, ventriculi pondus, nec non nausea praecedunt. Hypochondria tenduntur, lienis moles non raro augetur. Pulsus interea admodum creber, irregularis, contractus, minimus, vix aut ne vix quidem aliquando tactui obvius, interdum tamen lentus¹⁰⁾. Respiratio brevis, anxia, suspiriosa; loquela interrupta. Tussicula sicca interdum ita continuo urget, ut ne verbum quidem aeger proferre possit¹¹⁾. Perturbantur ideae, vel rapida earum successio occurrit; aliquando potius sopor conspicitur. Sensuum, praesertim tactus, officium nonnunquam pervertitur aut deletur. Exsiccantur ulcera. Mammae nutricum arescunt. Econtra urina aquosa, copiosa, interdum viridis¹²⁾, rubra¹³⁾, cum frequenti
eam

9) STAHL diss. de vomitu praecipuo febrium intermittentium symptomate. Erf. 1730.

10) B. BRENDAL opusc. mathem. et medic. argument. P. II. Diss. 11. febr. part. §. 1. P. I. Progr. 22. de pulsu febrium Comment. I. §. 7.

11) Singularis haec scena mihi in Principe Lithuano A. R. anno 1805. obvenit. Cfr. R. BUCHHAVE observationes raro in praxi obvenientes. Obs. 2. in Actis R. soc. med. Havniensis. T. II. p. 400.

12) FR. PAULLINI in Eph. Nat. Cur. Dec. II. a. 9. obs. 193. BONET med. sept. collat. L. III. Sect. 29. Cap. 21.

eam deponendi desiderio. Fertur et sperma, pene erecto, cum dolore ejaculatum fuisse¹⁴⁾, et testes etiam aliquando doluisse¹⁵⁾. Stadium frigoris nunc ad dimidium horae, plerumque ad duas, interdum ad quatuor, quin imo ad sex¹⁶⁾ horas protrahitur. Tandem frigus, sensim sensimque, non sine grata sensatione, evanescit.

Stadium
caloris.

3. Extincto frigore cutis universa *aestu*¹⁷⁾ et rubore suffunditur. Aeger in stragulis rejiciendis et pedibus denudandis intentus. Augetur corporis volumen. Caput vehementer dolet. Nihilominus sensuum et cerebri functiones acuuntur, quod praecipue de imaginatione et memoria valet¹⁸⁾. Aegroti, systemate nervoso praeter modum excitabili instructi, saepe in vaniloquia, et tendinum subsultus incidunt. Infantes potius soporosi fiunt, aut somnum imaginibus terrificis stipatum experiuntur.

p. 928. A me quoque *urinam viridem* in aegrotis, febre intermittente laborantibus, qui cinchonam, mihi sub nomine *Quajanae* traditam, sumebant, visam esse, ex nota ad p. 62. primae editionis hujus operis elucet. De imperio cinchonae in secretionem urinae legatur RUBINI in *Memorie della società italiana*. 1799.

13) TIZEAU l. c.

14) HUFELAND's *Journal* etc. IX. B. 3. St. p. 19.

15) HEBERDEN, *Commentarii de morborum historia et curatione*. Recudi curavit Soemmerring. 1804. p. 140.

16) HAEN l. c. P. IX. C. I. §. 3.

17) NEIFELD de *genesi caloris febrium intermittentium*. Lips. 1744.

18) REIL, op. cit. Tom. I. p. 45.

riuntur. In genere patientes rumorem et lucem aegre ferunt. Oculi micant, pulsantque undique cum impetu arteriae, inprimis carotides et temporales. Sanguis e naribus saepe manat. Aegroti haemorrhoidibus simul obnoxii in variis corporis partibus congestionum indicia experiuntur. Pulsus plerumque minus frequens quam sub stadio frigoris atque regularis, sed fere semper plenus et durus. Respiratio, in aegro saltem pulmonibus sanis dotata, libera quidem, sed anhelans. Os siccum. Sitis continuat, crescit imo cum potus aciduli desiderio. Alvus clausa. Urina pauca, ignea, cum ardore nonnunquam deposita. Elapsis duabus, tribus, vel et octo interdum horis calor simul cum ceteris symptomatibus decrescit. Pulsus interea fit undosus et mollis.

4. Hoc ipso tempore *sudor*, ad pudenda at- Stadium
que axillas incipiens, frontem et tandem univer- sudoris.
sum corpus cooperiens, vaporosus, calidus, in aegrotis arthriticis, scorbuticis, plicosis, aut cuti candida crinibusque fulvis instructis, odore specifico, fere acidulo praeditus, [saporem aliquando habens muriatis ammoniae¹⁹⁾], copiose prorumpit. Oritur dormiendi desiderium. Alvus clausa, urina pauca vel nulla. Sudor ab una ad tres circiter horas protrahitur, decrescente semper magis magis-

19) SEBASTIAN l. c. Idem MURSI observationem refert, quae testatur sudorem hominum febre intermittente laborantium nonnunquam in crystallos abire.

magisque febre, donec ea tandem omnino evanescat.

Stadium
apyrexiae.

5. Ingruente ita *stadio apyrexiae* pulsus, saltem dum aeger decumbit, si celeritatem nonnunquam excipias, nil morborum offerre solet. Cutis si tangatur, amoenam subfrigidamque, peculiarem admodum, nec facile verbis designandam temperiem exhibet. Interdum levi sudore adhuc cooperitur. Urina quoad copiam normalis sed spumosa, post quandam moram ut plurimum pelliculâ, simul recipientis lateribus adhaerente, obduci, atque aut sedimento sive lateritio²⁰⁾, sive puriformi, aut rubecula instrui solet. Aeger serenus, recreator factus, ac, si alioquin fuerat sanus, sensum secundae valetudinis, praecipue, mutatis a sudore madefactis linteis, experitur. Verum dum lectulum deserit, ut plurimum mox capitis gravedinem et debilitatem percipit. Non raro gustus depravatus, halitus male olens, appetitus deletus, oculi subflavescentes. Habitus corporis cachecticus evadere, speciale aliquid, quod experto plerumque latentem morbum primo oculi ictu patefacit, exhibere solet. Circa labia frequenter pustulae

20) Sedimentum lateritium, cujus primum ut symptomatis febrium intermittentium meminit SYDENHAM, non adeo constans esse, ut vulgo creditur, observarunt praeterea F. J. LAUTER histor. med. biennalis morbor. rural. C. 14. p. 173. — CHR. WEBER obs. med. fasc. I. obs. 10. §. 21. et nota. — HUXHAM opp. T. I. p. 103. — STÖRK ann. med. II. p. 172.

lae apparent (*Hydroa febrilia*)²¹). *Hydroa* hujusmodi et ad volas manuum, psorae instar, prorupisse, vidimus. Duratio apyrexiae, pro vario febris typo, varia; de qua re infra.

§. XXIII.

Febres intermittentes larvatae.

1. *Febres intermittentes larvatae*¹⁾ eae sunt, Definitio. quae sub forma alterius morbi apparent, quum tamen et ob originem, et ob decursum, et ob mendendi rationem, ad febres intermittentes spectent.

2. Febribus intermittentibus *larvatis*, nemine, ^{Febris subcontinua.} *febres subcontinuas* adnumeramus: idque jure, quum eae sub larva alterius morbi, febris videlicet continuae obveniant. Febris istiusmodi antiquis passim nomine *semitertianarum*, vel *hemitritaearum* salutabantur²⁾.

Hodie.

21) Vid. Part. II. Sect. II. hujus Voluminis. Cap. de Hydrois.

1) KEMME diss. de febrib. nervos. et interm. larvatis 1786. — DELABIGNE diss. sur les fièvres intermittentes larvées. Paris 1806. — D. CRAANEN diss. de genuino febrium intermittentium larvatarum caractere, illarumque peculiari indole. Lugd. Bat. 1806.

2) GOLDHAGEN diss. de febris hemitritaeae antiquitatibus. Halae 1782. — Et PUCCINOTTI (l. c. Storia p. 279.) ait: „... noi non dubitiamo punto di collocare l'emitteriteo tra le perniciose del suolo romano: e se molte febbri non andassero sotto il nome generico di terzane doppie o di subintranti o di succontinue, se altrettante non ne venissero commodamente rilegate tra le

Hodiedum *iis* nomen *subcontinuarum Tortii* impertitur, propterea quod *Tortius*³⁾ primus fuit, qui hoc morborum genus ad febres intermittentes pertinere et illarum instar curandum esse patefecit. Ingruunt febres *subcontinuae* veluti intermittentes, et eodem pacto curriculum suum absolvunt. At quum ad apyrexiam pervenerit, febris nequaquam in totum cessat, sed tantum decrescit, ita nempe, ut loco apyrexiae, *remissio* solummodo morbi habeatur, donec novus paroxysmus exacerbationem simulans, advenerit. Paroxysmus hic plerumque levi horripilatione aegrum aggreditur; sequuntur calor, et plus minusve sudor. Nova apyrexia, seu remissio, ut plurimum antecedente minus evidens est, adeo, ut morbus, quo magis ingravescit, eo magis adspectum febris continuae exhibeat.

Aliae lar-
vatae.

3. Nonnunquam autem febres intermittentes tali pacto reconditae sunt, ut, excepto aegritudinis decursu acuto, ne formam quidem *febris* offerant, sed *sub larva alterius cujusdam morbi*, in conspectum se prodant, ita tamen, ut alternatim ex paroxysmis et ex intervallis plus minusve liberis, componantur. Morbi, sub quorum forma febres hujusmodi intermittentes saepius latent, sunt:

putride e le maligne, gli emitranei sarebbero forse anche oggidì frequenti a Roma nell' autunno come lo erano per lo passato."

3) l. c.

sunt: odontalgia, ophthalmitis, amaurosis, cephalalgia, neuralgia facialis, apoplexia, asthma, catarrhus, epilepsia, mania, vomitus, lumbago, ischias, metrorrhagia alique mox recensendi.

§. XXIV.

Febres intermittentes benignae et perniciosae.

1. Febres intermittentes, tum manifestae, tum Divisio.
larvatae, nunc leviter sine ullo vitae periculo decurrunt, nunc modo contrario. Illae *benignae*, hae *perniciosae* vocantur. En interea istarum conspectum: plenam enim doctrinam pro tractatibus illorum morborum, qui febrium intermittentium larvam induere queunt, reservamus ¹⁾).

2. *Febres intermittentes perniciosae* triplicis ^{De feb.} sunt generis: 1) nunc enim morbus solummodo in ^{int. perniciosus} uno alterove ex consuetis paroxysmi febris inter- ^{in specie.}mittentis stadiis ita viget, ut vita periclitetur, v. c. dum in stadio frigoris aeger cadaveris instar riget, in stadio caloris quasi comburitur, in eo sudoris diffluere videtur (*Febris intermittens perniciosa algida, lipyria, diaphoretica*); 2) nunc consueta stadia paroxysmi non terrent, sed ipse paroxysmus perniciem minatur, supervenientis cujusdam alieni symptomatis caussa, v. g. comatis, sternutationis, vertiginis, paralyseos, convulsio-
num,

1) Sic in tractatibus de dolore capitis, de apoplexia, de epilepsia etc. de febribus intermittentibus perniciosis cephalicis, apoplecticis, epilepticis etc. quaestio est.

num, proventus pediculorum, dolorum capitis, ventriculi, abdominis, artuum, aphoniae, anginae, hydrophobiae, respirandi difficultatis, tussis, vomitus, fluxus dysenterici, cholerae, haemorrhagiae narium, pulmonum, uteri, peripneumoniae, scorbuti, peticularum, urticae. (*Febris intermittens perniciosa comatosa, sternutatoria, vertiginosa, paralytica, convulsiva, phthirisiaca, cephalica, cardialgica, colica, arthritica, aphonica, anginosa, hydrophobica, asthmatica, catarrhosa, emetica, dysenterica, choleric, epistaxica, pneumonorrhagica, metrorrhagica, peripneumonica, scorbutica, petechizans, urticata.*); 3) nunc paroxysmus, consuetis febrium intermittentium symptomatibus orbatus sub forma gravissimi alterius morbi apparet, v. c. apoplexiae, epilepsiae, maniae, fatuitatis, amauroseos, tetani, (*Febris intermittens perniciosa apoplectica, epileptica, maniac, fatua, amaurotica, tetanica*). Hoc ultimum febrium intermittentium perniciosarum genus ad febres intermittentes *larvatas* pertinere, cetera ad *manifestas*, vix opus est animadvertere.

§. XXV.

Febres intermittentes regulares et irregulares.

Febr. int. 1. Paroxysmi et libera intervalla febrium in-
in regula- termittentium tum manifestarum, tum larvatarum,
res et irre- tum benignarum, tum perniciosarum, nunc *cum*
gulares di- *ordine*, nunc *sine eo* sibi invicem succedunt. Di-
viduntur. vidun-

viduntur hac de caussa febres intermittentes in regulares et irregulares sive anomalas¹⁾.

2. Febres intermittentes regulares dividuntur in simplices et compositas²⁾. Ad simplices spectant: Feb. int.
regulares.

- a) *quotidianae*; quae omni nychthemero semel curriculum suum absolvunt.
- b) *tertianae*; quae alternis diebus paroxysmum, die vero intermedio apyrexiam exhibent.
- c) *quartanae*; quae quarta quaque die paroxysmum, duo vero nychthemera apyrectica offerunt.
- d) *quintanae*; quae omni quinto die paroxysmo instruuntur, concessis tribus diebus apyrexiae. Eadem ratione *sextanae*³⁾, *septimanae*⁴⁾,
octa-

- 1) Observationes huc spectantes occurrunt apud RIEDLIUM (obs. med. Cent. III. obs. 74. p. 394. et Lin. med. A. II. Junii obs. 1. p. 257.), FORESTUM (Lib. III. obs. 44. 45.), BOERHAAVIUM (consultat. med. Vol. II. cas. 3.) et J. LANZONIUM (*observations sur divers cas de fièvres intermittentes anormales; in Annales de la société de médecine de Montpellier. T. II. p. 273*).
- 2) VRANEX diss. de febribus intermittentibus compositis. Loew. 1793.
- 3) SCHENK obs. med. Lib. VI. de raro febris typo. Obs. 2. — ZEVIANI *nuovo fonte di pronostici. P. I.* — Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. obs. 10.
- 4) HIPPOCRATES epidemic. Lib. I. Sect. 3. text. 2. — RHODIUS Cent. I. obs. 18. — J. SPON obs. de febr. qu aest. 9. apud NIGRISOL. p. 248. — BOERHAAVE apud

*octanae*⁵⁾, *nonanae*⁶⁾ definiuntur, ne de febribus intermittentibus dicamus, quae, ut narrant, habuerunt paroxysmos redeuntes *die decimo*⁷⁾,
decimo

SWIETEN comment. ad Aph. 746. — MORGAGNI de sed. et caus. morbor. Epist. XLIX. W. HARRIS in *Philadelphia Journal of the medical and physical sciences*. By CHAPMAN. 1822. Vol. 4.

- 5) AE. CAPRILIUS de febr. putrid. L. II. — J. SPON l. c. — AMATUS LUSITANUS Cent. VII. curat. 5. — ETTMÜLLER Opp. T. II. P. I. Colleg. pract. prax. spec. Lib. I. Sect. 15. C. 2. (Omni die veneris vespere), PAULINI Eph. Nat. Cur. Dec. II. A. 5. Append. obs. 64. (die veneris mane, sicque ultra duos menses), BALLONIUS Epidem. et ephem. Lib. II. Constitut. vernalis et aestiva. 1576. §. 4. — HAGENDORN Cent. II. obs. 57. — RAZOUX *tables nosologiq. depuis le premier juin 1757. jusqu'au janvier 1762.* — S. SCHULZE Eph. Nat. Cur. Dec. I. A. 4 et 5. obs. 7. (quinque paroxysmi omni octavo die, iisdem symptomatibus, eademque horâ, excepto ultimo paroxysmo qui anticipaverat) — HAEN *divisio febrium*. 4. *divisio* (quatuor paroxysmi) — WERLHOFF obs. de febrib. p. 269. — TISSOT *avis au peuple* C. 18. §. 25. (omni die dominico).
- 6) HIPPOCRATES epid. L. I. Sect. 3. Text. 2. — ZACUTUS LUSITANUS prax. med. Lib. III. obs. 34. (duos annos durans in viro quinquagenario) — WERLHOFF l. c. (sex paroxysmi in puella duodecim annorum scrophulosa).
- 7) ZACUTUS LUSITANUS l. c. (per duos annos in viro sexaginta annorum) — GILBERT comp. de febr. Lib. I.

*decimo quinto*⁸⁾, *post mensem*⁹⁾, *tertium mensem*¹⁰⁾, *annum*¹¹⁾ et *triennium*¹²⁾. Ad febres intermittentes *compositas* pertinent:

a) *quotidianae duplices*; quae duobus paroxysmis intermedia apyrexia nychthemeri spatio stipantur¹³⁾.

b) *tertianae duplices*; quae quidem quotidie paroxysmo uno instructae sunt, sed ita, ut paro-

8) NIC. FLORENTINUS Tract. II. Summ. 4. Dist. 5. Cap.

9. — RHASES V. FORESTUM Lib. III. obs. 43. Schol.

p. 170. — BALLONIUS l. c. §. 34. — NIGROSOL l. c.

(decem accessus in femina). — WERLHOFF l. c. p. 270.

9) RIEDLIN Lin. med. a. VI. Decembr. obs. 25. (in

puella necdum menstruata), PAULINI Eph. Nat. Cur.

Dec. II. a. 5. Append. obs. 64. (exemplum proprii

patris), WERLHOFF l. c. — Accessus febriles deter-

minatâ ante novilunium die pluries redire vidi, in

infantibus vermibus obnoxiiis, quin tamen morbus ad

febres intermittentes pertinuerit.

10) BALLONIUS l. c. §. 14. et constitut. aestiv. a. 1578.

p. 164.

11) C. PLINIUS secundus Lib. I. cap. 51. et VALER.

MAXIMUS L. I. cap. ultimo. (de Poeta Antipater SIDO-

NIO, qui omni anno die natalitio febre laborabat) —

AMAT. LUSITAN. Cent. VII. curat. 75. Schol. (die na-

talitio). — J. LANZONI Eph. Nat. Cur. Dec. III. a.

1. obs. 21. — BALLONIUS l. c. HAEN l. c.

12) BORELLUS obs. med. phys. Cent. II. obs. 100.

13) Bis quotidianam duplicem observavi: viderunt et

SAMUEL VOGEL (*Handbuch* p. 37), LAUTERUS (*Histo-*

ria medica biennalis morbor. rural. p. 7), BURSERIUS

(l. c. §. 136.), J. P. FRANK (l. c. p. 43) etc.

Frank Prax. I. 1. 1.

Q

paroxysmi alternis diebus sibi similes sint, relate scilicet vel ad tempus, quo invadunt, vel ad vim, qua saeviunt, vel ad apparitionem cujusdam symptomatis, uni tantum paroxysmo alternis diebus proprii, vel relate ad singula simul ¹⁴).

c) *tertianae triplices*; quae prima et tertia die duos paroxysmos, secunda et quarta, unum tantum exhibent ¹⁵).

d) *tertianae quadruplices*; quae quotidie duos paroxysmos inter se alternis diebus respondentes, prae se ferunt ¹⁶).

e) *quartanae duplices*; quae prima et secunda, quarta et quinta die paroxysmis, tertia autem die apyrexia stipantur, tali modo, ut primus paroxysmus quarto, secundus quinto respondeat ¹⁷).

f) *quartanae triplices*; quae quotidianae fere instar, singulis diebus accessiones habent, tali autem ratione, ut primus paroxysmus respon-

14) Vulgatissimi typi exempla enarrare supervacaneum foret.

15) GALEN. de crisibus. Lib. II. c. 9. — PANAROLI Pentec. I. obs. 34. — SCHENK Lib. V. obs. 12. — FOREST. l. c. obs. 5.

16) TULPIUS in observat. med. Lib. IV. c. p. 46.

17) Vulgaris haec febris intermittens forma a FORESTO (Lib. V. obs. 910.) et in Ephem. Nat. Cur. Dec. I. a. 9. 10. obs. 40. describitur.

respondeat quarto, secundus vero quinto, tertius sexto¹⁸⁾.

A typo febrium intermittentium *duplici*, ille, qui *duplicatus*¹⁹⁾ dicitur, probe distinguendus. Est enim

g) *febris tertiana duplicata* ea, quae paroxysmos duos, alternis diebus, diem vero a febre liberum intermedium offert²⁰⁾. Ita:

h) *quartana duplicata*; quae omni quarto tantum die duos paroxysmos prae se fert; et

i) *quartana triplicata*; quae prima die tres exhibet accessus, totidem septima, decima: diebus intermediis a febre liber est aeger. Paroxysmi vero ejusdem diei inter se non sunt similes, sed sibi quarta quavis die eodem ordine respondent.

Et exempla *complicationis* febris intermittentis

Q 2

tis

18) GALENUS de praenotione c. 2. — ZACUTUS LUSITANUS prax. med. Lib. IV. hist. 35. — PANAROLIUS Pentec. II. obs. 25. — BARTHOLINUS hist. anat. rara. Cent. I. hist. 95. FORESTUS l. c. obs. 11. SCHENK l. c. Obs. 11.

19) Etiam si GALENUS febrium intermittentium typos accuratissime distinxerit, haec tamen, de qua agitur, distinctio illum latuit. Debetur ea SAUVAGESIO (Nosolog. method. T. II. P. I. Class. 2. ord. 3.). GERM. *doppeldes* (duplex), *verdoppeldes* (duplicata) *Fieber*.

20) RIVERIUS Cent. IV. Obs. 16. AMATUS LUSITANUS Cent. I. p. 6.

tis *quintanae* cum *tertiana duplici*²¹⁾ et *quotidianae* cum *septimana*²²⁾ describuntur.

Febres int.
irregula-
res et ano-
maliae.

3. *Febres intermittentes irregulares* nullam constantem rationem inter paroxysmorum et apyrexiarum decursum exhibent. Porro in ipsis febribus intermittentibus regularibus, *anomaliae*²³⁾, memoratu dignae, obveniunt. Spectat huc *inversio stadiorum*²⁴⁾. Sic illud frigoris aliquando desideratur, paroxysmo immediate cum calore ingruente. Quandoque frigus post calorem, nullo comparente sudore apparet²⁵⁾. Interdum sudor scenam aperit, subsequente frigore²⁶⁾. Alias sudoris, ut conspeximus, loco, diarrhoea praesto est. Et stadium caloris in apyrexiam transivisse vidimus, quâ versus finem vergente, sudor, frigori novi paroxysmi alligatus, prodiit. Ad anomalias quodammodo pertinent etiam febrium intermittantium paroxysmi, qui *unam* dumtaxat *corporis humani partem aggrediuntur*, videlicet faciem

21) PANAROLI Pentec. obs. 30.

22) HUFELAND *Journal* V. 1. p. 45.

23) E. R. CAMERARIUS diss. de febre intermittente anomala. Tüb. 1792.

24) J. COLLA *osservazione d'una febbre intermittente accompagnata d'un ordine insolito di sintomi*. In *Giornale della soc. med. chirurg. di Parma*. Vol. 3. p. 3.

25) O. BORRICHIVS in act. med. Hafn. Vol. III. obs. 37.

26) SCHENK Lib. VI. p. 817.

faciei latus²⁷⁾, brachium²⁸⁾, digitum²⁹⁾, crus³⁰⁾, et imum ventrem³¹⁾.

§. XXVI.

N e c r o s c o p i a.

1. Quum occasionem cadavera hominum fe- Observa-
tiones.
bribus intermittentibus directe demortuorum se-
candi haud simus nacti, eo majori studio alio-
rum huc spectantes observationes collegimus.
Docent istae: *cadaverum superficiem* interdum
flavedinem prae se ferre¹⁾; — *encephalum* ali-
quando conspicuam seri aut sinceri aut cruenti
copiam includere, praesentibus simul notis in-
flamma-

27) P. BERGIUS in *Abhandlungen der Schwedischen Aka-
demie*. 16. B. 4. Vierteljahr. (Faciei latus sub somno
muro recenter dealbato respondens).

28) CNÖFFEL Eph. Nat. Cur. Dec. I. a. 3. obs. 205.
(Brachium dextrum viri hora septima matutina frigore
corripiebatur. Rigebant simul et tremebant partis
affectae digiti. Trium horarum spatio elapso, calor
ejusdem membri succedebat.) — M. JACOBÆUS act.
Hafniens. Vol. I. obs. 119 (Casus fere similis). — PH.
DES-ALLEURS *revue médicale*, Mai 1824 (Tremor et
stupor brachii dextri omni 3. aut 4. die).

29) J. U. G. SCHLEGEL's *Materialien f. d. St. d. A. W.*
u. pr. Heilk. 4. Samml. p. 79 — 83. 2. Topische Fieber.

30) SWIETEN comment. ad aph. 757. — *Medical es-
says* T. I. p. 295.

31) AUXIRON in *Journ. de médecine pratique par Mr. A.*
ROUX. T. 24. p. 60.

1) PUCCINOTTI l. c. p. 148. (*Il cadavere . . . mostrava
in tutta la superficie esterna una tinta subitterica*).

flammatoriis meningum²⁾; — *cerebrum* esse modo immune (etiamsi sub morbi praevii decursu caput valdopere affectum fuerit³⁾), modo collapsum, molle, cum sero multo in ventriculis lateralibus⁴⁾, modo compactum una cum cerebelli medulla, punctis rubris notatum, meningibus inter se morbose adcretis earumque vasis sanguiferis dilatatis⁵⁾, modo varicibus notatum⁶⁾; —
colum-

- 2) MIANOWSKI in *Pamiętnikow towarzystwa lekarskiego Wileńskiego. T. I.* (Magister gymnasii Vilnensis a. 1811. gravi febre intermittente laboravit, cui lethalis mania successit. Secto cadavere, hydrocephalus acutus, socia inflammatione chronica meningum, comparuere). PUCCINOTTI l. c. p. 34. 148. (Similes observationes post febrem intermittentem cephalalgicam et lethargicam).
- 3) SENAC op. c. Lib. I. cap. 23. („Caput insons reperitur, licet nonnunquam gravissimis torqueatur doloribus“); CASIMIR MEDICUS op. c. 2. B. 3. Kap. §. 102. (Secto cranio hominis, apoplexia periodica trucidati, cerebrum sanissimum invenit); PUCCINOTTI l. c. (Post febr. intermitt. perniciosam lethargicam vix morborum quid in encephalo detegere potuerat).
- 4) PUCCINOTTI l. c. p. 149 (Praevia febr. inter. cum emprosthotono).
- 5) PUCCINOTTI l. c. (Post febr. intermitt. pernicio. tetanicam).
- 6) LANCISIUS de noxiis paludum effluviis Lib. II. cap. 6. §. 5. (De epidemia Romana a. 1695. disserens post febres intermittentes perniciosas comatosas et apoplecticas, inquit, „cerebrum frequentibus varicibus et plerumque sanguineo sero intra corticis sulcos effuso

columnam vertebralem quandoque easdem prorsus ac *encephalum* notas morbosas patefacere, idque nonnunquam majori in gradu⁷⁾; *pulmones* et *cor* saepe sanguine aggravari⁸⁾; — *pericardium* pluries

deprehensum fuit.“), Puccinotti l. c. p. 148. (Cadaveris feminae febr. int. pern. phrenetica necatae rationem reddens ait: „*i piccioli vasi sanguigni che scorrono sulla pia madre e sulla parte inferiore del cervello erano ingorgati. Sotto la pia madre eravi pure del siero rossigno nelle diverse sinuosità cerebrali, e il simile fu trovato ne' ventricoli laterali. I plessi coroidi erano varicosi o vesicolari, sì che li avreste detti un gruppetto di idatidi. La sostanza del cervello e del cervelletto in genere più compatta del naturale. Il processo di flogosi si estendera anche sugl' emisferi del cervelletto. Il tubercolo annulare verso l'origine del quinto pajo, il corpo olivario, e il principio dello spinal midolla erano decisamente infiammati.*

- 7) Puccinotti l. c. p. 149. (De femina febr. int. pern. tetanica demortua ait: „*Ma le alterazioni patologiche maggiori le ascondeva la midolla spinale. Una copiosa sierosità sanguinea stagnava fra le membrane ed il corpo della midolla stessa nel suo tratto rinchiuso fra le vertebre cervicali. Vedeasi manifestamente la spinal midolla ricoperta dalla pia madre fatta tutta rosseggiante per la distensione dei suoi piccioli vasi, e mediante questa membrana, il corpo della midolla era tenacemente aderente: e il detto corpo trasversalmente tagliato mostrò una solidità fuor di natura, tanto nella sostanza bianca esterna in cui vedevansi dei minimi punti sanguigni, quanto nell' interna cinerea.*“).
- 8) Harveus de motu cordis c. 16. („*In tertianae febris principio morbifica caussa cor petens, circa cor et*

pluribus conspicuam seri continere copiam⁹⁾; — *ventriculum cordis dextrum* concrementum fibrosum — albuminosum habuisse¹⁰⁾; — *cor* fuisse villosum cum polypo racemoso, cujus pedunculus unus parieti sinus dextri venae cavae adhaerebat¹¹⁾; — *ventriculum* haud raro flatibus praeter

pulmones quando immoratur, anhelosos, suspirosos, et ignavos facit, quia principium aggravatur vitale, et sanguis in pulmones impingitur, incrassatur, non transit. *Hoc ego ex dissectione illorum, qui principio accessionis mortui sunt, expertus loquor*); BONET anat. pract. Lib. IV. Sect. I. obs. 29. („... eorum, qui in paroxysmi febris tertianae initio extincti fuere, *cor et pulmones sanguine aggravati* reperti sunt“); SENAC l. c. („At circuitus et respirationis organa, multa ut diximus patiuntur, *sanguine nigro turgent cordis atria et pulmonis vasa*; fit illuvies inter minimos ejus lobos“); COLINX l. c. §. 41. obs. I.

9) SENAC l. c. („... effusa se prodit aqua in thoracis cavo; *ea turget in quibusdam pericardium*; id inprimis observatum in iis, qui in maritimis oris febre intermittente confecti occubuerunt).

10) AUDOUARD in *Annales cliniques de la société de médecine pratique de Montpellier* l. c.

11) PUCCINOTTI *lettera della flogosi nelle febbri intermittenti perniciose*. Urbino 1823. p. 40 (Praevia febr. intermitt. syncoptica). Nec (quod a classico de morbis cordis scriptore expectari licuit) SENACIUS cordis in febribus intermittentibus affectiones praetervidit. „Sed cordi, inquit, potest inferri vis summa; ventriculi longe fieri possunt ampliores; ut et venae cavae; hinc palpitationes et sanguineae concretiones,

ter modum distensum¹²⁾, hinc inde una cum intestino duodeno phlogosin exhibere¹³⁾, *intestina* nunc tumida, nunc angusta¹⁴⁾, nunc vermibus referta¹⁵⁾ esse; — *bilem* copiosam atram undique effusam saepe in conspectum venire¹⁶⁾; — *hepar* nihi-

quibus obnoxii sunt, qui febrem intensiorem diuturnamque passi fuerunt.“ Op. c. Lib. I. c. 19. p. 106.

12) SENAC l. c. („... eo procedit aliquando distensio et irritatio, unde ortum duxit, ut dubitari nequeat, quin inde mors successerit, spasmo scilicet in ventriculi parietibus insurgente multi sublati sunt; vidi homines, qui dum febre liberati viderentur, post coenam, repleto stomacho, fato functi fuerint; in his mire intumescebat pars haec *flatu distenta*, vel aqua turgens, aut ingestis obruta“).

13) SYLVIVS prax. med. append. Tract. X. — BATHOLINUS hist. anat. rarior. hist. 56.

14) SENAC l. c. libr. I. cap. 23. („In intestinis nonnulla observantur, quae febri tribui possunt; saepe, ut diximus, valde tumida sunt, ex eo autem quod intumescant variis in locis, sequitur, quod in aliis *contracta* sunt; varias *angustias* imprimis in intestino colo reperi, atque eo plerumque loco, ubi renem scandit sinistrum, et infra eum demergi videtur, antequam in intestinum rectum abeat“).

15) PANAROLUS Pentec. I. obs. 41. — LANCISI l. c. §. 5. („Intestina autem fere undique sphacelo tentata continebant foedissima excrementa *vermiumque copiam*“).

16) LANCISI l. c. §. 2. (Praeviis febribus intermittentibus perniciosis cardialgicis, colicis, cholericis, et dysentericis „ingens, inquit, malorum sedes sub adspectum venit in abdomine, ubi exta pene omnia li-

nihilominus haud semper morbi indicia patefacere¹⁷⁾; alias apparere albidum, veluti exsanguie et maceratum, nonnunquam mole auctum, induratum, glandulisque flavis obsitum, aut sanguine nigerrimo turgens¹⁸⁾; — *systema venae portarum* eadem aliquando ratione turgere¹⁹⁾; — *pancreas* interdum laborare hypertrophia, abscessu, obstructione

vida, ac potissimum hepar subfusci, ac *bilis cystica atri coloris* passim occurrunt“); — SENAC l. c. („bile turgens et obstructa reperta est vesicula fellea“); — CASIMIR MEDICUS l. c. (De aegroto cujus supra (3) memini, sermonem instituens, ait: „Hingegen war der Magen und die Eingeweide mit einer Menge von Galle gleichsam überschwemmet, und sogar die Häute derselben mit dieser Farbe durchdrungen, ja die benachbarten Theile ebenfalls davon übertüncht“). — PUCCINOTTI *Storia* etc. p. 148. (De aegra, supra indicata (3), ubi loquitur, ait: „La superficie delle tenui intestina tutta sporca di bile transudata“).

17) BIANCHI *hist. hepatica*. P. III. C. MEDICUS op. c. 2. B. p. 96. („Mit diesen Fehlern der Galle aber ist nicht allemal ein Fehler der Leber verknüpft, wie solches einige Neuere behaupten“); PUCCINOTTI *storia* etc. Vol. I. p. 27.

18) SENAC l. c.

19) SENAC l. c. („in quibusdam verò venam portam in tubum amplissimum abivisse observavi“); PUCCINOTTI *lettera* etc. p. 22. (Post febr. int. pern. diaphoreticam ait: „L'apertura del cadavere offerì nel basso ventre tutto il sistema della vena porta turgidissimo di sangue“).

structione et scirrho²⁰); — *lienem* in summam aliquando molem excrescere²¹), sanguinis picis instar nigri receptaculum esse, dein in putrilaginem abire, ita, ut quibusdam crepuerit²²); — *glandulas mesenterii* volumen auctum et obstructionem offerre²³); — *peritonaei* duplicaturam tumores amplecti²⁴) et in genere viscera cuncta abdominalia phlogosin illiusque reliquias nonnunquam manifestare²⁵).

2. Ex

20) SENAC l. c. („sed mirum profecto non est, in huiusmodi partem incidere obstructiones; cum sanguis per venas hepaticas cursum suum absolvere nequeat“).

21) VOIGTEL *Handbuch der pathologischen Anatomie*. 3. B. p. 144. — LA PEYRE *histoire de la société R. de médecine* a. 1777—78. p. 145.

22) SENAC l. c. (Erat mulier quartana laborans neglectâ; cum vero solitis muniis vacaret aegra haec, repente concidit mortua; in dissecto cadavere lienis soluta compages reperta est, multaque sanguinis copia per abdomen effusa).

23) SENAC l. c. („Ego vero lustratis his partibus laesas praesertim observavi mesenterii glandulas“).

24) SENAC l. c. („Concrescunt scilicet liquida stagnantia et in *steatomata* abeunt“).

25) A. SPIEGELIUS *de semitertiana* liber. („In dissectionibus semitertiana mortuorum cadaveribus, reperi inflammationes ex sanguine bilioso et pituitoso factas circa jecoris cavam partem, in ventriculo, intestinis tam crassis quam tenuibus, mesenterio, omento, liene et saepius in una partium commemoratarum; aut pluribus, aliquando etiam in omnibus, quae celeris mortis

Conclusio-
nes.

2. Ex allatis observationibus colligitur, febres intermittentes nulla certa et constantia vestigia in cadaveribus relinquere²⁶⁾. Phaenomena itaque morbosa, de quibus anatomia pathologica testatur, potius rerum positionibus adventitiis, quam febribus intermittentibus directe tribuenda sunt. Minoris vero ob id non sunt ponderis. Maxime bilis larga secretio, viscerumque volumen auctum et phlogoses perpendi merentur. Quoad bilem, ne ad illius praesentiam ob solum colorem flavum concludamus, quippe qui saepe ex sanguine, pauca in copia reliquis fluidis mixto oritur. Viscerum volumen auctum (hypertrophia) probe ab obstructione distingui debet. Docuerunt nimirum observationes REZIAE²⁷⁾ et SOEM-

caussa erant, superveniente gangraena vel sphacelo.“
— „Nullius eorum, qui a semitertiana perierant, cadaver inspexi, in quo pulmones et jecur non male haberent; vel una cum his caput, lien, renes, mesenterium. Intestina magna ex parte inflammata, et in aliqua parte gangraena correpta erant, praesertim, quo loco ileon colo jungitur“).

26) „Imperocchè le cose che per quattro o sei volte reputavamo aver determinato come costanti a indicarci il fondamento su cui fermare il modo essenziale della condizione patologica, venivano poi smentite da ulteriori osservazioni di diversa parte e natura.“ PUCCINOTTI storia etc. p. 57.

27) Specimen observat. anat. patholog. Ticini 1784. p. 1—25. Venet. 1802.

SOEMMERRINGII²⁸⁾ in lienibus et glandulis mesenterii post febres intermittentes volumine auctis, vasa tum sanguinea tum lymphatica non solum non esse obliterated, sed e contra magis adhuc, quam in statu sanitatis materiae injectionis patula. De phlogosi eo cautius judicandum, quum in febribus intermittentibus, utpote potissimum in regionibus calidis et tempore aestivo lethali-
bus²⁹⁾, putredinis effectus plus, quam in reliquis morbis, in errorem ducere queunt. Postremo non obliviscendum, quod corporis humani loca, quae vigentibus illis febribus maxime affecta cernuntur, non semper in cadaveribus partibus lae-
sis respondere soleant³⁰⁾. Has vero hucusque
non

28) *Anmerkungen zu BAILLIE über den krankhaften Bau.*
Anmerk. 233.

29) „Poco amica alle sezioni anatomiche è la state, massime nei luoghi caldissimi siccome è Roma; e per quel costume di non poter far passare all' anfiteatro i cadaveri se non scorse le ventiquattro ore, le carni non resistono al coltello, e le tele minute delle membrane e di alcuni vasi trovansi già alterate da putrefazione, e le viscere talvolta le trovi come spappolate.“ PUCCINOTTI lettera etc. p. 55.

30) „... per esempio nella letargica a apoplectica aver trovato le parti della cavità del cranio in istato normale, e invece affette, ma non proporzionatamente quelle dell' abdomine; nelle catarrali, pleuritiche, dispnoiche aver visto talora entro al torace non esser lesione organica sufficiente.“ PUCCINOTTI lettera etc. p. 43. — Contrarium quidem contendit BAILLY (*Nouvelles recher-*

non omnibus in partibus accuratissime perlustratas fuisse, libenter concedimus³¹⁾).

§. XXVII.

C a u s s a e.

Paludosae
regiones

1. Paucae sane inveniuntur regionis¹⁾, quae
febres

ches physiologiques sur les fièvres intermittentes pernicieuses, fondées sur des observations d'anatomie pathologique, faites à l'hôpital de Saint-Esprit à Rome, communiquées à l'institut R. de France à la séance du 29. Decembre 1823); at illius observationes nimis Broussaisi systema redolent, ut illis caeca fides tribui possit. Alioquin peregrinatorum observationes circa morbos endemicos regionum extranearum parum valere, ex illis respectu ad plicam polonicam a Gallis jactatis satis superque intellexi.

31) „*Che a dare grandi rischiarimenti alla patologia delle febbri perniciose sarebbe bisognato seguire oculatissimamente i vasi linfatici, e i filamenti nervosi del sistema spinale e simpatico, entro i quali sistemi è forse riposto quel non so che di occulto, che determina il genio di quei primi movimenti specifici di dette malattie.*“ PUC-
CINOTTI storia etc. p. 56.

1) BONTIUS asserit, se in India orientali nullas febres intermittentes indigenas vidisse (de method. medend. in India orientali. Lib. V. cap. 14. 15.). Idem testantur de promontorio bonae spei — KOLBE (*Vollständige Beschreibung des Afrikanischen Vorgebirges der guten Hoffnung.* p. 537.), de insula St. Thomae — DETHARDING (diss. de morbis advenas in America vexantibus. a. 1745), de Siam — DE LA LOUBÈRE (*description du Royaume de Siam*), de Islandia — ANDERSON (*Nachrichten von Island und Grönland* p. 166.), de regione

febres intermittentes, saltem sporadicas et inprimis vernaes, interdum non exhibeant. Attamen ^{feb. inter. incunabula.} procul dubio vera hujus morbi incunabula sunt regiones paludibus abundantes, idque praesertim tempore aestivo et autumnali²). Sub paludum autem nomine veniunt non solum aquarum perpetuae

Andreaemontana — LINKVOGEL (diss. de febre intermittente in regione Andreaemontana exule. Gotting. 1747.), deque nonnullis Sueciae locis — LINNAEUS (amoenitates acad. Vol. I. Diss. I. Hypothesis nova de febrium intermittentium causa. §. 7. et MURRAY med. prakt. Bibliothek 3. B. 12. St. p. 40.), qui narrat, quod adventante in unum illorum locorum (Hernsandiam) aegro, febre intermittente laborante, pueri, ut miraculum viderent, quo pacto quis media aestate frigus experiri possit, e schola aufugerunt.

- 2) LANCISI de noxiis paludum effluviis. Genev. 1718. — G. BLANE *facts and observations respecting intermittent fevers, and the exhalations which occasion them. in medico-chirurgical transactions T. 3. p. 1.* KOREFF de regionibus Italicis aëre pernicioso contaminatis. Berol. 1817. S. M. R. GIRARD *observations sur la vallée d'Egypte et sur l'exhaussement séculaire du sol qui la recouvre.* Paris 1818. FOURNIER et BÉGIN in *dict. des sciences médicales art. marais.* BROCCHI *dello stato fisico del suolo di Roma.* Roma 1821. — FERGUSON in *Philadelphia Journal of the medical and physical sciences.* Nov. 1823. — J. S. E. JULIA *recherches historiques, chimiques et médicales sur l'air marécageux.* Paris 1823. — MONFALCON *histoire des marais et des maladies causées par les émanations des eaux stagnantes.* Paris 1824.

petuae stagnationes, sed vel eae fortuitae, quae inundationum sive pluviarum immodicarum caussa nascuntur, aut quae originem trahunt ex aquis in fossis urbium, praecipue munitarum, vel in campis, oryzae culturae (dicatis, nec non in pratis, aut absconditis nemorosis locis, utut montanis³⁾), stagnantibus, aut saltem imperfecte et lente defluentibus.

Quo pacto
febr. inter.
producant.

2. Quaeritur autem, quo pacto paludes febres intermittentes gignant, scilicet⁴⁾ an atmosphaeram oxygene spoliando? an humiditatis caussa? an ob effluvium specificum, aërem inquinans?

An ob
oxygenii
defectum?

3. Quum paludes gaz hydrogenium azoto nuptum exhalent, suspicari hinc liceret, debitam proportionem inter partes atmosphaeram constituentes, ita perverti, ut oxygenii defectus inde oriatur. At contrarium docent experimenta ope eudiometri, a summo in rebus physicis magistro, ALEXANDRO VOLTA, suscepta. Observavit nempe illustris vir, atmosphaeram in locis omnino paludosis,

3) Quum a. 1791. mense Julio cum Patre meo montem St. Gothardi adscendissem, mirati sumus, eo loco febres intermittentes occurrere. Ast postquam Monachus, montis illius fastigium inhabitans, paludes circa origines Rheni et Ticini obvias, nobis indicaverat, res jam non amplius mira videbatur.

4) VARRONIS (de re rustica. Lib. I. cap. 12.) opinionem, paludes ob insecta, quibus abundant, sanitati insidias struere, utpote omni probabilitate, relate ad febres intermittentes, destitutam, silentio praetereo.

dosis, ac maxime evolutioni febrium intermittantium faventibus, debitam consuetamque azotum inter et oxygenium rationem exhibuisse. Corruunt igitur opiniones illorum, qui paludum noxas repetebant vel e connubio gaz hydrogenii, carbonici ⁵⁾, azotici et ammoniacalis ⁶⁾; vel e hydrogenio carbonato ⁷⁾; vel ex oxydo-nitroso ⁸⁾, vel ex septono oxygenato ⁹⁾.

4. Humiditatem in producendis febribus in-
termittentibus magni momenti esse, clare ex eo <sup>An ob hu-
midita-
tem?</sup> patet, quod febres huiusmodi praecipue in locis humilibus et humidis endemicae sint, quod praesertim post pluvias multas, et vigente nebulosa tempestate epidemice grassari soleant ¹⁰⁾, quodque inprimis eos invadant homines, qui circa occasum solis, quo tempore vapores, in atmosphaera prius radiorum solarium ope soluti, praecipitantur, aëri libero, non satis tecti, se exponunt. Attamen, quo minus directe ex sola humiditate febres intermittentes repetere valeamus, plurima obstant.

In

5) V. DAVY *Beschreibung von Ceylon*. 1822.

6) BAUMES. 7) ZULLATI.

8) MITCHILL. 9) ODIER.

10) Soleant, inquam, nam Vilnae a. 1815. aestatis tempore pluviae permultae locum obtinuerunt, quin febres intermittentes crebrae obvenerint. Et SEBASTIAN (l. c.) fatetur, in Batavia aestatem frigidam et pluviosam potius febribus intermittentibus obstare, quod confirmat H. F. THYSSSEN (*geschiedkundige Beschouwing der Ziekten in de Nederlanden*. Amst. 1824).

In regionibus nempe, alias febribus intermittentibus haud faventibus, vel sub constitutione annua iis adversante, a continua licet et maxima atmosphaerae humiditate, nunquam morbus, de quo agitur, evolvitur. Porro febres intermittentes vix sub ipsis pluviis vel inundationibus apparent, sed postea.

An ob efflu-
vium
specifi-
cum?

5. Quod aër paludosus principio peculiari inquinatus sit, ipse illius specificus odor testari videtur¹¹⁾, quamvis vel ex eo febrium intermittentium originem directe repetere non audeamus. Quodcunque autem sit hocce principium¹²⁾, nil impedit, quominus recepto atque vulgato nomine *miasmatis* insigniatur.

Miasma.

6. Est igitur *miasma* principium, ex paludibus una cum rore¹³⁾ emergens, instrumenta physica

11) Plus vice unica in regionibus transpadanis, quae aëris puritate excellunt, Ticinum versus iter faciens, quo magis huic urbi paludibus circumdatae appropinquabam, hujusmodi specificum odorem percipiebam, non sine ingrata totius corporis sensatione.

12) In historia epidemicae febrium intermittentium constitutionis anni 1765, inquit BURSERIUS (institut. §. 98.), quam ego libro inscripto *Saggi di Medicina Pratica etc. P. I. p. 37.* adjeci, a miasmatibus, quae e palustri solo, corruptisque aquis erumpebant, earum originem derivandam duxi. Nolui tamen de peculiari illorum miasmatum natura quidquam pronuntiare, ne ad hypotheses confugere, a quibus quam maxime me temperare debeo, cogerer.

13) RIOAUD et VAUQUELIN sur l'analyse des rosées éle-

sica hucusque nota eludens, at per effectus in corpus humanum, 'in quo morbum sui generis gignit, abunde demonstratum.

7. Differt miasma a contagio, quod morbus, ^{Miasma differt a contagio.} ab illo ortus, potestate vix gaudet alios inficiendi, quae potestas morbis ex contagio inest. Nunquam saltem contagiosi aliquid in febribus intermittibus animadvertere potuimus, animadverterunt tamen alii, praecipue ubi ille morbus epidemice aut in regionibus calidissimis grassabatur¹⁴).

8. Superest, ut inquiramus in rerum positiones, sub quibus paludes praecipue aptae sunt febribus intermittibus generandis. ^{Quando paludes praecipue feb. int. generent.} Primum *aestus solis* considerationi nostrae sese offert. Aegre nempe paludes in regionibus septentrionalibus febres

R 2 inter-

vées des marais. v. Annales cliniques de la société de médecine pratique de Montpellier. Liv. XLIV. p. 286.

- 14) MEIBOMIUS de febribus intermitt. epidem. §. 8. (epidemia Guelpherbytensis a. 1666.); — LANZONI act. phys. med. nat. cur. Vol. II. obs. 209. — HEUERMANN l. c. p. 13. (epidem. Holsatica); — CLEGHORN obs. on the epidem. diseases in Minorca cap. 2. — FR. HOFFMANN med. rat. syst. T. IV. P. I. Sect. I. c. 4. §. 4. — SALMUTH Cent. III. obs. 51. — COLIGNY l. c. §. 108. — KORTUM l. c. p. 10. — AMELUNG Bemerkungen über die häufigen vorzüglich intermittirenden Fieber, die in den Rheingegenden von 1794 bis 1799 vorzüglich unter den Soldaten herrschten. in HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 18. B. 2. St. p. 100. Cfr. SCHNURRER Chronik der Seuchen. 2. Th. 1825. p. 194. 195. 196. 206. 221. 480. 481.

intermittentes gignere valent¹⁵⁾; nec in ipsis regionibus calidis paludes hiemali tempore nocivum principium, de quo sermo est, exhalant. At nec aestus dumtaxat defectui tribui potest, quod paludes in regionibus septentrionalibus non sint adeo nocivae; nam et hic calor aestatis tempore aliquando vehemens¹⁶⁾. Denique summus calor vel in ipsis plagis meridionalibus paludosis ad febres intermittentes excitandas minime requiritur¹⁷⁾. Imo sub aequatore febres hujusmodi sat raras esse ajunt¹⁸⁾. Ni fallimur, nil magis paludum insalubritatem adjuvat, quam coeli constantia, nil magis illi obstat, quam temperiei continuae vicissitudines¹⁹⁾. At nec *venti* ubicunque febribus intermit-

15) Pulcherrima Europae Urbs, *Petropolis*, paludibus circumdatur; nihilominus febres intermittentes ibi non admodum regnant.

16) Temperatura media aestatis *Petropoli* est $23\frac{1}{4}$ graduum thermom. Reaum.

17) In Insubria saepius febres intermittentes maxime eo tempore grassari vidi, quo thermometer gradum vigesimum caloris non attingebat.

18) WILSON l. c. p. 163. Testantibus BONTIO; CLARK (*on the diseases in long voyages to hot climates*); LYSONS (*essay on fevers*).

19) Ticini pluviae sub maximis aestivis caloribus interdum per mensem et longe ultra omnino desiderantur. Eo ipso tempore tanta observatur aliquando malacia, ut levissima pluma apertae fenestrae vespere imposita, postero mane adhuc eodem in loco reperiatur. *Petropoli* contra mensibus Julii et Augusti, qui inter cetera

termittentibus obstant; qui enim e regione paludosa spirant, causam hujusmodi morbi potius advehunt²⁰). Impedireturne insalubritas paludum in regionibus septentrionalibus brevitate vel potius absentia noctuum tempore aestatis²¹)? Legimus saltem, transitum rapidum a diebus calidissimis in noctes subfrigidas febribus intermittentibus in agro Romano favere²²). *Solum* quod attinet, indubitabile est, proventum febrium intermittentium impediri per arenam et longe magis adhuc per terram fossilem paludes circumdantem²³). Etiam dum paludum superficies concreta est, aut aqua non omnino stagnante obducitur, vix generationi febrium

anni tempora ob tranquillitatem atmosphaerae excellent, octo tantum dies ventis expertes numerantur.

20) HUNTER's *Bemerkungen über die Krankheiten der Truppen in Amerika. A. d. E. Leipz. 1792. 8.*

21) Tempore occasus solis, vel saltem hora prima noctis, febrium intermittentium periculum in regionibus paludosis maximum esse, supra monui; at in septentrionalibus aestate aurora proxime occasum sequitur, unde saltem probabile fit, quod etiam si atmosphaera effluvia paludum interdiu retineat, tempus non concedatur, ea in detrimentum generis humani noctu praecipitandi.

22) SANTARELLI l. c. PUCCINOTTI *lettera* p. 23.

23) JOS. FRANK's *Reise nach Paris, London etc. Wien 1805. 2. Th. p. 283.* Solo vulcanico e contra potius evolutionem febrium intermittentium promoveri, suspicatur LODER (*Bemerkungen über ärztliche Verfassung und Unterricht in Italien. Leipzig 1812*).

februm intermittentium locus datur²⁴). Quamvis mora in ipsis silvis potius ortui februm periodicarum faveat²⁵); attamen nemora, paludes inter et aliquam regionem posita, hanc a febribus hujusmodi praeservant²⁶). — Aquam salitam maris, paludibus mixtam, insalubritatem earum augere, pro certo habuit PRINGLE. Contrarium affirmat JACKSON²⁷).

Aliae
causae.

9. Solum miasma, nulla alia extante caussa, ad febres intermittentes producendas saepe sufficit. Alias miasma, aut *incognita annua seu epidemica* (illius effectus aemulans), *constitutio*²⁸), ad febres intermittentes solummodo praedisponit, idque potissimum, si corpus humanum propter vitium

24) KORTUM l. c. p. 7.

25) WILSON l. c. p. 171. testantibus PRINGLE et CLEGHORN.

26) *Observations on the causes of the increase of intermittent fevers in Pennsylvania.* Vid. *Voll. II. of RUSH's medical inquir. and obs.* FERGUSON l. c.

27) WILSON l. c. p. 176.

28) Imperium miasmatis paludosi in aetiologia februm intermittentium non est nimis extollendum. Posse enim has febres sine illo miasmate oriri, prae omnia sequens docet observatio. Vidi pluries Vilnae febres intermittentes caput extulisse mense februario, thermometro Reaumurii viginti et ultra frigoris gradus indicante, quo sane tempore paludes, in massam veluti saxeam concretae, nec hilum exhalare potuerant.

vitium haereditarium²⁹), idiosyncrasiam³⁰), infantiam³¹), senectutem³²), catameniorum periodum³³), nutricis officium³⁴), vel climatis insolent-

29) Dari praedispositionem haereditariam ad febres intermittentes contendunt RHODIUS (Cent. I. obs. 12.) et J. D. GEYER (Eph. Nat. Cur. Dec. II. a. 5. obs. 229. et Append. p. 28. obs. 44.). Ille de familia febris quartanae continuò obnoxia narrat; hic de viro febre tertiana laborante testatur, qui prolem genuit, quae primo nativitatis mense eadem die eademque horâ paroxysmum ejusdem morbi cum patre experiebatur. Nonne haec phaenomena potius per domicilium commune febribus intermittentibus favens, quam per vitium haereditarium explicanda forent? Caeterum constat, a matre febre intermittente laborante, prolem eodem morbo affectam, excludi solere. Legatur de hisce febribus *congenitis* L. JOUBERT lib. de quartana C. 3. — FR. HOFFMANN l. c. C. 2. Thes. pathol. §. 18.

30) De febre tertiana ex esu anguillae et casei, a quibus vir et femina abhorrebant, narrat ETTMÜLLER (l. c. not. ad octanas).

31) Pluries observavi, infantes effectum ingruentis epidemiae febrium intermittentium prae adultis expertos esse.

32) Senes potissimum febribus intermittentibus perniciosi apoplectici obnoxios esse constat.

33) Permultae ex aegrotis meis circa menstruationis tempus in febrem intermittentem inciderunt, quod de recidivis jam pridem notum est.

34) Mirabar saepe peculiarem illarum ad febres intermittentes proclivitatem. Saepissime proles ubera sugens eodem morbo laborare solebat.

lentiam³⁵⁾ caussis morborum excitantibus alioqui pateat. Inter haec febribus intermittentibus potissimum occasionem praebent suppressio transpirationis³⁶⁾, errores in diaeta tum quoad copiam³⁷⁾ tum quoad qualitatem³⁸⁾, potus cerevisiae³⁹⁾, aquarum corruptarum⁴⁰⁾, argillâ abundantium⁴¹⁾, mine-

35) Advenas in regionibus, quae febribus intermittentibus favent, magis adhuc, quam incolas, illis obnoxios esse, et animadvertit HEYFELDER (in *Rheinisch-Westphälischen Jahrbüchern der Med. u. Chirurg.* 8. B. 2. St.). Ego tamen incolas catervatim febribus intermittentibus laborasse vidi.

36) E. STAHL l. c. cas. 21. — FR. HOFFMANN l. c. T. III. P. I. Sect. 1. c. 8. §. 13. MADAI l. c. §. 105. Ex balneis fluviatilibus praepostere adhibitis, multas febres intermittentes vernaes Vilnae inter alumnos conspexi.

37) De intermittente ex innocentissimo alias pane, nimia vero copia ingurgitato, lege RIEDLIN lin. med. a. 5. 6. febr. obs. 5.

38) E. c. ab ostreis (LOTICHIUS obs. med. L. I.), piscibus (ETTMÜLLER obs. 225. J. H. SCHULZE diss. de febr. in genere et quotidiana. §. 9.), ovis crudis (MADAI l. c. §. 257.), ficis in Sardinia crescentibus (TORTI l. c. L. II. c. 8. schol. 2. et respons. Iatro-Apol. §. 38.) cucumeribus sativis (H. KNIPHOF in act. phys. med. nat. cur. Vol. V. obs. 18.) de quibus ultimis saepissime febres intermittentes in Insubria ortas vidi, at vix unquam in Lithuania.

39) RIEDLIN l. c.

40) J. J. VIREY *des animalcules infusoires, considérés comme la principale cause du danger des eaux corrom-*

mineralium ⁴²⁾ aliarumque per se quidem innoxiarum, at post esum carnis suillae frigide et copiose haustarum ⁴³⁾, animi pathemata, praesertim terror ⁴⁴⁾, verecundia ⁴⁵⁾, gaudium ⁴⁶⁾, imaginatio ⁴⁷⁾, Venus ⁴⁸⁾, venae sectiones ⁴⁹⁾, cohibitae haemorrhagiae ⁵⁰⁾, fuga praepostera sudoris

pues, prises en boisson. V. Journal complémentaire du diction. des scienc. médicales. T. XIV. cah. 55. p. 201.

41) LINNAEUS diss. hypothesis nova de febr. intermittentium caussa. §. 7. v. Amoenit. acad. Vol. I. diss. I. et diss. febris interm. ibid. Vol. X. No. 1.

42) BAYLIES *practical reflexions on the use and abuse of Bath Water. c. 13.*

43) Haec est caussa communissima febrium intermittentium in Lithuania.

44) SWIETEN comment. ad aphor. 755 (ex adpectu gliris), TRALLES de usu opii Sect. II. c. 2. §. 4. (ex adpectu erucæ), D. CRÜGER Eph. Nat. Cur. Dec. III. a. 2. obs. 198. (ex adpectu epileptici), ETTMÜLLER l. c. obs. 140. — A canium impetu plures febrium tertianarum casus numero.

45) RIEDLIN lin. med. a. II. mai. obs. 17.

46) MADAI l. c. §. 107.

47) W. B. NEBEL in Act. Phys. Med. Nat. Cur. Vol. V. obs. 117. (descriptionem morbi audiendo.) LOTICHIUS l. c. I. I.

48) MADAI l. c. §. 112 (post nuptias).

49) Monachus ALEXANDER Eph. Nat. Cur. Dec. II. A. 4. Append. obs. 5. (quoties venae sectio instituebatur, toties altera die praesto erat tertiana).

50) Ephem. Nat. Cur. Cent. obs. 68.

ris pedum⁵¹⁾, ulcerum⁵²⁾, psorae⁵³⁾ et herpetis⁵⁴⁾. Nec violentiae externae, a caussis febres intermittentes excitantibus, penitus excludendae sunt⁵⁵⁾. Contra memorabile est, his febribus in genere resistere solere, qui mercurio caussis febrium intermittentium resistere solent, qui mercurio haud dudum usi sunt⁵⁶⁾, qui psora⁵⁷⁾ et mania⁵⁸⁾ laborant.

Caussa
proxima,

10. Quaevis medicorum secta relate ad *causam proximam* febrium intermittentium proprias sibi construxit hypotheses⁵⁹⁾. Quaerebatur illa in materia, in qua calor praeter naturam existit⁶⁰⁾; — in

51) MADAI l. c. §. 102.

52) MADAI l. c. §. 242 (fonticulorum quoque sanatio).

53) MADAI l. c. §. 128.

54) DE MEZA act. soc. Reg. med. Havn. Vol. I. No. 10.

55) C. L. DUMAS *della natura e del modo curativo delle febbri remittenti, che si associano alle grandi ferite. Firenze 1805.* — PUCCINOTTI l. c. *storia* p. 314. *cap. XIII. delle perniciose traumatiche.*

56) Ubique locorum observavi. Num ob mercurii in hepar actionem?

57) RHODIUS. Contrarium contendit VAN HOVEN l. c. 1. *Thl.* §. 21.

58) KLEIN l. c. p. 96.

59) De illis strictim rationem reddiderunt JUNKER diss. de caussa proxima febrium intermittentium. Hal. 1770. — HELLER in HUFELAND'S *Journ. der pr. Heilk.* 27. B. p. 10. GELLINI de caus. febrium intermitt. proxima. Patav. 1823.

60) GALENUS de different. febr. Lib. I. cap. text. 4. (sanguine, bile, pituita etc.).

— in sanguinis fermentatione, succi nutrititii adsimilationem impediēte ⁶¹⁾; — in succo pancreatico cum bile effervescente ⁶²⁾; — in humoribus corruptis vasorum mesentericorum ⁶³⁾; — in sanguinis tenacitate ⁶⁴⁾; — in fermento digestivo ⁶⁵⁾; — in stagnatione succi nervei ⁶⁶⁾; — in fibrarum laxitate imminutaque transpiratione ⁶⁷⁾; — in cruoris et succi nervei viscositate ⁶⁸⁾; — in vitata bile ⁶⁹⁾ et hepatis obstructione ⁷⁰⁾; — in ebullitionis specie inter aërem atmosphaericum et sanguinem ⁷¹⁾; — in spasmodica fibrillarum constrictione ⁷²⁾; — in primarum viarum impuritate cum peculiari systematis nervosi conditione ⁷³⁾; — in asthenia ⁷⁴⁾; — in hac ipsa tempore apyrexiae
et

61) WILLIS de febr. cap. 3.

62) SYLVIVS prax. med. Lib. I. cap. 30. §. 58.

63) FELIX PLATER prax. med. T. III. cap. 2. p. 52.

64) ROBINSON animal. oecon. p. 444.

65) ETTMÜLLER opp. T. II. Lib. I. Colleg. pract. Sect. 15. cap. 2. p. 303.

66) BORELLI referente FR. HOME in princip. med. P. 2. Sect. V.

67) HOME l. c.

68) BOERHAAVE aph. 755.

69) VALCARENCHI de praecip. febr. §. 27.

70) SENAC l. c. cap. 6.

71) WERLHOFF op. c.

72) CULLEN v. BOWDLER diss. de febr. intermitt. nat. et indole. Edinb. 1776.

73) SELLE pyretologia. Berol. 1773. p. 88.

74) BRUNONIS elementa medicinae. §. 661.

et sthenia vigente paroxysmo⁷⁵⁾; — in vasis sanguineis cum processu vegetativo universali et periodico⁷⁶⁾; — in anomalia nervorum⁷⁷⁾; — in systematis lymphatici inflammatione⁷⁸⁾; — in statu inflammatorio glandularum abdominalium⁷⁹⁾; — in terrae motu microcosmi, nervorum temperie periodica et disharmonia⁸⁰⁾; — in processus nutritivi abnormitate⁸¹⁾; — in sublato aequilibrio inter singulos factores vitales processus organico-dynamici, cum unius alteriusve abnormi nisu in formationem organicam, proinde vel in crystallisationem, vel in hydrogenesin, sub forma lactae, ad nutum oscillationis macrocosmicae, periodice renovatae⁸²⁾; — in irritatione locali⁸³⁾; — in fluido

75) GIANNINI *della natura delle febbri. Napoli T. I.* p. 71.

76) REIL *Fieberlehre. 2. Th. p. 160. Hal. 1804.*

77) HUFELAND'S *System der prakt. Heilkunde. 2. B.*

78) MARCUS *Entwurf einer speciellen Therapie. Nürnberg. 1807.*

79) WALCH *über die Fieber p. 240.*

80) Philosophi transcendentales.

81) GRUITHUISEN referente FR. HILDENBRAND op. c. Vol. II. §. 241.

82) FR. AB HILDENBRAND l. c. §. 242.

83) P. J. MONGELLAZ *essai sur les irritations intermittentes, ou nouvelle théorie des maladies périodiques, fièvres larvées, fièvres pernicieuses et fièvres intermittentes en général exposée suivant la doctrine de Mr. BROUSSAIS et appuyée d'un grand nombre d'observations. Paris 1821.*

fluido vitali irregulariter diffuso⁸⁴); — in decumbendi ratione homini propria, utpote congestionibus vicissim favente, mane in visceribus abdominis et vespere in systemate cerebri⁸⁵); — in peculiari systematis nervorum affectione⁸⁶); quam ultimam opinionem, quippe validissimis argumentis suffultam⁸⁷), et nos (culpam praecipue

84) FORNI *storia di due febbri perniciose, e saggio di una nuova teoria delle febbri intermittenti, con un annunzio della dottrina del fluido vitale e delle modificazioni organiche. V. Repertorio medico-chirurgico di Torino. No. 60. Dicembre 1824.*

85) BAILLY l. c.

86) SWIETEN comment. ad aphor. 757. — TRNKA l. c. Vol. I. §. 38. — THAER de actione systematis nervosi in febribus. Gotting. 1774. recus. in LUDWIG script. nevrol. minor. T. 3. p. 259. — ISENFLAMM prakt. Anmerkung. über die Nerven. §. 26. — PETITRADEL op. c. p. 373.

87) 1° Res, quae systema nervosum labefactant, quammaxime ad febres intermittentes praedisponunt. 2° Miasma paludum, animi pathemata, febrium intermittentium vulgatissimae caussae, systemati nervoso potissimum infensa sunt. 3° Febrium intermittentium paroxysmi multis symptomatibus nervosis, e. c. spasmo cutaneo, tremore, mentis acumine etc. stipantur. 4° Imo haud paucae febres intermittentes larvatae, e. c. epileptica, maniaca etc. protinus in laesione systematis nervorum consistunt. 5° Plurimi morbi nervorum a febribus intermittentibus, male curatis, originem trahunt. 6° Contra febres intermittentes morbos nervorum, quibus superveniunt, saepe tollunt.

pue in nervos, qui e spinali medulla egrediuntur⁸⁸⁾, quique ad abdominis viscera⁸⁹⁾ speciatim pertinent, conjiciendo) amplecteremur; nisi tutius fore existimaremus, cum GORTERO⁹⁰⁾, BURSARIO⁹¹⁾ et J. P. FRANK⁹²⁾ ignorantiam hac in re fateri, in qua etiam relate ad hypotheses (quamvis

7° Autopsia cadaverum hominum, febribus intermittentibus jugulatorum, haud raro laesionem systematis nervosi patefaciunt. 8° Pharmaca febrifuga maxime ad sic dicta nervina spectant. Et 9° Animi pathemata, imaginatio, desiderium expletum, febribus intermittentibus interdum extemplo medentur.

88) Frigus febrile a *lumbis* oritur et per *spinam* assurgit; — cutis, quae nervis spinalibus gubernatur, anserina fit, ecchymoses exhibet, tactum amittit; — partes genitales marium, quae etiam imperio nervorum spinalium subjiciuntur, saepe vigente paroxysmo in consensum trahuntur; — febres intermittentes incrementum corporis, quod maxime a columnae vertebralis evolutione pendet, promovent; — illaeque rebelles interdum ope fonticulorum lumbis admotorum sanantur.

89) Nervus intercostalis, radices e nervis spinalibus accipiens, sibi partem conspicuam in plexibus nervorum abdominalibus formandis, vindicat.

90) Prax. med. system. No. 195.

91) l. c. §. LXXII. („At quoniam haec non ultra indagari se sinunt, et *captum fere nostrum excedere videntur*, satius erit eas febrium intermittentium hinc causas enumerare, quae sensibus perviae vocantur“).

92) Op. c. T. I. p. 39. („Causa proxima febris periodicae intermittens ignoratur“).

vis partim doctissimas⁹³⁾ circa *causam determinati recursus paroxysmorum* versamur.

§. XXVIII.

93) MEAD (de imperio solis et lunae) recursum periodicum morborum a fluxu et refluxu atmosphaerae, imperante lunâ (cum eodem phaenomeno cohaerente), repetiit. CASIMIR MEDICUS fontem morborum, periodum habentium, in nimia ventriculi et intestinorum sensibilitate illarumque partium cum universo corpore consensu, concurrentibus pro re nata bile, muco, saburris et vermibus, collocavit (l. c. p. 283). Aliorum hypotheses morborum periodicorum originem per *consuetudinis leges* perque excitabilitatem modo exhaustam, modo restauratam, itaque stimulos morbosos, licet stabiles, nunc minime (sub apyrexia) nunc maxime (sub paroxysmo) percipientem, expli- cant. Hac cum hypothesi, observatio, quam saepe saepius institui, nexum habere videtur, videlicet, quod accessus morborum periodicorum eadem nychthemeri horâ; qua primâ vice a causa quadam ob- via, e. c. a terrore, violentia externa etc. excitati fuere, praecise redire soleant. Ad febrium intermit- tentium quod spectat periodum, optarem, ut physici indagarent, num illa cum *electricitate atmosphaerica* cohaereat, nec ne? Constat saltem: electricitatem negativam, atmosphaerae humidae (febribus intermit- tentibus faventi) esse sociam (SPRENGEL inst. pathol. gen. Vol. I. §. 132.); — electricitatem atmosphericam certis et determinatis nychthemeri horis periodice modo decrescere modo augmentum capere, ita qui- dem, ut illa tempore matutino (quo paroxysmi evolvi solent) gradum minimum, noctu vero (ubi saepissime apyrexia obvenit) maximum attingat (HANSTRÖM *cor- respondence astronomique* 2. cahier) electricitatem, san-

§. XXVIII.

D i a g n o s i s.

Febres in-
termitt. a
reliquis
morbis
periodicis
disting-
uuntur.

1. In primo diagnoseos limine quaestio sese offert: *num omnes morbi, qui periodice decurrunt, ad febres intermittentes spectent, nec ne?* — Morbos periodicos quot quot a capite ad calcem exstant, itaque praeter febres intermittentes, maniam, epilepsiam, asthma, icterum etc. *unam dumtaxat familiam* constituere eximius de illis morbis scriptor, C. MEDICUS docuit¹⁾. — Contrariam prorsus opinionem J. P. FRANK defendit, contendens, febres intermittentes cum reliquis morbis periodicis nil nisi formam communem habere²⁾. Quum febres intermittentes saltem

pro-

guinis particulas a se invicem remove (EDWARD de *l'influence des agens physiques sur la vie. Paris 1824.*) et electricitatem ipsam sanguinis in febre intermittente quotidiana cum morbi vi decrevisse (C. F. BEL-
LINGERI *sull' elettricità del sangue nelle malattie*).

1) Op. c. 2. Buch §. 64 — 70. („Ich habe bisher fünf Beweise aufgestellt, wovon ein jeder zwar allein vermögend ist, die nahe Verwandtschaft der periodischen Krankheiten mit den Wechselfiebern darzuthun, die aber, zusammen genommen, eine vollkommne Gewissheit davon geben. Es ist also der allersicherste Schluss, dass diese beiden Gattungen unter einerlei Hauptklasse gehören“).

2) De periodicarum affectionum ordinandis familiis. Orat. acad. v. Delect. opuscul. medicor. Ticini 1791. T. X. p. 361. („Sed quousque tandem morborum vestis magis, quam natura, in artis exercitio considera-

prognosin et curam ab illis reliquorum morborum, periodos servantium, plane diversam exposcant, et quum in quaestionibus nosologicis dirimendis utilitas practica praecipue curanda sit, Patris opinionem eo magis amplexi sumus, quo magis notae gentilitiae utriusque generis morborum, ut sequens docet tabula diagnostica, non desiderantur.

Febras intermittentes.

1. Solent certis et determinatis anni temporibus evolvi.
2. Sibi prae aliis regiones eligunt paludosas et humiles.
3. Morborum saepe epidemicum constituunt.
4. Inter unum alterumve paroxysmum paucae dumtaxat horae, aut pauci saltem dies, locum obtinent.
5. Licet per menses durare possint, attamen

Reliqui morbi periodici.

1. Evolutio ad nullum peculiare anni tempus spectat.
2. Ubique locorum indiscriminatim obveniunt.
3. Rarissime epidemice grassantur.
4. Paroxysmi hebdomadibus, mensibus, annis separantur.
5. Potius instar morbo-

morbi

bitur? et quo jure demum, ob vana symptomatum studia, morborum nomina patientur vim, et, quae ad haec ipsa dirigitur, curatio, confusionem et injuriam?").

- | | |
|---|--|
| <p>morbi acuti speciem prae se ferunt.</p> <p>6. Tempus, a paroxysmo liberum, morbum plus minus sapit.</p> <p>7. Paroxysmi raro nocturno invadunt tempore.</p> <p>8. Ab ipso initio corpori humano habitum morbosum specificum impertiunt.</p> <p>9. Tum per naturam, tum per evacuationes simplicissimas sanari, per cinchonae vero corticem miraculi instar debellari solent.</p> | <p>rum chronicorum decurrunt.</p> <p>6. Tempus liberum plerumque perfectae sanitatis refert imaginem.</p> <p>7. Paroxysmi saepe noctu ingruunt.</p> <p>8. Habitus corporis ut plurimum non est morbosus.</p> <p>9. Natura non nisi lentescere molitur; evacuationes haud raro morbum aggravant, et cinchonae virtus dubia est, aut saltem non major illâ multorum pharmacorum.</p> |
|---|--|

Feb. intermittentes a feb. secundariis quibusdam distinguuntur.

2. Neque omnis febris, quae evidenter ex paroxysmis et apyrexiiis constat, ideo ad febres intermittentes pertinet³⁾. Legitima enim febris intermittens *morbum primum* sistit. At intermittentium formam vel nonnullae ex febribus secundariis exhibent, quae igitur omni pacto ab illis distinguuntur.

3) JUNCKER diss. de simulatis febribus intermittentibus in viscerum laesionibus. Hal. 1756. J. P. FRANK de period. affect. ordin. familiis.

distingui debent⁴⁾. Alia nempe est earum prognosis, aliaque medendi ratio. Morbum, ad spectum febris intermittens prae se ferentem, ipsa aliquando graviditas inducit⁵⁾. Idem de uteri osteo-steatomate dicendum⁶⁾. Species quartanae, a prorumpente dente ultimo molari ortae, nobis nota est. Evolutionem luis venerea a symptomatibus febrium intermittentium comitari, saepe saepius conspeximus⁷⁾. Idem de lepra fertur⁸⁾. In hysteria⁹⁾, in arthritide, in calculo bilioso¹⁰⁾,

S 2 in

- 4) J. P. FRANK de affect. periodic. ordinand. familiis.
- 5) HOFFMANNI system. ration. T. IV. Sect. 1. c. 3. §. 18.
- 6) In museo pathologico R. Universitatis Ticinensis osteo-steatoma uteri conservatur, quod in cadavere aegrae detectum fuit, quae singula febris intermittens perniciosae emeticae symptomata exhibuerat. J. P. FRANK opuscul. posthuma. Vindob. 1824. p. 93.
- 7) Similes observationes describuntur a DEIDIER de morbis vener. obs. 4. (tertiana); a BALLONIO epid. et ephem. L. II. Const. aestiv. a. 1575. p. 86. Const. hyemal. ejusdem p. 104. ab A. MONRO eph. d'Edimb. T. VI. art. 47. obs. 9. (quartana) etc.
- 8) J. P. FRANK epit. T. IV. p. 213.
- 9) WEDEL Eph. Nat. Cur. Dec. I. a. 2. obs. 193. FRAUNDORFER ibid. Dec. III. a. 5 et 6. obs. 136. SAUVAGES nosol. method. l. c. art. 9. No. 3.
- 10) J. M. VORWALTNER Eph. Nat. Cur. Dec. III. a. 5. 6. obs. 109. (Febris quarto quovis die accedens, silensque post 120 calculorum biliosorum evacuationem); HEUERMANN vermischte Bemerkungen. 1. B. K. 3. p. 9.

in scorbuto¹¹⁾ et in chlorosi haud raro febricula, aspectu intermittens, observatur. Ita in angustatione urethrae¹²⁾. Suppurationes vesicae urinariae vel prostatae, omnibus febrium intermittentium symptomatibus stipatas, praesertim frigore corpus concutiente ac largis sudoribus, pluries observamus. Nullo autem alio in morbo febres secundariae aspectum febrium intermittentium legitimarum saepius usurpant, quam in phthisi pulmonali. Distinguuntur vero in genere febres secundariae, ex suppurationibus ortae, (febres hecticae) a legitimis intermittentibus ex praesentia signorum alterius morbi; ex habitu aegri, potius tabifico, quam cachectico; ex sedimento puriformi, non lateritio urinarum; ex rebelli vel exasperato morbo, ob adhibitum corticem cinchonae officinalis; ex absente forte constitutione annua febribus intermittentibus favente; ex typo quotidiano, qui in legitimis intermittentibus sat rarus est, vel ex accessionibus anomalis, aut vespertinis. Porro: „in febre intermittente, ait insignis practicus¹³⁾, accessiones sunt longiores, tum tria alia tempora horroris, caloris et sudoris, accuratius definiuntur, et in decessionibus febris ex toto intermittit.

Verum

11) ETTMÜLLER opp. T. II. P. 2. — Coll. consult. cas. 22. TIMAEUS cas. med. L. VIII. cas. 15.

12) EVERARD HOME *practical observations on the treatment of Strictures in the urethra and the oesophagus.* London 1797. p. 64.

13) HEBERDEN l. c. p. 143.

Verum hectica nunquam adeo remittit, quin articularum motus concitetur, decem minimum ictibus in sexagesima horae parte superans modum naturalem.“ Attamen nullum e signis, hucusque traditis, saltem separatim consideratum, diagnosin indubiam reddit. Ipsae enim febres intermittentes interdum sub larva alterius morbi apparent; habitus aegri, vel latente suppuratione non semper tabificus; in ipsis intermittentibus legitimis urina non raro puriformis; et hae ipsae febres interdum a primis cinchonae dosibus exasperantur; annua tandem constitutio saepe in morbum specialem, de quo agitur, non influit. Nec desunt febres secundariae quotidie, vel et alternis diebus, matutinis horis apparentes¹⁴⁾, magno frigore stipatae. Ita non omnes febres intermittentes tam perfecte intermittunt, ut pulsus constanter normalis evadat. Exemplo sint febres subcontinuae. Postremo non ignorandum, posse febrem intermittentem legitimam, cum morbo alias febrem secundariam pro comite habente, societatem inire¹⁵⁾. Quam arduum sit, hanc diagnosin instituere, non est cur moneam.

3. Videri posset, difficile admodum non esse, *Diagnos. febr. inter. manifestae.* diagnosin febrium intermittentium, quas *manifestas* nuncupavimus, instituere: atque ita quidem

14) Acta mea Instituti Clinici Vilmensis. Annus Primus.
p. 99.

15) Nonnunquam phthisicos, simul vera febre intermittente affectos, pertractavi.

dem res saepe se habet, dum morbus per aliquot dies, paroxysmis cum apyrexiiis alternatim apparentibus, indolem suam manifestavit. Ast longe aliter est a primo morbi initio. Tunc enim haud facile determinari plerumque potest, utrum ingruens febris ad intermittentes, an ad continuas pertineat. Hac sub rerum positione ex eo statum morbi conjectura saltem attingimus, quod in genere febres intermittentes frigore intensiore atque diuturniore invadunt; quod subsequens calor rapide crescit, et cito sudore excipitur. Sed vel absoluto post spatium aliquot horarum febris decursu, dubitari adhuc potest, an fuerit paroxysmus febris intermittens, an *ephemera*¹⁶⁾. Apyrexiam hinc a convalescentia quodammodo distinguere nos docent peculiaris cutis amoena et subfrigida temperies illi propria, pulsum conditio a legitima convalescentia aliena, habitus aegri febrilis et notio morborum regnantium. Notandum quoque est, quod febrium intermittentium paroxysmi tempore diurno ingruendo, apyrexias noctis curriculo relinquant, quo fieri posset, ut aeger obdormiens eam non animadvertat. Oportet igitur medicus aegros de febre intermittente suspectos nocturnis quoque horis visitet.

Diagnosis
febr. sub-
continuae.

4. Distinguuntur *subcontinuae febres* a febribus continuis, quoniam illae exacerbationibus et remis-

16) GALENUS de art. cur. ad Glauc. L. I. c. 2. — SWIETEN comment. ad aph. 728.

remissionibus longe magis conspicuis insigniuntur, quarum priores saepe cum notabili horrore incipiunt, posteriores copioso sudore terminantur. Porro febres subcontinuae simul cum intermittibus grassari solent, aut ex istis sive neglectis sive male tractatis evolvuntur, iterumque facile in eas transeunt. Et sedimentum lateritium, quae urina in subcontinuis instructa esse solet, hinc ad diagnosin instituendam conferre valet. Cave vero, ne febres catarrhales, et gastricas, praecipue in puerperis, quae non raro febrium subcontinuarum instar decurrunt, pro intermittibus declares.

5. Quoad febres intermittentes *larvatas*, quae potius *chronici morbi* sub larva apparent, sequentia probe adnotari debent. Febribus intermittentibus grassantibus, quivis morbus, periodice recurrens, pro suspecto habeatur; facile enim pertinebit ad hanc morborum classem. In hoc numero praecipue sint morbi supra enumerati¹⁷⁾; et inter eos maxime, qui benignam indolem prae se ferunt. Semper enim experti sumus, diagnosin febrium intermittentium larvatarum *benignarum* majoribus longe difficultatibus premi, quam *perniciosarum*. Quotidie enim accidit, ut morbi, quos febres intermittentes larvatae benignae simulant, utpote levioris momenti, v. c. odontalgia, opportunis adhibitis auxiliis brevi evanescant. Hoc vero in morbis gravioribus, e. c. in apoplexia, vix contingere solet,

Diagnosis
aliar. feb.
larvat.

17) §. XXIII. 3.

solet, nisi ex classe intermittentium originem trahant. Quamobrem, si e. g. hodie ad aegrum ob gravem morbum decumbentem vocaris, quem postera die praeter omnem expectationem fere sanum inveneris, eo minus de febre intermittente larvata dubita, quo magis constitutio epidemica hujusmodi morbis favet. Accedit, ut febres intermittentes larvatas non raro uno eodemque in aegroto febres intermittentes manifestae praecedant. Porro, quamvis in illis symptomata febrilia in genere desiderentur, ingruit tamen saepe paroxysmus cum quodam horrore. — Superest monitum! Quum nomina, quibus febres intermittentes larvatae designari solent, utplurimum a symptomatibus, quae illis formam conciliant, deducta sint; cavendum, ne arbitremur, cognito morbi nomine etiam illius essentiam notam esse. Ad hanc respiciendo febres intermittentes larvatae, quae maniacae, cardialgicae etc. dicuntur, potius encephaliticae¹⁸⁾, gastriticae etc. nuncupandae forent.

Diagnosis
febr. inter.
infantum.

6. Febres intermittentes interdum maxime in infantes grassantur. Quo tenuior eorum aetas, eo difficilius morbus cognosci solet. Ne illum praetervideamus, toties febris intermittens suspicio haberi debet, quoties favente annua constituitur.

18) Cfr. *Mémoire sur quelques phlegmasies cérébrales, présentées comme cause de fièvres intermittentes pernicieuses*, par Mr. ITARD. V. *Revue med.* Octob. 1823.

stitutione tali aegritudinum generi, infantes alternatim mox valent, mox aegrotant, praecipue si accessiones febriles copiosis sudoribus terminentur. Praeterea quum medicus aegrotulis continuo adstare nequeat, illorum nutrices alique custodes probe edocendi sunt, ut ad phaenomena febrium intermittantium gentilitia adtendant deque illorum sive praesentia sive absentia rationem reddant. Inter febres intermittentes perniciosas nulla aetati infantili communior eâ, quae comatosa dicitur. Quomodo haec perniciosa febris a communi encephalitide et a hydrocephalo acuto distinguenda sit, suo loco tradetur.

7. *Diagnosis febrium intermittantium vel benignarum vel perniciosarum*, tum ex statu paroxysmi, tum ex eo apyrexiae desumitur. Cavendum autem, ne ex paroxysmo, inconsueto quodam symptomate stipato, statim febrem intermittentem perniciosam arguamus, praecipue dum aegri systemate nervoso delicatiori instruuntur. Hoc enim in casu terrificata symptomata vel in benigna febre conspici solent. Attamen laesio functionum vitalium in febribus intermittantibus magnaue vocis a statu normali aberratio¹⁹⁾, nunquam parvi facienda. Haec regula sacra esto, si agatur de senibus, de locis

Diagnosis
febr. inter.
benigna-
rum et
pernicio-
sarum,

19) Vocem in multis febribus intermittantibus perniciosis debilem, tremulam, raucam, nasalem, ingratam evadere, jure monet egregius PUCCINOTTI *storia etc.* p. 157.

locis uliginosis, calidis²⁰⁾, et de tempore aestivo vel autumnali. Absit vero, ut in vulgarem errorem incidamus, febres intermittentes perniciosas ceteris anni temporibus extraneas judicandi. Observavimus eas pluries Viennae mensibus Aprilis et Maji. Nil autem magis suspicionem de latente febre intermittente perniciosa injicit, quam, si vel in ipso stadio apyrexiae, inconsueta occurrat virium prostratio, simul cum proclivitate ad lipothymias, capitis dolore, temulentia²¹⁾, faucium ariditate, lingua sicca, rubra, anxietate, et pulsu exiguo. Postremo nosse juvat, febres intermittentes perniciosas praecipue typum subcontinuae, quotidianae, et tertianae sequi. Si sequantur eum tertianae duplicis, facile paroxysmus unius diei ad perniciosam pertinebit, alterius ad benignam, uti aliquoties conspeximus. Rara est febris intermittens perniciosa, quartanae typum exhibens. Paucae, quae a nobis observatae, fuere omnes algidae. Febres intermittentes non ex propria natura, sed ex alieno morbo iis socio, perniciem desumere, aliquis putavit. Hoc quidem interdum fieri posse constat²²⁾; sed in genere contrarium asseri-

20) Facile hinc intelligitur monitum eximii medici Romani DE MATTHAEIS: „monitum idcirco volumus ad praxeos utilitatem, *perniciosas febres longe foecundiores et numerosiores esse, quam vulgo censetur.*“ (Ratio instituti clinici Romani. Epicris. ad. I. Histor.).

21) BURSERIUS l. c. §. CI.

22) HELLWIG (opusc. phys. med. 69. p. 226.) de vidua

asserimus, eo, quod in febre perniciosa intermittente *omnia* symptomata periodice recurrunt et fugatis prius, si adfuerint, complicationibus, cinchona mature riteque adhibitâ, illico debellantur, quod in alieno morbo non facile contingeret.

8. Quamvis febres intermittentes quotidianae, tertianae, quartanae etc. non ita inter se differant, ut instar morborum diversorum, tot singulis in capitibus, antiquiorum more, pertractari debeant; attamen multum refert, ut illarum *typus*, quo citius id fieri potest²³⁾, accuratissime determinetur. Ita enim et morbi exitus, et tempus administrandis febrifugis magis accommodatum, facilius indicari queunt. — Quum febres intermittentes relate ad typum divisae essent in *regulares* et *irregulares*²⁴⁾, notandum est, ut febris pro
regu-

narrat, quae per trium hebdomadum curriculum febre intermittente quartana duplici laboravit, cui tandem convulsiones lethales supervenere. Similia leguntur apud J. LANZONI Eph. Nat. Cur. Dec. II. a. 9. obs. 209. Ipsemet episcopum Vilmensem H. STROYNOWSKI, senem gracilem, ex apoplexia fortuito paroxysmo febris intermittens quotidianae superveniente, amisit.

23) GALENUS (de crisibus L. II. c. 4.) ait, illum medicis haud esse adnumerandum, qui ingruentem tertianam ab ingruente quartana distinguere nescit. FORESTUS monet, medici esse, tertianam in primo morbi limine cognoscere, quum paroxysmis jam alternis diebus comparentibus, quaevis anus illam definire sciat.

24) §. XXV.

regulari declarari possit, non absolute requiri, ut illius paroxysmi determinato horae momento, quemadmodum in *febre consistente*²⁵⁾ contingit, redeant. Possunt enim febrium intermittentium paroxysmi solito vel *citius* (*febres intermittentes anticipantes*) vel *tardius* (*febres intermittentes postponentes*) ingruere, quin ideo irregulares evadant²⁶⁾.

Diagnosis
quotidia-
nae.

9. Inter febres intermittentes regulares minus sane communis est *quotidiana*, de qua ne apud *Hippocratem* quidem mentio fit. At existentiam illius immerito alios²⁷⁾ negasse, pro certo habemus. Non inficiabimur quidem febres, typum quotidianae sequentes, saepe ad hecticas, vel saltem ad tertianas duplices pertinere, ac revera, priusquam febris pro quotidiana declaretur, requiritur non solum, ut primaria sit, sed etiam ut paroxysmi quotidie, eadem circiter hora, eademque vi, iisdem

25) Febris intermittens *consistens* ea est, cujus paroxysmi determinato horae momento ingruunt. Vidi illarum haud paucas, quae revera horologii vices agere potuissent!

26) AMAT. LUSITANUS (Cent. V. curat. 19.) de febre tertiana narrat, cujus paroxysmi tres horas anticipabant. De quartana regulariter decem horas anticipante legitur in Eph. Nat. Cur. Dec. II. a. 8. obs. 124.

27) FERNELIUS patholog. Lib. IV. c. 12. PLATER prax. med. T. II. SENNERTUS Lib. II. de febrib. c. 19. SENAC l. c. C. I. p. 15.

iisdem symptomatibus stipati sint, et ut sibi alternis diebus *non* respondeant. Hujusmodi febres, quarum praesentiam FR. HOFFMANN²⁸⁾, WERLHOF²⁹⁾, BURSERIUS³⁰⁾ et J. P. FRANK³¹⁾ quoque confirmant, et nos conspeximus³²⁾. Paroxysmi febris intermittens quotidiana, morbi ut plurimum vernalis, plerumque mane, inter horam sextam et nonam, apparere solent, idque nunc anticipando³³⁾ nunc postponendo³⁴⁾. Idem fatentur DODONAEUS³⁵⁾ et MADAI³⁶⁾. Contra GALENUS³⁷⁾ contendit, febres intermittentes quotidianas *vespere* vel *noctu* ingruere, quod FORESTUS³⁸⁾, TIMAEUS³⁹⁾, RUBEUS⁴⁰⁾, BINNINGER⁴¹⁾ alique⁴²⁾ confirmant. Opinionem ista diversitas forte varietati

28) Med. rat. syst. T. IV. P. I. Sect. I. c. 3.

29) Obs. de febr. Sect. IV. §. 4.

30) Op. cit. §. CXXXV.

31) Epitome etc. Vol. I. p. 41.

32) Febres intermittentes typum quotidianum longe frequentius in Lithuania, quam in Italia et Germania sequuntur.

33) Sic in Lithuania.

34) WERLHOF l. c. Sect. VI. §. 4. p. 271.

35) Annot. in BENIVIENTI. Cap. 59. p. 221.

36) l. c. §. 151.

37) De crisi lib. II. c. 5.

38) Lib. III. obs. 20. 21.

39) Cas. Lib. VIII. Cas. 16.

40) Nocturn. exercitat. 17. 20. 23.

41) Cent. I. obs. 92.

42) PH. J. SCHENFELDER hist. enarrat et curat. Lib. I. hist. 35.

rietati climatis, aut quod potius existimamus, confusioni febrium intermittantium cum catarrhalibus et hecticis, quae horis vespertinis delectantur⁴³⁾, adscribenda est. Ex tota enim a GALENO relictæ febris intermittens quotidianæ descriptione⁴⁴⁾, characteres febris hecticæ translucent⁴⁵⁾.

Diagnosis
tertianæ.

10. Communissima inter febres intermittentes *tertiana*⁴⁶⁾, tum simplex tum duplex est. Ordinetur horis matutinis⁴⁷⁾, concessis tamen exceptionibus⁴⁸⁾. Frigus conspicuum est, sæpe cum membrorum

43) N. 2. 44) De crisis. Lib. II. c. 3. 5.

45) Sic contendit, febrem quotidianam perfricationem seu frigus tenue habere (l. c. c. 5.), — calorem mittem, sed mordacem obvenire, — sudorem ab initio non apparere, — pulsum minorem esse, quam in quartana et lentior, quam in tertiana (de art. cur. ad Glauc. Lib. I. c. 7.), — sitim deesse aut vix urgere (Lib. II. c. 5. et de typis c. 3.), et apyrexias imperfectas esse (de differentia febrium). Mirum hinc non est, hujusmodi GALENI opiniones contradictores in illos invenisse, qui de legitimis quotidianis locuti sunt. Spectant huc MADAI l. c. §. 153., BÜCHNER misc. phys. med. a. 1730. febr. 873. TANNA l. c. p. 55 — 59.

46) GRIEVE diss. de febribus tertianis intermitt. Edinb. 1770. WYNACKER diss. de febre interm. tertiana. Lond. 1790.

47) Sic E. STAHLII (colleg. casual. cas. 21. Schol. §. 4.) sic mea experientia. Contra CULLENII (*first lines* §. 56. 59.) febres tertianas horis vespertinis invadere contendit. Valet id verisimiliter de Scotia.

48) LANZONI (Eph. Nat. Cur. Dec. II. a. 9. obs. 209.

brorum rigore⁴⁹); calor urens, siccus universum corpus aequali ratione detinet. Aequalis quoque est sudor. Sitis magna.

11. Febris intermittens *quartana*⁵⁰), in qui-
busdam regionibus, quae vel maxime febribus in-
termittentibus favent, rara est⁵¹). Ut plurimum au-
tumni tempore grassatur. Visa tamen est et ver-
nali tempore⁵²); nec non epidemica⁵³). Paroxys-
mus pomeridianis vel vespertinis horis in con-
spectum venire solet. Maximo et diuturno stipatur
frigore, quod ad quindecim horas protractum
fuisse legimus⁵⁴). Calor, a morbi saltem iaitio,
minor, quam in tertianis⁵⁵). Pulsus frequentiam
hisce febribus alias propriam raro attingit, obser-
vatur praeterea inaequalis⁵⁶). Nulla ex febribus
inter-

Diagnosis
quartanae.

de tertianae accessione nocturna, et mihi aliquoties
visa, testatur.

49) Observatio GALENI (art. curat. ad Glauc. c. 5.) et
FORESTI (l. c. obs. 4. Schol. GALENI de different.
febr. c. 5.).

50) FELLINGER diss. de febre quartana. Groning 1784.
— KREYSIG observat. quaedam de febribus intermit-
tentibus quartanis. Viteb. 1797.

51) KORTUM l. c. Rarissima et in Lithuania.

52) COLE nova hypoth. super febr. intermitt. Cap. VII.
§. 4. GRÜLING curat. med. Cent. IV. obs. 72. MA-
DAI l. c.

53) A. 1616. in Germania. SCHNURRER l. c. p. 159.

54) GRANT op. cit.

55) GALENUS art. cur. l. c. et de different. febr. c. 5.

56) GALENUS l. c.

intermittentibus habitum corporis magis cachecticum reddit, quam quartana.

Diagnosis
quintanae.

12. Diagnosis febris intermittens *quintanae* facile errori subjicitur, quod nempe cum tertiana, cujus forte unus paroxysmus non erupit, confundatur. Quamvis alias sat rara haec febris sit, aliquoties tamen eam observavimus. Observarunt HIPPOCRATES⁵⁷⁾, TULPIUS⁵⁸⁾, SWIETEN⁵⁹⁾, STOLL⁶⁰⁾, QUARIN⁶¹⁾, TISSOT⁶²⁾, C. W. SACHSE⁶³⁾ etc.

Diagnosis
alior. ty-
por.

13. *Septanae* facile cum quartanis, in quibus paroxysmus unus desideratur, confunduntur. In febribus *omni mense* redeuntibus dijudicandis, memores esse juvat, illas potius ad catamenia, ad haemorrhoides, adque vermes intestinales, quam ad legitimas intermittentes spectare posse.

Diagnosis
indolis
morbi.

14. Sapienter KLEINIUS: „genium quovis fere anno habent (febres intermittentes) alium atque alium, ut, qua methodo currente anno liberaveris, eadem ipsos anno jam vertente e medio forsan tollas⁶⁴⁾.“ Eadem haec verba febribus intermittenti-

57) Epidemicor. Lib. I. Sect. 3. Text. 2.

58) Obs. med. Lib. III. c. 52. (menses 18 in puella duraverat quintana).

59) Comment. aph. 746. (quintana ex quartana orta, post quartam accessionem evanescens).

60) Ratio medendi. T. III. p. 75.

61) Meth. med. febr. b.

62) *Avis au peuple*. c. 18. §. 251.

63) Nova acta Nat. Cur. T. I. obs. 98. (sex paroxysmi).

64) Op. cit. p. 98. De imperio annuae constitutionis

tentibus, quatenus in *variis regionibus* obveniunt, adaptari queunt⁶⁵). Maxime igitur refert, febres intermittentes, quatenus peculiarem medendi rationem exposcunt, a sese invicem distingui. Ut doctrina hujusmodi facile concipi possit, eam sequenti modo exponimus. Appellabimus *simplices* eas febres intermittentes, quae ita constitutae sunt, ut sine damno mox cortex cinchonae officinalis vel remedia similia adhiberi queant; *complicatas* autem eas, quarum curatio magis intricata est. Complicatas porro, prout methodum vel antiphlogisticam, vel antirheumaticam, vel antigastricam exigunt, dividemus in febres intermittentes *inflammatorias, rheumaticas et gastricas*. Sed vel complicationes hujusmodi duplicis sunt generis: nunc enim, ablata per opportuna remedia complicatione, febris

in febrium intermittentium indolem pulchre quoque locutus est E. ACERBI v. *Annotazioni di medicina pratica. Milano 1819. Ann. I. Cap. delle febbri periodiche.*

65) Praxis, quam vicissim in Insubria, Austria et Lithuania exercui, me edocuit, imperium climatis nullo in morbo tam evidens esse, quam in febribus intermittentibus. Debet igitur medicus proprietates febrium intermittentium illius regionis, in qua praxin exercet, peculiari studio perscrutari atque probe cavere, ne illis praecepta therapeutica, quae ex observationibus sub alieno coelo collectis emergunt, praepostere adaptet. De indole febrium intermittentium in Lithuania scripsi (*Pamiętnikow Towarzystwa Lekarskiego Wilenskiego. T. II.*).

febris intermittens simplex remanet, auxiliis diathesi periodicae accommodatis pertractanda; nunc vel ope illorum remediorum jam omnis tollitur morbus.

Diagnos
febris int.
simplicis.

15. Absentia symptomatum diatheseos inflammatoriae, rheumaticae, et gastricae, plerumque de natura *simplici* febrium intermittentium testatur. Plerumque, inquam, nam vel absentibus complicationum indiciis, attamen complicatio interdum latet. Suspicamur tale quid, dum praeter omnem expectationem morbus remediis febribus intermittentibus simplicibus accommodatis rebellis est, atque eo magis, quo magis indoles aliorum morborum simul regnantium, sive inflammatoria, sive rheumatica, sive gastrica, observatur. Sicuti autem absentia symptomatum complicationes indicantium fallax est, ita et illorum praesentia. Simplicissimas saepe febres intermittentes vel inflammatorias, vel rheumaticas, vel gastricas symptomatibus insignitas conspeximus. Quo magis tunc in supposita hac complicatione abigenda intenti eramus, eo magis crescebant illius apparentia symptomata, donec ad usum corticis cinchonae pervenerimus, quo facto extemplo totus tollebatur morbus. Ut *apparentem* hujusmodi febrium intermittentium *complicationem*, a *reali* distinguere possitis, securum, quoad fieri potest, diagnosticon aperiamus. Respicite ad stadium apyrexiae; si in eo symptomata complicationem unam alteramve indi-

indicantia continent, de *realis complicationis* praesentia vix ambigite. Si vero symptomata illa sub paroxysmi solummodo tumultu in conspectum veniant, cessent vero ingruente apyréxia, de *apparente tantum complicatione* sat tutum statuите judicium.

16. Febris intermittens *inflammatoria* cum fortiori, sed non protracto frigore invadere solet, Diagnosis
febris int.
inflammato-
riae. rapide enim succedit calor maximus; rubent scilicet facies, oculi et universa cutis; arteriae quotquot sunt, imprimis carotides et temporales vehementer pulsant. Urgent symptomata catarrhalia, et saepe sanguis e naribus stillat. Caput acutissimo dolore detinetur; hypochondria et regio epigastrica tensionem exhibent, attactumque saepe⁶⁶⁾ non ferunt; succedunt vigiliae, veternus et interdum deliria. Urina ignea, sedimento lateritio, saepius puriformi instructa. Sudor, plerumque moderatus, paroxysmum nequaquam terminat; pul-
T 2 suum

66) De *reconditis* inflammationibus febrium intermittentium sociis audiatur A. SPICELIUS (de semitertiana s. subcontinua). „Ego, inquit, plures, qui febre quotidie sese exacerbante, praecipue circa vesperam, aut statim post meridiem in modum duplicis tertianae perierunt, secui, et in his non putredinem in vena cava, sed inflammato alicujus primi regiminis viscere, vel alia aliqua recondita parte, inflammationem paulo minorem inveni, quam ut dolor ab aegro, vel tactu hypochondriorum a medico et aegroto cognosceretur.“

suum enim frequentia et plenitudo, sitis, calores fugaces, symptomatum catarrhalium aliorumque phlogosin partis cujusdam indicantium⁶⁷⁾, praesentia, de imperfecta apyrexia testimonium praebent⁶⁸⁾. Paroxysmi typum tertianae duplicis sequi, aut irregulariter decurrere solent. Non desunt tamen exempla quartanarum inflammatoriarum⁶⁹⁾. Nec rarissimae sunt febres intermittentes perniciosae inflammatoriae, inprimis illarum, quae apoplecticae, pleuriticae, asthmaticae, catarrhales et arthriticae dicuntur⁷⁰⁾. Febris intermittens inflammatoria, grassantibus aliis morbis inflammatoriis oriri solet, praecipue tempore vernali et aestivo.

67) RIVERIUS ait: „In febrium acutissimarum et perniciosarum curatione, hoc diligenter animadvertendum, rarissime eas fieri sine interna et peculiari visceris cujusdam affectione et plerumque inflammatione. Quare nunquam omittendam curam hypochondriorum, capitis, thoracis, uteri, renum et vesicae, ut omni ratione investigemus, quae harum partium insigniter laboret, et ei quod fieri potest subveniatur.“ (Praxis med. Lib. XVII).

68) „Uno dei caratteri i più certi della flogosi combinata alla periodicità, è la sussistenza di qualche sintoma infiammatorio anche durante la quiete de' parossismi.“ PUCCINOTTI storia etc. T. I. p. 26. — NEUSCHAEFER diss. de syncho paroxysante, vulgo tertiana vernali. Gies. 1786.

69) FORESTUS observationum Lib. III. Obs. 32. Cfr. MORGAGNI de sed. et caus. morb. Epist. XXI. No. 43.

70) PUCCINOTTI l. c. p. 25.

aestivo (quo, praesertim in regionibus calidis⁷¹), siccis et montosis⁷²), peregrinatores ad caput, rustici et hortulani ad spinam insolantur⁷³), in plethoricis gravidis, haemorrhoidariis hominibusque, morbis inflammatoriis jam prius obnoxiiis⁷⁴), abusu vini sive cremati deditis, post suppressas adsuetas haemorrhagias, ab animi pathematibus fortioribus, a motu corporis nimio et usu praepostero prophylacticorum⁷⁵).

17. Vernali et aestivo tempore, favente con-
stitutione annua morbis rheumaticis⁷⁶), dum fe-
bres

Diagnosis
febr. int.
rheumati-
cae et ca-
tarrh.

71) Cfr. infra historia Haemitritei Daciae.

72) PRINGLE *Krankheiten einer Armee* p. 246.

73) „Ma una altra riflessione è da farsi quanto alle insolazioni, ed è questa, che stando di mezza state a torme nelle campagne romane gli agricoltori, ed a cielo scoperto tengono sempre esposto ai raggi cocenti del sole le loro schiene, incurvati come sono ne' lavori del mietere, dell' arare, del seminare ed altre simili cose; l'azione di quel forte stimolo è risentita principalmente dalla midolla spinale, la quale quanta parte abbia nella produzione de' più gravi fenomeni delle perniciose, lo mostrano le perniciose tetaniche e le epilettiche; e a noi lo mostrano alcune comechè rare rachiotomie.“ PUCCINOTTI lettera etc. p. 12.

74) „Si quae pars ante morbum laboraverit, ibi novus morbus se figit.“ HIPPOCRAT.

75) „Ho veduto alcuni giovani dell' ospedale usare il detto preservativo (la china coll' acqua vita), ed essere: primi a cader nelle febbri, e gli ultimi a liberarsene.“ PUCCINOTTI lettera etc. p. 17.

76) P. J. BERGIUS *Gedanken von den Ursachen der Wech-*

bres intermittentes ab humiditate, frigore aliisque atmosphaerae vicissitudinibus excitantur, aut in aegrotis aliunde rheumaticis et arthriticis incommodis subjectis, locum obtinent, facile *naturam rheumaticam* aut *catarrhalem* induunt. Nil miri hîc subesse, haud difficile is intelliget, qui perpenderit, quantum abdominis conditio in febress intermittentes influat, quantumque abdomen cum systemate cutaneo consensum habeat⁷⁷). *Febres intermittentes rheumaticae*, doloribus capitis, lumborum et artuum (a consuetis in febre intermittente membrorum molestiis probe distinguendis) insigniuntur. *Febres intermittentes catarrhales* tussi pectorisque cruciatibus stipantur. Utrisque interdum communia sunt coryza, tormina abdominis, fluxusque alvi.

Diagnosis
febr. int.
gastricae
in genere.

18. *Febris intermittens gastrica* catervam symptomatum gastricorum durante paroxysmo exhibet, quorum pars ad ipsam apyrexiam protrahitur. Sunt autem haec symptomata diversa, prout febris intermittens gastrica est vel *saburralis*, vel *biliosa*, vel *pituitosa*, vel *verminosa*.

Diagnosis
febr. int.
gastr. saburralis.

19. *Febris intermittens gastrica saburralis* insignitur capitis gravitate, anorexiâ, oris amarore, screa-

selfieber und deren Uebereinstimmung zwischen ihnen und den Flussfiebern. v. Schwedische Abhandl. J. 1785. p. 274.

77) Pulchre de hac re locutus est GAUTHIER. Vid. HUFELAND's Journ. der prakt. Heilk. XVIII. B. p. 151.

screatione frequente, ructibus nidorosis, dolore ventriculi, alvi obstructione aut diarrhoea faeculenta. Obvenit haec febris praecipue in pueris aliisque hominibus, gulae indulgentibus, aut victu crudo utentibus vitamque sedentariam ducen-
tibus.

20. *Febres intermittentes gastricae biliosae* in Diagnos. febr. int. gastr. biliosae.
regionibus calidis, uliginosis, temporeque aestivo omnium communissimae⁷⁸⁾, annuntiantur⁷⁹⁾, insigniunturque faciei, albugineae oculorum, aliarumque partium, interdum universi corporis flavedine morbosa⁸⁰⁾, genis profunde rubentibus, ad nasi latera pallescentibus, linguâ muco flavo, fuligi-

78) WILLIS de febribus. Cap. XVI. LANCISI l. c. p. 277. (Epidemia Balneoregii). PUCCINOTTI *storia etc.* T. I. p. 27. („Non solo particolari casi, ma intiere annuali epidemie de febbri periodiche hanno portato questo carattere bilioso al massimo grado“) et *Lettera etc.* p. 13. („Veramente chi ha fatto a Roma studio particolare su queste febbri quasi giurerebbe su quella massima di GALENO: tertianas semper fieri jecore laborante“).

79) „L'omopatia (complicazione) biliosa . . . è quasi sempre preparata innanzi allo sviluppo di esse febbri e ne precede o ne accompagna le prime accessioni.“ PUCCINOTTI *storia etc.* T. I. p. 29.

80) Flavedine, inquam morbosa, ne medici juvenes, Europae septentrionalis, dum illis contingit aegrum, in regionibus meridionalibus natum curare, cutim flavam, quam iste a natura impertitam habet, pro symptomate bilioso declarent, quod plus vice expertus sum.

fuliginoso obducta, halitu foetente, anxietate, nausæ, vomitu bilis aeruginosae, admodum amaræ, causticae⁸¹⁾, flatibus epigastrium percurrentibus, doloribus vagantibus sub costis spuriis, praecipue hypochondrii dextri⁸²⁾, diarrhoeâ biliosâ, pulsu parvo irregulari, urina ex rubro flava, jumentosa, sudore⁸³⁾, sputis, narium muco⁸⁴⁾, sanguinisque sero flavescentibus, viridescentibus, atque apyrexiiis sat perfectis⁸⁵⁾. Dum febres, de quibus sermo est, *perniciosae* evadunt, icterum, cardialgiam, emesin, choleram, colicam, pleuritidem et delirium pro symptomate agnoscere solent. Ansam illis porrigunt animi pathemata et transpiratio suppressa⁸⁶⁾; item praeviae febres intermittentes et affectiones viscerum abdominalium inde relictæ. Caeterum bilem sine *evidente* hepatis labe (instar salivæ sine vitio idiopathico parotidis) copia et qualitate peccare posse, cum

81) „*La materia del vomito è caustica; caduta sul mattonato lo fa ribollire come quando vi si getta a gocce l'acido solforico.*“ PUCCINOTTI *storia etc. T. I. p. 28.*

Cfr. NOTARJANNI l. o.

82) PUCCINOTTI l. o.

83) „*La materia del sudore tinge in giallo i pannolini.*“ PUCCINOTTI l. o.

84) NOTARJANNI l. o. PUCCINOTTI l. o.

85) PUCCINOTTI l. o. p. 29.

86) FR. HOFEMANNUS inquit: „Nil magis bilem vitiat, eamque impuram et salibus causticis refertam reddit, quam solemnis per superficiem corporis prohibita evacuatio.“ PUCCINOTTI l. o. p. 28.

cum aliis ⁸⁷⁾ contendimus. Quodsi autem *affectio inflammatoria hepatis*, febrem intermittentem concomitans, bilis secretionem largiorem redderet, morbus pro *febre intermittente inflammatorio-biliosa* definiendus foret ⁸⁸⁾. Ne vero ex unis ventris

87) §. XXVI. No. 1. (16).

88) Febres intermittentes, quae in Vallachia, Moldavia, Bessarabia, Chersoneso Taurica et in Hungaria inferiore, verbo, in Dacia, endemice grassantur, ad indolem gastrico-inflammatoriam accedere videntur. Illas, duce J. M. MINDERERO (*über den Hemitritaeus in den südlichen Provinzen des Russischen Reiches*. v. HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1809. 2. St. p. 1. etiam Berolini 1809.) pro peculiari morbo sub nomine *Hemitritaei Daciae* quondam (in prima scilicet hujus operis editione §. XLVI.) declaravi, idque immerito. Serius enim plurimi medici experti, qui diu in Dacia praxin exercuerunt, de intermittente illius hemitritaei indole me certiores reddiderunt. Praeterea ipse reliquias hujus morbi saepius Vilnae inter centuriones militum, qui ad exercitum Moldavicum spectarunt, observavi invenique, illas omni sub respectu cum malis, a febribus intermittentibus alias relictis, convenire. Ac re quidem vera, si perpendamus, febres, de quibus sermo est, in regionibus paludosis, aestate in autumnum vergente, noctibus frigidis, dies praeter modum calidos excipientibus, regnare, atque somno in aëre aperto, decubitu super solum humidum, esui nimio fructuum horaeorum et praecipue melonum, animi pathematibus et defatigationi ortum debere, indolem illarum intermittentem ex aetiologia probatam habemus. Accedit symptomatologia, veram imaginem febris intermittens subcontinuae Tortii exhibens. Mor-

tris cruciatibus, inprimis si sub attactu non au-
geantur, ad affectionem inflammatoriam hepatis
aut

bus enim extemplo plerumque horis pomeridianis a frigore, haud tamen constanti, incipit. Mox sequitur calor intensus viscera adurens. Aeger debilitatem artuum, dolorem lumborum, ardorem in regione epigastrica, anxietatem, nauseam, vomituritionem accusat. Accedit vomitus biliosus sine levamine ac sub continua jactatione. Ita pungentes dolores hypochondriorum et pectoris, cum sensu constrictionis totius abdominis. Alvus aut stricta aut laxata nimis. Faeces biliosae, foetidae. Urina parca, obscure rubra, potus coffeae instar, interdum atra. Superficies corporis ab initio sicca, aspera, dein humida. Vigente vomitu sudor copiosus sine levamine prorumpit. Apud plures species urticariae alternatim in cute apparet et evanescit. Sub nixu ad vomitum, vomituque ipso, non raro epistaxis, absque symptomatum imminutione, in conspectum venit. Urgent inquietudo, insomnia, cephalaea, delirium, siccitas oris, sitis inexplebilis, angustia respirationis. Facies collabitur atque a forma consueta valde recedit; oculi in orbita profunde jacent, eorum ictus ferox. Vasa albuginea turgent, ipsa vero albuginea non flavet. Pulsus inconstans. Lingua pura, serius tantum alba, flava, nigra. Circa mediam noctem angustiae, vomitus et calor remittunt, pulsus vero febrilis manet. Secunda morbi die mane morbus de novo exacerbatur, iisdem symptomatibus, sed majori vi urgentibus. Sitis praecipue intolerabilis et potus ingurgitatus vomitu redditur. Versus meridiem nova remissio, citra eam pulsum. Tertia die aeger expergefit sublevatus, et stadium remissionis ad pomeridianas horas protrahitur. Exacerbatio hic in-

aut reliquorum viscerum abdominalium concludas! Pluries enim experti sumus, hujusmodi cruciatus nil nisi effectum ipsius bilis esse.

21. *Com-*

gruens minoris momenti esse solet. Ita exacerbationes longiores sed mitiores, cum exacerbationibus brevioribus sed fortioribus alternatim eodem ordine eademque vi contingunt ad septimam usque diem. Hoc tempore symptomata ad acmen perveniunt. Si tunc vomitus creber spontaneus oriatur, si faeces foetidae, biliosae copiose secedant, si urina multa rubra, — crisis. Alias remissiones evanescunt, febrisque fit quasi continens cum delirio, sopore, cutis colore flavo, singultu, tremoribus, subsultibus tendinum, alvo clausa, abdomine tumido. Mors sequitur die decima quarta, vel si tardissime, die vigesima. Non raro vero morbus in febrem intermittentem transit, sed rebellem, aegrum ad ossa usque emaciantem, interdum tetano vel parotidibus stipatam. Nec *autopsiae cadaverum* alia largiuntur symptomata, quam illa, quae post febres intermittentes observari solent. Inveniuntur nimirum in *cavitate cranii* — fluidum viridescens, vasa cerebri et meningum valde dilatata, et sanguine turgida; in *pectoris cavo* — pulmones sanguine referti, coloris viridis nigrescentis; in *abdomine* singula viscera lurida, viridia, ventriculus et intestina flatibus distenta, arteriae coronariae ventriculi et vasa sanguinea intestinorum admodum ampla, universus tubus intestinalis colluvie obscuro-viridescente, odoris specifici, obductus, tamen sine notis inflammatoriis; hepar volumine auctum et colore solito obscuriore notatum, cystis fellea bile tenaci repleta et lien interdum turgidus. Quodsi MINDERER neget, febres Daciae ad intermittentes spectare, quia cinchonâ non debellantur; ad-

Diagnosis
febr. int.
gastr. pi-
tuitosae.

21. *Complicatio pituitosa* in febribus inter-
mittentibus catarrhalibus obvenire solet. Verisi-
mile est, irritationem membranae mucosae ven-
triculum et intestina investientis ita *mucum* lar-
giri, uti irritatio hepatis bilem largitur. Nec
mirum, si mucus tenax, facile acidam induens
naturam, tubum intestinalem obruendo, sympto-
matum gastricorum cohortem excitet. Inter haec
communis sunt, dolor ventriculi, screatio fre-
quens, vomituriatio, vomitusque pituitae, aphthae
et inquietudo.

Diagnosis
febr. int.
gastr. ver-
minosae.

22. *Febrium intermittantium complicatio ver-
minosa* omni aevo observata est⁸⁹⁾. Communis
obser-

versarii id in morbi quidem principio, at non serius,
concedunt. Et quomodo cortex in febre intermittente,
complicationem gastricam exhibente, nullis praemissis
evacuationibus, conducere posset? Verum MINDERER
praeterea *emetica* damnat. Neque id mirum. Quam-
vis enim autopsiae cadaverum veram inflammationem
non patefaciant, testantur tamen de congestionibus in
cerebro, pulmonibus, ventriculo et hepate. Hae sane
evacuationum sanguinis saltem localium ope ante usum
emeticorum debellandae forent.

89) FORESTUS Lib. III. obs. 44. (febris tertiana in puero
trienni unis anthelminthicis fugata); S. FORMIUS apud
RIVERIUM obs. commun. 12. p. 329. (tertiana rejecta
taenia debellata); J. CHR. WINKLER Eph. Nat. Cur.
Dec. I. a. 6 et 7. obs. 4. (puella annorum quindecim
ope vermifugi a tertiana duplici liberata); CHR. F.
PAULINI ibid. Dec. II. a. 5. append. obs. 22. (quar-
tana expulsis per jalappam vermibus suppressa); GER-

observatur haec complicatio in Lithuania, idque non solum inter pueros, sed etiam inter adultos, praesertim sexus sequioris. Palam illa fit peculiari corporis aegrotantis habitu aliisque symptomatibus vermium, alibi describendis, maxime vero pruritu narium, epistaxi, et inquietudine sub somno, alias vigente apyrexia febricitantibus placide concesso. Ne vero affectiones inflammatoriae glandularum mesenterii, quippe quae saepius symptomata illis vermium intestinalium similia offerant, nos in errorem inducant, cavendum.

23. Postremo ad *complicationes*, quas febres Complicatio febr. inter. cum morbis chronicis. intermittentes, cujuscunque demum indolis, cum *morbis chronicis*, aut saltem, in hominibus valedudinariis, cum praedispositione ad illos ineunt, respiciendum est⁹⁰). Tali complicationi adscribi debet,

BEZ ibid. Dec. III. a. 1. obs. 136. (quartana cum rejectione frustuli carnis suillae putridae a multis vermium circumdati cessans); J. A. HÜNERWOLFF ibid. a. 2. obs. 96. (tertiana rebellis in infante trienni ope calomel devicta); J. J. NEUHOLD act. phys. med. nat. cur. Vol. III. append. obs. 4. (cessatio spontanea tertianae reddito per os verme). Plurimos aegros anthelmintlicorum ope a febribus intermittentibus liberavi; in multis aliis evacuatio ascaridum cinchonae viam sternebat. TORTII enim saepe valet sententia, vermes potius esse *comites*, quam *causam* febrium intermittentium. (Op. c. Lib. V. c. 6. p. 43.).

90) Sic CELSUS: „Neque hercule satis est, ipsas tantum febres medicum intueri, sed etiam totius corporis

debet, quod aliquando febres intermittentes, etiam-
si non perniciosae⁹¹⁾, vitae nihilominus insidias
struunt. Quoties illa obvenit, mutationes, quas
febres intermittentes, tum vigente paroxysmo tum
apyrexiae tempore, propter praesentiam e. c. hy-
steriae, hypochondriasis, scrophularum, haemor-
rhoidum, arthritidis, scorbuti⁹²⁾, atoniae⁹³⁾ etc.
subeunt, probe perpendendae sunt. Hoc enim
opere (pro quo elementa in hujus tractatus cur-
riculo passim obveniunt) neglecto, tota ex libris
hausta scientia ad aegrorum lectos corrui.

§. XXIX.

P r o g n o s i s.

Pericu-
lum.

1. „Quocumque modo (febres) intermiserint,
quod sine periculo sint significant;“ ita HIPPOCRA-
TES¹⁾. Verum neque post detectam corticis cin-
chonae virtutem talem, forte aliter interpretan-
dam²⁾,

habitus, et ad eum dirigere curationem seu supersunt
vires, seu desunt, seu quidam mali effectus interve-
nerunt.“ (Lib. III. cap. 6.).

91) „Sotto il nome di perniciose noi non comprendiamo
già una famiglia particolare di febbri e divise dalle in-
termittenti; ma solamente un genere di febbri intermit-
tenti congiunte a tal patologico disordine di funzioni
organiche che minaccia la vitalità ad ogni ri-
novellarsi de' parossismi.“ PUCCINOTTI storia
etc. Lib. I. p. 50.

92) PUCCINOTTI l. c. p. 32.

93) PUCCINOTTI l. c. p. 35.

1) Aphorismorum Sect. IV. Aphor. 43.

dam²⁾), sententiam pronunciare audemus. Periculi enim plenae sunt febres intermittentes perniciosae; nec ceterae, quamvis re ipsa non perniciosae, omnino innocuae observantur, praecipue dum, ut monuimus, valetudinarios, gravidas³⁾ puerperas, infantes aut senes⁴⁾ invadunt. Intermittens si fiat vere continua, aeger plerumque morietur; *vere*, inquam, continua, nam febris *subcontinua* nequaquam pertinet ad febres continuas. Maxime enim errat REIL, ubi contrarium contendit⁵⁾. Extant febres intermittentes, quae licet minime periculosae, attamen rebelles sunt, et vice versa. In genere febres intermittentes cernuntur graviores, dum epidemice, praecipue autumno, vel etiam vere, subsequente aestate humida, regnant, dum noctu invadunt, in obesis, in potatoribus, in aegris corticem cinchonae vel cibos omnino respuentibus; in iis, qui continua

oris

2) Forte febres continuae, quae ad intermittentes spectant, non sunt periculosae? Cfr. WERLHOFF l. c. Sect. I. §. 4.

3) FR. HOFFMANN (med. rat. systema T. IV. P. I. S. I. c. 2. thes. patholog. §. 18.) docet, gravidas nonnisi partus ope a quartanis liberari. Quartanas ego quidem in gravidis hucusque non curavi, at plures tertianas idque feliciter. Teste J. LANZONIO (Eph. Nat. Cur. Dec. III. a. 5 et 6. obs. 284.) interdum abortus succurrit.

4) ALBERTI diss. de febre intermittente senibus letifera. Hal. 1754.

5) Op. cit. 2. Th. p. 119.

oris siccitate laborant, in arthriticis, vel qui visceribus aliunde labefactatis instructi sunt. Hisce enim in casibus et fere semper, quando febris intermittens, praesertim autumnalis, negligitur aut male curatur, vel sanata febre alia imminet pericula⁶⁾, videlicet (ne dicamus de morbi recidiva⁷⁾), dyspepsia, lienis tumor⁸⁾, obstructions hepatis et glandularum mesenterii, oedema pedum, hydrops ascites, rhachitis⁹⁾, arthritis, scorbutus, hypochondriasis¹⁰⁾, haemorrhoides¹¹⁾, diabetes¹²⁾,

6) A. B. RANOE observata circa febrium intermittentium diuturnarum et male tractatarum sequelas. v. acta R. soc. med. Havniens. Vol. I. p. 385. F. L. BANG observationes practicae circa nexum febrium intermittentium cum aliis morbis ibid. Vol. II. p. 214. — Quodsi gravissimos morbos, in quibus consilium meum unquam expetitur fuit, ad memoriam revocem, fateri adigor, *maximam illorum morborum partem ex febribus intermittentibus, sive neglectis sive male curatis, primam traxisse originem.*

7) V. infra §. LI.

8) SYDENHAM (op. c. Sect. I. c. 5. §. 44.) lienis tumorem veluti crisin febrium intermittentium considerat. Mihi ille tumor est malum, febre praecedente longe pejus.

9) SYDENHAM l. c. §. 42. 45. — ROSENSTEIN apud TRNKA l. c. p. 163.

10) SCHENK Lib. I. obs. 6. ETTMÜLLER de abusu praecipit. c. 3. §. 5. HORST Lib. X. obs. 28.

11) WERLHOF Op. c. Sect. III. §. 6. p. 97. Multos vidi homines haemorrhoidibus laborantes, qui, ante-

betes¹²⁾, gonorrhoea¹³⁾, tetanus¹⁴⁾, mania¹⁵⁾ aliaque nervorum mala¹⁶⁾.

2. At

quam febres intermittentes perpassi erant, illas plane ignoraverant.

- 12) SYDENHAM epist. responsor. I. §. 33. Fere omnes, quos vidi diabeticos (illorum numerus ad quindecim ascendit) graves febres intermittentes perpassi erant.
- 13) De *libidine cum spermatis dolorifica evacuatione* post quartanam testatur HANNAEUS (Eph. Nat. Cur. Dec. II. a. 4. obs. 113.). Curavi Vilnae Drm. K ski, alumnus seminarii medici, qui post febrem intermittentem tertianam, cortice, praemissis evacuationibus tubi intestinalis, fugatam, in *pollutiones nocturnas* adeo repetitas incidit, ut tabis dorsalis periculum eo magis urgeret, quo magis aegrotus simul de saevo lumborum dolore conquerebatur. Multa contra haec mala adhibita fuerunt auxilia, at omnia incassum, donec adventante *febris recidiva eaque naturae commissa*, tertius paroxysmus illa sponte debellaverit. De *satyriasi* lethali ex febre intermittente legitur apud CABRIOLUM v. TRNKA l. c. p. 163.
- 14) MORGENSTERN in nov. act. phys. med. nat. cur. T. III. obs. 74.
- 15) SYDENHAM opp. T. I. Sect. I. c. 3. E. HAGEDORN obs. et hist. med. pract. Cent. III. Francf. et Lips. 1698. — FR. HOFFMANN consult. et respons. Cent. I. T. I. cas. 36. Francf. ad Moen. 1734. — COLLIN ann. med. III. Pars. 1. Vindob. 1764. p. 78 — 81. — VAN DEN BOSCH histor. constitut. verminosae. Lugd. Bat. 1769. — *Verhandelingen uitgeg. d. de Maatschappij der Weetenschap. te Haarlem* XIV. 1773. — STRACK l. c. p. 21. — KEUP in BALDINGER's neuem Magazin der Heilk. 10. B. p. 76. — et SEBASTIAN *Bemerkungen über* Frank Prax. I. 1. 1.

Utilitas. 2. At non reticendum, valetudinarios interdum in ipsa febre intermittente, potissimum vernali, remedium invenire. Quamvis enim virtus salutifera febrium intermittantium plus quam parum est jactata sit ¹⁷⁾, fateri tamen oportet, cum BOERHAAVIO ¹⁸⁾, FR. HOFFMANNO ¹⁹⁾ aliisque summis viris, illarum ope sanatas fuisse lepram ²⁰⁾, cephalaeam periodicam ²¹⁾ aliosque dolores habituales ²²⁾, apoplexiam ²³⁾, paralysin ²⁴⁾, epilepsiam ²⁵⁾, hypo-

die Melancholie u. Manie als Nachkrankheiten d. Wechselfieber. v. HUFELAND's Journ. der prakt. Heilk. 1823 Junius p. 3.

16) E. c. amaurosis (v. HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 5. B. 3. St. 1811.). Huc spectare quoque videtur peculiaris *idiosyncrasia*, quam puella post febrem tertianam acquisivit. Abhorrebat nimirum a cerevisia et a vino, v. MERKLIN in Eph. Nat. Cur. Dec. II. a. 53 obs. 244.

17) Cap. I. §. XIX. No. 1. (8).

18) Consult. et respons. med. Vol. II. cas. 19 et 214 Goett. 1752.

19) Med. rat. syst. T. III. Sect. II. c. 1. §. 25.

20) FORESTUS l. c. obs. 32. schol.

21) SWIETEN comment. ad aph. 754.

22) SWIETEN l. c. (dolor scapulae dextrae).

23) WERLHOF l. c. Sect. IV. §. 3.

24) ELLER med. chir. Anmerk. p. 15. 18. PAULI acta phys. med. nat. cur. Vol. V. obs. 64. COLE hypotyposis super febr. interm.

25) HIPPOCRATES Sect. V. aph. 70. — GALENUS comment. in Hippocrat. Epid. Lib. I. ad No. 4. — SALMUTH Cent. II. obs. 84. — LANZONI Eph. Nat. Cur.

hypochondriasin²⁶⁾ aliaque mala nervorum²⁷⁾, blennorrhoeam aurium²⁸⁾, praedispositionem ad phthisin pulmonalem²⁹⁾, cordis motus perversos³⁰⁾, stomacacen³¹⁾, metrorrhagiam menstruam³²⁾ et tumores mammae³³⁾. Praeterea febres intermittentes, nisi pestem³⁴⁾, saltem alios morbos

U 2 acutos

Dec. III. Append. p. 20. obs. 29. — CRÜGER ibid. a. 3. obs. 148. (saltem quousque quartana duravit, epilepsia habitualis non comparuit).

26) BALLONIUS epidem. et ephem. L. II. Const. aest. a. 1579. p. 174. — FR. HOFFMANN l. c. — ROTHART *Beyträge zur Arzneywissenschaft*. No. 2. p. 17. — Lib. Bar. F... virum summopere hypochondriacum, Vilnae curavi. Quo primum is in febrem intermittentem inciderat, de malis illius sociis rationem reddens, haec habita ratione passionum habitualium, nunc suspensarum, nullius esse momenti asserebat. Permissi hinc, ut febris defervesceret. Ea tandem sponte cessante, vix vestigium hypochondriasis remansit.

27) COLE l. c. c. 8. §. 4.

28) BINNINGER Cent. I. obs. 84.

29) Plus vice simplici istam SYDENHAMI observationem confirmatam habui. Regiones vero febribus intermittentibus faventes, evolutioni phthiscos pulmonalis ob stare, ut contendit WELL (*transaction of a society for the improvement of med. and chir. knowledge. Vol. 3. No. 33.*), fabula est.

30) DE LA HIRE *hist. de l'acad. R. des sciences à Paris*, a. 1718.

31) AMAT. LUSITAN. Cent. I. cur. 85.

32) P. ROMELIUS Eph. Nat. Cur. Dec. II. a. 7. obs. 213.

33) COLING l. c. §. 91.

34) MYE de morbis Bredanis p. 5.

acutos avertunt³⁵). Saepissime corporis incrementum promovent³⁶).

Restrictio. 3. Interim non reticemus, a nobis longe plures casus observatos esse ubi febres intermittentes morbis aliis supervenerunt, quin vel minimum levamen attulerint³⁷). Immo hinc inde pristinus ab illis aggravatus fuit morbus³⁸).

P. stadiorum.

4. Horror importunior fit illis, qui vomunt. Frigus forte atque diu durans, per se neque diuturnitatem morbi, neque ejus periculum semper denotat. Contrarium opinatur KLEIN³⁹). Qui febribus

35) Jam HIPPOCRATES vim febrium quartanarum, alios morbos graves avertendi, cognoverat. (Epidem. Lib. VI. Sect. 6. text. 9.). Ego saltem, infantum, qui febribus intermittentibus laborabant, simul aliis morbis epidemicis correptorum non recordor.

36) WIERUS puellam vidit, e stirpe quoad staturam ordinaria ortum ducentem, quae usque ad aetatis annum duodecimum potius parva erat, quo autem tempore, perpessa febrem intermittentem quartanam collosa evasit. J. H. SCHULZE exemplum juvenis narrat, qui post quartanam, quae triennium perdurabat, ulnam in longitudinem increvit. (TRNKA l. c. p. 213.). Cfr. *Bref exposé de la cause des resultats et du traitement de l'accroissement trop rapide. In Journ. complémentaire au dict. des sciences médicales. T. XIII. 50 cah. p. 127.*

37) COLING l. c. §. 87. (Hemiplegia incassum levamen a febre intermittente tertiana expectabat).

38) FR. HOFFMANN op. c. T. IV. P. 3. S. 2. c. 3. obs. 7. (Febris tertiana hydropi superveniens lethalis).

39) l. c. p. 59.

bribus intermittentibus moriuntur, saepe quidem sub frigore, ergo in principio paroxysmi excedunt e vita⁴⁰⁾, sed et tardius⁴¹⁾. Nulla constans proportio inter stadium frigoris et caloris. Paroxysmus, qui sine sudore terminatur, rebellem febrem indicat. Sistit enim sudor, nisi totius morbi⁴²⁾, saltem unius cujusque paroxysmi *crisin*. Critica quoque visa est diarrhoea⁴³⁾. Ex urina crassiori et turbida, febris decursus brevis, et ex clara tenui,

40) SYDENHAM Sect. I. c. 5. §. 2. — R. A. VOGEL de cognosc. et cur. morb. §. 16. — HOLLER in coac. praenot. Hippocratis p. 302. — RAYGER schol. ad SPINDLER obs. 35. FR. HOFFMANN l. c. T. IV. P. I. cas. 2. thes. pract. §. 21. — SENAC l. c. p. 106. („Id equidem in adultiori aetate infrequens est periculum; sed in *senectute* non raro impendere solet“).

41) Sub *caloris stadio* humorum tantus caput versus erat impetus, ut oculi extra orbitas pellerentur. Aegrorum alter ruptis vasis sanguineis obiit. v. BALLONIUM epid. et ephem. Lib. II. const. aestiv. a. 1579. p. 174.

42) De sudore quidem febrium intermittantium crisi testantur praeter alios BARTHOLINUS (hist. anat. rar. Cent. III. obs. 88.) et SWIETEN (comment. ad aphor. 764.); verum ego potius cum SENAC (op. c. p. 109.) dicam: „licet (per sudores) sublevetur corpus evanescente paroxysmo, *non tollitur febris causa*; quin imo hoc levamine exhauriuntur aegri.“

43) BARTHOLINUS l. c. Cent. II. hist. 56. — HORST obs. Lib. I. obs. 7. — DODONAEUS annot. in BENIVIENI cap. 59. p. 221. — LANZONI Eph. Nat. Cur. Dec. II. a. 9. obs. 207. Schol. — SWIETEN comment. ad aph. 754.

nui, intense rubra, ignea, contrarium praesagiri posse, traditum est⁴⁴⁾; verum saepe vidimus, rem se ita non habuisse⁴⁵⁾. Sanguinis largus fluxus e naribus, plerumque bonum⁴⁶⁾, e contra paucae guttulae, malum. Et haemorrhoidum fluxus aliquando salutaris⁴⁷⁾. Idem de quibusdam vitiis cutis, videlicet de illius flavedine⁴⁸⁾, deque psudracia⁴⁹⁾, furunculo⁵⁰⁾, pustulis⁵¹⁾, maculis, tum

44) KLEIN l. c. p. 95.

45) Febrem quartanam duplicem *magno urinarum profluvio* fugatam fuisse, refert HERTOP in Eph. Nat. Cur. Dec. I. a. 2. obs. 143.

46) PROSPER ALPINUS (de praesagienda vita et morte L. VII. c. 2. §. 5. et L. VI. c. 13. §. 3.) narrat se ipsum post epistaxin sex librarum a quartana liberatum fuisse. Casus similes leguntur apud RIVERIUM Cent. IV. obs. 61. — MAYER Eph. Nat. Cur. Cent. VI. obs. 60. et HAEN rat. med. P. XI. c. 1. §. 1. Debent vero hi casus probe a febre intermittente cum perniciosa epistaxi distingui.

47) HAEN l. c. §. 4. et propria experientia.

48) FORESTUS L. III. obs. 10. — PLATER obs. L. II. p. 334. — SAUVAGES nosol. method. T. III. P. 2. cl. 10. ord. 6. art. 30. No. 2. Simplex, de qua hic agitur, flavedo cutis, probe ab ictero distingui debet.

49) Huc scilicet *scabiem criticam* revoco, de qua loquuntur ALBERTI diss. de effect. prurig. §. 124., BOERHAAVE consult. med. Vol. I. cas. 22. RIVERIUS Cent. IV. obs. 41., BARTHOLINUS Cent. IV. hist. 35., SMETIUS miscell. med. p. 550. WELSCHIUS Eph. Nat. Cur. Dec. I. a. 4. et aph. 44. obs. 85. COLING l. c. §. 91. SENNERT de febr. L. II. c. 17.

tum nigris⁵²⁾, tum albis⁵³⁾, maxime vero de hydrois⁵⁴⁾ valet. Optimum si aeger screator factus est, et si apyrexia perfecta observatur.

5. Extant febres intermittentes, adeo perniciosae, ut aegrum secundo sive tertio paroxysmo e medio tollant⁵⁵⁾. Imo suspicamur, eas interdum vel prima accessione necare, et funera plura improvisa,

50) MADAI l. c. §. 129.

51) WEBER obs. med. fasc. II. obs. 4. p. 13. (Socia Leucophlegmatia).

52) SILVATICUS v. RHODIUS Cent. I. obs. 16.

53) C. PISO de serosa colluvie. Sect. VI. obs. 177.

54) Jam HIPPOCRATES (epid. Lib. IV. text. 41.) docuit *ulcuscula ad labia* febrem tertianam solvere, quod confirmatur a WERLHOF (l. c. Sect. II. §. 8.), MORAGNI (op. c. epist. XLIX. 21.) et propria experientia. Interea saepe hydroa labiorum vidi, quin febris intermittens, saltem illico cessaret, quod jam pridem animadverterat PECHLINUS (obs. phys. med. L. II. obs. 20.). SEBASTIAN (l. c.) hydroa ista non pro crisi febris, sed pro illa affectionis hepatis, febris sociae habet. Pro hac opinione, caeterum difficulter probanda, loquitur tamen observatio mea, hydrois labiorum ut plurimum labium *dextrum*, latus igitur hepati respondens, detineri.

55) J. C. DUPONT DES LANDES *histoire d'une fièvre qui a enlevé le malade au bout de 24 heures, sur laquelle on appelle la décision de cette question, savoir: si elle doit être rangée parmi les ataxiques intermittentes, ou parmi les ataxiques continues.* v. SEDILLOT *recueil périodique de la soc. de médecine de Paris.* T. 32. p. 353.

provisa, quae apoplexiae, convulsionibus, cholerae tribuuntur, et tunc accidunt, dum febres intermittentes perniciosae grassantur, paroxysmo illarum primo, jam letali, adscribenda esse. In genere perniciēs harum febrium eo major esse solet, quo majores anxietas praecordiorum et inquietudo.

P. typorum.

6. Vim, diurnitatem et periculum febrium intermittentium magis a constitutione annua et aegrorum pendere, quam a typo, quem sequuntur, persuasum habemus. Excipi tamen merentur febres intermittentes subcontinuae, quae, si perniciosae, omnium perniciosissimae⁵⁶). Ex paroxysmo anticipante vel retardante, nil concludi potest⁵⁷),

56) „At in *semitertiana* appellata contingit quidem et acutos morbos fieri, et est haec prae aliis maxime lethalis.“ (HIPPOCRATES I. epidem. Sect. III. text. 5.) — „Periculosa porro est *semitertiana*“ et „in universum ferus periculosissimusque hic typus est.“ (GALEN. lib. de typo. cap. 8.) — „Alterum *longe perniciosius*, quod tertio quidem revertitur, ex octo autem et quadraginta horis fere sex et triginta per accessiones occupat (interdum etiam vel plus vel minus), neque ex toto in remissione desistit, sed tantum levius est. Id genus plerique medici *Hemitritaeum* vocant.“ (C. CELSUS lib. III. cap. 3.) — „Gravissima sunt et terrifica symptomata, quae *hemitritaeos* comitantur.“ Et „*Semitertiana* morbus est *maxime periculosus*, saepe corripit virilem aetatem, vel eidem proximam, potissimum tempore autumnī.“ (BAGLIVI prax. med. L. I.),

est⁵⁷⁾, nisi simul duratio paroxysmi major vel minor fiat, quo in casu primum, utpote transitum in febrem continuam indicans⁵⁸⁾, malum, alterum bonum. Febris intermittens *quotidiana* pro rebeli et diuturna haberi solet⁵⁹⁾, opinio haec verisimiliter illius cum febribus hecticis confusione⁶⁰⁾ innititur. Nos saltem in curandis quotidianis legitimis, aliam difficultatem, praeter eam, quae ex apyrexiae brevitate, quippe continuationi febrifugorum obstante, emergit, non invenimus. Idem fere de *tertiana duplici* dicendum. *Tertiana* inter omnes intermittentes facilius sanatur. Terminatur ea septimo utplurimum paroxysmo⁶¹⁾; aliquando vero aut citius⁶²⁾, aut tardius⁶³⁾. Quo ultimo in casu transitus illius
in

57) GALENUS jam observavit nonnullas febrium intermittantium epidemias id *proprium habere*, quod illarum paroxysmi anticipent.

58) Pulchre hoc argumentum dilucidavit FORESTUS. Lib. III. obs. 26. nota.

59) FORESTUS Lib. III. obs. 21. schol. — MADAI l. c. §. 160.

60) §. XXVIII. No. 9. (45).

61) HIPPOCRATES Sect. IV. aph. 69. — SCHLIERBACH act. phys. med. nat. cur. Vol. VI. obs. 61. — FORESTUS l. c. obs. 4. 7. 10.

62) FORESTUS l. c. obs. 2. 3. (tertianas describit tertio et quinto paroxysmo terminatas, quarum plurimas vidit, praesertim inter recidivas).

63) FORESTUS l. c. obs. 9. (nono paroxysmo terminata)

in febrem quartanam timendus est⁶⁴). Tertianas periculo destitutas esse⁶⁵), perniciosis, quae libenter alternis diebus recurrunt, refutatur. Tertianae laborantes facile hecticos fieri⁶⁶), nunquam observavimus: qui hanc morborum successionem animadvertisse testantur, forte febrem hecticam intermittentis instar decurrentem, cum legitima tertiana confuderunt. In tertianis tertius paroxysmus plerumque est gravissimus, qui si mitis, indicium habes brevis ac mitis febris⁶⁷). *Quartana*, praesertim autumnalis⁶⁸), medicorum quondam scandalum, maxime diuturna est⁶⁹). Caeterum

ea

— M. DONATUS L. III. c. 14. (decimo nono paroxysmo cessans). Inter rusticos et pauperes innumerabiles tertianas ad mensem et longe ulterius protractas vidi.

64) RIVERIUS Cent. III. Append. ad obs. ult. p. 257.

65) GALENUS de art. cur. ad Glauc. L. I. c. 8. et quodammodo FORESTUS l. c. obs. 6. schol.

66) KLEIN op. cit. p. 99.

67) WERLHOF de febribus Sect. 1.

68) Pulchre HIPPOCRATES (Sect. I. aph. 25.) quartanas *aestivas*, quippe breves, ab autumnalibus, quippe longis, distinxit.

69) Quartanam minimum annum perdurare edixit HIPPOCRATES (epidem. L. VI. Sect. 6. text. 23.). Cfr. SYDENHAM Sect. I. c. 5. §. 10. Militem, *computatis simul recidivis*, tres annos febre quartana laborantem vidi. Sic et illorum interpretor observationes, qui narrant de quartanis protractis ad *annos quinque* (F. MENA lib. de febrib. c. 3.); — *septem* (WIERUS med. obs. rar. p. 37.); — *octo* (FORESTUS l. c.); — *novem*

ea in hominibus aetate florentibus et aliunde sanis raro periculosa evadit. Alias ex quartana facile oriuntur morbi chronici, inter quos saepissime hydrops et scorbutus⁷⁰). Contenditur, quod maxima pars hominum qui ad aetatem admodum provectam pervenerunt, in vitae curriculo quartanam perpassi sint⁷¹). Falsum est, quartanam homi-

(FERNELIUS patholog. Lib. IV. c. 14.); — *duodecim* (BAUTZMANN in Eph. Nat. Cur. Dec. II. a. 8. obs. 45.); — *tredecim* (FABR. AB AQUAPENDENTE V. MADAI l. c.); — *octodecim* (MADAI l. c. §. 144.); — *viginti* (Eph. Nat. Cur. Dec. III. a. 9. obs. 51.); — *viginti duos* (A. MASSARIA de febr. L. VII. c. 11.); — *viginti quatuor* (RIDUS TRASIMENUS de reb. coel. L. VIII. c. ult.); — *triginta tres* (WIERUS l. c. p. 36. 37. BINNINGER Cent. V. obs. 64.); — *et quadraginta octo* (GABELSCHOWER Cent. VI. obs. 74.).

70) Quartanam pro minime periculosa declararunt HIPPOCRATES (Epid. L. I. Sect. 3. text. 2.) et GALENUS (de art. cur. ad Glauc. L. I. c. 8.). FORESTUS (Comment. III. in Hippocrat. epidem. Lib. I. ad No. 4.) hanc declarationem jure restrinxit. Observavit nimirum epidemias febrium intermittantium cum typo quartano, quae periculo non vacabant. Praeterea quartana senibus valde infensa est. Nec desunt exempla febrium intermittantium perniciosarum typo quartano alligatarum. Memorabilis est observatio WIERI (l. c. p. 37.) febris videlicet *quartanae habitualis*, quae, quum tandem cessasset, mortem post se traxit. Cfr. JUCH diss. de morbis ex febre quartana male curata, eosque legitime curandi methodo. Erf. 1735.

71) BOERHAAVE aphor. 745. — FR. HOFFMANN op. c.

hominem bis non aggredi⁷²). — *Febris quintana*,
pro

T. IV. P. I. Sect. I. c. 2. Thes. patholog. §. 19. —
DE LA HIRE *hist. de l'acad. R. de méd. à Paris. a.*
1718. NIC. CHESNAU obs. med. L. IV. c. 4. obs. 4.
p. 450. et WERLHOF l. c. Sect. V. §. 9. obs. part. 41.
p. 249. Mirandum memorabile istud argumentum in
macrobiotica HUFELANDII, plane silentio praeteritum
fuisse. Quamvis enim in ea verser opinione, homines
qui provectissimam aetatem attigerunt, sicuti alias mul-
tas aerumnas, ita etiam quartanas perpessos fuisse; at-
tamen observationem ab auctoritate tot cl. virorum
suffultam, ulteriore indagatione dignam existimavi; id-
que eo magis, quum, si verum foret febres intermit-
tentes potissimum ex affectione medullae spinalis pro-
ficisci, illarum cum longaeuitate nexus, magni eva-
deret momenti. Domus senum receptioni dicatas,
optimam hujusmodi rem indagandi occasionem prae-
bere putans, ex duabus illarum sequentes notitias,
quas humanitati D. doctoris SCHIFFNER, medici pri-
marii nosocomii civici Vindobonensis, et Consiliarii
Sax medici domi militum invalidorum Vilmensis de-
beo, accepi. In domo senum, sic dicta, *beim*
blauen Herregott, inter 36 homines, ab anno
aetatis 80 ad 98; 13 nullas febres intermittentes ex-
perti sunt. Laborarunt *quotidiana* — 4; *tertiana* — 9;
quotidianá et *tertianá* — 4; *quotidiana*, *tertiana* et
quartana — 5. In domo militum invalidorum inter 35,
illorum qui ab anno 60 — ad a. 90 — aetatis numera-
bant, ut sequens tabula docet, 25, *quartaná* labora-
runt.

pro pessima omnium habita⁷³⁾, eandem, quam
quar-

Anno domini	in loco	per spatium	miles	natus annos	nunc invali- dis adscri- ptus ob :
1785.	Schwetzingen.	1. mensis.	I. W.	60.	dyspnoe- am.
1781.	Leitomischel.	9. mensium.	S. F.	62.	ulcera pe- dum.
1782.	Mähr. Neu- stadt.	3. mensium.	S. S.	63.	vitium pe- ctoris.
1809.	Neuheusel. Hung.	3. hebdo- mad.	A. T.	66.	dyspnoe- am.
1797.	Semlin.	4. mensium.	C. S.	66.	paralysin.
1817.	Petronell.	2. mensium.	I. St.	68.	vulnera.
1783.	Hradisch. Hung.	35. dierum.	S. P.	70.	debilitat. senil.
1790.	Betzwa. Hung.	8. mensium.	I. M.	70.	item.
1786.	Grätz.	18. dierum.	L. H.	74.	item.
1799.	Alexandria.	3. mensium.	G. C.	75.	item.
1770.	Auspitz. Mo- rav.	3. mensium.	G. B.	75.	item.
1804.	Mezőhegyer. Hung.	1. mensis.	F. B.	75.	item.
1783.	Hradisch.	35. dierum.	M. T.	75.	item.
1785.	Linz.	30. dierum.	P. E.	75.	ocul. debi- litat.
1786.	Tundanell.	21. dierum.	L. H.	75.	vitium pe- ctoris.
1783.	Gradiska.	14. dierum.	G. P.	76.	debilitat. oculor.
1790.	Cremona.	3. mensium.	K. R.	76.	debilit. se- nil.
1776.	Mantua.	6. mensium.	K. H.	78.	item.
1793.	Heilbrun.	3. mensium.	L. B.	79.	item.
1782.	Reichenau. Bohem.	20. dierum.	M. L.	80.	item.
1773.	Brün.	4. mensium.	S. S.	80.	item.
1772.	Constanz.	1. mensis.	M. St.	83.	item.
1770.	Ofen.	28. dierum (bis).	I. H.	84.	item.
1787.	Stuhlweissen- burg.	3. hebdomad.	A. R.	85.	item.
1760.	Znaim.	2. mensium.	Ph. F.	89.	item.

72) Quartanam unica tantum vice radices agere docue-
runt AETIUS (Lib. V. c. 82.) et FERNELIUS de abdit.
rer. caus. L. II. c. 13.). Ast in Insubria homines

quartana; admittit prognosin. — Transitus februm intermittentium duplicium vel duplicatarum in simplices, boni est augurii. Evanescit tunc primum paroxysmus mitior⁷⁴).

P. feb. int.
simplicis
et compli-
catae.

7. Febris intermittens legitima *simplex*, concessa facultate corticem cinchonae officinalis adhibendi, eoque optimae notae, quemcumque tandem typum sequatur, facili opera in homine ceteroquin sano vix non semper vincitur. Contrarium vero de febribus intermittentibus *complicatis* dicendum. Febris enim intermittens *inflammatoria* vel *rheumatica* neglecta, sive methodo calefacientes pertractata, nisi spontanea epistaxis succurrat, facile in febrem continuam ruit, symptomatibus catarrhalibus, imo illis peripneumoniae stipatam.

Ett

cognovi qui, tempore nonnullorum annorum intermedio, quartanam secunda vice perpassi sunt. Idem locum habuisse testantur HEUERMANN l. c. p. 47. — C. REIES Elys. jucund. quaest. camp. p. 954. — BENIVIENUS l. c. cap. 59. — WIERUS l. c. p. 38. — MADAI l. c. p. 268. — SYDENHAM opinionem AETII et FERNELII restrinxit, asserendo (Sect. I. c. 5.) alteram quartanae invasionem *breviorem* esse. Id fieri possedocent observationes MADAI (l. c.) et MORTONI (phthisiologia cap. 12. hist. 3.); ast contrarii quoque exstant casus apud MARC. DONATUM et WIERUM (TRNKA l. c. p. 217.).

73) HIPPOCRATES epid. L. I. Sect. 3. 5.

74) Hoc pluries mihi visum phaenomenon jam a GALENO (de crisibus L. II. c. 9.) notatum fuit, confirmatumque a FORESTO (L. V. obs. 11.).

Et *metastases* crebro observantur⁷⁵). Pejores adhuc, si fieri potest, sunt sequelae febris intermittens *gastricae*, si male tractetur. Hoc enim in casu febris vel in continuam, vel in chronicum morbum transit. Dum primum contingit, aeger ab initio de anxietate et praecordiorum tensione conqueritur; tandem pulsus, sub ipsa apyrexia, frequentia crescit, celerque nec non durus fit. Serius paucae, sed repetitae sanguinis guttae e naribus stillant; oculi flavescunt, lingua sicca crinesque flaccidi evadunt, abdomen in meteorismum ascendit, diarrhoea vires plerumque frangens oritur, atque aeger, forte a *phlebitide* prehensus⁷⁶), in maximo vitae periculo versatur. Dum vero febris, de qua agitur, in morbum chronicum desinit, habitus corporis de die in diem magis evadit cachecticus; urina imminuitur et sedimentum copiosum, plerumque lateritium offert. Vires digestionis admodum labefactatae; abdomen tumidum, lienis vel hepatis volumen auctum tactui exhibet; crura tument; universa cutis, praecipue autem extremitates inferiores maculis lividis notantur, donec tandem vel hydrops, vel icterus, vel

75) VOGEL diss. de metastasibus febrinum intermittentium. Goett. 1775.

76) Saltem maxima est similitudo inter aegros, de quibus agitur, illosque, qui *phlebitide* laborant. Cfr. D. MELI sulle febbri biliose. Milano 1822. Et ejusdem: Sulla condizione patologica delle febbri biliose. Nuovi fatti. Milano 1824.

vel scorbutus, vel labes mesenterii manifesta, in conspectum veniant.

§. XXX.

C u r a.

Prophylaxis.

1. Multa a Republica, ad febres intermittentes endemicas avertendas, fieri possunt¹⁾. Huc pertinent: exsiccatio paludum²⁾, saltem in viciniis habitationum; constructio molium ad praepediendas inundationes; ventilatio domuum antea inundatarum; leges, quibus oryzae cultura, vel prata paludosa, solum in determinatis distantiiis, iisque magnis ab urbibus permittuntur³⁾; edicta, ne paludes, quarum superficies jam jam solidescit,
sine

1) Agrum Romanum ante urbem conditam sic descripsit OVIDIUS:

Hic ubi nunc fora sunt, udae tenuère paludes,
Amne redundatis fossa madebat aquis.
Curtius ille lacus, siccas qui sustinet aras,
Nunc solida est tellus, sed fuit ante lacus.
Qua velabra solent in circum ducere pompas,
Nil praeter salices cassaue canna fuit.

Fast.

Cfr. J. B. DONIUS de restituenda salubritate agri Romani. Florent. 1647.

2) DE PRONY *description hydrographique et historique des marais — Pontins, relief du sol, cadastre, détails intérieurs, analyse raisonnée des principaux projets, proposés pour leur dessèchement. Paris 1824.*

3) *Edict des Königreichs Italien vom 3. Februar 1809 die Reisfelder, Wiesen etc. betreffend. Vid. Salzburger med. chirurg. Zeitung 1809. No. 21.*

sine necessariis cautelis subverti et reliquae in piscinas converti⁴⁾ possint. Combustio quoque vegetabilium, super solum paludosum, utpote fossis ansam porrigens, prohibenda est⁵⁾. Res publica porro multum inde lucraretur, si cultura illius oryzae, quae in solo sicco vegetat, quaeque nuper in Europam introducta est⁶⁾, universalis reddi

4) „Un des plus grands fléaux des pays marécageux, est l'établissement des pécheries. Comme les eaux stagnantes sont très-propres à nourrir le poisson, les propriétaires ont un grand intérêt à établir, dans plusieurs points des digues et des écluses, qui forment autant d'obstacles à leur cours, et exposent aux accidens le plus graves.“

FOURNIER et BÉGIN l. c.

5) „... le sol qui constituoit le fond des marais est, le plus ordinairement, formé de débris à demi décomposés de substances végétales et animales; ce qui constitue la tourbe. Or, il arrive assés fréquemment, lorsque les cultivateurs brûlent, dans ces champs tourbeux, le chaume ou d'autres productions végétales, que le feu gagne le terrain lui même, et le détruit jusqu'à une profondeur assés considérable, et quelques fois dans une étendue de plusieurs arpens. Cet accident, qui s'est renouvelé plusieurs fois dans les marais Pontins, a pour resultat la formation d'une fosse qui se remplit d'eau.“

FOURNIER et BÉGIN l. c.

6) Ab amicissimis nobis viris Dr. REHMANN et de CARRO. De hoc memorabili argumento legi merentur: *Vaterländische Blätter vom 8. December 1819.* — *Wiener Zeitung. 18. April, 15. Julius u. 5. Dec. 1820.* — *Oesterreichischer Beobachter. 15. April, 25. Mai u. 5. Sept. 1819.* — *23. Julius, 23. Nov. 1820.* — *8. März*

Frank Prax. I. 1. 1.

reddi posset. Medici militares potissimum Praefectis legionum suggerere deberent, ne praeter necessitatem aquas in fossis urbium munitarum stagnare patiantur; ne militum stationes prope paludes ponantur, neque, si fieri potest, ipsa castra loca uliginosa attingant, aut saltem curent, ut nemus ea a castris separet. Medici nautici periculum patefacere deberent, quod imminet, dum naves prope litora paludosa in anchoris expectant, aut dum nautis et classiariis permittitur noctes in terra uliginosa transigere⁷⁾. Ad pravos effectus aëris nocturni in regionibus calidis praepediendos, lavatio ope aquae sale marino imbutae suadet⁸⁾. Sunt, qui fumo e caminis emergenti vim, miasma paludum destruendi, tribuant⁹⁾. Multa tandem remedia extraneis per regiones paludosas Italiae iter instituentibus, ad arcendas febres intermittentes, ab incolis suadentur, ad quae esus allivi sativi potusque cremati¹⁰⁾, pertinet. Cortici peruviano

1821. — *Biblioteca Italiana*. Dicembre 1822. Marzo

1823. — *Oryza*, de qua sermo est, etiam cum magno successu in horto agrario R. universitatis Ticinensis, ab eximio illius moderatore MORETTI, colitur.

7) WILSON l. c. p. 170.

8) HALES in I. Volum. of the medical museum.

9) W. HARRIS in *Philadelphia Journ. of the medical and physical sciences*. By CHAPMAN. 1822. Vol. 4.

10) PUCCINOTTI lettera etc. p. 17. („Usano gli agricoltori, che vanno la mattina in frotta per tempissimo a

ruviano virtutem inesse, febribus intermittentibus in iis occurrendi, qui nondum hoc morbo laborant, cum viro experto¹¹⁾, negamus. Fertur potius, cortex hujusmodi sano homini porrectus speciem paroxysmi febris intermittens excitare¹²⁾. In genere febres intermittentes, vel ex paludum praesentia endemicae, vel ex ignota annua constitutione epidemicae, sequentibus avertuntur: fugâ nempe solerti caussarum, hunc morbum excitantium¹³⁾, praecipue humiditatis, somni in aëre aperto¹⁴⁾, victu nutriente atque facilis digestionis et (nisi corpus humanum alioquin ad morbos inflammatorios praedispositum sit, aut febres intermittentes, quae modo grassantur, characterem inflammatorium prae se ferant) modico vini vel cremati usu. Alias enim victus tenuis¹⁵⁾ et potus acidulus¹⁶⁾ eligendi forent. Dum febres intermit-

X 2 tentes

lavorare ne' luoghi malsani attorno Roma, quasi inebriarsi coll' acquavite“).

11) PUCCINOTTI l. c.

12) HAHNEMANN. Vid. HUFELAND's *Journal der prakt. Arzneykunde* 2. B. 4. St. p. 465.

13) §. XXVII. 9.

14) THEDEN *Unterricht für Wundärzte*. p. 167.

15) PETRONIUS (de victu Romanorum) advenam tempore aestivo Romae degentem monet, ut „*victu tenui ac refrigerante utatur*.“

16) PUCCINOTTI quum rusticum senem, a febribus intermittentibus semper immunem, interrogaret, quonam uteretur prophylactico, is respondit: „*invece dell' acquavite io ho sempre bevuto e la mattina e tra il*

tentes indolis gastricae regnant, illas emeticum interdum avertit¹⁷⁾. Calomel hîc ut prophylacticum proponere¹⁸⁾ non audemus. Caeterum ex dictis colligitur prophylaxin febrium intermittantium non esse unam eandemque ubique locorum et omni tempore, sed pro varia illarum febrium indole valdopere differre.

Morbi cura
dividitur.

2. *Cura* febris intermittens bifaria; respicit enim *paroxysmum* et *apyrexiam*. Prima illa ad mitigationem symptomatum, haec ad curam radicalem morbi tendit. Cura autem utraque varia, prout febris intermittens pertinet vel ad manifestas, vel ad larvatas; vel ad simplices, vel ad complicatas. Primum de *manifesta* et *simplici*.

C. imminens
paroxysmi.

3. Cognita circiter hora adventus paroxysmi, aegroti

giorno grosse giarre di acqua col succo del limone. Mio padre faceva lo stesso ed è morto vecchio in casa sua nel letto. L'anno scorso io perdei due figliuoli in questa Roma. Questi matti non vollero mai lasciare quella maledetta acquavita, che anzi vi ponevano dentro ora la polvere da schioppo, ora il pepe polverizzato. Essi mi morirono tuttidue di febbre; loro danno. Et DONI (l. c. p. 172.) inquit: „Erat enim *poscae* usus olim apud milites atque agricolas frequens, quam non sine magna utilitate aestivo tempore rustici nostri usurpare possent.“ Et FORESTUS (l. c. Lib. II. obs. 7. Schol.) acetum proponit.

17) „... multos in eas (febres intermittentes) inclinantes, concitato, vel etiam repetito vomitu ab iis immunes servavi.“ SENAC l. c. lib. II. cap. 4.

18) Cfr. §. XXVII. No. 9. p. 266.

aegroto non permittendum, ut paulo antea ventriculum cibis oneret, vel mentem intendat, facile enim tunc paroxysmus fortior evadit. *Emeticum* ante adventum frigoris porrectum interdum paroxysmum avertit, atque nil impedit, quominus in *rebelli* etiamsi non gastrico, morbo ad hoc deveniamus auxilium, utpote quod praeter virtutem evacuantem alios adhuc non satis intellectos in systema nervorum abdominalium effectus habet. In consuetis autem intermittentibus vomendi conatus molestias paroxysmi adaugent, atque nonnunquam, praecipue apud feminas, vomitus fit effrenis vixque sedandus. — Aliquando paroxysmum praeveniunt guttae quindecim sive viginti *laudani liquidi Sydenhami*, quod remedium tuto adhiberi potest in febre intermittente perfecte simplici, absentibus congestionibus et viscerum obstructionibus, praesertim in aegrotis systemate nervoso admodum sensibili instructis. Consentit in eo et incomparabilis doctrinae vir HEBERDEN¹⁹⁾. Ante febris adventum *albumen trium ovorum* cum aqua tepida et saccharo porrigere consulit SEGUIN²⁰⁾. Et *cursus* brevi ante paroxysmum pro medela infallibili febrium intermittantium commendatur²¹⁾. Item *lusus aleae*²²⁾, et esus allii, aquam

19) Op. cit. p. 142.

20) Vid. *Salzburger med. chirurg. Zeitung*. 1809. No. 44.

21) HORST opp. med. exercitat.

22) SCHENK obs. med. Lib. IV.

aquam fervidam cum pipere superbibendo ²³⁾. Rustici in agro Romano solis tunc sese exponunt actioni. Ita et aethiopes atque incolae Jamaicae ²⁴⁾. CELSUS balnea tepida tempore, quo aeger paroxysmum expectat, suaserat ²⁵⁾. Sunt, qui *balnea pedum calida* ²⁶⁾ adhibuerunt. Nec defuere *balnei frigidi* laudatores ²⁷⁾. Ad nos quod spectat, ut paroxysmus febris intermittens *benignae*, patienter expectetur, pro regula generali habemus.

C. frigoris. 4. Vigente *frigoris stadio*, extremitates aegri linteis calidis circumdantur, saltem pedibus lateres calefacti, vel urcei aqua fervida repleti admoventur. *Vaporis* hîc commendatum *balneum* ²⁸⁾ difficulter locum habebit. Potus porrigitur tepidus et leniter aromaticus, *infusum* scilicet *florum* sive *foliorum citri aurantiaci*, *florum matricariae chamomillae*, vel *theae viridis*. Verum, aeger minimis haustis bibat oportet, maxima enim damna sibi adferre solent febricitantes, dum largiter potant ineunte paroxysmo. Exstant imo medici, potum hîc omnino prohibentes ²⁹⁾. *Ligatura brachiorum,*

23) CELSUS de re medica. Lib. III. c. 12.

24) WILSON l. c. p. 186. 25) l. c.

26) S. KOSAKINS tract. de sale. Sect. 12. c. 10. p. 64. —

WEDEL pharmac. acroamat. L. III. Sect. 2.

27) TRNKA l. c. p. 427.

28) Journal de médecine, chirurgie et pharmacie. T. XXXVII. Octob. 1816.

29) FR. HOFFMANN op. c. T. IV. P. I. Sect. 1. c. 1.

chiorum, sive applicatio instrumenti vulgo *tourniquet* ad ea, suadente KELLIE³⁰⁾, interdum stadium frigoris brevius reddunt, ast paroxysmi curriculum perturbant. Usus *gelatinae animalis* non solum curriculum stadii frigoris imminuere, sed etiam cardialgiam, anxietatem illud concomitantia debellare, HALLÉ testatur³¹⁾, de quo remedio infra accuratius. Idem effectus a *subcarbonate potassae* sive *calce succo limonum* vel *aceto* nuptis, et sub actu effervescentiae haustis, non raro observatur, quod remedium simul vomitum compescere solet. Huic scopo vel *aqua gase carbonico saturata* non raro satisfacit.

5. Adveniente *caloris stadio* stragula sensim C. caloris. sensimque removenda, *temperatura* cubiculi moderanda, et *potus* frigidiusculus subacidus, e. c. ex aqua *succo saccharato baccarum vaccinii oxycoccos*, *berberis vulgaris*, *citri medicae*, suppediandus. Nunquam enim observare potuimus, potum acidulum paroxysmos futuros longiores fortioresque reddere, vel corticis cinchonae virtutem infringere, uti tradidit Cl. vir³²⁾. *Immersio aegrorum*

method. spec. §. 4. CLEGHORN. Vid. WILSON op. cit. p. 187.

30) In DUNCAN's medical commentaries Vol. XIX. Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte. XVII. B. p. 78.

31) Journal général de médecine etc. T. XIX. p. 336. Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte. XXI. B. 4. St. p. 410.

rum in *aquam frigidam*, ad extinguendum stadium caloris, suadente GIANNINI³³⁾, nemini arisit. Nec illa pro nova habenda³⁴⁾. Molestam cephalaeam leniunt obscuritas, quies, silentium, erecta aegrorum positio, *cataplasma frigidum ex mica panis, baccis contusis juniperi communis et aceto*, fronti impositum, sinapismi ad suras, praecipue vero *clysteres emollientes*³⁵⁾. Venae sectio, et hirudines hîc opem non afferunt³⁶⁾. Nec phar-
maca

32) VICTET op. cit. 33) Op. cit. T. I. p. 54 sq.

34) JAM CNÖFFEL (Eph. Nat. Cur. Dec. I. a. 3. obs. 211.) et E. FRANZISCI (*neupolirter Kunst- und Sittenspiegel ausländ. Völker* p. 1227.) de balneo frigido sub caloris stadio adhibito narrant. At quanto cum damno id factum fuerit testantur ALBRECHT (Ephem. Nat. Cur. Dec. II. a. 9. obs. 78.) et BALLONIUS (epidem. et ephem. Lib. II. Constitut. aestiv. a. 1579. p. 514.).

35) Quanti sint momenti, docuerunt SYDENHAM Sect. I. c. 5. §. 15. — ETTMÜLLER l. c. p. 267. — WERLHOF op. c. Sect. III. §. 12.

36) Mori, in omni febre intermittente venam secandi, primum SYDENHAM frenum injecit (opp. Sect. I. c. 5. §. 25.). Accessit BOERHAAVE (aph. 762.), HEUERMAN (l. c. p. 18.) epidemiam febrium intermittentium descripsit, quae phlebotomiam omnino respuebat. TORTI (obs. med. Sect. I. cap. 5.) affirmat, in febribus intermittentibus a se observatis eadem die, qua sanguis e vena detrahebatur, morbi typum e simplici in duplicem conversum esse. Nec venae sectionibus in febribus intermittentibus favent RAMAZZINI (constitut. rural. a. 1690.) et FR. HOFFMANN (consult. et respons. med. Cent. II et III. cas. 200.). SENAC

maca requiruntur. Quodsi tamen aegroti aut illorum parentes medicamentum quoddam expeterent, plethoricis *nitras potassae*³⁷⁾, nervosis *aether nitricus alcoholisatus* praescribi posset³⁸⁾. Imo, si cephalaea ultra modum cum nonnullis nervorum turbis urgeret, dummodo omnis desit complicatio inflammatoria et gastrica, consilio DAHLBERGII³⁹⁾, LINDII⁴⁰⁾ et ODIERI⁴¹⁾ ad *laudanum liquidum* SYDENHAMI⁴²⁾ confugiendum foret, quod aegrotis nostris *adultis* vix non semper maximum hac sub rerum positione solatium attulit. Enim vero cephalaeam compescit, calorem, quod nemo crederet, temperat, atque sudoris adventum promovet.

6. In-

(l. c. Lib. II. cap. 3.) inquit: „fatendum tamen est, eam (venae sectionem) *per se* febribus intermittentibus non mederi.“

37) R. Nitratis potassae (Nitri) drachmam semis. Aquae rubi idaei uncias quinque, syrupi ejusdem unciam. M.

38) R. Aquae nucleorum pruni cerasi uncias quinque. Spiritus nitri dulcis scrupulum unum. Syrupi Violae odoratae unciam unam. M. D. S. Omni hora cochlearia duo majora.

39) Vid. MURRAY's *med. prakt. Bibliothek*. 3. B. p. 301.

40) *Ueber die Krankh. der Europäer in heissen Klimat. Riga und Leipzig 1773. 8. p. 295.*

41) *In medical and philosophical commentaries by a society in Edinburgh. Vol. VI. p. 351.*

42) R. Aquae melissae uncias quatuor. Laudani liquidi Sydenhami guttas viginti. M. D. S. Omni dimidia hora cochleare majus capiat.

C. sudoris. 6. Ingruente *sudoris stadio*, prima esto regula, ut aeger terminum illius patienter in lectulo, debito modo stragulis obtectus, expectet; alias, a cohibitio scilicet sudore, eo imperfectior erit apyrexia, fortiorque futurus paroxysmus. In genere aegros nil magis sublevat, copioso sudore⁴³⁾. Si sitis continuaret, infusum theae vel aliud aromaticum, adjecto succo citri, vel si vires languerent, et sudor ob id non satis expelleretur, cum vino sive taffia porrigi posset. Desiderante aegro nutrimentum, nil impedit, quominus illi jusculum carneum, vel avenaceum sive simile praebeatur. Quo primum autem sudor imminui et lintea eo madida frigescere incipiunt, indusium, stragula et, si possibile, lectus, mutari debent. Nova lintea sicca sint oportet, atque cavendum, ne aura frigida aegrum attingat. Omni sane jure fassus est KORTUM⁴⁴⁾, febres intermittentes apud pauperes, vel ex eo, quod beneficio mutationis linteorum a sudore madefactorum destituti sunt, difficilioris curationis esse. Porro quoniam vapor, ex aegro declinante paroxysmo emanans, totum aliquando cubiculum replet, ipse vel ad aliud proximum cubiculum deportandus, vel saltem in pristino illo subfumi-

43) Transpirationis operis imprimis in regionibus calidis summam in febribus intermittentibus rationem habendam esse, suadet inter alios egregius MOSELEY op. cit. p. 197.

44) l. c. p. 15.

fumigium ex aceto vel aqua aromatica ferro candenti adpersa, instituendum. Ceteras munditiei curas, v. c. lavationem manuum, ablutionem oris, purificationem dentium, linguae, aliaque silentio praeterimus. Sufficiat enim meminisse, nil magis aegrotos recreare, atque morbi curam adjuvare, munditie.

7. Paroxysmus febris intermittens *larvatae* C. paroxysmi feb. et *perniciosae*, morbi instar, sub cuius forma illa int. larvat. et pernicio. apparet, curandus. Quamobrem cum vix detur morbus, qui aliquando sub forma febris intermittens sive larvatae, sive perniciosae non compareat; patet neminem in cura harum febrium excellere posse, qui totam therapiam specialem non calleat. Verum methodum, variis formis morborum accommodatam, dum sub paroxysmo adhibes, nunquam obliviscendum, eam tantummodo ad scopum symptomata leniendi inservire, absolutam autem curam non aliter obtineri posse, quam deducta dein in auxilium methodo specifica febribus intermittens consentanea. Sic e. c. in peripneumonia periodica vigente paroxysmo ad venae quidem sectionem recurrendum est (saltem id postulantibus temperamento, aetate aegri, respirationis pulsumque conditionibus) at non eodem pacto, uti in consueta peripneumonia sis memor, morbum non posse aliter tolli, quam exhibito febrifugo.

8. Frigoris stadium, alioqui in *febre intermit-* C. feb. int. inflamma-
tente toriae.

tente inflammatoria, plerumque breve⁴⁵⁾, vix medentis auxilium exposcit. Solum cavendum, ne aegrum admodum stragulis cooperiamus, neque illi potum nimis aromaticum et calidum porrigamus, quod consilium dum negligitur, subsequens aestus intendi solet. Quodsi aegrotus potum tepidum respueret frigidumque expeteret, *aqua frigida* haud recusanda foret. Etenim experientia, imprimis in climatibus calidis capta, docuit, ipsam aquam glaciam sub stadio frigoris, in febribus perniciosis cardialgicis, syncopticis, lethargicis et *algidis*, non solum non nocere, sed e contrario ad potiora pertinere auxilia⁴⁶⁾. Adveniente calore capitis

45) §. XXVIII. 16.

46) MOSCA (l. c.) inquit: „Il senso naturale pare che provi della ripugnanza nel voler usare l'acqua nevatata nella (febbre intermittente) cardialgica pel gran dolore allo stomaco, nell' algida per lo grandissimo ed universale freddo di tutto il corpo, e nella letargica per la grandissima sonnolenza e torpore. Ma l'innumerabile quantità d'osservazioni fatte in altre febbri di mal costume con quegli ed altri simili sintomi, risanate coll' acqua fredda, dovrà achetare cotesto naturale senso e farlo cedere alle ragioni ed alla sperienza.“ — Et NOTARJANNI (l. c. p. 73.): „Molto profitto si è ricavato ancora in queste febbri dalle bevande fredde e della neve istessa sin dalla prima invasione.“ Et PUCCINOTTI (lettera etc. p. 37.): „Io ho sempre sentito da miei infermi di perniciosa algida lamentarsi d'un fuoco che loro avvampava le interne viscere mentre fuori erano freddi come marmo. Tale fu in particolare un certo vignajuolo detto Baldassare della Scalasanta,

capitis insigni dolore, delirio, aut sopore, sive difficili respiratione stipato, in aegro robusto, succi pleno, favente annua constitutione vel coelo morbis inflammatoriis, praecipue si aeger nuper ex regione frigida ad calidius clima pervenerit⁴⁷⁾, sique morbus recens fuerit, *venae sectio* indicatur⁴⁸⁾, qua neglecta morbi transitus in febrem continuam inevitabilis. Quoad selectum venae sauciandae⁴⁹⁾, *salvatellae* principatus concedi solet⁵⁰⁾. Non omnino indicata venae sectione, imprimis

il quale mentre si curava da me della sua algida a large dosi di chinachina, non trovava altro ristoro che masticare de' pezzi di ghiaccio, bere ogni tanto limonate di neve e la stessa corteccia se non era sciolta nell' acqua gelata, ei non poteva tenerla nello stomaco."

47) Vid. Dr. CURTIN epist. ad Cl. DUNCAN in med. comment. Vol. IX.

48) SENAC inquit: „Vidi saepissime febres duplices tertianas *unicâ venae sectione* in tertianas simplices abire; media ergo febris potest tolli misso sanguine; sed quod non minoris est momenti, observatione certâ et repetitâ mihi constat, paroxysmos omnino mitiores fieri, vel serius redire; praeterea postquam missus est sanguis, minus urget calor, parcior est sudor, dolor capitis est levior, functiones partium melius procedunt.“ (Op. c. L. II. cap. 3.).

49) De hoc argumento docte disseruerunt GALENUS (de art. cur. ad Glauc. L. I. cap. 2.) et FORESTUS (L. III. obs. 34. schol. 4. obs. 11.).

50) ZACUT. LUSITAN. prax. hist. L. IV. c. 26. obs. 22. Prax. admir. L. III. obs. 32. — PACHEQUUS obs. 47.

primis apud infantes, *hirudines* circa loca, in quibus indicia congestionis vel phlogoseos vigent, aut circa illa, e quibus natura salutarem cruoris depletionem minatur⁵¹⁾, admoveri debent⁵²⁾. Dum depletio sanguinis localis ad nucham aut dorsum indicatur, *cucurbitulae sacrificantes* optime conducunt. Praeterea summa ratio *temperaturae* cubuli habenda, quae sit oportet, si possibile, inter gradum duodecimum et decimum quartum thermometri Reaumurii. Optimus potus hîc *solutio supertartratis potassae*⁵³⁾. Adducto aegro ad
apy-

commun. RIVER p. 276. BAGLIVIVS prax. med. L. I. c. 2. §. 10.

51) MADAI (l. c. §. 203.) sequentem narrat casum. Femina ab eo tempore, a quo ubera proli praeberere inceperat, in tertianam febrem, dolore gravi lumborum stipatam, incidit. Trium prolium haec femina jam pridem mater fuerat; ast tunc catamenia sat cito post partum ingruere erant solita. Haec animadvertens medicus, venam e pede secuit, quo facto morbus exemplo siluit. — Febres intermittentes, quartanis non exceptis, ope aperitionis artificialis haemorrhoidum sanatae, leguntur praeter MADAI (l. c.) apud RIVERIVM prax. med. L. XVII. c. 5. — RAYGERUM schol. ad SPINDLER obs. 43. — FORESTUM L. III. obs. 41 (nisi febris ad hecticas pertinuerit) etc.

52) *Observations de deux fièvres pernicieuses intermittentes traitées par la méthode antiphlogistique, par Mr. PÉREYRA. V. Journal médical de la Gironde. Décembre 1824.*

53) R. Supertartratis potassae (Cremoris tartari), Sacchari

apyrexiam, interdum necessitas venae sectionis reiterandae occurrit ⁵⁴⁾, persistentibus nimirum rerum positionibus supra indicatis, et praesertim si illius brevitatis ⁵⁵⁾ timorem transitus morbi in febrem continuam injiceret. Sanguinis detrahendi copiam determinare haud audemus. Media et hîc tenenda est via, atque magnus virium vitalium respectus habendus, praecipue in regionibus uliginosis. Praeterea vel mixtura ex *nitrate potassae* ⁵⁶⁾, vel *pulveres temperantes* ⁵⁷⁾ exhibentur, aut, si largior alvina purgatio desideraretur, *sulphas magnesiae*, imperata simul diaeta ex jusculis vegetabilibus et fructibus sive recentibus sive cum saccharo et aqua coctis. Methodus hujusmodi saepe paucorum dierum spatio omnem debellat morbum, usui cinchonae saepe omnino rebellem ⁵⁸⁾.

aa unciam unam et semis. Aquae fontis fervidae libras tres. Frigefacta detur. S. pro potu.

54) FORESTUS (L. III. obs. 2.) se ipsum a febre intermittente tertiana, cujus paroxysmi delirio stipabantur, ope phlebotomiae, *apyrexiae* tempore institutae, liberavit. Ita et alterum aegrum (l. c. obs. 3.). Similia leguntur apud PECHLINUM l. c. L. II. obs. 12. — RIVIERIUM Cent. I. obs. 20. et GRANT l. c. p. 109.

55) HUXHAM l. c. WERLHOFF l. c. Sect. III. c. 5.

56) Supra (37).

57) *Pulveres temperantes*. R. Pulv. Supertartratis potassae unciam semis. Nitratis potassae drachmam unam. M. div. in octo pulveres aequales. D. S. Cape omni secunda hora pulverem.

bellem⁵⁸⁾. Quod si autem febris remanserit, ea, deleta inflammatoria complicatione, *simplex* facta, uti talis pertractanda.

C. feb. int.
rheumati-
cae et ca-
tarrh.

9. *Febris intermittens rheumatica et catarrhalis*, dum fortis, eandem methodum ac inflammatoria exposcit. Contra in morbo miti, aut eo auxiliorum antiphlogisticorum ope, tali reddito, *diapnoicis* indulgendum est; idque praesertim sub paroxysmi finem. Commendantur hoc sub respectu *acetum*⁵⁹⁾, *succus citri cum infusione herbae theae viridis*⁶⁰⁾, *potus copiosus aquae calidae*⁶¹⁾, *sulphur*⁶²⁾; verum nos *acetum ammoniacale*⁶³⁾ et

58) Quondam Viennae mercatoris curam suscepi, febre tertiana laborantis. Morbus erat consueto cortici rebellis. Adhibito eo exquisitissimo, adhuc gravior reddebatur. Confugi tandem ad venaesectionem, qua vix peracta, febris illico cessavit. Vide similia apud RUSH *medizinische Beobachtungen. A. d. E. Leipzig 1792. p. 200.*

59) TRNKA l. c. p. 323. 60) ibid. l. c. p. 324.

61) SENAC op. c. L. II. cap. VI. — J. DEPPE in the *American medical Recorder. New-York 1822. Vol. 5. Art. 11.*

62) RULAND thes. med. tit. febres. RIVERIUS Cent. IV. obs. 83. — HAEN rat. med. P. XII. c. 6. §. 8. — *Berliner Sammlung 2. B. 6. St. Art. 2. No. 2. p. 590.* — Pulvis pyrius remedium sistit vulgi, cujus virtus forte et sulphuri adscribenda est.

63) R. Spiritus Mindereri Roob Sambuci aa unciam unam. Cap. binis aut tribus vicibus; superbibendo infusum florum sambuci calidum.

et *solutionem tartratis stibii et potassae* ⁶⁴⁾, aliis diapnoicis anteponimus. Quodsi sub febris intermittens rheumaticae et catarrhalis decursu dolor, evacuationibus sanguinis sive universalibus sive localibus, rebellis, urget, ille *vesicatorium* exposcit.

10. Sub ipso paroxysmo febris intermittens C. feb. int. gastricae, vix alia methodus requiritur, quam ea, ^{gastricae} ~~saburralis~~. quae in simplici morbo commendata fuit. Attamen vomitum ibi sub frigoris stadio comparentem, non libenter sedamus, promovemus potius potu tepido. Vigente calore porrigitur *solutio supertartridis potassae*. Etiam si dolor capitis valde urget, hic non ad opium confugiendum, quod diathesi gastricae reali adversatur. Apyrexiae sub stadio quo magis series symptomatum gastricorum vigere continuat, eo magis morborum remediis complicationi accommodatis, aggredimur. In febre intermittente gastrica *saburrali* primum est saburram, ut dicunt, mobilem reddere, qui scopus attingitur, tum *solutione tartratis stibii et potassae*, tum *pulveribus resolventibus* ⁶⁵⁾, tum pulvere *mu-riatis*

64) R. Tartratis stibii et potassae (Tartari emetici) granum unum. Aquae destillatae simplicis libram unam. D. S. Omni prima sive secunda hora vasculum semis coffeanum.

65) *Pulveres resolventes*. R. Pulveris supertartratis potassae unciam semis. Tartratis stibii et potassae granum unum. M. exacte, et divid. in octo partes aequales. S. Cap. omni secunda hora dosis.

riatis ammoniae secunda vel tertia quaque hora a scrupulo semis ad scrupulum unum porrecto. Dum remedia hujusmodi unam alteramve evacuationem jam produxere, sequens paroxysmus plerumque mitior evadit. Tunc tota cura resolventium ope absolvenda est. Alias adveniente proxima *apyrexia*⁶⁶⁾, pro re nata, dum scilicet saburrae vel bilis sursum turgent, *emeticum*⁶⁷⁾, dum inferiora versus, *purgans*⁶⁸⁾, dum per utrasque vias, in robustissimo aegro, *emeto-purgans*⁶⁹⁾ exhibetur.

Eva-

66) CELSUS (L. III. c. 12. 14.), CRATO (cons. et epist. med. L. II. p. 417.) aliique emetica et purgantia sub ipso *paroxysmo* adhibent. Quam periculosa haec methodus sit, SENAC (l. c. L. II. cap. 4.) et SWIETEN (comment. ad aph. 759.) demonstrant.

67) Curationes febrium intermittentium *emeticorum* ope leguntur apud GALENUM de art. cur. ad Glauc. L. I. c. 10. — TIMAEUM l. c. L. VIII. cas. 10. — PRINGLE l. c. p. 247. — COLINX l. c. p. 33. — LAUTTER l. c. cap. 1. p. 3. — STÖRK ann. med. II. p. 164. — R. Tartari emetici grana tria. Aquae destillatae fontis uncias tres. Cap. dimidium, et, nisi vomitus sequatur, interpositâ semper quartâ horae parte, binis vicibus, quod reliquum est. Aut. R. Pulveris radici caephelidis ipecacuanhae grana viginti quinque. Cap. aut R. Pulveris radices caephelidis ipecacuanhae grana viginti, pulveris tartari emetici granum unum. M. Capiat. — Infantibus tot ipecacuanhae grana, quot anni aetatis.

68) R. Salis amari drachmas decem. Aquae fervidae uncias quinque. Syrupi cerasorum unciam. M. Cap. binis vicibus.

69) Salis amari unciam unam et semis, tartari emetici

Evacuationes tali pacto abortae, vel febrem omnino fugant, vel eam ad statum intermittentis *simplicis* reducunt. Quod si febris, et post evacuationes debito modo peractas, rebellis evaderet, vel vi cresceret, ab usu evacuantium abstinendum foret ⁷⁰⁾, eoque magis, si nullus in diaeta error subrepserit. Diaeta enim in febre intermittente gastrica saburrali, praecipuum sistit curationis momentum. Esto ea vegetabilis, subacida. Absolutis evacuationibus, aegrotantibus viribus fractis et vinum meracum cum pane tosto et aromatibus porrigitur.

11. In febre intermittente gastrica *biliosa* C. feb. int. cum phlogosi aut congestione viscerum abdomi-^{gastr. biliosa.} nalium, praecipue hepatis, *venae sectio* e brachio aut pede dextro non negligenda est. Copia sanguinis minor, quam in morbo pure inflammatorio detrahitur. Complicationis etenim inflammatoriae quod restat, per *hirudines* et *cucurbitulas scarificantes* abdominis locis dolentibus admotas, abigi solet. Usui interno pharmacum *mucilaginosum* simulque *subacidum* ⁷¹⁾ inservit. Sedatâ sic

Y 2

irrita-

grana tria. Solve in aquae destillatae libra una. Cap. tribus vicibus.

70) MATH. GEORGI (*art. piccol. di medicare* p. 61.) refert, in Dertonensi epidemia quodam autumno febres, tertiano typo recurrentes, *frequenti purgatione* tractatas, lethales evasisse; omissa autem purgatione ex consilio eximii medici MORO fere omnes sanatas.

71) R. Gummi arabici drachmas tres. Fructuum tama-

irritatione alvus ope *calomel*⁷²⁾ et *clysterum* movenda. Ab emeticis abstinendum, ne vix extinctum incendium revocetur. Contra vero si morbus nunquam inflammatoriam complicationem agnoverit, *emesis*⁷³⁾, (nulla obstante gravi contraindicatione), sine ambagibus cienda, et recrudescuntibus iterum symptomatibus biliosis, reiteranda⁷⁴⁾ est. *Tartarus emeticus* hîc tum pueris tum adultis aequè proficuus. Nisi hoc pharmacum alvum aliunde provocaret, illa *lenibus purgantibus*⁷⁵⁾, elicienda. Quo sub opere probe observandum est, num morbus decrescat, nec ne?

Quod-

rindorum drachmas sex. Mellis puri unciam unam. Ebulliant per horae quadrantem c. s. q. aquae. Colatura librae unius D. S. omni hora duas capiat uncias.

72) Homini adulto *unicâ vice*, a granis quinque ad decem, sine ullo additamento exhibeo.

73) „Hoc ita certum est, ut praetermisso emetico, rebelles omnino fiant febres et diuturnae.“ SENAC l. c.
„Cortex, quamvis rite sumtus, interdum parum efficax est; quo in casu suspicio erit, ventriculum sordibus onustum vim remedii impedire. Itaque vomere oportet, quo facto febris non raro cedit.“ HEBERDEN l. c. p. 142. Cfr. GRUNER diss. Estne febris intermittens curatio a vomitoriis incipienda? Jen. 1788.

74) „... tantus est biliosi hujus magmatis fomes aut proventus, ut undâ vice vomere multis satis non sit.“ SENAC l. c.

75) „... certum est enim, quod si leniter et quasi sponte succedat evacuatio, et si biliosa inprimis educantur, facilius tolli morbi fontem.“ SENAC l. c.

Quodsi vires aegri tantummodo decrescerent, praemissa jam satis methodo anti-gastrica, ad febri-fugum confugiendum foret.

12. Febris intermittens gastrica *pituitosa* ab C. feb. int. initio uti febris intermittens catarrhalis curatur. <sup>gastr. pi-
tuitosae et
vermino-
sae.</sup> Cavendum ne irritatio, hîc in tubo intestinali vigens, a pharmacis nimis activis augeatur. Quamobrem donec illa, methodo antiphlogistica, fracta sit, dumtaxat *remedia mucilaginosae* ⁷⁶⁾ praescribenda sunt; vanus foret timor, ne pituita per illa augeatur. Serius vero ista *resolventium* ope incidenda. Scopus hîc optime *salis ammoniaci* ⁷⁷⁾ usu obtinetur. Si acida primarum viarum praesto essent, maxime *sal absynthii* ⁷⁸⁾ conducit. Sedatâ irritatione ventriculi et intestinorum, dilutâ pituitâ, extinctisque acidis, prout mucus sursum vel deorsum urget, ille, ut relate ad bilem docuimus, *emeticorum* et *purgantium* auxiliis eliminandus, sicque morbus aut debellandus, aut ad simplicitatem perducendus. *Complicatio verminosa*

76) E. c. decoctum seminum lini; radicis salep; gummi arabici.*

77) R. Muriatis ammoniacae drachmam unam. Solve in decocti radicum graminis libra una. Adde Syrupi liquiritiae unciam unam. M.

78) Grana decem pro dosi, idque omni tertia horâ. „Resolvit potenter, acidum frangit, lotium movet, detergit colluviem primarum viarum et conducit, quando ventriculus corticem non fert.“ BOERHAAVE V. MURRAY apparatus medicam. T. I. p. 22.

nosa febrium intermittantium, pharmaca ascaridibus, hinc inde et taeniae, adversa exposcit. Sed et hisce in pharmacis administrandis summa tubi intestinalis ratio habenda est, ne scilicet illius a vermibus excitatam irritationem, anthelminthicis acrioribus augeamus. Praemissis igitur, si opus fuerit, evacuationibus sanguinis sive universalibus sive localibus, alias immediate, tempore apyrexiae, vel *oleum ricini*, vel *calomel*, cum vel sine *radice jalappae* et *seminibus cinæ* (*artemisiae contra*)⁷⁹⁾ propinantur. Sic, nisi morbus illico tollatur, saltem febrifugo via sternitur.

C. feb. int.
simplicis.

13. Perductis febribus intermittantibus complicatis ad statum *morbi simplicis*, vel in febre intermittente mox a primo initio *simplici*, ante omnia eruendum est, *utrum liceat morbum illico suppressere, nec ne?* Nequaquam licet⁸⁰⁾, dum febris intermittens morbo quodam chronico supervenerat, quæ, ea vigente, aut evanescit aut immittitur, inprimis si morbus ille ex febre intermittente praepostere cinchona sanata originem duxerit.

79) R. Pulveris calomel grana tria rad. jalappae, seminis santonici ââ grana decem. M. Cap. jejuno ventriculo (pro puero octo, decem annorum). Cfr. MANDRUZZATO della facoltà febrifuga del santonico. Venezia 1800 (folia et summitates).

80) BOHN de praematura intermittantium fuga suspecta. Lips. 1709. KRIECHBAUM diss. de curat. febrium intermittantium simplicium, omissis plane emeticis, purgantibus, laxantibus et febrifugis. Gies. 1745.

rit. Juvat enim effectuum salutarium febris intermittens memores esse. Verum non reticendum, multa damna, quae olim praematurae exhibitioni corticis cinchonae tribuebantur, potius feбри adscribenda esse, diu scilicet nimis duranti. Atque ita opinantur MILLAR, JACKSON, LIND, BROCKLESBY, quorum testimonia collegit WILSON⁸¹⁾. Et re quidem vera (supra allatis casibus exceptis), quam primum id fieri potest, feбри intermittenti finis ponendus, idque dum ea *simplex* est *cinchonâ*, quam sententiam, ex conspicua nostra hoc in morbo experientia depromptam, et testimonio eximii HEBERDEN⁸²⁾ suffulcimus.

14. Est enim *cortex cinchonae officinalis*, ge- Cinchona. nuinus bonaeque indolis, remedium adeo securum febris intermittens legitimae simplicis ut inter centenos aegros, hoc morbo laborantes, vix unus inveniatur, qui paucorum dierum spatio ejus ope non sanetur⁸³⁾. Qui contrarium dictitant, atque virtu-

81) l. c. p. 257 sq. 82) Op. cit. cap. 38. extremo.

83) De hac cinchonae admirabili virtute primum testati sunt SYDENHAM, MORTON, RAMAZZINI, TORTI, WERLHOF et maxime ZENDRINI (*trattato della china-china, con una prefazione intorno ai pregiudizj che corrompono l'arte medicinale, col modo più severo d'apprenderla. Venez. 1705. Cfr. Sammlung die Fieberrinde betreffender Abhandl. u. Aufsätze. A. d. E. und Franz. mit Zusätzen. Nürnberg. 1769. — J. C. SCHENKENBECHER's Bericht über die heilsamen Wirkungen der Kinkina. Riga 1769. — G. G. KÜHN über die China-*

virtutem divini prorsus remedii, maximo Creatoris dono generi humano impertiti, in dubium vocare, vel denigrare audent; hi vel ab hypothesebus, sive contradicendi cupiditate obcoecantur; vel ad eos amandandi, quorum malignitas non alia prorsus ratione eximia pharmaca, ac homines magni ingenii, obtrectat. Nonnulli tandem tempore *Napoleonis* cinchonae virtutem minoris pretii facere simulabant, ne fateri adigerentur, continentem nullo pacto posse commercio maritimo absque magno generis humani detrimento carere.

Cinch.
species.

15. Post infinita pericula, cum *cortice cinchonae* tum *fusco*, tum *rubro*⁸⁴⁾, tum *flavo*⁸⁵⁾, tum *regio*⁸⁶⁾ instituta, fatemur, caeteris paribus hisce

oder Fiebrerrinde in chem. u. therapeutischer Hinsicht. Leipzig 1804. — C. BAUSCHENBUSCH de manifestis in organismo vivo mutationibus ope chinae etc. product. Tübing. 1809. PELLETIER et CAVENTON v. Repertor. für die Pharmacie von A. BUCHNER und G. KASTNER. 1822. Nürnberg. 12. B. 1. Heft.

84) CH. COTHENIUS *chemische Untersuchungen der rothen Chinarinde, wie auch derjenigen, welche bisher im Gebrauche gewesen, nebst einer kurzen Geschichte der China überhaupt. Uebersetzt von PYL. Berlin 1783. — W. SAUNDERS Beobachtungen über die vorzüglichsten Heilkräfte der rothen peruvianischen Rinde. A. d. E. von LUDWIG. Leipzig 1783.*

85) FR. MARABELLI *chem. Untersuchung der neuerlich bekannt gewordenen gelben peruv. Rinde. A. d. I. von TITIUS. Leipzig 1797.*

86) J. RELPH *Untersuch. über die med. Wirkungen der*

hisce corticis speciebus aequalem omnino vim febrifugam inesse⁸⁷⁾. Quid de virtute chinae, quam *Bicoloratam* vocant⁸⁸⁾, deque aliis minus usitatis speciebus⁸⁹⁾ sentiendum sit, tempus docebit⁹⁰⁾.

Königs-China. A. d. E. mit Zusätzen von FRIES. Breslau 1797. — J. C. A. MAYER Untersuch. der Königs-China-Rinde. Berlin 1794.

87) Cortex quidem *flavus*, qui ab aliquot annis in Europae officinis invenitur, ceteras species virtute antecellit, sed non alia ex causa, quam quod hae minoris notae esse solent. Quotiescunque nempe cortice cinchonae ordinario, quem aliquando generositate Nuntiorum Hispanicorum accepi, utebar, semper eum corticem flavum officinarum vel virtute adaequantem vel superantem inveni. Cujus rei memores sunt, qui copiam *chininii* in variis corticis speciebus determinare student. Cfr. MICHÄLIS *vergleichende Uebersicht der verschiedenen China-Arten in Beziehung auf ihren Gehalt an Chinin und Cinchonin*. v. HUFELAND's *Journal d. prakt. Heilk.* 1824. April. p. 109.

88) (BREERA) *Risultamenti ottenuti nella clinica medica della I. R. università di Padova dall' amministrazione di una china Bicolorata per la cura delle febbri accessionali anco d'indole perniciosa. — Si premette il sunto delle osservazioni relative raccolte dai medici Trevigiani. Padova 1824.* (Contenditur chinam hujusmodi ad unciam semis porrectam paroxysmis frenum injicere, — recidivis occurrere, — vomitum compescere — et complicationem inflammatoriam non augere: „arresta la febbre e per nulla inasprisce la flogosi“).

89) Enumerantur a H. RUIZ *von dem officinellen Fiebertinden-Baume und dessen Arten. A. d. Span. Gött.*

cebit ⁹⁰). Spectaretne illa ad *chinam* St. *Luciae* ⁹¹)?

Tempus
admini-
strationis.

16. Pro corticis cinchonae usu *apyrexia* eligitur. Vigente enim paroxysmo remedium hujusmodi plerumque vel vi salutari caret, vel infinitas gene-

1794. LAMBERT (*a description of the genus cinchona. Lond. 1797.*). M. ROHDE monographiae generis tentamen. Goett. 1804. a GRAF (*die Fiebertinden in botanischer, chemischer und pharmaceutischer Beziehung. Wien 1825.*), atque a BERGEN et SANTEN (*v. Magazin der ausländ. med. chir. Literatur. Hamburg 1825. p. 363.*).

90) Respectu ad *chinam bicoloratam* sic sentiunt CARMINATI et PALLETTA in *Rapporto all' I. R. istituto di scienze etc. letto il 4. febbrajo 1825. (v. Annali di medicina pratica di OMODEI. No. 99. Marzo 1825. p. 512.)*: „Eppure, niuno de' malati si trovò alleviato notabilmente della febbre, niuno sperimentò un cangiamento nella forma e durata del parossismo, e niuno in conseguenza fu colla bicolorata guarito da febbrili periodici insulti.“ — Contrarium contendit cl. BRERA (*cenni sul rapporto etc. v. OMODEI op. cit. No. 100.*) asserens: „... questa corteccia prosiegue ad esternare de' soddisfacenti (effetti) fra noi ed altrove.“ Rebellem febrem intermittentem illius ope debellavit nuper cl. SCHIFFNER medicus primarius nosocomii civici Vindobonensis.

91) M. MALLET *sur la quinquina de la Martinique. v. Journ. de physique p. l'Abbé ROZIER. T. XVII. p. 169.* et GIUSEPPE MORETTI *memorie ed osservazioni intorno a diversi oggetti riguardanti la scienza naturali. T. I. Pavia 1820. p. 223.*

generat molestias, anxietatem scilicet, ventriculi oppressionem, vomitum, dysuriam, caloris febrilis augmentum etc. Tuto tamen cortex in apyrexia etiamsi imperfecta, uti in febribus subcontinuis, vel declinante paroxysmo in febre intermittente subintrante porrigi potest.

17. Cinchona in subtilissimum *pulverem* re-Forma. dacta, aqua commixta⁹²⁾, sive *electuarii*⁹³⁾, sive *pilularum*⁹⁴⁾ sub forma porrecta, singula ex ea deducta praeparata vi febrifuga antecellit. Tanta enim est pulveris corticis efficacia, ut vel ejusdem pars, quae jam pro decocto parando inserviit, si exsiccetur, novi fere corticis instar agat⁹⁵⁾.

18. Ad praecavendum futurum paroxysmum Dosis.
non raro drachmae duae cinchonae exquisitissimae Modus ex-
hibendi.
suffi-

92) In nosocomiis ne cortex ab infirmariis, aut, ut experti sumus, ab ipsis aegrotantibus venditetur, juvat eum jam aqua infusum ex officina praescribere.

93) R. Pulveris corticis cinchonae officinalis unciam et semis. Fiat l. a. electuarium cum s. q. Syrupi Corticis ejusdem. D. S. Omni prima sive secunda hora ad magnitudinem nucis.

94) R. Pulveris corticis peruviani alcoholisati unciam unam. Extracti ejusdem drachmas tres. Syrupi ejusdem q. s. ut fiat massa pilularum, ex qua formentur pilulae ponderis granorum trium. Conspergantur pulvere radice ireos florentinae. D. S. Omni secunda seu tertia hora capiat a duodecim ad viginti pilulas.

95) Atque id demonstrant multiplicia experimenta, quae tum in clinico instituto Universitatis Vilmensis, tum in eo, quod societatem Beneficentiae attinet, institui.

sufficiunt. In genere tamen uncia una requiritur, atque unciae tres ad curam totius morbi atque convalescentiae absolvendam. Plerumque prima illa dosis curriculo unius apyrexiae porrigi potest. Quum vero in subcontinuis, quotidianis, et tertianis duplicibus ob brevitatem decursus unciam corticis ingerere (saltem sine molestia aegrorum), arduum sit; nisi periculum immineat, memoratam cinchonae dosin spatio *duarum apyrexiarum* exhibere sufficit. Excepto enim casu febris intermittens perniciosae, cur aegrotus cortice obrui debeat, minime intelligimus ⁹⁶). Potius „observandum, an innocue a stomacho recipiatur remedium hoc; an ciborum exsuscitetur appetentia; an levis oriatur mador, quo perfundatur totum corpus; an alvi adsit laxitas; an denique urinae nativus restituatur color“ ⁹⁷); aut contra, an gravitatis et constrictionis sensus in ventriculo inducatur; an sitis intensior urgeat; an dolores in hypochondriis insurgant, anque calor cutis urens evadat. Quae ultima dum contingunt, mora facienda, ac sal quoddam medium intercalandum. Acrius in cura febrium intermittentium *perniciosarum*, ut indicavimus, incedendum. Hic enim duo inter mala minus eligendo, incommoda, cortice

96) JUNCKER diss. de rationali expectatione et irrationali festinatione in febrium intermittentium curatione. Hal. 1742.

97) SENAC l. c. cap. XV.

tice inducenda, morti alias inevitabili anteponimus. Quam ob rem istis in febribus omni pacto non solum uncia illius una, sed et ultra, tempore apyrexiae praescribi debet. Servante febre typum tertianae, sive quartanae, plerumque drachma una pulveris cinchonae sine incommodo secunda vel tertia quaque hora suppeditatur. Quocunque in casu, prima corticis dosis, statim cessante sudore exhibenda, ne scilicet aeger, ingruente apyrexia saepe obdormiens, paulo post remedii sumendi gratia a somno excitari debeat. Accidit haud raro, ut post primas cinchonae doses, paroxysmus intendatur; hoc, nisi febrifugum incongrue adhibitum fuerit⁹⁸), indicio esse solet, morbum brevi evaniturum fore⁹⁹). *Minorem dosin cinchonae* proxime ante paroxysmi adventum porrectam efficaciorē esse largiori longe antea adhibita¹⁰⁰), nunquam confirmatum vidimus. Nec consultum videtur ad suppeditandum corticem appropinquan-tem paroxysmum expectare, utpote qui, si praeter

ter

98) Huc spectare videtur casus enarratus a J. A. PH. GESNER in *Sammlung. von Beobachtungen aus der Arznei- u. Naturk.* 3. B. p. 223.

99) Sic omni jure docuerunt TORTI (l. c. L. IV. c. 3. hist. 1.) et WERLHOF (l. c. Sect. III. §. 4.).

100) BARTHOLINUS Cent. V. hist. 50. — TORTI l. c. cap. 7. — THUESSINK *Waarnemingen* 1808. et NASSÉ in HUFELAND's *Journ. der prakt. Heilk.* 1814. Januar. p. 78.

ter consuetudinem anticiparet, aut vomitum socium haberet, gravia portenderet mala¹⁰¹).

Correcti-
va.

19. Cortex cinchonae in febre intermittente *simplici*, atque *in homine* aliunde sano *locum habente nullo adjuvante sive corrigente* remedio indiget, atque inutilis sane, quin imo damnosa est consuetudo, illi vinum, aromata, amara, narcotica sive excitantia jungendi. Methodus hujusmodi solum in specialibus quibusdam casibus locum obtinet, videlicet, ubi aut quid superest complicationis, aut aegrotus aliis simul morbis adfectus est. Sic ubi febris intermittens prius erat *inflammatoria*, etiamsi morbus ad simplicitatem reductus sit, cortex tamen *nitratis potassae* connubium¹⁰²); ut nova, diatheseos inflammatoriae impediatur evolutio, exposcit. Praevia complicatione *saburrali* aut *biliosa*, nisi alvus sponte abun-

101) Audiatur SENAC: „Ex ante dictis non minus patet, *quam inconsulto* exhibeatur idem remedium (Kina-kina) in febrilis frigoris invasione,“ — „quid scilicet expectari tunc potest ab ejusmodi remedio, dum ut diximus, constricta rigidaque sunt omnia, dum ventriculus ipsam aquam calidam vix ferre potest, dum stagnat sanguis in vena portae, in auriculis cordis, in ipso pulmone; anxietates profecto exsurgent inexplicabiles; intendetur frigoris vis; paroxysmis addentur vires“ (l. c. cap. XIV.). Cfr. J. P. FRANK epitome de cur. homin. morb. T. I. p. 64.

102) R. Pulveris corticis peruviani unciam unam. Nitri puri drachmam unam. M. Divide in partes octo — vel duodecim aequales.

abundet, *cinchona radici rhei palmati*, copulanda¹⁰³⁾; quae methodus et casui, ubi febrifugum alvum adstringit, accommoda est. Perstante *vermium* suspicione, cortex vel *seminibus santonici*¹⁰⁴⁾ vel *radici valerianae*¹⁰⁵⁾, jungendus. Qui *acido primarum viarum* obnoxii sunt, illius cum *magnesia*¹⁰⁶⁾ aut *gummi arabico*¹⁰⁷⁾ unione gaudent. *Debilitate ventriculi* laborantibus *cinchona* cum *cinnamomo*¹⁰⁸⁾ praescribitur. Dum tubi intestinalis *imbecillitas* illi universi corporis juncta cernitur, aegerque vino aliunde adsuetus est, hoc liquidum febrifugo pro vehiculo inserviet. Febribus intermittentibus homines haemorrhoidales invadentibus, cortici *cremor tartari*¹⁰⁹⁾ addendus. *Hystericæ* et *chloroticae*, alique sensibilitate exquisita dotati, corticem peruvianum facile vomitu rejiciunt, nisi *opio* jungatur¹¹⁰⁾.

Haec

103) R. Tincturae rhei aquosae uncias tres. Capiat cochleare majus simul cum cortice, ad effectum leniter purgantem usque.

104) Drachma seminum pro uncia corticis.

105) Drachma radiceis pro uncia corticis.

106) Drachma semis pro uncia corticis.

107) Drachmae duae pro uncia corticis.

108) Grana duo pro drachma corticis.

109) Ad drachmam corticis cochlearculum coffeanum, donec effectus eccoproticus exsurgat.

110) R. Aquae menthae, aut melissae, aut chamomillae, uncias quatuor. Laudani liquidi Sydenhami guttas quindecim. Praemittatur unicuique cinchonae dosi cochleare unum alterumve majus.

Haec ipsa methodus tunc quoque indicata est, si cortex cum detrimento *per alvum ruit*. Cum *detrimento*, inquam, nam levis hîc diarrhoea non nocet, immo prodest. In febribus intermittentibus *arthriticorum* indicatae ceteroquin cinchonae, infusum *stipitum solani dulcamarae* superbibendum. Difficillima autem est febrifugi administratio in hominibus, *labe pulmonum* mulctatis. Cum ea cautela cortex tunc exhiberi debet, ut *mucilaginoso pharmaca* simul praescribantur¹¹¹⁾. Et hîc *stipites dulcamarae* sibi laudem promeruerunt¹¹²⁾. Sic quoque vigentibus *scrophulis* incedendum. *Scorbuticis*, febre intermittente detentis, connubium cinchonae cum *succo citri*¹¹³⁾ conducit.

Cinchonae
praeparata.

20. Sunt autem aegri, et quidem haud pauci, quorum ventriculus cortici, in substantia porrecto, omnino reluctatur. Praeterea magna difficultas debitam illius dosin *infantibus* administrandi occurrit¹¹⁴⁾. His sub rerum positionibus medici confugere solebant ad *cinchonae extractum*, praecipue

111) SENAC op. c. L. II. cap. XVIII.

112) COLLIN ann. med. P. I. c. 2. p. 103.

113) HOSACKI (*New-York medical and physical journal* 1823. Jun.) formulam (R. Pulveris corticis peruviani unciam unam. Succu citri uncias tres) hîc solummodo indicatam esse puto.

114) Dum ubera adhuc sugebant pusiones, *nutrici* cortex porrigebatur (*Samml. auserl. Abhandl. f. pr. Aerzte.* 1. B. p. 37.).

cipue *vinosum*¹¹⁵⁾; ad illius *decoctum saturatum*¹¹⁶⁾; *syrupum*¹¹⁷⁾, et *sal essentielle*; ad *clysteres*¹¹⁸⁾, ad *balnea*¹¹⁹⁾, atque *cataplasmata*¹²⁰⁾ ex cortice parata; ad connubium cinchonae cum potu coffeae, nec non ad *adspersionem indusiorum* illius ope¹²¹⁾. Ex illo autem tempore, quo chemia in cortice cinchonae principium quoddam alcalinum, *chininium*¹²²⁾ dictum detexit, quod partem febr-

115) Ad unciam semis in unciis sex vini hispanici aut aquae menthae pro adultis. *Pueris* consilio HEBERDENII (op. cit. p. 142.) exhibebatur: extracti cinchonae, sacchari, singulorum scrupulus, aquae cochleare et sesqui cochleare lactis.

116) R. Corticis cinchonae officinalis ruditer tusi unciam unam et semis. Coque per sextam horae partem c. s. q. aquae fontis vase clauso. Colatura librae unius. D.

117) R. Syrupi cinchonae unciam unam et semis. Extract. ejusdem s. q. aquae naphae subacti drachmam semis. M. D. S. Cochleare coffeanum omni hora infanti unius anni.

118) R. Corticis cinchonae ruditer tusi uncias duas. Coque leniter cum aquae simplicis libra una et semis, *quin coletur*. D. S. pro duobus clysteribus, praemis- sis enematibus simplicibus, ad intestinum rectum a faecibus liberandum, injiciendis.

119) Pro infantibus.

120) Ad regionem epigastricam in infantibus (TRANKA I. c. p. 447.). Cfr. CP. LBR. RÖMER's *Abhandl. über d. Peruvianische Rinde, besonders deren Anwendung als äusserliches Heilmittel*. Altenb. 1792.

121) PYE in *med. observ. and inquir.* Vol. 2. p. 245.

122) GALL. Quinine (ex cortice flavo), cinchonine (ex cortice fusco).

febrifugi activam sistere contendunt, quodque principium acido sulphurico nuptum (*sulphas chininii* ¹²³)), aegrotantibus in parva dosi ¹²⁴), quin simul partes ligneae ingurgitari debeant, porrigi potest; ex illo, inquam, tempore, praeparata supra allata minoris in cura febrium intermittentium evaserunt momenti. Immo, si suffragiis undique de *sulphatis chininii* virtute emanatis ¹²⁵) fides tribuenda sit, ipsius corticis cinchonae

123) GERM. Schwefelsaures Chinin. Chinasalze.

124) *Infantibus* ad granum unum alterumve in uncia una syrupi cinchonae spatio apyrexiae. *Adultis* hoc eodem spatio a granis, duodecim ad grana octodecim. R. Sulphatis chininii grana quatuor (sex). Sacchari albi grana octo. M. f. pulvis. cap. tales doses tres tempore a febre libero. Vel R. Sulphatis chininii grana duodecim (octodecim). Aquae destillatae simplicis uncias quatuor. Syrupi cinchonae unciam unam. M. Cap. tribus vicibus.

125) FICINUS, Cinchonin, medicamentum efficacissimum adversus cachexiam e febre intermittente obortam tutissime exhibendum. Dresd. 1816. CHOMEL *observations sur l'emploi des sulfates de quinine et de cinchonine dans les fièvres intermittentes; lues à l'académie des sciences le 26. fevrier 1821. v. Nouveau journal de médecine. T. X. mars 1821. p. 285. — HALLÉ in Revue médicale an. 2. — Bericht über die Entdeckung des Cinchonin's und Chinin's. v. HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1821. 6. St. — OPPERT einige Beobacht. über die Wirkungen des schwefelsauren Chinin's. ib. 1823. July. p. 82. — Nachricht über die Chinasalze in Magazin der ausländischen Literatur der gesammten Heil-*

chonae [crudi exsilium expectari debet. Interea

Z 2

in

kunde. Herausgeg. von Dr. GERSON u. JULIUS. Hamburg. 1. B. p. 563. 2. B. p. 172. — 1822. April. p. 360. — Dr. WIEDEMANN, ZIEGLER, JÄGER et SPIRITUS in RUST's Magazin der gesammten Heilk. 17. B. 1. Hest. p. 135. 136. 186. — GITTERMANN über die Wirksamkeit des schwefelsauren Chinins gegen Wechselfieber; in Rheinische Jahrbücher für Medic. n. Chirurgie. Herausgeg. von HARLESS. 6. B. 3. St. p. 16. — BUCHNER und KASTNER Repertorium für Pharmacie. 1822. — G. DE MATTHEIS in Biblioteca Italiana. 1822. p. 423. — Osservazioni sulla virtù febrifuga del solfato di chinino dei Dri A. BARBAGI et G. MINA. Palermo 1822. — P. MARIANINI memoria di alcune indagini intorno all' uso ed all' efficaccia del solfato di china. Mortara 1822. — Waarnemingen gedaan met sulfas de Quinine, door C. H. à ROY. Amsterd. 1822. — Untersuchungen üb. die eigenthümlichen Kräfte des Quinins von Dr. ELLIOTSON in Neuen Samml. auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. 7. B. 3. St. — Ueber die an der Loire und besonders in Tours endemisch herrschenden Wechselfieber u. das mit Erfolg gegen dieselben angewandte schwefelsaure Chinin, von Dr. HEYFELDER in Rheinisch-Westphäl. Jahrbücher der Med. u. Chirurg. 8. B. 2. St. p. 18. — Verbeterde bereiding van den Kina-Loogzouten door F. L. A. NIEUWENHUIS; benevens geneeskundige Waarnemingen met deze zuivere bestanddeelen der Kina. Door C. J. NIEUWENHUIS. Amsterd. 1823. — VAN MAANEN diss. de sulphate chininae. Lugd. Bat. 1823. — FR. TANTINI sull' uso del solfato di chinino in una febbre terziana pernicioso letargica. v. Repertorio medico-chirurgico di Torino. No. 53. 1824. Maggio. — BIANCHETTI cenno intorno al solfato di chinino. ibid.

in re tam gravi non est properandum. *Primum* enim ad lectos aegrorum, chemiam et dona ferentem, timemus. *Secundo* in febribus intermittentibus perniciosis, in quibus vita aegrorum unice a matura et debita febrifugi remedii administratione pendet, de corticis peruviani *crudi*, quem exhibituri sumus, bonitate sensuum nostrorum ope judicare possumus; non ita de qualitate *sulphatis chininii*, quem non omnes pharmacopolae rite praeparare sciunt, ac nonnulli adulterant¹²⁶⁾. *Tertio* quamvis hucusque sulphatis chininii, quae ad febrem intermittentem debellandam requiritur, dosis, vix pretium corticis *crudi*, ad eundem effectum praestandum necessarii,

— F. BARKER in *Transactions of the association of Fellows and Licentiates of the King and Queen College of Physicians in Ireland*. Vol. 4. No. 26. Dublin 1824.
 — *Ansichten u. vergl. Erfahrungen über d. Wirkungen der Chinabasen oder neuen Chinapräparaten in Krankheiten und ihr Verhältniss zur China selbst*, von Dr. GÜNTHER in HUFELAND's Journ. 1825. Decbr. Cfr. *Neue Samml. auserl. Abh.* 7. Bd.

126) „Allorchè si prescrive il solfato di chinino si osservi accuratamente alla sua qualità, poichè la perniciosissima mala fede di alcuni speciali fa loro esitare per puro solfato di chinino un impuro mescuglio di scarsissima quantità di detto solfato unita a molto maggior dose or di nitro, or d'acido boracico, or di magnesia, or di farina semplice, or di farina resa amara con alcool in cui sia stato infuso del legno quassio.“ TANTINI l. c. p. 203. not.

rii, excedat; attamen num res etiam in posterum ita se habitura sit, dubitare licet. *Quarto.* Lis adhuc sub iudice est, num *principium adstringens*, quod cortex peruvianus continet, et a quo principio, haec ipsa chemia haud dudum omnem illius vim febrifugam repetebat, plane inefficax sit, nec ne¹²⁷). *Quinto.* Et quid, si febres intermittentes a paucis annis (a quibus sulphatis chininii usus invaluit) solito mitiores fuissent; ita ut *una* tantum corticis pars constitutiva ad illas debellandas sufficere potuerit? Et *Sexto.* Quodsi chininium partem activam corticis peruviani unice sistat; nonne ab illo pravi quoque effectus, qui huic crimini vertuntur, unice repetendi sunt? Ac re quidem vera jam ipsi sulphatis chininii fautores conqueri incipiunt, de malis a praegrandibus illius dosibus¹²⁸), deque impotentia

127) Vir amicus cl. PEZZONI Bizantii multas febres intermittentes ope *Tannin* (a granis XC — C nychthemeri spatio) sanavit (*histoire de la société de médecine pratique de Montpellier* 1807.). Gallae jam dudum illo in morbo usurpatae fuere (RENEAULME in *histoire de l'académie de Paris* 1711.).

128) ALTONI MENARD *du danger des grandes doses du sulfate de quinine dans les fièvres remittentes et intermittentes.* In *Revue médicale* 1823. Novembre. Et TONELLI (*annali di med. prat. d'OMODEI Gen. e febbr.* 1825.) qui ait: „nel numero di 38 individui che hanno trangugiato il solfato di chinino, sol ne vedito la metà immune dall'apparizione di qualche morbooso fenomeno; e negl'altri osserviamo ove iste-

tentia ipsius, corporis vires, corticis peruviani crudi instar, restaurandi¹²⁹). Quae cum ita sint, medici prudentis est, *corticem cinchonae officinalis crudum* sine praeconcepta opinione contra febres intermittentes adhuc pro usu quotidiano, proque cura plurimarum perniciosarum, retinere; *sulphatem autem chininii* ad eos casus reservare, ubi aut aegri tenera aetas, aut ventriculi debilitas, aut vomitus, administrationi corticis in substantia obstant.

De reme-
diis surro-
gatis in
genere.

21. Conspicuum corticis cinchonae pretium, difficultas eum bonae notae acquirendi, et peculiaris quorundam aegrorum nullo pacto superanda adversus eundem idiosyncrasia sive praeconcepta opinio, medicos ad alia in febribus intermittenti-
bus adhibenda remedia impulere, quorum nonnulla vel ante cinchonae inventum praescribebantur¹³⁰), alia tandem ex novis experimentis innoscere¹³¹). Studium, quod ponitur in detegendis reme-

rismo, ove convellimenti convulsivi, ove sussulto dei tendini, ove la vertigine, ove una sordità temporaria, ed ove una depressione più o meno considerevole di forze, in alcuni casi assai a lungo protratta."

129) *Gazetta di Milano* (non a azione permanente).

130) J. H. SCHULZE diss. de febrium intermittantium curationibus antiquis. Halae 1737. GRAUMANN meletemata ad curationem febrium interm. Buzov. 1787.

131) J. C. RENARD *die inländischen Surrogate der Chinarinde*. Mainz 1809. — PH. JAC. PIDERIT *über inländische Surrogate für die Chinarinde*. Gött. 1809. —

remediis, quae cinchonae subrogentur, spernendum non est; at dolendum medicos hucusque ex eo paucos collegisse fructus. Adhuc nempe desideratur remedium, quod generalem et constantem cinchonae contra febres intermittentes virtutem adaequet. Non desunt enim pharmaca, quae in datis harum febrium epidemiis, fere cinchonae instar agunt; at haec ipsa pharmaca, alia adventante epidemia, effectum saepe omnino destituuntur¹³²⁾. Hoc idem ipsa in cinchona interdum contingere, suspicamur quidem¹³³⁾, at si revera contingat, casu complicationis, praecipue gastricae¹³⁴⁾, excepto, perraro. Utile opus esset, characteres febrium intermittentium apprime eruere, quae variis cinchonae remediis surrogatis, in speciali-

A. ERNET de medicamentis in febribus intermittentibus cortici peruviano substitutis. Berol. 1822.

132) Febres intermittentes, quae anno 1801. vere et aestate Vindobonae grassatae sunt, seminibus *phellandrii aquatici* constanter sanavi; sequentibus autem annis idem remedium eodemque in morbo spem semper frustravit. Similia relate ad corticem aesculi hippocastani inveniuntur in apparatu medicaminum Murrayi. Vol. III. p. 128 sq.

133) Anno, ni fallor, 1787, medici Insubriae fere omnes conquerebantur, corticem peruvianum in tollendis intermittentibus consuetum effectum minime produxisse. Inprimis hoc adscribebatur pravae cinchonae conditioni, at quum ipsa optimae indolis inveniretur, culpam in peculiarem febrium indolem refuderunt.

134) No. 11. (73), HEBERDEN.

cialibus epidemiis, devictae fuere. — Patet autem quoque de nullo inter ea remedia certum iudicium ferri posse, nisi illius virtus febrifuga ab experientia nonnullorum annorum confirmetur. — Caeterum remediis cinchonae surrogatis hucusque cognitis, minus oeconomiae consulitur, quam primo intuitu videri posset. Magnum enim oeconomiae momentum in eo positum est, ut morbus citius tutiusque, quam fieri possit, tollatur; at si consideremus magnas remediorum surrogatorum doses, quae plerumque ad morbum debellandum requiruntur; necessitatemque, ubi non prosint, ad cinchonam tandem serius ocyus confugiendi; palam fit, huiusmodi remedia surrogata, praesertim in nosocomiis, in quibus ad tempus longioris detentionis aegrorum, ob victum aliasque causas, ratio simul est habenda, saepe ipsius cinchonae pretium superare¹³⁵⁾. Haec omnia vero nos non impediunt, quo minus hîc de praecipuis cinchonae remediis surrogatis disseramus.

Radices
variae.

22. Radicem *cephaëlidis ipecacuanhae* tum in refracta omnino dosi, tum ad ipsam nauseam vomitumque usque porrectam, non raro in febribus intermittentibus tollendis proficuum invenimus, invenerunt jam pridem GIANELLA¹³⁶⁾, et WICH-
MANN¹³⁷⁾,

135) Idem fatetur et calculo demonstrat BOURGES, Vid. *Journal général de médecine etc.* T. XXXV. Mai 1809. P. 47 sq.

136) De admirabili ipecacuanhae virtute in curandis febribus. In HALLERI coll. diss. pract. T. V. No. 155.

MANN¹³⁷⁾. Praecipue hoc remedium in iis intermittentibus conducit, quas insolita ciborum aversio comitatur. Radix quoque *acori calami* in intermittentibus laudem meretur¹³⁸⁾. Exhibetur in pulvere ad scrupulos duos interpositis spatiis idoneis. Non ita laude digna radix *gei urbani*¹³⁹⁾, licet cinchonae instar ad uncias tres exhibita fuerit. Radicem *gentianae luteae*¹⁴⁰⁾, quoque uti febrifugum commendatam, nunquam, nisi aliis remediis junctam, in febribus periodicis tentavimus. Nec hisce in morbis radices *anthemidis pyrethri*¹⁴¹⁾, *dictamni albi*¹⁴²⁾, *plantaginis latifoliae*¹⁴³⁾, *marantae arundinaceae*¹⁴⁴⁾ tentamini subjecimus.

137) Vid. SCHAERTLICH diss. de usu opii in febre intermittente. Goett. 1783.

138) Acta soc. med. Havniensis. Vol. II. p. 206. HERBERDEN l. c. p. 142.

139) BUCHHAVE observationes circa radicem gei urbani. Copenh. 1781.

140) ETTMÜLLER opp. T. II. P. I. p. 277. — FR. HOFFMANN med. rat. syst. T. III. Sect. 2. c. 8. §. 4. — Eph. Nat. Cur. Dec. III. a. 9. obs. 23. Schol. MURRAY op. cit. T. II. p. 14 sq.

141) Journal der ausländischen medicinischen Literatur. 1802. Junius.

142) STÖRK lib. de flammula jovis. Cap. II. cas. 4 et 5.

143) DIOSCORIDES de med. mat. L. II. c. 114. — BOERHAAVE mat. med. Sect. 768. — SENAC l. c. Lib. II. cap. 9. („ego quidem jusculum quo erant incocta ejus (plantaginis) herbae folia, febres contumaces abegisse novi“). Inter patris schedas sequentem invenio: „Den

jecimus. Radix *aristolochiae serpentariae* utiliter in febre intermittente rebelli cinchonae jungitur¹⁴⁵).

Herbae
nonnullae.

23. Inter herbas ad febres intermittentes sanandas, eae *menyanthis trifoliatae*¹⁴⁶), et majori adhuc in gradu *artemisiae absynthii*¹⁴⁷), satisfecerunt, vim scilicet paroxysmorum infregerunt, ac febrem sensim sensimque debellarunt. Usi sumus succo recenter expresso et alcohol, singulorum drachmis tribus, bis terve curriculo apyrexiae repetendis. Methodum hanc fere solum militibus et rusticis, et quidem absente omni diatheseos inflammatoriae indicio, accommodatam esse, per se elucet. Herbas *datiscac cannabinae*¹⁴⁸), *taxi baccatae*¹⁴⁹),

16. April 1818 versicherte mich Herr Dr. PFEIFFER (Arzt in der Leopoldstadt Wiens), dass er mehrere Wechsel- fieber dadurch glücklich geheilt habe, dass er seinen Kranken zwischen den Anfällen ein Decoct, welches er mit einer Handvoll der Wurzeln der *Plantago latifolia* mit Wasser zubereiten liess, zu trinken gegeben habe.“

144) Bull. univers. 1824. Octobr. (sub forma ptisanæ).

145) R. Pulveris corticis cinchonae officinalis drachmas sex; radicis aristolochiae serpentariae drachmas duas. M. D. in octo partes aequales; vel M. fiat. l. a. electuarium c. s. q. Syrupi cinchonae; ut supra capiatur.

146) HUFELAND's Journ. d. prakt. Heilk. 2. Th. p. 457.

147) HEUERMANN's Bemerkungen u. Untersuchungen. 1. Th. p. 20. KORTUM l. c. p. 15.

148) Adhibuit RUBINI in pulvere, a scrupulo uno ad drachmam semis bis quaterve de die, aut extractum a

*tae*¹⁴⁹), *lycopodis Europaei*¹⁵⁰) et *syringae vulgaris*¹⁵¹), nunquam adhibuimus.

24. Interdum cum successu, sed tamen nunquam illi cinchonae aequiparando, longe saepius sine omni fructu, usurpavimus quosdam inter laudatos in febre intermittente cortices, *cortices* scilicet *aesculi hippocastani*¹⁵²), *salicis*¹⁵³) tum *albae*¹⁵⁴),
Cortices
varii.
 tum

granis quatuor ad grana sex. Vid. *Medicinische National-Zeitung*. 1798. p. 345.

149) BRERA comment. med. T. I, Part. 1. p. 76. Adhibet praeter folia et corticem, utriusque scilicet pulverem, spatio nychthemeri partitis vicibus ad drachmas duas; extractum a granis decem ad grana duodecim.

150) *Lettera del medico G. FR. RE sopra un nuovo succedaneo della corteccia del Peru. Torino 1820.* (Tota planta exsiccata, et in pulver. subt. redacta bis ter de die a scrupulo uno ad drachmam unam).

151) *Nye Hygæa, udgivet af C. OTTO 1823. Febr. v. Magazin der ausländischen Literat. der gesammt. Heilk. herausgeg. v. GERSON u. JULIUS 1824. März. April. p. 365.*

152) TURRA *lettera ed alcune osservazioni sulla febrifuga qualità dell' ipocastano. Vicenza 1780. ZANICHETTI lettera intorno alla facoltà dell' ipocastano. Vid. Raccolta d'opuscoli scientifici. T. X. p. 200. Contra vid. Journ. général de médec. T. XXXV. 1809. Mai. p. 34.*

153) ROSENBLAD diss. de usu corticis salicis in febr. intermitt. Lond. 1782. JAMES *observations on the bark of a species of Willow. Lond. 1792. WHITE observations on the Willow-Bark. Bath. 1798.*

154) GÜNZ de cortice salicis albae, cortici substituendo.

tum *latifoliae*¹⁵⁵), tum *fragilis*¹⁵⁶), [*quercus roboris*¹⁵⁷), *pruni padi* et *spinosae*¹⁵⁸). Desideramus experientiam propriam relate ad virtutem febrifugam corticum *crotonis cascarillae*¹⁵⁹), *li-riodendri tulipiferae*¹⁶⁰), *angusturae*¹⁶¹), *calysayae Arollendae*¹⁶²) et *Rhois Cotini*¹⁶³). Item respectu *carbonis vegetabilis*¹⁶⁴), et *lichenis parietini*¹⁶⁵).

Lips. 1778. STONE *philosoph. transact. Vol. LIII.* p. 195 sq.

155) *Experiments and observations on the cortex salicis latifoliae.* By G. WILKINSON. 1803.

156) GERHARD. Vid. MURRAYI op. cit. Vol. I. p. 47.

157) SCOPOLI *flora carniolica.* p. 414. J. MARX *Geschichte der Eichlen.* Dessau 1784. p. 75. — R. A. ZWIERLEIN *Deutschlands Eichenbaum mit seinen höchst wirksamen Heilkräften.* Leipzig 1824. p. 37—55.

158) *Salzburg. med. chirurg. Zeitung.* 1808. No. 77.

159) JUNKERUS *therapia generalis.* p. 302.

160) *Salzburg. med. chirurg. Zeitung.* 1809. No. 20.

161) BRAND *treatise on angustura.* 2. edit. 1793. F. A. A. MAYER *Beyträge zur Geschichte der Angustura-Rinde.* Gött. 1793.

162) FRORIEP *Notizen aus dem Gebiete der Natur und Heilkunde.* 9. B. 6. St.

163) ZSOLDOS *historia Rhus cotini.* Taurini 1815.

164) CALVERT in *Bibliothèque médicale Britannique.* Paris 1814. No. 1. (a granis quindecim ad viginti ter quaterve de die), MAKESY in the *New-England Journal of medicine, surgery and the collateral branches of science.* Vol. 4. No. 2.

*tini*¹⁶⁵). *Lignum quassiae amarae*¹⁶⁶) pluries incassum omnino tentavimus.

25. *Flores arnicae montanae* non immerito in Flores aliqui. febribus intermittentibus commendatas fuisse¹⁶⁷), si paucis, quae cum iis instituimus, periculis pondus quoddam concedendum est, arbitramur, praesertim in tertianis autumnalibus, in quartanis, in febribus intermittentibus sine nota causa recidivas patientibus, cum proclivitate ad obstructions viscerum, ad oedema, absente inflammatoria quacunque dispositione. Interdum arnica sub iisdem rerum positionibus utiliter cinchonae additur¹⁶⁸). *Florum matricariae chamomillae*, jam antiquitus¹⁶⁹)

165) *Die Wandflechte, ein Arzneymittel, welches die peruvianische Rinde nicht nur entbehrlich macht, sondern sie auch an gleichartigen Heilkräften übertrifft. Als solches entdeckt, erprobt, untersucht, beschrieben u. dem k. k. Directorium der med. Facultät zu Wien zur Concurrenz überreicht, von Dr. G. C. H. SANDER. Im Jahr 1813 von Sr. k. k. Majestät von Oesterreich mit dem Preise von hundert Dukaten belohnet. Mit 1 Kupfer. Sondershausen 1816.*

166) SCHLEGER *Casselische gelehrte Beyträge*. 1769. May und Juni.

167) STOLL *ratio medendi*. T. III. p. 168. Vide etiam *collect. soc. med. Havn.* T. II. p. 162. Ita: PLIES in HUFELAND's *Journal* 9. B. 2. St. p. 87. KIRCKHOFF l. c.

168) R. Pulveris corticis peruviani unciam unam. Pulveris florum arnicae drachmam unam. F. c. s. q. Syrupi corticis peruviani electuarius. Cap. spatio duarum apyrexiarum.

tus¹⁶⁹⁾ celebratam, virtutem in febribus intermittentibus, vel cinchonae rebellibus, testatur HERDEN¹⁷⁰⁾.

Semina. 26. Quid de virtute febrifuga *seminum phel-*
Fructus. *landrii aquatici* sentiendum sit, jam monuimus¹⁷¹⁾.
Nucleos amaros amygdali communis, qui jam a BERGIO¹⁷²⁾ aliisque¹⁷³⁾ et nuper¹⁷⁴⁾ in febribus intermittentibus commendati fuere, pro suspecto habemus¹⁷⁵⁾ atque haud securo remedio¹⁷⁶⁾. Etiam *aqua pruni laurocerasi* semper incassum in febre intermittente a nobis adhibebatur. Nil circa virtutem febrifugam *seminum strychni nucis vomicae*¹⁷⁷⁾,

169) GALENUS de simpl. med. facultat. L. III. — Dioscorides de med. mat. L. III. c. 145. (praecipue succus expressus).

170) l. c. Dosis scrupuli duo, corticis cinchonae instar repetendi.

171) No. 21. not. 132.

172) Materia medica. p. 413.

173) Pulvis antifebrilis HEURNII, ante paroxysmum cum vino hauriendus, constabat ex amygdalis amaris, nucleis persicorum et nuce moschata usta, ââ scrupulo uno. (HAEN rat. med. P. XI. c. 1.).

174) HUFELAND's Journ. der prakt. Heilk. 28. B. 2. St. p. 111. 3. St. p. 134.

175) Relatum nobis fuit Genuae, hominem quartana laborantem, cui agyrta unciam amygdalarum amararum porrexerat, ab hac dosi neatum fuisse. Agyrta ad forum vocatus, exemplis patefecit, se tali modo jam multas quartanas rebelles sanasse.

176) Aliquoties saltem sine fructu nucleos hujusmodi adhibui.

*cae*¹⁷⁷), *ignatiae amarae*¹⁷⁸), *sinapis nigrae*¹⁷⁹),
*piperis nigri*¹⁸⁰), et *corticis fructus pomi auran-*
*tiaci*¹⁸¹)

177) JUNGHANS diss. de nuce vomica et cortice hippocastani. §. 5. HUFELAND's *Journal* 2. B. p. 493 sq. Quum nux vomica peculiare in medullam spinalem exerceat imperium, quumque febres intermittentes ex hac systematis nervosi parte potissimum proficisci videantur; operae pretium foret, pharmacum illud ulterioribus submittere experimentis idque cautissime. A granis enim quindecim nucis vomicae puella interfecta est narrante FR. HOFFMANN (l. c. T. II.).

178) HUFELAND l. c. p. 498.

179) MURRAY op. c. T. II. p. 326.

180) Usus *piperis* in febribus intermittentibus antiquissimus est. Ait HEREDIA (syntagma. Quaest. XXI. de cura hemitritaei): „Et GALENUS quidem, et qui ante eum fuerunt, curant hemitritaeos cum aqua hordei, in qua est virtus piperis.“ *Piperis grana* adhibuerunt AMATUS LUSITANUS (cent. II. cur. 97.) et ETTMÜLLERUS (opp. Tom. II. pars. I. p. 273.). De usu *olei piperis destillati* in febribus intermittentibus loquuntur ERNESTUS (lib. de oleis destillatis), KUNRAD (med. destill. Pars I.) etc. *Piperis* virtus antifebrilis celebratur quoque a LANGE (de remed. Brunsw. domesticis p. 113.) ab A. AASHEIM (in actis R. soc. med. Hafn. Vol. III. p. 270.) aliisque. Altera ex parte FORESTUS (lib. V. obs. 9. schol.) *piperis* usum pro periculoso declarat. Tanti viri monitum hoc pharmacum e praxi medica exulasse videtur, donec iterum in illam introductum fuerit per meum ex fratre nepotem LUDOVICUM FRANK (*medicinisch-chirurgische Zeitung*. 1821. No. 9. 10.) *grana integra piperis* decem ad sexdecim de die exhibentem. Interea celeberrimi chemici

*tiaci*¹⁸¹⁾ et *punicae granati*¹⁸²⁾, ex propria experientia proferre possumus. Profuit non raro infusum ex fabis tostis¹⁸³⁾, praesertim vero viridibus¹⁸⁴⁾, *coffae*.

27. De

OERSTAEDT, PELLETIER et POUTET in pipere nigro principium gentilitium detexerunt illudque nomine piperini salutarunt. Confirmata hujus principii existentia ab eximio chemico, comite PAOLI (OMODEI *annali universali di medicina. Vol. XIX. p. 197.*), illud a cl. D. MELI (*sui vantaggi della piperina o alcali del pepe nero*) adversus febres intermittentes laudatum est. Ac revera novum hoc pharmacon suffragia nuper collegit DD. MICCOLI (OMODEI op. c. Vol. XXIX. p. 269.) et GORDINI (*osservazioni sull' uso del piperino. OMODEI op. c. Giugno 1825. No. 102. p. 375.*) qui ultimus contendit, piperinum dosi sex vel octo granorum successive porrectum, febres intermittentes, iis quae sulfati chininae restiterunt non exceptis (sic?), sanare et illarum recidivas optime praepedire. Doleo miracula piperini alibi (*repertorio medico chirurgico di Torino 1824.*) in dubium vocari.

181) J. LANZONI in Eph. Nat. Cur. Dec. III. a. 2. obs. 35. — WERLHOF in Commerc. Literar. Norimb. a. 1735. heb. 2. 3. p. 98. — MOEHRIN ibid. 1736. p. 20. WILBERDING diss. de aurantiis. cap. 2. §. 6. (Pulvis cum syrupo citri in electuarium reductus), RIVERIUS Cent. IV. obs. 84. (cum vino), NIGRISOL l. c. p. 276. not. ad SPONII quaest. 26 (infusum vinosum).

182) *Notice sur un remède propre à remplacer le quinquina; par le D. REMANN. Moscou 1809.*

183) Vulgatissimum atque haud raro efficax remedium, praesertim potatorum, febribus intermittentibus labo-

27. De antiquissimo¹⁸⁵⁾, *opii* in febribus in-
termittentibus usu, debitis locis¹⁸⁶⁾ jam mentio-
nem fecimus. Caeterum illud febribus hujusmodi
radicitus evellendis impar est. Extractum *hyo-*
*scyami et hellebori nigri, aconiti napelli*¹⁸⁷⁾ at-
que tincturam *agarici muscarii*¹⁸⁸⁾, hisce in fe-
bribus nunquam adhibuimus. *Oleum animale*
Dippelii jam dudum in illis praescribebatur¹⁸⁹⁾,
alia vero remedia ejusdem generis e. c. *moschus*,
aether sulphuricus, camphora, potissimum syste-
matis

Narcotica.
Excitan-
tia.

rantium, sistit potus ex fabis tostis Arabicis cum suc-
co citri et taphia.

184) *Erfahrungen über den rohen Caffee. Von GRINDEL.*
HUFELAND's Journ. der pr. Heilk. 1809. 11. St.

185) GALENUS de theriaca ad Pison. cap. 13. — AEGI-
NETA. L. II. c. 23. — TRALLIANUS. L. XII. c. 8. —
FORESTUS. L. III. obs. 29. Schol. — SCHAERTLICH
diss. de usu opii in febre intermittente. Goetting.
1783. — J. V. BREDa de variis opium scopo febrif-
fugo adhibendi methodis. Lugd. Bat. 1800.

186) No. 3. 5.

187) HUFELAND's *Journal* 2. B. p. 532. 18. B. p. 104.
Vomitum, post febrem intermittentem emeticam, cae-
terum cortice sanata, relictum, extracto aconiti na-
pelli, sensim sensimque ad grana viginti quinque de
die porrecti, sanavit Dr. DESTe, narrante PUCCINOT-
TI *lettera etc.* p. 36.

188) Remedium domesticum in Lithuania, at sane peri-
culosum.

189) a WERLHOFIO. Obs. de febr. Sect. II. p. 78. —
HALLER diss. de praeparatione olei animalis ejusque
in febribus intermittentibus usu. Goetting. 1747.

Frank Prax. I. 1. 1.

Aa

matris Brunonis gratia in therapiam hujus morbi introducta fuisse ¹⁹⁰⁾ suspicamur.

Murias ammoniacae, alumen. 28. *Murias ammoniacae* jam dudum celebritatem in febrium intermittantium cura acquisivit ¹⁹¹⁾, atque eam ad hanc usque diem non amisit. Debet autem remedium hujusmodi magna dosi, e. c. a drachma una et ultra brevi ante paroxysmum porrigi, nam repetitis vicibus spatio apyrexiae et parva dosi nil efficit, rite monente KORTUM ¹⁹²⁾. Verum non omnes aegri magnas muriatis ammoniacae doses, sine ventriculi incommodis, perferre queunt. Hoc cum ita sit, raro curam febrium intermittantium omnino huic remedio committimus, saepius vero illud cortici jungimus ¹⁹³⁾, praesertim in intermittente autumnali, quae obstructionibus viscerum abdominis debilitateque ventriculi stipatur. Circa *aluminis* ¹⁹⁴⁾ in febribus intermittentibus virtutem, propria destituimur experientia.

29. Et

190) MARCUS *Magazin d. speciel. Therapie u. Klinik.* 1. St. Antidotum invenitur in BOEHMERI diss. de curatione febrium intermittantium per exaestuantia infida et nociva. Hal. 1774. Cfr. TANTINI opusculi scientifici. Pisa 1812. §. febbri intermittenti. p. 4.

191) WILHELM MUYS diss. de salis ammoniaci praeclaro ad febres intermittentes usu. 1716. CAUSLAND in *medical commentar.* Vol. III. REIL op. cit. 2. B. p. 178, 192) l. c.

193) R. Pulveris corticis cinchonae officinalis drachmas sex. P. muriatis ammoniacae drachmas duas. M. D. in octo partes aequales.

194) TRANKA l. c. p. 360.

29. Et *antimonii* virtus in febribus intermit-^{Antimo-}
tentibus celebratur¹⁹⁵⁾, ea scilicet oxydi stibii hy-^{nium.}
drosulphurati praecipitati (kermes), et praecipue
tartratis stibii et potassae. Hoc ultimo remedio
non solum in febribus intermittentibus gastricis et
rheumaticis utiliter usi sumus, sed in simplici
etiam, praecipue vernali. Attamen in graviore
casu nunquam satisfecit.

30. De usu *martis* contra sequelas nonnullas^{Mars.}
februm intermittantium infra sermo erit. Verum^{Bismuth.}
vel in ipso earum curriculo interdum utiliter fer-
rum, praecipue cum extractis amaris¹⁹⁶⁾, adhibui-
mus, adhibuerunt alii¹⁹⁷⁾. Sulphatem ferri¹⁹⁸⁾,
et *prussiatem ferri*¹⁹⁹⁾, nullo tentamini adhuc

Aa 2

sub-

195) UNZER's *Arzt*. XII. B. CAUSLAND in DUNCAN's
med. Comment. for the year 1781. 1782. Vol. VIII.
MARX in TODE's *medicin. Bibliothek*. 2. Th. 2. St.
p. 120.

196) R. Extracti herbae menyanthi trifoliatæ unciam
unam. Pulveris limaturæ martis puræ drachmas duas.
M. f. c. s. q. mellis electuarium. Cap. omni secunda
sive tertia hora ad magnitudinem nucis.

197) RIVERIUS *prax. med.* L. XVI. Sect. 2. c. 5. HUX-
HAM *opp.* T. II. c. 2. p. 35. GRAINGER l. c. p. 99.
DE FELICI medicus Ticinensis expertissimus.

198) *Journal général de médecine etc.* T. XXXIV. 1809.
Janvier.

199) *A treatise on the use of Prussiate of iron in inter-*
mitting and remitting fevers. By W. ZOLLICKOFFER.
Maryland 1822. HOSACK in *New-York medical and*
physical Journ. 1823. June. V. *Magaz. der ausl. Li-*

subjecimus. Idem de *oxydo Bismuthi*²⁰⁰⁾ fate-
mur.

Mer-
curius.

31. *Mercurii*, praecipue muriatis hydrargyri
virtus in ea febre, quae intermittentis instar de-
currit atque syphilidis progenies est²⁰¹⁾, quotidie
confirmatur. Existimamus imo, febres, de quibus
fertur²⁰²⁾, eas nullo pacto cinchonâ, sed solo
tandem hydrargyro sanari potuisse, non ad clas-
sem febrium intermittantium legitimarum perti-
nuisse. At propterea peculiarem vim febrifugam
mercurii²⁰³⁾, nequaquam in dubium vocamus;
imo eam in febribus intermittentibus, hepatis ob-
structione stipatis, ipsi experti sumus. Quarta-
nam enim per annum et ultra rebellem, *aethiope*
antimoniali, ad minimas doses per mensem, ex-
hibito, debellavimus²⁰⁴⁾.

32. An-

terat. d. gesamt. Heilk. von GERSON und JULIUS. 3.
B. p. 474. 6. B. p. 508.

200) HENKE in HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 1820.
Sept. p. 99. (Ad plura grana (!) secundâ vel tertia
quaque hora!!). Ipse vero ille auctor jam laudes
propositi remedii temperat l. c. *December p. 27.*

201) §. XXVIII. 2. (7).

202) ALEX. MONRO in *Actis Edinb. Vol. VI. art. 47.*
obs. 9.

203) BURSERIUS l. c. §. 186. HERZ *Briefe 2. Samml p.*
109. HUFELAND's *Journ. 3. B. p. 182.* LYSONS *trea-*
tise of the use of camphor and calomel in fevers. v.
Edinburgh medical Essay's and observations. Vol. VI.

204) Vilnae in filia decenni D^{mini} Grzcewicz, quae mor-
bum prope Pinsk contraxerat. Cfr. SCHULZE diss. de

32. Antiquus est usus *arsenici* in febribus ^{Arsenicum,} ^{phospho-} ^{rus.} intermittentibus²⁰⁵⁾, vel inter rusticos et judaeos Lithuaniae. Malorum antiquiorum²⁰⁶⁾ immemores, terribile hoc venenum, et qui ex illo paratur, *arseniatem potassae*, de novo in praxin introduxerunt TH. FOWLER²⁰⁷⁾, BURDACH²⁰⁸⁾, HEIM²⁰⁹⁾, HARLESS²¹⁰⁾, BÜRGER²¹¹⁾, WINKLER²¹²⁾,
HOFF-

usu mercurialium in febre quartana curanda. Hal. 1742.

205) R. LENTILIUS Eph. Nat. Cur. Dec. II. a. 3. obs. 46.

— J. G. LAIB ibid. a. 5. in addend. p. 474. — M. FRICCIUS tract. de virt. venen. med. cap. 2. — JACOBI act. Mogunt. T. I. p. 216.

206) E. STAHL obs. phys. med. a. 1697. novembr. cap. 1. (duos aegros arsenico adversus febres intermittentes, quibus laborabant, adhibito, interfectos fuisse, narrat), — STÖRK ann. med. p. 79. 80. (aeger cum intermittente per arsenicum in febrem hecticam conjectus fuit), — SCHLIERBACH act. phys. med. nat. cur. Vol. VI. obs. 62 etc.

207) *Medical reports of the effects of arsenicum in the cure of agues.* Lond. 1786.

208) *Handbuch der prakt. Arzneimittellehre.* 3 Th. Leipz. 1806. p. 63.

209) HORN's *Archiv für med. Erfahr.* 1810. 3. B. 2. St.

210) *Journ. der ausländischen med. Literatur.* 8. B. 2. St. *Bemerkungen u. Erfahrungen über die Heilsamkeit des Arseniks gegen Wechselfieber.* Frankf. 1810.

211) HORN l. c. 1814. p. 249.

212) *Erfahrungen über die Heilkräfte des Arseniks gegen Wechselfieber.* v. *Allgemeine med. Annal. des zweyten Jahrzehends des 19. Jahrhunderts.* 1811.

HOFFMANN²¹³), EBERS²¹⁴), BRERA²¹⁵) et TANTINI²¹⁶). Veluti coacti²¹⁷) tria cum arsenico in febribus intermittentibus instituimus experimenta, eaque incassum, et, Deo sit laus, absque detrimento. In ea nempe nunc versamur opinione, haud nova²¹⁸), veneno illo febres intermittentes quidem sanari, verum aegros interfici.

Illius

213) *Ueber den Gebrauch des Arseniks gegen Wechselfieber u. einige verwandte Krankh. v. Abhandl. der phys. med. Soc. zu Erlangen. 2. B.*

214) HUFELAND'S *Journ. der pr. Heilk.* 1813. (Interea rite de periculis ex arsenico judicat).

215) *Annotazioni medico-pratiche sulle diverse malattie trattate nella clinica medica — di Pavia. Nuova ed. accresciuta. Crema 1806. 4. Vol. I. p. 228.*

216) *Esperienze mediche. Pisa 1825. p. 33.*

217) Rogantibus nimirum clinici instituti Vîlnensis alumnis a. 1810. Serius istiusmodi precibus, ut nova et periculosa pharmaca experimentis clinicis subjicerem, aures amplius non praebui, neque me unquam ita fecisse poenituit. Crescebat enim in dies fides publica in scholam clinicam, quo magis vulgus certior reddebatur, illam neutiquam ad probandum, sed ad sanandum, institutam esse.

218) SENAC ait: „. . eoque (arsenico) sunt plurimae febres devictae, sed aegri in phthisin tandem delapsi mortui sunt.“ l. c. L. II. cap. XI. En patris mei schedam huc spectantem: „Herr Oberstaabsarzt v. WEHRING versicherte mich den 13. September 1811, dass, als er in Ungarn war, in einem Militärspitale das Arsenicum häufig gegen die Wechselfieber von einem Regimentsarzte gebraucht worden sey; dass aber sehr viele

Illius aemulum, *phosphorum*²¹⁹⁾ nec tentavimus, nec unquam tentabimus.

33. Convertamus nos ad tutiora. *Gelatinam* ^{Gelatina. etc.} *animalem*, a SEGUIN in febre intermittente commendatam, virtute quidem non omnino destitutam esse, vel propria experientia testatur. At longe abest, ut hoc remedium cum cinchona aequiparemus; si excipiamus forte quasdam epidemias febrium intermittentium, in quibus gelatina peculiari modo utilis videbatur²²⁰⁾. Optime virtutem hujus remedii ad trutinam vocavit HALLÉ cum sociis²²¹⁾. Ita ALIBERT²²²⁾. Caeterum auxilia

Patienten, die solch ein Mittel gebraucht hätten, in tödtliche Wassersuchten verfallen seyen, so dass er keine dieser Wassersuchten geheilt habe.“

219) Medici nonnullorum nosocomiorum Vilnensium phosphorum cum successu in febribus intermittentibus pertinacissimis sine viscerum obstructionibus, sequenti sub forma adhibuerunt. R. Phosphori, hepatis sulphuris aa grana quatuor. Myrrhae scrupulum unum. Vitelli ovorum No. unum. Conterendo assidue affunde sensim sensimque, donec phosphorus exactissime subigatur, emulsionis gummi arabici libras duas. D. S. Probe agitando lagenam, capiat (adultus) ter de die cochleare majus.

220) GAUTIERI *Versuche und Beobachtungen über die Wirksamkeit der thierischen Gelatina in intermittirenden Fiebern*. Vid. HUFELAND's *Journal*. 18. B. 2. St. p. 120.

221) *Journal général de médec.* T. XIX. p. 336. *Samml. auserl. Abhandl. für prakt. Aerzte*. 21. B. 4. St. p. 410.

lia adversus febres intermittentes e *regno animali* petita, nova non sunt; etenim contra hujusmodi morbum jam dudum commendati fuere: *millepedes*²²³), *araneae*²²⁴), earum *telae*²²⁵), *testae ovorum*²²⁶) et *ostrearum*²²⁷) *calcinatae*, *corda bufonum*²²⁸), *leporum*²²⁹), *cranium humanum*²³⁰), *urina*²³¹), *varia stercora*²³²) etc.

Remedia
externa,

34. *Remedia externa*, omnium antiquissima²³³), in febribus intermittentibus supervacanea non sunt²³⁴). Loquimur de *frictione columnae vertebralis*²³⁵); de *illinitione abdominis ope unguenti*

222) *Elémens de thérapeutique et de matière médicale. T. I. p. 205.*

223) RIEDLIN *lin. med. Ann.* II. Mart. obs. 4. p. 106 — 7.

224) TANKA *l. c.* p. 305.

225) WIERUS *l. c.* p. 44. Chirurgus Vilmensis WOYNICZ nonnullas illarum ope fugavit febres interm. Cfr. *Rust Magaz. d. gesamt. Heilk.* 19. B. 3. H. p. 515.

226) SAUVAGES *l. c.*

227) Partem *pulveris antifebrilis Pharmacopoeae Batavae* constituunt.

228) PAULLINI *Eph. Nat. Cur. Dec. II. a. 6. app. p. 40. obs. 33.*

229) GRÜNDEL *Eph. Nat. Cur. Dec. II. a. 8. obs. 104.*

230) BENEDICTUS *L. XXX.* 231) TANKA *l. c.* p. 330.

232) H. COMMENUS *Eph. Nat. Cur. Dec. I. a. 3. obs. 120. (suilli in alcohol)*, CRÜGER *ibid. Dec. II. a. 4. obs. 15. (avium)*, PAULLINI *ib. a. 5. app. p. 36. obs. 58. (canis maris).*

233) SCHULZE *diss. cit.*

234) Legi meretur KORTUM *l. c.* p. 18.

235) FORESTUS *L. III. obs. 38. (cum oleo chamomillae,*

*guenti cum tartaro emetico*²³⁶); de *emplastro regionibus stomachi*²³⁷), *lien*²³⁸), et *spinae*²³⁹), *imposito*; de *cataplasmate ex allio ad digitum*²⁴⁰), *deque aliis epicarpiis*²⁴¹); de *camphora epigastrio*
appen-

- applicitis dein linteis calidis), — STÖRK ann. med. II. p. 169. (cum pannis camphorâ imbutis), — TOZZI med. pract. L. II. (cum oleo colocynthidis), — R. A. VOGEL l. c. §. 25. (cum unguento pomadino et oleis lavandulae et ruthae cumque balsamo peruviano), — HAUTESIÈRE *recueil II.* (cum oleo terebinthinae). Cfr. KNYPER diss. de frictione spinae dorsi ut probatissimo remedio in febribus intermittentibus. Ultraj. 1784.
- 236) POMMER in HUFELAND's *Journ. der pr. Heilk.* 1823. Jänner p. 29.
- 237) VELSCH *Ephem. Nat. Cur.* Dec. I. a. 4 et 5. append. p. 53. ALLEN l. c. art. 42. (emplastrum antifebrile rubrum).
- 238) J. H. SCHULZE diss. de mercurii usu in febr. int. quartanis curandis §. 24. (emplastrum saponaceum).
- 239) PROSP. ALPINUS v. TRNKA l. c. p. 445. (emplastrum ex farina triticea, thure àâ unciis duabus, c. s. q. succi menthae).
- 240) LEDEL *Ephem. Nat. Cur.* Dec. II. a. 9. obs. 427.
- 241) BOYLE de utilitate philosoph. exper. exerc. V. c. 10. §. 17. (cataplasma ex uvis passulis minoribus, turionibus lupuli et sale marino), — HARROD *crocologia* cap. 2. (cataplasma ex allio, sale marino, pipere, et croco, partibus anaticis). — C. RENSTRÖM *Schwedische Abhandlungen.* 15. B. 1. Viertelheft. (cataplasma ex nicotiana, fermento panis et aceto; ad brachium per nychthemeri spatium), — J. LANZONI *Eph. Nat. Cur.* Cent. V. obs. 30. p. 60. (thuris in granis drachmae duae, croci grana decem, salis culinaris drach-

*appensa*²⁴²); de *fonticulis lumbis admotis*²⁴³); de *sulphatis chininii super loca prius epidermide spoliata inunctione*²⁴⁴), deque *electricitate*²⁴⁵).

Alia. 35. Per res in imaginationem potenter agentes, *amuleta*²⁴⁶) et *similia*²⁴⁷), *nisus maximos corporis animique*²⁴⁸), *rebelles febres intermittentes*

mam semis, vitelli ovorum No. unum. (M. applicetur pulsui). Cfr. CALVET an febribus intermittentibus epithemata in carpis. Avenion. 1762.

242) ETTMÜLLER apud TRNKA l. c. p. 436.

243) Sic militem a febre quartana rebelli sanavi. Cfr. S. HOOD *analytical physiology. Liverpool 1822.*

244) A. LEMBERT et A. J. LESIEUR in *Archives générales de médecine* 1824. mai. (epidermis vesicatorii ope detrahitur.).

245) *Schwedische Abhandlungen. 14. B. 2. Viertelheft. — BALDINGER's neues Magazin. 3. B. p. 452. (ad ventrem et spinam), — MAUDUYT in FOURCROY médecine éclairée. T. III.*

246) E. c. aëtites, aranea, lacerta aliaque variis corporis partibus appensa. Item per verba mystica. v. TRNKA l. c. p. 450.

247) E. c. *transplantatio febris e corpore aegri in alia corpora, de quibus rebus absurdis legi posset RIEDLIN lin. med. a. II. novemb. obs. 30. (aegri urina a cane epota), — Ephem. Nat. Cur. Dec. III. a. 9. obs. 219. (urina in vesica porcina in camino suspensa); KUNRAD medulla distill. p. 377. (ovum recens in urina aegri decoctum et acervo formicarum immisum) etc.*

248) Tali pacto *Quintum Fabium Maximum* a febre quartana in acie fuisse liberatum, historia refert. PLIN. hist. natur. Lib. VII. c. 50. — Cfr. ERDMANN in HORN's *neuem Archiv für med. Erfahrung. 1. B. p. 267.*

tes sanatas esse, mulierculae quotidie narrant, ac fasti medici confirmant. Idem de *terrore*²⁴⁹⁾ et *ira*²⁵⁰⁾ valet. Num et de *insitione vaccinae*²⁵¹⁾?

Inter-

249) Militem Vilnae curavi, qui, quum primo praelio interveniret, terrore vehementer percussus, in febrem intermittentem inciderat. Ab hac liberari haud potuerat, donec, caeterum valens, alteri praelio, non minori terrore juncto, interesse debuerit. Praeterea de febribus intermittentibus terrore sanatis leguntur exempla apud RIEDLIN lin. med. ann. 6. p. 87. (ab explosione sclopetorum), HÜNNERWOLF Ephem. Nat. Cur. Dec. II. a. 3. obs. 93. (ex bombardae explosione), BOYLE de utilit. phil. exper. exerc. 5. p. 282. (ex gliris praegrandis furiosi insultu), MANGET in notis ad BARBETTI prax. med. L. III. cap. 3. §. 9. p. 115. — GARMANN Eph. Nat. Cur. Dec. I. a. 2. obs. 150. (ex lapsu in aquam), LANZONI ibid. Cent. IX. obs. 5. (vide quoque Dec. II. a. 4. obs. 92. Dec. III. a. 3. obs. 47.). — PECHLINUS obs. phys. med. L. III. obs. 24. (a lapsu); AMBR. PARAEUS L. I. c. 23.; — ROEFINK ord. et method. special. com. p. 1024., — BLEONY zodiac. Gall. Januar.; — DAVIDSON in *medical facts and observations. Vol. V. No. 7.* (ex fractura claviculae). CHOMEL l. c. §. 553. (ex fractura brachii quartana quinque annorum). Cfr. C. PEZOLD observ. med. chirurg. select. Vratislav. 1718. No. 20. — SCHEIDEMANTEL *die Leidenschaften als Heilmittel betrachtet. Hildburgh.* 1787. p. 321.

250) VALERIOLA obs. med. L. II. obs. 4. (a quartana ira liberavit); BORRICHIVS Eph. Nat. Cur. Dec. I. a. 3. obs. 238. (a tertiana pertinace).

251) RICHTER *specielle Therapie.* 2. B. p. 387. — Jour-

Interdum rebellis febris a cibo, licet re ipsa hoc in morbo incongruo, sed vehementer desiderato, fugatur²⁵²), quamobrem HILDANUS ait: „quartanarii, pica simul detenti, non prius febre liberantur, quam post perversi illius appetitus expletionem²⁵³).“ Nil vero securius rebellem intermittemem profligat, quam mentis recreatio²⁵⁴) et maxime peregrinatio ad regionem febribus hujusmodi non faventem, montosam et siccam²⁵⁵). Profuere inter-

nal complémentaire du dictionnaire des sciences médicales. T. VI.

252) E. c. a brassica acescente (C. BIERLINGO advers. curiosa No. 53.); a libris duodecim uvarum (LANZONIUS Eph. Nat. Cur. Dec. III. a. 4. obs. 66.); a vini potu ad ebrietatem (ibid. a. 1. obs. 67.); ab halecibus (PAULINI ibid. Dec. II. a. 5. append. p. 16. obs. 21.). Cfr. TRNKA l. c. p. 461—63. — a Clupea Harenga (RUST Magazin der gesammt. Heilk. 19. B. 3. H. p. 517.).

253) KLEIN l. c. p. 100.

254) Legitur de febribus intermittentibus sanatis per musicam (HOLBERG apud TRNKA l. c. p. 467. — DUPONT in Journ. de médecine. T. 68. p. 288.) — per balsium (ROMELIUS Eph. Nat. Cur. Dec. III. a. 2. obs. 218. — FORESTUS L. III. obs. 38. Schol. ex GUINERO) per nuptias (GERBEZ Eph. Nat. Cur. Dec. III. a. 1. obs. 137.) — per choreas (JAEGERSCHMIDT ibid. a. 3. obs. 100. — GABELHOFER Cent. VI. cur. 39. 40.) etc.

255) SYDENHAM l. c. Sect. I. c. 5. §. 32. — FR. HOFFMANN l. c. T. IV. P. I. Sect. I. c. 2. obs. et caut. §. 4. — HUXHAM l. c. Tr. I. Cfr. Ephem. Nat. Cur. Dec. III. a. 7. obs. 16. 52.

interdum et aquae soteriae salinae gaz acidum carbonicum continent²⁵⁶).

36. Quanti hinc momenti *regimen diaeteticum* in cura febrium intermittantium sit, jam satis elucet. Sine illo nec praesens curabitur febris, nec ejusdem sanatae impeditur recidiva. *Debet autem regimen diaeteticum peculiari febrium intermittantium indoli accommodari.* Sic dietam strictissimam, quam medici veteres²⁵⁷) illorumque imitatores²⁵⁸), in omni febre intermittente imperaverant, dumtaxat ad has febres indolis inflammatoriae, rheumaticae, catarrhalis et gastricae, limitamus. Docet enim experientia, febres intermittentes simplices et diuturnas quaeque in aegrotis aliunde exhaustis obveniunt, abstinentiam a cibis neutiquam ferre²⁵⁹). Concedimus itaque tempore apyrexiae *juscula* cum oryza, hordeo, avena et potissimum cum radicibus apii petroselini, dauci carotae, herba scandicis cerefolii et similibus. Ubi stomachus viget, junio-
rum

256) *Die Heilquelle von Borszék.* Wien 1825. p. 33.

257) CELSUS L. III. c. 15. (una aqua calida ab initio).

258) ZACUTUS prax. med. L. III. obs. 2. — RIEDLIN lin. med. ann. I. mai. obs. 3. (abstinentia fere totalis), — TESSIER ergo febris vulgari intermittenti cito compescendae, abstinentia. Paris. 1775.

259) HOLLER comment. in Coac. Hippocrat. p. 179. (li-
pothymia et mors in tertiana); SPONIUS apud NIGRI-
sol l. c. quaest. X. (mors in quartana); TULPIUS L.
IV. c. 53. et SWIETEN comment. ad aph. 762. (noxae).

rum quoque animalium *carnes* albae concedi queunt. A fructibus horaeis, ovis et lacte abstinendum²⁶⁰). *Vinum* in morbo simplici, sique aegrotus illi adsuetus sit, concedi potest. Militibus et rusticis libenter hîc *crematum* exhibemus. Item *cerevisiam*, praecipue amaram. Praeterea ut *aër*, aegrotum et convalescentem ambiens siccus et calidus sit, curandum. Lectum evitandum esse, SYDENHAM docet²⁶¹); contrarium contendit SENAC²⁶²). Illius consilium in febre intermittente inflammatoria leviori; hujus autem monitum in reliquis hujus morbi speciebus sequi juvat. Caeterum, *motus* viribus respondens, non nocet, dummodo tempore diurno et in locis siccis instituat. *Animus* esto placidus; sanatio enim febrium intermittentium per illius commotionem ad exceptiones spectat. Maxime coitus evitandus est²⁶³).

§. XXXI.

De convalescentia et febribus intermittentibus recidivis.

Genera-
tim.

1. Ne vero credamus convalescentem, quum paro-

260) Fructus horaei ubique nocent. Ova et potissimum lac dumtaxat in Lithuania nociva inveni.

261) Epist. respons. I. §. 23. 24. 262) l. c.

263) Quartanae enim trium mensium cortici rebellis oper coitus fugatae exemplum (Eph. Nat. Cur. Dec. II. a. 10. obs. 128.), exceptionem constituit sane rarissimam. Ego enim inveni, coitum maximum sanationis febrium intermittentium obstaculum constituere.

paroxysmi febris intermittens suppressi sunt, sanitatem jam attigisse! latet enim adhuc morbi germen, minima porrecta opportunitate, rursus pullulans. Proclivitas ista recidendi, characterem gentilitium febrium intermittens sistit. Placuit hinc propositum¹⁾, illum in definitionem suscipiendi. Nec minus placuit impulsus, quem doctorum coetus medicis dedit²⁾, ut scilicet serio in modum tantae calamitati³⁾ occurrendi, inquirant.

2. Expectandus est reditus paroxysmorum fe. Signa. bris intermittens, ubi pulsus necdum ad conditionem normalem rediit; ubi aliquod a febre remansit

1) ROBERT THOMAS *the modern practice of physic. With appendix by Dr. HOSACK. New-York 1817.*

2) Societas illustris Italica scientiarum die 18. Augusti a. 1803. sequentem proposuit quaestionem: „*Determinare con decisive sperienze una maniera più sicura e men fastidiosa delle usate finora, onde impedire la recidiva delle febbri periodiche già troncate colla chinachina.*“

3) „*Qual dispiacevole cosa per un uomo che già si credea salvo nel porto, trovarsi di bel nuovo in mezzo alla tempesta? Quanto è crudele lo stato d'incertezza a cui è ridotto un recidivo, che ad ogni mutazione di stagione, ad ogni alterazione di cibo, ad ogni affezione d'animo tema di risentire scorrersi nelle vene il gelo febbrile.*“ *Dissertazione di PIETRO RUBINI sopra la maniera meglio atta ad impedire la recidiva delle febbri periodiche, coronata dalla società Italiana delle scienze. Modena 1805.*

mansit malum; ubi horâ, qua paroxysmus invadere erat solitus, debilitas increscit et crebra obvenit oscitatio; ubi convalescens ipse sensum internum secundae valetudini proprium necdum experitur; maxime vero ubi oris amarities, vel salivae dulcedo⁴⁾ percipiuntur; ubi lingua arescit; ubi ciborum desiderium languet, ubi ventriculus tumet; ubi alvus segnis est; ubi urina pauca, sedimento praedita, apparet; ubi somnus levis, viresque prostratae sunt; ubi carnes siccae, urentes; ubi sudor praeter consuetudinem, et nutritio non restaurata.

Caussae. 3. *Caussae* febrium intermittantium recidivae promoventes, sunt debitae criseos defectus⁵⁾; febris, spontanea seu artificialis, paroxysmo paricessatio⁶⁾; neglectus complicationum⁷⁾ et cinchonae

4) J. D. SANTORINI *istruzioni intorno alle febbri. P. II.*

5) „Quae in morbis post crisis relinquuntur, recidivas facere solent.“ HIPPOCRATES Sect. II. aph. 12.

6) „Febrientem si non in diebus imparibus febris dimiserit, recidivare solent.“ (HIPPOCRATES Sect. IV. aph. 61.). Hanc sententiam confirmat FORESTUS (Lib. III. obs. 14.), dicens, febres tertianas post paroxysmum 2. 4. 6. 8. cessantes eousque recidere, quousque tandem cum paroxysmo impare cessent. Nec aliter sentit VAN HOVEN (op. c. 1. Th. p. 94.). Meum hac in re iudicium quondam (Cfr. prima huius operis editio p. 82.) suspenderam; nunc novis per tria lustra collectis observationibus, allatorum scriptorum opinioni et ego subscribo.

7) „... sublato morbo incredibile dictu, quanta mor-

nae praepostera exhibitio; hujus pharmaci, ubi indicatur, aut brevis⁸⁾, aut protracta nimis⁹⁾ administratio; febris diurnitas¹⁰⁾; usus incongruus venae sectionis¹¹⁾, purgantium¹²⁾ et clysterum¹³⁾

borum vis, *expurgationis defectu* post febres autumnales subnascatur.“ „... hoc intelligi velim de iis solum febribus, quae vel sponte sua, vel alio sive medicamento, sive methodo, praeter corticem peruvianum erant debellatae.“ SYDENHAM opp. Sect. I. cap. 5.

8) GORTER (compend. med. Tract. LII. §. 31.) inquit: „cortex si magna copia detur, febrem sistit sine recidiva.“ Addit BURSERIUS (op. c. §. 133. not. a): „Verum id esse, pluries et pluries comperi.“ Sic quoque G. GALEATIUS in Comment. instit. scient. Bonon. T. V. P. 2. p. 224.

9) „Les effets toniques du quinquina sont sans contredit bien constatés: mais il l'est également, que leur usage trop prolongé finit par en produire, qui leur sont directement opposés.“ DUPAN considération sur la nature et le traitement du rachitis.

10) Observavit praeterea STRACK (l. c.) „febrim, quae diu insedit, corticis plus ad curationem requisivisse et magis obnoxiam fuisse recidivis, quam quae, ut incepit, protinus expulsa est. Accedit PANZANI ubi ait: „noi possiamo attestarne per nostra propria esperienza e sopra di noi medesimi e sopra altrui, che adoperando un tal metodo (di troncane subito le intermittenti) si evitano frequentemente le recidive, mentre non assueto il sistema alla frequenza, alla molteplicità delle febbrili reproduzioni si libera tuttavia vegeto dal nato morbo, nè quasi punto è disposto ricader facilmente nella morbosa già debellata sua condizione. (Storia ragionata dei morbi).

11) STRACK l. c. aegrot. XVI^{us}.

12) „Novi ego alios a febre (intermittente) aliquamdiu curatos, cum purgationem pro exterminandis materiae febrilis reliquiis fortiolem inirent, illico recidivam passos.“ WILLIS de febrib. cap. 4.

sterum ¹³⁾ in convalescentia; transitus rapidus nimis a diaeta lauta convalescentium in nosocomiis, ad victum tenuem domesticum apud pauperes ¹⁴⁾; et potissimum perseveratio constitutionis annuae aut epidemicae febribus intermittentibus faventis. Nec proinde mirum est, si, praesertim in corpore imbecilli ¹⁵⁾, ut primum, sic iterum, et tertio, et quarto, caussae remotae a quibus febris antea orta est, illam non revocent modo, sed etiam excitent atque inducant ¹⁶⁾. Nec observationem silentio praeteribimus, certas febrium intermittentium epidemias prae aliis recidivis favere ¹⁷⁾. Utut sit, caussae recidivas gignentes inprimis activae observari solent, dum ea in aegrum agunt die, qua antea paroxysmum experiri erat solitus, animadvertente jam CELSO ¹⁸⁾. Prudens

13) „Leviissima catharsi, immo *enemate* ex lacte et saccharo, febris recidivam imminere eandemque, si non satis cessavit, purgante redire contumaciorem, aut pertinaciorem reddi, atque altas magis figere radices,“ SYDENHAM observavit. (op. c. Sect. I. cap. 5.).

14) Id quondam in nosocomio Ticinensi expertus sum; hancque observationem extollit RUBINI l. c. p. 27.

15) De febribus intermittentibus, quae Dionysiopoli a. 1801. grassabantur, quaesitores societatis medicae Parisiensis sic sentiunt: „*C'est au défaut de la chaleur, de vêtements, d'une nourriture appropriée à l'état de foiblesse, qu'on doit rapporter les principales causes de ces rechûtes, aux quelles les vieillards et les enfans ont été le plus exposés.*“ (Recueil périodique de la société de médecine de Paris, T. XIII.).

16) BUBSERIUS l. c.

17) „Hae (recidivae) quovis tempore occurrere possunt, ac frequentius sese in *certis* produnt *epidemiis*.“ SENAC l. c. p. 124.

18) De medicina. Lib. III. cap. 16.

dens igitur est consilium STRACKII ¹⁹⁾ ut per totum convalescentiae curriculum, calculus dierum sive horarum, quibus antea paroxysmi adventare erant soliti, retineatur. Recidivae primo morbo peiores esse vulgo existimantur, at saepe saepius nullum discrimen detegere potuimus. Febres intermittentes cinchona sanatas, prae ceteris ad recidivas pronas esse, falsa est opinio.

4. Ut periculum recidivae avertatur, praeter ^{Quomodo} regimen diaeteticum, usus continuatus cinchonae ^{evitanda.} vel alterius febrifugi exposcitur. Est tamen modus in rebus, nec convalescentes pharmacis obrui debent. Jugulato jam paroxysmo, spatio primi, secundi, tertii nychthemeri, drachma una pulveris corticis cinchonae mane et vespere sumta, ad impediendam recidivam sufficit. Dein satis est tertia quaque die, et quidem in tertiana die paroxysmo respondente, talem exhibere dosin. Rebus bene cedentibus quies tunc spatio aliquot dierum conceditur, confugiendo tardius iterum ad febrifugum, ita ut spatio trium hebdomadum patienti tres sive quatuor unciae exhibeantur. Atque sic in febre intermittente benigna. In perniciosa nempe ad minimum duplex requiritur dosis, ad curam omnino absolvendam. Homini- bus cinchonae pulverem respicientibus potest quidem decoctum saturatum corticis ejusdem exhiberi, at vix ei fidendum, saepe saltem sub illius usu recidivas contigisse observavi. Idem accidere solet, dum, fugatis paroxysmis cinchona, remediis amaris recidivas praeveniri credimus. Praesentiam fluxus menstrui non solum hinc corticis

Bb 2 usum

19) Op. cit. p. 96.

usum non excludere, sed imo expostulare, nunquam obliviscendum.

Cura recidivae.


5. Febris intermittens recidiva, aliarum febrium intermittentium instar, pertractari debet. Interdum juvat et illam non statim suppressere, praecipue si desiderium ciborum a praegressa febre deletum, apparente nova, restituatur²⁰). Et causae recidivae excitantis ratio habenda. Facile enim recidiva complicata fit, quamvis praegressa febris simplex fuerit.

Ad revocandam febrem intermittentem.

6. Si forte febris intermittens praepostere sanata fuisset, quaeritur, quid ad eam revocandam fieri liceret? Favente annua constitutione adhuc febribus intermittentibus plerumque nil facilius, quam suppressam iterum excitare febrem, et quidem adhibito fortiori purgante salino. At deleta jam jam constitutione illa, vix possibile existimamus, febrem intermittentem arte excitare nisi forte ope gaz acidi carbonici²¹). Qui contagiosam febrium hujusmodi naturam admittunt, commercium cum febricitantibus suadent.

20) Cfr. §. XXIX. No. 1. (6). Saepius observationem nuper a HOBHOUSE factam (*New-York med. repository* 1823.) confirmatam habui, videlicet obstructions lienis, hepatis, dyspepsiam ex febre intermittente praepostere sanata pullulantes, vix aliter tolli posse, nisi per hujusmet febris recidivam eamque naturae commissam.

21) Vid. HUFELAND's *Journ. der prakt. Heilkunde*. 6. B. p. 278. 282.



10/55

