

**SIDA : protéjase a sí mismo y a sus seres queridos / Estado de Nueva York,
Departament de Salud.**

Contributors

New York (State). Department of Health

Publication/Creation

1988.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ghfecvz8>



License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

SIDA



Protéjase a
sí mismo y a sus
seres queridos.

Usted debería saber que...

El SIDA es causado por un virus que se encuentra en la sangre y en el semen de una persona infectada.

Para que haya contagio, el virus del SIDA tiene que penetrar en su sangre.



¡No se puede saber si una persona está infectada por el aspecto que tiene!

El virus del SIDA puede penetrar en su sangre...

CUANDO usted comarte agujas y otros instrumentos para inyectarse drogas.

Una aguja usada por una persona infectada puede transmitir el virus a la próxima persona que la use.

CUANDO usted tiene relaciones sexuales con una persona infectada con el virus.



Es probable que la mitad de todos los drogadictos que se inyectan drogas ya estén infectados y pasen el virus a sus parejas sexuales.

PROTEJASE A SI MISMO Y A SUS SERES QUERIDOS.

No se inyecte drogas.

Jamás comparta con nadie agujas ni otros instrumentos.*

No tenga relaciones sexuales sin hacerle antes a su pareja muchas preguntas sobre su salud y sin averiguar antes si es drogadicto.

Use condones cada vez que tenga relaciones sexuales. La ayudarán a usted y a su pareja a protegerse del virus.

Evite las relaciones sexuales por el ano porque pueden ocasionar heridas sangrantes por las cuales se contagia el virus.

La mujer embarazada que está infectada puede pasar el virus a su bebé.



Sométase a la prueba del SIDA *antes* de quedar embarazada.

* Para esterilizar sus instrumentos, sumerja durante 10 minutos la aguja, la jeringa y la cuchara o tapa de botella (cooker) en alcohol desinfectante o en una parte de blanqueador común y diez partes de agua. Enjuague bien.

El virus del SIDA puede penetrar en su sangre...

HAY UN ANALISIS DE SANGRE GRATUITO PARA SABER
SI USTED TIENE EL VIRUS DEL SIDA.

Si quiere saber adónde debe dirigirse para que le hagan
el análisis o para obtener más información sobre el SIDA,

LLAME AL

1-800-541-2437

Si necesita tratamiento de rehabilitación para drogadictos,
llame al **1-800-522-5353.**



State of New York
Department of Health
Albany, NY 12237

0265 (4/88)

19-5-95 = Ken Arnold, WTH