

## **La tuberculosis / ARCAT.**

### **Contributors**

ARCAT (Paris, France)

### **Publication/Creation**

2008.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/syqb9bqa>

### **License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

# La Tuberculosis



Para obtener más información  
contactar Arcat  
94-102, rue de Buzenval  
75020 Paris  
Tél. : 01 44 93 29 29  
Fax : 01 44 93 29 30  
E-mail : [hispano@arcat-sante.org](mailto:hispano@arcat-sante.org)



[www.arcat-sante.org](http://www.arcat-sante.org)

Con el apoyo de Inpes

La Tuberculosis es una enfermedad causada por un microbio llamado el bacilo de Koch (B.K.). Esta enfermedad sigue siendo muy frecuente, contagiosa y también puede causar la muerte si no se toma el tratamiento necesario. Los tratamientos actuales son muy simples y muy eficaces.

### **¿Cuáles son las personas con más riesgo?**

Cualquier persona puede verse afectada por ésta infección. El riesgo de desarrollar la enfermedad es aún más alto para los niños, los ancianos y los adultos inmunodeprimidos (con las defensas inmunitarias muy bajas). En Francia, los casos de Tuberculosis son más frecuentes en los grupos de personas extranjeras de bajo nivel socio-económico y viviendo en alojamientos muy precarios (por ejemplo, muchas personas conviviendo en espacios muy pequeños).

### **¿Cómo se transmite?**

El B.K. afecta primariamente a los pulmones (la Tuberculosis pulmonar es la más contagiosa) pero puede extenderse a otros órganos (riñones, huesos, cerebro...).

Un enfermo de tuberculosis contagioso puede transmitir el B.K. cuando habla, tose, estornuda, o escupe. El microbio estará entonces presente en el aire que los demás podrán respirar. De esta manera se puede transmitir la tuberculosis.



## ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis?

De manera general, los síntomas más frecuentes son:

- fiebre por la noche
- tos con flemas y posible presencia de sangre
- sudor nocturno
- baja de peso considerable
- cansancio
- falta de apetito

Los otros síntomas dependen de la localización de la enfermedad.

## ¿Cómo diagnosticar la tuberculosis?

- Con un examen médico
- Con una radiografía pulmonar
- Con el análisis del esputo en un laboratorio
- Con un test cutáneo (intradermoreacción)



## ¿Cómo curarse?

El tratamiento a base de antibióticos específicos es muy eficaz, la duración del tratamiento es de 6 meses a 1 año. Este tratamiento necesita un seguimiento muy regular.

Es muy importante tomar la medicación hasta el final, para no tener una recaída y desarrollar resistencias. ¡¡¡Jamás tienes que dejar de tomar el medicamento por tu propia cuenta!!!

Para curarse, es necesario tomar una combinación de medicamentos, una vez al día y cada 24 horas con el estómago vacío y siempre a la misma hora.





## **¿Cómo protegerse contra la tuberculosis?**

- Teniendo una vida sana e higiénica
- Vacunarse con una vacuna BCG
- Haciendo los exámenes necesarios en los centros de salud.

## **Consejos**

- No dude en consultar a su médico tratante, es el mejor consejero para su salud
- Siempre acudir a un especialista y no acudir a cualquier persona
- No se cure solo

## **Tuberculosis y VIH**

La infección por el VIH y la tuberculosis constituyen una combinación letal, ya que se refuerzan mutuamente. La infección por el VIH debilita el sistema inmunitario. La tuberculosis es una importante causa de mortalidad en la población VIH.

## **Direcciones útiles**

### **Centre Médico-social Edison**

Service de dépistage  
itinérant  
44 rue Charles-Moureu  
75013 Paris  
Tél. : 01 44 97 86 73  
Métro : Place d'Italie

### **Centre Médico-social Ridder**

3-5 rue Ridder  
75014 Paris  
Tél. : 01 58 14 30 30  
Métro : Plaisance

### **Centre Médico-social Boursault**

54 bis, rue Boursault  
75017 Paris  
Tél. : 01 53 06 35 60  
Métro : Rome

### **Centre Médico-social Belleville**

218 rue Belleville  
75020 Paris  
Tél. : 01 40 33 52 00  
Métro : télégraphe

### **CDDPS de Noisy-le-Grand**

4 mail Victor Jarra  
93160 Noisy-le-Grand  
Tél. : 01 43 04 66 00

### **CDDPS de Saint-Denis**

11 rue Daniel Casanova  
93200 Saint-Denis  
Tél. : 01 45 28 76 49

### **CDDPS de Villejuif**

143 rue Jean Jaurès  
94800 Villejuif  
Tél. : 01 53 14 14 00

### **CDDPS de Vitry-sur-Seine**

27 avenue M. Robespierre  
94400 Vitry-sur-Seine  
Tél. : 01 46 80 07 22

**No dude en contactarnos si desea más  
informaciones o un acompañamiento específico.**

**TEL. : 01 44 93 29 29**