

Il est séropo : avec lui je risque de prendre mon pied : préservatif, dépistage, traitement... c'est possible / Crips Île-de-France.

Contributors

Crips Île-de-France

Publication/Creation

[2012]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/zfwxsduj>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).


**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



IL EST SÉROPO
AVEC LUI JE RISQUE DE
PRENDRE MON PIED

Préservatif, dépistage, traitement... C'est possible

 crips

 LesFrance

C'EST POSSIBLE,

- Parce que** rejeter une personne parce qu'elle est séropositive, c'est me priver d'une belle rencontre.
- Parce qu'** avoir peur des personnes séropositives, c'est m'empêcher d'en parler du VIH et donc ne pas pouvoir adapter mes pratiques pour réduire les risques de transmission.
- Parce que** le préservatif, bien posé et lubrifié, est un moyen de prévention efficace pour avoir du plaisir avec une personne quelque soit son statut sérologique.
- Parce que** si le préservatif glisse, craque ou est oublié, le TPE (traitement post-exposition) est disponible aux urgences, si possible dans les 4h et au plus tard dans les 48h après la prise de risque.
- Parce qu'** avec une personne séropositive qui prend un traitement, a une charge virale indétectable et pas d'IST, le risque de transmission du VIH est quasi nul.
- Parce que** c'est avec une personne persuadée d'être séronégative mais qui vient de se contaminer que les risques sont les plus forts : c'est dans les premières semaines que la quantité de virus est la plus élevée.
- Parce qu'** une personne séropositive fait régulièrement des bilans médicaux, ses IST sont plus souvent dépistées. Elle est donc moins à risque de m'en transmettre.
- Parce qu'** au moindre doute, le dépistage me permet de connaître mon statut sérologique et d'être pris en charge si nécessaire.
- Parce que** si je ne suis toujours pas rassuré, des professionnels et des bénévoles peuvent m'écouter, m'informer, me conseiller et m'orienter.