

**D'amour et d'eau fraîche : Fred et Ludo vivent en couple depuis plusieurs mois et sint très amoureux. Le test du dépistage s'impose ... / Ministère de la Santé et de la Protection sociale ; INPES, Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé.**

### **Contributors**

France. Ministère de la Santé et de la Protection sociale  
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (France)

### **Publication/Creation**

[2004?]

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/pwnemg9z>

### **License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

## D'amour et d'eau fraîche

Fred et Ludo vivent en couple depuis plusieurs mois et sont très amoureux. Le test de dépistage s'impose...

C'est cool nous deux, non ?...

Je comprends pas, on est bien tous les 2, autant arrêter les capotes, non ?

Ouais... j'aurais jamais cru que ça m'arriverait...

Bon, demain on va faire un test ?

On devait pas faire un pique-nique ?...

Oui, c'est pas ça...

Ben, si vraiment on a envie d'aller voir ailleurs, on fait gaffe et voilà...

Ah bon, t'as envie d'aller voir ailleurs toi ?

Arrête ! c'est quoi le problème ?

Rien, juste que je suis pas sûr, à une époque j'étais pas au top, j'ai fait un peu n'importe quoi...

Allez justement, viens maintenant, il faut savoir, on va faire un test !

**49%** des personnes dont le sida a été diagnostiqué en 2003 ignoraient leur séropositivité, excluant toute prise en charge précoce de leur infection.

## JOUEZ LA CARTE DU DEPISTAGE

- **En cas de prise de risque :** rapport sexuel sans préservatif avec une personne de statut sérologique inconnu ou accident de préservatif pendant le rapport sexuel (déchirement ou glissement). Un premier test de dépistage du VIH/sida peut être réalisé quinze jours minimum après la prise de risque.
- **Et si vous souhaitez abandonner le préservatif dans le cadre d'une relation stable**

Consultez votre médecin traitant ou un médecin dans une consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG). Il existe au moins une CDAG par département.

Pour connaître l'adresse de la CDAG la plus proche :

Sida info service 0 800 840 800 ou [www.sida-info-service.org](http://www.sida-info-service.org)

### SI VOUS AVEZ PRIS UN RISQUE IL Y A MOINS DE 48 HEURES :

rendez-vous le plus tôt possible aux urgences d'un hôpital, si possible avec votre partenaire, en vue d'un traitement pouvant éviter la contamination.



Ministère de la Santé  
et de la Protection sociale

Institut National  
de Prévention  
et d'Éducation  
pour la Santé

**inpes**  
[www.inpes.sante.fr](http://www.inpes.sante.fr)