

Tu suces? #2, Pipe profiler / Le Kiosque Infos Sida.

Contributors

Kiosque Infos Sida Toxicomanie

Publication/Creation

[between 2010 and 2014?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ssskqvjg>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

TU SUCCES ?



#2

LA SYPHILIS

De quoi parle-t-on ?

D'une infection à bactérie, le « tréponème pâle ».

Est-elle fréquente ?

Oui, elle fait un retour en force dans la communauté gay depuis plusieurs années.

Comment ça se transmet ?

Facilement. Lors d'une fellation ou d'un rapport anal non protégés, par simple contact de la peau ou d'une muqueuse avec les lésions, situées le plus souvent au niveau du sexe, de l'anus et de la bouche.

Quels sont les signes ?

L'apparition, 2 à 4 semaines après la contamination, d'un chancre (plaie rosée, creuse et indolore) sur la zone d'entrée de la syphilis : le sexe, l'anus, dans la bouche ou la gorge (syphilis I). Très contagieuse, cette lésion peut passer inaperçue, surtout si elle se trouve au fond de la gorge ou de l'anus.

Attention : si le chancre disparaît sans traitement, Miss Syphilis est toujours là !

L'infection peut évoluer quelques semaines après (syphilis II) et se manifester par des boutons ou des taches rosées (roséole) sur le torse, les paumes, la plante des pieds, les muqueuses et provoquer de la fièvre. Mais il n'y a parfois aucun signe apparent...

Non soignée, elle peut évoluer vers une syphilis III, susceptible d'entraîner de graves atteintes au cerveau, au cœur ou aux articulations.

Ça se soigne ?

Très bien si diagnostiquée au stade I et II, par une injection d'antibiotique dans la fesse (gauche ou droite, au choix !).

Où et quand consulter ?

Régulièrement (surtout si tu as de nombreux partenaires) et rapidement en cas de lésion type chancre ou d'éruption cutanée type roséole. Le dépistage de la syphilis se fait par prise de sang. Tu peux consulter ton médecin, te rendre dans un centre de santé spécialisé ou dans un CIDDIST¹.

Fellation et syphilis : comment prévenir ?

Pendant la période contagieuse (chancre, boutons/taches sur le corps) et durant le traitement, évite les pipes. Si tu n'es pas infecté ou si tu l'ignores, la capote est ce qu'il y a de mieux contre la diffusion de la syphilis.

BONNES PRATIQUES DE LA FELLATION

Autant que possible, utilise un préservatif.

Si tu n'utilises pas de préservatif :

Toi suceur : avant et après la pipe, évite tout ce qui peut aggraver tes muqueuses buccales (brossage de dents, curage interdentaire, bains de bouche alcoolisés, etc.). Pense à la transmission indirecte lors de pratiques collectives : en suçant un partenaire qui a une IST² tu peux contaminer un autre partenaire sucé dans la foulée.

Enfin, évite d'avoir du sperme³ en bouche pour limiter le risque de contamination par le VIH.

Toi sucé : évite d'éjaculer dans la bouche de ton partenaire si tu n'es pas certain de ton statut vis-à-vis du VIH. Veille à l'hygiène de ta queue en la chouchoutant – sans excès – avec des produits lavants doux, non irritants.

1. Centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles

2. Infection sexuellement transmissible

3. Le VIH est également présent dans le liquide pré-séminal

VIH ET AUTRES IST

Les IST non soignées, dont la syphilis, peuvent augmenter le risque de contracter le VIH lors de rapports non protégés.

Si tu es séropositif, sois particulièrement vigilant car tu peux être plus sensible aux IST.

D'une façon générale, il est conseillé à tous de s'inspecter régulièrement bite, couilles, cul et gorge, et de se rendre chez le médecin pour des check-up réguliers. Une visite annuelle chez le proctologue est conseillée. Il faut pouvoir parler franchement avec son médecin de sa santé sexuelle.

Si c'est difficile, renseigne-toi auprès du Kiosque ou de Sida Info Service pour obtenir des contacts.



Le Kiosque Infos Sida
01 44 78 00 00
www.lekiosque.org

Sida Info Service
0 800 840 800

Réalisé
avec le soutien
financier de
l'INPES

PIPE PROFILER

1. Tu sucres :

- a/ Du bout d'la langue
- b/ Sans les mains (ni les dents !)
- c/ À pleine bouche

2. Le meilleur pour toi :

- a/ Sucrer
- b/ Sucrer **ou** être sucé
- c/ Sucrer **et** être sucé

3. Le meilleur moment c'est :

- a/ Avant la pénétration
- b/ Ça dépend du moment (et du mec !)
- c/ Avant, pendant, après...

4. Pour accompagner :

- a/ Une bonne masturbation avec des mains expertes
- b/ Une bonne crème chantilly
(5% M.G., pas plus, pour garder la ligne)
- c/ Un doigt dans le cul



Majorité de C - Pipe « gourmande »
Suceur ou sucé, cette pratique n'a plus
de secret pour toi : un vrai virtuose !

Majorité de B - Pipe « open »
Tu sucres selon la situation
et l'humeur, et tu es toujours prêt
à tenter de nouvelles expériences.

Majorité de A - Pipe « de velours »
Tout en douceur et subtilité, tu sais
éveiller différentes sensations.
Tu considères la pipe comme
un délicieux amusement-bouche.

SUCE ET ASTUCES

Conseils à prendre ou à laisser pour une bonne pipe

- Veille à ne pas blesser avec tes dents surtout si tu aimes mordre. Tu peux aussi serrer en utilisant tes lèvres.
- Tu peux serrer la base de sa bite d'une main pour la faire bander plus longtemps.
- Pour faire monter la pression, tu peux lui caresser la raie, les couilles ou lui pincer les tétons.
- Avec ta langue, tu peux t'attarder sur le gland, les couilles ou le périnée.
- En changeant de rythme tu peux varier et faire durer le plaisir... et respire avec le nez !
- L'endurance du suceur vient avec l'entraînement, alors ne lâche pas le morceau !
- Les échanges de regards peuvent rendre la situation plus excitante... Profites-en pour observer ses réactions et comprendre comment lui faire du bien.

Le petit ~~+~~ technique

Quand ton partenaire bande, sa bite pointe généralement vers le haut alors que ta gorge est courbée vers le bas. Pour ne pas te faire mal, le mieux est de vous allonger tête-bêche. Sa bite pouvant avoir une courbure plus ou moins marquée, à toi d'adapter ta position pour que la pipe soit la plus agréable possible pour vous deux.