

Qui vivra baisera ... : qui vivra aimera ... qui vivra jouira ... qui vivra verra : pour que dure le plaisir ... / réalisée à l'initiative du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité - Secrétariat d'État à la Santé et aux Handicapés et du CFES.

Contributors

France. Ministère de l'emploi et de la solidarité
France. Ministère de la santé publique
Comité français d'éducation pour la santé

Publication/Creation

[between 2010 and 2014?]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/dttjqubx>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>




QUI VIVRA BAISERA
POUR QUE DURE LE PLAISIR

VU PAR PHILIPPE LEVY



QUI VIVRA AIMERA
POUR QUE DURE LE PLAISIR

VU PAR JEAN-CHRISTOPHE POLIEN



QUI VIVRA JOUIRA
POUR QUE DURE LE PLAISIR

VU PAR BERNARD BENANT



QUI VIVRA VERRA
POUR QUE DURE LE PLAISIR

VU PAR MAI-LINH



POUR QUE DURE LE PLAISIR...

LE SAVIEZ VOUS ?

- Il y a toujours plusieurs milliers de contaminations par le VIH chaque année en France (entre 4000 et 6000).
- Les Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) sont en recrudescence parmi les homosexuels, certaines d'entre elles accroissent le risque de contamination par le VIH.
- L'utilisation de gel à base d'eau est recommandée pour les pénétrations anales, car elle limite les risques de déchirure du préservatif.
- Le partage d'objets d'hygiène (rasoir, brosse à dents, etc) peut donner lieu à un échange sanguin.
- Pour la fellation, le risque est faible quand il n'y a pas éjaculation dans la bouche de votre partenaire ; il est plus élevé avec éjaculation. Il est nul quand vous utilisez un préservatif.
- Les traitements contre le VIH n'empêchent pas la contamination de son ou de ses partenaires quand on est séropositif.
- Même quand sa charge virale est indétectable, une personne séropositive peut transmettre le virus du sida.
- Si les deux partenaires sont séropositifs, il est fortement conseillé d'utiliser des préservatifs. Il existe de très nombreuses souches de VIH, certaines étant plus virulentes que d'autres. La surcontamination par un virus différent de celui existant chez une personne infectée peut altérer les défenses immunitaires de cette personne et aggraver la maladie ou entraîner des résistances aux traitements.

SI VOUS AVEZ PRIS UN RISQUE : LE DÉPISTAGE

- Si vous avez pris un risque - pénétration anale sans préservatif (active ou passive), rupture du préservatif, fellation avec éjaculation dans la bouche - allez le plus tôt possible, dans les heures qui suivent et avant 48h, dans le service des urgences d'un hôpital (ouvert 24h/24).

Le médecin évaluera avec vous le risque et vous proposera éventuellement un traitement d'un mois, pris en charge à 100 %, qui peut empêcher la contamination. Allez-y avec votre partenaire si cela est possible. Au moindre doute, demandez conseil au médecin de votre choix ou dans une CDAG (Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit).

VOUS VIVEZ UNE RELATION STABLE ET VOUS VOULEZ ABANDONNER LE PRÉSERVATIF

- Si, au cours des 3 derniers mois, vous avez eu systématiquement des rapports protégés, vous pouvez faire un test de dépistage. Sinon, vous devez attendre en protégeant vos relations. Désormais on peut détecter la présence du virus 15 jours après la prise de risque, mais il faut attendre trois mois pour être sûr d'être séronégatif.

Vous et votre partenaire pouvez consulter un médecin de votre choix, en ville, à l'hôpital ou dans une CDAG (Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit). Il vous prescrira à chacun un test de dépistage.

→ Si le résultat de votre test et celui de votre partenaire sont négatifs, vous êtes séronégatifs tous les deux. Vous pouvez donc arrêter d'utiliser des préservatifs au sein de votre couple mais vous devez continuer à vous protéger avec d'autres partenaires.

→ Si le résultat de votre test est positif, consultez un spécialiste. Il commencera un suivi médical et vous pourrez bénéficier, quand cela sera nécessaire, d'un traitement efficace. Protégez-vous systématiquement y compris au sein de votre couple et lors de vos rencontres occasionnelles.

- N'oubliez pas : le test de votre partenaire ne peut pas vous renseigner sur votre séropositivité ou votre séronégativité. A chacun son test.

NUMÉROS UTILES

Si vous vous posez des questions, si vous voulez en parler :

• **Sida Info Service :** 0800 840 800

Confidentiel, anonyme et gratuit, 24h/24.

• **Hépatites Info Service :** 0800 845 800

Confidentiel, anonyme et gratuit.

• **Ligne Azur :** 0801 20 30 40

Pour ceux qui s'interrogent sur leur sexualité. Du lundi au samedi de 17h à 21h.

• **Fil Santé Jeunes :** 0800 235 236

Confidentiel, anonyme et gratuit, de 8h à minuit.

Autres numéros :

• **Ecoute Gaie :** 01 44 93 01 02

Lundi, mercredi, jeudi : de 20h à 22h. Mardi et mercredi de 18h à 20h.

• **Centre Gai et Lesbien de Paris :** 01 43 57 21 47

Tous les jours de 14h à 20h.

• **Association des Médecins Gais :** 01 48 05 81 71

Mercredi de 18h à 20h. Le samedi de 14h à 16h.

Les photos ont été réalisées par MAI-LINH, PHILIPPE LÉVY, BERNARD BENANT ET JEAN-CHRISTOPHE POLIEN



Carte réalisée à l'initiative du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité -
Secrétariat d'Etat à la Santé et aux Handicapés et du CFES.

**Le sida
on en
meurt
encore.**