

Sida et traitement d'urgence : demandez conseil: Sida Info Service... / ill.: P. Ouin.

Contributors

Ouin, Pierre

Publication/Creation

[between 2004 and 2014?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/nng35ygw>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

SIDA ET TRAITEMENT D'URGENCE



Demandez conseil :

SIDA Info Service

HÉPATITES Info Service

DROGUES ALCOOL TABAC Info Service

0 800 840 800

0 800 845 800

113

Le traitement postexposition vise à réduire le risque de contamination par le VIH, après :

- avoir partagé du matériel d'injection (seringue, filtre, cuiller, « soupe »),
- avoir eu un rapport sexuel non ou mal protégé (pénétration sans préservatif, mauvaise pose ou déchirure du préservatif).

Pour évaluer les risques pris et bénéficier de ce traitement, vous devez vous rendre **le plus vite possible** après la prise de risque (dans les 48 heures) au service des urgences de l'hôpital le plus proche.

Un médecin évaluera avec vous le risque pris et l'intérêt de vous prescrire le traitement.

Si un traitement est prescrit, vous devez le suivre pendant 4 semaines pour obtenir la plus grande efficacité. Le traitement est gratuit.

Le traitement postexposition réduit mais n'élimine pas totalement le risque de contamination.



« A CHAQUE SHOOT, MATÉRIEL NEUF (SERINGUE, FILTRE, COTON, EAU, CUILLER) - A CHAQUE RAPPORT SEXUEL, UN PRÉSERVATIF »