

**VIH : traitement post-exposition : en cas d'exposition possible au VIH, vous avez 48 heures pour tenter de vous en sortir / Sida Info Service ... [and 6 others].**

**Contributors**

Sida Info Service

**Publication/Creation**

[between 2004 and 2014?]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/pdehn4r5>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



## **Traitement Post - Exposition**

En cas d'exposition possible au VIH, vous avez 48 heures pour tenter de vous en sortir.

# « Traitement Post-Exposition »

## Lisez attentivement la notice.

Le Traitement Post-Exposition permet de réduire les risques de contamination par le VIH, en cas de prise de risque (rapport anal non protégé, éjaculation dans la bouche, etc.).

Rendez-vous le plus vite possible (au mieux dans les quatre heures), et au plus tard dans les 48 heures, aux urgences de l'hôpital le plus proche. Si possible, venez accompagné de la personne avec qui vous avez eu le rapport sexuel à risque. Un médecin évalue avec vous le risque pris et l'intérêt de vous prescrire le traitement, au regard des recommandations officielles.

Le traitement associe deux ou trois antirétroviraux, et dure quatre semaines. Il peut provoquer des effets secondaires importants. Le TPE réduit le risque de contamination mais ne l'élimine pas complètement. Le préservatif reste le seul moyen de se protéger efficacement du VIH.

En cas de rupture de préservatif, il est important que les partenaires fassent un point sur l'accident et qu'une personne qui se sait atteinte incite son partenaire à se rendre aux urgences afin de consulter un médecin.

**Faites le test. Protégez-vous.**

