

**Prise de risque: que faire? : en cas de prise de risque: ... rapport non protégé, rupture de préservatif : le T.P.E. (Traitement Post Exposition) : 48h pour agir / SNEG, santé et prévention.**

**Contributors**

Syndicat national des entreprises gaies

**Publication/Creation**

[between 2000 and 2014?]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/kbercbwy>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

**Prise de risque :**  
**QUE FAIRE ?**

En cas de prise de risque :  
... rapport non protégé  
rupture de préservatif ...

**LE T.P.E.**  
(*Traitement Post Exposition*)



## T.P.E. (TRAITEMENT POST EXPOSITION) :

**C'est quoi ?** Le T.P.E. est un traitement anti-rétroviral temporaire de 4 semaines. Le but est de diminuer le risque d'infection par le VIH immédiatement après un risque d'exposition.



**Pour qui ?** Il concerne les personnes séronégatives ou qui ne connaissent pas leur statut sérologique.

**Où ?** Rendez-vous le plus vite possible aux urgences de tout hôpital (au mieux dans les 4 heures et au plus tard dans les 48 heures) de préférence avec votre partenaire. Le médecin évaluera avec vous le risque pris et l'intérêt de vous prescrire un traitement post exposition. Ce traitement réduit le risque de contamination par le VIH mais il ne l'élimine pas complètement.





**TEST :** Si la prise de risque date de plus de 48 heures, faites-vous dépister. L'infection peut être détectée dès le 15<sup>ème</sup> jour. Si le résultat du test est négatif, ce n'est que 6 semaines après la prise de risque qu'un autre test permettra de savoir avec certitude que vous n'êtes pas atteint par le VIH.



**PROTECTION :** entre la prise de risque et votre prochain test de dépistage, il est important d'utiliser le préservatif, avec tous vos partenaires.

**DIALOGUE :** Si vous aviez arrêté le préservatif avec votre partenaire régulier, il est important de discuter de votre prise de risque et de la nécessité de vous protéger à nouveau dans l'attente de votre test de dépistage.



## Où trouver d'autres informations ?

... Auprès de SIDA INFO SERVICE

Tél. 0 800 840 800 - [www.sida-info-service.org](http://www.sida-info-service.org)

... Dans les Centres de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG)  
ou les Centre d'Information, de Dépistage et de Diagnostic  
des Infections Sexuellement Transmissibles (CIDDIST)

... Auprès de votre médecin traitant



*Partenaire des lieux festifs*  
**[www.sneg.org](http://www.sneg.org)**