

www.histoiresdemecs.org ... : merci à l'ensemble des exploitants mobilisés autour des actions de prévention / SNEG prévention, Xavier Gickel [illustration].

Contributors

Gickel, Xavier
Syndicat national des entreprises gaies

Publication/Creation

2010.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/n3zbbhb6>

License and attribution


Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



LE TRAITEMENT POST-EXPOSITION



1 DÉFINIR UNE PRISE DE RISQUE :

> Rapport sexuel non protégé (ou en cas de rupture du préservatif) avec une personne de statut sérologique positif ou inconnu.

> Partage de matériel d'injection (par exemple lors de l'usage de drogues injectables) et/ou de pailles à sniff.

2 SI VOUS PENSEZ AVOIR PRIS UN RISQUE, réagissez IMMEDIATEMENT

(et jusqu'à 48 heures maximum) en vous rendant aux urgences d'un hôpital.

N'hésitez pas à joindre **Sida Info**

Service au 0800 840 800 (24h/24)

qui vous indiquera les hôpitaux de proximité prenant en charge les situations à risque VIH. Si possible, demandez à votre (vos) partenaire(s) de vous accompagner. Afin de faciliter l'évaluation du risque, il est toujours

> Prénom

> Nom

> Portable

> Mail

> Facebook



Partenaire de la Vie Gay
www.sneg.org

*Merci à l'ensemble
des exploitants
mobilisés autour
des actions de
prévention.*



mieux de connaître le statut sérologique de son (ses) partenaire(s) et de pouvoir le (les) contacter au besoin.

3 UNE FOIS SUR PLACE, précisez que vous venez pour une prise de risque VIH. Demandez à voir le médecin rapidement. Il évaluera avec vous le risque de contamination et vous prescrira si besoin un traitement d'urgence appelé **TPE** (traitement post-exposition) : pris de manière optimale, il réduit fortement le risque de transmission du VIH. Attention, ce traitement est contraignant (effets indésirables) et doit être pris tous les jours pendant un mois.



Le Kiosque

36, rue Geoffroy L'Asnier

75004 Paris

Tél. : 01 44 78 00 00

www.lekiosque.org

Avec le soutien de l'INPES.



LE DÉPISTAGE
**POURQUOI ET
COMMENT CONNAÎTRE
SON STATUT
SÉROLOGIQUE ?**

1 CONNAÎTRE VOTRE STATUT

SÉROLOGIQUE par rapport au VIH/sida vous permettra de savoir où vous en êtes après une prise de risque. C'est aussi essentiel si vous souhaitez ne plus utiliser le préservatif avec votre partenaire stable. Connaître son statut permet d'établir une stratégie de prévention adaptée et, en cas de séropositivité au VIH, d'initier une prise en charge médicale précoce.

2 LES TESTS ACTUELS :

> Le test Elisa de 4^e génération, réalisé à partir d'une prise de sang, détecte à la fois les anticorps produits par l'organisme et l'antigène P24 du VIH. Sa fiabilité est optimale 6 semaines après l'exposition au risque.

> Le test rapide du VIH permet, par prélèvement d'une goutte de sang au bout du doigt, d'obtenir un résultat en moins de 30 minutes. Il détecte les anticorps

et son résultat est parfaitement fiable 3 mois après l'exposition au risque. En cas de séropositivité détectée un second test de confirmation est utilisé : le Western Blot ou l'Immuniblot.

- 3 LE TEST DE DÉPISTAGE DU VIH** est réalisable dans les consultations de dépistage anonyme et gratuit (CDAG). Vous pouvez également vous rendre dans un laboratoire d'analyses médicales avec une prescription médicale. Pour connaître la CDAG la plus proche de chez vous ou les associations proposant le dépistage rapide du VIH : **Sida Info Service au 0 800 840 800** ou **Le Kiosque au 01 44 78 00 00**.



Le Kiosque
36, rue Geoffroy L'Asnier
75004 Paris
Tél. : 01 44 78 00 00
www.lekiosque.org
Avec le soutien de l'INPES.